


一
提
金
法
截
仁
綱


醫
統
正
脈
三
廿
七


三	九	三	七	漢
函	架	冊	號	書
架	冊	號	類	

一	二	九	漢
三	一	二	書
二	〇	二	門
冊	架	函	類
架	冊	號	

內閣文庫	番號	漢	12974
	冊數	32 (31)	
	函號	301	58







殺車槌法卷之三



餘杭節菴陶華述

新安吳中珩校

吾專傷寒深明奧旨脉正則道合神機用藥則隨手
取應的本續論全備發明殺車槌法世之罕有永為
養生之寶矣今將秘驗三十七方就註三十七槌法
二十條煎法二十條劫病并製解法名殺車槌也實
為我肺臍不傳之妙我後子孫一字不可輕露莫與
俗人言莫使庸醫見爾宜謹慎珍藏毋違我之致囑

也

劫病法

一傷寒發狂奔走人難制伏先於病人處生火一盆用醋一碗傾於火上其煙冲鼻入內即安方可察其陽狂陰燥親切用藥無差若初起頭疼發熱惡寒方除已後登高而歌棄衣而走踰垣上屋罵詈叫喊大渴欲死脈來有力乃因邪熱傳裏陽盛發狂當用寒藥下之此為陽狂凡見舌卷囊縮者不治若病起無頭疼身微熱面赤戴陽煩燥脈來沉微無力欲坐臥於泥水中乃因寒熱而發燥即陰證似陽當用熱藥

濕之此為陰燥凡見厥冷下利譫語者不治醫者不看脈以虛陽上膈而燥誤為實熱反與涼藥使渴盛燥急則氣消成大害矣須詳脈來有力無力此為良法

傷寒腹中痛甚將凉水一盞與病人飲之其痛稍可者屬熱痛當用涼藥清之清之不已而或達臍硬痛大便結實煩渴屬燥屎痛急用寒藥下之若食積痛同治法若小腹硬痛小水自利大便黑身目黃者屬蓄血痛亦用寒劑加行血藥下盡黑物則愈此三者皆痛隨利減之法也

若飲水愈加作痛屬寒痛當用溫藥和之和之不已
而或四肢厥冷腹痛嘔吐瀉利急用熱藥救之須詳
脈來有力無力此爲良法

傷寒直中陰經真寒證甚重而無脈或吐瀉脫元而
無脈將好酒薑汁各半盞與病人服之其脈來者可
治當察其陰用藥不拘脈浮沉大小但指下出見者
生如用此法脈不至者必死又當問病人有何疼痛
處若有痛證要知痛甚者脈必伏宜隨病制宜如無
痛證用此法而脈至者此爲吉兆尤當問病人若平
素原無正取脈須用覆手取之脈必見也此屬反關

脈診法與正取法同若平素正取有脈後因病診之
無脈者亦當覆手取之

取之而脈出者陰陽錯亂也宜和合陰陽如覆取正
取俱無脈者必死矣此爲良法

一傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑俱用井水浸青布
片於舌上洗淨後用生薑片子時時浸水刮之其胎
自退凡見舌生黑胎芒刺者必死此熱毒入深十有
九死是腎水尅心火也若發黃者用生薑時時週身
擦之其黃自退若心胸脇下有邪氣結實滿悶硬痛
又法用生薑一觔搗渣去汁炒微燥帶潤用絹包於

患處款款熨之稍可又將渣和均前汁炒乳再熨許久豁然寬快俱為良法

一傷寒鼻衄成流久不止者將山梔炒黑色為細末次入鼻內外將水紙搭於鼻冲其血自止若點滴不成流者其邪在經未解照後秘方用藥不在此法

一傷寒熱邪傳裏服轉藥後鹽炒麩皮一升將絹包於病人腹上款款熨之使藥氣得熱則行大便秘通矣

一傷寒吐血不止用韭汁磨京墨呷下其血見黑必止如無韭汁用鷄子清亦可正謂赤屬火而黑屬水

也

一傷寒直中陰經真寒證或陰毒證身如被杖腹中絞痛嘔逆沉重不知人事四體堅冷如石手指甲唇青藥不得入口六脉沉細或無脉欲絕者將葱縛一握切去根葉取白三寸許搗如餅先用射香半分填於臍中後放葱餅臍上以火熨之連換二三餅稍醒確入生姜汁煎服回陽救急湯如不醒再灸關元氣海二三十壯使熱氣通其內逼邪出於外以復陽氣如用此法手足溫汗不出不省人事者必死也此為良法

一傷寒熱病熱邪傳裏亢極無解用黃連煎水一盞放井中頭冷浸青布搭在胸中徐徐換之待熱勢稍退即除不可久漬夏天用此法冬天不宜用

一傷寒服藥轉吐出不納者隨用竹管重捺內關後將生姜自然汁半盞熱飲其吐即止大凡服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑溫和服之如要取汗雖辛甘之劑亦宜熱服如要止汗雖辛甘溫之劑亦宜溫服此為良法

一中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者先用皂莢末燃紙燒煙沖入鼻中有嚏可治隨用吐痰法將皂

莢末五分半夏白礬各三分為細末姜汁調服探吐後服導痰湯加減治之無嚏不可治此為良法

一治乾霍亂不得吐者用滾湯一碗入皂莢末三分鹽一撮調服探吐莫與米湯設若與之即死是穀氣反助邪氣也

一中寒卒倒昏迷不省者先用熱酒姜汁各半盞灌入稍醒後服加味理中飲為效如不飲酒人止用姜汁灌之依法調治此證冬月甚有之餘月幾希矣

製藥法

一用附子去皮臍先將鹽水姜汁各半盞用沙鍋煮

七沸後入黃連甘草各半兩再加童便半盞再煮七沸住火良久撈起入磁器盛貯伏地氣一晝夜取出曬乾以備後用庶無毒害頂圓臍正一兩一枚者佳此為良法

一用川大黃須錦紋者佳剉成飲片用酒拌均燥乾以備後用不傷陰血如年壯實熱者生用不須製之此為良法

一用麻黃去節先滾醋湯略浸片時撈起以備後用庶免太發如冬月嚴寒腠理至密當生用者不須製之此為良法

一用茱萸將鹽水拌均炒燥以備後用庶無小毒此為良法

解藥法

一用附子後身目紅者乃附毒之過用蘿蔔搗水瀉汁二大盞入黃連甘草各半兩犀角三錢煎至八分飲之以解附毒其紅即除如解遲必血從耳目口鼻出者必死無蘿蔔用蘿蔔子搗水取汁亦可此為良法如無蘿蔔子用澄清泥漿水亦可也

一用大黃後瀉利不止者用烏梅二箇炒粳米一撮乾姜三錢人參炒白朮各半兩生附子皮一錢半甘

草一錢升麻少許燈心一握水二大鍾去滓後入炒陳壁土一匙調服即止取土氣以助胃氣也此為良法

一用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露出外用炒糯米半升龍骨牡礪藁本防風各一兩研為細末週身撲之隨後秘方用藥免致亡陽而死為良法

煎藥法

一用發汗藥先煎麻黃一二沸後入餘藥同煎
一用止汗藥先煎桂枝一二沸後入餘藥同煎

一用和解藥先煎柴胡一二沸後入餘藥同煎
一用下藥先煎滾水入枳實一二沸後入餘藥同煎
一用溫藥先煎乾姜一二沸後入餘藥同煎
一用行血藥先煎桃仁一二沸後入餘藥同煎
一用利水藥先煎猪苓一二沸後入餘藥同煎
一用止瀉藥先煎炒白朮一二沸後入餘藥同煎
一用消渴藥先煎天花粉一二沸後入餘藥同煎
一用止痛藥先煎白芍藥一二沸後入餘藥同煎
一用發黃藥先煎茵陳一二沸後入餘藥同煎
一用發斑藥先煎青黛一二沸後入餘藥同煎

一用發狂藥先煎石膏一二沸後入餘藥同煎

一用嘔吐藥先煎半夏一二沸後入餘藥同煎

一用勞力感寒藥先煎黃耆一二沸後入餘藥同煎

一用感冒傷寒藥先煎羌活一二沸後入餘藥同煎

一用暑證藥先煎香薷一二沸後入餘藥同煎

一用風病藥先煎防風一二沸後入餘藥同煎

一用腹如雷鳴藥先煎煨生姜一二沸後入餘藥同煎

一用濕證藥先煎蒼朮一二沸後入餘藥同煎

秘用三十七方就註三十七槌法

升麻發表湯 即麻黃湯自有加減法

治冬月正傷寒頭痛發熱惡寒脊強脉浮緊無汗為

表證此足太陽膀胱經受邪當發汗以頭如斧劈身

如火熾者宜用此湯

麻黃

桂枝

甘草

杏仁

升麻

川芎

防風

白芷

羌活

本經發熱惡寒頭痛無汗而喘者本方加乾葛去升

麻

本經發熱惡寒身體痛者本方加蒼朮芍藥去杏仁

本經惡寒發熱身痒面赤者以其不得小汗出故也
本方去白芷杏仁加柴胡芍藥

本經頭痛發熱惡寒腦中飽悶者本方加枳殼桔梗
本經感寒深重服湯不作汗者宜再服至二三劑而
汗不出者死

本經汗後不解者宜再服量證輕重用麻黃升麻分
多寡爲當

水二鍾姜三片葱白二莖槌法加江西豆豉一撮煎
之熱服取汗如神宜厚被覆首凡中病即止不得多
服多則反加別病矣

疎邪實表湯 即桂枝湯自有加減法

治冬月正傷風頭痛發熱惡寒春強脈浮緩自汗爲
表證此足太陽膀胱經受邪當實表散邪無汗者不
可服

桂枝 赤芍藥 甘草 防風

川芎 羌活 白朮

如汗不止加黃耆 喘加柴胡杏仁

腦中飽悶加枳殼桔梗

水二鍾姜三片棗二枚槌法加膠飴二匙煎之溫服
羌活冲和湯 以代桂枝麻黃青龍各半等湯此太

陽經之神藥也

治春夏秋非時感冒暴寒頭痛發熱惡寒春強無汗
脈浮緊此足太陽膀胱經受邪是表證宜發散不與
冬時正傷寒全治法此湯非獨治三時暴寒春可治
溫夏可治熱秋可治濕治雜證亦有神也秘之不與
庸俗知此奇妙耳本方自有加減法備開于後

羌活 壹錢

防風 壹錢

蒼朮 壹錢

黃芩 壹錢

川芎 壹錢

白芷 壹錢

甘草 壹錢

生地黄 壹錢

細辛 伍分不可多

如腦中飽悶加枳殼桔梗去生地黄

夏月本方加石膏知母名神木湯如服此湯後不作
汗本方加蘇葉喘而惡寒身熱本方加杏仁生地黄
汗後不解宜再服汗下兼行加大黃金底抽薪之法
其春夏秋感冒非時傷風亦有頭痛惡寒身熱脈浮
緩自汗宜實表本方去蒼朮加白朮汗不止加黃耆
即加減冲和湯再不止以小柴胡加桂枝芍藥一錢
如神

水二鍾姜三片棗二枚煎至一鍾槌法加葱白搗汁
五匙入藥再煎一二沸如發汗用熱服止汗用溫服
柴葛解肌湯 即葛根湯本湯自有加減法

治足陽明胃經受證目疼鼻乾不眠頭疼眼眶痛脈
來微洪宜解肌屬陽明經病其正陽明腑病別有治
法

柴胡

乾葛

甘草

黃芩

芍藥

羌活

白芷

桔梗

本經無汗惡寒甚者去黃芩加麻黃冬月宜加春宜
少夏秋去之加蘇葉

本經有汗而渴者治法開在如神白虎湯下
水二鍾姜三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之執
服

柴胡雙解飲 即小柴胡湯本方自有加減法

治足少陽膽經受證耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脈來
弦數屬半表半裏宜和解此經膽無出入有三禁不
可汗下吐也止有小柴胡一湯隨病加減再無別湯

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參

陳皮

芍藥

本經證小便不利者加茯苓

本經嘔者入姜汁竹茹 脇痛加青皮

痰多加瓜蒌仁貝母寒熱似瘧者加桂枝

渴者加天花粉知母

齒燥無津液加石膏 嗽者加五味金沸草壞證加
鰲甲

本經證心下飽悶未經下者非結胸乃表邪傳至胸
中未入乎腑證雖滿悶尚爲在表只消小柴胡加枳
桔未效就以本方對小陷胸加枳桔一服豁然其妙
如神秘之不與俗人言之耳虛煩類傷寒證本方加
竹葉炒粳米

本經與陽明合病本方加葛根芍藥如拾芥
婦人熱入血室加當歸紅花
男子熱入血室加生地黃

老婦人傷寒無表證其熱勝者本方加大黃甚者加
芒硝

水一鍾姜一片棗二枚槌法入生艾汁三匙煎之溫
服

桂枝大黃湯 卽桂枝湯內加大黃本方自有加減
法

治足太陰脾經受證腹滿而痛咽乾而渴手足溫脈
來沉而有力此因邪熱從陽經傳入陰經也

桂枝 赤芍藥 甘草 大黃
枳實 柴胡

本經腹滿不惡寒而喘者加大腹皮去甘草

水二鍾姜一片棗二枚煎之臨服槌法入栝柳磨水

二匙熱服

加味理中飲 即理中湯本方自有加減法

治足太陰脾經受證自利不渴手足溫身無熱脈來

沉而無力此屬臟寒

乾姜

白朮

人參

甘草

肉桂

陳皮

茯苓

厥陰消渴氣上衝心飢不欲食食即吐蛇腹痛大便實者本方加大黃蜜少許利之

本經腹滿時減者依本方去甘草

本經嘔吐者入半夏姜汁

本經蹇臥沉重利不止少加附子

利後身體痛者急溫之加附子

自利腹痛者入木香磨姜汁調服和之

水二鍾姜一片棗二枚煎之臨服槌法入炒陳壁土

一匙調服取土氣以助胃氣

茵陳將軍湯 即茵陳湯本方自有加減法

治足太陰脾經腹滿身目發黃小水不利大便實發

渴或頭汗至頸而還脈來沉重者宜用

大黃

茵陳

山梔

甘草

厚朴

黃芩

枳實

大便自調者去大黃厚朴加大腹皮利小便清為效

水二鍾姜一片棗法加燈心一握煎之熱服

導赤散 即五苓散本方自有加減法

治小水不利小腹滿或下焦蓄熱或引飲過多或小

水短赤而渴脉沉數者以利小便為先惟汗後亡津

液與陽明汗多者則以利小便為戒

茯苓

豬苓

澤瀉

桂枝

白朮

甘草

滑石

山梔

中濕身目黃者加茵陳 水結胸證加木通燈心如

小水不利而見頭汗出者乃陽脫也

得病起無熱但譫語煩燥不安精采不與人相當此

湯治之

水二鍾姜一片燈心二十莖棗法入鹽二字調服

六乙順氣湯

以代大承氣小承氣調胃承氣大柴胡三乙承氣湯

大陷胸等湯之神藥也舉世無人知此奇妙耳秘之

莫與俗人言本方自有加減法備開

此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫

語揭衣狂妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗胸腹滿
硬遶臍疼痛等證悉皆治之效不盡述

大黃

枳實

黃芩

厚朴

甘草

柴胡

芒硝

芍藥

潮熱自汗譫語發渴揚手擲足揭去衣被狂妄斑黃
大便實者俱屬正陽明胃腑病依本方
口燥咽乾大便實者屬少陰依本方

下利純清心下硬痛而渴者屬少陰依本方
怕熱發渴譫妄手足乍冷乍溫大便實者陽厥證屬
厥陰依本方舌卷囊縮者難治須急下之

譫語發渴大便實遶臍硬痛者有燥屎依本方

熱病目不明謂胃水已竭不能照物病已篤矣惟宜
急下依本方目中不了了即目不明也

轉屎氣者謂下泄也有燥屎焉當下之依本方如更
衣者止後服不必盡劑不更衣者宜再少與大便通
者愈

結胸證心下硬痛手不可近燥渴譫語大便實者依
本方去甘草加甘遂桔梗凡傷寒過經及老弱并血
氣兩虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或
有表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去

芒硝下之則吉蓋恐轉藥硝性燥急故有此戒大凡傷寒邪熱傳裏結實瀕看熱氣淺深用藥今之庸醫與俗醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣余謂傷寒之邪傳來非一治之則殊耳病有三焦俱傷者則痞滿燥實堅全俱宜大承氣湯厚朴苦溫以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹寒以潤燥軟堅大黃苦寒以泄實去熱病斯愈矣邪在中焦則有燥實堅三證故用調胃承氣湯以甘草和中芒硝潤燥大黃泄實不用枳朴恐傷上焦虛無氤氳之元氣調胃之名自

此然矣上焦受傷則痞而實用小承氣湯枳實厚朴之能除痞大黃之泄實去芒硝不傷下焦血分之真陰謂不伐其根本也若夫大柴胡湯則有表證尚未除而裏證又急不得不下者只得以此湯通表裏而緩治之猶有老弱及血氣兩虛之人亦宜用此故經云轉藥孰緊有芒硝者緊也大承氣最緊小承氣次之調胃承氣又次之大柴胡又次之其大柴胡加大黃小柴胡加芒硝方爲轉藥蓋爲病輕者設也仲景又云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

右先將水二鍾滾三沸後入藥煎至八分槌法臨時
服入鐵繡水三匙調服立效取鐵性沉重之義最能
隆熱開結有神此千金不傳之秘若非吾之子孫承
繼焉肯泄露玄機故戒耳

如神白虎湯 即白虎湯本方自有加減法
治身熱渴而有汗不解或經汗過渴不解脈來微洪
宜用

石膏 知母 甘草 人參
山梔 麥門冬 五味子

心煩者加竹茹一團如大渴心煩背惡寒者依本方

去山梔加天花粉無渴不可服此藥為大忌水二
棗一枚姜一片槌法加淡竹葉十片煎之熱服

三黃石膏湯

此湯治陽毒發斑身黃如塗朱眼珠如火狂叫欲走
六脈洪大燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不解已成
壞證表裏皆熱欲發其汗病熱不退又復下之大便
遂頻小便不利亦有錯治溫證而成此證者又八九
日已經汗下後脈洪數身壯熱拘急沉重欲治其內
由表未解欲發其表則裏證又急趨趨不能措手待
斃而已殊不知熱在三焦閉塞經絡津液榮衛不通

後重道法 卷三 十一

遂成此證又治汗下後三焦生熱脈洪譫語不休晝夜喘息鼻時加衄身目俱黃狂叫欲走者通用此湯治之有神人所不識

石膏 壹兩半

黃芩

黃連

黃柏 各柒錢

山梔 叁拾箇

麻黃

香豉 貳合

水二鍾姜三片棗一枚槌法入細茶一撮煎之熱服

三黃巨勝湯

此湯治陽毒發斑狂亂妄言大渴叫喊目赤脈數大便燥實不通上氣喘急舌卷囊縮難治者權以此湯

劫之三黃石膏湯內去麻黃豆豉加大黃芒硝是也

水二鍾姜一片棗二枚煎之槌法臨服入泥漿清

水二匙調服即安

冲和靈寶飲

治兩感傷寒起於頭痛惡寒發熱口燥舌乾以陽先受病多者以此湯探之中病即愈

羌活

防風

川芎

生地黃

細辛

黃芩

柴胡

甘草

乾葛

白芷

石膏

水二鍾煨生姜三片棗二枚槌法入黑豆一撮煎之

溫服取微汗爲愈如不愈表證多而甚急者方可用
麻黃葛根爲解表如裏證多而甚急者先以調胃承
氣爲攻裏是也

如以陰經自中病發熱下利身疼痛脈沉細無力不
渴倦臥昏重者又當先救裏溫之回陽救急湯是分
表裏寒熱而治此其權變大法也歟古云兩感雖爲
死證猶有可救之理及用藥先後寒熱之劑若發表
攻裏一誤則枉死者多矣良可惜哉深可惜哉予將
不傳之妙秘驗之方盡吐盡非惟救人有功亦且陰
騭匪輕謹之慎之母怠毋忽

桃仁承氣對子 即桃仁承氣湯本方自有加減法
治熱邪傳裏熱蓄膀胱其人如狂小水自利大便黑
小腹滿痛身目黃譫語燥渴爲蓄血證脈沉有力宜
此湯下盡黑物則愈未服前而血自下者爲欲愈不
宜服

桃仁

桂枝

芒硝

大黃

芍藥

柴胡

青皮

當歸

甘草

枳實

水二鍾姜三片煎之臨服槌法入蘇木煎汁三匙
調服

消斑青黛飲

治邪熱傳裏裏實表虛血熱不散熱氣乘於皮膚而為斑也輕則如疹子重則如銀紋重甚則斑爛皮膚或本屬陽誤投熱藥或當下不下或下後未解皆能致此不可發汗重令開泄更加斑爛也然而斑之方蕈與蚊迹相類發斑多見於胸腹蚊迹只在於手足陽脈洪大病入昏憤先紅後赤者斑也脈不洪大病入自靜先紅後黃者蚊迹也其或大便自利拂鬱氣短燥屎不通又如果實壓胃者盧醫復生不能施其巧矣凡汗下不解足冷耳聾煩悶欬嘔便是發斑之候

黃連

甘草

石膏

知母

柴胡

玄參

生地黃

山梔

犀角

青黛

人參

大便實者去人參加大黃

右水二鍾姜一片棗二枚煎之棗法臨服入苦酒

一匙調服

生地芩連湯

此湯治鼻衄成流久不止者或熱毒入深吐血不止者宜用

黃芩

山梔

桔梗

甘草

生地黄

黃連

柴胡

川芎

芍藥

犀角

如無升麻代之

外用劫法水紙搭於鼻冲

如去血過多錯語失神撮空閉目不知人事者同治法

水二鍾棗二枚煎至八分槌法隨服入茅根搗汁磨

京墨調飲如無茅根以藕搗汁亦可

加味犀角地黄湯

此湯治煩燥漱水不下咽者屬上焦有瘀血宜用

犀角

生地黄

牡丹皮

芍藥

甘草

桔梗

陳皮

紅花

當歸

水二鍾姜二片煎之臨服槌法入生藕節搗汁三

匙溫服

回陽救急湯

即四逆湯本方自有加減法

治寒邪直中陰經真寒證初病起無身熱無頭疼止惡寒四肢厥冷戰慄腹疼吐瀉不渴引衣自蓋蹠臥沉重或手指甲唇青或口吐涎沫或至無脉或脉來沉遲而無力者宜用

熟附子

乾姜

人參

甘草

白朮

肉桂

陳皮

五味子

茯苓

半夏

或嘔吐涎沫或有小腹痛加鹽炒茱萸

無脉者加猪膽汁一匙

泄瀉不止加升麻黃耆 嘔吐不止加姜汁

水二鍾姜三片煎之臨服入射香三釐調服中病以

手足溫和即止不得多服多則反加別病失如後止

可用前理中飲加減治之無妨

回陽反本湯

此湯治陰盛格陽陰極發燥微渴面赤欲坐臥於泥

水井中脉來無力或脉生無欲絕者宜用

熟附子

乾姜

甘草

人參

麥門冬

五味子

臘茶

陳皮

面戴陽者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清泥漿

水一鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗為效

柴胡百合湯

此湯治瘧後昏沉發熱渴而錯語失神及百合勞復
等證

柴胡

人參

黃芩

甘草

知母

百合

生地黃

陳皮

渴加天花粉 胸中煩燥加山梔

有微頭疼加羌活川芎 嘔吐入姜汁炒半夏

胸中飽悶加枳殼桔梗

食復者加枳實黃連甚重大便實者加大黃

胸中虛煩加竹茹竹葉

瘧後乾嘔錯語失神呻吟睡不安者加黃連犀角咳

喘者加杏仁百合宜加麻連

心中驚惕為血少加當歸茯苓遠志

虛汗者加黃耆 脾倦加白朮

腹如雷鳴加煨生姜 勞復時熱不除加葶藶烏梅

生艾汁

水二鍾棗一枚姜三片槌法醋煮鱉甲煎之湯

如聖飲

治剛柔二症頭搖口噤身反張手足攣搐頭面赤項

強急與瘳瘳同治法

羌活

防風

川芎

白芷

柴胡

芍藥

甘草

當歸

烏藥

半夏

黃芩

有汗是柔症加白朮桂枝 無汗是剛症加麻黃蒼

朮 口噤咬牙者如大便實用大黃利之

水二鍾姜三片煎之臨服入姜汁竹瀝溫服
溫經益元湯

治因汗後大虛頭眩振振欲擗地并肉羸筋惕及因
發汗太多衛虛亡陽汗不止或下後利不止身疼痛
者併皆治之

熟地黄

人參

白朮

黃耆

甘草

白芍藥

當歸

生地黄

白茯苓

陳皮

肉桂

如飽悶加枳殼去地黄 如瘦人去芍藥有熱去附
子利不止加炒白朮升麻陳壁土去當歸地黄嘔者

加姜汁製半夏 渴者加天花粉

汗後惡風寒屬表虛去附子肉桂生地黄加桂枝膠
飴 水二鍾姜三片棗一枚槌法加糯米一撮煎之
溫服

逍遙湯

治有患傷寒瘧後血氣未平勞動助熱復還於經絡
因與婦人交接搖慾而復發不易有病者謂之勞復
因交接淫慾而無病人反得病者謂之陰陽易予曾
見舌出數寸而死者多矣此證最難治必宜此湯

人參

知母

竹青

如卵縮腹痛倍

加黃連

甘草

滑石

生地黃

萐根

柴胡

犀角

水二鍾棗二枚姜三片煎之槌法臨服入燒裊襠末一錢半調服有黏汗出為效不黏汗出再服以小水利陰頭腫即愈

升陽散火湯

此湯治有患人又手冒腦尋衣摸床謔語昏沉不醒人事俗醫不識是病便呼為風證而因風藥誤人死者多矣殊不知汗熱乘於肺金元氣虛不能自主持名曰撮空證小便利者可治小便不利者不可治

人參

當歸

柴胡

芍藥

黃芩

甘草

白朮

麥門冬

陳皮

茯苓

有痰者加姜汁炒半夏 大便燥實謔語發渴加大黃泄漏者加升麻炒白朮

再造散 水二鍾姜三片棗二枚槌法入金首飾煎之熱服

治患頭疼發熱項脊強惡寒無汗用發汗藥二三劑汗不出者庸醫不識此證不論時令遂以麻黃重藥及火劫取汗誤人死者多矣殊不知陽虛不能作汗

故有此證名曰無陽證

黃耆

人參

桂枝

甘草

熟附

細辛

羌活

防風

川芎

煨生姜

夏月加黃芩石膏 冬月不必加

水二鍾棗二枚煎至一鍾槌法再加炒芍藥一撮

煎三沸溫服

黃龍湯

治有患心下硬痛下利絕清水譫語發渴身熱庸醫不識此證但見下利便呼為漏底傷寒而便用熱藥

止之就如抱薪積火誤人死者多矣殊不知此因熱聚傳裏胃中燥屎結實此利非內寒而利乃日逐自飲湯藥而利也直急下之名曰結熱利證身有熱者宜用此湯身無熱者用前六乙順氣湯

大黃

芒硝

枳實

厚朴

甘草

人參

當歸

年老氣血虛者去芒硝

水二鍾姜三片棗子二枚煎之後再加桔梗一沸熱服為度

調榮養衛湯

即補中益氣湯

治有患頭疼身熱惡寒微渴漑然汗出身作痛脚腿
酸疼無力沉倦脉空浮而無力膚醫不識因見頭疼
惡寒發熱便呼爲正傷寒而大發其汗所以輕變重
而害人者多矣殊不知勞力內傷氣血外感寒邪宜
少辛甘溫之劑則愈名曰勞力感寒證故經云勞者
溫之損者溫之溫能除大熱正此謂也有下證者大
柴胡下之則緩

人參

黃耆

當歸

生地黃

川芎

柴胡

陳皮

甘草

細辛

羌活

防風

白朮

元氣不足者加升麻少許須知元氣不足者至陰之
下求其升口渴加天花粉知母喘嗽加杏仁去升麻
汗不止加芍藥去升麻細辛腦中煩熱加山梔竹茹
乾嘔者加姜汁炒半夏腦中飽悶加枳殼桔梗去生
地黃甘草黃耆白朮少許痰盛者加瓜蒌仁貝母去
防風細辛腹痛去耆朮加芍藥乾姜和之其因血鬱
內傷有痛處或大便黑加桃仁紅花去芍辛羌防黃
耆白朮太甚者加大黃下盡瘀血則愈後撮本方去
大黃調理

水二鍾姜三片棗二枚槌法入葱白一莖煎之溫服

導赤各半湯

治患傷寒後心下不硬腹中不滿大小便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中獨語一二旬目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則嚥不語則不思形如醉人庸醫不識而誤人者多矣殊不知熱傳手少陰心也心火上而逼肺所以神昏名越經證

黃連

黃芩

甘草

犀角

麥門冬

滑石

山梔

茯神

知母

人參

水二鍾姜棗煎之加燈心一握煎沸熱服

益元湯

治有患身熱頭疼全無不煩便作燥悶面赤飲水不得入口庸醫不識呼為熱證而用涼藥誤死者多矣殊不知元氣虛弱是無根虛火泛上名曰戴陽證

熟附

甘草

乾姜

人參

五味

麥門冬

黃連

知母

葱

艾

水二鍾姜一片棗二枚煎之臨服槌法入童便三匙頭冷服

桂苓飲

治有患初得病無熱譫語煩燥不安精采不與人相
當庸醫不識呼為狂發誤用下藥死者多矣殊不知
此因熱結膀胱名曰如狂證

猪苓

澤瀉

桂枝

甘草

白朮

知母

黃柏

山梔

蘇葉

水二鍾姜三片煎至一鍾槌法再加滑石末一錢煎
三沸溫服取微汗為效

當歸活血湯

有患無頭疼無惡寒止則身熱發渴小水利大便黑

口出無倫語庸醫不識呼為熱證而用涼劑誤人多
矣殊不知內傳心脾二經使人昏迷沉重故名挾血
如見崇

當歸

赤芍藥

甘草

紅花

桂心

乾姜

枳殼

生地黄

人參

柴胡

桃仁泥

服三貼後去桃仁紅花乾姜桂心加白朮茯苓
水二鍾姜一片煎之槌法入酒三匙調服
加味導痰湯

有患憎寒壯熱頭痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫

庸醫不識皆為傷寒治之誤人多矣殊不知此因內傷七情以致痰迷心竅神不守舍神出舍空空則痰生也名曰挾痰如鬼祟痰證類傷寒與此同治法

茯苓

半夏

南星

枳實

黃芩

白朮

陳皮

甘草

桔梗

黃連

瓜蒌仁

人參

在力壯盛先用吐痰法次服此湯

水二鍾姜三片棗二枚煎之臨服槌法入竹瀝姜汁溫服

加減調中飲

治食積類傷寒頭疼發熱惡寒氣口脈緊盛但身不痛此與為異耳經云飲食自倍腸胃乃傷輕則消化重則吐下此良法也

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

白朮

山查

神曲

枳實

草菓

黃連

乾姜

腹中痛加桃仁 痛甚大便實熱加大黃下之去山查草菓神曲乾姜

心中兀兀欲吐者與乾霍亂同吐法用滾水一碗入鹽一撮皂莢末五分探吐

水二鍾姜一片煎之槌法臨服入木香磨取汁調飲

即效

加減續命湯

治脚氣類傷寒頭疼身熱惡寒支節痛便秘嘔逆脚軟屈弱不能轉動但起於脚膝耳禁用補劑及淋洗

防風

芍藥

白朮

川芎

防已

桂枝

甘草

麻黃

蒼朮

羌活

暑中三陽所患必熱脈來數去附子桂枝麻黃加黃芩黃柏柴胡

寒中三陰所患必冷脈來遲加附子

起於濕者脈來弱加牛膝木瓜

起於風者脈來浮加獨活 元氣虛加人參少許大

便實者加大黃

水二鍾棗二枚姜一片燈心二十莖煎之槌法入姜

汁調之溫服

芩連消毒湯

治天行大頭病發熱惡寒頭項腫痛脈洪取作痰火治之其喉痺者亦照此方治之

柴胡

甘草

桔梗

川芎

投車追去

卷三

三

黃芩

荊芥

黃連

防風

羌活

枳殼

連翹

射干

白芷

先加大黃利去一二次 後依本方去大黃加人參 當歸調理

水二鍾姜三片煎至一鍾鼠黏子一撮再煎一沸槌 法入竹瀝姜汁調服

六神通解散

治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒脉洪數先 用中和湯不愈後服此湯

麻黃

甘草

黃芩

石膏

滑石

蒼朮

川芎

羌活

細辛

水二鍾姜三片槌法入豆豉一撮葱白二莖煎少入熱 服取汗中病即止