

婦人良方序

世之醫者於婦人一科有專治婦人方
有產寶方治以專言何專攻也方以寶
言愛重之也蓋醫之術難醫婦人尤難
醫產中數體則又險而難彼其所謂專
治者產寶者非不可用也綱領敬漫而
無統節目諄略而未備醫者盡於簡易



不能深求徧覽有才進一方不效輒束
手者有無方可據揣摩臆度者有富貴
家鄙藥賤而不服者有貧乏人憚藥貴
而無可得服者有醫之貪利以賤代貴
失其正方者古云看方三年無病可治
治病三年無藥可療又云世無難治之
病有不善治之醫藥無難代之品有不

善代之人此之謂也僕三世學醫家藏
醫書若干卷既又編行東南所至必盡
索方書以觀暇時閉關淨室繙閱涵泳
究極未合採摭諸家之善附以家傳經
驗方秤而成編始自調經訖于產後凡
八門門數十餘體總二百六十餘論
後有藥不惟其貴賤惟其效綱領節

目燦然可觀度幾病者隨索隨見隨試
隨愈僕於此編非敢求異昔人也蓋亦
補其偏而會其全聚於散而斂於約期
更無憾云患者千慮必有一得君子母
以人廢言昔嘉熙元年八月良日建康
府明道書院醫論臨川陳自明良父序

新刊類校婦人良方補遺大全總目

臨川陳自明良甫編集

菴峯熊宗立道軒補遺

松軒葉玄昊顯章類校

卷之首

辨識修製藥物法度

卷之一

凡醫婦人先須調經故以為初

調經門

月經類

月經序論第一

產寶方序論第三

月水不調方論第五凡四方

精血篇第二齊光祿大夫褚聖麟

王子亨論第四

紫石英丸 加減茱萸湯 姜黃散 桃仁散

補遺固真丹 醋附丸 內補當歸丸

○月水不通方論第六 **附**產寶方論

○養生必用論經病第七 凡十方

當歸散 琥珀散 救急方 產寶方

梅師方 萬病丸 紅花當歸散 驚甲丸

桃仁煎 **補遺**麥會花散

○室女月水不通方論第八 凡二方

通經丸 聖重方 **補遺**杜牛膝散

室女經閉成勞方論第九 凡十方

栝子仁丸 澤蘭湯 沉香散 當歸散 金花散

芎藭散 資血湯 麥煎散 斃前丸

八仙飲子 茅香飲子 **補遺**大油煎散 牡丹散

○血枯方論第十四 四方

烏賊骨丸 菴參丸 乾地黃湯 磁石丸

補遺茯苓補心湯

○月水不利方論第十一 不利流也。凡四方

白薇丸 牡丹散 牛膝散 **補遺**異功散

○月水行或不行心腹刺痛方論第十二 凡六方

溫經湯 桂枝桃仁湯 地黃通經丸 琥珀散

兼撥丸 **補遺**千金溫經湯 失笑散

○月水不斷方論第十三 凡六方

牡丹丸 續斷丸 禹餘糧丸 牡蠣丸 **補遺**一方

○婦人殺血心痛方論第十四 凡一方 **補遺**失笑散

○崩暴下血不止方論第十五 凡三十六方

小蓟湯 阿加陀丸 琥珀散 五靈脂散

刺芥散

獨聖散

神應散

金華散

如聖散

如神散

耆附丸

竹茹丸

如聖無比散 又二十三方

補遺 奇效四物湯

鎮宮丸 又二方

○崩中帶下方論第十六

○崩中漏下生死脉論第十七 凡三十三方

鹿茸丸

栢葉散

益母草散

白芷散

乳香散

破故紙散

白礬丸

伏龍肝散

茯苓散

千金温經湯

紫金散

沉香牡丹丸

白芷暖宮丸

竹茹丸

地黄丸

補遺 三方

○婦人白濁白淫方論第十八 凡二方

魚黃散

補遺 鎮精丸

固精丸

○婦人天癸過期經水不調方論第十九 凡二方

當歸散

茱萸鹿茸丸

補遺 五方名

○婦人血分水腫滿方論第二十 凡三方

椒仁丸

葶藶丸

補遺 小調經散

卷之二

衆疾門

經脉不調衆疾生為故以次之

○通用類

○極一方總論第一

○產室方論第二

○博濟方論第三

○寇宗奭論第四

○通用方論第五 凡十六方

四物湯

佛手散

丹參散

勝金丸

金釵煎

交加散

玉露通真丸

補中丸

二聖散

二聖大寶琥珀散

白木煎

沉香琥珀煎

滋血湯

烏雞煎丸

補遺 三方名見十遺門

中風類

○婦人中風方論第一 九十三方

至寶丹 蘇合香丸 五積散 牛黃清心丸 大八風湯

排風湯 三生飲 參蘇飲 木香煑散 附子理中湯

加減小續命湯 小風引湯 千金竹瀝湯

補遺星香湯 星附湯 烏藥順氣散

○婦人中風角弓反張方論第二 九十九方

小續命湯方見 葛根湯 桂枝加葛根湯 附木散

桂心白木湯 附子防風散 八物白木散 白殭蚕散

烏蛇丸 **補遺**解毒雄黃丸

○婦人中風口噤方論第三 九三方

天南星散 走馬散 烏蛇散

補遺一方

○婦人中風不語方論第四 九二方

神効解語丹 防風湯 竹瀝湯 **補遺**三黃獨活湯

小省風湯

○婦人風痺手足不隨方論第五 九二方

三痺湯 三五七散 **補遺**五痺

○婦人中風自汗方論第六 九六方

獨活湯 續命煑散 **補遺**防風白木牡礪散

○婦人臂痛方論第七 九方

栝子仁丸 舒經湯 茯苓丸 控涎丹 白芥子散

流氣飲子 **補遺**交加散 四物湯 茯苓丸說

○婦人賊風偏枯方論第八 九三方

大八風湯 增損茵芋酒 續斷湯 **補遺**全生虎骨散

虎胫骨酒

婦人良方卷之四
婦人偏風口喎方論第九 凡五方

防風湯

深師續命湯

補遺 天仙膏

灸法

○婦人血風心神驚悸方論第十 凡三方

茯神散

龍齒丸

朱貫琥珀散

補遺 二方

○婦人失血過多心神不安方論第十一 凡一方

寧志膏

補遺 茯苓補心湯

○婦人風邪顛狂方論第十二 凡四方

防風散

補遺 牛黃清心丸

排風湯

○婦人飛尸血厥方論第十三 凡六方

太乙神精丹

蘇合香丸

雄朱散

白薇湯

倉公散

補遺 內鼻散

硫黃散

卷之四

○血風類

○婦人血風身軀骨節疼痛方論第一 凡五方

芍藥散

羚羊角散

通靈丸

當歸沒藥丸

大効虎骨散

補遺 蒼耳散

○婦人血風白虎歷節走疰方論第二 凡七方

漏蘆散

四生丸

麝香丸

芍藥知母湯

附子八物湯

獨活寄生湯

補遺 羌活湯

○婦人血風癢癢痒方論第三 凡八方

何首烏散

附子酒

補遺 烏荊散

消風散

○婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四 凡七方

養正丹

鈎藤散

斗門方

蔓荊子散

四神散

川芎散

補遺 三五七散

○婦人血風頭痛方論第五

附

○九方 厥頭痛發逆頭痛

許叔微方

七生丸

芎辛湯

如聖餅子

玉真丸

硫黃丸 白附子散 **補遺** 茶調散 都梁丸

○婦人項筋強痛方論第六 凡五方

追風散 急風散 蝎附散 都梁丸 木瓜煎 **補遺** 烏藥順氣散

○婦人腰痛方論第七 凡二方

如神湯 獨活寄生湯 **補遺** 舒腰散 又一方

○婦人腰脚疼痛方論第八 凡三方

酸棗仁散 骨碎補散 **補遺** 養腎散

○婦人脚氣方論第九 凡十一方

牛膝散 大腹皮散 半夏散 犀角散 木香散

紫蘇散 桑白皮散 薏苡仁散 四白散

蒼朮丸 **補遺** 烏藥酒

○卷之五

○癆瘵類

○婦人勞瘵序論第一 凡一十二方 **附** 二十四種蒸病論

雞蘇丸 防風湯 温金散 桔梗飲子 瓜樓湯

子卷散 含化丸 河車丸 補肺湯 四君子湯 養正膏

猪肚丸 **補遺** 阿膠丸 神授散 蘇合香丸

○婦人骨蒸勞方論第二 凡十五方

天靈蓋方 懶肝丸 黃耆丸 然鬼丸 驚甲煎

麥煎散 筒骨煎 華佗方 沈蘇良方 地黃煎

石膏散 青蒿散 鼈甲煎丸 逍遙散 枳殼散

補遺 崔氏灸法 地仙散 大補湯 **附** 五心煩熱 清心蓮子飲

○婦人血風勞氣方論第三 凡十四方

人參荆芥散 鼈甲丸 琥珀丸 香甲散 地黃煎

荆芥散 荆芥煮散 如聖散 乞力伽散

大効油煎散 血風勞方 又香甲散 馬鞭草散

小柴胡湯

乾姜柴胡湯

海蛤散

補遺 灸法

○婦人咳嗽方論第十一 凡九方 咳嗽用溫藥方論第十二

黃耆散

蛤蚧丸

含化丸

具母湯

定喘湯

補肺湯

金不換散

橘皮湯

補遺 華蓋散

小青龍湯

參蘇飲

○婦人勞嗽方論第十三 凡二方

四滿丸

補遺 溫金散

阿膠丸

○婦人喘滿方論第十四 凡六方

神秘湯

杏子散

千縉湯

車膏丸

神授湯

九寶湯

補遺 三拗湯

定喘湯

四磨湯

五味子湯

○婦人風痰方論第十五 凡八方

旋覆花湯

天南星丸

柴胡半夏湯

金沸草散

瓜蒂散

大半夏湯

白七湯

補遺 導痰湯

○婦人心胸嘈雜方論第十六 凡二方

旋覆花湯

半夏茯苓湯

補遺 一方

卷之七

嘔吐類

○婦人嘔吐方論第一 凡六方

益智子散

丁香散

竹茹湯

槐花散

半夏丸 人參七

○婦人霍亂方論第二 凡六方

加減理中丸

千金真四順湯

猪膽湯

香薷散

呵子散

胡椒湯

補遺 說

○婦人翻胃吐食方論第三 凡二方

白堊散

白芷散

補遺 太倉丸

又說四方

○婦人血膈方論第四 凡一方

○婦人鼻衄方論第五 凡七方

刺薊散

伏龍肝散

茅花湯

補遺

四方名 又七方

牡丹煎

補遺 抽刀散

○婦人吐血方論第六凡十三方

雞蘇散 千金真湯

柔脾湯

四生丸

犀角地黃

青餅子 乾薑甘草湯

補遺 說二方

○婦人痰癖諸氣方論第七凡四方

麝香丸 神效方 葱白散

桂枝桃仁湯

補遺 說二方

○婦人疝瘕方論第八凡四方

乾漆散 烟砂丸 巴豆丸

良方黑神丸

補遺 蟠葱散

○婦人八瘕方論第九凡一方

桃仁煎

補遺 大硝石丸

○婦人腹中痰血方論第十凡二方

桃仁散

桃仁丸

補遺 論二

○婦人瘕痞方論第十一凡三方

川山甲散

蓬莪朮丸

丁香丸

補遺 說二方

○婦人食瘕方論第十二凡二方

礞石丸

礞石丸

補遺 小三

○婦人積年血瘕塊方論第十三凡七方

乾漆丸

琥珀丸

礞石丸

沒藥丸

五雲逐風丸

三稜煎 水府丹

補遺 說二方

○婦人血氣心痛方論第十四凡六方

烏藥散

阿魏丸

雞舌香散

陳氏二神丸

抽刀散 靈苑方

補遺 說三方

○婦人血氣心腹疼痛方論第十五凡一十方

延胡索散

琥珀散

沒藥散

山茹金散

八位散

不換金散

定命散

大効琥珀散

蠲痛散

沒藥散 牡丹散

至聖湯

菖蒲丸

延胡索散

當歸煎丸

神聖北亭丸

琥珀散

補遺 手前散

○婦人血氣小腹疼痛方論第十六凡四方

葳靈散

當歸散

靈苑方

石灰散

補遺 茶金丸

婦人良方

婦人良方

每給散

補遺 灸法

婦人兩脇脹痛方論第十七凡六方

補遺 說四方

草豆蔻散 菴闔子散 人參紫堯 氣針丸 木通散三

婦人心腹脹滿方論第十八凡三方

白朮散 檳榔散 木香散 **補遺** 說二方

卷之八

淋瀝類

婦人淋瀝小便不通方論第一凡十一方

補遺 說四方

木通散 石韋散 桃膠散 金沙散 鱗酥散 火府丹

婦人睥轉不得小便方論第二凡十方

滑石散 窮藥散 石韋湯 千金丹 葱白湯 **補遺** 三

婦人小便數方論第三凡二方

鹿茸散 桑螵蛸散 **補遺** 水丸

婦人遺尿失禁方論第四凡七方

鹿茸丸 **補遺** 食法 秘元丸

婦人小便出血方論第五凡九方

鹿茸散 髮煎散 生乾地黄散 當歸散 **補遺** 四方

婦人大便不通方論第六凡八方

牽牛丸 大麻仁丸 **補遺** 皂角丸 煎煉粥 角神散

婦人風入腸間或秘或利方論第七凡四方

疾藥湯 大五柔丸 二仁丸 蜜丸法 **補遺** 通氣散 八方

婦人泄瀉方論第八凡八方

香朴丸 桂香丸 豆蔻分氣散 五香散 豆蔻丸

胃參散 人參豆蔻散 木香散 **補遺** 諸方

婦人協熱下利方論第九凡三方

玉粉丹 四味阿膠丸 **補遺** 說三方

婦人帶下方論第十凡十三方

白頭翁湯 神木散 大神丸 二黃熟子湯

四順附子湯 三建州 加味參附湯 香茸丸
參香散 豆蔻餅 調中湯 **補遺** 論

○婦人痢後嘔噦方論第十一 七一方

橘皮乾姜湯 半夏生姜湯 橘皮竹茹湯 生姜橘皮湯

退陰散 猪苓湯 **補遺** 三方

○婦人大便下血方論第十二 凡八方

防風如神散 木香烏金丸 地榆湯 腸風黑散

補遺 加減四物湯 又四物 灸法

○婦人痔瘡方論第十三 凡五方

警甲散 鵝解元方 **補遺** 一方 灸法 敷法

○婦人胎肛候方論第十四 凡五方

聖惠方 集驗方 孫真人方 **補遺** 又蛤散 又方

○婦人陰腫方論第十五 凡六方

首痛散 麻黃湯 白散 **補遺** 三方

○婦人陰痒方論第十六 凡十方

大黃散 廣濟方 崔氏方 礬石散 **補遺** 一方

○婦人陰冷方論第十七 凡六方

五加皮浸酒方 傅心方 坐道藥 坐藥法 **補遺** 論一

○婦人陰挺出下脫方論第十八 凡六方

當歸散 廣濟方 千金翼方 **補遺** 三方

○婦人陰中生瘡方第十九 凡五方

集驗方 肘後方 黃芩湯 雄黃散 **補遺** 三方

○婦人傷丈夫頭痛方第二十 凡二方

集驗方 桑白皮湯 **補遺** 說一方

○婦人交接輒血出痛方第二十一 凡二方

千金方 集驗方 **補遺** 一方 **補遺** 二方

○婦人交接他物傷方第二十二 凡三方

小戶嫁痛方第二十三 凡四方

千金方

補遺一方

卷之九

求嗣門

疾病既無須知求嗣故以次之

求嗣類

○陳無擇求子論第一 褚尚書求男論第二 婦人無子論第三
○千金翼求子方論第四 凡十四方

男女受胎時日法

禁忌法

推王相時日法

推書宿日法

七子散

慶雲散

盪胞湯

坐道藥

紫石英丸

延年方

內灸丸

秦桂丸

養真丸

白薇丸

地黃湯

金城太守白薇丸

千金翼白薇丸

茱萸丸

紫石英丸

補遺陽起石丸

濟陰丹

暖宮丸

溫隱君求嗣保生篇方論第五 凡一方

續嗣降生丹

補遺世勸

卷之十

胎教門

求嗣已明須知胎教故以次之

姙胎類

○姙娠總論第一

○姙子論第二

○受形篇第三

○論胎教第四

○孕元立本章第五

○疑形殊真章第六

○氣質生成章第七

○轉女為男法第八

卷之十一

姙脉類

○脉例第一

○診婦人有姙歌第二

○驗胎法第三 凡一方

○胎殺避忌產前將護法第四

○月遊胎殺第五

○十干日遊胎殺第六

○十二支日遊胎殺第七

○六甲旬遊胎殺第八

○太史局日遊胎殺第九

○食忌論第十 ○孕婦藥忌歌第十一

卷之十一

胎教已明頂知妊娠疾病故以次之

胎教已明頂知妊娠疾病故以次之

○妊娠數類

○妊娠隨月數服藥及將息法第一 凡二十方

烏雄雞湯 補胎方 艾湯 黃連湯 雄雞湯 茯神湯

菊花湯 調中湯 阿膠湯 安中湯 安胎當歸湯

麥門冬湯 柴胡湯 旋覆花湯 葱白湯

杏仁湯 芍藥湯 葵子湯 半夏湯 猪腎湯

○妊娠惡阻方論第二 凡十二方

白朮散 人參丁香散 醒脾飲子 保生湯

二香散 近効方 安胎散 補遺二方

○妊娠痰逆不思食方論第三

半夏茯苓湯 張氏方 茯苓丸 茯苓散 集驗方

柴胡湯 補遺 旋覆半夏湯 人參半夏丸 說二方

○胎動不安方論第四 凡二十方

集驗方 安胎方 鈎藤湯 護胎法 產宝方 黃耆湯

又產宝方 安胎鐵罩散 銀亭酒 養生必用方

產宝方 寄生湯 順氣飲子 文冲寄生湯

秦元湯 止痛湯 膠艾湯 補遺 說二方

○妊娠漏胎下血方論第五

○妊娠卒然下血方論第六 凡十三方

補遺 桑寄生散 安胎散

○妊娠驚胎及僵仆方論第七 凡七方

催生神妙佛手散 竹茹酒 秦元湯 縮砂湯 補遺 說一

○太史局日遊胎殺第九 ○食忌論第十 ○孕婦藥忌歌第十一

卷之十一 胎教已明頂知妊娠疾病故以次之

○妊娠門

○妊娠隨月數服藥及將息法第一 凡二十方

烏雄雞湯 補胎方 艾湯 黃連湯 雄雞湯 茯神湯

菊花湯 調中湯 阿膠湯 安中湯 安胎當歸湯

麥門冬湯 柴胡湯 旋覆花湯 葱白湯

杏仁湯 芍藥湯 葵子湯 半夏湯 猪腎湯

○妊娠惡阻方論第二 凡十二方

白朮散 人參丁香散 醒脾飲子 保生湯

二香散 近効方 安胎飲 補遺二方

○妊娠痰逆不思食方論第三 凡八方

半夏茯苓湯 張氏方 茯苓丸 茯苓散 集驗方

柴胡湯 補遺旋覆半夏湯 人參半夏丸 說二方

○胎動不安方論第四 凡二十方

集驗方 安胎方 鈎藤湯 護胎法 產宝方 黃耆湯

又產宝方 安胎鐵罩散 銀亭酒 養生必用方

產宝方 寄生湯 順氣飲子 文冲寄生湯

秦元湯 止痛湯 膠艾湯 補遺說二方

○妊娠漏胎下血方論第五

○妊娠卒然下血方論第六 凡十三方

補遺桑寄生散 安胎散

○妊娠驚胎及僵仆方論第七 凡七方

催生神妙佛手散 竹茹酒 秦元湯 縮砂湯 補遺說一

○妊娠胎上逼心方論第八 凡七方

紫蘇飲

當歸湯

補遺大聖散

○妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛方第九 凡一方

補遺二方

○妊娠誤服毒藥傷動胎氣方論第十 凡三方

奪命丸

腹痛方

阿膠散

補遺一方

○妊娠心痛方論第十一 凡七方

川芎當歸湯 白木湯

千金方

補遺火炆散又說四

○妊娠心腹脹滿方論第十二 凡十一方

當歸芍藥散 香朮散

單豆蔻散

阿膠散

補遺說四

○妊娠中惡方論第十三 凡三方

當歸散

補遺四方

○妊娠腰腹及背痛方論第十四 凡十方

當歸散

通氣散

大地黃丸

小品學根湯

補遺桂枝丸

○妊娠小腹脹滿方論第十五 凡一方

當歸散

補遺一方

○妊娠心腹脹滿方論第十六 凡三方

倉公下氣湯 阿梨勒散

補遺一方說

卷之十三

妊娠數墮胎類

○妊娠數墮胎方論第一 凡五方

千金方

剛繁方

廣濟方

紫石英丸

卷栝丸

補遺說二

○妊娠胎不長養方論第二 凡五方

胎不長方

養胎白朮散

黃耆散

養胎人參丸

白朮丸

補遺二方

白朮散

○妊娠胎動安不得却須下方論第三 凡七方

牛膝湯

桂心散

小品方

文仲方

補遺說一方

○妊娠墮胎右血下不止方論第四 凡三方

左骨散 千金方 救急方 **補遺** 二方

○妊娠日月未足欲產方第五 凡四方

集驗知母丸 槐子丸 **補遺** 說

○斷產方論第六 凡七方

小品方 新產方 千金方 廣濟方 **補遺** 二方

○妊娠咳嗽方論第七 凡八方

疑冬花散 桔梗散 馬兜鈴散 麻黃散

百合散 紫苑湯

○妊娠吐衄血方論第八 凡二方

馬勃方 白茅花湯 **補遺** 說

○妊娠子煩方第九 凡十方

竹葉湯 竹茹湯 麥門冬散 柴胡散 人參散

黃連湯 一母丸 **補遺** 麥門冬湯

○妊娠煩燥口乾方論第十 凡四方

升麻散 知母散 葛根散 人參黃耆散 **補遺** 說 二方

卷之十四

妊中風類

○妊娠中風方論第一 凡四方

防風散 白朮酒 **補遺** 說 五方

○妊娠風症方論第二 凡二方

麻黃散 防風葛根散 小品湯 葛根湯

補遺 於羊角散 又說一方

○妊娠腹內鬼胎方論第三 凡二方

雜黃丸 **補遺** 一方

○妊娠傷寒方論第四 凡二十方

加減四物湯 阿膠湯 葱白湯 前胡湯 蘇木湯

黃龍湯 柴胡石膏湯

枳實散

五寶花湯

麥門冬湯

梔子大青湯

芍藥湯

當歸茯苓湯

白朮散

柴胡散

麻黃散

升麻散

新校

柴胡散 古各生

良方白朮散

竹葉湯

補遺 芍藥散

○妊娠時氣方論第五 凡三方

秦光散

葛根飲子

消熱飲子

補遺 說一方

○妊娠熱病方論第六 凡五方

葱白蘆根湯

梔子仁飲子

大黃飲子

補遺 蘆根湯

梔子五物湯

升麻六物湯

○妊娠傷寒熱病防損胎方論第七 凡七方

升麻散

前胡散

石膏湯

梔子仁飲

補遺 白朮散

○妊娠熱病胎死腹中方論第八 凡四方

黑神散

催生湯

鹿角散

烏雞方

補遺 三方

○妊娠癰疾方論第九

集驗方

千金方

黃芩散

七寶散

補遺 養胃湯

驅邪散

清脾湯

○妊娠霍亂方論第十 凡四方

人參散

白朮散

木瓜煎

止渴飲

縮脾飲

補遺

人參白朮散

理中湯

木瓜湯

卷之十五

○妊娠泄瀉方論第十一 凡三方

○妊娠泄瀉方論第一 凡三方

厚朴丸

草菓飲

補遺

風寒暑濕論方

○妊娠下痢赤白及黃水方論第二 凡十五方

地榆散

赤石脂散

熱艾湯

黃連阿膠散

艾葉湯

根黃方

厚朴散

補遺

赤白散方

○妊娠大小便不通方論第三 凡十方

井遂散 猪苓散 葵子散 當歸散

補遺 大腹皮湯 八正

○妊娠小便不通方論第四 凡八方

杏仁丸 苦參丸 葵子散 八味丸

補遺 一方

○妊娠子淋方論第五 凡五方

地膚大黃湯 **補遺** 二方 黃苓湯

○妊娠遺尿方論第六 凡三方

白薇散 **補遺** 桑螵蛸散

○妊娠尿血方論第七 凡五方

補遺 姜蜜湯 五苓散 又一方

千金方 艾葉酒 地黃酒 續斷湯 熟地黃湯

○妊娠胎水腫滿方論第八 凡十一方 **附** 產乳養子論

天仙藤散 茯苓散 崔氏方 **新校** 方 澤瀉散 防已湯

千金鯉魚湯 商陸赤小豆湯 腎著湯 指迷方 **補遺** 川芎散

○妊娠腹內鍾鳴方第九 凡一方 **補遺** 一方

○龍葵德孕癰方第十 凡一方 **補遺** 一方

○妊娠不語論第十一 无方

○妊娠傷食方論第十二 凡二方

木香丸 白朮散 **補遺** 說二方

○妊娠臍燥悲傷方論第十三 凡二方 大棗湯 **補遺** 淡竹茹湯

卷之十六

坐月門

○坐月序論 妊娠疾病既明須知坐月故以次之

○坐月序論

○產寶方周類序論第一

○將護孕婦論第二

○滑胎例第三 凡八方

滑胎枳殼散 張氏方 內補丸 易產滑胎方

神寢丸 榆白皮散 猪肚方 保氣散 **補遺** 無憂散

○月空方位例第四

○逐月安產藏衣忌向方位第五

○推婦人行年法第六

○體玄子借地法第七

○禁草法第八

○禁水法第九

○入月預備藥物第十

○催生符第十一

卷之十七

產難門

坐月既明須知產難故以次之

十產類

○產難論第一

○楊子建十產論第二 凡一方

推腸生方

○催生方第三 凡三十六方

催生柞木散子

如神散

如聖散

曹秀才方

催生丹

乳香方

如神開滑膏

蛇蛻方

遇仙丹

如聖膏

寸金散

陸氏方

兔血散

集驗方

備急方

如音散

七聖散

神妙乳珠丹

小品方

文仲方

龍蛻散

應急方

催生湯

○郭稽中產難方論第四 凡二方

勝金散

神應黑散

補遺說

○產難子死腹中方論第五 凡十八方

當歸葵子散

錫粉丸

十全方

趙和叔傳方

何氏方 水銀方

文仲方

崔氏方

一字神散

鄧知縣傳方

補遺說一方

○產難生死訣第六

卷之十八

產後門

產難既明須知產後疾病故以次之

○產後通用類

○產後將護法第一

○產後調理法第二

○產後通用方論第三

補遺 加味四君子湯

黑神散 烏金散

仁煎 增損澤蘭丸

醋墨方

四味湯 玉露散

地黃煎 理中丸 黑志丹

當歸散

勝金丸 黑散子

朱砂丸 姜粉散 地黃酒

地黃丸

琥珀散 大當歸方

許仁則方

補遺 說一方

○產科序論

○胞衣不出方論第四 凡二十二方

奪命丹 牛膝湯 花藥石散

牛膝散 救急方

延年方 治胞衣不下訣

補遺 五方

○產後血暈方論第五 凡十六方

清魂散

廣濟方 獨行散

張氏方

近効方

崔氏方

奪命散

補遺 牡丹散

又四方

○產後顛狂方論第六

何氏方

補遺 說

○產後狂言謔語如有神靈方論第七 凡一方

補遺 說一方

○產後不語方論第八 凡二方

七珍散

胡毛孤鳳散

補遺 一方

卷之十九

產後亂語類

○產後不見鬼神方論第一 凡三方

調經散

栢子仁散

茯神散

補遺 說

○產後臆虛心神驚悸方論第二 凡七方

產乳七宝散

琥珀地黃丸

補遺 說二方

○產後心驚中風方論第三 凡五方 **補遺**抱膽丸

○產後中風恍惚方論第四 凡四方

千金方 天麻丸 **補遺**辰砂遠志丸

○產後所下過多虛極生風方論第五 凡一方

濟危上丹 **補遺**當歸建中湯

○產後虛汗不止方論第六 凡八方

麻黃根散 千金方 止汗散 人參湯 **補遺**說一方

○產後冒悶汗出不識人方論第七 凡一方

○產後汗出多而變瘥方論第八 凡一方 **附**中風口禁角弓友張

小續命湯 大豆紫湯 小品方 **補遺**說一方

○**附**中風口禁角弓友張方論

荆芥散 小品方 羌活酒 宝方 千金雞屎醴

張文仲方 經効方 **補遺**說一方

○產後中風方論第九 凡七方

○郭橐中產後中風方論

經効方 **補遺**交加散 獨活寄生湯

○產後中風筋脉四肢挛急方論第十 凡四方

○產後熱悶氣上轉為脚氣方論第十一 凡一方 **補遺**寄生湯

卷之二十

產後身腰痛類

○產後遍身疼痛方論第一 凡二方

越痛散 五積散 **補遺**一方

○產後腰痛方論第二 凡十方

廣濟方 救急方 大豆酒 陳氏如神湯 桃仁湯

五香連翹湯

○產後惡露不絕方論第三 凡九方

廣濟方 文仲葛氏方

獨聖湯 牡蠣散

補遺 胎愈

○產後惡露不下方論第四九六方

芍藥湯 備急丹 荷葉散 廣濟方 沒藥丸

補遺 說二

○產後餘血上搶心痛方論第五九三方

大岩蜜湯 失笑散 蜀椒湯 **補遺** 說一方

○產後惡露不盡腹痛方論第六九十二方

溫隱居澤蘭湯 產室方 地黄散 卷荷散 芸臺散

補遺 說二方

○產後兇枕心腹刺痛方論第七九十八方

延胡索散 天仙藤散 涌黃散 黑神散

桃仁芍藥湯 廣濟方 必効方 千金方 千金粟更酒

姜黃散 獨聖散 **補遺** 二方

○產後小腹痛方論第八九六方

延胡索散 香桂散 紫金丸 **補遺** 當歸養血丸 三

○產後寒疝方第九九三方

羊肉湯 產室方 **補遺** 說一方

○產後兩脇脹滿氣痛方論第十九六方

經効方 當歸散 **補遺** 抵聖湯

○產後積聚癥塊方論第十一九三方

桃仁散 三稜散 桂心散 **補遺** 大玄胡索散

○產後血瘕方論第十二九八方

鱉甲丸 產室方 千金方 凌宵花散 葛氏方

蓬莪茂散 **補遺** 說

○產後餘血奔心煩悶方論第十三九九方

集驗方 經効方 **補遺** 一方

產後虛煩方第十四九七方

蘇白湯 竹根湯 人參當歸湯 其竹茹湯 千金必効方
赤小豆散 蒲黃散 **補遺** 說二方

卷之二十一

產後乾渴類

○產後口乾痞悶方論第一 凡一方見現凡 **補遺** 說一方

○產後血渴方第二 凡五方

產寶方 楊氏家藏黃芩散 括樓散湯 千金竹葉湯

延胡散 **補遺** 當歸芍藥散

○產後乍寒乍熱方論第三 凡九方 **附** 產後方論

增損四物湯 大調經散 產寶方 知母湯

附 郭稽中產後方論

草菓飲子 生熟飲子 **補遺** 說三方

○產後尋芳方論第四 凡十一方

石子湯 許仁則方 人參鱉甲散 增損柴胡湯

熟地黃散 白茯苓散 黃耆丸 補益方

胡氏牡丹散 黃耆煮散 **補遺** 黃耆建中湯 猪腰粥

○產後虛羸方論第五 凡十五方

人參散 熟乾地黃湯 補虛丸 羊腎湯

羊肉當歸湯 黃雌雞湯 產寶方 救急方 當歸散

佛手散 當歸羊肉湯 **補遺** 說一方

○產後風虛勞冷方論第六 凡十二方

黃耆散 木香散 人參散 枸杞子丸 補益白薇丸

產寶方 延年澤蘭丸 廣濟方 **補遺** 濟危上丹

○產後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七 凡一方

抵聖湯 **補遺** 說一方

○產後嘔逆不食方論第八 凡四方

丁香散

開胃散

補遺

四君子湯

石蓮散

○產後霍亂方論第九 凡四方

白朮散

附子散

溫中散

良姜散

補遺

說一方

卷之二十二

產後傷寒類

○產後傷寒方論第一 凡七方

人參當歸散

小柴胡湯

增損柴胡湯

竹葉防風湯

陽旦湯

芍藥湯

千金蜀漆湯

補遺

說一方

○產後頭痛方論第二 凡三方

川芎散

芎附散

一奇散

補遺

說一方

○產後咳嗽方論第三 凡四方

二母散

集驗方

經効方

補遺

說一方

○產後喉中氣急喘促方論第四 凡四方

旋覆花湯

參蘇飲

補遺

說二方

○產後口臭黑氣起及鼻衄方論第五 凡二方

經驗方

海上方

○產後咳慮方論第六 凡六方

丁香散

石蓮散

產寶方

咳逆方

羌活散

補遺

說三方

○產後血崩方論第七 凡八方

固經丸

芎藭芍藥湯

乾地黄散

白芍藥散

阿膠丸

菖蒲酒

瑞蓮散

補遺

二方

○產後月水不調方論第八 凡二方

琥珀散

薑黃丸

○產後月水不通方論第九 無方

○產後四肢浮腫方論第十 凡九方

小調經散

加減茱萸湯

枳朮湯

奪命散

漢防己散

張氏方 **補遺**一方

○產後腹痛及瀉痢方論第十一 凡七方

調中湯 桃膠散 白頭翁湯 張氏的奇方 **補遺**一方

○產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第十二 凡三十一方

黃連丸 經効方 文仲方 救急方 必効方 廣濟方

赤石脂丸 膠蠟湯 當歸湯 許仁則方 桂丸方

續命湯 **補遺**一方 **新校**一方

卷之二十三

發產後痢疾類

○產後痢疾作渴方論第一 凡三方

必効方 經効方 古今錄驗

○產後大便秘 方論第二 凡七方

麻仁丸 麥蘗散 阿膠枳殼丸 許文士方

蜜兌法 **補遺**說一方

○產後大小便不通方論第三 凡三方

葵根湯 集驗方 桃花散 **補遺**說一方

○產後遺糞方第四 凡二方

廣濟方 集驗方 **補遺**一方

○產後諸淋方論第五 凡十五方

茅根湯 集驗方 滑石散 張允愚方 廣濟方

木通散 **補遺**二方

○產後小便數方論第六 凡一方

桑螵蛸散 括樓湯 **補遺**一方

○產後小便不禁方論第七 凡四方

廣濟方 千金方 固脬散 **補遺**補脬飲 雞肉金散

○產後小便出血方論第八 凡二方 **補遺**二方

○產後陰脫玉門不閉方論第九 凡十二方

硫黃散 千金方 廣濟方 當歸散

集驗方

陳氏玉元湯 髮法集驗方 桃仁膏 櫻枝散 皂角散

補遺四方

○婦人陰蝕五疳方論第十 凡八方

千金方 洗榻湯 甘濕散 狼牙湯 **補遺**二方

○產後乳汁或行或不行方論第十一 凡十五方

漏蘆散 產室方 一靈苑方 湧泉散 下乳方 崔氏方

千金漏蘆湯 **補遺**湧泉散 又二方

○產後乳汁自出方論第十二

○產後吹妳方論第十三 凡六方

括蘆散 天南星散 皂角散 經驗方 **補遺**一方

○產後如乳方論第十四 凡十方

赤龙皮湯 天麻草湯 飛鳥膏散 黃連胡粉膏

補遺經効諸方

○乳癰方論第十五 凡二十五方

連翹湯 張氏橘香散 陳日華方 金黃散

乾膿散 卅參膏 經効方 瓜樓散 **補遺**說方

卷之二十四

拾遺門

○婦人元臟受氣虛弱致生百病方第一 凡三方

濟陰丹 固真丹 大効内補丸 **補遺**說一方

○婦人血蠱血癭血結血失方第二 凡六方

木香散 石室散 大腹皮散 大黃甘遂湯

竹茹湯 膏髮煎

○婦人腸覃腸癰方第三凡二方

烏啄丸

瓜子陽

補遺 敗醬散 牡丹湯

蠟礬丸

○婦人整容方第四凡一方

面瘡方

補遺 栢連散 粉刺方 洗面藥 染髮方

○產乳集將護嬰兒方論第五凡二方

初生浴兒良日

木瓜丸 延胡索散

新刊類校婦人良方補遺大全月錄首卷里

新刊類校婦人良方大全卷之首

藥藥性製法

○辨識修製藥物法度

凡藥有宜火宜酒者有用子用皮者有去子去皮者有去苗葉者有別研入藥者有煎成湯去滓後入者若此之類各上不同今備于前既復更註於逐方之下

長砂

如鏡面者于上

雄黃

如雞冠通者于上

雌黃

无灰石者于上

石硫黃

如我兒黃色于上赤

者名石

伏龙肝

正光金月下土是也

太陰玄精石

已上並研令極細如麪無声于妙

禹餘糧

代赭

磁石

性性者妙

自然銅

紫石英

有紫色如箭者于上

雲母石

大已餘糧

已上並用火煨令通赤醋淬如此七次或十次方可研令極細如麪或用水飛尤妙

赤石脂 白石脂 陽起石 有雲頭兩肢輕鬆如狼牙者至不可用

研如麩或有大塊一出時 青礬石 每用一兩或兩錢用酒石二兩入只

解散研于麩乃 梁上塵 研如粉 絳礬石 青礬石 研如粉 白礬石 研如粉

石膏 如瓦真者以方 鮮石代之最 滑石 出佳者明白而暗者是吉則所

產色黑者各 蘇合香油 洗周生布絞去滓開用 竹茹 竹茹竹皮是也

桑寄生 對節而主根 木通 有川木通有錢子 未通即擊藤者于正今

果有奇効 阿魏 餅以麩搜和成 葛根 切片煎乾

罌粟殼 木密一宿少令焦色 有大毒能動胎氣多見豎者

麻黃 棟小者于上去根節若以上所用根節 人參 棟色黃明堂

不油者干上本草云不去 北細辛 棟直而極細味辛

地榆 歲靈仙 柴胡 前胡 羌活 獨活 宜用紫色

尋常白色者乃足老宿前胡謹不可用 羌活自是有白如鬼眼狀

人以紫色節密者為羌活黃色作塊者為 獨活即羌活時類也 療風宜用油活煎

紫苑 取茸薑如北細辛者良以牢山出 為上所交次之 雜以東

葉肺病最為急須今京師所有皆車前草 旋覆花根以赤土染之

又味雖大抵能走血又煎熱中復利小便 藥本

得之今又服走津液藥 秦艽 齒根

升麻 滿蘆 防風 棟軟而裏面有 藥若似

桔梗 肥人多以養危為之 要棟味苦 為上去心腹苦

已上並洗去苗蘆細切曬乾秤用 水香 棟如初骨氣味辛其甚者為上近時川人採南雲根以亂真

云土青木香不甚入 蘇合香 沉香 種類不一惟色 丁香

檀香 白芷 官桂 愈嫩則愈厚愈老則愈薄仍用紫色

藿香 荊芥 薄荷 紫蘇

諸香藥並不可見火或急用宜多紙裹懷燥用

北文 兩却用糯米粉打糊成餅子多黃用或以酒煨亦可

婦人良方首 製法之法

敗醬即今之苦

鳴起草即蒼耳也

澤蘭葉

紫蘇

藿香

荊芥

薄荷

香薷青柔

柏葉

茵芋

大青

莽草

枝

菴蘭

石楠葉

石韋去梗

批把葉

先用溫水浸別去毛却用姜汁炙

已上並去梗取葉以紗隔去塵土惟紫蘇藿香飲藥中宜蒸嫩梗大

能下氣

黃連

官棟大而以鷹爪者尤佳

石菖蒲

一寸九節者佳此種類甚多取生於石上葉有劔者真無劔者名溪

菴生

於泥中者名昌陽可解

舶上茴香

北茴香

葫蘆巴

以酒破故紙

蛇床子

薏苡仁

紫蘇子

除是自種自取力是真者可取

伐病

雖云細而香者是真近來人多採野蘇子以亂其真其子亦小却以真蘇葉按令香更不可辨

菴蘭子

亭蓋子

甜者棟細而脆者真要分甜若

黑牽牛

亦有半炒

牛蒡子

羌花

醋浸過炒令黃色去梗

已上並隔紙炒香用

五味子

色黑內有羊腎者佳入補藥中宜生用

木鼈子

去殼切

巴豆

川中來者似松子而差小者為上其殼及皮心用皮紙裹打去油如此者三五次油方盡或有不去油者

車前子

兔絲子

二味先用溫水淘洗去泥以紗隔去油乾方可

末為

香附子

金毛狗脊

骨碎補

細切炒令黃色春

石斛

陳色黃如金大者去根皮細切用酒蒸一宿蒸一伏又浸火炒燥用酒

肉蓯蓉

香而肥有鱗甲分明者如川牛膝布如鼠尾者為

當歸

已上氣香味甜者

為上微炒

並去薑酒浸半日不可太過久則失味先淨慢火焙乾切方秤分兩

五加皮

桂心

補藥用厚者發散用薄者

海桐皮

黃蘗皮

揚梅皮

白蘗皮

杜仲

厚朴

桑白皮

或炙或炒今人多以糖獨根皮為為最要子細辨

並削去粗皮細切方用惟杜仲厚朴每一斤用生薑一斤研取自然

汁菴一宿次日炒令黃色

甜瓜子

瓜樓子

冬瓜仁去杏仁

桃仁

郁李仁並先

及仁却用水煮一二併酸棗仁去皮炒栝子仁揀去殼

去皮以交其川黃新片口白辣香者為上去殼用及開口者

皂角子去皮弦川椒然後慢火炒色亦變以紙乘於地上後覆出汗

度山施名性佳縮砂 白豆蔻 益智 草菓取仁

檳榔如雞心大腹子生用肉豆蔻三味山茱萸

呵子炮去核取肉秤刀核者川練子蒸去皮大黃溫經

令香熟亦有三稜根為偽者逢我茂香較細切或更用醃醋

酒洗生用樽金狼毒 紫河車洗切神麴

日半 半夏麴以洗過半夏為末以生薑生地黄研取自然汁

天雄重兩半已上附子厚圓而堅草烏 川烏重七

五味並用灰火炮裂去皮尖併用吳茱萸去核半夏

天南星重一兩者佳忌用栗掌炮去二宿 吳茱萸去核半夏

二味並用湯泡七次 生地黄研取自然汁

熟地黄溫水爭洗焙乾却以酒發濕却用中子乘於瓶上

須商藥當用熟本草云男子 滴乳香用并粉同妙胡索根

具母去心姜汁 山藥 川芎 芍藥 知母

續斷川中來者佳小薊根已土畧洗細切巴戟揀紫色者為

牡丹皮 抱杞根即地骨皮也切虞世云此藥至賤都下

石蓮 烏藥川麥門冬 天門冬畧用水浸軟比二門冬去

仍不損藥力七藥並宜如此 遠志一宿黃芩刮去朽者

右有心者並搗去心只取肉焙乾秤用

青橘皮 橘皮取多年揀小而細者佳若大而黃者辨皮也不堪入藥

二味用溫水洗淨却於砂盆內磨去白焙乾秤

枳殼揀小而實者為上去穢殼必黃用木草有枳實一條王子

也類 茯苓藥宜用白色利水 茯神去木用色 猪苓水浸

右三味並去黑皮細切焙燥秤

婦人良方首卷 藥之法

9

蒼木 取茅山者為上米泔浸 白木 擇白而肥者方是浙木若瘦
不堪用油 者去之

右二木並去蘆切細焙乾却以麥麩炒令黃燥用

甘草 黃者 黃耆 擇如箭幹直而甜者佳去其皮 旋覆花 取白者 鶴風

諸花並去其毒蒂

血餘 淨洗 童子小便 夏月要入 龍齒

龍骨 並陳有布紋者佳台色為上五色者次之黑者為下火

虎頭骨 虎脊骨 天靈蓋 虎前脛骨 龜甲 鼈頭

鹿茸 煉過而有血色者佳大者為麋茸小者為鹿茸冬至口藥角

解是以利補陰藥性熱鹿茸性溫並洗淨

並用酥炙黃用

紫梢花 上如薄羅狀者是去木用 鹿角膠 阿膠 擇明亮

土味並細切以蚌粉炒燥如珠方用

桑葉 或去木 珍珠母 取末 玳瑁 用

犀角 有竹紋者 羚羊角 有馬鞍者佳

諸角宜用馬齒先鏽取屑懷煤為末方可入藥

牡蠣 取左 地龍 沙土只取皮 烏賊骨 一名海螵

僵蚕 云 穿山甲 細切 玃青 紅娘子 斑蝥 去尾

黃公 去取足 全蝎 天壽 蛇 虎持全 烏蛇 擇得小

石 折蟬 蛤蚧 並酒 烏 蛇

白花 蛇 石 折蟬 蛤蚧 並酒 烏 蛇

二蛇並用酒浸一二宿去皮骨取肉炙香用仍經久不蛀

晚 蟬 龜甲 擇大而有九

婦人良方首卷 製藥之法 五

五靈脂以開原者為上以砂者為次之先少 乾漆令壓不

狗羊腎及肝並去脂膜勿 鯉魚鱗 獭猪左懸蹄甲

娟皮 露蜂房 牛角腮 蒼朮

並用火燒存性研為細末用

麝香陳牙者真名生麝亦有 麝香用者研極細用 額肝用

並用研細為末用

荷葉必育用時中 益母草法根根各日

尾白散服 尾箭羽能脂取 五倍子法中

安息香去石 沒藥 乳香 琥珀

右五味並研細

新刊類校婦良方補遺大全卷之首

新刊婦人良方補遺大全卷之一



醫學士臨川 陳自明 良甫 編集

鰲山 熊宗立 道軒 補遺

松軒 葉玄昊 顯草 類校

調經門

○月經序論第一

凡醫婦人先須調經故以為初

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下天謂天真之氣降癸謂壬癸水名故云天癸也然衝為血海任主胞胎腎氣全盛二脈流通經血漸盈應時而下所以謂之月事者平和之氣常以三旬一見以像月盈則虧也若遇經脈行時最宜謹於將理將理失宜似產後一般受病輕為宿疾重可死矣蓋被驚則血氣錯亂經脈軒然不行逆於身則為血分癆瘵等疾若其時勞力則生虛熱變為疼痛之根若恚怒則氣逆氣逆則血逆上於腰腿則遇經行

時腰腿痛重過期即安也逆於頭腹心肺背脇手足之間則遇經行時其證亦然若怒極則傷肝而有眼暈脇痛嘔血瘰癧癰瘍之病加之經血滲漏於其間遂成竅穴淋瀝無有已也凡此之時中風則病風感冷則病冷久而不愈變證百出不可言者所謂犯時微若秋毫感病重如山岳可不畏哉

○精血篇第二 ○齊光祿大夫褚澄遺書

飲食五味養髓骨肉肌膚毛髮男子為陽也中必有陰也中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子為陰也中必有陽也中之數七故一七而陰血升二七而陰血溢皆飲食五味之實秀也方其升也智慮開明齒牙更始發黃者黑筋弱者強暨其溢也凡充身體手足耳目之餘雖針芥之歷無有不下凡子形肖父母者以其精血嘗於父母之身無所不歷也是以父一肢廢則子一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其母然雌鳥乳獸無天癸而成胎何也鳥獸精血往來尾間也精

未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已通而思色以降其精則精不出而內敗小便道澀而為淋精已耗而復竭之則大小便道牽疼愈疼則欲大小便愈便則愈疼女人天癸既至踰十年無男子合則不調未愈十年思男子合亦不調也則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而之腫或雖合而難子合男子多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

○產寶方序論第三

大率治病先論其所主男子調其氣女子調其血氣血入之神也不可
不謹調護然婦人以血為基本氣血宣行其神自清所謂血室不蓄則
氣和血凝結則水大相形月水如期謂之月信不然血凝成孕此乃調
變之常其血不來則因風熱傷於經血故血不通或外感風寒內受邪
熱脾胃虛弱不能飲食也既不充榮衛抑遏肌膚黃燥面無光澤時發
寒熱腹脹作痛難於子息子藏寒熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忍

致崩漏經云腹中如塊忽聚忽散其病乃瘀血涸不流而搏寢張時作
是熱此乃成癥或先後失期雖通而或多或少或寡寃病之源蓋本於此

○王子亨方論第四

論曰經者常候謂候其一身之陰陽德伏知其安危故其來必以月太
過不及皆為不調過於陽則前期而來過於陰則後時而至其有乍多
乍少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為邪詳說於下

○月水不調方論第五

夫婦入月水不調者由勞傷氣血致體虛風冷之氣盛也若風冷之氣
客於胞內傷於衝任之脈損手太陽少陰之經衝任之脈皆起於胞內
為經絡之海手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主上
為乳汁下為月水若則月水是經絡之餘若冷熱調和則衝任任脈氣
盛太陽少陰所之血宣流依時而下若寒溫乖適經脈則虛若有風
冷虛則乘之邪於血或寒或溫寒則血結溫則血消故月水乍多乍少

少故為不調也

石英圓

出本治婦人病多五月經乍多乍少或前或後時發寒

痛醫者一例呼為經病不曾論定陰勝陽是陽勝陰所以服藥少得有
効蓋陰氣勝陽則胞寒氣冷血運行經所謂天寒地凍水凝成冰故
令乍少而在月後若陽氣勝陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸
溢故令乍多而在月前當知陰陽調其氣血使不相勝以平為福

紫石英

禹餘糧

人參

龍骨

川烏

官桂

桑寄生

杜仲

五味子

遠志

澤瀉

當歸

石斛

茯苓

乾姜

川椒

牡蠣

甘草

右為細末煉密丸如梧桐子大每服三五丸空心米飲吞下○指

迷方同

加減

治衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不止赤

白帶下小腹急痛每至經行時頭眩飲食減少氣滿心忪肌膚不澤

悉皆主之 出張氏方

吳茱萸 半兩

麥門冬 乾姜

白茯苓 牡丹皮 南木香 苦梗 各三

北細辛 一錢半 沅風 官桂 各一 半夏 七分

右吹咀每服四大錢水一盞半生姜五片棗子一枚煎至七分去滓空心溫服

○治婦人室女經脈不調臍腹冷痛惡心腹常脹滿至晚則增宜服
烏沉湯 吞下艾煎丸 見和劑局方

薑黃散 治血臍久冷月水不調臍腹刺痛 出專治婦人方

川薑黃 成片子者 蓬莪木 紅花 桂心 川芎 各一

延胡索 牡丹皮 當歸 各二 白芍藥 三兩

右為細末每服一錢水半盞酒半盞煎至七分熱服

仁散 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四肢虛弱不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來幸躰沉

重唯欲眠睡多思酸物 澤蘭葉 川牛膝 各四兩

桃仁 粉草 半夏 各一 赤芍藥 生地黃 各三兩

當歸 桂心 牡丹皮 人參 蒲黃 川芎 各四

右為粗末每服五大錢水盞半姜三片煎七分空心滓去溫服

補遺固真丹 治元臍虛冷衝任衰弱月候或前或後乍多乍少頭眩

惡食或發寒熱小腹急痛赤白帶下心忪氣悶但子宮血海虛冷並皆

治療 方在二十四卷拾遺

醋付丸 治証同上

右以香附子不拘多少搗去毛淨用好醋煮半日焙碾為末醋糊丸

梧桐子大每服三四十九米飲吞下不以時候婦人數墮胎由氣

不下降所以胎氣不固此藥最妙一方加陳艾神驗 二方予用之

內補當歸丸 治血氣虛損月水不調或崩中漏下去血過多肌躰羸

困及月水將行腰腿痛重並皆治之

真蒲黃 炒七次 熟地黃 半斤 當歸 酒煮 阿膠 炒 白芷

續斷 炮 乾姜 炮 甘草 炙 川芎 各四 肉桂 附子 炮去

白芍藥 各一兩 白木 三刀 長茱萸 湯洗七次炒三兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九食前溫酒下

○月水不通方論第六

夫婦人月水不通者由勞傷血氣致令躰虛受風冷邪氣客於胞內傷
換衝任之脈并手太陽少陰之經致胞絡內血絕不通故也衝任之脈
起於胞內為經脈之海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經
為表裏王上為乳汁下為月水風冷傷其經血血性得溫則宜流得寒
則滯閉既為風冷所搏血結於內故令月水不通也又云腸中鳴則月
水不來病本在胃胃氣虛不能消化水穀使津液不生與氣故也所以
方單用厚朴其理 又云醉以入房則內氣竭絕傷冷肝使月水衰少不
來所以爾者肝藏於血勞傷過度血氣枯竭於內也又先唾血及吐血

下血謂之脫血名曰血枯亦月水不來也所以爾者津液減耗故也但
益津液其經自下也診於腎脈微澁者是月水不通也又左手關後尺
內浮為陽絕無勝脫脈也月水閉閉又肝脈沉而急隱之亦然時小便
難善頭眩痛腰背痛足寒時疼月水不來時恐得之時有所墮墜也月
水不通久則血結於內生塊變為血瘕亦作血癥血水相并壅滯不通
脾胃虛弱變為水腫也所以然者脾候身之肌肉象於土土主剋消於
水血既并脾氣衰弱不能剋消故水氣流溢浸漬肌肉故腫滿也

○產寶方論

論曰經脈不通日久此非細事實為沉病若是室女紅脈不通初因貪
食酸鹹之物遂致血脈乾涸變成勞疾若因經脈正行誤食熱麪生冷
為室遂成此疾腹內積塊語謔為胎時日稍深必見困篤

○養生必用論金病第七

初虞世云女子十四天癸至任脈通月事以時下故令有子天癸者物

之自然月者以月至經者有常也其來不可過與不及多與少及此皆謂之病不行尤甚百疾生焉血既不能滋養百病則髮落面黃身羸瘦血虛則發熱故身多熱水不足則燥氣燔燥氣燔則全受邪全受邪則肺家嗽也則為肺癰肺疾必矣醫見經不行則用蛭虫水蛭等行血藥見熱則用除熱諸寒藥寒出妄意故中不行以藥行之為害滋大經水枯竭則無以滋養其能行乎譬猶索万金於乞丐之人雖種禁並下不可得也但服以養氣益血諸藥天笑自行又有一種婦人盛實月經閉閉利之則行自有證候幸者宜審焉

當歸散 治血脈不通

當歸 川山甲 煨蒲黃 各半刀 煨 辰砂 一末 麝香

右為細末研停每服二末熱酒調下如不喫酒薄荷醋湯亦可

琥珀散 治心膈迷悶腹脹撮痛氣急氣閉月信不通并疾

天台烏藥 二兩 當歸 義茂 各一乃

右為細末每服二末溫酒調下後服以食壓之大忌生冷油膩等物

看產後諸疾用炒姜酒調下 已上出如人經驗方

○救急療婦人月經不調或一月不來或隔月不來或或多或少臍下絞

痛面色痿黃四體虛吸羸瘦不能食方

當歸 川牛膝 牡丹皮 桃仁 各兩 大黃 芍藥

土瓜根 芍藥 朴硝 桂心 蛭虫 去翅 水蛭 各半

右以水九升煮取三升分溫五服忌如常法

○療月經不通腹中痛 見產寶方

牛膝 六分 大黃 桃仁 去皮尖 炙 細辛 各五

當歸 各四 水蛭 三分 糯米炒黃

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下

○治月水不通 出產方 已試有驗

厚朴 姜汁炙香細切 不以多少濃煎去滓空心溫服

○治婦人經候不來數月臍腹疼痛或有一塊上下相柱飲食減少腹滿惡心大便秘澀者宜服局方北亭丸用石菖蒲馬鞭草煎湯送下三四十九兩服必通

治治女人月經淤閉月候不來繞臍寒疝痛徹及產後血氣不調腹中生瘕結而不散及癥瘕等病

乾漆

許碎炒令大烟出煙

牛膝

去苗酒浸一宿焙各一丸

右為末以生地黃汁壹升入二味藥末銀石器內慢火熬候可圓即圓如梧桐子大空心米飲或溫酒下二九日再勿加病去止

補遺

每服當二

治治婦人血臟虛竭或積瘀血經候不行或斷續不定時作腹痛腰膝重疼攻刺小腹緊硬及室女月經不通並宜服之

紅花

當歸尾

紫葳

牛膝

甘草

蘇木

各二

白芷

桂心各半赤芍藥

九丸

劉寄奴

去根五兩

右為細末空心熱酒調三錢服食前臨卧再服若血久不行濃煎紅花酒調下孕婦伏服一名凌霄花散

治

治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結硬時發刺痛漸成

勢狀出神劑方

龍中去糖桂心

三稜醋煮牡丹皮

牛膝去苗呵子肉

琥珀

大黃濃

土瓜根

桃仁

去皮尖及人麩炒

右各等分為細末煉蜜丸如梧桐子大煎桃仁湯送下十五丸破血廢氣塊尤效

治治月水不調阻滯不通

大黃

補硝

桃仁

去皮尖及人麩炒各二丸

蜚虫

一及去足翅炒黑用

右為細末用醋五升入銀石器內慢火熬成膏可圓上如梧桐子大當日晚不須喫食五更初以溫酒吞下一丸至明日午際取下如赤豆汁或似鷄肝蝦蟇衣其病下了即一丸分作二服未下再服

候鮮紅即住服仍以調氣湯散補之

補遺 夫氣血散 治婦人月水不行發熱腹脹等疾

當歸 酒浸 凌宵花 劉寄奴 紅花 酒浸 留置在後煎 官桂

牡丹皮 白芷 赤芍藥 延胡索 各等分

右咬咀每服五錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎沸去渣熱服

○室女月水不通方論第八

論曰夫衝任之脉起於胞內為經脉之海手太陽小腸之經手少陰心之經也二經為表裏心主於血上為乳汁下為月水也女子十四而天癸至腎氣全盛行任流通經血既盈應時而下各之月水常以三旬而一見謂之平和也 若倦期者由勞傷血氣壅結故令月水不通也

補遺 治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心 青皮 大黃 煨 川椒 莪茂 川烏 炮去

乾漆 碎之 煨 令盡 當歸 桃仁 去皮尖 炒 乾姜 各等分

右為細末分為四分用一分以米醋熬成膏和餘分藥末成劑切

治之圓如梧桐子大曬乾每服二十丸淡醋湯下至三十丸温酒

亦得空心食前服

○治室女月水不通 出聖惠方

雄鼠屎一兩燒存性為細末空心温酒調下一錢神效

補遺 杜牛膝散 治婦人室女血閉不通五心煩熱

紅花 半斤 當歸 杜牛膝 各五斤 桃仁 去皮尖 二斤半

右為末每服二錢空心温酒下

○室女經閉成勞方論第九

冠宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者世有室女童男積想在心思慮過當多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭也則神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金婦人良方一卷 調經明

氣虧故發軟。既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒髮焦筋痿
俟五臟傳遍故卒不能死者然終死矣此一種於勞中最難治蓋病起
於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接
如此則可得九死一生舉此為例其餘諸勞可按脈與證而治之。張
氏云室女月水又不行切不可用青心等涼藥醫家多以為室女血熱
故以涼藥解之殊不知血得熱則行冷則凝養生必用方言之甚詳此
說大有理不可不知

○若經候微少漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生期熱其脈微
數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火上逼水固亡津液當養
血益陰慎無以毒藥通之宜栝子仁丸并澤蘭湯

栝子仁丸

栝子仁 炒別研

牛膝

卷栝 各半

澤蘭葉

續斷 各二兩

熟地黄 三兩

右為細末煉蜜丸如梧栝子大空心飲下三十丸

日中散

澤蘭葉 三兩

當歸

芍藥 各一兩

甘草 半兩

右為粗末每服五錢水二錢煎至一錢去滓溫服

赤白帶散

治室女榮衛不調經候凝滯或時頭目昏悶上膈積涎
肢體不利五心虛煩飲食進退多困少力

沉香

井草 灸

續斷 各一兩

木香 一兩

鼈甲 半

常山

當歸

柴胡

人參

半夏

桂心

生地黄

白茯苓

青皮

陳皮 各一兩

右為細末每服二錢水一盞生姜三片煎至七分溫服空心日三服

金花散

治室女骨蒸熱勞

藿香

零陵香

延胡索

芍藥

白芷

川芎

當歸

桂心 各一兩

蓮子心 分

晚蚕蛾 分

右為細末溫酒調下一錢日二服

清心散

治心腎俱虛勞嗽二三聲無疾遇夜發熱熱過即冷既有盜
汗四肢倦怠體勞黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥

汗四肢倦怠體勞黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥

能治微嗽有唾上中有紅線名曰肺痿若上件疾不治便成羸劣之疾

白芍藥六 綿黃耆 甘草 人參 當歸 半夏
白茯苓 熟地黄 五味子 阿膠各二兩炒

右咬咀每服三大錢水盞半生姜十二片棗三個煎至九分無時溫

服日進三服。陳總領日華云鄉人揚元鼎女及并病證甚危一

歲之間百藥俱試無有效者亦嘗從予求治法無有應之者偶遇
名醫得此方只一料遂除根專錄此方傳人

貧血湯

治婦人血熱氣虛經候澀滯不通至使血聚肢體麻木渾身

疼痛煩倦或室女年及經脈未行日漸黃瘦將成勞疾切不可便投紅
花破硬等物他日為患也若是前證則憎寒發熱五心煩燥飲食減少
宜服此藥滋養而通利之

挂心 枳殼 川芎 當歸各二 赤芍藥二 牡丹皮一
馬鞭草 荆芥穗各四兩

右為粗末每服四錢烏枚一個水二盞同煎至一盞去滓空心食前

日四服有此證服至半月經脈自通此方至妙不可輕視非一二

服便見特達之效而鄙之仍服後素有諸疾因此藥皆去矣

麥煎散

治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胸煩痛出蘇沈良

鱉甲 大黃溫紙 常山 赤茯苓 柴胡 白朮

當歸 乾漆炒令煙盡 生地黄 石膏各一兩 甘草半兩

右為細末每服二錢水一盞小麥五十粒煎至六分食後臨卧時溫

服有虛汗加麻黃根一兩此黃州吳判官方治骨熱黃瘦口臭肌

熱盜汗極效麥煎散甚多此方吳君寶之如希世之珍其效可知

麥煎丸

治男子婦人童男室女五勞七傷傳症飛尸尸注八極骨蒸

肺痿黃瘦虛勞無力肌肉不生婦人血蒸五心煩熱血風勞氣室女月

閉黃瘦氣塊腹痛經脈不調乾嗽咽膈不利癥瘕積塊臉赤口瘡已上

等疾無不效驗 黃耆 柴胡 枳殼 知母

白茯苓 沉香 人參 附子 木香 升麻

肉桂 胡黃連 杏仁 當歸 常山 羌活
京三稜 烏梅肉 安息香 明者同胡桃肉細研

右十九味修製了各秤一兩為末用活蠶一箇重十兩或半斤者以河水養七日須逐日換新水用童子小便五升無灰酒五升銀石器內慢火熬百沸先更入挑柳枝東南上者各剉三合烏梅五十箇拍破此三味用綿裹同蠶煎煮至一半去挑李枝等三味蠶便取去將肉研如膏骨并殼焙乾為末再入汁中熬如漆色或更入酒少許此在臨時斟酌盛放瓷器中搜和前藥入臼中杵千下圓如梧桐子大丈夫婦人十五歲以上二十九至三十九溫酒下婦人荆芥酒下所煮膏子須契勘多少勿令剩却但少些子不妨却別熬酒若膏剩恐斃不全故也凡服此藥恐熱三日更須服八儂飲子一服解之

飲子

常山 白木 秦艽 洪州鬼臼

赤芍藥 甘草 紫蘇 銀州柴胡
右等分洗淨為粗末每服半兩水一碗烏拔肉二箇葱白薤白挑柳槐枝各七寸同煎至一盞去滓溫服滓併煎

○治女子經脈不行胸膈滿悶身軀麻木或有寒熱候
厚朴 牡丹皮 茅香 藿香 甘草 名三錢 陳皮
生半夏 麥芽 蒼朮 少各半及 赤芍藥 三分 當歸 半兩

補遺 大油煎散 治女子經候不調臍腹脹滿腰腿無力煩渴潮熱身軀拘攣日漸羸瘦

海桐皮 五加皮 牡丹皮 地骨皮 桑白皮 各等分
右剉散每服四錢姜三片棗一枚清油數點水一盞半煎空心溫服

注冊散 婦人室女血氣虛損內則月水不行外發潮熱肢軀羸困漸

成骨蒸此藥治之

桂心

陳皮略一

莪朮

鬼箭各三錢

延胡索

沒藥

當歸

乾漆各二

蘇木

甘草各半

烏藥一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分不拘時服

○血枯方論第十。出駱龍吉方

腹中論曰有病胸脇支痛者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液四肢清目眩時七前後血病名曰血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也註云夫藏血受天一之氣以為滋榮者也其經上貫膈布脇肋今脫血失精肝氣已傷故血枯酒而不榮胸脇痛以經絡所貫然也妨於食則以肝病傳脾胃病至則先聞腥臊臭出清液則以肝病而肺乘之先唾血四肢清目眩時七前後血皆肝病血傷之證也

烏賊魚骨丸

治婦人血枯胸膈四肢羸妨於食飲病至聞腥臊臭氣

先唾血出清液或前後泄血目眩轉月事衰少不來 岐伯方

烏賊魚骨

去甲四兩

薔茹 一兩

右為末以雀卵和成劑丸如小豆大每服五丸加至十丸以鮑魚煎

湯下以飯壓之

養血合丸

治婦人胸脇支滿聞腥臊氣唾血目眩不能飲食泄血不已

日久血枯

菴菴 酒浸 熟地黄

白茯苓

兔絲子

附子 炮

當歸 炒

白石英 研 五味子

禹餘糧 研 烏賊魚骨

去甲各一兩

人參 半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大酒下三三十九丸米湯亦可空心日中

臨臥各一服

乾地黃湯

治婦人先有所脫血或醉入房勞傷故月事衰少不來

乾地黄

澤蘭葉

白茯苓

人參

五味子

附子 炮

禹餘糧 制

當歸

右等分為粗末每服三錢薑五片水一盞煎至米分空心溫服

磁石丸 治婦人陰氣衰弱血枯不榮月事不來

磁石製研 白茯苓 附子炮 乾地黄 人參 當歸

右各一兩為細末煉蜜丸如梧桐子大酒下三十九米湯亦可空心

日中臨卧各一服

補遺 **失令補心湯** 婦人以血旺氣衰為本心主血肝藏血今血衰而

氣盛者由心氣虛耗不能主血又不能制乎肺金使肺氣得以乘乎肝

木肝之虧損則血不能藏漸致枯涸不榮經絡故月事不調矣此方專

補心元之虛抑其肺氣之乘調和榮衛滋養血脉其疾自然平復矣

○即參蘇飲內除木香與四物湯對分勻和以姜棗煎每服四錢

食前溫服 參蘇飲 方在中風門 四物湯 方在氣滯門

○月水不利方論第十一 不利不流利也凡四方

夫婦人月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受風冷客於胞內損傷

陳皮 官桂 烏藥 川芎 羌活 各等分

右為末每服二錢生薑三片半酒半水煎空心服

○月水行或不行心腹刺痛方論第十一 凡六方

論曰夫婦人月經來腹痛者由勞傷血氣致令體虛風冷之氣客於胞

絡損於衝任之脉手太陽少陰之經衝脉任脉皆起於胞內為經脉之

海也手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水

其經血虛則受風冷故月水將行之際血氣動於風冷也 與血氣相

擊故令痛也 亦可就第七卷第十五論尋方

○若經道不通統脈寒亦動微其脉沉緊此由寒氣客於血室血凝不

行結積血為氣所衝新血與故血相搏所以發痛譬如天寒地凍水凝

成冰宜溫經湯及桂枝桃仁湯萬病丸 乃病方見第七卷第七論

溫經湯 當歸 川芎 芍藥 桂心 牡丹皮

義茂 各半兩 人參 甘草 牛膝 各一兩

多或少 方見後崩中帶下十六論

失笑散

治婦人室女月水或行或止心腹刺痛

五靈脂 蒲黃各等分

右為末 醋調 二錢 熬成膏 入水一盞 再煎七分 食前熱服

○月水不斂方論第十三 凡六分

夫婦人月水不斂者由損傷經血衝任脈虛損故也衝任之脈為經脈之海手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水若勞傷經脈衝任氣虛故不能制經血令月水不斂也凡月水不止而合陰陽則冷氣漸入於臟令人身體面目痿黃亦令絕子不產也

○若經候時行時止或淋瀝不斷腹中時痛其脈沉細此因寒熱邪氣客於胞中衝任不調此非虛弱蓋邪氣伏留滯於血海譬如有積之人利不定有所去即愈宜**牡丹皮** **牡蠣**

厚朴 **吳茱萸** **川椒** **人參** **川芎** **北柴胡**
桂心 **乾姜** **細辛** **兩** **蜜虫** **五十箇** 去頭足 炒
小炮 **大黃** **葶藶** **若梗** **茯苓** **當歸**

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下十九丸末知漸加至二十丸以知為度

續斷丸

治婦人月水不斷口乾心煩四肢羸瘦飲食無味漸加之弱

川續斷 **當歸** **烏賊骨** **黃耆** **牛角鯁** **五味子**
耳草 **龍骨** **赤石脂** **熟地黄** **各一兩** **地榆** **各半**
艾葉 **附子** **乾姜** **川芎** **各三分**

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸食酒溫酒下

禹餘糧丸

治婦人久冷月水不斷面色痿黃四肢瘦弱心神虛煩飲食減少

赤石脂 **熟地黄** **川芎** **乾姜** **黃耆** **艾葉**
栢葉 **當歸** **人參** **白茯苓** **各半**
禹餘糧 **鹿角膠** **紫石英** **續斷**

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下

地礪丸 治婦人血海虛損月水不斷

牡礪粉 赤石脂 代赭石 各一兩 阿膠 川芎

當歸 鹿茸 續斷 乾姜 各三分 甘草 一分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九食前温酒下

○療經血不止 黃芩 五分 當歸 栢葉 蒲黃 各四分

生薑 二分 艾葉 一分 生地黄 二十四分 伏龍肝 十二分

右咬咀用水二升煎取八合分為二服

○療經血不止歌曰 此婦人經驗方。已試有效

婦人經血正淋漓 獲瑞蓮蓬燒作灰

熱酒一盃調八字 自然安樂更無疑

又一方 蓮蓬殼 拒霜花

右二味等分為末每服一錢空心米飲調服

補遺 治婦人經水不止

香附子 白芍藥 熟艾

右等分每服五錢水煎空心服

○婦人殺血心痛方論第十四 一方

凡婦人血崩心痛甚者名殺血心痛小產血過多而心痛甚者亦然

烏賊魚墨炒醋湯調下 此魚腹內有墨汁過見人必吐甚墨以蔽其身

補遺 失笑散 治証同上 方見前

○崩暴下血不正方論第十五 凡三十六方

論曰夫婦人崩中者由臟腑傷損衝脈任脈血氣俱虛故也衝任之脈為經脈之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平而氣血調適經下依時若勞動過多致臟腑俱傷而衝任之氣虛不能約制其經血故忽然暴下謂之崩中暴下診其寸口脈微遲尺脈微絃寸口脈微遲為寒在上焦但吐爾今尺脈微絃如此即小腹引腰脊痛

婦人良方一卷 婦人經水不調 婦人經水不調 婦人經水不調

者必下血也

○若經候過多遂至崩漏色明如水下得温則煩甚者至於昏悶其脉數疾小為順大甚者逆此由陰陽搏為熱所乘攻傷衝任血得熱則流散譬如天暑地熱則經水沸溢陽傷於陰令人下血當補其陰宜服小

小煎湯

右三件入水一盞煎至一半去滓温服

小煎莖葉

洗切研取汁一盞

生地黃汁一盞

白木

半升

阿膠散

右等分為細末滴水丸如梧桐子大阿膠湯化下二丸

琥珀散

治崩暴下血 陳總領方

赤芍藥

香附子

荷葉 枯

男子髮

皂莢水洗

當歸

棕櫚 炒焦

烏紗帽

是漆紗頭中取陽氣行上故也

右等分除棕外其餘並切麤片新瓦上煨成黑炭存性三分為細末

每服三五錢空心童子小便調下如人行十里再進一服不過七

八服即止如產後血去多加米醋京墨麝少許予親戚黃守正知

為和劑局日內子凌夫人忽苦此疾危殆百藥不效偶得此方旋

即安愈○張聲道云大率治血崩先用此譬如治崩有積不先去

之徒服斷下藥一時暫止久則毒氣愈深甚至危殆血崩乃經脉

錯亂不循故道滲溢妄行一二日不止便有積瘀之血凝成窠臼

更以藥澁住轉見增劇宜先以五積散加醋煎投一二服次服靈

脂散及順氣藥去故生新自能平治此切當之說

五靈脂散

治婦人血山崩及治丈夫脾積氣○張氏云治血崩諸藥

不能止者妙好五靈脂炒令煙盡為末每服一錢温酒調下此藥兼能

解藥毒及蛇蝎蜈蚣咬塗傷處立愈。一方每服三錢水酒童便各半

盞煎至八分通口服名抽刀散治產後有病服三服散惡血或心腹脇

肋脚痛不可忍者或只用童子小便尤佳或中風即入草烏頭半錢重

同煎此鄧知縣方。張氏云亦治腸風下血如不能飲酒者煎為梅柏
葉湯調下如心煩口乾渴者加蒲黃炒減半用一方燒存性霹靂酒調
下然此藥氣惡難喫燒之存性極妙

又一方

五靈脂十兩為末水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎成膏入
神麩二兩為末和丸如梧桐子大每服二三十丸溫酒下

荆芥散

治婦人崩中連日不止 夏太君婦娘方
用荆芥穗於燈盞多着燈心好麻油點燈就上燒荆芥焦色為
細末每服三錢童便調下

獨聖散

治婦人血山崩不止 止經驛方
防風 去義蘆。右不以多少為細末酒煮白麩清調下二錢空
心食前日二服更以麩作糊酒投之極驗

已上三方似非止血之藥如靈脂荆芥防風皆是去風之藥然風

為動物衝任經盛被風所傷致令崩中暴下僕因覽許學士傷寒
脉歌曰脉浮而太風傷榮也血也而用此藥方悟古人見識深奧
如此矣

一方

右為粗末用水五盞先煮艾葉至二盞半入膠消洋溫分二服空心
服一日服盡

又方

牛角髓 烏賊骨 各一分
麝香 一錢
右為細末入麝香令停酒調下一錢七一日二三服

神應散

治婦人血崩不止
桂心 不以多少碎細內微
為末每服一二錢米飲調下

又方

治崩中下血 出本事方
黃芩不以多少為細末每服一錢霹靂酒調下 許學士云崩中
補血藥此治陽乘於陰前所謂天暑也然經水非淫是也近
有玉飾醫值夜喚起有一宮女血如山崩其時暑月葉筒中只

有大順散西古用今水周服極則奏效以此知醫要惟變合亦效

金華散 治婦人血室有熱崩下不止服溫藥不效者

延胡索 瞿麥穗 當歸 乾葛各一兩 牡丹皮及石膏 二兩

桂心 別馬卡三分 蒲黃半兩 威靈仙 三分

右為細末每服三錢水一盞煎至六分空心溫服日一服

○凡血崩之疾亦有陰陽分熱之不同不可一槩用藥僕常察一婦人崩漏暴下諸醫投姜桂附子等藥服之愈甚召余診之六脉緊數遂用此藥兼局方龍腦蘇丸數服即安本事方單用黃芩者亦此之意也

如聖散 治婦人血山崩

棕櫚 烏梅各一兩五分 乾姜燒過存性

右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服又患者不過三服即愈
一方 用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方 用棕櫚燒存性為末湯破酒分淡調下三錢空心服

又方 用棕櫚白礬各一兩 為末酒調三錢服

屢效方 治婦人血崩

當歸 白芍藥 乾姜 棕櫚各等分

右各煨存性碾如細末秤過醋湯調以有節朱筋左攬四十九轉食前服

千金方 治婦人崩中去血不止

大小薊根 一斤 用酒一斗漬五宿任意服之千金方用白茅根六兩半酒煮服

縮砂散 治血崩

新縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為細末米飲調下五錢

又方 用益智炒為細末鹽米飲調下

如神散 治婦人血崩不止赤白帶下

香附子 赤芍藥名芍

右為細末每服二錢益一捻水一盞煎至七分溫服無時候日二服十服見效

一方

用香附子去毛炒焦為細末用極熱酒調下二錢放溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢七如山崩不可者亦能解之米飲調亦可。許學士云治下血不止或成五色崩漏常服資血調氣是婦人仙藥也已上並出婦人經驗方

養附丸

治婦人室女一切血氣經脈不調臍腹疝痛面色痿黃心怔乏力腹脹脇痛頭暈惡心飲食減少崩漏帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治之慶心服餌自見其功爾已上三方大同小異此並實方

香附子

不必多先將去毛用上好醋煮出苦味

○為末醋煮糊為丸如梧桐子大

每服三十九米飲送下无時候婦人數墮胎由氣不下降所以胎氣不固此藥尤妙一方有文同養亦好

○治血崩方

用夏枯草為細末每服二錢米飲調下无時候

○治崩中下血不止小腹痛

為藥 一兩半炒黃 相兼 六兩微炒

右水一升煎取六合入酒五合再煎取七合空心分為兩服一方為

細末酒調二錢一方有鹿角膠等分炒燥為細末酒調服方寸匕

治白帶臍腹疼痛面黃瘦悴也千金聖惠方

○治崩中下血久不止或赤或黑臍下痛

側柏炒 芍藥 龜甲炙 桑耳各六分 乾地黄 黃耆

細斷各五分 當歸炒 艾葉 牛角各四分 禹餘糧分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九煎黃耆湯空心下

○治崩中書夜不止醫不能治

芎藭 一兩 生地黄汁 二合

先用酒五升煮芎藭一升去滓下地黄汁再煎二三沸分為三服不
耐者漸進 小品方元地黄汁不欲酒者水煎亦可

一方 丁香二兩為細末用酒三升煮取一升空心頓服必效方用丁
香百顆酒煎服 梅師方同

○治忽患崩中血不止結作血片如鷄肝色碎爛

- 芎藭分十二 阿膠
- 青竹茹各八分
- 續斷
- 地榆
- 小薊根各十分
- 當歸六分 生地黄
- 伏龍肝各十二分

右用水九升煮取三升去滓分作三服先服此藥後服補藥九子

- 阿膠
- 龜甲
- 川芎
- 當歸
- 赤石脂
- 丹參各六分
- 續斷
- 甘草
- 龍茸各五分 龍骨十一分
- 龜甲十分 地榆七分
- 烏賊骨八分

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下二十九日二服常煮小薊汁
服之尤佳

○治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立

- 芍藥
- 白芷
- 黃耆
- 龜甲
- 川芎各八分 烏賊骨八分
- 乾地黄
- 牡蠣
- 五色龍骨
- 乾姜各十分 桂心六分 附子五個

右為細末空心酒調方寸匕

- 白芷
- 牡蠣
- 龍骨
- 芍藥
- 赤石脂
- 阿膠
- 當歸
- 川芎
- 鼈甲
- 烏賊骨
- 人參各六分 艾葉四分
- 乾地黄八分
- 呵子四分 乾薑
- 黃耆各五分

右為細末空心酒調方寸匕

如丸 治婦人崩中赤白帶下 鄧元老方

- 當歸
- 白朮
- 青木香
- 蚕蛻段
- 墨棕刷煨 地榆
- 川山甲煨各一兩
- 竹茹
- 川芎
- 白茯苓
- 粉草

- 血餘煨 牡蠣煨
- 綿子各半及熟 地黄四兩 赤石脂煨各三兩

右七味煨藥用綿子裹定入瓶子內用益泥固濟用炭則半煨存性

却同前藥碾為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九空心温酒吞下服

經驗方 治崩暴下血

百草霜二錢 狗膽汁壹處并停分作兩服當歸酒調下

如聖方 治血山崩

晚香冰 一兩 伏龍肝 半斤 同為細末酒調二錢七

千金方 治崩中去血不止千金翼無茅根

白茅根 二兩 小蘗根 五斤 一方無小蘗根

右二末細切用酒五升煮取四升去滓分四服温服

○婦人崩中無問久近悉皆治之

伏龍肝 斤 小蘗根 桑寄生 續斷 地榆 艾葉 各三

阿膠 當歸 赤石脂 厚朴 各二 生薑 五兩

右十味切以水一斗煮取三升絞去滓分作三服忌如常法

補遺 **奇效四物湯** 治有熱久血崩一服稍安八服無恙

當歸 熟地黄 白芍藥 川芎 大艾葉 阿膠 炒 黃芩

右等分每服四錢水一盞姜四片煎空心温服

又方 陳槐花 一兩 百草霜 半斤 同為末燒紅秤鍾淬酒下

又方 治經血得執漏崩不止口苦咽乾

黃芩 黃柏 各二 黃連 五升 阿膠 炒 四升

每服四錢水煎温服

鎮心石 治崩漏不止或五色或赤白不定或如豆汁或狀若豚肝或

下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久不止令人黃瘦口乾胸煩不食

代赭石 紫石英 禹餘糧 已上三件並用火煨醋淬出滓

香附子 去毛醋煮 陽起石 川芎 麝茸 燒去毛醋蒸焙

伏神 去木 阿膠 當歸 酒浸 蒲黃 各一 升 血竭 別研五

右為末艾醋汁打糯米糊丸梧桐子大每服七十九空心米飲吞下

崩中帶下方論第十六 凡三十方

論曰崩中帶下者何答曰其患有五夫病之中人皆有受憂因起之候
 須盡心講究竊尋方書唯言帶下有血色之與形此不參先賢醫中之理
 也且五崩是婦人極重之患療之最難後之學者莫識其源殷幼習醫
 方濟衆服餌當極濟人之道徧以思慮於茲彌久其功頗有精妙夫此
 病者起於風氣寒熱之所傷或產後早起不避風邪也上之氣入於胞
 門或以經脈流傳臍膈而發下血名為帶下若傷足厥陰肝之經其色
 則青如泥色若傷手少陰心之經其色赤如紅津若傷手太陰肺之經
 其色則白形如涕若傷足太陰脾之經則其色黃如爛瓜若傷足少陰
 腎之經則其色黑如衄血此為其因也。問曰風邪氣之所中是人皆
 受之何為婦人獨患此病答曰五臟六腑男女雖同其中細微各有差
 別緣婦人有胞門子臟風冷中之則為所病若男子則為他病矣。又
 問何以名為帶下復有冷熱者何答曰脈有數經名字不同音經八脈

有帶在腰如帶之狀其病生於帶脈之下其有冷熱者即隨其性也又
 號崩中者二帶之下別名也請君子有留心於醫存志備者以此推
 之萬不一失

崩中漏下生死脈方論第十七 凡三十三方

論曰夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脈虛損故也衝脈任脈
 為經脈之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也手少陰心之經也此
 二經上為乳汁下為月水婦人經脈調適則月水依時若勞傷衝任氣
 虛不能制其經脈血非時而下淋瀝而不斷謂之漏下也。致五臟傷
 損五臟之色隨臟不同若五臟皆虛損者則其色隨血下診其脈寸口
 弦而大弦則為藏大則為訖藏則為寒訖則為虛上寒相搏其脈為牢
 婦人即半產而漏下又云尺脈急而弦大風邪入少陰之經女子漏白
 下赤又漏下赤白不止脈小虛滑者生脈太緊實數者死也又漏血下
 赤白日下血數斗脈急疾者死遲者生也又云尺寸脈虛者漏血漏血

婦人月方一老
脈浮不可治也

○若經候過多其色瘀黑甚者崩下吸口少氣臍腹冷極則汗出如雨
尺脈微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中氣不能固可灸關元百壯
下當中
宜**龍耳丸**
麤茸燎去毛醋炙 赤石脂 禹餘糧製各

艾葉 栢葉 附子炮各 熟地黃洗焙 當歸 續斷各二

右為細末酒糊丸如梧桐子大空心溫酒下三十圓

栢葉散 治婦人崩中漏下不問年月遠近

栢葉 續斷 川芎 當歸 生乾地黃 龜甲
鼈甲各一 禹餘糧二 阿膠 赤石脂 牡礪

地榆 艾葉 養茸各一

右為末每服二錢食前粥飲調下。一方有丹參如龍茸數煉蜜丸
如梧桐子大每服三四十九丸空心溫酒吞下

益母草散 治赤白惡露下不止

益母草開花時採陰乾為細末空心溫酒調二錢日三服

○療帶下赤白年月深久不差

乾薑半兩 白芍藥二兩

右各炒黃色同為末空心米飲調二錢日兩服

續命方 乾姜 芍藥等分 又云加香附子等分 甘草成半

右各炒黃色同為末空心米飲調下方寸匕

白芷散 治婦人赤白帶下

白芷一兩 海螵蛸二个 燒 胎髮一團 煨

右為細末空心溫酒調下二錢

乳香散 治赤白帶下

草菓一个去皮入乳香一小塊用麩餅

右為細末每服二錢陳米飲調下重者三錢

破故紙散 治赤白帶下

破故紙 石菖蒲 等分並剉炒

右為末每服二錢用菖蒲浸酒調溫服更入斑猫五个 去翅頭足糯米同炒去米

治子宮久冷赤白帶下 牡礪 煨 黃狗頭骨 煨

紫梢花 韶膠 母丁香 蛇床子 破故紙 桂心 等分

右為細末煉蜜丸如鷄頭大臨事用一粒

白帶冷丸 治婦人血脈久冷赤白帶下補虛進食暖血海

北礬 四兩 大附子 二兩二個 黃狗頭骨 四兩

右為末粟米粥為丸如梧桐子大每服三十圓醋湯吞下或飯飲亦

可空心日三服忌生冷毒物

伏龍肝散 治婦人赤白帶下久患不瘥肌瘦黃瘁多困乏力

棕櫚 不以多燒灰火急 伏龍肝 於鍋竈直下去取

梁上塵 懸長者如死以竈頭虛空中者炒令煙尽於淨地出

右三味等分碾和令停入龍腦麝香各少許每服二錢溫酒調下

醋湯亦可患十年者半月可安 予方一親戚婦人年四十五經年

語言所服諸藥無效召僕診之六脈微濡問之服何藥云凡

當歸川芎益血諸品丹藥服之皆不作效僕遂合清劑方於左

伏龍肝散 治婦人血海不調因虛冷成積經絡無定赤白帶下崩中不

止面色度黃胎氣多損 三方出持法

白茯苓 青木香 杜仲 菖蒲 乾地黄 栢子仁

秦朮 青皮 兔絲子 呵子皮 當歸 艾葉

青石脂 五加皮 牛角觥 烏賊骨 等分

右為末每日空心以糯米粥一盞將一匙粥攤溫炒藥一錢相和喫

下後喫餘粥或有胎息用鯉魚糯米粥下

○治冷白帶下

桑寄生 芍藥 栢葉 各四分 桑耳 禹餘糧 各六分

吳茱萸 乾地黄 各八分 烏賊骨

右為細末空心用飯飲調下二錢也

○治白崩中不絕

批礪 禹餘糧

各六分

黃皮

阿膠

烏賊骨

續斷

白芷 各四分

當歸

赤石脂 各六分

白石脂

龍骨

各五分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九空心溫酒下

○治帶下

茅花 炒一握

棕櫚炭 三握

嫩蓮葉 三張

耳節草 和

右為細末空心酒調方寸匕

○治赤白帶下骨立者 崔元弼方

地榆 一斤洗剉

用水三升煮至一半去滓再煎如稠錫絞濾空心服三合日二服

聖惠方 治漏下五色亦治嘔血

地榆 三兩

本草注云地榆主帶下十二病一日多赤二日多白三日多黃四日多黑五日多青六日多紫七日多赤八日多白九日多黑十日多青十一日多赤十二日多白

門辟七日合發陽氣痛八日小腹寒九日子痛用錯一升

煮十餘沸去滓食前稍熱服一合

○治婦人漏下不斷方

亂髮 皂莢水洗 空心溫酒調下一錢

又方 用鹿角燒灰細研食前溫酒調下二錢

又方 用桃仁燒灰細研食前溫酒調下二錢

千金溫經湯 治女人曾經小產或帶下三十六病腹脹痛口乾目眩

發熱小腹急痛手足煩熱大腑不調時上泄血經脈不調久不懷孕

吳茱萸 三 白芍藥 當歸

芍藥 各二

麥門冬 去心

半夏 各二

人參

阿膠 粉炒

牡丹皮 去心

甘草

桂心 各一

右為粗末每服三錢水一盞姜五片煎七分去滓空心食前溫服忌

生冷羊肉生葱海藻松菜等 千金方同

此方命散 治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不斷腰腹重痛凡是

五色帶疾並皆治之 男六德續錄

禹餘糧穀赤臘中淨如此者七 赤石脂研 龍骨煨石盡研

白芍藥 川芎 附子 熟地黄各 當歸一 乾薑炮 肉桂各半

右為細末每服二錢入麝香少許米飲調下空心食前 日二服

○文仲治婦人崩中漏下青黃赤白使人無子方

禹餘糧研 赤石脂研 牡蠣煨研 桂心 烏賊骨去皮 伏龍肝研

右等分為末温酒調下方寸七日二服 生葱

又方 鹿茸酥炙 當歸各二兩 蒲黃半及炒

右三味為末温酒調下五分七日三服

又方 京墨為末二七若燒露蜂房為末三指撮酒調下

又方 常灸猪腎食之

○千金療婦人白崩中方

桂心 赤石脂 小薊根各二兩 熟地黄四 芍藥 阿膠

右七味切以酒六升水四升煮取三升去滓入膠令洋分為三服

三服 千金翼有白馬通汁二升用白石脂

刺痛四肢困煩神效方 治婦人血海久虛經候不利赤白帶下血氣衝心多發

沉香三分 牡丹皮心 赤芍藥 當歸 桂心 川芎

黃耆去芦 人參 茯苓 山藥 白芷 橘紅

吳茱萸泡七次炒 白巴戟心 木香 牛膝酒洗 枳殼去穢

肉豆寇 製厚朴 生乾姜 白龍骨各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心温酒下若心腹痛煎

白芷酒下

○廣濟治帶下病方

芍藥七兩熬令黑為末每服三錢七以酒調下

○千金治帶下方脉数者可用

拘杞根 一斤 生地黃 五斤

二味以酒一斗煮取五升分為三服

良止暖宮圓

暖血海實衝任治子宮虛弱風寒客滯因而斷緒不成
孕育及數嘗墮胎或帶下赤白漏下五色頭目虛暈吸上少氣胸腹苦
痛心下頓悸脘腹刺痛連引腰背下血過多兩脇牽急嘔吐不食而色
青黃肌膚瘦瘠寢睡自汗

禹餘糧製一兩 白姜炮 芍藥 白芷 川椒製

阿膠粉炒 艾葉製 川芎各三分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十九米飲下或溫酒醋湯亦得
常服溫補胞室和養血氣光澤顏色消散風冷退除百病自成孕
育性平不熱

竹茹丸

治婦人赤白帶下方見崩暴下血不止方

地黃丸

治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶漸上瘦瘠飲食
少味累年無子龐安常方

熟地黃及山 茱萸 蕪荑仁各一及 乾姜三分 白芍藥微

代赭石各二及 白姜黍 厚朴各三分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下五十圓日三服許寧

凡婦人有白帶是病一病令人不產育宜速治之此
丸為對症神貴婦人有此病所以專為帶下衣也

補遺

經水丸 治赤白帶下

石菖蒲 檳榔等分 為末鹽酒溫上調下

又方

白芍藥炒 黃狗頭骨燒存性

右等分為末每服二錢溫酒下

○治婦人血崩帶下

大艾醋一兩 黃一兩 五倍子三兩 烏梅五升 川芎五升

右為末每服二錢空心米飲下兩服即止

○婦人白濁白淫方論第十八凡三方

論曰夫婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養水火不升降或因勞

傷於腎七氣虛冷故也腎主水而開竅在陰七為溲便之道胞冷腎損

故有白濁白淫宜服**烏丸**或**因思慮**當致使陰陽不分清濁相干而成白

濁者然思則傷脾故也宜用**四七湯**吞**白丸子**此藥極能分利方見簡

更宜**小烏丸**每貼加茯苓一錢重者益智二十枚去殼碾鹽煎服

治血厥久冷腹脹疼痛小便濃白如泔

片子薑黃三又 大附子炮一及

紅藍子

三稜各半

牡丹皮

羌花醋浸

木香

赤芍藥 榔桂

郁李仁去皮

沒藥各一分

右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥為末以水七分酒

三分同煎至七分熱服

補遺

治小便白濁

破故紙

青盜

白茯苓

五味子

各等分為末酒糊丸空心三十九鹽湯或酒任意下

治下虛胞寒小便白濁或如泔或如凝脂腰重

壯礪散

兔絲子酒蒸焙

韭子炒

龍骨

五味子

白茯苓

桑螵蛸酒炙

白石脂各等分

為末酒糊丸梧桐子大每服七十丸空心鹽湯下

婦人天癸過期經脈不調方論第十九凡二方

按許學士云婦人天癸過期而經脈不調或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損七益謂女子七七數盡而經脈不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善宜服**當歸散**

當歸

川芎

白芍藥

黃芩

白朮各半

山茱萸肉兩

右為細末空心食前溫酒調下二錢日三如冷者去黃芩加桂心二兩

補氣固血治本臟因虛生寒月經行多或來不及期腹

痛怯風臟腑不和

鹿茸

五味子

茯苓

杜仲 赤石脂 各一兩

黑龍骨 肉豆寇 白茯苓 各半兩

右為細末酒煮麩糊為圓如梧桐子大空心食前熱米飲吞下五七

十丸一月後血氣已安去龍骨加沉香半兩可以常服中年已後

婦人最宜服此藥

補遺 滋血湯 醋附圓 杜牛膝散 牡丹散 艾煎散等皆治婦人

天笑過期經脈不調方並見前

○婦人血分水分腫滿方論第二十 凡三方

夫婦人腫滿若先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通名曰血分水化為血七不通則復化為水矣宜椒仁丸若先因先便不利後身面浮腫致經水不通名曰水分宜服葶藶丸方見前

治血分 桃仁 其遂 續隨子 附子 吳茱萸 延胡索

郁李仁 黑牽牛 五靈脂 當歸 吳茱萸 延胡索

芫花 醋浸一宿炒黃 石膏 各一分 信石 瞻藥 各一分

班猫 糯米炒黃去 玃膏 各三十枚 夫頭足翅糯米炒黃

右為細末麩作糊為圓如豌豆大每服一九橘皮湯下

○治經脈不利即為水七流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候与水相類醫作水治之非也宜此方 養生必用方

人參 當歸 大黃 溫紙裹三斗米下蒸 桂心

瞿麥穗 赤芍藥 白茯苓 各三兩 葶藶 炒別研一方

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下十五丸至三十九

葶藶丸 治水分 王氏指迷方

葶藶 炒別研一分 續隨子 去殼各半 乾笋末 一兩

右為末棗肉圓如梧桐子大每服七圓煎扁竹湯下如大便利者減

續隨子葶藶各一分加白朮半兩

○又有腸覃臙脹脾氣血氣血蠱水蠱石蠱血蠱 此數證亦並見後十

補遺

小調經散

治婦人因經水斷絕敗血停積五臟流入四肢令人

浮腫不可作水氣治之但調經水其腫自消

方在二十二卷產後四肢

新刊婦人良方補遺大全卷之一

