

大德重校聖濟總錄卷第一百七十三

小兒門

小兒疳痢

小兒疳痢久

不差

小兒疳腫

小兒五疳出蟲

小兒諸疳



小兒疳痢

論曰小兒疳痢者由乳哺不節生冷過度傷于脾胃冷熱相搏致府藏不調久而不差即變諸疳若大腸虛弱水穀不化下利無度是為疳痢其證面色萎黃肌體羸瘦盜汗壯熱皮毛焦枯嗜好酸鹹心腹虛脹痢下蘊瘀日夜無度是也

治小兒一切疳痢熊膽散方

熊膽 研

雄黃 研

青黛 研

丹砂 研

黃礬 燒令汁枯

細辛 去苗葉

芫荽子 炒各半兩

盧會 研

龍膽

當歸切焙

白礬汁盡

蟬蛻炒

蝦蟆炙焦各參分

麝香研

黃連去須

黃蘗去蘊皮

甘草炙各壹兩

右一十七味搗研為散六十日至百日孩子每服一

字匕一二歲半錢匕三四歲一錢匕並米飲調下早

晚食前服

治小兒疳痢赤白及一切痢桃皮散方

桃白皮炙半兩

黃連去須

胡粉炒

赤茯苓

去黑皮各壹兩黃蘗去蘊皮炙半兩

丁香炒

右六味搗羅為散每服半錢匕米飲調下早晚食前

服量兒大小加減

治小兒疳痢定命丸方

青黛研分

烏蛇去皮骨酒浸炙壹分

白附子壹分

乾蠍炒碎

膩粉研分

獨角仙去足炙壹枚

棘剛子去殼柒枚

麝香研壹分

右八味各搗研為末用豬膽汁丸如黍米大每服三

丸早晨晚後溫水下

治小兒急疳痢不止或膿或血或青或黃髮結成穗或

髮墮落鼻乾咬指好啞土炭金髓丸方

金牙壹分

烏頭生去皮臍半兩

黃連搗末用雞子壹枚取清和

宋作餅炙

肉豆蔻壹枚

訶梨勒用貳枚

石中黃如無禹餘糧代麝香研

丹砂研各壹分

石八味搗研為末鍊蜜丸如棗豆大每服五九空心米飲下日晚再服量兒大小加減

治小兒三歲已止疳痢口瘡身體脚手心熱龍骨湯方

龍骨兩

黃連須去

黃蘗去蘖皮炙

地榆各參分

白頭翁

乾薑炮

當歸切焙

醋石榴皮

白朮各半兩

右九味麤搗篩一二歲兒每半錢匕水半盞生薑三片同煎至三分去滓分溫二服早晚食前服量兒大

小加減口瘡取盧會赤地利末傅之下部生瘡取蚘

蛇膽黃連麝香等分為末塗傅之

治小兒疳痢嘔逆厚朴丸方

厚朴去鹽皮生薑汁炙參分

龍骨半兩

白茯苓去黑皮人參各參分

白石脂半兩

陳橘皮去白切當歸各分

肉豆蔻去殼

烏梅肉炒乾木瓜各半

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大每服五丸七

丸煎生薑棗湯下食前服

治小兒一切疳痢龍骨丸方

白龍骨壹分

白石脂壹兩

雞屎藤天

黃連壹分

胡粉炒

赤茯苓去黑皮

阿膠炙燥各兩

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如麻豆大每服五九七丸

空心食前米飲下更量兒大小加減

治小兒氣疳下痢腹脹胡黃連丸方

胡黃連兩

蛇蛻炙壹分

蝦蟇炙半兩

青蘘獨壹分

蝸牛炒半兩

木香壹分

訶梨勒皮兩

麝香壹分

右八味搗研爲末用飯爲丸如菘豆大每服三九五

丸米飲下蟲出爲度

治小兒無辜疳痢無食子丸方

無食子壹分

甘草炙

龍骨

當歸切

黃連壹分

人參各壹兩

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如麻子大每服三九五丸

米飲下早晨日午服以差爲度

治小兒五疳八痢砒霜丸方

砒霜研壹錢

凝水石燒

附子炮裂去皮臍各壹分

定粉炒半兩

右四味搗研爲末用粟米飯丸如麻子大每服三九

五丸米飲下更量兒大小加減  
治小兒疳痢鉛丹散方

鉛丹

研炒

定粉

研各壹兩

蛇蛻

炙焦

夜明沙

炒

盧會

研臨時入各壹分

右五味以前四味搗研為散用醋拌和為餅就熱銚上煨熟細研為散後入盧會和勻每服一字匕以米飲調服早晨日午服量兒大小加減

治小兒一切疳痢青金散方

鉛丹

黃若子

胡粉

各半

大棗

貳拾枚

右四味一處杵作團燒令通赤取出候冷研細每服半錢匕空腹米飲調下晚後再服

治小兒疳痢百中湯方

檉皮

黃連

枳殼

去瓤炒

蕪荑

各半兩

生薑

豉

兩

葱白

參莖

右七味各細剉以水五合浸經宿平旦煎取三合量兒大小空腹服之初服經日昏沉後漸漸甦未全効

更作一劑熱湯與竹瀝飲之

治小兒疳痢久服藥不差訶梨勒散方

訶梨勒炮去核

龍骨

赤石脂

蜜陀僧煨

酸石榴皮煨

麝香研各壹分

右六味搗研為散每服半錢匕米飲調下空心食前服若是膿血痢黃連湯調下量兒大小加減

治小兒疳痢兼渴不止定粉散方

定粉炒研

雞子壹枚取白

右二味將定粉與雞子白相和更研如膏一二歲每服半錢匕水七分煎至三分放溫服之更量兒大小

加減

治小兒疳痢日夕不止手足逆冷或下鮮血虛渴不止

烏梅丸方

烏梅肉炒

龍膽

龍骨各壹兩

黃連

去須壹兩半

地龍糞炒壹兩壹分

右五味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大一歲兒米飲下三丸食前服以差為度

治小兒疳痢及吐豆蔻丸方

肉豆蔻

去殼壹枚

木香兩

丹砂研

人參

訶梨勒煨去核

麝香研各壹分

右六味搗研為末用飯丸如麻子大每服二九空心米飲下日再服更量兒大小加減

治小兒一切痢久成疳阿膠丸方

阿膠炙令

白龍骨

黃連須

白石脂

雞屎白炒

胡粉炒

赤茯苓

去黑皮  
各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如麻子大每服米飲下三

九食前服更量兒大小加減

治小兒疳痢龍骨散方

龍骨

胡粉炒

白礬燒令汁盡  
各壹分

黃連去須  
半兩

右四味搗研為散每服半錢匕米飲調下空心服量

兒大小加減

治小兒疳痢或口内生瘡龍齒散方

龍齒半兩

丁香壹分

黃連去須

胡粉炒

赤茯苓

去黑皮  
各半兩枳殼去瓤  
炒壹分

右六味搗羅為散每服半錢匕粥飲調下食前服量

兒大小加減或加牛黃一錢亦得有鮮血加蕪荑一

分

治小兒五疳八痢丹砂丸方

丹砂研

青黛研各壹分

丁香半

五式

肉豆蔻去殼壹枚

無食子壹枚

麝香研壹錢



乾蝦蟇

去頭足醃  
塗炙壹枚

右七味搗研爲末麩糊丸如黃米大每服三九五九

空心米飲下

治小兒疳痢氣下痢腹大肌瘦常服熊膽丸方

熊膽

補

胡黃連

夜明沙

炒

青黛

研

黃連

去須各

肉豆蔻

去殼

盧會

研壹

龍腦

研壹

蟾頭

酥炙壹枚

麝香

研貳

使君子

去殼壹分

丁香

半

無食子

壹分

右一十三味除研外搗羅爲末粟米飯爲丸如菉豆

大每服七丸至十九米飲下日三

治小兒脾疳藏府滑瀉或痢肉豆蔻丸方

肉豆蔻

去殼壹枚

訶梨勒

炮去核壹分

黃連

壹分

赤石脂

研壹

木香

壹分

蟾頭

生薑汁壹枚

右六味搗研爲末用蝸牛肉研爲丸如黍米大焙乾

每服三丸至五丸溫粥飲下食前服

治小兒五疳瀉痢肌膚黃瘦多困好喫泥土五心常熱

煩渴引飲夜多上竄虛汗使君子丸方

使君子

去殼麩

無食子

各伍

木香

赤芍藥

各伍

盧會

研各壹分

肉豆蔻

去殼

檳榔 煨到各

黃連 去須

麒麟竭 研

麝香 研各

右一十味搗研爲末粟米飯丸如麻子大每服五丸

至十九米飲下不拘時服夏秋宜常服

治小兒疳痢羸瘦飲食減少引飲六神丸方

丁香

木香

肉豆蔻 去殼秤各

同以麩裹

盧會 研壹

使君子 去殼

訶梨勒皮 各半

右六味搗羅爲末棗肉和丸如菘豆大每服三九至

五丸米飲下空心服

治小兒疳瘦下痢腹脹不思飲食厚朴丸方

厚朴 去麩皮生薑汁炙半兩

陳橘皮 去白切焙壹分

使君子 去殼麩裏煨 甘草 炙

訶梨勒皮 半生半炮

兩

右五味搗羅爲細末鍊蜜丸如小雞頭大兒三歲已

上每服一九米飲化下百日兒每服作四服乳汁或

清米飲化下

治小兒疳痢不止麝香丸方

麝香 研壹錢

使君子 去殼半生半炮 無食子 半生半炮

右三味搗研爲末以薄麩糊丸如小菘豆大每服三

九五丸米飲下

治小兒一切疳痢蘭香散方

蘭香

人糞

白狗糞

蝦蟇

白礬

蜘蛛

蚯蚓

蝸牛子

剉味并蘆會研

蚺蛇膽

研各壹分

右一十味搗研為散以葦管斜批吹少許入鼻中及

齒上更以蜜和塗紙上貼之如下部即內之

治小兒疳痢羸瘦大疳丸方

白礬

綠礬

膽礬

乾蝦蟇

去腸肚炙

良若子

葶藶

炒各壹分

蝸牛

肆枚已上漿味入在瓶內鹽泥固濟候乾火焙通赤取出研為細末

胡黃連

生蝸牛

麝香

丹砂

雄黃

牛黃

研各壹錢

熊膽

訶梨勒皮

細辛

去苗葉各貳錢

青黛

右一十七味搗研為末和令勻燒粟米飯和丸如麻

子大每服三九至五九薄荷湯下不拘時候量兒大

小加減服

治小兒疳痢腹脹肌瘦泄瀉不止至聖丸方

使君子

去殼 貳拾枚

肉豆蔻

去殼 壹枚

丁香

陳錦

炒

雄黃

研

熊膽

研各壹錢

麝香

研半錢

訶梨勒皮

壹分

右八味搗研為末白麩糊和丸如菴豆大每服十九

米飲下乳食前量兒大小加減服

治小兒疳痢無常色黃連木香丸方

黃連

去須

木香

各半兩

麝香

研壹錢

定粉

壹分

狗肝

壹具切

蝦蟇

壹枚大者切

右六味先搗研四味為末將狗肝蝦蟇用酒三升煮

爛至一升去滓煎成膏丸前末如菴豆大每服三丸

空心米飲下更量兒加減

治小兒疳痢煩渴肌體羸瘦安神散方

黃耆

惟碎蜜水炙到半兩

甘草

炙到

白茯苓

去黑皮

人參

石蓮肉

主心炒各壹分

右五味搗羅為細散每服半錢匕水半盞棗一枚煎

三五沸量兒大小加減溫服

治小兒疳痢黃瘦焦枯壯熱脹滿沉香煎方

沉香

剉

丁香

醋石榴皮

各壹錢

木香

肉豆蔻

去殼

訶梨勒

炮去

無食子

縮沙人

各參錢

使君子

去皮半兩

右九味搗羅爲末鍊蜜調成煎每服一豆大米飲化下

治小兒疳痢皮毛焦枯肌體羸瘦喜食酸鹹心腹脹發熱胡黃連丸方

胡黃連壹分

芎藭

蓬莖茂  
劉蝦

青橘皮去白

陳橘皮去白焙乾薑炮

對煎

京三稜根  
參細

右七味搗羅爲末每抄一錢匕入巴豆干粒去皮心膜人冷油內慢火煎黑色研細煮醋麪糊丸如黍米大一歲一丸薄荷湯下

治小兒疳痢面黃體瘦盜汗壯熱心腹虛脹皮毛焦枯

苒若丸方

苒若子壹兩醋浸  
宿炒黑色

木香

胡黃連

盧會研各壹錢

訶梨勒皮貳枚

肉豆蔻大者壹枚去盡

右六味搗研爲末用燒粟米飯和丸如黃米大每服五丸至十九空心米飲下

治小兒乳哺不節生冷過度下痢不止面黃肌瘦腹脹發熱名曰疳痢胡黃連丸方

胡黃連末 白燕黃人末 盧會研

麝香 壹分

巴豆 伍粒去皮心 麝出油研

右五味合研勻細煮麪糊和丸如粟米大每服五丸

至七丸柳枝湯下不拘時

治小兒疳痢方

丹砂 半兩

麝香 研

熊膽 研

丁香 爲末

蟾酥 各壹錢

右五味將四味細研如麪取蟾酥和爲丸如黍米大

一歲兒一九米飲或乳汁相和勿令碎喫藥後以

水濃煎桃柳枝淋洗兒取一九吹兒鼻中以濕青衣

蓋覆體其蟲便出以疾退爲度

治小兒疳氣腹脹泄痢小便赤澁鼈甲散方

鼈甲 去垢爛

訶梨勒 木香

赤茯苓 去黑皮

蒼朮 米泔浸一宿切焙各壹兩

牽牛子 壹兩半

右六味搗羅爲散食前溫水下半錢匕日再服量大

小加減

治小兒疳痢日夜無數脫肛身體瘦羸丁香丸方

丁香 參

麝香 研少

青黛 研壹

蝦蟇 壹枚去肚足

麝香 壹分

右四味搗研爲末煮漿水飯爲丸如粟米大溫水下

三九量兒大小加減服

小兒疳痢久不差

論曰小兒宿挾疳氣加以乳食不節冷熱相乘腸胃虛弱遂令下痢甚則嘔噎變成疳廩

治小兒疳痢久不差食物即嘔積豬膽丸方

積豬膽

瓦上煨乾貳兩

胡椒

乾薑

炮

蕪荑

炒

陳橘皮

去白焙各壹分

葶藶

微炒

倉米

炒參

右七味搗羅爲末用稀糊和丸如麻子大每服五丸

米飲下早晨晚後各一量兒大小加減

治小兒疳痢久不差黃連散方

黃連

去須

白茯苓

去黑皮剉

阿膠

炒

黃蘗

去皮剉

人參

丁香

各半兩

訶梨勒

參枚炮去核

桃白皮

參剉

無食子

無孔者貳枚

右九味搗羅爲散每服半錢匕米飲調下空心日午

近晚各一更量兒大小加減

治小兒疳痢經年不止進退不定狀如白膠雄黃丸方

雄黃

研

凝水石

研

白礬

研

水蓼

剉

丹砂

研各半兩

砒霜

研半錢

鉛丹

研

雞子皮

燒灰各壹分

大黃

炒剉

右九味除別研外搗羅爲末和勻以蟾酥和丸如棗  
豆大每服一丸至二丸石榴皮湯下生薑湯亦得早  
晚食前各一更量兒大小加減

治小兒疳痢或黃或青項細腹脹口鼻生瘡日加羸瘦

蟬蛻丸方

蟬蛻去足

麝香研各膏分

青黛研

阿膠炙煉各半兩

蛇蛻皮豐條燒灰

瓜蒂炒

右六味搗羅爲末稀糊和丸如棗豆大五歲以下每  
服三丸或五丸米飲下空心日午近夜各一更量兒  
大小加減

治小兒疳痢久不差救急散方

丁香貳柒粒

雞屎礬燒

麝香研各壹分

黃蘗去盛皮剉壹兩

右四味除麝香外搗羅爲散和勻每服半錢匕早晨  
米飲調下相繼煮苜蓿并葱令熟與喫極効更量兒  
大小加減

治小兒久患疳痢當歸湯方

當歸切

人參

乾薑炮

木香各叁分

桃白皮剉

槐白皮炙

丁香

阿膠炒

甘草炙剉各半兩



龍骨

黃連去須各壹兩

麝香研壹分

右一十二味將一十一味蠶搏篩與麝香和勻一二歲兒每用半錢匕水一小盞煎至四分去滓分溫二服更量大小加減

治小兒疳痢久不差蕪蕪丸方

蕪蕪

炒為末半兩

羊子肝壹枚

右二味先用米泔煮羊肝令熟候冷切作薄片將蕪蕪末糝在肝內搗爛更入少糯米糊和丸如麻子大每服五丸米飲下早晚食前各一更量兒大小加減  
治小兒久疳痢丁香散方

丁香壹枚

桃白皮炙壹分

白茯苓去黑皮

黃藥去蘆皮各

黃連去須各參分

胡粉炒研半兩

右六味搗羅為散每服半錢匕米飲調下空心日午各一更量兒大小加減

治小兒久痢無間冷熱疳痢胡粉散方

胡粉壹分

棗七枚大者去核入胡粉在內

右二味煨赤取出候冷細研為散每服半錢匕米飲

調下空心午後各一更量兒大小加減

治小兒疳痢久不差腹內鼓脹麝香丸方

麝香壹分

豆巴豆去心皮

黑豆壹兩

右三味先將巴豆入麻油中煎令黑色研爛用紙五

重裹出油盡為度與麝香同研勻用稀糊和丸如黍

米大每服一九或二九米飲下空心午後各一更量

兒大亦加減出餘各味為用半錢米煎

治小兒疳痢久不差丁香散方

小丁香各一分 香麻各一分 調梨勒皮各一分 當歸切焙各一分

谷龍骨燒 麝香研

胡黃連各一分 肉豆蔻去殼 米泔洗 空心日

右八味搗羅為散每服半錢匕米飲調下早晨午後

各一更量兒大小加減白芍各一分

治小兒疳痢久不差龍骨散方

龍骨燒 赤石脂各半 訶梨勒皮

蜜陀僧各一分 石榴皮暴乾 麝香研各一分

右六味搗研為散每服半錢匕空心米飲下日晚再

服粟米飲下

治小兒疳痢久不差黃連散方

黃連去須 黃蘗去麤皮 桃白皮炙

胡粉各半 丁香各一分

右五味搗羅為散每服半錢匕米飲調下空心午後

各一量兒大小加減丁香各一分

治小兒宿挾疳氣因乳食不節腸胃虛損下痢日久五  
靈脂散方

五靈脂

赤箭

龍骨各壹分

麝香研

盧會研

丁香各半錢

熊膽研

胡黃連各壹錢

右八味搗為細散每服半錢匕陳米飲調下

治小兒疳瀉不止漸漸羸瘦眾藥不効者異効散方

桃根白皮剉

黃蘗去蘊皮

蕪荑各壹錢

黃連去須微炒

厚朴去蘊皮生薑汁炙

木香

丁香

檳榔剉各壹錢

無食子壹錢

棟根白皮剉半

右一十味搗羅為散每服一字三歲以上半錢匕五

六歲一錢匕用紫蘇木瓜米飲調下乳食前一日三

服

小兒疳蟲

論曰小兒宿有疳氣加以腸胃虛弱寒邪乘之則變下  
痢痢久不止腸胃益虛寒濕相乘蟲因虛動侵蝕府藏  
或口齒生瘡或肛門傷爛故名疳蟲

治小兒疳蠱下部開張痢有膿血爛痒赤腫麝香丸方

麝香研

蟬殼去青足

豬牙皂莢去皮

盧會研

人中白研各壹分

青黛半兩

右六味搗研爲細末先取五月五日蝦蟇一枚以繩子雙繫後脚倒掛用胡黃連一寸以綿繫內蝦蟇口中繫定將不津器承蝦蟇涎從午至戌解放蝦蟇其取胡黃連并涎用將六味藥末就涎和丸如粟米大每先暖漿水洗兒輒帛拭乾後扶坐取一丸子以乳汁少許化下須臾如醉慎勿驚之卽蟲自出若蟲色白或身黃頭黑皆是病淺易差若蟲子徧體亂出紛紛如碎剪馬尾此必死之候

治小兒疳瘡蝕口鼻及下部危急雞屎礬傳方

雞屎礬燒研

右一味先以米泔洗瘡拭乾以藥傅之日三

治小兒疳腫下痢不問赤白及五種疳氣痢疾麻子膏方

大麻人

貳兩黑豆黃

青黛半斤

蝦蟆壹枚燒研

麝香研壹兩

日真

右五味先研麻人次搗研黑豆等四味爲末與麻人同研如稠錫入少許竹漚和勻用瓷合收口鼻疳瘡者每服半匙匕米飲調下日三若膈脊疳每日塗口鼻三上若下部開以綿裹藥半匙匕內下部日三換

量兒大小加減

治小兒疳蝕蝕口鼻及下部赤爛方

大麻人參

乾蟾蜍

地龍

葶藶

亂髮

右五味除乳髮外並搗碎與髮和勻都入在一枚新

竹筒內置於瓦上以煆灰火燒取灑少少塗兒口鼻

頂上及穀道中

治小兒疳痢下部開并生瘡吹藥麝香散方

麝香

黃連

右三味相和研勻取一葦管吹少許於下部

治小兒蠱蝕下部雄黃散方

雄黃

胡粉

右二味細研如粉每服半錢匕以乳汁調內下部中

日三上以差爲度

又緋帛膏方

緋帛

倒棘刺

雄黃

磁石

麝香

蚰蛇膽

槐枝

右八味先研六味爲細末次鍊脂作油去滓下槐枝

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

煎令焦黃去槐枝下六味藥末煎成膏以瓷器盛每

用少許塗下部日三

治小兒疳蠱蝕下部苦參膏方

苦參伍

艾葉貳

青箱子

甘草參兩

各

右四味先以青精甘草爲細末次用水五升煎苦參艾葉成膏量多少去滓入二味藥末和作梃子長一寸如筋許大暴乾塗豬脂內下部日再蟲出盡爲度

又方

右以鐵衣少許研細內下部中

治小兒疳蠱蝕下部久痢膿血舉體疼痛面色虛腫苦

參丸方

苦參

雌黃

雄黃

豆白礬煨兩各大至麝香去麝香砂許

右六味搗研爲末以一小棗許大內下部中日兩三

上

治疳蠱蝕食肛門治不以時多至殺人豬膽飲方

豬膽壹

苦酒伍

右二味同煎量力空心飲之蠱即死

治小兒宿有疳氣又因腸虛下痢寒濕相乘蠱因虛動

侵食藏府或口齒生瘡或肛門傷爛病名疳蠱青金定

命九方

胡黃連末兩

兩

盧會研

研

肉豆蔻去殼

壹分

訶梨勒伍枚

去

白檳榔壹枚

末

木香末

末

麝香研

研

丁香半兩

末

紅雪研

壹分

蜜陀僧研

壹分

鶴融壹分

末

丹砂研

壹分

右一十三味合研令勻用酒煎豬膽膏和丸如棗

豆大每服五丸至七丸

疔疔疔膿茶下氣疔可香湯下

腦疔黃連湯下肺疔橘皮湯下急疔乾笋湯下食疔

生薑湯下脾疔棗湯下疔疔鹽湯下

治小兒疔口瘡齒斷露宜黃藥散方

黃藥根皮銹

黃連去須

黃芩去黑

升麻銹

參分

大青兩

乾蝦蟇研

壹分

右六味搗羅為散以綿裹貼齒斷上吐涎

治小兒疔膿或口齒生瘡或肛門傷爛黃連丸方

黃連去須

白燕去皮

麝香研

石三味搗研為末麩糊和丸如麻子大一二歲每服

十丸溫米飲下日三

小兒五疔出蟲

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

論曰諸疔之病皆因肥甘所致蓋人之府藏氣血更相

築養逢甘則中緩中緩則榮衛行遲故府藏之間化生  
諸蟲狀如絲髮或如馬尾蝕於府藏令兒病疳以藥治  
之其蟲自出或出頭項或出腹背其蟲色黃白赤者可  
治青黑者不可治

治小兒諸疳青黛丸方

青黛研

盧會研

乾浮萍草

蝦蟇燒

蟬蛻去

蒙豆

故皮子巾

燒及 豉炒

白礬燒

丹砂研

麝香研各

右一十一味搗研爲末和勻用粟米飯爲丸如麻子

大一歲兒每服一粒用溫熱水下先以桃柳湯浴兒  
後與藥服藥後得睡覆面看脊骨間必有蟲出形  
狀不定甚者吐出或噎出卽愈

治小兒疳定命夜明沙丸方

夜明沙炒

青黛研

蛇蛻炒

蟬蛻去

麝香研

地龍去土

乾蝦蟇燒

燒 各壹分 蚌蟬炙 拾枚

右八味搗研爲末和勻粟米飯丸如麻子大一二歲  
兒每服三九三四歲兒五丸並用米飲下空心日午  
各一服更水化一丸滴兩鼻中又以桃柳湯浴兒以



青布裏良久蟲出青布上

治小兒諸疳麝香丸方

麝香 研

熊膽 研

丹砂 研

牛黃 研

蜚蛇膽 研

瓜蒂 各壹

赤小豆 粒

蟾酥 貳片如  
柳葉大

右八味搗研爲末和勻麪糊和丸如麻子大每服三

丸至五丸米飲下空心日午近晚各一更量兒大小

加減服後以桃柳湯浴兒卽以青衣蓋覆當有蟲出

治小兒疳出蟲瓜蒂丸方

瓜蒂 燒

麝香 研

蟾酥 各半

烏蛇尾 酒浸

黃連 去須各

蛇蛻 燒

熊膽 各半

右七味搗研爲末用粟米飯丸如麻子大溫熱水化

破二丸滴於鼻中蟲出爲効

治小兒諸疳氣麝香散方

麝香 研

白礬 壓

膽礬 燒

皂莢 燒 灰各

豬膽 壹枚去

膩粉 研 錢

右大味再同研令極細每服一字匕米飲調下服藥

後以青衣蓋兒身上良久有蟲出卽差

治五疳吐蟲腹脹羸瘦除疳散方

丁香

生犀角末各半錢

苦棟根有子者良赤者不用

陰乾  
白檀榔

鶴蝮各半兩

蜜陀僧

壹分  
白檀榔炮到各壹分

右六味搗羅爲散每服一錢匕米湯調下日三蟲自

出更量大小加減

治小兒五疳眼鼻多痒寒熱往來腹藏不調或瀉膿血  
肌體瘦弱飲食不化多因少力眼澁饒睡兼治驚風月  
蟾丸方

乾蟾壹枚大者 蛇蛻皮大者

穀精草貳兩參味同入壹瓶

子內以鹽泥  
固濟燒灰

胡黃連 甜瓜蒂

丁香各壹分

熊膽研

盧會研

天竺黃研

牛黃研

丹砂研

龍腦研

麝香研

雄黃壹分

青黛研半兩

右一十五味搗研爲末再研勻用豮豬膽汁煮麩糊  
丸如菘豆大每服三五丸米泔下量兒大小加減服  
藥後以桃柳湯浴兒着青衣蓋疳蟲出衣上  
治小兒疳殺蟲盧會丸方

盧會研

燕薹炒

木香

鶴虱炒各半兩

右四味搗研爲末水浸炊餅丸如黃米大每服十九  
米飲下更量兒大小加減

治小兒疳疔定粉丸方

定粉

豬膽各壹分

右二味研和爲丸如菉豆大每服二九米飲下

治小兒疳殺蟲雄黃散方

雄黃

黃連須

木香各壹分

麝香

研半

右四味搗研爲散每服半錢匕米飲調下量兒大小

加減

小兒諸疳

論曰小兒疳疾皆以肥甘而得之故名諸疳五藏所受  
各各不同在肝爲風疳其狀搖頭揉目白膜遮睛色青  
黃毛焦髮立筋青腦熱覆面而臥腹有積聚時下痢身  
體自汗久不愈轉加羸瘦是爲肝疳若目睛帶青脉左  
脇下鞭吐涎眼角有黑氣者不可治在心爲驚疳其狀  
渾身壯熱吐痢無常頰赤面黃胸膈煩滿鼻乾心躁口  
舌生瘡時有盜汗或發虛驚久不愈則下痢膿血是爲  
心疳若驚啼多渴便食辛味耳邊有脉舌上有黑靨者  
不可治在脾爲食疳其狀腹多筋脉啼促氣羸乳食不

多心腹脹滿多啼欬逆面色萎黃骨立毛焦形枯力劣  
胸膈壅悶乳食難消腸胃不和下痢酸殞鼻乾口燥愛  
暗憎明情意不佳好喫泥土是爲脾疳若腹大脣無血  
色人中平滿下痢不禁皮枯骨露者不可治在肺爲氣  
疳其狀欬嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多啼咽喉不利揉鼻  
咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡脣邊赤痒腹中氣脹食減下  
痢皮上粟起是爲肺疳若欬逆氣促下痢白沫身有斑  
紋黑色如粟米者不可治在腎爲急疳其狀肌骨消瘦  
齒斷生瘡逢寒遇熱則鼻乾口燥腦熱如火脚冷如冰  
食少吐逆時或下痢下部生瘡肛門脫出是爲腎疳若

嗜酸鹹飲乳無度小便白濁牙齒青黑耳腦乾燥肩聳  
骨枯者不可治凡此五疳又有五絕之候一掐著脚中  
指底不覺疼二抱著手足垂韉無力三病未退徧身不  
煖四藏府瀉青涎及沫不止五項筋舒展無力如此皆  
不可治也五疳之外隨十二經脉血氣所受變狀不一  
故曰諸疳

治小兒二十四種疳熊膽散方

熊膽

牛黃

雄黃

五靈脂

丹砂

麝香

各半兩

蚺蛇膽

已上細研

黃連

去須

乾蠍

去土

天麻

蝸牛炒

馬兜零根乾者

大黃實碎炒  
各壹分

右一十三味熊膽等七味研令如粉黃連等六味搗羅爲散再同研令極細每服一字至半錢匕用米飲調下早晨午間臨臥各一服量兒大小加減服之或以蜜爲丸如麻子大每服三九至五九

治小兒五疳無食子丸方

無食子參按大者  
煨熟用

牛黃研

麝香研

丁香

雄黃研水  
飛

青黛研

木香

丹砂研水飛  
各壹分

蟾酥參按如柳葉  
大焙過研

熊膽半兩  
研

蝸牛殼乾者去土  
貳拾枚

右一十一味搗研爲末更同研令細水浸蒸餅爲丸如黍米大一二歲兒臨臥乳汁下一丸三四歲二丸五六歲三丸七八歲五丸米飲下亦得日再服之

治小兒五疳羸瘦腹脹下利可思飲食使君子丸方

使君子用水和生麩裹炮以麩  
熟爲度只取使君子用丁香

無食子

熊膽研

胡黃連

夜明沙炒

青黛研

肉豆蔻人

黃連去須  
微炒

盧會研各  
壹兩

蟾頭乾者壹  
枚炙黃

蟾酥壹錢

子大

麝香壹錢

龍腦半錢

右一十四味搗研爲細末拌令勻濕紙裏粟米燒飯和丸如麻子每三歲服五丸至七丸用溫米飲下日三服不計時候大小以意加減

治小兒疳氣盧會丸方

盧會研

釣藤別搗末

雄黃

青黛各半

蟾酥研

熊膽研

麝香研參味

各壹分

右七味同研勻入豬膽汁和丸如棗豆大每日空心臨臥煎荊芥湯下三九至五九二歲以下兩丸

治小兒疳氣蝦蟇煎丸方

蝦蟇壹枚用酒

地龍去土炒

木香各壹分

肉豆蔻壹枚去殼

麝香研

黃連去須各壹錢

夜明沙

白蕪荑各壹錢

丹砂壹錢

右一十味用蝦蟇蕪荑末漬豬膽二枚法酒一盞煎成膏和其餘藥末爲丸如粟米大每服五丸至七丸米飲下日三兩服

治小兒一切疳四磨丸方

龍膽土

虎膽

熊膽研

豬膽土

盧會研

麝香研

白礬灰

荆芥穗各壹分

右八味搗研爲末先取東引石榴根半斤碎剉以水三椀煮至半椀去滓以慢火煎如膏下諸藥末又熬令可丸卽丸如菟豆大用瓷器收之如遇諸疔有蟲或指鼻眼手刺指甲及下部者取一丸以荆芥湯化爲汁候兒睡後點少許於鼻中腦上十指下部蟲間藥氣皆化爲水

治小兒一切疔吹鼻青黛散方

青黛研

細辛去苗葉各半兩

瓜蒂

麝香研

地龍微炒

盧會研

黃連去須各壹分

右七味搗研爲細散每用少許吹鼻中得嚏噴多卽易治嚏噴少難治不嚏噴不可治

治小兒五疔心藏驚疔肝藏風疔肺藏氣疔脾藏滑疔腎藏急疔皆治之常服金蟾丸方

蟾酥字

胡黃連

使君子

熊膽研各壹分

木香壹錢

麝香研少許

牛黃研半錢

丹砂研飛

大黃半兩

虎睛研壹對

右一十味搗研爲末燒粟米飯丸如麻子大荆芥湯下三九至五九量兒大小加減服之

治小兒一切疳腦悶昏沉宜先用吹鼻散方

青黛

研

躑躅花

各壹分

黃連

去

瓜蒂

地龍

微炒

麝香

研各半分

右六味搗研爲細散每用少許吹在鼻中看嚏噴多少嚏噴多卽病輕嚏噴少卽病重

治小兒疳氣面黃肌瘦發熱多困好喫泥土搗眉咬甲時好伏地香蟾丸方

乾蟾

壹枚炙焦

麝香

研半錢

胡黃連

半兩

丹砂

研

牛黃

研

蛇蛻

燒灰

雄黃

研

天竺黃

研

熊膽

研

蟬蛻

壹分各

天仙子

半合水浸出芽子爲度焙乾爲細末

肉豆蔻

壹枚去殼

右一十二味搗研爲細末糯米飯和爲丸如黃米大每服七九至十九米飲下不拘時候一日三服

治小兒疳氣身體壯熱毛髮焦黃目常有淚滿口生瘡脚手細弱腹脇脹滿好喫泥土使君子丸方

使君子

去皮

夜明沙

炒

白蕪荑

炒各半兩

胡黃連

壹兩

麝香

半錢

細辛

去苗葉



盧會 研

雄黃 研

蟾酥

橫檀 剉

蟬蛻 去翅足炒  
蝸牛 捨核  
各壹分

乾蝦蟆 貳枚用溫水洗去腸肚惡物并骨爪後慢火炙黃色為度  
樟羅 為末用酒壹升同熬

膏 成

右一十三味除蝦蟆外搗研為細末入膏子和為丸

如麻子大每服五丸至七丸米飲下不拘時候一日

三服

治小兒腦脊疳口生白瘡齒疳并諸般疳疾悉主之熊

膽膏方

熊膽

蚺蛇膽

盧會

牛黃

麝香

龍腦 各壹分

右六味並研如粉用新汲水兩盞入藥末攪令勻以

瓷器盛重湯煮之水只可及瓷器五分以來慢火煮

旋添煖水煮至半日更投三五粒粳米同煮米爛藥

即成以篋子攪令勻勿令藥乾欲點鼻中時先七日

孩子與乳母忌生冷醬豉五辛熱麪魚肉并少食鹽

然後取藥少許漸漸吹鼻中及塗口瘡上頻使兩日

即停一日看兒髮變青即止至七度停藥後還須慎

口

治小兒一切疳病鶴蝮丸方

鶴蝨輕炒

胡黃連

盧會研

丹砂壹分 研各

青黛研參

右五味搗研為末更入乳鉢內研令細用米泔煮豬

膽令熟取汁和為丸如麻子大每服三九至五九米

飲下早晨午間日晚各一服量兒大小加減

治小兒五疳瘦弱不思乳食黃連豬膽丸方

黃連去須

盧會研

燕蕒

青黛研

檳榔到各壹分

蟬蛻貳拾壹箇去土

胡黃連兩半

麝香錢半

右八味搗研為末以豬膽丸如麻子大每服五七丸

量兒加減米飲下

治一切疳氣青金定命丸方

胡黃連壹兩 為末

盧會研

青黛研各參分

肉豆蔻貳枚去殼為末

訶梨勒伍枚煨去核為末

檳榔壹枚 為末

麝香研

丹砂研

蜜陀僧為末

木香為末

丁香為末各半兩

紅雪研

鶴蝨為末各壹分

右一十三味再同研令勻用酒煎積豬膽膏丸如棗

豆大每服五九至七九妳疳臘茶下氣疳丁香湯下

膈疳黃連湯下肺疳橘皮湯下急疳乾笋湯下食疳

生薑湯下脾疝棗湯下肝疝鹽湯下

治五疝殺蟲化食長肌肉退風熱青黛丸方

青黛別研留壹  
半為衣使君子肉 檳榔錫

夜明沙 白雉黃霜炒令紫  
各半兩

蛇蛻壹條  
炙 肉豆蔻麩裏銀去  
殼壹分

巴豆半分用麩炒令  
紫去殼別研 麝香壹錢  
研

黃連壹分半  
去須炒 蝦蟇壹枚酒浸炙令  
黃紫色去骨

右一十一味先研巴豆令細次用豬膽一枚取汁同  
研令勻旋入其餘藥末搗和為丸如未就更用少輒  
飯再研得所丸如麻子大每三歲以下者一九五歲

兩九寸歲三九食後用熱水下日三服如風熱大便

澁用葱湯下五九至七九以通利為度

治小兒常服殺疝蟲天漿子丸方

天漿子柒枚  
去殼 青黛研 烏蛇酒浸去  
骨炙熟

丹砂研 麝香壹分 草薜隔紙  
炒過

龍腦研 雄黃研 膩粉各半  
分

白附子炮 獨角仙去翅足炙  
各壹枚

乾嗽伍枚  
炒 蟬蛻拾枚  
去足 蟾酥壹  
分

右一十四味各搗研為末用生豬膽為丸如黃米大  
每服一粒早晨日晚各一服

治小兒五疳胡黃連丸方

胡黃連

蛤蚧

牛黃

犀角屑

天麻

人參

肉豆蔻人

大黃

研如粉

右九味搗研為末鍊蜜為丸如麻子大每服五九空

心午後各一服溫水下

治小兒諸疳壯熱黃連丸方

黃連

黃蘗

甘草

青橘皮

去白焙

右四味搗羅為細末研麝香少許和勻入豬豬膽肉

用線繫定於石器內漿水煮五七沸取出當風掛一

宿去膽皮研熟丸如菜豆大每服五七丸米飲下漸

加至十九

水吞

不食多困齒爛鼻瘡疔奚潮熱等疾牛黃煎方

蝦蟆

殼去皮骨腸胃炙焦搗末以無灰酒帶蓋積豬膽膏取汁同熬成膏

訶梨勒皮

使君子

胡黃連

蟬蛻

無食子

盧會

蕪荑人

熊膽

夜明沙

丹砂

雄黃

木香

肉豆蔻去殼春夏半  
分秋冬壹分

牛黃研貳

麝香研壹錢

龍腦半錢

右一十七味搗研十六味為末入前膏丸如麻子大每服五七丸米飲下驚疳金銀薄荷湯下乾疳腹脹桃人藁香湯下疳蟲東引石榴苦楝根湯下此丸尤治疳痢若挾熱而痢者不可服

治小兒諸疳肢體羸弱藏府虛滑可思乳食二和丸方

胡黃連壹兩

木香半兩

麝香研壹錢

右三味搗研為細末麩糊和丸如麻子大前二歲每

服十九溫粥飲下日三

大德重校聖濟總錄卷第一百七十三

大德重校聖濟總錄卷第一百七十四

小兒門

小兒傷寒

小兒中風

小兒發黃

小兒瘡

小兒水氣腫滿

小兒心痛

小兒傷寒

論曰小兒傷寒之病有冬時冒犯嚴寒而得之者有傷四時非節之氣而得之者所感雖不同然皆名傷寒大率與大人傷寒證狀無異惟用藥分劑差少爾治法兼見傷寒門中

治小兒傷寒身熱頭痛欬嗽喘鳴鼻乾不得臥十味湯方

前胡去蘆

芫胡去苗

人參

甘草炙

獨活去蘆

桔梗炒

赤茯苓去黑皮

枳殼去穢

芎藭

羌活去蘆頭各半兩

右一十味麤擣篩每二錢匕水一盞入生薑三片大棗二枚擘破同煎至七分去滓分溫三服

治小兒傷寒頭痛肌熱喘麤白朮湯方

白朮

人參

麻黃去根節

甘草炙

葛根剉

藿香去根

桔梗炒各半兩

右七味麤擣篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓不計時候溫服

治小兒傷寒外證身熱脉浮人參湯方

人參

麻黃去根節

赤茯苓去黑皮

白朮

乾葛剉

甘草炙各半兩

右六味麤擣篩每二錢匕水一小盞入葱白少許同煎至六分去滓分溫二服

治小兒傷寒吸啞喘麤肌熱煩躁作渴茯苓湯方

茯苓壹兩

烏梅肉半兩微炒

乾木瓜壹兩

右三味擣篩為麤末每服一錢匕以水一小盞入生薑錢子一片煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減

治小兒傷寒壯熱頭痛煩渴枳椇散方



栝樓根附半

苦參壹分

人參壹分去

寒水石半兩

甘草壹分炙

石膏半兩

右六味搗篩為麤散每服一錢匕以水一小盞煎至

五分去滓不計時候溫服量兒大小以意加減

治小兒傷寒四肢煩熱心躁口乾多渴葛根散方

葛根半兩

麻黃半兩去

人參半兩去

甘草壹分炙

桂心壹分

右五味搗羅為麤散每服大一錢匕以水一小盞入

生薑錢子一片棗一枚擘去核煎至三分去滓溫服

不拘時

治小兒傷寒頭痛肌熱喘麤噉唾石膏湯方

石膏碎壹錢

白朮半兩

麻黃去根節

桔梗炒

甘草炙

水萍暴乾

杏人湯浸去皮尖雙

右七味麤搗篩每服一錢匕水半盞葱白少許煎至

三分去滓溫服不拘時候

治小兒傷寒體熱面赤口乾或欬嗽黃芩湯方

黃芩去黑心

麻黃去根節

桂去麤皮

甘草炙

石膏碎

芍藥各半

杏人拾枚湯去皮尖雙人炒

右七味麤搗篩每服一錢匕水半盞生薑三片煎至

三分去滓量兒大小加減

治小兒傷寒四物湯方

芍藥

黃芩去黑心

升麻

葛根各半兩

右四味麤搗篩每服一錢匕水半盞煎取三分去滓

溫服量兒大小以意加減

治小兒四五歲傷寒取汗射干湯方

射干

甘草炙

升麻

芍藥

石膏搗研各半兩

杏仁貳拾枚湯浸去皮尖雙入

桂枝去粗皮

麻黃去根節

桂枝去粗皮

右八味麤搗篩每服一錢匕水一小盞煎至五分去

滓溫服後以衣蓋覆出汗更量兒大小加減

治小兒傷寒葛根飲方

葛根汁

淡竹瀝各半兩

右二味相和煎三五沸二三歲兒分三服百日兒對

酌服之

治小兒傷寒胃氣不和解肌蒼朮散方

蒼朮

厚朴去蘊皮生剉陳橘皮湯浸去白

乾薑炮分

甘草炙半兩

六一小盞入生薑大

右五味搗羅爲散每服一錢匕水一小盞入生薑大  
棗各少許同煎至六分熱服

### 小兒中風

論曰風者百病之長善行而數變小兒氣血未定肌肉  
脆弱腠理虛疎爲邪風所中以春甲乙得之則中于肝  
以夏丙丁得之則中于心以季夏戊己得之則中于脾  
以秋庚辛得之則中于肺以冬壬癸得之則中于腎各  
隨其府藏之俞所中則爲藏府之風或客于皮膚肌肉  
榮衛或留于筋膜骨髓隨其變化爲病不一各有間甚  
之狀大率與大人所得證候皆同特小兒之治分劑多

寡差殊宜消息以調之

治小兒卒中風狀如欲絕增損續命長理石湯方

長理石 碎

石膏 碎

赤石脂 碎

白脂石 碎

滑石 碎

桂去 蠟

大黃 剉炒

麻黃 去根節先煎

防風 去

牡蠣 燒

龍骨 碎

栝樓根 剉各

甘草 炙壹兩

寒水石 壹分

右一十四味廬搗篩一二歲兒每服一錢匕水半盞  
煎至三分去滓溫服服後汗出以粉傅之若有熱者  
增大黃不汗者加麻黃無寒水石以朴消代之日三

服量兒大小加減服之

治小兒卒中風惡毒及久風四肢不隨并羸瘦不能行

步續命湯方

麻黃去根節先煎掠去沫焙貳兩

甘草炙半兩

黃芩去黑心壹兩

芎藭兩半

桂去麤皮半兩

杏仁拾枚湯退去皮尖雙入麩炒令熟

葛根剉半兩

升麻兩半

當歸切焙兩半

獨活去蘆頭半兩

人參壹分

右一十二味麤搗篩三四歲兒每服一錢匕水七分

煎至四分去滓連夜三四服量兒大小加減服之汗

出以粉傅之避風

治小兒風痲不能語口眼喎斜四肢不隨石膏湯方

石膏碎壹兩

麻黃去根節先煎掠去沫焙壹兩

甘草兩半

射干兩半

桂去麤皮半兩

芍藥兩半

細辛去苗葉壹分

當歸切焙兩半

右八味麤搗篩一二歲兒每服一錢匕水半煮煎至

三分去滓溫服日三量兒大小加減服

治小兒中風手足拘急石膏湯方

石膏研分

真珠末水飛過壹兩

右二味同研勻細為末三四歲兒每服一錢匕水七

分煎至四分去滓溫服日三量兒大小以意加減

治小兒中風筋脉拘急或手足癱瘓等羌活散方

羌活去膏頭 芎藭參分 防風參分

天麻半兩 白附子壹分 麻黃去根節先煎

兩 當歸炙乾切 甘草兩

右八味搗羅為散一三歲兒每服半錢匕乳汁調服

三四歲兒服一錢匕日三服如無乳熱水調服亦得

量兒大小加減服之乳母亦用煖酒調下一錢匕

治小兒新生肌膚嫩弱喜為風邪所中身體熱或中大

風手足驚掣甘草摩膏方

甘草炙 防風去叉各 白朮

桔梗各參 雷丸貳兩

右五味搗羅為麤末用不入水豬脂一斤鍋內火上

先鍊過去滓入諸藥末更煎令成膏新綿濾去滓入

瓷合內貯之每用特取少許炙手以膏摩之百度効

小兒無病每日以膏摩顙上及手足心良辟風寒也

治小兒中風蓖麻散方

蓖麻子貳拾枝去 天漿子去殼壹

生蠟參拾 石榴一枚取却石榴子及柒分盛

清燒令通赤候藥香氣出即熟取出  
打破裝便搗羅為末入後藥參取出

總錄一百七十四

天南星

半夏

白附子 各壹分半

右七味將後藥三味並生用搗羅為散與前藥相和

研令勻酒調下一字重者不過兩服

治小兒汗出中風一日之時兒頭頸腰背熱二日即腹

熱手足不屈宜服慎火草散方

慎火草 乾者半兩景天草是也

丹參

麻黃 去根節先煎去沫焙

白朮 各壹分

右四味搗羅為散一二歲兒每服半錢匕漿水調服

三四歲兒服一錢匕日三服量兒大小加減

治新生小兒中風麝香散方

麝香 細研壹分

驢鬚頭毛 手太指大壹把

右二味以乳汁和驢毛令得所於銅器中微火炒令

焦取出與麝香同研令如粉每服一字乳汁調下連

夜三服

治小兒中風口眼牽急丹砂丸方

丹砂 研

乾蠍 去足微炒

白僵蠶 微炒

天南星 地裂各半兩

白附子 壹分

右五味搗羅四味為末入丹砂研令勻麩糊和丸如

菉豆大一歲兒服一丸薄荷湯下

治小兒中風四肢拘攣心神煩亂不得睡臥獨活湯方

總錄一百七十四

九

獨活去蘆頭

黃耆剉壹兩

防風去分

白鮮皮分參

茯神去木壹兩

羚羊角屑參分

桂去麝皮半兩

酸棗人壹兩

甘草炙半兩

右九味麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓量兒大小以意加減服之

治小兒中風口眼喎斜發歇不定神識昏昧紫金丹方

草烏頭壹分炭火內煨存性

天南星壹分炭火內煨存性

性平

丹砂研參錢

蜈蚣壹條赤尾

白花蛇生取肉焙乾

蠟梢炒

牛黃研

麝香研

乳香壹子內鑿通研各壹錢

右九味先將五味搗羅為細末入研者藥合研勻用酒煮麪糊和丸如麻子黍米大量兒大小每服三九至五丸煎桃符湯下急驚風研服

治小兒中風痙身背強直牙關緊急螻蝦丸方

螻蝦壹枚大者去翅足炒乾

棘剛子去皮參拾枚

烏頭炮裂去皮

天南星中者炮壹枚

防風去分

細辛去苗葉壹錢

乾蠍炒壹錢

白附子大者壹枚

丹砂研壹分

麝香研半錢

右一十味搗研為細末用石腦油為丸如棗豆大每服一丸至二丸薄荷水化下不計時候如小兒目睛

上視口噤不開用醋化一九灌入鼻中男左女右灌之

治小兒中風痙頸項強直及風癩潮發牛黃丸方

牛黃研

丹砂研

天竺黃研

蠟梢

白僵蠶

天南星

白附子各壹分

右七味並生用搗研令細鍊蜜丸如梧桐子大每服金銀薄荷湯化下一丸至二丸服之

治小兒中風天癇驚邪風癩白僵蠶丸方

白僵蠶炒壹兩

乾蠍炒壹分

白附子炮壹兩

天南星

炮裂半兩

烏蛇

酒炙令香去骨半兩

右五味搗羅爲末粳米飯爲丸如麻子大一二歲兒每服三丸以溫酒下連夜三服隨兒歲數以意加減服之

小兒發黃

論曰小兒瘵熱在胃或濕熱相搏熏散肌肉其證目黃身或疼痛肌肉如橘色或得之傷寒或得之時氣或得之風溫皆脾胃氣虛邪熱與穀氣相搏所爲也利其小便則愈又小兒百日以上非因傷寒溫病身體微黃者此由將息過度胃熱所致慎不可灸唯宜薄衣裳兼粉



之自愈其證不可不辨

治小兒發黃升麻湯方

升麻

黃芩去黑

山茵陳

此胡去苗

瓜蒂

知母焙

藍葉各壹兩

山梔子壹兩 大黃炒 其蠶白黃

石膏搗碎各壹兩半

甘草炙

芍藥各半兩

羚羊角銹參分

右一十三味麤搗篩三四歲兒每服一錢匕水七分

煎至四分去滓溫服早晨午後近夜各一服量大小

加減

治小兒黃病山茵陳丸方

山茵陳半兩

山梔子人

秦艽去苗

大黃剉炒各參分

朴消研

郁李人湯去皮別研各壹兩

右六味除郁李人外搗羅為末與郁李人和勻鍊蜜

和丸如棗豆大每服溫水下三丸至五丸日再服量

兒大小以意加減

治小兒發黃桑白皮湯方

桑根白皮剉

麻黃去根節湯煮掠去沫 秦艽去苗土各壹分

大黃剉炒半兩

右四味麤搗篩每一錢匕水七分牛乳一合同煎至

五分去滓分溫食前日三服量兒大小加減

治小兒黃疸身體目睛小便並黃茵陳湯方

山茵陳

壹分

大黃

剉炒 半兩

山梔子

人伍枚

右三味麤搗篩五六歲兒每一錢匕水七分煎至四分入朴消半錢更煎一兩沸去滓分溫日三服量大小加減

治小兒天行發黃心腹脹急三黃湯方

大黃

剉

黃芩

去黑心各 壹兩半

山梔子

人叁分

右三味麤搗篩三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服取利爲度

治小兒黃病青麥汁方

青麥自然汁

右一味一二歲兒取半雞子殼分二服三四歲兒取一雞子殼分二服早晨午後各一服

治小兒忽發黃面目皮肉並黃栝樓根飲方

生栝樓根

右一味擣取汁二大合蜜一大匙和勻火煖分三服

治小兒黃病土瓜根汁方

土瓜根汁

右一味一二歲兒取半雞子殼分二服三四歲兒取

一雞子殼分二服早晨晚後各一

治小兒身目俱黃秦芫湯方

秦芫參

右一味麤搗篩每一錢匕入牛乳一合同煎至五分

去滓分溫日三服量兒大小加減

治小兒諸黃瓜蒂散方

瓜蒂壹拾枚

小豆貳拾粒

糯米肆拾粒

右三味搗羅為散吹少許入鼻中即差

治小兒黃病韭根汁方

韭根汁

右一味滴少許入鼻中出黃水即差

治小兒胃熱身體微黃除熱粉方

寒水石肆

煎至甚消去新氣滑石肆

小吡紙不

石膏肆

赤石脂肆

水一木香壹正壹

大黃捌

甘草捌

黃芩壹

治小兒防風法

小兒寶驚心殿麻黃根等

右一十二味搗羅為末以蛤粉一升藥末三合相和

再篩粉兒日三出藥而小兒甚驚也法出散

代錢小兒瘡法出藥而小兒甚驚也法出散

論曰夏傷於暑秋成痰瘧小兒血氣壅盛內挾實熱因

犯暑邪客于皮膚分肉之間至秋為風冷所折陽盛於外陰長於內陰陽相搏發而成瘡先寒後熱者寒瘡也先熱後寒者溫瘡也熱而不寒者瘰癧也若汗出過多亡陽而渴當節其飲多飲而小便澀則變為飲辯矣味治小兒瘡發作不定多渴心煩烏梅湯方

烏梅肉 炒

常山 各半

甘草 炙 參

右三味麤擣篩每服一錢匕水一盞入竹葉五片小麥三十粒同煎至四分去滓溫服量兒大小加減不

拘時候

治小兒溫瘡常山湯方

常山

淡竹葉 各壹兩

小麥 壹合

右三味麤擣篩分為四劑每劑以水二盞煎至一盞去滓分溫三服一日令盡以差為度更量兒大小加減

治小兒諸瘡大青湯方

大青

鼈甲 醋炙去 襴

赤芍藥 各半兩

當歸 切

茵陳蒿

麻黃 去節煎 去沫 焙

豬苓 去黑皮 各壹分

右七味麤擣篩每服半錢匕水半盞煎至三分去滓溫服日二更量兒大小加減

治小兒瘡疾身體壯熱增寒發作有時當歸湯方

當歸切焙

赤芍藥

龍甲醋炙去

苳胡去苗

大黃剉炒

甘草炙分壹分

桃人去皮尖雙人楚炒半兩

右七味麤搗篩五六歲兒每服半錢匕水半盞煎至

三分去滓溫服日三更量兒大小加減

治小兒瘡大黃湯方

大黃剉炒

常山各壹分

桂去麤皮

甘草生各半兩

右四味麤搗篩三四歲兒每服半錢匕以水半盞煎

至三分去滓未發前溫服吐利為効更量兒大小加

減

治小兒瘡疾升麻湯方

升麻

常山

蜀漆

大黃剉炒

萎蕤

黃芩去黑心

桂去麤皮各壹分

芒消壹兩

右八味麤搗篩五六歲兒每服半錢匕水半盞煎至

三分去滓發時溫服吐利為効更量兒大小加減

治小兒瘡癰實壯熱頭痛欲吐甘草湯方

甘草炙

常山各壹兩

右二味麤搗篩三四歲兒每服半錢匕水半盞入竹葉十片同煎至三分去滓溫服更量兒大小加減得吐卽止

治小兒瘡發寒熱腹脹下痢嘔逆黃瘦此胡湯方

此胡去土壹分 枳殼大者壹分 訶梨勒大者壹分

黃芩去黑心 甘草炙 芍藥

知母皆各半兩

右七味麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓

溫服

治小兒諸瘡蛇蛻散方

蛇蛻燒及

右一味研細每服半錢或一錢匕冷水調下

又方

鹿角燒壹兩

右一味麤搗篩每服一錢匕未發時水半盞煎至三分去滓溫服更量大小加減

小兒水氣腫滿

論曰腎者胃之關開竅於二陰水穀入胃輸于下焦機關在腎小兒脾腎稟受不足者關閉不利水液不能下輸致水聚於胃而生諸病土不勝水水液妄行乘于肌

肉流溢皮膚故爲腫滿然有水腫有風腫皮薄如熟李者水腫也虛腫如吹者風腫也治各有法宜依證調之  
治小兒水腫腹大諸癩不差澤漆丸方

澤漆葉

紙上炒  
各半兩

甘遂炒

黃芩去黑

郁李人湯浸去皮  
尖炒研

芍藥

豬苓去黑 杏仁湯浸去皮尖  
雙炒研

車前子各參

鼈甲去裙襴  
醋炙 此胡去苗各  
半兩

右一十一味搗研爲末鍊蜜和搗三五百杵丸如  
菘豆大五六歲兒每服五丸溫水下更看兒大小增  
減

治小兒腫滿結實諸治不差甘遂丸方

甘遂炒

葶藶紙上  
炒

車前子

豬苓去黑

杏仁湯浸去皮尖  
雙炒研

芍藥各參

澤漆葉

黃芩去黑

鼈甲去裙襴  
各半兩

右九味搗研爲末鍊蜜和丸如菘豆大五六歲兒每  
服五丸竹葉湯下以利爲度更量兒大小增減

治小兒腫滿構皮湯方

構木白皮切伍合  
卽楮也

赤小豆碎

赤茯苓去黑皮  
壹兩半

右三味咬阻如麻豆大五六歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服日再更量兒大小增減

治小兒通體腫滿腹脹氣喘郁李人湯方

郁李人湯浸去皮尖炒葶研

大黃剉

此胡壹兩半上苗各

芍藥

豬苓去黑心

澤瀉各壹兩

赤茯苓去黑皮

黃芩去黑心壹兩

麻黃去根節壹分

升麻

杏仁湯浸去皮尖雙入炒研

鼈甲去裙襴曬炙各參分

右一十二味麤搗篩五六歲兒每用二錢匕水一盞煎至五分去滓分溫二服日再以利為度更量兒大

小增減

治小兒水氣腫滿豬苓湯方

豬苓去黑皮

海蛤

防己

白朮

葶藶子紙上炒

朴消各壹分

桑根白皮剉

赤茯苓去黑皮各半兩

右八味麤搗篩五六歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服日再以差為度更量兒大小增減

治小兒水氣甘遂散方

甘遂炒

大黃剉

牽牛子炒各參分

葶藶紙上炒壹分

檳榔煨剉半兩



右五味搗羅為散每服一字七熟水調下以利為度  
更量兒大小增減

治小兒腫滿服藥不退葶藶煎方

葶藶 紙上炒 防己 壹兩半 澤漆葉

郁李人 去皮尖炒各壹兩壹分 赤茯苓 去黑皮

澤瀉 杏人 湯浸去皮尖雙入炒研如膏各參兩

苕胡 去苗貳兩

右八味將七味麤搗篩以水一斗煎至二升半去滓  
入杏仁膏及白蜜一斤慢火煎如稀飴二歲兒每服  
半錢匕溫水調下漸加之更隨兒大小加減

治小兒水氣慎榔散方

慎榔 煨熟 大黃 剉炒各參分 葶藶 紙上炒

牽牛子 炒各半兩

右四味搗羅為散三四歲兒每服半錢匕熱水調下  
以利為效更隨兒大小增減

小兒心痛

論曰經言心無正痛真心痛即難治小兒心痛者心包絡脉受邪也包絡者心之別脉邪氣客之則厥氣上逆痞而不散故發為心痛

治小兒冷邪氣攻心痛不欲飲食桃人湯方

桃人參參茶根湯浸去皮尖雙入炒黃

厚朴去鹽皮生薑汁炙壹兩

人參兩

陳橘皮湯浸去白焙壹分

麥蘗微炒半兩

檳榔到半兩

附子炮裂去皮臍

桂去鹽

當歸切焙各壹兩

右九味麤搗篩一二歲兒每服半錢匕水半盞煎至三分去滓不計時候溫服更量大小加減

治小兒冷氣心痛不思飲食檳榔散方

檳榔到參分

當歸切焙壹兩

蓬莪茂煨到參分

吳茱萸湯洗焙乾壹分

阿魏壹分麤裝煨令熟為度

木香參分

右六味搗羅為細散一二歲兒每服半錢匕溫酒調

下不計時候

治小兒心疼不可忍葶撥散方

葶撥壹分

胡椒壹分

桂去鹽皮壹分

桃人湯浸去皮尖雙入炒黃半兩

木香兩半

當歸切焙參分

右六味搗羅為細散一二歲兒每服半錢匕溫酒調

下不計時候

治小兒心痛面色青黃不欲飲食麝香丸方

麝香細研壹分

檳榔到

陳橘皮湯浸去白焙

肉豆蔻去殼

吳茱萸

湯洗焙乾炒

木香

各壹兩

右六味先將茱萸以米醋煮一二十沸後掘一地坑子可安得茱萸以炭火半秤燒坑子令通赤以米醋半盞及茱萸入在坑內用瓷碗蓋之四面以灰擁定勿令泄氣候冷取出與前藥一處搗羅為末入麝香和勻醋煮麪糊和丸如黃米大二三歲兒每服五丸三四歲七九溫酒下不拘時候

治小兒心痛不可忍桃人湯方

桃人

去皮尖雙

赤芍藥

桔梗

桂皮

甘草炙各半兩

右五味搗羅四味為末與桃人同研勻每服一錢匕水一盞煎至半盞去滓溫服量兒大小加減不拘時候

治小兒心痛木香湯方

木香

高良薑

炒各壹分

白朮

桔梗

白茯苓

去黑皮各半兩

右五味搗篩一二歲兒每一錢匕水一盞煎至五分去滓分溫二服發時併喫更量兒大小加減

治小兒心痛紫沉消積丸方

沉香

硃砂

各肆兩

阿魏

巴豆霜各壹兩以上各研別為末用蜜膏介酒化熬成膏

丹砂研 丁香 乾薑炮各

硫黃研 青橘皮湯浸去高良薑

檳榔剉 木香 人參

胡椒 桂去麤皮各肆兩

右一十五味除前膏外一十一味搗研為細末入前

膏和搗丸如芡豆大以瓷合收密封每服二丸食前

橘皮湯下更量度加減

治小兒積氣冷氣心痛硝砂丸方

硝砂錢貳 乾漆炒 五靈脂

胡椒 桂去麤皮 京三稜炮

蓬莖炭炮各壹兩 巴豆貳拾壹枚去心皮膜醋煮令出油研

斑貓貳拾壹枚去翅足炒

右九味搗羅為末研令勻醋煮麩糊和丸如粟米大

一二歲兒每服五九三四歲兒每服七九橘皮湯下

餘以意加減

治小兒嘔逆心腹疼痛化水穀消積聚沉香煎丸方

沉香剉 丁香 木香

胡椒 沒藥研 丹砂研水

高良薑 檳榔麵裹煨熟去麤剉 硝砂揀淨水飛慢火熬乾

青橘皮

湯浸去白焙

硫黃

研水飛各壹兩

縮沙

去皮

吳茱萸

湯浸焙乾

阿魏

醋浸研澄去沙和麩作餅子炙焦各半兩

巴豆

去皮心膜研出油盡膏分

右一十五味各搗研爲末和勻鍊蜜丸如菘豆大以瓷合收密封每服二九食前臨臥生薑橘皮湯下量虛實大小加減

治小兒心痛胡椒丸方

胡椒

碎拾

檳榔

壹枚

斑貓

染拔去翅足

右三味搗羅爲細末燒粟米飯爲丸黃米大二二歲兒每服三九三歲已上五九煎菖蒲湯下

治小兒心痛薑黃散方

薑黃

檳榔

剉

右三味等分搗羅爲散溫酒調下一二歲兒每服半錢匕已下餘以意加減

治小兒虻蟲攻心腹痛楝根湯方

楝根皮

有子者

酸石榴根

槐根

各壹握切碎用東引者

右三味以水三盞煎取一盞去滓空心頓服以藥盡合之卽瀉蟲出仰之卽吐蟲出神驗兒小分減服治小兒疳蟲咬心痛不時日夜不睡人參湯方

人參

桂

去蟲皮

桃柳枝

剉

狼牙

乳香研

青橘皮去白 焙炒

吳茱萸

湯浸焙炒 各壹分

古老錢

肆文火 煇醋淬

右八味麤擣篩每服一錢匕水六分煎至四分去滓  
溫服量兒大小加減

大德重校聖濟總錄卷第一百七十四