

蕙怡堂驗方總目四

婦人門目錄

益母丸

益母膏

獨聖散

女金丹

琥珀丸

四製香附丸

九製香附丸

調經方

勝金丹

婦人不孕方

伏龍肝

月水久閉方

經血逆行方

白帶方

又白帶方

赤白帶下方

又方

又方

血淋方

沙淋方

行經腹痛方

子宮脫下方

崩漏方

血崩神方

血崩不止方

又方

保產無憂方

鯉魚湯

胎中上心危急方

阿膠丸

真人安胎散

阿膠酒

二神散

胎前產後下痢

妊娠下痢方

止啼湯

達生散

毓麟丸

通產散

難產方

鼠腎丸

橫生方

潤胎方

胞衣不下方

又方

子死腹中方

遇仙丹

血暈方

生化湯

通乳方

又方

產後無乳方

催乳散

子腸不收方

縮舌散

產後經風方

華陀愈風散

血塊痛方

止乳方

蕙怡堂經驗方卷四

會稽陳大縉魯齋甫手集

男光耀雨民氏增訂

婦人門

益母丸

益母草四十觔熬成膏藥三斤真龜膠一斤蛤粉炒當歸二
斤白川芎一斤俱蒸熟右三味為末入益母膏為九重三錢晒

乾磁瓶收貯

胎動不安蘄艾湯下

催生砂仁三錢煎湯下

產後血塊痛紅花湯下

血暈山楂湯下

虛脫人參湯下

血崩人參湯下

產後癥多昏亂不知人事醋炒紅花湯下

月水先期或一月兩次或懨懨不息人參條芩杜仲湯下

月水過期非紅非紫紅花桃仁湯下

赤帶用赤雞冠花白帶用白雞冠花煎湯下

血枯紅花湯下

肉淋黃連人參湯下

吐紅黃芩灰柏湯下

便血地榆湯下

虛損熟地白芍陳皮湯下

陰虛潮熱往來沙參湯下

骨痛地骨皮湯下

男人白濁三角酸煎湯下

夢遺茯神杜仲白雞冠湯下

腳跟腫皮脫出水牛膝湯下

心痛桃仁湯下

血虛頭疼川芎白芍湯下

腰痛杜仲湯下

腰痛腸脹氣冲胸塞芍藥杜仲湯下

益母膏 又名還魂丹

五月五日六月六日或小暑日益母草花正開時採取花葉
子石臼內搗汁沙鍋內文武火熬膏忌鐵器每服五錢或一
兩

胎動腹痛下血不止當歸湯下

橫生逆產胎衣不下炒鹽湯下

產後血暈口渴狂言產後中風失音口噤血結奔痛時發
寒熱面赤心煩或鼻衄舌黑口乾童便太酒下
產後咳嗽惡心吐酸脹痛無力黃酒下

產後漏血紅棗湯下 產後痢疾米湯下

產後崩漏糯米湯下 產後帶下阿膠湯下

產後二便不通煩躁口苦薄荷湯下 凡產後以童便化

下一服能安魂魄調經絡破血瘀凡經不調者服之則調

無子者服之則孕婦人之聖藥也

獨聖散

丹參為末酒下二錢此藥破宿血生新血安生胎落死胎止
血崩帶下調經脉或前或後或多或少及冷熱勞傷腰脊
疼痛等症俱治

女金丹

人參

當歸

生地

丹皮

白茯苓

白芷

玄胡索

酒洗去油

肉桂

白芍

膏本

去蘆酒洗

沒藥去油

川芎

白薇

酒洗各二兩

沉香

赤石脂

酒漂甘草各一兩

共為細末蜜丸或益母膏為丸硃砂五錢為女人不孕經

後當歸川芎湯送下一丸重三錢每日服一丸三月後必

孕胎動欲產開水送下一丸睡片刻即安每月服三五丸

保定足月分娩

琥珀滋生丸 治婦人胎前產後百病

琥珀一兩醋炒 燈草同研 阿膠一兩炒成珠 五味子五錢 附子製各一兩 夏五錢

肉桂去粗皮五錢 沉香五錢 不川芎五錢 桑寄生

當歸

肉蓯蓉

人參

續斷

熟地

沒藥炙

木香不見火

延胡索

乳香炙各一兩

牛黃三錢

硃砂一兩為衣

各製淨末先將益母草八兩搗碎加水十碗熬成一半去

渣慢火熬成膏和藥末少加老蜜搗千餘下分為百分每

丸重一錢四分硃砂為衣陰乾再晒極乾黃蠟為壳每服

允脣脢疼痛遠臍腹痛及嘔逆上氣築心痰喘不進飲食

用姜汁少許和酒化服

諸色痢疾及赤白帶下血冷血崩漏胎下血用生姜艾葉

炒令黑色酒煎數沸調服

泄瀉不止陳米飲調服

尿澁諸淋通草燈心湯下

血暈不知人事童便調灌半丸醒後當歸湯服一二丸

上熱下冷人參湯服

遍身虛腫水氣赤小豆湯調服

產內二毒傷寒及中風角弓反張黃麻湯調服被蓋取汗

月經不通或間雜五色頻頻而下斷續不止飲食無味肌

瘦面赤唇焦乍寒乍熱四肢頻痛五心煩熱黑點血班

赤腫足注血風勞傷並用童便入姜汁少許服

臨產用酒下一丸易產

常服以童便加酒一半免惡

心惡

懷胎臨月一日一服至產下不覺疼痛或服至十日飲食倍增是藥力也其功不能盡述

四製香附丸此婦人之聖藥種子之奇方屢試屢效

香附二斤分四處各浸七日一日一換取出炒黃勿焦

水一童便一米泔一米醋一鹽水

當歸酒洗

熟地艾葉二兩煎湯拌蒸川芎

白芍

條芩炒各八兩

血熱加生地八兩共爲末蜜丸空心清湯下

九製香附丸治婦人百病調經種子安胎神效

香附十八兩杵淨分作九分每分二兩一酒一醋一鹽水一童便

一小茴二兩煎汁一益智仁二兩煎汁

一梔子炒黑三兩煎汁

一茱萸子二兩煎汁一白附子製石菖蒲各一兩製其前汁

製法

各汁俱春浸三日夏一日秋五日冬七日浸至

日足連渣同香附晒乾檢出香附去渣再將香附合一處入砂鍋內用斬艾五兩無灰陳酒同煮酒乾再添再煮須煮至香附黑色為度取起晒乾為末聽用

香附末八
歸身酒洗
大熟地姜汁蒸

大生地姜汁洗

白芍酒炒各四兩
川芎酒洗三兩
白朮土炒四兩

甘草蜜炙九錢

枣仁炒二兩
人參一兩
茯苓一兩

天冬去心二兩七錢

益母草嫩葉四兩
山萸肉二兩

真化皮二兩

元胡醋炒一兩
阿膠蛤粉炒條芩四兩
酒炒二兩

砂仁連壳一兩五錢

右藥各製如法共為末蜜丸梧子大必須早晚各服三錢

清湯下服至一料不孕者必孕既孕者堅固易產且凡舊有之病俱已消除神效

香附二斤分四分一酒一醋一童便一蜜水俱歸身酒蒸

川芎酒蒸

艾葉醋炒

條芩

阿膠蛤粉炒成珠各三兩

右藥共為末用益母草煎膏為丸梧子大清湯下三錢用以調經種子安胎俱神效

勝金丹 治女人胎前產後一切淋濁帶下月經不調并血枯

不孕小產難產血暈血瘀停胞死胎等症并男婦諸虛百

損

香附一斤分四分一童便一酒一醋

藁本三兩歸身川芎

人參

赤芍

白芍

白芷各一兩

五錢

甘草炙七錢熟地四兩

丹皮三兩

白茯苓

牛膝

杜仲各二兩白薇去蘆五錢

以上俱酒浸一宿晒乾為末

赤石脂

白石脂

各一兩

以來醋浸透煅紅共七次為

末

硃砂

琥珀各五錢

乳香

沒藥各一兩

以上四味用酒研爛如膏和入前各藥末內擦磨數十次
令極勻加煉蜜為丸彈子大金箔為衣每服一丸陳酒下

婦人不孕方

雞一隻黑骨白毛者佳如無用三年陳驥雞亦可
益母草一斤分四分一酒一醋一姜汁總入雞內用重湯煮雞淡吃
一川芎汁各浸透炒黑
或酒送亦可雞骨并藥渣焙乾為末加歸身四兩續斷二兩
姜六錢為末蜜丸每日早午晚酒送各三錢一料即孕

伏龍肝 孕婦傷寒恐致墮胎用灶心土對鑊臍處取一塊研
末溫水調塗臍上一日一換至七日之後即不墮 如盤腸
生者塗頭頂母腸即收 如胞衣不下者塗腳心即下或酒

送二錢亦可

月水久閉方

二垂沙黃色四兩炒卽入無灰酒一壺於砂鍋內滾二三沸取起
以磁器盛之去沙酒畧溫飲數盞

經血逆行方

韭菜搗汁一盞入童便半盞燉熟服即止

白帶方

鹿角燒灰為末每早酒調下二錢一二次即愈

又方

藕節八兩

赤茯苓

白茯苓

赤茯神

白茯神

柏子仁去油

益智仁鹽水炒

各一兩爲末

金櫻膏為丸梧子大每服三錢清湯下藥盡病愈

赤白帶下方

棉花子炒黑去壳研末米糊為丸每服三錢赤帶用沙糖湯下
白帶用白糖湯下

又方

黃狗頭骨一具燒灰存性每服三錢服完卽愈

白帶丸方

藕節八兩

芡實二兩

白茯苓一兩

白茯神一兩

山藥三兩

蓮鬚一兩五錢

蓮子二兩

金櫻膏十八兩

右藥爲末膏丸服藥完病愈

又方 並治遺精

赤白茯苓各四兩 赤白茯神各四兩 柏子仁五錢 益知仁五錢
為末米糊為丸梧子大每早陳酒或清湯送下

血淋方

車前子二錢 萍根一錢 水煎多服效 又白荷花煎湯
飲立愈

沙淋方

車前草搗汁半碗入蜜一兩懸井中五更溫服效如白淋去
蜜加沙糖一兩

行經腹痛方 婦能種子

真蘄艾

紅花

當歸

益母草各三錢

酒煎另用雞蛋一個刺數孔入藥罐內同煮熟即以藥汁
同雞蛋吃下不過三個痛止即受胎

子宮脫下方 治婦人濕熱煩勞太過子宮陰中脫出無論有
娠無娠俱可服

藿香

臭椿皮

荆芥

錢

三煎湯洗之如已收上可不

必服藥如不收即服後方

人參一錢

炙甘草一錢五分

白朮一錢

歸身八分

炙甘草五分

陳皮五分

升麻二分

柴胡三分

梔子炒

黃芩酒洗

車前

木通

澤瀉各一錢
如上焦有火頭眩去人參加沙參二錢姜枣
為引服一二劑即愈再用歸脾湯調理不可煩惱為要

崩漏方

阿膠五錢炒

乾姜五錢炒

附子五錢

醋

蘄艾五錢

為末

炒黑

將姜附艾三味用好酒二杯煎一杯和阿膠末空心熱服

覺熱至臍即止患一年者二帖三五年者四帖全愈更用

后藥除根

白雞冠花炒五錢

炙甘二錢

百藥煎二錢

木耳二錢

白芷一錢

共為末每日空心當歸湯送二錢藥完永不再

發

血崩神方

真阿膠二兩炒

慎火草卽火炭草

炙焦研二兩

棕毛燒存性一兩

龍骨煅

牡蠣煅

蒲黃炒黑一兩

烏梅肉焙焦各一兩

為末蜜丸梧子大空心酒下三錢

血崩不止方

蓮蓬壳荆芥穗燒存性各半每服二錢米飲下

又方

棉花子燒存性酒下三錢立止

保產無憂方

歸身一錢五分 川芎一分 厚朴七分 姜白芍一錢二分 酒洗

一錢

酒洗

五分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

五分

荆芥炒黑八分

川貝

去心一錢

一斤

一斤

一斤

一斤

一斤

一斤

炙甘五分

姜三片空心煎服六七月即可服臨月服三五帖甚妙難

產橫生胎動不安等症並治癆能下死胎

鯉魚湯 孕婦五六個月腹大異常高過心胸者乃胎中蓄水

如不治子母難保此方生之

當歸酒洗一錢五分

白芍一分

錢五分

白茯苓二錢

白术炒二錢

五分

陳皮三分

用鯉魚一尾重半斤之上去鱗腸白煮熟去魚留汁二盞

加姜三片同前藥慢火煎至一盞空心服如未愈再服

胎衝上心危急方

白术五錢

條芩二錢

白芍四錢

枳壳一錢

水煎服。如人壯健單用枳壳五錢煎服亦可。

阿膠丸 治姪婦大便門

枳壳炒

阿膠炒等分為末。蜜丸梧子大。一散為衣。清

湯下二十丸。未通可加至五十丸。

真人安胎散

舊葵扇燒灰

二蚕沙二錢

共為末。用鳳凰衣十四張煎。

湯送下。

阿膠酒 孕婦血痢并下血皆妙

阿膠炒

酒一斤半煮化服。或黃明膠亦可。

二神散 治姪婦痢

雞子一枚破頂去白留黃入黃丹一錢攪勻封口鹽泥固火
上煨焙泥乾取出為末米飲下一服愈是男二服愈是女

胎前產後下痢方

敗龜甲以末醋炙為末調服自愈

姪娠下痢方

黃柏蜜拌炒焦

糠去皮

二味搗為丸桐子大空心米湯

下三五十丸一日三服妙不可言

止啼湯 治姪娠兒在腹中啼

黃連二錢

甘草一錢

水煎服立愈

達生散

當歸酒洗

白芍酒炒

人參

白朮土炒

陳皮

紫蘇各一

錢

炙甘二錢

錢

大腹皮酒洗

三錢

青蔥 五葉

枳壳 八分

黃楊木腦頭

七個

春加川芎 一錢

夏加黃芩 一錢

孕婦八九個月服數十劑有力易生較勝瘦胎散

毓麟丸 專一保胎服至七個月平安可以止藥

人參 一兩 五錢 条芩 鹽水炒歸身

杜仲 各三兩

白朮 炒四兩 川斷酒浸一兩 五錢 陳皮 一兩 熟地 一兩

香附 童便浸晒 炒乾四兩 阿膠 炒二兩

為末米糊為丸汞豆大空心服七八十九清湯下一方加

黃芪蜜炙一兩五錢

通產散 臨產交骨不開五七日不生及矮小女子交骨不開

死在須臾服之一二寸香時卽下

敗龜板 一個灸 女人髮一握 擇生過男者 洗去油 腺存性 當歸 全用 四兩

川芎二兩

乳香四錢

益母草研頭末四兩

為末每服六錢圓眼湯下有力者加參一錢煎湯下更妙

難產方

麻油五錢

好蜜一兩

同煎十數沸溫服胎滑即下

鼠腎丸

鼠腎子一對用燒酒浸三日去皮膜 輕粉 雄精各一錢
檀香三分 射一分 研成丸分十二粒勿經女手勿令一人見陰乾磁瓶收貯俟交骨開清湯下一丸立效 如有二鼠另作一料另貯勿混

橫生方

於本婦右腳小指頭灸三壯艾如麥粒大神驗

潤胎方

產婦胎未下而胞水先流則乾澀難產以車前子二三兩酒

半碗水四碗煎服

胞衣不下方

瓦松煎汁服一口卽下或用蟬蛻瓦焙乾為末清湯下一

刻卽落神效

又方

小貝母七個去心煎服立下

治子死腹中不出

黃牛屎炒熟醋調敷母臍卽出

催生遇仙丹

蛇蛻一尺新瓦上煅存性草麻淨仁七粒硃砂

雄黃各一錢

共研為末入厚粥少許為兩丸候胞破水下安臍中一丸

清涼膏封固胞下速去不可忘記切切

血量方 此物須預備

韭菜一把寸斷以酒壺以滾醋泡之塞大口用小口觸鼻卽
醋如昏迷打呵欠用人參一錢虛則多加用韭菜根酒煎入
醋半小杯服之立止

生化湯

當歸金五錢 川芎二錢 炮姜四分 炙甘四分

桃仁十粒

紅花八分

水煎服如汗多減川芎五分小

腹急痛加元胡索一錢汗出如油不止加參芪血暉則先

以姜汁童便飲之如止血塊作痛原方如韭菜白四十九

根如不眠加益母草三四錢如停食加消食藥以緩胃為

主肉食加山楂肉

通乳方 治產后乳汁不通

木通二個 猪前蹄一個 熬爛并汁食之卽通

又方

猪前蹄三隻 木通五錢

石膏五錢

熬熟食蹄與湯

卽通

產後無乳方 凡乳母不宜吃猪肝

黑芝麻炒黑為末三錢熱酒冲服或用猪蹄湯冲服更妙

催乳散

漏蘆

通草各一錢

貝母二錢

白芷一錢

共為末用猪前蹄一個酒水各半煎湯送下不可用鹽神效

子腸不收方

枳壳三錢煎服卽收

縮舌散 治產后舌出

硃砂為末敷之 或將盆急擲驚之卽收並治房慾后舌出
不收卽將本婦鞋底炙熱頂項頸三處熨之

產后經風身硬方

柚子皮二個 金銀花半斤 蘿梗一兩 過海風藤四兩

防風一兩 茄桿一兩 青松毛半斤 甘草節二兩

煎水一大鍋傾盆內患人坐于上圍以綿被勿令出氣熏

二次後可服前藥

華陀愈風散 治產後中風口噤手足瘓癰如角弓式產后血

暈不省人事四肢強直或心腹倒築吐瀉欲死

荆芥穗微焙爲末每服三錢酒調服或童便溫服噤口則挑

齒灌之入鼻中亦效 荆芥乃產後要藥角弓反張產後
惡得此症者十存一二而已 又產後因怒發熱以致迷候


悶亦如上治之男婦中風口噤酒服二錢立愈

血塊痛方

伏龍肝三錢研黃酒調下立愈

止乳方 婦人子壞而乳不收恐生乳病者用之

麥牙一兩 水煎溫服乳即收上



兒科門目錄

白膜裹舌

生下無氣

頭裂奇方

撮口癰風

鴉口白

癰不乾

癰風青筋神效方

小兒初生

稀痘方

又稀痘方

又方

絕痘方

稀痘丹

痘初起

化毒黃蠟丸

快班紅蠟丸

百解綠蠟丸

痘瘡黑蠟方

痘瘡破爛方

痘生眼內方

痘瘡回毒膏

又方

婁金散

移回毒法

痘後餘毒移法

金氏七寶丹

又七寶丹

抱青丸

消疳丸

理脾丸

集勝丸

千金散

活洛丹

五疳散

走馬疳

疳積并痢方

雞肝散

回生丹

急驚風方

桃花散

肚大牙疳方

喉瘡口疳方

急慢驚風方

走馬牙疳方

口疳腐爛方

牙疳摻藥方

蟾胆丸

雞肝丸

久病腹大人瘦

避難救兒方

蛔厥方

脫肛方

蟬化散

馬脾風方

水瀉方

腹脹大小便不通

止癟方

痢方

口白舌硬方

肥兒丸

畫眉丹

兒科門

白膜裹舌

小兒初生有白膜皮裹舌或遍舌根可以指甲刮破令血出
以煅過白礬如米粒許敷之如不卽治則啞

生下無氣

小兒生下沒氣者切不可棄之卽用新綿裹煖以胞衣放鍋
上架起鍋內着水漫火薰令熟氣貫於腹內男則左脚大
指先動女則右脚大指先動且不得住蒸俟其心腹間吻
動卽止將臍帶留長咬下仍以綿絮包裹必須對日方能

出聲

頭裂奇方

一小兒方七月連胞生下破胞而出與乳吃得活至三日後

忽頭破作四塊此乃母力不足之故以母項心髮燒灰敷
之卽合

撮口齧風

小兒初患之時齒根上有小泡如粟米狀急以溫水蘸青軟
絹裹指輕輕擦破兒口卽開便安不必服藥若臍風一成
必有青筋一道上行至肚而生兩岔宜灸筋頭三壯截住
若見兩岔卽灸兩岔三壯十活八九遲則上行攻心死矣

鷦口白

朱砂二錢

硝一錢五分

枯礬三分

鷦口白一錢陰乾

火煅存性

共為末先用亂髮裹指將口內白拭去用井水調藥雞毛

押之

臍不乾

亂髮燒灰敷之效

癆風青筋神效方

南星

半夏各五分

天麻

全蝎各三分

巴霜一錢

右為末米糊為丸栗米大每服五丸用牛黃少許磨水送下其青筋處用燈火打數十次立效

小兒初生

用胡桃去皮嚼爛以綿包如乳頭樣使兒吮汁盡待其腹內污物去盡並無瘡毒之患

稀痘方

赤荳

黑荳

菉豆各一撮

甘草節五分

不時煎服

屢驗凡鄰近出痘卽與兒食可免不出卽出亦輕

又稀豆方

朱砂一分五厘 黄連一分五厘 甘草一分五厘 膻帶本夫人者瓦
飛淨

右藥四味共為細末密調一日夜小兒口內抹完則豆不出卽出亦少

又方

將臍帶瓦上焙乾每重一分用硃砂五厘當歸生地煎濃汁一二塊壳調帶末抹兒上膀并乳頭上一日內抹盡次日大便下穢汚濁物終身永無瘡疹之患

絕痘方

用活烏鯉魚一個入硃砂五錢於魚口內縫好陰乾如端午日製至冬至日煎湯與兒洗浴冬至日製端午洗浴過三次痘永不出矣如不信留一手一足驗之

〇 稀痘丹

立春前後三日內採半開半含紅梅花蕊一茶鐘去蒂仍放
鐘內以碟覆蓋一周時其氣汗自然升上却用新搗盆未用
者搗如泥擊成餅將透明朱砂飛過一錢勻摻花上緩緩研
和少加白蜜丸如龍眼大晒半乾金箔為衣每遇四絕日服
一丸草草湯下忌鐵器葷醒當晚微微發熱次日遍身出癰
是其驗方也

痘初起

將臨清濟寧上好油臘脂點兩眼角則免壞眼

痘瘍神效三蠟丸方 三丸俱用黃蠟為壳

化毒黃蠟丸

硃砂五兩明 亮

當歸

生地

犀角 要帶黑有棕
眼

人參各五

川連

葛根

黃柏

荆芥穗

甘草各四
錢

白朮八錢
牛蒡子

連翹各七
錢

升麻二錢
牛黃一錢
取者佳

分活

右切片將硃砂打篆豆大絹袋裝縫水十碗酒二碗全藥

入砂鍋內文武火煮之止剩一盞汁為度攢淨拌朱砂晒

乾為末以猪心血調糊為丸每丸乾重五分凡痘初出卽

細研一丸用薄荷湯調服痘即減少輕快其效如神此

方傳自異人用硃砂仍用補氣和血解毒快班托元清心

諸藥煮之功效甚大保嬰之仙方也又有后二丸方各

奏奇效痘疹始終病症盡於三方之中務須炮製精虔內

有犀角能清心火去難解之毒牛黃清熱祛骨髓難拔之

毒硃砂鎮心寧神解周身之毒人中黃降火清心解毒復

元蓋痘毒結于受胎之始根深蒂固臟腑俱蘊熱毒若非
金石大力珍重藥味豈能透骨清髓掃蕩臟腑之真毒乎
有心濟世者其加之意焉

快班紅臘丸

當歸紅花汁浸焙干熟地姜製生地酒洗人參各二兩

白朮

川芎各一兩元參

白茯苓各八錢

荆芥穗

牛膀子炒各七錢犀角錢三錢

牛黃一分錢

甘草六分

人中黃二錢人屎燒五錢

右為細末蜜丸如皂角子大三歲兒服一丸一歲服半丸
薄荷燈心湯下此丸專治五六日上痘疹不起起而膿不
全全而不厚煩憊不寧或遍身痒塌間有乾黑者若不急
爲益血補氣內托化毒大復元氣則膿不滿而回靨凸矣

縱目前苟免大患則倒靨倒發痘毒日久不瘡者多矣

百解綠蠟丸

歸尾

紅花汁浸二兩

生地

一兩二錢

白朮

人參

牛膀子

各八錢炒

牛黃

一錢

犀角

镑

花粉

滑石

各六錢水飛

人中黃

威靈仙

酒浸各五錢

白丹皮

七錢

大黃

酒浸蒸晒三次一兩

二錢

祛毒復元全在此味

換榔

升麻四錢汁浸

右爲細末蜜丸皂角子大三歲一丸一歲半丸蠟丸收貯

愈久愈效此丸專治十二日後痘瘡倒靨毒氣內收不

能散降顧伏于臟腑之間乘虛而發變症百端或爲痘瘡

痘疔倒靨倒發毒盛危急等症惟以化毒爲主斯免爛膚

腐筋潰鼻蝕牙喪明之患此丸能祛臟腑之毒俱從二

便徐徐降下不傷元氣不損脾胃雖至弱者服之亦不知
毒從何去真元如何自復也凡服藥以燈心薄荷湯下以
上三蠟丸歷著奇效妙難盡述取用簡便而奏效甚神

痘瘡黑屬方

獐猪第二番血清半盞和冰片一分溫服良久下痰血一
二次痘卽紅起矣

痘瘡破爛方

用陳年松花或乾篆豆粉或蕎麥麵敷之愈

痘生眼內方

刺鱠魚之血點眼不生蘿蔔花又以麥冬三錢去心搗

爛貼足心其痘自落

痘後回毒膏 媵治諸般熱毒

麻油四兩入番木鱉一兩去毛全油煎枯擗出木鱉入壯人頭髮三兩熬化滴水成珠加飛丹二兩收成膏貼一個即消

又方

八月採田塍邊野毛荳連莖根煅存性為末真麻油調敷不問初起日久已未潰神效用荳更妙

婁金散

犬屎內骨七分經霜糞更妙多收布包打碎水淘出骨洗淨搗爛金銀花三錢

水煎服不問寒熱虛實初起一服即消已潰即飲神方也移回毒法治痘毒生在枝節緊要處

白荳為末水調敷之即攻平肉處發毒以免后患

痘后餘毒移法

或生于手足節澗處不知治法恐成痼疾須於毒腫起時
卽剥蝦蟆皮貼之內服敗毒藥則毒移于他處矣

金氏七寶丹

蛇含石六兩

代赭石六兩

二味以銀罐盛貯炭火內燒
紅陳米醋淬其細者自沉醋

底粗者撈起再煅再淬
以淬完爲度研極細末

大南星四兩

汁煮透姜

白附子五錢

射香一錢

朱砂五錢

金銀箔不拘多少

亦全爲衣

古爲細末於端午正午時用米粽入柏搗爛丸如芡實大

用微火烘燥瓦瓶盛之密封入勿洩氣專治小兒急慢驚

風傷風疳病食積風痰氣喘夜啼以生姜一片薄荷一團

竹葉七片燈草一團爲引然藥性惟鎮心却疾一味墜下

凡痘疹盛行時不宜進切忌

又七寶丹

胆南星 五錢

射香 二分五厘

天竹黃

山藥 各三錢

羌活 錢三

全蝎 一錢

琥珀

珊瑚 分三

牛黃 二分

右為細末蜜丸梧子大辰砂金箔爲衣 急慢驚風薄荷

湯下 感冒風寒發熱姜葱湯下 內傷飲食生冷清茶

下 心腹痛霍亂吐瀉淡姜湯下 伏暑傷熱積聚身熱

清湯下 大小便閉燈心湯下 泄瀉米飲下 夜啼燈

草薄荷湯下 量年大小一丸半丸不拘時服

抱青丸 治小兒驚風痰嗽口臭喉腫疾涎壅盛厥逆癲癇一切

風火等症及大人痰火症神效

雄精 辰砂 琥珀屑 各二錢 竹瀝霜 五錢 明天麻 七錢

麵煨

胆星 一兩
丸製

珍珠 五分

金箔 一百

射香 五分

右為細末甘草熬膏作丸如芡實大硃砂爲衣 薄荷燈

草湯下一丸 取竹瀝霜法用大磁盤數面曝烈日中極

熱少入竹瀝盪開止令盤濕不可過多取其易乾多盤攤
晒以竹片括下收貯但竹瀝清淡成霜較少令立一簡便
法門取上號天竹黃研細水飛入瀝晒乾再入再晒以加
重五錢爲度用之功效相等

消疳丸治疳眼因飲食失節以致腹大面黃肝血不能養目先治其疳而目自愈

蘆薈煅一兩 胡黃連五錢 五谷虫洗净瓦焙乾二兩

全研爲末蜜丸彈子大每空心米飲湯下一丸至腹小服

理脾丸

理脾丸

陳皮

茯苓

山楂

半生半蒸各一兩

白朮炒二兩

黃連

炒

蘆薈

煅

炙甘草各五錢

為末神曲黃米糊丸彈子大姜湯下

勝集丸

銅壁仙人曰：丸治癥不必細分五疳，但虛則補之，熱則清之，冷則溫之，吐則治利，則治利積，則治積，虫則治

用之屢試屢驗

蘆薈

煅

五靈脂

去泥沙

夜明砂

淘淨

史君子

生

取肉一半熟

砂仁

去壳橘紅

木香

炙

焦各

當歸

錢

川蓮

川芎

乾蟾

炙

焦各

當歸

錢

青皮

炒各一
錢五分

虛人加人參三錢

白术

五錢

去義水青

皮

因於熱者加膽草三錢

去砂仁義木

因于吐瀉下痢

加白术

二錢

肉果

煨

訶子肉

各一錢

去義水青皮

因於風

搖頭擡目者加天麻

羌活

各二錢

因于積痛者加煨

三稜

川練子肉

小茴香

炒各一錢

去芎歸

因于瘧者

加醋炙

鱉甲

三錢

因于虫者加白蘞羨

一錢

川練子

二錢

去芎歸

因于渴者

加入參

白术各二錢

去砂仁義木

右為末

雄猪胆汁

二個打神曲糊為丸如菉豆大每日米湯下十丸

千金散治小兒一切痰喘急慢驚風雖至死嚥下即活

全蝎炙三分 硫砂四分 水牛黃六厘 炙甘一分 射香二厘
飛

胆星二分 黃連 天麻各四分 疟藥三分

為細末用五六厘薄荷燈心全金銀煎湯不拘時調服

活絡丹治臍風撮口急驚痰膠滿口牙關緊急角弓反張天吊等症

川牛黃一分 辰砂五分 蜈蚣一條 全蝎全者三個洗炒

射香少許 胆礬三分 巴豆五粒水一

殭蚕炒五條水洗輕粉三分 煤硝二分 右研細末用皂角

煎湯糯米粉打成糊為丸菉豆大每服七丸葱白煎湯下

以利為度

五疳散專治小兒五疳潮熱面黃肌瘦煩渴吐瀉肚大青筋手足如柴精神疲倦歷試有效無疾預服諸疾不生元氣

虛弱者服半月
自然身體輕健

白术蜜水炒一兩五錢

史君子各七錢五分
甘草一錢五分

山楂肉

麥芽炒

金櫻子肉炒

蓮子心隔帝

橘紅各五錢

麥冬去心一兩

芡實蒸二錢五分

青皮二錢炒

爲細末蜜丸每服一錢清湯下

回生丹治小兒慢脾風

附子童便製人參各五錢

天麻一錢紫河車一錢

全蝎一錢五山藥三錢炒

朱砂一錢珍珠五分

天竺黃鈎藤各二錢五分

琥珀牛黃各五分

茯苓二錢金箔十貼

右研細末麻油老酒調服一歲者一分量兒大小加減服

治急驚風方

辰砂

天竺黃
錢一
冰片

射香各一月石三分

青黛五分

雄黃二分

珍珠

牛黃

琥珀各一分

右研細末蜜丸黃豆大薄荷湯調下一丸

走馬疳

陳年糟茄一二個燒灰存性研末敷上一二次卽愈神效
小兒疳積并痢方

雞肫皮炒黃色爲末每服一錢又治水瀉及脾胃虛弱以其能化食去積健胃故也

鷄肝散治疳積如神或爲丸服亦可

白芙蓉花陰乾
三錢肉果油麵裹煨去胡連五分

右藥同鷄肝一具加酒漿一碗重湯燉熟去薑食肝多

吃十幾枚卽眼瞎亦愈

桃花散 治痘後瘡成毒

滑石 五錢 龍骨 二錢 白芨 一錢 赤石脂 一兩

共研末摻之

肚大牙疳方

班毛七個去頭足

糯米十撮

全炒黃去米將班毛為末飯丸

雄黃末為衣晒干入雞子內飯鍋蒸熟去藥吃鷄子

喉瘡口疳方

人中白 賦

輕粉各一錢

硼砂

胡連

薄荷葉

蚕子燒灰

川連

黃芩各七兒茶

青黛各五分

蘆薈三分

冰片一分

牛黃一分鬼饅頭

二錢 賦存半性

以上俱為細末吹患處

急慢驚風方 放鼠仍活

取活鼠腎子陰乾磨少許清湯送下數匙一腎治數人

走馬牙疳方

經霜貓糞瓦燬存性為末每一錢加冰片一分青黛五分

胡連三分共研為細末摻牙根

口瘡腐爛方

薄荷六錢黃柏五錢青黛水飛白硼砂三分冰片一分

硃砂二分水飛共研細末瓦罐收貯每用少許敷之數日愈

牙瘡摻藥方

真青布五寸燒經霜野木連一個燬存性如無以白
川倍子一個燬存性

川椒三厘冰片五厘共為末摻患處

蟾胆丸治小兒急慢驚風

雄黃

硃砂

黃連

乳香各二分
四厘

冰片

射香各一分共為末蝦蟆膽五六個和藥末為丸芡實大每

三厘

滴取汁

五六個和藥末為丸芡實大每

服一丸薄荷湯下

雞肝丸治小兒五疳

蘆薈炒一牛黃一分雄黃七分雷丸肉炒二錢史君子炒二錢

為末用十兩重鷄肝一具秤藥末五分塗肝上蒸熟與小兒食之或作丸如米粒大白湯下至者三服全愈忌冷水發物等愈后以參苓白朮陳皮補脾之藥調理

小兒久病腹大人瘦

初用參調胃等藥二三貼用蝦蟆一隻洗净剉包外用

黃泥包裹猛火煅過存性去泥剉研末清湯送下一錢人

弱服五分雖病久者二隻無不愈

避難救兒方

婦女避難小兒啼哭棄者甚多此方可止兒啼遇兵亂須刊刻貼示救人甚衆

用棉花團一個不可甚大大則塞口又不可小小則恐吞
下外用棉紮緊用蜜糖水煮透置口中得沾甜味再不啼
哭仍以一線紮住以便牽出更妙

蛔厥方

一人年近一十二歲病發目瞪口牽手指捏撮猶如風狀
發過即安醫以風疾驚三症治之皆不效遇一生云此蛔
厥症也用苦練子一味煎湯服之下蛔虫數百竟痊

小兒脫肛方

蟹頭燒灰存性為末加冰片少許麻油調擦立愈

蟬花散 治兒夜啼不止狀苦鬼祟

蟬脫下半截為末薄荷湯入酒少許調下二三分

馬脾風方 肺脹喘滿胸高氣急兩肋肩動陷下作坑鼻竅脹肩
咳嗽聲啞痰涎潮塞身生油斑狀如暗子不早治即

死

人參 檉榔各三分 黑丑 分 白丑各二分 木香一分
生大黃一分

為末蜜水調桑白皮湯下一匙名一捻金服之無不神驗

小兒水瀉方

葱姜搗爛入黃丹為丸如豆大每服一丸填臍內以膏蓋之卽止又白麵炒飯鍋焦研末白糖和作餅食

腹脹大小便不通

急令母嗽口吸咂胸前背心手足灣臍下共七處以紅赤色為度湏臾卽通

小兒止癟方

胡椒三粒研末入砂糖調勻為丸癟前一日入臍內以膏蓋

於上使外遊次日解去

小兒痢方

用梧桐葉三四片煎湯洗足三五次愈

小兒口白舌硬不能飲食

巴豆仁一粒射香厘許共研成丸貼眉心卽愈以舌變紅赤色為度

肥兒丸治小兒面黃飲食不進四肢倦惰冷汗夜熱腹大肚痛等症時時服之百病皆愈

人參 黃連姜汁 神曲炒 麥芽炒 山楂炒

白朮土炒各七錢 荻苓 炙甘各六錢 胡連一兩 史君子去壳九錢

蘆薈五錢入新傾銀罐內鹽泥封以穀糠火煨透

共為末以四五年陳米糊為丸每丸重一錢飯后與服

畫眉丹治小兒不肯斷乳

山梔

三個

雄黃少許

朱砂少許

輕粉少許

黃丹

末一錢

共為末用生麻油調勻候小兒睡熟勿令知覺以新筆畫
兒兩眉上次日卽不吃乳

膏藥門目錄

一見消

加味太乙膏

松香膏

瘡塊膏

膏藥療方

水火既濟膏

千挫膏

蒲公英膏

內庭秘傳白玉膏

凍瘡破爛膏

鬱金膏

趙府神應比天膏

清涼膏

炙瘡膏

霏雲祖師亂傳膏

化瘡反正膏

化瘡消積膏

接骨神異膏

紫金膏

岐天師一見消

金鎖比天膏


段門子膏

化瘡膏

毓麟膏

五神膏

春雪膏



膏藥門

一見消 治風氣折傷并癰毒等症。其初起癰毒須留頭攤貼。
川烏三兩 草烏三兩 川倍子四兩 開楊花三兩 大黃六兩
血餘四兩 生南星三兩生半夏三兩 白芨五兩 白蔹五兩
當歸六兩 土貝母四兩 金銀花三兩 白芷四兩
右藥用麻油五斤浸三日煎枯去渣濾淨入紅丹四十兩
收成膏水浸去火毒任意攤貼。

加味太乙膏

治跌打損傷風寒濕痺腰腹心胃疼痛并已潰瘍拔毒收

口

黃柏 防風 元參 赤芍 白芷 生地 大黃 歸身
肉桂 海藻 昆布 蒼朮以上各五錢 金銀花一兩 皂角刺

山茨菰 桂枝錢 五

土貝母 何首烏 苦參 連翹

花粉各一兩

右藥用真麻油五斤浸春五夏三秋七冬十日熬枯去渣入飛過紅丹四十兩收成膏離火入血竭末五錢攤貼百病

○松香膏 治黃水瘡、臍瘡俱效

松香末一兩、萆薢仁四十九粒研細

○右藥用重湯煮化攪勻隨意攤貼如破瘡用烏金紙攤

○瘡塊膏 治積食瘡脹等症

川椒四十九粒開口者倍子七粒整者真麻油四兩熬枯去渣入鉛

粉二兩收存膏離火入射香末一錢攪勻攤貼一个即愈

重者三個愈婦女須候經淨貼之否則不效

膏藥療方

用人乳一盃入枯礬少許鷄翎塗之一二日愈

水火既濟膏 治夾棍瘻瘍爛瘡跌打損傷風痛

麻油二十兩 象皮三錢

紅花三分錢

大草麻二十粒去壳

五銖錢二個 蟑蛛六個

頭髮洗淨大把

紅丹八兩同入鍋內

用槐枝攪熬一滾取起連鍋放水缸內頓一時再熬如此數十次熬至滴水成珠為度離火入乳香沒藥兒茶射各末分攪勻攤貼

千搘膏 治諸毒諸瘡未潰已潰俱可貼惟臘瘡楊梅毒不貼
長夏枯草一斤煎汁入北草麻肉二百四十個 甜杏仁一百個
四十合桃肉十六個俱去粗細皮候熟取起搗爛輕粉銅青各二物用袋盛入汁煮熟撈起為末后入松香末一斤煮

乾兌入黃占二兩攪勻離火入乳香沒藥兒茶末各六錢
并前煮熟藥五味共入臼搗千餘下收貯重湯攤貼

蒲公英膏

蒲公英十數斤熬成膏用香油半鐘收成貼諸毒癰瘡痘瘡
疔瘡等症

內庭秘製白玉膏 治一切癰疽瘡瘍疔瘡未成貼之消已成
貼之呼膿生肌

大鯽魚二尾十兩重者佳不去鱗腸一隻重半斤 大蝦蟆以上者佳 巴豆仁三兩

草麻仁二兩 用真麻油一斤四兩

銅鍋熬油滾入巴豆草麻待枯撈出后入鯽魚蝦蟆仍候
枯撈出濾淨再熬至滴水不散去火待油冷入鉛粉二十兩

再熬至滴水成珠離火入乳香末五錢番木鱉雄雌二个

麵裹煨熟為末攢勻傾入水盆內去火毒用時重湯燉攤

凍瘡破爛膏

大黃半斤麻油一斤黃丹半斤

煎成膏攤貼如無膏藥遇凍瘡破者用水煮大黃片貼如
未破酒煮貼俱效

麝金膏 治刀傷 火傷 瘡毒未成留頭 兼女人貼脚肢

生地二兩 麝金三兩

蠟豬油一斤二熬枯去渣入甘草末一兩黃蠟四兩攢勻

攤貼

趙府神應比天膏接折骨斷指化大毒并治百病

當歸

紅花

生地

川芎

芍藥

蘿木各二

羌活

獨活

蓬木煨

防風

荆芥

野菊花

骨碎補去皮毛

牙皂

苦參

牛膝

三稜煨

白芨

山甲炙

續斷

蟬蛻

全蝎

湯泡三次

山豆根

地龍去泥

甘松

三奈

槐枝

柳枝

桃枝

榆枝

夏枯草

露蜂房

各一兩

白蘂

三個去壳

南星

半夏各五錢

男血餘

皂莢水洗三兩

胎髮

二十九

白花蛇一條去頭尾

桑白皮

連翹

金銀花

川貝

山慈姑

木別仁

甘草

大黃

桃仁

杏仁

川蓮去鬚首烏

五味

黃芪

合歡花

象皮

昆布洗去鹽味

鳳凰退各二兩

川附子一個

黃芩

射干

洗

黃柏

烏藥

玄參

五加皮

天麻

人參

大力子

肉桂

豨莶草各四兩

以上為粗藥

雄黃

二兩

銀硃

大錢

硃砂

二兩

花蕊石二兩為粗末用硫黃末二兩攪勻入陽城罐內封固
煉一日取出

石膏煅二兩赤石脂二兩自然銅二兩二味各入傾銀罐內煅紅
醋淬七次埋土中一宿去火氣

雲母石兩乳香三兩全龍骨研二兩龍骨二兩炮自然銅製

阿魏一兩全自然沒藥三兩炙全赤銅研二兩五錢全石膏

兒茶二兩全雲母安息香五錢研二兩五錢全安息香

丹珠一兩卽人血牛黃三兩全雄黃射香四錢全銀硃二錢

冰片二錢全硃砂螭蛇胆五錢同雄黃研二兩五錢

檀香一兩五錢丁香五錢木香一兩五錢

降香五錢已上不通用火三七一兩

黃蠟三兩白蠟三兩

蘆合香二兩五錢以上為細藥

淘鵝油四兩

真麻油十五斤將粗藥浸春五夏三秋七冬十日入鍋文

武火煎枯絹濾去渣又煎油至滴水成珠下淘鵝油黃白
蠟蘓合油再下炒過黃丹七斤柳枝攪試其軟硬得所離
火下細藥冷定沉水中三日取起攤用

貼膏法

五癆七傷遍身筋骨疼痛腰脚軟弱貼兩膏肓穴兩腎俞穴
兩三里穴 腰痛貼命門穴 痰喘氣急咳嗽貼兩肺俞穴
華蓋穴膻中穴 小腸氣疝氣貼膀胱穴 左癱右瘻手足
麻木貼兩肩井穴井兩曲池穴 癰疾男貼左臂女貼右臂即
止 男子遺精白濁女人赤白帶下月經不調血山崩漏貼
陰交穴關元穴 心氣痛貼中脘穴 偏正頭風貼風門穴
走氣貼章門火 寒濕腳氣貼兩三里穴 一切無名腫
毒癰疽發背對口瘡瘍瘻瘍瘍楊梅風毒跌打損傷指斷臂

折瘡塊癰瘕皆貼本病患處

清涼膏

白芷 大黃 生地 甘草 苦參 黃柏 黃芩 當歸
元參各一兩 五錢 白芍一兩 紅花 八錢 金雀花根 二兩

右藥麻油三斤浸三日熬枯去渣入水粉紅丹各十二兩
收成膏攤用

灸瘡膏

當歸 川芎 芍藥 白芷各二兩 細辛 頭髮各一兩

用真麻油一斤半浸三日熬枯去渣入鉛粉十二兩收成膏

攤用

霏雲祖師亂傳膏藥方

治五癆七傷一切濕瘻流火疾注傷筋動骨惡毒怪瘡血

瘕卽瘡腹臍胸填湯火蛇傷蟲傷棒瘡夾棍種種奇症對

患貼治無不神效

熟地 生地 當歸 番木鱉毛去 白芷 赤芍 人參

大黃 肉桂 川椒 生姜各二
兩 鐘金 義木 牛膝

白蘞 白芨 防風 茄花 大風藤 蒼术

青皮 烏藥 羌活 檉皮 骨皮 銀花 殭蚕

靈仙 草麻仁 白附子 龍骨 虎掌 山甲

阿膠 龜膠 血餘各一兩
二錢 槐柳枝 各一丈二尺

以上藥各咀片用真麻油十斤浸之春五夏三秋七冬九日取起入大鍋內炭火熬枯去渣熬至滴水成珠入黃丹

八十一兩水飛炒斷烟用槐柳枝不住手攪之待成膏乘

熱先入阿魏五錢離火再入細薑潮腦乳香炙沒藥炙各五錢

輕粉四錢血竭雄黃各三各爲細末緩緩投入攪勻傾入
清水缸內多人扯拔百餘次去火毒熬膏時須擇清淨地
方天醫黃道吉日上供九天慈悲救苦天醫大帝中
天大聖消災解厄霏雲祖師香花燈果隨力供養避婦女
生人鷄犬須得三人齋戒沐浴口念寶號虔誠合就有力
捨施無力諒取藥本丸貼此膏終身不得食牛犬鳥魚蟹
龜犯之舊病復作貼法附后

泄精白帶貼肚臍丹田腎俞癱瘓勞傷宜體會其病患
處貼之疝氣按痛硬處丹田腎俞貼之瘧疾貼寒熱
起處水瀉痢疾腹痛貼臍食積貼胃口臌脹用巴
豆白仁一粒少少綿裹納臍內膏蓋之哮病貼肩井穴
心背頭風貼太陽以上俱七日一換凍瘡爛瘡與癬

用貼過舊膏藥貼之奇效。凡積久難愈之症須貼半年數月方愈。勿謂無速效而棄之。凡貼膏須患者度意半不立愈

化痞反正膏

治諸般痞塊積聚寒熱腹痛胸膈痰飲小兒大肚痞積婦人經水不通血瘕等症孕婦勿用。痘毒未破疾癥俱妙。

川烏

草烏

半夏

紅芽大戟

芫花

甘艸節

甘遂

細辛

姜黃

山甲

狼毒

牽牛

威靈仙

巴豆仁

三稜

蓬术

枳壳

白术

水紅花子

葱白頭

鱉甲

紅莧菜

白芍

沙參

丹參

白芨

貝母

各一兩俱
反藜蘆並

治痞

藜蘆葱管者

真二兩

乾蟾

四隻

用麻油

五斤浸七日

照常煎枯去渣

秤油一斤用蜜陀僧

一斤

用蜜陀僧

八兩次下黃占二兩沸止離火或用豆腐泔水浸擗至三次又用井水抽拔一度以去辣味免發庠復上火不住手攬成膏待稍溫下阿魏二兩箬上炙研末投入或全赤石脂研亦可不住攬勻磁器存貯用狗皮攤貼每張重五錢半月一換重者不過三貼必愈

化痞消積膏

凡小兒不壽卒多痞積所致此膏專治痞積氣塊身熱口內生疳用狗皮攤貼患處三日卽止熱七日覺腹內漸痛十日大便下膿血為驗忌生冷腥膻發物百日卽愈

秦艽

三稜

莪朮

蜈蚣

巴豆

各五錢

當歸

大黃

黃連

各三錢

全蝎

十四個

山甲

十四丸

要正

木蟹七個以上粗藥

阿膠一兩
阿魏

蘆薈各二錢
射香

片腦

沒藥

乳香各一錢以上

細藥

真麻油二斤將粗藥入油熬枯去渣入紅丹一斤二兩以槐柳枝攪至烟盡滴水成珠離火下各細藥攪勻攤貼瘡處

✓接骨神異膏

骨碎補

當歸

赤芍

羌活

草烏

蘆木

桃仁

甘松

三奈

五加皮

大黃各二兩

川烏

紅花各一兩

一猪板油二斤

葱

韭

姜

槿樹皮各一
捻

真麻油二斤

浸前藥煎枯去渣收貯聽用

松香十餘斤以棕皮青松毛鋪甌底入松香加多水蒸之其
松香盡流下甌去加冷水不住手搏扯以潔白為度加枯礬
草麻子汁再搏扯十餘次製五斤淨末聽用

頭髮勿洗一斤舊髮網巾三頂血管鵝毛二隻另用油二斤

另鍋煎至變化為度合前藥油共一鍋下飛丹一斤煎至滴
水成底徐徐加入松香末再下細藥土鱉虫炒黑四兩

龍骨三兩煅

血竭一兩

自然銅二兩煅醋淬七次

阿魏一兩

乳香三兩炙去油

沒藥二兩炙去油

虎骨二兩酥炙

黃狗前蹄

一對煅過

肉桂二兩去粗皮

右為末入膏內攪勻水浸三日去火氣攤貼接骨如神

紫金膏 治風寒濕氣痞積漏肩風霍膝風痺氣跌打損傷夾

棍棒瘡神效

松香十二斤鎔化傾在地下候 另用白芷麻黃川烏草烏各

兩 吳茱萸三兩 威靈仙四兩 開楊花六兩 胡椒四兩 附子三兩

水三十碗煎汁十碗聽用再以生姜六斤葱六斤取汁聽用

將前汁合一處先入汁四五碗候沸入松香末徐徐再入

汁以乾為度另鍋煎麻油三十六兩冬月加三兩熬至滴

水不散俟冷入前松香內攪勻離火然后加入礬紅一斤

乳香去油沒藥去油肉桂五靈脂炒木香不見火各二兩共為末

入前膏內攪勻攤貼

岐天師一見消

金銀花一斤 蒲公英四兩 赤芍四兩 黃芪半斤 紫花地丁六

紅花半斤 鬼曼頭四兩 共七味 地榆二兩 黃柏二兩

羌活一兩 半夏一兩 紫草一兩 麻黃二兩 瓜萎一兩

白芷一兩

當歸二兩

梔子二兩 獨活一兩 黑參三兩

花粉一兩

蒼朮一兩

鈎藤一兩 木通一兩 大黃一兩

柴胡八錢

甘草五錢

皂角五錢 連翹三錢 防風五錢

牛膀子五錢 共二十三味

全蝎二錢 犀角二錢

廣木香三兩

蟬蛻三錢

沒藥炙三錢 射香二錢

以上六味共

為末先將前七味用麻油十斤煎枯撈起再下地榆等二

十三味煎枯撈出再煎至滴水不散入黃丹五斤成膏離
火入金燭等六味末攪勻收貯攤貼一切瘡疽大毒三個

消小毒一個消神效

金鎖匙天膏

治發背瘡疽無名腫毒疔瘡鼠痔馬刀瘻瘞紫癰紅絲鴉
癰漏睛等瘡兩腿血風內外瞼瘡魚口便毒楊梅結核金

瘡杖瘡蛇燭虫咬虎犬人傷頑瘡頑癬久流膿血萬般爛
瘡風寒痰濕四肢疼痛乳癖乳岩不論已破未破並用葱
椒湯洗淨貼之如初發勢凶將膏剪去中心留頭出氣不
必揭起一膏可愈一毒攤時不可見火必須重湯化開

紫花地丁

劉寄奴去泥

野麻根

蒼耳草連根葉子

豨莶草各一斤

山甲一具或爭

蛤蟆皮一百張或乾蟾一百

甲一斤

隻更妙

一百張或乾蟾一百隻更妙

真麻油十二斤

內將四斤先煎穿山甲枯焦餘藥入八斤

酒油內加老油葱汁各二碗文武火煎藥枯去渣復煎至滴

水成珠每藥油一斤加飛丹八兩

看嫩老得所離火不住

手攬下牙身五靈脂去砂大黃各末兩

待溫下白膠香即

芸香末四兩成膏水浸三四日用

段門子膏 治疗瘡癰毒癰痛痞塊積聚立效

木通 威靈仙 川烏 羌活 防已 各五錢 歸尾

白芷 赤芍 生地 川山甲 玄參

黃茂

烏藥 草烏 首烏 川芎 官桂 金銀花

防風 丹皮 紅花 韶金 蜂房 全蝎

連翹 桑子 枳壳 青皮 南星 半夏

青木香 秦艽各三錢 頭髮一團烏梢蛇一條 蛤蚧一隻

右藥細剉麻油六斤浸夏三春五秋七冬九入鍋熬至
化藥枯去渣又熬至滴水成珠將飛丹三斤攪入油內成
膏半冷下

蟾酥二錢乳香炙沒薑炙各七錢血竭七錢兒茶五錢阿魏二兩

蘆薈一兩樟腦二兩射香三錢

各末攪勻候凝盛磁器內埋土中二十一日去火毒用

治撲跌傷損須另加阿魏射少許大妙

化痞膏 治一切痞塊在左脇者更妙

大黃五錢 人參三錢 白朮五錢 枳實三錢 丹皮二錢

鱉甲一兩 神曲一兩 山楂五錢 麥芽五錢 厚朴三錢

當歸一兩 白芍一兩 史君子錢三兩頭尖錢蒲公英一兩

金銀花兩 生甘二錢 檵榔二錢 防風一錢 川芎一錢

右薦用麻油三斤 浸一二日 敗枯去渣 再熬至滴水不散

入飛過紅丹十八兩 收成膏離火入后藥末

薄荷葉二錢 乳香五錢 没藥五錢 赤石脂錢二射一錢

冰片二錢 阿魏三錢 血竭三錢

右為末入膏內攬勻攤貼一個即愈 藥須攤得厚不可大

治婦人久憒小產能保胎十月無虞并治腎虛腰痛諸瘡久
爛遺精白濁及女人淋帶血枯經閉神效

人參一兩 桑寄生一兩 二蚕沙一兩五 生地

杜仲 繢斷 阿膠各一

兩

地榆五錢

錢

當歸 熟地各二 砂仁一兩

兩

阿膠一兩

錢

右藥用麻油一斤半按季浸桑柴熬藥枯去渣下飛過紅
丹十二兩黃占二兩成膏離火下

紫石英火煅七錢醋淬赤石脂煅七錢龍骨煅三錢為末入膏內攪勻

收貯攤貼如憒于三月墮者先一個月預貼腰眼七日

一換保過三月之期以后半月一換至十月滿而止萬無

一失遺精淋帶經閉貼腎俞穴下丹田其餘俱貼患處

血餘

蛇蛻

蜂房各四兩

元參

杏仁各二兩

右用麻油二斤浸一宿熬枯去渣入黃丹一斤收成膏貼
一切無名腫毒瘡疽等症如遇腸瘻肺瘻即以此膏丸梧
子大米湯送三五錢能使毒從大便出

春雪膏

治一切腫毒不必留頭未成卽消已成貼上能止痛

又能使皮薄易潰呼膿收口無不神效耑治一切瘻瘍無
論已破未破俱有奇效

白香膠

揀淨為末篩過一兩

草麻子仁

紅壳者佳十九粒

搗極爛四

右二味擦拌勻入磁碗內上蓋一小碗用麵糊封口重湯
煮二杳收貯用時以重湯烊化烏金紙攤貼

製藥門目錄

造百藥煎法

又一法

製鹿角霜法

製胆星法

製黃茂法

製白朮法

荷蒸白朮法

製甘草法

製秋石法

製半夏曲法

取人中黃法

製神曲法

製血餘法

製淡豆豉法

法製陳皮方

製半夏法

製杏仁法

又法

取神火法

取水中金法

升輕粉法

升粉霜法

降藥

九轉靈藥法

打靈砂法

乾蒸米露法

又法

製元明粉法

風化硝法

冰霜法

昇白靈藥法

取紅鉛法

煉金頂砒法

取蟾酥法

製藥門

造百藥煎法

五倍子不拘多少敲如豆板大以白酒拌勻置煖處發過膏無澁味為度如澁再拌再發製就晒乾用

又一法

五倍子一斤薄荷四兩知母一兩烏梅七個右三味用水五碗煎濃汁二碗半存貯听用再煎二汁將倍子入二汁內浸洗淨以杵舂千餘下入鉢內按實入頭汁半碗蓋緊放濕地上浸過二晚取倍子又搗千餘仍入鉢內加頭汁半碗酒濕依前又浸二日待倍子生白毛取出又搗千餘入鉢內加入頭汁一碗連浸七日夜完待倍子又生白毛又搗千餘做成餅陰乾用

製鹿角霜法

新鹿角斷二寸長流水浸三日刷去垢每用一斤用楮實子一兩桑白皮一兩全入鐵鍋煎三晝夜魚眼湯火慢滾不可斷火常添熱水勿令水乾角露至期取起去外黑皮切薄片晒乾為末卽好霜矣其汁再熬濃仍可作膠用

製胆星法

天南星不拘多少為末冬月用黃牛膽汁數個拌如糊仍入胆皮內掛當風處陰乾取出為末又用牛膽焰前拌掛如此九次用

製黃芪法

嫩黃芪一斤洗去泥沙切片晒乾另用防風三兩煎汁二碗一碗又煎二汁一碗又煎三汁半碗將前汁和勻用一碗拌黃

又炒極干又汗一盞拌透
芪令透微火炒極乾又用汁一碗拌透又炒半乾再用五味
子六錢搗碎煎汁三次約共半宮碗入黃芪拌透微火炒乾
任用此藥可代人參每用三錢可代參一錢用治氣虛中滿
等症甚效

製白朮法

鷄腿冬朮去蘆洗淨用白布一層鋪甌底將新黃土打碎如
指大鋪布上一層再蓋布一層入白朮一層又蓋布一塊再
入黃土一層又蓋布一層又入白朮一層如此層層間隔文
武火蒸五炷香為度取出晒一日又用水畧潤焰前換土蒸
晒如是九次白朮全無辛燥之性甘美異常亦可代參

又荷蒸白朮法

白朮切片用薄荷葉煎湯拌透外用荷葉包裹入甌蒸三炷

香取出晒乾又拌又蒸又晒如是五七次或九次貯用氣味清香甘美亦可代參

製甘草法

大粉甘草刮去粗皮畧趁損蜜塗炙乾又塗又炙以透為度
切片入藥用

製秋石法

秋月取童便每缸用石膏七錢桑條攪澄傾去上面青液澄
去下面滓穢如此二三次又入秋露水攪澄一次又用新磚
數塊磨光洗净晒乾浸入便內三日取起晒乾上起白霜掃
下即秋石也又浸又晒較前更多其掃下秋石再研入罐鉄
盞蓋定鹽泥固濟升打三香升起盞上者名秋冰味淡而香
乃秋石之精英也

製半夏曲法

半夏一斤湯泡九次生姜四兩小麦粉六兩蓼草搗汁牙皂煎湯搗成餅攤箕上蓋以禾草發七日取掛當風處陰乾用

取人中黃法

用小竹筒刮去青要兩頭有節節上挖一小孔入甘草末塞滿用瀝青封口冬月入糞缸內至春取起洗净埋土三日取出懸當風處陰乾取甘草末用

造神曲法

六月六日或五月五日或三伏日上寅日採蓼草三兩青蒿
蒼耳各六兩俱搗汁杏仁末一兩赤小豆三兩去壳為末

帶麸麥麯二斤

共搗踏實成餅一如造酒藥法愈久愈好入藥炒令香熟用

製血餘法

頭髮用灰汁浸一日取起洗净入缸多水浸之用木棍攪之漸漸將面上撈起再攪再撈澄出缸底剃刀鐵屑淨然后換水浸一宿洗至極净水清為度撈起晒乾裝入磁瓶內按實用鐵絲網蓋口又另用潤口磁瓶一個入清水小半瓶埋入土中露出口將髮瓶倒轉以口套入水瓶口內外用羊毛蓋泥封口並將上髮瓶週圍包裹約一指厚四圍加糠炭煅二晝夜退火冷定取起下瓶內水面浮者即血餘也取出晒乾聽用

製淡豆豉法

黑大豆一斗水浸一宿淘净蒸熟攤勻蒿草蓋面候上起黃衣取出用净水拌之乾濕得所安甕中築實桑葉蓋泥封晒

七日取出晒一時又水拌入甕如此七次再蒸去火氣磁瓶

收貯

法製陳皮方

用陳皮二斤河水浸一週時用竹刀輕輕刮去浮白貯竹筐內再用沸湯淋三四次又用冷河水洗淨以無苦味為度濾出晒半乾得淨皮一斤初次用甘草烏梅肉各四兩煎濃汁拌皮再晒再露俟皮酥捻如豆板大又用川貝母四兩青鹽三兩爲細末加入拌勻晒露微乾收貯

製半夏

治痰厥中風以八九枚研末清湯下立效疾多者每日服一枚妙

大半夏四斤石灰五升滾水三十碗澄清去渣將半夏浸七日日晒夜露取井水淘三四次水泡三日換水三次

二次用童便三十碗照前法三次皮硝二斤白礬一斤化水三十碗照前法四次姜二斤煎汁三十碗照前法

五次蘿卜汁三十碗照前法 六次竹瀝十碗浸晒乾為度不必淘洗

七次用甘草 薄荷 黃芩 瓜萎仁 花粉各四兩
枳實 陳皮 枳壳 砂仁各二兩 木香一兩

共煎汁三十碗候溫浸十四日取出連藥扣蓋熱坑上三
柱香去薑晒乾聽用一方無黃芩委仁枳實花粉加肉桂
三錢荳仁五錢五味五錢青皮五錢
丁香一錢川芎一兩製如上
沉香一錢

製杏仁法

杏仁去皮尖四兩 水煮三沸晒乾入童便內浸透又晒乾再
以生地桑白皮百合薄荷各三錢煎汁拌蒸七次每日任意
嚼用

又方

大杏仁去皮尖四兩先以川五倍炒黃烏梅各二兩銅鑊寬水煮杏仁如黑取出洗淨又用薄荷元參桔梗桑皮欬冬甘草各二兩同煮杏仁以沒頭水乾爲度取出陰乾任用

取神火法

劈砂一斤帶水研細以滾水冲之面上有浮起一層用荆川紙拖之晒乾掃下卽神火也其砂澄清去水研過再用滾水冲之見有浮起者照前拖晒如此六七次至面上無有浮起者而止每砂一斤約可得神火八九分用烏金紙包收貯用時以鵝毛蘸藥掃少許于膏上能使毒水易乾瘡口易收其砂仍可用

取水中金法

出山鉛四五十斤入大鍋內上下架火煎煉俟其化至大紅

色面上三開三合忽現金色如牡丹花樣以鐵杓中心搬起
置冷地上再看有金色花起又搬一杓約搬八九斤光景冷
定聽用以搬起鉛化開澆成薄片剪如錢大鑽一孔以竹條
穿之不可疊實穿入一個須離隔半分再穿一個約百個爲
一串共七八串用火酒二三斤浸一宿取起另用大口蟬一
個入米醋二三十斤用希竹蓋盛鉛錢掛蟬口內約離醋寸
許包好蟬口用泥封固勿令走氣約月餘取出掃下白霜即
水中金也其未盡之鉛可入蟬內再薰再掃

升輕粉法

水銀一斤 薑 硼 硝 皂礮各二兩 研勻入瓦盆內上
蓋一盆用鐵絲繞之蓋滷調磚漿粉封固約三四分厚底
火升打三五香冷定開看其升起在盆上者是掃下貯用

以潔白爲佳

升粉霜法

水銀一斤 薑 磔 硝 皂礬各四兩研勻入陽城罐
泥封口地爐升打一香底火二香轉角火三香齊藥火香盡
退火冷定開看其升起在上者是其色不同因火文武而別
降藥一名帝金丹

水銀 食鹽 綠礬青者佳 白礬 火硝各一錢以上共爲
細末入傾銀小罐炭火煎滾變紅色取起候冷另置銅盆一
個入水在內上加大碗一個將藥罐倒覆碗內紙燃塞口外
用鹽坭封固另將草灰敷碗邊罐底露出加炭火其上打二
香去火俟冷取起其藥降于碗底而色白者卽此丹也

九轉靈藥法

水銀一斤 盡 硼 硝

皂礮 各八兩 入陽城罐

內藍泥固濟約四分厚上蓋鐵盞鐵系統定藍滷調磚漿粉

封口三釘架起入菊花爐打火三香一香平底二香轉角三

香齊藥再老半香取起謂之升火冷定開出取下面墜底者

不用留取上面升起者仍用原鐵盞蓋好照前封固烘乾另

將地掘一小孔埋陽城罐半截于內四圍原泥躋實架炭于

陽城罐上截北鐵盞高三寸從最高處發火約三香緩緩

燒至於地平謂之降火再老半香退火冷定其不降者不用

另取短陽城罐一個合在原罐之上封口照前打升火畢開

出去底下陽城罐另換新罐封固照前打降火畢開出去上

面陽城罐照前換下罐封打如是共九升九降畢取出細研

再入小陽城罐每藥一兩上蓋石膏末一兩鐵盞蓋口照前

封固上水下火打三香退火冷定開取出其升上者卽靈藥也以少許掃膏藥上能去腐呼膿生肌收口神效其餘各轉所存之藥研入瘡瘍藥內殺虫如神

打靈砂法

水銀一斤 硫黃四兩先將黃入鍋化開入水銀炒至不見星為度入陽城錐內鐵盞蓋口鹽泥封固架三釘菊花爐內上水下火升打三香取起冷定開出其升上紫紅色者即靈砂也

乾蒸米露法 松柏葉露花露俱全此法收久不壞

鐵熬盤置灶上盤內貯砂三寸許砂上加銅鑊一面將米升許淘透入鑊內合上錫甌俟其滴出約半茶盃而止不可多取恐有焦氣其米仍可煮飯

瓶式


造錫瓶法

形如燒酒瓶而不貯水內腰有槽傍通于滴口米氣上騰則露珠流入槽內而出下設子口二層內子口要與銅錠緊緊相合不可走氣外子口套在銅錠之外二子合約深半寸銅錠約深二寸套上子口子口之上即係流露之槽要于出口處畧底些錫瓶連子口共高六寸不可太高頂如和尚頭各徑七寸半俱木尺

又法 銅錠深五寸許貯米合錫瓶于上入重湯內大火久煮亦可取露竟無焦氣而露較多于前法

製玄明粉法

朴硝十兩長流水一石煎化澄去沙土熬至一半入盆內露一宿結成硝去水每硝二斤入蘿卜切塊半斤加水煮熟去蘿卜露一宿再換蘿卜加水再煮再露或五七次九次再用



甘草煮露一次每硝一斤去草以硝入沙罐內築寢外用鹽
泥固濟厚半寸許不蓋口以炭十斤先文後武化至沸候火
盡冷定蓋口固濟以頂火十五斤煅之火盡冷定取出隔紙
安地上盆覆三日去火毒研末每一斤入生甘末一兩炙甘
末一兩和勻瓶貯

製風化硝法

以提淨芒硝置風日中消盡水氣自成輕飄白粉 又法以
粗瓦瓶盛硝掛當風簷下待硝滲出瓶外結成霜刮下收貯

製冰霜法

朴硝一斤打碎老皮西瓜一個切去蓋去子留瓢入硝于內
數日化成水再以此水入頂老王瓜內掛當風處約半月餘
其外面起白霜每霜一錢入冰片一分用點風火時眼或吹

入喉中治喉痺喉風無不神效

昇白靈藥法 外科收口神藥

黑鉛二兩化開投入水銀二兩火硝二兩綠礬二兩白礬二兩聽用

右三味共碾為末炒乾入前黑鉛水銀拌勻入陽城罐內
鐵盞蓋口鹽泥封固晒乾架三釘八卦爐內上水下火昇
打三香冷定開看如粉凝結盞底上刮下收貯聽用

取紅鉛法

女子十四歲而天癸至此陰中之真陽遇此將行時兩顎先
若桃花之狀陽獻陰藏其經只在半月之裏必來預用白紗
一尺五寸洗净綿帶一條束臍下將紗兩尖頭前后繫帶上
中間常兜陰器小便解一頭便罷卽繫之經至盡染紗上取
初至紅鉛一顆大如魚眼紅色明亮如珠此為接命至寶隨


與好酒一杯和服一時侯如醉不醒只以人乳飲之一日後
自甦已後能絕房事延壽一紀餘經換紬兜取陰乾浸清白
童便內片時其經自然脫下取置磁盤內陰乾聽用

煉金頂砒法

用鉛一斤小罐內炭火煨化拔白砒二兩于化烊鉛上煉烟
盡為度取起冷定打開金頂砒結在鉛面上取下聽用

取蟾酥法

用蟾不拘大小其酥俱有用潤銅鑷鑷蟾眉鰲高肉上微緊
拔出酥來凝聚鑷裏多則括下陰乾聽用其取過之蟾避風
二日仍送青草中自然不傷其生如取後便見風下水俱成
破傷風而死



急救門目錄

中草毒

菌毒

解鈎吻毒

中砒毒

解鳩鳥毒方

解巴豆毒

解燒酒毒

狗肉毒方

牛肉毒方

服鹽滷方

解鹽毒方

中鹽毒必效方

解鹽毒

解金蚕蠱毒

中藥毒及中惡

救五絕方

又方

月蟾起死丹

允跌打縊溺心頭熱者

打死暈倒在地

救縊死法

縊死方

水溺死方

還魂草

麁死并中惡方



蕙怡堂備急方

附

急救門

中草毒 西涼嶺南一帶常有其患入咽欲死之急症

馬兜鈴苗一兩爲末溫水調服即愈

菌毒 笑不止及腹痛

地漿水飲之即愈 或嚼金銀花不吐自愈或乾花煎濃汁飲

解鈎吻毒方俗名斷腸草

取人糞汁或白鴨白鵝斷頭滴血入口中或羊血灌之亦好
或葱汁或甘葛或鷄蛋清皆可解

中砒毒 心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷

防風四兩煎湯服即解

柏樹葉搗爛冲生白酒飲之卽解

楊梅樹皮煎湯二三碗服之愈

用紫蝴蝶花根搗汁一碗灌下立愈

用桐油灌之得吐卽解

鮮鴉鳥毒

乾葛末井水調服

鮮巴豆毒 凶中此毒口渴面赤五心煩熱泄痢不止

冷粥一碗服下卽止

鮮燒酒毒

鍋蓋上氣水半盞灌下卽醒

狗肉毒方

杏仁二兩和皮研細熟湯拌勻分三盞服瀉出卽愈

牛肉毒方

黃連 甘草湯或單用大甘草煎服亦效。如渴切勿飲水飲
則難治。

服鹽滷方

生大黃二兩搗碎、生腐漿一碗全搗數十下。服后瀉數遍再
用生甘汁一碗冷吃解大黃毒。

鮮鹽滷方

生豆腐漿灌之。或黃豆入水搗汁灌之。或肥皂水灌之。
或羊血灌之立愈。

鹽毒必效方

芫荽根搗汁半升和酒服立下。

解鹽毒方

玳瑁水磨濃汁服一盞即消

解金蚕蠱毒

丸中毒者以白箬試嘗之甘而不澁再以黑豆嚼之不鮮卽是急取石榴朝東根皮煎濃汁飲之卽吐出活魚立愈

中藥毒及中惡卒死

急取鴨熱血灌入喉卽活此方亦解河魌毒

○救五絕方

一自經 二墻壓 三溺水 四魔魅 五產後暈絕

皆以半夏研細末冷水和丸如小豆大塞鼻中并用燥末吹耳內心溫者死一日猶可活此扁鵲活人法令人多因氣絕不救惜哉又方急於人中穴及兩足大指甲離一韭菜葉各灸三五壯卽活

又方但心頭溫者皆可救

生牛夏為末吹鼻可生 一方皂角為末吹其耳鼻即活

月蟾起死丹 凡遇凶死灌之卽活。命盡者亦能淹留三五天如有命服丹追魂用藥調治

三月三日向辰方取金絲大蝦蟆一個必前有五指者養至五月五日午時懸起陰乾勿令損壞候月蝕之夜以新盆盛水浸之于初蝕時入水蓋以新盆次早開視而蟾活矣以硃砂一兩搗萬下面東方丸之如梧子大死三日以內屍不壞者可救以水送下或溫酒挖開口灌之月蝕之日先以溫水

浸蟾濕

允跌打縊溺心頭熱者

急用大雄鷄一隻割去冠血注鼻中卽活

打死暈倒在地立救可活

血管鷄毛 煙存性一錢 乳香 没藥 百草霜各一錢

共爲末老酒調服即醒

救縊死法

凡遇縊死者徐徐抱住急為解繩不可割斷取卧橈上緊
挽其髮一人摩其胸脇一人屈其臂及足脰待其氣回將
雞冠血滴入口中即生

縊死方

取活鵝嘴挿入喉中鶩鳴應聲即醒

水溺死方一宿者尚可活

紙裹皂莢末納糞門中須臾水出即活

還魂草 治卒中惡死吐痢不止不知何病不拘大小男女

用馬櫟一丸絞汁灌之乾者水煮亦可此扁鵲法也

魘死并中惡方

不可用火照但痛咬其脚根即甦

或皂角末吹鼻嚏出即

活



救荒門目錄

諸葛乾糧

辟穀仙方

生津止渴丸

行軍辟穀方

行路不饑

救荒丹

防饑救生四果丹


斬草丹

守山乾糧

服黃精法

又法





救荒門

諸葛乾糧

白茯苓二斤 乾姜一兩 黃米二升

山藥一斤

白麵二斤 麻油半斤 茄實三斤

黃米二升

各藥一處蒸熟焙乾為末每服一匙新汲水下日進一服

氣力如湧一日不飢渴

行軍辟穀方

李衡公

大黃豆五斤淘去皮為末至極淨

麻子仁三斤綿包用沸湯浸至冷取垂并中一宿

勿令着水次日晒乾新瓦上撲出壳
簸揚取粒粒皆完者蒸三遍為末

白茯苓六兩 糯米五升淘淨與茯苓全蒸為末先將麻仁

糯米茯苓共搗極爛漸加豆末和勻捏如拳大塊復入甑蒸之約三個時辰冷定取出晒乾為末每用麻子汁調服以飽

爲度不得吃一切諸物第一頓一月不饑第二頓四十九日
不飢第三頓百日不饑第四頓一年不饑第五頓千日不饑
永遠顏色日增氣力加倍如渴飲麻子汁或芝麻汁滋潤臟
腑加欲吃飲食用葵菜子三合為末煎湯冷定服之下其藥
再服稀粥一二日稠粥一二日方可飲食但服藥之後大忌
房事慎之

防饑救生四果丹

栗子去壳 紅棗去皮核 胡桃去壳皮 柿餅去蒂

各等分入甌蒸二時取出石臼中杵搗不辨形色捻爲厚
餅晒乾收貯冬月吉日焚香修合凡飢者與食一餅茶湯
任嚼服腹中氣足自飽一餅可耐五日再服不限日數此
藥補腎水健脾土潤肺金清肝木而心火自平也

辟谷仙丹

熟地一斤九蒸晒 天冬二斤去心

為末蜜丸彈子大晒乾每服二三丸溫酒化下日服三次
服至廿日身輕目明久久可爲地仙

行路不饑

芝蔴一斤紅棗一斤占米一升

共為末蜜丸彈子大每吃一丸水下一日不饑

斬草丹 傷荒 辟谷 修道

芝麻黑豆半升齊 炒成黃色去了皮

貫眾茯苓各四兩

乾姜甘草亦如之 棗肉為丸錢來大

走遍山川不忍飢

試問山中青苗草 管教入口化為泥

生津止渴丸

烏梅肉二斤 檀香三錢 白豆蔻五錢 薄荷三兩 甘葛二兩

飛盞一兩 紫蘆一兩 花粉三兩

爲細末煉蜜爲丸元眼大渴即噙化一丸能止渴

救荒丹 與辟谷少異

黑豆五升洗淨蒸三遍晒乾去皮爲末火麻子三升湯浸一宿撈出晒乾用牛皮膠水拌晒去皮淘淨蒸三遍碓搗漸次下黑豆末和勻用糯米粥爲丸如拳大入甑蒸從夜至子大至寅取出晒乾磁器內盛蓋不令見風每服三塊但飽為度不得食一切物第一頓七日不饑第二頓四十九日不飢

第三頓百日不飢容顏佳勝更不憔悴渴即研火麻子漿飲之滋潤臟腑若要重吃物用葵子三合杵碎煎湯飲開通胃腕再以薄粥飲數次然后飲食則無碍矣

守山乾糧

紅蘿卜洗淨蒸熟俟
半乾搗爛 糯米搗白浸透蒸飯入紅蘿卜等分搗
勻泥竹璧上待其自乾愈久愈堅不蛀不爛如遇荒年鑿下
手掌大一塊可煮成稀粥一大碗食之且耐飢或做成土
坯樣砌牆亦可

服黃精法

黃精根梗不拘多少細剉陰乾爲末水調服初服不可多恐
飽脹以後漸漸加多饑則再服可以不食渴則飲水一年之
久可變老為少身輕善走久久成地仙不得食一切烟火之
物則有效

又法

黃精蒸熟晒乾為末另用生黃精切碎熬膏搗成丸鷄子大

日服三次每次一丸可以絕食不饑渴則飲水兼除百病

怪症門目錄

血餘症 又血餘症

臍虫

離魂症 混身風陣

有虫如蠅走

脉溢 眉毛動搖

傷寒狂走

夜多惡夢 治男女爲精怪所迷

病后失精

反經上行方 意痛毛

鼻繩

灸瘡飛肉 發班髮硬

血擁

空中見禽 垂睛

應聲虫

飲油 失物望

血潰

傷寒并熱霍亂 肉刺

白寒瘡

腸破腸出 氣結堅硬

蛇光熟

肉化石

交腸

腎漏

肉腫如蛇

大腸虫

小兒流水

兒生無皮

斷皮

肉人

厚皮

四肢如石

截腸

肉壞

冷熱相吞

筋解

喉肉腫鼻

人面瘡

肺痿

蛇瘕

蛟龍瘕

蟹瘕

雞瘕

傷胞

尸厥走氣如雷

瘡如蛇

視物倒植

見獅子

見蓮花

乳懸

肉線

炙大血出

頭出蛆

痘爛生蛆

疽發有聲

指節斷落

腦風

舌出

木舌脹滿

子母虫

奶頭裂

紅點

產后身冷

紫泡

腦疽頭腫

紅絲瘤

聞雷昏倒

飲食別下

三陰交出血

頸腫連頭

身發庠

小兒身庠

盤腸產

產戶下物如帕

陽腫瘻

喘嘔煩亂

夏月中寒

冬月中暑

紅絲瘡

蚌珠

人面瘡

舌脹滿口


舌腫不能言

齒縫血條

血汗

木明內視

黑丹方



怪症門

血餘症

十指皆斷壞惟有筋連每節內虫出如燈心長數寸遍身綠毛用胡黃連白茯苓赤茯苓等分每服三錢水煎服愈

又血餘症

口生肉毬有根如線吐出乃能飲食捻之痛入心用射香水研服三日根化卽愈

臍虫

腹中如鐵石臍內出水旋變作虫行繞身體其痒難忍擾撥不盡用蒼朮爲末入射少許服又將蒼朮煮濃湯浴之

離魂症

卧時覺身外有一身一樣無別但不言語名曰離魂蓋卧則

魂歸于肝肝虛邪襲魂不歸舍也用人參二錢龍齒二錢赤
茯苓一錢水煎濾清調飛過硃砂一錢睡時溫服每夜一服
三日後魂歸氣爽

渾身風陣

臨睡渾身風出約至四五升隨致血肉俱壞每宿漸多痒極
難言惟飲水卧床晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動
鼻開用鹽醮湯飲之十日卽愈

有虫如蟬走于皮下作聲若兒啼

是為筋肉之化用雷丸雄黃等分為末摻豬肉上灸服自安
脉溢

毛竅出血不止皮脹如鼓湧臾口鼻耳目被氣脹合用姜汁
飲之自安

眉毛動搖

目不能交睫喚之不應但能飲食用大蒜搗汁酒調飲愈

傷寒狂走

鷄子壳出過小鷄者煎湯服卽醒

夜多惡夢

好硃砂大塊者帶在頭上便解

治男女爲精怪所迷

以桐油塗男女之陰陽數次自絕

病后失精

凡男子病后傷于交接卵腫或縮入肚內絞痛欲死者卽取本婦陰毛燒灰為末服仍取洗陰水飲之遲則悞矣

反經上行方

婦人經時眼血如狂用紅花桃仁歸尾等分煎湯服破血下行即愈

意痛毛

男女大脚指縫中生毛拂着痛不可忍用桐油煎滾乘熱滴入一點于患處毛卽脫忍痛少頃無恙

鼻繩

一人鼻中出毛晝夜長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去更生此因食猪羊血過多而然也用硼砂乳香等分飯為丸水下十粒早晚各一服病去乃止

灸瘡飛肉

一人因艾灸訖火痂便落瘡內鮮血片片如蝴蝶樣騰空飛去痛不可忍此是血肉俱熟之故用大黃芒硝等分爲末水

調下微痢卽愈

發班髮硬

一人眼赤鼻漲大喘渾身出班髮如銅鐵絲硬乃熱毒結于下焦也用白朮滑石各一兩水三碗煎一碗牛不住口飲數服乃愈

血擁

一人遍身肉出如錐痒痛不能飲食名曰血擁用赤皮葱燒灰水淋汁洗內服淡豆豉湯散盞而愈數

空中見禽

一人眼前常見禽鳥飛去捉之卽無乃肝胆經多疾用枣仁羌活玄明粉青葙子各一兩為末每次水煎二錢一日三服

垂睛

一人眼珠垂下至鼻大便血出名肝服用羌活水煎服數次即愈

應聲虫

一人腹內有物作聲隨人言語名應聲虫服雷丸即愈

飲油

一人飲油五升方快意乃髮入胃血裹化虫也用雄黃五錢

水調服

失物望

一人卧於床四肢不動只進飲食好大言說喫物謂之失說
物望病如說某肉即以某肉與看不與食失他物望也睡中
流出饒涎即愈

血潰

一人眼內白背俱黑見物依舊毛髮直如鐵條不語如醉名
曰血潰延醫治之百藥不效後遇一道人云此症可治因拜
求之遂令用五靈脂酒調下二錢而愈

傷寒併熱霍亂

一人氣喘不能言口中流涎吐逆齒皆搖動氣出轉大即悶
絕名傷寒并熱霍亂用大黃人參各五錢水三盞煎一盞服

肉刺

一人手足甲忽然長倒生肉刺如錐食葵菜自愈

白寒瘡

一人面上及遍身生瘡似貓兒眼有光彩無膿血冬則近脰

名曰白寒瘡多食魚鷄葱韭而愈

腸破腸出

一人脇破腸出臭穢難當急以香油扶腸送入卽不出以人
參杞子煎湯淋之皮自合吃猪腎粥十餘日愈

氣結堅硬

一人口鼻中氣出盤旋不散凝似黑雲過十日漸至肩與肉
相連堅勝鐵石無由飲食多因瘧后得之用澤蘭水煎日飲
三杯五日愈

蛇光熱

一人頭面發熱有光包他人手近如火灸用蒜汁半兩酒調
下吐物如蛇遂安

肉化石

一人渾身生泡如甘棠梨破則出水內有石一片如指甲大
其泡復生抽盡肌肉不可治矣急用三稜莪术各五兩為末

分三服酒下

交腸

一人小便出屎大便出屎名交腸用舊幞頭燒灰酒下五分
愈

腎漏

一人陽舉不痿精流無歇時痛如針刺為腎漏病用韭菜子
破故子各一兩爲末每服三錢水煎日三服即止

肉腫如蛇

一人身及頭面肉腫如蛇狀用濕磚上青苔一錢水調塗立
消

大腸虫

一大腸內出虫不斷斷而復生行坐不得用鶴風末水調

服五錢愈

小兒流水

一小兒初生如魚泡又如水晶碎則流水用蜜陀僧研極細
末摻之

兒生魚皮

一小兒初生遍身無皮俱是赤血肉掘土坑卧一宿長皮或
用白旱米粉乾撲于身上候生皮乃止

斷皮

一人項上生瘡如櫻桃有五色瘡破則項皮斷逐日飲牛乳
自消

肉人

一人自項至前陰後尻尾皮肉裂開如刀割一條痛不可忍

一道人云是肉人症教飲牛乳而愈

厚皮

一人大指忽麻木皮厚如裹鍋巴遇一道人教以苦參用酒煎吃外敷苦參末而愈後本人見一女子遍身患皮厚全上卽服苦參酒外敷苦參數斤而愈

四肢如石

一人寒熱不止四肢如石擊之如鐘磬聲日漸消瘦用茱萸木香等分水煎一二服卽愈

截腸

一大腸頭出寸餘候乾自落落後又出名截腸病用芝麻油器盛坐之飲火麻子汁數升愈

肉壞

一人鼻鯉臭水流吼碗盛而視之有鐵色蝦蟆如米大走躍
捉之卽化為水此肉壞矣食鷄肉一日兩次一月而愈

冷熱相吞

一人兩足心凸腫硬如釘脛骨生碎孔流髓身發寒戰惟思
飲酒此肝腎氣冷熱相吞用川烏炮為末敷之內煎韭菜湯
服之愈

筋解

一人四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用黃蘆酒浸
一宿焙為末酒下二錢多服卽安

喉肉腫臭

一人喉間生肉層層相疊漸腫起有竅出臭氣用臭橘皮葉
煎服愈

人面瘡

昔人患人面瘡于臂上滴酒瘡口卽面赤與物食之卽肉脹獨與貝母則斂眉閉口若苦楚狀乃煎貝母以葷筒灌之數日而愈

肺瘻

一婦人年二十餘胸生一竅口中欬膿血與竅相應而出此肺瘻也用人參黃芪當歸加退熱排膿之劑而愈

蛇瘕

一人患蛇瘕乃蛇精之液沾菜上人悞食之腹內成蛇或食蛇亦有此證其人常飢食之卽吐用赤頭蜈蚣一條炙末分二服酒下

蛟龍瘕

蛟龍瘕寒食飯三升每服五合日三服吐出蛟龍而愈

鱉瘕

鱉瘕痛有來止或食鱉卽痛用鱉屎一升炒投酒浸一宿焙乾為末原浸酒調下

鷄瘕

鷄瘕有病冷疾者是因食白滌鷄過多所致用蒜一枚煮服乃吐一物如升大疾裹開視乃鷄錐也再服吐十三鷄錐而愈

傷胞

一婦人產後有傷胞破不能小便常漏濕不乾用生絲絹一尺剪碎白牡丹根皮一錢白芨末一錢水煎至絹爛如餳空心頓服不得作聲作聲則不效

尸厥氣走如雷

一人尸厥奄然死去腹中氣走如雷用硫黃一兩硝硝五錢細研分三服好酒煎覺烟起則止溫灌之片時再服而安

瘡如蛇

一人生瘡如蛇出數寸用雄黃塗之卽消

視物倒植

一人眼中視物倒植用藜蘆瓜蒂為粗末水煎服吐而愈

見獅子

一人患疾見物如獅子伊川教以用手直前捕之見其無物久久自愈

見蓮花

一人見滿壁皆蓮花以礞石滾痰丸下之愈

乳懸

一婦人產后忽兩乳細小下垂過腹痛甚名乳懸用芎歸各二斤內半斤水煎服餘藥燒烟薰乳口鼻二料乃愈

肉線出

一婦人產后水道出肉線一條長三四尺動之則疼痛欲絕先服失笑散數服次以帶皮姜三觔搗爛入清油二斤煎油一斤煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲于水道旁以前姜薰之冷則熨之一日夜縮其大半二日即盡入再服失笑散芎歸湯調理而愈如肉線斷不可治矣慎之

炙火血出

一人炙火至五壯血出一縷急如溺手冷欲絕以酒炒黃芩一二錢酒下即止

頭出蛆

一人頭皮內時有蛆出以刀切破皮用絲瓜葉擣汁搽之蛆出盡絕根

痘爛生蛆

一小兒痘爛生蛆以柳葉帶條鋪地將兒卧其上蛆盡出而愈

痘發有聲

一人淵痘發于肋下久則一竅有聲如嬰兒啼矣湯陵泉二七壯聲止而愈

指節斷落

一人手指灣曲節間痛不可忍漸至斷落以草麻子二兩去壳碎者不用黃連四兩貯瓶內水二升浸之春夏三日秋冬

五日每早面東以此水吞下草麻子一粒加至四粒微泄如無
害忌食動風物屢效

腦風

一人患頭風症耳內常鳴頭上有啾啾鳥雀聲此頭腦夾風
也用芎歸湯而愈

舌出

一人傷寒舌出寸餘連日不收用楊花腦抹舌上應手而收
重者五錢方愈

木舌脹滿

一婦人木舌脹滿口諸藥不效以排針砭之五七度腫減三
日方平血出盈斗

子母虫

一婦人或生虫一對于地能行長寸餘自此以後月生一對
醫以苦參加虫藥為丸服之又生一對埋于土中過數日發
而視之暴大如拳名曰子母虫從此絕根

奶頭裂

一人奶頭裂尋秋後嫩茄子裂開頭者陰乾焙為末水調服
紅點

一男子每至秋冬遍身發紅點作痒此寒氣收斂腠理陽氣
不能發越煩鬱內作也宜以人參敗毒散解表再以補中益
氣湯實裏而愈

紫泡

一人因剥牛脅悶昏暈遍身俱紫泡急刺其泡處良久遂醒
更服解毒藥而愈

腦疽頭腫

一人患腦疽面目腫閉頭焮如斗此膀胱濕熱所致以黃連
消毒飲二劑次服槐花酒二碗頓退以指按下腫即復起此
膿已成也于頸額肩頰各刺一孔膿并湧出口目始開更以
托裏散加金銀花連翹三十劑愈

紅絲瘤

李叔和問東垣曰中年得一子一歲後身生紅絲瘤而死四
子皆然何也東垣曰汝乃腎中伏火精內有紅絲故也俗名
胎瘤取精觀之果如其言遂以滋腎丸數劑其妻服六味地
黃丸乃受胎生子前證不復作矣

產後身冷

一婦產后日食茶粥二十餘碗一月後遍身冰冷數塊人以

指按其冷處即冷從指下上應至心如是者二年諸治不效
以八物湯去地黃加橘紅入姜汁竹瀝一酒盃十服乃溫

聞雷昏倒

一小兒七歲聞雷則昏倒不知人事以人參歸身麥冬少入
五味子熬膏盡一斤後聞雷自若

飲食別下

一人飲食若別有咽喉斜過膈下徑達左脇而作痞悶以手
按之則瀝瀝有聲以控涎丹十粒服之少時痞處作熱有聲
泄下痰飲二升飲食正達胃矣

三陰交出血

一婦三陰交無故血出如射將絕以指按其竅縛以布條昏
倒不知人事以人參一兩煎湯灌之愈

頸腫連頭

一人頸項與頭相統按之堅硬用漏蘆湯一劑服下發痒頃刻消散

身發痒

一人田間收稻忽然遍身痒入骨髓用食鹽九錢湯泡三碗每進一碗探而吐之三探三吐而愈

小兒身痒

一小兒遍身痒以生姜搗爛布擦之而止

盤腸產

一盤腸產者臨產子腸先出而后產子產后而腸不收用醋半盞冷水七分調勻噴婦面三噴三收其腸收盡此良方也

產戶下物如帕

丹溪治一產婦產戶下一物如帕有尖約重一斤却喜血不盡虛急以人參歸參各一錢芪朮升麻各五分煎連服三帖

即收上

陽腫瘻

一少年陽物挺長腫而瘻皮塌常潤磨股難行兩脇氣冲上手足倦弱先以小柴胡湯加黃連大劑行其濕熱少加黃柏降其送上之氣腫漸收莖中硬塊未消以青皮為君佐以散風之藥為末服之外用絲瓜汁調五味子末敷之愈

喘嘔煩亂

一病人似喘不喘似嘔不嘔似嚦不嚦心中憤憤然無奈醫人用半夏半觔生姜汁一升水三升先煎半夏至二升入姜汁共煎至一升半少冷分四服日三服夜一服病止停服

夏月中寒

一月暑月行百里渴飲山水至晚以單席陰地上少睡頃間寒熱吐瀉身如刀刮而痛醫皆作暑治進黃連香薷飲不效予診其脉細緊而伏此中寒也衆醫俱笑予以附子理中湯大服乃濟

冬天中暑

一婦人冬月患惡寒發熱惡食乾嘔大便欲去不去諸醫皆以虛弱用滌痰二陳湯不效后請予治脉虛無力類乎傷暑衆以為不然予究之婦曰昨因天寒取綿套之因得此症予曰誠哉傷暑也汝之綿套晒之盛暑熱收箱中必有暑氣令體虛得之易入故病如是婦曰然用黃連香薷飲進二服其病瘳矣噫冬中暑夏中寒病亦鮮見問切之功活變之法不

可不知也

紅絲瘡

此症起于手者頃刻紅絲長至胸瘡起于足頃刻紅絲到腹死在旦夕初起之時兩頭繩線縛住紅絲即將瘡頭刺出毒血嚼浮萍草敷之愈

蚌珠

患蚌珠以河蚌蛤水養淨對剖取肉半個貼患處蚌內熱又換貼數次卽愈又治內蚌珠取老蚌一個水養淨輕輕取起放于乾處俟其開口卽入冰片末數分露一宿化為水傾入患處以小盆盛接再傾進之三次卽愈如無蚌用大田螺亦可兼治耳病并痔瘡

人面瘡

人面瘡以精豬肉一片重三四兩摻貝母末貼每日一換。換時以豬肉蜂窠煎湯洗二十日後用乳香沒藥白石脂血竭黃連黃柏各一錢螺旋三分共末摻患處。

舌脹滿口

用蒲黃乾姜等分為末乾擦即愈

舌腫不能言

用草麻子四十粒紙上取油將油紙燃燒烟薰舌卽消舌出血用薰鼻中自止。

齒縫血條

齒中出血如條係上熱下虛內用防風羌活黃連人參茯苓麥冬煎服外用香附青鹽百草霜骨碎補等分為末摻之其

香附須用生姜汁製過。

血汗

出汗紅色者血自毛孔中出卽飢衄又名脉溢乃虛極有火之症也用人參歸身黃芪服之又建中陽辰砂妙香散皆宜如狐傷血絡血出不止以人參一兩服之毛孔節次血出不止則皮脹如鼓須臾口鼻脹合名曰脉溢又用生姜汁和井水各半服之立愈

水明內視

一人閉目即內見臟腑頭眩心悸三月不能寐一醫以大甘草作丸與服數日漸瘥人問其故醫曰內經不云水明內視乎甘草色黃味甘土也吾以土尅水故勝之

黑丹方

人面忽生黑丹如芥子狀不治患將遍身卽死鹿角燒灰存

性猪油調敷愈