

醫學綱目序



予夙有志方藥少困舉子業未遑也歲
癸丑釋褐都下迨丁巳承乏比部意通
都大邑良師萃焉聽讞之暇留心諮訪
或枚舉一二輩曰是出入於公卿之門
者衆皆靡然從之徃徃不暇攷其術業
吁徇名之弊豈特仕道然哉已未歲先
君子以腸澀背養聞病不至是抑不審

醫之過也使不孝長抱終天之恨焉因
自顧拙於宦者與世之拙於醫者安可
預人家國事耶遂絕意進取間取靈素
諸書反覆讀之古奧淵邃莫知端倪友
人邵君偉元授予以醫學綱目四十卷
曰是書出於蕭山婁全善先生所輯簡
而知要繁而有條悉本於靈素亦猶律
之條例比附不出於禮經也公以禮律

佐時獨不能以是書濟癘疾耶予笑而
受之惜抄本相傳魚豕盈帙前此欲刻
者數家而難於校正往往中止今亦無
繇是乎因與偉元暨劉君化卿彖帙校
讐矢志弗措有不合者晝繹夜思若將
通之凡再逾寒暑而後就梓訛者正缺
者補秩然可觀回視舊本若草藁矣此
書二百年來幾晦而復明幾廢而復舉

寧不有定數存乎書大要本之陰陽以
定其準參之運氣以稽其變察之色脈
以明其診酌之虛實以立其法攷之同
異以正其訛是故時至有早晚則民病
有徵應矣氣位有正變則勝復有徵甚
矣血氣有虛實則調治有逆從矣氣味
有厚薄則約方有輕重矣營衛有宣壅
則補瀉有疾留矣其說一正於靈素甲

乙而參之以仲景東垣諸君子之緒論
病必有門門必揭其綱治必有法法必
詳其目巨細不遺詳畧通貫參互衆說
而折衷之於經能由此者謹道如法萬
舉萬全不由此者實、虛、天人長命
故覽其書如大都列肆之中丹砂玉札
馬渤牛溲何所不有而其取裁劑量則
固存乎人焉耳先生嘗曰病之千變萬

化不越陰陽五行又曰氣失其平則為疾醫者意也不過平其氣耳嗚呼此數言者又為是書之綱領乎夫不治刑不知造律者之深意不治病不知著書者之苦心先生康濟之心甚盛而幾於無所用者予得而推廣之亦邵劉二君從吏之力也同年趙君宗正寔聞而協成之予與宗正同官比部者也疇昔筦刑

之意重於殺人抑此書之行為生人計也亦重於殺人之慮也處心積慮有始終同而不異者宜得牽連書之以示後世焉時

嘉靖乙丑歲中秋日前進士履齋曹灼撰

醫學綱目序

醫之爲學其道博其義深其書浩澣其要不過陰陽五行而已蓋天以陰陽五行化生萬物其稟於人身者陰陽之氣以爲血氣表裏上下之體五行之氣以爲五臟六腑之質由是人身具足而有生焉然陰陽錯綜五行迭運不能無厚薄多少之殊故稟陰陽五行之氣厚者血氣臟腑壯而無病薄者血氣臟腑怯而有病陽多者火多性急而形瘦陰多者濕多性緩而形肥陽少者氣虛表虛上虛而易於外感陰少者血虛裏虛下虛而易於內傷況乎人以易感易傷之軀徇情縱慾不適寒溫由是正損邪客而陰陽臟腑愈虛愈實或寒或熱而百病出焉故診病者必先分別血氣表裏上下臟腑之分野以知受病之所在次察所病虛實寒熱之邪以治之務在陰陽不偏傾臟腑不勝負

補瀉隨宜適其病所使之痊安而已然其道自軒岐而下仲景詳外感於表裏陰陽丹溪獨內傷於血氣虛實東垣扶護中氣河間推陳致新錢氏分明五臟戴人熟施三法凡歷代方書甚衆皆各有所長耳故後世用歷代之方治病或效或不效者由病名同治法異或中其長或不中其長故也姑舉一病言之設惡熱病熱病之名同也其治之之法異四君治血實之熱也四物治血虛之熱也白虎治氣實之熱也補中治氣虛之熱也麻黃治表熱也承氣治裏熱也四逆治假熱也柴胡治真熱也瀉青導赤瀉白滋腎瀉黃治五臟熱而各異也各能洞燭脈證而中其肯綮則皆效其或實用虛法虛用實法表用裏法裏用表法真用假法假用真法則死生反掌之間尚何責其效乎脈者不悟是理泛用古今之方妄試疑似之病每致夭橫者不

少矣若是者虛竊濟生之名實所以害人之生亂醫之真孔子以鄉愿亂德爲德之賊斯則醫之賊也暗損陰陽神明不佑可不謹哉英爰自髫年潛心斯道上自內經下至歷代聖賢書傳及諸家名方晝讀夜思廢食忘寢者三十餘載始悟千變萬化之病態皆不出乎陰陽五行蓋血氣也表裏也上下也虛實也寒熱也皆一陰陽也五臟也六腑也十二經也五運六氣也皆一五行也鱗集於魚輻輳於轂醫之能事畢矣是以不揣蕪陋掇拾經傳方書一以陰陽臟腑分病拆法而類聚之分病爲門門各定陰陽臟腑之部於其卷首而大綱著矣析法爲標標各撮陰陽臟腑之要於其條上而衆目彰矣病有同其門者立枝門以附之法有同其標者立細標以次之凡經有衍文錯簡脫簡者一以理考而釋正之傳失經旨衆論矛盾者各以經

推而辨明之庶幾諸家之同異得失得以曲暢旁通精粗相因巨細畢舉同病異法如指諸掌名之曰醫學綱目藏之巾笥以便考求使夫臨病之際自然法度有歸不致悞投湯劑而害生亂醫獲罪神明者矣雖於軒岐心法之妙不敢同年而語然亦天地生物之心一助云耳

蕭山仙居岩樓英全善撰

醫學綱目序

醫學綱目序例

凡治法皆以正門爲主枝門旁考之假如心痛門爲正門其下李心痛胎前心痛產後心痛等枝門皆以心痛正門治法爲主其卒痛胎前產後則旁考以佐之也

凡門分上下者其上皆內經之元法其下皆後賢之續法如穴法門上穴法門下是也標之上下亦然如針灸上皆內經元法鍼灸下皆後賢續法是也

凡所類之方皆先賢名方今號其名但號所編之人且如王海藏所編之方有仲景方有千金方有易簡方并種種名方今但號海藏之名實不及仲景并千金易簡等方也凡所類之方獨東垣海藏羅謙甫丹溪以扶護元氣爲主可純依元方其餘諸方多是攻邪之劑善用之者必詳其人虛實灼見其實者可依元方若兼虛者氣虛必以四君

子相兼用之或各半作複方用之血氣必以四物湯兼用之或各半作複方用之庶不夭人長命也
凡言運氣皆謂一歲之中長幼之病多相似者俗謂之天行時氣是也

凡所載藥方在本條者宜考本條其有病在本條而方見別條者詳載目錄以便檢閱又有方名而無方藥者另立補遺以備參考
凡傷寒藥方六經自相為用不必另立別條

醫學綱目目錄

卷之一

陰陽臟腑部

陰陽

五臟

卷之二

陰陽臟腑部

診法通論

診虛實法

入治法

診寒熱法

法

診病傳變

診病愈劇

診病生死

諸脈診病雜法

卷之三

陰陽臟腑部

治法通論

倒倉法

丸散法

服藥法

分兩法

製藥法

藥貴精專

煎藥法

卷之四

陰陽臟腑部

治虛實法

治上下法

診五臟虛實

診五邪相干

診五邪分虛實賊邪正



五邪相干

四君子湯

生脈散

益氣丸

人參黃芪湯

調中益氣湯

四物湯

三才丸

溫衛補血湯

八物湯

黃芪建中湯

雙和散

大補十全散

正氣天香散

導氣丸

通真丸

木香和中丸

木香檳榔丸

全真丸

神功導水丸

舟車神祐丸

大聖濟川散

越鞠丸

順氣丸

金剛丸

牛膝丸

煨腎丸

清神益氣湯

稀涎散

豆參散

三聖散

二仙散

碧霞丹

獨聖散

瀉青丸

安神丸

八物定志丸

瀉心湯

導赤散

錢氏益黃散

人參安胃散

瀉黃散

補肺阿膠散

瀉白散

補腎丸

補血丸

固真丸

三才封髓丹

八味地黃丸

離珠丹

還少丹

玉女長春不老丹

芩黃湯俱本條

小建中湯太陰腹痛

朮仁承氣湯傷寒畜血

四逆湯少陰下利

麻黃湯傷寒太陽

桂枝湯傷寒太陽

承氣湯陽明潮熱

養正丹眩暈

柴胡調經湯婦人血崩

瓜蒂散太陰發黃

青黛散頭痛

水芝丸小便數

卷之五

陰陽臟腑部

治寒熱法

治發熱

勞瘵骨蒸熱

專屍勞熱

產後發熱

治寒熱法

當歸補血湯

補中益氣湯

清涼飲子即四順散

三補丸

桔梗湯

清神散

龍腦飲子

涼膈散

立效散

石葦散

清金丸又名與點丸

抑青丸

千金地黄丸

門冬丸

清心丸

火府丹

當歸龍薈丸

回金丸

佐金丸

滋腎丸

木香金鈴散

牛黃散

妙香丸

黃連解毒湯

三黃丸

紫雪

柴胡升陽湯

火鬱湯俱本條

白虎湯太陽發熱

地骨皮散往來寒熱

桃仁承氣湯傷寒畜血

大小承氣湯俱陽明潮熱

調胃承氣湯太陽發熱

三物黃芩湯產後虛煩

瀉白散

瀉心湯

導赤散

瀉青丸四方俱虛實條

鮮毒雄黃丸喉痺

勞瘵骨蒸熱

草還丹

瓊玉膏

清神甘露丸

黃芪膏子煎丸

補天丸

補腎丸

六味地黄丸加五味為腎氣丸

黑地黄丸

柴胡飲子

防風當歸飲子

大金花丸

麥煎飲

地骨皮枳殼散

秦艽鱉甲丸

人參地骨皮散

人參柴胡散

大黃蜜虫丸

百勞丸

四物湯加減法

逍遙散

五蒸湯已上俱本條

鷄酥丸咳吐血

小陷胸湯傷寒結胸

炙甘草湯傷寒悸

傳屍勞熱

太乙明月丹

取傳屍伏屍勞虫法

神人阿魏散
俱本條

白茯苓湯

犀角紫河車丸

產後發熱

人參湯

犀角飲子
俱本條

卷之六

陰陽臟腑部

治惡寒

往來寒熱

外熱內寒外寒內熱

上熱下寒上寒下熱

產後往來寒熱

瘧寒熱

久瘧

瘧脹

產後瘧

治寒熱

升陽益胃湯

黃芪補胃湯

白朮附子湯

巴戟丸

胡椒理中丸

鉄刷湯

二氣丹

附子理中丸

大建中湯

天真丹

代灸膏

沉香桂附丸

大已寒丸

姜附湯
俱本條

桂枝加附子湯
陽明

自汗

神珠丸
即離珠丹

桂枝加芍藥人參新加湯
傷寒體痛

還少丹
三方俱虛實法

茯苓散
嘔吐清水

雙和散
虛實法

定志丸
驚悸

菖蒲丸
小兒遲言

益黃散
虛實法

小青龍湯
傷寒效

四逆湯
少陰下利

往來寒熱

調中湯

解風湯

防風湯

地骨皮散

柴胡散

地黃丸

既濟解毒湯
俱本條

潤肺散
效

大柴胡湯
少陽寒熱

產後往來寒熱

柴胡四物湯

小柴胡加生地湯

增損柴胡湯

熟地散

增損四物湯

黃芪丸俱本條

瘧寒熱

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

白芷湯

桂枝石膏湯

桂枝芍藥湯

桂枝黃芩湯

雙解飲子

麻黃黃芩湯

白虎加桂枝湯

蜀漆散

牡礪湯

柴胡去半夏加括

萎湯

截瘧方

人參養胃湯

絕瘧青蒿丸

七寶湯

剋効飲子

辟邪丹

斷瘧如聖散俱本條

堯仁承氣湯傷寒畜血

小柴胡加桂枝湯

傷寒太陽

小柴胡湯少陽寒熱

久瘧

藜蘆散

雄黃散

鱉甲煎丸

瘧母丸

十棗湯俱本條

三花神佑丸水脹

小胃丹

內傷飲食

瘧脹

蒼朮湯

本條

產後瘧

草菓飲子

生熟飲子

俱本條

卷之七

陰陽臟腑部

刺灸通論

刺虛實

刺寒熱

入治寒熱法

卷之八

陰陽臟腑部

穴法上

穴法下

卷之九

陰陽臟腑部

調攝宜禁

用藥宜禁

刺禁

灸禁

卷之十

肝膽部

諸風

卒中之初

中分淺深

中淺能言

中深難言 產中風 口噤 口眼喎斜 身癢

卒中之初

救急稀涎散

勝金丸

俱本條

中淺

三黃湯

疎風湯

拯濟換骨丹

續命丹

俱本條

中深

加減中和湯

當歸連翹湯

玄參升麻湯

牢牙散

清肺飲子

潤腸丸

益氣調榮湯

地黃飲子

地黃煎

荆瀝湯

黃芪湯薰法

仲景續命湯

紫古加減續命湯

雲岐子加減法

三化湯

羌活愈風湯

四白丹

二丹丸

大秦茺湯

天麻丸

獨聖散

竹瀝湯

煮散

犀角防風湯

輕骨丹

風藥聖餅子

稀簽丸

正舌散

扶神散

地黃酒

防風湯

竹瀝湯

防已湯

獨活煮散

保命金丹

活命金丹

解語丸

俱本條

瀉青丸

虛實法

至寶丹

補遺

獨活丹

續命散

二方瘕瘕

產中風

血風湯

本條

口噤

分涎散

白朮酒

俱本條

口眼喎斜

清陽湯

秦艽升麻湯

定風餅子

枳茹酒

俱本條

癢

何首烏散

消風散

澡洗藥

俱本條

卷之十一

肝膽部

眩

癩癩

子癩

痊

勞風

胎前痊

產後痊

瘕瘕

顫振

產從瘕瘕

厲風

眩

鈎藤散

芩薊散

天麻半夏湯

羌活湯

羚羊角散

都梁丸

川芎散

養正丹

半夏白朮天麻湯

芎朮湯

旋覆花湯

獨聖散

搜風丸

白朮附子湯

二生散

澤瀉白朮湯

俱本條

大豆紫湯

瘕

芎歸湯

婦人大法

水煮金花湯

利乾嘔

半夏加茯苓湯

嘔吐

五苓散

陽明渴

青黛散

頭痛

癩癩

祛痰丸

礬丹丸

參硃丸

神應丹

琥珀壽星丸

密陀僧散

五癩丸

防風通聖散

風引湯

犀角丸

龍腦安神丸

珠子辰砂丹

烏頭丸

法煮葶麻子

升陽湯

俱本條

碧霞丹

虛實法

沉香天麻湯

小兒驚癩

子癩

葛根湯本條

瘧

防風當歸散 麻黃加獨活防風湯

瓜蒌加桂枝湯 桂枝加芩防湯 千金續命湯

柴胡加防風湯 倉公當歸湯 八物白朮散

桂枝加芍藥防風防已湯 附子散

桂心白朮湯 附子防風散俱本條 神朮加羌活麻黃

湯 白朮加桂心黃芪湯二方俱傷寒太陽

葛根湯傷寒太陽與本條不同 小續命湯方見前瘧

大承氣湯陽明潮熱

勞風

皂角化痰丸嗽咳

胎前瘧

獨活防風湯

防風葛根湯俱本條

產後瘧

竹瀝湯

大豆紫湯

舉卿古拜散俱本條

破傷風

玉真散

羌活防風湯

蜈蚣散

白朮防風湯

大芩黃湯

江鯁丸

羌活湯

地榆防風散

養血當歸地黃散

俱本條

防風湯中

瘧瘕

人參益氣湯

獨活湯

胃風湯

薯蕷丸

續斷丸

牛黃散

續命煮散

獨活散俱本條

顫振

星附散

金牙酒

俱本條

產後癰瘕

愈風湯

增損柴胡湯

秦艽湯

俱本條

厲風

醉仙散

四聖保命丹

祛風散

通天再造散

愈風丹

換肌散

二聖散

栝葉散

樺皮散

凌霄散

祛風丸

如聖散

補氣瀉榮湯

俱本條

卷之十二

肝膽部

諸痺

行痺

痛痺

麻木

着痺

鶴膝風

攣

身痛

產後身痛

諸痺

升麻湯

本條

行痺

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

防風湯

薏苡仁散

麝香丸

龍虎丹

附子八物湯

和血散痛湯

大羌活湯

麻黃湯

牛蒡子散

控涎丹

大豆蘘散

犀角湯

茵芋丸

控涎加杏仁湯

定痛丸

松節酒

松葉酒

俱本條

痛痺

潛行散

二妙散

犀角升麻湯

四物蒼朮各半湯

活血丹

蒼朮復煎散

煖筋湯

活血應痛丸

八珍丸

烏靈丸

史丞相遇仙方

五加皮酒

姜桂諸熨法

拈痛散

紅藍花酒

虎骨丸

木瓜虎骨丸

麒麟竭散

趁痛散

姜黃散俱本條

茯苓丸

着痺

芍藥補氣湯

人參益氣湯

除濕補氣湯

黃芪桂枝五物湯

清陽補氣湯

補氣升陽和中湯

溫經除濕湯

除風勝濕羌活湯

茯苓湯

烏頭粥

續斷丸

前胡散

蚘蚋丸

換骨丹俱本條

神效黃芪湯目倒睫條

寧

薏苡仁散

與前方不同

養血地黃丸

羚羊角湯

烏頭湯

薏苡仁湯

活血通經湯

煨腎散

俱本條

身痛

拈痛湯

麻黃桂枝升麻湯

俱本條

甘草附子湯

太陽身痛

產後身痛

趁痛散

本條

五積散

太陽發熱

卷之十三

肝膽部

驚悸怔忡

產驚悸

心動

怒

善太息

目疾

赤腫

外障

內障

不能近視

不能遠視

雀目

目淚 風沿爛眼 倒睫拳毛 努肉攀睛

絲垢入目 視岐亂見 睇目直視 目上視

驚悸怔忡

溫膽湯 半夏麻黃丸 鎮心丹

密陀僧散 寒水石散 定志丸

辰砂遠志丸 茯苓丸俱本 珍珠母丸

獨活湯仁方俱 羌活勝濕湯腰 硃砂安神丸煩

茯苓甘草湯厥陰 炙甘草湯見傷寒悸

產驚悸

七寶散 大牡丹皮散俱本

諸目疾 赤腫

補肝散 止痛散 桔梗丸

針頭丸 救苦丸 芩辛湯

明目細辛湯 菊花散 四物龍膽湯

槐子散 川芎散 散熱飲子

洗肝散 地黃湯 助陽和血補氣湯

碧天丸 驅風散 碧雲散

神聖散 拔毒散 宣風散

廣大重明湯俱本

外障

羌活除翳湯 局方流氣飲 撥雲散

神仙退雲丸 羌活退翳湯 消翳散

五秀重明丸 羚羊角散 補陽湯

連栢益陰丸 升陽泄陰丸 百點膏

羌活退翳膏 退翳膏子 圓明膏

金絲膏 金露膏 夜光丸

蟾光膏

碧雲散

搐鼻方

俱本條

選奇湯

瀉青丸

虛實法

內障

人參補胃湯

益氣聰明湯

圓明內障升陽湯

芩連湯

復明散

熟地丸

益陰腎氣丸

滋陰地黃丸

當歸湯

甘菊花丸

四神丸

柴胡散

補肝散

五福還瞳丹

羚羊角飲子

補肝散

羚羊角散

羚羊角湯

蘆薈丸

墜翳丸

除風湯

磁石丸

黃連羊肝丸

鎮肝明目羊肝丸

補肝散

養肝丸

熟地丸

益本滋腎丸

補腎丸

神麴丸

俱本條

不能近視

地芝丸

本條

不能遠視

定志丸

本條

雀目

蛤粉丸

本條

目淚

當歸飲子

銀海止淚方

當歸湯

川芎丸

俱本條

風沿爛眼

蘆薈石散

紫金膏

俱本條

防風通聖散

癩

倒睫拳毛

神効明目湯

防風飲子

神効黃芪湯

撥雲湯

連翹飲子

青黛散俱本條

努肉攀睛

還睛散

千金方

飛絲塵垢諸方

卷之十四

肝膽部

脇痛

脇痛氣逆

腋腫

腋臭

諸疝

癰疝

狐疝

產小腹痛

閉癘遺溺

小便不通

淋

胎前產後淋

閼

小便數

小便黃赤

遺溺

產遺尿

前陰諸疾

陰縮陰挺

陰痿陰汗陰

痒陰臭

陰冷陰腫陰痛陰吹

筋

轉筋

霍亂轉筋

脇痛

桂枝散

白氣湯

芎藭湯

薏苡仁丸

枳殼煮散

大黃附子湯

神保丸

枳實散

調中順氣丸

沉香導氣散

俱本條

龍薈丸

虛實法

煮黃丸

內傷飲食

控涎丹

行痺

腋臭

腋氣神効方

諸疝附小腹諸疝治法同

丁香練實丸

丁香疝氣丸

當歸四逆湯

玄胡苦練湯

胡蘆巴丸

川練散

天台烏藥散

木香練子散

抵當烏頭桂枝湯

烏頭煎

茴香散

金練散

沉香桂附丸

蒺藜湯

當歸生姜羊肉湯

控引舉丸

礪砂丸

俱本條

桂枝湯

傷寒太陽

癩疔

香附散

海蛤丸

地黄膏子丸

安息香丸

念珠丸

金鈴丸

大戟丸

抵聖丸

雄黃散

失笑散俱本條

狐疝

蜘蛛散俱本條

小便不通

清肺散

茯苓戎鹽湯

滋腎丸

黃連丸

白花散

導氣除燥湯

括萎瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

髮灰散

菹仁煎俱本條

猪苓湯

王苓散俱陽明渴

癰即淋病

琥珀散

茯苓琥珀湯

鹿角霜丸

石葦散

火府丹

石燕丸

海金沙散

八正散

葛粉丸

腎着湯

茯苓丸

巴戟丸

腎瀝湯

瞑眩膏俱本條

胎前淋瀝

茯苓散

歸母苦參丸俱本條

產後淋瀝

茅根湯俱本條

小便數

茯苓琥珀湯

水芝丸

衛真湯俱本條

石脂神砂丹方滯下

遺溺

鹿茸丸

白薇散

茯苓丸

俱本條

神芩導水丸

虛實法

產遺尿

桑螵蛸散

陰痿陰汗陰冷陰臭

龍膽瀉肝湯

固真湯

溫腎湯

補肝湯

清震湯

柴胡勝濕湯

椒粉散

八味丸

虛實法

霍亂轉筋

建中加木瓜柴胡湯

建中加附子當歸

湯

半夏湯

木瓜湯

一粒青金丹

俱本條

四君子湯

虛實法

平胃散

泄瀉

建中湯

少陰吐

香薷散

少陰吐利

卷之十五

肝膽部

頭痛

產後頭痛

偏頭痛

雷頭痛

大頭痛

眉痛

頭重

頭風屑

不得臥

多臥

喉咽

喉痺

咽隘痛

乳蛾

喉如梗狀

諸物哽咽

項頸強痛

頭痛

大青空膏

小青空膏

清上瀉火湯

補氣湯

安神散

川芎散

石膏散

荊芥散

玉真丸

神妙丸

羌活附子湯

川芎神功散

救苦神白散

黑龍丸

麻黃茱萸湯

順氣和中湯 青黛散 透頂散

茶調散 大川芎丸 神聖散

芎辛丸 微清膏 乳香盞落散

茯苓半夏湯 白芷散 搐鼻川芎散

如聖散 瓜蒂神妙散 火筒散

頭風摩散方 頭風餅子俱本條 半夏白朮天麻湯

暈眩

產後頭痛

一奇散 加減四物湯 芎附散俱本條

偏頭痛

川芎散 細辛散 白附散俱本條

雷頭痛

茶調散 愈風餅子 升陽湯俱本條

涼膈散寒熱法

大頭痛

普濟消毒飲子 黑白散俱本條

眉痛

選奇湯本條

頭重

紅苜散本條

頭風屑

消風散本條 萬病紫苑丸積塊

不得臥

酸枣湯 驚甲丸 真珠母丸

獨活湯俱本條 羌活勝濕湯腰痛 温膽湯驚悸

喉痺

荆芥湯

五香散

如聖勝金錠

解毒雄黃丸

烏犀角膏

備急如聖散

一字散

玉鑰匙

玉屑無憂散

開關散

神效散俱本條

桔梗湯咽嗑痛

半夏桂枝甘草湯少陰咽痛

小續命湯中風

咽嗑痛

潤喉散

龍麝聚聖丹

祛毒牛黃膏

咽喉備急丹

增損如聖湯

利膈湯

桔梗湯

發聲散俱本條

乳蛾

咽喉乳蛾方

粉香散

羅青散

玄參散

乾姜散俱本條

喉如梗狀

半夏厚朴湯

諸物梗方

項頸強痛

木瓜煎

養神湯

椒附散俱本條

卷之十六

心小腸部

心痛

卒心痛

妊娠心痛

諸氣痛

胃痛胃滿

胃痺短氣

煩躁

虛煩

胎產煩躁

懊懣

脅悶

譫妄

產譫妄

循衣撮空

飛屍鬼疰

喜笑

健妄

諸痛

諸逆衝上

噫

下氣

心痛

木附湯

扶陽助胃湯

金鈴子散

烏頭赤石脂丸

括萎韭白半夏湯

大建中湯

桂枝姜枳湯

果附湯

二姜丸

草苴薏丸

九痛丸

藜本湯

木香丸

礪砂丸

麻黃桂枝湯

化虫丸

補金散

取寸白虫方

木香三稜散

粉蜜湯

失笑散

手拈散

海蛤丸

煮黃丸

神佑丸

小胃丸

厚朴丸

紫苑丸

烏奔丸

正氣天香散

黃連湯

龍膽湯

卒心痛

黃連湯

龍膽湯

走馬湯

胎前心痛

白朮散

二

產後心痛

火龍散

大巖蜜湯

失笑散

諸氣痛

調氣湯

寬中丸

和氣散

胃痛胃滿

括萎萆白白酒湯

枳實萆白桂枝湯

人參湯

枳朴大黃湯

上清散

括萎萆白半夏湯

心

三物小陷胃湯

結

漆澤湯

咳

胃痺短氣緩急

茯苓杏仁甘草湯

橘枳姜湯

薏苡附子散

虛煩

陳皮湯

淡竹茹湯

硃砂安神丸

妙香丸

俱本條

梔豉湯

傷寒煩

竹葉石膏湯

傷寒勞復

溫膽湯

驚悸

酸棗湯

不得眠

胎前虛煩

竹葉湯

本條

知母丸

婦人欲產

產後虛煩

竹葉湯

芍藥梔豉湯

三物黃芩湯

竹皮大丸

俱本條

躁

霹靂散

傷寒煩躁

譫妄

附中心惡屍症等証

遠志丸

茯神散

加減續命湯

八毒赤散

雄砂散

五邪湯

俱本條

太乙神精丹

方缺

蘇合香丸

中卒

還魂湯

中卒

大東湯

善悲

產後譫妄

奪命散

調經散

栢子仁散

俱本條

循衣撮空

生地黄連湯

本條

健忘

大聖枕中方

開心不忘方

俱本條

定志丸

驚悸

諸逆衝上

赤丸

本條

噫

枳殼散

本條

旋覆代赭湯

傷寒痞

卷之十七

心小腸部

諸見血 衄血 久衄 產後衄

吐血 咳唾血 妊娠咳唾血

溲血 妊娠尿血 下血 中蠱下血

諸痿 注夏 解你 舌

舌腫 舌卷 舌強 舌縱涎下

自嚙舌 汗 自汗 頭汗

手足汗 無汗 盜汗 卒中暴厥

五絕 暴死暴病

諸見血

生地黄散 龍腦鷄蘇丸 文蛤散俱本條

黃芪桂枝湯黃疸 白芍當歸湯婦人血崩

當歸建中湯婦人產虛弱 增損胃風湯下血

芳歸木附湯 桂婦六合湯婦人產虛弱

黃芪四君子湯 當歸四逆加吳茱萸湯補遺

衄血

止衄散 畫粉散 麥冬飲子

生料鷄蘇散 寸金散 定命散

茜梅丸 御院麝香散俱本條

久衄

黃芩芍藥湯 三黃補血湯 地黃散俱本條

吐血

人參救肺湯 必勝散 鷄蘇散

大補血丸 五神湯 四生丸

瀉心湯 犀角地黃湯 加味芍歸湯

二合灰散 除濕湯 栝葉湯

門冬飲子 天門冬丸俱本條 理中湯少陰吐利

咳唾血

七傷散

恩袍散

地黄散

大阿膠丸

切勞散

五味子黃芪散

子苓散

黃芪鱉甲散

人參黃芪散

人參蛤蚧散

麥門冬湯

續斷散

紫苑散

三拗湯

蓮心散

鷄子散

鷄蘇丸

朱砂膏

百部丸

欬冬散

匾荳散俱本條

甘桔加阿膠紫苑湯

人參半夏丸咳

桂苓甘露散補遺

溲血

玉屑膏

髮灰散

鹿角膠丸

小蘗飲子

冬榮散俱本條

萹草汁法淋

下血

升麻補胃湯

和中益胃湯

升陽除濕和血湯

益智和中湯

黃連湯

芍藥黃連湯

涼血地黃湯

升陽除濕防風湯

當歸和血散

槐花散

結陰丹

椿皮丸

玉屑丸

平胃地榆湯

胃風湯

烏荊丸

黃土湯

赤小荳當歸散

蒜連丸

烏奔丸

五槐丸俱本條

諸痿

補益丸

龍虎丹

虎潛丸

加減四斤丸

芸苗丹

衛生湯俱本條

健步丸

補益腎肝丸俱痿厥

神龜滋陰丸下瀉

人參酒

商陸飯俱痿厥

注夏

清暑益氣湯

黃芪人參湯

清燥湯俱本條

舌腫痛

金沸草湯

黑散子俱本條

烏犀膏喉痺

舌強舌卷

礬石散俱本條

舌縱涎下

神龜滋陰丸

通天愈風湯

清心導痰丸

清心牛黃丸俱本條

自汗

牡礪散

周衛湯

羌活勝濕湯

芪附湯

人參丸

白朮散

安胃湯俱本條

盜汗

當歸六黃湯

正氣湯

嚴氏黃芪湯

栝子仁丸

白朮湯

黃芪散

五仙丸俱本條

龍薈丸虛實法

牡礪散自汗

卒中暴厥

蘇合香丸

三物備急丸

大黃龍丸

附子理中湯

白薇湯

倉公散

全生活血湯

當歸附子湯

仲景救卒死方俱本

解毒雄黃丸喉痺

乾姜附子湯補遺

五絕

一自縊

二摧壓

三溺水

四魔魅

五產乳諸法

卷之十八

心小腸部

癰疽

腫瘍

潰瘍

癰疽所兼諸症

久漏瘡

腫瘍

內疎黃連湯

內托復煎散

當歸黃芪湯

奪命丹

淨腋湯

白芷升麻湯

托裏溫經湯

內托榮衛湯

縮毒金粉散

羌活當歸湯

檳榔散

黃栢當歸湯

十宣散

托毒散

五香湯

五香連翹湯

內托散即護心散

排膿湯

托裏排膿生肌散

保安湯

柞木飲子

車螯散

漏蘆湯方二

內消升麻湯

內消丸

單煮大黃湯

神仙追毒丸

消毒飲子

神効托裏散

回毒金銀花湯

黃芪散

黃芪四物湯

內固黃芪湯

阿膠飲子

牛膠飲

黃礬丸

國老膏

遠志酒

忍冬酒

安神散

黃連消毒飲

排膿散

當歸散

四虎散

乳香膏

內消金黃散

太白膏

針頭散

萬應針頭丸

獨勝散

騎竹馬灸法

木香散俱本條

千金托裏散方見下疔

潰瘍

替針丸方二

托裏溫中湯

加味十全湯

麥飯石膏

猪蹄湯

雄黃散

神異膏

熱瘡寒膏藥

寒瘡熱膏藥

逼毒散

欽瘡口方

乳香散

赤紅散

生肌散

平肌散俱本條

癰疽所兼諸症

竹葉黃芪湯

金銀花散

忍冬丸

黃芪六一湯

桑枝湯

五味子湯

犀角膏

和氣散

聖愈散俱本條

久漏瘡

骨碎補丸方二

桂附丸

陷脈散

神應膏

烏金散

截疔散俱本條

卷之十九

心小腸部

癰疽部分形狀不同

疔瘡

石癰

諸腫

癰癧

結核

癰瘡

偷針

天蛇頭代指

甲疽嵌甲

乳癰乳岩

囊癰陰頭癰

便毒

貼骨癰

內癰有三

肺癰腸癰

胃脘癰

癰疽所發部分

琥珀膏

疔瘡

保生錠子

神聖膏藥

托裏散

破棺丹方二

金砂散

蒼耳散

蟾酥丹

奪命散

奪命丹

還魂丹

追毒丸俱本條

石癰

木香散腫

癰癧馬刀

太乙膏

剋効散

玉燭散

三聖丸

連翹湯

必勝丸

白花蛇散

小犀角丸

蝸牛散

粉金散

清涼散餅

龍泉散

絳宮丸

連翹散堅湯

升陽調經湯

散腫潰堅湯

救苦勝靈丹湯

文武膏

托裏救苦神應丸

化氣調經湯

追毒神異湯

俱本條 翠玉膏

廉瘡

瘦瘤

破結散

玉壺散

人參化瘦丹

寶金散

海帶丸

一井散

小黃膏

生肌青龍散

枯瘤方二

點瘻瘤方

俱本條

乳癰乳岩

神効瓜萎散

立効散

橘皮湯

勝金丹

皂角散

連翹湯俱本條

便毒

青皮湯

玉燭散俱本條

貼骨癰

三生散

俱本條

肺癰腸癰胃脘癰

葶藶大束瀉肺湯

桔梗湯

葦莖湯

獨行方

如聖丸

濟生桔梗湯

桔梗白散

升麻湯

濟生排膿湯

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

薏苡湯

射干湯

復元通氣散俱本 小青龍湯傷寒 搜風湯

卷之二十 心小腸部

丹標瘞疹 丹毒風毒 瘞疹 疥癬

紫白癜風附白 面瘡 癩頭瘡

口瘡唇瘡 牙疳瘡 耳內瘡 腎臟風陰瘡

下疳瘡 婦人陰瘡 臙瘡 脚氣瘡足跟

瘡 凍瘡 手足皴裂脚縫爛

反花瘡 惡瘡 雜瘡 疔瘡

擗撲損傷 金瘡 杖瘡 湯火傷

竹木刺入肉 箭頭入肉 漆瘡

通治諸般惡虫蛇咬 毒蛇咬 蜈蚣咬

蠅蝮咬 蝎咬 班蜘蛛咬 刺毛蚯蚓蟻

蛄咬

丹毒

漏蘆散 消毒丸 金花散俱本

神佑丸水脹

瘞

旋覆花丸本條

疥

麻黃飲 消毒飲 一上散

藺茹散 木香散俱本 防風通勝散癩

癬

苦參丸 何首烏散 栢脂膏

祛濕散俱本 烏頭丸紫白

紫白癜風白禿

龍蛇散 加減何首烏散 烏頭丸俱本

面瘡

洗面方

面油摩風膏

瑩肌如玉散

白附丹俱本條

口瘡唇瘡

黃連升麻湯

祿袍散

蜜栢散

紅芍藥散

化毒法

多効散俱本條

牙疳

神功丸俱本條

耳內瘡

黍粘子散

曾青散

黃連散俱本條

腎臟風陰瘡

四生散

烏頭丸俱本條

下疳瘡

泄水丸

追毒錠子俱本條

婦人陰瘡

洗塌散

甘濕散

菝枝薰法

蛇床子俱本條

臙瘡

翠玉膏

黃芪丸

二妙丸俱本條

脚氣瘡足跟瘡

捷應散俱本條

凍瘡

如神散俱本條

手足皸裂脚縫爛

潤肌膏俱本條

惡瘡

乳香消毒散

碧霞錠子俱本條

顛撲傷損

內消方

走馬散

接骨丹

接骨散

定痛乳香神應散

定痛接骨紫金丹

聖靈丹

破血消痛湯

復元羌活湯

巴戟湯

當歸導滯散

奪命散

鷄鳴散

花蕊石散

芸臺散俱本條

金瘡

生肌地黃散

末藥散

勝金方

劉寄奴散

王不留行散俱本條

杖瘡

鬼代丹

乳香散

五黃散

沒藥散

杖瘡丹俱本條

鷄鳴散前傷損

湯火瘡

保生救苦散

冰霜散

綠白散俱本條

竹木針刺入肉諸方

箭頭入肉

踴鉄膏

萬全神應丹俱本條

諸虫蛇蜂蝎咬方

雄黃消毒膏

一上散俱本條

馬虎熊犬咬諸方

蟬花散俱本條

癩犬咬

定風散俱本條

附寄烏

卷之二十一

脾胃部

內傷飲食

胎前傷食

不能食

饑不能食

消痺

上消

胎前產後渴

產後發黃 食勞疴苦

黑疸

內傷飲食

五苓散

除濕散

導飲丸

葛花解醒湯

烏梅丸

百益丸

枳朮丸

麩蘖枳朮丸

木香枳朮丸

檳榔丸

木香檳榔丸

保和丸

大安丸

三黃枳朮丸

除濕益氣丸

上二黃丸

枳朮導滯丸

白朮丸

半夏枳朮丸

木香乾姜枳朮丸

丁香爛飯丸

小胃丹

蠲飲枳實丸

金露丸

木香見睨丸

三稜消積丸

感應丸

神應丸

雄黃聖餅子

檳榔丸

煮黃丸

瓜蒂散俱本條

烏奔丸積塊

四逆加吳茱萸生姜湯

通脈四逆湯少陰下利

理中丸太陽發熱

備急丸中卒

胎前傷寒

木香丸

白朮散俱本條

百病皆生於痰

導痰湯

妙應丸加減法即控涎丹

滾痰丸

黃芩利膈丸

中和丸

小黃丸

祛風丸

導痰丸

川芎丸

五飲湯

倍朮丸

旋覆花湯

木香半夏丸

降痰丸俱本條

十束湯痰

大青龍湯傷寒太陽

小青龍湯傷寒咳

半夏加茯苓湯乾嘔五苓散前傷食

澤瀉白朮湯眩

厚朴大黃七物湯小腹脹

苓桂朮甘湯短氣

小半夏加茯苓湯嘔吐

甘遂半夏湯瀉

真武湯太陰下利

痞

黃芪補中湯

葶蘆丸

木香消痞湯

大消痞丸

黃連消痞丸

失笑丸

回金丸俱本條

枳實理中丸傷寒結胃

人參湯胃痛

半夏瀉心湯傷寒痞

枳朮丸

檳榔丸

煮黃丸三方內傷飲食

不能食

和中丸二方

七珍散

六神湯

異功散

寬中進食丸

交泰丸

麴朮丸

二神丸俱本條

木香枳朮丸

木香乾姜枳朮丸二方內傷飲食

人參半夏丸咳嗽

惡食

失笑丸痞

消癰

熬猪肚湯中消

羊肉冬瓜湯

麥冬飲子上消

化水丹上消

小承氣湯陽明潮熱

順氣散補遺

腎氣丸寒熱法

地黃丸虛實法

內化丸

鳳髓丹遺夢

上消

人參石膏湯

加減地骨皮散

人參白朮散

麥冬飲子二方

止渴潤燥湯

化水丹

蜜酒方

文蛤散

神効散

千里漿仁 芷母湯 文蛤飲

甘草石膏湯俱本 白虎加人參湯陽明

調胃承氣湯太陽發熱 三黃丸發熱 六味地黃丸虛實

五苓散傷食 猪苓湯陽明 火府丹淋

白虎湯太陽發熱 凉膈散寒熱 小柴胡湯少陽寒熱

四君子理中湯

中消

猪肚丸 順利散 參蒲丸俱本

下消

生津甘露飲子 和血養氣湯 地黃飲子

清涼飲子 甘露膏 千金地黃丸

黃連丸 麥冬湯 冬瓜飲子

三消丸 胡粉散 葛根丸

嘔吐 吐 乾嘔 惡心

嘔苦水 吐酸吞酸 嘔吐清水 嘔沫

嘔膿 嘔吐虫 吐利 闕格

膈氣 反胃 噎 噎塞

口開目瞪 嘈雜 噦 產後噦

腹痛

草薺薤丸 神聖復氣湯 益智和中丸

温胃湯 木桂湯 麻黃薺丸

厚朴湯 高良姜湯 附子粳米湯

益智散 五靈脂湯 芍藥甘草湯

厚朴三物湯 當歸丸 四物苦練湯

温中丸 大蒼朮丸 七氣湯俱本

小建中湯太陰腹痛 理中湯少陰吐利 四逆湯

真武湯 俱少陰下利

附子湯 傷寒少陰

正陽散

回陽丹 俱傷寒囊縮

當歸四逆湯 厥陰厥

芍藥黃芪湯 滯下

胎前腹痛

當歸芍藥散

地黄當歸湯

芩歸湯 俱本條

產後腹痛

捲荷散

黑白散

紫金散

立効散

下淤血湯

桂心丸

內補當歸建中湯

獨聖散

枳實芍藥散 俱本條

黑神散 婦人產後

四物加玄胡沒藥

白芷湯 婦人通治

四物苦練湯 腹痛

當歸生姜羊肉湯

產後虛弱

腸鳴

葶藶丸 本條

升陽除濕湯 泄瀉

行氣丸

茴香散 俱本條

黃芪湯 瘧

胎前渴

葛根散

人參黃芪散

知母散 俱本條

產後渴

竹葉湯

玄胡索散

桃花散 俱本條

口燥咽乾

黃芪湯 俱本條

五味子湯

桑枝煎 二地瘧

黃疸

茯苓除濕湯

茵陳梔子湯

腎疸湯

桂枝加黃芪湯

麻黃醇酒湯

瓜蒂湯

梔子大黃湯

大黃硝石湯

黃連散

理中加茯苓湯

茵陳附子乾姜湯

養榮湯

補中湯

穀疸丸

葛根湯

啗鼻瓜蒂散

俱本條

茵陳散

太陰發黃

小柴胡湯

傷寒往來寒熱

小建中湯

太陰腹痛

小半夏湯

嘔吐

食勞疳黃

大溫中丸

小溫中丸

煖中丸

紫金丹

束礬丸

五方俱本條

黃汗

芪桂酒湯

本條

目黃

青龍散

本條

黑疸

硝石散

本條

卷之二十二

脾胃部

腹痛

胎前腹痛

產後胎痛

腸鳴

嘔吐

小半夏加茯苓湯

大半夏湯

加減二陳湯

藿香安胃散

丁香茱萸湯

藿香平胃散

竹茹湯

枇杷散

豬苓散

香靈丸俱本條

半夏瀉心湯傷寒

紅苳丸番胃

吳茱萸湯少陰吐

四逆湯少陰

吐

桔梗湯

木香散

荆黃湯

檳榔散

大黃甘草湯

金花丸

青鎮丸

茯苓澤瀉湯

白朮散

碧霞丸俱本條

獨參湯傷寒壞症

乾嘔

陳皮湯本條

惡心

生姜半夏湯

茯苓半夏湯

柴胡半夏湯

蒲黃散

開胃散俱本條

吐酸吞酸

咽醋丸

服蒼朮法

乾姜丸俱本條

參黃丸泄瀉

加減二陳湯

藿香安胃散二方見前

嘔吐

嘔吐清水

茯苓飲本條

嘔沫

半夏乾姜散本條

吐犹

烏梅丸傷寒虻厥

吐利

黃芩加半夏生姜湯

黃芩湯

水煮金花丸俱本條

關格

大承氣湯陽明潮熱

番胃

紫沉丸

厚朴丸

附子丸

白朮木香散

白朮散

十膈氣散

荳蔻散

新瓦散

人參利膈丸

大黃湯

玄胡粉

芫花丸

紅荳丸

丁香附子散

附子散

桂香散

鯽魚散俱本條

六丁丸即香靈丸見嘔吐

噎

漢防已湯

人參散大便秘

噎塞

吳茱萸丸本條

滋腎丸寒熱法

嘈雜

導引丸內傷飲食

噦

陳皮竹茹湯

羌活附子湯俱本條

卷之二十三

泄瀉滯下通論

食泄

滯下

久泄久利

胎前利

纏金丹

厚朴丸反胃

黃芪補中湯痞痞

消痞丸痞痞

利膈丸番胃

五噎膈氣丸俱本條

柿錢散

小承氣湯陽明潮熱

脾胃部

丁香柿蒂散

產後痢

大便不通

產後大便閉

大小便不通

產後大小便閉

泄瀉

胃苓湯

對金飲子

平胃散加減法

四苓散

益元散

參萸丸

甘遂半夏湯

白朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯

蒼朮防風湯

并陽除濕湯

人參升胃湯

止瀉姜麴丸

固腸丸

訶子散

厚朴枳實湯

補脾丸

扶脾丸

蒼朮湯

訶子丸

赤石脂禹餘糧湯

朝真丹

漿水散

桂枝湯

白朮散

麴朮丸

止洩丸

附子溫中湯

鞠藭丸

桂香丸俱本條

進退大承氣湯

下滯

涼膈散

寒熱

四逆湯

少陰

赤石脂丸

少陰

乾薑湯

遺補

消風湯

下利

大柴胡湯

少陽

水煎金花丸

吐利

木香和中丸

虛實

芍藥升麻湯

蒼朮地榆湯

下滯

玉龍丸

傷寒

食泄

加減木香散

白朮湯

防風芍藥湯

蒼朮防風湯

補本丸

木香丸

俱本

宣風散

小兒痘

滯下

芍藥湯

玄青丸

利積丸

烟臘丸

香連丸

荳蔻香連丸

黃連阿膠丸

導氣湯

進退承氣法

芍藥黃芩湯

當歸導氣湯

紫參湯

定痛黑丸子

靈砂丹

陳麩丸

茯苓湯

神效越桃散

堅中丸

芍藥栝皮丸

加減平胃散

青六丸

蒼朮地榆湯

槐花丸

石脂神砂丹

水煎木香膏

斷下湯

白朮安胃散

訶子皮散

養臟湯

地榆芍藥湯

救命延年丸

阿膠梅連丸

黃連丸

感應丸

白頭翁湯

升陽除濕防風湯

下血

建中湯

理中湯

桃花湯

胃風湯

膠艾湯

附子理中湯

震靈丹

惡寒

久洩久痢

白朮黃芩湯

五味子散

乾薑丸

聖餅子

肉蔻丸

固中丸

洩瀉丸

訶黎勒丸

木香散

芍藥湯

麻黃升麻湯

小續命湯

胎前下利

大寧散

黃連湯

厚朴散

草果飲

產後痢

救急散

黃連丸

白頭翁加甘草阿

膠湯

當歸芍藥湯

大便不通

潤腸丸

活血潤腸丸

當歸潤腸湯

導滯通幽湯

潤腸橘杏丸

人參散

從蓉潤腸丸

益血丹

七宣丸

厚朴湯

枳榔散

大黃牽牛散

半硫丸

麻黃白朮湯

蜜煎導法

霹靂煎

通關散

宣積丸

麻仁湯

大小便不通

車狗散

迴生神膏

掩臍法

卷之二十四

脾胃部

水脹通論

水腫

胎前水腫

產後水腫

少腹脹

少腹脹滿

胎前腹脹

水腫

防已黃芪湯

防已茯苓湯

越婢湯

甘草麻黃湯

杏子湯

導滯通經湯

白茯苓湯

大棗湯

羌活散

五加皮散

香蘇散

白丸子

葶藶丸

聖靈丹

赤茯苓丸

續隨子丸

三種散

無礙丸

茯苓散

取十種水病方

補藥方

三花神佑丸

海金沙散

海藻散

知母湯

復元丹

實脾散俱本條

蒲灰散淋

牡礪澤瀉散傷寒勞復

中滿分消丸腹脹

胎前水腫

防已湯

葶藶散二方俱本條

產後水腫

大調經散

小調經散

奪魂散

加減吳茱萸湯俱本條

少腹脹

附子菘菹湯

索氏三和湯

調胃白朮澤瀉散

枳朮湯

木香化滯湯

小溫中丸

禹餘糧丸

桂枝去芍加麻辛附子湯

牛黃琥珀丸

防已椒蘆丸

葶藶丸

楮實子丸

廣茂潰堅丸

四炒枳殼丸

沉香交泰丸

沉香海金沙丸

治腫木香散

香棗丸

厚朴七物湯

木香順氣湯

中滿分消湯

木香塌氣丸

中滿分消丸俱本條

白丸子寒熱法

三補丸寒熱法

少腹脹滿

澤漆湯

晞露丸

烏喙丸

見睍丹

石英散

大黃甘遂湯

萬病丸俱本條

胎前腹脹

枳殼湯

紫金丹

抵聖湯

白聖散

俱本條

枳木湯

小腹脹

卷之二十五

脾胃部

積塊癥瘕

婦人血積

胎前產後積

息積

面部

面腫頰腮痛

面熱面寒

面青面塵

面赤

面黃

面白

面黑

頰車病

癩狂通論

狂

欲獨閉戶牖而處

口部

口苦

口糜

口瘡

口臭喉腫

口疳

入中消門

唇

唇瘻

瘻入口

四肢

肉部

身重

怠墮嗜臥

蠱毒

奇病

積塊癥瘕

消塊和胃湯

磨積方

柳宗元纂救三死

方

萬病丸

乾柿丸

硝石丸

醋煮三稜丸

神功助化散

聖散子

紅丸子

雞爪三稜丸

礪砂煎丸

治瘕丸

玄胡索丸

荆蓬煎丸

二賢散

小阿魏丸

阿魏丸

破積導飲丸

小三稜煎

神效五食湯

流氣丸

肥氣丸

加減肥氣丸

伏梁丸

痞氣丸

加減痞氣丸

息奔丸

加減息奔丸

奔豚丸

肥氣丸

五靈丸

束膏丸

定喘葶藶丸

奔豚湯

聚散湯俱本條

潤下丸咳

妙應丸痰

保和丸傷食

琥珀膏癰疽

婦人血積

當歸丸

加減四物湯

黑神丸

沒藥散

牡丹散

木香礪砂丸

桃仁煎俱本條

胎前產後積

芍藥湯本條

息積

磨積丸

化氣湯俱本條

面寒面熱

升麻加黃連湯本條

面白

巴戟丸惡寒

面黑

冲和順氣湯本條

狂

鎮心丹

來麩膏

當歸承氣湯

辰砂散

寧志膏

防已地黃湯

驚氣丸

牛黃膏俱本條

礪砂丸癰疽

口苦

龍膽瀉肝湯本條

口糜

胡黃連散

必效散俱本條

口臭喉腥

加減甘露飲

加減瀉白散俱本條

身重

甘薑苓朮湯

參朮湯俱本條

防已黃芪湯傷寒身重

怠墮嗜臥

人參補氣湯俱本條

蠱毒

辰砂丸

解毒丸方二

青黛雄黃丸

礬灰散俱本條

解諸毒方

奇病諸方

卷之二十六

肺大腸部

咳嗽

乾咳嗽

咳嗽喉中作聲

暴嗽

久嗽

妊娠嗽

咳嗽

厚朴麻黃湯

澤漆湯

三拗湯

水煮金花丸

化痰玉壺丸

天麻丸

小黃丸

白朮丸

玉粉丸

薑桂丸

太白丹

法製半夏

人參欵花散

紫蘇半夏湯

紫蘇飲

紫蘇散

杏參飲

利膈丸

杏仁煎

潤下丸

桔梗湯

白朮湯

白朮散

防風丸

皂角化痰丸

白龍丸

潤肺散

抑痰丸

溫脾湯

甘膽丸

瓜蒌丸

生薑甘草湯

桂枝去芍藥加皂

菝湯

九仙散

欵花清肺散

人參清肺湯

人參欵花散

安肺散

人參理肺散

黃連化痰丸

青礞石丸方二

定嗽化痰丸 人參半夏丸 金珠化痰丸

人參清金丸 半夏溫肺湯 丁香半夏丸

溫胃化痰丸 胡椒理中丸 柴胡飲

杏子湯 搜風化痰丸 延壽丹

防風丸 川芎丸 團參散

人參欵花膏 補肺湯 欵花補肺湯

清肺湯 瀉火補肺湯 蛤蚧丸

大利膈丸 墜痰丸 透羅丹

清金丸 欵氣丸 紫參飲

貝母湯俱本 清金丸寒熱 越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯喘門 麻黃湯傷寒

赤石脂禹餘糧湯少陰下利 桔梗湯傷寒

芍藥甘草湯厥陰 小柴胡湯少陽寒熱 黃芩加半夏生薑

湯大吐利 升麻湯傷寒陽毒 烏梅丸厥陰

麻黃附子細辛湯傷寒太陽 茯苓甘草湯厥陰

錢氏異攻散小兒痘 吳茱萸湯少陰吐 厚朴湯大便不通

干縉湯喘 十棗湯癰 稀涎散實

三聖散虛實 瓜蒂散太陰發黃 碧霞丹虛實

乾咳嗽 補肺法俱本

甘桔湯 咳嗽作聲

射干麻黃湯 白前湯俱本

久嗽

薰法二條 枳殼湯 生半夏湯

馬兜苓丸俱本 蛤蚧丸咳

妊娠嗽

馬兜苓丸

麻黃散

紫菀湯

桔梗散俱本條

卷之二十七

肺大腸部

喘

喘不得臥

產後喘

短氣

少氣

善悲

妊娠善悲

鼻塞

鼻淵

鼻鼽

鼻癰肉

酒齶鼻

鼻黑肩背痛

肩痛

皮膚

皮膚痛

皮膚索澤

瘡

舌瘡

喉瘖

胎前產後瘖

脫肛

穀道痛蝕

痔

喘

麥門冬湯

天門冬丸

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

麻黃定喘湯

麻黃蒼朮湯

四磨湯

平氣散

加減瀉白散

槐角利膈丸

定喘飲子

木防已湯

木防已加茯苓芒硝湯

千縉湯

半夏丸

雙玉散

紫金丹

清金丹

化痰丸

人參平胃散

參蘇溫肺湯

加減瀉白散

加減三奇湯

紫參散

清金湯俱本條

沉香滾痰丸痰

四七湯即半夏厚朴湯咽如硬狀

人參半夏湯嗽咳

葶藶大棗瀉肺湯肺癆

白朮散嗽咳

稀涎散實

調中益氣湯加減

法實

喘不得臥

神秘湯

苓桂五味甘草湯

真應散

紫金丹

俱本條

產後喘

血竭散

參蘇飲

旋覆花湯

見睨丸

俱本條

奪命丹

胞承不下

小調經散

水腫

短氣

正元散

苓桂朮甘湯

俱本條

欬花補肺湯

嗽咳

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

二方胸痺

括萋薤白半夏湯

心痛

腎氣丸

勞瘵

善悲

甘麥大棗湯

本條

鼻塞

麗澤通氣湯

溫肺湯

禦寒湯

溫衛湯

溫衛補血湯

萹澄茄丸

通草散

菖蒲散

俱本條

鼻淵

防風湯

蒼耳散

辛荑散

俱本條

鼻中瘰肉

羊肺散

辛荑膏

輕黃散

俱本條

酒齋鼻

鉛紅散

簡要方

粉黃膏

檳榔散

俱本條

升麻湯

傷寒陽毒

瀉青丸

虛實

肩背痛

通氣防風湯

本條

皮膚索澤

大黃蠶虫丸

勞瘵

葦莖湯

瘧肺

喉痞

訶子湯

發聲散

玉粉丸

蛤蚧丸

通聲膏

俱本條

產後瘡

七珍散

孤鳳丹

俱本條

脫肛

蝟皮散

香荆散

鍼粉散

俱本條

痔

秦艽蒼朮湯

秦艽白朮丸

蒼朮澤瀉丸

痔藥膏子

鱉甲丸

蓮花蕊散

七聖散丸

秦艽防風湯

秦艽羌活湯

當歸郁李仁湯

神應散

淋洗法

蒲黃散

薰痔法

枯痔法

割痔麻藥

俱本條

黑地黃丸

勞瘵

卷之二十八

腎膀胱

腰痛

胎前腰痛

產後腰痛

脊痛脊強

寒熱厥通論

寒厥熱厥

產後寒厥

脚氣頑麻腫痛為痺厥

足痿軟不能為痿厥

脚氣衝心為厥逆

產脚氣

腰痛

立安丸

杜仲酒

麋茸丸

補腎丸

補陰丸

蒼朮湯

牛膝酒

獨活寄生湯

防風湯

川芎肉桂湯

獨活散

羌活湯

橘核散

如神湯

桃仁酒

地龍湯

橘核酒

熟大黃湯

羌活勝濕湯

摩腰丹

皂角膏

俱本條

煨腎丸法虛實

八味腎氣丸法虛實 小續命湯中風

五積散發熱

腎著湯身重

胎前腰痛

通氣散

五加皮散

五茄皮丸俱本條

產後腰痛

紫金丸

生地黄湯

桃仁湯俱本條

寒厥

加減白通湯本條

痺厥

竹瀝湯

風引湯

大驚甲湯

麻黃湯

獨活湯

厚朴湯

風引獨活湯

地黄丸

薏苡丸

勝駿丸

蒼朮丸

酒浸牛膝丸

當歸拈痛湯

羌活導滯湯

開結導飲丸方二

枳實大黃湯

茵芋丸

健步丸

十全丹

續斷丸

薏苡仁酒

虎骨酒

檳榔散

漂洗法俱本條

越婢加白朮湯

烏頭湯痺行

痿厥

補益腎肝丸

健步丸

神龜滋陰丸

越婢加朮湯

左經丸

續骨丹

商陸飯

人參酒俱本條

通天愈風湯經舌

黃芪人參湯

清燥湯二方見注夏

厥逆

三腕散

大腹子散

桑白皮散

薏苡仁散

礬石湯俱本條

八味地黄丸法虛實

救三死方積塊

卷之二十九

腎膀胱部

耳聾

暴聾

耳鳴

耳腫痛

停耳

虫入耳

骨

牙齒痛

齒搖斷露

牙蛀牙不生

髮黃白

髮落不生

二陰

欠噫

欠伸

嚏

身體拘急

夢遺

白濁

恐

耳聾

燒腎散

嚴氏菴蓉丸

蠟彈丸

栴榔神芎丸

犀角散

茯苓散

地黄湯

薑蠟散

通神丹俱本條

復元通氣散腹瀉

暴聾

蒲黃膏

龍腦膏俱本條

耳鳴

黃芪丸

柴胡耳鳴湯俱本條

耳腫痛

嚴氏犀角飲子

解熱飲子

菖蒲錠子俱本條

停耳

紅綿散

松花散

白蓮散

麝香散

禹餘糧丸俱本條

虫入耳諸方

齒痛

牢牙地黄散

馘鬼散

清胃湯

當歸龍膽散

益智木律散

草薺菴散

立效散

細辛散

白芷散

竭稍散

治虫散

獨活散

追風散

定痛散

雄黃定痛膏

透關散

牢牙散

白牙散

麝香刷牙散

刷牙方

俱本條

齒搖齟露

羌活散

黃連散

牢牙散

麝香散

取蛀牙法

俱本條

甘露飲子小兒症腫咽痛

牙蛀牙不生

麝香散

救苦散

葶撥散俱本條

髮黃白

張天師草還丹

青絲散

俱本條

髮落不生

滋榮散

三聖膏

俱本條

夢遺

巴戟丸

金鎖丹

固真丹

補真玉露丸

秘真丸

八仙丹

珍珠粉丸

鳳髓丹

清心丸

桂枝龍骨牡蠣湯

天雄散

猪苓丸

烏金散

俱本條

白濁

加減珍珠粉丸

鹿茸丸

茯苓丸

金箔丸

王瓜散

葶藶分清飲俱本條

恐

人參散

茯神散

補膽防風湯俱本條

卷之三十

傷寒通論

續傷寒通論

太陽症

傷寒部

發熱 惡寒 頭痛 項強

太陽症

桂枝湯 麻黃湯 大青龍湯

溫粉方 桂枝加葛根湯 葛根湯

桂枝二越婢一湯 桂枝麻黃各半湯

抵當湯 麻黃附子細辛湯

柴胡加桂枝湯

發熱

調胃承氣湯 白虎湯 黃芪湯

調中丸 理中丸 神木湯

白朮湯方二 又黃芪湯 川芎湯

黃芪建中加當歸湯 九味羌活湯

大白朮湯 五積散 參蘇飲

柴胡散 人參散

惡寒

四逆加人參湯 芍藥甘草附子湯

桂枝去芍藥湯 桂枝去芍藥加附子湯

頭痛

連鬚葱白湯 葛根葱白湯 獨活湯

石膏川芎湯

項強

桂枝去桂加茯苓白朮湯

身體痛

桂枝加芍藥生薑人參新加湯 麻黃加朮湯

甘草附子湯 桂枝附子湯 白朮附子湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

杏仁湯

麻黃復煎湯

卷之三十一

傷寒部

陽明症 胃實不大便

自汗

不得臥

潮熱

譫語

狂亂

捻衣摸牀

渴

嘔

乾嘔

少陽症

口苦咽乾

眩

往來寒熱

脇滿痛

胸滿

胸痛

少陽症續法

陽氣獨盛變陽毒

太陰症

腹滿

腹痛

發黃

少陰症

但欲寐嗜臥

口燥舌乾

咽痛

吐

吐利

下利

厥陰症

氣上衝心

饑不欲食

吐衄

厥

少腹滿囊縮

陰氣獨盛變陰毒

陽明症胃實不大便

麻仁丸

蜜煎導法

猪膽汁法

自汗

桂枝加附子湯

防風白朮牡蠣散

不得臥

黃連阿膠湯

酸棗仁湯

黃連解毒湯

梔子烏梅湯

潮熱

大承氣湯

小承氣湯

柴胡加芒硝湯

狂亂

鵲石散

防風黃連湯

渴

白虎加人參湯 五苓散 猪苓湯

文蛤散 人參湯

嘔

葛根加半夏湯

乾嘔

赤茯苓湯 人參葛根湯

少陽症往來寒熱

小柴胡湯 大柴胡湯 柴胡桂枝乾薑湯

脇滿痛

十棗湯

陽毒

升麻鱉甲湯 陽毒升麻湯 陽毒梔子湯

大黃散 葛根散 黑奴丸

丹砂丹

太陰症腹滿

桂枝加大黃湯 厚朴薑半夏湯

桔梗半夏湯

腹痛

黃連湯 小建中湯 薑鹽湯

發黃

茵陳蒿湯 梔子柏皮湯 麻黃連翹赤芍湯

茵陳湯 五苓加茵陳湯 瓜蒂散

少陰症欲寐嗜臥

麻黃附子甘草湯 附子湯

四逆散

咽痛

甘草湯

桔梗湯

半夏散

苦酒湯

半夏桂枝甘草湯

吐

吳茱萸湯

乾薑芩連人參湯

建中湯

吐利

理中湯

四逆湯加豬膽汁方

香薷散

白朮散

訶子散

人參散

回陽散

增損縮脾飲

茯苓瀝瀉湯

下利

四逆湯

白頭翁湯

真武湯

豬膚湯

麻黃升麻湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

通脈四逆湯

黃芩湯

葛根連芩湯

桃花湯

赤石脂禹餘糧湯

三黃熟艾湯

薤白湯

赤石脂丸

地榆散

黃連阿膠湯

燥腸丸

七宣丸

枳實芍藥薑甘湯

厥陰症氣上衝心

瓜蒂散

桂枝加桂湯

李根湯

厥

當歸四逆湯

茯苓甘草湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

烏梅丸

五味子湯

少腹滿囊縮

正陽散

回陽丹

陰毒

陰毒甘草湯

正元散

退陰散

五聖散

白朮散

正陽丹

還陽散

返陰丹

火燄散

代灸塗臍膏

破棺丹

卷之三十二

傷寒部

台病併病汗下吐後等病

喘

身重

難轉側

遺尿

盜汗

面赤

壞病

戰慄振搖

筋惕肉瞤

叉手冒心

驚

悸

臟結結胸

痞氣同異

結胸

痞

煩

煩躁

欬

小便不利

小便難

尸厥鬱冒

噫

噦

無汗

瘰狀

頭汗

舌白脞

動氣

鼻衄

下血

唾血

畜血

吐血

短氣

心痛

除中

下重

身熱惡寒身寒惡熱

瘧

痲

狐惑

百合病

喘

桂枝加厚朴杏仁湯

甘草石膏湯

身重

防已黃芪湯

壞病

羊肉湯

戰慄振搖

茯苓桂枝白朮甘草湯

驚

柴胡加龍骨牡礪湯

桂枝去芍藥加蜀

漆牡礪龍骨救逆湯

茯苓丸

犀角湯

麥冬茯苓飲子

悸

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

炙甘草湯

結胸

大陷胸湯

小陷胸湯

三物白散

大陷胸丸

枳實理中丸

增損理中丸

穿結散

海蛤散

結胸灸法

痞

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

桂枝人參湯

旋覆代赭湯

桔梗枳殼湯

煩

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子乾薑湯

梔子厚朴湯

煩躁

薑附湯

茯苓四逆湯

桂枝甘草龍骨牡

礪湯

霹靂散

已寒丸

欬

小青龍湯

補肺散

阿膠散

桔梗湯

噫

如聖加枳實湯

如聖加人參藿香杏仁湯

噦

橘皮乾薑湯

半夏生薑湯

勻氣散

陰毒吃逆方

肉苳蔻湯

良薑湯

瘡狀

桂枝二麻黃一湯

動氣

防葵散

枳殼散

前胡散

鼻衄

犀角地黃湯

茅花湯

滑石湯

畜血

抵當湯

抵當丸

桃仁承氣湯

生地黄丸

吐血

麻黃人參芍藥湯

瘕

射干湯

癰

黑膏方

葛根橘皮湯

玄參升麻湯

大青四物湯

猪膽雞子湯

消毒飲子

狐惑

雄黃散

治蠱桃仁湯

黃連犀角湯

雄黃錠散

百合病

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

括蕒牡礪散

百合滑石散

卷之三十三

傷寒部

五五

勞復

陰陽易

四時傷寒不同

冬傷寒

春溫病

夏暑病

秋瘧疾

溫疫

風溫

濕

瘧

婦人傷寒

熱入血室

妊娠傷寒

產後傷寒

小兒傷寒

溫病

韓氏和解因時法

溫中法

灰包熨法

勞復

枳實梔子豉湯

牡礪澤瀉散

竹葉石膏湯

補脾湯

麥冬湯

雄鼠屎湯

七味葱白湯

陰陽易

燒棍散

竹皮湯

青竹茹湯

豶鼠糞湯

當歸白朮湯

溫病

升麻解肌湯

暑病

一物瓜蒂湯

桂枝石膏湯

梔子升麻湯

酒蒸黃連丸

橘皮湯

蒲黃散

黃芪湯

蒼木石膏湯

桔梗散

消暑丹

消暑丸

玉龍丸

溫疫

老君神明散

聖散子

雄黃丸

務成子熒火丸

調中湯

風溫

知母乾葛湯

防已湯

婦人熱入血室

桂枝加芍藥湯 麻黃加生地黄湯

乾薑柴胡湯 小柴胡加地黃湯

小柴胡加牡丹皮湯 小柴胡加芒硝大

黃湯 桂枝加附子紅花湯

甘草芍藥湯

妊娠傷寒

黃芪解肌湯 表虛六合湯 表實六合湯

風濕六合湯 升麻六合湯 柴胡六合湯

大黃六合湯 人參六合湯 厚朴六合湯

梔子六合湯 石膏六合湯 茯苓六合湯

琥珀六合湯 膠艾六合湯 附子六合湯

四物大黃湯 桂枝芍藥當歸湯

芍藥湯 阿膠散 安胎白朮散

葱白湯 護胎方 梔子大青湯

產後傷寒

竹葉湯 玉露散

小兒傷寒

大青膏 雄黃膏 人參羌活散

七寶散 麻黃黃芩湯 升麻黃芩湯

大黃丸 薄荷散 枳殼半夏湯

藿香正氣散 小建中減桂加黃芪湯

和解因時法

調脈湯 葛根柴胡湯 人參桔梗湯

薄荷湯 防風湯 香芍湯

六物麻黃湯 七物柴胡湯 發表湯

人參湯 石膏湯 解肌湯

芍藥湯

知母湯

温中法

温中湯

橘皮湯

七物理中丸

厚朴丸

白朮湯

橘皮湯

二苓湯

熨法

厚朴丸

卷之三十四

婦人部

婦人治通論

調經

經閉

血崩

赤白帶

婦人通治

四物湯加減法

柴胡四物湯

芎歸湯

調經

四物加苓連湯

四物加苓朮湯

四物加葵花湯

四物加地黃當歸湯

桂枝桃仁湯

柴胡丁香湯

琥珀散

交加散方二

交加地黃丸

益母草丸

土瓜根散

四物加黃苓湯

升陽舉經湯

紫石英丸

苓心丸

當歸散俱本條

經閉

五補丸

衛生湯

萬病丸

血極膏

紅花當歸散

牛膝散

温經湯

牡丹散

通經丸

掌中金丸

礬石丸俱本條

桂枝桃仁湯方見調經

血崩

旋覆花湯

備金散

醋附丸

縮砂散 當歸芍藥湯 芎歸膠艾湯

益胃升陽湯 調經升陽除濕湯

柴胡調經湯 獨聖散 黃芪當歸人參湯

栝黃散 伏龍肝散 牡礪散

涼血地黄湯 小薊湯 芎藭酒

金華散 丁香膠艾湯 香礬散

五靈脂散 琥珀散 荊芥散

神應散 如聖散俱本條 四物膠艾湯通

赤白帶

乳香散 樗皮丸 固腸丸

地榆膏 苦楝丸 伏龍肝散

補經固真湯 調經補真湯 地黄丸

桂附湯 坐藥龍盤膏 勝陰丹

回陽丹 酒煮當歸丸 當歸附子湯

固真丸 補真潤腸湯 溫經湯

益母散 白芷散俱本條 摩腰膏腰

卷之三十五 婦人部

胎前症 求子 受胎 惡阻

妊娠經來 胎漏下黃汁或如荳汁 胎動不安

胎上逼心 跌撲毒藥傷胎 妊病可下胎

斷胎 胎自墮 十月未足欲產過期不產

縮胎法 坐草法 催生法 下死胎法

產後症 胎衣不下 血暈 血不下

血不止 虛弱 無乳 乳汁自出

陰脫

求子

蠱斯丸

大五補丸

增損三才丸

紫石英丸

盪胞湯

坐道藥俱本條

受胎

驗胎散方二

惡阻

半夏茯苓湯

茯苓丸

乾薑人參半夏丸

歸原散

人參橘皮湯

安胎飲俱本條

胎漏下血

立聖散

桂枝茯苓丸俱本條

胎漏黃汁

銀苧酒本條

胎動

永固丸

當歸散

養胎白朮散俱本條

胎上逼心

紫蘇飲本條

跌撲毒藥傷胎

佛手散

阿膠散

奪命丸俱本條

姪病可下胎斷胎

斷子法本條

胎自墮

醋附丸崩血

月未足欲產

知母丸本條

縮胎

遠生散

黑神丸

縮胎丸方二

束胎丸

滑胎枳殼散

安胎內補丸俱本條

催生

如聖散方二

柞木飲子

神效乳硃丹

勝金散

催生丹

勝金丹

易產天麻丸

神效七聖散

如聖散

半夏湯

如聖膏

遇仙丹

立聖丹

如神散俱本條

產後症

地黃丸

桃仁煎

黑神散俱本條

胞衣不下

奪命丹

牛膝湯

備急丹

半夏湯

下胎丸俱本條

花蕊石散顛撲損傷

黑龍丸血不下

黑神散

如聖膏催生

血暈

清魂散

荊芥散

獨行散

紅花散

牡丹散俱本條

芎歸芍藥湯血不止

血不下

黑龍丸俱本條

血不止

芎歸芍藥湯

牡礪散俱本條

產後虛弱

當歸羊肉湯

當歸建中湯

三元湯俱本條

十全散法虎實

無乳

立效方

湧泉散俱本條

卷之三十一

小兒部

治法通論

生下胎疾

肝主風

角弓反張

搖頭 偏風 驚搐 驚癇

天弔 眼目 眼白多 雀目疳瘡

赤眼 通睛 偏墜 陰脫囊腫脫

囊 疝氣 小便不通 淋病

遺尿

生下胎疾

百壽散 浴體法 生地黄湯

木瓜丸 燒丹丸俱本條

偏風

全蝎散本條

驚搐

塗頤法 鎮心丸 小黑龍丸

涼驚丸 利驚丸 鎮肝丸

五福化毒丹 瓜萋湯 青白丸子

溫白丸 釣藤飲子 羌活膏

返魂丹 八仙散 醒脾散

釀乳方 撩痰方 芎藭散

油珠膏 補脾益真湯 前朴散

醒脾丸 蝎稍散 回生散

梓朴散 豆卷散 黃芪益黃散

奪命散方二 大黑龍丸 鎮驚丸

保命丹 溫驚丸 抱龍丸

天麻散 天麻防風丸 七味羌活膏

釀乳方 編銀丸俱本條 地黄丸勞瘵

瀉青丸 益黃散 導赤散俱虛實法

大青膏小兒傷寒 小續命湯中風 白餅子癖

安神丸法虛實

調中丸腹痛

異功散吐瀉

黃連安神丸大煩躁

寒水石丸大驚悸

麝香丸疳

辰砂丸遺補

紫雪治熱

軟金丹

桃枝丸積熱

史君子丸疳

驚癇

五色丸

雌黃丸

蛇黃丸

沉香天麻湯

牛黃丸

得效方

斷癇丹俱本條

奪命丹驚擗

天弔

九龍控涎散

釣藤飲俱本條

雀目疳眼

煮肝丸

龍膽飲子俱本條

通睛

牛黃丸本條

小便不通

捻頭散

木通散

冬葵子散俱本條

喉痺

碧霞丹本條

卷之三十七

小兒部

心主熱

潮熱

積熱

溫病

變蒸熱

心痛

美舌

重舌

木舌

舌白胎

鼻衄

遲言

盜汗

自汗

癰癤

腮腫

惡核瘰癧

赤丹

疥癬

眉煉

耳瘡附凍

面瘡

口瘡

癩頭瘡

腳凍瘡

痘疹治法通論

痘出太密

出不快 癢塌 灰白色 黑陷倒靨

寒戰 發熱 寒熱 痘渴

瀉瀉 瀉不瀉 吐逆 腹脹

脹痛 痘喘 大便秘 餘毒

痘入目 咽痛 痘風 癩瘡

痘瘡痛 膿而不痂 痘後瘡癩 痘癰

中惡 客忤

潮熱

地骨皮散 生犀散 犀角散

秦艽散 金星丸俱本條 瀉白散虛實

甘桔湯大人乾咳 涼膈散治熱 四逆湯傷寒下利

捻頭散小便秘不通 桂枝芍藥湯瘧寒熱 香苾丸白汗

四順飲即清涼飲子見發熱 奪命散驚風 惺惺散痘

積

紅綿散 六神散 銀白散

桃枝散 梔鼓飲子俱本條

變蒸熱

紫霜丸本條

心痛

靈礬散本條

鼻衄

地黃湯本條

遲言

昌蒲丸 雞頭丸俱本條

盜汗

黃芪散 虎杖散俱本條

自汗

香朮丸本條

赤丹

防已散

荆芥散

解毒散方二

白玉散

生料四物湯俱本條

疥癬

苦瓠散

青金散俱本條

耳瘡

白斂散本條

口瘡

如聖散

牡礪散俱本條

痘法通論

安裏解毒防風湯

升麻葛根湯

惺惺散

四物解肌湯

防風蒼朮湯

黃栢膏

胡荽湯

消毒救苦湯俱本條

當歸丸

束變百祥丸俱痘大便秘

枳實丸

枳木丸

神應丸三方俱傷食

白虎湯太陽發熱快

八正散淋

十二味異功散不出

葛根湯傷寒太陽

七味肉苳菹丸瀉不渴

甘露飲咽痛

小柴胡湯少陽寒熱

玉露散瀉吐

出太密

鼠粘子湯

調肝散俱本條

出不快

錢氏消毒飲

六一湯

活血散

陳氏異功散

藍根散

鼠粘子湯

化毒湯

透肌湯

甘桔加梔子湯

水解散

四聖散

紫草廻班散

紫草木通散

人參蟬蛻散

紫草散

絲瓜湯俱本條

犀角地黄湯血調

升麻葛根湯補遺

升麻黃芩湯

麻黃黃芩湯俱小兒傷寒

黑陷倒靨

紫草散

回生散

麻黃湯

猪尾膏

龍腦膏子

四蠶散

百祥丸

牛李膏

無比散

箬葉散俱本條

發熱

連翹散

梔子金花丸

三黃丸

宣風散

通膈丸俱本條

四聖散

紫草木通散俱出不快

寒熱

太和散本條

渴

六味人參麥冬飲本條

七味人參白朮散

渴

十一味木香散痘渴瀉

渴瀉

十一味木香散本條

瀉不渴

七味荳蔻散本條

痘喘

杏甘湯

人參清膈散

前胡枳殼湯俱本條

宣風散熱痘發

大便秘

當歸丸

棗變百祥丸

洗心散

俱本條

痘入目

蟬蛻散

地黃散

決明散

撥雲散

蜜蒙花散

通聖散

蛤粉散

俱本條

黃柏膏

痘通治法

調肝散

痘密

羊肝散

即下蜜蒙花散

咽痛

如聖餅子

甘草桔梗升麻湯

甘露飲子

地黃丸

俱本條

鼠粘子湯

消毒散

俱出快

癩搗

括萋湯

溫驚丸

俱驚癩

痘瘡痛

五物木香散

膿而不痂

雄黃散

綿聖散

滅癩藥

俱本條

痘後瘡癩

連翹散

本條

痘癰

木香散

本條

中惡

龍腦膏

痘黑陷

客忤

真珠散

本條

卷之三十八

小兒部

脾主濕

吐瀉

吐

吐水吐虫

泄瀉

乳食不化

赤白痢

腹脹附丁

水腫

疳

疳虛羸

鶴節

宿食

痞

哺露

癖

脾弱多困

渴

大小便秘

黃疸

腹痛

鵝口

口瘡見心

口噤

滯頤

臍風噤口

吐瀉

白附丸

玉露散

一名甘露飲

和中散

和胃丸

金液丹

荳蔻散

錢氏異功散

溫中丸

半粟散

俱本

白餅子

癖

益黃散

虛實法

開胃丸

補遺

吐

萬安膏

方二

朱沉丹

定吐紫金核

香銀丸

白朮散

藿香散

門冬飲

清膈飲子

鐵粉丸

二氣散

俱本條

泄瀉

萬安膏

吐

蘇合香丸

中卒

平胃散

大人泄瀉

四君子丸

癖

赤白痢

白附香連丸

荳蔻香連丸

木香丸

小香連丸

黃栢丸

釀乳法

黃連加減例

俱本條

腹脹

塌氣丸

調中丸

阿魏丸

小阿魏丸

肥兒丸

六神丸

十全丹

中滿分消丸

消痞丸

升陽滋血湯

麻黃升麻湯俱本條

白餅子癖

解毒丸喉痺

大黃丸小兒傷寒

紫霜丸癖

癖

史君子丸

厚腸丸

芎朴丸

大蘆薈丸

胡黃連麝香丸

榆仁丸

沒石子丸

紅鉛散

乳香丸

蘭香散

龍骨散

白粉散

五福化毒丹

胡黃連丸

木香丸

如聖丸

麝香丸

睡驚丸

鱉甲散方

猪肚丸

龍膽丸

烏犀丸

化虫丸

大胡黃連丸

大蕪荑湯

龍粉丸

三稜散

黃龍丸

膽礬丸

肥兒丸

蘆薈丸

五疳保童丸

生筋散俱本條

涼驚丸驚咳

安神丸虛實法

二丁丸癖

進食丸癖

疳虛羸

蘆薈丸

露星膏

橘連丸

二聖丸俱本條

木香丸

胡黃連丸並疳

宿食

消乳丸

七聖丸俱本條

痞

甘遂散本條

枳朮丸條

枳實理中丸傷寒結胸

癖

白餅子

進食丸

雙聖丸

珍珠丸

消積丸

丁香化癖散

二丁丸

紫霜丸俱本條

渴

白朮散消上

大小便不通

握宣丸

郁李仁丸俱本條

黃疸

加減瀉黃散

梔子栝皮湯

犀角散

連翹赤小豆湯

消食丸

茯苓滲濕湯

瓜蒌散俱本條

茵陳湯傷寒發黃

五苓散陽明渴

益黃散虛實法

史君子丸疳

調中丸腹痛

人參白朮散消渴

腹痛

釣藤膏

魏香散

蒜乳丸

調中丸

當歸丸

三稜散

安虫散

安虫丸

蕪荑散俱本條

三黃丸虛實法

消積丸

白餅子俱癖

白朮散渴

滯頤

溫脾丹本條

清心導痰丸舌縱涎下

撮口臍風

栝墨散本條

卷之三十九

小兒部

肺主燥

咳嗽

嗽膿血

喘

馬脾風

悲哭

夜啼

疳

鼻

龜胸

龜背

脫肛

脫肛瘻

腎主虛寒

解顛

顛填

行遲齒遲髮遲

停耳

呵欠

額黑唇青

雜病寒熱

瘡

繼病

五硬五軟

咳嗽

葶藶丸

人參荆芥散

麻黃湯

漏銀丸

百部丸

紫蘇子散

黃芪湯

塗唇膏俱本條

瀉白散

補肺阿膠散

俱虛賣法

百祥丸

痘黑陷

白餅子癩

白附丸瀉吐

嗽膿血

甘桔散本條

喘

萬金丹小兒疔

馬脾風

牛黃奪命散

無價散俱本條

悲哭

龍齒散本條

夜啼

五味子散

燈花散俱本條

蒜乳丸

當歸丸俱腹痛

蒲黃散舌

牡礪散口瘡

瘡

通關散本條

鼻

辛萸膏本條

脫肛

五倍子散

赤石脂散

水聖散俱本

解顛

天南星散

三辛散俱本

補腎地黄丸勞

行遲齒遲髮遲

五加皮散

羚羊角丸

芩黃散

香薷散俱本

停耳

紅玉散

湯氏龍黃散俱本

額黑唇青

補陽湯本

雜病寒熱

平胃散大人

進食丸癖

瘧

萬金丹

草菓飲

露星散

小柴胡湯

青皮湯

養胃湯

鬼哭散

鱉甲飲子

大腹皮湯

四獸散

截瘧丹俱本

繼病

龍膽湯本

卷之四十

運氣部

運氣總論

南北政

六節盛衰

盛衰正變

歲步終始

升降交接

勝復盈虛

運氣應人

藥應陰陽

歲味歲穀

逆從反佐

內外調治

治先歲氣

約方

氣至太過不及占

應時應化占

動亂躄法占

地理占
釋病機

正變淫勝勝復占

釋九

醫學綱目目錄終



醫學綱目卷之一

陰陽臟腑部

陰陽

榮衛

素陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也治病必求於本積陽為天積陰為地陰靜陽躁陽生陰長陽殺陰藏陽化氣陰成形陰陽應象論

清陽為天濁陰為地地氣上為雲天氣下為雨雨出地氣雲出天氣故清陽出上竅濁陰出下竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六腑水為陰火為陽陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化生精氣生形味傷形氣傷精精化為氣氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅同上

天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養

榮行脉
中衛行
脉外

五氣氣和而生津液相成神乃自生六節藏
象論

靈人受氣於穀穀入於胃以傳與肺五臟六腑皆以受氣其清者為榮濁者為衛榮在脉中衛在脉外榮周不休五十而復大會陰陽相貫如環無端榮衛生
會篇○其浮氣之不

循經者為衛氣其精氣之行于經者為榮氣衛氣
篇素榮者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六府乃能入

於脉也故循脉上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脉也故循皮膚之中分肉之

間薰於膏膜散於胸腹肺
論

榮衛應
宗氣之
呼吸

靈五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積於胃中出於喉嚨以貫心脉而行呼吸焉榮氣者沁其津液注之於脉化以爲血以榮四末內注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出其浮氣之慄疾而先行於四末分肉皮膚

之間而不休者也晝行於陽夜行於陰常從足少陰之分

間行於五臟六腑邪客
篇

帝曰榮衛之行奈何岐伯曰穀始入於胃其精微者先出於胃之兩焦以溉五臟別出兩行榮衛之道其大氣之搏而不行者積於胃中名曰氣海出於肺循喉咽故呼則出吸則入天地之精氣其大數常出三入一故穀不入半日則氣衰一日則氣少矣五味
篇

衛法天
營法地
之浮地

丹溪天地屬金說 邵子曰天依地地附天天地自相依

附內經曰大氣舉地夫自清濁肇分天以氣運於外而攝水地以形居於中而浮於水者也是氣也即天之謂也自

其無極者觀之故曰大氣至清至剛至健屬乎金者也非至剛不能攝其水非至健不能運行不息以舉地之重非至清其剛健不能長久上古而不老或曰子以天氣為屬

金固周易乾卦取象之義何至遂以屬金言之乎善言天者必有證於人善言大者必取譬於小願明以告我曰天生萬物人為貴人形象天可以取譬肺主氣外應皮毛內經謂陽為外衛非皮毛乎此天之象也其包裹骨肉臟腑於其中此地之象也血行於皮裏肉腠晝夜周流無端此水之象也合三者而觀非水浮地天攝水地懸於中乎聖人作易取金為天氣之象厥有旨焉

劉河間說脉者血氣之先斯論得之矣人身之脉血氣之所為而不知所以周流不息者正乾道乾乾之意也亦猶理之寓乎氣所以為血氣之先先之一字厥有旨焉

靈黃帝曰願聞衛氣之行出入之合何如伯高曰歲有十二月日有十二辰子午為經卯酉為緯周天二十八宿而一面七星四七二十八宿房昴為緯虛張為經是故房至

循行脉
外五十

畢為陽昴至尾為陰陽主晝陰主夜故衛氣之行一日一夜五十周於身晝日行於陽二十五周夜行於陰二十五周周行五臟是故平旦陰盡陽氣出於目目張則氣上行於頭循項下足太陽循背下至小指之端其散者別於目銳眦下手太陽下至手小指之間外側其散者別於目眦眦下足少陽注小指次指之間以上以上二字衍文也其下當有其散者三字循手少陽之分側下至小指之間別者以上以上二字至耳前合於頷脉注足陽明以下行至肘上入五指之間其散者從耳下下手陽明入於大指之間入掌中其至於足也入足心出內踝下作踵行陰分復合於目故為一周是故日行一舍人氣行於身一周與十分身之八日行二舍人氣行三周於身與十分身之六日行三舍人氣行於身五周與十分身之四日行四舍人氣行於身七周與十分

身之二日行五舍人氣行於身九周日行六舍人氣行於身十周與十分身之八日行七舍人氣行於身十二周在在身二字與十分身之六日行十四舍人氣二十五周衍文也於身有奇分與十分身之四陽盡於陰陰受氣矣其始入於陰常從足少陰注於腎腎注於心心注於肺肺注於肝肝注於脾脾復注於腎為周是故夜行一舍人氣行於陰臟一周與十分臟之八亦如行陽之二十五周而復合於日陰陽一日一夜合有奇分十分身之四與十分歲之二是故人之所以臥起之時有早晏者奇分之不盡故也衛氣

行篇右衛氣之行晝行陽則目張而寤夜行陰則目瞑而寐謹按此節言平旦陽氣之出目而下行於手足三陽也皆一時分道並注非有先後次第也此經篇末言水下

一刻人氣在太陽水下二刻人氣在少陽水下三刻人氣在陽明水下四刻人氣在陰分者則是先下太陽究竟然後下少陽候少陽究竟然後下陽明候陽明究竟方上行陰分大與此節矛盾蓋衍文也

陽氣有晝夜陰陽之分

素陽氣者一日而主外平旦人氣生日中而陽氣隆日西而陽氣已虛氣門乃閉是故暮而收拒無擾筋骨無見霧露反此三時形乃困薄生氣通大論

靈衛氣行於陰二十五度行於陽二十五度分為晝夜故氣至陽而起至陰而止故曰日中而陽隴為重陽夜半而陰隴為重陰故大陰主內太陽主外各行二十五度分為晝夜夜半為陰隴夜半後而為陰衰平旦陰盡而陽受氣矣日中為陽隴日西而陽衰日入陽盡而陰受氣矣夜半而大會萬民皆臥命曰合陰平旦陰盡而陽受氣如是無

巴與天地同紀榮衛生會篇

榮行脉
周中五十

榮無陰
陽之異

黃帝曰余願聞五十榮奈何岐伯荅曰天周二十八宿宿
三十六分人氣行一周人氣行一周之下當有千八分八
分之上當有宿字下當有人氣行五十字身八字蓋天
周二十八宿宿三十六分人氣行一周於身與十分身之
八宿三百六十分人氣行一十八周於身也日行二十八宿人
經脉上下左右前後二十八脉周身十六丈二尺以應二
十八宿漏水下百刻以分晝夜故人一呼脉再動氣行三
寸一吸脉亦再動氣行三寸呼吸定息氣行六寸十息氣
行六尺日行二分日行二分之上當有二十息二百七
氣如尺中十二字十息氣行十六丈二尺氣行交通於中一周於身下水二
刻日行二十五分二十五分當
作二十分五百四十息氣行再周於
身下水四刻日行四十分二千七百息氣行十周於身下
水二十刻日行五宿二十分一萬二千五百息氣行五十

榮於身水下百刻日行二十八宿漏水皆盡脉終矣所謂
交通者并行一數也故五十榮備得盡天地之壽矣凡行
八百一十丈也五十榮備黃帝曰榮氣之道內穀為寶穀入
于胃乃傳之脉流溢於中布散於外精專者行於經隧常
榮無已終而復始是謂天地之紀故氣從太陰出注手陽
明上行注足陽明下行注足跗上注大指間與太陰合上
行抵髀從脾注心中循手少陰出腋下臂注小指合手太
陽上行乘腋出頰內注目內眥上顛下項合足太陽循脊
下尻下行注小指之端循足心注足少陰上行注腎從腎
注心外散於胷中循心主脉出腋下臂出兩筋之間入掌
中出中指之端還注小指次指之端合手少陽上行注臑
中散於三焦從三焦注膽出脇注足少陽下行至跗上復
從跗至大指間合足厥陰上行至肝從肝上注肺上循喉

龍入頰頰之竅究於畜門其支別者上額循顛下項中循
脊入骶骨是督脉也絡陰器上過毛中入臍中上循腹裏
入缺盆下注肺中復出太陽此榮氣之所行也逆順之常
也榮氣篇○頰苦琅切頰酥朗切頰也東
恒云十二經一脈也畧為十二分而已

手太陰

肺手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺

從肺系橫出腋腋下循臑內通名曰臑上臂上行少陰心主之前

臑內廉凡有三脉太陰居前少陰居後厥陰居中也下肘中接處曰肘循臂內上骨

下廉臑下掌上名曰臂臂有二骨今入寸口掌後陷中動

寸口中動脉上魚循魚際魚際穴也出大指之端少商其

支者從腕後直出次指內廉出其端

手陽明

大腸手陽明之脉起於大指次指之端商陽循指上廉指

廉本節前陷中二間穴本節後陷中三間穴也出合谷兩骨間合谷上入兩筋之

中陽溪循臂上廉入肘外廉曲池上臑外前廉上肩出髀

骨之前廉上出於柱骨之會上入缺盆絡脉下膈屬大
腸其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交人中
左之右右之左上挾鼻孔

足陽明

胃足陽明之脉起於鼻之交頰中旁約太陽之脉下循鼻

外入上齒中還出挾口環唇下交承漿却循頤後下廉出

大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙其支者從

大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從

缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起於胃口下循

腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兔下膝臑中臑上

接處下循脛外廉謂脛骨之外廉也其外廉下膝三寸三

寸巨虛下廉也直下下足跗衝陽穴也足面曰跗跗上

至腕中解溪穴也指之間皆有動脉其大指之關足少陽脉也上入指本節

後間動脉足厥陰脉也上跗上動脉足陽明脉也針經終
始篇云陽明在上厥陰在中少陽在入中指內間中指內
下者是也凡言間皆謂兩指中間也

後陷中陷谷穴也本節前陷中內其支者下廉三寸而別

庭穴也大指次指之端厲兌穴也

足太陰脾足太陰之脉起於大指之端隱白穴也在循指內側白

肉際大指內側本節後大指本節後約二寸內過核骨後核骨下太白穴也核骨在

蹠骨前約三寸如棗核橫于足內側赤白肉上內蹠前廉

際者是也賣太師指為孤拐骨者非是也

中商丘穴也上端內循脛骨後交出厥陰之前上膝股內

前廉陰陵泉穴也入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散

手少陰心手少陰之脉起于心中出屬心系下膈絡小腸其支者

從心系上挾咽繫目系其直者復從心系却上脉下出腋

下肺脉從肺系橫出腋下心脉從肺而下循臑內後廉行

太陰心主之後下肘內少海穴也循臂內後廉臂內後廉上腕

也抵掌後脫骨之端神門穴也入掌內後廉掌內後廉小指本

循小指之內出其端少冲穴也在小指內廉之端

手太陽小腸手太陽之脉起於小指之端少澤穴也循手外測小指本

穴也本節後陷上腕臂下掌上節處曰腕腕前起骨中陷

中後溪穴也出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩筋之間少海穴也上循

臑外後廉出肩解繞肩胛交肩入缺盆絡心循咽下膈

抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目銳眦却入耳

中其支者別頰上頰抵鼻至目內眦斜絡於顙

足太陽膀胱足太陽之脉起於目內眦上額交巔其支者從巔至

耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髀內挾脊

抵腰中入循脊絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫髀

入臑中臑下端上接處約文中央其支者從髀內左右別

下貫胛挾脊內過髀樞髀云髀骨節也循髀外從後廉下合臑中

以下貫蹠內足趾出外蹠之後崑崙穴也循京骨京骨穴也至小指

外側小指外側本節後陷中束骨穴也本節前通谷穴也小指端至陰穴也

足少陰腎足少陰之脉起於小指之下斜走足心湧泉出於然骨

之下然骨穴也在內踝前起大骨下陷中循內踝之後內踝之後跟骨之上

上太陵二寸復溜穴也別入跟中以上踰內出膈內廉陰谷穴也上股內

後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循

喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胃中

手厥陰心主手厥陰心包絡之脉起於胃中出屬心包絡下膈歷

絡三焦其支者循胃出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行

太陰少陰之間入肘中曲澤穴也下臂行兩筋之間兩筋之上

使穴也當腕中太陵穴也入掌中勞宮穴也循中指出其端中衝穴也其支

者別掌中循小指次指出其端

手少陽三焦手少陽之脉起於小指次指之端關冲穴也上出兩指之

間兩指之間陷中掖門穴也上兩指本節後間陷中冲滑穴也循手表腕陽池穴也出臂

兩骨之間兩骨之間上腕三寸支溝穴也上貫肘天井穴也循臑外上肩而交

出足少陽之後入缺盆布臑中散絡心包下膈循膈三焦

其支者從臑中上出缺盆上項繫耳後直上出耳上角以

屈下頰至頰頰頰也其支者從耳後入耳中出走耳前過客

主人前交頰至目銳眦

足少陽膽足少陽之脉起於目銳眦上抵頭角下耳後循頸行手

少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從

耳後入耳中出走耳前至目銳眦後其支者別銳眦下大

迎合手少陽抵於頰下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫

膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者

從缺盆下腋循胃過季脇下合髀厭中實氏云腋下腿以

下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前外輔骨之前膝之下

之足取直下抵絕骨之端陽輔穴也下出外踝之前丘墟穴也循足跗

上入小指次指之間小指次指之間本節前陷中俠溪穴也本節後陷中臨池穴也小指次指
陰穴也其支者別跗上入大指之間循大指岐骨內出其
端還貫爪甲出三毛

足厥陰

肝足厥陰之脉起於大指叢毛之際大敦穴也上循足跗上廉

足跗上廉大指間陷中行間穴也去內踝一寸上踝八寸

交出太陰之後中封穴也上膕內廉曲泉穴也循股陰入毛

中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨

之後上入頤頰連目系上出額與督脉會於巔其支者從

目系下頰裏環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺經脈

右榮氣之行自手太陰始足至厥陰終一周於身也詳

其一周於身外至身體四肢內至五臟六腑無不周遍

故其五十周無晝夜陰陽之殊衛氣之行則不然晝但

周陽於身體四肢之外不入五臟六腑之內夜但周陰

於五臟六腑之內不出身體四肢之外故必五十周至
平旦方與榮大會於肺手太陰也

黃帝曰脉行之逆順柰何岐伯曰手之三陰從臟走手手

陰從中焦注大指次指手少陰從心中注手小指手

厥陰從胃中注手小指次指此手三陰從臟走手也手

之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從

足走腹

脉度

黃帝曰願聞脉度岐伯曰手之六陽從手至頭長五尺五

六三丈手之六陰從手至臂中三尺五寸三六一丈八尺

五六三尺合二丈一尺足之六陽從足上至頭八尺六八

四丈八尺足之六陰從足至臂中六尺五寸六六三丈六

尺五六三尺合三丈九尺躋脉從足至目七尺五寸二七
一丈四尺二五一尺合一丈五尺督脉任脉各四尺五寸
二四八尺二五一尺合九尺凡都合一十六丈二尺此氣

之大經隧也

脉度篇

督脉

素督脉者起於小腹以下骨中央女子入繫庭孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合篡間繞篡後別繞繫至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎與太陽起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩膊內挾脊抵腰中入循脊絡腎自少陰股內至目五字上下其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫臍中央上貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央骨空論

右督脉始終行身之後東垣云督脉者出於會陰穴

陰

即經文所謂篡

根於長強穴上行脊裏至於巔附足太陽膀胱

之脉膀胱者諸陽之首兼榮衛之氣係焉督脉為附督者都能為表裏上中下十二經之病焉王註云自其少腹直上至兩目之下中央指任脉之行而言是督脉

所係由此言之則任脉督脉衝脉名異而同一體也謂之任脉者女子得之任養也謂之衝脉者以其上氣衝也謂之督脉者以其督領諸脉也

任脉

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉上頤循面入目骨空論

右任脉始終行身之前東垣云任脉起於會陰根於曲骨入前陰中出腹裏過臍上行附足厥陰之經為生化之元也貫穿諸經無所不係焉

衝脉

衝脉者起於氣街並少陰之經挾臍上行至胷中而散骨空論

靈衝脉任脉皆起於胞中上循背裏為經絡之海其浮而

外者循腹右上行會於咽喉別而絡唇口五音五味篇

右衝脉始終亦行身之前俠任脉兩傍東垣云衝脉分

爲二道起於會陰根於氣街爲二道入腹中央俠臍兩
傍上行附足陽明之脉至胷中而散一說上至腦耳上
角下至足內踝絡跗上若搐如引繩之狀上下動之若
一貫諸經之脉無所不到以其從胃脉故也十二經之
海也旺爲生化升降之主

躄脉黃帝曰躄脉安起安止何氣何榮岐伯荅曰躄脉者少陰
之別起於然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循
胷裏入缺盆上出人迎之前入頰屬目內眥合於太陽陽
躄而上行氣并相還則爲滯目氣不榮則目不合黃帝曰
氣獨行五臟不榮六腑何也岐伯荅曰氣之不得無行也
如水之流如日月之行不休故陰脉榮其臟陽脉榮其腑
如環之無端莫知其紀終而復始其流溢之氣內溉臟腑
外濡腠理黃帝曰躄脉有陰陽何脉當其數岐伯荅曰男

子數其陽女子數其陰當數者爲經其不當數者爲絡也

脉度論○頰音佻
面頰也躄渠畧切

右躄脉始終獨言陰躄而不及陽躄者有脫簡也當數
謂當脉度一十六丈二尺之數也男子以陽躄當其數
女子以陰躄當其數

奇經
八脉

難經脉有奇經八脉者不拘有十二經何也然有陽維有

陰維有陽躄有陰躄有衝有督有任有帶之脉凡此八脉
者皆不拘於經故曰奇經八脉也經有十二絡有十五凡
二十七氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖說溝渠
通利水道以備不然天雨降下溝渠溢滿當此之時霽霈
妄行聖人不能復圖也此絡脉滿溢諸經不能復拘也
難七 其奇經八脉者既不拘於十二經皆何起何繼也然
督脉者起於下極之俞並於脊裏上至風府入屬於腦任

脉者起於中極之下以上至毛際循腹裏上關元至咽喉
衝脉者起於氣街並足陽明之經挾臍上行至胃中而散
也帶脉者起於季脇迴身一周陽蹻脉者起於跟中循外
踝上行入風池陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至咽
喉交貫衝脉陽維陰維者維絡於身溢蓄不能環流灌溉
諸經者也故陽維起於諸陽會也陰維起於諸陰交也比
於聖人圖設溝渠溝渠滿溢流於深湖故聖人不能拘通
也而人脉隆盛入於八脉而不環周故十二經亦不能拘
之其受邪氣蓄則腫熱砭射之也三十八難並步浪切
右督任蹻脉岐伯謂在十二經榮氣周流度數一十六
丈二尺之內扁鵲謂奇經八脉不拘於十二經二說矛
盾以待賢者又衝脉虞庶註云素問曰衝脉並足少陰
之經難經却言並足陽明之經况少陰之經挾臍各五

分陽明之經挾臍左右各二寸氣衝又是陽明脉氣所
發如此推之則衝脉自氣街起在陽明少陰二經之內
挾臍上行其理明矣

榮獨手
大陰足
少陰陽
明動不
休

靈黃帝曰經脉十二而手太陰足少陰陽明獨動不休何
也岐伯曰足陽明胃脉也胃者五臟六腑之海其清氣上
注於肺肺氣從太陰而行之其行也以息往來故人一呼
脉再動一吸脉亦再動呼吸不已故動而不止黃帝曰氣
之過於寸口也上十焉息下八焉伏何道從還不知其極
岐伯曰氣之離臟也卒然如弓弩之發如水之下岸上於
魚以反衰其餘氣衰散以逆上故其行微黃帝曰足之陽
明何因而動岐伯曰胃氣上注於脉其悍氣上衝頭者循
咽上走空竅循眼系入絡腦出頰下客主人循牙車合陽
明并下人迎此胃氣別走於陽明者也故陰陽上下其動

也若一故陽病而陽脉小者為逆陰病而陰脉大者為逆故陰陽俱靜俱動若引繩相傾者病黃帝曰足少陰何因而動岐伯曰衝脉者十二經之海也與少陰之大絡起於腎下出於氣街循陰股內廉邪入膕中循脛骨內廉並少陰之經下入內踝之後入足下其別者邪入踝出屬跗上入大指之間注諸絡以溫足脛此脉之常動者也○動踰篇

咸切疑額字之誤

陽脉人迎脉也陰脉寸口脉也

經脉十二者伏行分肉之間深而不見其常見者足太陰過於外踝之上無所隱故也諸脉之浮而常見者皆絡脉也六經絡手陽明少陽之大絡起於五指間上合肘中飲酒者衛氣先行皮膚先充絡脉絡脉先盛故衛氣已平榮氣乃滿而經脉大盛脉之卒然動者比邪氣居之雷於本

末不動則熱不堅則陷且空不與衆同是以知其何脉之動也雷公曰何以知經脉之與絡脉異也黃帝曰經脉者常不可見也其虛實也以氣口知之脉之見者皆絡脉也雷公曰細子無以明其然也黃帝曰諸絡脉皆不能經大節之間必行絕道而出入復合於皮中其會皆見於外故諸刺絡脉者必刺其結上甚血者雖無結急取之以瀉其邪而出其血雷之發為痺也凡診絡脉脉色青則寒且痛赤則有熱胃中寒手魚際之絡多青矣胃中有熱魚際絡赤其暴黑者雷久痺也其有赤有黑有青者寒熱氣也其青短者少氣也凡刺寒熱者皆多血絡必間日而一取之血盡乃止乃調其虛實其小而短者少氣甚者瀉之則悶悶甚則休不得言悶急坐之也經脉篇

素黃帝曰夫絡脉之見也其五色各異青黃赤白黑不同

辨惑

其故何也岐伯曰經有常色而絡無常變也帝曰經之常也何如岐伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脉之色也黃帝曰絡之陰陽亦應其經乎岐伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行也寒多則凝沍凝沍則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤皆常色也謂之無病五色具見者謂之寒熱帝曰善經絡論篇靈經脉為裏支而橫者為絡絡之別者為孫盛而血者疾誅之盛者瀉之虛者飲藥以補之脉度篇素目受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝五臟生或篇許昌滑壽著十四經發揮釋經脉為曲絡脉為直經為榮氣絡為衛氣乃所以惑亂來學也謹按經云經脉十二伏行分肉之間深而不見諸脉浮而常見者皆絡脉

也又云諸絡脉不能經大節之間必行絕道而出入復合於皮又云當數者為經不當數者為絡今發揮謂手太陰脉其支從腕後出次指端交於手陽明者為手大陰絡手陽明脉其支從缺盆上挾口鼻交於足陽明者為手陽明絡凡十二經之支脉伏行分肉者皆釋為絡脉則是絡脉亦伏行分肉之間而不浮見亦能經大節而不行絕道亦當經脉一十六丈二尺內之數而非不當數也又按經云足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下耳後未嘗言其脉有曲折也今發揮謂足少陽脉起目銳眥作三折從目銳眥至完骨是一折又自完骨至睛明是一折自睛明至風池是一折則是內經以經脉之曲折朦朧者為直行也又按經云水穀入於胃也其氣分為三隧故宗氣積胷中出喉嚨而行呼吸焉榮氣

者沁其津液注之於脉化以爲血以榮四末內注五臟
六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而皆行於
四末分肉皮膚之間而不休者也又云衛出於上焦常
與榮俱晝行於陽二十五周夜行於陰二十五周故至
平旦五十周復與榮氣大會於手太陰矣此言衛氣與
榮氣相會未嘗及宗氣今發揮謂氣行一萬二千五百
息脉行八百十丈適當寅時復會於手太陰則是將積
於胃中呼吸與榮周相會之宗氣牽合作晝行陽夜行
陰與榮五十周方會之衛氣也乖舛經義罪孰甚焉
陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實陰道虛
陰在內陽之守也陽在外陰之使也應象論
陰者藏精而起亟也陽者衛外而爲固也通天論
靈內有陰陽外亦有陰陽在內者五臟爲陰六腑爲陽在

陰陽表裏

外者筋骨爲陰皮膚爲陽壽夭剛柔篇

靈足太陽與少陰爲表裏少陽與厥陰爲表裏陽明與太
陰爲表裏是爲足之陰陽也手太陽與少陰爲表裏少陽
與心主爲表裏陽明與太陰爲表裏是爲手之陰陽也血氣

形志篇

脉度

靈黃帝問於伯高曰脉度言經脉之長短何以立之伯高
曰先度其節骨之大小廣狹長短而脉度定矣黃帝曰願
聞衆人之度人長七尺五寸者其骨節之大小長短各幾
何伯高曰頭之大骨圍二尺六寸胸圍四尺五寸腰圍四
尺二寸髮所覆者顛至項一尺二寸髮以下至頤長一尺
君子終折結喉以下至缺盆中長四寸缺盆以下至髑髏
長九寸過則肺大不滿則肺小髑髏以下至天樞長八寸
過則胃大不及則胃小天樞以下至橫骨長六寸半過則

迴腸廣長不滿則狹短橫骨長六寸半橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半內輔下廉下至內踝長一尺三寸內踝以下至地長三寸半膝膈以下至跗屬長一尺六寸跗屬以下至地長三寸故骨圍大則太過小則不及角以下至在骨長一尺行腋中不見者長四寸腋以下至季脇長一尺二寸季脇以下至髀樞長六寸髀樞以下至膝中長一尺九寸膝以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長三寸京骨以下至地長一寸耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸兩顴之間相去七寸兩乳之間廣九寸半兩髀之間廣六寸半足長一尺二寸廣四寸半肩至肘長一尺七寸肘至腕長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至其末長四寸半項髮以下至背骨長二寸半脊骨以下至

裏藏
府度

尾骶二十一節長三尺上節長一寸四分分之一奇分在下故上七節至於脊骨九寸八分分之七此衆人骨之度也所以立經脉之長短也骨度篇○髑許
竭切髑云居切唇至齒長九分口廣二寸半齒以後至會厭深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二寸半咽門重十兩廣二寸半至胃長一尺六寸胃結曲屈伸之長二尺六寸大一尺五寸徑五寸大容二斗五升小腸後附脊左環迴周疊積其注於迴腸者外附於臍上迴運環十六曲大二寸半徑八分分之少半長三丈三尺迴腸當臍左環迴周葉積而下迴運環反十六曲大四寸徑一寸寸之少半長二丈一尺廣膠傳脊以受迴腸左環葉脊上下辟大八寸徑二寸寸之太半長二尺八寸腸胃所入至所出長六丈四寸四分迴曲環反三十二曲也腸胃
論

難七衝門何在然唇為飛門齒為戶門會厭為吸門胃為賁門太倉下口為幽門大腸小腸會為闌門下極為魄門故曰七衝門也四十

上下素腰以上為天腰以下為地

三焦難上焦者在心下下膈在胃上口主內而不出其治在膻

中玉堂下一寸六分直兩乳間陷者是中焦者在胃中

脘不上不下主腐熟水穀其治在臍傍下焦者在臍下

當膀胱上口主分別清濁王出而不內以傳導也其治在

臍下一寸三十

靈黃帝曰願聞榮衛之所行皆何道從來岐伯荅曰榮出

於中焦衛出於上焦黃帝曰願聞三焦之所出岐伯荅曰

上焦出於胃上口並咽以上貫膈而布胃中走腋循太陰

之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與榮俱行於陽

二十五度行於陰亦二十五度一周也故五十度而復大

會於手太陰矣黃帝曰願聞中焦之所出岐伯荅曰中焦

亦並胃中出上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其

精微上注於肺脉乃化而為血以奉生身莫貴於此故獨

得行於經隧命曰榮氣黃帝曰夫血之與氣異名同類何

謂也岐伯荅曰榮衛者精氣也血者神氣也故血之與氣

異名同類焉故奪血者無汗奪汗者無血故人生有兩死

而無兩生黃帝曰願聞下焦之所出岐伯荅曰下焦者別

迴腸注於膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成糟

粕而俱下於大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦

而滲入膀胱焉黃帝曰善余聞上焦如霧中焦如漚下焦

如瀆此之謂也榮衛生會篇

海藏頭至心為上焦心至臍為中焦臍至足為下焦此三

焦者足太陽之別也。又靈樞經云：膺下膀胱至足爲足三焦，右手尺脈爲命門與包絡脈同診。此包絡亦有二焦之稱，爲命門之火游行於五臟之間，主持乎內，手三焦主持乎上，足三焦主持乎下，上中下三焦通爲一氣，衛於一身，爲外護。既云頭至心，心至臍，臍至足，是有狀也，呼爲三焦，是有名也，以爲無狀可乎。經曰：三焦者，水穀之道路也，却是有形狀，何以然。上焦者，主內而不出，中焦者，主腐熟水穀，下焦者，主出而不內。故經曰：上焦如霧，中焦如漚，下焦如瀆也。手經者，主持上也，足經者，主持下也。命門者，主持內也，爲衛者，主持外也。三焦真氣爲父氣，散於包絡，相從母也，並行而不相離，母之真氣也，故俱會於胃中。經云：膻中之分，父母居之，氣之海也。如天地之尊，不係五行也。清邪中於上焦，名曰潔也。頭項強，腰脊痛，濁邪中於下焦，名

曰渾也。陰氣爲慄，便溺妄出，表虛裏急。上焦下焦與中焦相混，上焦怫鬱，臟氣相薰，中焦不治，衛氣上衝，榮氣不通，血凝不流。若衛氣前通者，小便赤黃，與熱相搏，因熱作使，遊於經絡，出入臟腑，陰氣前通，陽氣後微，陰無所使，客氣內入，噫而出之，聲嗚咽，寒厥熱壅，必下血，陰陽俱厥，脾弱液下，下焦不固，清便下重，便數而難，腹築湫痛，命將難全。此命門之脈，診在右手尺也。經曰：五臟不和，五液不下，當鬮不鬮，便溺俱脫，生氣絕矣。所以腹臍湫痛也。故曰：命將難全。前三焦自外而入，後三焦自內而出，霧不收，則爲喘滿，此出而不內也。漚不利，則爲留飲，留而不散，久爲中滿，上不能內，下不能出也。瀆不利，則爲腫滿，此因上內而下不出也。此三焦之所不歸也。三焦有臟而無腑，在內則游行是血也，在外則固護是氣也。上焦如霧者，氣也。中焦

如漚者血也中焦者血氣之分也下焦在臍膀胱上口主
分別清濁出而不納卽傳道也治在臍下名曰三焦其腑
在氣街中又云有臟無腑成氏云血室者血之所居也榮
衛停止之所經脉流會之處衝脉是矣夫衝者竒經之一
也起於腎下出於氣街並足陽明經挾臍上行至胷中而
散焉爲諸經之海也

啓玄子云衝爲血海諸經朝會男子則運而行之女子則
停而止之是皆謂之血室內經云任脉通衝脉男既運行
女既停止故運行者無積而不滿動也停止者有積而能
滿靜也不滿者陽也氣也能滿者陰也血也故滿者以時
而溢爲之信有期者動也乾道成男坤道成女故運行者
陽之象也停止者陰之象也血氣榮衛男女皆有內外諧
和其脉同診脉者血之府也故爲氣血之室爲藏物之舍

亦爲府也三焦之府在氣街中爲男女血海之府經又曰
有臟而無腑從無形而言之也有臟而有腑從有形而言
之也清邪濁邪所傷三焦齊病亦同兩感經云心包絡主
之脉出胷中下膈歷絡三焦此其所以與相火並行與命
門脉同診於右尺中也東垣云三焦有名無形主持諸氣
以象三才之用故呼吸升降水穀往來皆待此以通達是
以上焦在心上主內而不出中焦在胃脘主腐熟水穀下
焦在臍下主分別清濁出而不內統而論之三才之用本
於中焦中焦者胃脘也稟天五之冲氣陰陽清濁自此而
分十二經絡自此而始或不得其平則寒熱偏勝虛實不
同榮衛澁滯清濁不分而生諸病故曰氣會三焦手少陽
脉通於臆中臆中者臣使之官爲氣之海審此則知三焦
者冲和之本也三焦相火及包絡之脉人之元氣也周身

陰陽受病之初

何處無之是名相火用事主持陰陽之氣神明之府也

素夫自古通天者生之本此九字着意玩味王太僕云論天謂元氣即天真也本於

陰陽天地之間六合之內其氣九州九竅五臟十二節皆

通乎天氣其生五其氣三數犯此者則邪氣傷人此壽夭

之本也蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊

邪弗能害也此因時之序故聖人傳精神服天氣而通神

明失之則內閉九竅外壅肌肉衛氣散解此謂自傷氣之

削也陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰故天運當

以日光明是故陽因而上衛外者也陽主動凡人之知覺

皆陽氣薰膚充身澤毛若霧露之溉而充之耳若陽氣一

失其所則散解不行而薰光澤漸之遺道所以九竅閉塞

于內肌肉壅滯于外而知覺運動視聽言嗅之靈皆失也

故人之靈明壞不彰壽命易折猶因於寒欲如運樞起居

天之失光明則萬物無以發生也因於寒欲如運樞起居

如驚神氣乃浮丹溪云欲如運樞以下二句皆衍文也下

寒邪初傷客於肌表邪鬱而為熱有似燔

喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散丹溪云君火為病也

短為拘弛長為痿其位高而氣清其體虛故聰明得而係

馬濁氣薰蒸清道不通沉重而不爽利似乎有物以蒙目

能養筋故為拘攣小筋弛張者濕傷筋不能束骨故為痿

弱因而濕首如果各三字為句濕熱不接以下各四字為

句文整而意明王太僕謂反濕其首若濕物裹之以因於

濕首為句如裹為句則濕首之濕如裹濕之濕皆是入為

文義并因於氣為腫四維相代陽氣乃竭陽氣者煩勞則

張精絕辟積於夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以

聽潰潰乎若壞都汨汨乎不可止辟偏也蓋陽者視聽動

清靜則視聽動作所張之精竭絕偏枯至夏月而劇故目

聾耳閉而視所失潰潰汨汨而動作廢正仲景所謂春夏

劇秋冬瘥之病俗人名曰注夏者是也或曰鄭康成云口

鼻之呼吸為竟耳目之聰明為鬼夫鬼者陰血也可目之

聰明乃陰血所為今經言陽氣煩勞則目盲耳閉者何也

曰以耳目與口鼻對言則口鼻為陽耳目為陰以耳目口

鼻與臟腑對言則耳目口鼻為陽臟腑為陰故陽氣行陽
二十五度於身體之外則耳目口鼻皆受陽氣所以能知
覺視聽動作而寤行陰二十五度於臟腑之內則耳目口
鼻無陽氣運動所以不能知覺而寤聽明者豈非陽氣為
之乎夫人之耳目猶月之廣也月質必受日光所加始能
明耳目亦必受陽氣所加始能聰明是故耳目之陰血虛
則陽氣之加無以受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛
則陰血不能自施而聰明亦失是故耳目之聰明必陰血
能視聽也陽氣者大怒則形氣絕而血苑於上使人薄
厥有傷於筋縱其若不容汗出偏沮使人偏枯汗出見濕
乃生痙痺膏粱之變足生大疔受如持虛勞汗當風寒薄
為鼓鬱乃痙王註云苑積也鼓曰粉刺陽氣者精則養神
柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大倭榮氣不從逆於
肉理乃生癰腫陷脉為痿留連肉腠腠氣化薄傳為善畏
及為驚駭榮氣不從逆于肉理乃生癰腫十二字舊本元
誤在及為驚駭之下夫陽氣因失衛而寒氣從
之為倭然後榮氣逆而為癰腫癰腫失治然後陷脉為鬼
痿而陷留連於肉矣焉○倭力主切背俯不能仰也
汗未盡形弱而氣燥穴俞以閉發為風瘡故風者百病之

七情傷氣

始也清淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此因時
之序也故病久則傳化上下不并良醫弗為故陽蓄積病
死而陽氣當隔隔者當瀉不亟正治愈乃敗之生氣通天論
帝曰余知百病生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消
恐則氣下寒則氣收炆則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則
氣結九氣不同何病之生岐伯曰怒則氣逆甚則嘔血及
殮泄故氣上矣喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則
心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣
消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣
不行矣寒則腠理閉氣不行故氣收矣炆則腠理開榮衛
通汗大泄故氣泄矣驚則心無所倚神無所歸慮無所定
故氣亂矣勞則喘息汗出外內皆越故氣耗矣思則心有
所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣舉痛篇

飲食傷陰

年四十而陰氣自半也起居衰矣陰陽應象論

陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷脾論

陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味生氣通天論

勞倦傷脾

垣勞倦所傷論 調經篇云陰氣生內熱岐伯曰有所勞

倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱

氣薰胃中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘息汗出外

內皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞倦皆損

其氣衰則火旺火旺則乘脾土脾主四肢故困熱無氣以

動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜

安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱火以酸味收其散氣

以甘溫調其中氣經言勞者溫之損者溫之是也仲景云

平人脉大為勞脉極虛亦為勞夫勞之為病其脉浮大乎

足煩熱春夏劇秋冬瘥脉大者熱邪也極虛者氣損也春

夏劇邪助時也秋冬瘥時勝邪也以黃芪建中湯補之此

亦溫之也夫上古聖人飲食有節起居有常不妄作勞故

能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去謂治未病也中

古以下去聖久遠飲食失節起居失宜妄作勞役形神俱

傷故病而後以藥之是治已病也推其百病之源皆因飲

食勞倦胃氣元氣散解不能滋榮百脉漑灌臟腑衛護周

身之所致也故蒼天之氣貴清淨陽氣惡煩勞則飲食喜

怒之間寒暑起居之際可不慎歟

右東垣勞倦所傷論餘論見治虛實法補中益氣湯方

條

素夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風

雨寒暑其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒調經篇

此陰陽以內外言之而總諸陰陽形氣之傷東垣先生

謂內外傷者是也謂男女飲食喜怒所傷者皆屬內為陰也諸寒溫風濕所傷皆屬外為陽也

於陰

靈夫百病之始生也皆生於風雨寒暑陰陽喜怒飲食居處大驚卒恐則血氣分離陰陽破散經絡厥絕脉道不通

於陰

陰陽相逆衛氣稽留經脉空虚血氣不次乃失其常口問素喜怒傷氣寒暑傷形暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上行滿

陰陽應象論

寒傷形

熱傷氣氣傷痛形傷腫故先痛而後腫者氣傷形也先腫而後痛者形傷氣也

此上二節經旨似自相矛盾既曰曰寒暑傷形又曰寒傷形熱傷氣者何也蓋言雖不一而理則有歸夫喜怒之傷人從外入而先著於形故曰寒暑傷形傷氣也寒暑之傷人從外入而先著於形故曰寒暑傷形也分而言之則怒之氣從下上而先發於陰故曰暴怒傷陰喜之氣從上下而先發於陽故曰暴喜傷陽寒則人氣內藏氣內藏則寒之傷人先著於形故曰寒傷形暑則人氣外溢氣外溢則暑之傷人先著於氣故曰熱傷氣也

五臟

陰陽

靈五臟者所以藏精神血氣菟兔者也六腑者所以化水穀而行津液者也本藏論

素五臟者藏精氣而不瀉也故滿而不實六腑者傳化物而不藏故實而不滿所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也五臟別論

平且至日中天之陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中之陰也合夜至鷄鳴天之陰陰中之陰也鷄鳴至平且

天之陰陰中之陽也故人亦應之夫言人之陰陽則外為陽內為陰言人身之陰陽則背為陽腹為陰言人身之臟腑中陰陽則臟者為陰腑者為陽肝心脾肺腎五臟皆為

陰膽胃大腸小腸膀胱三焦六腑皆為陽背為陽陽中之陽心也背為陽陽中之陰肺也腹為陰陰中之陰腎也腹

陽心也背為陽陽中之陰肺也腹為陰陰中之陰腎也腹

五藏通
四時五
行內應
六府七

為陰陰中之陽肝也腹為陰陰中之至陰脾也此皆陰陽
表裏內外雄雌相輸應也金匱真心者生之本神之變
也其華在面其克在血脉為陽中之太陽通於夏氣肺
者氣之本鼻之處也其華在毛其克在皮為陽中之太陰
通於秋氣腎者主蟄封藏之本精之處也其華在髮其
克在骨為陰中之少陰通於冬氣肝者罷極之本魂之
居也其華在爪其克在筋以生血氣此為陽中之少陽通
於春氣罷音疲脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本榮
之居也名曰器能化糟粕轉味而入出者也其華在唇四
白其克在肌此至陰之類通於土氣東垣云四白
當作四紅
凡十一臟取決於膽也六節臟
象論
東方生風風生木木生酸酸生肝肝生筋筋生心肝主目
其在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智玄生

靈

神神在天為風在地為木在體為筋在臟為肝在色為蒼
在音為角在聲為呼在變動為握在竅為目在味為酸在
志為怒怒傷肝悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸
南方生熱熱生火火生苦苦生心心生血血生脾脾主舌
其在天為熱在地為火在體為脉在臟為心在色為赤在
音為徵在聲為笑在變動為憂在竅為舌在味為苦在心
為喜喜傷心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣酸勝苦
中央生濕濕生土土生甘其生脾脾生肉肉生肺脾主口
其在天為濕在地為土在體為肉在臟為脾在色為黃在
音為宮在聲為歌在變動為噦在竅為口在味為甘在志
為思思傷脾怒勝思濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘
西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎肺
主鼻在天為燥在地為金在體為皮毛在臟為肺在色為

白在音為商在聲為哭在變動為欬在竅為鼻在味為辛
在志為憂憂傷肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦
勝辛

北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎腎生骨髓骨髓生肝腎
主耳其在天為寒在地為水在體為骨在臟為腎在色為
黑在音為羽在聲為呻在變動為慄在竅為耳在味為鹹
在志為恐恐傷腎思勝恐寒傷血燥勝寒鹹傷血甘勝鹹
天氣通於肺地氣通於嗑風氣通於肝雷氣通於心穀氣
通於脾雨氣通於腎六經為川腸胃為海九竅為水注之
氣以天地為之陰陽陽之汗以天地之雨名之陽之氣以
天地之疾風名之暴風象雷逆氣象陽故治不法天之紀
不用地之理則災害至矣陰陽應象論

靈肺合大腸大腸者傳道之府心合小腸小腸者受盛之

府肝合膽膽者中正之府脾合胃胃者五穀之府腎合膀
胱膀胱者津液之府少陽屬腎腎上連肺故將兩臟三焦
者中瀆之府水道出焉屬膀胱是孤之府也是六府之所

與合者

本輸篇

五臟常內閱於上七竅也故肺氣通於鼻肺和則鼻能知
香臭矣心氣通於舌心和則舌能知五味矣肝氣通於目
肝和則目能辨五色矣脾氣通於口脾和則口能知五穀
矣腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣五臟不和則七竅
不通六腑不和則雷為癱脈度論

難肝主色心主臭脾主味肺主聲腎主液鼻者肺之候而
反知香臭耳者腎之候而反聞聲其意何也然肺者西方
金也金生於巳巳者南方火也火者心心主臭故令鼻知
香臭腎者北方水也水生於申申者西方金也金者肺主

聲故令耳聞聲四十一

素心之合脉也其榮色也其主腎也肺之合皮也其榮毛也其主心也肝之合筋也其榮爪也其主肺也脾之合肉也其榮唇也其主肝也腎之合骨也其榮髮也其主脾也

五臟生五臟所主心主脉肺主皮肝主筋脾主肉腎主

骨是謂五主宣明五五臟化液心為汗肺為涕肝為淚

脾為涎腎為唾是為五液同上諸脉者皆屬於目諸髓者

皆屬於腦諸筋者皆屬於節諸血者皆屬於心諸氣者皆

屬於肺五臟生

難經言八會者何也府會太倉臟會季脇筋會陽陵泉髓

會絕骨血會膈膈會大杼脉會太淵氣會三焦外一筋

直兩乳內也熱病在內者取其會之氣穴也四十一

五臟素心者君主之官也神明出焉肺者相傳之官治節出焉

肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膻中

者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸

者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者

作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者

州都之官津液藏焉氣化則能出矣凡此十二官者不得

相失也故主明則下安以此養生則壽歿世不殆以為天

下則大昌主不明則十二官危使道閉塞不通形乃大傷

以此養生則殃以為天下其宗大危戒之戒之靈蘭秘

五臟所藏心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏志是謂五

臟所藏宣明五五精所并精氣并於心則喜并於肺則

悲并於肝則憂并於脾則畏并於腎則恐是謂五并虛而

相并者也憂當作怒畏

脾不帝曰脾不主時何也岐伯曰脾者土也治中央常以四時

長四歲各十八日寄治不得獨主於時也脾臟者常著胃
土之精也土者生萬物而法天地故上下至頭足不得主
時也

大陰陽
明論篇

五藏稟
氣於胃

靈黃帝曰願聞穀氣有五味其入五臟分別奈何伯高曰
胃者五臟六腑之海也水穀皆入於胃五臟六腑皆稟氣
於胃五味各走其所喜穀味酸先走肝穀味苦先走心穀
味其先走脾穀味辛先走肺穀味鹹先走腎穀氣津液已
行榮衛大通乃化糟粕以次傳下

五味
篇

人之所受氣者

穀也穀之所注者胃也胃者水穀氣血之海也海之所行
雲氣下者天也胃之所出氣血者經隧也經隧者五臟六
腑之大絡也食氣入胃散精於肝淫氣於筋

經脈
別論

食氣

入胃濁氣歸心淫精於脉脉氣流經經氣歸於肺肺朝百
脉輸精於皮毛毛脉合精行氣於府府精神明留於四臟

氣歸於權衡權衡以平氣口成寸以決死生 飲入於胃
遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸
膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為
常也

同上

火相
君相

丹溪相火論

太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜

而合而生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火
也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆
屬火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言
生於虛無守位稟命因其動而可見故謂之相天主生物
故恒於動人有所生亦恒於動其所以常於動者皆相火
助之也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣
也具於人者寄於肝腎二部肝屬木而腎屬水也膽者肝
之腑膀胱者腎之腑心包絡者腎之配三焦以焦言而下

焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能有生天之火雖出於木水而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而爲火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天也或曰相火天人之所同何東垣以爲元氣之賊又曰火與元氣不兩立一勝則一負然則如之何而可使之無勝負乎曰周子言神發知矣五性感動而萬事出有知之後五者之性爲物所感不能不動謂之動者卽內經五火也相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣內經以暑與熱言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈有甚於君火者也故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子亦曰必使道心常爲一

身之主而人心每聽命焉此善處乎火也人心聽命道心而又能主之以靜彼五火將寂然不作而相火惟有裨補造化以爲生生不息之運用爾何賊之有或曰內經相火註言少陰少陽矣未嘗言及厥陰太陽而吾子言之何也曰足太陽少陰東垣嘗言之矣治以炒栢取其味辛能瀉水中之火是也戴人亦言膽與三焦尋火治肝和包絡俱無異此歷指龍雷之火也予亦備述天人之火皆生於動如上文所云者實推廣二公之意或曰內經言火不一往徃於六氣中見之言臟腑者未之見也二公豈自有所據邪子能爲我言之乎經曰百病皆生於風寒暑濕燥火之動而爲變者岐伯歷舉病機一十九條而屬火者五此非相火爲病之出於臟腑者乎攷諸內經少陽病爲瘕瘕太陽病時眩仆少陰病脅瘕暴瘕鬱冒不知人非諸熱瘕瘕

諸病多屬火

之屬火者乎手少陽病惡寒鼓慄臆病振寒少陰病灑淅惡寒振慄厥陰病灑淅振寒非諸振鼓慄如喪神守之屬火者乎少陽病嘔逆厥氣上行膀胱病衝頭痛太陽病厥氣上衝胃少腹控牽引腰脊上衝心少陰病氣上衝胃嘔逆非諸逆衝上之屬火者乎少陽病譫妄太陽病譫妄膀胱病狂顛疾非諸燥狂越之屬火者乎少陽病附腫善驚少陰病齎熱吐酸附腫不能久立非諸病附腫疼酸驚駭之屬火者乎又原病式曰諸風掉眩屬於肝火之動也諸氣憤鬱病痿屬於肺火之升也諸濕腫滿屬於脾火之勝也諸痛痒瘡瘍屬於心火之用也是皆火之為病出於臟腑者然也注文未之發爾以陳無擇之通達且以暖熾論君火日用之火言相火而又不曾深及宜乎後人之不無聾瞽也悲夫

諸病始
子胃虛

東垣胃虛則臟腑經絡俱病論 針經本輸曰手陽明大

腸手太陽小腸皆屬足陽明胃小腸之穴在巨虛下廉大腸之穴在巨虛上廉此二穴皆在足陽明胃二里穴下也大腸主津小腸主液大腸小腸受胃之榮氣乃能行津液於上焦漑灌皮毛充實腠理若飲食不節胃氣不及大腸小腸無所稟受故津液涸竭焉內經曰耳鳴耳聾九竅不利腸胃之所生也此胃弱不能滋養手太陽小腸手陽明大腸故有此證然亦止從胃弱而得之故聖人混言腸胃之所生也或曰子謂混言腸胃所生亦有據乎予應之曰經云脾不及令人九竅不通謂脾為至陰受胃之陽氣能上升水穀之氣於肺充溢皮毛散入四臟今脾無所稟不能行氣於臟腑故有此症此則脾虛九竅不通之謂也雖曰脾虛亦胃之不足所致耳或曰經云五臟不利則九竅

不通此不言脾不言腸而言五臟何也予曰此說與上二說無以異也蓋謂脾不受胃之稟命致五臟所主九竅不能上通天氣皆閉塞不利故以五臟言之此三者止是胃虛所致耳然亦何止於此胃虛則五臟六腑十二經十五絡四肢皆不得榮運之氣而百病生焉豈一端盡之乎真氣又名元氣乃先身生之精氣也非胃氣不能滋之胃氣者穀氣也榮氣也運氣也生氣也清氣也衛氣也陽氣也又天氣人氣地氣乃三焦之氣分而言之則異其實一也不當作異名異論而觀之飲食勞役所傷自汗小便數陰火乘土位清氣不生陽道不行乃陰血伏火况陽明胃土右燥左熱故化燥火而津液不能停且小便與汗皆亡津液津液至中宮變化為血者也血者脉之腑也血亡則七神何依百脉皆從此中變來也人之百病莫大於中風

有汗則風邪客之無汗則陽氣固密腠理閉拒諸邪不能傷也或曰經云陽不勝其陰則五臟氣爭九竅不通又脾不及則令人九竅不通名曰重強又五臟不和則九竅不通又頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也請析而解之谷曰夫脾者陰土也至陰之氣主靜而不動胃者陽土也主動而不息陽氣在於地下乃能生化萬物故五運在上六氣在下其脾長一尺掩太倉太倉者胃之上口也脾受胃稟乃能薰蒸腐熟五穀者也胃者十二經之源水穀之海也平則萬化安病則萬化危五臟之氣上通九竅五臟稟受氣於六腑六腑受氣於胃六腑者在天為風寒燥濕暑火此無形之氣也胃氣和平榮氣上升始主濕熱濕熱者春夏也行陽二十五度六陽升散之極下而生陰陰降則下行為秋冬行陰道為寒涼也胃既受病不能滋養故六

腑之氣絕以致陽道不行陰火上行五臟之氣各受一腑之化乃能滋養皮膚血脈筋骨故言五臟之氣已絕於外是六腑生氣先絕五臟無所稟受而氣後絕矣肺本收下又主五氣氣絕則下流與脾土壘於下焦故曰壘強胃氣既病則下溜經曰濕從下受之脾為至陰本乎地也有形之土下填九竅之源使不能上通於天故五臟不和則九竅不通胃者行清氣而上即地之陽氣也清陽成天曰清陽出上竅曰清陽實四肢曰清陽發腠理者也脾胃既為陰火所乘穀氣閉塞而下流即清氣不升九竅為之不利胃之一腑病則十二經元氣皆不足也氣少則津液不行津液不行則血虧故筋骨皮肉血脈皆弱是氣血俱羸弱矣勞役動作飲食飢飽可不慎乎凡有此病者雖不變易他疾已損其天年更加之針灸用藥差悞欲不夭枉得乎

陽不密則外邪入傷五臟

素凡陰陽之要陽密乃固兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是謂聖度故陽強不能密陰氣乃絕陰平陽秘精神乃治陰陽離缺精氣乃絕因於露風乃生寒熱是以春傷於風邪氣留連乃為洞泄夏傷於暑秋為痲瘧秋傷於濕上逆而欬發為痿厥冬傷於寒春必溫病四時之氣更傷五臟生氣通天論

黃帝問曰天有八風經有五風何謂岐伯對曰八風發邪以為經風觸五臟邪氣發病所謂得四時之勝者春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春所謂四時之勝也東風生於春病在肝肺在頸項南風生於夏病在心肺在胃脇西風生於秋病在肺肺在肩背北風生於冬病在腎肺在腰股中央為土病在脾肺在脊故春氣者病在頭夏氣者病在臟秋氣者病在肩背冬氣者病在四肢故春善病

軌衄仲夏善病胃脇長夏善病洞泄寒中秋善病風瘧冬
善病痺厥故冬不按躺春不軌衄春不病頸項仲夏不病
胃脇長夏不病洞泄寒中秋不病風瘧冬不病痺厥殭泄
而汗出也夫精者身之本也故藏於精者春不病溫金匱
真言

論○按躺二字非衍文其上下必有脫
簡蓋即冬不藏精者春必瘟病之義也

五勞傷
五味傷

五勞所傷久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行
傷筋是謂五勞所傷宣明五
氣篇多食鹹則脉凝泣而變色

多食苦則皮槁而毛拔多食辛則筋急而爪枯多食酸則
肉胝膈而脣揭多食甘則骨痛而髮落此五味之所傷也

五臟生
成篇

靈黃帝曰酸走筋多食之令人癢何也少俞曰酸入於胃
其氣澁以收上之兩焦不能出入也不出即留於胃中胃
中和溫則下注膀胱膀胱之胞薄以懦得酸則縮繆約而

不通水道不行故癢陰者積筋之所終也故酸入而走筋
矣黃帝曰鹹走血多食之令人渴何也少俞曰鹹入於
胃其氣上走中焦注於脉則血氣走之血與鹹相得則凝
凝則胃中汁注之注之則胃中竭竭則咽路焦故舌本乾
而善渴血脉者中焦之道也故鹹入而走血矣黃帝曰
辛走氣多食之令人洞心何也少俞曰辛入於胃其氣走
於上焦上焦者受氣而榮諸陽者也姜韭之氣薰之榮衛
之氣不時受之久留心下故洞心辛與氣俱行故辛入而
與汗俱出黃帝曰苦走骨多食之令人變嘔何也少俞
曰苦入於胃五穀之氣皆不能勝苦苦入下腕三焦之道
皆閉而不通故變嘔齒者骨之所終也故苦入而走骨故
入而復出知其走骨也黃帝曰甘走肉多食之令人愧
心何也少俞曰甘入於胃其氣弱不能上至於上焦而

與穀留於胃中者令人柔潤者也胃柔則緩緩則虫動虫

天邪害歲食邪

素天之邪氣感則害人五臟水穀之寒熱感則害人六腑

外傷入府內傷入藏

地之濕氣感則害人皮肉筋脉陰陽應象論 疢賊風虛邪者

陽邪從頭面入

陽受之則入五臟入六腑則身熱不時臥上為喘呼入五

陰邪從筋入

臟則填滿閉塞下為殮泄久為腸癰大陰陽明論

滯於府

靈黃帝問曰邪氣之中人也柰何岐伯答曰邪氣之中人

高下也黃帝曰高下有度乎岐伯曰身半已上者邪中之

也身半已下者濕中之也故曰邪之中人也無常中于陰

則滯于府中于陽則滯於經黃帝曰陰之與陽也異名同

類上下相會經絡之相貫如環無端邪之中人或中於陰

或中於陽上下左右無有恒常其故何也岐伯曰諸陽之

會皆在於面中人也方乘虛時及新用力若飲食汗出腠

理開而中於邪中於面則下陽明中於項則下太陽中於

頰則下少陽其中於膺背兩脇亦中其經黃帝曰其中於

陰柰何岐伯曰中於陰者常從臂胫始夫臂與胫其陰皮

薄其血淖澤故俱受於風獨傷其陰黃帝曰此故傷其臟

乎岐伯曰身之中於風也不必動臟故邪入於陰經則臟

氣實邪氣入而不能容故還之於腑故中陽則滯於經中

陰則滯於腑黃帝曰邪之中人臟柰何岐伯曰愁憂恐懼

則傷心形寒飲冷則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣

逆而上行有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不下積

於脇下則傷肝有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾有

所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎黃帝曰五臟

之中風柰何岐伯曰陰陽俱感邪乃得往邪氣臟腑病形篇 黃

邪氣中人深淺

帝曰有一脉生數十病者或痛或癱或熱或寒或痒或痺或不仁變化無窮其故何也岐伯曰此皆邪氣之所生也帝曰余聞氣者有真氣有正氣有邪氣何謂真氣岐伯曰真氣者所受於天與穀氣并而充身也正氣者正風也從一方來非實風又非虛風也邪氣者虛風之賊傷人也其中人也深不能自去正風者其中人也淺合而自去其氣來柔弱不能勝真氣故自去虛邪之中人也灑淅動形起毫毛而發腠理其入深內搏於骨則為骨痺搏於筋則為筋攣搏於脉中則為血閉不通則為癰搏於肉與衛氣相搏陽勝者則為熱陰勝者則為寒寒則真氣去去則虛虛則寒搏於皮膚之間其氣外發腠理開毫毛搖氣行來行則為痒留而不去則為痺衛氣不行則為不仁

刺節真邪篇

醫學綱目卷之一

醫學綱目卷之二

陰陽臟腑部

諸脉診病雜法

診難經言望而知之謂之神聞而知之謂之聖問而知之者謂之工切脉而知之者謂之巧何謂也望而知之者望見其五色以知其病聞而知之者聞其五音以別其病問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也切脉而知之者診其寸口視其虛實以知其病在何臟腑也經言以外知之曰聖以內知之曰神此之謂也

診法當以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調勻氣脉未亂故乃可診有過之脉切脉動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六腑強弱形之衰盛以此參伍決死生之分

脉要精微論

望

丹經曰診脉之道觀人勇怯肌肉皮膚能知其情以為法

也凡人形長不及短大不及小肥不及瘦人之色白不及黑嫩不及蒼薄不及厚而况肥人濕多瘦人火多白者肺氣虛黑者腎氣足形色既殊臟腑亦異外證雖同治法迥別所以肥人責脉浮瘦人責脉沉躁人責脉緩緩人責脉躁不可一槩觀之

仲景云肥人當沉今反浮瘦人當浮今反沉故責之

聞善診者察色按脉先別陰陽審清濁而知部分視喘息

聽音聲而知所苦觀權衡規矩而知病所主按尺寸觀浮

沉滑澁而知病所生以治無過以診則不失陰陽應象論

問閉戶塞牖繫之病者數問其情以從其意得神者昌失神

者亡移精變氣論必審問其所始病與今之所方病而後各

切切循其脉視其經絡浮沉以上下逆從循之三部九候論凡

未診病者必問嘗貴後賤雖不中邪病從内生名曰脫榮

書病屬
夜病屬
血病屬

嘗富後貧名曰失精五氣留連病有所并醫工診之不在臟腑不變軀形診之而疑不知病名身體日減氣虛無精病深無氣灑灑然時驚病深者以其外耗於衛內奪於榮良工所失不知病情五經論

東垣百病晝則增劇夜則安靜是陽病有餘乃氣病而血

不病也夜則增劇晝則安靜是陰病有餘乃血病而氣

不病也晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也

晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷入陰中也名曰熱

入血室晝則發熱煩躁夜亦發熱煩躁是重陽無陰當

亟瀉其陽峻補其陰夜則惡寒晝則安靜是陰血自旺

於陰分也夜則安靜晝則惡寒是陰氣上溢於陽中也

夜則惡寒晝亦惡寒是重陰無陽當急瀉其陰峻補其

陽晝則惡寒夜則煩躁飲食不入名曰陰陽交錯者死

左主血
右主氣

矣

肺主氣其脉居右寸脾胃命門三焦各以氣為變化運
用故皆附焉心主血其脉居左寸肝膽腎膀胱皆精血之
隧道筦庫故皆附焉男以氣成胎則氣為之主女挾血成
胎則血為之主男子病右脉克於左者有胃氣也病雖重
可治女子病左脉克於右者有胃氣也病雖重可治反此
者虛之甚也

脉候陰

素脉有陰陽知陽者知陰知陰者知陽凡陽有五五三
十五陽所謂陰者真藏也見則為敗敗必死也所謂陽者
胃脘之陽也別於陽者知病處也別於陰者知死生之期
三陽在頭三陰在手所謂一也別於陽者知病忌時別於
陰者知死生之期陰陽別論○王註曰頭謂人迎脉在結
喉兩傍一寸五分手謂氣口脉在手魚
際之後一寸兩者相應俱往俱來若引
繩小大齊等者曰平人故言所謂一也別於陽者知病

脉狀陰
陽相反

從來別於陰者知死生之期

王機真
藏論

靈氣口候陰人迎候陽

四時
氣論

素謹熟陰陽無與衆謀所謂陰陽者去者為陰至者為陽

靜者為陰動者為陽遲者為陰數者為陽

陰陽
別論

諸浮不躁者皆在陽則為熱其有躁者在手

但浮不躁則
病在足陽脉

之中其有躁者病
在手陽脉之中

諸細而沉者皆在陰則為骨痛其有

靜者在足脉要精微論○沉細而躁者病生於手
陰脉之中靜者病生於足陰脉之中也

脈經浮脉按之不足舉之有餘沉脉舉之不足按之有

餘遲脉呼吸三至去來極遲數脉去來促急一至六
七至

虛脉遲大而軟按之不足指下豁豁然空實脉大而

長微強按之隱指幅幅然一日舉
按有力緩脉去來亦遲小駛

於遲一日浮
大而軟緊脉數如切繩狀一日如轉
索之無常洪脉極大

在指下細脉小甚似無而有滑脉往來前却流利展

轉替替然與數相似一日鹿鹿如欲脫○仲景云翁奄沉為滑沉為純陰翁為正陽陰陽和合
故名曰滑許學士云仲景此三字論滑脈是也翁合也主張而復合也奄沉言忽降而下也方翁而合俄降而下奄謂奄忽之間仲景論滑脈可謂諦矣
滑脈細而遲往來難且散或一止復來一日短而止脈訣云如刀刮竹痕陳無擇云如雨沾沙
弦脈舉之無有按之如弓弦狀弦而不大為弦
革脈有似沉伏實大而長微弦陳無擇云如按鼓皮仲景云弦而大
軟脈極軟而浮細作軟一
弱脈極軟而沉細按之欲絕指下結脈往來緩時一止復來仲景云脈來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脈難治
促脈來去數時一止復來 芤脈浮大而軟按之中央空兩邊實 微脈極細而軟或時欲絕若有若無 動脈見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖 伏脈極重指按之着骨乃得 散脈大而散散者氣實血虛有表無裏代脈來數而中止不能自還因而復動脈結者生代者死

右陰陽相反脈狀者以王氏經文之脈形狀移置如陳氏三因云脈偶也蓋浮沉相反浮主表病屬陽沉主裏病屬陰也遲數相反遲主寒并病及陽氣虛數主熱并病及血虛也虛實相反虛主血氣虛實主血氣實也洪細相反洪主血氣多細主血氣少也滑濇相反滑主血實氣虛濇主氣實血虛也緩緊相反緩主虛熱與緩縮也強革與濡弱相反強革主虛寒濡弱主虛熱與緩緊同法推也結促相反結主陰盛促主陽盛也浮數實緊洪滑強革芤散屬陽沉遲虛緩細濇軟弱結微動伏代屬陰後賢因別陽脈為七表陰脈為八裏也

脈狀陰陽相類

- 浮與芤相類
- 革與實相類
- 軟與弱相類
- 弦與緊相類
- 沉與伏相類
- 滑與數相類
- 微與濇相類
- 緩與遲相類

陰陽相
及病症

氣證則飲水 血證不飲水 氣病則麻 血病則
痛 無陽則厥 無陰則嘔 陰證身靜重語無聲氣難
布息目睛不了了鼻中呼不出吸不入往來口與鼻中氣
冷水漿不入大小便不禁而止惡寒有如刀刮 陽證身
動輕語有聲目睛了了鼻中呼吸出入能往能來口與鼻
中氣皆熱

奇經脈
狀

診兩手脈浮之俱有陽沉之俱有陰陰陽皆實盛者此為
衝督之脈也衝督之脈者十二經之道路也衝督用事則
十二經不復朝於寸口其人皆苦恍惚狂癡不者必當猶
豫有兩心也 兩手陽脈浮而細微綿綿不可知俱有陰
脈亦復細微綿綿此為陰蹻陽蹻之脈也此家會有病鬼
魅風死苦恍惚亡人為禍也 尺寸脈俱浮直上直下此
為督脈腰背強痛不得俛仰大人癩病小兒風癩疾 尺

奇經病
狀

寸脈俱牢一作直上直下此為衝脈胃中有寒也

奇經之為病何如然陽維維於陽陰維維於陰陰陽不
能自相維則悵然失志溶溶不能自收持陰蹻為病陽蹻
而陰急陽蹻為病陰緩而陽急衝之為病逆氣而裏急督
之為病脊強而厥素問作脊
強反折任之為病其內苦結男子為
七疝女子為瘕聚帶之為病腹滿腰溶溶若坐水中陽維
為病苦寒熱陰維為病苦心痛此奇經八脈之為病也

九難

陰陽辨
惑

辨陽滯於陰陰滯於陽論○精要云陽滯於陰脈浮洪弦
數陰滯於陽脈沉細弱瀉陽滯以寒治之陰滯以熱治之
竊詳其意陽滯陰滯當作熱滯寒滯求之寒熱固可作陰
陽論能於陰於陽分明是於氣血他無可言也熱滯於氣
固矣獨無寒滯耶寒滯於血固矣獨無熱滯耶何寒不能

傷氣何熱不能傷血耶以愚觀之氣為陽行脉外血為陰行脉內相並分派周流循環一身無停止謂之脉一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉共得六寸一身通七尺五寸行得八百一十丈得熱則行速為太過得寒則行遲為不及五味之偏七情之過氣為凝滯津液稠厚積而久之為飲為痰滲入脉內血為所亂因而凝濁運行泣注或為沸騰此陰滯於陽也正是血滯於氣也氣病矣或以藥助邪病上生病血病日增溢出脉外隧道隘塞升降有妨運化失令此陽滯於陰也正是氣滯於血也病分寒熱者當是稟受之素偏虛邪之雜合豈可專以陽為熱陰為寒耶浮洪弦數氣病之脉也豈可遽作熱論沉細弱瀦血病之脉也豈可遽作寒論此萬病之根本豈止疥癬瘡瘍癰疽而已幸相評其是否注胡故切閉塞也

表裏

素寸口脉沉而堅者曰病在中寸口脉浮而盛者曰病在

外平人氣象論下同海藏云脉浮為表浮之實大沉之深損小是為表也浮之實大沉之亦然即非表也邪已入矣脉盛滑堅者病在外脉小實而堅者病在內

靈氣口主中人迎主外禁服人迎盛堅者傷於寒氣口

盛堅者傷於食五色篇

右氣口脉謂兩手掌後手太陰之脉也人迎脉謂挾喉兩傍足陽明之脉也

內外傷辨

海辨內外傷傷風鼻中氣出龕合口不開肺氣通乎天

也傷食口無味津液不減鼻息氣勻脾氣通乎地也外傷一身盡熱先太陽也自內而之外者先無形也內傷

手足不和兩脇俱熱先少陽也從內之外者先有形也

內外俱傷人迎氣口俱盛或舉按皆實大表發熱而惡寒腹不和而口液此內外兩傷也凡診則必捫手心手背

手心熱則內傷，手背熱則外傷，次以脈別之。

三部所主

脈有三部九候，各有所主之然。三部者，寸關尺也。九候者，浮中沉也。上部法天，主胃以上至頭；有疾，中部法人主膈下至臍；有疾，下部法地，主臍以下至足；有疾，宜審刺活人。凡初下指，先以中指端按得關位，掌後高骨為關，乃齊下前後二指為三部。脈前指寸口也，後指尺部也。若人臂長，乃踈下指；臂短，則密下指。若先診寸口，浮按消息之，次中按消息之，次重按消息之，次上竟消息之，次下竟消息之，次推指外消息之，次推指內消息之。凡診脈以氣息平定，方下指，以一呼一吸為一息，其一息之間，脈息四至，或五至，不大不小，與所屬部分四時相應者，為平和脈矣。過則為至，不及則為損，損至之脈，難經諱言之矣。仲景曰：吸而微數，其病在中焦實也；當下之，即愈。虛者不

治在上焦者，其吸促；在下焦者，其吸遠。此皆難治，呼吸動搖振振者不治。

素五臟不平，六腑閉塞之所生也。

通評虛實論

屬腑所

難何以別知臟腑之病也？然數者，腑也；遲者，臟也。數則為熱，遲則為寒。諸陽為熱，諸陰為寒。故以別知臟腑之病也。

九病有欲得溫者，有欲得寒者；有欲得見人者，有不欲

得見人者，而各不同。其病在何臟腑，然病欲得寒而欲得見人者，病在腑也；病欲得溫而不欲得見人者，病在臟也。何以言之？腑者，陽陽病欲得寒，又欲見人，臟者，陰陰病欲得溫，又欲閉戶獨處，惡聞人聲，故以別知臟腑之病也。

難臟腑發病，根本等，不然不等也。柰何？然臟病者，止而

不移，其病不離其處；腑病者，彷彿貴嚮，上下行流，居處無

常五十一

連氣病機

帝曰夫百病之生也皆生於風寒暑濕燥火之化之變也經言盛者瀉之虛者補之余錫以方士而方士用之尚未能十全余欲令要道必行桴鼓相應由拔刺雪汚功巧神聖可得聞乎岐伯曰審察病機無失氣宜此之謂也帝曰願聞病機何如岐伯曰諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣贖鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱瞀瘵皆屬於火諸痛痒瘡皆屬於心諸厥固泄皆屬於下諸痿喘嘔皆屬於上諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸瘧項強皆屬於濕諸逆衝上皆屬於火諸脹腹大皆屬於熱諸躁狂越皆屬於火諸暴強直皆屬於風諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱諸病肘腫疼酸驚駭皆屬於火諸轉反戾水液混濁皆屬於熱諸病水液澄徹清冷皆屬於寒諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱故大要曰謹守病機各司其屬

有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝踈其

血氣令其調達而致和平此之謂也

至真要大論

右病機一十九條實察病之要旨而有者求之無者求之盛者責之虛者責之一十六字乃各篇首盛者瀉之虛者補之之旨而總結病機一十九條之義又其要旨中之要旨也河間原病式但用病機一十九條立言而遺此一十六字猶有舟無操舟之工有兵無將兵之帥不免臨病之際湯劑悞投致人夭折今負僭踰引經傳之旨證其得失其補大矣夫諸風病皆屬於肝也風木盛則肝太過而病化風如木太過發生之紀病掉眩之類俗謂之陽瘧急驚等病治以涼劑是也燥金勝則肝為邪攻而病亦化風如陽明司天燥氣下臨病掉振之類俗謂之陰瘧慢驚等病治以溫劑是也諸火熱病皆

屬於心也熱甚則心太過而病化火熱如歲火太過病
譫妄狂越之類俗謂之陽躁讖語等病治以攻劑是也
寒水勝則心為邪攻而病亦化火熱如歲水太過病躁
悸煩心譫妄之類俗謂之陰躁鄭聲等病治以補劑是
也諸濕病皆屬於脾也濕土甚則脾太過而病化濕如
濕勝則濡洩之類仲景用五苓等劑去濕是也風木勝
則脾為邪攻而病亦化濕如歲木太過病飧泄之類錢
氏用宣風等劑去風是也諸氣膈鬱皆屬於肺也燥金
甚則肺太過而病化膈鬱如歲金太過甚則喘欬之類
東垣謂之寒喘治以熱劑是也火熱勝則肺為邪攻而
病亦化膈鬱如歲火太過病咳喘之類東垣謂之熱喘
治以寒劑是也諸寒病皆屬於腎也寒水甚則腎太過
而病化寒如太陽所至為屈伸不利之類仲景用烏頭

湯等劑是也濕土氣勝腎為邪攻而病亦化寒如濕氣
變物病筋脉不利之類東垣用復煎散健步丸等劑是
也其在太過而化之病為盛盛者真氣也其在受攻而
化之病為虛虛者假氣也故有其病化者恐其氣之假
故有者亦必求之無其病化者恐其邪隱於中如寒勝
化火之類故無者亦必求之其病之化似盛者恐其盛
之未的故盛者亦必責之其病之化似虛者恐其虛之
未真故虛者亦必責之凡一十九條病機皆用此一十
六字為法求之庶幾補瀉不差也今河間捐此一十六
字但以病化有者為盛無者為虛而不復究其假者虛
者為未備此實智者之一失也

五病

素五氣所病心為噫肺為欬肝為語脾為吞腎為欠為噦
胃為氣逆為噦為恐大腸小腸為泄下焦溢為水膀胱不

五色

利為癰不約為遺溺膽為怒是為五病宣明五氣論

色味當五臟白當肺辛赤當心苦青當肝酸黃當脾其黑當腎鹹故白當皮赤當脉青當筋黃當肉黑當骨五臟生成篇

靈目赤色者病在心白在肺青在肝黃在脾黑在腎黃色


不可名者病在胷中論病診尺篇

五脉

素五脉應象肝為弦心脉鈎難經改大脾脉代難經改肺脉

毛難經改腎脉石難經改

海藏四正脉傷之圖



靈色青者其脉弦也赤者其脉鈎也黃者其脉代也白者

其脉毛黑者其脉石見其色而不得其脉反得相勝之脉則死矣得其相生之脉則病已矣邪氣臟腑病形篇

色脉相應

難經言見其色而不得其脉反得相勝之脉者即死得相生之脉者病即自已色之與脉當參相應為之奈何然五臟有五色皆見於面亦當於寸口尺內相應假令色青其脉當弦而急色赤其脉浮大而散色黃其脉中緩而大色白其脉浮濇而短色黑其脉沉濡而滑此所謂五色之與脉當參相應也脉數尺之皮膚亦數脉急尺之皮膚亦急脉緩尺之皮膚亦緩脉濇尺之皮膚亦濇脉滑尺之皮膚亦滑五臟各有聲色臭味當於寸口尺內相應其不相應者病也假令色青其脉浮濇而短若大而緩為相勝浮大而散若小而滑為相生也十三難假令得肝脉其外證善潔面青善怒其內證臍左有動氣按之牢若痛其病四肢

滿閉淋洩便難轉筋有是者肝也無是者非也 假令得

心脉其外證面赤口乾善笑其內証臍上有動氣按之牢

若痛其病煩心心痛掌中熱而哕有是者心也無是者非

也喉之曰切假令得脾脉其外證面黃善噫善思善味其內

證當臍上有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重

節痛怠墮嗜臥四肢不收有是者脾也無是者非也 假

令得肺脉其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其內証臍右

有動氣按之牢若痛其病喘咳灑淅寒熱有是者肺也無

是者非也 假令得腎脉其外證面黑善恐數欠其內証

臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛泄如下重

足脛寒而逆有是者腎也無是者非也十六難

有正經自病有五邪相干已上經文皆診正經自病其五

邪相干診法附在治法門

相合脉

海藏相合脉脉之相合各有虛實假令洪弦相合洪客

弦主也子能令母實也弦洪相合弦客洪主也母能令子

虛也洪弦相合見于春為子能令母實也弦洪相合見于

夏為母能令子虛也○又如澹澹相合見于秋亦子

能令母實也澹澹相合見于冬亦母能令子虛也餘皆倣此至於手足之經亦相合假

令傷寒膀胱脉浮堅而洪者即手足經合也餘倣此

海脉不勝者挾其子之勢也脉弦而入金之分非火之勢

則不敢侵金之分 弦而帶數甲經於申也 緊而帶洪

五發

素五病所發陰病發於骨陽病發於血陰病發於肉陽病

發於冬陰病發於夏是五發也五邪所亂凡邪入於陽則

狂邪入於陰則痺搏陽則為癩疾搏陰則為瘖陽入之陰

則靜陰出之陽則怒是為五亂宣明五氣篇

難脉

難脉有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼

吸之間脾受穀味也其脉在中浮者陽也沉者陰也故曰

陰陽也心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短

濡者肺也腎肝俱沉何以別之然牢而長者肝也按之濡

舉指來實者腎也脾者中州故其脉在中是陰陽之法也

四難 脉有輕重何謂也然初持脉如三菽之重與皮毛相

得者肺部也如六菽之重與血脉相得者心部也如九菽

之重與肌肉相得者脾部也如十二菽之重與筋平者肝

部也按之至骨舉指來疾者腎部也故曰輕重也難五

右以脉之輕重候五臟

三部九候

素尺內兩候則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中兩尺脉也

脉經左尺脉以候腎膀胱右尺脉以候命門三焦凡附

言外者皆指臂之外側也凡言內者皆指近臂筋也上左外以候肝內以候膈左關脉也脉經左右外以候

胃內以候脾右關脉也脉經右關上附上右外以候肺

三焦

三焦

內以候胃中

右寸脉也脉經右寸脉以候肺大腸

左外以候心內以候臆

中

左寸脉也脉經左寸脉以候心小腸

前以候前後以候後上竟上者胃

喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛足中事也

脉要精微論

內經以寸關尺脉候臟腑者止於如此至難經始定寸關尺為三部浮中沉為九候至後世但診寸關尺之三部湮晦其足手面之三部為大失也

無擇

心部在左手寸口屬手少陰經與小腸手太陽經合

肝部在左手關上屬足厥陰經與膽足少陽經合 腎

部在左手關後尺中屬足少陰經與膀胱足太陽經合

肺部在右手關前寸口屬手太陰經與大腸手陽明經合

脾部在右手關上屬足太陰經與胃足陽明經合 右

腎部在右手尺中屬手厥陰心包絡與三焦手少陽經合

難脉有三部部有四經手有太陰陽明足有太陽少陰為

上下部何謂也然手太陰陽明金也足太陽少陰水也金生水水流下行而不能上故在下部也足厥陰少陽木也生手太陽少陰火火炎上行而不能下故為上部手心主少陽火生足太陰陽明土土主中宮故在中部也此皆五行子母更相生養者也十八難

東垣兩手攙抄於前俱仰其手掌左手居外右手居裏則

木火土金水五行相序而經綸四時之令無差忒矣六微

旨大論曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相

火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一

步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之是

次列五行相生之理也

攙抄兩手六脉

五行相生之圖

手心主少陽火生足

太陰陽明土

足太陰陽明土生手

太陰陽明金

手太陰陽明金生足

太陽少陰水

主少陽火

行而不能下生手心

手太陽少陰火炎上

太陽少陰火

足厥陰少陽木生手

厥少陽木

厥下而不能上生足厥

流足太陽少陰水

帝曰何謂三部岐伯曰有下部有中部有上部部各有三候三候者有天有地有人也必指而導之乃以為真上



部天兩額之動脈王註云在額兩傍

脈王註云在鼻孔下兩傍近

耳前陷者中動應于手是也

中部地手陽明也王註云在手大指次指岐

人手少陰也謂掌後銳骨之分

下部地足少陰也王註云在足內踝後

下部人足太陰也王註云在魚腹上越筋間直

故下部之天以候肝地以

候腎人以候脾胃之氣中部天以候肺地以候胃中之氣

人以候心上部天以候頭角之氣地以候口齒之氣人以

候耳目之氣九候之相應也上下若一不得相失一候

後則病二候後則病甚三候後則病危所謂後者應不俱

也王註曰俱猶三部九候皆相失者死上下左右之脈

上部地兩頰之動

上部人耳前之動脈王註云在

中部

下部

足大

內踝後

太溪之

筋間直

取動應

以候

肝地

以候

胃中之

相應如參春者病甚上下左右相失不可數者死中部之
候雖獨調與衆臟相失者死察九候獨小者病獨大者病
獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病比
並三部
九候論


右以三部九候候五臟

面診藏

庭者首面也闕上者咽喉也闕中者肺也下極者心也
直下者肝也肝左者膽也下者脾也方土者胃也中央者
大腸也挾大腸者腎也當腎者臍也面王以上者小腸也
面王以下者膀胱子處也顙者肩也顙後者臂也臂下者
手也目內眥上者膺乳也挾繩而上者背也循牙車以下
者股也中央者膝也膝以下者脛也當脛以下者足也巨
分者股裏也巨屈者膝臙也此五臟六腑肢節之部也庭
額中也闕中者兩眉之間也下極者兩目之間也直下者
兩鼻而下也方者鼻隧也面王者鼻柱之端也蓋自顙而

下闕上屬首咽喉之部分也自闕中循鼻而下鼻端屬肺
心肝脾腎五臟之部分也自目內眥挾鼻而下至承漿屬
膈胃大腸小腸膀胱六腑之部分也自顙而下頰則屬肩
臂手之部分也自牙車而斜下頰屬股膝脛足之部分也
經云五臟次于中央六腑挾其兩側首面各有部分有部
上于陽庭王官在于下極者正謂此也
分用陰和陽用陽和陰當明部分萬舉萬當能別左右是
謂大道男女異位故曰陰陽審察澤夭謂之良工沉濁爲
內浮澤爲外黃赤爲風青黑爲痛白爲寒黃而膏潤爲膿
赤甚者爲血痛甚爲攣寒甚爲皮不仁五色各見其部察
其浮沉以知淺深察其澤夭以觀成敗察其散搏以知遠
近視色上下以知病處積神於心以知往今故相氣不微
不知是非屬意勿去乃知新故色明不麓沉夭爲甚不明
不澤其病不甚其色散駒駒然未有聚其病散而氣痛聚
未成也腎乘心心先病腎爲應色皆如是男子色在于面
王爲小腹痛下爲卵痛其圓直爲莖痛高爲本下爲首狐

疝癘陰之屬也女子在于面王為膀胱子處之病散為痛
 搏為聚方圓左右各如其色形其隨而下至眦為滯有潤
 如膏狀為暴食不潔左為左右為右其色有邪聚散而不
 端面色所指者也色者青黑赤白黃皆端滿有別鄉別鄉
 赤者其色亦大如榆莢在面王為不日其色上銳首空上
 向下銳下向在左右如法以五色命歲青為肝赤為心白
 為肺黃為脾黑為腎肝合筋心合脉肺合皮脾合肉腎合
 骨也五色篇



扁鵲
診脈
府

暈者肺之官也目者肝之官也口唇者脾之官也舌者心
 之官也耳者腎之官也故肺病者喘息鼻張肝病者皆青
 脾病者唇黃心病者舌捲短顙赤腎病者顙與顏黑五臟
篇 色起兩眉薄澤者病在皮唇青黃赤白黑者病在肌
 肉榮衛濡然者病在血氣目色青黃赤白黑者病在筋耳
 焦枯受塵垢病在骨衛氣失常篇
 黃帝曰五臟之氣閱于面者余已知之矣以肢節知而閱
 之柰何岐伯曰五臟六腑者肺為之蓋巨肩陷咽喉見其
 外五臟六腑者心為之主缺盆為之道骸骨有餘以候髆
 髆肝者主為將使之候外欲知堅固視目大小脾者主為
 衛使之迎糧視唇舌好惡以知吉凶腎者主為外使之遠
 聽視耳好惡以知其性黃帝曰善願聞六腑之候岐伯曰
 六腑胃為之海廣骸大頸張骨五穀乃容鼻隧以長以候

大腸唇厚人中長以候小腸目下暴大其膽乃橫鼻孔在外膀胱漏泄鼻柱中央起三焦乃約此所以候六腑者也

五色蒸
枝節診
截府

赤色小理者心小。麤理者心大。無鬲髆者心高。鬲髆小短舉者心下。鬲髆長者心下堅。鬲髆弱小以薄者心脆。鬲髆直下不舉者心端正。鬲髆倚一方者心偏傾也。心小則安。邪弗能傷。易傷以憂。心大則憂不能傷。易傷於邪。心高則滿於肺中。悅而善忘。難開以言。心下則截外。易傷於寒。易恐以言。心堅則截安。守固心脆則善病消瘴。熱中心端正則和利。難傷。心偏傾則操持不一。無守司也。白色小理者肺小。麤理者肺大。巨肩反膺。陷喉者肺高。合腋張脇者肺下。好肩背厚者肺堅。肩背薄者肺脆。背膺厚者肺端正。脇偏踈者肺偏傾也。肺小則少飲。不病喘喝。

肺大則多飲。善病胸痺。喉痺逆氣。肺高則上氣。肩息。欬。肺下則居貴。迫肺善脇下痛。肺堅則不病。欬上氣。肺脆則苦病。消瘴。易傷。肺端正則和利。難傷。肺偏傾則胸偏痛也。青色小理者肝小。麤理者肝大。廣胃反骹者肝高。合脇兔骹者肝下。胃脇好者肝堅。脇骨弱者肝脆。膺腹好相得者肝端正。脇骨偏舉者肝偏傾也。肝小則臟安。無脇下之病。肝大則逼胃。迫咽。迫咽則苦膈中。且脇下痛。肝高則上支。賁切。脇悅為息。賁。肝下則逼胃。脇下空。則易受邪。肝堅則截安。難傷。肝脆則善病消瘴。易傷。肝端正則和利。難傷。肝偏傾則脇下痛也。

黃色小理者脾小。麤理者脾大。揭唇者脾高。唇下縱者脾下。唇堅者脾堅。唇大而不堅者脾脆。唇上下好者脾端正。唇偏舉者脾偏傾也。脾小則臟安。難傷于邪也。脾大則

苦溱眇而痛不能疾行脾高則眇引季脇而痛脾下則下加于大腸下加于大腸則臟苦受邪脾堅則臟安難傷脾脆則善病消痺易傷脾端正則和利難傷脾偏傾則善滿善脹也

黑色小理者腎小麓理者腎大高耳者腎高耳後陷者腎下耳堅者腎堅耳薄不堅者腎脆耳好前居牙車者腎端正耳偏高者腎偏傾也腎小則臟安難傷腎大則善病腰痛不可以俛仰易傷以邪腎高則苦背脊痛不可以俛仰腎下則腰尻痛不可以俛仰為狐疝腎堅則不病腰背痛腎脆則善病消痺易傷腎端正則和利難傷腎偏傾則苦腰尻痛也

心性診
五藏

五臟皆小者少病苦焦心大愁憂五臟皆大者緩于事難使以憂五臟皆高者好高舉措五臟皆下者好出人下五

臟皆堅者無病五臟皆脆者不離于病五臟皆端正者和利得人心五臟皆偏傾者邪心而善盜不可以為人平反覆言語也

皮肉爪
勝診六
府

肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大腸大而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結

心應脉皮厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者脉薄脉薄者小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而長皮薄而脉衝小者小腸小而短諸陽經脉皆多紆屈者小腸結

脾應肉肉脘堅大者胃厚肉脘磨者胃薄肉脘小而磨者胃不堅肉脘不稱身者胃下胃下者管約不利肉脘不堅者胃緩肉脘無小裏累者胃急肉脘多少裏累者胃結胃結者上管約不利也

肝應瓜瓜厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者
膽急爪濡色赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑
多紋者膽結也

腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚麤理薄皮者三焦膀胱
薄踈腠理者三焦膀胱緩皮急而無毫毛者三焦膀胱急
毫毛美而麤者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也本出

篇藏

尺診歲

黃帝問余欲無視色持脉獨調其尺以言其病從外知內
為之柰何岐伯曰審其尺之緩急小大滑瀼肉之堅脆而
病形定矣視人之目窠上微癰如新臥起狀其頸脉動時
欬按其手足上窅而不起者風水膚脹也尺膚滑其淖澤
者風也尺肉弱者解俯安臥脫肉者寒熱不治尺膚滑而
澤脂者風也尺膚濇者風痺也尺膚麤如枯魚之鱗者水

沃飲也尺膚執甚脉盛躁者病溫也其脉盛而滑者病且
出也尺膚寒其脉小者泄少氣尺膚炬然先熱後寒者寒
熱也尺膚先寒久大之而熱者亦寒熱也肘所獨熱者腰
以上熱手所獨熱者腰以下熱肘前獨熱者膺前熱肘後
獨熱者肩背熱臂中獨熱者腰腹熱肘後麤以下三四寸
熱者腸中有虫掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒魚上
白肉有青血脉者胃中有寒尺炬然熱人迎大者當奪血
尺堅大脉小甚少氣悅有加立死論疾診尺篇

雜診

鼻頭色青腹中痛舌冷者死鼻頭色微黑者有水氣色

黃者胃上有寒色白者亡血也設微赤非時者死其目正

圓者瘥不治又色青為痛色黑為勞色赤為風色黃者便

難也鮮明者有雷飲言遲者風也搖頭言者其裏痛也

行遲者其表疆也坐而伏者短氣也坐而下一膝者必腰

痛也裏實護腹而懷卵者必心痛也師持脉病人久者無病也脉之因伸者無病也假令向壁臥聞師到不驚起而目眈視若三言三止脉之咽唾此為詐病假令脉自和更言此病大重當須服吐下藥針灸數十百處乃愈病者素不應食而反暴思之必發熱也師曰息搖肩者心中堅息引胃中上氣者欬息張口短氣者肺痿吐沫師曰病人語聲寂然善驚呼者骨節間病語聲喑暗不徹者心膈間病語聲啾啾細而長者頭中病

脉經脉一來而久住者宿病在心主中治脉二來而久住者病在肝支中治脉三來而久住者病在脾下中治脉四來而久住者病在腎間中治脉五來而久住者病在肺支中治五脉病虛羸人得此者死所以然者藥不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

診虛實法

診寒熱法

俱入治法

診病傳變

診病將死期入診生死條

病傳變

素帝曰病成而變何謂岐伯曰風成爲寒熱痺成爲消中厥成爲癩疾久風爲殮泄脉風成爲癘病之變化不可勝

數脉要精微論曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消其傳爲息賁者死不治曰三陽爲病發寒

熱下爲癰腫及爲痿厥臄痛其傳爲索澤其傳爲頽疝曰一陽發病少氣善欬善泄其傳爲心掣其傳爲膈二

陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠名曰風厥二陰一陽發病善脹心滿善氣三陽三陰發病爲偏枯痿易四

肢不舉陰陽別論

黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何岐伯曰腎移寒於肝癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋攣肝移寒於心狂膈中心

移寒於肺肺消肺消者飲一溲二死不治肺移寒於腎為
涌水涌水者按腹不堅水氣容於大腸疾行則鳴濯濯如
囊裹漿水之病也脾移熱於肝則為驚衄肝移熱於心則
死心移熱於肺傳為膈消肺移熱於腎傳為柔瘕腎移熱
於脾傳為虛腸澀死不可治胞移熱於膀胱則癰溺血膀
胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜小腸移熱於大腸為
虛瘕為沉大腸移熱於胃善食而瘦入謂之食侏胃移熱
於膽亦曰食侏膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下
不止也傳為衄衄瞋目故得之氣厥也論氣厥

診病愈劇

病愈劇應時日
靈黃帝曰夫百病者多以旦慧晝安夕加夜甚何也岐伯
曰朝則人氣始生病氣衰故旦慧日中人氣長長則勝邪
故安夕則人氣始衰邪氣始生故加夜半人氣入臟邪獨

居於身故甚也黃帝曰其時有反者何也岐伯曰是不應
四時之氣臟獨主其病者是必以臟氣之所不勝時者甚
以其所勝時者起也一日分為四時篇

素肝主春足厥陰少陽主治其日甲乙病在肝愈于夏
夏不愈甚於秋秋不死持於冬起於春禁當風肝病者
愈在丙丁丙丁不愈加於庚辛庚辛不死持於壬癸起于
甲乙肝病者平旦慧下晡甚夜半靜

心主夏手少陰太陽主治其日丙丁病在心愈在長夏
長夏不愈甚於冬冬不死持於春起於夏禁溫食熱衣
心病者愈在戊巳戊巳不愈加於壬癸壬癸不死持於甲
乙起於丙丁心病者日中慧夜半甚平旦靜

脾主長夏足太陰陽明主治其日戊巳病在脾愈在秋
秋不愈甚於春春不死持於夏起於長夏禁溫食飽食濕

地澤不 脾病者愈在庚辛庚辛不愈加於甲乙甲乙不
死持於丙丁起於戊巳 脾病者日昃慧日出甚下晡靜
肺主秋手太陰陽明主治其日庚辛 病在肺愈在冬冬
不愈甚於夏夏不死持於長夏起於秋禁寒飲食寒衣
肺病者愈在壬癸壬癸不愈加於丙丁丙丁不死持於戊
巳起於庚辛 肺病者下晡慧日中甚夜半靜
腎主冬足少陰太陽主治其日壬癸 病在腎愈在春春
不愈甚於長夏長夏不死持於秋起於冬禁犯焯煖熟食
溫炙衣 腎病者愈在甲乙甲乙不愈甚於戊巳戊巳不
死持於庚辛起於壬癸 腎病者夜半慧四季甚下晡靜
夫邪氣之客於身也以勝相加至其所生而愈至其所
不勝而甚至其所生而持自得其位而起必先定五臟之
脉乃可言間甚之時死生之期也臟氣法時論

右以五臟時日占病愈甚極準錢仲易深得此理學者
宜究心而又擴克之

診病甚損
靈病在臟沉而大者其病易已小為逆病在腑浮而大者
其病易已 脉口滑小緊以沉者病益甚在中人迎氣大
緊以浮者其病益甚在外 脉口滑以沉者病日進在內
人迎脉滑盛以浮者病日進在外 脉口浮滑者病日進
人迎沉而滑者病日損五色篇

診生死

察形氣色脉定生死

凡治病察其形氣色澤脉之盛衰病之新故乃治之無
後其時形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已脉從四
時謂之可治脉弱以滑是有胃氣命曰易治取之以時形
氣相失謂之難治色天不澤謂之難已脉實以堅謂之益
甚脉逆四時為不可治必察四難而明告之所謂逆四時

者春得肺脉夏得腎脉秋得心脉冬得脾脉其至皆懸絕
沉瀆者命曰逆四時五機真氣實形實氣虛形虛此其

常也反此者病穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反此者病
脉實血實脉虛血虛此其常也反此者病刺志氣虛身

熱此謂反也穀入多而氣少此謂反也穀不入而氣多此
謂反也脉盛血少此謂反也脉少血多此謂反也氣盛

身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑穀入多而氣少者得
之有所脫血濕居下也穀入少而氣多者邪在胃及與肺

也脉少血多者飲中熱也脉大血少者脉有風氣水漿不
入此之謂也同上形盛脉細少氣不足以息者危形瘦脉

大胃中多氣者死形氣相得者生參互不調者病三部九
候皆相失者死上下左右之脉相應如參春者病甚上下

左右相失不可數者死中部之候雖獨調與衆臟相失者

死中部之候相減者死目內陷者死全文見前上形肉

已脫九候雖調猶死

靈熱病脉靜汗已出脉盛躁是一逆也病泄脉洪大是二
逆也着痺不移脰肉破身熱脉偏絕是三逆也淫而奪形

身熱色天然白及後下血衄血衄篤重是謂四逆也寒熱
奪形脉堅搏是謂五逆也五禁篇○脰渠損切腹脹身

熱脉大是一逆也腹鳴而滿四肢清泄其脉大是二逆也
衄而不止脉大是三逆也咳且澀血脫形其脉小勁是四

逆也欬脫形身熱脉小以疾是謂五逆也如是者不過十
五日而死矣其腹大脹四末清脫形泄甚是一逆也腹脹

便血其脉大時絕是二逆也欬澀血形肉脫脉搏是三逆
也嘔血胃滿引背脉小而疾是四逆也欬嘔腹脹且飧泄
其脉絕是五逆也如是者不及一時而死矣工不察此者

而刺之是謂逆治玉波篇○

搏浦谷切

素熱而脉靜泄而脫血脉實病在中脉虛病在外脉堅瀆者皆難治平人氣象論

御脉曰脉病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人者短命則死人病脉不病名曰內虛以有正氣雖困無苦

左有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛上有病而下痛此為逆逆者死不可治 肥人脉細小如絲欲絕

者死 羸人脉躁者死 人身瀆而脉往來滑者死 人

身小而脉往來大者死 人身大而脉往來小者死 人

身短而脉往來長者死 人身長而脉往來短者死 人

身滑而脉往來瀆者死

素五臟者中之守也中盛臟滿氣勝傷恐者聲如從室中

言是中氣之濕也言而微終日乃復言者此奪氣也衣被

不歛言語善惡不避親疎者此神明之亂也倉廩不藏者

是門戶不要也水泉不止者是膀胱不藏也得守者生失

守者死脉要精微論 五臟者身之強也頭者精神之府頭傾

視深精神將奪矣背者胃中之府背曲肩垂府將壞矣腰

者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能行

則僂俯筋將憊矣骨者髓之府不能久立行則振掉骨將

憊矣得強者生失強者死同 五臟之氣故色見青如草

茲者死黃如枳實者死黑如焰者死赤如衄血者死白如

枯骨者死此五色之見死也五臟生成篇○衄 青如翠

羽者生亦如鷄冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑

如鳥羽者生此五色之見生也上同 生於心如以縞裹朱

生於肺如以縞裹紅生於肝如以縞裹緝生於脾如以縞

裹括蕤實生於腎如以縞裹紫此五臟所生之外榮也上同

察色

夫精明五色者氣之華也。赤欲如白裏朱，不欲如赭。白欲如鷺羽，不欲如鹽。青欲如蒼壁之澤，不欲如藍黃。欲如羅裹雄黃，不欲如黃土黑。欲如重漆色，不欲如地蒼。精微

華陀病人面目俱等者不死。

素面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。

面青目青，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死。

也。王註云：凡色見黃者為有胃氣，故不死。五臟以胃為本，故無黃色皆自死焉。○五臟生成篇。

華陀病人面青目白者死，病人面青目黃者五日死。

病人着床心痛，短氣脾竭，內傷百日後愈，能起徬徨因坐。

於地，其立倚床能治此者，可謂神良。病人面赤目白者。

十日死，憂恚思慮，心氣內索，面色反好，急求棺槨。病人。

面赤目青，教六日死。病人面黑目白者，八日死。腎氣內。

傷病因留積。病人面黑目直視，惡風者死。病人面白。

目黑者死。此謂榮華已去，血脉空虛。赤色出兩顴大如。

母指者，病雖小愈，必卒死。全文見暴死。○顴額骨也。東垣曰：脈訣言面赤如粧，不久居面。

顯赤色于兩顴，若塗胭脂之狀，而又且圓也。病至于此，不可久居于世，譬猶根本已竭，枝葉未即衰落，亦如紅霞滿。

天者是也。

扁鵲病人耳目及顴頰赤者，死在五日中。黑色出。

於庭大如母指，必不病而卒死。全文見暴死。額中也。病人黑出於。

額上髮際下，直鼻脊兩顴上者，亦死在五日中。病人黑。

氣出天中下，至年上顴上者死。病人及健人或黑色及。

白色起入目及鼻口者，死在三日中。病人耳目鼻口有。

黑色起入于口者，必死。病人面黑兩脇下滿，不能自轉。

反者死。病人面黑唇青者死。病人面青唇黑者死。

病人及健人面忽如馬肝色，望之如青，近之如焦黑者死。

病人面無精光若土色不受飲食者四日死 病人目無精光及牙齒黑色者不治

按脉

五邪所見春得秋脉夏得冬脉長夏得春脉秋得夏脉冬得長夏脉是謂五邪皆同命死不治

何以言至秋當死春曰二月之時脉當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝脉屬木應濡弱反得毛脉者是肺脉也肺屬金金來尅木故知死是也 春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病

但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰今病藏真散於肝肝藏筋脉之氣也 平肝脉來奕弱招招如揭長竿末

稍曰肝病平春以胃氣為本病肝脉來盈實而滑如循長竿曰肝病死肝脉來急益勁如新張弓弦曰肝死

夏胃微鈞曰平鈞多胃少曰心病但鈞無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病藏真通於心心藏血脉之氣也

平心脉來累累如連珠如循琅玕曰心平夏以胃氣為本病心脉來喘喘連屬其中微曲曰心病死心脉來前曲後

居如操帶鈞曰心死 秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病藏真高於肺以行榮衛陰陽也

平肺脉來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣為本病肺脉來不上不下如循鷄羽曰肺病死肺脉來如物之浮

如風吹毛曰肺死 冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有鈞曰夏病鈞甚曰今病藏真下於腎腎藏骨髓之氣也

平腎脉來喘喘累累如鈞按之而堅曰腎平冬以胃氣為本病腎脉來如引葛按之益堅曰腎病死腎脉來發如奪

索辟辟如彈石曰腎死 長夏胃微奕弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死奕

索辟辟如彈石曰腎死

長夏胃微奕弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死奕

弱有石曰冬病弱甚曰今病藏真濡於脾脾藏肌肉之氣也。平脾脉來和柔相離如鷄踐地曰脾平長夏以胃氣為本病脾脉來實而盈數如鷄舉足曰脾病死脾脉來銳堅如鳥之啄如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死已上並見

平人氣象論

真肝脉至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟弦色青白不澤毛折乃死仲景云肝死藏浮之弱按之如索不來或曲如蛇形者死真心脉至

堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死仲景云死藏浮之脉實如豆麻擊手按之益燥疾者死真肺脉至大而虛如以毛羽中

人膚色白赤不澤毛折乃死仲景云肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死真腎脉至搏而絕如指彈石辟辟然色黑黃不澤毛折乃

死仲景云腎死藏浮之堅按之亂如轉丸益下入尺中者死真脾脉至弱而乍踈乍數色黃青不澤毛折乃死仲景云脾死藏浮之大堅按之中如覆杯絜絜然如搖者死

諸真藏脉見皆為死不治也。黃帝曰見真藏曰死何

也岐伯曰五臟者皆稟氣於胃胃者五臟之本也臟氣者

不能自致于手太陰必因於胃氣乃至手太陰也故五臟各以其時自為而至于手太陰也故邪氣勝者精氣衰

也故病甚者胃氣不能與之俱至于手太陰故真臟之氣獨見獨見者病勝藏也故曰死已上並玉機真藏篇人以水穀為

本故人絕水穀則死脉無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真藏脉不得胃氣也平人氣象論所謂陰者真藏也見則為

敗敗必死也所謂陽者胃腕之陽也陰陽別論凡持真脉之藏脉者肝至懸絕急十八日死心至懸絕九日死肺至懸

絕十二日死腎至懸絕七日死脾至懸絕四日死同上仲寸脉下不至關為陽絕尺脉上不至關為陰絕此皆不

治決死也若計其餘命死生之期以月節剋之也王註云陽絕死

於春夏陰絕死於
秋冬此言甚應

靈所謂五十榮者五臟皆受氣持其脉口數其至也五十

動而不一代者五臟皆受氣四十動一代者一臟無氣

云却後四歲
春草生而死三十動一代者二臟無氣脉經云却後二
歲麥熟而死

十動一代者三臟無氣脉經云却後二
歲桑樞赤而死十動一代者四臟

無氣脉經云歲中死得節不動出
清明日死遠不出穀雨死矣不滿十動一代者五臟

無氣脉經云却
後五日死予之短期要在終始所謂五十動而不一

代者以為常也以知五臟之期予之短期者乍數乍疎也

根結

難經云脉不滿五十動而一止一臟無氣者何臟也然

人吸者隨陰入呼者因陽出今吸不能至腎至肝而還

故知一臟無氣者腎氣先盡也

代按脉之來緩而時一止復來者名曰結陰也又脉來動

結促代
脉

而中止更來小數中有還者及動名曰促陽也脉來動而

中止不能自還者動而中止復來如前名曰代陰也得此

脉者必難治

自還者動而中止復來數於前動也不能自還者動而

中止復來如前動同而不數也

活有結脉有促脉有代脉結者陰也陰盛則結脉來緩時

一止復來曰結主胃滿煩躁促者陽也陽盛則促脉來數

時一止復來曰促主積聚氣痞憂思所成大抵結促之脉

雖時一止為病脉非死脉也唯代脉者真死矣往來緩動

中止不能自還因而復動名曰代也代者死也仲景傷寒

脉結代心動悸炙甘草湯主之

脈至脉指
熱病脉四至三日死脉四至者平人一至病人脉四至

也熱病脉五至一日死時一大至半日死忽忽悶亂者

至脉指

卷之四十一

天

雜診死

死、熱病脉六至半日死忽疾大至有頃死 熱病脉
四損三日死所謂四損者平人四至病人脉一至名曰四
損 熱病脉五損一日死所謂五損者平人脉五至病人
脉一至名曰五損 熱病脉六損一時死所謂六損者平
人脉六至病人脉一至名曰六損若絕不至或久乃至立
死

脈平人不病脉來如屋漏雀啄者死 此脾真滅脉也王註云屋漏者其來既絕

而止時時復起而不相連屬也 脉來如彈石去如解索

者死 此腎真滅脉也王註云彈石者辟堅急 病人脉如

蝦之遊如魚之翔者死 王註云蝦遊者冉冉而起尋復退

如偃刀者死脉涌涌不去者死脉忽去忽來暫止復來者

死脉分絕者死 轉豆者心真臟脉偃刀者肝真臟脉忽去忽來者脾真臟脉也 三部脉

神脫

診病傳生死

如釜中湯沸朝得暮死半夜得日中死日中得半夜死

難寸口脉平而死者何謂也然諸十二經脉者皆係於生

氣之原所謂生氣之原者謂十二經之根本也謂腎間動

氣也此五臟六腑之本十二經脉之根呼吸之門三焦之

原一名守邪之神故氣者人之根本也根絕則莖葉枯矣

寸口脉平死者生氣獨絕於內也 尺難謂兩手寸關尺脉皆平而難也

三月若六月若三日若六日傳五臟而當死 風者百病

之長也今風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱當

是之時可汗而發也或痺不仁腫痛當是之時可湯熨及

火灸刺而去之弗治病入舍於肺名曰肺痺發欬上氣弗

治肺即傳而行之肝病名曰肝痺一名曰厥脇痛出食當

是之時可按若刺耳弗治肝傳之脾病名曰脾風發痺腹

中熱煩心出黃當此之時可按可藥可浴王註云出黃謂黃色出于便溲

之所弗治脾傳之腎病名曰疝瘕少腹寬熱而痛出白一

名曰蠱當此之時可按可藥弗治腎傳之心病筋脉相引

而急病名曰瘵當此之時可灸可藥弗治滿十日者法當

死腎因傳之心心即復反傳而行之肺發寒熱法當三歲

死此病之次也然其卒發者不必治於傳或其傳化有不

以次不以次入者憂恐悲喜怒令不得以其次故令人有

大病矣因而喜大虛則腎氣乘矣怒則肝氣乘矣悲則肺

氣乘矣恐則脾氣乘矣憂則心氣乘矣此其道也故病有

五五五二十五變及其傳化傳乘之名也王機真歲論

右邪初入表蓋傳之緩者也

夫病傳者心病先心痛一日而咳心火傳肺也三日脇肢痛肺金傳脾也

五日閉塞不通身痛體重脾金傳心也三日不已死冬夜

半夏日中 肺病喘欬三日而脇肢滿痛肺金傳肝木也一日身

重體痛五日而脹肝木一日傳脾土十日不已死冬日入

夏日出 肝病頭目眩脇肢滿三日體重身痛五日而脹

肝木三日傳脾土 三日腰脊少腹痛脛痠脾胃土傳腎水也 三日

不已死冬日入夏早食 脾病身痛體重一日而脹脾自傳胃

二日少腹腰脊痛脛痠三日背脇筋痛小便閉脾土三日傳腎水

三日傳膀胱也 十日不已死冬人定夏晏食 腎病少腹腰脊痛

脘痠三日背脇筋痛小便閉腎傳膀胱也 三日腹脹膀胱水傳小腸火也

三日兩脇肢痛小腸傳心也 二日不已死冬大晨夏晏晡

胃病脹滿五日少腹腰脊痛脘痠胃土傳腎水也 三日背脇筋

痛小便閉腎傳膀胱也 五日身體重膀胱水傳心火 六日不已

死冬夜半後夏日暍 膀胱病小便閉五日少腹脹腰脊

痛脘痠膀胱傳腎也 一日腹脹腎水傳小腸火也 二日身體痛小腸傳心也

痛脘痠腎也 一日腹脹腎水傳小腸火也 二日身體痛心也

體痛亦二日不已死冬鷄鳴夏下晡諸病以次是靈樞無

相傳如是者皆有死期不可刺間一臟止靈樞無及至三

四臟者乃可刺也標本病傳論

右靈樞謂之大氣入臟蓋傳之急者也王註云有緩傳

者有急傳者緩者或一歲二歲三歲而死其次或三月

若六月而死急者一日二日三日四日或五六日而死

則此類也王氏此言其能推廣經意然不能驗日數者

但驗病之次傳如心先病心痛次傳於肺或欬或喘次

傳於肝或脇痛或頭眩次傳於脾胃或閉塞不通或身

痛體重或脹或泄次傳於腎膀胱或少腹腰脊痛脛痠

或背脂筋痛小便閉如此曰必死無疑累驗有淮鄰人

趙氏始肝病脇痛半載次傳之脾腹脹而死又卜叔英

嫂氏始肺病咳喘次傳之肝頭眩不寐次傳之脾腹脹

而死又楊白麻師始脾病腹痛次傳之膀胱小便淋閉

次傳之心曾痺痛通身青脉而死矣蓋心主血脉故也

釋次傳

難經言七傳者死間臟者生何謂也然七傳者傳其所勝

也間臟者傳其子也何以言之假令心病傳於肺肺傳於

肝肝傳於脾脾傳於腎腎傳於心一臟不再傷故言七傳

者死也間臟者傳其所生也假令心病傳脾脾傳肺肺傳

腎腎傳肝肝傳心是母子自相傳周而復始如環之無端

故言生也五十一難

經言者素問靈樞二經之病傳論所言也七傳當作次

傳次傳者死即素靈二經病傳論言諸病以次相傳皆

有死期不可刺者是也心火傳所勝之肺金肺金傳所

傳肺肺本傳肝肝本傳脾今心病間肺一臟傳肝或間
肺肝二臟傳脾肝木生心火心火生脾土故曰傳其所
生也難經諸證惟呂廣釋七傳為次傳為得經旨虞庶
父非是註而穿鑿釋之實秦越人呂廣之罪人也

活傷寒入裏見標脉則生假令胃病下之脉浮而汗出是
也雜病出表見標脉則死假令脾病補之脉弦而面青者
是也

診死期

九候之脉皆沉細懸絕者為陰主冬故以夜半死盛
躁喘數者為陽主夏故以日中死寒熱病者以平日死
熱中及熱病者以日中死病風者以日夕死病水
者以夜半死脉乍疎乍數乍遲乍疾者日乘四季死三部九候
論肝見庚辛死心見壬癸死脾見甲乙死肺見丙丁死
腎見戊癸死是謂真臟見皆死平人氣象論五臟受氣於其

所生傳之於其所勝氣舍於其所生死於其所不勝病之
且死必先傳行至其所不勝病乃死此言氣之逆行也故
死同上

肝受氣於心傳之於脾氣舍於腎至肺而死

緩者秋死急者庚辛日及日晡死是也

心受氣於脾傳之於肺氣舍於肝至腎而死

緩者冬死急者壬癸日及夜半死也

脾受氣於肺傳之於腎氣舍於心至肝而死

緩者春死急者甲乙日及朝死也

肺受氣於腎傳之於肝氣舍於脾至心而死

緩者夏死急者丙丁日及日中死也

腎受氣於肝傳之於心氣舍於肺至脾而死

緩者長夏死急者戊巳日及戌辰丑未死也

此皆逆死也一日一夜五分之此所以占死生之早暮也

王機真藏論○甲乙經死生作死者一日一夜五分之謂朝主所畫主心辰戌丑未主脾肺主肺夜主腎也

五臟傷死期

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便其氣動形期六

月死真臟脉見乃予之期日王註云皮膚乾着骨間肉陷謂人骨枯槁大肉陷下也真

臟脉形見前按脉條

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項期

一月死真臟見乃予之期日

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項身

熱腕肉破脰真臟見十日之內死王註云脰謂肘膝後肉也如塊者脰渠損切

大骨枯槁大肉陷下肩髓內消動作益衰真臟未見期一

歲死見其真臟乃予之期日王註云肩髓內消謂缺盆深也動作衰謂交接微也

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿腹內痛心中不便肩項身

熱破脰腕肉目眦陷真臟見目不見人立死其見人者至

其所不勝之時則死 急虛身中卒至五臟絕閉脉道不

通氣不往來譬於墮溺不可為期其脉絕不來若人一息

五六至其形肉不脫真臟雖不見猶死也林註云一息當作一呼○已上

竝王機真藏論

五神傷死期

靈是故怵惕思慮者則傷神神傷則恐懼流淫而不止因

悲哀動中者竭絕而失生喜樂者神憚散而不藏愁憂者

氣閉塞而不行盛怒者迷惑而不治恐懼者神蕩憚而不

收本神篇下同

心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破脰腕肉毛悴色

夭死于冬

脾愁憂而不解則傷意意傷則悞亂四肢不舉毛悴色天

死于春

肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正當人

陰縮而攣筋兩脇骨不舉毛悴色夭死于秋
肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛
悴色夭死于夏

腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以
俛仰屈伸毛悴色夭死于季夏

恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下是故五
臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無
氣則死矣

診經終
命絕

瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕此決死生之要
不可不察三部九候
論下同

足太陽氣絕者其足不可屈伸死必戴眼 太陽之脉其
終也戴眼反折瘈瘲其色白絕汗乃出出則死矣診要經
絡篇下
同○凡癩瘡亦戴眼灸崑崙穴即隨下不戴也若灸崑崙
仍眼戴不下者是為太陽終也上註經汗謂出汗如珠不

流復旋
乾也

少陽終者耳聾百節皆縱目眇絕系絕系一日半死其死
也色先青白乃死矣衆音瓊 王註云日
衆謂直視如驚

陽明終者口目作動善驚妄言色黃其上下經盛不仁則
終矣王註云經盛謂面目頸頰足趾腕脛
皆燥盛而動也不仁謂不知善惡也

少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉上下不通而終矣面黑
者手足少陰絕

太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面赤不
逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣

厥陰終者中熱嗑乾善溺心煩甚則舌卷卵上縮而終矣
此十二經之所敗也

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫于皮毛者也故
氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮節津液去皮節者

則爪枯毛折者則毛先死丙篤丁死火勝金也經脈

同
手少陰氣絕則脈不通脈不通則血不流血不流則髦色不澤故其面黑如漆柴者血先死壬篤癸死水勝火也
足太陰氣絕者則脈不榮肌肉唇舌者肌肉之本也脈不榮則肌肉軟肌肉軟則舌痿人中滿人中滿則唇反唇反者肉先死甲篤乙死木勝土也

足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脈也伏行而濡骨髓者也故骨不濡則肉不能著也骨肉不相親則肉軟却肉軟却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊篤己死土勝水也

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚于陰器而脈絡于舌本故脈弗榮則筋急筋急則引舌

與卵故唇青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木也

五陰氣俱絕則目系轉轉則目運目運者為志先死志先死則遠一日半死矣

六陽氣絕則陰與陽相離離則腠理發泄絕汗乃出故旦占夕死夕占旦死

仲脈浮而洪身汗如油喘不休水漿不下體形不仁乍靜乍亂者此為命門絕也又未知何臟先受其災若汗出髮潤喘不休者此為肺先絕也陽反獨留形體如烟煤直視搖頭者此為心絕也唇吻反青四肢熱熱汗出者此為肝絕也環口顰黑柔汗發黃者此為脾絕也溲便遺尿狂言目反直視者此為腎絕也又未知何臟陰陽相絕若陽氣前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭者其人死身色必黃腋下溫心下熱也 六腑氣絕于外

者手足寒上氣脚縮五臟氣絕于內者利不禁下甚手足不仁

雜診命絕

厥病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不

見人汗出如水不止一云二日死也病人膽絕七日死何以知

之眉為之傾病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青

呼罵不休一云八日死病人心絕一日死何以知之肩息回

視立死一云二日死病人腸絕六日死何以知之髮直如

乾麻不得屈伸自汗不止一云小腸絕病人脾絕十二日死

何以知之口冷足腫腹熱臙脹泄利不覺出無時度一云五日死

病人胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆

血大便赤泄一云九日死病人肉絕六日死何以知之耳乾舌背腫溺

張但氣出而不還一云鼻口虛張短氣病人大腸絕不治何以知

之泄利無度利絕則死病人腎絕四日死何以知之齒

為暴枯面為正黑目中黃色腰中欲折自汗出如流水一云

人中平七日死病人骨絕齒黃落十日死諸浮脉無根者皆

死已上五臟六腑為根也

扁鵲華陀病人五臟已奪神明不守聲嘶者死病人循

衣縫謔語者不可治陽明絕病人陰陽俱絕掣衣掇空妄

言者死病人妄語錯亂及不能語者不治熱病者可治

已上三條皆陽明絕病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人臥遺尿不覺者死陽明絕病人尸臭者不可治病

人面是白直視肩息者一日死膈肺絕病人陰結陽絕目

睛眊眊者死病人陰陽絕竭目眊陷者死病人目系

傾者七日死病人口如魚口不能復閉而氣出多不反

者死病人口張者三日死病人唇青人中反者死肝脾

絕下 病人唇反人中滿者死 病人唇口忽乾者不治
病人唇腫齒焦者死詳 病人陰陽俱竭其齒如
熟小豆其脉駛者死 病人齒忽變黑者十三日死絕
病人舌卷卵縮者必死絕 病人汗出不流舌卷黑
者死絕 病人髮直者十五日死絕 病人髮如
乾麻善怒者死絕 病人髮與眉衝起者死絕 病人
爪甲青者死 病人爪甲白者不治 病人手足爪甲下
肉黑者八日死 病人榮衛竭絕面浮腫者死 病人卒
腫其面蒼黑者死 病人手掌腫無文者死 病人臍腫
反出者死臍反出者此為脾先絕 病人陰囊並俱腫者死 病人
脉絕口張足腫五日死 病人足跗上腫兩膝大如斗者
十日死

諸脉診病雜法

諸脉診病雜法者竊恐迷亂診病大綱故以雜法名之也
凡前篇脉之浮沉遲數虛實洪細滑澁所指陰陽表裏寒
熱血虛氣實之病者皆診病之大綱學者常須識此勿令
悞也故內經論脉主病必以陰陽相對言之或以五臟分
配言之未嘗雜他法者欲人識其綱也故診病先定大綱
然後雜究諸病如診得浮脉大綱主表也沉脉大綱主裏
也然後雜究其或屬寒屬風屬氣等病之類是也餘見如
左方

浮脉主病

無擇浮為在表 為風 為氣 為熱 為痛 為嘔
為脹 為痞 為喘 為厥 為內結 為滿不食 浮
大為臍塞 為緩為不仁 浮大長為風眩癩疾 浮滑
疾為宿食 浮大濇為宿食滯氣 浮短為肺傷諸氣
浮滑為飲為泄利 浮細而滑為傷飲 浮滑疾緊為百

合病 浮數為大便堅小便數 浮緊為淋為癃閉

東垣辨脉浮所主病不同。○浮者沉之反也。譬譬然見於皮毛上與皮毛相得微按之則絕無有如空中之浮雲所主病一則為風一則為虛。古人云浮而有熱者虛也。浮而無熱者風也。予謂此未盡善。蓋風有八風寒熱溫涼各各不同。其中有風熱止言脉浮雖不能分別八面之風。兼見脉候止說浮而已。須兼見的證。單在一臟或兩臟相合亦足以分何臟之病。言風無熱則非也。况八風之脉皆見於左手寸脉外側若右手行陰道脉中受虛邪賊邪之風亦於氣口外側顯見。推而內之外而不內者是也。其虛勞脉雖有傳變必顯於內側六脉互傳皆為不足之病。則是五臟傳變必從四時傳變於外六腑乃受之。如是則勝復之作不能相過。此之謂也。若浮而弦者風也。見於左關浮而

澁者虛也見於右寸

病 芤脉主

無擇寸芤為吐血 微芤為衄血 關芤為大便血出 尺芤為下焦虛小便血出 為咳

病 滑脉主

滑為血 為滿 為熱 為伏痰 為宿食 為畜血 為癃閉 為痒 為血氣俱實 滑而浮散為癰瘰 滑數為結熱 滑實為胃實 滑利為妊娠 滑而大小不勻必吐為病進為泄利 滑而浮大小腹痛弱則陰中痛大便亦然

脉滑曰風

病 實脉主

實熱 為嘔 為痛 為氣寒 為喘咳 為大便不禁 實緊為陰不勝陽 為胃寒 為腰痛

病 弦脉主

弦為寒 為痛 為飲 為瘕 為水氣 為中虛 為厥逆 為拘急 為寒癱 弦緊為惡寒 為疝瘕 為

痺 弦而鈞為脇下刺痛 弦長為積隨左右上下

伸 弦則衛氣不行

病 緊脈主

無擇 緊為寒 為痛 為咳 為喘 為滿 浮緊為肺

有水 緊而滑為衄 緊為遁尺 緊數為寒熱 動為

宿食 為逆痛

素盛而緊曰脹

本事 記有人患傷寒六七日心煩昏睡咽燥小便白色自

汗予診之寸口尺中俱緊予曰寒中少陰之經是以脈緊

仲景云脈緊而汗出者亡陽也屬少陰法當咽痛而復下

利蓋謂此也有難之曰脈訣緊脈屬七表仲景以緊脈屬

少陰然則緊脈屬陽耶屬陰耶予言仲景云寸口脈俱緊

者清邪中於上焦濁邪中於下焦又云陰陽俱緊者口中

氣出唇口乾燥蹠臥足冷掌中涕出舌上滑胎勿妄治也

又云緊則為寒又云諸緊為寒又曰曾為人所難緊脈從

何而來師云假令亡汗若吐以肺裏寒故令脈緊假令咳

者坐飲冷水故令脈緊假令下利以胃虛故令脈緊又云

寸口脈微尺脈緊其人虛損多汗由是觀之則是寒邪之

氣久客經脈所致皆虛寒之脈也其在陽經則浮而緊在

陰經則沉而緊故仲景云浮緊名為傷寒又曰陽明脈浮

而緊者必潮熱此在陽則浮而緊也在陰則沉而緊故仲

景云寸口脈微尺脈緊其人虛損多汗則陰當先絕而不

見陽又云少陰緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈

緊反去者此欲解也此在陰則沉而緊也仲景云浮為在

表沉為在裏數為在腑遲為在臟欲知表裏臟腑先以浮

沉遲數為定然後兼於證而別陰陽也

病 洪脈主

無擇 洪為脹 為滿 為痛 為熱 為煩 洪實為癰

大脉主病

洪緊為癰疽 為喘急亦為脹 洪浮為陽邪來見

素 龐大者陰不足陽有餘為熱中也 微論 大則病進
丹溪云大洪之別名其病得之於內傷者陰虛為陽所乘故脉大當作虛治之其病得之於外傷者邪客於經脉亦大當作邪勝治之合二者觀之皆病方長之勢也謂之病進不亦宜乎海藏云君侵臣是也

仲 平人脉大為勞 大則為虛
無 擇數為熱為虛 為吐 為痛 為煩渴 為煩滿

數脉主病 促脉 促

釋曰其促有五 一曰氣 二曰血 三曰飲 四曰食 五曰痰 但臟熱則脉促以氣血痰飲留滯不行則止促非惡脉也

散脉 散

釋曰六腑氣絕於外則手足寒上氣五臟氣絕於內則下利不禁甚者不仁其脉皆散散則不聚病亦危矣

革脉 革為滿 為急 為虛寒相搏 半產漏下

微脉主病 釋曰革者革也固結不移之狀三部應之皆危脉也 微為虛 為弱 為芤 為嘔 為泄 為亡汗 為拍

急 微弱為少氣 為中寒 沉為在裏 為實 為水 為寒 為喘 為癥 沉弱

為寒熱 沉細為少氣臂不能舉 沉滑為風水 為下重 沉緊為上熱下冷 沉重而直前絕者為汚血 沉

重而中散者為寒食成癥 沉重不至寸細絕者為遁尺 沉緊為懸飲 沉遲為痼冷 沉重為傷寒發熱

緩脉主病

緩為在下 為風 為寒 為弱 為痺 為疼 為不仁 為氣不足 為眩暈 緩而滑為熱中 緩而遲虛

寒相搏食冷則咽痛

溢脉主病

溢為少血 為亡汗 熱氣不足 為逆冷 為下痛

為心痛 澁而緊為痺 為寒濕

素脉澁曰痺

平脉之狀不一。大率多兼見之。人之病有四。曰實。曰熱。曰寒。曰虛。故學者診亦必浮沉遲數為之綱。以察病情。初學者又以浮數為熱。為有餘。沉遲為寒。為不足。其間最難體認者。澁脉也。最難調治者。弦脉也。澁脉細而遲。往來難且散。又曰短而止。得此脉者。固為寒。為濕。為血虛。為汚血。為氣多。然亦有病熱與實者。或者得脉之帶澁。徒見其有細有遲。又散。皆是不足之象。便以為虛。而寒。猛浪用藥。寧不悞人。若夫或因多怒。或因憂鬱。或因厚味。或因補劑。燥劑。或因表裏無汗。氣騰血沸。清化為濁。老痰凝血。膠固雜揉。脉道澁滯。亦見澁狀。參之形證。病情斯得。先賢曰。澁而堅。按之不減。有力。為中焦實。有伏結。脾肺氣寒。實熱在胃中。

可不慎歟。弦為春令之脉。非春時而見者。木為病也。五臟更相制伏。以防其太過。木為病。則肝邪盛矣。肝之盛。金之衰也。金之衰。火之炎也。火之炎。水之弱也。金不足以制木。則土病矣。攷之諸家。則曰弦者。虛也。為反胃。為痛痺。沉弦為疝瘕。弦長為積病。雙弦為寒飲。雙弦而遲。為心下堅。偏弦飲也。弦急為腹痛。弦而鈎。主蜚尸。弦緊而微。細主寒積。微弦而伏。主癥。不治。弦而大。主半產。漏下。亡血。失精。弦而小。主寒痺。弦在左寸。頭痛。弦在右寸。水走。腸胃。弦在左關。怒而血聚。弦在右關。寒痛。四肢拘急。弦在趺陽。腸痔下血。弦在尺中。小腹痛。白腸挺核。木邪風氣上極。土敗為病。先哲蓋常言之矣。惟金因火伏。木寡于畏之論。猶未發明。倘非滋水以降火。厚土以養金。而又以行濕散風。導鬱為之輔佐。邪何由去。病何由安。况弦脉為病甚多。而治法又有

隔二隔三之異故不容於自默也若曰不然何弦屬陽而仲景列沉瀯弱微弦為五陰之數至於敗散殘賊之脉又以弦為之首瀯為之中其意可見滑切

遲脉主病

無擇遲為寒 為痛 遲而澁為癥瘕咽酸

伏脉主病

伏為霍亂 為疝瘕 為水氣 為溏泄 為停痰 為

宿食 為諸氣上衝 為惡膿死肌

濡脉主病

濡為虛 為痺 為自汗 為氣弱 為下重 濡而弱

為內熱外冷自汗 為小便難

弱脉主病

弱為虛 為風熱 為自汗

細脉主病

細為血氣俱虛 為病在外 為積 為傷濕 為後泄

為寒 為神勞 為憂傷過度 為腹滿 細而緊為

癥瘕積聚 為刺痛 細而滑為僵仆 為發熱 為嘔

吐

動脉主病

動為痛 為驚 為攣 為泄 為恐

虛脉主病

虛為寒 為脚弱 為虛 為食不消化 為傷暑

結脉主病

結為痰 為飲 為血 為精 為氣

釋曰氣寒脉緩則為結氣熱脉數則為促雖緩數不同

亦當如促脉分別可也

代脉代者一臟絕他臟代至

釋曰代真死脉不分三部隨應皆是

三部主焦病

脉經寸浮則中風 寸扎則胃中積血 寸滑則嘔逆

寸實則胃中熱 寸弦則胃中急痛 寸緊則頭項急

寸洪則熱甚於胃中 寸微則陽虛 寸沉則陰中伏陽

胃中痰 寸緩則太陽中濕 寸澁則中氣虛 寸遲則

陰溢於上 寸伏則胃中積氣 寸濡則多自汗 寸弱

則陽氣虛微

關浮則腹脹滿 關芤則腸中積血 關滑則胃寒不能食 關實則胃中切痛 關弦則胃寒不能食 關緊則腹中鬱結 關洪則番胃吐食 關微則氣結於心下 關沉則心下痛 關緩則腰痛難伸 關澁則血少而留 關遲則粥漿不入 關伏則腸癖瞑目 關濡則少氣精神散 關弱則胃氣虛 尺浮則大便乾澁 尺芤則小便有血 尺滑則下焦停寒 尺實則小腹脹小便不禁 尺弦則下焦停水 尺緊則臍腹痛 尺洪則陰絕 尺微則臍下有積 尺沉則腰脚重 尺緩則飲食不消 尺澁則逆冷傷血 尺遲則寒甚於腰脚 尺伏則殮泄穀不化 尺濡則骨肉不相親 尺弱則陰氣內絕

雜診

素夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則

病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少澁則心痛渾渾革至如湧泉病進而色散綿綿其去如弦絕者

死脉要精微論

寸口之脉中手短者曰頭痛寸口脉中手長者曰足脛痛寸口脉中手促上擊者曰肩背痛脉小弱以澁者謂之

久病脉滑浮而疾者謂之新病已上平人氣象論 徵其脉小色

不奪者新病也徵其脉不奪其色奪者此久病也 徵其

脉與五色俱奪者此久病也 徵其脉與五色俱不奪者

新病也 推而外之內而不外有心腹積也王註云脉附臂筋取之不

審推筋令遠使脉外行而不出外者心腹積也 推而內之外而不內身有熱也

王註云脉遠臂筋推之令近遠而不近身有熱也 推而上之上而不下腰足清

也而上而不下治宜舉之也 推而下之下而不上頭項痛

也而下而不上治宜抑之也 按之至骨脉氣少者腰脊痛

損傷脉
移常虛

而身有痺也已上脉要
精微論

孫按開寶寺僧衣鉢甚厚常施惠於人孫重之與往還一日謂孫曰某有一事於翁約賞罰為戲可否孫曰如何為賞罰僧曰若診吾脉若知某病賞三十千為一筵若不中罰十千歸小僧孫曰諾與之診左手無脉右手有脉遂尋左手之脉乃轉左臂上動搖如常孫曰此異脉也醫書不載脉行常道豈有移易之理往昔少年為驚撲震動心神脉脫舊道乍移臂外復遇驚撲不能再歸年歲長大氣血已定不能復移目下無病爾僧曰某襁褓而撲皆幾死固宜脉失所某亦平生無病亦不曾診脉聞公神醫試驗之果神醫也

診一歲病證相同

一歲病證相同者五運六氣所為之病也五運六氣之病

有常有變難診另詳於運氣類證今但取常而不變者編之

合八風虛實邪正		
立秋 坤 玄委	夏至 離 上天	立夏 巽 陰洛
秋分 兌 倉果	招搖 中央 招搖	春分 震 倉門
立冬 乾 新洛	冬至 坎 叶蟄	立春 艮 天函

立秋二 玄委 西南方	夏至九 上天 南方	立夏四 陰洛 東南方
秋分七 倉果 西方	招搖中央	春分三 倉門 東方
立冬六 新洛 西北方	冬至一 叶蟄 北方	立春八 天函 東北方

太乙移宮

靈太乙常以冬至之日居叶蟄之宮四十六日明日居天
魚四十六日明日居倉門四十六日明日居陰洛四十六
日明日居天宮四十六日明日居玄委四十六日明日居
倉果四十六日明日居新洛四十五日明日復居叶蟄之
宮曰冬至矣太乙日遊以冬至之日居叶蟄之宮數所在
日從一處至九日復反於一常如是無已終而復始太
乙移日天必應之以風雨以其日風雨則歲美民安少病
矣先之則多雨後之則多旱太乙在冬至之日有變占
在君太乙在春分之日有變占在相太乙在中宮之日有
變占在吏太乙在秋分之日有變占在將太乙在夏至之
日有變占在百姓所謂有變者太乙居五宮之日瘋風折
樹木揚沙石各以其所主占貴賤因視風所從來而占之
風從其所居之鄉來為實風主生長養萬物從其衝後來

太乙占法

為虛風傷人者也主殺主害謹候虛風而避之故聖人曰
避虛邪之道如避矢石然邪弗能害此之謂也是故太乙
入徙立於中宮乃朝八風以占吉凶也風從南方來名曰
大弱風其傷人也內舍於心外在於脉其氣主為熱風從
西南方來名曰謀風其傷人也內舍於脾外在於肌其氣
主為弱風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於肺外在
於皮膚其氣主為燥風從西北方來名曰折風其傷人也
內舍於小腸外在於手太陽脉脉絕則溢脉閉則結不通
善暴死風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外
在於骨與肩背之脊筋其氣主為寒風從東北方來名曰
凶風其傷人也內舍於大腸外在於兩脇腋骨下及肢節
風從東方來名曰嬰兒風其傷人也內舍於肝外在於筋
紐其氣主為身濕風從東南方來名曰弱風其傷人也內

方候
候
風

舍於胃外，在肌肉，其氣主體重。此八風皆從其虛之鄉來，乃能病人。三虛相搏，則為暴病卒死。兩實一虛，病則為淋。露寒熱犯其雨濕之地，則為痿。故聖人避風如避矢石焉。其有三虛，而偏中於邪風，則為擊仆偏枯矣。九宮八風篇

中宮之曰，立春立夏立秋立冬，四日屬四維，中央之土也。太乙入徙立於中宮，當作立於五宮。

黃帝曰：願聞歲之所以皆同病者，何因而然？少師曰：此八正之候也。黃帝曰：候之奈何？少師曰：候此者，當以冬至之日，太乙立於叶蟄之宮，其至也。天必應之以風雨。風雨從南方來者，為虛風，賊傷人者也。其夜半至者，萬民皆臥而弗犯，故其歲民小病。其以晝至者，萬民懈惰，而皆中於虛風，故萬民多病。虛邪入客於骨而不發於外，至其立春，陽氣大發，腠理開，因立春之日，風從西方來，萬民又皆中於

虛風，此兩邪相搏，經氣結代者矣。故諸逢其風而遇其雨者，命曰遇歲露焉。因歲之和，而少賊風者，民少病而少死。歲多賊風，邪氣寒溫不和，則民多病而死矣。黃帝曰：虛邪之風，其所傷貴賤，何如？候之。少師曰：正月朔日，太乙居天畱之宮，其日西北風不雨，人多死矣。正月朔日，平旦北風，春民多死。正月朔日，平旦北風，夏民多死。正月朔日，夕時北風，三也。正月朔日，日中北風，夏民多死。正月朔日，夕時北風，秋民多死。終日北風，大病死者，十有六也。正月朔日，風從南方來，命曰旱鄉，從西風來，命曰白骨，將國有殃，人多死。亡。正月朔日，風從東方來，發屋揚沙石，國有大災。正月朔日，風從東南方行，春有死亡。正月朔日，天和溫不風，糴賤，民不病。天寒而風，糴貴，民多病。此所謂候歲之風，賊傷人者也。二月丑不風，民多心腹病。三月戌不溫，民多寒熱。四月

巳不暑民多癘病十月申不寒民多暴死諸所謂風者皆
發屋折樹木揚沙石起毫毛發腠理者也

歲露論

醫學綱目卷之二

醫學綱目卷之三

陰陽臟腑部

垣醫之可法 自伏羲神農黃帝而下名醫雖多可法者有數人至于華氏之剖腹王氏之鍼法術非不神也後人安得而效之非若岐伯之聖經雷公之炮灸伊摯之湯液箕子之五行越人之問難仲景之傷寒論叔和之脈訣士安之甲乙啓玄子之述作錢仲陽之議論潔古之方書皆活法所可學者豈千方萬論印定後人眼目者所能比哉其間德高行遠奇人異士與夫居縉紳隱草莽者雖有一法一節之可觀非百世可行之活法皆不取也予豈好辨哉欲使學者觀此數聖賢而知所向慕而已或有人焉徒欲廣覽泛涉自以為多學而用之無益者豈為知本

海錢氏活人王朝奉王德孚所論皆宋人易老守真皆金人所用之劑寒熱之不同者蓋本諸此讀此數書而用之

亦當以地方世代所宜責之然莫若取法于潔古折衷于仲景湯液則萬世不易之大法也

治法

素邪風之至病如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治六腑其次治五臟治五臟者半死半生也

病之始起也可刺而已其盛可待衰而已故因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之形不足者溫之以氣精不足者補之以味其高者因而越之其下者引而竭之中滿者瀉之於內其有邪者瀆形以為汗其在皮者汗而發之其慄悍者按而收之其實者散而瀉之審其陰陽以別柔剛陽病治陰陰病治陽定其血氣各守其鄉血實宜決之氣虛宜掣引之並見陰陽應象論

仲大法春宜吐夏宜汗秋宜下冬宜溫及灸

海病在天之無形當汗病在天之有形當吐病在地之無形當利小便病在地之有形當利大便

脉夫欲治病當先知其證何起乃可攻之耳

垣假令治病無問傷寒畜血結胃發黃等諸證并一切雜證等各當於六經中求責之如發黃證或頭痛腰脊強惡寒即有太陽證或身熱目痛鼻乾不得臥即有陽明證餘倣此不獨六經中求責五臟求責尤急務也假令面青脉弦口乾身熱煩心心痛掌中熱而腕即有心證也餘倣此

丹治病必求其本 病之有本猶草木之有根也去葉不去根草猶在也治病猶去草病在臟而治腑病在表而攻裏非惟戕賊胃氣抑且資助病邪醫云乎哉

一法治瘴積下利吐痰而愈 一法治汚血哽噎用非汁開汚血而愈 一法治下疳瘡自利用龍薈九柴胡

湯而愈其詳分見各門

海治病必求其本 假令腹痛桂枝加芍藥大實痛桂枝加大黃何為不只用芍藥大黃等而於桂枝內加之要從太陽中來以太陽為本也又如結胸證自高而下脉浮者不可下故先用麻黃湯解表表已脉沉後以陷胸湯下之是亦求其本也至於畜血下焦血結膀胱是從太陽中來侵盡無形之氣乃侵膀胱中有形血也

治分標本

素先病而後逆者治其本先逆而後病者治其本先寒而後生病者治其本先熱而後生寒者治其本先熱而後生病者治其本先泄而後生他病者治其本必且調之乃治其他病先病而後生中滿者治其標先中滿而後煩心者治其本人有客氣有同氣小大不利治其標小大利治其本病

治分新久

發而有餘本而標之先治其本後治其標病發而不足標而本之先治其標後治其本謹察間甚以意調之間者并行甚者獨行先小大不利而後生病者治其本

標本病傳論

仲夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾也

海初治之道法當峻猛者謂所用藥勢疾利猛峻也緣病得之新暴感雖輕得之重皆宜以疾利之劑急去之 中治之道法當寬猛相濟為病得之非新非久宜以緩疾得中之藥養正去邪相濟而治之假令如見邪氣多正氣少宜以去邪藥多養正藥少凡加減法如此之類更宜臨證消息增減用之仍依時令行之無妄也更加針灸其病即愈 末治之道法宜寬緩寬者察藥性平和緩者廣服無毒以養氣血安中蓋為病證已久邪氣伏潛至深而正氣微少故以善藥廣服養正氣而邪氣自去更加針灸其效

必速

治分五法

治病之道有五法和取從折屬也。一治各有五五五二
 十五如火之屬衰於戌金之屬衰於辰是也。一治日和
 假令小熱之病當以涼藥和之和不已次用取。二治
 曰取為熱勢稍大當以寒藥取之取之不已又用從。三
 治曰從為勢已甚當以溫藥從之為藥氣溫也味隨所用
 或以寒因熱用或以熱因寒用或以汗發之發之不已又
 用折。四治曰折為病勢極甚當以逆制之制之不已當
 以下奪之下奪之不已又用屬。五治曰屬為求其屬以
 衰之緣熱深陷在骨髓間無法可出針藥取之不能及故
 求其屬以衰之。求屬之法同聲相應同氣相求經曰陷下者衰之夫衰
 熱氣之法同前所云火衰於戌金衰於辰之類是也如或
 又不已當廣其法而治之。譬孫子之用兵若在山谷則塞

淵泉有水則把渡口。在平川廣野當清野千里塞淵泉者
 刺膺穴把渡口者奪病發時前清野千里者如肌羸瘦弱
 宜廣服大藥以養正氣。夫病有中外治有緩急。在內
 者以內治法和之。在外者以外治法和之。氣微不和
 以調氣法調之。其次大者以平氣法平之。盛甚不已
 則奪其氣令其衰也。故經曰調氣之方必別陰陽定其中
 外各守其鄉。內者內治。外者治外。微者調治。其
 次平治。盛者奪之汗之下之。寒熱溫涼衰之以屬隨
 其攸利。

治分難易

難臟病難治腑病易治何謂也。然臟病所以難治者傳其
 勝也。腑病易治者傳其子也。與七傳間臟同法也。

治分脉有神無神

海脉之不病其神不言當自有也。脉之既病當求其中神
 之有與無焉。謂如六數七極熱也。脉中有九即有神也。三

遲二敗寒也。脉中有力即有神也。熱則有神也。當泄其熱。則神在焉。寒則有神也。當去其寒。則神在焉。寒熱之脉無力無神。將何藥以泄熱去寒乎。苟不知此。而遽泄去之。將何依以生。所以十亡八九。

治分形志苦樂

素形樂志苦。病生於脉。治之以灸刺。形樂志樂。病生於肉。治之以鍼石。形苦志樂。病生於筋。治之以熨引。形苦志苦。病生於咽嗑。治之以百藥。形數驚恐。經絡不通。病生於不仁。治之以按摩。醪藥是謂五形志也。血氣形志篇

治分緩急

海緩急辨。經云。治主以緩。治客以急。所當知也。諸有表證。當汗。脉浮急。汗之。脉沉緩。汗之。諸有裏證。當下。脉浮緩。下之。脉沉急。下之。三陽汗當急而下當緩。三陰汗當緩而下當急。主為病則緩去之。客為病則急去之。胃中氣病自病也。為主。治當緩。胃中血病他病也。

為客。治當急。上無形。下入腹中。即為客也。治當急。下有形。上入腹中。即為主也。治當緩。歲之六氣主也。司天在泉間氣客也。補上治上。制以緩。不犯血藥。便謂之緩。非緩慢之緩也。補下治下。制以急。不犯氣藥。便謂之急。非急速之急也。熱在至高之分。故用輕劑。從高而按。治從緩也。若急服之。上熱未退。而中寒復生矣。若入有形。當下之者。從其急。從其急者。從其權也。大腸滑泄。治以收之。服藥當以一物壓之。欲其及於下部也。故服在空心。食前。若在食後。非徒無益。而又害之。此謂治之緩也。近者奇之。先急而後緩。遠者偶之。先急而後緩。下者奇之。先緩而後急。汗者偶之。先緩而後急。

靈樞奇偶。汗從九地之下。下從九地之上。

治分四時

東垣諸病四時用藥之法。不問所病。或溫或涼。或熱或寒。

如春時有疾於所用藥內加清涼風藥夏月有疾加大寒之藥秋月有疾加溫氣藥冬月有疾加大熱藥是不絕生化之源也錢仲暘醫小兒深得此理內經曰必先歲氣無伐天和是為至治又曰無違時無伐化又曰無伐生生之氣此皆常道也用藥之法若反其常道而變生異證則當從權施治假令病人飲酒或過食寒或過食熱皆可以增疾如此以權衡應變治之權變之藥豈可常用乎權變之藥於時禁藥禁有不暇顧者矣故不可輕用

辨攻之非
丹愚聞張子和書惟務攻擊其意以正氣不能自病因為邪所客所以為病也邪去正氣自安因病有在上中下深淺之不同立為吐汗下三法以攻之初看其書將謂醫之法盡於是矣復因思內經有言謂之虛者精氣虛也謂之實者邪氣實也夫邪所客必因正氣之虛然後邪得而客

之苟正氣實邪無自入之理由是於子和之書不得不致疑於其間又思內經有言陰平陽秘精神乃治陰陽離訣精氣乃絕又思仲景有言病當汗解診其尺脈瀉當與黃芪建中湯補之然後汗之於是知張子和之書非子和之筆也和馳名中土其法必有過於同輩者何其書之所言與內經仲景之意若是之不同也於是決意於得明師以為之依歸發其茅塞遂遊江湖但聞某處有某醫便往而拜問之連經數郡無一人焉後到真定始得原病式東垣藁乃大悟子和之孟浪然終未得的然之議論將謂江浙間無可為師者泰定乙丑夏始得聞羅太無於陳芝岩之言遂往拜之蒙叱罵者五七次超超二閱月始得降接因觀羅先生治一病僧黃瘦倦怠羅詢其病因乃蜀人出家時其母在堂又遊浙右經七年忽一日念母之心不可

過欲歸無腰纏徒爾昕夕西望而泣以是得病時僧二十
五歲羅今隔壁宿泊每日以牛肉猪肚其肥等煮糜爛與
之凡經半月餘且時以慰諭之言勞之又曰我與銀拾錠
作路費我不望報但欲救汝之死命耳察其形稍甦脉稍
克與桃仁承氣一日三貼下之皆是血塊痰積方止次日
乃與熟菜稀粥將息又半月其人遂如舊又半月餘與銀
遂行因大悟攻擊之法必其人克實稟受素壯乃可行也
否則邪去而正氣傷小病必重重病必死羅每日有求醫
者必令其診視其脉狀回稟羅但臥聽口授用某藥治某
病以某藥監某藥以某藥為引經往來一年半並無一定
之方至於一方之中有攻補兼施者亦有先攻後補者有
先補後攻者又大悟用古方治今病焉能照合隨時取中
此之謂歟其時羅又言用古方治今病正如拆舊屋補湊

新屋其材木非一一再經匠氏之手其可用乎由是又思
許學士釋微論曰予讀仲景書用仲景法然未嘗守仲景
之方乃為得仲景之心也遂取東垣方稿手自抄錄乃悟
治病入當如漢高祖繼暴秦周武王繼商之後自非散財
發粟與三章之法其受傷之氣倦憊之人何由而平復也
於是知陰易之陽易亢攻擊宜審正氣須保護以局方為
懲戒哉

論張劉
所主不
同

海虞許先生論梁寬父症右脇肺部也咳而吐血舉動喘
逆者肺診也發熱脉數不能食者火來刑金肺與脾俱虛
也肺與脾俱虛而火乘之其病為逆如此者例不可補瀉
蓋補金則慮金與火持而喘咳益增瀉火則慮火不退位
而痰癖反盛止宜補中益氣湯先扶元氣少以治病藥和
之聞已用藥而未獲效必病勢苦逆而藥方未到也當與

寬父熟論遠期秋涼庶可平復蓋肺病者惡春夏火氣至
秋冬則退正宜於益氣湯中隨四時陰陽升降浮沉溫涼
寒熱及見有症增損服之升降浮沉則順之溫涼寒熱則
反之順其理和其氣為治之大方也或覺氣壅間與加減
枳朮丸或有飲間服局方枳朮湯數月後庶逆氣少回逆
氣回則治法可施但恐已至色青色赤脉弦脉洪則無及
矣近世論醫有主河間劉氏者有主易州張氏者張氏用
藥依準四時陰陽升降而增損之正內經四氣調神之義
醫而不知此是妄行也劉氏用藥務在推陳致新不使少
有怫鬱正造化新新不停之意醫而不知此是無術也然
主張氏者或未盡張氏之妙則瞑眩之劑終莫敢投至失
幾後時而不救者多矣主劉氏者或未極劉氏之妙則取
效目前陰損正氣遺害後日者多矣能用二子之長而無

二子之弊其庶幾乎史副使病不見色脉不能懸料以既
愈復發言之則恐亦宜取張氏依準四時陰陽升降用藥
以扶元氣庶他日既愈而不發也寬父病後初感必深所
傷物恐當時消導不盡停滯淹延變生他症以至于今恐
亦宜效劉氏推陳致新之法少加消導藥於益氣湯中庶
可以取效也

倒倉法

丹溪倒倉論經曰腸胃為市以其無物不有而穀最為多

故謂之倉若積穀之室也倒者傾去舊積而滌濯使之潔
淨也胃居中屬土喜容受而不能自運者也人之飲食遇
適口之物寧無過量而傷積者乎七情之偏五味之厚寧
無傷於中和之德乎糟粕之餘停痰瘀血互相糾纏日積
月深鬱結成聚甚如桃核之穰諸般奇形之虫中宮不清
矣土德不和矣誠於中形於外發為癰瘰為癆瘵為蠱脹

為癩疾為無名奇病先哲制為萬病丸溫白丸等劑攻補兼施寒熱並用期中病情非不功巧然不若倒倉之為便捷者也以黃牡牛擇肥者買一二十斤長流水煮爛融入湯中為液以綿濾出查滓取淨汁再入鍋中文武火熬至琥珀色則成矣每飲一鍾少時又飲如此者積數十鍾寒月則重湯溫而飲之病在上者欲其吐多病在下者欲其利多病在中者欲其吐下俱多全在活法而為之緩急多寡也須先置一室明快而不通風者以安病人視所出之物可盡病根則止吐利後或渴不得飲湯其小便必長取以飲病者名曰輪迴酒與一二碗非惟可以止渴抑且可以滌濯餘垢睡一二日覺飢甚乃與粥淡食之待三日後始與小菜羹自養半月覺精神煥發形體輕健沉痾悉安矣其法須五年忌食牛肉吾師許文懿公始病心痛用熱

燥香辛如丁附桂姜輩治數年而足孿痛甚且惡寒而多嘔甚而至于靈砂黑錫黃芽熾丹繼之艾火十餘萬又雜治數年而痛益甚自度為廢人矣衆工亦技窮矣如此者又數年困甚煩渴惡食者一月已服通聖散半月餘而大腑逼迫後重肛門熱氣如燒始時下積滯如五色爛錦者又如柏燭油膩者近半月而病似退減又半月而畧思穀唯兩足難移計無所出至次年三月遂作此法節節如應因得為全人次年再得一男又十四年而壽終又一婦人久年脚氣吐利而安又臨海林兄患久嗽吐血發熱消瘦衆以療治之百方不應召予視之脈兩手弦數日輕夜重計無所出亦因此而安時冬十月也第三年得一子又鎮守百戶蕭伯善公以便濁而精不禁親與試之有效夫牛坤土也黃土之色也以順為德而效法乎健以為功者牡

之用也。肉者胃之樂也，熟而為液，無形之物也。橫散入肉，經由腸胃而滲透膚腠，毛竅爪甲無不入也。積聚久則形質成，依附腸胃回薄，曲折處以為棲泊之窠。曰：阻碍津液，氣血薰蒸燔灼成病，自非倒腸刮骨之神妙，孰能去之？又豈以合勺銖兩之丸散所能窺犯其藩牆戶牖乎？切詳肉液之散溢，腸胃受之其厚，皆倍於前，有似乎腫，其回薄曲折處，非復向日之舊肉液，充滿流行，有如洪水泛漲，其浮莖陳朽，皆推逐蕩漾，順流而下，不可停畱表者，因吐而汗，清道者自吐而涌，濁道者自泄而去，凡屬滯碍一洗而空，牛肉全重厚和順之性，盎然渙然，潤澤枯槁，補益虛損，寧無精神渙發之樂乎？正似武王克商之後，散財發粟，以賑殷民之望也。其方出於西域之至人，於中年後可行一二，次亦却疾養壽之一助也。與戴廟齋書，倒倉法，非敢吝。

也。志於學者不多也。然患者往往徂於苟安，而靠後功夫，全籍自飲輪迴酒十餘盃，以祛逐餘垢，迎接調勻新布榮衛，使臟腑盲膜生意敷暢，有脫胎換骨之功者也。多嫌其穢而不肯喫，若非明物理通造化者，其肯視為美醞良藥乎？前日相見時，失議此一節，蓋有數人曾因此成中輟者，寧不功虧一篔，徒爾跋涉，且是暴殄天物，敢此詳告。又中間飲到七八鍾後，藥力經涉經絡骨節中，搜逐宿垢，正邪寧不抵牾，必有急悶，似痛非痛，有一段惡况，此皆好消息，邪不勝正，將就擒耳，尤須忍耐而受，又於欲吐未吐，欲泄未泄，或吐瀉交作時，自有惱聒意思，皆須歡喜樂受，一聽醫者以靜待之，况此等又有大半日景象，必先說知，使方寸瞭然，庶臨時可以安守也。倒倉治癱勞蠱癩等症，推陳致新，扶虛補損，可吐可下，用黃色肥牯牛腿精肉二

十斤順取急長流水於大鍋內煮候水耗少再添湯不可添冷水以肉爛成查為度濾去查用肉湯再熬如琥珀色隔宿不吃晚飯如大便秘者隔宿服神功丸不秘者不用五更以密室不通風處溫服一鍾候隔間藥行又服陸續至七八鍾如病人不欲服強再與之必身體皮膚間皆痛方見吐下如病在上欲吐多者須緊服又不可太緊恐其不納病在下欲利多者須踈服又不可太踈恐其下遠臨時消息大抵先見下方可使吐須極吐下使其上下積俱盡出大便中須見核桃肉狀無臭氣則止得睡覺氣定與喫還魂酒一二鍾即病人瘦弱也粥食將息無有不愈未行此法前一月不可近婦人已行此法後半年不可近婦人三年不喫牛肉如性急好色不守禁忌者不可行此法也倒倉全在初三鍾慢飲最緊要能行經墜中去

藥性不同

素厚味者為陰薄為陰之陽氣厚者為陽薄為陽之陰味

東垣風升生味之薄者陰中之陽味薄則通陰陽應象論

防風	升麻	羌活	柴胡
葛根	葳靈仙	細辛	獨活
白芷	桔梗	黍粘子	藁本
川芎	蔓荊子	秦艽	天麻
麻黃	荊芥	薄荷	前胡
熱浮長氣之厚者陽中之陽氣厚則發熱			
附子	烏頭	乾薑	生薑
良薑	肉桂	桂枝	草薺
丁香	厚朴	木香	益智
白荳蔻	川椒	吳茱萸	茴香

玄胡索

縮砂

紅花

神麩

濕化成其蒸氣味

氣溫涼寒熱在人則以胃應之味辛酸苦在人則以脾應之

黃芪

人參

甘草

當歸

熟地

半夏

蒼朮

白朮

陳皮

青皮

藿香

檳榔

莪木

三稜

阿膠

訶子

杏仁

麥芽

桃仁

紫草

蘇木

燥降收氣之薄者陽中之陰氣薄則發泄

茯苓

澤瀉

猪苓

滑石

瞿麥

車前子

木通

燈草

五味子

桑白皮

犀角

白芍藥

天門冬

烏梅

牡丹皮

地骨皮

枳殼

琥珀

連翹

枳實

麥門冬

寒沉歲味之厚者陰中之陰味厚則泄

大黃

黃柏

黃芩

黃連

石膏

草龍膽

生地黄

知母

防己

茵陳

牡礪

瓜蒌根

朴硝

玄參


山梔

川練子

香豉

地榆

脾不主時於四季末各旺一十八日乃坤土也生化一
 十一歲受胃之稟乃能生化
 天有陰陽溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也寒涼者
 天之陰也 地有陰陽辛甘淡酸苦鹹六味是也辛甘淡
 地之陽也酸苦鹹地之陰也 輕清成象味薄細茶之類
 本乎天者親上 重濁成形味厚大黃之類本乎地者親
 下 味之薄者為陰中之陽味厚則泄酸苦鹹寒是也 氣之
 味之厚者為陰中之陰味薄則通酸苦鹹平是也 氣之
 厚者為陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也 氣之薄
 者為陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也
 清陽發滕理清之清者也 清陽實四肢清之濁者也
 濁陰歸六腑濁之濁者也 濁陰走五臟濁之清者也
 粥淡陽中之陰所以利小便 茶苦陰中之陽所以清眼



目

苦藥平升 微寒平亦升 甘辛藥平降 甘寒瀉火
苦寒瀉濕熱 苦甘寒瀉血熱

素壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯火散
氣少火生氣陰陽應象論 壯火姜附之屬少火升麻葛根之
屬

帝曰五味陰陽之用如何岐伯曰辛甘發散為陽酸苦涌
泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽六者或收或散或

緩或急或燥或潤或軟或堅以所利而行之調其氣使其
平也至真大要論

垣辛能散結潤燥 苦能燥濕堅軟 鹹能軟堅 酸能
收緩收散 甘能緩急 淡能利竅

五辣 蒜辣心 薑辣頰 葱辣鼻 芥辣眼 蓼辣舌

素五味所入酸入肝辛入肺苦入心鹹入腎甘入脾是謂
五入宣明五氣篇

引經

東垣引經藥

太陽經 手羌活 足黃柏

陽明經 手白芷升麻 足石膏

少陽經 手柴胡 足青皮

太陰經 手桔梗 足白芍藥

少陰經 手獨活 足知母

厥陰經 手柴胡 足青皮

向導

手太陰肺

南星

欵冬花

升麻

桔梗

山藥

檀香

粳米

五味子

白茯苓

天門冬

麥門冬

阿膠

桑白皮

葱白

杏仁

麻黃

益智

丁香

白芷

砂仁檀香為使

知母

梔子

黃芩

石膏

足太陰脾

草薺

茱萸

砂仁人參為使

防風

當歸

益智

黃芪

蒼朮

白朮

膠飴

代赭石

茯苓

麻子

甘草

半夏

通入手足太陰肺脾

升麻

芍藥

木瓜

藿香

白芍藥

玄胡索

砂仁

手陽明大腸

升麻

白芷

麻子

秦艽

薤白

白石脂

砂仁白石脂為使

肉苳蔻

石膏

足陽明胃

丁香

草薺

砂仁

防風

石膏

知母

白朮

神麩

葛根

烏藥

半夏

蒼朮

升麻

白芷

葱白

通入手足陽明

麻黃酒

大黃酒

連翹

升麻

白朮

葛根

石膏

檀香佐以他藥

白芷

手少陽三焦

川芎

大黃酒

柴胡

青皮

白朮

熟地

黃芪

地骨皮

石膏

細辛

附子

足少陽膽

半夏

草龍膽

柴胡

通入手足少陽

青皮

川芎

柴胡

連翹

手厥陰心包絡

沙參

白朮

柴胡

熟地

牡丹皮

敗醬

足厥陰肝

草龍膽

蔓荊子

阿膠

瞿麥

桃仁

山茱萸

代赭石

紫石英

當歸

甘草

青皮

羌活

吳茱萸

白朮

通入手足厥陰

青皮

熟地

柴胡

川芎

皂角

苦茶

桃仁

手太陽小腸

白朮

生地黃

羌活

赤茯苓

赤石脂

砂仁赤石脂為使

足太陽膀胱

蔓荊子

滑石

茵陳

白茯苓

猪苓

澤瀉

桂枝

黃柏

羌活

麻黃

通入手足太陽

防風

羌活

藁本

蔓荊子

茴香

黃栢

白木

澤瀉

防已

大黃酒

手少陰心

麻黃

桂心

當歸

生地

黃連

代赭石

紫石英

梔子

獨活

赤茯苓

足少陰腎

知母

黃栢

地骨皮

阿膠

猪膚

牡丹皮

玄參

敗醬

牡蠣

烏藥

山茱萸

天門冬

猪苓

澤瀉

白茯苓

檀香

甘草

五味子

吳茱萸

益智

丁香

獨活或用稍

桔梗或用稍

砂仁黃栢茯苓為使

通入手足少陰

細辛

熟地

五味子

澤瀉

地榆

附子

知母

白木

命門

附子

沉香

益智

黃芪

製方大去

恒藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同類之物味皆鹹其氣皆寒之類是也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相為用各有厚薄性用不等製其方者必宜明其為用經曰味為陰味厚為純陰味薄為陰中之陽氣為陽氣厚為純陽氣薄為陽中之陰味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱又曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽凡此之味各有所能辛能散結潤燥苦能

淡味滲泄為陽凡此之味各有所能辛能散結潤燥苦能

燥濕軟堅鹹能軟堅酸能收緩收散甘能緩急淡能利竅
若用其味必明其氣之可否若用其氣必明其味之所宜
識其病之標本臟腑寒熱虛實微甚緩急而用其藥之氣
味隨其症而製其方可也是故方有君臣佐使輕重緩急
君臣大小反正逆從之制也主治病者為君佐君者為臣
應臣者為使用此隨病之所宜而又贊成方而用之君一
臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也
君二臣六偶之制也去咽嗑近者奇之遠者偶之汗者不
奇下者不偶補上治上制之以緩補下治下制之以急急
者氣味厚也緩者氣味薄也薄者少服而頻食厚者多服
而頓食又當明五氣之鬱木鬱達之謂吐令條達也火鬱
發之謂汗令踈散也土鬱奪之謂下無壅滯也金鬱泄之
謂解表泄小便也水鬱折之謂制其衝逆也通此五法乃

治病之大要也

素帝曰非調氣而得者治之柰何有毒無毒何先何後願
聞其道岐伯曰有毒無毒所治為主適大小為制也帝曰
請言其制岐伯曰君一臣二制之小也君一臣三佐五制
之中也君一臣三佐九制之大也寒者熱之熱者寒之微
者逆之甚者從之堅者削之客者除之勞者溫之結者散
之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益之逸
者行之驚者平之上之下之摩之浴之薄之劫之開之發
之適事為故帝曰何謂逆從岐伯曰逆者正治從者反治
從少從多觀其事也帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒
因熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其所因其
始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必

已至真要大
論下同

此言內氣失調而得病之治法也。

帝曰氣調而得者何如岐伯曰逆之從之逆而從之從而逆之踈氣今調則其道也。

此言內氣本調因感外邪得病之治法也。蓋內氣失調之病根本不固惟病邪微者可逆治之苟病邪甚者逆治之則病邪格拒必變危矣故反從其病勢而治之也。如元氣本調之病根本堅固則不分微甚皆可逆從而治之也。

帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上下三品之謂也帝曰三品何謂岐伯曰所以明善惡之殊貫也。

臣為君者最多為臣者次之佐者又次之藥之於症所主同者各等分凡藥之所用者皆以氣味為主補瀉在味隨

時換氣主病者為君假令治風防風為君治上焦熱黃芩為君治中焦熱黃連為君治濕防已為君治寒附子之類為君兼見何症以佐使藥分治之此制方之要也如仲景治表虛製桂枝湯方桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者親上故桂枝為君甘草芍藥為佐陽脉瀆陰脉弦法當腹中急痛製小建中湯方芍藥味酸寒主收補中本乎地者親下故芍藥為君桂枝甘草佐之一則治表虛一則治裏虛各言其所主用也後之用古方者觸類而長之庶不至差悞矣凡解利傷風以防風為君甘草白朮為佐經云辛甘發散為陽風宜辛散防風味甘辛又治風通用故防風為君甘草白朮為佐凡解利傷寒以甘草為君防風白朮為佐是寒宜甘發也或有別症於前隨症治病藥內選用其分兩以君臣論凡眼暴熱赤腫以防風黃

苓為君以瀉火以黃連當歸根和血為佐兼以各經藥用之。凡眼久病昏暗以熟地黃當歸根為君以羌活防風為臣甘菊甘草之類為佐。凡痢疾腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐見血先後以三焦熱論。凡水瀉茯苓白朮為君芍藥甘草為佐。凡諸風以防風為君隨症治病藥為佐。凡嗽以五味子為君有痰者以半夏為佐。喘者以阿膠為佐有熱無熱以黃芩為佐但分兩多寡不同耳。凡小便不利黃柏知母為君茯苓澤瀉為佐。凡下焦有濕草龍膽防風為君甘草黃柏為佐。凡痔漏以蒼朮防風為君甘草芍藥為佐詳別症加減。凡諸瘡以黃連當歸為君甘草黃芩為佐。凡瘰癧以柴胡為君隨所發時所屬經分用引經藥佐之。

已上皆用藥之大要更詳別症於後隨症治病藥內逐

一加減用之

隨症用藥

仲夫諸病在臟欲攻之當隨其所得而攻之如渴者與猪苓湯餘皆倣此。

頭頭痛須用川芎如不愈各加引經藥。太陽川芎陽明白芷太陰蒼朮少陰

細辛少陽柴胡厥陰吳茱萸頂癩痛須用藁本去川芎。一本作項頸腦痛

肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之。腹痛須用芍藥惡

寒而痛者加桂惡熱而痛者加黃柏。心下痞用枳實黃

連。肌熱及去痰者須用黃芩肌熱亦用黃芪。腹脹用

薑制厚朴。虛熱須用黃芪止虛汗亦用。脇下痛往來

寒熱日晡潮熱須用柴胡。脾胃受濕沉困無力怠墮好

臥去痰用白朮。破滯氣用枳殼高者用之。夫枳殼者損

胃中至高之氣三二服而已。破滯血用桃仁蘇木。補

血不足須用甘草。去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰加

南星胸中寒痰痞塞用陳皮白朮多用苦寒則瀉脾胃

腹中窄狹須用蒼朮 調氣須用木香 補氣須用人參

和血須用當歸凡血受病者皆當用當歸也 去下焦

濕腫及痛并膀胱有火邪者必須酒洗防已草龍膽黃栢

知母 去上焦濕及熱須用黃芩瀉肺火故也 去中焦

濕熱與痛用黃連瀉心火故也 去滯氣用青皮勿多服

多服則瀉人真氣 渴者用乾葛茯苓禁半夏 嗽者用

五味子 喘者用阿膠 宿食不消用黃連枳實 胃中

煩熱須用梔子仁 水瀉須用白朮茯苓芍藥 氣刺痛

用枳實看何部分以引經藥導使之行則可 血刺痛用

當歸詳上下用根稍 瘡痛不可忍者用苦寒藥如黃栢

黃芩詳上下根稍用及引經藥則可 眼痛不可忍者用

黃連當歸根以酒浸煎 小便黃者用黃栢數者瀉者或

加澤瀉 腹中實痛兼熱用大黃芒硝 小腹痛用青皮

莖中痛用生甘草稍 飲水多致傷者用白朮茯苓猪

苓 胃脘痛用草薤菹 凡用純寒純熱藥必用甘草以

緩其力也寒熱相雜亦用甘草調和其性也中滿禁用經

曰中滿者勿食甘

潔古非白朮不能去濕非枳實不能消痞非天雄不能補

上焦陽之虛非附子不能補下焦陰之虛

垣如脈緩怠惰嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平

胃散若脈弦氣弱自汗四肢發熱或大便泄瀉或皮毛枯

槁髮脫落從黃芪建中湯 脈虛而血弱於四物湯中摘

一味或二味以本顯症中加之 或真氣虛弱及氣短脈

弱從四君子湯 或渴或小便秘澀赤黃多少從五苓散

去桂摘一二味加正藥中 假令表虛自汗春夏加黃芪

秋冬加桂如腹中急縮或脉弦加防風急甚加甘草腹中
窄狹或氣短者亦加之腹滿氣不轉者勿加雖氣不轉而
脾胃中氣不和者勿去但加厚朴以破滯氣然亦不可多
用於甘草五分中加一分可也腹中奔悶此非腹脹乃散
而不收可加芍藥如肺氣短促或不足者加人參白芍
中焦用白芍則於脾中升陽使肝膽之邪不敢犯也腹中
窄狹及縮急者去之及諸酸清藥不可用腹中疼痛者
加甘草芍藥稼穡作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲
已化土此仲景妙法也腹痛蕪發熱加黃芩惡寒或腹中
覺寒加桂怠惰嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或泄瀉
加蒼朮自汗加白朮小便不利加茯苓渴亦如之氣弱者
加白茯苓人參氣盛者加赤茯苓硝砂仁氣復不能轉運
有熱者微加黃連心煩亂亦加之小便少者加猪苓澤瀉

汗多津液竭於上勿加之是津液還入胃中欲自行也
不渴而小便秘塞加炒黃栢知母小便澀者加炒滑石小
便淋澀者加澤瀉且五苓散治渴而小便不利無惡寒者
不得用桂不渴而小便自利妄見妄聞乃瘀血症用炒黃
栢知母以除腎中燥熱竅不利而淋加澤瀉炒滑石只治
竅不利者六乙散中加木通亦可心葳熱者用錢氏導赤
散中滿或但腹脹者加厚朴氣不順加橘皮氣滯加青皮
一橘皮三氣短小便利者四君子湯中去茯苓加黃芪以
補之如腹中氣不轉者更加甘草一半腹中刺痛或周身
刺痛者或裏急者腹中不寬快是也或虛坐而大便不得
者皆血虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛者皆加
當歸身頭痛加川芎苦頭痛加細辛此少陰頭痛也髮脫
落及臍下痛者加熟地黃如皮毛肌肉之不伸無大熱

不能食而渴者加葛根半兩。燥熱及胃氣上衝為衝脉所逆或作逆氣而裏急者加炒黃栢知母覺胃熱而不渴加炒黃芩如胃中結滯氣澁或有熱者亦各加之。如食少而小便少者津液不足也勿利之益氣補胃自行矣。如氣弱氣短者加人參只升陽之劑助陽之勝多加參。惡熱發熱而燥渴脉洪大者白虎湯主之或喘者加人參如渴不止寒水石膏各等分少與之即錢氏方中甘露散主身大熱而小便數或上飲下澉此燥熱也氣燥加白葵花血燥加赤葵花。如小便行病增者此內燥津液不能停當致津液少加炒黃栢赤葵花。如心下痞悶者加黃連一黃芩三減諸甘藥不能食心下軟而痞者甘草瀉心湯則愈。痞有九種治有五方見仲景瀉心篇如喘滿者加炙厚朴便不利者加之如胃虛弱而痞者加甘草。喘而小便不利為禁藥。

利者加苦葶藶。如氣短氣弱而腹微滿者不去人參去甘草加厚朴然不若苦味泄之而不令大便行如腹微滿而氣不轉者加之。如中滿者去甘草倍黃連加黃栢更加三味五苓散少許此病雖宜不宜汗如汗多亡陽加黃芪四肢煩熱肌熱與柴胡羌活升麻葛根甘草則愈。如鼻清涕惡風或項背脊強痛羌活防風甘草等分黃芪倍加臨臥服之。脉熱身熱加減法見發熱門。

約方禁服篇云約方猶約囊也囊滿弗約則輸泄方成弗約則神與氣弗俱未滿而知約之可以為上不可以為天下師此聖人所以退太過而進不及以平為期也大凡氣味者有毒無毒固宜常制矣是以大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九餘

以穀肉菜果食養盡之無使過之傷其正也。至如君一臣二，奇之制也。君二臣四，偶之制也。近而奇偶制小，其服遠而奇偶制大，其服大則數少，小則數多，多則九之，少則二之。補上治上，制以緩，補下治下，制以急急，則氣味厚，緩則氣味薄，下不以偶，汗不以奇，隨其邪之所在，高下淺深，輕重虛實，影響無間，萬舉萬全，是謂中行，故可為師也。假如證大而湯劑小，則邪氣少，屈故藥力已乏，欲不復治，其可得乎？猶一盃水救一輿薪之火，火竟不滅，是謂不及，故不可以為師，而可以為工矣。證小則湯劑大而邪服，邪已盡而藥餘力，欲不傷正，何所容哉？猶火炎崑崗，玉石俱焚，莫之能止，是謂太過，此又不可以為工，是為僮醫也。三者之論，惟中而已，過與不及，皆為偏廢，然而太過猶甚於不及，何以明之？蓋失於姑息，邪復勝正者，止於勞而無益，猶可

勉而適中，或失苛暴，則血氣被傷，因致羸替者，有之。危殘者，有之。滅亡者，有之。非徒無益，而又害之，此所謂猶甚也。可不戒哉？嘗考仲景之書，於承氣湯下，攻裏則曰：若更衣止，後服於桂枝方後，發表乃云：漿漿微汗，益佳，不可令如水淋漓，皆本乎軒岐之微旨也。

丸散法

仲言劉如麻頭與咬咀同意。夫咬咀，古之制也。古者無銖刃，以口咬細，今如麻頭為籠末，煎之使藥水清，飲於腹中，則易升易散也。此所謂咬咀也。今人以刀器剉如麻頭大，比咬咀之易成也。若一槩為細末，不分清濁矣。經云：清陽發腠理，濁陰走五臟，果何謂也？又曰：清陽實四肢，濁陰歸六腑，咬咀之藥，取汁易行經絡故也。若治至高之病，加酒煎去濕，以生薑補元氣，以大棗發散風寒，以葱白去膈上痰，以蜜細末者，不循經絡，止去胃中及臟腑之積氣，味厚

者白湯調氣味薄者煎之和查服去下部之疾其丸極大
而光且圓治中焦者次之治上焦者極小用稠麪糊取其
遲化直至下焦或酒或醋取其收其散之意也犯半夏南
星欲去濕者以生姜汁稀糊爲丸取其易化也水浸宿炊
餅者易化滴水丸者又易化煉蜜丸者取其遲化而氣循
經絡也蠟丸者取其難化而旋旋取效也大抵湯者蕩也
去久病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能
速去之取用藥之舒緩而治之意也病在心上者先食
而後藥病在心下者先藥而後食病在四肢者宜飢食而
在且病在骨髓者宜飽食而在夜古之方劑鎰分兩
與今不同云一升者今之大白盞也云鎰者六鎰爲一分
卽二錢半也二十四鎰爲一兩也三兩者今之一兩二兩
者今之六錢半也料例大者合三分之一足矣大黃恐

寒則損胃氣須煨至於川烏附子須炮以制毒也黃栢
知母下部藥也久弱之人須合用之酒浸曝乾恐寒傷胃
氣也熟地黃酒洗亦然當歸酒浸助發散之意也

至元庚辰六月許伯威年五十四中氣本弱病傷寒八
九日醫者見其熱甚以涼藥下之又食梨三四枚痛傷脾
胃四肢冷時發昏憤余診其脉動而中止有時自還乃結
脉也心亦悸動吃噫不絕色變青黃精神減少目不欲開
倦臥惡人語笑以炙甘草湯治之成無已云補可去弱人
參大棗之甘以補不足之氣桂枝生姜之辛以益正氣五
臟痿弱榮衛涸流濕劑所以潤之故用麻仁阿膠麥門冬
地黃之甘潤經益血復脉通心是也加以人參桂枝急扶
正氣生地黃減半恐傷陽氣剉一兩劑服之不效予再候
之脉證相對莫非藥有陳腐故不效乎再而藥之氣味厚

者煎服其證減半再服而安凡藥之昆虫草木產之有地
根葉花實採之有時失其地則性味少異失其時則氣味
不全又况新陳之不同精麤之不等倘不擇而用之其不
效者醫之過也內經曰司歲備物氣味之精專也修合之
際宜加謹焉

病人服藥必擇人煎熬制度令親信恭誠至意者為之煎
藥銚器除油垢腥穢必用新淨甜水為上量水多少斟酌
以慢火煎熬分數用紗濾去渣取清汁服之無不效也

醫學綱目卷之四

陰陽臟腑部

治虛實法

虛實大法

素邪氣盛則實精氣奪則虛

通評虛實論○此二句乃虛實之要領

邪之所湊其氣必虛

評熱論○針經云風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人許學士云邪之所湊

其氣必虛留而不去其病則實

難人有三虛三實何謂也有脉之虛實有病之虛實有診

之虛實脉之虛實者濡者為虛緊牢者為實病之虛實者

出者為虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急

者為實診之虛實者濡者為虛牢者為實痒者為虛痛者

為實外痛內快為外實內虛內痛外快為內實外虛故曰

虛實也

素所謂重實者言大熱病氣熱脉滿是謂重實

通評虛實論下同

脉氣虛尺虛

甲乙經作脉虛氣虛尺虛

是謂重虛所謂氣虛者言無

常也尺虛者行步恆然脉虛者不象陰也 脉盛皮熱腹

脹前後不通悶齋此謂五實五實死身汗得後利則實者

活玉機真藏論下同○子和診一舟子病乃五實也作大類下七八十九連瀉二百餘行與 脉細皮寒氣少泄利

前後飲食不入是謂五虛五虛死漿粥入胃泄注止則虛

可活治五虛黃芪建中湯理中湯之類方見後條傷寒

恒胃中元氣盛則能食而不傷過時而不饑脾胃俱旺則

能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而

四肢不舉脾實而邪氣盛也治脾胃虛補中益氣湯見發熱

形氣不足病氣有餘是邪勝也急瀉之形氣有餘病氣

不足急補之形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可

刺之刺之則重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟

空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣形氣有餘病氣有

餘此謂陰陽俱有餘也急瀉其邪調其虛實根結篇○束

作之時病氣精神增添者是謂病氣有餘若病來劇作之時神氣困弱者是謂病氣不足病氣有餘乃邪氣勝也急瀉之以寒涼酸苦之劑病氣不足急補之以辛甘熱之劑

不問形氣有餘及形氣不足只取病氣有餘不足也夫形氣者氣謂口鼻中氣息也形謂皮肉筋骨血脉也形勝者為有餘消瘦者為不足察其氣者審口鼻中氣勞役如鼓

為氣有餘若喘息氣促氣短或不足少息者為不足其曰形氣謂人形體中之血氣也當補當瀉全不在此只在病

勢潮作之時精神困弱語言無力懶語者急補之若形氣不足病未潮作之時亦為不足此乃陰陽俱不足也禁用

針當補之以甘藥不已灸臍下一寸五分氣海穴也

素陽道實陰道虛太陰陽明論 至陰虛天氣絕至陽盛地氣

不足氣不足論

血實氣虛則肥氣實血虛則瘦所以肥能寒而不能熱

瘦能熱而不能寒者由寒則傷血熱則傷氣損其不足則

陰陽愈偏故不能也損其有餘者方得平調故能之矣

肥而澤者血氣有餘肥而不澤者氣有餘血不足瘦而

瘦而澤者血氣有餘肥而不澤者氣有餘血不足瘦而

瘦而澤者血氣有餘肥而不澤者氣有餘血不足瘦而

瘦而澤者血氣有餘肥而不澤者氣有餘血不足瘦而

瘦而澤者血氣有餘肥而不澤者氣有餘血不足瘦而

瘦而澤者血氣有餘肥而不澤者氣有餘血不足瘦而

陰陽氣血虛實

無澤者血氣俱不足，審察其形氣有餘不足而調之，可以知逆順矣。陰陽二十五人篇

衛氣虛則汗多，榮血虛則無汗。經云：衛氣者所以肥腠理，司開闔者也。今衛虛則腠理疎，開闔無司而汗多矣。又云：奪血者無汗，奪汗者無血。今血少則無汗矣。

毛髮三足候

美眉者太陽多血，通髯極鬚者少陽多血，美鬚者陽明多血。五音五味篇

黃帝曰：夫子之言脈之上下血氣之候，以知形氣奈何。岐伯曰：足陽明之上血氣盛則髯美長，血少氣多則髯短。故氣少血多則髯少，血氣皆少則無髯，兩吻多畫。足陽明之下血氣盛則下毛美長，至胸血多氣少則下毛美短，至臍行則善高舉，足指少肉，足善寒，血少氣多則肉而善瘰，血氣皆少則無毛，有則稀枯瘁，善癢厥足痺。瘰少玉切，乃凍瘡也。

足少陽之上氣血盛則通髯美長，血多氣少則通髯美短，血少氣多則少髯，血氣皆少則無髯。感於寒濕則善痺，骨痛爪枯也。足少陽之下血氣盛則脛毛美長，外踝肥，血多氣少則脛毛美短，外踝皮堅而厚，血少氣多則脛毛少，外踝皮薄而軟，血氣皆少則無毛，外踝瘦無肉。足太陽之上血氣盛則美眉，眉有毫毛，血多氣少則惡眉，面多少理，血少氣多則面多肉，血氣和則美色。足太陰之下血氣盛則跟肉滿踵堅，氣少血多則瘦跟空，血氣皆少則喜轉筋，踵下痛。手陽明之上血氣盛則鬚美，血少氣多則鬚惡，血氣皆少則無鬚。手陽明之下血氣盛則腋下毛美，手魚肉以溫，血氣皆少則手瘦以寒。手少陽之上血氣盛則眉美以長，耳色美，血氣皆少則耳焦惡色。手少陽之下血氣盛則手捲，多肉以溫，血氣皆少則寒以瘦。

氣少血多則瘦以多脉 手太陽之上血氣盛則頰多鬚
面多肉以平血氣皆少則面瘦惡色 手太陽之下血氣
盛則掌肉充滿血氣皆少則掌瘦以寒已上見陰陽二十五人篇

精液血脉候

黃帝曰余聞人有精氣津液血脉余意以為一氣耳今乃
辨為六名余不知其所以然岐伯曰兩神相搏合而成形
常先身生是為精 何謂氣岐伯曰上焦開發宣五穀味
熏膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣 何謂津岐伯曰腠
理發泄汗出溱溱是為津 何謂液岐伯曰穀入氣滿淖
澤注於骨骨屬屈伸洩澤補益腦髓皮膚潤澤是謂液
何謂血岐伯曰中焦受氣取汁變化而赤是謂血 何謂
脉岐伯曰壅遏營氣令無所避是謂脉黃帝曰六氣者云云 精脫
者耳聾氣脫者目不明津脫者膝理開汗大泄液脫者骨
屬屈伸不利色夭腦髓消脛痠耳數鳴血脫者色白天然

不澤其脉空虚

已上見決氣篇

右精氣津液血脉六者蓋精氣即衛氣津液血脉即營
血之異名衛氣根於血營血根於氣故曰一氣也

脫血候

素臂多青脉曰脫血

平人氣象論下同

安臥脉盛謂之脫血

靈尺炬然熱人迎大者當奪血

論病診尺篇

診氣虛實法

氣虛則脉弦血虛則脉大仲景云脉弦則衛氣不行內經

云脉麤大者陰不足陽有餘也

脉脉大而堅者血氣俱實脉小者血氣俱虛 脉大者血

氣俱多脉細微者血氣俱虛

靈脉動而實且疾者疾瀉之虛而徐者則補之終始篇

難脉有陽虛陰盛陽盛陰虛何謂也然浮之損小沉之實

大故曰陰盛陽虛沉之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是

陰陽虛實之意也六難

仲脉藹藹如車蓋者名曰陽結也脉纍纍如循長竿者名

曰陰結也如車蓋者浮大而有力也如循長竿者沉而有力也

脉寸口脉漈漈如羹上肥陰氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰

如羹上肥者浮大而無力也如蜘蛛絲者細而無力也

仲脉綿綿如瀉漆之絕者亡其血也

脉滑者多血少氣脉濇者少血多氣

仲寸口脉微而濇微者衛氣衰濇者榮氣不足

難脉有損至何謂也然至之脉一呼再至曰平三至曰離

經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此死至之脉也何

謂損一呼一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰死

四呼一至曰命絕此損之脉也至脉從上下損脉從上下

也損脉之為病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損

損於血脉血脉虛少不能榮於五臟六腑三損損於肌肉

肌肉消瘦飲食不能為肌膚四損損於筋筋緩不能自收

持五損損於骨骨痿不能起於牀反此者至脉之病也從

上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者

死治損之法奈何然損其肺者益其氣損其心者調其榮

衛損其脾者調其飲食適其寒温損其肝者緩其中損其

腎者益其精此治損之法也治損之法詳見虛門脉來一呼再至

一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸三至為適得病

前大後小即頭痛目眩前小後大即胃滿短氣一呼四至

一吸四至病欲甚脉洪大者苦煩滿沉細者腹中痛滑者

傷熱濇者中霧露一呼五至一吸五至其人當困沉細夜

加浮大晝加不大不小雖困可治其有大小者為難治一

呼六至一吸六至為死脉也沉細夜死浮大晝死一呼一

至一吸一至名曰損人雖能行猶當着牀所以然者血氣

皆不足故也再呼一至再吸一至名曰無冤無冤者當死也人雖能行名曰行屍上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死上部無脉下部有脉雖困無能爲害也所以然者譬如人之有尺樹之有根枝葉雖枯槁根本將自生脉有根本人有元氣故知不死已上十四難

神寸口諸微亡陽諸濡亡血脉來緩時一止復來者名曰結脉來數時一止復來者名曰促脉陽盛則促陰盛則結此皆病脉

挾喉兩旁人迎脉大爲陽盛兩手寸口脉大爲陰盛詳見鍼灸門刺虛實法內經以挾喉兩旁動脈爲人迎脈經以關前爲人迎當以內經爲正

素陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂陽不勝其陰則五臟氣爭九竅不通生氣通天論

虛實用藥法

察氣虛氣弱者

陳皮 黃芪 人參

氣實氣結者

青皮 厚朴 木香 沉香

血虛者

生地黃 當歸身

血虛惡血積聚者

當歸稍 蘇木 紅花

海氣血弱者勿與枳殼以其損氣也 氣血盛者勿與丁香以其益氣也 脉弦而虛者勿損氣脉大而實者勿益氣 脉中有少力浮則似止胃中真氣不及也

人參 五味子 麥門冬 沉香

川芎 益智 白芷 丁香

氣虛則生脉散 血虛則三才丸

四君子湯治真氣虛弱及短氣脉弱

白朮 人參 黃芪 茯苓等

右爲粗末每服伍錢水一盞煎至七分食遠温服

千金生脉散

氣虛宜四君子

人參 五味 麥門冬

製益氣丸治語言多損氣懶語補上益氣

麥門冬去心 人參各三錢 橘皮去白 桔梗

炙甘草各半兩 五味子二十粒

右為極細末水浸油餅為丸如雞頭大每服一九細嚼

津唾嚥下油餅和油燒餅也

虛損人參黃芪湯

人參二錢 黃芪 白朮 陳皮去白各乙錢

甘草半錢 當歸 茯苓各乙錢

右咬咀水煎空心熱服胃熱不能食者加姜棗湯煎

垣補中益氣湯治飲食勞倦所傷方見虛熱門

調中益氣湯治脉弦洪緩而沉按之中之下時得一澁其

證心腹滿閉肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽

肥忽瘦四肢懶倦口失滋味腹難舒伸大小便溺清利而

數或上飲下泄或大便澁滯不行一二日一見夏月殮泄

米穀不化或便後見血及白膿胸滿短氣膈咽不通或痰

嗽稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾兩目焰火視物昏

花努肉紅絲熱壅頭目不得安臥嗜臥無力不思飲食

黃芪乙錢 甘草伍分 人參半錢去蘆

柴胡二分為上氣不足胃氣與脾 橘皮二分如

不得連轉者氣下陷能補上氣從水引火 升麻二分 蒼朮五分 木香乙分

右剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去渣帶熱

服宿食消盡服之寧心絕思藥必神効蓋病在四肢血

脉空虛宜在旦服 如時顯熱燥是下元陰火蒸蒸發

也加真生地黃二分 黃柏三分 如大便虛坐不得或大便

了而不了腹常逼迫血虛血澁也加當歸身分 如身

體沉重雖小便數多亦加茯苓分二蒼朮錢乙澤瀉分五黃栢分五
三分時令從權祛濕也不可用兼足太陰已病其脉絡於心中故顯濕熱相合而生煩亂也如胃
氣不和加湯洗半夏錢半生薑三片以制半夏之毒有嗽
者去之緣痰厥頭痛非半夏不能除此足太陰脾經之
邪所作也如無已上證只服

黃芪錢乙

人參錢二

甘草分五

橘皮分二

柴胡分二

升麻分二

蒼朮分五

黃栢酒洗分二

右件劉如麻豆大依前煎服

中氣不足隨時加減用藥法 如食少不饑加炒麴 如

食已心下痞別服橘皮枳朮丸 如脉弦四肢滿悶便

難而心下痞加甘草黃連柴胡 如腹中氣上逆者是

衝脉逆也加黃栢分三黃連錢乙以泄之 如大便秘燥

心下痞加黃連桃仁少加大黃當歸身 如心下痞奔

悶者加白芍藥黃連 如心下痞腹脹加五味子白芍

藥縮砂仁 如天寒少加乾姜或中桂 如心下痞中

寒者加附子黃連 如心下痞嘔逆者加黃連生薑橘

皮 如冬月不加黃連少入丁香藿香葉 如口乾咽

乾加五味子葛根 如脇下急或痛加柴胡甘草 如

胸中滿悶鬱鬱然加橘紅青皮木香少許 如頭痛有

痰沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏錢半生薑分二或分三

分 如腹中或周身間有刺痛皆血澁不足加當歸身

如噦加五味子多益智少 如脉洪大兼見熱症少

加黃連黃芩生地黃甘草 如脉緩沉重怠惰無力者

濕勝也加蒼朮澤瀉人參白茯苓五味子 如脉澁覺

氣滯澁者加當歸身天門冬木香青皮陳皮有寒者加

桂枝黃芪 如食不下乃胃中胃上有寒或氣澁滯加

青皮陳皮木香此三味爲定法冬天加益智仁草苴蔻仁縮砂仁夏月少用更加黃連秋月氣滯滯氣不下更加枳榔草苴蔻仁縮砂仁或少加白苴蔻仁如春三月食不下亦用青皮少陳皮多更加風藥以退寒覆其上如初春猶寒更少加辛熱以補春氣之不足以爲風藥之佐益智草苴蔻皆可也如脉弦者見風熱之證以風藥通之如胃中緻塞或氣閉悶亂者肺氣滯滯不行宜破滯氣青皮陳皮少加枳榔木香冬月加吳茱萸人參如胃中緻塞閉悶不通者爲外寒所遏使呼出之氣不得伸故也必寸口脉弦或微緊乃胃中有寒若加之以舌上有白胎滑者乃丹田有熱胃中有寒明矣丹田有熱者必尻骨冷前陰間冷汗兩丸冷是邪氣乘其本而正氣走於經脉中也若遇寒則必作陰陰而痛以此

辨丹田中有伏火加黃栢生地黃勿誤作寒証治之如秋冬天氣寒涼而腹痛者加半夏或益智或草苴蔻之類如發熱或捫之而肌表熱者此表証也只服補中益氣湯一二服亦能得微汗則涼矣如腳膝痿軟行步無力或疼痛乃腎肝中伏濕熱也少加黃栢空心服之不愈更增黃栢加漢防已半則腳膝中氣力如故也如多唾或唾白沫者胃口上停寒也加益智仁如少氣不足以息者服正藥二三服氣猶短促者爲膈上及表間有寒所遏當引陽氣上伸加羌活獨活藁本最少升麻多柴胡次之黃芪加倍

四物
虛官

四物湯益榮衛滋氣血

熟地黃補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥川芎治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通腎經之藥芍藥和血當歸如血刺痛非此不能除乃通腎經之藥

此不能除乃通腎肝之藥

芍藥和血

當歸除乃通腎經之藥

右爲粗末水煎。又春則防風四物加防風倍川芎。夏則黃芩四物加黃芩芍藥。秋則門冬四物加天門冬倍地黃。冬則桂枝四物加桂枝倍當歸。若血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合。若風眩加秦艽羌活謂之風六合。若發熱而煩不能睡臥者加黃連梔子謂之熱六合。若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合。若氣虛弱起則無力睚然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合。若虛寒脈微自汗氣難布息便清白加乾姜附子謂之寒六合。若身熱脈躁頭昏項強者加柴胡黃芩。若因熱生風者加川芎柴胡防風。若目赤暴發作雲醫疼痛不可忍宜四物龍膽湯。方見眼目門若瘡疾加荆芥酒煎常服。若虛煩不得睡加竹葉人參。若虛熱病四物與參。

蘇飲相合名補心湯主之。若煩躁大渴加知母石膏。若陰虛致熱與血相搏口舌乾渴飲水加瓜蒌麥門冬。若諸痛有濕者宜四物與白朮相半加天麻茯苓。川山甲酒煎。若四肢腫痛不能行動四物蒼朮各半湯主之。若嘔者加白朮人參生薑。若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防己。若治燥結四物與調胃承氣湯各半爲玉燭散。若臟閉澀者加大黃桃仁。若老人風秘加青皮等分煎。若流濕潤燥宜四物理中各半湯。若滑瀉者加官桂附子。若血痢加膠艾煎。若腹脹加厚朴枳實。若虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚朴六合四物湯四兩厚朴姜製一兩枳實麩炒半兩。若血氣上衝心腹肋下滿悶宜治氣六合四物湯四兩加木香檳榔各一兩。若發寒熱者加乾姜炒黑牡丹。

皮白芍藥柴胡 若虛壯熱似傷寒者加人參柴胡
四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈
等皆可作各半湯此易老用藥大畧也 四物湯加減
治婦人裸病方二十六道見婦人部 四物湯加減治
妊娠傷寒方名六合湯一十五道見傷寒部 四物湯
加減調經方七道見調經

三才丸

天門冬 地黃 人參 各等分爲末煉蜜丸空心服

陽不勝陰則九竅不通
溫衛補血湯治耳鳴鼻不聞香臭口不知五味氣不快四肢困倦不收行步欹側毛髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉中啞啞不得臥口舌液乾太息頭不可回顧項筋緊脊骨強痛頭旋眼黑頭痛呵欠嚏噴

蒼朮二分 升麻四分 柴胡根三分 生地黃二分

牡丹皮三分 熟甘草二分 白朮二分 當歸三分

人參三分 生甘草半分 丁香二分 王瓜根二分

黃芪二分錢 陳皮二分 吳茱萸二分 葵花七朵

右爲麤末水二盞煎法如常食前服 一本加藿香黃
栝地骨皮桃仁

脾胃不足皆爲血病是陽氣不足陰氣有餘故九竅不通諸陽氣根於陰血之中陰血受火邪則陰盛陰盛則上乘陽分而陽道不行無生發升騰之氣也夫陽氣走空竅者也陰氣附形質者也如陰氣附於土陽氣升於天則各安其分也今所立方中有辛甘溫藥者非獨用也復有甘苦大寒之劑亦非獨用也以火酒二制爲之引使苦甘寒藥至頂而復入腎肝之下所謂升降浮沉之道自偶而至奇自奇而至偶也瀉陰火以諸風藥升發陽氣以滋肝膽之

用是令陽氣生上出於陰分末用辛甘溫藥投其升藥使
大發散陽分而令走九竅也

陰不勝陽則脈數病狂

治陰不勝陽脈至數疾六七至甚則狂者治見寒熱門黃
連解毒湯三黃九紫雪諸方求之甚者承氣湯

診陽絕陰絕

仲云陽先絕色青陰先絕色赤

海脈絕者陰入于地中也脈者如地中溝渠也通達諸經
灌溉一體陽氣鼓舞而行之陽不行則脈不動矣是以陰
離而不守故大小便皆為之不禁內溫之外灸之並行而
不可緩溫之四逆輩灸之臍下臑穴一寸五分氣海是也

氣血俱虛宜八物

梁八物湯偶方四物四君子二方合和也

白朮 茯苓 人參 黃芪
當歸 芍藥 川芎 地黃
右為散每五錢水二盞煎至一盞去查食後溫服

建中湯 治虛勞憂思諸不足黃芪建中湯主之

黃芪三兩 桂枝二兩 去皮 甘草二兩 炙 大棗十二枚

芍藥六兩 生姜二兩 膠飴乙升

右七味以水七升煮取三升去查納膠飴更上微火消
解溫服一升日三服 氣短胃滿者加生姜 腹滿者

去棗加茯苓乙兩 及療肺虛損不足補氣加半夏乙兩

建中湯 又治脈弦自汗四肢發熱或皮毛枯槁髮脫落宜黃芪

建中湯

建中湯 治虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢酸疼手足煩熱咽

口乾燥小建中湯主之方見傷寒

建中湯 雙和散補血益氣治虛勞少力

黃芪 熟地黃 當歸 川芎各乙錢
白芍藥乙錢 官桂 甘草各七分

右爲粗末每服四大錢水一盞半生姜三片肥棗三枚煎至八分去查服予製此方是建中四物二方每傷寒瘧疾中暑大疾之後虛勞氣乏者以此調治皆驗不熱不冷溫而有補

海大補十全散治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂 甘草 芍藥 黃芪 當歸

川芎 人參 白朮 茯苓 熟地各等分

右爲麤末每服二大錢水一盞生姜三片棗二枚煎至七分不拘時候溫服桂芍藥甘草小建中湯也黃芪與此三物卽黃芪建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子

氣實

湯也川芎芍藥當歸地黃四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱法天地之成數故名曰十全散

河正氣天香散治九氣

烏藥二兩 香附末八兩 陳皮 蘇葉 乾姜各乙

右爲細末調服

玄導氣丸

青木香 蘿蔔子 茴香 檳榔 牽牛頭末各四兩

右爲末薄糊丸如桐子大每服三四十九

仲桃仁承氣湯方見傷寒部畜血門

玄通真丸婦人通經男子破血

大黃去皮米醋同煮爛 桃仁各四兩去皮尖另研 天水末四兩天水一名益元散

乾漆二兩用瓦焙煙盡 杜牛膝二兩生

右爲末醋糊丸如桐子大每服六七十丸

血實

氣血俱實

木香和中丸

木香 沉香 白荳蔻 枳實炒 檳榔

蓬朮 青皮 陳皮 當歸酒洗 黃芩

木通 黃連 縮砂 猪牙皂角去皮弦并子蜜水潤

乾炙 郁李仁湯去皮 三稜已上各淨末乙兩

大黃四兩 香附三兩 黃栢二兩 牽牛頭末三兩

右為末水丸每服三錢重白湯下或姜湯下

木香枳榔丸流濕潤燥推陳致新

木香 枳榔 青皮 陳皮 廣茂

枳殼 宣連各半兩 黃栢乙兩半 大黃乙兩半 黑牽牛

評曰此戴人經驗方也善治下虛上實抑火升水流濕潤燥推陳致新資陰代陽散鬱破結活血通經及治肺痿喘嗽胃膈不利脾濕黃疸宿食不消一切雜証不能

盡述戴人每令病人夜睡服之以進食任服他藥婦人

調和血氣小兒驚疳積熱皆可量輕重用之原本有香附二兩

全真丸治脾臟積熱洗滌腸垢潤利燥澁風毒攻經手足

浮腫或頑痺不仁痰涎不利涕唾稠粘胃膈痞塞臍腹脹

滿飲食減少困倦無力凡所內傷竝宜服之

黑牽牛八兩燥火炒四兩生用 大黃二兩米泔浸

泔取出切焙乾細為末 四兩同取頭末四兩 三兩逐日換

右以皂角二兩輕手揉去皮子水一大碗浸一宿入蘆

荀一兩切作片子同皂角一處熬至半碗去查再熬至

二盞搜和上件藥末乾濕得所丸如桐子大每服三十

二丸諸飲下不拘時候金宣宗敕賜名保安丸

心印神芎導水丸治勞瘵停濕二陽病熱鬱

黃芩乙兩 黃連半兩 大黃二兩 川芎兩

滑石四兩

薄荷兩

黑牽牛四兩頭末

河間制治一切熱証其功不可盡述設或久病熱鬱無問瘦瘵老弱并一切証可下者始自十丸以爲度常服此藥除腸垢積滯不傷和氣推陳致新得利便快竝無藥燥搔擾亦不困倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下者使服四五丸未效再服以意消息常服二三十丸不動臟腑有益無損或婦人血病下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃經虛風熱所鬱色黑齒槁身瘦焦痿黃或服甘熱過度成三消等病若熱甚於外則肢體躁擾病於內則神志躁動拂鬱不開變生諸症皆令服之惟臟腑滑泄者或裏寒脈遲者或婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服

舟車神祐丸洩水濕

甘遂

乙兩醋炒

大黃

二兩

芫花

一兩醋炒

黑牽牛

四兩頭末

輕粉

乙錢

大戟

乙兩醋炒

青皮

陳皮

木香

枳榔

各半兩

取蠱加蕪荑半兩爲末水

丸空心服

河間依仲景十棗湯例製出此方主療一切水濕爲病戴人云十棗洩諸水之上藥所謂溫藥下者是已如中滿腹脹喘嗽淋閉水氣蠱腫畱飲癖積氣血壅滯不得宣通風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛久新瘧痢等患婦人經病帶下皆令按法治之病去如掃故賈同知稱爲神僊之奇藥也緣此方河間所定初服五丸日三服加至快利後卻常服以病去爲度設病愈後平人能常服保養宣通氣血消運飲食若病痞悶極甚者便多服反

煩滿不開轉加痛悶宜初服二丸每服加二丸加至快
利爲度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四
歲者三五丸依前法加減至戴人變爲神芎丸神祕不
傳然每令病人夜臥先服百餘粒繼以濬川等藥投之
五更當下種種病出投下少未再服和膈藥須以利爲
度有五曰一下者三日一下者病輕者可一二度止重
者五六度方愈是擒縱卷舒之妙臨証制宜非言可諭
觀其藥雖峻急認病的確自非老手諳練有大負荷者
焉敢見諸行事予每親製用之若符節然又隨人強弱
當依河間漸次進服強實之人依戴人治法行之神効
可驗

大聖濬川散

大黃乙兩煨

甘遂半錢

牽牛乙兩頭末

木香三錢

郁李仁配

芒硝三錢

評曰此下諸積之聖藥也諸濕爲土火熱能生濕土故
夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾濕病本不自生因
於火熱怫鬱水液不能宣通停滯而生水濕也凡病濕
者多自熱生而熱氣多爲兼病內經云明知標本正行
無問者是也夫濕在上者目黃而面浮在下者股膝腫
厥在中者肢滿痞膈痿逆在陽不去者久則化氣在陰
不去者久則成形世俗不詳內經所言留者攻之但執
補燥之劑怫鬱轉加而病愈甚也法當求病之所在而
爲施治瀉實補虛除邪養正以平爲期而已又嘗考戴
人治法假如肝木乘脾土此土不勝木也不勝之氣尋
救于子巳土能生庚金庚爲大腸味辛者爲金故大加
生姜使伐肝木然不開脾土無由行也遂以舟車丸先

通閉塞之路是先瀉其所不勝後以姜汁調瀘川散大下之是瀉其所勝也戴人每言導水丸必用禹功散繼之舟車丸必以瀘川散隨後如寒疝氣發動腰脚膝急痛者亦當下之以瀉其寒水世俗聞於治體一槩鹵莽有當下而非其藥終致委頓而已豈知巴苳可以下寒甘遂芫花可以下濕大黃芒硝可以下燥如是分經下藥兼食療之非守一方求其備也故戴人曰養生與攻病本自不同今人以補劑療病宜乎不効是難言也

治法

丹

六鬱氣血冲和百病不生
一有拂鬱諸病生焉

氣 香附

撫芎

蒼朮

濕 蒼朮

川芎

白芷

痰 海石

香附

瓜蒌

南星

熱 青黛

香附

蒼朮

川芎

梔子

血 桃仁

紅花

青黛

川芎

香附

食 蒼朮

香附

山查

神麩

鐵砂加醋炒

春加用芎

秋冬茱萸

夏加苦參

越鞠丸解諸鬱

蒼朮

香附

川芎

神麩

梔子

凡鬱在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降矣餘皆倣此

益陰經血解五臟結氣用山支炒令十分有二分焦黑爲末以姜汁入湯煎飲之其效捷於他方也

世順氣丸治血鬱香附半斤童便浸曬乾粟糊爲丸

本具母能散心胃鬱結之氣殊有功

保論曰虛損之人寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛故損自上而下治之宜以辛甘淡過于胃則不可治

虛損分陰陽

也感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以甘苦酸鹹過于脾則不可治也自上而下者一損損於肺皮聚而毛落二損損於心血脈虛少不能榮於臟腑婦人月水不通三損損於胃飲食不為肌膚自下而上者一損損於腎骨痿不能起於牀二損損於肝筋緩不能自收持三損損於脾飲食不能消克論曰心肺損而色敗腎肝損而形痿穀不能化而脾損感此病者皆損之病漸浸之深皆虛勞之疾也

四君子湯治脾損而皮聚毛落益氣可也方見前

八物湯治心肺虛損皮聚而毛落血脈虛損婦人月水愆期益氣和血方見前

十全散治心肺損及胃飲食不為肌膚益氣和血調食方見前

金剛丸治腎損骨痿不能起於牀益精補腎

萆薢 杜仲炒 菴蓉酒浸 兔絲子酒浸

右細末酒煮猪腰子為丸桐子大每服五七十九空心酒下

牛膝丸治肝腎損骨痿不能起牀筋緩不能收持宜益精緩中

牛膝酒浸 萆薢 杜仲炒 菴蓉酒浸

防風 兔絲子酒浸 白蒺藜分等 桂分乙

右細末酒煮猪腰子九桐子大空心酒下五七十九丸煨腎丸治肝腎損及脾食穀不化宜益精緩中消穀

牛膝 萆薢 杜仲 菴蓉 兔絲子

白蒺藜 胡蘆巴 破故紙分等 桂兩半

右丸如金剛丸法治腰痛不起者神効

右陰陽虛損諸方蓋謂虛而無熱者設也若虛而有熱者作虛熱治之虛熱又分二法一治新病屬虛熱者反治條求之一治久病屬勞瘵者骨蒸門求之

針灸

經絡氣不足經氣有餘者寸口熱而尺寒也秋冬為逆春夏為從治主病者經滿絡虛刺陰灸陽若經虛絡滿者尺熱寸口寒瀼也春夏死秋冬生絡滿經虛灸陰刺陽經絡皆實是寸脈急而尺緩也皆當治之故曰滑則從瀼則逆也通評虛也實論

診脈辨

素夫人之常數太陽常多血少氣少陽常多氣少血陽明常多氣多血少陰常多氣少血厥陰常多血少氣太陰常少血多氣此天之常數血氣形志論

診表裏虛實

許學士脈浮而有力者表實也浮而無力者表虛也沉而有力者裏實也沉而無力者裏虛也

雲脈浮診得六數七極者為表實也浮診得三遲二敗者為表虛也如中診得六數七極者是中焦之熱實也中診得三遲二敗者中焦虛也如沉診得六數七極者下焦有實熱也沉診得三遲二敗者下焦虛也

表裏真治

素帝曰病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其中外各守其鄉內者內治外者外治微者調之其次平之盛者奪之汗之下之寒熱溫涼哀之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命至真要大論下同帝曰病之中外何如岐伯曰從內之外者調其內從外之內者治

其外從內之外而盛於外者先調其內而後治其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其內中外不相及則治主病

垣表虛桂枝黃芪表實麻黃葛根裏虛人參白朮裏實枳

實大黃

自汗脈浮無力為表虛無汗脈沉有力為表實自利脈沉無力為裏虛不大便脈沉有力為裏實

實

麻黃湯

實

調胃承氣湯

實

大承氣湯

海藏浮

中

沉

虛

桂枝湯

虛

小建中湯

虛

四逆湯

隔

浮可下者外無六經之形証

沉可汗者內無便溺之阻

証

証

証

証

証

雲麻黃為瀉能瀉表之實不能瀉裏之實桂枝為補能補表之虛不能補裏之虛姜附為補不能補表之虛而能補裏之虛承氣為瀉能瀉裏之實而不能瀉表之實建中為補能補中焦之虛而不能補上焦下焦之虛調胃為瀉能瀉中焦之實而不能瀉上焦下焦之實也

本事有人病傷寒身熱頭疼予視之曰邪在表此表實証也當汗之以麻黃湯或問曰傷寒大抵因虛故邪得以入

之今邪在表何以云表實也予曰古人稱邪之所湊其氣則虛留而不去其病則實蓋邪之入人也始因虛入及邪居中則反為實矣大抵調治傷寒先要明表裏虛實能明此四字則仲景三百九十七法可立而定也何以言之有表實有表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛予於表裏虛實歌中常論其事矣仲景麻黃湯之類為表實而設也桂枝湯之類為表虛而設也裏實則承氣之類是也裏虛則四逆之類是也表裏俱實所謂陽盛陰虛下之則愈也表裏俱虛所謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀華陀傳有府吏倪尋李延其証俱頭痛身熱所苦正同陀曰尋當下之延當發汗或難其異陀曰尋外實延內實故治之異耳

麻黃湯桂枝湯承氣湯

三方並見傷寒部

四逆湯

方見傷寒門

右仲景治表裏虛實法萬世之準繩也

通戊申六月初樞判白文舉年六十二素有脾胃虛損病
目疾時作身面目睛俱黃小便或黃或白大便不調飲食
減少氣短上氣急墮嗜臥四肢不收至六月中目疾復作
醫以瀉肝散下數行而前疾增劇予謂大黃牽牛雖能除
濕熱而不能走經絡下咽不入肝經先入胃中大黃苦寒
重虛其胃牽牛其味至辛能瀉肺氣重虛肺本故嗽大作
蓋標實不去本虛愈甚加之適當暑雨之際素有黃証之
人所以增劇也此當補脾胃肺之本臟瀉外經之濕熱製
清神益氣湯主之而愈

防風

分三

生姜

分五

蒼朮

分三

茯苓

分三

澤瀉

分三

升麻

分二

此藥能走經除濕熱而不守故不瀉本臟補肺與脾胃

本臟中氣之虛弱

橘皮

分二

青皮

分乙

人參

分三

生甘草

白朮

白芍藥

各二分

此藥能守本而不走經不走經者不滋經絡中邪守者
能補五臟之元氣

五味子

分三

麥門冬

分二

人參

分三

黃柏

分乙

此藥去時令虛熱濕蒸

右判如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去渣稍熱
空心服

火熾之極金伏之際而寒水絕體於斯時也故急救之以
生脉散除其濕熱以惡其太甚肺欲收心苦緩皆酸以收
之心火盛則甘以瀉之故用人參之甘佐以五味子之酸
孫思邈曰夏月常服五味子以補五臟氣是也麥門冬微

苦寒能滋水之源於金之位而清肅肺氣又能除火刑金之嗽而歛其痰邪復微加黃栢之苦寒以爲守位滋水之流以鎮墜其浮氣而除兩足之痿弱也

右舉東垣一法爲例餘可觸類而長也

仲病有急當救裏救表者何也師曰病醫下之續見下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體疼痛清便自調者急當救表也救裏四逆湯救表桂枝湯

羅征南帥不鄰吉反腸鳴自利咽嗑腫痛先治咽塞後治

下利愈方見外熱內寒

本事後周姚僧垣名醫也帝因發熱欲服大黃藥僧垣曰大黃乃急快藥至尊年高不宜輕用帝不從服之遂至不起及元帝有疾諸醫皆謂至尊至貴不可輕服大黃宜用平藥僧垣曰脉洪而實必有宿食不用大黃必無瘥理元

帝從之果下宿食乃愈合用與不用必心下明得諦當然後可

診左右不同

海仲景浮汗而沉下右手沉實 調胃 承氣

左手沉實 桃仁 抵當

難經沉汗而浮下 右手浮實 枳實 牽牛

左手浮實 桃仁 四順

右手 襍病是爲之表 傷寒是爲之裏

左手 襍病是爲之裏 傷寒是爲之表

上下虛實大法

素天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也帝曰何以然岐伯曰東方陽也陽者其精并於上并於上則上盛而下虛故其耳目聰明而手足不便也西方陰也陰者其精并於下并於下則下盛而上虛故其耳目不聰明

而手足便也故俱感於邪其在上則右甚在下則左甚此
天地陰陽所不能全也故邪居之陰陽應象篇頭痛巔疾下
虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招尤目冥耳聾
下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝腹滿臍脹肢膈臑
脇下厥上冒過在足太陰陽明咳嗽上氣厥在胸中過在
手陽明太陰心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰五臟生成篇

診治上
下虛實

靈下虛則厥下盛則熱上虛則眩上盛則熱

垣兩寸脉實謂之陽盛陰虛下之則愈兩寸脉俱虛謂之陰陽皆虛補

陰竭宜調之以甘藥兩寸脉不足求之于地地者脾胃也當從陰引陽兩

寸脉短小乃陽氣不足病在下也謂之陰盛陽虛取之下

陵三里補瀉無形是謂導氣同精治在五亂中取法乃不

足病也當取穴於腹募氣海膺下一寸五分甚者取三里

氣衝以毫鍼引之 兩關脉俱實上不至發汗下不至利大便宜芍藥湯瀉其土

實 兩關脉俱虛脉沉細宜服理中湯脉弦遲宜兩尺脉俱

實是陰盛陽虛汗之則愈兩尺脉俱虛宜服姜附湯補陽問何陰虛

仲景云兩尺脉俱虛者不宜下下之則為逆逆者死兩尺脉或不見或短小病在天

上求之於五臟皆愈或血絡經隧伏火是天上有陰火故陽不收斂也又難

經云下部無脉或兩尺竭絕乃為食塞當吐

素來疾去徐上實下虛為厥顛疾來徐去疾上虛下實為

惡風也脉要精微論補上治上制以緩補下治下制以急急則

氣味厚緩則氣味薄適其至所此之謂也病所遠而中道

氣味之者食而過之無越其制度也是故平氣之道近而

奇耦制小其服也遠而奇耦制大其服也大則數少小則

數多多則九之少則二之至真要論遠近言募府之位也

鑿病在上為天 煎藥宜武宜清服宜緩飲制度宜炒酒

上下用藥法

洗病在下為地、煎藥宜文宜濃服宜急飲。

垣在上不厭頻而少 在下不厭頓而多 少服則滋榮於上多服則峻補於下 病在心上者先食而後藥 病在心上者先藥而後食 凡用黃芩黃連半夏知母病在頭面及手皮膚者須用酒一鍾借酒力以上升也咽之下臍之上須酒洗之在下生用大凡生降熟升 凡諸藥根在上者中半已上者氣脉上行以生苗者為根中半已下者氣脉下行以入土者為稍病在中焦上焦者用根下焦者用稍則根升而稍降也 去下部之疾者其丸極大而光治中焦之疾者次之治上焦者極小稠麵糊取其遲化直至下焦稀麵糊取其易化水浸宿蒸餅為丸及滴水為丸者又易化也

羅東垣先生治消渴以甘露飲子劑為粗散時時以舌舐

之取膈上停留此劑之緩也治心煩欲吐怔忡不安臥以

辰砂安神丸如米大津液下十餘丸此近而奇耦制小其

服也心肺在上為近劑小者不令下行故也治臊臭製瀉肝湯其說云難

經論心主五臭入肝為臊臭此其一也用柴胡苦平微寒

為君佐以龍膽苦寒以瀉心火澤瀉車前子甘鹹寒平淡

滲肝之邪所謂在下者引而竭之多用水煮頓服之此制

之急也以下焦陰虛制滋腎丸以黃栢大苦寒為君知母

苦寒為佐使桂甘辛大熱為臣用丸如雞頭實大空心沸

湯下百餘丸此遠而奇耦制大其服也

素高者抑之下者舉之至真要論○王註云高者抑之制其勝也下者舉之濟其弱也

海熱在至高之分故用輕劑從高抑之治從緩也若急服

之上熱未除中寒生矣如治大頭痛用酒煨大黃及黃連

也類是

局方養正丹

方見眩運門

垣柴胡調經湯一婦人經候黑血凝結成塊左廂有血瘕水瀉不止穀有時化有時不化東垣云經漏不止是前陰之氣血已下脫矣水瀉數年不愈是後陰之氣血下陷亦已脫矣是病人周身之氣常行秋冬之令久沉久降當大舉大升以助春夏次用四物隨顯証加減調經湯方見血崩

丹一婦人產後有物如衣裙半在腹半在蓆醫不能曉先生曰此子宮也氣血虛隨子而下不能入即與黃芪當歸之劑而加升麻舉之仍以外攻之法而用五倍子作湯洗濯皴其皮使緩斂頃之子宮上先生慰之曰三年後可再生兒無憂也已而果然

靈陷下則灸之東垣云陷者皮毛不任風寒知陽下陷也其脈雖數中必得細強而脈小或沉澁覆脈上知其熱火陷下也雖脈八九至甚數疾而陰脈覆其上者可灸陰脈者細強脈小沉澁是也

氣反者反取

素氣反者病在上取之下病在下取之上病在中傍取之

五常政大篇

丹一男子病小便不通醫以利藥治之加劇丹溪云此積痰病也積痰在肺肺為上焦而膀胱為下焦上焦閉則下焦塞譬如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉乃以法大吐之吐已病如失又治一老人泄痢百方不應膈悶食減丹溪與吐劑吐出膠痰升許而痢止詳見久痢此者舉之之意夫小便不通氣血壅塞於下焦也泄瀉日久氣血降沉於下焦也今大吐之則一身血氣皆升浮而復於上焦則下之壅塞者流通降沉者升舉故皆痊也

病在上取之下如噦逆喘滿上氣者多臍下丹田三里引氣下降其病立痊之類是也

吐上盛宜

保仲景云傷寒三四日邪氣未傳於裏止用瓜蒂散吐而

傷仲景云傷寒三四日邪氣未傳於裏止用瓜蒂散吐而

瘥豈可汗也。又傷寒六七日，胃中微悶，不欲言，懊惱昏眩，無下証，仲景梔子湯吐之，立可。又云：中風不知人事，亦不須發汗，喉中呬鳴有聲，用稀涎散吐之。又云：風頭痛，若不吐涎，久則瞽目而不治，用瓜蒂散吐之。三吐而瘥，又暴嗽，風涎上壅，咽塞不利，茶調散吐之。陽癰久不愈，未成痴呆，用導涎散吐之。又陰癰，用三聖散吐之。又膏梁之人，多食生鱸，化蟲伏於胃中，胃膈不快，噎食不下，用藜蘆散吐之。又久患脇痛，諸藥不能治，用獨聖散加蝎稍半錢吐之。諸癰不時發作，不知人事，用半生熟湯吐之。暗風病久不瘥，發過如舊，用鬱金散吐之。痰瘧久不瘥，發寒熱無時，用常山散吐之。蛟龍瘕，痛腹脹如鼓，久不愈，欲死，用糖毬散吐之。吐出其物，形如蜥蜴，長七八寸，亦可。一人初患傷寒，飲冷心腹悶，身熱見食則嘔，用赤小豆散吐之。婦人筋攣急，

痛用神應散吐之。或曰：筋病吐之，何爲？答曰：木鬱達之所謂達者，令其條達也。又有打撲墜損，先吐之，用金花散，後下之，用承氣湯，蓋承者順也。偏枯証，半身不遂者，用追風散吐之。頭風，後有目疾，眼有半明，可救者，用防風散吐之。小兒上喘，潮熱，先用鬱金散吐之，後用鎮涎散下之，立効。治顛狂，病久不已，用三聖散吐之，後大下之。諸風掉搖，目直不知人事，便可用懸頭膏吐涎，立効。胃膈滿背痛，或臂疼，可先用祛風湯吐之，後服烏藥散，厲風，或瘡瘍惡瘡，便用三聖散吐之，後服苦參丸，諸厥氣，中風不省人事，便用神聖散，翼內灌之，吐出涎，立効。破傷風，牙關緊急，角弓反張，亦用神聖散吐之，吐後汗下之，効。三法俱用之者，乃上古高醫神妙莫測，今庸下之流，止看諸方，不知治法，不識源流，不行聖人法，去聖日寢遠矣，可惜悲哉。

丹凡吐取逆流水調藥吐之凡藥升動真氣者皆能吐如防風桔梗芽茶山柅川芎蘿蔔子以姜汁醋少許瓜蒂散少許入壺汁溫服之以鵝毛鈎探之

子和稀涎散

猪牙皂角

不蛀者去皮弦乙兩

綠礬

五錢

藜蘆

半兩

右爲細末每服半錢或一二錢幹開牙關漿水調灌之
丹吐食積痰用蘿蔔子五合油炒插入漿水搗汁入桐油白蜜少許旋旋半溫用帛緊束肚皮然後用鵝毛攪喉中令吐又法用蝦帶殼半斤入醬姜蔥等料物煮汁先吃蝦後飲汁以鵝翎鈎引即吐必須緊勒腹肚吐肥人濕痰用益元散壺汁調下探引吐之

世荳參散吐痰輕劑

赤小荳

苦參

右爲末酸漿水調服用鵝翎探之

丹吐法單藥

桔梗蘆

人參蘆

艾葉

末茶

瓜蒂

藜蘆

附子尖

砒

此數味皆自吐不用手法探引但藥湯皆可吐虛病症用人參蘆吐之

子和三聖散

防風

二兩去蘆

瓜蒂

三兩揀淨炒微黃

藜蘆

聖惠方減用之一兩或半兩

或三錢

右各爲麤末每服約半兩以壺汁三茶盞先用二盞煎三五沸去壺汁次入水一盞煎至三沸却將先二盞同一處熬二沸去查澄清放溫徐徐服之以吐爲度不必盡劑

一方用

鬱金兩半

藜蘆錢

苦參錢

右為末，薑汁調吐如吐不止，丁香一粒止之，又不止，葱白湯呷之。

治風涎用天南星一枚，中開一竅，如粟米大好醋納於中，焙乾，如此三次，藜蘆二錢半，並為末，酒糊丸，每三五丸，空心溫酒下，一飯時自吐，如未吐，再三丸，如涎盡嘔不止，冷葱白湯止之。

仲瓜蒂散

方見傷寒，腳氣上衝，活人服瓜蒂法附於後。

衍義云：凡用瓜蒂良久涎未出者，含砂糖乙塊下咽，即涎吐之。

子和二仙散瓜蒂好茶各等分，為細末，每服二錢，薑汁調下，空心用之。

衍義瓜蒂，此即甜瓜蒂也。去瓜皮，用蒂約半寸許，暴極乾，不限多少，細末，量疾每用一二錢，膩粉一錢，以水半合，同調勻灌之。治風涎暴作，氣塞倒臥，服之良久，涎自出，或覺有涎，用諸藥行化，不下，但如此服，涎即出。

和劑碧露丹

石綠

細研九度，飛過十兩。

附子尖

川烏尖

蝎梢

各七

右為末，入石綠令勻，糊丸，雞頭大，每服用薄苛汁半盞，化下一丸，更以酒半合溫服之，須臾吐出痰涎。

右吐痰熱劑，凡吐痰用寒劑累累吐不透者，必用熱劑吐之，方透。丹溪用瓜蒂、梔子、苦參、藜蘆等劑，累累吐，許白雲先生不透後，以附子尖和漿水與之，始得大吐也。

子和獨聖散用砒不以多少，為細末，每服一字，以新水調下，斡開牙關灌之，尋常勿用。

世治痰喘

砒乙錢麴二兩清水捏餘香油煮黃色為末每用末
子乙銅錢面江茶三銅錢面調勻五更井水調下如
不吐可添半銅錢面次日再服

子和

青黛散搗鼻取涎神妙

方見頭痛氣實痰熱結吐難出者必先二三次用苦梗開

之

丹吐法先以布搭膊勒肚腹於不通風處行之 凡用探

吐鵝毛須浸以桐油却以皂莢水洗去油曬乾待用

子和

療痰者以釵股雞翎探引不出以螿投之不吐再投

之且投且探無不出者吐至昏眩慎勿驚疑書曰若藥不
瞑眩厥疾不瘳如發頭眩可飲冰水立解如無冰水新汲
水亦可強者一二吐而安弱者可作三次吐之庶無損也
吐之次日有頓復者有轉甚者蓋引之而上未平也數日

當再為之如覺渴者冰水新水瓜梨涼物皆不禁惟禁食

過飽硬物乾脯難化之物 一醫吐一婦人半月不止命

懸須臾予煎麝香湯解之下咽立止或問麝香何能止吐

予謂之曰瓜苗聞麝香即死吐者瓜蒂也所以立解 如

藜蘆吐者不止以葱白湯解之如石藥吐者不止以甘草

貫衆解之諸草木吐者可以麝香解之

丹溪云丁香甘草白朮總解諸藥

吐藥之苦寒者有豨莩瓜蒂茶末梔子黃連苦參大黃黃

芩 苦辛而寒者有鬱金常山藜蘆 甘苦而寒者有地

黃汁 辛而寒者有輕粉 酸而寒者有晉礬綠礬薑汁

酸辛而寒者有膽礬 酸鹹而寒者有青鹽白米飲

甘鹹而寒者有滄鹽 甘而寒者有牙硝 甘而微溫且

寒者有人參蘆 苦而溫者有木香遠志厚朴 辛苦而

溫者有薄荷羌花 辛而溫者有穀精草葱根鬚 甘而

溫者有烏頭附子尖。酸而溫者有飯漿。鹹而溫者有皂角。辛而熱者有蝎稍。酸而平者有銅綠。甘酸而平者有赤小豆。凡此三十六味惟常山膽礬瓜蒂有小毒。藜蘆芫花輕粉烏附尖有大毒。外二十六味皆吐藥之無毒者。各對証用之。宜先小服不吐。積漸加之。

吐辨不可

病勢劇危。老弱氣衰者不可吐。吐不止則亡陽血虛者不可吐。諸吐血嘔血咯血衄血嗽血崩血失血者皆不可吐。病人無正性妄言妄從者不可吐。主病者不辨邪正之說不可吐。性行剛暴好怒喜淫之人不可吐。

海脉尺中按之有力當吐之。若尺中按之無力不可吐也。有力則陽氣下陷於陰中為陰中所遏。故吐之使陽氣得上升也。

經脾胃虛不可妄用吐藥論。六元正紀論曰木鬱則達

之者蓋木性當動蕩軒舉是其本體。今乃鬱於地中無所施為。卽是風失其性。人身有木鬱之証者當開通之。乃可用吐法以助風木。是木鬱則達之之義也。又說木鬱達之者蓋謂木初失其性鬱於地中。今既開發行於天上是發而不鬱也。是木復其性而有餘也。有餘則兼其所勝脾土受邪見之於木鬱達之條下不止此一驗也。又厥陰司天風木旺也。厥陰之勝亦風木旺也。俱是脾胃受邪見於上條。其說一同。或者不悟木鬱達之四字之義。反作木鬱治之。重實其實脾胃又受木制。又復其木。正謂補有餘而損不足也。既脾胃之氣先已不足。豈不因此而重絕乎。明胃中空塞當吐。氣口三倍大於人迎。是食傷太陰。上部有脉下部無脉。其人當吐。不吐則死。以其下部無脉。知其木鬱在下也。塞道不行而肝氣下絕矣。兼肺金主塞而不

降為物所隔金能尅木肝木受邪食塞胸咽故曰在上者因而越之仲景曰實煩以瓜蒂散吐之如經汗下謂之虛煩又名懊懣煩燥不能眠知其木鬱也以梔子豉湯吐之味者不知膈咽不通上支兩脇腹脹胃虛不足乃濁氣在上則生臘脹之病猛浪吐之况胃虛必怒風木已來乘陵胃氣內經以鐵烙鎮墜之豈可反吐助其風木之邪不宜吐而吐其差舛如天地之懸隔唯窒塞煩悶者宜吐之耳治下實大承氣湯在前表裏條

下實宜
五藏虛
實為病

靈肝氣虛則恐實則怒本神論肝實則兩脇下痛引少腹

善怒虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐如人將捕之經文

見刺虛
實法

素春脉太過則令人善怒忽忽眩冒而顛疾其不及則令人胃痛引背下則兩脇胠滿玉機真藏論○背者肺之分野肝木不及而肺金乘之故

胃痛
引背

靈心氣虛則悲實則笑不休本神篇心實則胃中痛脇肢

滿脇下痛膺背扁髀間痛兩臂內痛虛則胃腹大脇下與

腰相引而痛經文見刺
虛實法

素夏脉太過則令人身熱膚痛為浸淫其不及則令人煩

心上見欬唾下為氣泄玉機真藏論

靈脾氣虛則四肢不用五臟不安實則腹脹經洩不利本神篇

脾實則身重善饑肉痿足不收行善痠腳下痛虛則

腹滿腸鳴飧泄食不化經文見刺
虛實法

素脾脉太過則令人四肢不舉其不及則令人九竅不通

名曰重強玉機真藏論

靈肺氣虛則鼻塞不利少氣實則喘噎曾盈仰息本神篇

肺實則喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀脰足皆痛

虛則少氣不能報息耳聾噤乾經文見刺虛實法

素秋脉太過則令人逆氣而背痛慄然其不及則令人

喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音玉機真藏論

腎氣虛則厥實則脹本神腎實則腹大脛腫喘咳身

重寢汗出憎風虛則胷中痛大腹小腹痛清厥意不樂經文

見刺虛實法

冬脉太過則令人解休脊脉痛而少氣不欲言其不及

則令人心懸如病饑眇中清脊中痛少腹滿小便變玉機真藏論

五臟受病分野

木不及其病內含肱脇外在關節火不及其病內含膈

脇外在經絡土不及其病內含心腹外在肌肉四肢

金不及其病內含膺脇肩背外在皮毛水不及其病內

舍腰脊骨髓外在谿谷踠膝氣交變論

五臟病

黃帝問曰春脉如弦何如而弦岐伯對曰春脉者肝也東

方木也萬物之所以始生也故其氣來栗弱輕虛而滑端

直以長故曰弦反此者病帝曰何如而反岐伯曰其氣來

實而強此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病

在中玉機真藏論

難春脉弦反者為病何謂反然其氣來實強是謂太過病

在外氣來虛微是謂不及病在內十五

素帝曰夏脉如鈎何如而鈎岐伯曰夏脉者心也南方火

也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鈎反此者

病帝曰何如而反岐伯曰其氣來盛去亦盛此謂太過病

在外其氣來不盛去反盛此謂不及病在中玉機真藏論

難夏脉鈎反者為病何謂反然其氣來實強是謂太過病

在外氣來虛微是謂不及病在內十五

素帝曰秋脉如浮何如而浮岐伯曰秋脉者肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛以浮來急去散故曰浮反此者病帝曰何如而反岐伯曰其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中

王機真藏論

難秋脉毛反者為病何謂反然其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在內

十五難

素帝曰冬脉如營如何而營岐伯曰冬脉者腎也萬物之所合藏也故其氣來沉以搏故曰營反此者病帝曰何如而反岐伯曰其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中

王機真藏論

難冬脉石反者為病何謂反其氣來實強是謂太過病在外氣來虛微是謂不及病在中

十五難五問

素帝曰四時之序逆從之變異也然脾脉獨何主岐伯曰脾脉者土也孤藏以灌四傍者也帝曰然則脾善惡可得見之乎岐伯曰善者不可得見惡者可見帝曰惡者何如可見岐伯曰其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此謂不及病在中

王機真藏論

難脾者中州也其平和不可得見衰乃見耳如雀之啄如水之下漏是脾之衰見也

十五難

診夢虛實

陰氣盛則夢涉大水而恐懼陽氣盛則夢大火而燔煇陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢墮甚饑則夢取甚飽則夢與肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢恐懼哭泣飛揚心氣盛則夢善笑恐畏脾氣盛則夢歌樂身體重不舉腎氣盛則夢腰脊兩解不屬凡此十二盛者至而瀉之立已厥氣客于心則夢見丘山烟火客于肺則夢飛揚見金

鐵之奇物客于肝則夢山林樹木客于脾則夢見丘陵大澤壞屋風雨客于腎則夢臨淵沒居水中客于膀胱則夢遊行客于胃則夢飲食客于大腸則夢田野客于小腸則夢聚邑街衢客于膽則夢鬪訟自剗客于陰器則夢接內客于項則夢斬首客于脛則夢行走而不能前及居深地窮苑中客于股肱則夢禮節拜起客于胞胲則夢洩便凡此十五不足者至而補之立已也滯邪發夢說

臟腑氣味補瀉

肝膽

味辛補酸瀉氣溫補涼瀉

心小腸

味酸補甘瀉氣熱補寒瀉

脾胃

味甘補苦瀉氣溫補寒瀉

補瀉各從其宜逆從互換入求責法

肺大腸

味酸補辛瀉氣涼補溫瀉

腎膀胱

味苦補酸瀉氣寒補熱瀉

肝苦急急食甘以緩之甘草

肝欲散急急食辛以散之川

五臟虛實補瀉

芎 以辛補之細辛 以酸補之芍藥 肝虛以生姜陳

皮之類補之虛則補其母腎者肝之母也以熟地黃栢補

腎如無他証錢氏地黃丸補之 補肝丸四物湯內加防

風羌活等分爲細末煉蜜爲丸是也 鎮肝丸卽瀉青丸

去梔子大黃是也治肝虛錢氏補腎地黃丸方見勞

海肝實以白芍藥瀉之如無他証錢氏瀉青丸主之實則

瀉其子心乃肝之子以甘草瀉心

錢氏瀉青丸

當歸去蘆焙補

草龍膽焙稱

川芎

梔子

川大黃煨

羌活

防風去蘆

右各等分爲末煉蜜爲丸雞頭大每服一丸煎竹葉湯

同砂糖溫水化下

海藏云東垣先生治癰後風熱毒醫膜氣暈遮睛以此劑瀉之大効初覺

治易

仲問曰上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾四季脾土不受邪即勿補之中工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝之病補用酸助用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝焦苦入心甘入脾脾能傷腎之氣腎氣微弱則水不行水不行則心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝木自愈此治肝補脾之要妙也肝虛則用此法實則不必用之經曰虛虛實實補不足損有餘是其義也餘臟准此

垣從前來者為實邪從後來者為虛邪此子能令母實母能令子虛是也治法云虛則補其母實則瀉其子假令肝受心火之邪是從前來者為實邪當瀉其子火也然非直瀉其火十二經中各有金木水火土當木之分瀉其火也故標本論云本而標之先治其本後治其標既肝受火邪

先於肝經五穴中瀉榮火行間穴是也後治其標者於心經五穴內瀉榮火少府穴是也以藥論之入肝經藥為引瀉心火藥為君標而本之先治其標後治其本既肝受水邪當先於腎經湧泉穴中補木是先治其標後於肝經曲泉穴中瀉水是後治其本以藥論之入腎經藥為引用補肝經藥為君是也

海心苦緩急食酸以收之五味子 心欲軟急食鹹以軟之芒硝 以鹹補之澤瀉 以甘瀉之人參黃芪甘草 心虛以炒鹽補之虛則補其母肝乃心之母以生姜補肝如無他証錢氏安神丸是也

錢氏安神丸

麥門冬

去心焙

馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

研

甘草

各半兩

硃砂

乙兩研

龍腦

乙字研

右為細末煉蜜為丸如雞頭大每服半丸砂糖水化下無時

海八物定志丸補益心神安定魂魄治痰去胃中邪熱理肺腎此方補心更候同志定奪

人參乙兩

菖蒲

遠志去心

茯神去心

茯苓乙兩

硃砂二錢

白朮

麥門冬去心各半兩

牛黃二錢另細研

右為細末煉蜜丸如桐子大米飲湯下三十九無時

若髓竭不足加生地黄當歸 若肺氣不足加天門

冬麥門冬五味子 若心氣不足加上黨參茯神菖

蒲 若脾氣不足加白朮白芍藥益智 若肝氣不

足加天麻川芎 若腎氣不足加熟地黄遠志牡丹

皮 若膽氣不足加細辛酸棗仁地榆 若神昏不

足加硃砂預知子茯神

心實以甘草瀉之如無他証以錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散

錢氏瀉心湯

黃連乙兩去鬚

右為極細末每服一字至半錢乙錢臨臥溫水調下海藏

云易老單方瀉心湯出於此乃實邪也實則瀉其子

錢氏導赤散丹溪云導赤散正小腸藥也

生地黄

木通

甘草各等分

右同為末每服三錢水乙盞入竹葉七片同煎至五分

食後溫服一本不用甘草用黃芩

脾苦濕急食苦以燥之白朮 脾欲緩急食甘以緩之甘

草 以甘補之人參 以苦瀉之黃連 脾虛以甘草大

棗之類補之如無他証以錢氏益黃散補之虛則補其母
心乃脾之母以炒鹽補心

錢氏益黃散

陳皮乙兩

青皮

呵子肉

甘草各半兩

丁香二錢

右為細末每服二錢三錢煎服

海藏云此劑瀉脾以燥濕

東垣閻孝忠編集錢氏方以益黃散補土又言風旺必克脾土當先實其脾味者不審脾中寒熱一例用補脾藥又不審藥中有丁香青皮辛熱大瀉肺金脾虛之症豈可反瀉其子為寒水反來侮土中寒嘔吐腹痛瀉痢青白口臭中氣冷益黃散神治之藥也如因服熱藥巴豆之類過劑損其脾胃或因暑天傷熱積食損其脾胃而成吐瀉口臭中氣熱而成慢驚者不可服之今立一方治胃中風熱名

人參安胃散

黃芪二錢

人參乙錢

生甘草半錢

炙甘草半錢

白芍藥七分

陳皮乙錢

黃連少許

白茯苓四分

右為麤末每服水二盞煎五沸去渣溫服

海脾實以枳實瀉之如無他証以錢氏瀉黃散瀉之實則瀉其子肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

錢氏瀉黃散

藿香七錢

山梔仁乙兩

石膏半兩

甘草二兩

防風四兩

右剉同蜜酒微炒香為細末每服二錢水一盞煎清汁

服海藏云此劑瀉脾熱

海肺苦氣上逆急食苦以瀉之呵子皮一作黃芩肺欲收急食酸以收之白芍藥以酸補之五味子以辛瀉

之桑白皮 肺虛以五味子補之如無他証錢氏補肺阿膠散主之虛則補其母脾乃肺之母以甘草補脾

錢氏補肺阿膠散

阿膠 乙兩 半炒

黍粘子 乙兩 炒香

馬兜苓 半兩 炒

甘草 乙錢 炒

杏仁 七箇 去皮尖

糯米 乙兩

右為末每服二錢水一盞食後海藏云杏仁瀉肺非若人參天冬麥冬之補也當以意消息之

海肺實以桑白皮瀉之如無他証以瀉白散主之實則瀉其子腎乃肺之子以澤瀉瀉腎

錢氏瀉白散

桑白皮 乙兩 炒黃

地骨皮 乙兩

甘草 半兩 炒

右為細末每服二錢水一盞入粳米百粒同煎食後服易老加黃連海藏云治肺熱傳骨蒸熱白宜用此以直瀉之用山梔黃芩方能瀉肺但當以氣血

之分

海腎苦燥急食辛以潤之知母黃栢 腎欲堅急食苦以堅之知母 以苦補之黃栢 以鹹瀉之澤瀉 腎虛以熟地黃栢補之

桓腎有兩枚右為命門相火左為腎水同質而異性也經曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味又云氣化精生味和形長無陰則陽無以化當以味補腎真陰之虛陰本既固陽氣自生化成精髓若相火陽精不足宜用辛溫之劑世人用辛熱之劑治寒甚之病非補腎也難經云臟腎獨有兩者何也然腎兩名非皆腎也其左者為腎右者為命門命門者諸精神之用含元氣之所係也故曰男子以藏精女子以繫胞故知腎有二也左腎屬水水不足則陰虛宜補腎丸

龜板 酒炙 四兩

知母 酒浸 炒

黃栢 炒焦 各三兩

乾姜 乙兩

右為末粥丸一方無姜有側栢葉用地黃膏為丸
補血丸

龜板酒炙 黃栢炒 知母炒各 生乾姜乙

杜牛膝二兩

右為末粥丸

固真丸

龜板醋炙 虎骨酥炙 蒼耳酒蒸九 生地姜汁

栢皮半兩 乾姜三錢 烏藥半兩

右為末姜汁糊丸

垣三才封髓丹降心火益腎水

麥門冬去心 熟地 人參各半 黃栢炒三

甘草炙七錢半 縮砂仁乙兩

右為細末水糊和丸梧子大每服五十九丸用菴蓉半兩

作片酒浸一宿次日煎至三五沸去渣送下前九子空

心服

右腎屬火火不足則陽虛宜八味丸

垣八味丸治腎氣虛乏下元傷憊臍下疼痛夜多漩溺脚

膝緩弱面色痿黃或黧黑及虛勞不足渴欲飲水腰重疼

痛小腹急痛小便不利並宜服之脾惡濕腎惡燥古人制

方益腎皆濕潤之藥也故八味丸仲景謂之腎氣丸以熟

地黃為主

熟地補腎水真 肉桂補腎水真 丹皮補神志不

附子能行諸經而不 白茯苓能伐腎邪 澤瀉去胞中留

三山茱萸治精滑不 乾山藥能治皮毛中乾

右八味為細末煉蜜丸皆君主之藥也若不依易老加

減服之終不得效若加五味子為腎氣丸述類象形之

劑也益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光

錢氏地黄丸加減法 如陽事多痿不振依本方然夏月

減附子三停精完全減血虛陰衰熟地黄為君 精滑山

茱萸為君 小便或多或少或赤或黃或白茯苓為君

小便淋漓澤瀉為君 心虛腸胃積熱心火熾盛心氣不

足牡丹皮為君 皮膚澁乾山藥為君 已上言為君者

其分兩用八兩其乾地黄只依為臣分兩餘皆同

保命金剛丸牛膝丸煨腎丸並見虛損門

海離珠丹又名神珠丹治下焦陽氣虛乏臍下腹冷痛足

肝寒而逆

杜仲炒去絲

萹薺二兩

呵子炮五箇

龍骨乙兩

破故紙三兩

巴戟酒浸去

胡桃乙百箇

硃砂另研乙

縮砂仁兩半

右為末酒為丸梧桐子大硃砂為衣每服三十九空心

溫酒鹽湯任下

還少丹大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰

腳沉重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁

乾山藥

牛膝酒浸

遠志去心

山茱萸去核

白茯苓

五味

巴戟酒浸去心

肉蓯蓉酒浸

石菖蒲

楮實

杜仲去絲

姜汁

舶上茴香各乙兩

枸杞乙兩半

右為細末煉蜜同棗肉為丸桐子大每服三十九溫酒

或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日精神爽半月

氣壯二十日目明一月夜思飲食冬月手足常煖久服

令人身體輕健筋骨壯盛怡悅顏色壽延難老更有加

減法如熱加山梔子乙兩心氣不寧加麥門冬乙兩少

精神加五味子乙兩陽弱加續斷乙兩常服固齒牢牙
永無瘡癩婦人服之容顏悅澤煖子宮去一切病

水芝丸

方見小便數門

丹玉女長春不老丹牛膝根汁蒼耳根汁各二碗不可入
水和一處磁器熬成膏如稠蜜金罌子為末散半斤用不
去皮蓮子實豬猪肚即鵝猪肚蒸熟取蓮子曬乾四兩和前二
末膏子丸如梧子大溫酒下廿丸一月身和暖二月覺精
神服一料驗甚

海腎實須澤瀉瀉之腎本無實不可瀉錢氏止有補腎地
黃丸無瀉腎之藥 治脉洪而實錢氏地黃丸加生地黃
去山茱萸是也此治左手本部脉實若右尺洪實以鳳髓
丹瀉之

補母瀉子法

假令水在木之分是從後來者此為虛邪雖水為虛邪則

木本虛矣經曰母能令子虛 假令火在木之分是從前
來者此為實邪雖火為實邪則木本實矣經曰子能令母
實 假令兩手脉弦無表証乃東方實也是西方不足也
緣母虛所致宜大補其脾土微補肺大泄其火微泄其木
權症諸論云先調其氣次治諸疾況此本經不足的証也
難經云東方實是西方虛也又云欲泄其邪先補其虛此
之謂也此証當以溫藥補肺以氣藥燥劑為用如正氣已
勝當再服泄火瀉風之藥清鬲涼上勿令入胃此為全治
用益黃加白朮半夏茯苓甘草如酒病得之加澤瀉治手
足陽明二燥益黃者燥濕而補氣也實瀉黃也泄火瀉風
用瀉青之類羌活防風生地黃甘草黃連等分黃芩倍之
凡用藥補即用各方之生數如理中丸建中湯是也瀉即
用各方之成數七宣丸是也

有正經
自病有
五邪相

法診五邪

有正經自病有五邪所傷何以別之經言憂愁思慮則傷心形寒飲冷則傷肺恚怒氣逆上而不下則傷肝飲食勞倦則傷脾久坐濕地強力入水則傷腎是正經自病者也何謂五邪有中風有傷暑有飲食勞倦有傷寒有中濕此之謂五邪假令心病何以知中風得之然其色當赤何以言之肝主色自入為青入心為赤入脾為黃入肺為白入腎為黑肝為心邪故知當赤色也其病身熱脇下滿痛其脉浮大而弦何以知傷暑得之然當惡臭何以言之心主臭自入為焦臭入脾為香臭入肝為臊臭入腎為腐臭入肺為腥臭故知心病傷暑得之也當惡臭其病身熱而煩心痛其脉浮大而散何以知飲食勞倦得之然當喜苦味虛為不欲食實為欲食何以言之脾主味入肝為酸入心為苦入肺為辛入腎為鹹自入為甘故脾邪入心為喜

苦味也其病身熱體重嗜臥四肢不收其脉浮大而緩何以知傷寒得之然當譫言妄語何以言之肺主聲入肝為呼入心為言入脾為歌入腎為呻自入為哭故知肺邪入心為譫言妄語也其病身熱灑灑惡寒甚則喘咳其脉浮大而濇何以知中濕得之然當喜汗出而不可止何以言之腎主濕入肝為泣入脾為涎入肺為涕自入為唾故知腎邪入心為汗出不可止也其病身熱而小腸痛足脛寒而逆其脉沉濡而大此五邪之法也四十九難

肝主色 心主臭 脾主味 肺主聲 腎主液

肝色青 其臭臊 其味酸 其聲呼 其液泣

心色赤 其臭焦 其味苦 其聲言 其液汗

脾色黃 其臭香 其味甘 其聲歌 其液涎

肺色白 其臭腥 其味辛 其聲哭 其液涕

腎色黑 其臭腐 其味鹹 其聲呻 其液唾

病有虛邪有實邪有賊邪有微邪有正邪何以別之從後來者為虛邪從前來者為實邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病者為正邪何以言之假令心病中風得之為虛邪傷暑得之為正邪飲食勞倦得之為實邪傷寒得之為微邪中濕得之為賊邪五十

一脈為十變者何謂也然五邪剛柔相逢之意也假令心脈急甚者肝邪干心也心脈微急者膽邪干小腸也心脈大甚者心邪自干心也心脈微大者小腸邪自干小腸也心脈緩甚者脾邪干心也心脈微緩者胃邪干小腸也心脈瀦甚者肺邪干心也心脈微瀦者大腸邪干小腸也心脈沉甚者腎邪干心也心脈微沉者膀胱邪干小腸也五臟各有剛柔邪故令一脈輒變為十也十難

靈黃帝曰請問脈之緩急大小滑瀦之病形何如岐伯曰

臣請言五臟之病變也心脈急甚者為痰癥微急為心痛

引背食不下謂色赤脈鈞而急也餘緩大小滑瀦五脈做此緩甚為狂笑微緩為

伏梁在心下上下行時唾血大甚為喉吟微大為心痺引

背善淚出小甚為善噦微小為消痺滑甚為善渴微滑為

心疝引臍小腹鳴瀦甚為瘖微瀦為血溢維厥耳鳴顛疾

肺脈急甚為癩疾微急為肺寒熱怠惰咳唾血引腰背胷

若鼻息肉不通謂色白脈毛而急也餘脈做此緩甚為多汗微緩為痿瘦

偏風頭已下汗出不可止大甚為脛腫微大為肺痺引胃

背起惡日光小甚為泄微小為消痺滑甚為息賁上氣微

滑為上下出血瀦甚為嘔血微瀦為鼠瘻在頸腋腋之間

下不勝其上其應善瘥矣

肝脈急甚者為惡言微急為肥氣在脇下若覆杯謂色青脈弦而

急也餘脈微此緩甚為善嘔微緩為水瘕痺也大甚為內癘善嘔
衄微大為肝痺陰縮欬引小腹小甚為多飲微小為消痺
滑甚為癘疝微滑為遺溺瀦甚為溢飲微瀦為瘕攣筋痺
脾脈急甚為瘕瘕微急為膈中食飲入而還出後沃沫緩
甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心慧然若無病大甚為
擊仆微大為疝氣腹裏大膿血在腸胃之外小甚為寒熱
微小為消痺滑甚為癘癘微滑為蟲毒蝟蝎腹熱瀦甚為
腸癘微瀦為內癘多下膿血

腎脈急甚為骨癘疾微急為沉厥奔豚足不收不得前後
謂色黑脈石而急也餘脈微此緩甚為折脊微緩為洞洞者食不化下嗝
還出大甚為陰痿微大為石水起臍已下至小腹腫脹然
上至胃腕死不治小甚為洞泄微小為消痺滑甚為癘癘
微滑為骨痿坐不能起起則目無所見瀦甚為大癘微瀦

為不月沉疴黃帝曰病之六變者刺之奈何岐伯答曰諸
急者多寒緩者多熱大者多氣少血小者血氣皆少滑者
陽氣盛微有熱瀦者多血少氣微有寒是故刺急者深內
而久留之刺緩者淺內而疾發鍼以去其熱刺大者微瀉
其氣無出其血刺滑者疾發鍼而淺內之以瀉其陽氣而
去其熱刺瀦者必中其脈隨其逆順而久留之必先按而
循之已發鍼疾按其痛無令其血出以和其脈諸小者陰
陽形氣俱不足勿取以鍼而調以甘藥也初詳滑者陰氣
有餘今反言陽

肝五邪

假令肝病實邪風熱相合風性急火搖動焰而旋轉其

脈弦而緊洪風熱發狂宜芎黃湯

羌活

川芎

大黃

各乙

甘草

半

右咬咀每服半兩水二盞煎至六分去渣溫服

氣盛瀦者陽氣有餘今反言少氣多血恐二脈乃
交互間宜更詳之已上並見邪氣臟腑病形篇

虛邪風寒相合木慮腎恐拘急自汗其脉弦緊而沉仲景云風感太陽移証在少陰經中桂枝加附子湯主之 賊邪風燥相合血虛筋縮皮膚皴揭脉弦浮而濇仲景云血虛筋急桂枝加栝蒌湯主之 微邪風濕相合體重節痛臟腑洞泄脉弦長而緩仲景云身體疼痛下利清穀急當救裏四逆湯主之 正邪中風目眩頭重叫怒不出脉弦緊而長仲景云甚則如癰為瘥宜羌活湯本草云羌活主瘥癰防風黃芩為佐小兒為癰大人為瘥

心五邪

假令心病實邪熱濕相合憤憤心煩熱蒸不眠脾經絡於心心經起於脾二經相接故為濕熱脉浮大而緩足太陰寄証在手太陽宜梔豉湯若瘥加厚朴枳實 虛邪熱風相合妄聽妄聞耳有簫聲膽與三焦之經同出於耳銅人云刺關衝出血瀉支溝脉浮大而弦初小柴胡湯後大柴

胡湯此証是太陽與少陽為病前客後主也 賊邪熱寒相合膽惕心懸如饑神怯恐怖足少陰與手厥陰相接水中心經故神怯怖耳脉大而沉濡亦在太陽經中內經曰心虛則憊以黃連附子瀉心湯主之治法云熱多寒少以熱為佐如寒多熱少加附子乾姜佐之 微邪熱燥相合過飲歌樂實為熱燥俗言暢飲也病人言快活快活是有聲歌樂也以意思漿是無聲歌樂也脉大而洪濇白虎湯主之喘則加人參 正邪熱也脫陽見鬼燥擾狂越脉洪實一呼四至是八至脉也小承氣湯主之謂腹不堅大也

肺五邪

假令肺病實邪燥寒相合毛聳皮涼濇多而清其脉短濇而沉此証如秋冬宜八味丸若春夏宜地黄丸 虛邪燥濕相合微喘而痞便難而痰其脉浮濇而緩枳實理中湯

主之如喘甚加人參若便難加木香枳榔各半錢為極細末煎下理中丸 賊邪燥熱相合鼻窒衄血溢血泄其脉濇而浮大甚者桃仁承氣湯微者犀角地黄湯極者抵當湯微者抵當丸 微邪燥風相合皮燥甲枯血虛氣虛二臟俱虛先血後氣其脉浮濇而弦大養氣血藥主之 正邪燥自病其氣曠鬱皆屬於肺諸燥有聲其脉浮濇而短則諸嗽藥選而用之

腎五邪

假令腎病實邪寒風相合當藏不藏故下利純清其脉沉滑而弦仲景云少陰証口燥咽乾下利純清大承氣湯主之脉沉弦而遲四肢逆冷者宜四逆湯等 虛邪寒清相合咳唾多呻灑淅寒清無寐經言燥化清其脉沉實而濇酸棗仁湯主之 賊邪寒濕相合腎為胃關關閉水溢關閉不利水在胃為腫在肺為喘及變諸証其脉沉緩而大

仲景云大病瘥後腰下有水氣者牡蠣澤瀉湯主之 微邪寒熱相合膀胱執鬱津液枯少其脉沉濡而大內經曰水少乾涸是也猪苓湯主之 正邪寒自病為寒忿用藏黑痺經沉其脉沉濡而滑宜黑痺天麻丸如証同脉異微者腑病也甚者臟病也

脾五邪

假令脾病實邪濕燥相合胃中燥屎腹滿堅痛其脉緩而長瀼正陽陽明証也調胃承氣湯主之 虛邪濕熱相合熱陷胃中腸澼下血脉緩而大黃連解毒湯主之 賊邪濕風相合嘔逆脇痛往來寒熱脉緩而弦長小柴胡湯主之 微邪濕寒相合寒來求濕身黃而不熱體重而不渴謂之寒濕其脉緩沉而滑木附湯主之如小便不利者加茯苓 正邪濕自病腹滿時痛手足自溫其脉沉濇而長虛痛桂枝加芍藥湯實痛桂枝加大黃湯主之

胃為十二經之海十二經皆稟血氣滋養於身脾受胃之稟行其血氣也脾胃既虛十二經之邪不一而出假令不能食而肌肉削乃本病也其右關脈緩而弱本部脈也本部本証脈中兼見弦脈或見四肢滿閉淋洩便難轉筋一証此肝之脾胃病也當於本經藥中加風藥以瀉之本部本証脈中兼見洪大或見肌熱煩面赤而不能食肌肉消一二証此心之脾胃病也當於本經藥中加瀉火之藥本部本証脈中兼見浮濇或見氣短氣上喘咳痰盛皮濇一二証此肺之脾胃病也當於本經藥中兼瀉肺之邪及補氣之藥本部本証脈中兼見沉細或見善恐數欠之証此腎之脾胃病也當於本經藥中加瀉腎水之浮及瀉陰火伏熾之藥

弦脈

風邪所傷甘草芍藥黃芪建中湯之類或甘酸之劑皆可用之

洪脈

熱邪所傷三黃丸瀉黃散調胃承氣湯或甘寒之劑皆可用之

脾胃右關其脈緩如得緩脈

本經太過濕邪所傷正胃散白朮茯苓五苓散或除濕之劑皆可用之

濇脈

燥邪所傷異攻散加當歸四君子湯加熱地黃或甘溫甘潤之劑皆可用之

沉細脈

寒邪所傷益黃散養脾丸理中湯如寒甚則加附子甘熱之劑皆可用之

前項所定方藥乃常道也如變則更之

脾胃不足不同餘臟無定體故也其治肝心肺腎有餘不足或補或瀉惟益脾胃之藥為切經言至而不至是為不及所勝妄行所生受病所不勝乘之也至而不至者謂從後來者為虛邪心與小腸來乘脾胃也脾胃脈中見浮大而弦其病或煩躁悶亂或四肢發熱或口苦乾咽乾蓋心主火小腸主熱火熱來乘土位乃濕熱相合故煩燥悶亂也四肢者脾胃也火乘之故四肢發熱也飲食不節勞

役所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故
口咽乾也病人自以為渴醫者治以五苓散謂止渴燥而
反加渴燥乃重竭津液以至危亡也經云虛則補其母當
於心與小腸中以補脾胃之根蒂以甘溫之藥為之主以
苦寒之藥為之使以酸味為之臣佐以心苦緩急食酸以
收之心火旺則肺金受邪金虛則以酸補之次以甘溫及
甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也所勝妄
行者謂心火旺能令母實母者肝木也肝木旺則挾火之
勢無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或身體沉重走注
疼痛蓋熱濕相搏風熱鬱而不得伸附麗於有形也或多
怒者風熱下陷於地中也或目病而生內障者脾裹血胃
主血心主脉脉者血之府也或云心主血又云肝主血肝
之竅開於目也或妄見妄聞起妄心夜夢亡人四肢滿悶

轉筋皆肝木火盛而為邪也或生痿或生痺或生厥或中
風或生惡瘡作腎痿或上熱下寒為邪不一皆風熱不得
生長而木火遏於有形中也所生受病者言肺受土火木
之邪而清肅之氣傷或胃滿少氣短氣者肺主諸氣五臟
之氣皆不足而陽道不行也或欬嗽寒熱者濕熱乘其內
也所不勝乘之者水乘木之妄行而反來侮土故腎火下
亢致督任衝三脉盛火旺煎熬令水沸騰而乘脾肺故痰
涎唾出於口也下行為陰汗為外腎冷為足不任身為腳
下隱痛或水附木勢而上為眼渣為眵為冷淚此皆由肺
金之虛而寡于畏也夫脾胃不足是火不能生土而反抗
拒此至而不至是為不及也

白朮

人參

甘草

芍藥

黃連

黃芪

桑白皮

諸風藥皆是風能勝濕也諸甘溫藥亦可

心火亢盛乘於脾胃之位亦至而不至是為不及也

黃連君 石膏佐 芍藥佐 知母佐

黃栢臣 甘草使 生地臣 黃芩佐

肝木妄行胸脇痛口苦舌乾往來寒熱而嘔多怒四肢滿

閉淋洩便難轉筋腹中急痛此所不勝乘之也

柴胡君 防風臣 白朮佐 羌活佐

獨活佐 芍藥臣 甘草臣 升麻使

茯苓佐 猪苓 澤瀉佐 肉桂臣

藁本 川芎 細辛 蔓荊子

白芷 石膏 黃栢 知母

滑石

肺金受邪由脾胃虛弱不能生肺乃所生受病也故欬嗽

氣短氣上皮毛不能禦寒精神少而渴情慘慘不樂皆陽

氣不足陰氣有餘是體有餘而用不足也

人參君 白朮佐 白芍藥佐 橘皮臣

青皮破滯氣 黃芪臣 桂枝佐 桔梗引

桑白皮佐 甘草 木香佐 枳榔

五味佐此三味除客氣

腎水反來侮土所勝者妄行也作涎及清涕唾多溺多而惡寒者是也上火復之及三脉為邪則足不任身足下痛不能踐地骨乏無力喜睡兩丸冷腹陰陰而痛妄聞妄見腰脊背脇皆痛

乾姜君 蒼朮佐 川烏臣炒少許 白朮臣

肉桂佐 茯苓 澤瀉使 猪苓佐

附子佐炮

孫按虞部郎中汪奉老疾革有子可升當遺表奏廢召孫至曰郎中亡矣不可治可升告孫曰生且固難如何可延三日以待奏回孫曰郎中之患肝氣將絕脾土反勝當後脾土火旺肝氣乃絕方今日辰巳間當畧瀉脾土使不能勝肝則木且未絕三日後早奏下當日氣絕孫尚藥精究五臟盛衰類此

天地之氣內淫而勝為病藥方六氣乘虛為病相勝藥方六氣之復為病藥方並見運氣類註

醫學綱目卷之五

陰陽臟腑部

治寒熱法

診治寒熱大法

陰勝則陽病陽勝則陰病陽勝則熱陰勝則寒重寒則

熱重熱則寒

陰陽應象論下同

陽勝則身熱腠理閉喘麤為之

俛仰汗不出而熱齒乾以煩寃腹滿死能冬不能夏陰

勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥厥則腹滿死能

夏不能冬

諸有過切之瀦者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣

有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘則無

汗而身寒陰陽不足則有汗而身熱予補此句為病之重

者莫大於此如刀削肌肉危之甚不能久矣按經曰邪

生於陽者得之風雨寒暑又曰陽虛生外寒陽受氣於上

焦以溫皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通上焦不

通則寒氣獨留於外故寒慄又曰陽盛生外熱上焦不通利則皮膚緻密腠理閉塞玄府不通衛氣不得泄越故外熱經曰邪生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒又曰陰虛生內熱有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣薰胃中故內熱又曰陰盛生內寒厥氣上逆寒氣積於胃中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留則血凝血凝則脈不通其脈盛大以澁故中寒餘見針灸門

靈視其顏色黃赤者多熱氣青白者少熱氣黑色者多血少氣五音五味篇經曰凡診絡脈脈色青則寒且痛赤則有熱胃中寒手魚際之絡多青胃中有熱魚際絡赤其暴黑者留久痺也其有赤有黑有青者寒熱氣也其青短者少氣也浮絡多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見其寒熱也餘見陰陽通論

治分反

難經云數則為熱遲則為寒諸陽為熱諸陰為寒全文見診法通論經曰人迎盛則為熱虛則為寒氣口盛則脹滿寒中

食不化虛則熱中出糜少氣溺色變全文見針灸虛實寒者熱

之熱者寒之微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從少從多觀其事也帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒因

熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已

全文見治法通論微者調之其次平之盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利全文見治法虛實

正治
以寒治熱
以熱治寒

王註曰假如小寒之氣溫以和之大寒之氣熱以取之甚寒之氣則下奪之奪之不已則逆折之折之不盡則求其屬以衰之小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣則汗發之發之不已則逆制之制之不盡

則求其屬以衰之

難陽盛陰虛下之則愈汗之則死此熱病也陽盛生外熱陰虛生內熱用寒藥下

之仲景云桂枝下兩陽盛則斃陰盛陽虛汗之則愈下之則死此寒病

生內寒陽虛生外寒用熱藥汗之非止發汗也為助陽也仲景云承氣入胃陰盛以下東垣云用甘藥以助升浮生

長之帝曰論言治寒以熱治熱以寒方士不能廢繩墨而更

其術也有病熱者寒之而熱有病寒者熱之而寒二者皆

在新病復起奈何岐伯曰諸病寒之而熱者取之陰熱之

而寒者取之陽所謂求其屬也王註云益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光

帝曰善服寒而反熱服熱而反寒其故何也岐伯曰治其

王氣是以反也帝曰不治王而然者何也岐伯曰悉哉問

也不治五味屬也夫五味入胃各歸所喜故酸先入肝苦

先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之

常也氣增而久天之由也至真要大論下同○王註云入肝為溫入心為熱入肺為

清入腎為寒入脾為至陰而四氣兼之皆為增其味而益其氣故久服黃連苦參而反熱者此其類也故曰久而增

氣物化之常也氣增不已則臟氣偏勝氣有偏勝則臟有偏絕臟有偏絕則有暴夭者故曰氣增而久天之由也

海問寒病服熱藥而寒不退熱病服寒藥而熱不退何也

答曰啓玄子云熱不得寒是無水也寒不得熱是無火也

寒之不寒責其無水熱之不熱責其無火經云滋其化源

源既已絕藥之假焉能滋其真水火也

帝曰脈從而病反者何如岐伯曰脈至而從按之不鼓諸

陽皆然王註云言病熱而脈數按之不鼓動乃寒盛格陽而致之非熱也此一節言症屬陽脈亦從症雖

屬熱而病反寒也諸陽皆然謂三陽緊數而不鼓太陽標本不同之脈也帝曰諸陰之反何如

岐伯曰脈至而從按之鼓盛而甚也王註云形症皆寒按之而脈氣鼓擊於指

下盛此為熱盛拒陰而生病非寒也此一節言症屬寒脈亦從症雖屬寒而病反熱也是故百病之

起有生於本者有生於標者有生於中氣者有取本而得

以治以熱治以寒以寒

治寒

治寒

者有取標而得者有取中氣而得者有取標本而得者有
逆取而得者有從取而得者逆正順也若順逆也故曰知
標與本用之不殆明知逆順正行無問此之謂也不知是
者不足以言診足以亂經故大要曰粗工嘻嘻以為可知
言熱未已寒病復始同氣異形迷診亂經此之謂也夫標
本之道要而博小而大可以一言而知百病之害言標與
本易而勿損察本與標氣可令調明知勝復為萬民式天
之道畢矣六氣之病標本相反者唯太陽少陰之病為最
蓋太陽標陽本寒少陰標陰本熱王註釋諸陽
脈至而從為病熱脈數者太陽之標也按之不鼓為寒盛
格陽者寒水之本與標相反也釋諸陰脈至而從為脈証
是寒者少陰之標也按之鼓甚為熱甚拒陰者君火之本
與標相反也是故不知相反者逆標氣之陰陽而正治則
順本氣之寒熱而病加知相反者順標氣之陰陽而反治
則逆本氣之寒熱而病愈故曰逆正順也知標與本用之
不殆明知逆順
正行無問也

陰症似

右脈從病反言症似陽者脈亦從症似陽而其病反是

寒也症似陰者脈亦從症似陰而其病反是熱也故皆
反其脈症施治如身熱微熱煩躁面赤其脈沉而微者
陰症似陽也身熱者裏寒故也煩躁者陰盛故也面戴
陽者下虛故也若醫者不知脈誤為實熱反與涼藥則
氣消成大病矣外臺秘要云陰盛發躁名曰陰躁欲坐
井中宜以熱藥治之故仲景少陰症面赤者四逆湯加
葱白治之東垣云寒涼之藥入腹周身之火得水則升
走陰燥之極故欲坐井中是陰已先亡醫猶
不悟復認為熱重以寒
藥投之其死也何疑焉

逆氣象陽

全文見
五臟

或因吐因嘔因嗽而發躁蒸蒸身熱如坐甑中欲得去
衣居寒處或飲寒水則便如故振寒復至則氣短促速胃
中滿悶欲絕甚則口開目瞪聲聞于外而淚涕涎痰大作
其發躁須臾而已如前六脈細弦而瀆按之而虛此大寒

陽症似陰

症也以辛甘寒甘溫之劑大瀉南方北方則愈

活手足逆冷大便秘小便赤或大便黑色脉沉而滑者陽症似陰也輕者白虎湯重者承氣湯傷寒失下血氣不通令四肢逆冷此是伏熱深故厥亦深速以大承氣湯加賦粉下之汗出立愈蓋熱厥與陰厥自不同熱厥者微厥却發熱陰厥即不發熱四肢逆冷惡寒脉沉細大小便滑泄右二節言症似陽而脉病屬陰症似陰而脉病屬陽故反其症而治之蓋症似陽而脉病屬陰者世尚能辨若脉症俱是陰而病獨屬陽者舉世莫辨而致天拆者滔滔皆是許學士云熙寧中邠守迪因其猶子病傷寒見其煩渴而汗多以涼藥治之遂成陰毒數日卒迪痛悼之遂著陰毒形症訣三篇蓋傷世之意深矣

熱因寒用

通足太陽膀胱之經乃熱因寒用且膀胱本寒其經老陽

寒因熱用

也太陽為標有陽之名無陽之實謂其將變陰也其脉緊而數按之不鼓而空虛是外見虛陽而內有真寒也故仲景以姜附湯久久熟煎不溫服而寒服之亦是寒治也姜附氣味俱陽加之久久熟煎取重陽之熱瀉純陰之寒是治其本也不溫服而寒服此以假寒治太陽標之假陽也故為真假相對之治法因藥處治者當知其脉之空虛則是內伏陰寒之氣外顯熱症大渴引飲目赤口乾面赤身熱四肢熱如火者此浮陽將絕于外而內則為寒所拒也手少陰心之經乃寒因熱用且少陰之經真陰其心病根本是真火也故曰少陰經標陰本熱是內則心陽為本外則真陰為標其脉沉細按之洪大緊甚而盛者心火在內則緊甚洪大真陰為標則得脉之沉細寒水之體也故仲景以大承氣湯酒製大黃煎成熱服之以除標寒用大

黃芒硝辛苦大寒之氣味以瀉本熱以此用藥可以為萬世法矣

治熱以寒

素治熱以寒溫而行之

至真要大論○即寒因熱用之類如前大黃芒硝大寒之藥熱服是已

丹溪治色目婦人惡寒用八物湯去芎加炒栢治之反劇知其病熱深而藥無反佐之過也仍取前藥熟炒與之而愈此治熱以寒借火之力溫而行之也

溫治熱以寒溫而行之有三皆因大熱在身止用黃芪人參甘草此三味者皆甘溫雖表裏皆熱燥發於內捫之肌熱於外能和之汗自出而解矣此溫能除大熱之至理一也熱極生風乃左遷入地補母以虛其子使天道右遷順行諸病得天令行而必愈二也況大熱在上其大寒必伏於內溫能退寒以助地氣地氣者在人乃胃之生氣使真

氣旺三也

治寒以熱

素治寒以熱涼而行之

即熱因寒用之類如用乾姜附子大熱之藥須冷服是已

仲景治少陰病下利脈微者與白虎湯利不止厥逆無脈乾嘔煩熱白通加猪膽汁湯主之此治寒以熱借膽汁之涼而行之也

東垣治寒以熱涼而行之有三北方之人為大寒所傷其足脛脹乃寒勝則浮理之然也若火灸湯浴必脫毛見骨須先以新汲水浴之則時見完復矣更有大寒凍其面或耳若近火湯必脫皮成瘡須先於涼房處浴之少時以溫手熨烙必能完復此涼而行之除其大寒之理一也大寒之氣必令母實乃地道左遷入肺逆行於天以涼藥投之使天道右遷而順天令諸病得天令行而必愈二也況大寒在外其大熱伏於地下者乃三焦包絡天真之氣所居

之根蒂也熱伏於中元氣必傷在人之身乃胃也以涼藥和之則元氣充盛而不傷三也

惡寒非寒

丹惡寒非寒惡熱非熱論○經曰惡寒戰慄者皆屬於熱又曰戰慄如喪神守皆屬於火惡寒者雖當炎月若遇風霜重綿在身如覺凜凜戰慄如喪神守惡寒之甚也原病式曰病熱症而反覺自冷此為病熱實非寒也或曰往往見有服熱藥而可愈者何也病熱之人其氣炎上鬱為痰飲抑遏清道陰氣不升病熱尤甚積痰得熱亦為暫退熱勢助邪其病益深或曰寒勢如此誰敢以寒涼藥與之非殺而何予曰古人遇戰慄之症有以大承氣湯下燥糞而愈者惡寒戰慄明是熱症但有虛實之分耳

惡熱非熱

經曰陰虛則發熱夫陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌

表之間而惡熱實非有熱當作陰虛治之而用補養之法可也或曰傷寒惡寒惡熱者亦是耶予曰若病傷寒者自外入內先賢論之詳矣愚奚庸贅

治發熱

大法

凡火鬱當看熱在何經輕者可降重者則隨其性而升之人虛火盛顛者用生姜湯若投以冰水正治之立死

實火可瀉小便降火極速 有補陰即火自降炒栢地黃之類 凡氣有餘便是火急甚者必緩之生甘草兼瀉兼緩參朮亦可 凡火盛者不可驟用寒涼藥必兼溫散之

左金丸治肝火用黃連六兩吳茱萸一兩 陰虛火動難

治 喫酒人發熱難治 不飲酒人因酒發熱者難治

一男子二十三歲因酒發熱用青黛瓜蒌仁入姜汁每日數匙入口中三兩月而愈

垣小兒癰後餘熱不退痂不收斂大便不行是謂血燥則當以陰藥治之因而補之用清涼飲子通大便而瀉其熱潔古云涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風徹熱之劑也此甘寒瀉火也傷寒表邪入於裏日晡潮熱大渴引飲譫語狂燥不大便是胃實乃可攻之夫胃氣為熱所傷以承氣湯瀉其土實元氣乃得周流承氣之名於此具矣此苦寒瀉也今世人以苦泄火故備陳之除熱瀉火非甘寒不可以苦寒瀉火非徒無益而反害之故有大熱脈洪大服苦寒劑而熱不退者加石膏如症退而脈數不退洪大而病有加者宜減苦寒加石膏如大便軟或泄者加桔梗食後服之此藥誤用則其害非細用者旋旋加之如食少者不可用石膏石膏善能去脈數如病退而脈數不退者不治

熱分虛

海大熱而脈反細小不可下者瀉心湯主之脈有力可用

之。骨肉筋血皮毛陰足而熱反勝之是謂實熱

垣能食而熱口舌乾燥大便難者實熱也以辛苦大寒之劑下之瀉熱補陰經云陽盛陰虛下之則愈脈洪盛而有

丹人壯氣實火盛顛狂者可用正治芒硝冰水之類飲之海骨痿肉燥筋緩血枯皮聚毛落陰不足而有熱疾是謂虛熱

垣不能食而熱自汗氣短者虛熱也以甘寒之劑瀉熱補氣經云治熱以寒溫而行之脈虛弱無力者是已

當歸補血湯 治婦人肌熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無內經曰脈虛血虛脈實血實又云血虛發熱是也症象白虎惟脈不長實難辨也悞服白虎湯必死此病得於饑困勞役

黃芪

兩

當歸

二錢
酒洗

右剉作一服水二盞煎至一盞去查稍熱空心服之

補中益氣湯 治飲食勞倦所傷始為熱中蓋人受水穀之氣以生所謂清氣營氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別名也夫胃氣為水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也若飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流肝腎陰火得以乘其土位故脾症始得則氣高而喘身熱而煩其脉洪大而頭痛或渴不止其皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火

上衝則氣高喘而煩熱為頭痛為渴而脉洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春生之令不行則無陽以護其營衛不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然與外感風寒之症頗同而實異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外則有餘有餘者瀉之傷其內則不足不足者補之汗之下之吐之剋之之類皆瀉也溫之和之調之養之之類皆補也內傷不足之病苟誤認作外感有餘之症而反瀉之則虛其虛也實實虛虛如此死者醫殺之耳然則奈何唯當以辛甘溫劑補其中而升其陽甘寒以瀉其火則愈矣經曰勞者溫之損者溫之又曰溫能除大熱大忌苦寒之藥損其脾胃脾胃之症始得則熱中今立法治始得之症

黃芪

病甚熱甚
者乙錢

人參

三分
嗽去之

甘草

五分

當歸身

二分
酒製

橘皮二分

升麻二分

柴胡二分

白朮三分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去查食遠稍熱服如傷重者不過二服而愈若病久者以權立加減法治之如腹中痛者加白芍五分炙甘草三分惡寒冷痛者加中桂去皮二分如惡熱喜寒而腹痛者於已加芍藥甘草中更加生黃芩三分或二分或夏月腹痛而不惡熱者亦然治時熱也若天涼惡熱而痛於加白芍甘草黃芩中更加桂少許天寒腹痛去芍藥味酸寒故也加益智仁三分或加半夏五分生姜三片如頭痛加蔓荊子三二分痛甚者加川芎二分頂痛腦痛加藁本三分或五分若苦頭痛者加細辛二分諸頭痛者併用此四味足矣若頭上有熱則此不能治別以清空膏治之如臍下痛者加

真熟地五分其痛立止如不止者乃大寒也更加肉桂去皮三分或二分內經所說小腹痛皆寒症從復法相報中來也經曰大勝必大復從熱病中變而作也非傷寒厥陰之症也仲景用抵當湯併丸主之乃血結下焦膀胱也如胃中氣壅滯加青皮二分氣促少氣者去之如身有疼痛者屬濕若身重者亦濕加去桂五苓散一錢如風濕相搏一身盡痛加羌活防風各五分升麻藁本根蒼朮各一錢勿用五苓散所以然者為風藥已能勝濕故別作一服與之如病去勿再服以治風之藥大損元氣而益其病故也如大便秘瀆加當歸稍一錢如閉瀆不行煎成正藥先用一口調玄明粉半錢或一錢得行則止此病不宜下下之恐變成凶症也如久病痰嗽者去人參初病者勿去冬月春寒或秋涼

時各宜加不去節麻黃半錢如春令大溫則加佛耳草三分欬冬花二分如夏月病嗽加五味子三分去心麥冬二分或三分如舌上白滑胎是胃中有寒勿用之如夏月不嗽亦加人參三二分并五味子麥冬各等分救肺受火邪也 如病人能食而心下痞加黃連二分或三分如不能食而心下痞勿用如脇下痛或急縮者俱加柴胡甘草

垣氣運衰旺圖。

濕胃化 熱小腸長 風膽生 皆陷下不足先補則用黃芪 甘草 當歸 升麻 柴胡 人參乃辛甘發

散以助春夏生長之用者也

土脾形 火心神 木肝血 皆大盛上乘生長之氣後瀉則用甘草稍之甘寒瀉肺火逆於胃中傷氣者也黃芩之苦寒以洩胃中之熱喘氣上奔者也 紅花以破惡血 用黃芩大補腎水益肺氣瀉血中火燥者也 寒膀胱藏氣 燥大腸收氣 皆大旺後瀉則用黃芪之甘溫止自汗實表虛使不受寒邪當歸之辛溫能潤燥更加桃仁以通幽門閉塞利其陰路除大便之難燥者也

水腎精 金肺氣 皆虛衰不足先補則用黃栢之苦寒除濕熱為痿乘於腎救足膝無力亦除陰汗陰痿而益精甘草稍黃芩補肺氣洩陰火之下行腎苦氣上逆急食苦以洩之也

此初受熱中常治之法也非權也權者臨病制宜之謂也

實熱正治

海晝熱則行陽二十五度大抵柴胡飲子 夜熱則行陰

二十五度大抵四順飲子 又云一身盡熱或日晡潮熱或夜則行陰發熱者皆血熱

也四順飲子或桃仁承氣湯選而用之當視其由表入裏腹痛血刺痛腹中有無轉矢氣之異 平旦

發熱熱在行陽之分肺氣主之故用白虎湯以瀉氣中

之火 又云白虎治脈洪故抑之使秋氣得以下降也 日晡潮熱熱在行陰之

分腎氣主之故用地骨皮以瀉血中之火 又云地骨皮散治脈弦故

舉之使春氣得以上升也按地骨皮散治虛熱方也

熱分氣

氣分熱

柴胡飲子

白虎湯

血分熱

清涼飲子

即四順散

桃仁承氣湯

恒牽牛味辛烈能瀉氣中之濕熱不能除血中之濕熱防已味苦寒能瀉血中之濕熱又通血中之滯塞

柴胡飲子

方見勞熱

白虎湯

方見傷寒

地骨皮散

方見骨蒸門

清涼飲子

大黃 蒸

甘草 炙

當歸 洗

芍藥 洗各等分

右咬咀每服五錢薄荷十葉水一盞半同煎至七分去

查溫服

桃仁承氣湯

方見傷寒

丹人病脈虛氣鬱發熱

芍藥

酒炒一兩二錢五分

香附 一兩

蒼朮 半兩

沙參 三錢

甘草 一錢五分

右炊餅丸服

脈滑腸有宿食常暮發熱明日復止者於宿食門求之濕痿夜熱以三補丸加白芍藥為丸

三補丸方

黃芩

黃柏

黃連

為末粥糊為丸

熱分表裏

熱分上下

有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱故苦者以治五臟五臟屬陰而居于內辛者以治六腑六腑屬陽而在于外故曰內者下之外者發之又宜養血益陰身熱自除以脈言之浮數為外熱沉數為內熱浮大有力為外熱沉大有力為內熱

仲熱在上焦者因欬為肺痿熱在中焦者為堅熱在下焦者為尿血亦令淋閉不通
肘前熱者腰以上熱手前獨熱者腰以下熱肘前獨熱者膺前熱肘後獨熱者肩背熱臂中獨熱者腰腹熱肘後以下三四寸熱者腸中有虫掌中熱者腹中亦熱全文見診法
海三焦熱用藥大例 上焦熱梔子黃芩 中焦熱小便不利黃連芍藥 下焦熱黃栢大黃
上焦熱 清神散 連翹防風湯 涼膈散
龍腦飲子 犀角地黃湯

肘獨熱多渴咽腫日赤口糜屬上熱

中焦熱 小承氣湯 調胃承氣湯 洗心散
四順清涼飲 桃仁承氣湯
下焦熱 大承氣湯 五苓散 立効散
八正散 石葦散 四物湯
身熱脈洪無汗多渴者熱在上焦宜桔梗湯

桔梗 連翹 山梔 薄荷 黃芩 甘草各等分
右為粗末竹葉白水煎溫服汗之熱服 春倍加防風 羌活 夏倍加黃芩知母 季夏淫雨倍加羌活 秋加桂五錢 冬加桂一兩亦可以意消息隨症增損而用之

蜀清神散消風壅化痰涎治頭目眩面熱

檀香挫 人參去蘆 羌活去苗 防風去蘆各一兩
薄荷去上 甘草 荆芥穗各二兩 石膏研四兩

細辛 去苗焙 五錢

右為末每服二錢沸湯點服或入茶末點服 此方虛熱可用

龍腦飲子治蘊積邪熱咽喉腫痛眼赤口瘡心煩鼻衄 丹溪云上中二焦藥也

砂仁 瓜蒌根 各三兩 藿香葉 二兩 石膏 四兩

甘草 蜜炙 六兩 梔子 微炒 十兩

右為末每服二錢至三錢用新汲水入蜜調下

無擇 加減涼膈散退六經之熱 丹溪云涼膈散心脾胃藥也

易老 涼膈散減大黃芒硝加桔梗甘草一法加防風同為舟楫之劑浮而上之治胃膈中與六經之熱以手足少陽之氣俱下膈終胃中三焦之氣同相火遊於身之表膈與六經乃至高之分此藥浮載亦至高之劑故施於無形之中隨高而走去胃膈中及六經之熱也

梔子仁 一兩 五錢 芒硝 兩半 連翹 薄荷

黃芩 甘草 各一兩半 大黃 五錢

右為粗末每一兩水二盞竹葉七片同煎至一盞去渣入蜜少許食後服加姜煎亦得去六經熱減大黃芒硝加桔梗甘草人參防風治肺經邪熱咳嗽有痰加半夏涼膈與四物湯各半服能益血洩熱名雙和散錢氏去連翹加藿香石膏為瀉黃散

本草方 治大人小兒五臟積熱煩燥多渴唇裂喉閉目赤鼻頰結硬口舌生瘡陽明疰傷寒發狂見鬼譫語大小便閉一切風壅並皆治之

山梔仁 甘草 赤芍藥 各一兩 大黃

朴硝 連翹 薄荷 淨 乾葛 各二兩

右為散每服二錢水一盞入竹葉七片蜜三匙同煎至

七分去查食後服唯陽明症傷寒忌下 此藥局方亦載綠味數與用藥大段不同予一姪婦忽患熱病欲死付之一服立效後來累服累驗幸毋忽

又方

白朮 荊芥 赤芍藥各三兩 大黃

車前子生用 木通 甘草 當歸各二兩

右為細末大便秘結米泔調空心服三錢上膈壅熱或生赤丹或生癰瘡用水二盞煎六分若小便結如淋狀用蘆根打碎洗淨煎湯下五心煩熱用生姜一片同煎服效

小承氣湯方見傷寒 調胃承氣湯方見傷寒 四順飲子方見前氣血

桃仁承氣湯方見傷寒 大承氣湯方見傷寒

立效散治下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛或出血

山梔炒半兩 瞿麥穗一兩 甘草炙三分

右為末每服五錢水一碗入連鬚葱根七箇燈心五十莖生姜七片同煎至七分溫服

石葦散治膀胱有熱水道淋澁或尿如荳汁及出砂石

石葦 木通 滑石 王不留行各二兩

甘草稍一兩 當歸 白朮 瞿麥 芍藥

葵子各三兩 黃芪二兩

右為細末每服煎湯調下空心服

經云胃足陽明之脈氣盛則身以前皆熱當取足三里等穴全文見刺灸

帝曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也岐伯曰是

人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風如炙如火者是人當肉燥也見逆調論燥消削也

手獨熱 大小便澀閉血熱 痔屬下

身前熱 屬陽明 四肢熱 屬陽盛 陰虛

手足心
熱屬火

仲三物黃芩湯治婦人四肢煩熱方見產頰
治手足心熱用東垣火鬱湯方見後火鬱熱條

梔子 香附 蒼朮 白芷 半夏

川芎 右用神麴糊丸

熱分五
臟

身熱有五不同論 五臟有邪各有身熱其狀各異以手捫摸有三法以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脉也重按至筋骨之分則熱蒸手極甚輕摸之則不熱是熱在筋骨間也輕手捫之則不熱重手加力按之亦不熱不輕不重按之而熱是熱在筋骨之上皮毛血脉之下乃熱在肌肉也此謂三法以三黃丸通治之細分之則五臟各異矣

肺熱者輕手乃得微按全無聲響然見於皮毛上為肺主皮毛故也日西尤甚乃皮毛之熱也其症必見喘欬灑淅寒熱輕者瀉白散重者涼膈散白虎湯之類治之及地黃地骨皮散

心熱者心主血脉微按於皮膚之下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛之下則熱少加力按之則全不熱是熱在血脉也日中太甚乃心之熱也其症煩心心痛掌中熱而噦以黃連瀉心湯導赤散硃砂丸安神丸清涼散之類治之脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不輕不重在輕手重手之間此熱在肌肉遇夜尤甚其症必急惰嗜臥四肢不收無氣以動以瀉黃散調胃承氣湯治實熱用之人參黃芪散補中益胃湯治中虛有熱者用之肝熱者按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱寅卯間尤甚者其脈弦其病四肢滿悶便難轉筋多怒多驚四肢困熱

筋痿不能起於牀瀉青丸柴胡飲之類治之兩手脉弦者或寅申發者皆肝熱也俱宜用之

腎熱者輕按之不熱重按之至骨其熱蒸手如火如炙其人骨蘇蘇然如虫蝕其骨困熱不任亦不能起於牀滋腎

丸六味地黄丸主之以脉言之則輕按之如三菽之重與重與血脉相得而數者心熱也如九菽之重與肌相得而數者皮熱也如十二菽之重與筋相得而數者肝熱也按之至骨舉指來疾而數者腎熱也

黃連瀉心火 木通瀉小腸火 黃芩瀉肺火

黃芩瀉大腸火 柴胡瀉肝火黃連佐之 柴胡瀉膽火亦佐之

以黃連 白芍藥瀉脾火 石膏瀉胃火

知母瀉腎火 黃柏瀉膀胱火一日瀉龍火

熱在皮七日瀉其端咳傷肺 海皮膚如火燎而以手重取之不甚熱肺熱也目白睛赤煩躁引飲單與黃芩一物湯

丹清金丸伐脾肺火 黃芩為末粥丸又名與點丸

右二方瀉肺中血分之火瀉白散瀉肺中氣分之火

錢瀉白散方見治虛實法五臟條 涼膈散 白虎湯方俱見前

瀉心湯瀉丁方見治虛實法五臟條

丹柳青丸伐心經之火須審虛實用之 黃連為末粥丸

本事方治心熱千金地黄丸

黃連四兩為粗末 生地半斤研取汁連查餅二味拌勻曬乾

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九食後門冬湯下

門冬丸治心經有熱

麥冬兩 黃連半兩

右為細末蜜丸如桐子大食後熟水下三十九

海清心丸治熱

熱在血脉日中甚煩心掌熱屬心

黃柏二兩

麥冬兩

黃連兩

龍腦錢

煉蜜丸如桐子大每服十九臨臥門冬酒下或薄荷湯亦得

錢導赤散瀉丙方見治虛實法五臟條

海火府丹丙丁俱瀉

黃芩兩

黃連兩

生地兩

木通兩

為細末煉蜜如梧子大每服二三十丸臨臥溫水下

錢瀉黃散方見治虛實法五臟條

調胃承氣湯方見傷寒

瀉青丸方見

治虛實法五臟條

熱在兩脇寅卯甚多怒用
當歸龍薈丸

當歸焙

草龍膽

山梔

黃連

黃柏

黃芩各一兩

大黃

蘆薈

青黛各半兩

木香二錢半

麝香半錢另研

右為末煉蜜丸如小菝大小兒如麻子大生姜湯下二
三十九忌發熱諸物兼服防風通聖散

丹回金丸伐肝經火亦審虛實用之

黃連兩

吳茱萸兩

右為末粥丸

佐金丸佐肺金以伐肝木之邪

片苓兩

吳茱萸兩

右為末蒸餅丸

垣滋腎丸

黃柏二兩酒洗焙

知母二兩酒洗焙

肉桂二錢

右為末熟水丸如雞頭大每服百丸加至二百丸白沸

湯下空心服

治腎熱諸方並見勞瘵

熱在腰或痛屬男

熱分腸
胃屬上
熱屬胃
腸下熱
屬腸

胃中熱則消穀令人懸心善饑臍已上皮膚熱腸中熱則
出黃如糜臍已下皮熱師傳篇○胃居臍上故胃熱則臍已
下熱如肝膽居臍上熱腸居臍下故腸熱則臍已
則當背脊亦熱腎居腰腎熱則當腰亦熱可類推也

暴熱者病在心肺積熱者病在腎肝暴熱者宜局方雄
黃解毒丸積熱者宜局方妙香丸暴者上喘也病在心肺
謂之喘宜木香金鈴子散上焦熱而煩者宜牛黃散有
病久憔悴發熱盜汗謂之五臟齊損此熱勞骨蒸之病也
瘦弱虛損煩喘腸澀下血皆蒸勞也治法宜養血益陰熱
能自退此謂不治而治也錢氏地黄丸主之

雄黃解毒丸治上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫
喉痺

木香金鈴散治暴熱心肺上喘不已
大黃五錢 金鈴子去核 木香各三錢 輕粉少許

朴硝二錢

右為末柳白皮煎湯調下食後三四錢以利為度
牛黃散治上焦熱而煩不能臥睡

山梔 大黃 鬱金各半兩 甘草

右為末每五錢水煎溫服微利則已

局妙香丸丹溪云疏決腸胃制伏木火之劑

辰砂水飛八兩 龍腦 膩粉研 麝香研各八兩

牛黃半兩 金箔九十片 巴荳三百十五粒去皮心膜炒熟研如泥去油

右合研勻用淨黃蠟六兩入白礬七錢半同煉蜜勻為
丸每兩作三十九丸米飲吞下如要藥速行即用鍼刺一
眼入冷水浸少時服之

久熱屬勞瘵治法見瘵門

諸熱分而言之則有氣血表裏上下五臟之異合而言

暴熱肺

積熱腎

熱五

之則氣熱表熱上焦熱心肺熱皆屬陽而治相類血熱裏熱下焦熱腎肝熱皆屬陰而治亦相類中焦與脾熱亦然

羅通治熱氣用黃連解毒湯治大熱甚煩躁錯語不得眠

黃連七錢半 黃柏 山梔各半兩 黃芩一兩

右咬咀每服五錢水煎去查熱服如未效再服

海前方中加防風連翹為金花丸治風熱加柴胡治小兒

潮熱與四物相合各半為湯治婦人潮熱

三黃丸治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤

腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁飲食不美下

焦有熱小便赤澀大便秘結五臟俱熱即生癰癤瘡瘻及

治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血丹溪云此三焦藥也

黃連淨 黃芩去蘆 大黃各十兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九熟水吞下視

臟腑虛實加減服之小兒積熱亦宜服

本事紫雪治脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫

走瘴毒及解諸熱藥毒卒黃等毒并蠱魅野道熱毒又治

小兒驚疳熱病丹溪云此心脾肝腎胃經之藥

寒水石 石膏 磁石 滑石已上四味各三斤搗至五斗去查入後藥 玄參一斤洗 沉香 羚羊角 犀角

青木香 升麻各五兩 丁香一兩 甘草八兩已上八味搗為末入

前藥汁中再煎取一斗五升去查入下項二味藥 朴硝 硝石好者二斤

入前藥汁中微火煎不住手將柳木棍攪候七八升許投在盞中半日後欲凝方入下項二味藥

辰砂三兩研 麝香真者一兩二錢乳研已上二味入前藥汁中拌調令勻

合成後窞二日每服一錢或二錢冷水食後調服大人

小兒子細加減局方又用黃金一百兩

小兒子細加減局方又用黃金一百兩

垣陰覆乎陽火不得伸宜汗之經曰體若燔炭汗出而散者是也 脉弦而數者此陰氣也宜風藥升陽以發火鬱則脉數峻退矣 凡治此病脉數者當用黃柏少加黃連柴胡蒼朮黃芪甘草更加升麻得汗則脉必下乃火鬱則發之意也

柴胡升陽湯治男婦四肢發熱肌肉熱筋痺熱骨髓中熱發如火燎火燒捫之令人亦熱四肢主屬脾脾者土也熱伏地中此病多因血虛而得又因胃虛過食冷物冰水無度鬱遏陽氣於脾土之中經曰火鬱則發之

升麻

葛根

獨活

羌活各半兩

防風二錢半

甘草生二錢

柴胡五錢

炙甘草二錢

人參兩半

白芍藥兩半

右咬咀每服半兩水三大盞煎至一盞去查稍熱服忌

冷物冰水月餘

垣火鬱湯治五心煩熱是火鬱于地中四肢土也心火下

陷在脾土之中故宜升發火鬱丹溪云治手足心熱用東垣火鬱湯○又手足心熱

方見前手足心熱條

升麻

葛根

防風

柴胡根

炙甘草

白芍藥各五錢

右咬咀每服三四錢水二大盞入連鬚葱白三寸煎去

查稍熱服

運氣發熱有三

一曰火熱助心實而熱經曰歲火太過炎暑流行病甚則

身熱骨痛而為浸淫又曰少陽所至為瘍疹身熱又曰少

陰司天客勝則頭痛是少陽之發熱治以諸寒是也

二曰寒邪攻心虛而熱經曰歲水太過寒氣流行民病身

熱煩心燥悸陰厥又曰歲金不及炎火乃行寒復則陰厥
且格陽反上行發熱又曰少陽在泉主勝則熱反上行熱
發格中而嘔蓋主勝者謂冬寒勝少陽之客熱治以諸熱
是也

三曰風扇火及寒濕鬱火而熱經曰太陽司天之政初之
氣氣乃大溫民病身熱頭痛是風扇陽而熱也治宜清之
又云四之氣風濕交爭民病大熱少氣又云少陽司天之
政二之氣火反鬱白埃四起民病頭痛身熱是寒濕鬱火
而熱治視寒熱少多其制是也

靈黃帝曰刺節言徹衣夫子乃言盡刺諸陽之奇輸未有
常處也願卒聞之岐伯曰是陽氣有餘而陰氣不足陰氣
不足則內熱陽氣有餘則外熱內熱相搏熱於懷炭外畏
綿帛近不可近身又不可近席腠理閉塞則汗不出舌焦

唇槁腊乾嗑燥飲食不讓美惡黃帝曰善取之奈何岐伯
曰取之於其天府大杼三痛又刺中膺以去其熱補手足
太陰以去其汗熱去汗稀疾於徹衣刺節真邪篇火熱
在上推而下之從下上者引而去之

甲身熱脅痛不可反側顛息主之 嗜臥身體熱不能
動搖大濕 三陽絡主之

海兩手太熱為骨厥如在火中可灸湧泉穴三壯立安
撮要 手心發熱 魚際取針向後三分 少府三分 脚心發熱濕

痺 束骨先瀉後補灸 足底發熱脚核疼 公孫半寸瀉
素脉浮而瀼瀼而身有熱者死通詳虛實論 熱而脉靜者難

治玉機真藏論 脉盛汗出不解者死脉虛熱不止者死詳見傷寒發熱
勞瘵骨蒸熱

勞瘵骨蒸熱

玄虛者皮毛肌肉筋爪骨髓氣血津液不足也若男女終日勞役神耗力倦饑飽越常喜怒憂思形寒飲冷縱欲恣情素問曰今人未及半百而衰者以酒爲漿以妄爲常醉以入房以慾竭其精以耗散其真根源從此而虛竭矣五臟六腑如何不弱五勞六極七傷從此而始何謂五勞心勞血損肝勞神損脾勞食損肺勞氣損腎勞精損六極謂筋脉肉皮毛骨痺損是謂六極七傷難經言之甚詳傷形與氣謂之七傷總而言之爲虛是也大抵五行六氣水特五之一耳夫一水既虧豈能勝五火哉虛勞等症蜂起矣其體虛者最易感於邪氣當先和解微利微下之從其緩而治之次則調之醫者不知邪氣加之於身而未除便行補劑邪氣得補遂入經絡致死不治如此誤者何啻千萬良可悲哉內經中本無勞症之說其曰勞者溫之溫者溫

存之義不足者補之以味穀肉菜果百味珍羞無非補也今之醫者不通其法唯知大補之道輕則當歸鹿茸雄附重則乳石丹砂加以灼艾補燥其水水得熱愈涸生火轉甚少而成嗽痰血潮熱煩渴喜冷此則熱證明矣重則失音斷不可救猶且峻補不已如此死者醫殺之耳及遇良工治驗而以清劑解之不合病人之意反行恠責及聞發表攻裏之說畏而不從甘死於庸工熱補之手雖死不悔深可憫也夫涼劑能養水清火熱劑能燥水補火天下之事無出乎理理既明何患疾之不安勞爲熱證明矣還可補乎惟無邪無熱無積之人脉舉按無力而弱者方可補之又必察其胃中及右腎二火虧而用之心虛則動悸恍惚憂煩少色舌強宜養榮湯琥珀定神丸之類以益其心血脾虛面黃肌瘦吐利清冷腹脹腸鳴四肢無力飲食

不進宜快胃湯進食丸之類以調其飲食肝虛目昏筋脉拘攣面青恐懼如人將捕之狀宜牛膝益中湯虎骨丹之類以養助其筋脉肺虛呼吸少氣喘乏咳嗽啞乾宜枳實湯加人參黃芪阿膠蘇子以調其氣腎虛腰背脊膝厥逆而痛神困耳鳴小便頻數精漏宜八味丸加五味子鹿茸去附子用山藥等丸以生其精

勞瘵主陰虛痰與血病 虛勞漸瘦屬火陰火消鑠卽是積熱宜照後法治之

草還丹治陰虛骨蒸用青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減至二斗去蒿再熬至一升入猪膽七箇再熬數沸用甘草末收和爲丸梧子大每服五十九

治勞病四物湯加竹瀝入小便 陰虛發熱四物湯加黃栢降火補陰甚者加龜板

張文仲治骨蒸方生地黃一升搗取汁盡分再服利則減之以身涼爲度

右丹溪論勞瘵主乎陰虛者蓋自子至巳屬陽自午至亥屬陰陰虛則熱在午後子前寤屬陽寤屬陰陰虛則汗從寐時盜出也升屬陽降屬陰陰虛則氣不降氣不降則痰涎上逆而連綿吐出不絕也脉浮屬陽沉屬陰陰虛則浮之洪大沉之空虛也此皆陰虛之症用四物竹瀝又加炒栢龜板皆補陰降火之劑又須遠嗜慾薄滋味靜心調養以助之也

陰虛發熱四物湯加黃栢兼氣虛者加參芪白朮
御院瓊玉膏滋血補氣延年益壽

人參三十六兩去蘆 白茯苓二十四兩去皮研爲細末 生地
黃十六斤搗取汁以盡爲度去查 蜜六斤

右和勻入銀石器瓶中內用油紙外用竹箬包以軟篾縛緊瓶口入重湯內懸胎煮之用桑柴文武火不住手三晝夜入井中浸一日夜出火毒又煮一日出陰毒取出每早空心用酒或白湯調下

羅清神甘露丸治男子婦人虛勞不足大骨枯大肉陷皆治之

生地汁 白蓮藕汁 生乳汁用生

右三味等分用砂石器內以文武火熬成膏子用後藥

人參 白朮 黃連 黃芪 五味子

胡黃連

石各等分爲細末以前膏子和劑丸如桐子大每服五十丸人參湯下

海黃芪膏子煎丸

人參 白朮各一兩半 柴胡 黃芩各一兩

白芷 知母各半兩 甘草半兩 鱉甲一兩手大者酥炙

黃芪半斤爲粗末用水二斗熬一斗去查再熬今不住手攪成膏至半斤入白蜜一匙錫一兩再熬 右爲末用黃芪膏和勻丸每早白湯服下

呼吸少氣懶言語無力動作目無睛光面色眊白皆兼氣虛也

補天丸治陰虛骨蒸發熱形羸瘦者紫河車洗淨用布絞乾用補腎丸藥末搗細焙乾再碾爲末酒煮米糊爲丸梧子大每服七八十九熱湯下夏月加五味子紫河車卽初生男子胞衣也

補腎丸治陰虛有痰膈不清者

龜板一兩半酥炙 黃柏半兩炒 牛膝二兩 乾姜二錢

陳皮兩半

右為末姜汁打糊丸每服七八十九

治酒色過傷少陰

黃栢一兩半炒 黃芩半兩炒 地黄一兩 龜板五兩酒炒

夏加砂仁三錢五味五錢冬加乾姜炒黑三錢用炊

餅為丸食前白湯服三五十九丹溪心法以地黄作黃栢

潔地黄丸治久新憔悴寢汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩腸

澀下血骨蒸痿弱無力不能運動東垣云治脉沉而虛者

熟地八兩 山茱萸淨肉 山藥各四兩 牡丹皮

茯苓 澤瀉各三兩

右為細末煉蜜丸桐子大空心温酒服五十九

垣或問錢氏地黄丸補腎又曰補肝何也曰然手厥陰心

主包絡足厥陰肝經俱治在下焦經云不足者滋其化源

故肝腎之病同一治法此地黄丸補二經之意也海藏云若加五

味為腎氣丸此滋肺之源以生腎水

源黑地黄丸加五味子為腎氣丸治陽盛陰衰脾胃不足

房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補氣益胃

蒼朮一斤油浸 熟地一斤 五味子半斤 乾姜秋冬一兩夏半兩春

錢七

右為細末棗肉丸梧子大食前米飲或酒服百丸治血

虛久痔甚妙經曰腎苦燥急食辛以潤之此藥開腠理

生津液通氣又五味子酸以收之此雖陽盛而不燥熱

乃是五臟虛損於內故可益血收氣此藥類象神品方

也

治陽盛心肺不足宜八味丸四肢弱無力多困未知陰陽

先損夏可用地黄丸春秋宜腎氣丸冬宜八味丸

雞蘇丸治嗽血方見

右治肺腎虛蓋肝心屬陽肺腎屬陰陰虛則肺腎虛矣
腎虛者從房室中來其症或腰痠腰痛或足痿足痿足
熱或遺精白濁是也肺虛者或咳嗽或吐血是也治腎
虛四方前二方龜板黃栢為君有痰無痰皆可用後二
方地黃為君無痰可用痰多而膈不清者宜審之治肺
虛咳嗽唾血者方法浩大另立咳嗽唾門也

虛勞皆積熱做成始健時可用子和法後日羸憊四物
湯加減送消積丸使熱不作也 蒸蒸發熱積病最多
小陷胃湯治濕痰發熱極妙方見傷寒部結胃門
退實熱勞積痰

- 鱉甲 龜板 側栢 瓜蒌仁
- 半夏 黃連 黃栢
- 右為末炊餅丸

又濕痰發熱

- 黃芩炒 黃連炒 香附生 蒼朮
- 右為末瓜蒌穰為丸 青礞石丸方見咳嗽 河間人參半
夏丸方見咳嗽

治施官人年三十餘不可勞動勞動則發熱臍洪而大
在右手短而濇在左手予謂此必酒痰成濕傷血又問之
遇少勞則喘乏力小便或赤或白

- 當歸 黃芪 人參各五分 芍藥一分
- 白朮二分 川芎五分 木通三分 黃芩三分
- 陳皮五分 厚朴五分 炙甘草二分 煎湯下青礞
石丸

羅柴胡飲千解一切肌骨蒸熱寒熱往來及傷寒發汗不
解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快產後但有如此之

症並宜服之

黃芩

甘草

大黃

芍藥

柴胡

人參

當歸各半兩

右咬咀姜三片煎熱服

保防風當歸飲子治煩熱皮膚索澤食後煎服空心宜以此飲下地黃丸

柴胡

人參

黃芩

甘草

防風

大黃

當歸

芍藥各半兩

滑石二錢

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片煎七分溫服如痰

嗽加半夏如大便黃米穀完出驚悸溺血淋閉欬血衄

血自汗頭痛積熱肺痿後與大金花丸

大金花丸

黃栢

黃芩

黃連

山梔各一兩

右為細末水丸小莖大每服一百丸溫水下日二三服
或大便實加大黃自利如中外熱者此藥作散煎服名
解毒湯或腹痛嘔吐欲作利者每服解毒湯半兩加半
夏茯苓厚朴各三錢姜三片如白膿後重下利後重者
加大黃三錢

麥煎散治少男室女骨蒸婦人風血攻疰四肢

赤茯苓

當歸

乾漆

鱉甲炙

常山

大黃煨

柴胡

白朮

生地

石膏各一兩

甘草半兩

右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨臥服若有

虛汗加麻黃根一兩東坡云此黃州吳判官療骨蒸黃

瘦口臭肌熱盜汗極效吳君寶之不肯妄傳

當歸龍薈丸治肝有積痰汚血結熱而勞瘵者其大衝脉

必與衝陽脉不相應宜以補陰藥吞此丸神效方見前

右勞瘵兼痰積其症腹脇常熱手足頭面則於寅卯時分乍有涼時者是也若頑痰膠固難治者必以吐法吐之或沉香滾痰丸透膈丹之類下之又甚者或用倒倉法若痰積閉塞經脉則太衝脉與衝陽寸口脉數而不相應者極難治自陰虛條至此凡六法但患勞者罕能脫此六法自此以後數法宜審而行之無其病莫妄施也

世治骨蒸熱神效

前胡錢一

柴胡錢二

胡黃連錢一

猪脊髓條一

猪膽筒一

右水煎入猪膽汁服之

石地骨皮枳殼散治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多

盜汗

地骨皮

秦艽

柴胡

枳殼

知母

當歸

鱉甲醋炙

右等分為末水一盞桃柳枝頭各七箇姜三片烏梅一箇去查臨臥服

羅秦艽鱉甲散治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤目倦盜汗

柴胡

地骨皮各一兩

秦艽

知母

當歸各半兩

鱉甲一兩去裙襖醋炙

右為麤末每服五錢水一盞入烏梅一箇青蒿五葉同煎至七分去查溫服臨臥空心各一服

人參地骨皮散治臟中積冷營中熱按之不足舉之有餘陰不足而陽有餘也

茯苓兩

知母

石膏各一兩

地骨皮

人參

柴胡

生地各一兩五錢

右咬咀每服一兩生姜三片水煎細細服

人參柴胡散治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜有盜汗及婦人虛勞骨蒸尤宜

白茯苓

人參

白朮

柴胡

當歸

半夏麴

乾葛

甘草炙

赤芍藥已上各一兩

右為細末每服三錢姜四片棗三枚水煎帶熱服許學士云

但有勞熱症皆可服熱退即止大抵透肌葛根第一柴胡次之其方多黃芩半兩

右四方治虛損復受邪熱皆宜用柴胡衍義云柴胡本經並無一字治勞今人方中治勞鮮有不用者誤人甚多常原病勞有一種真臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也當斟酌之如經驗方治勞熱青蒿煎丸

用柴胡正宜服之無不效熱去即須急已若無邪熱得此愈甚雖至死人亦不怨王海藏云苟無實熱醫取用之不死何待後之用柴胡者宜審諸又大忌茶連栢驟用純苦寒藥反瀉其陽但當用瓊玉膏之類大助陽氣使其復還寅卯之位微加瀉陰火之藥是也

火鬱湯方見前


柴胡升陽湯方見前

右二方治重陰覆其陽火不得伸或洒洒惡寒或志意不樂或脉弦數或四肢五心煩熱是也病去即已不可過劑服寒涼藥症雖大減脉反加數者陽鬱也大忌寒涼宜升宜補犯之死速

海問兩手寸關弦病脾弱火勝木旺土虧金鑠當作何治答曰不治標本從乎中治木標也土本也火中也燂金虧土旺木者皆火也錢仲陽安神丸主之山積麥冬益金之

氣金益則氣旺而木自平寒水石牙硝火中添水使化為濕熱也濕熱為季夏之令非土而何故用硃砂以墜火下行將退與子權行濕令也故脉弦得除而土自旺秋喘加人參丹砂等夏則不加養氣者加沉香欲發汗者臨臥先與白粥一盞後藥之則汗也寒熱神少振搖小便淋或多或大便走完穀不化口乾舌縮唇吻有瘡心下痞大渴引飲惡乾喜濕目花四肢無力怠惰嗜臥食不入皮膚燥澁面色鰲黑肌肉消鑠胃腹中急額上汗者法宜洩火益濕補氣脉弦浮沉者同治以安神丸主之方見治氣不化小便不利濕潤肌滑熱蒸陰少氣不化方見氣走小便利自汗肌燥瀆為迫津液不能停離珠丹主之方見弦數者陽陷于內從外而之內也弦則帶數甲經于乙緊則帶洪壬經于丙若弦虛則無火細則有水此二脉從內之外不

宜離珠丹



火令速行而土虛土虛則長夏不至難經曰虛則補其母資其化源當瀉火于金中補土是也

右寸顯弦數脉是東方實乃乘子勢也既瀉其子火木自虛矣以寒藥瀉火是補北方水木既乘火勢而來侮金當金中瀉火火退則木無所恃而自退是實則瀉其子也

仲五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑

緩中補虛大黃蚘虫丸主之結在內者手足脉必相失宜此方然必兼大補劑瓊玉膏

之類服之

- 大黃十兩
- 黃芩二兩
- 甘草三兩
- 桃仁升

杏仁升一

芍藥兩四

地黃兩半

乾漆一兩

重虫升一

水蛭枚百

鱘鱮升一

麝虫斤半

右十二味為末煉蜜丸如小豈大日三服酒下五丸

陳大夫傳張仲景百勞丸治一切勞瘵積滯疾不經藥壞症者宜服

當歸炒

乳香

沒藥各一錢

人參一錢

大黃錢四

重虫十四枚去翅足水蛭十四枚制

右為細末煉蜜丸如桐子大都作一服可百丸五更百勞水下取惡物為度服白粥十日百勞水用杓揚百遍

仲景甘爛水是也

外臺治骨蒸桃仁一百二十枚去皮併雙仁留尖杵和為

丸平旦井花水服令盡服訖量性飲酒仍須吃水多效隔日又服一劑百日不得食肉

仲炙甘草湯一名復

味湯

治虛勞不足汗出而悶脉結悸行動

如常不出百日且急者十一日死方見傷寒

海四物加減湯治婦人骨蒸

當歸

白芍藥

川芎

地黃已上補血

地骨皮瀉腎火

牡丹皮瀉包絡火

各等分

右咬咀水煎服

羅逍遙散治血虛勞倦五心煩蒸頰赤盜汗室女血弱陰虛營衛不和月水不調痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

茯苓

白朮

當歸

芍藥

柴胡

甘草炙

右咬咀生姜一塊煨切破薄荷少許同煎

右二方治婦人骨蒸大法若夫要處並同於前陰虛法取之蒸病治者宜隨各經虛實內外淺深用藥加減

可也

古今錄驗五蒸湯

茯苓 甘草 人參 竹葉 地黄

葛根 知母 黃芩 石膏 粳米二合

右咬咀以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥至一盞溫服隨症加減于後忌海藻菘菜蕪荑大醋

實熱 加黃芩 黃連 黃柏 大黃

虛熱 氣 加烏梅 秦艽 柴胡

血 加青蒿 鱉甲 蛤蚧 小麥 牡丹皮

肺蒸乾鼻 加烏梅 天冬 麥冬 紫苑

大腸右鼻孔 加大黃 芒硝

皮蒸舌白 加石膏 桑白皮

膚蒸皆味 加丹皮

氣蒸鼻乾喘促 加人參 黃芩 山梔

心蒸舌乾 加黃連 生地

小腸下唇 加赤茯苓 生地 木通

血蒸髮焦 加生地 當歸 桂心 童便

脈蒸唾白浪語脈絡 加當歸 生地

脾蒸唇焦 加白芍 木瓜 苦參

胃蒸舌下 加石膏 粳米 大黃 芒硝 乾葛

肉蒸食無味而嘔 加白芍

肝蒸眼 加川芎 當歸 前胡

膽蒸眼色 加柴胡 括萋

筋蒸甲焦 加當歸 川芎

三焦蒸乍熱乍寒 加石膏 竹葉

腎蒸兩耳 加生地 石膏 知母 寒水石

膀胱蒸右耳 加澤瀉 茯苓 滑石

腦蒸頭眩 加生地 防風 羌活

髓蒸髓枯骨 加生地 當歸 天門冬

骨蒸齒黑腰痛足逆 加鱉甲 地骨皮 丹皮

生地 當歸

醫蒸肢細跌腫 加石膏 黃芩

胞蒸赤黃 加澤瀉 茯苓 生地 沉香 滑石

凡此諸症皆熱病後食肥甘油膩房事飲酒犯之而成
久蒸不除變成疴病死期近矣

牡丹皮治無汗之骨蒸能瀉陰中之火 知母治有汗之骨蒸

治骨蒸勞用薄荷汁與衆藥熬成膏

治患勞人燒香法玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入磁瓶內封閉地中埋甕半日取出更用炭末六

兩煉蜜六兩和勻入瓶內封甕五日取出燒使鼻中常聞香氣疾自愈矣

撮要 治骨蒸勞熱 膏育在四椎下五椎上各開三寸多百壯詳見刺法門 三里

摘英 熱勞上氣喘滿 肺俞五分留七呼灸七壯 尺澤

崔氏治骨蒸傳尸勞灸四花穴兼治赤白帶

第一次取二穴令患人正立取一蠟繩從足大姆指端左

右貼肉量至後跟上臚至委中橫紋絕斷為則子復令患

人解髮分兩邊令見頭縫卻平身正坐取前則子從鼻端

貼肉上至頭縫下至項脊骨以則子盡處為記用墨點之

是穴又另取一繩令患人合口將繩兩頭至口吻當中鈎

起至鼻柱根如人字齊兩吻截斷却展直於前則子盡頭

墨記處橫量開取兩平頭是穴高下相平 第二次取

二穴令平身正坐又取一繩繞項向前雙垂與乳頭齊截
斷却背翻繩頭向項後以繩中停於結喉上其下雙垂繩
頭盡處當背骨中用墨點之亦不又取一繩令病人合口
橫量二吻截斷移於前脊中記處橫量取平須左右當中
兩頭是穴連前第一次通取共計四穴同時上火七壯至
二十壯灸至百壯候灸瘡瘻却取三次穴 第三次取二
穴將前第二次量口吻繩子於第一次雙繩頭盡處墨點
記上當脊骨直上下豎點令繩子中停中心在墨點處於
上下繩盡處是穴灸如前法

標 體熱勞嗽 魄尸 瀉

治骨蒸熱不可治者或前板齒乾燥 大椎

要 又法 鳩尾 灸二十七壯補之

右背俞取膏肓肺俞四花穴大椎等穴治勞瘵者皆為

陽氣下陷而寒熱往來也若灸之早百發百中累試有
效

玉龍傳尸勞 湧泉 第二足指端量至根盡折中是針三分

治無血必危凡欲出血 豐隆 此穴治痰針入 丹田 此

刺入二分便瀆彈指 治氣喘針入 三分補二呼

神 男子婦人脈大為勞極虛亦為勞 男子面色薄者主

渴及亡血卒喘悸脈浮者裏虛也 勞之為病其脈浮大

手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自出瘦削不能行 脈弦

而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛虛寒相搏

此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精 跌陽脈

浮而芤浮者衛氣衰芤者榮氣傷其體瘦肌肉甲錯浮芤

相搏榮氣衰微四屬斷絕

右胗脈浮而大或大而弦皆為虛勞者蓋陽盛陰虛之

症也暮多見之

仲男子婦人脉虛細弱者勞也 男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便利面色白時目瞑兼衄少腹滿此為勞使之然 脉沉小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溇泄食不消化也

見之 右胗脉虛微細弦為虛勞者蓋陰陽俱虛之症也最多

云骨蒸之極聲啞咽痛面鰓脉躁直視汗出如珠喘乏氣促出而無入毛焦唇反此皆不治之症雖有神醫亦無如之何矣

傳尸勞熱

華治傳尸勞太乙明月丹其病肌瘦面黃嘔吐咳嗽不安先燒安息香令烟出病人吸之不嗽非傳尸也不可用

此藥若烟入咳嗽不止乃傳尸也宜用此藥

雄黃

木香各半兩

天靈蓋炙一兩 輕粉一分

鱉甲

酥炙一兩

兔屎二兩

右為末用法酒一大升大黃末半分熬膏入前藥為丸彈子大硃砂為衣五更初服勿令人知以童便和酒化一丸服如人行十里許必吐出虫狀如燈心細長及如爛瓜子又如蝦蟇狀各不同未效次日再服以應為度

治傳尸伏尸皆有虫須用乳香薰病人之手乃仰手掌以帛覆其上薰良久手背上出毛長寸許白而黃者可

治紅者稍難青黑者即死最驗若熏之良久無毛者即非此症乃屬勞瘵虛損即用前參芪溫補之藥

取傳尸伏尸勞虫法

天靈蓋

十字解者酥炙為末三分

安息香

半兩

虎糞骨

人骨為上獸骨

次之醋

鱉甲

九肋大者醋炙一兩

桃仁

去皮尖二錢半

麝香

研

栝榔

為末

青蒿

稍兩

豉

三百粒

芴頭

一百二十根

童便

半碗

楓葉

二十葉

桃柳東南

枝如筋大者每七條各七寸

右先將青蒿桃柳楓葉芴頭用水二官升煎半乾去查入天靈虎糞骨鱉甲安息香童便煎取汁去查約有四五合將栝榔麝香研勻調作一服早辰空腹服以被蓋汗恐汗內有細虫以白紙拭之投火中湏臾必下如有虫以大火焚之棄流水中所用藥勿令病者知之半月後氣血復完再進一服依前法三次無虫乃止以美飲食調理其病自愈

無又方

桑枝

柳枝

石榴枝

桃枝

梅枝

各七莖長四寸

青松

一小握

右用童便一升半芴白七莖去頭葉煎及一半去查別入安息香阿魏各一分煎至一鍾濾去查調辰砂末半錢栝榔末一分麝香一字分作二服調下五更初一服五更三點時一服至巳牌後取下虫色紅者可治青者不治見有所下即進稀粥飲温煖將息不可食粉麵生冷毒物合時湏擇良日不得令猫犬孝服穢惡婦人見之

濟神人阿魏散治骨蒸傳尸等寒熱羸勞困倦喘嗽

阿魏

錢三

青蒿

一握

東北方桃枝

一握細切

甘草

如病人中指許大男左女右細剉

右以童便二升半隔夜浸藥明旦煎取一大升空心温服分為三服每次調入栝榔末三分如人行十里再進

一服男病女煎女病男煎合藥時忌孝子孕婦病人及腥穢鷄犬等物服後忌油膩濕麵生冷硬物服至一二劑即吐出虫子或瀉出更不須服餘藥若未吐利即當盡服病在上則吐在下則利皆出虫如馬尾人髮即愈服藥後覺五臟虛弱魂魄不安即以白茯苓湯補之

白茯苓錢一 人參錢五 遠志二錢去心 龍骨

防風錢二 甘草三分 生地錢四 麥冬四錢去心

犀角末錢五 大棗七枚

右以水二大盞煎作八合分三服溫服如人行十里一服仍避風寒若覺未安隔日更作一劑已上藥餌須連服之

羅犀角紫河車丸治傳尸勞三月必效其餘勞症只消數服

紫河車一貝米泔浸一宿洗淨焙乾 鱉甲炙 桔梗

胡黃連 白芍 大黃 敗鼓皮心醋

貝母去心 龍膽草 黃藥子 知母已上各錢半

芒硝 犀角 蓬朮各一錢半 朱砂錢二

右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣空心溫酒服三四十丸

本事葛洪云鬼症者是五尸之一症又按諸鬼邪為害其變動乃有三十六種至九十九種大畧使人淋漓沈沈默默的不知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死傳於旁人乃至滅門覺知是候者急治獺肝一具陰乾取末水服方寸七日三服效未知再服此方神良天慶觀一法師行考校極精嚴時一婦人投狀述患人有所附須臾乃附語云非我所禍別是一鬼亦自病人命衰為祟

耳今已成形在患人肺中為虫食其肺系故令吐血聲嘶
師掠之曰此虫還得長生否久而無語再掠之良久云唯
畏獺爪屑為末以酒服之則去矣患家如其言得愈此予
所目見也究其患亦相似獺爪者獺肝之類歟

肘後治屍疰鬼疰病用桃仁五十枚研碎以水煮取四升
作一服盡當吐如病不盡二三日再服

玄治傳屍蟲瘵之症父子兄弟互相傳染甚者絕戶此乃
祖父冤債或風水所係雖有符文法水下虫之法然虫去
人亡亦未為全美若能平素保養則自愈矣

產後發熱

大全人參湯治產後諸虛不足發熱盜汗

人參

當歸等分

右為末以猪腰子一具去脂膜切小片子以水三升糯

米半合芴白二條煮米熟取清汁一盞入藥末二錢煎
至八分不拘時溫服

羅犀角飲子治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇
口乾燥

犀角

麥冬

白朮各半兩

柴胡兩一

枳殼炒

地骨皮

生地

甘草炒

當歸

人參

茯苓

黃芩

黃芩各七錢

右咬咀入浮麥七十粒姜三片同水煎每服四錢

產後發熱多屬虛寒惟乾姜加入補藥中神效此丹溪
法也

醫學綱目卷之五終

醫學綱目卷之六

陰陽臟腑部

治惡寒

陽虛惡寒正治

升陽虛惡寒用參芪之類甚者加附子少許以行參芪之氣 未康呂親家形瘦色黑平生喜酒多飲不困年近半百且有別館忽一日大惡寒戰且自言渴却不能飲予診其脉大而弱惟右關稍實畧類弦重取則澁遂作酒熱內鬱不得泄由表熱而下虛也黃芪一物與乾葛同煎與之盡黃芪二兩乾葛一兩脉得小次日安矣

脾胃之虛怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口舌乾食無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺病洒淅惡寒氣慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃名曰升陽益胃湯

羌活

半兩

柴胡

三錢

獨活

半兩

白朮

三錢

人參

一兩去蘆

甘草

炙一兩

防風

半兩以其秋旺故以辛溫瀉之

半夏

一兩湯洗

黃芪

二兩

茯苓

二錢小便利不

渴者勿用

澤瀉

三錢不淋者勿用

黃連

二錢

橘皮

不去穢四錢

白芍藥

五錢何故秋旺用人參白朮芍藥之類反補旺為脾胃虛則肺受病故因時而補母虛也

右咬咀每服三錢生薑五片棗二枚去核水三盞同煎至一盞去查溫服早飯後午飯前服之禁忌如前其藥漸加至五錢止服藥如小便罷而病加增劇者是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄滋味或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉可以小役形體使胃與藥轉運升發慎勿大勞役使復傷胃氣若脾胃得安

靜尤佳若胃氣稍強少食果以助穀藥之力五穀為養

五菓為助者也

禁忌如前者服藥忌語一二時辰及酒濕麵大料物及冷蒸寒涼淡滲之物

黃芪補胃湯治表虛惡賊風

黃芪

三錢

甘草

一錢

麻黃

一錢

草薺

一錢半

橘皮

一錢半

青皮

七分

當歸

一錢

香白芷

一錢半

升麻

三分

藁本

三分

柴胡

六分

黃柏

八分

右劉如麻豆大水二盞煎至一盞去查稍熱食前服

丹晉雲胡君錫年三十一歲形肥而大色稍蒼厚家富而足更專嗜口味兩年前得消渴病醫與寒涼藥而得安有一人教以病後須用滋補令其專用黃雌雞因此食至千餘隻漸有膈滿嘔吐之病醫者意為胃寒遂以附子沉香之藥百餘貼嘔病除月餘天氣大熱忽惡風足亦怕地氣

遂堆糠尺許厚上鋪以簞糊以重紙方可坐臥而兩手不能執筆口鼻皆無氣以呼吸欲言無力行十餘步便困倦脉皆浮大而虛僅得四至予作內有濕痰因多服燥熱藥遂成氣耗血散當此夏令自合便死因其色之蒼厚元氣尚全可以安穀遂以人參黃芪白朮熬膏煎淡五味子湯以竹瀝調飲之三日諸病皆愈令其頓絕肉味一月後康健如舊又以雞湯下飯一月後胸腹膨滿甚自煎二陳湯加附子白豈菟飲之其病頓除遣人問調理藥予教以絕去諸藥與肉飲自然平安

右陽虛惡寒五法皆以參芪為君首一法佐以附子中三法佐以升陽之劑末一法佐以消痰之劑也

垣夫脾胃之症始則熱中終傳寒中經云陰盛生內寒厥氣上逆寒積於胃中是腎水反來侮土此謂所勝者妄行

也作中滿腹脹作涎作清涕或溺足下痛不能任身履地骨乏無力喜睡兩丸多冷時作陰陰而痛或妄見鬼狀夜夢亡人腰背胛眼腰脊俱痛而不渴不瀉此濕氣去寒獨留寒獨留則血凝泣血凝泣則脉不通故其脉盛大以瀆名曰寒中

白朮附子湯

白朮

附子炮

陳皮

蒼朮制

厚朴制

半夏湯泡

茯苓去皮

澤瀉各一兩

猪苓去皮半兩

肉桂四錢

右剉如麻豈大每服五錢水二盞生薑三片煎至一盞食前溫服量虛實加減

夫病熱中症者衝脉之火附二陰之裏傳之督脉督脉者第二十一顛下長強穴是也與足太陽膀胱寒氣為附經

督脉其盛也如巨川之水疾如奔馬其勢不可遏太陽寒氣細細如線督脉逆太陽寒氣上行衝頂入額下鼻尖入手太陽傳於胷中手太陽者丙熱氣也足太陽膀胱者壬寒氣也壬能尅丙寒熱逆於胷中故脉盛大其手太陽小腸熱氣不能交入膀胱經故十一經之盛氣積於胷中故其脉盛大其膀胱逆行盛之極子能令母實手陽明大腸金卽其母也故燥旺其燥氣挾子之勢故脉濇而大便不通以此言之脉盛大以濇者手陽明大腸脉也

若見此病中一症皆爲寒禁用諸甘酸藥

痺病惡寒
素帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何岐伯曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是爲何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水爲事太陽氣衰腎

脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄名曰骨痺是人當斲節也逆調論

寒分氣
東垣云晝則惡寒是陰氣上溢於陽分也夜則惡寒是陰血自旺於陰分也

瀰氣分寒桂枝加附子湯方見傷寒自汗桂枝加芍藥人參

新加湯方見傷寒體痛

血分寒巴戟丸神珠丸方見治虛實法

巴戟丸

良薑六兩

紫金藤十六兩

巴戟二兩

青鹽二兩

肉桂

吳茱萸名四兩

右爲末酒糊丸每服二十九丸暖鹽酒送下鹽湯亦得

三焦寒用藥大例

上焦寒陳皮厚朴藿香 中焦寒大小便不通白木乾薑

丁香 下焦寒肉桂附子沉香

桂附丸 二氣丹 還少丹

上焦 鐵刷湯 中焦 下焦 八味丸

胡椒理中丸 大建中湯 天真丹

胡椒理中丸

欵冬花去梗 胡椒 甘草炙 萹撥

良薑各四兩 白木五兩 乾薑 陳皮去白

細辛去苗各四兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九丸溫湯酒米飲任

下

鐵刷湯

良薑炒六兩 茴香各二兩 甘草炙一兩 蒼朮米泔浸一宿八兩

右為細末每服二錢薑三片鹽一捻水一盞煎至七分溫服或熱酒調下

二氣丹

肉桂去粗皮 硫黃細研各一錢 乾薑炮 硃砂研為衣各二錢

附子一箇去皮臍炮製為末半兩

右為細末研勻麵糊為丸梧子大每服三十九丸鹽湯下

附子理中丸

人參去蘆 附子炮去皮臍 乾薑炮 甘草炙

白朮各三兩

右為末煉蜜和丸每一兩作十九丸每服一丸以水一盞

化破煎至七分服

大建中湯治內虛裏急少氣手足厥逆少腹攪急或腹滿
弦急不能起臥微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口
乾精自出或手足乍寒乍熱而煩苦酸痛不能久立補中
益氣

桂心錢一

芍藥

黃芪各二錢

甘草一錢

生薑錢五

當歸

人參各三錢

附子半錢

半夏錢二

棗三枚

右咬咀水五盞煎至三盞去渣分三服

垣天真丹治下焦陽虛

沉香

巴戟酒浸炒

茴香鹽炒香

破故紙炒

萆薢酒浸

胡蘆巴炒

杜仲麩炒

琥珀各兩

官桂錢五

牽牛炒黑去鹽取

右爲末用浸藥酒糊爲丸梧子大每服五十九至八十

丸空心溫酒下

海下焦寒四逆例乾薑味苦能止而不行附子味辛能行
而不守泄小便不通二藥皆陽氣化能作小便若薑附木
三味內加茯苓以分利之爲佳附生用而不炮則無火力
熱則行而不止兼以水多煎少則熱直入下焦

代灸膏治老人衰弱元氣虛冷臟腑虛滑腰脚冷痛沉重
飲食減少手足逆冷不能忍者用此代灸其効不能盡述

大附子一箇

吳茱萸

桂皮

木香

蛇牀子各半兩

馬蔞草一兩

右爲細末每用藥半匙白麵半匙生薑汁半盞用煎成
膏攤於紙上臨臥貼臍以油紙覆其上綿衣繫之自夜
至明乃去每夜如此貼之其腰腹如炙百壯除寒積腰
疼貼腰眼

背惡寒是痰飲仲景云心下有留飲其人背惡寒冷如米
治法茯苓丸之類是也方見痰飲 身前寒屬胃經云胃足陽

明之脉氣虛則身以前皆寒慄治法宜鍼法補三里穴是
也 手足寒者厥也治見 掌中寒者腹中寒魚上白肉

有青血脉者胃中有寒也腹胃寒理中之類 ○全見診法

五臟寒方

肝寒雙和湯方見治虛實法

心寒定志丸菖蒲丸方見小兒

脾寒益黃散方見小兒

肺寒小青龍湯方見傷寒

腎寒八味丸方見治虛實法

海通治大寒大已寒丸 四逆湯

垣沉香桂附丸

沉香

附子炮

肉桂

乾薑炮

良薑

吳茱萸

茴香炒

川烏各一兩

右為末醋煮麵糊為丸桐子大每服五七十九米飲下
食前一服忌生冷

海大已寒丸

葶撥

肉桂各四兩

乾薑炮

良薑各六兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧子大每服二十粒米飲
湯下食前服

垣諸脉按之無力所生病症 六脉中之下得弦細而瀆
按之無力腹中時痛心胃相控掣隱隱而痛或大便溏泄
鼻不聞香臭清濁礙止目中淚出喘喝痰嗽唾出白沫腰
沉沉苦痛項背骨節時作痛目中流火口鼻惡寒時時頭
痛目眩苦振寒不止或嗽或吐或嘔或噦則發燥蒸蒸而
熱如坐甌中必得去衣居寒處或飲寒水則便如故其振
寒復至或氣短促胃中滿悶而痛如有膈咽不通欲絕之

狀甚則口開目眩聲聞於外而淚涕痰涎大作其發燥方過而振寒復至或面白而不澤者脫血也悲愁不樂情慘意悲健忘或善噦此風熱大損寒水燥金復也如六脉細弦而瀼按之空虛此大寒症也亦傷精氣以辛甘溫熱潤之劑大瀉西北二方則愈

薑附湯治中寒口噤四肢強直失音不語忽然暈倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩燥兼治陰証傷寒大便利而發熱者

乾薑 熟附子分等

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去渣溫服或慮此藥性太燥即以附子理中湯相繼服餌薑附本治傷寒經下後又復發汗內外俱虛身無大熱晝則煩燥夜則安靜不渴六脉沉伏並宜服此不知脉者更宜審之

兼治中脘虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆一方附子湯以生用者名曰白通湯一方白通湯內加白朮倍之甘草減半名生附子白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹脹滿身重手足痠癢黎黎自汗失音不語便利不禁一方用薑附湯加麻黃白朮人參甘草等分名附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱腰脊強急口眼喎僻語聲渾濁胸腹脹氣上喘急不能轉動更宜審而用之

六月病寒者宜從中治

海 六月大熱之氣反得大寒之病氣難布息身涼脉遲何以治之答曰病有標本病熱為本大寒為標用涼則順時

而失本用熱則順本而失時故不從乎標本而從乎中治中治者何用溫是已然既曰溫則不能治大寒之病治大寒者非薑附不可若用薑附又似非溫治之例然衰其太

半乃止。脉得四至，餘病便無。令治之足矣。雖用薑附，是亦中治也。非溫而何？經曰：中熱遠熱，雖用之，不當。然勝至可犯，亦其理也。

右虛寒正治，蓋謂脉虛而惡寒者設也。脉虛惡寒，真寒也。故正治。

丹色目婦人，年近六十，六月內常覺惡寒，戰慄喜炎，火御綿多汗如雨，其形肥肌厚。已服附子十餘貼，渾身痒甚，兩手脉沉瀆，重取稍大，知其熱甚而血虛也。以四物去川芎，倍地黃，加白朮、黃芪，炒黃栢，生甘草、人參，每服一兩，重方與一貼，腹大泄，目無視，口無言。予知其病勢深，而藥無反佐之過也。仍用前藥，熱炒與之。蓋借火力為向導，一帖利止，四帖精神回，十帖病痊安。蔣氏年三十餘，形瘦面黑，六月喜熱惡寒，兩手脉沉而瀆，重取似數，以三黃丸下之。

以薑湯每服三十粒，二十帖，微汗而安。

三黃恐是三補丸，苓連栢也。

海婦人先病惡寒，手足冷，全不發熱，脉八至，兩脇微痛。治者便作少陽治之。陽在內，伏于骨髓；陰在外，致使發寒。治當不從內外從乎中治也。宜以小柴胡調之，倍加薑棗。

子和一婦人，身冷脉微，食沸熱粥飯，六月重衣，以衣帽蒙

其首，猶覺寒，泄注不止，常服薑附、硫黃，燥熱之劑，僅得平和。稍用寒涼，其病轉加。三年不愈，戴人診其兩手脉，皆如橫繩，有力一息六七至。脉訣曰：六數七極，熱生多，以涼布熨心，以新汲水淋其病處。婦乃叫殺，人不止，令人時時復以冷水淋之。至三四十桶，大戰汗出，昏困一二日而向之。所惡者皆除。此法本於華陀所用，世無知者。

素陽明所謂洒洒振寒者，陽明者午也。五月盛陽之陰也。陽盛而陰氣加之，故洒洒振寒也。

脉解篇

右寒實反治蓋謂脉實而惡寒者設也脉實惡寒假寒也故反治

濕痰惡寒宜吐

丹久病惡寒當用解鬱 濕痰積中抑遏陽氣不得外泄身必惡寒 進士周本道年近四十得惡寒症服附子數百帖而病甚予診其脉弦而緩遂以江茶入生薑汁香油些少吐痰一升許減大半又與通聖散去麻黃大黃芒硝加當歸地黃百帖而安

一女子惡寒用苦參赤小芫各一錢為末釐水吐後

用後藥

川芎 南星 蒼朮 黃芩 酒麪丸服

上焦不通則陽氣抑遏而皮膚分肉無以溫之故寒慄東垣升陽益胃湯用升發之劑開發上焦以伸陽明出外溫之也丹溪吐出濕痰亦開發上焦使陽氣隨吐升發出外溫之也故寒慄皆愈二者治陽虛表寒之要

運氣惡寒有三

一曰火熱經曰諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火又云少陽所至為惡寒戰又云少陽在泉客勝則腰腹痛而反惡寒治以寒劑是也

二曰風經云厥陰在泉風淫所勝病洒洒振寒治以辛涼是也

三曰寒濕包熱經云陽明司天之政清熱之氣持於氣交民病振寒四之氣寒雨降病振慄治視寒熱輕重多少其制是也

治寒厥必先熨

靈陰陽者寒暑也熱則滋雨而在上根荖少汁人氣在外皮膚緩腠理開血氣減汗大泄皮淖澤寒則地凍水冰人氣在中皮膚緻腠理閉汗不出血氣強肉堅濟當是之時善行水者不能往冰善穿地者不能鑿凍善用針者亦不

能取四厥血脉凝結堅搏不往來者亦未可卽柔故行水者必待天溫冰釋凍解而水可行地可穿也人脈猶是也治厥者必先熨調和其經掌與腋肘與腳項與脊以調之火氣已通血脉乃行然後視其病脈淖澤者刺而平之堅緊者破而散之氣下乃止此所謂以解結者也刺節真邪篇○下同用針之類在於調氣氣積於胃以通榮衛各行其道宗氣留於海其下者注於氣街其上者走於息道故厥在於足宗氣不下脉中之血凝而留止弗之火調弗能取之用針者必先察其經絡之實虛切而循之按而彈之視其應動者乃後取之而下之六經調者謂之不病雖病謂之自已也

大寒在外留而補之入於中者從合瀉之針所不爲灸之所宜官能篇○從合治之

黃帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故爲振寒寒慄補諸陽

鍼灸臟腑惡寒有三

其一取肺經云振寒鼓頷不得汗出腹脹煩冤取手太陽是也 其二取胃經云胃足陽明之脉是動則病洒洒振寒善伸數欠視盛虛熱寒陷下取之也 其三取膽經云膽足少陽之脉所生病者汗出振寒視盛虛熱寒陷下取之也

針灸下

撮下部寒冷 關元 腎俞

桑君又法 氣海 中極

甲振寒痠癢手不伸咳嗽唾濁氣膈善嘔鼓頷不得汗煩滿身痛因爲痠癢尺澤主之 頭項惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目系急痛引額頭重項痛玉枕主之 悽悽振寒

數欠伸高俞主之

密語通身惡寒筋脉拘急十指不得近風

絕骨二寸半推而上之
令氣中和為解

治往來寒熱

靈榮之生病也寒熱少氣血上下行壽夭剛柔篇

仲云婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此

為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯

主之方見傷寒

海小柴胡加減法 如寒熱往來經水不調去半夏加秦

芫芍藥當歸知母地骨皮牡丹皮川芎白朮茯苓 如小

柴胡湯與四物湯各半名調經湯 無孕嘔者加半夏

無汗者加柴胡 惡寒者加桂 有汗者加地骨皮 嗽

者加紫苑 通經者加京三稜廣茂 勞者加鱉甲

感寒飲冷脉沉瀋者屬寒

羅完顏小將軍病寒熱間作腕後有班三五點鼻中微血
出兩手脉沉瀋胸膈四肢按之殊無大熱此內傷寒也問
之向者臥殿角傷風又渴飲冰酪水此外感者輕內傷者
重外從內病俱為陰也故先班後衄顯內陰症寒熱間作
脾亦有之非徒少陽之寒熱也與調中湯數服而愈

調中湯 白茯苓 乾薑 白朮 甘草各等分

右剉如麻豈大每服五錢水一盞半煎

經云風氣盛於皮膚之間內不得通外不得洩風者善行

而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶其寒也則衰飲食

其熱也則消肌肉故使人怵慄而不能食名曰寒熱風入皮膚

為寒熱○全文見風 因於露風乃生寒熱全文見五臟 風

盛為寒熱全文見診

河解風湯治中風寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上膈壅沸

人參 川芎 獨活 甘草

麻黃 去節湯洗 焙各一兩 細辛 兩

右為末每服三錢水一盞生薑五片薄荷葉少許同煎至八分不計時候

防風湯治中風寒熱

防風 甘草 黃芩 桂枝

當歸 白茯苓 各一兩 秦艽 乾葛 各一兩半

杏仁 五十枚

右為散水酒薑棗煎服

麻大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧輕則消導重則下之熱食承氣之類寒食見睨之類並宿食門求之

右積聚而寒熱以積聚法治之

雲地骨皮散治血中風氣體虛發渴寒熱

柴胡 地骨皮 桑白皮 枳殼

前胡 黃芪 各七錢半 白茯苓 五加皮

人參 甘草 桂心 芍藥 白條各半兩

右咬咀每服三錢生薑三片水煎

柴胡散治寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩

柴胡 黃芪 赤茯苓 白朮 各二兩

人參 地骨皮 枳殼 製 桔梗

桑白皮 赤芍藥 生地黄 各七錢半

麥門冬 三兩 甘草 兩半

右咬咀每服四錢薑五片水煎

本事有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自

汗是時疫氣大行醫見其寒熱作傷寒治之大小柴胡雜進數日病劇予診視之三部無寒邪脉但厥陰弦長而上魚際宜服抑陰等藥予製此地黃丸

生地黃兩三

柴胡

秦艽

黃芩各半兩

赤芍藥兩一

右細末煉密丸桐子大每服三十九烏梅湯吞下不拘時候日三服昔宋褚澄療師尼寡婦別製方蓋有為也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞嘗讀史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背痠寒熱衆醫皆以為寒熱也倉公曰病得之欲男子不可得也何以知其然診其脉肝脉弦出寸口是以知之蓋男子以精為主婦人以血為主男子精盛則思室婦人血盛則懷胎夫肝攝血故

也厥陰弦出寸口又上魚際則陰血盛可知褚澄之言信有為矣

右地黃丸雖曰抑陰實補陰瀉陽之劑也

丹趙孺人夜間發寒後便熱丑寅時退起來口渴食少無味穀不化腹痛而泄倦怠或遇事則熱燥赤眼氣壅又不耐風寒亦惡熱

白朮錢二

芍藥炒一錢

陳皮錢一

黃芩半錢

炒栢錢三

炙甘草二分

炒苓三分

牡丹三分

木通三分

人參半錢

歸身錢二

確砂三分

煎下保和丸實腸丸各三十九

呂十四孺人怒氣後寒熱咳嗽食少淋泄

縮砂三分

甘草三分

人參半錢

白朮半錢

連翹錢一

陳皮錢一

茯苓錢一

薑二片同煎

潤肺散治嗽方見

大柴胡湯治結熱在裏往來寒熱傷寒

有宿食者以宿食法治之

臟腑寒熱有四

一曰肺經云脉之至也喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也又曰肺脉微急為肺寒熱是也

二曰脾經云脾脉小甚為寒熱是也

三曰太陽經云三陽為病發寒熱是也

四曰陽維難經云陽維為病苦寒熱是也

運氣寒熱有二

一曰火熱攻肺經云少陰司天熱氣下臨肺氣上從喘嘔寒熱又云少陽司天火氣下臨肺氣上從寒熱肘腫又云少陰司天熱淫所勝寒熱皮膚痛又云歲木不及燥乃大

行復則病寒熱瘡瘍治以寒劑是也

二曰寒熱相錯經云陽明司天之政天氣急地氣明民病寒熱發暴三之氣燥熱交合民病寒熱又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從民病寒熱如瘡又云少陰司天之政四之氣寒熱互至民病寒熱治視寒熱多少其制是也

子和武陽仇天祥之子病發寒熱諸醫作骨蒸勞治之半年病甚戴人往視之診其手脉尺寸皆朝於關關脉獨大戴人曰肺癰也問其乳媪曾有痛處乳媪曰無戴人令兒去衣舉其兩手觀其兩脇下右脇稍高戴人以手側按之兒移身避之按其左脇則不避戴人曰此肺部有癰已吐膿矣

針灸上

素灸寒熱之法先灸項大椎以年為壯數王註云如患人之年數次灸攢骨以年為壯數尾骨謂之攢骨視背膪陷者灸之膪者為筋

骨之間陷中也王註舉臂肩上陷者灸之肩腧兩季脇之

背胛骨際有陷處也京門外踝上絕骨之端灸之陽輔足小指次指間

灸之俠溪喘下陷脉灸之承筋外踝後灸之崑崙缺盆骨

上切之堅動如筋者灸之當隨其所膺中陷骨間灸之天

穴也未詳是也陽池臍下關元三寸灸之毛

際動脉灸之氣衝膝下三寸分間灸之三里足陽明附上

動脉灸之衝陽巔上一灸之百會凡當灸二十九處灸之

不已者必視其經之過於陽者數刺其俞而藥之按項大

上一灸之二十九處也已上出骨空論

靈皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁脂不得汗取三陽之

絡以補手太陰肌寒熱者肌痛毛髮焦而唇槁脂不得汗

取三陽于下以去其血者補足太陰以出其汗骨寒熱者

病無所安汗注不休齒未槁取其少陰于陰股之絡齒已

骨寒熱

汗出不止難治髓故難治也槁死不治骨厥亦然寒熱病篇○無汗而寒熱者屬表可

肺寒熱

邪在肺則病皮膚寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中

咳喘

外膺背三節五臟之傍以手疾按之快然乃刺之取之缺

盆中以越之五邪篇

肝寒熱

小腹滿大身時寒熱小便利取足厥陰全文見經云

利口苦

絡病者善太息口苦下利寒熱取陽陵泉全文見

風寒熱

素病風且寒且熱汗出一日數過先刺諸分理絡脉汗出

取分理

且寒且熱三日一刺百日而已

多血絡

經云凡刺寒熱皆多血絡必間日而一取之血盡乃止乃

調其虛實

甲寒熱五處及天柱風池腰膂長強大杼中膂內俞上窞

斷交上腕關元天牖天容合谷陰谿關衝中渚陽池消燄

少澤前谷腕骨陽谷少海然谷至陰崑崙主之 身寒熱
 陰都主之 寒熱刺腦戶 風寒熱腋門主之 心如懸
 陰厥脚腓後廉急不可前却癢癢便膿血足跗上痛舌卷
 不能言善笑心下痞四肢倦溺青赤白黃黑青取井赤取
 榮黃取輪白取經黑取合 血痔泄後重腹痛如癢狀臥
 仆必有所扶持及失氣涎出鼻孔中痛腹中常鳴骨寒熱
 無所安汗出不休復溜主之 骨寒熱澁難腎膺主之
 肺寒熱呼吸不得臥上氣嘔沫喘氣相追逐胸滿脇膺急
 息難振慄脉鼓氣鬲胸中有熱支滿不嗜食汗不出腰脊
 痛肺俞主之 咳而嘔冷寒食不下寒熱皮肉膚痛少氣
 不得臥胸滿支兩脇鬲上兢兢脇痛腹臙胃腕暴痛上氣
 肩背寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚默默然嗜臥怠惰不
 欲動身常濕濕一作温心痛無可搖者鬲俞主之 欬而脇

帶咳寒
 熱取背
 輸太陰

滿急不得息不得反側腋脇下與臍相引筋急而痛反折
 目上視眩耳中條然肩項痛驚狂衄少腹滿目眈眈生白
 翳欬引胸痛筋寒熱唾血短氣鼻酸肝俞主之 寒熱食
 多身羸瘦兩脇引痛心下賁痛心如懸下引臍少腹急痛
 熱面急一作黑目眈眈久喘咳少氣溺濁赤腎俞主之 寒
 熱咳嘔沫掌中熱虛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交
 兩手而齖口沫出實則肩背熱痛汗出暴四肢腫身濕搖
 肘寒熱饑則煩飽則善面色變一作癰口噤不開惡風泣出
 列缺主之 寒熱胸背急喉痺欬上氣喘掌中熱數欠伸
 汗出善忘四肢厥逆善笑溺白列缺主之 胸中膨膨然
 甚則交兩手而齖暴痺喘逆刺經渠及天府此謂之大膺
 肺系急胸中痛惡寒胸滿悒悒然善嘔膽汁腦中熱喘
 逆氣氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫鬲中

食體不下喉痺肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿中府主之

寒熱目眩暈善欬喘逆通谷主之 煩心欬寒熱善噦

勞宮主之 寒熱唇口乾身熱喘息目急痛善驚三間主

之一本云寒熱心背引痛胸中不得息咳唾血涎煩中善

寒熱善嘔商丘主之 嘔厥寒時有微熱脇下支滿喉痛

噤乾膝外廉痛淫灤脛痠腋下腫馬刀瘻肩腫吻傷痛太

衝主之

嘔寒熱
取太陽
厥陰

頭痛寒
熱取少
陽厥陰

寒熱頭痛喘喝目不能視神庭主之其目泣出頭不痛者

聽會取之 寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流

汗頭維主之 寒熱胸滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣胸

中有聲喉中鳴天池主之 寒熱頭痛水溝主之 寒熱

善怖頭重足寒不欲食脚攣京骨主之 下部寒熱病汗

不出體重逆氣頭眩痛飛陽主之 肩背痛寒熱瘰癧瘻

頸有大氣暴聾氣蒙瞽耳目不開頭頷痛淚出目鼻衄不

得息不知香臭風眩喉痺天牖主之 寒熱痠痛四肢不

舉腋下腫馬刀挾癭髀膝脛骨淫灤痠痺不仁陽輔主之

寒熱頸瘰癧欬呼吸炙手三里左取右右取左 寒熱

頸瘰癧大迎主之 寒熱瘰癧胸中滿有大氣缺盆中滿

痛者死外潰不死肩引項不舉缺盆中痛汗不出喉痺欬

嗽血缺盆主之 寒熱頸瘰癧肩痛不可舉臂臑膺主之

寒熱頸瘰癧耳鳴無聞痛引缺盆肩中熱痛手臂不舉

肩真主之 寒熱瘰癧目不明欬上氣唾血肩中膺主之

寒熱頸腋下腫申脉主之 寒熱頸頷腫後谿主之 胸

中滿耳前痛齒熱痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲

則皮乾熱煩曲池主之

振寒寒
熱取太

振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷小指之間

頸頷腫
寒熱取
太陽陽

熱口中熱煩心心痛臂內廉痛聾欬痰口乾頭痛不可
 顧少澤主之 振寒寒熱肩臑肘臂頭痛不可顧煩滿身
 熱惡寒目赤痛皆爛生翳膜暴痛眦耳聾臂重痛肘攣
 痂疥腦滿引臑泣出而驚頸項強身寒頭不可顧後谿主
 之 振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛狂易虛則生疣
 小者痂疥支正主之 寒熱悽厥鼓頷承漿主之
 肩痛引項寒熱缺盆主之 身熱汗不出胃中熱滿天窞
 主之 寒熱肩腫引胛中肩臂酸痛臑膺主之 臂厥肩
 膺胸滿痛目中白翳眼青轉筋掌中熱乍寒乍熱缺盆中
 相引痛數欬喘不得息臂內廉痛上鬲飲已煩滿太淵主
 之
 寒熱腹臙央央然不得息京門主之 善齧頰齒唇熱汗
 不出口中熱痛衝陽主之 胃管痛時寒熱皆主之

肩痛寒熱取太陽少陰

腹脹痛寒熱取太陽

寒熱篡反出承山主之 寒熱篡後出瘕瘕脚膈酸重戰
 慄不能久立脚急腫痛跌筋足攣少腹引喉嗌大便難
 承筋主之
 寒熱脛腫丘墟主之 寒熱痺脛不收陽交主之 跟厥
 膝急腰脊痛引腹篡陰股熱陰暴痛寒熱膝痠重合陽主
 之 寒熱解嬾一作爛淫灤脛痠四肢重痛少氣難言至陽
 主之

脛腫寒熱取太陽

腰痛寒熱取太陽

寒熱腰痛如折束骨主之 寒熱骨痛玉枕主之
 靈黃帝曰人之善病寒熱何以候之少俞答曰小骨弱肉
 者善病寒熱黃帝曰何以候骨之大小肉之堅脆色之不
 一也少俞答曰顙骨者骨之本也顙大則骨大顙小則骨
 小皮膚薄而其肉無腠其臂濡濡然其地色焘然不與天
 同色汚然獨異此其候也然後臂薄者其髓不滿故善病

寒熱也五變

寸微惡寒尺弱發熱

仲云病有洒淅惡寒而復發熱者何也曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之何謂陽不足假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也何謂陰不足假令尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也全文見傷寒

寒熱

素寸口脉沉而喘曰寒熱平人氣象論脉沉數細散者寒熱也脉要精微論○沉脉溢洪大寒熱在中尺膚烘然

先熱後寒寒熱也言初捫尺膚則熱久之則寒也尺膚先寒久之而熱

者亦寒熱也言初捫尺膚則寒久之則熱也寒熱奪形脉堅搏是逆也

寒熱安臥脫肉生死門診寒熱赤脉上下貫臍子見一脉一歲死見一脉

半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半死見三脉

寒熱赤脉貫臍子死

寒熱病者平旦死全文見診生死

三歲死見赤脉不下貫臍子可治也○寒熱篇

門

產後往來寒熱

雲產後往來寒熱四物內加小柴胡湯

保治日久虛勞微有寒熱脉沉而數宜柴胡四物湯

川芎 當歸 芍藥 熟地黄各一錢半

柴胡八錢 人參 黃芩 甘草

半夏各三錢

右為末水煎服

雲產後往來寒熱而脉弦者少陽也小柴胡加生地黄湯

柴胡二兩 黃芩五錢 人參三錢 半夏一兩五錢

大棗三枚 生地黄 梔子 枳殼各五錢

右如前煎服

虛熱

增損柴胡湯治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏

陳皮 川芎 白芍藥各等分

右咬咀每服三錢薑五片棗二枚水同煎食後日二服

大全治產後乍寒乍熱增損四物湯

人參 當歸 芍藥 川芎

乾薑各一兩 甘草

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎七分去查熱服無

時

雲熟地黃散治產後蓐勞皆由體虛氣力未壯勞復所起

四肢煩疼時發寒熱

熟地黃 人參 白芍藥 白茯苓

白朮 續斷各一兩 黃芪 桂心

五味子 當歸 川芎各七錢半

右咬咀每服四錢薑三片棗一枚水同煎

黃芪丸治產後蓐勞寒熱進退頭目眩痛骨節酸疼氣力

乏

黃芪 鱉甲 當歸炒各一兩 桂心

白芍藥 續斷 川芎 牛膝

茯苓 沉香 栝子仁 枳殼各六錢半

五味子 熟地黃各半兩

右為細末煉蜜為丸桐子大每服四五丸粥飲下食

後

外熱內寒外寒內熱

仲云病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也

活人云先與桂枝湯治寒次與小柴胡湯治熱也

表熱裏寒

羅病有遠近有緩急 征南帥不隣吉反年七旬丙辰冬
南征至楚丘諸路迎送多獻酒醴因而過飲太多遂腹痛
腸鳴自利日夜約有五十餘行咽嗑腫疼耳前後赤腫舌
本強涎唾稠粘欲吐不吐以手洩之方出言語艱難反側
悶亂夜不得臥予診得脉浮數極按之沉細而弦即謂中
丞粘公曰仲景言下利清穀身體疼痛急當救裏清便自
調急當救表救裏四逆湯救表桂枝湯今胃氣不守下利
清穀腹中疼痛雖宜急治之比之咽嗑痛猶可少待公曰
何謂也答曰內經云瘡發咽嗑名曰猛疽此疾治遲則咽
塞咽塞則氣不通氣不通則半日死故宜急治於是遂砭
刺腫上紫黑血出頃時腫勢大消遂用桔梗甘草連翹黍
粘酒製黃芩升麻防風等分咬咀每服約五錢水煮清令
熱嗽冷吐去之咽之恐傷脾胃自利轉甚再服涎清腫散

治急中
急
謂

聲出後以神應丸辛熱之劑以散中寒解化宿食而燥脾
濕丸者取其不即化則不犯上焦至病所而後化乃治主
以緩也不數服利止痛定後胸中閉塞作陣而痛思靈樞
云上焦如霧宣五穀味蒸膚充身澤毛若霧露之漑是爲
氣也今相公年高氣弱自利日久致脾胃中生發之氣不
能滋養於心肺故使閉塞而痛經云上氣不足推之揚之
脾不足者以甘補之再與發散甘辛之味溫養脾胃加以
升麻人參上升以順正氣不數服而胸中快利痛止內經
云調氣之方必別陰陽內者內治外者外治微者調之其
次平之盛者奪之隨其攸利萬舉萬全又曰病有遠近治
有緩急無越其製又曰急則治其標緩即治其本此之謂
也

仲云病人身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

熱裏裏

活人云先與白虎加人參湯治熱
次與桂枝麻黃各半湯以解其外

上熱下寒上寒下熱

羅上熱下寒治驗 中書左丞姚公茂六旬有七宿有暗
風至元戊申末因酒病發頭面赤腫而痛耳前後腫尤甚
胸中煩悶嗌咽不利身半已下皆寒足脛尤甚由是以牀
相接作坑身半已上常臥於牀飲食減少精神困倦而體
痛命予治之診得脉浮數按之弦細上熱下寒明矣內經
云熱勝則腫又曰春氣者病在頭難經云畜則腫熱砭射
之也蓋取其易散故遂於腫上約五十餘刺出血紫黑約
一盃數頃時疼痛消散又於氣海中大艾灸百壯乃助下
焦陽虛退其陰寒次於三里二穴各灸三七壯治足胫下
寒引導陽氣下行故也遂製一方名曰既濟解毒湯以熱
者寒之然病有高低治有遠近無越於此以黃芩黃連苦

寒酒製為引用瀉其上熱桔梗甘草辛甘溫升佐諸苦藥
治其熱柴胡升麻苦平味薄者也陽中之陽散發上熱連
翹苦辛平散結消腫當歸辛溫和血止痛酒煨大黃苦寒
引苦性上行止煩熱投劑之後腫散痛減大便利再服減
大黃慎言語節飲食不旬日良愈

既濟解毒湯治上焦頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得臥身
半已下皆寒足胫尤甚大便赤秘

大黃酒煨大便
利不用

連翹酒製
炒

黃芩酒
炒

甘草炙

黃連酒炒

桔梗各二
錢

柴胡

歸身

升麻各一
錢

診 脉熱病所謂陽附陰者腰以下至足熱腰以上寒陰氣下
爭還心腹滿者死所謂陰附陽者腰以上至頭熱腰以下
寒陰氣上爭還得汗者生

靈上寒下熱先刺其項太陽久留之已刺則熨項與肩胛
令熱下合乃止此所謂推而上之者也刺節真邪論下同上熱
下寒視其虛脉而陷之於經絡者取之氣下乃止此所謂
引而下之者也

垣另有上熱下寒經曰陰病在陽當從陽引陰必須先由
絡脉經隧之血若陰中火旺上騰於天致六陽反不衰而
上充者先去五臟之血絡引而下行天氣降下則下寒之
病自去矣慎勿獨瀉其六陽此病陽亢乃陰火之邪滋之
只去陰火只損血絡經隧之邪勿悞也 聖人以上熱下
寒是有春夏無秋冬也當從天外引陽下降入地中此症
乃上天羣陰火熾而反助六陽不能衰退先於六陽中決
血絡出血使氣下降三陰雖力微能逐六陽下行以陰血
自降故也亦可謂老陽變陰之象也故經云上熱下寒視

其虛脉下陷於經絡者取之此所謂引而下之也但言絡
脉皆是也病大者三稜鍼決血去陽中之熱熱者手太陽
小腸中畱火熱之邪致此老陽不肯退化為陰而下故先
決去手太陽之熱血使三陰得時之用而下降以行秋令
奉收道下入地中而舉藏也乃瀉老陽在天不肯退化行
陰道者也至元戊辰春中書叅政楊公正卿年踰七十病
面顏鬱赤若飲酒狀痰稠粘時眩暈如在風霧中一日會
都堂此症忽來復加目瞳不明遂歸命予診候兩寸脉洪
大尺脉弦細無力此上熱下寒明矣欲藥之為高年氣弱
不任記先師所論凡上熱譬猶鳥巢高顛射而取之即以
三稜針於顛前髮際疾刺二十餘出紫黑血約二合許即
時頭目清利諸苦皆去自後不復作刺上熱下寒與經旨
責其虛治之能引上熱下降垣於
熱處得血候熱自裏退而下降也

密語上寒下熱上熱下寒、懸鍾二寸半上寒下熱先補後瀉上熱下寒先瀉後補或分開上寒補懸鍾五分下熱瀉曲池一寸五分

瘧寒熱

內經論瘧皆生於風暑魄汗未盡形弱而氣燥穴俞已閉發為風瘧見生氣通天論秋善病風瘧全文見五臟夏暑汗不出者秋成風瘧

素黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其蓄作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷帝曰何氣使然願聞其道岐伯對曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽弁於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故飲冷也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏

於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也此令人汗空踈腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間日而作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內着陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰善其作日晏與其日早者何氣使然也岐伯曰邪氣客於風府循脊而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稍益晏也其出於風府日下一節二十五日五一下至骶骨二十六日六二入於脊內注於伏膂伏一作中之脉其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪氣內薄

日作者邪客淺者邪客深者邪客
邪與衛會於風府則邪新邪循風府下脊背與衛會則日晏久邪循伏膂上缺盆與

高會則
曰早

於五臟橫連募原也其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故問曰乃作也靈樞經云瘧者內薄於五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能曰作故次日乃畜積而作焉謂畜積二字則非一日之義明矣始明邪氣未盛未與衛氣相當故未作必候畜積與衛氣相當故作焉

風無常府邪客處是府

帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之始發也不當風汗其日作者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循脊而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所舍則其府也 帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒冷之水

寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧 帝曰先熱而後寒者何也此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧 帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏岐伯曰溫瘧得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外者也如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧 其但熱不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧帝曰瘧瘧何如岐伯曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開

風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消燼肌肉故名曰瘧瘧。帝曰瘧未發其應何如岐伯曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脉躁在陰則寒而脉靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病也

衛與邪相并則病作與邪相離則病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已離於陽則熱已至次日又集而并合則復病也

帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴

已上俱瘧論篇

帝曰火熱復惡寒發熱有如瘧狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會遇之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之節也瘧亦同法

至真要大論

瘧應四時

帝曰論言夏傷於暑秋必病瘧今瘧不必應者何也岐伯曰此應四時者也其病異形者反四時也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗。帝曰夫風之與瘧相似同類而風獨常在瘧則有時而休者何也岐伯曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沉以內薄故衛氣應乃作

瘧論篇

保夏傷於暑秋必病瘧蓋傷之淺也近而暴傷之重也遠而深瘧瘧者久瘧也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發洩于外邪氣內行至秋而發為瘧也初不知何經受病隨

其受而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪氣其症各殊同傷寒論之也故內經曰五臟皆有瘧其治各別在太陽經者謂之風瘧治多汗之在陽明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之風熱瘧治多和之此三陽受病皆謂暴瘧也發在夏至後處暑前者此乃傷之淺者近而暴也在陰經者則不分三經皆謂之溫瘧宜以太陰經論之其發處暑後冬至前者此乃傷之重者達而深也瘧瘧者老瘧也故謂之久瘧

桂枝羌活湯治瘧病處暑前後頭痛項強脉浮惡風有汗

桂枝 羌活 防風 甘草各半兩

右為籠末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服迎發日服吐者加半夏麩

瘧疾頭痛項強脉浮惡風無汗者宜麻黃羌活湯

麻黃 羌活 防風 甘草各半兩

右同前服法如吐加半夏麩等分

治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長睡臥不安先以大柴胡湯下之微利為度如下過外微邪未盡者宜白芷湯以盡其邪

白芷湯

白芷 知母各一兩 石膏四兩

右為籠末同前服法

治瘧無他症隔日發先寒後熱寒少熱多宜桂枝石膏湯

桂枝五錢 石膏 知母各一兩半 黃芩一兩

右為籠末分作三服水半盞同煎服間日者邪氣所舍深也如外邪已罷內邪未已再下之從卯至午發者宜大柴胡湯下之從午至酉者知邪在內也宜大承

氣湯下之。從酉至子發者，或至寅時發者，知邪在血也。宜桃仁承氣湯下之。前項下藥，微利為度，以小柴胡湯徹其微邪之氣。

治瘧寒熱大作，不論先後，此太陽陽明合病也。謂之大柴寒熱作，則必戰動。經曰：熱勝則動也。發熱則必汗泄。經云：汗出不愈，知為熱也。陽盛陰虛之証。治當內實外虛，不治恐久而傳入陰經也。宜桂枝芍藥湯主之。

桂枝

黃芪

知母

芍藥

石膏

右為麤末，五七錢，用水煎。如前藥服之，寒熱轉大者，知太陽陽明少陽三陽合病也。宜桂枝黃芩湯以和之。

甘草

石膏

知母

桂枝

柴胡

黃芩

人參

半夏

右為麤末，同煎服。服後如外邪已罷，內邪未已，用大柴胡大承氣等湯下之。

治處暑後冬至前後瘧疾，其法並於久瘧法求之。

局方雙解飲子，治瘧疾辟瘴氣神效。

肉苳蔻

草苳蔻

各二箇，一箇用水和，麪裹煨，一箇生用。

厚朴

生薑

甘草

大者二兩，一兩一分，一兩一分。

右各咬咀，每服分一半，用水一碗煎至一大盞，去渣空。

心溫服。東垣云：秋暮暑氣衰，病熱瘧，知其寒也。局方用雙解飲子，是已知此方治寒瘧也。

保治發瘧如前症，是夜發者，麻黃黃芩湯主之。

麻黃

甘草

桃仁

黃芩

桂枝

右為細末，依前服法。桃仁味苦甘辛，肝者血之海，血受

晝發屬
夜發屬

邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散
血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯
發散血中風寒之劑

世桃仁承氣湯治夜瘧有實熱者方見傷寒

治先熱後寒者小柴胡湯先寒後熱者小柴胡加桂枝湯
多熱但熱者白虎加桂枝湯多寒但寒者柴胡桂薑湯此
實或滑或熱多少定治法也若多寒而但有寒者其熱或
有熱者其熱或虛或微弱當用桂枝湯或桂枝湯加芍藥
湯亦快也所以欲學者必先問其寒熱或熱多熱少或寒
多寒少無一失也

小柴胡加桂湯治瘧先寒後熱方見傷寒 小柴胡湯治瘧先

熱後寒

仲溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩時便難白虎
加桂枝湯主之脉經云朝發暮解

知母六兩

甘草二兩

石膏斤

粳米二合

桂三兩

右剉每服五分水一盞煎八分去渣溫服出汗愈

柴胡桂薑湯治瘧寒多微有熱或寒不熱方見傷寒

瘧多寒者名曰牡瘧蜀漆散主之

蜀漆燒去

雲母燒三日

龍骨等分

右三味搗為散末發前以漿水服半錢匕如溫瘧加蜀
漆一錢臨發時服一錢匕

牡礪湯治牡瘧

牡礪四兩

麻黃去節

甘草二兩

蜀漆三兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸
藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

柴胡去半夏加枳實湯治瘧病後渴者亦治勞瘧

柴胡兩八

人參

黃芩各三兩

括萎根兩四

生薑兩二

大棗十二枚

甘草炙三兩

右七味以水一斗二升煮取六升去查再煎取三升溫服一升一日兩三服

丹瘧

有風

有暑

有食

有痰

三日一發者受病一年 間日一發者受病半年 一日

一發者受病一月 二日連發住一日者氣血俱受病

一日間日者補藥帶表藥後用截瘧丹截之在陰分者用

藥徹起陽分方可用截方

常山

草果

檳榔

知母

烏梅

川山甲炒

甘草炙

用水酒各一大碗煎至半碗露一宿臨發前二時溫服之如吐則勿服之

大法補中帶散

大法暑風必當發汗夏月多在風涼處歇遂閉汗而不泄因食者必從飲食將息 瘧而虛者須先用參朮一二帖托住其氣不使下陷後用他藥治內傷挾外邪者同法內必生痰必以汗解二陳湯加柴胡常山黃芩 瘧而甚者發寒熱頭痛如破滑而飲水自汗可與

人參

黃芪

白朮

黃連

黃芩

梔子

川芎

蒼朮

半夏

天花粉

水煎服

一丈夫瘧脈弦細每日近午發此風寒也

白朮

柴胡

青皮

半夏

蒼朮二錢

麻黃

木通一錢半

桂一錢

甘草

何氏子年二十歲瘧間日作頭痛惡寒為甚

麻黃錢一 白木錢五 青皮錢三 木通錢七

蒼朮錢二 桂皮錢半 半夏錢五 炙甘草錢三

小娘患瘧汗但未到下體

白木錢二 麻黃 知母錢一 半夏錢半

人參 桂枝錢半

分二貼薑三片水二盞半煎至半盞露星月下一夜次

日早空心熱服

陳一之子二歲間日瘧

麻黃分五 白木錢二 蒼朮錢半 陳皮錢一

半夏錢一 木通錢一 甘草錢半

何主首二十歲瘧間兩日作寒自足起發時口渴身痛頭

痛服已有汗

麻黃分半 黃芪 白木炒 青皮錢二

芍藥 蒼朮錢二 木通錢一 炙甘草錢三

柴胡錢一

王舅瘧左弦甚右畧濇將退時有汗

人參兩一 半夏兩一 白朮 柴胡各六

蒼朮 青皮各五 木通兩一 甘草些

分五帖煎服三之一去查入薑汁半杯露一夜次早溫

服之

王孺人舊患瘧疾因勞心力又發今骨節疼痛惡心食少

與此方

人參錢五 白朮兩一 蒼朮兩一 陳皮兩一

川芎 當歸 木通各七 甘草錢一

分六帖薑三片

馮官人發瘧脉弦有汗

人參錢五

黃芪

黃連

白朮錢各三

芍藥兩半

茯苓錢三

黃芩分三

作五帖水煎服

盧兄瘡後辛苦再發脉大洪而浮此血傷也宜補之

人參錢半

白朮錢一

黃芩錢四

甘草錢四

白芍錢一

黃連錢三

生地黄

茯苓

歸尾分各五

作一帖熱飲仍灸大椎穴五壯

一婦人五十餘歲形實喜作勞性急味厚喜火食夏却患惡寒發熱更作無休時衣被雖厚常凜然兩脉皆濇予作雜合邪治之遂以四物湯加陳皮以人參白朮為君生甘草黃栢為佐多入薑汁吞通神丸三十九回金柳青各二十九阿魏十九煎三帖而得睡第五帖而身和第七帖通

身微汗諸症皆去

局方人參養胃湯

草菓

茯苓

人參去蘆各半兩

甘草炙七錢

橘紅七錢半

厚朴去皮姜製

蒼朮湯洗炒

半夏湯洗各一兩

藿香葉洗去土

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一箇煎至七分去查熱服肺弱無加或寒者加黃芩黃連柴胡

右朴蒼藿香發散也半菓茯苓橘却痰也人參用之惟虛

人最宜

丹絕瘡青蒿丸

青蒿

冬瓜皮

官桂

馬鞭草各二兩

右藥燻乾為末糊為丸如胡椒大每一兩分四服於戌時前一時服盡治瘡方百草霜黃丹等分細研每服

二錢七於發日虛心水調服不止連兩服愈。治瘧用
蒜不拘多少研極爛以黃丹少許聚為度丸如雞頭大
候乾每服一九新汲水下而東服至妙

垣治瘧疾

大蒜一顆分
開片

右一片內入巴荳肉一粒輕紙裹煨熟去巴荳研入黃
丹為丸如雞頭大每服一九先發寒用桃枝七寸東向
者煎湯發日五更面北服如發熱用冷水送下未全好
次發又可進一服除根

右黃丹劫痰例輕劑也

易簡七寶湯

常山 陳皮 青皮 檳榔
草菓 甘草炙 厚朴等分

右咬咀每服半兩水酒各一盞煎六分當發日侵辰服
之此服有常山必須吐而愈或當日大作俗謂闔藥是
也虛怯人及脾胃寒者不宜服
右此劫痰例重劑也虛人慎之或補後用之

局方尅効飲子

龍腦 麝香 定粉各研半兩 荷葉焙

菴荳末 甘草炙各五兩 硃砂一兩研丸 信離炙二錢半

金箔二十五片為衣

右為末煉蜜搜和每兩作二十九丸無名異為衣每服一
二丸溫水磨連日發者未發前服之間日者不發夜服
之隔數日發者前一日夜服之

河辟邪丹治嵐瘴鬼瘧併日頻日

菴荳 雄黑荳各四十粒 信半錢另研

黃丹錢一

硃砂錢二

右為末同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每服一粒用東南桃枝取七枚研汁并花水早晨日欲出不出時向日吞之

右信砒劫痰為至峻之劑虛人切忌之

運氣瘧疾有二

一曰火熱經云歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣又云火太過曰赫羲其病笑瘧狂妄又云火鬱之發民病溫瘧又云少陽司天火淫所勝民病發熱惡寒而瘧又云少陽之復發而為瘧又云少陽司天之政民病寒熱瘧治以寒劑是也

二曰寒濕經云陽明司天為四之氣病瘧寒之候是也河斷瘧如聖散

砒二錢

蜘蛛大者三箇

雄黑豈四十粒

右為末滴水為丸如雞頭大如來日發於今晚夜北斗下先獻過次早以紙裹於耳內札一丸立愈如神一粒可救二人

素帝曰夫經言有餘者瀉之不足者補之今熱為有餘寒為不足夫瘧者之寒陽火不能溫也及其熱水水不能寒也此皆有餘不足之類當此之時良工不能止必須其自衰乃刺之其故何也願聞其說岐伯曰經言無刺熇熇之熱無刺渾渾之脉王註曰渾渾謂脉無端緒無刺漉漉之汗故為其病逆未可治也夫瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴夫瘧氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱瘧者風寒

瘡未發宜堅束

針灸

之不常也。病極則復，至病之發也。如火之熱，如風雨不可當也。故經言曰：方其盛時必毀，因其衰也。事必大昌，此之謂也。夫瘡之未發也，陰未并陽，陽未并陰，因而調之，真氣得安，邪氣乃亡，故工不能治其已發，為其氣逆也。帝曰：善攻之，奈何？早晏何如？岐伯曰：瘡之且發也，陰陽之且移也，必從四末始也。陽已傷，陰從之，故先其時，堅束其處，令邪氣不得入，陰氣不得出，審候見之，在孫絡盛，堅而血者，皆取之，此其往而未得并者也。論瘡 凡治瘡，先發如食頃，乃可治，過之則失時也。瘡發身方熱，刺跗上動脈，開其空，出其血，立寒。瘡方欲寒，刺手陽明、太陰、足陽明、太陰，謂出血當隨井俞而刺之。瘡脉滿大急，刺背俞，用中針，傍五腧俞各一，適肥瘦，出其血也。王註云：背俞謂大杼、五腧俞，噫嘻也。○脉去魚反。瘡脉小實急，灸脛少陰，刺指井。脛少陰復溜穴，指井至陰穴也。瘡脉緩大虛，便宜

用藥，不宜用鍼。諸瘡而脉不見，刺十指間出血，血去必

已。先視身之赤如小豆者，盡取之。刺瘡者，必先問其病

之所先發者，先刺之。先頭痛及重者，先刺頭上及兩額

兩眉間出血。王註云：頭上謂上星、百會兩額，謂懸顛兩眉間，謂橫竹等穴。先項背痛

者，先刺之。先腰脊痛者，先刺郄中出血。先手臂痛者，

先刺手少陰、陽明十指間。先足脛痠痛者，先刺足陽明

十指間出血。風瘡瘡發，則汗出，惡風，刺三陽經背俞之

血者。胛痠痛甚，按之不可名，曰：胛髓病，以鑱針針絕骨

出血，立已。身體小痛，刺至陰。諸陰之井，無出血。間日一

刺。瘡不渴，間日而作。刺足太陽，渴而間日作。刺足少陽

靈樞經云：瘡不渴，間日而作。刺足陽明，渴日作。刺手陽明。溫瘡，汗不出，為五十九刺。

足太陽之瘡，令人腰痛，頭重，寒從背起，先寒後熱，焯焯

暍暍然，熱止，汗出，難已，刺郄中出血。金門穴，黃帝中誥圖經云：委中主之，海藏

羌活加生地黃 足少陽之瘧令人身體解休寒不甚熱

小柴胡加桂湯 不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽穴使絡

胡湯 足陽明之瘧令人先寒洒淅洒淅寒甚久乃熱熱

去汗出喜見日月光火氣乃快然刺足陽明跗上穴衝陽

足太陰之瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至

則善嘔嘔已乃衰即取之待病衰即取之并俞及公 足

少陰之瘧令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處

其病難已海小柴胡加半夏湯陽明病 足厥陰之瘧令

人腰痠少腹滿小便不利如瘧狀非瘧也數便噫恐懼氣

不足腹中悒悒刺足厥陰太衝穴海四物加 肺瘧令人

心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明列缺

心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少

陰神 肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥

陰見血封 脾瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗

出刺足太陰商 腎瘧者令人灑灑然腰脊痛宛轉大便

難目眴眴然手足寒刺太陽少陰太鍾 胃瘧者令人且

病善饑而不能食而肢滿腹大刺足陽明太陰橫脈出

血厲先解絡 瘧寒熱甚寒熱厥取手陽明 瘧寒少熱

多取足少陽 瘧面赤目眴眴心痛取手陽明少陽 瘧

腰背痛不渴取足太陽俱刺

甲瘧瘧神庭及百會主之 瘧振寒熱盛狂言天樞主之

瘧盛熱列缺主之 瘧寒厥及熱厥煩心善噦心滿而

汗出刺少商出血立已 熱瘧口乾商陽主之 瘧寒甚

欲嘔沫陽谿主之 風瘧汗不出偏歷主之 瘧多寒少

熱大鍾主之 瘧欬逆心悶不得臥嘔甚熱多寒少欲閉

戶而處寒厥足熱太谿主之 瘧瘕瘕驚股膝重肝轉筋

頭眩痛解谿主之。瘧日西發臨泣主之。瘧多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔崑崙主之。瘧不渴間日作崑崙主之。

久瘧

久瘧者痲瘧也以其隔二三日一發纏綿不去

丹老瘧係風暑之邪入在陰分在臟宜用血藥引出陽分而散川芎撫芎紅花當歸蒼白朮白芷黃栢甘草露一宿早服古方多用峻劑恐非稟受怯弱與居養所移者所宜始悟常山砒丹烏梅劫劑或誤投之輕病變重重必危矣三日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰經瘧也作於寅申巳亥日者厥陰經瘧也作於辰戌丑未日者太陰經瘧也瘧得於暑當以汗解或因取涼太過汗鬱成痰其初感也弱者即病胃氣強者伏而未發至於再

感復因內傷其病乃作宜其難瘥夫感暑與風皆外邪也故非汗多不解今之邁此疾者已經再三劫試胃氣重傷何由得愈欲治此症必先與參朮等補劑為君加柴葛等發散藥漸而收汗得汗而虛又行補養下體屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆

丹治一婦病瘧三日一發食少經不行已三月脈無時冬寒議作虛寒治疑誤再診見其梳洗言動如常知果誤也經不行非無血為痰所碍脈無非血氣虛乃積痰生熱結伏其脈而不見耳當作實熱治與三花丸旬日後食進脈出帶微弦謂胃氣既全雖不瘧當自愈而經行也令淡滋味果應

三花神佑丸
方見水脹

一婦身材小味厚痲瘧月餘間日發於申酉頭與身痛寒多喜極熱辣湯脈伏面慘晦作實熱治之以十棗湯為末

粥丸黍米大服十粒津嚥日三次令淡飯半月大汗愈
久瘡欲吐不吐宜吐之用藜蘆散或雄黃散

瘡病能食而痰伏者小胃丹方見內傷飲食

一人性急好酒色味厚適多憂怒患久瘡忽大熱下臭積
大孔痛陷下此大虛脈弦大而浮以瓦磨如錢圓燒紅童
便焮急取以紙裹於痛處恐外寒乘虛而入也以參歸陳
皮煎服淡味半月而安

一婦人久痢因哭子變瘡一日五六作汗如雨不止脈微
數疲甚無邪可治陰虛陽散死在旦夕且服四獸等熱劑
遂用參朮各二兩白芍藥一兩黃芪半兩炙甘草二錢作
大劑四五服而愈

一人因勞役發嗽得瘡又服發散藥變為發熱舌短語
言不正痰吼有聲脈洪實似滑先用獨參湯加竹瀝二蛤

殼一服後吐膠痰舌本正後用黃芪人參湯服半月而愈

藜蘆散 大藜蘆末分五 溫菴水調下以吐為度

雄黃散 雄黃 瓜蒂 赤小豆各一錢

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

驚甲煎丸 治瘡母

驚甲十二分 烏扇三分 黃芩 鼠婦熬

大黃 桂枝 石韋去毛 厚朴

紫葳 阿膠各三分 乾姜 人參

桃仁各二分 柴胡 蜚螈熬各六分 芍藥

牡丹皮 廔虫炒各五分 蜂窠炙四分 瞿麥二分

葶藶炒 半夏各一分 赤硝十二分

右二十三味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗浸
灰候酒盡一半着驚甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁

內諸藥煎為丸如桐子大空心服七九日三服
瘡母丸

青皮 桃仁 紅花 神麩

麥芽 鱉甲醋炙 三稜 蓬朮

海粉 香附俱用醋炙

右為末神麩糊為丸如桐子大每服五七十九白湯下

小兒瘡疾痞塊用生地芍藥各一錢半陳皮川芎黃芩半

夏各一錢甘草二分姜水煎調鱉甲末服

十棗湯 芫花醋浸 大戟 甘遂制各等分

右為末每服半錢水一盞棗十枚同煎半盞服

瘡脹

秋深久瘡胸中無物又無痰癖腹高而食少俗謂瘡氣入
腹宜蒼朮湯主之

蒼朮兩四 草烏頭錢一 杏仁三十箇

右為粗末起作一服水三升煎至一半均作三服一日

服盡

產後瘡

產後瘡疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調
之熱多者宜服草菓飲子

半夏湯泡七次 赤茯苓 草菓煨去皮 甘草炙

陳皮 川芎 白芷各一錢二分 紫蘇

良姜 青皮各六分 乾姜二錢四分

右咬咀分二貼水二盞姜五片棗二枚煎至八分當發
日早連進三服無不効者

寒多者宜服生熟飲子

肉苳蔻 草菓仁 厚朴 半夏

陳皮

甘草

大棗核去

生姜各二錢半

右咬咀分二分一半生一半以濕紙裹煨香熟和勻分作二貼水二盞煎八分空心一服食後一服二相并煎午前一服

醫學綱目卷之七

陰陽臟腑部

刺灸通論刺虛實寒熱八法

大法

靈小針之要易陳而難入針解云易陳者易言也難入者難著于人也**粗守形**

上守神粗守形者守刺法也上守神者守神客者正邪共會也神者正氣也客者邪氣也在門者邪循正氣之所出入也**未睹其疾惡知其**

原未睹其疾者先知邪正何經之疾也惡知其原者先知何經之病所取之處也**刺之微在速遲**

速遲者疾徐之意也**粗守關上守機**粗守關者守四肢而不知血氣徐之意也**粗守關上守機**粗守關者守四肢而不知血氣徐之意也

機之動不離其空知氣之虛實用針之疾除也**空中之機清淨以微**

針以得氣密意守氣勿失也**其來不可逢**氣盛不可補也**其往不可追**氣虛不可

知機之道者不可掛以髮言氣易失也**不知機道扣之不發**言

知補瀉之意血氣已盡而氣不下也**知其往來要與之期**知其往來者知氣

與之期者知氣之可取之時也**粗之閤乎**冥冥不知氣之微密也**妙哉上獨有之者**

盡知針意也**往者為逆**言氣之虛而逆也**來者為順**言氣之平也**明知**

意也**往者為逆**言氣之虛而逆也**來者為順**言氣之平也**明知**

逆順正行無問言知所取之處也迎而奪之惡得無虛追而濟之

惡得無實迎之隨之以意和之針道畢矣迎而奪之者瀉也追而濟之者

補也難經云所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往來隨其逆順而取之故曰迎隨又云迎而奪之者瀉其子也追而濟之者補其母也假令心病瀉手心主俞是謂凡用針

迎而奪之也補手心主井者是謂隨而濟之也者虛則實之氣口虛而當補之也素云針下熱也滿則泄

氣口盛而當瀉之也素云宛陳則除之去血脈也素云邪

盛則虛之邪也素云出針勿瀉其大要曰徐而疾則實徐而疾

出也素云徐出疾而徐則虛疾內而徐出也素云言實與

針而疾按之虛若有若無言實者有氣虛者無氣也素云言實與虛者

察後與先若亡若存言氣之虛實補瀉之先後也為虛與

實若得若失言補者似然若有得也瀉則恍然若有失也

若得若失素云為虛與實者工勿虛實之要九針最妙素

失其法若得若失者離其法也為其各有補瀉之時者一宜也

補瀉之時以針為之素云補瀉之時者與氣開閉相合也

瀉曰迎之必持而內之放而出之排陽得針邪氣得泄按而引

針是謂內溫血不得散氣不得出也補曰隨之意若

忘之若行若按如蚊虻止如留如還去如弦絕令左屬右

其氣故止外門已閉中氣乃實必無留血急取誅之持針

之道堅者為寶正指直刺無針左右神在秋毫屬意病者

審視血脉者刺之無殆方刺之時必在懸陽及與兩衛神

屬勿去知病存亡血脉者在膺橫居視之獨澄切之獨堅

刺之而氣之不至無問其數刺之而氣至乃去之勿復

針針各有所宜各不同形各任其所為刺之要氣至而有

效效之信若風之吹雲明乎若見蒼天刺之道畢矣邪氣

來也緊而疾穀氣來也徐而和並見九針十二原并小針解

凡刺之屬三刺至穀氣邪僻妄合陰陽易居逆順相反浮

沉異處四時不得稽留淫泆須針而去故一刺則陽邪出

再刺則陰邪出三刺則穀氣至穀氣至而止所謂穀氣至者已補而實已瀉而虛故以知穀氣至也所謂三刺則穀氣出者先淺刺絕皮以出陽邪再刺則陰邪出者少益深絕皮致肌肉未入分肉間也已入分肉之間則穀氣出故刺法曰始淺刺之以逐邪氣而來血氣後刺深之以致陰氣之邪最後刺極深之以下穀氣此之謂也故用針者不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工也並終始官針二篇

右候氣有二一曰邪氣二曰穀氣凡刺氣至則候邪氣盡盡則穀氣至至則止針矣所謂邪氣者曰緊而疾曰補而未實瀉而未虛也所謂穀氣者曰徐而和曰補而已實瀉而已虛也

視其色察其目知其散復一其形聽其動靜上工知相五色于目有知

調尺寸小大緩急滑濇以言所病也知其邪正者知論虛邪與正邪之風也右主推之左持而御之者言持針而出入也氣至而去之言補瀉氣調而去之也

已上見針解凡將用針必先診視脈氣之劇易乃可以治也

素五臟已定九候已備後乃存針王註云先定五藏之脈次循九候之診然後乃

存意於用針之法黃帝問曰經言氣之盛衰左右傾移以上調下以左調右有餘不足補瀉於榮俞余知之矣此皆榮衛之傾移虛實之所生非邪氣從外入於經也余願聞邪氣之在經也其病人何如取之奈何岐伯對曰夫聖人之起度必應於天地故天有宿度地有經水人有經脈天地溫和則經水安靜天寒地凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波涌而隴起夫邪之入於脈也寒則血凝泣暑則氣淖澤虛邪因而入客亦如經水之得風也

經之動脈其至也亦時隴起其行於脈中循循然其至寸口
中手也時大時小大則邪至小則平其行無常處在陰與陽
不可爲度從而察之三部九候卒然逢之早過其路帝曰
候氣奈何岐伯曰夫邪去絡入於經也舍於血脈之中其寒
溫未相得如涌波之起也時來時去故不常在故曰方其來
也必按而止之止而取之無逢其衝而瀉之真氣者經氣也
經氣太虛故曰其來不可逢此之謂也靈樞云其脫則不復邪氣復至而病益畜故曰其往不可追此之謂也靈樞云其往不可追也者氣虛不可瀉也不可掛以髮者待邪之至時而發針瀉矣不可掛以髮者言氣易失也若先若後者血氣已盡其病不可下故曰知其可取如發機不知其取如叩錘故曰知機道者不可掛以髮不知機者扣之不發此之謂也帝曰補瀉

奈何岐伯曰此攻邪也疾出以去盛血而復其真氣此邪新客溶溶未有定處也推之則前引之則止逆而刺之溫血也刺出其血其病立已邪之新客來也未有定處推之則前引之則止逢而瀉之其病立已俱離合真邪論

右候邪氣新客經脈而取之之法也言邪之初客經脈其寒溫未相搏如涌波之起也時來時去故不常在欲取之者必於三部九候之間診察以待之儻於一部一候見其如涌波之來則按而止之然後取之不可逢其衝來便瀉之故曰其來不可逢其或候氣不審至於涌波之大氣已過去而瀉之則真氣脫邪氣復至而病益蓄故曰其往不可追也凡診三部九候而待邪至之機以發刺者必專心致意故曰知機道者不可掛以髮也所謂涌波者脈浮大也三部九候非寸關尺乃面有三

部手有三部足有三部合三部為九部也

帝曰善然真邪已合波隴不起候之奈何岐伯曰審捫循三部九候之盛虛而調之察其左右上下相失及相減者審其病藏以期之不知三部者陰陽不別天地不分地以候地天以候天人以候人調之中府以定三部故曰刺不知三部九候病脉之處雖有大過且至工不能禁也誅罰無過命曰大惑反亂大經真不可復用實為虛以邪為真用針無義反為氣賊奪人正氣以從為逆榮衛散亂真氣已失邪獨內著絕人長命予人天殃不知三部九候故不能長久因不知合之四時五行因加相勝釋邪攻正絕人

長命

離合真邪論

右候邪客已久真邪已合而取之之法也言取邪之新客者但候波隴之脉來處取之今真邪已合波隴不起

而不知邪客之處也故又必當捫循三部九候之盛虛視其盛處瀉之虛處補之左右相失而左大右細者瀉左補右上下相失而上大下小者瀉上部補下部上小下大者補上部瀉下部左右上下皆相減而細者審其何臟之減以其減臟日時之衰者補其所減經減臟日時之盛者瀉其所勝經候邪去真復而止故曰刺不知三部九候病脉之處則誅罰無過反亂大經用實為虛以邪為真真氣已失邪獨內著絕人長命也

上工救其萌芽必先見三部九候之氣盡調不敗而救之故曰上工下工救其已成救其已敗救其已成者言不知三部九候之相失因病而敗之也知其所在者知診三部九候之病脉處而治之故曰守其門戶莫知其情而見邪形也

入正神明論

難言上工治未病中工治已病者何謂也然所謂治未病者見肝之病則知肝當傳之於脾故先實其脾氣無令得受肝之邪也故曰治未病焉中工見肝之病不曉相傳但一心治肝故曰已病也七十難

自篇首至此乃察病用針切要之旨學者當潛心體認之醫而不知此非工也噫今世稍知穴法便自驕滿由不知粗守形上守神之論也可慨哉

靈夫氣之在脉也邪氣在上針解云言邪氣之中人也高故邪氣在上也濁氣

在中言水穀皆入於胃其精氣上注于肺濁溜于腸胃若寒暑不適飲食不節而病生於腸胃故命曰濁氣在

中清氣在下言清濕地氣之中人也必從足始故曰清氣在下針陷脉則邪氣出

取之取之陽也針大深則邪氣反沉言浮淺上針也中脉則邪氣出取之陽也針大深則邪氣反沉言浮淺

欲深刺也深則邪氣從之入故曰反沉皮肉筋脉各有所處言經絡各病各

有所宜甲乙經宜字作合各不同形各以任其所宜見小針解及九針十二原

素病有浮沉刺有深淺各至其理無過其道過之則內傷不及則生外壅壅則邪從之淺深不得反為大賊內動五

藏後生大病故曰病有在毫毛腠理者有在皮膚者有在

肌肉者有在脉者有在筋者有在骨者有在髓者云云刺要

論病在脉調之血病在血調之絡病在氣調之衛病在

肉調之分肉病在筋調之筋病在骨燔針劫刺其

下及與急者主註云調筋法也病在骨燔針藥熨調骨法也病不知所

痛兩蹠為上身形有痛九候莫病則繆刺之刺絡也痛在於

左而在脉病者巨刺之刺經脉也見調經論篇

靈手屈而不伸者其病在筋伸而不屈者其病在骨在骨

守骨在筋守筋終始篇

難言刺榮無傷衛刺衛無傷榮何謂也然針陽者臥針而

刺之刺陰者先以左手攝按所針榮俞之處氣散乃納針

刺之刺陰者先以左手攝按所針榮俞之處氣散乃納針

是謂刺榮無傷衛刺衛無傷榮也見七十

一難

素刺骨者無傷筋刺筋者無傷肉刺肉者無傷脉刺脉者無傷皮刺皮者無傷肉刺肉者無傷筋刺筋者無傷骨刺骨無傷筋者針至筋而去不及骨也刺筋無傷肉者至肉而去不及筋也刺肉無傷脉者至脉而去不及肉也刺脉無傷皮者至皮而去不及脉也林註云此謂淺深不刺皮無傷肉者病在皮中針入皮中無傷肉也刺肉無傷筋者過肉中筋也刺筋無傷骨者過筋中骨也此之謂反也
戒其大深也刺齊論

九鍼

靈凡針之要官針最妙九鍼之宜各有所為長短大小各有所施也不得其用病弗能移疾淺針深內傷良肉皮膚為癱病深針淺病氣不瀉反為大膿病小針大氣瀉太甚疾必為害病大針小氣不泄瀉亦復為敗失針之宜大者

瀉小者不移已言其過請言其所施官針篇

靈一曰鑱針長一寸六分頭大末銳去瀉陽氣九針十二原鑱鉏街

切○紫古云平半寸長一寸六分其頭大末銳主熱在頭分宜此

甲一者天天者陽也五臟之應天者肺也肺者五臟六腑之蓋也皮者肺之合也人之陽也故為治鑱針鑱針者取法於巾針去末半寸卒銳之長一寸六分大其頭銳其末令無得深入而陽氣出主熱在頭身者故曰病在皮膚無常處者取之鑱針於病所膚白勿取

靈二曰員針長一寸六分針如卵形楷摩分間不得傷肌

九針十二原紫古云其身長針針如卵形肉分氣病宜此

甲二者地地者土也人之所以應土者肉也故為之治員針員針者取法於絮針必循其身而員其末其鋒如卵長一寸六分以瀉肉分之氣令不傷肌則陽氣得瀉故曰病

在分肉間取以負針

靈三曰鍤針長三寸半鋒如黍粟之銳主按脉勿陷以致

其氣九針十二原紫古云脉氣虛少者宜此

甲三者人也人之所以成生者血脉也故為之治鍤針鍤

針者取法於黍粟大其身而負其末如黍粟之銳長三寸

五分令可以按末勿陷以致其氣使邪氣獨出故曰病在

脉氣少當補者取以鍤針針于井榮分輸

靈四曰鋒針長一寸六分刃三隅以發痼疾九針十二原紫古云瀉熱

出血發泄痼疾

甲四者時也時者四時八風之客於經絡之中為痼病者

也故為之治鋒針鋒針者取法於絮針箒其身而鋒其末

刃三隅長一寸六分令可以瀉熱出血發泄痼疾故曰病

在五臟固居者取以鋒針瀉于井榮分輸取以四時也

靈五曰鈹針長四寸廣二分半末如劍鋒以取大膿九針十二原鈹音皮紫古云一名破針用以破癰腫血膿

原鈹音皮紫古云一名破針用以破癰腫血膿

甲五者音也音者冬夏之分分于子午陰與陽別寒與熱

爭兩氣相搏合為癰膿者也故為之治鈹針鈹針者取法

於劍令其末如劍鋒廣二分半長四寸可以取大膿出血

故曰病大膿血取以鈹針

靈六曰負利針長一寸六分大如釐且負且銳中身微大

以取暴氣九針十二原紫古云尖如毫且負且利中身微大調陰陽去暴氣

甲六者律也律者調陰陽四時而合十二經脉虛邪客於

經絡而為暴痺者也故為之治負利針負利針者取法於

釐針且負且銳中身微大長一寸六分以取癰腫暴痺令

尖如釐微大其末反小其身令可深內也故曰病痺氣暴

發者取以負利針

靈七曰毫針長三寸六分尖如蚊虻喙靜以徐往微以久

留之而養以取痛痺九針十二原索古云尖如蚤齒聚調經絡去痛痺

甲七者星也星者人之七竅邪之所客於經舍於絡而為

痛痺者也故為之治毫針毫針者取法於毫毛長一寸六

分令尖如蚊虻喙靜以徐往微以久留正氣因之真邪俱

往出針而養生以治痛痺在絡也故曰痺病氣通而不去

者取之毫針

靈八曰長針長七寸鋒利身薄可以取遠痺九針十二原

痺深居骨解腰脊節腠之間者

甲八者風也風者人之股肱八節也八正之虛風傷人內

舍於骨解腰脊節腠之間為深痺也故為之治長針長針

者綦針也長七寸長其身而鋒其末令可以取深邪遠痺

故曰病在中者取以長針綦巨共切

九曰大針長四寸尖如挺其鋒微負以瀉機關之水也針九

十二原索古云一名焮針針風虛合于骨解皮膚之間者

甲九者野也野者人之節解皮膚之間也淫邪流溢於身

如風水之狀而溜不能過於機關大節者也故為之治大

針大針者取法於鋒針其針微負長四寸以瀉機關內外

取大氣之不能過於關節者也故曰病水腫不能過關節

者取以大針

黃帝問曰刺有五邪何謂五邪伯高曰病有持癰者有容

大者有狹小者有熱者有寒者是謂五邪刺五邪法未詳凡刺

癰刺用鈹針無迎隴易俗移性不得膿脆道更行去其鄉

不安處所乃散亡諸陰陽過癰者取之其輸瀉之凡刺

大邪用鋒針日以小泄奪其有餘乃益虛剽其通針其邪

肌肉親視之無有反其真刺諸陽分肉之間凡刺小邪

凡刺

用真針日以大補益其不足乃無害視其所在迎之界遠近盡至其不得外侵而行之乃自費刺分肉之間凡刺熱邪用鑱針越而蒼出游不歸乃無病為開通關門戶使邪得出病乃已 凡刺寒邪用毫針日以溫徐往徐來致其神門戶已閉氣不分虛實得調其氣存也刺節真邪論

靈凡刺有九曰應九變一曰輸刺輸刺者刺諸經榮輸藏腧也二曰遠道刺遠道刺者病在上取之下刺府輸也三曰經刺經刺者刺大經之結絡經分也四曰絡刺絡刺者刺小絡之血脉也五曰分刺分刺者刺分肉之間也六曰大寫刺大寫刺者刺大膿以鉞針也七曰毛刺毛刺者刺浮痺皮膚也八曰巨刺巨刺者左取右右取左九曰焮刺焮刺者刺燔針則取痺也 凡刺有十二節以應十二經一曰偶刺偶刺者以手直心若背直痛所一刺前一刺後

以治心痺刺此者傍針之也 二曰報刺報刺者刺痛無常處也上下行者直內無拔針以左手隨病所按之乃出針復刺之也 三曰恢刺恢刺者直刺傍之舉之前後恢筋急以治筋痺也傍之舉之者謂直刺入邪轉針頭從傍挑舉其筋也 四曰齊刺齊刺者直入一傍入二以治寒氣小深者或曰三刺三刺者治痺氣小深者也 五曰揚刺揚刺者正內一傍內四而浮之以治寒氣之博大者也 六曰直針刺直針刺者引皮乃刺之以治寒氣之淺者也 七曰輸刺輸刺者直入直出稀發針而深之以治氣盛而熱者也 八曰短刺短刺者刺骨痺稍搖而深之致針骨所以上下摩骨也 九曰浮刺浮刺者傍入而浮之以治肌急而寒者也 十曰陰刺陰刺者左右率刺之以治寒厥中寒厥足踝後少陰也 十一曰傍針刺傍針刺者直刺傍刺各一以治留

痺久居者也 十二曰贊刺贊刺者直入直出數發針而淺之出血是謂治癰腫也 凡刺有五以應五藏一曰半刺半刺者淺內而發針無針傷肉如拔毛狀以取皮氣此肺之應也 二曰豹文刺豹文刺者左右前後針之中脉為故以取經絡之血者此心之應也 三曰關刺關刺者直刺左右盡筋上以取筋痺慎無出血此肝之應也或曰淵刺一曰豈刺 四曰合谷刺合谷刺者左右雞足針于分肉之間以取肌痺此脾之應也 五曰輸刺輸刺者直入直出深內之至骨以取骨痺此腎之應也 見官針篇 標幽賦 拯救之法妙用者針察歲時於天道定形氣於予心春夏瘦而淺刺秋冬肥而刺深不窮經絡陰陽多逢刺禁既論藏府虛實須向經尋原夫起自中焦水初下漏太陰為始至厥陰而方終穴出雲門抵期門而最後正經

十二別絡走三百餘支正側偃伏氣血有六百餘候手足三陽手走頭而頭走足手足三陰足走腹而胸走手要識迎隨須明逆順況夫陰陽血氣多少為最厥陰太陽少氣多血太陰少陰少血多氣又有氣多血少者少陽之分氣盛血多者陽明之位先詳多少之宜次察應至之氣輕滑慢而未來沉濇緊而已至既至也量寒熱而留疾未至也據虛實而痛氣氣之至也若魚吞釣餌之浮沉氣未至也似閉處幽堂之深邃氣速至而效速氣遲至而不治觀夫九針之法毫針最微七星可應衆穴主持本形金也有蠲邪扶正之道短長水也有決疑開滯之機定刺象木或斜或正口藏比火進陽補羸循機捫而可塞以象土實應五行而可知然而一寸六分包含妙理雖細擬於毫髮同貫多岐可平五藏之寒熱能調六府之虛實拘攣閉塞遣八

邪而去矣寒熱痛痺開四關而已之凡刺者使本神朝而後入既刺也使本神定而氣隨神不朝而勿刺神已定而可施定脚處取氣血爲主意下手處認水木是根基天地人三才也湧泉同璇璣百會上中下三部也大包與天樞地機陽蹻陽維并督脉主肩背腰脚在表之疾陰蹻陰維任帶衝主心腹脇肋在裏之危二陵二蹻二交似續而交五大兩間兩商兩井相依而列兩支足見取穴之法必有分寸先審自意次觀肉分或屈伸而得之或平直而安定在陽部筋骨之側陷下爲真在陰分鄰臙之間動脉相應按五穴定一穴而必端取三經用一經而可正頭部與肩部詳分督脉與任脉異定明標探本論刺深刺淺之經住痛移疼取相交相貫之逕豈不聞藏府病而求門海俞募之微經絡滯而求原則交會之道更窮四根三結依標本

而刺無不痊但用八法五門分主客而針無不效八脉始終連八會本是紀綱十二經絡十二原是爲樞要若一日刺六十六穴之法方見幽微一時取十二經之原始知要妙詳夫補瀉之法非呼吸而在手指速效之功要交正而識本經交經繆刺左有病而右畔取瀉絡遠針頭有病而脚上針巨刺與繆刺各異微針與妙刺相通觀部分而知經絡之虛實視浮沉而辨藏府之寒温且夫先令針耀而慮針損次藏口內而欲針温目無外視手如握虎心無外慕如待貴人左手重而切按欲令氣散右手輕而徐入不痛之因空心恐怯直立側而多暈背目沉指坐臥平而勿昏至推于十十變定孔穴之開闔論其五行五藏察時日之旺衰伏如橫豈應若發機陽交陰別而定血暈陰蹻陰維而下胎衣痺厥偏枯迎隨裨經絡接續漏崩帶下温

補使氣血依歸靜以久留停針候之必准者取照海治喉中之閉塞端的處用大鍾治心性之呆痴大抵疼痛實瀉痒麻虛補體重節痛而俞居心下痞滿而井主心脹咽痛針太衝而立除脾痛胃疼瀉公孫而立愈胸滿腹痛刺內關脇疼肋痛針飛虎筋攣骨痛而補魂門體熱勞嗽而瀉魄戶頭風頭痛刺申脉與金門眼癢眼疼瀉光明與地五瀉陰郄止盜汗併小兒骨蒸刺偏歷利小便兼大人水蠱中風環跳而宜刺虛損天樞而可取由是午前卯後太陰生而疾溫離左酉南月死朔而速冷循捫彈努留吸母以堅長爪下伸提疾呼子而噓短動退空歡迎奪右而瀉涼推內進搓隨濟左而補煖慎之大凡危疾色脉不順而莫針寒熱風陰饑飽醉勞而切忌望不補而晦不瀉弦不奪而朔不濟精其心而求其法無灸艾而壞其肌正其理而

求其源免投針而失其位避灸處而和四肢四十又九禁刺處而除六俞三十又二抑又聞高皇抱疾而未瘥李氏刺巨闕而得甦太子暴死爲屍厥越人針維會而復醒肩井曲池甄權刺臍痛而復射懸鍾環跳華陀刺蹠足而立行秋夫刺腰俞而鬼兔沉痾王纂針交俞而妖精立出刺肝俞與命門使瞽士視秋毫之末刺少陽與交別俾聾夫聽夏蚋之聲嗟夫去聖逾遠斯道漸墜或不得意而散其學或眩其能而犯禁忌庸愚智淺難契於玄言至道淵深得之者有幾偶述斯言不敢示諸明達者焉庶幾乎童蒙之心啓

通玄賦 必欲治病莫如用針巧運神機之妙工開聖理之深外取砭金能蠲邪而扶正中含水火善回陽而倒陰原夫絡別支殊經交錯綜或溝渠溪谷以岐異或山海丘

陵而隙共斯流派以難揆在條綱而有統理繁而昧縱補
瀉以何功法捷而明自迎隨而得用且如行步難移大衝
最奇人中除脊脊之強痛神門去心性之呆痴風傷項急
始求於風府頭眩目暈要覓於風池耳閉須聽會而治也
眼痛則合谷以推之胸結身黃取湧泉而即可腦昏目赤
瀉攢竹以偏宜但見若兩肋之拘攣仗曲池而平掃治半
身之不遂作環跳以長驅牙齒痛呂細堪治頭項強承漿
可保太白宣導於氣衝陰陵開通於水道腹膨而脹奪內
庭以休遲筋轉而疼瀉承山之在早大抵脚腕痛崑崙解
愈股膝疼陰市能醫癩發顛狂兮憑後谿而療理瘡生寒
熱兮仗間使以扶持期門罷胸滿血崩而可用勞宮退胃
翻心痛以何疑考夫大敦去七疝之偏疼王公謂此三里
却五勞之羸瘦華老言斯固知腕骨祛黃然谷瀉腎行間

治膝腫腰疼尺澤去肘疼筋緊目昏無見二間宜取鼻寒
不聞迎香可引肩并除兩胛難任絲竹空療偏頭痛不忍
咳嗽寒痰列缺堪治眇矇冷淚臨泣尤准完骨將腿痛以
祛殘腎俞把腰疼而瀉盡以見越人治屍厥於維會隨手
而甦文怡瀉死胎於三陰交應針而墮聖人於是察麻與
痛分實與虛實則自外而入也虛則自內而出之是故濟
母以裨其不足奪子而平其有餘觀二十七之經絡一一
明辨據四百四之疾症件件皆除故得天柱都無躋斯民
於壽域幾微已判彰往古之玄書抑又聞心胸病求掌後
之大陵脊背患責肘前之三里冷痺腎俞取足陽明之士
連臍腹痛瀉足少陰之水脊間心後者針中渚而立痊脇
下肋遠者刺陽陵而卽止頭項痛擬後谿以安然腰脚疼
在委中而已矣夫用針之士於此理苟明者焉收祛邪之

功而在乎撚指

海兩脇痛少陽丘墟 心痛少陰太溪湧泉足厥陰原穴

腰痛崑崙及委中出血 喘滿痰實口中如膠足少陰

太溪 嘔噦無痰手厥陰太陵 熱無度不可止陷谷出

血 骨節疼痛實無所知三稜刺絕骨出血 小腸疝氣

足厥陰太衝 血衄不止大小便血婦人血不足刺足太

陰井 喉閉手足少陽井并少商手足太陰井 大煩熱

不止晝夜無度刺十指間出血謂八關大刺 陰頭中痛

不可忍卒疝痛婦人陰中痛俱刺足厥陰井 眼大眦痛

刺手太陽井小眦痛刺少陰井 骨熱不可治者板齒乾

燥灸骨會大維

接經 手足經同

經曰留瘦不移節而刺之使十二經無過絕假令十二經

中是何經絡不通行當刺不通凝滯俱令氣過節無問其

數以平為期如諸經俱虛補十二經如諸經俱實瀉十二

經補當隨而濟之瀉當迎而奪之

右大接經從陽引陰從陰引陽皆取十二經井穴

門針灸條

脉之所居深不見者刺之微內針而久留之以致其脉氣

也脉淺者勿刺接絕其脉乃刺之無令精出獨出其邪氣

耳

病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也深刺之痒者陽

也淺刺之病在上者陽也在下者陰也病先起于陰者先

治其陰而後治其陽病先起于陽者先治其陽而後治其

陰 春氣在毛夏氣在皮秋氣在分肉冬氣在筋骨此病

各以其時為齊故刺肥人者秋冬之齊瘦人者春夏之齊

難言春夏刺淺秋冬刺深者何謂也然春夏者陽氣在上
人氣亦在上故當淺取之秋冬者陽氣在下人氣亦在下
故當深取之春夏各致一陰秋冬各致一陽者何謂也然
春夏溫必致一陰者初下針沉之至腎肝之部得氣引持
之陰也秋冬寒必致一陽者初內針淺而浮之至心肺之
部得氣推內之陽也是謂春夏必致一陰秋冬必致一陽
難七十

垣夫陰病在陽者是天外風寒之邪乘中而外入在人之
背上府俞藏俞是人之受天外寒邪亦有二說中於陽則
流於經此病始於外寒終歸外熱故以治風寒之邪治其
各藏之俞非止風寒而已六淫濕暑燥火皆五藏所受乃
筋骨血脉受邪各有背上五藏俞以除之傷寒說從仲景
中八風者有風論中暑者治在背上小腸腧中濕者治在

胃腧中燥者治在大腸腧此皆六淫客邪有餘之病皆瀉
其背之腑腧若病久傳變有虛有實各隨病之傳變補瀉
不足只治在背府腧 陽病在陰者病從陰引陽是水穀
之寒熱感則害人六府又曰飲食失節及勞役所傷陰火
乘於坤土之中致穀氣榮氣清氣胃氣元氣不得上升滋
於六府之陽氣是五陽之氣先絕於外外者天也下流伏
於坤土陰火之中皆先由喜怒悲憂恐為五賊所傷而後
胃氣不行勞役飲食不節繼之則元氣乃傷當從胃腧合
三里穴中推而揚之以伸元氣故曰從陰引陽若元氣愈
不足治在腹上諸府之募穴若傳在五藏為九竅不通隨
各竅之病治其各藏之募穴於腹故曰五藏不平乃六府
元氣閉塞之所生也又曰五藏不和九竅不通皆陽氣不
足陰氣有餘故曰陽不勝其陰凡治腹之募皆為元氣不

足從陰引陽勿誤也若錯補四末之俞錯瀉四末之俞皆非也錯瀉者差尤甚矣按岐伯所說只取穴於天上天上者人之背上五藏六府之俞不當瀉而瀉豈有生者乎興言及此寒心徹骨若六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脉之病苟錯取穴於胃之合及諸腹之募者必危亦岐伯之謂下工可不慎哉

刺虛實

虛實法素曰刺法言有餘瀉之不足補之何謂有餘何謂不足岐伯對曰神有有餘有不足氣有有餘有不足血有有餘有不足形有有餘有不足志有有餘有不足夫心藏神肺藏氣肝藏血脾藏肉腎藏志而此成形志意通內連骨髓而成身形五藏五藏之道皆出於經隧以行血氣血氣不和百病乃變化而生是故守經隧焉 神有餘則笑不休神

不足則悲血氣未并五藏安定邪客於形洒淅起於毫毛未入於經絡也故命曰神之微神有餘則瀉其小絡之血出血勿之深斥斥推也小絡孫絡也針經曰經脈為裡支而橫者為絡絡之別者為孫絡也無中其大經神氣乃平神不足者視其虛絡按而致之刺而利之無出其血無泄其氣以通其經神氣乃平帝曰刺微奈何曰按摩勿釋著針勿斥移氣於不足神氣乃得復氣有餘則喘咳上氣不足則息利少氣血氣未并五藏安定皮膚微病命曰白氣微泄氣有餘則瀉其經隧無傷其經無出其血無泄其氣不足則補其經隧無出其氣問曰刺微奈何對曰按摩勿釋出針視之曰我將深之適人必革精氣自伏邪氣散亂無所休息氣泄腠理真氣乃相得血有餘則怒不足則恐血氣未并五藏安定孫絡水溢則經有留血血有餘則瀉其盛經出其血不足則視其虛

經內針其脉中久留而視脉大疾出其針無令血泄問曰
刺留血奈何對曰視其血絡刺出其血母令惡血得入於
經以成其疾 形有餘則腹脹溼澀不利不足則四肢不
用血氣未并五藏安定肌肉蠕動命曰微風形有餘則瀉
其陽經不足則補其陽絡問曰刺微奈何對曰取分肉間
無中其經無傷其絡衛氣得復邪氣乃索 志有餘則腹
脹食泄不足則厥血氣未并五藏安定骨節有動志有餘
則瀉然筋血者不足則補其復溜然筋即然谷穴問曰刺未并奈
何對曰即取之無中其經邪所乃能立虛問曰虛實之形
不知其何以生對曰血氣已并陰陽相傾氣亂於衛血逆
於經血氣離居一實一虛夫五藏之虛實皆生於血氣之
離并耳有餘者血氣并入其藏
盛而實也不足者血氣離去其藏衰而虛也經氣未并五
藏安定者五藏之血氣未并為實未離為虛者安定其所
而陰陽均平久留者一邪初客之時故當即治若其初不
治則漸并漸離而虛藏所離之血氣有并歸於實藏所以

陰陽相傾而不均平衛亂榮逆而三候不一實藏自實虛
藏自虛而一實一虛也然所謂一盛一虛者不獨五藏也
凡陰陽表裏上下經絡皆然也故病有陽盛陰虛陰盛陽
虛者有表盛裏虛裏盛表虛者有上盛下虛下盛上虛者
有經滿絡虛絡滿經虛者所謂無實實虛虛損不足並有
餘者海藏所謂上熱未除中寒復生之類皆治一實一虛
之戒學者宜究心焉 血并於陰氣并於陽故為驚狂血并於陽氣
并於陰乃為臆中臆即熱也血并於上氣并於下心煩惋善怒
血并於下氣并於上亂而善忘問曰血并於陰氣并於陽
如是血氣離居何者為實何者為虛對曰血氣者喜溫而
惡寒寒則泣不能流溫則消而去之是故氣之所并為血
虛血之所并為氣虛問曰人之所有者血與氣耳今夫子
乃言血并為虛氣并為虛是無實乎對曰有者為實無者
為虛故氣并則無血血并則無氣今血與氣相失故為虛
焉絡之與孫脉俱輸於經血與氣并則為實焉血之與氣
并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死問

曰實者何道從來虛者何道從去虛實之要願問其故對曰夫陰與陽皆有俞會陽注於陰陰滿之外陰陽均平以充其形九候若一命曰平人夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒問曰風雨之傷人也柰何對曰風雨之傷人也先客於皮膚傳入於孫脉孫脉滿則傳入于絡脉絡脉滿則輸于大經脉血氣與邪并客於分腠之間其脉堅大故曰實實者外堅充滿不可按之按之則痛問曰寒濕之傷人也柰何對曰寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊榮血泣衛氣去故曰虛虛者聶辟聶謂聶皴辟謂辟疊也氣不足按之則氣足以温之故快然而不痛問曰陰之生實柰何對曰喜怒不節則陰氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣走之故曰實矣問曰陰之生虛柰何對曰喜則氣下悲則氣消

消則脉虛空因寒飲食寒氣充滿則血泣氣去故曰虛矣問曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰虛則內寒予已聞之矣不知其所由然也對曰陽受氣於上焦以温皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留于外故寒慄問曰陰虛生內熱柰何對曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣薰胸中故內熱問曰陽盛生外熱柰何對曰上焦不通利則皮膚緻密腠理閉塞玄府不通衛氣不得泄越故外熱問曰陰盛生內寒柰何對曰厥氣上逆寒氣積於胸中而不瀉不瀉則温氣去寒獨留則血凝泣凝則脉不通其脉盛大以瀋故中寒問曰陰與陽并血氣以并病形已成刺之柰何對曰刺之者取之經隧取血於營取氣於衛用形哉因四時多少高下問曰血氣以并病形以成陰陽相傾

補瀉奈何對曰瀉實者氣盛乃納針針與氣俱內以開其門如利其戶針與氣俱出精氣不傷邪氣乃下外門不閉以出其疾搖大其道如利其路是謂大瀉必切而出大氣乃屈問曰補虛奈何對曰持針勿置以定其意候呼內針氣出針入針空四塞精無從去方實而疾出針氣入針出熱不得還閉塞其門邪氣布散精氣乃得存動氣候時近氣不失遠氣乃來是謂追之

調經論

補瀉法

素帝曰不足者補之奈何岐伯曰必先捫而循之切而散之推而按之彈而怒之抵而下之通而取之外引其門以閉其神呼盡內針靜以久留以氣至為故如待所貴不知日暮其氣以至適而自護候吸引針氣不得出各在其處推闔其門令神氣存大氣留止故命曰補 吸則內針無令氣忤靜以久留無令邪布吸則轉針以得氣故候呼引

針針盡乃去大氣皆出故命曰瀉

離合真邪論

補法左手插穴右手置針於穴上令病人咳嗽一聲撚針入透於腠理後令病人呼氣一口隨呼針至分寸待針沉緊時轉針頭向病所以手循捫經絡覺氣至却因針頭向下覺針沉緊令病人吸氣一口急出其鍼急閉其穴虛羸氣弱痺麻者補之

瀉法先以左手插穴右手置針於穴上令病人咳嗽一聲撚針入于腠理復令病人呼氣一口隨吸氣入針至分寸覺針沉緊轉針頭向病所若覺氣退便轉針頭向下以手循取經絡覺針沉悶令病人吹氣一口徐出其針不閉其穴命之曰瀉豐肥堅硬疼痛者瀉之

右以病人氣之呼吸醫人針之出納分補瀉令病人吸氣而入針氣與針同入為補令呼氣出針針與氣同出

為瀉呼氣氣出而入針為瀉吸氣氣入而出針為補也
難何謂補瀉當補之時何所取氣當瀉之時何所置氣然
當補之時從衛取氣當瀉之時從榮置氣其陽氣不足陰
氣有餘當先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當
先補其陰而後瀉其陽榮衛通行此其要也七十
六難
針有補瀉何謂也然補瀉之法非必呼吸出內針也然知
其為針者信其左不知為針者信其右當刺之時必先以
左手厭按其所針榮腧之處彈而努之爪而下之其氣之
來如動脉之狀順針而刺之得氣因推而內之是謂補動
而伸之是謂瀉不得氣乃與男外女內不得氣是謂十死
不治也七十
八難
右以鍼之推內動伸分補瀉也從衛取氣者謂淺內針
待衛氣至漸漸推內進至深也從榮置氣者謂深內針

待榮氣至却漸動伸退至淺也蓋補者針入腠理得氣
後漸漸作三次推內進至分寸經所謂徐內疾出世所
謂一退三飛熱氣榮榮者是也瀉者直針入分寸得氣
後漸漸作三次動伸退出腠理經所謂疾內徐出世所
謂一飛三退冷氣沉沉者是也

經言能知迎隨之氣可令調之調氣之方必在陰陽何謂
也然所謂迎隨者知榮衛之流行經脉之往來也隨其逆
順而取之故曰迎隨調氣必在陰陽者知其內外表裏隨
其陰陽而調之故曰調氣之方必在陰陽七十
二難

右以迎隨分補瀉也然迎隨之法有三此法以針頭迎
隨經脉之往來一也又瀉子為迎而奪之補母為隨而
濟之二也又前法呼吸內出針亦名迎隨三也又針頭
之隨者謂榮衛之流行經脉之往來手之三陰從胸走

手手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹也迎者以針頭斜迎三陰三陽之來處針去也隨者以針頭斜隨三陰三陽之往處針去也

夫行針者當刺之時口溫針煖先以右手揣按其所鍼榮俞之氣彈而怒之抓而下之捫而循之通而取之隨病人咳嗽一聲右手持針而刺之春夏二十四息秋冬三十六息徐出徐入氣來如動脈之狀補者隨經脈推而內之左手閉針孔徐出針而疾按之瀉者迎經脈動而伸之左手閉針孔疾出針而徐按之隨而濟之是謂補迎而奪之是謂瀉

右合迎隨推內動靜二法言補瀉也

靈補須一方實深取之稀按其痛以極出其邪氣一方虛淺刺之以養其脈疾按其痛毋使邪氣得入 脈實者深

刺之以泄其氣脈虛者淺刺之使精氣無得出以養其脈

獨出其邪氣終始

右以淺深分補瀉淺為補深為瀉也

竇凡補瀉非必呼吸出內而在乎手指何謂也故動搖進退搓盤彈撚指循捫攝按抓切者是也 動者如氣不行將針伸提而已 退者為補瀉欲出針時各先退一頭許然後却留針方可出之此謂之退也 搓者凡令病人覺熱外向臥針似搓線之狀勿轉太緊治寒向裏臥依前轉法以為搓也 進者凡不得氣男外女內者及春夏秋冬各有進退之理此謂之進也 盤者為如針腹部于穴內輕盤搖而已此謂之盤也 搖者凡瀉時欲出針必須動搖而出者是也 彈者凡補時用大指甲輕彈針使氣疾行如瀉不可用也 撚者以手撚針也務要記左右左為

外右爲內也 循者凡下針於所部分經絡之處用手上
下循之使氣血往來經云推之則行引之則止 捫者凡
補者出針時用手捫閉其穴是也 攝者下針時如氣澁
滯隨經絡上用大指甲上下切其氣血自得通行也 按
者以手按針無得進退如按切之狀也 抓者凡下針用
手指作力置針有准也 切者凡欲下針必先大指甲
左右于穴切之令氣血宣散然後下針是不傷榮衛故也
問穴各有兩如補瀉只刺病所取兩穴俱刺耶曰不然隨
病左右而補瀉之左則左補右則右補 問針經云灸幾
壯針訖而後灸何也曰針則針灸則灸若針而弗灸若灸
而弗針

難言有見如入有見如出者何謂也曰謂左手見氣未至
乃內針針入見氣盡乃出針是謂有見如入有見如出也

王註謂此法取有其
經者未然見八十難

靈所謂氣至而有效者瀉則益虛虛者脉大如其故而不
堅也堅如其故者適雖言快病未去也補則益實實者脉
大如其故而益堅也大如其故而不堅者適雖言快病未
去也故補則實瀉則虛痛雖不隨針病必衰去終始

素刺虛者須其實刺實者須其虛針解云刺實須其虛者
爲針陰氣盛至針下寒
乃去針也刺虛須其實者爲針陽氣盛至針
下熱乃去針也王註云要以氣至而有效也

靈三脉動于足大指之間必審其實虛虛而瀉之是謂重
虛重虛者病益甚凡刺此者以指按之脉動而實且疾者
疾瀉之虛而徐者則補之反此者病益甚其動也陽明在

上衝陽厥陰在中太衝少陰在下太溪

難言東方實西方虛瀉南方補北方何謂也然金木水火
土當更相平東方木也西方金也木欲實金當平之火欲

實水當平之土欲實木當平之金欲實火當平之水欲實
土當平之東方者肝也則知肝實西方者肺也則知肺虛
瀉南方火補北方水南方火火者木之子也北方水水者
木之母也水勝火子能令母實母能令子虛故瀉火補水
欲令金不得平木也經曰不能治其虛何問其餘此之謂
也七十五難金不得平木不字衍文
素上實下虛切而從之索其經絡脉刺出其血以見通
靈一經上實下虛而不通者此必有橫絡盛加於大經令
之不通視而瀉之此所謂解結也 邪之所在皆為不足
故上氣不足胸為之不滿耳為之苦鳴頭為之苦傾目為
之暝中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則乃
為痿厥心倦補足外踝下留之 上氣不足推而揚之下
氣不足積而從之陰陽皆虛火自當之

甲內傷不足三陽絡主之

靈陰陽不相移虛實不相傾取之其經終始

難言虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之何謂也曰
虛者補其母實者瀉其子當先補之然後瀉之不實不虛
以經取之者是正經自生病不中他邪也當自取其經故
言以經取之也六十九難

右自篇首分陰陽臟腑虛實而施補瀉法者皆謂陰陽
相移虛實相傾而血氣所離之經為虛所并之經為實
故一實一虛而用針補虛瀉實矣若陰陽不相移虛實
不相傾則血氣未離并無虛經無實經但取本經自病
不於他經補瀉也

刺五刺靈帝曰經脉十二者別為五行分為四時何失而亂何得
而治岐伯曰五行有序四時有分相順則治相逆則亂帝

曰何謂相順對曰經脉十二者以應十二月十二月者分
為四時四時者秋冬春夏其氣各異榮衛相隨陰陽已和
清濁不相干如是則順之而治帝曰何謂逆而亂對曰清
氣在陰濁氣在陽榮氣順脉衛氣逆行清濁相干亂于胸
中是為大惋故氣亂于心則煩心密嘿俛首靜伏亂于肺
則俛仰喘喝接手以呼亂于腸胃則為霍亂亂于臂脛則
為四厥亂于頭則為厥逆頭重眩仆帝曰五亂者刺之有
道乎岐伯曰氣在于心者取之手少陰主之輸氣在于肺
者取之手太陰榮足少陰輸氣在于腸胃者取之足太陰
陽明不下者取之三里氣在于頭者取之天柱太杼不知
取足太陽榮輸氣在于臂足取之先去血脉後取其陽明
少陽之榮輸帝曰補瀉奈何對曰徐入徐出謂之導氣補
瀉無形謂之同精是非有餘不足也亂氣之相逆也五亂篇

邪刺
威

靈邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善墮節時脚腫
取之行間以引脇下補三里以溫胃中取血脉以散惡血
取耳間青脉以去其掣邪

素肝病者兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目眈眈無見
耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽氣逆則

頭痛耳聾不聰頰腫取血者脅者肝之野怒者肝之用
肝實則氣并其經故脇痛

靈邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之其
輸也

素心病者胃中痛脇支痛脇下痛膺背脊甲間痛兩臂內
痛虛則胸腹大脇下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌

下血者其變病刺郄中血者胃者心之野背脊有胃者心
之府小腸經所過心實故氣

靈邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善
經也

饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有熱有寒皆調于三里

素脾病者身重善饑肉痿足不收行善癭脚下痛虛則腹滿腸鳴食泄食不化取其經太陰陽明少陰血者

靈邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外俞背三節五藏之傍以手疾按之快然乃刺之取之缺盆中以越之

素肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀膕足皆痛虛則少氣不能報息耳聾啞乾取其經太陰足太陽之外厥陰內血者

靈邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背脛項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡取之

素腎病者腹大脛腫喘咳身重寢汗出憎風虛則胸中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽血者

靈大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒即泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉邪氣藏府病形篇腹中腸鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺盲之原巨虛上廉三里氣篇

邪刺六府

胃病者腹膜脹胃脘當心而痛上支兩脇膈噎不通飲食不下取之三里同上五邪篇飲食不下膈塞不通邪在胃脘在上腕則刺抑而下在下腕則散而去之同上四時篇

小腸病者小腸痛腰脊控舉而痛時窘之後當耳前熱若寒甚若獨肩有上熱甚及手小指次指之間熱若脉陷者此其候也手太陽病也取之巨虛下廉同上邪氣篇小腹控舉

其候也手太陽病也取之巨虛下廉同上邪氣篇小腹控舉

引腰脊上衝心邪在小腸病者小腸者連臍系屬于脊貫
肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃燠肝散于背結于臍
故取之背原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨
虛下廉以去之按其所過之經而調之同上四時篇

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不得肩
上熱若脉陷及足小指外廉及脛踝後皆熱若脉陷取委
中央同上邪氣篇

三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留即
為脹候在足太陽之外大絡大絡在太陽少陽之間亦見
于脉取委陽小腹痛腫不得小便邪在三焦約取之太陽
大絡視其脉絡與厥陰小絡結而血者腫上及胃腕取三
里同上四時篇

膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之嗌中

哧哧然數唾在足少陽之本末亦視其脉之陷下者灸之

其寒熱者取陽陵泉同上邪氣篇善嘔嘔有苦長太息心中

澹澹恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆

則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以

閉膽逆却調其虛實以去其邪同上四時篇

十二經病

靈寸口主中人迎主外兩者相應俱往俱來若引繩大小

齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大如是者名曰平人

人迎大一倍于寸口病在足少陽一倍而躁病在手少陽

人迎二倍病在足太陽二倍而躁病在手太陽人迎三倍

病在足陽明三倍而躁病在手陽明盛則為熱虛則為寒

緊則為痛痺代則乍甚乍間盛則瀉之虛則補之緊痛則

取之分肉代則取血絡且飲藥陷下則灸之不盛不虛以
經取之名曰經刺人迎四倍且大且數者名曰溢陽溢陽

爲外格死不治必審按其本末察其寒熱以驗其藏府之

病禁服人迎一盛瀉足少陽而補足厥陰二瀉一補日

一取之必切而驗之踈取之上氣和乃止人迎二盛瀉足

太陽而補足少陰二瀉一補二日一取之必切而驗之踈

取之上氣和乃止人迎三盛瀉足陽明而補足太陰二瀉

一補日二取之必切而驗之踈取之上氣和乃止終始

靈寸口大于人迎一倍病在足厥陰一倍而躁在手心主

寸口二倍病在足少陰二倍而躁在手少陰寸口三倍病

在足太陰三倍而躁在手太陰盛則脹滿寒中食不化虛

則熱中出糜少氣溺色變緊則痛痺代則乍痛乍止盛則

瀉之虛則補之緊則先刺而後灸之代則取血絡而後調

之陷下則徒灸之陷下者脉血結于中中有著血而寒故

宜灸之不盛不虛以經取之寸口四倍者名曰內關內

關者且大且數死不治必審察其本末之寒溫以驗其藏

府之病通其榮輸乃可傳于大數大數曰盛則徒瀉之虛

則徒補之緊則灸刺且飲藥陷下則徒灸之不盛不虛以

經取之所謂經治者飲藥亦曰刺灸脉急則引脉大以弱

則欲安靜用力無勞也禁服脉口一盛瀉足厥陰而補

足少陽二補一瀉日一取之必切而驗之踈而取之上氣

和而止脉口二盛瀉足少陰而補足太陽二補一瀉二日

一取之必切而驗之踈而取之上氣和乃止脉口三盛瀉

足太陰而補足陽明二補一瀉日二取之必切而驗之踈

而取之上氣和乃止所以日二取之者太陰主胃太富于

穀氣故可日二取之也終始人迎與脉口俱盛三倍以

上命曰陰陽俱溢如是者不開則血脉閉塞氣無所行流

淫于中五藏內傷如此者因而灸之則變易爲他病矣上

肺手太陰之脉是動則病肺脹滿膨膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手而督此爲臂厥是主肺所生病者欬嗽上氣喘渴煩心胃滿臍臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍于人迎虛者則寸口反小于人迎也

脾足太陰之脉是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧瘡瘕泄水閉黃疸不能臥強立股膝內腫厥足大指不用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反

小于人迎也

大腸手陽明之脉是動則病齒痛頰腫是主津液所生病者目黃口乾鼻衄喉痺肩前臍痛大指次指不用氣有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

胃足陽明之脉是動則病洒洒振寒善呻數欠顏黑病至則惡人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走黃響腹脹是爲鼯厥是主血所生病者狂瘡溫淫汗出鼻衄口喎唇脣頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣街股伏兔鼯外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘于胃則消穀善

飢溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

心手少陰之脉是動則病噎乾心痛渴而欲飲是爲臂厥是主心所生病者目黃脇痛臍臂內後廉痛厥掌中熱痛爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

腎足少陰之脉是動則病饑不欲食面如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起目眈眈如無所見心如懸若饑狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是爲骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣噎乾及痛煩心痛黃疸腸

澀脊痠股內後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之灸則強食生肉緩帶被髮大杖重履而步盛者寸口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

小腸手太陽之脉是動則病噎痛頰腫不可以顧肩似拔臍似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頰有臍肘臂外後廉痛爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

膀胱足太陽之脉是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲臃如結踠如裂是爲踝厥是主筋所生病者痔瘡狂顛疾頭顛項痛目黃淚出軌衄項背腰尻臃踠脚皆痛小指不用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱

則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

心主手厥陰心包絡之脉是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胃脘反滿心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

肝足厥陰之脉是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癩疝婦人少腹腫甚則噎乾面塵脫色是主肝所生病者胃滿嘔逆飧泄狐疝遺溺閉癆爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

三焦手少陽之脉是動則病耳聾渾渾惛惛噎腫喉痺主氣所生病者汗出目銳眦痛頰痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不爲用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

膽足少陽之脉是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛領痛目銳眦痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾癭汗出振寒瘧胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

俱見經脉篇

難言脉有是動有所生病一脉輒變爲二病者何也然經言是動者氣也所生病者血也邪在氣氣爲是動邪在血

血為所生病氣主响之血主濡之氣留而不行者為氣先
病也血滯而不濡者為血後病也故先為是動後所生也
二十
二難

右十二經為病通表裏而言若其病或見于表或為疼
痛或為癰癤者但當于其所痛之分野求其經脉屬何
經而鍼灸之也另立經脉分野圖于左

頭部

巔 足太陽厥陰督脉

頭角直耳上 中是少陽

中行 前直鼻上巔後直鬢中上巔督脉

第二行 足太陽一十五分各開兩傍為頭第三行

第三行 足少陽

面部

額 足少陽陽明

鼻 手陽明太陽足陽明督脉

人中 督脉手足陽明

唇 足陽明

唇內 足厥陽

承漿 足陽明任脉

上齒 足陽明

下齒 手陽明

舌 足太陰少陰

目內眦 手足陽明太陽

目銳眦 手太陽足少陽

眉至額 直鼻而上督脉直目內眦而下足太陽

直目瞳子而上足少陽直銳眦而上手足少陽

頰 直目內眦而下足陽明直目瞳子而下足陽明

頰車 足少陽陽明

耳 手足少陽手太陽

目系 手少陰足太陽

頸項部

項中間

拔項大筋中 足太陽

當完骨下 手少陽項大筋之前耳之後也

當耳下 足少陽

當曲頰下 手太陽

曲頰前一寸 手陽明

挾喉兩旁動脉 足太陽陽明

缺盆中 任脉

咽 手太陰少陰足太陽

喉臑 足少陰陽明

喉嚨後足厥陰

肩

前廉手陽明

後廉手太陽

上廉手陽明

背部

中行督脉

第二行足太陽

第三行足太陽

膺輸部

中行任脉

第二行足少陰

第三行足陽明

第四行足太陽

腹部

中間行任脉

第二行足少陰

第三行足陽明

第四行足太陽

腋下

中間手厥陰

前手太陽

後手太陽

脇部

腋直下脾經

臑部自肩至肘曰臑

前廉手陽明

後廉手太陽

外廉手太陽

內廉手少陰

內前廉手太陽

內後廉手少陰

臂部

上廉手陽明

下廉手太陽

外廉手少陽

內廉手厥陰

內上廉手太陽

內下廉手少陰

股脛部

前廉足陽明

後廉足太陽

外廉足少陽

內廉足厥陰

內前廉足太陽陰

十二經別經

靈手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散入于魚際其病實則手銳掌熱虛則欠故小便遺數取之去腕半寸別走陽明也

足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之所別也

手少陰之別名曰通里去腕一寸半別而上行循經入于心中繫舌本屬目系其實則支膈虛則不能言取之掌後一寸別走太陽也

足少陰之別名曰太鍾當踝後繞跟別走太陽其別者并經上走于心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癰虛則腰痛取之所別也

手心主之別名曰內關去腕二寸出于兩筋之間循經以上繫于心包絡心系實則心痛虛則為頭項強取之兩筋間也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者徑脛上擊結于莖其病氣逆則辜腫卒疝實則挺長虛則暴痒取之所別也

手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃實則節弛肘廢虛則生肱小者如指痲疥取之所別也

足太陽之別名曰飛陽去踝七寸別走少陰實則執室頭

背痛虛則斂衄取之所別也

手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循

臂乘肩髃上曲頰偏齒其別者入耳合於宗脉實則齟齬

虛則齒寒痺隔取之所別也

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛

骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉

痺痺瘖實則狂顛虛則足不收脛枯取之所別也

手少陽之別名曰外關去腕二寸外透臂注胸中合心主

病實則肘攣虛則不收取之所別也

足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實

則厥虛則痿躄坐不能起取之所別也

任脉之別名曰尾翳下鳩尾散于腹實則腹皮痛虛則痒

搔取之所別也

督脉之別名曰長強挾脊下項散頭上下當肩脾左右別

走太陽入貫膂實則項強虛則頭重取之所別也

脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布胸脇實則身盡痛

虛則百節盡痠此脉若羅絡之血者皆取之脾之大經

絡也 凡此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求

之上下人經不同絡脉異所別也

俱出經脉篇

繆刺法

素黃帝曰余聞繆刺未得其意敢問何也岐伯對曰夫邪

之客於形也必先舍於皮毛留而不去入舍於孫脉留而

不去入舍於絡脉留而不去入舍於經脉內連五藏散於

腸胃陰陽俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入極於五藏

之次也如此則治其經焉今邪客於皮毛入舍於孫絡留

而不去閉塞不通不得入于經流溢大絡而生奇病也夫

邪客大絡者左注右右注左上下左右與經相干而布於

四末其氣無常處不入於經俞命曰繆刺帝曰願聞繆刺
以左取右以右取左柰何其與巨刺何以別之岐伯曰邪
客於經左盛則右病右盛則左病亦有移易者左痛未已
而右脉先病如此者必巨刺之必中其經非絡脉也故絡
病者其痛與經脉繆處故命曰繆刺

調經篇云身形有痛九候莫病則繆刺之痛在干左而
右脉病者巨刺之盖身形有痛邪在絡脉故繆刺絡脉
于井穴也病在於左而右脉病則知邪偏入半邊經脉
而半邊經脉偏盛并引其無病者半邊亦痛故宜刺經
脉於左邊偏盛者之榮俞也

帝曰願聞繆刺柰何取之何如岐伯曰邪客於足少陰之
絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿無積者刺然骨之前出血
如食頃而已不已左取右右取左病新發者取五日已

邪客於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛
手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一疔壯
者立已老者有頃已左取右右取左比新病數日已 邪
客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉
交者各一疔男子立已女子立頃已左取右右取左 邪
客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足大指爪甲上與肉
交者一疔立已不已刺外踝下三疔左取右右取左如食
頃已 邪客于手陽明之絡令人氣滿胃中喘息而支肘
胸中熱刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一疔左取
右右取左如食頃已 邪客於掌臂之間不可得屈刺其
踝後先以指按之痛乃刺之以月死生為數月生一日一
疔二日二疔十五日十五疔十六日十四疔 邪客於足
陽蹻之脉令人目痛從內眥始刺外踝之下半寸所各二

疔左取右右取左如行十里頃而已 人有所墮墜惡血
留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脉下
傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脉出血刺足跗
上動脉不已刺三毛上各一疔見血立已左刺石右刺左
邪客于手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺手大指次
指爪甲上去端如韭葉各一疔立聞不已刺中指爪甲上
與肉交者立聞其不時聞者不可刺也耳中生風者亦刺
之如此數左刺右右刺左凡痺往來行無常處者在分肉
間痛而刺之以月死生為數用針者隨氣盛衰以為疔數
針過其日數則脫氣不及日數則氣不瀉左刺右右刺左
病已止不已復刺之如法月生一日一疔二日二疔漸多
之十五日十五疔十六日十四疔漸少之 邪客於足陽
明之絡令人鼻衄上齒寒刺足中指次指爪甲上與肉交

者各一疔左刺右右刺左 邪客於足少陽之絡令人脇
痛不得息欬而汗出不足小指次指爪甲上與肉交者各
一疔不得息立已汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺
右右刺左病立已不已復刺如法 邪客於足少陰之絡
令人嗌痛不可內食無故善怒氣上走貫上刺足下中央
之脉各三疔凡六刺立已左刺右右刺左嗌中腫不能內
唾時不能出唾者刺然骨之前出血立已左刺右右刺左
邪客於足太陰之絡令人腰痛引少腹控眇不可以仰
息刺腰尻之解兩胛之上是腰俞以月死生為疔數發針
立已左刺右右刺左 邪客於足太陽之絡令人拘攣背
急引脇而痛刺之從項始數脊椎挾脊疾按之應手如痛
傍刺之三疔立已 邪客於足少陽之絡令人留于樞中
痛髀不可舉刺樞中以毫針寒則久留針以月死生為數

立已治諸經刺之所過者不病則繆刺之 耳聾刺手陽
明不已刺其通脉出耳前者 齒齲刺手陽明不已刺其
脉入齒中者立已 邪客于五藏之間其病也脉引而痛
時來時止視其病繆刺之于手足爪甲上視其脉出其血
間日一刺一刺不已五刺已繆傳引上齒齒唇寒痛視其
手背脉血者出之足陽明中指爪甲上一痛手大指次指
爪甲上各一痛立已左取右右取左 邪客于手足少陰
太陽足陽明之絡此五絡皆會于耳中上絡左角五絡俱
竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥刺其
足大指內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺足中指
爪甲上各一痛後刺手大指內側去端如韭葉後刺手心
主少陰銳骨之端各一痛立已不已以竹管吹其兩耳鬚
其左角之髮方一寸燔治飲以美酒不能飲者灌之立已

凡刺之數先視其經脉切而從之審其虛實而調之不調
者經刺之有痛而經不病者繆刺之因視其皮部有血絡
者盡取之此繆刺之數也俱出繆刺論

靈黃帝曰願聞奇邪而不在經者岐伯曰血絡是也帝曰
刺血絡而仆者何也血出而射者何也血少黑而濁者何
也血出清而半爲汁者何也發針而腫者何也血出若多
若少而面色蒼蒼者何也發針而面色不變而煩惋者何
也多出血而不動搖者何也願聞其故岐伯曰脉氣盛而
血虛者刺之則脫氣脫氣則仆血氣俱盛而陰氣多者其
血滑刺之則射陽氣畜積久留而不瀉者其血黑以濁故
不能射新飲而液滲于絡而未和于血也故血出而汁別
焉其不新飲者身中有水久則爲腫陰氣積于陽其氣因
于絡故刺之血未出而氣先行故腫陰陽之氣其新相得

而未和合因而瀉之則陰陽俱脫表裏相離故脫色而蒼蒼然刺之血出多色不變而煩惋者刺絡而虛經經虛之屬于陰者陰脫故煩悶陰陽相得而合為痺者此為內溢於經外注於絡如是者陰陽俱有餘雖多出血而弗能虛也帝曰相之奈何岐伯曰血脈者盛堅橫以赤上下無常處小者如針大者如筋則其瀉之萬全也故無失數矣失數而反各如其度黃帝曰針入而肉著者何也岐伯曰熱氣因于針則針熱熱則肉著于針故堅焉血絡論○經脈者必取其結上甚血者雖無結急取之以寫其邪留之發為痺也又云其小而短者少氣甚者瀉之則悶悶甚則什不得言悶則急坐之也

右刺藏府經絡四病各不同十五絡病至淺在表也十二經病次之六腑病又次之五臟病至深在裏也故治法有難易焉至於絡又各不同十五絡之絡乃陰經別

走陽經陽經別走陰經而橫貫兩經之間所謂橫者為絡與經相隨上下者也繆刺之絡乃病邪流溢大絡不得入貫經俞而其痛與經脈繆也乃絡病經不病者也血絡之絡及皮膚所見或赤或青或黑之絡而小者如針大者如筋也以淺深言之血絡至淺繆刺者次之十五絡近裏而貫經俞也

四海
胃者水穀之海其輸上在氣衝下在三里水穀之海有餘則腹滿不足則饑不受穀食

衝脈者為十二經之海其輸上在于大杼下出于巨虛之上下廉血海有餘則常想其身大怫然不知其所病血海不足亦常想其身小狹然不知其所病

膻中者氣之海其輸上在于柱骨之上下前在于人迎氣海有餘者氣滿胃中惋息面赤氣海不足則氣少不足以

言

腦爲髓之海其輸上在千其蓋下在風府髓海有餘則輕
勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無
所見懈怠安臥審守其輸而調虛實

刺寒熱

入治寒熱法

醫學綱目卷之

醫學綱目卷之八

陰陽臟腑部

五臟俞
各五

穴法上

肺

靈肺出于少商少商者手大指端內側也為井木

銅人云少商二穴木也在大指端內側去爪甲角韭葉許手太陰脈之所出也為井以三稜針刺之出血以瀉諸藏之熱不宜灸甲乙經云針入二分留一呼灸一壯

溜于魚際魚際者手魚也為榮

銅人云魚際二穴火也在大指本節後內側散脈中手太陰脈之所行也為榮針入二分留三呼可灸二壯

注于大淵大淵魚後一寸陷者中也為腧

銅人云大淵二穴土也在手掌後陷中手太陰脈之所注也為輸針入二分可灸三壯

行于經渠經渠寸口中也動而不居為經

銅人云經渠二穴金也在寸口陷中手太陰脈之所行也為經針入二分留三呼禁灸灸即傷人神

入于尺澤尺澤肘中之動脈也為合手太陰經也

銅人云尺澤一穴水也在肘中約紋上動脈中手太陰脈之所入為合針入二分可灸五壯

心

心出于中衝中衝手中指之端也為井木

銅人云中衝二穴木也在手中指端去瓜甲如韭葉陷中手厥陰心主脈之所出也為井針入一分留三呼可壯

溜于勞宮勞宮掌中中指本節之內間也為榮

銅人云勞宮一穴火也在掌中央動脈中心原虛處屈中指無名指取之手厥陰脈之所溜也為榮針入三分留六呼可壯

注于大陵大陵掌後兩骨之間方下者也為膈

銅人云大陵二穴土也在掌後兩筋間陷中手厥陰脈之所注也為膈針入六分可灸三壯

行于間使間使之道兩筋之間三寸之中也有過則至無

過則止為經

銅人云間使二穴金也在掌後三寸兩筋間陷中手厥陰心包絡脈之所行也為經針入三分可灸五壯其穴有大絡為限故入絡過膈掌後正勞宮後三寸寸止處是穴故經曰有過則至無過則止也

入于曲澤曲澤肘內廉下陷者之中也屈而得之為合手

少陰也

銅人云曲澤二穴木也在肘內廉下陷中屈肘得之心包絡脈之所入也為合針入三分留七呼可灸三壯○手少陰少字當作厥

肝

肝出于大敦大敦者足大指之端及三毛之中也為井木

銅人云大敦二穴木也在足大指端去瓜甲如韭葉及三毛中足厥陰脈之所出也為井針入三分留六呼可壯

溜于行間行間足大指間也為榮

銅人云行間二穴火也在足大指間動脈應手陷中足厥陰脈之所溜也為榮針入六分留十呼灸三壯

注于太衝太衝行間上二寸陷者之中也為膈

銅人云太衝二穴土也在足大指本節後二寸或云一寸五分陷中足厥陰脈之所經也為膈針入三分留十呼可壯

行于中封中封內踝之前一寸半陷者之中使逆則宛使和則通搖足而得之為經

銅人云中封二穴金也在足內踝前一寸仰足而取之
陷中伸足乃得之足厥陰脉之所行也為經刺入四分
留七呼可灸三壯其穴使足逆仰則穴有宛陷可定針
使手足和其穴有巷道可通故曰使逆則宛和則通也
入于曲泉曲泉輔骨之下大筋之上也屈膝而得之為合
足厥陰也

銅人云曲泉二穴水也在膝內輔骨下太筋上小筋下
陷中屈膝得之足厥陰脉之所入也為合刺入六分留
十呼可
灸三壯

脾

脾出于隱白隱白者足大指之端內側也為井水

銅人云隱白二穴木也在足大指端內側去爪甲如韭
葉足太陰脉之所出也為井針入一分留三呼可灸三
壯

溜于大都大都本節之後下陷者之中也為榮

銅人云大都二穴火也在足大指本節後陷中足太陰
脉之所溜也為榮刺入二分留七呼可灸三壯○按本
節前後後字當
作前更詳

注于太白太白腕骨之下也為膈

行于商丘商丘內踝之下陷者之中也為經

銅人云商丘二穴金也在足內踝骨下微前陷中足
太陰脉之所行也為經刺入三分留七呼可灸三壯

入于陰之陵泉陰之陵泉輔骨之下陷者之中也伸而得
之為合是太陰也

銅人云陰陵泉二穴水也在膝下內側輔骨下陷中伸
足乃得之是太陰脉之所入也為合刺入五分留七呼
可灸
三壯

腎

腎出于湧泉湧泉者足心也為井水

銅人云湧泉二穴一名地衝在足心陷中屈足捲指宛
宛中跪取之少陰脉之所出也為井刺入三分留七呼
可灸
三壯

溜于然谷然谷者然骨之下者也為榮

銅人云然谷二穴火也一名龍淵足內踝前起大骨下
陷中足少陰脉之所溜也為榮刺入三分留三呼灸三
壯刺之多見血
使人立饑欲食

注于太溪太溪內踝之後跟骨之上陷中者也為膺

銅人云太溪二穴土也在跌上踝後跟骨上動脈陷中足少陰腎脈之所注也為膺刺入三分留七呼灸三壯凡人病有此脈則生無則死

行于復溜復溜上內踝二寸動而不休為經

銅人云復溜二穴金也一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸筋骨陷中足少陰脈之所行也為經刺入三分留三呼可灸五壯

入于陰谷陰谷輔骨之後大筋之下小筋之上也按之應手屈膝而得之為合足少陰經也

銅人云陰谷二穴水也在膝下內輔骨之後大筋下小筋上足少陰脈之所入也為合刺入三分可灸三壯

膀胱出于至陰至陰者足小指之端也為井金

銅人云至陰二穴金也在足小指外側去瓜甲如韭葉足太陰脈之所出也為井刺入一分留五呼可灸三壯

溜于通谷通谷本節之前外側也為榮

銅人云通谷二穴水也在足小指外側本節前陷中足太陽脈之所溜也為榮刺入二分留五呼可灸三壯

注于束骨束骨本節之後陷者中也為膺

銅人云束骨二穴木也在足小指外側本節後陷中足太陽脈之所注也為膺刺入三分留五呼可灸三壯

過于京骨京骨足外側大骨之下為原

銅人云京骨二穴在足外側大骨下赤白肉際陷中按而得之足太陽脈之所過也為原刺入三分留七呼可灸七壯

行于崑崙崑崙在外踝之後跟骨之上為經

銅人云崑崙二穴火也在足外踝後跟骨上陷中足太陽脈之所行也為經刺入五分留十呼可灸五壯

入于委中委中在膕中央為合委而取之足太陽也

銅人云委中二穴上也在膕中央約文中動脈陷中足太陽脈之所入也為合刺入五分留七呼可灸三壯

膽出于竅陰竅陰者足小指次指之中也為井金

銅人云竅陰二穴金也在足小指次指之端去瓜甲角如韭葉足少陽脈之所出也為井刺入一分留三呼可灸三壯

溜于挾溪挾溪足小指次指之間也為榮

六
命命各

銅人云扶溪二穴水也在足小指次指二岐骨間本節前陷中是少陽脉之所瀦也為榮刺入二分留三呼可壯

注于臨泣臨泣上行一寸半陷者中也為膺

銅人云臨泣二穴木也在足小指次指本節後間陷中去挾溪一寸五分是少陽脉之所注也為膺刺入二分留三呼可壯

過于丘墟丘墟外踝之前下陷者中也為原

銅人云丘墟二穴在足外踝下如前陷中去臨泣三寸是少陽脉之所過也為原刺入五分留七呼可灸三壯

行于陽輔陽輔外踝之上輔骨之前及絕骨之端也為經

銅人云陽輔二穴火也在足之外踝上四寸輔骨前絕骨端三分去丘墟七寸是少陽脉之所行也為經刺入五分留七呼可灸三壯

入于陽之陵泉陽之陵泉在膝外陷者中也為合伸而得之足少陰也

銅人云陽陵泉二穴土也在膝下一寸筋外廉陷中是少陽脉之所入也為合刺入六分留十呼可灸七壯至

四十壯

胃出于厲兌厲兌者足大指次指之端也為井金

銅人云厲兌二穴金也在足大指次指之端去爪甲角如薤葉足陽明胃脉之所出也為井刺入一分留一呼可灸一壯

溜于內庭內庭次指外間也為榮

銅人云內庭二穴水也在足大指次指外間陷中是陽明胃脉之所瀦也為榮刺入三分留十呼可灸二壯

注于陷谷陷谷者上中指內間上行二寸陷者中也為膺

銅人云陷谷二穴木也在足大指次指本節後陷中去內庭二寸是陽明胃脉之所注也為膺刺入五分留七呼可灸三壯

過于衝陽衝陽足跗上五寸陷者中也為原搖足而得之

銅人云衝陽二穴一名會原在足跗上五寸去陷谷各三寸骨間動脉是陽明脉之所過也為原刺入三分留十呼可灸三壯

行于解谿解谿上衝陽一寸半陷者中也為經

銅人云解谿二穴土也在膝下衝陽後一寸五分腕上陷中足陽明脉之所行也為經刺入五分留五呼可灸

入于下陵下陵膝下三寸髌骨外廉三里也為合復下三里三寸為巨虛上廉復下上廉三寸為巨虛下廉也大腸屬上小腸屬下足陽明胃脉也

銅人云三里二穴土也在膝下三寸髌外廉足陽明脉之所入也為合刺入一分留七呼可灸三壯素問在膝下三寸髌中廉兩間肉分間甲乙云巨虛上廉足陽明與大腸合在三里下三寸刺入三分灸三壯巨虛下廉足陽明與小腸合在上廉下三寸刺入三分可灸三壯按足陽明胃也大腸小腸皆屬于胃是足陽明也

三焦者上合手少陽出于關衝關衝者小指次指之端也為井金

銅人云關衝二穴金也在手小指次指之端去爪甲角如莖葉手少陽脉之所出也為井刺入一分留三呼可灸

溜于液門液門小指次指之間也為榮

銅人云液門二穴水也在手小指次指陷中握拳取之手少陽脉之所溜也為榮刺入三分留三呼可灸三壯

注于中渚中渚本節之後陷者中也為腧

銅人云中渚二穴木也在手小指次指本節後間陷中掖門下一寸手少陽脉之所注也為俞刺入二分留三呼可灸

過于陽池陽池在腕上陷者之中也為原

銅人云陽池二穴一名別陽在手表腕上陷中手少陽脉之所過也為原刺入二分留三呼可灸

行于支溝支溝上腕三寸兩骨之間陷者中也為經

銅人云支溝二穴火也在腕後三寸兩骨之間陷中手少陽脉之所行也為經刺入二分留七呼可灸二七壯

入于天井天井在肘外大骨之陷者中也為合屈肘乃得

銅人云天井二穴土也在肘外大骨後肘上一寸兩筋間陷中屈肘取之手少陽脉之所入也為合刺入一寸留七呼可灸三壯

三焦下膈在于足大指之前少陽之後出于膈中外廉名曰委陽足太陽絡也手少陽經也

銅人云委陽在足太陽之前少陽之後出于膈中外廉兩筋間承扶下六寸此足太陽之別絡刺入七分留五呼灸三壯屈身而得之詳銅人云委陽在承扶下六寸以今經文考之當云一尺六寸謹按經文論委陽在足太陽之前少陽之後出于膈中外廉又按經文取合穴法取委陽者屈伸而索之取陽陵泉者正監膝與之齊下至委陽之前取之是知委者曲也委中即兩膈之中央委陽即曲掖之陽分約文之盡處兩筋間是推其分野正當太陽少陽之間內外廉之界故曰太陽之前少陽之後膈中外廉也其穴正在約文盡處兩筋之間屈伸而得之故取法曰屈伸索之也只正膝與之齊陽陵泉正對其穴故曰取陽陵泉者下至委陽之前取之也又考諸尺寸則承扶下至其穴正得一尺六寸故愚斷然謂甲乙脫去一尺二字無疑也

三焦者足少陽太陽之所將太陽之別也上踝五寸別入貫膈腸出于委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉瘡虛則遺溺遺溺則補之閉瘡則瀉之

小腸

手太陽小腸上合于手太陽出于少澤少澤小指之端也

為井金

銅人云少澤二穴金也在手小指之端外側去爪甲一分陷中手太陽脉之所出也為井刺入一分留二呼可壯

溜于前谷前谷在手外廉本節前陷者中也為榮

銅人云前谷二穴水也在手小指外側本節前陷中手太陽脉之所溜也為榮刺入一分留三呼可灸一壯

注于後谿後谿者在手外側本節之後也為腧

銅人云後谿二穴木也在手小指外側本節後陷中手太陽脉之所注也為腧刺入二分留三呼可灸三壯

過于腕骨腕骨在手外側腕骨之前為原

銅人云腕骨二穴在手外側腕骨前起骨下陷中手太陽脉之所過也為原刺入一分留三呼可灸三壯

行于陽谷陽谷在銳骨之下陷者中也為經

銅人云陽谷二穴火也在手外側腕中銳骨下陷中手太陽脉之所行也為經刺入二分留二呼可灸二壯

入于小海小海在肘內大骨之外去端半寸陷者中也伸臂而得之為合手太陽經也

銅人云小海二穴土也在肘內大骨外肘端五分陷中
屈手向頭取之手太陽脉之所入也為合刺入二分留
七呼可
灸三壯

大腸上合手陽明出于商陽商陽大指次指之端也為井
金

銅人云商陽二穴金也一名絕陽在手大指次指內側
去爪甲如莖葉手陽明脉之所出也為井刺入一分留
一呼可
灸三壯

溜于本節之前二間為榮

銅人云二間二穴水也在手大指次指本節前內側陷
中手陽明脉之所溜也為榮針入三分留九呼可灸三
壯

注于本節之後三間為腧

銅人云三間二穴火也在手大指次指本節後內側陷
中手陽明脉之所注也為腧針入三分留三呼可灸三
壯

過于合谷合谷在大指岐骨之間為原

銅人云合谷二穴在手大指次指岐骨間手陽明
脉之所過也為原刺入三分留六呼可灸三壯

行于陽谿陽谿在兩筋間陷者中也為經

銅人云陽谿二穴火也一名中魁在腕中上側兩筋間
陷中手陽明脉之所行也為經刺入三分留七呼可灸
三壯

入于曲池在肘外輔骨陷者中也屈臂而得之為合手陽
明也

銅人云曲池二穴土也在肘外輔骨屈肘曲骨之中手
陽明脉之所入也為合刺入五分留七呼可灸三壯

是謂五臟六腑之腧五五二十五腧六六三十六腧也六
腑皆出足之三陽上合于手者也已上並出
本輸篇

右五臟腧二十五穴六腑腧三十六穴并巨虛上下廉

共六十四腧實切要之穴也凡五臟六腑有病皆此六

十四穴主之其太淵太陵太衝太白太溪為五臟之原

其三里巨虛上下廉委中委陽陽陵泉為六腑之合又

切要中之切要而醫所最當先者也六腑之合謂胃合于三里大腸合于巨虛上廉小腸合于巨虛下廉此三腑皆出足之陽明也三焦合于委陽膀胱合于委中此二腑皆出足之太陽也膽合于陽陵泉此一腑出足之少陽也六腑有疾皆取此六腧故後於其尾結之曰六腑皆出足之三陽而表章之也今效竇漢卿傍通十二經孔穴圖而復折衷之於經開如左方

十二經
孔穴圖

肺	井木少商	中衝	大敦	隱白	湧泉
心	榮火魚際	勞宮	行間	大都	然谷
肝	俞土太淵	太陵	太衝	太白	太溪
脾	經金經渠	間使	中封	商丘	復溜
腎	合水尺澤	曲澤	曲泉	陰陵泉	陰谷

天腸	小腸	膽	胃	膀胱	三焦
井金商陽	少澤	竅陰	厲兌	至陰	關衝
榮水二間	前谷	挾谿	內庭	通谷	液門
腧木三間	後溪	臨泣	陷谷	束骨	中渚
原合谷	腕骨	丘墟	衝陽	京骨	陽池
經火陽溪	陽谷	陽輔	解溪	崑崙	支溝
合土	虛上廉	虛下廉	陽陵泉	三里	委中

素黃帝曰願聞五臟六腑所出之處岐伯曰五臟五腧五五二十五腧六腑六腧六六三十六腧經脈十二絡脈十五凡二十七氣以上下所出為井所溜為榮所注為腧所行為經所入為合二十七氣所行皆在五腧也節之交三百六十五會知其要者一言而終不知其要流散無窮所言節者神氣之所遊行出入也非筋肉皮骨也九針十

難十變又言陰井木陽井金陰榮火陽榮水陰膺土陽膺
 木陰經金陽經火陰合水陽合土陰陽皆不同其意何也
 然是剛柔之事也陰井乙木陽井庚金陽井庚庚者乙之
 剛也陰井乙乙者庚之柔也乙為木故言陰井木也庚為
 金故言陽井金也 經言所出為井所入為合其法奈何
 然所出為井井者東方春也萬物始生故言所出為井也
 所入為合合者北方冬也陽氣入藏故言所入為合也
 十變言五臟六腑榮合皆以井為始者何也蓋井者東方
 春也萬物始生諸跂行喘息蠕飛蠕動當生之物莫不以
 春而生故歲數始於春月數始於甲故以井為始也 諸
 井者肌肉淺薄氣少不足使也刺之奈何然諸井者木也
 榮者火也火者木之子當刺井者以榮瀉之故經言補者
 不可以為瀉瀉者不可以為補此之謂也

右緊論

難經言春刺井夏刺榮季夏刺膺秋刺經冬刺合者何也
 蓋春刺井者邪在肝夏刺榮者邪在心季夏刺膺者邪在
 脾秋刺經者邪在肺冬刺合者邪在腎其肝心脾肺腎而
 繫于春夏秋冬者何也然五臟一病輒有五也假令肝病
 色青者肝也臊臭者肝也喜酸者肝也喜呼者肝也喜泣
 者肝也其病衆多不可盡言四時有數而並繫于春秋冬
 夏者也針之要妙在於秋毫者是也

海藏天元圖 七十四難曰從其首繫其數

肝

青

臊

酸

呼

泣

心

赤

焦

苦

言

汗

脾

黃

香

甘

歌

涎

肺

白

腥

辛

哭

涕

腎

黑陰谷

腐復溜

臑太溪

呻然谷

液湧泉

夫天元法者謂之五化疊元當從其首繫其數首者寅方春也在人為肝是從東方順天輪數至所主之處計從幾數却於所受病一方倒疊回去數至依前數盡處便於受病一方穴內瀉所主之方來路穴也不得於所主之方內經中瀉之勿誤 假如病者聞香臭二者心主五臭也入脾為香臭從東數至所主之處所主五臭者心也東一南二計得二數却當於受病之方倒疊回去脾一心二元數二也是數至心心者榮火也當於受病之方內瀉榮火是從脾經瀉大都是也或曰何以倒疊數對曰此從地出為天輪所載右遷於天不當於所顯之處治之此舟行岸移之意也

右天元圖乃海藏發明扁鵲七十四難之義但心膈五

穴不合經旨按內經言心臟堅固邪弗能容故手少陰獨無腧其外經病而臟不病者獨取其經於掌後銳骨之端其餘脉出入屈折其行之徐疾皆如手少陰心主之脉行也故諸邪之在心者皆在心之包絡也今圖中列心五邪曰赤焦苦言汗者皆當在心包絡所受而不列心包絡中衝勞宮太陵間使曲澤五穴反列手少陰少府少衝少海神門靈道五穴為未得也

難五臟六腑各有井榮俞經合皆何所主然經言所出為井所溜為榮所注為腧所行為經所入為合井主心下滿榮主身熱腧主體重節痛經主喘咳寒熱合主氣逆而泄此五臟六腑其井榮俞經合所主病也

地元圖

六十八難曰元証合復生五象

井

心下

膽

身熱

節痛

逆氣

泄

喘咳寒熱

體重

榮身熱元證心下滿體重小腸寒熱心下滿逆氣逆氣

俞體重元證心下滿寒熱心下滿逆氣逆氣

經喘欬元證心下滿體重心下滿逆氣逆氣

合逆氣元證心下滿體重心下滿寒熱心下滿元證心下滿

假令膽病善潔面青善怒元証得弦脉又病心下滿當刺

如見善潔面青善怒脉又弦又病身熱當刺又病體重節

痛當刺如見善潔面青善怒脉又弦又病喘咳寒熱當刺

又病逆氣而泄宜刺膽餘經例做此假令肝經洩淋便難

轉筋春刺井夏刺榮季夏刺膈秋刺經冬刺合此是斷五

邪之原

陰陽例即人元圖

陰陽者子午也謂榮合水火之稱名曰陰陽也十二經皆

有之或感得父氣或感得母氣而病焉子午者乾坤乾坤

包六子六子附乾坤也故七十難云春夏各致一陰秋冬

各致一陽春夏刺井榮秋冬刺經合是各致一陰一陽之

義亦謂井經近乎子午然當微瀉其井大瀉其榮微補其

經大補其合或補或瀉反作是寒則留之熱則疾之故微

大補瀉以應之春食涼夏食寒秋食温冬食熱 假令膽

病善潔面青善怒脉得浮之實大沉之損小是感得父氣

為陽中之陰當於本經中瀉火補水却得浮之損小沉之

實大是感得母氣為陰中之陽當于本經中瀉水補火

配合例

難曰上工治未病者見肝之病則知肝當傳於脾故先實

其脾氣無令受肝之邪氣也假令見肝病欲入其脾者先

於足太陰經中補土字一針又補火字一針後於足厥陰

肝經內瀉木字一針又瀉火字一針

子母例

假令見肝病滿閉淋洩便難轉筋又見心病煩心心痛掌中熱而噦當於足厥陰肝經內木火二字各瀉一針

兄妹例

假令見足厥陰肝經太過又兼見膽之証太過是為兄妹當瀉肝經內木火二字各一針又瀉膽經內水火二字各一針此五法乃人元法也已上子母兄妹名曰四針象俱屬人元圖

靈五臟有六腑六腑有十二原十二原出于四關主治五臟五臟有疾當取之十二原十二原者五臟之所以稟三百六十五節氣味也五臟有疾應出十二原而原各有所出明知其原覩其應而知五臟之害矣

陽中之少陰肺也其原出于太淵太淵二陽中之太陽心也其原出于太陵太陵二

陰中之少陽肝也其原出于太衝太衝二

陰中之至陰脾也其原出于太白太白二

陰中之大陰腎也其原出于太溪太溪二

膏之原出于鳩尾鳩尾一

肓之原出于氣海氣海一凡此十二原者主治五臟六腑

之有疾者也九針十

難言肺之原出于太淵心之原出于太陵肝之原出于太

衝脾之原出于太白腎之原出于太溪少陰之原出于厲

兌膽之原出于丘墟骨之原出于衝陽三焦之原出于陽

池膀胱之原出于京骨大腸之原出于合谷小腸之原出

于腕骨十二經皆以俞為原者何也然五臟俞者三焦之

所行氣之所留止也三焦所行之原為俞者何也然臍下

腎間動氣者人之生命也十二經之根本也故名曰原三

焦者原氣之別使也主通行三氣經歷于五臟六腑原者
三焦之尊號也故所止輒為原五臟六腑之有病者皆取
其原也

海藏拔源例

假令針肝經病了又於本經原穴亦下一針如補肝經亦
於肝經原穴上補一針如瀉肝經來亦於肝經原穴上瀉
一針如餘經有補瀉針畢做此例亦補瀉各經原穴

靈黃帝曰余聞五臟六腑之氣榮輸所入為合令何道從
入入安連過願聞其故岐伯荅曰此陽脉之別入於內屬
于腑者也黃帝曰榮輸與合各有名乎岐伯曰榮輸治外
經合治內府黃帝曰治內府奈何岐伯曰取之于合黃帝
曰合各有名乎岐伯荅曰胃合于三里大腸合入于巨虛
上廉小腸合入于巨虛下廉三焦合入于委陽膀胱合入

于委中央膽合入于陽陵泉黃帝曰取之奈何岐伯荅曰
取之三里者低跗取之巨虛者舉足取之委陽者屈伸而
索之委中者屈而取之陽陵泉者正豎膝予之齊下至委
陽之陽取之取諸外經者揄申而從之黃帝曰願聞六腑
之病岐伯荅曰面熱者足陽明云云即前所謂內腑之病
而用合穴治之也

內腑病見針
灸六腑條

穴法下

頭部 銅人神庭一穴在鼻直上入髮際五分足太陽腎脉之會
禁不可針針即發狂宜灸七壯至三七壯

上星一穴在額顛上鼻直中入髮際一寸陷中容豆是穴
督脉氣所發刺入二分留十呼灸三壯至五壯止不宜多
灸

顛會一穴在上星上一寸陷者中是穴督脉氣所發刺入

三分灸二七壯七七壯止針入二分留三呼得氣卽瀉
前頂一穴在顙會上一寸五分骨陷中是穴督脉氣所發
刺入一分可灸三壯至七七壯針入三分留七呼瀉五吸
百會一穴一名三陽五會在前頂後一寸五分所中央旋
毛中可容豆是手足三陽督脉之會刺入二分灸七壯
後頂一穴在百會後一寸五分枕骨上督脉氣所發可灸
五壯針入四分
強間一穴在後頂後一寸五分督脉氣所發可灸五壯針
入三分
腦戶一穴在枕骨上強間後一寸五分足太陽督脉之會
禁不可針灸七壯
風府一穴在項後髮際上一寸大筋内宛宛中人疾言其
肉立起言休立下足太陽督脉陽維之會禁不可灸灸之

令人瘖針入三分

瘖門一穴在項後入髮際五分宛宛中督脉陽維之會入
繫舌本仰頭取之不可灸針入八分

右正頭部中行前髮際至後髮際十穴通長一尺一寸
取頭部同身寸法見後雜法條

曲差二穴在神庭傍一寸五分入髮際足太陽脉氣所發
針入二分灸三壯

五處二穴在上星傍一寸五分足太陽脉氣所發針入三
分留七呼灸三壯

承光二穴在五處後二寸足太陽脉氣所發針入三分不
可灸

通天二穴在承光後一寸五分足太陽脉也針入三分留
七呼灸三壯

絡却二穴在通天後一寸五分足太陽脉氣所發針入三分灸三壯

玉枕二穴在絡却後七分半夾腦戶傍一寸三分起肉枕骨上入髮際三寸足太陽脉氣所發可灸三壯針入三分天柱二穴在夾項後髮際大筋外廉陷中足太陽脉氣所發針入二分得氣卽瀉

右正頭部第二行一十四穴

臨泣二穴在目上眥入髮際五分陷中足太陽少陽陽維之會針入三分留七呼

目窻二穴在臨泣後一寸足少陽陽維之會針入三分灸五壯

正營二穴在目窻後一寸足少陽陽維之會針入三分灸五壯

承靈二穴在正營後一寸五分足少陽陽維之會可灸三壯

腦空二穴在承靈後一寸五分夾玉枕傍枕骨下陷中足少陽陽維之會針入五分灸三壯

風池二穴在腦空後髮際陷中足少陽陽維之會針入七分留七呼可灸七壯

右正頭部第三行十二穴

頷厭二穴在曲周下腦空上廉手足少陽陽明之交會針入七分留七呼可灸三壯

懸顛二穴在曲周上腦空中足少陽脉氣所發針入三分留七呼可灸三壯

懸釐二穴在曲周上腦空下廉手足少陽陽明之交會針入三分可灸三壯

曲鬢二穴在耳上髮際曲隅陷中鼓頤有空處足太陽少陽之會針入三分灸七壯

右側頭部在耳前者八穴頤厭在腦空上廉懸顛在腦空中廉懸釐在腦空下廉皆直頭角上至耳前定其三穴曲鬢又在懸釐之後

率谷二穴在耳上入髮際一寸五分足太陽少陽之會可灸三壯針入三分

天衝二穴在耳上如前三分氣府註云足太陽少陽之會可灸七壯針入三分

角孫二穴在耳郭中間上開口有空可灸三壯針入三分
右側頭部在耳上者六穴率谷最上天衝次之角孫最下

竅陰二穴在完骨上枕骨下搖動有空是太陽少陽之會

針入三分可灸七壯

浮白二穴在耳後入髮際一寸足太陽少陽之會針入五分可灸三壯

完骨二穴在耳後入髮際四分足太陽少陽之會針入五分可灸七壯

顛息二穴在耳後青絡脉中足少陽脉氣所發不宜針可灸七壯

癩脉二穴在耳本後鷄足青絡脉刺出血如豆汁可灸三壯針入一分

翳風二穴在耳後尖角陷中按之引耳中痛手足少陽之會針入七分灸七壯

右側頭部在耳後者十二穴翳風帖耳癩脉次之顛息又次之完骨又次之浮白最後竅陰又居浮白之上也

鼻素窅一穴在鼻柱上端準頭督脉氣所發宜禁針灸

水溝一穴在鼻柱下人中近鼻孔陷中手足陽明之會針入四分留五呼灸三壯至七壯

兌端一穴在唇上端手陽明脉氣所發針入三分留六呼灸三壯

斷交一穴在唇內齒上斷縫中任督足陽明之會針入三分灸三壯

右面部中行從鼻端下至唇內四穴督脉也

承漿一穴在頤前下唇下宛宛陷中太陽脉胃脉督脉任脉之會針入三分灸七壯至七七壯

廉泉一穴在頷下結喉下四寸中央乃陰維任脉之會可灸三壯針三分

右面部中行從唇至結喉上二穴任脉也

攢竹二穴在兩眉頭少陷中足太陽脉氣所發不宜灸針入一分宜以細三稜針刺之宜洩熱氣

睛明二穴在目內眥頭外一分手足太陽少陽陽明陽蹻陰蹻五脉之會針入一分留三呼不可灸

右面部第二行直目內眥上至眉尖四穴足太陽也

迎香二穴在禾窅上一寸鼻下孔傍五分手足陽明之會針入三分不宜灸

禾窅二穴在鼻下俠谿水溝傍五分手陽明脉氣所發針入三分灸三壯

右面部第二行直目內眥俠鼻而下四穴手陽明

陽白二穴在眉上一寸直目瞳子手足陽明少陽陽維五脉之會可灸三壯針入三分

右面部第三行直目瞳子上至眉上二穴足少陽

承泣二穴在目下七分直目瞳子陷中躄脉任脉足陽明之會可灸二壯不可針

四白二穴在目下二寸足陽明脉氣所發可灸七壯針入三分

巨髎二穴在俠鼻孔傍八分直目瞳子躄脉足陽明之會針入三分可灸七壯

地倉二穴在俠口吻傍四分如近下有脉微動者是躄脉手足陽明之會針入三分可灸二七壯

大迎二穴在曲頰前一寸三分骨陷中動脉是足陽明脉氣所發針入三分留七呼可灸三壯

右面第三行直目瞳子下至大迎骨空十穴足陽明

本神二穴在曲差傍一寸五分直耳上入髮際足少陽陽維之會針入五分可灸三壯

絲竹空二穴在眉後陷中足少陽脉氣所發不可灸針入三分留三呼

右面第四行直目銳眦上髮際四穴手足少陽

瞳子髎二穴在目外去眦五分手足少陽之會可灸三壯針入三分或云禁灸

顴髎二穴在顴骨下廉銳骨端陷中手足少陽太陽之會針入三分

右面第四行直目銳眦後下顴骨下廉四穴手足少陽

頭維二穴在額角入髮際本神旁一寸五分足少陽陽明脉之會針入二分禁灸

禾髎二穴在耳銳髮下橫動脉手足少陽脉氣所發針入七分可灸三壯

客主人二穴在耳前起骨上廉開口有空動脉宛宛中足

陽明少陽之會可灸七壯若針必側臥張口取之禁針深
上關若刺深令人欠而不得却下關若久留針即却而不
得欠牙關急

耳門二穴在耳前起肉當耳缺者針入三分留三呼可灸
三壯

聽會二穴在耳前陷中上關下一寸動脉宛宛中張口得
之手少陽脉氣所發針入七分留三呼可灸五壯至二七
壯止

下關在客主人下耳前動脉下廉合口有空開口即閉閉
口有穴足陽明少陽之會針入四分不可灸

右側面部在耳前十二穴頭維居上禾髎客主人次之
耳門又次之聽會又次之下關居下

聽宮二穴在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽三

脉之會針入三分可灸三壯

右側面部在耳中二穴

頰車二穴在耳下曲頰端近前陷中足陽明脉氣所發側
臥開口取之針入四分灸七壯至七七壯止

右側面部在耳下者二穴

頸項部天突一穴在頸結喉下四寸宛宛中陰維任脉之會針五
分留三呼得氣即瀉灸三壯

右頸項中一穴

人迎二穴在頸大脉動應手夾結喉兩旁一寸五分仰而
取之以候五臟氣足陽明脉氣所發不可灸針入四分針
過深則殺人

水突二穴在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明脉氣所
發針入三分可灸三壯

氣舍二穴在頸直人迎下天突陷中足陽明脉氣所發針入三分可灸五壯

右頸項第二行六穴

扶突二穴在人迎後一寸五分手陽明脉氣所發可灸三壯針入三分針經云在氣舍後一寸五分

天鼎一穴在頸缺盆氣舍後一寸半直扶突曲頰下手陽明脉氣所發可灸三壯針入三分

右頸項第三行四穴

天窓二穴在頸大筋前曲頰下俠扶突後動脉應手陷中手太陽脉氣所發針入三分可灸三壯

右頸項第四行二穴

天容二穴在耳下曲頰後手太陽脉氣所發針入一寸可灸三壯

右頸項第五行二穴

天牖二穴在頸筋間缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上手少陽脉氣所發針入一寸留七呼不宜補亦不宜灸

右頸項第六行三穴

天柱二穴

見正頭部第二行

右頸項第七行二穴

風府一穴

見正頭部中行

右頸中央一穴

有部膈會二穴在肩前廉去肩頭三寸宛宛中手少陽維之會針入七分留三呼灸七壯

肩髃二穴在肩端凸骨間陷宛宛中舉臂取之手陽明躄脉之會針入六分留六呼可灸七壯至二七壯若灸偏風七七壯不宜多灸恐手臂細若風病筋骨無力久不瘥者

當灸不畏細也

缺盆二穴一名天盖在肩上橫骨陷中針入三分不宜太深使人逆息可灸三壯

右肩前廉六穴臑會極外肩髃次之缺盆極裏

肩髃二穴在肩端臑上陷中針舉臂取之針七分可灸三壯

巨骨二穴在肩尖端上行兩叉骨罅間陷中手陽明陽蹻之會針入一寸半可灸三壯

肩井二穴在肩上陷缺盆上大骨前一寸半以三指按取之當中指下陷中手足少陽陽維之會針入五分灸七壯
秉風二穴在肩上小髃骨後舉臂有空處手太陽陽明手足少陽之會針入五分可灸五壯

天髃二穴在肩缺盆中上髃骨之際陷中央手少陽陽維

之會針入八分可灸三壯

右肩上廉自肩髃至此十穴肩髃極外巨骨次之肩井又次之秉風又次之天髃極在裏

臑俞二穴在肩髃後大骨下髃上廉陷中手足太陽陽維陽蹻之會舉臂取之針入八分可灸三壯

肩真二穴在肩曲髀上兩骨解間肩髃後陷中針入八分可灸三壯

天宗二穴在秉風後大骨下陷中手太陽脉氣所發針入五分留六呼可灸五壯

曲桓二穴在肩中央曲髀陷中按之應手痛針入五分可灸三壯

肩外髃在肩甲上廉去脊三寸陷中針入六分可灸三壯
肩中髃在肩甲內廉去脊二寸陷中針入三分留七呼可

灸三壯

右肩後廉十二穴臑膈肩真極外天宗曲桓次之外膈中膈極裏

脈部淵腋二穴在腋下三寸宛宛中舉臂取之刺入三分不宜灸灸之不幸令人生腫蝕馬瘍內潰者死寒熱者生馬瘍可治

大包二穴在淵腋下三寸脾之大絡布胃脇中出九肋間針入三分可灸三壯

輒筋二穴在腋下三寸復前行一寸着脇足少陽脈氣所發針入六分可灸三壯

天池二穴在乳後一寸腋下三寸着脇直腋腋肋間手厥陰足少陽脈之會針入三分灸三壯

右側腋八穴

背部大杼一穴在項後第一椎下陷中手足三陽督脈之會針

入五分留三呼瀉五吸若灸以年爲壯

陶道一穴在大椎節下間俛而取之督脈足太陽之會可灸五壯針入五分

身柱一穴在第三椎節骨下俛而取之督脈氣所發針入五分灸七七壯

神通一穴在第五椎節下間俛而取之督脈氣所發針入五分留五呼可灸三壯

靈臺一穴在第六椎節下間俛而取之督脈氣所發療病法出素問

至陽一穴在第七椎節下間俛而取之督脈氣所發針入五分可灸三壯

筋縮一穴在第九椎節下間俛而取之督脈氣所發針入

五分可灸三壯

脊中一穴一名神宗在第十一椎下間俛而取之督脉氣所發針入五分不可灸

懸樞一穴在第十三椎節下間伏而取之針入三分可灸三壯

命門一穴在第十四椎節下間伏而取之針入五分灸三壯

右背部中行自項中央直脊至命門穴與臍相對十穴命門與臍相對若取可正身立用一杖自地量至臍截斷却移向後量脊杖頭截處是穴也

陽關一穴在第十六椎節下間坐而取之針入五分灸三壯

腰腧一穴在二十一椎節下間宛宛中以挺伏地舒身兩

手相重支額縱四體開然後巧取乃得其穴督脉氣所發針入八分留三呼瀉五吸灸可七壯至七七壯

長強一穴一名氣之陰郄督脉別絡在脊骶端足少陰少陽所結針入三分抽針以大痛為度其穴伏地而取之乃得可日灸三十壯至二百壯止

右背部中行自命門穴直脊下至尾閭骨端三穴

大杼二穴在項後第一椎下兩旁相去各一寸五分陷中手足太陽之會針入五分可灸七壯

風門二穴在第二椎下兩旁相去各一寸五分督脉足太陽之會針入五分留七呼灸三壯

肺腧二穴在第三椎下兩旁相去各一寸五分足太陽脉氣所發針入三分留七呼灸百壯

厥陰腧二穴在第四椎下兩旁相去各一寸五分針入三

分灸七壯

心膂二穴在第五椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留七呼禁灸

膈膂二穴在第七椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留七呼灸三壯

肝膂二穴在第九椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留六吸灸三壯

膽膂二穴在第十椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分灸三壯

脾膂二穴在第十一椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留七呼灸三壯

胃膂二穴在第十二椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留七呼灸隨年壯

三焦膂二穴在第十三椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入五分留七呼灸三壯

腎膂二穴在第十四椎下兩旁相去脊中各一寸五分與臍平針入三分留七呼灸隨年壯

大腸膂二穴在十六椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留六呼灸三壯

小腸膂二穴在十八椎下兩旁相去脊中各一寸五分針入三分留六呼灸三壯

膀胱膂二穴在十九椎下兩旁相去各一寸五分足太陽脈氣所發針入三分留六呼灸三壯

中齋內膂二穴在二十椎下兩旁相去各一寸五分俠脊起肉間針入三分留十呼灸三壯

白環膂二穴在二十一椎下兩旁相去各一寸五分足太

陽脉氣所發針如腰戶法同挺杖伏地端身兩手指重支額縱息令皮膚俱緩乃取其穴針入五分得氣即先瀉如瀉多補之不宜灸

右背第二行去中行各一寸五分俠脊直下三十四穴上髎二穴在第一空腰踝下夾脊陷中足太陽少陽之絡針入三分可灸七壯

次髎二穴在第二空夾脊陷中針入三分可灸七壯甲乙云針入三分留七呼灸五壯

中髎二穴在第三空夾脊陷中足厥陰少陽所結之會針入二分留十呼可灸三壯甲乙云針入二分留十呼

下髎二穴在第四空夾脊陷中足太陰厥陰少陽所結之會針入二分留十呼灸三壯

會陽二穴在陰尾尻骨間兩旁督脉所發針入八分可灸

五壯

右背第二行自臑踝骨夾脊斜下四骨空八穴內經謂之八髎穴是也陰尾骨兩旁二穴

附分二穴在第二椎下附項內廉兩旁相去各三寸手足太陽也令正坐取之針入三分可灸五壯

魄戶二穴在第三椎下兩旁相去各三寸正坐取之足太陽脉氣所發針入五分宜久留針可灸七壯至百壯

膏肓腧二穴在第四椎下兩旁相去各三寸又法令人正坐豎脊伸兩手以臂着膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從髀骨上角摸索至骨下頭其間

當有四肋之間灸中間從髀骨之裏去髀骨容側指許舉

脂去來筋間空處按之自覺牽引於肩中灸兩髀中一處至百壯多至三百壯當覺下髀髀然如水流之狀亦當有

所下若得痰疾則無所不下也如病人已困不能正坐當令側臥俛上臂令前取穴灸之又以右手從肩上住指頭所不及者是穴也左取亦然乃以前法灸之若不能正坐當伸兩臂令人俛兩髀骨使相離不爾卽髀骨覆其穴灸之無驗此穴無病不治

神堂二穴在第五椎下兩旁相去各三寸正坐取之足太陽脉氣所發針入三分可灸五壯

諛譎二穴在肩膊內廉第六椎下兩旁相去各三寸正坐取之足太陽脉氣所發以手重按之病者言諛譎是穴針入六分留三呼可灸一十一壯

膈關二穴在第七椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發針入二分可灸五壯

魂門二穴在第九椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取之

足太陽脉氣所發針入五分可灸五壯

陽綱二穴在第十椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發針入五分可灸五壯

意舍二穴在第十一椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取之足太陽脉氣所發針入五分灸五十壯至百壯

胃倉二穴在第十二椎下兩旁相去各三寸足太陽脉氣所發針入五分可灸五七壯

盲門二穴在第十三椎下兩旁相去各三寸义肋間經云與鳩尾相直足太陽脉氣所發針入五分可灸三十壯

志室二穴在第十四椎下兩旁相去各三寸陷中足太陽脉氣所發針入五分可灸三壯

包盲二穴在第十九椎下兩旁相去各二寸陷中伏而取之足太陽脉氣所發針入五分可灸五七壯

秩邊二穴在第二十椎下兩旁相去各五寸陷中伏而取之足太陽脉氣所發針入五分可灸三壯

右背第三行二十八穴

膺輸部

天突一穴在結喉下一寸宛宛中陰維任脉之會針入五分留三呼針宜橫下不得低可灸五壯

璇璣一穴在天突下一寸陷中仰頭取之任脉氣所發針入三分灸五壯

華蓋一穴在璇璣下一寸陷中仰頭取之任脉氣所發針入三分灸五壯

紫宮一穴在華蓋下一寸六分陷中仰頭取之任脉氣所發針入三分半

玉堂一穴在紫宮下一寸六分陷中任脉氣所發針入三分灸三壯

臆中一穴在玉堂下一寸六分橫直兩乳間陷中仰臥取之任脉氣所發禁穴不可針

右膺輸部中行自缺盆中間下至兩乳中間六穴

中庭一穴在臆中下一寸六分陷中任脉氣所發針入三分可灸五壯

右膺輸部中行自兩乳中間下至鳩尾岐骨間一穴

膺腑二穴在巨骨下去璇璣旁各二寸陷中仰而取之足少陰脉氣所發針入三分灸五壯

或中二穴在膺腑下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉氣所發針入四分灸五壯

神藏二穴在或中下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉氣所發針入三分灸五壯

靈墟二穴在神藏下一寸六分陷中仰而取之足少陰脉

氣所發針入三分灸五壯

神封二穴在靈墟下一寸六分陷中仰而取之足少陰脈氣所發針入三分灸五壯

步郎二穴在神封下一寸六分陷中仰而取之足少陰脈氣所發針入三分灸五壯

右膺輪第三行十二穴

氣戶二穴在巨骨下胸府兩旁各二寸陷中仰而取之足陽明脈氣所發針入三分可灸五壯

庫房二穴在氣戶下一寸六分陷中仰而取之足陽明脈氣所發針入三分灸五壯

屋翳二穴在庫房下一寸陷中仰而取之足陽明脈氣所發針入三分灸五壯

膺窗二穴在屋翳下一寸六分足陽明脈氣所發針入三

分灸五壯

乳中二穴當乳足陽明脈氣所發禁不可灸灸則生蝕瘡瘡中有汁膿血可治瘡中有瘰肉若蝕瘡者死宜淺刺二分

乳根二穴當乳下一寸六分陷中仰而取之足陽明脈氣所發針入三分灸五壯

右膺輪第三行十二穴

雲門二穴在巨骨下俠氣戶旁各二寸陷中動脈應手手太陰脈氣所發針入二分若刺深令人氣逆可灸五壯

中府二穴乃肺之募在雲門下一寸乳上三肋間動脈應手足太陰之會針入三分留五呼可灸五壯

右膺輪第四行貼巨骨下一寸四穴中府二穴手足太陰會也雲門二穴手太陰也

周榮二穴在中府下一寸六分陷中仰而取之足太陰脉氣所發針入四分灸五壯

胃鄉二穴在周榮下一寸六分陷中仰而取之足太陰脉氣所發針入四分

天谿二穴在胃鄉下一寸六分陷中仰而取之足太陰脉氣所發針入四分灸五壯

食竇二穴在天谿下一寸六分舉臂取之足太陰脉氣所發針入四分灸五壯

右膺輪第四行自巨骨下一寸下至腹八穴皆足太陰也

腹部鳩尾一穴在前臆蔽骨下五分此穴大難針須大好手方可下針針入三分留三呼瀉五吸禁灸

巨闕一穴心之募也在鳩尾下一寸任脉氣所發針入六

分留七呼得氣即瀉灸七壯至七七壯

上脘一穴在巨闕下一寸五分去鳩骨下三寸任脉足陽明手太陽之會針入八分日灸二七壯

中脘一穴胃之募也在上脘下一寸五分手太陽少陽足陽明所主任脉之會上紀者中脘也針入八分留七呼瀉

五吸灸二七壯

建里一穴在中脘下一寸針入五分留十呼可灸五壯

下脘一穴在建里下一寸足太陰任脉之會針入八分灸七壯至百壯

分水一穴在下脘下一寸臍上一寸任脉氣所發針入八分可灸七壯水病禁針針即成水蠱病死

神闕一穴當臍中是穴灸百壯禁針

上右腹部中行自鳩尾蔽骨端下至臍中八穴

陰交一穴在臍下一寸任脉氣所發針入八分灸百壯
氣海一穴在臍下一寸五分任脉氣所發針入八分灸百壯

后門一穴在臍下二寸三焦之募也任脉氣所發灸二十壯

關元一穴在臍下三寸小腸之募也足太陰少陰厥陰三陰任脉之會下紀者關元也針入八分留三呼灸三壯至三百壯

中極一穴在關元下一寸膀胱之募也足三陰任脉之會針入八分留十呼灸五壯

曲骨一穴在橫骨上毛際陷中動脉應手任脉足厥陰之會針入二寸灸七壯至七七壯

右腹部中行自臍已下至橫骨六穴

會陰一穴一名屏翳在兩陰間任脉別絡腎脉衝脉之會可灸三壯

右腹部中行在兩橫骨下至兩陰之間一穴

幽門一穴挾巨闕兩旁各五分衝脉足少陰之會針入五分可灸五壯

通谷一穴在幽門下一寸衝脉足少陰之會針入五分灸五壯

陰都二穴在通谷下一寸衝脉足少陰之會針入五分灸五壯

石關二穴在陰都下一寸衝脉足少陰之會針入一寸灸三壯

商曲二穴在石關下一寸衝脉足少陰之會針入一寸灸五壯

盲膪二穴在商曲下一寸直臍旁五分衝脉足少陰之會
針入三分灸五壯

中注二穴在盲膪下一寸衝脉足少陰之會針入一寸灸
五壯

四滿二穴在中注下一寸衝脉足少陰之會針入五分灸
三壯

氣穴二穴一名胞門一名子戶在四滿下一寸衝脉足少
陰之會針入三分灸五壯

大赫二穴一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脉足少
陰之會針入三分灸五壯

橫骨二穴一名下極在大赫下一寸衝脉足少陰之會針
入一寸可灸三壯

右腹第二行二十二穴詳幽門下通谷上欠二穴

不容二穴在幽門兩旁各一寸五分去任脉二寸直四肋

端足陽明脉氣所發針入五分灸五壯

承滿二穴在不容下一寸足陽明脉氣所發針入二分灸
五壯

梁門二穴在承滿下一寸足陽明脉氣所發針入三分灸
五壯

關門二穴在梁門下一寸足陽明脉氣所發針入三分灸
五壯

太一二穴在關門下一寸足陽明脉氣所發針入八分灸
五壯

滑肉門二穴在太一下一寸足陽明脉氣所發針入八分
灸五壯

天樞二穴大腸之募也在俠臍兩旁各二寸足陽明脉氣

所發針入八分留七呼灸百壯

外陵二穴在天樞下一寸足陽明脉氣所發針入八分灸五壯

大巨二穴在外陵下一寸足陽明脉氣所發針入五分灸五壯

水道二穴在大巨下三寸足陽明脉氣所發針入二寸五分灸七壯

歸來二穴在水道下二寸足陽明脉氣所發針入八分灸五壯

氣衝二穴在歸來下鼠鼷上一寸動脉應手宛宛中足陽明脉氣所發可灸七壯艾炷如大麥大禁針

右腹第三行二十四穴

期門二穴肝之募也在不容旁一寸五分直兩乳第二肋

端足太陰厥陰維之會針入四分可灸五壯

日月二穴膽之募也在期門下五分陷中足太陰少陽陽維之會針入七分可灸五壯

腹哀二穴在日月下一寸半足太陰陰維之會針入五分灸五壯

大橫二穴在腹哀下二寸五分直臍旁足太陰陰維之會針入七分灸五壯

腹結二穴在大橫下一寸三分一名腹屈針入七分灸五壯

府舍二穴在腹結下三寸足太陰陰維厥陰之會此三脉上下入腹絡肝脾結心肺從脇上至肩此太陰郄三陰陽明之別針入七分灸五壯

衝門二穴上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約文中動

脉足太陰厥陰之會刺入七分灸五壯

右腹第四行十四穴

章門二穴脾之募也在大橫外直臍季脇端側臥屈上足伸下足舉臂取之足厥陰太陽之會針入六分灸百壯

帶脉二穴在季脇下一寸八分針入六分灸五壯

五樞二穴在帶脉下三寸一云在水道旁一寸五分針入一寸灸五壯

維道二穴在章門下五寸三分足少陽帶脉之會針入八分灸五壯

居膠二穴在章門下八寸三分監骨上陷中陽躄足少陽之會針入八分灸三壯

右腹第五行十穴

京門二穴腎之募也一名氣府在監骨下腰中挾脊季肋

掌臂部

下一寸八分針入八分留七呼可灸三壯

右腹第六行二穴

少商二穴 魚際二穴 大淵二穴 俱見前藏俞

右大指內側至寸口動脉六穴

孔最二穴去腕上七寸手太陰之郄針入三分灸五壯

經渠二穴 尺澤二穴 俱見前藏俞

右寸口動脉循臂內上骨下廉至肘中六穴

中衝二穴 勞宮二穴 俱見前藏俞

右中指內廉至掌心四穴

內關二穴在掌後兩筋間去腕二寸手心主絡別走少陽針入三分可灸三壯

郄門二穴在掌後去腕五寸手厥陰郄針入三分可灸五壯

大陵二穴 間使二穴 曲澤二穴 俱見前

右掌後循臂內兩筋間至肘內廉十穴

黃帝曰手少陰之脉獨無腧何也岐伯曰少陰心脉也心者五藏六府之大主也精神之所舍也其藏堅固邪弗能容也容之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在於心之包絡包絡者心主之脉也故獨無腧焉黃帝曰少陰獨無腧者不病乎岐伯曰其外經病而藏不病故獨取其經於掌後銳骨之端其餘脉出入屈折其行之徐疾皆如手少陰心主之脉行也 邪密篇
少衝二穴木也一名經始在小指內廉端去瓜甲角如韭葉手少陰脉之所出也為井針入一分可灸三壯
少府二穴火也在小指本節後陷中直勞宮手少陰脉之所流也為榮針入二分灸七壯

右小指內廉至掌後廉四穴

神門二穴土也皆掌後銳骨之端陷中手少陰脉之所經也為俞針入三分留七呼灸七壯

陰郄二穴在掌後脉中去腕五分手少陰郄針入三分灸七壯

通里二穴在腕後一寸針入三分灸三壯

靈道二穴金也在掌後一寸五分手少陰脉之所行也為經針入三分可灸三壯

少海二穴水也在肘內大骨外去肘端五分手少陰脉之所行也為合針入三分灸七壯

右掌後銳骨端直臂內廉至肘內廉十穴

關衝二穴 液門二穴 中渚二穴 陽池二穴 俱見前

右第四指外間至手表腕八穴

外關二穴手少陰絡在腕後二寸陷中針入三分留七呼
灸三壯

會宗二穴在腕後三寸空中針入三分灸三壯

三陽絡二穴在臂上大交脉支溝上一寸灸七壯禁針

四瀆二穴在肘前五寸外廉陷中針入六分留七呼灸三
壯

支溝二穴 天井二穴俱見前府俞

右臂外兩骨之間至肘十二穴

商陽二穴 二間二穴 三間二穴 合谷二穴俱見前府俞

右大指次指上廉至合谷兩岐骨間八穴

列缺二穴去腕側上一寸五分以手交叉中指末筋骨罅

中手太陰絡別走陽明針入二分留三呼灸七壯

偏歷二穴手陽明絡別走太陰在腕中後三寸針入三分

留七呼灸三壯

溫溜二穴在腕後小土五寸大土六寸手陽明郄針入五

分可灸三壯大土小土即大人小兒也

下廉二穴在輔骨下去上廉一寸斜針入五分留五呼灸

三壯

上廉二穴在三里下一寸其分獨抵陽明之會斜針入五

分灸五壯

三里二穴在曲池下二寸按之肉起銳肉之端針入二分

可灸三壯

肘髎二穴在肘大骨外廉陷中針入三分灸三壯

陽溪二穴 曲池二穴俱見前府俞

右腕上側兩筋間循臂上廉至肘後曲縫尖十八穴

少澤二穴 前谷二穴 後溪二穴 腕骨二穴

陽谷二穴

俱見前府俞

右小指外側至腕中十穴

養老二穴在手踝骨上一空腕後一寸陷中手太陽之郄針入三分灸五壯

支正二穴在腕後五寸手太陽絡別走少陰針入三分灸三壯

少海二穴

見前府俞

右臂骨下廉至肘內側肉骨之間六穴

挾白二穴在天府下去肘五寸動脈中針入三分可灸五壯

天府二穴在腋下三寸臑臂內廉動脈中針入四分留三呼不可灸

右肘內約文中動脈直上腋中之前動脈四穴

天泉二穴一名天溫在曲腋下三寸舉臂取之針入六分灸三壯

右肘內曲澤穴直上腋中二穴

青靈二穴在肘上三寸舉臂取之灸七壯

極泉二穴在臂內腋下筋間動脈入曾針入三分灸七壯

右肘內廉少海穴直臑內後廉四穴

清冷淵二穴在肘上三寸伸肘舉臂取之針入三寸灸三壯

消灤二穴在肩下臂外間腋斜肘分下行針入六分灸三壯

右肘骨上兩筋間天井穴至肩端四穴

五里二穴在肘上三寸行向裏大脈中央灸十壯禁針

臂臑二穴在肘上七寸臑內端手陽明絡針入三分灸三

足部

壯

右曲池穴直上有骨前廉四穴 肘內側兩骨間直上
肩端後肘太陽脉無穴

公孫二穴在足大指本節後一寸別走陽明足太陰絡針
入四分灸三壯

隱白二穴 大都二穴 太白二穴 商丘二穴俱見前

右大指內側至內踝前廉十穴

大敦二穴 行間二穴 太衝二穴 中封二穴俱見前

右大指外間至內踝前一寸八穴

厲兌二穴 內庭二穴 陷谷二穴 衝陽二穴

解溪二穴俱見前

右第二指外間至腕上十穴

地五會二穴在足小指次指本節後陷中去俠溪一寸針

入二分不可灸灸之令人瘦不出三年死

竅陰二穴 俠溪二穴 臨泣二穴 丘墟二穴俱見前

右第四指外間至外踝之前十穴

申脉二穴陽蹻所生在外踝下陷中容爪甲白肉際針入

五分留六呼灸三壯

金門二穴在足外踝下足太陽之郄陽維所別屬也針入

一分灸三壯

僕參二穴在跟骨下陷中拱足得之足太陽陽蹻上二脉
之會針入三分灸七壯

至陰二穴 通谷二穴 束骨二穴 京骨二穴

崑崙二穴俱見前

右小指外側至外踝之後一十六穴

照海二穴陰蹻所生在足內踝下令患人穩坐足底相對

赤白肉際陷中針入三分灸三壯

水泉二穴足少陰郄去太溪一寸在足內踝下針入四分灸五壯

太衝二穴在足跟後衝中別走太陽足少陰絡針入二分留七呼灸三壯

湧泉二穴 然谷二穴 太溪二穴 俱見前藏俞

右足心斜至內踝之後一十二穴

蠡溝二穴在足內踝上五寸別走少陽足厥陰絡針入二分留三呼灸三壯

中都二穴一名中都內在內踝上七寸筋骨中與少陰相直針入三分灸三壯

右內踝前一寸上踝至八寸足厥陰脉四穴

地機二穴一名脾舍足太陰之郄在膝下五寸針入三分

可灸三壯

血海二穴在膝臑上內廉白肉際二寸半針入五分灸三壯

箕門二穴在魚腹上越筋間陰股內動脉應手經云股上起筋間針入三分留六呼灸三壯

陰陵泉二穴 見前藏俞

右內踝上八寸循脛骨後上膝股內前廉足太陰脉八穴

三陰交二穴在足內踝上三寸骨下陷中足太陰厥陰少陰之會針入三分灸三壯

漏谷二穴一名大陰絡在足內踝上六寸骨下陷中針入五分灸三壯

右內踝前廉上踝至八寸足太陰脉四穴

膝關二穴在犢鼻下二寸旁陷中針入四分灸五壯

陰包二穴在膝上四寸股內廉兩筋間針入六分灸三壯

五里二穴在陰廉下去氣衝下三寸陰股中動脈應手針入六分灸五壯

陰廉二穴在羊矢下去氣衝下二寸動脈中針入八分灸三壯

曲泉二穴見前

右內踝上八寸上膕內廉循踝至腹足厥陰脈十穴

交信二穴在足內踝上二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄針入四分留五呼灸三壯

築賓二穴在內踝上膕分中陰維之郄針入三分灸五壯

陰谷二穴復溜二穴俱見前

右內踝之後直膕至骨內廉上股內後廉八穴

懸鍾二穴在足外踝上三寸動脈中足三陽之大絡按之

陽明脈絕乃取之針入六分留七呼灸五壯即絕骨穴

光明二穴在足外踝上五寸別走厥陰足少陽絡針入六分留七呼灸五壯

外丘二穴在足外踝上七寸足少陽郄少陽所至針入三分灸三壯

陽交二穴在足外踝上七寸斜屬三陽分肉間針入六分留七呼灸三壯

陽陵泉二穴陽輔二穴俱見前

右外踝之前至絕骨端上外輔骨前十二穴

陽關二穴在陽陵泉上三寸犢鼻外陷中針入五分禁灸

中犢二穴在髀骨外膝上五寸分肉間陷中針入五分留

七呼灸五壯

環跳二穴在髀樞中側臥伸下足屈上足取之針入一寸留十呼灸五十壯

右外輔骨前上膝髀外廉六穴

豐隆二穴在外踝上八寸下斷外廉陷中別走太陰足陽明絡針入三分灸三壯

條口二穴在上廉上一寸舉足取之針入五分灸三壯

犢鼻二穴在膝膑下斷骨上骨解大筋中針入六分灸三壯

巨虛下廉二穴 三里二穴俱見前

右髀骨外廉至膝膑一十二穴

梁丘二穴在膝上二寸兩筋間足陽明之郄針入三分灸三壯

陰市二穴在膝上三寸伏兔下陷中拜而取之針入三分

留七呼禁灸

伏兔二穴在膝上六寸起肉正跪正坐而取之一云膝蓋上七寸針入五分禁灸

髀關二穴在膝上伏兔後交文中針入六分灸三壯

右膝膑中直伏兔上至氣衝八穴

附陽二穴在足外踝上三寸陽蹻之郄太陽前少陽後筋骨間針入五分

飛陽二穴在外踝上七寸針入三分灸三壯

承山二穴在腓腸下分肉間陷中針入七分灸七壯

承筋二穴在腓腸中央陷中灸三壯不可針

合陽二穴在膝約文中央下二寸針入六分灸五壯

委中二穴 見前

右外踝之後直腓至臑中一十二穴

浮郄二穴在委陽上一寸展膝得之針入五分灸三壯

委陽二穴見前

右膶外廉四穴

殷門二穴在肉郄下六寸針入五分留七呼灸三壯

承扶二穴在尻臀下股陰上約文中針入二分灸三壯

右膶中直髀後廉至尻四穴

法竇問同人身寸法荅曰以中指大指相屈如環取內側交兩

角為寸

右竇漢卿取中指內側為同身寸者大法也若取頭部

膯膶部腹部同身寸又各有活法不可執一也 其頭

部法前髮際至後髮際通長一尺二寸取法以軟蔑直

鼻從前髮際貼肉量至後髮際截之却將此蔑折為十

二分度則其十二分度之一分乃頭部同身寸之一寸

也 其膯膶部法自天突穴至臆中穴通長六寸八分取

法亦以軟蔑從缺盆中間天突穴宛宛中貼肉量至直兩

乳中間臆中穴截之折為六分八釐度則其六分八釐度

之一分乃膯膶部同身寸之一寸也 其腹部法自鳩尾

至臍下通長八寸取法亦以軟蔑從鳩尾蔽骨端貼肉量

至臍中央截之折為八分度則其八分度之一分乃腹部

同身寸之一寸也量腹部同身時宜正臥針灸亦然

醫學綱目卷之八

醫學綱目卷之八

醫學綱目卷之九

陰陽臟腑部

調攝宜禁 用藥宜禁 刺禁 灸禁

大法

素醫不能嚴不能動神外為柔弱亂至失常病不能移則醫事不行疏五過論

凡陰陽之要陽密乃固兩者不和若春無秋若冬無夏因

而和之是謂聖度故陽強不能密陰氣乃絕全文見五臟

神乃治陰陽雜決精氣乃絕生氣通天論

素春夏養陽秋冬養陰以從其根故與萬物沉浮於生長

之門逆其根則伐其本壞其真矣四氣調神論

陰常不足

丹陽有餘陰不足論○人受天地之氣以生天之陽氣為

氣地之陰氣為血故氣分常有餘血分常不足何以言之

天地為萬物父母天大也為陽而運於地之外地居天之

中為陰天之大氣舉之日實也亦屬陽而運於月之外月

缺也屬陰稟日之光以爲明者也人身之陰氣其消長視月之盈缺故人之生也男子十六歲而精通女子十四歲而經行是有形之後猶有待於乳哺水穀以養陰氣始成而後可與陽氣爲配方能成人而爲人之父母古人必近至三十二十而後嫁娶可見陰氣之難於成而古人之善於攝養也禮記註曰惟五十而後養陰者有以加內經曰年四十陰氣自半起居衰矣又曰男子六十四歲而精絕女子四十九歲而經斷夫以陰氣之成止供給得三十年之視聽言動已先虧矣夫人之情慾無涯以此難成易虧之陰氣若之何而可以縱恣也經曰陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實而陰道虛又曰至陰虛天氣絕至陽盛地氣不足虛與盛之所在非吾之過論也蓋主閉藏者腎也司踈洩者肝也二臟皆有相火而其系上屬於

心心君火也爲物所感則易動心動則相火亦動動則精自走相火翕然而起雖不交會亦暗流而踈洩矣所以聖賢只是教人收心養心其旨深矣天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月屬午爲火大旺火爲肺金之夫火旺則金衰六月屬未爲土大旺土爲水之夫土旺則水衰况腎水常籍肺金爲母以補助其不足故內經諄諄於資其化源也古人夏月必獨宿而淡味兢兢業業愛護保養金水二臟正嫌火土之旺爾內經又曰冬不藏精者春必病瘟十月屬亥十一月屬子正火氣潛伏閉藏以養其本然之真而爲來春發生升動之本若於此時恣嗜慾以自戕賊至春升之際下無根本陽氣輕浮必有溫熱之病夫夏月火土之旺冬月火氣之伏此論一年之虛耳若上弦前下弦後月廓月空亦

爲一月之虛大風大霧虹霓飛電暴寒暴熱日月薄蝕憂
愁忿怒驚恐悲哀醉飽勞倦謀慮勤動又皆爲一日之虛
若病患初退瘡痍正作尤不止於一日之虛而已今人多
有春未夏初患頭疼脚軟食少體熱仲景謂春夏劇秋冬
瘥而脉弦大者正世俗所謂注夏病也若犯此四者之虛
似難免此夫當壯年便有老態仰事俯育一切墮壞興言
至此深可驚懼古人謂不見所欲使心不亂夫以溫柔之
感於身聲音之感於耳顏色馨香之感於目鼻誰是鉄漢
心不爲之動也唯善攝生者於此五箇月出居於外苟值
一月之虛亦宜暫遠帷幕各宜珍重保全太和期無負敬
身之教幸甚

味淡養陰

茹淡論○或問內經精不足者補之以味又曰地食人以
五味古者人年五十而食肉子今年邁七十矣盡却鹽醢

豈中道乎何子之神茂而色澤也曰味有出於天賦者有
成於人爲者天之所賦者若穀菽果菜自然冲和之味有
養人補陰之功此內經所謂味也人之所爲者皆烹飪調
和偏厚之味有致病伐命之毒此吾子所疑之味也今鹽
醢之卻非直茹淡者夫麥與粟之醎粳米山藥之甘葱薤
之辛之類皆味也子以爲淡乎安於冲和之味者心之收
火之降也以偏厚之味爲安者欲之縱火之勝也何疑之
有內經又曰陰之所生本在五味非天賦之味乎陰之五
宮傷在五味非人爲之味乎聖人防民之具於是爲備凡
人饑則必食彼粳米之甘而淡者土之德也物之爲陰而
最補者也惟可與菜同進經以菜爲充者恐於饑時頓食
或慮過多因致胃損故以菜助其充足取其疏通而易化
此天地生萬物之仁也論語曰肉雖多不使勝食氣又曰

疏食菜羹又曰飯蔬食飲水傳曰賓主終日百拜而酒三行以避酒禍此聖人施教之意也蓋穀與肥鮮同進厚味得穀爲助其積之也久寧不助陰火而致毒乎故服食家在卻穀者則可不卻穀而服食未有不被其毒者內經謂久而增氣物化之常氣增而久天之由也彼安於厚味者未之思爾或又問精不足者補之以味何不言氣補曰味陰也氣陽也補精以陰求其本也故補之以味若甘草白朮地黃澤瀉天門冬五味子之類皆味之厚者也經曰虛者補之正此意也上文謂形不足者溫之以氣夫爲勞倦所傷則氣虛故不足溫者養也溫存以養之使氣自充氣充則形完矣故言溫不言補經曰勞者溫之正此意也彼爲局方者不知出此凡諸虛損証悉以溫熱佐輔補藥名之曰溫補不能求經旨故也

房術殺人

或曰千金方有房中補益法可用否予應之曰傳曰吉凶悔吝皆生於動故人之疾病亦生於動其動之極也病而死矣人之有生心爲火居上腎爲水居下水能升而火能降一升一降無有窮已故生意存焉水之體靜火之體動動易而靜難聖人於此未嘗忘言也儒者立教曰正心收心養心皆所以防此火之動於妄也醫者立教曰恬澹虛無補精養神亦所以遏此火之動於妄也蓋相火藏於肝腎陰分君火不妄動相火惟有稟命守位而已焉有燔灼之虐猷飛走之狂勢也哉易兌取象於少女兌說也遇少男艮爲咸咸無心之感也艮止也房中之法有艮止之義也若艮而不止徒自戕賊何補益之有竊詳千金之意彼壯年貪縱者此水之體非向日之靜也故著房中之法爲補益之助此可用於質壯心靜遇敵不動之人也苟無聖

賢之心神仙之骨未易爲也女法水男法火水能制火一
樂於與一樂於取此自然之理也若以房中爲補殺人多
矣况中古以下風俗日媮資稟日薄說夢向痴難矣哉媮

候切○房
中補益論

醇酒冷飲論○醇酒之性大熱有大毒清香美味既適於
口行氣和血亦宜於體由是飲者不自覺其過於多也不
思肺屬金惟畏火又畏寒其體脆其位高爲氣之主爲腎
之母木之夫酒下咽膈肺先受之若是醇酒理宜冷飲過
於肺入於胃然後漸溫肺先得溫中之寒可以補氣一益
也次得寒中之溫可以養胃二益也冷酒行遲傳化以漸
不可恣飲三益也古人終日百拜不過三爵既無酒病亦
無酒禍今予稽之於禮經則曰飲齊視冬時飲齊酒也視
猶比也冬時寒也參之內經則曰熱因寒用厥旨深矣今

則不然不顧受傷只圖取快蓋熱飲有三樂存焉膈滯通
快喉舌辛美盃行可多不知酒性喜升氣必隨之痰鬱於
上溺澁於下肺受賊邪金體必燥恣飲寒涼其熱內鬱肺
氣得熱必大傷耗其始也病淺或嘔吐或自汗或瘡痍或
鼻齖或自泄或心脾痛尚可發散而去之若其久也爲病
深矣爲消渴爲內疽爲肺痿爲內痔爲鼓脹爲失明爲哮
喘爲勞嗽爲癩癩又爲難名之疾倘非具眼未易處治可
不謹乎人言一盞冷酒須兩盞血乃得行酒之不可冷飲
也明矣此齊東之語也今參之於經證之以理發之爲規
戒子尚以爲迂耶 賤體在病年餘而今秋又得痢者一
月自揆不久終獲苟安蓋久病之後氣血銷損脂膏消散
當此之時初感之証已退減惟諸虛百損在耳大凡藥雖
參芪亦是毒物內經於藥字之下加毒字又加攻字天地

間養人性命者惟穀耳。備土之德得氣中和故其味淡甘而性和平。大補而滲泄乃可久食而無厭。是大有功於人者在藥則不然矣。不肖得安全者自去秋得病。餌藥至冬節日便不吃藥。惟一味白粥不吃。下飯雖鹽醬與醢醢。清滴皆不入口。此等淡味初亦甚難。自想此証必無他慮。但思已過收放心。自訟自責。安心待死。既自待死。尙可吃粥。猶有可生之理由。是自解以死。不愈於淡乎。如此乃可打捱得過。此時非淡不可以。和此氣血。氣血不和不足以復此生意。不以死在前。操此心以摧抑其怒與妄想。血氣雖欲復生不可得也。詳玩來書。此時無病可言矣。曰煩躁曰喘急。曰氣響曰腹痛。曰咳嗽。曰大腑澹。曰小腑澹。皆吾兄之所自求者。平時爲學不肯先求已過而克治之。但欲妄得以遂其受用之私心。至於染病之後又不能歸罪於已。

思所以安其親之心而盡其子職之當然者。方且操欲速之念。以極其怨尤之痴。所以怒火熾矣。而况稟受急躁火中。又火加之。口味不節。又起陰經之火。至於奄延歲月。陰且受火克。所存者鮮矣。惟有借穀氣以扶持。所以未死。其所以煩躁者。氣隨火升也。喘急者。氣因火鬱而爲痰。在肺胃也。氣響與痛或嗽痰者。由食成積而愈盛也。大腑澹者。肺因火燬。不行收令。其大腸之門戶不得斂也。小腑澹者。血因火燬。下焦無血。氣不得降而滲洩之令不行也。據高懷欲速之心。便欲倚重於藥。而掃除之。殊不知此法不可行矣。而此病有必安之理。昔者孟子教滕君於齊。人築薛以爲滕之深計。令其強爲善而已矣。者心也。蓋他無良策。有以禦齊之侵奪。彼齊君者。只亦欺我無君人之德爾。以常人聽孟子之言。非迂濶乎。孟子之學出于孔子者也。豈

欺勝君哉兄之症有似乎此今之議藥為尤難欲攻則無
病邪之實欲補又無的在之虛惟有減欲心斷絕口味使
內靜外安陰氣自然以漸而復某自去冬至節直到今日
不曾用刀圭之藥今已十月安好矣又病之後若欲以藥
力摧趨速效此是擾苗助長者也無可求之理內經諄諄
言之而後人特未之思爾復戴仲積書

大病宜守禁忌

東垣天病不守禁忌論○病而服藥須守禁忌孫真人千
金方言之詳矣但不詳言所以守禁忌之由敢陳其約以
為規戒夫胃氣者清純沖和之氣人之所賴以為生者也
若謀慮神勞動作形苦嗜慾無節思想不遂飲食失宜藥
餌違法皆能致傷既傷之後須用調補若恬不知恠而乃
恣意犯禁舊染之証尚未消退方生之証與日俱積吾見
醫藥將日不暇給而傷敗之胃氣無復完全之望去死近

陰虛忌肉

矣方書云二人同患痢一人愈後自恃能食縱口大嚼而死一人惡食能禁口淡味得生其詳具見後泄下門
世俗以肉為補性之物肉無補性惟補陽而今之虛損者
不在於陽而在於陰以肉補陰猶緣木而求魚何者肉性
熱入胃便熱發熱發便生痰痰多氣便不降而諸証作矣
又病後可用作養胃氣蓋胃氣非陰氣不足以自全所以
淡味為自養之良方尤當今之急着也食淡又須安心使
內火不起可也

東垣養老論○人生至六十七十以後精血俱耗平居無
事已有熱症何者頭昏目眩肌痒溺數鼻涕牙落涎多寐
少足弱耳聾健忘眩暈腸燥面垢髮脫眼花坐久兀睡未
風先寒食則易飢笑則有淚但是老境無不有此或曰局
方烏附丹劑多與老人為宜豈非以老年氣弱下虛理宜
溫補今吾子皆以為熱烏附丹不可施之老人何耶予曉

之曰奚止烏附丹劑不可妄用至於好酒膩肉濕麵肉汁
燒炙煨炒之類辛辣甜滑皆在所忌者或又曰甘旨養老
經訓具在爲子與婦甘旨不及孝道便虧而吾子之言若
是其將有說以通之乎願聞其略予愀然應之曰正所謂
道並行而不相悖者請詳言之古者井田之法行鄉閭之
教具人知禮讓比屋可封肉食不及幼壯五十方纔食肉
當時之人血氣冲和筋骨堅凝腸胃清厚甘旨養老何由
致病今則不然幼小食肉強壯恣饗比及五十疾已蜂起
氣耗血竭筋柔骨痿腸胃壅闕涎沫充溢而况人身之陰
難成易虧六七十後陰不足以配陽孤陽幾欲飛越因天
生胃氣尙爾留連又籍水穀之陰羈縻而不走耳所陳前
證皆是血少內經曰腎惡燥烏附丹劑非燥而何夫血少
之人若防風半夏蒼朮但是燥劑且不敢多况烏附丹劑

乎或者又曰一部局方悉是溫熱養陽吾子之言無乃繆
妄乎予曰局方用燥劑爲劫濕病也濕得燥則豁然而收
局方用煖劑爲劫虛病也補脾不補腎脾得煖則易化而
食進下雖暫虛亦可少回內經治法亦許用劫正是此意
蓋爲質厚而病淺者說此亦儒者用權之意若以爲經常
之法豈不大悞彼老年之人質雖厚此時亦近乎薄病雖
淺其本亦易以撥而可用劫藥以取速効乎若夫形肥者
血多形瘦者血實間或有可用劫藥者設或失手何以收
救吾寧稍遲計出萬全豈不美乎烏附丹劑其不可輕餌
也明矣至於飲食尤當謹節夫老人內虛脾弱陰虧性急
內虛胃熱則易飢而思食脾弱難化則食已而再飽陰虧
難降則氣鬱而成痰至於視聽言動皆成廢懶百不如意
怒火易熾雖有孝子順孫亦是動徹扼腕况未必孝順乎

所以物性之熱者炭火制作者氣之香辣者味之甘膩者皆不可食也明矣雖然腸胃堅厚福氣深壯者世俗觀之何妨奉養縱口固快一時積久必爲災害由是觀之多不如少少不如絕爽口作疾厚味腊毒古人格言猶在人耳可不慎歟或曰如子之言殆將絕而不與於汝安乎予曰君子愛人以德小人愛人以姑息况施於所尊者哉惟飲與食將以養生不以致疾若以所養轉爲所害恐非君子之所謂孝與敬也然則如之何則可曰好生惡死好安惡病人之常情爲子與孫必先開之以義理曉之以物性旁譬曲諭陳說利害意誠辭確一切以敬順行之又須以身先之必將有所感悟而自無杆格之逆矣若子所謂絕而不與施於有病之時尤其是孝道若無病之時量酌可否以時而進某物不食以某物代之何傷於孝敬乎若夫平居

閑話素無開導誘掖之言及至飢腸已鳴饒涎已動飲食在前馨香撲鼻其可禁乎經曰以飲食忠養之忠之一字恐與此意合請勿輕易看過予事老母固有愧於古者然每年踰七旬素多痰飲至此不作節養有道自謂有術只因大便燥結時以新牛乳猪脂和糜粥中進之雖得暫時滑利終是膩物積多次年夏時鬱爲粘痰發爲脇瘡連月苦楚爲人子者置身無地因此苦思而得節養之說時以小菜和肉煮進之且不敢多又間與參朮補胃生血之藥加減遂得大腑不燥面色瑩潔雖瘦弱終是無病老境得健職此之由也因成一方用參朮爲君牛膝芍藥爲臣陳皮茯苓爲佐春加川芎夏加五味黃芩麥冬冬加當歸身倍生姜一日或一貼或二貼候其小水纔覺短少便進此藥小水之長如舊卽是卻病捷法直到八十有七一旦無

病而死。顏貌如生。後到東陽。因聞老何安人性聰敏。七十以後。稍覺不快。便却粥數日。單服人參湯數貼而止。後九十餘。無疾而卒。以其偶同。故筆之。以求是正。

東垣安養心神調治脾胃論。○靈蘭秘典論曰。心者君主之官。神明出焉。凡喜怒忿悲憂思恐懼。皆損元氣。夫陰火之熾盛。由心生凝滯。七情不安。故也。心者神之舍。心君不守。化而爲火。夫火者七神之賊也。故曰陰火太盛。經營之氣不能順養於神。乃脉病也。神無所養。津液不行。不能生血脉也。人心之神。真氣之別名也。得血則生。血生則脉旺。脉者神之舍。若心生凝滯。七神離形。而脉中惟有火矣。善治斯病者。惟在調和脾胃。使心無凝滯。或生懽欣。或逢喜事。或天氣暄和。居溫和處。或食滋味。或見可欲事。則慧然如無病矣。蓋胃中元氣得舒伸。故也。

脾胃將理法。○或方怒不可食。不可大飽。大飢飲食欲相接。而溫和宜穀食多。而肉食少。不宜食肉汁。忌寒濕物。令肌肉不生。陽氣潛伏。四肢怠惰之症。疼痛沉重。時當濕雨。則洩利大便。後有白膿血痢。或腸澀下血痛。此乃諸陽氣不行。陽道之故也。勞則陽氣衰。宜乘車馬遊玩。遇風寒則止。行住坐臥。各得其宜。不可至疲倦。日晴暖。可以溫湯澡浴。勿以熱湯。令汗大出。勿困中。飲食雖飢渴。當先臥至不困。乃食。食後少動作。忌博奕勞心。遇夜汗出。宜避賊風。夜半收心靜坐。少時。此生發周身血氣之大要也。夜寢語言。大損元氣。須默默少時。候周身陽氣行。方可言語。忌浴當風。汗當風。須以手摩汗孔。合方許。見風必無中風中寒之疾。遇卒風暴寒。衣服不能禦者。則宜掙努周身之氣。以當之。氣弱不能禦而受之者。死。遠

行卒遇疫癘之氣飲酒者不病腹中有食者病空腹者死
白粥粳米藁豆小豆鹽豉皆滲利小便且小便數不可
更利况大瀉陽氣反行陰道切禁濕麵如食之覺快勿禁
藥中不可服澤瀉茯苓猪苓燈心琥珀通草木通滑石
之類皆瀉陽道行陰道也如渴小便不利或閉塞不通則
服得利勿再服 忌大鹹助火邪而瀉腎水真陰及大辛
味蒜韭五辣醋大料物官桂乾姜之類皆傷元氣 如衣
薄而氣短則添衣於無風處居處如氣尚短則用沸湯一
碗薰其口鼻即不短也 如衣厚而氣短則宜減衣摩汗
孔令合于漫風處居止 如久居高屋或天寒陰濕所逼
令氣短者亦如前法薰之 如居周密小室或大熱而處
寒涼氣短者則出就風日凡氣短皆宜食滋味湯飲令胃
調和 或大熱能食而渴喜寒飲當從權以飲之然不可

遊八風宜

耽嗜如冬喜熱飲亦依時暫飲 夜不安寢衾厚熱壅故
也當急去之仍拭汗孔或薄而寒即加之睡自穩也 飢
而睡不安則宜少食飽而睡不安則宜少行坐 遇天
氣變更風寒陰晦宜預避之大抵宜溫煖避風寒省言語
少勞役為上 若服升浮之藥先一日將理次日腹空方
服服畢更宜將理十日先三日尤甚不然則反害也
風從南方來名曰大弱風其傷人也內舍於心外在於脉
其氣主為熱全文見脈歲病經諸所謂風者發屋折木揚沙起石開發腠理者也其從太乙所居之方
來者為實風主生長萬物其從衝後來者為虛風主殺害傷人故聖人謹候虛風而避之邪非能害今言風從南方
來者夏至為實風太乙所居之方故也冬至為虛
風者以其衝太乙者故也餘方虛風實風同義
風從西方來名曰謀風其傷人也內舍於脾外在於肌其
氣主為弱立秋為實風立春為虛風
風從西方來名曰剛風其傷人也內舍於肺外在於皮膚

其氣主為燥秋分為實風
春分為虛風

風從西北方來名曰折風其傷人也內舍於小腸外在於

手太陽脉脉絕則溢脉閉則結不通善暴死立冬為實風
立夏為虛風

風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨

與肩背之督筋其氣主為寒冬至為實風
夏至為虛風

風從東北方來名曰凶風其傷人也內舍於大腸外在於

兩脇腋骨下及肢節立春為實風
立秋為虛風

風從東方來名曰嬰兒風其傷人也內舍於肝外在於筋

紐其氣主為身濕春分為實風
秋分為虛風

風從東南方來名曰弱風其傷人也內舍於胃外藏於肌

肉其氣主體重夏至為實風
冬至為虛風

此八風皆從其虛之鄉來乃能病人故聖人避風如避

矢石焉

病禁

病在肝禁當風 病在心禁溫食熱衣 病在脾禁溫食

飽食濕地濡衣 病在肺禁寒飲食與衣 病在腎禁犯

焯煖熱溫食灸衣全文見診病愈劇○宣明五氣篇云心
惡熱肺惡寒脾惡濕腎惡燥今皆就其

所惡而禁之也焯音對
反埃烏來反頤熱也

靈肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸腎病禁甘肺病禁苦五
篇

素五味所禁辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食

鹹苦走骨骨病無多食苦甘走肉肉病無多食甘酸走筋

筋病無多食酸是謂五禁勿令多食宣明五
氣論 肝色青宜

食甘粳米牛肉棗葵皆甘 心色赤宜食酸小豆犬肉李

韭皆酸 肺色白宜食苦麥羊肉杏薤皆苦 脾色黃宜

食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹 腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃

葱皆辛 辛散酸收甘緩苦堅鹹與毒藥攻邪五穀為養

五果爲助五畜爲益五菜爲充氣味合而服之以補精益氣此五者有辛酸甘苦鹹各有所利或散或收或緩或急或堅或爽四時五臟病隨五味所宜也藏氣法時論○五藥以攻病邪五味之中和者則爲穀菜菜以助益充其情氣也仲五臟病各有得者愈五臟病各有所惡各隨其所不喜者爲病病者素不應食而反暴食之必發熱也

用藥宜禁

藥禁
用病雖實胃氣傷者勿便攻擊論○凡言治者多借醫爲喻仁哉斯言也真氣民也病邪盜賊也藥石兵也或有盜起勢須剪除而後已良將良相必先審度兵食之虛實與時勢之可否然後動動涉輕妄則吾民先困於盜次困於兵民困則國弱矣行險僥倖小人所爲萬象森羅果報昭顯其可不究心乎治呂氏寒戰用莖葛愈一法治葉先生滯下用參朮而後下之愈○一法治婦

人積塊用消石丸大峻後用補劑間服愈詳各見本門大凡攻擊之藥有病則受之病邪輕藥力重則胃氣受傷夫胃氣者清純冲和之氣也惟與穀肉菜果相宜蓋藥石皆是偏勝之氣雖參芪輩爲性亦偏况攻擊之藥乎 忌春夏不宜桂枝秋冬不宜麻黃 藥忌已汗者不可再發已利者不可再利 病忌虛人不宜用涼實人不宜用熱

時禁

東垣凡治病服藥必知時禁經禁病禁藥禁夫時禁者必本四時升降之理汗下吐利之宜大法春宜吐象萬物之發生耕耨斫斫使陽氣之鬱者易達也夏宜汗象萬物之浮而有餘也秋宜下象萬物之收成推陳致新而使陽氣易收也冬宜周密象萬物之閉藏使陽氣不動也夫四時陰陽者與萬物沉浮於生長之門逆其根伐其本壞其真矣用溫遠溫用熱遠熱用涼遠涼用寒遠寒無翼其勝也

故冬不用白虎夏不用青龍春夏不用桂枝秋冬不服麻黃不失氣宜如春夏而下秋冬而汗是失天信伐天和也。有過則從權過則更之。經禁者足太陽膀胱諸陽之首。行於背表之表風寒所傷則宜汗傳入本則宜利小便。若下大早則變証百出此一禁也。足陽明胃經行身之前。病主腹滿脹大便難宜下之。蓋陽明化燥火津液不能停禁。若發汗利小便爲重損津液。此二禁也。足少陽膽經行身之側在太陽陽明之間。病則往來寒熱口苦胸脇痛祇宜和解。且膽者無出無入。又主發生之氣。下則犯太陽汗則犯陽明利小便則使發生之氣反陷入陰中。此三禁也。三陰非胃實不當下。爲三陰無傳本須胃實得下也。分經用藥有所據焉。病禁者如陽氣不足陰氣有餘之病。則凡飲食及藥忌助陰瀉陽諸淡食及淡味藥物瀉陽升發以

藥禁

助收斂諸苦藥皆沉瀉陽氣之散浮。諸姜附官桂辛熱之藥及濕麪酒大料物之類助火而瀉元氣。生冷硬物能損陽氣皆所當禁也。如陰火欲衰而退以三焦元氣未感必口淡如鹹物亦所當禁也。藥禁者如胃氣不行內亡津液而乾涸求湯飲以自救非渴也。乃口乾也。非濕勝也。乃血病也。當以辛酸益之而淡滲五苓之類則所當禁也。汗多禁利小便小便多禁發汗咽痛禁發汗利小便。若大便快利不得更利大便秘澀以當歸桃仁麻子仁郁李仁皂角仁和血潤腸如燥藥則所當禁者也。吐多不得復吐如吐而大便虛軟者。此上氣壅滯以姜橘之屬宣之。吐而大便不通則利大便藥所當禁也。諸病惡瘡小兒痲後大便實者亦當下之。而姜橘之類則所當禁也。人知脉弦而服平胃散脉緩而服黃芪建中湯乃實實虛虛皆所當禁也。

人稟天地之濕化而生胃也胃之與濕其名雖二其實一也濕能滋養于胃胃濕有餘亦當瀉其太過也胃之不足惟濕物能滋養仲景云胃勝思湯餅而胃虛食湯餅者往往增劇濕能助火火旺鬱而不通則生大熱初病火旺不可食濕以助火也察其時辨其經審其病而後用藥四者不失其宜則善矣

丹大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田者所以補陽陽生陰長故也不可用附子可多服人參

垣春宣論○春蠶也陽氣升浮草木萌芽蠢然而動人氣在頭有病宜吐又曰傷寒大法春宜吐宣之爲言揚也謂吐之法自上而出也今世俗往往有瘡癩者膈滿者蟲積者以爲不於春時宣瀉毒氣不可愈也醫者遂用牽牛巴豆大黃枳殼防風葶藶爲丸藥名之曰春宣丸於二月三月

春忌下

服之謂俾下利而止初瀉之時臟腑得通時暫輕快殊不知氣升在上則在下之陰甚弱而用利藥戕賊真陰其害何可勝言况仲景承氣湯等下劑必有大滿大堅實有燥屎轉矢氣下逼迫而無表証者方行此法可下之証悉具猶須遲以待之泄利之藥其可輕試之乎予伯考形肥骨瘦味厚性沉五十歲輕於聽信忽於三月半贖春宣丸服之下二三行甚快每年習以爲常至五十三歲時七月初熱甚無病暴死此豈非妄用春宣爲春瀉而至禍耶自上召下曰宣宣之一字爲吐也明矣子和已詳論之昔賢豈妄言哉後之死者又有數人愚故表而出之以爲後人之戒

夏忌溫

夏日伏陰在內論○天地以一元之氣化生萬物根於中者曰神機根于外者曰氣血萬物天地同此一氣人靈於

物形與天地參而為三者以其得氣之正而通也故氣升亦升氣浮亦浮氣降亦降氣沉亦沉人與天地同一橐籥也子月一陽生陽初動也寅月三陽生陽初出於地此氣之升也已月六陽生陽盡出於上此氣之浮也人之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹中之陽虛矣經曰夏者經滿氣溢孫絡受血皮膚充實長夏氣在肌肉所以表實表實者裏必虛也世言夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷看其悞甚矣或曰以手捫腹明知其冷非冷而何前人治暑病有玉龍丹大順散桂苓丸單煮良姜與縮脾飲用草果等皆溫熱之劑何吾子不思之甚也予曰經云春夏養陽王太僕謂春食涼夏食寒所以養陽也其意可見矣若夫涼臺水閣大扇風車陰木寒泉水果冰雪寒涼之傷自內及外不用溫熱病何由安詳玩其意實非

為內伏陰而用之也前哲又謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之若於夏月火令之時妄投溫熱寧免實實虛虛之患乎或曰四月純陽於理或通五月一陰六月二陰非陰冷而何予曰此陰之初動於地下也四陽浮於地上燔灼焚燎流金礫石何陰冷之有孫真人製生脉散令人夏月服之非虛而何東垣經云一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾聖濟經曰陽劑剛勝積若燎原為消渴癰疽之屬則天癸竭而榮涸陰劑柔勝積若凝冰為洞泄寒中之屬則真火微而衛散故大寒大熱之藥當宜權用之氣平而止如寒熱有所偏勝令人臟氣不平嗚呼生死之機捷若影嚮殆不可忽

丹局方地榆散○治痢每用粟殼地榆而治瘧每用砒丹常山然此四五件亦痢瘧之一藥但以粟殼輩投之一二

瘡家身疼忌汗

傷寒衄血脈微忌汗

服投之不止反閉胃口而有嘔逆之証漸成禁口常山葶
 投之一二服投之不去反耗損真氣而寒熱纏綿之咎漸
 成勞瘵今局方水菘木香丸以青皮為君地榆散以枳殼
 為君稍可擔負亦須證明而後可但枳殼為君以枳實為
 臣非獨止痢且有安胃氣止澹泄之功若止用枳殼雖亦
 言其安胃氣却無止痢止澹泄之功局方中地榆散當去皮用
 羅仲景云瘡家雖身疼痛不可發汗其理何也予曰此榮
 氣不從逆於肉理而為瘡腫作身疼痛非身感寒邪而作
 疼痛故戒之以不可發汗如汗之則成瘡又問仲景言鼻
 衄者不可發汗復言脈浮緊者當服麻黃湯發之衄血自
 止所說不同願聞其故答曰此與瘡家槩同且夫人身血
 之與汗異名而同類奪血者無汗奪汗者無血今衄血妄
 行為熱所逼若更發其汗則反助熱邪重竭津液必變凶

証故不可汗若脈浮則為在表緊則為寒寒邪鬱遏陽不
 得伸熱伏營中迫血妄行上出於鼻則當麻黃湯散其寒
 邪使陽氣得伸其衄自止又何疑焉或者嘆曰知其要者
 一言而終不知其要者流散無窮潔古之學可謂知其要
 者矣傷寒衄忌汗者微脈

海當汗而不汗則生黃當利小便而不利亦然脾主肌肉
 四肢寒濕與內熱相合故也 不當汗而汗亡其津液令
 毒氣擾陽之極極則侵陰矣故燥血而畜之胃中或利小
 便過多亦然○若犯發汗多畜血上焦為衄若利小便多
 畜血為發狂 或問曰傷寒雜症一體若誤下變有輕重
 何也答曰傷寒誤下變無定體雜症誤下變有定體何以
 然曰傷寒自外而入陽也陽主動雜証自內而出陰也陰
 主靜動者犯之其變無窮靜者犯之其變止痞與腹脇痛

而已故變無窮者為重病痞與脇痛者為輕也。

羅無病服藥辨諺云無病服藥如壁裏安柱此無稽之說為害甚大夫天之生物五味備焉食之以調五臟過則生疾故經云陰之所生本在五味陰之五官傷在五味又曰五味入胃各隨其所喜故酸先入肝辛先入肺苦先入心甘先入脾鹹先入腎久而增氣氣增而久天之由也又云酸走筋辛走氣苦走骨鹹走血甘走肉五味者口嗜而欲食之必自裁制勿使過焉至於五穀為養五果為助五畜為益五菓為充氣味合而食之補精益氣倘用之不時食之不節猶或生疾况藥乃攻邪之物無病而可服乎聖濟經云彼修真者蔽於補養輕餌藥石陽劑剛勝積若燎原為消渴癰疽之屬則天癸絕而陰涸陰劑柔勝積若凝冰為洞泄寒中之屬則真火微而衛散一味偏勝一臟偏傷

一臟受傷四臟安得不病唐孫思邈言藥勢有所偏勝令人臟氣不平裴潏諫唐憲宗曰夫藥以攻病非朝夕嘗用之物况金石性酷烈有毒又加煉以火氣非人五臟所能禁至於張臯諫穆宗曰神慮淡則氣血和嗜欲多而疾疾作夫藥以攻疾無病不可餌故昌黎伯銘李子之墓曰余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也今直取目見親與之遊而以藥敗者六七公以為世誠工部尚書歸登殿中御史李虛中刑部尚書李遜第刑部侍郎常建襄陽節度使工部尚書孟簡東川節度使御史大夫盧植金吾將軍李道古今又復取目見者言之僧闡仲章服火煉丹砂二粒項出小瘡腫痛不任牙痒不能嚼物服涼膈散半斤始緩後飲酒輒發藥以寒涼之劑則緩終身不愈鎮人李潤之身體肥盛恐生風疾至春服

搜風九月餘便下無度飲食減少舌不知味口乾氣短臍
腹痛足脛冷眩運欲倒面色青黃不澤日加困篤乃告親
知曰妄服藥禍悔將何及後添煩躁喘滿至秋而卒張秀
才者亦聽方士之說服四生丸推陳致新服月餘大便或
溇或瀉飲食妨阻怠惰嗜臥目見黑花耳聞蟬聲神虛頭
旋飄飄然身不能支至是方知藥之悞也遂調飲食慎起
居謹於保養二三年間其証猶存踰十年後方平復劉氏
子聞人言臘月晨飲凉水一杯至春無目疾遂飲之旬餘
腹中寒痛不任咳嗽嘔吐全不思食惡水而不欲見足脛
寒而逆醫以除寒燥熱之劑急救之終不能効此皆無故
求益生之祥反生病焉或至於喪身殞命壁裏安柱果安
在哉且夫高堂大厦樑棟安基址固壞塗毀墜安柱壁中
甚不近人情繫古老人云無病服藥無事生事此誠不易

之論人之養身幸五臟之安泰六腑之和平謹於攝生春
夏奉以生長之道秋冬奉以收藏之理飲食之有節起居
而有常少思寡慾恬淡虛無精神內守此無病之時不藥
之藥也噫彼數人者既往不咎矣後人當以此為龜鑑哉
仲陰盛陽虛不宜下辨○陰盛陽虛汗之則愈下之則死
此言邪氣在表之時也夫寒邪屬陰身之外皆屬陽各臟
腑之經絡亦屬陽也蓋陽氣為衛衛氣者所以溫肌肉充
皮毛肥腠理司開闔此皆衛外而為固也或煩勞過度陽
氣內損不能為固陽為之虛陽虛者陰必湊之故陰得以
勝邪氣勝則實陰盛陽虛者此也陰邪既勝腠理緻密陽
氣伏鬱不得通暢所以發熱惡寒頭項痛腰脊強應解散
而藥用麻黃者本草云輕可去實葛根麻黃之屬是也蓋
麻黃能退寒邪使陽氣伸越作汗而解故曰陰盛陽虛汗

之則愈裡氣和平而反下之中氣既虛表邪乘虛而入由是變症百出故曰下之則死外臺秘要云表病裏和汗之則愈下之則死正此意也

仲陽盛陰虛不宜汗辨○陽盛陰虛下之則愈汗之則死此言邪氣在裏之時也夫寒邪始傷於表不解而漸傳入於裏變而爲熱人之身在裏者爲陰華陀云一日在皮二日在膚三日在肌四日在腎五日在腹六日入胃入胃謂之入腑也腑之爲言聚也若府庫而聚物焉又爲水穀之海榮衛之源邪氣入於胃而不復傳流水穀水穀不消去鬱而爲實也此陽盛陰虛者此也故潮熱引飲腹滿而喘手足熱熱汗出大便難而譫語宜大承氣湯下之則愈潮熱者實也此外已解可攻其裏而反汗之表無陰邪汗又助陽陽實而又補表表裏俱熱不死何待外臺秘要云表

和裏病下之則愈汗之則死正此意也

汗多亡陽○齊大兄冬月因感寒邪頭項強身體痛自用酒服靈砂丹四五粒遂大汗出汗後身輕至夜前病復來以前藥復汗其病不愈復以通聖散發汗病添身體沉重足脛冷而惡寒是日方命醫醫者不究前治又以五積散汗之翌日身重如石不能反側足脛如冰冷及腰背頭汗如貫珠出而不流心胸燥熱煩亂不安喜飲西瓜梨柿冰水之物常置左右病至於此命予治之脰得六脉如蛛絲微微欲絕予以死決之主家曰得汗多矣焉能爲害予曰夫寒邪中人者陽氣不足之所致也而感之有輕重治之者豈可失其宜哉仲景云陰盛陽虛汗之則愈汗者助陽退陰之意也且寒邪不能自汗必待陽氣泄乃能出也今以時月論之大法夏月宜汗然亦以太過爲戒况冬三月

閉藏之時無擾乎陽無泄皮膚使氣亟奪為養藏之道也
逆之則少陰不藏此冬氣之應也凡有觸冒宜微汗之以
平為期邪退乃已急當衣煖衣居密室服實表補衛氣之
劑雖有寒邪弗能為害此從權之治也今非時而大發其
汗乃謂之逆故仲景有云一逆尚引日再逆促命期今本
傷而并汗汗而復傷傷而復汗汗出數四使氣亟奪衛氣
無守陽泄於外陰乘於內故經云獨陽不生獨陰不長不
死何待雖盧扁亦不能治也是日至夜將半項強身體不
仁手足搐急瓜甲青而死矣金匱要畧云不當汗而妄汗
之奪其津液枯槁而死今當汗之一過中亦絕其命況不
當汗而強汗之者乎

下多亡陰○真定趙客乙丑歲六月間客於他方因乘困
傷濕麵心下痞滿燥熱時作臥不得安遂宿於寺中僧妄

以大毒食藥數九下十餘行心痞稍減越日困睡為盜劫
其財貨心有所動遂燥熱而渴飲冷水一大甌是夜臍腹
脹痛僧再以前藥復下十餘行病加困篤四肢無力燥熱
身不停衣喜飲冷水米穀不化痢下如爛魚腸腦赤水相
雜全不思食強食則嘔痞甚於前噫氣不絕足脣冷少腹
不任其痛請予治之診其脈浮數八九至按之空虛予泝
流而尋源蓋暑天之熱已傷正氣又以有毒大熱之劑下
之一下之後其所傷之物已去而無遺矣遺巴豆之氣流
毒於腸胃之間使嘔逆而不能食胃氣轉傷而然及下膿
血無度大肉陷下皮毛枯槁脾氣弱而衰也舌上赤澁咽
乾津液不足下多亡陰之所致也陰既亡心火獨旺故心
腎燥熱煩亂不安經曰獨陽不生獨陰不長天之由也遂
辭而退後易他醫醫至不審其脉不究其源惟見痞滿以

枳殼丸下之病添喘滿利下不禁而死金匱要畧云不當下而強下之令人開腸洞泄便溺不禁而死此之謂也夫聖人治病用藥有法不可少越內經曰大毒治病十去其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病十去其九復以穀肉果菜食養盡之無使過之過則傷其正矣記有之云醫不三世不服其藥蓋慎之至也彼僧非醫流妄以大毒之劑下之太過數日之間使人殞身喪命用藥之失其禍若此病之擇醫可不謹乎戒之戒之

方成勿約之失○丁巳冬十一月予從軍回至汴梁有伶人李人愛謂予曰大兒自今歲七月間因勞役渴飲涼茶及食冷飯覺心下痞請醫治之醫投藥一服下利兩行其症遂減不數日又傷冷物心腹復痞滿嘔吐惡心飲食無味且不飲食四肢困倦懶於言語復請前醫診視曰此病

易為更利幾行即快矣遂以無憂散對加牽牛末白湯服至夕腹中雷鳴而作陣痛少焉既吐又瀉煩渴不止飲食無度不復能禁時發昏憤再命前醫視之診其脉不能措手而退頃之冷汗如洗口鼻氣漸冷而卒矣小人悔恨無反敢以為問予曰未嘗親見不知所以然既去或曰予親見之果藥之罪歟而非歟予曰此非藥之罪乃失其約量之過也夫藥之無據反為氣賊內經云約方猶約囊也囊滿弗約則輸泄方成弗約則神與氣弗俱故仲景以桂枝治外傷風邪則曰若一服汗出病瘥停後服不必盡劑大承氣湯下大實大滿則曰得更衣止後服不必盡劑其慎如此此為大戒蓋得聖人約囊之旨也治病必求其本蓋李人以雜劇為戲勞神損氣而其中痛因時暑熱渴飲涼茶脾胃氣弱不能運化而作痞滿以藥下之是重困也加

以不慎又損其陽虛而復傷傷而復下陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆內起仲景所謂一逆尚引日再逆促命期如是則非失約量之過而何故內經戒云上工平氣中工亂脉下工絕氣不可不慎也

脫營忌瀉○疏五過論云常貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營鎮陽一士人軀幹魁梧而意氣豪雄喜交遊而有四方之志年踰三旬已入仕至五品出入從騎塞途姬侍滿前飲食起居無不如意不三年以事罷去心思鬱結憂慮不已以致飲食無味精神日減肌膚漸至瘦弱無如之何遂耽嗜於酒久而中滿始求醫醫不審得病之情輒以丸藥五粒溫水送下二十餘行時值初秋暑熱猶盛因而煩渴飲冷過多遂成腸鳴腹痛而為痢疾有如魚腦以至困篤命予治之診其脉乍大乍小其症反覆悶亂兀兀

欲吐嘆息不絕予料曰此病難治啓玄子云神屈故也以其貴之尊榮賤之屈辱心懷慕戀志結憂惶雖不中邪病從內生血脉虛減名曰脫營或曰願聞其理黃帝針經有曰宗氣之道內穀為主穀入於胃乃傳入於脉流溢於中布散於外精專者行於經隧周而復始常營無已是為天地之紀故氣始從手太陰起注於陽明傳流而終於足厥陰循腹裏入缺盆下注肺中於是復注手太陰此營氣之所行也故晝夜氣行五十營漏水下百刻凡一萬三千五百息所謂交通者並行一數也故五十營備得盡天地之壽矣今病者始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀阻暴喜傷陽暴怒傷陰喜怒不能自節蓋心為君主神明出焉肺為輔相主行營衛制節由之主貪人欲天理不明則十二官相使各失所司使道閉塞而不通由是則經營之氣

脫去不能灌溉周身百脉失其天度形乃大傷以此養生則殃何疑之有

瀉火傷胃○經歷晉才卿膏梁而飲至春病衄醫曰諸見血為熱以清涼飲子投之即止越數日其疾復作醫又曰藥不勝病故也遂投黃連解毒湯既而或止而復作易醫數四皆用苦寒之劑俱欲勝其熱然終不愈而飲食起居浸不及初肌寒而時躁言語無聲口氣臭穢如冷風然其衄之餘波則未絕也或曰諸見血者熱衄熱也熱而寒之理也今不惟不愈而反害之何哉予言內經曰五臟以平為期又云下工絕氣不可不慎也彼惟知見血為熱而以苦寒攻之抑不知苦寒能瀉脾胃夫脾胃土也乃人身之所以為本者也今火為病而瀉其土火固未嘗除而土已病矣土病則胃虛胃虛則榮氣不能滋榮百脉元氣不

循天度氣隨陰化而變無聲與肌寒也噫粗工嘻嘻以為可治言熱未已寒病復起此之謂也

下工絕氣危生○丁巳予從軍至開州夏月有千戶高國用謂予曰父親年七十有三於去歲七月間因內傷飲食又值霖雨瀉痢暴下數行醫以藥止之不數日又傷又瀉止而復傷傷而復瀉至十月間肢體瘦弱四肢倦怠飲食減少腹痛腸鳴又以李醫治之處以養臟湯治之數日泄止後添嘔吐又易以王醫用丁香人參蘆香橘紅甘草同為細末生姜煎數服而嘔吐止延至今正月間飲食不進扶而後起又數日不見大便予問醫曰父親不見大便何以治之醫曰老官人年過七旬血氣俱衰弱又况瀉痢半載脾胃久虛津液耗少以麻仁丸潤之可也眾親商議一親曰馮村牛山人見証不疑有果決遂請治之診其脉問

其病曰此是風結也以搜風丸百餘丸服之利數行而死
予悔恨不已敢以為問予曰人以水穀為本今高年老人
久瀉胃中津液耗少又重瀉之神將何依靈樞經曰形氣
不足病氣不足此陰陽俱不足也不可瀉之瀉之則重不
足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老
者絕減少者不復矣又曰上工平氣中工亂脉下工絕氣
危生絕氣危生其牛山人之謂歟

用藥無據反為氣賊○北京按察書吏李仲寬年五旬至
元巳巳春患風症半身不遂麻痺言語蹇澁精神昏憤一
友處一法用大黃半斤黑豆三升水一斗同煮豆熟去大
黃新汲水淘淨每日服二三合則風熱自去服之過半又
一友云用通聖散四物湯黃連解毒湯相合服之其効尤
速服月餘精神愈困遂還真定歸家養病親舊獻方無數

不能悉錄又增瘖瘂不能言氣冷手足寒命予診視細詢
前由盡得其說予診之六脈如蛛絲細予謂之曰夫病有
表裏虛實寒熱不等藥有君臣佐使大小奇偶之制君所
服藥無考憑故病愈甚今已無救君自取耳未幾而死有
吏曹通甫妻蕭氏年六旬有餘孤寒無依春月忽患風疾
半身不遂言語蹇澁精神昏憤口眼喎斜與李仲寬症同
予刺十二經井穴接其經絡不通又灸肩井曲池詳病時
月處藥服之減半予曰不須服藥病將自愈明年春在張
子敬郎中家見其行步如舊予嘆曰夫人病痊得不亂服
藥之故由此論之李仲寬亂服藥終身不救蕭氏貧困恬
憺自如內經曰用藥無據反為氣賊聖人戒之一日姚雪
齋舉許先生之言曰富貴有二事反不如貧賤有過惡不
能匡救有病不能醫療噫李氏之謂歟

戒妄下。○真定鈔庫官李提舉年踰四旬體幹魁梧肌肉豐盛有僚友師君告之曰肥人多風証今君如此恐後致中風搜風丸其藥推陳致新化痰宜服之李從其言遂合一料每日服之至夜下五行如是半月覺氣短而促至月餘添怠惰嗜臥便白膿小便不禁足至膝冷腰背沉痛飲食無味仍不欲食心胸痞滿時有燥熱健忘恍惚不安凡三易醫皆無效因陳其由請予治之予曰孫真人云藥勢有所偏助令人臟氣不平藥本攻疾無疾不可餌平人穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所依君本身體康強五臟安泰妄以小毒之劑日下數行初服一日且推陳矣陳積已去又何推焉今飲食不為肌膚水穀不能運化精微灌溉五臟六腑周身百脉神將何依故氣短而促者真氣損也怠惰

嗜臥者脾氣衰也小便不禁者膀胱不藏也便下膿血者胃氣下脫也足脛寒而逆者陽氣微也時有燥熱心下虛痞者胃氣不能上營也恍惚健忘者神明亂也金匱云不當下而強下之令人開腸洞泄便溺不禁而死前証所生非天也君自取之治雖粗安促命期矣李聞之驚恐汗浹於背起謂予曰妄下之過悔將何及雖然君當盡心救其失予以爲病勢過半病將難痊固辭而退至秋疾甚醫以奪命散下之燥熱喘滿而死內經曰誅罰無過是謂大惑如李君者內經所謂大惑之人也衛生君子可不戒哉

刺禁

靈五臟之氣已絕於內而用針者反實其外是謂重竭重竭必死其死也靜治之者輒反其氣取腋與膺針經云五絕於內者脉氣口內絕不知者反取其外之病處與陽經之合有留針以致陽氣陽氣至則內重竭重竭則死矣其

死也無氣五臟之氣已絕於外而用針者反實其內是謂
逆厥逆厥則必死其死也躁治之者反取四末針解云五臟之氣已絕於外者脈氣口外絕不知者反取其四末之輸有留針以致其陰氣陰氣至則陽氣反入入則逆逆則死矣陰氣有餘故躁○難經云五臟脈絕於內者腎肝氣已絕於內也而醫反補其心肺五臟脈絕於外者心肺脈已絕於外也而醫反補其腎肝陽絕補陰陰絕補陽是謂實實虛虛損不足益有餘如此死者醫殺之耳刺之害中而不去則精泄害中而去則致氣精泄則病益甚而恇致氣則生為癰瘍無實實虛虛損不足而益有餘是謂甚病病益甚難經云假令肺實而肝虛肝者木也肺者金也金微少氣用針不補其肝而反重實其肺故曰取五脈者死實實虛虛損不足而益有餘是中工所害也取三陽之脈者恇針解云言用針盡大瀉其諸陰之脈也取三陽之脈者恇針解云言恇然不復也奪陰者死針解云言取尺之五里五往者也奪陽者狂針害畢矣針解云奪陽者狂正言也

甲問曰針能殺生人豈不能起死人乎對曰能殺生人不

能起死人者也是人之所生受氣於穀穀之所注者胃也胃者水穀之府氣血之海也海之所行雲雨者天下也胃之所出氣血經隧也經隧者五臟六腑之大絡也迎而奪之而已矣迎之五里中道而止五至而已五往而藏之氣盡矣故五五二十五而竭其輸矣此所謂奪其天氣者也故曰闕門而刺之者死於家中入門而刺之者死於堂上黃帝曰請傳之後世以為刺禁經隧靈樞作經墜凡刺之補瀉無過其度與脈逆者無刺

靈凡刺之禁 新內勿刺 新刺勿內 已刺勿醉

已醉勿刺 新怒勿刺 已怒勿刺 新勞勿刺

已刺勿勞 已飽勿刺 已刺勿飽 已饑勿刺

已刺勿饑 已渴勿刺 已刺勿渴 大驚大恐

必定其氣乃刺之 乘車來者臥而休之如食頃乃刺之

步行來者坐而休之如行十里頃乃刺之

凡此十二禁者其脉亂氣散逆其榮衛經氣不次因而刺之則陽病入於陰陰病出於陽邪氣不生粗工不察是謂伐身形肉已奪是一奪也大奪血之後是二奪也大奪汗之後是三奪也大泄之後是四奪也新產又大下血是五奪也此皆不可瀉也

素天温日明則人血淖液而衛氣浮故血易瀉氣易行天寒日陰則人血凝泣而衛氣沉月始生則血氣始精衛氣始行月廓滿則血氣實肌肉堅月廓空則肌肉減經絡虛衛氣去形獨居是以因天時而調血氣也是以天寒無刺天温無疑月生無瀉月滿無補月廓空無治是謂得時而調之因天之序盛虛之時移光定位正立而待之故日月生而瀉是謂藏虛月滿而補血氣揚溢絡有留血命曰重

藏府禁

實月廓空治是謂亂經陰陽相錯真邪不別沉以流止外虛內亂淫邪乃起入正神明論刺陽明出血氣刺太陽出血惡氣刺少陽出血惡血刺太陰出血惡血刺少陰出血惡血刺厥陰出血惡氣也血氣形志篇

穴禁

甲神庭禁不可刺 上關刺不可深令人耳無聞

顛顛刺不可多出血 左角刺不可久留

人迎刺過深殺人 雲門刺不可深使人逆息不能食

缺盆刺不可過深使人逆氣 五里禁不可刺手陽明經穴

臍中禁不可刺 伏兔禁不可刺刺五分

三陽絡禁不可刺 復溜刺無多見血

承筋禁不可刺 然谷刺無多見血

乳中禁不可刺 鵝尾禁不可刺

靈刺上關者，喏不能欠，刺下關者，欠不能喏。刺犢鼻者，屈不能伸，刺兩關者，伸不能屈。本論

時禁

素春氣在經脈，夏氣在孫絡，長夏氣在肌肉，秋氣在皮膚，冬氣在骨髓。中帝曰：願聞其故。岐伯曰：春者天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脈。夏者經滿氣溢，入孫絡受血，皮膚充實，長夏者經絡皆盛，內溢肌中。秋者天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急，冬者蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通于五臟，是故邪氣者常隨四時之氣血而入客也。至其變化不可為度，然必從其經氣，辟除其邪，則亂氣不生。帝曰：逆四時而生亂氣，奈何？岐伯曰：春刺絡脈，血氣外溢，令人少氣；春刺肌肉，血氣環逆，令人上氣；春刺筋骨，血氣內著，令人腹脹。夏刺經脈，血氣乃竭，令人解休；夏刺肌肉，血氣內却，令人善恐；夏刺筋骨，血氣上逆，令人善怒。

秋刺經脈，血氣上逆，令人善忘；秋刺絡脈，氣不外行，令人臥不欲動；秋刺筋骨，血氣內散，令人寒慄。冬刺經脈，血氣皆脫，令人目不明；冬刺絡脈，內氣外泄，留為大痺。冬刺肌肉，陽氣竭絕，令人善忘。凡此四時刺者，大逆之病不可不從也。反之則生亂氣，相淫病焉。故刺不知四時之經病之所生，以從為逆，正氣內亂，與精相薄，必審九候，正氣不亂，精氣不轉。四時刺逆從論

日辰禁

春甲乙日自乘，無刺頭，無發朦于耳內；夏丙丁日自乘，無振埃于肩喉，廉泉長夏戊巳日自乘，四季無刺腹，去爪瀉水。秋庚辛日自乘，無刺關節于股膝；冬壬癸日自乘，無刺足脛，是謂三禁。

刺法淺

素黃帝問曰：願聞刺要。岐伯對曰：病有浮沉，刺有淺深，各至其理，無過其道。過之則內傷，不及則生外壅，壅則邪從。

之淺深不得反為大賊內動五臟後生大病故曰病有在毫毛腠理者有在皮膚者有在肌肉者有在脉者有在筋者有在骨者有在髓者是故刺毫毛腠理無傷皮皮傷則內動肺肺動則秋病溫瘧泝泝然寒慄刺皮無傷肉肉傷則內動脾脾動則七十二日四季之月病腹脹煩不嗜食刺肉無傷脉脉傷則內動心心動則夏病心痛刺脉無傷筋筋傷則內動肝肝動則春病熱而筋弛刺筋無傷骨骨傷則內動腎腎動則冬病脹腰痛刺骨無傷髓髓傷則銷鑠胘酸體解依然不去矣

刺要論

雜禁

凡刺之道必中氣穴無中肉節中氣穴則針遊于巷中肉節則皮膚痛補瀉反則病益篤中筋則筋緩邪氣不出與真相搏亂而不去反還內着用針不審以順為逆刺中心一日死其動為噫刺中肺三日死其動為欬刺中肝五日

死其動為欠

素問作語

刺中脾十五日死

素問作十日

其動為吞刺

中腎三日死

素問作六日又云七日

其動為噦刺中膽一日半死其

動為嘔刺中膈為傷中其病雖愈過一歲必死刺跗上中大脉血出不止死刺陰股中大脉血出不止死刺面中溜脉不幸為盲刺客主人內陷中脉為內漏為齧刺頭中腦戶入腦立死刺膝髓出液為跛刺舌下中脉太過血出不止為瘡刺臂太陰脉出血多立死刺足下布絡中脉血不出為腫刺足少陰脉重虛出血為舌難以言刺郄中大脉令人仆脫色刺膺中陷中肺素曰刺膺中陷中脉為喘逆仰息刺氣衝中脉血不出為腫鼠蹠刺肘中內陷氣歸之為不屈伸刺脊間中髓為偃刺陰股下三寸內陷令人遺溺刺乳上中乳房為腫根蝕刺腋下脇間內陷令人欬刺缺盆中內陷氣泄令人喘欬逆刺少腹中膀胱溺出令人少腹滿刺

手魚腹內陷為腫刺膈腸內陷為腫刺匡上陷骨中脉為漏為盲刺關節中液出不得屈伸俱出刺禁篇

宜灸

垣針經云陷下則灸之天地間無他惟陰與陽二氣而已陽在外在上陰在內在在下今言陷下者陽氣下陷入陰血之中是陰反居其上而覆其陽脉証俱見寒在外者則灸之異法方宜論云北方之人宜灸熯也為冬寒大旺伏陽在內皆宜灸之以至理論之則腎主藏藏陽氣在內冬三月主閉藏是也太過則病固宜灸熯此陽火陷入陰水中是也難經云熱病在內取會之氣穴為陽陷入陰中取陽氣通天之竅穴以火引火而導之此宜灸熯也若將有餘之病一槩灸之豈不悞哉仲景云微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也又云脈浮宜以汗解用火灸之

邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也脉浮熱甚而反灸之此為實實而虛治因火而動必咽燥唾血又云身之穴三百六十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之為災并中髓也仲景傷寒例第三十

按明堂針經各條下所說禁忌明矣內經云脉之所見邪之所在脉沉者邪氣在內脉浮者邪氣在表世醫只知脉之說不知病症之禁忌若表見寒証身汗出身常清數慄而寒不渴欲覆厚衣常惡寒手足厥皮膚燥枯其脉必沉細而遲但有一二症皆宜灸之陽氣下陷故也若身熱惡熱時見燥作或面赤面黃咽乾噤乾口乾舌上黃赤時渴咽噤痛皆熱在外也但有一二症皆不宜灸其脉必浮數或但數而不浮亦不可灸灸之則災害立生若有鼻不聞香臭鼻流清涕眼臉時痒或欠或

捷惡寒其脈必沉是脈証相應也或輕手得弦緊者是陰伏其陽也雖面赤宜灸之不可拘于面赤色而禁之也更有腦痛惡寒者雖面赤亦宜灸風府一穴若帶偏腦痛更惡風者邪在少陽宜灸風池無灸風府然艾炷不宜大但如小麥粒一七壯足矣若多灸艾炷大防損目四十五難曰八會者何也然府會太倉藏會季脇筋會陽陵泉髓會絕骨血會膈俞骨會大杼脉會太淵氣會三焦外一筋直兩乳內也熱病在內者取其會之氣穴東垣辨之矣內經中說熱病在內取會之氣穴皆陷下者灸之從陰引陽於背膂府會太倉太倉者中腕也是六府六陽之總稱也藏會季脇者脾之募也在腰背腹募之間與臍平是兩儀之間也五藏六府陽陷者皆取脾胃是萬物有餘皆出於土也脾者五藏之總稱也

帶脉者脾之附經也又其別稱也血會膈俞高俞者背之上也骨會大杼大杼者背也髓會絕骨絕骨者是骨名也在足外踝上也乃足少陽之分筋會陽陵泉陽陵泉者足少陽經中膝下外側也脈會太淵太淵者兩寸脉也氣會膻中膻中者兩乳是也熱病在內取會之氣穴者謂熱陷于內故取百會之穴以灸伸之此為陷下者灸之非太過不及本經所生自病中它邪者乃以經取之也恐後學所疑復明其理以証之陷者皮毛不任風寒知陽氣下陷也其脉中得必細弦而緊小或沉澁覆其上知其熱火陷下也雖脈八九至甚數而陰脉覆其上者皆可灸陰脈者細弦緊小沉澁如上說是也

禁灸

頭維禁不可灸

承光禁不可灸

腦戶禁不可灸

風府禁不可灸

灸之不幸使人瘖

瘖門禁不可灸

灸之使人瘖

耳門耳中有膿不可灸

下關耳中有乾耄不可灸

人迎禁不可灸

絲竹空禁不可灸灸之不幸使人目小及盲

承泣禁不可灸

脊中禁不可灸

白環俞禁不可灸

乳中禁不可灸

石門女子禁不可灸

氣衝灸之不得息

淵液禁不可灸

鳩尾禁不可灸

陰市禁不可灸

陽關禁不可灸

天府禁不可灸

伏兔禁不可灸

地會五禁不可灸

瘰癧禁不可灸

經渠禁不可灸

使人傷人神

醫學綱目卷之九

醫學綱目卷之十

肝膽部

諸風

大法

寒熱

不仁

素帝問曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風或為偏枯或為風也其病各異其名不同或內至五臟六腑不知其解願聞其由岐伯對曰風氣藏于皮膚之間內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人怵慄而不能食名曰寒熱風論治見寒熱門○怵

風氣與陽明入胃循脉而上至目內眦其人肥則風氣不得外泄則為熱中而目黃人瘦則外泄而寒則為寒中而泣出治熱中見黃疸門治寒中見目淚門

風氣與太陽俱入行諸脈俞散于分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤脹而有瘍衛氣有所凝而不行故

癘風

其肉有不仁也治見痺門

風寒客于脈而不去名曰癘風或名曰寒熱癘者其榮衛熱腫其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚癢潰

藏府風

以春甲乙傷于風者為肝風 以夏丙丁傷于風者為心

風 以季夏戊己傷于邪者為脾風 以秋庚辛中于邪

者為肺風 以冬壬癸中于邪者為腎風 風中五臟六

俞穴風

腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風治見中風

門 風氣循風府而上則為腦風治見頭痛 風入係頭則為

目風眼寒治見眼目 飲酒中風則為漏風治見肝門 入房汗出

中風則為內風王註以勞風為內風治見症門 新沐中風則為首風治見

痛頭 久風入中則為腸風飧泄治見下痢 外在腠理則為泄

風故風者百病之長也至其變化乃為他病也無常方然

藏府風

致甲乙經作故字 有風氣也帝曰五臟風之形狀不同者何願聞

其診及其病能岐伯曰肺風之狀多汗惡風色皛然白時

欬短氣晝日則瘥暮則甚診在眉上其色白皛字音邊切白貌也○仲

景云肺中風者口燥而唾身暈而重胃而腫脹 心風之狀多汗惡風焦絕善怒

嚇赤色病甚則言不可快診在口其色赤嚇字衍文也○仲

翕翕發熱不能起心中飢食則嘔吐 肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼嗌

乾善怒時憎女子診在目下其色青目潤及脇痛常嘔吐令

甘人嗜 脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄

微黃不嗜食診在鼻上其色黃仲景云脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮

目暈而短氣 腎風之狀多汗惡風面癭然浮腫脊痛不能正

立其色始隱曲不利診在肌上其色黑奇病論云有癭然

大緊身無痛處形不瘦不能食食少名為何病岐伯對曰病生在腎名為腎風腎風不能食善驚而心氣痿者死○

張子和治桑惠民病風面黑畏風不敢出爬搔不已眉毛脫落作癩醫三年不痊求治于戴人戴人曰非癩也乃出素問風論云腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色始

面癭然浮腫今公之病乃腎風也宜先刺其面大出血其

診

俞穴風形

血當如墨色三刺血变色矣于是下針自額上下排針直至額頤皆出血果如墨色遍腫處皆針之惟不針目眦外兩傍蓋此少陽經少血多氣隔日又針之血色乃紫二日外又刺其血色变赤初針時癢再刺則額角痛三刺其痛不可任蓋邪退而然也後二十日餘又輕刺一遍方已每刺必以冰水洗其面血十日黑色退一月面稍赤三月乃紅白但不服除下熱之藥病又作戴人在東方無能治者胃風之狀頸多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿失衣則臄脹食寒則泄診形瘦而腹大首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風日則病少愈漏風之狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風衣常濡口乾善渴不能勞事泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾上漬其風不能勞事身體盡痛則寒

右五臟風症多汗惡風其治法用仲景桂枝湯之類孫真人皆灸本臟背腧兼用續命湯治之

靈黃帝曰人之善病風厥漉汗者何以候之少俞荅曰肉

不堅腠理疎則善病風帝曰何以候肉之不堅也少俞荅曰膈肉不堅而無分理理者粗理粗理而皮不緻者腠理疎此言其渾然者五變論

素暴厥而聳偏塞閉不通內氣暴薄也不從內外中風之病故瘦留着也通評虛實論此條非風病汗出而身熱者風也全文尺膚滑其淖澤者風也尺膚滑而澤脂者風也全文

脈脈浮而大者曰風病風以日夕死全文見診生死

中風 卒中之初 中分淺深

中淺半身偏痛舌能言 中深半身不收舌難言

產中風 口噤 口眼喎斜 癢

考異 中風世俗之稱也其症卒然仆倒口眼喎斜半身不遂或古強不言唇吻不收是也然名各有不同其卒然仆倒者

見診法

經稱為擊仆世又稱為卒中乃初中風時如此也其口眼
喎斜半身不遂者經稱為偏枯世又稱為左癱右瘓及腰
腿風乃中倒後之証邪之淺者如此也其古強不言唇吻
不收者經稱為痲病世又稱為風懿風氣亦中倒後之症
邪之深者如此也東垣以邪淺為中脈中腑而易治邪深
為中臟而難治者得之矣凡病偏枯必先仆倒故內經連
名稱為擊仆偏枯也後世迷失經意以偏枯痲病之旨一
以中風名之遂指偏枯為枯細之枯而非左癱右瘓之症
習俗之弊至于如此也殊不知仲景云骨傷則痿名曰枯
蓋痿緩不收則筋骨氣肉無氣以生脉道不利手足不稟
水穀之氣故曰枯非細之謂也或積日累月漸成細者間
有之非可便指枯為細也

內經兼
內傷外

素凡治消痺仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏梁之

感

疾也

通評虛
實論

三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉

見診病傳變氣樞云真氣
去邪氣獨留發為偏枯

靈其有三虛而偏中於邪風則為擊仆偏枯矣

九宮八
風篇

風中五臟六腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則

為偏風

全文見
諸風

右經四節論偏枯前一節屬內傷後二節屬外感蓋此

症內傷外感相兼而成也至于河間東垣丹溪則專主

內傷仲景陳無擇孫思邈則專主外感今詳偏枯邪淺

者宜瀉外感為主補內傷佐之痲病邪深者宜補內傷

為主瀉外感佐之也

中風為百病之長乃氣血閉而不行此最重疾凡治風

之藥皆辛溫上通天氣以發生為體是元氣始出地之根

蒂也

河間東垣主內傷

河風病多因熱盛俗云風者言末而忘其本也所以中風而有癱瘓諸症者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非外中于風良由將息失宜而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣佛鬱心神昏冒筋骨不為用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐之五志有所過極而卒中者由五志過極皆為熱甚故也所謂肥人多中風者肥則腠理緻密而多鬱滯氣血難以通利若陽熱又甚而鬱結甚故多卒中也其瘦者腠理疎通而多汗洩血液衰少而為燥熱故多有勞嗽之疾也然肥人反勞者由暴然亡液損血過極故也瘦人反中風者由暴然陽熱太甚而鬱結不通故也經云人之氣以天地之疾風名之故中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾五旬氣衰者多有此疾壯歲之際無有也若肥盛則間有之亦形盛氣衰如此治

法宜和臟腑通經絡便是治風

東垣論中風從內出其治法則如外入之証亦以發

表攻裡行中道三法也

仲景無擇思過主外感

仲夫風之為病當半身不遂或但臂不遂者此為痺脉微而數中風使然無擇諸方論中所謂左癱右瘓者蓋邪氣

中人邪氣反緩正氣即急正氣引邪啣僻不遂也風懿者

以心悶閉不能言俱噫噫作聲蓋肺氣入心則能言邪中

心肺涎潮塞故使然也四肢緩縱為風痲者以風涎散注

于關節氣不能行故使四肢不遂也舌強不能言者以風

入心脾經心之別脉系于舌本脾之脉俠咽連舌本散舌

下今風涎入其經絡故舌不轉而不能言也四肢拘攣者

以中風冷邪氣入肝臟使諸經攣急屈而不伸也風柔者

以風熱入于肝臟使諸經張緩而不收也故經曰寒則攣

急熱則弛張風顛者以風入于肝臟經絡上氣不守正位

風懿者邪中

心肺

風痲者風涎注

于關節故置

不遂

不能言者以風入

心脾經

拘攣者以風冷入

肝

風涎入肝則弛

緩不收

風入肝則顛面

招顛

風病乃風冷氣
中故使心禁與
風乾乃
半身不遂
亦偏中肺經

故使頭招面搖手足顛掉也。風瘖者以風冷之氣客于中
滯而不能發故使口噤不能言也。與前所謂涎塞心肺同
候此以口噤為差耳。腰腿風者半身不遂失音不語臨事
不前亦偏中于心肺經所致也。已上皆言風從外入

卒中之初

初中治法

初中倒時隨即醒者宜治若不醒者宜搯人中至醒若痰
涎壅盛者宜吐之口噤者亦宜吐之若口開手撒遺尿者
為陽暴絕速宜大料參芪補接之若眼戴上者宜灸之
本治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮于
上膈氣閉不通宜救急稀涎散

猪牙皂角

四挺肥實不
蛙者去黑皮

晋礬

光明者
一兩

右為細末研勻輕者五分重者三字七溫水調灌下不
大嘔吐但微微令涎出一二升便得醒醒後緩緩調治

不可便大投藥餌恐過傷人

治中風同前症勝金丸

生薄荷

兩半

猪牙皂角

二兩槌碎水一升二味
一處浸取汁研成膏

苾蒂

末一兩

梨蘆

二兩

硃砂

半兩
研

右將硃砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如龍
眼大以硃砂為衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐為度
得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金
虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣閉
不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可乎但不
當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾予用此三方每每有

驗羅謙甫方有粉霜
馬粉無梨蘆治法同

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子

二粒去
皮膜

白礬

如拇指大一
塊為末

右將二味在于新瓦上煨令江子焦赤為度為末煉蜜丸如雞荳大每服一九用綿裹放患人口中近喉處良久吐痰立愈

中倒後口禁牙關緊急治法另見後口噤門亦用吐法

玄風病口開手撒眼合遺尿鼻聲如鼾者五臟氣絕也蓋口開者心絕手撒者脾絕眼合者肝絕遺尿者腎絕聲如鼾者肺絕也若見一猶可用工若面赤時黑主陽上散腎水反克心火蕪遺尿口開氣喘者斷不救也

五臟氣絕速宜大料參芪煎濃湯灌之及臍下大艾灸之亦可轉死迴生也

羅治中風眼上戴不能視者灸第二椎骨第五椎上各七壯一齊下火炷如半束核大立愈

表裡

靈虛邪偏客于身半其入深內居榮衛榮衛稍衰則真氣

去邪氣獨留發為偏枯故其邪氣淺者脉偏痛刺節直邪篇

偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠之間巨針

取之益其不足損其有餘乃可復也痲之為病也身無痛

者四肢不收志亂不甚其言微知可治甚則不能言不可

治也痲廢也痲痺經絡之邪氣深者痲與偏枯是二疾以其半身無氣行運故名偏枯以其手足廢而不收或名痲或偏廢或全廢皆口痲也

巨針取之千金作温臥取汗

右內經論中風之淺深也其偏枯身偏痛而言不變志

不亂者邪在分腠之間即仲景東垣所謂邪中腑是也

痲病無痛手足不收而言瘖志亂者邪入于裡即仲景

東垣所謂邪中臟是也

仲寸口脉浮而緊緊則為寒浮則為虛寒虛相傳邪在皮

膚浮者血氣虛絡脉空虚賊邪不瀉或左或右邪氣反緩

診

正氣即急正氣引邪啗僻不遂邪在于絡肌膚不仁邪在于經即重不勝邪入于腑即不識人邪入于臟舌即難言口遂吐涎

在臟在腑在經之治法

絜風者百病之始善行而數變行者動也風本為熱熱勝汗則虛其衛多下則損其榮汗下各得其宜然後宜治其在經雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者宜汗之中臟者宜下之此雖合汗下亦不可過也仲景云汗多則亡陽下多則亡陰亡陽則損氣亡陰則損形故經言血氣者人之神不可不謹養也所謂表裏不和須汗下之表裡已和是宜治之在經也其中腑者面顏顯五色有表証而脉浮惡風惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中腑也其病多易治其中臟者唇吻不收舌

不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞽大小便秘結皆曰中臟也其病多難治若風中腑者先以加減續命湯隨証發其表如兼中臟則大便多秘澁宜以三化湯通其滯表裏証已定別無變端後以大藥和而治之大抵中腑者多著四肢中臟者多滯九竅雖中腑者多兼中臟之証至于舌強失音久服大藥能自愈也

垣中血脉則口眼喎斜中腑則肢節廢中臟則性命危急此三者治各不同如中血脉外有六經之形証則從小續命湯加減及疎風湯治之如中腑內有便溺之阻隔宜三化湯或局方中麻仁丸通利之外無六經之形証內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦芫湯羌活愈風湯治之中臟痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血脉中腑之病初不宜用龍麝牛黃為麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入

腎治骨恐引風深入骨髓如油入麩莫之能出又不可一
槩用大戟芫花甘遂瀉大便損其陰血則真氣愈虛言中
臟者大小便秘東垣言中腑者有便溺阻隔二說當以東
垣為主蓋大小便秘結不中臟者亦有之中臟者亦有大小
便不秘
結者也不

中淺半身偏痛舌能言

表
難經所謂偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠
是也

解表雜方

仲三黃湯治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒終
日不欲飲食陳無擇兼半身不遂失音不言

黃芪二錢

獨活四錢

細辛二錢

麻黃五錢

黃芩三錢

右五味以水六升煮取二升分溫作三服一服小汗二
服大汗心熱加大黃二錢腹滿加枳實一枚氣逆加人

參三錢悸加牡蠣三錢渴加瓜蒌根三錢先有寒加附
子一枚

繫踈風湯治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黃去節三兩

益智仁

杏仁去皮尖各一兩炒

甘草炙

升麻各五錢

右咬咀每服一兩水一小碗煎至六分去渣熱服脚踏
熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月不可服

海拯濟換骨丹自汗者不宜服

槐皮芎朮芷

仙人防首蔓

十味各停勻

苦味香減半

龍麝加少許

硃砂作衣纏

麻黃膏煎丸

大小如指彈

右治半身不遂口眼喎斜手足不仁言語蹇澁或痛入
骨髓或痺在皮膚或中急風涎潮不言精神昏塞行步

艱難筋脉拘急左癱右瘓一切風疾並皆治之

槐筴子生

人參

桑白皮

蒼朮

川芎

何首烏

蔓荆子

歲靈仙

防風各二兩

五味子

木香

苦參各一兩

香白芷二兩

麝香二錢

龍腦二錢

辰砂五錢

右十四味為細末入麝香令勻又用麻黃十斤去根節

用大河水三石三斗熬至六斗去滓再熬至二斗半入

銀石器內熬成膏入前藥末和勻杵三五千下每一兩

作十九硃砂為衣每服一九先搗碎酒一盞浸自晨至

晚食後臨卧攪勻服之神清無睡是藥之驗更隔五日

服之如無汗宜服若體自汗服之是重亡津液也若風

盛人于密室溫臥取汗

羅續命丹治男子婦人卒中諸風口眼喎斜言語蹇澁牙

關緊急半身不遂手足搐搦頑痺疼痛涎潮悶亂婦人血

風喘嗽吐逆坐臥不寧

川芎

羌活

南星姜製

川烏

白蘚皮

海桐皮

肉桂

當歸

防風

熟地

乾葛各一兩

地榆

虎骨

硃砂

鉛白霜

烏蛇生

牛黃

雄黃各三錢

輕粉二錢

麻黃

去節四兩以好酒三升煎一升不用麻黃用酒

右為末以麻黃酒汁入蜜半斤熬成膏和藥為丸彈子

大每服一九苳淋酒下或葱湯化下不拘時候中書左

丞張仲謙患半身不遂麻木大醫劉子益與服之汗大

出一服而愈

服桑枝法桑枝一小升細切炒香以水三大升煎取二

行中道
雜方

寒

升一日服盡無時。圖經云：桑枝溫平，不涼不熱，可以常服。瘠體中風，痒乾燥，脚氣風氣，四肢拘攣，上氣眼暈，肺氣咳嗽，消食利小便。又服身輕聰明，耳目令人光澤。燕療口乾，仙經云：一切仙藥，不得桑煎不服。出抱朴子。政和間，何子常病兩臂痛，服諸藥不效，依此作數劑，臂痛即愈。

外療偏風半身不遂，冷癖疰，附子一兩生用，咬咀納于無灰酒中，經一七日，隔日飲之，服一小合瘥。

中深半身不收，舌難言。經所謂痲之為病，身無痛，四肢不收，志亂不甚，其言微，知可治，甚則不能言者是也。

風症辨

丹今世所謂風病，多與痿証滾同論治，良由局方多以治風之藥通治諸痿也。古聖論風痿各有篇目，源流不同，治法亦異，不得不辨。按風論風者，百病之長，至其變化乃為

它病。又曰：善行數變。曰：因丁露風曰：先受邪曰：在腠理曰：客曰：入曰：傷曰：中。歷陳五臟與胃之傷，皆多汗而惡風，其發明風邪係外感之病，有臟腑內外寒熱虛實之不同，若是之明且盡也。別無癱緩痿弱卒中不省，僵仆喎邪，攣縮眩運，語澁不言之文也。或曰：吾子謂內經風論主于外感，局方用麻黃桂附輩，將以解風寒也。用腦麝，葳蕤，仙黑牽牛輩，將以行疑滯也。子之言過矣。曰：風病外感，善行數變，其病多實少虛，發表行滯，有何不可治風之外，何為又歷述神魂恍惚，起便須人，手足不隨，神志昏憤，癱緩，躡曳，手足筋攣，眩運，倒仆，半身不遂，膝脚緩弱，四肢無力，顫掉，拘攣，不語，語澁，等諸痿症，兼治之。考諸痿論，肺熱葉焦，五臟因而受之，發為痿躄，心氣熱，生脈痿，故經縱不任地，肝氣熱，生筋痿，故宗筋弛縱，脾氣熱，生肉痿，故痺而不仁，腎氣

熱生骨痿故足不任身又曰諸痿皆生于上謂之上者指病之本在肺也又曰昏惑曰瘖癡曰瞽昧曰暴病曰鬱冒曰矇昧暴瘖曰瞽憇皆屬于火又曰四肢不舉曰舌本強曰足痿不收曰痰涎有聲皆屬于上又禮記註曰魚肉天產也以養陽作陽德以為倦怠悉是濕熱內傷之病當作諸痿治之何局方治風之方兼治痿者十居八九不思諸痿皆起于肺熱傳入五臟散為諸症大抵只宜補養若以外感風寒治之寧免實實虛虛之禍乎風病外感之邪有寒熱虛實而挾寒者多痿病內熱之傷皆是虛証無寒可散無實可瀉局方本為外感立方而以內傷熱証滾同一治其為害也似非細故

丹溪補中帶攻

右丹溪諸論蓋因局方治中風孟浪用發表行濕之藥戕賊血氣誅伐根本不知補養之法故引痿病以救局

方之失而其言如此然局方所述中風手足不隨起便須人神魂恍惚不語語澁等証即內經熱病相同至于異處不得不察針經刺節真邪云真氣去邪獨留發為偏枯痿論云陽明虛則宗筋縱帶脈不引而足痿不用由是知手足不隨者在偏枯手足為邪氣阻塞帶脈道而然在痿病則陽明虛宗筋縱帶脈不引而然也痲病有言變志亂之症痿病則無之也痲病又名風痲而內傷外感兼備痿病獨得于內傷也痲病發于擊仆之暴痿病發于怠惰之漸也凡此皆明痲與痿明是兩疾也

風病冷痰為先左右氣血之分

大率治風主血虛有痰治痰為先或作屬虛挾火與濕半身不遂者大率多痰在左屬死血在右屬痰左以四物湯等加桃仁紅花竹瀝姜汁右以二陳四君子湯等加竹瀝姜汁氣虛有痰者濃煎獨參湯加竹瀝姜汁聲

如鼯者屬氣虛以人參一兩煎湯一盞入竹瀝姜汁遺尿者亦屬氣虛以參芪竹瀝姜汁與之少食者亦為氣虛宜參芪竹瀝血虛有痰宜四物湯俱用姜汁炒恐泥痰再加竹瀝入內服治痰若氣虛少食者用竹瀝氣實能食者加荆瀝此二味開經絡行氣血入四物湯中必少用姜汁肥人多濕用附子烏頭行經肥人中風口喎手足麻木左右俱作痰治用

貝母 瓜菱 南星 半夏 陳皮 黃芩 白朮
黃連 羌活 黃柏 防風 荆芥 歲莢仙 薄荷
桂心 甘草 天花粉 多食濕麪加附子竹瀝姜汁
酒一匙行經

瘦人多火瘦人脈虛火實四物湯加牛膝竹瀝一匙行經黃芩黃柏有痰加痰藥痰壅盛者口眼喎邪者不能言者皆當用吐

氣虛治驗

法輕者用瓜蒂蝦汁皂角急者用黎蘆五分或三分加射香灌入鼻內吐痰出如口不噤者灌入口內吐痰出一吐不已再吐之亦有虛而不可吐者有痰者先吐後用藥

羅風中腑兼中臟治驗○順德府張安撫耘夫年六十一

歲于巳未閏十一月初患風証半身不遂語言蹇澁心神昏憤煩躁自汗表虛惡風如洒冰雪口不知味鼻不聞香臭耳聞木音則驚怖小便頻多大便結燥欲用大黃之類下之則平日飲食減少不敢用不然則又滿悶晝夜不得瞑目而寐最苦于此約有三月餘凡三易醫病全不減至庚申三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥疼痛不利唾多中脘氣痞似噎予思內經云風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟乃病臟病形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此風氣下陷入陰中不能生發上行則為疾矣又云形

樂志苦病生于脉神先病也邪風加之邪入于經動無常處前証互相出見治病必求其本邪氣乃服論時月則宜升陽補脾胃瀉風木論病則宜實表裡養衛氣瀉肝木潤燥益元氣慎怒是治其本也宜以加減冲和湯主之

柴胡

各五錢

升麻

當歸

甘草

各三錢

半夏

黃柏

酒洗

黃芩

陳皮

人參

芍藥

各二分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去渣溫服自汗加黃芪五分五味子二十粒晝夜不得睡乃因心事煩擾心火內動上乘陽分衛氣不得交入陰分故使然也以硃砂安神丸服之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三月有餘今困睡不已莫非它病生否予曰不然衛氣者晝則行陽二十五度夜則行陰二十五度此衛氣交

入陰分循其天度故安撫得睡也何病之有焉止有眼

白睛紅隱澁難開宜以當歸連翹湯洗之

黃連

各五分

連翹

四分

當歸

甘草

各三分

右作一服水二盞煎至一盞去渣時時熱洗十三日後至日晡微有悶亂不安于前冲和湯中又加柴胡三分以升少陽之氣飲三服至十五日全得安卧減自汗惡寒燥熱胃膈痞元小便多服藥後小便減少大便一二日一行鼻聞香臭口知味飲食如常脉微弦而柔和按之微有力止有咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早晨語言快利午後微澁宜以玄參升麻湯治之

升麻

各五分

黃連

四分

連翹

桔梗

各三分

鼠粘子

玄參

甘草

姜蚕

各三分

防風

一分

右咬咀總作一服水二盞煎至七分去渣稍熱噙漱時啣之前症良愈止有牙齒無力不能嚼物宜以牢牙散

牢牙散治牙齒無力不能嚼物

羊脛骨灰

升麻

生地

黃連

石膏

白茯苓

人參

梧桐淚

右為細末入麝香研勻臨臥擦牙後以溫水漱之

安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出肌肉瘦不能正臥臥則痛甚經云汗出但阻使人偏枯余思針經云虛與實隣決而通之又云留瘦不移節而刺之使經絡通和血氣乃復又云陷下者灸之為陰氣下陷入陰中有膊時痛不能運動以火導之火引而上補

之溫之已上症皆宜灸刺為此先刺十二經之井穴于四月十二日右肩臂上肩井穴內先針後灸二七壯及至灸瘡發于枯瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月初八日再灸左肩井次于尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日臂膊又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

白芍藥

人參

升麻

柴胡

天門冬

麥門冬

陳皮

甘草

甘草

黃芩

黃栢

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去渣溫服食後汗多加黃芪五分後以潤腸丸

潤腸丸治胃膈痞滿大便澀滯

麻子仁研 大黃酒煨各一兩半 歸尾 枳實

白芍藥 桃仁泥 升麻兩半 人參

甘草生 陳皮各三錢 木香 檳榔各二錢

右除桃仁、麻仁外為末，却入二仁泥、蜜和丸，如桐子大，每服七八九，溫水食前服，初六日得處暑節，暑猶未退，宜微收實皮毛，益胃氣，秋以胃氣為本，以益氣調榮湯主之，藥中加時藥，使邪氣不能傷也。

人參 三分為臣 益氣和中 陳皮 二分為佐 順氣和中

熟地 二分為佐 養血 潤燥瀉陰火 白芍藥 四分為佐 補脾 微收肝木之邪

白朮 三分為佐 養胃 和中厚腸胃 升麻 二分為佐 使使陽明 氣上升滋榮百脉

當歸 二分為佐 和血潤燥 黃芪 五分為君 實皮毛 止自汗 益元氣

半夏 二分 療風痰 強胃進食 甘草 二分 灸為佐 調和 胃氣 溫中 益氣

柴胡 二分 為使 引少陽之氣 使出于胃中 乃風行于天上

麥門冬 三分為佐 猶有暑氣未退 故加之 安肺氣 至秋分節不用

右咬咀，作一服，水二盞，煎至一盞，去渣，溫服，忌食辛熱之物，反助暑邪，秋氣不能收，正氣得復而安矣。

厥逆者 溫補之

素太陰所謂入中為瘖者，陽盛已衰，故為瘖也。內奪而厥，則為瘖，此腎虛也。少陰不至者，厥也。脉解篇王註云：瘖，舌瘖也。腎氣內奪，則

足廢

河地黃飲子，治舌瘖不能言，足廢不能用，腎虛弱，其氣厥不至舌下。

熟地 巴戟 山茱萸 肉苳蓉酒浸

石斛 附子炮 五味子 白茯苓

菖蒲 遠志去心 官桂 麥冬去心各等分

右為末，水一盞半，每服三錢，生姜五片，棗一枚，薄荷同煎，至八分，不拘時服。

耐治中風四肢逆冷吐清水婉轉啼呼者取桂二兩咬咀以水三升煮取二升去渣適寒温盡服

熟煩者今補之

干地黄煎治熱風心煩悶及脾胃熱不下食冷補方

生地汁 枸杞根汁各二升 生姜汁

酥各三升 荆瀝 竹瀝各五升 天門冬

人參各八兩 茯苓六兩 大黃 梔子各四兩

右十一味擣後五味為細末先煎地黄等汁成煎次納

藥末攪勻每服一七日再漸加至三七覺利減之

荆瀝湯治患風人多熱宜服

荆瀝 竹瀝 生姜汁各五合

右三味相和温煖為一服每日且服煮散午後進此平

復乃止煮散見後解表雜方條

口禁者 唐王太后中風不能言脉沉而口噤醫人許胤宗曰既

薰之

不能下藥宜湯氣薰之藥入腠理週時可瘥乃煎黃芪防風湯數斛置床下氣如烟霧薰之其夕便得語藥力薰蒸其效如此

丹溪云人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎無形王太后病風不言而脉沉其急非大補不可也若以有形之藥湯緩不及事今以黃芪防風煎湯氣如烟霧滿室則口鼻俱受非智者通神之法不可為也

雜方

食主風中心氣風熱手足不遂及風痺不任筋脉互緩恍惚煩躁熊肉二斤切如常法調和作臠腊空肚服之
肝中緩風四肢不收者豉三升水九升煮三升分為三服日二服亦可酒漬飲之 治卒風中不得語煮豆煎汁如

飴含之亦可濃煮飲之佳。

聖治卒風中不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服又當愈。

肘治中風卒不得語以苦酒煮白芥子附頸一周以綿裹之一日夕而瘥。

凡治中風莫如續命之類然此可扶持初病若要收全功火艾為良中風皆因脉道不利血氣閉塞也灸則喚醒脉道而血氣得通故收全功。

本凡中風續命排風風引竹瀝諸湯及精神丹茵芋酒之類更加以灸無不愈者然此疾積聚之久非一日所能收皆大劑久而取效唐書載王太后風瘖不語醫者蒸黃芪防風湯數斛以薰之得瘥蓋此類也今人服三五盞求效

則責醫也亦速矣孟子曰七年之病必求三年之艾久而

後知爾。

仲景攻中帶補

仲續命湯治中風痲身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘攣不能轉側。

麻黃兩六

桂枝兩二

當歸

人參各一

石膏兩四

乾姜

甘草

芎藭各一

杏仁三十枚

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治肺風但服不得臥咳逆上氣面目浮腫。

解表

潔治中風外有六經之形症先以加減續命湯隨証治之。

麻黃節去

人參

黃芩

芍藥

甘草炙

川芎

杏仁炒去皮尖

防已

官桂

防風各一兩

附子

炮去皮 劑半兩

右除附子杏仁外搗為粗末後入二味令勻每服五錢水二盞半生姜五片煎至一盞去渣稍熱服食前

如無汗惡寒者加 麻黃 防風 杏仁 右依本方

加一倍宜針太陽經至陰出血 如有汗惡風者加

桂枝芍藥杏仁 右依本方加一倍宜針風府已

上二証太陽中風也

如身熱無汗不惡寒者加 知母石膏甘草 如

身熱有汗不惡寒者加 葛根 桂枝 黃芩 右依

本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽明之賊

也刺厲兌者瀉陽明之實也已上二証陽明中風也

如無汗身涼者加 附子 乾姜 甘草 宜針隱白

去太陰之賊也此一証太陰中風也

如有汗無熱加 桂枝 附子 甘草 若依本方加

一倍宜針太溪此一証少陰中風也

如無此四証六經混淆繫于少陽厥陰或肢節攣痛或

麻木不仁宜羌活連翹續命湯

小續命湯

羌活 兩 四

連翹

兩 六

右古之續命混殺無經今立分經治療又各分經針刺

無不愈也治法宜刺厥陰之井大敦以通其經灸少陽

之經絕骨以引其熱是針灸同象治法之大體也

附雲岐子加減法 如精神恍惚加 茯苓 遠志 如

心煩多驚者加 犀角兩 如骨節間煩庸有熱者去附

子倍芍藥 骨間冷痛者倍用桂枝附子 如燥悶小便

澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎服 如臟寒下痢者

去防已黃芩倍附子白朮一兩熱痢不可用附子 如脚弱加牛

攻裡

滕石斛各一兩 如身疼痛加秦芫一兩 如腰痛加桃仁杜仲各半兩 如失音加杏仁一兩 如或歌笑語無所不及者用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩無附子防風生姜有當歸一兩自汗者去麻黃杏仁加白朮 春加麻黃一兩 夏加黃芩七錢 秋加當歸四兩 冬加附子半兩

內有便溺之阻隔復以三化湯導之

厚朴姜製

大黃

枳實

羌活各等分

右剉如麻荳大每服三兩水三升煎至一升半服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失于通塞或一氣之微汗或一旬之通利此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

行中道

羌活愈風湯療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤及治風濕內弱者是風熱體重也或瘦而一枝偏枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜而多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病生靜則萬病息是以此藥能安心養神調陰陽無偏勝保命集云內邪已除外邪已盡當服此藥以行中道諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減服之如覺風動服此不致倒仆

羌活

甘草炙

防風去

黃芪去

蔓荊子

川芎

細辛去

枳殼炒去

人參去

地骨皮

麻黃去

知母去

甘菊

薄荷

枸杞

當歸去

獨活

白芷

杜仲炒去

秦芫去

芍藥去

黃芩

白茯苓三兩上各

石膏兩三

生地

蒼朮各四兩

肉桂兩一

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服如遇天陰
加生姜三片煎空心一服臨臥再煎查服俱要食遠服
空心嚥下二丹丸謂之重劑臨臥嚥下四白丹謂之輕
劑是動以安神靜以清肺 假令一氣之微汗用愈風
湯三兩加麻黃一兩勻作四服每服加生姜五七片空
心服以粥投之得微汗則住 如一旬之通利用愈風
湯三兩大黃一兩亦勻作四服如前煎臨臥服之得利
為妙常服之藥不可失四時之輔如望春大寒後加半
夏柴胡人參各二兩木通四兩此迎而奪少陽之氣也
望夏加石膏黃芩知母各二兩此迎而奪陽明之氣
也 季夏之月加防己白朮茯苓各二兩此勝脾土之
濕也 秋初大暑後加厚朴藿香各二兩桂一兩此迎
而奪太陰之氣也 望冬霜降後加附子官桂各一兩

當歸二兩此勝少陰之氣也 如得春減冬所加藥四
時類此此藥治七情六慾四氣無使五臟偏勝及不動
于榮衛如風秘服之永不燥結如又瀉服之能自調適
初覺風氣便服此藥與局方天麻丸一料相為表裡乃
治未病之聖藥也不問男子婦人小兒風癩急慢風等
病服之神效

四白丹能清肺氣養魄為中風者多昏冒氣不清利也

白朮 白茯苓 人參 砂仁

香附 甘草 防風 川芎 各半

白芷 一兩 白檀 半錢 知母 二錢 羌活

薄荷 獨活 各二錢 細辛 二錢 麝香 一錢

牛黃 錢 龍腦 半錢 俱 藿香 半錢 甜竹葉 二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每兩作十九臨臥嚼一九

用愈風湯送下能上清肺氣下強骨髓

二丹丸治健忘養神定志和血內以安神外華腠理

熟地 天冬 丹參各一兩半 茯神

甘草各一兩 菖蒲半兩 遠志半兩 人參半兩

麥冬一兩 硃砂二錢

右為細末煉蜜丸如桐子大空心用愈風湯送下至六十九

中風外無六經之形証內無便溺之阻格知為血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮也當以秦朮湯主之

秦朮 石膏 甘草 川芎

當歸 羌活 獨活 防風

黃芩 白芍藥 白芷 白朮

生地 熟地 白茯苓各一兩 細辛半兩

右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓溫服無時如遇

天陰加生姜七八片加心下痞每服一兩加枳實一錢

同煎

天麻丸行榮衛壯筋骨

天麻六兩 酒浸 玄參六兩 牛膝六兩 酒浸

葶藶六兩 另 杜仲七兩 剉 當歸十兩 全用

羌活十兩 生地六兩 附子一兩 炮

獨活五兩 無一

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五七十九病大至百丸空心食前溫酒或白湯服忌壅塞失于通利故服藥半月稍覺壅塞微以七宣丸輕踈之使藥可為用也如素有痰又病中風津液湧溢在胸中氣不得利者用獨

痰用吐

聖散吐之吐後用利氣瀉火之劑

獨聖散治諸風隔痰諸癩痰涎津液湧溢用苾蒂一兩炒黃色為末每服量虛實又新或二錢藥末茶一錢酸齏汁一鍾調下若用吐法須天氣清明陰晦無用如病卒暴者不拘此法吐時宜辰卯二時故內經云平旦至日中天之陽陽中之陽也若論四時之氣仲景大法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日之氣辰卯是其候也故宜早不宜夜先令病人隔夜不食如服藥不吐用熱齏水投之如吐風癩者加全蝎五分微炒如有虫者加狗油五七點雄黃末一錢甚者加芫花五分立吐虫出如濕腫滿者加赤小荳末一錢此藥不可常用大要辨其虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑

清熱

潔瀉清丸治中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安臥此

是風熱煩躁方見治虛實法

解表雜方

一婦人年六十左癱手足不語涎痰

防風

荆芥

羌活

南星

沒藥

乳香

木通

茯苓

厚朴

桔梗

甘草

麻黃

全蝎

紅花

右作末酒湯下不拘時春脉漸伏以淡鹽湯齏汁每早一碗吐五日仍以白朮甘草陳皮厚朴菖蒲一日二貼後以川芎山梔豆豉瓜蒂葉荳粉齏湯吐不用蒼朮南星生姜牛膝茯苓酒糊丸服十日後夜間微汗手足動而能言

千竹瀝湯治風痲四肢不收心神恍惚不知人不能言方

患熱風者必先用此以制熱毒

竹瀝升二 生葛汁升一 生姜汁升五

右三味相和溫服分三服平旦日晡夜各一服服訖覺

四肢有力次進後湯方

竹瀝升一 生葛汁升五 芎藭 防已

附子 人參各一兩 羚羊角三兩 芍藥

黃芩 甘草 桂心各一兩 生姜四兩

石膏六兩 杏仁四十枚 麻黃 防風各一兩半

右十六味咬咀以水七升煎減半納瀝再煮取二升五

合分三服取汗間五日更服一劑頻服三劑漸覺少損

仍進後方

竹瀝升三 防風 升麻 羚羊角

防已 桂心 芎藭各二兩 麻黃三兩

右八味咬咀以水四升合竹瀝煮取二升半分三服兩

日服一劑常用加獨活三兩此方神良頻進三劑若手

足冷者加生姜五兩白朮二兩若未除更進後服

竹瀝升一 甘草二兩 人參 芎藭

獨活 升麻各二兩 防風 麻黃

芍藥各一兩半 羚羊角 生姜 石膏

附子一作杏仁 防已 桂心 黃芩

白朮各二兩

右十七味咬咀以水八升煮減半納瀝煮取二升半分

三服相去如行人十里又更服若有氣者加陳皮牛膝

五加皮各一兩

凡風痺服前湯得瘥訖可常服煮散除餘風方

防已 防風 獨活 秦艽

黃芪 芍藥 人參

白朮 扶神 羚羊角 遠志

升麻 石斛 牛膝 五加皮

丹參 甘草 厚朴 天門冬

陳皮 地骨皮 黃芩 桂心各一兩

乾地黄 杜仲 生姜 麻黃

檳榔 藜蘆 烏犀角各二兩 苡薏仁一升

石膏六兩

右三十三味搗篩為粗散和攪勻每服以水三升藥三兩煮取一升綿濾去渣頓服之取汗日服若覺心中熱煩以竹瀝代水煮之

世治卒中風不語桂枝薄辣者去皮一兩懷中藏三箇時辰分三服水煎併進神效

右解表諸方治中風全不能語經所謂甚則不能言者是也

羅犀角防風湯治一切諸風口眼喎斜手足躄拽言語蹇澁四肢麻木皆治之

犀角 防風 甘草 天麻

羌活各一兩 滑石三兩 石膏一兩 麻黃七錢半

獨活 山梔各七錢 荆芥 連翹

當歸 黃芩 全蝎 薄荷

大黃各半兩 桔梗 白朮 細辛各四錢

右咬咀每服五錢水二盞生姜十片煎至一盞去渣稍熱服未汗再一服如病人臟氣虛則全減大黃

輕骨丹治風癱瘓四肢不隨

苦參 桑白皮 白芷 蒼朮

甘松

川芎各四兩

麻黃去節五升河水五升煮去渣再熬成膏至

右為末入前麻黃膏和丸如彈子大每服一九溫酒研

化服之臥取汗五七日間再服手足當即輕快卒中涎

潮分利後用之一方有浮萍四兩

風藥聖餅子治半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅盛

及一切風他藥不効者小兒驚風大人頭風婦人血風並

治之

川烏生

草烏

麻黃去節各二兩 蒼朮

何首烏

白附子

白姜蚕

川芎各五錢

防風

乾姜各二錢半

雄黃四分

藿香

荆芥各二錢半

右為末醋糊丸如桐子大捏作餅子嚼碎茶湯送下食

後

世採浮萍草法并方 不在山兮不在岸採我之時七月

半一任癱風與痲風些少微風都不筭豆淋酒內下三錢

鐵僕頭上也出汗

本治風半身不遂此方甚妙

川山甲左癱用左脚右癱用右脚

川烏頭

紅海蛤各二兩

右為末每用半兩生葱自然汁調成膏作餅子約一寸

半左患貼左脚右患貼右脚貼在足掌心內用舊絹片

緊扎定于密房中無風處椅子上坐用湯一盆將有藥

脚浸于湯中用小心人扶病人恐汗出不能支持候汗

出急去藥如汗欲出時身必麻木以汗週遍為妙如未

効半月後再用一次神妙

世治卒中手足不遂用麥麩五升入烏頭尖一升連翹半

升同甑炊令大熟鋪在蓆下以手足不遂處臥之令熱氣薰蒸候出汗爲度日用三次元藥再蒸用之候兩日外別用新藥如無烏頭尖只用草烏頭半升不去皮尖研作粗末亦可

千治半身不遂用蚕沙兩石分作三袋每袋可七斗蒸熟一袋着患處如冷再換一袋依前法數數換易百不禁瘡止須羊肚釀粳米葱白姜椒豉等煮爛熟喫日食一具十日止此方千金不傳

右解表方治中風語言蹇澁經所謂志亂不甚其言微知者是也

通裡雜方
羅中臆治驗○真定府臨濟寺趙僧判于至元八月間患中風半身不遂精神昏憤面紅頰赤耳聾鼻塞語言不出診其兩手六脉弦數常記繫古有云中臆者多滯九竅中

臆者多着四肢今語言不出耳聾鼻塞精神昏憤是中臆也半身不遂是中臆也此臆臆俱受病先以三化湯一兩內踈二三行散其壅滯使清氣上升充實四肢次與至寶丹加龍骨南星安心定志養神使各臆之氣上升通利九竅五日音聲出語言稍利後隨四時脉証加減用藥不旬日稍能行步先以繩絡其病脚如履闕或高處得人扶之方可踰也又刺十二經之井穴以接經絡翌日不用繩絡能行幾步百日大勢皆去戒之慎言語及節飲食一年方愈

子和一衲子因陰雨臥濕地一年手足皆不遂若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸芍藥乳香沒藥自然銅之類久服反加大便澁風燥生經歲不已戴人以舟車丸下三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄

之數日手足能舉戴人曰受風濕寒三氣合而為痺水濕得寒而浮畜于皮膚之間久而不去內舍六腑宜用去水之藥可也水濕者人身中之寒物也寒去則血行血行則氣和氣和則愈矣

世治中風大便秘者用不蛀皂角燒灰為細末每服一錢米飲調下

行中道
雜方

本稀簽丸稀簽俗呼火杓草莖葉頗類蒼耳春生苗葉秋初開花秋末結實法于五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實或云秋花成實後和枝取用洗淨曝乾入甌中用酒蜜蒸之九遍焙乾搗篩為細末煉蜜丸如桐子大空心用溫酒或米飲下四五十丸張乖崖進表云誰知至賤之中乃有殊常之效臣服至百服眼目清明至于服鬚髮變黑筋骨強健又云甚益元氣療諸疾患脩合施

人服無不效

羅正舌散治中風舌強語澁

雄黃 研

荆芥 各等分

右為末每服二錢用豆淋酒調下

茯神散治証同前

茯神心 兩

薄荷 兩

蝎稍 錢半

右為末每服一二錢溫酒調下

本治風在肝脾語澁脚弱大便多秘地黃酒

熟地 兩

附子

茵芋

羌活

防風

芎藭 各一兩

石斛 兩

丹參 兩

牛蒡根 兩

牛膝

杜仲

桂枝 兩

大麻子 升

右剉入絹袋盛寬貯之用無灰酒一斗九升封漬七日

逐日空心食前後飲一盞常醺勿令吐

治中風內虛脚弱語蹇防風湯

石斛一兩 地黃 杜仲 丹參

防風 川芎 麥門冬 桂心

獨活各一兩

右為粗末每服五錢水一大盞半棗三枚同煎去渣溫服

治中風入肝脾經四肢不遂舌強語蹇竹瀝湯

歲薑仙 附子 桔梗 防風

蔓荊子 枳殼 川芎 當歸各等分

右為粗末每服四錢水一盞竹瀝半盞生姜四片同煎至八分去渣溫服日三四忌口

治久風邪入肝脾二經言語不轉防已湯

漢防已 防風 桂心 附子各半兩

歲薑仙三錢 麻黃兩半

右為粗末每服四錢水一盞引子半盞煎七分去渣溫服日三四引子用竹瀝荆瀝地黃汁各一盞生姜汁拌勻用之已上四方龐先生傳審而用之良驗

干獨活煮散治風痲

獨活八分 芎藭 芍藥 茯苓

防風 防已 葛根各六兩 羚羊角

當歸 人參 麥門冬 桂心

石膏各四兩 磁石十兩 甘草三兩 白朮五兩

右十六味各切剉分為二十四服每服生姜生地切作一升杏仁二七枚以水二升煮取七合或日晚或夜中或日一服或間日服

安神雜方

羅局方至寶丹治風中臟局方見

聖保命金丹治中風口眼喎斜手足躄拽言語蹇澁四肢不舉晨昏痰多

貫仲兩 生地錢七 大黃兩半 青黛

板藍根錢各三 硃砂研 蒲黃 薄荷錢各二

珠子研 龍腦錢研各一 麝香研一 牛黃二錢半研

右為末研和藥勻蜜丸如雞荳大每服一九細嚼茶清

送下新汲水亦得如病人嚼不得薄荷湯化下無時此

藥墜痰涎大有神效用金箔為衣

活命金丹治中風不語半身不遂肢節痺疼痰涎潮上咽

嗑不利胸膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱不退勞

病諸藥不治無問男女老幼皆可服

板藍根 貫仲 甘草 乾葛各一錢

桂心 芒硝兩 大黃兩半 珠子粉

牛黃研 青黛 生犀屑 薄荷錢各五

辰砂四錢研一 麝香研 龍腦二錢

右為末和勻蜜水浸蒸餅為劑每兩作十九就濕用硃

砂再用金箔四十片為衣臘月修合磁器收貯多年不

壞如療風毒茶清化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱

勞病及小兒驚風熱病用薄荷湯化下

海解語丸治中風語言不正

白附子 石菖蒲 遠志 全蝎

羌活 天麻 南星 白姜蚕

右為細末蜜丸如菉荳大服之

經治中風及壅滯旋覆花淨洗搗末煉蜜丸如桐子大夜

臥茶湯下五九七九至十九 治中風不語喉中如拽鋸

治痰雜方

運氣

針灸

聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一枚去浮皮却于臍上
 刺一坑子內入藜蘆陳醋和麵包裹四面用火逼令黃色
 同搗再研極細生麪為丸如小荳大每服三丸温酒下
 運語澁皆屬風經云厥陰司天風淫所勝民病舌本強是
 風氣勝也又云厥陰司天主勝則舌難以言是風氣虛也
 靈帝曰刺節言解惑夫子乃言盡知調陰陽補瀉有餘不
 足相傾移也惑何以解之岐伯曰大風在身血脈偏虛偏
 虛者不足實者有餘輕重不得傾側宛伏不知東西不知
 南北乍上乍下乍反乍覆顛倒無常甚于迷惑黃帝曰善
 取之奈何岐伯曰瀉其有餘補其不足陰陽平復用針若
 此疾于解惑黃帝曰善刺節真邪論○盡知調陰陽補瀉
 有餘不足相傾移者謂診手部三
 候面部三候足部三候視其所候之症其脈實者瀉之虛
 者補之如陽經之脈實陰經之脈虛瀉其陽經補其陰經
 陰經之脈實陽經之脈虛瀉其陰經補其陽經又如此
 左實右虛瀉左補右右實左虛瀉右補左之類是也

羅灸風中脈口眼喎斜

聽會二穴

頰車二穴

地倉二穴

凡喎向右者為左邊脈中風而緩也宜灸左喎陷中二七
 壯凡喎向左者為右邊脈中風而緩也宜灸右喎陷中
 二七壯艾炷如大麥大

灸風中腑手足不遂等疾

百會一穴

肩髃二穴

曲池二穴

足三里二穴

絕骨二穴

風市二穴

凡覺手足痺或麻或痛良久乃已此將中腑之候宜灸此
 諸穴病在左灸右在右灸左

灸風中臟氣塞涎上不語極危者下火立效

百會一穴

風池二穴

大椎一穴

肩井二穴

曲池二穴

間使二穴

足三里二穴

凡覺心中憤亂神氣不怡或手足麻木此中臟之候也不問是風與氣可速灸此七穴五七壯日後再別灸之隨年壯止凡遇春秋二季可時時灸此七穴以泄風氣

凡人風發怕痛不肯灸忽然卒死是謂何病曰風入臟故也病者不可不知予自五月間口眼喎斜灸百會等三穴即正右手足麻木無力灸百會髮際等七穴得愈七月氣塞涎上不能語魂魄飛揚如墮江湖中頃刻欲絕灸百會風池等左右頰車二穴氣遂通吐涎半碗又下十餘行伏枕半月遂平復自後凡覺神氣少異于常即灸百會風池等穴無不立效

本范子默記崇寧中凡兩中風始則口眼喎斜次則涎潮閉塞左右共灸十二穴得氣通十二穴者謂聽會頰車地

倉百會肩髃曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池也依而用之無不效

羅中風鍼法出竇大師氣元歸類

手太陰 列缺偏風半 天府卒中惡鬼疰不得安卧

手陽明 肩髃 曲池偏風半

足陽明 大巨偏枯四 衝陽偏風口眼喎斜足緩不收

手太陽 腕骨偏枯

足太陽 輔陽風痺不仁四股不舉

足太陰 照海大風偏枯半身不遂善悲不樂

足少陽 陽陵泉半身不遂 環跳風眩偏風半身不遂

甲痺痿臂腕不用唇吻不收合谷主之 偏枯四肢不舉

善驚大巨主之 偏枯不能行大風默默不知所痛視如

見星溺黃小腹熱咽乾照海主之 偏枯臂腕發痛肘屈

不得伸手又風頭痛泣出肩臂頸痛項急煩滿驚五指掣
不得屈伸戰惕腕骨主之

羅天接經從陽引陰治中風偏枯

出雲岐子
醫李新說

足太陽膀胱之脉出于至陰小指外側去爪甲如韭葉為
井金^十 足少陰腎之脉湧泉起于小指之下斜趨足心

^三呼 手厥陰心包之脉其直者循中指中衝出爪甲如韭

葉陷中為井其支者別掌中小指次指出其端 手少陽

三焦之脉起小指次指之端去爪甲如韭葉為井^三 足

少陽膽之脉起足竅陰小指次指之端去爪甲如韭葉為

井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛中

^三呼^十 足厥陰肝之脉起大敦大指入叢毛之際去爪

甲如韭葉及三毛為井^六呼^十 手太陰肺之脉起大指之

端出于少商大指內側去爪甲如韭葉為井其支者出次

指內廉出其端 手陽明大腸之脉起大指次指之端入

次指內側去爪甲如韭葉為井^呼中指內交^呼 足陽明

胃之脉起足大指次指之端去爪甲如韭葉為井其支者

入大指出其端^呼 足太陰脾之脉起足大指端循指內

側去爪甲角如韭葉為井隱白是也^呼 手少陰心之脉

起于小指內出其端循指內廉去爪甲角如韭葉為井

手太陽小腸之脉起手小指之端去爪甲下一分陷中為

井

大接經從陰引陽治中風偏枯

手太陰肺之脉起手大指端出于少商大指內側去爪甲

角如韭葉為井^三呼^呼 手陽明大腸之脉起手大指次指

之端去爪甲如韭葉為井其支者入大指間出其端 足

陽明胃之脉起足大指次指之端去爪甲如韭葉為井其

支者入大指間出其端 足太陰脾之脉起足大指端循指內側去爪甲如韭葉爲井隱白也 手少陰心之脉起手小指內出其端循指內廉去爪甲如韭葉爲井 手太陽小腸之脉起手小指之端去爪甲下一分陷中爲井 足太陽膀胱之脉起足小指外側至陰去爪甲如韭葉爲井金 足少陰腎之脉起足小指之下斜趨足心爲井湧泉穴也 手厥陰心包之脉其直者循手中指出其端去爪甲如韭葉爲井中衝穴也其支者循掌中循小指次指出其端 手少陽三焦之脉起手小指次指之端去爪甲如韭葉爲井 足少陽膽之脉起于竅陰小指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛中 足厥陰肝之脉起足大指之端入叢毛之際去爪甲如韭葉爲井大敦也六呼

大接經皆十二經井穴也此羅謙甫治趙僧判中臆刺十二井穴愈治張安撫中臆灸十二井穴愈內經所謂留瘦不移節而刺之是也

難陰躄爲病陽緩而陰急陽躄爲病陰緩而陽急

羅云治失音不語出竇大師氣元歸類

手陽明 天鼎暴瘖并

手少陰 陰郄瘖不 合谷瘖不

足陽明 頰車 地倉不語飲食不收水漿漏落病右治左病左治右

手少陽 支溝暴瘖 三陽絡暴瘖不

手太陽 天窓暴瘖不

足少陰 通谷暴瘖

手厥陰 間使瘖不

玉中風不語不省人事 頂門炎七 百會針入豆許先補後瀉瀉多

害中風自汗仲景雖處以桂枝湯至于不住發搐口眼瞤動遍身汗出者豈勝對治此時獨活湯續命散能復榮衛却風邪不可缺也獨活續命散方見癱瘓條

干治中風無密室者不可療強人居室不密尚中風邪况服藥之人乎服汗劑必依此法

再寒則筋急熱則筋緩緩因于弛長縮因于短促若受濕則弛弛因于寬而長然寒與濕未嘗不挾熱三者皆因于濕然外濕非內濕無以啓之不能成疾致濕之由酒麪爲多魚與肉繼以成之若甘滑燒炙香辛硬物皆致濕之因戒之慎之藥中肯綮矣若將理失宜雖聖醫不治也天產作陽氣浮發熱先哲格言但是患痿之人若不能淡薄食味吾知其必不能安全也丹溪斷癱病爲痿凡人初覺食指次指麻木不仁或不用者三年內必中風之候也宜先服

診

愈風湯天麻丸各一兩料此治之先也是以聖人治未病不治已病中風人能食蓋甲已化土脾盛故能多食此脾愈盛下克腎水腎水虧則病增宜廣服藥不欲多食病能自愈中風多食風木盛也盛則克脾脾受敵求助于食經曰實則夢與虛則夢取當瀉肝木治風安脾脾安則食少是其養矣

肺脉微緩爲痿癭偏風頭已下汗出不可止全文見治虛實法

脾脉微緩爲風痿四肢不用心慧然若無病同上經云脉緩者多熱

蓋風痿即風非之類

素胃脉沉鼓瀆胃外鼓大心脉小堅急皆鬲偏枯男子發

左女子發右不瘖舌轉可治三十日起其從者瘖三歲起

年不滿二十者三歲死大奇論王註云從謂男發左女發右也

玄中風不語者爲病在心臟脉反沉者治難見効凡病脉

不應病者危

丹脉訣內言不治証見則不可治筋枯不治動則筋痛者是謂筋枯以其無血滋潤筋骨也

產後中風

丹產後中風口眼喎斜必用大補氣血然後治痰當以左右手脉分其氣血多少以治切不可作中風治用小續命湯及發表治風之藥

雲治產後中風半身手足不遂言語蹇澁恍惚多忘精神不定

獨活

當歸

芍藥

防風

川芎

玄參

天麻各五錢

桂心三錢

右咬咀以水八升煮取二升半分爲三服覺效更作一劑又作丸每服二十九如有熱加葛根五錢有冷加白

虛

术五錢若有氣症加生姜一兩半若手足不遂加牛膝一錢半草薢三錢黃芪四錢若腹痛加當歸芍藥七錢半若不食加人參五錢玄參一兩若寒中三陰所患必冷小續命湯加姜煎若暑中三陽所患必熱小續命湯去附子減桂心一半加薄荷煎保血氣湯治產後諸風痿攣無力

秦艽

羌活

防風

白芷

川芎

芍藥

當歸

白朮

茯苓

熟地各等分

右爲末一半蜜丸一半散酒調下五七十九妙

食治產後風虛五緩六急手足頑痺氣血不調大荳一升炒令熟熱投三升酒中密封飲之

小品治產後中風語澁四肢拘急羌活三兩爲末每服五

錢水酒各半盞煎去渣溫服

右產後中風用續命湯及羌活發散之藥必詳氣血以四物四君子相與各半停對分兩服之可也

口噤中倒之初有口噤者故附之

實開關法

丹口噤搐鼻用鬱金黎蘆為末水調搐之治口噤卒不得語附子杵末內管中吹喉中立安千金翼云吹喉中恐是吹鼻中經治急中風目瞋牙噤無門下藥者用此末子以中指蘸末揩大牙左右二三十遍其口自開始得下藥名開關散天南星搗為末白龍腦二件各等分研五月五日午時脩治者只一字至半錢効涎盛者吐之

吐痰法

簡治中風口噤涎潮壅塞吐涎方用皂角一挺去皮塗猪脂炙黃為末每服一錢七非時溫酒服如氣實脈盛調二錢七如牙不開用白梅揩齒口開即灌藥吐出風涎瘥

本治中風不省人事牙關緊急用黎蘆一兩去蘆濃煎防風湯洗過焙乾切炒微黃褐色搗末每半錢溫水下以吐涎為効如人行三里許未吐再服

羅分涎散治中風涎潮作聲口噤手足搐掇

藿香

全蝎炒

白附子

南星炮各一兩

丹砂

膩粉

粉霜各二兩

右為細末每服一錢七至二錢薄苛湯或茶湯調下未吐利再服

衍黃芪防風湯薰法方見中深半身不遂門

世治中風口噤不知人事產後中風用白木四兩水三升煎一升頓服

大白木酒治妊娠中風口噤語言不得

白木

獨活兩

黑荳炒一合

虛

右剉以酒三升煮取一升半去查温分四服口噤者幹
開灌之得汗即愈

干治中風通身冷口噤不知人事用獨活四兩好酒一升
煎半升分温再服

破傷風口噤見破傷風門

針灸

人中四分得

承漿三分

百會一分

人中

合谷一分

口眼喎斜

凡半身不遂者必口眼喎斜亦有無半身不遂之症而喎
斜者故另立附之

木運氣風

運氣口眼喎斜者多屬胃土風木不及金乘之土寡于畏
也經云木不及曰委和委和之紀其動縵戾拘緩又云厥
陰所至為縵蓋縵縮短也木不及則金化縮短乘之以勝
木之條達也戾者口目喎斜也拘者筋脉拘強也木為金
之縮短牽引而喎斜拘強也緩者筋脉縱也木為金乘則
土寡于畏故土兼化緩縱于其空隙而拘緩者自緩也故
目喎斜者多屬胃土有痰治法宜辛温瀉金之短縮平土
之濕痰也

垣清陽湯治筋脉縮短牽引口目喎斜方見後

孟中賊風口偏不能語者取吳茱萸一升清酒一升和煮
四五沸合服之半升日三服得少汗瘥

干治口喎大豈三升炒令焦好酒三升淋取汁頓服一日
一服

治中風面目相引口偏着耳牙車急舌不得轉方

獨活兩

竹瀝

生地汁各一升

右三味合煎取二升頓服即愈

胃土

治卒中風口喎不正取空青末如荳大一枚含之即愈

口目喎斜之症大率在胃而有筋脉之分經云足之陽

筋為喎邪也經云胃足陽明之脉挾口環唇所生病者

口喎唇邪此胃土之脉為喎邪也

口喎唇邪此胃土之脉為喎邪也

垣清陽湯治口喎斜頰腮急緊胃中火盛汗不止而小便數

升麻二錢

葛根一錢半

當歸身二錢

黃芪二錢

甘草炙一錢

紅花一錢

蘇木五分

桂枝一錢

甘草生五分

黃栢酒一錢

右咬咀作一服酒三盞煎至一盞三分去查稍熱食前服訖以火熨摩緊急處即愈夫口喎筋急者是筋脉血絡中大寒此藥少代燔針劫刺破惡血以去凝結內泄衝脉之火熾

羅風中血脈治驗○大尉中武史公年六十八歲于至元

十月初侍國師於聖安寺丈室中煤炭火一爐在左邊遂

覺面熱左頰微有汗師及左右諸人皆出因左頰踈緩被

風寒客之右頰急口喎于右脉得浮緊按之洪緩予舉醫

學提舉忽君吉甫專科針灸先以左頰上灸地倉穴一七

壯次灸頰車二七壯後于右頰上熱手熨之議以升麻湯

加防風秦艽白芷桂枝發散風寒數服而愈或曰世醫多

以續命等藥治之今君用升麻湯加四味其理安在對曰

足陽明經起于鼻交頰中循鼻外入上齒中手陽明之經

亦貫于下齒中况兩頰皆屬陽明升麻湯乃陽明經藥香
白芷又行手陽明之經秦艽治口噤防風散風邪桂枝實
表而固榮衛使邪不能再傷此其理也夫病有標本經絡
之別藥有氣味厚薄之殊察病之源用藥之宜其效如桴
鼓之應不明經絡所過不言藥性所主徒執一方不惟無
益而又害之者多矣學者宜細思之

秦艽升麻湯治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘急惡
風寒

升麻 乾根 甘草 芍藥

人參 秦艽 白芷 防風

桂枝 各半 兩 各三 錢

右咬咀每服一兩水二盞連鬚葱根白三莖煎至一盞
去查稍熱服食後服藥畢避風寒臥得微汗出則止

舟車舍人口眼喎斜先自右邊牙疼

防風 南星 桂枝 半夏

蒼朮 甘草 白朮 茯苓

右煎後入姜汁一合服

本治風客陽經邪傷腠理背脊強直口眼喎斜體熱惡寒
痰厥頭痛肉瞶筋惕辛頰鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭
痛眩暈如坐車船常服解風邪傷寒辟霧露瘴氣爽慧神
志諸風不生定風餅子

天麻 川烏 南星 半夏

川姜 川芎 白茯苓 甘草

右為細末姜汁為丸如龍眼大作餅子硃砂為衣每服
一餅細嚼熱姜湯下不拘候熙豐間王丞相常服預防

風疾神驗

千枳茹酒主口僻眼急大驗諸藥不瘥方枳實上青括取末欲至心止得茹五升微火炒去濕氣以酒一斗漬微火煖令得藥味隨性飲之

子和東杞一夫患口目喎斜其兩手急數如弦之張有力而實其人壯氣充風火交勝與調胃承氣湯六兩以水四升煎作三升分作四服令稍熱啜之前後約瀉四五十行去一兩次以苦劑投之解毒數服以升降水火不旬而愈脉訣云熱則生風

筋病塗法

內經治口眼喎斜多屬足陽明筋病蓋足陽明筋結頰上得寒則急得熱則弛左寒右熱則左頰筋急牽引右之弛者而右隨急牽引喎向左也右寒左熱則右頰筋急牽引左之弛者而左隨急牽引喎向右也故其治法以火灸且為之膏油熨其急者以白酒調和桂末塗其弛者又以桑

為鈎鈎其舌吻之喎僻處使正平而高下相等復以水調生桑灰于鈎柄之坎縫處連頰塗之以收其弛兼飲姜酒散美肉使筋脉氣和以助外之塗熨不飲酒者自強其筋骨以手拊拍其急處使症自去也詳見筋門

千又方

牡礪

附子

礬石

竈下黃土

右四味各等分為末取三年雄鷄冠血和藥傳其上持鏡看候欲復故便急洗去之不速去便過不復還也千金

翼云偏左塗右偏右塗左

又方酒煮桂取汁一升以故布浸搗病上則正左喎斜搗

右右喎斜搗左此秘方不傳余常用大効此方即內經用酒桂塗法也

又方大皂莢一兩去皮子搗篩以三年石灰末水和左喎

塗右右喎塗左乾又塗之

取硬石灰一合以醋炒和如泥于患偏風牽口喎斜人
口唇上不患處一邊塗之立便牽正

孫卒患偏風口喎語澁取衣中白魚摩耳下喎向左摩右
向右摩左即正魚也

聖治中風口喎用巴荳七枚去皮爛研喎左塗右手心喎
右塗左手心仍以暖水一盞安向手心須臾即便正洗去
藥并頻抽掣中指

針灸

子和一長吏病口目喎斜予療之目之斜灸以承泣口之
喎灸以地倉俱效苟不効者當灸人迎夫氣虛風入而為
偏上不得出下不得泄真氣為氣邪所陷故宜灸所以立
愈按此乃麻蕪喎斜故灸之愈若筋急喎斜非灸可愈必
用服藥及用燔針劫刺其急處或用馬膏塗法可愈故
承泣地倉人迎皆足陽明
陽明胃脈之所發也

玉口眼喎斜 地倉針入二分沿皮斜向頰
車一寸半留十吸瀉之 頰車二分
斜向

地倉已上二穴喎右
補瀉左喎左補瀉右

甲乙口僻顙竅及斷交下關主之 面目惡風寒頰腫癰
痛招搖視瞻癩瘕口僻巨竅主之 口不能水漿喎僻水
溝主之 厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不能收舌不
能言不能嚼大迎主之 口僻偏歷主之 口僻刺太淵
引而下之 口僻噤外關主之 僻不正失欠口不開翳
風主之

干又方以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麩塞密
勿令泄風一頭納大荳一顆并艾燒令然灸七壯即瘥患
右灸左患左灸右千金不傳耳病亦可灸之

癢

凡中風多有痒甚不收者故編此附之于後與前中風方
相兼用之可也

血虛

丹經曰諸痒為虛血不榮肌膚所以癢也當以滋補藥以養陰血血和肌潤痒自不作矣治身上虛癢四物加黃芩煎湯調浮萍末服之治諸痒如虫行此虛也先與大料四物湯服之益一斗水一石煎減半温浴三次能治一切風痒秘要諸痒凌霄花末酒下一二錢此花補陰血甚速本草云凌霄膏治熱風身痒遊風風疹疥癩血蒼耳葉同用也陶安人身體肥壯久患癢痒自投風藥漸成虛症身上麻木無力口苦乾小便數

氣虛

白朮	錢二	陳皮	芍藥	黃芩	兩一
茯苓	錢七	歸身	黃芪	人參	
川芎		青皮	蒼朮	木通	錢五
黃柏	酒炒	五味子	甘草	錢二	
每服下黃精九三十九					

表邪

靈虛邪搏於皮膚之間其氣外發腠理開毫毛搖氣往來行則為痒刺節直邪篇

丹何首烏散治渾身風寒濕痒

何首烏	鹽炒	天麻	枸杞	生地	
熟地	各一兩	防風	川芎	薄荷	
訶子		甘草	各半兩		

右為末每服二三錢温酒空心服温茶亦得

集治風氣客皮膚癢痒不已蟬蛻薄荷末等分為末酒調

一錢七日三服又方治風氣客于皮膚癢痒不已蜂房

灸過蟬蛻等分為末酒調一錢七日二三服

局消風散治皮膚頑麻癢疹癢痒

茯苓	川芎	羌活	人參
荆芥穗	防風	藿香	蟬蛻

白姜蚕

炒去絲甘草炒各二兩

厚朴

陳皮各半兩

右為末每服二錢茶酒調下

經治風癢痒不止枳殼三兩麩炒微黃去穢為末每服二錢非時水一盞煎至六分去查服

聖治婦人瘙疹身痒不止用蒼耳花葉子等分搗羅為末頭淋酒調服一錢匕

熱

丹治一切痒食羊蹄根不宜多

雜方

河痒得爬而解者爬為火化微則亦能痒甚則痒去者謂令皮膚辛辣而屬金化辛能散火故金化見則火化解矣聖治風瘙癢疹偏身痒成瘡者用蚕沙一升水二斗煮取一斗二升去查熱洗宜避風

羅澡洗藥治一切諸風及偏身瘙痒光澤皮膚

乾荷葉

三十兩葶藶仙兩十五

藁本斤一

零陵香斤一

茅香

兩一

甘松

白芷

各半斤

右為粗末每用二兩生絹袋盛水二桶約四斗煎五沸放熱於無風處淋濕洗之避風少時如水少時便添熱湯斟酌得所勿添冷水不添藥末浴痒無如鹽濃煎湯最妙

診

伸寸口脉遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經則身痒而癩疹心氣不足邪氣入中則胸滿而短氣脉緩而大浮為風虛大為氣強風氣相搏大成癩疹身為痒痒者名泄風又為痲癩

醫學綱目卷之十

醫學綱目卷之十一

肝膽部

眩

癩癩

子癩

大法

成無已云眩者非眩而見其眩謂眼黑眩也運者運為運轉之運世謂之頭旋是也

內經論眩皆屬肝木屬上虛丹溪論眩主於補虛治痰降

火仲景治眩亦以痰飲為先也

肝木作眩

諸風掉眩皆屬於肝全文見診法

河掉搖也眩昏亂旋運也風主動故也所謂風氣動而頭

目眩運者由風木旺必是金衰不能制木而木復生火風

火皆屬陽多為蕪化陽主乎動兩動相搏則頭目為之眩

運而旋轉故火本動也燭得風則自旋轉人或乘舟車及

作環舞而眩運者其動不止而左右紆曲故經曰曲直動

搖風之用也眩運而嘔吐者風熱甚故也

狗蒙招尤目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入
肝全文見治
虛實法

〔本〕治肝厥頭暈清頭目釣藤散

釣藤 陳皮 半夏 麥門冬

茯苓各半 石膏 人參 甘菊

防風各半 甘草分

右為麤末每服四錢水一鍾半生薑七片煎至八分溫服

治肝厥狀如癎疾不醒嘔吐醒後頭虛運發熱方

麻黃 釣藤取 石膏 乾葛

半夏麴 柴胡 甘草 枳殼

甘菊

右為麤末每服四錢水一鍾半生薑三片棗一枚同煎

至八分去查溫服

婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車上蓋因血
虛肝有風邪熱故耳素問云狗蒙招搖目眩耳聾上虛下
實過在足少陽厥陰甚則歸肝蓋謂此也余常取此方以
授人比他藥捷而效速芎勞散

川芎乙 當歸分 羌活 旋覆花

蔓荊子 細辛 石膏 藁本

荆芥穗 半夏麴 防風 熟地

甘草各半

右為末每服二錢水一大鍾生薑三片同煎至七分去
查溫服不拘時服

右甘寒瀉風木

〔羅〕風痰治驗 叅政楊公七旬有二有風痰於至元戊辰

春忽病頭旋眼黑目不見物心神煩亂兀兀欲吐復不吐
心中如懊懜之狀頭偏痛微腫面赤色腮頰亦赤色足脡
冷命予治之余料之此少壯之時喜飲酒久積濕熱於內
風痰內作上熱下寒是陰陽不得交通否之象也經云治
熱以寒雖良工不敢廢其繩墨而更其道也然而病有遠
近治有輕重參政今年高氣弱上熱雖盛豈敢用寒涼之
劑損其脾胃經云熱則砭之又云高巔之上射而取之余
以三稜針約二十處刺之其血紫黑如露珠之狀少頃頭
目便覺清利諸症悉減遂處方云眼黑頭旋虛風內作非
天麻不能除天麻苗謂之定風草此草獨不為風所搖故
以為君偏頭痛者乃少陽也非柴胡黃芩酒製不能治黃
連苦寒酒炒以治上熱又為因用故以為臣橘皮苦辛溫
炙甘草甘溫補中益氣為佐生薑半夏辛溫能治風痰茯

苓甘草利小便導濕熱引而下行故以為使服之數劑邪
氣平生氣復而安矣

天麻半夏湯治風痰內作胸膈不利頭旋眼黑兀兀欲吐
上熱下寒不得安臥

天麻

半夏各乙

橘皮去白

柴胡七分

黃芩

酒浸

甘草炙

白茯苓去皮

前胡各五分

黃連三分

右咬咀作一服水二鍾薑三片煎至一鍾溫服食後忌

酒麪生冷物

垣羌活湯治風熱壅盛上攻頭目昏眩

羌活

防風

黃芩各乙兩

柴胡七分

黃連

酒煮

黃柏酒炒

瓜蒌酒洗

甘草炙七分

白茯苓

錢五

澤瀉

錢六

右為麤末每服五錢水煎取清食後或先臥通口熱服之日二服

右苦寒瀉風水

外感風邪眩

靈筋骨血氣之精而與脉并為目系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣大感

本治一切頭旋本因體虛風邪乘於陽明經上注頭面遂入於腦亦因痰水在於胸膈上犯大寒使陽氣不行痰水結聚上衝於頭目令頭轉旋羚羊角散

羚羊角

茯神各一兩

芎藭

防風

白芷

半夏湯洗七次各半兩

枳殼

附子各一分

甘草三錢

右為麤末每服四錢水一鍾半生薑五分慢火煎至七分去查不拘時候溫服

百一都梁丸治風吹項背頭目昏黑眩痛

香白芷

大塊者用沸湯泡洗四五次焙乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用荆芥湯點茶下

無大豆紫湯治中風頭眩惡風自吐冷水有汗方見症門

聖治風頭旋用蟬殼二兩微炒為末非時下溫酒一鍾七

上虛眩

針經胃風篇云上虛則眩又五臟生成篇云狗蒙招尤目

昏冒搖掉眼黑眩屬下實上虛也

丹陳客婦人近五十頭痛麻木眩運脉甚虛宜補氣益血

去風行濕

天麻

酒乙

人參

錢半

白朮

錢一

黃芩

錢半

歸身尾

酒半

川芎

錢半

陳皮

錢半

甘草

錢三

黃芪

錢三

半夏

錢五

生薑

錢三

右作一劑水煎服

賈舅因勞役眼眩倦怠頭不爽肚帶溏滑

黃芪

錢半

人參

錢半

當歸

錢一

黃柏

炒三分

白朮

酒一錢

陳皮

錢半

蔓荊子

錢五

甘草

錢三

煎稍熱飲之丑卯時各一次去枕眠少時巳申時又各

一次瘥

男子因作勞成病發熱脚酸口苦頭暈

白朮

茯苓

黃連

川芎

兩半

白芍藥

人參

生地

陳皮

當歸

各一兩

甘草

錢一

杜仲

兩六

分十八貼食前熱下抑青丸二十二粒

丈夫患熱頭眩脉大而散此是辛苦中來

陳皮

錢三

柴胡

錢三

人參

錢二

白朮

錢二

黃芪

錢三

木通

錢一

甘草

錢些

分三貼服

本治風眩頭暈川芎散

山茱萸

兩一

山藥

甘菊花

人參

川芎

各半兩

茯苓

兩半

為末每服二錢酒調下不拘時候日三服不可悞用野

菊花

血虛眩

三因芎歸湯治產後去血過多眩暈不省及傷胎去血多

崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多不止懸虛心煩

眩暈頭重目暗舉頭欲倒方見婦人大法條

丹頭眩屬氣虛挾痰無痰作眩不得治痰為主挾補氣藥

論虛降火治痰

并降火藥濕痰多者用二陳湯 痰多因火動者二陳湯
加酒芩眩運火動其痰二陳湯加黃芩蒼朮羌活散風行
濕 水煮金花丸治頭眩方見痰飲

丹眩運不可當者大黃三次酒炒乾為末茶調下每服一
錢至二錢 一男子年七十九歲頭目昏眩而重手足無
力吐痰口口相續左手脉散大而緩右手緩而脉大不及
於左重按皆無力飲食畧減而微渴大便三四日一行衆
人皆與風藥至春深必死予曰此皆大虛證當以補藥作
大劑服之衆怒而去余教用人參黃芪當歸身芍藥白朮
陳皮濃煎作湯使下連栢丸三十粒如此者服一年半而
精力如少壯時連栢丸冬加乾薑少許餘三時皆依本法
連栢皆薑汁炒為細末又以薑汁煮糊為丸
本治虛風頭旋吐痰涎不已養正丹

黑鉛

水銀

硫黃

硃砂各一兩

右用鐵盞一隻火上溶鉛成汁次下水銀用柳杖子打
勻取下放少時下二味末令冷研為粉用米飲丸或用
棗肉丸如梧子大每服三十丸鹽湯下

此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已

虛者宜補中

垣范天駱之內素有脾胃之病時顯煩躁曾中不利大便

不通初冬出外而晚歸為寒氣怫鬱悶亂大作火不得伸
故也醫疑有熱治以疎風丸大便行而病不減又疑藥力
少復加七八十九丸下兩行前症仍不減復添吐逆食不能
停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘
無力不欲言心神顛倒兀兀不止目不敢開如在風雲中
頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥予謂前症乃
胃氣已損復下兩次則重損其胃而痰厥頭痛作矣製半

夏白木天麻湯治之而愈

天麻

分五

半夏

湯洗一錢半

人參

分五

白木

一錢

蒼朮

分五

橘皮

黃芪

澤瀉

白茯苓

各五分

神麴

一錢炒

大麥蘗

一錢半

乾薑

三分

黃栢

二分

右件咬咀每服半兩水二盞煎至一盞去查帶熱服食前此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭疼非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除其苗為定風草亦治內風之神藥也內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元氣人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱甘苦溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽神麴消食蕩胃中滯氣大麥蘗寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃栢苦大寒酒洗以主冬天少火在泉發

躁也

右氣虛挾痰眩暈余嘗治一人臥則稍輕但舉足則頭旋眼黑以天麻半夏茯苓陳皮白附僵蚕參芪草歸生薑黃芩煎湯服之五六日愈蓋做此方加減之也

濟芩朮湯治胃中濕痰眩暈嘔逆頭重不食

川芎

半夏

酒洗

白朮

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞生薑七片煎服不拘時有附

子桂心無半夏

巖旋覆花湯治中脘伏痰嘔逆眩暈

旋覆花

半夏

橘紅

乾薑

各一兩

枳榔

人參

甘草

白朮

各半兩

右剉碎每服一兩薑水煎服

仲卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

悸者兼行水

方見 嘔吐 假令瘦人臍下有悸吐涎沫而頭眩此水也五苓散主之方見傷寒

痰閉不出者吐之

子和青黛散搐鼻取涎治眩神效方見頭痛

頭風眩運可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛涼之藥防風通聖散加半夏等味仲景云此痰結胸中而致也通聖散見癩

獨聖散

瓜蒂不以多少 鬱金各等分

右為細末每服一錢或二錢薑汁調下服之用鷄翎探吐

大小便滯者微利之

河間搜風丸治邪氣上逆風熱上攻頭目眩運大小便結滯

人參

茯苓各半兩

滑石二兩

藿香二錢半

乾薑

白礬生各一兩

蛤粉二兩

南星

大黃

黃芩各二兩

牽牛四兩

薄荷半兩

半夏一兩

寒水石一兩

右為末滴水丸小豆大每十九生薑湯下加至二十九

日三服

體虛有寒者溫之

仲白朮附子湯治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣

白朮二兩

附子一兩半泡去皮炙 甘草一兩

右三味剉每五錢薑五片棗一枚水鍾半煎至七分去

查溫服

本治體虛有風外受虛濕身如在空中二生散

生附子去皮臍

生南星各等分

右二味咬咀每服四大錢水一鍾生薑十片慢火煎至

八分去查服戊午年予在新安有此疾張醫傳授此方

三服愈

仲息形腫者利濕

仰心下有支飲其人苦冒眩澤瀉白朮主之短氣倚息形如腫為支飲

用澤瀉五兩白朮二兩以水二升煮一升分溫再服

運氣運氣眩有二

一曰風助肝盛眩經云厥陰司天之政風行太虛雲物搖動目轉耳鳴三之氣風乃時舉民病掉眩又云厥陰司天客勝則耳鳴掉眩又云厥陰之勝耳鳴頭眩又云厥陰之復筋骨掉眩治以諸涼是也

二曰濕邪傷腎眩經云太陰司天濕淫所勝頭項腰痛而眩治以苦熱是也

雜方

河神妙散搐鼻治頭目昏眩偏正頭痛方見頭痛門

針灸腦為髓之海其輪上在於其蓋下在風府髓海不足則腦

轉耳鳴脛痠眩冒目無所見全文見針灸蓋者百會穴也補百會風府二穴則眩愈

上氣不足頭為之苦傾目為之眩補足外踝下留之全文見針灸

邪在腎肩背頭項痛時眩取湧泉崑崙視有血者盡取

之全文見針灸

怪穴 頭目眩運 至陰

標 金門 申脉

桑 風池 神庭內風池通玄同 金門 瀉 三里 補

心頭暈怕寒些少風寒則目暗殭仆不分冬夏常用綿帽

包日夜不離一去帽即發 百會 惺惺乙分恐星 風池

二寸半主頭大熱 豐隆 二寸半

桑頭熱 上顛 風門 攢竹 百會

甲風眩善嘔煩滿神庭主之如顏色青者上星主之取上

星者先取諛諛後取天牖風池如頭痛顏青者顛會主之

風眩引頷痛上星主之先取譙譙後取天牖風池 風
眩目瞑惡風寒面赤腫前項主之 風眩目眩顛上痛後
項主之 風眩驚手腕痛泄風汗出至腰陽谷主之 腦
風目瞑頭痛風眩目痛腦空主之 風逆暴四肢腫濕則
唏然寒飢則煩心飽則眩大都主之 頭眩目痛至陰主
之

診

丹左手脉數熱多 脉澁有死血 右手脉實痰積 脉
大必有久病

癩癩

癩癩即頭眩也痰在膈間則眩微不仕痰溢膈上則眩甚
仆倒於地而不知人名之曰癩癩徐嗣伯云大人曰癩小
兒曰癩其實一疾也然與中風中寒中暑尸厥等仆倒不
同凡癩癩仆時口中作聲將省時吐涎沫省後又復發時

作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲
省時無涎沫者後不復再發間有發者亦如癩癩之常法
也

大法

丹癩屬驚與痰宜吐 大率行痰為主 黃芩 黃連

瓜蒌 半夏 南星 尋火尋痰分多少治之無有不愈

分痰與熱有熱以涼藥清其心 有痰必用吐藥吐後
用東垣安神丸 此證必用吐吐後用平肝之藥青黛柴
胡川芎之類

海治長洪伏三脉風癩驚癩發狂惡人與火者灸第三椎
第九椎服局方妙香丸以針穿一眼子透冷水內浸少時
服之如本方若治弦細緩三脉諸癩似狂者李河南五生

丸妙香丸方
見虛煩條

上實

氣亂于頭則為厥逆頭重眩仆

全文見
針灸

邪搏陽則為癩

疾見診法下同針經九針云邪入於陽轉為癩疾厥成爲癩疾厥氣上逆也

素帝曰人生而有病癩疾者病名曰何安所得之岐伯曰病名爲胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發爲癩疾奇病論

凡癩癩及中風中寒中暑中濕氣厥尸厥而昏眩倒仆不省人事者皆由邪氣逆上陽分而亂於頭中也癩癩者痰邪逆上也中風寒暑濕及氣厥尸厥者亦風寒暑濕等邪氣逆上也邪氣逆上則頭中氣亂頭中氣亂則脉道閉塞孔竅不通故耳不聞聲目不識人而昏眩無知仆倒於地也以其病在頭顛故曰癩疾治之者或吐痰而就高越之或鎮墜痰而從高抑之或內消痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑發散上焦或針灸頭中脉絡而導其氣皆可使頭顛脉道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癩

高者因而越之

癩之癩與厥成癩疾眩冒癩疾之顛一疾也王太僕誤分癩爲二疾獨孫真人始能一之今特冠此氣亂頭顛等經文於癩癩篇首使人知疾有所歸而治有所據也

局碧霞丹治五癩疾方見上

世治暗風天麻南星半夏僵蚕白附子防風各半兩白礬二兩用木瓜一箇切去頂取穰納前藥末用原頂覆住麩包煨熟就搗如泥爲丸又用皂角二寸敲細酒半盞浸一宿如發時取前藥一十九粒納口中用酒灌下取出痰即愈自省後日服三十粒薑湯下

治風癩及心風病用皂角三挺搥破濾汁熬如稀糊攤紙上晒乾取兩葉如小錢大用溫漿水浸洗去紙注於兩鼻孔各一蜆殼許須臾涎下咬筋瀝盡涎後服祛痰丸

代赭石一兩 白礬二兩

上者抑之行之

右為細末，稀糊為丸，如梧子大，每服二十九，冷水送下，不拘時。

仲風引湯治癩疾瘰癧

方見寒熱條

無礬丹丸治五癩百癩無問陰陽冷熱

礬丹

晉礬各一兩

右用塶鑿一窠可容二兩許，先安丹在下，次安礬在上，以炭五斤，熾令炭盡，取出，細研，以不經水猪心血為丸，如菉荳大，每服十九至二十九，橘皮湯下。

心血少者益之

世治暗風遠年日久不愈，皆可服用，地黄廣南道地者不計多少，火煨醋淬七次，為細末，每服二錢，溫酒調下，年深者亦治。

羅參硃丸治風癩大有神效

人參

蛤粉

硃砂各等分

右為細末，縱猪心血為丸，如梧子大，每服二十九，金銀花湯下，食遠服。

神應丹治諸癩，用好辰砂不拘多少，為細末，用猪心血和之，得所以蒸餅，裹蒸取出，就熱丸，如梧子大，每服一丸，食遠臥時煎人參湯下，大有神效。

琥珀壽星丸

天南星一斤，掘坑二尺深，用木炭五斤，煨熟取出，炭用好酒一升，浸之，將南星趁熱下坑，用盆蓋，訖，合過一宿，取出，再焙乾為末，琥珀四兩，硃砂二兩，一半入藥。

猪心三箇，取血，另打生薑麪糊，攪令稠粘，將猪心血和入藥末，丸如梧子大，每服五十九，煎人參湯，空心送下，日進三服。

世蜜陀僧散治暗風，取蜜陀僧成塊者，以鐵線纏，又用鐵線懸掛，火煨紅，用酒醋一升，焯盡，出火毒，研極細，每服一

疾迷心之

錢麝香酒調下 治癩疾凌霄花一味為細末每三錢空心酒調服每服藥時以木梳不住手梳其髮又用冷水一碗逐口含之水温則換水盡住梳如此四十九日永絕其根

楊氏家藏五癩丸治癩癩發作不問新久並宜服之

天南星泡一兩 烏蛇肉酒浸一宿去皮骨焙一兩 硃砂二錢半另研

全蝎二錢去毒炒 半夏二兩酒洗焙 雄黃一錢半另研 蜈蚣半條去頭足炙

白附子半兩泡 白僵蠶一兩半炒去絲 麝香三錢另研

白礬一兩 皂角四兩搥碎水半升揉汁與白礬同熬乾研

右為末薑汁煮麪糊丸如梧子大每服三十九薑湯下

丹治癩疾

川芎二兩 防風 猪牙皂角 鬱金

明礬各一兩 蜈蚣一條

右細末蒸餅丸如梧子大空心清茶下十五丸一日除根

羅治癩病心風病用天南星九蒸九曝為末生薑汁打糊為丸如梧子大每服二十九煎人參麥門冬菖蒲湯下亦可

風木

素春脉者肝也春脉太過為病在外善怒忽忽眩冒而癩

疾全文見治法脉來弦實而強為太過 歲木太過甚則忽忽善怒眩冒而

癩疾全文見運氣類註

丹治巡檢夫人癩通聖散二錢半薑三片煎下犀角丸三十粒

保防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥

大黃 芒硝 連翹 薄荷

麻黃

不去節 各五錢

黃芩

石膏 各一兩

白朮

山梔

荆芥穗

各二錢半 滑石 三兩

甘草

一兩

右為麤末每服一兩生薑煎溫服日再服

若勞汗當風寒薄為皴鬱乃痲此勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝倍加芍藥當歸發散玄府之風當調其榮衛 俗云風刺或生癰疹或赤或白倍加麻黃鹽豉芫白出其汗麻黃去節亦去芒硝以醎走血而內凝故不用之發汗罷依前方中加四物湯黃連解毒三藥合而飲之日二服故內經曰以苦發之為熱在肌表連內也小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎藥中調木香末一錢七麻黃主於表而不主於裏故去之 腰脇走注疼痛者加硝石當歸甘草一服各二錢調車前子末海金砂

末各一錢故經曰腰者腎之府 破傷風者如在表則

辛以散之在裏則苦以下之蕪散之汗下後通利榮血

祛逐風邪每一兩加荆芥穗大黃各二錢調全蝎末一

錢羌活末一錢 諸風癩瘡小兒急慢驚風大便秘結

邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竄睡語筋轉驚悸肌

肉蠕動每一兩加大黃二錢梔子二錢茯苓末二錢七

如肌肉蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命曰微

風 風傷於肺咳嗽喘急者每一兩加半夏桔梗紫菀

各二錢 如打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一

兩加當歸大黃各三錢半調沒藥乳香末各二錢 解

利四時傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩芫白十

莖鹽豉一合生薑半兩水一碗同煎至五七沸或煎一

小碗溫冷服一半以筋投之即吐吐罷後服一半稍熱

服汗出立解。如飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連
鬚二錢。芩白十莖依法立愈。慎勿用桂枝麻黃湯解之。
頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每一兩加黃連薄荷各二錢。
半內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵者濁涕下不
已。王註曰膽液不澄則為濁涕。不巳如水泉者故曰鼻
淵也。此為足太陽脉與陽明脉俱盛也。如氣逆者調木
香末一錢。

脉滿大為熱

素心脉滿大癩瘕筋癢

仲風引湯除熱癩癩又治大人風引少小驚癩瘕癢日數
十發醫所不療又治脚風

大黃

龍骨

乾薑各四兩

桂枝三兩

甘草

牡礪各二兩

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏各六兩

右十二味杵瓮末篩以帚囊盛之取三指撮并花水三
升煮三沸温服一升。治風熱瘕瘕食後量多少啣之不用查無不效
河犀角丸治風癩癩發作有時揚手擲足口吐痰涎不省
人事暗倒屈伸

犀角末兩半

赤石脂三兩

朴硝二兩

白僵蚕一兩

薄荷葉一兩

右為末麩糊丸如梧子大每服二十九至三十九温水
下日三服不拘時候如覺痰多即減數忌油膩炙燥

龍腦安神丸治男婦五種癩癩無問遠年近日發作無時

茯苓

去皮取人參蘆末三兩

地骨皮

甘草

麥門冬

去心各二兩

龍腦三錢

牛黃半兩

硃砂二錢

飛

桑白皮一兩

馬牙硝二錢

麝香三錢

烏犀角末

一兩金薄三十片

右十三味煉蜜為丸如彈子大金薄為衣冬月溫水化

下夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽語澁舌強日進三服

肺小急為寒

靈肝脉小急癩瘰筋攣王註云肝養筋藏血肝氣受寒故癩瘰筋攣二陰急

為癩厥同肺脉急甚為癩疾腎脉急甚為骨癩疾法虛實

法

羅沉香天麻湯治癩瘰筋攣方見小兒門

珠子辰砂丹治風癩久不愈者

薯蕷 人參 遠志 防風

紫石英 茯神 虎骨 虎睛

龍腦 五味子 石菖蒲 丹參

細辛各二錢半 珠子末四錢

右件為細末麩糊為丸如梧子大用硃砂二錢研細為衣每服三十五丸煎金銀花湯送下日進三服忌魚肉

濕麩動風之物

烏頭丸治五風癩病

川烏 草烏 天仙子 五靈脂各二兩

黑豈一升

右為細末滴水丸如梧子大每服五七丸溫水下如中風加附子半兩

實

子和昔項開完顏氏病搐先右臂并右足約搐六七十數良久左臂并左足亦搐六七十數不瘥兩目直視昏瞶不識人幾月餘求治於余先涌其寒痰三四升次用導水禹功散泄二十餘行次服通聖散辛涼之劑不數日而瘥

羅法煑草麻子治諸癩病不問年深日遠

草麻子去皮取仁二兩 黃連去鬚剉如黃大一兩

右件用銀器水一大碗慢火熬水盡即添水熬三日兩

夜為度取出去黃連只用草麻子仁風乾不得見日用
竹刀將草麻子每粒切作四塊每次服五粒計二十塊

作一服用荆芥湯食後溫服服草麻子仁者終身忌食
黃犯之則腹脹而死

虛

丹治一婦人四十五歲生子多觸胎時有腹痛每夜喜飲
酒三盞即睡其夫性暴而諧謔所以借酒解怒忽九月望
後癩病大作目上視揚手擲足甚強健舉體大筋皆動喉
嚮如鋸涎沫流口兩角如此一時辰許諸症皆靜狀如熟
寢全不知人半時小腹漸痛上至心痛大作汗如雨自頭
至乳而止如此半時痛漸減汗亦收痛作時却自言其痛
其餘言語皆謬誤問亦不答亦不知人痛定又熟寢如前
癩與痛間作晝夜不息經兩宿方召予脉之痛作時脉四
至半似弦非弦左弱於右予未敢與藥候癩作時再看形
脉後作時六脉皆隱但有大筋轉於指下眼白青而面不

青手之動三倍於足予問之痛作時必欲重按比癩作時
汗必不出其夫言果然予曰此非死證若尚能嚙藥則易
治試以調香附子末灌之適癩勢稍定却嚙得半盞令急
燒竹瀝未就時痛大作余以肝有怒邪因血少而氣獨行
所以脾受病脾胃之間舊有酒痰為肝氣所抑鬱而為痛
然酒喜動可以出入升降入內則痛出外則癩當乘其入
內之時急為點大敦行間中腕三處穴令分頭同時下火
灸之足上艾火少灸先了腹上痛漸下至腰而止熟寢少
時癩作如前證減半又以竹瀝入少薑汁灌下大半鍾灌
時適值癩定但熟寐如前自是不省人事一晝二夜皆已
棄之余曉之曰身不發熱因痛則汗出大便不通者五六
日自予來亦未見其小水非死症當是血少無神而昏耳
爾為痛搯人中俄而呻吟急以人參湯同竹瀝灌之又昏

睡如前余教以作人參白朮膏入竹瀝調下如此二晝夜凡用人參一斤白朮二斤眼忽能開手能舉自言脅膈滿而舉身皆痛耳目仍未有聞見忽自溺床甚多余聞之甚喜且得癩與痛皆不作但教令用陳皮芍藥甘草川芎湯調參朮膏又加竹瀝飲之余欲往他處且與脉之聞其作聲余自知謬拙不教以粥與藥間服急令作稀粥與之止嚙得三四匙牙禁不受余遂以木楔斡開以稀粥入藥湯又與竹瀝同灌一大鍾蓋是粥多而藥居三之一予遂出門教令粥藥相間與之予在二十里外未申間天大風作予料此婦癩必作特往視之癩不作而痛作脉去來急無次急為灸然谷太衝巨闕灸罷痛定問其要粥否答曰我正飢其夫飲之以粥嚙兩鍾予乃往他處仍教以藥湯調參朮膏竹瀝與粥間與之如前第二夜半時召予甚急往

視之癩病大作奪手不能診脉令人扶定兩時予捉其中指強而脉之四至半麓大有力左右同而右少緩口妄言而無次又怒罵人眼上視不瞬而嘔又欲起走其狀若有所憑然予捉定兩手為灸兩大指背半甲半肉際各三壯怒狀稍殺求免索粥視之耳目仍未有聞見昏寐至夜半狂怒大作且言鬼怪之事而師巫至大罵巫者予靜思之氣因血虛亦從而虛邪因入理或有之且與補藥血氣若克邪當自退仍與前藥又恐痰頑佐以荆瀝又以秦承祖灸鬼法灸之哀告我去昏睡一晝夜忽自起坐索粥其夫與之方問夫你面垢如許惟床上有香氣繼又無所知識惟開眼不睡手足雖能運動却作尋摸態如此又二晝夜粥食稍加又溺床多如前予益喜仍守前藥予又往他處次日晚忽來召予急往視之病人自言渾身皆痛脉之

皆五至左右均而和曰參朮膏俱盡遂教令就與前藥中加參朮煎去荆瀝加香附末與一服覺甚快余且令守此藥至次夜半又來告急曰前痛大作往視之坐桶上叫聲甚高予思之此虛病亦多汗腸燥而糞難耳痛當在小腹與腰急烘琥珀膏大者貼小腹仍教以熱手摩腰腎間連得下氣而痛減就睡少時又起如是者五六次一醫者勸令用通利藥予曰痛與死孰為輕重且堅忍至夜半後當自通又往他處至四更來告急往視之痛大作予令坐以溫湯中當自下換湯痛定覺甚快第二桶湯下結糞二塊就睡天明予又往他處至晚又告急予視痛大作連及兩脇手不可近予思之此痛無因若結糞未盡痛當在下今痛在上必因食多問之果然醫者欲用感應丸予教勿與粥藥病者力索藥遂以香附末令舐之至夜半痛漸減天

明覺畧飢索粥予曰非飢也乃嘈耳勿與而自安其家又自與粥至辰巳間予往他處至晚痛又作而病者索香附末不已遂以湯調半碗與之探令吐猶有宿食痛遂止予又往他處至夜半又告痛復作詢之以醋拌蘿蔔苗吃粥又以香附末探吐之痛定教令一晝夜勿與食至次日少與淡粥覺飢時以陳皮湯下白朮丸如此調理自安痰癩癩治法並見上虛條

久癩為痰積
潔治風癩病久不能愈者從厚朴丸春秋加添外又於每門一料中加人參菖蒲茯苓各一兩五錢和劑服之厚朴丸方見吐

陰陽

垣升陽湯治陽躄癱足太陽下行宜升陽氣

麻黃

八錢不
去節

羌活

一兩

防風根

八錢

炙甘草

五錢

右咬咀每服三錢水五大盞煎至一盞去渣稍熱服宿

食消盡腹中空服之後避風寒一二時辰乃效

潔晝發治陽躄申脉二穴在足外踝下陷中容爪甲白肉際是也夜發治陰躄照海二穴在足內踝下陷中是也先灸兩躄各二七壯然後服前藥

王治百病風癩用麻仁四升水六升猛火煮令芽生去查煎取七合旦空心服或發或不發或多狂語勿恠之但令人摩手足須臾即定凡進三劑無不愈

羅神應丹治諸風心癩病

狐肝一具

烏鴉一隻

鴟梟一箇

白礬一兩

野狸一箇去肚腸不用皮毛用新瓦確盛肉以炭火煮爛

生犀角末一兩

右為末用酒打麩糊為丸如皂子大硃砂為衣每服一丸酒送下不拘時候

楊氏蝎虎治癩法見小兒驚癩門妙

針灸

靈暴擊癩眩足不任身取天柱

氣亂於頭則為厥逆頭重眩仆取之天柱天杼不知取太陽榮輸於此義同

癩疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩心候之于顏取手太陽陽明太陰血變而止癩疾始作而引口啼呼吸悸者候之手陽明太陽左強者攻其右右強者攻其左血變而止癩疾始作先反僵因而脊痛乃候之太陽陽明太陰手太陰血變而止俱出癩狂篇

玉癩此灸癩必先下之乃可灸不灸則氣不通能殺人針不拘鳩尾必高手乃可下針但宜灸亦不可多灸多則令人健忘

通後谿

集鳩尾湧泉心膻

案陽交三里後谿太衝間使

摘風癩熱病心風驚癩 上脘 三里

桑天吊 巨闕 百會 顛門

東癩 平旦發者足少陽 晨朝發者足厥陰 日中發

者足太陽 黃昏發者足太陰 人定發者足陽明 半

夜發者足少陰 心癩面赤心下熱短氣喘息 巨缺

肝癩面青反視手足搖動 丘墟 中封 脾

癩面黃腹大善利 胃腕并腕傍一寸各三壯 衝陽

隱白 肺癩面白口吐沫 肺腧 少商 少陽 各三

腎癩面黑正直視身不搖如尸厥 金戶 少海 至陰

湧泉 各三壯 膈癩四肢不舉 風府 一七壯 百會

人中 承漿 各隨 腸癩都無動靜如尸厥狀 承山

湧泉 勞宮 翳風 各隨年壯 刺入一分 神關

馬癩目張搖頭馬鳴欲反折 風府 三壯 刺一分

牛癩目直視腹滿 鳩尾尖 三壯 大椎 三壯

羊癩揚目吐舌 大椎 三壯 刺一分

猪癩吐濁沫口動搖 浮白 三壯 刺一分

犬癩手屈拳攣 勞宮 一壯 刺一分 絲竹空 助戶 各一

雞癩搖頭反折善驚目搖 至陰 竅陰 厲兌 各壯 刺一分

甲癩疾多言耳鳴目僻頰腫實則聾齟喉痺不能言齒痛

草軌血虛則痺膈偏歷主之 癩疾吐舌鼓頷狂言見鬼

溫濡主之 腕後 癩疾吐舌曲池主之 癩疾互引僵仆

申脉主之 先取陰蹻後取京骨 癩疾狂妄行振寒京骨

主之 癩疾身痛狂善行束骨主之 癩疾僵仆轉筋僕

參主之 癩疾目眈眈軌血崑崙主之 狂癩疾體痛飛

揚主之 癩疾反折委中主之 癩疾憎風而振寒不得

言得寒益甚身熱狂走欲自殺目反妄見瘈瘲泣出死不知人肺膺主之 癲狂膈膺及肝膺主之 癲疾僵仆目妄見恍惚不樂狂走瘈瘲絡都主之 癲疾互引及折戴眼及眩狂走不得臥心中煩攢竹主之 癲疾發寒熱大煩滿悲泣出解谿主之 癲疾互引口喎喘悸者大迎主之取手陽明太陰變血而止 癲疾狂多食喜笑不發於外煩心渴商丘主之 癲疾嘔沫神庭及兌端承漿主之其不嘔沫本神及百會後頂玉枕天衝大杼曲骨尺澤陽谿外丘當上腕傍五分通谷金門承筋合陽主之委中下二寸為 癲疾互引水溝及斷交主之 癲疾上星主之先取噫嘻後取天牖風池 癲疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面赤腫願會主之 癲疾瘈瘲狂走頸項痛後頂主之後頂在百會後一寸五分 癲疾狂走瘈瘲搖頭口喎戾頸強強間主之

癲疾骨瘦眩狂瘈瘲口噤羊鳴刺腦戶 狂易多言不休及狂走欲自殺目反妄見刺風府 癲疾怒欲殺人身柱主之 狂走癲疾脊急強目轉上插筋輸主之 癲疾發如狂走者面皮厚敦敦不治虛則頭重洞泄淋瀝大小便難腰尻重難起居長強主之 寒厥癲疾噤呵瘈瘲驚狂陽交主之 癲疾大瘦腦空主之 癲疾僵仆狂虛腕骨及風池主之 癲疾狂瘈瘲眩仆瘖不能言羊鳴沫出聽官主之 癲狂煩滿刺絲竹空 癲疾吐舌沫出羊鳴戾頸天井主之天井在肘後 癲疾氣短嘔血胸背痛行間主之 痿厥癲疾洞泄然谷主之 癲狂互引天柱主之 右針灸癲法內經但取手足太陽陽明太陰六經而已今甲乙經等書又多取督經手足太陽足少陰厥陰蓋隨症取之然學者當以內經為主也

診

靈骨癩疾者顛齒諸膺分肉皆滿而骨居汗出煩惋嘔多

沃沫氣下泄不治癩苦感切○骨居汗出筋癩疾者身

倦攣急大刺項大經之大杼嘔多沃沫氣下泄不治脉

癩疾者暴仆四肢之脉皆脹而縱脉滿盡刺之出血不滿

灸之挾項太陽灸帶脉于腰相去三寸諸分肉本輸嘔多

沃沫氣下泄不治癩疾者疾發如狂者死不治治癩

疾者嘗與之居察其所當取之處病至視之有過者瀉之

置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二

十壯窮骨者骹骨也俱出癩疾篇

來疾去徐上實下虛為厥癩疾全文見治虛實法

素癩疾脉搏大滑久自已脉小堅急死不治通評虛實論癩

疾脉虛則可治實則死上同

脉癩疾脉實堅者生脉沉細小者死此見與內經相反更詳之當以內經為正

風熱

子癩

雲葛根湯治妊娠臨月因發風瘧忽悶曠不識人吐逆眩

倒名曰子癩

葛根

貝母去心

牡丹皮

防風

當歸

川芎

白茯苓

桂心

澤瀉

甘草各二兩

獨活

石膏

人參各三兩

右咬咀以水九升煮取三升分温二服貝母令人易產

未臨月升麻代之

丹治一婦人懷妊六月發癩手足揚直面紫黑色合眼涎

出昏曠不省人事半時而醒醫與震靈丹五十餘貼其疾

時作時止無減症直至臨產方自愈產一女蓐中子母皆

安次年其夫疑丹毒必作求治之診其脉浮取弦重取瀼

按至骨則沉實帶數時正二月因未見其癩發正狀未敢與藥意其舊年癩發時乃五月欲待其時度此疾必作當審諦施治至五月半其疾果作皆是午巳兩時遂教以自製防風通聖散用生甘草加桃仁多紅花少或服或吐至四五劑疾漸疎而輕發為疥而愈

大治子癩用硝砂末酒調下二錢

詳見安胎

癩 勞風 胎前癩 產後癩

大法補虛

癩病者口噤角弓反張者是也

丹癩大率與癩病相似比癩為虛宜帶補多是氣虛有火兼痰宜服人參竹瀝之類不用兼風藥

無此症多由亡血筋無所營故邪得以襲之所以傷寒汗下過多與夫病瘡人及產後致斯病者槩可見矣

丹一男子二十餘歲患痘瘡醫謝後忽患口噤不開四肢

強直不能屈時或逆臍腹痛一陣則冷汗如雨痛定則汗止時作時止其脉極弦緊而急如真弦狀向知此子極勤苦意其因勞倦傷血山居多風寒乘虛而感又因痘瘡其血愈虛當用辛溫養血辛涼散風遂以當歸身芍藥為君川芎青皮釣藤為臣白木陳皮甘草為佐桂枝木香黃連為使更加紅花少許煎十二貼而安

海神木加羌活麻黃湯治剛癩解利無汗

神木方見傷寒太陰

白木加桂心黃芪白木湯治柔癩解利有汗

白木方見傷寒太陽

太陽陽明加川芎 荆芥穗 正陽陽明加羌活 酒大

黃 少陽陽明加防風 柴胡根

熱而在表者加黃芩 寒而在表者加桂枝黃芪附子 熱而在裏者加大黃 寒而在裏者加乾薑良薑附子

已上數經寒熱當以脉別之

表症屬太陽

防風當歸散

防風

當歸

川芎

地黄各一兩

右剉每服一兩水三盞煎至二盞溫服

仲活人治瘧法並見後表裏陰陽條 太陽病發熱無汗而反惡寒者名曰剛瘧 太陽病發熱汗出而不惡寒者名曰柔瘧

仲葛根湯治太陽無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧葛根湯主之方見傷寒

若發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧宜麻黃加獨活防風湯

麻黃去節

桂枝各一兩

芍藥三兩

甘草兩

獨活

防風各一兩

右剉細每服一兩水二鍾煎至一鍾半溫服

仲瓜蒌桂枝湯太陽病其症備身體強兀兀然脉反沉遲

此為柔瘧

海藏治有汗而為柔瘧

瓜蒌根二兩

桂枝三兩

甘草二兩

生薑三兩

大棗十二枚

芍藥二兩

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出

食頃啜粥發之

海若發熱自汗而不惡寒者名曰柔瘧宜桂枝加川芎防風湯

桂枝

芍藥

生薑各一兩

甘草

防風

川芎各一兩

大棗六枚

右剉細每服一兩水三盞煎至一盞半去渣溫服

凡剛柔二瘧並可與小續命湯方見中風門但去查入生薑汁小續命

湯加減法 若柔瘧自汗者去麻黃夏間及病有熱者減

桂枝一半冬及初春去黃芩

千續命湯治卒中半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或癡或身強直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用食大小便不利皆療之

人參

桂心

當歸

獨活

黃芩

乾薑炮

甘草炙各七錢半

石膏一兩半

杏仁四十枚

右九味咬咀以水九升煮取三升分溫三服日二服取汗無汗者加麻黃

裏証屬陽明

仲剛瘧為病胃滿口噤臥不着席脚攣急必齧齒可與大承湯方見傷寒

子和呂君玉之妻年三十餘病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癇治之以天南星雄黃天麻烏附用之殊無少效戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直搖

動風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝木茂而自病因涌風涎二三升次以寒刺下十餘行又以排針刺百會穴出血一盃立愈

半夏半裏屬少陽

海若汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱脉弦者少陽風瘧宜柴胡加防風湯

柴胡

人參

半夏製六錢

黃芩五錢

生薑

甘草各六錢半

防風一兩

棗三箇

右剉每服一兩水三盞煮至一盞半去渣溫服

太陽陽明合病

若發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽兼陽明也宜去風養血防風當歸散主之方見本門大法條

瘧分陰陽

陽瘧並見表裏條仲景雖曰瘧皆身熱足寒然屬陽不厥逆

陰瘧無汗

百一治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之

以酒或水六升煮取二升去查服

千倉公當歸湯治賊風口噤角弓反張瘥方

當歸 防風錢各七半 獨活一兩半 附子一枚

細辛兩半 麻黃一兩二錢半

右咬咀以酒五升水三升煮取三升服一升口不開者格口納湯一服當蘇二服小汗三服大汗

活八物白朮散治陰瘥一二日面腫手足厥冷筋脉拘急汗不出恐陰氣內傷

白朮 茯苓 五味子各半兩 桂心三分

蘇黃兩半 良薑一分 羌活兩半 附子三分

右為末每服四錢水一大盞生姜五片同煎至五分去查溫服無時

海若發熱脉沉而細者附太陰也必腹痛宜桂枝加芍藥

防風防已湯 又宜小續命湯

桂枝一兩半 防風 防已各一兩 芍藥二兩

生薑一兩半 大棗六枚

右剉每服一兩水三盞煎至一盞半去查溫服

汗陰瘥有 活附子散陰瘥手足厥逆筋脉拘急汗出不止頭項強直頭搖口噤

桂心三錢 附子一兩泡 白朮一兩 川芎三錢

獨活兩半

石為末每服三錢水一鍾棗一枚煎至五分溫服 桂心白朮湯治陰瘥手足厥冷筋脉拘急汗出不止

白朮 防風 甘草 桂心

川芎 附子

石為末每服五錢水二鍾生薑五片棗二枚同煎至七

分去查温服

附子防風散治陰瘧閉目合面手足厥逆筋脉拘急汗出不止

白芷兩一

防風

甘草各三分

桂心兩半

附子三分

乾薑三分

柴胡一兩半

茯苓三分

五味子兩一

葦府

右為末每服三錢水二盞生薑四片同煎去查温服

潮發汗太多因致瘧身熱足寒項強惡寒頭熱面腫目赤頭搖口噤背反張者太陽瘧也若頭低視下手足牽引肘膝相攣陽明瘧也若一目或左右邪視并一手一足搖擗者少陽瘧也汗之止之和之下之各隨其經可使必已

右太陽瘧屬表無汗宜汗之有汗宜止之陽明瘧屬裡

宜下之少陽瘧屬半表半裏宜和之所謂各隨其經也

丹盧婦人因怒手足強直十指如束左脉弦虛右脉弦大而強稍堅此風木攻脾土宜速瀉肝氣助肺金補脾土之陰

黃連錢二

天南星

白朮

人參

黃芩

天麻

川芎

木通

陳皮

青皮各半錢

甘草一分

作一貼煎取一盞入薑汁令辣再沸熱服

肺移熱於腎傳為柔瘧全文見診病傳變

運氣

運氣瘧有三一曰風經云厥陰在泉客勝則大關節不利內為瘧強拘急外為不便又云諸暴強直皆屬於風是也

二曰濕經云諸瘧項強皆屬於濕王註謂陽內鬱而陽行於外是也三曰寒包熱經云火太過曰赫羲赫羲

雜方

之紀上羽與正徵同其病瘥蓋司天之寒東火於中亦陰陽內鬱陰行於外之意也

世治角弓反張胞衣瓶內水鷲毛挑入患人口唇即愈

耐治中風身體強直不得屈伸反覆括枳樹皮細切一升

以酒二升浸一宿每日溫酒服半升酒盡再作枳實即枸櫞樹去風

濕效

干治口噤手足不隨而身體強直伏龍肝五升以水七升

和攪取汁飲之

診

仲病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭

動搖卒口噤背反張者瘥病也活人書云外症發熱惡寒與傷寒相似但其脈沉遲

弦細而項背反張為異耳太陽病發汗太多因致瘥夫風病下之

則瘥復發汗必拘急夫瘥脈按之緊如弦直上下行脈瘥家其脈伏堅直上下行

無凡瘥脈皆伏沉弦緊

仲太陽病發熱脈沉而細者名曰瘥為難治瘥病有灸

瘥難治即破傷風之類瘥病若發其汗者寒濕相搏其表益虛

即惡寒瘥病發其汗已其脈洽洽如蛇暴腹脹大者為

欲解脈如故反伏弦者瘥

靈風瘥身反折先取足太陽及臑中及血絡出血中有寒

取三里熱病

素太陽所謂強上引背者陽氣太上而爭故強上也脈解

督脈為病脊強反折骨空論

足少陰之筋循脊內挾脊上至項其病主癰瘕及瘥在外

者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病

者不能仰治在燔針

甲風瘥身反折先取太陽及臑中及血絡出血瘥中有

針灸

寒取三里 痲取之陰驕及三毛上及血絡出血 痲取
顛會及百會又膈輸上關光明主之 痲目不眴刺腦戶
痲脊強反折痲癩疾頭重五樞主之 痲互引善驚
天衝主之 痲反折心痛形氣短尻腫瀉小便黃閉長強
主之 痲筋痛急互引肝輸主之 熱痲脾輸及腎輸主
之 痲口噤互相引口乾小便赤黃或時不禁承漿主之
痲驚互引脚如結膈如裂束骨主之 痲反折互引腹
脹掖攣背中怏怏引脇痛內引心中脊內肺輸主之 又
刺陽明從項而數背椎俠脊脊而痛按之應手者刺之尺
澤三痛立已

勞風

即痲之偏

虛邪 四云痲比癩為虛蓋因勞汗遇風內挾太陽寒濕之邪治
亦與痲同法但當視其所勞則知虛在何處如方勞則腎

虛汗出腠理開風入皮膚得寒則閉風不能出與水俱行
其人當目下腫如臥蚕之狀戴人云腎主水其經至于目
下故也不禁房室則死明其虛在腎也所以關於太陽何
也太陽主寒其經最在外腠理得寒則閉故太陽先受邪
也治宜八物白朮散倉公當歸湯

見前

河間芎朮丸

方未

皂角化痰丸

方見咳

胎前痲

表

此病多由風寒濕乘虛而感皆從太陽經治之

活獨活防風湯 治痲太陽有汗

桂枝

兩

芍藥

三兩

甘草

半兩

獨活

防風

各一兩

右剉細每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服

防風葛湯 治痲太陽無汗

葛根

兩四

麻黃

兩三 芍藥 防風

桂枝

兩一

右剉細每用一兩先煮麻黃去上沫入後藥同煎數沸
溫服

產後瘧

竹瀝湯 治產中風口噤面青手足急強用竹瀝一竹

分為五服微溫頻服大效

此症因虛遇風挾痰而作宜服人參竹瀝之類

虛痰 產問曰產後汗出多而變瘧者何答曰產後血虛腠理不

密因遇風邪搏之故變瘧也宜速斡口灌小續命湯稍緩

解表 即汗出如雨手拭不及不可救也

小續命方見前瘧條

舉鄉古拜散 治新產血虛瘧者荆芥穗不以多少瓦上

微炒為末大苳黃卷熱酒沃之去黃卷取汁調四五錢和

查飲之其效如神

干大苳紫湯 治產後中風形如角弓反張口噤涎潮黑

苳半升炒令焦黑烟起以無灰酒二升沃之入磁器中每

用一盞入獨活五錢同煎至六七分去滓溫服

按續命已下三方太陽厥陰藥也邪實脈浮弦有力者

固宜但產後血氣大虛之人不宜輕發其表但用防風

當歸散治之為妙

血虛

海防風當歸散

方見前瘧條

破傷風

瘵瘧

顫振

產後瘵瘧

破傷風者因瘡熱甚鬱結而榮衛不得宣通佛熱因之遍

體故多白痂是時瘡口閉塞氣難宣通故熱甚而生風也

大法 先辨瘡口平無汁者中風也邊自出黃水者中水也並欲

作瘵急治之又痛不在瘡處者傷經絡亦死症也初覺瘡

腫起白痂身寒熱急用玉真散貼之傷在頭面急嚼杏仁和雄黃白麩傅瘡上腫漸消為度若腰脊反張四肢強直牙關口噤通身冷不知人急用蜈蚣研細末擦牙吐出涎沫立甦亦宜按摩導引

河破傷風風熱躁甚佛鬱在表而裏氣尚平者善伸數欠筋脉拘急或時惡寒或筋惕而搐脉浮數而弦也宜以辛熱治風之藥開衝結滯而愈猶傷寒表熱佛鬱而以麻黃湯辛熱發散也凡用辛熱開衝風熱結滯宜以寒藥佐之則良免致藥中病而風熱轉甚也如治傷寒發熱用麻黃桂枝加黃芩石膏知母之類是也若止以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙若表不已漸傳入裏裏又未太甚而脉弦小者宜以退風熱開結滯之寒藥調之或微加治風辛熱亦得猶傷寒在半表半裏而以小柴胡和解之也若裏勢

已甚而舌強口噤項背反張驚惕搐搦涎吐稠粘胸腹滿塞便溺秘結或時汗出脉沉洪數而弦也然汗出者由風熱鬱甚于裏而表熱稍罷則腠理疎泄而心火熱甚故汗出也法宜除風散結寒藥下之後以退風熱開結滯之寒藥調之則熱退結散而風自愈矣

背後搐者羌活獨活防風甘草向前搐者升麻白芷獨活防風甘草兩傍搐者柴胡防風甘草右搐加滑石

解表 河玉真散

南星

防風各等分

右為末生姜汁酒調服傷處以此貼之

羌活防風湯 治破傷風初邪傳在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草

地榆

細辛各一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎八分熱服熱則加黃芩一兩大便秘加大黃一兩

防風湯見前風條

蜈蚣散

蜈蚣對

魚鱧五錢炒

左蟠龍半兩炒烟盡

右為細末用防風湯調服

實表白木防風湯若服前藥已過歲府和有自汗者宜服此藥

白木

防風

黃芪各一兩

右咬咀每服七錢水二盞煎至一盞去滓溫服

攻裏大芩黃湯臍秘小便赤自汗不止者宜速下之

川芎一兩

黃芩六錢

甘草半兩

大黃一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服以利

為度

江鰮丸 治破傷風驚而發搐戩府秘澁知病在裏

江鰮半兩炒

野鴿糞半兩炒

雄黃一錢

蜈蚣對

天麻兩

白殭蚕半兩

右為細末分作三分先用二分燒餅為丸如桐子大硃砂為衣又用一分入巴荳霜一錢同和亦以燒餅為丸不用硃砂為衣每服硃砂為衣丸藥二十九丸入巴荳霜丸藥一丸次服二丸漸加至利為度再服硃砂為衣丸藥病愈止

和解羌活湯 利後宜服搐瘥不已亦宜服

羌活

獨活

地榆各一兩

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服如有熱加黃芩有痰加半夏

地榆防風散 治半表半裏頭微汗身無汗

地榆 防風 地丁香 馬齒莧各一

友為細末每服三錢溫米飲調下

虛

養血當歸地黃散日久氣血漸虛邪氣入胃宜養血四物湯加防風藁本白芷細辛各等分為細末每用五錢水一盞半煎至一盞溫服

瘕瘕

病筋脉相引而急名曰瘕瘕俗謂之攣是也

風火

河諸執贅瘕皆屬于火熱勝風搏併于經絡風主動而不寧風火相乘是以熱贅瘕生矣治法祛風滌熱之劑折其火熱贅瘕可立愈若妄加灼艾或飲以發表之劑則死不旋腫矣

診治

素問云心脉急甚者為瘕瘕此心火虛寒也治宜補心牛

黃散主之靈樞云心脉滿大癩瘕筋攣此心火實熱也治

宜瀉心火涼驚丸主之肝脉小急亦癩瘕筋攣此肝虛也

續斷丸主之若肝脉盛者先救脾宜加減建中湯素問云

脾脉急甚者亦為瘕瘕此脾虛肝乘之而瘕也故宜實土

瀉肝木之劑

虛實汗多不止為虛無汗能食為實

脾胃垣人參益氣湯 治熱傷元氣四肢困倦手指麻木時時

瘕瘕

黃芪錢二 甘草炙 升麻各五分 五味子三十粒

柴胡六分 生甘草五分 人參一錢二分 炙甘草五分

白芍藥七分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去查熱服

獨活湯 治風虛昏瞶不自覺知手足瘕瘕或為寒熱血

虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

獨活 羌活 人參 防風

當歸 細辛 茯苓 遠志

半夏 桂心 白薇 菖蒲

川芎各五錢 甘草二錢半

每服一兩水二盞生姜五片煎八分食後溫服

胃風湯 治虛風症能食麻木牙關緊急手足痲痺目肉

蠕睨胃中有風面腫

白芷一錢二分 升麻二錢 葛根一錢 蒼朮一錢

甘草五分 柴胡 藁本 羌活

黃柏 草薺各五分 麻黃半錢不 蔓荊子一錢

當歸身一錢

右咬咀水二鍾姜三片棗二枚煎至一鍾溫服

腎

千薯預丸 治虛勞不足風氣百疾頭目眩冒驚悸狂癩

薯蕷八分 當歸一分 桂心七分 神麴炒

熟地各十分 甘草二分 人參一分 芩薺五分

芍藥 白朮 麥門冬 杏仁各六分

柴胡 桔梗 茯苓各五分 鹿角膠七分

乾姜三分 白朮三分 防風六分 大棗一百枚為膏

黃芩六分 大苳黃卷七分

右二十二味末之和棗膏煉蜜丸如彈子大空腹酒服

一九日三服

肝

續斷丸 治肝勞虛寒脇痛脹滿眼昏不食攣縮痲痺

續斷酒浸 川芎 當歸酒浸 半夏湯泡

橘紅 乾姜炮各一兩 桂心 甘草炙各半兩

右為細末蜜丸如桐子大每服百丸白滾湯下

心

牛黃散 治心虛風筋脉攣搐神昏語澁

牛黃

龍腦

硃砂

麝香各一錢

蟬蛻

烏蛇肉酒浸一兩全蝎炒

殭蚕炒

桑螵蛸

羚羊角 阿膠炒

天麻

防風

甘菊花 蔓荊子

桂心

細辛

側子炮去皮

獨活去芦各半兩犀角兩

麻黃七錢半

右為細末和勻再研每服一錢荳淋酒下

續命煮散 治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼瞶動

或時搐搦或渴或自汗

防風

獨活

當歸

人參

細辛

葛根

芍藥

川芎

甘草

熟地

遠志

荆芥

半夏各五錢

官桂七錢半

每服一兩水二盞生姜三片煎至八分去渣通口服汗

多者加牡礪粉一錢半

風熱獨活散 消風化痰

細辛

石膏研

甘草各半兩

防風

藁本

旋覆花

川芎

蔓荊子

獨活各一兩

右為細末每服三錢姜三片水一大盞煎七分食後服

運氣運氣瘕瘕有二

其一曰火經曰火鬱之發民病嘔逆瘕瘕又曰少陽所至

為暴注暍瘕又曰少陽司天客勝則為瘕瘕是也

其二曰水經曰陽明司天燥氣下臨木氣上從民病脇痛

目赤掉振鼓慄又曰歲土太過雨濕流行民病足痿不收

針灸

行善瘕又曰太陰之復頭頂痛重而掉瘕尤甚是也

甲卒心中痛瘕瘕互相引肘內廉痛心熬熬然間使主之

熱病先手臂身熱瘕瘕唇口聚鼻張目下汗出如轉珠

兩乳下二寸堅腸滿悸列缺主之 振寒瘕瘕手不伸欬

嗽唾濁氣膈善嘔尺澤主之 大風嘿嘿不知所痛嗜臥

善驚瘕瘕天井主之 頭重鼻衄及瘕瘕至陰主之 身

熱狂走譫語見鬼瘕瘕身柱主之

千腹滿瘕瘕心痛氣滿不得息巨闕主之 嘔血時瘕善

搖頭顏青汗出不過肩傷寒溫病曲澤主之

顛振

顛振也振動也風火相乘動搖之象比之瘕瘕其勢為緩

內經云諸風掉眩皆屬於肝掉即顛振之謂也又曰諸禁

鼓慄如喪神守皆屬於熱鼓慄亦動搖之意也此症多由

風熱相合亦有風寒所中者亦有風挾濕痰者治各不同

也常見此症多於傷寒熱病疾中無見者多是熱甚而然虛亦有之皆戰搖振動輕利而不痿弱比之中風癱

曳牽動重遲者微有不同

風濕

星附散 治中風雖能言口不喎斜手足躄曳者

天南星

半夏已上俱用姜制

黑附子去皮

白附子

茯苓

川烏去皮

殭蚕

沒藥各等分

右咬咀每服五錢水酒各一盞煎八分熱服并進得汗

為度

風熱

獨活散見前瘕瘕條

瘕

千金牙酒 療積年八風五疰舉身躄曳行步跛躓不能

收持

金牙

碎如米粒用小絹袋盛

地膚子

無子用莖葉一方用蛇床子

熟地

胡藿根

附子

防風

細辛

莽草各四兩

川椒合四

羌活斤一

一方用獨活

右十味咬咀盛以絹袋用酒四斗於磁器中漬封固勿令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日服一合常令酒氣相接不盡一劑病無不愈

產後痲痺

產後因虛傷風痲痺同傷表症未傳入裏宜服防風湯前見

門風

愈風湯 治產後中風口噤痲痺亦治血暈四肢強直用

荆芥略炒為末每服三錢豆淋酒下

增損柴胡湯 治產後感異症手足牽搐涎潮昏悶

柴胡

黃芩一錢二分

人參一錢半

甘草一錢半

表

熱

石膏

二錢

知母

一錢

黃芪

二錢半

半夏

一錢半

右咬咀分二服水二盞姜三片棗二枚煎八分不拘時服

秦芫湯前症已去次服此藥去其風邪

秦芫

芍藥

柴胡

各一錢七分

甘草

一錢二分

黃芩

防風

各一錢二分

人參

一錢

半夏

各一錢一分

右咬咀分二貼每貼水二盞姜三片煎八分食遠服

癘風

經曰脉風成爲癘俗呼癘風是也

大法

丹云大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癘風以其酷烈暴悍可畏爾人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虻虫於穀道中出所出雖有上下道路之異然皆

不外於陽明一經而已。看其疙瘩上先見在上體多者病在上也。下先見在下體多者病在下也。上下同得者病在上復在下也。陽明主胃與大腸無物不受。此風之入人也。氣受之在上多血受之在下多血氣俱受者上下皆多。自非醫者有神病者有鐵心罕有免者。余曾治四五人中間惟一婦人得免。以其貧甚無物可吃也。孫真人曰：吾嘗治四五百人終無一人免者。非真人之不能治也。第無一人能守禁忌耳。

大法重者取積取汗

下劑 醉仙散 治大風疾遍身癢疹瘡痒麻木

胡麻子 牛旁子 枸杞子 蔓荊子各一
白蒺藜 苦參 瓜蒌根 防風各半
右為細末每十五錢末入輕粉一錢拌勻每服一錢茶

調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭黃涎
渾身疼痛昏悶如醉次後利下膿血惡臭氣病根乃去
矣

四聖保命丹

大黃兩半 黃柏兩 苦參 荊芥各四
右為末煉蜜和勻分作一百二十九丸每服一丸溫酒送
下食遠日三服忌肉醬一方用蝦蟆一箇燒灰

祛風散

大蚕沙五升先篩淨水淘三遍控乾 東行蝎虎一條培乾用白

右每服一二合熬栢葉湯調服食前日三服

通天再造散 治大風惡疾

鬱金錢 大黃一兩 白牽牛六錢半

皂角刺黑大者一兩

右為末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

汗劑愈風丹 治癩

皂角一斤

去皮弦剉作四指許以無灰酒浸一宿漉出同新汲水一大碗揉作餅汁濾去查以

砂鍋慢火熬膏

苦參四兩末

土蝮蛇頭尾全用陰乾為末

右二味末以皂角膏丸如桐子大每服七十九空心用

防風通聖散煎成送下日二服服三二日後入浴出汗

病重者不過一料病微者止用烏梢蛇不用土蝮

換肌散 治大風年深不愈至眉毛墮落鼻梁塌壞額顛

腫破服此速效

白花蛇三兩

烏蛇三兩酒浸一宿地龍去土三兩

當歸酒制

細辛

白芷各一兩天麻

蔓荊子

葳靈仙

荆芥穗 甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

川芎

沙苑蒺藜

甘草炙

天門冬

赤芍藥

葛蒲九節者

何首烏

胡麻炒

草烏頭各三兩

蒼朮三兩米泔浸

木鱉子去殼三兩定風草三兩

右同為細末每服五錢匕食後酒調服酒多為妙

緩劑 輕者踈風和血以二聖散治之二聖散方

大黃兩半

皂角刺三錢燒灰

右將皂角刺一二箇燒灰研細用大黃半兩煎湯調下

二錢早服樺皮散中以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散

此為緩治

栝葉湯用東南枝上栝葉一秤水一桶水三沸去查瓮盛

起旋熬蚕沙調服初服苦澁三五日後甜十日四肢沉重

便赤白痢一月後發出瘡疔瘡破用烏龍散搽之

烏龍尾

即倒懸

烏鷄子皮

二味為末用栢油調搽於破瘡上

樺皮散 治肺擁風毒遍身癢疹癢

荆芥穗

二兩

枳殼

樺皮

各四兩

杏仁

二兩去皮尖用水一碗煎令減半取出令乾另研

右為末每服二錢食後溫酒調下

凌霄散 治癩風神效

蟬殼

地龍

炒

僵蚕

全蝎

凌霄花

兩半

右為末每服二錢熱酒調下無時於浴室中常蹲湯中

一時許服藥神效

祛風丸 治疥癩經曰脉風成爲癩也

黃芪

枳殼

防風

芍藥

甘草

熟地

地骨皮

枸杞子

生地

右九味木杵相為細末煉蜜丸如桐子大白湯下五十

丸

洗藥如聖散

蔓荊子

苦參

玄參

厚朴

刺芥

紫參

陳皮

沙參

麻黃

去節

防風

白芷

葳靈仙

右為細末每服五錢桃柳枝各一把水五升煎臨臥熱

洗忌五辛

陳垣治

垣段庫使病癩風滿面連鬚極痒眉毛已脫落須用熱水沃之稍緩每晝夜須數次或砭刺亦緩先師曰風論中云夫癩者榮衛熱附其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚

瘍潰風寒客于脉而不去名曰癘風治之者當刺其腫上以銳針刺其處按出其惡氣腫盡乃止常食如常食勿食他食如用藥當破血去熱升陽去癢瀉榮以辛冷散之其溫升之行陽明經瀉心火補肺氣乃治之正也

補氣瀉榮湯

升麻

連翹各六分

蘇木

當歸

全蝎

黃連

地龍

黃芪各三分

黃芩

生四

甘草一錢

人參二分

生地四分

桃仁

三箇

桔梗五分

麝香許少

胡桐淚一分

水蛭

炒令烟盡二箇

蜚虫去翅足微

右剉如麻豆大除連翹另剉胡桐淚研白荳蔻二分為細末二味另放麝香蜚虫水蛭三味為末另放外都作一服水二大盞酒一匙入連翹煎至一盞六分再入白

荳蔻二味并麝香等三味再上火煎一二沸去渣稍熱早飯後午飲前服忌酒濕麪生冷硬物

針灸經大風刺其肌肉故汗出百日刺骨髓汗出百日凡二百

日髮眉生而止針

承漿一穴在頤前唇下宛宛中足陽明任脉之會療偏風口喎面腫口齒痺蝕虫瘡灸亦佳日灸七壯至七七壯灸則血脉通宣其風應時立愈

醫學綱目卷之十二

肝膽部

行痺

痛痺

諸痺着痺

鶴膝風

攣

一身盡痛

產後身痛

風痛雜合病

風寒濕三氣為痺

素黃帝曰痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為

痺也其風勝者為行痺注行痺者行而不定也稱為走寒

氣勝者為痛痺痛痺者疼痛苦楚世稱為痛濕氣勝者

為着痺着痺者着而不移世稱為麻木不仁之類是也凡

麻者得矣或痛着一處始終不移者是也帝曰其有五者何也岐伯曰以冬

遇此者為骨痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為肌痺

以至陰遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺凡風寒濕所

着痺之病冬遇此者為骨痺春遇此者為筋痺夏遇此者

為肌痺長夏遇此者為肌痺秋遇此者為皮痺皆以所遇

之時所客之處命名非此行痺痛痺着痺帝曰內舍五

臟六腑何氣使然岐伯曰五臟皆有合病久而不去者內舍於其合也故骨痺不已復感於邪內舍於腎筋痺不已復感於邪內舍於肝脈痺不已復感於邪內舍於心肌痺不已復感於邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺所謂痺者各以其時重感於風寒濕之氣也凡痺之客五臟者肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘盜乾善噫厥氣上則恐肝痺者夜臥則驚多飲數小便上為引如懷腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭脾痺者四肢解墮發欬嘔汁上為大塞腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發殮泄治見殮泄門胞痺者少腹膀胱按之內痛若沃以湯溢於小便上為清澀治見淋門淫氣喘息痺聚在肺淫氣憂思痺聚在心淫氣遺溺痺聚在腎淫氣乏竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾王註云淫氣謂氣之妄行者各隨臟之所主而

入為痺也

諸痺不已亦益內也其風氣勝者其人易已也帝

曰痺其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易已帝曰其客於六腑者何也岐伯曰此亦其食飲居處為其病本也六腑亦各有俞風寒濕氣中其俞而食飲應之循俞而入各舍其腑也帝曰以鍼治之奈何岐伯曰五臟有俞六腑有合循脈之分各有所發各隨其過則病瘳也痺

論篇

刺痺大法

冬感風寒濕者為骨痺久不已則內入於腎病腎脹足攣尻以代踵身躄脊以代頭取太溪委中

春感風寒濕者為筋痺久而不已則內入於肝病臥則驚多飲數小便取太衝陽陵泉

夏感風寒濕者為脈痺久而不已則內入於心病心下滿

暴喘噎乾善噫恐懼 取太陵小海

長夏感風寒濕者為肉痺久而不已則內入於脾病四肢解墮發欬嘔汁 取太白三里

秋感風寒濕者為皮痺久而不已則內入於肺病煩滿喘嘔 取太淵合谷

榮衛為痺

帝曰榮衛之氣亦令人痺乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五臟洒陳於六腑乃能入於脈也故循脈上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脈也故循皮膚之中分肉之間熏於盲膜散於胸腹逆其氣則疾從其氣則愈不與風寒濕氣合故不為痺帝曰善痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也治見痛痺其不痛不仁者病久入深榮衛之行溢經絡時疎故不通皮膚不營故

為不仁

治見

其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也

痛風條酒

清中熨

其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽乘陰故為痺

熱其多汗而濡者此為逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也 帝曰夫痺之為病不痛何也岐伯曰

痺在骨則重在於脉則血凝而不流在於筋則屈而不伸

在於肉則不仁在皮則寒故具此五者則不痛也凡痺之

類逢寒則急逢熱則縱帝曰善俱痺論

雜方

河升麻湯治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱皮色變諸風皆治

升麻三兩

茯神去皮

人參

防風

犀角鎊

羚羊角鎊

羌活各一兩

官桂半兩

右為末每服四錢水二盞生薑二塊碎竹瀝少許同煎至一盞溫服不計時候

素少陰有餘病皮痺癱瘳不足病肺痺 太陰有餘病肉
 痺寒中不足病脾痺 陽明有餘病脈痺身時熱不足病
 心痺 太陽有餘病骨痺身重不足病腎痺 少陽有餘
 病筋痺脇滿不足病肝痺四時刺逆從論 肺脈微大為肺痺引
 脅背起惡日光 心脈微為心痺引背善淚出全文見診
 靈黃帝曰何以候人之善病痺者少俞答曰粗理而肉不
 堅者善病痺黃帝曰痺之高下有處乎少俞答曰欲知高
 下者各視其部五變論
 關中薄澤為風衝濁為痺五色篇 浮絡多青則痛黑則痺
 全文見皮絡脈暴黑者留久痺也陰陽
 素脈濇曰痺平人氣象論
 行痺即走注疼痛
 仲諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣兀兀欲吐

表寒

桂枝芍藥知母湯主之

桂枝兩四

芍藥兩三

甘草兩二

麻黃兩二

生薑兩五

白朮兩五

知母兩二

防風兩四

附子兩二

右以水七升煮取二升溫服七合日三服

病歷節不可屈伸疼痛烏頭湯主之

麻黃

芍藥

黃芪各三兩

甘草炙

川烏

五枚咬咀以蜜二升煎取一升即去烏頭

右咬咀五味以水三升煮取一升去渣納蜜再煎服七

合不時盡服之

河防風湯治行痺走注無定

防風

甘草

當歸

赤茯苓去皮

杏仁

去皮炒熟

桂各一兩

黃芩

秦艽

葛根各三錢

升麻去節半兩

右為末服五錢水酒各二盞棗三枚薑五片煎至一盞去渣溫服

本治濕傷腎腎不養肝肝自生風遂成風濕流注四肢筋骨或入左肩膈肌肉疼痛漸入左指中薏苡仁散

薏苡仁一兩

當歸

小川芎

乾薑

茵芋

甘草

官桂

川烏

防風

人參

羌活

白朮

麻黃

獨活各半兩

右為細末每服二錢空心臨臥酒調下日三服

治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如虫噬晝靜夜劇及一切手足疼痛麝香丸

川烏

大八角者三箇用生

全蝎

二十一箇生用

黑荳

二十一箇生用

地龍

半兩

右為細末入麝香半字同研勻糯米糊為丸如棗荳大每服七丸甚者十九夜臥令膈空溫酒下微出冷汗一身便瘥予得此方凡是歷節及不測痰痛一二服便瘥在歙州日有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發如虫噬其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服愈歙切

丹龍虎丹治走注疼痛或麻木不遂或半身疼痛

草烏

蒼朮

白芷

各一兩

右研為末水拌發熱過再入乳香二錢當歸牛膝各半兩酒糊丸如彈子大酒化下

無附子八物湯治歷節風四肢疼痛如錘鍛不可忍

附子

炮去皮臍

乾薑

芍藥

茯苓

表熱

半夏

桂心各三兩

白木四兩

人參三兩

右剉散每服四錢水二盞煎至七分去查食前服

丹痛風走注疼痛

黃栢酒炒

蒼朮

酒炒各二錢

右作一服煎就調酒葳靈仙末羚羊角灰臣蒼朮佐芥子使用薑一片入藥末一錢搗碎以前藥再溫服

東和血散痛湯治兩手十指一指疼下一指疼疼後又腫骨頭裏痛膝痛左膝痛下右膝痛發時多則五日少則三日晝輕夜重痛時覺熱行則痛輕腫却重解云先血後氣乃先痛後腫形傷氣也

羌活身

升麻

麻黃去節各錢半

桃仁十箇

柴胡二錢

紅花一分

歸身一分

防風錢一

甘草分二

獨活分五

猪苓分五

黃栢錢一

防已分六

知母酒一錢

黃連酒一錢

右咬咀分作四服每服水一大盞煎至一半去查空心熱服

羅真定府張大素好嗜酒五月間病手指節腫痛屈伸不利膝髓亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食食即欲吐面色痿黃精神減少至六月間求予治之診其脈沉而緩緩者脾也難經云俞主體重節痛俞者脾之所主四肢屬脾蓋其人素飲酒加之時助濕氣大勝流於四肢故為腫痛內經云諸濕腫滿皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之內經云濕淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又云風勝濕羌活獨活苦溫透關節而勝濕故以為君升麻苦平葳靈仙蒼朮防風苦辛溫發之者也故以為臣血壅而不流則痛當歸辛溫以散之

甘草甘溫益氣澤瀉鹹平茯苓甘平導濕而利小便以淡滲之使氣味相合上下分散其濕也

羌活

升麻各一錢

獨活各七錢

蒼朮

防風

甘草

葳靈仙

茯苓

當歸

澤瀉各半兩

右剉作一服水二盞煎至一盞溫服食前一服食後一

服忌酒麪生冷硬物

本麻黃湯治歷節

麻黃兩一

羌活兩一

黃芩三錢

細辛

黃芪各五錢

右為麤末每服五錢水二盞煎至八分去查溫服接續

三四日有汗慎風

治風熱成歷節攻手指作赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇

暑熱或大便秘即作牛蒡子散

牛蒡子

新葶鼓炒

羌活各三兩

生地二兩半

黃芪一兩半

右為細末湯調二錢服空心食前日三服此病習膈生

痰久則赤腫附著肢節久久不退遂成厲風此孫真人

預戒也宜早治之

河大荳蘖散治周痺注五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤

澤皮毛補腎用大荳蘖一升炒香熟為末每服半錢溫酒

調下空心加至一錢日三服本草云大豆消瘀血破婦人惡血治熱痺筋牽膝痛古人

取汗酒沃荳蘖

痰涎流注

無控涎丹凡人忽曾背手脚頸項腰膂隱痛不可忍連筋

骨牽引釣痛坐臥不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注使用風藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚欲為癰疽

亂投藥貼亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變為疾或令人頭痛不可舉或神思昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲口流唾涎手脚重腿冷痺氣不通誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但用是藥不過數服其疾如失

甘遂去心

紫大戟去皮

白芥子真者各等分

右為末煮糊丸如桐子大晒乾臨臥淡薑湯或熟水下五七丸至十九痰猛氣實加丸數不妨其効如神

表裏兼施

犀角湯治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角兩二

羚羊角兩一

前胡

黃芩

梔子仁

射干

大黃

升麻各四兩

豉升一

右九味咬咀每服五錢水二盞煎服

本茵芋丸治歷節腫滿疼痛

茵芋

硃砂

薏苡仁各一兩

牽牛一兩半

郁李仁兩半

右細末煉蜜杵丸如桐子大輕粉滾為衣每服十九至十五丸或二十九五更溫水下到晚未利可二三服快利為度白粥將息

子和治一稅官風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則痛甚兩足惡寒經五六月間猶綿脛靴足膝皮膚少有跣露則冷風襲之流入經絡其病轉劇走注上下往來無定其痛極處便攀急而腫起肉色不變膝理如虫行每遇風冷病必轉增飲食減肌體瘦乏須人扶稍能行立所服者烏附薑桂種種燥熱燔針着灸莫知其數前後三年不愈一日予脈之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通經散各一服是夜

瀉三十餘行痛減半漸服赤茯苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痺方是也日三服煎七八錢熱然汗出余又作玲瓏竈法薰蒸血熱必增劇諸汗法古方多有之惟以吐發汗者世罕知之故予嘗曰吐法兼汗良以此夫

治遊風行走無定或如盤大或如甌或着腹背或着臂或着脚悉主之

海藻

茯苓

防風

獨活

附子

白朮

大黃

鬼箭羽

當歸各二兩

白朮各三兩

大黃五兩

右九味咬咀以水二斗漬五日初服二合漸加以知為度

并控涎散治身及脇走癢痰挾死血加桃仁泥丸治走注

疼痛

歲靈仙錢一

川芎錢七

梔子錢炒一

當歸錢一

肉桂分一

蒼朮錢一

桃仁錢七

甘草五

右用生薑五片水二盞煎半乾入童便半盞竹瀝半盞沸熱服忌肉麵雞

定痛方治一切風濕痺痛

乳香

沒藥

地龍去

木鱉皮去

金星石

五靈脂

右等分蜜丸如彈子大每服一九臨臥酒下

血中有

外治歷節諸風百節痠疼不可忍用松脂三十斤煉四五

十遍以煉酥三升溫和松脂三升熟攪令極調勻每旦空

腹以酒服方寸七日二服數日食麪粥為佳慎勿食血腥

生冷鮮物菓子百日瘥松節酒治歷節風四肢疼痛松

節二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服丹溪云松屬金能滲

血中之濕干松葉酒治歷節松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日服五六度

濕熱寒走注疼痛治法及熱走注疼痛治法並見表寒表熱條垣身體沉重走注疼痛濕熱相搏而風熱鬱不得伸附着於有形也宜蒼朮黃柏之類

雜方

李絳兵部手集方治臂脛痛不計深淺皆効用虎脛骨二大兩粗舂熬黃羚羊角一大兩屑新芍藥二大兩細切三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空腹飲一盃冬月速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也

經治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一具塗酥炙黃槌碎

絹袋盛用清酒三升漬五日每服二合日三服

針灸聖治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃槌碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少緩飲之妙

靈黃帝問於岐伯曰周痺之在身也上下移徙隨脈其上下左右相應間不容空願聞此痛在血脈之中邪將在分肉之間乎何以致是其痛之移也間不及下鍼其搖痛之時不及定治而痛已止矣何道使然願聞其故岐伯答曰此衆痺也非周痺也黃帝曰願聞衆痺岐伯曰此各在其處更發更止更居更起以右應左以左應右非能周也更發更休也帝曰善此痛安生何因而有名岐伯曰風寒濕氣客於外分肉之間迫切而為沫沫得寒則聚聚則排分肉而分裂也分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則它痺發發則如是此內則不在臟而外

未發於皮獨居分肉之間真氣不能周故命曰癰痺周痺當作

衆痺夫周痺邪在分肉血脈今云邪獨居分肉之間而命曰周痺者是衆痺之誤為周痺也明矣神歸之則熱熱則痛解者所謂更止更居也痛解則厥厥則它痺發者所謂更發更起也自黃帝曰善此痛安生至此一百十四字元悞在後刺其下以黃帝曰善刺之奈何岐伯曰刺此者

痛雖已止必刺其處勿令復起帝曰善願聞周痺如何岐伯曰周痺者在於血脈之中隨脉以上隨脉以下不能左右各當其所黃帝曰刺之奈何岐伯曰痛從上下者先刺其下以過之後刺其上以脫之痛從下上者先刺其上以過之後刺其下以脫之故刺痺者必先切循其下之六經視其虛實及大絡之血結而不通及虛而脉陷空者而調之熨而通之其瘳堅者引而行之帝曰善已得其意矣周痺篇○大絡血結不通為實脉陷空為虛過字一作退下同

按謬刺論云凡痺往來行無常處者在分肉之間痛而

刺之以月死生為數用鍼者隨氣盛衰以為痛數針過其日數則脫氣不及日數則氣不瀉左刺右右刺左病已止不已復刺之如法月生一日一痛二日二痛漸多之十五日十五痛十六日十四痛漸少之詳此亦刺衆痺於所痛之法當與前衆痺法相參用之

刺五臟六腑痺法見諸痺條

千治歷節但於痛處灸三七壯佳

怪白虎歷節風痛 兩踝尖在內外兩踝尖灸之 渾身疼痛往來

上下無常 陽輔 如足跟不得履地 風池 如膝蓋

腫起 曲池一寸半 陽陵泉一寸半

心婦人四旬因小產成病百節痛無常處臥牀不起

八字五分 環跳四寸半 五樞三寸半 曲池 液門各一寸半

絕骨二寸半 如脊背痛者 人中 大椎節下各五分

診

委中

七分見血立効

無附骨疽與白虎飛尸。歷節皆相類。歷節痛則走注不定。白虎飛尸痛淺按之則便止。附骨疽痛深按之亦無益。又一說白虎飛尸亦能作膿着骨而生。及其腐潰碎骨出盡方愈。如是則附骨與白虎飛尸同是一病。但淺深不同耳。仲寸口脈沉而弱。沉即主骨弱。即主筋沉即為腎弱。即為肝。汗出入水中如水傷心。歷節黃汗出。故曰歷節。少陰脈浮而弱。弱則血不足。浮則為風。風血相搏則疼痛如掣。盛人脈濇小短氣。自汗出。歷節疼不可屈伸。此皆飲酒汗出當風所致。

痛痺 即痛風

丹溪治先受之血熱

丹病風論。○氣行脈外。血行脈內。晝行陽二十五度。夜行陰二十五度。此平人之造化也。得寒則行遲而不及。得熱

則行速而太過。內傷於七情。外傷於六氣。則氣血之運。或遲或速。而疾作矣。彼痛風者。大率因血受熱。已自沸騰。其後涉於冷水。或立濕地。或扇風取涼。或坐臥當風寒涼外搏。熱血得寒。污濁凝滯。所以作痛。夜則痛甚。行於陰也。治法以溫辛涼之劑。流散寒濕。發腠理。其血得行。與氣相和。其病自安。然亦有數種治法。各異。謹書一二。以証予言。一治東陽傳丈腿痛。一治朱宅閫內痛攣。一治隣鮑子痢後風。皆數十貼。半年安。詳見後丹溪先治內熱條 或問。比見隣人用草藥研酒飲之。不過數貼。亦有安者。如子之言。類皆經久取効。無乃太緩乎。予曰。此劫病草藥。石上採絲為之。君過山龍等佐之。皆性熱而燥者。不能養陰。却能燥濕。病之淺者。濕疾得燥則開。熱血得熱則行。亦可取効。彼病深而血少者。愈劫愈虛。愈劫愈深。若朱之病是也。子以我為迂緩乎。

朱之病即朱閩寧痛醫十月不應而丹溪起之也

潛行散治痛風黃栢一味酒浸焙乾為末生薑汁和酒調服必兼四物等湯相間服之妙

二妙散治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血虛加補血藥如痛甚以薑汁熱辣服之

黃栢炒 蒼木炒製去皮

右為麓末生薑研入湯煎沸調服此二物皆有雄壯之氣如表實氣實者少酒佐之一法二妙為君加甘草羌活各二錢陳皮芍藥各一錢酒炒葳靈仙半錢為末服之佳

血虛血汚者補而行之

一男子家貧多勞秋涼忽渾身發熱兩臂膊及腕兩足及跨皆疼痛如鍛晝輕夜劇醫與風藥則愈痛與血藥則不効惟待斃而已予脉之兩手俱瀋而數右甚於左問其飲

食則如平時形瘦則如削盡蓋大痛而瘦非病也用蒼木一錢半酒黃栢一錢半生附一片生甘草三分麻黃五分研桃仁九箇作一貼煎入薑汁些少令辣熱服至四貼後去附子加牛膝一錢至八貼後來告急云氣上喘促不得睡痛似微減此時昏黑不能前去診視予意其血虛因服麻黃過劑陽虛被發動而上奔當與補血鎮墜帶味酸之藥以收之遂以四物湯加川芎芍藥人參二錢五味子十二粒作一貼與二貼服之喘促隨定是夜遂安三日脈之數減大半溢脉如舊問其痛則曰不減然伸吟之聲却無察其起居則疲弱無力病人却自謂不弱遂以四物湯加牛膝白朮人參桃仁陳皮甘草枳榔入薑三片煎服如此藥與五十貼而安一月後因負重擔痛復作飲食亦少再與此藥每貼加黃芪三分又二十貼方全愈 東陽傳文

年踰六十性急作勞患兩腿痛動作則痛甚予視之曰此兼虛証當補血虛病自安遂與四物湯加桃仁陳皮牛膝生甘草煎入生薑研潛行散熱飲三四十貼而安何縣長年四十餘形瘦性急因作勞背疼臂痛骨節疼足心發熱可與四物湯帶熱下大補丸保和丸共六十粒食前服婦人脚疼脚怕冷夜劇日輕

生地

白芍

歸尾各五錢

黃栢炒

黃芩

白朮

陳皮各三錢

牛膝二錢

蒼朮三錢

甘草稍錢一

右分六貼煎服食前熱飲之

隣人鮑子年二十餘因患血痢用瀉藥取效後患痛風號叫撼隣里予視之曰此惡血入經絡證血受濕熱久為凝濁所下未盡留滯隧道所以作痛經久不治恐成枯細遂

與四物湯桃仁紅花牛膝黃芩陳皮甘草煎生薑汁研潛行散入少酒飲之數十貼又與刺委中出黑血近三合而安痢後風係血入臟腑下未盡復還經絡不得行故也松明節一兩以乳香一錢炒焦存性蒼朮一兩紫葳一兩半甘草半兩黃栢一兩桃仁去皮不去尖一兩俱為末每服三錢生薑同杵細水盪起二三沸服

挾痰者疎導之

朱宅閩內年三十食味甚厚性亦燥急患痛風攣縮數月醫不應予視之曰此挾痰與氣症當和血疎痰導氣病自安遂以潛行散入生甘草牛膝枳殼通草陳皮桃仁薑汁煎飲半年而安

陸郎左腿又骨舊痛小便赤少此積憂痰涎所為

白朮

枳殼

赤芍一錢

條芩

連翹

通草

甘草稍三分

六安人脚取骨痛

蒼朮

白朮

陳皮

芍藥三分

木通二錢

甘草五分

分四貼煎下大補丸四十粒

右丹溪治痛風法主於血熱血虛血汚或挾痰皆不離四物潛行黃柏牛膝生甘草桃仁陳皮蒼朮生薑汁而隨症加減發前人之所未發醫世俗之所不醫其有功於世也大矣

痛在胃絡者解食毒

本王檢正患鼻額間痛或麻痺不仁如是數年忽一日連口唇頰車髮際皆痛不開口雖言語飲食亦妨在額與頰上常如糊手觸之則痛予作足陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滯而不行故有此症或者以排風小續命透髓丹之類與之皆不效製此犀角升麻湯贈之數日而愈

犀角十兩

升麻

防風

羌活各三兩

川芎

白附

白芷

黃芩各半兩

甘草一分

右麓末每服四大錢水一盞半煎至八分去渣通口食後服臨臥一服日三四服足陽明胃也經云腸胃為市又云陽明多血多氣胃之中腥羶五味無所不納如市廛無所不有也六經之中血氣俱多腐熟飲食故飲食之毒聚於胃此方以犀角為主解飲食之毒也陽明經絡環唇挾舌起於鼻合頰中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙王公所患皆一經絡也故以升麻佐之餘藥皆滌除風熱升麻黃芩專入胃經稍通者自能曉海四物蒼朮各半湯治肢腫不能舉動四物湯蒼朮各半兩同煎服效與活血丹相表裏

赤熱但治

活血丹與四物蒼朮各半湯相表裏治遍身骨節疼痛如神

熟地黃兩 當歸 白朮 白芍

續斷 人參各一兩

右細末酒糊丸如桐子大

先賢法後感之外寒微者以蒼朮發之
東垣蒼朮復煎散治寒濕相合腦戶痛惡寒項筋存強肩背胛卵痛膝膕痛無力行步能食身沉重其脈沉緩洪上急

蒼朮 四兩水二碗煎至二大盞去渣入下藥 羌活錢一

升麻 柴胡 藁本 澤瀉

白朮各五分 黃柏三分 紅花鈔

右為籠末用蒼朮湯二盞煎至一大盞去渣溫服空心微汗為效忌酒麵

緩筋湯治目如火腫痛兩足及伏菟骨筋痛膝少力身重腰痛夜惡寒痰嗽項頸筋骨皆急痛目多眵淚食不下

羌活錢二 獨活錢二 藁本三分 麻黃三分

蘇木一分 升麻三分 甘草各二分 草薢三分

生地 黃芩 黃柏各三分 蒼朮五分

歸身三分 柴胡三分 熟地二分 生甘草根二分

甚者桂附發之

仲桂枝芍藥知母湯 河間防風湯 已上二方治偏風神妙並見行痺表條

世治痛風草烏四兩去尖木鱉子三兩去殼自然銅一兩煨香白芷三兩沒藥二兩另研南星二兩葳蕤仙二兩地龍三兩糊為丸每服十五粒

羅活血應痛丸治風濕客於腎經血脈凝滯腰背腫疼不能轉側皮膚不仁遍身麻木上攻頭目虛腫耳內常鳴下

注脚膝重痛少办行履艱難項背拘急不得舒暢常服和
血脉壯筋骨使氣脈宣通

狗脊去毛六兩 蒼朮泔浸一宿十兩 香附炒十兩 陳皮九兩

沒藥一兩 草烏二兩 歲靈仙三兩

右為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服十五丸温酒
或熱湯送下不拘時候久服忌桃李雀鷓諸血物

丹八珍湯治一切痛風脚氣頭風

乳香 沒藥 代赭石 川山甲生用三錢

川烏不去皮尖生用一兩 草烏不去皮尖生用五錢

羌活半兩 全蝎二十一箇明頭尾全者

右醋糊丸如桐子大每服十一丸

羅烏靈丸治久患風寒麻木痛行步艱難

五靈脂二兩 川烏一兩炮去皮臍

右為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服十九加至五
十九空心温酒下忌一切冷物

又甚者以酒行桂附
史丞相遇仙方治諸般痛風手足艱難筋骨疼痛口眼喎
斜言語蹇澁

附子炮去皮臍 川烏炮去皮臍 當歸酒浸焙 川芎

羌活 肉蓯蓉酒浸炮 杜仲去皮炒去絲薑汁製

黃芪 白蒺藜炒去刺 白木 人參

川牛膝酒浸焙去蘆 防風 天麻去苗

白茯苓 草薺 狗脊炒去毛 續斷

獨活 肉桂去粗皮 赤芍各一兩 虎脛骨二兩半酥炙

右二十二味切細以生絹袋盛之用無灰酒浸密封瓶
口春三日夏二日秋七日冬十日取出晒焙乾為末酒
糊丸如桐子大用浸藥酒一盞送下五十九空心服忌

生冷油膩苳腐麵食發風之物

藥學不
動者董
之製之

世五加皮酒治風濕遍身疼痛俗名痛風或腫或癰或脚氣不能步履者用五加皮不拘多少入白麵內同釀白酒飲之或入在麵內造好酒尤妙

丹治環跳痛不已防生附骨癰方以蒼朮佐黃柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加黃芩體虛者加杜仲牛膝以甘草為使大料煎入酒深者恐木栢桂枝十數貼發不動以少麻黃一二貼又不動者恐癰將成掘地成坑以火煨紅沃以小便赤體坐其上以被席圍抱下體使熱蒸騰理間血氣暢而愈 特行熱毒攻手足大痛欲死作地坑深三尺可容則止却燒令熱以酒沃之乘熱着履坐其上包裹勿泄氣立安若手痛者煖酒浸之傷寒
類要衍用三升醇酒拌蚕屎五升甑蒸熱於煖室中鋪於油單

上令患風冷氣閉及近感癱風人就所患一邊臥着溫熱處厚蓋覆汗出為度若虛人須在左右防大熱昏冒仍令頭面壅覆未全愈間再作

外治風痛腫白虎病以三年醞醋五升熱煎三四沸切葱白二三升煮一沸濾出布帛熱裹當病上熨之瘥為度

靈寒痺之為病也雷而不去時痛而皮不仁黃帝曰刺寒痺內熱奈何伯高答曰刺布衣者以火焮之刺大人者以藥熨之黃帝曰藥熨奈何伯高答曰用醇酒二十斤蜀椒一升乾薑一斤桂心一斤凡四種皆咬咀漬酒中用綿絮一斤細白布四丈并納酒中置酒馬矢煖中蓋封塗勿使泄五日五夜出布綿絮曝乾之乾復漬以盡其汁每漬必晬其日乃出乾之并用查與綿絮複布為複巾長六七尺為六七巾則用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱

入至於病所寒復炙巾以熨之三十遍而止汗出以巾拭其身亦三十遍而止起步內中無見風每刺熨如此病已矣此所謂內熱也內音納○壽天剛柔篇

羅拈痛散治肢節疼痛熨烙藥

羌活

獨活

細辛

肉桂

防風

白朮

良薑

麻黃不去節

天麻去苗

川烏生去皮

吳茱萸

乳香研

小椒去目

全蝎生

當歸各一兩

川薑五錢

葛根兩

右為籠末入乳香研勻每抄藥一十錢甚者十五錢同細鹽一升炒令極熱絹袋盛熨烙痛處不拘早晚頻用藥冷再炒一次用畢甚妙

汚血

神婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍花酒主之用

紅藍花一味以酒一大升煎減半頓服一半頃之再服

濟虎骨丸治經絡凝滯骨節疼痛筋脈攣急遇陰寒愈痛

乳香

沒藥各另研

赤芍

熟地

虎脛骨酥炙

黃

當歸各一兩

血竭五錢

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻線纏定勿令透氣好酒六升煮酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許杵和為丸如桐子大每服五十九病在上食後在下食前溫酒下

羅木瓜虎骨丸治風寒濕合而成痺脚重不仁疼痛少力足下癢痛不能踏地脚膝筋拳不能屈伸及項背拘急手足無力耳內蟬鳴頭眩目運諸證脚氣行步艱難并皆治之

木瓜

麒麟竭研

虎脛骨酒炙

木香

自然銅醋焯七次 楓香脂 龜板醋炙 骨碎補去毛

甜瓜子 桂皮 當歸 沒藥各一兩

乳香研半兩 地龍去土 安息香重湯酒煮入藥各二兩

右件十五味除沒藥外為細末拌勻酒麵糊為丸如桐

子大每服三十九丸溫酒送下煎木瓜湯送下亦得漸加

至五十九丸空心食前服

濟麒麟散治寒濕傳於經絡疼痛不可忍

血竭 南乳香 沒藥 白芍

當歸各六錢 水蛭杵碎炒令烟盡 麝香各三錢

虎脛骨酥炙黃五錢

右八味為細末和勻每服三錢食前溫酒下

丹趣痛散

乳香 沒藥 桃仁 紅花

當歸 地龍 五靈脂 牛膝酒浸

羌活酒浸 香附便浸 生甘草

如痰熱加酒芩酒栢

痛風大法 蒼朮 南星 川芎 白芷 當歸 酒芩

在上者加羌活葳靈仙桂枝 在下者加牛膝防已木

通黃栢 薄桂治痛風無味而薄者獨此能橫行手臂領

南星蒼朮等至痛處

上中下痛風方

南星二兩 台芎一兩 白芷五錢

桃仁五錢 桂枝三錢橫行手臂 漢防已半兩

龍膽草半兩 蒼朮米泔浸一宿二兩 黃栢二兩

紅花一錢半 葳靈仙二錢去芦上下行 神麩一兩

羌活三錢通身走骨節

上

右為末，麵糊丸，食前服一百丸。

世茯苓丸治臂痛如神方見 控涎丹治肩背臂痛如神

方見

控涎丹加去油木鱉子一兩桂五錢治臂痛每服二十九
加至三十九妙

丹治臂痛

半夏錢一

陳皮錢半

茯苓分五

蒼朮錢二

葳靈仙分三

酒苧錢一

白朮錢一

南星錢一

香附錢一

甘草許少

世治臂痛

紅花炒

神麩炒

俱為末調服之

薑黃散治臂痛非風非痰、

薑黃兩四

甘草

羌活各一

白朮兩二

腰已下痛者加海桐皮當歸芍藥

垣臂痛有六道經絡究其痛在何經絡之間以行本經藥
行其氣血血氣通則愈矣若表上諸痰痛便下之則不可
當詳細辨之

右東垣云臂痛有六道經絡以行本經藥行其氣血者
蓋以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而
定之則其臂臑之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾
葛行之後廉痛者屬太陽經以藁朮羌活行之外廉痛
者屬少陽以柴胡行之內廉痛者屬厥陰以柴胡青皮
行之內前廉痛者屬太陰以升麻白芷葱白行之內後
廉痛者屬少陰以細辛獨活行之并用針灸法視其何
經而取之也

虛實

足痛新病以痛風法治之久病非脚氣以鶴膝風治之各

自有門痛風多屬血虛然後寒熱得以侵之治法並見血熱血虛條

丹張子元氣血虛有痰小便白濁陰火間起痛風時作

人參兩一 白朮兩二 熟地兩二 川黃柏炒各兩二

山藥 海石好者一兩炒 瑣陽 乾薑煨半兩

南星兩一 敗龜板二兩炙

右粥為丸如梧子大淡鹽湯下

痛風有痰帶熱先以舟車丸或導水丸神芎丸下之後以
趁痛散調血如痰熱趁痛散加酒苓酒栢

治痛風方

糯米一盞 黃躑躅根把一 黑荳半盞

右件用酒水各一碗煎半乾徐徐服之大吐大瀉一服
住便能行動

子和一男子六十餘病腰尻脊膊皆痛數歲不愈晝靜夜

躁犬痛往來屢求自盡天且則定夕則痛作必令人手槌
擊至五更雞鳴則漸減向曙則痛止戴人診其脈兩手皆
沉滑堅勁有力如張弓弦謂之曰病雖瘦難任然腰尻脊
膊皆痛者必大便堅燥其左右曰有五七日或八九月見
燥屎一兩塊如彈丸結硬不可言渾身燥痒皮膚皺揭枯
澁如麩片戴人既得病之虛實陰用大承氣以薑棗煎之
加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑蓋病者聞煖則悅聞寒
則懼說補則從說瀉則逆此蔽非一日也而况一齊眾楚
於是藥煎成使稍熱咽之從少至多累至三日天且晚臍
腑下泄四五行約半盆以燈視之皆燥屎硬塊及瘀血雜
臟腑穢不可近須臾痛減九分昏睡鼻息調如常人睡至
明日始覺饑而索粥溫涼與之又因睡一二日其痛盡去
次令飲食調養日服導飲丸甘露散滑利便溺之藥四十

餘日乃復 常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛戴人曰四肢諸陽之本也當時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛以三花神祐丸大下之熱遂去

運氣痺有二

一曰濕經云太陰司天濕淫所勝病肘腫骨痛陰痺陰痺者按之不得治以苦熱是也

二曰燥經云陽明所至為尻陰股膝髀腓足痛又云歲金太過燥氣流行甚則尻陰股膝髀腓足皆痛是也

針灸

內經刺灸諸痛法先明經脈次別淺深蓋經脈者為手足十二經脈也

手前廉痛屬陽明經云手陽明脈所生病者肩前臑痛大指次指痛不用 後廉痛屬太陽經云手太陽脈是動則病有似拔臑似折所生病者肩臑肘臂外後廉痛 外廉

痛取少陽經曰手少陽脈所生病者耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用又云邪客手少陽之絡令人臂外痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痛左取右右取左 內廉痛取厥陰經云手厥陰脈是動則病手心熱肘臂攣急腋腫 內前廉痛屬太陰經云手太陰脈所生病者臑臂內前廉厥掌中熱 內後廉痛屬少陰經云手少陰所生病者臑臂內後廉痛厥掌中熱痛 足前廉痛屬陽明經云足陽明脈所生病者膝膕腫痛循膺乳氣街股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不用 後廉痛屬太陽經云足太陽脈是動則病頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲臑如結臑如裂是謂踝厥所生病者項背腰尻臑踵脚背痛小指不用 外廉痛屬少陽經云足少陽所生病者臑脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸

節皆痛小指次指不用又云足髀不可舉側而取之在樞
合中以員利鍼大鍼不可刺又云邪客於足少陽之絡令
人留於樞中痛髀不可舉刺樞中以毫針寒則久留鍼以
月死生爲數立已 內廉痛屬太陰經云足太陰脈所生
病者股膝內腫厥足大指不用 內後廉痛屬少陰經云
足少陰脈所生病者脊股內後廉痛足下熱而痛 內前
廉痛屬厥陰經云足厥陰脈是動則病腰痛不可以俛仰
此十二經手足脈痛皆視虛實寒熱陷下而施補瀉疾
留灸之法也已上全文並見針灸門十二經條盛則瀉
之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則
灸之

淺深者謂皮脉內筋骨之淺深也 病在皮調之皮蓋取
血絡也 病在脈調之脈即取前手足十二經之血脈也
病在肉調之分肉內經云病在肌膚肌膚盡痛名曰肌
痺傷於寒濕刺大分小分多發鍼而深之以爲熱故無傷
筋骨傷筋骨癱發若變諸分盡熱病已止 病在筋調之
筋經云痛在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痺刺筋上爲
故刺分肉間不可中骨也 病在骨調之骨經云病在骨
骨重不可舉骨髓痠痛寒氣至骨名曰骨痺深者刺無傷
脈肉爲故其道大分小分骨熱病已止又云邪在腎則病
骨痛陰痺陰痺者按之不得取之湧泉崑崙有血者盡取
之又云骨痺舉節不用而痛汗注煩心取三陽之經補之
一作
三陰

此皮脉肉筋骨之淺深隨其處取之也

又久痺不去身者視其血絡盡出其血 痛痺久而入臟
腑爲病刺法見諸痺條

玉渾身疼痛但於痛處鍼不拘經穴須避筋骨穴名天應

穴

撮臂膊疼痛 肩顛 手三里 外關

摘臂膊疼痛并麻痺 肩顛 肩井 曲池

集臂膊麻痺疼痛 肩顛 曲池 手上廉 合谷 不

應再取肩井 列缺

玉臂痛連腕 液門 沿皮向後透陽池瀉 中渚 沿皮透腕骨瀉

撮臂內廉痛 經渠 一分 忘灸 靈道 一分 肘針 向前三分 少海 五分

東臂痠攣 肘竅 竅陰 尺澤 前谷 後溪

甲手臂不得上頭尺澤主之 臂不可舉頭項痛咽腫不

可咽前谷主之 肘臂腕中痛頸腫不可以顧頭項急痛

眩淫灤肩胛小指痛前谷主之 肘痛不能自帶衣起頭

眩頷痛面黑惡風肩痛不可顧關衝主之 肘痛引肩不

可屈伸寒熱頸項肩背痛痿痺不仁天井主之 千金云肩內麻木

肘中濯濯臂內痠痛不可及頭外關主之 肘痛尺澤主之

撮腕痛 陽溪 曲池

玉腕無力并痛 腕骨 橫針入三分痛則瀉無力則補 曲池 補瀉全上

撮五指拘攣 三間 一分先瀉後補灸之 前谷 一分瀉之灸 五指皆

痛 陽池 外關 合谷 跨痛腿支風 環跳 在髀樞中側肘

仲下足屈上足方可針可入三寸半補少瀉多留入吸 居窕 一寸二分留八吸瀉之 委中出

血 標幽膊痛蹙足 環跳 懸鍾 摘英作丘墟針五分留三呼灸三壯

集膊痛腿支風不能轉側舉動艱難 環跳 三寸半灸七七壯

風市 灸二七壯 居窕 三寸半灸七七壯 委中 崑崙 三里 陽

陵泉 下穴 不巳取 五樞 陽輔 腰脚痛 委中 崑崙

人中

桑側脚風 絕骨 太衝

東髀樞痛足脛寒熱足外廉皮骨痛 臨泣分 足三陰

半寸 陽輔

甲髀樞中痛不可舉以毫針寒留之以月死生為病數一作息立已長鍼亦可 腰脇相引痛急痺筋痠脛痛不可屈伸痺不仁環跳主之

東髀筋急脛痛縱緩痿痺膈疼膝冷外廉不可屈伸濕痺流腫風市 中瀆 陽關 懸鍾 腿痛陽陵泉 三里

伏兔 陰市 腿膝拘攣痛引脇或青或焦或鰲或枯如腐木狀風市多 陽陵泉 曲泉 崑崙 腿膝外廉

痛股腫胛痠轉痿痺或膝脛熱不能行動俠溪分 髀關光明各一 髀痺引膝股外廉急痛脛痠搖動有聲諸節痠不能行陽陵泉 絕骨 中封

甲膝外廉痛熱病汗不出目外眦赤痛頭眩兩額痛逆寒泣出耳鳴多汗目痒胷中痛不可反側痛無常處俠溪主之 膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁陽關主之 髀痺引膝股外廉痛不仁筋急陽陵泉主之 膝內廉痛引髓不可屈伸連腹引咽喉痛膝關主之

東腿膝內廉痛引髓不可屈伸連腹引咽喉痛太衝五分 中封 膝關 脛痠寒足下熱不能久立濕痺不仁中都

衝陽 承山 承筋 脛寒四肢重少氣難言不得臥至陽 三陰交

甲痺脛重足跗不收跟痛巨虛下廉主之 脛痛足緩失履濕痺足下熱不能久立條口主之 脛若若苦痺膝不能屈伸不可以行梁丘主之

匡草鞋風崑崙馮留 太溪馮留 申脈五分補少瀉多

撮草鞋風足腕痛崑崙透太丘墟各寸半商丘瀉灸解

集又法崑崙丘墟商丘照海不已取太衝

溪足腕不用痿躄坐不起髀脚痛光明沿皮五分丘墟直

分腕緩不收覆足不任脛痠然谷浮白崑崙

撮外踝紅腫痛申脈半寸瀉

摘繞踝風曲池如繞外踝痛兼刺孫絡足少陽小指間三分如繞內踝痛兼刺大都三分

王脚背紅腫太衝丘墟衝陽彈針出血臨泣

集又法太衝臨泣行間內庭不已取崑崙

丘墟

撮大姆指本節前骨疼太衝彈針出血足五指盡痛不得踐

地湧泉二分然谷一分

甲風寒從足小指起脈痺上下帶胷脇痛無常處至陰主

之、足下熱痛不能久坐濕痺不能行三陰交主之骨

痺煩滿商丘主之。膚痛癢痺外丘主之。寒氣在分肉

間痛上下痺不仁中瀆主之。

諸痺着痺即麻木不仁

靈衛氣不行則為麻木刺真節邪篇

垣神効黃芪湯治渾身麻木不仁或左或右半身麻木或

面或頭或手臂或脚腿麻木不仁並皆治之方見日門倒睫拳毛

芍藥補氣湯治皮膚間有麻木此肺氣不行也繫古老人立効神方

黃芪兩一白芍藥兩半橘皮兩一澤瀉兩半

甘草一兩

右咬咀每服一兩水二大盞煎至一盞去渣溫服如肌

肉麻必待瀉營氣而愈如濕熱相合四肢沉痛當瀉濕

熱

氣虛不

垣杜彥達患左手右腿麻木右手大指次指亦常麻木至腕已三四年矣諸醫不效求治明之明之曰麻者氣之虛也真氣弱不能流通填塞經絡四肢俱虛故生麻木不仁與一藥決三日効遂製人參益氣湯服二日便覺手心熱手指中間如氣滿脹至三日後又覺兩手指中間皮肉如不敢觸者似痒痛滿脹之意指上瑟瑟不敢用手擦傍觸之明之云真氣遍至矣遂於兩手指指甲傍各以三稜針一刺之微見血如黍粘許則痺自息矣又爲處第二第三服之

人參益氣湯治五六月間兩手麻木四肢困倦怠墮嗜臥乃濕熱傷元氣也以此藥浴之

- 黃芪錢八 人參
- 甘草各五錢生 甘草炙二錢
- 五味子一百二十粒 升麻三錢 柴胡二錢半

芍藥三錢

右咬咀每服稱半兩水五盞煎一盞去渣空心溫服服後令少臥於麻痺處按摩屈伸少時午飯前又一服日二服

第二次藥煎服如前

- 黃芪錢八 紅花五分 陳皮一錢 澤瀉

第三次服藥

- 黃芪六錢 黃柏二錢 橘皮三錢 澤瀉
- 升麻各二錢 白芍五錢 生甘草四錢 五味一百粒
- 生苳八錢 炙甘草一分

右咬咀分作四服煎服如前法稍熱服秋涼去五味冬月去黃苳服之大効

除濕補氣湯治左腿麻木沉重

黃芪錢八

甘草稍錢六

五味十粒

升麻稍

當歸

柴胡稍

澤瀉各錢二

紅花二錢半

陳皮錢一

青皮錢四

右咬咀分作四服水三大盞煎至一盞去查稍熱食前服

氣虛汗風寒

仲血痺病從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出臥不時動搖加被微風遂得之形如風狀但以脈自微濇在寸口關上小緊宜鍼引陽氣令脈和緊去則愈血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外証身體不仁如風痺狀黃芪桂枝五物湯主之

黃芪

芍藥

桂枝各三兩

生薑六兩

大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三服一方有

人參

羅中書左丞張仲謙至元戊辰春正月在大都患風証半身麻木一醫欲下之未決可否命予決之予曰治風當通因通用汗之可也然此地此時雖交春令寒氣猶存汗之則虛其表必有惡風惡寒之証仲謙欲速瘥遂汗之身體輕快後數日再來邀予視之曰果如君言官事繁劇不敢出行當如之何予曰仲景云大法夏宜汗陽氣在外故也今時陽氣尚弱初出於地汗之則使衛氣亟奪衛氣失守不能肥實腠理表上無陽見風必大惡矣內經曰陽氣者衛外而為固也又云陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰當此之時猶有過汗之戒况不當汗而汗之者乎遂與黃芪建中湯加白朮服之滋養脾胃生發榮衛之氣又以溫粉撲其皮膚待春氣盛表氣漸實即愈矣內經曰化

氣虛挾
火毒

不可伐時不可違此之謂也黃芪建中湯方見治虛實條
垣戊申春節使趙君年七旬病體熱麻股膝無力飲食有汗妄喜笑善饑痰涎不利舌強難言聲啞不鳴身重如山求治於先師診得左手脈洪大而有力量是邪熱客於經絡中也兩臂外有數癩遂問其故對以燃香所致先師曰君之病皆此也夫人之十二經灌溉週身終而復始蓋手之三陽從手表上行於頭加之以火邪陽并於陽勢甚熾焉故邪熱毒行流散於周身而熱麻鍼經云胃中有熱則虫動虫動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下熱傷元氣而沉重無力飲食入胃慄悍之氣不循常度故多汗心火盛則妄喜笑脾胃熱則消穀善饑肺金衰則聲啞不鳴仲景云微數之脈慎不可灸焦枯傷筋血難復也君奉養以膏粱之味無故加以大毒熱傷於經絡而為此病明矣內經曰熱

淫所勝治以苦寒佐以苦甘以甘瀉之以酸收之當以黃栢知母之苦寒為君以瀉火邪壯筋骨又腎欲堅急食苦以堅之黃芪生甘草之甘寒瀉熱補表五味子酸止汗補肺氣之不足以為臣炙甘草當歸之甘辛和血潤燥柴胡升麻之苦平行少陽陽明二經自地升天以苦發之者也以為佐咬咀同煎取清汁服之更繆刺四肢以瀉諸陽之本使十二經絡相接而泄火邪不旬日而良愈遂名其方曰清陽補氣湯

蒼朮

錢四

藁本

錢二

升麻

錢六

柴胡

錢三

五味

錢一

黃栢

酒製
錢三

知母

酒二
錢二

陳皮

半錢

甘草

生二
錢二

當歸

錢二

黃芪

錢三

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查空心服之待少時復以美饍壓之

補氣升陽和中湯李正臣夫人病診得六脉中俱弦洪緩相合按之無力弦在其上是風熱下陷入陰中陽道不行其症閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而目開則麻木漸退久則絕止常開其目此症不作懼其麻木不敢合眼故不得眠身體皆重時有痰嗽覺胃中常是有痰而不利時煩燥氣短促而喘肌膚充盛飲食大小便如常惟畏麻木不敢合眼為最苦觀其色脉形病相應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脉皆屬於目靈樞曰開目則陽道行陽氣遍布周身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木為風雖三尺之童皆以為然細校之則非如久坐而起亦有麻木假為繩繫縛之人釋之覺麻木作而不敢動久則自已以此驗之非有風邪乃氣不行也不須治風當補其肺中之氣則

麻木自去矣知其經脈陰火乘其陽分火動於中為麻木也當兼去陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外濕在上作也當實其皮毛以溫劑身重脈緩者濕氣伏匿而作也時見燥作當升陽助氣益血微瀉陰火去濕通行經脈調其陰陽則已非五臟六腑之本有邪也補氣升陽和中湯主之

黃芪錢五

人參錢三

甘草錢四

陳皮錢二

當歸錢身二

生草根錢一錢去腎熱

佛耳草錢四

白芍錢三

草苴蔻錢一錢半益陽退寒

黃柏錢一錢酒先除濕

火瀉

白朮錢二

蒼朮錢半除熱調中

白茯苓錢一錢除濕導火

澤瀉錢一錢用同上

升麻錢一錢行陽明經

柴胡錢

右咬咀每服三錢水二大盞煎至一盞去查稍熱服早飯後午飯前服之至八服而愈

溫經除濕湯李夫人十月二十日得立冬嚴霜作時病四肢無力乃痿厥濕熱在下焦也醋心者是濁氣不降欲滿也合眼麻木者陽道不行也開目不麻木者目開助陽道故陰寒之氣少退也頭眩暈者風氣下陷於血分不伸越而作也

羌活	獨活	柴胡	黃芪
分七	分三	分二	分二
人參	甘草	白芍	陳皮
錢一	錢一	錢三	錢二
白朮	蒼朮	澤瀉	猪苓
錢一	錢二	錢一	錢一
黃栢	黃連	木香	草薢
分三	分三	各二分	分二
神麴	麻黃	升麻	當歸
分二	去節三分	分五	分三

右剉如麻苴大作二服水二大盞煎一盞去查稍熱服食遠治肢節沉重疼痛無力之聖藥也

濕氣風症不退眩暈麻木不已除風濕羌活湯主之

濕痰死
血
火燥

羌活	防風	柴胡	藁本
兩一	兩一	分五	分三
獨活	蒼朮	茯苓	澤瀉
分五	米泔制錢一	錢二	分二
猪苓	甘草	黃芪	陳皮
去皮二分	錢五分	錢一	分三
黃栢	黃連	升麻	川芎
分三	去鬚一分	分七	三分去頭痛

右吹咀每服三錢或五錢水二盞煎至一盞去查稍熱服量虛實施用如不盡証候依加減法用之

丹手足木者是濕痰死血 十指麻是胃中有濕痰死血 子和鄆城梁賈人年六十餘忽曉梳髮覺左手指麻斯須半臂麻又一臂麻斯須頭一半麻比及梳畢從脇至足皆麻大便二三日不通往問他醫皆云風或藥或針皆不解求治於戴人戴人曰左手三部脉皆伏比右手小三倍此枯澁痺也不可純歸之風亦有火燥相兼乃命一涌一泄一汗其麻立已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小

指次指尚麻戴人云病根已去此餘烈也可針溪谷溪谷者骨空也一日晴和往針之用靈樞中雞足法向上臥針三進三引訖復卓針起向下臥針送入十指間皆然手熱如火其麻全愈

停飲

濟茯苓湯治停畜支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯

赤茯苓

陳皮

枳實去穢炒

桔梗去聲

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎服不拘時

形數驚恐經絡不通病生於不仁治之以按摩醪藥全文見治法

雜方

一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同為末滴水丸如彈大每服一丸生姜温酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻

風寒十衛不行為不仁

風論云風氣行諸脈俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤脹而有瘍衛氣有所礙而不行故其肉有不仁也全文見諸風門

又氣穴論云肉分之間谿谷之會積寒留舍榮衛不居內為骨痺外為不仁命曰大寒留於谿谷此亦風寒相干衛氣致衛氣不行而不仁也全文見氣穴論

仲黃芪五物湯方見本門衛氣條世傳惡風而麻木者烏附最

驗

本治風寒濕痺麻木不仁粥法 川烏生為末

右用白米作粥半碗藥末四錢同米用慢火熬熟稀薄不要稠下姜汁一茶匙許蜜三大匙攪勻空心啜之温為佳如是濕更入薏苡仁二錢增米作一鍾服○此粥治四肢不隨痛重不能舉者有此証預宜防之左氏曰

風淫末疾謂四肢為四末也脾主四肢風邪客於肝則
淫脾脾為肝剋故疾在末穀氣引風濕之藥徑入脾經
故四肢得安此湯劑極有力予常用此方以授人服者
良驗

治風濕四肢浮腫肌肉麻痺甚則手足無力筋脉緩急宜
續斷丸

川續斷

革薺

當歸微炒

附子

防風

天麻各一兩

乳香

沒藥各半兩

川芎三分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九酒或飲下
空心食前服

丹溪劉河間作原病式嘗以麻為澁同歸燥門中真識病
機者也

河前胡散治榮虛衛實肌肉不仁致令癢重名曰肉苛

前胡

白芷

細辛

官桂

白朮

川芎各三兩

附子炮

吳茱萸湯泡炒

當歸各二兩

川椒去目并閉目者生用二兩

右剉以茶酒三升拌勻同窰一宿以煉成猪脂膏五斤
入藥煎候白芷黃紫色漉去查成膏病在處摩之凡大
癥瘕瘡癩皆治并去諸風瘡痒痛傷折墜損

針灸

內經針灸着痺分新久新者湯熨灸之經云風寒客入皮
膚或痺不仁腫痛可湯熨及火灸刺而去之是也全文治法見師傳

久者焮針刺之經云着痺不去久寒不已焮取三里是
也四時氣篇

也四時氣篇

垣陝帥郭巨濟偏枯二指着痺足不能伸迎先師治之以
長針刺委中至深骨而不知痛出血一二升其色如墨又

診

且繆刺之如是者六七次服藥三月病良愈

甲膝寒痺不仁不屈伸髀關主之

着痺不移腠肉破身熱脉偏絕是逆也全文見診生死 着痺久

而入臟腑者為逆刺法見諸痺

素榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不

用肉如故也人身與志不相有曰死逆調論

脉診人被風不仁痿廢其脉虛者生緊急疾者死

鶴膝風即歷節之類

汚血

羅卿九治鶴膝風腰膝風縮之疾

伊卿頭尾生一條桃仁生

白附

阿魏

桂心 安息桃仁同研

白芷各一兩

乳香

沒藥各三分已上九味用童便酒二升炒熟另處

北漏蘆

當歸

白芍

牛膝

羌活

地骨皮

歲靈仙各一兩為末

右蜜為丸彈子大空心温酒化下一丸胡楚望博士病

風痿手足指節皆如桃李痛不可忍服之悉愈

丹一丈人年七十歲患脚膝疼稍腫

生地

歸頭

白芍

蒼朮

炒栝錢三

川芎

桂錢二

木通半錢

分四貼煎取小盞食前熱服

飲食痰積

一男子年近三十滋味素厚性多焦怒秋間髀樞左右一

點發痛延及膝晝靜夜劇痛劇惡寒口或渴或不渴或痞

或不痞醫多用風藥兼用補血至次年春其膝漸腫痛愈

甚食漸減形瘦羸至春末膝腫如桃不可屈伸診其脉左

弦大頗實寸瀉甚大率皆數知其小便必數而短遂作飲

食痰積在太陽陽明治之炒栝一兩生甘草稍犀角屑蒼

血虛挾濕熱

木鹽炒各三錢川芎二錢陳皮牛膝木通芍藥各五錢遇
 暄熱加條芩三錢為細末每三錢重與生姜自然汁同研
 細多少以水盪起煎令沸帶熱食前飲之一晝夜四次與
 至半月後數脉漸減痛漸輕去犀角加牛膝敗龜板半兩
 當歸半兩如前服又與半月腫漸減食漸進不惡寒唯脚
 膝痠軟未能久立久行去蒼木黃芩時當夏熱加炒黃柏
 至一兩半予依本方內加牛膝春夏用莖葉冬用根杵取
 汁用之効尤速須斷酒肉濕麵胡椒當仲夏加生地黃牛
 兩冬加茱萸桂枝

雜方

世換骨丹通治風兼治鶴膝風

- | | | | |
|-----------------------|----|----|-----------------------|
| 防風 | 午膝 | 當歸 | 虎骨 |
| 枸杞 <small>二兩半</small> | 羌活 | 獨活 | 敗龜板 |
| 秦艽 | 草薺 | 松節 | 蚕沙 <small>各一兩</small> |

茄根二兩 蒼木四兩

酒浸或酒糊丸皆可

食脚筋急痛煮木瓜令爛研作粥漿樣用裹痛處冷即易
 一宿三五度熱裹便瘥煮木瓜時入一半酒煮之

子和嶺北李文卿病兩膝臏屈伸有聲剝剝然或以為骨
 鳴戴人曰非也骨不戛焉能鳴此筋濕也濕則筋急緩者
 不鳴急者鳴也若用予之藥一湧一泄上下去其水則自
 無聲矣李文卿從其言既而果然

素寒膝伸不屈治其捷骨空論下同經云輔骨上橫骨下

外之中側立搖動取之筋動應手滑壽云捷○坐而膝痛

治其機壽云機為機王註云機後為腎立

而暑解治其骸關痛起立而膝解為骸關王註云暑熱也若膝

滑壽云挾膝解中為臏膝痛痛及捩指治其臏

為胛王註云胛為膝解 坐而膝痛如物隱者治其關云

之曲脚之中委中穴 胛上為關王註云關在胛上當 膝痛不可屈伸治其臂

內王註云大 連胛若折治陽明中俞膠王註云若膝痛

痛如折者則針陽明 膝痛若別治巨陽少陽榮主註云

膝中俞膠三里穴也 通谷穴足少陰榮然谷穴也 淫灤脛痠不能立久治少

陽之雜在外上五寸 痛而無力也外踝上五寸光明穴也

右捷機骸關諸穴更參訂之

靈膝中痛取犢鼻以員利針之發而間之針大如釐刺膝

無疑 雜病

玉鶴膝風腫及腿痛 髓骨在膝蓋骨上一寸梁丘穴兩

之濕 膝關在膝蓋骨下犢鼻內傍橫針透膝

集又法 膝關 委中 三里 下穴

陽陵泉 中腕 豐隆

通膝腫 行間

撮要陽陵泉 橫透陰陵泉 陰陵泉 橫透陽陵泉 膝關

法見前 玉龍下

世脚拗痛 委中出血

桑脚膝痛筋急 風池 三間 三陰交 三里

熱學

熱學者經所謂肝氣熱則筋膜乾筋膜乾則筋急而攣

門見痿 又云因於濕首如裹濕熱不攘大筋綆短小筋弛

長綆短為拘弛長為痿之類是也 全文見陰陽丹溪云大

傷筋不能束骨故為痿弱

丹王秀濕熱大作脚痛後手筋拘攣足乏力

生地 當歸 川芎 白朮 各二錢

蒼朮 一錢 甘草 炙三 木通

煎湯下大補丸三十九大補丸須炒煖

心薏苡仁散治筋脉拘攣久風濕痺

薏苡仁一升搗散以水二升取末數匙作粥空腹食之衍義云筋急拘攣有兩等素問大筋受熱則縮而短故攣急不伸則可用薏苡仁若素問言因寒筋急不可用也

寒攣

寒攣者經所謂寒多則筋攣骨痛者是也

本同官欽丞張德操常言其內子昔患筋攣脚不得屈伸逾年動則令人抱持求醫於泗水楊吉老云此筋病宜服下三方一年而愈

治筋極養血地黄丸春夏服之

熟地一分

蔓荊一分

山茱萸錢五

黑狗脊炙

地膚子

白朮

乾漆

躑躅炒

天雄

車前子各三分

草薺

山芋即山藥

澤瀉

牛膝各一兩

右細末煉蜜和杵丸如桐子大每服五十九温酒下空心食臥服

治筋痺肢節束痛羚羊湯秋服之

羚羊角

肉桂

附子

獨活各一兩三錢半

白芍

防風

芎藭各一兩

右為粗末每服五大錢水一盞半生姜三片同煎至八分取清汁服日可二三服

治寒冷濕痺留於筋脉縮不能轉側烏頭湯冬服之

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦艽

附子

官桂

白芍各七分

乾姜

白茯苓

防風炙

當歸各一兩

獨活一兩三錢半

右為粗末每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分去

查空心食前服

干薏苡仁湯治筋攣不可屈伸

白蘆

薏苡仁

芍藥

桂心

酸棗仁

乾姜

牛膝

甘草各一兩

附子三枚

右九味，咬咀，以醇酒二斗漬一宿，微火煎三沸，每服一升，日三，扶杖起行，不耐酒服五合。

垣活血通經湯靈壽縣董監軍癸卯年十二月間大雪初霽時因事到真定忽覺有風氣暴仆診候得六脉俱弦甚按之洪實有力其症手攣急大便閉澀面赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搖急而攣痺乃風淫末疾而寒在外也內經云寒則筋攣正此謂也本人素多飲酒內有實熱乘於腸胃之間故大便閉澀而

面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急搖用黃柏之苦寒滑以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂枝辛熱入手陽明之經為引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣為之輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥名之曰活血通經湯

升麻錢一

葛根錢一

桂枝錢二

當歸錢一

人參錢一

芍藥錢五

甘草錢一

酒柏錢二

右剉如麻苴大都作一服水二盞煎至一盞去查熱服令煖房中近火摩搓其手乃愈

虛攣者經所謂虛邪搏於筋則為筋攣又云脉弗榮則筋急全文見診生死門又仲景云血虛則筋急此皆血脈弗榮於

虛攣

筋而筋成攣故丹溪治攣用四物加減本事治筋急極用養血地黄丸蓋本乎此也

靈黃帝曰人有八虛各何以候岐伯曰以候五臟黃帝曰候之奈何岐伯曰心肺有邪其氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩膕凡此八虛者皆機關之室真氣之所遇血脉之所遊氣血固邪不住留住留則傷經絡骨節機關不得屈伸故病攣也

濕痰

丹一村夫背偃僕而足攣已成廢人予診其脉兩手皆沉弦而瀉遂以戴人煨腎散與之上吐下瀉過月餘久吐瀉交作如此凡三帖然後平復煨腎散用甘遂末三錢鑽猪藥末在內荷葉包裹燒熟溫酒爵服之

肝攣皆屬

肝攣皆屬肝經云肝主身之筋故也又云陽明之復甚則入肝驚駭筋攣又云脾移寒於肝癰腫筋攣

雜方

心除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩搗末水一升半煎取七合去查啞

針灸

食酒煮木瓜粥裹筋急痛處佳方見鶴膝風門

內經鍼灸法取攣有筋攣脉攣之異取筋攣者經云病在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痺刺筋上為故刺分肉間不可中骨也病起筋筋病已止者是也全文見痛痺門取筋脉者經云手厥陰脉是動則病手心熱肘腕攣急腋腫辨虛實寒熱陷下取之是取筋脉之攣也全文見針灸門十二經條又曰少

陽之別名曰外關去腕二寸則肘攣取之所別也全文見針灸門十五又曰邪客於足太陽之絡令人拘攣背急引脇而痛

刺之從項始數脊椎俠脊疾按之應手如痛刺之傍三痛

灸筋急不能行內踝筋急灸內踝四十壯外踝筋急灸

門全文見針灸門繆刺絡條是取絡脉之攣也

外踝三十壯立愈

玉兩肘俱攣

曲池

九分先瀉後補
補四呼瀉九吸

尺澤

手如弓方可
針五分先補

後瀉

標筋攣骨痛

竟門

補

張仲文禪山灸法治脚筋攣急

見腰痛門兩脚
內外曲交尖

撮膝曲筋急不能舒

曲泉

一寸

惟膝筋拘攣不開

兩膝

外曲交尖灸二十
七壯即委陽穴

甲兩手攣不收伸及掖偏枯不仁手瘕偏小筋急太陵主

之、掖拘攣暴脉急引脇而痛內引心肺譴譴主之

一身盡痛

寒熱

一身盡痛其病暴似傷寒屬濕痺並見傷寒太陽症門其
留連難已者於此求之 寒而一身痛者甘草附子湯熱

者拈痛湯

甘草附子湯方
見傷寒身疼門

垣拈痛湯治濕熱相搏肩背沉重疼痛上熱胃膈不利及
遍身疼痛

羌活

兩半

人參

錢二

甘草

錢五

防風

三錢
去頭

苦參

酒炒三錢

升麻

去芦二錢

葛根

二錢

知母

酒炒二錢

黃芩

酒炒二錢

澤瀉

三錢

猪苓

三錢

茵陳

酒五錢

白朮

半錢

當歸

酒三錢

蒼朮

二錢

右為細末每服一兩水二盞煎至一盞食遠或空心日

一服

氣滯

丹婦人患身痛食少脉澁畧沉重取弦實此氣滯也

白朮

錢二

青皮

黃芩

芍藥

木通

陳皮

神麴

桂

甘草

五分

蘇梗

二分

右分十貼煎

虛

垣麻黃桂枝升麻湯李夫人患渾身麻木睡覺則少減開

日久則全已閉目則麻復至此症用藥已全去又因家事不和心中煩惱遍身骨節疼身體沉重飲食減少腹中氣不轉運

麻黃不去節五分

桂枝三分

升麻

人參五分

白朮三分

甘草炙三分

黃芪五分

半夏二分

生姜一分

陳皮二分

厚朴一分

木香一分

茯苓三分

澤瀉三分

黃柏二分

附子二分

草薺菀二分

右咬咀水二大盞煎至一盞去查稍熱食遠服

本治遍身皆痛如勞証者若傷寒身體痛者不可服但少年虛損冷憊老人諸疾並皆治之

黃芪

人參

甘草

附子炮

羌活

木香

知母

芍藥

川芎

前胡

枳殼

桔梗

白朮

當歸

茯苓

半夏制已上各五錢

柴胡

鱉甲醋炙各一兩

桂心

酸棗仁三分

杏仁半兩炒

右為末每服二錢水一盞姜三片棗二箇烏梅三枚葱白三寸同煎至七分空心溫服

針灸

脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸實則身盡痛此脉若羅絡之血皆取之脾之大絡脉也全文見針灸

潔百節痛實無所知 絕骨三稜針出血

產後身痛

虛 雲趁痛散治產後氣弱血滯遍身疼痛及身熱頭疼

牛膝

當歸

桂心

白朮

黃芪

獨活

生姜各半兩

甘草

薤白各三錢半

風寒汚血

右咬咀每服半兩水三盞煎至一盞半去查食前服
五積散加酒煎治感寒頭痛身疼方見傷寒門恐與四物
各半服之穩當加桃仁煎治腰痛逐敗血去風濕
大治產後遍身青腫疼痛及衆疾

牛膝

大麥蘖等分

右為細末以新瓦罐子中填一重麥蘖一重牛膝如此
填滿用鹽泥固濟火煨過赤放冷研為散但是產後諸
疾熱酒調二錢下

風痺雜合病

風痺風與痺雜合病也蓋風痺痿厥四者多雜合如風痺
風痿痿厥痺厥風厥之類是也風痿風痺病今集中風門
痿厥痺厥卽脚氣病今集入厥咀風厥痿痺散見各門風

痺今入痺門焉

陰陽

靈樞病在陽者命曰風壽天剛柔篇東垣云此病在陽因十二

經各受風邪以高言之氣分也故身半以上風之中也用
針當引而去之也又曰散而去之用藥以辛溫發散通因
通用又熱因熱用是也

靈樞病在陰者命曰痺東垣云身半以下濕之中也命曰
痺飲食自倍腸胃力傷得之勞倦脾胃氣虛而下陷運氣
榮氣不得升浮經營心肺也

診

陰陽俱病命曰風痺言陰陽氣血俱病也尺膚濇者風痺也全文見診法

靈樞云風痺淫瀼病不可已足如履水時如入湯中股脛

淫瀼煩心頭痛傷腎時嘔時眩已汗出傷心久則目眩傷肝

悲以善恐短氣不樂傷脾不出三年死也乙云三日死

醫學綱目卷之十二終

醫學綱目卷之十三

肝膽部

驚悸怔忡

產驚悸

心憺憺動

大槩屬血虛有痰驚者心卒動而不寧也悸者心跳動而怕驚也怔忡亦心動而不寧也

丹怔忡大槩屬血虛與痰 有慮便動者屬虛 時作時

止者痰因火動 瘦人多是血虛 肥人多是痰飲

真覺心跳者是血少宜四物安神之類

治勞役心跳大虛症

硃砂錢一

歸身

白芍

側柏

川芎各五錢

陳皮

甘草

黃連各三錢

右用猪心血為丸

六脈俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脈也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜

氣浮以甘辛溫微苦峻補其血熟地黃生地黃柴胡升麻
白芍藥牡丹皮川芎黃芪之類以補之以防血溢上竭

鎮墜之劑謂
丹砂之類

在林學士本南人歷內地為官有一子甚端嚴而聰敏父
母愛之居常喜食海蛤飲食之頃未嘗不設至十八年忽
面色頓青形體瘦削夜多驚悸皆謂勞瘵之疾百療不瘳
遂召杜脈之杜曰非病何以知之蓋雖病削面青精神不
減問學院子秀才好食甚物曰多食南海中味杜曰但多
服生津液藥病當自愈如是經兩月面色漸有紅潤意夜
亦無驚悸林學士延杜而問曰醫師之驗久聞世名願聞
此病所以杜曰王冰素問曰鹽發渴乃勝血之証海味皆
鹹物既多食海味使心血漸衰則夜驚悸今既去鹹用生
津液之藥人且少壯血液易生面色漸有紅潤此疾去乃

安矣衆醫以為勞瘵非其治也

水停心
下必悸

仲食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣飲水多必
心下悸

無五飲停畜閉於中脘最使人驚悸屬飲家

時作時
止者痰
因火動

溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽
懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症或短氣悸乏或復自汗

膽虛不能致脾則
脾之水飲作矣

半夏湯洗

竹茹

枳實炒各
二兩

橘皮二兩
去白

甘草炙一
兩

白茯苓一兩
五錢

右為剉散每服四大錢水一盞半夏五片棗一枚煎七
分去渣食前服

仲心下悸者半夏麻黃丸主之

半夏

麻黃等分

右二味為末煉蜜和丸如小豆大飲服三九日三服

茯苓甘草湯方見傷寒悸

驚屬肝心脾

素東方青色入通於肝其病發驚駭金匱真言論

脾移熱於肝則為驚血病傳變

一陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠者名曰風厥全文

三陽一陰太陽脈勝一陰不得止內亂五臟外為驚駭陽

類論

臥而驚者肝

本珍真丸獨活丸並治臥驚悸多魘二方並見不得臥○經云臥則血歸於肝

今血不靜臥不歸肝故驚悸於臥也

東羌活勝濕湯治臥而多驚悸多魘洩者邪在少陽厥陰

也加柴胡五分如淋加澤瀉五分此下焦風寒二經合病

也經曰腎肝之病同一治為俱在下焦非風藥行經不可

也羌活勝濕湯方見腰痛

諸病疼酸驚駭皆屬於火全文見診

因驚成悸者病在心膽

丹病自驚而得者則神出其舍舍空得液則成痰也血氣入舍則痰拒其神不得歸焉控涎丹加砂遠志

無驚悸因事有所大驚而成者名曰心驚膽寒病在心膽

經其脈大動動脈如豈厥厥動東垣硃砂安神丸方見煩躁門東

垣云外物驚宜鎮平以黃連安神丸是也

無鎮心丹治驚悸

辰砂用黃松節酒浸龍齒用遠志苗醋煮

右只取辰砂龍齒各等分為末猪心血為丸如芡實大

每服一丸以麥門冬葉菴荳燈心白蜜水煎荳熟為度

臨臥咽下小兒磨化半丸量歲數與之

世蜜陀僧散治驚氣入心絡不能語者昔有為狼及大蛇

所驚皆以此而安用蜜陀僧研極細末茶調一錢七服

即愈

無寒水石散治因驚心氣不行鬱而生涎結爲飲遂爲大疾忪悸墮懼不自勝持少遇驚則發尤宜服之。

寒水石煨 滑石水飛各一錢 生甘草一錢

右爲末每服二錢熱則新汲水下怯寒則薑棗湯下加龍膽少許尤佳。

子和衛德新之妻旅宿樓上夜值盜劫人燒舍驚墜床下自後每聞有響則驚倒不知人家人輩躡足而行莫敢冒觸有聲諸醫作心病治之人參珠珀及定志丸皆無效戴人見而斷之曰驚者爲陽從外入也恐者爲陰從內出也驚者爲自不知也恐者爲自知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚怕則膽傷矣乃命侍女執其兩手按於高椅上坐當面前下置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之其婦人大驚戴曰我以木擊几何必驚乎伺少停擊之驚

少緩又斯須連擊三五次又以杖擊門又暗遣人擊背後之窗徐徐驚定而歎曰是何治法戴人曰內經云驚者平之平者常也常見必無驚是夜使人擊其門窗自昏暮達曙熟臥不聞夫驚者神上越也從下擊几使之下視所以收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不喜戴人至是終身敬服。

仲灸甘草湯治脈結代而悸方見傷寒

丹驚悸定志丸加琥珀鬱金

無定志丸治心氣不足驚悸恐怯

菖蒲炒 遠志去心 茯苓各二兩 人參一兩

辰砂爲衣

右爲末蜜丸如桐子大每服五十九米湯下一方去茯神名開心散服二錢七不時

本安神鎮心治驚悸消風痰辰砂遠志丸

石菖蒲

遠志

人參

茯神

川芎

山藥

鐵粉

麥門冬

天麻

半夏

南星

白茯苓生各一兩

細辛

辰砂各半兩

右為細末生薑五兩取汁入水煮糊丸如棗豈大另以硃砂為衣每服二十五丸夜臥服生薑湯下小兒減服

茯苓丸

石菖蒲

辰砂

人參

遠志

茯苓

真鐵粉

茯神

南星牛膽製

半夏麴等分

右為細末生薑四兩取汁和水煮糊丸如桐子大別用細末為衣乾之每服十粒加至二十粒夜臥生薑湯下

上三方療驚良驗

聞木音則驚屬胃

胃足陽之脈是動則病聞木音則惕然而驚欲動

素陽明所謂甚則惡人與火聞木音則惕然而驚者陽氣與陰氣相搏水火相惡故惕然而驚也脈解篇○黃帝問曰

足陽明之脈病惡人與火聞木音則惕然而驚鐘鼓不為

動聞音而動何也岐伯曰陽明者胃脈也胃者土也故聞

木音而驚者土惡木也陽明脈解篇

痰飲驚悸屬脾

痰飲驚悸屬脾土見前痰飲條

運氣

運氣驚悸有三

一曰肝木不及金來乘之經曰木不及曰委和委和之紀

其發驚駭又云陽明之復則入肝驚駭筋攣是也

二曰火邪助心經云少陽所至為驚惑又云少陽所至為

驚躁又云少陽之勝善驚是也

三曰寒邪傷心經云歲水太過寒氣流行病煩心躁悸是也

按經云陽氣者開闔不得寒氣從之乃生大僂陷脈為瘦留連肉腠俞氣化薄傳為善畏及為驚駭者是瘦瘡所為之驚駭也蓋俞則瘦瘡之俞竅其痛氣留連肉腠之間恐人觸着而痛故化惕惕然之心內薄而傳為善畏驚駭之疾也

針灸

撮心爍爍跳動少衝瀉之灸立效

甲驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵黑病飢不欲食照海主之○膽寒怯寒厥手臂痛善驚妄言面赤泣出液門主之○善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱嗑乾渴行間主之素肝脈驚暴有所驚駭大奇論王註云驚謂馳驚言迅急也○二陽急為驚○白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中名

曰肺痺寒熱

全文見積塊下全

○陽明瀆則病積而善驚

仲寸口脈動而弱動即為驚弱即為悸

脈驚主病者其脈止而復來其人目睛不轉不能呼氣

因驚生病有四

仲病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四病皆從驚發得之

產驚悸

大七寶散產後服之安神壓驚

辰砂研

桂心

當歸

川芎

人參

白茯苓

羚羊角

燒存性各二錢

乾薑一錢炮

右為末每服一錢用羌活豆淋酒調下如不飲酒漬米水飲調下○如心煩熱悶以麥門冬去心煎湯調下減薑桂○如心下煩悶而痛用童便酒調下○如腹痛加

當歸○如心悶加羚羊角○如心虛氣怯加桂心 不
下食或惡心加人參○虛顛加茯苓

海大効牡丹皮散治血藏虛風及頭目不利不思飲食手
足煩熱肢節拘急疼痛胸膈不利大腸不調陰陽相干心
驚怯悸或時旋運

牡丹皮

川芎

枳殼

麩炒各一兩

陳皮

玄胡索

甘草

羌活

半夏

湯洗各半兩

木香

訶子肉

芍藥

三稜

炒半兩

乾薑

當歸

白朮

桂心

錢五

右為細末每服二錢水一盞半煎五七沸食前溫服益
血海退血風勞攻注消寒痰實脾胃理血氣攻刺及氣
虛惡寒潮熱証至妙

大治產後中風心忪悸志氣不定恍惚語言錯亂

人參

羚羊角

麥門冬

茯苓

茯苓

白蘚皮

甘草

石膏

淡竹瀝

右咬咀用水二升煎至七合下竹瀝分三服

心澹澹動

厥陰病澹澹因痰動也心澹澹動者謂不怕驚而心自動也驚恐
亦曰心中澹澹恐謂怕驚而心亦動也

其澹澹自動之病屬二經一屬心主手厥陰病經云心主
手厥陰之脈是動則病心中澹澹大動面赤目黃喜笑不
休視盛虛寒熱陷下取之是刺灸之法也又曰太陽司天
寒淫所勝病心澹澹大動胸脇胃腕不安治以甘熱是運
氣之寒傷心主也○其二屬少陽病經云一陽發病少氣
善欬善噫其傳為心掣是也

厥陰病
心澹澹
大動

少陽病
心掣

反曳也

怒

怒在陰陽為陰閉遏其陽而陽不得伸也經云陰出之陽則怒又云血并於上氣并於下心煩冤善怒東垣云多怒者風熱陷下於地是也○怒在臟腑所屬經在臟為肝在志為怒又云肝藏血血有餘則怒又云膽為怒是也

丹治怒方

香附末

六兩

甘草末

一兩

右和勻白湯調服五錢

怒皆屬木太過

運氣怒皆屬木太過經云木太過曰發生發生之紀其病怒又云歲木太過風氣流行甚則善怒又云歲土不及風反大行民病善怒是也○怒在禁忌多生厥逆經云陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥又云暴怒傷陽又云怒則氣逆甚則嘔血及飡泄是也

善太息

太息皆屬燥邪傷膽

運氣善太息皆屬燥邪傷膽經云陽明在泉燥淫所勝病善太息又云陽明之勝太息嘔苦又云少陰司天地乃燥凄愴數至脇痛善太息是也

針灸

內經灸刺善太息皆取心膽二經經云黃帝曰人之太息者何氣使然岐伯曰思憂則心系急心系急則氣道約約則不利故太息以出之補手少陰心主足少陽留之也又曰膽病者善太息口苦嘔宿汴視足少陽脈之陷下者灸之又云膽足少陽之脈是動則病口苦善太息視盛虛實寒熱陷下取之是也

甲色蒼蒼然太息如將死狀振寒溲白便難中封主之脾虛令人病寒不樂好太息商丘主之○凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即取公孫及井膈

實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂飲多不嗜臥虛則腹脹腸中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之

目疾門 目赤腫痛 外障 內障

不能遠視 不能近視 雀目日落不見物

目淚不止 風沿爛眼 倒捷拳毛 努肉

攀睛 飛絲塵垢入目 視岐亂見

目開不閉 眇目直視 目上視

目具陰陽五臟

經云瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽故陰陽合傳於

精明此則眼具陰陽也全文見視岐亂見又曰五臟六腑之精氣

皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之

精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為

約束裹擷筋骨氣血之精而與脈并為系上屬於腦後出

於項中此則眼具五臟六腑也全文見視岐亂見後世以內外皆

屬心上下兩臉屬脾白眼屬肺黑眼屬肝瞳子屬腎謂之五輪蓋本諸此也又有八廓之說無義無據今不得刪入焉

臟腑主目有二

肝主目

一曰肝經云東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝又云人臥血歸於肝肝受血而能視又云肝氣通於目肝和則目能辨五色也

心合脈諸脈皆屬於目

二曰心經云心合脈諸脈者皆屬於目是也至東垣又推之而及於脾如下文所云

目疾始於脾胃

東垣五臟生成篇云諸脈者皆屬於目目得血而能視針經九卷大惑論云心事煩冗飲食失節勞役過度故脾胃虛弱心火太盛則百脈沸騰血脈逆行邪害孔竅天明則日月不明也夫五臟六腑之精氣皆稟受於脾土而上貫

於目脾者諸陰之首也。目者血氣之宗也。故脾虛則五臟之精氣皆失所司，不能歸明於目矣。心者君火也，主人之神宜靜而安，相火代行其令，相火者胞絡也，主百脈，皆榮於目。既勞役運動，勢乃妄行，及因邪氣所并而損其血脈，故諸病生焉。凡醫者不理脾胃及養血安神，治標不治本，不明正理也。

陽主散，陽虛則眼楞急而為倒捷拳毛。○陰主斂，陰虛不斂則瞳子散大而為目昏眼花。

靈目皆外決于面者為銳眦，在內近鼻者為內眦，上為外眦，下為內眦。癩狂 ○診脈痛赤脈從上下者，太陰病從下

上者，陽明病從外走內者，少陽病。太陽病宜溫之，散之，陽明病宜下之，寒之，少陽病宜和之也。論疾診尺篇

保論云：眼之為病，在腑則為表，當除風散熱；在臟則為裏

當養血安神，暴發者為表而易療，久病者為裏而難治。除風散熱者，瀉青丸主之；養血安神者，定志丸主之。婦人熟地黃丸主之，或有肥體氣盛風熱上行，目昏澁，槐子散主之。此由胸中濁氣上行也，重則為痰厥，亦能損目。常使胃中氣清，自無此病也。又有因目疾服涼藥多則損氣者，久之眼漸昏弱，乍明乍暗，不能視物，此則失血之驗也。熟乾地黃丸消氣定志丸相須而養之，或有視物不明，見黑花者，此之謂腎氣弱也，宜補腎水，駐景丸是也。或有暴失明者，謂眼居諸陽交之會也，而陰反閉之，此風邪內滿，當有不測之病也。

目赤腫痛

目痛分陰陽 目疼有二，一謂目眦白眼痛，一謂目珠黑眼疼，蓋目眦白眼疼屬陽，故晝則疼甚，點苦寒藥則效。經所謂白眼赤脈

法於陽故也目珠黑眼疼屬陰故夜則疼甚點苦寒則反劇經所謂瞳子黑眼法於陰故也

陰症治法

簡補肝散治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及羞明怕日夏枯草五錢香附子一兩共為末每服一錢臘茶調下無時候服

右夏枯草治目珠疼至夜則疼甚者神效或用苦寒眼藥點上反疼甚者亦神效蓋目珠者連日本日本又名目系屬厥陰之經也夜甚及用苦寒點之反甚者夜與寒亦陰故也丹溪云夏枯草有補養厥陰血脈之功其草三四月開花遇夏至陰生則枯蓋稟純陽之氣也故治厥陰目疼如神者以陽治陰也予周師目珠疼及連眉稜骨痛并頭半邊腫痛遇夜則作用黃連膏子點上則反大疼諸藥不效灸厥陰少陽則疼隨止半月又作

又灸又止者月餘遂以夏枯草二兩香附二兩甘草四錢同為細末每服一錢五分用茶清調服下咽則疼減大半至四五日良愈又一男子年六十歲亦目珠連眉稜骨疼夜甚用苦寒劑點亦甚與前証皆同但有白翳二點在黑目及外眥為翳藥皆不效亦以此藥問東垣選奇湯又加四物黃連煎服并灸厥陰少陽而安

本治睛疼難忍者

川歸

防風

細辛

薄荷各等分

右為末每服二錢麥門冬熟水調下食後日午夜臥各一服

保止痛散治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛脈弦作內障也得之於飢飽勞役

柴胡一兩

甘草灸七錢半

瓜蒌根二兩

當歸

黃芩酒一牛炒

生地黃兩一

右為瓮末每三錢水一盞半薑三片棗一枚臨臥熱服
小便不利加茯苓澤瀉各五錢

治太陽經衛虛血實目腫赤臉重頭中濕淫膚腎睛痛肝
風盛眼黑腎虛

桔梗丸

桔梗斤一 牽牛頭末二兩

右細末每服四五十九至一百丸食前溫水下日二次

陰病似陽照法

衍暴赤眼無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點目
熱淚出隨點隨愈但小兒甚懼不須疑已試良驗有瘡者不可用

又以此治疔驗

張仲文治眼暴赤腫痛不得開又淚出削附子赤皮末加
蠶屎着背中以瘥為度

本治丈夫女人室女小兒諸般赤眼針頭丸

川烏尖七枚 白僵蠶七枚去砂十

右為末用猪膽取汁調藥不令稀用成軟塊攤在碗內
荆芥艾各一兩皂角小者一莖燒將藥碗覆薰之常將
藥膏攪勻轉又攤又熏以皂角荆芥艾盡為度再搜成
塊用油紙裹入地中出火毒冬天兩日夜夏天一夜春
秋一日夜取出丸如針頭大每一丸點眼中妙

陽症治法

丹治目中百病乳汁煎黃連點之

衍人乳汁治目中功多何也人心主血肝藏血肝受血則
能視蓋水入於經其血乃成又曰上則為乳汁下則為月
水故知乳汁即血也用以點目豈不相宜者哉○治眼痛
小黃栢皮一名小栢子以瓮布揩去瓮皮刮取柔細黃屑
以手急捏成團如鷄子大以苧絲縛之次以蘿蔔葉包之

又用苧絲縛之置灰火內煨去外二三層有灰者急用紗絞出黃汁收之點眼甚妙一方用乳汁拌小黃栢皮同煨點之又勝

世傳信方眼風汨痒或生翳或赤眚一切皆主之宣州黃連搗為細末雜核仁去皮碾為膏綠此性稍濕末不得故耳與黃連等分相合取不蛀乾棗三枚割頭少許留之去核以二物填於中却取割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以水半碗於銀器中文武火煎取一鷄子殼以綿纏待冷點眼萬萬不失前後試驗數十人皆應保點眼藥除昏退翳截赤定痛

當歸二錢

黃連二錢

防風一錢五分

細辛五分

甘草一錢

右劉如麻荳大水一大碗文武火煎滴水不為度

入熟蜜少許點閉

丹暴赤眼痛枸杞汁點妙集手

目卒痛荆芥燒汁點之後

保救苦丸治眼暴赤發噴痛甚者

黃連一兩

川歸二錢

甘草一錢

右劉細水半碗浸一宿以火熬約至一半綿絞去查令淨再熬作稠膏攤在碗上倒合以物蓋之用熟艾一大塊如彈子大底下燃之薰膏子令艾盡為度下下項藥
硃砂一錢 腦子五分 乳香 沒藥研各等分
右研入膏和丸如米大每用二丸點眼兩角仰面臥藥化方起

世點藥方黃連五錢去鬚槌碎用水三碗浸夏月三日冬五日以古文錢百枚筒同煎取汁半碗又將查再煎凡三次取綿纏過以磁器燉成膏子如沙糖樣却將蘆甘石黃

連牙茶小便煨過者入麝香少許同研細入前膏子再煨可丸為度如桐子大化點○一方不用蘆甘石只將膏子入麝少許點尤妙○一方陰陽寒熱通用以生薑自然汁重綿纏過澄薑泥晒乾却用黃連膏入蜜少許以薑泥為丸餅如錢厚或水化或乾點神效

惡寒脈浮者為有表

薑汁點法見前黑睛痛條治目痛惡寒脈浮者效○治目

皆白眼痛諸法並見後表裏寒熱虛實等條

東垣選奇湯防風飲子治眉骨痛不可忍方見眉痛門

芎辛湯治兩目晝夜隱濇難開羞明畏日目赤視物昏暗

芎藭

蔓荆子各五分 細辛二分

防風一錢五分

甘草

白芷各一錢

右作一服水一大盞八分煎至一盞去查稍熱臥服之

極佳

明目細辛湯治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睫成細眵糊多隱濇難開眉攢痛悶鼻涕唾極多如稠膿大便微硬喜食冷物

麻黃

羌活各三錢

藁本一錢

川芎五分

細辛少許

白茯苓一錢

蔓荆子六分

荆芥蕙二錢

當歸稍一錢

生地黃六分

川椒八粒

桃仁二十枚

紅花少許

防風二錢

右並剉如麻荳大分作四服每服水二大盞煎至一盞

去查稍熱服食後忌酒濕麪及風寒處行走

本治肝腎風毒氣上衝眼痛菊花散

甘菊花

牛蒡子炒各八兩 防風三兩

白蒺藜去刺一兩

甘草一兩五錢

右為細末每服二錢熱水調下食後臨臥

脈實有力者為有裏

凡目赤痛或大腑秘或脈實有力者為有裏宜微利之

實熱條瀉青丸洗肝散之類是也

海目赤暴作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯

四物錢各五

防已錢各二

右水煎服

丹丈夫患眼赤腫痛

連翹 黃芩 歸鬚 陳皮

蒼朮錢各二 木通半一錢 甘草錢灸一

分三貼薄苛葉五片水二盞煎一半入些好酒熱飲之

保槐子散治體肥氣盛風熱上行目昏澇

槐子 黃芩 木賊 蒼朮各等分

右細末食後茶送下

川芎散治風熱目眩熱腫及胸中不利

川芎 槐子各一兩

右為末氣滯下利薑湯調目疾茶清調熱上攻吹咀一

兩煎服

潔治眼赤暴發腫散熱飲子

防風 羌活 黃芩 黃連各一兩

右切每半兩水二盞煎食後溫服加大腑秘加大黃一

兩如痛甚加川歸地黃煩躁不得臥加梔子一兩

治目暴發赤腫除風散熱瀉青丸方見治法門

局洗肝散風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱澇眵淚

薄苛去梗 當歸 羌活 防風各去蘆

梔子仁 甘草炙 大黃 川芎各二兩

右為末每服二錢食後熱水調下

本事治目暴赤瀼腫疼痛

木賊半兩 去節

細辛半兩 淨洗

草烏一分 去尖

龍膽草半兩 去根

右為剉散每服三大錢水一大盞黑荳半合煎至一二

沸入沙糖一塊如大彈子大煎至八分去查食後溫服

一應諸眼患並用忌煎煉油麩酢醬熱物及不得嗔怒

房色等事則便易獲痊矣

虛熱宜 升降水 火

治腎經虛冷水候不升不能上滋肝木致令眼目昏暗或

痛或痒須用此藥方調治之

川芎

荆芥

天麻

草薺

川烏炮

烏藥

羌活

黑牽牛炮

川歸

金釵石斛 各等分

右為末煉蜜丸如荳大硃砂為衣每服一九薄荷湯嚼

下

目赤腫足寒者必用時時溫洗其足并詳赤脈處屬何經

灸三里臨泣崑崙等穴立愈○海藏四物龍膽湯方見 熱條

保地黃湯治眼小昏瀼因發而久不能瘥

防風

當歸

黃芩

黃連

人參

茯苓

羌活

地黃各等分

右麓末每服五七錢水一盞半煎至一盞溫服

丹赤眼痒痛煎枸杞汁服救急方

垣助陽和血補氣湯治眼發上熱壅白睛紅眵多淚無疼

痛而隱瀼難開此服寒藥太過而真氣不能通九竅也故

眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風分七

黃芪錢一

甘草分五

蔓荊子

歸身分五

白芷分二

升麻分七

柴胡

右咬咀作一服水一盞半煎至一盞去查熱服臨臥避

風及忌食冷物

碧天丸治目疾累服寒涼不愈兩目蒸熱有如火薰赤而不痛紅系血脈滿目貫睛翳悶昏暗羞明畏日或上下臉赤爛或不伏風土而內外銳皆皆洗破之

瓦粉炒

銅綠七分

枯白礬二分是一錢

右研銅綠白礬令細旋旋入瓦粉銅綠勻熱水和之共為丸每用一丸熱湯半盞浸一二箇時辰洗至覺微瀼為度少合眼半時辰許臨臥更洗了眼目就睡尤神妙一丸可洗十日如再用重湯內頓令熱此藥治其標為裏熱治已去矣裏實者不宜用此當瀉其實熱諸方見前大腑秘堅條

治熱宜

子和清州王正之子年十五歲目赤多淚衆工無效戴人見之曰此兒病在目裏當得之母腹中被驚其父曰妊娠

時在臨清被圍戴人令服瓜蒂散加鬱金上湧下泄各去涎沫數升人皆笑之其母曰兒腹中無病何以吐瀉如此至明日其目輝然爽明○一小兒名得孫眼發赤其母買銅綠欲洗兒目煎成家人誤與兒飲之須臾大吐吐訖立開○安慶趙君玉目暴赤腫點洗不退偶思戴人法曰凡病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散君玉歎曰法之妙其迅如此乃知法不遠人人自遠耳

壅者
夾之

孫仁廟朝中衛才人忽患眼疼衆醫皆不能療或投寒藥或投補藥加之腑臟不安上乃問孫孫曰臣非眼科乞不全責於臣降旨有功無過孫乃診之肝脈弦滑非熱壅也乃才人年壯血盛肝血併不通遂問及宮人月經已二月不通衆醫曰有孕孫曰此正為疾耳遂下通血藥其經既通不日眼疾亦愈上賜錢三十萬才人贈金一囊官人謠

曰神醫不來雙目難開

丹治風赤眼乾蚯蚓十箇炙為末冷清茶下二錢夜臨臥與服聖惠方

點精雜方

點藥諸方分陰陽並見前眼痛分黑白條

世治眼暴赤腫大田螺以清水漾去泥壁去掩入黃連末一錢麝此少在內將一盞子安少濕泥仰安田螺在泥上粘定露一宿次日早盡化為水以鷄翎刷眼痛處則瘥外治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白碗中浸春夏一食時以上看碧色出即以此筋頭纏綿仰臥點所患眼乃先從大眥中滿眼點微痛不畏良久三五飯頃即側臥瀝却熱汁每日十度已上不過二日瘥○治赤目痒痛地骨皮三升水三斗煮取三升去查納鹽二兩煎取二升傳目或加乾薑二兩

博濟治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍或上下臉皆赤

爛浮翳肉侵睛神效驅風散

五倍子兩一 蔓荆子兩一

右同杵為末每用二錢水二盞銅瓦器內煎及一盞澄

查熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去渣

痒

潔眼稍赤爛

黃連三錢 白礬三錢 銅綠 蜜陀僧一錢

輕粉少

右為極細末少少貼之

東碧雲散搗藥

青黛一錢 蔓荆子一錢 川芎二錢 薄荷二錢

鬱金一錢 石膏一錢 細辛一錢 紅荳一錢

芒硝錢一

右為細末口噙水鼻孔內噴之

治赤眼頭風等症此方名為神聖散

乳香 沒藥 川芎 石膏

雄黃各二錢 盆硝半兩

右為細末專治赤眼冷淚頭風耳聾耳痒鼻塞聲重一搗牙根便住

保眼發赤腫毒氣侵睛脹痛宜拔毒散

盆硝 乳香 雄黃 沒藥各等分

右為細末研以少許搯鼻中

治眼風毒發腫鼻中欲嚏嚏多鼻損而生瘡宜風散

川芎 甘菊各二錢 乳香 沒藥各一錢

右為末少許搯鼻中

貼洗雜方

本治赤腫眼以白薑末水調貼脚掌心 又以上硃蜜調
帛貼眼上

山赤眼用九節黃連秦皮麤末加滑石一塊煎湯洗 又

方用熱湯篩洗或濃煎冬青葉湯入鹽熱洗

丹治火眼艾燒細烟以碗蓋之候烟上成煤取下以溫水

調洗之入黃連尤妙斗門

垣廣大重明湯治兩目臉赤爛熱腫疼痛并稍赤及眼臉
痒及痒極抓至破爛赤腫眼楞生瘡翳目多眵痛隱濇難
開

草龍膽稍 防風 甘草根 細辛各等分

右剉如麻荳大內甘草不剉只作一挺先以水一大碗
半煎草龍膽一味乾一半再入餘三味煎至一小半碗
夫查用清汁帶熱洗以重湯坐令極熱日用五七次洗

運氣

風助火熱在上

火獨盛熱在中

肝實宜清之

肝虛宜溫之

針灸

畢少合眼須臾即去努肉縱長及痒亦減矣

運氣目赤有二

一曰風助火鬱於上經云少陰司天之政二之氣陽氣布風乃行寒氣時至民病目眩目赤氣鬱於上而熱又云少陽司天之政初之氣風勝乃淫候乃大溫其病氣怫於上目赤是也

二曰火盛經曰火太過曰赫義赫義之紀其病目赤又云火鬱之發民病目赤心熱又曰少陽司天之政三之氣炎暑至目赤又云少陽之勝目赤是也

三曰燥邪傷肝經云歲金太過燥氣流行民病目赤又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從脇痛目赤是也

內經灸刺白眼痛有四法

其一取足太陽經云目痛赤脈從上下者太陽病故知取

之也

其二取足陽明經云目痛赤脈從下上者陽明病故知取之也

其三取足少陽經云目痛赤脈從外走內者少陽病又手足少陽之脈所生病者皆目銳眦病故知取之也

其四取蹻脈經云邪客足陽蹻之脈令人目痛從內眦始刺外踝之下半寸所左刺右右刺左又云目中赤痛從內眦始取之陰蹻也

灸刺黑珠痛有三法

其一取足太陽經云足太陽有過項入于腦者正屬目本名曰眼系頭目若痛取之在項中兩筋間是也

其二取足厥陰經云肝足厥陰之脈上入頰頰連目系故取之也

其三取少陰經云手少陰之别名曰通里屬目系取之掌後一寸也又足少陽之正陽明之正皆繫目系經無取法也

子和余嘗病目赤或腫或翳作止無時偶至新息帥府百餘日羞明隱澹腫痛不已忽眼科姜仲安云宜刺上星至百會速以銚針刺四五十刺攢竹穴絲竹空穴上兼眉際二十刺及鼻兩孔內以草莖彈子出血如前約二升許來日愈太半三日平復如初

潔眼痛睛欲出者須八關大刺十指間出血須十指縫
心眼暴赤腫 神庭 上庭 顙門 前頂

百會各出血立愈
世眼眶腫 二間 行間

摘眼疼不可忍 風也 合谷立愈

玉眼紅腫羞明怕日并昏 睛明斜飛向鼻不直針忌灸 童子窳

針入一分沿皮內透魚腰 太陽翳腫上三稜針出血

竇眼痒痛 光明 第五各瀉 行間

集羞明怕日 攢竹 合谷灸 小骨空灸如前 二間

張風眼卒生翳膜疼痛 中指本節尖上灸三壯小麥大左灸右右灸左

集諸障 睛明 四白在珠下一分 太陽百會商陽厲

兌光明各出血合谷三里命門肝膈光明各灸之

撮嬰眼赤腫疼痛 陽谷一分瀉 至陰

甲內皆赤腫目眈眈無所見皆痒痛溼膚白翳睛明主之

○目眈眈赤痛天柱主之○目痛泣出甚者如脫前谷主之○眼痛下廉主之○白膜覆珠子無所見解溪主之○

青盲無所見遠視眈眈目中溼膚白膜覆瞳子目窻主之

○目痛口僻疾目不明四白主之○目痛引眦少腹偏痛

○目痛引眦少腹偏痛

皆一嘔瘳癡視昏嗜臥照海主之瀉左陰躄取足左少陰
前作春先刺陰躄後刺少陰氣在橫骨上○目中白翳然谷取
之○目視不明振寒自翳瞳子不見腰兩脇痛脚痠轉筋
丘墟主之○目赤目黃翳窳主之○目眩無所見偏頭痛
引目外眥張急頷厭主之○目中痛不能視上星主之先
取噫嘻後取天牖風池○目痛不明斷交主之
葉眼痛久不愈○魚際壯灸七

外障在睛外
遮睛

表裏上

經云診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從
外走內者少陽病按此論表裏之翳明矣用以治症如鼓
應桴也

醫從上
下皆太

凡赤脈翳初從上而下者屬太陽以太陽主表其病必連
眉稜骨痛或腦項痛或半邊頭腫痛是也治法宜溫之散

陽宜溫
散

之溫則臘茶鹽川附等分煎服立愈戴立齋嘗以此證用
川附一錢作一服隨愈散則簡要夏枯散東垣選奇湯之
類是也○一方附子半兩芽茶一大撮白芷一錢細辛川
芎防風羌活荆芥各半錢煎服神效
簡夏枯草治眉稜痛目翳從上下者累效必與退雲丸相
兼服夏枯草方見目珠痛條

垣選奇湯治眉稜骨痛目翳從上下者妙方見眉
痛條
羌活除翳湯治太陽寒水翳膜遮睛不能視物

麻黃根一分 羌活一兩 防風兩 藁本七錢

薄荷葉二錢 細辛少許 荆芥蕙七錢煎成
藥加之

川芎二錢 當歸根三錢 生地酒一錢 小椒五分

黃栢四錢 知母五錢
酒製

右咬咀每服三錢水三大盞煎至一盞半入荆芥蕙再

煎至一盞去查稍熱服後忌酒濕麪

本又方

防風兩 白蒺藜兩 羌活一兩 甘草二兩

右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點服食後

醫從下
上者陽
明宜下
宜寒

赤脈翳初從下而上者或從內皆出外者皆屬陽明以陽
明主裏其症多熱或便實是也治法宜下之寒之下則局
方流氣飲錢氏瀉青丸局方溫白丸加黃連黃栢之類累
用累驗寒則一味黃連羊肝丸之類也

局流氣飲治目生翳障

大黃炮 牛蒡子炒 川芎 菊花去枝

白蒺藜炒去梗 細辛去苗 防風去苗 玄參去苗

山梔去皮 黃芩去蘆 甘草炙 蔓荊子

荆芥去梗 木賊去根節 草決明一兩 蒼朮二兩

右為末每服二錢臨臥用冷酒調下

羅撥雲散治因眼發濕熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞明
隱濇難開

川芎 草龍膽 楮實 薄荷

羌活 荆芥蕙 石決明 草決明

蒼朮 大黃 甘草 木賊

密蒙花 連翹 川椒 甘菊

桔梗 石膏 地骨皮 白芷

白蒺藜 檳榔各一兩 石燕對一

右件搗羅為細末每服三錢溫茶清一盞調下食後一
日三服忌雜魚鳥諸肉

海藏東垣先生治痲後風熱毒翳膜氣暈遮睛以瀉青丸
子瀉之大効初覺易治保命集云痲後翳膜亦能治
之瀉清丸減大黃一半用之

妻姪女形肥筭年時得目疾每一月或二月一發發時紅腫瀆痛難開如此者三年服除風散熱等劑及尋常眼藥則左目反有頑翳從銳皆來遮瞳人右目亦有翳從下而上經云從內外走者少陽病從下上者陽明病予謂此少陽陽明二經有積滯也脈短滑而實晨則似短潔古云短為有積滯遏抑臟腑宜下之遂用溫白丸減川芎附子三之二多加龍膽黃連如東垣五積法從二九每日加一九加至大利然後減丸又從二九加起忽一日於利中下黑塊血若干如墨大而硬堅從此漸覺痊而翳盡去矣

內障世黃連羊肝丸治目翳從下上者從內皆出外者神效方見
音從外赤脈翳初從外皆入內者為少陽以少陽主半表半裏治

少陽宜和解

法宜和解之神仙退雲丸之類是也

七 垣神仙退雲丸治一切翳暈內外障昏無睛者累效妙方

川芎

當歸各一兩半

犀角酒洗

枳實

川棟

蟬殼

甘菊

薄荷葉不見火已

上各半兩

瓜蒞仁生者六錢蛇退

密蒙花

荆芥蕙

各二錢此三味與甘草同焙乾去甘草不用

地骨皮洗

白蒺藜

微炒去刺羌活

生地酒洗焙乾各一錢

川木賊

一兩半去節童便浸一宿焙乾

右為細末煉蜜為丸每一兩分作十九米泔湯調服日

進二三丸食後婦人當歸湯下有氣者木香湯下使之在人消息

本治諸眼患因熱病後毒氣攻眼生翳膜遮障服此藥逐

旋消退不犯刀針

青箱子

防風

枳殼各一兩

羌蔚子

細辛各半兩

枸杞子

澤瀉

生地黃

石決明

各一兩半黃連半兩

車前子

川當歸

麥門冬

去心各二兩

右各如法修事焙乾為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸飯飲吞下忌一切熱毒物

垣羌活退翳湯

羌活

二錢防風一錢

黃芩半兩

柴胡三錢

五味子

二錢黃柏五錢

芍藥五錢

黃連二錢

甘草

草龍膽五錢黃芪三錢

升麻二錢

歸身

二錢石膏二錢

右件剉如麻莖大水二盞分作二服煎至一盞入酒少

許去查臨臥熱服忌言語

消翳散一名龍膽飲子

青蛤粉

半兩羌活

龍膽草

黃芩炒各三錢

蟬退

五分一錢麻黃半錢

穀精草半兩

升麻二錢

川鬱金

半兩甘草根炙五分

右為細末每服二錢食後溫茶調下已上四方熱多者宜之

又方

川芎

羌活

旋覆花

防風各二兩

甘草

蒼朮油浸一夕去皮日乾不見火

楮實

楮葉

並八月採陰乾已上各一兩

甘菊

枳實

蟬退

木賊各一分

右木臼中治為末茶清調下二錢早食後臨臥各一服治暴赤眼忌濕麪及酒楮實須真無實者取葉不爾諸

藥無效合時不得焙及犯鐵器予觀此方取楮葉必無實者蓋陰陽二合相匹配耳有實者陽也無實取葉者陰也所以不得真楮實者悉無效

羅五秀重明丸治眼翳膜遮睛隱澁昏花常服清利頭目

甘菊花開頭五百箇 荆芥五百穗 木賊去節五百節 楮實五百枚

川椒開口者五百粒

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼時時咽

下食後噙化無時臨臥大忌酒麪熱物已上三方無熱者宜之

表裏下

翳膜者風熱重則有之或癍入眼此肝氣盛而發在表也翳膜已生在表明矣宜發散而去之若反疎利則邪氣內搐為翳益深邪氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之水瞖而沉邪氣牢而深者謂之陷翳當以煖發之物使其邪氣再動瞖膜乃浮佐之以退翳之藥而能自去也病久者

不能速効宜以歲月除之

腎分新久

新翳所生表散方東垣羌活除瞖湯有熱血虛者退雲丸之類是也

保治水瞖久不去者羚羊角散

羚羊角 升麻 細辛各等分 甘草半錢

右為末一半煉蜜為丸每服五七丸用一半為散以

泔水煎吞丸子食後

煖發陷翳亦羚羊角散之類用之在人消息若陰虛有熱者兼服神仙退雲丸

陰盛陽虛當先補其陽後瀉其陰

垣補陽湯治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通令青白翳見於大眥乃足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此當先補其陽後於足

太陽少陰標中瀉足厥陰肝經陰火乃次治也內經曰陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯臨臥服瀉陰丸若天色變大寒大風并大勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不得服候體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利空竅於眼目矣

羌活

獨活

當歸身

去蘆頭用稍
截酒洗焙乾

甘草梢

熟地黃

人參

去蘆

黃芪

白木

已上各一兩

澤瀉

陳皮

去白各一兩

生地黃

炒二錢

白茯苓

去皮

知母

炒黃色各五錢

柴胡

去苗二兩

防風

去蘆半兩

白芍藥

半兩

肉桂

去皮一錢

右同為麤末每服半兩水二大盞煎至一盞去查溫服空心使藥力行盡方許食

連栢益陰丸

羌活

獨活

甘草根

炒

當歸身

依前製

防風

五味子

各半兩

黃連

酒洗或伴劉炒火色一兩

石決明

燒存性五錢

草決明

黃芩

黃栢

知母

各一兩

右為細末煉蜜丸如棗荳大每服五十丸漸加百丸止臨臥清茶送下常以助陽湯多服少服此藥以此藥一則妨飲食二則力大如升陽湯不可多服

升陽泄陰丸

羌活

獨活

甘草根

歸身

熟地

人參

黃芪

白木

各半兩

瀉澤

白芍藥

陳皮

白茯苓

防風

肉桂

生地

知母

酒炒三錢如大

暑加

楮實酒拌

柴胡去苗一錢半

右吹咀每服五錢水煎熱服另合一料煉蜜丸如桐子大食遠茶清送下五十九每日與前藥各一服不可飽服如天氣熱甚加五味子三錢或半兩天門冬去心半兩枳實亦加半兩

右上一三方合治一病空心補陽湯臨臥連栢丸食遠升陽泄陰丸

滋陰地黃丸治內障兼右目小背青白翳瞳子散大內障丹丈夫因勞力後兩眼上星右邊獨昏此熱傷血

白朮

歸身尾

生地

木通

黃連酒浸

黃芩炒

黃栢炒各二兩

甘草灸一錢

分三貼煎服大熱加白芍藥

醫從下而上諸方瀉青之類並見表裏上條○翳除盡至期年月

醫除至期復發者有積雜方

日期復發者或間一月或二月一發皆為積治如脈滑者宜溫白丸加黃連草龍膽如東垣五積法服之百點膏張濟民眼翳以至遮瞳人視物不明如覺雲氣遮障以此方治之

黃連

二錢以水一碗煎至半碗再入後藥

當歸六分

甘草根六分

防風根

八分

麩仁去皮尖三分

右剉如麻荳大麩仁另研如泥同熬滴入水中不散去查沫入好蜜少許再煎少時為度極要病人心淨點之點至目微痛為度一日點五七次臨臥點尤妙名曰百點膏但欲多點使藥力相續

羌活退翳膏治足太陽寒水膜遮左睛白翳上視物不明

椒樹

東南根西北根各二兩

麻黃

去節根三分

羌活七分

黃連

三分

歸身六分

防風

三分

柴胡三分

生甘草四分

升麻三分

生地黄三分

漢防已二分

麩仁六分

藁本二分

右淨水一碗先煎漢防已黃連生甘草當歸身生地黄煎至一盞入餘藥再煎至一盞去查入銀磁器內熬稀膏點之有力為度

退翳膏子治黑白翳

荆芥穗錢一

黃連錢三

生地黄錢一

甘草錢五

歸身錢六

連翹錢四

柴胡錢五

升麻錢三

防風錢四

麩仁錢三

青皮錢四

細辛錢一

右先用水半盞浸荆芥一處次將黃連生地黄甘草三味用水一大碗煎至半碗再下餘七味同煎至一盞去查更上火熬至半盞入荆芥水二匙入蜜少許再煎令勻點之神效

圓明膏治內障生翳及瞳子散大皆勞心過度飲食失節

柴胡去苗 錢五

麻黃去節 錢五

歸身錢三

生地黄兩半

黃連去鬚 錢五

甘草錢二

訶子皮濕帛裏 錢二

右七味先以水二碗熬麻黃至一碗去沫外六味各咬咀如荳大篩去沫子秤入內同煎滴水中不散去查沫入蜜少許再熬點之

右點方四皆東垣先生所製乃隨證立法非如泛常通用之方如瞳子散大用訶子收之之類也

保金絲膏點眼

生薑取汁 兩四

白蜜煉去沫 一斤

猥猪膽汁錢三

黃連四兩 碎用水

右先煎黃連水後入薑汁次入蜜同煎去沫淨入下項

腦子

礪砂

熊膽各四錢

射香

青鹽各三錢 輕粉少許 鵬砂二錢

右研細攪勻同煎令稀膏用之

羅金露膏

麩仁棗碎 黃丹各一兩 黃連半兩 蜜六兩

右件先將黃丹入鍋中炒黃至紫入蜜攪勻下長流水四升以嫩柳枝頭七莖把定攪之次下麩仁候滾十數沸又下黃連用柳枝不住手攪熬至二升置籬內傾藥在紙上慢慢滴之無令塵污如有瘀血加礶砂一錢上火煨開入前膏子內用

夜光丸治赤眼翳目昏花

宣黃連 訶子去核各二兩 當歸一兩 銅綠一錢

右咬咀用河水三升同浸兩晝夜入銀磁器熬取汁再入文武火熬槐柳枝攪滴水成珠為度

猴猪胰子二箇先去脂以水洗換水無度令淨入黃連膏內煮黑色取出用之

蘆甘石一兩童便一碗燒紅焯盡為度 黃連四兩河水浸去查焯乾研細用

青鹽六兩細研 蜜一斤澄去查蠟 梨十枚去皮核絞取汁

右將梨汁甘石入膏子內熬五七沸次入青鹽用槐柳枝攪褐色傾入磁瓮冷水內拔去火毒臘月合為妙正月十一月次之餘月皆不可

濟蟾光膏治遠年目病不通道路去翳膜須用臘月成開日合

白沙蜜四兩色白者炒隔年蔥一枝去鬚皮短切與蜜一同熬去白膜觀蔥軟熟為度以綿纏滓

放定用紙收取蠟面 黃丹三錢水飛生用 蜜陀僧三錢水飛生用

蘆甘石煨過五錢淨水飛入前蜜中用桃柗各一枝攪勻放下 杏仁已上三味研極細湯炮去皮尖已

當歸 赤芍藥 秦皮

黃連去蘆頭淨二兩 川芎半兩 訶子皮

防風

石膏

玄精石

井泉石

無名異

玄參

代赭石

石決明

味各三錢咬阻或雪水或長流河水五升銀磁器內
熬至二升總去渣淨再熬至一升將十五味藥水傾
入前放下藥蜜一同慢火燉藥紫
金色時再添入後藥勿令火急

沒藥

琥珀

硃砂

麩仁

已上五味各三錢前四味先研爛後入麩仁水飛一同

研細澄有渣冉水飛研清冉水飛方傾入前紫金藥內

一同復熬一二沸以藥滴於水中不散為度大抵勿令

過與不及取下土中埋七日取出置銀器中如法收貯

再添入後細藥傾入藥時亦用桃柳枝攪勻

南鵬砂

珍珠

龍腦

珊瑚枝

錢

麝香

右件五味研極細亦以桃柳枝攪勻傾入前藥中復攪

勻然後以帛封器盒口旋取用如有取不盡藥用淨水

斟酌洗碗却將碗藥水熬三五沸另行收拾或洗眼或

膏子藥稠了時傾入些少調解

右用桑柴燒共計二十九味

疔療目熱生膚赤白膜取雀屎細直者人乳和付目上消

爛盡○烏賊骨主目中一切浮翳細研和蜜點之又骨末

治目中熱有效

丹治眼翳擣白皮索為繩日乾燒為灰研細點之自漸退

妙○又方猪膽皮去汁撚為繩燒灰點之亦妙

東碧雲散治外障搗藥

麻黃根

歸身

乳香

麝香

右將當歸麻黃為麈末炒黑色入乳射研極細噲化搗

入鼻中

摘鼻

薄荷三錢

石膏一錢

芒硝

川芎各等分

細辛二錢

蔓荊子三錢

青黛一錢

右為末鼻內搐之

丹楊生娘患赤眼生膜似白星

秦皮

滑石

黃連

荊芥

歸頭

赤芍藥各三錢

右分四貼煎洗仍教其莫洗浴止可洗脚

治法以鵝翎截之近黑睛及當白睛啣之膜自聚上以

針鈎挽之割去即見物以綿當眼着血斷三日瘥

東垣醫魏邦彥夫人目翳暴生從下而起其色綠腫痛不

可忍先師曰翳從下而上病從陽明是也綠非五方之正

色殆肺腎合為病邪乃就畫家以墨臚粉合成色諦視之

與翳同色肺腎為病無疑矣乃瀉肺腎之邪而入陽明之

藥為之使既效而他日病復作者三其所從來之經與翳

色各異乃以意消息之曰諸脈皆屬於目脈病則從之此

必經絡不調則目病未已也問之果然因視所不調者治

之病遂不作

針灸外障並見目赤門

內障

在睛裏昏暗與不患之眼相似唯瞳人裏有隱隱青白者

無隱隱青白者亦有之

氣虛則
目暴無

丹一老人病且暴不見物它無所苦起坐飲食如故予曰

太虛急煎人參膏二斤服二日目方見一醫與青礞石藥

予曰今夜死矣不悟此病得之氣大虛今不救其虛而反

用礞石不出此夜必死果至夜半死○一男子四十餘歲

形實平生好飲熱酒忽目盲脈澹此因熱酒所傷胃氣汚濁之血死在其中而然也遂以蘇木作湯調人參膏飲之服二日鼻內兩手掌皆紫黑予曰此病退矣滯血行矣以四物加蘇木桃仁紅花陳皮煎調人參末服數日而愈○一男子五十五歲九月間早起忽開眼無光視物不見急就睡片時却能見人物竟不能辨其何人何物飲食減平時之半神思極倦脈之緩大四至之上重按則散而無力予作受濕治詢之果因臥濕地半箇月得此証遂以白朮爲君黃芪茯苓陳皮爲臣附子爲佐十餘貼而安

右三方治目不明皆爲氣脫而用參朮追回者也經云上焦開發宜五穀味薰膚充身澤毛若霧露之漑是謂氣脫者目不明卽其證也

人參補胃湯治勞役飲食不節內障眼病此方神效

黃芪根

兩一

人參

兩一

甘草

錢八

蔓荊子

錢二

白芍藥

錢三

黃栢

三錢酒焯四次

右咬咀每服三四錢水一大盞煎至一盞去渣稍熱服臨臥三五服兩目廣大視物如常惟覺兩脚踏地不知高下蓋火伏升發故也病減住服七日再服此藥宜春間服之

益氣聰明湯治飲食不節勞傷形體脾胃不足內障耳鳴或多年視物昏暗令目廣大久服無內障耳鳴耳聾之患又令精神倍常飲食增倍身輕體健耳目聰明

黃芪

兩半

甘草

錢六

人參

兩半

升麻

錢三

葛根

錢三

蔓荊子

錢一

白芍藥

錢一

黃栢

一錢酒洗四次

炒黃

右咬咀秤二錢水二鍾煎至一鍾去渣熱服臨臥服五

更再煎服之得睡更妙如煩亂或有熱春月漸加黃栢夏月倍之如脾胃弱去之熱減亦少用但有熱或麻木或上壅頭目三兩服後其熱皆除又治老人腰以下沉重疼痛此藥久服治人上重反有精神兩足輕浮不知高下空心服之或少加黃栢輕浮自减小兒減服多則壅滯若治倒捷去黃栢芍藥忌煙火酸物

圓明內障升麻湯治內障得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛為此疾劉舜卿因南征飲食失節形體勞役心不得休息眼疾復作今擬此方服之効

柴胡根七錢

羌活根一兩半

防風根半兩

白朮

甘草灸

歸根酒洗

升麻根各一兩

白芍六錢

乾薑一錢

五味子二錢

人參

葛根

黃芪各一兩

白茯苓三錢

右咬咀每服五六錢水三大盞煎至二盞入黃芩黃連湯二錢同煎數沸去查煎至一盞食後熱服

黃芩黃連湯

一方有升麻五錢柴胡一兩

黃芩酒洗炒

黃連去鬚酒洗炒七錢

草龍膽一兩酒洗炒四次

生地一兩酒洗

右咬咀每服二錢入水二盞煎數沸去查再煎至一盞熱服午後晚間俱不可服唯午飯時服之方効

復明散治內障

黃芪半錢

川芎五分

柴胡

連翹

甘草灸各一錢

歸身二錢

蒼朮五分

生地一錢

陳皮五分

黃栢三分

右劉如麻荳大每作一服水二大盞煎至一盞去查稍熱服食後忌酒濕麪辛熱大料之物

右四方治目不明皆氣虛而未脫故可與參芪中微加
連栢若氣既脫則黃栢等涼劑不可施經云陽氣者煩
勞則張精絕目盲不可以視耳閉不可以聽之類是其
證也

血虛則
睛散大
視物花

內障瞳子散大論并方

腎主骨之精為瞳子散大者因腎
水虛骨枯而心包絡之火得以乘

之也○凡心包絡之脈出於心中代心君行事也與少陽為
表裏瞳子散大者少陰心之脈挾日系厥陰肝之脈連目
系心主火肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦宜酸宜
涼大忌辛辣熱物是瀉木火之邪也飲食中常知此理可
也以諸辛主散熱則助火故不可食諸酸主收心氣瀉木
火也諸苦瀉火熱則益水也尤忌食冷水大寒之物此物
能損胃氣胃氣不行則元氣不生元氣不生緣胃氣下陷
胃中三焦之火及心火乘於肺上入胃灼髓火主散益瞳

子之散大者以此大熱之物直助火邪尤為不可食也藥
中去茺蔚子以味辛及主益肝是助火也故去之加黃芩
半兩黃連三錢黃連瀉中焦之火黃芩瀉上焦肺火以酒
洗之乃寒因熱用也亦不可用青箱子為助陽火也更加
五味子三錢以收瞳人之散大也且火之與氣勢不兩立
故經曰壯火食氣氣食少火少火生氣壯火散氣諸酸物
能助元氣孫真人云五月常服五味子助五臟氣以補西
方肺金又經云以酸補之以辛瀉之則辛瀉氣明矣或曰
藥中有當歸其味亦辛其而不去何也此一味辛甘者以
其和血之聖藥也况有甘味又欲以為鄉導為諸藥之使
故不去也

熟地黃丸治血弱氣虛不能養心致火旺於陰分瞳子散
大少陰為火君主無為不行其令相火代之與心包絡之

脈出心系分爲三道少陽相火之體無形其用在其中矣
火盛則能令母實乙木肝旺是也其心之脈挾目系肝之
脈連目系况手足少陽之脈同出耳中至耳上角斜起終
於目外小眥風熱之盛亦從此道來上攻頭目致偏頭腫
悶瞳子散大視物昏花血虛陰弱故也法當養血涼血益
血收火散火而除風熱則愈矣

熟地兩一

歸身酒洗五錢

柴胡去苗八錢

天門冬去心焙三錢

錢

人參去蘆二錢

甘草炙二錢

地骨皮三錢

黃芩兩半

枳殼炒二錢

五味子三錢

生地黄七錢半酒

浸

黃連三錢

右爲細末煉蜜丸如菉荳大每服一百丸茶湯送下食
後日二服制之緩也大忌辛辣物而助火邪及食寒冷
物損其胃氣藥不上行也又一論云瞳子黑眼法於陰

由食辛熱之物助火乘於胷中其睛故散睛散則視物
亦大也

益陰腎氣丸 此壯水之主以鎮陽光也

山茱萸

取皮一兩 茯苓二錢半

五味

熟地二兩

乾山藥

錢五 澤瀉二錢半

牡丹皮

生地酒洗焙乾一兩

歸稍

酒洗五錢

右爲細末煉蜜丸如桐子大硃砂爲衣每服五七十九
淡鹽湯送下

滋陰地黃丸治內障右眼小眥青白翳大眥亦微顯白翳
腦痛瞳子散大上熱惡熱大便澀後痞難小便如常遇熱
煖處頭疼暗脹能食日沒後天陰暗則昏此症可服熟地
黃丸翳在大眥加葛根升麻翳在小眥加柴胡羌活

熟地八錢

生地酒洗半兩

歸身酒洗半兩

知母酒洗炒三錢

丹參

兩半

黃栢

酒浸焙
兩半

芍藥

三兩

防已

酒洗焙
二錢

羌蔚子

兩半

牡丹皮

三錢

寒水石

一錢
生用

柴胡

兩半

黑附

錢一

川芎

錢二

右為細末煉蜜丸如小荳大空心五十九白湯下如宿食未消候飢時服之餌後忌言語隨後食壓之

保當歸湯治翳補益瞳子散大

歸身

黃芩

各錢

黃連

地黃

各錢三

柴胡

錢一

芍藥

錢二

甘草

各錢三

右水煎臨臥服

羅甘菊花丸治男子腎臟虛弱眼目昏暗或見黑花常服明目煖水臟活血駐顏壯筋骨

甘菊花

去土
兩二

枸杞

兩四

熟地

兩三

乾山藥

兩半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九空心食後

各一服溫水下

瑞竹四神丸治腎經虛損眼目昏花補虛益損及兩眼雲翳遮睛

甘州枸杞

一斤
揀去白醜青燒者

一味分作四分一
兩四錢用乳

香茴香各一兩炒

一兩四錢用芝蔴一
盞將枸杞淘過

合炒炒時先用好酒

一盞將枸杞淘過

右件炒過將川椒等四味篩去不用止用枸杞子加熟地白朮茯苓各一兩同為細末煉蜜為丸如桐子大每服五七十九空心溫酒送下加甘菊一兩尤妙

右地黃枸杞補腎例按瞳子散大不當用羌蔚川芎附子今東垣滋陰地黃丸兼用者蓋有外障大小皆之腎

故也

保柴胡散明目益腎水

柴胡

羌活

防風

生地

芍藥

甘草各等分

右為麤末水煎臨臥服

脾受邪者血病

東垣云肝木旺則火之勝無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或病目而生內障者脾暴血胃主血心主脈脈者血

之腑也或曰心主血又云脈主血肝之竅開於目也治法亦前

熱地黃丸之類是也

氣血虧者目昧

河目昧不明熱也然玄腑者無物不有人之臟腑皮毛肌

肉筋膜骨髓牙爪至於世之萬物盡皆有之乃氣出入升

降之道路門戶也人之眼耳鼻舌身意神識能為用者皆

升降出入之通利也有所閉塞者不能為用也若目無所

見耳無所聞鼻不聞臭舌不知味筋痿骨痺爪退齒腐毛

髮墮落皮膚不仁腸胃不能滲泄者悉由熱氣怫鬱玄腑

閉密而致氣液血脈榮衛精神不能升降出入故也各隨

鬱結微甚而為病之輕重故知熱鬱於目則無所見也故目微昏者至近則轉難辨物由目之玄腑閉小如隔簾視物之象也或視如蠅翼者玄腑有所閉合者也或目昏而見黑花者由熱氣甚而發之於目亢則害承乃制而反出其泣氣液眯之以其至近故雖微而亦見如黑花也

誠哉河間斯言也目盲耳聾鼻不聞臭舌不知味手足

不能運用者皆由其玄腑閉塞而神氣出入升降之道

路不通利故先賢治目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連

等藥入肝解肝中諸鬱蓋肝主目肝中鬱解則目之玄

腑通利而明矣故黃連之類解鬱熱也椒目之類解濕

熱也芫蔚之類解氣鬱也芎歸之類解血鬱也木賊之

類解積鬱也羌活之類解經鬱也磁石之類解頭鬱墜

邪氣使下降也蔓菁下氣通中理亦同也凡此諸劑皆

治氣血鬱結目昏之法而河間之言信不誣矣至於東垣丹溪治目昏用參芪補血氣亦能明者又必有說通之蓋目主氣血盛則玄腑得利出入升降而明虛則玄腑無以出入升降而昏此則必用參芪四物等劑助氣血運行而明也

羊肝丸三方又散一方並見肝條治肝中諸鬱目昏如神本治久年眼生黑花不明者

椒目炒一兩 蒼朮炒二兩

右件為末醋糊丸如桐子大每服二十九醋茶送下不過十日取效丹溪云椒目行參道不行也

外補肝散治三十年失明蒺藜子七月七日收陰乾搗散飲食後水服方寸七

崔但瞳子不壞者療十得九愈蔓菁子六升蒸之看氣遍

用甌下釜中熱湯淋暴乾還淋如是三遍即取杵篩為末食上清酒調二錢送下日再服本草云蔓菁子下氣利五臟又利大便通中益氣經治虛勞目暗味三月蔓菁花陰乾為末以井花水空心調下二錢七久服長生

世五福還瞳丹治目白翳赤石脂川椒二味同炒辰砂茯神乳香束肉為丸如桐子大空心溫酒下百九十服見效

內障取
足厥陰
太陽手
少陰

按內障先患一目次第相引兩目俱損者皆有翳在黑睛內遮瞳子而然今詳通黑睛之脈者目系也目系屬足厥陰足太陽手少陰三經蓋此三經臟腑中虛則邪乘虛入經中鬱結從目系入黑睛內為翳龍木論所謂腦脂流下作翳者即足太陽之邪也所謂肝氣衝上成翳者即足厥陰之邪也故治法以針言之則當取三經之腧穴如天柱風府太衝通里等穴是也其有手巧心

審諦者能用針於黑眼裏撥其翳為効尤捷也以藥言之則當補中疎通此三經之鬱結使邪不入目系而愈今集龍木論并方于後

龍木論羚羊角飲子治圓翳內障不痛不痒

羚羊角三兩 細辛 知母 車前子

人參 黃芩各二兩 防風二兩半

右為末每一錢以水一盞煎至五分食後去渣溫服之

補肝散治肝風內障不痛不痒眼見花發黃白黑赤或一

物二形

羚羊角 防風各三兩 羌活 車前子一兩

人參 茯苓各二兩 細辛 玄參

黃芩炒各一兩

右為末食後調服一錢米飲湯下

羚羊角散治綠風內障頭旋目痛眼內痛澁者

羚羊角 防風 知母 人參

茯苓各一兩 玄參 黃芩 桔梗各一兩

細辛三兩 車前子一兩

右為末以水一盞散一錢煎五分食後去渣溫服

羚羊角湯治青風內障勞倦加昏重頭旋腦痛眼內痛澁者

羚羊角 人參 玄參 地骨皮

羌活各一兩 車前子一兩半

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去渣溫服

右四方皆羚羊角玄參細辛羌活防風車前子為君蓋

羚羊角行厥陰經藥也丹溪云羚羊角入厥陰經甚捷

是也玄參細辛行少陰經藥也海藏云玄參治空中氣

血之氣無根之火為聖藥也羌活防風車前子行太陽
經藥也如筋脈枯澁者諸方中更加夏枯草能散結氣
有補養厥陰血脈之功嘗試之有驗然此諸方又當悟
邪之所在若氣脫者必與參膏相半服之氣虛者必與
東垣補胃人參湯益氣聰明湯之類相半服之血虛者
必與熟地黃丸之類相兼服之更能內觀靜守不干塵
累使陰氣平伏方許作效

肝中熱

蘆薈丸黑水凝翳內障不痛不痒微有頭旋脈瀆者

蘆薈

甘草各一分

人參

牛膽各半兩

栝子仁

細辛各一分

羚羊角

二兩蜜炙

右為末煉蜜為丸如桐子大空心茶下十九

障翳丸治偃月翳束花翳等病微有頭旋額痛者

青羊膽

青魚膽

鯉魚膽

各七箇熊膽一分

牛膽半兩

麝香少許

石決明

右為末麪糊丸如桐子大空心茶下十九

除風湯治五風變成內障頭旋偏腫痛瞳人結白者

羚羊角

車前子

芍藥

人參

茯苓

大黃

黃芩

芒硝各一兩

右為末水一盞散一錢煎至五分食後去渣溫服

磁石丸治雷風內障頭旋惡心嘔吐

磁石

燒赤醋

五味子

牡丹皮

乾薑

玄參

各一兩

附子炮半兩

右為末煉蜜丸如桐子大食前茶下十九

本治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異用黃連末一兩

白羊肝一具去膜同於砂盆內研令極細象手撚為丸如

桐子大每服以溫水下三十九連作五劑但是諸眼目疾

及障翳青盲皆治忌猪肉冷水唐崔承元為官治一死囚
出活之後數年以病且致死一日崔為內障所苦喪明逾
年後半夜獨坐自歎忽聞塔除窸窣之聲崔問是誰徐曰
昔年蒙恩活囚也今來報恩遂將此方告訖而沒依此合
服不數月眼復得明

又方治內障

白羯羊肝

只用于肝一片薄切新瓦上焙熟地半兩

兔絲子

蕤仁

車前子

麥門冬

地膚子

去殼

澤瀉

防風

黃芩

白茯苓

五味子

桂心

杏仁炒

細辛

枸杞子

羌蔚子

苦苧蘆

青葙子

各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四丸溫水下日
三服不拘時候張臺卿嘗苦目暗京師醫者令灸肝俞

遂轉不見物因得此方眼目遂明一男子內障醫治無
效因以餘劑遺之一夕燈下語其家曰適偶有所見如
隔門縫見火者及旦視之眼中醫膜俱裂如線張云此
藥靈勿妄與人忽之則無驗予益信之且欲廣其傳也
經云肝虛則目眈眈無所見耳汨汨無所聞善恐如人將
捕之狀海藏云目瞑肝氣不治也

肝氣虛

又鎮肝明目羊肝丸

羯羊肝

一具新瓦盆中燂了更焙之肝大止用一半

甘菊

羌活

栝子仁

細辛

官桂

白朮

五味子

各半兩黃連三分

右為細末煉蜜丸如桐子大空心食前溫水下三四十
丸

千補肝散治目失明方

青羊肝一具去膜薄切之以新瓦瓶子未用者入肝於中炭火炙之為極細末

蓼子一合熬令香

右為末食後服方寸七日二加至三七不過一二劑能一歲服可夜讀細書

治目眵眵無所見方用青羊肝一具細切以水一斗銅器中煮以麪餅覆上上鑽兩孔如人眼大以日向就薰不過再薰即瘥

肝血不足 濟養肝丸治肝血不足眼目昏花或生眵淚

當歸酒洗

車前子酒蒸

防風去蘆

白芍藥

麩仁另研

熟地酒蒸

川芎

枳實各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九熟水送下不拘時

本素問云久視傷血血主肝故勤書則傷肝主目昏肝傷

則自生風熱氣上騰致目昏亦不可專服補藥但服益血

鎮肝明目藥自愈

熟地黃丸

熟地一兩半

黃連

決明子各一兩

沒藥半兩

甘菊花二兩

防風

羌活各一兩

桂心五錢

硃砂五錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九熟水下食後

日三服

膽熱

千明目髮不白落方用牛膽浸槐子陰乾百日食後每日吞一枚十日身輕三十日白髮再黑百日通神

膽移熱於腦則辛頰鼻淵傳為衄鱗瞑目全文見診病傳變

腎虛

經云腎足少陰之脈是動則病坐而欲起目眵眵如無所見○又云少陰所謂起則目眵眵無所見者陰內奪故目

左腎陰虛

眩暈無所見也此蓋房勞目昏也

治瞳子散大諸方並見前陰虛睛散大視物花條

東益本滋腎丸必與前陰虛睛散大條相兼服

黃栢去皮挫碎酒洗炒

知母去毛挫碎酒洗炒各等分

右為極細末滴水丸如桐子大每服一百五十九熱湯送下空心服服後以乾物壓之

右腎陽虛

濟補腎丸治腎氣不足眼目昏暗瞳人不明漸生內障

磁石煨醋焯七次水飛過

兔絲子酒蒸二次各二兩

五味子

熟地酒蒸焙

枸杞子

楮實子

覆盆子酒浸

肉蓯蓉酒浸焙

車前子酒蒸

石斛去根各一兩

沉香

青鹽二味另研各半兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九空心鹽湯下

補腎雜方

千神麴丸主明目百歲可讀細書

神麴四兩

磁石煨醋焯七次一兩

光明砂水飛一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服五丸米飲下食前日三服常服益眼力此方神驗不可且述

外治積年目失明不識人决明子二升杵散食後以粥飲服方寸匕本草云决明子微寒助肝氣益精水

千白瓜子七升絹袋盛攪沸湯中三偏暴乾以酢五升湯一宿暴乾為末酒調方寸匕服日三服之至百日可夜讀

書本草云白瓜子平寒外臺名補肝散主五勞七傷酢酸入肝

運氣目昏有四

一曰風熱經云少陰司天之政風熱參政雲物沸騰太陰橫流寒乃時至往復之作民病聾瞑此風熱參布目昏也二曰熱經云少陰在泉熱淫所勝病目瞑治以鹹寒此熱勝目昏也

三曰風又云歲水不及濕乃大行復則大風暴發目視眊眊此風勝目昏也

四曰燥經云陽明司天燥淫所勝目昧眚瘍治以苦熱是也

本讀書之苦傷肝損目誠然晉范甯嘗苦目痛就張湛求方湛戲曰古方宋陽子少得其術以授魯東門伯次授左丘明遂世世相傳以及漢杜子夏晉左太冲凡此諸賢並有眼目疾此方用損讀書一減思慮二專內視三簡外觀四宜起晚五宜早眠六凡六物燉神火下以氣簇蘊於胸中七日然後納諸方寸修之一年近能數其目睫遠視尺筮之餘長服不已洞見墻壁之外非但明目乃亦延年審如是而行非可謂嘲戲亦奇方也

羅省郎中張子敬年六十七歲病眼目昏暗微黑色皮膚

不澤六脈弦細而無力一日出示治目二方問予可服否予曰此藥以黃連太苦之藥爲君諸風藥爲使且人年五十膽汁減而目不明內經云土位之主其瀉以苦瀉風藥亦能瀉土年六十脾胃虛而皮肉枯重瀉其土使脾胃虛而不能營運榮衛之氣滋養元氣胃氣不能上行膈氣吐食諸病生矣又况年高衰弱此藥不可服只宜慎言語節飲食懲忿窒慾此不治之治也子敬以爲然明年春除關西路按察司三年致仕還精神清勝脈遂平和此不服寒涼之劑也內經云誅伐無過是謂大惑解之可也

靈黃帝曰人之哀而涕泣者何氣使然岐伯曰心者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故涕泣出焉液者所

以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣泣不止則液竭
液竭則精不灌精不灌則目無所見矣故命曰奪精補天
柱經俠頸俠頸謂頸中分也

針灸

針灸內障有四法此篇是其一也

其二取肝經曰肝虛則目眈眈無所見善恐取其經厥陰
與少陰取血者是也

其三取腎經云腎是少陰之脈是動則病目眈眈無所見
視寒熱虛實取之也

其四取陽蹻經云邪之所在皆為不足上氣不足目為之
瞑補足外踝下留之是也

玉眼久病昏花 肝膈一分沿皮向外一寸半補三呼 三里一寸瀉

童子窳

子和戴人女僮至西華目急暴盲不見物戴人曰此相火

也太陽陽明氣血俱盛乃刺其鼻中攢竹穴與項前五穴
大出血目立明

甲青盲遠視不明承光主之○瞳子癢遠視昏眈眈夜無
見目潤動與項口相參引啞噤口不能言刺承泣 目瞑
身汗出承漿主之

撮要眼無光○商陽一分沿皮向後三分瀉之

甲青盲商陽主之○瞳目眈眈偏歷主之○瞳目眈
眈少氣灸手五里左取右右取左○目瞑遠視眈眈目窳
主之○青盲瞳目惡風寒上關主之

金針開
內障法
龍木論內障根源歌

不疼不痛漸昏濛 薄霧輕烟漸漸濃

或見蛇飛花亂出 或如絲絮在虛空

此般狀樣因何得 肝臟停留熱與風

大叫大啼驚與恐 腦脂流入黑睛中
初時一眼先昏暗 次第相牽與一全
苦口何須陳逆耳 只緣肝氣不相通
此時服藥宜銷定 將息多垂卽沒功
日久旣應全黑暗 時名內障障雙瞳
名字隨形分十六 龍師聖者會推窮
靈藥這回難得效 金針一撥日當空
強脩將息依前說 莫遣依前病復踪

針內障眼法歌

內障由來十六般 學醫人子審須看
分明一一知形狀 下針方可得安然
若將針法同圓翳 誤損神光取瘥難
冷熱光明虛與實 調和四體待令安

不然氣悶違將息 嘔逆勞神翳却翻
咳嗽震頭皆未得 多驚先服鎮心丸
若求涼藥銀膏等 用意臨時體候看
老翳細針初復嫩 針形不可一般般
病虛新產懷娠月 下手纔知將息難
不雨不風兼皓月 清齋三日在針前
安心定意行醫道 念佛親姻莫雜喧
患者向明盤膝坐 提撕腰帶得心安
針者但行賢哲路 惻隱之情實善緣
有血莫驚須住手 裹封如舊再開看
忽然驚振醫重卜 服藥三旬見朗然
七日解封難見日 花生水動莫它言
還睛丸散堅心服 百日分明復舊根

針內障後法歌

內障金針針了時	醫師言語要深知
綿包黑豆如毬子	眼上安排日係之
臥眠頭枕須安穩	仰臥三朝莫厭遲
封後忽然微有痛	腦風牽動莫它疑
或針或絡依經法	痛極仍將火慰之
擬吐白梅含咽汁	吐來仰臥却從伊
起則恐因遭努損	雖然希有也須知
七朝豉粥溫溫食	震着牙開事不宜
大小便時須緩緩	無令自起與扶持
高聲叫喚言多後	驚動睛輪見雪飛
如此志心三十日	漸行出入認親知
狂心莫憶陰陽事	夫婦分牀百日期

一月不須臨洗面 針痕濕着痛微微
 五腥酒麪周年斷 服藥平除病本三
 右龍木論金針開內障大法謹按其法初患眼內障之
 時其眼不痛不澁不痒頭不旋不痛而翳狀已結成者
 宜金針撥去其翳如撥雲見日而光明也今具其畧于
 後

開內障圖

圓翳初患時見蠅飛花發垂蟻薄烟輕霧先患一眼次第
 相索俱圓翳如油點浮水中陽看則小陰看則大金
 針一撥 ○滑翳翳如水銀珠 ○游翳翳如凝脂色 ○浮翳
 即去 藏形睛之深處細看 ○橫翳橫如劍脊兩邊薄中央厚宜
 方見宜針深撥之 ○翳皆先患一目向後俱損初患之時其眼痛澁頭旋額痛
 雖有翳狀亦難針撥獨偃月翳束花翳黑水凝翳微有頭
 旋額痛者宜 ○水翳初患時頭旋額痛者眼臉骨鼻頰骨
 針輕撥之 ○東堅白宜于所過經脈針其俞 ○偃月翳初患時微嫩頭
 穴忌出血宜針撥動不宜強撥

目次第相牽俱損翳一半厚
一半薄宜針先從厚處撥之
○東花翳
初患時微有頭旋眼滿眼中時時痒

痛先患一眼向後俱翳週迴如錐齒輕輕
撥去莫留短脈兼于所過之經針灸其臉
○散翳
翳如酥點乍青

乍白宜
針撥之
○黑水凝翳
初患時頭旋眼滿見花黃黑
○驚振
頭腦被打築惡血流入眼內至二三年成翳翳

雖不痛不痒其翳黃色紅色者不宜針撥翳狀破散者不

宜針撥中心濃重者不宜針撥撥之不動者曰死翳忌撥

獨白翳黃心宜先服藥後針之若無翳者名曰風亦不宜

針

白翳黃心
翳四邊白中心黃者先服逐翳散次針足經所

○烏風
無翳但瞳人小三五年內結成翳青白色
○肝風
無翳眼前多見虛花或白或黑或赤或黃或

見一物二形二眼同患急宜補治切忌勞
○五風變
初患時頭旋額角

時頭旋額痛或一目先患或因
○綠風
初患時頭旋額角

嘔吐雙目俱暗瞳子白如霜
○黑風
初患時頭旋額角

鼻頰骨痛眼內痛溢先患一眼向
○青風
初患時微有痛溢頭

向後俱損無翳眼見黑花
○雷頭風變
初患時頭旋惡心嘔吐先患一

後俱損無翳
○雷頭風變
初患時頭旋惡心嘔吐先患一

勞倦加昏重
小凝脂
結白

能遠視不能近視 能近視不能遠視

陰虛不能近視

東能遠視不能近視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣

盛血虛氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣穀氣真氣

之賊也元氣之來也徐而和細細如線邪氣之來也緊而

強如巨川之水不可遏也

海目能遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎

東地芝丸治目不能近視能遠視及大厲風成癩悉皆治

之
生地焙四兩 天門冬去心四兩 枳殼炒二兩 甘菊花去皮二兩
右同為細末煉蜜丸如桐子大每服一百丸茶清送下

陽虛不能遠視

溫酒亦下食後六味地黃丸亦治此症
能近視不能遠視者陽氣不足陰氣有餘乃氣虛而血盛也血盛者陰火有餘也氣虛者元氣衰弱也此老人桑榆之象也

海目能近視責其有水不能遠視責其無火法宜補心

東定志丸出局方治眼不能遠視能近視者

遠志去苗心二兩 人參一兩 白茯苓去皮一兩 菖蒲二兩

右為末煉蜜九硃砂為衣每服十九丸加至二十九

雀目日落即不見物

濕痰 無蛤蚧丸治雀目日落不見物

蛤粉細研 黃蠟等分

右溶蠟搜粉為丸如東大每用猪肝一片二兩許批開裹藥一丸麻線纏入瓮內水一碗煮熟取出乘熱薰目

至溫吃肝以愈為度神效

千雀目方

地膚子五錢 決明子一升

右二味為末以米飲汁和丸食後服二十九至三十九日服至瘥止

世治雀目用蒼朮四兩米泔水浸一宿切作片焙乾為末每服三錢猪肝二兩批開糝藥在內用麻線繫定粟米一合水一碗砂鍋內煮熟熏眼候溫臨臥服之大効

聖治雀目眼不計時月用蒼朮一兩搗羅為末每服一錢不計候

針灸 心雀目不能夜視 神庭 上星 前頂 百會各出血

愈之立 又法 照海 肝俞

目淚不止

火氣燔
目淚出

素厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也夫一水不勝五火故目皆盲是以氣衝風泣下而不止夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燔目故見風則泣下也有以比之夫火疾風生乃能雨此之類也脈解精微論子和凡風衝淚出俗言作冷淚者非也風衝于內火發于外風熱相搏由是淚出內外皆治可愈治外以貝母一枚白膩者加胡椒七粒不犯銅鐵研細臨臥點之治內以當歸飲子服之

當歸

大黃

柴胡

人參

黃芩

甘草

芍藥

滑石

右切碎每服三錢至五錢水一盞生薑三片同煎七分去查溫服

肝為淚

全文見五臟

寒濕積滯淚出

垣水附木勢上為眼澁為眵為冷淚此皆由肺金之虛而肝木寡於畏也

孫英宗朝國婆婆患眼冷淚眼科醫官治二三年不能療上召孫孫至曰臣非眼科但有藥耳容進方用石決明一兩赤小豆一兩半半夏五錢生班猫二十一粒炒去頭足木賊五錢為末薑汁丸如桐子大每服二十九薑湯下方進聖旨下眼科詳定眼科醫官奏曰此方於眼科甚不相涉班猫有毒恐傷臟腑不敢用合再取聖旨國婆婆聞之曰眼科醫官不惟不能亦不愿使我治也但合此藥總傷無怨上聞之孫自進藥服經十餘日愈八分二十日全愈時眼科並降兩官孫賞錢三十萬銀海止淚方

蒼朮米泔浸一兩半木賊去節二兩香附子炒去毛

右為末煉糊丸如桐子大食後鹽湯下三九

汗多淚出者風寒入胃經云風氣與陽明入胃循脈而上至目內眥則寒中而泣出此中風寒淚出也

河當歸湯治風邪所傷寒中日淚自出肌瘦汗不止

當歸 人參各三兩 官桂一兩 乾薑炮

白朮 白茯苓 甘草 川芎

細辛 白芍藥各半兩 陳皮一兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八分去渣熱服不計時併三服

雅方本治頭風冷淚雁安常二方

甘菊 決明子各二錢 白朮 羌活

川芎 細辛 白芷 荆芥穗各半兩

右為細末每服一錢溫湯調下食後日三服

又方

川芎 甘菊 細辛 白朮

白芷已上各等分

右為末蠟丸如黍米大夜臥服一九日中一時辰換一丸

本治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵齒間緊急作頭痛川芎丸

川芎 柴胡各一兩 半夏 甘草炙

甘菊 人參 前胡 防風各半兩

右每服四錢水一盞生薑四片薄荷五葉同煎七分去渣溫服

靈五臟六腑心為之主耳為之聽目為之視肺為之相肝

為之榮脾為之衛腎為之主外故五臟六腑之津液盡上
滲于目心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則液上
溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故欬而泣出矣

丹婦人患眼眵不思食四物湯加白朮陳皮黃芩連翹分
六貼煎食前熱服 又灸合谷

肘治眼淚出不止用黃連濃漬綿乾拭目

山風淚眼九節黃連和槐樹皮灰麤末燉湯澄清頻洗

垣神効明目湯連翹飲子治淚不止 二方並見
倒捷拳毛

運氣

運氣淚出皆從風熱經曰厥陰司天之政三之氣天政布
風乃時舉民病泣出是也

針灸

集迎風冷淚眵瞶黑花 大骨空小骨空 如上法灸
之吹火滅 二
間 一分沿皮向後
刺五分灸之 合谷 針
灸

風沿爛眼

風熱

丹風沿眼系上膈有積熱自飲食中挾怒氣而成頑痰痞
塞濁氣不降清氣不上升由是火益熾而水益降積而久
也眼沿因膿漬而腫於中生細小虫絲逐年久不愈而多
痒者是也 用紫金膏以銀釵脚措去油膩點之試問若果
痒者又當去虫以絕根本蓋紫金膏止是去濕與去風涼
血而已若前所謂飲食挾怒成痰又須更與防風通聖散
去硝黃為細末以酒拌勻晒乾依法服之禁諸厚味及大
料物方盡諸法之要 紫金方未詳即蘭室秘藏
眼目門還睛紫金丹是也

防風通聖散 方見
綱

世蘆甘石散治爛風眼以蘆甘石不拘多少先用童便煨
七次次用黃連濃煎汁煨七次次用谷雨前茶清濃煎煨
七次又併三汁餘者一處再煨三次然後安放地上一宿
出火氣細細研入冰片射香點上神妙蘆甘石煨時須用

好紫銷炭極大者鑿一穴以安蘆甘石

丹治風沿爛眼二蚕沙用香油浸月餘重綿纏過點之愈
久愈妙

世紫金膏用水飛過號丹蜜多水少文武火熬以器貯點
之

保治眼赤瞎以青泥蛆淘淨晒乾末之仰臥合目用藥一
錢放眼上須臾藥行待少時去藥赤瞎自無

針灸

東垣目眶赤爛歲久俗呼赤瞎是也常以三稜針刺目外
以洩濕熱立愈

撮要風弦爛眼

大骨空

在手大指第二節尖灸九壯以口吹火滅

小骨空

在手小指二節尖灸七壯亦吹火滅

倒睫拳毛

陽虛

眼睫毛倒入眼中尖是也

垣神効明目湯治眼楞緊急致倒睫拳毛損目及上臉皆
赤爛睛亦疼痛昏暗目則冷淚長流夜則眼眇滿眼

葛根一錢半

甘草根二錢

防風根一錢

蔓荆子五分

細辛根三分

又一方加黃芪根一錢

右咬咀作一服水一盞八分煎至二盞去渣稍熱臨臥
服効

防風飲子治倒睫拳毛

黃連炒

甘草灸

人參各一錢

葛根

防風各五分

歸身一錢半

細辛葉

蔓荆子各三分

右剉如麻荳大都作一服水二大盞煎至一盞去渣温
服食後避風寒濕熱處眠之

神効黃芪湯治渾身麻木不仁及兩目緊急縮小羞明畏

日或隱澁難開或視物無力睛痛昏花手不得近或目少
睛光或目中熱如火服五六次神效

黃芪兩二 人參去蘆一兩 甘草兩一 蔓荊子錢二

白芍藥兩一 陳皮去白半兩

右吹咀每服四五錢水一盞八分煎至一盞去渣臨臥
稍熱服如小便淋澁加澤瀉五分如有大熱證加黃柏
三錢酒浸四次炒如麻木不仁雖有熱不用黃柏再加
黃芪一兩如眼縮小去芍藥忌酒醋濕麪大料物蔥韭
蒜及淡滲生冷硬物如麻木重甚者加芍藥一兩木通
一兩

撥雲湯戊申六月徐總官患眼疾於上眼皮下出黑白翳
二箇隱澁難開兩目緊急而無疼痛兩手寸脈細緊按之
洪大無力知足太陽膀胱為命門相火煎燉逆行作寒冰

翳及寒膜遮睛與下項一服神效外證呵欠善悲健忘嚏
噴時自淚下面赤而白能食不大便小便數而欠氣上而
喘

黃芪分七 細辛葉分五 柴胡分七 生薑

荆芥錢一 防風半錢 羌活半錢 藜蘆錢一

甘草稍一錢 升麻錢一 葛根分五 川芎分五

知母錢一 黃柏半錢 歸身錢一

右剉如麻荳大作一服水二大盞煎至一盞稍熱服

連翹飲子治目中溜火惡日與火隱澁小角偏緊久視昏
花迎風有淚

蔓荊子 甘草 連翹各三分 柴胡分二

酒黃芩分五 生地分三 防風分五 人參分三

黃芪分五 紅葵花分三 升麻錢一 歸身分三

羌活五分

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去查稍熱食後服
前一方便治倒睫拳毛後三方治眼楞緊急縮小眼楞緊
縮小者倒睫拳毛之漸也故以其方附於後蓋陽虛則
眼楞緊急陰虛則瞳子散大故東垣治眼楞緊急用參
芪補氣為君佐以辛味疎散之而忌芍藥五味子之類
酸收是也治瞳子散大用地黃補血為君佐以酸味收
斂之而忌芫薺子青箱子之類是也

治倒睫眼方以無名異末摻捲在帛中作撚子點着至藥
末處吹殺以烟薰之自起

本治倒睫爛弦

蠶沙兩

號丹五錢

右二味慢火熬成膏入輕粉五分熬黑色逐時湯泡洗

瑞青黛散治眼倒睫極效

蝟刺

束棘針

白芷

青黛

右各等分為細末左眼倒睫口噙水左鼻內搗之右眼
倒睫右鼻內搗之

山眼毛倒睫摘去拳毛用虱子血點入眼內數次即愈
垣眼生倒睫拳毛由目緊急皮縮之致也蓋內伏熱攻陰
氣外行當去其內熱并火邪使眼皮緩則眼毛立出翳膜
亦退用手法攀出內臉向外刺以三稜針針出熱血以左
瓜甲迎住針縫立愈

努肉攀睛

羅還睛散治眼翳膜昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎

草龍膽

草決明

石決明

荆芥

枳實

野菊花

野麻子

熱

白茯苓皮去

甘草炙

木賊

白蒺藜

川椒炒去子

仙靈脾

茵陳已上各半兩

右為細末每服二錢食後茶清調下一日三服忌雜魚肉及熱麪蕎麥等物一方有楮實子無仙靈脾茵陳枳殼三味

圖治卒患赤目努肉生內痛者取好梨一箇搗絞汁黃連三枚碎之以綿裹漬令色變仰臥注目中

外主目翳及努肉用礬石最白者納一黍米於翳上及努肉上即冷淚出綿拭之令惡汁盡其疾日減翳自消薄便瘥礬石須真白者方效

干治目中生息肉翳滿目閉瞳子及生珠管方

貝齒七枚燒為末 真珠等分

右為細末如粉以注翳肉上不過五度即瘥

針灸

集努肉攀睛

睛明

風池

太陽出血

期門

飛絲塵垢入目

雜方

世治飛絲入目者用頭垢點入眼中即出神效○飛絲入眼用柘樹漿點了綿裹筋頭蘸水於眼上繳拭涎毒○治飛絲入目以火麻子一合杵碎并花水一碗浸攪却將舌浸水中涎沫自出神效一方用茄子葉碎杵如麻子法在妙

丹飛絲落眼眼腫如眯痛澁不開鼻流清涕用京墨濃磨以新筆塗入目中閉目少時以手張開其絲自成一塊看

在眼白上却用綿輕輕惹下則愈如未盡再塗此方累效

○治眯目鹽與豉置水中浸之視水其查立出孫真人方

干治稻麥芒入眼取蟬螬以新布覆自上待蟬螬從布上摩之其芒出着布上

山物落眼中用新筆蘸繳出○又方濃研好墨點眼立出

視岐亂見

精不相
比則視
岐

靈帝曰余嘗上清冷之臺中堦而顧匍匐而前則惑余私
異之竊內怪之獨瞑獨視安心定氣而不解獨搏獨眩被
髮長跪俛而視之後久之不已也卒然自上何氣使然岐
伯曰五臟六腑之精氣皆注於目而為之精精之窠為眼
骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精
為白眼肌肉之精為約束裹擷筋骨血氣之精而與脈并
為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛
其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則目系
急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比也
則精散精散則視岐故見兩物大惑論
本荀牧仲頃年嘗謂予曰有人視一物為兩醫作肝氣盛
故見一為二服瀉肝藥皆不驗此何疾也予曰孫真人曰

靈樞有云目之系上屬於腦後出於項中云云則視岐故
見兩物也令服驅風入腦藥待愈

神勞則
指氣亂
視岐

靈目者五臟六腑之精也榮衛寘寘之所常營也神氣之
所生也故神勞則寘寘散志意亂是故瞳子黑眼法於陰
白眼赤脈法於陽也故陰陽合轉而精明也目者心之使
也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常處精神
寘寘散不相得故曰惑也帝曰余疑其然余每之東苑未
曾不惑去之則復余唯獨為東苑勞神乎何其異也岐伯
曰不然也心有所喜神有所惡卒然相感則精氣亂視誤
故惑神移乃復是故間者為迷甚者為惑大惑篇
素夫精明者所以視萬物別白黑審長短以長為短以白
為黑如是則精衰矣

右目亂見治法東垣益氣聰明之類是也

目閉不開

足太陽之筋為目上綱足陽明之筋為目下綱熱則筋縱
目不開全文見筋胸條

眇目直視眇目者目睛斜倒不正小兒謂之通睛

針灸
甲眇目者水溝主之

集直視者視物而目睛不轉動者是也若目睛動者非直視也傷寒直視者邪氣壅盛冒其正氣使神氣不慧臟腑之氣不上榮於目則目為之直視傷寒至於直視為邪氣已極證候已逆多難治經曰衄家不可發汗發汗則額上陷脈緊急直視不能眇不能眠以肝受血而能視亡血家肝氣已虛目氣已弱又發汗亡陽則陰陽俱虛所致也此雖錯逆其未甚也逮狂言反目直視又為腎絕直視搖頭又為心絕皆臟腑氣脫絕也直視譫語喘滿者死下利者

亦死又劇者發狂則不識人循衣摸床惕而不安微喘直

視脈弦澹者死皆邪氣盛而正氣脫也

少陽終者其百節縱目覈絕系全文見診生死條目系絕故目不動而直視王注云

覈謂直視如驚貌○覈音瓊

目上視

診
瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕全文見診生死戴眼者目直視不能

轉動也

太陽之脈其終也戴眼反折癩瘕

針灸目上視見中風上

醫學綱目卷之十三

醫學綱目卷之十四

肝膽部

脇痛

脇痛氣逆

附腋踵

腋臭

肝實則
脇痛善
怒中熱

丹肝木氣實肝火盛而脇痛者當歸龍薈丸為瀉肝火要藥脇痛甚者用生姜自然汁吞下龍薈丸以肝火盛也

龍薈丸方見治
法門肝實條

經云肝氣實則怒又云肝痛者兩脇下痛引少腹善怒龍薈丸治肝實脇痛其人氣收者善怒是也甚則用姜汁吞下經云風木淫勝治以辛涼是也

壽四郎右脇痛小便赤少脉少弦不數此內有陳久積痰飲因外感風寒所遏不能宣散所以作痛與龍薈丸三十粒保和丸三十粒細嚼姜片以熱湯下服後脇痛已安小便尚赤少再與

白朮三錢

陳皮

芍藥各二錢

木通一錢半

條苓錢一 甘草分五

右姜三片煎熱飲之、

一婦人脾疼帶脇痛口微乾問已多年時尚秋用二陳湯加川芎乾葛青皮木通下蘆薈丸二十粒 章宅張郎氣痛自右脇時作時止脈沉而弦小便時有赤色吞酸喜嘔出食此濕痰在脾肺間所以肝善乘之小柴胡湯去黃芩加川芎白术木通芍藥滑石生姜煎湯下保和丸三十五粒

一婦人氣暈兩脇胃背皆痛口乾、

青皮 半夏錢五 白术 黃芩

川芎錢三 木通錢二 陳皮錢二 桔梗錢二

甘草錢二 炙半

右分六帖煎熱服 又脇下有食積一條扛起加吳茱

脇痛挾食積

萸炒黃連

肝虛筋痛中清

本治因驚傷肝脇骨裡疼痛不已桂枝散

枳殼一兩 桂枝兩半

右為細末每服二錢姜棗湯調下

潔勻氣散專治脇痛、

山梔 熟地 茯苓 細辛

桂心 川芎各等分

右研為末加羊脂煎服、

本治脇下疼痛不可忍兼治肺弱芎葛湯

川芎 乾葛 桂枝 細辛

枳殼 人參 芍藥 麻黃

防風各半 甘草錢二

右為粗末每服五錢水二盞生姜三片同煎至七分去

查溫服日三服有汗避風

治脇下風氣作塊寒痲發則連小腹痛揆心其積屬肝在右脇下故病發則右脇手足頭面昏痛不思飲食

乾葛

兩一

麻黃

分一

附子

箇一

川芎

防風

當歸

枳實

芍藥

桂枝

羌活

甘草

各四錢

右為粗末每服四錢水一盞半生姜三片同煎至七分去查服日三有汗避風

治脇痛如前兼去手足枯悴薏苡仁丸

薏苡仁

兩一

石斛

用細者二錢

附子

兩半

牛膝

生地黄

各三錢

細辛

人參

枳殼

栝子仁

川芎

當歸

各半兩

甘草

桃仁

各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九酒吞下食前日三服九子食前煮散食後相兼服為佳

治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脉緊腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊脊攣急此藥大治脇痛枳殼黃散

枳殼

四兩

細辛

桔梗

防風

川芎

各二兩

葛根

一兩半

甘草

右為粗末每服四錢水一盞半姜棗同煎至七分去查空心食前溫服

右肝虛脇痛經所謂木不及病中清肱脇痛是也中清謂中有寒也執實脇痛當歸龍薈丸是也

仲脇下偏痛發熱其脉弦緊此寒也以溫藥下之宜大黃

附子湯

實

大黃三錢

附子二枚

細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里更進一服

神保丸治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消

木香二錢

胡椒半

巴豆十枚去皮心膜研

乾蝎七枚

右四味共為末湯浸蒸餅為丸如麻子大亦用硃砂為衣每服五丸心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨姜湯下血痛炒姜醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒任下

許學士云沈存中良方載項在建陽醫者王琪言諸氣噎

痰氣

勝胱脇下痛最難治謂神保丸能治之熙寧中病項筋骨痛諸醫皆作風治之數月不瘥乃流入于背齋又臂攣痛甚苦憶琪語有証乃合服之一服而瘥再發又一服立効

繫煮黃丸治脇下痠痺痛如神方見內傷飲食
丹控涎丹治一身氣痛及脇走痛痰挾死血加桃仁泥凡脇痛有痰流注二陳加南星川芎蒼朮實者控涎丹下之本治男子兩脇疼痛枳實散

枳實兩

白芍藥炒

雀腦芩

人參各半兩

右細末姜棗湯調二錢酒亦得食前日三服

東調中順氣丸治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香

白荳蔻去殼

青皮炮

京三稜炮各一兩

陳皮

大附子各二兩

半夏湯炮七次一兩

縮砂去殼

檳榔

沉香各半兩

右為末煮麪糊為丸如桐子大每服三十九漸加六十丸食後陳皮湯送下

沉香導氣散治一切氣不升降脇肋痞塞

沉香二錢半

人參五錢

檳榔二錢半

白朮

烏藥

麥蘖炒

神麴炒

紫蘇葉

大腹皮炒

厚朴製各一兩

訶子皮炮半兩

香附炮一兩半

姜黃

橘紅

甘草各四兩

京三稜二兩

廣茂

炮四兩

益智二兩

紅花四兩

右為細末每服二錢食前沸湯點服

汚血

丹溪云脇痛有死血者桃仁紅花川芎之類是也若跌撲脇痛者亦為汚血流歸脇下而痛東垣復元活血湯之類是也治法見擗撲傷損門

運氣

運氣脇痛者鄉境皆病脇痛也其証有二

其一風木助肝氣實而痛經云厥陰所至為脇痛又云厥陰在泉風淫所勝民病兩脇裡急支滿又云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病脇痛治以涼劑得痊也

其二燥金攻肝虛而痛經云少陽所至為脇痛又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從脇痛又云少陰司天地乃燥妻滄數至脇痛善太息又云歲木不及燥乃大行民病中清肱脇痛治以溫劑得痊也

針灸

內經灸刺脇痛有三法

其一取肝經云肝病者兩脇下痛引小腹善怒取其經厥陰與少陽又云邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內行善

掣節時脚腫取之行間以引脇下補三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其掣是也

其二取膽絡經云邪客足少陽之絡令人脇痛不得息欬而汗刺足小指次指爪甲上與肉交者各一疔不得息立已汗出立止欬者溫衣飲食一日已左刺右右刺左其病不已復刺如法是也

其三取心經云心手少陽脈所生病者目黃脇痛視虛實熱寒陷下施補瀉疾留灸之法也

隼脇痛 懸鍾 竅陰此二穴左取右右取左竅陰出血妙 外關

三里此一穴正取

又法 支溝 章門 中封

陽陵泉治閉 行間瀉肝怒氣 期門治傷寒後脇痛

治脇并胸痛不可忍 期門四分 章門六分灸七壯至七七壯

行間 丘墟 湧泉

東胸脇痛 期門沿皮三寸 支溝 膽俞沿皮半寸

胸脇脹滿痛 公孫 三里

太衝 三陰交 腰脇痛 環跳

至陰 太白 陽輔

撮脇肋痛 支溝透間使瀉之灸 外關透內關如取支溝不必再取外關

通脇痛 陽陵泉

甲脇下支滿嘔吐逆陽陵泉主之 腹中氣脹嗑嗑不嗜

食脇下痛陰陵泉主之

診 仲寸口脈弦者即脇下拘急而痛其人嗇嗇惡寒也

靈合腋張脇者肺下肺下則居貴迫肺善脇下痛 青色

粗理者肝大肝大則逼胃迫咽則苦膈中且脇下痛

凡脇骨偏舉者肝偏傾肝偏傾則脇下痛 揭唇者脾高

脾高則眇引季脇而痛

俱見本草

脾滿氣逆

見喘條

針灸
腋腫

附腋腫

腋臭

內經針灸刺腋腫有二法

其一取膽經云膽足少陽之脉所生病者缺盆中腫痛腋
下腫是也

其二取心經云心主手厥陰脉是動則病手心熱腋腫皆
視虛實寒熱陷下施補瀉疾留灸也

丹腋氣神效方

蜜陀僧一兩

白礬七錢

礶砂許少

射香少

右為細末先用皂角煎湯洗後傳上

又方

銅青

蜜陀僧

辰砂

白礬

礶砂

白附子

亦如前法搽之

本治腋氣用夜明砂不拘多少為末用豆豉汁調塗立效

又方以銅青好者不以多少米醋調成膏先洗淨腋下用
輕粉摻過却使上件塗之立效

經治狐臭用生姜塗腋下絕根本

三因治狐臭大蜘蛛一箇以黃泥入少赤石脂搗羅極細
入鹽少許杵為一窠包藏蜘蛛在內以火燒令通紅放冷

剖開將蜘蛛研細臨臥入輕粉一字用醞醋調成膏付腋
下明日登廁必瀉下黑汗臭穢不可聞於遠僻處傾埋之
免致染人

世治腋氣先用刀削去腋毛淨用白定粉水調搽傳患處
至過六七日夜後次日早看腋下有一黑點如針孔大用

筆點定即用艾炷灸七枚灸過攻心中痛當用後藥下之

青木香

檳榔

丁香

檀香

射香

大黃

右煎服以下為度。

諸疝

附少腹痛
同一治法

癰疝

狐疝

產小腹痛

大法

疝痛屬足厥陰肝經也。小腹亦肝經也。故疝痛與小腹痛同一治法。所謂疝者，舉丸連小腹痛也。其痛有獨在舉丸者，有獨在小腹偏於一邊者，有舉丸如升斗者，癰疝是也。又立臥出入往來者，狐疝是也。

丹疝痛之甚者也。舉丸連小腹急痛也。有痛在舉丸者，有痛在五樞穴邊者，皆足厥陰之經也。或有形或無形，或有聲或無聲，或有形如瓜，有聲如蛙者，素問以下歷代名醫皆以為寒。蓋寒主收引，經絡得寒收引不行，所以作痛。理固然也。有得寒而無疝者，又必有說通之可也。予嘗因門

歷代獨
治外束

羅丁香練實丸治男子七疝痛不可忍者，婦人瘦聚帶下。

戶上履霜雪，踢冰徒涉，不曾病此。以予素無熱在內也。因而思之，此症始於濕熱在經，鬱而至久，又感寒氣外束，濕熱之邪不得疏散，所以作痛。若只作寒論，恐為未備。或曰：此症多客厥陰一經，其道遠，其位卑，鬱積濕熱，何由而致。予曰：大勞則火起於筋，醉飽則火起於胃，房勞則火起於腎，大怒則火起於肝。本經火積之久，母能生子，濕氣便盛。厥陰屬木，係於肝，為將軍之官，其性急速，火性又暴，為寒所束，宜痛之亦大暴也。愚見有用烏頭、梔子等分作湯用之，其効亦敏。後因此方隨症與形加減用之，無有不應。然濕熱又須分多少而施治，但濕者腫多，癰疝是也。又有挾

虛而發者，當以參朮為君，而以疏導藥佐之，胗其脉不甚

沉急，而大謬無力者是也。然其痛亦輕，惟覺重墮牽引耳。

之寒

皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸於一

當歸去

附子炮去

川練子

茴香各一

右剉碎以好酒三升煮酒盡為度焙乾作細末每藥末一兩入下項藥

丁香五

全蝎十三

玄胡索五

木香五

右四味同為細末入前項當歸等末內拌勻酒糊為丸如桐子大每服三十九至百丸温酒空心送下一方無

香名苦練凡疝氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥也九立効

川練茴香皆入小腹經當歸玄胡索和血止痛疝氣帶下皆積寒邪於小腸之間故以附子佐之丁香木香為

引導也漆匠韓提控疝氣每發痛不可忍則於榻兩末各置一枕往來伏之以受如是三年不已服此藥三劑

良愈

丁香疝氣丸治臍下撮急疼痛并臍下週身一遭皆急痛小便頻數清其五脉急洪緩濇沉按之皆虛獨腎脉按之不急皆虛無力名曰腎疝

當歸

茴香各半

甘草稍五

麻黄根節一

丁香五

全蝎十三

玄胡兩

羌活稍三

肉桂錢一

防已錢三

川烏兩半

右件為細末酒糊丸如雞荳大每服五十九淡鹽湯送下須空心宿食消盡服之

羅當歸四逆湯治男子婦女疝氣臍下冷痛相引腰膝而疼

當歸稍七

附子炒

官桂

茴香炒各

芍藥分四

玄胡索

川練子

茯苓各三

澤瀉分二

柴胡分五

右研為粗末，都作一服水煎空心。

玄胡索苦練湯治臍下冷撮痛陰冷大寒。

肉桂三分

附子三分

熟地黄錢一

甘草稍錢灸半

苦練子二分

黃栢引錢一

玄胡索二分

右件都作一服水四盞煎至一盞，依法食前服。

右四方桂附治寒，玄胡當歸川練茴香丁香木香和血。

調氣蓋寒症挾汚血滯氣者宜之。

葫蘆巴丸治大人小兒小腸氣蟠腸奔豚疝氣偏墜陰腫。

小腹有形如卵，上下來去痛不可忍，或絞結繞臍攻刺嘔。

吐悶亂並皆治之。

葫蘆巴兩炒二

茴香鹽炒一兩半

吳茱萸湯洗炒一兩二錢

川練子

去核炒一兩二錢

巴戟

去心炒七錢半

川烏

炮去皮尖七錢半

黑丑

炒取頭末二兩

右研為細末，酒糊為丸，如桐子大，每服十五丸至二十。

丸止，空心溫酒送下。小兒五丸，茴香湯下，食前一服。

黑丑。

衍葫蘆巴本經云得茴香桃仁治膀胱氣甚效，嘗合用桃。

仁麩炒各等分，拌酒糊丸，半為散，每服五七丸，空心食。

前鹽酒下，散以熱米飲調下，與丸子相間，空心各一二服。

効。

丹腎氣疝。

茴香

破故布

吳茱萸鹽炒各半兩

木香三錢半

葫蘆巴七錢半

右為細末，蘿蔔搗汁，九鹽湯下。

右三方，葫蘆巴破故布巴戟為君，蓋疝而元陽素虛少。

者宜之。

本治小腸氣不可忍者

烏藥搗碎酒浸二宿

高良姜剉

茴香兩

青皮去白

右研為末每服二錢遇發熱酒調下

治遠年小腸氣眾醫不瘥者

硫黃炒令黃不可犯銅鐵器各等分

右研為末每服五錢用熱酒調空心服除根本

川練散

木香一兩 茴香一兩 鹽一匙 一處炒黃色不用鹽

川練子一兩 剉細用巴豆十粒打破一處炒黃色不用巴豆

右研為細末每服二錢空心食前調下

天台烏藥散

烏藥 木香 茴香炒 良姜各五錢

檳榔三錢 川練子十箇 巴豆十四粒 青皮半兩

右八味先以巴豆打碎一同練實用麩炒候黑色去巴

荳麩俱不用外為細末每服一錢溫酒調下痛甚炒生

薑熱酒下亦得

簡木香練子散治小腸疝氣膀胱偏墜久藥不効者服此

其効如神

川練子三十箇 巴豆二十粒 同炒黃赤色 去巴豆不用將川練子研為末

葶藶半兩 石菖蒲一兩 炒 青木香一兩 炒

荔枝核二十枚 炒

右研為細末每服二錢入射香少許空心炒茴香鹽酒

調下

右以巴豆炒藥例許學士云大抵此疾因虛而得之不

可以虛驟補邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實

矣故必先滌去所畜之邪熱然後補之是以諸藥多借
巴莖氣者蓋爲此也

仲寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能
治抵當烏頭桂枝湯主之

右用烏頭一味以蜜二升煎減半去查以桂枝湯五合
解之令得一升後初服二合不知再服三合又不知復

加至五合其知者如醉狀得吐者爲中病桂枝湯方見傷寒門海藏
以附子建中湯加蜜煎治疝即此法也

腹痛脉弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正
相搏即爲寒疝寒疝繞臍痛若發則自汗出手足厥冷其

脈沉弦者大烏頭煎主之脉經云邪正作弦緊
大烏頭炒去皮不咬咀以水三升煮取一升去查納蜜二升煎令水氣盡作湯服食

後一服過後再不作矣

丹溪治
內鬱之
濕熱

治諸疝方

枳實九粒炒

桃仁十四箇炒

山梔九箇炒去皮

吳茱萸七粒炒

山查四粒炒

生姜如指大

右味同入搗盆搗細取順流水一鍾入瓶內煎至微沸
帶查服如濕勝癩疝者加荔枝核如痛甚者加鹽炒大
茴香二錢如痛處可按者加薄桂少許

又方治疝痛

山梔二兩炒

山查四兩炒

枳實炒

茴香各二兩炒

柴胡

牡丹皮

八角茴香炒各一兩

桃仁

茱萸炒半兩

右研爲末酒糊丸空心鹽湯下五六十丸

治陽明受濕熱傳入太陽發熱惡寒小腹連毛際間悶痛
不可忍

梔子仁炒 桃仁炒 枳實炒 山查各等分

右味同研細入生姜汁半合同水一小鍾盪起煎令沸熱服之一方加茱萸

楊淳三哥因舊有腎氣上引乳邊及右脇痛多痰有時膈上痞塞大腑秘結平時少汗脉弦甚與保和温中各二十九研堯仁郁李仁吞之

本治膀胱氣痛茴香散

茴香 金鈴子肉 蓬莪朮 京三稜各一兩

甘草半兩

右為細末每服二錢熱酒調下每發痛甚連日只三二服立定

治膀胱氣金練散

巴豆一百粒 去壳 川練子二十四箇湯浸去薄皮切作片子

右三味用麩二升同炒令黃赤去麩與巴豆不用只將川練肉一味為末每服三錢温酒空心送下余闕古今一切名方無如此奇特有效一方川練子不用巴豆炒亦妙

靈胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹師傳篇 疾飢胃熱痛脹腸寒也

丹諸疝痛處用手按之不痛者屬虛必用桂枝炒山梔細切川烏頭等分為細末生姜自然汁打糊為丸如桐子大

每服三四十九丸空腹白湯下

疝可按者並于歷代獨治外寒條下求之

丹溪云疝有挾虛而發者其脉不甚沉緊而大豁無力者是也然其痛亦輕惟覺重墜牽引耳當以參朮為君疏導藥佐之蓋疏導藥即桃仁山查枳實梔仁茱萸川練玄胡索丁香木香之類以佐參朮之類是也

按之不痛屬虛

海姬提領因疾服涼劑數日遂病臍腹下大痛幾至於死與姜附等劑雖稍蘇痛不已隨本方內倍芍藥服之愈
羅疝氣治驗○癸丑歲治火兒赤憐歹病疝氣復因七月間饑飽勞役過飲潼乳所發甚于初面色青黃不澤臍腹陣痛搐撮不可忍腰不能伸熱物熨之稍緩脉得沉小而急予思難經有云任之為病男子內結七疝皆積寒于小腸所致也非大熱之劑即不能愈遂制一方名之曰沉香桂附丸每服一百丸空心溫酒下間服天台烏藥散旬日良愈明年秋如故
沉香桂附丸治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛引小腹不可忍腰痛不能伸喜熱熨稍緩

沉香

附子炮去皮臍

川烏炮去皮臍

乾姜炮

良姜炒

官桂去皮

茱萸湯洗

茴香炒各一兩

右研為細末醋煮麵糊為丸如桐子大每服五十九至七八十九止空心食前熱米飲湯下日三服忌冷物
丹治疝劫痛方

川烏頭細切

梔子仁去壳

右各等分煎湯服之神効濕多癩腫者烏頭為君蓋川烏頭治外束之寒梔仁治內鬱之熱也

羅陰疝足厥陰之脈環陰器抵小腹或痛因腎虛寒水涸竭瀉邪補肝宜以蒺藜湯主之
蒺藜湯治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也房慾勞痛不可忍者

蒺藜炒去尖

附子炮去皮臍

山梔仁各半兩

右研為末每服三錢水一盞半煎至七分去查食前溫服

丹又方

橘核 桃仁 梔子 茱萸

川烏各等分

右研煎服

治疝作急痛

蒼朮鹽炒 香附鹽炒 茴香炒為佐 黃柏酒炒為君

青皮 玄胡索 益智 菝仁為臣

附子鹽水炒 甘草為使

右研為末作湯服後一痛過更不再作矣

仲寒疝腹中痛及脇痛裏急者當歸生姜羊肉湯主之

當歸三兩 生姜五兩 羊肉一斤

按之而痛者為實

右上三味以水八升煮取三升溫服七合一日三服若寒多者加生姜十片痛多而嘔者加陳皮二兩白朮一兩如加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之衍義云張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不應驗有一婦人產當寒月寒氣入產門腹臍以下脹滿手不敢犯此寒疝也師將治之以抵當湯謂有瘀血非其治也可服張仲景羊肉湯二服遂愈

羅疝氣痛及脚膝無力控辜証 至真大要論云小腹控

辜引腰脊上衝心唾出清水及為噦噫甚則入心善忘善

悲甲乙經曰邪在小腸也小腸病者小腹痛引腰脊貫肝

肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既入則厥証上衝

肝肺客冷散于胸結於臍控引辜丸上而不下痛而入腹

甚則衝于心胸蓋其經絡所係也啟玄子云控引也辜陰

丸也

大便不利者利

控引舉丸治小腸痛結上而不下痛引心臆即東垣茵香練實丸按之痛為實此方有茱萸等剛劑本不可入此條綠芫花有利性故入之

川練子

茴香炒

吳茱萸湯洗

青皮

陳皮各一兩

芫花醋炒五錢

馬蘭花醋炒一兩

右為細末醋糊為丸如桐子大每服三十九溫酒送下

食前服量虛實加減以利為度

本治小腸氣痛撞腹面青唇黑欲死者

木香

茵陳

芫花

甘遂各等分

右四件為末每服二錢水一盞煎至七分去渣溫服服

過此藥後應犯甘草藥皆不得吃恐與甘遂相反故也

其藥其妙亦甚有理屢有驗效

硃砂丸

木香

沉香

巴豆肉各一兩

青皮

二兩不去皮

銅青

半兩研

硃砂一錢研

右已上二香青皮三味細研同巴豆慢火炒令紫色為

度去巴豆為細末入硃砂二味同研勻蒸餅和丸如梧

桐子大每服七丸至十九鹽湯吞下日二三服空心食

前服

子和律科王敏之病寒疝臍下結聚如黃瓜每發繞臍急

痛不能忍戴師先以舟車丸及猪腎散下四五行覺藥繞

病三五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒

治寒萬舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒

疝本是水故也即日病減八分食進一倍又數日以舟車

丸百餘粒通經散四五錢服之利下候三四日又服舟車

丸七八十粒猪腎散三錢乃健步如常矣近穎尾一夫

病卒疝赤腫大痛數日不止余以導水丸一百五十九令

三次咽之次以通經散三錢空腹淡酒調下五更下二三
十行腫痛皆去不三日平復如故

右治實痢利大便形氣實脈有力者宜之

小便不利者利

杜三十七太尉忽患小腸氣痛醫官及京城醫家用藥皆
不效每一發幾死上召杜至進藥數服不驗太尉曰我命
不久致良醫不能治上召杜問所以杜對臣用古方書皆
不獲愈今日撰一方容進上杜曰撰方已成未敢進先合
藥以進太尉一服十愈八九再服全愈然後進方名曰救
命通心散川烏頭一兩用青鹽一錢酒一盞浸一宿去皮
尖焙乾川練子一兩用巴豆二十一粒同炒候黑色去巴
豆茴香半兩石燕一對土狗五枚芥子一錢六分爲末每
服三錢入羊石子內濕帟煨香熟夜半時用好酒半升入
鹽細嚼石子以酒嚥下不得作聲小便大利其病遂去曹

家今秘此方

本頃在嶽城日欽尉宋荀甫膀胱氣作疼不可忍醫者以
剛劑與之痛愈甚小便不通三日矣臍下虛脹心悶予因
候之見其面赤黑脈洪大予曰投熱藥太過陰陽痞塞氣
不得通爲之奈何宋尚手持四神丹數粒云醫謂不止更
服此予曰若服此定斃後無悔渠求治予適有五苓散一
兩許令三服用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水一盞半
煎至七分令接續三服中夜下小便如墨汁者一二升臍
下寬得睡翌日脰之脈已平安矣續用礪砂丸與之數日
瘥

右利小便治疝常治謝人妻小腹疼痛小便不通先艾
灸三陰交以茴香丁香青皮檳榔桂茱萸玄胡索山查
枳實又倍用黃栢煎服之愈

小腹有
死血

丹赤岸朱同道年四十歲八月望雨後得涼半夜後腹痛甚汗如雨兩脚踏破壁痛在小腹手不可近六脉弦而細實重取如循刀刃責責然問之云六月大熱時于深潭浴水病或起於此與大承氣湯大便微利痛遂頓止至次日酉時其痛復作痛在小腹堅硬手不可近又與大承氣加桂兩服研莢仁同煎大便下紫黑血升餘而痛頓止至次日酉時痛復作如初脉雖稍減而責責然猶在與大承氣湯加附子兩貼研莢仁同煎下大便五行得黑紫血如破絮者二升許痛遂頓止一夜得睡次日酉時痛復如初詢知小腹和軟痛在臍腹間下脉亦和似若無病但呻吟如舊詢知乃食蘿蔔菜苗羹兩頓與小建中湯一貼而愈世一婦人少腹痛百藥不效一醫用杉木節童便煎服下血而愈

丹治膀胱氣急用蕪荑和食鹽等分綿裹如棗大納下部或下水惡汁并下氣佳

丹治小腸氣用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤粹入醋中以焯竭爲度搗羅如麩用湯調下一大盞卽瘥如神血師代赭石也

聖治寒疝小腹及陰中相引而痛自汗出欲死丹參一兩杵爲散每服熱酒調下二錢七

丹治諸疝瘕時用海石香附二味爲末生姜汁湯調亦能治心瘵

衍木賊細剉微炒搗爲末沸湯點二錢服食前治小腸膀胱氣緩緩必效

本治疝氣

青礬一兩

白礬一兩各
爲粗末

右用小瓦罐子一隻入二藥在內用麻皮縛緊搗益泥封固以炭五斤煨令通紅盡炭為度取出埋地穴中伏一宿出火毒醋糊為丸如菉豆大每服十九空心鹽湯送下或白湯亦可

運氣肝受邪小腹痛引脇

運氣小腹痛有三二曰肝病小腹痛引脇痛是也經云厥陰之復少腹堅滿裏急暴痛是風氣助肝盛而然治法當瀉肝也又云歲金太過民病兩脇下痛小腹痛又云歲木不及燥乃大行民病中清祛脇痛少腹痛又云歲土不及風乃大行民病腹痛復則胸脇暴痛下引小腹者是燥邪攻肝虛而然治法當補肝瀉金也又寒氣客於厥陰之脈則血泣脈急故脇肋與小腹相引痛者治法亦同也全文見諸痛門

小腸受邪小腹痛引舉丸

二曰小腸其病小腹痛引舉丸腰脊痛是也經云少陰之脈心下熱善饑臍下痛又云少陰之復燠熱內作小腹痛絞痛者是熱助小腸盛而然治法當瀉小腸也又太陽在臬寒淫所勝與太陽之復皆病小腹痛控臑引腰脊上衝心痛及太陰司天大寒且至病小腹痛者是寒邪攻小腸虛而然治法當補小腸瀉寒邪也

膀胱受邪小腹痛引小便

三曰膀胱其病小腹痛腫不得小便是也經云太陰在臬病小腹痛腫不得小便是也濕邪攻膀胱虛而然治法當補膀胱瀉濕土邪也經文見

針灸

內經刺灸小腹痛共四法一曰肝經曰肝病者兩脇下痛引小腹取其經厥陰小腸全文見灸刺又曰邪客厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉交者各一痛男子立已女子有頃已左取右右取左者是也全文見灸刺二曰小腸經云病者小腹痛腰脊控臑而痛時窘甲上大之後取巨虛下廉又云小腸控臑引腰脊上衝心邪在小

腸取之盲原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之巨虛

下廉以去之按其所過之經以調之是也全文並見針灸

氣海又云疝暴痛取足太陰厥陰盡刺去其血絡靈樞熱

穴也風疝而小腸病經云心為牡藏病為心

小腸為之使故小腹當有形也

三曰膀胱經云膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲

小便而不得取委中央又云小腹痛腫不得小便邪在三

焦約取之足太陽大絡者是也全文見針灸門六腑條

四曰督任衝脉經文見如左

素病在小腹不得大小便病名曰疝得之寒刺小腹兩股

間刺腰髀骨間刺而多之盡吳病已長刺節篇小腹兩股

起于氣衝故也腰髀間者王註謂腰尻扶脊平立陷者中

按之有骨處是也疝為寒生故多刺少腹盡熱乃止針

靈腎脉生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝任

脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚俱見骨

空論

摘元藏發動臍下痛不可忍 氣海 三陰交立愈

左右取

玉疝氣少腹偏痛 大敦二分沿皮向後三分瀉之

三陰交一寸瀉

撮又法 大敦 水道 小海

桑又法 中極 印腎

摘卒疝少腹痛不可忍 大敦三分隔六

陰市三分灸 照海三分灸七壯已上

疝癰小腸膀胱腎餘疝氣 氣海 五樞各用燭針刺入

三里 三陰交刺

桑疝 三陰交 三里 足三間

摘疝 行間 三里

集大法 關門 關元 水道 三陰交不已再

取下穴

海底 歸來

摘少腹痛 關元 三里

甲陰跳遺溺小便難痛陰上下入腹中寒疝陰挺出偏大腫腹臍痛腹中悒悒不樂大敦主之 腹痛上搶心心下滿癢莖中痛怒瞋不欲視泣出長太息行間主之 環臍痛陰騫兩丸縮腹堅痛不得臥太衝主之 疝瘕臍少腹引痛腰中痛中封主之 陰跳腰腹痛實則挺長寒熱攣陰暴痛遺溺便大虛則暴瘕氣逆腫辜卒疝小便不利如瘕狀數噫恐悸氣不足腹中悒悒少腹痛噎中有熱有瘕肉狀如着欲出背攣不可俛仰蠡溝主之

右取藏經厥陰

男子陰疝兩丸上下少腹痛五樞主之 大疝腹堅坵墟主之

右取腑經少陽

少腹痛飧泄出糜次指熱若脉陷寒熱身痛唇乾不渴汗出毛髮焦脫肉少氣内有熱不欲動搖泄膿血腰引少腹痛暴驚狂言非常巨虛下廉主之 少腹痛控繫引腰脊疝痛上衝心腰脊強溺黃赤口乾小腸膈主之 疝瘕髀中急痛循脇上下搶心腹痛積聚府舍主之 腹痛疝積聚上衝心雲門主之

右巨虛下廉小腸膈者取本腑也府舍雲門者刺太陰以予之也

四肢淫滌身悶瘕疝至陰主之 臍疝繞臍痛衝胸不得息炎臍中 陰疝引窠陰交主之 少腹痛臥善驚氣海主之 臍疝繞臍痛石門主之 暴疝痛少腹大熱關元主之 少腹痛溺難陰下縱橫骨主之 男子陰端寒上

衝心中很很會陰主之 癰疽然谷主之 卒疽少腹痛
 照海主之病在左取右右取左立已 陰暴起疽癥胞中
 有血四滿主之 臍疽繞臍痛時上衝心天樞主之 氣
 疽噦嘔面腫奔豚天樞主之 陰疽氣疽天樞主之 陰
 疽痿莖中痛兩丸騫臥不可仰臥刺氣衝 陰疽衝門主
 之一作衝門 寒疽下至腹腠膝腰痛如清水大腹諸疽按之
 至膝上伏兔主之 寒疽痛腹脹滿痿厥少氣陰谷主之
 素厥陰脉滑則病狐疽風少陰滑則病肺風疽太陰脉滑
 則病脾風疽陽明脉滑則病心風疽太陽脉滑則病腎風
 疽少陽脉滑則病肝風疽四時刺逆從論
 胗肝脉滑甚為癩疽 心脉微滑為心疽引臍下小腹鳴
 腎肝滑甚為癰疽全文見治法
 陳夫滑脉關已上見者為大熱蓋陽與陽併也故大熱滑

診

脉尺部見為大寒生癩疽滑脉者命門包絡之名也為丙
 丙丁熱火併于下蓋丙丁不勝壬癸從寒水之化也故生
 癩疽

素帝曰診得心脉而急此為何病岐伯曰病名心疽小腹
 當有形也帝曰何以言之岐伯曰心為牡藏小腸為之使
 故曰少腹當有形也脉要精微論 心脉搏滑急為心疽肺脉沉
 搏為肺疽腎脉肝脈大急沉皆為疽俱大奇論

脈脈來中央堅實徑至關者衝脈也動若少腹痛上搶心
 有瘦疽絕孕遺矢溺脇支滿煩也

丹臍下忽大痛人中如墨色者多死

子和七疽圖○寒疽其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或控
 辜丸而痛得于坐臥濕地或寒月涉水或冒雨雪或坐臥
 磚石或風冷處使內過勞宜以溫劑下之久而無子

水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶或囊
痒而搔出黃水或少腹中按之作水聲得於飲水醉酒使
內過勞汗出而遇風寒濕之氣聚于囊中故水多令人為
卒疝宜以逐水之劑下之有漏針去水者人多不得其法
筋疝其狀陰莖腫脹或潰或痛而裏急筋縮或莖中痛痛
極則痒或挺縱不收或白物如精隨洩而下久而得於房
室勞傷及邪術所使宜以降心火之劑下之

血疝其狀如黃瓜在小腹兩旁橫骨兩端約中俗云便癰
得於重感春夏大燠勞于使內氣血流溢滲入脬囊留而
不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑下之

氣湯各半
服之是也

和血四物
湯調胃承

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱之
而脹罷則氣散者是也有一治法以針出氣而愈者然針

有得失宜以散氣之藥下之或小兒亦有此疾俗云偏氣
得于父已年老或年少多病陰痿精怯強力入房因而有
子胎中病也此疝不治惟築賓一穴主之

狐疝其狀如瓦臥則入小腹行立則出小腹入囊中狐則
晝出穴而溺夜則入穴而不溺此疝出入上下往來正與
狐相類也亦與氣疝大同小異今人帶鉤鉗是也宜以逐
氣流經之藥下之

癰疝其狀陰囊腫脹如升如斗不痒不痛者是也得之地
氣卑濕所生故江淮之間湫澹之處多有此疾宜以去濕
之藥下之女子陰戶突出雖亦此類乃熱則不禁固也不
可便謂虛寒而澁之燥之補之本名曰瘕宜以苦下之以
苦堅之

王註云陽氣下墜陰氣上爭則寒多下

墜則筋緩故舉垂縱緩因作癰疝也

已上七疝下去其病之後可調則調可補則補各量病勢

勿拘俗法經所謂陰盛則腹脹不通者癰疽也不可不

下
右疽圖雖七然寒疽即疽之總名水疽即癰疽之屬氣
疽即狐疽之屬血疽即癰癤之屬惟筋疽罕見之蓋下
疔瘡之屬也

癰疽

辜囊腫大如升如斗是也

癰疽不痛難治

丹下部癰氣不痛之方細思非痛斷房事與厚味不可用
藥惟促其壽若蒼朮神麩白芷山查川芎枳實半夏皆要
藥人視其藥皆鄙賤之物以啓慢心又不能斷慾以愛護
其根本非徒無益而反被其害者多矣且其藥宜隨時月
寒濕更按君臣佐使加減大抵癰疽屬濕多

蒼朮

神麩

白芷散

山查

川芎

枳實

半夏

南星

右神麩糊為丸有熟加山梔一兩堅硬加朴硝半兩秋
冬加吳茱萸二錢半

癰疽

南星

山查

蒼朮

白芷

半夏

枳實

神麩

海藻

昆布

各半兩

玄明粉

吳茱萸

各二錢

右為末酒糊丸

又方治木腎不痛

南星

半夏

黃柏

酒洗

蒼朮

鹽炒

枳實

山查

白芷

神麩

炒

滑石

炒

茱萸

昆布

右為末酒糊丸空心鹽湯下一方加枸杞子

無香附散治癩脹用香附子不拘多少為末每用酒一盞
海藻一錢煎至半盞先撈海藻嚼細用所煎酒調末二錢
服

東又方治偏墜初生用川山甲茴香二味為細末酒送下
以乾物壓之

吁木腎以楮木葉雄者晒乾為末酒糊為丸空心鹽酒下
本方云無實者雄也

從小便利惡物

海蛤九癩疔

醋炒三次

當歸

海金沙

賦粉

礶砂各一錢

海藻

粉霜各五分

水蛭二十一條炒

青黛

滑石

乳香各一錢

硃砂二錢為末

地龍二十一條去頭足

右細末鹽煮面糊為丸如小荳大硃砂為衣每服十丸

煎燈心湯空心服之小便下冷膿惡物乃効却以黃連
紫荷車板藍根各二錢煎湯嗽口以固牙齒去板藍根
加管仲

綿包取汗

世治偏墜大者用乾姜桂各一兩為末以綿一兩水大三
碗同煮二十餘沸起晒乾又煮水盡為度用乾綿包陰九
汗出數次漸愈

癩氣痛者易治

海地黃膏子丸治男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛卵
痛即控掣相似漸成腫陰陰痛上衝心腹不可忍者宜服
此藥

血竭

沉香

木香

廣茂炮

玄胡索

蛤蚧

人參

當歸

川芎

川練炒

續斷

白朮

全蝎

茴香炒

柴胡

吳茱萸

沒藥

已上分兩不定
隨症加減用之

氣多者加青皮

血多加肉桂

右同為細末地黃膏子九桐子大空心温酒下二十九

日加一丸至三十丸

簡安息香丸治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅硬如石痛不能忍者

玄胡索

炒

海藻

洗

昆布

洗

青皮

去白

茴香

炒

川練子

去核

馬蘭花

已上各一兩半

木香

半兩不

木香

半兩不

大戟

酒浸三宿切片焙乾三錢半

右為細末另將礪砂真阿魏真安息香三味各二錢半用酒一盞醋一盞將礪砂阿魏安息香淘去砂石用酒醋合一盞熬成膏子再入麝香一錢沒藥二錢半俱各另研細入前藥一同和丸如棗莖大每服十九至十五

丸空心用綿子灰調酒下

本治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍念珠丸

乳香

礪砂

各三錢飛

黃蠟

一兩

右乳香礪砂同研勻溶蠟和為丸分作一百串八九以線穿之露一宿次日用蛤粉為衣旋取用乳香湯下頃年有人貨疝疾藥日貨數阡有一國醫多金得之用之良驗

熱鬱者
內疎之

丹鄭子敬因吃酒後飲水與水果偏腎六時作蛙聲或作

痛炒枳實一兩茴香鹽炒炒梔子各三錢研煎下保和丸

昌世官膀胱氣下墜如蛙聲臭橘子核炒十枚桃仁二

十枚蘿蔔自然汁研下保和丸七十 混兄年三十左腎

核腫痛此飲食中濕墜下成熱以橘核即臭五枚桃仁七

枚細研順流水一盞煎沸熱下保和丸

疾束之
濕散之

本治膀胱腫硬牽引疼痛及治小腸氣陰囊腫毛間出水

宜服金鈴丸

金鈴子肉五兩

茴香炒

馬蘭花炒

兔絲子

海蛤

破故紙

海帶各二兩

木香

丁香各一兩

右細末糊丸如桐子大每服二三十丸温酒搥湯空心食前服

無大戟丸治陰癩腫脹或小腸氣痛

大戟去皮剉炒

葫蘆巴炒四兩

木香一兩

附子炮去皮臍

茴香

訶子煨去核

檳榔各半兩

川練五兩

麝香半兩另研

右爲末獨取川練以好酒二升葱白頭七枚長三四寸煮川練軟去皮核取肉和上件藥杵丸如桐子大空心

按之臍
腹痛者
下之

温酒下十九丸潮發疼痛炒姜熱酒下十五丸

抵聖丸治陰癩腫滿赤腫大便秘欲飲水按之臍腹痛

續隨子

薏苡仁

郁李仁

茵芋

白牽牛各一錢

右爲末滴水丸如桐子大每服五丸用博濟方香姜散嚥下黃昏服五更利下惡物效

子和汝南司候李審言因勞役王事飲冷水坐濕地乃濕氣下行流入臍囊大腫痛不可忍以金鈴川練等藥不效

求治于戴人曰可服洩水丸審言感之又數日痛不可堪竟從戴人先以舟車丸瀦川散下青綠水十餘行痛止後

用茴香丸五苓散以調之三日而腫消至老更不作

雜方

世綿包取汗方見癩疔

丹木腎以枇杷葉野紫蘇葉蒼耳葉水晶蒲萄葉濃煎湯

薰洗

無雄黃散治陰腫大如斗核痛人所不能治

雄黃一兩

礬二兩

甘草生半兩

右剉散以水五升煎洗

溼失笑散治腎腫

荆芥蕙

朴硝

右為粗末蘿蔔葱同煎湯淋洗

梅治卒外腎腫痛大黃末醋和塗之乾即易之

焦治男子陰腫大如升核痛人所不能治者搗馬鞭草塗

之男子陰腫大如斗核痛人所不能治者蔓菁根搗傅

之

燥邪攻

運氣癩疔有二經云陽明司天燥淫所勝丈夫癩疔婦人

小腹痛又云陽明之勝外發癩疔者是燥邪攻肝氣虛而

肝

然治法當補肝瀉燥金也全文見運氣類注

素厥陰所謂癩疔婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽中

之陰邪在中故曰癩疔少腹腫也所謂癩疔膚脹者曰陰

亦盛而脈脹不通故曰癩疔也俱昧解篇

三陽為病發寒熱下為癰腫及為痿厥腦瘖其傳為癩疔

全文見診病傳變王註云腦瘖痿痛也

靈黃帝曰刺節言去爪夫子乃言刺關節肢絡愿卒聞之

岐伯曰腰脊者身之大關節也肢脛者人之管以趨翔也

莖垂者身中之機陰精之候津液之道也故飲食不節喜

怒不時津液內溢乃下流於壘血道不通日大不休俛仰

不便趨翔不能此病榮然有水不上不下鉞石所取形不

可匿常不得蔽故命曰去爪帝曰善刺節真邪篇

內經刺灸癩疔共四法其一節此篇文所謂鉞石取壘囊

小腸勝

針灸

中水液者是也其法今世人亦多能之舉丸囊大如斗者
中藏穢液必有數升信知此出古法也鍼針如刀狀

其二取肝經云足厥陰之脈是動則病丈夫癩疝婦人小
腹腫是也是于足厥陰肝經視盛虛熱寒陷下而施補瀉

留疾與灸也至文見針灸門十二經條

其三取肝之絡經云足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸

別走少陽其別者徑脛上臑結于莖其病氣逆則臑腫卒

疝取之所別是也是於內踝上五寸貼脛骨後近肉處蠡

溝取之也至文見針灸門十五經條

其四取足陽明筋經云足陽明之筋聚於陰器上腹其病

轉筋髀前腫癢疝腹筋急治在燔針劫刺以知為數以痛

為輸是也是於轉筋痛處用火針刺之也

桑治偏墜當外腎縫沿皮針透即消

集木腎紅腫如升太不痛 大敦 三陰交 海底 歸

來在水道下二寸針 木腎紅腫陰汗偏墜 闌門毛際旁開二寸針

入二寸半 三陰交

甲癩疝大巨及地機中郄主之 癩疝陰暴痛中封主之

千金云癩疝癢暴痛痿厥身體不仁 氣癢癩疝陰急股樞膈內廉痛交信

主之 丈夫癩疝陰跳痛引篡中不得溺腹支脇下措滿

閉癢陰痿後時泄四支不疼實則身疼痛汗不出目眩眩

然無所見怒欲殺人暴痛引髓下節時有熱氣筋攣膝痛

不可屈伸狂如新發衄不食喘呼小腹痛引噫足厥痛湧

泉主之

撮木腎紅腫疼痛 然谷半寸瀉之

世灸關元者可愈蓋灸之早方效

垣前陰分大寒大熱囊垂縮○陰陽別論云三陽為病發

寒熱辨

寒熱下為壅腫及為痿厥肺痛其傳為索澤又傳為癩疝
夫熱在外寒在內則累垂此九夏之氣也寒在外熱在內
則卵縮此三冬之氣也足太陽膀胱之脉逆上迎手太陽
小腸之脉下行至足厥陰肝之脉不得伸其任脉並厥陰
之脉逆則如巨川之水致陽氣下墜是風寒濕熱下出囊
中致兩辜腫大謂之曰疝太甚則為癩足厥陰之脉與大
腸膀胱寒水之脉同至前陰之末傷寒家說足厥陰肝經
為病煩滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大熱靈樞經云
足厥陰肝經筋中為寒則筋攣卵縮為大寒前說囊縮為
大熱此說為大寒此說囊縮垂墜下引癩疝脚氣為大寒
風濕盛下垂為寒與上二說不同何也曰以平康不病人
論之夏暑大熱囊卵累垂冬天大寒急縮收上于前三說
又不同何也是相乖取不相乖取荅曰傷寒家囊卵縮大

熱在內宜承氣湯急下之與經筋說囊卵縮大寒在外亦
是熱在內與傷寒家同故再引平康人以證之冬天陽氣
在內陰氣在外人亦應之故寒在外則皮急皮急則囊縮
夏月陰氣在內陽氣在外人亦應之故熱在外則皮緩皮
緩則囊垂此癩疝之象也三說雖殊皆一理也用藥者宜
詳而審之已上三論各有所主兼此考訂則脉証陰陽寒
熱虛實之辨判然矣

狐疝

狐疝屬厥陰

臥則入腹立則出腹偏入囊中者是也

海藏仲景療陰狐疝氣有大小時時上下者蜘蛛散主之

狐夜伏而晝見以見疝處厥陰之分即人之陰篋隱奧之所晝下而夜上故以狐疝名焉

蜘蛛十四枚

桂半錢要入厥陰取其肉厚者

右為散每服一錢蜜丸亦可雷公云凡使勿用五色者

兼大身上有刺毛生者并薄小者已上皆不堪用須用
屋西南有網身小虎大腹內有蒼黃膿者真也凡用去
頭足了研如膏投藥中用此余之方法若仲景炒焦用
全無功矣

針灸

一方治水癩偏大上下不定疼痛不止牡礪不拘多少鹽
泥固濟炭三斤煨令火盡冷取二兩乾姜一兩焙為細末
二味和勻冷水調得所塗病處小便大利即愈
內經刺灸狐疝但取足厥陰一經經云肝足厥陰之脈所
生病者狐疝是也隨其經盛虛寒熱陷下取之也
甲狐疝太衝主之 陰股內痛氣癰狐疝走上下引少腹
痛不可俛仰上下商丘主之 狐疝驚悸少氣巨缺主之
心婦人疝瘕結核疼痛發作無時日出穴夜入穴或負重
即下稍輕即止此狐疝也 天井五分 肘尖五分小壯
汗出則愈

診

氣海

三寸又互換東西上下
向病所各進三寸漏之

中極

三十立愈

耳後陷者腎下腎下則腰尻痛不可俛仰為狐疝全文見診
產後少腹痛併見產後
腹門痛

閉癰遺溺

閉癰分二病

小便不通

淋

胎前淋閉

胎後淋閉

小便數

小便黃赤

遺溺

姪遺尿

產遺尿

遺尿者溺出不自知覺也閉癰者溺閉不通而淋瀝滴點
也惟肝與督脉三焦膀胱主之

肝脉督脉
循陰

肝脉督脉主之者經云肝足厥陰之脉過陰器所生病者

遺溺閉癰又云督脉者女子入繫廷孔其孔溺孔之端也

其男子循莖下至篡與女子等其生病癘痔遺溺故遺溺

閉癰皆取厥陰腧穴及督脉俞穴也

三焦約
下焦

三焦主之者經云三焦下脉在干足太陽之前少陽之後出于脘中外廉名曰委陽足太陽絡也三焦者足太陽少陽之所將太陽之別也上踝五寸別入貫膈腸出于委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉瘖虛則遺溺遺溺則補之閉瘖則瀉之是也

膀胱藏
瀉

膀胱主之者經云膀胱不利為瘖不約為遺溺是也然遺溺閉瘖不取膀胱脬穴者蓋膀胱但藏溺其出溺皆從三焦及肝督脉也

閉瘖分二病

久暴

閉瘖合而言之病也分而言之有暴久之殊蓋閉者暴病為溺閉點滴不出俗名小便不通是也瘖者久病為溺瘖淋瀝點滴而出一日數十次或百次名淋病是也今分其病立為二門

小便不通

分氣血之

分熱在氣

項小便不利在氣在血之異夫小便者足太陽膀胱所主長生於申申者西方金也金能生水金者肺也肺中伏熱水不能生是絕小便之源也人法象天地膀胱之源自頭項下至於足故曰陽中之陰如渴而小便不通者肺不能降是也治法者用清燥金之正化氣味薄之藥茯苓猪苓澤瀉琥珀燈心通草車前子瞿麥扁蓄之類皆為淡滲之藥能瀉肺火而清肺金滋水之化源也若不渴熱在下焦是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易分別耳清肺散治渴而小便閉或黃或澁邪熱在氣分也

茯苓錢二

猪苓錢三

澤瀉錢三

琥珀分五

燈心二分

木通七分

通草二分

車前子炒一錢

瞿麥五分

蒲葦七分

桂五分

右為末每服五錢水煎熱服五苓散八正散亦宜用之

仲猪苓湯治脉浮發熱渴而小便不利方見傷寒

五苓散治煩渴飲水過多或多水入即吐心中淡淡小便

不利方見傷寒

茯苓戎塩湯方

茯苓半斤

白朮二兩

戎塩彈丸大一枚

右三味為末白湯調下

百小便不通車前子草一斤水三升煎取一升半分作三

服

熱在血分

東滋腎丸治下焦陰虛脚膝軟無力陰汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉者邪熱在血分也

黃栢二兩酒洗焙

知母二兩酒洗焙

肉桂二錢

內經云執者寒之又云腎惡燥急食辛以潤之以黃栢之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君以知母苦寒瀉腎火故以為佐肉桂辛熱寒因熱用也

右為細末熟水為丸如雞豈大每服百丸加至二百丸煎百沸湯下空心服昔長安有大賢王喜夫病小便

不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極腿脚腫脹破裂出黃水雙睛凸出晝夜不得眠飲食不下苦痛不可

名狀求予治之因問受病之始知病不渴近苦嘔噦眾醫皆用治中滿利小便滲淡之藥急難措手乃辭歸從

夜至旦耿耿不寢窮究其理忽記素問有云無陽則陰無以生無陰則陽無以化又云膀胱州都之官津液藏

烏氣化則能出矣此病小便癃閉是無陰而陽氣不化者也凡利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化者此乃奉養太過膏梁積熱損北方之陰腎水不足故膀胱腎之室久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也獨為關非格病也潔古老人曰熱在下焦填塞不便是治關格之法今病者內關外格之病悉具死在旦夕但治下焦可愈隨處以稟北方寒水所化大苦寒氣味俱陰者黃栢知母桂為引用丸如桐子大沸湯下二百丸服藥少時須臾前陰如刀刺火燒之痛溺出如瀑泉湧出臥具皆濕床下成流顧盼之間腫脹消散予驚喜曰大哉聖人之言豈可不遍覽而執一者也其証小便閉塞而不渴時見躁者是也凡諸病居下焦皆不渴也二者之

病在氣在血最易分別

紫黃連丸治因服熱藥過小便不利諸藥莫能效者或臍下痛不可忍者

黃連炒

黃栢炒

甘草各等分

右咬咀水煎溫服食前如更不通加知母此藥助氣使氣得化則通矣

羅白花散治小便不通膀胱有熱用朴硝不以多少為細末每服二錢煎茴香湯調下食前簡要先用茴香酒調垣導氣除燥湯治小便不通乃血滲致氣不通而竅澁之症

知母三分酒洗

黃栢四錢

滑石二錢炒黃

澤瀉三分

茯苓二錢去皮

右和白每服半兩水煎稍熱空心服如急閉小便不拘

時候

手小便不通用蚯蚓杵以冷水攪過濃服半碗立通大解
熱疾不知人事欲死者服之効

渴而腹
冷為水

伸小便不利者有水氣其人苦渴栝蒌瞿麥丸主之

瓜蒌根兩二

茯苓

薯蕷各三兩

附子一枚

瞿麥兩一

右五味末煉蜜丸如桐子大服三九日三服不知增至
七八九以小便利腹中溫謂之知

氣鬱于
下微者
香以散

小便不通腹下痛狀如覆碗痛悶難忍者乃腸胃乾涸膈
中氣不下故經所謂膀胱者州都之官津液藏焉氣化則
能出矣故膈中者臣使之官三焦相火腎為氣海也王註
曰膀胱津液之府胞內居之少腹處間毛內藏胞器若得
氣海之氣施化則溲便注下氣海之氣不及則隱秘不通

故不得便利也先用木香沉香各三錢酒調下或八正散

甚則宜上湧之令氣通達使自通利經所謂病在上下取

之王註曰熱攻於上不利於下氣盛于上則溫辛散之苦

以利之

一方煎陳皮茯苓湯調木
香沉香末服之空心下

甚者吐
以提之

丹小便不通屬氣虛血虛有實熱痰氣閉塞皆宜吐之以

提其氣氣升則水自降蓋氣承載其水者也氣虛用參朮

升麻等先服後吐或就參芪藥中調理吐之血虛用四物

湯先服後吐或就芩歸湯探吐之痰多二陳湯先服後探

吐之痰氣閉塞二陳湯加香附木通探吐之實熱當利之

或用八正散蓋大便動則小便自通矣

丹治一男子小便不通用吐法一吐便如法論見治虛實

法病在下取之上條

吐者下
下微者

伸小便不利蒲灰散滑石白魚散茯苓戎鹽湯主之

蒲灰
髮灰

經劑行本草消汚血滑石
丹溪云逐汚血

蒲灰散方

蒲灰七分恐即蒲黃粉

滑石三分

右二味杵為散飲服五分方寸七日三服

滑石白魚散方

滑石二分

亂髮二分

白魚二分衣魚也

右三味杵為散飲服五分七日三服

無髮灰散治臍下急滿小便不通用髮灰研細每用二錢

米醋二合調服一法與葵子等分為末飲服二錢訖即炒

黑荳葉蓋其上即通丹溪云髮髮補除之功甚捷

甚考峻劑破之

本桃仁煎治婦人積血頃在毘陵有一貴宦妻妾小便不通臍腹脹痛不可忍眾醫皆作淋治如八正散之類數種

皆治不通病愈甚予診之曰此血癥也非瞑眩藥不可去

予用此藥初服至日午大痛不可忍臥少頃下血塊如拳者數枚小便如黑荳汁一二升痛止得愈此藥猛烈大峻氣虛血弱者宜斟酌之

桃仁

大黃

朴硝各一分

蜚虫半兩炒黑

右四味為末以醇醋二升半銀石器內慢火煎取一升

五合下大黃桃仁蜚虫等不住手攪良久出之丸如梧

子大前一日不晚食五更初温酒吞下五丸日午取下

如赤荳汁或如雞肝蝦蟇衣狀未下再作如見鮮血即

止續以調血氣藥補之此方出千金此方不可妄用

右四方治汚血小便不利前三方輕劑可用後一方峻

劑須認得分曉用之

虛實

丹呂仲年六十六歲病傷寒得汗熱退後脉尚洪此洪脉作虛脉論與人參黃芪白朮炙甘草當歸芍藥陳皮數日

其脉仍大未收斂又小便不通小腹下妨悶頗為所苦但
仰臥則點滴而出予曰補藥服之未至前藥倍加黃芪人
參大劑與服兩日小便方利

小腹痛脹如覆椀為實其法有二氣壅塞於下者用吐法
以提之血汚於下者用桃仁之類以破之二方並見血氣條

雜方

世治小便閉用大田螺生去殼搗細封臍上即通治傷
寒後小便不用生薑八九塊杵碎水十餘椀麻布五六
尺同煎數沸用桶盛至候通手以布頻熨小腹良久恰用
紅苳末一七江茶二七井花水調服神效小便如注

本治小便難小腹脹滿不急治殺人用葱白一斤細剉炒
令熱以帕子裹分作兩處更替熨臍下即通

玄陰陽關格前後不通利大便小水自行中有轉胞之証
諸藥不效無救則脹滿悶亂而死予曾以甘遂末水調傅

臍下內以甘草節湯飲之藥汁至臍二藥相反而胞自轉
矣小水來如湧泉此救急之良法也

聖治小便難腹滿悶不急療之殺人用蓼芩一兩去苗以
水一大盞煎取七分去查每于食前作兩服瘥

世治小便不通用大杏仁二十一枚研水調分作二服効

杏仁紫苑利小水解肺鬱鬱解則氣自降而小便去矣

千治婦人卒不得小使用紫苑末以井花水服三撮便通
小便血五撮立止

外若小便不通數病而微腫方取陳筆頭一枚燒為灰和
水服之此方未詳

經云腎合膀胱膀胱者津液之府也小腸屬腎腎上連肺
故將兩藏三焦者中瀆之府也水液出焉是屬膀胱乃腎
之府也又云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

由是言之膀胱藏水三焦出水治小便不利故刺灸法但取三焦穴不取膀胱也小腸屬腎肺故東垣用清肺飲子滋腎丸利小便是也

運氣

運氣小便不利有三

其一屬濕邪攻三焦經云太陰在泉濕淫所勝病小腹痛腫不得小便又云水不及曰涸流涸流之紀上宮與正宮同其病癃閉是也

其二屬風邪攻脾經云厥陰司天風淫所勝病澹瘕泄水閉是也

其三屬燥熱經云陽明司天之政天氣急地氣明民病癃閉初之氣其病小便黃赤甚則淋又云少陰司天之政地氣肅天氣明二之氣其病淋是也

針灸

內經刺灸小便不利法有五

其一取肝經云肝足厥陰之脈所生病者癃閉又云小腹滿身寒熱小便不利取足厥陰又云癃取陰蹻及三毛上及血絡出血是也

其二取三焦經云三焦病者腹氣滿小腹丸堅不得小便窘急溢則水流即為脹候在足太陽之外大絡大絡在足太陽少陽之間亦見于脈取委陽又云小腹痛腫不得小便邪在三焦約取之太陽大絡大絡委陽視其絡脈與厥陰小絡結而血者當有取之是也

其三取腎絡經云足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其病實則癃閉取之所別也

其四取脾經云足太陰之脈所生病者澹瘕泄水閉視虛實寒熱陷下而施補瀉疾留灸也

其五雜取經云內閉不得洩刺足少陰太陽與髀骨上以

長針氣逆則取其太陰陽明厥陰甚則取少陰陽明動者之經也

經治小便淋瀝或有血以赤根樓葱近根截一寸許安臍中上以艾灸七壯

羅治小便淋瀝不通用鹽不以多少炒熱填滿病人臍中却用艾如筋頭大灸七壯其小便自出

摘內陰谷出密語關元八分令病人覺淋瀝三五次三陰交即透陰谷

撮小便閉數不通 陰谷一寸五分 陰陵泉瀉 標又法 偏歷

集小便閉不通 陰陵泉 陰谷 三陰交 氣海 關元灸三十壯刺二寸五分不已取下穴 太溪 陰交

東熱淋小便黃腹滿 陰陵泉 關元各二寸 氣衝二七壯

石淋不得小便 關元三壯 氣門 大敦各二壯 血淋

氣海 丹山各刺灸三七壯 小便熱痛目赤尿如血 列缺

沿皮一寸 太陵 承漿各五分 又法 曲骨灸二七壯 陰陽二

陵泉各二寸五分

甲少腹中滿熱閉不得溺足五里取之 溺難痛白濁卒

疝少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不可以俛仰面黑熱腹中臏滿身熱厥痛行間主之

癰潰溺鼠睪痛小便難而白期門主之 陰胞有寒小便不利扶承主之

筋急身熱少腹堅腫少腹時滿小便難尻股寒髀樞痛外引季脇內控八竅委中主之 癰中竅主之 胸滿膨膨

然實則癰閉腋下腫虛則遺溺脚急兢兢然筋急痛不得大小便腰痛引腹不得俛仰委陽主之 小腹脹急小便

不利厥氣上頭顛滿谷主之 勞瘵小便赤難前谷主之
氣瘰溺黃關元及陰陵泉主之千金云寒熱不節 腎病不可俛仰 氣
癢小便黃氣虛則遺溺石門主之 小便難竅中熱實則
腹皮痛虛則痒癢會陰主之

癢即淋病

血受傷者補血

丹朱郎小便淋痛脉左大右濇此為勞傷經血勿作淋治
可補血行肝經滯血自愈

生地 當歸 赤芍各一錢 川芎三分

條芩三分 甘積三分 陳皮五分 木通五分

黃栢二分 紅花大 杜牛膝一錢

右桃仁泥研滑石同前待淋病去退滑石桃仁杜牛膝
木通入川牛膝代木通分兩倍之

金華申明叔年踰七十因壯年踏冷患腎氣痼痛常食蒼

木烏附等藥二十餘年痼氣少止却患小便淋痛又十三
年其間又服朴硝大黃治諸淋之藥百方俱試並無一效
至是年春頸項帶右邊發一疽延及缺盆可尺許不能食
淋痛愈加必須叫號其瘡淫潰濃血淋漓精神困憊時正
六月診其脉兩手濇短左微是弦狀輕重皆近五至予謂
此瘡皆前烏附等藥積毒所發此淋亦因燥烈之藥凝積
滯血滿膀胱况濇脉為敗血短脉為血耗遂令於溺後視
之有物出如敗膿者否視之果然因思之忍痛則傷血叫
則傷氣遂先治淋令取杜牛膝根莖葉同煎取濃汁却煎
四物湯作大料與服三日後痛漸減前所謂敗膿者至是
漸少五七日淋病全安此時瘡亦定蓋四物能生血也但
飲食減少瘡未收斂耳遂用參芪當歸白朮四藥大劑於
瓦器熬為膏以陳皮半夏縮砂木香煎取清汁調膏藥飲

遂能食又一月而瘡安 一方名血餘散治血淋內崩吐血舌上出血便血用亂髮以皂角水洗淨晒乾燒灰爲末每服二錢以茅根車前葉煎湯調下

主治五種淋用苧蔴根兩莖打碎水一椀半煎半碗頓服即通太妙丹溪云苧根補陰行滯血

博治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麩褻煨爲末每一錢七水一盞煎至七分空心服

氣虛者燕補氣 氣虛淋八物湯加杜牛膝黃芩汁煎服老人氣虛亦能淋參朮中加木通山梔

仁八姪淋病脉沉而大此主勞苦傷血下焦蘊結

人參 歸尾 白芍 香附錢五

條芩 木通錢三 山梔炒三錢半 黃芪錢五

生甘草稍五分

分六帖杜牛膝湯兩盞煎取一盞食前熱飲之

胡雲六朝奉七十餘因擗後悞與荆芥大黃等藥傷正氣以致惡血結聚今則小便如淋中滿食少以此治之

生芪錢三 人參錢二 歸頭 白朮

陳皮錢一

作一帖煎服

又生氣藥

縮砂錢三 海金沙 紅麴錢二 檀香錢二

木香 白荳蔻 丁香錢一

分六帖研薏仁十四枚入生氣散

死血作淋牛膝膏妙但虛人能損胃不宜食

本治婦人諸般淋苦杖根俗呼杜牛膝多取洗淨碎之以

一合用水五盞煎至一盞去渣入麝香乳香少許研調下

雜方

鄞縣武尉耿夢得其內人患砂石淋者十三年矣每漩痛楚不可忍溺器中小便下砂石剝剝有聲百方不效偶有此方啜之一夕而愈目所見也

耳
[干]用牛膝以酒煮服治小便淋痛肘後方用牛膝根莖葉亦以酒煮服治小便不利莖中痛欲死及治婦人血結堅痛如神蓋牛膝治淋之聖藥也但虛人當用補劑監治之

世茄樹散治放尿有血帶血線童子小便煎茄樹根汁服之効

[羅]琥珀散治五淋瀝瀝痛小便有膿血出

琥珀研

海金砂研

沒藥研

蒲黃各一兩研

右研為細末每服三錢食前煎葶草根湯調下日三服黃明之小便澁莖中痛不可忍相引脇下痛制以茯苓琥

珀湯主之

川練子

去核判炒

甘草

生各一錢

人參五分

玄胡索

七分

茯苓

四分

琥珀

澤瀉

歸稍

柴胡各三分

右咬咀都作一服長流水三盞煎至一盞去渣溫服空心食前數服大効

[瑞]治諸般砂石淋琥珀二錢研細空心用葱白頭濃煎湯調下無間諸般淋證一二服立効丹溪云琥珀古今方用者反受其滲急之苦耳本草琥珀消汚血極驗

無鹿角霜丸治膏淋

鹿角霜

白茯苓

秋石

各等分

右為末糊丸如桐子大每服五十九丸米飲下

[圖]治石淋導水用螻蛄一枚鹽二兩同于新瓦上鋪蓋焙

實熱

乾研末温酒調下一錢七服之即愈

靈苑治五種淋疾氣淋熱淋勞淋石淋及小便不通至甚者透膈散用硝石一兩不夾泥土雪白者研為末每服二錢諸淋各依湯使如勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子煎湯下通後更須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚子內隔紙炒至紙焦為度再研令細用温水調下小便不通小麥湯下卒患諸淋並以冷水調下並空心先調使藥消散如水即服之更以湯使送下服藥未効者服此立愈

子和百亭劉十三之子年六歲病砂石淋戴人以苦劑三涌之以益腎散三下之立愈 鹿邑一閭閻之家有子二

十三歲病膏淋三年矣鄉中醫不能治往京師備訪多作虛損補以温燥灼以針艾無少減聞戴人僑居滬東見戴人曰惑蠱之疾也亦曰白淫實由少腹熱非虛也可以涌以泄其人以時暑憚其法峻不決者三日浮屠一僧曰予亦有暑病近覺頭痛戴人曰亦可涌願與君同之母畏之于是涌痰三升色如黑礬汁內有死血并黃綠水又瀉積穢數行尋覺病去方其來時面無人色及治畢次日面如醉戴人慮其暑月路遠又處數方使歸以自備云 屈村張氏小兒年十四歲病約一年半矣得之夏秋發則小便大痛至握其峻跳躍旋轉號呼不已小便數日不得下下則成砂石大便秘澁肛門脫出一二寸諸醫不能治求治于戴人戴人曰今日治今日効時日在辰巳間矣以調胃承氣僅一兩加牽牛頭末二錢汲河水煎之令作三五度

咽之、又服苦末丸如芥子許六十九日加晡上涌下泄一
時齊出有膿有血涌泄既覺定令飲新汲水一大盞小溲
已利一二次矣是夜凡飲新水二三十遍病去九分止哭
一次明日困卧如醉自晨至暮猛然起走索食于毋歌笑
自得頓釋所苦繼以太白散八正散等調理一日大瘥恐
暑天失所養留五日而歸戴人曰此下焦約也不吐不下
則下焦何以開不令飲水則小便何以利大抵源清則流
清也苦末丸
未詳考

丹諸淋皆屬於熱余每用黃栢滋腎丸每百丸用四物湯
加甘草稍杜牛膝木通桃仁滑石木香煎湯空心吞服兼
灸三陰交如鼓應桴累試累效者

保淋悶者涼膈散加滑石四兩茯苓一兩涼膈散方
見治發熱
羅石葦散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宜出

少起數臍腹急痛或尿如荳汁或便出砂石並皆治之

木通 石葦 滑石各二兩 炙甘草

王不留行 當歸各一兩 白朮 瞿麥

芍藥 葵子各二兩

右為細末每服二錢小麥粥湯調下空心服一方加沉香陳皮無滑石瞿麥白朮木通

本治心經熱小便澁及治五淋火府丹

生地 木通 黃芩 甘草

右為細末煉蜜杵丸如桐子大每服二十粒木通煎湯下此藥治淋澁臍下滿痛

右二方解熱利小便兼補之劑

無石燕丸治石淋多因憂鬱氣注下焦結所食鹹氣而成令人小便礮痛不可忍出砂石而後小便通

石燕燒令通赤水中燂三次搗研水飛焙乾 滑石

石葦去毛 瞿麥穗各一兩

右為末糊丸桐子大煎瞿麥燈心湯下十九食前服日
二三

羅海金砂散治小便淋澁及下焦濕熱氣不施化或五種
淋疾癰閉不通

海金砂研 木通 瞿麥穗 滑石

通草各半兩 杏仁湯洗去皮尖

右為細末入燈心同煎空心服

八正散治小便赤澁或淋閉不通及熱淋並宜服之

大黃麩裏煨 木通 瞿麥 滑石

篇畜 車前子 山梔仁 甘草各等分

右為末入燈心同煎小兒少少與之

潔葵花散治小便淋澁經驗葵花根一味洗淨剉水煎五

七沸服之立効味甘寒

世葛粉丸治男女淋病疼痛効速勿輕忽之

沙糖本草云治心脾大腸熱 葛粉

和丸如桐子大井花水化開一二丸

治血石淋楊樹蛙脣烏梅一大棗三水一盞煎服

靈苑治卒患諸淋遺澁不止小腸赤澁疼痛三葉酸漿草

入家園林亭檻中着地開黃花味酸者是取嫩者淨洗研

絞自然汁一合用酒一合攪勻空心服之立通三葉酸漿草即布谷

飯詳見白帶門

無葎草汁治膏淋及尿血葎草搗汁二升醋二合和空腹

服一盞又濃煮汁飲亦治淋瀝尿血葎草俗名辣母藤又名葛勒蔓處處離牆

之上有

胞痺似淋屬寒

胞移熱于膀胱則癃溺血全文見診病傳變胞謂女子胞也

難痺論云胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀于小便上為清涕夫膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客于胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便以足太陽經其直行者上交巔入絡腦下灌鼻竅則為清涕也治胞痺小便不通腎着湯千金河間方同

赤茯苓

去皮

白朮

各四兩

甘草

炙三兩

乾薑

炮一兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去渣溫服日三

茯苓丸治胞脾小便內痛

赤茯苓

防風

細辛

白朮

澤瀉

官桂各半兩

瓜蒌根

紫苑

附子

黃芪

芍藥

甘草

炙各三分

生地

牛膝酒浸

山芋

獨活

半夏湯浸

山茱萸各一分

右十八味為細末煉蜜丸如桐子大每服十九溫酒送

下食前

巴戟丸治胞脾臍腹痛小便不利

巴戟

去心一兩半

桑螵蛸

炒

遠志

去心

生地

山芋

附子

炮

續斷

各一兩

肉苁蓉

酒浸各一兩

杜仲

炙

石斛

鹿茸

酥炙

龍骨

兔絲子

五味子

山茱萸

官桂各三錢

右十六味為細末煉蜜丸如桐子大溫酒下三十九空

心食前

腎瀝湯治胞痺小腹急小便不利

桑白皮炒

犀角屑

杜仲炙去絲

五加皮

麥門冬

木通

桔梗各一兩

赤芍藥錢五

右八味為麤末每服五錢水一盞半羊腎一箇切竹瀝少許同煎去渣溫服

諸淋皆屬於熱古方有冷淋蓋十百之一也今因胞痺屬風寒濕故主寒條

雜方

無瞑眩膏治諸淋疼痛不可忍受及砂石淋大蘿蔔切一指厚四五片好白蜜淹少時安淨鉄鏊上慢火炙乾又蘸又炙盡蜜二兩番覆炙令香軟不可焦候蜜盡細嚼以鹽湯一盞送下立効

聖治冷淋小腸不利莖中急痛用斛葉搗末每服二錢水一盞葱白七寸煎六分去渣食前溫服

崔療石淋便中有石子者胡桃肉一升細米煮漿粥一升

病禁

相和頓服即瘥胡莩性熱

運氣小便淋氣及針灸淋闕法並見小便淋闕門

仲淋家不可發汗發汗則便血淋之為病小便如粟狀

小腹弦急痛引臍中

腎脉滑實為癰瘕全文見治虛實法

脉少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則氣淋

素病有癢者一日數十洩此不足也身熱如炭頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也太陰脉細微如髮者此不足也其病安在名為何病岐伯曰病在太陰其盛在胃頗在肺病名曰厥死不治奇病論○癢病脉細不治

胎前淋闕

丹轉胞病胎婦稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之古方皆用滑利疎導藥鮮有應効因思胞為胎

虛

診

所壓展在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起懸在中央胞系得踈水道自行然胎之墜下必有其由一日吳宅寵人患此脉之兩手似瀝重取則弦左手稍和予曰此得之憂患瀝爲血少氣多弦爲有飲血少則胞弱而不能自舉氣多有飲中焦不清而溢則胞知所避而就下故喜墜遂以四物湯加參朮半夏陳皮生甘草生薑空心飲隨以指探喉中吐出藥汁候少頃氣定又與一貼次日亦然如是八貼而安此法果爲的確恐偶中耳後有數人歷歷有效未知果何如耶仲景云婦人本肌盛頭舉身滿今反羸瘦頭舉中空減胞系了戾亦致胞轉其義未詳必有能知之者一婦人四十一歲妊孕九箇月轉胞小便不出三日矣下急脚腫不堪存活來告急予往視之見其形悴脉之右瀝而左稍和此飽食而氣傷胎系弱不能自舉而下墜

着膀胱偏在一邊氣急爲其所閉所以水竅不能出也轉胞之病大率如此予遂製一左補血養氣血氣既正胎系自舉則不下墜方有安之理遂作人參當歸身尾白芍藥白朮帶白陳皮炙甘草半夏生薑煎湯濃與四貼任其叫噉至次早天明又與四貼藥查作一貼煎令頓飲之探喉令吐出此藥湯小便立通皆黑水後就此方加大腹皮枳殼青葱葉縮砂仁二十貼與之以防產前後之虛果得就薦平安產後亦健一婦人妊娠七八箇月患小便不通百醫不能利轉加急脹診其脉細弱予意其血氣虛弱不然水載其胎故胎重墜下壓住膀胱下口因此溺不得出若服補藥升扶胎起則自下藥力未至愈加急滿遂令一老婦用香油塗手自產門入托起其胎溺出如注脹急頓解一面却以人參黃芪升麻大劑煮服或少有急滿仍用

熱

手托放取溺如此三日後胎漸起小便如故

仲問曰婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也

師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小

便則愈宜腎氣丸主之即八味丸方見治法酒下十五丸至二十九日再服

產療小便不通及胞轉桑螵蛸搗末米飲服方寸七日三

仲妊娠有水氣重身小便不利洒淅惡寒起即頭眩葵子

茯苓散主之

葵子 茯苓各三兩

右二味杵為散飲服方寸七日三服小便利則愈

妊娠小便難飲食如故歸母苦參丸主之

當歸 貝母 苦參各四兩

右三味末煉蜜丸如小昔天飲服三丸加至十九男子加滑

石半兩

肺氣鬱

外治妊娠患子淋猪苓五兩一味為末以白湯三合服方

寸七漸至二七日二夜一

天治妊娠卒不得小便杏仁一味去皮尖搗丸如大棗豈

燈心湯吞七粒立利

丹朱宅婦人三十餘歲四箇月胎大小便閉因與通利冬

葵子等藥已通但氣未順此由性急血耗氣亂須和其氣

滋其血乃安

陳皮 青皮 芍藥錢一 人參

歸身尾 川芎 地黃 白朮兩半

茯苓 木通 甘草二分

針灸 甲小腸難水脹滿溺出少胞轉不得溺曲骨主之 胞轉

不得小便小腹滿關元主之

產後淋閉

汚血

無治產前後淋其法不同產前當安胎產後當去血瞿麥
蒲黃最為產後要藥

茅根湯治產後諸淋主之

白茅根八兩

瞿麥

葵子二兩

白茯苓

各四兩

人參二兩

蒲黃

桃膠

滑石

甘草各一兩

紫貝十箇

石首魚枕石

煨

右剉為散每服四錢水一盞半薑三片燈心二十莖煎
至七分去查溫服亦可為末木通煎湯調下

滯氣

大療產後小便不通用陳皮去白為末空心服酒調二錢
一服便通

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒用鹽填臍中却以
葱白剝去粗皮十餘根作一縛切作一指厚安鹽上用大
艾炷滿葱餅上以火灸之覺熱氣入腹內即時便通神驗

小便數

數而少
為實

羅中書右丞合刺合孫病小便數而短晝夜約二十餘行
臍腸填滿腰脚沉痾不得安臥季春下旬一日奉勅治之
遂往診視脉得沉緩時時帶數常記小便不利有三不可
槩論若津液偏滲於腸胃大便泄瀉而小便澁少者一也
宜利而已若熱搏下焦津液則濕熱不能行者二也必滲
瀉則愈若脾胃氣澁不能通調水道下輸膀胱而化者三
也可順氣令施化而出今右丞平素膏梁濕熱內蓄不得
施行膀胱竅澁是以起頻而見少也非滲泄分利則不能
快利遂處一方名曰茯苓琥珀湯內經曰甘緩而淡滲熱
搏津液內蓄臍腹脹滿當須緩之泄之必以甘淡為主遂
以茯苓為君甘寒滑以利竅澁猪苓琥珀之淡以滲泄利
水道故以二味為臣脾惡濕濕氣內蓄則脾氣不舒益脾

勝濕必以甘為助故以甘草白朮為佐賦入腎賦味湧泄為陰故用澤瀉之賦以泄伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行以辛散之桂枝味辛散濕潤燥故以為使煎長流甘爛水使不助其腎氣大作湯劑令直達于下而急速也兩服減半旬日良愈

茯苓琥珀湯

茯苓

白朮

琥珀各半兩

甘草炙

桂去皮各三錢

澤瀉兩

滑石七錢

猪苓兩

右為細末每服五錢煎長流甘爛水一盞調下空心食前待少時以美饍壓之

數而為虛

食主下焦虛冷小便數損無力生薯蕷半斤刮去皮以刀切碎于鐺中煮酒沸下薯蕷不得攪待熟加鹽葱白更添酒空腹下二三盞妙

羅水芝丸治上焦真氣虛弱小便頻數日夜無度

蓮肉

去皮不以多少用好酒浸一兩宿猪肚一箇將酒浸蓮肉入肚中多半為度水煮熟取出蓮肉

切焙乾

右為細末酒煮麪為丸如芡實大每服五十九米飲湯下食前

虛寒

世治夜少小便用益智二十四箇為末鹽五分水一盞煎八分臨臥溫服

本衛真湯治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱真陽不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺來盜汗面無精光唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛背倦心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無味日漸瘦悴外腎濕癢夜多小便腫重冷痛牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白帶下漏分五色子宮感寒久不成

孕並皆治之此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺極之際補腎實臟男子攝血化精諸病未萌之前皆能制治使不復為梗

當歸一兩酒浸一宿

人參半一兩

金釵石斛五兩

白茯苓

木香

肉苳蔻

山藥已上各三兩

生地二兩

熟地溫水洗三兩

丁香一兩

青皮一兩去白

川牛膝二兩童便酒各半盞浸一宿

右為細末每三大盞酒調下鹽亦得空心食前一服婦人諸病童便同酒調空心下

又左治男子婦人一切虛冷之疾活血駐顏減小便除盜汗治婦人久不生產似帶疾而非時有遺瀝並皆治之功驗不可具述

蒼朮切

川煉子

茴香

吳茱萸湯洗

破故帛

胡蘆芭已上各一兩並炒

川姜

川烏

草烏已上各半兩炮

山藥二兩

右各炮治如法同為細末醋糊為丸如桐子大每服十五丸空心溫酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日二服耳目永不昏聩髮髮不白

衍隣家有一男子小便日數十次如稠米泔色心神恍惚瘦瘁食減令服桑螵蛸散末終一劑而安此藥能安神魂定心志治健忘小便數補心氣用桑螵蛸遠志菖蒲龍骨人參茯苓當歸龜甲醋炙已上各一兩為末以人參湯調下二錢

海薑附石脂神砂丹治小便數而不禁怔忡多忘方見帶下

丹因看盧氏醫鏡見此一藥味數分兩同惟丹砂用伏火者及治病有差所治者小便數而不禁怔忡多忘魘夢不

已不同耳見其不同審而詳之乃得此治法不差且泛論之經言腎主大便肝主小便淋洩難經云小腸為赤腸是面赤色及便溺色赤皆出心與小腸南方赤色顯於外也經言下焦如瀆者正謂大小便也大便為陰為有形氣化乃下焦之下者也謂腎主大便不言大腸者明子行父道為腎臟病小便為陽為無形氣化乃下焦之高者也謂肝主小便淋洩亦是子行父道為腑病凡諸無形氣化者皆腑病所主諸有形氣化者皆臟病所主此二証俱在下焦則同但有形無形及在腑在臟有殊俱是丹田衰敗不言心火者以其相火代行君之政令故也細分之則膀胱壬水勝丙火小腸者不傳入陰故為泄血泄血利不禁為有形質病且不傳陰則陰不病何為有形病此為陰之體也為腑之用也天地陰陽互為體用以斯可見是明五臟者

為六腑所用六腑者為五臟所用明矣是有形皆為傳陰也大小便不禁是膀胱不禁為遺溺此不傳陰也是丹田胞絡受寒為壬所克大抵諸腑皆乘有形有病者皆在腑責其所乘皆在臟也用伏火丹砂者去其寒性耳治法同者以其俱在下焦補諸無形同在胞絡耳以其胞與腎相對有渠相通故也腎主大便肝主小便所治安得不殊經曰腎肝同歸一治又曰少陽主骨所生病便洩難膀胱主筋所生病亦可知也小便不禁茯苓湯下大便不禁米飲下此論局方姜附神砂丹而發運氣小便數皆屬火經云少陽之復便數憎風是也小便數惟二藏有之

運氣

數而又屬肺

一屬肺經云肺手太陰之脉氣盛有餘則有背痛風寒汗出中風小便數而欠是也以刺言之瀉手太陰則愈

夜臥多驚屬肝

針灸

一屬肝經云足厥陰之瘧令人如瘡狀而小便不利又云肝痺者夜卧則驚多飲數小便是也視虛實補瀉之則愈

東小便數腹痛

尿胞在玉泉下一寸屈骨端

玉小便多

命門隨年壯炎

腎俞

一分沿皮向外六分補六呼尋一吸

集小便滑數

中極炎

腎腧

陰陵泉

不已取

氣海

陰谷 三陰交

溺赤

便赤為熱

諸病水液渾濁皆屬於熱全文見診

小便黃者少腹中有熱

也全文見水腫

小便黃無如黃栢知母効

脈澹脛冷為寒

脈尺澹足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯足太衝補之

臟腑

臟腑小便黃有四

一屬肝熱經云肝熱病者小便先黃是也

二屬胃實經云胃足陽明之脈氣盛則身已前皆熱其有

餘於胃則消穀善饑溺色黃是也

三屬肝虛經云肺手太陰之脈氣虛則肩背痛寒少氣不

足以息溺色變故耳

四屬腎虛經云冬脈者腎脈也冬脈不及則令人眇清春

痛小便變是也

運氣

運氣小便黃有二

一屬風經云厥陰之勝祛脇氣并化而為熱小便黃赤是

也

二屬熱經云少陰司天熱淫所勝病溺色變又云少陽之

勝溺赤善驚又云陽明司天燥氣下臨暴熱至乃暑陽氣

鬱發小便變是也蓋暴熱謂地氣少陰之熱也

邪之所在皆為不足中氣不足溲便為之變補足外踝下

針灸

留之

全文見刺虛實法

甲小腸有熱溺赤黃中管主之 溺黃下廉主之 小便黃赤完骨主之 小便黃腸鳴相追逐上廉主之

遺溺

垣小便遺失者肺金虛也宜安臥養氣禁勞役以黃芪人參之類補之不愈當責有熱加黃栢生地甲乙云肺脉則少氣不足以息

下虛遊脫

下虛謂膀胱下焦虛經云水泉不止者是膀胱不藏也仲

景云下焦竭則遺溺失便其氣不能自禁制不須治久則愈又云下焦不歸則遺洩世用桑螵蛸鷄脬脰之類是也

丹治遺溺桑螵蛸酒炒為末薑湯送下二錢妙

無鷄內金散治溺床失禁鷄脬脰一具并腸洗淨燒為灰

男用雌女用雄即是鷄脬內黃皮研為末每服二錢酒飲

調服妙 又方用羊肚系盛水滿線縛兩頭煮熟取中水

頓服之瘥

山大人遺溺不知葶薇根細研酒下

丹鹿茸丸治久虛冷小便自濁滑數不禁

鹿茸 椒紅 桂 附子

牡蠣 石斛 補骨脂 肉蓯蓉

鷄脬脰 沉香各一兩 桑螵蛸三

右為末酒糊丸桐子大食前酒下二十九此方因沉香溪取之

之

又云鹿角屑炒黃為末温酒下二錢妙本草云鹿角逐陰

中邪氣惡血鹿茸丸方見虛條

河熱甚客於腎部手足厥陰之經廷孔鬱結極甚而氣血

不能宣通則痿痺神無所用故津液滲入膀胱而旋溺遺

失不能收禁也經曰目得血而能視耳得血而能聽手指

虛寒

汚血

寒熱鬱結

得血而能攝、掌得血而能握、足得血而能走、臟得血而能液、腑得血而能氣、然血所通流則氣亦然也。氣血先行則其中神自清和而應機能為用矣。故經曰：血氣者人之神，不可不謹養也。故諸所運動時習之，則氣血通利而能為用；閉塞之則氣血行微而其道不得通利，故劣弱也。若病熱極甚則鬱結而氣血不能宣通，神無所用而不遂其機，隨其鬱結之微甚而有不用之大小焉。是故目鬱則不能視色，耳鬱則不能聽聲，鼻鬱則不能聞香臭，舌鬱則不能知味。至如筋癢骨痺，諸所出不能為用，皆鬱結之所致也。丹：千金翼白薇散治尿出不知時。

白薇 本草云氣大寒

白芍藥 各等分

右為末，溫酒調下方寸七日，三服食前。

嘗治一男子遺溺不覺，膝洪大盛，以黃栢、知母、杜牛膝

為君，青皮、甘草為臣，木香為佐，桂些少反佐，服數貼大効。此法與前白薇散皆河間所謂熱甚，廷孔鬱結，神無所用，不能收禁之意也。

世神芎導水丸治遺尿有實熱者，每百丸空心白湯下，若一服利止後服。前法河間所謂廷孔鬱結不能收禁，此所謂淫氣遺溺，痺聚在腎，痺謂氣血不通也。

無茯苓丸治心腎俱虛，神志不守，小便淋瀝不禁，及遺泄白濁。

赤茯苓 白茯苓

右為末，以新汲水接洗澄去新沫，控乾別取地黃汁同好酒銀石器內熬成膏，搜和為丸，如桐子大，空心熱酒嚼下。

世用薏苡仁鹽炒煎服効。方見小兒

本燕蓐草主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主
噦氣即燕窠中草也

膀胱欬者欬而遺溺全文見欬

針灸

針灸遺溺法有四

其一取肝其二取督脉其三取三焦並見遺溺閉癃門其
四取肺經云手太陰之别名曰列缺其病虛則欠欬小便
遺數取之去腕一寸別走陽明者是也

東遺尿失禁 陰陵泉 陽陵泉二寸半 大敦七壯 又方

曲骨 陰陽 二陵泉各二寸半

甲遺溺關門及神門委中主之 氣癰小便黃氣滿虛則

遺溺石門主之

肝脉微滑為遺溺全文見治法

妊娠遺尿

診

熱 虛

大白薇散治妊娠不知尿出時方見前熱條

產後一味桑螵蛸散治妊娠小便數不禁方見前下虛條 又方

用鷄尾毛燒灰末酒調方寸匕

產遺尿

無婦人產虛產理不順致傷膀胱遺尿無時

丹嘗見尿胞因收生者不謹以致破損而得淋瀝病遂為

癰疾一日有徐婦年壯難產得此因思肌肉破傷在外者

宜可補完胞雖在腹恐亦可治遂診其脉虛甚予曰難產

之由多是氣虛產後血氣尤虛試與峻補因以參芪為君

芎歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐煎以猪羊胞中湯極

饑時飲之但劑小率用一兩至一月而安蓋令氣血驟長

其胞自完恐稍緩亦難成功矣

喬町婦人產後尿不禁面微浮晷發熱于午後此膀胱為

虛

坐婆所傷

黃芪

歸身尾

芍藥

各一錢半

白朮

錢一

人參

陳皮

甘草

各三分

右煎熟飲之

泄脫

雲桑螵蛸散治產後小便數及遺尿

桑螵蛸三十箇炒

鹿茸

酥炒

黃芪

各三兩

牡蠣

人參

赤石脂

厚朴

各二兩

右為細末空心米飲調下三錢七

又方

桑螵蛸半兩炒

龍骨

一兩

右為細末米飲調下二錢空心

前陰諸疾

陰縮陰縱

陰痿陰汗

陰冷陰痒

陰臭陰腫

陰痛陰吹

前陰諸疾前陰所過之脉有二一曰肝脉二曰督脉經云脉足厥陰之脉入毛中過陰器抵少腹是肝脉所過也又云督脉者起於少腹以下骨中央女子入繫庭孔循陰器男子循莖下至篡與女子等是督脉所過也

陰縮陰縱

寒熱

陰縮謂前陰受寒入腹內也陰縱謂前陰受熱挺長不收也經曰足厥陰之筋傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰氣是也

丹鮑兄二子餘歲玉莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股不能行兩脇氣上手足倦弱先以小柴胡加黃連大劑行其濕熱畧加黃柏降其逆上之氣其挺腫漸收漸減及半但莖中有堅塊未消遂以青皮一味為君佐以散風之劑末服外以絲瓜汁調五倍子末傅而愈 平江王氏子年三十

歲忽陰挺長腫而痛脉數而實用朴硝荆芥湯浸洗又用三一承氣湯大下之愈

針灸

內經刺灸前陰挺長之法有一經云足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其病實則挺長取之所別是也

診

明堂陰卵入腹、臍下六寸兩旁各一寸六分灸二七壯內經診陰縮而死者皆屬肝傷經云肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正當陰縮而攣筋兩脇骨不舉毛悴色夭死于秋又云厥陰終者喜溺舌卷卵上縮是也

陰痿陰汗陰冷陰臭

肝陰痿傷

陰痿皆耗散過度傷于肝筋所致經云足厥陰之經其病傷于內則不起是也

陰汗脾

垣陰痿陰汗臊臭論○一富者前陰間嘗聞臊臭又因連

濕熱

日飲酒腹中不和求予治之予應之曰夫前陰者足厥陰之脈絡陰器出其挺末臭者心之所走散入于五方為臭入肝為臊臭此其一也當于肝經中瀉行間是治其本後於心經中瀉少衝以治其標如惡針當用藥除之治法當求其本連日飲酒夫酒者氣味俱能生濕熱是風濕熱合於下焦為邪故經云下焦如瀆又云在下者引而竭之酒者是濕熱之水亦宜決前陰以去之是合下焦二法治之

上濕制腎治法

龍膽瀉肝湯治陰部時復濕痒有臊臭

柴胡稍

澤瀉各一錢

車前子

木通各五分

當歸稍

龍膽草

生地各三分

右剉如麻荳大作一服水三大盞煎至一盞去查稍熱服空心宿食消盡服便以美饌壓之柴胡入肝為引用澤瀉車前子木通其淡滲之味利小便亦除臊臭是名

在下者引而竭之生地黃草龍膽之苦寒瀉酒濕熱更兼車前子之類以徹肝中邪氣肝主血用當歸以滋肝中血不足也

固真陽治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後有餘滴臊氣尻醫并前陰冷惡寒而喜熱膝亦冷正月內定此方

升麻

柴胡

羌活錢各一

甘草炙

澤瀉錢各半

草龍膽炒

知母炒

黃柏各二錢

右剉碎麻苳大水三盞煎至一盞去渣稍熱空腹服以美饌壓之

溫腎湯治面色痿黃身黃脚軟弱無力陰汗陰莖有干色二月定此方

麻黃分六

防風根一分

白朮錢一

蒼朮半錢

澤瀉錢二

猪苓

升麻

白茯苓

黃柏酒各一錢

柴胡稍分六

右件分作二服每服水二大盞煎至一盞去渣稍熱服食前天晴明服之候一吋辰許方食

補肝湯治前陰如冰冷并冷汗兩脚痿弱無力

黃芪分七

人參

葛根各三分

甘草炙分五

升麻分四

知母

柴胡

羌活

陳皮

歸身

黃柏炒

防風

白茯苓

澤瀉各二分

蒼朮分五

麩末分二

猪苓分四

連翹分二

右咬咀水二大盞煎至一盞去渣稍熱服食前忌酒濕麩

清震湯治溺黃臊臭淋瀝兩丸如水陰汗浸兩股陰頭亦冷正值十二月天寒凜冽霜雪交集寒之極矣

升麻分五

柴胡分二

羌活錢一

黃柏酒一錢

蒼朮分五

防風分三

甘草分二

藁本分三

紅花分一

歸身分二

猪苓分三

澤瀉

黃芩分五

麻黃根分三

右剉如麻豈大都作一服水二大盞煎至一盞去查臨臥服忌酒濕麪

柴胡勝濕湯治兩外腎冷兩髀樞陰汗前陰痿弱陰囊濕痰臊氣

澤瀉半一錢

羌活半一錢

升麻半一錢

生甘草

柴胡各三錢

草龍膽錢一

黃柏酒二錢

紅花少許

當歸稍

麻黃

漢防已

茯苓各一錢

五味子二十箇

右咬咀水三大盞煎至一盞去查稍熱服食前忌酒濕

麪房事

垣仲景八味丸治陽事多痿不振今依全方夏減桂附一

半春秋三停減一

疾去精足全減桂附只依六味地黃丸〇八味方見治法

腎脉大甚為陰痿全文見診

運氣

運氣陰痿皆屬濕土制腎經云太陰司天濕氣下臨腎氣

上從陰痿氣衰而不舉是也

雜方

椒粉散治前陰兩丸濕痒秋冬尤甚冬月減

麻黃錢一

黑狗脊分五

斑猫二箇

猪苓分三

肉桂分二

歸稍分三

輕粉少許

紅花少許

蛇床子分五

小椒分三

右為極細末滲上避風寒濕冷處坐臥

丹腎囊濕痒先以吳茱萸煎湯洗之後用吳茱萸半兩寒水石三錢黃柏二錢半獐獠蛇床子各半兩輕粉一錢白

礬三錢硫黃二錢栴榔三錢白芷三錢為末糝之

千有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜痛悶不得眠取生椒擇之洗淨以布帛裹着丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取出瘥

本曾有人陰冷漸次冷氣入陰囊腫滿晝夜疼悶不得眠煮大薊汁服立瘥

內經針灸陰暴痒痛足厥陰之别名曰蠹溝上內踝五寸是也全文見針灸門

撮陰痿 關元補 陰濕 陰谷寸半

惟穴陰中濕痒外腎生瘡 海底在脬囊底十字文縫中灸瀉二十七壯

獨陰在足第二指節下橫文灸瀉二十七壯

陰冷陰腫陰痛陰吹

溪婦人陰腫腎痛枳實半斤切碎炒熱布裏包熨之冷即

易錄

交接勞復陰卵痛是勞復陰陽易

仲胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之方見

黃疸

繫男子陰頭痛女子陰中痛 大敦

集陰莖虛痛 中極 太溪 三陰交 復溜不已取血

郄 陰陵泉 關元 海匡

甲婦人陰中痛少腹堅急痛陰陵泉主之 女子陰中寒

歸來主之

筋 轉筋 霍亂轉筋

靈足太陽之筋起於足小指上結於踝邪上結于脉其下循足外側結于踵上循跟結于膕其別者結于膝外上膕中內廉與膕中并上結于髀上挾脊上項其支者別入結

經筋診法

于舌本其直者結于枕骨上頭下頰結于鼻其支者為目
上綱下結于頰其支者從腋後外廉結于肩髃其支者入
腋下上出缺盆上結于完骨其支者出缺盆邪上出于頰
其病小指支跟腫痛腫攣脊反折項筋急肩不舉腋支缺
盆中紐痛不可左右搖治在燔針劫刺以知為數以痛為
輸名曰仲春痺以知為數以痛為輸者言經筋病用燔針
如取經脈法有幾呼吸幾吸幾度之定數也但隨筋之痛
處為輸穴亦非如取經脈法有榮俞經合之定穴也

足少陽之筋起于小指次指上結外踝上循脛外廉結于
膝外廉其支者別起外輔骨上走髀前者結于伏兔之上
後者結于尻其直者上乘眇季脇上走腋前廉繫于膺乳
結于缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額
角交巔上下走頷上結于頰支者結于目眥為外維其病
小指次指支轉筋引膝外轉筋膝不可屈伸膺筋急前引

髀後引尻即上乘眇季脇痛上引缺盆膺乳頸維筋急從
左之右右目不開上過右角並躄脈而行左絡于右故傷
左角右足不用命曰維筋相交治在燔針劫刺以知為數
以痛為輸名曰孟春痺也

足陽明之筋起于中三指結于跗上邪外上加于輔骨上
結于膝外廉直上結于髀樞上循脇屬脊其直者上循髀
結于膝其支者結于外輔骨合少陽其直者上循伏兔上
結于髀聚于陰器上腹而布至缺盆而結上頸上挾口合
于頰下結于鼻上合于太陽太陽為目上綱陽明為目下
綱其支者從頰結于耳前其病足中指支脛轉筋脚跳堅
伏兔轉筋髀前腫癢疝腹筋急引缺盆及頰卒口僻急者
目不合熱則筋縱目不開頰筋有寒則急引頰移口有熱
則筋弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏膏其急者以白酒

和桂以塗其緩者以桑鈎鈎之即以生桑灰置之坎中高下以坐等以膏熨急頰且飲美酒噉炙炙肉不飲酒者自強也爲之三拊而已治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸名曰季春痺治在燔針之上當有其病轉筋者五字如足宜施下筋寒轉筋之病其筋熱緩縱者則不宜也○搏擊也指也蓋治口咽僻之法以火烘馬之脂膏熨其半邊急者以白酒調和桂末塗其半邊緩者又以桑鈎鈎其口吻之僻偏復於故處使高下相等復以水調生桑灰於鈎柄之坎縫處連頰塗之以收其緩其桑鈎柄別用線繫縛於肩後使勿走作也復飲酒噉肉使筋味柔和以助外之塗熨不飲酒者則自強其筋骨使正以手相拍其熨處也張子和云左寒右熱則左急而右緩右寒左熱則右急而左緩故偏于左者左寒右熱偏于右者右寒左熱夫寒不可輕用辛熱之劑蓋左中寒則逼熱于右右中寒則逼熱于左陽氣不得宣行故也

足太陰之筋起于大指之端內側上結于內踝其直者絡于膝內輔骨上循陰股結于髀聚于陰器上腹結于臍循腹裏結于肋散於胃中其內者着於脊其病足大指皮內

踝痛轉筋痛膝內輔骨痛陰股引髀而痛陰器紐痛下引臍兩脇痛引膺中脊內痛治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟秋痺也

足少陰之筋起于小指之下並足太陰之筋邪走內踝之下結于踵與太陽之筋合而上結于內輔之下並太陽之筋而上循陰股結于陰器循脊內挾膂上至項結于枕骨與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者主癩癧及瘡在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸在內者熨引飲藥此筋折紐紐發數甚者死不治名曰仲秋痺也

足厥陰之筋起于大指之上上結于內踝之前上循脛上結內輔之下上循陰股結于陰器絡諸筋其病足大指支

內踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不起傷于寒則陰縮入傷于熱則縱挺不收治在行水清陰氣其病轉筋者治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸命曰季秋痺也

手太陽之筋起于小指之上結于腕上循臂內廉結于肘內銳骨之後彈之應小指之上入結于腋下其支者後走腋後廉上繞有腓循脛出走太陽之前結于耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結于頷上屬目外眥其病小指支肘內銳骨後廉痛循臂陰入腋下腋下痛腋後廉痛繞有腓引頸而痛應耳中鳴痛引頷目瞑良久乃得視頸筋急則爲筋癭頸腫寒熱在頸者治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸其爲腫者復而銳之本支者上曲牙循耳前屬目外眥上頷結于角其痛當所過者支轉筋治在燔針

劫刺以知爲數以痛爲輸名曰仲夏痺也

手少陽之筋起于小指次指之端結于腕上循臂結于肘上繞臑外廉上有走頸合手太陽其支者當曲頰入繫舌本其支者上曲牙循耳前屬目外眥上乘頷結于角其病當所過者即支轉筋舌卷治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸名曰季夏痺也

手陽明之筋起于大指次指之端結于腕上循臂上結于肘外上臑結于髀其支者繞有腓挾脊直者從肩髃上頸其支首上頰結于頰直者上出手太陽之前上左角絡頭下右頷其病當所過者支痛轉筋有不舉頸不可左右視治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟夏痺也

手太陰之筋起于大指之上循指上行結于魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下出缺盆結肩前髃

上結缺盆下結胃裏散貫貫合貫下抵季脇其病當所過者支轉筋痛甚成息貫脇急吐血治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰仲冬痺也

手心主之筋起于中指與太陰之筋並行結于肘內廉上臂陰結腋散前後挾脇其支者入腋散胃中結于臂其病當所過者支轉筋前及胸痛息貫治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰孟冬痺也

手少陰之筋起于小指之內側結于銳骨上結肘內廉上入腋交太陰挾乳裏結于胸中循臂下繫于臑臂當其病

內急心承伏梁下為肘網其病當所過者支轉筋筋痛治在燔針劫刺以知為數以痛為輸其成伏梁唾血膿者死

不治名曰季冬痺也名曰季冬痺也六字元誤在此後無用燔針之下今移在此經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽

急則反折陰急則俛不伸燔刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔針艾灸亦然今世不分寒急熱縱皆用艾灸者未知此理也

足之陽明手之太陽筋急則口目為噤皆急不能卒視治皆如右方也俱見靈樞經筋篇

形樂志苦病生于筋治之以熨引全文見治法

諸筋病皆屬于節經云諸筋者皆屬于節又云手屈而不伸者病在筋是也 肝主諸筋經云肝主筋又云在臟為

肝在體為筋又云酸生肝肝生筋筋生心是也 筋病忌風忌食酸辛忌久行經云風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸

又云酸走筋筋病無多食酸又云多食辛則筋急而爪枯又云久行傷筋走也

轉筋

血熱 丹轉筋皆屬血熱四物加黃芩紅花蒼朮南星有筋轉于

足大指轉上至大腿近腰結了乃因奉養厚飲酒感寒而作加酒茶紅花蒼朮南星薑煎服

雜方 聖治肝虛轉筋用赤蓼荳葉切作三合水一盞酒三合煎至四合去渣溫分二服

孫尚藥治脚轉筋疼痛攣急松節二兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只留一分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下同是筋病皆治之

外治轉筋取故綿以醎醋浸甑中蒸及熟用綿裹病人脚令更易勿停癢止

仲轉筋之為病其臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹者鷄屎白散主之用鷄屎白一味為散取方寸七以水六合和溫服

針灸

丹轉筋徧身入肚不忍者作極鹹塩湯于槽中暖浸之

靈轉筋于陽治其陽轉筋于陰治其陰皆燂刺之四時氣則經所謂以痛為輸之法蓋用火燒燂針切刺轉筋之時當察轉筋之痛在何處在陽刺陽在陰刺陰隨其所痛之處刺之故曰以痛為輸也若以針未刺則再刺之以知竟應效為度故曰以知為數是也

竇轉筋而疼灸承山而可治

足太陽之下血氣皆少則善轉筋踵下痛全文見治法

霍亂轉筋

皆作虛

海吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中四君子湯平

胃散建中湯方見治虛每服一兩水三盞姜五片煎至一

盞去渣溫服 如吐瀉轉筋自汗脈浮者四君子加桂五

錢主之 如吐瀉轉筋脇下痛脉弦者宜建中加木瓜柴

胡湯平胃散加木瓜五錢亦可也

桂枝二兩

芍藥三兩

甘草一兩

膠飴半斤

生薑一兩 大棗六枚 木瓜五錢 柴胡五錢

右劉如麻荳大每服一兩水三盞煮至一盞半去查下

膠飴兩匙煎化服 如吐瀉後小便不通胃中實痛者

四君子湯加大黃一兩主之 如吐瀉轉筋腹中痛體

重脉沉而細者宜四君子湯加芍藥高良姜湯四君子

湯四味各一兩芍藥良姜各五錢同煎法 如吐瀉

霍亂四支拘急脉沉而遲者宜四君子湯加姜附厚朴

湯四君子四味各一兩生姜附子厚朴炮製各三錢 同煎

服

如吐瀉轉筋四支厥冷脉微緩者宜建中湯加附子當歸

湯

桂枝一兩 當歸二錢 芍藥二兩 甘草半兩

膠飴半升 生姜一兩 附子三錢 大棗六枚

右同煎服

活香薷散治非時霍亂大渴煩燥汗出轉筋疼痛不可忍

方見傷寒吐利門

湯為執

丹怡六官霍亂泄多吐少口渴脚轉筋

滑石三錢 白朮二錢 蒼朮 厚朴

乾葛 陳皮各錢半 甘草此三錢 木通一錢

姜五片

下保和丸四十粒

本霍亂轉筋香薷煮汁飲之無不瘥者

肘治霍亂心腹煩短氣未得吐下若轉筋燒梔子二十

枚研末熟水調下

不渴為寒

保霍亂轉筋吐瀉不止宜半夏湯

半夏麩 茯苓 白朮各半兩 甘草炙

右為末渴者涼水下不渴溫水下無時如吐瀉不止身無汗者可與瀉痢門漿水散兼桂枝湯又可與白朮湯

直指木瓜湯治霍亂吐瀉轉筋擾悶

木瓜二兩

茴香二錢五分微炒

甘草炙二錢

吳茱萸洗焙七次二兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片烏梅少許煎溫服

活霍亂轉筋者用理中湯去朮加附子一枚生用理中湯方見傷寒

諸藥不効者寒熱煎施

本治霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不効者一粒青金丹

硫黃一兩研

水銀八錢

右二味鈔子內炒柳木篦子不住手攪勻更以柳枝蘸

冷醋頻頻洒候如鉄色結如青金塊方成刮下再研如粉留小半為散餘以粽子尖三箇醋約半盞研稀調得所成膏和丸如鷄荳大硃砂為衣每服一九煎丁香湯磨化下熱服如服散丁香湯調下一錢傷寒陰陽乘伏用龍腦冷水磨下日二三服

雜方

梅治霍亂轉筋皂角末一小荳許入鼻中取嚏便瘥

古今錄治霍亂轉筋取蓼花一把去兩頭以水二升半煮一升半頓服之

食治吐後轉筋煮木瓜汁飲之甚良

外治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生姜三兩搗碎以酒一升煮三四沸頓服

世霍亂之証輕則上吐下瀉兩脚轉筋甚則遍體轉筋腹肚疼痛手足厥冷若欲絕者倉卒之際宜于臍中灼艾及

針灸

用蓼一把煎湯炮洗次投以姜附理中湯之類其脉洪大

者易治脉微腎縮舌卷者不治

又法中風亦灸承山

東霍亂轉筋在兩臂及胸堂中者筋拘不及動搖 亶中

中府 巨闕 胃脘 尺澤 太陰灸七壯

甲霍亂轉筋 金門 僕參 承山 承筋主之

肝之合筋也其榮爪也全文見五藏 肝熱者色蒼而爪枯全文

痿見 多食辛則筋急而爪枯全文見五藏

醫學綱目卷之十四

醫學綱目卷之十五

肝膽部

頭風痛

產頭痛

偏頭痛

雷頭痛

大頭痛

眉痛

頭重

頭風屑

丹頭痛

多主於痰痛甚者火多有可吐者亦有可下者

垣金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣

東垣大法

者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目

內眥上額交巔直入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少

陽膽之脈起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從

上受之風寒傷上邪從外入客經絡令人振寒頭痛身重

惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之

則愈此傷寒頭痛也治法見傷寒條頭痛耳鳴九竅不利者腸胃

之所生乃氣虛頭痛也治法見氣虛條如氣上不下頭痛巔疾者

下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也治法

見寒濕條有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛治見寒條有心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也治見實條

頭痛分三陰三陽見陰陽條

諸血虛頭痛當歸川芎主之 諸氣虛頭痛人參黃芪主之 主者主治也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法也 血氣俱虛頭痛者於調中益氣湯加川芎蔓荊子細

辛其効如神 諸濕厥頭痛清空膏主之即風濕熱頭痛也方見濕氣條

諸痰厥頭痛半夏白木天麻湯主之方見脾土條 諸厥逆

頭痛羌活附子湯主之方見寒條 如濕熱在頭者以苦吐之

不可執方而治方見實條

三陽散而寒之

海三陽頭痛

羌活

防風

荊芥

升麻

葛根

白芷

柴胡

川芎

芍藥

細辛

蔥白連鬚分兩旋加

陰證頭痛只用溫中藥如理中薑附之類也

凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦

有三陰三陽之異 太陽經頭痛惡風寒脈浮緊川芎獨

活之類為主 少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡黃芩

主之 陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脈浮緩長實者升

三陰燥而溫之

麻葛根石膏白芷主之 太陰經頭痛必有痰體重或腹

痛為痰癖脈沉緩者蒼朮半夏南星主之 少陰經頭痛

三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃

附子細辛湯主之 厥陰經頭疼項痛或吐痰沫冷厥其

脈浮緩吳茱萸湯主之方見傷寒

清空膏治偏正頭痛年深不愈者及療風濕熱頭痛上壅損目及腦痛年深不止

羌活

防風各一兩

柴胡七錢

川芎五錢

甘草

炙一兩半

黃連兩

黃芩

三兩半酒製一兩半炒

右為細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨臥如苦頭痛每服中加細辛二錢如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛加羌活防風川芎甘草又加半夏一兩半如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴正陽明頭痛只與白虎湯加白芷
東垣云諸濕熱頭痛清空膏主之丹溪云東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂頭顛痛也

濕熱宜清之

丹小清空膏治諸般頭痛惟血虛頭痛不治用片芩細切

酒拌勻晒乾為末茶清調下酒亦可

垣清上瀉火湯昔有人年少時氣弱於氣海三里節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜風寒其頭痛便愈微來煖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活

三錢

防風

七分

升麻

七分

柴胡

五分

藁本

半錢

細辛

少許

川芎

二分

荆芥

二分

蒼朮

三分

蔓荊子

二分

黃芩

酒製一錢半

黃連

酒製半錢

黃柏

酒製一錢

甘草

五分

知母

酒製一錢半

當歸

三分

生地

半錢

黃芪

一錢

紅花

少許

右剉如麻荳大分作二服每服水二盞煎至一盞去渣稍熱服食遠

補氣湯服前藥之後服此藥

黃芪八分

甘草炙

歸身各二錢

柴胡

升麻各二分

細辛少許

麻黃炒

苦丁香各半錢

水煎服

安神散治頭旋眼黑頭痛

羌活一兩

防風二錢半

柴胡五錢

升麻五分

酒黃柏一兩

酒知母半錢

酒生地半兩

黃芪一兩

甘草炙三錢

生甘草三錢

右咬咀每服半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荊子半

錢川芎三分再煎至一盞臨臥去查熱服

右東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒栝加

風劑也

羅川芎散治頭風偏正頭痛昏眩

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草炙

香附子

石膏炙半兩

荊芥

薄荷

菊花

防風

茵陳各一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下日三服

石膏散治頭疼不可忍

麻黃去根

石膏各一兩

何首烏半兩

葛根七錢半

右為細末每服三錢生薑三片水煎稍熱服

石膏散治頭疼

川芎

石膏亂紋好者

白芷

右各等分為細末每服四錢熱茶清調下

本荊芥散治頭風王太醫方

荊芥

石膏煨存性等分

右為細末每服二錢薑三片蔥白三寸和鬚使水一盞

煎至七分食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風頭疼一切頭疼並皆治之

茵陳揀淨五兩

麻黃

石膏

煨存性各二兩

右為末每服一錢臈茶調下食後服服畢仰臥霎時

寒濕

玉真丸治腎氣不足氣逆上行頭疼不可忍謂之腎厥其脈舉之則弦按之則堅

硫黃二兩

石膏

煨通赤研

半夏

湯洗

硝石

研各一兩

右為細末研勻生薑汁糊為丸如桐子大陰乾每服二

十九薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子亦

佳虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

素問云頭疼巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎

狗蒙招尤目眩耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入

腎虛則頭痛耳聾虛則頭暈

肝下虛者腎虛也故腎虛則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈狗蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀也故肝厥頭暈腎厥巔痛不同如此治肝厥鈞藤散見眩門神妙丸治頭疼及腦風

食鹽

硫黃

各等分

右為末水調生麩為丸如桐子大每服十五丸用薄荷

茶食前下荊芥酒亦得

丹孫兆口訣治頭疼附子炮石膏煨等分為末入腦麝少

許酒茶下半錢妙

右硫附中加石膏之劑

治頭風如神附子一枚生去皮臍用菘荳一合同煮荳熟

為度去附子只喫荳立瘥每附子一枚可煮五次後末服

之修真秘要

本治氣虛頭疼用大附子一枚剝去心入全蝎二箇在內取前附子末同鍾乳一分麪少許水和裹炮熟却研為末以焦黃為度蔥茶調下一錢或半錢

又方用大附子

一枚和皮
臍生為末

大川芎

一箇剝
作四片

以水和附子末如麪劑裹川芎作四處如附子末少入少麪裹畢以針穿數孔子用真腦射薰其穴內覺附香再捻合穴子如未覺內有香即再薰一炷細羅成灰用銚子內熱灰炮熟末之每服半錢蔥茶調下不拘時候

右泗醫楊吉
老二方神效

右附子純熱例

大寒犯
腦項痛
齒亦痛

素帝曰人有病頭痛數歲不已此安得之名為何病岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆奇病論

垣羌活附子湯治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰腦風出奇病論中

防風

分二

黃芪

錢一

麻黃

錢一

蒼朮

半錢

升麻

分二

甘草

分二

黑附子

分一

羌活

半錢

白芷

白僵蚕

黃栢

各三分

右咬咀水煎去香溫服食後若有寒嗽加佛耳草三分

羅川芎神功散治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新並皆治之

川芎

兩一

甘草

半錢

川烏

生去皮臍

白芷

天南星

麻黃

去根各半兩

右為末每服三錢水二盞生薑三片煎至七分投清酒半盞和查溫服密室避風如人行五七里再服汗出為度其病立愈

救苦神白散治男子婦人偏正頭痛眉骨兩太陽穴痛及熱上攻頭目目赤不已項筋拘急耳作蟬鳴

川芎

甘草炙各八錢

甘松去土

赤芍藥

白芷

兩頭尖

川烏頭去皮臍各六錢

右為細末每服二錢溫茶調下服藥後飲熟水半盞

本治一切頭疼黑龍丸

天南星洗

川烏各半斤黑荳拌蒸三次

石膏兩半

麻黃

薄荷各四兩

藁本

白芷各二兩

京墨兩半

右為細末煉蜜杵丸彈子大每服一九薄荷茶湯調下

治傷寒頭疼太陽頭疼及一切頭疼

川烏炮

草烏各半兩

麻黃

川芎

防風

羌活各一兩半

地龍去土

全蝎一箇

雄黃

三錢

右為細末每服半錢食後茶清調下

垣麻黃吳茱萸湯治頭痛胸中痛食減少咽噎不利寒冷脈左寸弦急

麻黃

半錢

吳茱萸三分

黃芩二分

川烏一分

羌活

五分

細辛少許

蔓荊子一分

藁本

柴胡

黃芪各二分

蒼朮一錢

黃連二分

半夏

一分

黃柏

升麻各二分

紅花少許

當歸

二分

右咬咀作一服水二大盞煎至一盞去渣稍熱服食後

丹東陽陳允露筋骨體稍長患體虛而勞頭痛甚至有訣別之言予察其脈弦大而帶數以人參為君川芎陳皮為佐至五六日未減眾皆訝之以藥之不對也予曰藥力有

虛

次第更少俟一二宿當自安忽其季來問曰何不少加黃芪予不答又經一宿忽自言病頓愈予脈之覺指下稍盛又半日病者言胃上滿不覺飢視其腹紋已隱矣予曰藥中莫加黃芪否曰然止與三貼遂連與二陳湯加厚朴枳殼黃連以瀉其衛三貼而安

血虛頭痛自魚尾上攻頭痛必用川芎當歸湯眉尖後近髮際口魚尾

大一奇散治血虛頭痛神妙即芎歸湯也方見產頭痛又方用川芎半兩為末每服二錢臘茶調下甚效曾有產後頭痛者一服即愈

外治頭痛欲裂當歸一兩酒一升煮取六合飲至醉效
素頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也通評虛實論○東垣云此氣虛頭痛也用人參黃芪主之

氣虛頭痛治驗 叅謀栢仲實年六十一歲二月間患

頭痛不可忍晝夜不得眠邀往視之其人云近在燕京患頭昏悶微痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加復汗解病轉加而頭愈痛遂歸每召醫用藥雷同到今痛甚不得安臥惡風寒而不喜飲食診其脈弦細而微氣短而促懶言語內經曰春氣者病在頭今年高氣弱清氣不能上升頭面故昏悶此病本無表邪因發汗數四清陽之氣愈虧損不能上榮亦不能外固所以頭苦痛而惡風寒不喜飲食氣短弱宜升陽補氣頭痛自愈名之曰順氣和中湯

黃芪錢半 人參錢一 白朮分五 陳皮分三

當歸分五 芍藥分五 甘草分三 升麻分三

蔓荊子分二 柴胡分三 川芎分二 細辛分二

內經曰陽氣者衛外而為固也今年高氣弱又加發汗

衛外之氣愈損故黃芪甘溫補衛實表為君人參甘溫當歸辛溫補氣補血芍藥味酸收衛氣為臣白朮陳皮炙甘草苦甘溫養衛氣生發陽氣上實皮毛腠理為佐柴胡升麻苦辛引少陽陽明之氣上升通百脈灌漑周身者也川芎蔓荊子細辛辛溫體輕浮清利竅為使右件咬咀作一服水二盞煎至一盞去渣溫服食後服之減半再服而愈

氣血俱虛

垣調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛治氣血俱虛頭痛方

實

子和青黛散治頭風

猪牙皂角

玄胡索一分

青黛少

右為細末水調葶許鼻內灌之其涎自出先仰臥灌鼻俟喉中酸味即起身涎出口咬銅錢一文任流下

丹頭痛搐鼻取涎

葶撥

川芎

薄荷

白芷

細辛各等分

為末入猪膽內與汁拌勻陰乾再為末用無根水為丸如菴荳大青黛為衣每一丸茶清化灌鼻中口噙銅錢三文其涎來如泉一方有玄胡索藁本青黛無薄荷細辛

本治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近尅日取効名透頂散

細辛表白者三莖

瓜蒂七箇

丁香三粒

糯米七粒

腦子

麝香各一黑荳大

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻另自治為末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻用瓦甌子盛之謹閉

觀口患人隨左右搖之一大荳許良久出涎一升許則安

濕熱在頭必吐之

東垣云濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之若用上項搖鼻藥而涎少者必兼下項吐法治之

聖治痰厥頭痛以烏梅十箇取肉鹽二錢酒半盞合水煎至七分去查非時溫服吐即住

四頭痛難忍支風痰所致梔子末蜜和濃塗舌上吐即止

兵部集

頭痛非冷非風此膈有痰也濃煎茶啜一二升探吐之吐而又吐候苦汁出乃止不損人待渴自止妙

外臺秘要

子和茶調散瓜蒂好茶二味等分爲末每服二錢薑汁調下空心用之 丹霞僧病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱痛以布圍其巔上置冰於其中日易數次熱不能已諸

邪在胃必下之

醫莫識其證求見戴人戴人曰此三陽蓄熱故也乃置炭火於煖室中出汗涌吐三法併行七日方愈 常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一二次發必頭痛痛則擊數百拳出黃綠涎一二盞方愈此年發益頻目見黑花昏不知人三四日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一效戴人以雙解散發汗以苦劑吐痰病去八九續以分劑平調自春至秋如此數次方獲全瘥

邪在胃而頭痛者必下之其證必兼隔痞或動作則痛甚或右手脈滑盛者是也治法並見脾胃條

風

東風生於春病在頭命在頸項全文五臟春氣者病在頭惡風爲胃

頭面多汗爲首風

河新沐中風爲首風頭面多汗惡風當先風一日則病甚至其風日則少愈大川芎丸主之

治見諸風條

大川芎丸治首風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘倦

川芎斤一 天麻四兩用 鄆州者

右為末煉蜜丸每兩作十九每服一九細嚼茶酒下食後服

腦戶極冷為腦風

風氣循風府而上則為腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散主之

神聖散治腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭痛不可忍者

麻黃去節 細辛去苗 乾葛生一半 炒一半 藿香葉各等分

右為末每服二錢煮荆芥薄荷酒調下茶亦得并治血風證

又方治腦風邪氣留飲頭疼不可忍者用遠志末不以多少於鼻中搐於痛處揉之相兼前藥可用也

眼痛目暈為風痰

丹頭疼連眼痛此風痰上攻須用白芷開之

雨前茶 川芎 白芷 防風

台烏 細辛 當歸 為末湯調服

世偏正頭風川芎細辛防風白芷烏頭尖全蝎稍南星薑製麝香少許為末每一字温酒調服

丹頭風方

羌活錢三 細辛錢一 川芎錢二 乾葛錢二

甘草半錢 防風錢二 半夏錢一

右除川芎細辛二味外研為末用酒和炒晒乾入川細二味末和勻每服一錢茶清調下

又方

荆芥 草烏尖片七 防風 甘草

台芎 蔓荆子 桔梗 麻黃

右為末茶調服。

本治頭疼面赤煩悶咽乾上膈風痰頭目暈昏百節疼痛背項拘急芩辛丸

川芎 防風 僵蚕 獨活各一兩

桔梗三兩 麻黃 細辛 白附子

羌活 甘草各四兩 薄荷 荆芥各一兩半

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一粒茶酒吞下食後

散徹清膏

川芎三錢 蔓荊子一錢 細辛一分 藜本一錢

薄荷三分 生甘草半錢 炙甘草稍半錢

右為細末食後茶清調下一錢或半錢

本治頭目風荆芥穗細辛川芎等分為末飯後湯點二錢凡治頭痛皆用芩芷羌防辛等溫氣藥升散者由風木

風虛則壅塞而痛宜辛散之

虛不能升散而土寡于畏得以壅塞而痛故用此助肝木散其壅塞也若風盛踈散太過而痛服辛散藥反甚者則宜用酸澁收而降之乃愈後乳香盞落散是也

羅乳香盞落散治男子婦人偏正頭疼不可忍大有神効

御米殼去蒂四兩 陳皮 甘草炙 桔梗去蘆

柴胡去苗各一兩

右為細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長四指同煎七分去查食後溫服

垣半夏白朮天麻湯治太陰痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩

方見 闕眩門

東垣先生壯歲病頭痛每發時兩頰青黃眩暈目不欲開懶於言語身沉體重兀兀欲吐數日方過潔古老人曰此厥陰太陰合而為病名曰風痰宜以局方王壺丸治之少

風盛則踈散而痛宜酸收之

風濕痰

風濕藥二味可加雄黃白朮以治風濕更有水煮金花丸更灸俠溪二穴各二七壯不旬日愈是知方者體也法者用也徒知體而不知用者弊體用不失可謂上工信矣哉

金花丸方見咳嘔

丹徐舍人因作勞頭與目眩痛足冷身熱脈大而不甚數作勞痰治之

半夏錢二

川芎

黃芩

白朮

陳皮錢一

木通錢一

甘草少許

分二貼煎薑一片下保和丸三十九

羅茯苓半夏湯治風熱痰逆嘔吐或眩運頭痛

半夏三箇稍大者製

赤茯苓錢一

陳皮錢一

黃芩分一

甘草錢一

右用水二鍾生薑三片煎一盞分三服作一日溫服無

時

丹又治濕痰頭痛

黃芩酒炒

蒼朮酒炒

川芎

細辛各二錢

甘草錢一

為末搗生薑一片和勻茶清調服

賈孺人脈沉有痰頭痛

川芎錢一

澤瀉酒炒

白朮半酒

煎下茯苓丸三十粒茯苓丸方見痰飲門

聖治偏正頭疼併夾腦風連兩太陽頭痛以白僵蚕細研

為末用蔥茶調服方寸七

右濕痰頭痛用半夏南星及酒朮酒芩燥其痰也風痰

頭痛用風藥餘者並見風頭痛條

素陽明所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者陽明并於上上

鼻鼽腹腫邪在

者則其孫絡太陰也故頭痛鼻軌腹腫也脈解篇

孫館職學士張居易嗜酒散誕不為名利拘束忽發熱頭
疼俾翰林醫官治之十日愈甚諸學士共議召孫孫至脈
之曰餘人皆曰傷寒故作此疾也張學士好酒多痰食所
傷也今疾非傷寒而右手脈甚數左手脈平和此必傷酒
食而作頭痛宜喫食藥五七丸俟之半日進退決矣孫遂
用食藥經食久膈漸寬頭痛遂減再進利膈藥遂獲安大
凡陽邪頭疼經十日豈得不變發熱而狂亂故知非傷寒
乃食病之過也

丹胡孺人因喫冷粉與肉頭痛自汗膈痞小便赤

白木二錢 陳皮一錢 木通 川芎

黃芩各半錢

薑水煎熟吞下草荳蔻丸阿魏丸保和丸各五十粒

脈動作頭重痛熱氣潮者屬胃謂胃有酒食及痰疾之類也

丹頭痛如破酒炒大黃半兩茶煎服

右以酒炒大黃下頭痛蓋病在胃而頭痛者必下之方
愈也如孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛詳見本條
郭茂恂以黑龍丹下其嫂金華君產後汚血頭痛詳見
產後頭痛皆下咽即安是也

心火

心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰東垣清空膏之類

治之全文見治虛實後法

腎水

頭痛巔病下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎頭痛全文見治虛實法

見治虛實法

許學士謂之腎厥頭疼也用玉真丸治之東垣云此寒濕
頭痛氣上而不下也玉真丸方見寒熱條

運氣

運氣頭痛有四

一曰火鬱於上而痛經云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大濕其病氣拂於上頭痛二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上頭痛又云少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒而瘡治以寒劑為君也

二曰寒氣逐熱氣上行而痛經云歲金不及炎火乃行復則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱又云太陽之勝熱反上行頭項頂顛腦戶中痛目如脫又云太陽之復心痛痞滿頭痛治以熱劑為君也

三曰濕邪傷腎膀胱而痛經云太陰司天濕淫所勝腰脊頭項痛時眩又云太陰在泉濕淫所勝病衝頭痛目似脫項似拔又云太陰之復頭項痛重而掉瘳尤甚亦治以熱劑為君也

四曰陽明復氣兼非位之心病而痛經曰陽明之復欬噦

雜方

煩心病在膈中頭痛治以溫劑也

垣白芷散治風頭痛搐鼻

石膏錢二

薄荷錢三

芒硝錢二

鬱金

右細末口噙水搐鼻若症在太陽加羌活二錢防風一錢紅荳二粒為末搐之

川芎散搐鼻

青黛錢二

蔓荊子

川芎各一錢

芒硝各一錢

石膏錢三

細辛根錢一

薄荷葉錢二

紅荳粒一

右為末搐鼻

丹瘦人搐鼻藥

軟石膏

朴硝錢半

腦子

檀香皮

荊芥

薄荷葉各一錢

白芷

細辛錢三

羅如聖散治眼目偏痛頭風

麻黃燒灰

盆硝二錢

麝香

腦子各少

右件為細末搗之神效

又方

楊梅青

硝石

伏龍肝等

右為末搗鼻立效

河瓜蒂神妙散治偏正頭目昏眩及偏正頭痛

焰硝

雄黃

川芎

薄荷葉

道人頭

即蒼耳子藜蘆各一分

天竺黃一錢

右為細末含水鼻中搗一字神驗

右六方搗鼻治頭痛屬熱者也

本治八般頭風

草烏尖

細辛等

黃丹少

右為細末葦管搗入鼻中立效

丹治卒頭上痛皂莢末吹鼻嚏則止斗門方

世火筒散治頭風應驗方

蚯蚓糞四錢

乳香二錢

麝香少

右為末用紙筒自下燒上吸烟搗鼻內神效

仲頭風摩散方

大附子一枚

炮食鹽等分

右二味為末以方寸七摩疹上令藥力行

聖治風頭痛每天欲陰風雨先發者用桂心一兩為末以

酒調如膏用傳頂上并額角

治頭風餅子

五倍子

全蝎

土狗七箇

右為末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤透貼太陽

穴上灸熱貼之驗甚仍用帕子縛之啜濃茶睡覺即愈
聖治時氣頭痛不止用朴硝二兩為末生油調塗於頂上
經患頭風山荳根搗末油調塗之

食治熱風頭痛燒杏仁令烟盡去皮尖以亂髮裹之咬於
所患處齒下其痛便止

世偏正頭痛風醉頭風以草麻子九粒先用米調成膏塗
茶碗底却用火燒草麻仁烟出以茶碗覆薰烟上候烟盡
用少湯衝開服之覺額上痒是効

針灸
丹頭內如虫蛙響名天白蟻用茶子細末吹鼻中周氏方

靈厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰厥病篇下同

厥頭痛頭脈痛心悲善泣視頭動脈反盛者刺盡去血後
調足厥陰頭痛項腫盛者取血與厥陰厥頭痛貞貞都耕切頭重而痛

瀉頭上五行行五先取手少陰後取足少陰 厥陰頭痛

意善忘按之不得取頭面左右動脈後取足太陰 厥頭

痛項先痛腰脊為應先取天柱後取足太陽經云頭目苦痛取之項中

兩筋間蓋風府穴也又云足太陽脈是動則衝頭痛目如脫項似拔所生病者頭顛項痛故應頭痛取足太陽也

厥頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱瀉出其血後取足少

陽經云足少陽脈從耳後入耳中出走耳前所生病者頭痛故耳前後脈湧熱者取足太陽也真頭

痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治 頭痛不可取于

膻者有所擊墮惡血在于內若肉傷痛未已可側刺不可

遠取也 頭痛不可刺者大痺為惡日作者可令少愈不

可已 陽迎頭痛腦滿不得息取之人迎陽迎即陽逆也又云肝氣逆則

頭痛耳聾頰腫取血者是瘀血腫滿處取之也

摘偏正頭風 絲竹空沿皮向外透率谷 風池橫針入寸半透風府 合

谷半寸已上穴未愈再取 解溪 三里 中腕中腕一穴灸五分壯

集正頭風 百會一分灸七壯 上星二分灸七壯 合谷

不愈 神庭灸七壯 太陽在兩額角眉後紫脈

再取 醉頭風穴內攢竹一 印堂一分灸 攢竹一分沿皮 三

里 豐中灸 風門沿皮向

摘頭風面腫項強不得回顧 天牖五分留七呼不宜補

血腫脹合 當取下穴 諛諛六分留三呼瀉五吸後取天

潔頭風 後谿 京骨

右手足太陽

玉頭痛嘔吐 神庭一分 印堂在兩眉中沿皮透左攢竹

皮透右攢竹補三吸

摘風痰頭痛 豐隆五分灸 腎厥頭痛 湧泉三分彈

嘗治一老婦人頭痛久歲不已因視其手足有血絡皆紫黑遂用三稜針盡刺出其血如墨汁者數盞後視其受病之經灸刺之而得全愈即經所謂大痺為惡及頭

痛久痺不去身視其血絡盡出其血是也

甲腦風頭痛惡見風寒鼻衄鼻塞喘息不通承靈主之

頭痛身熱引兩頷急一作痛 腦空主之 頭痛目窻天衝風

池主之已上諸穴在頭部第三行也 善嚏頭痛身熱頷厭主之 熱

病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮疼懸

釐主之 熱病偏頭痛引目外眥懸釐主之 醉酒風熱

發兩角眩一云痛不能飲食煩滿嘔吐率谷主之千金云此條在

風 頤額措滿引牙齒口噤不開急痛不能言曲鬢主之

已上諸穴皆在耳前也 頭痛引頸竅陰主之 頭風耳後痛煩心

及足不收失履口喎僻頸項搖憇牙車急完骨主之已上諸穴

皆在耳後也 頭目瞳子痛不可以視俠項強急不可以顧陽

白主之 頭痛目眩頸項強急胸脇相引不得傾側本神

主之已上諸穴皆在面部也 頭痛振寒清淵主之 頭痛項背

急消灤主之 頭風痛鼻軌衄眉頭痛善嚏目如欲脫汗
出寒熱面赤頰中痛項強不可左右顧目系急瘵癢攢竹
主之 頭眩痛重目如脫項似拔狂見鬼目上反項直不
可顧暴攣足不任身痛欲拆天柱主之 風眩頭痛鼻不
利時嚏涕自出風門主之 暴病頭痛身熱痛肌肉動
耳聾惡風目皆爛赤項不可以顧髀樞痛泄腸辟束骨主
之 風眩頭痛少海主之 厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼
喜笑不休發於外有所大喜喉痺不能言豐隆主之 陽
厥凄凄而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小便不利善嘔
三里主之 厥頭痛面腫起商丘主之 厥頭痛孔最主
之 頭重項痛目不明風到腦中寒重衣不熱汗出頭中
惡風刺腦戶主之 頭重目瞑厥寒熱項強難以顧汗不
出陶道主之 頭痛如破身熱如火汗不出癰瘕裏急腰

診

股相引痛命門主之

素寸口之脈中手短者曰頭痛平人氣象論

推而下之而下而

不上頭項痛

脈診頭痛目痛久視無所見者死久視不見見諸脈病雜法下而不見諸脈病雜

卒視上而不下者是病若頭痛目痛脈急短濇死未詳其義

產後頭痛

血虛

大 一奇散治產後頭疼用當歸川芎為細末每服二錢水

一盞煎七分溫服

寒熱

丹 產婦年三十餘身熱頭痛肚痛

陳皮

白朮

白芍各二錢

黃芩半錢

川芎錢一

乾薑

牡丹皮

甘草各一錢半

荆芥錢半

分四貼煎服

保治產後頭痛血虛痰癱寒厥皆令頭痛加減四物湯

蒼朮一兩 羌活 川芎 防風

香附炒 白芷各一 石膏二兩 細辛乙兩

當歸 甘草各五錢

右麤末每一兩水煎服無時如有汗者知氣弱頭痛也方中加芍藥三兩桂一兩半生薑煎如痰癱頭痛加半夏三兩茯苓一兩生薑煎如熱痰頭痛加白芷三兩石膏三兩知母一兩如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑三片煎服

敗血

大芎附散治產後敗血作梗頭痛諸藥不效

右大附子一枚醱醋一碗用火四畔灸透蘸醋令盡去皮臍加川芎一兩並為細末每服一錢茶清下

郭茂恂嫂金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛

作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無瞬息間每頭痛甚欲取大石壓良久漸定心痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是十日不已衆醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服下瞑目寢如平常至平旦下一行約三升詐如蝗虫子三疾減半已刻又行如前則頓愈矣黑龍丹方見產後血不下條

偏頭風

頭半邊痛者是也當與前頭痛相參用之

丹偏頭風 有痰者多

左屬風 荆芥 薄荷 左屬血虛 川芎 當歸

右屬痰 蒼朮 半夏 右屬熱 黃芩

羅川芎散治偏頭痛神效

甘菊 石膏 川芎 白僵蚕生各六錢

大法

熱

右為極細末每服三錢茶清調下

潔治頭痛連睛痛

石膏

鼠粘子炒

右為末茶清食前調下

垣細辛散治偏頭風

細辛二分

川芎七分

柴胡二錢

黃芩酒炒一錢

生黃芩五分

瓦粉二分

甘草炙一錢半

黃連酒炒七分

芍藥半錢

右咬咀每服三錢水煎食後溫服之

寒濕

經治偏頭痛絕妙葶揆為末一兩於食前用清粥飲調半錢服

本治風寒客於頭中無時疼痛牽引兩目遂至失明宜白附散

白附子一兩

麻黃不去節

川烏

南星各半兩

全蝎五箇

乾薑

硃砂

麝香各一分

右為細末酒調一字服畧睡少時効一族人患頭痛不可忍一服瘥

治偏頭風

猪牙皂角去皮筋

香白芷

白附子各等分

右為末每服一錢臘茶調下右疼右邊臥左疼左邊臥皆疼仰臥食後服

冊偏頭風葶揆猪膽搗鼻中

本治偏頭風用好蘿蔔自然汁一蚬殼許令患人仰臥左

疼注左右疼注右或兩邊皆疼皆注之雖十年患者亦効

王荆公患十二年用之立効後醫數人皆愈此禁中秘方

針灸

靈頭半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明厥病篇雷頭風

頭痛而起核塊者是也

子和凡雷頭懶于俗呼之謬名也可用茶調散吐之次用神芩丸下之然後服烏荊丸及愈風餅子之類衰者可用

涼膈散消風散熱

實者下之茶調散方見上下部即二仙散是也

大黃

黃芩各二兩

牽牛

滑石各四兩

右為細末滴水為丸如小豈大溫水下十五丸每服加十九丸以利為度日三服

表散

愈風餅子

川烏炮半兩

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荊芥

薄荷

甘草炙已上各一兩

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細嚼

茶酒送下不計時候

涼膈散

方見前寒熱條

保夫治雷頭風者諸藥不效為與證不相對也蓋雷頭風者震卦主之震仰盂故予製藥內加荷葉者象震之形其色又青乃述類象形當煎局方中升麻湯主之升麻湯治頭面疔瘡增寒拘急發熱狀如傷寒

升麻

蒼朮

荷葉

右為細末每服五錢水一盞煎七分溫服食前後或燒全荷葉一箇研細調藥服之妙

針灸

針出血則愈矣

雷頭風 上顛 百會 風池

大頭痛

上熱

頭痛如腫大如斗是也。大率多是天行時疫病。

垣泰和年東垣以監納濟源稅時長夏多疫癘初覺憎寒體重次傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不救張縣丞亦得此證至五六日醫以承氣湯加藍根下之稍緩翌日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可以請治遂命診視具說其由曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此雖邪熱客於心肺之間上攻頭而為腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊不知適其病所為故遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間熱以為君橘紅玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以為臣連翹鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬尾勃白僵蚕味苦平散腫消毒定喘以為佐新升麻柴胡苦平行

少陽陽明二經不得伸桔梗味辛溫為舟楫不令下行共為細末用湯調時時服之拌蜜為丸噙化之服盡良愈因歎曰往者不可追來者尤可及凡他所有是病者皆書方以貼之全治甚眾。
普濟消毒飲子

黃芩

黃連 各半兩

人參 三錢

橘紅

玄參

甘草 生各二錢

連翹

鼠粘子

板藍根

馬尾勃 各一錢

白僵蚕 炒七分

升麻 七分

柴胡

桔梗 各二錢

右為細末服如前法或加防風薄荷川芎當歸身咬咀如麻荳大每服五錢水煎去查熱服之食後時時服之如大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利之腫熱甚者宜砭刺之

海大頭病者雖在身半以上熱伏于經以感天地四時非節瘟疫之氣所着以成此疾至於潰烈膿出而又染他人所以謂之疫癘也大抵足陽明邪熱太甚實資少陽相火爲之熾多在少陽或在陽明甚則逆傳視其腫勢在何部分隨其經而取之濕熱爲腫木盛爲痛此邪發於首多在兩耳前後所先見出者爲主爲根治之宜早藥不宜速恐過其病所謂上熱未除中寒已作有傷人命矣此疾是自外而之內者是爲血病况頭部分受邪見於無形之處至高之分當先緩而後急先緩者謂邪氣在上着無形之部分既着無形所傳無定若用重劑大瀉之則其邪不去反過其病矣雖用緩藥若又急服之或食前或頓服咸失緩體則藥不能除病矣當徐徐清無形之邪或藥性味形體擬象服餌皆須不離緩體及寒藥或酒炒浸之類皆是也

後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速去反損陰也此却爲客邪當急去之是治客以急也且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下各爲本家病也若急治之不惟不能解其紛而反致其亂矣此所以治主當緩也治客當急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主也陰分受陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者當急去之此治急以客也假令少陽陽明之爲病少陽者諸邪出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黃芩黃連甘草通炒過剉煎少少不住服呷之或服畢再用大黃或酒浸或煨又以鼠粘子新瓦上炒香咬咀煎去渣內芒硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微利及邪氣已只服前藥如不已再服後藥依前次第用之取大便利邪已卽止如陽明渴者加石膏少陽渴者加瓜蒌根湯陽明行

經加升麻葛根芍藥之類太陽行經加羌活防風荆芥之類選而加之並與上藥均合不可獨用散也

潔黑白散治大頭病如神

烏黑蛇酒浸 白花蛇去頭尾酒浸

雄黃二錢

大黃煨半兩

右為極細末每服一二錢白湯調無時

瘰癧毒頭腫者其枯湯加鼠粘子大黃芒硝

丹大頭天行病

羌活 酒苧 酒蒸大黃

厥

素巨陽之厥則腫首頭重全文見厥

山大頭風用井底泥調大黃芒硝塗之此方若在表者忌之在裏者宜之

運氣

運氣大頭病皆屬火蓋經所謂上腫者即其屬也經云少陽司天之政風熱參布大陰橫流寒乃時至民病上怫腫

色變又云少陰司天之政熱病生於上清病生於下民病嗑乾腫上終之氣燥令行餘火內格腫於上咳喘其治方東垣普濟消毒飲子得之矣

眉痛

酒眉痛屬風熱與痰作風痰治類頭風用白芷酒黃芩末

酒調下

又方

川烏二味為君童便浸炒

細辛

羌活 黃芩 甘草各等分為佐

酒選奇湯眉骨痛不可忍

防風 羌活各三錢 酒黃芩一錢冬不用如能食熱痛者加之

甘草三錢夏生冬灸用

右咬咀每服三錢水煎稍熱服食後時時

風熱痰

針灸

撮要

眉攢內痛 解溪

取盡

眉間痛 攢竹

瀉出血沿皮透魚腹

頭維

一分沿皮斜向下透懸懸選而用之不必

取盡

眉稜骨痛 攢竹

合谷 神庭

頭重

濕氣

紅豆散治頭重如山此濕氣在頭也

麻黃根

錢半

苦丁香

錢半

紅荳

十粒

羌活

連翹

各三錢

右五味為細末鼻內搗之

又方

羌活根

燒

連翹

各三錢

紅荳

半錢

右為末搗鼻

針灸

督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左右別

走太陽虛則頭重高搖之挾脊之有過者取之所別也

見針灸○長強穴在脊際即尾骨端也

表裏虛實

撮頭重如石 印堂

一分沿皮透攢竹先左後右彈針出血

頭風屑

羅肝經風盛木自搖動尚書云滿招損老子云物壯則老

故木凌脾土金來克之是子來為母復仇也使梳頭有屑

皮見肺之證也謂肺主皮毛大便實瀉青丸主之虛則消

風散主之

瀉青丸方見治虛實法

消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩痛肌肉

蠕動目眩旋運耳簾蟬鳴眼澁好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻

燥痒癢疹又治婦人血風頭皮腫痒眉骨疼旋欲倒痰逆

惡心

芫薺

羌活

人參

茯苓

白僵蚕

藿香

荆芥

甘草

蟬殼

去土各二兩

厚朴

去皮薑製

陳皮

去白各半兩

防風

右為細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每日三服便覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛身重寒熱倦疼用荆芥茶清調下半盞不拘服之小兒虛風目澁昏倦及急慢驚風用乳香荆芥湯調下亦得

雜方

丹頭痺風屑發黃用酒炒大黃茶調服

海萬病紫苑丸治頭多白屑每服三九至五七九薑湯下

方見積塊條

本治風屑極燥痒無時此乃氣虛風邪侵於皮表而生用藜蘆不拘多少為末先洗頭須避風候未至十分乾時用末糝之須用入髮至皮方得緊縛之兩日夜次日即不燥痒如尚有些少可再用一次立効

禹錫按陳藏器云鹽麩子主頭風白屑効俗名麩鹽挑其末結五倍子

患頭上白屑極多山荳根油浸塗以孩兒乳汁調塗効

本又方

白芷

零零香各等分

右為末如前法用之候三五日篋去傳三二次終始不生

多臥 不得臥

陰陽榮衛

黃帝曰病而不得眠者何氣使然岐伯曰衛氣不得入

於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽躄盛不得入於陰則陰氣虛故目不瞑矣又曰病目不得視者何氣使然岐伯曰衛氣留於陰不得行於陽留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰躄滿不得入於陽則陽氣虛故目閉也大惑論

足太陽有通項入于腦者正屬日本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰躄陽躄陰陽相交陽入陰陰出陽交于目銳眥以睛脈考之當作目內眥陽氣盛則瞑目陰

陰盛則瞑目

寒熱論

帝問曰夫邪氣之客入也或令人目

不瞑不臥出者何氣使然伯高曰衛氣者晝日行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行於五臟六腑今厥氣客於五臟六腑則衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹇陷陷當作滿不得入於陰陰氣虛故目不瞑黃帝曰治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其臥立至黃帝曰善此所謂決瀆壅塞經絡大通陰陽和得者也愿聞其方伯高曰其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭為一升半去其查飲汁一小杯日三稍益以知為度故其病新發者覆杯則臥汗出則已矣久者三飲而已也

邪客篇○按本草秫米即所謂糯米是也

黃帝曰人之

多臥者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕則分肉不解焉腸胃大則衛氣留久皮膚濕則分肉不解其行遲夫衛氣者晝常行於陽夜行於陰故陽氣盡則寐陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚濕分肉不解則行遲留於陰也久其氣不清則目瞑故多臥矣其腸胃小皮膚滑以緩分肉解則衛氣之留於陽也久故少瞑焉黃帝曰其非常經也卒然多臥者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦上焦閉而不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒然多臥焉

大惑

膽虛不眠寒也酸棗仁炒竹葉湯調服

聖惠方 膽實多

睡熱也酸棗仁生用末茶薑汁調服

濟衆方○一法酸棗仁一兩生用膽茶二兩以生薑汁塗炙微焦搗羅為末每服二錢水七分盞煎六分溫服無時

不得臥

虛勞

仲虛勞虛煩不得眠酸枣湯主之

酸枣仁二升

甘草一兩

知母

茯苓

芡實

各二兩一方
加生薑二兩

右以水八升煮酸枣仁得六升內諸藥煮取三升分温
三服

本治膽虛不得眠四肢無力驚甲丸

驚甲

酸枣仁

羌活

牛膝

黃芪

人參

五味子

各等分

右為細末煉蜜杵為丸如桐子大每服三四十九温酒
送下

聖治骨蒸勞煩心不得眠用酸枣仁一兩水一大盞半研

絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更煮過不計

時服之

素帝曰人有臥而有所不安者何也岐伯曰藏有所傷及

精有所寄之則安故人不能懸其病也

精有所寄之則安
太素作精有所倚

則臥不
安是也

海胡洽治振悸不得眠人參白朮茯苓甘草生薑酸枣仁

六物煮服

肝虛

本真珠母丸治肝經因虛內受風邪臥則寬散而不收狀

若驚悸

珠母

三分研
細用碾當歸

熟地

各一兩半

人參

酸枣仁

栝子仁

犀角

茯苓

各一兩

沉香

龍齒

各半錢

右為細末煉蜜為丸如桐子大辰砂為衣每服四五十
丸金銀薄苛湯下日午後臥服

獨活湯

獨活

羌活

人參

前胡

細辛

半夏

五味子

沙參

白茯苓

酸東仁

甘草各一兩

右為粗末每服四大錢水一盞半薑三片烏梅半箇同煎至七分去查不拘時候

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每臥則鬼飛揚覺身在牀而神鬼離體驚悸多魘通夕無寐更醫不効予為診視詢之曰醫作何病治董曰衆皆以為心病予曰以脈言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂為變平人肝不受邪臥則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以臥則魂飛揚若離體也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未服藥已覺沉痾去體矣願求治之予曰公且持此說與衆醫議所

治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除此方用真珠母為君龍齒佐之真珠母入肝經為第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以為鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治鬼不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已

肝虛則
彈之水
飲作

羌活勝濕湯加柴胡治臥而多驚邪在少陽厥陰也方見前

痛諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也全文見水腫

內經半夏湯治不得臥乃去飲之劑也方見前

溫膽湯治大病後虛煩不得眠兼治驚悸方見驚悸

肝虛則
脾之思

丹煩不得眠六乙散加牛黃服之即益元散

思慮勝

診

子和一富家婦人傷思慮過甚二年不得寐無藥可療其夫求戴人治之戴人曰兩手脈俱緩此脾受邪也脾主思故也乃與其夫議以怒激之多取其財飲酒數日不處一法而去其婦大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤自是食進其脈得平此因膽虛不能制脾之思慮而不寐今敷之怒膽復制脾故得寐也

素陽明者胃脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也下經曰胃不和則臥不安此之謂也逆調論

喘不得臥 以喘法治之
厥不得臥 以脚氣法求之

素帝曰人之不能偃臥者何也岐伯曰肺者藏之蓋也肺氣盛則肺大肺大則不能偃臥

針灸 撮膽寒不得臥 竅陰一分補之灸

和驚不得眠善斷水氣上下五臟遊氣也陰交主之 不得臥浮郄主之

多臥

濕執

子和陳州長史一小兒病寐而不寤三日諸醫作睡驚治之或欲以艾火灸之或以大驚丸及水銀餅子治之其父曰此子平日無疾何驟有驚乎以子之病問戴人戴人診其兩手脈皆平和戴人曰若驚風之脈當洪大而強今則平和非驚風也戴人竊問其乳母爾三日前曾飲酒醉否遽然笑曰夫人以煮酒見餉酒味甚美三飲一罌而睡夫陳酒味甘而戀膈酒氣滿乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛葛花縮砂仁貫衆煎汁啜之立醒

連氣 運氣多睡皆屬內熱經云陽明司天之政初之氣陰始凝氣始肅病中熱善眠是也

針灸怪穴困睡多

無名指第二節尖

灸一壯屈手指取之

咽喉

喉痺

咽噎痛

乳蛾

喉中

介介如梗

諸物梗咽

項頸強痛

法咽喉大

經云一陰一陽結謂之喉痺又云肝者中之將也取決於膽咽為之使故以喉咽入肝膽部

素喉主天氣咽主地氣

太陽陽明論

地氣通於噎全文見五藏○咽喉

下接連胸中肺葉之間噎即咽之低處也咽即噎之高處也

咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者

音聲之戶也懸雍者音聲之關也

全文見瘡

予和咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉

以納氣故喉氣通於天咽以納食故咽氣通於地會厭管

乎其上以司開闔掩其喉則其食下不掩之其喉錯必舌

抵上齧則會厭能閉其喉矣四者交相為用闕一則飲食

癈而死矣

喉痺

法喉痺大

凡經云喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天氣閉塞也云咽痛云噎痛者謂咽喉不能納唾與食而地氣閉塞

也云喉痺咽噎痛者謂咽喉俱病天地之氣並閉塞也蓋

病喉痺者必兼咽噎痛病咽噎痛者不能兼喉痺也今以

喉咽俱病諸方並入喉痺門中

喉痺惡寒及寸脈小弱於關尺者皆為表證宜甘桔湯半

真桂枝甘草湯詳寒熱發散之若水漿不得入口者用解

毒雄黃丸四五粒以極酸醋磨化灌入口內吐出濃痰却

服之間以生薑自然汁一蜆殼噙下之神效

按喉痺惡寒者皆是寒折熱寒閉於外熱鬱於內薑汁

散其外寒則內熱得伸而愈矣切忌膽礬酸寒等劑點

惡寒寸脈小者皆為表証

喉反使其陽鬱結不伸又忌硝黃等寒劑下之反使其陽下陷入裏則禍不旋踵矣韓祗和云寸脈弱小於關者宜消陰助陽垣云兩寸脈不足乃陽氣不足故用表藥提其氣升以助陽也或三部俱小弱亦可用其法也喉痺鄉村病皆相似者屬天行運氣之邪治必先表散之亦大忌酸藥點之寒藥下之鬱其邪於內不得出也其病有二

其一屬火經云少陽所至為喉痺又云少陽司天之政三之氣炎暑至民病喉痺治宜仲景桔梗湯或面赤斑者屬陽毒宜陽毒諸方汗之

其二屬濕經云太陰之勝火氣內鬱喉痺又云太陰在泉濕淫所勝病隘腫喉痺治宜活人半夏桂枝甘草湯或面青黑者屬陰毒宜陰毒諸方汗之

運氣
熱邪以
寒表之

寒邪以
熱表之

仲 桔梗湯治傷寒客熱咽痛

方見傷寒咽痛○海藏治咽痛甘桔湯加鼠粘子竹茹妙

無 荆芥湯治咽喉腫痛語聲不出嚙之痛甚

荆芥 兩半

桔梗 兩

甘草 兩一

右剉散每服四錢水一盞薑三片煎六分去渣溫服

活 半夏桂枝甘草湯治暴寒中人咽痛

方見傷寒咽痛

無 治卒喉痺不得語小續命湯加杏仁七箇煎甚妙

續命湯方

見中風門

和 五香散治喉咽腫痛毒氣結塞不通

木香

沉香

雞舌香

薰陸香

各一兩

麝香 另研三錢

右為末入麝香研勻每二錢水一盞煎服不拘時

本 治中風急喉痺欲死者白僵蚕搗篩為末生薑自然汁

調下喉立愈

丹溪云僵蚕屬火而有土與木老得金氣而僵治喉痺者取其火中清化之氣以從治相

火散濁逆
結滯之疾

陳附子去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入內含之勿咽
其汁主喉痺

和如聖勝金錠治咽喉急閉腮頰腫痛并单蛾結喉重舌
木舌

硫黃細研一兩半 川芎一兩 臈茶 薄芎去根梗各半兩

貫衆二兩 硝石研四兩 荆芥二兩

右為末生蔥汁搜和為錠每服先用新汲水灌嗽次嚼
生薄荷五七葉却用藥一錠同嚼極爛并水嚥下甚者
連進三服并以一錠安患處其病隨藥便消

羅征南帥不隣吉亥病咽痛下利方見表熱裏寒門

洪武戊辰春鄉村病喉痺者甚眾蓋前年終之氣及當
年初之氣二火之邪也予累用甘桔湯加黃連半夏薑

蚕鼠粘子根等劑發之挾虛者加參芪歸輩水漿不入
者先用解毒雄黃丸醋磨化之灌喉痰出更用生薑汁
灌之却用上項藥無不神驗若用膽礬等酸寒點過者
皆不治蓋邪鬱不出故也

喉閉者
先取痰

羅解毒雄黃丸治纏喉風及急喉閉卒然倒仆牙關緊急

雄黃 鬱金各一分 巴荳去皮油十四箇

右為細末醋糊為丸菴荳大茶清下七丸吐出頑痰立
甦未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下幹口開灌
之下咽無有不治如小兒驚熱痰涎壅塞或二九三九
量小大加減一法用雄黃丸三粒醋磨化

大治纏喉風雄黃一塊新汲水磨急灌吐瘥

丹纏喉風屬熱痰宜用鷺翎蘸桐油探吐之又法用射干
逆流水吐之

世遠志去心為末，每半錢，水小半盞，調服。口含竹管吐痰涎，極捷治喉痺如神。

烏犀角膏治咽喉腫痛及一切結喉爛喉，道尸纏喉，痺喉急喉，飛絲入喉，重舌，木舌等證。

皂莢 兩條子搥碎用水三升浸一時久按汁去查入瓦器內熬成膏 好酒合

硃砂 研一錢同皂角膏攪勻令稠 人參 一錢為末

白霜梅 各少許並研入膏中

右拌和前藥用鷺毛點少許於喉中，以出盡頑涎為度。却嚼甘草二寸，嚥汁吞津，若木舌先以麈布蘸水揩舌冷，次用生薑片擦之，然後用藥。

山纏喉風，皂角揉水灌下得吐愈。

斗治纏喉風，喉痺，飲食不通，欲死者，用反菟草根一莖，淨洗內入喉中，取寒痰出，即瘥。神驗，更以馬牙硝津蘸之，即

絕根反菟草一名紫苑。

世治咽喉痛，用土烏藥，即矮樟根，以醋兩盞煎一盞，先噙後嚥，吐出痰涎為愈。

杜治纏喉風，束氣不通用，蛇蛻灸黃當歸等分為末，溫酒調下一錢，七得吐愈。

牙關閉者搖鼻取痰

羅備急如聖散治時氣纏喉風，漸入咽喉，塞水穀不下，牙關緊急，不省人事。

雄黃 細研 藜蘆 生用 白礬 飛 猪牙皂角 去皮

右等分為細末，每用一荳大，鼻內搐之，立效。

世一字散治喉閉，氣塞不通，飲食不下。

雄黃 另研一分 蝎梢 七枚 白礬 生研 藜蘆 各一錢 猪牙皂角 七錢

右為末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎為愈
治喉咽痛牙關緊急用巴荳去殼以紙壓出巴荳油在紙
上以此紙作撚子點火吹滅以烟薰入鼻中即時口鼻涎
流牙關開矣

不惡寒寸脈大者皆屬下証

喉痺不惡寒者及寸脈大滑實於關尺者皆屬下證宜硝
石青黛等寒藥降之或白礬等酸劑收之也韓祗和云寸
脈大於關尺者宜消陽助陰東垣云兩寸脈實為陰盛陽
虛下之則愈故予每用此法治急喉痺如鼓應桴或三部
俱實亦可用其法也

無玉鑰匙治風熱喉痺及纏喉風

硃砂一兩 鵝砂半兩 腦子一字 白僵蚕一分

右為末以竹管吹半錢入喉中立愈

治喉痺咽痛用蒲黃甘草青黛芒硝等分為末時時嚥

荳許神効

外療喉痺神驗朴硝一兩細細含嚥汁立愈

無玉屑無憂散治纏喉風咽喉疼痛語聲不出咽物有碍
或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癥小兒妳癰或悞吞骨屑
哽塞不下

玄參 貫衆 滑石 砂仁

黃連 甘草 茯苓 山荳根

荊芥各半兩 寒水石煨 鵝砂各三錢

右為末每服一錢先抄入口以清水嚥下此藥除三尸
去八邪辟瘟療渴

丹治喉痺呼吸不通須臾欲絕絡石草二兩水升半煎取

二盞去查細細呷之立通外臺秘要。本草云絡石
味苦溫微寒無毒主風熱

治喉痺白瑞香花根寸許研細調灌之妙白瑞香藥
性未詳

【醫】卒喉痺取黃栢片含之又黃栢一斤咬咀酒一斗煮二沸去查恣飲便愈

【世】喉痺水穀不下蘿蔔汁咽之甚佳蘿蔔下氣甚速

【丹】又方李實根一片噙口內佳 治風熱痰喉痺先以干縉湯次以四物湯加黃栢知母養陰則火降矣

【靈苑】治急喉閉逡巡不救者鱖魚膽臘月收陰乾為末每用少許點患處藥至即瘥病深則水調灌之

【丹】用李實根研水傳頂上一遭 治喉痺卒不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傳之千金方

又方

右降之之劑
硃砂各五分 鵬砂一分 杜牛膝調傳

羅開關散治喉風氣息不通

白僵蚕炒一兩 枯白礬各等分

右為細末每服三錢生薑蜜水調下細細服之

【本】治纏喉風用白礬末半錢烏雞子清一箇二味調勻灌入喉中立効如神此方活人不計數幸毋忽

【世】喉閉用枯礬末吹納喉中急用燈盞底油脚灌下

【世】治喉痺馬屁勃白礬等分為細末以鷲翎吹入喉中吐痰二升愈馬屁勃味辛平 治喉閉一握金一握燒灰拌白礬末

炒青色為度用筋三四根壓下舌看喉中端的吹入患處妙此藥一名八角荷一名山荷葉如川芎樣生深山詩云

一葉一枝花深山是我家硫黃怕我死水銀化成砂

【世】神効散荆芥草麻肉等分為末蜜丸皂子大綿裹含化治喉痺語聲不出者佳

丹 又方猪牙皂角和霜梅為末噙之
治 喉痺咽腫手足不和惡寒者用鴨嘴膽礬末以筋蘸藥點患處藥至即瘥神效

右收之之劑

汚血

海 治喉痺取蟻螬虫汁點在喉中下咽即開

崔 治喉痺雍塞不通取紅藍花搗絞取汁一小升服之以瘥為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極

驗咽喉寒服之皆瘥
四 又方用茜草一兩煎服降血中之火

世 治咽腫杜牛膝搗自然汁和醋服之本草云杜牛膝主血結及血塊

無 馬鞭草散治患喉痺咽腫連頰吐氣數者
馬鞭草 本草云馬鞭草味辛涼破血主癰瘡血瘰癧通月經

右搗自然汁每服一合許又一法用馬啣鐵煮汁服

亦妙

丹 治喉痺射干切一片含嚥汁外臺秘要○本草云射干脾間味辛涼微温有毒

孫 押班都知潘元從喉閉急召孫至於夾袋中取藥末半七吹入喉中少頃潘吐出膿血立愈翌日潘詣孫謝曰火

急之難非明公不能救救人之急非藥不能療贈金一百兩願求方以濟非常之急孫以其方授之用猪牙皂角白礬黃連等分細剉新瓦上焙乾為末每用半錢吹入喉中

因曰神方無價安用以利易哉遂不受所贈

肺絕

急喉痺其聲如鼯有如痰在喉嚨者此為肺絕之候速宜參膏救之用薑汁竹瀝放開服如未得參膏或先煎獨參湯救之服早者十全七八次則十全四五遲則十不全一也

雜方

素一陰一陽結謂之喉痺陰陽別論

海治喉閉遂巡不救方。
皂莢去皮弦子生半兩為細末以筋頭點少許在腫痛處更以醋糊調藥末厚塗項上須臾便破血出立瘥○丹溪以雞毛蘸傳腫處尤妙

又用遠志去心水調傳項上一遭

丹治喉痺青艾和莖葉一握用醋同杵傳痺處冬月用乾者李師方

一法用青艾汁灌下

山喉閉用蛇床子燒烟薰入喉中愈

本喉中卒被毒氣攻痛者切商陸根炙熟隔布熨之冷輒易立愈

丹有人患纏喉風食不能下大麥麩作稀糊嚥之滑膩容易下嚥以助胃氣衍義云以此代粥食也若能食者不必用此

針灸

山挫喉氣不通者以冷水徐灌之

內經刺灸喉痺法有二今以經脈所過咽喉取之驗者及他病相干而致喉痺取之者通六經也

其一取手足陽明經云喉痺不能言取足陽明能言取手陽明又云胃足陽明脈從大迎前下人迎附循喉嚨所生病者頸腫喉痺視盛虛熱寒陷下取之又云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其病氣逆則喉痺卒瘖取之所別也又曰大腸手陽明脈所生病者喉痺視盛虛熱寒陷下取之也

其二取手少陽經云三焦手少陽之脈出缺盆上項繫耳後是動則病噎腫喉痺視盛虛熱寒陷下取之又曰邪客手少陽之絡令人喉痺刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一疇壯者立已老者頃已左取右右取左是也

其三以經絡所過喉咽者有二經云肝足厥陰之脈循喉嚨之後故喉之後疼者取之累驗也又云腎足少陰之脈上貫肝鬲循喉嚨竇漢卿所謂必准者照海治喉中之閉塞是也

其四他病相干致喉痺者有一經云心欬之狀喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺取心之俞蓋太陵穴是也

孫文潞公一日喉腫翰林咽喉科治之經三日愈甚上召孫治之孫曰病得相公書判筆一管去筆頭水露筆管點藥入喉便愈孫随手便刺相公昏仆不省人事左右皆驚愕流汗孫乃笑曰非我不能救相公須臾嘔出膿血升餘旬日乃平復如故見上上喜曰孫召良醫甚有手段予嘗治一男子喉痺於大溪穴刺出黑血半盞而愈由是言之喉痺以惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散發散不

愈次取痰取痰不愈次去汚血也

摘治喉痺

豐隆

湧泉

關衝

甚者以小三稜針藏筆鋒中詐言點藥於喉痺

上乃刺出紫血頓下立愈

蠟喉痺乳蛾

少商

針入一分臥針向後三分

照海

太衝

熱喉閉不通

少商

隱白

少衝

湧泉

摘喉痺頰腫如升水粒不下

少商

出血

手太指背頭節

三稜新刺

陽谷

三分

甲喉痺完骨及天憲氣舍天鼎尺澤合谷商陽陽溪中渚

前谷商丘然谷陽交悉圭之

喉痺胸中暴逆先取衛脈

後前三里雲門

皆瀉之

喉痺刺少陰少陰在手腕當小指掌後動脈是也針入

三分補之

喉痺咽如梗三間主之

喉痺不能言溫留曲池主之

診

喉痺氣逆口喎咽喉如扼狀行間主之 喉痺咽腫水

漿不下璇璣主之 喉痺食不下鳩尾主之

白色養理者肺大肺大則多飲善病喉痺全文見診 心脈大

甚為喉吟全文見治

咽噎痛咽噎不能納 唾與食是也

大法

形苦志苦病生於咽噎治之以百藥全文見治法

咽痛必用荆芥 陰虛火炎上者必用玄參

氣虛人參加竹瀝 血虛四物加竹瀝

久病養陰解鬱

咽痛有陰氣大虛陽氣飛越痰結在上遂成咽痛脈必浮

大重取必瀉去死為近宜補陰陽人參一味濃煎湯細細

飲之此証皆是勞嗽日久者有之如用實

咽瘡多虛火游行無制客於咽喉宜用人參蜜灸黃栢荆

芥治之

潤喉散治氣鬱夜熱咽乾梗塞用

桔梗二錢

粉草

紫荷車

香附各三錢

百藥煎一錢半

右為細末傳口內

咽喉生瘡損了不用生薑用之辛辣痛又能散不收

咽痛實熱者

黃連

荆芥

薄荷

蜜薑汁調噲

咽中瘡腫草麻子一粒去皮朴硝一錢同研新汲水作一

服連進二三服效丹溪云草麻子屬金性善收能遣毒腫又似屬水當是外科要藥

龍麝聚聖丹治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫頭痛或

成喉痺或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹滿

口生瘡飲食難咽並宜服之

川芎

生地

犀角屑

羚羊角

新病退熱祛邪

琥珀

研各五錢

馬牙硝

研三錢

鵬砂

研一兩

人參

赤茯苓

各三錢

玄參

桔梗

升麻

鉛白霜

研

連翹

各五錢

硃砂

水飛二錢

牛黃

研二錢

麝香

研三錢

腦子

研三錢

金箔為衣

右為細末煉蜜為丸每兩作十九用金箔為衣每服一丸薄苛水化下或細嚼或噙化如無薄苛新水亦可臨臥用之

祛毒牛黃膏治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬滿口生瘡涎潮喘急飲食難進咽膈不利

牛黃

研三錢半

人參

琥珀

犀角

取細末

桔梗

生地

鵬砂

各半兩

雄黃

一兩

玄參

升麻

各三錢

蛤粉

水飛四兩

寒水石

煨二兩

硃砂

飛研七錢

鉛白霜

腦子

各一錢

金箔

為衣

實熱降衣之

右為細末煉蜜丸如小彈子大金薄為衣用磁石器內收貯每服一九濃煎薄苛湯化下或新汲水服亦得日進二三服噙化亦得咽喉備急丹

青黛

芒硝

白僵蚕

各一兩

甘草

四兩

右為細末用臘月內牛膽有黃者盛藥其中蔭四十九日多時為妙

經患喉痛含山荳根一片細咽津極妙

丹咽痛鵬砂或和膽礬白僵蚕白霜梅和噙又方百藥煎去黑皮鵬砂甘草生白礬等分為細末每服一錢食後

米飲調細細咽下

貯咽喉卒腫食飲不通黃栢搗傳腫上冷復易之用苦酒

和末佳

浮熱表散之

丹 婦人患咽疼用桔梗一兩生甘草半兩分三貼水二碗煎取一小盞稍熱飲之先與蚤休末細咽之蚤休末即金線重樓是也
羅 增損如聖湯治風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛並治之

桔梗二兩 甘草炙一兩半 枳殼湯浸去穢 防風各半兩

右件為細末每服三錢水一大盞煎至七分去查入酥如米許攪勻食後溫服

本 治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡利膈湯

雞蘇葉 荆芥 防風 桔梗

人參 牛旁子隔紙炒 甘草各一兩

右為細末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加僵蚕一兩

百 桔梗湯治咽腫微覺痛聲破季冬合之

麻黃不去節半錢 桔梗一錢 黃芩三錢 甘草一錢

白僵蚕三錢 馬屁勃一兩 桂枝少許 婦身三分

右吹咀水二盞煎去查稍熱服食後可徐徐呷之

羅 發聲散治咽痛妨悶咽物則微痛不宜寒涼藥過泄之此妨悶虛熱也

瓜蒌一箇 白僵蚕微炒兩 桔梗七錢半 甘草炒二錢

右為細末每用少許乾糝咽喉中若腫痛左右有紅或只一壁紅紫長大水米難下用此散一錢朴硝一錢和勻糝喉中咽津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用前散一錢七白礬細研半錢乾糝

百 薑汁調僵蚕末治咽痛神效詳見喉痺

無 蜜附子治感寒咽門閉不能咽大附子一枚生去皮臍切作大片蜜塗炙令黃含嚥津甘味盡更以附子片塗蜜

寒邪溫之

灸用之

汚血破之

丹治咽痛用諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂掛到咽門而止口中飲食

不入須用深取牛膝根直而獨條者洗淨入好醋三五滴

同研細就鼻孔滴二三點入去則絲斷珠破其病立安

素肝者中之將也取決於膽咽為之使奇病論

雜方

世咽痛用倒摘刺根淨洗入好酒醋同研滴在喉中耳若

痒即安 范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿水

飲下方寸七

廣主咽喉寒鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一箇

開頭取白去黃著米酢煨拌澆火頓沸起擊下沸定須頓

三度就熱飲酢盡不過一二次瘥

運氣

運氣咽喉噎痛皆屬寒經云太陽在泉寒淫所勝民病噎

痛頷腫是也

針灸

內經灸刺咽喉有二

其一取足少陰經云腎足少陰之脈所生病者咽腫上氣

噎乾痛又云噎中腫不能內唾時不能出唾者刺然骨之

前出血立已左刺右右刺左又云邪客足少陰之絡令人

噎痛不可納食無故善怒氣上走贛上林億云贛膈也謂

刺足下中央之脈各三痛凡六刺立已左刺右右刺左是

也

其二取手太陽經云小腸手太陽之脈是動則病噎痛頷

腫視虛實寒熱陷下取之也

法咽中痛不可納食湧泉主之 咽腫難言天柱主之

喉痛瘖不能言天突主之

同喉痺法

乳蛾

浮熱者
收之

竹 咽喉乳蛾方

雄黃

鬱金各五錢

白礬生用二錢半

膽礬五分

右為細末以竹管吹入喉中立能言語

實熱者
降之

粉香散吹乳蛾即開

白礬三錢

巴豆三粒去皮油去

輕粉

麝香各少許

右於鐵器上飛白礬沸入巴豆在礬上枯去不用巴豆為細末三味和合吹喉中

痰 治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰鹽花一兩二味

細研以筋頭點藥在上

符 羅青散治單雙乳蛾

蒲黃五錢

羅青

盆硝研各三錢

甘草二錢

右為細末每服一錢冷蜜水調細細咽之吞不下雞翎蘸藥喉內掃之立效

本 玄參散治懸癰痛不下食

玄參一兩

升麻

射干

大黃各半兩

甘草

右為細末用水煎至七分放溫時時含咽良驗

有表者
散之

無 乾薑散治懸癰熱卒暴腫大

乾薑

半夏湯洗去滑等分

右為細末以少許著舌上嚥津

汚血破
之

世 乳蛾用杜牛膝根紅者研調男用女乳汁女用男乳汁納鼻吸之

丹 治喉中卒生肉綿裹筋頭蘸鹽搯一日六七次易之真係

方人

咽中介介如梗狀

雜方

仲 婦人咽中如有灸鬻半夏厚朴湯主之

半夏一升

厚朴三兩

茯苓

生薑各四兩

蘇葉二兩

右五味以水七升煮取四升分温四服日三夜一

丹痰結核在咽此濕痰必用痰藥中鹹能軟堅之味

瓜蒌實

青黛

杏仁

海蛤粉

桔梗

連翹

風化硝

右為末薑蜜丸噙化

針灸

內經灸刺咽噎介介如梗狀有二

其一取陽陵泉經云膽病者善太息口苦嘔宿汁噎中介然數唾取陽陵泉是也

其二取太陵經云心欬之狀喉中哧哧然如梗狀取心之俞是也

諸物梗喉

出之法

無治諸哽煮薤白令半熟以線縛定手執線頭少嚼薤白咽之度薤白至哽處便牽引哽即出矣 又法用綿一小塊以蜜煮用如食薤法

世治骨哽入喉

硝砂

甘草各等分

右為末以綿裹少許噙之旋旋咽津久之即出

骨哽以乳香燒烟吸入喉即吐出

本治諸魚骨哽久不出方以皂角少許吹入鼻中得嚏哽出多秘此方

陳獺主魚骨哽不可出者取獺足於項下爬之亦可煮汁食之

治哽螻蛄膽一枚吞下亦治刺不出傳之刺即出

古今錄療魚骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作

屑水服之即出未出再服

右治骨哽

子和一小兒誤吞一錢在喉中不下諸醫皆不能出亦不能下乃命戴人戴人熟思之忽得一策以淨白表紙令卷實如箸以刀縱橫亂割其端作鬚鬚之狀又別取一箸縛針鈎於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑探之覺鈎入於錢竅然後以紙卷納之咽中與鈎尖相抵覺鈎尖入紙卷之端不碍肌肉提之而出

書誤吞釵取薤白曝令萎黃煮使熟勿切食一大束釵即隨出

丹治誤吞錢釵及鏹用飴糖一片漸漸食之自出外臺秘要

右治錢哽

世治骨哽槿樹葉油馬屁勃砂糖三味熬膏為丸噙化累

下之之法

効

治骨哽喉痛用水牛屎上生出蕈曬乾為末用砂糖為丸徐徐嚥吞下仍用砂糖為衣不然損牙

外治魚骨哽在喉中以少礪砂口咀嚙咽之立下

世治魚骨哽用玉簪花根研細取汁竹管灌喉中不可著齒着則齒酥 骨哽用萱草根汁服之傳者云可立視骨

下 邵云萱草即鹿蔥也又名宜男

又方魚骨哽細嚼蘿蔔徐徐咽之愈

丹治魚骨哽百法不能療者錫糖丸如鷄子黃大吞之立出方

治諸哽生艾數升水酒各五升煮取四升稍熱服之外臺

世魚骨哽楮子搗自然汁濾去渣服或收曬乾為末水和

汁服亦可楮子即谷櫚子也一方用楮樹皮

術橄欖味澁食久則甘嚼汁咽治魚哽

治哽以瞿麥為末水調方寸七服

治骨哽白茯苓一味臨時細切為末以所哽骨煎湯調下

治雞骨哽用水簾草搗汁飲之骨自消 治骨哽以野苧根洗淨搗爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以雞羹化下如魚骨所傷魚湯化下 治一切骨哽用金鳳花子嚼爛嚙下無子用根亦好

山誤吞稻芒麥芒咽間者急取鵝口中涎灌之或取薦頭草嚼亦妙

丹魚骨在肚中刺痛煎茱萸汁一盞飲之骨軟而出食

丹治吞錢艾一把水五升煎至一升頓服便下錢氏方 治吞錢及鐵物在喉者不得下南燭根燒細末湯調一錢下之

山誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服

之外臺秘要 又方誤吞銅錢用家茨菰取汁呷飲自消見山居方

外誤吞錢併金銀等物以糊粉一兩搗調之分再服如吞金銀物在腹中以水銀服之令消烱

無凡治哽之法皆以類推如鸕鷀治魚哽磁石治針哽髮灰治髮哽狸虎治骨硬亦各從其類也

項頸強痛

靈缺盆之中任脈也名曰天突當缺盆中央動脈是也 一次任脈

側之動脈是陽明也名曰人迎挾喉二旁之動脈是也 二次脈手

陽明也名曰扶突挾喉動脈之後曲 三次脈手太陽也

名曰天窻手陽明之後當曲頰之下是也 四次脈足少陽也名曰天容

曲頰之後當耳之下是也 五次脈手少陽也名曰天牖耳後當完骨土是也

六次脈足太陽也名曰天柱挾項大筋中是也 七次脈頸中央

診

針灸

之脈督脈也名曰風府 足陽明挾喉之動脈也其膈在膈中 手陽明次在其膈外不至曲頰一寸 太陽當曲頰 足少陽在耳下曲頰之後 手少陽出耳後上加完骨之上 足太陽挾項大筋之中俱本輪篇

內經刺灸項頸痛有二

其一取足手太陽治項後痛經云足太陽之脈是動則病項如拔視虛盛寒熱陷下取之又云項痛不可俛仰刺足太陽不可以顧刺手太陽又云大風項頸痛刺風府風府在上椎又云邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足小指爪甲上與肉交者各一痛立已不已則刺外踝下三痛左取右右取左如食頃是也

其二取足手陽明治頸前痛經云足陽明之脈所生病者頸腫又云手陽明之脈是動則病頸腫皆視盛虛寒熱陷

下取之也

玄 頸項痛 後谿

玉 項強 承漿 風府

甲 頭項痛重暫起僵仆鼻塞鼽衄喘息不得通通天主之

頂上痛風頭重目如脫不可左右顧百會主之 頸痛

項不得顧目泣出多眦鼻衄目內皆赤痛氣厥耳目不

用咽喉倭引項筋攣不收風池主之 項腫不可俛仰頰

腫引耳完骨主之 項強刺瘖門 頸項痛不可以俛仰

頭痛振寒瘕瘕氣實則脇滿俠脊有并氣熱汗不出腰背

痛大杼主之

東風生於春病在肝膈在頸項全文見五藏

肝筋急 **本** 治筋急項不得轉側木瓜煎

木瓜 兩筒取 蓋去穢 沒藥 研二 乳香 研一

右二味内木瓜中用蓋子合了竹簽簽定飯上蒸三四次研爛成膏子每服三五匙地黃酒化下生地黃汁半盞無灰酒二盞和之用八分一盞熱煖化服有人患此證自午後發至黃昏時定予曰此患先必從足起經言足十二經絡各有筋惟足太陽之筋自足至項大抵筋者肝之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至兌陰壯陽弱之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於是時予授此方三服而愈

熱痰

丹男子項強不能回顧動則微痛診其脈弦而數實右手為甚予作痰熱客太陽經治之用二陳湯加酒洗黃芩羌活紅花服後二日愈

虛熱

垣養神湯治精神短少不得睡項筋腫急難伸禁甘温宜

苦寒

虛

黃芪	錢一	人參	分三	甘草	分七	蒼朮	分五
白朮	分三	柴胡	錢四	升麻	錢四	歸身	分五
麥芽	分五	木香	分一	川芎	分三	半夏	分七
橘皮	錢一	黃連	分五	黃芩	酒二分	黃栢	分一

右咬咀每服五錢水二盞煎去渣稍熱服不拘時

本治腎氣上攻項背不能轉移椒附散

大附子一枚六錢上者炮去皮臍末之

右末每二大錢好川椒二十粒用白麩填滿水一盞半生薑七片同煎至七分去椒入鹽空心服予一親戚患項筋痛連背髀不可轉移服諸風藥皆不效予嘗憶千金髓有腎氣攻背強一證予處此方與之一服頓瘥自爾與人皆不驗蓋腎氣自腰夾脊上至曹溪穴然後入

泥丸宮曹溪一穴非精於搬運者不能透今逆行至此不得通用椒以引歸經則安矣氣上達椒下達故服之愈

表寒

千治風項強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水洒之令冷納生桃葉鋪其席下臥之令項在藥上以衣着項邊令氣上蒸病人汗出良久即瘥

又方治頭項強不得顧視蒸大苳一升令變色納囊中枕之

諸瘕項強皆屬於濕全文見診法治法見傷寒項強條

醫學綱目卷之十五

醫學綱目卷之十六

心小腸部

心痛

卒心痛

胎前心痛

產後心痛

諸般氣痛

寒熱

丹心痛即胃脘痛凡心痛必用溫藥此是鬱結不行阻氣不運故痛在下者多屬食宜溫利之 大凡心膈痛須分新久若明知身受寒氣口喫寒物而得者於初得之日當與溫散或溫利之

身受寒氣宜溫

溫散謂治身受寒氣於外者如陳無擇麻黃桂枝湯治

外因心痛之類是也

溫利謂治口食寒物於裏者如仲景九痛丸潔古煮黃

口食寒物宜溫

丸治大實心痛之類是也

方見

久病為鬱熱宜寒之

若曰病得之稍久則成鬱久鬱則蒸熱熱久必生火原病式中備言之矣若欲行溫散溫利寧無助火添病耶由是

方中多以山梔為熱藥之向導則邪易伏病易退正氣復而病安矣然病安之後若恣縱口味不改前非病復作時乃委咎於醫悞也 大槩胃口有熱而作痛非山梔不可須薑汁佐之多用台芎開之 用山梔炒去皮每十五枚煎濃湯一呷入薑汁令辣再煎少沸吞九枚加川芎一錢尤妙 又方用山梔去殼炒黃為末以薑汁調粥丸有寒者加草薹蔻末丸服之

又方治氣實心痛

山梔去殼炒香附乙錢

茱萸錢一

右為末炊餅丸如花椒大以生地黄用酒洗淨同生薑煎湯下廿丸外用胡椒草撥各半兩為末以醋調捏成丸子吞之

心痛方

黃連炒

山梔炒

茱萸各五錢

荔枝核燒存性為末三錢

滑石

右為末薑汁化炊餅為丸

又方治心痛

白朮

白芍藥

砂仁

半夏

當歸各三錢

桃仁

甘草

黃連

神麴炒

陳皮

吳茱萸各一錢半薑一錢 蠶

人參一錢

又方二陳湯加川芎蒼朮倍加炒梔痛甚者加炒乾薑此從治反治之法

暴病為寒宜溫之

保寒厥心痛者手足逆而通身冷汗出便利溺清或大便利而不渴氣微力弱急宜以朮附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死宜急救之是知久病非寒暴病非熱也朮附湯治寒厥暴心痛脈微氣弱即仲景朮附湯也

附子炮去皮

一兩白朮四兩

甘草炙一兩

右麤末附子令勻每三錢水一盞半薑五片枣一枚煎至一盞去查溫服食前

羅胃脘當心而痛治驗 漕運使崔君長男雲卿年二十五體本豐肥奉養膏粱時時有熱證友人勸食寒涼物因服寒藥至元庚辰秋瘧發醫以砒霜等藥治之新汲水下禁食熱物瘧病未除反添吐瀉脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦屢醫未效至冬不瘧延至四月間勞役煩惱過度前證大作請予治之診視脈得弦細而微手足稍冷面色清黃不澤情思不樂惡人煩冗飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水每發作冷汗時出氣促悶亂不安須人額相抵而坐少時易之予思內經云中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則為痿

厥心寬又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得熱則已非其辛大熱之劑則不能愈遂製一方名曰扶陽助胃湯

附子

炮去皮二錢乾薑炮一錢半

草薢

益智仁

揀參

甘草炙

官桂

白芍藥各一錢

吳茱萸

陳皮

白朮各五分

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱溫中散寒故以為君草薢益智仁辛甘大熱治客寒犯胃為佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫白朮陳皮苦溫補脾養氣水挾木氣亦來侮土故作急痛桂辛熱以退寒水芍藥味酸以瀉木來剋土吳茱萸苦熱泄厥氣上逆於胸中為使右剉如麻荳大都作一服水二盞薑三片棗二枚同煎至一盞去查溫服食前三服大勢去痛減半至秋先灸中脘三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣

滋榮百脈以還少丹服之喜飲食添肌肉皮膚潤澤明年
春灸三里二七壯乃胃之合穴亦助胃氣引氣下行又以
芳香助脾服育氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒慾慎
言語節飲食一年而平復

身熱足冷煩躁為熱者

保熱厥心痛者身熱足冷痛甚則煩躁而吐額上自汗知
為熱也其脈洪大宜灸太谿崑崙表裏俱瀉之是為熱病
引熱下行汗通身出者安也灸後與金鈴子散痛止服枳
實白朮丸去其餘邪也

金鈴子散治熱厥心痛或作或止久不愈者

金鈴子

玄胡索各一兩

右為末每服三錢酒調下痛止與枳朮丸

外療峭心痛熊膽如大荳許和水服大效本草熊胆味苦寒

仲心中寒者其人病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹

寒飲

心譬如蠱注其脈浮者自吐乃愈

經云寒氣客於背俞之脈則血脈澁血脈澁則血虛血虛
則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則
痛止矣此亦寒氣客心背而痛也

心痛徹背背痛徹心烏荳赤石脂丸主之

蜀椒一兩

烏頭炮一分

附子炮半兩

乾薑炮一兩

赤石脂兩

右五味為末蜜丸如桐子大先食服一九日服三不效

稍加服

胸痺不得臥心痛徹背者括萎薤白半夏湯主之

括萎實一枚

薤白三兩

白酒一斗

半夏半升

右四味同煮至四升服一升日三服

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭

足上下痛而不可觸近大建中湯主之

蜀椒二合 乾薑四兩 人參二兩

右三味以水四升煮取二升去查內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之

心中痞厥逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之

桂枝 生薑各一兩 枳實五兩

右三味以水六升煮取三升分溫三服

聖治寒疝心痛四肢逆冷全不飲食用桂心二兩去皮搗

羅為散不計時候熱酒調下一錢匕

世果附湯治寒氣心痛

附子 草果 良薑等分

以酒煎服立效

羅二薑丸養脾溫胃去冷消痰大治心脾疼寬胸下氣進飲食及一切冷物所傷並皆治之

乾薑炮 良薑

右等分為細末麪糊丸如桐子大每服十五丸至二十丸食後陳皮湯姪娠婦人不宜服

右方辛甘熱以散寒結

世治心痛累效水梅一箇去核生硫黃為末相和搗勻以可丸為度作一丸白湯下立愈病不再作

右方酸熱以收散寒凡服辛劑反甚者改服酸劑立愈也

丹客寒犯胃草豈蔻丸主之熱亦宜用止可一二服

草豈蔻一錢四分 吳茱萸湯泡洗

益智仁 僵蚕炒 歸身 青皮各六分

神麴

薑黃各四分

生甘草三分

桃仁去皮

半夏

湯泡七錢

澤瀉一錢

利減半

麥蘖炒黃

一錢半

炙甘草六分

柴胡四分

詳脇下痛多少與之

人參

黃芪

陳皮

右一十八味除桃仁另研如泥外為極細末同研勻湯浸炊餅為丸如桐子大每服三十九丸熱白湯送下食遠旋斟酌多少用之

監縣之閤年五十餘春末心脾疼自言腹脹滿手足寒過肘膝須綿裹火烘胸襟畏熱却喜掀露得風涼則快脈皆沉細而澁稍重則絕輕取似弦而短口渴乾而喜熱飲穀肉全不食遂以草苴薹九三倍加黃連滑石炒神麴為丸白朮為君茯苓為佐陳皮為使作湯送下一百丸服至二斤諸証皆愈

虛寒

以物柱按而痛者挾虛以二陳湯加炒乾薑和之

按之痛止者為虛治法並見寒心痛條丹溪云苴薹九

治氣餒弱人心痛方見寒熱通用條

仲九痛九治九種心痛

附子三兩

生狼牙一兩

巴荳一兩

去皮心炒研如脂

人參

乾薑

吳茱萸各兩

右六味為末煉蜜丸如桐子大酒下強人初服三九日三服弱者二九兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛併冷腫上氣落馬墜車血疾等證皆主之忌口如常法

寒實

濕煮黃丸治大實心痛方見飲食內傷

藁本湯治大實心痛大便已利宜以此徹其痛也

藁本兩

蒼朮兩

右剉每服一兩水二盞煎至半盞溫服

右寒實

熱實

仲按之心下滿痛者此為實也當下之宜大柴胡湯

方見傷寒

子和一將軍病心痛不可忍戴人曰此非心痛乃胃脘當心痛也內經曰歲木太過民病胃脘當心而痛乃與神祐丸一百餘粒病不減或曰此胃脘有寒宜溫補不宜與涼劑將軍素知戴人明了復求藥於戴人戴人復與神祐丸二百粒作一服犬下六七行立愈

神祐丸方見水腫門

右熱實

食積痛

丹蔣氏子年十六久瘧方愈十日而心脾大痛兩手脈皆伏痛稍殺時氣口緊盛餘脈皆弦實而細予曰此宿食也詢之因食冷油煎堆子遂以小胃丹津嚥十餘粒仍斷飲食經三日凡與小胃丹十二次痛不作至晚下忽大痛連

及兩脇予曰此必與穀太早問之果然遂斷其飲食亦與藥蓋宿積已因小胃而稍解其痛又因新穀與餘積相併而復作若又攻擊必大傷胃氣所以不與藥又斷食三日其家大恐以為不救時有怨言予曰六日不能思食強禁不與方成惡候待其索食與之又須較量方可至夜更餘心嘈索食予先用白朮黃連陳皮作丸子遂以熱湯下七八十九以除其嘈雜若以為飢而與粥其痛必如前矣其家苦欲與予詢病者隔間莫尚悶否答曰我纔飢作必繼之薄悶今雖未甚快然亦未嘗思食過兩時許又索食予以前丸與之如是者又一晝夜飢不再作人亦昏困思睡予教以用稀粥減平日之半兩日禁其雜食調理半月而安

小胃丹方見飲食內傷

保心痛用小胃丹津下十五丸

右漸除熱宿食積法

世木香丸治食積心痛

木香

丁香

三稜

蓬朮

青皮

陳皮二錢半

檳榔二錢

白芷一錢

巴豆肉

十五粒用醋煮令無白心

右末醋糊丸麻子大

本治一切積聚有飲心痛礪砂丸

礪砂

三稜另末

乾薑

香白芷

巴豆

去油各半兩

大黃另末

乾漆各半兩

木香

青皮

胡椒各一分

檳榔

肉苳蔻各一分

右為細末醞醋二升煎五七沸後下三稜大黃末同煎五七沸入礪砂同煎成膏稀稠得所入諸藥和勻杵丸如菘荳大年深成塊生薑湯下四五丸食積熱水下白

心傷痛

痢乾薑湯下赤痢甘草湯白痢當歸湯蔥酒亦得
潔厚朴九紫苑九治積聚心痛厚朴九方見翻胃紫苑九方見積塊
仲心傷者其人勞役即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱臍跳其脈弦此為心臟所傷也

外因痛

丹心痛輕者散之麻黃桂枝重者加石碱用川芎蒼朮炒山梔作丸服

桂枝

麻黃

石碱

右為末薑汁浸炊餅為丸桐子大熱薑湯下十五丸如服丸數多又治痰飲

無麻黃桂枝湯治外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急不得轉側

麻黃去節湯浸焙

桂心

芍藥

細辛去苗

乾薑

甘草炙各七錢半

半夏

香附各五錢

右劉每五錢水盞半生薑五片煎七分去查食前服大便秘入大黃量虛實加減

世治心疼甚效

檳榔

桂心

葛根

甘草

細辛

半夏

桔梗

枳殼

川芎

防風

右等分惟甘草半之水煎服有人心疼諸藥不效服此愈

內因痛

丹青巖劉山長子年三十六歲得心疼十八年矣因酒飲牛乳病發時飲食無碍得病八年後盛暑及沐浴飲食時皆無汗中間更醫不一悉以丁附諸丹等熱藥治之至是黃瘦食減若不勝衣痛作時須以一物拄之診其脈皆三至弦弱而瀉未風先寒大便或閉或泄最苦是胸膈吞酸

七月內遂以二陳湯加白朮黃連黃芩桃仁郁李仁澤瀉每旦用此藥飲而出之所吐皆苦黑水雜以如浸木耳片者此日却再與兩貼飲而不出如此兩月近二百餘貼澁脈漸退至數漸添忽一日診其脈純弦漸有充滿之狀時正立冬後頗暄暖意其必欲作汗又意其血氣未充汗難以發以人參黃芪芍藥當歸陳皮半夏甘草調理二日此時痛雖緩每晝夜一二作至第三日與麻黃蒼朮當歸川芎甘草等藥纔下咽目上視口噤而無神色予呼之不應見其四肢不收急以左手抱其頭就坐於床以右手拇指捻其中須臾而愈通體汗如雨自此痛不復作但人倦食未增耳續又大為噤酸所苦每一晝夜六七作其作時有一酸塊自胸膈間直衝上咽喉情狀極惡遂悉罷諸藥以黃連濃煎取冷俟酸塊欲上時以冷黃連汁數滴與之

即回如此六七次半日許其塊亦除於是罷藥淡粥調養
又近三箇月時以立春節旬餘中腕處微有脹急面帶青
色氣息喘促時天氣尚寒意謂脾土因久病衰弱木氣行
令此肝凌脾急以索矩三和湯與之至四日而安

一婦人年四十餘歲因二十年憂患後心痛或可按或不
可按食甚減口渴而不能飲水形瘦骨立心痛止則頭痛
作其痛無常處頭痛止則心痛作夜間全不寐大便七八
日一行堅小而黑而出亦難累與四物加陳皮生甘草前
後約百餘貼病雖不增却無退減予曰此肺久為火所鬱
氣不得行由是血亦畜塞遂成污濁氣壅則頭痛血濁不
行則心痛通一病也治肺當自愈遂做東垣方清空膏例
細切酒炒透令赤色為細末以熱白木湯調下頭上稍汗
如此十餘貼漸漸汗至通身及膝而止諸病皆愈因其膝

虫痛

下無汗形瘦病久小便數大便澁兩手皆見澁脈當議補
血以防後患問其又思水而不飲遂與四物加陳皮生甘
草桃仁酒芩以補之遂安
裏實心痛並見按之滿痛為實條丹溪云心痛脈堅實不
大便者下之

羅化虫丸

鶴虱

檳榔

胡粉炒

苦棟根去厚皮各

五十兩

白礬飛十兩

右為末麩糊為丸桐子大小兒疾病多有諸虫或因臟
腑虛弱而動或咽食甘肥而動動即腹中疼痛往來上
下攻心痛則笑不休合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎
沫或吐清水四肢羸困面青色黃飲食雖進不生肌肉
或寒或熱沉沉默默不知病處一歲兒服五丸溫漿

下入香油一兩點打勻下之米飲亦得其虫自下

保妙香丸治男子婦人心痛強中搖熱如癩狀方見燥門

風癩者羌活湯引下妙香丸羌活湯方見諸風條血癩者當歸湯

引下妙香丸當歸湯方見諸血條

丹虫痛者面上白斑唇紅能食治用棟根錫灰之類脈堅

實不大便者下之

羅補金散治諸般虫

鶴虱生

雷丸

定粉

錫灰已上各等分

右為末每服三錢空心少油調下又用猪肉一兩燒熟

摻藥在上細嚼亦得用翎毛掃甘遂末一錢與前藥一

處服之其虫自下

本治寸白虫方黑鉛灰炒四錢一服先喫猪肉脯少許一

時來却用砂糖濃水半盞調灰五更服虫盡下白粥將息

一日良

又療寸白虫用錫灰蕪荑檳榔者極佳予宣和中每覺心

中多嘈雜意欲作飲又疑虫漫依此方所說翌日下長虫

二條一長二尺五寸頭扁闊尾尖銳每寸作一節斑如錦

紋一條皆寸斷矣千金謂勞則生熱熱則生虫心虫曰蛔

脾虫曰寸白腎虫如方截絲縷肝虫如爛杏肺虫如蚕皆

能殺人惟肺虫為急肺虫居肺葉內蝕人肺系故成瘵疾

咯血聲嘶藥所不到治之為難道藏中載諸虫頭皆向下

行唯自初一至初五以前頭上行故服藥多取月朞以前

蓋為此也

取寸白虫方

畫粉

密陀僧各等分

右為末每服二錢用麻油調服空心下頃刻成涎取下

取寸白虫

錫灰兩

木鱉

蘆薈二十文

黃丹文十

輕粉文十

右為末，猪膏油丸如桐子大，先齋一日，晚莫喫飯，次早五更溫水調下，分作二服。

制虫，制勞悅肌膚，去勞熱。

檳榔半一兩

龍膽草兩一

乾漆兩半

右為細末，煉蜜丸如桐子大，每服十九，至十五丸，熟水吞下。

張仲文治寸白虫，熬胡粉令燥，平旦作肉臙，以藥方寸匕入臙中服之效。

丹治諸虫，棟皮細末，米飲調下，二錢匕。斗門方

壬主脾胃有虫，食即痛，面黃無色，疼痛無時，以石州蕪荑仁二兩，和麩炒令黃色為末，非時米飲調二錢匕，瘥。

經治蛔虫吐水，心痛，鶴虱三兩為末，蜜丸，平旦漿水服二

十九，愈。千金方為末，空心溫醋湯下，虫當出。

經曾宿食冷，多寸白虫，每朝空心，熱酒調山荳根末三錢服之，其虫自出。

簡治諸虫在臟腑，久不瘥，檳榔半兩，炮搗為末，每服一錢，至二錢，蔥蜜煎湯調下，空心。

外療蛔虫心痛，惡心吐水，乾漆，熬搗蜜丸，服十五丸，日再服。

范旺治寸白虫，方狼牙五兩，搗末，蜜丸，麻子大，隔宿不夜，食明旦以漿水下一合，服盡愈。

大治寸白虫，以酸石榴東引根一握，淨洗，細剉，用水三升，煎取半碗，已下去查，五更初溫服，盡至明日，取下虫一大團，永絕根本，一日喫粥補之。

本金櫻東行根治寸白虫，剉二兩，入大米三十粒，水二升。

煎五合空心服須臾瀉下

干治寸白虫、茱萸根洗去土四兩切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者皆不任用

食治蛔虫心痛面青口中沫出取臨水扁蓄葉一斤細切以水三斗煮如餲去查空心服一升虫即下至重者再服仍通宿不食來日平明服之效

本取寸白虫苦絲瓜不以多少研為末每服二錢好酒二盞空心調服

竹木香三稜散治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛

半生半炒大腹子

檳榔

雷丸

錫灰

醋炒

三稜

蓬朮

木香

大黃

已上各一兩

右為細末每服三錢空心用蜜水調下或砂糖水亦可須先將燒肉一片口中半嚼之休嚥下吐出口中肉汁後服藥

右方有攻性而下虫者

本崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少搗取汁搜麵作餅飪或冷淘食良久當利出虫長一尺許頭似筆管後不復患至元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食之便吐一物可方一寸如蝦蟆狀無目足等微似有口蓋為此物所苦自此頓愈麵中忌用鹽

丹治蛭虫吐清水氣口刺痛取生艾汁隔宿勿食以肥香脯方寸片先喫令虫聞香次即飲一升必下蛭虫胸喉中覺有虫上下偏喜聞蔥豉油食之香者兩三日不食開口

而臥將油煎蔥豉令香放口邊，虫當自出引而去之，但隨所喜物用之亦可。

世治心痛稀葎草搗汁醋和服之，效有人服此吐虫二條，終身不發。

子和酒官楊仲仁病心氣痛，此人常好飲酒，初飲二三杯必奔走，三五十次其酒稍散，方能復席，飲至前量醉後至明日，嘔清黃水數口，夜變魚腥臭，六七日始安，戴人曰：宜吐乃吐虫一條，青黃色長六七寸，口目鼻俱全，二目膜瞠，狀如蛇類，楊醃乾示人。

仲虺虫為病，令人吐涎心痛，發作有時，毒藥不止，甘草粉蜜湯主之。

甘草

二兩

粉

一兩

蜜

四兩

右三味以水三升，先煮甘草取二升，去渣，內粉蜜攪令

和煎如薄粥，溫服一升，瘥即止。

孫向大王宮中有一官人，七太尉所寵也，忽患一疾，凡惡心則吐虫數條，後乃頻作，七太尉甚愍之，累治不瘥，每用殺虫藥，則吐虫愈多，召孫診之，孫曰：六脈皆細，非虫脈也。今雖吐虫，乃臟寒而虫不安，失居上膈，因而吐出，復用殺虫藥，虫為藥所苦，不能自安，所以吐虫愈多也。孫遂用藥，不三五服，皆一色丸子，虫遂不吐，明日再召孫至，六脈漸大，進前藥，其病不作，後求方，乃硫黃附子各一兩，並末，粳米糊為丸，每三十九丸，米飲下。

仲烏梅丸治虺

方見傷寒陰病

氣痛

河正氣天香散治心痛，但忍氣則發者。

方見氣痛門

血痛

丹心痛脈澁者，有死血，又云作時飲湯水下，作吃者有死血，桃仁承氣湯下之。

方見傷寒

凡治證必要先問起居何如。

假如心痛有因平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛用桃仁承氣湯下之切記輕者用葑汁桔梗能開提其氣血藥中兼用之

經失笑散治婦人心痛氣刺不可忍五灵脂淨好者蒲黃等分爲末每二錢用黃醋一杓熬成膏再入水一盞煎至七分熱服效

世手拈散治心脾疼極驗詩云草果玄胡索灵脂并没藥酒調三二錢一似手拈却 又治心痛劉寄奴末六錢玄胡索末四錢薑汁熱酒調服妙

簡治九種心痛腹脇積聚滯氣筒子乾漆二兩搗碎炒出烟細研醋煮麩糊和丸如桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得服無時

外治心痛當歸爲末酒調服方寸匕

痰痛

丹治心痛亦能治哮喘半夏研碎香油炒薑汁炊餅爲丸薑湯下二十九

五味鹹更堅條海蛤丸寒條括萎半夏葑白湯表條桂麻石碱丸皆治痰飲心痛之妙劑也

世治心痛累效陳年白螻螺殼洗淨爲末熱酒調下一錢半即愈

丹一味牡蠣粉酒調下二錢氣實者可用

治痰飲心痛海蛤丸

海蛤

燒爲灰研極細過數日火毒散用之

瓜蒌仁

帶穰同研

右以海蛤入瓜蒌內乾濕得所爲丸每服五十九

又方治脾疼海蛤粉佐香附末用川芎山梔生薑汁煎辣湯調服爲佳

手治血氣攻心痛不可忍以蓼根剉酒浸服之瘥

雜方

世心痛枯礬辰砂少許每半錢人參湯調下 一方用白礬辰砂糊丸好醋吞下神效 又方辰砂一味研好醋調服效 又方用白礬為細末每服一錢茶調下

外黃連湯肘後龍膽酒

並見卒心痛熱條

仲粉蜜丸脾受肝制而急故虫不安用粉蜜之甘緩以安之

方見垂條

素少陽所謂心脇痛者言少陽盛也盛者心之所表也九月陽氣盡而陰氣盛故心脇痛也所謂不可反側者陰氣藏物也物藏則不動故不可反側也

脈解篇

瑞蚕沙散治男子婦人心氣痛不可忍者晚蚕沙不拘多少為細末用滾湯泡過濾淨取清水服之立止 又方黃荊子炒焦為末米飲調下亦治白帶 治心痛用洗淨玉簪花根搗濃汁雜和好酒一半熱服

運氣

干治心腹俱痛以布裹椒薄注腹上火熨令椒汗出良運氣心痛凡熱風濕寒燥五氣之初皆能干心而痛蓋心為五臟之主故也

一曰熱邪干心經云少陰司天熱淫所勝病心痛肺膜又云少陰之復暴瘖心痛又少陽之勝熱客於胃煩心心痛又云陽明司天燥氣下臨暴熱至甚則心痛此在泉之熱為痛治皆以寒劑是也

二曰寒邪干心經云太陽司天寒氣下臨甚則心痛又云陽明司天之政四之氣寒雨降病心痛又云歲水太過民病上下中寒煩心躁悸心痛又云歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至心痛又云水鬱之發民病寒客心痛又云太陽司天寒淫所勝病厥心痛又云太陽之復心胃生寒心痛痞滿又云少陽在泉主勝則熱反上行而客于心心痛

蓋終之氣寒勝其客也又云歲火不及寒乃大行病鬱胃
蒙昧心痛又云太陽之勝寒厥入胃則內生心痛皆治以
熱劑是也

三曰風邪干心傷胃經云少陽司天之政終之氣風乃至
心痛又云少陽司天風行于地心痛胃脘痛噎不通又云
歲水不及濕乃大行復則暴風大發噎中痛於心腹又云
木鬱之發民病胃脘當心而痛噎咽不通又云厥陰在泉
風淫所勝心痛支滿又云厥陰司天風淫所勝胃脘當心
而痛又云厥陰之復厥心痛又厥陰之勝胃脘當心而痛
治皆以涼劑是也

四曰濕邪干心經云土鬱之發心痛脇腹又云太陰在泉
濕淫所勝病飲積心痛又云太陰之勝火氣內鬱心痛熱
格治皆以熱劑是也

五曰燥邪干心經云陽明之復善太息心痛痞滿治以溫
劑是也

六曰寒熱中于心經云少陰司天之政寒熱凌犯而爭於
中寒厥入胃心痛三之氣大火行寒氣時至民病氣厥心
痛治分寒熱多少調之是也

針灸

厥心痛者他臟病干之而痛皆有治也真心痛者心臟自
病而痛故夕發旦死旦發夕死無治也然心臟之經絡有
病在標者其心亦痛而有治經云心手少陰之脈是動則
病噎乾心痛渴而欲飲又心主手少陰之脈所生病者心
痛掌中熱皆視盛虛熱寒陷下取之又經云手心主之別
名曰內關去腕二寸出於兩筋之間實則心痛取之兩筋
間也又云邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不及調
其俞是也

靈厥心痛與背相控善瘳如從後觸其心僂倭者腎心痛也先取京骨崑崙發針不已取然谷厥病篇下同

心痛引背灸刺法有四

其一取足太陽經刺節云取京骨崑崙者是其穴也蓋足太陽之正循膂當心入散絡故心痛引背取之也

其二取足少陰經刺節云取京骨崑崙不已取然谷者是其穴也又經云腎足少陰經之脈所生病者煩心心痛視盛虛熱寒陷下取之也又經云心痛引腰脊欲嘔取足少陰者是也蓋足少陰脈貫脊絡心故亦治心痛引背也

其三取足少陽經云心痛引背不得息刺足少陰不已取少陽者是也蓋手少陽之脈散絡心脈又三焦下俞曰委陽是足太陽絡足太陰循膂當心入散絡故亦治心痛引背也

其四取督任脈經云背為心相控而痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也又云心痛當九節刺之按已次按之立已不已上下求之得之立已者是也蓋十椎與九節者督脈也胃脘與天突者任脈也

厥心痛腹脹胸滿心尤痛甚者胃心痛也取之太都太白心痛兼脹灸刺法有二

其一取足太陰經云取太都太白者是其穴也又經云脾足太陰之脈是動則病胃脘痛腹脹所生病者煩心心中急痛者視盛虛熱寒陷下取之又云心痛腹脹嗇嗇然大便不利取足太陰者是也蓋足太陰脈從胃上膈注心中故心痛腹脹者取之也

其二取足陽明經云胃病者腹脹胃脘當心而痛飲食不下取之三里者是也蓋胃脘當心痛者似心痛實非心痛

也

厥心痛如以錐針刺其心心痛甚者脾心痛也取之然谷太谿

脾心痛而取然谷太谿者故孫真人張潔古謂之妄經也

厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也取之行間太衝

心病色蒼如死狀者取肝其兼小腸滿便澀難者亦取肝經云心痛引少腹滿上下無常處便澀難刺足厥陰是也

厥心痛臥若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心痛也取之魚際太淵

徒居謂間居間謂痛緩心痛臥與間居則痛緩動作則

益甚者取肺其兼短氣者亦取肺經云心痛但短氣不足以息刺手太陰者是也

心痛不可刺者中有盛聚不可取于脘腸中有虫瘕及蛟蛸皆不可取以小針心腸痛懷作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟蛸也以手聚按而堅持之無令得移以大針刺之久持之虫不動乃出針也

集九種心痛 間使 靈道 公孫 太衝 三里 陰陵泉

桑心氣痛 巨缺 雄尾 各取一揲 興隆 瀉之 撮脾脊後心疼痛 中渚 瀉之 灸心痛背穴 心俞

高俞

瀝心痛脈弦肝原穴 脈沉腎原穴 脈瀦肺原穴 脈浮心原穴 脈緩脾原穴

摘冷心痛、巨缺燔針刺之如五臟氣相干而脇痛

玉心脾疼、上腕二寸半瀉、中腕二寸半補

甲心痛不可按煩心巨缺主之、心痛有虫多涎不得反

側上管主之、心痛上搶心不欲食支痛引鬲建里主之

撮心胸痛并氣攻、勞官、大陵各三分瀉之、內關

甲心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心恒而驚太陵及間使

主之、心寒痛難以挽仰心疝衝胃死不知人中腕主之

心痛衄噦嘔血驚恐畏人神氣不足郄門主之

難陰維為病苦心痛內關穴通陰維

甲脾逆氣寒厥急煩心善唾噦噫胸滿噉呼胃氣上逆心

痛太淵主之針云肺脹胃逆、心膨痛尺澤主之千金云心煩悶亂少氣不足以

息、心痛卒欬逆尺澤主之出血立已、胸痺心痛肩內

麻木天井主之、胸脇背相引而痛嘔吐不食幽門主之

診

胸痺心痛不得息痛無常處臨泣主之千金云不得反側

丹心痛雖日數多不喫飯不死若痛止便喫物還痛必須

三五服藥方可喫物、心痛左手脈數熱多脈濇有死血

右手脈實是痰積、脈大必是久病、兩手脈堅實不

大便者下之、痛甚者脈必伏多用溫藥附子之類不可

用參朮

心脈微急為心痛引背食不下全文見治虛實法

仲問曰病腹痛有虫其脈何以別之師曰腹中痛其脈當

沉若弦反洪大故有虵虫、脾脈微滑為蠱毒蝮蝎腹熱

全文見治虛實法

脈關上脈緊而滑者虵毒、脈沉而滑者寸白、肘後麓

以下三四寸熱者腸中有虫全文見診、真心痛手足青至節

心痛甚旦發夕死夕發旦死

熱則生虫故脈洪大者主虫

卒心痛

竹治急心疼方

斑猫七箇頭胡椒四十粒

右將二味同炒令斑猫焦碎吹去斑猫不用却將淨胡椒研為細末只作一服熱酒調下不拘時候

治暴心痛不可忍者

荔枝核丹溪云荔枝核屬金性燥熱

右為末每服一錢水醋各半盞煎七分稍熱服

熱

外治卒心痛黃連八兩一味咬咀水七升煮五升絞去渣溫飲五合日進三服

肘卒心痛龍膽草四兩酒三升煮一升半頓服

實

仲走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通

巴荳二枚去皮炒杏仁二枚

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下

老少量服通治飛尸鬼擊等病

有虫

竹海上方急救男子婦人心疼牙關噤欲死者用隔年陳

蔥白三五根去皮鬚葉搗為膏將病人口幹開用匙將膏

送入咽喉用香油四兩灌送下油不以多少但得蔥下喉

其人必甦少時將腹中所停虫病等物化為黃水微得利

為佳除根永不復發累效一方用真香油頓服一盞亦妙

雜方

附治卒心痛白艾成熟者一升水二升煮取一升去渣頓

服若為客氣中者當吐虫丹溪云艾屬火而有水服多者有毒發

治卒心痛東引桃枝一握切碎以酒一升煎去半升頓服

大效

針灸

經云邪客于足少陰之絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿無積者刺然骨之前出血如食頃而已不已左取右右取左

病新發者五日已

摘卒心痛不可忍

上腕

八分先補後瀉覺針下氣行如滾雞子入腹為度次取後穴

氣海

湧泉

無積者刺之如食頃而已有積者先飲藥利之刺之立已如不已再刺後穴

間使 支溝 三里

丹鍼灸經治卒心痛不可忍吐冷酸水及原臟氣少灸足

大指次指內約文中各一壯如小麥大下火立瘥

甲卒心痛癩癡互相引肘內廉痛心敖敖然間使主之

卒心痛汗出大敦主之出血立已 心腹中卒痛而汗出

石門主之

胎前心痛

血虛

大治妊娠卒心痛氣欲絕

川芎

當歸

茯苓

厚朴各等分

右水六升煎二升分二服

虛熱

白朮散治妊娠卒心痛欲死不可忍者

白朮

赤芍藥

各二兩

黃芩

半兩

右水六升煮取二升半分三服半日令盡微下水令易

產忌桃李雀肉

產後心痛

滯氣

羅火龍散治產後心痛

艾葉

鹽炒

茴香

炒

川練子

炒各一兩

右為末水煎服

汚血

大治婦人血崩心痛甚者名曰殺血心痛小產下血過多

而心痛者亦然用烏賊魚墨炒為末醋湯調下此魚腹多有墨汁見

人過必吐其墨以蔽身

失笑散治心腹痛百藥不效服之即愈方見心痛汚血條

救治產後血不盡心腹痛荷葉熬令香為末水煎下方寸

寒

大崑蜜湯治產後血寒心痛

熟地

當歸

獨活

吳茱萸

芍藥

乾薑

甘草

桂心

小草各一兩

細辛半兩

右為散每服半兩水三盞煎至一盞去查稍熱服

聖治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心三兩搗羅為散

狗膽汁和丸如櫻桃大不拘時候熱酒磨下二丸

諸般氣痛

大法

丹氣痛一身腔子裏氣痛少用木香於藥內行得開

河正氣天香散治婦人一切諸氣或上奏心胸或攻築脇

肋腹中結塊發渴刺痛月水不調或眩暈嘔吐往來寒熱

減食方見治虛實氣血條

血滯

丹調氣方

香附四兩

人參一兩

烏藥二兩

砂仁一兩

甘草二兩

右為細末熟湯調服

本治脾積氣婦人諸般氣痛

香附五兩

蓬朮兩

甘草各二兩

右各淨研為細末每服二錢入鹽少許白沸湯空心熱

服

治一切氣疾丈夫婦人撞心冷氣並皆治之

香附一斤

炒

陳皮四兩

去毛

甘草一兩

生

右為細末每服二錢空心鹽湯點服

丹寬中丸 枳殼為末酒糊丸

婦人患氣痛喜食熱物 二陳湯加木通薑五片煎下保

和丸

濕痰

女子患氣痛要揉者曾服烏沉湯有效又再發

陳皮六錢半

半夏

青皮兩半

芍藥二錢

木通

川芎

茱萸一錢

甘草五分

右分五貼薑三片煎服

明五院君出外怒歸膈痞痛不思食脈沉弦稍數此氣抑不通也

半夏三錢

青皮

枳殼各二錢

黃芩

芍藥各錢半

木通

甘草各一錢

右薑三片煎取半盞下保和丸三十粒

三七嫂怒後氣痛脈沉不思食

青皮一錢

柴胡半錢

甘草二分

半夏一錢

黃芩五分

木通三錢

陳皮五分

右薑三片煎服

熱

感村婦人五十七歲氣痛不可按漸漸痛至足

青皮

芍藥各三錢

川芎

陳皮各三錢

黃栢炒

木通各一錢

甘草些

右分三貼煎熱飲

寒

本治婦人室女血氣刺痛不可忍日夜叫喚可憐者一服效

芸臺子

肉桂板桂也

良薑

沒藥各等分

右焙乾為末每服三錢乳香湯調下熱服不拘時候

孟詵心腹中結伏氣杏仁陳皮桂心訶黎勒皮為丸空心服三十九

實積

本和氣散治男婦一切氣疾他藥不瘳者

甘草炙半兩

白芨一兩

地骨皮

山蜈蚣

藿香兩半

白芷兩一

木香

紅內消

山慈菘各半兩

右焙乾為末每服二大錢空心塩湯點服余鄉村有一老醫數世習醫凡婦人氣疾惟憑此藥百發百中

胃病胃滿

心病

經云南風生於夏病在心俞在胃脇又云仲夏善病胃脇此則胃脇痛屬心故入心部

肝病

肝虛則胃痛引背脇肝實則胃痛不轉側喜太息肝著則常欲蹈壓其脅經云春脈如弦其氣不實而微此謂不及令人胸痛引背下則兩脇脹滿此肝虛而其脈症見於春如此也

仲肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胃中痛不得轉側食則吐而出汗也 肝著其人常欲踏其胃上先未苦時

但欲飲熱旋覆花湯主之

方未考金匱婦人門有旋覆花湯方或云是此

素陽明所謂胸痛短氣者水氣在臟腑也水者陰氣也陰氣在中故胸痛少氣也

脈沉遲者寒者虛痰

仲胸痺之病喘息咳唾胸背痛短氣寸口脈沉而遲關上小緊數者宜以括萎薤白白酒湯主之

括萎實一箇

薤白半升

白酒七升

右三味同煮取二升分温再服

括萎薤白半夏湯治胃痺不得臥心痛徹背方見心痛門

胃痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之

枳實薤白桂枝湯

枳實四枚

厚朴兩四

薤白斤半

桂枝兩一

括萎實一箇

右五味以水五升先煮厚朴枳實取二升去查納諸藥
煮數沸分温作三服

人參湯

白朮 人參 甘草 乾薑各二兩

右四味以水八升煮取三升温服一升日三服

按之滿痛者熱

孫主簿季述之母患胸中痞急不得喘息按之則痛脈數
且濇曰胃痺也因與仲景三物小陷胸湯一劑和二劑愈

方見傷寒

仲支飲胸滿者枳朴大黃湯主之

厚朴兩一 大黃兩六 枳實兩四

右三味水五升煮取二升分温再服

痰雜方

脈寸口脈沉胸中引脇痛胸中有水氣宜澤漆湯及刺巨
闕瀉之澤漆湯仲景方也見咳門

杜壬治胃脇痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰咳大括
萎去穰取子熟炒連皮研和麩糊為丸如桐子大米飲下
五十九

耳治胸腹雍滯去痰開胃用半夏洗淨焙乾搗羅為末生
薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水一
盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半錢煎取一盞温服能去
胸膈壅滯大壓痰毒及治酒食所傷其功效大矣

丹鄭仲游年二十有三高有一點相引痛吸氣皮覺急

滑石兩一 桃仁兩半 枳殼兩一 黃連兩半

甘草錢二

右為細末每錢半以蘿蔔根自然汁研煎熟飲之一日
五六次

仲本年二十七因吃熱補藥又妄自學吐納以致氣亂血

汚血

熱嗽血消瘦遂與行倒倉法今嗽血消瘦已除因喫炒薑米膈間有一點氣梗痛似有一條絲垂映在腰與小腹亦痛大率偏在左邊此肝部有惡血行未盡也

滑石兩一

黃丹三錢

枳殼炒一兩

黃連五錢

生甘草二錢

紅花一錢

柴胡五錢

桃仁二兩

右為細末每服一錢半以蘿蔔自然汁煎沸服之

表

垣上清散清利頭目寬快胸中不利者悉利於表

黃芪三錢

甘草二錢

人參三錢

葛根一錢半

防風根一錢

蔓荊子半錢

右咬咀分作二服每服水一盞半煎至一盞去渣臨臥

溫服以夾衣蓋覆面首不語須臾汗出為效未服藥預

一日不語如服藥畢亦一日不語

運氣胸痛有二

運氣

其一火邪助心經云歲火太過甚則胸中痛脇支滿脇痛膺背肩胛兩臂內痛是也

其二金邪傷肝經云歲金太過民病胸痛引背兩脇滿且痛引少腹又云歲土不及風乃大行民病體重腹痛金復則胃脇暴痛引少腹者是也

內經灸刺胸痛有四

針灸

其一取心經云心痛者胸中痛脇支滿脇下痛膺臂肩胛間痛兩所臂內痛實則胸腹大脇下腰子相引而痛取其經少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者是也

其二取腎經云腎虛則胃中痛大腹小腹痛取其經少陰太陽血者按刺法不分補瀉但言取血王註謂先去血脈後調虛實也

其三取膽經云膽足少陽脈所生病者胸脇肋髀膝外皆

痛詳盛虛熱寒陷下取之也

其四取筋經云手心主之筋其病當取過者又轉筋前及胸痛息責治在燔針劫刺以知為數以痛為輸又足太陽之筋足少陽之筋痛皆引胸痛治在燔針劫刺以知為數以痛為輸也

灸刺胃滿有三法

其一取氣海經云膻中者氣之海其輪上在手柱骨之上下前在於人迎氣海有餘者氣滿胸中悅息面赤審守其輪而調其虛實無犯其害是也手柱骨滑伯仁謂肩胛上際會處是穴也其二取肝經云肝足厥陰脈所生病者胸滿嘔逆飧泄狐疝遺溺閉癢詳盛虛熱寒陷下取之也其三取胃經云厥逆腹滿面腫唇潔潔然暴言難甚則不能言取足陽明是也

集胸脇痛不堪 期門四分 章門六分七壯 行間

丘墟 湧泉

東又法 期門沿皮二寸 支溝 膽俞沿皮一寸五分

甲胸滿痛璇璣主之 胸脇痞滿痛引胸中華蓋主之

胸脇痞滿痺痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心紫宮主之

胸中滿不得息脇痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心玉堂主

之 胸脇背相引痛心下胸中嘔吐多睡飲食不下幽門

主之 胸脇痞滿痛引膈不得息悶亂煩滿不得飲食靈

墟主之 胸脇痞滿劫引背痛臥不得轉側胸鄉主之

大氣不得息息即胸脇中痛實則其身盡寒虛則百節盡

縱大包主之 胸滿善太息胸中膨膨然丘墟主之千金云胸

背時寒間使主之 胸滿不得息頸頰腫陽谷主之千金云陽

急 胸中痛天容主之 胸脇痞滿勞宮主之 胸痺引

點

胸脇痞滿膈塞飲食不下嘔吐食後還出中庭主之
胸脇痞滿痰癥引膈腹痛短氣煩滿巨闕主之

胸脇痞滿不得息咳逆乳癆洒淅惡寒神封主之 胸脇

痞滿膈逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂步廊主之 胸

脇痞滿惡聞人聲木音巨虛上廉主之 胸下滿痛膺腫

乳根主之 胸脇痞滿喘逆上氣呼吸喘息不知食味氣

戶主之 胸脇脹腸鳴切痛太白血主之

撮胸滿血膨 期門一分沿皮向外一寸五分瀉

甲傷食脇下滿不能展轉反側目青而嘔期門主之 暴

脹胃脇痞滿足寒大便難面唇白時時嘔血太衝主之

胸中暴滿不得眠轍筋主之 胸脇痞滿寒如風吹狀俠

溪主之 胸脇滿頭痛項內寒熱外丘主之 多臥善唾

胸滿腸鳴三間主之

診

氣

仲脈當取太過不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者極
虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也
白色麤理者肺大肺大則多飲善病胸痺全文見診下同

胸痺短氣緩急

仲胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘枳薑湯

主之

茯苓杏仁甘草湯

茯苓二兩 杏仁五十箇 甘草一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服

橘枳薑湯

陳皮一斤 枳實三兩 生薑半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服

干治胸痺氣滿壅心膈不利枳實二兩麩炒微黃為末非時以清粥飲調下二錢聖惠方同

仲胸痺緩急者薏苡仁附子散主之

薏苡仁十五兩 大附子十箇

右二味杵為散服方寸七日三服

煩燥 虛煩 胎前虛煩 產後虛煩 躁 懊懣

昏悶

大法

垣煩躁發熱論 黃帝針經五亂篇云氣亂於心則煩心蜜默俛首靜伏云云氣在於心者取少陰心主之俞又云咳喘煩寃者是腎氣之逆也又云煩寃者取足少陰又云煩寃者取足太陰仲景分之為二煩也躁也蓋火入於肺則煩入於腎則躁俱在於腎者以道路通於肺母也大抵煩躁者皆心火為病心者君火也火旺則金燥水虧惟火

獨存故肺腎合而為煩躁又脾經絡於心中心經起于脾中二經相搏濕熱生煩夫煩者擾擾心亂兀兀欲吐怔忡不安躁者無時而熱冷汗自出少時則止經云陰躁者是也仲景以梔子色赤而味苦入心而治煩鹽豉色黑而味鹹入腎而治躁名梔子豉湯乃神藥也若有宿食而煩者梔子大黃湯主之

運氣 運氣煩躁有二

一曰熱助心火煩躁經云少陰之復燠熱內作煩躁鼽嚏又云少陽之復心熱煩躁便數憎風是也

二曰寒攻心虛煩躁經云歲水太過寒氣流行邪害心火病身熱煩心躁悸陰厥是也

診 成煩為擾而煩躁為憤躁之躁合而言之煩躁為熱也析而言之煩陽也躁陰也煩為熱之輕者躁為熱之甚者

無內熱曰煩外熱曰躁

謹按先賢治煩躁俱作有屬熱者有屬寒者治獨煩不躁者多屬熱惟悸而煩者為虛寒治獨躁不煩者多屬寒惟火邪者為熱蓋煩者心中煩胸中煩為內熱也躁者身體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲在井中為外熱也內熱者有本之熱故多屬熱外熱者多是無根之火故屬寒也

內外俱虛身軀冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆身不得安靜者死熱病七八日其脈微細小便不利加暴口躁脈代舌焦乾黑者死

虛煩

活人云虛煩似傷寒非傷寒也成無已云傷寒有虛煩有心中煩有胸中煩二說不同攷之於書成無已之言實出

診治

仲景活人無據然往往有非因傷寒而虛煩者今故兩存之立虛煩一門於此心部立傷寒煩一門於傷寒部無虛煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清清不寐皆虛煩也

保起臥不安睡不穩謂之煩宜梔豉湯竹葉石膏湯二方並見

傷寒

但煩熱者清肺去痰

活云但獨熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實也不可下病此者內外皆不可攻攻之必遂煩渴當與竹葉湯若嘔者與陳皮湯一劑不愈再與之孫真人云此法數用有效

陳皮湯

陳皮一兩 甘草錢五 人參一分 竹茹錢五

右劉如麻荳大每服五錢水一盞半薑三片棗一枚煎至七分去查食前服

無淡竹茹湯治心虛悶頭疼短氣內熱不解心中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬心去 小麥各二兩半 甘草炙一兩 人參

白茯苓各一兩半 半夏湯洗二兩

右劉散每服四錢水二盞薑七片棗三枚淡竹茹一塊如指大煎至七分去查食前服

煩熱冲心乱者安神

垣朱砂安神丸治心亂煩熱怔忡心神顛倒兀兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊懣之狀皆膈上血中伏熱蒸蒸不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸生地又為長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕熱朱砂納浮游之火而安神明

朱砂一錢研水飛 黃連淨酒炒一錢半 甘草炙五分 生地

當歸頭各一錢

右為極細末蒸餅為丸如黃米大每服十九津下

下痢後煩者吐之 仲下痢後更煩按之心下濡者為虛煩也梔子豉湯主之方見傷寒部煩門

煩而汗出不解者刺之飲湯 帝曰有病身熱汗出煩滿煩滿不為汗解此為何病岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名

曰風厥帝曰愿卒聞之岐伯曰巨陽主氣故先受邪少陰與其為表裏得熱則上從之從之則厥也帝曰治之奈何岐伯曰表裏刺之飲之服湯評熱論刺謂針足太陽六陰也飲之服湯謂仲景止逆下

氣麥門冬湯之類也

煩欲入井脈伏口渴于熱者 丹一女子年二十餘歲在室素強健六月間發煩悶困憊不食發時欲入井六脈皆沉細而弱數兩日後微渴衆以

下之

為病暑治不效四五日加嘔而人瘦手心極熱喜在陰處
漸成伏脈時妄語予急制局方妙香丸如桐子大以井水
下一丸半日許大便藥已出病無退減遂以麝香水洗藥
以針穿三竅次日以凉水送下半日許大便下稠痰數升
是夜得睡困頓伏枕旬日而愈因記金匱云昔肥而今瘦
者痰也遂作此藥治之
妙香丸丹溪云疏決腸胃制伏木火藥也

辰砂飛研五兩

牛黃

龍腦

膩粉

麝香研各一兩

金箔九十片

巴莖三百十五粒去尖膜炒熟研

右令研勻煉黃蠟六兩入好蜜三分同煉令勻為丸每
兩作三十九如要此藥速行針刺一眼子冷水浸少時
服效更速小兒百病丸如菘荳大

煩不得眠者補

無

溫膽湯治大病後虛煩不得眠方見不得眠門

虛

仲酸枣湯治虛勞虛煩不得眠方見不得眠門

右九法治熱煩前五法煩熱怔忡知熱在心肺也故用
竹葉石膏辰砂鎮墜其熱使下行也第六法煩而下利
知熱在上也故用梔豉湯吐之第七法煩而汗出不解
知表裏有邪也故用表裏飲湯第八法脈沉口渴手心
熱知熱不在表也故用妙香丸下之第九法溫膽酸枣
治不得眠也

煩皆生於虛

凡心虛則煩心肝腎脾虛亦煩心經云夏脈者心也其不
及者令人煩心又云肝虛腎虛脾虛皆令人躰重煩寃者
是知煩多生於虛也

運氣

運氣煩有五

一曰熱助心實而煩經云少陰司天熱淫所勝病胃中煩
熱噎乾又云少陽司天火淫所勝病煩心胃中熱又云少

陽之勝煩心心痛治以鹹寒是也

二曰心從制而煩經云太陽司天寒氣下臨心氣上從寒清時舉火氣高明心熱煩是也

三曰金攻肝虛而煩經云歲金太過燥氣流行肝木受邪民病體重煩寃是也

四曰土攻腎虛而煩經云歲土太過雨濕流行腎水受邪民病體重煩寃又云歲水不及濕乃大行民病煩寃足痿是也

五曰木攻脾虛而煩經云歲木太過風氣流行脾土受邪民病體重煩寃蓋肝虛腎虛皆令人體重煩寃故金太過則肝虛土太過則腎虛木太過則脾虛凡此三太過之歲則肝腎脾受邪而虛皆病體重煩寃也

針灸

灸刺煩心有四

其一取心俞經云心主手厥陰心包絡之脈所生病者煩心心痛掌中熱詳盛虛熱寒陷下取之又云氣亂于心則煩心密默俛首靜伏取之手少陰心主之腧是也

其二取腎膀胱俞經云腎足少陰之脈所生病者煩心心痛痿厥足下熱痛視盛虛熱寒陷下取之又云舌縱涎下煩悒取足少陰又云足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其病氣逆則煩悶取之所別也又汗出煩滿不解表裏取之巨陽少陰也

其三取肺俞經云手太陰之脈所生病者煩心胃滿視盛虛熱寒陷下取之又云振寒洒洒鼓頷不得汗出腹脹煩寃取手太陰是也

其四取脾俞經云脾足太陰之脈所生病者煩心心下急痛溏瘕泄水閉視盛虛熱寒陷下取之是也

熱

胎前虛煩

大竹葉湯治妊娠苦煩悶名曰子煩

防風

黃芩

麥冬

去心各二兩

白茯苓

四兩

右剉散每服四錢水二盞竹葉十數片煎七分去查温服之

益母丸治子煩似虛不得臥者即知母丸但用東肉為丸

數未足欲產明

治子煩口乾不得臥用黃連去鬚為細末每服一錢粥飲調下

產後虛煩

血妄心

大治產後餘血不盡奔心煩悶生藕汁飲二升甚效竹瀝亦得
治產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕羊血一盞頓服如不定更服立效

煩短氣欲絕者補之

產後血虛氣煩生地黃汁清酒各一盞相和煎一沸分服服之

治產後虛煩用蒲黃以東流水和服方寸匕極良

治產後短氣欲絕心中煩悶竹葉湯

竹葉

麥門冬

小麥

甘草

生薑

大棗

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去查納餘藥煮取三升去查温服虛悸加人參二兩少氣力加糯米五合

雲產後虛煩不得眠芍藥豉湯

芍藥

當歸

梔子

各五錢

香豉

半合

右如梔子豉湯修服產後傷寒便同下後變証此方雖

不若仲景酸棗湯穩當

大竹葉湯

方見虛條

熱

煩不得眠者吐之

重可去快

經治產後煩躁禹餘糧一枚狀如酸餛者入地埋一半四面繁築用炭一秤發頂火一斤煨去火三分耗二為度用濕沙土罨一宿方取出打去外面一重只使裏內細研水淘澄五七度將帛襯乾再研數千遍用甘草煎湯調二錢七只一服立效

四肢煩熱者為表

仲二物黃芩湯婦人在草褥自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之小柴胡湯方見傷寒

黃芩一兩

苦參二兩

乾地黄四兩

右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下虫

婦人產中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之

生竹茹二分

石膏二分

桂枝一分

甘草七分

白薇一分

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服一九日三夜二

難方

服有熱者倍白薇煩喘者加栝實一分

躁

諸躁狂越皆屬於火

全文見診○丹溪治一女子煩欲入井中口渴心熱脈伏者妙香丸下之

口渴手心熱脈伏為火

愈此乃火之躁也

陰盛發躁名曰陰躁欲坐井中宜以熱藥治之

成無已云雖躁欲坐

不渴手不熱脈虛為寒

井中但欲水不得入口是也

垣陰躁之極欲坐井中陽已先亡醫猶不悟復指為熱重

以寒藥投之其死也何疑焉况寒涼之劑入腹周身之火

得水則升走矣

活震震散

方見燥

診躁法

見煩躁

懊懣

診

懊懣虛煩之劇者治法並見虛煩門成無已云懊者懊惱之懊懣者鬱悶之貌即心中懊懣惱煩煩懣鬱鬱然

不舒暢憤然無奈比之煩悶而甚者懊懣也

贅悶

贅悶亦虛煩之甚者治法並與傷寒虛煩同蓋贅者昏也悶者煩也凡贅而不悶者名曰昏迷悶而不贅者名曰虛煩今日贅悶者謂昏迷虛煩併病許學士所謂懊懣終夕不得臥心中無曉會處者是也

運氣

運氣贅悶者屬內熱經云火鬱之發民病贅悶懊懣又云太陽司天之政三之氣寒氣行民病心熱贅悶不治者死是也

譫妄

附中等惡尸在等症

產後譫妄

產後循衣撮

空

虛者

丹虛病痰病有似鬼祟論 血氣者身之神也神既衰乏邪因而入理或有之若夫血氣兩虧痰客中焦妨碍升降

不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死吁哉冤乎誰執其咎憲慎之子傳兄年十七八時暑月因大勞而渴欲飲梅漿又連得大驚三四次妄言妄見病似鬼邪診其脈兩手皆虛弦而帶沉數予曰數為有熱虛弦是大驚又梅漿之酸鬱於中脘補虛清熱導去痰滯病乃可安遂與人參白朮陳皮茯苓連等藥濃煎湯入竹瀝薑汁與旬日未效眾皆尤藥之不對予脈之知其虛之未完與痰之未導也仍與前方入荆瀝又旬日而安 外弟戚一日醉飽後亂言妄見詢之係伊亡兄附體言出前事甚的乃叔在邊叱之曰非邪乃食魚生與酒太過痰所為耳灌鹽湯一大碗吐痰一二升汗因大作歷一宵而安 金氏婦壯年暑月赴筵歸乃姑詢其坐次失序遂赧然自愧因此成疾言語失倫其中多間一句

曰奴奴不是脈大率皆數而弦予曰此非邪乃病也但與補脾清熱導痰數日當自安其家不信邀數巫者噴水而呪之旬餘而死或曰病非邪而以邪治之何遽至於死予曰暑月赴宴外境蒸熱辛辣適口內境鬱熱而况舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴以法水是瀦其體密其膚使汗不得泄汗不出則蒸熱內燔血不寧則陰消而陽不能獨立也不死何為或曰外臺秘要有禁呪一科庸可廢乎予曰移精變氣乃小術耳可治小病若內有虛邪當用正大之法自有成式昭然可攷然符水惟膈上熱痰一呷冷涼胃熱得之豈不暫快亦可取安若內傷而虛與冬令嚴寒符水下咽必冰胃而致害彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解卒得清冷膚腠固密熱何由解必致內攻陰陽離散血氣垂爭

去死為近又何訝焉

仲邪哭使鬼鬼不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人多畏合目欲眠夢遠行而精神離散鬼鬼妄行陰氣衰者為顛陽氣衰者為狂

本治因驚言語顛錯不能服溫藥宜遠志丸

硃砂 半兩入麝少許同研

金箔 五片 遠志

南星 人參 白附子 白茯苓

酸枣仁 各半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大朱砂為衣每服三十九薄苛湯下食後臨臥服

茯神散

茯神 乾地黃 白芍藥 川芎

當歸 桔梗 白茯苓 遠志 已上等分

右為細末每服二錢水二盞燈心末肉同煎至七分不拘時候貫明遠教授母七十四歲因戎為驚疾如上証服此二方得效

運氣

運氣謔妄即傷寒家謔妄也其病有二

一曰火邪助心經云歲火太過上臨少陰少陽病反謔妄狂越又云火太過曰赫曦其動炎灼妄擾又云少陰所至為謔妄又云少陰之復振慄謔妄又云少陽之勝心痛煩心善驚謔妄治以鹹寒是也

二曰寒邪傷心經云歲水太過寒氣流行邪害心火病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒謔妄上臨太陽渴而妄冒又云陽明司天之政四之氣寒雨降振慄謔妄治以甘熱是也

中風謔語

無加減續命湯治中風或歌哭或笑語無所不至

麻黃三兩

人參

桂枝

白朮各二兩

當歸

防己

黃芩

甘草

白芍藥

芩藭

杏仁各一兩

右剉散每服四大錢水一盞半棗二枚煎七分去渣不以時服

中惡謔語

病者卒心腹脹滿吐利不行如乾霍亂狀世所謂中惡是也。由人精神不全心志多恐遂為邪鬼所擊或附着沉沉默默妄言謔語誹謗罵詈訐露人事不避譏嫌口中好言未然禍福及至其時毫髮未失人有起心已知其故登高陟險如履平地或悲泣呻吟不欲見人如醉如狂其狀萬端但隨方俗攷驗治之

羅八毒赤散治男子婦人染着神鬼謂之鬼疰病

雄黃

礬石

朱砂

牡丹皮

附子炮 藜蘆 巴苳各一兩 蜈蚣一條

右八味為細末，煉蜜為丸，如小荳大，每服十九丸，冷水送下，無時。

尸疰等症

本飛尸者，發無由，漸昏，然而至其狀，心腹刺痛，氣息喘急，脹滿，遁尸者，停遁在人肌肉血脈之間，觸即發動，亦令人心腹脹滿，刺痛，喘急，攻脇，衝心，瘥後復發，沉尸者，發時亦心腹絞痛，脹滿，喘急，雖歇之後，猶沉痼在人府藏，令人無處不惡風，尸者，在人四肢循環經絡，其狀冷躍，去來沉沉，默默，不知痛處，衝風則發，伏尸者，其病隱伏，五藏積年，不除，未發身體都如無患，發則心腹刺痛，脹滿，喘急，又有諸尸注，候者，則是五尸內之尸注，而挾外鬼邪之氣，流注身體，令人寒熱淋漓，或腹痛，脹滿，喘急，或礫塊踊起，或攣引腰脊，或舉身沉重，精神雜錯，恒覺昏謬，每節氣改變，輒致

大惡，積年累月，漸至頓滯，以至于死，死後復易，傍人乃至滅門，故為尸疰，皆用忍冬藤葉，剉數斛，煮令濃，取汁煎服，日三瘥。

太乙神精丹，蘇合香丸，治此疾第一。

因喪驚憂，悲哀煩惱，感尸氣，成諸證，變動不已，似冷似熱，風氣觸，則發，用雄朱散。

雄黃 朱砂 桔梗 羌活

芍藥 當歸炒 升麻 川烏

龍腦 川芎 南星炮 山梔

陳皮 木香 莽草 白朮

枳殼 檳榔 黃芩各等分 麻黃五分

白僵蚕炒 虎頸骨醋炙 紫蘇子 鬼箭羽炒等分

蜈蚣二條 酒炙

右為細末，每服二錢，酒調下，日三服。

頃在徽城，日常修合神精丹一料，庚申子家一婦人夢中見二蒼頭，一前一後，手中持一物，前者云：到也。未後應云：到也。擊下，爆然有聲，遂覺。覺後心一點痛，不可忍，昏悶一時許，予忽憶神精丹，有此一証，取三粒令服之。少頃已無病矣。云服藥覺痛止，神醒，今如常矣。日後相識，稍有邪氣，與一二服，無不應驗。方在千金中，治中風之要藥，但近世少得，曾青磁石為難合爾。

無還魂湯，治卒中惡，奄忽氣絕，口噤不開。方見卒中暴厥門與仲景方同

但加桂耳

千五邪湯，治邪氣啼哭，或歌或笑。

禹餘糧

防風

桂心

芍藥

獨活

甘草

白朮

人參

石膏

牡蠣

秦艽

防已

菖蒲

茯神

雄黃

蛇蛻皮

右咬咀，每服五錢，水三盞，煎七分服之。

仲大棗湯，治婦人悲傷欲哭，象如神靈。方見肺門悲門

產後譫妄

敗血

雲奪命散，治產後血暈入心，經語言顛倒，健忘失志。

沒藥

血竭

右研細為末，產後用童便與細酒各半盞，煎一二沸，調

下二錢，良久再服，其惡血自下行。一婦人產後譫妄如神，服諸藥不效，用此服而愈。

此服而愈

挾熱

又方治產後敗血衝心發熱，狂言奔走，脈虛大者。

乾荷葉

生地黄

牡丹皮

右三味濃煎湯，調蒲黃二錢，七一服即定。

挾寒

郭氏論產後乍見鬼神者何荅曰心主身之血脈因產耗傷血脈心氣虛則敗血得積上干於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛倒醫人不識呼為風邪如此但服調經散每服加龍膽一捻得睡即安

沒藥

琥珀並細研

桂心各一錢

芍藥

當歸

各一分

麝香

細辛

各三分

右為末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服

天治方產一日見鬼言語顛倒用蘇合香丸一錢以童便調服即醒

熱

雲治產後發熱狂言奔走脈虛大者四物湯加柴胡如不愈加甘草柴胡生地黃等分煎服亦可

廣治產後血暈心悶不識神言鬼語氣急欲絕

芍藥

甘草

丹參

各一兩

生地汁

生薑汁

各一升

白蜜

合一

右水二升先煮三味取八合下地黃生薑汁蜜調分為二次服

鎮墜

大治產後敗血及邪氣入心如見祟物顛狂用大辰砂一二錢研極細用乳汁三四茶匙許調仍握紫項活地龍一條入藥候地龍滾三滾取出地龍不用不令帶藥出但欲得地龍身上涎耳入無灰酒與前乳汁和合七八分盞重湯溫遇疾作分三二服

虛

栝子仁散治產後狂言亂語皆由內虛敗血挾邪攻心

栝子仁

遠志去心

人參

桑寄生

防風

琥珀另研

當歸炒

生地焙

甘草

等分

右為麤末先用白羊心一箇切片以水一大盞半先煮

至九分去羊心入藥末五錢煎至六分去渣無時服
循衣撮空

熱
海治婦人血風症因大脫血崩漏或前後失血因而枯躁
其熱不除循衣撮空摸床閉目不省擲手揚視搖動不寧
錯語失神脈弦浮而虛內躁熱之極也氣虛鼻乾不潤上
下通躁此為難治宜生地黃黃連湯主之

川芎

生地黃

當歸各七錢

赤芍藥

梔子

黃芩

黃連各三錢

防風一兩

右為麤末每服三錢水二盞煎至七分去渣取清飲無
時徐徐與之若脈實者加大黃下之

大承氣湯氣藥也自外而之內者用之生地黃黃連湯血
藥也自內而之外者用之氣血合病循衣撮空証同自氣
而之血血而復之氣大承氣湯下之自血而之氣氣而復

診
之血地黃黃連湯主之二者俱不大便

華病人循衣縫譫語者不可治 病人陰陽俱絕掣衣撮

空妄言者死

喜笑不休

心火熱化

喜笑皆屬心火經云心藏神神有餘則笑不休又云在藏
為心在聲為笑在志為喜又云精氣併於心則喜又云火
太過為赫曦赫曦之紀其病笑狂妄又云少陰所至為喜
笑者是也

河笑蕃茂鮮淑舒榮彰顯火之化也故喜為心火之志也
喜極而笑者猶燔爍太甚而鳴笑之象也故病笑者心火
之盛也

子和路經古宅逢一婦病喜笑不止已半年矣眾人皆無
術求治於戴人戴人曰此易治也以滄鹽成塊者二兩餘

用火燒令通赤放冷研細以河水一大碗同煎至三五沸
放溫分三次啜之以釵探於喉中吐出熱痰五升次服降
火劑火主苦解毒是也不數日而笑定矣內經曰神有餘
者笑不休也所謂神者心火是也火得風而煽故笑之象
也五行之中惟火有笑常治一老男子笑不休口流涎黃
連解毒湯加半夏竹葉竹瀝薑液而笑止矣
刺灸喜笑獨取心主一經經云心主手厥陰之脈是動則
病面赤目黃喜笑不休詳盛虛熱寒陷下取之

健忘

丹健忘精神短少者多亦有痰者

上虛下實
靈黃帝曰人之善忘者何氣使然岐伯曰上氣不足下氣
有餘腸胃實而心氣虛虛則榮衛留於下久之不以時上
故善忘也大惑篇

心虛

于孔子大聖枕中方

龜甲

即龜板占敗者

龍骨

遠志

菖蒲

右四味等分為末酒服方寸七日三服常令人大聰明

衍義云龜甲以其靈於物象用補心甚驗

治多忘方

菖蒲

一分

茯苓

茯神

人參

各五分

遠志

七分

右五味為末酒服方寸七日三夜一五日效

局定志丸治善忘安神定志

方見門

聖千金翼聖惠同補心虛治健忘令人耳目聰明用戊子
日服開心不忘方

菖蒲

遠志

各一分

右搗為細末服方寸七食後令人耳目聰明從外見裏

及千里外事令人長生去三百病毒不能為害

肘治人心孔憊塞多忘喜誤丁酉日密自至市買遠志著巾角中為末服之勿令人知

腎傷

腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言全文見診死生

血并於下氣并於上亂而喜忘全文見刺虛實

運氣

運氣喜忘皆屬心火虛經云火不及曰伏明伏明之紀其病昏惑悲忘又云太陽司天寒氣下臨心氣上從善忘又云太陽之復甚則入心善忘善悲是也

雜方

本草商陸花主人心憊塞多忘喜悞取花陰乾百日搗末日暮水服方寸七臥思念所欲事即於眼中自覺

針灸

集健忘 列缺 心俞 神門 中腕 三里 少海灸

診

無髑髑者心高心高則滿於肺中悅而善忘難開以言全文見診

諸痛門

諸部分痛各入本門如痛風入痺門目痛入目門此特痛之大法耳

寒熱

素黃帝問曰予聞善言天者必有驗於人善言古者必有合於今善言人者必有厭於已如此則道不惑而要數極所謂明明也今予問於夫子令言而可知視而可見捫而可得令驗於已如發蒙解惑可得而聞乎岐伯再拜稽首對曰何道之問也帝曰愿聞人之五臟卒痛何氣使然岐伯對曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛帝曰其痛卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或按之而痛者或按之無益者或喘動應手者或心與背相引而痛者或脇肋與小腹相引而痛者或腹痛引陰股

者或痛宿昔而成積者或卒然痛死不知人少間復生者
或痛而嘔者或腹痛而後泄者或痛而閉不通者凡此諸
痛各不同形別之奈何岐伯曰寒氣客於脈外則脈寒脈
寒則縮絀縮絀則脈絀急絀急則外引小絡故卒然而痛
得炆則痛立止因重中於寒則痛久矣炆古迥切熱也寒氣客
於經脈之中與炆氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也
寒氣稽留炆氣從上則脈充大而血氣亂故痛甚不可按
也寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引
故痛按之則血氣散故按之痛止寒氣客於俠脊之脈
則深按之不能及故按之無益也寒氣客於衝脈衝脈
起於關元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之
故喘動應手矣寒氣客於背俞之脈則血脈泣脈泣則
血虛血虛則痛其俞注于心故相引而痛按之則熱氣至

熱氣至則痛止矣

治見心痛

寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈

者絡陰器繫於肝寒氣客於脈中則血澁脈急故脇肋與

小腹相引痛矣

治見脇肋痛

厥陰客於陰股寒氣上及小腹

血泣在下相引故腹痛引陰股

治見腹痛

寒氣客於小腸膜

原之間絡血之中血泣不得注於大經血氣稽留不得行

故宿昔而成積矣

治見積

寒氣客於五臟厥逆上泄陰氣

竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣寒氣

客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

治見吐法

寒氣客於小腸

小腸不得成聚故後泄腹痛矣

治見滯下

熱氣留於小腸小

腸中痛癰熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣

治見秘結

帝曰所謂言而可知者也視而可見奈何岐伯曰五臟

六腑固盡有部視其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛此

所謂視而可見者也帝曰捫而可得奈何岐伯曰視其

形氣陰陽

主病之脈堅而血及陷下者皆可捫而得也

俱舉痛論篇

素氣傷痛形傷腫故先痛而後腫者氣傷形也先腫而後痛者形傷氣也

陰陽應象論

靈有形而不痛者陽之類也無形而痛者陰之類也無形而痛者其陽完而陰傷之也急治其陰無攻其陽有形而痛者其陰完而陽傷之也急治其陽無攻其陰陰陽俱動乍有形乍無形加以煩心命曰陰勝其陽此謂不表不裏其形不久

痛隨利減

通則不痛痛則不通又云痛隨利減亦有當隨其經絡而通之則疼痛去矣如輕可去實麻黃葛根之屬是也謂如頭痛當用川芎細辛之類通之則無疑滯痛隨利減也海諸痛為實痛隨利減世多以下之為利也假令痛在表者實也痛在裏者實也痛在血氣者亦實也故在表者汗

之則愈在裏者下之則愈在血氣者散之行之則愈豈可
以利為下乎作通字訓則可得矣故經曰通則不痛痛則
不通此之謂也

運氣

運氣諸痛皆屬火經云諸疼痛皆屬於火是也

一屬火實經云火鬱之發民病骨痛節乃有動是也

一屬火虛經云火不及曰伏明伏明之紀其發痛是也

禁忌

丹諸痛皆屬火寒涼藥不可峻用必用溫散之藥 諸痛
不可用人參蓋補氣氣旺則不通而痛愈甚矣

諸逆衝上

逆氣象陽

全文見五藏

凡氣逆必見象陽症面赤脈洪當以

法降其逆乃愈若以氣象陽盛而用寒藥攻之則不救矣
氣上衝心咽不得息治法見傷寒厥陰病條

如秋冬之月胃脈四道為衝脈所逆并脇下少陽脈二

秋冬為寒春夏

為熱

道而反上行病名曰厥逆經曰逆氣上行滿脈去形七神昏絕離去其形而死矣其証氣上衝咽不得息喘息有聲不得臥於調中益氣加吳茱萸半錢或一錢觀厥氣多少用之如夏月有此症為大熱也蓋此症隨四時為寒熱溫涼宜以酒黃連酒黃栢酒知母各等分為細末熟湯為丸如桐子大每服二百丸白湯空心下仍多飲熱湯服畢少時便以美飲食壓之使不得胃中停留直至下焦以瀉衝脈之邪也

寒氣厥逆赤丸主之

茯苓

桂心各四兩

細辛一兩

烏頭

附子

各二兩

射罔

如大棗一兩

右六味為末內真珠為色蜜丸如麻子大先食酒飲下三九日三夜一服不知稍增之以知為度一方用半夏四兩不用桂

逆氣五臟皆有

腹引掣九逆在心小腸

一曰心小腸經云諸逆衝上皆屬於火又云少腹控掣引腰脊上衝心邪在小腸取之盲原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之是也

嘔吐逆在胃

二曰胃經云胃為氣逆是也胃逆有嘔有噦故刺嘔吐取中腕三里也刺噦取乳下黑根盡處及臍下三寸皆大驗也治各有本門

喘咳逆在肺大腸

三曰肺大腸經云肺苦氣上逆急食苦以泄之又云腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立邪在大腸刺盲之原巨虛下廉是也其肺逆曰咳喘取天突人迎泄之也治亦各有門

耳聾頰腫逆在肺奔豚脚

四曰肝經云肝氣逆則耳聾不聰頰腫取血者是也五曰腎即奔豚氣逆脚氣衝心之類是也治亦各有門

氣不得前後逆在腎
六曰腎經云督脈別絡生病從少腹上衝心而痛不得前

後為衝疝是也治見疝門

針灸 玉腎氣衝心 關元二寸半補 帶脈一分沿皮向外二寸半瀉

摘腹有逆氣上衝心腹脹滿不得息 氣衝右臍下七寸兩旁相去遠

運氣 二寸動脈應手 灸七壯忌針 三里立愈

運氣厥逆有三 一曰風火經云少陽司天火氣下臨風行于地厥逆膈不

通是也

二曰寒經云水鬱之發善厥逆是也

三曰濕經云太陰司天濕氣下臨厥逆是也

噫飽氣也俗作暖氣 下氣

仲上焦竭善噫何謂也師曰上焦受中焦氣未和不能消

是故能噫耳經云衛出于焦 上焦不歸者噫而酢酸經云不歸不至也上

上下藏府

焦之氣不至其部則物不能傳化故噫而酢吞 噫屬心脾及二陽一陰經云心為噫又云太陰所謂上走心為噫者 陰盛而上走於陽明陽明絡屬心為噫故曰上走心為噫也又云二陽一陰發病主驚駭背痛善噫欠也

寒熱 仲旋覆代赭湯治痞而噫方見傷寒痞門

本心下蓄積痞悶或作痛多噫敗邪氣枳殼散主之

枳殼 白木各半兩 香附一兩 檳榔二錢

右為細末每服二錢米飲調下日三服不拘時候厖老方

丹宣州人與前方証皆除氣上築心膈噫氣稍寬脈之右

關弱短左關左尺長洪大而數此肝有熱宜瀉肝補脾

青皮一錢 白木二錢半 木通 甘草二分

煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒

噫氣胃中有火有痰

南星製

半夏

軟石膏

香附

各等分水煎服

運氣噫有三

一曰熱助心實而噫經云少陰之復噫噦是也

二曰寒攻心虛而噫經云太陽司天寒淫所勝善噫又云

太陽之復唾出清水及為噦噫是也

三曰風攻脾虛而噫又云厥陰在泉風淫所勝腹脹善噫

是也

針灸

針灸噫獨取脾經云脾足太陰之脈是動則病腹脹善噫

診

視盛虛熱寒陷下取之也
仲寸口脈弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞

酸食卒不下氣填於膈上
脈寸脈緊寒之實也寒在上焦胸中必滿而噫 跌腸脈

微而澁微無胃氣瀆即傷脾寒在膈而反下之寒積不消

胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胸膈上虛下實穀氣

不通為閉塞之病 跌腸脈微瀆及寸脈緊而噫者皆屬

寒全文見 太陰中者腹脹閉噫氣嘔逆

下氣

心虛 下氣屬心虛經云夏脈者心也心脈不及下為氣泄者是

也

腸胃鬱

河腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故善噫

診

而或下氣也
診癩癩勞瘵若氣下泄不止者必死此真氣竭絕腸胃腠

理閉塞穀氣不能宣通於腸胃之外故從腸胃中泄出也

醫學綱目卷之十六

醫學綱目卷之十七

心小腸部

諸見血門

衄血

久衄

產後衄

吐血

咳唾血

妊娠咳唾血

溲血

妊娠尿血

下血

中蠱下血

大法

衄血出於肺以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地紫參丹參阿膠之類主之咯唾血者出於腎以天門麥門貝母知母桔梗百部黃柏遠志熟地黃之類主之如有寒者乾薑肉桂之類主之痰涎血者出於脾葛根黃芪黃連芍藥甘草當歸沉香之類主之嘔血出於胃實者犀角地黃湯主之虛者小建中湯加黃連主之

榮之生病也寒熱少氣血上下行方見寒熱

素帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何以得

熱

之岐伯曰病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也帝曰治之奈何復以何術岐伯曰以四烏鯁骨一鹿茹二物并合之丸以雀卵大如小菟以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也

論中

諸見血無寒衄血吐血溺血皆屬於熱但血家症宜服

生地黃散主之

生地

熟地

枸杞子

地骨皮

甘草

天門冬

黃芪

芍藥

黃芩

右剉每一兩水盞半煎一盞去查溫服脈微身涼惡風每一兩加桂半錢吐血者多有此證

海龍腦鷄蘇丸治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血熱驚

悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

薄芎

斤一

麥冬

去心二兩

甘草

半兩

生薑

六兩

黃芪

新蒲黃

炒

阿膠

二兩

黃連

一兩

人參

二兩已上俱末

木通

各二兩

銀柴胡

二兩

剉同木通沸湯浸一日夜絞汁

右為細末好蜜二斤先煎一二沸然後下生地黃末不住手攪時加木通柴胡汁浸熬成膏勿令火緊焦了然後加前藥末和丸如豌豆大每服二十九白湯下

虛勞虛煩梔子湯下 肺熱黃芩湯下 心熱悸動恍惚

人參湯下 唾咳吐衄四血去心麥門冬湯下 肝熱

防風湯下 腎熱黃柏湯下 已上並食後臨臥服

治五淋及婦人漏下車前子湯下 痰嗽者生薑湯下

莖中痛者蒲黃滑石水一鍾調下 氣逆者橘皮湯下

室女虛勞寒熱潮作柴胡人參湯下

梅治吐血下血并婦人漏下雞蘇莖葉煎取汁飲之

海胸中聚集之殘火腹裏積久之太陰上下隔絕脈絡部

分陰陽不通用苦熱以定于中使辛熱以行於分升以其

溫降以辛潤化嚴肅為春溫變凜冽為和氣汗而愈也然

餘毒土苴猶有存者周身陽和尚未泰然胸中微躁而思

涼飲因食冷物服涼劑陽氣復消餘陰再作脈退而小弦

細而遲激而為衄血唾血者有之心肺受邪也下而為便

血溺血者有之腎肝受邪也三焦出血色紫不鮮此重沓

寒濕化毒凝泣水穀道路浸漬而成若見血證不詳本源

便用涼折變乃生矣陽証溢出血陰証下如豚肝

上而血者黃芪桂枝湯 白芍當歸湯

中而血者當歸建中湯 增損胃風湯

寒

運氣

下而血者芎歸木附湯 桂附六合湯 若三血証在行

陽二十五度見黃芪四君子湯主之 若二血証在行陰

二十五度見當歸四逆加吳茱萸主之

玄血證吐血衄血便血其人陰虛陽走其脈沉而散其外

証虛寒無熱候宜烏金丸散止之法宜上用散下用丸次

以木香理中湯加大七氣湯入川芎煎調蘇合香丸溫之

運氣上下出血有四

一曰熱助心火甚而血湧沸也經云歲火太過炎暑流行

肺金受邪民病血溢血泄又云少陽之復火氣內發血溢

血泄王註謂血上七竅為血溢泄利便血為血泄者是也

二曰寒攻心火虛而血逃亡也經云太陽司天寒淫所勝

血變于中民病嘔血血泄衄血善悲又云太陽在泉寒淫

所勝民病血見是也

三曰濕勝血亡經云太陰在泉濕淫所勝民病血見是也
四曰寒熱凌犯血亡經云少陰司天之政水火寒熱持於
氣交熱病生於上冷病生於下寒熱凌犯而爭於中民病
血溢血泄是也

雜方治
諸瘀血

丹血餘散治血淋兼治內崩吐血舌上出血小便出血用
亂髮皂角水淨洗洒乾燒灰為末每二錢以茅草根車前
草煎湯調下本草謂髮灰消瘀血通關格利水道破癥瘕
血衄有人生血瘤大如栗常被衣擦破則血出不止用此
血餘灰付之愈一人刀傷血流不止用胎髮灰付之亦愈
海孫真人九竅出血方荊葉搗取汁洒和服之

丹九竅出血以刺薊一握絞汁以酒半盞和服之如無生
者搗乾者為末冷水調三錢舌上無故出血如線用槐
花炒研末用手摻之

舌上血

肘舌上忽出血如簪孔者香薷汁服一升日三服

無用髮灰二錢米醋二合調服或付舌上血出孔處

文蛤散治熱壅舌上出血如泉

五倍子洗

白膠香

牡礪粉各等分

右為末每用少許摻患處或燒熱鉄烙孔上

身齦血

丹治陰虛牙出鮮血氣鬱以四物加牛膝香附生甘草側
柏

羅牙疼腫痒動搖牙齦潰潤宜露出血口氣等疾

當歸

藁本

地骨皮

防風

白芷

槐花

川芎

甘草炙

升麻

細辛各等分

右為細末每用少許擦牙痛甚者取三錢水一盞半黑
荳半合生薑三片煎至一盞去粗熱嗽冷吐之

孫治滿口齒有血枸杞根為末煎湯嗽後喫又治膈上吐血妙

齒縫中多出血當以鹽湯嗽又能益齒走血之驗也

丹齒痛斷出血夜以鹽厚付斷上有涎瀝盡乃臥涎出時叩齒勿住十夜瘥忌魚肉熱物

肘齒間出血不止苦竹茹以醋浸一宿含之

千濃煎竹葉湯入鹽少許含之止濃煎茶含嗽亦妙

治牙血用附米白芷大黃三物燒灰以青鹽和擦之

本治一切牙疼風熱齦常出鮮血以至崩落口臭不可近人者宜服之

大黃米泔浸生地黃大者薄切

右二味旋切各用一片二片合定貼所患牙上一夜即愈未全可則再如前法用忌說話恐引風毒津液漬痛

處

世無故牙動牙宣血出香附米用薑汁浸一宿晒乾為末嗽口揩齒令白且堅而不動無血矣又方以楊梅樹皮濃煎湯嗽口勿嚙神妙

千治齒斷間津液出血不止以礬石一兩燒水三升煮取一升先拭齒乃含之

衍有人病齒縫中血出以紙撚蘸蟾酥少許於血出處按之立止

靈苑治虛氣攻牙齒痛血出牙斷痒痛骨碎補二兩細剉炒令黑色杵末依常盥漱後揩齒斷下良久吐之臨臥後嚙之無妨

耳中血 無治耳中出血以龍骨末吹入即止

汗血 病者汗出污衣名曰汗血皆由大喜傷心喜則氣散血隨

氣行婦人產蓐有此證治以葎草汁

葎草 不拘多少俗名葛勒蔓也蔓生葉似葎麻而小薄有細刺花黃白子如麻子

右搗汁二升醋二合和空腹飲一盞或煮濃飲亦治沸

瀝尿血

右九竅血舌血牙血汗血不愈又當於衄血吐血條相

參用之

針灸

潔衄血吐血下血婦人下血不止 隱白 五分灸

東又法 隱白 太陵 神門 各五分 太溪 七分

心 婦人經脈妄行鑽心脇疼妄行於上則衄血中則吐血

下則下血 癭門 乙分治衄血 巨缺 一分治吐血 氣海 五分治崩血

中極 三分 三陰交 五分

海 血證與黃證俱頭汗出

垣 血溢上行或唾或嘔或吐皆凶也若變而下行為惡利

診

者順也血上行為逆其治難下行為順其治易故仲景云畜血症下血者當自愈意同若無病之人忽然下利者其病進也今病血症上行而復下行惡利者其邪欲去是知吉也

脈沉為在裏榮衛內結胸滿必吐血

衄 尺脈浮目睛暈黃衄未止暈黃去目睛慧了知衄今止

病人面無血色無寒熱脈沉弦者衄也浮弱手按之絕

者下血煩欬者必吐血 心脈微瀆為血溢 全文見診下同 肺

脈滑甚為唾血 肺脈微滑為上下出血

伸 脈弦而大弦則為減大則為乳減則為寒乳則為虛虛

寒相搏此名曰革婦人則半產漏下男子則亡血失精

衄 脫血而脈實者難治 玉機真藏論

衄而不止脈大而逆也 全文見診生死

難病若吐血復熱衄脈當沉細反浮大而牢者死 吐血
衄血脈滑弱小者生實大者死 汗出若衄其脈滑小者
生大躁者死

嘔血胸滿引背脈小而疾者逆也全文見診生死

素脈至而搏血衄身熱者死大奇論

衄吐血欬逆上氣其脈數而有熱不得臥者死

衄諸見血身熱脈大者難治難治者邪勝也身涼脈靜者

易治易治者正氣復也 衄血者若但頭汗出身無汗及

汗出不至足者死

素鹹走血血病無多食宣明五醜氣篇

衄血

無止衄散

黃芪六錢

赤茯苓

白芍藥各三錢 當歸

生地

阿膠炒各三錢

右為細末煎黃芪湯調下三錢未止再服

垣治血衄不愈以三稜針於氣衝上出血立愈更服此藥
尤妙

五味子十粒

麥門冬去心五分 當歸五分

黃芪一錢

生地三分

人參五分

右咬咀作一服水二盞煎一盞空心熱服

丹鼻血不止諸方不效糯米炒微黃為末新水下二錢此
方甚妙

梅治鼻衄出血眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸七須臾

吹鼻中瘥

實

保衄血先服朱砂蛤粉次服木香黃連大便結者下之用
大黃芒硝甘草生地溘軟者梔子黃芩黃連可選用之

熱

丹 衄血以涼血行血為主 犀角地黄湯入鬱金同用丹

云犀角性走散血 虛者用之禍至

虞世 治咯血衄血白芍藥一兩犀角一分為末新水服一

錢七衄止為限

衍 畫粉散治鼻衄血不止一二服除根白土即畫匠所用

畫粉研極細每服五錢新井水調服立止

世 人中白為末白湯調服治衄累效

羅 生地黄湯治鼻衄昏迷不省

生地黄三五斤不暇取汁使患人生吃呷汁三斤 許又以其查塞鼻須臾血止取汁尤佳

保 衄血不止麥門冬飲子

麥門冬去心 生地黄

右切水煎服

孫 凡治鼻衄及膈上熱盛乾地黃龍腦薄苛等分為末冷

水下

丹 鼻衄脈數有熱

人參三分 黃栢炒二分 黃連五分 地黃一錢

歸尾五分 甘草二分 黃芩五分 芍藥一錢

玄 鼻衄血者初出多不能止用黃丹吹入鼻中乃肺金受

相火所制然也宜生料雞蘇散治之

雞蘇葉 黃芪去蘆 生地 阿膠

白茅根各一兩 麥門冬去心 桔梗 蒲黃炒

貝母去心 甘草各五錢

右咬咀每服四錢薑三片水煎服

衍 治大熱衄血用萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞

相和時時細呷丹溪云萱草屬水性下行陰分

丹 鼻血貫仲根細末水調一錢七立止

羅寸金散治鼻衄不止

黃藥子五錢

土馬穩半兩有足者

生甘草各一錢

右為細末每服二錢新水調下未止再服立瘥本草云土馬穩

即昔與垣衣之類垣衣生墻垣之側土馬穩生垣墻之上背陰古墻上多有之

治鼻衄不止黃藥子為末每服二錢七煎薄苛湯下良

久以新汲水調麩末二匙頓服之

血 飛麩二錢塩一錢新汲水調下

世 血用蛙竹末米飲調服驗

膽移熱於腦則辛頰鼻淵傳為血衄全文見診病傳變

河 定命散治膽受熱熱血妄行鼻中衄衄并血汗不止

朱砂

寒水石

麝香

右為末每服半錢新汲水調下不計時候看老幼虛實

加減

寸脈微為寒

脈 寸口脈微苦寒為衄宜服五味子湯磨茱萸膏令汗出

方未考

予男衄寸口脈微小用寒涼藥不止後用小建中湯加梔

仁黃芩黃栢一服立愈

自鼻塞為表

四 七叔婆鼻塞時有血些少出

羌活

獨活

防風

升麻

乾葛

蒼朮

陳皮一錢

甘草炙

白芷

麻黃

黃芪

分二貼入開口紅椒七粒棗二枚去核蔥白三根水二

盞煎取淺盞稍熱飲之

藏府

春善病衄全文見五臟

仲 從春至夏衄者太陽從秋至冬衄者陽明

結聖者散之

丹 衄血不止以養胃湯一貼煎服效一方治衄血妄行

用百藥煎半燒半生和水酒調服。

散者收之

本 茜梅丸治衄血無時

茜草根

艾葉各一兩

烏梅肉焙乾半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大烏梅湯下三十九。

運氣

運氣衄有三。

一曰熱助心火而血溢為衄經云少陰所至為衄衄又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從衄衄鼻窒又云少陰司天熱淫所勝民病衄衄又云少陽司天三之氣炎暑至其病血溢衄衄又云少陽司天火氣下臨肺氣上從衄衄鼻窒又云少陽司天火淫所勝病甚則衄衄又云少陽之復太熱將至欬衄必也。
二曰寒攻心火而血逃為衄經云太陽司天寒淫所勝嘔血血泄衄衄善悲時眩仆也。

三曰寒熱相逼而衄經云陽明司天之政初之氣陰始凝氣始肅民病中熱衄衄此外寒鬱內熱而衄也又云少陰司天之政四之氣寒熱互至民病衄衄此下寒迫上熱而衄也。

雜方

世 衄血白芨末新汲水調下神妙

御院躡香散治鼻衄不止

白礬枯過另研

白龍骨粘舌者另研各半兩

麝香另研半字

右三味杵和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然後吹藥於鼻中或以濕紙蘸藥塞鼻尤妙

廣 治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍骨作末吹一豈許於鼻中立止

圖 榴花百葉者主心熱吐血及衄血等乾之作末吹鼻中立瘥已上皆瀝劑 亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒

驚癇止血鼻衄燒之吹鼻內立已髮灰破活血補陰

本山梳不拘多少燒存性為末搐入鼻中立愈蔡子渥傳云同官趙無疵其兄衄血甚已死入殮血尚未止偶一道人過聞其家哭詢問其由道人云曾服丹或燒煉藥予有藥用之即出此藥半錢七吹入鼻中良久得活併傳此方
治鼻衄人中白係尿缸結者燒灰少許吹入鼻中已上寒劑
鼻衄過多昏冒欲死用香墨濃研點入鼻中
鼻血龍腦葉研塞立止入豉尤妙

治血以蔥白一握搗汁投酒少許抄三四滴入鼻中瘥

無白芨散治鼻衄立效白芨不以多少為末冷水調用紙花貼鼻竅中 一方用黃膠湯浸令軟貼鼻竅中鼻竅山根也

垣治鼻衄久不止或素有熱而暴作者諸藥不效神法以

大白紙一張作十數摺於冷水內浸濕置頂中以熱熨斗熨之至一重或二重紙乾立止

簡治鼻血不止服藥不應宜用蒜一枚去皮細研如泥攤一餅子如錢大厚一荳許左鼻血出貼左脚心右鼻血出貼右脚心如兩邊俱出貼兩脚心即瘥血止即以溫水洗去之 一法用紙圓兒右衄塞左耳左衄塞右耳 又冷水調白麩飲之

治衄不止百藥不效因心憂慮得者急縛兩手中指上立止

針灸
針灸衄取四經

其一取足手太陽經云衄而不止血流取足太陽大衄衄血取手太陽不已取宛骨下不已刺臑中出血又云膀胱足太陽之脈所生病者鼽衄項背腰尻臑端痛視盛虛熱

寒陷下取之又云足太陽之別名曰飛陽去踝七寸別走少陰虛則躄衄取之所別也

其二取足手陽明經云胃足陽明之脈所生病者躄衄又

云大腸手陽明之脈所生病者目黃口乾衄衄皆視盛虛

熱寒陷下取之又云邪客於足陽明之絡令人躄衄上齒

寒刺足中指次指爪甲上與肉交者各一痛左刺右右刺

左

摘衄血 瘖門分三 合谷 內庭

密 又法 瘖門 三里瀕 照海分五

世 又法 三里 外關瀉 重者風府

集 又法 風府 上星 百勞 合谷不已取後穴 迎

香 人中 印堂

口鼻出血不止 上星灸三報穴

診 虛

甲 頭腦中寒鼻衄目泣出神庭主之 衄血不止承漿及委中主之 衄衄腰脊脚膈痠重戰慄不久立膈如裂脚急跟痛足攣引少腹痛咽喉痛大便難臍脹承山主之 頭重鼻衄反瘕癢汗不出煩心足下熱不欲近衣項痛目昏及小便皆不利至陰主之 診衄法見諸見血門

久衄

世 久衄炒糯米為末水調服神妙詳見

題 黃芪芍藥湯治鼻衄血面多黃眼溢多眩手麻木張彥

明男衄血多歲不效用此方

黃芪兩一 甘草分二 升麻兩一 葛根

羌活兩各半 白芍藥錢二

右為麤末每服半兩水二盞煎至一盞去渣溫服二十

五貼而愈六脈細弦而瀉按之空虛其色必白而天不
澤者脫血也此大寒証以辛溫補之以養血以甘溫潤
之劑佐之即愈此脫血傷精氣之証也六脈俱大按之
空虛心動面赤善驚上熱乃手少陰心之脈也此因氣
盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜浮氣以
辛溫微苦峻補其血再用三黃補血湯

三黃補血湯

熟地錢二

生地錢三

當歸

柴胡各錢半

白芍藥錢五

川芎錢二

牡丹皮

升麻

黃芪

各一錢補之治
血溢者上竭

右為籠末每服半兩水二盞煎五沸去渣溫服食前兩
手脈花兩頭則有中間全無而虛曰花血至胸中或衄
血吐血以犀角地黃湯主之

羅地黃散治衄血往來久不愈

生地

熟地

枸杞子

地骨皮各等分

右為細末每服二錢蜜湯調下日三服

雜方

世治鼻血常發者於發時用生薑杵碎合額上一日如痒
就搔之永不再發

用治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少炒令焦搗末每
衄發以杏仁大塞鼻中數度可 大病瘥後小勞便鼻衄
牡礪一分石膏五分搗末酒服方寸七日三四服亦可蜜
丸如桐子大服之

產後衄

診治

大產後口鼻黑氣起及鼻衄者名曰胃絕肺敗此証不可
治遇有此疾急取緋線一條并產婦頂心髮兩條繫係中
指節即止 治產後鼻衄中風以荊芥為末童便調下神

驗此方氣虛人勿用

吐血

氣虛不能攝血

治吐血以人參一味為末雞子清投新汲水調下一錢服之千金

人參救肺湯治吐血亦用

人參 升麻 柴胡 歸稍

蒼朮各一錢 熟地 白芍藥 黃芪各二錢

陳皮 蘇木 甘草各五分

右為麤末作一服水二盞煎一盞去查稍熟食前服

局必勝散治血妄流溢或吐或衄

小蘗并根用 人參去蘆 蒲黃炒 當歸

熟地 川芎 烏梅去核各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

有熱者補中降火

保雞蘇散治虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉 黃芩 刺蘗 生地

黃芪各一兩 當歸 赤芍藥各半兩 阿膠

伏龍肝二兩

右為麤末每服四錢薑三片竹茹彈子大水同煎

丹朱富六因辛苦吐血或衄夜間發熱口乾身疼食少當作虛勞治

白朮六錢半 人參 青皮炒 生地

芍藥 陳皮 歸尾 甘草炙半兩

川芎三錢 紅花五分

分十貼水二盞煎至三之一食前稍熱飲下保和丸十

四粒與點丸十粒

一婦人年五十餘嘗吐血今又作面黃身蠕動食少

青皮兩半 人參三錢半 白朮 陳皮各三錢

白芍藥 木通各二錢 黃連炒 乾薑

黃芩炒 川芎各錢半 黃柏炒一錢 生甘草

生地各錢半 歸頭二錢

分七貼水二盞煎至三分之一去渣入藕汁半盞再煎
沸通口飲之

血虛隨火上行 夫口鼻出血皆係陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上

竅法當補陰抑陽氣降則血歸經也

大補血丸治陰虛吐血

當歸一錢半 生地一錢半

右以杜牛膝汁浸三日取起酒洗淨入臼內杵干杵為丸桐子大白湯下

梅治吐血神效方生地黃汁一升二合白膠香二兩以磁

器盛入甑蒸令膠消服妙 一方獨用生地黄汁半升飲之立止神妙

雲五神湯治婦人熱毒上攻吐血不止

生藕汁 刺薊汁 生地汁各二錢 生薑汁半盞

白蜜一盞

右和煎三兩沸無時以一小盞調炒麪一錢食前服聖惠
治心熱吐血口乾獨用刺薊搗絞取汁一小盞服

犬四生丸治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生荷葉 生艾葉 生栢葉 生地黄各等分

右研爛丸如雞子大每服一丸水三盞煎一盞濾過温

服經驗治吐血咯血一味荷葉焙乾為末米湯下二錢
匕亦佳又山居治吐血一味側栢葉研細酒調服妙

丹經血逆行或血腥或吐血用葦菜汁服立效

簡治吐血咯血蒲黃一兩搗為散每服三錢温酒或冷水

調服妙 治吐血茜草一兩生搗羅為散每服三錢水一盞煎七分放冷食後服

世治內損吐血飛羅麩不以多少微炒濃磨細墨一匙茶調下二錢立效 又方治吐血用松烟墨磨汁服立效

衍治大吐血好墨細末二錢以白湯化阿膠清稠稀得所頓服熱多者尤相宜

挾痰者清痰降火

四先見紅後見痰多是陰虛火逆痰不下降四物湯加痰火藥

治火上錯經妄行四物湯加炒山梔童便薑汁此後諸方用童便薑汁雖無痰亦吐血要藥也

治吐血衄血用鬱金為末以童便薑汁

好酒調服一方不用酒 治吐血紅山茶花陰乾為末每服一錢用童便半鍾生薑汁少許調服

本治吐血鼻紅生薑二分絞汁并壯健丈夫小便一升乘

熱頓飲瘥

四又方以童便一分酒半分搗栢葉溫飲之 吐血挾痰

痰積者下之

積方可下若一碗兩碗吐者只補陰降火用四物大劑之類挾痰若用血藥則泥而不行只治火其血自止山梔最

清胃脘血

六吐血者由憂思諸氣鬱極方散而生熱則心血妄行宜

玄明粉加黃丹服之次用四物解毒加藕節治之如前症

之熱並宜清之

仲心氣不足吐血衄血瀉心湯主之亦治霍亂

大黃兩二 黃連 黃芩各一兩

右三味以水三升煮取一升頓服之

海雲岐子犀角地黃湯治寸乳血在上焦

生地兩二 黃芩一兩半 黃連兩一 大黃兩半

右咬咀秤一两水二盞煎去查食後服之

簡治吐血川大黃一两搗為散每一錢生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服

血紫氣寒胸中者下之

丹吐血覺胸中氣塞上吐紫血桃仁承氣湯下之

喘氣

馮舅氣上奔吐血心膈疼

枳殼三錢

青皮二錢

生地

木通

牡丹皮一錢半

桃仁二十箇

川芎

黃芩

黃連一錢

甘草少

生乾薑

桔梗

分四貼煎服

汚血

或暴吐紫血一碗者無事吐出好此熱傷血死肝中宜服四物解毒之類

傷損吐血

千治墜馬積血心胃唾血無數乾荷花根為末酒服方寸七日三服

無加味芎歸湯治打撲傷損敗血流入胃腕嘔吐黑血或如葶羹汁

川芎

當歸

白芍藥

百合水浸半日

荆芥穗各等分

右剉散每四錢水一盞酒半盞煎七分去查不拘時候

內傷飲食吐血

仲夫酒客欬者必致吐血此因極飲過度所致也此即肺疽之屬

千吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液出還流入胃中或

如葶羹汁或如切鱖血凝停胃中因即蒲悶便吐或去數

斗至一石者是也得之於勞倦飲食過常也肺疽者或

飲酒之後毒滿悶吐之時血從吐後出或一合半升一升

是也傷胃者因飲食太飽之後胃中冷不能消化便煩

悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝臍因傷裂胃口吐血
色鮮正赤腹亦絞痛自汗出其脈緊而數者為難治也

書音戡
疑血也

無理中湯能止傷胃吐血以其方最理中脘分利陰陽安

定血脈海藏亦云飲冷傷脾吐血以理中湯理治中脘
分利陰陽此亦理治內軀之法也方見傷寒

二合灰散治因啖辛熱嘔吐出血一合或半升許名曰肺

疽

紅枣和核燒
存性百藥煎煨各
等分

右為細末每服二錢米飲調下

外感雨
濕吐血

除濕湯治冒雨着湯鬱于經絡血溢作衄及血溢流入胃

胃滿吐血

茯苓 乾薑各四
錢 甘草炙 白朮各二
錢

右剉每服四錢水一大盞煎八分去查服頭疼加川芎

二錢最止浴室中發血此方治冒雨吐血理中湯治傷
胃吐血皆用乾薑為君丹溪治

大吐血不止亦用乾薑一味炮為末童便調
服從治之者可見乾薑亦為吐血要藥也

男子年十七家貧而多勞十一月得寒病時吐三兩口

血六脈緊濇一日食減中痞醫投溫膽湯枳桔湯三日後

發微熱口乾不渴口中有痰此感寒也詢知云因十日前

霜中曾渡三四次溪水心下有悲泣事腹亦飢遂以小建

中湯去芍藥加桔梗陳皮半夏四貼而安 又方治吐血

以交趾桂五錢為末冷水調服亦小建湯治感寒吐血之

義經云太陽司天寒淫所勝血變于中嘔血泄血孰衄平

以辛熱者即理中建中用乾薑桂枝治吐血之類皆同也

吐血挾熱者治法並見血虛
隨火上行條

經治嘔血黃栢好者以蜜塗炙乾杵末用麥門冬熱水調

下二錢七立瘥

挾熱者
內虛

挾寒者
外火

廣治心熱吐血不止生葛根搗汁半大升頓服立瘥
吐血挾寒者多是口食寒物身受寒氣之病治法並見內
傷飲食外感雨寒條

仲吐血不止栝葉湯主之

栝葉

乾薑各二

艾三

右三味以水五升取為通汁一升合煮取一升分溫再
服

廣治吐血鼻衄不止伏龍肝半升以新汲水一大升淘取
汁和蜜頓服

運氣

運氣血溢有五

一曰熱助心血沸而溢經云少陽司天之政初之氣候乃
大溫其病氣沸於上血溢又云少陰司天客勝甚則血溢
又云少陽司天客勝則血溢又云火鬱之發民病血溢治

以鹹寒是也

二曰寒攻心血逃而溢經云太陽司天之政寒濕之氣持
於氣交民病血溢治宜苦以燥之溫之也

三曰內火格拒外寒壅遏而血溢經云少陰司天之政終
之氣燥令行餘火內格甚則血溢是也

四曰風濕相薄血溢及下寒相薄蒸熱於上而血溢經云
太陰司天之政初之氣風濕相薄民病血溢此風濕相薄
血溢也四之氣畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉
暮蒸熱相薄民病腠理熱血暴溢此地氣之寒相薄天氣
蒸熱於上而血溢也

五曰燥邪攻肝血溢經云歲金太過燥氣流行病反側欬
逆甚而血溢是也

傷肺

素夫傷肺者脾氣不守胃氣不清經氣不為使真藏壞決

經脈傍絕五臟漏泄不衄則嘔示從容論○傷肺即傷氣當於氣虛不能攝血條參

羅門冬飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

五味子五箇 甘草 芍藥 黃芪各一錢

紫苑半錢 人參 歸身 麥門冬

右為麤末作二服水煎食後服

本天門冬丸治吐血咯血能潤肺止咳

天門冬 甘草 杏仁炒 貝母

白茯苓 阿膠各半兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一九嚥津含化日夜

十九

丹酒色過度飢飽吐血痰血神妙

枇杷葉 欬花 北紫苑 杏仁去雙仁皮尖

鹿茸灸如法 桑白皮 木通各一兩 大黃半兩

右煉蜜丸臨臥合化

傷肝

經云怒則氣逆其則嘔血故氣上矣又云陽氣者大怒則形氣絕而血苑於上使人薄厥此皆怒則傷肝氣而嘔血以黃連香附青黛柴胡甘草平其肝自愈矣宜服赤茯苓瀉心湯

世治嘔血咯血衄血肝損白芨為末米飲調服神妙

簡治吐血檉葉搗末每服二錢水一盞煎七分和查服

中蠱毒吐血見下血門

針灸吐血有二

其一取肺經云暴痺內逆肝相搏血溢鼻口取天府是也其二取筋經云手太陰筋病當所過者支轉筋痛甚成息奔脇急吐血治在燔針劫刺以知為數以痛為諭是也

密吐血 風府 大椎 鬲俞 肝俞各五分瀉

東又法 胃脘 臑中 肝俞各沿皮

集又法 臑中 中脘 氣海 三里 乳根 支溝不

已取下穴肺俞 腎俞 心俞 膏肓 關元

東嘔血脇痛口乾不可欬引腎痛

不容傍刺 上脘三寸 太陵 郄門 神門

甲嘔血太陵及郄門主之 嘔血上氣神門主之 心下

有膈嘔血上脘主之 嘔血肩急脇下痛口乾心痛與背

相引不可欬欬則肩痛不容主之

肝脈太甚為內瘕善嘔血全文見治

診吐血法見前諸

咳唾血

丹咳血 痰盛 身熱多是血虛

大法

診

血鬱血 汚血熱

丹七傷散治勞嗽吐血痰

黃藥子 白藥子各一兩半 赤芍藥七錢 知母

玄胡索各半兩 鬱金二錢 當歸半兩 山藥

乳香 沒藥 血竭各二錢

右為末每服二錢茶湯下本草云黃藥子白藥子治肺熱有功○一法紅花當歸煎

下湯

羅恩抱散治咯血吐血及治煩躁

真生蒲黃 薄苛各一兩

右研勻細每服三錢濃煎桑白皮湯調下

地黃散治一切吐血咯血能解一切毒及諸熱煩躁

茜草根四錢 大豆子 黃藥子 甘草各二兩

右為細末每服二錢新汲水調下加人參二兩治痰嗽

有血

丹痰帶血絲出童便竹瀝主之 又方用韭汁童便二物合和加鬱金細研入內服之其血自消 經血逆行或血腥吐血唾血韭汁服立効咯血用薑汁童便青黛入血藥中加四物湯牛膝膏地黃膏之類

氣逆氣滯

方治一切肺病咳嗽膿血及唾膿血不止方好酥三十斤煉取凝當中醍醐服一合日三升即止一切藥皆不及此

海甘桔加阿膠紫苑湯治肺痿唾膿血方見傷寒咽痛門

梅肺疾膿血取薏苡仁十兩杵碎以水三升煎取一升入

酒少許服之本草云薏苡仁下氣利腸胃消水腫

血虛

羅大阿膠丸治嗽血唾血

阿膠微炒 卷栢 生地 熟地

大蘗獨根者晒乾 雞蘇葉 五味子各一兩 栢子仁另研

茯苓 百部 遠志 人參

麥門冬 防風各半兩 乾山藥一兩

右爲細末煉蜜丸如彈子大煎小麥麥門冬湯嚼下一丸食後

右方保養精血純補劑也血虛者宜之

氣虛

方治上氣喘息咳嗽吐血咯血人參細末雞子清調三錢

五更初服便去枕睡仰臥只一服愈年深再服忌酸醃酢醬麪等物及過醉飽須好將息 一男子三十歲因連夜

勞倦不得睡成一痰嗽出白黃膿嗽聲不出時初春大寒

醫與青龍湯四貼遂覺咽喉有血絲腥氣逆上兩日後血

腥氣多遂有血線一條自口中右邊出直上如此每晝夜

十餘次診其脈弦大而散弱左大爲甚人倦而苦於嗽予

作勞倦感寒強以甘辛燥熱之劑以動其血不宜急治恐

成肺痿遂與人參黃芪當歸身白朮芍藥陳皮炙甘草生
甘草不去節麻黃煎熟入藕汁與之兩日而病減嗽止却
於前藥去麻黃又與四日而血症除脈之散大者未收歛
人亦倦甚遂於前藥中除藕汁加黃芩礞砂半夏至半月
而安

天劫勞散治肺痿痰嗽痰中有紅線盜汗發熱熱過即冷
飲食減少

白芍藥

六兩

黃芪

甘草

人參

當歸

半夏

白茯苓

熟地

五味子

阿膠

炒各二兩

右咬咀每服三錢水盞半生薑二片葱三枚煎九分無
時溫服日三陳日華云有女及笄病甚危一歲之間百
藥無效偶得此方只一料除根

羅五味子黃芪散治嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝
無力

麥門冬

熟地

黃芪

桔梗

甘草

一分

白芍藥

五味子

二分

人參

二錢

右為籠末每服四錢水煎日三服

雲岐子苓散涼心肺解勞熱

黃芪

一兩

白芍藥

黃芩

人參

白茯苓

麥門冬

桔梗

生地

各半兩

右為籠末先用竹葉一握小麥七十粒水三盞薑三片
煎一盞半入藥末三錢煎七分去渣溫服

席延賞治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾又不可服涼藥
好黃芪四兩甘草一兩為末每服三錢如茶點羹粥中亦
可服

右參芪例純補劑也丹溪云脈大發熱為氣虛此氣血俱虛者宜之若血虛而氣不虛者不宜當用前阿膠丸之類及汚血條求之

丹婦人五十六歲盛夏吐紅痰有一二聲嗽

人參錢一

防風分五

白朮錢

陳皮

茯苓錢各

乾薑分三

生甘草分一

桔梗錢半

右煎二之一入藕汁二大蛤再煎帶熱下三黃丸

王卅四丈發熱脇痛咳嗽紅痰口渴渴大便秘倦怠脈稍數而虛詢之發熱曾飲水一碗病因飲食不節成積痰發又飲冷水傷胃成虛傷肺成痰

白朮錢半

人參

陳皮

川芎錢各一

芍藥

茯苓

桔梗

甘草錢各五

右作二貼煎取八分入竹瀝二分再煎沸熱飲下龍

補中有通

丸卅丸如嗽三十九

右丹溪參朮藕汁竹瀝法也

脈大發熱喉中痛者是氣虛用參芪蜜炙黃栢荆芥地黃當歸韭汁童便薑汁磨鬱金飲之其血自消

右參芪加鬱金韭汁童便補中解鬱也

羅黃芪鱉甲散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忡日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利食減多渴咳嗽稠粘時有膿血

黃芪兩一

素白皮

半夏

黃芩

甘草錢

知母

赤芍藥

紫苑錢各五

秦艽

白茯苓焙

生地

柴胡

地骨皮各六錢

肉桂

人參

桔梗各三錢

鱉甲去裙

天門冬去心

各一兩

右爲麤末每服二大錢水一大盞食後煎服

人參黃芪散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忡潮熱盜汗減食咳嗽膿血

人參兩一

秦艽

茯苓各二兩

知母二錢半

桑白皮一兩半

桔梗兩一

紫苑

柴胡二兩半

黃芪三兩半

半夏湯洗一兩半

鱉甲去裙酥炙二兩

右爲麤末每服三錢去查服

右參芪鱉甲例補中有通也

羅人參蛤蚧散治三二年間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣酥炙黃色

杏仁去皮尖炒五兩

甘草炙三兩

人參

茯苓

貝母

知母

桑白皮各二兩

右爲細末磁器內盛每日如茶點服神效

海蛤蚧補肺勞虛嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則

成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛用蛤蚧

阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆爲屑次入

膠分四服每服用河水三升於銀石器內慢火煮至半升

濾去查臨臥微温細細呷之其查候服盡再搥都作一服

以水三升煎至半升如前服病人久虛不喜水當減水

右蛤蚧例亦補中有通久嗽不愈者宜之

麥門冬湯治傷寒後傷肺欬唾膿血胸脇脹滿上氣羸瘦

麥門冬去心

桑白皮

生地各一兩

半夏湯洗七次

紫苑

桔梗炒

淡竹茹

麻黃去根節各七錢

五分

五味子

甘草炙各半兩

右爲麤末每服五錢水二盞生薑二錢半棗三枚劈破

同煎去查食後溫服

羅續斷散治骨蒸勞熱傳尸瘦病潮熱煩躁喘嗽氣急身疼盜汗兼治咳嗽唾膿血

續斷

紫苑

桔梗

青竹茹

五味子

各三錢

生地

桑白皮

各五兩

甘草

各二兩

赤小豆

半升

右為麤末每服三錢入小麥五十粒水煎去查日三服

海紫苑散治欬嗽唾血虛勞症肺痿變癆

紫苑

人參

知母

貝母

桔梗

甘草

五味子

茯苓

阿膠

右為麤末生薑水煎服

右門冬五味例亦補中有通也

外療傷唾血方用茅根一味服方寸七日三服亦可絞汁飲之主熱渴

丹治勞瘵傳尸寒熱交攻久嗽咯血日漸羸瘦先服三拗湯與蓮心散萬不失一

三拗湯

麻黃

不去節

甘草

杏仁

不去皮尖

右剉碎薑東煎服

蓮心散

當歸

黃芩

甘草

枳殼

鱉甲

醋炙

前胡

柴胡

防已

阿膠

蓮肉

去心

南星

各一錢

川芎

一兩

芫花

醋炒十分乾黑

右十三味咬咀合和獨芫花另包每服二錢半水一小盞半生薑三片棗一枚入芫花一撮煎八分服無時須

吐有異物後芫花漸減蓋芫花反甘草多之所以殺虫
少之所以去寒熱妙處在此方與纂要不同宜考之

補有

本治勞瘵吐血損肺及血妄行神傳膏用剪草一斤婺台
州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨
洗為末加入生蜜一斤和為膏以器盛之不得犯鐵九蒸
九曝日一蒸曝病人五更起面東坐不得語用匙挑藥如
粥服每服四匙良久用稀粟米飯壓之藥冷服粥飲亦不
可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋
常咳嗽血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其
尊人常以此方畀之九日而藥成前一夕病者夢人戒令
翌日勿亂服藥次日將服之為屋上土墜器中不可服再
合既成又將服之為猶覆器又不得服又再合未就而是
人卒矣此藥之異如是若小小血妄行一啜而愈或云是

陸農師夫人鄉人艾孚先嘗親說此事渠後作大觀本草
亦收入集中但人未識不肯信爾

外療咳逆唾膿血雞子湯

雞子箇一

甘草條二

甘遂分一

大黃分二

黃芩分二

右用水六升煮取二升去查內雞子攪令調盡飲之良

忌海藻松菜

子和隱湯劉氏一男子年二十餘歲病勞嗽咯血吐唾粘
臭近不可聞秋冬少緩春夏則甚寒熱往來日晡發作狀
如痰瘧寢汗如水累服麻黃根敗蒲扇止汗汗自若也又
服寧神散寧肺散止嗽嗽自若也戴人先以獨聖散湧其
痰痰狀如雞黃汗隨湧出昏愢三日不省時時飲以涼水
精神稍開飲食加進又與人參半夏九桂苓甘露散服之

不數日愈

丹台州林德方年二十餘歲得嗽而咯血發熱肌體漸瘦衆醫以補藥調治數年其症愈甚予診其六脈皆澁予曰此好色而多怒精血耗少又因補寒藥太多榮衛不行汚血內積肺氣壅遏不能下降治肺壅非吐不可精血耗少非補不可惟倒倉二者俱備但使之吐多於瀉耳兼灸肺俞五次而愈

脈浮大作虛治

雲雞蘇丸治虛熱昏憤倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉斤半

黃芪兩一

甘草

川芎各半兩

防風兩一

桔梗兩半

荆芥兩二

甘菊三錢

生地兩半

腦子錢半

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一九麥門冬去心煎湯嚼下若肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不得喘嗽痰

涎或發寒熱小便赤澁加車前子二錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下

脈沉滑作實治

脈浮大者作虛治宜虛條下參芪諸方主之若浮大而上壅甚者宜此雞蘇丸方 脈沉滑有力者作實治宜實條諸方主之

熱

丹先痰嗽後見紅多是痰積熱降痰火為急 痰涎帶血出此胃口熱血蒸而出重則山梔輕則藍實 荆芥能散喉管痰血

欬血方

青黛

瓜萎實

訶子

海石

山梔

右為末薑汁蜜調噲服嗽甚加杏仁後以入物湯加減調理

垣鄭仲本年二十三歲因心痛服丹附等藥得上氣病膈
兩脇急迫脹觸不快便時嗽咯出血病形漸瘦大便燥而
難脈弦數夜同畧熱食稍減因與燈籠草和節麻黃細末
以白朮桔梗木通甘草湯調下十餘服病減半又與通聖
散去石膏為丸以桃仁湯下之

經治咯血黃藥子漢防已各一兩為末每服一錢匕水一
盞小麥二十粒同煎食後溫服

羅朱砂膏鎮心安神解熱及肺損嗽血等疾

蒼木二錢

朱砂研

生犀

人參

玳瑁

甘草炙

珍珠末各一兩

牛黃

麝香

南鵬砂

琥珀研

羚羊角

安息香醋煮

赤茯苓去皮

遠志去心各半兩

鐵粉

蘇合香油

和藥亦得各一兩

右為末煉蜜破蘇合香油劑諸藥為小錠子更以金箔
裹之磁器收貯每服一皂子大食後嚙化衛尉葉丞得
效并阿膠丸相雜服此藥治血安神更勝至寶丹每兩
作五錠子

肺熱咳唾血惟七傷散用黃藥子白藥子最有效方見血
鬱血汚條又脈浮數忌灸若誤灸之必唾血仲景云脈浮
熱甚反灸之必咽燥唾血是也 孫兆因博士王珣患咽

喉壅塞胸膈不利時發寒熱夜多盜汗忽心胸塞悶咳血
三數日即止晚後脈數口乾涎唾稠粘咳嗽一二聲不透
肩背微痛嘗於關元氣海中腕三里等穴着艾不詳病得

之肺虛其狀中客熱症皆因誤灸服暖藥所致遂與外臺
第一廣濟紫苑湯為丸合服之立效方未
寒 千百部丸主諸咳不得氣息唾血方

百部根二兩 升麻半兩 桂心 五味子

甘草炙 紫苑 乾薑各一兩

右七味蜜丸桐子大每服三十九日三次知為度忌生蔥海藻菘菜

外療肺偏損胸中虛肺偏痛唾血氣欬欬冬散

欬冬花 當歸各六分 桂心 芎藭

五味子 附子炮各七分 細辛 貝母各四分

乾薑 生地各八分 白朮 甘草炙

杏仁去皮尖各五分 紫苑三分

右共為末清酒服方寸七日二服忌生蔥生菜桃李雀肉海藻菘菜猪肉蕪荑

按唾血咳血屬寒者少今此二方用薑附熱劑蓋為腎足少陰脈是動病咳唾血者設也用者審之

肺傷咳血

脈肺傷者其人勞倦則咳唾血其脈細緊浮數皆吐血此為躁擾嗔怒得之脈傷氣壅所致

經云肺脈不及則令人喘呼吸少氣而咳上氣見血下者此病皆肺虛咳唾血之症治法並見氣虛條

肺虛宜酸收之

治虛勞久嗽咯血用五倍子焙為細末每服一錢用溫茶一大口許調勻食後米飲半盞調服

肺盛宜辛散之

經肺經嘔咳諸血及痰中有血初用生蘿蔔汁半盞入鹽少許服之立效如無生蘿蔔用蘿蔔子一錢蘇葉一錢同煎服次用雞蘇散加阿膠治之本草云蘿蔔大下氣氣下則血亦下也

經治咳嗽甚者或有吐血鮮素白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處搗為末每服一二錢米飲調下此方神效

本治久嗽咯血成肺痿及吐白涎胸膈滿悶不食匾豆散

扁豆 生薑各半 枇杷葉去毛 半夏

人參 白朮各一分 白茅根三分

右剉水三升煎一升去渣下檳榔末一錢和勻分四服不拘時候

千治上氣咳嗽喘息喉中有物唾血方

生薑汁 杏仁各二升 糖 蜜各一升

猪膏合二

右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令淨搗如膏和薑汁蜜糖等合煎令可丸每服如杏仁一枚日夜六七服漸次增加

右後二方生薑多肺虛及汗多亡陽與血下便者忌用

素少陰所謂咳唾則有血者陽脈傷也脈解篇

腎傷唾血 運氣 運氣咳唾血有二

一曰熱傷肺經云少陰司天熱淫所勝民病唾血又云少陽司天火淫所勝病欬唾血治以鹹寒是也

二曰濕傷腎經云太陰司天濕淫所勝咳唾則有血治以苦熱是也

丹治咯血用白芨一兩藕節半兩為細末每一錢湯調服

神效或云芩下咽至血竅則竅為芩末填而血止也

山咯血新綿灰半錢酒調下

針灸 針灸唾嗽血毒取足少陰一經經云腎足少陰之脈是動則病咳唾有血視盛虛熱寒陷下取之也

東吐血內損

地五會三分灸 魚際五分 尺澤一寸

甲唾血時寒熱瀉魚際補尺澤 唾血振寒隘乾大淵主

之內傷唾血不足外無膏澤地五會灸 胸脇脹滿咳逆

上氣呼吸及唾濁沫膿血庫房主之

外治上氣唾膿血灸兩乳下黑肉際各一十壯

診伸寸口脈數其人咳口中及有濁唾涎沫者何師曰此為

肺痿之病若口中辟辟燥咳即胸中隱隱痛脈反滑數此

為肺癰 咳唾膿血脈數虛為肺痿數實為肺癰

右肺痿唾膿血治法散見本門諸方若肺痿但唾涎沫

無膿血者見咳嗽門

肺脈微急為肺寒熱急情咳唾血引腰背胸若鼻息肉不

通經云急者多寒○全文見治虛實法

素肺脈搏堅而長當病吐血王註云肺虛極則咯逆故唾血○脈要精微篇

脈唾血脈緊強者死滑者生

手少陰筋病內急心承伏梁下為肘網其成伏梁唾膿血

者死不治全文見筋○伏梁之積在臍上

心脈微緩為伏梁在心唾血全文見虛實法

禁忌

羅肺痿辨 華嚴寺何上座年未四十四月間因澡浴大

汗出還寺剃頭傷風寒頭疼四肢困倦就市中贖取通聖

散服之又發汗頭疼少減再日復作又以前藥發之汗數

次四肢添勞重喘促自汗惡風咳而有血懶於言語飲食

減少求醫治之與藥又多以生薑為引至六月間精神愈

困飲食減少形體羸瘦或咳或唾紅血極多請予治之具

說前由診其脈浮數七八至按之無力予曰不救矣或曰

何為不救予曰血之與汗異名同類奪汗者無血奪血者

無汗金匱要畧云肺痿之病從何得之師曰或從汗出或

被快藥下利重亡津液故得之今肺氣已虛又以辛藥瀉

之重虛其肺不死何待藏氣法時論云肺欲收急食酸以

收之以酸補之以辛瀉之蓋不知內經之旨仲景云醫術

淺狹情然不知病源為治乃誤發汗吐下之相反其禍至速世人但務彼翕習之榮而莫見此傾危之習惟明者居然能護其本近取諸身夫何遠之有焉其僧不數日果亡

妊孕咳唾血

針灸

心妊孕寒熱往來咳嗽血痰或嘔吐不食無力或喘滿乳脊相應痛或口中唾如霜雪出語無聲或耳鳴或痰涎日夜漱碗誤用熱藥之故也 風門 鬼戶各五分 支溝

間使

各相透

如寒熱未解百節痠癢昏憤再取絕骨五分

太溪三分

如脈氣未平瀉太淵

太白各二分

熱府

已上穴實瀉虛補治產前病立效此病安後半年必有一變四肢消瘦單腹腫脹即取陰交一穴去其惡物也

洩血

氣虛

無玉屑膏治尿血并五淋砂石疼痛不可忍受者

黃芪

人參各等分

右為末用蘿蔔大者切一指厚三指大四五片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二兩為度勿令焦至熟蘸黃芪人參末吃不以時仍以塩湯送下

外療虛尿血方乾膠三兩炙搗末酒二升和温服

無髮灰散治小便尿血

血虛

髮灰

本草云髮灰能消瘀血通關格利水道破滯通血脚丹溪云髮補陰甚捷

右一味每用二錢以米醋二合湯少許服并花水調亦得一法茅草根車前子煎湯調下尤妙兼治肺疽心衄內崩吐血一兩口或舌上出血如針孔若鼻衄吹內立已

葛治小便出血當歸四兩細剉酒三升煮取一升頓服

丹有血虛四物湯加牛膝膏

胞絡絕則澀血

悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數

澀血也全文見痿

澀可去

姚氏治小便出血龍骨末方寸匕水調溫服日三服瘥

肘治淋下血麻根十枚水五升煮取二升一服取血神效

疔血

經治尿血不止以鬱金一兩搗為末蔥白一握相和水一

盞煎三合去查溫服日三服

濟鹿角膠丸治房室勞傷小便尿血

鹿角膠半兩

沒藥另研

油頭髮灰各三錢

右為末用茅根汁打麩糊丸如桐子大每服五十九鹽

湯下

熱

胞移熱於膀胱則癰溺血全文見診病傳變

仲熱在下焦者則尿血亦令淋澀不通

丹溺血屬熱山梔炒水煎或用小薊琥珀

玄小便出血是心伏熱在於小腸宜鏡面草自然汁加生

蜜一匙服之以八正散加麥門冬蔥煎服如小便澀痛以

海金沙細末調治之八正散見淋條

外治尿血車前草搗取汁五合空心服之

濟小薊飲于治下焦結熱尿血成淋

生地四兩

小薊根

滑石

通草

蒲黃炒

藕節

淡竹葉

當歸去蘆酒浸

山梔仁

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎八分空心溫服

無葶草汁法方見淋

實熱

丹尿血實者可用當歸承氣湯下之後以四物加山梔當歸承氣湯即調胃承氣加當歸

脈尺脈滑氣血實婦人經脈不利男子尿血宜服朴硝煎
大黃湯下去經血針關元瀉之

雜方 丹冬榮散治小便出血及腸風下血用夏枯草燒灰存性
為末米飲下 一方用凉水調下

診 少陰瀉則病積洩血又見積塊

咳而且洩血脫形其脈小勁是逆也全文見診生死
咳洩血形肉脫脈搏是逆也同上凡脈曰勞曰強曰勁曰搏者皆謂有力而實也

妊娠尿血

聖治妊娠尿血用阿膠炒黃為散每食前以粥飲調下二
錢七

大治妊娠尿血

阿膠 熟地各等分

右為末空心粥飲調三錢

下血

大法

下血不可用純寒涼藥必於寒涼藥中加辛味為佐久

不愈者後用溫劑必兼升舉藥中加酒浸炒涼藥如酒煮
黃連丸之類 凡用血藥不可單行單止 腸風獨在胃

與大腸出治用黃芩秦芫槐角升麻青黛 定腸風痛用
蒼朮滑石當歸生地黃黃芩甘草 下血屬虛者當溫散

之四物加乾薑升麻 便血過多者四物加蝟皮 有熱
者四物加山梔升麻秦芫阿膠 有兼風者蒼朮秦芫芍

藥香附 胃清血非藍實不除

辨腸風
藏毒也

如下清血色鮮者腸風也血濁而色黯者藏毒也肛門

射如血線者虫痔也亦是一種下部虛陽氣不升血隨氣
而降者

仲景云脈弦而大者弦為緊大為朮緊則為寒朮則為虛

革脈為虛宜補

重痔宜熏

虛者宜升陽補胃

寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精此下部虛而下者也若得革脈須宜服溫補藥重痔宜熏千金用蝟皮艾者佳予嘗用有效方見痔

垣升麻補胃湯治宿有腸血症因五月大熱吃杏腸澀下血遠三四尺散漫如篩腰沉沉然腹中不痛血色紫黑病名濕毒腸澀是陽明少陽經血症升陽湯主之

升麻一錢半

羌活一錢

獨活五分

柴胡

防風各錢半

葛根三分

肉桂少許

白芍藥五分

牡丹皮半錢

黃芪一錢

熟地

生地各五分

歸身三分

甘草炙五分

右剉如麻子大作二服水二盞煎一盞去查稍熟食前服

按濕熱

和中益胃湯治太陰陽明腹痛大便常澹泄若不泄即秘

而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛脇下急縮脈緩而洪弦中指下得之按之空虛

熟地三錢

歸身酒洗三分

升麻五分

柴胡五分

蘇木一分

藜木二分

甘草炙三分

益智三分

右作一服水三大盞煎至一盞去查午食前溫服一貼愈

升陽除濕和血湯治腸澀下血另作一派其血溼出有力而遠射四散如篩下春二月中旬日下二行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當升陽去濕熱和血脈不兩服而愈

生地

牡丹皮

甘草各五分

白芍藥一錢半

熟地

黃芪一錢

升麻七分

歸身

蒼朮

秦艽

肉桂各三分

陳皮二分

甘草分五

右咬咀作一服水四大盞煎一盞稍熱空心服立效

換寒

益智和中湯治腸澼下血紅或深紫黑色腹中痛腹皮惡

寒右三部脈中指下得之俱弦按之無力關脈甚緊肌表

陽明分涼腹皮熱而喜熱物熨之內寒明矣

升麻錢一

葛根分五

白芍藥錢一

甘草分一

桂枝分四

益智分五

半夏分五

肉桂分一

歸身錢一

黃芪錢一

乾薑少許

牡丹皮

柴胡分各五

右為籠末作一服水三盞煎一盞食後溫服

按不如
意事

丹婦人年六十性多沉怒大便下血十餘年不止食減形
困心搖動或如烟熏情性極惡早起面微浮急此時便血
尤未盡絕中間若得一二口不來則意思稍清但遇稍不

如意事則血復作百法不治左三部脈浮大稍重手則無
久取之又似滯澁而至數不勻右三部沉澁細弱寸脈沉
絕予謂氣鬱生涎涎鬱胸中清氣不升經脈壅遏不降心
血絕少不能自養所以有如熏之狀非開涎不足以行氣
非氣行則血不能歸隧道以壯脾為君諸藥佐之遂以二
陳湯加酒紅花升麻當歸身酒黃連青皮貝母澤瀉黃芪
人參白朮酒芍藥每貼生附子一小片煎服四貼後血止
遂去附子加乾葛牡丹皮山梔子而如熏之狀亦除去又
於前方加礞砂炒神麩熟地木香倍參朮服半月而全愈
治下血蒼朮地黃同搗細末為丸不用鐵器

實者清
表攻裏

六大便下血曰腸風切勿止澁究其本末症狀先清其表

後攻其裏其血自止如脈洪大宜後方四物合解毒湯調

治解毒湯方
見發熱

本治腸風瀉血

牽牛五兩

牙皂三兩不蛀者搥碎

右二味水浸三日後除皂角不用將酒一升煮令乾焙為末煉蜜丸如桐子大每服七丸溫酒送下空心日午夜臥各一服或轉下黃物不妨病可後每日常服五丸飯飲送下

腹中不痛者為濕毒

潔黃連湯治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連

當歸各五錢

甘草炙二錢半

右咬咀每服五錢水煎

腹中痛者為濕毒

芍藥黃連湯治大便下血腹中痛者謂之濕毒下血

芍藥

黃連

當歸各半兩

大黃一錢

淡桂五分

甘草炙二錢

右咬咀每服五錢水煎如痛甚者調木香檳榔末一錢

服之

垣夫腸澼者為水穀與血另作一派如溷桶湧出也夏濕

長夏病甚者為濕熱

熱太甚正當客氣盛而主氣弱故腸澼之病甚也以涼血

地黃湯主之

黃栢去皮

知母炒各一錢

青皮炒

槐子炒

當歸

熟地各五分

右咬咀俱作一服水一盞煎七分溫服如小便澀臍下悶或大便前後重調木香檳榔細末各半錢稍熱於食前空心服如裏急後重又不去者當下之如腹中動搖有水聲而小便不調者停飲也診是何臟以去水飲藥瀉之假令脈洪大用瀉火利小便之類是也如胃虛不能食而大渴不止不可用淡滲之藥止之乃胃中元氣少故也與七味白朮散補之方見消渴如發熱惡

熱煩躁大渴不止肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力
或無目痛鼻乾者非白虎湯症也此血虛發躁當以黃
芪一兩當歸二錢咬咀水煎服 如大便秘塞或裏急
後重數至圍而不能便或少有白膿或少有血慎勿利
之利之則必致病重及鬱結不通以升陽除濕防風湯
升其陽則陰氣自降矣

升陽除濕防風湯

蒼朮

酒浸炒去皮淨四錢

白朮

一錢

白茯苓

白芍藥

各一錢

防風

二錢

右咬咀除蒼朮另作片水一碗半煮至二大盞內諸藥
同煎至一大盞去渣稍熱空心食前服如飧泄不禁以
此藥導其濕如飧泄及泄不止以風藥升陽蒼朮益胃
去濕脈實腹脹閉塞不通宜從權以苦多甘少藥泄之

如得通復以升陽湯助其陽或不便以升陽湯中加泄
藥通之

當歸和血散治腸澼下血或濕毒下血

槐花

青皮

荆芥

熟地

白朮

各六分

當歸

升麻

各一錢

川芎

四分

右為末每服二三錢清水飲湯調食前下

本治腸風臑毒槐花散

槐花

炒

栝葉

搗爛

荆芥

枳殼

右等分為末每服二錢米飲調空心食前服經驗治下血

芥等分為末酒調下一錢

玄 大便下血者肺與大腸受熱宜四物同解毒藥入艾煎
下三黃丸調治之

丹 治便血久久傷血并麻風症癰瘡見面者用

龜板二兩 升麻各半 白芍藥一兩

側柏葉一兩 椿皮七錢

右為末粥丸先用四物加白朮黃連甘草陳皮等藥作

湯送下

積熱便血

蒼朮 陳皮各二錢半 黃柏 黃芩各七錢半

連翹半錢 生地膏六兩

右為末以地黃膏搜為丸

脈緩大口渴便血月經紫色勞挾濕熱

白朮五錢 地黃 黃柏炒 白芍藥各三錢

地榆二錢 黃芩一錢 香附二錢

右為末炊餅為丸

孫用和治腸風瀉血黃芪黃連等分為末酒糊丸如葉莖

大每服三十九米飲下

羅結陰丹治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

寒濕下血者為結陰

枳殼炒 歲靈仙 黃芪 陳皮去白

椿根白皮 何首烏 荆芥穗各半兩

右為末酒糊丸如桐子大每服五七十九陳米飲入醋

少許煎過放溫送下

本椿皮丸 臭椿皮刮去麤皮焙十四兩 蒼朮 枳殼各二兩

右為末醋糊丸如桐子大空心食前米飲下三四十丸

治腸風瀉血久不止玉屑丸

槐根白皮去麤皮 苦練根去皮各三兩

椿根白皮四兩 天南星

半夏各半兩 葳靈仙一兩 寒食麪三兩

右爲末滴水丸如桐子大每服三十九以水一盞煎沸
下丸子煮令浮以匙抄起溫溫送下不嚼空心食前服
頃年有人下血幾盈盆頓爾疲萎諸藥不效予曰此正
腸風令服玉屑丸三服而愈

經治臟毒下血以苦練子炒黃爲末蜜丸米飲下十九至
二十九甚妙

斗治腸風痔瀉血羊蹄根葉蒸爛一碗食之立瘥

外治卒下血不止龍膽草一虎口以水五升煮取二升半
分爲五服瘥

本蕨菜花不以多少文武火焙乾爲末每服三錢飯飲調
下

子和一男子臟毒下血當六月熱不可堪自甘於死忽思
蜜水猛捨性命飲一大盞痛止血住

素結陰者便血一升再結二升三結三升駱龍吉云結陰之病陰氣內結

不得外行血無所稟滲入腸間故便血也其脈虛澀者是也因血結不行故下口陰陽別論 **血泄者**

脈急血無所行也從容篇

羅真定總管史侯男年四十二歲形體本瘦因勉強飲酸

酒得腹痛次傳泄瀉十餘日便後見血或紅或紫腸鳴腹

痛醫以諸見血皆熱治以芍藥栢皮湯之類前證如故仍

不欲食食則嘔酸形體愈瘦面色青黃不澤心下痞惡冷

物口乾時有煩躁不得安臥請予治之脘得脈弦細而微

遲手足稍冷內經曰結陰者便血一升再結二升三結三

升又曰邪至五臟則陰脈不和陰脈不和則血留之結陰

之病陰氣內結不得外行血無所稟滲入腸間故便血也

以平胃地榆湯主之

蒼朮

白朮

陳皮

茯苓

厚朴各五分

甘草炙

乾薑

當歸

炒麩

白芍藥

益智仁

人參各三分

地榆分七

升麻錢一

葛根分五

黑附子炮一錢

右作一服水一盞生薑三片葱二枚煎至一盞去查食

前溫服此藥溫中散寒除濕和胃數服病減大半又灸

中脘二七壯引胃氣上升次灸氣海百壯生發元氣灸

則強食生肉以還少丹服之至春再灸三里二七壯溫

脾壯胃生發元氣次服芳香之劑慎言語節飲食而愈

只食藥物

海楊師大醉醒發大渴飲水三大盞又飲米茶三碗後病

便鮮血四次約一盆先與吳茱萸丸翌日又與平胃五苓

各半散三大服血止後自利又與神應丸四服自利乃止

或問曰何不用黃連之類以解毒予曰若用寒藥其疾大

變難治寒飲內傷復用寒藥非其治也况血為寒所凝入

大腸間而便下血溫之乃行所以得熱則自止 楊氏飲

冷酒瀉血服對金散止亦理中脘分利陰陽安定血脈之

意也 唐生病因飲酪水及食生物下利紫黑血十餘行

脾胃受寒濕毒與六神平胃散半兩加白朮三錢以利腰

膈間血一服愈

身感寒氣

易胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄

瀉注下及腸胃濕毒下如荳汁或下瘀血日夜無度

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白朮各等分

右咬咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去

查稍熱空心服小兒量力增減 若加熟地黃芪甘草

等分為十味名十補湯 若虛勞嗽加五味子 若有

痰加半夏 若發熱加柴胡 若有汗加牡蠣 若虛

寒加附子 若寒甚加乾薑皆依本方等分 若骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩 若氣弱加人參 若小便不利加茯苓 若脈弦澀加川芎 若惡風加官桂 若脈澀加當歸 若腹痛加白芍藥 若胃熱濕盛加白朮

膠治血下防風為上使黃連為中使地榆為下使 若血瘀色紫者陳血也加熟地黃 若血鮮色紅者新血也加生地黃 若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地骨皮 若脈洪實痛甚者加酒浸大黃 治腸風烏荊丸

川烏頭一兩炮去皮尖

荊芥穗二兩

右為末醋九桐子大每服二十九溫酒送下熟水亦得 有病發時食前日三服無病時日一服

遠血

仲下血先便後血者此遠血也黃土湯主之

甘草

熟地

白朮

附子炮

阿膠

黃芩各三兩

灶中黃土半升

右七味以水八升煮取三升分溫二服

近血

下血先血後便者此近血也赤小豆當歸散主之

赤小豆

五兩浸令出曝乾

當歸一兩

右杵為末漿水服方寸匕日三服楊師云治熱毒下血或因食熱物發動以

赤豆杵末水調吞下方寸匕又方治腸風赤小豆炒黑為末每服二錢米飲調下

內傷飲食 則腹滿閉塞下為飧泄久為腸澀至文見五臟 則入五臟

素因而飽食筋脈橫解腸澀為痔生氣通大論

右飲食不節腸癖如羅謙甫治真定總管史侯男飲酸酒下血法及海藏治楊師飲冰茶下血法治唐生飲酪

水下血法是也並見寒濕條

世治酒積下血不止糞後見諸藥不效

神麩一兩 白酒藥二九

右同為末用清水調捏作餅子慢火上炙黃為細末每服二錢白湯調下亦治泄瀉神效

外感風寒

靈春傷於風夏生飧泄腸癖論疾診尺篇

易胃風湯治風冷乘虛入客腸胃下血方見寒濕條

丹治腸風下血及血崩用五靈脂炒去火毒每服二錢

世腸風下血馬鞭草葉研碎扭汁服

丹臟毒下血車前草連根一握生薑一小塊新水研碎去渣候血欲下時腰間必覺重便服此藥一盞少坐漸覺冷下腹中即登廁已不見血矣甚者不過再服

本治腸風臟毒酒痢下血

辛以散結

黃連 生薑

右二味煎湯下二氣九次服五槐丸方列于後

又方

金星草三兩草味苦寒大解丹石毒 陳乾薑

右為末每服一錢新汲水調空心服

孫真人治糞後有血濃煎艾葉湯和生薑汁三合服之

本治臟毒蒜連丸鷹爪黃連末用獨頭蒜一顆煨香熟研和丸如桐子大每服三四十九陳米飲下

蒜患暴下血以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗為膏可即丸如桐子大以米飲下五六十丸無不愈者葫即蒜也本草

種其能

烏梅丸治腸風下血服之立效

真僵蚕一兩 烏梅肉焙乾一兩

酸以收

右為末薄糊丸如雞頭肉大每服百丸食前白湯送下
日三服

本五槐丸治臟毒

五倍子

槐花陳

百藥煎

好者各等分

右焙乾為末酒糊丸如桐子大每服二十九空心米湯
下一日三服

丹治下血用白芷五倍子為末丸服

本治腸風

五倍子

白礬

各五錢

右為末順流水丸如桐子大每服七丸米飲下忌酒
右酸寒之劑

千糞前有血令人面黃石榴皮取末茄子枝湯下

丹治腸風下血百藥不效有一良醫獨用山裏朮俗名鼻
涕團又名酸棗最治下血之疾試取乾者為末服之應手

而安藥苟對症其效若此烏可以賤而忽之哉衍義云酸棗微熱

右酸熱之劑

本丈夫傷血婦人血崩瀆入大腸出血

草葶薺

檳榔各炒紫色

鶯粟殼

燒灰

右等分為末每服二錢空心米飲調下

世冬榮散治腸風下血方見瘦血

血見黑

博治遠年日久腸風下血不止枳殼燒灰存性羊脛炭為
末和勻用濃米飲一中盞調下空心五更初一服如人行

五里再服立效

每服枳殼灰五錢炭末二錢

本治腸風炒赤小葶散

方見上下血條赤豆當歸散下註

又方瓜蒌三箇燒灰存性每服三錢空心米飲調下

靈苑治腸風下血久不止茄蒂燒存性為末每服三錢七

食前米飲調下

丹溪云茄蒂燒灰存性山梔炒等分為末丸之米飲下百丸

本治腸風絲瓜燒灰存性空心溫酒調服二錢
食療治下鮮血梔子燒灰水和一錢七服之量其大小多
少服之

廣治瀉血不止素耳一兩熬令黑水一大升三合煎取六
大合去渣空心分溫三服

本治腸風下血

核桃殼 蘭退 皮鞋底 赤雞冠花分等

右燒灰為末每服一錢空心溫酒下

又方治臟毒

當歸、 枳殼 側柏葉 陳槐花子

百草霜 芍藥各一

右剉碎一處炒令烟微起為末每服二錢空心溫酒調
下日午米湯下各食前服甚妙

雜方

針灸

丹一方治腸澼用陳年棕櫚燒灰百藥煎為丸服

本又方皂角樹上葦新瓦上焙乾為末每服一錢溫酒下

山臟毒便血生藕節切片清早蘸平胃散嚼下

丹治腸痔大便常血取蔥白三五斤煮作湯盆中坐立瘥
灸刺腸澼下血有二法

其一取肝經云病注下血取曲泉是也

其二取腎經云腎是少陰之脈所生病者黃疸腸澼視盛
虛熱寒陷下而施補瀉疾留灸也

脈關脈花大便出血數斗者以鬲俞傷故也宜灸鬲俞若
下重去血者宜針關元

經治腸風下血灸二十椎下隨年壯三報穴立愈

甲腸中有寒熱注下腸澼便血會陽主之 腸鳴澼泄下
節主之 腸澼泄切痛四滿主之 腸澼中郟主之一都

診

惟穴治腸風下血肘內曲澤下一寸

集又法 三間 商陽 太陵 內關 命門 扶承

海血症與黃証俱頭汗出惡風口飲酒便褐色或黑色者亦同血症治之

素腎脈小搏沉為腸澼下血血溫身熱者死大奇論

滯而奪精身熱色天然及酒後下血血篤重是逆也全文見診

死生

素心肝澼亦下血二臟同病者可治其脈小沉澁為腸澼

其身熱者死熱見七日死大奇論 帝曰腸澼便血何如岐

伯曰身熱則死身寒則生 帝曰腸澼下膿血何如岐伯

曰脈懸絕則死滑大則生 帝曰腸澼之屬身不熱脈不

懸絕何如岐伯曰滑大者生懸澁者死以臟期之俱通評虛實論

脾脈外鼓沉為腸澼久自已 肝脈小緩為腸澼易治

俱大奇論

腹脹便血脈大時絕是逆也如此者不及一時而死矣全文

見診生死○絕謂斷絕而不相續也

脈腸澼下膿血脈沉小留連者生數疾且大有熱者死

腸澼筋攣其脈小細安靜者生浮大緊者死

素陰陽虛腸澼死陰陽別論

胃移熱於脾傳為虛腸澼死不可治全文見診病傳變

中蠱下血 唾水沉者心腹絞痛下血如爛肉者俱為蠱

千治中蠱下血如雞肝出其餘四臟俱壞惟心未毀或鼻

破待死取馬蘭根末水服方寸七隨吐則出極神此苗似

葛蔓綠紫生子似橘子

海治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死用

白蘘荷葉密安病人席下勿令病人知覺自呼蠱主姓名

雜方

百一 治中蠱毒或吐下血者若爛肝取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可治

千金翼 治蠱毒下血蝟毛燒末水服方寸匕當吐蠱毒

肘療 中蠱毒吐血下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮取一升服之吐即愈 又方用苦酒一升煮瓠令消服之神效

諸痿 注夏

痿者手足痿軟而無力百節緩縱而不收也

大法 痿屬濕熱 有濕痰者 有氣虛者 有血虛者 有食積妨碍不降者 有死血者

素 黃帝問曰五臟使人痿何也岐伯曰肺主身之皮毛心主身之血脈肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄着則生痿痺也心氣熱

則下脈厥而上上則下脈虛虛則生脈痿樞折挈脛縱而不任地也肝氣熱則膽洩口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣發為筋痿脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿帝曰何以得之岐伯曰肺者臟之長也為心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦故曰五臟因肺熱葉焦為痿痺此之謂也悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數洩血也故本病曰大經空虛發為肌痺傳為脈痿思想無窮所願不得意滯於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫故下經曰筋痿者生於肝使內也有漸

於濕以水為事若有所留居處相濕肌肉濡潰痺而不仁發為肉痿故下經曰肉痿者得之濕地也 有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎腎者水臟

也今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發為骨痿故
下經曰骨痿者生於大熱也帝曰何以別之岐伯曰肺熱
者色白而毛敗心熱者色赤而絡脈溢肝熱者色蒼而爪
枯脾熱者色黃而肉蠕動腎熱者色黑而齒槁也帝曰論
言治痿者獨取陽明何也岐伯曰陽明者五臟六腑之海
主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也衝脈者經脈之海也
主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣
街而陽明為之長皆屬於帶脈而絡於督脈故陽明虛則
宗筋縱帶脈不引故足痿不用也帝曰治之奈何岐伯曰
各補其榮而通其俞調其虛實和其逆順筋脈骨肉各以
其時受月則病已矣帝曰善痿病論

治痿獨
取陽明
解

或問曰治痿之法取陽明之一經此引而未發之言願明
以告我予曰諸痿生於肺熱只此一句便見治法大意經

曰東方實則西方虛瀉南方補北方此固就生尅言補瀉
而大經大法不外於此東方木肝也西方金肺也南方火
心也北方水腎也五方之中惟火有二腎雖有兩水居其
一陽常有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然
金體燥而居上主氣畏火者也土性溫而居中主四肢畏
火者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡於畏而
侮所勝肺得火邪則熱矣木性剛急肺受熱則失所養木
寡於畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一
身脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作瀉南方則肺金
清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不
虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣
治痿之法無出於此駱龍吉亦曰風火既熾當滋腎水東
垣先生取藥皮為君黃芪等補藥輔佐以治諸痿而無一

東垣以
黃柏佐
參朮芪
草等補
氣

定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者
有挾氣者臨病制方其善於治痿者早雖然藥中肯啓矣
若將理失宜醫不治也天產作陽氣厚發熱先哲格言但
是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安也

垣清暑益氣湯 黃芪人參湯 清燥湯二方並見注夏

丹溪以
乾薑佐
婦栢瑣
虎等補
血

丹補益丸治痿

龜板酒炙一兩

瑣陽酒浸一兩

生地酒浸一兩半

歸身酒浸一兩

陳皮一兩

杜牛膝酒浸一兩

白朮二兩

乾薑七錢

黃栢炒半兩

虎脛骨酒炙半兩

五味子二錢

茯苓半兩

白芍藥酒浸一兩

甘草炙一錢

兔絲子酒蒸熟研如糊入餘藥末晒乾

諸藥為末紫何車為丸如無紫何車猪腦骨髓亦得

龍虎丹治痿

敗龜板酒炙

虎骨酒炙

黃栢酒炙

乾薑二錢

瑣陽七錢

金箔十片

神麴

如懶言語加

山藥末七錢

右為末糯粉糊為丸空心白湯服

虎潜丸

龜板四兩

知母二兩

黃栢四兩

熟地二兩

牛膝三兩

瑣陽一兩

虎骨炙一兩

當歸一兩

芍藥兩

陳皮七錢

乾薑半兩

右為末酒糊丸加附子治痿厥如神

濕熱痿東垣健步丸加苓栢蒼朮 東垣補益腎肝丸治

脚膝無力二方並見痿厥

蕭炳神龜滋陰丸方見延下

丹溪氣虛

病痿四君子加蒼朮苓栢 血虛病痿四物湯加蒼朮黃

栢下補陰丸 保命集治脾虛四肢不用以十全散者蓋

治氣血俱虛者也

無搖活
痿獨補
虛

無加減四斤丸治腎肝虛熱滯於內致筋骨痿弱不自勝
持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不
生氣力諸虛不足

肉苁蓉

酒浸

木瓜

兔絲子

酒浸

鹿茸

煉去毛熟地

天麻

五味子

酒浸

右為末蜜丸如桐子大每服五十九溫酒米湯食前下

王啓玄傳玄珠耘苗丹三方序曰張長沙戒人妄服燥烈

之藥謂藥勢偏有所助勝尅流變則真病生焉猶憫苗不

長而握之者也若稟氣血不強合服此而不服是不耘苗

者也故名耘苗丹此丹養五臟補不足秘固真元均調二

氣和暢榮衛保神守中

五味子

巴戟

遠志

枸杞子

山藥

白茯苓

肉苁蓉

百部

酒浸

杜仲

炒斷

防風

栝子仁

另研

兔絲子

酒浸另研

右為末蜜丸桐子大食前溫酒鹽湯任下三十九春乾

惠湯下夏加五味子四兩四季月加苁蓉六兩秋加枸

杞子六兩

衛生湯補虛勞強五臟除煩熱養真元退邪熱順血脈

當歸

白芍藥

各四兩

甘草

炙一兩

黃芪

八兩

年老加酒半盞同水煎

雜方

蕭炳

治脚軟丹參酒

方見

經治骨軟風腰膝疼行履不得遍身搔痒何首烏大而

有花紋者同牛膝劉各一斤以好酒一升浸七宿焙乾於木

臼搗末蜜丸每日空心食前酒下三五十九

保四肢不舉俗曰癱緩故經所謂脾太過則令人四肢不

脾濕痿

脾實則四肢不舉微者燥之甚者下之

舉又曰土太過則敦阜阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂膏梁之疾其治則瀉令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不舉四肢皆稟氣於胃而不能至經必因於脾乃得稟受今脾病不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可十全散加減四物去邪留正

脾實病痿者經云脾病者肉痿足不收又云脾脈太過則令人四肢不舉又云其犯雨濕之地則為痿者是也

丹濕痰病痿二陳湯加蒼朮白朮黃芩黃柏之類入竹瀝

斗商陸飯治脚軟方見痿厥

子和陳下一武卒宋子玉因駐軍息城六月間暴得痿病

腰膝兩足皆不任用臂而不行求治於予予察其兩手脈俱滑大而有力予思內經火淫於內治以醎寒以鹽水越其膈間寒熱宿痰新者為熱舊者為寒或宿食宿飲在上脘者可以涌之宿痰既盡因而下之節次間行覺神志日清飲食日美兩足漸舉脚膝漸伸心降腎升又繼以黃連解毒湯加當歸等藥及瀉心湯涼膈散柴胡飲子大作劑煎時時呷之

保心熱盛則火獨光火炎上腎之脈常下行今火盛而上炎用事故腎脈亦隨火炎爍而逆上行陰氣厥逆火復內煽陰上隔陽下不守位心氣通脈故生脈痿膝腕樞如折去而不相提挈經筋縱緩而不任地故也可下數百行而愈

痿病食積妨碍不得降者亦有死血者俱宜下之

脾虛別用四肢不

素帝曰脾病而四肢不用何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟也今脾病不能為胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉帝曰脾與胃以膜相連耳而能為之行其津液何也岐伯曰足太陰者三陰也其脈貫胃屬脾絡噎故太陰為之行氣於三陰手足三陰經也陽明者表也五臟六腑之海也亦為之行氣於三陽手足三陽經也臟腑各因其經而受氣於陽明故為胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以益衰陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉大陰陽篇○調經篇云脾載肉不足則四肢不用從容論云四肢懈惰此脾精之不行也脾虛四肢不用治法並見前肺熱條諸痿喘嘔皆屬於上全文見診

此即諸痿皆生於肺熱之義王註云上謂上焦心肺氣

也

運氣運氣痿有三

一曰熱痿經云少陰之復少氣骨痿又云少陽之復少氣脈痿是也

二曰濕痿經云歲土太過甚則病肌肉痿足痿不收又云土太過曰敦阜敦阜之紀其病四肢不舉又云太陽司天之政寒濕之氣持於氣交民病寒濕發肌肉痿足痿不收四之氣風濕交爭風化為雨民病大熱少氣肌肉痿足痿又曰陽明司天之政四之氣寒雨降民病骨痿是也

三曰風制脾痿經云厥陰司天風氣下臨脾氣上從而土且隆體重肌肉痿是也

針灸

靈陽明根於厲兌結於頰大頰大者鉗耳是也頰大謂額角入髮際於耳上故名鉗耳也陽明為闔闔折則氣無所止息

而痿疾起矣故痿疾者取之陽明視有餘不足無所止息者真氣稽留邪氣居之也 足陽明根于厲兌溜于衝陽注于下陵入于人迎豐隆也 下陵三里穴也 手陽明根于商陽溜于合谷注于陽溪入于扶突偏歷也 盛絡皆當取之

根結篇

刺痿經文見前熱條今槩舉其畧肺熱葉焦則肺喘鳴生痿躄色白而毛敗者 補其榮魚際 通其俞太淵 至秋病已

心熱生脈痿數洩血樞折不相提挈脛縱不能任用於地色赤而絡脈溢者 補其榮勞宮 通其俞太陵 至夏病已

肝熱生筋痿下白淫口苦筋急攣色蒼而爪枯者 補其榮行間 通其俞太衝 至春病已

脾熱生肉痿乾渴肌肉不仁色黃而蠕動者 補其榮大都 通其俞太白 至長夏病已

腎熱生骨痿足不任身腰脊不舉骨枯髓減色黑而齒槁者 補其榮然谷 通其俞太溪 至冬病已

又痿躄足不收取之少陽陽明之別經云足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰虛則痿躄坐不能起取之所別也又云滂滂脛痿不能久立治少陽之維在外踝上五寸又云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其病虛則足不收脛枯取之所別者是也

骨痿懈惰取足少陰髓海經云少氣身漯漯也言吸吸也骨痿懈惰不能動補足少陰又云腦為髓之海其俞上在于其蓋下在風府髓海不足則腦轉耳鳴脛痠懈怠安臥審守其俞而調其虛實者是也百節弛縱取脾手太陽之

絡經云脾之大絡名曰大包出淵液下液三寸布胸脇虛則百節盡皆縱此脈若羅絡之血者取之脾之大絡也又云手太陽之別名曰支正上腕五寸實則節弛肘廢取之所別者是也

甲痿不相知太自主之一云耳重骨痿不相知足下緩失履衝陽

主之足緩不收痿不能行不能言語手足痿躄不能行地倉主之

腎脈微滑為骨痿坐不能起起則目無所見全文見治虛實法

丹斷不可作風治而用風藥

注夏

子和痿之作也皆五月六月七月之時午者少陰君火之位未者濕土庚金伏火之地申者少陽相火之分故痿發此三月之內為熱也故病痿之人其脈浮大

虛

丹注夏屬陰虛元氣不足補中益氣中去柴升加黃栢炒挾痰者用南星

垣刺志論云氣虛身熱得之傷暑熱傷氣故也痿論曰有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎腎者水藏也今水不能勝火則骨枯而髓虛足不任身發為骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也此濕熱成痿令人骨乏無力故治痿獨取於陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黃而數大便溏而頻或痢出黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脈中得洪緩若濕氣相搏必加以遲遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之內經曰陽氣者衛外

而為固也熱則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃芪甘
溫補之為君人參陳皮當歸甘草甘微溫補中益氣為臣
蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕升麻葛根苦甘平善解肌熱
又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒麩甘辛青
皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃栢苦寒
借甘味瀉熱補水虛者滋其化源以人參五味子麥門冬
酸甘微寒救天旱之傷於庚金為佐名曰清暑益氣湯

黃芪一錢五分

人參去蘆五分

升麻一錢

澤瀉五分

甘草炙三分

蒼朮去蘆一分

葛根二分

五味子九粒

白朮五分

神麩炒黃五分

黃栢酒浸去皮三分

麥門冬去心歸身三分

陳皮五分

青皮去皮三分

右件同咀咀作一服水二大盞煎至一盞去渣大溫服
食遠劑之多少臨時斟酌此病皆由飲食勞倦傷其脾

胃乘天暑而病作也但藥中犯澤瀉猪苓茯苓燈心通
草木通淡味滲利小便之類皆從時令之旺氣以泄脾
胃之客邪而補金水之不及也此正方已是從權而立
之若於其時病濕熱脾旺之症或小便已數腎肝不受
邪者誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先損其兩目也復
立變證加減法于後 如心火乘脾乃血受火邪而不
能升發陽氣伏于地中地者人之脾也必用當歸和血
少用黃栢以益真陰 如脾胃不足之證須少用升麻
乃足陽明太陰引經之藥也使行陽道自脾胃中右遷
少陽行春令生萬物之根蒂也更少加柴胡使諸經右
轉生發陰陽之氣以滋春之和氣也 如脾虛緣心火
亢盛而乘其土也其次肺氣受邪為熱所傷必須用黃
芪最多甘草次之人參又次之三者皆溫甘之陽藥也

脾始虛肺氣先絕故用黃芪之甘溫以益皮毛之氣而
閉腠理不令自汗而損元氣也上喘氣短懶語須用人
參以補之心火乘脾須用灸甘草以瀉火熱而補脾胃
中元氣甘草最少恐資滿也若脾胃之急痛并脾胃大
虛腹中急縮腹皮急縮者却宜多用經曰急者緩之若
從權必加升麻以引之恐左遷之邪堅盛卒不肯退反
致項上及臀尻肉添而反行陰道故使引之以行陽道
使清氣出地右遷而上行以和陰陽之氣也若中滿者
去甘草咳甚者去人參如口乾嗌乾者加乾葛 如脾
胃既虛不能升浮爲陰火傷其生發之氣榮血大虧榮
氣伏於地中陰火熾盛日漸煎熬血氣虧少且心包與
心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰惓惓
者心惑而煩悶不安也是由清氣不升濁氣不降清濁

相干亂於胸中使周身血氣逆行而亂經云從下上者
引而去之故當加辛溫甘溫之劑生陽陽生而陰長也
已有甘溫三味之論或曰甘溫何能生血又非血藥也
曰仲景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血也更
加當歸和血又宜少加黃栢以救腎水蓋甘寒瀉熱火
火減則心氣得平而安也如煩亂猶不能止少加黃連
以去之蓋將補腎水使腎水旺而心火自降扶持地中
陽氣也 如氣浮心亂則以硃砂安神丸鎮固之得煩
減勿再服以防瀉陽氣之反陷也如心下痞亦少加黃
連氣亂於胸爲清濁相干故以陳皮理之能助陽氣之
升而散滯氣又助諸甘辛爲用故長夏濕土客邪火旺
可從權加蒼朮白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕氣
大勝主食不消化故食減不知穀味加炒麩以消之復

加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣助秋損也此三伏中長夏正旺之時藥也

脾胃虛弱隨時為病隨病制方 夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱甚損傷元氣怠惰嗜臥四肢不収精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而視物眊眊無所見小便頻數大便難而秘結胃脘當心而痛兩脇痛或急縮臍下周圍如繩束之急甚則如刀刺腹難舒伸胸中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌強腰背腹皆痛頭痛時作食不下或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃庚大腸辛肺金為熱所乘而作當先助元氣治庚辛之不足黃芪人參湯主之

黃芪 一錢如自汗過多加一錢

人參 去蘆五分 甘草 炙二分

白朮 五分

蒼朮 半錢無汗一錢

橘皮 二分不白

黃栢 酒洗三分

腎水之源

神麩 炒三分

五味子 九粒

麥門冬 去心二分

婦身 酒洗二分

升麻 六分

右咬咀俱作一服水二盞煎至一盞去渣稍熟食遠或

空心服之忌酒濕麩大料物之類及過食冷物 如心

下痞悶加黃連 二三 如胃脘當心痛減大寒藥加草

薤薏仁 五分 如脇下痛或縮急加柴胡 二三 如頭痛

目中溜火加黃連 二三 川芎 三分 如頭目不清利上壅

上熱加蔓荊子 三分 藁本 二分 細辛 一分 川芎 三分 生地黃 二分

如氣短精神少或夢寐間困乏無力加五味子 九粒 如

大便澁滯隔一二日不見者致食少食不下血少血中

伏火而不得潤也加當歸身生地黃 各五分 桃仁 三箇去皮尖另

研麻子仁

研泥五分

如大便通行所加之藥勿再服

如

大便又不快利勿用別藥少加大黃

煨半錢

如不利者

非血結血秘而不通也是熱則生風其病人必顯風症

單血藥不可復加止常服黃芪人參湯藥只用羌活

兩

防風兩半二味咬咀以水四盞煎至一盞去查空心服之

大便必大走也一服便止如胸中氣滯加青皮并去

白陳皮倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣

不當瀉之如氣滯太甚或補藥太過或人心下有憂

滯鬱結之事更加木香二分或三分砂仁二分或三分白苳蔻仁

二分與正藥同煎服如腹痛不惡寒者加白芍藥半錢黃

芩二分却減五味子

夫脾胃虛弱至六七月間河漲霖雨諸物皆潤人汗沾衣

身重短氣甚則四肢痿軟行步不正脚欹眼黑欲倒者此

腎水與膀胱俱竭之狀也當急救之滋肺氣以補水之上

源又使庚大腸不受邪熱不令汗大泄也汗泄甚則亡津

液亡津液則七神無所依經云津液相成神乃自生津者

庚大腸所主三伏之義為庚金受囚也若亡津液汗大泄

濕令亢甚則清肅之氣亡燥金受囚風木無可以制故風

濕相搏骨節煩疼一身盡痛亢則害承乃制是也孫思邈

曰五月常服五味子是瀉內火補庚金大腸益五臟之元

氣壬膀胱之寒已絕於巳癸腎水已絕於午今更逢濕旺

助熱為邪西方北方之寒清絕矣聖人立法夏月宜補者

補天元之真氣非補熱火也令人夏食寒是也為熱傷元

氣以人參麥門冬五味子生脈脈者元氣也人參之甘補

元氣瀉熱火也麥門冬之苦寒補水之源而清肅燥金也

五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金也當此之時無病

之人亦或有二症况虛損脾胃有宿疾之人遇此天暑將
理失所違時伐化必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘
非喘骨乏無力其形如夢寐朦朧如烟霧中不知身所有
也必大汗泄若風犯汗眼皮膚必搐項筋皮枯毛焦身體
皆重肢節時有煩疼或一身盡疼或渴或不渴或小便黃
澁此風濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短氣促
身心煩亂有不樂生之意情思慘悽此陰勝陽之極也病
甚則傳腎肝為痿厥厥者四肢如在火中者為熱厥四肢
寒冷者為寒厥寒厥則腹中有寒熱厥則腹中有熱為脾
主四肢故也若肌肉濡潰痺而不仁傳為肉痿證證中皆
有肺疾用藥之人當以此調之氣上衝胸皆厥證也痿者
四肢痿軟而無力也其心煩寃不止心神瘵亂厥者氣逆
也甚則大逆故曰厥逆其厥痿多相須也於前已立黃芪

人參五味子麥門冬湯中每加白茯苓二分澤瀉四分猪苓白

朮各一分如小便快利不黃澁者只加澤瀉二分與二朮上

下分消其濕如行步不正脚膝痿弱兩足欹側已中痿

邪者加酒洗黃柏知母三分或五分令二足湧出氣力

如汗大泄者津脫也急止之加五味子六分炒黃柏五分炒知

母三分不令妨其食當以意斟酌若妨食則止候食進再服

取三里氣街以三稜針出血若汗不減不止者於三里穴

下三寸上廉穴出血禁酒濕麪夫痿者濕熱乘於腎肝

也當急去之不然則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不

能動心煩寃而不止也若身重減氣不短小便如常及濕

熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子澤瀉猪苓

茯苓黃柏知母蒼朮白朮之藥只依本病中證候加減常

服藥亦須用酒黃柏二分或一分六七月之間濕令大行于

能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故用寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動矣步行不正兩足欹側以清燥湯主之

黃芪錢半 黃連去鬚一錢 蒼朮一錢 白朮一錢

陳皮五分 五味子九粒 人參 白茯苓

升麻各三分 當歸一錢二分 澤瀉五分 柴胡

麥門冬 生地 神麴炒 猪苓

黃柏酒製 甘草各二分

右剉如麻豆大每服半兩水二盞煎至一盞去渣稍熱空心服

宋其勞傷發熱當作注夏治之

黃柏炒 升麻各三分 黃芪 人參

木通 白芍藥各五分 白朮半錢 陳皮

甘草各二分

婦人患注夏手足痿軟而熱

白朮一錢 黃柏炒 白芍藥 陳皮

當歸一錢 蒼朮五分 甘草生 薑片二

解休即痿類

解休之證懈倦困弱似痿故附痿後

冬脈太過為病在外則令人解休脊脈痛而少氣不欲言

全文見治虛實法王註云寒不寒熱不熱弱不弱壯不壯解不可名謂之解休也

素尺脈緩澹謂之解休平人氣象論云王註云尺為陰部腹腎主之緩為熱中澹為無血故

解名謂之解休也

尺內弱者解休安臥脫肉者寒熱不治全文見診生死

刺骨無傷髓髓傷則消爍肝痿體解休然不去矣全文見禁刺

賢病 診

針灸

足少陽之瘧令人身體解休寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽全文瘧

舌 舌腫痛 舌強舌卷 舌縱涎下多

唾 自嚙舌 舌胎 舌黑二條見傷寒

心脾

舌屬心脾二臟經云心主熱又云在臟為心在竅為舌又云心氣通於舌心和則舌能知五味是舌屬心也又曰中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌本屬脾也

舌腫痛

表

無金沸草湯治風寒傷於心脾令人增寒熱齒浮舌腫痛

荆芥穗兩四 旋覆花 前胡 麻黃去節各三兩

赤芍藥 半夏各一兩

右剉散每五錢水一盞半薑七片棗二枚煎七分去查

嗽口吐一半喫一半世醫用此發散傷寒傷風及加杏仁五味子治咳嗽皆效獨未知用之舌腫牙疼辛未年有人患舌腫滿塞粥藥不入其勢危甚大煎此一劑乘熱以紙籠氣薰之遂愈

濕痰

世烏犀膏治重舌木舌方見咽喉痛

熱

本治心脾壅熱木舌腫脹

玄參 升麻 大黃 犀角各三分

甘草兩半

右為細末每服三錢水一盞煎至五分溫服不拘時

世舌腫脹出口鵬砂細末切生薑薑藥楷舌腫處即退

又云革麻取油蘸紙撚燒烟熏之愈又治牛舌出亦好

反治

丹重舌用好膽礬研細傳之

無黑散子治舌忽然腫破用釜底煤研細以醋調傳舌上

下腕去更傳能先决出血竟傳之尤佳一法用塩等分調

山 舌腫亂髮燒灰水調下

丹 飛絲入口喉舌間生泡紫蘇嚼白湯下立效

針灸舌痛獨取脾脈經云脾足太陰之脈所生病者舌本痛視盛虛熱寒陷下取之也

摘 治舌下腫難言口瘡舌縱涎出及舌根急縮 廉泉三分

得氣即瀉
灸三壯

集 治舌腫 廉泉三分 金津 玉液各用三稜
針出血 天突

少商

東 又法 廉泉 然谷 風府 天突 關元

垣 廉泉一穴一名舌本在頷下結喉上治舌下腫難言舌

縱涎出口禁舌根急縮下食難刺瘡論云舌下兩脈者廉

泉也刺禁論云刺舌下脈太過血不止為瘡刺節直邪論

云取廉泉穴血變而止以明宜出血禁用針或問取廉泉

穴二說不同一說取頷下結喉上一說取舌下兩脈何者

為當答曰舌本者乃舌根蒂也若取舌下兩脈是取舌稍

也舌標也此法誤也當取頷下者為當此舌根也况足陽

明之脈根於厲兌結於廉泉頷下乃足陽明之所行也若

取舌下兩脈非足陽明經也戊與癸合廉泉足少陰也治

涎下解云胃中熱上溢廉泉開故涎下當出血瀉胃中熱

又知非舌下兩脈也頷下結喉上者為准矣脹論曰廉泉

玉英者津液之道路也 按針經云少陽結於廉泉今日陽明者悞也

子 和南隣朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起

和舌尖亦腫腫至滿口比元舌大三倍一外科以燔針刺

其舌兩旁下廉泉穴病勢轉凶將至顛載戴人曰血實者

宜決之以銚針磨令鋒極尖輕砭之日砭八九次出血約一二盞如此者三次漸覺血少痛減腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又諸痛痒瘡瘍皆屬心火燔針艾火皆失此義也

無凡舌腫下必有噤重狀如蜈蚣臥蚕有頭尾小白可燒鐵烙烙頭上即消

舌強舌卷

無礬石散治風濕寒舌強不能語

枯礬

桂心各等分

右為末每服一錢安舌下

針灸
針灸舌卷獨取手少陽絡與筋經云邪客手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一瘡又云手陽明之筋其病支

診

痛轉筋舌卷治在燔針劫刺以知為數以痛為輸是也

診舌卷若唇青卵縮者必死經云厥陰絡者甚則舌卷卵

上縮經又云肝者筋之合也肝脈弗榮則筋急筋急則引

舌與卵故唇青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死也

舌縱涎下多唾

寒熱

蕭治口角流涎不止口目喎邪手足痿軟方如左流涎者自然流也

神龜滋陰丸治足痿

龜板灸四兩

知母酒炒二兩

瑣陽酒洗一兩

黃栢炒赤二兩

枸杞子

五味子各一兩

乾薑炮半兩

右為末清水丸如桐子大每服七十九丸空心鹽湯下

通天愈風湯

人參錢

葳靈仙去蘆半錢

南星湯泡

貝母去心各錢

連翹

防風去蘆各五分

瓜蒌仁十五粒

白朮一錢

桔梗三錢

甘草

荆芥穗各五分

生薑三片

右水一鍾半煎七分去查入荆瀝一呷薑汁些少半飢時服吞下清心導痰丸五十粒日一服

清心導痰丸

白附一兩

南星姜製二兩

半夏姜製二兩

黃連炒七錢半

天花粉一兩

白僵蚕炒去絲半兩

川烏鹽製二錢

鬱金七錢

天麻

羌活各半兩

右為末薑汁糊為丸如桐子大每服五十九丸用通天愈風湯吞下

清心牛黃丸

膽星一兩

牛黃二錢

黃連一兩

婦身

甘草

辰砂各半兩

右為末湯浸蒸餅為丸菴荳大每服五十九臨臥時唾

津嚥下

涎多自然流出者為熱

嘗治宣文炳口流涎不止喜笑舌瘖脈洪大用連芩栝梔白朮蒼朮半夏竹瀝薑汁服之五日涎止笑息

唾多用加吐者為寒

云大病瘥出喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜理中丸東垣云多唾或唾白沫者胃口上停寒也藥

中加益智仁此多唾者用

針灸 舌縱涎下煩悶取足少陰寒熱 黃帝曰人之涎下者

何氣使然岐伯曰飲食者皆入於胃胃中有熱則虫動虫

動則胃緩胃緩則廉泉開廉泉開故涎下補足少陰口問

針灸 舌縱涎下煩悶陰谷主之

自嚙舌

針灸

靈黃帝曰人之自嚙舌者何氣使然岐伯曰此厥逆走上

脈氣皆至也少陰氣至則齧舌少陽氣至則齧頰陽明氣至則齧唇矣視主病者則補之

汗 自汗 頭汗 手足汗 無汗

盜汗

陰陽截府

素陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘則無汗而寒脈要精微論飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾別論

自汗

不任外寒為陽虛

素陽之汗以天地之雨名之全文見五藏陽加于陰謂之汗陰陽別論陽氣入內加于陰氣也凡傷寒始病脈浮至汗出則沉入內加于陰也

垣表虛自汗秋冬用桂枝春夏用黃芪能治虛勞自汗証

有寒者亦用桂枝無寒者用黃芪

無牡礪散治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗

許學士方亦治盜汗不止

黃芪

麻黃根

牡礪煨研

右剉散每服三錢水一盞半小麥一百粒煎至八分不

拘時服

垣周衛湯治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任外寒

黃芪

麻黃根各一錢

生甘草五分

猪苓

羌活各七分

麥門冬三分

婦稍五分

生地三分

生黃芩五分

五味子七粒

蘇木

紅花各一分

半夏湯洗七分

次五分

右咬咀如麻荳大作一服水一盞煎至一盞去渣稍熱服中風症必自汗汗多不得重發汗故禁麻黃而用根節也

心胸躁
熱者瀉
陰火

張芸夫已酉四月天寒陰雨寒濕相雜因官事飲食失節
勞役所傷病解之後汗出不止沾濡數日惡寒重添厚衣
心胸悶躁時躁熱頭目昏憤壅塞食少減此乃胃外陰火
熾甚與夫雨之濕氣挾熱兩氣相合令濕熱大作汗出不
休兼見風邪以助東方甲乙以風藥去其濕以甘藥瀉其
熱羌活勝濕湯主之

甘草錢三

黃芪分七

生甘草分五

生黃芪分三

防風分三

酒黃芪分三

人參

三錢以助氣益胃
已上藥瀉胸中熱

藁本分三

獨活分二

升麻分五

川芎分三

柴胡

五分已上風
藥勝其濕

細辛

蔓荊子各三
分

薄荷

一分已上
清利頭目

右作一服水二盞煎一盞半後入細辛等四味再熬至
一盞去查熱服一服而止諸症悉去

陽虛甚
者用芪
附

丹 人參黃芪少佐桂枝湯甚者附子亦可用

嚴 芪附湯治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪

去蘆
蜜炙 附子

右咬咀每服四錢水一盞薑十片煎八分食前溫服

通治虛

本 補精氣止肝邪平補五臟虛羸六腑怯弱充肌膚進飲
食人參丸

人參

山藥

白朮

白茯苓

石斛

黃芪

五味子

右為細末蜜丸如桐子大每服三十九空心食前飲下

久服不熱尤宜少年

尺脈虛
滑為陰
虛

平人氣象論云尺瀉脈滑謂之多汗王註謂尺膚瀉而尺
脈滑也膚瀉者榮血內涸又針經云腠理發泄汗出溱溱
是謂津脫津脫者腠理開汗大泄按此二經論自汗多而

血涸津脫者其治法乃東垣正陽湯用炒黃柏知母及當
歸六黃湯之類是也汗以臟腑言之皆屬心經云心為汗
難云腎邪入心為汗出不可止者是也

濕勝自汗

垣或問濕之與汗陰乎陽乎予應之曰西南坤土也在人
則為脾胃陽之汗以天地之雨名之濕主淋漓驟注者濕
勝也陰滋其濕為露為雨此陰寒隔熱火也隔者解也陰
濕寒下行地之氣也仲景云汗多則亡陽陽去則陰勝也
重虛則表陽虛極矣甚為寒中濕勝則音聲如從甕中出
若中水也相家有言土音如居深甕裏言其壅也遠也不
出也其為濕也審矣又知此二者亦為陰寒內經云氣虛
則外寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒知始為熱中者表
虛無陽不任外寒終傳為寒中者多成痺寒矣夫色以候
天脈以候地形者乃候地之陰陽也故以脈氣候之皆有

形之可見者也

痰火自汗

丹痰症亦有汗 火氣上蒸胃中之濕亦能作汗可用涼
膈散

汗出惡風為中風

素帝曰有病身熱解惰汗出如浴惡風少氣此為何病岐
伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉朮各十分
麩術五分合以三指撮為後飯病能篇麩術一名
薇術俗名吳風草

白朮散治飲酒中風汗多不可單衣食則汗出如洗久
不治必為消渴症

牡蠣二錢 白朮二兩 防風二兩

右為末每服一錢溫水調下不計時如惡風倍防風白
朮如多汗面腫倍牡蠣

酒風一名漏風經云飲酒中風則為漏風漏風之狀或多

雜方

汗常不可单衣食則汗出甚則身喘息惡風衣裳濡口乾善渴不能勞事此即酒風同治也凡五臟風皆自汗惡風

經文見風門

丹周師脈弦左大於右不數身易得汗小便赤口燥此為

白木

陳皮

婦尾

青皮

各半兩

白芍藥

人參

黃芩

川芎

各三錢

木通

甘草

各五錢

分九貼煎三之一稍熱飲之煎藥下保和丸二十粒

動而汗出有虛者有熱者

恒安胃湯治因飲食汗出日久心中虛風虛邪令人半身不遂見偏風痿痺之病先除其汗慄悍之氣按而收之

黃連

五味子

烏梅

生甘草

各五分

熟甘草

三分

升麻

稍二分

右咬咀分作二服每服水二盞煎一盞去渣溫服食遠忌濕麪酒五辛大料物之類

針灸

刺灸汗出有二

其一取肺經云邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外輸背三節五椎之傍以手疾按之快然乃刺之取之缺盆中以越之者是也

其二取手足少陽經云三焦手少陽之脈所生病者汗出目銳皆痛頰痛耳後痛膽足少陰之脈所生病者汗出振寒瘧皆視盛虛熱寒陷下而施補瀉疾留灸也

診

素肺脈奠而散者當病灌汗至令不復發散也

謂汗多如灌洗之狀病能論云汗出而浴亦此義也

肺脈緩甚多為汗

全文見治虛實法

脈要精微論○灌汗

頭汗

血病

海頭汗出劑頸而還血證也額上偏多何謂也曰首者六陽之所會也故熱薰蒸而汗出也額上偏多以部分左頰屬肝右頰屬肺鼻屬中州頤屬腎額屬心三焦之火涸其腎水溝渠之餘迫而上入於心之分故發為頭汗而額上偏多者屬心之部而為血證也飲酒飲食頭汗出者亦血證也至於雜證相火迫腎水上行入於心為盜汗或自汗傳而為頭汗出者或心下痞者俱同血證例治之無問傷寒雜病酒積下之而心下痞者血證也何以然曰下之亡陰亡陰者則損脾胃而亡血氣在胸中以亡其血陷之於心之分也故心下痞世人以為血病用氣藥導之則痞病愈甚而又下之故變而為中滿彭脹非其治也如此然當作何治獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

手足汗

熱甚反佐

一男子手足汗醫用苓連栝并補劑皆不效又足汗常多後以八物半苓為君白附川烏佐使其汗即無

雜方 本治脚汗

白礬 乾葛各等分

右二味為末每半兩水三碗煎十數沸洗逐日一次纏三五日自然無汗

無汗

靈奪血者無汗奪汗者無血榮衛生篇

虛實

垣真氣已虧胃中火盛汗出不休胃中真氣已竭若陰火已衰無汗反燥乃陰中之陽陽中之陽俱衰四時無汗其形不久濕衰燥旺理之常也其形不久者秋氣主殺生氣乃竭生氣者胃之穀氣也乃春少陽生化之氣也

盛夏浴食無汗者為表實

見心痛表裏條

楊順二官子患脈濇而短重取而弱此久受濕傷血多年無汗遇勞身熱倦怠如沙病狀

蒼朮

白朮

芍藥各半

陳皮六兩

歸身二兩

甘草

紅花各半兩

分六貼薑三片煎服

謝老形實夏月無汗成久嗽病

半夏

蘇葉

二味為末入莎末枕流末仁陷末以瓜蒌穰桃仁泥半

兩為丸先服三拗湯三貼却服此丸子

詳枕流末蛻殼灰蛤粉之類作

陷末神曲也

針灸

甲汗不出曲差主之

盜汗

發熱為熱

垣當歸六黃湯治盜汗之聖藥也

當歸

生地

熟地

黃栢

黃芩

黃芪

黃連各等分

右為麤末每服二三錢水一盞半煎七分去渣溫服小

兒用半錢

正氣湯治盜汗

黃栢炒一錢

知母炒一錢半

甘草炙五分

右麤末作一服水二大盞煎一盞去渣臨臥服

丹當歸龍薈丸治盜汗

見治法門

本治盜汗外腎濕

人參

苦參

龍膽草

麻黃根各三錢

右件為末煉蜜丸如桐子大每服三十九燒麩湯下

發熱為寒

嚴氏黃芪湯治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛發厥自

汗或盜汗不止並宜服之

黃芪去蘆蜜灸兩半

白茯苓去皮

熟地酒蒸

桂枝不見火

天門冬去心

麻黃根

龍骨各一兩

五味子

小麥炒

防風去蘆

當歸酒蒸

甘草各兩半

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎七分溫服不拘時

發厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛

虛

山盜汗臨夜喫淡煮麥圓子空心服妙香散

木戢陽氣止盜汗進飲食退經絡熱栢子仁丸

栢子仁

半夏麴各二兩

牡礪甘鍋子肉火煨用醋焙七次焙乾

人參

麻黃根慢火灸拭去汗

白朮

五味子各一兩

淨麴炒半兩

右八味為末塞肉丸桐子大空心米飲下三五十九日

二服得效減一服將愈即住作散調服亦可

丹白朮湯治盜汗用白朮四兩分作四處

一兩用黃芪同炒

一兩石斛同炒

一兩牡礪同炒

一兩麴皮同炒

各味炒黃色餘藥不用只用白朮研末每服三錢用粟

米煎湯送下盡四兩為效

世治盜汗出山藥一味為末臨臥酒調下三錢效

本牡礪散治盜汗方見前自汗門

世黃芪散治盜汗

黃芪

木通

葛根

右為麤末水煎服

通積滯

衍治盜汗尤切將椒目微炒搗細末用半錢匕以生猪上

世五仙丸治盜汗

天仙子

五靈脂

右為末水糊丸桐子大三十九白湯臨臥服本草云天仙子一名

莨菪子性甘寒
有毒服者審之

本治盜汗 歲靈仙 甘草各半 水煎服

臟腑盜汗皆屬腎經云腎病者盜汗出憎風是也

運氣 盜汗皆屬寒水經云歲水太過寒氣流行甚則勞汗

出憎風又云太陽所至為寢汗症是也

雜方 **世**治盜汗桑葉為末茶服之諸藥不應者累驗出醫

世豆豉能治久盜汗患者以一升微炒令香清酒二升漬

兩三日取汁任人服之不瘥更作三兩劑即止

世牡礪煨過麻黃根等分同研極細粉治盜汗及陰汗

針灸 **世**盜汗 陰都 五里 間使

扁盜汗 中極 氣海 虛損盜汗勞熱 百勞三分瀉

肺俞四分補

成盜汗者謂睡而汗出者也不睡則不能汗出方其睡也

溱溱然出覺則止而不復出矣

卒中暴厥 五絕 暴死暴病

脈動形
靜為尸厥

卒中者卒然不省人事全如死尸但氣不絕脈動如故或

脈無倫序或乍大乍小或微細不絕而心胸煖者是也

仲尸蹙脈動而無氣氣閉不通故靜而死也 菖蒲屑內

鼻孔中吹之令人以桂屑著舌下 又方剔取左角髮方

寸燒末酒和灌之立起此即內經法也詳見後

靈邪客于手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會于耳

中上絡左角五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀

若尸或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉後

刺足心後刺足中指爪甲上各一疔後刺手大指內側去

端如韭葉後刺手心主少陰銳骨之端各一疔立已不已
以竹管吹其兩耳鬚其左角之髮方一寸燔飲以美酒一

針灸

杯不能飲者灌之立已全文見刺灸音易

玉氣昏暈 奪命在曲澤上針入三分先補候氣回後瀉不可離手忌灸如不甦取臍中

臍中灸七壯忌針此二穴能起死回生

補尸蹙 玉泉八分補十呼得氣即瀉 **隱白**三分先補後瀉補生瀉成更于兩脇頻瀉

鬼擊 支溝 二分先補後瀉 補生瀉成 三里 補十呼瀉五呼此無問其數刺之氣 至去之勿復刺 **中惡 人中 中脘 氣海**

仲少陰脈不止腎氣微少精血奔氣促迫上入胃膈宗氣

反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令人不仁此為尸蹙當刺期門巨闕 恍惚尸蹙煩痛中極及僕參

主之

甲尸蹙死不知人脈動如故隱白及大敦主之 尸蹙暴

死金門主之

氣脈不治自愈 **孫**仁宗最寵貴妃一日食次忽仆倒遍身卒冷急奏帝上

乃急召孫杜既至奏曰不妨此乃氣厥爾少頃吐即復甦也御坐良久果吐而甦上問因何而得二人並奏曰此貴妃方食因憂怨氣上遂與食相併故如此者吐即氣透故復甦也上問妃有何事如此妃對曰陛下無嗣臣妾不能為陛下生皇嗣所以自怨氣忽上逆而至驚動聖駕上歎曰朕亦自責乃勞汝致病耶因嘉獎孫杜之能良久曰醫道如此豈非良醫也耶

右暴厥不知人不治自愈經云帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人也又云血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死者是也

口張目
開手撒
遺溺為
虛

丹嘗治一人陰先虧而陽暴絕者浦江鄭兄年近六十養受用之人也仲夏久患滯下而又犯房勞忽一晚登廁間兩手踈散兩眼開而無光尿自出汗如雨喉如鋸呼吸甚微其脈大而無倫次無部位可畏之甚予適在彼急令煎人參膏且先與灸氣海穴壯如小指大至八十壯右手能動又三壯唇微動參膏亦成遂與一盞至半夜後盡三盞眼能動盡二斤方能言而索粥五斤而痢止至數十斤而安

仲救卒死而四肢不收失便者方

馬屎一升水三斗煮取二斗以洗之又取牛洞稀糞也一升溫酒灌口中灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一壯瘥

救卒死而張口反折者方

灸手足兩爪後十四壯飲以五毒諸膏散方未考

救小兒卒死而吐利不知是何病方

狗屎一九絞取汁以灌之無濕者水煮乾者取汁

救卒死客忤死還魂湯主之

目閉口
噤手拳
為妻實
宜發表

麻黃去節三兩 杏仁去皮尖七十箇 灸甘草一錢 千金有桂二兩

右三味以水八升煮取三升去渣分令咽之通治諸感忤千金方云主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已無脈口噤拘不開去齒下湯湯下口不下者分病人髮左右提掄肩引之藥下復增服一升須臾立甦

局蘇合香丸治卒中惡忤疰

蘇合香油入安息香膏內 薰陸香另研 龍腦研各一兩
青木香 白朮 白檀香 丁香
朱砂研水飛 沉香 香附炒去毛 犀角鎔屑

華撥

安息香

另為末調無灰酒一升熬膏

麝香

訶梨勒

煨取皮各二兩

右為細末入研藥勺用安息香膏并煉白蜜和劑每丸桐子大清晨新汲水溫冷任意化服四九老人小兒一丸溫酒化服亦得用蠟紙裹一九如彈子大縫袋帶之陳無擇云病自內作不曉其名者服之皆效最治氣厥氣不和吐利關格甚有神效

肘扁鵲中惡與卒死鬼擊亦相類為治皆宜相參用之已死搗菖蒲生根絞汁灌之立瘥

俛救卒死而目閉者搗韭汁灌耳中吹皂莢末鼻中效

無治魘卒死諸暴絕症用半夏不拘多少湯泡七次為末每用少許吹入鼻中心頭溫者可治倉卒無方急於人中穴及兩脚大拇指離甲一韭葉許各灸三五壯即活

和一夫病痰厥不知人牙關緊急諸藥不能下候死而已戴人見之問侍病者口中曾有涎否曰有戴人先以防風藜蘆煎湯調瓜蒂末灌之口中不能下乃取長蛤甲磨去刃以紙裹其尖灌於右鼻竅中咽然下咽有聲復灌其左竅亦然戴人曰可治矣良久涎不出遂以砒石一錢又投之鼻中忽偃然仰面似覺有痛斯須吐穢及膠涎數升頓甦砒亦尋常勿用以其病大非此莫能動然無瓜蒂亦不可使用宜消息之

凡卒中口厥鬱胃中風中暑之類皆當發表也仲景云鬱胃欲解必是大汗出還菟湯用麻黃桂枝清菟湯用荊芥及諸卒中用皂角半夏搐鼻取嚏用藜蘆砒霜折齒取痰皆所以開發上焦使表邪流通也中暑忌冷水閉表亦此意

本解毒雄黃丸治卒中仆地不知人事方見

仲三物備急丸

氣急口
噤腹脹
滿痛為
實宜吐
下

大黃

乾薑

巴荳

各一兩去皮尖
心外殼研如脂

右藥各須精新先搗大黃乾薑為末研巴荳肉中合搗
千杵蜜和丸器中貯之 主心腹諸卒暴百病若中惡
客忤心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤停尸卒死者以
熱苦酒服大荳許三四丸或不下捧頭起灌令下咽須
臆當瘥如未瘥更與三九當腹中鳴即吐下便瘥若口
噤亦須折齒灌之

中暑

無中暑悶倒急扶在陰涼處切不可與冷水當以布巾衣
物等蘸熱湯慰臍中及氣海續以湯淋布上令徹臍腹煖
即漸醒如倉卒無湯處掬道上熱土於臍以多為佳冷即
易之古法道塗無湯即掬熱土於臍上仍撥開作窩子令

人更溺於中以代湯續與白虎竹葉石膏湯 凡覺中暑

急嚼生薑一大塊冷水送下如已迷亂悶嚼大蒜一大瓣

冷水送下如不能嚼即用水研灌之醒路中倉卒無水渴

甚急嚼生蔥二寸許津同嚥可抵飲水二升 中暑之病即
內經熱至則

是也

大黃龍丸治中暑眩暈昏不知人或身熱惡寒頭痛狀如
傷寒或往來寒熱渴甚嘔吐泄瀉常服去暑毒分陰陽

硫黃

硝石 各一兩

雄黃 透明者

白礬

滑石 各半兩

寒食麩 各四兩

右為末滴水丸如桐子大每服五丸至七丸加至二十

丸新汲水下昏塞不知人則以井水開口灌之中暑忌

冷此藥以冷水下之乃熱因寒用

本又方解一切暑毒欲死者便服之立甦

半夏四兩醋一升

甘草兩

肉桂

赤茯苓各半 白茯苓兩

右為末用生薑汁麩糊丸如桐子大每服五十九熱水下予夏日登途常畜此藥於篋笥中防諸緩急及僕仆門每日一服無伏暑之疾奇驗不一

山中暑發昏以新汲水滴兩乳以扇搦之重者以地漿灌之則醒若與水飲則死

仲諸乘寒者則為厥鬱員不仁以胃無穀氣脾不通口急不能言戰而慄也

無附子理中湯治五臟中寒口噤四肢強直失音不語昔有武士守邊大雪出帳外忽然暈倒時灌以此藥兩劑遂醒

大附子炮去皮臍 人參

乾薑炮

甘草灸

白朮各等分

右劉為散每服四大錢水一盞半煎七分去渣空心服口噤則幹開灌之

乾薑附子湯治中寒卒然暈倒或吐逆涎沫如暗風手脚攣搐口噤四肢厥冷或復躁熱方見傷寒

世治凍死法四肢直口噤只有微氣者用大釜炒灰令煖以囊熨心上冷即易之目開氣出然後以粥清稍稍進之若不先溫其心便將火灸則冷氣與火爭必死矣

恒瘡瘍鬱冒俗呼昏迷慎不可下汗之則愈此因出膿血至多而鬱冒

血厥也

仲鬱冒欲解必大汗出

本人平居無疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口啞不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移時方

寤此由汗過多血少氣併于血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱胃亦名血厥婦人多有之宜白薇湯倉公散

白薇湯

白薇

當歸各一兩

人參兩

甘草一分

右籠末每服五錢水二盞煎一盞去渣溫服

倉公散

藜蘆

瓜蒂

雄黃

礬石煨

右等分為細末少許吹入鼻中

脈問曰婦人病經水適下而發其汗則鬱胃不知人何也師曰經水下故為裏虛而發其汗則表亦虛此為表裏俱虛故令鬱胃也

婦人半產誤用寒涼藥有損論治法○婦人分娩及半

產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡此有形血去之後則心神無所養心與包絡者君火相火也得血則安亡血則危火上熾故令人昏冒火乘肺瞑目不省人事是陰血暴亡不能鎮撫也故血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷反為不足虛勞之病昏迷不省者上焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之倖免不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內經有云病氣不足宜補不宜瀉瞑目合眼之病悉屬於陰宜汗不宜下又不知傷寒鬱胃得汗則愈是禁用寒涼藥也分娩半產本氣不病是暴去有形之血亡血補血又何疑焉補血則神昌常時血下降亡今當補而升舉之心得血則能

養神不昏矣血暴降下是秋冬之令大旺今舉而升之以助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足以全生活血湯主之

全生活血湯 諸陽既陷何以知之血下脫故也

紅花

蔓荊子

細辛各五分

生地夏月倍加

熟地各一錢

藁本

川芎各一錢五分

防風

羌活

獨活

甘草炙

柴胡

葛根

歸身各二錢

白芍藥

升麻各三錢

右咬咀每服五錢水煎去查食前稍熱服

當歸附子湯 治臍下冷痛赤白帶下

當歸二分

炒塩三分

蠍稍

升麻各五分

甘草

柴胡各七分

黃栢許少

附子一錢

乾薑

良薑各一錢

右咬咀每服半兩水煎去查稍熱服或為細末酒麪糊

丸亦可

斗治婦人血風攻腦痛旋悶絕忽死倒地不知人事者用喝起草取其嫩心不限多少陰乾為末以常酒服一大錢不拘時候其功大效服之多達腦蓋善通頂門今蒼耳是也

大治妊娠因外感風如中風狀不知人用熟艾為末醋炒令極熱乘熱以絹帛裹熨臍下良久開省

奔豚氣上衝咽喉發作亦似死狀往來寒熱是也治見積聚

卒中仆地半身不遂者為中風治見中風

卒中仆地口吐涎沫者為癩癇治見癩癇

運氣鬱昌有二

其一屬熱經云少陰之復鬱昌不知人惡寒振慄又云少

腎肝

運氣

陽所至為昏昧又云諸熱昏瘳皆屬於火治以鹹寒是也
其二屬寒經云歲火不及寒乃大行民病鬱冒蒙昧心痛
又太陽司天與太陽之復皆病善悲眩仆又陽明司天之
政四之氣寒雨降病眩仆治以甘熱是也

中惡客忤卒死者灸臍中百壯以皂角末搐鼻或研菲
汁灌耳中

雜方
催救卒死

菲根

烏梅二七箇

吳茱萸半升炒

右三味以水一斗煮之以病櫛內中三沸櫛浮者生沉
者死煮取三升去查分飲之

救卒死方

雄雞冠割取血以管吹內鼻中

豬脂如雞子大苦酒

一升煮沸灌喉中

雞肝及血塗面上以灰圍四旁立

起 大豈二七粒以雞子白并酒和盡吞之

救卒死而壯熱者方用礬石半斤以水一斗半煮消以浸

脚令沒踝

世 驚怖死者以溫酒灌之

丹 痰中後心下迷悶汪洋食少倦怠

白朮二錢半

川芎半錢

蒼朮

半夏

茯苓各一錢

薑三片

水煎服

四六嫂因食生菜青梅痰發昏冒不知人口渴脈滑今已
能言但說心下痞痛乏力

陳皮

白朮各錢

蒼朮半錢

滑石一錢半

木香三分

甘草炙此少

半夏七分半

水煎服

婦人三十餘歲因產後能食半月後忽頭暈仆不知人醒
後至今食少

白朮錢二

川芎

黃芩

茯苓各一錢

薑片三

右煎取三之一下保和丸三十粒

諸厥無
腹痛者
思下

本世言氣中者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰憂
愁拂意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮昏塞牙關緊
急若槩作中風候用藥非止不相當多致殺人元祐庚午
母氏親遭此禍至今飲恨母氏平時食素氣血羸弱因先
子捐館憂惱忽一日氣厥牙禁涎潮一里醫便作中風以
大通丸三粒下之天下數行一夕卒予嘗痛恨每見此症
急化蘇合香丸灌之便醒然後隨其寒熱虛實而調理之
無不愈者
經云無故而瘖脈來乍大乍小乍短乍長者為祟滑者鬼
疰緊而急者遁尸

診

脈至如喘名曰暴厥厥者不知與人言大奇論 ○脈浮而

散者為胸什王註云浮為虛散為不足○脈要精微論 ○急虛身中卒至五臟

絕閉脈道不通氣不往來譬於墮溺不可為期其脈絕不

來若人一息五六至其形肉不脫真藏雖不見猶死也玉機

真藏論

無中暑脈陽弱陰虛微遲似芤

脈問曰婦人病如癩疾鬱冒一日二十餘發師脈之反言

帶下皆如師言其脈何類何以別之師曰寸口脈濡而緊

濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛氣虛血竭凝寒陰陽不

和邪氣舍於榮衛疾起年少時經水來以合房室移時過

度精感命門開經下血虛百脈皆張中極感陽動微風激

成寒因虛舍榮衛冷積於丹田發動上衝奔在胸兩津液

掩口入涎唾涌溢出眩冒狀如厥氣衝髀裏熱麗醫名為

癩灸之因大劇○問婦人病苦氣上衝胸眩冒吐涎沫髀裏氣衝熱師脈之不名帶下其脈何類何以別之師曰寸口脈沉而微沉則胃氣伏微則榮氣絕陽伏則為疹陰絕則為亡血病當小便不利津液閉塞今反小便通微汗出沉變為寒咳逆嘔沫其肺成痿津液竭少亡血損經絡因寒為血厥手足苦痺氣從丹田起上至胸脇沉寒怫鬱於上胸中窒塞氣歷陽部面翕翕如醉形體似肥此乃浮虛醫反下之長針復重虛榮衛久發眩冒故知為血厥也

仲問曰寸口脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟即死入腑即愈此為卒厥何謂也師曰唇青身冷為入臟即死如身溫和汗自出為入腑即愈

脈人病尸厥呼之不應脈伏者死脈大反小者死 卒中惡腹大四肢滿脈大而緩者生緊大而浮者死緊細而微

者亦生

五絕

丹治五絕一自縊二摧壓三溺水四魔魅五產乳用半夏一兩末為丸葶大內鼻中愈心溫者一日可治出子母秘錄

救自縊死法

仲救自縊死自旦至暮雖已冷必可治暮至旦則難恐此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一日已上猶可治之當徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使縱緩一人以手按據胸上數摩動之一人摩捋臂脛屈伸之若已僵直但漸漸強屈之并按其腹如此一炊頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按莫置亦勿勞之須臾可少與桂湯及粥清含與之令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最善無不活者

山自縊者切不可割斷繩子以膝蓋或用手厚裹衣物緊頂穀道抱起解繩放下揉其項痕搐鼻及吹其兩耳待其氣回方可放手若便泄氣則不可救矣

肘自縊死安定心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中即活男雌女雄 又方雞尿白如枣大酒半盞和灌及鼻中尤妙 千金方以藍汁灌之餘法同上

救擗壓死法

山卒墮擗壓倒打死心頭溫者皆可救將本人如僧打坐令一人將其頭髮控放低用半夏末吹入鼻內如活却以生薑汁香油打勻灌之

救溺死法

仲救溺死方取竈中灰兩石埋之從頭至足水出七孔即活

山溺水者放大凳上睡着將脚後凳脚站起二磚却蘸塩

擦臍中待其水自流出切不可倒提出水此數等但心頭微熱者皆可救治 又方溺水死一宿者尚活搗皂角綿裹內下部須臾出水即活

救魔死法

世治鬼魔不寤中惡者皂角為末如菴葶大許吹入鼻中得嚏即氣通

山魔死不得近前喚但痛咬其脚跟及唾其面不省者移動此少臥處徐徐喚之元有燈則存無燈切不可點燈及用皂角搐兩鼻

臥忽不寤勿以火照之殺人但痛嚙大姆指甲際而唾

其面則活取韭搗汁吹鼻孔冬月用韭根取汁灌口中

集治卒魔雄黃搗末細篩以管吹入鼻孔中

暴死暴病

暴死乃真死也皆死於片餉半日或一日二日如非卒中

可再醒也

虛

靈黃帝曰其有卒然暴死暴病者何也少師答曰三虛者其死暴疾也得三實者邪不能傷人也黃帝曰願聞三虛少師曰乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所傷是為三虛故論不知三虛二反為麓帝曰願聞三實少師曰逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能危之

歲露篇

三虛相搏則為暴病卒死

全文見診歲為病

運氣

運氣暴死暴病有四

一曰虛經云六位之氣盈何如岐伯曰大少異也大者之至徐而常少者之至暴而亡是也蓋暴雖謂所至之氣然病氣皆在其中也

二曰火經曰火鬱之發甚則悶懊懣善暴死又云少陰所

至為暴死又云少陽司天之政三之氣炎暑至民病暴死又云陽明司天之政二之氣榮厲大至民善暴死又云少陽所至為暴病是也

三曰風火經云少陽司天火氣下臨風行於地其主暴速又云厥陰司天風氣下臨其發機速主所謂變化卒急其為疾病速在發機是也

四曰金經云金太過曰堅成堅成之紀其動暴折瘍疰是也此金兼火化之氣金主折火主暴也

診

靈雷公曰人不病而卒死何以知之黃帝曰火氣入於臟腑者不病而卒死矣雷公曰病小愈而卒死者何以知之

黃帝曰赤色出兩顴大如拇指者病雖小愈必卒死黑色出於庭大如拇指必不病而卒死

赤色出兩顴即脈訣所謂暴病如粧不久居者是也。五色篇。

針灸

太陽根于至陰結于命門命門者目也太陽為開開折則肉節瀆而暴病起矣故暴病者取之太陽視有餘不足瀆者皮肉宛雉而弱也

根結

醫學綱目卷之十七

醫學綱目卷之十八

心小腸部

癰疽

腫瘍

潰瘍

癰疽所兼諸症

久漏瘡

虛實

腫瘍者癰疽未見膿而腫者也潰瘍者癰疽之膿已潰出者也丹溪云腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主設欲行大黃者宜審其虛實之原瘍潰內外皆虛宜以補接為主設欲行香散者宜防其虛虛之失由是言之則癰疽之腫時與潰時不同今分腫瘍潰瘍為二門

腫瘍

癰疽方腫未見膿者也

托裡疎
通行榮
衛三法

瘡瘍者火之屬須分內外若其脉沉實當先疎其內以絕其原也其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至甚遏絕經絡故發癰腫經曰榮氣不從逆干

肉理乃生癰腫此因失托裏及失踈通又失和榮衛也治
瘡之大要須明托裏踈通行榮衛三法托裏者治其外之
內踈通治其內之外行榮衛者治其中也內之外者其脉
沉實發熱煩躁外無焮赤痛甚邪氣深于內也故先踈通
臟腑以絕其原外之內者其脉浮數焮腫在外形証外顯
恐邪氣極而內行故先托裏以防其干也內外之中者外
無焮惡之氣內亦臟腑宣通知其在經當和榮衛也用此
三法之後雖未瘥必無變証亦可使邪氣峻減而易痊也
垣瘡疽之發其受之有內外之別治之有寒溫之異受之
表裡寒溫之異外者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引
入骨髓受之內者法當踈利以寒劑反用溫劑托裏則是
骨髓之病上徹皮毛表裏通潰共為一瘡助邪為毒苦楚
百倍輕則危殆重則死矣予聞潔古云瘡瘍之生也表裏

不同或攻或發少有差舛變証隨能殺人甚于傷寒也針
灸施治各隨其宜所用之藥又當明入五臟君臣是其法
也
繫內踈黃連湯治嘔哕心逆發熱而煩脉沉而實腫硬木
脉沉實痛深者宜寒劑踈通悶而皮肉不變色根係深大病遠在內臟腑秘澁當急踈
利之

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草

連翹

二兩

右除檳榔木香為末外並剉每服一兩水一盞半煎一
盞先吃一二服次每服加大黃一錢再加二錢以利為
度如有熱証止服黃連湯大便秘澁加大黃如無熱証
止用復煎散時時呷之如此內外皆通榮衛和調則經

絡自不遏絕矣

脈浮數
痛淺者
宜溫劑
托裡

內托復煎散治腫焮於外根盤不深形証在表其脉浮痛在皮內恐邪氣盛則必侵于內急須內托以救其裡

地骨皮

黃芪

防風

芍藥

黃芩

白朮

茯苓

人參

甘草

當歸

防已

桂枝

表裡已
行宜和

當歸黃芪湯治瘡瘍臟腑已行而痛不可忍者

右咬咀先將蒼朮一斤用水五升煎至三升去蒼朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓為湯去滓再依前煎十二味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能內侵也

榮衛

當歸

黃芪

地黃

川芎

地骨皮

芍藥

右咬咀水煎服如發熱加黃芩如煩躁不能睡卧者加梔子如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

表裡
雜方

奪命丹治惡瘡癰疽發背

大黃

為末置砂器中以水掩
八十一遍飛過一兩

牡礪

生姜

沒藥

乳香

右為粗末轉作九子一錢用好酒一升木炭火熬一沸分二碗盛之夜露一宿早晨去滓空心服

治發背方蒼耳炒黃擦其刺再炒深黃不見風研細末每服五錢七好熱酒調食前臨卧服

一則用大黃牡礪一則用蒼耳知有內外之別也前用奪命丹二藥表裏不同何以然乃膏梁之變脉沉而滑

地之濕氣感則害人皮肉筋脉浮而滑所以有泄之發之之異也

瘡以發表為先

丹癰疽因積毒在臟腑非一朝夕今發于外宜以標本為治當先助氣壯胃使根本堅固而以行經活血為佐參以經絡時令使毒氣外發此症仲景解表用麻黃桂枝之意施治之早可以內消此乃內托之本意也

太陽分野藥

通父家翟梗於尻醫上足太陽經生癰堅硬腫痛大作左右尺脉俱緊按之無力

羌活

黃栢酒洗各二錢

防風

藁本

連翹

各一錢

肉桂七分

甘草炙

蒼朮

陳皮各五分

當歸一錢

黃芪半錢

右作一服酒二大盞水一大盞煎至一盞去查熱服空心以來被蓋覆其癰使藥行罷去之一服愈

丹王姑丈七十餘患項疽脉實而稍大此因憂悶而生太陽經治之

歸頭二錢

黃栢半錢

黃芪

羌活

地黃酒

黃芩炒酒

桔梗一錢

黃連酒炒

連翹

防風

甘草生

人參

陳皮

防已

澤瀉半錢

白水煎服

垣淨腋湯治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴

麻黃一錢

桂枝二錢

草薺一錢

當歸稍七分

紅花少許

羌活二錢

防風一錢

柴胡一錢

升麻半錢

連翹

桔梗五分

甘草五分

生地五分

黃芩酒一錢

蒼朮一錢

右剉如麻荳大都作一服水二大盞煎至一盞去查稍熱服

陽明分
野藥

尹老家素貧寒形志皆苦干手陽明經分出癰第四日忽
腫幼有癩疔其臂外皆腫痛先腫在陽明左右寸皆短中
得之俱弦按之洪緩有力此癰得自八風之變以脉斷之
邪氣在表然其症大小便如故飲食如常腹中和口知味
知不在裏也不惡風寒止熱躁脉不浮知不在表也表裏
既和知邪止在經脉之中凝滯為癰出身半已上風從上
受之也故與卻寒邪和經脉中氣血使無疑滯也白芷升
麻湯

白芷七分

升麻

桔梗各五分

甘草炙

黃芩生

歸稍

生地各錢

酒黃芩

黃芪

蓮翹各二錢

中桂少

紅花少

右水酒各一盞同煎至一盞臨卧熱服一服愈

此症雖曰經脉之中然得之自八風之變其藥制度皆

發表之意

婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其脉弦洪按
之細小

升麻

連翹

葛根各一錢半

肉桂三分

黃芪

歸身

甘草各一錢

黍粘子五分

黃栢二錢

右作一服水一盞酒半盞煎至一盞二服愈

脉浮緊
者宜解

羅汗之則瘡已 丁巳年委予從軍回住曹州有趙同知

舅經歷病頭面赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒

牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥一瘍醫腫上砭

刺四五百餘針腫赤不減其痛益甚不知所由然予往診

視其脉浮緊按之洪緩此寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升

聚而赤腫經云天寒地凍則水冰人氣在中皮膚緻腠理

閉汗不出血氣強內堅濇當是之時善行水者不能注水善穿地者不能鑿凍善用針者亦不能取四厥必待天溫冰釋凍解而水可行地可穿人脈亦猶是也又曰冬月閉藏水冰地拆故用藥多而少針石也宜以苦溫之劑溫經散寒則已所謂寒繳腠理以苦發之以辛散之也宜以托裏溫經湯麻黃苦溫發之者也防風辛溫散之者也升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經中之邪故以為臣血流而不行者則痛以香白芷歸身辛溫以破血散滯濕熱則腫蒼朮苦甘溫躡輕浮力雄壯能泄皮膚腠間濕熱人參甘草甘溫白芍藥酸微寒調中益氣使托其裏也故以為佐各剉如麻苳大同秤水煮餌之以薄衣覆其手以厚被覆其身且卧于暖處則經血溫腠理開寒乃散陽氣伸大汗出腫減八九再服去麻黃防風加連翹黍粘子痛

腫悉去經言汗出則瘡已信哉

托裏溫經湯治寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏榮中聚而赤腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢躡疼痛

麻黃去根節

白芷

當歸各二錢

防風去芦

葛根各三錢

升麻四錢

甘草炙

白芍藥各一錢半

人參

蒼朮各錢

右剉如麻苳大每服秤一兩水二盞先煮麻黃令沸熟去沫再下餘藥同煎至一盞去渣大溫服訖卧于暖處即以綿衣覆之得汗而散

少陽厥陰分野

恒蒲津王世祥年七十感寒濕地氣二月間得附骨癱于

左腿外側足少陽之分少侵足陽明分潤六七寸長一小尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤深以指按至骨大痛又行步作痛與藥下咽疼痛立止二日後柔軟而腫消矣

柴胡

黍粘子

各錢半

連翹

肉桂

各一錢

黃芪

當稍

各二錢

黃栢

甘草

各五分

升麻

七分

作一貼好酒一盞半煎至一盞大温空心食消盡服之少時以早膳壓之使不令大熱上攻犯上中二焦也

賈德茂男十歲四月天氣大熱于左足大腿近膝股內足厥陰肝之經少侵足太陰脾之經分出附骨疽不辨肉色漫腫皮澤木硬痛勢甚大其脉在三部細弦按之洪緩畧有力

黃芪

二錢

柴胡

一錢

羌活

五分

連翹

一錢二分

肉桂

三分

土瓜根

三分

生地

一錢

黃栢

酒洗二分

當歸尾

七錢半

右作一服酒一盞水三盞煎至一盞空心熱服一服愈

內托榮衛湯治風濕熱鬱其手足少陽致血脉凝逆使榮衛周身元氣消弱其風熱滯于下其面色必赫赤而腫微黯色風水之性上衝顏必忿色其人多怒其瘡之色亦赫赤腫硬微帶黯色其瘡之形勢亦奮然高起結硬而作痛其脉洪緩而弦宜發其汗而通其榮衛則邪氣去矣

黃芪

桂枝

各五錢

防風

羌活

黃芩

當歸

各一錢半

連翹

柴胡

各二錢

甘草

炙

人參

各一錢

蒼朮

紅花

各三錢

右咬咀只作一服水酒各一大盞同煎至一盞温服右九方皆東垣及羅謙甫丹溪隨癰疽所發分野制之也其方皆以發表為先不過一二服而愈如癰疽發在太陽經分野必用防風羌活陽明經分野必用香白芷升麻少陽經分野必用柴胡太陰經分野必用芍藥升

麻少陰經分野必用獨活厥陰經分野必用青皮柴胡皆以桂佐之身半已下者必用酒水多熟煎之空心服使藥下行身半已上者必用酒水少帶生煎之臨臥服使藥上行脈細小無力必于本經藥中加辛熱劑脈洪大有力必于本經藥中加苦寒劑隨症加減活潑潑地其効如神真良醫也

消縮毒金粉散治但疼痛不急脹

乾葛 甘草 鬱金 川芎

瓜蒌根 白芷

右等分並生爲末每一錢溫酒入蜜調下不拘時此藥大散五臟積毒凝滯日三服

疔羌活當歸湯治腦疽

黃芩酒炒 黃連酒炒 歸身酒浸 甘草灸各一兩

脈有刀者春夏宜寒涼解表

羌活 黃栢酒浸 連翹各五錢 澤瀉

獨活 藁本各三錢 防風 梔子仁各五分

右咬咀分作四服水一小椀先浸一時許入酒一匙煎至八分去渣大溫服食後日二服和渣計六服三日服盡去渣清藥調下後棋榔散

棋榔散用棋榔爲細末將羌活當歸湯調下

黃栢當歸湯治背疽

黃栢炒七錢 黃芩炒 當歸身炒 甘草灸各一兩

黃連炒 防風各五錢 澤瀉 山梔

知母 地骨皮各三錢 連翹五分

右咬咀分作四服每服水一小椀浸一時許入酒一匙煎至八分去渣調下棋榔散大溫服與前藥同

丹呂孺人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此藥

白朮 川芎三錢 赤芍藥 連翹二錢半
 陳皮 防風 黃芩二錢 木通一錢半
 甘草五分

分五貼水煎服

丹 治好酒婦人用酒煨大黃取汗法見膏梁條

精要 十宣散 人參 當歸 黃芪各二兩

脈無力者秋冬宜溫熱解表

川芎 防風 厚朴 桔梗

官桂 甘草 白芷各一兩

右為細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數服以多為妙不飲酒者用木香濃煎湯下然不若酒力之勝也許學士云此方得于都下異人濟苦者不可計數陳無擇謂此藥在第四節服者非也早服中病者必消散

羅 千金托裏散治發背疔瘡方見疔瘡

消 托毒散治癰疽初起高腫發痛不定喘息氣粗

附子一枚泡去皮尖 當歸 麻黃 甘草

官桂 川芎 羌活 石葦

龍胆草

右九味等分為末每服二錢水一大盞姜三片鹽少許

同煎

丹 一男子年五十餘形實色黑背生紅腫近胛骨下痛甚

脈數而洪緊食亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃栢生

附子括萎子甘草節羌活青皮人參黃芪半夏生薑六貼

而消此非內托之意歟

精 五香湯

木香 沉香 麝香 乳香

丁香 粉草 人參 黃芪
犀角

右每服四錢水二盞煎至一盞不拘時

五香連翹湯

乳香 甘草 木香 沉香各三分

丁香半兩 連翹 射干 升麻

黃芪 木通 桑寄生如無升麻倍之

獨活各三分 麝香一分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分溫服大便秘者加

大黃

內托散一名護心散 一日至三日之內宜連進十數服

有丹石毒者宜解毒

真菴荳粉一兩 明乳香半兩 慢火于銀石器中炒手指

右研令勻每服二錢至三錢濃煎甘草湯調下時時細

呷要藥常在胸膈間若毒衝心有嘔逆之証大宜服此

如有寒而嘔逆不宜服此當用辛熱

丹溪云內托散菴荳解丹毒又治石毒味甘入陽明胃性寒能補為君乳香去惡腫入少陰性溫善竄為佐甘草性緩解五金八石及百藥毒為使此方專為服丹石而發疽者設若不因丹石而發疽恐非必用之劑又云內托散性涼治嘔有降火之理

雜方 仲排膿湯方

甘草二兩 桔梗三兩 生姜一兩 大棗十枚

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服

本托裏排膿生犀散

皂角刺不拘多少粗大黑紫者

右置瓶中鹽泥固濟炭火燒過存性放冷出研為細末

每服一錢薄酒微溫調下暑月陳米飲下

潔保安湯治瘡托裏或已成者速潰

瓜菱新者一個去皮火焙沒藥一錢研金銀花 甘草

生姜各半兩

右為細末用好無灰酒三升于銀石器內煎至一升分作三盞三次飲盡病微者只一服如服托裏藥不能發散又作瘡者用此

精柞木飲子

毒小者輕劑內消

乾柞木葉四兩半 乾荷葉中心蒂 乾萱草根

甘草節 地榆各一兩

右細剉每服半兩水二碗煎一碗分作二服早晚各一服未成者自消潰者自乾其荷蒂去惡血萱根下水解毒利胸膈柞木有芒刺能驅逐地榆主下焦血病輕小

証候或可倚仗

精車螯散

車螯一兩般通赤本草云車螯解酒毒 生甘草 輕粉五分

右一處為細末每服四錢濃煎括萎酒調下五更服轉下惡物為度未知再用効在五香之上本草云車螯大蛤也一名蜃

又方車螯四個黃泥固濟火煨赤出火毒一宿 瓜菱一個去皮瓦上炒香

燈心三十莖 甘草節五分

右為粗末作一服酒二盞煎一盞去渣入蜜一大匙和勻每用酒八分盞車螯末二錢膩粉少許調勻空心溫服取下惡物黃涎為効

丹云車螯散一以輕粉為佐一以燈心為佐其散腫消毒下積安詳穩重輕小症候可以倚仗

治背瘡荆芥穗木鱉子仁大黃歸頭甘草節除荆芥穗為

毒深者重劑攻裡

君外餘各等分酒水各一椀煎至七分空心向東飲即下積與粥便止若結成者用川練子七枚燒灰酒下次與十四枚又次與此一枚三貼後雖結亦小之陶氏

千漏蘆湯治癰疽丹疔惡肉時行熱毒赤腫

漏蘆

連翹

黃芩

白欵

枳殼

升麻

粉草

麻黃

朴硝各兩

大黃一兩半

右除硝外每服二錢水一盞姜三片薄荷三葉同煎溫

服取利爲度

精漏蘆湯

生黃芪

連翹

沉香

漏蘆各一兩

粉草半兩

大黃一兩

右爲細末每服二錢姜棗湯調下

內消升麻湯治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻

大黃各二兩

黃芩一兩半

枳實炒

當歸

芍藥

甘草各一兩

右咬咀水煎食前

羅內消丸治瘡腫初生及癰癧結核熱毒鬱滯服之內消

薄荷葉

皂角

不蛀者水煮至軟各半斤煎膏

牽牛半斤取頭末

青皮

陳皮各一兩

沉香半兩

廣茂炮

京三稜炮各三錢

右爲末入牽牛頭末用煎膏和丸如菉荳大每服三十

丸煎連翹湯送下食後

孫真人單煮大黃湯脉實沉而數膏梁食肉之輩大腑秘者詳審用之

錦文大黃酒洗去皮

右一味剉如麻荳大水煮服

精神仙追毒丸能解一切毒如被狐狸毒鼠惡菌河鮪毒疫死牛馬肉毒蛇犬惡虫所傷又治癰疽發背及療魚臍瘡人多不識喚作癰疽致命殺人者及治諸風癰疥赤腫癩等

五倍子

槌破洗焙三兩

山茨菰

去皮淨焙一兩

麝香

二錢研入

千金子

即續隨子去壳研去油取霜一兩

山荳根

一兩

紅牙大戟

去芦洗淨焙乾一兩半

全蝎

硃砂

雄黃

各一兩

右除千金子麝香外七味為細末却入研藥另勻用糯米飲為丸分四十九每服一丸生姜薄荷汁并花水研服昔有一女子久年病瘵磨一丸服之一時吐下小虫千餘條半月即無事 丹溪云神仙追毒丸其五倍子消毒殺虫解風為君山茨菰千金子大戟皆驅逐走泄

之劑佐以麝香升散若用之固裏以發表實非所宜苟能灼見臟腑有積毒異虫深痼而牀不虛者亦是快藥 古人兵曰義兵刑曰祥刑戒勿輕于用也

瘡高而薄澤其痛在外

帝曰癰疽何以別之岐伯曰榮衛稽留于經脉之中則

血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷肌膚骨髓不為焦枯五臟不為傷故命曰癰

劉涓子云癰之痛只在皮膚之上又云癰發如火焚茅初如黍米大三兩日如掌面大五七日如碗面大即易治如腫冷發渴發逆治之難愈

疽平而大堅其痛徹心

帝曰何謂疽岐伯曰熱氣淳盛下陷肌膚筋髓枯內連五臟血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽 劉涓子云疽發或如小癰觸則徹心痛四邊微起如橘皮

孔色紅赤不全變膿水不甚出至七八日疼悶喘急不止
又云始發腫高五指忽平陷者此內攻之候也精要云生
疽處不熱不痛低陷者此為內發難治必死

疽者上之皮天以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤
此其候也癰疽篇○精要云小按乃痛者病勢淺大按乃痛者病勢深此辨癰疽之法也

劉涓子云癰疽有三等毒氣浮淺屬腑猶傷寒陽症毒氣沉深
屬臟猶傷寒陰症毒氣猛烈而行經絡或淺或深無定五臟六

癰疽發表發穴

腑皆受五毒難為調理唯宜急切猶傷寒兩感於癰發諸處不問虛實高腫起盛光澤疼痛只在皮膚之上熱急脹滿或有痒疼別無惡候初用溫藥平氣次用排膿發穴

治癰所謂平氣者乃犀角飲之類其方用犀角連翹漏蘆甘草當歸肉桂皆發表之藥也所謂發穴者乃棘針之類用皂角刺為君甘草川芎乳香為佐使亦托裏之

癰疽實內補虛

藥也然不若黎古東垣諸方發表托裏為穩當

疽發諸處不拘大小精要謂廣一尺二尺曰疽者非惟起在背廣一尺二

尺三尺皮厚而紫黑高腫不常內疼如錐刺攻擊滿悶應四肢重疼前心亦痛餘處發猶可唯虛處及近筋骨處若膿毒未潰即傷爛筋骨肉損為疽者屬五臟毒氣深沉多氣伏硬堅實而不宜緩慢治之須內實五臟外透皮膚令軟勻和即膿透宜用內托實臟氣之藥排膿勻氣乃可不比癰之毒氣浮淺也毋作一類治之

凡一切瘡腫始覺患起高腫五七日忽平陷者此是內攻之候也急以內托散及內補湯藥補填臟腑令實最怕透膜膜穿十無一生矣

癰之邪淺其稽留壅遏獨在經脈之中而專攻于外故初發時自表便發熱患處便如枕如盆高腫而痛甚者縱欲

補虛法

下陷緣正氣內固不肯受故或便秘或發渴發逆以拒之
是以骨髓終不焦枯五臟終不傷也疽之邪深其稽留雍
遏內連五臟而不專攻于外故身軀或無熱患處或不腫
痛甚者聲嘶氣脫眼黑眼小十指腫黑如墨多死也治之
之法癰之初發當以紫古法為主表者散之裏者下之火
以灸之藥以敷之膿未成者必消膿已成者速潰也疽之
初發當以涓子法為主補填臟腑令實勿令下陷之邪蔓
延外以火灸引邪透出使有穴歸着而不亂則可轉死回
生變凶為吉今世外科不分癰疽一例宜熱拔毒外以五
香耗其氣內以大黃竭其血終不能自悟其藥之非惜哉
治癰疽初覺腫結未成可以消散毒飲子

黃芪二兩

甘草多

天羅生

山藥炒

鬼腰帶葉

半兩生竹箨陰濕石岸絡石而生者好絡
卡者無用其藤柔細兩葉相對形生三角

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分入酒三盞同煎

一二沸去查溫服

精神効托裡散治癰疽發背腸癰妳癰無名腫毒焮赤疼

痛憎寒發熱不問老幼虛弱並治之

黃芪

去

忍冬藤葉

各五兩

當歸

一兩

粉草

灸八錢

右為細末每服二錢酒一盞半煎至一盞病在上食後

服在下食前服少頃再進留滓外傳

保諸瘡瘍痛色變黑紫者回毒金銀花湯

金銀花

并梗二兩

黃芪

四兩

甘草

一兩

右用酒一升重湯煮三兩時去查溫服

本黃芪散

綿黃芪

一兩

甘草

半兩

皂角刺

棟紅紫者剉炒黃一兩

右細末每服二大錢酒一盞乳香一塊煎至七分去香服

海黃芪湯與四物相和亦名托裏湯血氣齊補也
黃芪四物湯

人參 黃芪 白朮 茯苓
芍藥 甘草 生姜 當歸
地黄 川芎 多加金銀花煎服

本內固黃芪湯

綿黃芪 人參 各半

右細末入真生龍腦一錢研細生藕汁和丸如菉苳大每服三十九溫熱水下加至四十九日三服

丹五八嬾年六十歲背上瘡脉洪大數午後惡寒發熱食少

連翹 黃芪 生三錢 人參 二錢 陳皮

茯苓 五錢 砂仁 三錢 甘草 炙 白朮 一錢

分十貼煎服

右方皆以黃芪為君甘草歸參為佐乃實內補虛之中兼托裏也

精阿膠飲子

明阿膠 妙如珠 粉草 各一兩 橘紅 半兩

右咬咀分作三服再服以水一盞煎七分去渣溫服

又方牛膠飲截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻于內
牛膠 通明者四兩 用酒一碗入膠內重湯煮溶透攪勻傾

出更侵酒隨意飲能飲者以醉為度此法活人甚多
又方黃礬丸服過一兩已上無不取效最止疼痛不傷臟腑活人不可勝數

白礬

兩半

右和丸如桐子大每服十九丸漸加至五十九丸溫酒送下如未破已消已破即合一日服百粒則有效能防毒氣內攻尤能護膜始終須服半斤瘡愈後服之尤佳治蛇咬溶化白礬乘熱滴傷處痛即止一方用明礬飛過研細以鷄子二個取清調礬末稀稠如糊用無灰陳好酒放開服之膿未成者即消已成膿者從大小便出神効累驗其功大勝黃礬丸

國老膏治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其効不可具述

甘草大者二斤槌碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之每服一二匙無灰酒或白湯亦可曾服燥藥丹劑者

亦解之

本事方每甘草一斤分作三服溫酒調下今云一二匙恐力少也

遠志酒治一切癰疽發背癰毒惡候浸有死血陰毒在中則不痛傳之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傳之即不痛或蘊熱在內熱逼人手不可近傳之必清涼或氣虛血冷潰而不斂若七情內鬱治之必愈

遠志不以多少泔浸槌去心為末酒一盞調末三錢澄清飲之以滓傳于患處

忍冬酒初發便當服此或貧乏之中或居鄉僻田夫野老百發百中

忍冬藤

生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和得所塗傳四圍中心留一口又取五兩用木

槌碎不

甘草一兩生剉

右二味入砂瓶內用水二碗文武火煎至一碗入好酒一大碗煎十數沸去渣分為三服一日連夜進盡病勢

重一日夜可二劑

忍冬藤補血如氣虛及寒多人不宜用是故田夫野老百發百中也

丹阿膠飲牛膠飲黃礬丸以牛皮屬金屬上補肺氣實大腸壯胃止泄黃礬丸以蠟味其淡入大腸有補難化國老膏以甘草化毒行經遠志酒忍冬酒皆有補性歸心歸血用之頗切善用者以之配入治腫瘍之散結潰瘍之補虛亦奏捷功

右丹溪實內補虛法皆以參朮歸芪又甚者獨參膏其法並見後分經條及散見潰瘍門虛實寒熱條真轉死回生之捷法也

禁忌

癰疽當分經絡論 六陰經六陽經分布周身有多氣少血者有多血少氣者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處近虛處怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞也何則諸經惟少陽厥陰經之生癰疽理宜預防以其多

氣少血也其血本少肌肉難長瘡久未合必成危証又云少陽經多氣少血與厥陰經同少陽有相火尤甚於厥陰經者其有不思本經少血遽用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵矣請述一二成敗之迹以告來者予族叔父平生多慮質弱神勞年近五十忽右膊外側廉上生結核身微寒熱而易怒食味頗厚脉之俱浮大弦數而重似瀆予曰此多慮而憂傷血時在初秋勿輕視之宜急補以防變証以人參一斤作膏下以竹瀝病者吝費招一外科以十宣五香散相間與服旬日後一日大風拔木病者發熱神思不佳急召予視之核稍高大似有膿于中起一紅線延過肩後斜走透背脊過入右脇下不痛覺脊背重而急迫食有嘔意脈同前但弦多耳急作人參膏入芎朮生姜汁飲之用人參三斤瘡潰膿乾又與四物湯加參朮陳皮

甘草半夏生姜百餘貼而安此等若在春令雖神仙不治

也幸而在秋金之令不幸因時下暴風激起木中相火而

致此自非參膏驟補何由得免此正涓子所謂補填臟腑

紅腫一人脇下生紅腫皆由庸醫誤下之而死詳見後條或曰太陰經非多血少氣

者乎何醫疽之生初無甚苦往往間有不救者吾子其能

治之乎予曰醫居小腹之後而又在其下此陰中之陰也

其道遠其位僻雖曰多血氣運不到氣既不到血亦罕來

中年已後不可生癰纒有痛腫叅之脉証但見虛弱便與

滋補血氣無虧可保終吉若用尋常驅熱拔毒舒氣之藥

虛虛之禍如指諸掌可不慎歟

邪風外入者多屬寒帝曰諸癰腫筋攣骨痛此皆安生岐伯曰此寒氣之腫

八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以其勝

治之愈也脈要精微論

靈血脈榮衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客之則

血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫寒

氣化為熱熱勝則腐肉腐肉則為膿膿不瀉則爛筋筋爛

則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋

骨肌肉不相榮經脉敗漏熏于五臟臟傷故死矣癰疽篇

生氣通天論云勞汗當風寒薄為皴皴乃瘞又云陽氣者

開闔不得寒氣從之乃生大倮榮氣不從逆於肉理乃生

癰腫是亦寒邪從勞汗之隙及陽氣開闔不得其理之隙

又客之為癰腫也觀此數論則知癰疽之發皆得之於寒

邪所客也獨運氣瘡瘍一歲老幼相似之病間有熱者不

可不知詳見運氣條

右經數節皆論癰疽乃因寒邪客之而發也治法則精要十宣散五香湯紫古蒼朮復煎散等發表之劑是也

丹朱郎年四十餘惡寒發熱右腿內廉厥陰分生一腫毒此是冷折熱在肺經血分與此方

瓜蒌子 黃藥子 赤芍藥 當歸頭

條芩三錢 青皮 皂角刺 桂枝二錢

甘草節生一錢

右分四貼煎取一盞入忍冬藤汁二蛤殼食前煎飲以忍冬藤查傳腫上

消安神散治諸色瘡腫調氣順榮衛

人參 茯苓 甘草炙 枳殼去穢炒

附子炮去皮炙 白姜 山藥 陳皮

右等分爲末每服一錢水一盞生姜三片大棗一個煎至七分通口服

膏內
高月
低者多

消膏梁之變亦是滋味過度榮氣不從逆于肉理乃生癰

屬熱

腫榮氣者胃氣也飲食入于胃中先輸於脾而朝於肺肺朝百脈次及皮毛先行陽道下歸五臟六腑而氣口成寸矣今富貴之人不知其節法酒肥羊雜以厚味積火太過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走于空竅而先行陽道今反行陰道則濕氣大勝子令母實火乃大旺熱濕既盛必來尅腎若不慎房事損其真水則水乏而濕熱之化上行其瘡必出背上及腦此爲大疔之最重者若毒氣出肺或脾胃之部分毒之次也若出于他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故經言膏梁之變足生大疔受如持虛者如持虛器以受物則無不受矣治大疔之法必當瀉其榮氣以標本言之先受病爲本非苦寒之劑爲主爲君不能除其苦楚疼痛也諸瘡瘍有痛往往多以乳香沒藥雜以芳香之藥止之必無少減之理此其悞也若使經

絡流通臟腑中去其雍滯必無痛矣痛則以苦寒之劑除之無不愈者瘡瘍食肉與自殺無異法當瀉氣而反補之故也

元好問飲酒太過脈候沉數九月間腦下項上出小瘡不痛不痒如白頭瘡凡四日後腦項麻木腫勢外散熱毒熾發又二日痛大作夜不得寐醫處以五香連翹湯後再邀東垣診視云膏梁之變不當投五香連翹湯已無及矣且疽已八日當先以火攻之然後用藥以火艾炷如兩核許者攻之百壯始覺痛次為處方云是足太陽膀胱之經其病逆當反治脉中得弦緊按之洪大而數又且有力必當伏其所主而先其所因其始則同其終則異必先歲氣無伐天和以時令言之可收不可汗經與病俱禁下法當結者散之醎以栗之然寒受邪而禁醎遂制黃連消毒飲治

之

黃連五分

黃芩五分

黃柏五分

人參五分

知母

四分酒炒此以苦寒引用通經為君

羌活

一錢此以大辛解

防風

五分

連翹

一錢此以結為臣

黃芪

一錢三分此以甘溫配諸苦寒者

當歸身

一錢酒洗生地一錢酒洗此以辛

陳皮

五分補胃氣

甘草

稍瀉腎火之邪補下

焦元

澤瀉七分滲淡導酒

防已

五分酒

熱留

歸稍五分

蘇木

五分去

下沉為舟

楫之用

桔梗

一錢使

所用之藥用酒洗併入酒煎者用酒熱為因為使

右俱作一服水三盞煎至半乾去查入酒少許再煎食

後溫服投劑之後大暍日出乃寤瘡腫減七分精神旺

飲啖漸進灸瘰漸膿出而痊服藥後不得飲水必再作
膿効遲初患三日者服之立効凡瘡皆陰中之陽陽中
之陰二証而已東垣治疽陽藥七分陰藥三分名曰昇
陽益胃散老人宜之亦名復煎散或加沒藥乳香各一
錢

右東垣論膏梁肉食之變治宜苦寒不宜芳香者如鮮
裏條撮要內消升麻湯孫真人單煮大黃湯皆為富貴
食肉之輩設也

丹嘗治一婦人年將七十形實性急而好酒腦生疽十五
日脈弦緊急且濇予急用大黃酒煨細切酒拌炒為末又
酒拌炒人參入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而上半
身汗睡覺病已此亦內托之意也

仲排膿散方

枳實

十六枚

芍藥

六分

桔梗

二分

右三味杵為散取鷄子黃一枚以藥散與鷄子黃相等
揉和煎如薄粥溫服一升即瘥

丹朱紹八官右腳腫生附骨癰吃草藥酒多生隔痰熱壅
無力

人參

黃連

茯苓

一錢

瓜蒌子

四十八粒

分二貼入竹瀝熱飲

保諸瘡腫已破未破焮腫者當歸散主之

川芎

黃芪

括萎

木香

黃連

各等分

右為粗末水煎一兩服如痛而大便秘加大黃三錢

外冷內
疼者宜
貼藥敷
熱亦不覺者須用熱物前後熨令透隨手便用緊急潰膿

治凡癰疽外冷內疼者由陰氣外逼皮膚用熱物熨之大

毒藥使膿外出盡腫平即用生肉煖瘡和正氣藥令進飲食不倦

治癰疽發背初腫時方

風化石灰二兩細辛一兩

右為粗末用熱醋傅患處乾再傅三上其腫即消

四虎散治發背初生筋脉緊急不舒

附子生去皮一兩天南星泡半夏湯洗七次狼毒各半兩

右四味為末熱酒調成膏攤上腫處以熟絹壓定覺患

處如火燒不妨

外熱內
瘡者宜
涼藥敷

凡癰疽外熱內疼者是有客邪內有積毒欲作膿透之候

治背瘡初發時小後五七日赤腫高即罨藥令內毒散滅

疼免牽引乳香膏
乳香一兩青薄荷葉四兩
洗乾

右研勻厚罨患處以青絹蓋之如乾以新汲水潤之常令濕其熱毒自然消散如熱毒攻結可用氣毒攻結不可用

貼癰毒令內消金黃散

白芷 白芨 白欵

右等分為細末用新汲水調傅

治陽症腫毒并金瘡

大粉草剉細用竹一段刮去青兩頭留節開一小竅入草在內滿後却用油灰塞竅從冬至日放糞缸內待立春日先一日取起豎在有風無日陰處二十一

日驗兩竅好却破竹取草為細末用水調傅

世圍藥 南星 草烏 黃栢

白芨各二兩 五倍子炒一兩

右為末調如糊隨血圍匝如墻壁可移險處於不險處如神

傳藥白欵

白芷

南星

白芨

貝母各等分

右為末水調傅外用圍藥束定內用傳藥提起制之有理

藥性論甘蕉根搗傅一切癰腫上乾即更傅無不瘥者

梅治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消

方搗芋根傅之數易効

濟諸瘡腫痛不可忍者以葵花根去黑皮搗爛若稠點并

花若付之若不稠不須用水以紙攤如膏藥貼之立効經

世又方芙蓉葉搗爛卷之立効晒乾為末水調傅亦妙

發背蝸牛百箇活者置淨瓶內新汲水一盞浸瓶中封閉

自晚至曉其水如涎取水將真蛤粉不拘多少調之刷瘡

上效

丹治背癰與癩久年烟壁土黃栢等分細末生姜汁捏成

膏傅之夏以茅香湯下一二錢妙經

本治癰疽止痛拔毒七寶散乾荷葉心當中如錢片不計

多少為粗末每用三匙水二盞慢火煎至一碗半放溫淋

洗乾以太白膏傅之

太白膏寒水石飛用臘月猪脂調成膏隨瘡大小用薄紙

攤貼之

寒熱通
用敷貼

欵瘡內消方黃明膠二兩水半升鎔消了入黃丹一兩再

煮三五沸又放溫冷以鷄毛掃在瘡口上如未成即全腫處自消

外凡癰不問已潰未潰者以膠一片水浸令軟隨腫大小貼當頭上開一孔若已潰合膿者當被膠急發之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

海治發背秘法李北海云此方神受極奇秘以甘草三大兩生搗別篩末大麥麩九兩於一盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水搜和如餅劑方員大于瘡一分熱傅腫上以油紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便內消

丹隔皮取膿法治諸般腫毒

驢蹄細切一兩 蕎麥麩一兩

白鹽半兩

草烏四錢 去皮

右為末水調作餅子煖火炙黃出火毒研米醋調成膏用白帛攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退

保治瘡瘍焮腫木硬針頭散

右以蟾酥乳香各一錢同研勻細以兒乳汁和如泥入磁石盒收之乾不妨每用以唾調撥少許於腫處上以膏藥貼之毒氣自消雖然有瘡亦輕

濟萬應針頭丸治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈

麝香二錢

血竭三錢如蠟者用散者不用非真

輕粉三錢

蟾酥三錢舌

硃砂三錢

片腦一錢

蜈蚣一對全用

右為極細末煉蜜和丸為劑如瘡有頭者用針頭挑破微有血出將藥一黍米大放挑開瘡內上用帛花周圍唾津濕貼瘡上不過時刻即愈如兩腋見無頭瘡即是暗疔即將兩手虎口內白土紋用針挑破如前法用藥封蓋忌鷄鶩酒濕麵一切發熱之物

子和一省椽背項常有瘰癧愈而復生戴人曰太陽血有

積熱

餘也先令涌泄之次於委中排針出紫血病更不復作也
予男衮常喜熱火烘灼其背及兩足又食自死肉久而兩
足常生癰毒愈而復生者半年餘予以清涼飲子下之得
紫黑血積於便中去者月餘其癰毒頓除是知積熱毒致
癰腫者如此

沉寒

李世英患疽數日後根脚開大或腹疼泄瀉手足常冷脈
沉微細或自汗出急用姜附之藥甚者於臍下關元着艾
三五百壯待手足溫泄瀉止飲食知味方可為喜

鬱氣

精憤鬱不遂志欲之人多犯此疾

無癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣宿于
經絡與血俱滯而不行壅結為癰疽不言熱之所作而後
成癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也

遠志酒治七情內鬱成癰疽

方見虛
實條

獨勝散治癰疽皆緣血滯氣凝而致者

香附子

去毛令淨以生姜汁
淹一宿焙乾研極細

右無時以白湯調二錢服之又云疽疾多因怒氣得之
若有此疾必多怒但服香附進食寬氣自有効

丹獨勝散治氣鬱血滯而諸瘡愈後常服半年尤妙此皆
施于昧實氣鬱之人予見吳允厚味氣鬱而形實性重年
近六十患背疽醫與他藥皆不行惟香附末飲之甚快始
終只此一味腫潰恃此以安然此等體實而又病實乃瘡
千百而一見者也每思香附經不言有補惟不老湯一方
乃言於老人有益用片子姜黃香附子甘草三味而以不
老為名且引錢菴先生與劉君為証夫豈無其故哉蓋于
行氣中有補之之理耳天之所以為天者健而有常也因
其不息所以生生無窮正如菴蔚子活血行氣有補陰之

妙故名益母胎前產後所恃者氣血耳胎前無滯產後無虛以其行中有補也夏枯草治瘰癧亦然

補遺謂婦人男子癰疽治法無異惟月閉血虛氣結三証有異耳愚謂婦人海滿則行月閉一証固異然婦人性情執着比之男子十倍雖有虛証宜補亦當以執着為慮向見樓氏婦早寡善飲啖形肥偉性沉毒年六十六七月間生背疽近正春醫遂橫直裂開取血雜以五香十宣散與酒飲之月餘未嘗議其寡居之鬱酒肉之毒執着之滯時令之熱卒至于平陷淹延兩三月而不救

藏府

六脈不和則留為癰全文見五臟○此則膏梁所變之癩也

諸痛痒瘡瘍皆屬于心全文見診○河間云人近火氣微瘡皆心火之用也或痒痛如針刺者猶飛迸火星灼之然也

右心火實則為執癰心火虛則為寒癰

脈肺乘肝即為癰 腎移寒於肝癰腫少氣全文見診病傳變下同

本治發背方草決明生用一升搗碎生甘草一兩亦碎水

三升煮取一升温分二服大抵血滯則生瘡肝為血之臟而决明和肝氣不損元氣也本草云决明除肝熱

三陽為病發寒熱下為癰腫三陽小腸膀胱也下為癰腫獨指膀胱為病又腦疽背癰

運氣 運氣癰疽有四

一曰火熱助心為瘡瘍經云少陽所至為瘡疹又云少陰

司天熱氣下臨肺氣上從甚則瘡瘍又云少陰司天之政初之氣寒乃始陽氣鬱炎暑將起中外瘡瘍又云少陽所至為瘡瘍又云少陽司天之政風熱參布太陰橫流寒乃時至民病寒中外發瘡瘍初之氣候乃大温其病膚腠中

瘡二之氣火反鬱其病執鬱於上瘡發于中三之氣炎暑至民病膿瘡又云太陽司天之政初之氣氣乃大溫肌腠瘡瘍此皆常化病之淺也又云少陰司天熱淫所勝甚則瘡瘍又云少陰司天客勝甚則瘡瘍又云少陰之復病痲疹瘡瘍癰疽瘰疬又云火太過曰赫羲其病瘡瘍血流又云火鬱之發民病瘡瘍癰腫此是邪變病之甚也
二曰寒邪傷心為瘡瘍經云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中癰疽注下又云太陽司天寒淫所勝血變于中發為癰瘍病本于心又云陽明司天之政四之氣寒雨降民病癰腫瘡瘍是也
三曰燥邪傷肝為瘡瘍經云木不及曰委和上商與正商同其病支發癰腫瘡瘍邪傷肝也又云陽明司天燥淫所勝民病瘍瘡瘰癧病本于肝是也

四曰濕邪瘡瘍經云太陰司天濕氣變物甚則身後癰又云太陰之勝火氣內鬱瘡瘍于中流散於外是也

丹精要第一論曰凡有此病未要辨問是癰是疽是虛是實是冷是熱首先便服內托散五香連翹湯宜泄毒氣又云內托散五香連翹湯沉麝湯等諸方不冷不熱不問老幼少壯陰陽虛實多服為妙夫癰疽瘡癤臟腑陰陽有淺深虛實今熱用藥有補瀉溫涼老幼少壯其稟受厚薄形志苦樂隨年歲而增損奈何欲以不冷不熱四五方而通治之又多服為妙此不能無疑者也學者當審經絡察病機而處治豈可仗此為通治之法

陽攻
之快
丹東陽李兌年踰三十形瘦膚厚連得憂患又因作勞且過于色忽左腿外廉側上發一紅腫其大如栗一醫聞其大腑堅實與承氣湯二貼下之不効又一醫教與大黃株

砂生粉草麒麟竭又二三貼半月後召予視之曰事去矣
又一李兄四十餘面稍白神甚勞忽脇下生一紅腫如桃
一人教用補劑衆笑且排於是以致氣飲十宣散雜進之
旬餘後召予視之予曰非惟不與補劑抑且多得解利氣
血俱憊難矣已而果然

此二者皆由不預防本經少陽少血遽猛浪用大黃攻
裏而死者也

一男子年近六十形素肥初夏於左膊外廉側生一核方
圓二寸餘不甚痛召予治診其脈息緩大而弱予曰此因
憂悶而生當氣升散之時須急與人參膏五六斤又看作
何應病家召他外科以十宣散五六貼而瘡甚予曰此太
虛也勿以輕小視之病家不信一外科仍以十宣散進之
又五六貼瘡平指出清水而死此可爲因虛而生癰疽者

少陽攻
表之誤

之例 胡經歷女及笄性急而形實未許嫁厚味積毒已
深髀骨中痛者年餘醫以氣藥雜治之愈而復發至秋冬
令忽大痛發熱醫者方悟髀樞穴上生附骨疽在外廉側
少陽之分其厚味性急自若自首至尾悉是五香湯十宣
散服至瘡潰猶與五香湯者月餘忽一日惡寒發熱膈滿
醫者不悟升散太多陰血已絕孤陽狂越于上猶恨服五
香飲欠多致膈間有滯大服以進一夕喘汗而死

此二者由不預防本經少陽血少遽猛浪用十宣五香
表散而死者也可不戒哉

針灸

帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣
有餘榮氣不行乃發爲癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化爲
膿小鍼能取之乎岐伯曰聖人不能使化者爲之邪不可
留也故兩軍相當旗幟相望白刃陳于中野者此非一日

之謀也能使其民令行禁止士卒無白刃之難者非一日之教也須臾之得也夫至使身被癰疽之病膿血之聚者不亦離道遠乎夫癰疽之生膿血之成也不從天下不從地出積微之所生也故聖人自治于未有形也愚者遭其已成也黃帝曰其已形不予遭膿已成不予見爲之奈何岐伯曰膿已成十死一生故聖人弗使已成而明爲良方著之竹帛使能者踵而傳之後世無有終時者爲其不予遭也黃帝曰其已有膿血而後遭乎不導之以小針治乎岐伯曰以小治小者功小以大治大者多害故其已成膿血者其惟砭石鉞鋒之所取也黃帝曰多害者其不可全乎岐伯曰其在逆順焉爾玉版篇○逆順法見潰瘍疹條

無治初生癰疽發背神效灸法累試有驗江陵府紫極觀因掘得石碑載之凡人初覺發背欲結未結赤熱腫痛先

以濕紙覆其上立視候之其紙先乾處則是結癰頭也取

大蒜切成片如當三錢厚安頭上用大艾炷灸之三壯即

換一蒜片痛者灸至不痛時住不痛者灸至痛時方住最

要早覺早灸爲上如有頭似麻荳大者不用濕布覆法只消頭上灸之若有十數

頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾于

餅上燒之一二日十灸十活三四日六七活五六日三四活

海灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者先及其潰所以

不痛而後及良肉所以痛也 灸而痛不痛而後止其灸

灸而痛者先及其未潰所以痛而次及將潰所以不痛也

精痒者灸至不痒痛者灸至不痛大槩以百壯爲準又云

譬如諸盜入主人之家必開門逐之使出萬一門不開無

從而出必傷主後已

本王遵發背方序云元佑三年夏四月官京師疽發於背

召國醫治之逾月勢益甚得徐州蕭縣人張生以艾火加瘡上自旦及暮凡一百五十壯知痛乃已明日鑷去黑痂膿盡潰肉理皆紅亦不復痛始別以膏藥貼之日一易焉易時旋剪去黑爛月許瘡乃平是歲秋夏間京師士大夫病疽者七人余獨生此雖司命自然固有料理不知其方遂至不幸者以人意論之可爲慨然於是撰次前從所得方模板以施庶幾古人濟衆之意此卽當頭隔蒜灸法但不用蒜耳

精史源母氏背髀間微痒視之有赤半寸許方有白粒如粟黍乃急着艾灸其赤隨消二七壯而止信宿復覺微痛視之有赤下流長二寸濶如菲葉舉家皆以前灸爲悔或云等慈寺尼智全者前病瘡甚大得灸而愈奔問之全云劇時昏不知但小師輩言范八奉議守定灸八百餘壯方甦約艾一篩爾亟歸白之見從始以艾作炷如銀杏大灸

其上十數殊不覺痛乃截四旁赤引其炷減四之三皆覺痛七壯後覺痒每一壯燼則赤隨縮入灸至二十餘壯赤暈收退病者不憚遂以艾作團大灸其上漸加至鷄黃大約四十圍方覺痛視火焦處已寸餘蓋灸之遲而初發處肉已壞壞肉成隔直至好肉方痛四旁知痛肉未壞也病者六夜不寐至是食粥安寢至晚視之瘡如覆一甌突高三四寸上有百數小竅色正黑突然高者毒氣出外而聚也百數小竅者毒未聚而浮攻肌膚也色正黑者皮與肉俱壞也非灸火出其毒於壞肉之裡則五臟逼矣

桑君當癰疽頭針而瀉之須避筋骨

短地之濕氣自外而入者瘡瘍當先服藥而後用針針時先用溫衣覆蓋不令凝泣壅滯使血脈得溫少行則血出立已若不如此血脈凝滯便針邪毒不瀉反傷良肉益其

瘡勢也嬰兒瘡亦然

指騎竹馬灸法先令病人以肘凭几豎臂腕要直用篾一條自臂腕中曲處橫紋男左女右貼肉量起直至中指尖盡處截斷為則不量指甲却用竹扛一條令病人腕衣騎定令身正直前後用兩人扛起令脚不着地又令二人扶定勿令僵仆却將前所量臂腕篾從竹扛坐處尾骹骨盡處直向上貼脊背量至篾盡處為則用墨點定此只是取中非灸穴也却用薄蔑作則子量病人中指節相去兩橫紋為則男左女右截為一則就前所點處兩邊各量一則盡處即是灸穴兩穴各灸五壯或七壯止不可多灸不問癰疽生何處並用此法灸之無不愈者蓋此二穴心脉所通處此癰疽皆心火留滯而生灸則心火流通即見安愈可以起死救危有非常之効累試累驗

詳臂腕中曲處橫紋即曲澤穴間橫紋非掌後腕之橫紋也

凡癰疽之發或因內有積熱或因外寒鬱內熱若於生發之際灸灸以散其毒治之于早可以移深為淺改重為輕諸項灸法皆好惟騎竹馬灸法尤為切要此消患於未形之策

凡瘡可灸刺者須分經絡部位血分多少腧穴遠近若從背而出者當從太陽五穴隨証選用或刺或灸泄其邪氣

凡太陽多血少氣

至陰 通谷 束骨 崑崙 委中

從鬢而出者多從少陽五穴選用 少陽少血多氣

竅陰 夾溪 臨泣 陽輔 陽陵泉

從髀而出者多從陽明五穴選用 陽明多血少氣

厲兌 內庭 陷谷 衝陽 解溪

從腦而出初覺腦痛難忍欲生瘡也腦者髓之海當灸刺絕骨以泄邪氣髓者舍也故脈浮者從太陽經依前選用脈長者從陽明經依前選用脈弦者從少陽經依前選用論曰諸經各有井榮輸經合井主心下滿及瘡色青榮主身熱及瘡色赤俞主軀重節痛及瘡色黃經主咳嗽寒熱及瘡色白合主氣逆而泄及瘡色黑各隨經病而見此証者或宜灸或宜針以泄邪氣經云邪氣內搖則壅熱宜砭射之也

右保命集分經灸刺乃大綱耳令更取靈樞經脈篇及銅人等書毫分縷析出各經分野在針門十二經條列為之圖目之曰經絡分野圖使人視之心目瞭然目無

全牛矣夫癰疽初發必先當頭灸之以開其戶次看所發分野屬何經脈經脈既定却內用所屬經脈之藥引經以發其表外用所屬經脈之俞穴針灸以泄其邪內外交治邪無容也針灸癰疽者更於針灸門十二經脈分野圖求之

甲 癰疽竅陰主之 頭項癰腫不能言天窓主之

乙 邪氣不傷於腸胃大便如常慎不可下切禁之

非秘結
積執著
忌大黃

丙 精要云大黃治癰疽之要藥以其宜熱拔毒又云瘡始

作皆須以大黃等湯極轉利之且排日不廢繼又自言患

癰疽者每有泄瀉皆是惡候此是不能無疑者也借曰前

用大黃恐因病躰實而大腑秘結有積熱沉痼之積者發

也止可破結導滯推令轉動而已豈可謂極轉利之而且

排日不廢乎若下利之後又與利藥恐非防微杜漸之意

瘡之始作即周禮腫瘍之時也腫在肌肉若非大滿大實
堅之証自當行仲景發表之法借五香湯為例散之於外
何必遽以峻下之藥以奪其裏自取其禍乎

精要云大凡癰疽不可舍五香湯此又不能無言者也開
卷便於第一論中詳言之吾不知良甫之時有許多大腑
堅秘病氣鬱塞若是之頑厚可以驟散而大下者若果有
之亦當開陳時之先後証之可否庶乎後人不敢孟浪殺
人也或曰癰疽用大黃走泄以去毒自孫真人行千金方
已言之矣良甫祖述其說何吾子病之深也曰大黃除諸
實熱而性峻急孫以盛行奇術於公卿間時在晚宋民不
知兵交游於富貴之家肉食之輩固皆捷効今良甫不分
貧富苦樂勞逸一槩用之寧無孟浪之患乎况有房勞而
虛者憂怒而虛者極意貪求而虛者強力動勞而虛者大

醉過飽而虛者皆因氣弱而滯血少而濁生疽固是難治
之病若大腑秘而稍安穀食肯守戒律甘心淡味者猶為
可治但費補工夫耳苟因旬日半月大便秘實不知其氣
不降也便以為實而行大黃些少寒熱不知其血氣不和
也便以為有外感而行表散如此害人甚速

瘡瘍及諸病面赤雖伏火熱禁不得攻裏為陽氣怫鬱
邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日
不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤之如見
風脈風証只用發表風藥便可以通利大便若只乾燥秘
瀉尤宜潤之慎不可下也九竅不利皆不可下瘡瘍鬱冒
俗呼昏迷是也慎不可下汗之則愈

宜忌
施於夏
月與瀆
瘡
排膿內補十宣散若用之干些少癰疽與冬月儘可助
內托之功若干冬月腫瘍用之亦可轉重就輕移深為淺

若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此方者不分癰疽冬夏無經絡無先後如盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉 又云內補十宣散瀉衛燥血藥太多止可用于輕小証候虛之甚者恐難倚仗

內托忌施於年老與體

精要云內托散一日至三日之內進十數服治毒氣攻衝臟腑名護心散此方專為服丹石而發疽者若不因丹石而發恐非必用之劑若夫年老者病深者証憊者躰重者葉豈雖補將有不勝重任之患矣

忌奪汗

疽瘡家雖不疼痛不可發汗汗之則痊發汗為大汗出非謂諸托裏之藥輕

純肉醫長冷藥敷貼

李世英疽不熱不痛屬陰切不可用冷藥敷貼恐逼毒氣入內

丹夫外施敷貼正與發表之意同經曰發表不遠熱大凡氣得熱則散冷則斂向見鄭經歷性嗜酒與煎燂年五十餘忽春末夏初在額絲竹空穴湧出一角長短大小如鷄距稍堅求予治予曰此非膏梁所致而何宜斷厚味先解食毒針灸以開泄壅滯未易治也此少陽經所過氣多血少者鄭以憚煩召他醫以大黃朴硝腦子等冷藥罨之一夕豁開如醬蚶徑三寸一二日後血自蚶中濺出高數尺而死此冷藥外逼熱鬱不得發宜其發之暴如此也

忌奪血

蟻針法謂開門放毒以為要捷恐可施於輕小証候耳愚謂蟻之所吮止膚間惡血若積毒于臟腑者徒竭之於外而不及于裏恐未為得往見張兄之子甫二歲遍身赤癩如霞片子向見其母久病疔謂毒熱在血所成者張曰誰不因母血所成何謂毒熱之血予曰其母雖疔食肉如平

時肉性熱與宿痰之熱相搏非毒歟張不之信自取五六
大蜚咬其血癰頓消乳食起居如舊予曰非其治也未可
以爲喜張怒越二三日大發熱而暴死非竭之於外血去
而氣不能獨居乎

治口乾
法

精要云口乾與口渴不同不宜用丹藥鎮墜用之其禍如
反掌用桑枝煎五味湯以救陰水甚妙方也而不言食味
起火怒氣生火房勞激火吾恐渴未易除也

灸法

精要謂頭上有發毒者不得灸恐因火氣拔起熱毒灸上
動病邪而添病愚謂此言過矣火本以暢達拔引鬱毒此
從治之意也頭爲諸陽所聚之處艾炷宜小壯數宜少小
者如椒粒少者三五炷而已若孟浪如腹背上引痛灸至
不痛不痛灸至痛爲例斯爲誤矣

按東垣灸元好問腦疽以大艾炷如兩核許者至百壯

始覺痛而痊由是推之則頭上發毒灸之痛者艾炷宜
小壯數宜少如不痛者艾炷大壯數多亦無妨也又引
陳日華之說謂於始發時用針灸十死八九此未之思
也切詳因灸而死者必其血虛孤陰將絕無以承當火
氣脈必浮數而大鼓與精神必短而昏豈可泛言始發
不可灸以誤人

保瘡疽已覺微漫腫硬皮不變色脈沉不痛者當外灸之
引邪氣出而方止經曰陷者灸之如外微覺木硬而不痛
者當急灸之是邪氣深陷也淺者不可灸慎之如有膿水
亦不可灸當刺之

按刺之膿出不腫痛者邪已去矣不宜灸若刺之膿出
而痛腫不止者亦當于腫上灸之無妨又毒雖淺却有
十數頭腫痛者亦灸之無妨

春夏宜
急生肌

肉

秋冬宜
調胃氣

疽一有癰疽瘡癤須順時節春夏為正易為整理緣天氣
 溫和肌肉緩慢而煖故易治其有肉冷是患人氣虛所致
 但以溫藥調順氣血外用溫煖潰膿膏藥貼之令穴候
 穴抽膿盡急用生肌長肉藥滿瘡口不宜緩慢恐至秋冬
 成漏瘡也或在秋冬發者乃春夏內先有發蒸熱毒過一
 陰生後再有伏毒至秋冬間又因食毒物酒麪房慾之事
 忽發初覺微小數日之間腫大疼不可忍初得大便五七
 日不通小便淋瀝者是其候也先調脾臟氣令實次服發
 穴排膿消毒去積之藥內托溫平不得用太熱澁之藥緣
 脾中臟要煖如用熱藥恐氣滯而不流暢致榮衛不調
 也貼即用溫涼藥不得用冷藥恐逼入毒氣須引膿外透
 方漸安矣

仲諸浮數脈應當發熱而反灑淅惡寒若有痛處當發其

癰

診

精陰滯于陽則發癰陽滯于陰則發疽而此二毒發無定
 處當以脈別之浮洪滑數為陽微沉緩澁為陰陰則熱治
 陽則冷治

右陽脈當以癰法治之陰脈當以疽法治之不必拘於
 熱治冷治也

垣身重脈緩濕勝者除濕 身熱脈大心躁時腫乍來乍
 去者清熱 諸痛眩暈動搖脈弦者去風 氣澁氣滯乾
 燥亡津液脈澁者瀉氣補血 寒勝則脈浮食不入便溺
 多惡寒脈緊者宜瀉寒水 腎脈澁甚為大癰全文見虛實法

診發背

疽夫人生最可憂者發背也其種有五

一曰陽毒因風熱而有或患熱毒消渴或先患傷寒餘有
 陽毒觸處畜積起于背脊鬻之間不問椎數但從兩夾脊

起止腰上滿背焮熱如炊之狀赤紫或紅如爛膿毒難成
成後不止止後痛不除驀忽數日之間復平如舊將謂腫
消此是內攻肉陷不可療矣

二曰陰毒發背是氣冷而作初如黍米粒起情緒不快
愔愔而痛直應前心心忪怔頭目昏重寒熱如瘧五七日
後始發引攻腫開闊難收內積有膿深沉遲緩未透宜急
以補氣湯藥內托外以抽膿藥貼之宜急見膿無膿即平
愈未期

三曰有人多服金石燒煉之藥毒惡流滯成發背者初起
如丹疹之狀藜藜漸開如湯火瘡面色如朱心膈煩躁多
渴嗜冷其瘡難起起即驚人猶勝于陰陽二毒者緣此有
解金石藥毒湯散治其內也賴有根底分明亦須急療方
安

四曰人有患酒食毒發背者此疾非近得之乃臟腑久積
乘飢乘困食之便睡或多食酒肉冷熱粘滑肥鮮熾膩未
下胸膈房室不禁恣意當風取快脾臟氣虛不能受乘發
毒攻背兩夾脊不問椎數初起癰頭如小彈子後大如拳
堅如石痛遍四肢加之拘急口苦舌乾腹急大小便澀十
數日後頭面手足虛腫及臟腑通泄如利內急痛者是其
症也喜方腫引急用收腫發穴潰膿湯藥內實外泄膿水
不可放縱遲緩則皮肉腐壞傷骨爛筋漸成膿多因而感
邪內敗者死矣

五曰人有冒山嵐瘴氣發背毒氣先在臟腑年月浸遠氣
血虛損衰弱初起腫色青黑如靴皮頑痺痛深附筋骨徹
髓按之如木石引手加深方覺似有痛處至五七日毒氣
浮淺腫高色變青白有如拳打之狀寒戰似瘡及有風候

頭動口偏手足厥逆眼黑睛小白多而慢此內有邪氣相搏急破出清血三五升方有黃膿白汁相和發泄其皮不寬不慢亦急脹痛亦不住直至色退熱疼方愈亦宜急急追趕膿與毒氣外出無害

早治慎重者生

初患腫三日內灸者生 八日內膿成針烙導引者生

未瘥慎勞力者生 慎忌食者生 慎喜怒者生 懼腫

猛療者生 急療者生 不諱發背者生

遲療縱恣者死

待膿自出不導引者死 未內攻而針烙用藥導引者生

內攻後導引針烙者死 瘡焮熱痛方盛已前療者生如

過此後已內攻者死 膿成後出不導引但傳藥者死

如赤白痢氣急者是已內攻醫療無益必死 癰不救

十得五生疽不療十全死 輕腫怕痛者必死 不遇良

方者死 節候不依法者必死 愚執恣意用性逸情者

死

可治証

有發背癰有發背疽如毒氣勇猛而發如火焚茅易于敗

壞初發即可如黍米粒大三兩日漸赤引腫如手掌面大

五七日如碗面大即易為攻焮熱赤引如火燒之狀浮面

漸潰爛闊開內發腫如炊之狀外爛皮肉如削去紫瘀膿

汁多而腫不退疼亦不止發渴發逆飲食不下嘔吐氣急

浮淺開闊者尤宜發膿托毒湯藥用之必愈陽証實也

不治証

其間有只如蓋面大者此非不大緣為毒氣深沉內虛毒

氣近膜也此必內攻近入臟腑却外入四肢先攻頭面虛

浮後攻手面次攻兩足面腫名曰毒氣散入四肢其人聲

嘶氣脫眼睛黑小十指腫黑乾焦不治陰証也

陰陽

精丸癰疽初發腫硬高者而毒氣却淺此乃六腑不和為

癰其証屬陽勢雖急而易治若初發如粟粒甚則如荳許

內外

雜方

與肉俱平或作赤色時覺痒痛痒時慎勿抵破此乃五臟

不調為疽其証屬陰蓋毒氣內畜已深勢雖緩而難治

始發一粒如麻荳大身軀便發熱生疽處腫大熱痛此為

發於外雖大如盆治之百可百活陽症實也

或身軀不熱自覺倦急生疽處亦不熱數日後漸大不腫

不痛低陷而壞爛此為發於內雖神仙無如之何陰症虛也

保木香散治小兒班後生癰如神出小兒門

地骨皮兩

木香兩

川山甲

炙黃二錢五分

麝香一字

右末米飲下三錢

潰瘍

癰疽已潰膿出者也

仲諸癰疽欲知有膿無膿以手掩腫上熱者為有膿不熱

者為無膿

膿成宜急破之

凡癰疽按之牢韌未有膿也按之半軟半韌已有膿也

宜急破之

詳何切半軟謂中火膿熟未詳何切半軟謂中火膿熟

凡瘡腫以手指從瘡旁按至四畔上赤黑者按之色不變

膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按之白良久方赤

遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡肉平實久而方消

夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾惟癰膿

成則宜針疽膿成則宜烙 切宜孰視詳審候其潰熟膿

透於外其勢盈盈欲出只用替針九自瘡頭咬開不半日

許其膿自出切不用針刀也 丹溪云精要論戒用針刀業外科者當拳拳服膺

替針九治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

以淺薄者用針九

白丁香一字

硃砂一字

沒藥一字

乳香一字

石灰餅藥內種糯米十四粒其法用石灰五升爐灰三

升以水五升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至三五升用瓦器盛貯用時以小青盞盛取半盞濃汁却用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯米十四粒種在皮紙面上一宿即是右為細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒未破用津貼瘡頭薄處即破膿滯不快則用一粒納瘡口內使膿不滯好肉易生

無替針丸

雄雀糞升

硃砂

陳倉米

沒藥各一

右研勻以米飯丸如粟大每用一粒貼瘡口眼中即潰膿出

海治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決取雄雀糞塗頭上乾即易之雀糞中堅者為雄

本治癰疽已有瘡眼未出膿痛不可忍用此藥紙即膿出巴荳一個去皮膜不去心油鹽豉十四個口中含去皮令軟同研爛真麝少許如難丸入少稀糊捏作餅子如鼠糞大大小臨時看瘡口紙之只以紙撚子送入藥須臾必痛忍之良久膿遂出

丹出一切瘡口出蛾壘殼燒存性無灰酒調下每服一枚服下一個時辰便有瘡口一個若服兩枚出瘡口兩枚

鍼針以取膿

精癰成膿宜針其鉄用馬銜鉄為之形如蕤葉兩面皆利可以橫直裂開五六分許取其毒血如覺病輕須先灸而後裂

按癰如椒眼數十粒或如蜂窠蓮房而膿出痛不除宜用針者以針橫直裂之則毒血挾膿出而愈如無椒眼之類只消直入取膿不必裂之也又法當椒眼上各各

灸之亦佳不必裂也

鉞針者未如劔鋒以取大膿全文見針灸門

素夫癰氣之息者宜以針開除去之病疑篇王註云息癰也死肉也○今世用

刀割去死肉者是也治腐腫者刺腐上視癰小大深淺刺刺大者

多血小者深之必端內針為故正長刺節論○大者多血小者深之八字衍文也

大小深淺刺七字取膿之法及矣備矣

漏疽成膿宜烙可用銀篋大二分長六寸火上燒令赤急

手熨烙毒上得膿為効

漏凡癰覺在虛處及眼不見處皆是惡症如發高腫紫赤

皮薄光澤覺裏有膿毒諸藥貼熨不破者宜用熟銅鍼於

油火上燎透先用墨筆點定却當頭以針淺刺入隨針出

膿者順也有不隨針膿出當用白紙作紐紐入針孔引出

膿毒當時腫退可及三分如腫不退是一逆也腫不退疼

不除但膿出二逆也膿疼不退患人不覺瘡輕三逆也雖

用針破出膿亦無所濟須急用引膿托裏湯藥以助其勢

力可也更有癰生實處不問淺深如有膿即用針烙無害

稍遲緩即恐傷筋骨內疼凡近筋脈骨節處不得亂行針

烙反致他病也 患疽初生赤硬或在虛處毒氣淺或在

實處毒氣深切須仔細辨認仍問患人疼痛覺深覺淺其

患處瘡頭不拘多少其間須有一個最大者即是大膿竅

當用熟鉄大針頭如釵脚者於麻油燈上燒令熟透以大

頭處按定插入一寸或至二寸膿當下恐未有膿毒出却

用白紙作紐子紐入直候次日取出其膿即隨紐下矣膿

色黃白即好若赤黑色防後有鮮血出即患人寒戰不禁

其有虛處不得亂行針烙 凡患發背覺似有膿成便用

大熟鉄針烙當正頭上烙之其烙並用麻油燈上燒令通

皮厚毒深宜烙

紅烙入可二寸許初入肉即須橫插入不得正入恐烙透膜也如已有破處皮爛潰熟更不得用針烙如是橫長赤引開闊當須兩頭下火針令膿毒隨針引出肥人膿汁多瘦人膿汁少如肥人却少瘦人却多多是肉敗壞成膿少是肉不腐爛受氣實也尤宜詳審不可造次便行針烙亦看患人氣脈勻和榮衛氣不節滯血脈不致凝澁即行針烙無畏切須仔細患人氣虛脈氣大者亦不可亂行針烙針烙之法不可容易先看皮紋緊慢厚薄紫赤色大光澤者即可用針烙如皮肉未變不可用針針亦無濟大抵用針只欲引膿如針刺無膿是氣伏也不可用針烙

丹或問烙法如何曰膿或汪洋欲出奈何皮厚肉深難穴者既前無內托之藥先致力于內後又不用烙以開竅脈膿何由出 膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久留肉腠

間則毒氣浸淫好肉亦化為膿腐此所以烙法有功于潰瘍也彼根淺而皮薄者何必假此以賣弄假法恐嚇而脇取利也

身形血
忌忌開
膿

靈帝曰願聞身形應九野柰何岐伯曰請言身形之應九野左足應立春其日戊寅巳丑 左脇應春分其日乙卯 左手應立夏其日戊辰巳巳 膺喉首頭應夏至其日丙午 右手應立秋其日戊申巳未 右脇應秋分其日辛酉 右足應立冬其日戊戌巳亥 腰尻下竅應冬至其日壬子

六腑膈下五臟應中州其大禁太乙所在之日及諸戊巳凡此九者善候八正所在之處所主左右上下身軀有癰腫者欲治之無以其所直之日潰治之是謂天忌日也

身形應九野圖

右應立秋戊申	右應秋分辛	右應立冬戊戌
手巳未忌開膿	脇酉忌開膿	足巳亥忌開膿
膺應夏至	六應中州太	腰應冬至
喉應夏至	膈乙所在日	尻下
首丙午日	及諸戊巳	壬子日
頭忌開膿	臟五下	窠忌開膿
左應立夏戊辰	左應春分乙	左應立春戊寅
手巳巳忌開膿	脇卯忌開膿	足巳丑忌開膿

行年血
忌忌患
癰疽

滑十歲二十二歲三十三歲七十三歲已上四人百神在上部不可患癰疽發背見血者死申子辰年血忌餘年不妨男女同

二十五歲三十一歲六十八歲七十四歲以上四人百神在額不可患瘡腫見血者死

十八歲二十四歲三十五歲四十五歲五十六歲六十七歲七十二歲八十九歲以上八人百神在兩肩隅不宜患癰疽瘡腫見血者死

十二歲二十七歲三十六歲五十九歲六十六歲九十七歲以上六人百神在中部不可患癰疽發背見血者死巳酉丑年血忌餘年不妨男女同

三十二歲四十二歲五十五歲六十一歲以上四人百神在肩背不可患癰疽見血者死

在肩背不可患癰疽見血者死

十九歲二十六歲四十九歲五十六歲五十七歲六十二歲八十歲九十一歲以上八人百神在肝肺俞不宜患癰腫見血者死

十一歲二十三歲二十四歲五十八歲九十六歲以上五人百神在脇肋不可患癰疽見血者死

十四歲二十九歲三十九歲四十六歲五十二歲六十歲六十九歲七十六歲八十一歲八十八歲九十五歲以上十一人百神在下部不可患瘡漏疾見血者死下部尤忌

見勞瘵人不宜下部出膿難瘥

十一歲十五歲二十七歲六十三歲七十五歲以上五人百神在尻尾間不可患癰疽見血者死

十三歲二十八歲五十二歲七十二歲九十三歲以上五人百神在足下不可患癰疽見血者死

虛實寒熱宜忌

二十一歲三十八歲四十一歲五十歲以上四人百神在遍身不可患瘡腫見血者不治

凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺已上者其赤腫焮熱者即用緊急收赤腫藥圍定不令引開中心即用抽膿聚毒散貼之急令散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大小深淺內發其膿汁膿水大泄急須托裡內補雖破穴膿汁不多再須排膿拔毒透後慎不令再腫須疼止腫消患人自覺輕便即是順疾也最宜節慎飲食其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑即止矣內補謂參芪之屬排膿謂皂角刺之屬

聖精要云凡疽疾勿食羊鷄牛鵞魚麪煎燂炙炒法酒等

味犯之必發熱只有梔子黃芩湯用之取効夫梔子黃芩湯犀角輔佐人參固可解食毒之熱若寒月與虛人寧無加減乎內經謂膏粱之變足生大疔此原癰疽之因也禁戒厚味盖以厚味能引起宿火之熱此誠富貴養口腹者所宜謹守若素貧者大不然矣予治章兄背疽徑尺家貧待死而已視瘡穴黑深似有近內之意急作參芪歸朮膏飲三日略以艾芎湯洗氣息奄奄不可支持幸其身不發熱而可進飲食每日作餛飩大碗與之盡藥膏五斤餛飩多肉者三十碗瘡口漸合以其因肉與餛飩助氣之有益也

拾時從証六脈沉數有力

羅凡治病必察其下 予從軍戊午年冬于武城縣有賈倉使父年踰六旬冬至後數日疽發于背五七日腫勢約七寸許不任其痛瘍醫曰視之膿成可開矣公懼不從越

脈微泄瀉者雖盛夏宜溫

三日醫曰不開恐變証生矣遂以燔針開之膿泄痛減以開遲之故迨二日變証果生覺重如負石熱如熾火痛楚倍常六脈沉數按之有力此膏粱積熱之變也邪氣酷熱故宜寒藥治之時月嚴凝復有用寒遠寒之或乃思內經曰有假者反之雖違其時以從其証可也與瘍醫議急作清涼飲子加黃連一兩五錢與之利下兩行痛減七分翌日復用前藥其証悉除月餘平復 陳錄判母年七十餘歲忽冬至後腦出疽形如甌面大命瘍醫診視俟瘡熟以針出膿因怒答侍妾瘡即內陷凹一菲葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身清時復嘔吐脈極沉細而遲盖綠衰老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已滌肥膿之氣獨存憔悴之形加之暴怒精神愈損故有此寒變也病與時同與瘍醫議遂制五香湯一劑加丁香附子各五錢劑盡

瘡復大發隨証調治而愈內經曰凡治病必察其下謂察時下之宜也諸痛痒癢瘡皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也固當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用也醫者意也隨所宜而治之可收十全之功矣 至元壬午五月二十八日王伯祿年五十有七右臂臍腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微脈證俱寒予舉瘍醫孫彥和視之曰此附骨癰開發已遲以燔針啓之膿清稀解次日肘下再開之加吃逆不絕彥和以丁香柿蒂散兩服稍緩次日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憤於左乳下黑盡處灸二七壯又處托裏溫中湯用乾姜附子木香沉香茴香羌活等分咬咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又當盛暑之時乾姜附子可乎予應之曰理所當然

不得不然內經曰脈細皮寒瀉利前後飲食不進此謂五虛况吃逆者胃中虛寒極也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言其定理也此証內外相反須當捨時從証非大方辛熱之劑急治之則不能愈矣遂投之諸症悉去飲食倍進瘡勢溫膿色正彥和又與五香散數服月餘平復噫守常者衆人之見知變者智者之事知常而不知變因而取敗者亦多矣况醫乎哉守常知變豈可同日而語

托裡溫中湯治瘡瘍為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微澹食則嘔逆氣短促吃逆不絕不得安臥時發昏憤

羌活

乾姜炮各三錢

黑附子

四錢炮去皮臍

益智仁錢一

茴香

甘草炙

丁香

沉香各一錢

木香半錢

陳皮錢一

按經曰寒淫于內治以辛熱佐以苦溫附子乾姜大辛熱溫中外發陽氣自裡之表以為君羌活味苦辛溫透關節炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐吃逆不下食益智仁沉香丁香大辛熱以散寒邪為佐瘡氣內攻氣聚而為滿木香尚香陳皮苦辛溫治痞散滿為使也

右咬咀都作一服水三盞生姜五片煎至一盞去渣溫服無時忌一切冷物

脾虛嘔逆不宜內托十宣

一老人年七十患背疽徑尺餘已雜與五香十宣數十貼膿血腥穢嘔逆不食者旬餘病人自云吃內托散隔中不安且素有淋病三十年今所苦者淋之痛與嘔吐不得睡而已急以參芪歸朮煮膏以牛膝湯入竹瀝飲之三日後盡藥一斤半淋止思食七日後盡藥四斤膿自湧出而

得睡又兼旬而安 一男子年六十餘性好酒肉背疽見膿嘔逆發熱蓋其得內托十宣多矣醫以嘔逆於嘉禾散中加丁香以溫胃行氣時七月大熱脈洪數有力予因謂此脈症在潰瘍尤為忌然形氣實只與人參膏和竹瀝飲之盡藥十五斤竹百餘竿而安予曰此病幸安也不溥味必再作仍厚味自若夏月醉後坐水池中又年餘左脇旁生一軟塊如餅二年後軟塊為疽本人見膿血淋漓而脈洪數有力又嘔逆食少遂自以人參膏入竹瀝飲之又百餘竿而安今八十歲強健如舊此病兩以老年血氣弱專服人參竹瀝而愈若與內托十宣散恐未能若是之安全也

渣後反痛宜補宜溫宜和解之

膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸者宜和解之亦有風寒逼者宜溫散之

補者歸芪之類和鮮者乳香芍藥之類溫散者防風桂枝之類

權小娘瘡後右腿股生癰破後筋吊疼脈虛而瀆詢之小便時疼處亦相應宜與生血導熱

川芎

歸頭

條芩

生地

赤芍

牛膝

黃栢

甘草分二

青皮炒

檳榔分五

通草分三

桂皮錢一

右煎食前熱飲之

潰後忌五香飛散忌大黃下積

五香湯即五香連翹湯去射干大黃升麻連翹加參犀角若用于腫瘍循可借其飛走以攻散其毒使不延蔓若用于潰瘍雖多有參芪甘草之緩補而走泄太多寧不犯仲景已有得汗復汗得下復下重虛之戒可不省乎
精要云血氣聞香則行聞臭則逆又言飲食調令香美登

其脾土養其真氣夫甘而淡者可養脾上若香美者但能起火經以熱傷脾熱傷氣為戒今日益脾養氣若施之于腫瘍者似有暢達之益潰瘍後用香美恐有發濕熱損真陰之患矣

精要云熱盛脈數與瀉蘆湯單煮大黃等湯不甚熱脈緩弱只投五香連翹湯夫熱盛脈數若腫瘍時臟腑秘而躰實者猶可與大黃若潰瘍後膿血出多者熱盛脈數去死為近其可下乎緩弱之脈古人皆以為邪毒已散五香之飛走升散其可用乎

膿出忌追毒丸

精要云初成膿宜用烙得膿利為効亦服神仙追毒丸此又不能無疑者也夫追毒丸下積取毒之藥決無取膿之効今用烙而得膿若在裏之氣血壯實則膿自出如推矣何不以和氣活血之藥佐參芪補劑使膿自托出乎

渴忌追毒丸

精要云瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒與清膾湯萬金散五香連翹湯六味車螯散千金漏蘆湯皆可選用下利已後渴尚未止宜用生津補氣藥則津液生氣血完渴自止矣夫大渴而與利藥非明示脈証何以知其當下又言下利後渴又不止却用補藥又不明言脈証恐是但有大渴必與峻下下後尚渴方與補藥夫醫者治未病如此用藥可乎况渴屬上焦當腫瘍時猶或可用若潰瘍時渴恐因血氣之虛何以待下利後方議其虛哉

潰後咽痛忌琥珀犀角膏

精要論疽疾咽喉口舌生瘡歸罪於不得內托以致熱毒衝心與琥珀犀角膏夫于腫瘍時用之猶或近理若於潰瘍後用之彼犀角腦子之升散寧不助病邪致虛以速其死也耶後有犀角散以大黃佐黃芪用黃芪則知其虛用大黃又似疑其有實熱夫瘡潰躄虛縱有舊熱將自漸因

膿血而消何必以峻冷利動臟腑若在秋冬何異用刀劍耶

潰後寒熱忌正氣

精要論癰疽發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒或連日作或間日作必先嘔痰然後寒熱寒熱解大汗出不可專以為有熱亦有氣虛而得者亦有因怒而得者又有先感寒邪脾氣不正而有此証者夫氣虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣藥和之脾氣不正者當以調脾藥養之今用不換金正氣散悉是溫散瀉衛之藥而欲以一兩入參收拾十四兩之瀉衛可乎若用于腫瘍時感寒邪者猶或庶幾彼氣虛者因怒者脾氣不正者此方能兼治乎又未知用于腫瘍耶潰瘍耶

穴未合慎風濕

瘡穴有孔慎風仍慎再合如再合者為風濕邪氣攻搏而再生膿宜如前以通和湯藥依次第用不可急性恐傷氣

害人之命也

無瘡瘍未合風入為破傷風濕入為破傷濕二者害人最急倉卒不知其因甚難認治癰疽瘰癧潰後尤宜謹之

補氣血

精加味十全湯治癰疽愈後補氣血進飲食

黃芪蒸

地黃蒸

當歸

川芎

人參

茯苓

芍藥炒

白朮

陳皮各一兩

粉草各一兩

桂心

五味各五錢

烏藥七錢

右咬咀每服一兩用水一椀生姜五片棗二枚同煎分作二服留查晒乾為末服之丹溪云加味十全湯須看年之老壯資之強弱証之緩急時之寒熱加減用之

丹加味十全湯治癰疽後補氣血進飲食實為切要蓋膿血出多陰陽兩虛非此藥何以回生起死惜其不分經絡

不載時令又在識者觸類而長之今之外科於瘡瘍腫平痛寬遂以為安漫不加省往往于結痂後兩三日或半年虛証乃見醫者不察病者不悟無補接調養之功因而轉成他病者惜哉予治一士夫因脚弱求診兩手俱浮洪稍鼓飲食如常惟言問不答肌上起白屑如麩片時在冬月予作極虛處治詢其弟乃知半年前曾于背臂腿三處自夏至秋冬節次生疽率用五香連翹湯十宣散與之今結痂久矣予為作參芪白朮當歸膏以二陳湯化飲之三日後盡藥一斤白屑沒者大半病者自喜呼吸有力補藥應効以漸而病家反怨藥不速應自作風病論治煉青礞石二錢半以青州白丸作料煎飲子頓服之予諫止不聽因致不救書以為警云

進氣

運氣癰自潰者惟上不及歲有之經曰土不及曰卑監卑

雜方

監之紀其動瘍涌分潰癰腫蓋土不及則肉腐為癰腫故木化啓折乘之而膿涌分潰其癰腫也

東垣癰疽用藥加減法 如發背疔腫膿潰前後虛而頭

痛者于托裏藥內加五味子 恍惚不寧加人參茯神

虛而發熱者加地黃瓜萎根 潮熱者加柴胡地骨皮

渴不止者加知母赤小荳 虛煩者加枸杞天門冬 自

利者加厚朴 膿多者加當歸川芎 痛甚者加芍藥乳

香 肌肉遲生者加白欵管桂 有風邪者加獨活防風

心驚悸者加丹砂 口目睜動者加羌活細辛一嘔逆

者加丁香藿葉 痰多者加半夏陳皮

精麥飯石膏在膿潰後圍瘡口

麥飯石

火煨醋淬十次研數日

鹿角

煨爛

白欵

右用麥飯石末二兩白欵末二兩鹿角灰四兩要研極

圍藥

洗藥

猪蹄湯治一切腫破消毒氣去惡肉凡瘡有口便用此湯濯洗

者不宜用

醋拂濕其藥初便一日洗換藥十日後兩日一換肉冷惡寒

白芷

生甘草

羌活

露蜂房

黃芩

赤芍藥

川歸等分

右為粗末看疽大小用藥如疽大獐猪蹄兩隻只用白水三升煮軟將汁分為兩次澄去面上油併下面查却

將藥末投其中再煎十數沸去渣以故帛蘸藥湯溫洗
薄楷惡血惡肉隨洗而下洗訖仍避風忌人口氣吹之
又忌狐臭人月經人

去死肉方 癰疽有死肉不去者用白丁香霜末深則絛之淺則乾摻
於膏藥上甚妙

海 又方膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉止去惡肉不
惟惡瘡凡癰毒有惡肉者俱可去

又方雄黃散以雄黃一錢另研巴豆不去皮研如泥入乳
香沒藥少許再研細少上惡肉自去

保 治惡瘡有死肉者及追膿

白丁香

輕粉

粉霜

雄黃

麝香

各一錢 巴豆霜

右細末新飯和作錠子用之

丹 治瘡疽攻腫息肉突出烏頭五枚苦酒三升漬三日洗
之日夜三四次古今錄驗

諸癰疽有肉凸出數寸者更于凸出瘡門求之

膏藥

神異膏 治諸般惡毒瘡癤發背癰疽其妙如神

露蜂房

要用蜂兒多者為妙細剪淨一兩

全蛇蛻以鹽水洗淨焙乾半兩

玄參

半兩去苳

綿黃芪

三分

黃丹

五兩研細後入

真麻油

一斤

杏仁

去皮尖切小片一兩

男子亂髮

洗淨焙乾如鷄子大

右件藥先將麻油入銀鈔中同亂髮于風爐上慢慢文
武火熬候髮焦鎔盡以杏仁投入候杏仁色變黑好綿
濾去渣再將所熬清油入銀鈔內然後入黃芪玄參二
味慢火熬一二時取出鈔子安一冷風爐上候半時久
火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪移鈔于

火上不住手攪慢火熬至黃紫色用綿濾過後復入清油在銚內乘冷投黃丹急攪片時又移銚於火上文武火慢慢熬不住手用柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠子則是膏成就矣若珠子稀再熬少時必候得所然後用瓷瓶內封收待用或恐偶然熬火太過稍硬難用却入少蠟熬添麻油在內瓷瓶盛封蓋於甑上蒸乘熱攪勻收而用之膏藥熬成了須用所盛瓷瓶置淨水盆中出火毒一晝夜歇三日方可用熬此膏藥極難於火候須耐煩看火緊慢火猛即藥中火發千萬謹戒膏藥方甚多効無出于此

恒熱瘡寒膏藥

當歸身水洗焙乾一兩

杏仁湯浸去皮尖一百個

肥嫩柳枝三兩半切如寸許水洗乾

肥嫩桃枝一兩切作如寸洗淨乾

麻油一斤

右件先熬麻油熱下桃柳枝熬令半焦以綿裏當歸杏仁同煎至柳枝黑焦為度去藥渣濾油澄淨抹去銚中渣滓令淨再上令沸旋旋入黃丹熬成滴水中不散為度

寒瘡熱膏藥

與寒膏藥同只將當歸身改作當歸稍桃柳枝分兩倒過便是

欬瘡口藥

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起宜用逼毒散方

黃藥子

白藥子

各一兩

赤小豆二兩

右為末水調傅

治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用緊瘡口生肌青散子

槿花葉

盛時收陰乾取四兩為末

青赤小荳

白芨

各二兩

為末臨時用槿花末三錢七白芨小荳末各一錢七相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不用貼

垣 歛瘡口方木香檳榔散用之決無疼痛以蠟油塗覆瘡上生肌歛肉甚速必無惡血瘡口疾合易取平復惟膏梁熱瘡所宜用也貧人害地之寒濕外來寒瘡者禁不可用

木香

檳榔

黃連

各等分

右為極細末依前調用濕則乾貼

治寒瘡歛瘡口藥

當歸身

一錢洗淨晒乾

青皮

二分去白

木香

一分

黃連

五分

右四味為極細末蠟油調塗取効甚速

保 瘡口大者乳香散

寒水石

煨兩各一

乳香

沒藥

各半兩

腦子

少許

右各研細和勻少許摻瘡口上

撮 桃紅散歛瘡口定痛辟風邪

滑石

四兩

乳香

輕粉

各二錢

小荳粉

一兩

寒水石

三兩

右為細末乾摻口上一方改小荳粉為定粉

稽 有人患昔疽已潰如碗面大視五臟僅膈膜耳自謂必死用大鯽魚一枚去腸臟以羯羊糞入其中烘焙焦黑極燥為細末乾摻之瘡口遂收至今無恙此方累用有效須候膿少欲生肌肉時用之

保 又方治瘡口久不收

小椒去目炒 定粉 風化硝二錢 白礬二錢

乳香 沒藥各一錢 右為末摻之

精生肌散

寒水石剉 滑石 烏魚骨 龍骨各一兩

定粉 蜜陀僧 白礬灰 乾胭脂各半兩

右為細末乾摻用之

平肌散治諸瘡久不斂

蜜陀僧煨 花蕊石煨 白龍骨各一兩 乳香另研

輕粉各一錢

右為細末和勻乾摻

丹精要論癰疽久而瘡口不合其肉白而膿血少此為瘡口冷滯乃病氣血枯竭不潮于瘡遂致如此用北艾葉一把入瓦器內濃煎湯避風處乘熱用艾湯澆洗瘡口四圍

淨肉以絹帛兜艾葉乘熱澆沃一日一次洗了須避風仍燒松香以烟薰瘡口良久用神異膏貼之不可與厭穢之人見若不能禁忌瘡口難安藥亦無效夫以血氣枯燥不知補接於內惟務熱洗於外不揣其本而齊其末而乃歸罪于冷滯大抵潰瘍宜洗若非行補接之藥以實其內竊恐淋洗有一時之快少頃恐病躰自覺疲憊有不耐煩之意非虛而何可不先議補接乎補接即參芪歸木之類是也

蘇亂髮蜂房蛇蛻皮各燒灰存性每味取一錢七酒調服

治瘡久不合神驗丹溪云髮補陰之功甚捷

丹收斂瘡口止有柳皮白斂煎湯飲之

靈眼白青黑眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛渴甚是二逆也有項中不便是四逆也聲嘶色脫是五逆也除此五者為順也玉版

精癰疽破潰之後其形候有逆有順眼白青黑而緊小一
惡也不能下食納藥而嘔食不知味二惡也腹痛渴甚三
惡也肩背不便四肢沉重四惡也聲嘶色脫唇鼻青黑面
目四肢浮腫五惡也煩躁時嗽腹痛渴甚泄利無度小便
如淋六惡也膿血大泄焮痛尤甚膿色敗臭氣不可近七
惡也喘粗短氣恍惚嗜臥八惡也未潰先黑又陷面青唇
黯便污者九惡也更有氣噫痞塞咳嗽身冷自汗無時瞪
目耳聾恍惚驚悸語言顛錯皆是惡証動息自寧飲食知
味一善也便利調勻二善也神彩精明語聲清朗三善也
膿清腫消色鮮不臭四善也躰氣和平五善也五善見三
則吉諸惡見四必危

癰疽所兼諸證

消熱毒方盛或發大渴此是毒攻心臟令舌乾煩渴也但

以補心氣藥內補即止

瘡渴

羅竹葉黃芪湯治發背發渴通治諸瘡大渴

淡竹葉二兩

生地八兩

黃芪

麥門冬去心

當歸

川芎

甘草

黃芩

芍藥

人參

半夏湯洗

石膏各三兩

右爲粗末每服五錢水一盞半竹葉五七片同煎至一盞去查溫服無時虛渴者忌用石膏半夏黃芩

金銀花散

金銀花

四兩去土甘草一兩炒

右爲細末每服四錢水酒各一盞同煎至一盞去查熱服

丹外科精要云疽疔向安後發渴與加減八味丸夫當此時血氣兩虛當用參芪補氣當歸地黃養血渴當自止何必

澤瀉茯苓導水佐以肉桂若忍冬丸黃芪六一湯等方切
當忍冬養血黃芪補氣渴何由作

忍冬丸大能止渴及療渴疾既愈之後須預防外癰疽
大宜服此

忍冬草 不以多少根莖
花葉皆可用

右入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入
甘草少許研為細末以所浸酒打麩糊丸如桐子大每
服五十九至百丸無時酒飲任下

黃芪六一湯大治渴疾補虛乏常服此藥終身可免癰疽
之疾

綿黃芪 去芦六兩一半生用一
半益水潤蒸三次焙乾 粉草 一兩一半生
一半炙黃用

右為細末每服二錢早晨日午以白湯點服若飲初盃
用酒調尤妙

桑枝湯大治口乾取桑枝一小升細切炒香以水三大升
煎取二升一日服盡

五味子湯大治口燥舌乾此是腎水竭也

五味 去芦 人參 去芦 麥門冬 去心

粉草 炙半兩

右咬咀每服半兩水一盞半煎至八分去查溫服無時
候一日二夜五七服妙

滄嘔逆

丹外科精要云嘔逆有二証一証謂初發時不曾服內托
散伏熱在心一証謂氣虛脾氣不正而嘔伏熱在心與內
托散三兩貼氣虛而嘔宜嘉禾散有寒熱宜家傳正氣散
兼與山藥丸以補腎謹按病機諸逆衝上嘔越皆屬於火
其內托散性涼固有降火之理若嘉禾散羣隊以為補虛
之劑補力已少徒有溫煖助火耳山藥丸補腎以壯下焦

之陰粗爲近理然治嘔須分先後腫瘍時當作毒氣上攻治之潰瘍後當作陰虛補之若年老因疽潰發嘔不食者宜用參芪曰木膏峻補取効佐藥隨時隨証加減恐用山藥丸緩急未易得力河間謂諸病瘡瘍如嘔者濕氣侵于胃也藥中宜倍加白朮

丹溪治一老人背疽嘔逆用補藥効方見潰瘍門予治一男子腫瘍嘔諸藥不止用獨參湯一服嘔即愈

精犀角膏治咽喉口舌生瘡昔有一貴人因疽而生此証醫者以爲心臟絕盡皆辭退愚進此藥一日而安

真琥珀

研

生犀角

各一錢

辰砂

砂

茯神

去木各二錢

真腦子

研

人參

去

酸枣仁

去皮研各二錢

右人參茯神犀角爲細末入乳鉢內別研藥味和勻用煉蜜搜爲膏子以瓷瓶收貯俟其疾作每服一彈子大

瘡泄瀉
逆冷

以麥門冬去心濃煎湯化服一日連服五服取効此方瘡瘍不宜用

和氣散

蒼朮

四兩米泔浸三日洗淨晒乾再以米醋炒令香黃色

甘草

炙

青皮

去穢各一兩

良姜

炒

肉桂

乾姜

炮各半兩

陳粟

升

右七味爲末每服一錢用炒茴香末半錢相和溫酒調下不拘時

瘡血出
不止

垣聖愈湯治諸惡瘡血出不止以寒水石細末搽之立止或瘡時間作黑色不可潰也藥力去盡却紅和如血出多而心煩不安不得眠睡此亡血也此湯主之

熟地

生地

各三錢

歸身

一錢

川芎

二錢

黃芪五分 人參三分

右咬咀如麻豈大都作一服水盞半煎至一盞去查稍熱服無時

瘡腫肉

梅治背瘡肉長疾皮不及裏見風即成腫以寒水石燒研為細末傅瘡上再用銅綠細末上之肉即不作腫矣

瘡毒急牽陰入小腹

不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉搗取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以來用之起死神効

久漏瘡

虛寒

丹漏瘡 須先服補藥以生氣血即參芪朮歸芩為主大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚艾炷灸炷隨漏之大小便多令微熱不可令痛乾則易之乾者再研為末再

寒

和再灸如困則止來日再灸宜至肉平為効亦有用附片灸仍用前血氣藥作膏藥貼之
經云肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將為膿內銷骨髓外破大腸留于節湊必將為敗積寒留舍榮衛不養肉縮筋肋肘不得伸內為骨痺外為不仁命曰大寒留于谿谷也此用附子灸者蓋此義也
梅師云腎移寒于脾發為癰疽少氣脾移寒于肝發為癰腫拘攣又云諸癰腫此皆安生岐伯曰生于八風之所變也又云地之濕氣感則害人皮肉筋脈聖濟云衣服之表易着寒所得之源大抵如此或發不變色或堅硬如石或捻之不痛久則然後變色疼痛漸奕而成膿如泔而稀久不能瘡瘡口不合變易為疔漏敗壞肌肉銷損骨髓以致

痿跛宜以此骨碎補丸主之

骨碎補

補骨脂

熟地

當歸

續斷

石楠

石斛

牛膝

杜仲

萆薢

附子

芍藥

川芎

兔絲子

沙參

羌活

防風

獨活

天麻

黃芪

此方與大倭方相表裏各等分爲末煉蜜丸空心鹽湯服

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大倭宜用

羌活

防風

細辛

附子

甘草

川芎

續斷

白芍

白朮

當歸

桂心

麻黃

黃芪

熟地

此方與前骨碎補丸相表裏

營氣不從逆于肉理乃生癰腫

陷脈爲瘻留連肉腠腠

氣化薄傳爲善畏及爲驚駭全文見陰陽門

精桂附丸治氣漏諸瘡

桂心

附子

炮裂米醋中浸再炮三五次去皮臍

厚朴姜製

粉草炙

白朮

各一兩木香一分

乳香研二錢

右爲細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下二二十九丹

溪云精要治冷漏諸瘡與桂附丸此冷只因瘡久不合

風冷乘之血氣不潮而成也厚朴雖溫其瀉衛尤速恐

不若參芪佐以陳皮庶乎與病情相得此方治冷漏瘡

若寒而虛者只以加味十全湯隨時令經絡加減用之

爲當又虛甚者宜參芪歸朮膏

陷脈散治漏瘡及二三十年癰癧或大如盂孟父久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟或潰令人驚惕卧寐不安躰中掣痛愈而復作

乾姜炮

琥珀研

大黃

附子炮去皮各一兩

丹參三分

石硫黃研

白石英研

鍾乳粉研

烏賊骨研各半兩

右爲末貯以篋合韋囊勿令泄氣若瘡濕即傅無汁即煎猪脂和傅之以乾爲度或死肌不消加芒硝二兩益佳一法胡燕屎一枚

攻裡

于和小渠袁三因強寇入家傷其兩脛外廉作瘡數年不已膿汁常消涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而出延爲濕瘡求治戴人曰爾中焦當有綠水二三升涎數掬袁曰何也戴人曰當被盜時感驚氣入腹驚則膽傷足少陽經也

兼兩外廉皆足少陽之部此膽之甲木受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦如漚既伏驚涎在中焦飲冷水咽爲驚涎所阻水隨經兩旁入瘡中故飲水瘡中水出乃上湧寒痰汗如流水次下綠水果二三升一夕而痂乾真可恠也

嘗治足膝下至踝漏瘡通足腫大於好足二倍行步不全用五龍丸大下之者六番每番皆五七行下後用黃柏蒼朮芫芍地草升葛星半牛膝活石桂調之近三四個月而安

發表

治漏瘡

川芎半兩

細辛二錢半

白芷稍半

甘草細末

右每日作湯服上瘡食後下瘡食前看瘡孔大小用隔年黃麻根刮去粗皮槌軟撚成繩子撚入孔中至不可

雜方

入則止日淺一日瘡用好膏藥貼之
本草治瘰有頭出膿水不止以啄木鳥一隻燒灰酒調服一錢七立瘥

收歛瘡口方

世神應膏治久漏瘡此宋褚防禦治理宗久漏瘡諸方不効獨此膏愈之如腸毒胃毒為丸服之神効

當歸一兩

赤芍藥

大黃各一兩

香白芷

官桂各一兩

玄參一兩

川續斷一兩

莪朮一兩

生地一兩

玄參三錢

川續斷二錢

莪朮一兩

右九味細剉用真香油二斤浸春五日夏三日秋七日冬十日入鍋內以文武火煎令黑色瀝去查如熱天用黃丹廿兩冷月十五兩旋旋下丹不住手攪試水中沉為度不可令婦人鷄犬見如漏有孔者以膏送入孔內外仍以膏攤貼之

海棋榔散治癰疽瘡癤膿潰之後外觸風寒腫軟僵硬膿水清稀出而不絕肉腠空虛惡汁臭敗瘡邊干及好肌不生及療疔瘰惡瘡浸潰不斂方見癩瘍斂瘡口藥即水香棋榔黃連等分為末敷貼也

丹治漏外寒藥

蘆甘石

牡礪粉

右為極細末傅之

濟烏金散貼惡瘡疔瘰

椽料子二個內一個實黃丹一個實白礬末相合定用黑俏麻皮纏了火內燒研細加麝香少許洗淨瘡貼之

疔截疔散治年深疔瘰瘡

黃連兩

白斂

白芨

黃丹各一兩

輕粉錢一

龍腦

麝香另研各半兩

蜜陀僧一兩

取朽骨方

丹

取朽骨久疽及痔漏中有者

右為細末和勻乾摻在紙上以膏貼之

取黑骨鷄脛骨上等砒霜實之鹽泥固濟火煨通紅取出地上出火毒去鹽泥用骨研細飯丸如粟米大以紙撚送入孔竅內更用膏藥貼之

本

雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康

成註云今醫方有五毒之藥作之用黃螯置石膽丹砂雄黃礬石磁石其中燒三日三夜其烟上着以鷄羽取之以注創惡肉破骨則盡出楊大年嘗記其事族人楊偶年少時有瘍于頰連齒輔車外腫若覆甕肉潰出膿血不輒吐之痛楚難忍療之百方彌久不瘥人語鄭法依法製藥成注之瘡中少頃取朽骨連兩牙潰出遂愈信古方攻病之速也黃螯即瓦盆也

針灸

東久漏瘡

足內踝上一寸

灸三壯六壯

如在上者肩井 鳩尾

診

肺脈微緩為痿痿

緩者多熱。全文見治虛實法

雜方

垣瘡醫自幼至老凡所經驗必須寫之嘗記疔瘻惡瘡諸

藥不效者取蟻螯剪去兩頭安瘡口上以艾炷灸之七壯一易不過七枚無不效者又法用乞火婆虫兒灸之同前法累驗神効人皆秘之往往父子不傳

醫學綱目卷之十八

醫學綱目卷之十九

癰疽所發部分名狀不同

疔瘡

石癰

諸腫

癰癧

附馬

結核

癭瘤

偷鍼

天蛇頭代指

甲疽嵌甲

乳癰乳巖

囊癰陰頭癰

便毒

貼骨癰

內癰有

三

肺癰腸癰胃脘癰

靈五臟身有五部伏兔一腓二腓者膈也背三五臟膺四

項五此五部有癰疽者死

寒熱病篇王海藏云腦鬚髮共頤四處亦為癰疽必死之處

消不可患癰疽者七處

眼後虛處

頤接骨處

陰根

根上毛間胛與尻骨接處

耳門前後車骨接處

諸因

小腹風水所成癰疽

頷骨下近耳後虛處

鼻骨中並

能害人但以諸法療之或有得瘥唯眼後虛處最險

正

腦上一處起為腦癰及腦疽腦鑱並在大椎骨上入髮際

通診癰疽要言部分

腦癰宜急破

生腦癰皮起易得破穴急破急出膿不害腦疽皮厚難得破穴須急發內毒使破穴方可

愈腦鑠難

腦鑠一處初起如橫木掘上起頂門下止大椎發腫如火燒其色青黑如靴皮大硬不見膿即損外皮如犬咬去肉之跡難愈鑠式約切

髮發防

左右鬢兩處癰疽初起如虫咬癢疼痛腫不赤紅難見膿汁是為鬢發此亦危篤之患既損破多為漏瘡

左右髮際起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺此疾婦人患多丈夫患少始因風濕上攻髮際亦宜出膿無傷

額及太陽發疽慎風水

左額右額發赤疽不拘大小狀如桃李急宜藥貼破見膿無害右額角一處發毒疽及惡癰為近太陽穴如腫滿太陽即成虛損為近穴而難消不可破如破後傷外風水即能害人亦宜用藥潰膿後速斂合瘡口如經冬月即成冷

瘡緣此處近太陽穴上至額角都為險處

左右太陽穴或發疽癰及癰五七日不潰毒氣流入眼眶攻眼眼合不開用藥貼破破後慎外風水所入即損其睛疰損眼臉而成大疾

發眉慮攻眼與太陽發髭

左右眉稜兩處發為發眉不拘在頭尾宜慮未穴已前攻擊在眉頭即攻入眼損睛在眉後即攻入太陽並宜戒慎鼻下一處人中兩處為發髭此多因摘髭外入風而結攻作不常寒熱相併此亦害人

發頤

下頤一處發為發頤肥人多有此疾恐手搔傷而發腫左右牙牙骨接處發癰疽處腫脹攻骨及牙關張口不得

牙火發忌風水

因諸風熱上攻或多食燒灸之物所為或因患牙癰即從牙縫中破出膿血切忌外風水觸犯

臂肘發處筋挛

垂臂兩處發接骨下臂鷺上起如鷄鴨卵大皆由榮衛不

調所為也喜患實處而不透內亦宜急消或發穴早療
兩臂肘起在接骨下引手至小骨之上發癰瘡此處雖實
奈連大小筋骨舉動不便垂手多墜疼如膿深沉徹骨即
傷筋脈拳縮不舒搗撒宜急以緩慢筋脈藥餌治之

發手背

兩手背發癰疽初生如水刺無頭腦頑然滿手背腫滿後
聚毒成瘡深入至骨而為發手背此屬五種皆發毒之類
也

發腋處

兩肋起疽名為發肋初腫盛至十數日不穴攻即腫大如
杯碗高如斂背痛徹內腸絞刺左邊患應右邊痛右邊患
應左邊痛唯有此處多是內毒却入攻而死者多人有斯
患急以針刺出膿血則免內攻傷內矣

三里發

三里兩處起癰疽初發如牛眼睛青黑便五七日破穴出
黑血汁膿腫攻膀胱連腿裏拘急冷疼此因傷筋氣勞力

所成宜用湯藥注射去其外毒自平息矣

接脚骨
上發處
損筋

兩脚接骨近上膀胱下一處起丹疽如胡桃大硬如物打
搯之狀不苦疼但腫急脹慮其損筋亦須早出膿毒可保
平安也

脚心發
毒淺可
治深不
可治

兩脚心發徹骨者不治如脚心微皮破不至深發膿不多
者可治 癰發雖重不至損人但世人不曉醫治自至危
殆耳

上焦宜
用解利
藥處傷
風水

上焦發癰為陽是壅塞實候宜解利溫涼湯藥去其積熱
上攻外即貼消毒逼腫藥如已結定即用發穴藥候穴破
出其膿毒腫平方貼生肉等藥然後歛合瘡口亦慮外傷
風水勿食發風熱醬麪毒物等忌房事

中焦宜
用暖內
藥防內
攻

中焦發癰至腰上一節前後心不定所在皆是滯滯候亦
乘虛而作不拘大小前起心雄尾者最要緊近兩腋是虛

處兩脇肋下至臍上及臍下兩傍一二寸發癰填氣伏硬難潰膿為此等處偏難發穴穴後難合瘡口並須先用煖內藥服後用熱藥貼令軟和慢慢破穴不得急破急破即朝夕出膿不住緩慢破穴即一頓出膿易為將息後心者唯有十一椎脾俞下十四椎上為腎俞腎俞下為腰俞兩處起癰者防毒氣內攻為此處皆是至虛處凡有癰起先須補內氣令實方可放破內氣實則不內攻且易得潰唯腰俞兩處多成漏疾預防節慾則免矣

下焦宜用和平

下焦發為流注虛損候前陰股兩處起如鷄卵大長橫摺內初起腫核結塊後四畔浮腫相併伏硬色青黑先用和平內藥服三五日後用發穴散及搔藥令軟即穴穴後其瘡口即隨摺子內作長瘡瘡口破宜急用抽毒膏出膿膿盡便貼合瘡口藥為此處無肉可壞更不須長肉也

便毒防漏

腿胫兩處起為便毒跨下兩鬢尖下大道前穀道小道後水道成懸癰皆是虛極人患此癰近穀道左右亦名痔癰宜急補脾臟及發處貼藥即用發穴散破後用抽膿膏膿盡用合瘡口散合之慎勿過冬即成冷漏難治

兩垂珠兩曲腓防漏

垂珠左右兩處起癰為驢馬墜初起大小不定此處微實皮肉薄紋緊口亦難合瘡初起宜以消散藥貼令內消此處亦易成漏瘡唯宜消散之硬即恐緩慢難為功矣又云交膈一處近稜線上亦為驢馬墜防漏驢馬墜是也

兩曲腓膀肚下內外兩踝前有廉刃兩邊為裏外廉上結癰腫此處近骨難瘥宜用收毒散外貼四畔中心即用活血肉藥貼無害

下至兩脚心發癰癰沉深不治如微似皮薄易破者猶可也 凡有癰腫皆屬六腑有疾

靈 癰發於頤中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不瀉塞咽
半日死其化為膿者瀉則合豕膏冷食三日而已 發於
頸者名曰天疽其癰大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋
前傷任脈內薰肝肺薰肝肺十餘日而死矣 俱出癰疽
篇下同
消 百脈疽腫起環頸項疼痛身體大熱不敢動止悄悄不
能食此有大畏恐駭上氣咳嗽其發引耳不可以腫十五
日可刺導引不刺導引見血八十日必死 土龍疽發背
起胃俞及腎俞大發寒熱十數日大汗展頸引身盡熱如
沸不穴二十日死九日可刺不刺其上下亦黑若膿青黑
者死血膿者不死

靈 陽氣大發消腦溜項名曰腦爍其色不樂腦項痛如刺
以針煩心者死不可治

消 赤色疽發頭額及腦前并手掌中十日不穴者死七日

可刺出赤血七日未有膿不可治 不穴者不作穴
而東攻西擊也 杼疽

發鬚鬚及兩耳不穴十五日死可刺其膿色黑如豆豉或

見血者死 黑疽發大椎骨上連兩夾脊上七日可刺導

引為癰疽出膿不可止吐碎骨身痒後痛者此故傷寒氣

入臟腑發為食疽也九日可刺導引之不刺不導引十一

日死

靈 發於肩及臑名曰疵癘其狀赤黑急治之此令人汗出

至足不害五臟癘發四五日逆熯之 癘疽篇○
此當入癘

消 丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發成疔疽五日

腫大令人口噤寒戰十二日可刺不治二十日死 陳乾

疽腫發起兩肩及兩大臂連胛骨二七日痛不息亦不可

動五十日身熱不赤六十日可刺刺之無血者死

靈 發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長踈

砭之塗以豕膏六日已勿裹之其癰堅而不潰者為馬刀挾癭急治之

消內疔疽發兩腋下及臂并兩手掌中振寒熱血噎乾飲多即嘔煩心忪脘脈盛六七八日診如此可汗不汗死

靈發於胸名曰井疽其狀如大莖三四日起不早治下入腹不治七日死矣 發於膺名曰甘疽色青其狀如穀實

瓜瓠常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十歲死死後出膿 發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀大

癰膿其中乃有生肉大如赤小莖治之劉陵薊草根各一升以水一斗六升煮之竭為取三升即強飲厚衣坐於釜

上令汗至足已疵疾蚤切○甲乙經於赤小莖下作治之劉陵草赤松根各一升**消**使熒疽腫起發肋及兩肩肘頭二十日不穴死九日可

刺發赤白相間膿多可治全無赤白者不治 蜂疽發髀

背起心俞及心包絡俞若肩髃二十日不穴死十日可刺其色赤黑膿清者不治 特疽發肺俞及肝俞不穴二十

日死八日可刺其色紅赤內隱起如椒子者死 陰陽二氣疽廣潤滿背或大或小不常腫熱脹六十日可刺導引

出膿不拘深淺多少發渴體倦十日外不見膿不治 筋疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可刺有瘡在肥腸中

九十日死 衝疽發小腹疼痛而振寒熱四日忪忪五日變色可刺不刺即導引出膿毒不治五十餘日死

靈發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死矣治見經虛條

消湧泉疽腫起發太陰如伏鼠二十日不穴死十日可刺發清膿赤黑者死白者可治太陰尻尾前是也

靈發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變色癰腫內薄於骨

不急治三十日死矣股脛劉涓子作股陽發於股陰名曰赤施不

急治六十日死在兩股之內不治十日死

消陰疽發腿髀及陰股始發腰強數飲不能多七日發堅腫脹惡疼心煩躁死不治

靈發於膝名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石石之者死須其柔乃石之者生陸堅如石者用生樟根擦之則効諸癰疽

之發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於陰者三十日死陽謂諸節之背陰謂諸節之脘却發於脛

名曰兔齧其狀如赤莖至骨急治之不急治害人也發

於內踝名曰走緩其狀灘色不變數石其輪而止其寒熱不死發於足上下名曰四滌其狀大癰不急治之百日

死發於足傍名曰厲癰其狀不大初從小指發急治去之其狀黑者不可消輒益不治百日死發於足指名曰

脫癰其狀赤黑者死不治不赤黑者不死治之不衰急斬之否則死矣

消癰敦疽發兩足指五日不穴死四日可刺其色發黑癰者不堪未過節者可治陽疽起足跌及足下二十日不

穴死十日可刺發赤白膿血不多其瘡上痒及赤黑者死禽疽始發者如疥數十處如拳打之狀發寒齒噤如此

者十四日死十日可刺導引膿出即愈衡疽發如腫或時復往來可要其所刺之導引膿出即愈

丹琥珀膏

歸鬚

川芎

黃芪稍

蜂房

細辛

皂角

升麻

甘草稍

草麻子

木鱉子

芍藥

白欬

獨活

川椒

藜蘆

防風稍

枸杞子

菖蒲

降真香

官桂

瓜蒌

蘇木

白芷

杏仁

黃連

槐枝已上各一兩

琥珀

沉香

木香

丁香

藿香

零香

雲母石

乳香

雄黃

硃砂

安息香

甘松已上各二錢半

輕粉

麝香各一錢

髮灰五錢

白礬拈一兩已上十六味為極細末

羊腎脂四兩

真酥二兩

香油四斤

黃丹

右先以前十六味剉槌碎用水五升文武火熬至二升半去查再用水五升又熬至二升半去查與前汁一處慢火煎用槐枝不住手攪成膏用磁器盛頓起將後琥珀等十六味研為極細末用帛包起於前膏內下淨羊脂四兩真酥二兩同膏入香油內攪令勻以文武火熬

膏內水盡用帛撚點油燒不爆為度漸入黃丹以二兩五錢重為一次仍用槐枝不住手攪滴水中不散軟硬得所如軟添黃丹如硬添油再上火熬却入前藥細末五兩微煎數沸用磁器盛貯如用於紙上攤之量瘡口大小專治五發惡瘡疔腫癰癤遠年冷疔痔漏一切無名惡瘡蛇傷蝎螫大吹並皆治之

疔瘡

疔瘡皆生四肢發黃疱中或紫黑必先痒後痛先寒後熱也

表裏

羅丙午歲予居葭城人多患疔瘡縣尹董公謂予曰今歲

患疔瘡者極多貧民無力醫治近於史侯處得數方用之者無不效官給藥錢君當捨手治之遂諾其語董公榜示通衢命予施藥如此一年全活甚衆其用保生錠子千金

托裏散神聖膏藥破棺丹凡四方
保生錠子治疔瘡背疽癰癤一切惡瘡

金脚信二錢 雄黃三錢 輕粉二錢 硃砂三錢

麝香一錢 巴荳四十九粒 另研文武火炮生用尤妙 加蟾酥一錢

右為細末用黃蠟五錢溶開將藥和成錠子冷水浸少
時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開每用一
餅次用神聖膏後用托裏散若瘡氣入腹危者服破棺
丹世傳疔瘡必有一條紅線可針紅線所至之處出毒血然後傳藥

神聖膏藥治一切惡瘡

當歸 藁本各半兩 沒藥 乳香各二錢

白芨 琥珀各二錢半 黃丹二兩 白膠香三兩

黃蠟二兩 粉霜一錢 木鱉子五十箇

巴荳十五粒 清油 槐柳枝各一百枝

膽礬一錢
右件一處先將槐柳枝下在油內熬焦取出復下餘藥
熬勿至焦濾出却將油澄清下黃丹再熬成膏用緋帛
攤之立有神効

托裏散治一切發背疔瘡

黃芪一兩 厚朴二兩 川芎 防風

桔梗各二兩 白芷一兩 連翹二錢 芍藥

官桂 甘草節 人參各兩 木香

沒藥 乳香 當歸各半兩

右為細末每服三錢酒一大盞煎二三沸和查溫服

破棺丹治瘡腫一切風熱

大黃二兩半 甘草 芒硝各一兩

右為細末煉蜜丸如彈子每服半丸食後溫酒化下或

童溺半盞研化之忌冷水

濟 金砂散取疔瘡

道人頭微妙存性一 硃砂半兩即蒼耳子 雄黃三錢

蟾酥以為多

右將瘡四圍刺破以少油調藥末置於瘡內緋帛封之數日疔自出如瘡入腹嘔逆者將蒼耳搗汁飲之但用方

綱目雖黃等分研細用蜜調先破瘡頭去血入藥豈大在瘡口內紙花貼之亦効

無 蒼耳散治一切疔腫神効用蒼耳草根莖苗子但取一色便可用燒灰存性研細用好米醋米泔澄淀和如泥隨瘡大小塗上厚二分乾即易之不過十度即拔根出須針破塗之更加雄黃尤妙

世 蒼耳與白梅研爛貼疔上拔去根

濟 蟾酥丹治疔瘡取蟾酥以白麩黃丹搜作劑丸如麥粒

狀針破患處以一粒納之取蟾酥法用蠟燭破眉稜上以竹篦刮下然後插在指陰處自乾用之

衍 苦苣擣汁傳疔瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調

傳本草云取苦苣莖中白汁傳疔腫出根又取汁滴瘡上立消

丹 治疔用磁石為末苦酒和傳封之根出立瘥秘要

疔瘡用白蘆為末水調傳之聖惠方

世 治疔瘡用麻內蛙虫一條研傳瘡上却用膏藥貼上一飯時去膏藥其疔自出

治疔瘡最有功効用蟬蛻僵蚕為末酸醋調塗四圍留瘡口俟根出稍長然後拔去再用藥塗瘡海藏方單用僵蚕為末津調塗亦佳

保 治疔瘡奪命散

烏頭尖 附子底 蝎稍 雌黃

雄黃各一錢

蜈蚣兩

礪砂

粉霜

輕粉各五分

砒二錢半

腦子少許

麝香少許

右為細末先破瘡出惡血以草杖頭用帛帶藥末插入于內以深為度

附日本三藏傳疔瘡方江子肉十粒半夏一大顆研末附于半枚羌螂一枚各為末四味臭麝香也相和看瘡大小以帛繩子圍瘡口以藥泥上又用絹帛貼傳時換新藥以可為度此方活人甚多

聖治疔瘡甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金方同

丹琥珀膏方見瘡疽推方條

又方用鍼刀斫破疔頭以蟾酥傳之後用 野菊花

莎草根

甜菜葉

搗細以無灰酒盡量調服

之酒醒疔化水即痛定如熱除不必去疔亦自愈也

托裏維世方 治疔瘡

獨脚茅

防風

細辛

甘草節

白僵蚕

青皮

黃連

羌活

獨活

蟬腿

赤芍藥各等分

右咬咀每服五錢先將一服加澤蘭葉少許薑一兩同搗爛熱酒和服然後酒水各半薑薑三片煎服此方神効

無治十三種疔皆以此法治之

以緋帛一片裹藥取匣為限先用亂髮鷄子大攤布帛上牛黃如桐子大又以棘刺針二十一枚赤小荳七粒為末並布髮上捲緋綿作團外以髮作繩十字縛之置熨斗中急火燒灰研細以枸杞或子或根皮枝葉隨得為末用枸杞末二七緋帛灰一七共成三七研勻分二

服空心温酒調下

取汗
世奪命丹治疔瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥錢半 硃砂水飛三分 輕粉 枯礬

寒水石水飛各一錢 銅綠字一 麝香字一

海羊二十箇研即蝸牛也

右件為細末將海羊另研為泥和藥一處丸如菉荳大如丸不就加好酒成之病輕者一九二九重者三九未效再服服時嚼蔥白一大口極爛置手心放藥丸於蔥內裹合以熱酒送下暖處臥取汗出為效忌米水

瑞返魂丹治十三種疔

硃砂 膽礬各一兩半 血竭 銅綠

蝸牛生用各一兩 雄黃 枯白礬各一兩 輕粉

沒藥 蟾酥各半 麝香少許

瘡毒入腹

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥為細末同研和丸如鷄頭大每服一九令病人先嚼蔥白三寸吐在手心將藥丸裹在蔥白內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘥如不能嚼蔥研爛裹下極效

治疔瘡毒氣入腹多嘔吐欲死者即服內托香粉散滴乳半兩另研真菉荳粉一兩為細末煎生甘草湯調三錢時時飲之常令灌潤胸膈一方用雄黃菉荳粉乳香等分為末水調服

世疔瘡入腹嘔者煎道人頭濃汁飲之

治疔瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁 蟬腿 貫仲各一兩 丁香

乳香各二錢

右為細末每服二錢空心温酒下紫花地丁麥熟時有蒲公英狀但蒲公英開黃花地丁開紫花

蒲公英狀但蒲公英開黃花地丁開紫花

瑞 治疔危篤者二服即愈輕者一服立効

土蜂房一蜂巢全本草云土蜂房有毒利大小便

蛇蛻一條全

右作一處器皿中盛用黃泥封固火煨存性研為細末每服一錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止其瘡已

化黃水矣仍服五聖散

大黃兩一

生薑兩二

瓜蒌筒一

皂角針兩二

甘草兩一

金銀花兩二

右咬咀用好酒二升同煎至八分去查不拘時服

羅

破棺丹

一方有當歸赤芍連翹牡蠣金銀花紫花地丁宜選用之

山梔

牽牛末

大黃兩各一

甘草

京三稜炮各七錢

右煉蜜丸如彈子大酒化服之

世 治疔瘡最驗用蒼耳臭牡丹各一大握搗爛新汲水或

順流水調服一碗瀉下黑水即愈

丹 追毒丸

有寒者熱下之

海浮石

燒赤醋燂七次半兩

乳香

沒藥各一錢

巴菝

四十粒

川烏

一兩

右為末醋糊丸如桐子大若患二三日服十九五六日服十四丸隨病上下服之先喫冷酒半盞或一盞又用冷酒吞下如嘔吞之不妨出藥依上服之病人大便不動再用三丸如疔看得端的爪破用頭垢留患處後服藥

藥

海 肘後犯疔腫垂死菊花葉一握搗絞汁一升入口即活

此神驗亦用其根

丹溪云根莖葉花皆可紫梗者佳

疔腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞汁冷服一升日

三服甚驗

危因通治方

灸

世疔瘡於所屬經絡各瀉之 疔瘡者必發於手足之間生黃疱其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之際急宜以針於紅線所至處刺出毒血然後以蟾酥乳香膏等藥於正瘡上塗之針時以病者知痛出血為好否則紅線入腹攻心必致危困矣

百一治疔腫以針刺四畔用石榴皮末着瘡上調麩圍四畔灸痛為度調末傳上急裏經宿連根自出

診

禹錫患疔腫中風疼痛者爛驢馬糞熨瘡滿五十遍極效
無一曰麻子疔其狀肉上起頭大如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子及衣布并入麻田中行 二曰石疔其狀皮肉相連色如黑荳甚硬刺之不入肉內陰陰微痛忌瓦爍磚石之屬 三曰雄疔其狀炮頭黑靨四畔仰炮漿起有水出色黃大如錢孔形忌房事 四曰雌疔其狀瘡

頭稍黃向裏靨亦似灸瘡四面炮漿起心凹色赤大如錢孔忌房事 五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有炮漿起如赤粟米忌火灸爍 六曰爛疔其狀色稍黑有白癩瘡中潰潰有濃水流瘡形大小如匙面忌沸熱食爛帛物 七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑荳四畔起大赤色今日生一明日二後日三乃至十若滿三十六藥所不能治俗名黑炮忌嗔怒畜積愁恨 八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮上浮生形如小荳狀似蛇眼大體硬忌惡眼看并嫉妬人見之及毒藥 九曰鹽膚疔其狀大如匙面四畔背亦有黑粟粒起大忌食鹹物 十曰水洗疔其狀大如錢形或如錢孔瘡頭白裏黑靨汁出中硬忌飲漿水水洗渡河 十一曰刀鎌疔其狀濶狹如薙葉大長一寸左側肉黑如燒爍忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以

藥治不可亂攻 十二曰浮瀝疔其狀瘡體圓曲少許不合長而狹如殭葉大內黃外黑黑處刺不痛黃處刺則痛
十三曰牛拘疔其狀肉皴起插不破

此十三種初發必先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子疔一種始末唯痒所最忌者不得觸犯犯即難治其浮瀝疔牛拘疔兩種無忌縱不治亦不殺人欲知犯觸但看脊強瘡痛極甚不可恐者是犯禁也 鮑步孝切

石癰

堅種雜方 治石癰如石不治腫者生商陸根搗擦之燥則易之取軟為度 張文仲 癰未潰以苦苣白汁滴之立潰本草云亦出疔根

保木香散治瘡難消不能作膿痛不止酒調下三錢 方見痘遺

諸腫

卒腫起大痛羌菁根大者杵之和苦酒如泥煮三沸帛上包之 氏 風毒腫三年苦酒濃煎蔥白以布包慰腫上

外臺秘要 治一切熱毒腫商陸根和鹽少許傳之日再易 孫

人食忌 治一切毒腫疼痛不可忍者搗草麻仁傳之立瘥

財後方 治腫蒺藜子一升炒黃杵細以香油和如泥再炒

令焦以舊布如腫之大小攤之貼腫上勿開頭搯上 外臺秘要

治惡刺及狐狸刺毒腫取蒲公英草根白汁傳之多塗

立瘥余七月十五日夜左手中指背措着庭木痛不可忍

十日後瘡日深漸高大痛欲死用此而安 孫方

經患熱腫水研山豈根濃汁塗乾再塗

疔膿月中以新瓦罐滿注熱水用朴硝二升投湯中攪散

掛北簷下俟硝滲出罐外却收之以人乳汁調半盞掃一

切風熱毒氣攻注目臉及發頭面四肢腫痛應手神効

腫毒或疼痛處以赤小荳為末水調傳頻換或用香白

芷水調傳尤妙 又方白芙蓉葉晒乾同皂角為末水調

傳

治諸處皮裏面痛何首烏末薑汁調膏以帛裹於痛處

用火灸皮鞋底熨之妙經驗方

療癰馬刀

結核連續者為癰癧形長如蛤者為馬刀

表裏交攻

羅曲陽縣劉禪師善治瘡瘍癰癧其効更捷授予四方太

乙膏玉燭散尅効散翠玉膏用之每每見効

太乙膏治癰子瘡神効

沒藥四錢

清油一斤

黃丹五兩

腦子研一錢

麝香三錢

輕粉

乳香各二錢

右以清油黃丹熬成膏用柳枝攪又用葱蔥七枝旋旋
加下蔥盡為度下火不住手攪至滴水不散却入沒乳
腦麝輕粉等味攪勻磁器內盛用

尅効散

斑猫四十九箇不
去翅足炒

官桂半錢

粳米四十粒

赤小荳四十粒

礶砂半錢

右五味研為細末初服一字次服半錢次服三字又次
服四字煎樟柳根湯送下空心服以小便淋瀝併作瀉
為効惡心嘔吐黃水無妨其癰癧日日自消矣

玉燭散治癰癧自消和血通經

當歸

芍藥

大黃

甘草

熟地

芒硝

黃芩

川芎各等分

右為麤末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去查

溫服日進一服七八日効

翠玉膏

方見
癩瘡

內除臟
腑之本

楊氏家藏治療癩方

荆芥

白僵蚕

黑牽牛各二錢

斑猫二十八箇去頭

翅足用
大米炒

右為末臨臥時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時又一服五更初却用溫酒調藥一錢或二三錢量強弱用服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯再進前藥一服更以燈心湯下調琥珀末一錢重服以小便內利去惡毒為愈如小便痛用青黛一錢以甘草湯調送下即止

嚴三聖丸治療癩

丁香五十粒

斑猫十箇

麝香另研一錢

右為末用鹽豉五十粒湯浸研爛如泥和前藥令勻丸如棗葶大每服五七丸食前溫酒送下日進三服五七日外覺小便淋瀝是藥之効或便下如青筋膜之狀是病之根也忌濕麪毒食

保連翹湯

連翹一斤

瞿麥一斤

大黃三兩

甘草二兩

右剉每服一兩水二碗煎至一盞半早食後已時服在項兩邊屬足少陽經服藥十餘日後可於臨泣穴灸二十七壯服藥不可住至五六十日方効一方加大黃木通貝母一作知母各五兩雄黃七分檳榔半兩減甘草不用同前藥為細末熟水調下三五錢

無必勝丸治療癩不以年深月近及腦後兩邊有小結塊連復數箇兼勞瘵腹內有塊

鯽魚

一箇去腸并子

雄黃

一粒鷄子大

礶砂

一錢已上二味並入在鯽魚腹內仰安魚

于炭火燒烟盡取出

蜈蚣

一條

蓬朮

半兩

梔子

五箇

皂角

二挺已上四味並燒存性

草麻子

五箇去皮燈上燒

黃明膠

三文

右為末另用皂角二挺去皮槌碎以水三碗揉去滓煮精羊肉四兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研成膏和藥末丸如菉荳大硃砂為衣温酒浸晨下十九一服至晚看肉疙瘩子若項有五箇則以五服藥取之視其所生多少以為服數既可更進數服

白花蛇散治久漏瘰癧發於頂腋間增寒發熱或痛或不痛

白花蛇

酒浸軟去皮骨焙乾二兩

犀角

鎊半兩

黑牽牛

半兩半生

炒半

青皮

兩

右為末每服二錢加膩粉半錢研勻五更糯米飲調下已時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌發風壅熱物如已成瘡一月可効神驗

世小犀角丸常服除去根本截其源流應効如神諸癧並宜服之

犀角

青皮

陳皮

各一兩

黑牽牛

一兩半生

炒半

連翹

兩

右為細末用皂角二條去皮弦子炮槌以布絞取汁一碗許又用新薄苛二斤研取汁同熬成膏以前藥末為丸如桐子大每服三十九連翹煎湯食後服間以薄苛茶湯服

子和一婦人病瘰癧延及胸臆皆成大瘡相連無好皮肉求戴人療之戴人曰火淫所勝治以鹹寒命以滄鹽吐之

外敷藥方

即一吐而着痂次用涼膈散解毒湯等劑皮肉反復如初

杏樹葉陰乾為末五分

萬年霜火煨為末二分半即人中白

蝙蝠火焙乾為末二分半

白花蛇蛻燒為末二分半為末二分半

蜜蜂七箇焙為末

右將杏樹葉末用清水調却入前四件藥末調勻傳患

處却將皮帛一片用針刺孔貼藥上如乾用清水就昏

上刷之每一晝夜換藥一次如面上發熱服清涼飲子

數貼其熱自退

敗散瘰癧方神効

白膠香

海螵蛸

降真香

用心無土氣者

右等分為末摻患處外以水昏掩之一夕而退

已破者

蜜蜂二十箇

蛇蛻七分半

蜈蚣二條端午前收者

右用香油四兩將前三藥入油內用文武火熬成入光

粉二兩用葉枝七條如筋大者急攪候冷出火氣七晝

夜方可用昏攤作膏貼患處已上二方得之於義門鄭氏累驗不須服藥貼上五

七日便消

貼瘰癧方用大烏頭五箇火炮五箇生用並去皮臍大

皂莢二條半以好米醋二鍾刷炙醋乾為度一半焙乾並

去黑皮又用炒糯米一百六十粒同研末以好米醋於火

上畧頓微煖傳貼患處入蜜少許尤佳 不問有頭無頭

大蟾五枚日乾細研酥調如麪日兩度貼之出聖惠方蟾一作蜘蛛

或破或不破項以下至胸前者皆治之用九真藤如雞

卵大洗生嚼常服之取葉搗覆瘡上數服即止出斗門方九真藤即

何首烏也

無蝸牛散治瘰癧潰與未潰皆可治

蝸牛不拘多少以竹簽穿瓦上曬乾燒存性

右為末入輕粉少許猪骨髓調用紙花量瘡大小貼之
一法以帶殼蝸牛七箇生用取去肉入丁香七枚於七殼內燒存性與肉同研成膏用紙花貼之

海項後側少陽經中疔瘡不辨肉色不問大小及月日深遠或有赤硬腫痛用

生山藥一塊革麻子一箇

右研勻攤貼之如神丹溪云山藥補陽氣生者能消腫硬經曰虛之所在邪必湊之留而不去其病為實非腫硬之謂乎故其氣則留滯自不容不行

世粉金散

黃柏 草烏等 為末蜜調傳之

清涼散餅

山慈姑生 良薑等

右俱搗為餅去汁罨之能散去寒熱或以山慈拈磨調酒服大妙此藥大能散癰如神

東龍泉散塗癰

瓦粉 龍泉粉炒即磨刀石上粉也 昆布去土

廣茂 京三稜各半兩酒浸炒乾

右件同為極細末煎熱水調塗之用此去疾尤速

世治癰用鯽魚莞花燒灰存性水調傳 治鼠癰小嫩鼠

未出毛者焙乾蝙蝠糞小麥炒鬼箭根焙乾各為末和勻

油調傳乾再傳之

本治鼠癰瘰癧刺蝟皮瓦上炒右一味研為末加水銀粉

乾傳

廣治瘰癧經年不瘥者生玄參搗碎傳上日一易之

外治瘰癧 燒狼屎灰傳上
本治諸瘰疾

硃砂

砒霜

礪砂

馬牙硝各等分

右乳鉢內研細麪糊搜如香附子狀相瘡口大小作之盡送入瘡口中恐腫時用薄苛研細塗之待收口却將大栢皮白丁香並為末盡入孔中如邊不乾却用江子去殼不拘多少用麻油煎令赤去火氣後去江子入蠟合如膏看瘡口大小塗之及將白芨末水調塗上立効治漏癧用蛇菰子不拘多少瓦上晒乾為末用紙撚蘸藥入瘡口立効蛇菰子未詳恐即慈菰子
丹 又方用大田螺肉燒存性為末麝香少許濕則乾摻乾則油調傳
服 人年五六十其脈浮大者痺俠背行苦腸鳴馬刀俠瘦

虛實

者皆為勞得之

又治瘰癧

人參

白朮

當歸

陳皮

芍藥

川芎

香附

茯苓

半夏

甘草

右作一服薑二片以金銀藤煎湯一鍾半煎前藥食後就吞絳宮丸五十粒

又方絳宮丸

大黃

山查

連翹

川芎

當歸

麥芽

桃仁

蘆薈

甘草

芸薹子

黃連

南星

海藻

升麻

羌活

桔梗

防風

白朮

黃芩

右用神麩糊為丸已破加人參一兩作膏用甘草節僵
蚕同煎

治頸上塊動者

夏枯草末六錢 甘草末一錢

右和勻每服一錢至二錢茶清調下食後

本言夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之功而
經不言觀其能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之
藥佐之外施艾灸亦漸取效此草三四月開花夏至邊便
枯蓋稟純陽之氣得陰則枯耳世人不知故表而出之
內瀉病本之法並見前表裏條

治瘰癧

東連翹散堅湯治耳下至缺盆或至肩上生瘡堅硬如石
動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇
或已流膿作瘡或未破並皆治之

當歸酒洗

黃芩生半兩

上瓜根酒炒 芍藥一錢

柴胡根二兩 連翹兩半

蒼朮三錢 草龍膽酒洗

黃芩酒炒 甘草炙六錢

黃連酒炒 廣茂酒炒

京三稜細剉半兩同廣茂酒洗一次微炒乾

右以一半為細末煉蜜為丸如粟壹大每服一百丸或

一百五十九一半咬咀每服半兩水一盞八分先浸半

日煎去查熱服臨臥頭低脚高去枕而臥每口作十次

嚥留一口送下丸子服畢如常安臥

升陽調經湯治遠項下或至頰車生瘰癧此症出足陽明
胃經中來也若其瘡深遠隱曲肉低是足少陰腎中來也
是戊傳癸水夫傳妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之
或作丸服亦得

升麻八錢

連翹兩半

葛根五錢

草龍膽酒炒

桔梗

兩半

細黃芩

酒炒六錢

黃栢

酒炒二次去皮七錢

知母

酒洗炒一兩

廣茂

酒洗炒一兩

甘草

炙半兩

京三稜

酒洗微同

廣茂炒五錢

黃連

去鬚酒洗五錢

右秤一半作丸煉蜜為丸如菘苳大每服一百丸或一百五十九一半咬咀每服半兩若能食大便硬可旋加至七八錢止水二盞先浸半日煎至一盞去查熱服臥身脚在高處去枕頭噲一口作十次嚥之留一口在後送下九子服藥畢臥如常此治法也

散腫潰堅湯治馬刀瘡結硬如石在耳下至缺盆或至肩上或至脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍下頰或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二瘡已破及流膿水並皆治之服藥多少臨病斟酌量病人飲食多少大便硬軟以意消息之

柴胡稍

四錢

升麻

六錢

桔梗

半兩

草龍膽

酒炒半兩

黃芩稍

酒洗炒八錢

連翹

三錢

甘草根

炙三錢

當歸

三錢

白芍藥

二錢

瓜蒌根

酒洗半兩

黃栢

去皮酒炒半兩

知母

炒半兩

葛根

二錢

黃連

二錢

京三稜

酒炒三錢

廣茂

酒洗炒三錢

昆布

去土半兩

右咬咀每服六錢或七錢水二盞先浸半日煎至一盞去查稍熱服於臥處伸脚在高處頭微低每噲一仁作十次嚥至服畢依常安臥取藥在胸中停留故也另攢半料作細末煉蜜為丸如菘苳大每服一百丸此湯留一口送下更加海藻半兩炒食後量虛實加減多少服皆倣此例

陽明

救苦勝靈丹湯治馬刀挾瘦者從耳下或耳後下頰至肩上或入缺盆中者乃手足少陽經之分野其瘰癧在於頰

下或至頰車者乃足陽明經之分野受心脾之邪而作也
今將二證合治之

黃芪 一錢 護皮毛實腠理及活血氣又人參三分補
實表補元氣乃瘡家之聖藥也 肺氣如
氣短及不調 而喘者加之 **真漏蘆** 半錢 勿以白
頭翁代之 **升麻** 一錢

葛根 半錢 此三味俱足陽明本經藥 **甘草** 半錢 能調中和
諸藥瀉火益胃
連翹 一錢 此一味乃十二經瘡中之藥不可
無者能散血結氣聚此瘡家之神藥也

牡丹皮 三分 去腸胃中留滯宿血 **當歸身** 三分
熟地黃 三分 此三味諸經中
和血生血涼血藥也 **白芍藥** 三分
月倍之其味酸其氣寒能補中

肉桂 二分 大
益氣治腹痛如冬月寒症勿用
散結聚如陰症瘡瘍少用之此寒因熱用之意又
為陰寒費蓋其瘡用大辛熱去之煩燥者勿用

柴胡 功同連翹如瘡不 **黍粘子** 三分 無
腫不用
昆布 二分 味鹹若瘡堅硬甚
者用之能軟堅也 **京三稜** 炮二分

廣茂 三分 此二味瘡堅硬甚
者用之不硬者勿用 **羌活**

獨活

防風

各一錢 已上三味必關手足太陽
症脊痛項強不可回顧似折項
似按防風辛溫如瘡在膈上雖無手足太陽
經症亦當用之為能散結去上部風邪故也

益智仁

二分 如唾多者胃不和也或吐沫
吐食胃中寒者加之無則勿用

麥芽

一錢 消食健脾神麩炒二分 食不
消化者用之 **黃連** 炒三分
治煩悶

厚朴

薑製一錢 二分 如腹脹加之
如腹脹加之 **黃栢** 炒三分 如有熱或悶
欲去衣者此腎中
伏火也更宜加用 脚無力加之如煩躁

右共為細末湯浸蒸餅捏作餅子晒乾搗如米粒大每
服三錢白湯下 如氣不順加橘紅甚者加木香少許
量病人虛實消息之毋令藥多妨其飲食此治之大法
也 如止在陽明分者去柴胡黍粘子二味餘皆用之

如在少陽分為馬刀挾瘦獨活漏蘆升麻葛根加瞿
麥三分 如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短促
者不可考其平素宜作氣盛而從病變治之權也加黃

者不可考其平素宜作氣盛而從病變治之權也加黃

芩黃連黃栢知母防已視邪氣在上中下而用之假令
在上焦加黃芩半酒洗在中焦加黃連半酒在下焦加
酒製黃栢知母防已之類選而用之 如大便不通而
滋其邪盛者加酒製大黃以利之 如血燥而大便乾
燥者加梔仁泥大黃 如風結燥不行者加麻仁大黃
以潤之 如風澁而大便不行加煨皂角仁大黃秦芫
以利之 如脈澁覺身亦氣澁而大便不通者加郁李
仁大黃以除風燥 如陰寒症為寒結秘而大便不通
者以局方半硫丸或加炮附子乾薑煎候水冷服之
大抵用藥之法不惟瘡瘍一家凡諸疾病氣素怯弱者
當去苦寒之劑多加人參黃芪甘草之類以瀉火而補
元氣餘皆倣此

濕痰

本治鼠癩瘰癧

土附子箇一

食鹽三升

小便五升

右三味同浸半月日取出將附子去黑皮陰乾為末用
黑苴爛煮研為膏丸附子末如桐子大每服十九酒吞
下早晚二服

雜方

丹

初發頭項硬未破者其効如神牡礪四兩甘草二兩為

末每服一大錢食後臈茶同點日二服半月除根枋虞世

鹹奕

溪治世義大官一切丈夫婦人瘰癧經効牡礪用炭一

稱煨通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄

參三兩并搗羅為末以麪糊丸如桐子大早晚食後臨臥

各三十九酒下藥將盡瘰亦除根出經

用治頷下瘰癧如梅李大宜速消之海藻一斤酒一升漬

數日稍稍飲之

辛散

行取蓼子微炒研為細末薄苜酒調二三錢服治瘰癧久

則効

酸收

世治瘰癧用夜合草遇夜則其葉閉合本草名合明俗名連錢母出禾田中貼水面生取其葉搗自然汁服之查盒患處効

甘緩

得文武膏治瘰癧用桑椹黑熟者一斗以布袋絞取汁石器中熬成膏子白湯化下一匙日三服紅者晒乾為末湯調服

針灸

聖治瘰癧腫硬疼痛年深時久不瘥用狸頭蹄骨酥灸黃搗羅為散每日空心粥飲調下一錢七

靈黃帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脈而不去者也鼠瘻之本皆在於臧其末上出於頸腋之間其浮於脈中而未內着於肌肉而外為膿血者易去也黃帝曰去之奈何岐伯曰請

從其本引其末可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之

徐往徐來以去之其小如麥者一刺知三刺而已寒熱

右經一章皆從經脈取臟腑之本以治瘰癧之末也其

末出於耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中者當於

手足少陽經取之或針或灸如後穴

扁瘰癧天井 肩井

撮瘰癧天井 半寸灸七壯瀉之

東腋下腫馬刀挾瘦善自嚙舌頰天牖中腫寒熱 臨泣

丘墟 各一分灸五壯 太衝 一分灸三壯 腋下頸項腫 天池 順

三分灸七壯 如頷腫加後谿 二分灸五壯 腋下腫馬刀挾瘦喉

痺 陽輔 五分灸七壯 申脈 一分灸三壯立愈

甲胸中滿腋下腫馬刀瘦善自嚙舌頰天牖中腫滯灤脛

痠頭眩枕骨頷顛痛目澁身痺洒淅振寒季脇支滿寒熱

脇腰腹膝外腫痛臨泣主之 馬刀腫癢淵液章門支溝
主之 出於頰下或至頰車者當於手足陽明經取之或
針或灸如後穴 三里足陽明 合谷手陽明

凡搗生商陸根作餅子置於瘰癧上艾炷灸餅子上乾即
易之灸三四餅出外臺秘要

世當癧上貼肉灸十四壯神効

東瘰癧馬刀將先出一瘡用四楞鐵環定住不令出移破
作口子以油紙撚紐之勿令合了以絕其瘡之源其効至
速如瘡不破或病人不肯破更以藥塗之三日一易之以
龍泉散主之方見表裏條

世瘰癧多生肩項或赤或白或沉或浮初生如莖久似核
年月浸久其大如梅或如雞卵排行成列或生二三或生
六七俗云蟠蛇癧是也用性努力思慮過久則疾痛赤腫

繼之早治爲上

流注癧婦人多有之其性急躁其氣怫鬱其心執着初生
在項破後膿注四肢遍體結毒如梅李狀不療自破孔竅
相穿寒熱疼痛或流膿汁是名流注癧也又名千歲瘡宜
服托裏救苦神應丸

川烏附去皮臍生用一兩

烏頭五兩

當歸酒浸一宿

沒藥

白芷

陳皮

甘草節各一兩

蟬蛻水洗半兩

大皂角七錠去皮弦子去

薑黃一兩

右用皂角敲碎水四大碗煎至二大碗濾去渣用汁一
同煮烏頭川烏候烏頭爛爲度搗如泥其餘諸藥却另
爲末和烏頭泥爲丸如桐子大每服六十九丸飢飽皆用
薄苛湯下若瘡既破穿鑿孔穴其處必生腫肉如指大
或黑或白乃風與氣搏宜驅風行經散氣之劑以化氣

調經湯主之

化氣調經湯與神應丸間服治流注癰

香附末

酒浸一宿
晒乾一兩

橘皮

二兩

羌活

一兩

白芷

一兩

甘草

半兩

牡蠣

煨半兩

天花粉

皂角刺

各半兩

右為細末每服二錢用清湯不拘時候調下日三次

如脈有力者先用追毒神異湯下之却服救苦神應丸

辰砂

血竭

各一錢

麝香

一字共

大黃

半兩

大甘草節

半兩

右為咬咀作一貼河水一鍾煎半鍾調前末子臨臥服

之

單窠癰者生一箇也發於頸項最難治但宜如前藥服之日久自消或發於顙骨亦難治用毒藥療之勿令浸漬日

久 蓮子癰一胞裹十數枚生於項之左右以手觸則能

轉動尚可用藥治療如堅硬挨不動者乃不可生憎寒發

熱燥渴凡遇此症至難治雖神聖亦無如之何也巳

重臺癰生於項頸或左或右初則單窠結在上或在重

疊見之是名重臺癰此症藥不可療不可針灸若是毒行

其腫痛發渴生痰萬死一生害人極速初覺有之急用小

犀角丸粉金散治之 燕窠癰形似燕窠不可治

肺脈微瀉為鼠瘦在頸支腋之間下不勝其上其應善痠

全文見治虛實法
色白脈主瀉

靈黃帝曰決其生死奈何岐伯曰反其目視之其中有赤

脈上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二

脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲而死見赤脈

不下貫瞳子可治也

寒熱篇

禁忌

丹夫瘰癧初發必起於少陽經不守禁戒必延及陽明經大抵食味之厚鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換須分虛實彼實者固易治自非痛斷厚味與發氣之物雖易亦難殊為可慮以其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若月經行不作寒熱可生稍久轉為潮熱其症危矣自非斷欲絕慮食淡雖神聖不可治也

結核

獨形而小核者為結核

熱

河結核火氣熱甚則鬱結堅硬如果中核也不須潰發但熱氣散則自消

痰積

丹結核或在項在頸在臂在身如腫毒者多在皮裏膜外多是痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散核

結核在頸項方

僵蚕炒

大黃酒浸

青黛

膽星各等分

右為末蜜丸噙

結核在下頰二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡

結核在臂二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼朮皂角刺僵

蚕麝香行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷

濟治頰下結核不消經効用大肚蜘蛛不拘幾箇以好酒浸之研爛同浸酌酒去渣溫熱臨臥服之

瘰癧

虛實

靈虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內着寒勝其

熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷

骨為骨蝕有所疾前筋疾前二字衍文也筋當作結筋屈不得伸邪氣

居其間而不及發為筋瘤有所結氣歸之衛氣留之不得

反津液久留合為腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有
所結氣歸之津液留之邪氣中之疑結日以易甚連以聚
居為昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣
并日以益大則為骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而
不去有熱則化而為膿無熱則為肉疽凡此數氣者其發
無常處而有常名也刺節直邪篇○此皆虛邪中人為病
弗去而久留着故積歲累月而成疽
也

子 新寨一婦人年四十餘有瘤三辨戴人令以醃吐之
三涌三汗三下癭已消半次服化癭之藥遂大消去夫病
在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

火
雜方

河 瘤氣赤瘤丹燦熱勝氣也火之色也
嬰 氣先須斷厚味

海藻洗一兩 黃連二兩

右為末以少許置掌中時時砥之津咽下如消三分之
二須止後服一方用黃栢二兩海藻一兩不用黃連亦
佳

治癭氣結核瘡瘡腫硬以昆布一兩洗去醃搗為末每用
一錢綿裹於好醋中浸過舍之咽津藥味盡再嚙之

射 治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去醃酒浸飲之
無 破結散

海藻洗 草龍膽 海蛤 通草

昆布 礬石枯 松蘿各三分 麥麩四分

半夏 貝母各二分

為末酒服方寸七日三忌鯽魚猪肉五辛生菜諸雜毒
物十日知二十日愈

濟 玉壺散治三種癭

海藻洗

海藻洗

昆布

雷丸各一兩

青鹽

廣茂各半兩

右等分爲細末陳米飲丸如榛子大噲化以煉蜜丸亦好

子和 人參化瘦丹

海藻洗

海藻洗

海蛤

昆布已上四味皆焙

澤瀉炒

連翹已上各等分 猪靨

羊靨各十枚猪羊靨

即猪羊外腎乃囊中之卵也

右爲末蜜丸如鷄頭大臨臥噲化一二丸忌油膩物

寶金散 偏醫瘰氣無不瘥

猪羊靨十對 煖水洗去脂膜後曬乾杵爲細末

海藻洗

海藻各二兩洗

丁香

木香

琥珀研

麝香研各一分

真硃研半兩

右件先將丁香木香海藻海帶杵爲細末入下項藥味合和再研細重羅過每服一錢熱酒一盞調服夜臥服垂頭而睡若在室男女十服必効如男子婦人患者一月見効有胎不可服

海帶丸治瘦氣久不消

海藻洗

貝母

青皮

陳皮

右件各等分爲細末煉蜜爲丸如彈子大食後噲化一丸大効

羅 枯瘤方名一井散

硃砂

粉霜

雄黃已上各二錢 輕粉

沒藥

乳香已上各一錢

土黃三錢

雄黃法硃黃

兩去殼巴莖半兩去油硃砂另爲末二錢右以硃黃一處爲末用木鑿子同石腦油成一塊油帛裹定埋於地坑內四十九日取出於磁器盛

壁作小塊研細少許硃黃印雌黃

右為細末以津調塗瘤頂外邊歇一菲葉先以花紙貼之上用小黃膏貼之

小黃膏 黃栢 黃芩 大黃各等分

右為細末以水調為糊比前藥大一遭三日一易至八九日不取直候可取一方單用黃栢末亦佳

羅小兒丹瘤革麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚妙出小兒門

羅生肌青龍散

訶子皮 高茶 龍骨

右件各等分為細末乾摻上

又枯瘤方

砒 硃砂 黃丹 雄黃
輕粉已上各一錢 斑猫生用三箇 硃砂 乳香

沒藥各一錢

右研為末糯米粥為丸捏作棋子樣爆乾先灸破瘤頂三炷以藥餅蓋上用黃栢末以水調貼之數日自然枯乾落下

一方以銅綠為末草刺瘤破摻上以膏藥塗之

世點瘤癩方神驗

桑柴灰 棗樹灰 黃荆灰 桐殼灰各二升半
蕎麥灰少

右以沸湯淋汁五碗許澄清入斑猫四十箇川山甲五片乳香腦子不拘多少約五碗煎作二碗用磁器盛之乳香腦子候冷入之後臨用時入新石灰調成膏神妙傳瘤上乾以清水潤之其効如神

羅枯瘤方

桑柴灰三碗

石灰三碗

朽木三兩

乾桑耳三兩

草烏半斤

川烏四兩

右朽木等四味一處燒灰令有性同前二灰研勻用水一桶淋汁如法熬成膏用之

針灸

東諸癭惡氣

肩顛男左灸十八壯右十七壯女右灸十八壯左十七壯

又法

天府七壯

衝陽隨年壯

甲癭天窻

一作天容千金作天府

及臈會主之

癭瘤氣舍主之

和

在西華眾人皆訕以為吐瀉而已一日魏壽之與戴

人入食肆中見一夫病一瘤正當目上綱內背色如灰李下垂覆目睛不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別有一術其人從之乃引入一小室中令俛臥一床以繩束其脰刺委中大出血先

令以手揉其目瘤上亦刺出雀糞立平出戶壽之大驚戴人曰人之有技可盡窺乎 郃城戴人之鄉也一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一類鷄距一類羊角腕不能釧向明望之如樵膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背者為膠瘤在面者為粉瘤此膠瘤也以銚針十字刺破按出黃膠膿三二匙立平瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢用此法耳

本治果報面生癩瘤方用艾丸灸十壯即用醋磨硫黃塗帑上剪如螺螄掩子大貼所灸處更用膏藥重貼二日一換候痒擠出膿如菘葶粉即愈硫黃羅謙甫作雄黃

診禁

無癭多着於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石癭皮色不變者名曰肉癭筋脈露結者名曰筋癭赤脈交結者名曰血癭隨憂愁消長

者名曰氣癭五癭皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致
天枉瘤則有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰肉
瘤尤不可治治則殺人唯脂瘤破而去其脂粉則愈
丹服癭瘤藥先須斷厚味

目皆瘍即俗謂之偷針也

運氣目皆方有二

一曰熱經云少陰司天之政三之氣大火行寒氣時至民
病目赤皆瘍治以寒劑也

二曰燥經云歲金太過民病目赤腫皆瘍又云陽明司天
燥淫所勝民病目昧皆瘍治以溫劑也

雜方 **世**治偷針眼方

南星 生為末 三錢 不拘 生地黃 不拘

右一處研成膏貼太陽兩邊腫自消

又方治偷針眼生薑搗細盒之淚出即愈

天蛇頭 代指

雜方

丹蒲公英草清明時節如薺菜狀中開一朵花如菊花者
取乾與蒼耳草二味等為末以好醋濃煎浸洗即愈

蒲公英忍冬酒治天蛇頭極效方見乳

世治天蛇頭蒲公英搗細水和調去查服之又搗查盒患
處屢効

治天蛇頭用

野落蘇即兼金銀花藤 天蕎麥

右切細用好米醋濃煎先薰後洗

又方用人糞雜黃泥搗之裹在患處即愈

丹治手指忽腫痛名為代指以烏梅入醋研浸患處立瘥
治手指腫酸漿水入少鹽熱浸之冷即易孫真人方

雜方

甲疽嵌甲 嵌立銜反

精治甲疽因剔甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復緣穿窄靴研損四邊腫焮黃水出浸淫相染五指俱爛漸漸引上脚踏跑漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能療者用綠礬五兩形色似朴硝而綠色置於鐵板上聚炭封之吹令火熾其礬即沸流出色赤如溶金汁者是真也候沸定汁盡去火待冷取出研為細末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡帛裹乾用此末傅之愈

靈死治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不瘥凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡不瘥用乳香末膽礬燒研等分傅之內消愈

精勝金方治甲疽努肉膿血疼痛不瘥用牡礪頭厚處生研為末每服二錢研錠花酒調下如瘡盛已潰者以此

傅之更服煎藥一日三服

丹嵌甲陷甲割甲成瘡久年不瘥者用烏頭尖黃栢等分末之洗淨貼之

精華陀治嵌甲累効方

礪砂

乳香

並研各一錢膩粉

橄欖核 燒存性用

三箇

黃丹 字一

右為末以生麻油調先以鹽湯洗淨挹乾傅之二次効

乳癰乳巖

乳癰陽明厥陰所屬

丹乳梗論○乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣焮熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可

消散失此不治必成癰癤治法踈厥陰之滯以青皮清陽
明之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫導毒以
瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或
散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯
於腫處其效尤捷彼村工喜於自銜便妄用針刀引惹拙
病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日
積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如驚棋子不痛不痒
十數年後方為瘡陷名曰妳巖以其瘡形嵌凹似巖穴也
不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然
後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得
此察其形脈稍實但性急躁伉儷自諧所難者後姑耳遂
以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安
此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而成

滯氣汚血

又有滯乳因兒口氣吹噓而成又有拗怒氣激滯而生者
煨石膏燒樺皮瓜蒌子甘草節青皮皆神効藥也婦人此
病若早治之便可立消有月經時悉是輕病五六十後無
月經時不可作輕易看也

乳癰

青皮

瓜蒌

橘葉

連翹

桃仁留尖

皂角刺

甘草節

破多加參芪

精 神効瓜蒌散治乳癰妳巖神効丹溪亦云妙捷恐貧賤
之家未能辦集者用後蒲公英尤妙

瓜蒌

一箇去皮焙為末子多者有力

甘草生

當歸酒浸焙各半兩

乳香另研

沒藥另研各錢半

右為末用無灰酒三升於銀石器內慢火熬取一升清
汁分作三服食後良久服如有妳巖便服此藥可杜絕

病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即於大小便
中通利如疾甚再合服以退為度 立効散與前方間
服神妙但於瓜萎散方減去當歸加紫色皂角刺一兩
六錢是也

本蒲公英草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及
封之立消

丹蒲公英在處田間路側有之三四月開黃花似菊味甘
解毒散滯意其可入陽明太陰經洗淨細研以忍冬藤濃
煎湯入少酒佐之隨手便欲睡睡覺已失之矣

雲張氏橘皮湯治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍
者神効因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之用陳皮一味
湯浸去白晒乾麩炒微黃為細末麝香研酒調二錢初發
覺赤腫疼痛一服見効

丹乳癰初發腫硬一服瘥真樺皮末酒服方寸七睡省已
失出灵苑

羅勝金丹治婦人吹乳極有神効用百齒霜即木梳右一
上髮垢味不拘多少用無根水為丸如桐子大每服三九倒流水
送下食後令病左臥右乳者右臥於溫處汗出愈
用新水傾於房上接之乃倒流水也

圖治婦人妳疼痛不可忍用川山甲灸黃木通各一兩自
然銅半兩生用三味搗為細末每服二錢溫酒調下不拘
時候

簡婦人吹乳獨勝散白丁香半兩搗羅為末每服一錢七
溫酒調服無時

雲治婦人吹乳皂角散訶曰婦人吹乳意如何皂角燒灰
蛤粉和熱酒一杯調一字頃間揉散笑呵呵

滯乳食
痰

又方

乳香研一錢

瓜蒌根末兩一右研令勻溫酒調服二錢

有熱者清之

丹楊孺人乳腫痛

青皮

石膏煨

連翹

皂角刺炒

黃藥子

當歸頭

木通各一錢

甘草生三分

作一貼入好酒些少同煎飲之又有別藥洗腫處

義二孺人平時乳內有結核不為痛忽乳邊又有一腫核

頗却有些痛

黃芩

川芎

木通

陳皮各四錢

人參二錢

芍藥一錢

大腹皮三錢

炙甘草

生甘草各一錢

當歸頭一錢

分二貼煎服

丹二孺人但經將行而乳腫先兩日發口乾而不渴食少

減脈左弦帶數右却平治用四物湯加陳皮白朮茯苓帶

熱下與點九三十粒

產後乳膨調麥牙飲自消

產後輕者內消實者下之

雲連翹湯治產後妬乳并癰

連翹

升麻

芒硝各一兩

玄參

芍藥

白蔞

防已

射干各八錢

大黃二錢

甘草六錢

杏仁四十箇去皮尖

右哎咀以水六升煮二升下大黃次芒硝分三服

乳石在早治

丹一婦人年六十厚味鬱氣而形實多妬夏無汗而性急

忽左乳結一小核大如棋子不痛自覺神思不佳不知食

味絕半月以人參湯調青皮甘草末入生薑汁細細呷一

日夜五六次至五七日消矣此乃妬岩之始不早治隱至

五年十年已後發不痛不痒必於乳下潰一竅如巖穴出

膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得於夫者有之婦人以夫為天失於所天乃能生此謂之巖者以其如穴之嵌呀空洞而外無所見故名曰巖患此者必經久淹延惟此婦治之早正消患於未形餘者皆死凡十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安

雜方敷貼

用蒲公英草搗爛食患處神妙

用天南星末以溫酒調塗之

治婦人乳痛成癥以益母草為末水調塗乳上一宿自

瘥生搗爛用之亦得

婦人吹乳用素樹蛙脣飯搗成膏貼之

乳頭裂破丁香末傳之

梅師方

針灸

穴乳癰

乳中穴

在乳下中針入一分沿皮向後一寸半灸瀉

乳癰寒熱短氣臥不安膺窓主之 乳癰凄素寒熱痛

不可按乳根主之 大驚乳痛梁丘主之 乳癰有熱三

里主之

乳癰諸藥不能止痛者三里針入五分立止

女子乳癰驚巨虛下廉

主之

千金云臂腫重足踣不收跟痛

乳癰太衝及復溜主之

妬乳太

淵主之 婦人乳餘疾盲門主之

囊癰陰頭癰

囊癰屬厥陰

外科精要云癰疽入囊者死囊屬厥陰今以死言之將

以為屬少陰腎經邪予親見入囊者七八人悉以濕熱入肝經施治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫辜丸懸掛可畏者皆不死但未知下虛年老者如何耳

治丈夫陰頭癰師所不能醫用鱉甲一枚燒末以鷄子

白和傳之良

便毒

虛

精治穀道前後生癰謂之懸癰用橫紋甘草一兩四寸截

斷以長流水一碗文武火慢慢煎水炙自早至午炙令水盡甘草中心見水潤為透細剉却用無灰好酒二小杯入甘草煎至一杯溫服之二三服便可保無虞此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃子即破若破難治此藥雖不能消過二十日後必盡消矣投兩服亦無害林判院嘗患此癰已破服此藥兩服瘡即合甚妙

疔青皮湯治便毒

青皮 防風 當歸身 甘草稍生各等分

右咬咀分作四服水一小碗煎至八分去粗大溫服空心日進三服

丹毒腫或着陰卵或偏着一邊痛牽引小腹痛不可忍見方

內疎

瘡疽雜病痛牽引小腹條

子和玉燭散即四物湯調胃承氣湯各半服之也

世又方

劉寄奴 王不留行 大黃 金銀花

木鱉子

右等分酒水煎露一宿五更服

丹便毒初起

射干大 生薑搗細

右取順流水煎微沸服之以瀉為度又用牛皮膠醋煮塗患處

已結成膿者

大黃兩半 枳實分三 厚朴錢三 甘草節錢一
連翹錢半 梔子錢一 生薑片三

右作一貼煎服之

又便毒

青皮

白芷

柴胡

赤芍藥

檳榔

朴硝

烏藥

木瓜

大黃

連翹

瓜蒌

生地黃

甘草節

三稜

蓬朮

黃芩

犀角

皂角刺

右咬咀水三碗煎至一碗大飢服以瀉為度

雜方

便毒取大蜘蛛一箇研細熱酒下

又方用甘草節白芷黃連各等分如破者龍骨白枯礬赤石脂并用鐵圍散癰疽腫毒亦治用之效

乳香

沒藥各半兩

大黃

黃連

黃栢

南星

半夏

防風

羌活

皂角刺

木鱉子

瓜蒌

甘草節

草烏尖

阿膠另研

右為細末醋調成膏以石器內火熬黑色鷲翎傳之

貼骨癰

保諸瘡大痛不辨肉色漫腫光色名附骨癰如神三生散

露蜂房

蛇退

頭髮洗淨等分

右燒灰存性研細酒下三錢

附骨癰熱在血分之極初發時以青皮甘草治之破後當養血

內癰有三

索肝滿腎滿肺滿皆實即為腫王註云滿謂脈氣肺之癰

喘而兩胛滿仲景云肺癰吐膿如米粥咽燥振寒肝癰兩胛滿臥則驚不得

小便腎癰脚下至小腹滿大奇論林億云脚下當作胛下○千金云腸癰之為病小

診

腹腫強按則痛便數似淋仲景云腸癰小腹痞堅蓋小腹
痛而痞堅者腎癰也小便數而似淋者腸癰也即肺癰肝
屬之

胃脘癰人迎脈逆而盛全文見後
胃脘癰條

肺癰腸癰胃脘癰

丹 肺癰疽發於內者肺癰肝癰腎癰腸癰囊內癰附骨癰惟
肺癰須先解表今表而出之

千 欬唾膿血其脈數實者為肺癰若口中欬即胃中隱痛
脈反滑數此肺癰也

問曰病者欬逆何以知其肺癰當有膿血吐之則死其脈
何如曰寸脈微而數微為風數為熱微則汗出數則惡寒
風中於衛呼氣不入熱逼於榮吸氣不出風傷皮毛熱傷
血脈風舍於衛其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多吐濁沫
時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌

可救膿成則死 問曰振寒發熱寸脈滑數其人飲食起
居如故此為癰腫醫反不知以傷寒治之不應何以知有
膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胃中者為肺
癰其脈數欬吐有膿血設膿未成其脈自數緊去但數為
膿已成也

先解表
次取膿
終補裏

要 小青龙湯方見傷
寒條

葶藶大棗瀉肺湯治肺癰喘不得臥
葶藶炒黃研細
丸如彈大 大棗十二
枚

水三升入棗先煮取二升去棗入葶藶又煮一升頓服
之又曰治肺癰胸滿脹一身并面目浮腫鼻塞涕涕出
不知香臭酸辛咳逆上氣喘鳴迫塞用前方三日一劑
可至三四劑須先與小青龙湯一劑乃與之

要 桔梗湯治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥

臭久久吐膿如粥者肺癰也

桔梗

甘草炙各一兩

水三升煮取一升去查分温再服則吐膿血也亦治喉

痺三因甘草倍之每四錢名四聖散千金亦名桔梗湯

用桔梗三兩甘草二兩服後必吐膿血

要葶藶湯治肺癰又云一本治欬有微熱煩滿心胸甲錯

葶藶三升切 薏苡仁半升 冬瓜仁半升 梔仁五十枚去皮

水一斗先煮葶藶得五升去粗入諸藥取二升分温五

服當吐如粥千金云肺癰當吐膿血葶藶即汀洲間蘆茨之粗種也

治吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入男子

髮灰研細入和之清米飲下可除根只兩服亦治吐血消風散方荆芥川芎羌活人參茯苓獨活防風藿香蟬蛻各二錢厚朴陳皮各半兩為末是也

膏獨行方治心胃甲錯為肺癰黃昏湯主之用夜合皮

掌大一枚水三升煮取二升分再服夜合樹按本草即烏農樹

右肺癰證治要畧以小青龍湯先與一劑乃行氣取膿

之藥將以解表之風寒邪氣此治腫瘍之例也後以葶

宙方終之者將以補裏之陰氣此治潰瘍之例也上方

皆丹溪所集

梅如聖丸治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶及肺癰

喘嗽唾膿血胃滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣臭腥久久

咯膿狀如米粥

獐腦研另 牛黃研另 桔梗 甘草生用各一錢

右為細末煉蜜丸每兩作二十九丸每用一丸噙化

丹濟生桔梗湯治肺癰心胃氣塞咳嗽膿血心神煩悶咽

乾多渴兩足腫滿小便赤黃大便多澁桔梗貝母川歸瓜

蒺仁枳殼薏苡仁素白皮防風已上各一兩生甘草杏仁

取膿雜方

蒸百合各半兩黃芪一兩半右修事咬咀每服四錢水一碗半生薑五片煎至八分去查服若大便秘加大黃小便秘加木通

仲桔梗白散治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗

貝母各三

巴豆一分去皮炒研如脂

右三味為散強人飲服半錢七羸者減之病在膈上者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一碗則定此要畧方丹溪不刪採用之者必有微意存焉

丹肺癰醫壘元戎搜風湯吐之

搜風湯未考

本治肺癰吐膿血作臭氣胃乳皆痛升麻湯

川升麻

桔梗

薏苡仁

地榆

牡丹皮

芍藥各半兩

甘草二分

補裏雜方

診

右劉麓末每一兩水一升半薑五片煎去查日三服

丹濟生排膿湯治肺癰得吐膿後以此排膿補肺生綿芪二兩細末每二錢水一碗煎一半服 肺癰收斂瘡口止有合權樹皮白欬煎湯飲之

肺癰已破入風者不治 腸癰千金謂妄治必殺人腸癰為病小腹重而強按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀其脈數者小有膿也巢云洪數者已有膿脈若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲或遠臍生瘡或膿自臍出或大便出膿血

脈問曰羽林婦病何以知腸有膿師曰脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為敗濁小腹痞堅小便或澁或自汗出或復惡寒膿為已成設脈遲緊則為瘀血血下即安

例腫瀉

要 薏苡附子敗醬散治身甲錯腹皮急如腹脹本無積聚身熱脈數者

附子炮二 敗醬分五 薏苡仁錢一

右為末每服方寸匕以水二合煎頓服小便當下三因薏苡仁附子同前敗醬用一兩一分每四錢水一盞半煎七分去查空心服

干 大黃牡丹湯治腸癰小腹痞堅或偏在膀胱左右其色白堅大如掌熱小便自調時自汗出脈遲堅者未成膿可下之當有血脈數膿成不復可下

大黃兩四 牡丹皮兩三 芒硝兩二 冬瓜仁升一
梔仁箇五十

右咬咀水五升煮一升頓服當下膿血稠繁用芒硝半合瓜子五合劉涓子用硝石三合肘後同名瓜子湯三

因用大黃梔仁各二分瓜子三分牡丹皮一錢硝二錢劉散作一貼水三盞煎至八分去查入硝再煎沸頓服無時

無 薏苡湯治腸癰腹中痛煩躁不安或脹滿不食小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑是者便可與或有差亦無妨薏苡仁五兩牡丹皮桃仁各三兩瓜子仁四兩劉散每四大錢水盞半煎七分服姚氏去桃仁用杏仁崔氏加芒硝二兩千金方同

例瀉湯補

醫案曰女子腹痛百方不治脈滑數時作熱腹微急孫診曰腹痛脈當沉細今脈滑數此腸癰也以雲母膏一兩作丸如桐子大以牛皮膠烱温酒調膠水下丸子藥餉時服盡膏下膿血一盆而安

干 灸法屈兩肘正肘頭銳骨是穴灸百壯下膿血而安

王氏餘話有婦人腸中痛不可忍大便自小便出李生診之曰芤脈見於陽部此腸癰也乃出雲母膏作百十九煎黃芪湯吞下利膿血數升而安李曰寸芤積血在胃關芤為腸生癰也李乃楊吉老之壻葉舉業習醫官取醫博士內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰受之七情者臟腑受之宜其發在腔子而向裏非干腸胃盲膜也謂之內者以其視之不見故名焉

右腸癰五方丹溪先生所集也前三方內其要畧一方元本雖云內有癰膿然先生不言之而又連千金三因二方置於篇首者蓋亦腫瘍瀉利例也後二方用膠烱黃芪煎湯吞藥者蓋亦潰瘍補例也

素帝曰人病胃脘癰者診當何如岐伯曰診此者當候胃脈其脈當沉細沉細者氣逆甲乙經沉細作沉澁逆者人迎甚盛甚

診

盛則熱人迎者胃脈也逆而盛則熱聚於胃中而不行故胃脘為癰也病能篇

雜方

河射干湯治胃脘癰人迎脈逆而盛嗽膿血榮衛不流熱聚胃口成癰

射干去毛

梔仁

赤茯苓去皮

升麻各一兩

赤芍藥一兩半

白朮半兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去渣入地黃汁一合蜜半合再煎溫服不計時候

要復元通氣散治諸氣澁耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛消腫

青皮

陳皮各四兩

甘草三寸生熟各半

川山甲炮

瓜蒌根各二兩

金銀花一兩

連翹一兩

右為細末熱酒調下

診

丹腸癰大腸有熱積死血流注桃仁承氣湯加連翹秦芫
近肛門破入風者難治用防風之類 大凡破傷風在
頭面則以白芷為君防風頭佐之蓋去頭面皮膚之風故
也在身體及四肢則以防風為君隨身稍用下部則以獨
活佐之 肺癰吐膿後其脈短而澹者自痊浮大者難治
其面色白而反赤者此火之尅金皆不可治
金匱方論曰熱在上焦者因欬為肺痿肺痿之病何從得
之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又
被快藥下利重亡津液故寸口脈數其人欬口中反有濁
唾涎沫者為肺痿之病若口中辟辟燥欬即胃中隱隱痛
脈反滑數此為肺癰欬唾膿血脈數虛者為肺痿數實者
為肺癰

按此言肺痿屬熱如欬久肺傷聲啞聲嘶咯血此屬陰

虛火熱甚是也本論治肺痿吐涎沫而不欬者其人不可
渴必遺尿小便數以上虛不能制下故也此為肺中冷
必眩多涎唾用灸甘草湯此屬寒也肺痿吐涎多心
中溫液者用灸甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱
不同是皆宜分治之故肺痿又有寒熱之異也

精勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內盛於肺也則汗出惡
風咳嗽短氣鼻塞項強胃脇脹滿久久不瘥已成肺痿也
保肺癰者由食啖辛熱炙燂或酣飲熱酒燥熱傷肺所致
治之宜早

醫學綱目卷之二十

心小腸部

丹燍瘰疹 丹毒風丹 瘰疹 疥癬 紫

白癩風白禿 面瘡 癩頭瘡 口瘡唇瘡 牙

疔瘡 耳內瘡 腎臟風陰瘡 下疳瘡 婦人

陰瘡 賺瘡 腳氣瘡足跟瘡 凍瘡 手足皴

裂 腳縫爛 反花瘡 惡瘡 雜瘡 疔 痣

大法微汗散之

疔發班屬風熱 風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散

中消息當以微汗散之下之非理防風通聖散方見顛癩門

羅時毒疔瘡漏蘆散治臟腑積熱發為腫毒時疫疔瘡頭

實熱下之

面洪腫咽嗑堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆

升麻

大黃

黃芩

各一兩

藍葉

玄參

各二兩

右為粗末每服二錢水煎腫熱甚加芒硝二錢半

消毒丸治時毒疔瘡惡症

大黃

牡礪燒

白姜炒各一兩

右爲細末煉蜜丸彈子大新水化下一丸無時內加桔梗黍粘子湯尤妙

丹治丹發疼痛扁竹汁服一升二合立瘥若未瘥再服効

虛者補之降之

內臺秘要○扁竹卽扁蓄

內傷班者胃氣極虛一身之火游行於外

所致宜補以降之

嘗治一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹熛用諸般敷貼丹熛藥及用刀於箇箇丹頭出血丹皆不退後以半陳生姜加補劑治嘔不効遂純用參半兩歸木各錢半濃煎一貼嘔止二三貼丹漸緩熱漸減約五十餘貼熱始除神氣始復

運氣

運氣丹熛皆屬火經云少陽司天客勝則丹疹外發及爲

丹熛是也

雜方

無治諸腫丹毒伏龍肝不拘多少爲末用雞子白和傳之日三次甚妙

治一切丹毒金花散

鬱金

黃芩

甘草

山梔

大黃

黃連

糯米

右七味等分生爲末用蜜和水調服

丹治烟火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真

珠末一兩搗和如泥塗之又方治螢火丹從頭起慎火草

搗和苦酒塗之

丹丹毒藍澱傳熱卽易子母秘錄

丹丹者惡毒之瘡五色無常苧根三斤水三斗煮浴每日

塗之

世治赤丹用黃瓜種中穰水去子以器貯之用時以水塗患處 又方用臘雪貯器中久化為水以水塗赤游妙

丹諸丹毒腫蚯蚓矢水和傳之聖惠方外臺同

手療丹癩疹方酪和鹽煮以摩之手下消

治赤游風腫蕎麥苦酒調傳兵部手集

治熱赤游丹毒括萋末二大兩醎醋調塗之

凡丹走皮中浸淫名火丹本方取躋躋傳之先刺破傳之良

丹者惡毒之瘡五色無常治之煮栗皮有刺者洗之佳

治金絲瘡一云紅絲瘡其狀如線或如繩巨細不一經

謂丹毒是也但比烟毒不甚廣濶人患此頭上有之下行

至心則死下有之上行者亦然可於瘡頭截經刺之出血

後嚼萍草根塗之自安

無丹毒自腹内生四肢者則易愈自四肢入腹者則難

診

針灸

治

丹人有病面上忽見紅點者多死

丹毒風丹痛者為丹毒癢者為風丹

賈宅小娘風痒黃精丸四十粒與

白朮七分 枳實炒 黃芩四錢

右分八貼下之食前

遍身風痒癩疹凌霄花細末酒下一錢立止

鮑允中年五十歲風丹痒甚腹微疼咽不利面身微腫五

六日不退兩寸脉滑大實右浮大左浮弦小以炒芩炒連

歸芍芍地桔草黍粘紫葳各一錢防風黃芪各半錢凡五

六貼而安

世河間神佑丸治風丹愈而復發或隔一月發或隔半年一年發者神佑丸下之百發百中方見水

愈而復發為積滯

服門

雜方

丹 一人患風丹遍身痒因酒得者

浮萍兩半

防風

黃芪

羌活三錢

當歸二錢

乾葛

麻黃一錢

生甘草半錢

世 治冷丹風

防風

甘草

白姜蚕

蟬腿

川芎

白芷

茯苓

荆芥

陳皮

厚朴

蒼耳子

人參

右為末豆淋酒調二錢

世 丹痒者用韭葉摻些鹽與香油以手摩熱於丹上措之

立愈出小

治風丹川山甲洗去腥於瓦上炒過存性每

一兩入甘草三錢為末米飲調服 治血風疙瘡瘡癩瘡

浮萍取自然汁豆淋酒下四物浸酒下亦得

丹 用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗患處未

瘡更入硫黃少許磨塗之

聖惠方

瘰

瘰小癬世謂之熱癬是也王註云大如酸棗或如荳色赤

而內有膿血也

風濕

海 汗出見濕乃生瘰癧為瘡癬也

勞汗當風寒薄為皴皴乃瘰 瘰色赤腹內有膿血

旋覆花丸

旋覆花三兩

防風

白芷

甘菊

南星

半夏

石膏

川芎

陳皮

白附子各半兩

蝎梢

姜蚕炒各三錢

右細末姜糊丸桐子大姜湯下三五十九食後

疹

疹似傷寒暴發暴消世訛為瘡子者是也疥似疹而延歲

月或乾濕痒痛不一經所謂癩疹是也癩亦延歲月乾而不濕痒而不痛是也

癩

丹疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者 疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯四順飲子虛者補中益氣湯皆同傷寒施治也

聖治風癩入腹身軀強舌乾燥用蔓青子三兩為末每服温酒下一錢七

運氣疹者有二

運氣

一曰熱經云火鬱之發民病瘍痲又云歲木不及燥乃大行復則炎暑流火瘡瘍痲疹又云少陰之復民病痲疹是也

二曰風經云歲水不及濕乃大行復則大風暴發肌肉疹發是也

疥

表

河防風通聖散治風熱瘡疥久不愈方見廟門

丹朱院君三十餘久患癩疹身痺而紫色可與防風通聖散加牛旁子為極細末每二錢水盞半入姜汁令辣煎食前熱飲之

麻黃飲治上軀生瘡或痒或痛黃水浸滌結痂推起延蔓於三陽之分根窠小帶紅腫此是濕熱症

麻黃半兩去根留節 防風兩 羌活 石膏六錢半煨

黃芩錢四 滑石兩一 陳皮 紫萍各七錢半

黍粘子七錢半 縮砂二錢半 蒼耳草三錢半 蒼朮兩

生甘草三錢半 薄荷葉一錢半 荆芥二錢半

右咬咀每六錢重水一鍾半猛火煎取六分入好酒四五滴去查熱服須得通身有汗其瘡自安甚者服至百

服之後看汗出到何處若自上而下出過脚腫其瘡自愈

眉消毒散 丹溪云消毒散氣表藥也

防風兩一 甘草兩二 荆芥穗兩三 黍粘子兩四

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分去查食後溫服

初虞世治皮膚風熱遍身生癩疹牛旁子浮萍等分以薄

荷湯調下二錢日二服

挾血虛

何小官生瘡小便黃用通聖散一錢半煎下黃精丸

楊三哥女生瘡午後發熱日間惡寒形削食少

白朮錢二 連翹錢一 煎下黃精丸三十粒

雜方

治每風瘡大風病相似好桑葉洗蒸一宿日乾末湯下二

錢七 方經驗

聖治風遍身癩疹疼痛成瘡用白姜蚕少許焙黃細研為

末酒服立瘥

穎臯韓吉卿自髀至足生濕蠹大者如錢小者如莖

痒則搔破水到則浸淫狀類虫行袴機愈而復生癩痕成

四十餘年不瘥戴人晒之曰此濕蠹瘡也由水濕而得故

多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃

癩疹入腹亦能殺人用蚕沙濃煎湯洗之

有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脛臍腹及近

隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩

水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參為丸如桐子大

食後溫水服二十九次日便愈

有樵夫來買苦參欲治疥不識藥性緩急但聞人言

可治濃煎一碗服之須臾大吐涎一盆三二日疥作痂矣

雜方

一上散治諸般疥瘡或痛或痒或喜湯火烘洗者

蛇床子一兩 雄黃一兩 硫黃二錢半 白礬半兩

黃連兩半 黑狗脊兩 寒水石一兩 班毛十四去

吳茱萸錢三 白膠香一兩 銅鈿溶過傾

右為細末香油調傅治疥瘡先用蒼耳草或羊不食草
籐煎濃湯洗去瘡痂然後用前藥傅可一次愈

小兒面瘡通面爛無全膚膿水流瀉百藥不効者陳年臘
猪油不入鹽者傅之神効出小兒明

又諸般疥瘡加減法 腫多加白芷開鬱 痛多加白芷
方解石 痒多加枯礬 陰囊瘡加茱萸濕多香油調

乾痒出血多加大黃黃連猪脂調 虫多加蕪荑錫灰楨
榔藜蘆班毛 紅色加黃丹 青色加青黛 瘡在上多

服通聖散 在下多以藏用丸下 脚腫出血加血分濕
熱藥

濕熱 膿胞瘡治熱為主

黃芩 黃連 大黃各三錢 蛇床子

寒水石錢二 黃丹分五 白礬錢一 輕粉

白芷 無名異各少許 木香少許痛者加

右為細末麻油調塗

殺虫 又瘡藥膿窠治熱燥濕為主 虫瘡如癰狀退熱殺虫為

主 乾疥瘡開鬱為主加吳茱萸

蕪荑 黑狗脊殺虫 樟腦錢一 松香頭上多

白礬 雄黃 硫黃 水銀殺虫

黃連 方解石分一 蛇床子定痒殺虫 松皮灰膿腫濕多

之加

羅 閭茹散治疥經年不瘥

水銀錢一 好茶錢二 閭茹錢三 輕粉少

右爲細末每用不拘多少麻油調塗之

世治疥癬以臘月猪脂不拘多少同生白礬杏仁加輕粉搗爛擦之陳無擇云杏仁輕粉最殺虫甚妙

本治疥不問新久方

白蕪荑兩 檳榔 吳茱萸各半兩 硫黃二錢

右爲末麻油調抓破楷之

丹砂瘡殺虫爲主

蕪荑二錢 剪草一錢 蛇床子三錢 白礬一錢

明礬一錢 吳茱萸一錢 蒼朮 厚朴

雄黃各半錢 寒水石二錢 黃栢二錢 輕粉一錢

世治砂瘡山蟻窠黃荊葉雉雞毛等分燒存性爲末香油調傅 又方用陳年船底灰搗細篩過桐油調傅立效

又方治砂瘡用水蒿苳燒灰存性香油調傅立愈水多者

乾傅水蒿苳如百合狀生水邊七八月結子又如野蘇狀

開疥癩瘡春天發焦疥開鱗爲主不宜抓破

白礬 吳茱萸各一錢 獐腦五分 輕粉十錢

寒水石二錢 蛇床子二錢 黃栢 大黃各一錢

硫黃一錢 檳榔一錢 右爲末猪脂油調搽

治疥 治癩疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘡後復發

取羊蹄根去皮細切熟熬以大酢和先洗淨傅上一時再以冷水洗之日一傅瘡若爲末傅尤妙千金翼 治疥取羊

蹄根和猪脂塗上或着鹽少許卽焦外臺秘要 治遍身風痒

生瘡疥茵陳煎湯濃洗立安千金翼

治痛 有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可忍有下但效以菖蒲三斗剉日乾之春羅爲末布席上使病瘡人恣臥其間仍以衣

神驗
被覆之既不粘衣被又復得睡不五七日其瘡如失應手

丹浸淫瘡痛不可忍者發寒熱刺薊末水調傅瘡上乾則易之簡要濟衆治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分

以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌博濟

外元希聲侍郎治卒發疥秘驗方石灰隨多少和醋漿水

調塗隨手即滅一法用石灰炒紅出火氣香油調傅

丹又方淋石灰汁洗之孫真人

久疥木香散治多時不斂一切惡瘡此藥能生肌肉止痛

木香

檳榔

黃連各半兩

白芷三錢

已上同為細末先洗淨每日一遍乾貼有水出勿怪未効又貼又方同上加地骨皮為細末先於瘡口上用溫漿水洗濕挹乾後上藥治之効不可述暨治下疳瘡

神効

丹諸瘡癬久年者千年韭根炒存性末之猪油調傅三次經

兵部手集多年惡瘡不癒或痛痒生皰爛研馬糞并齒灰傅上不過三兩遍效武良相在蜀足脛有瘡痛不可忍得此方便瘥

丹風瘡久不瘥燒菰蔞末以傅之按本草即野茭白

雜瘡疔子芙蓉葉陰乾為末傅之

瘡患禿瘡以水研山荳根傅瘡上患麩豆等瘡以水研山荳根服少許

丹連痲痒痛搗扁竹封痲落即瘥肘後洗諸瘡疥取冬

瓜藤皮煎湯妙日華中風犯毒霧櫟木皮煎湯洗妙木

運氣運氣浸淫皆厲火經云歲火太過甚則身熱膚浸淫是也

針灸

手疥 勞宮灸 太陵灸

瘡疥頑癬 絕骨 三里各一寸 間使 解溪各五分

血郄三寸

渾身生瘡疥 曲池 合谷 三里 絕骨 行間

委中

癬疥陽谿主之

少陰有餘病皮痺癢疹全文見諸症

浸淫瘡從口流向四肢者可治四肢流來入口者不可

治

癬

風熱

癬瘡用防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺

又方治癬用

浮萍一兩

蒼耳

蒼木二兩

苦參一兩

黃芩兩半

香附二兩

右為末酒調服或酒糊丸

羅苦參丸治肺毒邪熱生瘡生癬疥並宜服之以苦參一

味為細末粟米飲丸如桐子大每服五十丸空心溫水飲

湯送下

風濕

烏頭丸治風癬妙方見紫白癩風

羅何首烏散治脾肺風毒攻腫遍身癬變成癩疹搔之成

瘡或肩背拘急肌肉頑痺手足痠裂風氣上攻頭面生瘡

及治紫癩白癩頑麻等風

荊芥穗

蔓荊子

葳靈仙

何首烏

甘草灸

防風

蚶跛草

右件各等分搗羅為末每服一錢食後溫酒調下沸湯

亦得

雜方

癬在脛項間後延上至耳成濕癬他治不應以蘆薈一兩研甘草末半兩和勻先用溫漿水洗癬拭上傳之神妙

變劑

癬瘡方槿樹皮不犯銅鐵每二兩又蘆薈三錢白芨三錢細研為末刮癬出血用好醋調傅雖痛卻一傅可愈

一方用蘆薈

大黃

輕粉

雄黃

蛇床子

槿樹皮

檳榔

右先刮破癬用醋調藥末塗之

頑癬用槿樹皮加巴荳班毛為細末又加生硃少許水調傅

治牛皮癬用清香油一兩入全蝎七枚巴荳二十枚班毛十枚同熬候色焦者先去之去了入黃蠟一錢候溶收起朝擦暮愈不損皮肉

又方綠籬根

不拘多少花椒

信

防風

江子

十五粒白芨

百部

白斂

右各為末和綠籬根搗熟成團將藥於癬上擦之候痛過洗浴

又方一味綠籬根去粗皮取細皮貼肉者搗爛用醋調塗癬上立愈

乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

聖惠方外臺用班毛半兩炒為末蜜調傅上

輕劑

治癬疥久不瘥羊蹄根搗絞取汁用膩粉少許調如膏塗傳患處三五遍即瘥如乾即用猪脂調和傅之

羅栢脂膏治乾癬

栢油斤

黃蠟斤

杏仁

四十五粒朴硝抄

右件相和於鐵器內用老生姜葱白三根一順攪五七次煎沸濾過成膏於瘡上搽之

圖取楮皮枝中白汁塗癬甚妙

聖治癬濕痒用楮葉半斤細切搗傳癬上

經治五種瘡癬以韭根炒存性旋搗末以猪脂調傳之三

五度瘡 又方患癬瘡搗山荳根末臘月猪脂調塗之

濕者燥之

羅祛濕散治多年濕癬大有神效

蚕沙四兩

薄荷兩

右為細末每用不拘多少乾摻於瘡上或用生油調搽

子和一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝發痒

時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流又痛不可忍灸熨薰

滌硫黃藺茹白姜蚕羊蹄根之藥皆不效其父母求療於

戴人戴人曰能從予言則瘡父母諾之以銚針磨尖快當

其痒時於癬上各刺百餘針其血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不盡以告後人恐為癬藥所誤濕滯於血不可不砭者矣

紫白癜風白禿

海龍蛇散治風虛頑麻遍身紫白癜風癢痒痛者

白花蛇去骨焙

黑稍蛇去骨焙

草薺

天麻

黃芪

金毛狗脊

自然銅

骨碎補

楓香研

地龍

草烏頭鹽水浸剉各一兩

乳香

沒藥各三錢

麝香二錢

右細末酒糊丸桐子大每服十五丸酒下食後為末酒

調亦得

羅加減何首烏散治紫白癜風筋骨疼痛四肢少力眼斷腫人鼻樑崩塌皮膚疥癬手足皸裂睡臥不安行履艱難

何首烏

蔓荆子

石菖蒲

荆芥穗

苦參

葳靈仙

甘菊花

枸杞子各一兩

右爲細末每服三錢蜜茶調下不拘時

聖治白癩用馬鞭草不限多少爲末每服食前用荆芥薄荷湯調下一錢匕

風濕

本治宿患風癬遍身黑色肌體如木皮膚粗澁及四肢麻痺宜服烏頭丸

草烏頭一斤入竹籬內以水浸用瓦片於籬內就水中瀧洗如打菱角法宜候瀧洗去大皮及尖控起令乾用麻油四兩鹽四兩入銚子內炒令深黃色傾出油只留鹽并烏頭再炒令黑色烟出爲度取一枚劈破心內如米一點白恰好如白多再炒越熱取羅爲末用醋糊丸如桐子大每服三十九丸空心晚食前温酒下真州資福

雞方

庵文雅白老有此疾服數年黑點頓除脚力强健視聽不衰有一宗人遍身患紫癩風身如墨服踰年體悅澤予服之一年諸風疥瘡瘍皆瘥性差熱雖云去毒要之五七日作烏頭粥啜之爲佳粥法用豫章集中者佳

世紫白癩風貝母爲末以胡桃肉蘸洗浴後擦之神効

又方以信石好者爲上研極細用真香油調如薄粥過一宿取清油傳之愈 又方用金獅草搥碎擦之累効

世又方杜大黃 飛礬 右肥皂爲丸擦之

白禿 松香製 蕪荑 黃丹 光粉 枯礬

胡坯 右末香油入姜汁少許調傳上

針灸 又法直兩乳頭以篋量過當兩臍脈絡上灸之臍絡脈俗呼爲蝦蟆穴也

面瘡

治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺用盡藥不効者惟有
此藥可治神妙不可言每以少許臨臥時洗面令淨如面
油用之數日間瘡腫處自平赤亦自消如風刺粉刺一夕
見効仍塗藥勿近眼處

生硫黃

香白芷

瓜蒌仁

膩粉各半

全蠟七枚

蟬蛻五枚

芫菁七枚

右為細末麻油黃蠟約度如合面油法火熬溶取下離
火入諸藥在內每用少許塗面上

面瘡水調平胃散塗之

治臉上熱瘡涎出以蒲黃傳上瘡

洗面藥方治面有黥點或生瘡及粉刺之類并去皮膚
燥痒垢膩潤澤肌膚

皂角三斤去皮

弦子另搗

糯米二合

菘荳八合揀

楮實子五兩

三奈子

縮砂連皮

白芨二兩肥

甘松七錢

升麻兩半

白丁香五錢臘月

右七味同為細末訖和菘荳糯米粉及皂角末一處攪
勻用之効

面油摩風膏

麻黃二分

升麻根二錢

防風二錢

歸身一錢

白芨一錢

白檀五分

右以綿裹定前藥於銀石器中用油五兩同熬得所澄
清去查以黃蠟一兩再煎熬為度

瑩肌如玉散

白丁香一兩

香白芷七錢

升麻兩半

白芨兩

麻黃二錢

白牽牛兩

當歸稍兩

白附子二錢

白蒺藜兩

楮實子四錢

白茯苓三錢

連翹半錢

白蘇兩一 小椒兩一

右為細末每用半錢多少洗之

塗點點不令生瘡

猪苓 麻黃 桂枝 白蒺藜

白附子 連翹 防風 香白芷

白蘇 當歸身 升麻根 白芨

右等分為細末洗面用之臨臥唾調少許塗面上

肘 療面多疔點如雀卵色以殺羊膽一枚酒二升煮三沸

塗拭之三日瘡 治面上粉刺搗兔絲子絞汁塗之

竹 白附丹治男子婦人面上黑班點

白附子兩一 白芨 白蘇 白茯苓

蜜陀僧 白石脂 定粉各等分研

右為細末用洗面藥洗淨臨睡用人乳汁如無用牛乳

或雞子清調和丸如龍眼大罨乾逐旋用溫漿水磨開
傅之

癩頭瘡

風熱

丹 防風通聖散為末酒浸焙乾丸三次食後白湯調服日

三服至頭有汗効

世 濃煎鹽湯洗三五日一洗用一上散傅之久年不愈神

効方見疥部

丹 用好紫霄炭燒通紅入水研之又燒又焯以水熱為度

取所焯之水日日洗之使熱毒宣發而愈外以胡荽子伏

龍肝懸龍尾屋梁塵也黃連白礬為末調傅又服酒炒通聖散

効

一方單用黃連末傅之累効

口瘡唇瘡

熱

丹王四叔公口瘡舌强多痰

白朮

甘草稍錢一

人參

赤芍藥

木通

生地錢半

黃連錢炒

瓜蒌子十二枚

右作一貼煎

羅黃連升麻湯口舌生瘡

升麻錢一

黃連錢三

右為細末綿裹含津嚥

辛能散
鬱

丹治口瘡黃栢灸同細辛各二錢研極細傅之噲少時當

滿口有涎吐之少刻又傅又噲如是五七次立愈千金方此治

鬱氣
方也

羅綠袍散治大人小兒口瘡多不効者

黃栢兩四

甘草灸二兩

青黛兩一

右先取二味為末入青黛同研勻乾貼

衍黃栢皮蜜炙與青黛各一分同為末入生龍腦一字研

勻治心脾熱舌頰生瘡當搽瘡上有涎即吐之

垣蜜栢散治口瘡久不愈者用黃栢不計多少以蜜炙灰

色為細末乾摻上臨臥忌酒醋醬犯之則瘡難愈

丹好酒煮黃連呷下立愈

本治膈上熱極口舌生瘡

膩粉匕

杏仁七粒不去皮尖

右二味臨臥時細嚼令涎出則吐之用溫湯嗽口未痊

可又用

酸能收
緩

用治口瘡以薔薇根避風處打去土煮濃汁溫含冷易之

物五倍子治口瘡以末搽之便可飲食

本治口瘡以膽礬一塊用百沸湯泡開含漱一夕可瘥八

分一方用白礬湯嗽口亦妙凡口瘡用西瓜漿水瘡

實熱

甚者以此徐徐飲之冬月無留皮燒灰噲之

治口瘡以好墨研蠖蛄極細傅之立効胡氏 蠖蛄走小腸
膀胱其効甚捷因力峻氣猛陰虛氣上致瘡者戒勿用惟
體實有熱在上焦者用之如神

和治一男子病口瘡數年上至口中至咽嗑下至胃脘
皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗十去其九次服黃連解
毒湯不十餘日皆釋

虛火

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上先用理
中湯甚則加附子

本治滿口生瘡此因虛壅上攻口舌生瘡

草烏

南星

生姜

右焙乾為細末每服二錢臨臥時用醋調作掩子貼手
足心來日便愈

丹口瘡以遠志醋研鵝毛掃患處出涎

本治口鼻生瘡用生姜一塊臨睡時細嚼含睡不得開口
出氣眠着不妨睡覺咽下

臍肺

保治少陰口瘡半夏散聲絕不出者是寒遏絕陽氣不伸

半夏製一兩桂烏頭各一字同煎一盞分作二服 治太

陰口瘡甘礬散以甘草二寸白礬栗子大含化咽津 治

赤口瘡乳香散以乳香沒藥各一錢白礬半錢銅綠少許

研為末摻之 治白口瘡沒藥散以乳香沒藥雄黃各一

錢輕粉半錢巴豆霜少許為末摻之

運氣口瘡有二

運氣

一曰熱經云少陽司天火氣下臨肺氣上從口瘡是也

二曰寒經云歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至陰厥且
格陽反上行病口瘡是也

治口瘡猪蹄殼燒為末傅之立止張氏方 治口瘡與走

馬疔茄蒂中木去皮燒存性入少白梅灰與少礬細末傅之立安精要同

紅芍藥散

心病口瘡 紫桔紅蒼 三錢四兩 五服安康

右件紫苑桔梗紅芍藥蒼朮各等分為細末羊肝四兩批開摻藥末三錢用麻扎定火內燒令熟空心食之大

効白湯送下

聖主小兒口瘡通白者及風疔瘡蝕透者以白姜蚕炒令黃色拭去蚕上黃肉毛為末用蜜和傅之立効

陳主口內熱瘡以古文錢二十文燒令赤投酒中服之立瘥

聖口舌生瘡胸膈疼痛用炒豉細末含一宿便瘥

聖治口瘡用縮砂不拘多少火煨為末摻瘡即愈 又法用檳榔燒灰存性為末入輕粉傅之

聖治口瘡取桑樹汁先以髮拭口即以汁傅之

聖化毒法凡口瘡無問新舊遇夜臥將自己兩丸以手攪緊左右交手揉三五十遍但遇夜睡覺行之如此三五度因酒而生者一夜愈久病諸口瘡三二夜愈如鼻流清涕惡寒者攪二丸向上揉之數夜可愈

聖唇瘡以甌上滴下汗傳之累効如神

聖多効散治唇緊瘡及疹

訶子肉 五倍子各等分

右為細末乾貼上効

聖唇黃泡腫烏頭炒灰研香油調傅之胡氏方 唇上生瘡連年不瘥以八月藍葉一斤搗取汁洗之不過三日瘥千金

方 唇上生瘡用白荷花瓣貼之神効如開裂出血者即

針灸

止 口瘡 承漿 合谷 人中 長強 海泉三稜出血 不已用後

穴 金津、玉液各出 血

密 又方 委中瀉 後谿補此二穴乃心火 腎水二經之表

垣 又法 膽俞 小腸俞各灸七壯 太衝分五 勞宮

牙疳瘡

熱

垣 神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕斷肉將脫 牙落血出不止

黃連去鬚淨一 兩酒洗

縮砂仁半兩

甘草三錢

藿香葉一錢

生地黄酒浸三錢 木香一錢

升麻二錢

當歸身一錢

蘭香葉如無藿香 葉代之

右為細末水浸蒸餅為丸葶苈大每服一百丸加至二

百丸止白湯下食後服兼治血痢及下血不止血下褐 色或紫黑色及腸澼下血空心米飲送下其脈洪大而 緩及治麻木厥氣上衝逆氣上行腰間者

治小兒走馬牙疳見小兒 疳門

耳內瘡

少陽

垣 黍粘子湯治耳內痛生瘡

桔梗兩分

柴胡三分

連翹二分

黃芩二分

黍粘子二分

紅花許少

歸稍二分

生地黄二分

蒲黃一分

甘草一分

黃連二分

草龍膽一分

昆布一分

黃芪三分

蘇木一分

桃仁錢一

生甘草一分

右件剉如麻苳大作一服水二大盞煎至一盞去查稍 熱服食後忌寒藥利大便

少陰 羅治耳內生瘡者為足少陰是腎之經也其氣通於耳其經虛風熱乘之隨脈入於耳與氣相搏故令耳門生瘡也會青散主之

治耳內有惡瘡會青散

雄黃七

會青兩半

黃芩二錢半

右件搗為細末研勻每用少許納耳中有膿出即以綿杖子拭乾用之

黃連散

黃連兩半

白礬枯七錢半

右搗為細末每用少許綿裹納耳中

腎臟風陰瘡

風濕挾

無四生散治癩風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下注陰濕四散搔痒通體生瘡及婦人血風等症

白附子

蒺藜刺去

黃芪蜜炙

羌活等分

補中有泄

世治腎臟風凡指縫白者只一二服効

黃芪兩

木通

甘草

黑牽牛各半兩

右四味細剉用班毛七枚去翅同藥炒焦黑去班毛餘為末蒸餅糊為丸如桐子大空心鹽湯下三十九

本治腎臟風上攻下注生瘡并癰烏頭丸

川烏兩

草烏一兩二味以黑豈半升煮透軟去皮臍切晒乾

天麻

地龍去

白附子各半兩

右為末酒糊為丸如桐子大每服二三十丸空心食前鹽酒鹽湯任下

風熱

衍有一婦人患臍下腹上連二陰遍滿生濕瘡狀如馬刀他處並無熱痒而痛大小便泄出黃汁食亦減身面浮腫

醫作惡瘡治用鰻鮑魚松脂黃丹之類塗瘡上愈熱痛甚治不對故也細問之此人嗜酒貪啗喜魚鱗發風等物急令用溫水洗拭去膏藥尋馬齒莧四兩研碎入青黛一兩再研勻塗瘡上即時熱減痛瘁皆去仍服八正散日三服發散客熱每塗藥一時久即乾又再塗新濕藥如此二日減三分之一五日減二自此二十日愈既愈乃問曰此瘡何緣至此曰中下焦畜風熱毒熱氣若不出當作腸癰內痔仍須禁酒及發風物後不能禁酒果患內痔

寒濕

丹陰囊瘡蠟面茶末之先以甘草煎水洗後傳上妙鏡

陰上濕泡瘡硫黃末傳之日三次梅師

干治丈夫陰下濕痒蒲黃末傳之良

丹陰瘡人屎燒灰傳之安秘要

世腎臟風甘草節湯洗極効

雜方

秘腎臟風痒不可當者吳茱萸蛇床子等分煎湯洗神効治腎臟陰汗生瘡用莧菜根莖葉燒灰存性研細搥破傅之立愈又蒼耳草蛇床子煎湯洗之良

潔治男子婦人陰部濕淹瘡

五倍子細研五分白礬錢一銅綠許少輕粉字一

乳香五分

右為極細末洗淨搽之

世治陰瘡痒痛久不止

銅錢百枚烏梅七枚鹽二錢

右水一碗半煎至一碗洗之無不効驗

世腎臟風瘡 血邨即百虫窠右膝內廉上膝三寸陷中者

集腎臟風瘡 血邨即百虫窠針入寸半灸二十七壯三陰交

下疳瘡

針灸

熱
丹有一隣人三十餘性狡而躁素患下疳瘡或作或止夏
初患白痢膈上微悶醫與理中湯四貼昏悶若死片時而
甦予脈之兩手皆瀦重取畧弦似數予曰此下疳瘡之深
重者與當歸龍薈丸去麝四貼而利減與小柴胡去半夏
加黃連芍藥川芎生姜煎五六貼而安 一男子近三十
歲有下疳瘡雖屢求治以其不能忌口却之忽一日頭痛
發熱自汗衆作傷寒陽証治之反劇予診其脈弦甚七至
重按則澁予曰此症在厥陰藥與症不相應遂作小柴胡
湯加草龍膽黃連胡黃連帶熱服四貼而病脫然 治男
子耻瘡或痛在莖之竅或痛在莖之標皆手足大陽不利
熱毒下傳入于足厥陰故變紫黑色作蝕瘡毀其莖而死
宜以子和泄水丸散導其濕毒無不愈者若已成瘡先泄
其根次從標而治外以葱白黑豈汁漂洗拭乾以黃連木

香蜜陀僧乾胭脂之類細末搽之如內潰膿不出以追膿
散上之又用子和泄水丸如後竅膿少可用黃連木香脂
脂等貼之

子和泄水丸一名大智丸

大戟

芫花

甘遂

海帶洗

海藻洗

郁李仁

續隨子

已上各半兩

樟柳根兩一

右爲細末水煮棗肉爲丸如小豈大每服五七十九丸熟
水下

治下疳瘡先用張子和泄水去根後用此藥乾上

黃連

滑石各半兩

定粉錢三

輕粉少

乳香錢一

蜜陀僧錢二

右細末乾上或加乾胭脂或加木香檳榔

丹下疳瘡

蛤粉

臘茶

苦參

青黛

蜜陀僧

右用臘脂調塗河水洗淨并治臙瘡

世又方

青黛

海蛤

蜜陀僧

黃連

右為末傅上

丹

一切熱毒惡瘡及下疳瘡用蜜陀僧黃栢皮末各一分

半膩粉一錢麝香少許先洗瘡拭乾傅之甚者三四次

治下疳瘡雄黃黃連等分為末濕者乾摻乾者油調傅先

用荆芥射干煎湯洗却傅之妙一方用地骨皮末傅神効

取膿

海追膿錠子膿內潰不出以此藥追之

雄黃錢二

巴荳半一錢

輕粉字一

補虛

嘗治一男子下疳瘡每恣飲酒則發醫與小柴胡湯加

黃連數貼不効又與玉燭散下之反劇予以甘草節小
建中各半煎湯服之下咽痛止後以四物湯建中甘草
等分與之漸安

敷貼

丹陰頭瘡蜜煎甘草傅之安

外臺
秘要

又方用頭髮以鹽水

洗淨去油再用米泔洗淨又用清湯洗晒乾燒灰傅瘡上

便結靨

世蒼耳葉為末摻之

治下疳瘡黑形兔為末傅上神効

一名烏吊土
一名孩兒沙

海治下疳瘡久不愈橡斗子二箇各盛黃丹令滿相合以

亂髮纏定燒烟盡為度同研為末先以葱白熱漿水洗瘡

膿盡次上藥甚者不過三次如神

世療人陰生瘡膿出成坎取高昌白礬麻仁等分研煉猪

脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾即塗膏然後以楸

之
久者效

葉貼其上不過三五度瘡

下疳瘡用五倍子末傅之

婦人陰瘡

雜方

少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕爛者狼牙湯洗之用狼牙二兩以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯瀝陰中日三遍

洗榻散治陰蝕瘡

甘草

乾漆

黃芩

當歸

地黃

芍藥

龜甲

右細切以水七升煮取一半去查以綿帛內湯中用榻瘡處良久即易日二度每榻湯可作十里許即挹乾捨取甘濕散薄傅瘡上使徧可經半日又以湯榻榻訖如前傅藥

有一婢生此疾蝕處作兩瘡深半寸用此洗榻湯并後甘濕散不經七日平復甚効

甘濕散

蚰蛇膽

青木香

石硫黃

鐵精

麝香

各四分臨時入用綠射辟蛇毒若先以相和蛇胆即無力也

右各等分爲末更研細有患取如三碁子大和井花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部訖然後取藥如碁子安竹管裏內入下部中日再度老少量減其薰法每日一度不用再

桃枝薰法取東南桃枝五七枝輕打頭使散以綿纏之又搗石硫黃爲末將此綿纏桃枝撚轉之令末少厚又截一竹筒先內下部中仍以所撚藥桃枝燒熱薰之

女子陰瘡硫黃末傅之後

伸蛇床子散濕陰中主藥用蛇床子仁一味末之以白粉少許和令相得如棗大綿裹納之自然濕散氣運氣陰瘡皆屬寒經云太陽之勝陰中乃瘍隱曲不利治以苦熱是也

熱
疔瘡

治疔瘡極妙地骨皮一斤黃栢皮二兩剉為粗末用香油一斤半煎濾過藥油六七兩入淨松香二十兩黃丹二兩同煎候黃丹微黑色却入輕粉七角光粉二角煎法皆如煎膏法用長條紙拖過掛乾用若此瘡紫黑先用三稜針去惡血以冷水洗淨隨瘡大小剪膏藥掩上用絹帛緊緊扎縛俟一周時再換膏藥換時須用冷水洗瘡不過數換不問新久即愈須忌日氣火氣陽氣倘換膏藥再看如有黑腫未盡可再出血以紫黑血盡為度

治疔瘡用糯米泔嗽口過洗瘡拭乾却以地骨皮為細末蜜調傅瘡上又以油紙縛之

丹治疔瘡

白膠香兩一 黃栢兩一 軟石膏另研一兩青黛兩

龍骨分五

右為細末以香油調傅患處

又方羯羊屎二分石膏一分赤石脂半分為細末香油和之舊黑油傘紙作隔膏縛之除根

羅翠玉膏治疔瘡

瀝青兩四 黃蠟 銅綠各五錢 沒藥三錢

右件先將銅綠為細末入香油調勻又將黃蠟瀝青火上溶開次下油銅綠火上攪勻將沒藥等三味旋旋入攪勻用河水一碗將藥傾在內用手扯拔勻油紙裹看

瘡大小分大小塊口嚼捻成餅子貼於瘡上紙封三日
易之

丹 賺瘡用砂糖水煮冬青葉三五沸滂起石壓乾將葉貼
在瘡口上一日換二遍 腳痛成瘡水蓼煎湯洗瘡候乾

自安 經驗方

山 賺瘡用韭汁洗淨挹乾剉虎骨傳上

丹 二妙丸治下焦濕瘡 但是下焦有瘡皆可服 潛行散末蒼木末

各等分煉蜜為丸桐子大

寒濕

海 治兩賺脚膝生瘡局方虛損門服黃芪丸立安

黃芪丸

川烏頭 炮去皮 川練子

地龍 去土

茴香 炒

杜蒺藜 炒去刺 赤小豆

防風 去頭

黃芪 劉各一兩

烏藥 二兩

右為細末酒煮麩糊為丸如桐子大每服十五丸溫酒
下鹽湯亦得婦人醋湯下並空心服

脚氣瘡足跟瘡

雜方

世 捷應散治脚濕氣成瘡痒不可當爬之流黃水用羯羊
糞晒乾為末安於瓦上手把竹柴火燒作灰又研細先用
葱椒湯洗之次用香油調厚傳上以山茶花葉罨之帛縛
四五日即可

丹 脚上爛瘡久不瘥先以酸漿豆腐水洗三二次尋懸鈎
担葉地暴扭葉搗細入鹽些少盪之地暴扭葉即覆盆子
葉也

海 足跟瘡久不愈毒氣攻注用白木為細末先以鹽漿水
溫洗乾貼二日一換可以負重涉險

凍瘡

針灸

子和經曰寒瘡流水俗呼為凍瘡或經年不愈者用野中淨土晒乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小貼之以艾火加於餅上灸之不計壯數以泥乾為度去乾餅子再換濕餅子灸不問多少直至瘡痂覺痛痒是瘡可治也然後口含漿水洗漬用雞翎二十莖縛作刷子於瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也以軟帛拭乾用木香檳榔散傅之如夏月醫之更妙

世足跟紅腫凍瘡 足跟左足指面後跟赤白肉際骨下刺入三分彈針出血可灸二十七壯

足跟凍瘡潰破用椒葱湯洗刮去腐肉用三稜針出血將馬屁勃入生牛骨髓調和傅之効

雜方

治凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之
錫取臘月牡鼠死者一枚油一大升煎之使爛絞出查

再煎成膏塗凍瘡及折破瘡

丹治凍瘡用煎熟桐油蜜陀僧傅

山用五倍子煎湯洗

止痛

羅如神散治凍瘡皮爛不可忍用川大黃不拘多少為細末新水調掃凍破瘡上痛止立効

世治凍瘡痛者橄欖核燒存性為末用香油調塗患處其痛隨愈

子戴人女僮足有凍瘡戴人令服丹車丸濟川散大下之遂愈人或疑之戴人云心火降則寒消何疑之有

手足皴裂脚縫爛

雜方

羅潤肌膏治手足皴澁皮膚裂開疼痛不能見風

珠子瀝青兩白黃蠟八錢乳香二錢

右三味於鐵器內用文武火熬下瀝青在鐺內隨手便

下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀝青盡溶開微
微熬動放大淨水一盆於其傍以攪藥用匙取一二滴
滴於水中試之如硬再入油如軟硬合宜用新綿摠淨
入水中折疊扯之以白爲度油當旋旋入勿令軟了以
磁器內盛之或油紙裹亦得每用不拘多少先於火上
炙裂子口却捻合裂子藥亦火上炙軟塗於裂子上用
紙少許貼之自然合矣

東 老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車者皮膚皴
裂甚痛兩手不能執轆足不能履地而車上宿制此藥傳
之卽効明日遂行自後屢用屢効故錄於此

世 治手足皴裂春夏不愈者

生姜汁

紅糟

白鹽

猪膏

臘月者佳

右研爛炒熱擦入皴內一時雖痛少頃便皮軟皴合再

用卽安

丹 手足寒皴裂台椒三四合煮浸半食頃須臾再浸又傳
以羊猪髓腦甚妙 梅師方

世 治腳跟皴裂用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候
油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰入每用百
沸湯泡洗皴裂令軟傳其上卽安一方加水粉

山 脚裂爛蒸藕研成膏傳之

世 用五倍子爲末同牛骨髓填縫內卽好治脚指縫爛瘡
搗鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒存性爲末濕則搽之

反花瘡

瘡有努肉凸出者是也

雜方

丹 諸瘡努肉如蛇頭出數寸者硫黃末傳之卽縮 聖惠方

瘡有肉凸出烏梅燒灰爲末傳之立盡 鬼遺方 又以白梅

肉杵細入蜜捏成餅如錢大貼之妙 聖惠方

梅又方治反花瘡馬齒莧一斤燒灰細研猪脂調傳
世瘡凸出寸許根如小荳或大如梅者用花腳蜘蛛絲纏其根則漸乾而自脫落

惡瘡

虛實 羅乳香消毒散專治惡瘡

大黃煨

黃芪

牛蒡子炒

金銀花各五兩

甘草三兩

牡礪鹽泥煨五兩乳香

沒藥

懸萋各半兩

右爲粗末每服五錢水煎瘡在上食後在下食前

海惡瘡入腹心嘔逆藥食不下

荳粉兩

乾胭脂三錢

定粉二錢

右細末新水調下神効

雜方 碧霞挺子治惡瘡神効了不覺疼痛者

銅綠

硃砂各二錢

蟾酥一錢

右爲細末燒飯和作麥蘖挺子每刺不覺痛者須刺出血方維藥在內以膏藥貼之

蝕惡瘡方非奇異惡瘡不可用

銅綠二錢

硃砂一字

石膽礬半錢并細研

右爲細末傳之

治惡瘡或有小虫

膽礬一錢

龍骨二錢半

輕粉一錢

虎骨

白礬二錢半

麝香五分

乳香一錢

硃砂二錢

腦子一字

土蜂房二錢

露蜂房二錢半

雄黃二錢

右細末刺破鹽水洗看緊慢上藥神効

雜瘡

雜方

世治蒲萄瘡瘡頭如蒲萄色四圍腫起先追膿盡次用水

梅當瘡頭癩之神愈

本江左有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺臍肉脹起或不食之則臂痺有善醫者教其歷試諸藥無苦至具毋其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒磨貝毋水灌之數日成痂遂愈不知何疾也

天泡瘡通聖散及蚯蚓泥畧炒蜜調傳妙從肚皮起者裏熱發外速服通聖散

外天行班瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉以蒜壅啖之即止

孫卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傅

手太陽之別名曰支正上腕五寸虛則生疣小者指痂疥

取之所別也全文見針灸虛實

丹手足生疣目鹽傅上舌舐之只三次瘥後肘

世疣用雞胃中食指疣上指餘者以石壓之驗

世取痣餅藥

糯米百粒 石灰搗指大 巴荳三粒去殼研

右為末入磁瓶同甞三日每以竹簽挑粟許點上自然蝕落

緊取靨

風化石灰一兩 花碱半兩

右為細末上三次如天色冷濕用

術石灰水調一盞如稠粥揀好糯米全者半置灰中半置灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑靨子及

紋刺者先微微以針頭撥動置少許於其上經半日許膿汁自出別去藥不用且不得着水二三日愈 又方用水蛭一條雞子一枚開雞子小頭內水蛭以皮兒蓋合封之直至水蛭食盡雞清乾盡自死乃用之

擗撲傷損

金瘡

杖瘡

湯火傷

竹木刺針入肉

箭入肉

漆瘡

法 蒸罨損

世 凡擗傷皮破血出處疼不可忍乃風寒所着宜用葱杵碎入鹽少許炒熱罨上其痛即住冷則再溫之

本 崔給事頃在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖接毬子其將軍以杖相格乘勢不能止因傷李相姆指并爪甲劈裂遽索金刀藥裹之強坐頻索酒飲至數盃已過量而面色愈青忍痛不止有軍使言取葱新折者入瘡灰火煨熱剝皮擘開其間有涕取罨損傷處仍多煨葱續續取

熱者凡三易之面色却赤斯須云已不痛凡十數度易用熱葱并涕裹纏遂畢席笑語

海 治腦骨破及骨拆葱白爛研和蜜浮封損處立瘥 筋斷骨折者以法接之

接骨方

世 治擗撲筋斷骨折用粟米半升木鱉肉二十箇半夏半兩婦人髮一團葱白鬚一小束同炒烟盡存性爲末熱醋調傅神効 治擗撲筋斷骨折用糯米一升皂角切碎半升銅錢百箇同炒至半焦黑去銅錢爲末用好酒調膏厚紙攤貼患處神効

本 打撲傷損及一切腫癰未破令內消方

生地

研如泥

木香

細末

右以地黃膏隨腫大小攤於紙上摻木香末一層又再攤地黃膏貼腫上不過三五度即愈昔許元公入京師

赴省試過橋墜馬右臂白腕路人語其僕曰急與接入
白中若血漬白則難治矣僕用其說許以昏迷不覺痛
遂僦轎昇歸邸或曰非錄事巷田馬騎不能了此疾急
召之至巳日暮因秉燭視其面曰尚可治乃施藥封此
處至中夜方甦達旦痛止去其封損處已白其青瘀乃
移在白上自是日日易之腫直至肩背以藥下之瀉黑
血三升五日復常遂得赴試蓋用此法云

世走馬散治折傷接骨

栢葉生用

荷葉生用

皂角生用

骨碎補去毛等分

右爲末先將折傷處揣定令入元位以姜汁調藥如糊
攤紙上貼骨斷處用杉木片夾定以繩縛之莫令轉動
三五日後開看以溫葱湯洗後再貼藥復夾七日如痛
再加沒藥

本治腕打傷筋損骨疼痛不可忍

生地一斤切

藏瓜姜糖一斤 生姜四兩切

右都炒令勻熱以布裹罨傷折處冷則易之曾有人傷
折宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢見龜告曰勿相
害吾有奇方可療於夢中授此方神効

本骨碎補卷閃折筋骨折傷取根搗碎煮黃米粥和之罨
傷處良

本接骨丹敷貼藥

天南星四兩

木鱉子四兩

沒藥兩

官桂兩

乳香兩

右爲細末姜一斤去皮爛研取自然汁入米醋少許白
麪爲糊同調攤紙上貼傷處以帛縛之用篋夾定麻索
子纏

山 搗撲骨肉損醋搗肥皂爛厚罨之以帛縛之閃傷醋糟平胃散相和罨之

治 癩傷骨折及血黯方用益元散七分人參湯調之次用姜汁好醋二盞用獨子肥皂四箇敲碎接於姜汁醋中調和以綿濾過去查煎成膏藥貼之遍身亦可

本 又方柑桔葉白酒糟杵細縛痛處或大段痛用火燒地令紅用醋并米泔撥地上急鋪荐令患者荐上臥蒸出汗內則服藥外則貼罨易安

勝金 治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用綿裹血立愈

丹 折傷接筋方旋覆花根杵汁滴傷處又將查封瘡上十日使斷筋自續矣

蘇良仲方即金沸草根是也 接骨用好無名異

三兩為末丁乳檀沉木五香各半錢重為末先燒鐵銚紅以五香三之一彈入銚內候烟起則全下無名異待滾退

火定後再上火炒熱又將五香彈三之一彈入銚內候滾又退火如此者凡三次訖出火毒即用骨碎補去毛約一斤與生姜等分搗爛以碗覆之候發熱先約取五之一入小葱九莖連鬚去蒂同入沙盆搗細取其汁調前無名異末二錢衝老酒服之其查罨患處即愈如年老氣衰者再作一劑多飲酒力助之為妙

綴耳鼻

治擦落耳鼻用髮入碓子鹽泥固濟煨過為末乘急以所擦落耳鼻蘸灰綴定以軟絹縛定效江懷禪師為驢所咬下鼻一僧用此綴之効

肩穿法

山 負重擔肩破者剪猫兒頭上毛不語唾粘之 遠行脚踏泡用調生麪糊貼過夜即乾不可擦破又法用飯粘貼過夜以紙蓋之次日平復神効

傷分三部用藥

海 若登高下重物撞打箭鏃刃傷心腹胃中停積鬱血不

散以上中下三焦分之別其部分上部易老犀角地黄湯中部桃仁承氣湯下部抵當湯之類下之亦有以小便酒同煎治之更有內加生地黃當歸煎者有大黃者又法虛人不禁下者以四物湯加川山甲煎服妙亦有花蓋石散以童子小便煎或酒服之者此藥與前寒藥正分陰陽不可不辨也若瘀血已去用復元通氣散加當歸煎服亦可

無裡症者虛者但行補接

接骨神效無比累驗用當三錢一百零八箇錢厚字以連草者以鐵線穿定用活桑木一根作柴燒錢紅米醋一大碗未煎者不入鹽將所燒錢焯入醋中如此焯之以醋乾為度取醋中焯落銅錢末就用醋洗去灰晒乾為極細末再用黑雄雞一隻清湯煮熟去肉用骨一付以醋炙酥為末入乳香沒藥各一兩與銅錢末一處和勻每服一字臨服時用

患人髮在頂上者洗去垢燒灰入藥中無灰酒調服不吐只一服如吐出再服如痛止不可再服必須先夾縛所折骨端正用楊樹皮刮去肉糊并外粗皮傳之下咽便不痛五七日便能運動必終身忌葶薺一名地栗義門家傳方一方用五銖錢醋焯一兩二錢黑雞骨三兩研細勻每服病在下四錢踈服食前病在上二錢半頻服食後一方有乳香沒藥

潔方用醋焯半兩錢蘇木定粉南鵬砂各一錢為末作一服當歸酒二三服痛止勿服

丹接骨散

- 沒藥
 - 乳香各五錢
 - 自然銅一兩醋焯
 - 滑石二兩
 - 龍骨三錢
 - 赤石脂二錢
 - 麝香後入少許
 - 白石脂二錢
- 右為細末以好醋浸沒煮多為上候乾就炒燥為度臨

服入麝香少許挑小茶匙在舌上溫酒下病分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨石脂而多服儘好

世 又方接骨 乳香 沒藥 蘇木 降真節

川烏去皮 松明節一兩 自然銅米醋煨 各一兩 地龍去土麻油炒半兩 血竭三錢 龍骨半兩 生用 水蛭油炒半兩 土狗十個 油浸炒

右為細末每服五錢酒調下在上食後在下食前

拒 定痛乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍腹中疼痛

乳香 沒藥 雄黑豈 桑白皮 獨科栗子各一兩 破故紙炒二兩 當歸一兩 水蛭半兩

右為末每服五錢醋一盞沙石器內煎至六分入麝香

少許溫服

定痛接骨紫金丹

麝香 沒藥 紅娘子各一錢半 烏藥二錢

地龍去土二錢 川烏 草烏炮各一兩 五靈脂去皮半兩

木鱉子去壳半兩 茴香二錢 黑牽牛生用五分 骨碎補

歲靈仙 金毛狗脊 防風去芦 自然銅醋煨七次

各五錢 禹餘糧四錢 碎 陳皮 青皮各二錢半

右為細末醋糊丸如桐子大每服十九至二十九溫酒送下病上食後病下食前服

聖靈丹治一切打撲損傷及傷折疼痛不可忍者並宜服之

乳香五錢 烏梅去核 五個 白米撮 蒿苳子一大 盞炒 取二兩 八錢

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼熱酒吞下食後一伏時痛不止再服

經治折傷用水蛭新瓦上焙乾爲細末熱酒調下一錢食頃痛更一服痛止便將接骨藥封以物夾定直候至好

初虞世治從高至下墜及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩剉碎炒烟出二件研爲細末酒調二錢當下畜血未止再服其効如神

行自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲損傷研極細末飛過用當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛處

海治墜落車馬筋骨疼痛不止用玄胡索一兩搗羅爲散不計時服以荳淋酒調下二錢

本童便治卒血及心被打內有瘀血者煎服之一服一升

搨撲傷損松節煎酒喫 搨撲重傷用生姜自然汁四兩香油四兩打勻無灰酒熱調下

右乳香沒藥行汚血調氣例衍義云沒藥通滯血打傷

撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅瘀氣壅瘀則經絡

滿急經絡滿急故痛且腫矣道而行之則痛腫消焉

打損磕傷疼痛夜合花末服之酒下二錢七効

治打撲損傷折骨此藥專能接骨

夜合樹 卽合歡花去粗皮炒黑色四兩 芥菜子 炒一兩

右爲細末酒調二錢澄清臨臥服以粗查罨瘡上扎縛

之

又方用葱白砂糖二味相等分爛研傅之痛立止且無癢

白蠟屬金金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血

痕

定痛接骨續筋補虛與合歡皮同入長肉膏藥用極神效
但未曾試可為藥餌否若合歡皮常試之灸服之大有妙
理且有速効不可不知也

治打傷接骨方

接骨木 半兩本草
名菊藿

乳香兩 赤芍藥

當歸 川芎 自然銅各一兩

右為細末同黃蠟四兩溶入前藥末攪令勻候溫軟衆
手丸如龍眼大如打傷筋骨及閃拗着疼痛不可忍者
用此藥一丸無灰熱酒一盞浸藥候藥潰開乘熱呷了
痛便止若大段傷損碎拆須先整骨用川烏草烏為末
等分生姜汁調貼罨之又將帛縛定然後服此藥表裏
兩治無不効者此二方是一副不可分開
治打撲內損筋骨疼痛

沒藥 乳香 芍藥 川椒去子及
閉目者

川芎 當歸各半 自然銅三錢炭
火燒

右為細末用黃蠟四兩溶開入藥末不住手攪勻濕左
如彈子大每服一丸用好酒煎開消盡乘熱一服吃盡
看那處痛向痛處臥霎時服三五丸立効

治破傷見血酒一碗煎服

半兩當歸蠟二錢 合來搥碎酒同煎

直須軟冷連查吃 一切傷瘡保萬全

右夜合黃白蠟例接續筋骨補虛也

疔破血消痛湯治乘馬損傷跌破脊骨惡血流下脇下甚
痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活 防風 蘇木一錢
半

連翹 當歸 官桂 麝香另研

水蛭性錢炒去烟尽另研

右為粗末只一服酒二大盞米一盞水蛭麝香另研如

泥餘藥煎至一大盞去火稍熱調三味服之兩服立愈

中風有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不行下積

於脇下則傷肝又中風及有所擊仆若醉入房汗出當風

則傷脾又頭痛不可取于脰者有所擊墮惡血在內若肉

傷痛未已可側刺不可遠取之也邪氣臟腑及厥病篇

夫從高墜下惡血流於內不分十二經絡醫人俱作中風

肝經留於脇下以中風療之血者皆肝之所主惡血必歸

於肝不問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則

必有自汗但人人有汗出皆屬風証諸風皆屬於肝木况

敗血凝泣逆其所屬入於肝也從高墜下逆其上行之血

氣非肝而何非傷寒無汗既曰汗必自風化之也故以破

血行經藥治之

有症裡實者攻裡

復元羌活湯治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不可忍

者經云有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不行下損

於脇則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陽宜以

柴胡為引用為君以當歸活血脈又急者痛也以甘草緩

其急亦能生新血陽生陰長故也為臣川山甲括萋根桃

仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以蕩滌敗血為之使

氣味相合各有所歸痛自去矣

脇下痛者血在肝

柴胡錢五

當歸錢三

甘草錢二

川山甲炮三錢

大黃酒浸一兩

桃仁去皮尖五十個

紅花錢二

瓜萋根錢三

右件桃仁研爛餘藥剉如麻豈大每服一兩水二鍾酒

半盞煎至七分去查大温服食前以利為度得利後痛

或不盡服乳香神應散乳香神應散見前無裏証條

皆胃者
血冲心

紫巴戟湯治從高墜下及打撲內損昏冒嗜臥不能飲食
此謂血閉臟腑不通

巴戟去心半兩

當歸

地黃

芍藥

川芎

各一兩

大黃兩

右為末水煎以利為度

垣當歸導滯散治打撲損傷落馬墜車瘀血大便不通紅腫青黯疼痛昏悶畜血內壅欲死

大黃兩

當歸分

麝香少許

右三味除麝香別研外為極細末入麝香令勻每服三錢熱酒一盞調下如前內瘀血去或骨節傷折疼痛不可忍以定痛接骨紫金丹治之

大小便
之不利

巖奪命散治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心腹疼痛大小便不通

水蛭

用石灰拌慢火炒今乾黃色半兩

黑牽牛二兩

右為末每服二錢用熱酒調下約行四五里再用熱酒調黑牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡為度

無雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死煩躁頭痛叫呼不得並以此藥利去瘀血治折傷神妙

大黃

一兩酒蒸

桃仁

二十七粒去皮尖

右研細酒一碗煎至六分去查雞鳴時服次日取下瘀血即愈若便覺氣絕不能言取藥不及急擊口開用熱小便灌之即愈

羅氏花蕊石散治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損猶狗咬傷或至死血瘀傷處以藥摻之其血化為黃水再摻藥便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許調

一大盞服之立効若牛舐腸出不損者急內腸入用細系或桑白皮爲線縫合肚皮縫上搽藥血止立活如無桑白皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後搽藥婦人產後敗血不盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭覺暖急以童子小便調一盞取下惡物如肝片終身不患血風血氣証若膈上有血化爲黃水卽時吐出或隨大便出

石硫黃兩

花蕊石二兩

右二味相拌合勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦礮子一箇內可容藥候泥乾入藥在內再用泥封口候乾安在四方磚上上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自巳午時從下着火漸漸上徹直至經宿火冷炭盡又放經宿礮冷取出細研以絹羅子羅極細磁盒盛之依法使用

本治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛水仙散

未展荷葉陰乾一味爲末食前以童子熬小便一小盞調下三錢以利下惡物爲度

聖治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以大乾荷葉五片燒令烟盡細研食前以童子熬小便一小盞調三錢七日三服

塞上方治墜傷損撲瘀血在內煩悶者用蒲黃末空心熱酒調下三錢瘥

本宣和中有一國醫忽承快行宣押就一佛刹醫內人醫診視之已昏死矣問其從人皆不知病之由惶恐無地良久有二三老內人至下轎環而泣之方得其實云因蹴鞦韆自空而下墜死醫者云打撲傷損自屬外科欲申明又恐後時參差不測再視之微覺有氣忽憶藥篋中有蘇合

香丸急取半兩於火上焙去腦麝用酒半升研化灌之至三更方呻吟五更下惡血數升調理數日方瘥

仲景不
分表裏
先利之

仲治馬墜及一切筋骨損傷

大黃一兩切湯
浸或半兩

緋帛

亂髮如雞子
大燒灰

敗蒲席三寸 久用炊單布一尺
燒灰

桃仁四十九
個去皮

甘草如中指
節炙剉

右七味以童子小便量多少煎湯或內酒一大盞次下

大黃去查分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯浴以衣被

覆斯須通利數行通後立瘥利後浴水赤勿怪即瘀血

也

傷損愈
後青腫

聖治搯撲損肌膚青腫用茄子種通黃極大者切作片如

一指厚新瓦上焙乾為末欲臥酒調二錢七一夜消盡無

痕

療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蠶虫二十一

枚煨過同搗篩每用溫酒和散方寸七服血當化為水下

丹治被打瘀血在骨節下出者生鐵一斤酒五升煎取一

升飲之後附

本治從高墮下墜損惡血在骨節間疼痛芸臺散

荆芥 藕節各二兩
陰乾 芸臺子 川芎

馬齒莧各一兩
陰乾

右為細末用蘇木半兩酒一大盞煎至七分調下二錢服之不拘時服

丹盛官人因上山惡血瘀入內損傷食少脈弦此須用活血和氣

川芎三錢 青皮二錢 芍藥 滑石各一錢

牡丹皮五分 炙甘草一錢 桃仁七枚
研

右作一貼服之

禁忌 凡傷切不可飲冷水血見寒則凝但一系血入心即死

針灸 素人有所墜墮惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥

此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之

前血脈出血刺足跗上動脈不已刺三毛上各一疔見血

則已左刺右右刺左善悲驚不樂刺如右方

繆刺論

身有所傷血出多及中風寒若有所墜墮四肢懈墮不

收名曰體惰取小腹臍下三結交者陽明太陰也臍下三

寸關元也

寒熱篇○三結交者即關元穴是也

脈從高撲損內有血腹脹滿其脈堅強者生小弱者死

金瘡

雜方 本治金瘡止血除疼痛辟風續筋骨生肌肉地黃散

地黃

地崧

青蒿

蒼耳

苗

生艾汁

合

赤芍藥

各五兩入水煎取汁

右五月五七月七日午時修合以前藥汁拌石灰陰乾

入黃丹三兩更杵為細末凡有金瘡傷折出血用藥包

封不可動十日瘡不腫不膿

世治金瘡風化石灰菲葉嫩者同搗入鵝血調和成餅乘

風陰乾為末傳上

無鵝血亦得

治金瘡血不止用半夏石灰

鬱金三物為末搽上傷處即住

崔療金鎗刀斧傷破血以石灰一升石榴花半斤搗取末

少許捺少時血斷便瘥

潔末藥散刀箭藥止血住痛

定粉

風化灰

各一兩

枯礬

三錢另研

乳香

五分另研

沒藥

一字另研

右件各研為細末同和勻再研搽之

丹 刀斧傷石灰包之痛止血住

精勝金 方治刀斧傷止血生肌 蚕蛾散 晚蚕蛾為末 搽勻 絹帛裹隨手瘡合血止 一切金瘡亦治 一法用生晚蚕蛾石灰二味同搗成餅陰乾為末 傳之

本治金瘡止疼痛 劉寄奴散

劉寄奴一味為末散搽金瘡口裏 昔宋高祖劉裕微時 伐荻見大蛇長數丈射之傷明日復至聞有杵臼聲往 覘之見青衣童子數人於臼中搗藥問其故答曰我王 為劉寄奴所射合藥傳之帝曰神何不殺之答曰寄奴 王者不死不可殺帝叱之皆散收藥而去每遇金瘡傳 之効寄奴高祖小字也此藥非止治金瘡治湯火瘡大 妙經驗方云劉寄奴為末先以糯米漿雞翎掃着傷處 後搽藥末在上並不痛亦無痕大凡湯火傷急用鹽水

洗之護肉不壞

世治金瘡打撲損傷 用菴黃草研細入鹽少許 罨之愈

金瘡血出不止 按小蘗葉封之 金瘡止血 杵覆盆花苗

傳瘡立止

傳師方

本治金瘡血不止兼痛 用血竭末 傳立止

精治惡瘡 金瘡刀斧傷見血方以好降真香為末貼之入

水並無傷痕絕妙 方見華陀中藏 治刀箭傷出血不止 并骨折

檳榔

木香

胡地黃 各三錢

右為末 傳瘡口血立止 又可接骨

仲金瘡方 王不留行散 主之

瘡大者服藥

王不留行 十分八月

蒴藋細葉 十分七月

桑根 用白皮根行東南者三月三日採

甘草 各十分 黃芩 二分

川椒 三分除目及閉口者出汗

乾姜 芍藥

厚朴各二分

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令過各別研杵篩合治為散臘方寸七小瘡即粉之大瘡但服之產後亦可服如風寒桑東南根勿取之前三物皆陰乾百日用

廣金瘡血不止痛白芍藥一兩熬令黃杵細為散酒後米飲下二錢並得初三服漸加

鬼治金瘡出血肉癢編編二枚燒烟盡以水調服方寸七令一日服盡當下如水血消 金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩為細末白米飲送下方寸七日再用鬼遺方

診仲景問曰寸口脈微而瀋法當亡血若汗出設不汗者云何答曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也

脈金瘡血出太多其脈虛細者生數實者死 金瘡在

處出血不絕陰脈不能至陽者死接陽而復出者生 金瘡出血脈沉小者生浮大者死 斫瘡出血一二石脈來大者二十日死 斫刺俱有病多少血出不自止斷者其脈止脈來大者七日死滑細者生

杖瘡

藥鬼代丹治打着不痛

無名異研 沒藥研 乳香研 地龍去土

自然銅醋炒 木鱉子去殼等分

右為末煉密丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

精乳香散治杖瘡神效

自然銅半兩醋炒七次 乳香三錢 沒藥三錢

茴香四錢 當歸半兩

右為細末每服五錢溫酒調下

藥
汚血服

敷貼

雞鳴散下杖痛腹中惡血甚好方見撲傷損

黃丹

黃連

黃芩

黃栢

大黃

乳香已上各等分

右為細末新水調成膏用緋絹帛上攤貼

紫沒藥散治杖瘡止痛令瘡不移

蜜陀僧

沒藥

乳香各一兩

乾胭脂一兩半

膩粉兩半

右細末次入龍腦少許若多更妙燒葱與羊骨髓生用同研如泥攤在緋帛上貼之

四杖瘡痛用黃栢生地黃紫荆皮敷此皆要藥也只是血熱作痛用涼藥去瘀血為先須下雞鳴散之類雞鳴散方見擷撲傷

損條本草紫荆破宿血

又方用生地黄黃栢童便調傅或加韭汁 不破者以韭

菜蔥頭杵貼冷即易之膏藥用紫荆皮乳香沒藥生地黄大黃黃栢之類 又方用木耳盛於木杓內用沸湯浸爛

攪水令乾於砂盆內搗細傅瘡上 又方用大黃黃栢為末生地黄汁調傅如乾再傅 又方用野苧根嫩者不拘

多少洗淨同鹽併搗傅在瘡上神妙傷重多用鹽

世杖瘡丹用劉寄奴末六錢馬鞭草末四錢蜜調傅如濕者乾搽馬鞭草即欽筴帶此方甚妙

湯火瘡

初反治

世凡湯火傷急向火灸雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物塌之及井底泥傅之使熱氣不出爛入肌肉

世火燒以好酒洗之又以鹽傅其上如皮塌者以酒熬牛皮膠傅之 如湯傷以淋過第二次灰查傅立安 熱酒

傷糯米粉炒黑末酒調傅之 治湯火灼未成瘡者用艾
白根燒灰雞子黃和傅之如成瘡用白蜜封之以竹中膜
貼上日三

世治湯火瘡麩皮炒黑灰爲末傅上神妙此方有補性始
終皆可用 治湯火瘡取舊烹銀爐中燒過焦黃土研細
如粉以生姜調於帛上貼之痛止一方用溶銀鍋子細末
油調傅佳

十治火瘡未起梔子仁燒灰麻油和封之厚乃佳已成瘡
燒白糖灰粉傅之燥卽瘥用白糖
葛氏方

垣保生救苦散治火燒熱油所損或至肌肉亦脫一切犬
齒損傷并刀斧所傷用生寒水石不計多少爲極細末調
塗之或乾上然不如油調其痛立止並不作膿無分毫厘
苦楚日近完復永無破傷風症

中正治

精冰霜散治火燒皮爛大痛

寒水石 生

牡礪 燒

朴硝

青黛

輕粉 各等分

右爲細末新水或小油調塗立止

治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂

寒水石

大黃 各等分

右爲末以新汲水調塗傷處

丹治火燒

桐油

水銀 各等分

右二件以柳條不住手攪成膏再入大黃末石膏末和
以牛皮膠入少水溶開外用貓兒肚底毛細剪摻上貼
之

羅綠白散治湯熨火燒疼痛用苦參不拘多少爲細末每
用以小油調搽

精 凡被湯熱油痛不可忍取厠下黑淤泥量傷大小斟酌多少次以老姜汁麻油十分之一共研令勻搽傷處立愈
世 以青黛傳之妙

未補

世 治湯火瘡爛者以黃蜀葵花落者淨器收之入水些少待爛成水傳上神妙 熱油澆外痛以蜜傳之立安梅師方

本 治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和塗之

經 治湯火瘡至妙用劉寄奴爲末先以糯米漿雞翎掃傷處後搽藥末在上並不痛亦無痕大凡湯傷先用鹽末摻之護肉不壞然後傳藥 又方以榆白皮末猪脂油塗瘡愈

世 治火湯瘡先以酒洗次以楊梅樹皮爲末香油調傳

治湯火瘡用髮一束香油煎以髮盡爲度放冷搽患處驗

精 治中熱油及火烧除外痛以丹參八兩細剉以水微調

取羊脂二斤煎三上三下以傳瘡上愈梅師方同 治湯火至

聖膏用雞子黃十箇入銀石器內熬自然油調好粉傳之愈

竹木刺針入肉

雜方敷貼

精 凡諸竹木刺入肉中不出以躡躑研傳立出 又方用

白茅根搗傳之立出 又方嚼牛膝根卷之卽出

簡 治竹木刺扎入深不得出用烏羊糞搗爛水和罨於傷處厚傳之曾有庄僕腳心中刺不得出苦痛欲死以此藥黃昏傳之至四更其刺出遂安

山 蘆葦刺入肉者細嚼栗子查盒傷處 木竹刺已出痛者螻蛄罨之妙

簡 治針入肉不出用螻蛄腦子同硫黃研細調傳以紙花貼定如覺癢時其針自出

羅神聖膏取針悞入皮膚用車脂不拘多少成膏攤紙上如錢許二日一換三五次其針自出 又取針悞入皮膚用烏鴉翎三五枚火炙焦黃色碾為細末好醋調成膏子塗在瘡上紙蓋一二時針出効

簡治針入肉不出用雙仁杏仁搗爛以車脂調勻貼在瘡上其針自出

世治秀針刺足已出痛者用黃泥罨之

簡主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出者水煑白梅肉研爛調象牙末厚傅骨刺處自軟

圖生象牙主諸物刺入肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立出如咽中刺用水調飲之舊象梳屑尤佳

益魚骨在肉中不出者嚼吳茱萸封之骨當爛出

丹破傷風血凝心針入肉游走三症如神方用烏鴉翎燒

內服方

灰存性研細調一錢服

箭頭入肉

精治箭鏃入骨不可拔者

巴荳去壳微熬 蜷螂

并研勻塗所傷處須更痛定又微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃拔之立出方經驗同

潔出箭頭方

蜷螂不拘多少全用麝香

右為極細末撥動箭頭摻藥瘡口內

羅踴鐵膏取箭頭一切針刺入肉盡皆治之

鼯鼠頭一個或用入油汁內熬

蝮蝮四十枚 芫青一兩

土消虫十個

巴荳

馬肉內蛆焙乾 信

醬蛆焙乾

夏枯草

礪砂

磁石

雜方

黃丹

地骨皮

蘇木

螻蛄各一兩

石腦油兩

蒿柴灰汁三升

右將石腦油蒿柴灰汁文武火熬成膏次下地骨皮等末令勻磁器內收臨時用量瘡勢大小點藥良久箭頭

自湧出

萬全神應丹出箭頭魚骨針麥芒等遠近皆治之

葇荇科

即天仙
子苗也

於端午日前一日持不語戒遍尋上項科見即取酌中一科根枝葉實全者口道先生爾卻在這裏道罷用柴灰自東南為頭圍了用木篋子擷起周迴土次日端午日日未出時依前持不語用木擷只一擷取出水洗淨不令婦人雞犬見淨室中石臼內搗為泥丸如彈子大以黃丹為衣以紙袋封懸在高處陰乾若有箭不能出者以緋絹袋

盛此藥一丸放臍中用綿裹肚繫定先用象牙末貼瘡上後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之隨出陝西行省出軍曾用有效

楠孫真人治箭鏃在咽喉胸膈及針刺不出方以蠶蝓搗取汁滴上三五度箭頭自出

本療鏃不出搗瓜萋根傳瘡日三易自出

世李渤治箭鏃不出及惡刺以齒塗和鶴虱傳之

姚毒箭有二種交廣夷俚用燠銅作箭此一種纔傷皮便

悶膿沸爛而死若中之用飲屎汁并以傳之亦可惟此最妙又有一種用射菡以塗箭鏃人中之亦困若着寬處不

死近腹亦宜急治今葛氏方治射菡者是葛氏方用藍汁大莖猪羊血解之

漆瘡方

雜方

療漆瘡方用湯浸芒硝冷洗之又礬石亦可

漆瘡通身面目腫者亦治苦苣五月五日採曝乾食瘡

云生食亦可漢椒湯洗之妙 生姜真汁傳亦可其音燠本草有

治漆瘡用生紫蘇摩擦之累効 又方用人乳汁傳之

妙

再卽瘡 治漆瘡取荷葉乾者一斤水一斗煮取二升洗瘡上日

山漆瘡無名異水調傳

通治諸般惡虫蛇咬 毒蛇咬 蜈蚣咬 蠍咬

咬 蝎咬蜂螫 斑蜘蛛咬 刺毛蝨 蚧 蝨 蝨 蝨

羅聖惠治蛇咬蝎螫蚕咬妙

表裏初咬用藥敷貼

雄黃三錢

信一錢

皂角子

巴荳各四十粒

耳塞

麝香各少許

右五月五日不聞雞犬婦人處不語搗爲細末在杏子核內封之針挑出上痛處大有神効

世治一切蛇虫傷貝丹末酒調服効詳見蛇咬

治惡虫咬以酥和鹽傳之瘡

諸般惡虫咬以油浸紫草塗之

治蛇咬蚕咬惡虫咬猪膏搗汁傳陳藏器治狗咬

治蝎蜘蛛蛇毒雞卵輕敲一小孔合咬處卽瘡

毒入腹者服藥

治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚强直毒攻腹

內成塊逡巡不救用蒼耳嫩葉一握研取汁温酒和灌之

將滓厚罨所傷處

簡治毒蛇射工沙虱等物傷着人眼黑口噤手足强直毒

氣入腹

白礬

甘草等分

右為細末每服二錢冷水調下

毒蛇咬

初傷解毒法

丹治毒蛇傷急以小便洗出血次取口中唾塗之又以牙

塗封傷處傳而護之甚妙且不痛腫山君云用犬糞傳患處亦佳

世路行卒被蛇咬當急扯裏脚帶扎縛傷處上下寸許使

毒氣不能快傷肌體又急用白礬安刀頭火上溶汁沸滴

於傷處待冷以長篦子速挑去靨則毒血隨出黧腫尚未

退更滴之以退為度 村居山僻及途中夜行卒被蛇傷

咬難求白礬處速作艾炷灸五壯以唾調鹽塗之如黧腫

尚未消釋當更灸更搽毒涎自然流出且不透裏傷人

咬亦宜灸

世治一切毒蛇咬用透明雄黃研細末以醇酒濃調厚搽

傷處水流出如涎痛腫即消一方以蒿苣汁和雄黃末作

餅子候乾為末每用少許貼瘡口立効

黃白為蛇傷要藥

世有人被毒蛇所傷已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之

遂甦及以藥滓塗患處良久復灌二錢其苦皆去問之乃

五靈脂一兩雄黃半兩同為末止此耳後有中毒者用之

無不効驗

世治毒蛇所傷

細辛錢五 香白芷錢五 雄黃錢二

右為末加麝香少許每服二錢温酒調服効

世治一切蛇咬用香白芷嚼碎傳患處又用温酒調服効

世治一切蛇虫所傷用貝母為末酒調令病人盡量飲之

頃久酒自傷處為水流出候水盡却以藥滓傳瘡上即愈

治蛇咬腫毒悶欲死者用重臺六分續隨子六顆去皮同

為細末以酒服方寸七又以唾調少許傳患處立安崔氏海

雜方

方 又方用白礬二錢服之防毒氣攻心 又方金線重
樓以水磨少許傳咬處又爲細末酒服之 又方用柏樹
葉魚腥草地松節鉞面草草决明共一處研細傳傷處極
佳

海治蛇虺咬人以獨頭蒜酸漿草搗汁傳咬處佳

治蛇咬男子陰毛口含二十莖嚙其津毒不入腹

治諸般蛇咬此傳之於擒蛇者藥味不全亦可

大青 小青 青木香 烏柏葉

火炊草 山蕨菴 過山龍 地蜈蚣

天門冬 白芍藥 香薷

右細末用白木香研細生白酒調服查罨咬處累効

聖治蛇咬毒食菜莢一兩爲細末冷水調分爲三服立瘥

最治蛇毒吃菰蔣草根灰取以封之其草卽野茭白是也

廣濟 蛇咬作瘡暖酒浸日三次 廣利 蛇入人口并七

孔中者割猪母尾頭瀝血着口中并孔口上卽出

聖治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出者用刀破蛇尾內

生椒二三粒裹着卽出

世治卒爲蛇繞不解以熱湯淋之無湯令人尿之 蛇咬

忌食酸物梅子犯之大痛

蜈蚣咬

雜方

世治蜈蚣咬生雞血傳上立愈累効一男子爲蜈蚣入咽

喉中咬之垂死之際一醫令殺生雞血乘熱灌喉中蜈蚣

卽出而愈實良方也 又方用雞糞塗之 又方治蜈蚣

諸毒虫傷麻油點燈於瘡口上對口薰之登時愈 又法

大油紙燃燒燈吹滅以餘烟焯之 治蜈蚣咬竹葉清研

汁傳之立愈 又方用南星磨汁傳之累効

梅治蜈蚣咬痛不止獨頭蒜磨螫處立愈

聖治蜈蚣咬方用蝸牛搗取汁滴入咬處

蜈蚣咬取蜘蛛一枚安咬處當自飲毒如蜘蛛死而痛未止更易生者

蜈蚣咬嚼鹽傳其傷處次以鹽湯洗之梅師方 蜈蚣咬

頭垢塞之不痛則痒 治蜈蚣咬及諸虫咬毒先用鞋底

上擦之用大蒜小蒜桑葉卷傷處如無用油鼓盪傷處或

藍靛塗罨之亦効 治蜈蚣毒虫咬用桑枝汁同鹽擦痛

處或溶黃蠟滴患處肉黑為度 又方用皂角於咬處上

用艾灸熱去之効

蠶咬

雜方

治蠶咬尿成瘡初如粟漸大如莖如火燒泡大痛者速以草茶細末生油調傳瘡上立止甚妙又方猪膏搗汁傳之草茶即茶茗

也 治雨點蠶咬瘡用百合搗爛入鹽少許傳之効

千治蠶咬尿人影着便令人病瘡如粟粒累累痛似刺虫所螫惡寒壯熱用犀角磨汁塗之則愈

世蠶咬虫又名八脚虫隱壁間以尿射人遍身生瘡如湯火傷用烏雞翎毛燒灰雞子白塗之 治小兒蠶咬遠

腹匝即死用梨葉研爛傳之

食蠶咬尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上

蝎咬蜂螫

雜方 羅雄黃消毒膏治蝎螫不可忍

雄黃 信各半兩 巴豆三錢 白礬生一兩

右為細末黃蠟半兩溶開入藥攪勻為錠子如棗子大用時將錠子簽於燈焰上炙開滴於螫着處其痛立止

潔一上散治蝎螫痛

半夏一字生用 雄黃一字 巴莖一个去皮

右三味同研和勻上之 治蝎毒用溶化白礬乘熱滴

傷處痛止毒出

廣治蝎螫人研蜘蛛汁傳之瘡

山蝎螫苦蕒汁塗之

世治蝎螫地磨生姜塗之 又方南星米醋調擦之

外治蜂螫薄荷貼之瘡 又方蜂蝎螫人用人參嚼以封

之

聖治蜂螫人以酥傳之愈

班蜘蛛咬

雜方

張薦昔在劍南為張延賞判官忽被班蜘蛛咬項上一宿
咬處有二道赤色細如筋繞項上從曾前至心經二宿頭
面腫疼如數升益大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出

家財五百千并薦家財五百千募能療者忽一人應召云

可治張相初不甚信欲驗其方遂令目前合藥其人云不

惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甕碗取蜘蛛投入藍

汁良久方出甚困不能動又別搗藍汁復加麝香雄黃和

之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂

令點於咬處兩日內悉愈但咬處作小瘡痂落如舊

海蜘蛛咬遍身成瘡用青葱葉一莖小頭作一孔盛蚯蚓

一條捏兩頭不令透氣搖動化為水點咬處瘡

丹蜘蛛咬處嚼非白傳之

山蜘蛛等諸般虫咬用葛粉生薑汁調傳

經蜘蛛咬唾和山荳根末塗之狗咬毗蟬瘡蛇咬並水研

山荳根傳之蚘類脂切毗蟬 又方蜘蛛咬一身生絲半

乳一件飲之

沈存中秦皮一味治天蛇毒此瘡似癩而非癩也天蛇卽草間黃花蜘蛛人被其螫仍爲露所濡乃成此疾以秦皮煮汁一斗飲之瘥

刺毛虫蛭蚓螻蛄蚕咬

雜方

世春夏月樹下墻塹間有一等雜色毛虫極毒凡人觸着者則放毛入入手足上自皮至肉自肉至骨其初皮肉微痒以漸至痛經數日痒在外而痛在內用手抓搔或痒或痛必致骨肉皆爛有性命之憂此名中射工毒諸藥不効用好荳豉約一碗清油半盞拌豉搗爛厚傳痛痒處經一時久豉氣透骨則引出虫毛紛紛可見取下荳豉埋在中煎香白芷湯洗痛處如肉已爛用海螵蛸卽烏賊魚骨爲末傳之愈 一方取蒲公英根莖白汁傳之立瘥又方用鍋底黃上爲末以酸醋捏成團於痒痛處搓轉其

毛皆出在土上痛痒立止神効無比

黃土卽伏龍肝也

治蝨蟻

吹用老茶葉細末調傳

丹治蚯蚓咬如大風狀眉髯皆落夜則蚯蚓鳴於身上膿

作鹽湯浸數次安

傳信方

術昔有病腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈

聖治螻蛄咬用榭葉燒灰細研以泔水浸榭葉取洗瘡拭之納少許灰於瘡中 又方治螻蛄咬人用石灰醋和塗之

丹蚕咬人用麝香研蜜調傳

廣濟方

山居蚕咬用苧汁塗之

馬虎熊咬人 犬咬 癩犬咬 驢涎馬汗瘡 附猪馬畜瘡

雜方

山馬咬細嚼栗子傳傷處

聖治馬咬毒入心馬齒覓湯食之瘥

世治虎咬用野生菜搗爛塞所傷孔中滿不必換自然新肉長出而愈曾有人被咬已死用此方治之

丹熊虎傷毒痛煮生鉄令有味以洗之後虎傷人瘡取

青布緊捲燒一頭內竹筒中射瘡口令烟薰入瘡口中佳

世虎傷人瘡用苒子葉杵細塗之按本草苒子葉即猪音苒能治虎犬咬傷

丹熊傷人燒青布薰瘡中毒出仍煮葛根濃汁以洗之日十次并搗葛根為散煮葛根汁方寸七日五服瘥

世鼠咬用貓兒毛燒灰傳之立愈

丹鼠咬用麝香傳包之經

人咬傷用龜板或蟹甲燒為灰末以香油調傳

犬咬

雜方

丹犬咬人尿傳之 犬咬人以頭垢傳傷處又用熱牛糞塗於外後

衍犬傷人用杏仁量所傷大小嚼爛沃破處以帛繫定立瘥

世治犬咬用杏仁去皮尖同馬蘭根研細先以葱湯洗後以此藥塗傷處効 治犬咬傷用草麻子五十粒去殼以

井水研成膏先以鹽水洗咬處次以此膏敷貼一方用虎骨屑傳之 治犬咬人不要洗用紅炭火以物擊細待冷

取塗咬處即愈 治犬咬用黃荊葉搗菴瘡上即安 又方灸生姜乘熱擦之尤妙

丹狗咬用紫蘇葉口嚼碎塗之 犬咬破傷風腫以人參於桑柴火上燒成灰末傳之安

羅 蟬花散治夏月犬傷及諸般損傷蛆虫極盛臭惡不可近者

蛇退皮一兩火燒存性

蟬殼半

青黛兩

細辛二錢五分

右為細末每服三錢酒調下如六畜損傷成瘡用酒灌下如犬咬傷用酵子和喫蛆皆化為水蠅子不敢再落又以寒水石末乾摻上

癩犬咬

表裡治法

羅 定風散治風犬咬先口噙漿水洗淨用綿拭乾貼藥更不再發大有神効

天南星生

防風各等分

右為細末乾上更不再發無膿効不可具述

丹 治犬咬梔子皮燒灰石硫黃等分研細傅瘡

梅師方

世 治風狗咬用桃核殼半箇將野人乾糞填滿以榆皮蓋定罨於傷處又用艾於桃核上灸十四壯即愈永不復發

或用野犬糞如前法灸之

世 風狗咬即用犬糞塗仍拔去頂上紅髮

世 癩狗咬方用斑貓七枚去頭足翅以糯米少許於新瓦上同炒以米黃香為度去米不用以斑貓研碎好酒調下能飲人再進酒一盃傷在上食後服在下空腹服當日必有毒物從小便出如小狗狀如未下次日再進亦不下又進以毒物出為度若進至七服雖不下毒亦不妨矣服藥後腹中必不安小便莖中刺痛者不必慮此毒受攻將下耳痛甚者以蕪青一匙煎甘草湯送下即止如無蕪青青黛亦可疾愈後急以香白芷多雄黃少許為末搗韭根自然汁湯酒調下去斑貓毒以水淨嗽口嚼生葱白罨傷處

留小竅子出毒氣不可用他草藥菴忌犬猪羊及發風毒物小兒量歲數加減班猫食癩狗肉致病者治同即愈或過二三年再發治如前 治癩狗所傷用班猫二十一箇去頭翅并足用糯米一勻先將七箇入米內微火炒不令米赤去此班猫別用七箇再於前米內炒令班猫色變復去之又別用七箇如前法炒以米出青烟爲度去班猫不用以米研爲粉用冷水入清油少許空心調服頃又再進一服以小便利下惡物爲度如不利再進一服利後腹肚疼痛急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或煎黃連水亦可不宜便食熱物或以益元散水調服尤妙

風狗咬取小兒胎髮炒香傳野菊花研細酒調服盡醉止效

治癩犬所傷或經久復發無藥可療者用之極驗

雄黃色極明者五錢

麝香五分

右研勻用酒調二錢服如不肯服者則燃其鼻而灌之服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒候利下惡物再進前藥則見效矣

丹 痴犬咬人搗地黃汁飲之并塗瘡口愈 又方煮地榆汁飲之兼細末傳瘡上服方寸七日三忌酒若瘡瘥者搗生韭汁飲一二升梅師用後同 風犬咬後毒發如狗叫聲於化人壇拾頭頂骨燒末傳之 風狗咬毒發如狗叫者百方不治以人骨燒末之水下方寸七雖煩亂者亦治梅師

驢涎馬汗瘡

雜方
丹 驢涎馬汗入瘡腫漸甚可急治之遲則毒深不治以生烏頭末傳瘡口上良久黃水出立安

世 治驢涎馬汗入瘡用遠志去心爲末酒調塗 又方用

冬瓜青皮陰乾爲末貼瘡上 又方馬汗入肉毒氣引入如紅線者急用烏梅肉嚼爛塗瘡上 一方用烏梅和核爛研用好醋和成膏先將瘡口針破出盡紫紅血拭乾傳上以帛縛定 王氏治驢涎馬汗毒所傷白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相裹合以貼患處

附猪馬畜瘡

丹治猪畜瘡猪痒方

蛇床子

剪草

白礬

苦參

巴豆末

加羯羊糞桐油和傳之陶氏

垣馬老鼠瘡二方其瘡未詳

雜方

黃芪半一兩

甘草七錢

黃芩酒炒半兩

黃連生用一兩

黃栢酒七錢

連翹七錢

蒼朮

當歸稍

升麻各一兩

麻黃根八錢

防風二錢

澤瀉七錢

羌活

藁本各三錢

右爲細末水二大碗煎至一碗冷灌之神効

馬老鼠出足陽明太陰經分野大渴小便多草墁

升麻二錢

葛根一錢

連翹二錢

當歸身一錢

甘草炙一錢

蒼朮半一錢

黃栢半二錢

黃芩一錢

紅花許少

黃連五分

杏仁五個

黃芪二錢

生地一錢

琥珀三分

麻黃冬月加五分

猪苓

柴胡半一錢

白茯苓半一錢

澤瀉

右爲細末每服半兩水二碗煎至一碗冷灌之

醫學綱目卷之二十

醫學綱目卷之二十一

脾胃門

內傷飲食

胎前傷食

百病皆生於痰

大法

☐飲食傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六

腑痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺肺病則為喘咳為腫為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積為滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治法也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澀為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸澀當分寒熱輕重治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麩乾薑三稜廣茂巴

荳之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘗黃連
大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而
越之瓜蒂散之屬主之然而不可過劑過則反傷腸胃蓋
先因飲食自傷又加之以藥過故腸胃復傷而氣不能化
食愈難消矣漸至羸困故五常正大論云大毒治病十去
其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病
十去其九不可過之此聖人之深戒也

輕者內消

丹傷食惡食者胃中有物導痰補脾二陳湯加白朮山查
川芎蒼朮

傷飲

垣五苓散治煩渴飲水過多或水入即吐心中淡淡停濕
在內小便不利

肉桂兩一

猪苓

茯苓

白朮各一兩五錢

澤瀉二兩五錢

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時候服訖多飲熱
湯取汗出愈治傷冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸
治傷飲不惡寒胸中微覺夯悶身重飲食不化者或小
便不利者五苓散去桂依前斟酌服之 如痧熱在裏
身發黃疸食前濃煎茵陳湯調服愈

除濕散治傷馬牛乳酪及冰水一切冷物

半夏湯泡一錢

車前子炒五錢

甘草炙二錢

紅花二錢

茯苓七錢

乾薑三錢

澤瀉半兩

右為細末每服三錢食前白湯調下

冊導飲丸治水飲

吳茱萸三錢

白茯苓兩一

黃連五錢

蒼朮兩一

獨活七錢

右為細末神麩糊丸服

傷酒

丹 茱萸丸治飲用六一散一料加吳茱萸一兩水丸服

酒 酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上下分消其濕今之病酒者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之亦損腎水真陰及有形血氣俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣消燦折人長命不然則虛損之病成矣酒疸下之久則為黑疸慎不可犯宜以葛花解醒湯主之

海 治酒病宜發汗若利小便炎燄不肯下行故曰火鬱則發之以辛溫散之是從其體性也是知利小便則濕去熱不去若動大便尤為踈陋蓋大便者有形質之物酒者無

形之水從汗而發之是為近理濕熱俱去故治以苦溫發其火也佐以苦寒除其濕也

酒 葛花解醒湯治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

青皮

木香

橘紅

人參

猪苓

白茯苓

神麴

澤瀉

乾薑

白朮

白芷

葛花

砂仁

右為細末每服三錢白湯調下但得微汗則酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此酌飲成病自損元氣惟病酒者宜之

聖 治酒醉不醒用菘菜子二合研細井水調服

丹 烏梅丸治酒毒化痰消食

烏梅一斤 半夏 白礬各八兩 生薑二兩

右搗為細末以新瓦兩片夾定火焙三晝夜為度次入神麩麥芽陳皮青皮蓬朮枳殼丁皮大腹子各四兩糊丸每服四五十丸薑湯下

四烏梅丸治酒積神效方見積塊門

潔百杯丸治酒停胸中膈氣痞滿面色黃黑將成癥疾飲食不進日漸羸瘦如欲飲者先服不醉

生薑一斤去皮切片以鹽兩淹一宿焙乾 橘紅三兩 廣茂炮三錢

乾薑三兩 益智仁粒二十 丁香五十枚 甘草炙二錢

砂仁三十粒 三稜炮二錢 木香 茴香炮各一錢

白荳蔻三十粒

右為末煉蜜丸每一兩作五丸硃砂為衣生薑湯下細嚼無時服

丹解酒毒併熱毒栢若本草名枳枸北人名曰爛瓜杭州貨賣名蜜屈立春生秋熟冬間經霜後取食

傷食

垣枳木丸治痞積消食強胃海藏云本仲景枳木湯也今易老改為丸治老幼虛弱飲食不化或膈腑軟弱者

枳實去穰麩炒一兩 白朮二兩

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十九白朮湯下服白朮者本意不取其食速化但久服令人胃氣強實不復傷也

麩蘖枳木丸治為人強食所致心胸滿悶不快

神麩炒 麥蘖炒 枳實炒各一兩 白朮二兩

右為末荷葉燒飯為丸每服五十九

木香枳木丸破滯氣消飲食開胃進食

木香 枳實各一兩 白朮二兩

照前法為丸服

又方開胃進食

木香錢三

人參

乾薑各一錢半

枳實兩一

白朮兩二

照前荷葉燒飯為丸食前白湯服三五十九忌飽食

檳榔丸消食破滯氣

檳榔錢三

木香錢二

陳皮錢五

甘草錢一

人參錢二

右為末蒸餅丸每服二三十九食前白湯下

羅木香檳榔丸踈三焦寬胸膈破痰飲快氣潤腸

神麩

皂角去皮酥炙

郁李仁去皮各一兩

杏仁去皮尖炒

木香

檳榔

青皮白去

枳殼麩炒各一兩

右為末再用皂角四兩水一碗浸一日揉膏入熟蜜少

許為丸桐子大每服五十九淡薑湯下

丹保和丸治食積酒積

山查肉兩一

半夏鹽製

蘿蔔子炒各五錢神麩三錢

麥芽炒三錢

黃連炒兩半

陳皮兩半

右為末酒糊丸服或用神麩糊為丸尤妙

大安丸脾經消導之劑虛者宜斟酌用之

山查兩二

神麩炒

半夏製

茯苓各一兩

陳皮錢五

白朮兩二

連翹錢五

蘿蔔子炒兩半

右為末神麩糊丸服一方無白朮

三黃枳朮丸治傷肉食濕麩辛辣厚味之物填塞悶亂胸

膈不快

黃芩兩二

黃連炒酒

大黃煨

神麩炒

白朮

陳皮略一

右為末湯浸蒸餅為丸如棗葶大每服五十九丸白湯下

垣除濕益氣丸治傷濕麩心腹滿悶肢體沉重

枳實炒

白朮

黃芩生

神麩炒各一兩

紅花三分

蘿蔔子炒熟半兩

右為末荷葉飯丸每服五十九丸白湯下

上二黃丸治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩二兩

黃連酒洗一兩

升麻

柴胡各三錢

甘草二錢

枳實炒半兩

右為末湯浸蒸餅丸每服六七十丸白湯下

枳朮導滯丸治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶亂不安

黃芩

茯苓

白朮

黃連各三錢

澤瀉二錢

枳實炒

神麩炒各五錢

大黃煨二兩

右為末湯浸蒸餅為丸白湯下五七十九

白朮丸治傷葶粉濕麩油膩之物

白朮一兩

半夏製一兩

橘紅七錢

神麩炒

枳實炒各一兩

黃芩半兩

枯白礬三分

右為末湯浸蒸餅為丸量所傷多少加減服之如素食

多用乾薑故以黃芩瀉之

梅食狗肉不消心下堅或腹脹口乾發熱妄語煮蘆根汁

飲之

千食魚膾及生肉在胸膈不化必成癥瘕搗馬鞭草汁飲

之飲生薑水亦易消

通半夏枳朮丸治因冷食內傷一方有澤瀉一兩有小便

淋故也

半夏薑製二兩 枳實炒一兩 白朮一兩

右為末荷葉飯為丸如傷食寒熱不調毋服加上二黃丸十九白湯下

木香乾薑枳朮丸破滯氣消寒飲食

木香錢三 乾薑炮五錢 枳實炒一兩 白朮一兩半

右為末荷葉飯為丸食前白湯服四五十九

丁香爛飯丸治食傷太陰又治卒心胃痛

丁香錢一 丁皮錢三 甘草炙一錢 甘松淨

砂仁錢一 益智仁各三錢 三稜炮一錢 廣茂炮一錢

香附錢五 木香錢一

右為末湯浸蒸餅為末白湯服或細嚼亦可

小胃丹

芫花好醋拌勻過一宿於瓦器內不佳手攪炒令黑不令焦

甘遂濕麩裏水浸半

日洗晒乾一云水浸冬七日春秋五日或用水煮亦可

大戟水煮一

乾各半兩 大黃濕紙裹煨勿焦切焙乾再以酒潤炒熟焙乾一兩半

黃栢炒三兩

右為末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨臥津液吞下或白

湯送下取其膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服

一方加木香煨榔各半兩蒸餅丸每服七八十九

本治中酒不醒及傷食

巴菝去油三粒 烏梅二枚 丁香三粒 胡椒五粒

右為末入飯同杵二三千下為丸如桐子大細嚼丁香

湯下五七丸小兒一九

復餐

仲備急丸治尺寸俱盛填塞悶亂方見卒中門

蠲飲枳實丸逐飲消痰導氣清膈

枳實炒 半夏製 橘紅各二兩 黑丑取頭末三兩

傷熱食

右為末水煮麩糊為丸每服五十九食後生薑湯下
如所傷飲食在胸膈間兀兀欲吐返覆悶亂以物探吐
之甚者用瓜蒂散

仲人病有宿食何以別之曰脈浮而大按之反濇尺中亦

微而濇故知有宿食用大承氣湯下之傷寒方見脈數而滑

者實也此有宿食下之愈宜大承氣湯下痢不飲食者

宿食也亦宜大承氣湯下之脈緊如轉索無常者有宿

食也脈經云寸口脈緊胸中有宿食不化

金露丸治內傷心痞氣不升降水穀不消

大黃兩 枳實炒五錢 桔梗兩 牽牛二分

右為末荷葉飯為丸白湯下三五十九食後常服減半

一方薑糊丸

傷冷食

垣木香見睨丸治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴苳霜五錢 京三稜煨 神麩炒 石三稜去皮

木香二錢 香附兩 升麻三錢

草薳煨熟取心五錢 柴胡三錢

右為末湯浸炊餅為丸如菜苳大每服一二十九白湯

送下

三稜消積丸治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜炮七錢 廣茂炮七錢 青皮 陳皮各五錢

丁香 益智各三錢 神麩炒七錢 茴香炒半兩

巴苳和米皮炒焦去米

右為末醋麩糊為丸如桐子大每服十九至二十九溫

薑湯下食前服量虛實加減得更衣止後服

感應丸治中虛積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因

氣傷冷或因飢飽傷食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心

腹大痛霍亂吐瀉大便頻數後重遲澁久痢赤白膿血相雜米穀不化愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞滿四肢倦怠不思飲食不拘新舊冷積並皆治之

木香

肉苳蔻

丁香

各一兩半

乾薑

炮一兩

巴荳

七十箇去皮心藥研出油

杏仁

一百四十粒湯泡去皮尖研

百草霜

二兩

右前四味爲末外入百草霜研與巴荳杏仁七味同和勻用好蠟六兩溶化成汁以重絹濾去渣更以好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用丸春夏修合用清油一兩銚內熬令香熟次下酒煮蠟同化成汁就銚內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩半同煎煮熟成汁和置藥末成劑分

作小錠子油紙裏放旋丸服之每三十九空心薑湯下神應丸治一切冷物冷水及乳酪傷小腹痛腸鳴米穀不化

巴

杏仁

乾薑

百草霜

丁香

木香

黃蠟

二兩

右先將黃蠟用好醋煮去渣穢將巴荳杏仁同炒黑烟盡研如泥春夏入香油半兩秋冬八錢溶開下杏仁已荳攪勻次下木香丁香等末研勻搓作錠子油紙裏旋丸桐子大每米飲下三五十九食前日三服大有效雄黃聖餅子

巴荳

一百枚雄黃半兩去油膜

白麩

十兩炒又羅過

右三味內除白麩餘同爲細末共麩和勻用新水攪和做餅如手大以水再煮浮於湯上看硬軟捏作餅子每

服五七餅加至十餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利
二行食前茶酒任下

氣口脈
緊盛宜
下

人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰味
歸形若傷於味亦能損形今飲食過節以致腸胃不能勝
氣不及化故傷焉經云壯火食氣氣食少火壯火散氣少
火生氣又云飲食自倍腸胃乃傷以失四時之調節故能
成病脈在氣口經曰氣口脈盛傷於食心胃滿而口無味
口與氣口同口曰坤者口乃脾之候故胃傷而氣口緊盛
夫傷有多少有輕重如氣口一盛得脈六至則傷於厥陰
乃傷之輕也枳朮丸之類主之氣口二盛脈得七至則傷
於少陰乃傷之重也雄黃聖餅子木香檳榔丸枳殼丸之
類主之氣口三盛脈得八至九至則傷太陰填塞悶亂則
心胃大痛備急丸神保丸消積丸之類主之元元欲吐不

已俗呼食迷風是也經曰上部有脈下部無脈其人當吐
不吐者死瓜蒂散主之如不能吐是無治也經曰其高者
因而越之此之謂也備急下之亦可

檳榔丸治飲食過多心腹脹悶

檳榔二錢

陳皮

牽牛各一兩

木香二錢

枳實兩

右為末醋糊丸生薑湯下三四十丸

煮黃丸治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣痙癖刺痛如神

雄黃兩

巴莖五錢

右入白麩二兩同研勻滴水丸如桐子大滾漿水煮十

二丸濾入冷漿水內令沉冷每用時用浸藥冷漿下一

丸一日十二時盡十二丸以微利為度不必盡劑

仲宿食在上脘當吐之宜瓜蒂散又云凡血虛者不可吐

尺脈絕者當吐

垣瓜蒂散治大滿大實氣上衝逆上部有脈下部無脈填塞悶亂者用之如尺寸俱盛者宜用備急丸

瓜蒂炒

赤小豆者等分

右為細末每服二錢溫漿水調下取吐為度仲景以香豉七合煮取汁和散一匕服之若不至兩尺脈絕者不宜便服此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胃中窒塞悶亂不通以物探之得吐則已如探不去方以此劑吐之或曰盛食填塞胸中痞亂兩寸脈當用事今反兩尺脈不見其理安在曰胃中有食是木鬱宜達故探吐之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胃中者肺也為物所塞肺者手太陰金也金主殺伐與坤土俱在手而上而旺於天金能克木故肝木發生之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣

食塞於上脈絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長地之用在於天上則萬物收藏此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高源故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脈主之偏見於寸口食塞於上是絕五臟之源源絕則水不下流兩尺脈之絕此其理也何疑之有然必視所傷之物冷熱隨症加減如傷冷物一分熱物二分則用寒藥二停熱藥一停隨時消息經云必先歲氣無伐天和此之謂也

陰症脈鼓擊者宜溫

海秦生好服天生茶及冷物成積而痛塞脈非浮非沉上下內外按舉極有力堅而不柔觸手突出膚表往來不可

以至數名縱橫不可以巨細狀此陰症鼓擊脈也一身流
行之火萃於胸中寒氣逼之故搏大有力與真武四逆理
中等湯丸佐以芍藥茴香使不僭上每日服九九夜八九
至夜出汗而愈

潔既有三陰可下之法亦必有三陰可補之法予故云內
傷三陰可用溫劑若飲冷內傷雖云損胃未知色脈各在
何經若面色青黑脈浮沉不一弦而弱者傷在厥陰若面
色紅赤脈浮沉不一細而微者傷在少陰若面色黃潔脈
浮沉不一緩而遲者傷在太陰也 如傷在厥陰肝之經
當歸四逆湯加吳茱萸生薑湯之類主之方見 傷在少
陰腎之經宜服通脈四逆湯方見 傷在太陰脾之經理
中丸湯主之大便軟者宜湯結者宜丸方見
海唐臣嗜冷食遂成陰症脈遲七八至一止後僅三至予

亟與溫劑數服四五日不解遂續進三服一日脈生大汗
而解

禁忌

羅陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷謂食
物無貪於多貴在有節所以保中和而遂頤養也若貪多
務飽飫塞難消徒積暗傷以召疾患蓋食物飽甚耗氣非
一或食不下而上湧嘔吐以洩真元或飲不消而作痰咯
唾以耗神水大便頻數而洩耗穀氣之化生洩便滑利而
濁耗源泉之溫潤至於精清冷而下漏汗淋漓而外洩莫
不由食物過傷滋味太厚如能節滿意之食省爽口之味
當不至於飽甚即頓頓必無傷物物皆為益津液內畜精
華和氣邪毒不能犯疾疹無由作矣

胎前傷食

傷食

本治婦人有孕傷食宜服木香丸

木香二錢

三稜

白茯苓

人參各三錢

右為末麪糊丸每服三十九丸熟湯下

治妊娠氣不和調飲食少味宜服白朮散

白朮

紫蘇各一兩

白芷

人參

訶子皮

川芎

青皮各半兩

甘草一錢

右為末每服二錢水一盞薑三片煎至七分不拘時溫

服 妊娠傷食又當於前條傷飲食之輕劑參酌用之

經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之

五宮傷在五味若妊婦飲食不節生冷毒物恣意食啖致

脾胃之疾故妊娠傷食難得藥效惟此二方穩便

百病皆生於痰

傷飲

仲有痰飲有懸飲有溢飲有支飲 其人素盛今瘦水走

腸間瀝瀝有聲謂之痰飲病痰飲者當以溫藥和之又云心下

有痰飲者苓桂
甘朮湯主之

飲後水流在脇下咳唾引痛謂之懸飲

病懸飲者十棗湯主之

方見傷寒

留飲者脇下痛引缺盆咳

嗽則轉甚 胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節疼脈

沉者有留飲 飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身

體疼重謂之溢飲病溢飲者當發其汗大青龍湯小青龍

湯主之

二方並見傷寒

咳逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之

支飲 人咳數年其脈弱者可治實大數者死其脈數者

必苦冒眩其人本有支飲在胸中故也治屬飲家 支飲

亦喘而不能臥加短氣其脈平也 水在心心下堅築短

氣惡水不欲飲 水在肺吐涎沫欲飲水 水在脾少氣

身重 水在肝脇下支滿噎而痛 水在腎心下悸

嘔吐是水飲在心脇仲景云嘔吐心下痞者胸中有水宜

半夏茯苓湯主之又云嘔家本渴今反不渴心下有支飲

故也小半夏湯主之又云先渴却嘔者水停心下小半夏
加茯苓湯主之羅謙甫云痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩
心悸或半身不快或為寒熱並二陳湯主之方見丹眩
悸是飲仲景云卒嘔吐心下痞眩悸者膈間有水半夏加
茯苓湯主之方見又云瘦人臍下有悸吐涎沫而癩眩
者此水也五苓散主之方見又云胸滿目眩者苓桂甘
草湯主之方見又云心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯
主之方見

仲膈上病痰滿喘咳吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其
人振振身瞤劇必有伏飲治見脈大心下有留飲其人
背寒冷病人臂不時疼痛其脈沉細非風也必有飲在
上焦其脈虛者為微勞營衛氣不和故也久久自瘥脈虛
九不虛胸滿是飲仲景云支飲胸滿者厚朴大黃湯主
控涎丹

之方見又云心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂朮甘湯
主之方見
渴燥是水飲在腸胃所生仲景云渴而小便不利宜五苓
散主之 又云先渴却嘔者為水停心下小半夏加茯苓
湯主之 又云腹滿口舌乾燥此腸間有水氣防椒蘆黃
丸主之但因水所在之處不同而所兼之症不一也
自利有飲故丹溪治久痢皆吐之去膠痰自愈又仲景云
病者脈伏其人欲自利反快雖利心下續堅滿此為留
飲欲去故也其遂半夏湯主之方見又云小便不利四
肢沉重疼痛自利者此為水氣宜用真武湯去芍藥加乾
薑主之久病傷寒表不解嘔欬自利者此為水氣宜服小
青龍湯去麻黃加芫花主之 尺膚蒼如枯魚之鱗者水
飲候也全文 色鮮明者有留飲

診

素肝脈奕而散色澤者寗病溢飲者暴渴多飲而溢
入肌皮腸胃之外也脈要精論 肝脈濇甚為溢飲全文見治虛實法

仲脈雙弦者飲也皆大下後善虛脈偏弦者飲也 肺飲
不弦但苦喘短氣 脈弦數有寒飲冬夏難治 脈沉而
弦者懸飲內痛 脈浮而細滑者傷飲

痰症

孫綵帛鋪劉真外患傷寒六七日晝夜不得眠方眠即起
方起即倒未嘗少息看待厭倦召孫孫曰若言是氣必喘
作今無此症非氣也時復身上冷汗出尺寸脈皆沉關中
亦沉重診之鼓擊於指下此痰積寒聚於胸中也遂用陳
皮半夏乾薑三物各一兩為飲薑半兩搥碎以水兩碗煎
七分去渣分二服服藥經時遂睡經一晝夜不甦既覺下
痰一塊如鷄子大其疾遂愈凡痰症皆有冷汗其证明矣

丹風痰多見奇症 凡風痰病必用風痰藥白附子天麻
雄黃牛黃僵蚕皂角之類 濕痰多見倦怠軟弱 濕痰
宜用蒼白二木又用油炒半夏
痰清者屬寒用二陳湯之類

半夏 陳皮 茯苓 甘草
每服四錢加生薑七片烏梅一箇煎不拘熱服嘔吐甚
者加丁香

導痰湯

半夏兩四 南星 橘紅 枳殼
赤茯苓各半兩 甘草 薑水煎服

燥濕痰方

南星製 半夏製各 蛤粉二兩 青黛為衣

痰症治法

熱痰多挾風外症為多用青黛黃連天花粉大快膈上熱

痰 痰因火盛逆上者治火為先白朮黃芩石膏之類中
氣不足加參朮黃芩假之以降其熱也 食積痰神麩麥
蘗山查 欲吐食積痰用蘿蔔子油炒為末漿水調下探
而吐之 食積痰必用攻若氣虛者用補氣藥送 老痰
海石半夏瓜蒌香附五倍子佐他藥大治頑痰 鬱痰僵
蚕杏仁瓜蒌訶子貝母五倍子 痰而脾虛者清中氣二
陳湯加白朮之類兼用升提藥 內傷挾痰必用參朮芪
之類多用薑汁傳送或加半夏之類虛甚加竹瀝 眩運
嘈雜乃火動其痰用二陳湯加梔子芩連之類 噫氣吞
酸此係食鬱有熱火氣上動以黃芩為君南星半夏橘紅
為臣熱多加青黛 喉中如有物咯不出咽不下此老痰
也重者吐之用瓜蒂散氣實用荆瀝仲景用半朴茯苓 痰
結核在咽喉中燥不能出入化痰藥內加鹹藥軟堅之味

瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹少佐以朴硝薑蜜丸噙化
凡人身上中下有塊是痰問其平日好食何物吐下後方
用藥 痰之為物隨氣升降無處不到 痰在腸胃間可
下而愈 痰在經絡中非吐不可出吐中就有發散意
痰在膈上必用吐之瀉亦不出 痰膠固者及脈浮者俱
用吐法吐法見治法門上下條 痰在脇下非白芥子不能達 痰
在皮裏膜外以薑汁竹瀝導之 痰在四肢非竹瀝不能
開 二陳湯善治人一身有痰如在下加下引藥在上加
上引藥 潤下丸降痰最妙 青礞石丸重在風化硝
小胃丹能損胃食積痰用之然不宜多服 蒼朮治痰飲
成窠囊者極效 海粉能治熱痰降濕痰軟結痰消頑痰
最效可入丸子不可入煎藥 枳實瀉痰能衝墻壁 竹
瀝能治膈間有痰或癩狂或健忘或風痰最效又能養血

荆瀝治痰稍重用此二味效速且穩當二瀝治痰結在皮裏膜外及經絡者必佐以薑汁 薑汁治血滯不行中焦有飲取自然汁冷飲三四盞必覺胸中煩躁不寧後自愈氣實熱痰吐難得出或成塊或吐咯不出及兼氣鬱者難治 中焦有痰胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣 凡治痰用利藥過多致脾氣下虛則痰反易生而多矣

因痰之為病方論少有細述之者近惟三因畧言亦無加減法夫痰之源不一有因痰而生熱者有因熱而生痰者有因氣而生者有因風而生者有因驚而生者有積飲而生者有多食而成者有因暑而生者有傷冷物而成者有脾虛而成者有飲酒而成者其為病也驚痰則成心包痛顛疾熱痰則成煩燥頭風爛眼燥結怔忡懊懷驚眩風痰

成癱瘓大風眩暈暗風悶亂飲痰成脇痛四肢不舉每日嘔吐食痰成瘡疔口出臭氣暑痰中暈眩冒黃疸頭疼冷痰骨痺四肢不舉氣刺痛酒痰飲酒不消但得酒次日又吐脾虛生痰食不美反胃嘔吐氣痰攻注走刺不定婦人於驚痰最多蓋因產內交接月事方行其驚因虛而入結成塊者為驚痰必有一塊在腹發則如身孕轉動跳躍痛不可忍 凡人手臂或動不得或骨節遍身痛坐臥不寧此痰入骨也 有人脚氣久不治骨節痛與脚氣藥不效此痰病也 凡傷寒病後嘔吐藥不得入亦因初病膈中有涎痰也或因下之太早而遂議其非痰未為確論 傷寒發黃亦是痰病蓋因熱搏而成凡大便秘者亦是痰結 右前件諸症變生不一甚不易辨指下難求得此妙訣 慎勿輕傳

凡有痰者眼皮及眼下必有烟灰黑色舉目便知不待切脈 眼黑而頰赤者熱痰也面大黃色亦熱痰也外症必煩滿膈熱口乾思冷大便秘結小便赤熱久必生風或眩暈耳鳴眼花多虛症治之而用熱藥服久必脈大實發大熱而中風可急下之 眼黑而行步呻吟舉動艱難者入骨痰也其症遍體骨節疼痛 眼黑而面帶土色四肢痿痺屈伸不便者風濕痰也 眼黑而氣短促者驚風痰也 左右關脈大者膈中有痰也可吐之怕吐者消息下之 凡人每日背上一條如線而寒起者宜吐下之

妙應丸
加減法

凡病百藥不效其關上脈伏而大者痰也用妙應丸加減法方見走注疼痛即控延丹 脚氣加明松脂一錢檳榔木瓜各一兩卷栢半兩先以鹽水煎半日次日白水煮半日同前藥為丸每服二十九丸加至四十九丸再服下惡物立效 驚痰

加硃砂二錢又加全蝎每用八九丸常與之三五服去盡酒痰加雄黃全蝎各二錢每服十九 走注腰痛加核桃三箇燒灰每服三十九丸加至五十九丸温酒下 脚氣走注於前方內加吳茱萸 驚氣成塊者加川山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索蓬朮各四錢每服五十九丸加至七十九丸以利為度 腎痺痛加木鱉子去殼研一兩桂半兩 熱痰加益硝等分每服三兩丸 寒痰加胡椒丁香蝎桂各等分每服二十五丸

痰丸
治症

洞虛痰之為病成偏頭風成雷頭風成太陽頭痛眩運如

坐舟車精神恍惚或口眼瞤動或眉稜耳輪俱痒或頰腮四肢遊風腫硬似疹非疹或渾身燥痒搔之則隱疹隨生皮毛烘熱色如錦斑或齒頰似痒似痛而疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噁氣吞酸鼻聞焦臭喉間豈腥氣心煩

鼻塞咽隘不利咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因
舉動而唾其痰如墨又如破絮或如桃膠或如蜆肉或心
下如停冰鐵閉滯妨悶噁嚏連聲狀如膈氣或寢夢刑戮
刀兵劍戟或夢入人家四壁圍遶暫得一竇百計得出則
不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲鼻無
路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而寤或時郊行忽見
天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝酸軟或
骨節腰腎疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戳乍起
乍止並無常所或時手臂麻疼狀如風濕或臥如芒刺
不安或如毛虫所螫或四肢不舉或手足重滯或眼如薑
蜆膠粘痒澁開闔甚難或陰晴交變之時胸痞氣結閉而
不發則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲
初則涕唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳

內蟬鳴眼瞶肉惕治之者或曰腠理不密風府受邪或曰
上盛下虛或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛子備此疾苦
乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐噎塞煩鬱
有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃
間湧起凜然毛豎噴嚏千百然後遍身煩燥則去衣凍體
稍止片時或春秋乍涼之時多加衣衾亦得暫緩或頓飲
冰水而定或痛飲一醉而寧終不能逐去病根乃得神秘
沉香丸方屢獲大效愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱
語括之詩曰甌裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相逢二
八求斤正硝燬青礞倍若沉十七兩中沉半兩水九梧子
意須斟酌驅怪病安心志水瀉雙身却不任

大黃兩八

黃芩兩八

青礞石一兩硝燬
如金色

沉香兩半

右為末水丸如梧子大白湯食後空心服 一切新舊
失心喪志或癩或狂等症每服一百丸氣盛能食狂甚
者加二十九丸臨時加減消息之 一切中風癱瘓痰涎
壅塞大便或通或結者每服八九十九丸或加至百丸永
無秘結之患 一切陽症風毒脚氣遍身遊走疼痛每
服八九十九丸未效加至百丸 一切無病之人遍身筋
骨疼痛不能名者或頭疼牙痛或搖或痒風蛀等症風
寒鼻塞身體或疼或不疼非傷寒症者服八九十九丸痰
盛氣實者加之 一切吞酸噎逆膈氣及胸中疼悶腹
中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如翻胃心下恍惚如畏人捕
怵惕不安陰陽關格變生乖症食飢傷飽憂思過慮心
下嘈雜或痛或噦或晝夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉
赤眼每用加減服 一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭暈

目眩加減服之 一切顛頤腫硬若瘰癧者及口糜舌
爛咽喉生瘡者每服六七十丸加蜜少許一處嚼碎噙
化睡時徐徐嚥之曾有口瘡者服二三十丸依前法噙
之二三夜瘥 一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸
瘦發時必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下溫煖者量
虛實加減服之若事屬不虞之際至於百丸即便回生
未至顛危者虛弱疑似之間只服三十九丸或五十九丸立
見生意然後續續進之以瘥為度兼服生津化痰溫中
理氣之藥 一切荏苒疾病凡男婦患非傷寒內外等
症或酒色過度或吐血或月事愆期心煩志亂或腹脹
脇痛勞倦痰眩或暴行日中因暑伏痰口眼喎邪目痛
耳憤鼻塞骨節酸疼乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥無
效眾醫不識者依前法加減服之效大抵服藥須臨臥

在床用熱水一口許嚥下便臥令藥在喉膈間徐徐而下如日間病出不測疼痛不可忍必欲急除者須是一依前臥法服大半日不可食湯水及不可起身行坐言語直候藥丸除遂上焦痰滯惡物過膈入腹然後動作方能中病每夜須連進二次次日痰物既下三五次者仍服前數下五七次或只下二三次而病勢頓已者次夜減二十九頭夜所服並不下惡物者次夜加十九人壯病實者多加至百丸惟候虛實消息之或服過仰臥咽喉稠粘壅塞不利者痰氣泛上乃藥病相攻之故也少頃藥力既勝自然寧帖往往病久結實於肺胃之間或只暴病全無泛濫者服藥下咽即仰臥頓然百骸安靜五臟清寧次早先去大便一次其餘遍數皆是痰涕惡物看甚麼糞用水攪之盡係痰片粘涎或稍稍腹痛

腰腎拘急者蓋有一種頑痰惡物閉氣滑腸裏急後重者狀如痢疾片餉即已若有痰涎易下者快利不可勝言頓然滿口生津百骸爽快間有片時倦怠者蓋因連日病苦不安一時為藥力所勝氣體暫和如醉得醒如浴方出如睡方起此藥並不洞泄刮腸大瀉但取痰積惡物自腸胃次第而下腹中糟粕並不相傷其推下腸腹之糞則藥力所到之處是故先去其糞其餘詳悉不能備述服者當自知之

黃連導痰湯二陳湯加黃連枳實是也

熱痰雜方

黃芩利膈丸利胸中熱治膈上痰

黃芩生炒各一兩

南星三錢

半夏五錢

黃連三錢

枳殼三錢

白朮五錢

陳皮三錢

澤瀉五錢

白礬五分

右為末水浸蒸餅丸每服三四十九白湯下食遠服

丹中和丸

蒼朮 黃芩 半夏 香附

各等分為末蒸餅糊丸

垣小黃丸化痰止涎除濕和胃氣治胸膈不利

黃芩一兩 乾薑二錢 白朮半兩 半夏薑製五錢

澤瀉三錢 黃芪兩半

右為末蒸餅糊丸白湯下

風痰雜方

羅祛風丸有人喜食酸醜酒色過節滲注成痰飲聚於胸

膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻木升則頭目昏眩降則腰

脚疼痛深則左癱右瘓淺則厥然倒地此藥寬中祛痰搜

風理氣和血駐顏延年益壽
半夏麩 荆芥各四兩 槐角子炒 白礬生

橘紅 硃砂各一兩

右為末薑汁糊丸每服五六十九生薑皂角子仁湯送

下日三服

玄導痰丸

半夏六兩分作三處一分礬水浸一分肥皂角為末水浸一分用巴豆百粒同水煎

右餘藥在下半夏在上浸至十日半月時時動水令二

藥相透次相合一處揀去巴豆皂角慢火煮乾取半夏

切碎晒乾入

甘遂製二兩 百藥煎二兩 僵蚕一兩 全蝎二兩

右為末同前半夏末一處合和用揀出皂角鍊膏為丸

如硬再入糊令得所每服十五丸實者二十五丸

本膈上有痰川芎丸

川芎二兩細剉慢火熬熟 川大黃二兩蒸令乾

右件焙乾為末用不蛀皂角五七挺溫水揉汁絹濾出
查瓦罐中熬成膏和前二味為丸如桐子大每服十五
丸小兒三九生薑湯下

經治風痰用鬱金一分藜蘆十分各為末和勻每服一字
用溫漿水調下以餘漿水嗽口仰服以食壓之

寒痰雜方

海五飲湯治五飲最效

旋覆花

人參

陳皮去白

枳實

白朮

茯苓

厚朴製

半夏製

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

白芍

甘草炙

右等分每兩分四服薑十片水二盞煎去查溫服無時
忌肉食生冷等物因酒成飲加葛根葛花砂仁

局倍朮丸治五飲一曰留飲停水在心下二曰癖飲水在

兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈五曰流飲
水在脇間瀝瀝有聲皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮

桂心去皮

乾薑炮各一兩

右為末蜜丸每服二十九溫米飲下加至三十九食前

本治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多唾口中
清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉
弦細遲旋覆花湯

細辛

陳皮

桂心

人參

甘草

桔梗

芍藥

半夏

旋覆花

已上各半兩

赤茯苓

右為末每服四錢薑七片煎去查溫服

羅木香半夏丸治痰涎上壅心胸不利常服消痰寬膈

木香錢七

半夏兩一

陳皮

茯苓

薑屑

人參

草薺

白附子各五錢

右為末麩糊丸食後生薑湯下三五十九

氣痰雜方

降痰丸治三焦氣滯下痰飲消食利膈痞滿咳唾稠粘面熱目赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯氣消化痰涎

木香

檳榔

青皮

陳皮

京三稜

枳殼炒麩

半夏湯洗

大黃

黑牽牛各一兩

右為末麩糊丸食後薑湯下

運氣

運氣痰飲皆屬濕土經云太陰在泉濕淫所勝民病飲積又云歲土大過雨濕流行甚則飲發中滿又云土鬱之發飲發中滿又云太陰之勝腹背病滿飲發於中治以諸熱劑是也

針灸

撮諸痰為病頭風喘嗽一切痰飲 豐隆 中腕

心 婦人年高風痰作楚脈沉實滑數痰在下則無力在中則胸膈閉悶在上則頭風喘嗽昏運發則抽牽手足皆動

風門沿皮二寸半

巨闕三寸二分

豐隆二寸半

肩井五分

甲 溢飲脇下堅痛中腕主之

痞

不能食

飢不能食

惡食

姓

身惡食

痞者心下痞滿而不能食是也仲景云滿而不痛為痞滿而痛為結

濕主痞 傷寒下 早

通 夫痞者心下滿而不痛是也太陰者濕也主壅塞乃土

來心下為痞滿也傷寒下太早亦為痞乃因寒傷其榮榮者血也心主血邪入於本故為心下痞悶仲景立瀉心湯數方皆用黃連以瀉心下之土邪其效如嚮應桴故活人書云審知是痞先用桔梗枳殼湯非以此專治痞也蓋因

雜病下
之太早

先錯下必成痞症是邪氣將陷而欲過胸中故先用截散其邪氣使不致於痞先之一字早用之義也若已成痞而用之則失之晚矣不惟不能消痞而反損胸中之正氣則當以仲景痞藥治之經云察其邪氣所在而調治之正謂此也非止傷寒如此至於酒積雜病下之太過亦作痞傷蓋下多亡陰亡陰者謂脾胃水穀之陰亡也故胸中之氣因虛下陷於心之分野故致心下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則其痞益甚甚而復下之氣愈下降必變為中滿膨脹皆非其治也又有虛實之殊如實痞大便閉者厚朴枳實湯主之虛痞大便利者白芍陳皮湯主之如飲食所傷痞悶者當消導之去其胸中窒塞上逆兀兀欲吐者則吐之所謂在上者因而越之是也

海治痞獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣 傷

虛實

寒痞者從血中來雜病痞者亦從血中來雖俱為血症大抵傷寒之症從外至內從有形至無形故無形氣症以苦泄之有形血症以辛甘散之中滿者勿食其不滿者復當食也中滿者腹脹也如自覺滿而外無腹脹之形即非中滿乃不滿也不滿者病也當以甘治之可也無形氣症以辛甘散之者仲景人參湯是也

攻補兼施

黃芪補中湯

黃芪五分

人參八分

甘草

白朮

蒼朮各五分

陳皮五分

澤瀉

猪苓

茯苓各三分

用水煎至七分溫服送下大消痞丸

丹治一婦人因有大不如意事遂致膈滿不食因循累月積成癥痞不能起坐至午已間必發熱面赤酉戌後熱退

面赤亦退至夜小便雖數每出數滴而已六脈沉澁而短
 小左右一般重取皆有經水雖按月亦數滴而已予曰此
 志不遂而氣鬱胃有瘀血而血亦虛鬱氣成痰在中官却
 不食兼用補瀉之治法以白朮二錢人參茯苓各一錢紅
 花一莖大陳皮一錢煎取濃湯一呷食前熱服之少頃藥
 行後與半匙稀粥又少頃用減輕粉牽牛三花丸如芝蔴
 大以津唾下十五丸一日一夜煎藥丸藥各服四遍至次
 日方食知味又次日食稍進第三日則熱退面亦不赤如
 此七日飲食起坐平復如初
 三齋口渴食少氣痞脈弦

白朮 青皮 半夏各二錢 乾葛一錢
 木通一錢 甘草灸少許
 分二貼薑二片煎下與點丸二十九保和丸二十九

葶藶丸治心下痞胸中不利

苦葶藶酒浸炒 人參各三錢

甘草根炙 羌活

柴胡 獨活各二錢

黃芩三錢 浸一半炒

砂仁 茵陳酒炒各一錢

白芷錢一 青皮

厚朴 半夏各五分

當歸身錢七

右為末蒸餅丸篩內水發如米大臨臥白湯服一錢

木香消痞湯治因憂氣鬱結中脘腹皮急微痛心下痞滿
 不思飲食食亦不散常覺痞悶

柴胡七分 陳皮八分

甘草炙五分 半夏錢一

生薑錢一 梔子錢二

紅花少許 枳實錢一

木香七分 草薺錢一

作一服水煎去渣食前熱服忌酒麪等物

大消痞丸治一切心下痞滿及積年久不愈者

無形氣
 症以苦

黃芩

黃連炒各六錢

薑黃

白朮各一錢

人參二錢

甘草炙

砂仁各一錢

枳實炒五錢

半夏製四錢

乾薑一錢

陳皮二錢

神麩炒一錢

澤瀉三錢

厚朴二錢

猪苓一錢半

右為末水浸蒸餅為丸每服六七十丸至百丸食遠白

湯下

黃連消痞丸治心下痞滿壅塞不散煩熱喘促不寧

黃連一兩

枳實炒七錢

乾薑二錢

半夏七錢

黃芩一兩

茯苓

白朮

甘草炙各三錢

薑黃一錢

澤瀉一兩

猪苓

右為末湯浸蒸餅為丸每服五七十九白湯食前下

失笑丸治右關脈浮弦心下濕痞惡食懶倦開胃進食

枳實

黃連各五錢

乾薑二錢

半夏麩三錢

厚朴炙四錢

人參五錢

甘草炙二錢

白朮三錢

麥蘖二錢

右為末水浸蒸餅為丸每服三十九白湯送下不拘時

量虛實加減服

丹小娘心頭痞悶口乾面微黃脈洪

黃連

半夏

白朮

青皮

木通各三錢

分三貼薑煎去渣熱服下保和丸十五丸

回金丸瀉肝火行濕與熱能開痞結治肝邪補脾土

黃連六兩

吳茱萸一兩

右為末水浸蒸餅為丸一方用黃連六兩吳茱萸半兩

一名佐金丸

海少陰面赤下痢心下痞瀉心湯加減例易老單用黃連

瀉心湯用錢氏法後隨症加減 煩者加山梔 燥加香
豉 嘔加半夏 滿加枳實厚朴 腹痛加芍藥 脈遲
加附子 下焦寒加乾薑 大便硬加大黃 如用薑附
先煎令熟使熱不僭後加黃連同用

有形血
症辛甘
攻之

羅枳實理中丸治中脘痞滿滯氣不消積寒停冷飲食不
化方見
傷寒

仲人參湯治胸痺心痛方見 半夏瀉心湯治痞滿關脈

沉方見
傷寒

脾氣鬱
結

丹一女子在家因事不如意鬱結在脾半年不食每日食
棗數枚適喜饅頭亦能少食惟深惡粥飯予診其脾氣非
枳實不能散遂以溫膽湯去竹茹與服經三月服二百貼
而愈 又一女子二十餘許婚後夫遠出二年不歸女子
病重不食困臥如痴他無所苦諸醫不效予往治之見女

向裏床而睡形體羸瘦予思之此氣結病也藥不能治得
怒可解予往激其怒掌其面三日責以不得有外思女果
大怒而哭待其哭一二時許令其父母解之進藥二貼卽
欲食矣予謂其父母曰雖愈必得喜方可解若再思則結
氣必復至矣其父因僞作其夫有書回約日成婚一月餘
其夫果歸病得全愈

飲食傷
脾

飲食傷脾痞悶輕者大消痞丸枳木丸回金丸之類甚者
微下之吐之下之者檳榔丸煮黃丸吐之者二陳湯及瓜
蒂散探吐之是也

經治膈下冷氣及酒食飽滿常服用青皮四兩分作四分
一分用湯浸一宿去穢餘三分用鹽二兩拌勻良久銚內
微炒焦爲末每服一錢半茶末五分水一盞煎七分发溫
常服用沸湯點服尤妙

寒熱

寒痞辛甘散之枳實理中丸之類是也熱痞苦寒泄之大消痞丸之類是也

凡治痞軟石膏研末醋糊丸服能瀉胃火食積痰火運氣痞有三

一曰濕痞經云土平氣曰備化備化之紀其病痞又云太陰所至為畜滿為積飲痞膈又云太陰司天之政民病寒濕痞逆又云土鬱之發痞堅腹滿又云土不及曰卑監卑監之紀其病留滿痞寒是也

二曰寒痞經云水鬱之發民病痞堅腹滿又云太陽之復心痛痞滿是也

針灸

三曰燥痞經云陽明之復甚則痞滿是也
海問井主心下滿十二經皆有井當治何井 假令善潔面青善怒是少陽經受病當治金井竅陰是也 假令滿

閉淋洩便難轉筋足厥陰肝經受病當治木井大敦是也 假令頭項痛腰脊強發熱惡寒足太陽膀胱受病當治陽井至陰是也 假令手足自溫自利不渴足太陰脾受病當治陰井隱白是也

禁忌

羅藥戒○客有病痞者積於其中伏而不得下自外至者捍而不得納從醫而問之曰非下之不可歸而飲其藥既飲而暴下不終日而向之伏者散而無餘向之捍者柔而不支焦膈通達呼吸開利快然若未始有疾者不數日痞復作投以故藥其快然也亦如初自是不踰月而痞五作五下每下輒愈然客之氣一語而三引體不勞而汗股不步而慄肌革無所耗於前而其中藹然莫知其所來嗟夫心痞非下不可已予從而下之術未爽也藹然獨何如聞楚之南有良醫焉往而問之醫笑曰子無怪是藹然者也

凡子之來固爲是爾然也坐吾語汝天下之理有甚快於吾心者其末也必有傷求無傷於其中則無望快於吾心夫陰伏而陽蓄氣與血不運而爲痞橫乎子之胸者其累大矣擊而去之不須臾而除甚大之累和平之物不能爲也必將搏擊震撓而後可夫人之和氣冲然而其微泊乎其易危擊搏震撓之功成而子之和亦已病矣由是觀之則子之痞凡一快者則子之和亦一傷矣不踰月而快者五子之和平之氣不旣索乎故爾然如不終日也且將去子之痞而無害於和也子歸燕居三月而後與之藥可爲也客歸三月齋戒而復請之醫曰子之氣少復矣取藥而授之曰服之三月而疾少平又三月而少康終年而可復常且飲藥不得亟進客歸而行其說然其初使人憊然而遲之蓋三投藥而三反之也然日不見其所攻之效久較

則月異而時不同終歲而疾平矣客謁醫再拜而謝之坐而問其故醫曰此醫國之說豈特施之於病哉子獨不見秦之治民乎捍而不聽令墮而不勤事放而不畏法令之不聽治之不變則秦之民常痞矣商君見其痞也厲以刑法威以斬伐悍厲猛鷙不毫髮少貸痛剗而力鉏之於是乎秦之政如建瓴流通四達無敢或拒而秦之痞常一快矣自孝公以至二世凡幾痞而幾快矣頑者已圯強者已柔而秦之民無懽心矣故猛政一快者歡心一亡積快而不已而秦之四肢枵然徒具其物而已民心日離而君孤立於上故匹夫大呼不終日而百姓皆起秦欲運其手足肩背而漠然不我應故秦之亡也是好爲快者之過也昔者先王之民其初亦嘗痞矣先王豈不知肅然擊去之以爲速也惟懼其有傷於中也故不敢求快於吾心優柔而

撫育之教以仁義道以禮樂陰解其亂而除去其痞旁視而憊然有之矣然月計之歲察之前歲之俗非今歲之俗也不擊不搏無所忤逆是以日去其戾氣而不嬰其歡心於是政成教達安樂久而後患除矣是故三代之治皆更數聖人歷數百年而後俗成則予之藥終年而疾愈蓋無足怪也故曰天下之理有甚快於吾心者其末也必有傷求無傷於其終則無望快於予心雖然豈特治天下為然哉客再拜而紀其說

不能食

心下不痞滿自不能食也

虛實
脾虛難
任飯食

經治大人小兒不進乳食和氣去痰用人參四兩半夏一兩薑汁浸一宿曝乾為末麩糊丸食後生薑湯下

垣和中丸開胃進食

乾薑錢一

木瓜枚一

甘草錢三

陳皮錢一

人參錢一

白朮錢三

右為末蒸餅糊丸食前白湯下三五十九

本七珍散開胃進食補脾養氣

人參

白朮

黃芪蜜炙

山藥

白茯苓

粟米微炒

甘草等分

右為末每服二錢薑棗煎服如故不思飲食加匾荳一兩名八珍散此方溫平不熱常服飲食自倍

海六神湯治傷寒虛羸不思飲食

人參

白朮

黃芪各一兩

枳殼一方用枳實炒

白茯苓

各半甘草二錢

右為末每服五錢薑棗同粳米合許煎食前服

羅錢氏異功散治脾胃虛弱難任飲食異功散用人參白茯苓白朮甘草橘

紅木香各等分薑棗煎服

羅謙甫云脾胃弱而飲食難任者不可一槩用克伐之劑宜錢氏異功散補之自然能食設或嗜食太過傷脾而痞滿嘔逆權用枳實丸一服慎勿多服予嘗治翁氏久瘧食少汗多先用補劑加黃連枳實月餘食反不進汗亦不止因悟謙甫此言遂減去枳連純用補劑又令粥多於藥而食進又於原方內加附子三分半一服而愈

垣寬中進食丸滋形氣喜飲食

草薢仁錢五

砂仁錢五分

半夏錢七

麥芽炒一兩

枳實錢四

神麴錢半

甘草錢半

乾薑錢一

陳皮錢三

木香錢五分

白朮

白茯苓各二錢

猪苓

澤瀉

人參

青皮各一錢

右為末湯浸蒸餅為丸每服三五十九白湯下

脾胃有積不進食

和中丸治病久虛弱厭厭不能食而臟腑或秘或瀉常服和中理氣消痰進食去濕厚腸胃

厚朴薑製一兩

白朮一兩

半夏製一兩

橘紅八錢

檳榔錢四

枳實錢三

木香錢二

甘草錢三

右為末生薑汁浸蒸餅丸每服五六十九食遠白湯下

木香枳朮丸

木香參薑枳朮丸能開胃進食二方並見內傷

飲食

交泰丸升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脹除怠墮嗜臥四肢不收沉困懶倦

知母四錢

柴胡錢一

厚朴去皮炒三錢

冬加七錢

人參錢一

黃連六錢

苦練酒煑三錢

肉桂去皮一錢

白茯苓錢三

皂角去皮弦六錢

紫苑去苗六錢

小椒炒去汗無閉目者一錢半

白朮錢二

川烏頭四錢 乾薑炮三錢 巴豆霜半兩 吳茱萸湯洗半兩

砂仁三錢

右除巴豆霜另研入餘俱為細末蜜丸每服三四十九
溫水下量虛實加減

河人參半夏丸下痰進食方見咳

虛熱治一男子因服熱藥多又性急形瘦多倦食少此時四

月後與此方分作十四貼食後煎熱下大補丸十五粒

白朮一兩 炒麩一兩 陳皮七錢 黃芩六錢

人參 知母炒 麥門冬 木通各半兩

生甘草 炙甘草各二錢

又治勞苦不思飲食

白朮三錢 滑石 白茯苓各一錢

水煎服下保和丸三十九

滯
熱
打

治脚氣瘦倦不思飲食

白朮二兩

蒼朮

陳皮

黃連

黃栢

半夏各半兩

匾栢七錢半

香附一兩

白芍藥一兩

右為末薑汁糊丸

憂抑傷脾不思飲食

黃連炒

芍藥酒炒

香附

青六散末方見

滯下即六一散
加紅曲二兩

右薑汁浸炊餅為丸

濕痰氣滯不思穀食三補丸加蒼朮倍香附

治脾氣久虛不進飲食停飲脇痛麩朮丸

神麩炒十兩

白朮五兩

乾薑

官桂各二兩

吳茱萸

川椒各三兩

寒飲

右為末薄糊丸每服三五十九食前薑湯下有飲加白
木二兩此方自試有效

脾腎虛

二神丸治脾腎虛弱全不進食

破故紙

炒四兩

肉苳菘

生二兩

右為末用肥棗四十九箇生薑四兩切片同煮棗爛去
薑取棗剝去皮核用肉研為膏入藥末和杵丸如桐子
大每服三四十九塩湯下有人全不進食服補脾藥皆
不效予授此方服之頓能進食此病不可全作脾氣治
蓋腎氣怯弱真元衰削是以不能消化飲食譬之鼎釜
之中置諸米穀下無火力終日米不熟其何能化黃魯
直嘗記服兔絲子淘淨酒浸曝乾日挑數匙以酒下之
十日外飲嗽如湯沃雪亦知此理也

針灸

胃弱不思飲食腸鳴腹痛食亦不化 三里 三陰交

東三焦停水氣攻不食身黃微熱胃中有寒故也 維

中封 胃俞 腎俞

撮三焦邪熱不嗜飲食

關元 一分沿皮向後三分灸

東全不思食

然谷 出血立飢

脈浮滑而疾者食不消脾不磨 陽脈滑而緊滑則胃氣

實緊則脾氣傷得食不消者此脾不和也

枳朮丸之類治之

仲寸口脈微而瀆微者衛氣不行瀆者榮氣不達榮衛不

能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則頭疼口難

言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而

吞酸中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則為遺洩

異功散之類治之

飢不能食

飢不能

靈黃帝曰人之善飢而不嗜食者何氣使然岐伯曰精氣

并於脾熱氣留於胃胃熱則消穀穀消故善飢胃氣逆上則胃脘寒故不嗜食也大惑論

運氣

運氣飢不欲食皆屬濕邪傷腎經云太陰司天濕淫所勝民病心如懸飢不欲食治以苦熱是也

針灸

鍼灸飢不欲食有一法

其一清胃經云胃者水穀之海其膈上在氣衝下至三里水穀之海不足則飢不受穀審守其膈調其虛實是也

其二取腎經云腎足少陰之脈是動則病飢不欲食心如懸苦飢狀視盛虛熱寒陷下取之也

東飢不能食飲食不下嘔而雷鳴 大迎 中極 食竇

又法 期門 章門

診

冬脈不及為病在中令人心懸如飢全文見治虛實法

仲寸口脈弱遲弱者胃氣微遲者榮中寒榮為血血虛則

發熱胃為氣氣虛則發厥

惡食

屬胃

素太陰所謂惡聞食臭者胃無氣故惡食臭也

丹惡食者胸中有物導痰補脾二陳加白蒼查芩湯

白朮

山查

川芎

蒼朮

半夏

陳皮

茯苓

甘草

垣失笑丸治虛痞惡食方見痞門

妊娠惡食

虛

太治妊娠惡食

人參兩四

厚朴

生薑

枳殼

甘草各兩

水煎服

凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈

消瘴門

胎前產後渴

口燥咽乾

上臟

渴而多飲為上消 消穀善飢為中消 渴而便數有膏為下消

上消者舌上赤裂大渴引飲逆調論云心移熱於肺傳

為膈消是也以白虎加人參湯主之潔古曰上消者上焦受病又謂之膈消多

飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦治宜流濕以潤其燥

中消者善食而瘦自汗大便硬小便頻數叔和云口乾飲

水多食亦飢虛癯成為消中者是也以調胃承氣湯及三

黃丸主之潔古云中消者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消穀知其熱在中焦也宜下之

下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易

虧此腎消也以六味地黃丸主之潔古云腎消者病在下焦初發為膏淋謂淋下

如膏油之狀至病成面色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治宜養血以分其清濁而自愈矣

右三消者經謂之膈消膈消者渴而多飲是也中消者

經謂之消中消中者渴而飲食俱多或不渴而獨飲是

也下消者經謂之腎消腎消者飲一溲二其溲如膏油

即膈消消中之傳變王註謂肺臟消燥氣無所持是也

蓋肺藏氣肺無病則氣能管攝津液而津液之精微者

收養筋骨血脈餘者為溲肺病則津液無氣管攝而精

微者亦隨溲下故飲一溲二而溲如膏油也筋骨血脈

無津液以養之故其病成漸形瘦焦乾也然肺病本於

腎虛腎虛則心寡於畏妄行凌肺而移寒與之然後肺

病消故仲景治渴而小便反多用腎氣丸補腎救肺後

人因名之腎消及下消也或曰經既云肺消死不治仲

景復用腎氣丸治之何也曰飲一溲二者死不治若飲

一未至溲二者病尚淺猶或可治故仲景腎氣丸治飲

水一斗小便亦一斗之症若小便過於所飲者亦無及

矣

病式服藥

熬猪肚湯

小承氣湯

參瀉湯參瀉湯

三消分
水火圖

羊肉冬瓜湯

腎氣丸地黃丸

消渴手太陰

大渴不止

消中足陽明

腹脹泄而數便
胃熱消穀善飢

腎消足少陰

膏痺飲
少瘦多

麥冬飲子

肉化丸風髓丹

化水丹

易老順氣散

裝之毒制陽前瀆不患

消渴末
傳瘡疽
中滿不
治

論消渴末傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中
滿鼓脹聖濟總錄皆為必死不治之症潔古分而治之能
食而渴者白虎加人參湯主之不能食而渴者錢氏白朮
散倍加葛根主之上中既平不復傳下消矣前人用藥厥
有旨哉或曰末傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而
不潰或赤水者是也經曰有形而不痛者陽之類也急攻
其陽無攻其陰治在下焦元氣得强者生失强者死末傳

禁忌

中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢繩墨而更其道也
然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大
其服皆適其所至所為故知過與不及皆誅罰無過之地
也如膈消中消制之太急速過病所久而成中滿之疾正
謂上熱未除中寒復生者非藥之罪失其緩急之宜也處
方之際宜加審焉

本總錄論消渴有三種一者渴而飲水多小便數有脂似

麩片而甜者消渴病也二者吃食多不甚渴小便少有似

油而數者消中病也三者雖渴飲水不能多腿脚瘦小痿

弱小便數此腎消病也特忌房勞千金云消渴病宜慎者

有三一飲酒二房勞三醜食及麪能慎此三者雖不服藥

亦自可愈消渴之人愈與未愈當須慮患大難必於骨節

間忽發癰疽而卒

診

素帝曰夫子數言熱中消中不可服膏梁芳草石藥石藥發瘖芳草發狂夫熱中消中皆富貴人也今禁膏梁是不合其心禁芳草石藥是病不愈願聞其詳岐伯曰芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者帝曰不可以服此二者何以然岐伯曰熱氣慄悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾胃者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論腹中論王註云多飲數波謂之熱中多食數波謂之消中芳草
即白芷石藥
即鍾乳之類

滑石治渴本為竅不利而用之以燥能亡津液也天令濕氣太過者當用之若無濕用之是犯禁也

靈黃帝曰人之善病消瘖者何以候之少俞答曰五臟皆柔弱者善病消瘖黃帝曰何以知五臟之柔弱也少俞曰夫柔弱者必有剛強剛強多怒柔者易傷也黃帝曰何以

候柔弱之與剛強曰此人薄皮膚而目堅固以深者長衝直揚其心剛剛則多怒怒則氣上逆胸中蓄積氣血逆留臍皮充肌血脈不行轉而為熱熱則消肌膚故為消瘖此言其人暴剛而肌肉弱者也五變篇髑髕弱小以薄者心脆心脆則善病消瘖熱中肩背薄者肺脆肺脆則善病消瘖易傷脇骨弱者肝脆肝脆則善病消瘖易傷唇大而不可不堅者脈脆脈脆則善病消瘖易傷耳薄不堅者腎脆腎脆則善病消瘖易傷全文見診法心脈微小為消瘖滑甚為善渴肺脈微小為消瘖肝脈微小為消瘖小甚為多飲脾脈微小為消瘖腎脈微小為消瘖諸脈小者陰陽俱不足也勿取以針而調以甘藥全文見治虛實法凡治消瘖肥貴人則膏梁之疾

素心脈奕而散者當消渴自己脈要精微論帝曰消瘖何如

岐伯曰脈實大病久可治脈懸小堅病久不可治虛實論
難病若開目而渴心下牢者脈當得緊實而數反得沉澹
而微者死也十七

脈消渴脈數大者生細小浮短者死

渴而多飲為上消

丹治消渴養氣 降火 生血為主 苳萋根治消渴之

神藥

心移熱於肺傳為膈消全文見臍病傳變王註云心膈兩

橫膈膜故心熱入肺久久傳化內為膈熱消渴而多飲也

垣潔古云能食而渴者白虎倍加人參湯主之不能食而

渴者錢氏白朮散加葛根大作湯劑廣服之

保人參石膏湯治膈消上焦煩渴不欲多食

人參五錢

石膏兩一

知母七錢

甘草四錢

大法

能食為實熱

每服五錢水煎食後溫服

錢加減地骨皮散治上消

知母

柴胡

甘草炙

半夏

地骨皮

赤茯苓

白芍藥

黃芪

石膏

黃芩

桔梗

右為細末每服三錢薑五片水煎食遠溫服

項白朮散治虛熱而渴

人參

白朮

白茯苓

甘草各一兩

乾葛二兩

藿香一兩去上

木香一兩

右為末每服三錢煎溫服如飲水多多與服之海藏云四君子

加減法治濕勝氣號泄利大過

海治脾胃虛弱大渴不止而食少小便利大便不調精

神短少腹窄狹如繩束之

不能食為虛熱

白茯苓去皮

橘紅各一兩

生薑兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服二九白湯化空心服忌生冷硬物怒發思慮過度如脈弦或腹中急甚者加甘草三錢

易老門冬飲子治老弱虛人大渴

人參

枸杞子

白茯苓

甘草各三

五味子兩

麥門冬去心

薑水煎服

羅門冬飲子治膈消胸滿心煩精神短少多為消病

知母

甘草炙

瓜蒌仁

五味子

人參

葛根

茯苓

生地

麥門冬各一兩

右為籠末每服五錢加竹葉十四片同煎

渴分消濕熱 小便不利而渴知內有濕也小便自利而渴知內有燥

也濕宜泄之燥宜潤之

仲脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散主

方見傷寒

脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

方見傷寒

木火府丹治消渴方見 壬戌年一卒病渴日飲水三斗

不食者三月心中煩悶時已十月予謂心中有伏熱與此

藥數服每服五十九溫水下越二日來謝云當日三服渴

止又次日三服飲食如故此方本治淋用以治渴效信乎

藥要變通用之

藏器石燕主消渴同水牛鼻和煮飲之

渴而小便自利諸方並見下消燥熱條

恒神效生津甘露飲子方見下消燥熱條

渴分消結 消渴泄瀉先用白芍白朮各炒為末調服後隨症用藥

垣止渴潤燥湯治消渴大便乾燥喜溫飲陰頭短縮舌上白燥唇裂口乾眼澁難開及於黑處如見浮雲

升麻半錢

柴胡分七

甘草稍分五

杏仁六箇

桃仁研錢一

麻仁研錢一

歸身錢一

紅花少許

防風根錢一

荊芥穗錢一

熟地錢二

小椒分一

細辛分一

黃柏錢一

知母

石膏各錢一

水煎去查食後熱服

渴分有汗無汗

雜症有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以苦堅之太陽無汗而渴不宜服白虎湯若得汗後脈洪大而渴者宜服之陽明汗多而渴不宜服五苓散若小便不利汗少脈浮而渴者宜服之

病後餘熱燥渴

垣消渴病退後而燥渴不解此有餘熱在肺經可用參苓甘草少許生薑汁冷服虛者可用人參湯

寒

化水丹治手足少陰渴飲不止或心痛者

本事治飲冷水多

川烏

廣炮去皮四箇

甘草炙一兩

牡礪生三兩

蛤蚧

用厚者炮六兩

右為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云此藥能化停水

六經渴

垣太陽經渴其脈浮無汗者五苓散滑石之類主之陽

明經渴其脈長有汗者白虎湯涼膈散之類主之少陽

經渴其脈弦而嘔者小柴胡湯加瓜蒌之類主之太陰

經渴其脈細不欲飲縱飲思湯不思水者四君子理中湯

之類主之少陰經渴其脈沉細自利者猪苓湯三黃丸

之類主之厥陰經渴其脈微引飲者宜少少與之

聖治時氣煩渴用生藕汁一盞入生蜜一合令勻分為三

服

甘緩

蜜酒方

好蜜斤

水碗

細麴一升

好乾酵二兩

右先熬蜜水去沫冷下麴酵每日攪三次熱服

鹹爽

仲渴欲飲水不止者文蛤散主之

文蛤五兩按本草云文蛤味鹹寒治消渴渴陳無擇以文蛤為五味子

右一件捍為散以沸湯和服方寸匕

經治一切渴用大牡礪不拘多少於臘月或端午日黃泥

裹煨通赤放冷取出為末用鯽魚煎湯下一錢七小兒五

分只兩服瘥

本治渴疾飲水不止神效散

白浮石

蛤粉

蟬殼等分

右為末用鯽魚膽七箇調三錢不拘時服

又消渴方

白浮石

船上青苔等分麝香少許

右為末每服二錢溫湯下

苦堅 辛潤 黃連九卽瓜蒌根丸是也

保上焦燥而渴蜜煎生薑湯用大器傾注時時呷之法曰

心肺之病莫厭煩而少飲內經曰補上治上宜以緩又曰

卒以潤之開腠理致津液通則肺氣下流故火氣降而燥

衰矣其渴卽止 有人消渴引飲無度或令食韭苗日用

三五兩不得入鹽但吃得十斤卽效

海千里漿一名水葫蘆

木瓜

紫蘇葉

桂各一兩

烏梅肉一兩

赤茯苓一兩

一方有神麴荳粉

右為末煉蜜丸如彈子大噙化一丸嚥下齒屬腎水故也

酸收

又方

百藥煎

烏梅肉

紫蘇葉

人參

甘草

麥門冬

右等分爲細末煉蜜丸如彈子大噙化

芷梅湯

烏梅肉

甘草各三

百藥煎一

白芷兩

白檀錢

右爲細末湯點服

運氣渴有二

一曰熱助心盛而渴經云少陽司天之政三之氣炎暑至民病渴又云少陰之復渴而欲飲又云少陽之復噎絡焦槁渴引水漿治以諸寒劑是也

雜方

二曰寒攻心虛而渴經云太陽司天寒氣下臨心火上從噎乾善渴又云太陽司天寒淫所勝民病噎乾渴而欲飲又云寒水太過上臨太陽民病渴而妄冒治以諸熱是也

丹治消渴用燥絲湯飲之能引腎氣上行朝於口

仲吐酸欲得水而貪飲者文蛤飲主之兼治微風脈緊頭痛

文蛤五兩

麻黃

甘草

生薑各三兩

石膏五兩

杏仁五十粒

大棗十二枚

右咬咀以水七升煮取二升溫服一升汗愈

垣甘草石膏湯治渴病全愈再劇舌白滑微腫咽喉嚙唾覺痛噎腫時渴飲冷白沫如膠飲冷乃止

升麻一錢五分

柴胡七分

甘草根五分

黃栢一錢

石膏六分

杏仁六箇

梔仁

防風根

荆芥穗

生地各一錢

熟地三分

黃連三分

知母一錢

細辛一分

紅花少許

小椒三箇

婦身一錢

右水煎去查食後熱服

針灸

針灸口渴咽乾有四法

其一取心經云心手少陰之脈是動則病噎乾心痛渴而欲飲隨盛虛寒熱陷下取之也

其二取肺大腸經云大腸手陽明之脈所生病者目黃口乾隨盛虛寒熱陷下以施補瀉疾留之法也又云肺虛則少氣耳聾噎乾取其經太陰太陽之外厥陰內血者是也其三取腎經云腎足少陰之脈所生病者口熱舌乾咽腫噎乾隨盛虛寒熱陷下取之又云噎乾口中熱如膠取足少陰是也

其四取肝經云肝足厥陰之脈是動病甚則噎乾面塵脫色隨盛虛寒熱陷下取之

密 消渴經百口已上者不可刺
灸刺灸則瘡口病水不止

玉液 一分瀉見血 三里 瀉訖如前補玉液 關元 訖取下穴 一分再取下穴

瀉訖再取廉泉

集 又法 金津 玉液 承漿不巳 海泉 人中 廉

泉 腎俞 氣海

東 小腸俞 陽池各灸 廉泉出惡血 又法 胃脘

心脘 亶中各灸 又法 承漿 然谷 勞宮 曲

地 意舍 關元各灸

世 口熱咽乾唾如粘膠口苦噎中介介然 太溪分五 陽

陵泉二十寸

甲 渴飲身體燥多噎隱白主之 消渴嗜飲承漿主之

消渴腕骨主之 噎乾腹痠痛坐臥目慌慌善怒多言伏

溜主之

消穀善飢為中消

虛熱 瘰成為中消 全文見形經云五臟皆柔弱而脆者為消瘰王註云瘰為消熱病也 已食而

飢者胃疽

平人氣象論一云注夏即瘧勞病也

穀入多而氣少得之有所

脫血濕居下也

全文見形生死

胃熱則消穀

靈胃中熱則消穀令人心懸善飢眇已上皮膚熱師傳篇胃

中熱腸中寒則疾飢小腹痛脹

中熱則胃中消穀五隆津液

篇

案

三陽結謂之消

陰陽別論王註云胃及大腸俱熱結也熱則善消水穀

消渴中消自古只治燥止渴誤矣殊不知三陽結謂之

大腸熱則消水

消三陽者陽明也手陽明大腸主津液所生病熱則目黃

口乾是津液不足也足陽明主血所生病熱則消穀善飢

血中伏火是血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱

為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治

之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳草石藥其氣悍烈能助

熱燥也越人云邪在六腑則陽脈不和陽脈不和則氣留

之氣留之則陽脈盛矣陽脈太盛則陰氣不得榮也故
肉皮膚消削是也

食甘美所致

靈帝曰有病口甘者病名為何何以得之岐伯曰此五氣

之溢也名曰脾瘕夫五味入口藏於胃脾為之行其精氣

津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食

甘美而多肥也肥者令人多熱甘者令人中滿故其氣上

溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也

奇病論

虛者潤之

潔胃熱則善消水穀可飲其辛降火之劑用黃連末生地

白藕各自然汁牛乳各一升熬成膏和黃連末一斤丸如

桐子大每服三五十九少呷白湯下日進十服

河猪肚丸治消渴

猪肚筒

黃連兩

瓜蒌根兩

麥門冬四兩

知母兩

實者下

為細末納猪肚中線縫置甑中蒸極爛乘熱於石臼中杵可丸為度如硬加少蜜為丸每服三十九丸漸加至四

五十九丸渴則服之三因方多梁米杜仲本草云猪肚能補中益氣止渴
三

黃丸方見治發熱條

三調胃承氣湯治消中渴而飲食多方見傷寒此初起時宜服之
三順利散治中熱在胃而能食小便赤黃微利至不欲食為效不可多利

厚朴

枳實各一兩

大黃煨四兩

每服五錢水煎食遠服

食併即消中

大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食併全文見診病傳變而過不生肌膚亦易飢也東垣云善食而瘦者謂食移易胃伏火邪於氣分則能食脾胃虛則肌肉削也
於膽亦曰食併同上

河參蒲丸治食併胃中結熱消穀善食不生肌肉

人參

赤茯苓

菖蒲

遠志

地骨皮

牛膝酒浸各一兩

右為末煉蜜丸每服二十九丸米飲下

運氣消中皆屬熱經云少陰之勝心下熱善飢又云少陽之勝熱客于胃善飢治以寒劑是也

針灸

針灸消中皆取於胃經云邪在脾胃陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢取三里灸之又云胃足陽明之脈氣盛則身已前皆熱於胃則消穀善飢熱則清之盛則瀉之

困陰氣不足熱中消穀善飢腹熱身煩狂言三里主之

腹中氣脹引脊痛飲食多而身羸瘦名曰食併每作先取脾俞後取季脇

渴而便數有膏為下消

羅張安撫芸夫年四十五歲病消渴舌上赤裂飲水無度

燥熱

小便數多先師以此藥治之良愈消渴多傳瘡瘍為不救之疾既效亦不成瘡瘍享年七十五而終名之曰生津甘露飲子治消渴上下齒麻舌硬赤爛腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢萎弱無力面塵脫色脇下急痛善嘔善怒健忘醫肉腰背疼寒兩丸冷甚一方石膏用一兩二錢

石膏

人參

甘草

山梔

白苳蔻

白芷

連翹

甘草

葶澄茄

黃連

薑黃

藿香

白葵

麥門冬

杏仁

歸身

蘭香

黃栢

升麻根

木香

桔梗

柴胡根

知母

全蝎

右為末湯浸蒸餅和勻成劑捏作餅子晒乾杵碎如黃

米大每服二錢挑於掌內以舌舐之津液送下或白湯食後服之神效凡消渴為病燥熱之氣勝也內經云熱淫所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷氣氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不能故以石膏之甘寒為君啓玄子曰滋水之源以鎮陽光故以栢連梔子知母之苦寒瀉熱補水為臣以當歸杏仁麥門冬全蝎連翹白葵蘭香甘草甘寒和血潤燥為佐升麻柴胡苦平行陽明少陽二經葶澄茄白苳蔻木香藿香反佐以取之又用桔梗為舟楫使浮而不下也

和血養氣湯治口渴舌乾小便數舌上赤裂此藥生津除燥生肌肉一名地黃飲子

黃連

桃仁

生地

紅花

黃栢

當歸

甘草

升麻

知母酒五分 防已酒三分 羌活五分 麻黃根三分

口乾舌渴加杏仁六分 甘草生三分 小便數加石

膏六分

右咬咀作一服水煎去查稍熱服忌酒麪房事

清涼飲子治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結小便數

羌活稍一分 柴胡稍一分 升麻稍四分 防風稍五分

當歸六分 甘草稍一分 石膏半錢 知母酒製一分

紅花少許 防已五分 龍膽草一分 黃柏一分

桃仁五筒 杏仁五筒 生地酒五分 黃芪根一分

黃芩酒一分 甘草炙一分

右水二盞酒一小盞煎服

甘露膏治消渴飲水極多善食而瘦自汗大便結燥小便頻數又名蘭香飲子

石膏二錢 知母半錢 甘草生一分 人參五分

防風根一分 半夏製五分 蘭香五分 白芫薺

連翹 桔梗 升麻各五分

右為末水浸蒸餅丸或捏劑作薄餅子晒乾碎如米大每用淡薑湯下二錢

丹徐兄年四十歲口乾小便數春未得之夏來求治診其

兩手左瀋右畧數而不弦重取似大而稍有力左稍沉畧

弱而不弦然瀋却多於右喜兩尺皆不甚起此由飲食味

厚生熱謂之痰熱禁其厚味宜降火以清金抑肝以補脾

用三消九十粒左金阿魏丸各五粒以薑湯吞下一日六

次又以四物湯加參朮陳皮生甘草五味子麥門冬煎服

一日三次與丸藥間服一二日自覺清快小便減三之二

口亦不乾止渴未除頭暈眼花久坐則腰疼遂以摩腰膏

治腰疼仍以四物湯用參芪減川芎加牛膝五味子炒栢
麥門冬煎飲調六一散服及覺便多遂去六一散仍服丸
藥而安 黃連末治消渴要藥加天花粉末人乳生地黃
汁生藕汁二物為膏入山藥末搜和以薑汁和煉蜜為膏
徐徐挑於舌上以白湯少許送下亦得能食加軟石膏
治消渴以天花粉為末用人乳汁生薑汁煎膏丸如菉荳
大每服百丸食後服

附 治消渴小便多者煮瓜蒌根汁飲之良

世 治消渴無方可治者用天花粉大烏頭炒等分為細末
蒸餅丸每服百丸黑荳湯下

已上四方蒺藜根為君本草云蒺藜根主消渴止小便
通月水乳汁夫既能止小便又能通月水知其流濕潤
燥治消渴之要藥也

本 千金地黃丸治腎渴

黃連

四兩為末

生地

半斤研取汁連查拌黃連末和勻晒乾用

右再為細末煉蜜為丸食後麥門冬湯下五六十丸

羅 黃連丸治消渴飲水無度小便頻數

黃連

淨半斤用無灰好酒浸一宿重湯蒸一伏時取出晒乾用

右為細末滴水丸白湯下五七十丸

又方治卒消渴小便多搗黃連細末蜜丸服三四十九

麥門冬湯治消渴日夜飲水無度飲下即洩

麥門冬

去心 黃連

冬瓜

各二兩

右為麤末每服五錢水煎八分去渣溫服若冬瓜無乾
者用新冬瓜肉三斤去穰分作十二片為十二服每服
用瓜一片劈破水煎日三服

冬瓜飲子治消渴能食而飲水多小便如脂麩片日夜無

度

冬瓜一枚

黃連十兩為細末

右先以冬瓜破開去穰摻黃連末在內却用頂蓋定於熱灰中煨熟去皮切細爛研絞汁每服一盞至二盞日三夜一服

本三消丸用好黃連治淨為細末不拘多少切冬瓜肉研取自然汁和成餅陰乾再為細末用汁浸和加至七次即用冬瓜末為丸每服三四九以冬瓜汁煎大麥仁湯送下尋常渴止一服效

已上五方黃連冬瓜為君丹溪云冬瓜性走而急久病與陰虛者忌之又有黃連為佐用者審之

食治消渴飲水不止小便數用田螺五升水一斗浸一宿渴即飲之每日一度易水換螺為妙又方以水煮取汁飲

之螺亦任吃

重劑

子和治飲水百杯尚猶未足小便如砂或如杏色服此方三五日小便大出毒注下十日除限此方子和自云此重劑試有驗

水銀四錢

錫二錢同水銀炒成砂子

牡礪

密陀僧

知母

紫苑

苦參

貝母各一兩

黃丹兩

苳菱根半斤

右為細末男子用不生兒猪肚婦人用獾猪肚一箇納藥於內以麻線縫之用新瓦二片繩繫一二遭別用米一升苳菱根末半升於新水內煮熟取出放冷不用米及苳菱只研猪肚併肚中藥末爛和為丸如硬加蜜食前米湯下三四十九三四方無貝母

河胡粉散治大渴百方不痊者亦治腎消

黃丹

胡粉各半兩

苴菱根二兩半 甘草一兩

澤瀉

石膏

赤石脂

白石脂各半兩

右咬咀水煎服日二服如腹痛減之為丸服尤妙每服十九多則腹痛

反佐

葛根九治消渴消腎日飲碩水者

葛根三兩

瓜蒌根二兩

黃丹二兩

附子炮去皮一兩

右為末煉蜜丸每服十九日進三服春夏去附子

腎虛

垣

六味地黃丸治腎消效

方見治虛實法

經

治消渴不止下元虛者用牛膝五兩細剉為末生地黃

汁五升晝曝夜浸以汁盡為度蜜丸空心溫酒下三十九久服壯筋骨駐顏色黑鬚髮生津液

仲

治男子消渴小便反多如飲水一斗小便亦一斗腎氣

丸主之

方見治虛實法

子和

治腎消以腎氣丸本方內加山藥一味外桂附從四

時加減冬一兩春秋三錢夏一錢 又法腎氣丸去附子加五味子一兩半

本唐祠部李郎中治消渴者腎虛所致每發則小便甜醫

者多不知其故亦缺而不言洪範曰稼穡作甘以物理推

之淋飭醋酒作脯法須臾即甜足明人之食後滋味皆甜

流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸炎氣化成精氣下入骨髓

其次為脂膏又其次為血肉其餘則為小便故小便色黃

血之餘氣也五臟之氣鹹潤者則下味也若腰腎既虛冷

則不能蒸化穀氣盡下為小便故味甘不變其色清冷則

肌膚枯槁也猶如乳母穀氣上洩皆為乳汁消渴病者下

泄為小便皆精氣不實於內則小便數澀溺也又肺為五

臟華蓋若下有煖氣蒸則肺潤若下冷極則陽不能升故

肺乾而渴易於否卦言之矣乾上坤下陽無陰不降陰無陽不升上下不交故成否也譬如釜中有水以火煖之又以板覆之則煖氣上騰故板能潤若無火力則水氣不能上升此板終不得潤火力者腰腎強盛也常須煖補腎氣飲食得火力則潤上而易消亦免乾渴之患故仲景云宜服腎氣八味丸此疾與脚氣雖同皆為腎虛所致其脚氣始發於二三月盛於五六月衰於七八月凡消渴始發於七八月盛於十一二月衰於二三月其故何也夫脚氣壅疾也消渴宣疾也春夏陽氣上故壅疾發則宣疾愈秋冬陽氣下故宣疾發則壅疾愈審此二者疾可理也猶如善為政者寬以濟猛猛以濟寬隨時變通耳

和治諸虛不足胸中煩悸時常消渴唇口乾燥或先渴而欲發瘡或病瘡疽而後渴者宜用黃芪湯多服之

方見瘡直門凡

消渴而小便反多有脂者皆腎氣不啻攝津液也宜多服黃芪黃芪乃補氣之要藥

保行氣丸治消渴

五靈脂

衍義云五靈脂入肝最遠能行經血不能生血

烏頭去皮臍

右等分為末每服三錢冬瓜湯下無瓜時苗葉亦可日三服渴止勿服再服八味丸去附子加五味子

外治消腎小便數鹿角一具炙焦擣篩為末酒服方寸匕漸漸加之

保茴香散治消病下焦渴症小便如膏

茴香炒

苦棟炒

各等分炒為末食後酒調

下一錢

雜方

食治消渴舌焦口乾小便數野雉一隻以五味煮令極熟去肉取汁渴飲之肉亦可食

臍

肝瘰者夜臥則驚多飲小便數

全文見瘰

診

心移寒于肺消者飲一溲二不治全文見胎病傳變王註云腎臟消溲氣無所攝

仲寸口脈浮而遲浮即為虛遲即為勞虛則衛氣不足勞

則榮氣竭跌陽脈浮而數浮則為寒數則消穀而大堅氣

盛則溲數溲數則堅堅數相搏即為消渴 跌陽脈數胃

中有熱即消穀引飲大便必堅小便即數

胎前渴

虛熱

雲葛根散治婦人妊娠胃膈煩燥唇口乾裂四肢壯熱食少

葛根

黃芩

人參

麩仁

黃芪

甘草

麥門冬

右各等分每服四錢加竹茹彈子大水煎服

人參黃連散治妊娠身熱煩燥口乾少食四肢壯熱

人參

黃芪

葛根

秦艽

麥門冬

各一兩知母

各七錢甘草

各五錢赤茯苓

右咬咀每服四錢薑三片淡竹葉十四片同水煎

治妊娠壅熱心神煩燥口乾渴逆

升麻

黃芩

人參

麥門冬

山梔

柴胡

茯神

瓜蒌根

犀角

各一兩

知母

各五錢甘草

右咬咀每服四錢水煎服

知母散治妊娠煩悶口乾胞胎臟熱

知母

麥門冬

各半兩甘草

黃芪

黃芩

赤茯苓

各七錢半

右咬咀加竹茹同煎

產後渴

虛熱

雲竹葉湯治產後虛弱口渴

竹葉三升

甘草

人參

茯苓各一兩

生薑

半夏各三兩

麥門冬兩五

大棗十五箇

右咬咀以水九升先用生薑竹葉大棗煎取七升去渣

入藥煎取二升每服五合日三夜一

玄胡索散治產後失血渴不止

鬱金

乾葛

桂心

青皮

枳殼

玄胡索

右等分以好醋浸一宿焙乾為末每服二錢陳皮湯調

下日三夜一

本治產後出血太多虛煩發渴用真正蒲黃末二錢白湯

調下如渴燥甚井花水下

大治產後中風煩渴用紅花子五合微炒研碎以水煎濃

徐徐呷之

陳士良療血渴及產後渴疾用蓮子心生取為細末米飲

調下二錢效

雜方

保桃花散治產後不煩而渴

新石灰兩一

黃丹錢五

右為細末渴時用井水調下一錢

口燥咽乾

燥熱

垣飲食不節勞倦所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口

中津液不行故口乾咽乾病人自以為渴醫以五苓散治

之反加渴燥乃重竭津液以致危亡經云虛則補其母當

於心與小腸中補之乃脾胃之根蒂也以甘溫之藥為之

主以苦寒為之使以酸為之臣佐以辛心苦緩急食酸以

收之心火旺則肺金受邪金虛則以酸補之次以甘溫及

甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也
本黃芪湯治心中煩燥不生津液不思飲食

黃芪 熟地 白芍藥 五味子

麥門冬各三兩 甘草 人參 天門冬各五錢

白茯苓兩一

右咬咀每服三錢薑棗烏梅同煎去渣食後服

清五味子湯桑枝煎治口乾方見 燥熱咽乾忌南星半

夏

運氣

運氣口燥舌乾皆為熱燥二氣然分言之有四

一曰熱經云歲火太過民病噎燥又云少陰司天熱淫所

勝病胸中煩熱噎乾治以寒劑是也

二曰燥經云金鬱之發噎乾面塵又云陽明在泉燥淫所

勝甚則噎乾面塵治以溫劑是也

忌

三曰上熱下燥經云少陰司天之政水火寒熱之氣持於
氣交民病噎乾四之氣民病寒熱噎乾是也

四曰上燥下熱經曰陽明司天之政四之氣民病噎乾引
飲皆治以寒溫多少其制是也

素督脈主病噎乾骨空論 忌南星半夏

黃疸 產後黃 食勞疳黃 黃汗

目黃 黑疸

丹五疸不要分同是濕熱如蠶麩相似 輕者小溫中丸

重者大溫中丸 熱多者加苓連 濕多者茵陳五苓

散加食積藥 濕熱因倒胃氣服下藥大便下利者參芪

加茵陳山梔甘草

仲諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之宜桂枝

加黃芪湯 穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸不安

大法

久久發黃為穀疸茵陳蒿湯主之 黃疸病茵陳五苓散主之 二方並見傷寒

羅 茯苓除濕湯治黃疸氣熱嘔吐而渴欲飲冷身體面目俱黃小便不利不得安臥亦不思食

白茯苓 五分 澤瀉 三分 茵陳蒿 六分 猪苓 三分

黃芩 生 黃連 山梔 防已

白朮 蒼朮 陳皮 青皮 各二分

右咬咀水煎空心服

完顏正卿因官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱更以恚怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳身目俱黃微見青色顏黑心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐口生惡沫飲食不化時下完穀小便癃閉而赤黑辰巳之間發熱日暮則止至四月尤甚予診其脈浮而緩金匱云寸

口脈浮為風緩為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘰熱已行跌陽脈緊食穀即眩為傷脾風寒相搏穀氣不消胃中苦濁濁氣不流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸宜服茵陳梔子湯

茵陳 錢一 茯苓 五分 山梔仁 蒼朮 炒

白朮 各三錢 黃芩 生六分 黃連 枳實 炒

猪苓 去皮 澤瀉 陳皮 防已 各二分

青皮 一分

右咬咀作一服長流水煎食前溫服二服可愈山梔茵陳能瀉濕熱而退黃故以為君枳實苦寒泄心下痞滿肺主氣今熱傷其氣故身體麻木以黃芩苦寒瀉火補氣為臣二朮苦甘溫青皮苦辛溫能除胃中濕熱洩其壅滯養其正氣防已苦寒能去十二經滯濕澤瀉鹹平

虛

茯苓猪苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去癥閉
五治疸脈虛便赤此後五方主之治虛者驗

白朮兩一

人參

猪苓

茵陳各半兩

澤瀉錢七

山梔炒

木通錢三

桂枝

一婦人年二十八歲發黃脈澁經水自來不行身體倦怠未曾生子

陳皮

白朮

木通各一兩

黃芩

歸頭

丹皮各半兩

甘草錢一

分作十二貼水煎食前熱服

千治疸取小麥杵汁絞飲六七合晝夜飲三四次愈

仲諸疸用猪膏半斤亂髮如鷄子大三枚以髮入膏中煎至髮盡分再服病自從小便中出

疸腎疸湯治腎疸目黃渾身金色小便赤澁

升麻根半兩

羌活根錢一

防風根錢半

獨活根錢半

白朮

柴胡根

蒼朮錢一

猪苓錢一

澤瀉錢三

白茯苓

葛根錢半

甘草根錢三

黃栢錢二

人參

神麴各六分

分作二貼水煎食前稍熱服

仲桂枝加黃芪湯治黃疸脈浮而腹中和者宜汗之若腹滿欲嘔吐懊懣而不和者宜吐之不宜汗

桂枝

白芍藥各三兩

甘草兩二

生薑兩三

大棗十二枚

黃芪兩二

白水煎熱服須臾飲熱粥以助藥力取微汗為度未汗更服

汗法

丹治一人年二十歲因勞又冒雨得疸脚痠心悸口苦力弱尿黃脈浮而數病在表宜解外

黃芪三錢

白朮

蒼朮各一錢

陳皮

蘇葉

木通五分

山梔炒二錢

甘草稍些

白水煎服下保和十五丸與點抑青各十九丸温中二十九丸

吐法

仲麻黃醇酒湯治黃疸用麻黃三兩以好清酒五升煮取二升五合頓服盡冬月用酒煮春月用水煮 酒疸或無熱清言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先下之 酒疸心中熱欲嘔者吐之愈如陰症欲吐者韓氏用東坡湯理中湯類 瓜蒂湯治諸黃用瓜蒂二七枚以水一升煮取五合去渣頓服

百一治疸取藜蘆置灰內炮之少變色搗為末水服半錢七小便不利數服

予和蔡氏一女病黃遍身浮腫面目如金色困乏無力不

思飲食惟喜食生物灰裁之屬先以苦劑蒸餅為丸吐痰一碗又以舟車丸通經散下五七行如墨汁更以導飲丸磨食散氣不數日安好如初 李七老病涌水症面黃而喘二足皆腫按之陷而復起行則濯濯有聲常欲飲水不能睡臥戴人令上涌去痰而汗之次以舟車丸濬川散下以益腎散復下之又以分陰陽利水道之劑復下之所苦皆瘥

右脈浮而腹不和者吐之

仲治酒疸心中懷懊或熱痛梔子大黃湯主之

山梔十四枚

大黃二兩

枳實五枚

豆豉升

右四味以水三升煎取二升温作三服

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜大黃硝石湯主之

下法

大黃

黃柏

硝石各四兩

梔子十五枚

水煎將熟納硝石頓服
師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時以火劫其汗兩熱所得然黃皆從濕得之一身盡發熱面黃肚熱熱在裏當下之

羅黃連散治黃疸大小便秘澀壅熱累效

黃連二兩

大黃醋拌炒 黃芩

甘草炙各一兩

右為極細末食後溫水調下二錢日三服先用苳蒂散

搗鼻取下黃水却服此藥苳蒂散見後細方條

孫治黃疸皮黃眼睛赤金色小便赤取秦芫五兩牛乳三升煮取一升去查入芒硝一兩服之蕭炳云秦芫治酒疸

和安喜趙君玉病疸遍身發黃往問醫眾醫皆云乃陽

明症公等與麻知幾皆受訓於張戴人是商議吃大黃者

難與論病君玉不悅歸自揣無別病乃取三花神佑丸八

十粒服之不動君玉乃自悟曰予之濕熱甚矣此藥尚不

動以舟車丸濟川散服之大下結糞一斗一夕而黃退君

玉因此益信戴人之技

右脈沉而腹不和者下之

仲諸黃腹痛而嘔者宜小柴胡湯方見傷寒

孫治黃疸用柴胡一兩去苗甘草一分細剉作一劑以水

一碗白茅根一握同煎至七分去查不拘服

諸疸小便不利為裏實宜利小便或下之無汗為表實宜

發汗或吐之治法並見表裏疸條 男子黃大便自利當與虛勞小

建中湯方見傷寒

寒熱

內感傷寒勞役形體飲食失節中州變寒病生黃非外感而得只用建中理中大建中足矣不必用茵陳

和法

虛實

神治一婦人年六十歲病振寒轉慄足太陽寒水也呵欠噴嚏足少陽膽也口亡津液足陽明不足也心下急痛而疽手少陰受寒足少陰血滯也身熱又欲近火熱在皮膚寒在骨髓也臍下惡寒丹田有寒渾身黃及睛黃皆寒濕也餘症驗之知其為寒濕黃赤而黑又頻數者寒濕勝也病來身重如山便着床枕者陰濕盛也其脈右手關尺命門弦細按之洪而弦急為寒加之細者北方寒水雜以緩甚者濕盛出黃色脈洪大者心火受制也左手又按之至骨舉手來實者壬癸腎旺也六脈按之俱空虛者下焦無陽也用藥法先宜以輕劑去其寒濕兼退其洪大之脈以理中加茯苓湯投之

按此症雖小便黃赤亦作寒治者蓋以餘症及脈別之也

人參

白朮

甘草

乾薑

茯苓

水煎熟以冰冷與之此熱因寒用以假寒對足太陽之假熱以乾薑辛熱瀉膀胱之真氣故曰真對真假對假若不愈當以朮附湯與之

虛寒

羅陰黃治驗至元丙寅六月時雨霖霪人多病濕疫真定

韓君祥因勞役過度渴飲涼茶又食冷物遂病頭痛肢節

亦疼身體沉重胸滿不食自以為外感用通聖散二服後

添身體困甚方命醫治之醫以百解散發其汗越四日以

小柴胡湯二服後加煩燥又六日以三乙承氣湯下之燥

渴尤甚又投白虎加人參湯柴胡飲之類病愈增又易醫

用黃連解毒湯硃砂膏至寶丹十七日後病勢轉增傳變

身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚冷心下痞硬按之則痛

眼澁不欲開目睛不了了懶言語自汗小便利大便秘了而

不了命予治之診其脈緊細按之虛空兩寸脈短不及本

位此症得之因時熱而多飲冷加以寒涼藥過度助水乘
 心反來侮土先囚其母後薄其子經云薄所不勝乘所勝
 也時值霖雨乃寒濕相合此謂陰症發黃予以茵陳附子
 乾薑湯主之經云寒淫於內治以甘熱佐以苦辛濕淫所
 勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之附子乾薑辛甘大熱散
 其中寒故以為君半夏草薢辛熱白朮陳皮苦甘溫健脾
 燥濕故以為臣生薑辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實
 苦微寒瀉其痞滿茵陳微苦寒其氣輕浮佐以薑附能去
 膚腠間寒濕而退其黃故為佐使也煎服一劑前症減半
 兩服悉去又服理中湯數服氣得平復或難曰發黃皆以
 為熱今暑熱隆盛又以熱藥治之何也予曰理當然也成
 無已云陰症有二一者始外傷寒邪陰經受之或因食冷
 物傷太陰經也二者始得陽症以寒治之寒涼過度變陽

為陰也今君祥因天令暑熱冷物傷脾過服寒涼陰氣大
 勝陽氣欲絕加以陰雨寒濕相合發而為黃也仲景所謂
 當於寒濕中求之李思順云解之而寒涼過劑瀉之而逐
 寇傷君正謂此也聖賢之制豈敢越哉

附子

炮去皮
三錢

乾薑

炮二錢

茵陳

一錢二分

白朮

四分

草薢

一錢

白茯苓

三分

枳實

炒

半夏

製

澤瀉

各半錢

橘紅

三分

右生薑五片水煎去查涼服

無養榮湯治五疸脚弱心忪口淡耳響微寒發熱氣急小便
 便白濁當作虛勞治之

黃芪

當歸

桂心

甘草

陳皮

白朮

人參

白芍藥

熟地

五味子

茯苓

遠志

各三錢

去心

兩

右每服四錢薑棗煎空心服

右法治虛寒黃疸

虛熱

治婦人久勞苦得面黃心悸口苦小便不黃自利食少右脈大於左此虛中受濕也

白朮

芍藥

當歸各五錢

黃芪

黃芩

茯苓

人參各三錢

陳皮一錢半

黃連一錢

甘草五分

分六貼下保和溫中各二十九

補中湯治面黃多汗目眦赤四肢沉重減食腹中時痛咳嗽兩手左脈短右脈弦細兼澁右手關脈虛

升麻

柴胡各二錢

歸身二錢

蒼朮五分

澤瀉四分

甘草各八分

五味子廿一

黃芪二錢半

神麩三分

紅花少許

大麥麩五分

右作二服水煎食前

右二方治虛熱黃疸

濕熱

黃疸小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必

噦小半夏湯主之

方見嘔吐○小便色不變不可除熱者蓋中無熱故清白而不黃自無熱可除也

諸疸小便色白不可除熱者無熱也若有虛寒症者

當作虛勞治之 諸疸小便黃赤色者為濕熱治法並見表裏虛疸

條

嚴穀疸丸專治穀疸

苦參三兩

龍膽草一兩

牛膽一箇

右為末入牛膽汁加少蜜為丸空心薑湯或甘草湯下

葛根湯治酒疸

葛根一兩

枳實炒

山梔

豆豉各一兩

甘草各半兩

白水煎不拘時溫服

外治黃疸以柳枝入水濃煎汁服之

經患五色急黃以水調山豆根末二錢空心服之

運氣

運氣黃疸皆屬濕熱經云少陰司天之政四之氣溽暑至民病黃疸又云厥陰司天之政四之氣溽暑濕熱相薄民病黃疸而為臍腫是也

雜方

羅啗鼻瓜蒂散治黃疸渾身如金色累效

瓜蒂錢二

母丁香錢一

黍米四十粒

赤小豆五分

右為細末每夜臨臥時先含水一口却於兩鼻孔啗上半字便睡至明日取下黃水便服黃連散病輕者五日效重者半月效黃連散方見前大小閉條

聖治遍身如金色用瓜蒂四十九箇須是六月六日收者丁香四十九粒入甘鍋內燒烟盡為度研細小兒用半字

吹鼻及揩牙大人用一字吹鼻內立瘥

類要治黃疸用苦葫蘆瓢如大棗許四枚以童便浸三兩

食頃取兩棗許分納兩鼻中黃水自出效令病人吸之

又方治黃疸身眼皆如金色修合不可令婦人雞犬見之

取東引桃枝一握細切用水二鍾煎至半空心服服後三

五日其黃離離如薄雲漸散唯眼最後瘥百日方平復身

黃漸散後可時飲清酒一盞使眼中黃易散忌食熱麪猪

魚等物

針灸

針灸黃疸有二法

其一取脾經云脾足太陰之脈所生病者黃疸視盛虛熱

寒取之

其二取腎經云腎足少陰之脈所生病者黃疸視盛虛熱

寒取之

五黃疸 腕骨三分灸 中腕補

集黃疸 發虛傷寒飲食過多

腕骨一分 湧泉三分 百勞 三里 中腕 膏肓

甲黃瘰 善欠脇下滿欲吐脾俞主之千金云身重不可動 消渴身

熱面赤黃意舍主之 消渴黃瘰足一寒一熱舌縱煩滿

然谷主之 消瘰善喘氣走咽喉不能言手足清溺黃大

便難噎中腫痛唾血口中熱唾如膠太谿主之 黃疸熱

中善渴太衝主之 身黃時有微熱不嗜食膝內內踝前

痛少氣身重中封主之 黃瘰身黃勞宮主之 嗜臥四

肢不欲動搖身黃灸手五里左取右右取左 黃瘰刺脊

中千金云腹滿不能食

素目黃者曰瘰 溺黃赤安臥者亦名黃疸

靈身痛而色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也論疾疹尺篇

診

細脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃 腹脹滿面痿黃

躁不得睡屬黃家 跌陽脈緊而數數則為熱熱則消穀

緊則為寒食即為滿尺脈浮為傷腎 跌陽脈緊為傷脾

寒熱相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便

不通陰被其寒熱流膀胱身體俱黃名曰穀疸 陽明病

脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便又難此欲作穀疸

雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也 心中懊憹而熱

不能食時欲吐名曰酒疸 病酒黃疸必小便不利其候

心中熱足下熱是其症也

脈酒疸黃色心下結熱而煩

仲額上黑微汗出手足中熱薄暮則發膀胱急小便自利

名曰女勞疸腹如水狀不治治見黑疸 黃疸之病當以十八

日為期治之十日已上宜瘥反劇為難治 疸而渴者難

治疸而不渴者可治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱

脈凡黃家候其寸口脈近掌無脈口鼻冷並不可治
產後發黃

丹治一婦人四月內產發黃四肢倦怠食少經事不來時發熱脈弦

白朮兩一 人參 秦艽 丹皮

生地 木通 柴胡 芍藥各半兩

川芎 黃芩 乾葛各一錢 甘草

分十二貼水煎食前熱服

食勞疴黃

一名黃胖夫黃疸者暴病也故仲景以十八日為期食勞黃者宿病也至有久不愈者故宜另立篇門

瀉肝補脾

血虛

丹大温中丸治黃胖朱牛生脾胃

香附一斤童便浸去夏 甘草二兩 針砂炒紅醋

芍藥五兩 陳皮二兩 山查五兩 蒼朮五兩 厚朴薑製炒

白朮 茯苓各三兩 青皮六兩 蒼朮五兩 厚朴黑五兩

俱為細末醋糊丸如桐子面黑筋骨露氣實者米飲下

五六十九面肥白與氣虛羸弱者白朮湯下三四十九

忌一切生冷油膩鷄鵝羊鴨生硬併糍粽難化之物服

過七日後便覺手掌心涼口唇內有紅暈起調理半月

愈

丈夫黃脾胃有宿積口淡脚瘦氣急

針砂淘炒淨醋煨 蒼朮 香附

三稜各一兩 陳皮 黃連 茱萸

人參各半 茯苓七錢

右為末神麩醋糊丸每服五十九若飽入保和十九白湯下

又小温中丸治黃胖宜草野貧賤人服蓋其飲食無積但補陰燥濕而已

針砂一斤以醋炒為末入糯米炒極黃為末亦用一斤醋糊丸如桐子大每米飲下四五十九忌口同上輕者服五兩重者不過七兩愈

六十嫂面黃口苦而渴此食積生濕熱

白朮一錢 連翹一錢 羌活 通草

煎熟吞下穀疸丸保和丸各四十粒阿魏丸五粒

煖中丸治黃胖殺肝邪舒脾氣虛者不宜用

陳皮 蒼朮 厚朴製 三稜

白朮 青皮各五錢 香附一斤 甘草二兩

針砂十兩醋炒紅

右為末醋糊丸空心鹽薑湯下五十九晚食前酒下亦可忌狗肉

右五方附朴查青稜蓬以磨積針砂酸醋以瀉肝白朮蒼朮以補脾重可去怯之劑唯温中丸無補性虛者勿用

世治黃胖綠礬六兩用米醋於鐵鍋內煮七次以乾為度置地上出火氣為末南星末一兩炒麩一兩大皂角二斤水煮熟揉出膿膠去皮查濾過再熬入東子六兩蒸熟去皮核煎成濃膏搗勻和前藥末為丸如桐子大每服五丸早晚用薑湯各一服忌油膩煎燂如身上發紅斑時急煎棗湯服之斑自愈

本治男婦患食勞氣勞遍身黃腫欲變成水及久患瘰癧

小腸膀胱面目忽黃宜服紫金丹

膽礬三錢

黃蠟二兩

大棗五十枚

右以砂鍋或銀石器內用好醋三升先下礬蜜慢火熬半日取出棗去皮核次下蠟再慢火熬一二時如膏好入蠟茶二兩同和丸如桐子大每服二三十丸茶酒任下如久患腸風痔漏陳米飲下日三服一日見效宗室趙彥材下血面如蠟不進食蓋酒病也授此方服之終劑血止面鮮潤食亦倍常新安一士人亦如是與三百粒作一服立愈

羅棗礬丸治食勞黃目黃身黃

皂礬

不拘多少置砂鍋內燒通赤用米醋點之燒用木炭

右為末棗肉丸每服二三十丸食後薑湯下一方用白礬不用皂

世棗礬丸治黃胖

皂礬

五兩煨

棗肉

二兩

蒸粉

三兩

右為末生薑汁丸每服二三十丸一日二次米飲下食前

右三方礬醋之酸以瀉肝棗肉之甘以補脾若虛黃於前疸閉小便自利自汗虛勞疸條下諸方選用之

虛實

四婦人年三十面黃脚瘦弱口苦喜茶月經不勻且多倦

怠

黃芪三分

白朮一分

炒栢二分

秦芫二分

甘草三分

木通五分

陳皮五分

芍藥

人參各一錢

當歸一錢

一婦年六十面黃倦甚足瘦口苦脈散而大此濕傷氣也

白朮兩半

陳皮四錢

蒼朮

木通

黃芩各一錢

砂仁

人參

川芎各二錢

黃栢炒一錢 甘草炙五分

分六貼水煎食前服

王官人痞後面黃脚瘦弱倦怠食飽氣急頭旋

黃芪二分 蒼木一錢 白木半錢 木通二分

甘草炙二分 黃栢炒三分 厚朴錢一 陳皮錢一

水煎服

成康五官面黃脚瘦無力食不化脈虛而少弦口苦肚脹宜補之

蒼木半錢 木通三分 白木一錢 當歸五分

芍藥 陳皮各五分 甘草炙二分 川芎五分

人參三分 水煎下保和丸四十九

經治食氣遍身黃胖氣喘食不進心胸渴悶用不蛙皂角去皮及子塗好醋炙令焦為末一錢巴荳七粒去油膜二

件以淡醋研好墨為丸如麻子大每服三九食後陳皮湯下日三服隔一日增一九以利為度常服消酒食

子和一男子作贅偶病疽善食而瘦四肢不舉面黃無力其婦翁欲棄之其女不肯婦翁乃農夫招壻意欲作勞見其病甚每日詬辱之人教之餌蠟礬丸三稜丸俱不效戴人見之不眵而瘵使服涌劑去積痰宿水一斗又以泄水丸通經散下四五十行不止戴人命飲冰水一盞立止次服平胃散間服檳榔丸五十粒七日黃退力生蓋黃疽之症濕熱與宿穀故也俗謂之食勞黃

世喜喫乾茶

石膏 白芍藥 黃芩

水煎服更於積塊門茶瘰條相參用之

山酒麪黃用絲瓜連皮子燒灰因麪得病麪湯調下因酒

得病酒調下

黃汗

黃汗汗出染衣黃如栢汁是也

虛

仲問曰黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如栢汁脈沉何從得之師曰以汗出時入水中浴水從汗孔入得之宜芪桂酒湯主之

黃芪

白芍藥各五兩桂枝三兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升

初發當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒

阻故也

一方用好酒代苦酒

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮盜汗出者此勞氣也若汗出已反熱者久久其身必甲錯若發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久

診

久身必潤又胸前痛腰上有汗腰下無汗腰臑弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利者此為黃汗桂枝加黃芪湯主之方見本門表疽下
脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強則為隱疹身體為痒痒為泄風久為痲癩氣強則為水難以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此為風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗

目黃

經云目黃者曰黃疸然亦有目黃而身不黃者故宜另立篇門

風

風氣自陽明入胃循脈而上至目眚其人肥風氣不得外洩則為熱中而目黃全文見諸風條

青龍散治風氣傳化腹內疼結而目黃風氣不得泄為

熱中煩渴引飲

地黃

威靈仙

防風

荊芥穗

何首烏

去黑皮米泔浸一宿竹刀切各二兩

右為末每日三服食後沸湯調下一錢

類治黃疸目黃不除用瓜丁為細末如葶大納鼻中令病人鼻吸取鼻中黃水出愈

針灸

針灸目黃有五法

其一取心經云心少陰之脈所生病者目黃脇痛云

其二取心主經云心主手厥陰之脈是動則病面赤目黃

云

其三取小腸經云小腸手太陽之脈所生病者耳聾面黃

云

其四取大腸經云大腸手陽明之脈所生病者目黃口乾

云

其五取膀胱經云膀胱足太陽之脈所生病者目黃淚出

云

黑疸

黃疸久久變為黑疸身黃額黑或身面俱黃是也若身不

黃口面黑於章門主之針灸經云神門亦治疸

仰酒疸下之久久變為黑疸目青面黑心中如噉蒜齏狀

大便正黑皮膚爪之不仁其脈微弱雖黑微黃故知之

女勞疸

黃家日晡時發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急少腹

滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大

便黑或時溇此女勞之病非水也腹滿者難治硝石散主之

硝石

礬石燒各等分

診

右為細末勻和以大麥麩粥調服方寸七日三服病隨
大小便下小便去黃大便去黑是其候也

聖治黑疸多死宜急治用土瓜根一斤搗碎絞汁六合頓
服當有黃水隨小便出更服之

面瘡然浮腫脊痛不能正立其色焔黑多汗惡風者屬風
治見諸
風門

醫學綱目卷之二十二

脾胃部

腹痛 胎前腹痛 產後腹痛 腸鳴

丹腹痛 有寒 積熱 死血 食積 濕痰

大法

垣夫心胃痛及腹中諸痛皆因勞力過甚飲食失節中氣不足寒邪乘虛而入客之故卒然而作大痛經言得炁則止炁者熱也以熱治寒治之正也然腹痛有部分臟腑有高下治之者亦宜分之如厥心痛者乃寒邪客於心胞絡也前人以良薑菖蒲大辛熱之味末之酒調服其痛立止此直折之耳真心痛者寒邪傷其君也手足青至節甚則旦發夕死夕發旦死中脘痛者太陰也理中建中草薏菑丸之類主之臍腹痛者少陰也四逆薑附禦寒湯之類主之少腹痛者厥陰也正陽散回陽丹當歸四逆湯之類主之雜症而痛者苦練湯酒煮當歸丸丁香練實丸之類主

之是隨高下治之也更循各臟部分穴俞而灸刺之如厥心痛者痛如針刺其心甚者脾之痛也取之然谷太溪餘臟皆然如腹中不和而痛者以甘草芍藥湯主之如傷寒候下傳太陰腹滿而痛者桂枝加芍藥湯主之痛甚者桂枝加大黃湯主之夏月肌熱惡熱脉洪疾而痛者黃芩芍藥湯主之又有諸虫痛者如心腹懊懣作痛聚往來上下行痛有休止腹熱善渴涎出面色乍青乍白乍赤嘔吐水者虬咬也以手緊按而堅持之無令得脫以鍼刺之久持之虫不動乃出鍼也或局方化虫丸及諸虫之藥量虛實用之不可一例治也

寒
海秋腹痛肌寒惡寒脉沉微足太陰足少陰主之桂枝芍藥湯 中脘痛太陰也理中建中黃芪湯之類 臍腹痛少陰也四逆真武附子湯之類 小腹痛厥陰也重則正

陽散回陽丹之類輕則當歸四逆湯之類太陰傳少陰加甚者當變下利而止

中脘痛
屬太陰

仲虛勞裏急腹中痛小建中湯主之

方見傷寒

羅肝勝乘脾○真定路總管劉仲美年踰六旬有脾胃虛熱之証至元辛巳閏八月初天氣陰寒因官事勞役渴而飲冷夜半自利兩行平旦予診視其脉弦細而微四肢冷手心寒唇舌皆青褐色腹中微痛氣短而不思飲食予思內經云色青者肝也肝屬木唇者脾也脾屬土木尅土故色見於唇難經亦云見肝之病則知肝當傳之於脾故先實其脾氣令脾不受肝之邪也潔古先師云假令五臟各行已勝侮所不勝當重實不勝微瀉其勝以黃芪建中加芍藥附子湯主之且芍藥味酸瀉其肝木微瀉其勝黃芪甘草甘溫補實脾土皆重實其勝桂附辛熱治其寒水又

助陽退陰飴糖甘溫補脾之不足肝苦急急食甘以緩之
生姜大棗辛甘大溫生發脾胃升騰其氣行其榮衛能緩
其急每服一兩依法煎服再服而愈黃芪建中湯倍芍藥
量虛實加附子本方見治
虛實法

仲理中湯方見傷寒
少陰病

垣草荳蔻丸治脾胃虛而心火乘之不能滋榮上焦元氣
遇冬腎與膀胱之寒水旺時子能令母實致肺金大腸相
輔而來尅心乘脾胃此大復其讐也經曰大勝必大復故
皮毛血脉分肉之間元氣已絕於外又大寒大燥二氣併
乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引胃中而痛鼻息不通
不聞香臭額寒腦痛目時眩目不欲開腹中爲寒水反乘
痰唾涎沫食入反出腹中常痛及心胃痛脇下急縮有時
而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕或腸鳴此脾

胃虛之極也曾中氣亂心煩不安而爲霍亂之漸膈咽不
通噎塞極則有聲喘喝閉塞或日陽中或煖房內稍緩口
吸風寒則復作四肢厥冷身體沉重不能轉側不可回顧
小便溲而時燥此藥主秋冬寒涼大復氣之藥也

草荳蔻仁一錢四分
麩去皮

吳茱萸八分湯
洗焙乾

益智仁八分

白姜錢一 甘草分六

桃仁去皮尖
七分

澤瀉一分
數減半

黃芪分八

半夏一錢湯
泡七分

麥蘖一錢
半炒

神麴分四

姜黃分四

當歸身分六

柴胡分四

右件十七味同爲細末桃仁另研如泥再入一處研勻
湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三五丸白湯送下旋
斟酌多少

神聖復氣湯治復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水之旺

子能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背胷膈
 閉塞痛疼善噎口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或有息
 肉不聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如水頭作陣痛目
 中流火視物眈眈耳鳴耳聾項并口鼻或惡風寒喜日陽
 夜臥不安常覺痰塞膈咽不通口無滋味兩脇縮急而痛
 牙齒動搖不能嚼物腰臍間及尻髻膝足寒冷陰汗前陰
 冷行步欹側起居艱難掌中寒風痺麻木小便數而晝多
 夜頻而少氣短喘喝少氣不足以息卒遺矢無度婦人白
 帶陰戶中大痛牽心而痛鰓黑失色男子控辜牽心陰陰
 而痛面如赭色食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急而
 腹皮色白後出餘氣腹不能努或腸鳴膝下筋急肩胛大
 痛此皆寒水來復火土之讐也

乾姜炮三分

人參五分

半夏湯泡七分

柴胡錢一

藁本八分

防風五分

羌活錢一

甘草八分

升麻七分

白葵花五朶

歸身六分

黑附子三分

炮法

皮

桃仁湯浸去皮五分

郁李仁湯浸去皮五分

右作一服水五盞煎至二盞入

黃芪錢一

草薺錢一

錢一 錢麵煨 去皮稱

陳皮五分

右件入在內再煎至一盞再入下項藥

黃柏酒浸五分

黃連酒浸三分

枳殼三分

生地酒洗三分

已上四味預一日另用新水浸又次入

細辛二分

川芎三分

蔓荊子三分

預一日用水半大盞分作二處浸此三味并黃柏等藥

前正藥作一大盞不去查入此浸藥再上火煎至一大

盞去查稍熱服空心又能治咬頰咬唇咬舌舌根強硬

等症如神忌肉湯及食肉使不助經絡中火邪也大抵

腎併膀胱經中有寒肺氣元氣不足者皆宜服之神驗
於月生月滿時隔三五日一服如病急不拘時候
益智和中丸季秋合治心腹中大痛煩躁冷汗自出

草薹仁錢四

益智仁錢一分

砂仁錢七分

甘草錢二分

黃芪

當歸身

人參

乾姜

麥門冬

麩末

陳皮各五分

桂枝

桂花各一錢半

大麥蘖錢三分

黃連錢一分

生地錢一分

姜黃錢三分

木香錢二分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服二三十九溫
水送下細嚼亦得

溫胃湯治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

白苳薹錢三分

益智

砂仁

甘草錢二分

姜黃錢二分

陳皮錢七分

澤瀉錢三分

黃芪錢七分

乾姜錢二分

厚朴錢二分

人參錢三分

右爲細末每服三錢水一盞煎至半盞食前溫服

丹里成人年二十五歲肚痛二箇月食少面微寒

白朮

陳皮

青皮各半兩

川芎

白芍

半夏錢各三分

蒼朮

官桂

歸身尾

甘草錢一分

木通錢各一分

分七貼姜二片煎下保和丸二十粒

一老人腹痛作隔不禁下者

川芎

蒼朮

香附

白芷

茯苓

乾姜

滑石

右八方皆治中寒虛寒腹痛也

垣木桂湯治寒濕所客身體沉重胃脘痛面色痞黃

麻黃錢一分

桂枝錢五分

杏仁箇十

草薹仁

半夏

澤瀉

炒麴各五分

蒼朮三錢

陳皮一錢

白茯苓各一錢

猪苓五分

黃芪各五分

甘草二分

右咬咀水二大盞煎至一盞去查稍熱服食前

麻黃草荳蔻九季秋合治客寒犯胃心痛不可忍

麻黃去節二錢

草荳蔻

炒麴各一錢

益智八分

升麻

大麥麴

砂仁

黃芪

半夏湯泡

白朮

陳皮各五分

柴胡

甘草炙

吳茱萸

當歸身

青皮

木香

厚朴各二錢

萹澄茄

紅花

蘇木各五分

右為末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三五十九細嚼

溫水送下

厚朴湯治脾胃虛寒心腹滿及秋冬客寒犯胃時作疼痛

厚朴姜製

陳皮去白二兩

甘草炙

乾姜各五錢

茯苓去皮一兩

戊火已衰不能運化又加客氣聚為滿痛散以辛熱佐

以苦甘溫以淡泄之扶持胃氣以期平也

羅高良姜湯治心腹絞痛如刺兩脇支滿不可忍

高良姜五錢

厚朴姜製

當歸炒

桂心各二錢

右咬咀以水一升煮取四合分二服若一服痛止便停

不須更服若強人分二服劣人分三服增損之

本治心脾痛神効荔枝核為末每服一錢熱醋湯調下

仲四逆湯 真武湯 附子湯已上三方並見傷寒

腹中寒氣雷鳴切痛胃膈逆滿嘔吐附子粳米湯主之

附子一箇

半夏五分

甘草半兩

大棗十箇

臍腹痛
屬少陰

粳米升半

右五味以水八升煮米熟用湯或去查温服一升日三服

羅益智散治傷寒陰盛心腹痞滿嘔逆瀉利手足厥逆及一切冷氣攻心脇臍腹脹滿絞痛

川烏炮去皮臍四兩 益智皮去 乾姜炮 青皮去白各一兩

右為細末每服三錢水二盞生姜三片棗二枚劈破同煎至八分去查温服食前

本又方治胸滿氣噫下部冷臍腹疝痛

半夏二兩制 生姜六兩 陳皮四兩去白 桂一兩

吳茱萸五十粒湯洗泡

右㕮咀用水十升煮取四升分五服冷再服空心食前服 予少年時曾患臍疝腹痛初不疑其虛遍服諸家

藥無効遂自診之覺是虛症合此藥一劑服未至半劑頓愈

少腹痛屬厥陰 海正陽散 回陽丹 當歸四逆湯已上三方方見傷寒

羅葱熨治驗 內經云寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣而不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣又寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也諸寒作痛得炅則痛立止真定一秀士年三十一肌體本弱左脇下有積氣不敢食冷物覺寒則痛或嘔吐清水眩運欲倒目不敢開惡人煩冗靜臥一二日及服辛熱之藥則病退延至至元甲戌秋初因勞役及食冷物其病大作腹痛不止冷汗自出四肢厥冷口鼻氣亦冷面色青黃不澤全不得臥扶几而坐咳嗽咽膈不利予與藥服之見藥則吐藥不得入無如之何遂以熟艾約半斤用白紙一張鋪於腹上

紙上攤艾令勻又以葱數枝批作兩半片鋪於熟艾上
再用白紙一張覆之以慢火熨斗熨之冷則易之覺腹中
熱腹皮暖不禁以帛三搭多縫帶繫之待冷方解初熨時
得暖則痛減大暖則痛止至夜得睡翌日再與對証藥服
之良愈故立此熨法以救將來之痛也

熱

海夏腹痛肌熱惡熱脉洪疾手太陰足陽明主之芍藥黃

芩湯治腹痛脉洪數方見下
番胃

丹婦人肚墜痛不泄脉不數

陳皮

地黃

芍藥二錢

黃芩

木通

歸尾一錢

甘草些

桃仁二十
四箇

經卒患腹痛水研山荳根汁半盞服之

五靈脂湯治中暑肚腹疼不已

五靈脂

香附各等分

右為末白湯調服

虛

腹痛或大便利或用手重按痛處不痛者為虛治法並於
寒條選用之或無寒者如左方

芍藥甘草湯芍藥甘草治腹痛稼穡作甘甘者已也曲直
作酸酸者甲也甲已化土此仲景妙方也

芍藥二兩

甘草一兩

右哎咀每服五錢水煎服海藏云白收而赤散也酸以
收之甘以緩之

海肚腹痛者芍藥甘草湯主之

弦 傷氣 芍藥

洪 傷金 黃芩 加棗

脉緩 傷水 加桂枝 生姜

澁 傷血 當歸

遲 傷火 乾姜

丹婦人痢後血少腹痛

白芍藥二錢

歸身尾半錢

陳皮二錢

川芎五分

調服六一散

實仲痛而秘者厚朴三物湯主之

厚朴兩

大黃兩

枳實五箇

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取二升溫服一升以利為度

丹一男子年十八歲自小面帶微黃五月間腹大痛醫者與小建中湯加丁香兩貼不効加嘔吐清汁又與十八味丁沉透膈湯兩貼食全不進痛無休止臥不能起如此五六日又與阿魏丸百餘粒至夜發躁不得睡口却不渴予脉之左三部沉弦而數關部尤甚右三部沉滑而數實痛處不可按遂與大柴胡湯四貼加甘草下之痛嘔雖減食

猶未進遂與小柴胡湯去黃芩人參加芍藥陳皮黃連生甘草二十貼而愈 白雲許先生始因飲食作疼感脾疼後累因觸冒風雪腿骨作疼舉皆以脾疼骨疼為寒雜進黃牙瀝丹等藥雜治十餘年間艾灸數萬計或似有効及至病再作反覺加重至五十一歲時又冒雪乘船而病愈加至坐則不能起扶起亦不能行兩膝骨不能開合若脾疼作時則兩膝骨痛處似覺稍輕若飲食甘美脾疼不作則膝骨重痛增諸老袖手計無所出予謂此初因中脘有食積痰雜以胃寒濕抑遏經絡血氣津液不行痰飲注入骨節往來如潮其湧而上則為脾疼降而下則為膝痛非湧泄之法不足以治之時七月二十四日遂以甘遂末一錢入猪腰子內煨與食之連瀉七行至次日兩足便能行步至八月初三日嘔吐大作不能起牀顆粒不食但時煩

躁氣弱不能言語諸老皆歸罪於七月之瀉而又知累年
熱補之悞皆不敢用藥予嘗記金匱云病人無寒熱而短
氣不足以息者此實也其病多年鬱結一旦以刀圭之劑
泄之徒動猖狂之勢他未有制禦之藥所以如此仍以吐
劑達其上焦以次第治及中下二焦於初三日用瓜蒂吐
不透初六日用梔子又吐不透初九日用附子尖三枚和
漿水與之始得大吐其嘔噦終止前後所吐共得膏痰沫
液一大水桶初十日遂以朴硝滑石黃芩石膏連翹等涼
藥咬咀一斤蒸煎濃汁放井水中極冷飲之十一月十二
日十三日十四日每日食上件藥一斤十五日腹微滿大
小便皆秘悶予欲用大承氣下之諸老皆以爲不可十六
日六脉皆歇至予診其脉獨歇至卯酉二時其餘時刻平
勻如舊予曰卯酉爲手足陰陽之應此大腸與胃有積滯

不行所致當速瀉之爭論不已至十八日遂作紫雪半斤
十九日早紫雪成每用一匙頭以新汲井水化下至二十
日天未明已服紫雪五兩神思稍安腹滿亦減遂收起紫
雪不與二十一日大爲小便閉作痛所苦遂飲以蘿蔔子
汁半茶鍾隨手痛止小便立通廿二日小腹滿痛不可捫
摸神思不佳遂以大黃牽牛作丸服至三百丸至二十三
日巳時下大便併通如爛魚腸三碗許臭惡可畏是日神
思稍安診其脉不歇至矣二十四日腹大絞痛殆不能勝
者約一時許腰膂沉重且墜兩時不出聲不能言瀉下穢
物如柏油條者一尺餘肚中如燒片時方定至廿五日神
思漸安夜間得睡廿六日漸能出聲言語自初二日至此
並顆粒不曾入口語言並不出聲至廿七日方啜半盞稀
粥者四次似有生意至次月初四日方平安其脉自嘔吐

至病安日皆是平常弦大之脉唯有中間數日歇至少異耳至次年四月復行倒倉法方步履如初

腸癰亦腹痛但小便數似淋脉滑數為異耳治法見腸

腹脹短氣收之

肘治小腹俱脹痛短氣欲死或已絕用烏梅二七枚水五升煮一沸內大錢二七枚煮取二升半強人可頓服瘦人可分之再服

汚血散之

海當歸丸治三陰受邪於心臍少三腹疼痛氣風等症

四物湯各半兩 防風 獨活 全蝎各五分

續斷一兩 苦棟 玄胡各七錢 木香

丁香各二錢半 茴香一兩

右為細末酒糊丸桐子大空心温酒下三五十九大効

四物苦練湯

四物湯四兩 玄胡索 苦練各一兩

雲治腹中攪痛不可忍

玄胡索 當歸 白芍 川芎

乾姜各等分

右為末每服三錢温酒調下

又法治証同前

玄胡索 桂心各半兩 當歸一兩

右為細末熱酒調下

失笑散治心腹痛欲死百藥不効服此頓愈方見心痛

經治脾寒氣發歇痛不可忍者茺萸一兩桃仁一兩和炒

令茺萸焦黑後去茺萸取桃仁去皮尖研細葱白三莖煨

熟以酒浸温分三服

腹痛脈滑者痰脈弦者食

濕痰 清痰多作腹痛

白芷 蒼朮 香附

積 右為末生姜自然汁調入熱湯服之
溫中丸治食積肚痛

白朮 香附童便 針砂各四兩醋

山查肉 神麴各八 苦參一兩 川芎半兩春

吳茱萸 半兩湯浸冬 用春去之 蒼朮米泔浸一宿 二兩五錢

右為末醋調麵糊為丸如桐子大一方去山查神麴川

芎加半夏青皮黃連

世大蒼丸治失饑傷飽肚痛不食

蒼朮 炒 橘紅等分 為末

右生姜汁打炒神麴糊丸如桐子大每七十九米飲下

丹酒積腹痛用三稜蓬莪朮香附官桂蒼朮厚朴陳皮

甘草茯苓木香檳榔治之

楊淳三哥年六十食積痰作痛在心頭或在腹脇脈皆弦
瀦食甚少大便秘實此濕積也宜生血行氣進食磨積補
虛

白朮 炒麴 半夏各一 郁李仁

歸身尾 芍藥 陳皮各五 山查五

川芎 錢三 人參二 柴胡二 紅花五

桃仁 三箇

細末粥丸一日三次食前白湯下四五十丸

氣 羅七氣湯治虛冷上氣及寒氣怒氣思氣喜氣憂氣愁氣

內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止發即

欲死此藥主之

半夏 湯洗 五兩 人參去 甘草炙 肉桂各一

右為粗末入半夏令勻每服二錢水一大盞生姜三片

重

煎七分去查稍熱服食前
腹痛有作止者有塊耕起往來者吐清水者皆是虫痛治
法見心痛

井窈渠吳孺人年近四十得腹隱痛常以火燒磚瓦熨之
面與胃襟間惡火之熱氣發時少煩食亦減六脈和皆微
弦最苦夜間不得睡但世上凶惡之事并憂苦境像皆上
念時作惡泣說離別囑付後事如此者一年衆作心痛治
之自覺氣自下衝上雖久病人却不瘦予曰此肝受病遂
與防風通聖散吐之時尚春寒於通聖中加桂入姜汁調
之日三四次至初夏稍熱與當歸龍膽丸枳朮丸一月而
愈

運氣

運氣腹痛有二
一曰土盛攻腎而痛經云歲土太過雨濕流行腎水受邪

雜方

民病腹痛清厥意不樂是也

二曰火鬱之發痛經云火鬱之發民病腹中暴痛是也

世鹽炒熱用布裹熨痛處神効

丹攪腸沙用台芎爲末每一錢許入生姜自然汁半盞熱

湯內調服 又方樟木煎湯大吐之或用白礬末一錢清

湯調服探吐之或鹽湯探吐之亦可

世治發沙面青肚疼昏倒不省人事急以鼠屎一合研爲

細末滾湯調令通口澄清服之一服而安神効宜預收下

針灸

刺灸腹痛有四法
其一取脾胃經云邪在脾胃陽氣不足陰氣有餘則寒中

腸鳴腹痛皆調于三里又云足太陰之别名曰公孫去本

節之後一寸實則腹中切痛取之所別也又云腹痛刺臍

左右動脈已刺按之立已不已刺氣衝已刺按之立已

也

其二取大腸經云大腸病者腸中切痛而鳴濯濯感于寒
即泄當臍而痛取巨虛上廉是也

其三取督脈經云腎虛則胃中痛大腹小腹清厥意不
樂取其經少陰太陽血者是也

其四取任脈經曰任脈之別名曰尾翳下鳩尾散于腹實
則腹皮痛取之所別也

世治絞腸沙症手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫水於
病者膝灣內拍打有紫黑處以針刺去惡血即愈

玉腹痛并治氣塊 內關 支溝 照海

撮氣痛并治積痛食不化 氣海一寸半灸 五十壯 中腕二寸 半灸

十壯 隱白二分瀉之 久七壯

桑又法 巨闕 足三間 怪穴腹痛腸鳴 氣衝在海旁

各一寸半針入二寸半灸五十壯

世臍腹痛 陰陵泉 太衝 三里 支溝不巳取 下穴 中

腕 關元 天樞 繞臍痛 公孫 三陰交 陰谷

東胃腕暴痛臍中堅痛 石門 商丘 陰谷 大腸俞

膈俞

甲腹中寒疼外陵主之 大腸寒中千金作 寒疝 大便乾腹中

切痛者盲輸主之 繞臍痛搶心膝寒注利腹結主之

仲夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必

衝不衝者心下則痞也

脈若腹痛脈反浮大而長者死虫痛脈浮 大無妨

心腹痛痛不得息脈細小遲者生堅大疾者死有積脈堅 大無妨

胎前腹痛

仲婦人懷胎腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

虛

診

當歸三兩

芍藥一斤

茯苓四兩

白朮兩

澤瀉半斤

芎藭半斤

一作三兩

右六味杵為散取方寸匕酒和三日服

潔地黃當歸湯治婦人有孕胎痛

當歸兩

熟地兩

右為末作一服水三升煎至一升半去查頓服之

仲婦人腹中痛小建中湯主之方見虛勞

雲芎歸湯治妊娠先患冷氣忽心腹痛如刀刺

川芎

人參

茯苓

桔梗

吳茱萸

當歸各一兩

厚朴制

芍藥各二兩

右咬咀以水九升煎取三升分三服氣下即安

丹孫院君因近喪冒惡氣傷胎肚痛手不可近發熱口中

不思食須安胎散滯氣

熱

寒

青皮三錢

黃芩

芍藥各二錢

歸尾一錢

川芎一錢

木香五分

甘草少

分二貼水三盞先煎芎根二大片至三盞去芎根入前

藥同煎至一盞熱服

大治妊娠腹痛用生地黃三斤搗汁酒一升合煎減半頓

服愈

診

脉師曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死令人摸之如覆杯者則男如肘頸參差起者女也冷在何

面冷者為死温者為生

產後腹痛

敗血挾寒

大黑神散治產後惡露不盡心胃痞滿臍腹撮痛汚血諸

疾方見婦人產後

挾熱

丹產後三日血塊痛發熱

五靈脂炒

零

牡丹皮

沒藥

滑石

右研細分五貼豆淋酒下之食前

拔虛

馮宅產後發熱腹中痛有塊自汗惡寒會服黑神散

白朮

芍藥三錢

滑石五錢

黃芩二錢

牡丹皮二錢

半

人參

川芎

歸尾

陳皮

荊芥各一錢

乾姜一錢

甘草些

之汚血清

雲捲荷散治產後血上衝心血刺血暈腹痛惡露不快

初出捲荷

紅花

當歸各二兩

蒲黃炒

牡丹皮

各半兩

右爲細末每服三錢空心溫酒調下一碗或用童便調

下妙

大治血瘕痛無定處

童便三升

生地汁

生藕汁各一升

生姜汁二升

右先煎三味約三分減二次下姜汁慢火煎如稀錫每

取一合溫酒調下

治兒枕痛乃血瘕也用真蒲黃研細調服二錢如燥渴者

用新汲水調下

重劑

丹治產後兒枕大痛黑白散

烏金石

醋煨七次另研

寒水石

煨存性爲末

右各收之服時各抄一錢半米飲調下痛止勿服未止

再服

輕劑

海四物加玄胡沒藥白芷湯治產後敗血作痛方見婦人門

四物苦棟湯方見腹痛

一方治臍下痛不可忍四物湯加玄

胡索二錢半服之

大紫金丸治產後臍下痛卽失笑散醋爲丸是也五靈脂

分醋丸服

立効散治產枕痛不可忍用五靈脂慢火炒令乾為末二錢温酒下立瘥產枕即血枕也

丹產後惡露未盡小腹作痛

五靈脂 香附末

右合和醋為丸甚者入留尖桃仁一方加粉

大治產後血不盡血痛悶方取敗荷葉燒作灰暖水和服

酒調服二錢 又方取亂髮如雞子大灰汁洗淨燒為末

錘煨令通赤焯酒中候温飲之丹溪法用焯醋中使鼻聞其氣妙

喉劑

仲產婦脇痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中

有乾血着臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

大黃二兩 桃仁二十枚 蟅虫二十箇炒去足

右三味為末煉蜜和為四丸以酒一升煎一九取八合

頓服之新血下如豚肝

雲又方療產後血結下不盡腹中絞痛不止

大黃另浸 生地 當歸各二兩半 川芎

芍藥 桂心各一兩 甘草 黃芩各二兩

桃仁四十九箇制 右切細以水七升煮取二升半大黃更煎一二沸分三

服

桂心丸治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱

四肢羸瘦頭痛

青皮 乾漆炒烟尽各七錢 沒藥 檳榔

當歸 桂心 赤芍 牡丹皮各五錢

大黃 桃仁去皮 鱉甲炙 厚朴制

三稜煨 玄胡索各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九溫酒下
保治血暈血結或聚於胃中或偏於小腹或連於脇肋四
物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭紅花玄胡各一兩同為粗
末加四物煎調沒藥散服之

蛭虫一錢去翅足炒水蛭一錢炒麝香少沒藥

右為末入前藥調服血下痛止只服一服

虛寒仲產後腹中疼痛當歸生姜羊肉湯主之方見產後血弱

衍一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不得犯此
寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血也予教之曰非
其治也可服張仲景羊肉湯少減作二服遂愈
仲內補當歸建中湯治婦人產後虛羸不足腹中刺痛不
止吸吸少氣或苦少腹中急痛引腰背不能飲食產後一
月日得服四五劑為善令人強壯

當歸兩四桂枝兩三芍藥兩六生姜兩三

甘草兩二大棗兩十二枚

右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日令盡若大
虛加飴糖六兩湯成內於火上煖令飴消若去血過多
崩傷內衄不止加地黃六兩阿膠二兩合八味湯成內
阿膠服之

雲產後六七日忽然膺腹痛皆因呼吸冷氣乘虛入客於
血分宜服當歸建中湯方見

大獨聖湯治產後腹瀉當歸為末每服二錢水一盞煎至
七分溫服

雲治產後惡物不盡腹內疼痛產後常服此妙

生地 當歸各一兩生姜九錢細切煎

右為細末姜酒調二錢服

大治產後血塊痛

熟地斤 陳生姜半

右拌勻同炒乾為末每服一錢酒調產後以烏梅湯下之

實

仲產後腹痛滿不得便以枳實芍藥散主之

枳實燒令黑勿太過

芍藥切

右二味杵為散服方寸七日三服并主癰膿以麥粥下之

產後腹痛服枳實芍藥散不愈者宜下瘀血湯主之方見條

仲產後七八日無太陽症少腹堅痛此惡露不盡不大便煩燥發熱日晡時煩燥者不食食則讞語至夜即愈宜大承湯主之熱在裏結在膀胱也大承氣湯方見傷寒

雜方

藥忌

山兒枕痛用隔年蟹壳燒灰酒下

丹局方五積散治產後餘血作痛以蒼朮為君麻黃為臣厚朴枳實為使雖有當歸芍藥之補血僅及蒼朮三分之一不思產後之婦有何寒邪血氣未充似難發汗借曰藥性溫和可以推陳致新豈可用麻黃之悍附以蒼朮枳朴之散乎虛而又虛禍不旋踵矣

針灸

產後血塊痛三陰交氣海宜灸之

腸鳴

寒熱

垣如胃寒泄瀉腸鳴於升陽除濕湯加益智仁五分半夏五分生姜棗子和煎升陽除濕湯方見泄瀉

虛實

丹腹中水鳴乃火擊動其水也二陳湯加苓連梔子腹中鳴者病本於胃也全文見水腫腸鳴多屬脾胃虛一男子腸鳴食少臍下有塊耕動若得下氣多乃已已則復鳴醫

用踈氣藥與服半年不効予用參朮爲君甘草連參枳乾姜爲臣一貼腸鳴止食進又每服吞厚朴紅苳丸其氣耕亦平經云脾胃虛則腸鳴腹滿又云中氣不足腸爲之苦鳴此之謂也

肺移寒於腎爲涌水涌水者按之腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹水漿之聲也今文見疹病傳變

河葶藶丸治涌水疾行則腹鳴如囊裹水漿之聲

葶藶隔紙炒

澤瀉

椒目

桑白皮

杏仁

猪苓

去黑皮各五錢

右爲末煉蜜丸桐子大每二十九丸葱白湯下不拘時以利爲度

運氣

運氣腸鳴有二

一曰土發經云土鬱之發腸鳴而爲數後是也

二曰熱勝經云少陰在泉熱淫所勝病腹中腸鳴氣上衝胃治以鹹寒是也

針灸

針灸腸鳴有三法

其一補脾經云脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者是也

其二補足太陽經云中氣不足腸爲之苦鳴補足外踝下留之五分申脉穴也

其三取太陽經云腸中雷鳴氣上衝胃邪在大腸刺盲之原巨虛上廉三里是也

甲腹中常鳴時上衝心灸臍下 腹中腸鳴盈盈然食不化脇痛不得臥煩熱泄糜不嗜食胃脇痞滿喘息而衝鬲嘔心痛及傷飽身黃骨瘦羸章門主之 腸鳴相逐不可傾倒承滿主之 腸鳴而痛溫留主之 飲食不下腹中

雷鳴大便不節小便赤黃陽綱主之

嘔吐膈氣總論

大法
吐分三焦

潔論曰吐有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上
通天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主
腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦
吐者皆從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪其症食已暴
吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胃而發痛其治當降氣和
中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛
其脈浮而弦其症或先痛而後吐或先吐而後痛治法當
以小毒藥去其積檳榔木香和其氣下焦吐者皆從于寒
地道也其脈大而遲其症朝食暮吐暮食朝吐小便清利
大便秘而不通治法宜毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸
通復以中焦藥和之不令大腑結閉而自安也

右潔古論三焦吐其說蓋本於黃帝所謂氣為上膈食
飲入而遲出為下膈食時乃反出之其上焦食已暴
吐者今世謂之嘔吐也中下二焦朝食暮吐暮食朝吐
者今世謂之膈氣反胃也分嘔吐膈氣為二門

嘔吐	乾嘔	惡心	嘔苦水	吐酸吞酸
嘔吐清水	嘔沫	嘔膿	嘔吐虫	吐利

關格

嘔吐
分三陽

垣夫嘔吐噦者俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為
異耳且如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血
俱病也仲景云嘔多雖有陽明症慎不可下孫真人云嘔
家多服生姜乃嘔吐之聖藥也氣逆者必散之故以生姜
為主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也
有食入則吐有食已則吐以陳皮去白主之噦者少陽也

少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以姜製半夏為主故宋奉議治嘔吐噦以生姜半夏陳皮之類是也究其三者之源皆因其脾虛弱或因寒氣客胃加之飲食所傷而致也宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生姜之類主之按噦實指吃逆今先賢誤釋為乾嘔者非也若但有內傷而有此疾宜察其虛實使內消之痰飲者必下之當分其經對證用藥不可亂也

嘔有物有聲

表實者辛瀉

仲諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之用半夏一升生姜半斤以水七升煮取一升半分溫再服

卒嘔吐心下痞腸閉有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之

半夏升

生姜斤

茯苓

三兩一法四兩

右三味以水七升煮取一升半分溫再服

陳皮湯治嘔

方見乾嘔

孫治嘔吐以白檳榔一枚煨陳皮十分炙剉為末水一盞煎半盞服之

右姜半橘治嘔吐必用之聖藥然東垣云辛藥生姜之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胃中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用辛藥瀉之

仲胃反嘔吐者大半夏湯主之

服前小半夏湯諸湯不愈者服此立愈

半夏

二升洗完用

人參

三兩

白蜜

升

右三味以水一斗三升和蜜揚之二百四十遍煮藥取三升溫服一升餘分再服

李絳療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困倦無力垂死者

胃虛者甘益

以上黨人參三大兩劈破水一大升煮取四合熱頓服
丹久病嘔者胃虛不納穀也

生薑 人參 黃芪 白朮

香附

胃虛有寒嘔吐者東垣丁香茱萸湯仲景理中湯皆益胃
推揚穀氣之劑也方見寒條

大便不通者利之

垣若陰虛邪氣逆上空塞嘔噦不足之病此地道不通也
正當用生地黃當歸桃仁紅花之類和血涼血潤血兼用

穀氣久虛者食飲和之

甘草以補其氣微加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去
則氣逆嘔噦自不見矣 復有胃中虛熱穀氣久虛發而
為嘔噦者但得五穀之陰以和之則嘔噦自止五穀皆屬陰或食或

痞者治

仲嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之方見傷寒

寒

垣加減二陳湯治痰飲為患或嘔噦惡心或頭眩心悸或
中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和並宜治之

丁香一兩 半夏五兩 陳皮五兩 茯苓二兩

甘草一兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片烏梅一箇同煎
至七分去渣熱服無時或治痰痞加草苴蔻麩裹煨熟
一兩半

藿香安胃散治脾胃虛弱不飲食嘔吐不時

藿香半錢 丁香二錢 人參二錢 橘紅五錢

右件四味為細末每服二錢水二盞生薑三片同煎至
一盞去渣服食前

垣丁香吳茱萸湯治嘔吐噦胃寒所致

丁香五分 吳茱萸 草苴蔻 人參各一錢

甘草五分 黃芩一錢 柴胡五分 升麻七分

茯苓五分 當歸半錢 蒼朮一錢 半夏五分

乾姜五分

右為細末每服半兩水二盞煎至一盞去查熱服食前

忌冷物

世藿香平胃散治嘔吐不止

藿香兩 半夏兩 陳皮去白二兩 厚朴製一兩

蒼朮三兩 甘草二兩

右為粗末每服五錢水一盞半生姜三片棗三枚同煎

去查溫服

羅紅荳丸諸藥不愈者神效方見膈氣寒條

杜安業坊有閻氏家老婦人患嘔吐請石秀才醫曰胃冷

而嘔下理中丸至百餘丸其病不愈石疑此患召杜至曰

藥病正相投何必多疑石曰何故藥相投而病不愈杜曰

寒氣甚藥力未及更進五十九丸必愈如其言果愈石於是

師法於杜

海理中湯加減例理中湯方甘草人參白朮乾姜各等分

若為寒氣濕氣所中者附子一兩名附子理中湯 若

霍亂吐瀉者加橘紅青橘皮各一兩名治中湯 若乾

霍亂心腹作痛先吃鹽湯少許頓服嘔吐出令透即進

此藥 若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩生姜

十片 若泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯 若

泄瀉不已者於補中湯內加附子一兩不喜飲食水穀

不化者再加炒砂仁一兩共成八味 若霍亂吐下心

腹作痛手足逆冷於本方中去白朮加熟附名四順湯

若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及吐

利後胸痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實茯苓各一兩名枳實理中湯 若渴者但於枳實理中湯內加瓜蒌根一兩 若霍亂後轉筋者理中湯內加石膏一兩煨 若臍下築者腎氣動也去朮加官桂一兩 腎惡燥故去朮恐作奔豚故加官桂 若悸多者加茯苓一兩 若渴欲飲水者加朮半兩 若苦寒者加乾姜五錢 若腹滿者去白朮加附子一兩 若飲酒過多及啖炙煖熱食發為鼻衄者加川芎一兩 若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉只用本方 若中附子毒者亦用此方或止用甘草生姜等分煎服或以烏頭煎湯解之

仲嘔而胃滿者吳茱萸湯主之方見傷寒吐 嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥逆者四逆湯主之方見傷寒下利

杜王普侍郎病嘔飲食皆不得進召孫數日亦不愈後復召杜杜曰治嘔愈嘔此胃風也遂用川烏一兩淨洗去皮臍不去尖以漿水一碗煮乾每箇作兩片復用漿水一碗煮盡更作四片每細嚼一片以少溫水下少頃嘔遂止痛既少息杜遂問曰尋常好吃何物曰好吃甘甜之物杜曰是甘甜乃膏粱之物積久成熱因而生風非一朝一夕之故也王服其說痛而嘔為寒經云寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔者是也

熱 丹嘔吐胃中有熱膈上有痰二陳湯加炒梔子黃連生姜主之此方累試效

仲嘔而發熱者小柴胡湯主之方見往來寒熱 紫用小柴胡湯加青黛以姜汁打糊為丸名青鎮丸治嘔

吐脈弦頭痛蓋本諸此

本治胃熱嘔以竹茹湯

乾葛錢三

甘草錢二

半夏

三錢姜汁半盞藥木一升煮耗半

右末每服五錢水一盞姜三片竹茹一彈大棗一枚同

煎至一盞去渣溫服

有熱者手足心熱政和年有京人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃腕孫兆竹茹湯正相當爾治藥與之即時愈良方中槐花散亦相應

定嘔吐利膈枇杷散

枇杷葉

去毛味苦平下氣

人參

各一

茯苓錢五

茅根

兩二 半夏錢一

右細剉每服四錢水一盞半生姜七片慢火煎至七分

去渣入楨榔末五分和勻服之

仲嘔吐而病在膈上後思水解急與之思水者猪苓散主之

猪苓

茯苓

白朮

各等分

右三味杵為散飲服方寸七日三服

仲景云嘔吐思水解者急與之予長男每嘔水三二碗諸藥不効但吃井花水一口即住用白朮茯苓湯服愈信知先賢不誣也

本治卒嘔吐不止不欲食煮枇杷葉汁飲之止渴偏理嘔

丹婦人月經時口渴吃水多心痞善嘔不食

白朮

錢二 陳皮

錢二 山梔

炒 木通

黃芩

各一 炙甘

錢三

汚血

分二貼水二盞煎小盞入姜汁熱飲之
本治產後嘔不止者香靈丸

丁香

辰砂

另研各六分

五靈脂

錢一

右香脂先研末後入砂再研勻用狗膽或猪膽丸如雞頭大每服一丸生姜陳皮湯磨下

臟腑

諸痿喘嘔皆屬於上

全文見診

素太陰所謂食則嘔者物盛滿而上溢故嘔味解篇

辛散

辛散逆氣諸方用姜半橘之類

並見上壅條

苦泄

廣治嘔逆不能食訶黎勒皮二兩去核搗為末煉蜜和丸

梔子大空心服二十九日二服

酸收

食木瓜主嘔哕風氣又吐而轉筋煮木瓜汁飲之甚良

吐脚氣

世若病人直患嘔吐而復脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之

運氣嘔吐有四

一曰火熱經云少陰司天熱氣下臨嘔逆躁煩又云少陽所至為嘔涌又云少陽之復嘔逆又云火鬱之發嘔逆治以鹹寒甘寒是也

二曰風經云厥陰在泉風淫所勝病食則嘔又云厥陰司天風淫所勝食則嘔又云厥陰之勝甚則嘔又云厥陰之復嘔吐飲食不入入而復出甚則入脾食痺而吐治以辛涼甘清酸清是也

三曰風火經云少陽司天之政風熱參布民病嘔吐二之氣病熱鬱於上欬逆嘔吐三之氣民病嘔又云太陽司天之政初之氣病見熱頭痛嘔吐治以酸寒辛寒鹹寒是也四曰濕經云陽明司天之政初之氣其病嘔又云土鬱之發甚則心痛脚腫嘔吐是也

針灸

鍼灸嘔吐取法有二

其一取脾經云脾足太陰之脈是動則病食則嘔視盛虛熱寒陷下取之也

其二取肝經云肝足厥陰之脈所生病者胃滿嘔逆視盛虛熱寒陷下取之也

繫嘔盛無度并乾嘔 太陵 間使

扁嘔逆 中腕 尺澤

摘胃中痰飲霍亂驚悸腹脹暴痛恍惚吐逆不食 巨闕

六分三里愈

診 肝脉緩為善嘔全文見診虛實法

禁忌

垣孫真人言生姜為嘔家聖藥調上焦氣壅表實之病而言非以瀉氣而言之也若脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流是中氣不利清氣津液不上胃中閉塞氣道不開亦令人

噦惟宜益胃推揚穀氣而已勿作外實以辛藥生姜之類瀉其壅滯及妄以瀉氣瀉血藥下之則轉增閉塞疼痛或變作結胸復下其膈由此致危者多矣蓋氣已虛而反瀉之是重瀉其氣必胸中如刀削之痛與正結胃無異可不慎哉

丹嘔吐煎藥忌瓜萋杏仁桃仁蘿蔔子山梔皆要作吐丸藥中帶香藥行散不妨 注船大吐渴飲水者即死童便最好

吐有物無声

上焦熱

潔治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先降氣和中 桔梗湯

桔梗半兩

白朮半兩

半夏二兩

陳皮法

枳實炒

茯苓

厚朴各一兩

右粗末每服一兩水一盞煎至七分取清溫調木香散二錢隔夜空腹服之三服後氣漸下吐漸去然後去木香散加芍藥二兩黃芪一兩半同煎服之病愈則止如大腑燥結食不盡下以大承氣湯去硝微下之少利為度再服前藥補之如大便復結又依前微下之

木香散 木香 檳榔分

右為細末同煎藥調下

保治暴吐上焦氣熱所衝也經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬于火脈洪而浮者刺黃湯主之

荆芥兩一 人參錢五 甘草二錢半 大黃錢二

右粗末作一服水二盞煎至一盞去渣調檳榔散二錢空心服之

檳榔散

檳榔錢二 木香半錢 輕粉少許

右為細末同煎藥下如丸亦用水浸蒸餅為丸如小豆大每服二十九食後服

李絳獨參湯治嘔吐胃弱欲死方見嘔胃虛條

仲大黃甘草湯治食已即吐又治吐水

大黃兩四 甘草兩一

右二味以水三升煮取一升分溫再服

肝乘脾 繫金花丸治吐食而脈弦者由肝勝于脾而吐乃由脾胃之虛宜治風安胃

半夏湯洗 檳榔錢二 雄黃錢半

右細末姜汁浸蒸餅為丸如桐子大小兒另丸姜湯下從少至多漸次服之以吐止為度風痰羈絆于脾故飲食不下

治吐頭痛有汗脈弦青鎮丸主之

柴胡兩

黃芩七錢

甘草

半夏三錢

青黛半錢

人參五錢

右細末姜汁浸蒸餅丸桐子大每服五十九丸姜湯食後

下

仲胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯主之

茯苓半斤

澤瀉兩

甘草兩

桂枝兩

白朮兩

生姜兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫

服八合一日三服

本食即吐欲作反胃白朮散

澤瀉

白朮

茯苓各等分

右為末每服一錢湯調溫服

汚血

經治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可以

五靈脂不夾土石揀精好者不計多少搗細末研狗膽汁

和為丸如雞頭大每服一九煎熟生姜酒磨細更以少生

姜酒化下凡湯藥令極熱須是先做下粥溫熱得所左手

與患人藥吃不得嗽口右手急將粥與患人吃不令太多

雜方

碧霞丸治吐逆立効黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥

入銚內煎乾却用炭火三稱就銚內煨透紅冷取研細為

末川粟米飯丸如桐子大煎醪湯下七丸不嚼只一服

運氣

運氣吐皆屬風木經云厥陰之復甚則入脾食痺而吐又

也

灸刺見前灸刺嘔吐條

診

脈陽緊陰數其人食已即吐陽浮而數亦為吐寸緊尺

瀉其人胸滿不能食而吐 寸口脈數其人則吐 寸口脈細而數數則為熱細則為寒數為嘔吐

仲問曰病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者何也師曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故吐也

乾嘔無物有聲

散 乾嘔者辛 仲乾嘔噦若手足厥者陳皮湯主之

陳皮四兩 生姜半斤

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

熱者甘 肘主卒乾嘔不息取甘蔗汁溫服半升日三又以生姜汁

一升服並瘥 治卒乾嘔不息搗葛根絞取汁服一升瘥

本草云生葛根汁大寒

惡心欲吐不吐

濕痰

丹惡心有熱有痰皆用生姜隨証用藥

仲病人胃中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤然無奈者生姜半夏湯主之

半夏一斤 生姜一斤

右二味以水三升煮半夏取二升內生姜汁煮取一升半少冷分四服日三夜一服止停後服

風痰

垣茯苓半夏湯治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐是邪氣羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

炒麴三錢 大麥蘖半兩 陳皮 天麻各二錢

白朮 白茯苓 半夏各一兩

右為粗末每服五錢水二盞生姜五片煎至一盞去渣熱服

柴胡半夏湯治舊有風症不敢見風眼澁眼黑胃中有痰

惡心兀兀欲吐但遇風覺皮肉緊手足難舉動重如石若在暖室少出微汗其症隨減再遇風病復如是

半夏錢二

炒麩錢一

生姜片三

柴胡

升麻各五分

蒼木錢一

藁本分五

白茯苓分七

右為粗末只作一服水二盞煎至五沸去渣溫服

胃寒

張文仲治胃氣冷吃食即欲得吐以白荳蔻仁三枚搗篩更研細好酒一盞微溫調之併飲三兩盞佳

仲病人欲吐者不可下之

產後嘔

雲蒲黃散治產後三四日惡露不下嘔逆壯熱

芍藥二兩

知母二兩

生姜

當歸

蒲黃各二兩

紅花錢五

荷葉心中蒂筒一

生地汁一盞

右咬咀水二升煎至一升去渣下蒲黃煎數沸空心分

三服

療產後嘔吐不止

橘紅兩一

半夏麩

甘草各五分

藿香兩一

右為細末每服三錢姜三片水煎

大開胃散治產後胃氣不和嘔吐不止全不納飲食

訶子肉一兩

人參兩一

甘草兩半

右三味為細末別以半夏半分生姜一分葱白二七莖

水二大盞煎至六分去渣分為二服

嘔苦水

濕

丹鄭宅如夫人清早嘔苦水脈濇而微起轉如常此胃弱而上腕有濕也

黃芩錢七

滑石兩一

蒼木兩一

飛礬兩二

陳皮兩一

山查兩一

半夏兩一

桔梗錢五

針灸

炒苓五錢

姜水煎服

刺灸嘔苦獨取膽與胃經云善嘔嘔有苦長大息邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔取膽三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以開膽逆卻調虛實以去其邪又云口苦嘔宿汁取陽陵泉是也

運氣

運氣嘔苦皆屬燥經云陽明在泉燥淫所勝病善嘔嘔有苦又云陽明之勝嘔苦治以苦溫辛溫是也

吐酸吞酸

丹溪治本之熱

丹或曰吞酸素問明以為熱東垣又以為寒何也予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成積成積既久濕中生熱故從木化遂作酸味非熱而何其有鬱積之久不能自涌而出伏於脾胃之間咯不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味

刺心肌表溫暖腠理開發或得香熱湯九津液得行亦可暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治熱濕鬱積之法為未合經意予嘗治吞酸用黃連芩各製炒隨時令迭為佐使蒼朮茯苓為輔湯浸蒸餅為小丸吞之仍教以糲食蔬果自養則病易安 吞酸為君

咽醋丸

芩莖

去枝梗半兩 煎晒乾

陳皮

去白五錢

黃芩

炒五錢

蒼朮

半錢

黃連

一兩 細切用陳壁泥同炒

右為細末麩糊丸桐子大

參黃丸可治吞酸不可治自利方見泄瀉

兵部手集治酸心每醋氣上攻如酸醋茱萸一合水三盞煎七分頓服總濃亦強服

梅治酸心枳椇四兩陳皮二兩細搗為末空心生蜜湯下方寸七

丹丈夫因外感涼氣與宿飲相搏心下酸成嘔清水後有紅

青皮三錢 黃芩半錢 人參二錢 紫蘇

木通 甘草 枳殼二錢 桔梗半錢

麻黃五分

東垣治木之寒 疴病機云諸嘔吐酸皆屬於熱辨云此上焦受外來客邪也胃氣不受外邪故嘔傷寒論云嘔家雖有陽明症不可攻之是未傳入裏三陰不受邪也亦可見此証在外也仲

景以生薑半夏治之孫其人云嘔家多用生薑是嘔家藥以禱病論之嘔吐酸水者甚則酸水浸其心不任其苦其次則吐出酸水令上下牙酸清不能相對以大辛熱劑療之必減吐酸嘔出酸水也酸味者收氣也西方肺金旺也寒水乃金之子子能令母實故用大鹹熱之劑瀉其子以辛熱為之佐以瀉肺之實以病機之法作熱攻之者悞矣蓋雜病醋心濁氣不降欲為中滿寒藥豈能治之乎

加減二陳湯 藿香安胃散二方並見前嘔吐痰飲門

濕飲

本予平生有二疾一則下血二則膈中停飲下血有時而止停飲則無時始因年少時夜坐為文左向伏几案是以飲食多墜向左邊中夜以後稍困乏必飲酒二三盞既臥就枕又向左邊側睡氣壯盛時殊不覺三五年後覺酒止從左邊下漉漉有聲脇痛飲食外減十數日必嘔數升酸

水暑月止是右邊身有汗熱熱常潤左邊病處絕燥遍訪名醫及海上方服之少有驗者間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礬石其利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣予後揣度之已成癰囊如潦水之有科白不盈科不行水必盈科而行也清者可行濁者依前停蓄蓋下無路以出之也是以積之五七日必嘔而去稍寬數日復作脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕崇土以堆科白則疾當去矣於是悉屏諸藥一味服蒼朮三月而除自此後一向數年不吐不嘔胃膈寬飲啖如故暑月汗周體而身涼飲亦從中下前此飲漬其肝目亦多昏眩其後燈下能書細字皆蒼朮之力也其法蒼朮一斤去皮切末之用白芝麻半兩水二盞研搗取汁大棗十五枚爛煮去皮核研以麻汁勻研成稀膏搜和入相熟杵丸如桐子大乾之每日空

腹溫湯吞下五十九加至一百九二百九忌桃李雀鴿初服時必膈微燥且以茅朮製之覺燥甚再進山梔子散一服久之不燥也予服半年以後止用燥烈味極辛者削去皮不浸極有力亦自然不燥山梔散用山梔一味乾之爲末沸湯點服故知久坐不可伏向一邊時或運動亦調息之法

治酒癖停飲吐酸水乾姜丸

聖惠方

乾姜 葛根 枳殼 橘紅

前胡各五錢 白朮 半夏各一兩 茱萸

甘草各一分

右細末煉蜜丸如桐子大每服三十九用米飲服有效

治中風痰涎飲眩暈嘔吐酸水頭痛惡心

半夏二兩 南星 白附各一兩

右並生為末滴水丸如桐子大以生麵裹衣陰乾每服十九至二十九生姜湯下

子和棠溪張鳳村一田叟姓楊其病嘔酸水十餘年本畱飲諸醫皆以燥劑治之中腕臍脘以火艾燔鍼刺之瘡未嘗合戴人以苦劑越之其涎如膠乃出二三升談笑而愈運氣吐酸皆屬於熱經云諸嘔吐酸皆屬於熱又云少陽之勝欲嘔嘔酸治以辛寒是也

針灸 東吐宿汁吞酸 章門 神元

嘔吐清水

濕飲 本一味蒼朮丸治嘔吐清水如神方見吐酸濕條

仲茯苓飲治心胃中有停痰宿水自吐出水後心胃間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓 人參 白朮各三兩 枳實二兩

陳皮錢五 生姜兩四

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進之

丹盛兄兩手麻弦飲後嘔清水

神麴 蒼朮 香附各五錢 益元散兩一

半夏錢七半

右為末姜汁浸蒸餅為丸

仲渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之方見傷寒

火毒 丹施十年四十因灸艾火太多病腸內下血糞肚痛今痛自止善嘔清水食不下宜清胃口之熱

黃芩分五 陳皮 地黃各一錢 白朮半一錢

連翹錢半 甘草 茯苓分五 生姜片三

寒

干治痰飲水吐無時節者其源因冷飲過度遂令脾胃氣

運氣

羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲時稍加至三七服盡一斤終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健有人痰飲服藥不愈用此方愈

運氣嘔吐清水有二

一曰濕經云太陰之復嘔而密默唾吐清液治以甘熱是也

二曰寒經云諸病水液澄澈清冷皆屬於寒是也

嘔沫

仲乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾姜散主之

半夏

乾姜各等分

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服之

寒

針灸

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

方見傷寒

婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

刺灸嘔沫獨取手太陰經云手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫治主病者是也

脾脈微急為膈中食飲入而還出後沃沫

全文見虛實法經云急者多寒

嘔膿

仲嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

嘔吐虫

雜方

丹吐虫黑錫炒成灰楨榔末米飲調下

仲虺厥者當吐虺今病者靜而復時煩此為臟寒虺上入膈故煩須更復止得食而嘔又煩者虺聞食臭出其人當自吐虺虺厥者烏梅丸主之又主痢

方見傷寒厥陰論

灸

刺灸嘔虫獨取胃經云胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長虫出取胃三里是也

診

脈關上脈微浮積熱在胃中嘔吐蚘虫心健忘

仲病人有寒復發汗胃中冷必吐衄

吐利

成無已云若止嘔吐而利經云謂之吐利是也上吐下利躁擾煩亂乃謂之霍亂其與但稱吐利者有異也蓋暴於旦夕者為霍亂可數日久者為吐利今以暴為霍亂者寓於傷寒吐利門徐而日久者入此門

寒

海上吐下瀉不止當渴而反不渴脈微細而弱者理中湯

主之方見傷寒

濕熱

丹泄瀉或嘔吐六一散生姜汁湯調

丈夫因辛苦發熱腰腳痛吐瀉交作

白朮

滑石

陳皮

木通

柴胡半錢

人參錢一

甘草

五分

脈心乘肝必吐利

運氣

運氣吐利有二

一曰風木經云厥陰所至為嘔泄又云木太過曰發生發生之紀上徵則氣逆其病吐利是也

二曰寒水經云水太過曰流行流行之紀其動漂泄沃涌

是也源泄謂泄利沃涌謂吐沫也

欬嘔腹痛且發泄其脈絕是逆也全文見診生死

脾診

仲乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之

黃芩兩二

甘草兩二

芍藥兩三

半夏斤半

生薑兩四

大棗兩十

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一

服

黃芩湯治乾嘔下利

黃芩二兩

人參

乾姜各三兩

桂枝一兩

大棗十二箇

半夏半兩

右六味以水七升煮取三升温分三服

風痰

潔水煮金花丸治有痰而泄痢不止甚則嘔而欲吐利下而不能食由風痰羈絆脾胃之間

半夏一兩

天南星一兩

天麻半兩

寒水石一兩

燒存性

雄黃一錢

白麵四兩

右為末滴水為丸桐子大每服百丸先煎漿水沸下藥

煮令浮為度漉出生姜湯下食前

關格

關者不得小便格者吐逆上下俱病者也

寒熱

難邪在六腑則陽脈不和陽脈不和則氣留之氣留之則

陽脈盛矣邪在五臟則陰脈不和陰脈不和則血留之血

留之則陰脈盛矣陰氣太盛則陽氣不得相營也故曰隔

陰盛陽不得營故十陽氣太盛則陰氣不得相營也故曰

關陽盛陰不得營故人迎大三四倍於寸口陰陽俱盛不得相營也故曰關格

關格者不得盡其命而死矣三十難

潔關則不得小便格則吐逆關者甚熱之氣格者甚寒之

氣是關無出之由故曰關也格無入之理故曰格也 寒

在胃中過絕不入熱在下焦填塞不便

雲陰陽易位病名關格胃膈上陽氣常在則熱為主病身

半已下陰氣常在則寒為主病寒反在胃中舌上白胎而

水漿不下故曰格格則吐逆熱在丹田小便不通故曰關

關則不得小便胃中有寒以熱藥治之丹田有熱以寒藥

治之若曾中寒熱兼有以主客之法治之治本當緩治客當急尺寸反者死陰陽交者死關格者不得盡其命而死矣

丹必用吐提其氣之橫格不必在出痰也 有痰以二陳湯吐之吐中便有降 有中虛氣不運者補氣藥中升降之

孫奉職趙令儀女忽吐逆大小便不通煩亂四肢漸冷無脈凡一日半與大承氣湯一劑至夜半漸得大便通脈漸和翌日乃安此關格之病極為難治垂死而活者惟此人耳

孫治大小便不通關格不利燒皂角細研粥飲下三錢立通

外關格脹滿大小便不通獨頭蒜燒熱去皮紙裹納下部

氣立通

診
仲寸口脈浮而大浮為虛大為實在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆

脈下微本大者則為關格不通不得尿頭無汗者可治有

汗者死

成註云下微謂脈沉之而微也本大謂關後脈大也

膈氣 反胃 噎 咽喉噎塞 口開目瞪

嘈雜

辨惑

丹局方治氣一門有曰治一切氣冷氣滯氣逆氣上氣用

安息香丸丁沉香丸大沉香丸蘇子丸勻氣散如神丸集香

丸白沉香丸煨姜丸鹽煎散七氣散溫白丸生姜湯其治

嘔吐膈噎也用五膈丸五膈寬中散膈氣散酒癥丸草苴

薺丸撞氣丸人參丁香散其治吞酸也用丁香煎丸小理

中丸其治痰飲也用倍末丸消飲丸溫中化痰丸五套丸

且於各方條下或曰口苦失味曰噫酸曰舌澁曰吐清水
曰痞滿曰氣急曰脇下急痛曰五心中熱口爛生瘡皆是
明言熱症何爲悉用熱藥夫周流於人之一身以爲主者
氣也陽往則陰來陰往則陽來一升一降無有窮已苟內
不傷於七情外不感於六淫其爲氣也何病之有今日冷
氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無
降薰蒸清道甚而至於上焦不納中焦不化下焦不滲展
轉變爲嘔爲吐爲膈爲噎爲痰爲飲爲反胃爲吞酸夫治
寒以熱治熱以寒此正治之法也治熱用熱治寒用寒此
反佐之法也詳味前方旣非正治又非反佐此愚之所以
不能無疑也謹按原病式曰諸病嘔吐酸皆屬於熱諸積
飲痞滿中膈皆屬於濕諸氣逆衝上嘔涌溢食不下皆屬
於火諸堅痞腹滿急痛吐腥穢皆屬於寒深契仲景之意

金匱要畧曰胃痺病胃背痛括萸薤白湯主之胃痺心痛
徹背背痛徹心瓜萸薤白半夏湯主之心下痞氣氣結在
胃脇下上逆搶心者枳實薤白括萸桂枝湯主之嘔而心
下痞者半夏瀉心湯主之乾嘔而利者黃芩加半夏生姜
湯主之諸嘔吐穀不得入者小半夏湯主之嘔吐病在膈
上者猪苓湯主之胃反嘔吐者半夏參蜜湯主之食已卽
吐者大黃甘草湯主之胃反吐而渴者茯苓澤瀉湯主之
吐後欲飲者文蛤湯主之病似嘔不嘔似噦不噦心中無
奈者姜汁半夏湯主之乾嘔手足冷者陳皮湯主之噦逆
者陳皮竹茹湯主之乾嘔下痢者黃芩湯主之氣衝上者
皂莢丸主之上氣脈浮者厚朴麻黃湯主之上氣脈沉者
澤瀉湯主之火逆上氣者麥門冬湯主之心下有痰飲胃
脇支滿目眩茯苓桂朮湯主之短氣有微飲當從小便出

之宜茯苓桂朮甘草湯主之腎氣丸亦主之病者脈伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿者此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之病懸飲者十棗湯主之病溢飲者當發其汗宜大青龍湯又宜小青龍湯主之心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之支飲胃滿者厚朴大黃湯主之支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之嘔家本渴今反不渴心中有支飲故也小半夏湯主之卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而頭眩此水也五苓散主之心胃有停痰宿水自吐出水後心胃間虛氣滿不能食消痰氣令能食茯苓飲主之先渴後嘔爲水停心下此屬飲家半夏湯加茯苓主之觀其微意可表者汗之可下者利之滯者導之鬱者揚之熱者清之寒者溫之偏寒偏熱者反佐而行之挾濕者

淡以滲之挾虛者補而養之何嘗例用辛香燥熱之劑以火濟火實實虛虛咎將誰執或曰脈訣調熱則生風冷生氣寒主收引今冷氣上衝矣氣逆矣氣滯矣非冷而何吾子引仲景之言而斥其非然則諸氣諸飲諸嘔吐反胃吞酸等病將無寒症耶予曰五臟各有火五志激之其火隨起若諸寒爲病必須身犯寒氣口食寒物乃爲病寒非若諸火病自內作所以氣之病寒者十無一二或曰其餘痰氣嘔吐吞酸噎膈反胃作熱作火論治於理可通若病人自言冷氣從下而上非冷而何予曰上升之氣自肝而出中挾相火自下而出其熱爲甚自覺其冷非真冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故見此症冷生氣者出高陽生之謬言也若病果因於寒當以去寒之劑治之何至例用辛香燥熱爲方不知權變寧不誤人或曰氣上升者皆用

黑錫丹養正丹養氣丹等藥以為鎮墜然服之者隨手得
効吾子以為熱甚之病亦將有悞耶予曰相火之外又有
臟腑厥陽之火五志之動各有火起相火者此經所謂一
水不勝二火之火斯火也出於天造厥陽者此經所謂一
水不勝五火之火出於人欲二者之火相扇而動氣之升
也隨火炎上升而不降孰能禦之今借丹劑之重墜而降
之氣鬱為濕痰丹性熱燥濕痰被劫亦為暫開所以清快
丹毒積久偏助狂火陰血愈耗其升愈甚俗人喜溫迷而
不悟被此禍者滔滔皆是或曰丹藥之重欲降而升然如
之何則可予曰投以辛涼行以辛溫制伏肝邪治以鹹寒
佐以甘溫收以苦甘和以甘淡補養陰血陽自相附陰陽
比和何升之有先哲治法其則不遠吾不贅及或曰諸氣
諸飲與夫嘔吐吞酸膈噎反胃等症局方未中肯綮我知

之矣然則要畧之方果足用乎抑猶有未發者乎予曰天
地之氣化無窮人身之病亦變化無窮仲景之書載道皆
也醫之良者引例推尋可謂無窮之用借令畧有加減修
合終難踰越矩度也初病也其端甚微或因些小飲
食不謹或外胃風而寒暑或內感七情或食味過厚偏助
陽氣積成膈熱或資稟素實表密無汗或性急易怒陰火
炎上以致津液不行清濁相干氣為之病或痞或痛或不
思食或噎噫腐氣或吞酸或嘈雜或膨滿不求本原便認
為寒遽以辛香燥熱之劑投之數貼暫得快然以為神方
仍前厚味不節將理不謹舊疾被劫暫舒濁液易於攢聚
或半月或一月前病復作如此延蔓自氣成積自積成痰
此為痰為飲為吞酸之由也良工未遇謬藥已行痰挾汚
血遂成窠囊於是為痞為痛為嘔為噎膈反胃之次第諸

症隆起飲食湯液泥滯不行滲道蹇滯大便或秘或溏下
失傳化中焦愈停醫者不察猶執爲冷翻思前藥隨手得
快至此賓主皆悞藥欠燥熱顯俟久服脾可以溫胃可以
壯以糞一旦豁然之効不思胃爲水穀之海多血多氣氣
清和則能受脾爲消化之官氣清和則能運今得香熟之
藥偏助氣血沸騰其始也胃液凝聚無所容受其久也脾
氣耗散傳化漸遲其有胃熱易飢急於得食脾傷不磨鬱
積成痛醫者猶曰虛而積寒非尋常草木可療妄以烏附
助佐丹劑專意服餌積而久也血液俱耗胃脘乾槁其槁
在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入入亦不多
名之曰噎其槁在下與胃爲近食雖可入難盡入胃良久
復出名之曰膈亦曰反胃大便秘小若羊屎然名雖不同
病出一軀要畧論飲有六曰痰飲懸飲溢飲支飲留飲伏

飲分別五臟諸證治法至矣盡矣第悞醫者不善處治病
者不守禁忌遂使藥助病邪展轉深痼去生漸遠深可哀
憫或曰千金諸方治膈噎反胃未嘗廢姜桂等劑何吾子
之多言也予曰氣之鬱滯久留清道非借香熱不足以行
然悉有大黃石膏竹茹芒硝澤瀉前胡朴硝茯苓黃芩蘆
根瓜蒌等藥爲之佐使其始則同其終則異病邪易伏故
易於安或曰胃脘乾槁者古方果可治乎將他有要捷之
法或可補前人之未發者乎予曰古方用人參以補肺御
米以解毒竹瀝以清痰乾姜以養血粟米以實胃蜜水以
潤燥姜以去穢正是此意張雞峯亦曰噎當是神思間病
惟內觀自養可以治之此言深中病情治法亦爲近理夫
噎病主於血乾夫血者陰氣也陰主靜內外兩靜則臟腑
之火不起而金水二氣有養陰血自生腸胃津液傳化合

宜何噎之有

翻胃

大法丹
梁主潤

丹翻胃即膈噎大約有四血虛氣虛有熱有痰 治必用
童便竹瀝韭汁牛羊乳姜汁氣虛入四君子湯血虛入四
物湯加童便年少者四物湯清胃脘血血燥不潤故便瀯
年高者不治治必用參朮輩關防氣虛胃虛 一中年婦
人患反胃以四物湯加和白陳皮留尖桃仁生甘草酒紅
花濃煎入驢尿以防其或生虫也與數十貼而安 台州
一木匠年二十七勤於工作而性巧慧有一艾妻且喜酒
病反胃者半載其面白其脉瀯而不勻重取則大而弱小
便八九日方通一次糞皆燥結如羊屎甚羸乏無力予調
精血耗竭也先與甘蔗汁煎六君子湯加附子大黃與之
伺大便稍潤令謝去工作臥於牛家取新溫牛乳細飲之

每頓盡一盃一晝夜可五六次以漸而至七八次其餘菜

果粥飯皆不入口半月而大便潤月餘而安然或口乾蓋

酒毒未解間飲甘蔗汁少許近兩月而安矣六君子湯謂
人參茯苓白

朮枳殼陳皮半夏
各等分姜棗煎也 翻胃用韭汁二盞牛乳一盞生姜汁

半盞和勻溫服效別有方
見前

梅主反胃朝食暮吐旋旋吐者以甘蔗汁七升生姜汁一

升二味相和分為三服

丹杭州一男子四十餘歲患反胃兩月矣口乾而不喜飲

食有時不吐或吐則食物裹涎沫而出吐後胸膈方快其

脈俱瀯重則弦大蓋其壯年多服金石房中之藥所致時

正秋初尚熱遂令其多作竹瀝煮鶯粟米為粥代粥飯與

之每啜一二口而止卻帶溫頻頻與之自此不吐至旬日

稍涼以流水作稀粥入少竹瀝與之時間以四物湯加陳

皮益其血月餘而安

食主脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下粟米半升研粉水和丸如桐子大煮令熟點少鹽空心和汁吞下

世治番胃吞酸錫糖查六兩生姜四兩研細和為餅晒乾每用餅十兩入甘草一兩為末湯調下陳彥正服得効

內經主瀉積陽蓄積病苑而陽氣當隔隔者當瀉不亟正治粗乃敗之全文見陰陽

寒積 隔則閉絕上下不通則暴憂之病也通評虛實論

潔治中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼宜服紫沉丸

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 半夏麴 <small>三錢</small> | 烏梅 <small>去核二錢</small> | 沉香 <small>一錢</small> | 杏仁 <small>去皮尖一錢</small> |
| 砂仁 <small>三錢</small> | 丁香 <small>二錢</small> | 檳榔 <small>二錢</small> | 木香 <small>一錢</small> |
| 陳皮 <small>五錢</small> | 白荳蔻 <small>五分</small> | 白朮 <small>一錢</small> | 巴荳霜 <small>五分另研</small> |

右細末入巴荳霜令勻醋糊為丸如黍米大每服五十丸食後姜湯下愈則止小兒另丸 一法反胃吐食用橘皮一箇浸少時去白裹生姜一塊麴糵炒令熟去外麴煎湯下紫沉丸一百九一日二服後大便通至不吐則止此主寒積氣病機有代瀉石內果無白朮

垣厚朴丸主番胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其藥味即與萬病紫苑丸同

- | | | |
|----|------------------------|----------------------------|
| 厚朴 | 蜀椒 <small>去目微炒</small> | 川烏頭 <small>炮去皮各一兩半</small> |
|----|------------------------|----------------------------|

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----|----------------------|
| 紫苑 <small>去土苗</small> | 吳茱萸 <small>湯洗</small> | 菖蒲 | 柴胡 <small>去苗</small> |
|-----------------------|-----------------------|----|----------------------|

- | | | | |
|----|----|----|-----------------------|
| 桔梗 | 茯苓 | 官桂 | 皂角 <small>去皮炙</small> |
|----|----|----|-----------------------|

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 乾姜 <small>炮</small> | 人參 <small>各二兩</small> | 黃連 <small>二兩</small> | 巴荳霜 <small>半兩</small> |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

右為細末入巴荳霜勻煉蜜為劑旋旋丸如桐子大每服三丸漸次加至五七丸以利為度生姜湯下食後而

臥此藥治効與局方溫白丸同及治處暑以後秋冬間
 下痢大効 春夏加黃連二兩 秋冬再加厚朴二兩 如
 治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯苓各一兩
 半 如治風痛不愈者依春秋加藥外更加人參菖蒲
 茯苓各一兩半 如心之積加菖蒲白茯苓為輔 如
 肝之積加柴胡蜀椒為輔 如肺之積加黃連人參為
 輔 如脾之積加茱萸乾姜為輔 秋冬久瀉不止加
 黃連茯苓

保反胃大便不通者是腸勝胃也服局方半硫丸三十九
 大府秘用後集

附子錢五 巴莖仁 砒一豆

右末極細生姜糊丸菖莖大每服一九白湯下

治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通宜附子丸

附子炮五錢 砒研半錢 巴莖霜一錢

右同研極細溶黃蠟為丸如桐子大每服一二九冷水
 送下利為度利後更服紫苑丸常服一九勿令再閉

潔白木木香散治寒積氣嘔吐腹中痛是無積也胃強而
 乾嘔有聲無物脾強而吐食持擊強是以腹中痛當以此
 藥和之

木香錢一 白木兩半 半夏麩兩 檳榔錢二

茯苓錢五 甘草錢四 丁香錢一

右為細末每服一二錢濃煎芍藥生姜湯調下有積者
 痛時手按之愈痛無積者按之不痛

白木散治胃中虛損及痰而吐者

半夏麩五錢 白木 木香 甘草各一
 檳榔半錢 茯苓

右為細末每服二錢食前姜湯下

羅十膈氣散專治十般膈氣冷膈風膈氣膈伏膈熱膈悲膈水膈食膈喜膈皆病源也並因憂驚冷熱不調又乖將息更於喜怒無時貪嗜飲食因而不化積滯在膈上腸鳴痰嗽歲月漸深心胃噎塞漸至羸瘦久若不除必成惡候

人參

白茯苓

官桂

枳殼

炙甘草

神麴炒

麥芽炒

廣茂炮

白朮

陳皮去白

乾姜炮

京三稜煨

訶黎勒

煨去杪已上各一兩

厚朴姜製

檳榔

木香已上各五錢

右為極細末每服一錢塩湯點服如覺脾胃不和腹脹心胃滿悶用水一盞生姜七片棗二枚塩少許同煎至八分和查熱服空心食前

荳蔻散治五種膈氣

肉荳蔻

去皮五竹

人參

厚朴姜製

赤茯苓

桂各半兩

甘草炙半兩

檳榔五錢

訶黎勒

青皮各半兩

陳皮去白半兩

郁李仁湯泡去皮

尖炒黃半兩

半夏

湯洗了用生姜搗如泥堆新瓦上文武火焙黃五錢

右為極細末每服二錢入鹽少許如茶點服若入生姜棗同煎亦佳不拘時候能治氣補勞通血脈補脾胃去痰實

熱積

本駢尿治反胃外臺載昔幼年經患此疾每食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等時稱名醫奉勅令治醫竭其術竟不能療漸至羸憊死在朝夕忽有衛士云服駢小便極驗旦服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐卽便定後奏知大內中五六人患反

胃同服一時俱瘥此藥稍有毒服時不可過多盛取尿熱服二合病深者日服之良驗

本草云馱尿治癰疽反胃又云馱尿性寒味甘

世又方馱尿調平胃散

平胃散見瀉瀉

新瓦散治反胃用多年瓦一片燒紅入馱尿內焯廿一次

研為末倉米飯焦亦為末二分飯末一分瓦末蠟精和飯

丸以馱尿和平胃散服之吞下

丹番胃方

黃連細切姜汁煨炒三錢 山查肉錢一 保和末錢六

右粥丸桐子大人參湯入竹瀝再煎沸熱下六十九

羅人參利膈丸治胃中不利痰嗽喘滿利脾胃壅滯便秘

推陳致新治膈氣之聖藥也

木香 檳榔七錢半 人參 當歸

藿香 甘草 枳實 大黃酒浸

厚朴姜制各一兩

右為細末滴水為丸桐子大如雞丸少加宿蒸餅和丸

每服三五十九食後諸飲下

本大黃湯治冷涎番胃其候欲發時先流冷涎次則吐食

此乃勞証治不早死在旦夕用大黃一兩生姜自然汁半

茶盞灸大黃令燥又焯入姜汁中如此焯汁盡切焙為末

每服二錢陳米一撮葱白二莖水一大盞煎至七分先食

葱白炙服其藥不十日去根

羅玄明粉朴硝不以多少煎過澄瀘五七遍晚於星月露

至明日自然結成青白硝用一瓦礫按實炭火內煨從慢

至緊自然成汁煎至不響再加頂火一煨取出於淨地上

倒合盆去火毒至晚取出為細末每二斤入甘草末二兩

每用一錢二錢桃花湯或葱白湯調下治膈上氣壅滯五

臟秘塞邪熱忌魚及藕

飲積

丹番胃積飲通用益元散生姜自然汁澄清白脚丸小丸
子時時服益元散方見泄瀉 翻胃治用茱萸 貝母 瓜蒌

牛膝草

虫積

本治積聚停飲痰水生虫久則成反胃及變為胃癰其說
在靈樞及巢氏病源芫花丸

芫花醋炒科 牛膝

狼牙根

桔梗炒

藜芦炒

檳榔各半

巴荳十粒炒黑

右為細末醋糊為丸如赤荳大每服二三丸加至五七

丸食前生姜湯下 此方常服化痰消堅殺虫予患飲

癖三十年暮年常多雜痰飲來潮遲即吐有時飲半杯

酒即止蓋合此症也因讀巢氏病源論酒痕云飲酒多

而食穀少積久漸瘦其病常欲思酒不得酒則吐多睡

不復能食是胃中有虫使然名為酒痕此藥治之要之
須禁酒即易治不禁無益也

海有楊時者因患風氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服萬

病紫苑丸五丸至二十日瀉出肉塊蝦蟆五六枚白膿二

升愈又趙侍郎先食後吐目無所見耳無所聞服萬病紫

苑丸五丸至十日瀉出青蛇五七條下惡膿三升方愈紫苑

丸即前治反胃厚朴丸加羌活獨活防風是也乃磨積之劑

世治番胃用蛔虫火煨為末肉汁調下

降火

諸逆衝上皆屬於火全文見診

世治番胃大田螺不拘多少用新水養之待吐出泥澄去

上清水後用米篩張地上却將皮紙鋪在灰上傾此泥於

紙上候乾稠丸如桐子大每服三十九丸藿香湯下立愈仍

將田螺放水中如食之其病不安 治反胃多年壁上和

香附子末米飲湯頻服之

本治反胃吐食

白礬二兩 黃丹一兩

右為末入瓦礮內煨令和取出以淨紙盛放地上盆蓋一宿再為末蒸餅丸如桐子每服五丸至七丸空心溫酒下更量老少虛實與之

寒濕

羅紅荳丸治諸嘔逆膈氣反胃

丁香 胡椒 砂仁 紅荳各廿一個

右為細末姜汁糊為丸如皂角子大每服一丸以大棗一枚去核填藥麵裹燒熟去麵細嚼白湯下食前進三服神效

丁香附子散治膈氣吐食

丁香兩半 檳榔一大個 黑附一個半兩重炮去皮臍

硫黃去石 胡椒各二錢

右先將前四味為末次入硫黃再研勻每服二錢用飛硫黃一箇去毛翅足腸肚填藥在內用濕紙五七重裹定置慢火內燒熟取出嚼吃後用溫酒送下一日三服不拘時候如不吃暈酒溫粟粥飲調下飛硫黃或云蠅蠹本草無考

世六丁丸治番胃如神即香靈丸方見嘔吐

本附子散治反胃用附子一枚極大者生於磚上四面着火漸漸逼熟燂入生姜自然汁中再用火逼再燂約盡生姜汁半碗焙乾入丁香二錢每服二錢水一盞粟米少許同煎七分不過三服瘥斗門方用粟米飲調下一錢服之又方治男婦小兒唇青面黃肚裏冷疼引牽小腹以至番胃換食嘔吐口苦舌乾少寤多寐脚手牽掣不拘年日遠近一切脾冷病悉能除愈有一婦人年四十餘久患番胃

面目黃黑歷三十餘年醫不能効脾膈諸穴燒灸交遍其病愈甚服此藥七日頓然全愈服至一月遂去其根自是服之不三五服些小脾疾立便瘥平保全胃氣能生肌肉進飲食順榮衛當服大有補益累試累驗幸毋忽焉

人參兩

茯苓白者二兩

附子七錢已上重者炮去皮臍

粉草兩

黃芪一兩

右為細末再服三大錢鹽湯煎服忌生冷油麪粘膩等毒物無不効者甚妙

重劑

羅桂香散治膈氣反胃諸藥難瘥朝食暮吐甚者食已輒出其効神速

水銀

黑錫各三錢

硫黃五錢

右三味銚內用柳木槌熬研微火上細研為灰取出後用丁香末二錢桂末二錢生姜末三錢都一處研令勻

每服三錢黃米粥飲調下一服効甚者再服

右丁香附子例治番胃灼見臟腑有寒者服之丹溪云治反胃忌甚燥之劑犯之必死設用必與潤血藥相兼服又前瀉積條亦香燥劑用者謹之

汚血

本治男婦小兒遠年近日番胃吐食方用五靈脂一味不拘多少為細末用黃犬膽汁為丸如龍眼大每服一九好酒半盞溫服不止再服不過三服即効行義云五靈脂行味甘溫療心腹冷氣通氣脈女子月閉

臟腑

食不能下者胃脘膈也全文見水腫一陽發病少氣善效善

泄其傳為膈全文見診病傳變○王註云三焦內結中熱故膈塞不便

素三陽結謂之膈王註云小腸結則血脈燥嘔嘔脫熱則津液竭故膈塞不便

運氣

運氣膈食皆屬濕經云太陰所至為積飲痞膈是也

雜方

世治番胃痛而吐諸氣不入者黃牛鼻繩各姓者七箇長

七寸燒存性為末作三服用好酒調下飯湯調亦得 鯽魚散大鯽魚一箇去腸留膽納綠礬末填滿縫口以炭火灸黃為末每服一錢陳米飲調下日三服

山番胃細炒棠梨葉去刺為末酒下 又方松木節為末酒下

灸

靈黃帝曰氣為上膈者食飲入而還出余已知之矣虫為下膈下膈者食晬時乃出晬時遇余未得其意願卒聞之

岐伯曰喜怒不適食飲不節寒温不時則寒汁流於腸中流於腸中則虫寒虫寒則積聚守於下管則腸胃充郭衛

氣不營邪氣居之腸胃充郭則衛氣不營故邪氣得以居之也人食則虫上食

虫上食則下管虛下管虛則邪氣勝之積聚以留邪氣原而居下腕今虫上而下管虛則邪氣乘虛勝之而積聚以留也留則癰成癰成則下管約

下管約故食入則痛至晬時乃復出也其癰在管内者即內而痛深其癰在

腕外者則癰外而痛浮癰上皮熱黃帝曰刺之奈何岐伯

曰微按其癰觀氣所行先淺刺其傍稍內益深還而刺之毋過三行察其沉浮以為深淺已刺必熨令熱入中曰使

熱內邪氣益衰詳此刺癰非所刺也但刺後熨之使熱大氣入于積所則邪免衰去衛氣復盛也大

癰乃潰伍以參禁以除其內恬憺無為乃能行氣後以醎

苦化穀乃下矣 灸刺膈食有四

其一取胃經云虫為下膈按其癰刺之者是其一法也

其二取太陰經云太陰根于隱白結于太倉太陰為開開折則倉廩無所輸膈洞膈洞者取之太陰視有餘不足故

開折者氣不足而生病者是也蓋膈洞者經謂之食不化下噎選出也

其三取胃經云胃病若膈咽不通飲食不下取之三里是

也又云飲食不下膈塞不通邪在胃脘在上腕則刺抑而下之在下腕則散而去之是也

其四取手少陰經云手少陰之别名曰通里去腕一寸半其病實則支膈取之掌後一寸別走太陽者是也

撮翻胃 勞宮分 中腕灸瀉 心膈一分沿皮向外 玉番胃吐食 中魁中指第三節灸瀉之 中腕半寸 腕骨一分瀉

東吐食不化 上腕 中腕 下腕 甲食飲不化入腹還出下腕主之 又法三里 陰陵泉

不應取 三里 又法 腋聚毛下宛宛中五十壯 石關五十壯 中腕 脾膈 中魁

束今日食明日吐 心膈沿皮寸半 膈膈沿皮寸半 胃堂七壯即胃 中 巨闕 胃脘寸半各灸 又番胃 商丘 通谷

巨闕 然谷 隱白 陽陵泉 內庭 膈關

忌

甲背痛惡寒脊強俯仰難食不下嘔吐多痰鬲關主之

診

脈寸口脈微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足

血不足則胃中冷跌陽脈浮而濇浮則為虛濇則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐完穀不化名曰胃反脈緊

而濇其病難治脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在於上醫反下之令脈反弦故名曰虛

脾脈微急為膈中食飲入而還出涎沫全文見虛實法 素胃脈奕而散者當病食痺脈要精微論○至真要論云食痺而吐 腎脈微緩為洞洞者食不化下噎還出全文見治虛實法

噎

血稿

丹一男子年六十二歲平居不能頓食常喜頻食一日忽覺咽膈壅塞大便結糞如羊矢三四日一見走動倦乏與

補氣藥則作痛醫見食少則與快腸胃消導之藥予脈之
兩手俱見濇脈似真臟喜其人形瘦而色紫黑病見乎冬
却有生意遂於四物湯加白朮陳皮煎取濃湯研桃仁十
二粒再煎沸飲之多食諸般血以助藥力三十貼而知至
五十貼而大便潤七十貼而食進百貼而愈
浦江男子年六十自來好色虛甚去秋患吐病或有作時
或有止時腹結微渴

地黃錢一

人參錢半

白朮錢一

黃芩錢三

川芎錢三

芍藥錢一

當歸

陳皮各五分

枳殼分半

甘草分二

木通分三

楊淳三哥大便秘濇咽塞不通人參散主之方見大便秘門

積滯

厚朴九治飲食噎塞方見番胃
丹東陽王仲延咽膈間常覺有物悶悶每食物必屈曲自

汚血

膈而下且梗濇作微痛食亦減他無所苦予脈之右甚濇
而關甚沉左却和予曰汚血在胃腕之口氣因而鬱為痰
此必食物所致明以告我彼不自覺予又曰汝去冬好食
何物為多曰我每日必單飲點剝酒三兩盃逼寒氣為製
一方用生韭汁半盞令細呷之每服半盞一日三次盞韭
二斤而安

滯氣

治膈噎馬剝兒卽王瓜燒存性每一錢用棗肉平胃散二
錢溫酒調服食卽可下然後隨病源調理神效棗肉平胃散方見局

世治噎雞穀袋不問多少不可失包內物一粒用泥固濟

火煨存性用姜汁炒香附每箇入半兩香附末神麴為丸

姜湯送下

治氣噎不下飲食

枇杷葉去毛 青皮去穢 陳皮去白

右等分爲末每服二錢水一盞生姜五片同煎至六七分温服不計時候

治膈氣噎不下飲食用陳皮去白不拘多少用大蒜研細和九如菘荳大每服二十九至三十九丸温米飲下食後日三服

熱滯 金匱玉函五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉水三大盞煮二盞去查温服

寒滯 羅漢防已散治五噎

漢防已五錢 官桂兩 細辛七錢 陳皮去白一兩

羚羊角末 紫蘇各七錢半 杏仁湯洗去皮尖一兩

右爲細末每服三錢生姜三片水煎日二

本治五種積氣及五噎胃膈不快停痰宿飲纏金丹

丁香 木香 沉香 檳榔

官桂 胡椒 礪砂研 白丁香各一錢

白苝薹 飛礬各一錢研 馬兜苓 南星

五靈脂 瓜蒌根 半夏各半兩 硃砂三錢留半爲衣

右爲細末入二味研藥和勻生姜汁煮糊丸如桐子大每服三丸生姜湯下或乾嚼蘿蔔湯下

治氣食憂勞思慮五噎膈氣丸

麥門冬 甘草各五錢 人參四錢 桂心

細辛 川椒 遠志去心炒 附子

乾姜各二錢

右爲末煉蜜丸如雞豆大綿裹二丸含化食後日三夜三服胸中當熱七日愈

治氣食憂勞思慮五噎膈氣丸

半夏

桔梗各一兩

肉桂

枳殼各兩半

右細末姜汁麩糊丸如桐子大姜湯下三十九食後臥臥服

虫瘕

無擇廣五行記永徽中有僧惟則病噎不能食謂諸弟子曰吾死後便可開吾曾喉視有何物自經而卒弟子果開視曾中得一物形似魚而有兩頭遍躡皆肉鱗弟子置碗中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中盛藍作殿適有一僧以澱置器中此虫遂遠器中走須臾化為水此乃虫瘕非五噎比後人因以藍治噎悞矣

子和沈丘王宰妻病曾膈不利口流涎沫自言咽下胃中常有雷声心間時作微痛又復發昏曾乳之間灸癰如棊化痰利膈等藥服之三載病亦依然其家知戴人痰藥不損來求之一涌而出雪白虫一條長五六寸有口鼻牙齒

走於涎中病者惡而斷之中有白髮一莖此正與徐文伯所吐宮人髮瘕一同虫出立安

運氣

運氣噎皆屬燥經云陽明司天之政民病咳噎塞又云陽明之勝內餘噎塞曾中不便噎塞而欬又云陽明司天清復內餘噎塞者是也

右按運氣皆以噎塞生於燥噎塞者噎病也丹溪皆以噎病生於血槁血槁則燥矣得病情合經旨者丹溪一人也

雜方

禹錫頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈

聖治膈氣咽喉噎塞飲食不下用碓背上細糠蜜丸如彈子大不時含一丸嚥津下

孫治噎欲發時啣鷓鴣鳥嘴遂下外臺祕要同

聖治噎病用狼結喉骨曝乾杵末入半錢於飯飲內食之

妙

針灸摘五噎吞酸多唾嘔吐不止 天突五分留三呼得通關

在中腕旁各五分針入八分左撚能進飲食右撚能和脾胃許氏云此穴一針四効凡下針後良久覺脾胃入動為一効欠針破病根腹中作聲為二効次覺流入

撮治五噎中 中魁中指大二節尖灸以口吹火滅

甄權噎塞膈氣 通谷

明堂五噎分治 氣噎中 憂噎心膈灸 食噎乳根

乳左下一寸八分灸 勞噎鬲膈灸 思噎天府灸

集五噎 勞宮 中魁 中腕 三里 太陰 交溝

上腕不已再取後穴 臆中 太白 下腕 右關 脾

胃膈

診 仲寸口脈浮大醫反下之此為大逆浮即無血大即為寒寒氣相搏即為腸鳴醫不知而反與飲水令汗大出水得

氣必相搏其人即體

脈寸口脈緊而扎緊則為寒扎則為虛虛寒相搏脈為陰結而遲其人則噎

咽喉噎塞口開目眩

辛甘治本

垣堵塞咽喉陽氣不得出者曰塞陰氣不得下降者曰噎夫噎塞迎逆於咽喉胃膈之間令諸經不行則口開目眩

冬加辛 熱瀉標 夏加苦 寒瀉標

氣欲絕當先用辛甘氣味俱陽之藥引胃氣以治其本加堵塞之藥以瀉其標也寒月陰氣大助陰邪於外於正藥內加吳茱萸大熱大辛苦之味以瀉陰寒之氣暑月陽盛則於正藥中加青皮陳皮益智黃柏散寒氣泄陰火之上

逆或以消痞丸合滋腎丸滋腎丸者黃柏知母微加肉桂三味是也或更加黃連別作丸二藥七八十九空心約宿食消盡服之待少時以美食壓之不令胃中停留也記法

胃病

皆於補中益氣湯加減之

膈咽不通并四時換氣用藥法 黃帝針經曰胃病者腹
膈脹胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三
里夫咽者嚥物之門戶也膈者上焦心肺之分野不通者
升降之氣上不得下交通又云清氣在下則生飧泄濁氣
者謂泄黃如糜米穀不化者是也濁氣在上則生膈脹腹
中脹滿不得大便或大便難先結後溏皆是也濁氣在上
當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得入故食不得下
也此皆氣衝之火逆胃之脈反上而作者也清氣在下則
生飧泄者胃氣未病之日當上行心肺而榮經也因飲食
失節勞役形躰心火乘于土位胃氣弱而下陷入陰中故
米穀入而不得升反降而為飧泄也咽膈之間壅遏之甚
不得交通者皆衝脈上行逆氣所作也蓋胃病者上衝兩

脇膈咽不通飲食不下取之三里者是也針經云清濁相
干亂於胃中是為大惋大惋者惑也氣不交通最為急証
不急去之諸變生矣聖人治此有要法陽氣不足陰氣有
餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發於陽分而後瀉
陰也春夏之月陽氣在經當益其經脈去其血絡秋冬陽
氣降伏當先治其臟腑若有噎有塞塞者五臟之所主陰
也血也噎者六腑之所主陽也氣也二者皆由陰中伏陽
而作也今立四時用藥法并治法于後

冬月治法

冬三月陰氣在外陽氣在內當外助陽氣不得發汗內消
陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬乃水旺之時
水旺則金旺子能令母實肺者腎之母皮毛之陽元本虛
弱更以冬月助其令故病者善嚏鼻流清涕寒甚則濁涕
嚏不止此常也若大惡風寒小便數而欠或上飲下便色

清而多大便不調常夜無寐甚則為痰為嗽為嘔為噦為吐唾白沫以至口開目瞪氣不交通欲絕者吳茱萸丸主之

吳茱萸丸治寒在膈上膈咽不通

吳茱萸 草薹各一分 益智仁八分 白姜蚕四分

陳皮 人參 黃芪 升麻各八分

麥牙一分 甘草 歸身各六分 半夏一分

木香二分 澤瀉 姜黃 柴胡各四分

青皮二分

右為末湯浸蒸餅為丸如菘葢大細嚼三十九丸白湯送下不拘時候勿多飲湯恐速走下則減藥力

夏月治法

夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病值此時是天助正氣而剋其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋

陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中梗甚者前証俱作治法當從時用利膈丸瀉肺火以黃芪補中湯送下如兩足痿厥行步惟怯歌側欲倒臂肱如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不足以息以黃芪人參甘草白朮蒼朮澤瀉猪苓茯苓陳皮等作湯送下滋腎丸五六十丸六七月之間濕熱之令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞悶食不下以上件白朮蒼朮等湯送下消痞丸七十九更審而用之

黃芪補中湯方見 利膈丸方見 滋腎丸方見

消痞丸方見

嘈雜

痰火

丹嘈雜只是痰因火而動梔子姜炒黃連不可無 此食鬱有熱山梔黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛

肥人嘔雜二陳湯少加蕪荳蒼朮白朮炒梔子 心下
嘈雜者導飲丸最妙方見內傷飲食

噦 產後噦

噦者成無已許學士謂之吃逆是也或曰成無已許學士
固以噦為吃逆然東垣海藏又以噦為乾嘔陳無擇又以
噦各欬逆諸論不同今予獨取成許二家之說何也答曰
噦義具在內經諸家察之不詳故論紛紛耳謹按靈樞雜
病篇云噦以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大
驚之亦可已詳此經文三法正乃治吃逆之法按吃逆用
紙撚刺鼻便嚏則吃逆立止或閉口鼻氣使之無息亦
立已或作寃盜賊大驚駭之亦已此予所以取成許二家
之論噦為吃逆為得經旨也蓋噦吃之名雖二而病則一
經名為之噦者噦即吃聲之重也俗名為之吃者吃即噦

噦辨

聲之輕也皆因病聲之輕重得此二名初非噦吃有二病
若以噦為乾嘔設使乾嘔之人或使之嚏或使之無息或
使之大驚其乾嘔能立已乎噦非乾嘔也明矣若以噦名
欬逆夫噦者噦之病聲其聲發會厭下欬者欬之病聲其
聲發會厭上故內經噦有噦之口問欬有欬之篇論病各
不同噦不可名欬逆也明矣

降火補虛

丹吃逆論 吃病氣逆也氣自臍下直衝上出於口而作

聲之名也書曰火炎上內經曰諸逆衝上皆屬於火東垣
謂火與元氣不兩立又謂火元氣之賊也古方悉以胃弱
言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之未審
孰為降火孰為補虛人之陰氣依胃為養胃土傷損則木
氣侮之矣此土敗木賊也陰為火所乘不得內守木挾相
火乘之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病

人見此似爲危症然有實者不可不知敢陳其說趙立道年近五十質弱而多怒七月炎暑大飢索飯其家不能急具因大怒兩日後得滯下病口渴自以冷水調生蜜飲之甚快滯下亦漸緩如此五七日召予視脈稍大不數遂令止蜜水渴時且令以人參白朮煎湯調益元散與之滯下亦漸收七八日後覺倦甚發吃予知其因下久而陰虛也令其守前藥然滯下尙未止又以煉蜜飲之如此者三日吃尤未止衆皆尤藥之未當將以姜附飲之予曰補藥無速効附子非補陰者服之必死衆曰冷水飲多得無寒乎予曰炎暑如此飲涼非寒勿多疑待以日數藥力到當自止又四日而吃止滯下亦安 陳擇仁年近七十厚味之人也有久嗽病而作止不常新秋患滯下食大減至五七日後吃作召予視之脈皆大豁衆以爲難予曰形瘦者尙

可爲以人參白朮湯下大補丸以補血至七日而安此二人虛之調也 又一女子年踰笄性躁味厚炎月因大怒而吃作則舉身跳動脈不可診神昏不知人問之乃知暴病視其形氣俱實遂以人參蘆二兩煎湯飲一碗大吐頑痰數碗大汗昏睡一日而安人參入手太陰補陰中之陽者也蘆則反是大瀉太陰之陽女子暴怒氣上肝主怒肺主氣經曰怒則氣逆因怒逆肝木乘火侮肺故吃大作而神昏參蘆善吐痰盡則氣降而火衰金氣復位胃氣得和而解麻黃發汗節能止汗穀屬金糠之性熱麥屬陽麩之性涼失儒謂物物具太極學者不可不觸類而長引而伸之也

無凡吐利後多作噦此由胃中虛膈上熱故噦或至八九聲相連於氣不回至於驚人者若傷寒久病得此甚惡內

經所謂擾府者是也

右吐利後噦即丹溪治趙立道與陳擇仁二人噦皆於滯下得之之類六脈大豁用參朮而愈是也予長兄九月得滯下每夜五十餘行嘔逆食不下五六日後加吃逆與丁香一粒噦之立止但少時又至遂用黃連瀉心湯加竹茹飲之吃雖少止滯下未安如此者十餘日遂空心用御米殼些少澁其滑日間用參朮陳皮之類補其虛自服御米殼之後吃聲漸輕滯下亦收而安

實者下

仲噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈

小承氣湯治大便不通噦數譎語方見下利中

丹超越陳氏二十餘歲因飽後奔走數里遂患噦病但食物則連噦百餘聲半日不止飲酒與湯則不作至晚發熱如此者二月脈濇數以血入氣中治之用桃仁承氣湯加

紅花煎服下汚血數次即減再用木香和中丸加丁香服之十日而愈

痰鬱者吐之

無噦而心下堅痞眩悸者以膈間有痰水所為

丹洪孺人年廿六歲夏月因事為長上所阻怒氣折鬱不得舒須臾就浴湯熱不可近怒氣復增就悶絕昏倒乃以衣遮掩就房須臾欬逆大作每一聲必渾身為跳躍仍復昏悶凡三五息一作脈不可診予曰此膈上有痰逆為怒氣所鬱痰熱相搏氣不得降而逆非吐則不可是時夜半又事出倉卒適有人參蘆二兩在彼濃煎飲之大吐稠痰二升許通躡得汗困睡半夜而安此即前吃逆論所言者自此詳細故重出之

燥痰不出者用蜜水吐之

世噦聲頻密相連者為實可治若半時噦一聲者為虛難治多死在旦夕

滯氣 仲噦逆者陳皮竹茹湯主之

陳皮二升 竹茹二升 大棗三十枚 生姜半斤

甘草五兩 人參一兩

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日五服

乾嘔噦若手足厥者陳皮湯主之方見嘔吐門

本又方

枳殼五錢 木香一分

右細末每服一錢白湯調下未可再與

孫治諸吃噫陳皮二兩湯浸去穢剉以水一升煎之五合

通口服頃刻更加枳殼一兩去穢炒同煎之

外治久患欬噫連欬一二十聲者取生姜汁半合蜜一匙

頭煎令熱溫服如此三服立効

汚血 超越陳氏噦用桃仁承氣湯下汚血數升而愈是汚血為

噦也

熱 丹溪用益元散大補在汙趙立道陳擇仁滯下而噦者或

用蜜水治噦者是熱噦也

寒 潔柿錢散治吃逆

柿錢 丁香 人參各等分

右為細末水煎食後服

羅丁香柿蒂散治諸種吃噫嘔逆痰涎

丁香 柿蒂 青皮 陳皮各一兩

右為粗末每服三錢水一盞半煎七分去渣溫服不拘

時候

羌活附子湯

羌活 附子炮 木香 茴香各五錢炒

乾姜一兩

臟腑

胃為噦

全文見五臟虛實腹滿利而不噦者胃實也

運氣 運氣噦有三

一曰熱經云少陰之復噦噫治以苦寒是也

二曰寒經云太陽之復嘔出清水及為噦噫治以苦寒是也

也

三曰燥經云陽明之復欬噦治以辛溫是也

靈以草刺鼻

傷寒將愈忽患吃逆予與古人治吃逆之藥殆遍皆不愈計出無藥遂用皂角末吹入鼻中得嚏而吃逆止少時又吃又與皂角末嚏而止者凡數百次其嚏時出痰涕漸多自是吃逆漸疎至三二日而止此是合經草刺鼻嚏之法故書之

針灸

黃帝曰人之噦者何氣使然岐伯曰穀入于胃胃氣上注于肺今有故寒氣與新穀氣俱還入于胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復出于胃故為噦補手太陰瀉足少陰

篇

世治吃逆於臍下關元穴灸七壯立愈累驗

羅又方男左女右乳下黑盡處一韭葉許灸三壯甚者二十七壯

集治氣逆發吃 臍中 中腕 先補後瀉不 三里 肺

俞 行間

診 心脈小甚為噦 全文見治虛實法

產後噦

雜方 大產後欬逆三日不止欲死

肉桂 五錢 姜汁 三合

右同煎服二合以火先炙手摩令背熱時時塗藥汁盡妙

產後咳逆乾柿一箇切碎以水一盞煎六分熱呷

產寶治產後咳逆經三五日不止欲死方煎壁鏡窠三五

箇呷瘥即蜂子窠

針灸

大噫吃服藥無効灸期門必愈

醫學綱目卷之二十一終

醫學綱目卷之二十三

脾胃部

泄瀉滯下

滯下屬熱

潔論曰藏腑瀉利其證亦多大抵從風濕熱論之是知寒

少熱多寒則不能久也故曰暴泄非陰久泄非陽論曰春

宜緩形形緩動則肝木乃榮反靜密則是行秋令金能制

木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣

輕則殮泄身熱脈洪穀不能化重則下利膿血稠粘裏急

後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經云洩而便膿血知氣行

而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥湯是為輕

劑是實則瀉其子木能自虛而脾土實矣故經曰春傷於

風夏為殮泄此逆四時之氣人所自為也此一節熱泄所謂滯下也

有自太陰經脾受濕而為水泄虛滑微滿身重不知穀味

假令春宜益黃散補之夏宜泄之法曰宜補宜泄宜和宜

泄瀉屬濕

止和則芍藥湯止則訶子湯久則防變為膿血是脾經傳

受於腎謂之賊邪故難愈也若先利而後瀉謂之微邪故

易安此皆脾土受濕天之所為也雖聖智不能逃口食味

鼻食氣從鼻而入留積於脾而為水泄也此一節濕泄所謂泄瀉也

久瀉屬風

有厥陰經動下痢不止其脉沉而遲手足厥逆涕唾膿血

暴泄屬寒

此症難治宜麻黃湯小續命湯汗之法云為有表邪縮於

內當散之而自愈此一節風泄所謂久泄也有暴下無聲身冷自汗

治隨症施

漿水散是也此一節寒泄所謂暴泄也故法曰後重者宜下腹痛者

宜和身重者宜除濕脉弦者去風膿血稠粘者以芍藥竭

之身冷自汗者以毒藥温之風邪內縮者宜汗之則愈驚

澹為痢宜温之而已又曰在表者發之在裏者下之在上

者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分利之

又曰盛者和之去者送之過者止之兵法曰避其來銳擊

其惰歸此之謂也 凡病泄而惡寒太陰傳少陰為上來

剋水也用除濕白朮茯苓安脾芍藥桂枝黃連破血火邪

不能勝水太陰經不能傳少陰而反助火邪上乘肺經而

痢必白膿也加當歸芍藥之類是已 又裏急後重脉大

而洪實為裏實症而痛甚是有物結墜也宜下之若脉浮

大甚不可下 雖裏急後重脉沉細而弱者謂寒邪在內

而氣散也可温養而自安 裏急後重閉者大腸氣不宣

通也宜加檳榔木香宣通其氣若四肢慵倦小便少或不

大便起坐沉困飲食減少宜調胃去濕白朮芍藥茯苓三

味水煎服白朮除脾胃之濕芍藥除胃之濕熱四肢困倦

茯苓能通水道走濕 如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主

如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝

脉實宜下浮忌下脉細宜温閉者宜調

三部血
症

佐之如腹痛甚加當歸倍芍藥如見血加黃連為主桂枝
當歸佐之 如煩躁或先便白膿後血或發熱或惡寒非
黃芩不能止上部血也如惡寒脉沉先血後便非地榆不
除下部血也如惡寒脉沉或腰痛或臍下痛非黃連不除
此中部血也如便膿血相雜而脉浮大慎勿以大黄下之
下之必死謂氣下竭也而陽無所收凡陰陽不和惟以分
陰陽之法治之 又曰暴泄非陰久泄非陽有熱者脉疾
身動聲亮暴注下迫此陽也寒者脉沉而細身困鼻息微
者薑附湯主之身重不舉木附湯主之 渴引飲者是熱
在膈上水多入則自胃膈入胃中胃本無熱因不勝其水
胃受水攻故水穀一時下此症當灸大椎三五壯立已乃
督脉瀉也如用藥使車前子雷丸白朮茯苓之類五苓散
亦可 又有寒泄者大腹滿而泄又有鷺瀉者是寒泄也

寒熱

虛實

鷺者鴨也大便如水其中有少結糞者是也如此者當用
天麻附子乾姜之類 又法曰泄有虛實寒熱虛則無力
不及拈衣未便已泄出謂不能禁固也實則數至圍而不
便俗云虛坐努責是也裏急後重皆依前法進退大承氣
分六經湯主之 太陽病為挾熱痢涼膈散主之 表症誤下因而
下痢不止為挾
熱 陽明為痼瘕進退大承氣湯主之 太陰濕勝濡瀉
不可下而可溫四逆湯主之 少陰蟄風不動禁固可瀉
赤石脂丸乾姜湯主之 厥陰風泄以風治宜小續命湯
消風湯主之 少陽風氣自動大柴胡湯主之

分新久

保五泄傷寒乃分三部

初說暴 次說中 後說久泄

此說是難經五十七難是三節內該十五法初治以暴藥
中以的對症藥得中治也未治久泄仲景論厥陰經治法

是也

垣胃氣和平飲食入胃精氣則輸于脾上歸于肺行於百脉而養榮衛也若飲食一傷起居不時損其胃氣則上升精華之氣反下降是為飧泄久則太陰傳少陰而為腸澼假令傷寒冷飲食膜滿而脹傳為飧泄者宜溫熱之劑以消導之傷濕熱之物而成膿血者宜苦寒之劑以內疎之風邪下陷者升舉之濕氣內盛者分利之裏急者下之後重者調之腹痛者和之洞泄腸鳴無力不及拈衣其脉細微而弱者溫之收之膿血稠粘數至圞而不能便其脉洪大而有力者下之寒之大抵治病當求其所因察何氣之勝取相剋之藥平之隨其所利而利之以平為期此治之大法也 論瀉痢久不止或暴下者皆太陰受病不可離甘草芍藥若不受濕則不痢故須用白朮是以聖人立法

五泄

若四時下痢於芍藥白朮內春加防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附然更詳外證寒熱處之如裏急後重須加大黃如身困倦須用白朮若自汗逆冷氣息微加桂附以溫之如或後重膿血稠粘雖在感冬於溫藥內亦加大黃

難有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後重 胃泄者飲食不化色黃飧泄也保命云承氣湯下之 又有脾泄

者腹脹滿泄注食即嘔吐逆保命云建中理中湯主之 大腸泄者食

已窘迫大便色白腸鳴切痛保命云乾姜附子湯主之 小腸泄者溲

而便膿血少腹痛保命云承氣湯下之 大瘕泄者裏急後重數至

圞而不能便莖中痛保命云胃小腸大腸三症皆清涼飲子主之其泄自止厥陰症莖中痛加

并草少陰症裏急後重加大黃

此治五泄之法也

診

丹泄瀉之症水穀或化或不化並無努責惟覺困倦若滯

下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛之異然皆裏急後重逼迫惱人

仲大腸有寒者多驚漉有熱者便腸垢

靈腸中寒則腸鳴飧泄腸中熱則出黃糜師傳

仲下利脉微弱數者為欲自止雖發熱不死 下利有微

熱而渴脉弱者亦自愈 下利脉數而渴者今自愈設不

瘥必清膿血以有熱故也 下利脉數有微熱汗出今自

愈設脉緊為未解 下利脉反弦發熱身汗者自愈 下

利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒

汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

素胃脉虛則泄脉要精要論

脉滑按之虛絕者其人必下痢 肺脉小甚為泄全文

虛實法經云小者血氣皆少腎主名氣血皆虛 腎脉小甚為洞泄小者血氣皆少腎主閉藏今血氣虛少無

以閉藏故泄

素尺寒脉細謂之後泄平人氣象論 尺膚寒其脉小者泄少

氣全文見評虛實論

仲下利脉沉弦者下重 下利寸口反浮數尺中自濇者

必清膿 澁病若腹大而泄者脉當細微而濇反緊大而

滑者死

脉泄注脉緩時小結者生浮大數者死

素泄而脉大者難治玉機真藏論 病泄脉洪大是逆也全論

死生

仲下利脉大者為不止 下利日十餘行脉反實者死

靈大便赤辦飧泄脉小者手足寒難已飧泄脉小手足溫

泄易已論疾診尺篇 腹鳴而滯四肢清泄其脉大是逆也如

是者不過十五日死矣全文見診生死 腹大脹四末清脫形泄

甚是逆也如是者不及一時死矣

仲六府氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者利不禁下甚者手足不仁 下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負跌陽者為順也 下利後脈絕手足厥冷時脈還手足溫者生脈不還者死病者痿黃燥而不渴胃中寒而利不止者死 假令下利寸口關上尺中悉不見脈然尺中時一小見脈再舉頭者腎氣也若見損脈來為難治

丹下痢如魚腦者半死半生 下痢如麈腐色者死

純血者死 下如屋漏者死 下痢如竹筒注者不可治

五虛者不治

五虛者經云脈細皮寒氣少泄痢前後飲食不入此謂

五虛五虛者死其漿粥入胃泄注止則虛者活予嘗治

數人在下則泄瀉不止在上則吐痰不已者皆死蓋氣脫無所管攝故也若用參朮膏救之早者十活二三

泄瀉 產後泄瀉

下痢水穀不入裏急後重是泄瀉也

脾濕 世胃苓湯一名對金飲子治脾濕太過泄瀉不止

平胃散 五苓散各等分 右剉水煎服極效

羅內經曰濕勝則濡泄甲乙經云寒氣客於下焦傳為濡泄夫脾者五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾故不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡泄法當除濕利小便也治之以對金飲子

平胃散錢五 五苓散二錢 草薢麩裏煨

右相和作四服水一盞半生姜三片棗二枚煎至一盞

去查温服食前

垣加減平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胃滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色痿黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重節痛常多自痢或發霍亂及五噎八噫隔氣反胃等症

厚朴去皮姜制炒

蒼朮去粗皮米泔浸五兩

陳皮三兩

甘草二兩

右為細末每服二錢水一盞生姜三片棗二枚同煎至七分去查温服或去姜棗帶熱服空心食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非常之氣如小便赤澀加白茯苓澤瀉如米穀不化飲食傷多加枳實如胃中氣不快心下痞氣加枳殼木香如脾胃困弱不思飲食加人參黃

芪如心下痞悶腹脹者加厚朴甘草減半如遇夏

加炒黃芩如遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉如有痰

涎加半夏陳皮凡加時除蒼朮厚朴依例加之如一

服五錢有痰用半夏一兩如嗽飲食減少脉弦細加

歸身黃芪如脉洪大緩加黃芩黃連如大便硬加

大黃三錢芒硝二錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下

海加減平胃散例若泄瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃

散一法加藿香半夏若加乾姜為厚朴湯若温疫

時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連鬚葱白五寸豆豉三十

粒煎二三服取微汗出愈若五勞七傷脚手心熱煩

躁不安百節痠疼加柴胡若痰嗽瘧痢加姜製半夏

若小腸氣痛加茴香若水氣腫滿加桑白皮若

婦人赤白帶下加黃芪若酒傷加丁香若飲冷傷

加高良姜 若滑脫泄瀉加肉苳菘 若風痰四肢沉
困加荆芥 若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛腫拘急
加地骨皮 若腿膝溫痺加兔絲子 若白痢加吳茱
萸 若赤痢加黃連 若頭風加藁本 若轉筋霍亂
加樟木皮 若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿
膝痠婦人宮臟久冷月事不調者加桂枝 若胃寒嘔
吐多加生姜一法加茯苓丁香各三兩 若氣不舒快
中脘痞塞加砂仁香附三兩生姜煎服 若與五苓散
相半為對金飲子 若與六一散相合為黃白散 若
與錢氏異功散相合為調胃散 若飲食進退加神麩
麥芽冬月加吳茱萸川椒乾姜桂為吳茱萸湯 若加
藁本桔梗為和解散治傷寒吐利 若加藿香半夏為
不換金正氣散 若瘧疾寒熱者加柴胡 若小腸氣

痛者加紫蘇茴香

丹或曰平胃散之溫和可以補養胃氣吾子以為何如予
曰蒼朮性燥氣烈行濕解表甚為有功厚朴性溫散氣非
脹滿實急者不用承氣用之可見矣雖有陳皮非草之甘
緩甘辛亦是決烈耗散之劑實無補土之利經謂土氣太
過曰敦阜亦能為病况胃為水穀之海多氣多血故因其
病也用之以瀉有餘之氣使之平耳又須察其挾寒氣得
寒物者而後投之胃氣和平便須却藥謂之和平者初非
補之之謂豈可以為補劑而常用之乎或曰調胃承氣亦
治胃病謂之調者似與平胃之平意義相近何用藥之相
遠也予曰調胃承氣治熱中下二焦藥也經云熱淫于內
治之鹹寒佐以苦其功在乎導利而行之以緩平胃散止
治濕上焦藥也經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以

汗為故而止或曰治濕不利小便非其治也此非仲景法
耶何子言之悖也予曰淡滲治濕因有濕在中下二焦今
濕在上宜以微汗而解不欲汗多故不用麻黃葛根輩耳
五苓散治泄瀉水多者方見傷寒
瀉濕四苓散加蒼朮白朮甚者二朮必用炒

白朮

三分加澤瀉一兩半

茯苓

猪苓

蒼朮

各五錢

本治水瀉用草烏半生半燒灰存性為末醋丸空心井花
水下七丸

濕熱

河益元散治身熱泄瀉小便不利

滑石

六兩

甘草

一兩

右為末每服三錢蜜湯調下日三服如解寒發汗煎葱
白豆豉湯調下四錢併三服以效為度

丹參黃丸治濕熱滯氣者濕熱甚者用為向導上可治亦
酸下可治自利

六一散

七兩即益元散

吳茱萸

二兩

一方去茱萸加乾

姜一兩名溫六丸

本歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能愈人云市人有此藥
三文一貼甚效夫人買進之一服而愈後召賣藥者問其
方但用車前子一味為末米飲下二錢此藥利水道

丹黃芩木通入四苓散煎服治火多泄瀉 水煮金花丸

治泄不止乾嘔方見乾嘔而利門

風痰

實者下之

世木香和中丸腹痛泄瀉脉滑者神效累驗方見治虛實法

仲下利脉遲而滑者實也利未欲止急下之宜大承氣湯

方見傷寒下利脉反滑者當有所去下乃愈宜大承氣湯

下利脉中堅者當下之 下利後三部皆平按之心下堅

逐之

者宜大承氣急下之 病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也其遂半夏湯主之

其遂

大者三枚 小者一枚

半夏

十二枚以水一升 煮取半升去查

芍藥

五枚

右四味以水二升煮取半升去查以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

田仁七姪之子肚泄有積與小胃丹二十粒作二次吞之

小胃丹方見內傷飲食

積熱作泄亦宜下之

保治寒積痢男婦小兒各不同或赤白或清痢如水不後

重者寒也經曰澄澈清冷皆屬於寒此為虛寒中有積也

宜附子巴菝輩下之見利則愈空心服

仲下痢氣者當利其小便

氣者利小便虛者和之

潔治太陰脾經受濕水瀉注下體重微滿困弱無力不欲

飲食暴泄無數水穀不化先宜白朮芍藥湯

白朮

芍藥

各一兩

甘草五錢俱用炒黃效速

右細末每一兩水二盞煎至一半溫服

如腹疼甚者宜蒼朮芍藥湯主之

蒼朮

芍藥

各一兩

黃芩半兩

右剉每一兩入淡桂半錢水盞半煎至一盞溫服

如脉弦頭痛者宜蒼朮防風湯主之

蒼朮

防風

各二兩

右剉同前法煎服 如下

血宜蒼朮地榆湯主之方見下 已上症如心下痞每服

加枳實一錢如小便不利每服加茯苓二錢如腹痛漸

已泄下漸少宜訶子散止之方見後

丹氣虛泄瀉人參白朮炒芍藥升麻主之

其功散治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食方見小兒吐瀉

補脾行

人參白朮茯苓甘草陳皮各
等分為末每五錢姜棗煎服

丹女人吐泄左手脉弱此自來欠血面帶黃多年當作虛
濕治之

滑石六錢

白朮兩半

陳皮

當歸各三錢

厚朴

木通

芍藥各一錢

甘草各五分

分六貼姜一片煎

四八官患泄小便赤少食少倦怠脉弱此受濕為病當補
脾涼肺

白朮

滑石各一兩

黃芩

人參

芍藥各五錢

木通

陳皮各三錢

乾姜一錢

甘草各一分

分八貼煎服

五兒腹泄此受寒涼為病

白朮

蒼朮各二錢

乾姜

茯苓

厚朴各一錢

甘草各三分

右為末每服二錢白湯調下

一丈夫腹瀉胃痞不渴

半夏一錢

蒼朮

白朮

青皮各二錢

木通

紫蘇各一錢

良姜半錢

甘草少許

分三貼姜三片水二盞煎服

輝五孺人瘰癧已好止是食少乏力肚泄自汗

牡礪半錢

白朮二錢

乾姜三錢

陳皮五分

黃芪二分

當歸一分

白水煎服

積賈宅女人六十八歲腹泄面黃乏力脉浮大而數此有熱

滑石

白朮炒各一兩

茯苓

神麴炒

陳皮各五錢

黃連

黃芩

乾姜一錢

右為末粥為丸山查湯食前下五十粒

一丈夫病熱退未盡食太早口渴倦甚腹泄心煩脚冷

人參 滑石 柴胡 白朮

陳皮各一錢 木通半錢 甘草五分

分四貼煎七分下保和十五丸

右九方丹溪東垣治泄瀉之法大率皆用白朮滑石補

脾行濕其餘隨症加減第一二方專治泄也第三方治

泄之挾熱也第四五六方治泄之挾寒也第七八方治

泄之挾飲食積也

脈弦者
并陽除
濕

垣予病脾胃久衰視聽半失此陰盛乘陽加之氣短精神

不足此由弦脈令虛多言之過也皆陽氣衰弱不得舒伸

伏匿於陰中耳癸卯歲六七月間淫雨陰寒踰月不止時

人多病泄痢濕多成五泄故也一日予體重肢節疼痛大

便泄并下者三而小便閉塞思其治法按內經標本論大

小不利無問標本先利小便又云在下者引而竭之亦是

先利小便也又云諸泄利小便不利先分別之又云治濕

不利小便非其治也皆言當利小便必用淡味滲泄之劑

以利之是其法也噫聖人之法雖布在方冊其不盡者可

以意求耳今客邪寒濕之淫從外而入裏以暴加之若從

已上法度用淡滲之劑以除之病雖即已降之又降是

復益其陰而重竭其陽則陽氣愈削而精神愈短矣是陰

重強陽重衰反助其邪之謂也故必用升陽風藥即瘧以

羌活獨活柴胡升麻各一錢防風根半錢炙甘草半錢同

咬咀水二鍾煎至一盞去查稍熱服大法云濕寒之勝助

風以平之又曰下者舉之得陽氣升騰而去矣又法云客

者除之是因曲而為之直也夫聖人之法可以類推舉一

而知百者也若不達升降浮沉之理而一槩施治其愈者幸也

升陽除濕陽治脾胃虛弱不思飲食洩瀉無度小便黃四肢困弱自下而上引而去之

升麻

柴胡

羌活

防風各半錢

蒼朮

甘草炙三分

神麴

澤瀉

猪苓

陳皮各五分

麥蘖三分

右咬咀水二盞煎去查空心服如胃寒腸鳴加益智半夏各五分姜棗同煎非腸鳴不用

人參升胃湯治一日大便三四次澹而不多有時泄瀉腹

鳴小便黃

黃芪二錢

甘草炙一分

升麻六分

柴胡

陳皮

歸身

益智各二錢

紅花少許

人參六分

右剉作二服水二盞煎至一盞去查稍熱食前服

實積丹止瀉姜麴丸

神麴六兩

茴香兩

生姜二兩

右為丸每服五七十丸

痰積泄瀉

海石

青黛

黃芩

神麴

右為丸每服三五十九丸病少者必用吐法吐之方愈

右積滯洩瀉腹必耕痛方泄者是也或肚腹滿按之堅

者亦是也受病泄者宜神麴之類消導之病深而頑者

必用滯下門後重多熱條進退承氣之類下之方安

虛滑熱丹固腸丸

樗皮四兩

滑石二兩

右為末粥丸

丹溪云固腸丸性燥若滯氣未盡者不可遽用

保訶子散治洩久腹痛漸已瀉下漸少宜此藥止之

訶子

一兩半生半熟

木香

二兩

甘草

二錢

右為細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不已

宜因其歸而送之於訶子散內加厚朴一兩竭其邪氣也

虛滑久而不止者多傳變為痢太陰傳少陰是為鬼邪先以厚朴枳實湯防其傳變

厚朴

枳實

各一兩

訶子

一兩半生半熟

黃連

二錢

甘草

二錢

大黃

三錢

右為細末每服三錢或五錢水一盞半煎至一盞去渣

溫服已上皆治熱滑瀉

寒丹補脾丸

白朮

兩

白芍藥

二錢

右為細末飯丸冬月去芍藥加肉苳蔻澤瀉服之又下

止者於內加飛礬一錢半

氣痢訶黎勒散主之用訶黎勒

十枚

右一味為散粥飲和

頓服

林億云疑非仲景方也

垣扶脾丸治脾胃虛寒腹中痛澹洩無度飲食不化

白朮

茯苓

甘草

炙

烏梅肉

各二錢

紅苳

乾姜

肉桂

麥蘖

炒各四錢

神麴

錢

半夏

右為末荷葉裏燒飯為丸如桐子大每服五十九溫水

食前下

一方加藿香一錢

治痢久臟腑虛滑去積不已用蒼朮湯下桃花丸

蒼朮

兩

防風

兩

右劉水一碗煎至一大盞下桃花丸或赤石脂丸小便
利則安桃花丸即滯下門桃花湯為丸赤石脂乾姜二味是也

衍有一人病大腸寒清小便精出諸熱藥服及一斗二升
未效後教服赤石脂乾姜各一两胡椒半錢同為末醋糊
為丸如桐子大空心及食前米飲下五七十九丸終四劑遂
愈

本治脾胃不和泄瀉不止諸藥不效訶子丸

訶子皮 川姜 肉荳蔻 龍骨

木香 赤石脂 附子各等分

右細末糊丸如桐子大每服四十九丸米飲下

赤石脂禹餘糧湯方治大腸泄瀉

赤石脂制 禹餘糧各四錢制

右剉碎每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

孫治氣虛傷冷暴作水瀉日夜二三十行腹痛不止夏月
路行備急朝真丹用硫黃一两半研令極細枯白礬五錢
同細研勻水浸蒸餅去水和丸如桐子大硃砂為衣每服
十五丸溫米飲鹽湯下已上止寒泄

暴泄寒治暴水洩不止

肉荳蔻三箇用濕麪裹之置火內煨令麪焦去麪丹溪云肉荳蔻屬金屬土溫中補脾為有力日華子稱其下氣以脾胃得補而善運化氣自下也非若香附陳皮之駛泄

右將肉荳蔻為細末只作一服陳米飲調食前服之神
驗

潔暴泄如水周身汗出一身盡冷脉沉而弱氣少而不能
語甚者加吐此謂緊病宜以漿水散治之

半夏二兩 良姜二錢 乾姜 肉桂

甘草 附子炮各五錢

右細末每服三五錢水二盞煎至一盞熱服甚者三四服若太陽經傷動傳太陰下痢為驚漉大腸不能禁固卒然而下中有硬物欲起而又下欲了而又不小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯謙甫云驚漉者大便如水其中有少結糞是也

桂枝湯

桂枝

芍藥

白朮

各半兩

甘草

炙二錢

右切每服半兩水一盞煎至七分去渣溫服

白朮散

白朮

芍藥

各三錢

乾姜

炮半兩

甘草

炙二錢

右麤末如前服之甚則除去乾姜加附子三錢謂辛能發散也

羅麪朮丸治時暑暴泄吐脾胃及治飲食所傷胸膈痞悶

神麪

蒼朮

泔浸一宿各等分

右為細末麪糊為丸如桐子大每服三十九丸溫米飲送

下

止洩丸

肉苳蔻

五兩

滑石

製

右為末搗飯丸惟滑石

夏三兩半秋二兩春冬一兩一錢半

羅中寒治驗

參政商公時年六旬有二原有胃虛症至

元巳巳夏上都住時值六月霖雨大作連日不止因公務勞役過度飲食失節每日臍腹作痛腸鳴自利須去一二行少定不喜飲食懶於言語身體困倦召予視之予診其脉沉緩而弦參政以年高氣弱脾胃宿有虛寒之症加之霖雨及勞役飲食失節重虛中氣難經云飲食勞倦則傷脾胃正氣不足腎水必挾木勢反來侮土乃薄所不勝乘所勝也此疾非甘辛大熱之劑則不能瀉水補土雖夏暑之時有用熱遠熱之戒又云有假者反之是從權而治其

急也內經云寒淫于內治以辛熱乾姜附子辛甘大熱以瀉寒水以為君脾不足者以甘補之人參白朮甘草陳皮苦甘溫以補脾土胃寒則不欲食以生姜草薤辛溫治客寒犯胃厚朴辛溫厚腸胃白茯苓甘草助姜附以導寒濕芍藥酸微寒補金瀉木以防熱傷肺氣為佐不數服即愈

附子溫中湯治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜臥

附子

炮去

乾姜

炮各

人參

甘草

白芍藥

白茯苓

去

白朮

各五

厚朴

姜

草薤

薤根

陳皮

各三

右剉每服五錢或一兩水二盞半姜五片煎一盞食前溫服

簡理中湯治泄瀉加橘紅茯苓各一兩名補中湯若瀉泄不已者於補中湯內加附子一兩不喜飲食水穀不化者再加砂仁一兩共成八味理中湯方見傷寒本治脾胃中風濕臟腑泄滑鞠藭丸

芩藭

神麴

白朮

附子

各等

右為細末麴糊丸如桐子大每服三五十丸米飲下左氏述楚子圍蕭蕭將潰無社告申叔展曰有麴乎有山鞠藭乎鞠藭芩藭也意欲令逃水中以避禍是知芩藭能除濕當加朮附以制之若脾濕而泄者萬無不中亦治殮泄

無桂香丸治臟腑虛為風寒所搏冷滑注下不禁老人虛人危篤累效

附子

炮去

肉苳蔻

炮

白茯苓

各一

桂心

乾姜炮

木香炮各

丁香分

右為末糊丸如桐子大米湯下五十九空心服
孫治水瀉無度乾姜末粥飲調一錢服立效

熱

泄而身熱小便不利口渴者益元五苓若火多四苓加木

通黃芩

方見濕熱條

泄而困倦不便者及脉數者虛熱者宜

參木滑石苓通

方見補脾行濕條

泄而脉滑堅者實熱宜大承

氣湯

方見實條

丹玉龍丸治一切伏暑泄瀉神效

方見傷寒部暑門

上下表裏

仲下痢不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利

在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復痢不止者當利小便

下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四

逆湯攻表宜桂枝湯

歲時

大腸小腸為泄

全文見見診

一陽發病少氣善欬善泄

全文見診病傳

變

運氣泄瀉有六

一曰土助脾濕盛而泄瀉經云歲土太過雨濕流行病澹

泄腸鳴又曰歲水不及濕乃下行民病身重濡泄又云歲

火不及寒乃大行土復則病驚澹腹痛腸鳴泄注又云土

鬱之發民病飲發注下又云濕勝則濡瀉治以苦溫是也

二曰風木攻脾虛而泄瀉經云厥陰司天風淫所勝民病

冷泄澹泄又云春傷於風邪氣留連乃為洞泄治以辛涼

是也

三曰熱瀉經云少陽所主為暴注又云少陰之勝腹滿澹

泄又云火鬱之發民病注下治以寒劑是也

四曰寒泄經云歲水太過寒氣流行病腸鳴澹泄又云太

陽所至為流泄禁止又云太陽之勝寒入下焦傳為濡泄

治以熱劑是也

五日熱中寒中泄經云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中注下者是外寒內熱泄也又云長夏善病洞泄寒中者是外熱內寒泄也治以寒熱兼施是也

六曰燥泄經云歲木不及燥乃大行民病腸鳴澹泄又云陽明司天燥淫所勝民病腹中鳴注泄驚澹又云陽明之勝清發於中澹泄又云陽明之復腹脹而泄治以溫劑是也

雜法

子和昔聞山東楊先生者治府主洞泄不止楊初未對病人與眾人談日月星辰纏度及風雷雲雨之變自辰至未而病者聽之忘其園楊嘗曰治洞泄不已之人先問其所愛之事好棋者與之棋好樂者與笙笛勿輒

針灸

針灸泄瀉獨取大腸一經經云大腸病者腸中攻痛而鳴

濯濯冬日中于寒即泄當臍而痛取巨虛上廉

羅治水漬入胃為溢飲滑泄渴能飲水水下復泄泄而大

渴此無藥症當灸大椎

脈諸下痢皆可灸足大都五壯商丘陰陵泉皆三壯

甲澹泄不化食寒熱不節陰陵泉主之

玉治久泄瀉內天樞穴撮天樞二十半灸摘英五

集自痢不止 天樞 中樞

世又法 合谷 三里 陰陵泉不應取 中脘 關元

天樞 神闕

東泄痢不禁小腹絞痛 丹田灸百壯 泄痢不嗜食

長谷五十壯三報之在脇臍傍

徐石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄胃脾

虛弱垂命欲盡服之無不效中病當便已不可盡劑世人

宜忌

蓋知用而為福不知用而為禍此物損益兼行若俱棄而不用當倉卒之間又可闕乎

產後泄瀉

丹治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉洞泄不禁下青白黑色用荊芥大者四五穗於盞內燒灰不得犯油火入麝香研湯三呷調下此藥雖微能治大病方名的產後泄方

茯苓

川芎

黃芩

白朮

乾姜

滑石

陳皮

芍藥炒

右水煎服之

殮泄

殮泄米穀不化而完出是也

脾氣下

素清氣在下則生殮泄

陰陽應象論○三誌云熱氣在下則穀不化故殮泄東垣云清氣在

下者乃人之脾胃氣衰不能升發陽氣故用升麻柴胡助其辛之味以引元氣之升不令下陷為殮泄也
羅內經曰清氣在下則生殮泄又曰久風入胃中則為腸風殮泄夫脾胃土也氣冲和以化為事今清氣下降而不升則風邪久而干胃是木賊上也故冲和之氣不能化而令物完出所以謂之殮泄或飲食太過腸胃所傷亦致米穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之而消剋之也以加減木香散主之

木香

良姜

升麻

檳榔

人參各二錢半

肉苳蔻煨

吳茱萸泡

乾姜泡各五分

神麴炒二錢

陳皮五分

砂仁五分

右十一味為細末每服四錢水盞半煎至一盞去查食前溫服宜加白朮

河白朮湯治殮泄風冷入中泄利不止脉虛而細日夜數

行口乾腹痛不已

厚朴製

當歸去苗

龍骨各五錢

白木兩

艾葉半錢 熱炒

右為末每服三錢水一盞生姜三片同煎至八分去渣空心温服

治痰世宜奪食

凡泄則米穀不化謂之飧泄是清氣在下乃胃氣不升上古聖人皆以升浮藥扶持胃氣一服而愈知病在中焦脾胃也脉訣曰濕多成五泄濕者胃之别名也病本在胃真氣弱真氣者穀氣也不能剋化飲食乃濕盛故也以此論之正以脾胃之弱故也初病奪食或絕不食一二日使胃氣日勝泄不作也今已成大泄矣經云治濕不利小便非其治也又云下焦如瀆又云在下者引而竭之唯此症不宜此論其病得之於胃氣下流清氣不升陽道不行宜

升宜舉不宜利小便靈樞云頭有疾取之足謂陽病在陰也足有疾取之上謂陰病在陽也經曰陽病在陰陰病在陽此之謂也中有疾傍取之傍者少陽甲膽是也中者脾胃也脾胃有疾取之足少陽甲膽者甲風是也東方春也胃中穀氣者便是風化也作一體而認故曰胃中濕勝而成泄瀉宜助甲膽風勝以克之又是升陽助清氣上行之法也又一說中焦元氣不足溲便為之變腸為之苦鳴亦緣胃氣不升故令甲氣上行又云風勝濕也大抵此症本胃氣弱不能化食奪食則一日而可止夫奪食之理為胃弱不能剋化食則為泄如食不下何以作泄更當以藥滋養元氣令和候泄止漸與食胃勝則安矣若食不化者於升陽風藥內加炒麴同煎煎食入頓至心頭者胃之上口也必口沃沫或食入反出皆胃土停寒其右手關脉中弦

按之洪緩是風熱濕相合穀氣不行清氣不升為弦脉之
寒所隔故不下也麩之熱亦能去之若奮胃者更加半夏
生薑入於風藥內同煎奪食少食欲使胃氣強盛也若藥
劑大則胃不勝藥泄亦不止當漸漸與之今病既久已至
衰弱當以常法治之不可多服餌也人之肉如地之上豈
可人而無肉故肉消盡則死矣消瘦人有必死者八內經
肌肉消者勿治有七外經有一又病肌肉去盡勿治之天命也如肌肉不
至瘦盡當急療之宜先奪食而益胃氣便與升陽先助真
氣次用風藥勝濕以助升騰之氣病可已矣餘皆勿論此
治之上法也治用升陽除濕湯之類是也
羅加減木香散方見正條
仲下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之方見傷寒

河白朮散治飧泄脉細方見上條
垣治洩痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗宜防風芍藥湯

防風

芍藥

黃芩

各等分

右籠末每服半兩或一兩水二盞煎至一半温服
梅治水穀痢久不瘥厚朴三兩黃連三兩坐細水三升煎取一升空心服

病生於風

素春傷於風夏生飧泄生氣通天論

久風為飧泄全文見診法

久風入中為腸風飧泄論風

右久風入中為飧泄經云虛邪之中人也始於皮膚留而不入傳舍於絡脉留而不入傳舍於經留而不入傳舍於輪留而不入傳舍於伏衝之脉留而不入傳舍於腸胃在腸胃之時責響腹脹多寒則腸鳴飧泄食不化

此久風入中為殮泄之義同也

水自內出宜灸

潔古云太渴飲水多因致水穀一時下者宜灸大椎三五壯或用車前子雷丸白朮茯苓及五苓散等藥滲之詳見

風從外入宜下

大法條又如久風為殮泄者則不飲水而穀完出治法當以宣風散導之後服蒼朮防風湯

宣風散

方見小兒痘發熱條服之大利服後藥

蒼朮防風湯

蒼朮

去皮四兩

麻黃

一兩

防風

五錢

右麤末每一兩生姜七片水一盞煎至一半去渣溫服

如止後服後藥

補本丸

蒼朮

小椒

去目炒各一兩

右為細末醋糊丸如桐子大每服五十九食前溫水下

一法惡痢久不效者彌佳小兒丸如米大

子和趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月六月不愈諸醫以為胃受大寒故併與聖散子葶藶丸雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知藥之非反責明之不忌口戴人至而咲曰春傷於風夏必殮泄殮泄者水穀不化而直過下出又曰米穀不化熱氣在下久風入中中者脾胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能剋戊己腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病殮泄診其兩手脉皆浮數為病在表也可汗之直斷曰風隨汗出以火二盆暗置床下不令病人見火恐憎其熱詒之入室更服涌劑以麻黃投之乃閉其戶從外鎖之汗出如洗待一時許開戶滅火一半須臾汗止泄亦止 內經曰春傷於風夏生殮瀉此以風為根風非汗不出者有病此者腹中雷鳴泄注米穀

不分小便清滯皆以脾胃虛寒故耳服荳蔻烏梅粟殼乾姜附子曾無一效中脘臍下灸已數千燥熱轉甚津液涸竭瘦削無力飲食減少命予視之余以應象論曰熱氣在下水穀不分化生殮泄寒氣在上則生臍脹而氣不散何也陰靜而陽動故也診其脉兩手皆浮大而長身表微熱用桂枝麻黃湯以姜棗煎大劑連進三服汗出終日至旦而愈次以胃風湯和其臟腑調養陰陽食進而愈

腸痺

河水香丸治腸痺多飲不泄上氣喘爭時發殮泄腹痛

木香

白朮

官桂

蕪荑

訶子皮

良姜

附子炮去皮

厚朴姜制

肉荳蔻

各一兩 乾姜六錢

甘草五錢

右為末麩糊丸如桐子大每服二十九丸姜湯空心下

運氣

運氣殮泄皆屬風木攻脾經云歲木太過風氣流行脾土

受邪民病殮泄食減又云歲土不及風乃大行民病殮泄體重腹痛又云土不及曰卑監卑監之紀上角與正角同其病殮泄治以涼劑是也

針灸

刺灸殮泄有三法

其一取脾經云脾虛則腹滿腸鳴泄食不化取其經足太陰陽明又云殮泄取三陰之上補陰陵泉皆久留之熱行乃止又云殮泄取三陰者是也三陰者太陰也

其二取腎經云腎藏志志有餘腹脹殮泄瀉然筋血者是也然筋謂然骨視血絡盛則泄之

其三取肝經云肝足厥陰之脉所生病者胃滿嘔逆殮泄是也視盛虛寒熱陷下施法也

渴飲水多水穀一時下者灸大椎三五壯立已詳見大法條

甲殮泄大腸痛巨虛上廉主之 又太衝主之

雜方

遺尿

天治產後遺尿取故燕巢中草燒灰研細酒調服五分男子亦治

又方 白礬枯 牡蠣煨

右等分爲末酒服方寸七日三男女同治

診 墮病人臥遺尿不覺者死

滯下 久泄久痢 胎前痢 產後痢謂

之痢疾是也

丹痢初得時一二日間以利爲法有熱先退熱 後重者

當利氣木香枳榔腹痛用溫散藥姜桂之屬 下血當涼

血和血當歸桃仁之屬 下痛發熱惡寒身首俱痛此爲

表證宜微汗和解用蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生姜三片

表裏煎 下痢身發熱者有外感用小柴胡去參 下痢發熱

久不止者屬陰虛用寒涼藥必兼升散藥并熱藥用 下

痢初發熱必用大承氣下後看症用藥 發熱不惡寒脉

洪者宜大承氣若惡寒者忌下 下痢腹痛後重小水短

下積此爲裏症宜和中踈氣用陳皮芍藥滑石枳殼厚朴

之類

潔芍藥湯治下血調氣經曰澁而便膿血知氣行而血止

也行血則便自安調氣則後重自除

芍藥一兩 當歸各半 枳榔

木香各二錢 甘草一錢 大黃三錢 黃芩五錢

桂二錢

右麤末每服半兩水二盞煎至一盞食後溫服如血前

則漸加大黃如清後臙毒加黃栢半兩同煎服

利小便 一老人年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作

痢下血淡水膿腹痛小便不利裏急後重以參朮為君甘
草滑石檳榔木香蒼朮為佐下保和丸二十五丸第二日
前症俱減獨小便不利以益元散服之安

河益元散治身發熱下痢赤白小便不利盪胃中積聚

瀉

虛實

丹痢初得之必用調胃承氣及大小承氣實者用此下之

下婁男子五十餘下痢晝有積淡紅色夜無積食自進先

喫小胃丹兩服再與四十九次六十九去積却與斷下

羅玄青丸治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不能止

須吐下之以開除瀉熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜此

逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水氣腫腹脹兼療小

兒驚疳積熱乳癖諸症

黃連

黃栢

大黃

甘遂

芫花

醋拌

大戟

各五錢

輕粉

二錢

青黛

一兩

牽牛

四兩取頭末二兩

右為末研勻水丸小芫大初服十丸每服加十丸空心

日午臨臥三服以快利為度後常服十五丸數日後得

食力如利尚未痊再加取利利後却常服以意消息病

去為度後隨症止之小兒丸如黍米大退驚疳積熱不

須下者常服十九

玄利積丸

黃連

四兩

天水末

八兩

當歸

二兩

乳香

一兩

蘿蔔子

炒四兩

巴苳

一兩去油同黃連一處炒

右為末醋糊丸如桐子大弱者十五丸實者二十五丸

治下痢赤白腹滿脹痛裏急上瀉引飲小水亦瀉此積

滯也宜泄其熱中用清腸丸導氣丸推其積滯而痢自

無矣凡治積聚之症輕則溫而利之清腸丸是也重者
氣少惡食此為挾虛症宜加白朮當歸身尾甚者加人
參若又十分重者止用此藥加陳皮補之虛回而痢自
止矣

予族叔年近六十夏間患滯下病腹微痛所下褐色後重
頻併飲食大減時有微熱察其脉皆弦而瀦似數稍長却
喜不甚浮大兩手相等視其神氣大減予曰此非滯下乃
憂慮所致心血虧脾氣弱也與參朮為君歸身陳皮為臣
川芎炒白芍茯苓為佐使如熱加黃連為使與兩月而安
金氏婦年近四十秋初尚熱患滯下腹但隱痛夜重於晝
全不得睡食亦稍減口乾不飲已服治痢靈砂兩貼矣予
視之兩手脉等瀦且不勻神思倦甚飲食全減因與四物

湯倍加白朮以陳皮佐之數貼而安

義一姪患瘡間日作蕪痢脉虛甚身痛宜活血補胃待虛
稍回却又推積

人參

分五

白朮

錢一

蒼朮

陳皮

各一

白芍藥

炒五分

川芎

五分

滑石

炒一

甘草

炙少

桃仁

研七分

藥後病退惟脉少弦身倦用此方調補

人參

分九

蒼朮

錢三

半夏

分九

川芎

錢一

陳皮

錢一

木通

半錢

甘草

少

煎取三之一飲之可淡粥少少塞飢又靜坐養之

葉先生患滯下後甚逼迫正合承氣症但氣口虛形雖實
而面黃積白此必平昔食過飽而胃受傷寧忍二三日辛
苦遂與參朮陳皮芍藥等補藥十餘貼至三日後胃氣稍

完與承氣二貼而安苟不先補完胃氣之傷而遽行承氣恐病安之後寧免瘦憊乎

雜方

世治痢煙蠟丸黃蠟不拘多少用銀篦挑於真香油燈上燒薰落水碗內凡如此者七次為丸如蘿蔔子大每二

十丸白痢甘草湯下赤痢烏梅湯下本草云蜜蠟主下利膿血補中又云白蠟

主後重白膿

葛治重下此即赤白痢火熬豉令少焦杵服一合日三效無比又熬豉令焦水一升淋取汁冷服治淋日三服有效食治脾胃氣虛下痢日夜不已腸滑不進食用野雉一隻如食法細斫着陳皮葱椒調和鹽醬作餛飩熟煮空心食之

虛熱

丹噤口痢胃中熱甚大虛大熱故也用人參二錢黃連一錢濃煎汁終日細細呷之如吐再喫但一呷下咽便開又宜

封臍引熱下行用田螺肉搗碎罨臍中入麝香少許

世痢疾不納飲食者俗謂之噤口痢以脈症辨之如脾胃不弱問而知其頭疼心煩手足溫熱未嘗多服涼藥者此

乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜用敗毒散每服四錢陳倉米一百粒姜三片棗一枚水一盞半煎八分溫服若

其脈微弱或心腹膨脹手足厥冷初病則不嘔因服鷲粟殼烏梅苦澁涼藥太過以致聞食先嘔者此乃脾胃虛弱

用山藥一味剉如小荳大一半入銀瓦銚內炒熟一半生用同為末飯飲調下又方用石蓮槌去殼畱心并肉碾

為末每服二錢陳米飲調下此疾蓋是毒氣上衝心肺借此以通心氣便覺思食效

熱

暴注下迫皆屬於熱全文見診

荷香連丸治下痢赤白裏急後重

黃連

去苦二十兩用吳茱萸十兩同炒令赤去茱萸不用

木香

四兩八錢不見火

右為細末醋糊丸如桐子大每服三十丸空心飯飲下
錢荳蔻香連丸治泄瀉不問寒熱赤白陰陽不調腹脹攻
痛可用如神

黃連三錢

肉荳蔻

木香

各一錢

右為細末粟米飯丸黍粒大每服米飲下十九至二十三
十丸日夜各四五服食前

杜治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連二兩乾姜半兩各為
末每用連二錢姜半錢和勻空心溫酒下

羅黃連阿膠丸治脾胃氣冷熱不調下痢赤白狀如魚腦
裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連

三兩

茯苓

二兩

阿膠

右各為末水調阿膠和藥衆手丸如桐子大每服二十

丸溫米飲湯下

仲熱利下重者白頭翁湯主之

方見傷寒

仲下痢膿血裏急後重日夜無度宜導氣湯

芍藥

二錢

當歸

五錢

大黃

各二錢半

黃芩

黃連

木香

檳榔

各一錢

右為細末每服三錢水一盞煎至七分去渣溫服如未
止再服下後重則止

潔大瘕泄者裏急後重數至圜而不能便莖中痛用清涼

飲子主之其泄自止莖中痛者屬厥陰加甘草裏急後重
多者屬少陰加大黃令急推去舊物則輕矣內經曰因其

重而減之又云在下者引而竭之

清涼飲子方見治發熱

裏急後重數至圜而不得便皆宜進退大承氣湯主之

進退承氣法

進承氣法治太陰症不能食是也當先補而後瀉乃進藥

法也先剉厚朴半兩姜製水一盞煎至半盞服若二三服未已胃有宿食不消加枳實二錢同煎服二三服泄又未已如不加食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄未止者為腸胃久有塵垢滑粘加芒硝半合垢去盡則安矣後重無虛症者宜之若力倦氣少脉虛不能食者不宜此法蓋厚朴枳實大瀉元氣故也

退承氣法治陽明症能食是也當先瀉而後補乃退藥法也先用大承氣五錢水一盞依前法煎至七分稍熱服如瀉未止去芒硝減大黃一半煎二服如熱氣雖已其人心腹滿又減去大黃但與枳實厚朴湯又煎二三服如腹脹滿退泄亦自安後服厚朴數服則已

後重有邪壓垣感應丸治下痢赤白後重遲瀉方見內傷飲食門丹或曰治後重疎通之劑羅謙甫水煮木香膏東垣白朮安胃散等方已盡矣又有用御米殼等固澁之劑亦愈者

何也曰後重本因邪壓大腸墜下故大腸不能升上而重是以用大黃枳榔輩瀉其所壓之邪今邪已瀉其重仍在者知大腸虛滑不能自收而重是以用御米殼等瀉劑固其滑收其氣用亦愈也然大腸為邪墜下之重其重至圍後不減大腸虛滑不收之重其重至圍後隨減以此辨之百發百中也 其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此為死血症法當用搗細桃仁滑石行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱即加黃芩或口不渴身不熱喜熱手熨盪是名挾寒即加乾姜

八嬪將產患痢脉細弦而稍數後重裏急

滑石三錢 芍藥二錢 枳殼炒錢 木通二錢

甘草五分 白朮錢 茯苓錢

桃仁每貼九枚研同前

青田人肚痢紅紫血下墜逼迫不渴不熱

白朮

芍藥兩

陳皮

枳殼炒

歸身

滑石兩

甘草二錢

桃仁三十箇

分八貼下實腸丸三十粒

一丈夫因酒多下血肚疼後重成痢

滑石兩

連翹

黃芩

木通

芍藥

枳殼

白朮二錢

甘草五分

桃仁一枚

分四貼服

後重積與氣墜下服升瀉藥不愈者用秦芫皂角子煨大黃當歸桃仁枳殼黃連等劑若大腸風盛可作丸服

自古治裏急後重但用檳榔木香調氣及大黃下積至丹溪始用桃仁滑石活死血如鼓應桴實發前人之所未發也

調氣

其或下墜在血活之後此為氣滯症宜前藥加檳榔一枚

後重當和氣積與氣墜下者當兼升蕪消升謂升麻之類消謂木香

檳榔之類

仲泄痢下重者以水五升煮薤白三升至二升去渣以四

逆散方寸七內湯中煮取一升半分溫再服東垣云薤白泄滯氣

食主赤白痢下薤白一握切煮作粥食

補血

丹其或氣行血和積少但虛坐努責此為亡血症倍用當歸身尾却以生地黃生芍藥生桃仁佐之復以陳皮和之血生自安

垣虛坐而不得大便皆因血虛也血虛則裏急加當歸身

凡後重逼迫而得大便者為有物而然今虛坐努責而不得大便知其血虛也故用當歸為君生血藥佐之

凡諸用承氣等藥挨積之後仍後重者乃陽不升也藥中

當加升麻升其陽其重自去也

垣升陽除濕防風湯治裏急後重數至圉而不能便或少
有白膿或少血者慎勿利之升陽除濕防風湯方見下血

積丹其或在下則纏滯在上則嘔食此為毒積未化胃氣未
平症當認其寒則溫之熱則清之虛則用參朮補之毒解
積下食自進矣

治痢方

蒼朮

白朮

茯苓

當歸

白芍藥

青皮

生地

黃連

滑石

甘草

作一服水煎裏急後重加黃連滑石桃仁檳榔甚者大
黃嘔者加半夏姜汁

寒

世仲景建中湯治痢不分赤白久新但腹中大痛者神效
其脉弦急或濇浮大按之空虛或舉按皆無力者是也方見

寒

丹萎長官年三十餘奉養厚夏秋間患滯下腹大痛有人
教服單煮乾姜與一貼痛定少頃痛作又與又定由是服
乾姜三斤八日後召予視之左脉弦大似數右脉弦而大
稍減亦似數重取之似緊予曰此必醉飽後吃寒涼大過
當作虛寒治之因其多服乾姜遂教與四物湯去地黃加
人參白朮陳皮酒紅花茯苓桃仁煎生姜汁飲之一月而
安丹溪云下痢腹痛用姜桂溫散之
法乃乾姜并建中湯加桂是也
聖治冷痢腹中不能食肉荳蔻一兩去皮以醋麩裹煨熱
搗非時粥飲下二錢七

右下痢腹痛必溫散而愈者蓋本於內經所謂寒氣客
於小腸小腸不得成聚故腹痛後泄及所謂太陽病冬
日感寒即泄當臍而痛之病也

燕
垣芍藥黃芩湯治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩 芍藥各一 甘草五

右咬咀每服一兩水一盞半煎至一盞溫服無時如痛加桂少許

當歸導氣湯治膿血痢無度小便不通腹中痛

當歸 甘草一錢 芍藥一錢 青皮

槐花 七分 木香 檳榔各三 澤瀉五

生地黄 錢半或二錢

右為末水煎食前溫服如小便利去澤瀉

仲下痢腹痛紫參湯主之

紫參 斤半 甘草 兩

右二味以水五升先煮紫參取三升內甘草煮取一升

半分三次溫服

病按
潔厚朴丸治處暑秋冬間腹痛下痢大效方見反胃

世治痢疾定痛黑子丸

黃蠟 錢五 杏仁 江子 砂仁 各廿

右三件香油燈上燒存性鎔蠟和勻加乳香些少丸如

米大每服十餘粒

本治積痢定痛靈砂丹

礞砂 硃砂 各等分 研極細

右用黃蠟五錢巴豆三七粒去殼皮膜同於銀石器內

重湯煮一伏時候巴豆紫黑為度去二七粒止用一七

粒與前藥二味同研極勻再鎔蠟和藥旋丸藜苳大每

服二丸至五丸水瀉生薑湯下白痢艾湯赤痢烏梅湯

下服時須極空心服畢一時不可吃食臨臥尤佳次食

淡粥一日瘥疾乳香湯面東不發日晚間服此藥不動
氣服之瀉者止痢者斷疼者愈有積者內化亦不動臟
腑大凡痢有沉積者不先去其積雖暫安後必為害常
記陳侍郎經中庚戌秋過儀真求診初不覺有疾及診
視肝脉沉弦附骨取則牢予曰病在左脇有血積必發
痛陳曰誠如是前某守九江被召冒暑涉長江暨抵行
朝血痢已數日矣急欲登對醫者以剛劑燥之雖得止
數日臍下一塊大如盂旬日如碗大痛發則不可忍故
急請公祠以歸耳柰何予曰積痢不可強止故積血結
於臍脇下非抵當丸不可渠疑而不肯服次年竟以此
終

羅陳麴丸治腹中冷痛磨積止痢

陳麴一兩

乾姜炮

官桂

白朮

當歸

厚朴

人參

甘草炙各半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五十丸酒送下或
淡醋湯亦得食前一日三服發時不拘增數
右久病漸換其積方

初痢宜下

脈下痢而腹滿為實當下之

丹初下痢腹痛不可用參朮然氣虛胃虛者可用初得之
亦可用大承氣調胃承氣下之看其氣病血病然後加減
用藥 氣用參朮 血用四物 因積作後重者保和丸
主之五日後不可下脾胃虛故也

氣鬱發

腹痛者肺經之氣鬱在大腸之間者以苦梗發之然後用

愈多作

治痢藥氣用氣藥血用血藥 其或痢後糟粕未實或食
粥稍多或飢甚方食肚中作疼切不可驚恐當以白朮陳

皮各半煎湯和之自安 粥多及食肉作痛者宜奪食奪

水宜分

食者減其粥食絕其肉味也

恒茯苓湯治因傷冷水瀉變作赤白痢腹痛減食熱燥四肢困倦無力

茯苓分六

澤瀉

婦身分四

芍藥分一錢

蒼朮分二

生姜錢二

肉桂分五

黃芩分三

猪苓分六

甘草分五

升麻

柴胡錢一

一本無升麻柴胡

右咬咀作二服水煎稍熟食前服

羅神效越桃散治下痢之後小便利而腹中滿痛不可忍

此名陰陽反錯不和之甚也

大梔子

良姜各三錢

右為末米飲或酒調下三錢

赤黃為熱青白

內經膿血稠粘皆屬相火夫太陰主瀉少陰主痢是先洩

為寒

忘津液而火就燥腎惡燥居下焦血分其受邪者故便膿

血然赤黃為熱青白為寒治須兩審治熱以堅中九芫蕘

丸香連丸治寒白膠香散或多熱少寒承煮木香膏虛滑

頻數宜止宜瀉宜養藏湯木香養藏湯並見虛滑條白膠香散未攷

堅中丸治脾胃受濕滑泄注下

黃連

黃栢

赤茯苓

澤瀉

白朮略一

陳皮

肉苳蔻

白芍藥

人參

官桂

半夏錢五

右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十九丸温米飲

送下食前服

丹下血用四物為主當涼血和血當歸桃仁之屬

潔洩而便膿血者小腸泄也脉得五至已上洪大者宜七

宣丸脉平和者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芫

用藥隨寒暑

藥栢皮丸四時皆宜加減平胃散如有七宣丸症者亦宜服此藥去其餘邪兼平胃氣

芍藥栢皮丸方 芍藥 黃栢各等分

右為細末醋糊丸如桐子大每服五十九丸食前温湯下

加減平胃散經云四時皆以胃氣為本久下血則脾胃虛

損血水流於四肢却入於胃而為血痢宜服此滋養脾胃

白木 厚朴 陳皮各一兩 檳榔三錢

甘草三錢 木香三錢 桃仁 人參

黃連 阿膠 茯苓各五錢

右咬咀每服五錢姜三片棗一枚水煎温服無時 血

多加桃仁 熱泄加黃連 小便澀加茯苓澤瀉 氣

不下後重加檳榔木香 腹痛加官桂芍藥甘草 膿

多加阿膠 濕多加白木 脈洪大加大黃

食積

丹下血多主食積與熱或有用朴硝者

蒼朮 白木 黃芩 芍藥

滑石 茯苓 甘草 陳皮

神麴炒 煎下保和丸

醫治痢食積

附米 神麴 川芎 梔子

滑石 山查 紅麴 青黛

桃仁 為末丸服

濕熱

丹青六九去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸同服並不單

服兼治產後腹痛或自利者能補脾補血赤滄血痢效

六一散三兩即散 紅麴半兩

右飯為丸一方酒糊丸

二十九宣肚痢食少下墜赤積身熱

木通二錢 芍藥炒 陳皮 白朮

滑石錢五 甘草紅

分四貼煎下保和丸與點丸各十丸

潔蒼朮地榆湯治脾經受濕下血痢

蒼朮兩三 地榆兩

右對每一兩水二盞煎一盞湯服

槐花丸治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮 槐花 荆芥穗各等分

右為末水煎空心溫服

內瘕 神小腸有寒者其人下重便血

集治血痢神效乾姜於火上燒黑不令成灰磁碗合於釜中
為末每服一錢米飲調下

白濁氣 墮大便後有白膿或只便白膿因勞役氣虛傷太腸也

黃芪人參補之如裏急頻見汚衣者血虛也更加當歸
如便白膿少有滑頻見汚衣者氣脫加附子皮甚則加御
米殼如氣濇者只以甘草補氣當安臥不言以養其氣氣

勞熱

丹丈夫辛苦勞役肚痢白瀉

滑石兩一 陳皮 白朮錢六 芍藥錢五

黃芩錢三 甘草五分 桃仁箇三十

分六貼水二盞半煎取一盞食前服

飲積 孫郎中因飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮 厚朴 白朮 茯苓

滑石 下保和丸又云加炒麴甘草

身熱脈洪為熱治痢熱多者

大黃 黃連 黃柏 黃芩

枳殼

白芍藥

當歸

滑石

甘草

桃仁

白朮

右等分為末麪糊丸

世不問赤白痢用苦黃根不拘生乾搗取汁生薑蜜水調服未效再進半碗許立愈

集愚赤白痢山荳根搗末蜜丸空心煎木下二十九三服止

千治下痢冷熱諸治不瘥方

烏頭

黃連各一

右二味為末蜜和丸如桐子大下二十九日三夜二神

妙

世治似痢非痢挾熱者用苦棟根皮

去粗皮晒乾

右為末粳米飲為丸米飲下

去脉

羅至元乙亥應臺王千戶領兵鎮漣水此地卑濕因勞役

過度飲食失節至秋深瘡痢併作月餘不愈飲食全減形

容羸瘦時已仲冬求治於予具陳其由診得脉弦細而微

如蛛絲身體沉重手足寒逆時復麻痺皮膚痲疥如癘風

之狀無能以動心腹痞悶嘔逆不止皆寒濕為病久淹真

氣衰弱形氣不足病氣亦不足陰陽皆不足也針經云陰

陽皆虛針所不為灸之所宜內經云損者益之勞者溫之

十劑云補可去弱先以理中湯加附子溫養脾胃散寒濕

澁可去脫養藏湯加附子固腸胃止泄痢仍灸諸穴以併

除之經曰府會太倉即中脘也先灸五七壯以溫養脾胃

之氣進美飲食次灸氣海百壯生發元氣滋榮百脉克實

肌肉復灸足三里胃之合也三七壯引陽氣下交陰分亦

助胃氣後又灸陽輔二七壯接續陽氣令足脛溫暖除清

助胃氣後又灸陽輔二七壯接續陽氣令足脛溫暖除清

濕之邪迫月餘病退平復 理中湯方見傷寒部加附子名附子理中湯

海六脉沉緊按之不鼓膀胱勝小腸也或瀉痢不止而腹

脹或純便赤血或雜以血膿小便不多而不渴精神短少

或面白色脫此失血之故也或面黃氣短此本氣損少之

故也小腸者手太陽丙火也膀胱者是太陽壬水也是壬

水乘兩小腸之位小腸被壬所剋而外走也諸手經短而

足經長兼五行相剋論之又足經來剋手經此火投於水

大寒水之症宜溫之可安其與難經一症寒熱相反亦名

曰小腸瀉此病火投于水變為寒症又外傷足太陽膀胱

經左脉俱浮表陽之候也忽變為內寒亦旺火投盛水而

屈丙就壬化脉反不浮而微沉此內病與外病俱有此火

投水例非精於脉診者孰能辨之

石脂神砂丹

生附子

乾姜各五錢

赤石脂兩半 硃砂一分

右細末酒糊丸黑豈大每服十五丸米白湯下

太平廣記貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不效詔問群臣中

有能治者當重賞之有術士進以乳汁煎葦撥服之立瘥

世治水泄併赤白痢用草烏大者一兩半將一半燒灰一

半生用為細末醋糊丸如棗豈大每服七丸赤痢甘草湯

下白痢乾姜湯下水瀉井花水下並空心服忌腥臊熱毒

諸冷物

法 夏秋治

世俗治夏中暑痢疾用黃連香薷飲加甘草芍藥生姜神

效者蓋夏月之痢多屬于暑潔古治處暑後秋冬間下痢

用厚朴丸大效者蓋秋冬之痢多屬于寒經所謂必先歲

氣毋伐天和者是也 厚朴丸方見膈氣反胃 初病大腸閉塞裏急

後重 治法並見前 後重多熱條

勿病... 丹其或纏滯退減十之七八穢積未盡糟粕未實當以炒
芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然
固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行者但當單飲此湯固腸
丸未宜遽用蓋固腸丸者雖有去濕實腸之功其或久痢
體虛氣弱滑泄不止又當以訶子肉荳蔻白礬半夏等藥
瀉之甚者添牡蠣可擇用之然須以陳皮為佐恐太瀉亦
能作疼又甚者灸天樞氣海此穴大能止泄

寒滑

仲下痢便膿血者桃花湯止之方見傷寒若一服愈勿再服丹溪云桃花湯主病屬下焦血虛且寒非乾姜之溫石脂之澁且重不能止血用梗米之甘以引入腸胃
羅水煑木香膏治脾胃受濕臟腑滑泄腹中疼痛日夜無
度腸鳴水聲不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤黃或
便膿血並宜服之

木香 丁香各一兩 枳實炒五錢 當歸

乳香 訶子皮各一兩 肉荳蔻 砂仁各一兩半

藿香 黃連炒 白芍藥 青皮

陳皮去白 厚朴制 甘草炙各一兩 乾姜炮五錢

御米殼蜜水炒六兩

右為細末煉蜜丸彈子大每服一九水一大盞劈破煎至六七分和查稍熱食前服

海易簡斷下湯治下痢赤白無間新久長幼

白朮 茯苓各一錢 甘草五分 草果連皮一箇

右咬咀用鶯粟殼十四枚去筋膜并萼蒂剪碎用醋淹為糞末用作一服水一大碗姜七片棗子烏梅各七箇煎至一大盞分二服服之赤痢者加烏荳二粒白痢者加乾姜五錢鶯粟殼治痢服之如神但性緊瀉多令人嘔逆既以醋制加以烏梅不致為害然嘔吐人則不可

服大率痢疾古方謂之滯下多因腸胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止先以巴菝感應丸十餘粒白梅湯下令大便微利仍以前藥服之無不應手作效若脾胃素弱用荳蔻橘紅鶯粟殼各等分為末醋煮麩糊為丸桐子大每服五十九烏梅湯下兼治泄瀉暴下不止一服即愈更令藥力相倍為佳如覺惡心却以理中湯四物湯加荳蔻木香輩調其胃氣仍以二陳湯煮木香丸定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊年人尤非所宜若果首尾用平和之劑決難作效必致危篤雖欲服此則已晚矣其秦芫地榆黃栢木通之類其性苦寒却難輕服血痢當服胃風湯并膠艾湯之類白者宜服附子理中湯震靈丹之屬更宜審而用之若五色雜下泄瀉無時當用熟烏頭一兩厚朴乾姜甘草各一

分生姜煎服今之治痢多用駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已則服之取效若病稍重則非此可療

熱滑世治痢

側栢葉

錢一 甘草三錢

御米殼

去頂穰湯洗三次曬乾密拌炒黃

錢久者倍之

右咬咀水煎熟澄清入蜜呷服之先服木香栢榔丸後服此妙

本又方

黑荳粒五十

陳皮兩

鶯粟殼十四 甘草

右四味半生半炒水煎空心服盡此一劑無不效者
垣白朮安胃散治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘痛日夜無度又治男子小腸氣痛及婦人臍下虛冷并產後兒

枕痛虛弱寒熱不止者

御米殼三兩去頂糠

茯苓

白朮各一兩

烏梅取肉一兩

車前子一兩

五味子兩

右為末每服五錢水煎溫服

經治腸滑久痢神妙以石榴一箇劈破炭火簇燒令烟盡急取出不令作白灰用碗蓋一宿出火毒為末用酸石榴一箇煎湯調二錢

聖治痢久不止腸垢已出以烏梅二箇水一盞煎取六分去查食前分為二服

山治痢用五倍子為丸赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下各十九

脫肛

垣訶子皮散癸卯歲冬十月小雪天冷應時樞密院白家一老僕面墮脫色神氣特衰長跪於前曰病脫肛日久服

藥未驗近日復下赤白膿痢作裏急後重白多赤少不任其苦求予治療予曰此非肉食膏粱者也必多蔬食或飲食不節天氣已寒衣蓋又薄寒侵形體不禁而腸頭脫下者寒也滑也真氣不禁形質不收乃血脫也此乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當以澁去其脫而除其滑以大熱之劑除寒補陽以補氣之藥升陽益氣以微酸之味固氣上收名之曰訶子皮散

御米殼五分去花

乾姜六分

陳皮五分

訶子皮七分煨

右咬咀水煎服或為白湯調服亦可若空心一服減半再服全愈

羅養臟湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調臟腑受寒下痢去白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疼痛日夜無

度胃膈痞悶脇肋脹滿全不思食及脫肛墜下酒毒濕毒便血諸藥不效者並宜服之

人參

當歸各六錢

木香一兩四錢

肉桂八錢

肉蔻麩裏煨

白芍藥一兩二錢

甘草炙六錢

白朮六錢

御米殼蜜炙

訶子皮去核一兩二錢

右咬咀每服二大錢水煎去查食前溫服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌酒麪生冷魚腥油膩物臟腑滑泄夜起久不瘥者可加附子四片煎服此藥神效不可具述

保治泄痢膿血乃至脫肛者宜地榆芍藥湯

蒼朮八兩

地榆

卷栢

芍藥各三兩

右咬咀每服二兩水煎溫服病退勿服

大孔開世治痢大便不禁其大孔開如空洞不閉者用葱和花椒

末搗爛塞穀道中併服酸澁固腸之劑收之如御米殼訶子皮之類是也神效

大孔痛

丹陳伯夫年二十歲性急好酒色奉養厚適有事多憂恐患久瘡寒熱無時忽一日大發熱大便所下皆是積滯極臭大孔極痛呻吟不絕其孔陷下囁付後事予曰此大虛也脉皆弦大而浮遂以瓦片令敲圓如銅錢狀燒紅投童子小便中急取起令乾以紙裹安痛處其時寒恐外寒乘虛而入也以人參當歸陳皮作濃湯飲之食淡味至半月而安

久下赤白大孔痛不可忍炒鹽熨之又炙枳實熨之後

痢久大孔急痛亦有寒熱者熟艾黃蠟訶子燒薰之妙華日

下痢大孔痛因熱流于下檳榔木香黃連黃芩加乾姜

運氣下血有二

其一熱助心血盛而血下經云少陰司天熱淫所勝民病血泄溺色變又云少陽在泉火淫所勝民病溺赤甚則便血又云歲金不及炎火乃行民病血便注下又云厥陰司天風氣下臨火縱其暴赤沃下注治以鹹寒是也
其二寒攻心血虛而下經云太陰司天寒淫所勝血變于中民病血泄又云太陽之勝血脉凝泣或為血泄又云陽明司天之政四之氣民病血便治以諸熱是也

運氣下赤白有三

其一屬火經云少陽司天火淫所勝民病泄注赤白又云少陽在泉火淫所勝民病泄注赤白少腹痛注下赤白治

以甘清是也

其二屬風經云厥陰之勝腸鳴飧泄少腹注下赤白治以甘清是也

其三屬風濕經云太陽司天之政四之氣風濕交爭民病注下赤白是也

運氣裏急後重有二

其一濕助脾盛而重經云太陰之勝少腹滿腰脛重強內不便善注泄是也

其二風攻脾虛而重經云厥陰司天風淫所勝民病澹泄痲水閉是也痲謂後重也

雜方

本救命延年丸治丈夫女人一切重痢

黃連

乾姜

當歸

阿膠

右三件為末用米醋煮阿膠令消盡不可剩却將藥搜

醋丸如桐子大每服三十九飯飲吞下甚妙

又方 茱萸 黃連 阿膠 白芍等分同

右為細末麩糊為丸如桐子大每服三十九陳米飲送

下小兒十九陳無擇無阿膠各成已丸

羅阿膠梅連丸治下痢無問新久赤白青黑疼痛諸症

阿膠炒研極細 烏梅肉炒 黃栢炒 黃連

當歸 赤芍藥 乾姜炮 赤茯苓各等分

右為末入阿膠末研勻水丸桐子大米飲下

黃連丸治赤白痢

吳茱萸 黃連

右用好酒同浸三日各自為末各自丸白痢茱萸丸赤

痢黃連丸甘草湯下赤白痢二丸相和服

右四方寒熱蕪施收散蕪用之劑寒熱滑滯雜合為痢

者宜之

崔治痢方以生姜切如麻粒大和好茶一二碗任意啣之

愈若熱痢則留姜皮冷則去皮炒 又方用陳皮艾葉濃

煎湯服

針灸 滯下獨取足太陰一經經云脾足太陰之脉所生病者澹

痼泄水視盛虛熱寒陷下取之也

東泄痢不禁小腹痛後重便膿血

丹田一寸 復溜 小腸俞灸七吐不已取 天樞 腹哀胃

一寸五分 冷痢腹痛泄注赤白 關元 窮谷各灸五

泄痢及下失氣膿血 下腰五十壯穴在八魁正中央脊骨上灸各三宗骨三報

之 便膿血久痢下重 小腸俞灸

世裏急後重 合谷 外關

甲便膿血寒中食不化腹中痛腹哀主之 澹痼腹中痛

臟痺地機主之

宜忌

丹予族叔形色俱實瘥瘥又患痢自恃強健能食絕無忌憚一日召予曰却健而能食但苦汗出耳汝能止此汗否予曰瘥瘥非汗不能愈可慮者止健與能食耳此非痢也胃熱善消脾病不化食與積勢已甚矣此時宜節擇飲食以養胃氣省出入以避風寒候汗透而安叔曰世俗謂無飽死痢疾我今能食何謂可慮予曰痢而能食者知胃氣未病也故言不死非謂恣食不擇節者不從所言恣口大嚼過多又啖水菓如此者月餘後強求治不可着手矣淹淹又月而死內經以驕恣不論於理為不治之病信哉又周其姓者形色俱實患痢善食而易飢大嚼不擇者五月矣予責之曰病中當調補自養豈可恣味戕賊遂教其只用熟蘿蔔吃粥且少與調治半月而安

羅如瀉痢止脾胃虛難任飲食者不可一槩用剋伐之劑宜補養充足自然能飲食也宜錢氏方中異功散設或喜嗜飲食太過有傷脾胃而心腹痞滿惡心嘔逆不拘此例當權用橘皮枳朮丸一服得快勿再服若飲食調節不致有傷則胃氣自和平矣

丹下痢久甚者寒涼藥中必兼升散并熱劑初下痢不可用參朮唯氣虛者用之

衍有一男子暑月患血痢醫妄用寒藥逆制專用木香黃連阿膠治之此藥始感便用則可倘病久腸虛者不宜服切宜戒之 地榆性沉寒苦惟下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢未可輕使

丹古方用厚朴專為瀉積滯之氣然厚朴性太溫而散氣久服大能虛人滯氣稍行即去之餘滯未盡宜炒枳殼陳

皮然枳殼亦能耗氣比厚朴雖少緩比陳皮亦為重若滯氣退一半亦當去之只用陳皮以和衆藥然陳皮去白用有補瀉之兼能若為參朮之佐亦純作補藥用

久泄久痢

臟腑有積在上宜吐

丹予族叔年七十稟壯形瘦夏末患泄痢至秋百方不應予視之病雖久而神不瘁小便濇少而不赤兩手脉俱澁而頗弦自言胃微悶食亦減因悟曰此必多年沉積癖在腸胃詢其平生喜食何物曰我甚喜食鯉魚三年無日不用予曰積痰在肺肺為大腸之臟宜大腸之不固也當與澄其源而流自清以茱萸陳皮青蔥薤白根生姜煎濃湯和以砂糖飲一碗許自以指探喉中至半時吐痰半升如膠其夜減半次早又服又吐半升而痢止又與平胃散加白朮黃連旬日而安 朱仲符年近七十右手風攣多年

在下宜

七月患泄瀉百藥不愈診其脉右手浮滑而洪數予曰此必太陰分有積痰肺氣壅鬱不能下降大腸虛而作泄當治上焦遂用蘿蔔子加漿水蜜探之而吐得痰一塊大如椀色如琥珀稠粘如膠痢遂止不服他藥薤白一本作鹿目無考子和東門一男子病泄痢不止腹鳴如雷不敢冷坐坐則下注如傾諸醫例斷為寒症官桂乾姜丁香荳蔻枯礬龍骨之屬皆服之矣針灸無效遷延已二十載矣一日問于戴人戴人曰兩手寸脉皆滑予不以為寒然其所以寒者水也以茶調散湧寒水五七升又以無憂散泄積水數十行乃通因通用之法也次以五苓散淡劑滲泄利水道又以甘露散止渴不數日而冷食寒飲皆如故此法王啓玄言之矣柰無人用之何哉 太康劉倉使大便少而頻日七八十次常於兩股間懸半枚瓠蘆戴人見而笑之曰便

既頻而少欲通而不得通也何不大下之此通因通用也
止宜一服藥之力乃與藥大下二十餘行頓止

潔治泄痢久不安膿血稠粘裏急後重日夜無度宜大黃

湯用大黃一兩剉用好酒兩大盞浸半日同煮至一盞半

去渣分為二次頓服之痢止停服未止再服以利為度又

服芍藥湯以和之所以徹其毒也為藥湯方見
滯下和裏條

保白朮黃芩湯服前藥痢已除宜以此和之

白朮一兩 黃芩七錢 甘草三錢

右咬咀水煎去渣溫服

丹有人每早須大瀉一行或腹痛或不腹痛空心服熱藥
亦無效有人教以夜食前又進熱藥一服遂安後如此常
服愈蓋暖藥雖平旦服之至夜力已盡無以敵一夜陰氣
之故也

本治腎泄五味子散

五味子二兩 吳茱萸半兩

右二味炒香熟研為細末每服二錢陳米飲下有一人
每五更將天明時必溏痢一次如是數月有人云此名

腎泄腎感陰氣而然服此頓愈

每日早起瀉一二行俗謂之受肚瀉是也其症有二一

屬寒積在內即前二條之症是也 一屬食積在脾嘗治

翁仲政久泄早必泄一二行泄後便輕快脉滑而少弱先

與厚朴和中丸五十九丸大下之後以白朮為君枳殼茯苓

半夏為臣厚朴炙甘草連川芎滑石為佐吳茱萸十餘粒

為使生姜煎服十餘貼而愈

下執續寒
仲下痢已瘥至其年月日時復發者以病不盡故也當下

之宜大承氣湯

寒積熱
本治痢冷在腸胃間頻年腹痛泄瀉休作無時服諸熱藥不效宜先取去然後調治不可畏藥以養病也

厚朴 乾姜 甘草 桂心

附子生各二錢 大黃生細切水一盞浸半日煎汁用之

右咬咀水二升半煎八合後下大黃汁再煎六合去渣分三溫服服自夜至曉令盡否則更以乾姜丸佐之

乾姜丸

乾姜 巴荳去心研 大黃 人參各一兩

右除巴荳餘為末同研煉蜜丸如桐子大食前用湯吞下一丸陳米飲亦得

有人因憂愁中傷食結積在腸胃欲發吐利自冬後至暑月積傷發暴下數日不已玉函云下痢至隔年月日應期而發者此為有積宜下之止用溫脾湯尤佳如難下可佐

以乾姜丸後服白朮散

白朮 木香 附子 人參各等分

右細末每服二錢水一盞生姜二片棗子一箇煎六分溫服

汚血

丹東陽胡兄年四十歲患痢百餘日百法治不效時正九月初旬予診其六脉促急沉弦細弱托左手為甚晝夜十行視之穢物甚少雖下清涕中有紫黑血絲食全不進予曰此非痢也當作瘀血治之其兄問瘀血何事而致予曰飽食急走極力叫罵歐打顛撲多受疼痛盛怒不泄補塞太過大酒大肉皆能致之彼云去歲枉受責杖經涉兩年恐非此等瘀血予曰服吾藥得瘀血下則生矣以桃仁乳香沒藥滑石佐以檳榔木香用神麩糊為丸以米飲下五粒至夜半又不動又依前法下二百粒至天明下穢如爛

風邪內縮

魚腸者二升半困頓終日漸與粥食而安
久泄是風邪內縮先煎小續命湯以發其汗使邪氣不能
侵於外然後治其痢秋冬間下痢併治番胃加減厚朴丸
大妙

此症係風邪縮於內其症下痢不止寸脈沉而遲手足
厥逆下部脈不至咽喉不利或嘔吐膿血為難治宜麻
黃升麻湯或小續命湯以發之法曰表邪縮于內當散
邪於四肢布於絡脈外無其邪臟腑安矣有食積者加
枳實五錢如酒入而泄瀉此熱也加黃芩五錢麻黃升
麻湯見

傷寒小續命
湯見中風

子和李德卿妻因產後病泄一年餘四肢瘦乏諸醫皆斷
為死症求治戴人戴人曰兩手脈皆微小乃痢病之生脈
况洞泄屬肝經肝木克土而成此疾亦是腸澼澼者腸中

通因通

有積水也先以舟車丸四五粒又以無憂散三四錢下
四五行人皆駭之病羸如此尚可通耶眾人雖疑然未敢
謂且更看之復以導飲丸又通之渴則調飲五苓散向晚
使人伺之已起而緝麻前後約三四十行以胃氣湯調之
半月而能行一月而安健 劉德源病洞泄逾年食不進
肌瘦力乏行步欹傾面色黧黑舉世治病之藥皆用之無
效戴人先以舟車丸無憂散下十餘行殊不困已頗喜食
後以檳榔丸磨化其滯待數日病已大減戴人以為去之
未盡當再服前藥德源亦欣然請下之又下五行次後數
日更以苦劑越之往問其家彼云已下村中收索去也
酒肉積丹 一丈夫酒多病泄久不愈又自進附椒等食不進洩愈
多

滑石

黃芩半兩

乾姜

黃連

樗皮

粥為丸每服一百丸

予治方憲可二三年久泄下積但食肉則甚脉右關滑左沉細先以厚朴丸三四十粒下之次奪其食用補劑加二陳及朴連查榔等消導藥煎湯下厚朴丸五粒阿魏丸二十五丸服之五六日漸得下氣多而泄不止遂間服固腸丸泄漸止即安是知固腸丸之苦寒治酒肉積之要藥也

厚朴丸方見香胃

虛寒

垣聖餅子治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

黃丹

蜜陀僧各二錢

輕粉許少

定粉

研黃

各三錢

右為細末入白麩四錢和水丸如桐子大捻作餅子陰乾食前溫漿水磨服以大便黑色為效

衍義云黃丹治久積

丹脾泄當大補脾氣而健運之

潔肉苳丸治腎泄久不愈脉沉細無力者效

破故紙

肉苳蔻

麩裹煨各等分

右為末棗肉丸如桐子大米飲空心下

世固中丸治脾久泄去後與氣不快者

蒼朮

肉苳蔻

煨各一兩

右粥丸桐子大每服五十丸於固中丸內加破故紙一

兩名固下丸治腎久泄

丹泄瀉丸治久病大腸氣泄

熟地

芍藥

知母

升麻

乾姜

生甘草

右為末白湯調服再灸百會三五壯

又方 白朮

神麩

芍藥

或散或丸子服愈

虛積

垣治老人奉養太過飲食傷脾常時脾泄

白朮

炒二兩

白芍藥

酒炒一兩

神麩

炒一兩半

山查

二兩

半夏

制一兩

黃芩

炒半兩

右為末青荷葉燒飯丸

虛滑

本治腎泄宜五味子散

方九早

訶黎勒丸治休息痢晝夜無度臍腹撮痛諸藥不效

椿根白皮

二兩

母丁香

三十粒

右為細末醋糊丸如桐子大每服五十丸陳米飲湯入

醋少許一日三服效

椿根乃樗根俗所謂虎眼樹是也

本木香散治隔年痢不止并治血痢尤捷

木香

對用黃連半兩同炒

鶯粟殼

對用生姜半兩同炒

甘草

炙

右為細末入麝香少許每服一錢陳米飲下

雜方

世治久瀉不止用百草霜研細以粥糊為丸白湯下

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息痢取大虫骨炙

焦搗末調服日三七效

于治赤白痢積年不瘥飲湯調雲母末方寸七兩服效

又治血痢用千年石灰五升熬黃以水一斗攪令澄清一

服日三升

胎前下痢

虛 本治婦人胎前產後赤白痢

生姜

年少者百錢老者二

鴨子

一箇打碎入姜汁內攪勻

右二味煎至八分入蒲黃三錢煎五七沸空心温服立

效

無姪娠下痢赤白絞刺疼痛

鷄子

一枚烏鷄者佳

黃丹

一錢入鷄子殼內打

沉固濟火上煨培乾研為細末

右每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女
天治妊娠素弱頻併下痢腹痛羸瘦面色痿黃不進飲食

厚朴半兩 白木 川芎 白芍藥

熟地 當歸 乾姜 人參各一兩

訶子三錢 甘草一錢

右咬咀每服四錢姜三片同煎

又方治妊娠下痢腹痛小便澁

當歸 黃芪各一兩 糯米一合

右細切和勻水煎分四服

羅大寧散治妊娠下痢赤白灰色泄瀉疼痛垂死者

黑荳三十粒 粟殼二兩半 甘草二兩半

右為粗末都作一服生姜三片同煎食前服神效

挾熱 天治妊娠挾熱下痢亦治男子常痢

黃連 黃栢各一升 山梔仁二十枚

右咬咀每服五錢水二盞浸二時久煮十沸頓服若嘔

加陳皮一兩半姜三兩

黃連湯治妊娠下痢赤白膿血不止

黃連八分 厚朴制 阿膠炙 當歸

乾姜各六分 艾葉 黃栢各四分

右為細末空心米飲調下方寸匕日三服

滯氣 厚朴散治妊娠下痢黃水不絕

厚朴三兩 黃連三兩 肉荳蔻一枚 連皮用

右為籠末水煮頓服

草藥飲治妊娠臑氣本虛脾胃少弱臑腑虛滑腹膝疼痛

日夜無度

厚朴姜制 肉荳蔻一箇 薑

右咬咀每服三錢姜三片同煎
產後痢

雲救急散治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥 阿膠 艾葉 熟地各一兩
甘草 當歸各三兩

右咬咀水煎分二服空心飲

天當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產後血

暈崩中久痢方見妊娠腹痛門

後重者散之

楊療妊娠血痢用阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服
天產後諸痢煮薤白食之 又方羊腎脂炒薤白空心食

之甚佳

經治產後胎前痢疾敗龜甲一枚米醋炙研為末醋湯調

虛滑者收之 下丹溪云龜甲大補陰治勞倦

丹婦人患墮胎後膈滿食少痢不止脉虛左手尤甚

滑石 白芍藥炒 蒼朮各五錢 白朮二錢五分

乾姜四錢 茯苓一錢 訶子二錢煨

右為細末調下保和丸四五十粒

雲產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃連御米殼等藥

黃連丸治產後赤白痢腹中攪痛不忍

黃連 阿膠 蒲黃 梔子仁各一兩

當歸二兩 黃芩 黃栢各二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸米飲調下日

三夜一

仲產後下痢虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之脉經作熱痢重下新

產虛極者

白頭翁 阿膠各二兩 黃連 黃栢

虛

熱滑

秦皮

各三兩 甘草

右以水七升煮取二升半納膠令消盡分三服溫服
婦人臨產痢疾山梔不拘多少燒灰為細末空心熟水調
下一錢甚者不過五服

產後血痢小便不通臍腹疼痛用生馬齒莧搗汁二大合
煎一沸下蜜一合調頓服

寒滯

梅治產後血泄不禁餘血作痛蕪塊桂心乾姜等分為末
空心酒調服方寸七

雜方

大療產後痢日五十行者取木裏蠹虫糞炒黃急以水沃
之令稀稠得所服之即瘥

聖產後諸痢方取蒼耳葉搗汁半盞日三四溫服

大便不通 產後大便閉 大小便不通

產後大小便不通

虛實

垣津液耗而燥者以辛潤之 腎主五液津液感則大便

如常若飢飽勞役損傷胃氣及食辛熱厚味之物而助火
邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥又有年老
氣虛津液不足而結者腎惡燥急食辛以潤之是也

氣血風燥皆潤之

潤腸丸 并加減法 治胃中伏火大便閉澇或乾燥不通全不思
食乃風結血秘皆令閉塞須潤燥和血踈風則自然通矣

羌活 歸稍 大黃 各半兩 麻仁

桃仁 泡去皮尖各一兩

右為末除麻仁桃仁另研如泥外為細末煉蜜為丸如

桐子大每服三五丸空心白湯下 如病人不小便

因大便不通而澁其邪盛者急加酒洗大黃以利之

如血燥者加桃仁酒洗大黃 如風結燥者加麻仁大

黃 如風澁者加煨皂角仁大黃秦芫以利之 如脉

瀉覺身痒氣瀉者加郁李仁大黃以除氣躁 如寒陰
之病為寒結閉者以局方中半硫丸或加煎附子生姜
湯冰冷與之其病雖陰寒之症當服陽藥補之若大便
恒不甚通者亦當十服中與一服利藥微通其大便不
令閉結乃治之大法也 若病人雖是陰症或是陰寒
之症其病顯躁脉堅實亦宜陽藥中少加苦寒之劑以
去熱躁躁止勿加如陰躁欲坐井中者其二腎脉按之
必虛或沉細而遲此為易辨如有客邪之病亦從權加
藥以去之

右一方加減法隨寒熱虛實及血秘氣秘風秘用藥至
為詳盡餘方皆不出此也

垣活血潤腸丸治大便風秘血秘時常結燥

當歸稍錢一

防風稍錢二

羌活兩一

大黃兩一

麻子仁

二兩 桃仁

二兩 研

皂角仁 炮存性去皮研一兩其性得濕則滑

滑則燥結自除

右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸桐子
大每服五十九丸白湯下三二服後須以蘇子麻子粥每
日早晚食之大便日久再不結燥以磁器盛之紙封勿
令見風

當歸潤腸湯

升麻錢二

當歸稍錢一

熟地錢一

生地錢二

紅花分五

大黃煨

甘草稍生

桃仁

麻仁各一錢
研如泥

右劉如麻豆大作一服水三盞入桃麻仁煎一盞空心
稍熱服

導滯通幽湯治太便秘幽門不通上衝吸門不開噎塞不

便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸身

升麻稍

桃仁泥

甘草灸各一錢

紅花許少

熟地

生地各五分

右改咀作一服水二大盞煎至一盞調檳榔細末五分稍熱服之

海許學上治年老虛秘麻仁蘇子各半合研取汁分二服煮粥服之不藥而愈

羅潤腸橘杏丸降氣潤腸服之大腸自無瀉滯

橘皮

杏仁去皮尖并双仁者麩炒黃各等分本草云杏仁能瀉氣燥

右等分為末煉蜜丸如桐子大每服五十九丸空心溫水下亦不損胃氣

右乃潤燥法蓋桃仁麻仁治血燥杏仁郁李仁治氣燥阜角仁治風燥也

丹楊淳三哥大便秘瀉小便如常咽塞不通食下便有痰出脉瀉左右手同此血虛腸燥為脾約病甚者人參散主之

人參

黃芪各一錢

厚朴八分

地黃七分

桃仁

枳殼炒各一錢

甘草少許

煎入竹瀝姜汁飲之又與鎖陽菴蓉二錢桃仁一錢煮粥入竹瀝名潤腸散

婦人腸秘補血和氣以通之

肉苳蓉半兩

麻仁

白芍藥

陳皮

當歸身各一兩

右為末晒乾炒神麩糊為丸如桐子大食前白湯下五十丸二次服

世從蓉潤腸丸治發汗過多耗散津液大腑秘結

三才圖會卷之三
三十一
茯苓酒浸焙沉香另研

右為末用麻仁汁打糊丸如桐子大每服七十九米飲下

海益血丹治大便燥久虛亡血

當歸酒浸熟地各等分

右為末煉蜜丸如彈子大細嚼酒下

丹大腸虛秘而熱者

白芍藥半兩陳皮

生地

當歸身各一條

條苓甘草

右粥為丸白湯下

右從蓉當歸地黃潤燥法蓋積血枯竭而虛甚者宜之

有積丸泄之

垣有物有積而結者當下之食傷太陰腸滿食不化腹響響然不能大便者以苦泄之仲景麻仁湯方七宣五皆以大黃為君之類是也

風宜散之

垣治注夏大便滯者血少血中伏火也黃芪人參湯加

生地黃當歸身桃仁泥麻仁泥潤之黃芪人參湯方見注夏如潤

之大便久不快利者少加煨大黃微利之如加大黃久

不快利者非血結血秘是熱則生風病必濕風症止當服

黃芪人參湯只用羌活半兩防風半兩水四盞煎至一盞去查空心服之其大便必大走也

西北方人宜開

結東南方人宜潤燥

丹脾約丸論○成無已曰約者結約之約又束約之約胃

強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便

硬故曰脾約與此丸以下脾之結燥潤腸結化津液入胃

則大便利小便少而愈矣愚竊有疑者既曰脾約脾弱不

能運也脾弱則土虧矣必脾氣之散脾血之耗原其所由

久病大下大汗之後陰血枯槁內火燔灼熱傷元氣又傷

於脾而成此症傷元氣者肺金受火克氣無所攝傷脾者

肺為脾之子肺耗則津竭必竊母氣以自救金耗則木寡于畏土欲不傷不可得也脾失轉輸之令肺失傳送之官宜大便秘而難下小便數而無藏畜也理宜滋養陰血使孤陽之火不熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行津液津液入胃則腸潤而通矣今以^{能食便}大黃為君枳實厚朴為臣雖有芍藥之養血麻仁杏仁之溫潤為之佐使用之熱甚而氣實者無有不安愚恐西北二方地氣高厚人稟壯實者可用若用之東南之人內熱自甚而血氣不實者雖得暫通將見脾愈弱而燥矣後之用此方者須知在西北以開結為主在東南以潤燥為主慎勿膠柱而調瑟可也

^{能食便} 瀉臟腑之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而秘者能飲食小便赤當以麻仁丸七宣丸之類主之仲景麻仁丸方見傷

寒陽明病每服二十九丸未知加至五十九丸日三服以利為度

高七宣丸

柴胡兩五 桃仁去皮尖炒六兩 枳實炒五兩 甘草炙四兩

訶子皮各五兩 木香各五兩 大黃麩裹煨十五兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服二十九丸米飲送下漸加四五十丸以利為度

凡治大便不通用烏柏木皮方一寸劈破以水煎取小半盞服之立通不用多服其功神聖兼能取水或以此湯調下五苓散二錢空心更妙

潔胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯主之

陳皮兩一 甘草炙二兩 厚朴制二兩 白朮三兩

半夏麩炒一兩 枳實炒一兩

右麩末每用三五錢水盞半姜三片棗一枚煎至一盞

不能食 痰清為氣秘

能食便 赤為物秘

去查空心溫服實秘者物也虛秘者氣也

世棋榔散治腸胃受濕大便秘瀉用棋榔不拘多少為末每服二錢蜜湯點服不拘時

診象

海槐杏仁俱治大便秘當以血氣分之年老虛人大便秘燥秘者脉浮在氣杏仁陳皮主之脉沉在血桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以其干陽明病與手太陰為表裏也又云盛則難便行陽氣也敗則便難行陰血也

診陰陽寒熱

仲問曰脉有陽結陰結者何以別之曰其脉浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脉沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇垣有陽結有陰結陽結者散之陰結者熱之熱氣留於小腸腸中痛膈熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣全文見諸痛

陽結

膀胱移熱於小腸膈腸不便全文見診病傳變

保大黃牽牛散治相火之氣遊走臟腑大便秘結

大黃兩 牽牛頭末半兩

右為細末每服三錢有厥冷合用酒調無厥冷而手足煩熱者蜜湯調下食後以微利為度此謂不時而熱者濕熱也凡用大黃半兩至一兩而大便不通利者加麝少許調於藥中則大便必大走也

右熱秘皆陽結之屬仲景大小承氣及麻仁丸之類是也方見傷寒陽明病

世治後分閉塞用萱草根一捻同生姜搗碎取自然汁服之立愈

陰結

局半硫丸治年高冷秘虛秘

硫黃研細生用 半夏為末

右等分和勻生姜自然汁打麪糊為丸桐子大每服五

十九九空心温酒姜湯任下

垣麻黃白朮湯治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐穢痰白沫如膠時躁熱發欲去衣須臾而過振寒頂額有時如冰額寒尤甚頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭小腹急痛當臍有動氣按之堅硬而痛

麻黃不去根五分桂枝三分

杏仁四箇

吳茱萸四分

白芷五分厚朴三分

炒麩五分

升麻二分

柴胡

白朮

蒼朮各三分

甘草生一分

澤瀉

白茯苓各四分

橘紅二分

青皮去穢

黃連酒浸

黃柏酒浸

黃芪

人參

猪苓各三分

熟甘草一分

右段咀分作二服每服水二大盞半先煎麻黃沸去沫再入諸藥同煎至一盞去查稍熱食遠服 此症宿有風濕熱伏於榮血之中其水火乘於陽道而上盛元氣短少上喘為陰火傷其氣四肢痿在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又實其母肺金克木凌火是大勝必有大復其症善怒欠多嚏暈中如有物不聞香臭目視慌慌多悲健忘少腹急痛遍身黃腹大脹面目腫尤甚食不下痰唾涕有血目眦癆大便不通只二服皆愈

運氣運氣大便閉有三

一曰熱經云熱至則淋閉又云少陰之復膈腸不便是也

二曰寒經云太陽所至為禁止是也

三曰濕經云太陰司天濕淫所勝病大便難是也

外取法

仲蜜煎導法

方見傷寒胃實丹溪云潞公夏中病泄有人與石脂龍骨乾姜等藥煎雖止而勢甚苦公

又不樂大黃藥遂一夕用蜜煎三下結糞方十枚遂安若虛人秘者難下藥宜用此法

海霹靂煎用鹽與蜜乘熱捻如蜜煎法上頭碗用十許納

穀道中少許化開即通一法用蜜煎不通者用鹽吹入穀道中亦妙

海蜜煎與鹽相合如用草烏頭末相合亦可蓋鹽能軟堅

潤燥草烏能化寒消結可隨症陰陽所宜用之

急提盆散治雜病非陰候者用草烏頭不拘多少為極細

末每用葱一枝肥者削去鬚圓頭上有汁濕蘸之納穀道

中

仲猪膽汁方

方見傷寒胃實

孟大便不通氣奔欲死者以烏梅十箇置湯中須臾接去

核杵為丸如棗大納下部少時即通

又方治大小便不通

江子肉

杏仁

皂角

右為末作餅置臍上灸炙自通

世通關散治卒閉不通用鹽入臍中灸即通去之

平宜積丸手心握藥便通

巴豆

乾姜

葶子

良姜

硫黃

甘遂

白槿榔

各等分

右為細末研飯為丸如龍眼大早朝先用椒湯洗手麻油塗手掌口握藥一粒移時便瀉欲止以冷水洗手

針灸大便閉有二法

其一取胃經云腸中不便取三里盛瀉之虛補之是也

其二取腎經云邪在腎病大便難取之湧泉崑崙視有血

者盡之

玉大便秘塞

照海五分補二呼瀉六吸立通

支溝半寸瀉三吸

撮又法 照海瀉之 太白瀉之 亦可

集又法 照海半寸灸二 章門灸七壯 太白半寸灸五壯已上者

穴看虛實補瀉之虛結補則通熱結瀉則通寒結先瀉後補熱結先補後瀉之

摘又法 氣海八分令病人覺便三五次為度出 三里針時記令人挾臍揉之却刺三里

五分覺腹中鳴 三五次即透

世又法 合谷

東大便閉背七椎兩傍相去各一寸灸三壯 承筋灸三壯

賜遠按玉泉相去二寸隨年壯針 灸書無此穴或云非正穴也

又法 石門半寸 大都五分

膈治大便不通并傷寒水結 三間沿皮下向至合谷穴 三補三瀉候腹中通

針出 承山七分瀉之

甲大便難中渚及太白血之 又大鍾主之

禁忌 丹予觀古方通大便皆用降氣品劑蓋肺氣不降則大便

難傳送用杏仁枳殼沉香訶子等是也又老人虛人風人津液少而秘者宜以藥而滑之用胡麻麻仁阿膠等是也如妄以峻利藥逐之則津液走氣血耗雖暫通而即秘矣必更生他病昔王少府患此疾有人以駛藥利之者累矣後為肺痿咯膿血卒至不通而死

產後大便不通

虛

本婦人產後有三種疾鬱冒則多汗汗多則大便秘故難於用藥惟麻子蘇子粥最為穩當 用紫蘇子大麻子二味各半合洗淨研極細用水再研取汁一盞分二次煮粥啜下此粥不唯產後可服大抵老人諸虛風秘皆宜服之嘗有一人母年八十四忽爾腹痛頭疼惡心不食召醫數十議皆用補脾進食治風清利頭目等藥數日雖愈全不入食其家憂惶予辨說前藥皆誤矣此症正是老人風秘

臟腑雍滯聚於胃中則腹脹惡心不思飲食又上至於巔則頭痛神不清也若臟腑流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩啜而氣泄先下結糞如胡椒者十餘枚後漸得通利不用藥而自愈矣

丹產後秘結不通膨滿者氣急難坐臥用麥蘗末酒下一合神效出兵部

大小便不通

丹一婦人脾疼後患大小便不通此是痰隔中焦氣聚上焦二陳加木通初服後吐查再服

山大小便不通燒阜角灰為末粥清調下

本車狗散治大小便經久不通欲死者

用推車密七箇土狗七箇在土名土狗二物新瓦上焙

乾為末以虎目樹皮向東南者濃煎湯服之經驗如神

痰

熱

寒

虎目即虎杖其性大能利小便又解暑毒一說男子用推車密用頭

上狗用身女人病土狗用頭推車密用身效

海廻生神膏治陰症大小便不通及諸雜病陰候大小便不通者宜用此治法數日不通危急者用之非急不用

牡礪 陳粉 乾姜炮各一兩

右為細末男病用女人唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出愈蓋卵與乳乃男女之根蒂坎離之分屬也

診 脉盛皮熱肚脹前後不通齎悶此謂五實全文見治虛實法

雜方 丹掩臍法治大小便不通用連根葱一二莖帶土生姜一

塊淡豆豉二十一粒鹽二匙同研爛作餅烘熱掩臍中以

帛紮定良久氣透自通不通再換一餅

針灸 桑大小便不通 大都分

東大小便難 環岡在小腸俞下二寸 水道在背脊四面各一寸八分腰眼下一寸 榮

衛在背脊四面各一寸八分腰眼下一寸 甲三焦約大小便不通水道主之

產後大小便不通

雲療產大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 牡礪

生地 芍藥各一兩

右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

針灸

心治婦人產後忽小腹脹如蠱大小便不通氣海三里關元三陰交陰谷主之

醫學綱目卷之二十四 脾胃部

水脹通論

水脹皆本於勞勞過度

靈黃帝問曰水穀入于口輸于腸胃其液別為五天寒衣

薄則為溺與氣天熱衣厚則為汗悲哀氣并則為泣中焦

胃緩則為唾邪氣內逆則氣為之閉塞而不行不行則為

水脹余知其然也不知其何由生願聞其道岐伯曰五穀

之津液和合而為膏者內滲入于骨空補益腦髓而下流

于陰股陰陽不和則使液溢而下流于陰髓液皆減而下

下過度則虛虛故腰背痛而脛痠陰陽氣道不通四海塞

閉三焦不瀉津液不化水穀并行腸胃之中別于迴腸留

于下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水脹

五瘕津液過度也

本臍腹四肢悉腫者為水但腹脹四肢不甚腫為蠱脹也

診法

靈黃帝問于岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯荅曰水始起也目窠上微腫如新臥起之狀其頸脉動時欬陰股間寒足頸腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客于皮膚之間蹇蹇然不堅腹大身盡腫皮厚按其股窅而不起腹色不變此其候也鼓脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與腹脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內着惡氣乃起瘕肉乃生其始生也大如鷄卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒氣客于子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衄以留止日以益大狀如懷子月事

不以時下皆生于女子可導而下黃帝曰膚脹鼓脹可刺邪岐伯曰先瀉其脹之血絡後調其經刺去其血絡也

論○石水臍已下腫其脉沉

水腫

先目足腫後腹大為水

胎前水

產後水

素帝曰其有不從毫毛生而五臟陽以竭也津液充郭

云不從毫毛生言生于內也津液者水也充滿也郭皮也蓋陽竭於外津液得以充滿於郭而浮腫也其魄

獨居孤精於內氣耗于外形不可與衣相保此四極急而

動中是氣拒于內而形施于外治之奈何岐伯曰平治於

權衡去宛陳莖微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼

門潔淨府精以時服五陽已布踈滌五臟故精自生形自

盛骨肉相保巨氣乃平

湯液醪醴論○開鬼開發汗也潔淨府利小便也○王註云平治權衡謂察其脉浮沉也脉浮為在表脉沉為在裏在裏者泄之在表者汗之故下文云開鬼門紮藏府也去宛陳莖謂去積久之水物猶如莖莖之不可久留於身中也微動四極謂微動四肢令陽氣漸以宣行故曰溫衣也

仲景法

仲諸有水者腰已下腫當利小便腰已上腫當發汗乃愈
風水脉浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之

防已兩一

黃芪一分

白朮三分

甘草炙半兩

右剉每服五錢生姜四片棗一枚水盞半煎取八分去
查溫服良久再服腹痛加芍藥一法潔古用此湯調五

苓散治因濕為腫者

又方防已湯治風濕脉浮為在表其人或頭汗出無表症病者但下

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者防已茯苓湯主之

防已

黃芪

桂枝各三兩

茯苓六兩

甘草二兩

右五味以水六升煮取二升分溫三服

厥而皮水者蒲灰散主之

方見淋已上利小便法

風水急風一身悉瘡脉浮不渴續自汗出無大熱越婢湯主之

麻黃六兩

石膏半兩

生姜三兩

大棗十五枚

甘草二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

分溫三服 惡風者加附子一枚炮風水加朮四兩

裏水者一身面目黃腫其脉沉小便不利故令病水假如

小便自利此亡津液故令渴也越婢加朮湯主之于前越

婢湯加白朮四兩甘草麻黃湯亦主之

甘草二兩

麻黃四兩

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘草煮取三升

溫服一升重覆汗出不汗再服慎風寒

水之為病其脉沉小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣

水其汗即已脉沉者宜麻黃附子湯浮者宜杏子湯

麻黃三兩

甘草二兩

附子一箇

右三味以水七升先煮麻黃去上沫內藥煮取二升半

溫服八合日三服已上發汗出愈

丹溪法

水腫因脾虛不能制水水積妄行當以參朮補脾使脾氣得實則能健運自然升降運動其樞機則水自行非若五苓之行水也宜補中行濕利小便切不可下當用二陳湯加白朮人參蒼朮為主佐以黃芩麥門冬制肝木若腹脹少佐厚朴氣不運加木香木通氣若陷下升麻柴胡提之隨症加減必須補中用大劑白朮補脾如壅滿用半夏陳皮香附監之有熱者當清肺金門冬黃芩之屬 赤岸馬令入官素飲食不知飽但食肉必泄忽遍身發腫頭面加多致目亦不可開膈間滿如築兩足麻至膝而止渾身

不可見風陰器挺長其脉左沉而重取不應右三部雖短小却有和滑氣象遂令單煮白朮湯飲早晨空心探而去之食後白朮二錢麻黃五分川芎半錢防風三分作湯下保和丸五十九如此者二日因吐中得汗通體上截為多遂得腫寬而眼開氣順而食進却于前方中麻黃防風加白朮三錢木通通草各半錢下保和丸五十九如此者五日而安此即開鬼門之法也
蘆節婦年二十餘半月之前夜間發熱面先腫次及身足腫肚亦腫口渴思冷水食畧減

大腹皮半錢

白朮半錢

蒼朮半錢

梔子四枚

川芎錢一

麻黃分六

木通錢一

乾葛錢二

甘草稍些

朱秀才因父坐受濕能飲酒下血以苦瀉藥泄之遂成腫

疾而吐足皆腫口渴中滿無力少汗脉瀼而短乃血爲濕氣所傷法當行濕順氣清熱進食化積

滑石

六錢

白朮

二錢

木通

三錢

厚朴

乾葛

各二錢

蒼朮

一錢

分四貼加蘇葉七片每一貼煎至三之一熱下保和丸與點丸温中丸各五十九

王三九孺人浮腫膈滿腹滑泄口苦而渴小便赤少脉虛而豁大稍遲此有汚積病爲人性急

滑石

一兩

陳皮

四錢

蘇梗

白朮

川芎

木通

厚朴

各二錢

茯苓皮

一錢半

甘草稍

半錢

分六帖用順流水煎下保和丸廿五丸抑青丸十九

吳孺人胃中有積發爲腫成瘡疥身倦食少惡寒發熱脉

虛而沉

白朮

一兩六錢

滑石

二兩

生地

木通

川芎

各半兩

黃芩

茯苓皮

連翹

各四錢

紫蘇

三錢

甘草

炙一錢半

下保和丸三十九

一女子年三十餘歲腫病有熱服藥得安但兩足下節不
退肚肉自覺尚有熱脈却平矣飲食如昨

白朮

一錢

郁李仁

半兩

蘇梗

木通

條芩

檳榔

枳實

炒半兩

青皮

一兩

甘草稍

一錢

分十貼細研郁李仁以順流水三盞盪起煎一盞食前

熱服

張郎廿歲秋得腫疾午前上甚午後下甚口渴乏力脉瀼

弱食亦少稟氣素怯汗不能自出齲而為水與灸三里肺俞大椎合谷分水又與此方

白朮半錢 陳皮分五 黃芩 紫蘇

海金沙 木通 大腹皮 茯苓皮

乾葛炒 厚朴 甘草各二分

作一貼水煎服

光明人脚腫肚畧急身微熱脉畧數口乾

白朮錢一 茯苓分五 乾葛炒分五 蘇梗錢五

大腹皮錢三 甘草分二 川芎錢二 陳皮分五

許宅婦人二十已上脚踝腫近日有瘡毒

白朮錢七 蒼朮 陳皮 犀角末

川芎錢五 木通 連翹 蘇葉各三分

甘草稍一分

分七貼煎後入姜汁令辣熱食前服

馮官人因內有濕積兼時令濕熱右腿少陽分發爛瘡如掌大痒甚兩手脈洪緩畧數面目手足俱虛腫膈中午前痞悶午後腫到兩足則膈寬

犀角生五分 枳殼炒分五 陳皮 連翹

白朮各一分 木通分五 蒼朮分五 甘草稍二分

茯苓分五 加姜汁煎服

馮客瘡而發腫微渴脉左手虛右手大食少

白朮半錢 陳皮錢一 木通 厚朴炒

大腹皮各五分 甘草分二 牛膝分五 蘇梗分三

姜片三

馮孺人瘡而浮腫大便自利

人參 半夏 陳皮各一分 川芎

蒼朮炒

白芷各五分

木通二錢

白朮一錢

甘草灸三分

王官人年四十瘧兩日一發始善啖至春作腫大小便秘食少面浮腫口渴

厚朴一錢

白朮半錢

木通七分

陳皮一錢

川芎

大腹皮各五分

牛膝

滑石各一錢

甘草灸三分

右丹溪治水腫之法十五條其法大率皆以甘草佐白朮參陳等劑補中氣為君木通滑石郁李仁海金沙行水為臣厚朴大腹皮蘇梗通滯氣為佐使如氣不昇浮惡寒脉沉者探吐以提之頭面先腫加麻黃微汗之挾積氣者佐以保和溫中抑青等丸磨之挾熱者佐以黃芩之類清之挾瘡癰者佐以連翹犀角散之而隨証加

減也

先補後改

羅治腫以胃氣為本至元戊寅五月間積雨淋淫魯齋許仲平先生時年五十有八面目肢體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脉得弦細而緩魯齋曰年壯時多服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣營養臟腑經絡皮毛故氣行而瀆為浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五臟皆以胃氣為本五臟有胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養五臟則五臟脉不和平本臟之氣盛者其脉獨見輕則病過甚則必死故經曰真臟之脉弦無胃氣則死先生之疾幸而未至于甚尚可調補人知服牽牛大黃為一時之快不知其為終身之害也遂以平胃散加白朮茯苓草薏苡

仁數服而腹脹溘泄腸鳴時痛皆愈飲食進止有四肢浮腫以導滯通經湯主之良愈

導滯通經湯治痺濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮 桑白皮 白朮 木香各五錢

茯苓一兩 去皮

霖兩時加澤瀉一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

先攻後補 白茯苓湯能變水

白茯苓 澤瀉各二兩 郁李仁五錢

右咬咀作一服水一碗煎至一半生姜自然汁入藥常

服無時從少至多服五七日後覺腹下再腫治以白朮

散

白朮 澤瀉各半兩

右為末煎服三錢或丸亦可煎茯苓湯下三十九以黃芪芍藥建中湯之類調養之平復後忌房室猪魚鹽麪等物

雜方

本大東湯治四肢腫滿用白朮三兩咬咀每服半兩水一盞半大東三枚拍破同煎至九分去渣溫服日三四服不拘時候

梅治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮取六升去渣和肉葱豉作臠如常法食之商陸白者好

食醫治十種水氣痛不瘥欲死者鯉魚一頭重一斤已上者煮熟取汁和冬瓜葱白作羹食之 治十種水氣病不

瘥垂死者青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令熟作粥空腹食之

梅治水氣脹滿小便濇白鴨一隻去毛腸洗淨饋飯半升

與椒姜同穰鴨腹中縫定如法蒸熟食之

子和郟之營兵狄家小兒病風水諸醫用銀粉粉霜之藥小便反瀉飲食不進頭腫肚脹四肢皆滿狀若水晶求治戴人戴人曰此証不與壯年同壯年病水者或因留飲及房室此小兒終七歲乃風水証也宜出汗乃置燠室以屏帳遍遮之不令見火若內火見外火必昏瞶也使大服胃風湯而浴之浴訖以布單重覆之凡三五重其汗如水腫乃減五分隔一二日又依前法治之汗出腫減七分又三汗而全減尚未能食以檳榔丸調之兒已嬉笑如常日矣

本治水氣羌活散

羌活

蘿蔔子

各等分

右同炒香熟去蘿蔔子不用末之溫酒調下二錢一日一服二日二服三日三服取效

羅五皮散治他病愈後或瘡痂後身體面目四肢浮腫小便不利脉虛而大此由脾肺虛弱不能運行諸氣氣虛不理散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿也此藥並宜服之

大腹皮

赤茯苓皮

陳皮

桑白皮

各等分

右件為粗末每服五錢水一大盞同煎至八分去渣溫服不拘時候日進三服

香蘇散治水氣虛腫小便赤瀉

陳皮

去白

防已

木通

紫蘇葉

各半兩

右為末每服二錢水二盞生姜三片同煎

外治水病洪腫氣脹不消食用香薷五十斤細剉納釜中水浸上數寸煮使氣盡去查澄清熬稠丸如桐子大日三服每服五丸稍加以小便利為度

紫淨府

梅治水腫作坐臥不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒
灰淋汁煮赤小豈空心食令飽飢即食盡不得吃飯

兵治水病初得危急冬瓜不限多少任吃神効無比丹溪云冬

瓜性急又病與陽虛者忌之
丹十種水氣冬瓜去穰納赤豈在內蒸熟為丸服 治痢
日久津液枯四肢腫口乾用冬瓜黃土厚包五寸煨熟去
土取汁飲之錄驗

羅白丸子治遍身腫及卓腹脹滿喘悶不快小便赤澹神
効

輕粉五分 粉霜炒四分 礪砂研炒三錢 滑石研炒四錢

寒水石火燒研三錢 白丁香研羅末三錢

右件藥將輕粉滑石二味一處研勻用薄紙裹了却更
和白麵作餅再裹前藥又用桑柴火燒以熟為度取出

與前四味一處和勻水浸蒸餅搗乾為丸如菘豈大每
日姜湯下三服食前下第一日每服二丸第二日每服
三丸第三日每服四丸第四日每服五丸如覺小便多
腫漸減便勿服如小便不多更服一日二日加作六丸
做一服一日亦三服腫消為効如服藥至第三日覺牙
縫內痒痛口氣出時使用漱口藥用貫眾黃連各半兩
為散每服一錢水一盞煎至七分入龍腦少許攪勻溫
服之每一日煎一錢漱口如腫消忌鹽魚肉冷硬果食
只服粥百日永瘥如臟腑秘澹氣實先服治腫海藻散
此藥親用救人甚多神効

海藻散方見本門積氣条

仲牡礪澤瀉散治腰以下腫方見傷寒

河葶塵丸治一切水濕氣通身腫不可當者

人參

兩一

苦葶藶

四兩于鍋內焙上炒黃色為度

右二味同為細末用束肉和丸桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前驗

羅聖靈丹治脾肺有濕喘腫盛小便赤澹

苦葶藶

四兩

木香

檳榔

茯苓

麩裏

防風

木通

人參

已上各二錢半恐是二兩半

右為末用束肉為丸如桐子大煎桑白皮湯下

垣赤茯苓丸治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通

小便赤澹

葶藶

四兩

防已

二兩

赤茯苓

一兩

木香

五錢

右為細末束肉丸如桐子大每服三十九煎桑白皮湯下食前

續隨子丸治遍身虛腫喘悶不快

人參

漢防已

赤茯苓

木香

檳榔

各五錢

苦葶藶

四兩

續隨子

一兩

海金沙

五錢

右為細末束肉丸如桐子大每服二三十丸煎桑白皮湯食前下

海潔古方治水腫用蜈蚣去頭尾與葡萄心同搗露七日

曝乾為末淡酒調下暑月濕用尤佳

聖惠方治水腫喘促不得臥蜈蚣五枚為

末食前湯調半錢至一錢小便通効

仲夫水病人目下有臥蚕或面目鮮澤脉伏其人消渴病

水腹大小便不利其脉沉細者有水可下之

世治水腫

薏苡仁根

君木香

檳榔

黑牽牛

右為末酒調服妙

外療水病腫用鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以

輕劑

積者下

水二升赤小豆一大升和魚肉煮取二升已上生布絞取汁去查頓服盡如不盡分爲三服當下利利盡即瘥

本治身軀腫滿水氣急臥不得郁李仁一大合搗爲末合和麩搜作餅子與吃入口即大便利氣便瘥

丹有人患脚肤腫漸上膝足不可踐地大水頭面遍身腫脹滿用苦瓠瓢實稔如豈大以麩裏煮一沸空心服七枚至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃瘥三年內須慎口味 一方治腫取苦瓠殼以塩捺殼上燒存性爲末煎童便一盞調服瘥

苦瓠須擇無壓腐細埋潔淨者不爾有毒

世三種散治浮腫用陳蘿蔔種去瓢陳蒲殼去瓢烏豈一合同煎服即時退

羅無礙丸治脾濕積流四肢腫滿

大腹皮二兩 木香半兩 蓬朮 京三稜

檳榔 郁李仁各一兩

右爲細末炒麥藥麩糊爲丸如桐子大生姜湯下

本治腫滿小便不利茯苓散

郁李仁四錢 檳榔二錢 赤茯苓 白朮

甘遂切片炒 陳皮一錢半

右細末每服一錢姜東湯調下

治十種水病并根源証狀方法

一青水先從左右肋腫起根在肝 大戟

二赤水先從舌根起根在心 葶藶子

三黃水從腰腹起根在脾 甘遂微炒

四白水從脚腫起根在肺 桑白皮

五黑水從外腎腫起根在腎 連翹

六玄水從面腫起根在外腎 芫花醋炒

七風水從四肢腫起根在骨

澤瀉

八石水從腎腫起根在膀胱

藁本

九高水從小腹腫起根在小腸

巴豆去皮油

十氣水或盛或衰根在腹

赤小豆

右十般種病各有根源種種不同看十種病根除一味倍多餘九味等分逐味依法修治焙為細末煉蜜丸如桐子大用赤茯苓湯吞下三丸不拘時候每日三服忌鹽一百二十日綠鹽能化水也又忌魚蝦麪食一切毒物及生冷房室甚効用此方獲瘥後更用後來補藥

補藥方

肉桂去粗皮

赤茯苓去皮

乾姜

菝葜醋煮

川芎

肉苳蔻

桔梗各等分依法製服一方無赤茯苓菝葜有青

木皮白

檳榔

右等分為末每服三錢百沸湯點服空心食前日午晚各一服前項二方治水腫病甚効予試用之百發百中獲濟者無數世間所有水病方藥無出此三方之右者幸勿忽

浚劑

河三花神祐丸治中滿腹脹一切水濕腫滿

甘遂

大戟

芫花醋拌濕炒各五錢

大黃兩一

輕粉錢一

牽牛兩二

右為末滴水丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服至快利為度得利止後服神効

鼓海金沙散治脾濕大過通身腫滿喘不得臥及腹脹如

牽牛一兩半一半半

甘遂錢五

白木兩一

海金沙錢三

右為細末每服二錢煎倒流水一盞食前調下得宣利
止後服

羅海藻散治男子婦人通身虛腫喘滿不快

海藻

大戟

大黃

隨續子

去壳各一

兩右四味用好酒浸一宿取出晒乾候用

滑石

兩半

白牽牛

頭末生一

陳皮

去白各半兩

甘遂

麩炒一兩

白芫莖

個

青皮

白

右前藥都一處杵為細末大人每服二錢如氣實者三錢平明冷茶清調下至夜時取下水三二行腫減七分隔二三日平明又一服腫消忌魚肉百餘日小兒腫服一錢五歲以下者半錢女人有胎者不可服

虛實

保錢氏論虛實腹脹實則不因吐瀉久病之後亦不因下利得之脹而喘急悶亂更有痰有熱及有宿食不化者宜

大黃丸白餅子紫霜丸下之更詳別大小便如俱不通先利小便後利大便虛則久病吐瀉後其脉微細主目胞腮虛腫手足冷宜先與塌氣丸後與異攻散及和中丸益黃散和其氣因氣而腫者煎陳皮湯因濕而腫者煎防已黃芪湯調五苓散因熱而腫者八正散又一法燥熱干肺為腫者乃絕水之源當清肺除燥水自生矣于梔子豉湯中加黃芪如熱在下焦陰消使氣不得化者宜益陰則陽氣自化加黃連黃栢是也

寒熱

中滿分清丸

方見

熱水腫

梔子

五錢

木香

一錢

白朮

二錢

急流水煎

服 又方山梔子去皮取仁炒槌碎米飲湯送下如胃脘熱病在上者帶皮用

不治遊風攻頭面或四肢作腫塊知母湯

知母

麻黃

黃芪

甘草

羌活

白朮

枳殼

各一兩

右粗末每服四錢水一盞半牛旁子百粒研碎煎至七分溫日三四服覺冷不用牛旁子 有一達官母年七十中風手拘攣平日止是附子之類扶養一日面浮腫手背亦腫尋常有一國醫供藥診之是水病欲下大戟牽牛以導之其家大驚憂惶召予議之予曰素問稱面腫曰風足脛腫曰水此服附子大過正虛風生熱之証咽必噎塞膈中不利誠如予言進升麻牛旁玄參湯繼以知母湯三日便愈

無復元丹治三焦不瀉氣脉塞閉樞機不通喘息奔急水氣盈溢滲透經絡皮膚溢滿足脛尤甚兩目下腫腿腹間冷口苦心腹堅脹不得正偃偃則咳嗽小便不通夢中虛

驚不能安臥

獨活炮二兩

木香炒

川椒炒出

羌活

厚朴去皮姜製

陳皮

吳茱萸炒

桂心各一兩

澤瀉一兩半

肉蓯蓉

檳榔各半兩

右為末糊丸如桐子大每服五十九煎紫蘇湯送下不拘時此藥世傳屢驗服者宜先屏去諸藥一日三服先服澹利如傾次即腫消喘止宜絕慾屏鹽半年乃不耳作

本治脾虛浮腫實脾散

大附子一枚

草薺二兩

甘草一兩

乾姜二兩

大腹皮去皮六兩

木瓜一個去穢切片

右用水于沙器內煮乾一半擘開看乾姜不白心為度亦不得令水乾至焦取出焙乾為末每日午時空心沸

湯點服

藏府

三陰結謂之水

陰陽別論。王註云謂脾肺之脉俱寒結也。

下焦溢為水

全一又見診。王註云下焦為分注之所氣空不瀉則為溢水。

陽明所謂上喘為水者陰氣下而復上上則邪客于臟腑間故為水也

運氣水腫有四

一曰濕經云太陰所至為胛腫又云濕勝則濡泄甚則水閉胛腫又云太陰之勝足脛胛腫飲發于中胛腫于上又云太陰司天客勝則首面胛腫呼吸氣喘治以諸熱是也
二曰火熱經云諸病胛腫皆属于火又云少陽司天火氣下臨肺氣上從寒熱胛腫又云少陽司天火淫所勝民病皮膚痛色變黃赤傳而為水身面胛腫腹滿仰息又云少陽之復渴引水漿化而為水傳為胛腫又云少陽司天客

勝甚則胛腫治以諸寒是也

三曰寒經云寒勝則浮是也

四曰燥經云陽明所至為浮虛是也

針灸

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病岐伯曰腎者累之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢于皮膚故為胛腫胛腫者聚水而生病也帝曰諸水皆生于腎乎岐伯曰腎者牝臟也地氣上者属于腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢于風內不得入于臟腑外不得越于皮膚客于玄府行于皮裏傳為胛腫本之于腎名曰風水所謂玄府者汗空也帝曰水俞五十七處者是何主也岐伯曰腎俞五十七穴積陰之

所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎俞故水病下為胛腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得臥分為相輸俱受者水氣之所留也肺腎之標本共上下分為相輸應之病而俱受者緣此二臟乃水氣之所畜故也伏菟上各二行行五者此腎之街也三陰之所交結於脚也踝上各皆臟之陰絡水之所客也水熱穴論尻上五行行五

脊中一	懸樞一	命門一	腰俞一
長強一	大腸俞二	小腸俞二	膀胱俞二
中胎內俞二	白環俞二	胃倉二	
盲門二	志室二	胞盲二	秩邊二
伏菟上各二	行行五		

中柱二	四滿二	氣穴二	大赫二
橫骨二	外陵二	大巨二	水道二
歸來二	氣街二		
踝上各一行	行六		
太衝二	復溜二	陰谷二	照海二
交信二	築賓二		

靈風痲膚脹為五十七疔取皮膚之血者盡取之四特氣篇刺灸水腫有五法

其一取腎膀胱經前篇云五十七穴者是取其二經之穴也又經云腎病者腹大脛腫取其經少陰太陽血者是取其二經之血也
其二取血絡經前云取皮膚之血者盡取之是也
其三取胃經云胃足陽明之脉所生病者大腹水腫視盛

虛熱寒陷下取之是也

其四取委陽經云三焦病者不得小便溢則水取委陽是也

其五筋針取水先以鈹針針之已刺而筋之引針而納之

入而復之以盡其沫必堅來來緩則煩悅來急則安靜間

日一刺之沫盡乃止筋針針中有空

撮浮腫 分水 中腕各灸 內庭 行間 臨泣各瀉

東水氣皮痛不可近衣小腹敦敦然小便黃身潤 章門

屋翳灸 陰交 章門刺

華外腰水腫先從腰腫起 肝募 水分

內中水腫面痿黃 胃腕 通谷 氣海 水分

胞中水腫根在心水赤 心俞 巨闕 氣海

腹中水腫從脾起水黃 脾俞 胃腕 水分

肺喘水腫從胸起水白 肺俞 肝募

足心水腫從足起 白環俞 水分 臍中

四肢水腫變身浮 膽募

兩脇水腫四肢枯瘦從脇腫起 章門 期門

小腸水腫從臍腫起 氣海

保五脈論五水灸法

青水灸肝井弦 赤水灸心榮洪 黃水灸脾俞緩 白

水灸肺經瀉 黑水灸腎合沉

甲身腫關門主之 水腫脹皮腫三里主之 風水膝腫

巨虛上廉主之 風水面肘腫顏黑解溪主之 風水面

肘腫衝陽主之 水中留飲胸脇支滿刺陷谷出血立已

面肘腫上星主之先取諛諤後取天牖風池 水腫人

中盡滿唇反者死水溝主之 水腫大臍平灸臍中無理

診

不治

素目窠微腫如卧蚕之狀曰水

平人氣象論

足脛腫曰水

仲病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此

法當病水若小便自利及汗出者自當愈 跌陽脉當伏

今反數本自有熱消穀小便數今反不利此欲作水 寸

口脉浮而遲浮脉則熱遲脉則潛熱潛相搏名曰沉跌陽

脉浮而數浮脉則熱數脉則止熱止相搏名曰伏沉伏相

搏名曰水沉則絡脉虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚

則為水矣

素頸脉動喘疾欬曰水

平人氣象論

仲風水其脉自浮外証骨節疼痛惡風

針經論疾診尺篇云視人之目窠上

微癱如新臥起伏其頸脉動時欬按其手足上管而不

起者風膚脹也又仲景云太陰脉浮而緊法當骨節疼痛反

不疼身體反重而設其人不渴汗出即愈為風水治法見前陽虛條

皮水其脉亦浮外証肘腫按之沒指不惡風其腹如鼓下

渴當發其汗

又云渴而不惡寒者此是皮水蓋法當風水亦當發汗也治惡寒不渴皮水不惡寒而渴假令皮水不渴

亦當發汗也治

法見陽虛條 正水其脉沉遲外証自喘

石水其脉自沉外証腹滿不喘

大奇論篇腎肝并沉為石水并浮為風水

黃汗其脉沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰

膿

又云身腫而冷狀如周痺胃中空不能食反聚痛暮躁不得眠此為黃汗治法見黃疸條

仲心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其陰大腫 肝

水者其腹大不能自轉側脇下腹中痛時時津液微生小

便續通 肺水者身腫小便難時時鴨澹 脾水者其腹

大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難 腎水者其腹

大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面黃

瘦

便反壅

無大抵浮腫帶數即是虛寒潛止于其間必沉伏沉伏

則陽虛陰實為水必矣。面龐然浮腫疼痛其色焔黑多汗惡風者屬腎風。治見諸風註諸唇黑則傷肝缺盆平則傷心臍出則傷脾足心平則傷腎背平則傷肺凡此五傷必不可治也。

仲脉得諸沉當責有水身軀腫重水病脉出者死。無擇云大抵浮

脉帶數即是虛寒潛止于其間久必沉伏沉伏則陽虛陰實為水必矣

脉水病脉洪大者可治微細者不可治。水病腹大如鼓

脉實者生虛者死。水病夜半死。全文見診生死

仲諸病水者渴而不利小便數者皆不可發汗

素帝曰有病腎風者面附龐然壅塞于言可刺否岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時熱時熱從胃背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩

而不能食不能正偃正偃則咳病名曰風水論在刺法中帝曰願聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之故水氣時熱而汗出也小便黃者少腹中有熱也不能正偃者胃中不和也正偃則咳甚上迫肺也諸有水氣者微腫先見于目下也帝曰何以言之岐伯曰水者陰也目者亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫也真氣上逆故口苦舌乾卧不得正偃正偃則咳出清水也諸水病者不得卧卧則驚驚則欬甚也腹中鳴者病本於胃也薄脾則煩不能食食不能下者胃脘隔也身重難以行者胃脉在足也月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也

評熱論

仲問曰病者若水面目身軀四肢皆腫小便不利脉之不

考

言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微咳喘審如師
言其脉何類師曰寸口脉沉而緊沉為水緊為寒沉緊相
搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽
損陰盛結寒微動緊氣上衝喉咽塞噎脇下急痛醫以為
留飲而大下之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩
咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶
蘆丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象
若奔豚其水揚溢則浮咳喘逆當先攻擊衝氣令止乃治
咳咳止其喘自差先治新病病當在後

丹盧氏醫鏡水脹辨 內經曰諸氣憤鬱皆屬於肺諸濕
腫滿皆屬於脾諸腹脹大皆屬於熱蓋濕者土之氣土者
火之子故濕每生于熱熱氣亦能自濕者子氣感母濕之
變也凡病腫皆宜以治濕為主所挾不同故治法亦異類

例治腫以治水立說而欲導腎以決去之豈理也哉脾土
衰弱內因七情外傷六氣失運化之職清濁混淆鬱而為
水類例以為本末皆隸于肺腎胃三者而不及脾下文繼
以肺金盛而生水水液妄行氣息閉樞機壅而為腫夫脾
土受病肺為之子焉有自盛而生水者哉若謂腫之水果
生于肺金之清氣則滋長腎陰奉行降令為化生之源何
病腫之有今滲透經絡注流溪谷皆濁腐之氣窒碍津液
久久灌入隧道血亦化水而欲藉脾土以制之導腎氣以
利之不思脾病則肝木來侮子氣亦衰木寡于畏脾欲不
病不可得矣治法宜清心經之火補養脾土全運化之職
肺氣下降滲道開通使敗濁之氣其稍清者復回而為氣
為血為津液其甚者在土為汗在下為溺以漸而分消矣
今不明言而曰制水燥水得非白圭以隣國為壑乎經言

腫病因津液充郭而致不生於肺金之盛也明矣又言氣拒於內氣耗於外責其不能滲運敗濁耳又云開鬼門潔淨府鬼門膚腠也屬肺淨府膀胱也屬腎之府未聞有導腎氣之說註文明言陰精耗損腎氣果可導乎仲景謂治濕利小便即經中潔淨府之意苟以清淨為腎而導之果於經意有合乎錢仲陽謂腎無瀉法其可輕易導之乎或曰經言疏滌五臟非導腎歟予曰此承上文五陽已布而言若鬼門開矣淨府潔矣五臟之陽氣條布彼敗濁之氣自然疏導滌除於腎氣何與焉

胎前水腫

表裡

雲防已湯治妊娠脾虛遍身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已七錢半

桑白皮

赤茯苓

紫蘇莖葉各一兩

木香二錢半

右為粗末每服四錢姜四片水同煎食前服

葶藶散治妊娠遍身洪腫

葶藶子一兩

白朮五兩

茯苓

桑白皮

郁李仁各二兩

右為粗末水六升煎取二升分三服小便利即瘥

又方 澤瀉

葶藶各二兩

茯苓

枳殼

白朮各六兩

右細切以水六升煮取二升半分溫二服

子和治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴猪苓五兩末以熟水服方寸七日三服

丹子腫多濕用山梔一撮米飲吞下

產後水腫

大法

丹產後腫必用大補氣血為主少佐以蒼朮茯苓使水自利

汚血

大大調經散治產後腫滿喘急煩渴小便不利

大荳

一兩半炒去皮

茯苓

一兩

真琥珀

錢一

右為細末濃煎烏荳紫蘇湯調下

產後四肢浮腫者敗血循經流入四肢淫留日深腐爛如水故令四肢腫面黃宜服小調經散血行腫消則愈

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

各一錢

細辛

麝香

各五分

右為細末每服半錢姜汁酒各少許調停服

虛實

丹婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此躰虛而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中道水行氣可也

白朮

二兩半

陳皮

一兩

川芎

半兩

木通

六錢

茯苓

三錢

下與點丸廿五丸

天奪規散治產後虛腫喘促利小便則愈

生姜

三兩

白麩

三兩

半夏

七錢

右以生姜汁搜麩裹半夏為七餅子煨焦熟為末水調一盞小便利為効

聖如產後風寒在表面目四肢浮腫宜局方中七聖丸白湯下日加以利為度七聖丸方見痔如浮腫至膝喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多也如浮腫又頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也如只浮腫止七聖丸本方服之

垣中滿分消丸

方見脹門熱條用四物湯吞之

杜張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫急召產科醫治經半月不瘥病勢轉劇召杜治之杜至曰諸醫作何病張曰皆

寒熱

云水氣浮腫杜曰非也且水氣發咳嗽小便澀是也今愛
寵小便不瀆不作咳嗽惟手足寒乃血藏虛氣塞不通流
面生浮腫遂用益血和氣藥治之旬日病去七八經半月
全愈所用之藥乃灵苑方牡丹散也其方云治血藏風虛
冷今產科家多用此藥治產後諸病如神更名曰損金湯
者是也 牡丹散 方見產後
驚悸門
疾 天加減吳茱萸湯治婦人血藏虛宿挾風冷身面虛浮等

吳茱萸	半一兩	桔梗	乾姜	甘草
麥冬	門	防風	半夏	細辛
當歸		赤茯苓	牡丹皮	桂心
				<small>各半兩</small>

右為粗末每服四錢水一盞半煎至七分去查食前熱服

方

丹產後風腫水腫澤蘭防已等分温酒調下二錢如不能
飲者醋調下亦可 方成氏

大法

先腹大後四肢腫為脹 或獨腹大四肢不腫者治法同
無附子藁苈湯治寒客皮膚殼殼然而堅腹大身腫按之
陷而不起色不變病名膚脹一劑未知再作

大附子

一個重七錢者
生去皮臍半破

藁苈

二兩

右以生姜二兩切水二碗煎至一碗去查分三服空腹
温服次日將前附子破作四片再用藁苈二兩姜一兩
如前煎服停三日復將附子作八片如前煎服

治鼓脹法並見後行濕寒熱氣血諸條皆其法也

虛寒

仲脹滿按之不痛為虛痛者為實可下之 腹脹時減復
如故此為寒當與温藥 腹滿不減減不足言須當下之

宜大承氣湯

海脾虛滿者黃芪湯芍藥

脾實滿不運平胃散蒼朮

東垣云腹脹滿氣不轉者加厚朴以破滯氣腹中奔悶此非腹脹滿乃散而不收可加芍藥收之是知氣結而脹宜厚朴散之散而脹宜芍藥收之

補虛行濕

丹鼓脹大補中氣行濕此乃脾虛之甚必須遠音樂斷厚味朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛終日急氣血皆虛用大劑人參白朮佐以陳皮蒼朮茯苓之類有血虛者四物行血隨証加減凡補氣必帶厚朴寬滿腹脹必少佐厚朴者蓋厚朴味辛以氣聚于上焦故也氣不運加木香氣若陷下用升麻柴胡以提其氣水腫當補脾為主白朮茯苓陳皮佐之

鼓脹論 心肺陽也居上腎肝陰也居下脾居中亦陰也

屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能致心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是為無病之人今也七情內傷六淫外侵飲食失節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否于斯時也清濁相混隧道壅塞氣化濁血瘀鬱而為熱熱留而又氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似于鼓其病膠固難以治療故又名曰蠱若虫侵蝕有蠱之義驗之治法理宜補脾又須養肺金以制木使脾無賊邪之慮滋腎水以制火使肺得清化之令却蓋味以防助邪斷妄想遠音樂以保母氣無有不妥醫者不察病起于虛急於取效術能希賞病者苦

忌利藥

於脹急喜行利藥以求一時之快不知寬得一日半日其
腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣去死不遠古方惟禹餘糧丸
又名石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊為切當亦須隨
証又須順時加減用之為妙予友俞仁叔儒而醫連得家
難年近五十得此疾自制禹餘糧丸服之予診其脈弦澹
而數曰此丸新製煅煉之火邪尚存溫熱之藥太多宜自
加減不可執方俞咲曰今人不及古人此方不可加減服
之一月口鼻出血色黑骨立而死 楊兄年五十性嗜酒
病瘧半年患脹病自察必死來求治診其脈弦而澹重則
大瘧未愈手足瘦而腹狀如蜘蛛遂教以參朮為君當歸
川芎芍藥為臣陳皮黃連厚朴茯苓為佐生甘草些少作
濃湯飲之一日定三貼彼亦嚴守戒忌一月後瘧得汗而
愈又半月小便長而脹愈中間雖少有加減大意只是補

補氣血
為主

氣行濕 又陳氏年四十餘性嗜酒大便時見血于春間
患脹色黑而腹大其形如鬼診其脈數而澹重似弱予以
四物加黃連黃芩木通白朮陳皮厚朴生甘草作湯與之
近一年而安一補氣一補血餘藥大率相出入皆獲安以
保天壽或曰氣無補法子何補氣而獲安果有說以通之
乎予曰氣無補法乃世俗之言也蓋氣之為病痞悶壅塞
似難於補恐增病勢不思正氣虛者不能運行邪滯所着
而不去所以為病經曰壯者氣行則愈怯者著而成病苟
或氣怯不用補法氣何由行或曰子之藥審則審矣何効
之遲也病者久在床枕將必厭子之迂而求速効者矣余
曰此病之起或三五年或十餘年根深勢篤欲求速効自
求禍耳知王道者能治此病也或曰脹病將終不可與利
藥乎予曰灼知其不因于虛受病亦淺脾胃尚壯積滯不

固而又有可下之証亦宜畧與疏導若援張子和濟川散
禹功丸爲例行迅攻之策實所不敢 潘可達女年十九
歲稟受頗厚患胃腹脹滿自用下藥利十數行時脹無增
減來求治診其脈皆大畧按即散而無力全無數意予曰
此有表証反攻裏當死賴稟受好時又在室尚可挽回壽
損矣急與四物湯加人參白朮帶白陳皮炙甘草煎服至
半月後病不退又自用蘿蔔根種煎湯澡浴兩度時腫稍
增予曰表病攻裏已自難救今又虛其表事急矣于前藥
去地黃芍藥加黃芪倍白朮大劑濃煎湯飲又吞人參白
朮丸十日後如初病時又因吃難化物自利以參朮爲君
少加陳皮爲佐又與肉苳蔻訶子爲君山查子爲使粥和
作丸吞之至四五十貼而安 一男子年四十餘患瘧久
而腹脹脈不數而微弦重取則來不滑利輕重又皆無力

遂與索氏三和湯三倍加白朮入姜汁服之數服而瘧愈
小便利二三日脹稍減遂又小便短少予作氣血兩虛于
前藥內入人參牛膝當歸身尾作大劑料百服而愈
索氏三和湯三倍加白朮方

白朮

厚朴

陳皮

各三兩

木通

一兩

檳榔

紫蘇

各二兩

甘草

海金沙

大腹皮

白茯苓

枳殼

各一兩

水煎服

海調胃白朮澤瀉散治痰病化爲水氣傳變水穀不能食

白朮

澤瀉

芍藥

陳皮

茯苓

生姜

木香

檳榔

各一兩

右爲末治腹腫如神 若心下痞加枳實 若心下盛
加牽牛

伸心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作枳朮湯主之

枳實七
白朮二

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中軟即當散也

因積成
脹者補
虛消積

羅真定王君用年一十九歲病積臍左連脇如覆杯腹脹如鼓多青絡脈喘不得臥時值暑雨加之自利完穀日晡潮熱夜有盜汗求予往治之脉得浮數按之有力謂病家曰凡治積非有毒之劑攻之則不可今脈虛弱如此豈敢以常法治之遂投分滲益胃之劑數服而便清自調襍以升降陰陽進食和氣而腹大減胃氣稍平間以消積之劑不月餘良愈先師嘗曰潔古老人有云養正積自除譬如滿座君子縱有一小人自無容地今令真氣實胃氣強積自消矣

丹一婦人年三十六歲家貧多勞性偏急自七月斷經至

八月小腹下有一塊偏左如拳有時塊起即痛作伏則勢減至半月後腹漸腫脹食減平時三分之二無力遇夜發熱天明即稍退其脉得虛微短弱清左尤甚初與白朮一斤帶白陳皮一斤作二十貼服以三聖膏貼塊上經宿則塊軟再宿則塊小旬日後食稍進熱減半脉稍有力又與白朮一斤帶白陳皮半斤酒當歸身半斤木通三兩每貼研桃仁九粒盡此劑病悉除 一婦人年五十餘歲素好怒因食燒猪肉次早面脹絕不思食倦怠六脈沉瀯獨左豁大余作躄虛有痰氣為痰所隔不得降當以補虛利痰為主每早以二陳湯加參朮大劑與一貼服後探令吐出藥辰已時復與索氏三和湯一倍加白朮二貼至睡後以神佑七丸以撓其痰去牽牛如此服至一月而安矣 金壽一安人年七十一歲好濕麪得帶下病亦惡寒淋瀝醫

與荷花鬚柴胡等藥發熱所下愈多醫與縮砂豆蔻藥以其食少也腹滿脹氣喘又與葶藶散不應又與禹餘糧丸病愈甚醫又與崇土散亦不應子脉之兩手洪濇輕則弦長而滑實至是喘甚不得臥此不是濕而釀成濕在足太陰陽明二經水穀之氣為濕所抑不得上升遂成帶下理用升舉之劑以補氣和血次之而醫反與瀉燥宜其展轉身病遂與人參生肺之陰以拒火毒白朮以補胃氣除濕熱行水道棗仁去汚生新郁李仁行積水以通草佐之犀角屑解食毒消腫悶檳榔治最高之氣作濃湯吞下保和丸藥又疑素厚養有肉積加阿魏小丸同嚥之四五日後積氣漸消腫漸下又加補腎丸以生腎水之真陰又兩三日後漸安而得睡食有味矣又兩日後加與點丸以驅逐肺家之積熱而愈

一丈夫脾有熱腎有虛胃有積得腫疾或進或退口乾或氣喘醫連月不退脉軟而細以其形肥不以爲忌用

白朮

錢四

芍藥

地黃

連翹

當歸

錢二

青皮

人參

木通

羌活

黃芩

甘草

紅花

右分五貼煎下保和丸

楊生年三十因瘧初安淡食荳腐齋飯或脹在鬲上小便赤少不思食口渴脉弦而濡此胃中有瘀血用

蘇梗

錢三

木通

白朮

川芎

枳實

白芍

甘草

陳皮

厚朴

錢三

右研益元散下保和丸五十粒

一丈夫氣上壯或膨脹此下虛所致

陳皮錢五

人參

歸鬚

白朮

連翹各三錢

地黃

芍藥各二錢

木通半錢

甘草五分

右分五貼煎下保和丸

木香化滯湯

白芫荽仁

陳皮

大腹子

白茯苓

砂仁

人參各一錢

青皮

檳榔

木香

姜黃各二錢

白朮一錢

甘草灸四分

白檀二分

藿香葉二分

桔梗五分

右為細末水一大盞二分煎至一盞稍熱服食前沸湯

點服亦得

右方治因積滯成脹皆以參朮朴通等煎湯補虛行濕下神佑阿魏等丸消積所謂攻補兼施者也

劑

小溫中丸治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮

半夏湯泡去皮神麩炒

茯苓各一兩

白朮二兩

香附子不要烘晒針砂各一兩半

苦參炒

黃連炒各半兩甘草三錢

右為末醋水各一盞打糊為丸如桐子大每服七八十

丸白朮六錢陳皮一錢生姜一片煎湯吞下虛甚加人

參一錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕者服

此丸六七兩小便長病甚者服一斤小便始長

無禹餘糧丸治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但

是水氣悉皆主之

許孝士及丹溪皆云此方治彭脹之要藥

蛇含石

大者三兩以新鐵銚盛入炭火中燒蛇黃與銚子一般紅用銚取蛇黃傾入醋中候冷取

出研

禹餘糧三兩

真針砂五兩先以水淘

極細并藥入炭中燒紅銚出傾藥淨磚地上候冷研細

以三物為主其次量人虛實入下項治水多是取轉惟此方三物既非大

羌活 木香 茯苓 川芎

牛膝酒浸 桂心 白荳蔻炮 大茴香炒

蓬朮炮 附子炮 乾姜炮 青皮

京三稜炮 白蒺藜 當歸酒浸一宿 各半兩

右為末拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再搗極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下三十九至五十九最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動臟腑病去日日三服兼以溫和調補氣血藥助之真神方也

丹脉堅實人壯盛者或可用攻藥便收拾白朮為主

垣中滿治法開鬼門繫淨府開鬼門者發汗也繫淨府利

小便也又中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分清其氣下焦如瀆氣血自然分化不待洩滓穢如或大實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麪及味厚之物膏梁之人又或食已便臥使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此亦是熱脹也治熱脹分消丸主之

仲氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍加麻辛附子湯主之

桂枝 生姜三兩 甘草一兩 大棗十二個

麻黃 細辛各二兩 附子一個

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如虫行皮中即愈

聖牛黃琥珀丸治水腫腹大氣息不通危急者神効

牛黃 琥珀 椒目沉水 葶藶炒紫色 各三分

裡

表

昆布洗炙各一

海藻洗炙各一

牽牛炒

桂各一

右入味為末別研葶藶如泥一處拌勻煉蜜丸如桐子

大每服十五丸米飲下以小便利為度日再服河間方

有麝香龍胆無琥珀易名苦葶藶膏治法與此方同

仲腹滿口舌乾燥此腸胃間有水氣防已椒蘆丸主之

防已 椒目 葶藶炙 大黃各一

右四味末之蜜為丸如桐子大先食飲服十九日三服

稍增口中自有津液渴者加芒硝五錢

無葶藶丸治腫滿腹大四肢枯瘦小便澀濁

甜葶藶隔紙炒 薺菜根等分

右為末蜜丸如彈子大每服一九陳皮湯嚼下只三丸

小便清數丸當依舊已上葶藶

羅白丸子治單腹脹神效方見水

紫治水氣蠱脹紫淨府楮實子丸

楮實子一斗水二斗 白丁香半兩 茯苓三兩

右二味為末用楮實膏為丸如桐子大不計丸數從少

至多服至小便清利及腹脹減為度次服中治丸末治

藥調養踈啓其中忌甘苦峻補其下宜五補七宣丸白

香為行滯之劑中治丸即白末散用白木通等分為末以茯苓煎湯調下末治即黃芪建中之類方並見水

世治蠱用蝦蟆一枚去內腸入蜈蚣七個新瓦上焙乾為

末丸酒服如無蜈蚣用縮砂七粒本草云蝦蟆味辛寒有毒主邪氣破積堅

素黃帝問曰有病心腹滿日食則不能暮食此為何病岐

伯對曰名為鼓脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴

一劑知二劑已帝曰其時有復發者何也岐伯曰此飲食

不節故時有病也雖然其病且已時故當病氣聚于腹也
腹中論王註雜矢大利小便微寒用湯漬服之繫古云以酒調服

氣壯因積成疝者但治

五積久必心腹脹滿肝為肥氣心為伏梁肺為息奔脾為痞氣腎氣奔豚如斯之類從五積法治之可也

朱恕八哥肚腫因濕氣起自五月能飲酒左脇有塊兩足時有腫

白朮

三稜醋炒

木通

陳皮

大腹皮

赤茯苓

海金沙各五分

甘草二分

炒朴五分

肉桂三分

煎湯下保和丸三十溫中丸三十抑青丸十九

垣廣茂漬堅丸治中滿腹脹內有積堅硬如石形如盤令人坐臥不寧大小便瀆滯為喘氣促面色痿黃

厚朴生五分

黃芩五分

黃連六分

草薢五分

益智五分

半夏七分

蓬朮二分

甘草生

紅花錢一

柴胡

升麻

吳茱萸

澤瀉各二分

神龜三分

歸稍五分

青皮二分

陳皮一分

葛根四分
虛渴

右剉如麻苴大水二盞煎至一盞去渣稍熱服忌酒麪

二服之後中滿減半止有積不消再立方名曰半夏厚

朴湯

厚朴八分

半夏錢一

吳茱萸

肉桂

紅花

黃連各一分

桃仁七分

蘇木五分

京三稜

蒼朮

白朮

柴胡

葛根不用

甘草生各三分

歸稍

猪苓

乾姜

升麻各四分

草薢二分

澤瀉六分

木香

青皮

陳皮

黃芩生各二分

昆布

神麩

右劉如麻荳大作一服依前煎服之禁忌如前服此藥
二服後前証又減一半却於前藥中加減之

厚朴

黃芩

甘草

吳茱萸

益智

砂仁

荳蔻

半夏

黃芪

紅花

歸稍

黃連

右劉如麻荳大作一服水二大盞煎至一盞去查稍熱
服食前忌苦寒藥泄大便又忌魚兔肉并塩物房事等

項

心腹膨脹內多食積所致

南星

半夏

瓜蒌仁

香附

黃連

礞石

蘿蔔子

麝香

連翹

右用麩糊為丸

腹腫不寬滿食肉多

黃連

阿魏

作糊丸同温中丸白朮湯送下

食肉多腹脹用三補丸料內加香附半夏麩蒸餅丸服補

方見治
寒熱

積氣

世四炒枳殼丸治氣血凝滯腹內蠱脹

枳殼 四兩去穰切作指面大塊分四處一兩用蒼朮

黃去麥藷子一兩用乾漆一兩同炒黃去乾漆一

右用原炒蒼朮蘿蔔子乾漆茴香四味同水二碗煎至

一碗去查煮麩糊為丸如桐子大每服五十九食後米

飲下

孫殿中丞某郎中妹十歲腹痛色不變按之而大陷心腹

痞膈病已月餘按甲乙經云三焦脹者氣滿于皮膚中殼

然石堅遂與仲景方厚朴生姜二兩半夏七錢甘草半兩
人參一錢每用藥一兩五錢水煎分三服一日服之至二
十日愈

脉實脉
伏積積
者微利
之

聚 一斗置鍋內入水約四指用大戟并根苗蓋遍盆合

大戟 為丸每七九泄利小水却快實者

沉香 交泰丸 治大便燥結脉沉
之洪緩浮之弦者

沉香

白朮 各三錢

枳實 炒

厚朴 姜制
五錢

茱萸 湯泡

白茯苓

澤瀉

陳皮

當歸 各二錢

大黃 兩

青皮

木香 各二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十九加至七
八十九溫湯下食後微利止

沉香海金沙丸治一切積聚脾濕腫脹肚大青筋羸瘦惡

証

海金沙 半五錢

沉香 二錢

輕粉 錢一

牽牛末 兩一

右為末研獨科蒜如泥為丸如桐子大每服三十九加
至五十九煎百沸灯心通草湯空腹送下更量虛實加

減丸數取利為度

潔 治腫木香散治水腫脹大如鼓或遍身皆腫

木香

大戟

白牽牛 各等分

右細末用猪腰子一雙批片摻末在內煨熟空心服之

如食左腰子則搗左臂如食右腰子搗右臂如腫不能
全去于肚上澆臍滿腹塗甘遂細末却飲甘草水少許
其腫便去也

竹 香東丸治蠱氣病有十種苦丁香為細末用熟東為丸

如桐子大每服三十九煎東湯送下空心服之立効三服

大愈

仲病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故厚朴七物湯主之

厚朴斤半

甘草

大黃各三兩

大棗十枚

枳實五個

桂枝三兩

生姜五兩

右七味以水一斗煮取四升温服八合一日三服區者加半夏五合下利去大黃寒多者加生姜至半斤

右下脹諸方蓋本于經所謂泄之則脹已之旨也

寒熱

治脹專主濕熱治法見前補虛行濕條

諸腹脹大皆属于熱論此乃八益之邪有餘之証自

天外而入感風寒之邪自表傳裏寒變為熱作胃實腹病日晡潮熱大渴引飲譫語是太陽陽明併大實大滿者大承氣湯下之少陽陽明微滿實者小承氣湯下之內經曰

泄之則脹已此之謂也又熱論云傷寒變為熱故下之不脹者以明寒因寒用故曰下之脹已非陰盛生內寒胃寒脹滿之病假令痰瘧為脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋發者何也暑天當時助正氣故邪不能發至秋暮暑氣衰絕而瘧病作矣知其寒也局方用交解飲子者是也此天之邪氣雖有餘病痰瘧猶以為寒况不足病為脹滿者乎是知腹脹多為寒病也何以言之脉經云胃中寒則脹滿靈樞經云夫飲食不節起居不時未傳寒中又云腹脹滿胃脘當心而痛上支兩脇隔咽不通飲食不下取胃之三里又云濁氣在上則生膈脹靈樞經云脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水為脹與內經通評虛實論說腹暴滿按之不下取足太陽經絡者胃之募也正同又云腹滿膈脹支兩脇脇下厥上胃過在太

陰陽明此乃胃中寒熱鬱遏也又云大陰之厥則腹滿臌脹後不利不欲食食則嘔不得卧按內經所說寒脹多如此老夫但略舉其端其病者不悟寒脹之多一切脹滿病作熱治之多用三花神佑丸大黃牽牛之類下之或藥病不相應立致夭折由是論之當從靈樞素問乎當從俗醫胃臌之論乎今立治中滿臌脹寒脹一方熱脹一方評而用之使上下分消其氣可也中滿分消湯治寒脹分消丸治熱脹二方並見後條

胃中寒則腹脹胃中寒腸中熱則脹而且泄師傳 適

寒涼者脹下之則脹已五常政論東垣沉香海金沙丸方見脈實篇 陰并于

下則足寒足寒則脹也厥論

治熱脹法

泄濁氣在上則生臌脹 陰陽應象論云清氣在下則生

發泄濁氣在上則生臌脹此陰陽反作病之逆從也夫臌脹者以寒熱溫涼論之此何脹也曰此飲食失節為脹乃

受病之始也濕熱亦能為脹右關脈洪緩而沉弦脈浮于上是風濕熱三脈相合而為病也是脾胃之令不行陰火亢甚乘于脾胃盛則左遷而陽道不行是六腑之氣已絕于外火盛能令母實風氣外絕風氣外絕者是穀氣入胃清氣營氣不行便是風氣也異呼同類即胃氣者是也經云虛則蕪其所勝土不勝者肝之邪也是脾胃之土不足木火大勝者也經云濁陰出下竅濁陰走五臟濁陰歸六腑濁陰歸地此平康不病之常道反此則為脹也陰陽論云飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則臌脹閉塞調經篇云下脘不通則胃氣熱熱氣薰胸中故內熱下脘者幽門也人身之中上下有七衝門皆下衝上也幽門上衝吸門吸門者會厭也衝其吸入之氣不得下歸于腎肝為陰火動相拒故咽膈不通致濁陰之氣

不得下降而大便乾燥不行胃之濕與客陰之火俱在其中則腹脹作矣治在幽門使幽門通利泄其陰火潤其燥血生益新血幽門通利則大便不閉吸門亦不受邪其膈咽得通腹滿腹脹俱去是濁陰得下歸地矣故經曰中滿者瀉之于內此法是也

沉香交泰丸治濁氣在上中擾清陽之氣鬱而不伸以為腹脹服之以利為度方見前

右治脈洪便結而脹

治寒脹法

范天秩郎中之內八月中先因勞役飲食失節加之憂思氣結病心腹脹滿且食則不能暮食兩脇刺痛診其脉弦而細至夜濁陰之氣當降而不降腹脹尤甚大抵陽主運化飲食勞倦損傷脾胃陽氣不能運化精微聚而不散故為脹滿先灸中脘乃胃之募穴引胃中生發之氣上行陽

道後以順氣湯助之則濁陰之氣自此而降矣

木香順氣湯治濁氣在上則生腹脹

木香

蒼朮

草薢

麩裏煨各三分

厚朴

製四分

青皮

益智

陳皮

澤瀉

白茯苓

半夏

乾姜

吳茱萸

湯泡各二分

當歸

人參

各五分

升麻

柴胡

去苦各一分

內經曰留者行之結者散之以柴胡升麻之苦平行少陽陽明二經發散清氣運行陽分為君以生姜半夏草薢蒼朮青皮之辛苦大溫通順滯氣以陳皮當歸人參辛甘溫調和榮衛滋養中氣濁氣不降宜以苦洩之吳茱萸之苦熱洩之者也氣之薄者為陽中之陰茯苓甘平

澤瀉醃平氣薄引濁陰之氣自上而下故以為佐氣味相合最之洩之上之下之使清濁之氣各安其位也右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去渣溫服食前忌生冷硬物

右治脉弦細脇痛而脹

膠厥脉
發細車中滿分消湯治中滿寒脹寒疝大小便不通陰燥足不收四肢厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦燥寒沉厥奔豚不收二服愈

黃芩五

益智

半夏各三

川烏分一

吳茱萸

草薢各五

人參

木香

青皮

當歸

黃連各二

厚朴分五

茯苓

澤瀉

生姜

麻黃各二
不去節

升麻分三

柴胡稍

乾姜

葶藶各二
分

黃栢分五

右剉如麻苳大作一服水二盞煎至一盞去渣稍熱服食前大忌房勞酒麪生冷硬物油膩

丹治大人小兒因食果子多而腹脹氣急者肉桂細米飯丸苳苳大每服十九小兒五粒熱水下經方

垣靈樞經云腹滿大便秘不利上走胃臆喘息喝喝然取足少陰取者瀉也宜以辛熱散之

良姜

肉桂

益智

草薢苳仁

厚朴

升麻

甘草

獨活使

黃栢少許
引用

又方桂枝

桔梗

人參

青皮抄

陳皮

良姜

白朮

澤瀉

吳茱萸

四肢濕腫宜繆刺先瀉其血結後調其真經謂刺去其血結是也

治心腹脹滿短氣以草薹薹一兩去皮為細末生姜湯調下五分

太陰所至為畜滿 辨云脾為陰中之太陰又云脾為陰中之至陰乃為坤元亘古不遷之土天為陽火也地為陰水也在人則為脾同陰水之化脾有餘則腹脹滿食不化故無陽則不能化五穀脾盛乃大寒為脹滿故脉經云胃中寒則脹滿大抵此病皆水氣寒濕為之也治宜大辛熱之劑必愈然亦有輕重

木香塌氣丸治中滿腹脹下焦虛損者

蘿蔔子炒 陳皮去白各五錢 胡椒二錢 草薹薹面裹煨
木香 青皮各錢 蝎稍去毒二錢半
右為細末水調為丸如桐子大每服三十九溫米飲下

忌油膩服白粥百日重者一年小兒丸如麻子大桑皮皮湯下十九日三服大人陰囊洪腫冰冷須用青鹽乾姜白麩各三錢水和膏攤紙上貼

諸脹腹大皆為熱全文 諸病有聲鼓之如鼓皆屬于熱
中滿分消丸治中滿熱脹鼓脹氣脹水氣脹大熱脹有寒者不治

黃芩炒 黃連各五錢炒 姜黃 白朮
人參去芦 甘草炙 猪苓去皮各一錢 白茯苓去皮
砂仁各二錢 枳實炒黃 半夏湯泡各五錢 乾姜二錢
厚朴去皮炒一兩 知母炒四錢 澤瀉二錢 陳皮三錢

乾白湯下食後寒因熱用故焙服
有第二小娘食積挾濕手足生瘡腹滿面浮口渴食少

膈滿小便少大便實

大腹皮

乾薑各三錢

黃芩五錢

陳皮五錢

厚朴三錢

川芎三錢

炙甘草一錢

白朮一兩

木通兩半

姜三片煎服

南二孺人面浮肚脹

蒼朮五錢

黃柏三錢

白朮兩半

陳皮二錢

木通二錢

川芎五分

滑石炒錢半

甘草三錢

厚朴五分

裴孺人年五十二歲氣上膈滿食少此積熱生滯海診得左

三部濇小右三部微數重取稍大喜得無眩暈為可治之

病

白朮兩

青皮三錢

陳皮

厚朴各五錢

大腹皮二錢

片苓炒

木通五錢

蘇梗

川芎各三錢

桂枝三錢

甘稍一錢半

分十貼姜二片煮飲之煎查之湯下保和三十九

經患腹脹滿夯悶掘山梔根少許煎水調一盞服 女人

血氣腹腫以山梔根末三錢熱酒空心服之

仲寸口脉遲而濇遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷

遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷

則榮衛不利榮衛不利則腹滿腸鳴相逐氣轉膀胱榮衛

俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨寒陽前通則惡寒

陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃

散實則失氣虛則遺尿名曰氣分

氣分
血分

氣分謂氣不通利而脹血分謂血不通利而脹非脹病

之外又別有氣分血分之病也蓋氣血不通利則水亦

不通利而尿少尿少則腹中水漸積而為脹但氣分心

下堅大而病發于上血分血結胞門而病發于下氣分
先病水脹後經斷血分先經斷後病水脹也血分治法見水腹脹

藏府
腹滿臄脹支兩肱脇下厥上冒過在足太陰陽明全文見治虛實

太陰所謂病脹者太陰子也十一月萬物氣皆藏于中
故曰病脹脾解

右脾胃脹治法見前補虛行濕條諸方是也

腎氣實則脹全文見治虛實條 二陰一陽發病善脹心滿善氣

全文見診病傳變

運氣
運氣脹有七

一曰濕助脾盛而脹經云諸濕腫滿皆屬脾土又云歲土
太過甚則飲食中滿又云歲土不及濕乃大行民病腹滿

又云土鬱之發民病心腹脹滿腸鳴又云太陽司天寒氣
下臨濕氣變物水飲內畜中滿不發甚則肘腫治以諸熱
是也

二曰風攻脾虛而脹經云厥陰在泉風淫所勝病腹脹治
以辛涼是也

三曰寒脹經云水太過曰流行流衍之紀其病脹又云歲
水太過寒氣流行甚則腹大脛腫又云水鬱之發民病痞
堅腹滿又云太陽之勝皮膚痞腫腹滿又云太陰司天之
政民病寒濕腹滿身臄肘腫三之氣感于寒濕民病肘腫
胸腹滿治以諸熱是也

四曰燥脹經云陽明之復腹脹而洩治以溫劑是也

五曰寒鬱熱于中而脹經云陽明司天之政初之氣寒雨
化其病中熱脹又云太陽司天之政二之氣大涼反至火

氣遂抑民病氣鬱中滿是也

六曰寒熱相薄而脹經云少陰司天之政水火寒熱接于氣交民病腹脹大又云太陰司天之政四之氣寒風曉暮蒸熱相搏民病心腹滿熱臚脹甚則附腫是也

七曰火鬱之發脹經云火鬱之發民病脇腹胸背面首四肢臏憤臚脹是也

雜方

梅治腹滿不能服藥導引方取獨蒜煨熟去皮納下部冷即易

針灸

靈黃帝曰脈之應于寸口如何而脹岐伯曰其脈大堅以瀦者脹也黃帝曰何以知臟腑之脹也岐伯曰陰為臟陽為腑帝曰夫氣之令人脹也在于血脈之中耶臟腑之內乎岐伯曰二者皆存焉然非脹之舍也帝曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在于臟腑之外排臟腑而郭胸脇脹皮

膚故命曰脹黃帝曰臟腑之在胸脇腹裡之內也若匣匱

之藏禁器也各有次舍異名而同處一域之中其氣各異

願聞其故岐伯曰夫胸腹臟腑之郭也臚中者心主之宮

城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅者閭里

門戶也廉泉玉英者津液之道也故五臟六腑者各有畔

界其病各有形狀帝曰願聞脹形岐伯曰夫心脹者煩心

短氣臥不安甲乙經云心輸主之亦取列缺肺脹者虛滿而喘欬甲乙經云

肺輸主之亦取太淵肝脹者脇下滿而痛引少腹甲乙經云肝俞主

脾脹者善噦四肢煩惋躄重不能勝衣臥不安甲乙經云

之亦取太白腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛甲乙經云腎俞

胃脹者腹滿脘骨痛鼻聞焦臭妨于食大便難甲乙經云

大腸脹者脹鳴而痛濯濯冬日重感于寒則

小腸脹者少腹臏脹引而痛甲乙經云

食洩不化甲乙經云天樞主之

邪主

膀胱脹者少腹滿而氣滯甲乙云曲

三焦脹者

氣滿于皮膚中輕輕然而不堅甲乙云石

膽脹者脇下

痛脹口中苦善太息甲乙云陽

凡此諸脹者其道在一

明知道逆順針數不失瀉虛補實神去其室致邪失正真不

可定粗之所敗謂之天命補虛瀉實神歸其室久塞其空

謂之良工黃帝曰脹者焉生何因而有岐伯曰衛氣之在

身也常然並脈循分肉行有逆順陰陽相隨乃得天和五

臟更始四時有序五穀乃化然後厥氣在下榮衛留止寒

氣逆上真邪相攻兩氣相搏乃合為脹也榮氣循脈衛氣

逆為脈脹衛氣並脈循分為膚脹三里而瀉近者一下遠

者三下無問虛實工在疾瀉榮衛循脈至此三十九字原

恩聞之上有三里而瀉之上當有腕筋甲乙云凡黃帝曰

善何以解惑岐伯曰合之于真三合而得帝曰善黃帝曰

脹論言無問虛實工在疾瀉近者一下遠者三下今有其

三而不下者其過焉在岐伯曰此言陷于肉盲而中氣穴

者也不中氣穴則氣內閉針不陷盲則氣不行上越中肉

則衛氣相亂陰陽相逐其于脹也當瀉不瀉氣故不下三

而不下必更其道氣下乃止不下復始可以萬全烏有殆

者乎其于脹也必審其脈當瀉則瀉當補則補如鼓應桴

惡有不下者乎張論

刺灸脹有七法

其一取血絡經云膚脹先取脹之血絡是也

其二取胃經前篇脹論所謂三里而瀉近者一下遠者三

下無問虛實工在疾瀉是其一法也又云胃者水穀之海

其輸上在氣街下至三里水穀之海有餘則腹滿審守其

輸調其虛實又云胃病者腹膜脹取之三里也又云胃足

...

陽明之脈是動則病音響腹脹胃中寒則脹滿視盛虛熱寒陷下取之是脹病大法皆瀉胃穴三里也

其三取脾經云腹滿食不化腹響響不能大便取足太陰又云脾足太陰之脈是動病腹脹噎噫視盛虛熱寒陷下取之又云脾虛則腹滿腸鳴飧洩取其經太陰陽明少陰血者又云足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃虛則鼓脹取之所別也是脹之虛者多補足太陰脾穴也

其四取腎膀胱經云腎病者腹大脛腫取其經少陰太陽血者又云腎藏志志有餘則腹脹飧洩然筋血者又云邪在腎則病腹脹腰痛大便難取之湧泉崑崙是有血者盡取之又云腹滿大便不利腹大亦上走胸溢喘息喝喝然取足少陰又云男子如蠱女子如阻身軀腰脊如解不

欲飲食先取湧泉見血是跗上盛者盡見血也又云脹取三陽是脹病多瀉腎經諸穴也

其五取三焦委陽穴經云三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留即為脹取委陽是也蓋不得小便則水無所泄其水溢出皮膚腫者為水其水留于腹中獨腹脹者為脹也

其六取肺經云振寒洒洒鼓顛不汗出腹脹煩惋取手太陰是也

其七取厥病成脹經云陽明之厥腹滿不得臥太陰之厥腹滿腹脹少陰之厥腹滿心痛厥陰之厥少腹腫痛腹脹盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之是也

秘鼓脹之狀腹身皆大 臍上下左右各刺二分 中脘通關三里手 膚脹之狀空而不堅腹身盡腫按之陷而

不起 太白 公孫 復溜 絕骨 三里 分水

玉腹脹 分水二寸 氣海 三里 三陰交 人中

腹脹并兩足有水 內庭五分 臨泣三分 瀉用香油抹

腹暴脹按之不下 中腕 氣海 三里

單蠱脹氣喘 水分在分水旁各一寸半針

又法 分水 三里 行間 內庭 右關 氣海各灸

東腹脹臍突缺盆中滿尻腰腫 大敦 天牖 崑崙

甲寒氣腹滿痿淫濼身熱腹中積聚疼痛衝門主之 腹

滿嚮嚮然不便心下有寒痛商丘主之 腹脹善滿積氣

關門主之 腹中氣盛腹脹逆不得卧陰陵泉主之 腹

脹腸鳴氣上衝胃不能久立腹中痛濯濯冬日重感于寒

則洩當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠

臍急天樞主之 腹中有大熱不安腹有大氣相和挾暴

腹脹滿痿淫濼氣衝主之 腹滿痛不得息正卧屈一膝

伸一股並氣衝針入三寸氣至瀉之 腸中寒脹滿善噫

聞食臭胃氣不足腸鳴脹滿腹痛洩食不化心下脹三里

主之 大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立

巨虛上廉主之 腹滿不嗜食衝陽主之 寒腹滿脹厲

兌主之 男子如蠶女子如阻寒熱少腹偏腫陰谷主之

胃中寒脹食多身軀羸瘦腹中滿而鳴腹臌風厥胸脇

痞滿嘔吐脊急痛筋攣食不下胃輸主之 頭痛食不下

腸鳴臌脹欲吐時泄注三焦俞主之 腹滿臌脹大便泄

意舍主之 臌脹水腫飲食不下多寒胃倉主之 腹滿

不能食刺脊中 寒中傷飽食飲不化五臟臌滿脹心腹

胸脇痞滿脉虛則生百病上腕主之 腹脹不通寒中傷

診

飽食飲不化中脘主之 水腫水氣行皮中陰交主之
水腫腹大水脹水氣行皮中石門主之 腹滿胃中有熱
不嗜食懸鍾主之

素脉盛而緊曰脹

平人氣象論○脹論
脉大堅以瀉為脹

唇偏舉者脾偏傾脾偏傾則善滿善脹

全文

腹脹身熱

脉大是逆也如是者不過十五日死矣

全文見診生死下
同○脹或兼身熱

或兼如瘧狀皆
不可治累驗

腹大脹四末清脫形洩甚是逆也如是

者不及一時死矣

腹脹便血其脉大時絕是逆也 嘔

咳腹脹且飧泄其脉絕是逆也 少陰終者面黑齒長而

垢腹脹閉上下不通而終矣 太陰終者腹脹閉不得息

善噫善嘔嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通不通則面

黑皮毛焦而終矣

少腹脹滿

水腫石

臍下脹滿是也若先臍下滿漸延及臍上滿者亦用此法

無澤漆湯治石水四肢瘦腹腫不喘其脉沉

澤漆洗去腥
五兩

桑白皮

射干洗
浸

黃芩

茯苓

白朮各四
兩

澤瀉

防已各二
兩

右咬咀每服五錢水三盞烏荳一合煎二盞入藥同煎
七分去渣空腹溫服日三

聖治腹堅脹滿號石水方用白石英十兩搥大荳大以蠶

瓶盛用好酒三斗浸以泥重封瓶口用馬糞及糠火燒之

長令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一中盞飲日可

三度如吃酒少隨性飲之其白石英可更一度燒之

素陰陽結邪多陰少陽曰石水少腹脹 腎肝并沉為石

水論
大奇 腎脉微大為石水起臍已下至小腹腫脹然上

至胃脘死不治

診

靈腸單寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內着惡氣乃起瘰肉乃生其始生也大如鷄卵稍以益大至其成如懷子之狀又者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也

羅睇露丸治寒傷于內氣凝不流結于腸外又為癥瘕時作疼痛腰不得伸

京三稜

廣茂各一兩酒浸

乾漆

五錢洗去醃炒烟尽

茴香

三錢鹽炒

硃砂

四錢另研

輕粉

一錢另研

川烏

半兩炮去皮臍

青皮

去白三錢

雄黃

另研三錢

川山甲

炮二錢

麝香

五分另研

巴豆

三十粒去皮同廣茂三稜炒令采黃色去巴豆不用

右除另研四味外餘為細末和勻生姜汁糊為丸桐子大每服二三十丸溫生姜湯送下溫酒亦得食前

烏喙丸治腸單亦治乳餘

烏喙

炮去皮尖一錢

半夏

湯洗四錢

石膏

煨

蒸蘆

炒

牡蒙

茯苓酒浸

桂心

乾姜

炮各一錢

巴豆

七個研膏

右末蜜丸如棗葶大每服三五丸食後酒飲任下亦治男子疝病

石瘕

經云石瘕生於胞中寒氣客于子門子門閉氣不得通惡血當瀉不瀉以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子可導而下之
聖見現丹治寒客于下焦血氣閉塞而成瘕空大必不消者

附子

四錢炮去皮臍

鬼箭羽

三錢

澤瀉

肉桂

玄胡索

錢半

木香

各二錢

紫石英

一錢

檳榔

二錢半

血竭

錢半另研

水蛭

炒一錢半烟

桃仁

湯浸去皮炒黃三十個

京三稜到五錢 大黃到碎二錢同京三稜酒浸一宿焙乾

右除血竭桃仁外同為細末和勻用原浸酒打糊為丸
桐子大每服十九丸温醋湯送下温酒亦得食前

無石英散治婦人血結胞門或為癥瘕在腹脇間心腹脹滿腫急如石水狀俗謂之血蠱

紫石英一兩 歸尾 馬鞭草各五錢 紅花炒半兩

烏梅肉五錢 蓬朮炮 三稜炮 蘇木節

沒藥 琥珀研各一錢 甘草一錢

右為末濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒姜湯調服

診

脈問曰病有血分水分何謂也師曰經水前斷後病水名曰血分此病為難治先病水後經水斷名曰水分此病易治何以故去水其經自當下水分即氣分也

仲寸口脈沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脈

治

伏水穀不化脾氣衰則鶩溇胃氣衰則身躄腫少陽脈卑少陰細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分是也 師曰寸口脈沉而數數則為出沉則為入出則為陽實入則為陰結跌陽脈微而弦微則無胃氣弦則不得息少陰脈沉而滑沉則為在裏滑則為實沉滑相搏血結胞門其癥不瀉經絡不通名曰血分

仲大黃甘遂湯治女人小腹滿如敦敦狀小便微難而不渴為水與血并結在血室也

大黃四兩 甘遂炮 阿膠炒各二兩
右剉散每服三錢水一盞煎至七分去渣温服其血當下

無萬病丸治室女月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來下痢羸瘦此為血癥若生肉癥不可為也

乾漆碎炒令出

牛膝酒浸一宿

生地黄四兩入錢取汁

右以地黄汁入下二味為末慢火熬候可丸即丸如梧子大空心米飲或溫酒下一丸日再勿妄加病去止藥女人氣血虛經不行者不可服之

針灸

靈 小腹滿大上走胃至心浙浙身時寒熱小便不利取足厥陰雜疾

甲 石水痛引脇下脹頭眩痛身盡熱關元主之 振寒大腹石水四滿主之 石水刺氣衝 石水章門及然谷主之 又天泉主之

世 腸覃之狀內着惡氣乃起瘕肉大如鷄卵日以益大其成也如孕推之則移 中極 氣衝 天樞 五福 石瘕之狀生于胞中惡血不通日以益大如孕 陰陵泉

去胸中惡血 復溜順骨刺下待腹溫方可去

胎前腹脹

滯氣

大 紫蘇飲治妊娠心腹脹滿而脇妨悶方見婦人胎逼上心門

實熱

紫 枳殼湯治婦人妊胎腹脹

枳殼兩三

黃芩兩一

右為粗末每服五錢水盞半煎溫服

治胎前腹滿身軀沉重枳殼湯中加白朮一兩

仲 婦人懷妊六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者小

腹如扇所以然者子藏寒故也當以附子湯溫其藏附子湯方

見傷寒

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰已上重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實刺瀉勞宮及關元小便微利則愈

汚血

治產後血與惡露不下因而血脹用杜牛膝杵碎用水熬成膏去渣每服一椀未愈再服神効 子母產後穢汚不盡腹滿用麻子三兩酒五升煮取一升分温二服當下惡物

干治產後穢汚下不盡腹滿生姜二斤以水煮取汁服即出

日華治產後血脹苗葉同功乃益母草子也

保紫金丹治產後腫胸中有物狀是噎氣不降

代赭石 各等分按本草並無礱石止血下石淋除瘕結伏鬼物惡氣疑即此

右為細末醋糊丸桐子大每服三十五丸酒下胸中痛

加川歸湯下久服治血癖

大抵聖湯治產後腹脹滿悶嘔吐不定不可用尋常治脹

虛

止吐藥

赤芍藥 半夏 澤蘭葉 人參

陳皮 各一分 甘草 一分

右咬咀用水一碗生姜焙乾五錢煎至半碗去渣分熱

三服

丹陽禮五孺人瘕產後腹滿零渴不飲脉却虛

白朮 炒六錢 陳皮 五錢 白芍 炒極熟二錢半 厚朴

川芎 各二錢 每服加海金沙一錢

分四貼煎下保和丸廿五粒

天枳朮湯治虛後心腹大如盤 方見脹門補虛條

保又方 代赭石 兩 棗仁 三十去皮尖 大黃 兩半

右細末薄荷水調丸三五十九丸温水下無時

治產後腹大堅滿不能卧白聖散

實

樟柳根

大戟兩半

甘遂兩半

右細末每服二錢熱湯下取大府利為度此主水氣之

妙藥也

針灸

甲婦人產後餘疾飲食不下胸脇支滿目眩足寒心切痛善噫聞酸臭脹痺腹滿小腹尤大期門主之

醫學綱目卷之二十五

脾胃部

積塊癥瘕 婦人血積 胎前產後積 息積

大法

丹氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血成聚宜醋煮海石醋三稜莪朮桃仁紅花五靈脂附子之類石城白朮湯下之 瓦龍子能消血塊又能消痰 治塊當降火消食積食積即痰也行死血血塊去後須大補之

石城痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積 塊在皮裏膜外須用補氣香藥開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚味凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不退當用消積藥融化開則自消

垣治積要法 許學士云大抵治積或以所惡者攻之所喜者誘之則易愈如硃砂水銀治肉積神麩麥蘗治酒積水蛭蠅治血積木香檳榔治氣積牽牛甘遂治水積雄

黃膩粉治痰積礫石巴豆治食積各從其類也若用羣隊之藥分其勢則難取効須要認得分明是何積聚兼見何證然後增加佐使之藥不爾反有所損要在臨時通變也治積當察其所痛以知其病有餘不足可補可瀉無逆天時詳臟腑之高下如寒者熱之結者散之客者除之留者行之堅者削之强者奪之鹹以與之苦以瀉之全真氣藥補之隨其所積而行之節飲食慎起居和其中外可使必已不然遽以大毒之劑攻之積不能除反傷正氣終難復也醫者可不慎歟

諸積皆本陰虛

諸積皆本於喜怒傷臟而陰虛陰既虛矣則風雨襲陰之虛病起於上而生積清濕襲陰之虛病起於下而成積詳見

針灸條

諸積皆本陰虛

潔壯人無積虛人則有之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時

為主

有感皆能成積若遽以磨堅破結之藥治之疾似去而人已衰矣乾漆礪砂三稜牽牛大黃之類得藥則暫快藥過則依然氣愈消疾愈大竟何益哉故善治者當先補虛使血氣壯積自消如滿座皆君子則小人自無容地也不問何臟先調其中使能飲食是其本也

因鬱成積

丹有婦人三十歲因哭子至半年後胸痞有塊如杯飲食大減面淡黃慘黑若不勝衣六脈弦細虛澁至日晡後則

丹溪之法補中帶磨積為主

發寒熱予察其事勢已急補瀉兼用以補中益氣湯隨天氣寒暄加減法與東垣痞氣丸相間服方見五積門食前

用湯食後用丸常令湯多於丸些少如此近一月寒熱皆退食亦稍進又以丸用湯相等服之至第二月以後忽一夜大發寒熱至天明熱退胸中之塊如失至晚手足下半節皆腫遂停藥三五日後忽一夜手足之腫如失至天明

胸中之塊復有比如前覺小一暈遂以二陳湯加桔梗白朮枳實調理半月而安次年復生一男一婦人四十餘面白形瘦性急因大不如意三月後乳房下貼肋骨作一塊漸漸長大掩心微痛膈悶飲食減四之三每早覺口苦兩手脈微而短濇予知其月經不來矣爲之甚懼辭勿與治思至夜半其婦尚能出外見醫梳粧言語如舊料其尚有胃氣遂以參朮歸芎佐以氣藥作大服一晝夜與四次外以大琥珀膏貼塊上防其長經一月餘服補藥百餘貼食及平時之半仍用前藥又過一月脈氣漸充又與前藥吞潤下丸百餘貼月經不及兩月而至濇脈減五分之四時天氣熱意其經行時必帶紫色仍與前補藥加醋炒三稜吞潤下丸以抑青丸十五粒佐之又經一月忽報塊已消及大半月經及期尚欠平時半日飲食甘美如常但食

肉則覺不快予令止藥且待來春木旺時又與區處至次年六月忽報一夜塊大比舊反加大半指脈畧弦左畧怯於右至數日平和自言食飽後則塊微悶食行却自平予恣有動心事激之問之果然仍與前補藥加黃芩炒黃連以少木通生姜佐之去三稜煎湯吞潤下丸外以琥珀膏貼之半月值經行而塊散此是肺金爲內火所燬木邪勝土土不能運清濁相干舊塊輪廓尚在者因氣血之未盡復也濁氣稍留舊塊復起補其血氣使肺不受邪木氣平而土氣正濁氣行而塊散矣方提領年五十六丁丑年冬因飲酒後受怒氣於左脇下與臍平作痛自此以後漸漸成小塊或起或不起起則痛痛止則伏而黃口乾無力食少吃此物便噁此味轉惡風寒脈之左大於右弦濇而長大率左甚重取則全弦此得熱散太多以致胃氣太傷

陰血下衰且與和胃湯以補胃氣滋養陰血并下保和丸助其化粕同胃實陰血稍充卻用消塊和胃湯方

人參三錢 白木半錢 陳皮一錢 芍藥

歸身各五分 乾葛三分 紅花大豆大 甘藥二錢

作一貼下保和丸廿五龍薈丸十五

右三法補氣血藥為主磨積出入佐之皆補多於磨乃氣血虛甚而有積塊之法也

飲食酒肉成積

王郎心痛膈有塊與

白木錢二 青皮錢一 芍藥 木通

川芎 蒼朮各一錢 甘草五分

作一貼煎下保和丸三十粒

馮氏女年三十歲形瘦色嫩滋味素厚幼年曾踏雪嘗以

火烘鞋履以致濕熱上襲至廿五歲時口嘗吐清水吞酸

醫用丁香等熱藥時止時作時仍服前藥至當年心痛

胃痞有塊吃飯即吐些常出三之一遂與佐金丸廿四粒

以姜湯下之與三十餘次全不進食予曰結已開矣且令

止藥或口乾思飲止與半盞熟水間以青六丸與之雖困

臥着床尤以絕藥為善如此近四十日診其脈前後些微

弦重取似瀋輕取稍和至此弦脈漸添遂令與人參酒芍

藥湯引金瀉木漸漸思食而苦於大便秘病家必欲行大

黃予止之遂以生芍藥陳皮桃仁人參為丸與之用蜜煎

導大便行而食進調理半月而安

參茸九即佐金丸加人參一錢是也

盧子裕左脇下因瘧後食肉與酒而成塊

白朮錢一 柴胡醋炒一錢 茯苓錢二 枳殼炒五分

人參

作湯下阿魏五保和廿柳青十與點十攻塊五

長垣朱郎因酒多年濕病脇上有塊腹滑泄小便黃

滑石兩

白朮

三稜各六錢

陳皮五錢

黃連

猪苓各三錢

黃芩

木通各二錢

防風一錢

乾姜一錢

甘草五分

分七貼煎下保和丸二十

一丈夫壯左邊帶脇上有塊先吃匾食牛乳者成氣痛又

因酒肉塊大如桃食減三分之一

滑石兩

白朮四錢

陳皮

三稜三錢

蘿蔔子

連翹

黃連各一錢

乾葛二錢

桃仁廿個

黃芩一錢

甘草錢半

右分四貼水煎服

婦人脇下有塊大如掌脈濇時有熱此虛中有氣積先與
補虛次與磨積藥

白芍

歸鬚四錢

陳皮

白朮三錢

青皮

川芎

木通各一錢

甘草半錢

白水煎熱服

磨積藥

三稜醋煮一錢

枳實

青皮

桃仁各五錢

大黃五錢

桂枝半錢

海藻醋煮三錢

細末神麴糊丸如桐子大每服四十九

體虛有熱成積

世一孺人左脇下舊有塊漸長大脈弦而大稍數詢之近
亦發熱食亦減倦怠先與補之次攻此塊

陳皮五錢

白朮兩半

柴胡

歸頭

青皮各五錢

甘草一錢

木通三錢

右作八貼服

次與玫瑰

青皮醋一兩半

桃仁錢五

三稜醋兩半

桂枝三錢半

海藻醋洗三錢

醋調神麴糊為丸

一丈夫脇下有積塊內有痰熱汗不得泄兩脈大而散軟

此體有瘡

三稜錢五

白朮

黃連各三錢

人參二錢半

連翹

木通各三錢

川芎

桂錢一

甘草分五

水煎下保和丸

富小娘瘡後左脇下塊小便少

厚朴

柴胡錢二

三稜錢五

甘草分五

木通錢五

白朮六錢半

青皮錢五

生姜片一

右食前熱服

按之痛者消之

下邳錢郎正月發沙因此臍邊有塊二枚發起則痛伏則不痛有時又隱痛自炙臍中脈甚弦右手伏重取則畧數此蘊熱因春欲汗解而氣弱不能自發為汗復鬱又因食不節邪挾宿食所以成塊宜以保和二十温中二十抑青十用白朮木通三稜湯下

右十一法皆補藥與磨積相半兼服之前七法治飲食酒肉成積後三法治體虛有熱成積也

丹陳里長男廿七歲舊因飽食牛肉荳腐患嘔吐又不節飲食右脇下生一塊漸長今大如掌痛發則見痛止則伏其脈弦而數知此人必性急塊上不可按按則愈痛痛則必吐黃酸苦水詢之果然或作腎氣治予曰非也此足太陰有食積與濕痰

荔枝核燒二箇

山梔炒五箇去殼

枳實炒十箇

山查九箇

茱萸炒九枚

一方有人參

右細研急流水一盞蕩起煎沸入生姜汁令辣食前熱服與六貼吐二貼服四貼與此藥且止其痛卻與消塊藥

半夏末

六錢是角六箇水煮取汁拌半夏末曬乾

黃連炒五錢

石城二錢

另研

已上三件同為細末以糖毬膏為丸如胡椒大

丹一婢色紫稍肥性沉多憂年近四十經不行三月矣小腹中有一氣塊初起如栗漸如炊餅予脈之兩手皆濇重取卻稍和試令按塊痛甚捫之高寸半遂與千金消石丸至四五次後忽自言乳頭黑且有汁恐是孕予曰非也濇脈無孕之理又與三五貼脈之稍覺虛豁予悟曰藥大峻矣令止前藥與四物湯倍白朮佐以陳皮炙甘草至三十

貼候脈完再與消石丸數次忽自言塊消一暈便令莫服又半月經行痛甚下黑血半升內有如椒核者數十粒而塊消一半又來索藥以消餘塊予曉之曰勿性急似開矣不可又攻若次月經行當消盡矣次月經行下少黑血塊又消一暈又來問藥予曰且守禁忌至次月又消盡已而果然大凡攻擊之藥有病則病受之病邪輕而藥力重則胃氣受傷夫胃氣者清純中和之氣也惟與穀肉菜菓相宜蓋藥石皆偏勝之氣雖參芪輩為性亦偏况攻擊之藥乎此婦胃氣弱血亦少若待塊盡而去藥胃氣之存者幾希矣

一婦人年五十五歲形氣俱實富而神勞味厚性急常經水過多醫每用瀉藥止後病氣痛曾腹共有積塊大小十三枚遇夜痛甚着床累月飲食雖減應接家事如故其脈

痰瘵成塊者滑去之

隨氣上
塞咽中
者吐之

兩手皆漚而弱此因屢用瀉藥致敗血積聚不行故爾時
三月間用蜀葵根煎湯再煎人參白朮陳皮青皮甘草稍
牛膝成湯入玄明粉少許研桃仁調熱飲之服至二貼腹
痛下塊一枚再并查煎服又下一枚時以病久血耗不敢
再取塊告技窮而歸後想此症患者雖重其形質尚可受
藥但當去葵根玄明粉其後塊漸消而病安

白朮半錢

陳皮

半夏錢一

桔梗

青皮

木通錢五

甘草錢一

生姜錢二

煎服一二次病遂平復再與前藥半月後加桔梗煎一
服令其吐吐出痰積遂愈

子和息城司侯聞父死于賊乃大悲哭罷便覺心痛日增

氣結者
痰之

不已月餘成塊狀若覆杯大痛不堪藥皆無功議用燔針
炷艾病人惡之乃求治于戴人戴人至適巫者在其傍乃
學巫者雜以狂言以謔病者至是大笑不忍回面向壁一
二日心中結硬皆散戴人曰內經言夏則氣結喜則百脈
舒和又云喜勝悲內經自有此法

暴積急
去之

丹呂宗信年六十素好酒八月間因暑熱中得疾兩足冷
過膝上腕有塊如掌牽引脇痛不可眠臥飲食減半卻不
渴已自服生料五積散三貼予脈之六脈俱沉漚而小按
之不為弱皆數而右為甚大便如常小便赤色遂用大承
氣湯減大黃之半而熟炒加黃連芍藥川芎乾葛甘草作
湯下瓜蒌仁半夏黃連貝母丸至十二貼足冷退至脛塊
減半遂止藥至半月飲食復舊諸症悉除

唐柳宗元慕救死方元和十二年二月得腳氣夜半痞絕

脇有塊大如石且死因太寒不知人三日家人號哭榮陽
鄭詢美傳杉木湯服半食頃大下三次氣通塊散其方用
杉木節一大升橘葉一大升無葉以皮代之大腹楨榔七
箇合搗碎之童便三大升共煮取一升半分二服若一服
得快利停後服

肘治卒暴癥腹中有如石刺痛牛膝一大把并葉酒煮飲
之

外治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藿根一小束
洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿煖溫服五合至一升日
三若欲速得服於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒神
効

右暴積急去條四方如塊除後必用補劑以救其受攻
之傷也

之

海萬病紫苑丸療臍腹久患痲痺如椀大及諸黃病每地
氣起時上氣衝心繞臍絞痛一切虫咬十種水病十種蟲
病及反胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病女人多年
月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又治十二種風頑
痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如
鬼魅所着腹中生瘡腹痛服之皆効

紫苑

去苗土

吳茱萸

湯洗七次焙乾

菖蒲

柴胡

去鬚

厚朴

姜制各一兩

桔梗

去芦

茯苓

去皮

皂莢

去皮

桂枝

乾姜

炮

黃連

去鬚

蜀椒

去目及閉口
微炒出汗

巴豆

去皮膜
內油炒

人參

去芦各五錢

川烏

炮去皮
臍三錢

加羌活

獨活

防風

各一兩

右爲細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服三丸漸
加至五九七丸生姜湯送下食後臨臥服有孕者不宜

服具列于後

痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膿血痢米飲湯

下 墮傷血悶四肢不收酒下 蛔虫咬心栝榔湯下

氣噎憂噎荷葉湯下 打撲傷損酒下 中毒掃帚

灰甘草湯下 一切風升麻湯下 寸口虫栝榔湯下

霍亂乾姜湯下 咳嗽杏仁湯下 腰腎痛豆淋酒

下 陰毒傷寒溫酒下 吐逆生姜湯下 飲食氣塊

麪湯下 時氣井花水下 脾風陳皮湯下 頭痛水

下 心痛溫酒下 大小便不通燈草湯下 因物所

傷以本物湯下 吐水藜湯下 氣病乾姜湯下 小

兒天平風搐防風湯下 小兒疳痢葱白湯下 小兒

乳食傷白湯下 月信不通紅花酒下 婦人腹痛川

芎酒下 懷孕半年後胎漏艾湯下 有子氣衝心酒

下 產暈痛溫酒下 血氣痛當歸酒下 產後心痛

腹脹滿豆淋湯下 難產益智湯下 產後血痢當歸

湯下 赤白帶下酒煎艾湯下 解內外傷寒粥飲下

室女血氣不通酒下 子死腹中菓子湯下 又治

小兒驚癇大小顛狂一切風及無孕婦人身上頑麻狀

如虫行四肢俱腫呻吟等疾 楊駙馬患風氣衝心飲

食吐逆遍身枯瘦日服五九至二十日瀉出肉塊如蝦

蟬五六枚白膿二升愈 趙侍郎先食後吐日無所見

耳無所聞服五十日瀉出青蛇五七條四寸許惡膿三

升愈 王氏患大風病眉髮墮落掌内生瘡服之半月

瀉出癩虫二升如馬尾長寸許後愈 李靈患肥氣病

日服五九經一年瀉出肉鱉一枚愈 黃門李中風病

發時服藥泄出惡膿四升赤黃水一升一肉虫如亂髮

愈 李知府妻梅氏帶下病七年血崩不止骨痠着床
 日服五丸至十九十五丸取下膿血五升黃水一升肉
 塊如鷄子狀治愈一切萬病如神惟有孕者不宜服
 局温白丸治心腹癖塊久癥積聚大如杯椀黃疸宿食朝
 起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩
 脇十種水氣八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九
 種心痛積年食不消化或連年瘧疾不瘥及療一切諸風
 身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及療七十
 二種風三十六種遁尸疰忤及顛癇及婦人諸疾斷續不
 生帶下淋瀝五邪失心憂愁思慮飲食減少月水不調及
 腹中一切諸疾連年羸瘦因斃或歌或笑如鬼所使但服
 此藥無不除愈卽前萬病紫苑方減羌活獨活防風
 萬病丸療八種痞病五種癇病十種疰忤七種飛尸十二

種蠱毒五種黃病十二種瘧疾十種水病八種大風十二
 種痺并風入頭眼翳膜漠漠及上氣咳嗽喉中如水雞聲
 不得臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉不通心
 腹脹滿及胸背鼓脹氣結四肢流入胸腹又治心膈氣滿
 時定時發十年二十年不瘥五種下痢疰虫疣虫寸白諸
 虫上下冷熱久積痰飲令人多眠睡消瘦無力蔭入骨髓
 便成漏疾身體氣腫飲食嘔逆腰腿痠疼四肢沉重不能
 久行久立婦人因產冷入子臟臟中不淨或閉塞不通包
 中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛爲惡或因此斷產并小
 兒赤白下痢及狐臭耳聾鼻塞等病服此藥以三丸爲一
 劑不過三劑其病悉除說無窮蓋故稱萬病丸

牛黃細研 黃芩去 芫花醋炒 禹餘糧醋淬
 雄黃飛研 芫薺 人參去 紫苑去 醋炒

蒲黃微炒 麝香研 當歸去芦 桔梗去芦

大戟剉 乾姜炮 防風去芦 黃連去鬚

朱砂飛研 犀角鎊 前胡去芦 巴荳去皮心

細辛去苗 葶藶炒 肉桂去粗皮 茯苓去皮

桑白皮炒 芍藥 川椒去目及開口者微炒出汗

甘遂各一兩 蜈蚣去頭足炙 芫青二十八枚入大

米同炒黃 石蜥去頭尾足炙四寸

右爲細末入研藥勻煉蜜爲丸如荳大若一歲已下小兒有疾者令乳母服兩小荳大亦以吐利爲度近病及卒病多服積病久疾卽少服常服微溏利爲度 卒病欲死服三九取吐利卽瘥 卒中惡口噤服二九漿水下利卽瘥 五疰鬼刺客忤服二九 男女邪病歌哭腹大姪娠者服二九日三夜一間食服之 蠱毒吐血

腹如刺服二九不瘥更服 瘡病未發前服一九未瘥

更服 諸有痰飲者服三九 冷癖日三服每服三九

皆間食常令微溏利 宿食不消服二九取利 癥瘕

積聚服二九日三服 拘急心腹脹滿心痛服三九

上氣嘔逆胸膈滿不得臥服二九不瘥更服 大痢服

二九日二服 疔蠱服二九或一九如杏仁大和醋二

合灌下部中 水病服三九日再服間食服之瘥止

人弱卽隔日服 頭痛惡寒服二九覆取汗 傷寒天

行服二九日三服間食服之 小便不通服一九不瘥

明日更服 大便不通服三九又內一九下部中卽通

耳聾停急以綿裹如棗核塞之 鼻衄服一九 癰

腫疔腫破腫內一九如麻子大日一傅之赤根自出

疔疔腫血出以猪脂和塗有孔則內孔中瘥 癩瘡以

醋泔洗訖取藥和猪脂傅之 漏瘡有孔以一丸內孔
 中和猪脂傅上 痔瘡塗綿筋上內孔中即瘥 瘰癧
 以醋和塗上瘥 癬瘡以布揩令汗出以醋和塗上日
 一易瘥 胸背腰脇腫以醋和傅腫上日一易又服二
 九 諸冷瘡積年不瘥者以醋和塗之 惡刺以一丸
 內瘡孔中即瘥 蝮蛇螫以少許內螫處若毒入腹心
 煩欲絕者服三九 蜂螫以少許傅之瘥 婦人諸疾
 胞衣不下服二九 小兒驚癇服一九如米許以塗乳
 令小兒啣之看小兒大小加減 兒客忤服一九如米
 大和乳塗乳頭令啣之以意量之 蝎螫以少許傅之
 瘥 小兒乳不消心腹脹滿服一九如米許塗乳頭令
 啣之即瘥

羅乾柿丸取虛實積下膈甚妙

朱砂 研為衣 沒藥 研 猪牙皂角 去皮弦子為細末

乾姜 炮為末 乾漆 炒烟盡為末 京三稜 炮為末 輕粉 一錢

青礞石 煨為末 巴荳 三十粒去皮膜醋煮十沸

水銀 一錢鉛一錢結炒乾

右件各研勻軟飯和為丸如葦苳大煎柿蒂湯冷下三五丸加減用婦人有胎不可服

熱積寒消之 小腸移熱於大腸為久癖為沉 全文見診病傳變

干消石丸治癥瘕

硝石 六錢 大黃 八錢 人參 甘草 各三錢

右各為末先將硝黃末以三年苦酒先煎候將乾却用參甘二末和勻為丸每三十九米湯下四日一服候下如雞肝或如米泔赤黑色等効下後忌風冷

羅醋煮三稜丸治一切積聚不拘遠年近日治之神効

京三稜

四兩醋煮透
竹篾切晒乾

川芎

二兩
醋煮

大黃

半兩醋煮濕
帚裏煨過

右三味同為末醋糊為丸如桐子大每三十九溫水下不拘時病甚者一月効小者半月効

羅神功助化散專治男子婦人腹中痞塊不拘氣血食積所成此方之妙不可盡述

地扁蓄

錢五

瞿麥蕙

錢五

大麥蘖

錢五

神麩

錢二

沉香

錢半

木香

錢半

甘草

錢五

大黃

錢二

右為細末淨依分兩和勻男以甘草淡竹葉二味等分煎湯及無灰酒同調服酒多於湯 婦人用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒同調服酒多於湯忌油膩動氣之物及房事一月藥須用黃昏服大小便見惡物為度神妙非常誓不輕傳匪人

聖散子治遠年積塊及婦人乾血氣

礪砂

兩六

大黃

兩八

麥蘖

兩六

乾漆

燒過

菖蓄

茴香

炒

檳榔

各一兩

如婦人乾血

氣加川山甲

二兩
炮

右為細末每服三錢溫酒調下仰臥此藥只在心頭至天明大便如魚腸小便赤為驗取出並無毒有神効小兒用一錢十五已上五錢空心服之更効

寒積熱
消之

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經

血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

全文
諸痛

海紅丸子治大人脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹滿脹四肢無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不嗜飲食漸成脾虛不拘老少並宜服之

京三稜五斤水浸軟分切作小片子

蓬朮五斤

陳皮五斤揀淨

青皮五斤

胡椒三斤

乾姜二斤炮

右研六味同為細末醋糊為丸桐子大礬紅為衣每三十九食後姜湯吞下

羅雞爪三稜丸治五臟疝瘕氣塊

雞爪三稜

石三稜

京三稜

木香

青皮去

陳皮去白

礬砂三錢

檳榔

肉荳蔻各一兩

右為細末生姜汁麪糊為丸桐子大生姜湯送下

礬砂煎丸消積磨塊一切凝滯

黑附子

二枚各重五錢已上者炮裂去皮臍剉作片子

木香三錢

草撥一兩

礬砂三錢

開納在窰內火上煨乾

破故紙

一兩隔紙微炒

右將飛過礬砂末封在附子窰內却用剉出附子末蓋口用和成白麪裹約半指厚慢火灰內燒勻黃色去麪用木香等為細末卻用元裹附子熟黃麪為末醋調煮糊為丸如桐子大每服十五丸至三十九丸生姜湯送此藥累有奇功

本治癥丸治丈夫女人小兒年深日近沉積瘕塊面色青黃時上搶心吐水吞酸舌生白沫婦人積年月經不調漸成血氣或血蠱塊中焦之間覆如杯碗連年累月漸成瘦瘠寒熱往來一切脾胃受寒久不瘥愈之疾並皆治之

巴荳

五兩去油膜

蓬朮

三兩醋炙透

京三稜

二兩醋炙透

丁香皮

木香

丁香

厚朴三兩製

石菖蒲

良姜

蜚蜚

川牛膝

香附子

石蓮子

薏苡仁

史君子

右為細末稀麪糊為丸如菉豆大積年癥瘕成塊者第一服用熟水下二十九自後每日三九五九更量虛實加減與之五日去盡積塊若近脾胃有積者每服五九米飲吞下一服取効婦人血氣成塊及血瘕每服二十九用蘇木酒童子小便各一半煎五七沸令溫空心吞下自後每日用溫酒下三九其血塊逐旋消從大小便去盡自知小兒疝重腹痛不能忍日夜叫喚百藥不救者陳皮湯下七九立効諸虫皆宜下嘗服或白湯或姜湯下三五丸中酒及酒積大便鮮臭者白湯與酒各半吞十九立効如神一切咽塞心下硬痛皆用棗湯下五丸不拘時候

寒熱通用方

羅玄胡索丸治吐利腹脹心腹痛癥瘕氣結虫煩不安順三焦和脾胃

玄胡索

當歸

青皮去

雄黃飛

廣茂炮

木香

檳榔

京三稜炮各四兩

右為細末入雄黃末水糊為丸桐子大生姜湯下

荆蓬煎丸破痰癖消癥塊冷熱積聚胃膈症悶通利三焦升降陰陽順氣消食

京三稜

二兩酒浸冬三夏一日

枳殼炒一兩

廣茂二兩醋浸冬三

日夏一日已上二味同以去皮巴菴二十箇銀器內炒令黃色不用巴菴

青皮去

茴香微炒

木香去根

檳榔各一兩

右為細末水糊為丸豌豆大每服三十九生姜湯下

丹潤下丸治積塊方見

世二賢散消積塊進食方見

橘紅一斤

甘草四兩

鹽半斤

右用水二四碗從早煮至夜以爛為度水乾則添水晒

乾為末淡姜湯調下有塊者加姜黃半兩同前藥煮
氣滯加香附二兩同前藥煮 氣虛者加沉香半兩另
入噤口痢加蓮肉二兩去心另入

右自久積緩除條至此一十六方皆純是磨積之劑必
用補氣血藥相兼服之純用之致死乃醫殺之也謹之
驚風成塊者妙應丸加川山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索
蓬朮各四錢每五十九加至七十九以利為度妙應丸即
控涎丹方

驚積
茶積
丹茶癖喜吃茶及吃乾茶者

石膏 升麻 為末沙糖調服

酒積
世酒積方累効

烏梅 <small>肉一兩</small>	半夏 <small>麩七錢</small>	青木香 <small>錢四</small>	枳實 <small>半兩</small>
砂仁 <small>兩半</small>	杏仁 <small>錢三</small>	巴霜 <small>錢一</small>	黃連 <small>酒浸一兩</small>

右為末蒸餅丸菘荳大每八九白湯送下

虫積
褚澄傳云澄善醫為吳郡太守百姓李道念以公事到郡
澄見謂曰汝有重病答曰舊有冷病至今年久眾醫不瘥
澄為診曰汝病非冷非熱當是食白淪雞子過多所致令
取蒜一升煮食吐一物如升涎裹之開看是雞雛羽翅爪
距具足能行走澄曰此未盡更服餘藥又吐得如向者有
十三頭而病都瘥
衍有人病心腹滿煩彌二歲診曰腹有蟲誤食髮而然令
餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈
此殺毒虫之驗也

右二方吐虫積之法也

兩脇下積塊
丹治食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩運身
熱時作時止

黃連一兩半用柴萸益智 山梔半兩 川芎

神麴 桃仁去皮 三稜 蓬朮各半兩

香附童便浸 山查各一兩 蘿蔔子炒一兩半

右麴糊丸又方有青皮半兩白芥子一兩半炒

治脇痛有塊龍薈丸二錢半起料 加姜黃 桃仁各半

右蜜丸服

世小阿魏丸治脇下積塊

三稜醋炙一兩 蓬朮醋製一兩 青皮醋製二兩 胡椒三錢

木香一兩 麝香分二 阿魏二錢半

右為末醋煮陳倉米粉為丸桐子大

子和菓園劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絕

諸法無措戴人令一月之內涌四次下六次取去痰約一

二桶其中不化之物有如葵葉煮爛魚腸之狀涌時以木

吐下法

如意攪之覺病積如括漸漸而平及積既盡塊痕反窪如
白畧無少損至是而面有童色經水復行若當年少可以
有子

丹治塊在何部分 在中為痰飲 在右為食積 在左

為血積 潤下丸治痰積方見

阿魏丸去諸積

山查 南星皂角水浸 半夏同南星浸 麥牙

神麴 黃連各一兩 連翹 阿魏醋浸

瓜蒞 貝母各半兩 風化硝 石減

胡黃連 白芥子各二錢半 蘿蔔子蒸一兩

右為丸姜汁浸炊餅丸一方加香附蛤粉治嗽

羅破積導飲丸治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

木香 檳榔 陳皮白去 青皮白去

塊部分 痰食氣 血諸積 方

枳殼炒

枳實炒

廣茂炮

京三稜炮

半夏湯洗七次

神麩炒

麥蘖炒

茯苓

乾姜

澤瀉

甘草炙各五錢

牽牛頭末六錢

巴豆三十枚去皮心膜

右為細末入巴豆霜令勻生薑汁打麩糊為丸如桐子大每服三十九溫姜湯送下食前

無小三稜煎治食癥酒痞血癥氣塊時發刺痛全不思食積滯不消心腹堅脹逆嘔噦噫酢酸

京三稜

蓬朮名四兩

芫花一兩去梗葉

右同入甕器中用米醋五升浸滿封器口以炭火煨令乾取出稜不將芫花以餘醋炒令微焦焙乾為末醋糊丸如菘菹大每十五丸生姜湯下

羅神効五食湯丸取虛實積氣食蠱脹積塊水氣年深痞

瘕並皆治之

大戟括去皮

甘遂生各半兩

猪牙皂角生去皮

胡椒生

芫花醋浸一宿取出炒各一兩

巴豆去皮膜心醋煮

二十沸研半兩

右件除巴豆杵羅為末入巴豆再研勻水煮麩糊為丸如菘菹大每服五七丸氣實者十九夜臥水一盞入白米白麩黑菹生菜猪肉各少許煎至半盞去渣候湯溫下藥取下病忌油膩粘滑物婦人有胎者不可服

必効療癖取車下李仁微湯退去皮及並仁者與乾麩相拌搗為餅如麩乾和淡水如常漫麩法作餅大小一如病人掌為二餅微炙黃至熟空腹食一枚當大利如不利更食一枚或飲熱粥汁以利為度若至午後利不止即以前飲止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病

盡為限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉等無不効
丹保和丸治食積酒積方見

阿魏丸治肉積及飽食停滯胃壯者宜此脾虛者勿服

山查 蘿蔔子 神麩 麥芽

陳皮 青皮 香附各二兩 阿魏一兩醋

研 右炊餅丸

又方龍薈丸加白鴿糞大能消食積或入保和丸

羅流氣丸治五積六聚癥瘕癖塊留飲

木香 川茴香炒 青皮 廣茂炮

陳皮皁 蘿蔔子炒 補骨脂炒 萆薢茄

砂仁 神麩炒 麥蘖炒 枳殼麩炒各

牽牛一兩 檳榔一兩

右為細末麩糊為丸如桐子大食後每服三十九丸細嚼

白苳薏仁一枚白湯送下

丹治血塊丸

海粉醋 三稜醋 蓬朮 桃仁

紅花 五靈脂 香附 石城

右為丸白木湯吞下

木主癥積滿腹諸藥不瘥者取白馬尿服之愈

世治腹中有塊猪腰子一雙切薄片木鱉子肉一兩與猪

腰片相間縛定外用濕紙包火內煨熟取出去紙搗盆內

搗如泥入黃連末和為丸每服廿丸烏梅甘草湯吞下第

二服廿五丸三服三十九丸漸加至以痛為度大便利其塊

自消有神効

積有常處屬藏 難病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故 陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚

故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處故謂之聚故以是別知積聚也五十五難○治聚法見末條

肝積面青脈弦長定在左脇下

素青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支眩名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭脈緊是也五藏生成篇

難肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發欬逆瘖瘧連歲不已以季夏戊巳日得之何以言之肺病傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受故留結為積故知肥氣以季夏戊巳日得之

五十一
六難

肝脈微急為肥氣在脇下若覆杯全文見治虛實法

心積面赤脈數實定在心下

素赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之五藏生成篇帝曰病

有少腹盛上下左右皆有根此為何病可治否岐伯曰病名曰伏梁帝曰伏梁何因而得之岐伯曰裹大膿血居腸胃之外不可治治之每切按之致死帝曰然何以故岐伯曰此下則因陰必下膿血上則迫胃脘生膈俠胃脘內癥此久病也難治居臍上為逆臍下為從勿動亟奪腹中論○王註云生當作出林註云太素俠胃作便胃帝曰人有身體髀骨股肱皆腫環臍而痛是為何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而着於盲盲之原在臍下故環臍而痛也不可動之動之為水溺瀦之病同上

難心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人病煩心以秋庚辛日得之何以言之腎病傳心心當傳肺肺秋適王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋庚辛日得之五十六難

心脈微緩為伏梁在心下上下行時唾血全文見治虛實法

素黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝

脾積面黃脈大而虛定在中脘

女子同法得之疾使四肢汗出當風是也五藏生成篇疝當作痞字

難脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢

不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之何以言之

肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾復欲還

肝肝不肯受故留結為積故知痞氣以冬壬癸日得之十四難

脾脈微大為痞氣腹裏大膿血在腸胃之外全文見治虛實法

肺積面白脈數而浮定在右脇

素白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中喘而

虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也五藏生成篇○喘謂脈躁數也

難肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久不已令人洒

淅寒熱喘咳發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病傳

肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不

肯受故留結為積故知息奔以春甲乙日得之五十六難

肺脈滑甚為息賁主氣全文見虛實法

素黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺

腎積面黑脈寸口大實脈在少腹

得之沐浴清水而臥是也

難腎之積名曰賁豚發於少腹上至心下若豚狀或下或

上無時久不已令人喘逆骨瘦少氣以夏丙丁日得之何

以言之脾病傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎

復欲還脾脾不肯受故留結為積故知賁豚以夏丙丁日

得之五十一
六難

腎脈微急為沉厥奔豚足不收不得前後全文見治
虛實法

治五積
法

垣肝之積肥氣丸治積在左脇下如覆杯有頭足久不愈
令人咳逆瘖瘖連年不已

厚朴兩半

黃連七錢

柴胡二兩

椒去汗目附
不用四錢

巴豆霜五分

川烏炮去皮臍
一錢二分

乾姜五分

皂角去皮弦子
煨一錢半

白茯苓一錢

廣茂煨

昆布

人參各二錢半

甘草三錢

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研巴豆霜旋旋
入和勻煉蜜丸如桐子大初服二九一日加一九二日
加二九漸加至大便微溏再從兩九加服周而復始積
減大半勿服

右後積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條

下秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃連一錢半若治
風癩於一料中加人參茯苓菖蒲各三錢黃連只依春
用七錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心服

加減肥氣丸 仲夏合此治同前

柴胡

厚朴各半兩

黃連一兩

川椒

甘草各五分

巴霜三錢

乾姜半兩

肉桂二錢

人參半兩

川烏三錢

右除巴豆末外同為細末旋入巴霜研勻煉蜜丸如桐
子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便
微溏再從二九加服淡醋湯下空心服利大便行秋冬
去生姜半錢加厚朴一倍減黃連一半

心之積伏梁丸治起臍上大如臂上至心下久不愈令人
心煩

黃連一兩半

人參兩半

厚朴去皮姜製半兩 黃芩去皮三錢

肉桂錢一分

乾姜

巴豆霜 川烏焙去皮臍各五錢

葛蒲五分

紅荳

茯神去皮各一錢 丹參炮一錢

右除巴豆霜外為末另研荳霜旋入和勻煉蜜為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便微溏再從二九加服淡黃連湯下食遠周而復始即減半勿服秋冬加厚朴半兩通前共一兩減黃連半兩只用一兩黃芩不用

脾之積痞氣丸氣在胃脘腹大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴製半兩

黃連去鬚八錢

吳茱萸洗二錢 黃芩二錢

白茯苓另為末

澤瀉各一錢

巴豆霜另研四分 乾姜炮一錢五分

白朮二錢

川烏炮去皮臍五分

人參一錢

茵陳半錢

縮砂一錢半

桂四分

川椒炒五分

右除巴豆霜茯苓另研為末旋入外餘藥同為細末煉蜜為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便微溏再從二九加服淡甘草湯下食遠周而復始積減大半勿服

加減痞氣丸 孟秋合此

黃芩酒製三分

厚朴一錢

黃連酒製

半夏各五分

益智三分

吳茱萸三分

紅花五分

青皮二分

歸尾三分

澤瀉五分

茯苓

神麩

廣茂

昆布各二分

橘皮去白三分

熟地二分

人參二分

附子三分

甘草炙

巴豆霜

葛根各二分

右為末蒸餅為丸桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便微澹再從二九加服淡甘草湯送下

肺之積息奔丸 治左右脇下覆大如杯久不已令人洒浙寒熱喘咳嗽發肺癰

厚朴姜製八錢 黃連炒一兩 乾姜炮一錢 桂枝去皮一錢

巴苳霜四分 白茯苓一錢 川烏炮去皮一錢 川椒去汗半錢

人參二錢 桔梗一錢 紫菀去苗一錢 青皮五分

陳皮 京三稜炮 天門冬 白苳蔻各一錢

右除茯苓巴苳霜旋入外餘藥為末煉蜜丸如桐子大每服二九一日加一九二日加二九加至大便微澹再從二九加服煎淡生姜湯送下食達周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴五錢通前一兩三錢黃連減七錢

用六錢

加減息奔丸 仲夏合此其積為病寒熱喘咳氣上奔脈瀦失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相參氣分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅也

川烏錢一 乾姜錢一 人參錢二 陳皮錢八

黃連錢二 紫菀錢一 桂枝錢二 巴苳霜四分

厚朴錢一 青皮分七 川椒炒去汗半錢 紅花錢一

茯苓錢一 桔梗錢一 白苳蔻錢一 京三稜錢一

天門冬錢半

右件為末湯泡蒸餅為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九加至大便微澹為度再從二九加服煎生姜湯送下食前忌酒濕麪辛辣生冷之物腎之積奔豚丸發於小腹上至心下若豚狀或上下無時

久不已令人喘逆骨痠少氣及治男子內結七疝女子瘕聚帶下

苦棟酒煮三錢

黃連炒五錢

白茯苓二錢

澤瀉二錢

川烏炮五分

菖蒲二錢

玄胡索一錢半

全蝎一錢

附子一錢

巴豆霜四分

厚朴姜製七錢

獨活一錢

丁香五分

肉桂三分

右除巴豆霜茯苓另為末旋入外餘藥為細末煉蜜丸如梧子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡鹽湯送下食遠周而復始病減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前用一兩二錢如積勢堅大先服前藥不減於一料中加存性牡礪三錢疝帶勿加如大積大聚消其大半乃止藥過劑則死如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先服本

藏積藥諸疾自愈是治其本也餘積皆然如服藥人

覺熱加黃連如服藥人氣短加厚朴如服藥人悶

亂減桂

潔肝之積伏梁溫白丸加柴胡川芎治之心之積肥氣

溫白丸加菖蒲黃連桃仁治之脾之積痞氣溫白丸加

吳茱萸乾姜治之肺之積息奔溫白丸加人參紫菀治

之腎之積奔豚溫白丸加丁香茯苓遠志治之溫白丸方見前

丹賈福六舅子十餘歲左脇有塊能飲食

青皮細切醋炒

三棱

柴胡三分

桂枝

川芎

防風各二錢

白朮二錢半

木通一錢半

海藻一錢

甘草一錢

右分七貼煎取半盞下保和丸十五粒忌一切

無肥氣丸治肝之積氣三脇下如覆杯其脈弦而細

青皮炒

當歸各

蒼朮各一兩半

蛇含石煨醋

分

蓬木

三稜

鐵孕粉各二兩與

三稜蓬木同入醋煮一伏時

右為末醋煮米糊丸菴荳大每服四十九當歸酒下

海治伏梁在心下結聚不散用桃奴三兩為末空心温酒調下桃奴是桃實着樹不落者正月採樹上乾桃子是也出煙

本治肺喘久不愈為息賁五靈丸

五靈脂二兩

木香兩

馬兜苓去壳炒一兩

葶藶

右為細末蒸肉和丸如桐子大每服二十九生姜湯下日三

肺之積名曰息奔在右脇下大如杯令人洒淅寒熱喘嗽

發肺癰聖膏丸

葶藶

陳皮

桔梗各等分

右下二味為末入葶藶研勻煮肥蒸肉和丸如桐子大每服五七丸飲下予嘗患停飲久漬肺經食已必噎喘

覺肺系大急服此良驗

定喘急肺積葶藶丸

苦葶藶一兩當歸分

肉桂

白茯苓

鱉甲

川烏頭

乾姜

吳茱萸

大杏仁

茯苓

人參各五錢

栝榔一兩

右為細末煮蒸肉和杵丸如桐子大每服二三十丸姜枣湯下日四服不拘時候

師曰奔豚病從小腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之故越人曰驚者神上越也仲景謂奔豚從驚恐得之蓋奔豚病上衝

神上越也咽喉者隨奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

甘草

芍藥

當歸各二兩

半夏四兩

黃芩二兩

生姜三兩

芍藥二兩

乾葛三兩

甘李根白皮一升焙乾

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

茯苓桂枝甘草大棗湯治臍下悸欲作奔豚 桂枝加桂

湯治奔豚氣從小腹上至心已上二方並見傷寒

無散聚湯治有塊痛無常處展轉動移

半夏

枳榔

當歸各一兩

陳皮

杏仁去皮尖

桂心各二兩

茯苓

甘草炙

附子炮去皮臍

川芎

枳殼炒

吳茱萸湯洗

厚朴姜製各一兩

右剉散每四錢水一盞半煎七分去查食前服

運氣積塊皆從濕土經云土太過曰敦阜敦阜之化其動

濡積并穢是也

雜方 琥珀膏貼塊方見瘡疽門下

又貼塊三聖膏用石灰十兩細

節過炒紅急用好醋燉成膏入大黃末一兩官桂末半兩

攪勻以瓦器封貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

又貼塊

白鴿糞二兩

白芷三兩

硫黃

白蘇

木鱉子肉各一兩

右為末用麩水調和傅患處

貼積聚塊

大黃

朴硝各一兩

各為末大蒜搗膏和勻貼之

集驗尉癥吳茱萸三升碎之以酒和煮熟布裹熨癥上

診

冷更炒更番用之癥移走逐熨之候消乃止

黃帝曰人之善病腸中積聚者何以候之少俞答曰皮膚薄而不澤肉不堅而淖澤如此腸胃惡惡則邪氣留止積聚乃傷脾胃之間寒溫不次邪氣稍至稽積留止大聚乃起五變

胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能推而外之內而不外心腹積也全文見諸脈診病雜文

人病有沉滯久積聚可切脈而知之耶然診病在右脇有積氣得肺脈結脈結甚則積甚結微則氣微診不得肺脈而右脇有積氣者何也然肺脈雖不見右手脈當沉伏其外痼疾同法耶將異也然結者脈來去時一止無常數名曰結也伏者脈行筋下也浮者脈在肉上行也左右表裏法皆如此假令脈結伏者內無積聚脈浮結者外無痼疾有積身脈不結伏有痼疾脈不浮結為脈不應病病不應脈是為死病也難十八

仲諸積大法脈來細而附骨者乃積也寸口積在胸中微出寸口積在喉中關下積在臍傍上關上積在心下微下關積在少腹尺中積在氣衝脈出在左積在左脈出在右積在右脈兩出積在中央各以其部處之

素太陰瀆則病積心腹時滿厥陰瀆則病少腹積氣少陰瀆則病積澁血陽明瀆則病積時善驚太陽瀆則病積時善巔疾少陽瀆則病積時筋急目痛四時刺逆從論寸口脈沉而橫曰脇下有積腹中有橫積痛平人氣象論○即動脈也

脈左手脈橫癥在左右手脈橫癥在右脈頭大者在上頭小者在下脈遲而滑中寒有癥結偏得洪實而滑為積

弦緊亦為積為寒痺為疝痛內有積不見脈難治見一脈相應為易治諸不相應為不治 脈弦腹中急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕脈弦緊而微細者微也夫寒痺瘕瘕積聚之脈皆弦緊若在心下即寸弦緊在胃脘即關弦緊在臍下即尺弦緊 脈弦小者寒痺

心肺有積痺其脈皆喘數經云赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中名曰心痺白脈之至也喘而浮上虛下實有積氣在胸中喘而虛名曰肺痺是也

肝有積其脈弦長而青經云青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支肱名曰肝痺是也

脾腎有積痺其脈皆大經云黃脈之至也大而虛有積氣在腹中黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰

腎痺王註云上謂寸口是也

全文見上藏府條

脈診人心腹積聚其脈堅強急者生虛弱者死 脈弦而伏者腹中有瘕不可轉也必死不治

三部之積皆由虛生

靈黃帝問曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑清濕喜怒喜怒不節則傷臟風雨則傷上清濕則傷下三部之氣

所傷異類愿聞其會岐伯曰三部之氣各不同或起於陰

或起於陽請言其方喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰

也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上是謂三

部至於其淫泆不可勝數

百病始生篇下同

是故虛邪之中人

也始於皮膚皮膚緩則腠理開開則邪從毛髮入入則抵

深深則毛髮立毛髮立則淅然故皮膚痛留而不去則傳

舍於絡脈在絡之時痛於肌肉其痛之時息大經乃代留

而不去傳舍於經在經之時洒淅善驚留而不去傳舍於

輪在輪之時六經不通四肢則肢節痛腰脊乃強留而不

去傳舍於伏衝之脈在伏衝之時躰重身痛留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時責嚮腹脹多寒則腸鳴飧洩食不化多熱則溏出麋留而不去傳舍於腸胃之外募原之間已上數端皆邪氣襲虛留而不解去以次相傳未曾留者無有定所若留着而有定所則不能傳矣所謂留着者當如下文法云

風雨襲虛之積

留着於脈稽留而不去息而成積或着孫脈或着絡脈或着經脈或着輸脈或着於伏衝之脈或着於膂筋或着於腸胃之募原上連於緩筋邪氣滯洩不可勝論其着孫絡之脈而成積者其積往來上下臂手孫絡之居也浮而緩不能拘積而止之故往來移行腸胃之間水湊滲注灌濯濯有音有寒則膜膜滿雷引故時切痛其着於陽明之經則挾臍而居飽食則益大飢則益小其着於緩筋

有濕襲虛之積

也似陽明之積飽食則痛飢則安其着於腸胃之募原也痛而外連於緩筋飽食則安飢則痛其着於伏衝之脈者揣之應手而動發手則熱氣下於兩股如湯沃之狀其着於膂筋在腸後者飢則積見飽則積不見按之不得其着於輸之脈者閉塞不通津液不下孔竅乾壅此邪氣之在外入內從上下也此謂風雨襲陰之虛病起於上而積生也黃帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之始生得寒乃生厥乃成積也黃帝曰其成積奈何岐伯曰厥氣生足惋足惋生脛寒脛寒則血脈凝滯血脈凝滯則寒氣上入於腸胃入於腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積卒然多食飲則腸滿起居不節用力過度則絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒

汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津液瀦滲着而不去而積皆成矣

喜怒傷藏之積

此謂清濕蘊陰之虛病起於下而成積也

黃帝曰其生於陰者奈何岐伯曰憂思傷心重寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗之

針灸

浴則傷腎此謂喜怒傷臟病起於陰也風雨寒陰之虛則病起於上而生積清濕蘊陰之虛則病起於下

皆受病其積方成矣此內外三部之所生病者也黃帝曰善治之奈何岐伯對曰察其所痛以知其應有餘不足當

補則補當瀉則瀉毋逆天時是謂至治

手少陰筋病內急心承伏梁下為肘綱治在燔針劫刺以

知為數以痛為輸其成伏梁唾血膿者死不治

手太陰筋病甚成息奔脇急吐血手心主筋病胸痛息奔

皆治在燔針劫刺以知為數以痛為輸經文並見經筋

癥瘕積塊先於塊上針之甚者又於塊首一針塊尾一

針立應針訖灸之 又三里灸之

玉氣塊 照海 內關 通谷 又積塊 章門 中腕

灸皆三報之 氣海 天樞 上腕 通谷選用

甲傷憂煩思氣積中腕主之 腹中積上下行懸樞主之

大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢煩不嗜

食脾俞主之 腹中積聚時切痛商一作曲主之 胞中

有大疝瘕積與陰陽相引而痛苦涌泄上下出補尺澤太

谿手陽明寸口皆補之

摘伏梁氣狀如覆杯 上腕 三里

甲息奔時唾血巨缺主之 息奔脇下氣上衝胸中有熱

期門主之

撮奔豚氣 水道二十灸五

奔豚搶心不得息并疝 玉泉三寸即 章門五十壯

又法奔豚氣攻心脇痛滿淹淹欲絕急先用湯洗手足數

數易之却取下穴 氣海 期門 關元各五壯

疝氣衝心欲死 關門在玉莖旁二十針入

臍脈腹腫章門主之 奔豚上下期門主之 少腹積

聚勞宮主之 奔豚卵上入痛引莖歸來主之 臍脈上

腹臍堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰交主之 臍脈氣

腹臍痛舌強不能言莖腫先引腰後引小腹腰臍少腹堅

痛下引陰中不得小便兩丸騫石門主之 臍脈寒氣入

小腹時欲嘔傷中溺血小便數背臍痛引陰腹中窘急欲

湊後泄不止關元主之 臍脈上搶心甚則不得息忽忽

少氣尸厥心煩痛飢不能食善寒中腹脹引臍而痛小腹

右除椒漆外五物皆半生半炒爲細末用前生熟漆和
丸如彈子大又用茴香十二兩鋪陰地陰乾候外乾并
茴香收器中至乾去茴香用治腎氣膀胱疝瘕及疝墜
五隔血崩產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一
丸皆綿灰酒下 若難產炒葵子四十九粒杵碎酒煎
下 諸疾不過三服疝氣十服膈氣癥癖五服血癥三
丸一婦有塊如杯每發痛不可忍諸藥莫愈投此丸盡
三服杯氣盡消終身不復作矣

雲沒藥散治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒枕
痛

血竭

沒藥並細研

桂心

當歸

蒲黃

紅花

木香

玄胡索

乾漆炒

赤芍各等分

右爲極細末每服二錢熱酒調下食前若血塊衝心痛甚危者以大順散三錢酒調服立止

牡丹散治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛

牡丹皮 桂心 當歸 玄胡索各一兩

莪朮 牛膝 赤芍各三兩 京三稜一兩半

右爲粗末每服三錢水酒各半盞

羅木香 硃砂丸治婦人痰癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不瘥者

丁香 硃砂研 木香 官桂

附子炮 乾漆炒烟 細墨 大黃炒

乳香 廣茂 青皮 京三稜

巴苳霜減半 沒藥研 猪牙皂角 乾姜炮各等分

右除硃砂乳香沒藥外同爲細末以好醋一升化開

砂去查脚入銀器中慢火熬次下巴苳霜大黃末熬成

膏將前藥末與膏爲丸如麻子大每服三五丸食後

溫水送下加至大便利爲度

寒劑 治血積狹熱之証於產後血塊求之

大桃仁煎治婦人血瘕血積經候不通出干金方

桃仁去皮尖炒黃 大黃 蜚虫 朴硝

右四味末之以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升

五合下桃仁大黃蜚虫等不住手攪干下次下朴硝更

不住手攪良久出之丸如桐子大前一日不用吃晚飯

五更初用溫酒吞下五丸日午取下如黑苳汁雞肝蝦

蟆衣未下再作見鮮血卽上卽以調氣血藥補之

腸覃生於腸外月事時下石瘕生於胞中月事不以時下

二病皆似蠱脹並見張門

針灸
診
脈診婦人疝癖積聚脈弦急者生虛弱者死
甲婦人子藏中有惡血內逆滿痛石關主之

胎前產後積

虛實
素黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無
殞也帝曰愿聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也
衰其大半而止過者死至真要論

四血塊如盤有孕難服峻劑此方主之

香附醋炙四兩 桃仁去皮尖一兩 海粉醋炙二兩 白朮一兩

麩糊丸服

消汚血
南山婦人年三十八於九月廿三日月經行比前過後十
日得草藥以敗血海為下胎之謀有數滴血下因此腹痛
在小腹下有塊如碗大不可按湯熨則痛稍定大小便抽
痛小便澁大便畧下少赤積垢食不進口畧渴發熱此胃

氣為草藥所敗加以受傷之血妄行而不得洩所以為疝

砂仁三分 甘草炙三分 滑石半錢 川芎

黃芩各三分 牛膝二錢 桃仁七箇 水酒煎服

保芍藥湯治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥一斤 黃芩 茯苓各六兩

右散每半兩水煎日三服温

丹產後消血塊

滑石錢三 沒藥錢二 血竭錢二

右為細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末麩糊

丸白朮湯陳皮湯送下

又消血塊

香附童便浸 桃仁去皮留尖 為末醋糊丸

息積

氣證

素帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是為何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可刺灸積為導引服藥藥不能獨治也奇病論○王註云氣逆息難故名息積也用息奔法治之亦可

無磨積丸

胡椒一百五十粒

木香二錢

全蝎十枚

右為末粟米丸菜菔大每十五丸陳皮湯下

化氣湯治息積

砂仁

桂心

木香各二錢半

甘草炙

茴香炒

丁香皮

青皮炒

陳皮

乾姜

蓬朮炮各半兩

胡椒

沉香各一錢

右為末每服二錢姜蘇鹽湯調下婦人醋湯服

導引 陳無擇云導引法隨意行之皆可愚謂或按摩滿處或手足相屈伸或八段錦或六字氣之類以氣通為効

面

面腫頰腮痛

面熱面寒

面青

面塵

面赤

面黃

面白

面黑

頰車痛

面候

黃帝曰首面與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地凌水其卒寒或手足懈墮然而其面不裂何也岐伯答曰十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出於鼻而為臭其濁氣出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上薰於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也邪氣臟腑病形篇

面腫頰腮痛

表熱

丹朱奶兩腮熱腫膈壅之病也

乾葛

桔梗一錢

升麻一錢

蘇葉一錢

甘草炙七分

薄荷一錢

姜片

水煎服

垣咽痛頰腫脈洪大而赤者羌活勝濕湯加黃芩桔梗甘草各半錢治之如耳鳴目黃頰頰腫頸肩臑肘臂外後廉痛面赤脈洪大者以羌活防風甘草藁本通其經血加黃連黃芩消其腫以人參黃芪益其元氣而瀉其火邪

丹兩腮腫細辛草烏等分爲末入蚌粉以猪脂調傳腫處口含白梅置腮邊良久腫退出涎患消矣消時腫必先向下

世治疔腮

竹葉

車前草

栝子仁

杵碎熱傳患處

腮腫用赤小荳末傳之立効

山疔腮雞子青調赤小荳末及喉下諸般腫痛用蝸牛飛麩研勻貼腫處

風面腫曰風平人氣象論

主卒中風頭面腫杵杏仁如膏傳之

針灸針灸面頰腫痛有三法

其一取手陽明經云顛痛刺足陽明曲周動脈見血立已不已按人迎于經立已又云厥胸滿面腫脣潔潔然暴言難甚則不能言取足陽明又云厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰爲煩心也又云顛痛刺手陽明與顛之盛脈出血是也

其二取手太陽經云手太陽之脈是動則頰腫不可以顧所生病者目黃頰痛視盛虛熱寒陷下取之也

其三取手足太陽經云三焦手少陽之脈所生病者頰痛又云膽足少陽之脈所生病者頰腫視盛虛熱寒陷下取之也又云肝氣逆則頭痛耳聾頰痛取血者蓋取足少陽

之血也

東面赤頰熱惡風寒頰痛 攢竹 玉枕壯妙 巨竅壯

集頰腫生瘡名枯曹風 合谷 列缺 地倉 頰庫不

面腫目癢腫刺陷谷出血立止 頰腫唇瘡頰主之 頰腫痛天窓主之 頰腫口急頰車痛不可以嚼頰車

主之 面寒面熱 面寒面熱 面寒因胃虛

面熱為胃熱

面熱者足陽明病邪氣臟腑 面寒因胃虛 垣飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時而火上行獨燎其面針經云面熱者足陽明病

面熱○楊郎中之內五十一歲身體肥盛已酉春患頭目昏悶面赤熱多服清上藥不効請予治之診其脈洪大而有力內經云面熱者足陽明病脈經云陽明經氣盛有餘則身已前皆熱况其人素膏梁積熱於胃陽明經多血多氣木實則風熱上行諸陽皆會於頭目故面熱之病生矣先以調胃承氣湯七錢加黃連三錢犀角一錢疎下三兩行徹其本熱次以升麻加黃連湯去經絡中風熱上行如此則標本之邪俱退矣 升麻加黃連湯

升麻 葛根各一錢 白芷七分 甘草炙五分

白芍五分 酒黃連四分 生犀末三分 川芎三分

荆芥穗三分 薄荷三分

右剉如麻荳大用水半盞先浸川芎荆芥薄荷外都作

一服水二盞煎至一盞入先浸三味同煎至七分去渣
食後溫服數服愈忌酒濕麪五辛之物

咳逆停息不得臥面熱如醉此為胃熱上衝薰其面茯苓
桂枝五味甘草湯加大黃以利之前文方見喘不得臥

面寒為胃寒

羅面寒○其定維摩院尼長老六十一歲身體瘦弱已酉
十月間病頭面不耐寒氣弱不敢當風行諸治不效予診
之其脈皆弦細而微且其人年高素食茶菓而已陽明之
經本虛脈經云氣不足則身已前皆寒慄又加看誦損氣
由此胃氣虛經絡之氣亦虛不能上榮頭面故惡風寒先
以附子理中丸溫其中氣次以升麻湯加附子主之

升麻

葛根

白芷

黃芪各七分

甘草

各五分

黑附子

七分

人參

草薺

各五分

益智仁

三分

右判如麻苳大都作一服水三盞連鬚白葱頭二莖同
煎一盞去渣溫服食前數服良愈

升麻湯辨

或曰升麻加黃連湯治面熱升麻加附子湯

治面寒有何依據答曰出自仲景雲岐子註傷寒論中辨
葛根湯云尺寸脈俱長者陽明受病也當二三日發以其
脈夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥此陽明經受病
也始於鼻交頰中從頭至足行身之前為表之裏陽明經
標熱本實從標脈浮而長從本脈沉而實陽明為病蒸蒸
而熱不惡寒身熱為標病陽明本實者胃中燥鼻乾目疼
為本病陽明為肌肉之本禁不可發汗在本者不禁下發
之則變黃症太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉屬陽明
二陽併病葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中桂
枝麻黃各半湯主之榮衛之下肌肉之分者葛根湯主之

又名解肌湯故陽明爲肌肉之本非專於發汗止汗之治
桂枝麻黃兩方互併爲一方加葛根者便作葛根湯故榮
衛肌肉之次也桂枝芍藥生姜甘草大棗止汗有麻黃桂
枝甘草發汗葛根味薄獨加一味者非發汗止汗也從葛
根以解肌故名葛根湯錢仲易制升麻湯治傷寒瘟疫風
熱壯熱頭痛肢體痛瘡診已發未發用葛根爲君升麻爲
佐甘草芍藥安其中氣朱奉議作活人書將升麻列作陽
明經解藥予診楊氏婦陽明經標本俱實先攻其裏後瀉
經絡中風熱故用升麻湯加黃連以寒治熱也尼長老陽
明經標本俱虛先實其裏次行經絡故用升麻湯加附子
以熱治寒也仲景乃羣方之祖信哉

面青 面塵

肝木

難肝外證面青善潔善怒十六

運氣面塵有二

一曰燥金制肝經云陽明司天燥淫所勝民病嗌乾面塵
又云陽明在泉燥淫所勝病嗌乾面塵又云金鬱之發嗌
乾面塵宜治以濕劑是也

二曰火經云少陽之復厥氣上行面如浮塵目乃瞶瘵治
以寒劑是也

針灸
針灸面塵皆取肝膽二經經云肝足厥陰之脈是動病甚
則嗌乾面塵脫色又云膽足少陽之脈是動病甚則面微
有塵皆視盛虛熱寒陷下取之也

面赤

心火

難心外證面赤口乾善笑十六

表

面赤爲邪氣怫鬱在經宜表不宜下

仲景云下利脈沉而遲其人面赤身有微熱下利清穀者

以鬱冒汗出而解此面赤亦表而解也

運氣面赤皆屬寒經云太陽司天寒淫所勝民病面赤目黃治以熱劑是也

針灸面赤皆取心主經云心主手厥陰之脈是動則病面赤目黃視盛虛熱寒陷下取之也

面黃治法見黃疸門

難脾外證面黃善噫善思善味十六

診陽明經終者口目動作善驚妄言色黃診要經絡篇

面白

難肺外證面白善嚏悲愁不樂欲哭十六

血脫者色白天然不澤其脈空虛全文見治虛實法

恒巴戟丸治肺病面白不悅則為脫氣脫血脫津脫液脫

精脫神方見夢遺脈緊者寒也或面白善嚏或面色惡皆寒

也以羌活防風甘草藁本四味瀉足太陽少加附子以通其脈面色惡悲恐者更加桂附

太陽終者戴眼反折瘈瘲其色白絕汗出

少陽終者耳聾百節皆縱目繫絕系其色青白已上全文見診生死法

面黑若身黃面黑於黑疸求之

難腎外證面黑善恐欠十六

難陰出乘陽 一婦人年幾三十憂思不已飲食失節脾

胃有傷面色黧黑不澤環唇尤甚心懸如飢狀又不欲食

氣短而促大抵心肺在上行榮衛而光澤於外宜顯而藏

腎肝在下養筋骨而強於內當隱而不見脾胃在中主傳

化精微以灌四旁冲和而不息其氣一傷則四臟失所憂

思不已氣結而不行飲食失節氣耗而不足使陰氣上溢

腎胃

針灸

脾土

診

肺金

虛寒

於陽中故黑色見於面又經云脾氣通於口其華在唇今水反來侮土故黑色見於唇此陰陽相反病之逆也上古天真論云陽明脈衰於上面始焦故知陽明之氣不足非助陽明生發之劑無以復其色故以冲和順氣湯主之

升麻錢一

葛根錢半

甘草錢四

芍藥錢三

白芷錢一

黃芪錢八

防風錢一

人參錢七

蒼朮錢三

內經曰上氣不足推而揚之以升麻苦平葛根甘溫自地升天通行陽明之氣為君人之氣以天地之風名之氣留而不行者以辛散之防風辛溫白芷甘辛溫以散滯氣為臣蒼朮苦辛蠲除陽明經之寒白芍藥之溫酸安太陽經之怯弱十劑云補可去弱人參羊肉之屬人參黃芪甘草甘溫補益正氣為臣至真要大論云辛甘發散為陽生

辛熱大棗甘溫和榮衛開腠理致津液以復其陽氣故以為使

右件咬咀都作一服水二盞姜三片棗二枚同煎至一盞去渣溫服早飯後午飯前取陽升之時使人之陽氣易達故也數服而愈

孫樊樓有店家劉三一日滿面皆黑色有相者斷云不過月餘死既過月且安孫入店與客飲酒遂拜孫述說其病狀孫特與診之曰非病也乃為臭氣所薰穢氣畜於面部不散故有此色問劉曰汝一月前聞甚一陣非常臭氣不能避耶劉曰一日登溷其廁臭氣不可聞隱忍良久下廁明日遂有此疾孫曰去至臭無過至香我家有南人將至舊香可用沉檀二香各一兩碎擘焚於爐中安帳內以薰縹被蓋定勿令香氣散可端坐香邊瞑目靜坐候香氣散

方可出帳明日引鑑照之劉依其言面色漸變旬日如故
腎臭腐屬水脾臭香屬土今夫廁臭者腐臭也故聞之則入腎而面黑沉香者香臭也故薰之則脾土勝腎水而色還也

針灸 針灸面黑有二法

其一取胃經云胃足陽明之脈是動則病洒洒振寒顏黑
其二取腎經云足少陰之脈是動則病飢不欲食面如漆
柴視盛虛熱寒陷下取之也

診 少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉全文見診生死下同

太陰終者腹脹閉不得息善噫嘔逆則面赤不逆則面黑
皮毛黑

頰車病頰車開

雜方 平江陳氏因驚懼後常用手指甲指拄兩頰遂兩頰破
損心中懊懣不安服數而實諸藥不愈用活幼口義牛黃

清心涼膈丸數服如失

無凡伸欠頰車蹉但聞不能合以酒飲之令大醉睡中吹
皂角末搐其鼻噴透即自正

狂癲

狂謂妄言妄走也癲謂僵仆不省也各自一症今以狂入
脾部癲入肝部然經有言狂癲疾者有言狂互引顛者又
言顛疾為狂者此則又皆狂顛兼病今病有妄言妄走頃
時前後僵仆之類有僵仆後妄見鬼神半日方已之類是
以顛狂兼病者也

診

難顛狂之病何以別之然狂之始發少臥而不飢自高賢
也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休是也顛疾
始發意不樂直視僵仆其脈三部陰陽俱盛是也重陽者
狂重陰者顛五十九難○王註云狂病之後不欲眠臥不

以為癲疾謬矣

素二陰二陽皆交至病在腎罵詈妄行顛疾為狂陰陽類論○狂

註云二陰腎水二陽胃土土刑水病在腎胃為狂

靈邪入於陽則為狂轉則為顛疾九針篇

下虛上實

素顛疾厥狂久逆之所生也通評虛實論太陽所謂狂顛疾

者陽盡在上而陰氣從下下虛上實故狂顛疾也脈解篇

針灸狂顛有一法

其一取胃經云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其病實則狂顛取之所別是也

其二取膀胱經云膀胱足太陽之脈所生病者狂顛視盛虛熱寒陷下取之也

甲狂顛疾吐舌太乙及滑肉期門主之 狂什溫溜主之

狂顛疾陽谷及築賓通谷主之 狂互引顛疾數發後

谿主之 狂顛陰谷主之

狂

實

欲獨閉戶牖而處陰不勝其陽則脈流蕩疾并乃狂全文見虛實法

血并於陽氣并於陰故為驚狂全文見刺虛法

上實者從高抑之

素帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也帝曰陽

何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰何以知之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽

不動不動而動大疾此其候也帝曰治之奈何岐伯曰奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已使之服

以生鐵落為飲夫生鐵落者下氣疾也病能篇

無號礬丹治狂方見藥劑門

鎮心丹治驚悸自汗心煩短氣喜怒悲惡悉不自知忘魂

失魄狀若神靈所憑及男子遺泄女子帶下

辰砂研

白礬煨汁盡各等分

右爲末水丸如雞頭大每服一九煎人參湯下食後服

在上者因而越

世浙江一婦人顛狂不止醫以瓜蒂半兩爲末每一錢重井花水調滿一盞投之隨得大吐吐後熟睡勿令驚動自此無恙

竹來甦膏治遠年近日風癩心病風狂中風涎沫潮閉牙關不開及破傷風並皆治之

皂角

一兩肥大無虫蛀者去皮弦子

右將皂角切碎用漿水一大碗春秋浸三四日冬七日

夏一二日揉開取淨浸透皂角汁入銀器或砂鍋內以文武火熬用新柳條槐枝攪熬似膏藥取出攤於夾帋上陰乾收頓如遇病人取手掌一大片用溫漿化在盞

內用竹管兒盛藥水將病人扶坐定頭微擡起將藥吹入左右鼻孔內良久扶起涎出爲驗欲要涎止將溫鹽湯令病人服一二口便止忌雞魚生硬濕麪等物

子和一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疎棄衣而走罵言涌出氣力加倍三五人不能執縛燒符作醮問鬼跳巫殊不知顧服丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中滿然不遠二百里而求戴人一往戴人以車軸埋之地中約高二丈許上安中等車輪其輞上鑿一穴如作盆之狀縛病人在其上使之伏臥以軟衲襯之又令一人於下坐機一枚以棒攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許繞車輪數匝病人曰我不能堪可解我下從其言而解之索凉水與之冰水飲數升狂乃罷矣

素帝曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日

陽明實
則脈伏
直下之

踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱甚於身故棄衣欲走也帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄走也

陽明脈解篇○陽明所謂病至則欲乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭外并於陽故使之棄衣而走也

海許氏病陽厥狂怒罵詈親疎或哭或歌六脈舉按無力身表如水石發即叫呼聲高潔古云奪食則已因不與之食予用大承氣湯下之得臟腑渣穢數升狂稍寧數日復發復下如此五七次行大便數斗疾瘥身溫脈生良愈此易老奪食之法也

保當歸承氣湯

當歸

大黃各一兩

甘草兩半

芒硝七錢

右判如麻苳大每二兩水一大碗姜五片末十枚煎至一半去查熱溫服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加姜棗者胃屬土此引入胃中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利為度微緩以瓜蒂散入防風末藜蘆末吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散解毒湯等調之

子和一任人陰不勝其陽則脈流薄疾陽并乃狂難經曰陽極則狂陰極則顛陽為腑陰為臟非陽熱而陰寒也熱并於陽則狂狂則生寒并於陰則顛顛則死內經曰足陽明實則狂故登高而歌棄衣而走無所不為是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復上涌一二升三五日又復下之凡五六十日下百餘行吐亦七八度如吐

時暖室置火以助其汗數汗方平

一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如虫行兩手爬搔數年不已戴人診其兩手脈皆洪大如紐斷之曰肝主謀膽主決徭役迫遽財不能支則肝屢謀而膽屢不能決屈無所伸怒無所洩心火礩礩乘陽明金然胃本屬土而肝屬木膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發狂乃命置煨室中涌而汁出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則發之正謂此也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水與瘀血相雜而下數升來日乃康以通聖散調其後

潘相國寺僧充忽患顛疾經半年遍服名醫藥皆不效僧俗兄潘氏家富召孫療之孫曰今夜睡着明後日便愈也潘曰且告投藥報恩不忘孫曰有鹹物但與師吃待渴却

來道至夜僧果渴孫至遂求温酒一角調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故潘謝孫問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏得睡此乃靈苑方中硃砂酸枣仁乳香散也人不能用耳

辰砂散治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴日魂魄不守醫藥無驗

辰砂一兩須光明 酸枣仁半兩 乳香半兩光

右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿令吐至靜室中以前藥都作一服温酒調下作一盞調之令頓飲如飲酒素少人但以隨量取醉服藥訖便安置床枕令臥病淺者半日至一日病深者三兩日令家人潛伺之鼻息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒卽神魂定矣萬一驚悟不可復治正肅吳公少時心病服此

一劑五日方寤遂瘥

一醉膏治心恙無灰酒二碗香油四兩和勻用楊柳枝二十條逐條攪一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒或吐下即安矣

狂之為病少臥少臥則衛獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得衛填不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣

本寧志膏

人參

酸枣仁酪一辰砂錢

乳香分

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九薄荷湯送下予族弟緣兵火失心制此方與之服二十粒愈親舊多傳去服之皆驗

海狂邪顛癩不欲眠臥自賢自智妄行不休此方能安五

臟下心氣用白雄雞一隻煮熟五味調和作羹粥食之

經云悲哀動中則傷魂傷則狂妄不精不精則不正此

悲哀傷魂而狂當用溫藥補魂之陽仲景方以地黃湯本

事驚氣丸之類即是也 經云喜樂無極則傷魄魄傷則

狂狂者意不存人此喜樂傷魄而狂當用涼藥補魄之陰

辰砂鬱金白礬之類是也

世治失心

鬱金

七兩須四川

明礬三

右為細末薄糊為丸如桐子大每服五六十丸湯水任下昔有婦人顛狂可畏數年不愈後遇至人授此方初服覺心胸中有物脫去神氣灑然再服頓甦至人云此病用憂驚得之痰涎包絡心竅此藥能去鬱痰

風

仲

防已地黃湯治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈

浮

防已錢一

桂枝

防風各三錢

甘草二錢

右四味以酒一盃漬一宿絞取汁生地黄二斤咬咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黄汁和分再服

本治驚瘵積氣瘵風邪發則牙關緊急涎潮昏塞醒則精神若痴驚氣丸

附子

木香

白姜蚕

白花蛇

橘紅

天麻

麻黃各半兩

乾葛二兩

紫蘇葉一兩

朱砂一錢留少許為衣

天南星洗切

浸一夕半兩

右為末加腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服一九金銀薄荷湯化下温酒亦得此予家秘方也戊申年軍中一人犯法褫衣將受刑而得釋精神頓失如

痴予與一九服訖而寐及覺病已失矣提轄張載揚其妻因避寇失心已數年予授此方不終劑而愈又黃彥奇妻狂厥者踰十年諸醫不驗予授此方去附子加鐵粉亦不終劑而愈鐵粉非但化痰鎮心至如摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪大盛鐵粉能制伏之素問云陽厥狂怒治以鐵落飲金制木之意也此亦前人未嘗論及無治中風或歌或哭或笑語無所不及小續命湯用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩無防風附子生姜有當歸一兩

風熱

世治顛狂發作披頭大叫不避水火苦參為末蜜丸梧子

大每服十九薄荷湯化下妙

血熱

保牛黃膏治熱入血室發狂不認人

牛黃二錢

硃砂

鬱金

牡丹皮各三錢

甘草

腦子各一錢

右為末煉蜜丸如枣子大新汲水化下

寒肝移寒於心狂膈中全文見診病傳變

運氣運氣狂皆屬火經云諸燥狂越皆屬於火又云火太過曰

赫曦赫曦之紀其病笑謔狂妄又云歲火太過上臨少陰

少陽病譫妄狂越治以諸寒是也

雜方

子和項開合之妻病飢不欲食常好斗呼怒罵欲殺左右

惡言不輟眾醫皆處藥幾半載尚爾其夫命戴人視之戴

人曰此難以藥治乃使二娼各塗丹粉作伶人狀其婦人

大笑次日又作角觝又大笑其旁常以兩箇能食之婦誇

其食美病婦亦索其食而為一嘗之不數日怒減食增不

藥而瘥後得一子夫醫貴有才無才何足應變無窮

針灸

靈狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂飢治之取

手太陰陽明血變而止及取足太陰陽明 狂始發少臥

不飢自高賢也自辨智也自尊貴也善罵詈日夜不休治

之取手陽明太陽少陰舌下視之盛者皆取之不盛釋之

也 狂言驚善笑好歌樂妄行不休者得之大恐治之取

手陽明太陽太陰 狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所

生也治之取手太陽太陰陽明足太陰頭兩顙 狂者多

食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜治之取

足太陰太陽陽明後取手太陰太陽陽明 狂而新發未

應如此者先取曲泉左右動脈及盛者見血有頃已不已

以法取之灸骨解二十壯顛狂 大熱偏身狂而妄見妄

聞妄言視足陽明及大絡取之虛者補之血而實者瀉之

因其偃臥居其頭前以兩手四指挾按頸動脈久持之卷

而切之下至缺盆中而復止如前熱去乃止此所謂推而

散之者也

刺節真邪篇○頸動脈胃扶喉兩旁人迎脈也

胃足陽明之脈是動病甚則欲上高而歌棄衣而走故狂皆取陽明也

秦承祖灸法

狐魅神邪顛狂諸病并小兒驚癇兩手

大拇指用軟繩急縛之灸三壯艾炷着四處半在甲半在肉上四處盡燒一處不着其疾不愈神効難量此法累用累効

明堂

灸狂發怒欲殺人見鬼

身柱灸在三椎節下間

後谿

通玄

呆痴

神門

一穴沿皮向前三分先補後瀉灸之

後谿補生瀉成

又法

太鍾

失志呆痴

神門

中衝

鬼服

鳩尾

百會

心悶不已

支溝

用

狂易魚際及合谷腕骨支正少海崑崙主之

狂言笑

見鬼取之陽谿及手足陽明太陽

狂歌妄言怒恐惡人

與火罵詈三里主之

狂妄走善欠巨虛上廉主之

狂

易見鬼神與火解谿主之

狂言太淵主之

心懸如飢

之狀善悲而驚狂面赤目黃間使主之

狂疾液門主之

又俠谿丘墟光明主之

狂互引頭痛耳鳴目痺中渚主之

之身熱狂走談言見鬼瘈瘲身柱主之

狂妄言怒恐

惡火甚罵詈巨闕主之

欲獨閉戶牖而處

胃

素陽明所謂欲獨閉戶牖而處者陰陽相薄也陽盡而陰

盛故欲獨閉戶牖而居

帝曰陽明惡人者何也岐伯曰

陽明厥則喘而惋惋則惡人

陽明脈解篇

針灸

針灸獨閉戶牖而處有二法

其一取胃經云胃足陽明之脈是動則病惡人與火獨閉

戶牖而處視盛虛熱寒陷下取之也

其二取少陰經云少陰之虛獨閉戶牖而處註云取太鍾太溪二穴

甲熱病汗不出黕衄眩時仆而浮腫足脛寒不得臥振寒

惡人與木音喉痺齒惡風鼻不利多臥善驚厲兌主之

四厥手足悶者使人久持之厥熱脛痛腹脹皮痛善伸

數欠惡人與木音振寒嗌中引外腎痛熱病汗不出下齒

痛惡寒日急喘滿寒慄齒口禁懶惰不嗜食內庭主之

乙病若閉目不欲見人者脈當得肝脈弦急而長而反得

肺脈短而濇者死也

口 口苦 口瘡入疥 口糜 口臭喉醒

口甘入中消門 唇 唇痠入口瘡門

口候 口者脾之所主胃大腸脈之所挾經云中央黃色入通於

脾開竅於口藏精於脾又云脾主口在藏為脾在竅為口

又云脾氣通於口脾和則口能知五味矣此脾之所主於

口也

又經云胃足陽明之脈挾口下交承漿又云大腸手陽明

之脈挾口交人中此胃大腸之脈所挾於口也

口苦

肝氣熱則膽泄口苦全文見痿

肝報內經曰有病口苦名曰膽痺乃肝主謀慮膽主決斷盛汁

七合是清淨之府取決於膽膽或不決為之恚怒則氣上

逆膽汁上溢故口苦或熱甚而使然也以龍膽瀉肝湯主

之

柴胡錢 黃芩分七 生甘草 人參

天門冬去心 黃連 草龍膽 山梔

麥門冬 知母各五分 五味子七粒

右件咬咀都作一服水二盞煎至一盞去查溫服食遠

忌辛熱物大效

真氣上逆故口苦舌乾

全文見本糖

針灸

素帝曰有病口苦者病名爲何何以得之岐伯曰病名曰

膽痺夫肝者中之將也取決於膽咽爲之使此人者數謀

慮不決故膽虛氣上溢而口爲之苦治之以胆募俞論○病

膽募穴在腹部期門下五分膽俞穴在背部第十一椎下兩旁相去各二寸半

針灸口苦獨取於膽此篇經文是其一法也又經云膽病

者善太息口苦嘔汁當取陽陵泉又云膽足少陽之脈是

動則病口苦善太息視盛虛熱寒陷下取之也

口糜

熱

膀胱移熱於小腸腸澇不便上爲口糜

全文見診病傳變

移熱湯治口糜內經云膀胱移熱於小腸腸澇不便上

爲口糜好飲酒人多有此疾易老用五苓散導赤散相合

服之神效

丹治滿口白爛葶撥一兩厚黃栢一兩六錢爲末用米醋

煎數沸後調上藥涎出吐之再用湯嗽口卽愈重者二次

羅胡黃連散治口糜

胡黃連

五分

藿香

一錢

細辛

三錢

黃連

三錢

右爲末每用半錢乾摻口內漱吐之

必效散治口糜

白礬

大黃

等分

右爲細末臨臥乾貼瀝涎盡溫水漱之

運氣

運氣口糜皆屬熱經云少陰之復火氣內發上爲口糜治

以苦寒是也

口臭喉腥

熱

加減甘露飲治男子婦人小兒胃客熱口臭牙宣赤眼

口瘡一切瘡疹已散未散皆可服之

丹溪云甘露飲心脾胃藥也

熟地

生地

天門冬去心

黃芩

枇杷葉去毛

山茵陳

枳殼

金釵石斛

甘草各一兩

犀角三錢

右為末每服二錢水一盞煎至七分去查食後臨臥溫服小兒一服分作二服更斟酌與之

此方得自一品之家其間用犀角一味甚有道理百發百中予族中有一僕牙宣口臭牙齒漸漸頽落予與二服頓愈服之無不愈者本事方前集所未載此方緣得之不易故不敢輕泄服之自有奇效

治口臭香薷一把以水一斗煮取三升稍稍含之丹溪云惟

香薷湯能治口臭

肺熱喉腥治驗 梁濟民膏梁而飲因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭涕唾稠粘咽嗑不利口苦乾燥以加

減瀉白散主之

桑白皮三錢

地骨皮一錢

甘草炙錢半

知母七錢

黃芩五分

五味子二十粒

桔梗二錢

難經云心主五臭入肺為腥臭此其一也因洪飲大熱之氣所傷從心火刑於肺金以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣為君以黃芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣為臣肺欲收急食酸以收之以五味子酸溫以收肺氣麥門冬苦寒治涕唾稠粘口苦乾燥為君桔梗辛溫體輕浮治痰逆利咽膈為使也

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去查溫服食後一日二服忌酒濕麪及辛熱之物

聖治口臭仍醫齒腫痛細辛煮取濃汁熱飲令吐涎

種荷家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如登廁雖

親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金為火所乘火主臭應便如是也久則成腐腐者腎也此亢極則反兼水化也病在上宜涌之以茶調散涌而去其七分夜以舟車丸瀟川散下五七行比旦而臭斷

針灸 口中腫臭勞宮主之

唇唇入
口唇門

六腑之華在唇經云脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本榮之居也其華在唇四白是也 胃脈肝脈督脈皆環唇經云胃足陽明之脈挾口環唇又云肝足厥陰之脈環唇內經云督脈上頤環唇是也 衝脈任脈皆絡唇經云

衝脈任脈別而絡唇口是也 唇反者死經云唇舌肌者肉之本也唇反者肉先死是也

四肢

四肢候

陽主四肢經云四肢者諸陽之本也又云陽受氣於四肢是也陽實則肢腫經云結陽腫四肢是也 陽虛則肢滿經云冬氣病在四肢是也 脾主四肢經云四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟者是也 脾實則四肢不舉經云脾脈太過為病在外則令人四肢不舉者是也 脾虛則四肢不用經云脾藏肉形不足則四肢不用又云四肢懈惰此脾精之不行是也 治見痰及中風 五臟有邪留在支節經云肺心有邪其氣留于兩肘肝有邪其氣留于兩腋脾有邪其氣留于兩髀腎有邪其氣留于兩膝是也 治法見痛痺

運氣

運氣四肢不舉皆屬濕經云土太過曰敦阜敦阜之紀其病腹滿四肢不舉是也

針灸

風逆四肢腫復溜主之

肉

肉候 脾主肉經云脾主肉在體為肉在藏為脾又云邪在脾胃則病肌肉痛是也 脾病在谿經云北方黑色入通於腎故病在谿谿者肉之小會也

針灸

帝曰願聞谿谷之會也岐伯曰肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將為膿肉消骨髓外破大膈留於節湊必將為敗積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋助肘不得伸內為骨痺外為不仁命曰不足大寒留於谿谷也谿谷三百六十五穴會亦應一歲其小痺淫溢循脈往來微針所及與法相同

禁忌

形樂志樂病生於肉治之以針石全文見治法 濕傷肉甘傷肉經云濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘又云

甘走肉肉病無多食甘又云多食酸則肉胝膈而唇揭是也 坐樂傷肉經云久坐傷肉又云形樂志樂病生於肉治之以針石是也

身重 怠墮嗜臥

風濕

垣身重者濕也補中益氣湯去桂加五苓散主之

絮起臥不能謂之濕身重是也小柴胡湯黃芪芍藥湯

仲風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之方見傷寒身重

蔡夏月中風濕身重如山不能轉側宜除風勝濕去熱之藥治之

腎着

仲腎着之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反

不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出表裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘姜苓朮湯主之

甘草

白木各二兩

乾姜

茯苓各四兩

右四味以水五升煮取三升分温二服腰中自温

虛

素肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩寃

示從容論○體重屬肝腎虛脾虛則脾寡

于畏而體重腎虛則脾勝之而體重也

參朮湯治脾胃虛弱元氣不能榮於心肺四肢沉重食後昏悶

黃芪錢二

人參錢半

升麻分三

甘草灸四分

柴胡

酒黃柏各三分

陳皮分五

青皮分五

神麩分七

蒼朮錢一

當歸分二

右咬咀作一服水二盞煎至一盞半去渣帶熱服食前

運氣身重有五

一曰濕乃濕制腎虛而重經云太陰所至為身重又云太

陰之復體重身滿又云歲土太過濕氣流行民病體重煩

寃又云土鬱之發民病身重是也

二曰濕熱經云少陽司天之政四之氣炎暑間化其病滿

身重是也

三曰寒濕經云太陰司天之政三之氣感於寒濕民病身

重是也

四曰風乃木制脾虛而重經云歲木太過風氣流行民病

體重煩寃又云歲土不及風乃大行民病體重煩寃又云

厥陰在泉風淫所勝病身體皆重是也

五曰金乃燥制肝虛而重經云歲金太過燥氣流行民病

體重煩寃是也

針灸針灸身重有二法

其一取脾經云脾病者身重肉痿取其經太陰陽明少陰血者又云脾足太陰之脈是動則病腹脹身體皆重視盛

虛熱寒陷下取之也

其二取腎經云腎病者身重寢汗出憎風取其經少陰太陽血者是也

怠墮嗜臥

垣云脈緩怠墮嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平胃散又云怠墮嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或瀉泄加蒼朮自汗加白朮

虛

本補虛損治勞倦一切虛極欲垂死者肥人陰虛宜服瘦人不宜服

甘草三兩

蒼朮

一斤米泔浸一宿切用非白一斤細切同藥過一宿

川椒四兩炒

草烏

半斤水浸一宿切用鹽四兩浸一宿次日炒乾

右共為末用好酒糟六斤同搗三五千杵令勻為丸如桐子大每服三十九丸空心溫酒鹽湯任下婦人淡醋湯下

垣食入則困倦精神昏冒而欲睡者脾虛弱也

人參補氣湯治四肢懶倦

黃芪一錢半

人參七分

甘草炙三分

生地五分

防風七分

白芍五分

五味粒二十

升麻七分

肉桂二分

熟地六分

生甘草一分

黃柏七分

知母七分

右為粗末作一服水二盞煎至一盞濾去渣空心熱服下

蟲毒

無江南閩中山間人以蛇虺蜈蚣蟻蚰蝦蟆等百虫同器

畜之使其自相食啖勝者為靈以祀之取其毒雜以菜菓飲食之類以害人妄意要福以圖富貴人或中其症狀萬端或年歲間人多死又有人家香火奉祀如家先者亦謂

之蠱能病人世謂之蠱症以姓類屬五音謂之五蠱此皆
邊鄙邪僻之地多有此事中都則蔑聞也

診夫中蠱毒者令人心腹絞痛如有物吐出皆如爛肉若不
即治食人五臟即死驗令病人唾水沉者即是

蠱有人行蠱毒以病人若欲知其姓名者以敗鼓皮燒作
末飲服方寸七須臾自呼蠱家姓名可語之令呼喚將去
則愈治之亦有方

世驗蠱之法含一大苳其苳脹皮脫者蠱也苳不脹皮不
脫者非也以鵠皮至病人臥所下勿令知覺病甚者走
居則非也治療之法必須審而後行試而後可今人偶有
積聚脹滿之病類乎蠱者便以為蠱尤為非也凡蠱毒之
中有緩有急急者十數日便死緩者待以歲月氣力羸敗
食盡五臟而後死死則其毒流注於傍傍人亦成蠱注矣

經凡中毒嚼生苳不腥嚼白礬味甘者皆中毒無疑

脈人為百藥所中傷脈浮瀄而疾者生微細者死洪大而

遲者生千金遲作速

吐利蠱毒法

無辰砂丸治蠱毒從酒食中着者端午日合

辰砂細研 雄黃另研水飛 赤脚蜈蚣 續隨子各兩

麝香一錢

右為末糯米飲為丸如雞頭大若覺中毒即以酒下一

丸蛇蝎所螫醋磨傳効

必效主蠱毒神效以胡荽根絞汁半升酒和服之立下

治蠱毒土瓜根大如拇指長三寸切以酒半升浸一宿

一服當吐下

蛇蠱食飲中得之咽中如有物噓不下吐不出悶悶心

熱服馬兜苓即吐出又服麝香一錢七即吐蠱毒

聖五種蠱毒馬兜苓根三兩為末分為三貼水一盞煎五分去查服當吐虫出未快再服

本主蠱毒用大戟桃白皮以火烘乾班猫去翅足炒三物等分搗篩為散以冷水服半方寸匕其毒即出不出更一

服蠱並出此李饒州法大奇效若以酒中得則以酒服以食中得則以飲服之

右吐利蠱毒法

法凡諸蠱多是假毒藥以投之知時宜煮大荳甘草薺芫汁飲之通除諸毒藥

經山荳根不拘多少如中藥蠱毒密遣人和水研以禁聲服少許不止再服一方用酒調下二錢

經食中有蠱毒令人腹內堅痛兩目青黃淋露骨立病變無常用鐵精細研搗雞肝和為丸桐子大食前或後酒下

五九

蠱下血見血

雜方解毒

無解毒丸治設食毒中并百物毒救人於必死

板藍根

四兩洗晒乾

貫衆一兩剉去毛青黛

甘草生各一兩

右為末蜜丸桐子大以青黛另為衣如稍精神恍惚即是誤中諸毒急取十五丸爛嚼用新水送下即解

青黛雄黃丸凡始覺中毒及蛇虫咬癰疽纔作即服此毒氣不聚

青黛

雄黃等分

右為細末新汲水調下二錢

潔解毒丸善治男子婦人及小兒一切積熱不解停留作毒上焦壅熱咽喉不利口乾多渴伏暑困悶霍亂不寧或

山嵐瘴氣及食毒酒毒吐逆不定遊風丹毒迷惑昏困不
省人事唐煩發燥赤目口瘡善解四時傷寒之疾發散瘟
疫毒邪之氣及四方人不服水土一切諸毒並皆解之常
服此藥補真益氣化毒除風神效不可細述

滑石

黃芩

貫仲

茯苓

山梔

乾姜

草龍膽

大荳

青黛

甘草

薄荷

寒水石酪一

益智仁

砂仁

大黃

山荳根

生地

桔梗

百藥煎

紫河車即蚤

藁荳粉

馬勃

板藍根

黃藥酪半

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九新汲水化下
細嚼或噙化亦得小兒半丸如婦人血暈不省生姜薄
荷水磨下一丸

解諸毒用玉簪花根搗水服

治中諸藥毒

生甘草

黑荳

淡竹葉各等分

右咬咀用水一碗濃煎連服

無礬灰散治中諸物毒

明礬

建茶各等分

右為末每服三錢新汲水調下得吐即效

世解砒毒鼠莽毒用旋刺下羊血及雞鴨血熱服鼠莽草未詳

藍飲子解砒毒及巴荳毒用藍根沙糖二味相和搗水服
之更入薄荷汁尤妙

解砒毒

白蘆荳

青黛

甘草

巴荳半粒用半邊去壳不去白

右同為末沙糖一大塊水化開調一大盞飲之砒毒隨

解砒毒

利去却服五苓散之類

解砒毒用早禾稈燒灰新汲水淋汁濾過冷服一碗毒從利下即安又方用井花水調荳粉或菘荳搗水汁皆可解砒毒

漢椒四十九粒 黑荳十四粒 甘草節二寸碎之 烏梅二箇

右咬咀用水一盞煎至七分溫服

解鼠莽毒

解鼠莽草毒用枯過明礬同上等好末茶少許新汲水調服人有用之累效 解鼠莽草毒用大黑江荳煮汁服之如欲試其驗先刈鼠莽苗葉以荳汁澆其根從此敗爛不復生矣

解諸食毒

仲治自死六畜肉中毒方用黃柏搗屑服方寸七

治麝肉漏脯中毒麝肉密器蓋之脯宿者是也 燒犬屎

酒服方寸七或服人乳汁或飲菲汁二三升亦良 治黍

禾中藏肝脯食之中毒方大荳濃汁飲數升即解亦治狸

肉漏脯等毒 治食生肉中毒方掘地深三尺取其下土

三升以水五升煮數沸澄清汁飲一升即愈 治六畜馬

獸肉中毒方水浸荳豉絞取汁服數升即愈

治馬肝毒中人未死方雄鼠屎二七粒末之水和服日再

服屎尖者是 又人垢取方寸服之佳 治馬肉中毒欲死方

香豉二兩杏仁三兩相和蒸一食頃熟杵服日再服又方

煮蘆根汁飲之良 治噉蛇牛肉食之欲死方辨噉蛇牛肉毛髮向

後順者是也 飲乳汁一升立愈 以泔洗頭飲一升愈 牛

膝細切以水一斗煮取一升煖飲之大汗出即愈 治食

牛肉中毒甘草煮汁飲之即解 治食犬肉不消心下堅

或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞泄方杏仁一

升炒皮熟研以沸湯三升和取汁分三服利下肉片出大

驗 鳥獸有中毒箭死者其肉毒用大荳煮汁及藍汁服之即解

世 悞吞蜈蚣用生雞血令病人吃須更以清油灌口中其蜈蚣滾在血中吐出繼以雄黃細研水調服愈

仲 鱸食在心胃間不化吐不出速下除之久成癥病方

陳皮兩一

大黃兩二

朴硝兩二

右三味以水一大升煮取半升頓服消

食鱸多不消結為癥病治用馬鞭草搗汁飲之 或以姜

葉汁飲一升亦消 又可服吐藥吐之 食魚後食毒物

煩亂用陳皮濃煎汁服之即解 食鯪魚中毒用蘆根

煮汁服之即解

世 治食河豚魚中毒一時困殆倉卒無藥以清油多灌之使毒物盡吐出為愈

仲食蟹中毒治用紫蘇煮汁飲三升紫蘇子搗飲之亦良

冬瓜汁飲二升吃冬瓜亦可 食菓中毒用猪骨燒過

末之服方寸匕亦治馬肝漏脯等毒

世 解一切菌毒掘新地窟以冷水於內攪之令澄少頃取

飲之見本草陶隱居註謂之地漿 荷葉殺蕈毒

仲食諸菌中毒悶亂欲死治方 人糞汁飲一升 上漿

飲二升 大荳濃煮汁飲之 服諸吐利藥並解 取糞

汁法截淡竹去青皮浸滲其中取筒中汁是也 食楓樹

菌而笑不止亦治以前方

世 蕈毒吐瀉不止者用細茶芽研細以新汲井花水服神

效 治蕈毒欲死方用石首魚頭或鯢頭亦妙白水煮汁

灌之即愈 治中蕈毒用筴竹不入泥者數節煎湯飲之

立效

仲誤食芋煩毒欲死亦治以前方其芋根山東人名魁芋人種芋三年不收亦成野芋並殺人 蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣欲絕或吐下白沫身體痺冷急治之用肉桂煎汁飲之 或食蒜或食地漿 或濃煮豉荳汁飲之並解

仲食躁或躁方用豉煮濃汁飲之 鈎吻與芹菜相似誤食殺人解之用薺芎八兩水六升煮取二升分溫二服鈎吻生池傍無他異其莖有毛以此別之 菜中有水蓎若葉員而光有毒誤食之令人狂亂狀如中風或吐血治之用甘草煮汁服之解 春秋二時龍帶精入芹菜中人偶食之爲病發時手青腹滿痛不可忍名蛟龍病治之用錫糖二三升日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚瘥 食苦瓠中毒治之用黍稷煮汁服之解 飲食中毒煩滿治之用

苦參三兩苦酒一升半煮半沸三上三下服之吐食出卽瘥或以水煮亦得 犀角湯亦解 貪食食多不消心腹堅滿痛治之用鹽一升水三升煮令鹽消分三服當吐出食便瘥

奇病

雜方
項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲牛乳自消 寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊之一似鐘磬聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲卽愈 大腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落又出名爲截腸病若腸盡乃不治但初截寸餘可治用脂麻油器盛之以齧坐之飲大麻子汁數升愈 口鼻中腥臭水流以碗盛之有鐵色蝦魚如粳米大走躍不住以手捉之卽化爲水此肉壞矣 任意飲食雞肉愈 腹上麻痺不仁多煮葱白吃之自愈

婦人小便中出大糞名交腸服五苓散效如未盡愈可用舊幘頭燒灰酒服之 兩足心凸如腫上面生黑色豈瘡硬如釘子釘了履地不得脛骨破碎眼髓流出身發寒顫唯思飲酒此是肝腎氣冷熱相吞用炮川烏頭末傳之煎韭子湯服效 凡腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不驗乃為氣脫用益智子煎濃湯服立愈 四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用酒浸黃蘆三兩經一宿取出焙乾為末每服二錢酒調下服盡安 玉莖硬不痿精流無歇時時如針刺裡之則脆乃為腎滿瀉疾用韭子破故紙各一兩為末每服三錢水一盞煎至六分日三次飲之愈則住服 咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起不痛多日乃有竅子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈 腹中如鉄石臍中水出旋變作虫行之狀繞身匝啣痒

痛難忍撥掃不盡用濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮末入麝香少許水調服痊 眼前常見諸般禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾用酸枣仁羌活玄明粉青箱子花各一兩為末每服二錢水一大盞煎至七分和滓飲一日三服 大腸虫出不斷斷之復生行坐不得用鶴虱末水調五錢服之自愈 眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出名曰肝脹用羌活煎汁服數盞自愈 腹中有物作聲隨人語言用板藍汁一盞分五服服之又名應聲虫當服雷丸自愈 有飲油五升以來方始快意長得吃則安不爾則病此是髮入胃被氣血裹了化為虫也用雄黃半兩為末水調服虫自出如虫活者置於油中逡巡間連油潑之長江 治臥於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂之失說物望病治法如說食猪肉時便云

你喫猪肉一頓病者聞之卽喜遂置肉令病人見臨要却
不與喫此乃失他物望也當自睡中涎出便愈 手十指
節斷壞唯有筋連無節肉虫出如燈心長數尺餘遍身綠
毛卷名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之愈 遍身忽皮
底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔
以人參苦杖青鹽細辛各一兩作一服水二碗煎十數沸
去查飲盡便愈 眼白渾黑見物依舊毛髮直如鍊條雖
能飲食不語如醉名曰血潰用五靈脂爲末二錢酒調下
因着艾灸訖大痂便退落瘡內鮮肉片子飛如蝶形狀
騰空去了痛不可忍是血肉俱熱用大黃朴硝各半兩爲
末水調下微利卽愈 臨臥渾身虱出約至五升隨至血
肉俱壞每宿漸多痒痛不可言狀雖喫水臥床晝夜號哭
舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯十數碗

卽安 眼赤鼻張大喘渾身出班毛髮如銅鍊乃胃中熱
毒氣結於下焦用白礬滑石各一兩爲末作一服水三碗
煎至半令不住飲候盡乃安 有虫如蠅走於皮下作聲
如小兒啼爲筋肉之化用雷丸雄黃各一兩爲末摻在猪
肉片上炙熟喫盡自安 手足甲忽然長倒生肉刺如錐
痛不可忍喫葵菜自愈 鼻中毛出晝夜可長一二尺漸
漸粗圓如繩痛不可忍雖忍痛摘去一莖卽後更生此因
食猪羊血過多遂用乳香礪砂各一兩爲末以飯圓梧桐
子大空心臨臥各一服水下十粒自然退落 面上及遍
身生瘡似貓兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少
久則透脛名曰寒瘡多喫魚雞韭葱自愈 脇破腸出臭
穢急以香油摸腸用手送入煎人參枸杞淋之皮自合矣
喫羊腎粥十日卽愈 口鼻中氣出盤旋不散涎如黑墨

色過十日漸漸至肩胸與肉相連堅勝金鐵無由飲食此
多因瘡後得之煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈 偏身
忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血擁若不速治
潰而膿出以赤皮葱燒灰淋洗喫豉湯數盞自安 眉毛
搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不效者
用蒜三兩取汁酒調下卽愈 毛竅節次血出若血不出
皮脹膨如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脈溢飲生姜水
汁各一二盞卽安 忽然氣上喘不能語言口中汁流吐
逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘇復如是名曰傷寒併熱
霍亂用大黃人參末各半兩水三盞煎至一盞去滓熱服
可安 口内生肉毬臭惡自己惡見有根線長五寸餘如
釵股吐毬出飲食了卻吞其線以手輕捏痛徹於心困不
可言用水調生麝香一錢服三日驗 渾身生燎泡如甘

棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽盡肌
肉不可治急用荆三稜蓬莪朮各五兩爲末分三服酒調
連進愈 頭面發熱有光色他人手近之如火燒用蒜汁
半兩酒調下吐如蛇狀遂安 人自覺自形作兩人並臥
不別真假不語問亦無對乃是離魂用辰砂人參茯苓濃
煎湯服之真者氣爽假者化也 男子自幼喜飲酒至成
丁後日飲一二升不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日
就羸弱令其父用手巾縛住其手足不令動搖但扶少立
卻取生辣酒一壘就於其子口邊打開其酒氣衝入口中
病者必欲取飲堅不可與之須臾口中忽吐物一塊直下
壘中卽用帛封裏壘口用猛火燒滾約酒乾一半卽開視
之其一塊如豬肝樣約三兩重週回有小孔如針眼不可
數計棄之於江飲食復舊雖滴酒不能飲矣 夜間飲水

誤吞水蛭入腹經停月餘日必生下小蛭能食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食若不早治能令人死用田中乾泥一小塊小死魚三四箇將猪脂溶攪勻用巴豆十粒去殼膜研爛入泥內爲丸菘豈大用田中冷水吞下十丸小兒只用三丸至五丸須臾大小水蛭一時皆瀉出卻以四物湯加黃芪煎服生血補理方見婦人門通治類 婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂下直過小肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸將川芎當歸各二斤半斤剉散於瓦石器內用水濃煎不拘時候多少溫服餘一斤半剉作大塊用香爐慢火逐旋燒烟安在病人面前卓子下要烟氣在上不絕令病人低頭伏卓子上將口鼻及病乳常吸烟氣直候用此一料藥盡看病證如何或未全安畧縮減再用一料如前法煎服及燒烟薰吸必安如用此二料已盡雖兩乳

畧縮上而不復舊用冷水磨草麻子一粒於頭頂心上塗片時後洗去則全安矣 婦人臨產服催生藥驚動太早未嘗離經而用力太過以致盲膜有傷產後水道中垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛欲絕先服失笑散數服仍用老姜三斤淨洗不去皮於石鉢內研爛用清油二斤拌勻入鍋內炒熟以油乾焦爲度先用熟絹段約五尺長摺作結方令穩重婦人輕輕盛起肉線使之屈曲作一團納在水道口卻用絹袋兜裹候油姜稍溫傳在肉線上熏覺姜漸冷又用熨斗火熨熱使之常有姜氣如姜氣已過除去又用新者如此熏熨一日一夜其肉線已縮大半再用前法越兩日其肉縮盡入腹中其病全安卻再服失笑散芎歸湯補理切不可使肉線斷作兩截則不可醫 有人患勞瘵兩年諸藥不效

一日聞肉味其腹痛不可忍又恐傳染移在空房候其自
終經停三日病者腹痛氣息將絕思憶肉味之急忽有人
惠雞子三枚其病人俛仰取火低頭取瓦銚煎熟吹火屢
燃屢滅鼻中如有所得將熟間忽嚏噴一聲有紅線一條
自鼻中出牽抽約二尺長趨下瓦銚中病人知是怪物急
用碗覆煎銚中盡力燒火不住其銚欲裂方住火開銚視
之乃是小虫一條頭目皆具已煨死如鉄線樣卽以示家
人後棄之於江其病卽安 居民逃避石室中賊以烟火
熏之欲死迷悶中摸索得一束蘿蔔嚼汁下咽而甦又炭
烟熏人往往致死含蘿蔔一片著口中烟氣不能毒人或
預曝乾爲末備用亦可或新水搗爛乾蘿蔔飲之亦可
自行擲穿斷舌心血出不止以米醋用雞翎刷所斷處其
血卽止仍用真蒲黃杏仁去皮尖礪砂少許研爲細末煉

家說藥稀稠得所喻化而安 身上及頭面肉上浮腫如

蛇狀者用雨滴蟾上苔痕一錢水化開塗蛇頭上立消

治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢宜

急治下部不曉此者但攻其上不以爲意則下部生虫食

其肛爛見五臟便死燒艾於管中熏下部令烟入更入少

雄黃良肘後 有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄之乞

食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平古 療妖魅

猶鬼病人不肯言鬼方鹿角屑搗散以水服方寸匕卽實

言也外臺 蛟龍子生在芹菜上食之入腹變成龍子須

慎之用錫粳米杏仁乳餅煮粥食之三升日三服吐出蛟

龍子有兩頭 鬼擊之病得之無漸卒者如刀刺狀胸脇

腹內切痛不可抑按或卽吐血衄血下血一名鬼排斷白

犬頭取熱血一升飲之

丹馬希聖年五十餘性嗜酒常痛飲不醉糟粕出前竅便溺出後竅六脈皆沉澁與四物湯加海金沙木香檳榔木通桃仁服而愈此人酒多氣肆酒升而不降陽極虛酒濕積久生熱煎熬血乾陰亦太虛陰陽偏虛皆可補接此人中年後陰陽虛時暫可活者以其形實酒中穀氣尚在三月後其人必死後果然

醫學綱目卷之二十六

咳嗽

乾咳嗽

咳嗽中作聲

暴嗽

久嗽

孕嗽

大法

潔咳無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽無聲而有痰脾濕動而為痰也若咳嗽有痰而有聲者因傷肺氣動於脾濕故咳而兼嗽也脾濕者秋傷於濕積於脾也故內經曰秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而為咳嗽甚則動脾濕而為痰也是知脾無留濕雖傷肺氣亦不為痰若有痰而寒少熱多故咳嗽嗽非專主乎肺病以肺主皮毛而司於外故風寒先能傷之內經曰五臟六腑皆能使人咳非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時傳而與之也所病不等寒燥濕風火皆能令人咳惟濕病痰飲入胃留之而不行上入於肺則為

嗽假令濕在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同各宜隨症而治之若咳而無痰者以辛甘溫其肺故咳嗽者治痰為先治痰者下氣為上是以半夏南星勝其痰而咳嗽自安枳殼陳皮利其氣而痰自下痰而能食者大承氣湯微利之痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱嗽小柴胡四兩入石膏一兩知母五錢用之冬時嗽而發寒者謂之寒嗽小青龍湯加杏仁用之然此為大例更宜隨症隨時加減量其虛實此治法之大體也

咳分時
上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降胃火午後嗽多屬陰虛必用四物湯加知母炒黃柏先降其火黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用涼藥五味子五倍子欬而降之春嗽是春升之氣 夏是火炎上最重

秋是濕熱傷肺

冬是風寒外束

治嗽藥大槩多用生姜以其辛散也 咳逆非蛤粉青黛瓜蒌貝母不除 大槩有痰者加痰藥 用藥發散之後必以半夏逐其痰庶不再來 治嗽痰多用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也

吐痰多
凡上氣多有服吐藥得瘥亦有針灸得除者宜深體悟之

求裏
仲咳而脈浮者厚朴麻黃湯主之

厚朴五兩 麻黃四兩 石膏如鷄子大 杏仁半升

半夏升 乾姜兩 細辛兩 小麥升

五味子升

右以水一斗三升先煮小麥熟去查納諸藥煮取三升溫服一升日三服

脉沉者澤漆湯主之

半夏升半

紫參

五錢一作五升

澤漆三斤以東流水五升半煮取一斗五升

生姜

白前

各五兩

甘草

黃芩

人參

桂枝

各三兩

右咬咀內澤漆汁中煮取五升温服五合至夜盡

丹 感胃風寒咳嗽者行痰開腠理二陳湯加麻黃杏仁桔梗

局 三拗湯治咳嗽感胃風寒鼻塞聲重

甘草炙不

麻黃節不去

杏仁不去皮失

右咬咀每服五錢水一盞半姜五片煎服

冊 巡檢舍人夜嗽多脉大而浮三拗湯加知母黃芩生姜煎一男子五十餘歲患咳嗽惡風寒口燥乾心微痛兩手脉浮緊脅痞滿而數左手大於右手大槩表盛裏虛

問其人平日好嗜酒肉素有食積後因汗房勞又往來涉寒水且冒微雨又忍飢歸後繼以飽食酒肉而病先用人參每貼四錢麻黃根節一錢半與二三服咳嗽止惡風寒除後改用厚朴枳實陳皮青皮瓜蒌仁半夏為丸與二十餘貼用人參湯送下痞滿亦散而愈

麻黃錢一

蒼木錢二

瓜蒌

陳皮

半夏各三錢

枳殼錢三

黃芩錢一

桔梗錢二

木通錢一

甘草錢一

右分二貼加姜三片煎服

一婦人患嗽頭痛身膈痛

陳皮錢二

人參

川芎

麻黃

枳殼錢各一

分二貼水煎服

婦人患身疼嗽而食少

白朮

黃芩

芍藥各三錢

川芎二錢

木通

紫蘇各一錢半

甘草五分

右四貼熱服

脾肺夫咳之為病有一咳即出痰者脾勝濕而痰滑也有連欬十數不能出痰者肺燥勝痰濕也滑者宜南星半夏阜角灰之屬燥其脾若利氣之劑所當忌也澁者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺若燥肺之劑所當忌也

治風痰嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺閉澁必多燥怒宜以水煮金花丸主之

南星

半夏各一兩

天麻五錢

雄黃一錢

白麩三兩

寒水石一兩

右為末水丸如桐子大每服五十七丸至百丸煎漿水

沸下藥煮令浮為度淡漿水浸之以姜湯下

羅化痰玉壺丸治風痰吐逆頭痛目眩嗽嘔吐

天南星

半夏各一兩

天麻半兩

白麩三兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服三十丸水煮令藥浮漉出放溫姜湯下

潔天麻丸治風痰

天麻

半夏

天南星各一兩

雄黃少許

白麩三兩

右以水丸每服五七十丸至百丸先煎水沸下丸煮十

餘沸後用姜湯下食前

小黃丸治熱痰咳嗽脉洪面赤煩燥心痛唇口乾燥多喜笑

天南星

半夏各一兩

黃芩半兩

右為細末姜汁浸蒸餅為丸如桐子大每服五十九至七十九

白朮丸治濕痰咳嗽脉緩面赤肢體沉重嗜臥不收腹脹而食不消

天南星 半夏各一兩 白朮半兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九姜湯下食後局方防已丸亦可用

玉粉丸治氣痰咳嗽脉急面白氣上喘促泔洒寒熱悲愁不樂

天南星 半夏各一兩 陳皮去白二兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九人參生姜湯下食後服

姜桂丸治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛足寒而逆

心多恐怖

天南星 半夏各一兩 官桂去皮一兩

右為細末蒸餅為丸如桐子大每服五七十九生姜湯下食後

治嗽加減法 如心下痞悶加枳實五錢 如身熱甚加

黃連五錢 如體重加茯苓白朮各一兩 如氣逆上者

加苦葶藶五錢 如氣促者加人參桔梗各五錢 如氣

浮腫者加郁李仁杏仁各五錢 如大便秘者加大黃五

錢

羅太白丹治三焦氣澁破除餘痰止嗽開胃

半夏洗 天南星炮 寒水石炮 白礬枯

白附子炮 乾姜炮各等分

右為細末麩糊丸如桐子大每服三十九溫生姜湯下

食後

世法製半夏用大半夏不拘多少湯洗七次去臍焙乾再洗七遍用米泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬一兩半研溫水化浸上留水兩指許頻攪冬月宜煖處頓放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸二日夜通七日盡取出再用漿水於慢火內煮勿令滾候漿水極熟取出焙乾每服一二粒食後細嚼生薑湯下

石九方治濕痰滑而易出潔古所謂南星半夏勝其痰而咳嗽自安者是也

方 肺氣

羅人參欬花散治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年近日一切嗽病諸藥不效並皆治之

欬冬花

人參

五味子

紫苑

桑白皮

各一兩

杏仁

錢八

木香

檳榔

紫蘇葉

半夏

湯泡各五錢

右為細末煉蜜為丸如鷄頭仁大每服一丸食後細嚼淡姜湯送下

紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇

半夏

紫苑茸

陳皮

五味子

各五錢

桑白皮

半兩

杏仁

去皮尖一兩麩炒黃

右為麤末每服三錢生薑三片水煎日三服

垣紫蘇飲子治脾肺虛實寒涎痰咳嗽

紫蘇葉

桑白皮

青皮

五味子

麻黃

杏仁

陳皮

人參

半夏

甘草

炙各五錢

右咬咀每服五錢水二盞姜三片煎至七分溫服

本治肺感風寒作嗽紫蘇散

紫蘇 桑白皮 五味子 杏仁

麻黃 甘草 青皮各等分

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

治嗽杏參飲

杏仁 欵冬花 前胡 半夏制

五味子 麻黃 柴胡 桑白皮

人參 桔梗各等分

右為細末每服三錢水一盞半生姜五片同煎七分通

口服

右利肺氣藥紫蘇麻黃表多者宜之

潔利勝丸主胃中不利痰涎咳嗽喘促利脾胃壅滯調秘

泄藏推陳致新化食治利膈氣之妙品也

欵而脾
胃壅滯
者加大
黃

木香 檳榔 藿香各一錢 甘草各五錢

人參 當歸 厚朴各三錢 大黃酒炒

枳實各一錢

右為細末水丸桐子大每服三五十丸

衍有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉

木通欵花紫苑杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製

治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後夜臥各含化一丸未終

一劑而愈

右利肺氣藥加大黃脾胃壅滯者宜之

世杏仁煎治哮喘寒熱喜少嗔多面色不潤食少脉強緊

杏仁一兩去皮尖用童便浸一日一換夏月一日三換浸

半月取出洗淨焙乾研令極細每服一匙大用薄荷一葉

白蜜少許水一盞煎食後服甚不過兩劑永瘥

干用童便浸杏仁七日漉出洗淨研成泥別入瓮瓶中換小便煎成膏熱水下二錢瘥

圖用童便一升浸杏仁三升春夏七日秋冬二七日并皮

尖研細濾取汁煮令魚目沸候軟如麪糊即成用柳篋攪

勿令着底即以蠶布攤乾為丸每服三五丸茶酒任下

丹肺鬱痰嗽睡不安者 貝母 杏仁

右為細末砂糖入姜汁蒸餅丸含化

右童便浸杏仁利肺氣潤劑也津液枯少者宜之

潤下丸治氣實有痰又治積氣并大腸經氣滯痰嗽

陳皮去白 甘草 食鹽各五錢

右以水拌令鹽水乾焙燥為末蒸餅為桐子大或為末

白湯點服立效

衍有人患氣嗽將期或教以橘皮生姜焙乾神麪等分末

為丸如桐子大食後夜以米飲服三五丸兼舊患膀胱氣綠服此皆愈

潔玉粉丸治氣痰脉澁方見前

局桔梗湯除痰下氣胃脇脹滿痰逆惡心飲食不進

陳皮去白 半夏製 桔梗炒各十兩 枳實去穢炒黃三兩

右末每服二錢水一盞生姜五片同煎七分去渣服

右用陳皮枳實氣克形實者宜之寒者加姜桂些少後

二方有星半痰澁甚者忌服夫形肥或有汗或脉緩體

重嗜臥之人咳者脾濕勝也形瘦或夏月無汗或脉澁

之人咳者肺燥勝也濕者宜白朮蒼朮茯苓之屬燥之

是也燥者宜杏仁瓜蒌之屬潤之是也

白朮湯治咳嗽體重嗜臥脈緩前濕條白朮丸亦治此病

形肥脉緩痰滑者宜燥

氣克形實脉澁者宜利氣

白木 茯苓 半夏各等分
右為麤末作五分或半兩甚者加水二盞姜七片煎至一半取清水調神麩末二錢服之病甚者玉壺丸大妙永除根

白木散治夏暑大熱或醉飲冷酒痰濕不止膈不利
白木 茯苓 黃芩 半夏各等分

右為簾末每服五錢水二盞姜三片同煎去查調陳皮神麩末各一錢食後服

保酒性大熱不宜大飲蓋酒味熱而引飲冷與熱凝於胃中不散而成濕故痰作矣甚者吐之後與五苓甘露勝濕去痰之劑

肥痰 宜
潔防風丸治痰嗽胃中氣不清利者枳實丸亦治此症

氣

防風 枳殼炒各半兩 白木一兩

右為末煨飯丸每服六七十丸姜湯下

丹仁十二孺人虛而有濕痰膈上有熱

白木 滑石各一兩 陳皮 木通五錢
黃芩三錢 甘草炙一分 分六貼水煎服

七九嬌嗽有痰

蒼朮一兩 半夏一錢 陳皮半錢 甘草炙二分

茯苓五分 桔梗二分 姜三片煎服

治濕痰 蒼朮三錢 白木六錢 香附一錢

芍藥酒二錢 右蒸餅丸

治肥人濕痰

苦參 半夏各一錢半 白木二錢 陳皮錢一

右作一服姜三片竹瀝與水共一盞煎食遠吞三補丸

十五丸

羅 卑角化痰丸治癆風心脾壅滯痰涎盛多喉中不利涕唾稠粘咽塞吐逆不思飲食或時昏瞶

枳殼炒二兩 天南星炮 白附子炮 半夏湯洗七次

白礬枯 人參去芦 赤茯苓去皮各一兩

卑角木白皮酥炙一兩

右為細末生姜汁麩糊為丸如桐子大每服三十丸溫水下食後

白龍丸治酒積有痰

半夏 滑石 茯苓 白礬枯各等分

右為末神麩糊為丸

右七方白朮蒼朮白附子半夏燥濕枳殼陳皮利氣形肥痰澁者宜之

寒痰

宋徽宗妃苦痰面浮如盤李醫用蚌粉新瓦上炒令通紅放地上出火毒每半兩加青黛少許同淡螿水滴入麻油數點調服而愈

寒痰 本草治喘嗽汗多者忌用

草烏五錢 麻黃二錢

右為末每服三大錢蘿蔔一箇同煮令熟只喫蘿蔔妙

形瘦脉澁無汗者宜潤肺

千 杏仁煎潤肺丸已上二方見燥痰條

貝母一兩 瓜蒌仁半兩 青黛五錢

右為末姜蜜調成膏噙

抑痰丸 瓜蒌仁一兩 半夏二錢 貝母三錢

右為末炊餅丸如麻子大

咳逆上氣痰飲心痛

海蛤燒為粉研極細過數日火毒散用之 瓜蒌仁帶穰同研

右為丸如麻子大白湯下

楊文治痰嗽利胸膈方瓜蒌肥大者割開去子洗淨槌破刮皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍槌破焙乾為末用洗瓜蒌實熱水并穰同熬成膏為丸如桐子大生姜湯下二十九

飽食傷脾嗽

温脾湯治食飽則咳

甘草兩四

大棗二十枚

右二味咬咀水五升煮水貳升温分三服若咽中痛而聲鳴者加乾姜一兩

吃醋捨喉疾嗽

聖甘膽丸治吃醋捨喉因成咳嗽不止諸藥無效用甘草二兩去赤皮作二寸段中半擘開用猪膽汁五枚浸三日取出火上炙乾為細末煉蜜丸每服四十九茶清吞下臥服神效曾有人患此諸藥不效用此方一服愈

飲酒傷肺嗽

丹飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入韭汁就吞瓜蒌仁杏仁黃連丸

治酒嗽

青黛

瓜蒌仁

用蜜姜丸含化散肺毒也

食停積嗽非青黛瓜蒌實不除有食積人面青白黃色不常面上如蟹爪路一黃一白者是也

清金丸治食積嗽

方見虛實條

瓜蒌丸治食痰壅滯喘咳

瓜蒌實

半夏

山查

神麴各等分

為末瓜蒌穰水為丸竹瀝姜湯送下

又方治食積痰嗽

杏仁

蘿蔔子各二

為末粥丸服

食積痰作嗽發熱者

半夏

南星

瓜蒌實

蘿蔔子為佐

青黛

石碱為使

隨症加減九服之

肺痿

肺痿專在養肺養氣養血清金

仲生姜甘草湯治肺痿咳吐涎沫不止咽燥而渴

生姜五兩

人參二兩

甘草四兩

大棗十五枚

右四味以水七升煮取三升分溫三服

炙甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液液者用甘草一味

以水三升煮半升分三溫服

桂枝去芍藥加皁莢湯治肺痿吐涎沫

桂枝

生姜各三兩

甘草一兩

大棗十枚

皁莢

十枚去皮
弦多焦

右五味以水七升微微火煮取三升分三溫服

肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然

者以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎吐甘草

乾姜湯以溫之若服湯口渴者屬消渴

甘草

炙四兩

乾姜二兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去渣分溫再服

右治肺痿症或咳沫或咳血今編咳沫者入此門咳血

者入咳吐血門

診

熱在上焦者因咳為肺痿肺痿之病從何得之師曰或從

汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥

下利重亡津液故得之

肺脹

脈咳而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也

咳而上氣煩燥者為肺脹仲景云咳而上氣此為肺脹脈
浮大者越婢加半夏湯主之又云肺脹咳而上氣煩躁而
喘脈浮者心下有水小青龍湯加石膏主之二方並見喘門

丹肺脹而咳者用訶子青黛杏仁 訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂除火之功佐以海石香附瓜蒌仁青黛半夏麩姜蜜調噙之香附用童便浸三日 脉鬱痰嗽睡不安宜清化丸貝母杏仁為末沙糖入姜汁蒸餅為丸噙化清化丸方見火熱條 肺脹而嗽或左或右不得眠此痰夾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝之類如血礙氣作嗽者桃仁大黃姜汁丸服

針灸

一法灸但可一邊眠者可左側者灸右足三陰交可右側者灸左足三陰交立安

經治氣嗽嗽久者亦主之生訶子一枚含之嚥津瘥瘥後不知食味煎檳榔湯服之便有味

補羊瀉

丹定喘切方

訶子

百藥箭

荆芥各等分

為末姜蜜丸含化

治嗽切方

五味子兩

甘草二錢半

五倍子錢一

風化硝

為末蜜丸乾含化

世治痰嗽并喘白礬飛五倍子等分為末每二錢猪肝蘸藥臨臥服

本化痰涎方

明礬二兩

白殭蚕半兩炒去絲

右為細末生研薄荷令爛和丸如菴荳大每服二十九薄荷湯下日三服

治遠年近日喘嗽用皂角不蛀者二大莖剉去黑皮切開去子每子倉內入巴荳肉一粒合就麻皮縛定用生姜自然汁和蜜塗令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黃為度劈開去巴荳以好明礬一兩枯過草麻七箇姜汁和蜜塗炙前三味為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏與前藥和勻

每服一錢用柿餅灸過候冷蘸藥細嚼臨臥服忌魚鮮鮭
鯊油麵酒米醋煎燂熱毒等物

右訶子五味五倍白礬例丹溪云黃昏嗽者火浮於肺
酸味斂而降之是也

肺欲收
急食酸
以收之

羅九仙散治一切咳嗽

桑白皮

人參

桔梗

阿膠

五味子

烏梅

款冬花各一兩

貝母兩

粟穀八兩去蒂
蜜炒黃

右為細末每服三錢白湯點服嗽住止後服

款花清肺散治咳嗽喘促胸膈不利不得安臥

人參去

甘草炒

白礬枯

烏梅和核
杵碎

款冬花各一兩

甜葶藶生用

錢粟穀醋炒
四兩

右為細末每服二錢溫米飲湯調服食後忌油膩物多

言語損氣

人參清肺湯治男子婦人肺胃虛寒咳嗽氣急胸膈咽塞
腹脇脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽嗑隱痛及療肺痿勞嗽
吐血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

烏梅

地骨皮

人參

甘草炙

阿膠炮

杏仁去皮
炒

桑白皮

知母

粟穀去頂蒂炒
各一兩

右哎咀每服三錢水一盞半入烏梅一箇同煎至一盞
去渣溫服食後臨臥

人參款花散治咳嗽久不愈者

人參

款冬花各五錢

知母

貝母

半夏各三錢

粟穀一兩炒
黃色

右為簾末每服五錢烏梅同煎臨臥服

安肺散治痰嗽不問新舊

麻黃二兩去節 甘草二兩

御米殼四兩去蒂

右為末每三錢水一盞入烏梅一箇煎七分去查溫服

臨臥下

人參理肺散治喘嗽不止

麻黃去節炒 當歸

木香各一兩 御米殼炒

人參二兩 杏仁二兩

右咬咀每服四錢水煎

右御米殼烏梅例收後藥也

公主瀉

世治嗽貝母去心畧炒知母去毛各一兩巴豆霜十四粒為末和勻老生姜切如錢厚兩面蘸藥末臥嚼嚼時開口

勿咽

干治咳嗽胸膈滿多喘上氣

生姜汁一升半 砂糖五兩

右二味煎姜汁減半納糖更煎服

咳嗽上氣厥在胸中過在手陽明太陰全支見治虛實法

海肺咳喘息而有音甚則吐血麻黃湯 太陽咳而遺矢

赤石脂禹餘糧湯桃仁湯不止用猪苓分水散 心咳心

痛喉中介介鯁狀甚則咽喉痺用桔梗湯 小腸咳咳而

失氣氣與咳俱失芍藥甘草湯與夏脈不及病同蓋小腸為心之府故也 肝

咳兩脇下痛甚不可以轉轉則兩肘下滿小柴胡湯仲景云咳

引脇痛為懸飲宜上聖湯丹溪云咳引脇痛宜疎 膽咳

咳嘔膽汁黃芩加半夏生姜湯 脾咳右脇下痛陰陰痛

引肩背甚則不可以動動則咳劇升麻湯 胃咳嘔嘔甚

則長虫出烏梅丸 腎咳腰背相引而痛甚則咳涎麻黃

附子細辛湯 膀胱咳遺溺茯苓甘草湯 三焦咳腹滿

肺先受邪傳與五臟六

不欲飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆錢氏異攻散

素咳嗽煩寃者是腎氣之逆也示從容篇一陽發病少氣善

咳善泄 夏脉不及則令人上見咳唾下為氣泄全文見治虛實

寒熱面赤脈洪不者熱痰

凡咳嗽面赤胸腹脇常熱惟於足乍有涼時其脉洪者熱

痰在胸膈也宜小陷胸湯礞石丸之類清膈降痰甚而不

已者宜吐下其痰熱也面白悲噫或脇急脹痛或脉沉弦

細遲而咳者寒飲在胸腹也宜辛熱去之

世小陷胸湯治咳嗽膈有熱痰胸脇腹常熱者神效方見傷寒

丹黃連化痰丸

黃連 吳茱萸一錢半 陳皮五錢 半夏一兩

右為末麵糊丸如菉苳大每服百丸生姜湯下

右黃連半夏治痰嗽例

青礞石丸去痰或痞痛經絡中有痰皆能治之

青礞石硝煨五錢 半夏二兩 風化硝二錢 陳皮七錢

白朮一兩 茯苓七錢 黃芩半兩

右炒神麩姜糊丸

又方礞石丸治痰

礞石半兩 半夏七錢 南星 茯苓各五錢

風化硝二錢

右為末神麩糊丸

痰嗽化痰方

黃芩一兩半 滑石兩半 貝母 南星各一兩

風化硝二錢 白芥子五錢

右為末湯浸蒸餅丸丹溪云膈下痰非白芥子不能除

右風化硝佐礞石茯苓半夏治痰嗽例丹溪云礞石丸
重在風化硝

潔方見前小黃丸治咳嗽面赤煩燥脉洪濕痰條

羅人參半夏丸化痰墜涎止嗽定喘或風痰茶痰食痰一
切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏正頭風疼或壅頭目昏眩
耳聾鼻塞咽乾胸膈不利

人參

茯苓

天南星

各半兩

半夏

乾姜

白礬

寒水石

各一兩

蛤粉

薄荷

五錢

藿香

二錢

右為細末水糊丸如桐子大每服三十九丸生姜湯下食
後日三服

金珠化痰丸治痰熱安神定志除頭痛眩暈心怔忡恍惚
胸膈煩悶涕唾稠粘痰實咳嗽咽膈不利

生龍腦

研細半兩

皂莢仁

炒黃一兩

天竺黃

一兩

金箔

廿片為衣

白礬

枯二兩

半夏

姜汁制四兩

右阜角仁半為末與諸藥同拌勻生姜自然汁為丸如
桐子大每服三十九丸生姜湯下食後臨臥

人參清金丸治熱止嗽消痰定喘

柴胡

人參

各一兩

黃芩

甘草

炙

半夏

各七錢

麥門冬

青黛

陳皮

各二錢

五味子

二十粒

右為細末水麩糊為丸如桐子大每服三十九丸温白湯
下食後

面白脈
虛微者

垣脾肺受寒痰嗽用藥法

難經云肺太過則外症面白

善嚏悲愁不樂欲哭其內症喘咳上喝逆氣煩心胸滿煩
熱夜則涕出多嚏鼻塞不通肺金大實以子助母也心脾

肺皆受寒邪涎出口甘水反侮上寡於畏也腹中大寒病
名曰寒中痰白作泡肺中氣虛而為大寒子助母也當於
肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也口甘涎沫者胃中寒而
不和以辛甘熱去之飲酒者多有此反化

半夏溫肺湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜常多
唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致
其脈沉弦細遲

旋覆花

人參

細辛

桂心

甘草

陳皮

桔梗

芍藥

半夏制各

赤茯苓三

右咬咀每服四錢姜三片煎食後服

丁香半夏丸治心下停飲冷痰頭目眩暈睡臥口中多涎

檳榔三

丁香

半夏各一

細辛

乾姜

人參各五

右為細末生姜汁糊為丸如桐子大每服二十九姜湯

下日三服食後

羅溫胃化痰丸治膈間有寒脾胃停飲胸膈不快痰涎不

已

半夏泡三

陳皮去

乾姜炮

白朮焙各

右為細末生姜麩糊為丸如桐子大每服二十九生姜

湯下不拘時

潔姜桂丸治咳嗽面黧黑足寒脈沉方見前

局胡椒理中丸治肺胃虛寒咳嗽氣急逆氣虛痞不能食

嘔吐痰水

欵冬花去枝

薑擦

陳皮

乾姜炮

良姜炒

甘草炙

細辛去

胡椒各四

白木五兩

右末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸温湯下

仲吳茱萸湯方見傷寒

潔夏月嗽發寒熱者謂之熱嗽用小柴胡湯三兩加石膏

七錢知母三錢治之柴胡湯方見傷寒冬月嗽而發寒熱者謂

之寒嗽用小青龍湯加杏仁治之方見傷寒

丹火嗽宜清金化痰丸清化丸與清金丸同用專治熱

嗽及咽痛蓋苦能燥濕熱輕能治上取燈籠草葉為細末

蒸餅為丸每服三五十丸燈籠草即苦軌草其結房如燈籠狀故以名之清金

丸一名與點丸去肺火降膈上熱痰與清化丸同用黃芩

一味炒為末水丸服痰因火動逆上作嗽者先治火次

治痰用知母止嗽清肺金滋陰降火火鬱嗽用訶子海

石瓜萎仁青黛半夏香附以開之喘嗽不拘老幼久近

上壅等疾槐花為末滴水丸如桐子大熟水或姜湯下不

拘時

羅柴胡飲治虛勞羸瘦面黃無力減食盜汗咳嗽不止

柴胡兩五味子五錢地骨皮一兩鱉甲一兩

知母一兩

右為細末每服二錢入烏梅二枚青蒿五葉水煎去查服

本又方治勞嗽虛症及鼻流清涕耳作蟬鳴眼見黑花一切虛症丈夫婦人皆可服少年亦不妨

五味子二兩鱉甲三兩地骨皮三兩

右為末煉蜜丸如桐子大空心食前温酒或鹽湯任意服三五丸婦人醋湯下此方乃曲江人家秘方余服之大有功效處方有理甚妙

傷冷嗽

海易簡杏子湯治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療

人參

半夏

茯苓

細辛減半

乾姜減半

甘草

桂枝減半

芍藥

五味子各等分

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉二皮姜三片煎至六分去渣溫服 若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用粟殼去筋膜剉碎以醋淹炒等分加之每貼加烏梅一枚煎服其效尤驗嘔逆惡心者不可用此 若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃芍藥乾姜五味子各增一半一名小青龍湯

潔古水煑金花丸治咳嗽多怒 天麻丸 羅氏化痰玉

壺丸已上三方並見濕痰條

丹搜風化痰丸

人參

僵蚕

槐角

白礬

天麻

陳皮去白

荆芥各一兩

半夏四兩汁浸

辰砂兩半

右為末姜汁研蒸餅為丸除辰砂為衣每四十九姜湯下

羅延壽丹治風壅痰嗽或寒痰咽膈不利

天麻兩

枸杞一兩

明礬一兩半枯乾姜一兩半

右為細末酒和成劑再用蒸餅裹定於籠內蒸熟去麩搓為丸如桐子大每服三十九溫水下食後臨臥

局防風丸治風痰上攻頭痛惡心項急目眩旋暈痰涎壅滯昏憤

天麻酒浸一宿

甘草炙

川芎洗

防風各一兩

朱砂五錢

右為末每兩作十九丸朱砂為衣每服一九荊芥湯化服茶亦得不拘時

川芎九消風壅化痰涎利咽膈清目頭痛旋暈

川芎

薄荷去土各七錢半桔梗兩半

防風去芦一兩半

甘草三兩半

右為末煉蜜為丸每兩半作五十九丸每服一九細嚼臘茶清下食後臨臥

河間防風通聖散加半夏治風痰咳嗽方見癩癩千緡湯方見

喘 潔古治痰嗽不能飲食者厚朴湯治之方見大便秘

實山喘嗽白殭蚕為末姜汁清茶調服臨臥下

潔治痰嗽能飲食者大承氣湯微下之方見傷寒

者 丹陰虛咳嗽四物湯加竹瀝姜汁主之 陰分嗽者多屬

陰虛治之用知母止嗽勿用生姜以其辛散故也 肺虛

嗽甚此好色腎虛者有之人參膏以陳皮生姜佐之

羅團參散治脉氣不利治咳喘止嗽

紫團參

款冬花

紫菀茸各等分

右為細末每服二錢水一盞烏梅一枚同煎七分去查

溫服食後

陽虛者參芪

人參款冬花膏治脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背傷痛或虛勞冷嗽及遠年近日

一切咳嗽諸藥不效者

款冬花去枝

人參去芦

五味子去枝

紫菀去芦

桑白皮去粗枝各一兩

右為細末煉蜜和丸如鷄頭大每服一九食後細嚼淡姜湯送下或一九分作四服含化亦得

食治咳嗽不瘥者黃明膠炙令半焦為末每服一錢七人參末二錢七用豆豉湯一盞八分葱少許入銚子煎一兩沸後傾入蜜遇咳嗽時呷三五口

本治十六般哮喘

黃明膠

炙一兩

馬兜零

甘草

半夏

姜汁浸三日

人參

牛兩

杏仁

去皮尖巴上各一兩

右為細末每服一大錢水一盞煎至七分臨臥食後服
隨病有湯使為引

心嗽面赤或汗流加乾葛煎早飯後服 肝嗽眼泪出

加烏梅一枚大米十四粒煎 脾嗽不思飲食或一兩

時惡心入生姜二片煎 胃嗽吐逆酸水入蛤粉煎

膽嗽令人不睡加茯神五分茶清調下 肺嗽上喘氣

急入桑白皮煎 膈咳嗽出痰如真塊生姜汁調藥嚥

下 勞嗽入秦艽末同煎 冷嗽天曉嗽甚葱白三寸

同煎 血嗽連頓不住當歸末棗子同煎 暴嗽涕唾

稠粘入烏梅生姜同煎 產嗽背脚疼痛甘草三寸黃

蠟少許同煎 氣嗽肚痛脹滿入青皮去白同煎 熱

嗽夜甚蜜一七葱白同煎 哮喘喉如拽鋸入半夏三

枚同煎 腎嗽入黃芪白飴糖同煎

上件十六件般嗽痰依法煎服無不效驗此方乃京都

一家專治此疾因中官厚賂方始得傳屢試有效

右人參治嗽例

丹有一子三十餘久瘡虛甚盜汗得嗽嗽來便熱夜甚

甘草

炙

白朮

錢一

防風

錢一

黃連

分五

人參

分八

乾姜

分三

黃芪

分五

白水煎服

里成人多嗽怠惰脉不數兩手脉大而長此勞症無熱

白朮半錢

陳皮

蒼朮

茯苓各五分

神麴七分

川芎三分

黃芩三分

五味子七分

芍藥五分

黃芪

甘草各三分

用生姜二片同煎

陳孺人九十餘歲嗽或發或止發時有清痰寒熱作食少面虛浮淡黃色

陳皮

青皮

白朮

芍藥各五錢

麻黃二錢

木通

乾姜

黃芩各二錢半

甘草炒

防風各一錢

分七貼五味子七粒煎三之一

雲補肺湯治勞嗽

桑白皮

熟地各三兩

人參

紫菀

黃芪

五味子各一兩

右為末每服三錢水煎入蜜少許食後

短欵花補肺湯治年高氣弱肌體瘦困短氣遇秋冬咳嗽大作夜間尤甚三五百聲不絕春夏稍緩

黃芪兩半

甘草錢

當歸七分

佛耳草錢一

欵冬花二分

陳皮七分

丹皮三分

黃柏酒浸三分

蒼朮錢二

麴末七分

右咬咀每三錢水煎去查稍熱食後服

清肺湯除濕熱治金火嗽

黃芪錢四

蒼朮

防風

歸身

茯苓各一錢

五味子三十粒

陳皮一錢二分

青皮五分

澤瀉錢二

黃柏分六

右剉如麻豆每服五錢水煎去查稍熱臨臥服

瀉火補肺湯治金火嗽五六月間嗽

五
錢
五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

五
錢
二
錢
一
錢
一
錢

痰在腸胃脈沉下實者宜

羅大利膈丸治風痰實喘咳嗽風氣上攻

牽牛四兩生用 半夏洗 木香錢五 青皮去白二兩

槐角 栝榔 大黃各三錢 皂角去皮炙

各三

右為細末生姜麩為丸每服五十九生薑湯下

丹墜痰丸治痰飲

枳實 枳殼一兩半 明礬三錢枯 朴硝三錢

猪牙皂角二錢酒炒 黑牽牛半斤取頭末

右為末蘿蔔子汁為丸每服四十九雞鳴時服初有糞

次有痰

右下痰用大黃牽牛有熱者宜之

世治久嗽痰積半夏二兩用江子五錢敲損同煮至半夏

無白心去江子不用杏仁一兩用烏梅半兩同煮去烏梅

不用止將半夏杏仁焙乾為末煉蜜丸如棗豆大量虛實

服服後下痰積

羅透羅丹治痰實咳嗽胸膈不利

皂角酥炙去毒 燕牽牛微炒 半夏湯洗各二兩 巴豆去油另研一錢

大黃一兩水浸培用 杏仁麩炒去皮尖一兩

右為細末生姜自然汁丸如桐子大食後生姜湯送下
二十九咳嗽甚者三四服必效

丹治痰嗽喘

南星錢二 半夏 滑石錢三 江子五粒去油

輕粉少許

右用皂角仁浸濃汁丸梧子大每服七十九

本治諸般痰嗽

半夏姜汁浸一宿 天南星各兩 白礬各半兩 煇硝二錢

杏仁麩炒黃 青黛各半兩 猪牙皂角去黑皮并子各半兩

巴豆廿一粒去殼生用

右一處為末姜糊丸如菉苳大每服七丸臨臥姜湯

小兒五丸

丹青金丸治食積火鬱嗽

貝母 知母各半兩 巴豆霜錢

右為末姜汁丸青黛為衣

右下痰用巴豆有寒者宜之前一方便借巴豆之氣虛亦可服

潔欬氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮 陳皮 檳榔 木香

杏仁 茯苓 郁李仁去 川歸

廣茂 馬兜零炮 葶藶各三錢 人參

防已各四錢 牽牛頭末二兩半

右為細末姜汁麩糊丸如桐子大每服二十九加至七十丸食後姜湯送下

羅紫參散治肺氣虛咳嗽喘急胸膈痞痛脚膝微腫

人參二錢 蛤蚧一對 白牽牛炒 甜葶藶炒

木香 苦葶藶炒 檳榔各五錢

右為末用熟棗肉丸每服四十九丸煎人參湯下食後

右下痰用檳榔木香佐牽牛葶藶郁李仁久嗽面浮足

腫者宜之

孫兆視雷道矩病吐之頃間已及一升喘咳不已面色黧

黯精神不快兆與服仲景葶藶大棗湯一服訖已覺胸中

快利畧無痰唾矣

本治氣喘咳嗽

大黃 葶藶一兩淨瓦上炒

右為末煉蜜丸如桐子大每服五七十丸桑白皮湯下

右下痰用葶藶為效極速虛人忌用

仲咳家其脉弦為有水十棗湯主之 有支飲家欬煩胸

中痛不卒死至一百日或一歲宜十棗湯

丹伯温年近四十滋味厚素患咳嗽有痰與通神丸神木

丸和勻食前生姜湯下五六十丸後以津嚥小胃丹十五

丸日服六服

右十棗湯下痰仲景法也虛人審之丹溪變十棗為小

胃丹而少服徐徐法也

脉欬而時發熱脉卒弦者非虛也此為胸中寒實所致也

當吐之咳家其脉弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可

吐之其脈沉者不可發汗

子和稀涎散 三聖散 仲景瓜蒂散已上三方並見治法門

右吐熱痰法輕者但用芎藭梔仁蘿蔔子姜汁入酸藿

汁探吐之

痰在膈脈淨吐弦者巨

局碧霞丹方見治法門

本治遠年近日哮喘妙方

砒

麩

海螵蛸各一錢

右三味為末水調作餅子慢火炙黃再研令細每服一字用井花水調一大呷空心服良久吐出為度小兒加減與之忌食毒物

右吐寒痰法丸用藜蘆瓜蒂吐不透者用附尖神效

吐下兼施

子和常仲明病寒熱往來時咳一二聲面黃無力懶思飲食夜多寢汗日漸瘦削諸醫作虛損治之用二十四味燒肝散麻茸牛膝補養二年口中痰出下部轉虛戴人斷之曰上實也先以涌劑吐痰二三升次以柴胡飲子降火益水不月餘復舊此症何名乃經中云二陽病也二陽之病發心脾不得隱曲心受之則血不流故女子不月脾受之

則味不化故男子少精此二症名異而實同仲明之病味不化也 馳口鎮一男子年二十餘歲病勞嗽數年其聲欲出不出戴人問曾服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴人曰年壯不妄服藥可治先以苦劑涌之次服舟車瀉川丸大下之又服重劑果瘥 一田夫病勞嗽一涌一泄已減大半次服人參補肺湯臨臥更服棋榔丸以進食 右吐下兼施以攻其痰也

劫痰 本治勞嗽

青黛三錢

辰砂

雄黃

白礬

信各一錢 生用

右並為末淡豆豉一百粒湯浸去殼研如膏入前五味丸如桐子大每服一丸臨臥冷茶清下

治遠年近日喘嗽

蟬蛻一兩去頭足 五靈脂生 砒生 雄黃生

杏仁去皮尖 輕粉一兩 淡豆豉四十 馬兜零生一兩

右研除出輕粉另研餘為末用生姜葶藶自然汁合輕粉諸藥為丸如小彈大每服一九臨臥細嚼生姜湯送下

右用信劫痰例蓋為寒濕痰設也

運氣 運氣咳有二

一日火經云少陽司天之政初之氣候乃大溫其病氣拂於上欬逆二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上欬逆三之氣炎暑至民病咳終之氣風乃至其病陽氣不藏而咳是也

二曰燥熱經云少陰司天之政水火寒熱持於氣交民病咳喘三之氣大火行寒氣時至民病咳喘此上熱下燥為

咳喘也終之氣燥令行餘火內格咳喘此外燥包熱在內咳喘也

雜方

本治諸嗽久不瘥貝母湯

貝母一兩去心姜制 黃芩半兩 乾姜生一兩 五味子

陳皮各一兩 桑白皮半兩 半夏 柴胡

桂心各一兩 木香 甘草各一分

右為粗末每服五錢水一盞半加杏仁七箇去皮尖生姜七片煎去查熱服有姓蔣者其妻積年嗽制此方授之一服瘥以治諸般嗽悉愈

右方有寒有熱有收有散諸嗽通用也

藏腑 素黃帝問曰肺之令人欬何也岐伯對曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也此邪從外受之王註云邪謂寒氣 其寒

飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒寒邪從外受也肺寒則外內

合邪因而客之則為肺欬所謂肺先受邪也五臟各以其時受病

王註云時謂正月也非其時各傳以與之人與天地相參故五臟各

以治時肝治春心治夏脾治長夏肺治秋腎治冬也感於寒則受病微則為欬

甚則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏

則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰

何以異之岐伯曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則吐血取

淵大也心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉

痺取太陵穴也肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則

兩胠下滿取太衝穴也脾欬之狀欬則右脇下痛陰陰引肩背

甚則不可以動動則欬劇取大白穴也腎欬之狀欬則腰背相

引而痛甚則欬涎取大溪穴也帝曰六腑之欬柰何安所受

病岐伯曰五臟之久欬乃移於六腑脾欬不已則胃受之

胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長虫出取三里穴也肝欬不已則膽

受之膽欬之狀欬嘔膽汁取陽陵泉穴也肺欬不已則大腸受之

大腸欬狀咳而遺矢取巨虛上廉也心欬不已則小腸受之小腸

欬狀欬而失氣氣與欬俱失取巨虛下廉也腎欬不已則膀胱

受之膀胱欬狀欬而遺溺取委中穴也久欬不已則三焦受之

三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人

多涕唾而面浮腫氣逆也取支溝穴也帝曰治之柰何岐伯曰

治臟者治其俞治腑者治其合浮腫者治其經見欬論

治欬灸天突肺俞二穴泄火熱瀉肺氣

嗽灸兩乳下黑白際各百壯即瘥又以蒲當乳頭周匝

圍身令前後正平當脊骨下解中灸十壯又以繩橫量口

中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者

是合度

玉 治咳嗽

身柱三分瀉 至陽三分補三呼不 肺俞寸一分沿皮

瀉六吸寒痰紅痰 又法 風門外一分沿皮向

心 咳嗽喘滿氣急不食容顏黧黑鼻流清涕 風門向外

二十半 巨闕三分瀉之 太淵五分 期門平 下腕

五分 中腕解之 絕骨熱妙穴也 支

溝透間使兩脇張滿妙穴也

婦人咳嗽寒熱往來風寒嘔逆勞疸中滿喘急

風門沿皮一寸半 太淵五分治 中腕使氣往來為

效 絕骨 曲池各一寸半治寒 間使透支溝滿中

甲 欬逆上氣舌乾脇痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘

尺澤主之 咳乾嘔煩滿俠白主之 欬上氣喘不息得

暴痺內逆肝肺相搏鼻口出血身脹逆息不得臥天府主

之 欬逆上氣喘不得息嘔吐胸滿不得飲食輸府主之

欬逆上氣涎出多吐呼吸喘悸不得安或中主之 胸

滿咳喘不得息嘔吐煩滿不得飲食神藏主之 欬逆上

氣魄戶及氣舍主之 欬逆上氣譫譫主之 胸脇痞滿

不得俛仰飲食不下咳唾沫膿周榮主之 欬而泄不欲

食者商丘主之 凄凄寒咳吐血逆氣入心痛手陰郄主

之 欬而胸滿前谷主之 欬逆上氣吐沫天容及行間

主之 欬逆不止三焦有水氣不能食維道主之 欬面

赤熱支滿主之 欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不

通水突主之 天突 欬上氣喘暴瘖不能言及舌下挾縫

青脈頸有大氣喉痺咽中乾急不得息喉中鳴翕翕寒熱

項痛肩痛胸痛腹皮熱衄氣短鯁心痛隱疹頭痛面皮赤

熱身肉盡不仁天突主之 欬逆上氣喘不能言華蓋主

之

診

成無已云欬者聲欬之欬俗謂之嗽者是也肺主氣形寒

飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽令喉中

淫淫如萍習習如梗是冷嗽甚者續續不已連連不息坐

臥不安言語不竟動引百脈咳聲聞四近矣警枯鼎切

肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也

咳嗽肺脹壅遏不得眠者難治

人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其脉虛者必苦

冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家 上氣面浮腫

肩息其脉浮大不治又加利尤甚 脈浮短者其人肺傷

諸氣微少不過一年死法當嗽也 欬嗽羸瘦脈形堅大

者死 欬而脫形身熱脉小堅急以疾是逆也不過十五日死

診別

脉上氣脉數者死謂其形損故也 欬嗽脉沉緊者死浮

直者生浮軟者生小沉伏匿者死

丹欬嗽口燥咽乾有痰不用半夏用瓜蒌貝母飲水者不

用瓜蒌恐泥膈不快

乾咳嗽

乾咳嗽者無痰有聲是也此症本於氣潛潛微者連咳十

數聲方有痰出潛甚者雖咳十數聲亦無痰出是為乾咳

嗽也

開鬱 補陰 丹乾咳嗽極難治此係火鬱之症乃痰鬱其火邪在中用

苦桔梗以開之下用補陰降火之劑不已即成勞倒倉法

好此不得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒栢之

類

氣滯

海 其桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血

用生甘草加減二十餘條其桔湯方用桔梗三兩甘草一兩白水煮服

欬逆氣者加陳皮 欬嗽者加貝母知母 欬發渴者

加五味 吐膿血者加紫苑 肺痰者加阿膠 面目

腫者加茯苓 嘔者加生姜半夏 少氣者加人參麥

冬 膚痛者加黃芪 目赤者加梔子黃連 咽痛者

加鼠粘子竹茹 聲不出者加半夏桂枝 疫毒頭腫

者加鼠粘子大黃芒硝 胸痛膈不利者加枳殼 心

胸痞者加枳實 不得眠者加梔子 發狂者加防風

荆芥 酒毒者加葛根陳皮

實熱不降

一中年婦人乾欬寸脉滑動似葶狀餘皆散大不浮左大於右每五更心躁熱有汗但怒氣則甚與桔梗不開諸藥不效遂以石膏香附為君芩連青黛門冬瓜蒌實陳皮炒

雜方

栝歸梗為臣五味砂仁川芎紫苑佐之凡二十餘貼而安

潔古蜜煎生姜湯蜜煎陳皮湯與燒生姜胡桃方皆治無

痰而嗽者以辛甘潤其肺也如但使青皮藥皆宜去白本

草云陳皮味辛理上氣去痰氣滯塞青皮味苦治下氣二

味俱用散三焦氣也故聖惠法治云陳皮去穰穰不除即

生痰麻黃發汗節不去則止汗

本 補肺法

地黃二斤生淨洗 杏仁二兩 生姜 蜜各四兩

右搗如泥入瓦盆中置飯上蒸五七度每五更挑三匙

嚥下

治 久嗽方

白蜜一斤 生姜二斤取汁

右二味先秤銅鈔知斤兩訖納蜜復秤如數次納姜汁

以微火煮令姜汁盡惟有蜜斤兩在則止且服如棗大
含一丸日三服忌一切雜食

咳嗽喉中作聲

喉如肝聲為虛

一男子五十餘歲病傷寒咳嗽喉中聲如鶉與獨參湯一
服而軒聲徐至二三貼欬嗽亦漸退凡服二三十斤病始全
愈

梅治久患啞呷咳嗽喉中作聲不得眠取白前搗為末温

酒調二錢七衍義云白前保定肺氣

仲欬而上氣喉中水鷄聲射干麻黃湯主之

喉如水鷄聲為

射干兩三

麻黃

生姜各四兩

細辛

紫菀

欬冬花各三兩

大棗七枚

五味子

半夏各半升

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥

煮取三升分温三服

十白前湯欬逆上氣身體浮腫短氣腫滿且夕倚壁不得
臥喉中水鷄鳴

白前

紫菀

半夏

大戟各三兩

右咬咀以水一斗浸一宿明日煮取三升分三服

肺逆

素陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起則熏肺使
人喘鳴陰陽論起居如故而息有音者此肺之絡脉逆也

脉絡不得隨經上下故留經而不行絡脉之病人也微故

起居如故而息有音也

逆調論

針灸

督脉生病其上氣有音治其喉中央在缺盆中者天突其穴也

病上衝喉者治其漸漸者上俠頤也王註謂天迎穴

東咳喉中鳴唾血大鍾主之 胸脇支滿不得俛仰癢癢

欬逆上氣喉咽喝喝有聲太溪主之 咳逆上氣咽喉喝

喝喘息挾突主之

暴嗽

熱

干治暴熱嗽方

杏仁

紫蘇子一升

陳皮一兩

柴胡四兩

右咬咀以水一斗煮三升分三服

疾

山暴嗽白蜆殼洗淨研細粥飲下

本治暴嗽

砒霜一錢

白礬

一兩飛過細研

右先將砒霜安放茶盞內却將白礬末鋪蓋火煨為末烏梅肉丸如菉荳大朱砂為衣每服二丸紫蘇湯下

雜方

干治暴嗽百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏嘔之

久嗽

風寒
宜薰

丹肺受風寒久嗽非此不能除南星欵花鷺管石佛耳草雄黃為末拌艾以姜一厚片留舌上次用艾上燒之須令

煙入喉中一方無佛耳草有鬱金

又方鷺管石雄黃各

一分半另為末欵花佛耳草各一分半另為末却用紙一

幅方方闊四五寸以鷄子清塗其中央四旁各懸一寸許

不塗然後以鷺管石雄黃摻於鷄子清上又以欵花佛耳

草末摻其上覆之又以一箭筋從不塗紙旁捲起為一紙

筒用糊粘牢其旁抽箭筋出焙乾用時將一紙筒含在口

一頭火燒以口吸煙令滿嘔之嘔至燒筒盡為度却喫茶

二三口壓之

霍療久嗽薰法每日取欵花好鷄子少許蜜拌花使潤納

一升鐵鑊中又用一瓦碗鑽一孔孔內安小竹筒或筆管

亦得其筒稍長置碗鑊相合及插筒處皆麩糊塗之勿令

泄氣鑊下着炭火少時欵冬煙自竹管出以口含筒吸取

嘔之如胸中稍悶須舉頭即將指頭捻竹筒頭勿令漏煙

痰

氣出及煙盡止凡如是五日一為之至六日則飽食羊肉
餽飽一頓永瘥一法不用鑊枕用有嘴瓦瓶燒藥蓋住
瓶口却以口於瓶頸吸煙咽之尤捷
潔椒殼湯治久痰嗽胸膈不利者多上焦發熱

枳殼炒三兩

桔梗兩

黃芩一兩

右為細末每早取二兩半水三盞煎至一盞日作三服
午時一服中時一服臥時一服三日七兩半服盡又服
半夏湯

生半夏湯用半夏姜制切片每三錢半水盞半姜五片煎
至一盞食後服一日二三服二三日服了再服枳殼丸盡
其痰為度論曰先消胸中痰氣後去膈上痰再與枳木丸
謂首尾合治盡消其氣令痰不復作也

丹久嗽丸子

海蛤粉研細

膽星臣

杏仁臣

訶子佐

青黛佐

皂角莢使

右為末姜汁丸如桐子大姜湯下
久嗽乃積痰久留肺脘粘滯如膠氣不能升降或挾濕與
酒而作

香附童便浸

姜蚕炒

海蛤粉

瓜蒌仁

蜂房

杏仁

姜汁

竹瀝

神麩各等分

右為末蜜調噲化

謝老人形實夏月無汗成久嗽痰

半夏制

紫蘇葉各一兩

右二味入莎末蜆殼末神麩末以瓜蒌穰桃仁半兩和
丸先服三拗湯三貼方服此丸子

男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘡後得痰嗽次

年夏末得弦脉而左手虚叩之必汗少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下項方藥仍灸大椎風門肺俞五處

半夏兩一 白朮錢七 茯苓錢六 黃芩
陳皮 桔梗 枳殼 石膏煨各半兩

僵蚕炒二錢半 五味子一錢半

右用神麩糊丸姜湯下三十九丸先與三拗湯加黃芩白朮二貼夜與小胃丹十丸以攪其痰

潔古欬氣丸治久嗽浮腫 羅氏紫參散用蛤蚧衍義云

蛤蚧治久嗽有功

實者下之吐之

馬兜鈴丸治多年喘嗽不止大有神功

馬兜鈴去土 半夏湯洗七次焙乾 杏仁去尖尖楚炒各一兩

巴荳二十一粒去油研

已上除巴荳杏仁另研外餘為細末用皂角膏子為丸

如桐子大雄黃為衣每十九臨臥煎烏梅湯下以引為度

干治三十年咳嗽或飲或咳寒氣嗽雖不同悉治之

細辛 欬冬花 防風 紫苑各三兩

藜蘆二兩 川椒五合

右六味咬咀取藜蘆先着銅器中次紫苑次細辛次欬

冬花次椒以大棗百枚間在諸藥中以水一斗二升微

火煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明旦服

一枚以胸中温温為度若強人欲嗽吐者可少增服之

便吐膿裹結痰吐後勿冷飲食咳愈止藥藥勢靜乃食

不爾令人吐不已

治久嗽不瘥方

兔屎四十九粒 礪砂一分 胡桐淚一分

雜方

右三味為末蜜和丸如桐子大每服三丸以粥飲下日
三吐冷物盡即瘥

丹蛤蚧丸治久嗽方見陽虛效條又方衍義治久嗽膿血胸膈

噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆

為屑次入膠河水三升煮半升臨臥細呷愈詳見效血療三

十年嗽以百部根二十斤搗絞取汁煎之如飴服方寸七

日三服驗

百一治久咳嗽上氣十年諸藥治不瘥方以蝙蝠除翅足

燒令焦為末飲服之

妊娠嗽

雲馬兜鈴散治妊娠胎氣壅塞欬喘急

馬兜鈴

桔梗

人參

甘草

貝母各五錢

陳皮去白

大腹皮

桑白皮

肺

紫蘇各一兩 五味子五錢

右咬咀每服四錢姜三片水煎

麻黃散治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃去節

陳皮去白

前胡各一兩

半夏洗

人參

白朮

枳殼

貝母

甘草各半兩

右咬咀每服四錢葱白五寸姜三片棗一枚水同煎

紫菀湯治妊娠咳嗽不止胎不安

紫菀

天門冬各一兩

桔梗半兩

甘草

杏仁

桑白皮各二錢半

右咬咀每服三錢竹茹一塊水煎去渣入蜜半匙再煎

二沸溫服

天門冬去心兩

貝母

人參

甘草

桑白皮

桔梗

紫蘇各半兩

赤茯苓兩二

麻黃去節七錢半

右咬咀每服四錢姜三片水煎

醫方綱目卷之二十六

醫學綱目卷之二十七

肺大腸部

喘 喘不得臥 產後喘 短氣 少氣

丹 凡治嗽 未發以扶正氣為要 已發以攻邪氣為主

嘗治一中年男子久嗽每發時不食數日聲撼四鄰百

治不効脈寸沉伏關滑遂於未發時用人參白朮當歸地

黃以姜汁制之瓜蒌實陳皮茯苓黃芩黃連乾姜些少煎

湯下青礞石丸將發時先用神秘沉香丸下之次與前藥

中加杏仁枳實蘇葉倍瓜蒌實煎服一月後証減十分之

八後遂守此方漸安凡治數人皆以此法加減治之皆得

大効 氣虛短氣而喘有痰亦短氣而喘不可用苦寒之

藥火氣盛故也宜導痰湯加千縉湯 陰虛自少腹下火

起衝於上而喘者宜降心火補陰 有火炎上者宜降心

火清肺金 有痰者宜降痰下氣為主 上氣喘而躁者

大法

為肺脹欲作風水症宜發汗則愈 有陰虛挾痰喘者四
物湯加枳殼半夏補陰降火 諸喘不止者用椒目研極
細一二錢生姜湯調下切之氣虛不用 又法用蘿蔔子
蒸熟為君皂角燒灰等分為末姜汁加煉蜜丸如小豈大
每噙化五七十九切止之後因痰治痰因火治火 氣虛
者用人參蜜炙黃栢麥冬地骨皮之類 氣實人因服黃
芪過多而喘者用三拗湯以瀉氣若喘甚者須用阿膠
若久病氣虛而發喘者宜阿膠人參五味補之 新病氣
實而喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之 治哮喘專主于痰宜吐
法不可用涼藥必帶表散

喘 肺脹膨膨而喘咳留膈滿壅盛而上奔者於隨証用藥
方中多加五味子人參次之麥門冬又次之黃連少許
如甚則交兩手而督者真氣大虛也若氣短加黃芪五味

虛實喘
宜補

子人參氣盛去五味子人參加黃芩荆芥穗冬月去荆芥
穗加草薺薏仁

仰 火逆上氣咽喉不利止逆下氣宜麥門冬湯主之

麥門冬升七 半夏升一 人參兩四 甘草兩二

粳米合三 大棗枚十二

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一
服

保 天門冬丸治婦人喘嗽手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲
面目浮腫

天門冬十兩 麥門冬八兩 生地三斤 取去心

去心汁為膏

右三味為細末膏子為丸如桐子大每服五十九逍遙
散下逍遙散須去甘草加人參或與王氏博濟方人參
荆芥散亦得如面腫不已經曰面腫因風故宜汗麻黃

桂枝可發其汗後與柴胡飲子去大黃然論曰治臟者治其膈治腑者治其谷浮腫者治其經治膈者治其土也治合者亦治其土也如兵圍魏救趙之法也

本治欬嗽上氣喘急以人參一味為耒鷄子清投新水調下一錢昔有二人同走一含人參一不含俱走三五里許其不含者大喘含者氣息自如此乃人參之力也

右用門冬五味入參三味為主治肺虛或自汗或少氣而喘蓋聖藥也

予治一婦人五十餘歲素有痰嗽忽一日大喘痰出如泉身汗如油脈浮而洪似命絕之狀予適在彼速用麥門冬四錢人參二錢五味一錢五分煎服一貼喘定汗止三貼後痰亦漸少再與前方內加瓜蒌仁一錢五分白朮當歸芍藥黃芩各一錢服二十餘貼而安此實麥門冬五味人

醫而無汗者宜發表

參之功也如自汗兼腹滿脈沉實而喘者裏實也宜下之上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈 然而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越婢加半夏湯主之

麻黃兩六 石膏斤半 生姜三兩 大棗十五枚

甘草兩一 半夏半升

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

丹七三燔喘遇冬則發此寒包熱也解表則熱自除

枳殼三錢 麻黃 防風 黃芩

桔梗各二錢 陳皮 木通一錢半 通利九當

紫蘇五葉

右分四貼煎取小半盞熱飲之

治寒包熱而喘必用發散

半夏

枳殼炒

桔梗

黃芩炒

紫蘇

麻黃

杏仁

甘草

如天寒加桂枝

女子十二歲自小喘嗽

白朮

陳皮

青皮錢五

麻黃

茯苓

木通

片苓錢三

蒼朮

桔梗錢二

乾姜錢一

甘草錢五

一男子年一十四歲哮十日則發一遍此疾在上焦不得汗洩正當九月十月之交宜溫散仍與小胃丹佐之溫散加

麻黃

黃芩

每貼用一錢半入姜汁研細末以水盞半煎去渣飲之

每夜臨臥時與小胃丹十二粒津下之

溫散方無考

仲肺脹欬而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍加

石膏主之

麻黃

芍藥

枝枝

細辛

甘草

乾姜各三錢

五味子

半夏各半升

石膏二兩

右九味以水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥煎取三升強人服一升羸者減之日三服小兒服四合

麻黃定喘湯小兒寒鬱喘喉鳴腹內鳴堅滿鼻流清涕

脈沉急而數

麻黃

草薺菴

益智仁各一兩分半

甘草

歸身

紅花

黃芩生

柴胡稍分

一升麻

神麩各五分

吳茱萸二分

蘇木分半 全蝎個一

右咬咀分二服水二大盞煎至七分去渣稍熱服食後忌風寒微微有汗効

麻黄蒼朮湯治秋暮冬天每夜連聲嗽不絕大喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛臥而多驚筋攣肢節痛痰吐涎沫日晚呵欠不能飲食

柴胡根 羌活根 蒼朮各五分 麻黄分一

防風根 甘草根生 歸稍 黄芩各四分

熟甘草分三 五味子分九 草薹分六 黄芪分一錢

右分二貼水煎去渣稍熱服臨臥

右發表治喘前五方發寒包熱也後三方發外中皆寒也

四磨湯治七情鬱結上氣喘急

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎一二沸放溫服加木香枳殼為六磨湯有苦寒者加丁香桂亦可衍義云烏藥枳榔氣少走泄多但不甚剛猛與沉香同磨作湯治胃中氣膈甚當

右解鬱治喘

汗後不愈方
一婦人與前方發熱得汗而喘定夜半進少稀粥喘再作心痞口乾與下方

半夏 枳實炒三錢 黃連 白朮二錢

木通 陳皮各一錢半 麻黄 紫蘇各一錢

甘草五分

右咬咀姜水煎服若陰虛痰喘急者補陰降火四物加

枳殼半夏

脈遊數者陰虛

腹滿脈沉實者

羅喘則肺實

已未八月中霖雨不止時承上命治不憐

吉及元帥夫人年踰五十身軀肥盛因飲酒及潼乳過腹脹喘滿聲聞舍外不得安臥大小便澁滯氣口脈大兩倍於人迎關脈沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱

日臨夜煮食

海藏本草云陰不足者補之以味

治哮亦治積鷄子略敲損殼不損膜浸尿缸內三四

十九丸治厚味服訖復用瓊玉膏一劑繼服之而安

辰砂膽星陳皮神麩糊為丸如桐子大臨卧姜湯下三四

服百丸空心服以救肺虛又用阿魏黃連山查沉香牛黃

杷子五味子知母黃栢天門冬玄參末為丸如桐子大每

如此者六七年用人參生地黃膏和當歸牛膝肉蓯蓉枸

平江洗伯寧家豐好肉厚味每年到四月九月內必發氣

喘擡肩吐痰脈沉澁而細數諸醫用平肺之藥數年不愈

大盛上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實實者宜下之故制平氣散以下之

白牽牛

二兩半生牛熟只取頭末一兩

青皮

去白 檳榔 各三錢

陳皮

去白半兩 大黃 七錢

內經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之故以白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以為君陳皮苦溫躰輕浮理其肺氣青皮苦辛平散肺中滯氣為臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣大黃苦寒蕩滌滿實故以為使

右為細末每服三錢煎生姜湯一大盞調下無時一服減半再服喘愈止有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽再與加減瀉白散

桑白皮

去兩 地骨皮

知母

陳皮

青皮

各去 桔梗 去芦各五錢

黃芩 細剉

甘草 炙各三錢

右件劉如麻荳大每服五錢水二大盞煎至一盞去查
温服食後數服良愈華陀云盛則為喘減則為枯活人
云發喘者氣有餘也凡看文字須要會得本意盛而為
喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也氣
盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛又為有餘
當清肅下行而不喘以其火入于肺衰與不足而為喘
焉故言盛者非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘
者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故瀉肺以苦
寒之劑非瀉肺也瀉肺中之火實補肺也用者不可不
知

羅 槐角利膈丸治風勝痰實胸滿及喘滿咳嗽

皂角 一兩酥炙
去皮弦子 半夏 槐角 炒各
半兩
牽牛 一兩
半

右同為細末生姜汁麵糊丸如桐子大每服三十九食
後生姜湯送下

定喘餅子神驗

芫花 醋浸一宿炒 桑白皮 炒 吳茱萸 炒 馬兜鈴
陳皮 去白各一兩 寒食麪 三兩 白牽牛 三兩半生半炒
取頭末二兩

右為末和勻滴水丸如櫻黍大捏餅子取熟灰半碗在
鍋內同炒餅子熟每夜服一餅嚼爛煎馬兜鈴湯下如
患人心頭不快加上一餅或兩餅至微明利下神効婦
人有胎不可服

洞虛子神秘沉香丸下痰喘 方見痰
飲門

仲 膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得
之數十日醫吐之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三
日復發與不愈者宜木防已湯去石膏加茯苓芒硝湯主
吐下後不愈方

之

木防已三兩 石膏十二枚如

桂枝二兩

人參四兩

右四味以水六升煮取二升分温再服

木防已加茯苓芒硝湯方

木防已 桂枝各二兩 人參 茯苓

芒硝

右五味水六升煮二升去查内芒硝再微煎分温再服

微利即愈

丹喘急有風痰者婦人大全千緡湯

發時有痰吐出者化之

半夏七個炮製四片破之 皂角去皮 甘草各

生姜如指大

右用水一碗煮去半頓服一方不用甘草但用半夏末

一兩皂角去皮弦半兩生姜七片同入紗袋中水三升煎至一盞五分以手揉洗取清汁分作三服併服二服

効

雲四七湯治痰涎咽喉中上氣喘逆甚効方見咽喉條即仲景治婦人留

中如有灸齒半夏厚朴湯

保半夏丸治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒

半夏兩一 檳榔三錢 雄黃三錢

右為末姜汁浸蒸餅為丸桐子大每服三十五丸姜湯下小兒丸米大

經定喘化痰猪蹄甲四十九個淨洗控乾每個指甲内入

半夏白礬各一字裝罐子内封閉勿令烟出火煨通赤去火毒細研入麝香一錢七有上喘咳嗽用糯米飲下小兒五分至妙

發時有痰不出者開之

簡治喘急用桔梗一兩半搗羅為末童便半升煎取四合去查温服

凡治喘正發時無痰將愈時却吐痰者乃痰于正發之時閉塞不通而喘甚當于其時開其痰路則易安也宜此方桔梗之類及枳殼瓜蒌實杏仁蘇葉前胡等引出其痰候痰出喘退却調其虛實虛者補以參芪歸木實者瀉以沉香滾痰丸之類是也

河人參半夏丸化痰定喘方見欬喘予平日用此方治久喘未發時服此丸已發時用沉香滾痰丸微下之累効

世火喘用白虎湯加瓜蒌仁枳殼黃芩神効

保雙玉散治痰熱而喘痰湧如泉
寒水石 石膏各等分
右細末人參湯下三錢食後服

寒痰

支飲不得息用葶藶大棗瀉肺湯主之方見肺癰此効甚捷但慮人服忌

丹紫金丹治哮喘遇冷發者用之

精猪肉三十兩 砒霜明亮者一兩研細

右將肉切如骰子大用砒末入肉內拌勻分肉為六分每分用紙筋黃泥包之用火烘令泥乾又用白炭火於無人處煨青烟出盡為度放地上一宿研極細用湯浸蒸餅丸如菉荳大用茶清吞下大人二十九小兒十九量虛實用之

哮喘遇冷則發者有二証

其一屬中外皆寒治法乃東垣參蘇温肺湯調中益氣加茱萸湯及此方紫金丹劫寒痰者是也 其二屬寒包熱治法乃仲景丹溪用越婢加半夏湯等發表諸方之類及

預於八九月未寒之時先用大承氣湯下其熱至冬寒時無熱可包自不發者是也

食積痰

丹清金丹治哮喘遇厚味發者用之

薤白子 淘淨蒸令熟晒乾為末一兩

猪牙皂角 火燒過以碗覆地上作灰

末三錢

右為末拌勻用姜汁浸蒸餅丸如蘿蔔子大每服三十粒漫咽下一方劫喘用姜汁蜜煉丸桐子大每七八十丸噙下止之

瑞化痰丸快脾順氣化痰消食治久喘或作或止者甚妙

半夏 洗

南星 去皮

白礬

皂角 碎切

生姜

右各一斤用水煮南星無白點為度揀去皂角不用將生姜切作片同半夏南星晒乾無日色火焙再加

青皮 去穢

陳皮 去白

紫蘇子 炒

蘿蔔子 炒

乾葛

杏仁 去皮尖另研

神麩 炒

麥蘖 炒

山查

香附子 去毛

右各半斤淨與前藥合和一處研為細末生姜汁浸蒸餅打糊為丸如桐子大每服五七十九臨時食後茶湯送下

飲水多者滲之

仲病人飲水多必暴喘滿

白木散治夏月飲冷酒生痰膈滿 方見欬脚肺條

並痛者

丹喘而心痛油炒半夏為末粥丸姜湯下三十九

久嗽不已者吐之

哮喘必用吐法吐藥中用醋多不用涼藥

子和稀涎散 方見治法門上實條

世治喘用古文錢七個鹽梅七個水一盞同浸二宿每服

一呷空心良久吐出惡痰而効

寒熱
肺痿心
火刑肺

垣病機云諸痿喘嘔皆属于上辨云傷寒家論喘嘔以為

火熱者是明有餘之邪中於外寒變而為熱心火太旺攻肺故屬於上又云膏粱之人奉養太過及過愛小兒亦能積熱于上而為喘咳宜以甘寒之劑治之脈經又云肺盛

氣從小
腹衝上
者衝脈
之火

有餘則欬嗽上氣喘渴煩心胃滿短氣皆衝脈之火行于胃中而作也係在下焦非屬上也蓋雜病不足之邪起于有餘病機之邪自是標本病傳多說飲食勞役喜怒不節水穀之寒熱感則害人六腑皆由中氣不足其填脹腹滿咳喘嘔食不下皆以大甘辛熱之劑治之則立已今立熱喘寒喘二方于後

肺受熱

人參平肺散治心火刑肺傳為肺痿欬嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞悶咽嗑不利

桑白皮錢一 知母分七 甘草分五 茯苓分四

肺受寒

參蘇溫肺湯治形寒飲冷則傷肺喘煩心胃滿短氣不能宣暢

人參 肉桂 甘草 木香
五味子 陳皮 半夏製 桑白皮
白朮 紫蘇葉各二兩 白茯苓一兩

右咬咀每服五錢水一盞半生姜三片煎至七分去渣食後溫服如冬寒每服不去節麻黃半分先煎去沫下

諸藥

陰虛補
降火

喘有陰虛自小腹下火起而上者亦有痰火衝上者宜

四物湯加 青黛 竹瀝 陳皮入童便煎服

東垣分
冬熱夏
寒

調中益氣湯加減法方見治
虛實條

如秋冬月胃脈四道為衝脈所逆并脇下少陽脈二道而反上行病名曰厥逆其証氣上衝咽不得息而喘息有音不得臥加茱萸五分或一錢湯洗去苦觀厥氣多少而用之如夏月有此証為大熱也蓋此証隨四時為寒熱溫涼宜以酒黃連酒黃栢酒知母各等分為細末熟湯丸如桐子大每服二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美食壓之使不得胃中停留直至下元以瀉衝脈之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損証也當用溫平甘多辛少之藥治之是其本法也如時上見寒熱病四時症也又或將理不如法或酒食過多或辛熱之食作病或寒冷之食作病或居

大寒大熱之處益其病當臨時制宜暫用大寒大熱治法而取効此從權也不可以得効之故而久用之必致天橫矣黃帝針經曰從下上者引而去之上氣不足推而揚之蓋上氣者心肺上焦之氣陽病在陰從陰引陽宜以入腎肝下焦之藥引甘多辛少之藥使升發脾胃之氣又從而去邪氣於腠理皮毛也又曰視前痛者當先取之是先以繆刺瀉其經絡之壅塞者為血凝而不流故先取之而後治他病

加減瀉白散治陰氣在下陽氣在上咳嘔喘促

桑白皮兩一

青皮兩二

茯苓錢三

地骨皮錢七

甘草

陳皮

五味

人參各五錢

右咬咀每服四錢水一盞半入粳米數十粒同煎去渣溫服食後

行動則平居則氣平和行動則氣促而喘者亦衝脈之火予族兄
喘者亦衝脈之火六旬有餘素有喘証或唾吐血痰平居時則不喘稍行動

則氣促喘急以黃栢知母滋腎丸空心服七八九其証大減此黃栢知母能泄衝脈之火者如此効也

汚血

治卒上氣喘鳴息便欲死者研韭汁飲一升瘥蓋韭去胃中惡血滯氣

食主上氣咳嗽胃膈妨滿氣喘菀仁二兩去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煮粥食之

諸皆屬

諸氣憤鬱皆屬于肺全文見証○王註云憤謂憤鬱奔迫也

簡治肺氣喘嗽馬雙鈴二兩只用裏面子去殼秋石半兩入碗內和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味為末一錢水一盞煎六分溫呷以藥末含嚥津亦得衍義云治肺氣愈

垣加減三奇湯治咳氣喘上氣痰涎喘促胃膈不利

桔梗

半夏

陳皮

甘草

青皮

杏仁

人參

五味子各等分

右咬咀每服四錢水二盞姜二片煎至一盞去渣通口食後服

紫參散治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安卧

粟殼一兩密炒黃色

麻黃

桔梗

紫參

甘草炙

五味各五錢

右咬咀每服四錢水二盞姜三片同煎去渣食後服

清金湯治男婦不拘遠近肺氣咳嗽上氣喘急喉中涎壅管滿氣逆坐臥不安飲食不下

粟殼密炙

人參

甘草各半兩

陳皮

茯苓

杏仁

阿膠炒

五味子

桑白皮

薏苡仁

紫蘇

百合

貝母法

半夏麴

欵冬花各一

右咬咀每服五錢姜三片枣二枚烏梅一個水煎臨卧服

肺虛則少氣而喘經云秋脈者肺也秋脈不及則喘呼吸少氣而咳上氣見血下聞病音其治法則門冬五味人參之屬是也 肺痺肺積則久喘而不已經云淫氣喘息痺聚在肺又云肺痺者煩滿喘而嘔是肺痺而喘治法或表之或吐之使氣宣通而愈也 難經又云肺之積名息賁在右脇下如杯久不已令人喘咳發肺癰治法則息賁九能磨其積是也

胃喘

胃喘則身熱而煩經云胃為氣逆又云犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六府入六府則身熱不時卧上為喘呼又云陽明厥則喘而哕哕則惡人或喘而死者或喘而生

腎喘

者何也厥逆連臍則死連經則生是也哕王註謂熱內鬱而煩凡此胃喘治法宜加減白虎湯之類是也 腎喘則嘔咳經云少陰所謂嘔咳上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔咳上氣喘也東垣治以瀉白散是也

運氣

運氣喘者有三

一曰金助肺盛而喘經云歲金太過病甚則喘咳氣逆肩背痛又云歲金太過曰堅成堅成之紀其病喘喝胸憑仰息治以溫劑是也

二曰火攻肺虛而喘經云歲火太過炎暑流行肺金受邪民病少氣咳喘上臨少陰少陽咳喘息鳴又云少陰司天熱淫所勝病寒熱喘咳甚則肺脹大腹滿膨膨而喘咳又云少陰在泉熱淫所勝病氣上衝胃喘不能久立治以酸

寒是也

三曰風火為氣逆經云木太過曰發生發生之紀上微則其氣逆是也

針灸

黃帝曰衛氣之留於腹中播積不行死蘊不得常所使人肢脇胃中滿喘呼逆息者何以去之伯高曰其氣積于胃中者上取之積於腹中者下取之上下皆滿者傍取之黃帝曰取之奈何伯高對曰積于上瀉大迎天突喉中積於下者瀉三里與氣衝上下皆滿者上下取之與季脇之下一寸重者鷄足取之診視其脈大而弦急及絕不至者及腹皮急甚者不可刺也衛氣失常論○雞足取之者正足三爪也○東垣云大不可刺者宜灸也一則沉寒痛冷二則無脈知陽絕也三則腹皮急而陽脈也捨此三者餘皆不得灸若病在兩寸者及腹皮急甚者當從陰引陽取穴于腹募五臟病取五臟募六腑病取六腑募若病在兩尺脈者當從陽引陰取穴于背腧五臟病取五臟腧六腑病取六腑腧元氣病取六腑腧募筋骨有形病者取五腧

慕其病不在天之陽不在地之陰在腹中者故取季脇下一寸元氣病取之右筋骨病取之左故在中者旁取之此其理也灸者認取之

黃帝曰刺節言振埃夫子乃言刺外經去陽病余不知其所謂也愿卒聞之岐伯曰振埃者陽氣大逆上滿於胃中憤瞋肩息大氣逆上喘喝坐伏病惡埃烟飴不得息請言振埃尚疾於振埃黃帝曰善取之何如岐伯曰取之天容黃帝曰其咳上氣窮詰胃痛者取之奈何岐伯曰取之廉泉黃帝曰取之有數乎岐伯曰取天容者無過一里取廉泉者血變而止帝曰善哉刺節真邪篇○飴于結反

陽迎頭痛胃滿不得息取人迎寒熱篇○陽迎陽逆也 氣逆上刺

膺中陷者與下胃動脈雜病篇

刺灸喘滿有六法

其一取陽氣上四節經文所言者是也

其二取肺經云肺手太陰之脈是動則病肺脹滿膨膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手而脅所生病者欬上氣喘渴煩心胃滿視盛虛熱寒陷下取之也又云邪在肺則皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外膺背三節五椎之傍以手疾按之快乃刺之取之缺盆之中以越之又云肺病者喘咳逆氣肩背痛取其經太陰足太陽之外厥陰內血者王註謂內外之間是足少陰經也又云肺藏氣氣有餘則喘咳上氣瀉其經隧無傷其經無出其血無出其氣楊註謂經隧為列缺穴也又云氣亂於肺則俛仰喘喝接手以呼取之手太陰榮足少陰輸是也

其三取大腸經云腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立邪在大腸刺盲之原巨虛上廉三里又云邪客手陽明之絡令人氣滿胃中喘息而支肘胃中熱刺手大指次指爪甲上

去端如韭菜各一疇左取右右取左如食頃已足也

其四取腎經云腎病者喘咳身重寢汗出憎風取其經少陰太陽血者是也

其五取脾經云氣滿胃中喘急取足太陰大指之端去爪甲如韭菜寒則留之熱則痰之氣下乃止

其六取脾經內經詳文具痺

灸嗽兩乳黑白際二穴脊後三穴嘗灸族姪喘灸後一月喘發大吐痰一桶許而安見灸錄灸條下

治喘哮 天突針入向上下五分 臍中三分 璇璣三分

氣海 膺府一分沿皮向外 乳根一分沿皮向外一寸半瀉

吸一

五膈氣喘息不止 中腕八分 期門凡刺腹部氣虛人

丹田閉氣刺之

集哮喘灸刺上穴不愈者可選用之 膏盲 關元 中

腕 三里 百勞 腎膈各灸之 支溝 大陵

東陽哮喘諸穴選用之 天容 譙譙 氣舍 扶突

太白 刺 魄戶 中府 大包 域中 雲門 石門

期門各灸之

惟穴 氣喘 乳中在乳下肋中針入一分沿皮向後一寸半瀉之

哮喘 興隆三寸半

喘滿痰實口中如膠 太谿

喘少氣不足以息腹滿大便難時上走胃中鳴脹滿口

舌乾口中吸吸善驚咽中痛不可內食善怒恐不樂大鍾

主之 欬腸下積聚而喘逆卧不安席時寒熱期門主之

流注 氣促喘 天牢

喘逆熱胸肩甲內廉痛不可俛仰眇季脇引少腹而痛

脹噫嘻主之

恠穴婦人血弱氣喘 氣中在氣海旁一寸半針入二寸半先補後瀉

喘者肺主氣形寒飲冷則傷肺故其氣逆而上行衝急

喝喝而息數張口擡肩擡身滾肚是為喘也

喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死全文見小兒喘○王註云緩謂縱緩

急謂弦急非來惟之緩急也

脈上氣喘息低昂其脈滑手足溫者生脈濇四肢寒者死

丹哮喘必用薄滋味

凡下痰定喘諸方施之形實有痰者神効若陰虛而脈

浮大按之濇者不可下下之必反劇而死也

喘不得卧

脈浮按之濇者忌下 凡喘而卧不得其脈浮按之虛而濇者為陰虛去死不遠 慎勿下之下之必死宜四物加童便竹瀝青黛門冬五味

枳殼蘇葉服之

感冒風寒者宜表散

四胡安人年六十八惡寒發熱自四月來得痰嗽眠不得食少心膈痛口中連嗽五更頗甚

白朮

枳殼炒

黃連各二錢

芍藥二錢

片苓七錢

桔梗

蘇梗葉各一兩

木通五分

甘草炙

五味卅一

右入竹瀝煎服

一丈夫因病喘不可臥肺脈沉而澹此外有風涼濕氣遏內熱不得舒

黃芩

陳皮

木通各一錢半

麻黃

蘇葉

桂枝各錢

黃連

乾姜

甘草此三

開二教躰虛感寒發熱氣喘難臥

蒼朮

麻黃

白朮

片苓炒各五分

桂枝三分

半夏

枳殼各一錢

木通三分

甘草炙

右生姜二片同煎加研碎杏仁五個

此方半夏為君必是吐痰多之人也

右解表三方前一方便寒熱多者設後二方便寒多者設

獨睡多痰者化痰

咳逆上氣時時濁唾但坐不得眠者皂莢丸主之用皂莢

八兩刮去皮酥炙右一味為末蜜丸如桐子大以枣膏和

湯服三十九日三夜一

女人年六十自來無汗多痰今得喘病眠不得曾與青州

白丸子

半夏兩半

枳殼炒四錢

桔梗

陳皮

木通

黃芩二錢

麻黃半錢

紫蘇

防風各一錢

甘草炙五分

右分作五貼生姜三片水煎去渣入竹瀝兩蚶殼許熟飲

脈沉而大者行水

索夫不得臥則喘者是水氣之客也夫水者循經液而流也腎者水臟主津液主臥與喘也逆調論

垣神秘湯治病人不得眠則喘者水氣逆行上乘于肺肺得水而浮使氣不流通其脈沉大宜此治之

蘇葉 陳皮 生姜 桑白皮

人參各五錢 茯苓 木香各二錢

右咬咀水煎去渣大溫分二服

仲咳逆倚息不得卧小青龍湯主之方見傷寒○又云支飲亦喘不得臥加短

平也 青龍湯下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥

逆氣從小腹上衝胃咽手足痺其面翕然如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味子甘草湯治

其氣衝

桂枝皮去 茯苓各四兩 甘草炙三兩 五味子半升

右四味以水八升煮取三升去渣分溫三服

衝氣即低而反更咳胃滿者用桂枝茯苓五味甘草湯去

桂加乾姜細辛各三兩以治其咳滿咳滿即止而更復

渴衝氣復發者以細辛乾姜為熱藥也服之當遂渴而渴

反止者為支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復納半

夏半升以去其水於桂苓甘草五味湯中去桂加乾姜細辛半夏是也

水去嘔止其人形腫者加杏仁半升主之其証應內麻黃

以其人遂痺故不納之若逆而納之必厥所以然者以其

人血虛麻黃發其陽故也用

茯苓兩 甘草 乾姜 細辛各三兩

五味子 半夏 杏仁各半升去皮尖

右煎去查温日三服

若而熱如醉此胃為熱所衝薰其面加大黃三兩以利之
無真應散治遠年喘急不能眠百藥不効者

多年不
已者墜
痰

白石英

四兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚一個以藥入內縫定者熱取藥出月換猪肚一個如前法煮三次煮了取藥出晒乾研

右為末以官局欵冬花散二錢入藥末二錢再加桑白皮二寸生薑三片束子一個水一盞半煎至七分通口

服猪肚亦可喫只不得用醬醋塩椒姜等調和

欵冬花一錢具母知母桑葉杏仁半夏阿膠甘草各二錢麻黃去節四錢為粗末是也

劫痰

本治多年肺氣喘急哮喘久不得卧紫金丹

砒

水飛
碗壹
好者二錢用水略潤少時以帛泥乾研成膏

右用膏子和砒同杵極勻丸如麻子大每服十五九小兒量大小與之並用蠟茶清極冷吞下臨卧以知為度

有一親戚婦人患十年偏求醫者皆不効忽有一道人貨此藥漫贖一服是夜減半數服頓愈遂多金而得此方予屢用以救人時為神異

陽明逆者息有音

逆不得卧而息有音者是陽道之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脈也胃者六腑之海其

氣亦下行陽明逆不得從其道故不得卧也下經曰胃不和則卧不安此之謂也

感寒喘

感寒喘不得卧治法見產後喘

針灸

甲咳喘不得卧不得坐呼吸氣索咽不得卧中熱雲門主之咳逆煩滿不得卧胃中滿喘不得息背痛太淵主之

右針灸喘不得卧天突穴甚效予治數人皆中

產後喘

產後喘極危多死也

血氣

郭氏治產後喉中氣急喘促者因所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治陳無擇云

宜大料芎歸湯一方用獨參湯尤妙

若惡露不快散血停凝上薰手肺亦

令喘急但服奪命丹血去喘自定奪命丹方見抱衣不下

世血竭散治產後敗血衝心胃滿上喘命在須臾宜服

真血竭

如無紫礮代

沒藥

右等分研細頻篩再研取盡為度每服二錢用童便合好酒半大盞煎一沸溫調下方產下一服上床良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生百病

雲參蘇飲治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參

一兩為末

蘇木

二兩

右以水兩碗煮取蘇木一碗以下去查調參末隨時加減服神效

發

若因憂怒性理鬱發而喘者用小調經散以桑白皮杏

仁煎湯調服

小調經散方見水腫

表証

旋覆花湯治產後傷風寒咳喘痰涎壅盛坐臥不寧

旋覆花

赤芍藥

荆芥穗

半夏麩

五味子

麻黃

茯苓

杏仁

甘草

前胡

各等分

右咬咀每服四錢水盞半姜五片棗一枚煎七分去查食前溫服

浦江吳輝妻孕時足腫七月初旬產後二月洗浴即氣喘但坐不得臥者五個月惡風得煖稍寬兩關脈動尺寸皆虛百藥不效用牡丹皮飛仁桂枝茯苓乾姜枳實厚朴桑白皮紫蘇五味瓜蒌仁煎湯服之即寬二三服得臥其痰如失蓋作汚血感寒治之也

裡証

若傷醜冷飲食而喘者宜見現丸

姜黃

三稜

葶澄茄

陳皮

良姜

人參

蓬木等分

右為細末用蘿蔔浸煮爛研細將汁煮麩糊丸桐子大
蘿蔔子湯下

短氣

短氣者氣短而急似喘非喘也

詳見診條

平人無

實寒熱為

丹溪治白雲許先生脾疼勝疼短氣

實

用大吐大下者二十餘日凡吐膠痰一大桶如爛魚腸或如相油条者數碗而安詳見腹痛

少氣小

便數為

孫正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞相服之有效蓬莪朮一兩金鈴子去核一分右件為末入鵬砂一錢煉過研細和勻每服二錢鹽湯或溫酒調下空心服

服

短氣者肺主諸氣五臟之氣皆不足而陽道

不行也 氣短小便利者四君子湯中去茯苓加黃芪以

補之如腹中氣不轉者更加甘草一半 肺氣短促或不

足者加人參白芍藥中焦用白芍藥則脾中陽升使肝膽

之邪不敢犯之 如衣薄而短氣則添衣於無風處居止

氣尚短則以沸湯一碗薰其口鼻即不短也

法見調攝下同

如厚衣於不通風處居止而氣短則宜減衣摩汗孔令合於

漫風處居止 如久居高屋或天寒陰濕所遏令氣短者

亦如前法薰之 如居周密小室或大熱而處寒涼氣短

則就風日九氣短皆宜食滋味湯飲令胃氣調和

胸痺短氣

亦主之方見胃痺痛門 胃痺喘息咳唾胃背痛短氣括萎薤白半夏湯主之方見胃痺痛門 大短氣有微飲當從小便去之苓

桂甘湯主之腎氣丸亦主之

腎氣丸見

欬花補肺湯治

咳嗽短氣方見咳嗽

苓桂朮甘湯

形腫節痛目眩者為飲

茯苓四兩

桂枝

白朮

各三兩

甘草

二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

仲景論短氣皆屬飲此方苓桂朮甘湯是其一法也金匱

云咳逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲又云支飲

亦喘而不得卧加短氣其脈平也又云膈上有留飲其人

氣短而渴四肢歷節痛脈沉者有留飲又云肺飲不弦但

苦喘短氣其治法危急者小青龍湯脹滿者厚朴大黃湯

胃眩者此方苓桂朮甘湯及澤瀉湯不得息葶藶大棗湯

吐下不愈者木防已湯之類是也

針灸

靈短氣息短不屬動作氣索補足少陰去血絡也癲狂篇

東短氣房勞 天井 大椎 肺俞 肝俞 尺澤灸

甲短氣心痺悲怒逆氣狂易魚際主之

成短氣者短氣而不能相續者是已似喘而非喘若有氣

上衝而實非氣上衝也喘者張口擗肩搖身滾肚謂之喘

也氣上衝者腹裡氣時時上衝也所謂短氣者呼吸雖數

而不能相續似喘而不擗肩似呻吟而無痛者短氣也經

所言短氣者眾實為難辨之証愚師莫識之為治有誤者

多矣要識其短氣之真者氣急而短促謂之氣短者是也

脈寸口脈沉芻中短氣

神陽脈微而緊緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣

少氣

少氣者氣少不足以言也

素三陽絕三陰微是為少氣方盛衰論

怯然少氣者是水道

診

虛

不行形氣消索也示從容篇言而微終日乃復言者此奪氣也全文見診生

右少氣治法蓋生脈散獨參湯之屬是也

臟腑

一陽發病少氣善咳善泄全文見診傳

運氣

運氣少氣有二

一曰火熱經云火鬱之發民病少氣又云少陰之復少氣骨痿又云少陽之復少氣脈痿治以諸寒是也

二曰風濕經云太陽司天之政四之氣風濕交爭風化為雨民病大熱少氣是也

針灸

針灸少氣有三

一曰補肺經云肺藏氣氣不足則息微少氣補其經隧無出其氣又云肺虛則少氣不能報息耳聾聾乾取其經太陰足太陽之外厥陰內血者是也

診

二曰補腎經云少氣身潔潔也言吸吸也骨痿無懈情不能動補足少陰是也潔連合切

三曰補氣海經云膻中者為氣之海其輸上在于脊骨之上下前在于人迎氣海不足則氣少不足以言審守其輸

調其虛實所謂柱骨之上者蓋天容穴也人迎者結喉兩旁之脈動處也乃取天容人迎二穴補之也

魚際絡青短者少氣也全文見陰陽

素脾脈搏堅而長其色黃當病少氣脈要精微論一呼脈一

動一吸脈一動曰少氣平人氣象論尺堅大脈小甚少氣惋有加立死全文見診謂尺內堅而脈反小而少氣惋加也

善悲 妊娠善悲

悲屬肺經云在臟為肺在志為悲又云精氣并於肺則悲也

是也

肺虛補母仲婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大
棗湯主之

甘草三兩 小麥一升 大棗十枚

右三味水六升煮三升溫分三服亦補脾氣

本鄉里有一婦人數次無故悲泣不止或謂之有祟祈禳
請禱備至終不應予忽憶金匱有一証云婦人臟躁悲傷
欲哭象如神靈數欠伸者宜甘麥大棗湯予急令治藥盡
劑而愈古人識病制方種種絕妙如此

運氣運氣悲皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明伏明之紀其
病昏惑悲忘從水化也又云太陽司天寒淫所勝善悲時眩仆又云
從喜悲數欠又云太陽司天寒淫所勝善悲時眩仆又云
太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也

針灸悲有二

其一取心經云邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不
足而調其輪也

其二取厥陰經云厥陰根于大敦結于玉英絡于臍中厥
陰為闔闔折即氣絕而喜悲悲者取之厥陰視有餘不足
虛實寒熱陷下而取之也

妊娠善悲

太論管先生治一妊娠四五箇月臟躁悲傷遇晝則慘感
淚下數欠象若神靈如有所憑醫與巫皆無益與仲景大
棗湯一投而愈

鼻塞 鼻淵 鼻軌 鼻瘰肉

酒醴鼻 鼻得冷則黑

鼻氣通鼻塞昏屬肺經云肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣又

云五氣入鼻藏于心肺心肺有病而鼻為之不利也又云西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺又云肺主臭在臟為肺在竅為鼻是也

項金匱真言論云西方白色入通於肺開竅于鼻藏精於肺夫十二經脈三百六十五絡其氣血皆上走於面而走空竅其精陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣出於鼻而為臭難經云肺氣通於鼻肺和則能知香臭矣夫陽氣宗氣者皆胃中生發之氣也其名雖異其理則一若因飢飽勞役損脾胃生發之氣既弱其營運之氣不能上升邪塞孔竅故鼻不利而不聞香臭也宜養胃氣實營氣陽氣宗氣上升鼻管則通矣又一說難經云心主五臭肺主諸氣鼻者肺竅反聞香臭者何也蓋以竅言之肺也以用言之心也因衛氣失守寒邪客於頭面鼻亦

受之不能為用是不聞香臭矣故經曰心肺有病鼻為之不利素古曰視聽明而清涼香臭辨而溫煖者是也治法宜先散寒邪後補衛氣使心肺之氣得交通則鼻利而聞香臭矣

寒邪客肺
麗澤通氣湯治鼻不聞香臭

羌活 獨活 防風 升麻

葛根各二錢 麻黃不去節一錢冬加之 蒼朮三錢

川椒一錢 白芷 黃芪各四錢 甘草二錢

右每服一兩水二盞生姜三片棗二枚葱白三寸同煎至一盞去渣稍熱服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐臥行住

溫肺湯治鼻不聞香臭眼多眵淚

升麻 黃芪各二錢 葛根 羌活

甘草灸 防風各一錢 麻黃四錢不 丁香一分

右粗末分二服每服水一大盞葱白二握同煎一盞去查稍熱食遠服

禦寒湯治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻塞欬嗽上喘

黃芪錢一 人參 升麻 陳皮各五分

甘草灸 欬冬花 黃栢各二分 佛耳草

黃連 羌活 白芷 防風各二分

蒼朮七分

右咬咀作一服水二大盞煎至一大盞去查稍熱服食遠

溫衛湯治鼻不聞香臭目中流火氣寒血熱泪多臍下冷陰汗足痿弱

黃芪 蒼朮 升麻 知母

羌活 柴胡 歸身各一錢 人參

甘草灸 白芷 防風 黃栢

澤瀉各五分 陳皮錢三 青皮錢二 木香

黃連各三分

右作一服水煎去查溫服食遠日晴明服之

溫衛補血湯治耳鳴鼻不聞香臭不知穀味氣不快四肢困倦行步不正髮脫落食不下膝冷汗帶下喉中啞啞不得臥口舌液乾太息頭不可以回顧額項筋緊急痛旋暈眼黑頭痛呵欠嚏噴

升麻四分 柴胡 甘草生 甘草灸

地骨皮 桔梗各三分 生地 白朮

吳茱萸 黃栢各一分 蒼朮 陳皮

王瓜根 牡丹皮各二分 歸身一分 菝仁三個

葵花紅

右咬咀作一服水煎去查稍熟食前服

雜方

外治鼻塞不通小薊一把水二升煮一升去查分服本草云小

薊保精

世噲化萆澄茄丸治鼻不通

萆澄茄五分薄荷葉錢三荆芥穗一錢

右為細末煉蜜丸如櫻桃大每服一九噲化

本治鼻不聞香臭多年者亦治用生葱分作三段早用葱

白午用葱管中截晚換葱管末稍一截塞入鼻中令透裡

方効

無通草散治鼻齾氣息不通不聞香臭并鼻息肉

木通 細辛 附子各等分

右為末蜜和綿裹少許納鼻中

世萆蒲散治鼻內窒塞不通不得喘息

萆蒲 皂角各等分

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧少時

玉鼻閉塞不聞香臭 迎香一分沿皮向上 上星三分

集又法 迎香 上星 合谷 三處灸人中 風

府 百勞

甲左窒刺右右窒刺左兩脇下痛泄上下出曾滿短氣不

得汗補手太陽以出之 鼻不利前谷主之

鼻淵謂鼻出濁涕

膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕不止也傳為衄血

噴目全文見診病傳變又脈解精微論云清涕者腦也故腦滲為涕

羅鼻中諸病 膽移熱於腦則辛頰鼻淵濁涕不止如湧

泉不藏久而不已必成衄血之疾防風湯主之

腦熱

針灸

防風

去芦

黃芩

人參

甘草

川芎

麥門冬

去心各一兩

右細末每服一錢沸湯點服食後服日三

溫熱

丹治鼻淵

南星

半夏

蒼朮

白芷

神麴

酒苓

辛夷

荆芥

嘗治一中年男子右鼻管流濁涕有穢氣脈弦小右寸滑左手寸澁先灸上星三里合谷次以酒苓二兩蒼朮半夏各一兩辛夷細辛川芎白芷石膏人參葛根各半兩分七貼服之全愈此乃濕熱痰積之疾也

心寒

仲肺中寒者吐濁涕

無蒼耳散治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁

兩半

蒼耳子

錢半

香白芷

兩

薄荷葉

分五

右為末每服二錢用葱茶清食後調服

嚴云辛夷散治鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

辛夷仁

細辛

去土

藁本

升麻

川芎

白芷

木通

防風

甘草

右為末每服二錢食後茶清調服

運氣鼻淵皆屬熱經云少陰之復甚則入肺咳而鼻淵治以苦寒是也

針灸

撮鼻流清涕濁涕

上星

灸二十七壯清補濁瀉

集又法

上星

人中

風府

不愈再取後穴

百會

風池

風門 大椎

鼻流臭穢

上星

曲差

灸

合谷

不愈取後穴

人中

迎

香

鼻丸 潤明鼻出
鼻清涕

積 熱痰

丹 肥人鼻流清涕乃飲食痰積也

蒼朮 片苓 南星 川芎

白芷 辛夷 甘草

右或末或丸皆可白湯下

本 治鼻塞清涕出腦冷所致

通草 辛夷各半 細辛 甘遂

桂心 芎藭 附子各一

右細末蜜丸綿裹納鼻中密封勿令氣泄丸如麻子稍加天微覺少痛效搗姜為丸即愈

無 辛夷散治鼻塞腦冷清涕不已

細辛 川椒 乾姜 川芎

吳茱萸 辛夷 附子各三分 皂角屑兩半

桂心兩一 猪油兩六

右煎猪脂成膏先一宿以苦酒浸前八味取入油煎附子黃色止以綿裹塞鼻孔中

運氣 運氣鼻軌有二

一曰火攻肺虛鼻軌經云少陰司天熱氣下臨肺氣上從

軌衄鼻窒又云少陰司天熱淫所勝民病軌衄嚏嘔又云

少陽司天火淫所勝甚則軌衄又云少陽之復煩躁軌嚏

又云少陰司天客勝則軌嚏又云歲金不及炎火乃行民

病軌嚏又云金不及曰從革從革之紀其病嚏咳軌衄治

以諸寒是也

二曰金助肺實鼻軌經曰陽明所至為軌嚏治以溫劑是

也

針灸

針灸鼻竅獨取足太陽經云足太陽之別名曰飛陽去踝七十別走少陰實則竅室頭背痛取之所別是也
甲鼻竅不利室氣塞喘僻多涕竅衄有瘡迎香主之
鼻
竅不得息不收涕不知香臭及衄不止水溝主之

鼻瘰肉

肺壅

無羊肺散治肺虛壅鼻生瘰肉不聞香臭

羊肺具

白朮兩四

菴蓉

木通

乾姜

川芎

各一兩俱為末

右五味為細末以水盪打稀稠得所灌肺中煮熟焙乾細研為末食後米飲服二錢

有食積

世瘰肉因胃中有食積熱痰流注治本當消食積

蝴蝶簪錢二

細辛錢一

白芷五分

右為末以綿裹藥納鼻中頻頻換又方蝴蝶簪三分號

方

丹一分細辛一錢如此法塞鼻二因方單用枯簪末面脂用綿裹少許納鼻中數日瘰肉與藥消落
右鼻中用此藥塞更以星半蒼朮酒芩連神麩辛夷細辛白芷甘草消痰積之藥服之為効也

世辛夷膏治鼻生瘰肉室塞不通有時疼痛

辛夷葉兩二

細辛

木通

木香

白芷

杏仁

湯浸去皮尖及研各半兩

右用羊髓猪脂二兩和藥于石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各一錢為丸綿裹塞鼻中數日內脫落即愈此方有理

羅輕黃散治鼻中瘰肉

輕粉

杏仁

湯浸去皮尖及雙仁各一錢

雄黃兩半

麝香少許

右四味用淨乳鉢內先研杏仁如泥後入雄黃麝香同研極細勻磁合蓋定每有患者不拘遠近夜卧用筋點梗末大在鼻中瘰肉上隔一日夜卧點一次半月見効

世鼻中有瘰肉不聞香臭瓜蒂細辛等分為細末以綿包如豈許塞鼻中須臾即通有人患瘰肉垂出鼻外用此藥即化為黃水點滴至盡三四日愈聖惠方單用陳瓜蒂以羊脂和傅上日三次効

本消鼻痔方

苳蒂炒

甘遂各四錢

白礬枯

螺青炒

草烏尖各五分炒

右為末用真麻油搜令硬此子不可爛旋丸如鼻孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔化為水肉皆爛下每日一次用妙不可言

又方取鼻痔

苦丁香乃瓜蒂

赤小豈

丁香各十個

右慢火焙乾為末入腦子少許口內先含水次將小竹管吹藥入鼻中如半盞茶時盡為度候頭疼時取下

右瓜蒂例

取鼻痔

芭荳十二粒去壳

陽起石一錢

石蓮心三十枚

右為末每用半字許搐入鼻內又用綿塊子蘸藥塞入鼻中其痔肉化爛自出

又方取鼻痔

蝟稍

巴荳去油五粒

丁香五粒

白丁香七粒

右為細末用螺青一字和勻用內消膏藥溶開入上件藥末搜丸如龍眼核大臨睡用一丸安鼻內

針灸

右巴荳例

世治久患鼻瘡膿極臭者用百草霜研細用冷水調服三錢

鼻中瘰肉鮑衄 風池 風門 風府 人中 禾窠

甲鼻中瘰肉不利鼻額頰中痛鼻中有蝕瘡斷交主之

鮑衄涕出中有懸癰瘰肉內窒不通不知香臭素窠主之
鼻塞口僻清涕出不可止鮑衄有癰禾窠主之

酒釀鼻

風熱

羅鉛紅散治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺癢疹俗呼肺風以肺病在皮膚也

硫黃

白礬灰

各五錢

右細末入黃丹少許染與病人面色同每上五分津液塗之洗嗽罷及臨臥再上兼煎升麻湯下瀉青丸服之

除其本也

升麻湯方見小兒痘瀉青丸方見治虛實

本治肺風鼻赤皴用老山查為末溶黃蠟等分和丸彈子

大空心茶酒嚼下半月効忌酒炙煇

簡治赤鼻

枇杷葉

一兩去毛陰乾新者佳

梔子

兩

右為末每服二三錢温酒調下早晨服先去左邊臨臥服去右邊効若神

銜治酒皴風鼻上赤將橘核微炒為末每用二錢七研胡

飛肉一個同以温酒調服以知為度

面經云胡飛性熱

海云治酒皴鼻用山茱萸煖腰膝助水藏除一切風逐一切氣破癥

治酒皴鼻

片腦

硫黃

明淨者五分

枇杷葉

錢

寒

雜方

右用猪臟去頭段一尺用第二段一尺割下臟上脂煎成油調和前藥末入生臟內兩頭縛定掛當風處七日用時將小針於臟上針孔捏出藥少許用手傳患處十日內全愈

無粉黃膏治肺熱赤瘰俗曰酒皷

硫黃一分

蘿蔔

切去蓋剉作次子入硫黃在內以竹針蓋定安正入糠火煨一宿取

出細研

輕粉

烏頭尖各少許

右研勻以面油調卧時傳早晚洗去以酥調尤佳

治酒皷鼻用乳香硫黃細辛輕粉等分爲末水調傅

檳榔散治鼻頭赤

檳榔

硫黃各等分

片腦少許

右爲細末用粗絹帛包裹時時於鼻上捺磨鼻聞其臭効又加蓖麻子肉爲末酥油調臨睡時少許捺鼻上使

終夜得聞效

針灸

診

甲治酒皷以桐油入黃連末天鈞藤燒灰傅之
甲鼻管疽發爲病腦空主之
無鼻頭微白亡血也赤者血熱也酒客多有之

鼻得冷則黑

血熱

甲面鼻得冷則黑論

諸陽聚于頭則面爲陽中之陽鼻

居面中央而陽明起於頰中一身之血運到面鼻陽部皆

爲至清至精之氣矣酒性善行而喜升大熱而有峻急之

毒多酒之人酒氣薰蒸面鼻血得酒爲極熱熱血得冷爲

陰氣所搏汚濁凝結滯而不行宜其先爲紫而後爲黑色

也須用融化滯血使得流通滋生新血可以運化病乃可

愈予嘗以酒制四物湯加酒炒片苓陳皮生甘草酒紅花

生姜煎調下五靈脂末飲之氣弱形肥者加酒黃芪無有

不應入好酒數滴為引使

肩背痛 肩痛

肩背痛屬肺分野病經云西風生於秋病在肺喻在肩背
故秋氣者病在肩背又云秋肺太過為病在外則令人逆氣背痛愠愠然是也

通脈經云風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘其肺使肺氣鬱甚也當瀉風熱以通氣防風湯主之

柴胡 升麻 黃芪各一錢 防風

羌活 陳皮 人參 甘草各五分

藁本 青皮各三分 黃柏一分 白朮仁二分

右咬咀作一服水煎溫服食後氣盛者宜服面白脫色氣短者勿服

脚痛有背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之

丹治一男子忽患背胛縫有一線痛起上肩跨至胃前側脇而止其痛晝夜不歇不可忍診其脈弦而數重取豁大左大於右予意背胛小腸經也此必思慮傷心心藏未病而腑小腸先病故痛從背胛起及慮不能決又歸之膽故痛至胃脇而止乃小腸火乘膽木子來乘母是為實邪詢之果因謀事不遂而病故用人參四分木通二分煎湯使吞龍膽丸數服而愈

背痛兼二陽一陰發病主驚駭背痛善噫全文見診病傳變

陰陽明厥運氣肩背痛皆屬火攻肺病經云歲火太過民病肩背熱

運氣又云少陰司天熱淫所勝病有背膈缺盆中痛又云歲金不及其病內舍膈脇肩背外在皮毛治以寒劑是也

針灸針灸肩背有二法其一取肺經云肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出取其經太

陰足太陽之外厥陰內血者又云肺手太陰之脈氣盛有餘則肩背痛風寒汗出氣虛則肩背痛寒少氣不足以息視盛虛熱寒陷下取之是也

其二取腎經云邪在腎則病肩背頸項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡取之是也

玉肩背痛連胛 胛縫在背端骨下直腋縫尖及臂取二寸半瀉六吸 五樞二寸半瀉六吸

世肩背胛痛 崑崙 懸鍾 肩井

東肩背頸項腋前痛與胛相引者 湧泉一分見血妙 前腋刺面上 又法 氣舍五分 天窳灸 曲池一寸 天井

甲肩背痺痛不舉血瘀肩中不能動搖巨骨主之 肩背不可自帶衣臂腕外側痛不舉陽谷主之 肩背欲折臑

如拔手不能自上下養老主之 項背痛引頸魄戶主之 肩痛留滿悽厥脊背急強神堂主之 肩背髀痛臂不舉寒熱悽索肩井主之

通玄肩背痛 手三里主之

素寸口脈中手促上擊者曰肩背痛平人氣象論

針灸肩痛有三法

其一取手陽明經云大腸手陽明之脈所生病者肩前臑痛視盛虛熱寒陷下取之也

其二取手太陽經云小腸手太陽之脈是動則病肩似拔臑似折視盛虛熱寒陷下取之也

其三取筋經云手太陽之筋病繞肩胛引頸而痛應耳中鳴痛手陽明足太陽之筋皆病肩不舉皆治在燔針劫刺

以知為數以痛為膺也

東肩不可動臂不可舉

肩顛二寸

巨骨五分

清冷淵

一關衝分

玉肩端腫

肩顛二寸半

腕骨七分先

寫後補

兩胛痛

肩

井宜久停針

支溝

甲肩腫不能顧氣舍主之

肩中熱指臂痛肩髃主之

肩肘中痛難屈伸手不可舉腕重急曲池主之

肩肘節

酸重臂痛不可屈伸肘竅主之

肩痛不能自舉汗不出

頭痛陽池主之

肩重肘臂痛不可舉天宗主之

肩胛

周痺曲垣主之

肩胛中痛而寒至肘肩外膺主之

肩

膊閉急悽厥惡寒魄戶主之

肩痛不可舉天窳乘風主

之

肩重不舉臂痛肩窳主之

冷淵主之

肩痛不可舉引缺盆雲門主之

皮膚

皮膚痛

皮膚索澤

素黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡骨有度

量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之始

皮者絡部

終愿聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脈為紀者諸經皆

然陽明之陽名曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者皆

陽明之絡也其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則

寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內

少陽之陽名曰樞持上下同法視其部中有浮絡者皆少

陽之絡也絡盛則入客于經故在陽者主內在陰者主出

以滲于內諸經皆然太陽之絡名曰關樞上下同法視其

部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之

陰名曰樞臑上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡

也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經其出者從

陰內注於骨心主之陰名曰害肩上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經太陰之陰名曰關蠶上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經凡十二經絡脈者皮之部也是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於腑廩於腸胃邪之始入於皮也浙然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脈盛色變其入客於經也則感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爍腠破毛直而敗帝曰夫子之言皮之十二部其生病皆何如岐伯曰皮者脈之部也邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脈絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於腑臟也故皮者有分部不與而生大病也帝曰善皮部論

皮屬肺

診

皮膚屬肺經云肺之合皮也其榮毛也又云肺主皮毛在臟為肺在體為皮毛是也
毛折爪枯為手太陰絕經云手太陰者行氣溫於皮毛者也氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮絕者津液既去則爪枯毛折毛折者毛先死

皮膚痛

皮膚痛屬心

運氣

皮膚痛屬心實經云夏脈者心也夏脈太過則病身熱皮膚痛為浸淫

運氣皮膚痛皆屬火邪傷肺經云少陰在泉熱淫所勝病寒熱皮膚痛又云少陰司天火淫所勝熱上皮膚痛又云少陰之復咳皮膚痛治以諸寒是也

針灸

針灸皮膚痛取肺經云邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出咳動肩背取之膺中外膺背三節五椎之傍以手疾

按之快然乃刺之取之缺盆中以越之是也

甲身腫皮膚痛不可近衣淫灑苛獲久則不仁屏翳主之
皮膚索澤

皮膚索澤即仲景所謂皮膚甲錯蓋皮膚澀而不滑澤者是也

虛勞汚血

仲五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷
飢傷勞傷經絡榮衛傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩

中補虛大黃蜜虫丸主之

方見勞條

小腸膀胱

三陽為病發寒熱其傳為索澤

全文見診病傳變索盡也王氏云精血枯涸故皮膚

潤澤之氣皆盡也

仲咳有微熱煩滿胃中甲錯是為肺癰葶藶湯主之

方見肺癰

智中甲錯為肺門

運氣皮膚索澤屬燥傷胆氣經云陽明在泉燥淫所勝病

躰無膏澤治以苦寒是也

針灸皮膚索澤取足少陽經云足少陽之脈是動則病躰無膏澤視盛虛熱寒陷下取之也

尺膚粗如枯魚之鱗者水泆飲也

全文見診法

瘡 舌瘡 喉瘡 胎前產後瘡

邪入陰則瘡

瘡者邪入陰部也經云邪搏陰則為瘡又云邪入於陰搏則為瘡然有二症一曰舌瘡乃中風舌不轉運之類是一曰喉瘡乃勞嗽失音之類是也蓋舌瘡但舌本不能轉運言語而喉咽音聲則如故也喉瘡但喉中聲嘶而舌本則能轉運言語也

舌瘡

痰涎乘虛閉塞

丹一男子年三十五歲因連日勞倦發嗽發為瘡疾醫與

瘡道而

瘡藥三發後變為發熱舌短言語不辨喉間痰吼有聲診

其脈洪數似滑遂以獨參湯加竹瀝兩蚶殼許兩服後吐
膏痰三塊舌本正而言可辨餘証未退遂煎人參黃芪湯
服半月而諸証皆退粥食調補兩月方能起立

人舌短言語不辨乃痰涎閉塞舌本之脈而然嘗治一中
年男子傷寒身熱師與傷寒藥五貼日後變神昏而瘖遂
作躄虛有痰治之人參五錢黃芪白朮當歸陳皮各一錢
煎湯入竹瀝姜汁飲之十二日其舌始能語得一字又服
之半月舌漸能轉運言語熱除而痊蓋足少陰脈挾舌本
脾足太陰之脈連舌本手少陰別繫舌本故此三脈虛則
痰涎乘虛閉塞其脈道而舌不能轉運言語也若此三脈
亡血則舌無血管養而瘖經云刺足少陰脈重虛出血為
舌難以言又云刺舌下中脈太過血出不止為瘖治當以
前方加補血藥也又嘗治一男子五十餘歲嗜酒吐血桶

中風熱則舌縱

不言

中風寒則舌卷

不言

許後不食舌不能語但渴飲水脈略數與歸芎芍地各一
兩朮參各二兩陳皮一兩半甘草二錢入竹瀝童便姜汁
至二十餘貼能言若此三脈風熱中之則其脈弛縱故舌
亦弛縱不能轉運而瘖風寒客之則其脈縮急故舌強舌
卷而瘖治在中風半身不收求之也

針灸

針灸瘖有二治

其一取脾經云脾足太陰之脈是動則病舌本強視盛虛
熱寒陷下取之也

其二取心經云手太陰之別名曰通里去腕一寸五分別
而上行入於心中繫舌本虛則不能言取之掌後一寸是
也

診

心脈瀼甚為瘖

全文見虛實法

素心脈搏堅而長當病舌卷不能言

脈要精微論

喉疳

疎泄帶

俞繼道遺精誤服參芪及升浮劑遂氣壅於上焦面疳聲不出用童便浸香附為末調服而疎通上焦以治疳又用蛤粉青黛為君黃栢知母香附佐之為丸而填補下焦以治遺十餘日良愈本草言童便主久嗽失音故治疳多用童便由童便能降火故也出聲音方訶子炮去核木通各一兩甘草半兩用水三升煎至升半入生姜地黄汁一合再煎數沸放溫分六服食後日作半料訶子治逆氣破結氣木通通利九竅治肺癆甚當

河訶子湯治失音不能言語

訶子四個半桔梗一兩半甘草二寸半

右為細末每服二錢童便一盞水一盞煎五七沸溫服

甚者不過三服愈桔梗通利肺氣訶子泄肺導氣童便降火甚速

一方桔梗三兩大訶子四個甘草二兩炮製皆同每服一

開結痰

錢七入沙糖一小塊不入童便獨用水五盞煎至三盞時細呷一日服盡其效甚速

海發聲散治咽喉語聲不出

括萎皮坐白姜蚕頭去甘草各等分俱各炒黃

右細末每三錢溫酒調下或生姜自然汁調下用五分綿裹噙化咽津亦得不拘時候日兩三服

附治卒失音咽不出陳皮五兩水三升煮取一升去查頓服

羅玉粉丸治冬月寒痰結咽喉不利語聲不出

半夏洗五草烏一字桂一字

右為細末生姜汁浸餅為丸如鷄荳大每服一九至夜含化多年不愈亦有效黃帝針經中說寒氣客於會厭卒然而啞此藥主之

胃中積
血作痛
失音者音

蛤蚧丸治肺間邪氣胃中積血作痛失音并治久欬失

蛤蚧

一對去嘴足溫水浸去膜刮了血脈用好醋炙

訶子煨去核

阿膠

炒

生地

麥門冬去心

北細辛去苗

甘草

炙各半兩

右為末煉蜜丸如枣大每服一九含化食後

潤燥

千治暴嗽失音語不出方

杏仁

研如泥

姜汁

沙糖

白蜜

各一升

五味

紫苑各三兩

通草

貝母

各四兩

桑白皮

五兩

右咬咀以水九升煮五味紫苑通草貝母桑白皮取三升去查納杏仁泥姜汁蜜糖和攪微火煎取四升初服三合日再夜一後稍加

通聲膏方

五味

欵冬花

通草

各三兩

人參

細辛

桂心

青竹皮

菖蒲

各二兩

杏仁

一升

白蜜仁

棗膏

姜汁

一升

酥

五升

右咬咀以水五升微火煎三上三下去查納姜汁棗膏酥蜜煎令調和酒服如枣大二九

丹欬嗽聲嘶者此血虛受熱也用青黛蛤粉蜜調服之

世失音槐花瓦上炒令香熟於地上出火毒三更後床上

仰臥隨意服亦治咯血

千風寒之氣客於中滯而不發故瘖不能言

孟人患卒啞杏仁三分去皮尖熬另研桂一分如泥和取

杏核大綿裹含細細咽之日五夜三

寒

熱

丹治失音以桂末着舌下嚙津妙千金斗門食忌聖惠方同 治風冷

失音以紫梗荆芥根一兩研汁入酒相和温飲半盞服無

時聖惠方

聖治風冷失音咽喉不利以藁荷根二兩絞汁酒一大盞相和令勻不計時候温服半鍾

陰温乘虛入心失音

孫內侍曹都使新造一宅落成遷入經半月飲酒大醉臥

起失音不能語召孫至診曰因新宅故得此疾耳半月當

愈但服補心氣薯蕷丸治濕用細辛川芎又十日其病漸

減二十日全愈曹既安見上問誰醫曰孫兆郎中上乃召

問曰曹何疾也對曰凡新宅壁土皆濕地亦陰多人乍來

陰氣未散曹心氣素虛飲酒至醉毛竅皆開陰濕之氣從

而入乘心經心經既虛而濕氣又乘之所以不能語臣先

用薯蕷丸使心氣壯然後以川芎細辛又去濕氣所以能

語也

逆氣

運氣瘖有二

一曰熱助心實經云少陰之復暴瘖治以苦寒是也

二曰寒攻心虛經云歲火不及寒乃太行民病暴瘖治以

鹹温是也

狐惑聲啞

狐惑聲啞其証默默欲眠目不能閉起居不安是也治法見傷寒

針灸

靈黃帝問於少師曰人之卒然憂恚而言無音者何道之

塞何氣出行使音不彰願聞其方少師荅曰咽喉者水穀

之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者聲音之戶也

口唇者音聲之扇也舌者音聲之機也懸雍垂者音聲之

關也頰頰者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主發舌者

也故人之鼻洞涕出不收者頰頰不開分氣失也是故厭

小而疾薄則發氣疾其開闔利其出氣易其厭大而厚則開闔難其氣出遲故重言也人卒然無音者寒氣客于厭則厭不能發發不能下至其開闔不致故無音黃帝曰刺之奈何岐伯曰足之少陰上繫於舌絡於橫骨終於會厭兩瀉其血脈濁氣乃辟會厭之脈上絡任脈取之天突其厭乃發也憂悲無言篇

厥氣走喉而不能言手足清大便不利取足少陰雜病篇

皆逆氣也足少陰脈循喉嚨又挾舌本故取之

針灸瘖有三法

其一取足少陰上二段經文是也

其二取足陽明經云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰下絡喉嗑其病氣逆則喉痺卒瘖取之所別是也予治一男子四十九歲久病痰嗽忽一日感風寒食酒肉

遂厥氣走喉病暴瘖與灸足陽明豐隆二穴各三壯足少陰照海穴各一壯其聲立出信哉聖經之言也仍用黃芩降火為君杏仁陳皮桔梗瀉厥氣為臣訶子泄逆甘草和元氣為佐服之良愈

其三取手陽明經云暴瘖氣哽取扶突與舌本出血舌本廉泉穴也

甲瘖不能言合谷及湧泉陽交主之

癩卒暴失音 神門 湧泉

甲食飲善嘔不能言通谷主之 暴瘖氣哽喉痺咽痛不得息飲食不下天鼎主之 瘖不能言期門主之 暴瘖不能言支溝主之

胎前產後瘖

心腎

素黃帝曰人有重身九月而瘖此為何也岐伯對曰胞之

絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫于腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復王注云少陰腎脈也氣不常養故不能言

郭氏論產後不語者何荅曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服七珍散

人參

石菖蒲

生地

川芎各一兩

細辛

防風

辰砂另研各半兩

右為細末每服一錢薄荷湯調下不拘時

胡氏孤鳳丹散治產後閉目不語用白礬細研每服一錢熱水調下

脫肛

穀道痛蝕

丹脫肛氣虛者補氣參芪川芎升麻血虛者四物升麻

盡中有

氣熱者條芩六兩升麻一兩為末神麩為丸服之 血熱者涼血四物加黃柏

白治脫肛以槐花槐角各等分炒黃為末用羊血蘸藥炙熟食之酒下

世治脫肛

槐花

荆芥穗

白連

等分○白連恐是白欬

右為細末空心酒下便入

無蝟皮散治肛門或因洞泄或因用力脫出不收

蝟皮

一個燒存性

磁石半兩煨碎

桂心半兩

右為末飲服方寸七忌舉重及房室肘後治女人陰脫加蟹頭一枚燒灰研入

丹大腸頭出痛苦乾又落落又出名截腸病腸盡則死初出寸餘時治之以芝麻油一盞以醫坐之飲大麻子汁數

寒

燥

雜方

升愈

無五倍子為末每三錢水二碗煎減半入白礬一塊安小桶內洗之立効

世治男女脫肛用五倍荆芥小便濃煎洗之

本治腸風及脫肛不收有血下用皂角三莖槌碎水一碗揉令皂角消盡用絹二重濾取清汁數分將脫肛腸浸在藥水中其腸自收不用手托如大腸收了更用湯盪其脫肛上下令皂角氣行則不再作三次盪愈

集治脫肛歷年不愈以生鉄三斤水一斗煮取五升出鉄以汁洗日再 一方用磨刀漿秀水洗亦効

肘若腸隨脫肛出轉久不可收入搗生括萎汁浸之猪肉汁中洗手隨按之令暖自得入

世又方亦治脫肛

荆芥

龍腦

薄荷

朴硝

右煎湯朝朝洗之腸頭自入

無香荆散治脫肛 香附末 荆芥穗分

右為末每用三匙水一大碗煎熱淋洗

針粉散治脫肛歷年不愈針粉研細每用少許搽之按入即愈

本治腸風并脫肛及有血用蛇床子不拘多少炒為末貼大腸脫垂處立收甚妙

無用木賊不以多少燒存性為細末搽肛門上按之

乘關治瀉多時脫肛疼痛黑聖散用大蜘蛛一個葉重裹線繫定合子內燒令黑色存性取出細研入黃丹少許同研凡有上件疾即先用白礬葱椒湯洗拭乾後將藥末搽在軟處將手掌按托入收之妙

聖治大腸久積虛冷大便脫肛收不得蝸牛一兩燒灰猪脂和傅之

千治脫肛歷年不愈驚頭一枚燒令烟絕杵末日傅肛上手按接之

丹治脫肛用胡荽燒薰立入

濕治諸般痔脫肛以死蛇一條如指大濕者用掘地坑燒之將有孔板蓋坑上坐薰之烟絕為愈大効

世腸頭出用皂角薰次用蜈蚣一個入蜜浸去蜈蚣將蜜調土硃傅上即入 一女子脫肛醫用糯米一勺濃煎飲去米候洗肛溫柔却先以磚一片火燒通紅用醋沃濕以青布鋪磚上坐肛於青布上如熱則加布令厚其肛自吸入腹中而愈

紫叢膏治臟熱肛門脫出以紫背叢一大握又名魚腥草

針灸

搗爛如泥先用朴硝水洗淨肛門用芭蕉葉托入却用藥於醫下貼坐自然收入

集治脫肛 大腸腧 百會 長強

扁鵲脫肛 百會 肩井

摘又法 百會針二分灸七壯至十七壯

世脫肛 合谷

甲脫肛刺氣衝主之

穀道痛蝕

肘治穀道赤痛熬杏仁杵作膏傅之良愈

外治下部虫齧杵桃葉一斛蒸之令極熱內小口器中以下部榻上坐虫立死

脈脈蝕陰脫其脈虛小者生緊急死

痔

診

經方

仲小腸有熱者必痔

東垣治濕熱風燥四氣
秦芫蒼朮湯治痔疾若破謂之痔漏大便秘澁必作大也為病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣相合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也若大便燥結者主病兼受火邪也熱結不通去燥屎者其西方肺主諸氣其躰收下亦助疾病為邪須當破氣藥兼之治法全矣服之其疾立愈不可作丸以剉湯與之効如神速

秦芫一錢去芦

澤瀉三分

蒼朮七分製

防風根五分

苑仁去皮一錢另研

歸根三分酒洗第

黃栢去皮酒洗五分

大黃少許雖大便澁亦不可多用

檳榔一錢細末調服之

皂角仁燒存性去皮一錢搗細末調下服之

右除檳榔苑仁皂角仁三味候煎成藥研勻調入外餘改咀作一服水三盞煎至一盞二分去查入前三味再上火煎至一盞空心熱服待少時以美饅壓之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒麪大料物乾姜之類犯之則藥無効如有白膿加五朶白葵花須除萼去心細剪入青皮五分不去白入上藥同煎又用木香三分為細末同檳榔等三味再上火同煎依法服餌古人以此疾多以歲月除之此藥一服立愈若病久者再服必愈

秦芫白朮丸

秦芫去芦

歸稍酒洗

苑仁酒浸去皮尖另研各一兩

地榆錢三

枳實炒

白朮

皂角仁燒存性去皮各半兩

澤瀉

右爲細末和菘仁泥研勻煎熱沸湯麪糊丸雞荳大焙乾白湯下空心宿食消盡服之少時以美膳壓忌生冷硬物冷水冷菜之類并濕麪酒及五辣辛熱大料物之類犯之則藥無驗十服必愈

繫蒼木澤瀉丸

蒼木四兩 去皮

澤瀉

枳實

秦艽各二兩

地榆

皂角子

燒存性 各一兩

右爲細末燒餅爲丸如桐子大每服三十九丸米飲湯或

酒下

白朮丸

藥味與蒼木澤瀉丸同只改蒼木爲白朮去秦艽

行溪主 涼血

痔漏專一涼血爲主

人參

黃連

生地

涼血

當歸和

川芎

槐角涼生 血

條芩

涼大 腸

枳殼寬 腸

升麻

起

右煎湯服之外以澁藥蘆甘石童便煨牡蠣粉龍骨海蛤蜜陀僧之類敷之

許孺人產後痔作瘡有頭如蒜頭大或下鮮血或紫血大便疼與黑神散又多食肉大飽此濕熱在大腸所爲

郁李仁

麻仁

槐角

各七錢

枳實

皂角仁

五錢 爲末

歸尾

生地各三錢

大黃

炒一錢

右分六貼內三樣仁另研煎服

經患五種痔水研山荳根服

味甘寒 退血熱

本又方治痔用雞冠花不拘多少濃煎湯每服一盞空心

服本草云雞冠花性涼治瀉血

痔頭向上是大腸熱甚收縮爲主用四物解毒加枳殼

番花痔 甚大腸熱

白木槐角秦芫

治番花痔 荆芥 防風 朴硝

右煎湯洗之次用木鱉子鬱金研末龍腦些少水調塗

上

世治番花痔用信一錢蜈蚣數個以香油久浸之臥臨時先洗痔拭乾却取浸油傳患處用手按入立愈累効其餘痔皆妙

痔藥膏子治外痔番花脫出黃水不止腫痛並用銀潤篋蘸藥塗傳日一次重者五七次立愈先用藥水洗拭乾却傳此膏用真桑灰不拘多少淋濃汁兩碗熬至一碗却入草烏片大黃片各二錢再慢火熬至半碗入甘草一錢數沸下淨細石灰半匙頭不可多略沸三五次用絹一重花紙二重如絞漆狀濾過再熬成膏候冷用真膽礬五分研

寒

極細末放入膏中用瓦器盛貯封之臨用入龍腦末和勻傳之

本治風痔漏不問有頭無頭定三日安

藜蘆燒灰 天麻各五錢 皂角針不用皮條炒二錢

乾姜兩半 蓮子草 明礬 硫黃各一兩

大苦瓜菱個 麝香分五

右將瓜菱開一孔入礬并硫黃在內孔如小錢大就將元掩合定綿紙糊却用瓦罐子盛坐瓶上炭火煨令烟盡為度候冷取出研細同前六味藥末和令勻煉蜜丸桐子大每服十九至十五丸空心溫酒下日三服三日見効忌油麪醃藏牛馬肉魚腥生冷行房行遠勞力一切等事

治腸痔鱉甲丸

蠶甲 蝟皮炙焦 川山甲炙焦 白礬枯

附子 猪牙皂角各半兩炙焦

右細末研勻蒸餅丸如桐子大每服二十九食前日

三服

又方 槐花炒 白礬枯各一兩 附子五錢

右細末研勻蒸餅丸如桐子大每服二十九米飲下食

前日三服已上二方隴老傳

治腸風痔漏

赤芍藥 官桂去皮 甘草炙各等分

右咬咀每服二錢姜二片白糖一塊水一盞同煎七分

去查空心服

素因而飽食筋脈橫解腸澀為痔主氣通天論

潔黑地黄丸治血虛又痔神妙治痔之聖藥也方見勞瘵

世治痔方神妙

當歸 川芎 黃連 全蝎

三稜 蓬朮 羌活 獨活

山茱萸去核各半兩 枳殼十二兩去穢 商陸白者一兩

巴豆去壳不 木香 甘草節 鼠粘子炒

苦參 藜蘆 柴胡各一兩 刺蝟皮炒

猪牙皂角去皮弦各一兩 一方加白朮半夏荆芥薄

苛檳榔各一兩

右將巴豆二粒或三粒入枳殼內線扎定却用醋煮爛

訖冷水洗淨去巴豆不用晒焙乾入前藥同為細末煮

醋麩糊為丸桐子大每服三四十丸空心醋湯下更用

五倍子羌活獨活煎湯洗如大便燥結用煮過巴豆六

七粒加入前藥同丸

右一方踈風泄熱破積滯其効如神

集治五痔不以年月日久新枳實為末煉蜜丸桐子大空心飲下二十九

丹二三十年不愈者三服止用蓮花蕊散

蓮花蕊 黑牽牛頭末各一兩半 當歸 兩半

礬紅 少許

右為末先忌食肉五七日空心令食肉一頓就取温酒下三錢約兩時辰取下膿血或虫是効

海藏外臺治五十歲痔不瘥塗熊膽取瘥神効諸方不及此

頤七聖散丸治大腸疼痛不可忍王叔和云積氣生於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦是莫漫多方立紀

羌活 一兩 檳榔 木香 川芎

桂枝 去皮各半兩 大黃 八分 郁李仁 去皮另研一兩半

右除郁李仁另研外為細末煉蜜丸桐子大驗虛實臨時斟酌丸數白湯下取大便微利一服而愈切禁不得多利大便若大行其病滋甚

秦芫防風湯治痔漏大便時時發疼痛非痔漏也此藥主之

秦芫 防風 白朮 各一錢半 歸身 一錢

黃栢 五分 陳皮 紅花 少 甘草 炙

升麻 各六分 柴胡 二分 菝仁 三十個 大黃 三分

澤瀉

右剉如麻苳大總作一服水三盞煎一盞去查稍熱服空心宿食消盡服之避風寒忌房事酒濕麪大辛熱物

當風寒處大便

本治痔有鼠結核作渴疼痛方

皂角酥炙

黃芪

荊芥

槐子

川山甲

木香

蝟皮

桔梗

鱉甲醋炒

露蜂房焦炒

芍藥各一兩

大黃五錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九丸溫酒下食前日三服未知加至四五十丸

治痔下腫痛

枳殼一兩陳粟米同炒

青木香一分

右為末每服二錢飯飲調下

集治痔疾下血疼痛不止以玩月沙不限多少慢火熬令

黃色為末每二錢入乳香五分空心溫酒調下日三四服

瘥即免子糞是也

外治痔發疼痛裡肉作羹食之良作哺食不過三頓瘥

世治痔瘡痛不可忍者木綿花煎湯旋入朴硝乘熱薰之

候溫浸之

單用硝水極妙
曾用大有効

本治痔痛

大蜈蚣一條

大青州東

白礬一塊如
棗大

右將蜈蚣白礬二味為末用東肉丸分作二丸燒烟用

竹筒透引烟薰妙

并着補
虛去虫

垣秦茺羌活湯治痔漏成塊下垂疙瘡不任其痒

升麻根

柴胡

甘草炙

麻黃根各五分

黃芪

秦茺各一錢

防風根七分

藁本三分

細辛少

羌活根一錢三分

右剉如麻荳大作一服水二大盞煎一盞去查空心宿食消盡服之忌如前

梅治痔有虫咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煎汁安

盆中坐薰之塞其穀道湯冷更煖之良久欲大便當虫出
不過三度即愈如用末綿裹納下部

丹治痔穀道中虫痒不止水銀末膏各二兩研勻捏如枣
形薄綿裹納之明日虫出若痛者加粉草三大分作丸梅師方

羅淋滌藥治下部痔腫大腸頭痒痛

葳靈仙 枳殼炒各一兩

右為粗末熬水薰洗冷即再煖臨臥避風洗三次挹乾

貼蒲黃散

世治痔痒用五茄莖葉濃煎湯以瓶盛之坐瓶口上薰痔
至湯温洗之三次必効

虫如丹腸風痔漏有虫如絲細黑頭取去除根

瞿麥半升 猪牙皂角一升

右為末入猪腰子一雙內用米泔煮空心食之少頃肚
痛上攻虫皆隨出作地坑埋之薄粥補之

大腸硬者寬腸

垣當歸郁李仁湯治痔漏大便硬努出大腸頭下垂多血
苦疼不能忍

皂角仁另為細末調服 郁李仁 秦艽各一錢

麻子仁一錢 當歸稍 生地 蒼朮各五分

澤瀉三分 枳實七分 大黃三錢煨

右除皂角仁研細末餘藥剉如麻荳大水三大盞煎一
盞去查入皂角末調在內空心食前候宿食消盡服之
忌風寒處大小便

丹如欲涼大腸寬大腸則用枳殼去穰入巴荳鉄線纏煮
透去巴荳入藥用若丸藥則搗爛用煎藥則乾用

下血甚者止血

食治野鷄痔下血腸風明目方嫩槐葉一升蒸如茶法取

葉碾作末亦如茶法煎呷之

干治腸痔每大便下血槐樹上木耳取末之飲服方寸瘥日三服良

肘治腸痔每大便常血水服蒲黃方寸七瘥日三服良

食主五痔下血不止杏仁去皮尖及雙仁水一升研瀘取

汁煎減半投米煮粥停冷空心食之

厚治腸痔多年不瘥下血不止木賊枳殼各二兩乾姜一

兩大黃一分四味並剉一處入銚子內炒黑色存三分性

搗羅溫粟米飲調食前服二錢七甚妙

外治患腸痔大便常有血食鯽魚羹及隨意任作飽食孫

真人同

本治腸痔在腹內有鼠爛下血方

白蕪荑

椿樹東行根

狼牙根

貫衆

蝟皮炙

雄黃兩

白鱧頭炙

槐東引根白皮一分

右細末臘月猪脂和一九彈子大綿裹納下部

丹痔漏腸漏竅用赤石脂白赤脂枯礬黃丹腦子塞之

本治腸風痔漏用鯽魚一箇破開去腸入白礬令滿合之

瓦上燒過為細末用雞毛捲藥傅之立効

治痔漏瘡方

雞子一個煮熟去黃取白切炒

白礬明者如皂角子大匙上枯過用三分

右為末先用溫湯洗淨拭乾用紙捻點藥送入瘡孔內

立効日三易

右治痔漏下血如虛血必兼服黑地黃丸乃妙

鱗鯉甲燒一兩存性肉荳蔻仁三箇同為末米飲調二

錢服治氣痔膿血甚者刺蝟皮一兩燒服中病即已不必

憂怒則發者調氣

盡劑

運氣
雜方

運氣痔發皆屬寒經云太陽之勝痔瘡發治以苦熱是也
世治痔神應散治五種腸風下血上廁糞前有血名外痔
糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面有努肉名
爛痔痔頭上有孔漏出名腸風並治之

黃牛角鯁

一枚酌中
者槌碎

蛇蛻皮

一條
白者猪牙皂角

穿山甲片

刺蝟皮

對一兩

右五味細剉入甕瓶內以黃泥封固候乾先用小火燒
令烟出後用大火煨令通赤為度取出攤開候冷搗羅
為末服時先令患者臨卧時細嚼胡荽仁一個如糊用
無灰好酒一盞送下不可言語便睡至五更時以溫酒
調下藥末三錢至辰時更進一服雖久年不過三服立
効

洗法

世治腸風痔漏如神大樹木上寄生葉取乾為末酒水
飲任下或九桐子大服三十九亦得

治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末水服方寸
或九桐子大服之立効

洗痔瘡用荆芥朴硝桑寄生定痛解毒去風涼大腸熱安
胎如腫者加五倍子木鱉子研細調傅 又方五倍朴硝
桑寄生蓮房水煎先薰後洗一方加百藥煎洗

保淋洗法

天仙子

荆芥穗

小椒

蔓荊子

右水煎湯洗

本薰洗痔方用枳殼不拘多少為末每用二錢水一盞砂
瓶內煎令沸先去瓶嘴上坐薰後却瀉出通手熱洗妙

此方
妙除根

世洗痔方輕者用朝東馬齒莧劉寄奴濃煎湯薰待温却
用手洗拭乾薰者加大青葉梗乾者一半同煎

世痔痒用灰莧帶根濃煎湯先薰後洗 又方取河水頻
洗用蝸牛塗之

敷貼法

經痔漏用犍牛兒膽蝟膽各一個膩粉五十文麝香二十
文將蝟膽汁膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九
日熟旋取為丸如大菱角急送入瘡內後追出惡物日三
驗候瘡口漸合用生麪蓋瘡內一偏出惡物妙

世一方治痔用雄鷄膽片腦和勻帖之 一方熊膽塗之
神効

世治痔用活蜈蚣一條以香油一小罐浸之陳愈妙傳之
累驗

無貼痔法

蜀葵子半兩

蟬蛻五個

檳榔一個

右用束三枚取肉研細搜和藥末如覺硬滴少蜜研成

膏量大小貼於病處

羅蒲黃散治下部痔漏

蒲黃

血竭半兩

右為細末每用少許貼於患處

世治痔疾有頭如雞冠者用黃連末傅之即瘥更加赤

小荳末尤良

方用黃連末付妙

薰法

無薰痔法

蝟皮

切方三指大雄黃東大

熟艾鷄子

右為末用瓦器以灰實一半如燒香法安長桶內坐其
上薰之烟氣從口出為佳凡三度薰永瘥勿犯風冷忌
鷄肉毒物

本薰痔方用鼠郎皮一味瓶內燒烟坐身於瓶上薰三五次除根

枯痔法

世痔方赤脚蜈蚣一條香油煎酥紙上搥乾加乳香二錢沒藥二錢麝香粉霜各五分人指甲五錢泥裹煨乾脆為末用鵝毛管盛藥吹上如有水即時出盡不疼其物結一硬丁用線繫在上揭落之

羅治痔神効

雄黃

硫黃

明礬

各等分

右為末新盞盛藥先入礬末一半在底次入餘藥又將礬末一半蓋上用火煨候礬枯為度出火毒研末津液調傅乾落為度後用石膏五倍子為末收瘡口

周先生枯痔法

明礬

赤石脂

五錢

辰砂

痛加一錢

黃丹

右為末先用鬱金末護肛門如無鬱金用姜黃末代之調塗四圍好肉如不就加葉荳粉打合却將枯藥傅上如肛門疼急濃煎甘草湯放溫拂四圍肛門上就與寬腸藥

槐花

大黃

枳殼

木通

連翹

瞿麥

當歸

右半酒半水煎

枯藥早晨上一次日午一次洗去舊藥申時又洗去又上一次如要急安至夜半子時又洗上一次至次日且看痔頭淡淡黑色兩三日如烏毒四五日內用竹篦子輕輕敲打痔頭見如石堅至七八日便住更不須上枯藥且待自然如蘿蔔根乃脫去也洗用甘草荆芥槐花洗去舊藥方上新藥凡醫痔之法且如明日要下手今日先與此藥

所以寬大腸使大便軟滑不與痔相碍且不泄瀉痔頭未脫落者須要日日與之以大黃一两煨枳殼炒當歸酒洗一两同為細末如桐子大好酒吞下 治枯痔頭慮生他証凡用枯藥或觸壞腎根或水道赤瀉痛與此方大黃木通生地各一两滑石瞿麥各半兩同為細末每用四錢煎服 催痔方如枯盡未脫落以此催之好磁石一錢白姜蚕生川烏五分同為細末冷水調傅上立脫 凡用枯藥去盡乳頭恐留痔硬頭損破肛門四圍成瘡用此藥龍骨一錢石膏一錢沒藥五分膩粉五分同研十分細先以荆芥湯洗次摻之切忌毒物生姜 痔脫後用甘草湯豈豉湯洗再用荆芥五倍子煎水洗便不生膿 治痔脫後肉痒方用大粉草濃煎湯洗 收腸方凡用枯藥脫下乳頭隨即與此以收其腸此方補氣又收膿去血生肉令痕壯

人參

當歸各一兩

川芎

甘草

白芷

防風

厚朴

桔梗

桂枝

黃芪

右細末半酒半水煎如惡酒者酒少水多煎之夏月減桂朴加苓栝

繫痔法

經治痔瘻有頭方用芫花入土根不限多少以淨水洗却

入木臼搗用少許水絞取汁於銀銅器內慢火熬成膏將絲線於膏內度過繫痔繫時微痛候心燥落時以紙擦引入膏藥於竅內永除根未落不得便尿

割痔法

周先生割痔麻藥

川烏

草烏尖

胡椒

吳茱萸

花椒

白姜蚕炒

右細末酒調傅四邊然後割之又以此藥傅之否則亦

用麝香龍骨塗之

右枯痔繫痔割痔三法用前藥服及敷貼不退者然後用之必敬謹之不可視為常法

蝕痔法
本治痔漏此因大腸感風熱而生

生砒字一 水銀一粒如 膩粉字一 麝香一粒如

右件並入乳鉢內研極細如痔如有珠子者將礬湯淨

洗拭乾用手撚藥指在痔上覺痒便是藥行一日二次

又洗五日後住藥見効如或有孔只用紙撚引藥送入

令徹其內更用紙貼孔前一日二次使藥自能生全無

擇云忌用生砒恐毒氣入腹今兩存之以治珠突者

針灸

針灸痔獨取足太陽經云足太陽之脈所生病者痔瘡視盛虛熱寒陷下取之蓋後世取承山穴者是也

其二論督脈而不見其取法經云督脈生病癢痔蓋後世

取長強穴是也

四治痔瘡大蒜十片頭垢捏成餅子先安頭垢餅於痔頭上外安蒜片以艾灸之

本唐峽州王文顯充西路安撫司判官乘騾入駱谷有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如澆灰火至驛僵仆主驛吏云此病予曾患來須灸即瘥用柳枝濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時出至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登騾而馳去

玉痔漏下血裡急後重或痒或疼

二白在掌後橫紋上四寸手脈陰脈兩穴相並一穴

長強一穴大瀉三吸

世灸法 長強一穴大瀉三吸 灸可七壯雖久不愈者亦効

又法 脊骨凸處與臍平對是穴灸七 承山二十半補

壯

甲痔篡痛承筋主之 痔篡痛飛陽及委中扶承主之

痔痛攢竹主之 痔痛會陰主之 痔與陰相通者死

陰中諸病前後相引痛不得大小便會陰皆主之 痔骨

蝕商丘主之

診

無腸癖為痔如大澤中有小山突出為痔入於九竅中凡
有小肉突出皆曰痔不特於肛門邊生有鼻痔眼痔牙痔
等其狀不一方書分出五種曰牡曰牝曰脈曰腸曰氣牝
痔者肛邊生瘡腫突出一日數枚膿潰即散牡痔者肛邊
發露肉珠狀如鼠妳時時滴漬膿血脈痔者腸口顆顆發
癩且痛且痒出血淋漓腸痔者腸內結核有血寒熱往來
登溷脫肛氣痔者遇恐怒則發肛門腫痛氣散則愈又有

忌

酒痔每遇飲酒發動瘡腫痛而流血血痔則每遇大便清
血隨下而不止宜解熱調血順氣為主若久不愈必至穿
穴為漏矣

治痔切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽忌喫生冷硬物冷
菜之類及酒濕麪五辣辛熱大料物及乾姜之類犯之無
効此東垣格言也

醫學綱目卷之二十七

醫學綱目卷之二十八

腎膀胱部

腰痛

胎前腰痛

產後腰痛

脊痛脊

強

大法

恒六元正紀論云太陽所至為腰痛又云巨陽即太陽也

虛則頭項腰背痛足太陽膀胱之脈所過還出別下項循肩膊內挾脊抵腰中故為病項如板挾脊痛腰似折髀不

大抵腰痛寒濕多風熱少

可以曲是經氣虛則邪客之痛病生矣夫邪者是風熱濕燥寒皆能為病大抵寒濕多而風熱少然有房室勞傷腎虛腰痛者是陽氣虛弱不能運動故也經云腰者腎之府

寒熱腰痛皆虛

轉搖不能腎將敗矣宜腎氣丸茴香丸之類以補陽之不足也膏梁之人久服湯藥醉以入房損其真氣則腎氣熱

腎氣熱則腰脊痛而不能舉久則髓減骨枯發為骨痿宜六味地黃丸滋腎丸封髓丹之類以補陰之不足也靈樞

云腰痛上寒取足太陰陽明上熱取足厥陰不可俛仰取足少陽蓋足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹經所過處皆能為痛治之者當審其何經所過分野循其空穴而刺之審何寒熱而藥之假令足太陽令人腰痛引項脊尻背如重狀刺其郄中太陽二經出血餘皆倣此彼執一方治諸腰痛者固不通矣

久痛開之

如久腰痛必用官桂以開之方止腹脇痛亦然

煨腎丸治肝腎損及脾損穀不化腰痛不起者神效治虛實法

治虛實法

無立安丸治五種腰痛補腎又治脚氣

脈虛及房勞者陽虛

破故紙

續斷

乾木瓜

牛膝酒浸

杜仲

去皮對姜汁炒絲斷各一兩

萆薢二兩

右為細末蜜丸如桐子大每服五十九鹽湯或酒任下

本又方治五種腰痛

狗脊

萆薢

兔絲子

各一兩酒浸三日焙乾別研

右為細末煉蜜如桐子大每服三十九用萆薢二兩酒浸三日取酒服藥空心食前

無杜仲酒治風冷傷腎腰痛不能屈伸并補腎虛取杜仲

一斤切姜汁製炒斷絲用好酒二升浸十日每服三四合日四五服一方為末温酒調一錢空心服

驗治腰痛用破故紙炒為末温酒下三錢

右杜仲牛膝萆薢破故紙治腰例

本治腎虛腰痛不能轉側麋茸丸

麋茸

一兩鹿茸亦可兔絲子取末舶上茴香兩

右為末以羊腎二對用酒浸去膜研如泥和丸如桐子大陰乾如羊腎少入酒糊佐之每服三五十九温

酒或鹽湯下

戊戌年八月淮南大水城下浸灌者連日予忽臟腑不調腹中如水吼數日調治得愈自此腰痛不可屈折雖洗面亦相妨服徧藥不效如是凡三月予後思之此必水氣陰盛腎經感此而得乃灸腎脬三七壯服此藥

壬治腰痛鹿角去止皮取白者燉令黃為末酒服方寸匕

日三特禁生魚餘不禁新者良陳不佳角心中黃處亦不

中服大神良鹿角去惡血治腰痛羊腎為末酒服二方寸匕

日三服本草云羊腎補腎氣益精髓

右麋茸鹿茸羊腎治腰痛例

丹補腎丸治腎虛腰痛累效

烏藥葉本草云烏藥嫩葉補中益氣側柏葉

右酒蒸晒乾為末粥為丸如桐子大

經治腎虛脚無力生栗子入袋盛懸乾每日平明吃十餘顆次吃猪腎粥瘥

丸腰痛脈大者腎虛

杜仲 龜板 黃栢 知母

枸杞 五味各等分

右為末猪脊髓為丸

補陰丸治陰虛性急腰痛者

龜板 黃栢 知母 側柏葉

右為末地黃膏為丸

腰腿濕痛

龜板酒炙五錢 黃栢酒炒四錢 青皮三錢 生甘草一錢五分

右為末研姜一大片次入前藥末一錢研細以蒼耳汁

盪起煎令沸服之

脈大及膏梁人陰虛

腰腿疼痛

敗龜板

酒炙二兩

黃栢

炒酒

蒼朮

蒼耳

各二兩

匾栢

兩

威靈仙

酒浸二兩

右為丸以黑豈汁兼四物湯加陳皮生甘草生姜一片

煎吞下

又方

龜板

一兩

黃栢

炒

白芍

各兩

陳皮

葳靈仙

知母

蒼朮

蒼耳

各半兩

右為末蜜丸服

濕熱腰痛大便泄

龜板

一兩

楮皮

炒

蒼朮

滑石

各半兩

芍藥

酒炒

香附

各四錢

右為末粥丸如內傷白朮山查湯下

恒蒼朮湯治濕熱腰腿疼痛

蒼朮

三錢去濕止痛

柴胡

二錢行經

防風

一錢

黃栢

一錢始得之時

寒久不愈寒化為熱除濕止痛

右作一服水煎空心服

右龜板黃栢知母治腰痛例

無牛膝酒治腎傷風毒攻刺腰痛不可忍者

牛膝

川芎

羌活

地骨皮

五加皮

薏苡仁

甘草

各一兩

海桐皮

二兩

生地

十兩

右剉以絹袋裹入好酒二斗浸二七日夏三五宿每服

一盃日三四盃長令酒氣不絕為佳一法入杜仲一兩

炒絲斷

道六味地黄丸治腎虛腰痛

方見治法

丹婦人患腰痛此血分有熱

白芍錢五 生地錢四 當歸尾錢三 黃栢一錢半炒
白朮錢二 黃芩一錢半 木通錢一 甘草稍五分
川芎錢一

右分四貼煎取食前熱服

右地黃治腰痛例

十治腰痛

草薢

杜仲

枸杞根各

右三味咬咀好酒三斗漬之納罐內密封投於銅器中
煑一日服之無節取醉為度

產後
痛為虛

十一

義一姪婦瘧疾初安因衝風又發腰痛白濁已與參朮
枳榔半夏等補方又教以煑牡礪一錢木通五分炒栢三
分粗末入前方同煎
痢後腰痛兩腳無力

陳皮

半夏

白芍錢一

茯苓

蒼朮

當歸

黃芩酒五分

白朮錢二

甘草錢一

右作一服姜三片食前服

經行後
痛為虛

婦人月經行後腰痛為虛詳氣血虛於補氣血藥中加杜
仲側栢葉等藥

仲虛勞腰痛少腹拘急小便不利八味腎氣散主之方見治虛

實法

世治腰痛用葳靈仙丹溪云葳靈仙治痛之要藥為細末
每服二錢猪腰子一隻批開摻藥在內濕紙煨熟五更細
嚼熱酒下千金方用葳靈仙末一錢溫酒調下逐日以微
利為度病人稍虛禁用

本治腰腿痛氣滯藥基子

牽牛不以多少用新瓦火燒赤便以牽牛頓在瓦上自然一半熟一半生不得撥動取頭末一兩入硫黃一分同研勻分三服每用白麩一匙水和捏作碁子五更初以水一盞煮熟連湯送下痛住即止未住隔日再作予嘗有此疾每發只一服痛止

世治腰痛不可忍用牽牛不以多少研取頭末去滓不用取大蒜每一瓣擘開入巴荳肉一粒在內用濕紙裹定煨令蒜熟去巴荳將蒜研細和牽牛為丸如桐子大每服五丸醋湯茶空心食前量虛實服

本治五般腰痛

- 胡桃肉 五箇去皮研為膏
- 五靈脂
- 黑牽牛 炒
- 白牽牛 炒各三錢
- 狗脊 半兩微炒
- 草薺 三錢炒
- 沒藥 三十文
- 巴荳 五粒用濕紙裹煨取肉去油

右件為末將前胡桃膏醋糊丸如桐子大每服十五丸

風腰疼荳淋無灰酒下 氣腰疼煨葱白酒下 血

腰疼當歸酒下 打撲腰疼蘇木酒下

子和趙進道病腰疼一年不愈診其兩手脈沉重有力以通經散下五七行次以杜仲去粗皮細切炒斷絲為末每服三錢猪腰子一枚薄批五七片先以椒鹽淹去腥水摻藥在內裹以荷葉以濕紙數重封文武火燒熟臨臥細嚼溫酒送下每旦以無比山藥丸一服數日而愈通經散用陳皮當歸

甘遂為末每三錢臨臥溫酒調下

得於冷臥濕地為寒濕

羅獨活寄生湯治腎氣虛弱冷臥濕地腰腿拘急筋骨攣痛或當風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼

- 獨活
- 桑寄生
- 杜仲
- 牛膝

細辛

秦艽

茯苓

桂心

防風

芎藭

人參

甘草已上各兩半

當歸

芍藥

乾地黄各二兩

一方用續斷

三兩

右為粗末每服三錢水二大盞生姜五片同煎至七分

食前服

海防風湯治傷寒後腰痛或皮肉瘡痺腿膝疼痛行履艱

難不可俛仰

防風兩

麻黃去節

桂枝去皮

杜仲炙各七錢半

牛膝

五加皮

丹參各半兩

芎藭

附子

炮去皮臍一兩當歸

芍藥

羌活

續斷各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜二錢同煎食前服

垣川芎肉桂湯丁未年冬曹通甫自河東來有役人小翟

宿於寒濕之地腰痛不能轉側兩脇搐急作痛月餘不愈

腰痛論中所說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作痛

間有一二症屬少陽膽經外絡脈病皆宜去血絡之凝乃

愈其內經有云冬三月禁不得針只宜服藥通其經絡破

其血絡中敗血以此方主之

羌活一錢

柴胡一錢

獨活五分

肉桂

蒼朮各一錢

防風

漢防已各三分

桃仁五箇去皮另研

如泥

歸稍

甘草炙各一錢

炒麩五分

川芎一錢

右咬咀水酒煎去查食遠熱服

無小續命湯加炒去皮桃仁治風腰痛最妙方見中風

積散加桃仁治寒濕腰痛最効方見傷寒發熱

千杜仲酒治腎脈逆小於寸口膀胱虛寒腰痛胸中動通
四時用之方

杜仲

地黃各四兩

萆薢

羌活

天雄

蜀椒

芎藭

桂心

防風

秦艽

烏頭各三兩

五加皮

石斛各五兩

細辛三兩

瓜蒌根

地骨皮

續斷炒

桔梗

甘草各兩

右十九味咬咀以酒四斗漬四宿初服五合加至七八
合日再

本治久患腰痛

石甜瓜

一兩出蜀中

附子

炮五錢

冬瓜皮

冬瓜仁

檳榔

沒藥

烏藥各五錢

右為細末每服四錢溫酒調下臨臥時服服日只午後

平日膏桑厚味為熱腰重不冷為熱

申時先可晚食申時後不可食專候臨臥服

平日膏梁厚味之人腰痛皆是濕熱陰虛治見前陰虛

垣如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也於羌活勝濕湯中

加黃栢一錢附子五分蒼朮二錢羌活勝濕湯方見腎條

獨活湯治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活

防風

獨活

肉桂各三錢

甘草錢多二

歸稍錢五

桃仁

連翹錢五

漢防已

黃栢酒各一兩

澤瀉

大黃三錢

右咬咀每服五錢如麻頭大酒半盞水一盞去查熱服

立愈

羌活湯治腰膝無力沉重

羌活

防風一錢五分

甘草

生熟各五分

草薢

黃栢

葛根各五分

砂仁

錢一

陳皮

分六

知母二錢五分

黃芪二錢

蒼朮

升麻

獨活

柴胡各一錢

右為粗末作二服水二盞煎至一盞去查空心熱服

腰重冷如水者

仲腎着湯治身重腰冷如水痛重如帶千錢方見身重

為寒脈澁者為汚血

丹脈瀆者瘀血用補陰丸中加桃仁紅花補陰丸方見脈大條

世橘核散治腰痛諸般滯氣

山查子一兩

橘核五錢

破故紙二兩

乳香五錢

玄胡索

菴藺

沒藥

五加皮

紅麴各一兩

右為末酒調下

雲如神湯治男子婦人腰痛

玄胡索

當歸

桂心

杜仲各等分

右為末溫酒調下三錢甚者不過數服

無桃仁酒治腎虛風勞所傷毒腫掣痛牽引小腹連腰痛用桃仁麩皮炒去皮尖研細每服一錢七熱酒調下有汗即愈

跌撲傷損為汚血

垣地龍湯治腰脊痛或打撲傷損從高墜下惡血在太陽

經中令人腰脊痛或脛膈臂膊中痛不可忍鼻壅塞不通

中桂四分

桃仁六箇

羌活二錢

獨活

甘草

黃栢各一錢

麻黃五分

地龍四分

蘇木六分

歸稍一錢

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓食遠熱服

無橘核酒治打撲腰痛惡血瘀蓄痛不可忍用橘核炒去

皮研細每服二錢七酒調服或用猪腰子一箇去筋膜破

開入藥同葱白茴香鹽濕紙裹煨熟細嚼溫酒下

熟大黃湯治墜墮閃到腰痛不能屈伸

大黃

切如指大

生姜

切各半兩

右同炒令焦黃以水一盞浸一宿五更去查服天明取
下如雞肝者即惡物也

跌撲脈散大者補中消汚血

丹徐貨夫年六十因墜馬腰痛不可轉側六脈散大重取
則弦小而長稍堅予以為惡血雖有未可驅逐且以補接
為先遂令煎蘇木人參黃芪川芎當歸陳皮甘草服至半
月後漸散大飲食亦進遂與前藥調下自然銅等藥服一
月而安

治老人因擗撲腰痛

蘇木錢一

人參分五

歸頭身錢一

黃芪分五

陳皮錢一

木通分五

木香分五

右研桃仁九枚下接骨藥

食積食積腰痛

龜板酒炙

栢葉酒制

香附錢五

辣芥子

凌霄花錢一

右酒糊丸煎四物湯加陳皮甘草一分吞下

痰積痰積腰痛二陳湯加南星 食積痰積如脈有力者宜下
之

劉氣山劉氣腰痛香茶內滴入菜油數點頓服

腎膀胱素北風生於冬病在腎脬在腰金匱真言論 少陰所謂腰痛
者少陰者腎也十月萬物陽氣皆傷故腰痛也

太陽所謂腰脘痛者正月太陽寅寅太陽也正月陽氣出

在上而陰氣盛陽未得自次故腫腰脘痛也脈解

腰痛皆屬腎虛治法並見前陰陽虛條

腰痛皆屬腎虛治法並見前陰陽虛條

項脊痛項強腰似折項似拔衝頭痛乃足太陽經不行也

腰連脊項痛

宜汗 羌活勝濕湯主之

羌活

獨活錢各一

藁本

防風錢各一

蔓荊子分三

川芎分二

甘草分五

運氣腰痛有五

右件咬咀都作一服水二盞煎去一半去查溫服食後

一曰寒經云水鬱之發腰腫痛大關節不利屈伸不便又云太陽所至為腰痛之太陽之復腰腫反痛屈伸不便治以熱劑是也

二曰濕經云太陰司天濕氣下臨腎氣上從當其時反腰腫痛動轉不便又曰太陽在泉濕淫所勝病腰似折亦治以熱劑是也

三曰寒濕雜合經云太陰司天之政終之氣寒大舉濕大化病關節禁固腰腫痛治以燥熱是也

四曰燥經云陽明司天燥淫所勝病腰痛治以苦溫是也

雜方摩法

五曰燥熱風寒雜合經云少陰司天之政水火寒熱持於氣交民病腰痛初之氣寒乃始陽氣鬱民反周密關節禁固腰腫痛治以濕熱多寒清少也

丹摩腰丹治老人腰痛婦人白帶

附子尖

烏頭尖

南星錢各二

朱砂

樟腦

丁香錢各一

乾姜錢一

雄黃錢半

麝香五粒大者小則加之

右為末蜜丸如龍眼大每一丸用生姜汁化開如厚粥火上烘熱放掌上摩腰中候藥盡貼腰上即烘綿衣縛定腰熱如火間二日用一丸

貼法

世皂角膏治諸腰脚痠痛用好酒二大碗皂角一斤去皮弦搗碎熬至一半濾去查再用前汁入銀石器內熬為膏子隨痛處貼之

聖治風脚腰冷痺疼痛川烏頭三分去皮臍生為末好醋調塗於布帛上貼之痛即上

灸

山腰疼用牛皮膠化開生姜汁打勻貼痛處

遠足太陽脈令人腰痛引項脊尻皆如重狀刺其郄中太陽正經出血春無見血見刺腰痛篇下同○下註云郄中委中穴也

腰背俠脊而痛至頭几几然目眈眈欲僵什刺足太陽郄中出血几音殊引頸之貌項背強也

刺腰痛引項脊尻背三法此二法取足太陽出血也經云邪在腎腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩取之湧

泉崑崙視有血者悉取之此則足太陽少陰俱取血也

又云足太陽之脈是動則病衝頭痛目似眈項似板脊

痛腰似折此則視太陽盛虛熱寒陷下刺施補瀉疾留

灸以調之也

足少陰令人腰痛引脊內廉刺少陰於內踝上二瘡春

無見血出血太多不可復也王註云復溜穴也

刺腰痛引脊內廉此法出足少陰經血也經曰足少陰

之別名曰太鍾當踝後統踝別走太陽其病虛則腰痛

取之所別也此補足少陰絡也

少陽令人腰痛如以針刺其皮中循循然不可以俛仰不

可以顧刺少陽成骨之端出血成管在膝外廉之骨獨起

者夏無見血王註云成骨謂膝外近下脚骨上端兩起骨相並陷間容指者是按此謂陽陵泉穴

陽明令人腰痛不可以顧顧如有見者善悲刺陽明於胕

前三瘡上下和之出血秋無見血王註云三里穴也

衝絡之脈令人腰痛不可以俛仰仰則恐什得之舉重傷

腰衝絡絕惡血歸之刺之在郄陽筋之間上郄數寸衝居

為二瘡出血王註謂郄陽之間衝居二瘡為委陽股門二穴者非也今詳委陽正在郄外廉橫紋盡處

王註謂郄陽之間衝居二瘡為委陽股門二穴者非也今詳委陽正在郄外廉橫紋盡處

是穴非上郄也股門上郄一尺是穴非數寸也蓋郄陽筋者按郄內外廉各有一大筋上結於臂今謂外廉之大筋故曰陽筋也上郄數寸者謂上郄數寸於外廉大筋之兩間視其血絡盛者橫吾為二痛出血

刺腰痛不可俛仰四法上三法皆出血也經云肝足厥陰之脈是動則病腰痛不可以俛仰痠疝少腹腫此則

視虛實寒熱陷下施補瀉疾留灸以調之也腰痛引少腹控眇不可以仰刺腰尻交者兩髀脾上以月

生死為痛數發針立已左取右右取左王註云此邪客於足太陰之絡也控

通引也眇謂季脇下之空軟處也腰尻交者謂髀下尻骨兩傍四骨空左右八穴浴呼此骨為八髀骨也此腰痛取

腰髀下第四髀即下髀穴也足太陰厥陰少陽三脈左右交結於中故曰腰尻交者也兩髀脾謂兩髀骨下堅起肉

也脾上非脾之上巔正當刺脾肉夾直處即脾上也何者脾之上巔別有中膂肉俞白環俞雖並主腰痛考其形經

症不相應矣髀骨即腰脊兩傍起骨也俠脊兩傍腰髀之下各有脾肉隆起而斜起於髀骨之後內承其髀故曰兩

髀脾也下承髀脾肉左右兩脾各有四骨空故曰上髀次髀中髀下髀上髀當髀骨下陷者中髀三髀少髀下按之

陷中是也四空悉主腰痛唯下髀文與經同即太陰厥陰少陽所結者也○脾舒仁反髀若瓦反

刺腰痛引少腹控眇不可以仰取腰尻分間經文三出

此其一也繆刺論云腰痛引少腹控眇不可以仰息刺

腰尻之解兩脾之上是腰脰以月死生為痛數發針立

已左刺右右刺左又骨空論云腰痛不可以轉搖急引

陰卵刺八髀與痛上髀在腰尻分間此三節經文大同

小異通一法也又足厥陰之脈是動則病腰痛不可以

俛仰癢疝少腹腫視盛虛熱寒陷下調之此則證同法

異

陽維之脈令人腰痛痛上怫然腫刺陽維之脈脈與太陽

合端下間去地一尺所林註云承山穴也

飛陽之脈令人腰痛痛上怫然甚則悲以恐刺飛陽之

脈在內踝上五寸少陰之前與陰維之會築實穴也築實穴在內踝上臑

肉分間是穴

同陰之脈令人腰痛痛如小錘居其中怫然腫刺同陰之脈在外踝上絕骨之端為三疔王註云陽輔穴也

解脈令人腰痛痛而引肩目眈眈然時遺洩刺解脈在膝筋肉分間郄外廉之橫脈出血血變而止王註云膝外兩筋之間橫文之處

處筋肉高起則郄中之肉分也當取郄外廉有血絡橫見乃止愚按膝外廉筋肉分間即委陽穴是也

散脈令人腰痛而熱熱甚生煩腰下如有橫木居其中甚則遺洩刺散脈在膝前骨肉分間絡外廉束脈為三疔王註謂地機穴者非也既云膝前骨肉分間絡外廉束脈當在三里陽陵泉二穴上之骨上與膝分間是穴橫刺三疔也

昌陽之脈令人腰痛引膺目眈眈然甚則反折舌卷不能言刺內筋為二疔在內踝上大筋前太陰後上踝二寸

王註云交信穴也在內踝上二寸少陰前太陰筋骨間陰驕之郄也刺腰痛目眈眈有三此其一也若痛引肩遺洩者刺解

脈在郄外廉筋肉分間委陽穴也若痛引項脊欲俯者刺足太陽委中出血也

解脈令人腰痛如引帶常如折腰狀善恐刺解脈在郄中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血而已王註云郄中即委中穴也

會陰之脈令人腰痛痛上漯漯然汗出汗乾令人欲飲飲已欲走刺直陽之脈上三疔在躄上郄下五寸橫居視其

盛者出血王註云承筋穴也禁不可刺可灸三壯今云刺者謂刺其血絡之盛滿者也肉里之脈令人腰痛不可以欬欬則筋縮急刺肉里之脈

為二疔在太陽之外少陽絕骨之後王註云分肉穴也在足外踝直絕骨之端

如後同身寸之二分筋肉分間陽維脈氣所發也甲乙經作陽輔穴也厥陰之脈令人腰痛腰中如張弓努弦刺厥陰之脈在臑踵魚腹之外循之累累然乃刺之其病令人善言嘿嘿然

不慧刺之三疔王註云蠡陽穴分也

腰痛上寒刺足太陽陽明 上熱刺足厥陰 不可以俛

仰刺足少陽 中熱而喘刺足少陰刺郄中出血灸樞云

絡 腰痛上寒不可顧刺足陽明 上熱刺足太陰

刺腰痛篇取足太陽郄臑中間六法郄臑者膝後屈處

兩筋之間橫文臑內也太陰正經二法刺郄中央出血

解脈二法刺郄中橫文出血衛絡一法刺郄上數寸出

血會陰一法刺郄中下五寸出血也

羅張仲文傳神仙灸法療腰重痛不可轉側起坐艱難及

冷痺脚筋攣急不可屈伸灸曲蹠兩文頭左右脚四處各

三壯每灸一腳二火齊下艾炷纔燒至肉初覺疼使用二

人兩造齊吹至火滅午時着灸至人定已來臟腑自動一

二行或轉動如雷聲其疾立愈此法神効率不可量也

玉腎虛腰痛 腎臑取法以杖量與臑平去脊各一寸半灸二七壯 人中 委

中

撮腰強痛 命門灸二七壯十四椎節下間伏取之 崑崙瀉之灸亦瀉

摘忽然氣滯腰疼不可俛仰 志室五分得氣即瀉 行間 腰

脊內引痛不可屈伸 近上痛合谷 近下痛崑崙 復

溜 腰脊俱痛不可忍 風池 合谷 崑崙

桑又法 風池 承山 合谷 呂細 三間

東腰脊如痠 湧泉分 陰谷一寸 京骨分 行間分五

集腰閃到氣痛 尺澤灸忌 委中 人中 陽陵泉 束

骨 崑崙 下竅

羅腰痛不可俛仰轉側難身寒熱食倍多身羸面黃黑足

冷不仁腰重如石 腎臑灸五壯 中膂臑灸五壯 腰臑灸五壯

批腎虛腰痛久不已 肩井 腎臑灸五分七呼 腰痛刺

之不定者刺八膠見前針灸上條大虛腰痛刺而復發腰重不能舉體可刺委中動脈出血

潔腰痛在身之前足陽明原穴 身之後足太陽原穴 身之側足少陽原穴

甲腰痛脊急脇中滿小腹堅急志室主之 腰痛脊痛惡寒少腹滿墜癢閉下重不得小便胞盲主之 腰痛骹寒俛

仰急難陰痛下重不得小便秩邊主之 腰痛脊痛強引背少腹俛仰難不得仰息脚痿重尻不舉溺赤腰以下至足

清不仁不可以坐起膀胱膺主之 腰痛不可以俛仰中膺內膺主之 腰痛尻脊股髀陰寒大痛虛則血動實

則并熱痛痔痛尻腫中腫大便直出扶承主之 腰痛頸項痛歷節汗出而步履蹇復不仁膺中痛飛陽主之 大

腸實則腰背痺寒轉筋頭眩痛虛則鼻衄巔疾腰痛澱然

汗出令人飲食欲走承筋主之 腰痛不可舉足跟中蹶

後痛脚痿僕參主之 腰痛不能舉足少坐若下車躓地脛中矯矯然申脈主之 腰痛如小錘居其中憊然腫痛

不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常寒熱陽輔主之 腰痛控臑少腹及股卒俛不得仰刺氣街 腸臙肘寒

腰痛不得臥手三里主之 腰痛大便難湧泉主之 腰痛不可轉側章門主之 腰痛少腹痛陰包主之 腰痛

不可以久立俛仰京門及行間主之 腰痛少腹滿小便不利如癰羸瘦意恐懼氣不足腸中悒悒太衝主之 腰

足痛而清泄善嘔臑跳舉上窳主之 腰痛怏怏不可以俛仰腰以下至足不仁入脊腰背寒次窳主之 腰痛大

便難滄泄腰尻中寒中窳主之 腰痛小腹痛下窳主之 腎腰痛不可俛仰陰陵泉主之

摘閃着腰疼

氣海肥人一子瘦人五分三補三瀉令人覺臍上下痛
又停二十五息依前進針令人覺從外腎熱氣上入小腹出針神効 腰痛上寒實則脊

急長強主之

診

蓋腎脈搏堅而長其色黃而赤者當病折腰脈要精微論

帝曰有病厥者診右脈沉而緊左脈浮而遲不然病主何

在岐伯曰冬診之右脈固當沉緊此應四時左脈浮而遲

此逆四時在左當主病在腎頰關在肺當腰痛也病能痛不然二

字衍按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也微論

黑色粗理及耳後陷耳偏一邊高者善病腰痛經云黑色

粗理者腎大腎大則善病腰痛不可以俛仰又云耳偏高

者腎偏傾腎偏傾則苦腰尻痛是也

腎憊及盛怒傷志則腰失強不能轉搖而死經云腎者腰

之府轉搖不能腎將憊矣得强者生失强者死又云腎盛怒而不止則傷志志傷則善忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏是也

胎前腰痛

雲通氣散治妊娠腰痛狀不可忍此藥神效用破故紙不以多少瓦上炒香熟為末嚼胡桃肉一箇空心溫酒下三錢

五加皮散治妊娠腰痛不可忍或勝痛先服此散

杜仲四兩 五加皮 阿膠炙 防風

狗脊 川芎 白芍 細辛

葶藶各三 杏仁八十箇去

右咬咀以水九升煮取二升去渣下膠作三服

五加皮丸治妊娠腰痛不可忍者次服此丸

續斷炒

杜仲各二兩半

芎藭

獨活各三兩

五加皮

狗脊

草薺

芍藥

訶子肉各四兩

陰不足丹
仁六嫂有胎腰痛

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下四十九日三

白朮錢四

陳皮錢三

黃柏炒二錢半

人參

條芩

川芎

地黃

歸尾二分

甘草些

右分四貼水酒煎服

表

大紫酒治妊娠腰痛如折用大黑豇二合炒令香熟以酒

一大盞煮取七分去豇空心頓服

汚血

本治胎動腰痛捨心或下血取葱白不拘多少漚煮汁飲之

寒

天治妊娠腰背痛反覆不得產寶治妊娠卒腰痛俱用鹿角長六寸燒令赤酒中焯再燒再焯以角碎為度取酒飲之鹿角為末服方寸匕

雜方

肘率腰痛不安或腰痛胎轉捨心下血不止用菖蒲汁酒一升服之 妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉捨心或下血不止艾葉一把如雞子大以酒四升煮取二升分為二服良

產後腰痛

汚血

保治血癖腹乃刺刺腰痛用四物湯細末三兩加酒煮玄胡索細末二兩每服三錢酒下

雲紫金丸治產後惡寒不快腰痛小腹如刺寒熱腹痛久有瘀血月水不調亦可治心痛與失笑散同

五靈脂炒為末 真蒲黃各等分

右以好米醋調五靈脂末煨火熬成膏子次以蒲黃末搜和丸如櫻桃大每服一二丸水與童便各半盞煎至七分至藥化溫服之少頃再進一服惡露即下及有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

生地黄湯治產後腰疼腹中餘血未盡流為足腫不食

生地黄汁升一 芍藥 甘草各二兩 丹參四兩

生蜜合一 生姜汁合半

右切以水三升煮取一升去滓入地黄汁蜜姜汁微火煎一二沸一服三合日二夜三利一二行愈

大產後惡露方行忽然漸少斷絕不來腰中重痛者此由血滯宜桃仁湯如有大痛處必作癰疽當以癰疽法治之
桃仁湯方

桃仁 蘇木 生地黄各半兩 蜚虫去足炒

水蛭

右為粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服無時候惡露下即住服

脊痛脊強

針灸 灸刺脊痛脊強有三法

其一取督脈經云督脈之別名曰長強別走太陽實則脊強取之所別也

其二取足太陽經曰厥挾脊而痛者至項頭沉沉然目眩眩然腰脊強取足太陽胸中血絡是也

其三取小腸經云小腹控臑引腰脊上衝心邪在小腸取之盲原以散之刺太陰厥陰以下之取巨虛下廉以去之是也

玉脊脊并腰疼 人中口含水突處針入三分畧向上些但瀉無補留三吸 委中

二十半思灸又於四畔紫脈上去血如 三里 瀉 五樞

腰脊強不得俛仰刺脊中舉脊內廉痛便難陰痿不用

少腹急引陰及脚內廉內陰谷主之 男子脊急目赤支

溝主之 腰脊強四肢解墮善怒咳少氣鬱然不得息厥

逆肩不可舉陽乃痿身暈章門主之

診耳高者腎高腎高則苦背脊痛不可以俛仰全文見診

腎脈緩甚為折脊全文見治 虛實法

寒熱二厥 寒厥手足冷 熱厥手足熱

產後寒厥 脚氣頑麻腫痛為痺厥 足痿

不收為痿厥 脚氣衝心為厥逆 產脚氣

考 王太僕云厥者氣逆上也世謬傳為脚氣讀此始知其病

上古稱之為脚氣也經曰寒厥者手足寒也曰熱厥者手

足熱也曰痿厥者痿病與厥雜合而足弱痿軟無力也曰

痺厥者痺病與厥病雜合而脚氣頑麻腫痛也曰厥逆者

即前寒厥熱厥痿厥痺厥風厥等氣逆上而或嘔吐或迷

悶或脹或氣急或小腹不仁或暴不知人所謂脚氣衝

心者是也

寒熱二厥

大法 丹治厥因痰者用白朮竹瀝 因氣虛血虛者用四物四

君子 熱厥用承氣湯 外感用雙解散加姜竹瀝

寒熱二厥皆從 素黃帝曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為

寒厥陰氣衰於下則為熱厥帝曰熱厥之為熱也必起於

足下者何也岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於

足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱也帝曰寒厥之為

寒也必從五指而上於膝者何也岐伯曰陰氣起於五指

之裏集於膝下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上

寒其寒也不從外皆從內也

陽虛寒厥

帝曰寒厥何為而然也岐伯曰前陰者宗筋之所聚甲乙經筋作宗筋太陰陽明之所合也春夏則陽氣多而陰氣

少秋冬則陰氣盛而陽氣衰此人者質壯以秋冬奪於所

用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上也氣因

於中陽氣衰不能滲榮其經絡陽氣日損陰氣獨在故手

足為之寒也

帝曰熱厥何如而然也岐伯曰酒入於胃則絡脈滿而經

陰虛熱厥

脈虛脾主為胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入

則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不榮其四肢也此

人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散精氣壯則能消磨邪氣聚於脾中不得散於四肢也酒氣與穀氣相

搏熱盛於中故熱遍於身內熱而溺赤也夫酒氣盛而慄

悍腎氣日衰陽氣獨勝故手足為之熱也厥論寒熱二厥腎之精氣內竭

而成也

子和西華李政之病寒厥其妻病熱厥前後十餘年其妻

二厥治驗

服逍遙散十餘劑終無可效一日命予診之二人脈皆浮

大而無力政之曰吾手足之寒時時漬以熱湯漬而不能

止吾婦手足之熱終日沃以冷水沃而不能已者何也予

曰寒熱之厥也此皆得之貪飲食縱嗜慾遂出內經厥論

證之政之喜曰內經真聖書也十年之疑今而釋然縱不

服藥愈過半矣僕曰熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也

寒在上者以溫劑補肺金熱在上者以涼劑清心火分取

二藥令服之不輒不旬日政之詣門謝曰寒熱厥者皆愈

矣

針灸

靈厥逆為病也足暴清胸若將裂腸若將以刀切之煩而

不能食脈大小皆濇煖取足少陰清取足陽明清則補之
溫則瀉之顛狂

寒厥手足冷

脈沉實
數為熱

寒厥脈沉數實為熱東垣治中書貼合公脚膝尻醫背冷
脈沉數有力用黃柏滋腎丸再服而愈又治中書左丞姚
公茂上熱下寒用既濟解毒湯良愈丹溪治呂宗信腹有
積塊足冷至膝用大承氣加減下之愈此皆寒厥有熱也

脈沉細
微為寒

羅征南副元帥大感木兒年六十秋七月征南予從之過
揚州千里時仲冬病自利完穀不化臍腹冷痛足胕寒以
手搔之不知痛痒常燒石以溫之亦不得煖予診之脈沉
細而微予思之年高氣弱深入敵境軍務煩冗朝夕形寒
飲食失節多飲乳酪履於卑濕陽不外固由是清濕襲虛
病起於下故胕寒而逆內經云感於寒而受病微則為咳

盛則為泄為痛此寒濕相合而為病也法當急退寒濕之
邪峻補其陽非灸不能病已先以大艾炷於氣海灸百壯
補下焦陽虛次灸三里各三七壯治胕寒而逆且接引陽
氣下行又灸三陰交以散足受寒濕之邪遂處方云寒淫
所勝治以辛熱濕淫於外平以苦熱以苦發之以附子大
辛熱助陽退陰溫經散寒為君乾姜官桂大熱辛甘亦除
寒濕白朮半夏苦辛溫而燥脾濕故以為臣人參草薤菖
甘草大溫中益氣生姜大辛溫能散清濕之邪葱白辛溫
能通上焦陽氣故以為佐又云補下治下制以急急則氣
味厚故大作劑服之不數服瀉止痛減足胕漸漸溫調其
飲食十日平復明年秋過襄陽值霖雨閱旬餘前症復作
再依前灸添陽輔各灸二十壯再以前藥投之數服愈
加減白通湯治形寒飲冷大便自利完穀不化臍腹冷痛

足胛寒而逆

附子炮去

乾姜炮各

官桂皮

甘草炙

草薹寇

煨

半夏湯泡

人參

白朮各半

右剉每服五錢水二盞半生姜五片葱白五莖煎一盞三分去查空心宿食消盡温服

臟腑經

寒厥皆屬腎虛經云腎藏志志不足則厥又云腎虛則清厥意不樂又云下虛則厥又云諸厥固泄皆屬於下是也
靈黃帝曰少陰之脈獨下行何也岐伯曰不然夫衝脈者五臟六腑之海也五臟六腑皆稟焉其上者出於頰頰滲諸陽灌諸精其下者注少陰之大絡出於氣衝循陰股內廉入膕中伏行胛骨內下至內踝之後屬而別其下者並于少陰之經滲三陰其前者從行出跗屬下循跗入大指間滲諸絡而温肌肉故別絡結則跗上不動不動則厥厥

運氣

則寒矣

逆順肥瘦篇○經云經絡堅緊火所治之蓋灸以治之或易酒漬之也

運氣寒厥有二

一曰寒經云水平氣曰靜順靜順之紀其病厥又云歲水太過寒氣流行邪害心火火爆陰厥又云歲金不及炎火乃行復則病陰厥且裕是也

二曰寒濕經云太陰司天之政天氣下降地氣上騰民病寒熱是也

雜方

千治丈夫脚腰冷不隨不能行方上醇酒三斗水三斗合着甕中温漬至膝三日止冷則甕下常着灰火勿令冷

鍼灸

靈厥而寒甚骨廉陷下寒過於膝下陵三里陰絡所過得之留止寒入於中推而行之經陷下者火則當之經絡堅緊火所治之不知所苦兩躄之下男陰女陽良工所禁針論畢矣官能篇兩躄之下寒厥取足陽明少陰于足皆

留之

寒熱病篇

右灸刺寒厥二法補虛也經云足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥取之所別此法瀉實也又經云亂于臂臑則為四厥取之先去血脈後取其陽明少陽之榮輸此法治亂氣不補不瀉但徐出入導氣也

垣經云厥在於足宗氣不下脈中之血凝而留止非火調弗能取之

鑿身熱如火足冷如水可灸陽輔穴又云胫痠冷絕骨取之

甲厥甚取太陰陽明動者之經 足厥喘逆足下清至膝湧泉主之 寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕痒痛不可以食飲肘攣支滿喉中焦乾渴魚際主之 膝以下至

足清不仁不可以坐起尻不舉腰膕主之

熱厥手足熱

陰虛

丹可丞叔平生脚自踝以下常覺熱冬不可加綿於上常自言曰我資稟壯不怕冷予曰此是三陰虛宜斷慾事以補養陰血庶乎可免笑而不答年方十七患痿半年而死

鍼灸

手足煩者小便三升盆中溫漬手足

素熱厥取足太陰少陽皆留之

寒熱病篇

產後寒厥

鍼灸

產後手足冷逆 肩并竝

脚氣頑麻腫痛為痺厥

寒熱

垣脚氣之疾實水濕之所為也蓋濕之害人皮肉筋脈而屬於下然亦有二焉一則自外而感一則自內而致其治法自應不同故詳而論之其為病也有證無名脚氣之稱

自晉蘇敬始關中河朔無有也惟南方地下水寒其清濕之氣中於人必自足始故經曰清濕襲虛則病起於下或者難曰今茲北方其地則風土高寒其人則腠理緻密而復多此疾者豈是地濕之氣感之而為邪答曰南方之疾自外而感者也北方之疾自內而致者也何以言之北方之人常食潼乳又飲酒無節過傷而不厭且潼乳之為物其氣味則潼乳其形質則水也酒醴亦然人之水穀入胃胃氣蒸騰其氣與味宣之於經絡化之為血氣外榮四末內注五臟六腑周而復始以應刻數焉是謂天地之紀此皆元氣充足脾胃之氣無所傷而然也苟元氣不充則胃氣之本自弱飲食既倍則脾胃之氣有傷既不能蒸化所食之物其氣與味亦不能宣暢旁通其水濕之性流下而致之其自外而入者止於下脛腫而痛自內而致者乃或

至於手節也經云足脛腫曰水太陰所至為重肘腫此但言其自外者也所治之法前人方論備矣自內而致者治法則未有也楊太受云脚氣是為壅疾治以宣通之劑使氣不能成壅也壅既成而盛者砭惡血而去其重勢經曰畜則腫熱砭射之後以藥治之 按東垣論南方脚氣外感清濕作寒治北方脚氣內傷酒醴作濕熱治此實發前人之未發者以人論之不必以南北分寒熱凡外感寒濕者皆屬寒濕不必南方為然凡內傷酒醴者皆屬濕熱不必北方為然但隨脈症及詢其病之由來而施治可也素臥出而風吹之血凝於膚者為痺凝於脈者為泣凝於足者為厥此三者血行而不得反其空故為痺厥也五臟生

外感寒濕

冬苦病痺厥

全文見五厥

垣孫真人云凡四時之中皆不得久坐久立濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣洗足當風取涼皆成脚氣若暑月久立濕冷之地者則濕熱之氣蒸人經絡病發必熱則四肢皆痠疼煩悶若寒月久坐久立濕冷之地者則冷濕之氣上入經絡病發則四肢皆酷冷轉筋世有勤工力學之士久坐久立於濕地不得動靜冷風來入經絡不覺成病也若欲使之不成病者初覺則灸患處二三十壯則愈不復發熱黃帝云當風取涼醉以入房能成此病又云婦人產後取涼多有此疾深宜慎之內經論南方者其地下水土弱霧露之所蒸也江東嶺南大率如此春夏之交山林蒸鬱風濕毒氣爲甚足或感之遂成瘴毒脚氣其候則脚先屈弱漸至痺疼脛微腫小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時作寒熱便溲不通甚者攻心而勢逼治之誠不可緩支

法存所以留意經方偏善此術者豈非江右嶺表此疾得之多歟

千外臺總錄所錄皆謂南方卑濕霧露所聚之地其民腠理踈陽氣不能外固因而履之則清濕襲虛病起於下此因血虛氣弱受清濕之邪氣與血併行於膚腠邪氣盛正氣少故血氣濇濇則痺虛則弱故令痺弱也後人名曰脚氣針經云有道以來有道以去治之多以灸熯爲佳以導引濕氣外出及飲醪醴以通經散邪所制之方寒藥少熱藥多多用麻黃川烏姜附之屬內經云濕淫於外以苦發之麻黃苦溫發之者也川烏辛熱走而不能守通行經絡姜附辛甘大熱助陽退陰亦能散清濕之邪又察足之三陰三陽是何經絡所起以引用藥爲主治復審六氣中何氣當之治以佐使之藥孫真人云醫者意也隨時增損初

無定方真知言哉

脈分三

千風毒之氣入人體中脈有三品內外證候相似但脈有異耳 若脈大而緩宜服續命湯二劑立瘥若風盛宜作越婢湯加白朮二兩若脈浮大而緊轉駛宜作竹瀝湯又云脈浮大而緊駛此最惡脈也若細而駛者同是惡脈浮大者病在外沉細者病在內治亦不同 病人脈微而弱宜服風引湯此人脈多是因虛而得之若大虛短氣力乏可間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯即止

活治脚氣屬冷者小續命湯煎成旋入生姜自然汁服之最快續命方見前中風門

仲越婢加白朮湯見產瘕厥門

千第一竹瀝湯治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

脈浮大而緩者宜續命越婢

脈浮大而緊者宜竹瀝湯

竹瀝五升

甘草

秦艽

葛根

黃芩

麻黃

防風

細辛

桂心

乾姜各一兩

防已

升麻各一兩半

茯苓三兩

附子二枚

杏仁五十枚

右咬咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗千金翼方無茯苓杏仁有白朮一兩

第二大竹瀝湯治卒中風口噤不能言四肢縱緩偏痺攣急風經五臟恍惚恚怒無常手足不隨方

竹瀝一升四合

獨活

芍藥

防風

茵芋

甘草

白朮

葛根

細辛

黃芩

芎藭各二兩

桂心

防已

人參

石膏

麻黃

生姜

茯苓各一兩

烏頭一枚

右咬咀竹瀝每服四升分六服先未汗者取汗一服相
當即止

第三竹瀝湯治風毒入人五臟短氣心下甚熱手足煩疼
四肢不舉皮肉不仁口噤不語方

竹瀝二升 防風 茯苓 秦艽各三兩

當歸 黃芩千金翼作白芎 人參 芎藭千金作防已

細辛 桂心 甘草 升麻千金作通草

麻黃 白朮各二兩 附子二枚 蜀椒一兩

葛根五兩 生姜八兩

右咬咀以竹瀝煮取四升分五服初得病即須摩風膏
日再痺定止千金翼無麻黃蜀椒生姜

風引湯

麻黃 石膏 獨活 茯苓各二兩

吳茱萸 附子 秦艽 細辛

桂心 人參 防風 芎藭

防已 甘草 乾姜已上各一兩 白朮三兩

杏仁六十枚

右咬咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗為度
右六方表劑

服前禁
苦張滿
者宜下

竹瀝湯若不及熱服輒停在胸膈更為人患每服當使極
熱若服竹瀝湯得下者必佳也若加服數劑病及脈勢未
折而苦脹滿者可以大鱉甲湯下之湯勢盡而不得下可
以丸散助湯令下下後更服竹瀝湯令脈勢折將息料理
乃佳

大鱉甲湯治脚弱風毒攣痺氣上及傷寒惡風濕毒山水
瘴氣熱毒四肢痺弱方

驚甲兩二

防風

麻黃

白朮

石膏

知母

升麻

茯苓

橘皮

芎藭

杏仁去皮

人參

半夏

當歸

芍藥

萎蕤

甘草

麥門冬各一兩

羚羊角六銖

大黃一兩半

犀角

雄黃

青木香各半兩

大棗二十枚

貝齒

烏頭七枚

生姜一兩

薤白十四枚

麝香二銖

赤小豆合

吳茱萸五合

右咬咀以水二斗煮取四升分六服去查食前溫服如

人行十里久得下則止一方用大黃半兩煨畏下可止

用六銖一方用羚羊角五錢毒盛可用六銖胡洽有山

千金翼無知母升麻橘皮芎藭人參當歸萎蕤

右治寒濕屬裏

兼補雅方

仲烏頭湯治脚氣疼痛不可屈伸

方見歷節注疼痛

千麻黃湯治風惡毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不

能言毒氣衝心有人病者但一病相當即服此第一服次

第二服第三第四方

麻黃

大棗二十枚

茯苓三兩

杏仁三十枚

防風

白朮

當歸

升麻

芎藭

芍藥

黃芩

桂心

麥門冬

甘草各二兩

右咬咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日

三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服獨活湯方

獨活四兩

熟地三兩

生姜五兩

葛根

桂心

甘草

芍藥

麻黃各二兩

右咬咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日
三夜一脚弱時忌瓠子豉菜犯之一世治不愈

第三兼補厚朴湯并治諸氣咳嗽逆氣嘔吐方

厚朴 芎藭 桂心 熟地

芍藥 當歸 人參各二兩 黃芪

甘草各三兩 吳茱萸二升 半夏七兩 生姜一斤

右咬咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上肥

內入清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十

里久更進服

第四服風引獨活湯兼補方

獨活四兩 茯苓 甘草各三兩 升麻一兩

人參 桂心 防風 芍藥

當歸 黃芪 乾姜 附子各二兩

大葶升二

右咬咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相去

如人行二十里久更進服

本益氣血補肝腎祛風濕壯脚膝地黃丸

熟地一兩 牛膝 石斛各三兩 肉蓯蓉

茵芋 防風 川芎 桂心

五味子 附子 薏苡仁各半兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十九酒吞下空心

食前服

治腰脚走注痛此是脚氣宜薏苡丸

薏苡仁 茵芋 白芍藥 牛膝

川芎 防風 獨活各半兩 熟地

側子一升 桂心 橘紅

右細末煉蜜丸如桐子大每服三四丸酒下食前日
三服木瓜湯下亦得

三因勝駿丸治元氣不足真氣虛弱及諸虛寒濕氣進襲
手足拳攣脚脂連脚面拘急走注疼痛筋脈不伸行步不
隨常服益真氣壯筋骨黑髮鬚滑皮膚及去一切足弱鶴
膝風

附子一枚炮皮當歸酒浸一宿天麻酒浸牛膝酒浸

酸棗仁炒熟地酒浸防風各二兩木瓜四兩

乳香半兩研全蝎去毒一兩麝香二錢別研木香

沒藥另研羌活 甘草各半兩

右件為細末用生地黄三斤洗淨研爛如泥無灰酒四
升煮爛如膏以前藥勻和杵令堅每兩作十丸每服用
一丸細嚼臨睡酒下如冬月無地黃煉蜜丸如桐子大

每服五十九鹽湯下酒亦可服此藥五七日或半月見

效甚速行履如飛千里可至故名勝駿一方加槓榔草

巴戟木瓜各一兩減當歸地黃各一兩尤妙

雲蒼朮丸治乾濕脚氣筋脈拘攣疼痛不能行

乳香 沒藥各二兩研牛膝 青鹽各半兩

熟艾錢四川烏錢三全蝎炒二錢蒼朮米泔浸

右為細末共研藥和勻以木瓜一箇大者切一頭留作
蓋去穰入上件藥於內將蓋拴定安木瓜於黑葦中蒸
令極爛取出去皮連藥研成膏却入生蒼朮末拌勻丸
如桐子大每服五十九空心木瓜湯下以溫鹽酒亦可
日三服忌血與葷

本治腰脚筋骨痠無力酒浸牛膝丸

牛膝三兩川椒半兩去子并杏仁者附子一箇炮去皮臍

虎脛骨

真者半兩
醋炙黃

右咬咀用生絹作袋入藥紮口用煑酒一斗春秋浸十日夏浸七日冬浸十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥為末醋糊為丸每服二十九空心温酒鹽湯任下忌動風等物

內傷濕熱

丹脚氣須用提起其濕之在下者藥隨氣血用

治腫痛方

生地

黃栢

酒炒

蒼朮

酒炒

白朮

防風

檳榔

川芎

犀角

甘草梢

木通

黃連

熱加苓連

痰加竹瀝姜汁

及時令熱加石膏大

便秘加桃仁

小便澀加牛膝

有食積流注者

蒼朮

黃栢

防已

南星

川芎

白芷

犀角

檳榔

血虛加牛膝龜板 有如常腫者專主濕熱肥人加痰藥

一婦人足腫

生地

黃栢

蒼朮

南星

牛膝

酒洗

草龍膽

川芎

脚弱筋痛

牛膝

二兩

白芍

半兩

龜板

酒炙

黃栢

炒一兩

知母

炒一兩

甘草

炙半兩

右為末酒糊為丸

垣異法方宜論云北方者其地高陵居風寒冷冽其俗飲潼酪而肉食凡飲潼酪以飲多飲速者為能經云因而大

飲則氣逆又云食入於陰長氣於陽今乃反行陽道是為逆也夫乳酪醇酒者濕熱之物飲之屬也加以奉養太過亦滋其濕水性潤下氣不能收故下疰於足脛積久而作腫痛此飲食下流之所致也通評虛實論云穀入多而氣少濕居下也況潼酪醇酒之濕熱甚於穀者也至真要大論云太陰之勝火氣內鬱流散於外足脛附腫飲發於中附腫於下此之謂也故飲入於胃游溢精氣上輸於脾胃氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也若飲食自倍脾胃乃傷則胃氣不能施化脾氣不能四布故下流乘其肝腎之位疰於足脛加之房事不節陰盛陽虛遂成痼疾孫真人云古人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有之亦此意也

當歸拈痛湯治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利兼遍身疼痛流注手足足脛腫痛不可忍

羌活

甘草

黃芩

茵陳

人參

苦參

升麻

葛根

蒼朮

歸身

知母

澤瀉

猪苓

白朮

防風

水煎不拘時候

本草十劑云宣可去壅通可去滯內經云濕淫所勝治以苦溫羌活苦辛透關節勝濕防風甘草溫散經絡中留濕故以為君水性潤下升麻葛根苦辛平味之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白朮苦甘溫和平除濕蒼朮體輕浮氣力雄壯能除膚腠間濕故以為臣夫血壅而不流則為痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草

甘溫補脾養正氣使苦藥不能傷脾胃仲景云濕熱相合
肢節煩疼苦參黃芩知母茵陳苦寒乃苦以泄之者也凡
酒制炒以為因用治濕不利小便非其治也猪苓甘溫平
澤瀉鹹平淡以滲之又能導其留飲故以為佐氣味相合
上下分流其濕使壅滯之氣得宣通也

右咬咀每服一兩水二盞半浸藥少時煎至一大盞去
查溫服空心待少時以美饌壓之臨臥一服不須飯壓
羅中書粘合公年四旬有一體幹魁梧丙辰春從征至楊
州脚氣忽作遍身肢體微腫其痛手不能近足脛尤甚履
不任穿跣以騎馬控兩蹬而以竹器盛之以困急來告予
思內經有云飲發於中肘腫於上又云諸痛為實血實者
宜決之以三稜針數刺其腫上血突出高二尺餘漸漸如
線流於地約半升許其色黑紫頃時腫消痛減以當歸拈

痛湯一兩半服之是夜得睡明日再服而愈

肘風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但勤飲烏髀牛溺二三
升使小便利漸漸消當以銅器取新者為佳純黃者亦可
用

便溺阻
隔心下
痞滿宜
微下之

垣楊太受云脚氣之疾自古皆尚踈下為疾壅故也然不
可太過太過則損傷脾胃使營運之氣不能上行反下注
為脚氣又不可不及不及則使壅氣不能消散今立三方
於後詳虛實而用之

羌活導滯湯治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻
隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯除之

羌活

獨活各半

防已三錢

大黃酒煨一兩

當歸三錢

枳實三錢

右咬咀每服五錢或七錢水二盞煎至七分溫服微利

則已量虛實加減

開結導飲丸飲食不消心下痞悶

陳皮

白朮

澤瀉

茯苓

麴

麥蘖

半夏

枳實

青皮

乾姜

各半兩

如有積塊者加巴豆霜半錢

右為末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三五十九至七

十九溫湯下食遠服

又方治濕熱并諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫

檳榔

甘遂

赤芍

葳靈仙

澤瀉

葶藶

乳香

研各二兩

沒藥

研一兩

牽牛兩

大戟

炒三兩

陳皮

四兩

右為末麴糊為丸如桐子大每服五十九加至七八十

丸食前溫水送下得更衣止後服前藥忌酒二日又忌

麴及甘草三兩日食溫淡粥補胃

乙巳春廉平章年三十八身體充肥脚氣始發頭面渾身
肢節微腫皆赤色足脛赤腫痛不可忍不敢扶策手着皮
膚其痛轉甚起而復臥而復起晝夜苦楚難以名狀求
予治之平章以北土高寒故多飲酒積久傷脾不能運化
飲食下流之所致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半
再服腫痛悉除止有右手指末微赤腫以三稜針刺於爪
甲端多出黑血赤腫全去不數日因食濕麴肢體覺痛再
以枳實大黃湯治之

羌活一錢

當歸一錢

枳實五分

大黃酒煨三錢

夫脚氣之疾皆水濕之為也麴滋其濕血壅而不行故肢
節煩疼內經曰風能勝濕羌活辛溫透關節去濕故以為

主血留而不能行則痛當歸之辛溫散壅止痛枳實之苦寒治痞消食故以為臣大黃苦寒以導麪之濕熱併治諸老血留結取其峻駛故以為使也

右咬咀只作一服水一盞半煎至一盞去查溫服空心食前利下兩行痛止

世脚氣控涎丹加麩脂一錢檳榔木瓜各一兩卷栢半兩先以鹽水煮半日次日白水煮半日同前藥為丸每三十丸加至四五十丸服下惡物立効控涎丹方見走注疼痛

衍有人嗜酒日須五七十盃後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉炒同為末熟蜜為丸溫水下五七十九仍禁酒遂愈

本治風氣積滯成脚氣常覺微腫發則或痛茵芋丸

茵芋炒

薏苡仁

各半兩

郁李仁

兩

牽牛子

三兩生取

末一兩半

右細末煉蜜丸如桐子大每服二十九姜葱湯下未利加至三十九日三快利為度白粥補之

腎藏風症

治腎藏風攻注脚膝方

連珠甘遂兩

木鱉子

一雌一雄去殼

右為末獐猪腰子二箇批開用藥末一錢摻勻濕紙裹數重火煨熟放溫五更初細嚼米飲下積水多則利

多少則利少宜軟飯將息若患一脚須看左右如左脚用左邊腰子右脚用右邊腰子藥末止許一錢壬子年在毘陵有姓馬人鬻酒久不見因問其子云宿患腎臟

風今一足發腫如瓠自腰以下巨細通為一律痛不可忍欲轉側兩人挾持方可動或者欲以鉞刀決之予曰不可吾有藥當合以贈如上法服之辰巳間下膿水數

升卽時痛止腫退一月後尚拄拐而行予再以赤烏散
令塗貼其膝方愈後十年至毘陵率其子列拜以謝云
向脚疾至今不復作雖積年腎臟風併已失去今健步
自若矣

草有人重病足不履地者十年良醫殫技莫能治所親置
之道傍以求救者遇一遊僧見之告曰此疾一藥可治但
不知此土有否因爲之入山求索果得乃葳靈仙也使服
之數日能步履其後山人鄧思濟知之遂著其法云採得
陰乾月餘搗篩溫清酒和二錢七空心服之如人本性殺
藥可加及六錢七利過兩行則減之病除乃停服其性甚
善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

集治腎臟風壅積腰膝沉重葳靈仙末蜜和丸如桐子大
初服酒下八十九平明微利惡物如青膿桃膠卽是風毒
積滯也如未動夜再服一百丸取下後喫粥補之一月仍
當服溫補藥

子和息帥腰股沉痛行步坐馬皆不便或作脚氣寒濕治
之或作虛損治之烏附乳沒活血壯筋骨之藥無不用之
至六十餘日目赤上熱大小便俱瀉腰股之病如故戴人
診其兩手脈皆沉遲沉者在裏也宜泄之以舟車丸瀆川
散各一服去積水二十餘行至早晨服蠶白粥一二頓與
之上馬已能矍鑠矣 棠溪李十八郎病腰脚大不伸偃
僂跛躄而行已數年矣服藥無功止藥卻愈因秋暮涉水
病復作醫氏使服四斤丸其父李仲安乃乞藥於戴人戴
人曰近日服何藥仲安曰四斤丸曰目昏赤未其父驚曰
目正暴發戴人曰宜速來不來則喪明矣始來策杖而行
目腫無所見戴人先令涌之藥下忽走二十行兩目頓明

策已棄去比再涌泄能讀官曆日調一月令服當歸九健步而歸矣

虛

仲味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄醜則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不得獨行榮衛俱微三焦無所稟四續斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發便為歷節桂枝加黃芪湯之類治之

丹恂妳脚底如錐刺痛或肘腫手腕亦痛而腫大便泄滑裏急此血少又下焦血分受濕氣為病健步丸主之手腕足

生地一兩半 蒼朮 芍藥 陳皮各一兩

大腹子三錢 牛膝兩 歸尾 茱萸

黃芩各一兩 桂枝三錢

右為丸每服百丸白木通草煎湯食前下之

三因十全丹治腳氣上攻心腎相擊足心隱痛小腹不仁煩渴小便秘或利關節攣皮疼痛神効不可具述

肉蓯蓉酒浸 石斛酒浸 狗脊去毛 萆薢

茯苓 牛膝酒浸 地仙子 遠志去心炒

熟地三兩 杜仲去皮炒

右為末蜜丸如桐子大每服五十九丸温酒鹽湯任下

本治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊疼痛風毒流注下經行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中益氣涼血強筋骨益智輕身耐老續斷丸

思仙木五兩印 五加皮 防風

薏苡仁 羌活 川續斷各三兩 萆薢兩

生地五兩 牛膝酒浸

右為末好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以

鹽酒煮木瓜成膏和杵丸如桐子大每服三五十九空心食前溫酒鹽湯下

本療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以草薺二十四分合杜仲八分搗篩每日溫酒和服三錢七增至五錢忌食牛肉

活薏苡仁酒治脚痺

薏苡仁

牛膝各二兩

海桐皮

五加皮

獨活

防風

杜仲各一兩

熟地一兩

白朮半兩

右剉為粗末散入生絹袋內用好酒五升浸春秋冬二七日夏月盛熱分作數貼逐貼浸酒每日空心溫服一盞或半盞日三四服常令酒氣醺醺不絕久服覺皮膚下如數百條虫行即風濕氣散

本去風補血益氣壯筋骨強脚力虎骨酒

虎脛骨真

草薺

仙靈脾

薏苡仁

牛膝

熟地各二兩

右細剉絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百日

婦人去牛膝

丹六七叔婆血少氣多大便後脚痛而麻

當歸二錢半

芍藥

白朮二錢

陳皮

青皮一錢

地黃一錢半

川芎五分

甘草少些

桃仁十八箇

右分二貼煎

實

脚氣壅腫便溺阻隔心下痞滿飲食不消宜微利之方見內傷

濕熱

肺實宜吐宜汗

脚氣多屬肺氣實經云肺病者汗出尻陰股膝臑胫足皆痛故戴人治脚氣用涌法者良由此也又千金方多汗

之者亦瀉肺之法也今集踈肺氣之方于左

子和魏德新因赴冬選犯寒而行真元氣衰加之坐臥冷濕飲食失節以冬遇此遂作骨痺骨屬腎也腰之高骨壞而不用兩膝似折面黑如炭前後膝痛痿厥嗜臥徧問諸醫皆作腎虛治之予先以玲瓏竈慰蒸數日次以苦劑上涌寒痰三二升上實下虛明可見矣次以淡劑使白朮除脾濕茯苓養腎水又刺腎膈太溪二穴二日一刺前後一月平復如故 孫少府監韓彥正暴得疾手足不舉諸醫皆以為風針手足亦不知痛遂召孫診之孫曰此脚氣耳用檳榔末三錢生姜三片乾紫蘇七葉陳皮三錢水一大盞煎至七分去渣熱服數次而愈

治脚腫者檳榔散主之

陳皮一大

蒼朮炒一

酒半盞同已土藥煎

右煎數沸調檳榔末二錢食後服

聖治脚氣及風寒濕四肢攣急脚疼不可踐地用紫蘇二兩搗碎水三升研取汁以蘇子汁煮粳米粥二合和葱豉椒姜食之即止

右檳榔紫蘇例

雜方

世治一切脚氣奇方用川山甲前兩足者燒存性研細入麝香當門子少許多少隨人斟酌要服此藥須去他事至晚不可進飲食候至夜深腹空時調服坐臥隨意及雞鳴又一服痛立止過一二日便能步履如常極妙如神
干治脚氣十二風痺不能行松葉酒用松葉六十斤細剉咬咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法另煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日後澄飲之取醉得此酒力者甚衆

本虎骨酒治腰脚痛疼攣急不得屈伸及腿膝冷麻用虎骨一具及脛骨二莖酥炙黃槌碎無灰酒三斗密封七日空心晚食酒隨意飲

崔治腰脚蒸法取黃荆葉不限多少蒸熟熱置於甕中其下着火温之以病人置於葉中須臾汗出葉中旋旋喫飯稍倦即止以綿衣蓋避風仍進葱豉酒以瘥為度

世治諸般脚氣一服除根

防風去一錢

羌活

蟬蛻各三

薄荷分五

紫蘇分四

右曬乾為末每服五錢以無灰酒半碗熱調服訖服至一時久即煎後藥湯傾桶內披厚衣於桶上坐勿令走了藥氣將脚腿薰之當自下而上汗出直至頂門其出如水盡為度薰洗用

紫蘇斤半

忍冬花兩四

木饅頭七

蘇木兩二

右為粗末水一中樣桶煎藥味出分三度添用只一用永除根

南方忌洗北方宜洗

壇脚氣溲洗法 活人書曰凡脚氣服補藥及用湯溲洗皆醫之大禁也為南方外感濕氣乘虛襲人為腫痛而言非為北方內受濕氣注下腫痛而言也蓋濕氣不能外達宜淋溲開導泄越其邪名曰導氣除濕湯

葳靈仙

防風

荆芥穗

當歸

地骨皮

升麻

白芍

菟藿葉

右等分剉細水二斗煮取一斗五升去查熱淋洗無時

世治脚赤腫杉皮煎濃湯洗數次立愈本草云用杉節殊効

千治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼者用草蓆子葉切蒸薄裹三二易即消 治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿

裹法

連骨疼者葫蘆根剉碎和酒醋共三分根一分合蒸熟封裹腫上二三日即消亦治不仁

簡治脚氣連腿腫滿久不瘥方黑附子一兩去皮臍生用搗為散生姜汁調如膏塗傳腫上藥乾再塗之候腫消為度

山治脚氣用無名異化牛皮膠調勻貼患處

世治遠行脚腫用之可行千里輕便甚妙

防風 細辛 草烏

右等分為末摻內鞋底內如着前鞋即以水微濕過然後摻藥

食法

食療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和姜椒葱白鹽醬作腌腊空腹食之

針灸 **五**針脚氣腫痛 三里 骨各二 丘墟 針入一 行

間五分留八 解谿 針入五分 瀉之 商丘 針入五分 瀉之

撮治脚氣諸穴隨經選用之 陷谷 瀉之 行谷 五分瀉

中封 瀉之 俠谿 先瀉後 陽輔 絕骨 各二寸半瀉之

通谷 一分瀉

東陽脚氣針灸大法 此法與千金同恭服藥

風市 百壯三報穴正身平立 伏菟 病人端坐離膝蓋

按捺上有肉起如兔狀是 犢鼻 五十壯 膝眼 壯二十

穴可灸五十壯三報穴 絕骨 各五十壯凡上項諸穴不

報灸之三日令盡壯數為佳凡一頓灸盡壯數可日

病灸兩脚弱者看輕重加減不可執一靈驗不可述也

痛鵠又脚氣 腎氣 各四寸 肩井 三里 氣海

交龍 寒濕脚氣紅腫生瘡 中封 瀉之 陽輔 絕骨 各二

瀉之 灸

集又法 行間 三里 照海 崑崙 絕骨 京骨

委中 三陰交

玉兩足麻足腿膝無力 風市 在腿外廉垂手中指點到處是穴針五分補多瀉少

留五呼先瀉成後補生

集又足不能行 丘墟 行間 崑崙 太衝 陽輔

三陰交 復溜 三里 大治足不行

本風有一百二十四種氣有八十種唯脚氣頭風上氣當須藥不絕餘則隨其發動臨時消息但有風氣之人春末夏初及秋暮得通泄則不困劇所謂通泄者如麻黃牽牛郁李仁之類是也不必苦寒利藥也

禁忌

垣外臺云第一忌嗔嗔則心煩煩則脚氣發第二禁大語大語則傷肺肺傷亦發動又不得露足當風入水以冷水洗脚兩脚脛尤不宜冷雖暑月常須着綿褲至冬寒倍令

兩脛溫暖得微汗大佳依此將息氣漸薄損每至寅丑日割手足甲割少侵肉去氣夏時腠理開不宜當風臥睡睡覺令人按按勿使邪氣稽留數勞動關節常令通暢此並養生之要拒風邪之法也尋常有力每食後行三五百步疲倦便止脚中惡氣隨即下散雖浮腫氣不能上也

羅凡治此疾每旦早飯任意飽食午飯少食晚飯不食彌佳恐作胃營運之氣失其天度况夜食則血氣壅滯而陰道愈增腫痛矣

垣第一凡飲食酒及渣酪勿使過度過則傷損脾胃下注於足脛附腫遂成脚疾第二欲不可縱嗜慾多則脚氣發凡飲食之後宜緩行二三百步不至汗出覺困則止如此則不能成壅也經云逸者行之又云病濕痺忌溫食飽食濕地濡衣

千凡脚氣之病極須忌房室牛羊魚肉蒜韭菜菘菜蔓菁
瓠子酒麪酥油浮糜猪雞鷺鴨并忌大怒惟得食粳梁粟
米醬豉葱椒姜橘皮又不得食諸生菓子酸酢之食犯者
皆不瘥

凡脚氣之病始起甚微多不令人識也食飲嬉戲氣力如
故惟卒起脚屈弱不能動有此爲異耳 凡脚氣之候或
見食嘔吐憎聞食臭或有腹痛下利或大小便閉澹不通
或胸中衝悸不欲見光明或精神昏憤或喜迷忘語言錯
亂或壯熱頭痛或身體極冷疼煩或覺轉筋或腫或不腫
或胫腿頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁
此皆脚氣狀貌也 脚氣有腫者有不腫者其小腹頑痺
不仁者多不腫小腹頑後不過三五日卽令人嘔吐者名
脚氣入心如此者死在旦夕 其人黑瘦者易治肥大肉

厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風濕瘦人肉硬肥
人肉軟肉軟則受病難愈 凡脚氣覺病候有異卽須大
怖畏決意急治之稍緩則氣上入胸脇逆滿氣上肩息急
者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但見心下急
氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脈促短而數嘔吐
不止者死

足痿軟不收爲痿厥

痿厥有二

大法

一屬腎膀胱經云恐懼不解則傷精精傷則骨痠痿厥精
時自下是腎傷精脫也又云三陽爲病發寒熱下爲癰腫
及爲痿厥肺疝是膀胱在下發病也
二屬腎脾濕傷腎經云凡治痿厥發逆肥貴人則膏粱之
疾又云秋傷於濕上逆而發爲痿厥是也

腎勝

垣補益腎肝丸治目中溜火視物昏花耳聾耳鳴困倦乏力寢汗憎風行步不正兩脚軟側臥而多驚脚膝無力腰已下消瘦

柴胡 羌活 生地 苦參炒

防已炒各五分 附子炮 肉桂各一錢 當歸二錢

右細末熟水丸如雞頭大每服五十九溫水送下此藥

如在冬天中寒或心肺表寒目中溜火嚏噴鼻流清涕

咳嗽痰涎者止可服一九須與姜附禦汗湯等藥相兼

服之不可單服此表藥也

健步丸治膝中無力伸不能屈屈而不能伸脚脊腿脚沉

重行步艱難

羌活 柴胡各五錢 防風三錢 川烏一錢

滑石炒半兩 澤瀉三錢 防已酒洗一兩 苦參酒洗一錢

肉桂 甘草炙 瓜蒌根酒製各半兩

右為細末酒糊為丸如桐子大每服十九煎愈風湯空

心送下愈風湯在中風門在

腿脚沉重無力者於羌活勝濕湯中加酒洗漢防已五分

輕則附子重則川烏少許以為引用而行經也

右羌活柴胡伸提氣升防已苦參去濕熱桂附反佐之

也

左腎虛膏染

肅神龜滋陰丸治足痿用酒炙龜板四兩炒黃柏知母各

二兩枸杞五味瑣陽各一兩乾姜半兩為丸每服七十九

相兼服方見舌縱涎下

丹痢後脚弱漸細用 蒼朮一兩 白芍 龜板酒炙二兩半 黃柏酒半兩

右粥丸以四物湯加陳皮甘草煎湯吞之

中書貼合公年三十二歲病脚膝痿弱臍下尻陰皆冷陰汗臊臭精滑不固請醫黃道寧主以鹿茸九十旬不減至戊申春始求治于東垣遂診其脈沉數而有力乃曰公飲醇酒食以膏粱滋火于內逼陰於外醫見其症蓋不知陽強不能密緻皮膚冷而溢泄以爲內實有寒投以熱劑反瀉其陰而補陽真所謂虛虛實實也其不增虛者猶爲幸也復何望獲效耶卽處以滋腎大苦寒之劑制之以急寒因熱用飲入下焦適其病所瀉命門相火之盛再服而愈公以厚禮送之更求前藥方師固辭不受或問之曰物不受義也藥旣大驗不復與方何爲也曰大寒大熱之藥非常服者借以從權可也今公之病相火熾盛以乘陰位故用此大寒之劑以瀉相火而復真陰旣復其位則皮裏之寒自消矣內經云陰平陽秘精神乃治如過用之則故

病未已新病復起矣此予之意也

右龜板黃栢例嘗治一老人痿厥累用虎潛丸不愈後於虎潛丸加附子立愈如神蓋附反佐之功也

右腎虛房勞

本治後生丈夫酒色過多下焦虛憊足膝軟乏小便滑數外腎濕痒

兔絲子五兩依法研 石蓮肉二兩 白茯苓一兩

山藥 茴香各二兩 五味子五兩

右爲末糊丸如桐子大每服四十九溫酒或鹽湯下空心服如脚氣及脚膝無力者木瓜酒空心下五十九晚食前再服立效

脾濕

丹鄭安人年六十虛而有痰脈緩足弱與半夏天麻白朮湯下酒苓丸愈

肥貴人膏梁之

東陽吳子萬年五十形肥味厚且多憂怒脈常沉瀆自春

疾

來痰氣病醫認為虛寒率與燥熱香竄之劑至四月兩足弱氣上衝飲食減召予治之予曰此熱鬱而脾虛痿厥之證作矣形肥而脈沉未是死證但藥邪火盛當此火旺實難求生且與竹瀝下白朮膏盡二斤氣降食進一月後大汗而死書此以為諸賢覆轍之戒云

夏秋發是脾虛濕熱所勝

垣黃芪人參湯治夏天氣熱盛損傷元氣兩脚痿軟清燥湯治六七月濕令大行濕熱相合痿厥病作腰以下痿軟

癱瘓不能行動已上二方並見痿注夏條仲越婢加朮湯治肉極熱則身體津脫腠理開汗大泄厲風氣下焦脚弱成無已云外臺作越婢湯

麻黃六兩

石膏半斤

生姜

甘草各二兩

白朮四兩

大棗十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升

濕痰汚血

分溫三服如惡風加附子一枚炮

斗治脚軟用商陸根細切如小荳大煮令熟更入菘荳同爛煮為飯每日煮食以瘥為度其功最効

本治筋骨諸疾手足不遂行動不得遍身風瘡左經丸

草烏白大者

木鱉去殼

白膠香

五靈脂已上各三兩

半兩

班貓五箇去頭足翅甜炙

右為末用黑荳去皮生杵取粉一升醋糊共搜杵為丸

如雞頭大每服一九溫酒磨下治筋骨疾但未會針傷損者三五服立効此藥曾醫一人軟風不能行不十日

立効專治心腎肝三經通小便除淋瀝通營衛滑經絡此方因淨聖寺僧得之大有奇功

治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行續骨丹

天麻

明淨者酒浸

白附子

牛膝

木鱉子各半兩

烏頭一錢

川羌活兩

地龍去土一分

乳香

沒藥各二錢

硃砂一錢

右以生南星末一兩無灰酒煮糊為丸如雞頭大硃砂為衣薄荷湯磨一九食前服

雜方

丹人參酒浸服之治風軟脚弱可逐奔馬故曰奔馬草曾用有效

運氣

運氣痿厥皆屬水虛經云水不及曰涸流涸流之紀其病痿厥堅下是也

針灸

針灸痿厥有五法

其一取腎經云腎足少陰之脈所生病者痿厥嗜臥足下熱而痛視盛虛熱寒陷下調之也

其二補膀胱與肝經云邪之所在皆為不足下氣不足則為之痿厥心飽補足外踝下留之又云刺大指間上二寸

留之是補申脈太衝二穴是也

其三補足陽明絡經云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其病虛則足不收脛枯取之所別也

其四補足少陽絡經云足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰虛則痿躄坐不能起取之所別也

其五束縛四末經云痿厥為四末束挽乃疾解之日二不仁者十日而知無休病已是也

兩足癱瘓兩腿無力 鶴頂在膝蓋骨尖上灸七次

撮脚弱無力行步艱難 太衝 厲兌補灸 風市灸

玉又法 太衝五分瀉八 中封五分瀉八 三里一寸瀉十吸

集又法 公孫灸半寸 三里 絕骨 申脈不取 崑

器 陽輔

甲痿厥風頭重額痛髀樞股膈外廉骨節痛瘳痺不仁

振寒時有熱四肢不舉跗陽主之 痿厥寒足腕不收躄坐不能起髀樞脚痛丘墟主之 足不收痛不可以行天泉主之

診

足陽明之下血氣皆少則下毛無有則稀枯痺善痿厥足

痺全文見虛實法

脾脈緩緩甚為痿厥全文見治虛實法

脚氣衝心為厥逆

陰虛有火

丹脚氣衝心宜四物湯加炒栝再宜湧泉穴用附子末津

唾調傳上以艾灸泄引其熱下行

腹不仁者補

仲八味丸治脚氣上攻入少腹不仁方見治虛實法

腎心悶便

本草載唐柳宗元脚氣方方論俱見前積塊條

氣通者利

脚氣衝心用白栝榔一箇如雞心大者為末用童便生姜

汁溫酒共半盞調作一服廣利方不用姜汁酒但用童便五合調服日再服治衝心悶亂

不知人

外若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者栝榔為末以栝榔殼汁或茶飲或豉汁調服方寸匕甚利

右栝榔童便例

活三腕散治脚氣衝心腹氣飽悶大便秘滯者最良

獨活兩

白朮

木瓜焙乾

甘草炙半兩

大腹皮一兩

紫蘇兩

陳皮湯浸去白三分

沉香

木香

川芎

栝榔麩裏煨熟

各七錢半

右同一處杵為粗散每服二錢半水二盞同煎至一盞去查分三服熱服取便利為効

大腹子散治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子

紫蘇

木通

桑白皮

羌活

木瓜

荆芥

赤芍藥

青皮

獨活各一兩

枳殼兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白七寸去查空心
溫服

右檳榔紫蘇例

桑白皮散治脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣
急坐臥不得

桑白皮

郁李仁各一兩

赤茯苓兩

木香

防已

大子各一兩半

紫蘇子

木通

檳榔

青皮各七錢半

右咬咀每服三錢姜三片水煎

薏苡仁散治脚氣弱痺腫滿心下急大便澀

薏苡仁

防風

猪苓

川芎

防已

郁李仁

檳榔

大麻仁各兩

枳實七錢

桑白皮兩

甘草兩

羚羊角屑兩

右爲細末每服三錢熟水調下

韋宙療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁
李仁十二分搗碎水研取汁薏苡仁搗碎如粟米取三合
以米作粥空腹食之佳

右檳榔郁李仁防已例

雜方
仲礬石湯治脚氣衝心用礬石二兩以漿水一斗五升煎
三五沸浸脚

食理脚腫滿轉上入腹殺人赤小苳一升水五升煮令極
熟去苳適寒溫浸脚冷重煖之

廣治脚氣衝心煩悶亂不識人大苳一升水三升濃煎取
汁頓服半升如未定可更服

孫主脚氣及上氣取鯽魚一尺長者作鱠食一兩頓服瘥

帝曰願聞六經之厥狀病能也岐伯曰巨陽之厥則腫
 首頭重足不能行發為胸仆 陽明之厥則癩疾欲走呼
 腹滿不得臥面赤而熱妄見妄言 少陽之厥則暴聾頰
 腫而熱脇痛疝不可以運甲乙經云厥四逆喘氣滿臨泣主之 太陰之厥
 則腹滿臍脹後不利不欲食食則嘔不得臥 少陰之厥
 則口乾溺赤腹滿心痛 厥陰之厥則少腹腫痛腹脹涇
 澁不利好臥屈膝陰縮腫疝內熱甚則瀉之虛則補之不
 盛不虛以經取之 太陰厥逆肝急變心痛引腹治主病
 者王註云候其有過者當發取之故言治主病者 少陰厥逆虛滿嘔變下泄清
 治主病者 厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譫語治主病者
 三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死 太陰厥逆
 僵仆嘔血善衄治主病者 少陽厥逆機關不利機關不
 利者腰不可以行項不可以顧發腸癰不可治驚者死

陽明厥逆喘咳身熱善驚衄嘔血 手太陰厥逆虛滿
 欬善嘔沫治主病者 手心主少陰厥逆心痛引喉身熱
 死不可治 手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可
 以俛仰治主病者 手陽明少陽厥逆發喉痺噤腫疰治
 主病者論厥
 靈厥逆腹脹滿腸鳴胸滿不得息取之下胸二脇欬而動
 手者與背俞以手按之立快者是也癩狂 厥痺者厥氣
 上及腹取陰陽之絡視主病者瀉陽補陰經也寒熱

產脚氣

寒熱

大產後熱悶氣上轉而脚氣其狀熱悶掣痙驚悸心煩嘔
 吐氣上皆其候也可服小續命湯二三劑必愈又云寒中
 三陽所患必冷小續命加生姜汁最快暑中三陰所患必
 熱小續命湯去附子減桂心一半大煩躁者紫雪最良如

無紫雪用真薄荷煎冷水嚼下
諸方必與四物湯各半服之

醫學綱目卷之二十八

醫學綱目卷之二十九

腎膀胱部

耳聾

暴聾

耳鳴

耳腫痛

停耳

虫入耳

大法

保夫耳者以竅言之水也以聲言之金也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經也有若蟬鳴者若鍾鳴者有若火熇熇狀者各隨經見之其間虛實不可不察也假令耳聾者何謂治肺肺主聲鼻塞者肺也何謂治心心主臭如推此法皆從受氣於始腎受氣於巳心受氣於亥肝受氣于申肺受氣于寅脾受氣於四季此治法皆生長之道也

羅經曰精脫者則耳聾夫腎為足少陰之經乃藏精而氣通於耳耳者宗脈之所聚也若精氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎藏而精脫者則耳

耳聾面頰黑者腎虛

聾也然五臟六腑十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相併時并則藏氣逆名之曰厥厥氣相搏入於耳之脈則令聾其腎病精脫耳聾者其候頰頰色黑手少陽之脈動則氣厥逆而耳聾者其候耳內渾渾焯焯也手太陽厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也宜以燒腎散主之

保命集云耳以竅言之腎水也經云腎主耳左藏為腎左竅為耳又云腎氣通于耳腎和則耳能聞五音矣又云精脫者耳聾故羅謙甫以精脫耳聾之候為頰頰色黑也

燒腎散治耳聾室鑑方無巴戟

磁石一兩煨醋碎七次

附子一兩炮去皮臍

巴戟一兩

川椒一兩去目及閉口者微炒去汗

右為散每服用猪腎一枚去筋膜細切葱白韭白各一錢入散藥一錢鹽花一字和勻用濕紙裹於塘灰火內

煨熟空心細嚼酒解薄粥下之十日衍義云磁石石益腎氣腎虛而虛其者用之

嚴菴蓉丸治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉苁蓉酒浸切焙 山茱萸去核 石龍芮 石菖蒲

兔絲子酒浸蒸焙 羌活去芦 鹿茸去毛酒蒸焙 石斛去根

磁石煨醋碎水飛過 附子炮去皮臍各一兩 全蝎去毒七個

麝香一字旋入

右為末煉蜜丸桐子大每服一百丸空心鹽酒鹽湯任下

聖治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入粳米二合和煮粥入五味如法調和空腹食之作羹及酒並得

本地黃湯治腎熱聽事不真方見後風熱條

耳聾少氣盛乾者肺虛

右方用地黃磁石為君補腎虛有熱之劑也
道藏氣法時論云肺虛則少氣不能報息耳聾盛乾註云肺之絡會于耳中故聾此說非也蓋氣虛必寒盛則氣血俱滯滯而不行也耳者宗氣也肺氣不行故聾也

無蠟彈丸治耳虛聾

白茯苓二兩 山藥炒三兩 杏仁炒一兩半
去皮尖

右三味研為末和勻用黃蠟一兩鎔和為丸如彈子大

塩湯嚼下有人止以黃蠟細嚼點好建茶送下亦効山藥

茯苓杏仁皆入於太陽山藥大補陰氣惟杏仁利氣乃補中有通也少氣盛乾者門冬人參五朱湯嚼下

耳聾多恐者肝虛

經云肝虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐治法用四物湯加防風羌活柴胡菖蒲茯苓神等分煎湯服二十餘帖却用杜壬姜蝎散開之本草云肝虛則生薑補之是也

世治耳聾九節菖蒲去鬚切小塊十兩蒼朮十兩水合浸

氣逆耳聾

於瓦罐中七日取出去蒼朮單用菖蒲晒乾於糯米甑上蒸熟晒乾為末糯米飲調食後臨臥服効

丹大病後耳聾須用四物降火 陰虛火動耳聾者亦如

之 氣逆耳聾有三肝與手太陽少陽也經云肝氣逆則

頭痛耳聾不聰頰腫又云太陽所謂浮為聾者皆在氣也

羅謙甫云手太陽氣厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也

手少陽氣厥而耳聾者其候耳內渾渾焯焯此皆氣逆而

聾也治法宜四物湯吞龍薈丸降火及復元通氣散調氣

是也

丹耳聾必用四物龍薈養陰 復元通氣散治氣滯耳聾

方見腹癰

丹耳聾有濕痰者檳榔神芎丸下之

膈有痰滯者下之

大黃 黃芩各二兩 牽牛 滑石各四兩

風熱

加檳榔

滴水丸每服十九每次加十九白湯下

耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多宜開痰散風熱通聖散滾痰丸之類耳因鬱聾以通聖散內加大黃酒煨再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒

羅犀角散治風毒壅熱留心痰滯兩耳虛聾頭重目眩神効

犀角屑

甘菊花

前胡去芦

枳殼炒

菖蒲

羌活

澤瀉

木通

生地各半兩

麥門冬二兩去心甘草一錢

右為散每服三錢水煎食溫服

茯神散治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急昏悶不利

茯神一兩

羌活

柴胡

蔓荊子

薏苡仁

防風去芦

菖蒲

五味子

黃芪各半兩

甘草一分

麥門冬一兩去心薄荷三錢

右十二味為末每服三錢入生姜三片煎至五分食後溫服

本治男子二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心中拂意則轉覺重虛鳴疼痛地黃湯

生地一兩

枳殼

羌活

桑白皮一兩

磁石

搗碎水淘三二十次去尽亦汗為度二兩

甘草各半兩

防風

黃芩

木通

右為粗末每服四錢用水煎至去查日二三服不拘時候

風

無姜蝎散治耳聾因腎虛所致十年內一服愈出杜壬方

乾蝎四十九個去薑洗焙去風熱

生姜切片如蝎大四十九片開痰

右二味銀石器內炒至乾為細末向晚勿食夜卧酒調
作一服至二更以來徐徐盡量飲五更耳中聞百十攢
笙響便自此有聞法五更煎葱白湯一盞服先三
日服黑錫丹効又蝎先用糯米半升
同炒又用姜四十九片放
蝎上同炒去米姜不用

千治耳聾酒三升漬牡荊子二升碎之浸七日去查任性
服盡雖三十年亦瘥

耳為心
竅**素**南方赤色入通於心開竅於耳藏精於心全真
言論

虛寒治腎虛寒煨腎散菴蓉丸並見虛
實錄

運氣運氣耳聾有四

一曰濕邪傷腎三焦聾經云太陰在泉濕淫所勝民病耳
聾渾渾焯焯治以苦熱是也

二曰燥邪傷肝聾經云歲金太過燥氣流行肝木受邪民
病耳聾無所聞是也

三曰火邪傷肺聾經云歲火太過炎暑流行肺金受邪民
病耳聾是也
四曰風火炎擾於上聾經云少陽司天之政風熱秦布雲
物沸騰民病聾瞶三之氣炎暑至民病熱中聾瞶治以寒
劑是也

雜方

木治耳聾用鼠膽一個滴入耳中三次立効

勝治耳聾立効以乾地龍入塩貯在葱尾內為水點之

千治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神効

世治耳聾久不聞者

緊磁石如薑川山甲
木一字燒存性為

右用新綿裹了塞於所患耳內口中啣少生鉄覺耳內
如風雨聲即愈 甘草甘遂各半寸綿裹包插入耳內
又將甘草嚼之即通妙

通神丹治耳聾

阿魏

巴荳仁七個

安息香

桑白皮

各錢半

硃砂五分

大蒜

麻子仁各七個

右為細末入二仁與蒜同搗為丸如枣核大每用一

丸綿裹內耳如微痛則出

世治耳聾久不効者

大蒜一瓣一頭挽一坑子用芭荳一粒去皮膜慢火

炮去極熟入在蒜內用新綿裹定塞耳中不過三次

効

治耳聾單麻子五十粒去皮束子一箇同搗丸如枣核大

更入小兒乳汁和每用一九綿裹塞耳中覺熱為度一日

一換

世治耳聾用骨碎補削作細條火炮乘熱塞耳

本草云骨碎補破血

治新傷奇効

治耳聾以杏仁七箇去皮拍碎三分以綿裹於中着麩

鹽如小荳許以器盛於飯甑中蒸之候飯熟取出於患人

側臥將一裹捻油汁滴入耳中久之又以一裹依前法捻

滴之

世又方用雄猫尿滴入耳中左滴左右滴如猫不能放

尿用姜擦其齒即有

針灸耳聾有五法

其一取手足少陽手陽明經云耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足又云三焦手少陽之脈是動

則病耳聾渾渾惇惇視盛虛熱寒陷下調之也又云聾而

不痛者取足少陽聾而痛者取手陽明又云耳聾刺手陽

明不已刺其通脈出耳前者

針灸

其二取手陽明絡經云手陽明之別名曰偏歷去腕三寸
別入太陰實則鬪聾取之所別也又云邪客手陽明之絡
令人耳聾時不聞者刺手大指次指爪甲上去端如韭葉
各一痛立聞不已刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時
聞者不可刺也左刺右右刺左
其三取手太陽經云手太陽之脈所生病者耳聾目黃頰
腫視盛虛熱寒陷下調之也又云耳聾無一取耳中是也
其四取肝經云肝虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐取
其經厥陰少陽氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫取血者是也
其五取肺經云肺虛則少氣不能報息耳聾嗑乾取其經
太陰足太陽之外厥陰內血者是也
耳有膿不可刺經云耳痛不可刺者耳中有膿若有乾膜
取聾耳無聞也

治耳聾用蒼朮一塊長七分將一頭削尖一頭截平將
尖頭插耳內於平頭上安筋頭大艾炷灸之聾輕者七壯
重者十四壯如覺耳內有熱氣者効

玉耳聾耳鳴或疼或痒或停耳 听會 在耳珠前陷中口

入半寸 翳風 針入半寸 合谷 三里 瀉

摘又法 翳風 在耳後陷後按之引耳中令病人先以錢

閉口擡頭其 聽會 法如

世又法 中渚 臨泣

用耳聾兩顳顛痛中渚主之 耳焯焯渾渾無所聞外關

主之 頭重領痛引耳中噤噤嘈嘈和窅主之 聾耳中

癩洩癩洩者若風狀聽會主之 耳聾填填如無聞噤噤

嘈嘈若蟬鳴聽宮主之 聾翳風及會宗下窅主之 耳

聾嘈嘈無所聞天容主之 聾耳中不通合谷主之 耳

診

聾無聞天窓主之

脈病若耳聾脈反浮大而澁者死千金翼云脈大者生沉逆細者難治

暴聾

虛邪感逆

夫卒耳聾者由腎氣虛為風邪所乘搏於經絡隨其血脈上入耳正氣與邪氣相搏故令卒聾也

暴聾皆是厥逆之氣經云暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也又云少陽之厥暴聾是也

雜方

蒲黃膏治卒耳聾

細辛

蒲黃各一分

麩末

杏仁

湯浸去皮尖雙仁各三分

右為末研杏仁如膏和稔如棗核大綿裹塞耳中一日一易以差為度

又方龍腦膏

龍腦

半分

椒目

半兩

杏仁

一分湯浸去皮

右件搗研合勻綿裹棗核大塞耳中一日二易

世蜀椒巴荳萹蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中抽腎虛氣耳中如風水之鳴或如打鐘鼓之聲卒暴聾一日一易神効

治耳暴聾

雄黃

錢一

巴荳

一個去殼

右研細用葱涎和作一錠子紙捲定塞耳中

丹治耳暴聾凌霄花葉杵自然汁滴耳中差

斗門云本草凌霄花閉血

淤血丹溪云補陰甚捷

針灸

暴聾氣蒙耳目不明取天牖寒熱篇

甲卒氣聾四瀆主之

虛

耳鳴 與耳聾相參用之

丹馮官人左耳鳴此勞得之法當補陰而鎮墜之

黃芪 人參兩一 當歸 陳皮

茯苓七錢 升麻五錢 酒栢三錢 防風二錢半

甘草半錢 芍藥酒製

分十貼食前熱服飲了去眠一覺

耳中闕闕然是無陰者

右陰虛耳鳴經云液脫者腦髓消脛瘦耳數鳴是也

羅治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓覺耳內風吹更四肢

抽掣痛黃芪丸

黃芪去芦 白蒺藜炒瓦擦 羌活去芦各

黑附子大者 羯羊腎焙乾

右細末酒糊丸桐子大每服三四十九空心食前煨葱

鹽湯下

上實

素太陽所謂耳鳴者陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也脈解

實熱

丹耳鳴因酒過者用大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草

南星桔梗青皮荆芥如不愈用四物湯 耳聾必龍蒼丸

食後服 氣實人楨榔神芎丸下之神芎丸方見前虛實法

垣柴胡聰耳湯治耳中聾耳鳴耳聾

柴胡三錢 連翹四錢 甘草一錢 蜜虫三個去

水蛭炒五分 麝香少許 歸身 人參各一錢

右除黃虫水麝另研外用酒水煎熟去查方下三末再

上火煎一二沸稍熟食後服

運氣

運氣耳鳴皆屬風火經云厥陰司天風行太虛雲物搖動目轉耳鳴三之氣天政布氣乃時舉民病耳鳴又云厥陰之脈耳鳴頭眩又云少陽所至為耳鳴治以涼寒是也

耳鳴無晝夜用烏頭燒灰菖蒲等分末之包裹綿塞耳
中立効楊氏

治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久則成聾用生烏
頭一味掘得乘濕削如枣核大塞耳中日夜一易不過三
日愈

針灸

肘治耳中常鳴生地截塞耳數易之以瘥為度

黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脈之
所聚也故胃中空則宗脈虛虛則下溜脈有所竭者故耳
鳴補客主人手大指爪甲上與肉交者也口問篇

灸則耳鳴補法有三此其一也又經云上氣不足耳為之
苦鳴補足外踝下留之者二也又云腦為髓之海其輪上
在百會下在風府髓海不足則腦轉耳鳴審守其輪調其
虛實者也

取法有二經云耳鳴取耳前動脈者一也又云耳鳴取手
中指爪甲上左取右右取左先取手後取足者二也取謂
視虛實調之也

劫刺有一經云手太陽之筋其病肩髀引頸而痛耳中鳴
其痛轉筋者治在燔針劫刺之以知為度以痛為輸者是
也

耳虛鳴 腎俞 太谿

耳痛聾鳴上關主之刺不可深 耳聾鳴下關及陽谿

闕衝掖門陽谷主之 耳聾鳴頸頷痛耳門主之 耳鳴

無聞肩貞及完骨主之 耳中生風耳鳴耳聾時不聞商

陽主之 耳鳴百會及頷厭顙息天窓太凌偏歷前谷後

谿主之

心脈微瀦為耳鳴癩疾全文見治虛實法

耳腫痛

金尚五郎耳腫痛黃水出而臭

桔梗

麻黃

羌活

大黃酒炒二錢

木通

甘草

黃芩一錢半

右分三貼熱服

耳濕腫痛用涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荆芥羌

活服之更以腦多麝少濕加枯礬吹入耳中

犀角飲子治風熱上壅兩耳聾閉門外腫痛及膿水流

出

犀角鎊

菖蒲

木通

玄參

赤芍

赤小豆

甘菊花去梗各一兩

甘草半兩

右咬咀每服四錢用水十盞生姜五片煎八分溫服不

熱

血熱

拘時

無解熱飲子治氣虛熱壅耳內聾閉徹痛膿血流出

赤芍

白芍各半兩

當歸

甘草炙

大黃蒸

木鱉子

右為劉散每服四錢水一盞煎七分食後臨臥服詳此方乃

清涼飲子加木鱉也

運氣耳痛皆屬熱經云少陽之勝耳痛治以辛寒是也

羅菖蒲挺子治耳中痛

菖蒲兩

附子炮去皮臍半兩

右為細末每用不多少油調滴耳內効一法用醋左

如杏仁大綿裹置耳中日三易一法搗菖蒲自然汁灌

耳神効

又方治耳痛用食鹽不多少炒熱用束麩蒸熟青花布

運氣
雜方

包定枕之立効如神

世又用油胡荽肉為末狗胆汁和為丸如桐子大綿裹安耳中痛立止

世療耳內卒腫痛出膿水不止方礬石燒灰加麝香以筆管吹耳內日三四度

停耳

耳者宗脈之所聚腎氣之所通足少陰之經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生膿汁故謂之停耳也

新綿散治停耳出膿

白礬

胭脂

右研勻先用綿杖子纏去耳中膿及黃水盡即用別綿杖子引藥入耳中令到底摻之即乾如壯盛之人積熱

上攻耳中出膿水不瘥用無憂散送雄黃丸瀉三四

行瘥一方單用白礬灰吹入耳中日三次立効

松花散治停耳膿水不絕宜用此方

白礬

燒灰半兩

麻勃

木香

松脂

花胭脂

各一分

右搗羅為末每用時先以綿子淨拭後用藥吹入耳內効

白蓮散治停耳出膿汁

白礬

烏賊骨

黃連

龍骨

右搗羅為末以綿裹如束核大塞耳中日三易之

無麝香散治停耳耳底膿出

桑螵蛸

煨火炙存性一箇

麝香

一字另研

右為末研令勻每用半字糝耳如有膿先用綿杖子搽

風

乾一法用射香少黃丹多研勻入耳立効

世治停耳膿出不止用五倍焙乾一兩及全蝎燒灰存性三錢為末摻耳中

母耳爛用貝母研末乾摻之

餘禹糧丸治停耳有膿水塞耳

餘禹糧 一兩燒醋 烏賊魚骨 釜底墨

伏龍肝 附子一枚去皮生用

右件搗羅為末以綿裹如皂角子大內耳中日再易之如不瘥者內有虫也

世石菖蒲一寸巴荳一粒去皮全蝎一枚為末葱涎和如枣核大綿裹塞耳中

治耳熱出汗

滑石 爛石膏 天花粉 防風各一

熱

寒

雜方

右用腦子少許同研為末摻耳中

世治停耳膿不止陳橘皮燈上燒灰為末麝香少許二味和勻每用少許先用綿拭耳中膿淨却上藥 又方杏仁

泥治耳中病或有水出杏仁炒令黑為末葱涎搜和如枣核大綿包塞耳

虫入耳

雜方

丹治虫入耳用椒末一錢醋半盞浸良久少少滴耳中虫自出 方千金

世治虫入耳不出桃葉搗爛塞耳虫自出

無治百虫入耳用麻油灌之即効

山諸般惡虫入耳搗韭汁灌之

木治諸虫及虱等入耳用白膠香一味燒烟薰入耳令耳

孔內煖虫自出妙

羅治蟻入耳以大韭搗汁灌耳中 又方以鯪鯉甲燒灰為末以水調濾過滴入耳中即出 又方蜈蚣及蟻入耳用猪脂一指大炙令香安耳邊即出 治蜈蚣入耳用豕猪肉掩兩耳即出

本治飛虫入耳用好酸米醋一味滴入耳內虫必出不出即死曾有一人被焦虫入耳其虫口硬如鉄但身軟用此藥滴之立死而出

羅治飛蛾入耳以鷄管極氣吸之出 或擊銅器於耳邊即出

香治蜒蚰入耳用半夏生為末麻油調塗耳門外虫聞香即出

羅治蜒蚰入耳方用濕生虫研如泥攤紙上熬成紙條安耳內自出 又方用蝸牛虫去殼研爛滴水五七點再研

勻灌耳內自出無活者尋乾者研亦可

山蜒蚰及諸般虫入耳麻油灌入或用生葱汁生姜汁亦可

食蜒蚰入耳以羊乳灌入即成水

海蜒蚰入耳以牛酪灌耳中須更出如入腹即飲酪二升自消為水

子治耳中有物不出以細麻繩剪令頭散蘸好膠入耳中着物上粘之徐徐引出

經治水入耳以薄荷汁點立效

骨

腎度

腎度

腎主骨在臍為骨在臍為腎又云腎之合骨也其榮髮也○又云少陰者冬脈也伏行而濡骨髓者也一身骨度之長短見陰陽表裏條

骨空

素髓空在腦後五分在顛際銳骨之下王註云是謂風府通腦中也

一在斷基下王註云當頤下 一在項後中復骨下王註云脊骨下

也門穴 一在脊骨上空在風府上王註云上謂腦九穴也 脊骨下

空在尻骨下空林億云長強在脊 數髓空在面俠鼻王註云頤端正在尻骨下

等穴也 或骨空在口下當兩肩王註云大 兩髀骨空

在髀中之陽王註云近 臂骨空在臂陽去踝四寸兩骨

空之間王註云在支溝上同身 股骨上空在股陽出上

膝四寸王註云在陰市上伏 胫骨空在輔骨之上王註

謂犢鼻穴也 股際骨空在毛中動下 尻骨空在髀骨後相

去四寸王註云八 扁骨有滲理湊無髓孔易髓無空骨俱

空王註云扁骨謂尻間扁骨也其 骨上有滲理湊無髓孔也

禁忌

骨病忌食甘苦久立經云多食甘則骨痛而髮落又云苦走骨骨病無多食苦又云久立傷骨是也

病

骨病不屈經云手屈而不伸者病在筋伸而不屈者病在骨在骨守骨在筋守筋也

牙齒痛 齒搖斷露 牙蛀牙不生

通夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口者其牙

齒是手足陽明之所過上斷隸於坤土乃足陽明胃之所

脈所貫絡也止而不動下斷嚼物動而不休手陽明太腸

之脈所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒而惡

熱故其病不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢痛熱甚則

齒動齟齬袒脫作痛不已故所治療不同也有惡熱而作

痛者有惡寒而作痛者有惡寒又惡熱而作痛者有惡寒

飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有

牙齒動搖而作痛者有齒袒而作痛者有齒斷為疳所蝕

缺少血出而作痛者有齒斷腫起而作痛者有脾胃中有

風邪但覺風而作痛者有牙上多為虫所蝕其齒缺少而色變為虫牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者痛既不一豈可一藥而盡之哉

牙大痛必用胡椒薑撥能散其中浮熱監以升麻寒水石佐以辛涼薄荷荆芥細辛之類

得清涼
痛甚者
為寒

牙痛用清涼藥便痛甚者從治之

薑撥

川椒

薄荷

荆芥

細辛

樟腦

青鹽

右為末擦牙上

緊治牙寒疼

露蜂房

小椒

去目炒
各等分

右為粗末煎漱禁語言

烟牢牙地黃散治牙齒寒痛

麻黃

黃連

羊脛骨灰

各一錢

升麻

一錢半

草薺莖皮

一錢二分

吳茱萸

一錢

益智仁

歸身

各四分

藜本

二分

防已

生地

人參

熟地

羌活

各三分

黃芪

白芷

各五分

右為細末擦牙上先漱口淨然後用藥

世治牙痛百藥不效用荔枝殼燒灰存性擦牙痛處累驗

一云荔枝核亦可

外治牙痛獨囊蒜煨乘熱截用頭以熨痛上轉易之亦治

虫痛

丹齒痛茱萸酒煎含之

食療

壇馘鬼散治風熱牙痛昔劉經歷之內子年三十餘病齒

口吸涼
風痛止
者為熱

痛不可忍須騎馬外行口吸涼風則痛止至家則痛復作

家人以為祟祈禱於巫師而不能愈遂求治於先師問其故曰此病乃濕熱而邪也足陽明貫于上齒手陽明貫于下齒陽明多血多氣又加以膏粱之味助其濕熱故為此痛因立一方不須騎馬當令風寒之氣常生於齒間以黃連梧桐律之苦寒新薄苛葉荆芥穗之辛涼四味相合而作風寒之氣治其濕熱更以升麻之苦平引入陽明經為使牙齒骨之餘以羊脛骨灰補之為佐麝香少許入內為引用為細末擦之神妙又以調胃承氣去芒硝加黃連以治其本服之下三五日其病良愈不復作

清胃湯治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡入腦在本經十五絡中喜寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作其齒喜冷惡熱

地黃生三分

升麻錢一

牡丹皮五分

歸身三分

揀黃連

六分不好加二分夏倍之

右五味同為細末頓作一服水煎至一半去查候冷細哈之即効

丹陽明熱牙疼

大黃

燒灰存性

香附

燒存性

右為末入青鹽少許無時擦之

草淳于意醫齊中大夫病齩齒灸左手陽明脈苦參湯日漱三升五六日愈

丹卒牙痛苦竹一莖燒一頭得汗多者指痛處立安姚氏方

經患牙痛含山荳根一片於痛處

廣治牙齒疼痛取槐樹白皮一握切作一升煮去查着鹽少許適溫寒含之日三易

丹當歸龍胆散治寒熱牙痛

寒熱牙痛者為寒熱

升麻
麻黃各一錢
生地
白芷

羊脛骨灰各五分
草龍胆
黃連各一錢

歸稍五分
草荳蔻一錢

右為細末擦之神効

益智木律散治寒熱牙疼

草荳蔻二錢 益智
歸身 熟地

羊脛骨灰各五分 木律二分 升麻一錢

黃連四分

右細末擦之如寒牙疼不用木律

草荳蔻散治寒多熱少牙齒疼

草荳蔻一錢 黃連一錢 升麻一錢 細辛葉

防風各二分 熟地 羊脛骨灰各五分

歸身七分

右件為細末牙痛處擦之

立効散治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微惡寒飲大惡

熱飲其脈上中下三部陽虛陰盛是五臟內盛六腑陽道

脈微小小便滑數立効

防風一錢 升麻七分 甘草炙三分 細辛二分

草龍胆酒洗四錢

右咬咀頓作一服水二大盞煎至一盞去渣以匙抄在

口中燂痛處少時立止如多惡熱飲更加龍胆草一錢

此法不定隨寒熱多少臨時加減如更惡風作痛加草

荳蔻黃連各五分勿加龍胆草

通 細辛散治寒邪風邪犯腦痛齒亦痛

麻黃去節三錢 桂枝 羊脛骨灰各二分

羌活半錢 草荳蔻半錢 柴胡 升麻

腦連頭
痛兼齒
者外犯
大寒

寒多熱
少

防風

白芷各二分

藁本

蒼朮各三分

歸身四分

細辛少許

右為細末先嗽後擦之神効

白芷散治大寒犯腦牙齒疼痛

麻黃去節

草薹各一錢半

桂枝各二錢半

真菜萸

白芷各四分

羌活八分

歸身

熟地各五分

升麻一錢

右為細末先用水漱洗以藥擦之

蝎稍散治大寒犯腦牙疼

麻黃去節

桂枝

歸身

柴胡

白芷各二分

升麻

防風

藁本

黃芪各三分

羌活五分

羊脛骨灰二錢半

草薹錢皮一

蝎稍少許

右為末用如前法

神功丸 牢牙散 調胃承氣 咸硝加黃連 諸方皆治平昔

多食肉及口臭者內傷濕熱

多食肉人口臭牙齒動搖欲落或血出不止乃內傷濕熱膏梁之疾也方見熱條及齒搖新露

澤州李繼之忽患牙痛皺眉不語藥景先日曾記載

人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付舟車丸七十粒服

畢遇數知友留飲強飲熱酒數盃藥為鹽酒所發盡吐之

吐畢而痛止李大服曰戴人神仙也不三五日又痛再服

前藥百餘粒大下數行乃愈

表

牙痛而腫

軟石膏

升麻

細辛

大黃

白芷

防風

羌活

連翹

川椒

青鹽

龍胆

荆芥

香附各等分

右為細末搽患處

頭 治虫散治大寒犯腦牙齒疼痛及啣風作痛虫痛胃經濕熱腫痛

麻黃去節

羌活

草薺各五分

吳茱萸八分

藜蘆

白芷各三分

黃芪

升麻各一分

歸身

益智仁

黃連各四分

桂枝一分

羊脛骨灰

熟地各二分

右細末先用溫水淨漱口搽之

世 獨活散治牙根腫痛

川芎

獨活

羌活

防風各半兩

細辛

荆芥

薄荷

生地各二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服

虛

無 一婦人牙痛治療不效口頰皆腫以金沸草散大劑煎

湯薰漱而愈方見舌門

八味丸治虛壅牙痛浮腫方見治法腎虛條

簡 治牙齒腫痛用白礬一两燒灰大露蜂房一两微炙為

散每服用二錢以水一盞半煎十餘沸乘熱燂牙冷即吐

之

運氣

運氣齒痛皆屬熱經云少陰在泉熱淫所勝齒痛頰腫治

貼方

以醃寒是也

散方

母 治牙齒痛

常山

大戟

防風

細辛

荆芥

枇杷葉

何首烏

薄荷

帶用糟茄亦可

治牙齒痛用茄蒂燒灰存性為末傅痛處累驗如無茄

葱根鬚 川椒

右煎湯漱之極効

竹 追風散治諸般牙痛

貫衆 鶴虱 荆芥各等分

右咬咀每用二錢加川椒五十粒水一盞煎七分去香熱漱吐去藥立効

干 治牙痛以蒼耳子五升水一斗煎五升熟含之疼即吐

吐後復含不過三劑瘥莖葉亦得 牙痛用胡荽子濃煎

湯漱之

丹 齒痛省藤打碎含之嚙津本草木部有省藤治齒疼

世 治牙齒疼痛蟾酥用銀珠摻和為丸如蘿蔔子大每用

一丸搽上患處便不疼至三九吐濃涎數口全愈

定痛散治牙風疼痛立効

引涎方

細辛生半兩 白芷生 川烏頭生各一兩 乳香三錢

右為末每少許擦牙痛處引涎吐之須臾以鹽水灌漱

一方無白芷川烏有全蝎草烏

塞耳方 **家藏** 雄黃定痛膏治牙齒疼痛

大蒜二枚 細辛去苗 盆硝另研各二錢 雄黃另研一錢

猪牙皂角四錢

右為末同大蒜一處搗為膏丸如桐子大每用一九將綿子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右耳良久痛止一九可治數人

透關散治牙疼

蜈蚣頭 蝎稍去毒 草烏尖如麥粒大者

川烏底如錢薄者各七枚 雄黃如麥粒大者

胡椒七粒

右細末用紙燃子蘸醋點藥少許於火上炙乾塞兩耳
內閉口少時即効

世又方治牙疼用巴荳一粒煨黃熟去殼用蒜一瓣切一
頭作蓋剗去中心安巴荳在內以蓋合之用綿裹隨患處
左右塞耳中

右塞耳三法前一法治熱疼後二法治寒疼也

無牢牙散去風冷蛀齲宜露用之甚効

槐枝

柳枝各長四寸
四十九枝

皂角不蛀者
七莖

鹽四錢
文重

右同入甕瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細
用如常法有庵主年七十餘云祖上多患齒疼脫落得
此方効數世用之齒白齊密乃良方也

垣白牙散

升麻錢一

羊脛骨灰錢二白芷分七

石膏半錢

麝香少許

右為細末先用溫水漱口擦之妙

麝香刷牙散

麝香分一

升麻錢一

黃連錢二

白荳蔻

羊脛骨灰

草荳蔻各三錢半

歸身

防已酒浸

人參各三分

生地

熟地各二分

沒石子三枚

五倍子一個

右為細末用如前法擦之神効

丹刷牙方

羊脛骨灰兩

升麻錢一

黃連錢一

右為末擦之

針灸

靈齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明

針灸齒痛不惡清飲取足陽明上齒痛亦如之經云邪客於足陽明之絡令人齲衄上齒寒刺足中指次指爪甲上與肉交者各一痛左刺右右刺左又云邪客五藏之間繆傳引上齒齒唇寒痛視其手背脈血者去之足陽明中指爪甲上一痛手大指次指爪甲上一痛立已左取右右取左王註謂足大指次指為中指也
齒痛惡清飲取手陽明下齒痛亦如之經云大腸手陽明之脈入下齒中是動則病齒痛頸腫視盛虛熱寒陷下調之又云手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰虛則齒寒痺隔取之所別也又云齒齲刺手陽明不已刺其脈入齒中者立已是也

丹治齒痛金釵股火燒針痛處即止蜀本
撮牙痛牙槽 呂細即太溪穴補三呼 二間一分沿皮向後三分

灸之治下牙痛 委中六分瀉

世牙痛 足內踝兩尖灸治上牙 龍玄在列缺上青脈中灸之治下牙 又法承漿 風府

摘又法 合谷 內庭不應取靠

甲齒痛頰窮及三間主之 上齒齲兌端及耳門主之

口中下齒痛惡寒頓腫商陽主之 齒齲痛惡清三間主之

齒齲痛合谷主之 口齒痛溫溜主之 齒齲痛聽

會及衝陽主之 失欠下齒齲下牙痛頓腫下關主之

上齒齲痛惡寒者上關主之 下齒齲則上齒痛掖門主

之 齒痛四瀆主之 上齒齲腫日愈主之 上齒齲痛

惡風寒正營主之 牙齒齲痛浮白及完骨主之 齒牙

不可嚼斷腫角孫主之 上齒牙齲疾陽谷主之 齒齲

痛少海主之

診

撮風牙疼 大淵一分灸七壯
靈齧齒痛 按其陽之來有過者獨熱在左左熱在右右熱在上上熱在右下熱論疾診尺篇

齒搖斷露

腦痛筋急為寒

羌活散 治風寒濕犯腦痛項筋急牙齒動搖內齧袒脫疼痛

麻黃去根節 白芷各三錢 羌活根半錢 防風根三錢

藜本 歸身各三分 細辛根 柴胡根

升麻 蒼朮各五分 羊脛骨灰二錢

草薺 桂枝各一錢

右細末先用溫水漱口淨搽之其痛立止

黃連散 治冬天寒時分風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖疼痛

麻黃根 草薺薹皮 龍膽草酒洗各二錢

生地二錢 羌活根半錢 防風根二分 藜本三分

羊脛骨灰 歸身 熟地各六分 細辛根許少

升麻根 黃連各一錢

右極細末依前搽之

牙疳腫痛為熱

干 治牙齒根欲動脫生地細剉綿裹着齒上啞之日三四并嚙汁効

錢 甘露飲子治牙腫齒搖方見小兒痘腫咽痛

垣 牢牙散治牙根肉綻有根牙疳腫痛動搖欲落牙齒不長牙黃口臭宜用之妙夏月亦可

升麻四兩 羌活一兩 羊脛骨灰二兩

龍膽草一兩半酒洗

右為極細末以紗羅子羅細羊脛骨灰末和勻臨臥擦

牙妙

羅牢牙散擦牙

茯苓

石膏

龍骨

寒水石

白芷

各半兩

細辛

三錢

石燕

大者一兩小者二

右為細末早晚刷牙

疔麝香散治熱多寒少牙露根肉斷脫血出齒動欲落大痛妨食忤寒少忤熱多

麻黃

歸身

熟地

生地

人參

酒防已

各三分

升麻

一錢

草薺

黃連

各錢半

益智仁

二分半

麝香

少許

羊脛骨灰

二錢

右細末依前法搽之

牙方

恒還少丹常服寧牙齒

方見治虛實法

本治牙齒動搖髮髯黃赤一服妙

生姜

生地

一斤各洗淨研取自然汁查留用

右用不蛀皂角十莖刮去黑皮并筋將前藥汁蘸皂角慢火炙令黃以藥汁盡為度并前藥同入磁罐用火煨留性為末牙齒動搖用藥指齒齦上髭黃用銀器盛藥末三錢湯調將藥汁蘸鬚臨睡時用次早已黑三夜三次用之其黑如漆妙甚此方常用屢驗

疔痰藜散治打動牙齒痰藜根燒灰貼動牙即牢

疔治牙斷宜露每日以鹽末擦牙後用熱湯含漱百遍不過五日齒即牢密

疔治齒齦宜露蚯蚓糞水和為泥燒令極赤研如粉臘月猪脂和傅上日三傅瘥

本取蛙牙本分法

落牙法

鵬砂

成塊者

硃砂

各一錢

礞砂

二錢

川烏

七個

砒二錢色黃白有光

蟾酥七個

附子尖十四個

右和勻五月五日合者佳點藥于牙根上良久用手指
措下次用後傳藥

防風

荊芥各五文

乳香十五文

右為末措牙落處并用此子塞牙落孔子內

此二方余見一道人貨藥取牙一日常貨三兩貫余厚
賂始傳得妙

世落牙方用馬肉十兩信巴豆各等分剉馬肉片以信巴
末拌勻用石器盛候出虫焙乾研末於牙疼處出些血點
上隨落妙

本取牙落不犯手

草烏

萹撥各兩半

川椒

細辛各三兩

右細末每少許措患處自落

牙蛙牙不生

陽明畜血

海牙齒等齲數年不愈當作陽明畜血治之用菴仁承氣

湯為細末煉蜜丸桐子大服之好飲過者多得此疾屢服

有効菴仁承氣湯方見傷寒

丹治蛙牙痛內蒸蘆細末於孔中勿嚥津神妙 又方用

江子香油燈上燒過填入穴內

世治蛙牙腫痛用不蛙皂角一錠去皮子却用巴荳每於

皂子處安巴荳一粒用鹽泥固濟燒灰研細末用刺耳子

抄少許填入蛙牙內

外療齒齲痛有虫取雄雀糞以綿裹塞孔內日一二次易

之良

丹蠱齒用盧薈四分炒研細先用鹽措淨齒傳少許 一

寒蛙孔方

方用蘆薈白膠香塞蛀孔內 蛀牙取松脂銳如錐者塞孔中少頃虫出脂上

治牙疼

鶴虱 細辛 白芷 乾茄各等分

右件為末每用少許搯痛處如有蛀孔用飯丸藥末塞孔中立効

治牙蛀疼用鶴虱枝插患處立愈

麝香散

麝香錢一 銅綠分五 白芨 白礬各二錢半

白斂三錢半

右細末每少許貼牙患處

虫蝕牙根肉腐用棘針燒取瀝傳十餘次 又研雄黃末傳愈

治牙虫痛不可忍嚼薰陸香嚙其汁立瘥即乳香之類

又方治牙虫腐爛用棘針二百枚用水二升煮一升含之妙

治齲齒以郁李根白皮水煮濃汁含之冷即易之効

蛀牙温米醋漱出虫自愈 又風蛀牙疼用香白芷細辛煎漱之 又絲瓜兒燒灰存性擦之

薰法 虫牙疼天仙子不以多少燒烟用竹筒抵牙引烟薰之 其中虫即死永不發

治蛀牙用小瓦片置油拌葦子燒烟閉在水碗上恰用漏斗覆之以蛀牙受漏斗口中烟其牙肉虫如針者皆落

水碗中累効

救苦散治一切牙痛及寒風蛀牙疼

草烏 川烏 桂花 良姜

出河方

敷貼方

湯方

紅荳

胡椒

葶撥

細辛各五分

石膏

官桂各三錢

右細末先漱淨裡外乾摻之出涎立愈

搗鼻方葶撥散治風蛀牙疼

葶撥二錢

蝎稍

高良姜各一分 草烏各五分

右為細末每用半字先含水一口應痛處鼻內搗上吐了水用指粘藥少許擦牙疼痛處兼治偏正頭疼

牙不生法

經治大人小兒多年牙齒不生用黑荳三十粒牛糞火內燒令烟盡細研入麝香少許一處研勻先以針挑不生牙處令血出用藥少許搽不得見風忌酸鹹物

髮黃白

髮落不生

腎

腎主髮經云腎之合血也其榮髮者是也

陰厥

海張天師草還丹此藥久服輕身隨風而去如列子之乘

虛也若髮白者從根而黑如未白者永不白有不信者將藥拌飯與白猫吃一月即黑

地骨皮

生地

石菖蒲

牛膝

遠志去心

兔絲子酒浸三宿炒黃

右各等分為細末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心溫酒送下鹽湯亦得修製忌女人雞犬見此上少陰下厥陰藥也

雜方青絲散補虛牢牙黑髭鬚

香白芷

白茯苓各五錢

毋丁香

細辛

當歸

川芎

甘草

甘松各三錢

升麻

旱蓮草

地骨皮

生地

熟地

青鹽

破故紙各二錢

寒水石七錢

香附米

一兩生姜汁浸一宿炒

何首烏一兩

麝香五分

高茶末

右為細末庚日為始背東面西擦牙早不見日夜不見
燈刷畢嚙藥餘津潤髭一月白者頓黑忌食蘿蔔

本治髮髮黃黑方見牙動搖

草李卿換白髮方云刮老生姜皮一大升於鐺中以文武
火煎之不得令過沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗
刮便以姜皮置鐺中密封固濟勿令通氣令一精細人守
之地色未分時便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲
即換人看火一伏時即成置於磁鉢中研極細李方雖曰
一伏時若火候勻至日西即藥成也使時以小簪脚蘸取
如麻子大先於白髮下點藥訖然後拔之再點以手指熟
擦之令入肉第四日當有黑者生神効

梅治年少髮白拔去白者以白蜜塗毛孔中即生黑髮不
生取桐子搗汁塗上必生黑者

阿療髮黃能眩塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出
便盡黑不一升脂驗

髮落不生

通脈弦氣弱皮毛枯槁髮脫落黃芪建中湯主之髮脫落
及臍下痛四君子湯加熟地

濕痰

胡氏年十七八歲髮脫不留一莖飲食起居如常脈微
弦而瀉輕重皆同予曰此厚味成熟濕痰在膈間又日多
吃梅酸味收濕熱之痰隨上升之氣至於頭蒸薰髮根之
血漸成枯槁遂一時盡脫遂處以補血升散之藥用防風
通聖散去芒硝惟大黃三度酒炒煎以四物湯酒製合和
作小劑煎以灰湯入水頻與之兩月餘後診其脈濕熱漸
解停藥淡味調養又二年髮長如初而愈

虛

竹滋榮散長養髮髮落最宜

雜方

生姜焙乾

人參兩一

右細末每用生姜一塊切斷薩藥末於髮落處擦之二日一次用

世三聖膏治髭髮脫落能令再生

黑附子

蔓荊子

栝子仁

各半

右為末烏雞脂和勻搗研乾置瓦合內封固百日取出塗在髭髮脫處三五日即生自然牢壯不脫

本甜瓜葉治人無髮搗汁塗之即生

法治髮落不生令長麻子一升熬令黑壓油以傅頭髮上妙

聖治生眉毛用七月烏麻花陰乾為末生烏麻油浸每夜傅之烏麻即秋麻是也

二陰

腎

紫北方黑色入通於腎開竅於二陰

金匱真言論

前陰縮縱等疾屬肝經病見肝部

後陰痔脫肛等疾屬大腸腑病見肺部

欠嚏

腎主欠

腎主欠嚏經云腎為欠為嚏是也

嚏

運氣欠嚏有三

一曰寒經云太陽司天寒氣下臨心氣上從寒清時舉軌嚏喜悲數欠是也

二曰火經云少陽司天之政三之氣炎暑至民病嚏欠是也

三曰濕鬱其火經云陽明司天之政初之氣陰始疑民病中熱嚏欠是也

欠伸

陽明厥

二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠全文見診病傳變王註云氣鬱於胃故欠生焉

運氣

運氣欠伸皆屬風經云厥陰在泉風淫所勝病善伸數欠治以辛是也

診

中寒家善欠

針灸

黃帝曰人之欠者何氣使然岐伯曰衛氣晝日行于陽

夜半則行于陰陰者主夜夜者卧陽者主上陰者主下故

陰氣積于下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故

數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡陽氣盛則寤矣瀉足

少陰補足太陽口問篇

針灸欠伸有二法此篇經文取足少陰太陽是其一也其

二取胃經云胃足陽明之脈是動則病振寒善伸數欠視

盛虛實寒陷下調之也

火熱

嚏

河嚏鼻中因痒而氣噴作于聲也鼻為肺竅痒為火化心

火邪熱于于陽明發于鼻而痒則嚏也或故以物擾之痒

而嚏者擾痒屬火故也或視日而嚏者因目為王藏神華

太陽真火晃曜于目心神躁亂而熱發于上則鼻中痒而

嚏也

運氣

運氣嚏有三

一曰熱火經云少陰司天之政熱病生於上民病血溢鼽

嚏又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從病嚏鼽衄又云少

陰之復燠熱內作煩躁鼽嚏又云少陽所至為鼽嚏又云

少陽司天火氣下臨肺氣上從欬嚏鼽衄治以諸寒是也

二曰金不及火乘之經曰金不及曰從革從革之紀其病

嚏咳鼽衄從火化者是也

針灸

三曰燥金經云陽明所至為孰嚏是也

靈黃帝曰人之嚏者何氣使然岐伯曰陽氣和利滿於心

出於鼻故為嚏補足太陽榮眉本一曰眉上也口問篇○眉本恐攢

式竹

嚏理不密噴嚏不已 風門一分沿皮向後 半寸補一呼

其人清涕出發熱色和者善嚏

身軀拘急

運氣

運氣拘急屬寒及寒濕風濕經云諸寒收引皆屬於腎又云太陰司天之政民病寒厥拘急初之氣風濕相搏民病經絡拘強關節不利治法蓋小續命湯仲景三黃湯之類是也

夢遺 白濁

丹精滑專主濕熱用黃柏知母牡蠣蛤粉 夢遺專主熱

火法

與帶下同治法

虛實 寒熱

本治夢遺有數種下元虛憊精不禁者宜服茴香丸年壯氣盛又節淫慾經絡壅滯者宜服清心丸有情慾淫動經謂所愿不得名曰白淫宜良方茯苓散正如瓶中煎湯氣盛盈溢者如瓶中沸湯而溢慾動心邪者如瓶傾側而出憊虛不禁者如瓶中有罅而漏不可一槩用藥也又有一說經曰腎氣閉即精泄素問云腎者作強之官伎巧出焉又曰腎藏精蓋腎能攝精氣以生育人倫者也或育或散皆主於腎今腎氣衰則一身之精氣無所管攝故妄行而出不時也猪苓丸一方正為此設

虛憊不 禁者補 虛瀉精

內傷氣血不能固守夢遺者當補以八物湯加減吞檉根皮丸

面色白而不澤○難經云肺太過則令人面白善嚏悲

愁不樂欲哭面色白為寒脈沉厥急按之空虛色白脫氣
又為脫血又為脫津又為脫液又為脫精又為脫神是元
神漂浮乎外將離躰之象也其脈按之不鼓猶為亡陽况
虛空者乎病乃陰寒極矣若脈或盛大而濇猶為中寒之
病也况虛空者乎宜峻補之

巴戟丸治肝腎俱虛收斂精氣補其元陽充悅肌膚進美
飲食

五味子

川巴戟去心

肉蓯蓉酒洗

兔絲子炒

人參

白朮

熟地

骨碎補祛

茴香

牡蠣

白龍骨

覆盆子

益智仁各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九丸空心食前米飲下
日二三服補精止汗虛甚者用八物湯吞之

本治遺精夢泄關鎖不固金鎖丹亦名茴香丸

舶上茴香

葫蘆巴

破故紙

白龍骨各一

木香一兩半

胡荽三十個研

羊腎膏三對取用鹽半兩煉炙熱研如膏

右五味為末下二味同研成膏和酒浸蒸餅杵熟丸如
桐子大每服三五十九丸空心鹽湯下

羅固真丹

晚蚕蛾二兩

肉蓯蓉

白茯苓

益智各一兩

龍骨

右用鹿角膠酒浸化開丸桐子大每服三粒空心温酒
下乾物壓之

補真玉露丸治陽虛陰盛精脫淫瀼脛酸一方無茯苓

白茯苓去皮

白龍骨水飛

韭子酒浸炒

兔絲子酒浸各等

修合

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十九溫酒下鹽湯亦得空心食前服少時以美饌壓之梅師方止用龍骨四分韭子五合為散空心酒調服方寸匕治失精暫睡即泄聖惠方止用韭子微炒為散食前酒下二錢匕治夢中泄精外臺方用新韭子二升十月霜後枯者好酒八合浸一宿明日日色好令童子向南搗一萬杵平旦溫酒服方寸匕治虛勞采精再服立瘥此龍骨韭子為世精要藥也

梅治精滑久不固牡礪不拘多少砂鍋內醋焯七次細末醋糊丸桐子大每五十九空心鹽湯下

右龍骨牡礪治夢遺例王元珪虛而泄精脈弦大累與加減八物湯吞河間秘真丸及珍珠粉丸其泄不止後用五倍子一兩茯苓二兩為丸服之良愈此則五倍子瀉脫之功敏於龍骨蛤粉也

思想外
通首鎮
大等滯**河**秘真丸治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐陰人通洩

龍骨

一兩
另研

大訶子皮

五個

硃砂

一分為衣
一兩研細

縮砂

兩半

右為末麩糊丸菘荳大每服一二十九空心溫酒下熟水亦得不可多服太秘

本治虛損補精水壯筋骨益心智安魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽閉固天癸八仙丹

伏火硃砂

真磁石

赤石脂

代赭石

石中黃

禹餘糧

乳香

沒藥

各一兩

右為末研勻極細糯米濃飲丸桐子大或荳大每服一粒空心鹽湯下有人年幾七旬夢漏羸弱氣憊然虛損得此方服之頓爾強壯精氣閉固飲食如故予常製自服良驗

經云思想無窮所愿不得意淫於外入房大甚宗筋施縱

可壯節
悉指溢
者降火
補陰

發為白淫夢遺等症先賢治法有五 右法用辰砂磁石
龍骨之類鎮墜神之浮游是其一也 其二思想結成痰
飲迷於心竅而遺者許學士用猪苓丸之類導利其痰是
也方見治 其三思想傷陰者潔古珍珠粉丸用蛤粉黃
栢降火補陰是也方見 其四思想傷陽者謙甫鹿茸菴
蓉兔絲子等補陽是也方見白 其五陰陽俱虛者丹溪
治一形瘦人便濁夢遺作心虛治用珍珠粉丸定志丸服
之定志丸者遠志菖蒲茯苓人參是也

年少壯節慾遺泄者宜清心丸珍珠粉丸清心方
珍珠粉丸治白淫夢遺泄精及滑出不收見熱條

黃栢皮一斤新瓦 真蛤粉一斤

右為細末滴水丸如桐子大每服一百丸空心温酒送
下法曰陽盛乘陰故精泄也黃栢降火蛤粉鹹而補腎

陰

精滑不禁方用海蛤粉青黛香附黃栢知母之類

大鳳髓丹治心火狂陽太盛補腎水真陰虛損心有所
欲速于感動應之于腎疾于施泄此方固真元降心火益
腎水大有神効

黃栢兩炒二 縮砂兩一 甘草兩半 半夏炒

木猪苓 茯苓 紅蓮蕊 益智仁各三錢五

右為丸每服五七十九丸若只用黃栢甘草縮砂三味為
正鳳髓丹只用黃栢甘草二味為小鳳髓丹古人云瀉
心者非也乃瀉相火益腎水之劑

治經絡熱夢遺心忪恍惚膈熱清心丸用好黃栢皮一
兩研為細末生腦子一錢同研勻煉蜜為丸如桐子大每

腰脊時
有熱脈
熱數為

少腹急
陰頭寒
脈乳遲
為寒

服十九至十五丸濃煎麥門冬湯吞下大智禪師云夢遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之也嘗治一男子至夜脊心熱夢遺用珍珠粉丸猪苓丸遺止終服紫雪膏熱始除又一男子脈洪腰熱遺精用沉香和中丸下之導赤散治其火而愈於此知身有熱而遺者皆熱遺也

中夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虛乳遲為清穀亡血失精脈得諸乳動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之

桂枝 芍藥 生姜各三兩 甘草二兩

大棗十二枚 龍骨_煨 牡蠣_{煨各三兩}

右七味水七升煮三升分溫三服

天雄散方

天雄_炮 龍骨_{各三兩} 白朮_{八兩} 桂枝_{六兩}

清之不
止為虛
寒

右四味杵為散酒服半錢七日三服不止稍增之
愚壯年得夢遺症每四十五日必一遺累用鳳髓丹河間秘真丸雖少効終不除根後改用菖蒲遠志韭子桑螵蛸益智酸棗仁牡蠣龍骨瑣陽等劑為丸服之良愈
又一中年男子夢遺以珍珠粉丸等藥與服了無一効亦以遠志菖蒲等劑服之隨手而愈

澀之及
甚為難
滯

本猪苓丸用半夏一兩破如莖大猪苓末二兩先將一半炒半夏色黃不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶內養之空心溫酒鹽湯下三四十丸常服於申未間溫酒下○此古方也
今盛行於時而人多莫測其用半夏有利性而猪苓導水蓋腎閉導氣使通之意也予醫囊中嘗貯此藥緩急與人三五服皆隨手而驗林監丞庇民亦數服而愈

詳此治夢遺方屬鬱滯者居大半庸醫不知其鬱但用
龍骨牡蠣等瀉劑固脫殊不知愈瀉愈鬱其病反甚常
治一壯年男子夢遺白濁少腹有氣衝上每日腰熱卯
作酉涼腰熱作則手足冷前陰無氣腰熱退則前陰氣
耕手足溫又且多下氣暮多噫時振隔一旬二旬必遺
脈且弦滑而大午洪大予知其有鬱滯也先用沉香和
中丸大下之次用加減八物湯吞滋腎丸百粒若稍與
蛤粉等瀉藥則遺與濁反甚或一夜二遺遂改用導赤
散大劑煎湯服之遺濁皆止漸安又一中年男子皆夢
遺醫或與瀉藥反甚連遺數夜愚先與神芩丸大下之
却製此猪苓丸服之皆得痊安又丹溪先生治鎮守萬
戶蕭伯善便濁精滑不禁百藥不效與試倒倉法而安
於此見夢遺屬鬱滯者多矣

治精滑不禁用局方青州白丸子用辰砂為衣服之神
効

烏金散治夢泄精滑不禁九肋鱉甲每服二字用清酒
半盞童便半小盞陳葱白七八寸同煎七分和查日兩服

本草云鱉甲主
心腹癥瘕堅積

治男子夢與鬼交心神恍惚者刮鹿角屑三指撮日二
服酒下食療同

本草云鹿角屑
逐惡氣惡血

遺精白濁夜夢鬼交 心俞 一分沿皮向外一寸半
先補後瀉灸不宜多

白環俞 一寸半瀉六
吸補一平

又法 白環俞 一寸半灸五十
壯與中極相平 腎俞中極 灸隨
年壯

又法 腎俞 心俞 膏肓 關元 三陰 下穴
不巳取

腰脊冷濕多白濁失精 脾募 三七
壯 曲泉 灸

虛勞失精陰縮莖中痛 大赫 三七
壯 中封 灸

針灸

針方

華遺精五臟虛竭東陽曲骨端四七壯在陰橫骨中

東溺血精出列缺五分

遺丈夫失精中極主之男子精益陰上縮大赫主之

遺男子精溢脛痠不能久立然谷主之男子精不足太衝

主之

白濁

濕痰

便濁大槩皆是濕痰流注宜燥中宮之濕用二陳湯加蒼朮白朮燥去其濕肥白人必多濕痰以二陳去其濕熱胃弱者兼用人參以柴胡升麻升其胃中之氣胃中濁氣下流必用二陳加蒼朮白朮柴胡升麻一婦人年近六十形肥奉養膏粱飲食肥美中焦不清積為濕氣流入膀胱下注白濁白濁即濕痰也用二陳去痰蒼朮白朮去濕補胃加升麻柴胡升胃中之清氣服四貼後濁減大半

却覺胃滿因柴胡升麻升動胃氣痰阻滿悶而然間用二陳湯加炒麩白朮香附以泄其滿若素無痰者雖升動胃氣不滿也兼用青黛檮皮蛤粉炒黃栢炒乾姜滑石為末炒神麩糊丸服之

凡便濁服藥必兼服加減珠粉丸

蛤粉

青黛

此二味主胃中濁氣下流降入膀胱

檮皮末

大燥濕熱

滑石

黃栢

乾姜

炒褐色味苦斂肺氣下降使陰血生乾姜

製

右為末炒神麩為丸

又方

黃栢炒

黃栢生

蛤粉各一兩

神麩半兩

右為末滴水丸服

白濁濕熱傷氣

白濁者濕熱傷氣久下不止此係火不守也知母黃栢炒

附子各等分水丸服

赤濁濕熱傷血

赤濁者濕熱傷血於二陳湯中加白芍藥仍用炒栝蛤粉椿皮滑石青黛以神麩為丸一方加乾姜炮褐色固而不走

虛寒

羅白淫諸症○痿論曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫夫腎藏天一以慳為事志意內治則精全而瀋若思想外淫房室太甚則固有淫泆不守輒隨瘦溺而下也然本於筋痿者以宗筋弛縱也

內補鹿茸丸治勞傷思想陰陽氣虛益精止白淫

- 鹿茸酥炙
- 兔絲子酒浸
- 菝葜炒
- 白蒺藜
- 肉蓯蓉
- 紫苑
- 蛇床子酒浸
- 黃芪
- 桑螵蛸
- 陽起石
- 附子炮
- 官桂各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服二十九食前溫酒送下

茯苓丸治心氣不足思慮太過腎經虛損其陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

- 兔絲子酒浸五兩
- 石蓮去壳三兩
- 白茯苓去皮二兩

右為細末酒糊為丸如桐子大每服三十九鹽湯下常服鎮益心神補虛養血清小便

金箔丸治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

- 蚕蛾
- 破故紙炒
- 韭子炒
- 牛膝酒浸
- 肉蓯蓉
- 龍骨
- 山茱萸
- 桑螵蛸

- 兔絲子酒浸各一兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九溫酒空心下

王瓜散治小便自利如泔色此腎虛也

王瓜根

桂心各一兩

白石脂

兔絲子酒浸

牡蠣

鹽泥燒赤候冷去泥各二兩

右為末每服二錢煎大麥粥湯調下日三服食前

楊梅 草薺分清飲治白濁凝面如油光彩不定凝脚如糊

益智仁

川草薺

石菖蒲

烏藥各等分

右咬咀每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服

一方加茯苓甘草

恐

診

恐與驚悸相似實非驚悸也張子和云驚者為自不知故也恐者為自知也蓋驚者聞響即驚恐者自知如人將捕之狀及不能獨自坐臥必須人為伴侶方不恐懼或夜必用燈照無燈燭亦恐懼者是也

臟腑恐有四

腎

一曰腎經云在臟為腎在志為恐又云精氣并於腎則恐

是也

餘見虛條及針灸條

肝膽

二曰肝膽經云肝藏血血不足則恐戴人曰膽者敢也驚

怕則膽傷矣蓋肝膽實則怒而勇敢肝膽虛則善怒而不

敢也

餘見同上

胃

三曰胃經云胃為恐是也

心

四曰心經云心怵惕思慮則傷神傷神則恐懼自失者是

也

因恐得之為傷

丹周本心年六十歲形氣俱實因大恐正月間染病心不

自安如人將捕之狀夜臥亦不安兩耳後亦見火光炎上

食飲雖進而不知味且乾而不欲食以人參白朮當歸身

為君陳皮為佐加鹽炒黃柏參各少許煎服自愈月

眩而恐
為胆虛

餘而安

經云恐傷腎丹溪用益炒黃柏炙玄參引參歸等藥入補腎足少陰絡也

不治膽虛常多畏恐不能獨臥如人捕之狀頭目不利人參散

人參

枳殼

五味子

桂心

甘菊花

茯神

山茱萸

枸杞子各三分

栝子仁

熟地各一兩

右細末每二錢温酒調服

治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胃中滿悶茯神散

茯神一兩

遠志

防風

細辛

白朮

前胡

人參

桂心

熟地

甘菊花各三分枳殼兩

右為末每服三錢水一盞姜三片煎六分温服不拘老

切皆宜服

治膽虛目暗喉痛數睡眼目眩冒五色所障夢見被人爭訟恐懼面色變者補膽防風湯

防風錢一

人參七分

細辛

芎藭

甘草

茯苓

獨活

前胡各八分

運氣 右粗末每四大錢水盞半冬二枚煎八分去查食前服運氣善恐皆屬肝木虛經云木不及曰委和委和之紀其

病淫動注恐是也

針灸

內經針灸善恐有三

其一取腎經曰腎足少陰之脈是動病氣不足則善恐心惕惕如人將捕之虛則補之寒則留之是也

其二取肝經云肝虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽是也

其三取膽經云膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之取陰陵泉又云善嘔嘔有苦善太息心中憺憺恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則少陰血絡以閉膽逆却調其虛實以去其邪是也

甲心如懸哀而亂善恐噎內腫心惕惕恐如人將捕之多涎出喘少氣吸不足以息然谷主之澹澹而善驚恐

心悲內關主之

千金作曲

醫學綱目卷之二十九

醫學綱目卷之三十

傷寒部

傷寒通論

續傷寒通論

大法

凡傷於寒則為病熱熱雖甚不死若兩感于寒而病者必死 尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脈上

連風府故頭項痛腰脊強 尺寸俱長者陽明受病也當

三日前三日
病傳三
陽宜汗

二三日發以其脈俠鼻絡于目故身熱目疼鼻乾不得卧 尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脇絡

于耳故胃脇痛而耳聾此三經皆受病未入於腑者可汗而巳

三日後
病傳三
陰宜下

尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾 尺寸俱沉者少陰受病也當五

六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

也 云經云一二日少陰者謂初中病時便入少陰不經三陽也 大抵傷寒發于陽則太陽也發于陰則少陰也凡病一

日。至。十二。三。日。太。陽。症。不。能。罷。者。俱。治。太。陽。有。初。得。病。便。見。少。陰。症。者。且。夾。少。陰。亦。不。必。先。自。巨。陽。蓋。寒。入。太。陽。即。發。熱。而。惡。寒。不。入。少。陰。尺。寸。俱。微。緩。者。厥。陰。受。病。也。當。六。七。日。發。以。其。脈。循。陰。器。絡。于。肝。故。煩。滿。而。囊。縮。煩。滿。謂。少。腹。云。十。二。日。厥。陰。病。陰。囊。縮。少。腹。微。下。謂。向。者。囊。之。縮。者。今。復。病。少。腹。之。煩。滿。故。令。微。下。也。此。三。經。皆。受。病。已。入。於。腑。可。下。而。已。

三日陰陽俱傳日兩感者多死

若兩感於寒者一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五臟六腑皆受病則榮衛不行臟腑不通而死矣

三日無陽症不傳陽

傷寒一日太陽受之脈若靜者為不傳煩欲吐若躁煩脈微急者為欲傳也傷寒二三日陽明少陽症不見者不傳也

三日後能食不嘔者不為三陰不受邪也

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此

傳陰三日脈微小而身溫者欲解

問曰傷寒三日脈浮數而微病人身溫和者何也荅曰此為欲解也以夜半脈浮而解者澀然汗出也脈浮而解者必能食也脈不浮而解者必大汗出也三日少陽脈小欲已也

七日傳經盡當病衰

其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰耳聾微聞也十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日厥陰病衰囊縮少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也太陽病頭痛至七日已上自愈者行其經盡故也若欲再傳經者針足陽明使不傳則愈

七日脈
大煩躁
者解

六七日脈至皆大煩而口噤不言躁擾者必欲解也論見後條
傷寒六七日無大熱其人躁煩此為陽去入陰故也

十三日
不減脈
沉者危
更感異
氣者來
他病

若過十三日已上不間間廖尺寸陷者大危
若更感異氣變為他病者當依舊壞症而治之若脈陰陽
俱盛重感於寒者變為溫瘧 陽脈浮滑陰脈濡弱者更
遇於風變為風溫 陽脈洪數陰脈實大者遇溫熱變為
溫毒為病最重也 陽脈濡弱陰脈弦緊者更遇溫氣變
為溫疫以冬傷於寒發為溫病脈之變症方治如說見後條
凡發汗欲令手足皆周至熱熱然一時間許益佳不可令
如水流漓耳若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得
重發汗也活人云發汗必須如常覆蓋腰已上厚衣覆之
腰已下蓋之若腰已上淋漓而腰已下至足心
微潤病終不解凡云可發汗而無湯者丸散亦可用要以汗出
為解然不如湯隨症良驗 凡發汗溫服湯藥其方雖言

日一二服若病劇不解當促其服可半日間盡一二服若
與病相值即便有所覺重病者一日一夜當晬時觀之如
服一劑病症猶在故當復作本湯服之至有不肯汗出服
三劑乃解若汗不出者死病也 凡服湯藥發汗中病即
止不必盡劑吐下亦如之

許學士云記一鄉人傷寒身熱大便不通煩渴鬱冒醫者
用巴荳下之頃得溏利宛然如舊予觀之陽明結熱在裏
非大柴胡承氣不可巴荳止去積不能蕩滌邪熱蘊毒亟
進大柴胡等三服得汗而解嘗謂仲景一百一十三方為
丸者有五理中陷胃抵當烏梅麻仁是以理中陷胃抵當
皆大如彈子煮化而服與湯散無異至於麻仁治脾約烏
梅治濕蠶皆用小丸以達下部其他逐邪毒破堅癥導滌
血潤燥葢之類皆憑湯劑未聞用巴荳小丸藥以下邪氣

也既下而病不除不免重以_{大黃芒硝}下之安能無損也哉

欲攻當先表後下

凡傷寒之病多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣擬欲攻之猶當先解表乃可下之若表已解而內不消大

汗症汗後不罷者再汗

滿大實堅有燥屎者自可除下之雖四五日不能為禍也服桂枝湯大汗出脈洪大者復與桂枝湯如前法論見

日內可二三汗之令腰已下周遍為度

汗吐下溫針後不解為壞症

凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈重

針仍不解者此為壞症桂枝不中與也觀其脈症知犯何

逆當隨証治之

下後症

夫病陽多者熱下之則鞭無陽陰強大便鞭者下之則必

清穀腹滿

診病

脈師持脈病人欠者無病也脈之呻者病也言遲者風也

搖頭言者裏痛也行遲者表強也坐而伏者氣短也坐而

下一脚者腰痛也裏實護腹如懷卵物者心痛也寸口

諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊為寒諸乘寒者則為

厥鬱胃不仁以胃無穀氣脾瀆不通口急不能言戰而慄

也微脈極細而軟濡脈極軟而沉細也而浮細弱脈極軟而沉細

病六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁

擾必欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知脈浮故知

汗出解也若脈和平其人大煩目重臉內際黃者皆為欲

解也

寸關尺同等者當愈

河曰脈病欲知愈未愈者何以別之荅曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脈為陰陽

和平雖劇當愈

針經禁服篇云寸口人迎兩者相應若引繩大小齊等者名曰平人言手之寸口脈

與喉旁之人迎脈等齊為平人後條云六脈陰陽俱停必先振慄汗出而解者是也 凡得病厥脈

動數服湯藥更遲脈浮大減小初躁後靜此皆愈症也

脈浮數而微病人身溫和者欲解也論見前條 凡病反能飲

水者為欲愈論見腹渴 太陰中風脈陽微陰濇而長者為欲

愈論見腹滿 少陰中風脈陽微陰浮者欲愈論見欲寐 厥陰中

風脈微浮者欲愈不浮未愈

能飲水者欲解三陰病脈浮長者欲愈 三陽旦

解 太陽病巳至未解見發熱 陽明病申至戌解見胃實

三陰夜 少陽病寅至辰解見口苦 太陰病亥至丑解見腹滿

解 少陰病子至寅解見欲寐 厥陰病丑至卯解見氣上衝心

登得夜解夜得 問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令日中得病夜半

愈者以陽得陰則解也夜半得病日中愈者以陰得陽則解也 病家人請云病人苦發熱身軀疼痛病人自臥師到

診其脈沉而遲者知其瘥也何以知之表有病者脈當浮

大今反沉遲故知愈也假令病人云腹內卒痛病人自坐

師到脈之浮而大者知其瘥也何以知之若裏有病者脈

當沉而細今脈浮大故知愈也

脈浮緊按之芤 問曰病有戰而汗出者因得解者何也答曰脈浮而緊按

之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰

以脈浮故當汗出而解也

脈浮大按之不 若脈浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但出汗耳

不發戰也 問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脈大

而浮數故知不戰汗出而解也

脈微當不戰不 問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脈自微此以

曾經發汗若吐若下若亡血以內無津液待陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也

右海藏云戰而後解者太陽也不戰有汗而解者陽明也不戰無汗而解者少陽也

診生死

太陽病未解脈陰陽俱停必先戰慄汗出而解陽微者汗解陰微者下解論見發熱篇凡脈大浮數動滑此名陽也沉

瀋弦弱微此名陰也凡陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死陰陽俱盛大汗出不解者死陰陽俱虛熱不止者死又診生死詳法並見診法門

禁忌 服藥正如方法縱意違師不須治之

諸脈沉及尺脈久則譫語也論見脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之

假令尺中遲者不可發汗何以知之以榮氣不足血少故也活人云先以小建中湯加黃芪如尺脈尚遲再作一劑却服柴胡桂枝二越婢一湯其湯分小劑和解之愈

許學士云一鄉人丘生者病傷寒發熱頭疼煩渴脈雖浮

數無力尺以下遲而弱予曰此雖麻黃症而尺遲弱仲景云尺中遲者榮氣不足血氣微少未可發汗予於建中湯加當歸黃芪今飲翼日脈尚爾其家煎迫日夜督發汗藥幾不遜矣予忍之但只用建中調榮而已至五日尺部方應遂投麻黃湯啜二服發狂須臾稍定略睡已中汗矣信知此事誠難仲景雖云不避晨夜即宜便治醫者亦須顧其表裏虛實待其時日若不循次第暫時得安損五臟以促壽限何足貴哉昔南史載范雲傷寒恐不得預武帝九錫之慶召徐文伯診視以實懇之曰可便得愈乎文伯曰便瘥甚易只恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死猶可况二年乎文伯以火燒地布桃葉設席置雲於其上頃刻汗解撲以溫粉翼日果愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒夫取汗先期尚促壽限况不顧表裏不待時日

便欲速効乎每見病家不柰病未三四晝夜促汗醫者隨情順意鮮不敗事予故書此為戒

脈浮大應發汗醫者反下之此為大逆 諸外實者不可

諸外實者

下下之則發微熱脈厥者當臍握熱 諸虛者不可下下

之則大渴求水者易愈惡水者劇 太陽症表未解不可

諸虛者

下下之為逆 論見發熱 脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上瀼反在下微則

諸脈濡弱微瀼者忌汗

陽氣不足瀼則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩瀼則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠 陽微不可下下之

則心下痞鞭是復不可下之

則心下痞鞭 陽微不可下下當 脈浮熱甚反灸之此為實以虛治因火而動必咽燥唾吐

微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也 脈浮

宜汗反用火灸之邪無從出腰以下必重而痺 論見下重

有汗便數飲酒者忌桂枝

桂枝本為解肌若其脈浮緊發熱無汗者不可與也常須識此勿令悞也 脈浮自汗小便數微惡寒脚攣急忌桂

枝湯攻表 論見厥 酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒

客不喜甘故也

便瀉忌梔子

凡用梔子湯病人舊微瀉者不可與服之 若不瀉下而便攻之內虛熱入挾熱遂利煩躁諸變不可

誤下諸變症

勝數輕者困篤重者必死矣 太陽病下之其脈促不結

胃者此為欲解也脈浮者必結胃也脈緊者必咽痛脈弦

者兩脇必拘急脈細數者頭痛未止脈沉緊者必欲嘔脈沉滑者挾熱利脈浮滑者必下血

續傷寒通論

發熱惡寒

發熱惡寒身軀痛而脈浮者表証也表証者惡寒是也

脈浮為表

惡寒者屬太陽宜汗之

成惡寒一切屬表雖裏症悉具而微惡寒者亦是表未解也猶當先解其外候不惡寒為外解乃可攻裏也

發熱惡熱便硬腹滿脈沉為裡

不惡寒反惡熱手掌心并腋下濺濺汗出胃中乾燥結聚潮熱大便鞭小便如常腹滿而喘或譫語脈沉而滑者裏症也裏症者內熱是也內熱者屬陽明宜下之 傷寒始

發熱惡寒今汗後不惡寒但倍發熱而躁始脈浮而大今脈洪實或沉數細始惺靜今狂語此為胃實陽盛再汗即死須下之則愈亦有始得病便變陽盛之症須便下之不可拘以日數更有心胸連腹臍大段痞悶腹中痛坐臥不安胃悶喘急極者亦不問他症便下之若失下則氣血不通四肢便厥醫人不知反疑是陰厥復進熱藥禍如反掌不可不察也

寒熱往來腸滿脈弦為半表半裡

成邪之客於表者為寒邪與陽相爭則為寒矣邪之入於裏者為熱邪與陰相爭則為熱矣邪在半表半裏外與陽爭而為寒內與陰爭而為熱是以往來寒熱邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪半在表半在裡則寒熱亦半矣邪在表者必瀆形以為汗邪在裏者必蕩滌以取利其餘不外不內半表半裏又非發汗之所宜亦非吐下之所對是當和解則可矣小柴胡為和解之劑也

表裡俱見

治傷寒表症當汗裡症當下不易之法也發表攻裡本自不同甘遂神丹不可合飲桂枝承氣安可並進然而假令病人脈浮而大是表症當汗其人發熱煩渴小便赤却當下此是表裡俱見五苓散主之 假令傷寒不大便六七日頭痛有熱者是裏症當下其人小便清者知不在裏仍在表也當須發汗此是兩症俱見即未可下宜與桂枝湯

假令病人心下滿口不欲食大便鞭脈沉細是裏症當下其人頭汗出微惡寒手足冷却當汗此兩症俱見者仲景所謂半在表半在裏也小柴胡主之 假令太陰病表症未除而醫數下之遂挾熱而利不止心下痞鞭仲景謂之表裏不解桂枝人參湯主之 本太陽病醫反下之因爾腹痛是有表復有裡仲景用桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃 又云太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩湯主之此皆仲景治傷寒有表復有裡之法也

大柴胡湯治表裡內外俱熱之症治有表者或脈浮或頭痛或惡風或惡寒四症中或有一二尚在者乃十三日過經不解是也治有裡者或譫語或妄語或擲手揚視此皆裡之急者也若欲汗之則裡症已急欲下之則表証尙

在通宜大柴胡湯

無表裡症

傷寒四五日後以至過經無表症又於裡症未可下者皆可用小柴胡隨証加減用之以至十餘日亦可用十餘日外用小柴胡不愈者若大便鞭看症可下則用大柴胡下之以過經其人稍虛當下者用大柴胡湯則穩當恐承氣太緊病人不禁也仲景云六七日目中不了了睛不和無表裡症大便難身微熱此爲實也當下之宜大承氣湯又云病人無表裡症發熱七八日脈雖浮數可用大柴胡下之假令已下脈數不解至六七日不大便者有瘀血也屬抵當湯

百病皆分表裡

治傷寒須分表裡若表裡不分汗下差誤豈爲上工且如均是發熱身熱不渴爲表有熱小柴胡加桂枝主之厥而脈滑爲裡有熱白虎加人參主之均是水氣乾嘔微利發

熱而咳爲表有水小青龍加芫花主之体凉表症罷欬而脇下痛爲裡有水十棗湯主之均是惡寒有熱而惡寒者發於陽也麻黃桂枝小柴胡主之無熱而惡寒者發於陰也附子四逆主之均是身躄痛脈浮發熱頭痛身体痛者爲表未解麻黃湯主之脈沉自利身体痛者爲裏不和四逆湯主之以此觀之仲景表裏之法甚詳學者宜深究心也

半表半裡不同

海半表半裏者有幾夫邪在榮衛之間謂之半表半裏也太陽陽明之間少陽居身之半表半裏也五苓散分陰陽膀胱經之半表半裏也理中湯治吐泄上下之半表半裏也

頭痛身熱脈浮洪爲陽

活太陽陽明少陽皆屬陽症也太陽者膀胱也發熱惡寒頭疼腰痛而脈浮也陽明者胃也不惡寒反惡熱濇濇汗

出大便秘潮熱而脈長也少陽者膽也口苦咽乾脇下滿發熱而嘔或往來寒熱而脈弦也麻黃湯大青龍湯桂枝湯治太陽傷風寒也大柴胡湯調胃承氣湯小承氣湯大承氣湯治陽明傷寒也小柴胡湯治少陽傷寒也其他藥皆發汗吐下後症也若陽氣獨盛陰氣暴絕卽爲陽毒必發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑如錦紋或下利黃赤脈洪實或滑促當以酸苦之藥投之令陰氣復而大汗解矣古人云酸苦涌泄爲陰謂苦參大青葶藶苦酒之類皆復其陰氣也微用苦甚則兼用酸苦折熱復陰若熱極發厥陽症似陰者學者當以脈別之

此利厥陰脈沉微爲陰

太陰少陰厥陰皆屬陰症也何謂太陰症太陰脾之經主胃膈脹何謂少陰症少陰腎之經主脈細心煩但欲寐或自利而渴何謂厥陰症厥陰肝之經主消渴氣上衝心

心中疼熱饑不欲食食則吐虵下之利不止也三陰中寒
微則理中湯稍厥或中寒下利即乾姜甘草湯大段重者
用四逆湯無脈者用通脈四逆湯若陰氣獨盛陽氣暴絕
則為陰毒其症四肢逆冷臍腹築痛身如被杖脈沉實病
或吐或利當急灸臍下服以辛熱之藥令復陽氣而大汗
解矣古人云辛甘發散為陽謂桂枝甘草乾姜附子之類
能復其陽氣也微用辛甘甚則用辛苦若陰極熱躁陰症
似陽者學者亦當以脈別之

陰症陽
症辨

陰症陽症辨 靜江府提刑李君長子年十九歲四月
病傷寒九日醫者作陰症治之與附子理中丸數服其症
增劇別易一醫又作陽症議論差互不敢服藥李君邀予
往視坐間有數人予不欲直言其症但細為分解令自忖
度之凡陽症者身大熱而手足不厥臥則怛然起則有力

不惡寒反惡熱不嘔不瀉渴而飲水煩躁不得眠寤之而
多語其脈浮大而數者陽症也凡陰症者身不熱而手足
厥冷惡寒踈臥惡聞人聲或自引衣蓋覆不煩渴不飲食
小便自利大便反快其脈沉細而微遲者陰症也今診其
脈數得六七至其母云夜來叫呼不絕全不睡又喜飲冰
水予聞其言知陽症悉具且三日不見大便宜急下之予
遂以酒煨大黃六錢甘草炙二錢芒硝五錢煎服至夕下
數行燥糞二十餘塊是夜汗大出明日又往視之身涼脈
靜矣予思素問熱論云治之各通其臟腑故仲景述傷寒
論云六經各異傳變不同活人亦云凡治傷寒先須明經
絡其義一也昧者不學經絡不問病源按寸握尺妄意病
症不知邪氣之所在動致顛覆真盲醫哉昔韓子云醫之
病病在少思真理致之言也學者審之

陰症似陽陽症似
陰並見陰陽藏府

汗下大
法汗下
但當隨
症不可
拘日數

未滿三日可汗而已滿三日者可泄而已此大略言之耳凡病人有虛有實邪氣傳受遲速不同豈可拘以日數仲景云日數雖多但有表症而脈浮者猶宜發汗日數雖少若有裏症而脈沉者即宜下之正應隨脈治之又況六氣之邪乘虛之經皆自背得之則入太陽或入少陰自面感之則入陽明之類不必皆始於太陽也兼寒邪有首尾止在一經或間傳一二經不可以一理推但視脈與外症治之此活法也假令有人脈浮頭項強痛發熱而惡寒每日如此不以日數多少正是太陽經受之其餘經皆倣此大抵傷寒惟憑脈與外症以汗下之若過日多脈尚大浮數按之不足者尚責太陽也可發汗而愈若按之實者汗之必死須下之而愈也若始病脈沉細數外症或腹滿咽

乾或口燥舌乾而渴為熱正責屬裏可下之而愈若無此症表熱脈沉誤下者必死須用麻黃附子甘草麻黃細辛附子湯少發汗以治之此皆仲景之確論也 傷寒脈浮而緊身軀拘急惡寒無熱寒多熱少面色慘而不舒腰脊疼痛手足四末微厥此麻黃症也 傷寒脈浮而緩寸大而尺弱自汗體熱頭疼惡風寒多熱少其面光而不慘煩躁手足不冷此桂枝症也

辨傷寒
傷風汗
症不同

傷寒者脈緊而清傷風者脈浮而緩傷寒無汗傷風有汗傷寒畏寒不畏風傷風不畏風不畏寒大抵太陽病者必脈浮發熱惡風惡寒惡寒者不當風而自憎寒惡風者當風而憎寒也 六經皆有傷風傷寒其症各異太陽脈浮有汗為中風脈緊無汗為傷寒陽明善饑為中風不食為傷寒少陽兩耳聾目赤曾滿而煩為中風口苦咽乾目眩為

傷寒若三陰傷風無變異形症但四肢煩疼餘症同三陽也 傷風見寒脈者發熱惡風煩躁手足溫而脈反浮緊蓋發熱惡風煩躁手足溫為中風候脈浮緊為傷寒候也 傷寒見風脈者寒多熱少不煩躁手足微厥而脈反浮緩蓋多熱少寒不煩躁手足微厥為傷寒候脈浮緩為中風候也 傷風見寒傷寒見風大青龍症也 傷寒發表須當隨病輕重而汗之故仲景有發汗者有和 解者發汗如麻黃湯桂枝湯大青龍湯是也和解如小青 龍湯桂枝麻黃各半湯白虎湯桂枝二越婢一湯柴胡桂 枝之類是也後人不能深究寒邪淺深藥性緊慢一槩用 藥因致天傷其間縱或生全往往汗後虛乏遂至勞復或 變成百病淹引歲月卒至不救此皆由汗下過度陰陽並 竭血氣羸損以致此禍如遇病輕但當和解之所謂和其

發汗隨病輕重

榮衛以通津液令其自解可也

助汗法

丹溪治傷寒表症用補中益氣湯發散海藏用神木湯白 朮湯九味羌活散發散此皆和解之意不使真氣散失也 傷寒連服湯劑而汗不出者如中風法蒸之使溫熱之氣 於外迎之無不得汗其法用薪火燒地良久掃去以水洒 之取蚕砂栢葉桃葉糠麩皆鋪燒地上可側手厚上鋪席 令病人當上臥溫覆之移時汗立至候周身至脚心熱熱 乃用溫粉撲之汗止上床最得力者蚕沙桃栢葉也糠麩 乃助其厚多少隨用

治傷寒汗不出搖脚法用海蛤粉烏頭各二兩川山甲 三兩為末酒糊和丸大一寸許捏匾置患人足心下擘葱 白蓋藥以帛纏定於煖室取熱湯浸脚至膝下久則水溫 又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以和為

度

取裡看
熱深淺

治傷寒裡症須看熱氣淺深故仲景有直下之者如大承氣小承氣十棗大柴胡湯是也有微和其胃氣者如調胃承氣湯脾約丸少與小承氣微和之之類是也

金匱虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者雖瀉勿大泄之故王叔和序傷寒有承氣之戒

調治大便燥結用通幽湯潤腸湯丸皆為血氣津液不足者設也

三乘氣
分輕重
不同

藥用大承湯最緊小承湯次之調胃承氣又次之大柴胡湯又次之

瀉大承氣湯治大實大滿滿則胃腹脹滿狀若合丸大實則不大便也痞滿燥實四症俱備則用之雜病則進退用之

大黃 治大實

芒硝 治燥蘊此二味
治有形血藥也

厚朴 治大滿

枳實 治痞此二味治
無形氣藥也

小承氣湯治痞實而微滿狀若饑人食飽飯腹中無轉矢氣即大承氣湯只去芒硝心下痞大便或通熱甚須可下宜此方 調胃承氣湯治實而不滿者腹如仰瓦腹中有轉矢氣有燥蘊不大便而譫語堅實之症宜用之

右已上三法不可差差則無者生之有者遺之假令調胃承氣症用大承氣下之則愈後元氣不復以其氣藥犯之也若大承氣症用調胃承氣下之則愈後神癡不清以其無氣藥也小承氣症若用芒硝下之則或利不止變而成虛矣

三一承
氣湯非
是

調三一承氣湯辨○實則瀉之人所共知如緩急輕重之劑則臨時消息焉如不惡寒反惡熱發渴譫語腹滿而喘

手足濺然汗出急下之宜大承氣湯如邪未深恐有燥糞少腹痛小承氣湯試之腹中轉矢氣者有燥糞也乃可攻之不轉矢氣者初鞭後溏尚未可攻攻之則腹滿不能食若腹不通止與小承氣湯微和胃氣勿令大泄如發汗不惡寒但實者胃實也當和胃氣調胃承氣湯主之

成大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大甚故于大承氣湯中去芒硝又以結不至堅故減厚朴枳實如不至大堅然邪熱已甚而須攻下者亦未可投大承氣湯必以輕緩之劑攻之于大承氣湯中減厚朴枳實加甘草乃輕緩之劑以調胃也設若大承氣湯症反用調胃承氣湯下之則邪氣不伏小承氣湯症反用小承氣湯下之則過傷正氣而腹滿不能食故有勿大泄之戒此仲景所以分而治之未嘗越聖人之制度後之醫者以

此三藥合而為一旦云通治三藥之症及傷寒雜病一切所傷若如此說與仲景之方甚相背戾且失軒岐緩急之旨由是紅紫亂失迷惑世人一唱百和使病者暗受其弊將何所咎哉倘有公心審是者當于內經仲景方中求之責使藥症相對以聖賢之心為心則方之真偽自可得而知矣

汗下緩急

傷寒之法先言表裏及有緩急三陽表當急裏當緩三

陰表當緩裡當急又曰脈浮當汗脈沉當下脈浮汗急而下緩謂三陽表也脈沉下急而汗緩謂三陰裡也麻黃湯謂之急麻黃附子細辛湯謂之緩內經云有漬形以為汗謂汗之緩裡之表也又云在皮者汗而發之謂汗之急表之表也急汗者太陽緩汗者少陰是藏府之輸應也假令附子麻黃細辛湯是少陰症如得發熱脈沉裏和無汗故

漬形為汗今麻黃湯是太陽症頭項痛腰脊強脈浮無汗裏和是也在皮者汗而發之可也經曰治主以緩治客以急此之謂也

麻黃湯方見傷寒表裏上條

脈浮有表為表之裡宜急汗

假令得肝脈其外症善緊面青善怒其三部脈俱弦而浮惡寒裡和清便自調麻黃湯內加羌活防風各三錢謂肝主風是膽經受病也大便秘或泄下赤水無數皆裏不和也 假令得心脈其外症面赤口乾善笑其尺寸脈俱浮而洪惡寒裡和清便自調麻黃湯內加黃芩石膏各三錢謂心主熱是小腸受病也 假令得脾脈其外症面黃善噫善思善味尺寸脈俱浮而緩裡和惡寒麻黃湯內加白朮防風各三錢謂脾主濕是胃經受病也 假令得肺脈其外症面白善噎悲愁不樂欲哭其尺寸脈俱浮而瀼裡和惡寒麻黃湯內加桂枝生姜各三錢謂肺主燥是大腸

受病也 假令得腎脈其外症面黑善恐其尺寸脈俱沉而裡和惡寒麻黃湯內加附子生姜各三錢謂腎主寒是膀胱受病也

脈浮有裡為表之裡宜緩下

已上五症皆表之表也謂在皮者急汗而發之皆腑受病也表之裏者下之當緩謂隨臟表症外顯尺寸脈俱浮而復有裏症謂發熱飲水便利赤瀉或洩下赤水其脈浮按之內實或痛麻黃湯方去麻黃杏仁隨臟元加藥同煎分作五服每下一症初一服加大黃五分如邪未盡又加大黃一錢未盡再加大黃一錢半直候邪盡則止此先緩而後急是表之裏宜下之當緩也

麻黃附子細辛湯

方見下少陰但欲寐條

假令得肝脈其內症滿悶淋洩便難轉筋其尺寸脈俱沉而弦裏和惡寒麻黃附子細辛湯內加羌活防

脈沉有表為裡之表宜緩汗

風各三錢 假令得心脈其內症煩心心痛掌中熱而噦
其尺寸脈俱洪洪裏和惡寒心經受病於前湯內加黃芩石
膏各三錢 假令得脾脈其內症腹滿脹食不消怠墮嗜
卧其尺寸脈俱緩緩裡和惡寒脾經受病加白朮防已各三
錢 假令得肺脈其內症喘嗽洒淅寒熱其尺寸脈俱瀼
裡和惡寒肺經受病加生姜桂枝各三錢 假令得腎脈
其內症泄瀉下重足脛寒而逆其尺寸脈俱沉裡和惡寒
此腎經受病加姜附各三錢

脈沉有
裡為裡
之裡宜
急下

已上五症裡之表也宜瀆形以為汗皆臟受病也裏之
裏者下之當急謂隨臟內症已顯尺寸脈俱沉而復有
表症謂小便赤大便秘瀉或瀉下赤水或瀉或咳不能
飲食不惡風寒發熱引飲其脈俱沉按之內實而痛此
謂裡實宜速下之麻黃附子細辛湯內去麻黃隨臟元

忌汗症

加藥同煎分作三服每下一症初一服如大黃三錢邪
盡即止如邪未盡第二服加大黃二錢又未盡第三服
加大黃一錢此先急而後緩是裡之裡也宜速下之
太雲太陽症非頭痛項強不可發汗 非身熱惡寒不可發
汗 非脈浮不可發汗

忌表症

其脈微弱或尺脈遲者不可表 其人當汗而衄血者
不可表 壞病者不可表 婦人經水適來者不可表
風溫者不可表 濕溫者不可表 虛煩者不可表 病
人腹間左右上下有築觸動氣者不可表

壞症亦
症

曾經發汗若吐若下若溫病仍不解者為壞病 脈尺寸
俱浮頭痛身熱常自汗体重其息必喘其形不仁默默但
欲眠者為風溫 兩脛逆冷胸腹滿頭目痛苦妄言必多
汗者為濕溫 與傷寒症相似但不惡寒身不疼痛脈不

緊者為虛煩 臍上下左右有動氣按之牢若痛者為動氣

誤汗變症

太陽咽乾鼻衄淋漓小便不利皆不當汗已經發汗不得重發如無已上忌症雖經發汗邪氣未盡亦當重發之當汗不汗則生黃其症為風寒所傷陽氣下陷入內而與寒水上行於經絡之間本當發汗以徹其邪醫失汗之故生黃也脾主肌肉四肢寒濕與內熱相合故生黃也 不當汗而汗為畜血之症燥火也當益津液為上而反汗以亡之其毒擾陽之極則侵陰也故燥血畜于胃中也 當汗而發汗過多腠理開泄汗漏不止故四肢急難以屈伸也

忌下症

非陽明之本病不可下 陽明本病胃家實故也 **非痞滿燥實不可下** 非潮熱發渴不可下 **非罵詈親踈不**

可下 非脈沉數不可下 非棄衣而走登高而歌如見

鬼狀不可下

脈浮者不可下 脈虛者不可下 惡寒者不可下

嘔吐者不可下 不轉矢氣者不可下 轉矢氣者 小便清者不可下 大便堅小便數不可用承氣湯攻之 乃脾

也 大便鞭小便少者未可攻 陽明病自汗出若發汗

小便自利者不可下 宜用蜜煎導之

非 往來寒熱者不可和 非脇肋急痛者不可和 非

不可和症

留滿而嘔者不可和

診可解症

太陽傳陽明 其中或有下症陽明症反退而無熱與不渴却顯少陽症是知可解也 太陽症知可解者為頭不痛項不强肢節不痛則知表易解也 陽明症知可解者為無發熱惡熱則知裡易解也 少陽知可解者寒熱日

不移時而作邪未退也若用柴胡而移其時早移之于晏
晏移之于早氣移之于血血移之于氣是邪無可容之地
知可解也 可解之脈浮而虛不可解之脈浮而實浮而
虛者只在表浮而實者知已在裏也汗多不解者轉屬陽
明也 傷寒不頭痛知邪不在經若頭痛知邪在經也

六經病傳

六陽傳足傳手經則愈 陽中之陰水太陽是也為三陽
之首能巡經傳亦能越經傳 陽中之陽土陽明是也陽
明為中州之主主納而不出如太陽傳至此名曰巡經傳
也 陽中之陽木少陽是也上傳陽明下傳太陰如太陽
傳至此為越經傳 陰中之陰土太陰是也上傳少陽為
順下傳少陰為逆如傳少陰為上下傳也如太陽傳太陰
為悞下傳也 陰中之陽火少陰是也上傳太陰為順下
傳厥陰為逆如太陽至此乃表傳裏也 陰中之陰木厥

陰是也上傳少陰為實再傳太陰為自安

太陽六傳一 太陽者巨陽也為諸陽之首膀胱經病若渴
者自入于本也名曰傳本 太陽傳陽明胃土者名曰巡
經傳為發汗不盡利小便餘邪不盡透入于裏也 太陽
傳少陽膽木者名曰越經傳也為元受病脈浮自汗宜用
麻黃湯而不用故也 太陽傳太陰脾土者名曰悞下傳
為元受病脈緩有汗常用桂枝而反下之所致也當病腹
痛四肢沉重 太陽傳少陰腎水名曰表傳裏為病急當
下而反不攻不發所以傳裡也 太陽傳厥陰肝木者為
陰不至於首惟厥陰與督脈上行太陽相接名巡經得度
傳

有人病傷寒無汗惡風項既屈而且強予曰項強几几
若根湯症或問曰何謂几几予曰几几者如几疾屈而強

也謝復古謂病人羸弱須憑几而起悞也蓋仲景論中極有難曉處振振欲擗地心中懊懣外氣拂鬱鬱冒不仁膈內拒痛如此之類甚多成無已云凡音殊凡為短羽鳥不能飛騰動先伸引其頭項背強者可偃屈也甚得仲景之旨

太陽病

發熱

惡寒

惡風

頭痛

項強

身體痛

脈浮緩有汗者為中風宜桂枝湯

太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒 太陽病發熱汗出惡風脈緩者為中風 太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出當審惡寒淅淅惡風翁翁發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之 太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之 太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯 病人臟無他病時發熱自汗

出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯
桂枝湯方

桂枝

芍藥

生姜

甘草

大棗十二枚

右咬咀每服五錢水煎去渣溫服須臾飲熱稀粥一盞以助藥力令一時許遍身熱熱微汗者佳不可令如水淋漓若一服便得汗勿再服 或無汗或小便數手足冷者不可服活人云桂枝麻黃若夏月用加黃芩知母石膏總不如陶尚文用羌活沖和湯為最穩

右桂枝湯許學士云有人病發熱惡寒自汗脈微弱而浮三服湯而愈此方在仲景一百十三方內獨冠其首令人全不用何也仲景云太陽中風陽浮而陰弱陽浮者云至翁翁發熱宜桂枝湯此脈與症仲景說得甚

明後人看不透所以不敢用也

假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發汗也此謂元氣受病而然也又曰陽微則惡寒陰微則發熱醫既汗之使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所使也大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒舉此二端明白易曉何憚而不用桂枝湯哉

脈浮緊無汗者

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者

為傷寒麻黃湯主之

宜麻黃湯

麻黃去節先煮去

桂枝二兩

杏仁七十個去皮尖

甘草一兩

右咬咀每服五錢水煎溫服覆取微汗不須飲粥有汗

者勿服

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉潤此為逆也傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青龍湯發之

大青龍湯方

麻黃去節剋去

桂枝去

石膏碎

甘草炙各一兩

生姜切一兩半

大棗六枚

杏仁二十個去皮尖

右咬咀每服五錢水煎溫服取汗為度若汗周身潤止後服未汗可停待相次服盡不欲汗多恐亡陽故也若汗不止用溫粉撲之

溫粉方

白朮

藁本

川芎

白芷各等分

右研爲細末每末一兩入米粉三兩和勻撲周身止汗
若汗過多恐亡陽遂厥逆惡風煩躁不得眠故宜以此
粉止之

右中風脈當浮緩今反浮緊緩者大青龍症也

獨發熱惡風煩躁手足溫爲中風候脈浮緊爲傷寒脈是
中風見寒脈也寒多熱少不煩躁手足微厥爲傷寒候脈
浮緩爲中風脈是傷寒見風脈也蓋脈似桂枝反無汗病
似麻黃反煩躁是也

許學士云仲景治傷寒一則桂枝二則麻黃三則青龍桂
枝治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脈傷寒見風脈
三者如鼎立人皆能言之而不曉前人處方用藥之意故
醫遂多不用無足恠也且脈緩而浮者中風也故黃齋惡
風浙浙惡寒翁翁發熱仲景以桂枝對之脈浮緊而瀋者

傷寒也故頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡寒無汗而喘
仲景以麻黃對之至於中風脈浮緊傷寒脈浮緩仲景皆
以青龍對之何也予嘗深究三旨若症候與脈相對無不
應手而愈何以言之風傷衛衛氣也傷寒榮榮血也榮行
脈中衛行脈外風傷衛則風邪干陽陽氣不因發越而爲
汗是以自汗是表虛故仲景用桂枝以發其邪芍藥以和
其血蓋中風則病在脈之外其病稍輕雖同曰發汗特解
肌之藥耳故仲景于桂枝症云令半身絳絳微似有汗不
可如水淋漓病必不除是知中風不可大發汗汗過則反
動榮血邪氣乘虛襲之故病不除也寒傷榮則寒邪入陰
血而榮行脈中者也寒邪居脈中非特榮受病邪自內作
則併與衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而熱齒乾
而煩究仲景以麻黃發其汗又以桂枝甘草助其發散欲

滌除内外之邪榮衛之病爾大抵二藥皆發汗以桂枝則
 發其衛之邪麻黃并榮與衛治之亦自有淺深也何以驗
 之仲景桂枝第十九症云病當自汗出者此為榮氣和榮
 氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脈中
 衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯又四十七症
 云發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出者欲救邪風宜桂
 枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和又第一卷云寸口
 脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛
 俱病骨節煩疼當發其汗是知傷寒浮緊者榮衛俱病也
 麻黃湯中并用桂枝此仲景之言也至於青龍雖治傷風
 見寒脈傷寒見風脈之病然仲景又云汗出惡風者不可
 服之服之厥逆便有筋惕肉潤之症故青龍一症尤難用
 藥須是形症諦當然後可行故王寔夫症止用桂枝麻黃

各半湯治之蓋慎之也

太陽病
項強有
汗者葛
桂湯

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之
 桂枝加葛根湯方

桂枝 葛根 芍藥 甘草
各二兩 各二兩 各二兩 各一兩

右咬咀每服五錢水煎溫服覆取汗

無汗者
葛根湯

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之
 葛根湯方

葛根 麻黃 生姜 桂枝
各四兩 各二兩 各二兩 各二兩

右咬咀每服五錢去查溫服覆取微汗為度

太陽病
脈微身
不痒者
宜桂婢

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發
 汗宜桂枝二越婢一湯

各半湯

桂枝二越婢一湯方

桂枝

芍藥

麻黃

去節

甘草

各三錢

生姜

兩

石膏

半兩

大棗

六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

脈微身痛者宜桂麻各半湯

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少又其人
不嘔清便欲自可一日二度脈微緩者為欲愈也脈微而
惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐面色反有熱
色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃
各半湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝

兩

芍藥

生姜

兩

甘草

炙

麻黃

各半兩

大棗

六枚

杏仁

十二粒

去皮尖

右咬咀每服五錢水煎溫服

太陽中暍症

太陽者血症

凡仲景稱太陽病者皆表症發熱惡寒頭項強痛也若
脈浮大則與症相應宜發汗今見表症而脈反微不與
症應故不可發汗但用一二各半湯等和之可也

若太陽中暍發熱惡寒脈微弱手足逆冷而渴者白虎加
人參湯方論見中暑

太陽六七日表症仍在脈微而沉反不結胃其人發狂者
以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈所以然
者以太陽隨經瘀血在裏故也抵當湯主之

抵當湯方

水蛭

炒去子

蟅虫

各十枚

炒

大黃

兩

桃仁

七枚

去皮尖

右作一服水一盞煎溫服

太陽病身黃脈沉結小腹鞭小便不利者為無血也小便

自利其人如狂者血症諦也亦抵當湯主之

凡仲景稱太陽症脈沉者皆謂發熱惡寒頭項強痛而脈反沉也其症兼發狂小腹硬者為畜血此條抵當湯

是也

太陽濕痺 兼關節痛小便不利身黃者為濕痺論見濕痺

太陽症 兼卒口噤背反張者為瘥若無汗惡寒名剛症宜葛根湯

若有汗不惡寒名柔瘥宜瓜蒌桂枝湯方論見瘥

太陽陰症 病發熱頭痛脈反沉若不瘥身疼痠痛當救其裏宜四逆

湯方見下刊

少陰病但欲寐始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯論

欲寐

麻黃附子細辛湯方

麻黃去節 細辛各二兩 附子一枚泡

右咬咀每服五錢水煎溫服

凡仲景稱太陽病不惡寒者皆謂發熱頭項強痛脈浮

而反不惡寒也其証兼渴者為溫病兼汗出者為柔瘥

方論見溫病柔瘥

傷寒六七日發熱微寒肢節煩疼微嘔心下支結外症未

去者柴胡加桂枝湯主之

柴胡加桂枝湯方

柴胡一兩 桂枝 黃芩 人參

芍藥 生姜各半兩 半夏四錢 大棗三枚

甘草炙三錢

右咬咀每服五錢水煎溫服

凡仲景稱表不解者皆謂太陽病發熱惡寒頭項強痛

脈浮也蓋病雖屬太陽表症而有裡症兼之者則不言

太陽病 惡寒 汗 者 柔瘥 表不解 者即太陽病

症

症

症

症

症

症

症

太陽病但稱表不解也其兼心下支結者此條柴胡桂枝湯是也論見

兼心下有水氣乾嘔而欬者小青龍也方論見欬兼脇痛手

足溫而渴者小柴胡也兼心下痞者先用桂枝解表後

以瀉心攻痞也方論見痞兼下利腹滿脹者先以四逆溫裏

後以桂枝攻表也方論見下利

太陽病欲解時從巳至未解太陽病未解脈陰陽俱停

必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解陰脈微者

下之而解若欲下之調胃承氣湯主之下之宜解疑衍文太陽

病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈

太陽外症未解不可下之下之為逆欲解外者宜桂枝湯

主之

海大小調胃三承氣湯必須脈浮頭痛惡風惡寒表症盡

太陽欲解候

太陽表未解忌下

罷而反發熱惡熱譫語不大便方可用之若脈浮緊下之必結胃若脈浮緩下之必痞氣

許學士云常記一親戚病傷寒身熱頭痛無汗大便不通

已四五日予訊問之醫者治大黃朴硝等欲下之予曰子

姑少待予為視之脈浮緩居密室中自稱甚惡風予曰表

症如此唯大便不通數日腹且不脹別無所苦何遽便下

之大抵仲景法須表症罷方可下不爾則邪乘虛而入不

為結胃必為熱利也予作桂枝麻黃各半湯繼以小柴胡

熱熱汗出大便亦通而解仲景云凡傷寒之病多從風

寒得之始則表中風寒入裏則不消矣擬欲攻之當先表

解乃可下之若表已解而內不消大滿大堅實有燥糞者

自可除下之雖四五日不能為禱也若不宜下而便攻之內虛熱入為挾熱自利煩燥之變不可勝數輕者困篤重

者必死矣 原本正文重疊予刪正此段其理甚明大抵風寒入裏不消必有燥糞或大便堅秘須是脈不浮不惡風表症罷乃可下之大便雖四五日不通亦無害若不顧表而下遂為挾熱利也

表裏發熱

表裡發熱症

發熱惡寒脈浮者屬表即太陽症也方論見前發熱汗

出不惡寒反惡熱者屬裏即陽明症也方論見陽發熱

脈弦細頭痛者屬半表半裡即少陽症也論見口發熱

而嘔者小柴胡湯論見發熱欬嗽表不解者小青龍湯

兼脇痛喜嘔者小柴胡加乾姜五味子湯方論發熱而

喘表不解者小青龍去麻黃加杏仁湯兼胃滿者麻黃湯

方論發熱口渴有屬表者有屬裏者治法方論甚眾並

門

汗後脈浮數者發熱汗解半日許復煩躁脈浮數大者可更發汗宜桂枝

更汗湯論見煩

汗後發熱惡風寒者虛故也不惡寒但惡熱者實也當和胃

氣宜調胃承氣湯 太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者

屬胃也調胃承氣湯主之海藏云大黃洩實芒硝軟堅甘

之用

調胃承氣湯方

大黃一兩海藏云宜酒浸蓋邪氣居高非酒不到譬

浸引而上之若生用苦洩峻下則遺高分之邪熱所

以愈後或目赤或喉閉或頭腫膈上反生熱症矣

甘草半兩炙海藏芒硝九錢海藏云辛

右咬咀水一盞煮大黃甘草至七分去渣入芒硝更上

火微煮令沸溫服

汗之仍熱

發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而利者大柴胡湯論見

發汗後身灼熱脈浮汗出身重多眠鼻鼾者風濕論見

發汗後仍發熱心悸頭眩身潤動振振欲擗地者宜真武湯論見

宜四逆湯論見汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆惡寒者

云濕病汗徹復熱而脈燥疾不為汗衰法內經

狂言不能食謂之陰陽交者必死也

下之仍熱

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈桂枝湯主之

汗下後仍頭痛發熱心下滿小便不利者桂枝湯主之

去桂加茯苓白朮湯論見大下後身熱不去心中結痛者梔子豉湯主之論見

大下後身熱不去微煩者梔子乾姜湯方論

陽明病下之其外有熱手足溫心中懊憹

飢不能食但頭汗出者梔子豉湯論見

吐發熱

太陽病當惡寒今自汗出不惡寒發熱關脈細數者以

吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之

者不喜糜粥飲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致為小逆

發熱脈浮一症

瘥後更熱者小柴胡湯脈浮者以汗解脈沉者以下解論見

復勞

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

白虎湯方

知母三兩 甘草一兩 粳米三合 石膏八兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯論見下利厥

逆汗出熱不去者四逆湯

發熱厥逆二症

少陰病下利清穀厥逆裏寒外熱者通脈四逆湯方論見身熱手足逆冷而脈虛當夏月發者為中暑論見

發熱下利四症

傷寒表不解乾嘔發熱而咳下利者小青龍去麻黃加羌花湯論見 太陽與陽明合病必下利其症頭痛腰疼身

熱鼻乾脈浮大而長者宜葛根湯論見 發熱下利脈微

遲厥逆者通脈四逆湯 太陽與少陰合病自下利其症

頭寒曾滿往來寒熱脈浮大而弦者宜黃芩湯論見

發熱下利

下利清穀脈沉遲其人面赤微熱而厥者必鬱冒汗出自

欲解

解

厥逆躁

發熱下利厥逆躁不得卧者死 發熱而利汗不止者死

不得汗

者死

發熱吐

利心下痞硬者大柴胡湯渴者五苓散不渴者理

中湯

論並見痞及吐利門

發熱畜

發熱經水適來適斷小柴胡湯刺期門論見諸語滯狀 發熱脈

而二症

數消穀不大便者有瘀血宜抵當湯論見畜血

病甚者為五十九刺穴見温病門

太陽病發熱續法

傷寒多由內傷

此篇集丹溪海藏諸賢治傷寒皆以補養兼發散之法實

本經成敗倚仗生於動動而不已則變作及風雨寒熱不

得虛邪不能獨傷人之旨也蓋凡外傷風寒者皆先因動

作煩勞不已而內傷躰虛然後外邪得入故一家之中有

病者有不病者由躰虛則邪入而病躰不虛則邪無隙入

而不病也是故傷寒為病屬內傷者十居八九後學無知

舉世皆謂傷寒無補法但見發熱不分虛實一利下汗而

致天橫者滔滔皆是此實醫門之罪人也今集此法於仲

景之後其應如響使人遵之不犯虛虛實實之戒也

丹溪兼補發散

傷寒主乎温散 有卒中天地之寒氣者有口食生冷

之物者故傷寒為病必須身犯寒氣口食寒物者是以從

補中益氣湯加發散藥屬內傷者十居八九其法邪之所
奏其氣必虛只用補中益氣湯中從所見之症出入加減
氣虛甚者少用附子以行參朮之氣補中益氣湯方見治發熱內傷
之病專主東垣內外傷辨甚詳世之病此者為多但有挾
痰挾外邪者鬱熱於內而發者皆以補元氣為主宜看其
所挾而兼用藥

一男子素嗜酒因暴風寒衣薄遂覺倦怠不思飲食半日
至睡後大發遍身疼痛如被杖微惡寒天明診之六脈浮
大按之豁然左為甚予作極虛受風寒治之人參為君黃
芪白朮歸身為臣蒼朮甘草木通乾葛為佐使大劑與之
至五貼後通身汗如雨凡三易被得睡覺來諸症悉除

白朮 陳皮 乾葛 蒼朮各三錢
人參 川芎各錢半 黃芪 歸身

木通各一錢五分 甘草五分

右分三貼水煎服

盧兄年四十九歲自來大便下血脈來沉遲瀼面黃神倦
者二年矣九月間因勞倦發熱自服參蘇飲二貼熱退早
起小勞遇寒兩手背與面紫黑昏仆少時却醒身大熱妄
語口乾身痛至不可眠脈之三部不調微帶數重取虛豁
左手大於右手以人參二錢半帶節麻黃黃芪各一錢白
朮二錢當歸五分與三五貼得睡醒來大汗如雨即安兩
日後再發脇痛欬嗽若睡時嗽不作而妄語且微惡寒診
其脈似前而左略帶緊予曰此躰虛再感寒也再以前藥
加半夏茯苓至十餘貼再得大汗而安後身倦不可久坐
不思飲食用補中益氣去涼藥加神麩半夏砂仁五七十
貼而安

一丈夫因勞倦發熱甚倦不可以傷寒治之用

人參錢四 白芍藥 陳皮 當歸各三錢

黃芪三錢 蒼朮二錢 木通一錢 甘草少

右分三貼水煎溫服

一丈夫發熱五日倦甚略渴得洪脈不甚數略重則散大

此內傷症也用

白朮二錢 人參 陳皮 柴胡各錢

黃芪 蒼朮各一錢 木通六分 甘草少

右分二貼水煎服

一丈夫倦甚口乾發熱汗不出用

陳皮三錢 人參 白朮 蒼朮各二錢

乾葛半錢 黃芪 木通各一錢

右分二貼水煎服

一丈夫發熱振暈倦怠口渴

人參 白朮 白芍 柴胡各二錢

陳皮三錢 黃芪一錢 木通半錢 甘草少

右分四貼水煎熱飲

王孺人因辛苦發熱

芍藥五錢 白朮三錢 人參 當歸各二錢

陳皮一錢 川芎 甘草 木通各錢

右分四貼水煎溫服

第四女發熱冒風冷

麻黃 人參各五分 蒼朮一錢 甘草少

右水煎服溫

右十方皆補養中氣兼發散之劑

寒多者
補散加
姜附

杭州葉君章臘月因齋素中飢而冒寒作勞遂患發熱頭

痛醫與小柴胡湯遂自汗神昏耳聾目不見物予診其脈大如指似有力熱不退與人參黃芪白朮熟附炙甘草作大劑之一日而汗少二日而熱減半耳微有聞目能視物初用藥至四貼前藥中加蒼朮與兩服再得汗而熱除本日遂去蒼朮附子又與前藥作小劑服三日而安 呂仲修年六十六歲正月間因忍飢胃寒作勞頭疼惡寒發熱骨節皆疼無汗至次日妄語熱愈甚而妄語時止時作熱亦不為十分自服參蘇飲兩貼汗不出又再進一服以衣覆取汗大出而熱不退至第四日子診其脈兩手皆洪數而右為甚此因飢而胃寒加之作勞陽明經雖受寒氣不可攻擊當急以大劑補之以回其虛俟胃氣充實自能出汗而解遂以參芪白朮歸身陳皮炙甘草每貼加熟附子一片一晝夜服五貼至第三日口稍乾言語有次諸症雖

解而熱未退遂去附子加白芍又兩日思食却作肉萎問與之又三日精神全二日許自汗出而熱退診其脈不數洪脈却尚有些洪脈作大脈論年高而誤汗此後必有虛症見又與前藥至次日言我大便自病來不曾更衣今穀道逼痛坐努責狀如不堪醫者必欲投大黃巴豆等劑予謂大便非實秘為是氣因誤汗而虛不得充腹無力可努仍與前補藥以肉粥及茯苓與之一日半煎濃茵陳湯浸下躰方下大便軟塊者五六枚診其脈仍舊大未欵此因氣血未得回復又與前藥兩貼經兩日小便不通少腹下妨悶頗為所苦但仰臥則點滴而出予曰補藥服之未盡於前藥內倍加參芪大劑服兩日小便方利而安 陶明節年十九歲不憚勞勩不息農作忽一日因勞倦大發熱而渴恣飲冷泉水數碗次日熱退目不識人言語謬誤自

言肚痛不能轉側飲食不進身戰掉不自持又二日求予
診之兩手濇而大而右爲甚遂於氣海灸三十壯用白朮
二錢黃芪二錢熟附一片陳皮五分與十貼不効又增發
熱微渴餘症仍在却可進二匙稀粥予曰此氣欲利而血
未應也於前藥內去附子加當歸以和血因有熱加人參
一錢半服三十貼而安

黃芪湯治傷寒兩感拘急三焦氣虛自汗及手足汗出
或手背偏多或肢躄振搖腰腿沉重面赤目紅但欲睡眠
頭面壯熱兩脇熱甚手足自溫兩手心熱自利不渴大便
或難或如常度或口乾咽燥或渴欲飲湯不欲飲水或少
欲飲水嘔噦間作心下滿悶腹中疼痛或時喜笑或時悲
哭或時太息或時語言錯亂疑作謔言狂語者非也神不
守舍耳始得病于寤寐之間或恐悸頭項不甚痛行步只

如舊此陰盛陽虛之故也兩手脈浮沉不一或左或右往
來不定有沉濇弱微弦五種陰脈形狀按之全無力浮之
損小沉之亦損小皆陰脈也宜先緩而後急緩宜用黃芪
湯

黃芪湯方

人參

生姜

黃芩

白茯苓

白朮

白芍藥

甘草

嘔者加藿香

陳皮

甚者加乾姜

錢

右咬咀水煎量症加減多少用之 如大便秘結者調

中丸主之

調中丸方

人參

白朮

白茯苓

乾姜

甘草

各等分

右為末煉蜜丸每兩十九或五丸每服一二丸水少許煎服若病急者黃芪湯每服加乾姜一錢大便結者理中丸主之

理中丸方

人參

白朮

乾姜炮恐熱以生薑代之

甘草炙

右等分為末煉蜜丸每兩作五丸白湯化下先緩後急也若尤急者無汗宜附子乾姜甘草湯若自汗者宜白朮附子甘草湯量脈症可於四逆湯或真武湯或通脈四逆湯選用之

垣馮內翰姪櫟年十六病傷寒目赤而煩渴脈七八至醫欲承氣湯下之已煮熟矣偶東垣從外來馮告之故東垣切脈大駭曰幾殺此兒彼以脈數為熱今脈七至是極熱

也殊不知至真要大論云病有脈從而病反者何岐伯對曰脈至而從按之不鼓諸陽脈皆然此陰盛格陽於外非熱也取姜附來吾以熱因寒用之法治之治藥未就而病者爪甲已青頓服八兩汗漸出而愈

右七法補蕪發散隨所見症加姜附甚者熱附微者乾姜又甚者姜附蕪施皆反治法也

丹盛孺人年四十歲外冷內熱身疼頭痛倦怠脈虛微瀼

川芎

柴胡

芍藥各半

羌活

黃柏各二錢炒

南星錢一

甘草各三分

右分兩貼生薑三片水煎熱服

沈材妻年五十餘滿身骨節痛半日以後發熱黃昏至半夜却退

蒼朮

陳皮

羌活各一錢

白朮錢一

熱多者
補散加
芩朮

木通

炒栢

通草各五分

右咬咀水煎温服

丁親家於久瘧後暑月涉水又勞苦腿肘痛漸漸渾身痛脇亦痛發熱脈却澹不甚數予曰此勞倦乏力治用

白朮

黃芪

蒼朮

陳皮各一錢

人參

黃栢酒炒各五分

木通三分

甘草炙二分

右咬咀水煎下龍薈丸

小阿婆午後發熱遍身痛血少月經黑色大便閉用

芍藥五錢

黃芩

蒼朮各三錢

黃栢酒炒

木通各二分

右咬咀水煎服

右四方兼補發散隨所見脈症加炒栢龍薈皆正治法也

痧病者利散加消導

陳小娘年二十發熱目閉開口則熱甚渴思水解脈澹而濁溷此食痰也治用

黃芩

甘草

木通各五分

陳皮

白朮

乾葛各一錢

黃連

桔梗各六分

右咬咀水煎下保和丸二二十九

一丈夫因恐發熱心不安用南星白茯苓各五錢朱砂二錢已上為六貼再用

人參

當歸

柴胡各三錢

黃芩

川芎

木通各二分

甘草

紅花各五分

右分四貼水二盞半入金銀器同煎至一盞去查熱調服

海 右二方兼補發散隨所見症加食積痰藥神木湯治內傷冷飲外感寒邪無汗者

蒼朮制

防風各二兩

甘草炒一兩

右咬咀加葱白生姜同煎服如太陽症發熱惡寒脈浮而緊者加羌活二錢如太陽症脈浮緊中帶弦數者是無少陽也加柴胡二錢如太陽症脈浮緊中帶洪者是蕪陽明也加黃芩二錢婦人服者加當歸或加木香湯或加藜蘆湯各二錢如治吹奴煎成調六一散三五錢神効

神朮湯加減例

又神朮湯六氣加減例

太陽寒水司天 加羌活桂枝餘歲非時變寒亦加冬亦加

陽明燥金司天 加白芷升麻餘歲非時變涼濕亦加秋亦加

少陽相火司天 加黃芩地黃餘歲非時變雨濕亦加夏

亦加

太陰濕土司天 加白朮藁本餘歲非時變熱濕亦加夏末秋初亦加

少陰君火司天 加細辛獨活餘歲非時變熱亦加春末夏初亦加

厥陰風木司天 加川芎防風餘歲非時變溫和亦加春亦加

已上神朮湯六氣加減法非止為司天之氣設也至於歲之主氣與月建日時同前應見者皆當隨所見依土例加減之按海藏此論與戴人云病如不是當年氣看與何年運氣同便向此中求妙法方知皆在至其中之歌相表裏實發前人之所未發也蓋海藏此論所謂某氣司天加某藥者治常氣之法也所謂隨所應見加減

者治變氣之法也戴人所謂看與何年同氣求治法者亦治變氣之法也能將二公之法擴充行之則內經運氣之本義燦然矣夫內經論運氣有常氣有變氣常氣者有定紀如某年屬某氣司天當寒某年屬某氣司天當熱是也變氣者無定紀如某年屬某氣司天當寒反變熱當熱反寒是也王氏註文釋以經無定紀之變氣作有定紀之常氣使後學皆以年歲占運氣而其應者十無一二是以人莫之信而其道湮晦久矣二公生於數千百年之後復啓其端而續之與程朱續孔孟不傳之緒同功也今僕謹於海藏逐年司天加藥之後伸餘歲變常之義其意有不盡者別述運氣類註定之同志之士幸究心焉

以白木代桂枝

白木湯治內傷冷物外感風寒有汗者

白木

三兩

防風

二兩

甘草

一兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎至七分溫服一日止一二服待二三日漸漸汗少爲解

又白木湯治傷寒上解三陽下安太陰

白木

如汗之改用蒼木

防風

各一兩

右咬咀水煎至七分溫服用後方加減 若發熱引飲者加黃芩甘草 頭疼惡風者加羌活散三錢羌活一

兩半川芎七錢細辛二錢半去 若身熱目痛者加石

膏湯四錢石膏二錢知母半兩白芷七錢 腹中痛者

加芍藥湯三錢芍藥一兩桂枝半兩 往來寒熱而嘔

者加柴胡散三錢柴胡一兩半夏半兩 心下痞者加

枳實一錢 若有裏症加大黃一錢量虛實加減之邪

去止服

繫古以川芎湯有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝然春夏汗孔踈雖代麻黃有汗不當服桂枝宜用黃芪湯和餅之秋冬汗孔閉雖無以黃芪汗不當服麻黃宜用川芎湯和餅之春夏有汗脈微而弱枝惡風惡寒者乃太陽症秋冬之脈也宜用黃芪湯無汗亦用川芎湯秋冬有汗脈盛而浮發熱惡熱者乃陽明症春夏之脈也宜用黃芪湯無汗亦用川芎湯大抵有汗皆宜黃芪湯無汗皆宜川芎湯主之

黃芪湯有汗則能止之

白朮

黃芪

防風

各等分

右咬咀每服五七錢至一兩水煎溫服汗多惡風甚者加桂枝

川芎湯無汗則能發之

川芎

蒼朮

羌活

各等分

右咬咀每服五七錢至一兩水煎熱服無汗惡風甚者加麻黃一二錢

法云五臟之脈寸關尺也今止言寸尺陰陽也若陽緩而陰急表和而裏病陰緩而陽急裏和而表病

本黃芪建中加當歸湯治發熱頭疼脈浮數而尺中遲弱者宜先服此藥補血却與麻黃桂枝輩

黃芪

當歸

白芍

桂枝

甘草

右咬咀每服五錢姜三片棗一枚水煎日三夜二服如脈尚沉遲再進一服

有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若未瘥則其變不可勝言故立此法使不犯三陽禁忌解表神方

九味羌活湯尚尚節註云不問四時但有頭疼骨節痛發熱惡寒無汗脈浮緊者宜用此湯以代麻黃

表症具尺脈遲弱者先補血

為穩當如頭疼發熱惡風自汗脈浮緩者宜用加減冲和湯即羌活湯中減蒼朮加白朮細辛加黃芪是也

羌活一兩半治太陽肢骨痛之主藥也然非無為之主乃是撻亂反正之君也故大無不通小無不實關節節痛者非此不降

防風一兩半治一身盡痛乃卒伍卑賤之下職一聽君命將令而行隨所使引至之

細辛半兩治少陰腎經頭痛 川芎一兩治厥陰頭痛在胃

蒼朮雄壯上行之藥能除濕下氣及安太陽使邪氣不至傳足太陰解也

白芷一兩治陽明經頭痛在額 生地一兩治少陰心熱在內

甘草一兩能緩裏急調和衆藥故有國老之稱也 黃芩一兩治太陰肺熱在胃

已上九味雖為一方然亦不可執執中無權猶執一也當視其經絡前後左右之不同從其大小輕重之不一增損用之其効如神用咬咀水煎服若急欲汗者須熱服以羹粥投之若緩欲汗者溫服而不用湯粥投之脈浮而不解者先急後緩脈沉而不解者先緩後急九

解表雜方

和解四時傷寒混解六經不犯禁忌大白朮湯

白朮 石膏 防風 羌活各二錢

黃芩五錢 白芷半錢 知母七錢 甘草一錢

枳實兩半 細辛三錢

右咬咀每服半兩水煎溫服未解更一服春倍加防風羌活夏倍加黃芩石膏季夏淫雨倍加白朮白芷秋加桂五錢冬加桂八錢或一兩

海五積散治陰經傷寒脾胃不和及感寒邪

白茯苓

厚朴

芍藥

當歸

麻黃去節

半夏姜製各三兩

乾姜炮兩

人參

川芎各二兩

甘草兩

白芷四兩

枳殼五兩

陳皮

蒼朮新者二兩

桔梗十二兩

肉桂兩

右除枳殼肉桂外餘並為粗末於大鍋內文武火炒令黃熟不至焦用紙攤在板上候冷入枳殼肉桂末和勻入磁盆內每服二錢水一盞姜三片同煎服若傷寒蔥白一莖豈豉七粒同煎連服取汗若脾胃不和內傷冷物渾身疼痛頭昏無力胃膈不利飲食不下氣脈不和四肢覺冷或睡裏虛驚至晚心躁困倦即入鹽少許同煎若陰經傷寒手足逆冷及虛汗不止脈細疾面青而嘔更宜加附子同煎加減多少並在臨時消息之

袖珍方
無人參

參蘇飲治內外感一切發熱主藥又云前胡葛根自能解肌枳殼陳皮自能寬膈大治中焦滿痞凡有熱不得拘其所見小兒室女尤宜服之

前胡

枳殼

陳皮

甘草

桔梗

木香各一錢

人參

紫蘇

乾葛

半夏

茯苓各八分

右咬咀每服四錢用水一盞生姜五片棗一枚煎服不拘時若素有痰者候熱退以二陳六君子湯間服

右方治痰飲停積中脘閉塞眩暈嘈煩忪悸嘔逆及痰飲中人停留關節手脚羸曳口眼歪斜半身不遂食已則嘔頭疼發熱狀如傷寒者悉治之 一法用此藥三兩加四物湯二兩合和名茯苓補心湯大治男子婦人虛勞發熱或五心煩熱并衄血吐血便血及婦人下血

過多致虛熱者並宜服之或因用心太過發虛熱者及往來寒熱者用之神効

柴胡散治邪入經絡體瘦肌熱推陳致新解利傷寒時疫中暍伏暑

柴胡兩四 甘草一兩

右咬咀水煎食後熱服此藥冬月可以潤心肺止咳嗽除雍熱春夏可以禦傷寒時氣解毒居常不可缺者且倉卒可以易得長幼皆宜服之

山胃感用帶根蔥煎湯嚼生姜得汗愈

右六方通詳諸表方元氣不虛者服効

第二方熱多者宜服之

第三方寒多者宜服之

第四方痰飲者宜服之

第五六方倉卒宜備之

海治傷寒外症全是下症大熱而脈反細不可下者瀉心

下症具脈沉細者瀉心湯主之方見傷寒脈有力者黃連瀉心湯無心湯

雲人參散治傷寒汗下後餘熱不退或煩或渴面赤者

人參 山梔 藍葉 甘草

白蘚皮各等分

右咬咀每服五錢水煎服

丹絜矩新書謂有雜合邪者當以雜合法治之譬如惡寒

當隨症治不必先理感發熱得之感胃明是外合之邪已得浮數之脈而氣口又

緊盛明為食所傷病者又倦怠脈重按俱有豁意而胸膈

痞滿間引兩脇其脈輕取又似乎弦此又平昔多怒肝邪

之所為也細取左尺大細沉弱此又平時房勞之過也治

法宜以感冒一節且放後先視其形色之強弱厚薄且以

胃

目

治不必

先理感

人參散

煩渴者

汗下後

者瀉心

湯主之

方見傷寒

脈有力者

黃連瀉心

湯無心湯

補中化食行滯清涼胃火而以姜辣行之則中氣稍回傷滯稍行津液得和通軀得汗外感之邪自解醫者不肯詳審求之只顧表散外邪又不推究兼見之邪脈亦不窮問所得之病因與性情之執着巧施雜合治法將見正氣自虛邪氣愈固皆拙工之過也

發熱惡寒自傷

本發熱惡寒近似傷寒者有五種脈浮而緊其人發熱而

寒者有五

是欲為癰癤也脈浮按之反濇其人發熱惡寒或膈實而

嘔吐者此是傷食也脈浮而滑其人發熱背寒或頭眩而

嘔吐此是風痰之症也脈浮而弦其人發熱惡寒或思飲

食此是欲化瘧疾也能辨其脈又能驗其症斯無誤矣

發熱惡寒而渴者有二

海傷寒與雜症相似藥不可差 夫傷寒表症發熱惡熱而渴與下雜症同但頭痛身熱目痛鼻乾不得臥白虎主

之乃陽明經病也正陽陽明氣病脈洪大先無形也雜病裏症發熱惡熱而渴但目赤者病臟也手太陰氣不足不能管領陽氣也宜以枸杞生地熟地之類主之脈洪大甚則嘔血先有形也

禁忌

氣病在裏誤用血藥無傷也為安血而益陰也 血病在裏誤用氣藥如白虎湯者非也為瀉肺而損陰也

恒辨誤服白虎變症 昔西臺椽葛君瑞二月中病傷寒發熱以白虎湯主之病者面黑如墨本症遂不復見脈沉

細小便不禁東垣初不知也及診之曰此立夏以前誤服白虎白虎太寒非行經之藥止能寒臟腑不善用之則傷

善氣本病曲隱於經絡之間或投以大熱之藥求以去陰邪他症必起非所以救白虎也可用溫藥升陽行經有難

者曰白虎大寒非大熱何以救君之症柰何東垣曰病隱

針灸

經絡間陽道不行而本症見矣又何難哉果如其言而愈
大煩熱不止晝夜無度用八關大刺法見熱無度不
可止宜陷谷出血

遍身發熱如火狂言妄語氣虛者補手三里氣實者瀉
足三里

傷寒胃熱不已 大杼五分 風門五分留 中府乳

三肋間動脈應 手刺入三分 缺盆三分

傷寒胃熱不已 中脘瀉 上廉三分 下廉八分 三里

氣衝

傷寒四肢熱不已 雲門三分灸 肩髃 委中 腰膕

在二十一椎節下開宛宛中以挺伏地舒身兩手相重

支額縱四體然後取其穴針入五分留七呼灸七十壯

傷寒大熱不退 曲池瀉 絕骨補 傷寒熱退後再發熱 風門 合谷 行間 絕骨

惡寒

發熱惡

寒脈浮

屬太陽

無熱惡

寒脈浮

屬陰症

病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於

陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

發熱惡寒脈浮屬太陽方論甚眾並見發熱門太陽病條

惡寒脈微而復利者亡血也四逆加人參湯主之王叔和原入霍亂門

四逆加人參湯

人參 乾姜 甘草各一兩 附子一枚去皮

右咬咀每服五錢水煎溫服日三

診 少陰病惡寒身倦而利若利止手足溫者可治利不止手

足逆冷者不可治方論見下刊

少陰病惡寒身倦時煩欲去衣被者可治四逆無脈不煩

而躁者死方論見但欲寐

惡寒手足逆冷若兼大汗拘急下利四逆湯方論見下利

若兼頭汗心下滿脈沉細大便鞭者小柴胡湯方論見厥

若夏月中暑脈虛而渴背惡寒者白虎加人參湯方論見

若口中和但欲寐者灸之宜附子湯

發汗後惡寒者虛也論見發熱發汗病不解反惡寒者虛故

也芍藥甘草附子湯主之

芍藥甘草附子湯方

芍藥 白朮各二兩 甘草三兩 桂枝四兩

附子一枚炮去皮

右咬咀每服五錢水煎溫服

太陽病下後脈促胃滿者桂枝去芍藥湯主之

桂枝去芍藥湯方

桂枝去皮 生姜各兩半切 甘草一兩炙 大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

若微惡寒者去芍藥加附子湯主之活人云芍藥味酸脈促胃滿恐成結胸故

去芍藥單用辛甘之味發散毒氣也

去芍藥加附子湯方

桂枝 生姜各兩半 甘草一兩 大棗六枚

附子半個去皮炮

右咬咀水煎溫服每服五錢

傷寒汗下後心下痞而惡寒者表未解也先用桂枝湯解

表用大黃黃連瀉心湯攻痞若痞而汗出惡寒者表已解

也附子瀉心湯主之方論見痞

禁忌

陽明病胃家實若汗多發熱惡寒者表未解也未可與承氣湯方論見潮熱

傷寒脈浮汗出微惡寒小便數脚挛急者忌服桂枝湯方論

見

惡寒續法

活惡寒忌近火
大抵大陽病必發熱而惡寒不可過覆衣被及近火氣
恐寒熱相搏脈道沉伏愈令病人寒不可遏但去被徹火
兼飲以和表之藥自然不惡寒矣若婦人惡寒尤不可近
火恐寒氣入腹血室結聚針藥所不能治矣

惡風

表裡
發熱惡風為表虛屬太陽病方論見發熱太陽病條發汗後遂汗

漏不止其症似風

難屈伸但心下不

風濕相搏者骨節

惡風項強脇滿手足

惡風續法

惡風不同

或惡風者見風至則惡矣必居密室之內幃帳之中則坦然自舒惡寒者則不待風而自寒雖身大熱而不欲去衣者是也活人云惡寒者不當風而自憎寒惡風者當風而憎寒也

頭痛

頭痛表裡諸症
發熱頭痛惡風者屬太陽方論見發熱太陽病大便不利六七日

頭痛身熱小便赤者宜承氣湯若小便利者知不在裏仍

在表也宜桂枝湯論見胃實頭痛發熱脈弦細者屬少陽宜

小柴胡湯論見口苦若脈反沉者當救裏宜四逆湯論見發熱

頭痛兼心下痞硬滿痛苦眩冒時如結習者刺大椎第一

間肺俞肝俞論見項強若下後仍發汗無汗小便不利者桂

枝去桂加茯苓白朮湯方論見項強若表解汗出脅痛乾嘔

者宜十棗湯方論見脇痛頭痛乾嘔吐涎沫者用吳茱萸湯

方論 若表解汗出心下鞭引脇痛者用十棗湯 若陽

見吐 明胃實反無汗而小便利嘔欬手足厥者為寒邪 方論見

頭痛發熱吐利者為霍亂 吐利 濕家病身痛發熱

面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大能食者納藥鼻中則愈

方論見身痛濕痺條

太陽病下之復脈細數者頭痛未止

頭痛續法

表

一丈夫因浴冷水發熱頭痛脈緊此有寒濕也宜溫藥

汗之

蒼朮 麻黃 乾葛 各錢半 甘草 炙此

陳皮 川芎 各二錢

分二貼服得汗後知病退又與下補藥

芍藥 兩半 陳皮 半夏 各三錢 白朮

蒼朮 人參 木通 各二錢 甘草 五分

分四貼姜水煎服

一婦人頭痛發熱而渴

白朮 兩半 陳皮 川芎 各三錢 乾葛 二錢

木通 錢半 甘草 炙些

右分四貼水煎溫服

發散方 若已發汗或未發汗頭痛如破者用連鬚蔥白湯

連鬚蔥白湯方

蔥白 連鬚切半升 生姜 二兩

右以水二升煮取一升分二次溫服再不止者宜服後

方

葛根蔥白湯方

葛根 芍藥 知母 各半兩 蔥白

川芎 生姜各一兩

右以水三升煎至一升熱服

吐瀉方

若非次頭疼曾中滿及發寒熱脈緊而不大者即是膈上有涎宜用瓜蒂末一錢煖水調下吐涎立愈

汗下後頭痛分陰陽

傷寒汗下後頭痛起目眩者宜獨活湯

防風 獨活 旋覆花 當歸各七錢

右咬咀姜水同煎服

傷寒熱病後頭痛不止者用石膏川芎湯

石膏 川芎各一兩

右咬咀每服五錢水煎服

大經頭痛治法

太陽頭痛有汗桂枝湯無汗麻黃湯 陽明頭痛白虎湯 少陽頭痛小柴胡湯 太陰頭痛脈浮桂枝湯脈沉厥陰頭痛外傷本經桂理中湯 少陰頭痛小柴胡湯

枝麻黃各半湯 嘔而微吐苦水者吳茱萸湯

太陰頭痛者必有痰也少陰頭痛者足寒而氣逆也蓋太陰少陰二經雖不至頭然痰與氣逆壅於膈中則頭上氣不得暢降而為痛也

如脈浮而頭痛過在手足太陽刺完骨京骨 如脈浮而長過在手足陽明刺合谷衝陽 如脈浮而弦過在手足少陽刺陽池丘墟風府風池此刺頭痛之法也

傷寒頭痛刺合谷 攢竹

項強

診治 發熱惡風項強者屬太陽 方論見發熱太陽病体

項強脇下滿苦

身熱惡風手足温而渴者小柴胡湯 若下後不能食身黃小便難者與柴胡湯必反重 方論俱見脅痛

針灸 太陽與少陽并病頭項強痛或眩冒時如結胃心下痞鞭

者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎勿發汗如發汗則譫語脈弦五六日譫語不止當刺期門

太陽與少陽并病心下鞭頭項強而眩者當刺大椎肺俞

慎勿下之宜服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無

汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主

之注云心下滿痛小便不利者成結胃小便不利為停飲故加苓朮以行之

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

芍藥 生姜 茯苓 白朮 各兩

甘草 大棗 六

右咬咀每服五錢水煎溫服小便利即愈結胃亦項強

如柔瘕狀者大陷胃丸主之

項強卒口禁背反張為瘕方論見瘕

身体痛

之法

發熱惡寒身軀痛者屬太陽病麻黃湯大青龍湯是也

若蕪心下支結者柴胡桂枝湯 若蕪下利清穀腹脹者

先以四逆溫裏後以桂枝發表方論見發熱太陽病條 若尺脈遲

者血少榮氣不足活人先以黃芪建中湯養其血俟尺脈

回却用柴胡等湯和解之 身体疼痛脈沉發熱頭痛不

瘥者四逆湯方論見發熱 若少陰但欲寐手足寒者附子湯

方論見但欲寐 發汗後身軀痛脈沉遲者桂枝加芍藥生姜

人參新加湯主之

桂枝 人參 芍藥 生姜 各二

甘草 大棗 六

右咬咀每服五錢水煎溫服

身軀痛下利方論見下利條 身軀痛吐利為霍亂方論見吐利條 身

軀痛手足寒若脈沉但欲寐者附子湯方論見但欲寐 若大汗

身痛諸症

濕痺

出熱不去內拘急自利惡寒者四逆湯方論見 若夏月中暑脈虛而渴者白虎加人參湯方論見 身痛如被杖面目青咽痛者為陰毒升麻鱉甲去雄黃蜀椒湯方論見 太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺濕痺之候小便不利便反快但當利其小便活人脈沉細作沉緩 濕家之為病身盡痛發熱而煩身黃如熏可與麻黃加朮湯發其汗慎不可以大劑攻之

麻黃加朮湯方

麻黃二兩

桂枝二兩

甘草一兩

杏仁十個去皮尖

白朮四兩

右咬咀先以水煮麻黃去沫入諸藥煎溫服覆取微汗濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中

則愈

納鼻藥方見發熱

濕家其人但欲汗出背強欲得被覆向火若下早則噦曾滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒渴欲得水而不能飲則口煩躁也 濕家下之額上汗出微喘小便便利者死若下利不止者亦死

右濕痺活人書為中濕脈沉細為沉緩小便自利者朮附湯小便不利者甘草附子湯五苓散而不及麻黃加朮湯并納鼻藥蓋麻黃納鼻皆是表藥而非脈沉緩之劑故也

風濕不得屈伸者甘附

風濕相搏骨節煩疼掣痛不能屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

甘草

白朮各一兩

桂枝二兩

附子一枚

右咬咀水煎温服作四劑活人云身腫者加防風一兩

不能轉側者桂附

傷寒八九日風濕相搏身疼体煩不能轉側不嘔不渴脈浮虛而澹者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝附子湯方

桂枝二錢 附子一枚 甘草六錢 大棗四枚

生姜兩

右咬咀每服五錢水煎温服

白朮附子湯方

大便硬小便不利者附

白朮三兩 附子一枚炮 甘草二兩 生姜兩

右咬咀水三升煮一升分三服温服一服覺身痒半日

許再服三服都盡其人如冒狀勿怪即是朮附並走中逐水氣未得除故耳

發熱口捕劇者麻黃

薏苡湯方

薏苡仁 麻黃各半兩去 甘草一兩

杏仁十枚去

右咬咀每服四錢水煎温服有微汗者避風

身重汗出者防

風濕身重脈浮汗出惡風者防已黃芪湯方見

問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病仍不愈者何也答曰發其汗汗

大出者但風氣去濕氣在故不愈也若治濕風者發其汗但微微自欲汗出者風濕俱去也

躰痛續法

風濕

風濕相搏一身盡痛者補中益氣湯加羌活防風升麻藥本蒼朮治之如病去勿再服以諸風藥損人元氣而益其病故也

神木湯治風濕惡寒脈緊無汗 白朮湯治風濕惡風脈緩有汗俱見續傷寒發熱條

右二朮湯治風濕又當隨症加減其詳並見痊條及白朮神木二湯後

杏仁湯療風濕身體疼痛惡風微腫

桂枝兩 麻黃去節湯 芍藥 天門冬去心各一

生姜兩 杏仁二十五枚去皮尖炒

右咬咀每服五錢水煎溫服

麻黃復煎湯治陰室中汗出懶語四肢困倦乏力走疰

疼痛乃下焦伏火不得伸浮而躁熱汗出一身疼痛蓋風濕相搏也以麻黃發汗漸漸發之在經者亦宜發汗况值季春之月脈緩而遲尤宜發之令風濕去而陽氣升困倦乃退血氣俱得生旺也

麻黃去節用水五盞先煎令沸去沫查再煎至三盞方入下藥 黃芪各二錢

白朮 人參 柴胡根 防風

生地各五分 甘草三分 羌活 黃柏各一錢

杏仁三個去皮尖

右咬咀作一服入麻黃湯煎至一盞臨卧服勿飽服

當歸拈痛湯治濕熱為病身體疼痛方見諸痺門一身盡痛條

Vertical text or markings in the upper section of the page.

Vertical text or markings in the lower section of the page.

Vertical text or markings on the right edge of the page.

Vertical text or markings on the right edge of the page.

醫學綱目卷之三十一

傷寒部

陽明病

胃實不大便

自汗

不得臥

潮熱

譫語

狂亂

循衣摸牀

渴 嘔

乾嘔

陽明裏証 胃家實

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答

曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽

陽明者發汗利小便胃中燥煩實大便難是也陽明之為

病胃家實也問曰緣何得陽明病答曰太陽病發汗若下

若利小便者此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內

實大便難者此名陽明病也 傷寒脈浮而緩手足自溫

者是為繫在太陽太陽者身當發黃若小便利不能發黃

至七八日大便鞭者為陽明病也 陽脈實因發其汗汗

出多者亦為太過太過為陽絕於裏亡津液大便因鞭也

中風中
寒辨

陽明病若能食為中風不能食為中寒 陽明病但頭眩
不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛也

忌攻

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以
其人本虛故攻其熱必噦也 陽明病脈遲食難用飽飽

則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸下之腹滿如故所以
然者脈遲故也 陽明病欲解時從申至戌止 傷寒嘔

多雖有陽明症不可攻也 陽明病面合赤色不可攻之
攻之必發色黃小便不利也 陽明病心下鞭滿者不可

攻之攻之利遂不止者死利止者愈

胃實有
表者先
解表

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者
知不在裏仍在表也須當發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯 陽明

病脇下鞭滿大便不利而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯

若上焦得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解

脇痛脈
浮弦宜
和

陽明中風脈弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣
不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱

時時噦耳前後腫刺之小瘥外不解病過十日脈續浮者
與小柴胡湯脈但浮無餘症者與麻黃湯若不小便腹滿
加噦者不治

口苦脈
浮緊宜
和

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下
之則腹滿小便難也 許學士云宜小柴胡湯 陽明腹滿脈浮緊口

苦咽乾而喘若發熱汗出不惡寒反惡熱身重者忌發汗
忌加燒針忌下也 論見自汗 陽明病脈浮而緊者必潮熱發

作有時但浮者必盜汗出

右胃家實不大便雖三尺之童亦知可下也殊不知仲
景之法雖有胃實症若表未解及有半表者亦先用桂

枝柴胡以解外然後視虛實消息之也

胃實表
解無症
者以攻
大便硬
者導之

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便時宜用蜜煎導而通之若土瓜根及入猪膽汁皆可導之

蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬稍凝似飴狀攪之勿令焦候可丸以手捏作挺子令頭銳大如指長二寸許乘熱急作之納穀道中用手急捺住欲大便時乃去之 又猪膽汁方用大猪膽一箇瀉汁和醋少許和勻灌入穀道中如飯時頃大便自去

便硬無
所苦者
候之

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦

也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散 陽明病本自汗出醫更重發汗病已瘥尚微煩不了了者此大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

胃實表
解有証
者隨証
攻之

陽明病潮熱不大便六七日恐有燥糞欲知之法少與小承氣湯轉矢氣者有燥屎可攻若不轉矢氣者無燥糞不可攻

方論見
潮熱

陽明病汗出大便鞭而譫語者宜小承氣

方見
譫語

不大便腹滿者宜下之若但遶臍痛者則為燥

方見
腹滿

屎宜承氣湯 若心下至小腹滿痛者則為結胃宜陷胃

方見
腹滿

湯 陽明病不吐不下心煩者宜調胃承氣湯 陽

明病發熱汗出此為越熱不能發黃也但頭汗出身無汗

汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此為痧熱在裏身必發黃茵陳湯主之 小便不利大便乍難乍易有微熱喘胃不臥者宜大承氣湯論見不陽明症其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之方見無表裏症下後脈數不解消穀易飢六七日不大便者有瘀血宜抵當湯 傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯 跌陽脈浮而濇浮則濇強濇則小便數浮濇相搏大便難其脾為約麻仁丸主之

麻仁丸 丹溪云氣實而表藥也

麻仁升

芍藥

厚朴 去皮薑製

枳實 各四兩

杏仁

大黃 煨各八兩

右為末蜜和丸如桐子大米飲下二三十九未始益之每日三服

漱水不

陽明口燥但欲漱水不欲嚥者此必血

系人云輕則犀角湯重則抵當湯

胃實脈

許學士有一士人家病二人皆旬日矣一則身熱無汗大便不通小便如澁神昏而睡診其脈長大而實予用承氣

脈虛者

下之而愈一則陽明白汗大便不通小便利津液少口乾燥其脈亦大而虛作蜜煎三易之下燥盡得溏利而解其

家曰皆陽明不通何以治之異予曰二症雖相似然自汗

小便利者不可蕩滌五臟為無津液也然則傷寒大症相

似兩症稍有不同宜仔細斟酌正如格局看命雖年月日

時皆同而貴賤窮通不相侔者於一時之中有淺深故知

不可不謹

胃實反

陽明病發多反無汗其身如虫行皮中狀者此久虛故也

虛邪

陽明病反無汗而小便利三日嘔而欬手足厥者必頭痛若不欬嘔手足不厥者頭不痛

陽明胃實脈浮無汗而喘宜麻黃湯

陽結

脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日

陰結

脈沉而遲不能食身體重大便鞭名曰陰結也期十四日

胃實欲

少陰病但欲寐腹脹不大便者承氣湯主之

陰

胃實續法

結

傷寒大便不通 期門 章門 照海

陰

海已寒丸治陰症服四逆數日不大便躁渴者

自汗

成自汗者謂不因發散而自然汗出也

陽明外

證自熱

問曰陽明外症云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒何也答曰雖得之一

日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也問曰惡寒何故自罷

答曰陽明居中土萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自

止此為陽明病也 傷寒轉屬陽明者其人漉然微汗出

下證

本太陽初得病時發其汗先出不徹因轉屬陽明也 汗

出身熱不惡寒便鞭謔語者宜承氣湯

急下證

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

許有人患傷寒自痛鼻乾不得臥大便不通尺寸脈俱大

已數日一夕汗出予謂速以大柴胡湯下之醫駭曰陽明

自汗津液已涸法當用蜜煎何須苦用下藥予謂曰子雖

知蜜煎為穩當還用大柴胡湯此仲景不傳之妙公安能知之予力爭竟投大柴胡湯二貼愈仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若又下之豈不表裏俱虛又如論少陰云少陰病一二日口乾燥者急下之人多謂病發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈甚舉此二端則其可疑者不可勝數此仲景之書世人罕能讀也予謂仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏之說凡稱急者有三變謂纔覺汗未至津液乾燥便速下之則為精捷免致用蜜煎也若胃中識得了了自無可疑若未能了候用之反不若蜜煎之為穩也

和解症陽明脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則心憤憤反譫語若加燒針必怵惕躁不得眠若下則胃中空虛客氣動膈心中懊懷舌上胎者

梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

脈浮發熱口苦者邪在表脈緊自汗腹滿不惡寒者邪在裏此表裏俱有邪宜和解

小便不利飲食者自解

陽明欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翁翁如有熱狀奄然發狂濺然汗出而解此水不勝穀氣與汗共并脈緊則愈

下飲食者瘕瘕

陽明病若中寒不能食小便不利手足濺然汗出此欲作瘕瘕必大便初鞫後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

似陽明三症

太陽病發熱汗出不惡寒者為柔瘕

論見汗出不惡寒發熱關上脈細數曰小逆

表裏

汗出身熱不惡寒裏症前條陽明病是也

汗出身熱惡寒

風寒者宜桂枝湯

論見兼項強痛者桂枝加葛根湯

傷表不項 兼骨節煩疼不得屈伸小便不利者甘草附子湯論見

裏寒屬強 風濕身 若發汗後遂漏不止惡風者桂枝附子湯論見

熱條 若夏月中暑自汗身熱惡寒脈微弱口渴足冷者白虎

加人參湯主之方論見

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

汗出心下痞滿有二症其痞按之濡軟不痛而惡寒者宜

附子瀉心湯其痞按之鞭引脇痛而身體不惡寒者宜十

棗湯方論見

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢急難以屈

伸者桂枝加附子湯主之

桂枝附子湯

附子製一 桂枝去皮 生薑一兩 甘草炙一

大棗六

右咬咀每服五錢水煎溫服

詔有一人得太陽症因發汗汗不止惡風小便濇足攣而

不伸予診其脈浮而大浮為風大為虛予曰在仲景方中

有两症大同而小異一則小便難一則小便數用藥少差

即有千里之失仲景第七症云太陽發汗遂漏不止其人

惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯第十

六症云傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反

以桂枝湯攻表此誤也得之便數咽中乾煩燥吐逆一則

漏風小便難一則自汗小便數或惡風或惡寒病各不同

也予用第七症桂枝加附子湯三啜而汗止佐以甘草芍

藥湯足便得伸

二陽併病太陽病發汗不徹因轉屬陽明續自微汗出不

惡寒其人面赤燥煩短氣不知痛處但坐更發汗則愈論見

赤面

風溫症

發汗已身灼熱者名風溫風溫為病脈浮汗出身重多眠

胃乾

宜葳蕤湯論見風溫發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與之論見不

動氣

動氣在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤此為逆難治法

汗出而喘

汗下後汗出而喘者麻黃杏仁甘草石膏湯 下後利不止脈促喘而汗出者葛根黃芩黃連湯論俱見喘

汗出下利

汗出下利熱不去厥逆惡寒者四逆湯 汗出下利有微熱者其脈數自愈脈緊未愈論俱見下利 六七日後發熱而利其人汗出不止者死論見下利

汗出吐利

脈緊反汗出而咽痛吐利者少陰病亡陽 吐利汗出手足厥冷脈微欲絕者四逆湯 吐利止汗出而厥脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯方論並見吐利 脈陽微而汗出者為自和也汗出多者為太過 陽明汗多而渴者不可與猪苓湯 脈浮自汗若小便數脚攣急者不可與桂枝湯

診息

自汗續法

陰陽

海太陽自汗桂枝湯 陽明自汗白虎湯 少陰自汗四逆湯

陽明症身熱目痛鼻乾不得臥不惡寒而自汗或惡熱而尺寸俱浮者白虎湯主之 傷寒尺寸脈俱長自汗大出身表如冰石脈傳至于裏細而小及瘧疾但寒不熱其人動作如故此陽明傳入少陰戊合癸即夫傳婦也白虎加

桂枝主之然脈雖細小當以遲疾別之此症脈疾而非遲
故用此法白虎加桂枝湯方見瘧如中

活傷寒應發汗而動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗出
筋惕肉瞤此為逆難治先服防風白朮牡蠣散次服建中

湯

防風白朮牡蠣散治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

防風 牡蠣炒成 白朮各等分

右為細末每服二錢以酒調下米飲亦得日二三服汗

止後服小建中湯

診 成或汗出髮潤與其出如油或大如貫珠着身出而不流

皆為不治之症

灸 集傷寒汗多不止內庭瀉 合谷瀉 復溜瀉

手足汗 二陽併病潮熱譫語而手足漿漿汗出者陽明病短氣腹

滿而手足濺然汗出者俱宜大承氣湯方論見 陽明病

不能食小便不利手足濺然汗出者胃冷欲作痼瘕必大

便秘初鞭後溏論見

不得臥

陽明裏 身熱目疼鼻乾不得臥尺寸脈俱長者陽明受病也病人

小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥

屎也宜大承氣湯 汗後大汗出煩躁不得眠欲飲水者

少少與之愈論見 汗下後不得眠若反覆顛倒心中懊

懣者梔子豉湯方論 若但晝不得眠夜安靜不嘔不渴

無表症脈沉微無大熱者宜乾薑附子湯論見

少陰 少陰病欲寐二三日後煩心不得臥者黃連阿膠湯主之

煩躁論見

黃連阿膠湯

黃連

阿膠各一兩

黃芩五錢

芍藥一兩

鷄子一箇

右咬咀水二盞煎八分去渣納膠消盡又納鷄子黃攪

勻溫服日三

少陰病下利欲寐六七日後咳而嘔渴心煩不得眠者宜

猪苓湯

論見下利

少陰病但欲寐脈沉細不煩五六日變自

利煩躁不寐者死

論見不得寐

發熱下利厥逆煩躁不得臥

者死

論見下利

不得臥續法

麤

活傷寒吐下後心煩乏氣日夜不得眠者酸棗仁湯主之

酸棗仁湯

酸棗仁升一

麥門冬去心二合

甘草炙二錢半

知母半兩

茯苓

川芎

乾薑各一兩

右咬咀每服四錢水煎服

傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠者黃連解毒湯主之

黃連

黃芩

黃柏各半兩

山梔二錢

一方有阿膠二錢

右咬咀每服五錢水煎服如未知再服進粥以此漸瘥

傷寒瘥後虛煩不得眠心中懊懣者烏梅湯主之

梔子

炒半兩

烏梅去核四箇

黃芩

甘草炙各半兩

柴胡

兩

右咬咀每服四錢薑三片豉五十粒煎至七分去渣溫

服一本有竹葉七片

潮熱

素裏

成潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而

發者謂之潮熱若日三五發者是即發熱非潮熱也潮熱

屬陽明必於日晡時發者乃為潮熱

陽明病潮熱大便微鞭可與大承氣湯不鞭者不與之若不大便六七日恐有燥糞欲知之可少與小承氣湯入腹中轉矢氣者此有燥糞乃可攻之若不轉矢氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與之則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉矢氣者慎不可攻也

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

陽明病下症

陽明病胃實譫語而潮熱者承氣湯主之

大承氣湯

海藏云厚朴去痞枳實泄滿芒硝軟堅大黃泄實必痞滿燥實四症全者方可用之

大黃

酒浸一兩治不大便地道不通

厚朴

二錢姜製治腹

枳實

枳實

一枚治心下痞按之良久氣散痛緩此并主心下澹乃肝之氣盛也

芒硝

一兩治腹中轉矢氣內有燥屎本草云味辛寒潤燥

右咬咀水二大盞煎枳朴至一大盞下大黃復煎至六分去渣入硝又煎一二沸溫服如未利再作與服以通為度

小承氣湯

海藏云大黃泄實厚朴去痞必痞實全者可用

大黃

酒浸一兩

厚朴

姜製二錢

枳實

炒一

右咬咀同上法煎溫服以利為度不利再服 不大便

舌燥心下滿痛而日晡小有潮熱者宜大陷胃湯

陽明病發潮熱大便澹小便自利胸脇滿不去者小柴胡

湯主之

陽明為病胃實是也今便澹而言陽明病者謂陽明外症身熱汗出不惡寒反惡熱之病也

便澹腸滿脈弦浮而潮熱者宜

陽明中風脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗
嗜臥身黃小便難時時噦而潮熱者小柴胡加茯苓主之
傷寒十三日不解胃腸滿而嘔日晡時發潮熱已而微
利此必柴胡症下之而不得利今反利者知醫以丸藥下
之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴
胡加芒硝湯主之

柴胡

黃芩

人參

甘草

生姜

已上各五錢

半夏

湯浸三箇

大棗

三枚

芒硝

兩

每服五錢水一盞半煎至八分去渣納芒硝更微沸溫

服

診

陽明病脈浮緊者必潮熱發作有時

論見胃實有表條

潮熱續法

熱

活冬月陽明朝熱脈浮而緊者發作有時但脈澁者必盜

汗黃芩湯主之

方見下利

譫語

陽明宜下症

陽明為病胃家實是也胃實則譫語故譫語宜入陽明門

陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承

氣湯一盞腹中轉矢氣者更服一盞若不轉矢氣勿更與

之明日不大便脈反微澁者裏虛也為難治不可更與承

氣湯 陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎

五六枚若能食者但鞭亦宜大承氣湯下之 二陽併病

太陽病罷但發熱手足熱熱汗出大便難而譫語者下之

則愈宜大承氣湯 陽明病其人多汗以津液出胃中燥

大便必鞭鞭則譫語小承氣湯主之若一服譫語止勿更服

虛實實則譫

汗出譫語者必有燥糞在胃中此為風也須下之必過經

語虛則

乃可下下之若早語言必亂以表虛裏實故下之則愈宜

大承氣湯夫實則譫語虛則鄭聲鄭重煩煩也只將一句舊言重疊煩煩言之終日殷勤不換

鄭聲也蓋神有餘則能機變而亂語者發更端神不足則無機變而只守一語也

傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反

發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語成無已謂鄭聲

為鄭聲之聲非是前辨已明

汗後語

少陽病發汗後及小便數脚攣急誤與桂枝攻表後若胃

不和譫語者少與調胃承氣湯方論三陽合病腹滿身

重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之

則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之論見身重

汗發多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以

通津液後自愈發汗多又重發汗者亡其陽譫語脈短者

死脈自和者不死 諸逆發汗病微者瘥劇者言亂目眩

多亡

火後語

者死

形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴脈濇者必譫語弱

者發熱脈浮解之當汗出愈

太陽病火劫汗後身黃小便難身體枯燥頭汗腹滿微喘

或不大便久則譫語論見頭汗 太陽病二日反躁乃熨其背

而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振

慄自下利者此為欲解也故其汗從腰已下不得汗欲小

便不得反嘔欲失漉足下惡風大便鞭小便當數而反不

數及多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故

也 少陽病欬欬而下利譫語小便難者被火氣劫汗故

也吐下汗溫鍼後譫語柴胡湯症罷者此為壞病知犯何

逆以法治之論見壞症

下後症

胃滿譫語若下後煩驚小便不利身重不可轉側者柴胡

加龍骨牡蠣湯主之方論

熱入血室

陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實瀉之澱然汗出則愈 腹滿譫語脈浮緊者刺期

門論見

太陽少陽併病發汗則譫語脈弦五六日譫語

不止者宜刺期門論見

婦人發熱經水適來譫語為熱

入血室若熱除脈遲者身涼胃滿如結胃狀者刺期門若

晝則明了暮則譫語者無犯胃氣及上二焦必自愈活人

以小柴胡湯主之

論見婦人傷寒

傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以承氣湯下

之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以丸

藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為

內實調胃承氣湯主之若下利譫語者有燥屎也宜小承

氣湯

方見潮熱

右下利譫語其曰脈調和而手足和小便利者陽也故

用承氣下之其脈當微厥反少陰但欲寐被火氣劫汗

譫語小便難者陰也故當用補劑和之

但欲寐下利譫語俱見下利少

陰

許有人病傷寒下利身熱神昏多困譫語不得眠或者見

下利便以譫語為陰虛症予曰此亦小承氣症衆駭曰下

利而服小承氣仲景之法乎予曰此仲景之法也仲景云

下利而譫語者有燥糞也屬小承氣湯而得解予嘗讀素

問云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從多從少

視其事也帝曰何謂反治岐伯曰塞因塞用通因通用王

冰註云大熱內結注瀉不止熱宜寒療結復須除以寒下

之結散利止則通因通用也正合於此又何疑焉

診直視譫語喘滿者死下利者亦死 譫語妄言身微熱脈

浮大手足溫者生逆冷脈沉細者不過一日死矣

謔語續法

虛

素謔語者氣虛獨言也全文見註愚用參芪歸朮等劑治謔語得愈有百十數豈可不分虛

實一藥用黃連解毒大

小承氣等湯以治之乎

難脫陽者見鬼仲景謂亡陽謔語亦此義

海黃芪湯治傷寒或時悲哭或時嬉笑或時太息或語言

錯亂失次世疑作謔語狂言者非也神不守室耳兩手脈

浮沉不一舉按全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脈也

甚者用調中丸或理中丸二方並見

丹浦江鄭兄年二十歲九月間發熱頭痛妄言見鬼醫與

小柴胡湯數貼熱愈甚予視之形肥面亦帶白却喜筋骨

稍露診其脈弦大而數實脈本不實涼藥所致此因勞倦

成病與溫補藥自安遂以參朮為君苓芍為臣黃芪為佐

氣虛脈

陽者錯

失志者

脈損小

勞倦謔

附子一片為使與二貼而症不減或曰脈既數大狂熱而
又大渴用附子誤矣予曰此虛症而誤投寒涼之藥人肥
而脈左大於右事急矣非加附子參朮焉能有急效再與
一貼乃去附子作大劑與服至五十貼得大汗而愈自後
又補養兩月氣體方始平復 一人五月內患謔語大發
熱肢體不能舉喜冷飲診其脈洪大而數用黃芪茯苓濃
煎如膏却用涼水調與之三四服後病者昏睡如死狀但
顏色不改氣息如常至次早方醒諸症悉退而安 盧兄
汗後再發熱妄言呂仲脩汗後熱不退亦妄言陶明節熱
退後不識人言語謬妄皆用參芪朮歸等補劑而愈信哉
謔語屬虛者十居八九

便利肢

活大小便鞭手足冷脈微細者必鄭聲也當服溫藥白通

湯海藏用黃芪加乾薑湯方見傷寒候輔之脈極沉細

謔語為寒

外熱內寒肩背胸脇斑出十數點語言狂亂或曰發斑謔語非熱乎予曰非也陽為陰逼上入于肺傳之皮毛故斑出神不守舍故錯語如狂非謔語也肌表雖熱以手按之須臾冷透如水與薑附等藥數日約二十餘兩得大汗而愈後因再發脈又沉遲三四日不大便與理中丸三日內約半斤其病全愈以此知侯公之狂非陽狂之狂乃失神之狂即陰虛也

便秘手足虛脈洪謔語為熱

活大便秘小便赤手足溫脈洪數者必謔語也宜用調胃承氣湯

海治老幼及虛人傷寒五六日昏冒言妄小便或淋或澀起臥無度或煩而不得眠並宜白虎湯加山梔一錢

斗治熱病及時疫心躁狂亂奔走狀似癲癩言語不定久不得汗及時疫不知人事者以人中黃不拘多少入確內

用泥封固武火煨半日去火候冷取出於地上以盆蓋半日許研細如麪新汲水調下三錢或未退再服愈人中黃即屎也

狂亂

鎮墜

火劫汗後亡陽心驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆

牡蠣龍骨救逆湯方論見驚汗家重發汗必恍惚心亂小便

已陰痛與禹餘糧丸方見

下症

小腹痛發狂或身黃者宜抵當湯論見發熱方見畜血

疹

遺尿狂言目反直視者此為腎絕論見大法

狂亂續法

狂而脈實者為實熱

活病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脈實潮熱狂語如見鬼

狀此陽毒也治陽毒法見陽毒門表者陽毒升麻湯黑奴丸裏者大黃散

本治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋鵲石散

黃連

寒水石各等分

右為細末每服二錢濃煎甘草湯候冷調下

雲傷寒心風狂妄者宜防風黃連湯

黃連 大黃 防風 遠志

茯神各半

右為細末每服一兩水煎服

海黃芪湯治傷寒或歌或笑或悲哭譫言妄語方見發熱下

狂而脈虛者為虛熱

陳志仁傷寒狂妄每欲狂走四五人扶捉不定脈虛數用

柴胡湯反劇以參芪歸朮甘草陳皮煎湯一服狂定再服

安睡

針灸

集傷寒發熱不識尊卑 曲池 絕骨 百勞 湧泉

甲熱汗不出狂互引癩疾合谷主之

循衣摸床

診治

傷寒若吐若下後不解不大便五六日至十餘日日晡所

發潮熱不惡寒狂語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣

摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發熱

譫語者大承氣湯主之若一服利止後服 太陽病以火

劫發汗陰陽枯竭虛燥或不大便久則譫語甚者至噦手

足躁擾捻衣摸牀小便利者可治論見頭汗

許有人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩手撮

空直視喘急更數醫矣見之皆走此誠惡候得之者十中

九死仲景雖有症而無法但云脈弦者生瀉者死已經吐

下難以下藥謾且救之若大便得通而脈弦者庶可治也

與小承氣湯一服而大便利諸疾漸退脈且微弦半月愈

或問曰下之而脈弦者生此何意也予曰金匱玉函云循

衣妄撮牀惕不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發

熱譫語者承氣湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋

衣領及捻物者肝熱也此症在玉函列於陽明部蓋陽明者胃也肝有熱邪滯于胃經故以承氣瀉之且得弦脈則肝平而胃不受克此所謂有生之理讀仲景論不能博通諸醫書以發明其隱奧吾未之見也海藏云許學士作尋衣撮空是肝熱風滯未疾此論誠當然莫若以為肺熱之極其人必妄言亂語難經云肺邪入心為譫語

循衣摸牀續法

虛嘗治循衣摸牀者數人皆用大補氣血之劑惟一人兼睬振脈代遂於補劑中畧加桂二分亦振止脈和而愈

渴

病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也論見不大便服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎人參湯主之渴欲飲水無表証者太陽症罷轉屬陽明也下二條意同皆太陽轉屬陽明故渴也服桂枝

湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱

時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人

參湯主之王註云若純在表則惡風無時今表裏有熱故時時惡風也傷寒無大熱

口燥渴心煩脈微惡寒者宜白虎加人參湯陽明病脈

浮緊口苦腹滿而喘若下後渴欲飲水口乾舌燥者白虎

人參湯主之

白虎加人參湯

石膏碎四兩知母半兩甘草兩粳米一合

人參二錢

右咬咀每服五錢水煎溫服

右白虎加人參五條治表渴脈洪小便利者

本有人初病嘔吐俄為醫者下之已七八日而內外發熱

予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下且重虛矣
白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八日不解熱結在
裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相當也蓋始吐者熱在
胃腕而脈至今虛大三投湯而愈仲景既云傷寒若吐下
後七八日不解表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷
寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎又云脈浮滑此
以表有熱裏有寒白虎加人參湯主之 國朝林億校正
謂張仲景於此表裏自差矣予謂不然大抵白虎能除傷
寒中渴表裏發熱故前後二症或云表裏俱熱或云表熱
裏寒皆可服之一種脈浮無汗其表不解全是麻黃與葛
根症安可行白虎也林億見所稱表裏不同便謂之差是
亦不思之過也

溫病湯
似陽明

太陽發熱不惡寒而渴者為溫病

論見溫病活人歲時湯
主之發熱不惡寒者以

而有太表解也太陽病者必頭痛身疼
表未解也此表裏兩症皆兼見

渴而下
利者少
陰

渴而下利屬少陰其病但兼欲寐小便白者四逆湯兼咳
嘔不得眠小便不利者猪苓湯兼自利純青色水者大承

氣湯有熱者白頭翁湯

方論見
下利

消渴氣上衝心心疼飢不欲食食則吐蛇若下之則利不

止若欲飲水者少少與之愈

論見氣
上衝心

消渴吐
蛇者厥
陰忌下
小便不
利而渴
者太陽

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者
少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者

五苓散主之 發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之

陽明病脈浮緊口苦腹滿發熱汗出不惡寒者下後脈浮

發熱渴飲飲水小便不利者猪苓湯主之

五苓散方

猪苓

去皮
二兩 澤瀉

兩 白朮

三兩 茯苓

去皮
二兩

桂枝 去皮 半兩

右咬咀為散每服三錢白湯調下海藏云五苓散當服形亡必就陽明燥火成胃發黃故有調胃承氣症不當服而服之是為犯本小便強利津液重亡而成血症輕則桃仁承氣湯重則抵當湯主之

猪苓湯方

猪苓 去皮

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石 各半 兩

右咬咀每服五錢水煎溫服日三

頭汗者 兼胡茵 陳

渴而頭汗小便不利兼脇滿往來寒熱者柴胡桂枝乾薑湯兼發黃者茵陳蒿湯論見頭汗

咳嗽者 小青龍

表不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽而渴者小青龍湯去半夏加瓜蒌根湯論見效

暑濕身 熱足冷

夏月汗出惡寒身熱足冷而渴者為中暑白虎加人參湯

白虎加 人參

及酒黃連主之方見中暑惡寒身熱者症似表也足冷者不可表

表未解 刺期門

發熱惡寒腹滿汗出小便利而渴者為肝乘脾刺期門論見腹

表解宜 腹

表解不惡寒而渴者宜白虎湯方論見前陽明

渴而脇 滿寒熱

渴而脇滿及往來寒熱其症未經汗者小柴胡去半夏加人參瓜蒌湯若汗下後者柴胡桂枝乾薑湯詳見脇痛并往來寒熱

渴而心 下

渴而心下鞭痛日晡潮熱不大便者為結胃宜大陷胃湯若但鞭不痛者為痞與瀉心湯不解反渴而小便不利者宜五苓散詳見結胃痞氣二門

飲不 飲者又 蛤散

病在陽明應汗之反以冷水噴之灌之其熱益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不瘥與五苓湯論見結胃

文蛤散方

文蛤 一兩即海蛤粉也河間丹溪多用之大能治痰

右一味為散沸湯調服方寸匕

渴不能飲 下熱上寒

渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒論見濕痺

渴欲飲水水逆者五苓散主之
中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

渴欲飲水若太陽發汗後大汗出煩躁不得眠者及厥陰病氣起衝心心疼吐衄者少少與之愈論見前條及氣上衝凡得

時氣病至五六日而渴欲飲水不能多不當與之何者以腹中熱尚少不能消之更與水作病也至七八日大渴欲

飲水者猶當依症與之與之常令不足勿極意也言能飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之

忽然大汗出是為自愈也活人云凡病非大渴不可飲水若小渴咽乾者少少呷潤之令其胃中和乃佳

凡得病反能飲水此欲愈也但聞病飲水自愈小渴者亦強與之飲因成其禍不可復救活人云強飲水致飲停心下滿結喘者當以五苓散

或謂胃易主之下痢脈弱脈數而渴者自愈論見下利渴而發熱

診

其脈不弦緊而浮弱者汗出愈論見諸語

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥與猪苓湯復利其小便故也

右活人云切戒太陽症無汗而渴者不可與白虎湯陽

明症汗多而渴者不可與猪苓湯然太陽渴終不可與

白虎耶太陽症得汗後脈洪大而渴者方可與之也陽

明渴終不可與五苓散耶陽明症小便不利汗少脈浮

而渴者方可與之也

澤瀉法

羅傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用涼藥止

之恐復損胃氣愈不能食也白朮茯苓是也

海秦二母病太陰病三日不解後嘔逆惡心而脈不浮與

之半硫丸二三服不止復與黃芪建中湯脈中極緊無表

虛而食少者和胃之藥

裏病胃中大熱發渴引飲皆曰陽症欲飲之水予反與薑
附等藥緊脈反沉細陽猶未生以桂附薑烏之類酒丸與
百九接之二日中十餘服病人身熱煩躁不寧欲作汗也
又以前九接之覆以厚衣陽脈方出而作大汗翌日大小
便始通下瘀血一盆如猪肝然用胃風湯加桂附三服血
止其寒甚如此亦世之未見也

少陰湯
脈沉遲
為實沉
疾為熱
沉細者
虛

則大承氣湯 少陰口燥舌乾而渴身表涼脈沉細而虛
者瀉心湯主之此有形無形藥也

人參湯治傷寒七八日汗後心煩燥渴

人參

黃芩

柴胡

葛根各一兩

山梔

甘草各半兩

右為麗末每服五錢薑蔥煎溫服

溫中者
渴治法

活陽毒倍常燥盛大渴者黑奴丸主之

方見陽毒

風溫加渴

甚者宜瓜蒌湯

方見風溫

中暑伏熱累治不瘥其人發渴不

已酒蒸黃連丸主之

方見中暑

脈熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲水不止腹

大而脹尚不厭飲目無精光者死不治

嘔

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺濺然者是轉屬陽

明也 食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇

者屬上焦也 腹痛欲嘔吐者黃連湯主之

方論見腹痛

嘔而發熱者小柴胡湯主之 發熱微惡寒肢節煩疼微

嘔心下支結外症未去者柴胡加桂枝湯主之

論見發熱

陽病發熱惡寒身體痛嘔逆脈緊者名曰傷寒麻黃湯症

論見發熱

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯

強不能
食者轉
屬陽明

未裏

主之活人云頭疼身熱痛飢熱目疼鼻乾脉浮而長是也

葛根加半夏湯

葛根二錢 麻黃 生薑各一錢半 甘草

芍藥 桂枝各一錢 半夏二錢 大棗二枚

右咬咀以水一斗先煎葛根麻黃減二升去白沫納諸藥煎取三升温服一升覆取微汗

嘔而寒熱胸痛

嘔而往來寒熱胸脇苦滿者宜小柴胡若兼下利者乃太

陽少陽合病宜黃芩加半夏生薑湯論見往來寒熱及下利

嘔而薛僻微煩

太陽過經十餘日反二三下之後四五日柴胡症仍在者

先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與

大柴胡湯下之愈 太陽病過經十餘日心下温温欲吐

而心中痛大便反溇腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下

者與調胃承氣湯若不滿者不可與但欲嘔胸中痛微溇

者此非柴胡症以嘔故知極吐下也

先渴却嘔屬飲

本渴而飲水嘔者柴胡不中與也論見胸痛

先嘔却渴欲解

先渴却嘔者為水停心下此屬飲家活人云赤茯苓湯主之 先嘔

却渴者此為欲解候也金匱云嘔思水者急與之

嘔而下利

嘔而下利有寒熱者為陽宜黃芩湯大柴胡湯無熱者為

嘔而厥

陰宜猪苓湯真武湯並見嘔利門

嘔而心煩

嘔而脈弱小便利身熱見厥者難治四逆湯主之

嘔而心煩

嘔而心煩若汗吐下後者梔子生薑豉湯若未曾吐汗下

忌

後兼欬而渴者宜猪苓湯詳見不得脈

嘔多雖有陽明胃實不可攻之論見胃實 嘔家有癰膿者不

可治膿盡自愈 服桂枝嘔者酒客病論見大法

乾嘔

乾嘔發熱

乾嘔發熱兼自汗惡風鼻鳴者桂枝湯兼表不解有水氣

而欬者小青龍湯方見發熱

乾嘔脇痛若表解身涼短氣汗出不惡寒者十棗湯若兼

往來寒熱脈沉緊者小柴胡湯論見往來寒熱

乾嘔下利若兼表不解發熱而欬者小青龍湯去麻黃加

芫花湯論見欬若表身涼脇痛短氣汗出者十棗湯論見脇痛

若因下後心下痞硬滿腹中雷鳴日利數行者甘草瀉心

心下痞硬者瀉心湯論見

若脈微厥逆者宜白通湯若用白通湯溫後利不止厥逆

無脈者白通加豬膽汁湯論見下利

乾嘔厥逆若脈微下利者通脈四逆湯白虎加豬膽汁湯

論見下利若脈弦遲不利者四逆湯論見吐

乾嘔續法

飲水嘔者有停飲仲渴而飲水嘔者柴胡不中與也宜治膈間有水赤茯苓

湯主之

赤茯苓湯治傷寒嘔噦心下滿胃膈間有停水頭眩心悸

赤茯苓一兩 半夏姜製一兩 橘紅 芎藭各半兩

人參一兩 白朮半兩

右咬咀每服四錢姜五片水煎服

傷寒瘥後嘔者有餘熱在胃脘也竹葉石膏湯加生姜主

之

乾嘔不止為虛海葛根湯治傷寒乾嘔不止

葛根 人參各一兩 茯苓半兩 半夏姜製七錢半

白朮半兩 黃芪七錢半 麥門冬去心 甘草炙各一兩

右咬咀每服三錢生姜三片棗二枚同煎服

少陽病 口苦咽乾 眩 往來寒熱

脇滿痛 胸滿 胸痛 耳聾 少陽

病續法

口苦咽乾

少陽病

少陽之為病口苦咽乾目眩也

活人云宜小柴胡湯

耳聾胸滿忌吐下

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐

下則悸而驚

誤吐氣虛者悸誤下血虛者驚

脈弦發熱忌汗

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則

譫語此屬胃家胃和則愈胃不和則煩悸 傷寒三日少

陽脈小者欲已也 少陽欲解時從寅至辰上

口苦咽乾胃實者陽明忌汗下

陽明病腹滿脈浮緊口苦咽乾而喘若其人發熱惡寒誤

針

下之則腹滿小便難若其人發熱不惡寒反惡熱誤下之

則胃空虛為懊懣誤下之則譫語誤加燒鍼則不得眠

腹滿許學士云宜小柴胡湯

眩

少陽眩

眩而口苦舌乾者屬少陽

論見口苦

眩而心下鞭項強者屬

和項強宜刺

太陽少陽併病當刺大椎肺俞忌汗下

論見項強

陽明眩胃實

眩而胃實若能食不惡寒者中風若飽則頭眩小便難者

穀疸皆屬陽明

論見胃實

汗後眩為虛

太陽發汗後仍發熱心悸頭眩身暈振振欲擗地者真武

湯主之

方論見戰振

誤汗

動氣在左誤汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

方論見動氣活人云宜小建中

湯 諸逆誤汗而言亂目眩者死

論見譫語

頭眩脈沉緊發

汗則動經身為振振搖

論見戰振

往來寒熱

往來寒熱屬少陽宜小柴胡湯

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往來

寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯若已吐下發汗溫

針譫語柴胡症罷此為壞病知犯何逆以法治之 傷寒

五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡主之 血虛氣盡滕理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食者臟腑相連其病必下邪高病下故使嘔也宜

小柴胡湯

柴胡二兩

黃芩

人參

甘草各三錢

半夏薑製六錢

右咬咀每服五錢生薑五片棗三枚同煎溫服日三服若胸中煩而不嘔去半夏人參加瓜蒌實一枚若渴者去半夏加人參三錢括萎根一兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三分若脇下痞硬去大棗加牡礪一

兩 心下悸小便不利者去黃芩加茯苓一兩 若不渴外有微熱者去人參加桂三分溫覆取微汗愈 若欬者去人參大棗生薑加五味子半兩乾薑三分 凡柴胡病下之不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解 傷寒中風有柴胡症但見一症便是不必悉具

熱結裏
熱者大
柴胡湯傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者宜大柴胡湯論見結胃

柴胡二兩

黃芩

芍藥各半兩

半夏製六錢

生薑一兩

枳實半兩

大黃一兩

右咬咀每服五錢加大棗三枚水煎溫服以利爲度未利再服

詩有人病傷寒心煩喜嘔往來寒熱醫以小柴胡與之不

除予曰脈洪大而實熱結在裏小柴胡安能去之仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯三服而病除蓋大黃盪滌蘊熱傷寒中要藥王叔和云若不用大黃恐不名柴胡須酒洗生用有力

汗下後助滿小便閉頭汗心煩往來寒熱者柴胡桂姜湯傷寒五六日已發汗而復下之胸腹滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解也宜

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡二兩 桂枝 乾薑各半兩 括萎根

黃芩各一兩 牡蠣 甘草各半兩

右咬咀每服五錢煎溫服微煩再服汗出愈

脈微瀉者亡血病人脈微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着復衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則

發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故裸其身又陰脈遲濇故知血亡也

右脈微因大發汗所致故病當惡寒之時雖盛夏亦欲着複衣脈濇因大下所致故病當惡寒後發熱之時雖盛冬亦欲裸其體是皆亡血陽微陰弱不能勝冷勝熱非是盛夏牽延至盛冬也

脇滿痛

少陽脇滿乾嘔往來寒熱者屬少陽方論見往來寒熱

太陽傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡去半夏加人參瓜蒌根主之 得病六七日脈沉浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目

及身黃頸項強小便難者與柴胡湯必下重

陽明本渴而飲水欲嘔者柴胡不可與也食穀者噦王註云不嘔者屬柴胡症若因水而嘔者水停心下也

脇滿胃家實或嘔而舌上白胎者或脈弦浮大身黃小便難有熱者俱屬陽明症宜小柴

胡湯方論見脇滿潮熱大便溏利者小柴胡湯方論見

表裏若因下微利而嘔者先以柴胡湯解外後以柴胡加芒硝

湯主之方論見太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外

已解也若胃滿脇痛者與小柴胡湯脈浮者與麻黃湯

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發

作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡

寒者此表解裏未和也宜

十棗湯

芫花炒

甘遂

大戟各等分

右為細末合和之再入白中杵二三百下先以水一升

煮肥棗十枚取五六合去渣納藥末強人一錢虛人半

錢單飲棗湯送下平且服若下少病不除者明日更服

加五分利後米粥自養若合下不下令人脹滿遍身浮

腫也昔杜壬問孫兆曰十棗湯畢竟治甚病孫曰治太

陽中風表解裏未和杜曰何以知裏未和孫曰頭痛心

下痞滿脇下痛乾嘔汗出此知裏未和也杜曰公但言

病症而所以裏未和之故要緊總未言也孫曰某嘗於

此未決願聽開論杜曰裏未和者蓋痰與燥氣壅於中

焦故頭疼乾嘔短氣汗出是痰隔也非十棗不治但此

湯不得輕用恐損人於倏忽用藥者慎之

對婦人發熱惡寒經水適來熱除脈遲身涼脇滿如結胃狀

諸語者刺期門論見

診吐下汗後脈微心下痞脇痛氣上衝咽眩胃脈動惕者成痿論見下後脈弦者必兩脇拘急論見傷寒大法

脇痛續法

針灸集傷寒脇痛 支溝 陽陵泉

胃滿

少陽滿者柴胡合病喘者麻黃少陰滿者猪膚下後滿症

口苦咽乾又耳聾胃滿者屬少陽忌吐下宜柴胡湯論見太陽陽明合病喘而胃滿者宜麻黃湯論見少陰病下利咽痛胃滿心煩者宜猪膚湯方論見太陽病下之脈促胃滿者桂枝去芍藥湯方論見若脈促不結胃者欲解也論見下後胃滿小便不利若兼煩

驚譫語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯方論見若兼噦而舌胎者為濕痺論見汗下後煩熱胃中空者梔子豉湯主之論見

病症發熱惡寒加桂枝或自汗但頭不痛項不強胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者瓜蒂散主之論見氣上衝

痞鞭似滿者瓜蒂

胸痛

少陽胃胸脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見病胃中諸實胃中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾下利十餘行其脈反遲寸口脈微滑此可吐之利則止

宜吐症宜下症吐下後溫溫欲吐胃中痛大便溏腹滿而煩者宜調胃承氣湯論見

氣湯

耳聾

少陽病胃脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見口苦耳聾胃滿者少陽中風論見未持脈時病人手必自冒胃師因教試令效而不效此必

兩耳龍無聞也所以然者以重發汗虛故如此

少陽病續法

表裏中三法

海辨表裏中三說假令少陽症頭痛往來寒熱脈浮此三症但有其一即為表也口失滋味腹中不和大小便或閉而不通或泄而不調但有其一即為裏也如無上下表裏症餘皆虛熱也是病在其中矣

陽氣毒盛變陽毒

咽痛面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治
陽毒之為病面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治
七日不可治宜

升麻鱉甲湯

升麻二兩 當歸 蜀椒炒去汗 甘草各一兩

鱉甲手拈大 雄黃研半兩

右六味以水四升煮取一升頓服之取汗愈肘後千金

方陽毒升麻湯有桂無鱉甲陰毒用甘草湯無雄黃

陽毒續法

活陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言奔走或見鬼或下利脈浮大數面赤斑斑如錦紋咽喉痛下膿血五日可治七日不可治

升麻 犀角鎊 射干 黃芩

人參 甘草各等分

右咬咀水煎服食頃再服溫覆手足出汗則解不解重作

後賢更
各陽毒
湯
陽毒
升麻
黃芩
杏仁各二錢
梔子

升麻 黃芩 杏仁各二錢 梔子

赤芍各一錢 石膏二錢 知母 大青各一錢

甘草五錢 柴胡一錢

右咬咀每服半兩薑五片豉百粒同煎

大黃散治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂

大黃一兩 桂心二分 甘草炙 芒硝

木通 大腹皮各一兩 桃仁二十枚

右咬咀水煎服以利為度

海葛根散治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽喉乾痛

葛根七錢 黃芩 大黃醋炒 甘草

山梔 朴硝各半

右咬咀水煎服

活黑奴丸治時行病六七日未得汗脈洪大或數面赤目痛身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日已上不解熱在胃中口噤不能言為壞傷寒醫所不治或人精鬼已

竭心下尚煖撥開其口灌藥下咽即活兼治陽毒及發斑

麻黃去節泡 大黃二兩 釜底煤研 黃芩

芒硝 竈突墨研 梁上塵 小麥奴各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大新汲水研下一丸渴者與冷水盡飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若無汗再服一丸

須微利效小麥奴即小麥未熟時叢中不成麥捻之成黑勃是也此藥須是病人大渴倍常躁盛者乃可與之

若不渴者服之反為禍耳

水漬法 脈洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如烟煤宜以水漬布薄

之疊布數重新水漬之稍按去水搭於背上須臾蒸熱又漬冷如前薄之仍換新水數十易熱甚者置病人於水中

勢纔退則已亦一良法也

陰陽毒 丹砂丸治傷寒陰陽二毒相伏危惡形症

舶上硫黃 水銀 太陰石 玄精石各一兩

硝石兩半 太陽石一兩

右為末用無油銚子以文武火炒上項藥令勻如灰色研極細生姜自然汁浸炊餅丸如菉豆大每服五丸龍腦生姜蜜水下壓其躁也若陽毒末湯下陰毒白湯下不許於屋底炒

太陰病 腹滿 腹痛王叔和云元陽明篇

吐與利下三門並附入少陰病蓋此三門之病本屬太陰病因在少陰者反多故附入少陰也

腹滿

太陰病已下 太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結硬 太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯 本太陽病醫反下之因小腹滿時痛者屬太陰也桂枝加

芍藥湯主之 大便實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝加芍藥湯

桂枝 生薑各一兩半 甘草一兩 芍藥三兩

大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

桂枝加大黃湯

桂枝一兩 芍藥一兩 甘草炙半兩 大黃半兩大者減五錢

者加一兩虛者減五錢

右咬咀大棗三箇生薑四片水煎溫服

太陰病脈弱其人續自便利設當用大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也 太陰中風四肢煩疼陽微脈瀋而長者為欲愈 太陰病欲解時從亥至丑 腹滿時痛吐利者為太陰論見前太陰條

腹滿宜溫二症 霍亂吐利頭痛發熱身痛不渴而腹滿者理中丸加附子

主之論見吐利 下利腹脹滿身痛者四逆溫裏後用桂

枝攻表論見

腹滿宜利三症 噦而腹滿視前後部有不利者利之則愈論見 少陰腹

滿脹不大便者宜大承氣湯論見不 若兼脇下痛脈

腹滿宜和二症 腹滿小便不利身黃者茵陳蒿湯論見

弦浮大者宜小柴胡湯論見

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯 腹滿時減復

減復如故為虛 如故此虛寒從下而上也當以溫藥和之

腹滿脈浮四症 太陰病腹滿時痛脈浮者宜桂枝湯論見前 陽明脈弦

浮大脇痛身黃而腹滿者小柴胡湯論見 傷寒腹滿謔

語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱宜刺期門 陽明

病腹滿脈浮緊口苦咽乾而痛若其人發熱惡寒者下之

則腹滿小便難若其人發熱汗出不惡寒反惡熱者下之

則懊懣汗之則謔語加燒鍼則怵惕不眠論見胃家實註

腹滿脈遲忌下 陽明病腹滿脈遲若頭眩小便難者不可下若潮熱汗出

不惡寒者大承氣主之論見

腹滿自汗四症 三陽合病腹滿身重難轉側謔語遺尿自汗者宜白虎湯

論見 傷寒發熱脈濇惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗

出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫宜刺期門 腹

滿汗出不惡寒而喘若脈遲潮熱者大承氣湯若脈浮緊

口苦咽燥者忌發汗忌燒鍼忌下論見腹滿

汗後腹滿 發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之

厚朴生薑人參甘草半夏湯

厚朴 生薑各二 半夏六 人參一

甘草五

吐下後
腹滿

右咬咀每服五錢水煎溫服

傷寒吐後腹脹滿者與

下利清穀若發汗必脹滿論見 傷寒吐後腹脹滿者與
調胃承氣湯 下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯
論見 極吐下後溫溫欲吐胸痛便澹腹滿而煩者調胃

承氣湯論見

禁意

不大便六七日少與小承氣湯不轉矢氣者不可攻之攻

之則腹滿不能食論見 腹滿吐利者忌下論見 腹

滿脈浮緊口苦咽乾者忌汗下論見 腹滿脈遲者忌

下論見 腹滿脈弱自利設用大黃芍藥宜減之論見

中條

腹滿續法

活若飲食不節寒中陰經胸膈不快腹滿閉塞唇青手足

冷脈沉細少情緒或腹痛急作理中湯加青皮每服一二

腹滿脈
沉細無
力者理
中

劑胃即快矣枳實理中丸五積散尤妙 腹脹滿者宜桔
梗半夏湯

桔梗半夏湯治傷寒心腹痞滿時發疼痛

桔梗微炒

半夏薑製

橘紅各一兩

右咬咀每服四錢生薑三片水煎服

海少陰症小便遺瀝大便遺失其人病六七日靜重如山

目不視體如水腹脹滿與物則咽不與則不求其脈沉細

而微疾按之有力宜急下之與大承氣湯

腹痛

腹滿而痛吐利者屬太陰宜四逆湯論見腹滿
太陰條

若兼頭痛發熱身痛者屬霍亂 霍亂腹痛不渴者理中

丸加人參論見
吐利

病腹中滿痛者此為實也宜大承氣湯下之 病人不大

腹滿痛
不大便

脈沉細
有力者
宜承氣

腹滿吐
利者太陰

頭痛發
熱者霍

亂

為陽實

便五六日繞臍煩疼發作有時者有燥糞故使不大便也

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯 大下後六七

日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有

宿食故也宜大承氣湯 汗下後不大便而渴日晡潮熱

從心下至小腹鞭滿而痛者宜大陷胃湯 方論見

少陰病腹滿下利若小便不利四肢重痛者真武湯便膿

血者桃花湯若下利清穀手足厥逆脈微欲絕者通脈四

逆湯去蔥白加芍藥

少陰病腹痛若四肢逆而不溫者四逆散加附子 方論見

若手足厥冷脈微欲絕者通脈四逆加芍藥湯 方論見

腹痛嘔吐為陽

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者宜

黃連湯

甘草 灸

黃連

乾薑 各三分

大棗 三枚

半夏 兩半

人參

桂枝 各三分

石叟咀水煎服分二服

往來寒熱胃脇滿心煩喜嘔而腹痛者小柴胡去黃芩加

芍藥湯 方見往來寒熱條

腹痛脈弦者建中

傷寒陽脈濇陰脈弦當腹中急痛者先與小建中湯不瘥

者再與小柴胡湯

小建中湯

桂枝 一兩半

甘草 炙一兩

芍藥 三兩

生薑 一兩半

大棗 六枚

膠飴 八兩

右叟咀每服五錢生薑三片同煎至八分去渣下膠飴

兩匙許再煎化服 東垣云芍藥味酸於土中瀉木為君

木勢亦來侮土故脈弦而腹痛肉桂大辛熱佐芍藥以

建中之名始于此焉

診傷寒四五日腹中痛若轉矢氣及少腹滿者此欲自利也

腹痛續法

針灸

雲傷寒邪在三陰內不得交通故為腹痛手足之經皆會於腹如脈弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太淵太陵如脈沉而腹痛過在足太陰脾少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵如脈沉細而痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三陰交此刺腹痛之法也

腹痛欲吐不吐欲瀉不瀉為乾霍亂

丹乾霍亂此係內有所傷外為邪氣所遏有用吐藥者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥宜用二陳湯加解散藥如川芎蒼朮防風白芷之類是也

煎鹽湯治乾霍亂蠱毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣用煎鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡不盡更復吐訖復飲三吐乃止此法大勝諸治俗人以為田舍淺近之

法鄙而不用守死而已凡有此病即先用之吐訖後詳症

脈以加減理中湯治中湯欸緩調之

直薑鹽湯治欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽

生薑

右同炒色變以水一碗煎溫服病甚加童便一盞

世勝靈丹治乾霍亂腹痛甚者取千年石灰湯泡服

成病有乾霍亂濕霍亂乾霍亂死者多濕霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以出洩雖甚重胃中水穀洩盡則止矣所以死者少及乾霍亂死多者以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出洩壅閉正氣隔絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死者多矣

無乾嘔霍亂者忽然心腹脹滿絞痛蠱毒煩冤欲吐不吐欲利不利狀若神靈所附頃刻之間便致悶絕

黃王叔和原
入陽明篇

太陰濕熱黃傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰當發身黃小便不利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必

自止以脾家實腑穢當去故也

海色如煙薰黃乃濕病也一身盡痛色如橘子黃乃黃病也一身不痛

濕痺者甘附

成濕家之黃也身黃似薰黃雖黃而色暗不明也熱家之

黃也身黃似橘子色甚者勃勃出染着衣正黃如黃栢是其正黃色也色如薰黃一身盡痛發熱者為濕痺若脈沉

緩小便不利者甘草附子湯五苓散若脈大頭痛鼻塞者納藥鼻中則愈矣論見體痛

濕在上者納藥鼻中

許一人病身體痛面黃喘滿頭痛自能飲食大小便如常予診之脈大而虛鼻塞而煩予曰非濕熱宿穀相搏此乃

頭中寒濕非茵陳五苓不可行也仲景云濕家病身疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中初

無病病在頭中寒濕攻鼻故塞納藥鼻中則愈仲景無藥方此方見外臺刪繁症云治天行熱病蓋通貫臟腑寒濕

沉於骨髓之間或為黃疸宜瓜蒂散即此方也瓜蒂散方見後黃續

條 又有一舟稍病傷寒發黃鼻痠痛身與目如金色小便赤而數大便如常或者欲用茵陳五苓予曰非其治也

小便利大便如常則知病不在臟今眼睛鼻頰痛是病在清道中清道者華蓋肺之經也若下大黃則必腹脹為逆

亦用瓜蒂散先含水次搐之鼻中黃水盡乃愈

陽明熱頭汗出者茵陳

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳湯主之陽明胃家實身無汗但頭汗出小便不利飲水漿發

黃亦茵陳蒿湯主之

茵陳蒿

嫩者 兩 大黃

山梔

二錢

右吹咀用水三大盞先煎茵陳減半納二味煎熟溫服
日三服小便當利如皂莢汁狀色正赤過一宿腹滿減
黃從小便中去也

身黃脇痛

身黃脇痛小便難未下者宜柴胡下後者忌柴胡

二法俱見胃脇

門痛

汗後身黃

傷寒發汗後而身目俱黃所以然者以寒濕在裏不解故

也法不可下當於寒濕中求之

與熏法同

後身黃

太陽病脈浮數為表未解醫反下之若不結胸但頭汗出

餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃

論見結胸活人云茵陳湯主之

陽明病面赤攻之必發熱身黃小便不利

論見胃實

陽明病

黃而腹滿脈遲飽則頭眩小便難者雖下之腹滿如故

論見

腹滿下後不能食脇下滿痛頸項強小便難而身黃者與

柴胡湯必下重

火後身黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者身必發黃 風溫

脈浮汗出身重多眠若被火則微發黃色劇則如驚癇時

瘵癥

論見風溫

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣

流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃

論見頭汗

畜血身黃

身黃脈沉結少腹鞭而小便自利其人發狂大便黑者為

畜血宜抵當湯

論見畜血

發熱身黃

傷寒身黃發熱者梔子黃柏皮湯主之

梔子

十五枚

甘草

兩

黃柏

兩

右吹咀每服五錢水煎溫服

傷寒發熱在裏身必發黃麻黃連翹湯主之

麻黃

節去

連翹根

生薑

甘草

各一兩

赤小豆

梓白皮

半升

杏仁

二十粒

大棗

六枚

右吹咀每服五錢用潦水一盞半煎溫服麻黃杏仁生薑甘草大棗

五味甘草發散表邪為陽也赤小豆連翹梓皮酸苦泄裏為陰也潦水味薄不助陰氣也

右身黃小便自利小腹鞭而狂大便黑者為畜血則宜

抵當湯下之若小便不鞭其人不狂大便不黑者雖小

便利非畜血也其為症有三一者梔子柏皮湯二者麻

黃連翹赤小豆湯皆治身黃小便利而身不疼者海藏

所謂乾黃是也三者桂枝附子湯去桂加白朮湯皆治

身黃小便利而一身盡痛者活人所謂中濕是也

汗下燒針後心下痞而胸煩者面色青膚黧難治色微黃

手足溫者易治論見身黃禁忌見前汗後身黃下後身黃條

黃續法

海傷寒病遇太陽太陰司天若下之太過往往變成陰黃

一則寒水太過水來犯土一則土氣不及水來侵之多變

陰身汗出脈沉而黃為

此疾一則茵陳茯苓湯加當歸桂枝二則茵陳橘皮湯加

姜朮半夏三則茵陳附子湯四則茵陳四逆湯五則茵陳

姜附湯六則茵陳吳茱萸湯方見如左 發黃小便不利

煩躁而渴茵陳湯加茯苓猪苓滑石當歸官桂主之韓氏名茵

陳氏發黃煩躁喘嘔不渴茵陳湯加陳皮白朮生姜半

夏茯苓主之韓氏名茵陳陳皮湯發黃四肢遍身冷者茵陳湯加

附子甘草主之韓氏名茵陳附子湯發黃肢體逆冷腰上自汗茵

陳湯加附子乾姜甘草主之韓氏名茵陳姜附湯發黃冷汗不止

者茵陳湯加附子乾姜主之韓氏名茵陳附子湯發黃前服姜附

諸藥未已脈尚遲者茵陳加吳茱萸附子乾姜朮通當歸

主之韓氏名茵陳姜黃湯趙宗顏因下之太過生黃脈沉細遲無

力次第用藥至茵陳附子湯大效

按海藏次第用藥者謂先投韓氏茵陳茯苓湯次投茵

陳陳皮湯又次投茵陳附子湯後趙秀才次第飲此
趙秀才因下之早黃病脈寸微尺弱身冷次第用藥至茵
陳四逆湯大效 傷冷中寒脈弱氣虛變為陰黃仲景理
中湯加茵陳服之

便赤能食而黃

茵陳湯治傷寒發黃目赤黃小便赤

茵陳

山梔

柴胡

黃柏炙

黃芩

升麻

龍膽草各半兩

大黃炒一兩

右咬咀水煎空心服以利為度

往來寒熱而黃

海 往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯主之

發汗不徹而黃

衍 一 僧傷寒發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈

醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服
五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方
用茵陳梔子各三分秦艽升麻各四錢末之每用三錢水

四合煎及二合去查食後溫服以和為度

小便不利而黃

活五苓加茵陳蒿湯治發黃而渴小便不利

茵陳蒿湯分五苓湯分五

右二劑拌勻每服三錢日三服水調下

鼻寒而黃

又方傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搐一字許入鼻

中出黃水甚驗即用茵陳湯調五苓散服之最效

本治頭中濕熱發黃疸瓜蒂散

瓜蒂二十七枚

赤小豆

黍米各十四粒

右為細末如大芫大一粒許納鼻中縮入當出黃水慎
不可吹入

結胃發黃

雲結胃發黃太陽附本也

以結胃治之

痞氣發黃太陰附本

也治之法

診 活問白虎症亦有身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃

答曰白虎與發黃症相近遍身汗出此為熱越白虎症也
頭面汗出頸已下無汗發黃症也

成傷寒發黃是病已極是有不治者多矣非止寸口近掌
無脈鼻氣出冷為不治之症又若形體如烟熏直視搖頭

者是為心絕環口黧黑柔汗發黃是為脾絕皆不治之症
也

少陰病 但欲寐嗜臥 口燥咽乾 咽

痛 吐 吐利 下利

但欲寐嗜臥

少陰之為病脈微細但欲寐衛氣寤則行陽寐則行陰而

病但欲寐

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之見方

少陰病發熱脈沉者發熱汗之

脫他症者微汗之

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日

無症故微發汗也無症謂無吐利厥症

麻黃附子甘草湯

麻黃 甘草灸各二兩 附子一枚炮去皮切

右咬咀每服五錢水煎溫服須二三服以身汗為度

口和背惡寒

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯

附子半枚 茯苓七錢半 人參兩半 白朮兩

芍藥七錢半

右咬咀每服五錢水煎溫服日三

口燥咽乾

少陰二三日口燥咽乾者大承氣湯急下之方論見口燥咽乾

心煩不臥

若咽痛者甘草湯不瘥者桔梗湯方論見咽痛
少陰病得之二三日已上心中煩不得臥黃連阿膠湯主

之方見不

腹滿小便不利若便膿血者桃花

湯主之方論見

身重下利若四肢重痛下利者真武湯主之方論見

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯方見

少陰病下利至六七日變咳而嘔渴心煩不得眠者猪

苓湯主之

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自

利復煩躁不得寤寐者死少陰病六七日息高者死

少陰病脈緊至七八日自利脈緊變暴微厥手足反溫者

欲解也論見少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在

膀胱必便血也口燥咽乾但欲寐方論見欲吐不吐

但欲寐方論見吐利但欲寐方論見下利但欲寐方論見

利少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道

出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治少陰病

四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者死少陰病惡寒

身踈而利手足逆冷者不可治

少陰病四逆其人或欬悸或小便利或腹中痛或泄利

下重者宜

四逆散

甘草炙

枳實

柴胡

芍藥各等分

右為細末日飲和杏服方寸七日三服如欬者加五味

子乾薑各五分并主下利悸者加桂枝五分小便

不利者加茯苓五分腹中冷痛者加附子一枚炮令

拆泄利下重者先以水五升煮薤白三升去渣以散

三方寸七納湯中煮取一升半分溫再服

少陰病利欬悸泄

診差劇

腹脹咳嘔而渴

少陰病手足逆冷其人若下利後重者此條四逆散加薤

白湯若下利脈絕及無脈者通脈四逆湯白通加猪膽汁

湯方論見若身體骨節痛脈沉者宜附子湯 少陰病

脈沉者急温之宜四逆湯方見 少陰病身體痛手足寒

骨節痛脈沉者附子湯主之 少陰病脈沉發熱者宜前

條麻黃附子細辛湯 少陰病欲解時從子至寅上 少

陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治 少陰病下利

止而頭眩時時自冒者死 少陰中風脈陽微陰浮者為

欲愈 少陰病脈細沉數病為在裏不可發汗 少陰病

脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺部弱濇者不可復下

之

太陽病十日已去脈浮細嗜臥者外已解也胃滿脇痛者

小柴胡湯脈但浮者麻黃湯方見 脈浮汗出多眠若身

重息鼾者風温方論見 若合日則盜汗出者二陽合病

方論見

狐惑病默默欲眠目不得閉不欲飲食惡聞食臭其面目

乍赤乍黑乍白其聲啞者其草瀉心湯咽乾者苦參湯

其肛虫蝕雄黃熏之其脈洪無熱目赤皆黑者當歸赤小

豆散並見狐

口燥咽乾

少陰病得之二三日口燥乾者宜下之大承氣湯 少陰

病自利純青色水心下痛口燥乾者宜大承氣湯論見

傷寒無大熱口燥渴背惡寒者白虎加人參湯 陽明病

發熱汗出不惡寒反惡熱若口乾舌燥者白虎加人參湯

方論見渴

太陽病下後不大便日晡潮熱心下滿痛而舌上燥渴者

心滿痛

宜大陷胃湯

嗽水不咽者

陽明病口燥但欲嗽水不嚥者必血滿海藏云嗽水不嚥胃心下手不可近者

狐惑症病忌

病人默默欲眠目不能閉起居不安聲啞或咽乾者當作

狐惑治之 咽喉乾燥者不可發汗

咽痛

咽痛欲寐者少陰

少陰病二三日咽痛可與甘草湯不瘥桔梗湯 甘草湯

用甘草二兩咬咀每服四錢水煎去渣溫服日三服 桔

梗湯用甘草二兩桔梗一兩咬咀每服五錢水煎溫服

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

半夏製

桂枝

甘草炙各等分

右咬咀水煎服少少咽之為散白湯調服方寸匕亦效

日三服仲景法為散調服不咬咀

成甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主少陰寒熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛

少陰病咽中生瘡不能言語聲不出者苦酒湯主之

半夏製十枚 鷄子一箇去黃納半夏

右二味納半夏着苦酒以鷄子殼置刀鏤中安火上令三沸去查少少含咽之不瘥更作三劑

診脈緊當無汗反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復

吐利論見吐利

師曰伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有

伏氣當須脈之若脈微弱者當喉中痛似傷寒非候痺也

病人云實咽中痛雖爾今復欲下利見後活人續法

咽痛下利兼胃滿者猪膚湯厥逆面赤者通脈四逆湯下

厥陰咽痛下利少陰後復厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯並見下利

百毒成者陽毒

陽毒咽痛面赤斑斑如錦紋唾膿血五日可治七日不可

治宜升麻鱉甲湯

活人云陽毒升麻湯主之論見陽毒條

陰毒

陰毒咽痛面目青身痛如被杖五日可治七日不可治升

麻鱉甲去雄黃蜀椒湯

活人云陰毒甘草湯主之論見陰毒條

診

太陽下後脈緊者必咽痛

論見大法

陽明病頭眩而熱者必

咽痛若不效者咽不痛 先腰後熱者下利必自止止而

反汗出者其喉為痺發熱無汗者下利必自止者不止者

必便膿血其喉不痺

論見下利

忌

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得

蹶臥不能自溫 咽中閉塞不可下下之則上輕下重水

漿不下臥則欲蹶身急頭眩下利日數十行

咽痛續法

寒伏氣

活半夏桂枝甘草湯治伏氣之病謂非時有暴寒中人伏

氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈更微弱先發咽痛似傷寒非喉痺之病必下利始用半夏桂枝甘草湯主之此病只二日便瘥古方謂之腎傷寒也次用四逆主之

半夏桂枝甘草湯

半夏

湯洗

甘草

炙

桂心

各等分

右咬咀每服四錢水煎候冷少少細呷之

即仲景半夏散及湯但藥

吹咀

附吐

腹滿痛而吐太陰

腹滿時痛而吐者太陰病

論見腹滿活人云理中湯主之

不甚欲寐少陰

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐自利而渴

論見下利活人云四逆湯主之

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯 少陰病但欲

腹痛欲吐腹痛欲吐臥不煩而吐五日變自利煩躁不得寐者死論見但欲寐

腹痛欲嘔吐者宜黃連湯

病解後虛羸少氣欲吐者宜竹葉石膏湯

乾嘔吐涎沫頭痛者宜

吳茱萸湯

吳茱萸湯泡洗一兩半

人參三分

生姜一兩半

大棗三枚

右咬咀水煎去渣分二服

發熱渴欲飲水水入則吐者宜五苓散論見

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即

吐乾姜黃連黃芩人參湯主之

乾姜

黃連

黃芩

人參各等分

右咬咀水煎服

太陽病吐後汗出不惡寒發熱關脈細數飲食冷食朝食

暮吐此為小逆論見發熱

病人脈數為熱當消穀引食而反吐者此因發汗令陽氣

微膈氣虛脈乃數也數而容熱者不能消穀以胃中虛冷

故也凡服桂枝湯而吐者必吐膿血也註云內熱者服桂枝湯則吐如

酒客之類是也吐厥逆者甘薑

吐續法

脈煩數脈煩數渴為熱活吐有冷熱二症寸口脈數手心熱煩渴而吐以有熱在

胃脘五苓散主之

不飲水不飲水為寒寒多不飲水而吐者理中湯去朮加生姜主之

陰症喘促及吐逆者返陰丹入口便住

大橘皮湯治動氣在下不可發汗發又無汗心煩骨節疼

痛目暈惡寒食則反吐穀不得入先服大橘皮湯吐止後

誤汗移誤汗移

宜建中湯

陳皮一兩

生薑兩

棗子八枚

甘草兩半

人參錢一

竹茹半升

石水三大盞煮取一盞分二服

脚氣吐

病人直患嘔吐而脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之治見

脾

附吐利

吐利無熱頭為陰

腹滿時痛吐利不渴者太陰病論見腹滿活人云理中湯主之病人脈

陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐

利少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

少陰病吐利手足不逆冷反熱者不死脈不至者灸少

陰七壯少陰病吐利煩躁四逆者死少陰病下利欬

而嘔渴心煩變不得眠者宜猪苓湯論見下利少陰病腹痛

小便不利四肢重痛自下利或嘔者真武去附子加生姜

湯論見下利少陰病下利脈微濇嘔而汗出者當溫其上灸

之論見欲寐溫其上謂下有寒氣當溫其上以助陽氣也既吐且利小便復利而

大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之王叔和入霍亂篇

和入霍亂篇

太陽與少陽合病頭痛脇痛往來寒熱自利而嘔者黃芩

加半夏生姜湯論見合病發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐下

利者宜大柴胡湯論見合病發汗後水漿不得入口者為逆

若更發汗必吐下不止嘔吐而利者名曰霍亂病發

熱頭痛身疼惡寒吐利者此名霍亂自吐下又利止復更

發熱也霍亂頭疼發熱身疼痛熱多飲水者五苓散主

之寒多不飲水者宜

理中湯

吐利有寒熱頭痛為陽

人參 乾姜炮 甘草炙 白朮二

右剉每服四錢水煎去查溫服如寒甚者加乾姜一兩半 渴欲得水者加白朮一兩半 臍上築者腎氣動

也去白朮加桂枝二兩 吐多者去白朮加生姜四兩

下利多者倍用白朮 悸者加茯苓二兩 腹滿者

去白朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許自

溫勿發揭衣被活人云或四肢拘急或轉筋者亦去朮加附子

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

運氣

素土鬱之發民病嘔吐霍亂注下六元正 紀篇 太陰所至為

中滿霍亂吐下

右濕土霍亂即仲景五苓散理中丸之類是也

歲土不及風乃大行民病霍亂飧泄氣交 變論

右土虛風勝霍亂即羅謙甫桂苓白朮散之類是也

熱至則身熱霍亂吐下六元正 紀篇

右熱霍亂即活人書香薷散之類是也

針灸 靈足大陰之别名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別

者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則蠱脹

取之所別也經脈 氣亂於腸胃則為霍亂取之足太陰

陽明不下取之三里五亂篇東垣云足太陰期門穴也足陽明中脘穴也

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯 惡

寒脈微利止者四逆加人參湯方論見 惡寒

吐利止 後病 身痛者 和分 脈微者 溫裏 吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四

逆湯加豬膽汁下之

甘草炙 乾姜二 附子大一枚 豬膽汁半

右三味咬咀水三盞煎至二盞去查納豬膽汁分作二

次溫服其脈即來

乾嘔下利分陰

吐利發汗脈平不煩者以新虛不勝穀氣故也 乾嘔而

利兼脇痛而表解者宜十棗湯心下痞鞭而煩者宜甘草瀉心湯兼厥逆脈微者通脈四逆湯白虎加猪膽汁湯

乾嘔

診

脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自可者為欲解

吐利續法

內經霍亂法附

夏月霍亂為暑

活夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷飲須并底沉極冷頓服之乃效他藥不能救

香薷散治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦名為霍亂此皆飽食鱸炙頓啖乳酪酒膠百品無所不食多飲水漿眠睡

冷席風冷之氣傷於脾胃諸食結而不散陰陽二氣不和反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利不已百脈混亂榮衛俱虛冷搏筋轉皆宜服此

厚朴

黃連

香薷

甘草

右為末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之兼治不時

吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷冷汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須并中沉令極冷頓服之乃效

羅桂苓白朮散治胃暑飲食所傷傳受濕熱內盛霍亂吐瀉轉筋急痛腹滿痛悶小兒吐瀉驚風皆宜服此

桂枝

人參

白朮

白茯苓

澤瀉

甘草

石膏

寒水石

滑石

一方有木香藿香葛根各半兩

右為細末每服三錢白湯調下或新汲水生薑湯下亦

得有蒙古百戶昔良海因食酒肉飲潼乳得吐瀉霍亂
症從朝至午精神昏憤以困急來告予診視之脈得沉
數按之無力所傷之物已出矣卽以新汲水半碗調桂
苓白朮散徐徐服之稍得安靜又於墻陰掘地一穴約
二尺許貯以新汲水在內攪之待一時澄定名曰地漿
用清者一杯再調服之漸漸氣和吐瀉遂止至夜得安
翌日微煩渴遂愈却以錢氏白朮散時時服之良愈或
問用地漿者何也予曰坤爲地地屬陰土平曰靜順感
至陰之氣又於墻陰貯以新汲水以取重陰之氣也陰
中之陰能泄陽中之陽霍亂症由暑熱內傷而得之故
痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡又加暑熱七神迷
亂非至陰之氣則不能息予用之者此也內經福萬世
之書豈不信哉 又提學侍其公年七十九歲六月中

暑毒霍亂吐瀉昏冒終日不知人事夜半請予視之診
其脈七八至洪大有力頭熱如火足寒如冰半身不遂
牙關緊急予思內經五亂篇中云清氣在陰濁氣在陽
榮氣順脈衛氣逆行亂於胃中是謂大惋云云亂於腸
胃則爲霍亂於是霍亂之名自此而生蓋年高氣弱不
任暑氣陽不維陰則瀉陰不維陽則吐陰陽不相維則
旣吐且瀉矣前人見寒多以理中湯熱多以五苓散作
定法治之今暑氣極盛陽明得時之際况因動而得之
中暑明矣非甘辛大寒之劑不能泄其暑熱墜浮煽之
火而安神明也遂以甘露散甘辛大寒瀉熱補氣加茯
苓以分陰陽水水調灌之漸省人事諸症悉去後慎言
語節飲食三日以參朮調中湯以意增減服之理其正
氣逾十日後方平復

無訶子散治老幼霍亂一服即效

訶子炮去核

甘草炙

厚朴薑製

乾薑炮

神麴炒

草果去壳

良薑炒

茯苓

麥芽炒

陳皮各等分

右為細末每服二錢候發不可忍時用水煎入鹽少許服之

聖治霍亂用厚朴薑製火上炙令香為末以新汲水調下二錢七佳

大人參散治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參

厚朴薑製

橘紅各一兩

當歸炒

甘草炙各半兩

右為末每服四錢水煎服

丹霍亂內有所傷外有所感

雜方

集吐瀉還用吐以提其氣起吐用二陳湯加減或用檀香煎湯吐亦可

海霍亂症本自胃家或因寒飲或因飲水或傷水毒或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏轉筋攣扁經絡亂行暴作吐瀉中焦胃氣所主也察其色脈隨經標本此治霍亂吐瀉之法也

外治霍亂吐下不止者艾一把水三升煮至一升頓服

經霍亂陳皮湯下山荳根末二錢

山霍亂吐瀉用屋下倒掛塵泡湯澄清服之大忌飲食入

腹則死喫水水不妨不可飲熱湯

隻吐瀉不止或吐轉多四肢發厥虛風不省人事服此四

散漸煖神識便省

回陽散用天南星為末每服三錢用大棗三枚同煎至八

分溫服本者補服

霍亂轉筋治法見轉筋門

霍亂後方

羅增損縮脾飲解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多煩躁者尤宜服之

草果

烏梅

甘草

砂仁各四兩

乾葛二兩

右咬咀每服五錢生薑五片同煎以水沉冷以解煩或

溫或熱隨意服

無茯苓澤瀉湯治霍亂吐瀉後煩渴欲飲水

茯苓八兩

澤瀉四兩

甘草炙

桂心各二兩

白朮三兩

右咬咀每服四錢生薑二片同煎食前服一方有小麥

五兩

至多

世以小竹杖兩手反抱住於脊骨就杖兒上下各點一穴如先吐先灸上穴先瀉先灸下穴各三百壯百發百中又霍亂諸法不效者灸大椎 又以鹽納臍中灸二十七壯立甦

霍亂吐瀉中脘 天樞 三里 委中

摘又法上腕 三里

甲霍亂泄出不自知先取太谿後取太倉之原 又法巨

關 關衝 支溝 解谿

千又主陰陵泉

東吐利上下俱出藏痺膿血頭重臂痛太白 地機 風

府各五 長強 尺澤各一

甲霍亂泄利期門主之 厥逆霍亂府舍主之

世霍亂手足厥冷灸三陰交七壯

甲霍亂逆氣魚際太白主之 霍亂遺尿失氣三里主之

世病人合面正臥兩手着身以繩橫亘兩肘尖頭依繩下

俠脊兩邊相去各一寸灸三七壯無不驗 霍亂已死但

有煖氣者灸承筋七壯立甦 取法以繩從足拇指屈至後跟一匝捻斷等折一半為度

以此度從足跟貼地量上至膈度極頭處是穴

甲霍亂頸痺不仁承筋主之 千金云主 暴霍亂僕參主

之

診 世霍亂遍身轉筋肚痛四肢厥冷欲絕者其脈洪大易治

脈微囊縮舌卷不治

干諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止

羅潔古老人云霍亂轉筋吐瀉不止其病在中焦陰陽交

而不和發為疼痛此病最急不可與分毫粥飲穀氣入胃

則必死矣

保凡霍亂慎勿與粟米粥湯入胃即死本草云粟米味酸微寒無毒主養腎氣去脾胃中熱益氣霍亂脾胃極損不能傳化加粟米豈有能生也邪如吐瀉已多欲住之後宜以稀粥漸漸補養以遲為妙

下利

自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宜

四逆湯

甘草兩 乾姜三 附子半

右咬咀水煎溫服強人加附子半箇乾姜一兩半

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少

陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便

白以下焦虛有寒不能制水故令色白也 活人云四 少

陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不能眠者猪苓湯主之

自利而渴屬少陰

自利不渴屬太陰

少陰病自利清水色純青者心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

孫寶大郎患傷寒經十餘日口燥舌乾而渴心中疼自利清水衆醫皆相守但調理耳汗下皆所不敢寶氏親故相謂曰傷寒邪氣害人性命甚速安可以不決之疾投不明之醫乎召孫至曰即日不可下明日正當下投小承氣湯遂大便通得睡明日平復衆皆曰此症緣何下之而愈孫曰不深於書徒知有書耳不知書之奧也口燥舌乾而渴豈非少陰症乎少陰症固不可下豈不知少陰一症自利清水心下痛者下之而愈仲景之書明有是說也衆皆欽服

下利欲飲水者以有熱故也宜

白頭翁湯

白頭翁

黃栢

秦皮

苦蓮各三錢

右咬咀水煎去渣溫服不瘥再服

少陰病下利白通湯主之 少陰病二三日不已至四五

日腹滿痛小便利或下利或嘔者宜

真武湯

茯苓

芍藥各三錢

附子一箇

白朮

半兩加減法從

方本

右咬咀每服五錢生姜五片煎至八分溫服日三 欬

者加五味子細辛乾姜各一分 小便利者去茯苓

下利者去芍藥加乾姜 嘔者去附子加生姜七片

少陰下利咽痛胃滿心煩者猪膚湯主之用猪膚四兩以

水一盞半煎取一盞去渣加白蜜一合半白粉一合二勺

半熬煮和相得溫服 海藏云猪膚卽猪皮

厥利症

治 大汗利而厥冷者宜四逆湯 少陰病但欲寐下利若兼

手足厥逆者白通加猪膽汁湯通脈四逆湯方論見後厥利 兼

便膿血者宜桃花湯方論見後便膿血條 少陰病欬而下利譫語

者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗故也 少陰

病下利脈微瀉嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸

之溫其上義見前條 少陰病下利若利自止惡寒而蹇手足溫

者可治 大汗出熱不去內拘急四肢疼必下利厥逆而

惡寒者四逆湯主之 傷寒六七日大下後寸脈沉而遲

手足厥逆下部脈不至咽喉不利吐膿血泄下不止者為

難治宜

麻黃升麻湯

麻黃去節二兩半 升麻二兩 當歸 知母

黃芩 萎蕤各十條 石膏 白朮

乾薑 芍藥 天門冬 桂枝

茯苓 甘草各六錢

右咬咀每服五錢水煎溫服相次一炊時又進一服汗出愈

診

下利脈沉而遲其人面少赤身有微汗下利清穀者必鬱

冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

凡厥利當不能食今反能食者恐為除中試食以索餅

不發熱者知胃氣尚在必愈也論見 傷寒先厥後發熱

下利者必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗

而利必自止必便膿血便膿血者其喉不痺 下利後脈

絕手足厥冷時脈還手足溫者生脈不還者死 下利

手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死 傷

寒發熱下利厥逆躁不得臥者死 傷寒發熱下利至甚

厥不止者死

厥利但欲眠者少陰

少陰病下利脈微與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯後脈暴出者死微續者生

白通湯

乾薑兩一

附子一枚生用

右咬咀每服五錢入葱白二寸同煎溫服

白通加猪膽汁湯

乾薑一分

蔥白一莖

附子一枚生用

童便一分合二分

猪膽一箇

右水一盞煎至五分去渣入童便膽汁相和得所溫服

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不

惡寒其病面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出

者通脈四逆湯主之

甘草炙

乾薑兩二

附子一枚生用

面赤色者加

蔥九莖

腹中痛者去蔥加芍藥二兩

嘔者加生

薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

利止脈不

出者去桔梗加人參一兩

右咬咀每服五錢水煎溫服未瘥急更作一劑其脈續

續出者愈

少陰病但欲寐四肢逆而利若下重者四逆散加薤白也

論見厥方見但欲寐

若惡寒身蹇者不治欲寐

下利有表証為陽

下利腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯

攻表桂枝湯

傷寒表不解乾嘔發熱欬而下利者此為

水氣宜小青龍去麻黃加芫花湯

病者必自下利葛根湯主之

方見太陽病活人云下利而頭痛腰痛熱目疼鼻乾其

脈浮大而長者是其症也

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若

嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

下利而頭疼胃滿或口苦咽乾或往來寒熱其脈浮

大而弦是也

黃芩湯

黃芩三分

甘草炙

芍藥各二分

大棗枚

右咬咀水煎溫服若嘔加半夏六錢生薑五片

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘

而汗出者宜

葛根芩連湯

葛根三兩

黃連

黃芩各二兩

甘草炙半兩

右咬咀每服五錢水煎溫服日進二三服

下利清穀脈沉微手足厥逆者為陰宜通脈四逆湯論見前條

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之傷寒

醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏下後身

疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝

下利清穀脈沉微手足厥逆者為陰宜通脈四逆湯前條脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏下後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝

湯 少陰病下利便膿血者桃花湯主之 少陰病二三日

日至四五日腹滿小便不利下利不止便膿血者宜

桃花湯

赤石脂四兩一半全

大米二合

乾薑二錢

右水二大盞煮三味米熟去查納赤石脂細末一方寸

七溫服日三愈勿服

診 少陰病下利膿血者可刺 下利便膿血若厥而發熱厥

少熱多者病當愈也論見厥 先厥後發熱無汗者利不止

也論見前條 下利脈數而渴者令自愈設不瘥者必清膿血

以有熱故也 下利寸脈反浮數尺中自濇者必清膿血

下利脈數不解而下利不止者必挾熱而便膿血也論見

血

下利謔語分陰

下利謔語若脈微手足厥但欲寐小便難者為陰宜補劑

陽

和之

若脈和手足溫及不欲寐小便利者為陽宜調胃承氣湯

脈滑宜下

陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相

尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣

湯 下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承

氣湯 下利脈反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯

脈微宜下

下利脈微者白虎湯也若微瀉嘔而汗出數更衣者當溫

而灸之

方論見少陰下利條

下利脈大者虛也以其強下之故也設脈浮革故爾腸鳴

者屬當歸四逆湯主之

下利裏急後重

熱利下重者白頭翁湯主之 四肢逆而泄利下重四逆

散加薤白主之

論見前厥利條

下利肢疼身痛

下利身體疼痛若但四肢沉重疼痛小便不利者前條真

武湯症也 若四肢疼厥逆惡寒者四逆湯若通身疼痛

者先以四逆湯溫裏後用桂枝攻表也

方論見前

下利心下鞭

下利三部脈皆平按之心下鞭者急下之宜大承氣湯

下利後心下痞鞭者此非結熱但胃虛客氣上逆故使鞭

甘草瀉心湯主之

論見痞

下利咽痛

下利咽喉痛若兼胃滿者猪膚湯兼厥逆者通脈四逆湯

下利胸痛

若下利不止厥逆下部無力咳唾膿血者麻黃升麻湯

並見前條

下後利遂不止為協熱利

下利十餘行胸中痛寸口脈滑者宜吐之則利止

論見胃滿

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯後以他藥下

之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者宜利其小便

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂

禹餘糧

各四兩

右剉碎每服五錢水煎溫服不瘥再服

下後心下痞鞭腹中雷鳴乾嘔而利者甘草瀉心湯方論見瘥

下後心下痞鞭表裏不解而利者桂枝人參湯方論見瘥

下利脈促表不解喘汗而利者葛根黃芩黃連湯論見前

凡藥下後潮熱脇滿嘔而利者先用小柴胡湯解外

後以柴胡加芒硝湯論見潮熱凡藥下後譫語脈調和小便

利而下利不厥者調胃承氣湯論見下後脈大浮革腸

鳴而利者當歸四逆湯論見前下後脈數不解者必

便膿血論見前下後成陰症厥逆咽不利唾膿而利者

麻黃升麻湯論見厥

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反

去者為欲解也雖煩下利必自愈傷寒脈浮緩手足溫

至七八日忽暴煩下利日十餘行者必自止論見發熱

而厥七日下利者為難治傷寒六七日不利便發熱而

利其人汗出不止者死有陰無陽故也少陰病但欲臥

不煩至五六日忽自利煩躁不得寐者死論見但欲臥下利

脈沉弦者下重也脈大者為未止脈微數者為欲自止雖

發熱不死下利有微熱而渴脈弱今自愈下利脈數

而渴者自愈設不瘥者必清膿血論見下利脈數有微

熱汗出今自愈設復緊為未解傷寒下利日十餘行脈

反沉者死假令下利寸口關上尺中悉不見脈然尺中

時一小見脈再舉頭者腎氣也若損脈來至為難治下

利清穀不可攻表汗出必脹滿

下利續法

臍下寒
大便青
白為寒
臍下熱
大便黃
赤為熱

活寒毒入胃者臍下必寒腹脹滿大便黃白或青黑或下利清穀宜四逆湯理中湯白通加附子湯四逆加薤白散按熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津汁垢膩宜黃芩湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯赤石脂湯

三黃熟艾湯治傷寒四日而大下熱利時作白通湯諸藥多不得止宜服此湯除熱止利

黃芩

黃連

黃柏

熟艾半雞子大

右咬咀水煎溫服

薤白湯治傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱悉主之

豆豉半合

綿裹

薤白搗

山梔七枚

右咬咀用水二升半先將梔子十沸下薤白煎至二升下豉煎取一升二合溫服

赤石脂丸治傷寒熱利

赤石脂兩一

黃連

當歸各二兩

乾姜炮一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九米飲下日三服

便膿血
為濕

濕毒氣盛者下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁宜桃花湯地榆散黃連阿膠散

地榆散治傷寒熱毒不解日晚即壯熱腹痛便利膿血

地榆

犀角屑

黃連炒

葛根各一兩

梔子仁半兩

黃芩一兩

右咬咀每服四錢水一盞入薤白五寸同煎溫服

海阿膠湯治傷寒熱毒入胃下利膿血

黃連炒二兩

山梔半兩

阿膠炒

黃柏各一兩

右咬咀每服四錢水煎服

雲傷寒汗下後大小便利者腹中痛者宜燥腸丸

傷寒汗
下後大

小便利
腹痛宜

附子炮一

龍骨兩半

乾姜兩一

吳茱萸

粟殼

訶黎皮各半兩

右為細末酒糊丸如桐子大每服三十九溫水下利止

勿服

裏急後重宜下

傷寒汗下後裏急後重下利者宜

七宣丸

大黃兩一

桃仁去皮尖三十枚

檳榔

柴胡

訶子皮

甘草各半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九溫水下

裏急者宜和

傷寒汗下後氣逆利不止者寒也宜

枳實芍藥甘草湯

芍藥

甘草

枳實炒

乾姜炮各半兩

右咬咀每服五錢水煎服

厥陰病

氣上衝心

飢不欲食

吐虵

虫

厥

少腹滿囊縮

厥陰病

厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱飢不欲食食則吐

虵 厥陰病渴欲飲水者少少與之愈 厥陰中風脈微

浮為欲愈不浮為未愈 厥陰病欲解時從丑至卯上

病如桂枝症頭不痛項不強寸脈微浮胃中痞鞭氣上衝

咽喉不得息者此為胃有寒也當吐之宜

瓜蒂散

瓜蒂炒黃

赤小豆各一分

右研為細末取一錢用豉一合湯七合先漬之須臾煎

稀糜去查取汁相和溫頓服不吐少少加得快吐乃止

諸亡血虛家不可與服

活瓜蒂散每服一錢七藥下便臥欲吐且忍之良久不吐

脈浮氣上冲咽喉不得息者為陽

取三錢七湯二合和服以手指探之便吐不吐復稍增之
以吐為度若吐少病不除明日如前法再吐之不可令人
虛也如藥力過時不吐飲熱湯一升以助藥力吐訖便可
食無更服若服藥過多者飲水解之

奔豚

奔豚氣上衝胃腹痛往來寒熱奔豚湯主之

方見續壘腎積氣條

陰陽易

陰陽易少腹裏急引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼

中生花者宜燒棍散

論見陰陽易

剛瘕

氣上衝胃口噤不得語欲作剛瘕者宜葛根湯

論見瘕

汗後氣上衝

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹

上衝心者灸其核各一壯與

桂枝加桂湯

桂枝二兩半

芍藥

生薑各一兩半

甘草一兩

大棗六枚

下後氣上衝

右啖咀每服五錢水煎溫服

桂枝加桂以能洩奔豚氣也

太陽下後其氣上

吐下後氣上衝

傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胃頭眩脈沉緊若發汗則

動經身為振搖者茯苓白朮甘草湯

論見戰振方見振搖

傷寒吐

下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝
咽喉眩胃經脈動惕者久而成痿

氣上衝心續法

雜方

李根湯治氣上衝正在心端

半夏

當歸

芍藥

生薑

茯苓

桂枝

黃芩

甘草

甘李根白皮各等分

右啖咀每服五錢水煎溫服

飢不欲食

蛇厥者陰症

飢不欲食食則吐蛇者厥陰病論見氣上冲心手足厥冷脈乍

汗下後飢不欲食者陽症

緊心煩飢不能食者邪在胸中宜瓜蒂散吐之論見厥太陽病吐發汗出發熱不惡寒關脈細數腹中飢口不能食朝暮吐者此為小逆論見發熱陽明病下後心中懊懣飢不欲食但頭汗出者宜梔子豉湯論見煩

吐蛇虫

厥陰吐蛇

氣上衝心疼飢不欲食吐蛇者厥陰病論見氣上冲靜而復煩須臾復止得食而嘔又煩吐蛇虫者為蛇厥宜烏梅丸

方論見厥

病人有寒復發汗胃中冷必吐蛇活人云先服理中丸次服烏梅丸

厥

先厥後熱為寒

兩感於寒者三日少陰與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥論見

太陰註云耳聾者少陽病囊縮而厥者厥陰病

傷寒一二日至四五日而厥者

必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤成無已云若始得之

手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯

溫之若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也

四逆散主之必須識此勿令誤也四逆湯方見下劑四逆散方見欲寐又當

外症別之予嘗治一中年婦人惡熱身熱而渴脈數細弱

先厥後熱用溫藥反劇後以四逆散兼參朮各半服之厥

愈脈出洪大而痊

手足厥寒脈細欲絕者宜

當歸四逆湯

脈細弱而脈為寒

甘草

通草各六錢

當歸

桂枝

細辛

芍藥各一兩

右咬咀每服五錢入枣子一枚同煎温服

若其人内有久寒者宜當歸四逆加茱萸生薑湯主之於
原方内加吳茱萸二兩生薑二兩半 嘔而脈弱小便復
利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

脈滑厥者裏有熱也白虎湯主之

傷寒脈促手足厥逆者可灸之 脈經云可灸少陰厥陰主逆 傷寒六

七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰灸而不止者死

脈微促者宜吐 病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心中滿而煩飢不

能食者病在胃中當吐之宜瓜蒂散 脈緊一作脈結者有理 脈來

數時一止復來曰促脈來緩時一止復來曰結結促二脈

者脈為邪礙而歇止也灸之吐之所以逐去其邪也

脈沉而脈 少陰病身痛手足寒脈沉者宜附子湯 論見欲寐 傷寒五六

日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細

者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為
陽微假令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在裏
半在表也脈雖沉緊不為少陰病所以然者陰不得有汗
今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得
屎而解

本有人患傷寒五六日頭汗自出自頸以下無汗手足冷

心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以為陰

症予診其脈沉而緊予曰此症誠可疑然大便秘結非虛結

也安得為陰脈雖沉而緊為少陰症多是自利未有秘結

者此症半在裏半在表投以小柴胡湯得愈仲景稱傷寒

五六日頭汗出云云至得屎而解正此之謂也有人難曰

脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰不得有汗何也

今頭汗出者故知非少陰何以頭汗出便知非少陰症予

曰此一段正是仲景議論處謂四肢冷脈沉緊腹滿全似少陰然大便鞭頭汗出不得為少陰蓋頭者三陽同聚若三陰止胃而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出為陽微是陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脈法云心者火也明少陰則無頭汗者可治有汗者死心為手少陰腎為足少陰相與為上下惟以意逆志者斯可得之傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

茯苓甘草湯

茯苓

桂枝各二錢

生薑三錢

甘草灸一錢

右咬咀水煎溫服

悸而四逆吐而

少陰病四逆或悸者四逆散加桂枝主之

方論見欬寐

傷寒

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯欲

攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾姜湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四逆湯主之

甘草乾姜湯

甘草四兩

乾姜二兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

芍藥甘草湯

芍藥

甘草各二兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

調胃承氣湯

方見發熱

四逆湯

方見下利

問曰症象陽且按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而譫語師曰言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰尺寸浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脛攣急症象桂枝因加附子參其間增桂令汗出

附子溫經回陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩
亂更飲甘草乾姜湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急
重與芍藥甘草湯乃脛伸以承氣湯微溏則止其譫語故
知病可愈 少陰病食入則吐復不能吐手足寒脈弦遲
者宜吐之論見吐

下利而厥

下利而厥下重者四逆加薤白脈微者通脈四逆湯白通
湯溫後無脈者白通加豬膽汁湯汗後拘急者四逆湯下
後咽不利者麻黃升麻湯方論見下利

吐利厥為寒

吐利發熱惡寒汗出而厥者屬霍亂宜四逆湯 吐利煩
躁欲死而厥者屬少陰宜吳茱萸湯 吐利止脈微欲絕
而厥者通脈四逆加豬膽汁湯方論見吐利

渴而厥為暑

中暑口乾而渴治法見中暑門

躁無暫時止者

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為

煩者為就厥

臟厥非為蛇厥也蛇厥者其人當吐吐蛇今病者靜而復時
煩此為臟寒蛇上入膈故煩須更復止得食而嘔又煩者
虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥者宜

烏梅丸主之

烏梅七十

細辛

附子炮去皮

人參

黃栢

桂枝各一兩

乾薑二兩

黃連四兩

蜀椒炒去汗一兩

當歸

右九味共為細末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸熟杵成
泥和藥令相得納臼中加煉蜜杵二千下丸如桐子大
食前服十九日三服稍加至二十九忌生冷滑物等

診

凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是也
傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽
氣退故為進也 傷寒發熱四日厥反三日厥少熱多其

病當自愈四日至七日熱不除者其後必便膿也 傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食恐為除中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐胃熱來而復去也後三日脈之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日併前六日亦為九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不罷者此為熱氣有餘必發瘧膿也 傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈 傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利已白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胃膈煩滿者其後必便血 少腹滿痛而厥為冷結關元 論見少腹痛 少陰四逆惡寒身踈無脈不煩而躁死 論見欲寐

忌

少陰病但厥無汗而強發之必動其血 論見欲寐 諸四逆厥者不可汗之諸虛家亦然 傷寒五六日不結胃腹濡脈虛復厥者不可下此為亡血下之者死

右厥逆皆忌下惟前條先熱者必厥厥應下之而反發汗者一法宜下忌汗之

厥續法

寒厥

活冷厥者初得病日便四肢逆冷脈沉微而不數足多攣

臥時惡寒或自引衣蓋覆不飲水或下利清穀或清便自

調或小便數外症多惺惺而靜脈雖沉實按之遲而弱者

知其為冷厥也四逆湯理中湯通脈四逆湯當歸四逆湯

當歸四逆加茱萸生薑湯白通加豬膽汁湯隨症用之

熱厥

熱厥者初中病必身熱頭痛外別有陽症二三日至四五日方發厥兼熱厥者厥至半日却身熱蓋熱氣深方能發

厥須在二三日後也若微厥却發熱者熱深故也其脈雖伏按之而滑者為裏熱其人或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤外症多昏愢者知其熱厥也白虎承氣湯隨症用之

失下藥

又有下症悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥醫人不識却疑陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱厥須脈沉伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指爪溫須便承氣湯下之不可拘忌也

脈沉疾有力宜

海厥陰症四肢厥冷爪甲青脈沉疾按之有力者為陽則當下宜大承氣湯如脈沉遲按之無力者為陰則當溫宜

溫無方宜

四逆湯更須速灸之

天寒症宜熱

羅省椽曹德裕男婦二月初病傷寒八九日請予治之脈得沉細而微四肢逆冷自利腹痛目不欲開兩手常抱掖

下昏昏嗜臥口舌乾燥乃曰前醫留白虎加人參湯可服否予曰白虎雖云治口燥舌乾若只此一句亦未然今此症不可服白虎者有三傷寒症云立夏以前立秋以下不可妄用一也太陽症無汗而渴者不可用二也況病人陰症悉具其時春氣尚寒三也仲景云下利清穀急當救裏宜四逆湯五兩人參一兩生薑十餘片連鬚蔥白九莖水五大盞同煎至三盞去渣分三服一日服之至夜則止手足溫翌日大汗而解繼之以理中湯數服而愈孫真人習業論云凡欲為太醫必須精讀甲乙素問黃帝鍼經明堂流注十二經絡三候九部本草藥性仲景叔和並須精熟如此方為太醫不爾猶無目夜遊動致顛殞執此用藥者再思可矣

陽症治驗

真定府趙吉夫年三十三至元五月間因勞

天熱症宜寒

役飲食失節傷損脾胃時發煩躁而渴又食冷物過度遂
病身體困倦頭痛四肢逆冷嘔吐而心下痞醫人不察見
其四肢逆冷嘔吐而心下痞乃用桂枝末三錢七熱酒調
下仍以綿衣覆之作陰毒傷寒治之須臾汗大出汗後卽
加口乾舌澁眼白時紅項強硬肢體不柔和小便淋赤大
便秘澀循衣摸床如發狂狀問之則言語錯亂視其舌則
赤而欲裂朝輕暮劇凡七八日家人輩悉謂危殆不望生
全鄰人吉仲完舉予治之診其脈七八至知其熱症明矣
遂用大承氣湯苦辛大寒之劑一兩作一服服之利下三
行折其勝勢翌日以黃連解毒湯大苦寒之劑二兩徐徐
服之以去其熱三日後喘十分中減五六更與白虎加人
參湯約半斤服之瀉熱之氣前症皆退戒以慎起居節飲
食月餘漸得平復內經曰凡用藥者無失天時無逆氣宜

無翼其勝無贊其復是謂至治又云必先歲氣無伐天和
當暑氣方盛之時聖人以寒涼急救腎水之原補肺金之
不足雖有客寒傷人仲景云用麻黃湯內加黃芩知母石
膏之類恐發黃發斑又用桂枝湯之戒况醫以桂末熱酒
調服所謂差之毫釐謬以千里逆仲景之治法經云不伐
天和不贊其復不翼其勝不失氣宜不然則故疾未已新
病復起矣

熱症
中

用熱遠熱從乎中治 友人劉巨源年六十五歲至正夏
月因勞役飲食失節又傷冷飲得疾醫者往往以爲四時
症治之不愈逮十日請予治之曰右手三部脈沉細而微
太陰症也左手三部脈微浮而弦虛陽在表也大抵陰多
而陽少今所苦身體沉重四肢逆冷自利清穀引衣自覆
氣難布息懶言語此脾受寒濕中氣不足故也仲景言下

利清穀急當救裏宜四逆湯溫之內經有用熱遠熱之戒口乾但嗽水不嚥早晨身涼而肌生粟午後煩躁不欲去衣昏昏睡而面赤隱隱紅斑見於皮膚此表實裏虛故也內虛則外症隨時而變詳內外之症乃飲食勞倦寒傷於脾胃非四時之症明矣治病必察其下今適當大暑之時而得內寒之病以標本論之時為標也病為本也用寒藥則順時而違本用熱藥則從本而逆時此乃寒熱俱傷必當從平中治中治者溫之是也遂以錢氏白朮散加升麻就本方加葛根甘草以解其斑少加白朮茯苓以除濕而利小便人參藿香木香和脾胃進飲食咬咀一两煎服再服癡退而利止身溫而神出次服異功散治中湯辛溫之劑一二服五日得平止藥或曰病雖少愈勿藥可乎予曰藥攻邪也內經曰治病以平為期邪氣既去強之以藥變

証隨起不若以飲食調養待其真氣來復此不藥而藥不治而治之理旬日良愈必察其下者謙甫謂時下之宜也身熱而脈忽無脈者必有汗 隨若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而兩手忽無脈或一手無脈者必是有正汗也多用綿衣裹手足令溫煖急服五味子湯或兼與麻黃細辛甘草湯之類服之晬時必有大汗而解矣

五味子湯治傷寒喘促脈伏而厥

人參一分 五味子兩 麥門冬心法 杏仁去皮

生薑 陳皮各一分 棗子二枚

右咬咀水煎服

針灸 摘治傷寒手足逆冷 大都一分

傷寒六脈俱無復溜補大回 合谷 中極 支溝寸

半此穴和 復溜順骨 巨闕三分 氣衝灸七

宜忌 活諸手足逆冷皆屬厥陰不可汗下然有須汗須下者謂
手足雖逆冷時有溫時手足掌心必煖非正厥逆也當消
息之

診 脈病若四肢厥逆脈反浮大而短者死

少腹滿囊縮

脈沉結脈沉者囊縮者囊縮者而囊縮論見大法活人云脈沉短囊縮者承氣湯下之病者手足厥冷言我不
結胃小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

少腹硬滿小便利者為畜血若兼身黃發狂者抵當湯主

之不利者者畜血不利者黃發狂者抵當九但少腹急結者宜桃花承氣湯

詳見畜血門 傷寒表不解乾嘔發熱而欬或小便不利少腹

滿者小青龍去麻黃加茯苓湯主之論見

不大便日晡潮熱從心至少腹鞭滿而痛者宜大陷胃湯

少腹滿囊縮續法

活傷寒六七日煩滿囊縮其脈尺寸俱微緩者足厥陰肝
經受病也厥陰病其脈微浮為欲愈不浮為未愈宜小建
中湯脈浮緩者必囊不縮外症必發熱惡寒似瘡為欲愈
宜桂枝麻黃各半湯若尺寸俱沉短者必是囊縮毒氣入

腹宜承氣湯下之大抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故

次傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少

陽木為微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水

水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣克於脾

土脾再受邪則五臟六腑皆因而危殆榮衛不通耳聾囊

縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五生一死古人

云脾熱病則五臟危又土為木賊則死若第六七日傳厥

陰脈得微緩微浮為脾胃脈也故知脾氣全不受克邪無

厥陰煩
滿囊縮
脈浮者
宜汗脈
緩者宜
和脈短
者宜下

少腹滿
小便利
者畜血
不利者
宜飲

心腹滿
為結胃

所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

小便便
秘發熱
飲宜
下大小
便利不
熱不痛
宜温

海厥陰症者煩滿囊縮大小便不通發熱引飲腹滿尺寸脈微緩煩者火也滿者木也雖不吐虵囊縮但急者亦木也火與木相合四肢厥逆而爪甲青大小便不通地道塞也發熱引飲邪氣在裏宜温之下之

已上諸症大小便俱通地道不塞不發渴不引飲邪不在裏則宜温之灸之則裏外相接以復陽氣宜服

正陽散

麝香一錢細研性辛温 乾薑治腹急滿痞風毒 甘草灸各二錢半

附子一兩炮去皮臍味辛温 皂角二兩酥炙法皮

弦味 鹹温

右為細末每服二錢白湯下温服

回陽丹

硫黃半兩味酸温大熱治心腹腫聚邪氣冷癖左脇氣咳上氣脚冷無力 附子炮半兩

乾姜炮二錢半 木香半兩味辛温療肌中 全蝎半兩味

一切 萆澄茄半兩味辛温治皮風心腹氣脹 吳茱萸半兩洗炒

味辛温大熱治中風逐邪諸食不消氣逆利五臟順氣

右為末酒糊丸如桐子大生薑湯下三五十九併二三

服以熱投之衣被取汗

陰氣毒盛變陰毒

仲景但名陰毒

陰毒之為病面青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之升麻鱉甲湯方見陽毒

陰毒續注

活人更名陰毒

活陰毒甘草湯治傷寒時氣初得病一二日便結成陰毒或服藥後六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中

傷寒王退寒

絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細而疾身如被杖咽喉痛五六日可治七日不可治

甘草炙

升麻

當歸各五錢

雄黃二錢

桂枝去皮五錢

蜀椒炒去汗併閉口者及子二分

鱉甲酥炙一兩半

右咬咀水煎服如人行五里許更進一服覆取汗毒從汗出汗出即愈若未汗再服

本陰毒本因腎氣虛冷因慾事或食冷物後傷風內既伏陰外又感寒或先感外寒而後伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭痛腰重腹痛眼睛疼身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上及手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失或可起行不甚覺重診之則六脈俱沉細而疾尺部短小寸口或無六脈俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰

陰毒脈沉細疾

症也若服涼藥過多則渴轉甚躁轉急有此症者急服還陽退陰之藥即安惟補虛和氣而已宜服正元散退陰散五勝散陰症不宜發汗如氣正脈大身熱未瘥用藥發汗無妨

始得陰毒

正陽散治傷寒如覺風寒吹着四肢頭目骨節疼痛急服此藥如人行五里許再服連進三服出汗立瘥若患陰毒傷寒入退陰散五分同煎或傷冷傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無有不效

麻黃節去

陳皮

大黃生

甘草

乾薑

肉桂

芍藥

附子

吳茱萸

半夏製各等分

右咬咀麻黃加一半茱萸減一半同為末每服一錢水一盞姜三片葱一枚煎七分熱服以衣被蓋覆取汗切

須候汗乾去之如是陰毒不可用麻黃免更出汗
退陰散治陰毒傷寒手足逆冷脈沉細頭痛腰重連服三
次小小傷冷每服一字入正元散同煎入鹽一捻陰毒傷
寒咳逆煎一服細細熱呷病止

川烏

乾薑等分

右為麤末炒令轉色放冷再搗為細末每服一錢水一
盞鹽一捻煎至半盞去渣溫服

五勝散治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沉困倦咳嗽鼻塞
不思飲食兼治傷寒夾冷氣并慢陰毒神效

白朮

一兩半

甘草

五味子

石膏各一兩

乾薑

三兩半

右咬咀每服五錢水一盞入鹽少許同煎服如冷氣相
夾入薑棗煎或治陰毒病入艾葉少許煎服

海白朮散治陰毒傷寒心悶煩躁四肢厥冷

川烏

炮去皮臍

桔梗

附子

炮 白朮

細辛

各一兩

乾姜

炮半兩

右咬咀或末之白湯調下一錢匕

羅正陽丹治陰毒傷寒手足厥冷指甲青色體冷脈沉細
而微神效 用蔥蔥四五枝陳蜂房四五箇燒存性為細
末用蔥蔥搗和丸如彈子大手心內握定用手帕緊繫
定須更汗出以綿被覆蓋如手心熱甚休教解開如服
藥先服升麻湯五錢連鬚蔥三莖生姜五片水二大盞
煎至一盞去渣溫服被覆取汗則愈

陰毒漸深爪青

面黑

本陰毒漸深候 積陰感於下則微陽消於上故其候四
肢沉重逆冷腹痛轉甚或咽喉不利或心下脹滿結硬躁
渴虛汗不止或時狂言爪甲面色青黑六脈沉細而一息

七至以來有此症者速宜於氣海關元二穴灸二三百壯以手足溫煖為效仍服金液丹來甦丹五勝散還陽散退陰散

川烏去皮臍冷水浸七日薄切晒乾紙袋盛之有患
者取研末一大錢入鹽一小錢水一盞煎至七分服壓下陰毒所注如猪血相似未已再進一服效

還陽散治陰毒面青四肢逆冷心躁腹痛

用硫黃末新汲水調下二錢良久或寒一起或熱一起更看緊慢再服汗出瘥

返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁頭疼四肢逆冷

硫黃五兩

附子炮去皮臍

乾姜炮

桂心各半兩

硝石另研

太陰玄精石另研各二兩

右用生鐵銚先鋪玄精末一半次鋪硝石末一半中間下硫黃末又着硝石一半蓋硫黃却以玄精石末蓋上

用小盞合着用三斤炭火燒令得所勿令烟出細研似麩後三味搗羅為末與前藥同研令勻軟飯和丸如桐子大每服十五丸至二十九煎艾湯下頻服汗出為度病重則三十九此方甚驗喘促與吐逆者入口便住又服此藥三五服不退者更於臍下一寸灸之須是晝夜大段不住手灸不限多少壯數灸之艾炷勿令小小則不得力若其人手足冷少腹硬即於臍下兩邊各開一寸各安一道三處齊下火灸之仍與當歸四逆湯併返陰丹亦須頻服內外通透方得解若遲誤即死矣又若陰症加以少腹不通及陰囊縮入少腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴急灸之仍須與返陰丹當歸四逆湯加吳茱萸生薑慎勿與尋常利小便冷滑藥火燄散治傷寒惡候

舶上硫黃 黑附子去皮生用新臘茶為細末

右為細末先用好酒一升調藥攤入新碗中於火上蕩乾合在瓦上每一碗下燒熟艾一拳大以瓦堵起無令着火直至烟盡候冷即括取研入磁盒內盛每服二錢酒一盞共煎七分有火燄起勿訝傷寒陰毒者四肢冷脈沉細或吐瀉五心煩躁胃中結硬或轉早伏陰在內湯水不得下或無脈先喫一服如吐却更進一服服後心中熱其病已瘥下至臟腑中表未解者渾身壯熱脈氣洪大便宜用發表藥或表解者更不發熱便得眠睡渾身有汗若少有瘥結脈實方可用下膈行臟腑藥漸用調和元氣補治脾胃湯散服此藥三服不應者不可治也

陰毒沉六脈

本陰毒沉困之候與前後漸染之候皆同而更加沉重六

息八至

脈附骨取之方有按之即無一息八至已上或不可數至此則藥餌難為功矣但於臍下灼火艾如棗大三百壯以來手足不和煖者不可治也倘復和煖以前硫黃及熱藥助之若陰氣散陽氣來則漸減熱藥而和治之以取瘥也活治陰虛陽脫體冷無脈氣息欲絕不省人事及傷寒陰厥百方不效者用蔥以索纏如臂大切去根及葉惟存白長二寸許如大餅樣先以火煏一面令通熱勿令着火乃以熱面熨病人臍上連臍下又以熨斗滿貯火熨之令蔥餅中熱氣鬱入肌肉中須更作三四餅一餅壞不可熨又易一餅良久病人當省手足温有汗即瘥更服四逆湯以温其內

海治陰症諸藥不效併湯水不下身冷脈絕氣息短不知人用蔥白熨法莫若用醃醋拌麩皮炒熟注布袋中蒸熨

比上法尤速

代灸塗臍膏

附子

馬藺子

蛇床子

吳茱萸

肉桂各等分

右為細末可用白麩一匙藥末一匙生薑自然汁煨成膏攤帛上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其火力可代灸百壯腰痛亦可貼之 一法用丁香萹撥乾薑牡礪燒灰放手心中以唾津調如泥以手掩其陰至煖汗出為度

陰毒傷寒四肢逆冷者用吳茱萸不拘多少為細末溫酒和勻生絹袋盛之熱熨脚心令通暢愈若以湯煎溫藥滌洗以接四肢亦可

湯中伏 本治陰中伏陽破陰丹

硫黃

水銀各一兩

陳皮

青皮各半兩

右將硫黃先入銚子內鎔開次下水銀用鐵杖子打勻令無星傾入黑茶盞內細研入二味用麩糊丸如桐子大每服三十九丸如煩躁冷塩湯下陰症艾湯下良效

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰症也急服金液破陰來復等丹其脈遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰症而見陽脈有可生之理仲景所謂陰病見陽脈者生仍灸氣海丹田百壯手足溫溫陽回得汗而解或問滑沉之狀如何便有生理予曰仲景云翕奄沉名曰滑何謂也沉為純陰翕為正陽陰陽和合故名曰滑古人論脈滑雖曰往來前却流利旋轉替替然與數相似仲景三語而足也此三字極難曉翕合也言張而復合也故曰翕為正陽沉言忽降而下也故曰沉為正陰方翕而合俄

降而沉奄爲忽忽間仲景論滑脈可謂諦當矣其言皆有
法故讀者難曉宜細思之

醫學綱目卷之三十一

醫學綱目卷之三十二

傷寒部



合病併病汗下吐後等病 喘 身重

難轉側 遺尿 盜汗 面赤 壞病

戰慄振搖 筋惕肉瞤 叉手冒心

驚 悸 藏結結胃痞氣同異 結胃

痞 煩 煩躁 欬 小便不利

小便難 尸厥鬱胃 噫 噦 無汗

瘧狀 頭汗 舌白胎 動氣

鼻衄 下血 唾血 畜血 吐血

短氣 心痛 除中 下重 身熱惡

寒身寒惡熱 瘧 瘧 狐惑 百合

合病併病汗不吐後等病

汗 合病宜

太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之不下利但嘔者

葛根加半夏湯主之

宜和

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半

夏湯生薑湯主之

宜下

陽明與少陽合病必下利脈滑而數者有宿食也當下之

宜大承氣湯

論見下利

併病宜汗

二陽併病太陽出汗不徹因轉屬陽明自汗不惡寒太陽症不罷面赤燥煩短氣者更發汗則愈

二陽併病太陽症罷潮熱譫語者下之則愈

論見譫語

太陽與少陽併病項強眩冒心下硬如結胃者刺胃脘肝

脘論見強

喘

表裏

太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下麻黃湯主之

喘發熱脈浮為

許有人病傷寒脈浮而長喘而胃滿身熱頭痛腰脊強鼻

表

乾不得臥予曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利葛

根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胃滿者麻黃湯也治以

麻黃湯得解

太陽病頭疼發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃湯

論見發熱

陽明病脈浮無汗而喘者麻黃湯

論見大便

喘家有汗桂

枝湯加厚朴杏仁佳

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝去皮

芍藥各一兩

甘草炙

厚朴各六錢

杏仁去皮尖二箇

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片肥惠三枚劈破

同煎至八分溫服覆取微汗

表不解乾嘔發熱欬喘者小青龍去麻黃加杏仁湯

論見欬

喘潮熱腹滿大便小便秘脈沉為

陽明病潮熱汗出不惡寒短氣腹滿而喘者大承氣湯

論見

裏

不大便秘註云在裏而喘者腹滿在表而喘者腹不滿

小便不利大便乍難乍易微

熱喘胃不能臥者大承氣湯脈沉喘滿反發汗大便難者裏實論語

汗後而喘

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃

杏仁甘草石膏湯

麻黃兩

杏仁五十

甘草二

石膏半

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮

取二升去查溫服一升

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘汗後脈沉喘滿大

便難譫語者裏實論語

下後而喘

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃

杏仁甘草石膏湯

下後利不止脈促而喘汗者葛根黃

芩黃連湯論見

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝

加厚朴杏仁湯主之

許有武臣為寇執置舟中艙板下數日得脫乘飢恣食良久解衣捫虱次日遂傷寒自汗而脈不利一醫作傷食而下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高予診之曰太陽下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一啜喘定再啜藥熱汗出至晚身涼脈已和矣醫曰其平生不曾用仲景方不知其神捷如此

診

傷寒吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘直視脈弦者生澁者死論見循衣摸床

小便利者死論見

少陰病息高者死論見厥利

厥冷

無脈灸之不還反微喘者死厥利直視譫語喘滿者死

論見

脈浮洪汗出如油髮潤喘不休者為命絕論見

論見

脈浮洪汗出如油髮潤喘不休者為命絕論見大法

喘續法

陰症喘活陰證喘促者返陰丹主之四肢逆冷喘促入口便佳助

陰毒

飲水喘

病人小渴與水劇飲之致停飲心下滿結者喘死甚眾當以五苓散或陷胃丸主之方見渴及結胃

身重

身重面垢身重

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上出汗手足逆冷若自汗出者白

虎湯主之

身重脈浮多眠

身重脈浮緊

風溫為病脈浮汗出身重多眠鼻息鼾論見風溫宜活人參桂湯

陽明病脈浮緊口苦咽燥腹滿而喘發熱汗出不惡寒身

重忌汗忌燒鍼忌下論見自汗証云此証宜和解之

身重腹滿

陽明病汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘有潮熱者宜大

承氣湯論見不大便

風溫身重

風溫脈浮身重汗出惡風者宜防已黃芪湯

防已兩一

甘草兩半

白朮七錢半

黃芪去蘆一兩一錢

右咬咀每服五錢生薑四片大棗一枚水盞半煎八分

溫服良久再服服後當如虫行皮中從腰下如水後坐被上又以一被繞腰已下溫令微汗瘥喘者加麻黃

半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂三分

下有沉寒者加細辛三分

中暑身重

中暑病發熱惡寒身重痛汗出足冷脈虛而渴者忌汗下

鍼宜瓜蒂散白虎湯論見中暑

身重無汗

傷寒脈浮緩身不疼但重無少陰但欲寐吐利證者宜大

青龍湯

身重心悸者不可發汗當自汗者乃解論見

陰陽易為病身重少氣少腹急引陰中拘攣上衝胃眼花

者燒裨湯論見陰

少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利者真武湯論

重身

難轉側

三陽合病腹滿身重難轉側汗出者白虎湯論見 下後

曾滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側者柴胡牡礪湯

論見 風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脈浮

虛而澁者桂枝附子湯論見

遺尿

三陽合病腹滿身重難轉側譫語遺尿汗出者白虎湯論

病身重

風溫病脈浮汗出者身重多眠若下之則小便不利直視

失溲論見

寸口脈微而澁微者衛氣不行澇者榮氣不逮榮衛不能

相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言

衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而吞

酢中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥冷

太陽病火熨其背大汗出譫語十餘日振慄下利欲小便

不得反嘔而失溲者此為欲解也論見 遺溲狂言目反

直視者此為腎絕論見

盜汗

三陽合病脈浮大見關上但欲眠睡目合則汗 陽明病

脈但浮者必盜汗出論見胃實成無已云陽明病當作裏

盜汗脈浮邪在裏半表半裏

多眠息身者風溫

診

遺尿

論見

論見

論見

論見

論

論

故也 太陽病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也 論見結胃

傷寒盜汗者非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使然也何者若邪氣一切在表于於衛則自然汗出也此則邪氣浸行於裏外連表邪及睡則衛氣行於裏乘表中陽氣不緻津液得泄故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止矣其證悉當和表而已

面赤

面赤暈 煩短氣 脈濇者 汗不徹
二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽症不罷者不可下之之下之為逆如此可小發汗設面色綠緣正赤色者陽氣怫鬱在表當解之薰之若發汗不出不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之

不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知也 因發不透徹而面赤躁煩短氣者不足言陽氣怫鬱止是當汗不汗也故更發汗則愈

身痒脈浮遲者 陽虛
脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解反發熱者瘥遲為無陽不能作汗其身必痒也 太陽病如瘧狀若脈微惡寒面反有熱色而身痒者桂枝麻黃各半湯小汗之 論見發熱

口噤背張者症 赤斑者 陽毒
身熱足寒面赤卒口噤背反張者瘥病 陽毒面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血者宜升麻鱉甲湯方論見

面赤下利脈微 肢厥者 為陰
少陽病下利清穀手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒面赤色者通脈四逆湯加蔥白 論見下利 下利清穀脈沉遲面赤赤手足微厥者必鬱冒汗出解 論見下利

面赤
下

陽明病面合赤色者不可攻之論見便難

壞病

太陽病三日已發其汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈症知犯何逆隨証治之

壞病續法

虛

山治傷寒壞症獨參湯好人參一兩煎服

海陽症大汗大下後亡陽於外亡血於內上而津脫下而液脫津液兩亡宜以羊肉湯補之矧陰症者豈可不溫補哉此與傷寒太陽症振搖與真武湯一例外之陽病至此尚溫况內之陰候豈得不補耶

韓產脫血虛者宜用羊肉湯傷寒汗下太過亡陽失血若只用救逆效必遲矣與羊肉湯為效神速病人面色雖見陽是客熱上焦中下二焦陰氣已盛若調得下焦有陽則

上焦陽氣下降丹田知所歸宿矣夫氣有高下病有遠近証有中外治有輕重各適其至所為故病八九日汗下太過二脈沉細無力多蹇足臥惡聽人聲皮有粟時戰如瘧宜羊肉湯主之

當歸

白芍藥

黑附子

炮去皮 臍四錢

龍骨

燒通赤 半兩

生薑

二兩

牡礪

燒赤 一兩

桂枝

七錢 半

右為籠末每服一兩羊肉四兩葱白五寸去黃心同剉爛以水五升一升今之大盞也熬至一半以來瀘絞去渣分三服服之

戰慄振搖

虛

成戰者身為之戰搖也慄者心戰是也戰之與慄戰外而慄內也又云戰為正與邪爭則鼓慄而戰振但虛而不至爭故心聳動而振也戰之與振振輕而戰重也

汗後振
為虛

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝脅起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者宜

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓

桂枝

白朮

甘草

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去渣溫服

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動

振振欲躄地者真武湯主之

方見少陰
附下利

孫太乙宮道士周德真患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰掉欲倒地眾醫有欲發汗者有作風治者有用冷藥解者病皆不除召孫至曰太陽經病得汗早欲解不解者因太陽經欲解復作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩身轉遂作真武湯服之三服微汗自出遂解蓋真武湯附子白朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽者惟能

乾涸血液爾仲景云尺脈不足榮氣不足不可以汗以此

知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有一姓高者

子年三十初得病身微汗脈弱惡風醫以麻黃藥與之汗

遂不止發熱心多驚悸夜不得眠謔語不識人筋惕肉瞤

振振動搖醫又進鎮心藥予曰強汗之過也仲景云脈微

汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此為逆也惟

真武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈

清心
竹葉

湯未
考

下後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振 太陽病火熨其

背大汗出火熱入胃發謔語十餘日振慄自下利者此為

解也

論見
謔語

脈浮緊按之芤當戰而汗出解脈芤為虛是以發戰脈浮

未汗戰
振為欲

解

為在表故當汗出解也論見大法 太陽病脈陰陽俱停等必

戰慄汗出而解論見發熱 凡柴胡症下之若柴胡症不罷者

復與柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解論見往來寒熱 脈浮

而遲面熱赤而戰惕者當汗出解也反發熱者脈遲不能

作汗其身必痒也論見面赤

平居忽戰慄者初中邪

於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故邪中於陰也

筋惕肉瞤

虛

汗出筋惕肉瞤若眩悸振振欲蹶地者及服大青龍湯後

厥逆者俱宜真武湯方見戰掉及發熱 若動氣在左頭汗不止

者活人用防風白朮牡礪次服建中湯論見重寒

診

汗下吐溫鍼後若膚瞤動胃煩面色青黃者難治論見痞

治見痞

若經脈動惕脈微心下痞氣衝咽喉者久而成痿治見痞

叉手冒心

虛

發汗過多叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯論見

見

驚悸

虛

少陽耳聾目赤胃滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚論見

見

下後驚

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利譫語一身盡重不

可轉側者宜

柴胡加龍骨牡礪湯

半夏二合

大棗六枚

柴胡四兩

生薑

人參

龍骨

鉛丹

桂枝

茯苓各一兩半

大黃二兩半

牡礪二兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝
去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之活人云醫以火於
臥床下或周身用
火迫劫汗出或厥
而成火邪者是也

桂枝蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝去皮三兩 甘草炙二兩 生薑切三兩 牡蠣炒五兩

龍骨四兩 大棗十二枚 蜀漆洗去腥三兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

太陽傷寒者加溫鍼必驚也 風溫脈浮自汗身重多眠

若被火者微則發黃劇則如驚癇時瘕瘕論見風溫 陽明病

脈浮緊口苦咽乾腹滿若加燒針必怵惕煩躁不眠論見自汗

驚悸續法

傷寒後 虛熱 海茯苓九治傷寒後或用心勞倦四肢羸弱心忪驚悸吸

吸短氣

茯神 麥門冬去心 熟地各一兩 牡丹皮

人參 黃芪各七錢 桂枝 甘草炙

牛膝 澤瀉各半兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前溫酒

下二十九

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠睡

犀角屑半兩 茵陳蒿七錢半 茯苓二兩 芍藥

生地焙二兩 麥門冬去心兩半 山梔半兩

右咬咀每服五錢水一盞半薑二片竹葉三七片同煎

食後服

麥門冬茯苓飲子治傷寒後心神恍惚不得臥

麥門冬去心 赤茯苓去皮 知母焙 芩藺

甘草炙 酸棗仁微炒 陳皮去白炒 檳榔各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片煎溫服日三服
少陰心悸者四逆不可與也心悸者火懼水也惟腎欺心
故為心悸者是足經上手經也若與四逆湯變無形中惡
候生矣故先以甘草茯苓湯導其濕次以四逆湯溫之者
為心悸全無手經火令入足水也心悸在濕未去終至於
斃故不敢溫之溫之則壞矣

悸

汗後心

汗後心下悸若頭眩身瞤動振振欲僻地者真武湯也
論見 戰 若叉手自冒心者後條桂枝甘草湯也若謔語胃不
和煩悸者活人用調胃承氣湯也
論見 若臍下悸者後
條茯苓桂枝甘草大棗湯也 發汗過多其人叉手自冒
心心下悸欲得按者宜
桂枝甘草湯

桂枝四錢

甘草二錢

右二味以水一盞半煎八分去查溫服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚宜

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓八錢

甘草炙二錢

桂枝四錢

大棗二枚

右作二服以甘爛水二鍾先煮茯苓減二分納諸藥煮
取一盞去查溫服日三作甘爛水法取水斗許置大盆
中以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

下後心

脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗
當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表裏實津
液自和便自汗出愈 少陽病耳聾胃滿不可吐下吐下
則悸而驚者註云氣血虛往來寒熱胃脇滿心下悸而小
便不利者小柴胡去黃芩加茯苓湯
方論見往來寒熱

停飲心 太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之 傷寒脈結

代心動悸宜

灸甘草湯

甘草

生薑

人參

生地

桂枝

麥門冬

麻仁

阿膠

右咬咀每服五錢水一盞半入酒半鍾煎至八分去查

納阿膠溶盡溫服日三

霍亂吐利心悸者理中丸加茯苓

手足厥冷而悸者茯苓甘草湯手足逆而不溫悸者四逆

散加桂枝

臟結與結胃痞氣大同小異

問曰病有結胃有臟結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關

脈沉名曰結胃也何謂臟結答曰如結胃狀飲食如故時

時下利寸脈浮關脈細小沉緊名曰臟結舌上白胎滑者

難治 臟結無陽症不往來寒熱其人反靜

舌上滑胎者不可攻也 病胃中素有

痞連在臍旁引入小腹入陰筋者此名臟結死

病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之

因作痞所以成結胃者以下之太早故也 傷寒五六日

嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴胡症仍在者

復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗

出而解若心滿而硬痛者此為結胃也大陷胃湯主之但

滿而不痛者此為痞柴胡不中與之與半夏瀉心湯

寸浮關 沉下利 飲食如 故為臟 結

病發於 陽下之 成結胃 病發於 陰下之 成痞氣

結胃

大結胃
不按而
痛

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日
晡所有潮熱從心下至少腹而痛不可近者大陷胃湯主
之 太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛
數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫
反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁
煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞭則為結胃大陷胃湯主
之若不結胃但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身
必發黃也丹溪云此症曰胃中空曰短氣躁
煩曰脈浮大陷胃湯不可輕用
傷寒六七日結胃熱實脈沉而緊心下痛按之實鞭者大
陷胃湯主之雲岐云三症脈
胃皆日西潮熱
大陷胃湯

大黃

一兩半去皮為
末錦紋者佳

芒硝

一兩
八錢

甘遂

一字赤
連珠者

為細
末

右水二盞煮大黃至八分去查下硝一沸下甘遂末溫
服得快利止後服

小結胃
按之則
痛

小結胃病正在心下按之則痛脈浮滑者宜

小陷胃湯

半夏

湯洗
二兩

黃連

一兩

瓜蒌

一枚用四
分之一

右咬咀水二盞先煎瓜蒌至一盞半後用半夏黃連煎
取八分去查溫服未和再服微解下黃涎便安也

孫工部郎中鄭忠厚因患傷寒胃腹滿面黃如金色諸翰
林醫官商議畧不定推讓曰胃滿可下恐脈浮虛召孫至
曰諸公雖疑不用下藥鄭之福也下之必死其有一二服
藥服之必瘥遂下小陷胃湯尋利其病遂良愈明日面色
改白京城人稱服

熱實結

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

水結胃

但結胃無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大

頭汗無

陷胃湯主之活人云水結胃小半夏加茯苓

病在陽應以汗解之反以冷水噴之若灌之其熱被却不

得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散

寒實結

若不瘥者與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胃

湯此三物白散亦可

桔梗三分

巴豆

一分去皮尖
熬黑研如暗

貝母三分

右三味為末納巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人

半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱

粥一碗利過不止進冷粥一碗汗出已腹中痛與芍藥

一兩

右熱實結胃及寒實結胃活人不拘寒熱但用陷胃湯

不瘥用枳實理中丸應手而愈

結胃項

結胃項亦強如柔痙狀下之則和宜

大陷胃丸

大黃二兩

葶藶

芒硝

杏仁去皮炒
各三分

右搗羅二味納杏仁芒硝合研如脂相和為丸如彈大

後用甘遂末一字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服

一宿乃下如不下再服 王海藏云大陷胃湯太陽入

本藥也大陷胃丸陽明藥也小陷胃湯少陽藥也大陷

胃治熱實大陷胃丸兼喘小陷胃治痞

心下滿痛如結胃狀若頭下強痛眩冒者刺大椎肝膈若

汗下後頭項強痛發熱小便不利者桂枝去桂加茯苓白

朮湯方論並
見項強

熱入血

若婦人經水來熱除謔語者刺期門論見
謔語

診太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者此本有寒也反下之若利止必作結胃未止者四日復下之此作協熱利也四日復下之太陽病下之脈浮者必結胃也論見太陽少陽併病而反下之成結胃心下硬下利不止水漿不下其人心煩結胃症悉具煩躁者亦死

結胃續法

候下未成結胃者急用理中解之

活若誤下了初未成結胃者急頻與理中湯自然解了更不作結胃蓋理中湯治中焦故也此古人亦說不到後因人消息得之若大段轉損有厥症者兼與四逆湯便安胃中雖和傷寒未退者宜候日數足可下却以承氣再下之蓋前來下之未是故也

服隨胃不效者以枳實理中治

西晉崔行功云傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近用大陷胃湯皆不瘥者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻

大小結

氣毒相搏結於胃者當用枳實理中丸先理其氣次療諸疾古今用之如神應手而愈

枳實理中丸治傷寒結胃欲絕心膈高起手不得近

枳實十六片 茯苓 人參 白朮

乾薑炮 甘草炮已上各二兩

右為末煉蜜丸如雞子黃大每服一九熱湯化下連進二三服胸中豁然渴者加瓜蒌根一兩自汗者加牡蠣二兩煨過下利亦加

海增損理中丸王朝奉云大小陷胃湯丸不愈者宜與之

人參 白朮 瓜蒌 牡蠣

甘草炙各二兩 乾薑炒白半兩 枳實炒二十箇 黃芩去枯一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大湯一盞煎服不效復與之不過五六丸胃中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者

加瓜蒌根有汗加牡礪

以半夏
苓治水
結

活水結在胃脇間亦名結胃其證頭微汗出但結胃無熱者小半夏加茯苓湯小柴胡去葱加牡礪主之

孫按俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解衆醫以為溫病用表藥有謂食在膈者治之皆不愈召孫至曰用半夏茯苓湯遂瘥衆問其故曰頭有汗心下滿非濕症乃水結胃脇也水既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當遍身汗若有食心滿頭豈得有汗若言是表身又不疼不惡寒表証何在故凡水結胃脇頭必有汗耳

小半夏加茯苓湯附見

氣寒不
通宜穿
結

穿結散大實大滿心胸高起氣塞不通者為結也

蟾酥

麝香

輕粉

巴豆另研
少許

右再研過至細以乳汁為丸如黍米大每服二丸用薑

湯下不時服

血結胃
宜海蛤

本婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近宜

海蛤散

海蛤

滑石

甘草炙各
一兩

芒硝兩

右末每服二錢雞子清調下

小腸通利則胃膈血散膈中血聚則小腸壅小腸壅膈中血不流行宜此方若小便血散數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈活人書云此方宜非仲景然其言有理姑存之

針灸
治結胃灸法

巴豆十四
箇

黃連

七寸去
皮川

右搗細津唾和成膏填入臍中以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去為度纒灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也

摘傷寒結胃 先使人心敞骨下正痛處左畔揉之以毫

針刺左畔支溝穴正坐側臂取之二分次刺左間使名曰雙關刺次

左行間臥取之針入七分此支溝行間穴下針至分數內

吸訖長呼一口氣出針即左畔一壁結胃立效右畔

依上刺之慢慢呼吸停針用針獲時而愈無有不效

傷寒結胃瘧氣 胸中結痞湧泉 太溪 中衝 太陵

心中結痞隱白 太白 少衝 神門

胃中結痞少商 太淵 大敦 太衝并上下中腕瀉之

通玄 結胃身黃 湧泉

摘 血結胃面赤大燥口乾消渴胃中疼痛不可忍

期門 太陵 關元娠不得刺關元胎死不出子母俱亡慎之

集 傷寒胸膈痛 期門 太陵

活 近世治結胃多用金針并用硫黃陽起石者若寒實結

忌

胃或有瘕者若熱實結胸必死也

痞

心下痞按之濡其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之活人瀉心湯

浮者大云結胸與痞關脈須沉若關脈浮者大黃黃連瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

大黃 黃連各二兩 黃芩一兩

右咬咀以麻沸湯二升漬之一時良久絞去渣分溫再服

服

心下痞而復惡寒汗出者宜

附子瀉心湯

大黃 黃連 黃芩各一兩 附子一枚炮去皮臍

破別煮取汁

右咬咀百沸湯一大盞熱漬之一時久絞去渣納附子

惡寒汗出加附子

汁分溫再服

傷寒天下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞
當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃
連瀉心湯活人云表症未解心下妨悶者非痞也謂之支
結柴胡桂枝湯主之胃腸滿微結小柴胡加乾
薑牡蠣
湯主之

心下痞
硬悶脈
沉者半
夏瀉心

傷寒嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之若心下滿
而不痛者此為痞宜半夏瀉心湯論見結胃
痞同異

半夏瀉心湯

半夏湯洗七
次一兩黃芩

人參

甘草各一
兩半

黃連半
兩

大棗六
枚

乾薑一
兩

右咬咀每服五錢每一盞半煎至八分去渣溫服半夏
瀉心湯若加甘草即後條甘草瀉心湯治痞嘔噦吐利
也若加生薑即後條生薑瀉心湯治痞嘔噦氣下利也

嘔利下
後者加
甘草

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷
鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不
盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故
使鞭也宜

甘草瀉心湯

甘草炙二
兩

黃芩

乾薑各一
兩半

半夏一
兩

大棗六
箇

黃連半
兩

人參一
兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服活人
云伊
尹湯液論甘草瀉心
七味舊本無人參

傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯
主之

痞硬未
下

心下痞硬嘔逆下利若表解身涼脇痛十棗湯主之方論
並見

痞硬表
解身涼
脇痛

痛

痞硬下利

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有

水氣腹中雷鳴下利者宜

生薑瀉心湯

生薑二兩

黃芩

甘草 炙 人參 各一兩半

乾薑 兩

半夏 兩

黃連 兩

大棗 六箇

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去查溫服

下後表裏不解

太陽病外症未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者宜

桂枝人參湯

桂枝 另

甘草 炙 各一兩三錢

白朮 人參

乾薑 各一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞納桂更煮取七分

去查溫服日再服夜一服

汗下解後心下痞硬者

旋覆

傷寒發汗若吐若下解後心下痞噎噫氣不除者旋覆代赭石湯主之 活人云有旋覆代赭石湯証其人或欬逆氣虛者先服四逆湯胃虛者先服理中九次服旋覆代赭石湯為良

旋覆代赭石湯

旋覆花 兩

人參 兩

生薑 一兩

代赭石 三錢

甘草 炙 一兩

半夏 湯泡 八錢

大棗 六箇

右咬咀每服五錢水一盞煎至八分去查溫服 病解

後心下痞鞭噫氣若不下利者此條旋覆代赭石湯也

若下利者前條生薑瀉心湯也

痞硬氣上冲咽

胃中痞硬氣上衝咽不得息者瓜蒂散若心下痞鞭脇痛

服瀉心痞不解

氣上衝咽眩冒者成痿 方論並見氣上冲心 本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口煩燥小便不利者五苓散主之

心下支結似痞發熱惡寒身痛表症未解若心下支結妨悶者柴胡桂枝湯也

心下滿似痞手足冷心下滿似痞而手足厥冷若脈乍結乍緊心煩飢不欲食者瓜蒂散若脈沉細頭汗惡寒大便鞭者小柴胡湯

診

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足溫易愈

脈浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗屬腑者不令溲數溲數則大便鞭汗多則熱愈甚汗少則便難若脈遲尚未可攻陽明痞胃實心下硬滿者不可攻之

胃實

痞續法

虛滯

活傷寒本無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸最良審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙綠桔梗枳殼行氣先用之無不驗也

桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗

枳殼麩炒去穰各二兩

右咬咀以水二盞煎至一盞去渣分二服

煩

汗吐下後悞悞虛煩

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中悞悞

梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔

者梔子生薑豉湯主之陽明病下之其外有熱手足溫

不結胃心下悞悞飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

陽明病脈浮緊若下之則胃中空虛客氣動膈心中悞

懷舌上白胎者宜梔子豉湯論見下利後煩按之心下濡者為虛煩也宜梔

梔子豉湯

肥梔子四箇香豉半兩

右水二盞先煎梔子一盞納豉同煎取七分去渣溫服得快吐止後服

梔子甘草豉湯於梔子豉湯中加甘草半兩餘依前法得吐止服 梔子生薑豉湯於梔子豉湯中加生薑一兩二錢餘依前法得吐止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

梔子四兩乾薑半兩

右二味以水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止後

服

發汗吐下後心中懊憹而煩若無燥屎大便爽者此條梔子豉等湯也若有燥屎不大便者後條小承氣湯也

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

陽明病下之心下懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯方見陽明

熱胃實不大便心煩若吐下後者此條大小承氣湯也若不吐不下者調胃承氣也

許有人病傷寒八九日身熱無汗時時譫語時因下後大便不通三日矣非躁非煩非寒非痛終夜不得臥但心中無曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者未知是何症予診之曰此懊憹怫鬱二症俱作也胃中有燥屎者服承氣

胃實而煩

熱

方見陽明

湯下燥屎二十枚得利而解仲景云陽明病下之心中懊
懣微煩胃中有燥屎者可攻又云小便不利大便乍難乍
易時有微熱怫鬱不臥者有燥屎也承氣湯主之素問云
胃不和則臥不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大
便堅者必譫語此所以有時發譫語也非煩非躁非寒非
痛所以心中懊懣也聲如歎息而發一聲所謂外氣怫鬱
也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也

不得眠而煩論見不
得眠

胃滿而
煩

胃滿而煩若不經汗兼往來寒熱者小柴胡湯方論見往
來寒熱

兼下利咽痛者猪膚湯方論見
下利若汗下後往來寒熱者

柴胡桂枝薑湯方論見往
來寒熱兼身重不可轉側者柴胡龍

骨牡礪湯方論
見驚

胃中窒
而煩

發汗若下之而煩熱胃中窒者梔子豉湯主之

心下滿
而煩

心下鞭滿而煩若滿而不痛腹中雷鳴下利者甘草瀉心

湯 脇痛氣衝咽胃眩者成痿方論
見痿若滿痛下利不止

水漿不下者併病方論
見痞

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者宜

梔子厚朴湯

梔子去殼
四兩

厚朴薑製
一兩

枳實

切一
枚

已上三味用水一盞半煎取八分去渣溫服得吐者止

後服

腹滿而
煩

腹滿而煩若有燥屎者前條大承氣湯也若大便澹胃痛

欲吐先此時極吐下者調胃承氣湯也論見
嘔

吐後火
後煩

太陽病吐之但太陽當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為

吐之內煩也脈之微數不可灸灸則煩逆論見
大法

嘔時煩
鬱

嘔時鬱鬱微煩若與小柴胡湯嘔不止者大柴胡湯也若

脈浮數而煩
極吐下後胃滿便溏腹痛者調胃承氣湯也
病欲解者必當先煩乃有汗而解論見大法 太陽病初服桂

枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈 傷寒發熱汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯

脈平後煩者損穀
病人脈已解而日暮微煩以病新瘥人強與穀脾胃氣尚

弱不能消穀故令微熱煩損穀則愈 吐利汗後脈平小煩者以胃虛不勝穀氣也論見吐利

先煩後悸為熱
心悸而煩若少陽汗後譫語胃不和煩悸者活人用調胃承氣湯論見吐利

先悸後煩為虛
若二三日心中悸而煩者宜小建中湯論見悸 心煩而渴

但欲寐而煩
少陰病但欲寐而煩若自利而渴小便白者活人用四逆

下利厥逆而煩
湯論見欲寐 若與白通湯後下利不止厥逆無脈乾嘔者白通湯加猪

膽汁 若惡寒身倦時煩欲去衣者可治也論見但欲寐

手足厥冷而煩若脈乍結乍緊及心中滿飢不能食者宜瓜蒂散吐之

診 若脈緊至七八日自利脈緊變暴微手足反溫者欲解也方論並見下利 若下利無脈乾嘔者白通湯加猪膽汁也論見下利

煩躁有表証發熱惡寒體痛脈浮緊者大青龍湯也方論見發熱

若發汗不徹太陽証不罷其人面赤躁煩短氣者更發汗

則愈論見短氣

煩躁無
表証宜
下宜溫

得病二三日脈弱無太陽柴胡症煩躁心下鞅至四五日
雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承
氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭
鞅後必澹未定成鞅攻之必澹須小便利屎定鞅乃可攻
之宜大承氣湯王註云無太陽証為無表証也煩躁不
大便續臍痛發作有時者有燥屎也 下之後復發汗日
夜煩躁不得安眠時安靜不嘔則渴無表証脈沉微身無
大熱者宜

乾薑附子湯

乾薑兩

附子生用一枚

右二味以水三升煮取一升去查頓服

海服薑附湯有二法一法當熱服手少陰心也水包火熱
服以接心火身表寒感外火少也寒從外生熱從內消譬

如凍死寒在外也一法當寒服足少陰腎也寒邪入水冷
服以類腎水身表微熱內水多也熱從外生寒從內消譬
如飲冷寒在內也

發汗若下之病仍不解煩躁者宜

茯苓四逆湯

茯苓兩

人參六錢

附子

一枚生用去皮臍作八片只用二片

甘草二錢

乾薑各二錢

右剉如麻豆大作一服水一盞半煎至八分去查溫服

煩躁心
下鞅

煩躁心下鞅若未曾下者即前條無太陽柴胡症以小承
氣少少微和之也若已曾下心下鞅痛短氣躁煩者大陷

胃也若結胃証悉具煩躁者死也方論見結胃

外逆煩
躁

火逆下之因燒鍼煩躁者宜

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝半兩 甘草炙 牡蠣炙 龍骨各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

太陽病以火熏之不得汗其人必躁如不解必清血名為火邪

太陽病火熨其背大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄下利者欲解也論見諸語

煩躁厥逆若吐利者吳茱萸湯也論見吐利 若不煩而躁四逆脈不至死也論見厥 不得臥者死也論見

利下 成所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁而迤邐復煩者也從煩至躁為熱未有不漸煩而躁者也先躁後煩謂怫怫然更作燥悶此為陰盛隔陽也雖大躁

欲於泥水中臥但飲水不得入口是也此氣欲脫而爭聲如燈將滅而暴明也蓋內熱曰煩謂心中鬱煩也外熱曰躁謂氣外熱躁也內熱為有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不可治也 臟厥虵厥煩躁方論見厥 躁無暫定而厥者為臟厥靜而復煩吐舌而厥者為虵厥烏梅丸主之方論見厥 熱少厥微不欲食煩躁數日小便白者熱除也若欲食者愈若厥而嘔胃腸煩滿者便血論見厥 少陰病但欲寐不煩至五六日變自利煩躁不得臥者死論見欲寐

煩躁續法

煩躁不飲水為陰盛隔陽 活病人身冷脈沉細疾煩躁而不飲水者陰盛隔陽也宜服霹靂散須臾躁止得睡汗出即瘥火熾散丹砂丸並主之丹砂丸方見活人書

霹靂散治陰盛隔陽煩燥不飲水

附子一枚炮熟取出用冷灰挹

右為細末分作二服水二盞煎至六分臨熟入蜜半匙

放溫或冷服之須臾躁止得睡汗出即瘥

煩躁渴為土熱下寒海已寒丸此丸不僭上陽生於下治陰症服四逆輩胃中發躁而渴者或數日大便秘小便澁亦服此丸上不躁大小便自利

肉桂各五錢 良薑 烏頭炮各七錢

附子炮 乾薑炮 芍藥 茴香炒各一兩

右等分為細末糊為丸如桐子大溫酒下空心服五七十九丸八九十九丸亦得酒醋為糊俱可

恒躁六脈沉伏為陰中伏陽全破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏方論見陰毒頃年鄉人李信道得疾六脈沉伏不見深按至骨則若有

力頭疼身溫煩躁指末皆冷胃中滿惡心更兩醫矣皆不識止用調氣藥予診之曰此陰中伏陽也仲景法中無此証世人患此者多若用熱藥以助之則為陰所隔絕不能導引真陽反生客熱用冷藥則所伏真火愈見消燬非其治也須用破散陰氣導達真火之藥使火升水降然後得汗而解矣予授此藥二百粒作一服冷鹽湯下不時煩躁狂熱手足躁擾其家大驚予曰俗所謂換陽也須臾稍定畧睡身已中汗自昏達旦方止身涼而病除矣

欬

表不解而效屬太陽傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎

或小便利少腹滿或喘者宜 小青龍湯

麻黃 芍藥各三錢 五味子兩半 乾薑

甘草

細辛

桂枝去皮

半夏各三錢

右咬咀每服五錢水盞半煎八分去渣溫服 若微利

者去麻黃加芫花如彈子大熬赤色 若渴者去半夏

加瓜蒌根三分 若噎者去麻黃加附子一錢五分炮

若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓一兩 若喘

者去麻黃加杏仁三分去皮尖

往來寒熱而效屬少陽

欬而往來寒熱胃滿心煩喜嘔者小柴胡去人參薑棗加

表解胃實而效屬陽明

欬而表解胃實屬陽明病若反無汗小便利而嘔手足厥

但欲寐而效下利屬少陰

者必頭痛若頭眩不惡寒能食者必咽痛論見胃實

欬而但欲寐屬少陰病若下利腹痛小便不利四肢重痛

者用真武湯加五味子細辛乾薑也 若下利六七日變

欬嘔渴不得眠者猪苓湯也 若下利譫語小便難者被

火氣劫也 若四逆者用四逆散加五味子乾薑也方論並見

傷寒欬逆上氣其脈散者死謂其形損故也 欬而失小

便者不可發汗汗出則四肢厥冷論見遺尿

欬續法

丹崇慶和尚因飽醉後發熱嗽而右脇痛渴不安眠

柴胡 黃芩 白朮 陳皮

桔梗 木通各二錢 人參 麻黃各一錢半

甘草三錢 右分三貼水煎服

雲傷寒汗後喘咳不止恐傳肺痿補肺散

人參兩一 五味子錢五 桑白皮兩二 欬冬花

蛤蚧對一

右為細末每服五錢沸湯一盞調服

肺虛氣 乏宜補

內傷外感補而散之

肺虛氣 乏宜補

傷寒汗下後咳嗽肺虛聲音嘶敗者宜

阿膠散

薯蕷

阿膠炒

五味子

麥門冬法

白朮

各一兩

乾薑炮

桂枝各二錢

杏仁去皮尖

右剉細末每服七錢水二盞入烏梅肉一錢同煎服

肺實氣泄宜散

傷寒汗下後喘咳煩躁氣滯澁邪氣逆者用

桔梗湯

桔梗

桑白皮各一兩

貝母

訶黎勒各五錢

右爲細末每服五錢入五味子烏梅肉各一錢水二盞

同煎服

小便不利

小便不利表不解

若乾嘔發熱而欬少腹滿者小青龍湯

解

去麻黃加茯苓也

方論

若汗下後仍項強發熱心下滿

痛者桂枝去桂加茯苓白朮

方論見項強

小便不利胃脇滿身重

小便不利胃脇滿若往來寒熱未汗下者小柴胡去黃芩

加茯苓汗下後者加柴胡桂薑

方論見往來寒熱

若煩驚譫語

身重不可轉側者柴胡湯加龍骨牡蠣也

論見不得臥

小便不利大便難

小便不利大便難乍難乍易喘急不能臥者大承氣湯

條

小便不利而渴

小便不利而渴若脈浮數發熱者五苓散加猪苓湯

小便不利頭汗

若頭汗者柴胡桂薑湯加茵陳蒿湯

方論見發黃

小便不利關節疼

小便不利關節疼痛若痛不得屈伸汗出惡風身腫者屬

風濕宜甘草附子湯若脈沉緩大便反快者屬濕痺活人

用五苓散也

方論見身痛

小便不利頭汗滿

小便不利頭汗若脇滿者柴胡薑桂也

方論見往來寒熱

小便不利身發黃方論俱見發黃

若發黃者茵陳蒿湯也下後無他症勿治大便後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便

利必自愈活人云若大渴引飲須利之

小便不利但欲寐者屬少陰若腹滿下利膿血者用桃花

湯腹痛下利四肢重痛者用真武湯也方論見下利若四

逆者用四逆散加茯苓方論見但欲寐

陽明病小便不利濺然汗出者若欲食者愈不能食者欲

作痼瘕痼瘕者寒氣積結也

小便不利續法

陰症治法活陰症小便不利手足厥冷脈微細者不宜服利小便冷

滑藥但服返陰丹并取臍下石門穴灸之方論見陰毒返陰丹

針灸集傷寒小便不通取陰谷 陰陵泉

傷寒後小便不利見小便不通門

小便難

汗後小便難汗後小便難若太陽發汗遂漏不止者則惡風小便難四

肢難屈伸宜桂枝附子湯也方論自汗若太陽症中風以火

劫發汗則邪風被火熱血氣流溢身黃陽盛陰虛欲衄小

便難也方論見頭汗若少陰以火劫汗者則欬而下利譫語

小便難也論見脇痛

下後小便難下後小便難有二若脈遲浮弱惡風寒下之者則脇滿身

黃項強小便難也見脇痛若陽明胃實發熱惡寒脈浮緊

下之者則腹滿小便難也論見胃實

脇痛身黃小便難脇痛身黃小便難若陽明胃實未下者宜小柴胡湯若下

後不食項強者忌柴胡論見脇痛

尸厥鬱冒

少陰脈不至尸少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胃膈榮氣反

厥

聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門

太陽汗下後鬱

太陽病下之不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因至胃

胃

家汗出自愈所以然者汗出表和故也得裏和然後復

下之

得裏和三字中間必有衍文脫簡得字當字若字之誤裏和當是裏未和蓋脫一未字也

下利清穀發胃

下利清穀脈沉遲其人面赤身有微熱者必鬱胃汗出解

論見下利

喘秘鬱

小便不利大便乍難乍易喘胃不能臥者大承氣湯論見下利

胃乘寒鬱

諸乘寒者則為厥鬱胃不仁口急不能言戰慄也論見大法

心下硬眩胃

眩胃心下硬若不汗下吐而項強者為併病宜刺大椎肺

膈肝膈

論見項強

診

若汗下吐後脈微氣上衝咽者成痿論見氣上冲少陰病但

欲寐下利止而眩暈者死論見欲寐

尸厥鬱胃續法

熱

海傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二

句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則咽不與則不思六

脈細數而不洪大心下無痞腹中不滿大小便如常或傳

至十日已來形貌如醉醫見神昏不已多用大承氣湯下

之則誤矣蓋不知此熱傳手少陰心經也然又未知自何

經而來答曰本太陽經傷風風為陽邪傷衛陰血自燥熱

畜膀胱壬病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火自上迫

熏肺所以神昏也蓋肺為清肅之臟內有火邪故令神昏

宜梔子黃芩黃連湯若脈在丙者導赤散脈在丁者瀉心

湯若誤用涼膈散此乃氣中之血藥也如右手寸脈沉滑

有力者則可用之或用犀角地黃湯近於是已本方所說

若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中

熱藥若脈浮沉俱有力者是丙丁俱有熱可以導赤散瀉
心湯各半服之則宜矣此症膀胱傳丙足傳手經者下傳
上也丙傳丁者表傳裏也壬傳丁者良之離也越經傳者
又為腑傳臟也活人云傷寒只傳足經不傳手經者此言
不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或
止傳一經或間傳三經不可一途取之但視其脈與外證
治之此活法也與食則咽者邪不在胃也不與則不思者
以其神昏故也邪熱既不在裏誤用承氣下之其死也必
矣脈在丙者脈浮也脈在丁者脈沉也
脈在丙丁俱有熱者浮沉俱有力也

噫

濕痰

噫而心下痞硬不利者旋覆代赭湯若下利者生薑瀉心

湯也

方論
見痞

噫續法

水火相
傳噫氣

雲傷寒噫氣者何氣使然答曰胃中氣不交故也少陰經
至胃中交於厥陰水火相傳而有聲故噫氣也宜
如聖加枳實湯

甘草

桔梗各五錢

枳實炒三錢

右剉細每服五錢入五味子半錢水煎服

汗下後
喘而噫
氣

傷寒汗下後喘而噫氣者宜如聖加人參藿香杏仁湯各
分右剉細每服五錢水煎服

噦

汗下吐
後噦

傷寒大吐大下後極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復
與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

飲水而
噦

胃中虛冷不能食者飲水則噦與小承氣湯入腹中不轉
矢氣者不可攻之攻之必脹滿不食與水則噦論見
潮熱
本渴而飲水嘔者噦食穀者噦論見
脇痛 陽明病胃實不能

食者攻其熱必噦論實 濕家頭汗出背強惡寒欲覆被

向火者下之早則噦論實

火劫汗 太陽病以火劫發汗血氣流溢身黃欲衄頭汗腹滿譫語

甚者至噦拾衣摸床小便利者可治論實

噦滿下利 傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

診 陽明胃實脈浮浮大短氣腹滿脇痛嗜臥身黃小便難有

潮熱時時噦脈浮者小柴胡若不尿腹滿加噦者不治論實

實

噦續法

寒熱異 活噦胃寒所生橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退

陰散主之若服藥不瘥者灸乳直下一指許三壯若婦人

別屈乳頭下盡處是穴亦有陽症者小柴胡湯橘皮竹茹

湯方見雜病歲

橘皮乾薑湯

橘皮

通草

乾薑

桂心

甘草各三兩

人參二兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去渣溫服日三

羌活附子散方見雜病歲

半夏生薑湯治噦欲死

半夏一兩

生薑二兩切

右水二盞煎至八分去渣溫服

胃熱失 海傷寒欬逆脈散死 仲景之言不虛偽 大抵原因失

下生 欬逆喉中陰不內 便軟惟宜用瀉心 便硬尤

宜大承氣 二藥神工作者誰 東垣潔古為良劑

潔欬逆者火熱奔急上行而肺陰不內何其當哉故便秘

者宜大承氣下之便軟者瀉心湯主之

海少陰欬逆者此失下也陰消將盡陽逆上行使陰不內

也然陰既盡陽亦將盡也吸入腎與肝陽逆上行陰入不
 內故為陽極脈微將盡者不宜下宜服瀉心湯養陰退陽
 而已如不用瀉心湯涼膈散去硝黃清肺散亦可若脈左
 浮右沉實非表也裏極則反出於表也何以然欬逆舌強
 右脈實者知少陰裏也飲水過多心下痞而渴逆者五苓
 散主之別無惡候是也惡候生或兼以舌攣語言不正而
 反昏冒與咽痛者少陰也速下之宜大承氣湯也何以脈
 浮為表浮之實大沉之損小是為表也浮之實大沉之亦
 然即非表也邪入已深矣內熱當沉反浮陽極復之表也
 陰症者內已伏陰陰氣太甚腎水擅權肝氣不生胃火已
 病丁火又消所以遊行相火寒邪迫而萃集於胃中亦欲
 盡也故令人發熱大渴引飲欲去蓋覆病人獨覺熱他人
 按執之身體肌肉骨髓血脈俱寒此火即無根之火也故

身寒大渴不欲近衣為陰

用丁香乾薑之類熱藥溫胃其火自下

裏寒 勻氣散

川烏頭 大者三箇炮裂去皮臍

右為細末每服三錢用黑豆二十一粒砂糖同泡湯調

乘熱細細飲之

本治陰毒吃逆方

川烏頭 乾薑 附子 巴上俱炮 肉桂

芍藥 半夏 炙甘草 吳茱萸

陳皮 各等分 大黃

右為細末每服一錢水一盞生薑三五片煎至七分去

查溫服

肉苳蔻湯治傷寒汗後吃逆噫氣

肉苳蔻 筒 石蓮肉 炒 茴香 各一兩 人參

丁香各半

枇杷葉

五片拭去毛炙

右剉細用水四盞生薑十片煎二盞去查空心溫服分二服

表寒
良薑湯

橘皮

良薑

桂枝

當歸各一兩

麻黃兩半

杏仁二十箇

甘草兩半

檳榔三箇另為末

右咬咀用水四盞薑十片棗三枚同煎至二盞去查下檳榔末再煎三沸通口服一盞未已再服厖老云傷寒吃逆不止是陰陽氣升降欲作汗升之不下故胃氣上逆為吃逆無休止宜服此方

無汗

無汗發熱惡寒脈浮屬太陽

太陽發熱惡風寒體痛脈浮緊無汗其人若喘者麻黃湯也若煩躁者大青龍湯也若項背強者葛根湯也方論見發

執

若小便少氣衝胃口禁者為剛症亦葛根湯也

論見症

若自衄者必自愈論見

無汗不
大便屬
陽明

陽明病胃家實法當多汗若反無汗者有四證脈浮而喘者邪尚在表宜麻黃汗之身如虫行痒者久虛宜建中之類小便利而厥者寒邪宜溫之小便不利發黃者瘀熱宜茵陳利之也論見胃實

無汗身
痒為虛

無汗身痒其人若脈微惡寒面反有熱色者桂枝麻黃各

半湯也

方論見發熱

若脈浮遲面赤戰惕發熱者遲為無陽

不能作汗也

論見面赤

若陽明胃實身如虫行者久虛也論見

無汗小便不利其人若身黃頭汗渴飲水漿或悞懷者宜

茵陳湯

方論見發熱

若身黃脇痛鼻乾嗜臥有潮熱脈浮者

柴胡湯

方論見胃實

若項強發熱心下滿痛桂枝去桂加茯苓

白木也方論見

無汗禁忌若浮脈身痛者忌桂枝論見脈浮發熱表不

解者忌白虎湯論見若少陰欲寐但厥者忌強發汗必動

其血也論見凡發汗如服一劑病症尤在當再作本湯

與之至有不肯汗出者服三劑乃解若汗不出者死病也

論見

無汗續法

傷寒在表發熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺寸脈俱浮

合谷五分候遍身汗出即復溜瀉

又法 手陽明商丘 合谷 手太陽腕骨 陽谷

足少陽俠谿 足陽明厲兌 手厥陰勞宮 皆隨經辨

脈刺之 又十二經榮皆可刺

傷寒發汗不出 風池 俠溪 魚際散脈中二經

渠二分 內庭應時

瘧狀

太陽病如瘧狀一日二三度發其人若脈微緩不嘔清便

者欲愈也若脈微惡寒面有熱色身痒者桂枝麻黃各半

也方論見服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前

法若形如瘧日再發者汗出必解宜

桂枝二麻黃一湯

桂枝八錢 芍藥五錢 麻黃三錢 大棗二

生薑五錢 杏仁去皮尖 甘草半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去渣溫服

病人煩熱汗出解又如瘧狀日晡所發者屬陽明也脈實

者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂

枝湯 婦人寒熱經水適斷者為熱入血室其血必結故

日二三發者宜桂麻各半湯

日晡發者宜下和宜汗宜

使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之論見婦人傷寒

頭汗

小便不利頭汗小便不利其人若胸脇滿往來寒熱者柴胡桂薑也

方論見往來寒熱若發黃渴飲水漿者宜茵陳湯方論見發黃

胃實頭汗陽明胃實頭汗其人若下血譫語者為熱入血室宜刺期

門論見若下後手足溫不結胃心中懊懣飢不欲食者

宜梔子豉湯方論見煩若被火額上汗出小便不利者必發

黃也方見胃實

心下滿頭汗心下滿其人若脈沉細微惡寒手足冷口不欲食大

便鞭者小柴胡湯論見厥往來寒熱

若水結胃無大熱者大陷胃湯孫兆改用半夏茯苓湯

診太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常

度兩陽相薰灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰

陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口

乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸

牀小便利者可治 關格不通不得尿頭無汗者可治有

汗者死 濕家關節疼痛下之額上汗出微喘小便利者

死下利不止者亦死 濕家頭汗出欲被覆向火者若下

之早則噦胃滿小便不利舌上白胎也論見身痛

頭汗續法

診孫凡水結胃脇間頭必有汗治以半夏茯苓湯

活病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭

汗出者五臟乾枯胞中空虛津液少也慎不可下下之謂

之重虛

成頭者謂之會邪搏諸陽津液上溱則汗見於頭也

海頭汗出劑頸而還血証也額上偏多者屬心部為血証

也獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

舌白胎

半表半裏

舌上白胎若陽明胃實脇下滿不大便而嘔者小柴胡湯

論見胃實 若下後心中懊懣者梔子豉湯方論見煩 若下後噦

而胃滿小便不利者丹田有熱胸中有寒也論見牙疼

診忌 脈陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥倦臥足冷鼻中涕出

舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人微發熱手足溫者

此為欲解或到八日已上反大熱者此為難治設使惡寒

者必欲嘔也腹內痛者必欲利也海藏云惡寒必欲嘔者小柴胡湯腹中痛者理

中 臟結如結胃狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小

細沉緊舌上白胎滑者難治也若無陽症不往來寒熱其

人反靜者不可攻也論見臟結

舌胎續法

舌白胎邪淺黃黑者邪深

成舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後

舌上有膜白滑如胎甚者或燥澀黃黑是數者熱氣淺深

之故也邪氣在表者舌上即無胎及邪氣傳裏津液結搏

則舌上生胎矣寒邪初傳未全成熟或在半表或在半裏

或邪氣客於胃中者皆舌上白胎而滑也經曰舌上如胎

者以丹田有熱胃上有寒邪初傳入裏也陽明病脇下硬

滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪在半表

半裏也太陽病若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣

舌上胎者梔子豉湯主之是邪客於胃中也若病在臟宜

若可下如舌上滑胎者則不可攻是邪未全成熟猶帶表

寒故也

濇者白虎

及其邪傳為熱則其舌上之胎不滑而澀也經曰傷寒七

八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥

而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之是熱耗津液而滑者已乾也

若熱聚於胃則為之舌黃是熱已深矣金匱要畧曰舌黃未下者下之黃自去

治黑者不

若舌上黑色者又為熱之極也鍼經曰熱病口乾舌黑者死以心為君主之官開竅於舌黑為腎色見於心部心部者火也腎者水也水之邪熱已極鬼賊相刑故知必死也

雅方

垣下後病嗽加五味子麥門冬如舌上有滑胎者是胃中有寒勿用之曾有微寒加辛熱之劑立效 舌燥澀如楊

梅刺者用生薑切厚片蘸蜜於舌上搯之其刺立消神效

無薄苛蜜治舌上白胎乾澀語不真先以生薑厚片蘸

蜜水揩洗有用薄荷自然汁與白蜜等分調勻傳之良

動氣

甚意

動氣者為築築然動跳於腹者是也 動氣在右不可

發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水 活人云先服五苓散三服次服竹葉

湯 動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

活人云先服防風白朮牡蠣汗止次服建中湯方見自汗 動氣在上不可發汗發汗

則氣上衝正在心端 活人云宜服李根湯方見氣上衝 動氣在下不可

發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目暈惡寒食則反

吐穀不能進 活人云先服大橘皮湯吐止後服小建中湯 動氣在右不可下

下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也 動氣在左不

可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖身有熱臥則

欲蹇 動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱

汗自泄欲得水自灌 動氣在下不可下下之則腹脹滿

卒起頭眩食則下清穀心下痞也

動氣續法

滯氣

雲傷寒汗下後臍左有動氣者宜

防葵散

防葵一兩

木香不見

柴胡

黃芩各半兩

右劉為細末每服五錢水煎服

傷寒汗下後臍上有動氣者宜

枳殼散

枳殼麩炒五錢

赤茯苓

當歸

三稜炮各一兩

木香

訶黎勒各五錢

右為末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍右有動氣者宜

前胡散

前胡

赤茯苓

大腹皮

人參各五錢

木香

檳榔

大黃各三錢

右為細末每服五錢沸湯點服

傷寒汗下後臍下有動氣者宜

茯苓散

赤茯苓一兩

檳榔三錢

桂心

大腹皮

川茴香炮

良薑各五錢

右為細末每服五錢沸湯點服

如久不治傳為積熱治之難痊不可汗下也

鼻衄

表

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

活人云衄後脈浮者宜麻

黃湯衄後脈已微皆不可行麻黃湯宜黃芩芍藥湯

太陽病脈浮緊無汗發熱身

疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已微除其

人發煩目瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃

湯主之不大便頭痛有熱若小便赤者承氣湯也若小

便清而衄者桂枝湯也論見發汗 太陽病脈浮緊發熱無汗

而衄者愈也論見發熱

虛

太陽病以火劫發汗血氣流溢失其常度陽盛則欲衄陰

虛則小便難論見頭汗 少陰病但厥無汗而強發之必動其

血或從口鼻出或從目中出者難治論見欲寐 動氣發汗則

衄而渴飲水就吐論見動氣

診忌

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄 陽明胃實口燥但欲

漱水不咽者必衄也 衄家不可發汗汗出必額上陷脈

急緊直視不能瞬不得眠衄忌發汗者為無脈若浮緊身疼發熱惡寒之症宜發之

鼻衄續法

海仲景言衄不可發汗者蓋為脈微也若浮緊者麻黃湯

浮緩者桂枝湯脈已微二藥不可用犀角地黄湯主之景仲

云衄家不可發汗汗出必額上陷脈緊直視不能瞬不得眠又云亡血不可發其表汗出即寒慄而振此二說皆為

脈微不可汗也若脈浮緊及得緩者皆當發之是也

活傷寒衄血脈已微者黃芩芍藥湯犀角地黄湯主之

犀角地黄湯治傷寒應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐

血面黃大便黑此方主消化瘀血

芍藥

生地

牡丹皮

犀角

右咬咀每服五錢水一盞半煎取一盞有熱如狂者加黃芩一兩其人脈大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩

用黃芩

茅花湯治鼻衄不止用茅花尖一把以水三盞濃煎汁一

盞分二服即瘥無花以根代之

若衄而渴者心煩飲則吐水先服五苓散次服竹葉湯

本治傷寒衄血滑石丸

滑石末不以多少飯丸如桐子大每服十九微嚼破新

水咽下立止用藥末一錢飯少許同嚼下亦得老幼皆可服湯晦叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不以多少乃止宜服溫和藥以調其衛纔見鮮血急以此藥治之

下血

少腹結急下血

傷寒下血若太陽病外已解但少腹急結者桃仁承氣湯也

方論見畜血

胃實譫語下血

若陽明胃實譫語者宜刺期門穴

論見譫語

汗下後下血

太陽病以火熏汗不得汗其人必躁而滑血

論見躁

淋家

不可發汗發汗則便血 太陽病下之其脈浮滑者必下

血論見大法

診

少陰病但欲寐一身手足盡熱者必便血也 傷寒熱少厥微不欲食煩躁數日小便利色白若欲食者愈若嘔而

胃脘煩滿者必便血也

唾血

咽痛吐血

咽痛吐血若面赤斑斑如錦紋者為陽毒宜升麻鱗甲湯

方論見陽毒

下後厥逆吐血

若下後利不止手足厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯

見下利

後後汗後吐血

脈浮熱甚反灸之必咽燥唾血

論見大法

服桂枝湯吐者必

吐膿血

論見吐

畜血

太陽畜血

身黃如狂屎黑喜忘者為畜血 太陽病表証在而發熱

惡寒脈反沉結而身黃發狂少腹硬滿者若小便不利為

無血也小便自利血證諦也宜以抵當湯主之

論見發熱

抵當湯

水蛭十箇去子 蜜虫十枚去足 大黃一兩湯浸去皮 桃仁七枚去

右咬咀作一服水一盞煎七分去查温服

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不用餘藥宜

抵當丸

水蛭五枚 蜜虫五枚去足 桃仁六枚 大黃三錢

右為末煉蜜和作一丸以水一盞煎至七分頓服醉時

當下血不下再服

太陽病不解熱結膀胱其人似狂若血自下者病愈其外未解者尚未可攻當先解外外解但小腹急結者宜攻之

桃仁承氣湯王海藏方有薑七片桂硝各三錢

桃仁十二枚去皮尖 大黃一兩 甘草炙

桂枝 芒硝各半兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去查入硝化開食

後服

陽明畜血 陽明症胃家實喜忘大便黑色雖硬反易者有畜血宜抵

當湯論見胃實

海初便褐色者重再便深褐色者愈重三便黑色者為尤

重色變者以其火燥也如羊血在日色中須更變褐色久

則漸變而為黑色即此意也當詳察之

詐血在上則喜忘在下則發狂

下後畜血 病人無表裏症發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已

下脈不解胃熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血

宜抵當湯若脈數不解血下不止必協熱而便膿血也

成當不大便六七日之際無喜忘如狂之症又無少腹鞭

滿之候何以知其有畜血蓋以其脈浮數故也浮則熱客

於氣數則熱客於血下後浮數俱去則病已若下後數去而浮仍在則榮血中熱去而衛氣中熱在為邪氣獨留心下善飢邪熱不殺穀潮熱反渴也若下後浮去而數不解則衛氣中熱去而榮血中熱在血熱合併迫血下行胃虛協熱消穀善飢血至下焦若下不止則血得以泄必膿血也若不大便六七日則血不得出泄必畜在下焦為瘀血故須以抵當湯下之

口渴漱水不欲咽者瘀血在胸

病者胃滿痞痿舌青口燥但漱水不欲下咽無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血

海云漱水不咽胸滿心下手不可近

者挑仁承氣湯主之

病者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是瘀血也當下之

衄血唾血畜血續法

血分上中下三部

海血症古人用藥雖有輕重之殊而無上下之別今分作上中下三等以衄血嘔血唾血吐血為上部血結胃中為中部畜血下焦為下部夫既有三部之分故藥亦當隨其輕重也

上部血

汗多為衄血脈浮灸之咽燥為唾血當汗不汗熱入於裏者為嘔血吐血此在上也犀角地黃湯主之涼膈散加生地黃亦可然衄唾嘔吐俱在上亦當以輕重分之大凡血證皆不飲水惟氣證則飲之宜詳之此證乃足太陰所主脾所不暴越而上行所以有吐血嘔血之候也實者犀角地黃湯虛者黃芩芍藥湯凡病嘔吐者以脾所主故咸用芍藥主之是知太陰藥也

中部血

血結胃中 頭痛身痛漱水不咽者衄無熱胃滿漱水不欲咽者喜忘昏迷其人如狂心下手不可近者血在中也

桃仁承氣湯主之

下部血

畜血下焦 其人發狂小腹滿硬小便利大便反黑及
臍下疼者抵當湯丸主之如狂者在中發狂者在下

血分輕重異治

抵當湯丸藥味同劑如何是二法蓋喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿硬小便利者輕也故有湯丸之別
桃仁大黃等分水蛭虫重多者作湯三之二者作丸丸之名取其數少而緩也故湯用煎服一升丸止服七合也

活病人無表症不發寒熱唇燥但欲漱水不欲入咽其脈微而沉小腹硬滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也大抵傷寒當汗不汗裏熱畜化為血其人喜忘而如狂血上逆則喜忘血下畜則如狂輕者犀角地黄湯桃仁承氣湯甚者抵當湯丸須取盡黑物為效按太陽病畜血今云無表証者但說得陽明畜血為未備

海喜忘發狂身黃屎黑者疾之甚也但小腹滿小便利者輕也

生地黄丸病人七八日後兩手脈沉細微膚冷臍下滿或狂或躁大便實而色黑小便自利者此畜血証也若老幼氣虛弱者宜此方主之

生地黄

自然汁一升如無生地黃只用生乾地黃二兩

乾漆半兩炒烟盡

生藕

自然汁半升如無藕用刺薊汁一升半

藍葉一握切細乾者用末半升

虫虫

二十箇去翅足楚內炒黃

水蛭十箇炒

大黃一兩剉如荳大

桃仁

研碎半兩

右一處入水三升同慢火熬及二升放冷分二服先投一服至半日許血未下再投之此地黃湯比抵當湯丸其勢甚輕如無地黄與藕汁升數添水同煎抵當丸恐用之太過不止損血故以此湯主之

吐血續法

表虛脈浮緊者麻黃去芪

垣治一貧士病脾胃虛與補劑藥愈後繼而居曠室臥熱炕咳而吐血數次予謂此久虛弱外有寒形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱蓋冬居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口因思仲景治傷寒脈浮緊當以麻黃湯發汗而不與之遂成衄血却與麻黃湯立愈與此甚同因與

麻黃人參芍藥湯

麻黃一錢去外寒

桂枝半錢補表虛

白芍藥一錢

黃芪一錢實表益衛

甘草炙一錢補脾

五味五粒安肺氣

門冬三分保肺氣

人參三分益氣

氣不足而實其表

當歸五分和血養血

右咬咀作一服水三盞煎麻黃一味令沸去沫至二盞

入餘藥同煎至一盞去查熱服臨臥一服愈觀此一方足以為萬世模範也蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服之但凡虛人合用仲景方者皆當以此為則也

熱毒入裏者抵當桃仁

傷寒吐血諸陽受邪初熱在表應發汗熱毒入經結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當湯也輕者桃仁承氣湯無服犀角地黃湯三黃丸

短氣

短氣表

短氣骨節痛不得屈伸汗出小便不利惡風身腫者為風濕宜甘草附子湯方論見體痛短氣腹滿脇痛其人若脈弦

浮大外不解無汗嗜臥身黃小便難有潮熱者小柴胡湯

也論見胃實方見性來寒熱

短氣裏

若表未解手足濇然汗出或有潮熱者宜大承氣湯方論見潮熱若表解心下痞鞭乾嘔短氣者宜十棗湯方論見上條

短氣汗不徹

短氣煩躁若發汗不徹續微汗出不惡寒表證不罷面赤者為併病更發汗則愈論見面赤

短氣心硬痛

若下後心中懊懣心下硬痛者用大陷胃湯論見結胃跌陽脈微而緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣坐而伏者短氣也論見大法

心痛

下後心中結痛

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未全解也梔子豉湯主之

脈弦脇及心痛

陽明病胃實脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾無汗嗜臥身黃小便難有潮熱時時噦者小柴胡湯論見胃實方見往來

熱寒

心痛續法

針灸

摘傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛不可忍宜灸中脘氣

海二穴如小腹有氣上衝者宜灸天樞氣衝三里三陰

交如無此症只用前穴

除中

診

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死 眼睛不慧語言不出而穀食反多者此為除中口雖欲言舌不能語 凡手足厥冷而利不當食而食者恐為除中試與索餅食之發熱者除中不發熱者非也論見

厥門

下重

泄利下重

泄利下重若少陰症欲寐四逆者四逆湯加薤白散若熱者白頭翁湯方論見下利

脈浮誤灸下重

脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰已

下必重而痺名火逆也

脈遲浮弱誤下

脈遲浮弱惡風寒者表症醫反下之遂不食脇痛身黃項強小便難復與柴胡湯必下重論見脇痛

診下利脈沉弦者下重也論見下重

身熱惡寒身寒惡熱

診治

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也活人云先

以桂枝湯治寒次以小柴胡加桂以溫其表身大寒反不欲近衣者寒在皮

膚熱在骨髓也活人云先與白虎湯加人參除熱次以桂枝麻黃各半湯以解其外

續增瘧

表

射干湯治初秋暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏於內咳嗽曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如梗

射干一兩

半夏二兩

杏仁兩半去皮尖炒生薑炮二兩

甘草

紫苑各一兩

橘皮

肉桂

枳實各二兩

當歸

獨活

麻黃已上一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

續增斑

海陽症發斑有四有溫毒發斑有熱病發斑有時氣發斑

有傷寒發斑已上四斑活人有治法見後

斑斑如錦紋或發之四末或發之面部或發之背脊色紅

赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下早一則下晚乃外感

熱病而發也宜用玄參升麻湯白虎等藥王朝奉云赤斑出五死一生黑

斑出十死一生皆用白虎人參湯阿膠大青龍湯兼與紫雪散大妙可下者調胃承氣湯

活溫毒發斑者初春病人肌肉發斑癩疹如錦紋或咳心

悶但嘔者是也冬時觸冒寒毒至春始發初病在表或已

汗吐下而表証未罷毒氣未散以此發斑宜用黑膏主之

又有冬月溫煖人感垂戾之氣冬末即病至春或被積寒

陽斑如錦紋

斑至

有發

所折毒氣不得洩至天氣暄暖溫毒始發則肌肉斑疹如錦紋而咳心悶但嘔有清汁宜用葛根橘皮湯主之
黑膏方療溫毒發斑

生地半斤切碎 好豉升

右二味猪膚二斤合一處煎令三分減一絞去查用雄黃麝香如葶大為末同藥再煎服之其毒便從皮中出者則愈忌蕪蕪

葛根橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛癩疹如錦紋而咳心悶但嘔吐有清汁宜服此湯即止

葛根 橘皮 杏仁去皮炒 知母

黃芩 麻黃湯泡 甘草炙各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查溫服

熱病時氣斑無時發

熱病發癩與時氣發癩並同夫病人或未發汗或已經發汗而熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚所以發癩瘡癩疹如錦紋俗名謂之麩瘡素問謂之疹大抵發癩不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩更增癩爛也宜用玄參升麻湯大青四物湯猪膽雞子湯選用之玄參升麻湯治傷寒發汗吐下後毒氣不能散表虛裏實發熱於外故身發癩如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參 升麻 甘草炙各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去查熱服

大青四物湯治傷寒熱病十日已上發汗及吐利後熱不除身上斑出

大青兩 阿膠 甘草各二錢半 豆豉合

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞旋入膠再煎令
溶服

猪膽雞子湯治五六日斑出

猪膽三合

雞子一枚

苦酒三合

右三味合煎三沸強人盡服瘦人煎六七沸服之

陽毒癰
在面

陽毒升麻湯治癰出面方見
陽毒

海消毒飲子治癰

黍粘子六錢

荆芥

防風各二錢

甘草一錢

右咬咀水煎服

陰毒如
蚊咬狀

陰症發癰出胷背又出手足亦稀少而微紅者若作熱症

投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚於胷中上獨熏肺

傳於皮膚而為斑點但如蚊蚋蚤虱咬形狀而非錦紋也

宜調中溫胃加茴香芍藥以大建中陰毒升麻鱉甲湯之

類其斑自退可謂治本而不治標也

海藏云陽明發斑亦有紅點如斑出於皮

毛之間者宜白虎
瀉心等藥當審之

大建中湯

方見治
惡寒門

陰毒升麻鱉甲

湯治陰癰方見
陰毒

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絕厥

陰脈也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脈生

因渴私飲水一杯脈復退又見頭不舉目不開問之則犯

陽易若只與燒棍散則寒而不濟矣遂更用吳茱萸湯一

大服調燒棍散連進二服出大汗兩晝夜而愈

丹發癰似傷寒者痰熱之病發於外汗以散之下之非理

欲眠目不閉聲嗶為狐惑為齩

寘

狐惑之為病狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默然

欲眠目牽不得閉臥起不安虫蝕於喉咽為惑蝕於陰肛

為狐不欲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部

虫蝕下
為狐
為惑

則聲啞甘草瀉心湯主之方見 蝕於下部則咽乾苦參湯洗之 蝕於肛者雄黃散熏之用雄黃一味為末取二瓦合之燒向肛熏之

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽喉或從下焦蝕其肛陰蝕上為惑蝕下為狐狐惑病者猪苓散主之方未考究

病者脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眦一本眦有黃字黑若能食者膿已成也

赤荳當歸散主之方見下血

狐惑續法

濕痰 一婦人狐惑聲啞多眠目不閉惡聞食臭不省人事半月後又手足拘強脈數而微細先與竹瀝薑汁一盞服之忽胃中有汗腹鳴即目閉省人事遂用參朮歸陳入竹瀝薑汁飲之五六貼而愈

活狐惑傷寒與濕蘆皆重証初得狀如傷寒或因傷寒變成此疾大抵傷寒腹內熱食少腸胃空虛三虫行作求食蝕人五臟及下部為蠱虫病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠虫蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡虫蝕其臟下唇有瘡虫蝕其肛殺人甚急多因下痢而得治蠱桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散主之

治蠱桃仁湯

生艾

菴仁去皮尖炒

槐花子碎各

大棗十五箇

右水二盞煎至一盞半分三服

黃連犀角湯治傷寒及諸病之後內有蠱出下部者

黃連半

犀角一兩

烏梅七箇

沒藥一分

右水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃銳散治下部蠱瘡

雄黃

苦參

青箱子

黃連各二分

桃仁去皮尖一分

右為散以生艾搗汁為丸如棗核大綿裹納下部匾竹葉汁更嘉冬月無艾只用散裹納亦得

百合病

百脈一宗悉致其病

診

百合病論曰百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也人常默默然意欲食不能食意欲臥不能臥意欲行不能行或有時聞食臭或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥即劇吐利如有神靈者身形雖似和其人脈微數每渴時輒頭痛者六十日乃愈若渴時頭不痛漸然者四十日愈若渴時快然但頭眩者二十日愈體症

或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微

見者各隨其症治之

活人云此名百合傷寒多因傷寒虛勞大病之後不平後變成奇疾也

百合病發汗後宜服

百合知母湯

百合七枚

知母三兩切

右先將百合水洗浸一宿當白沫出去其水更以井水

二盞煎至一盞去查又將井水二盞另煎知母取一盞

去查和百合一盞同煎取一盞半分溫再服

百合病下後者宜用

滑石代赭湯

百合七箇

滑石三兩碎綿裹

代赭石如彈大一枚綿裹

右先將百合水洗淨浸一宿當白沫出水更以井水二升煎取一盞去查另用水二升煎滑石代赭石取一升

去查後合和同煎取一升半分溫服

百合病吐後宜用

百合雞子湯

百合七枚

雞子黃一枚

右先將百合作水浸一宿當白沫出去其水更以井水二升煎取一盞去查納雞子黃攪勻煎五分溫服

百合病不經吐下發汗病形如初者宜

百合地黄湯

百合七箇

生地黄汁一升

右水洗百合浸一宿當白沫出去水更以井水二升煎取一升去查納地黄汁煎取一升五分溫再服中病勿更服大便當如漆黑

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之用百合一升

以水一斗漬之一宿洗身已食煮餅勿以鹽豉食之

百合病渴不瘥者宜

括萎牡礪散

括萎根

牡礪各等分

右為末飲服方寸七日三服

百合病變發熱者一作發寒熱宜用

百合滑石散

百合一斤

滑石三兩

右為散飲服方寸七日三服當微利止服熱則除

宜忌 百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦為逆也

醫學綱目卷之三十二

醫學綱目卷之三十三

傷寒部

勞復門 陰陽易

仲景主於攻邪

大病瘥後勞復者枳實梔子豉湯主之

枳實

四枚炒

梔子

十四枚

豉

一兩

有食者大黃

右三味以清漿水二盞空煮退一盞內枳實梔子煮取

八分下豉更煮五六沸去渣溫服覆令取微汗若有宿

食內大黃量虛實加減

有熱者柴胡

傷寒瘥後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解之沉

實者以下解之

有水氣者滲之

大病瘥後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

牡蠣

澤瀉

蜀漆

洗去腥

商陸

海藻

括蔞根

葶藶

各等分

右為散水服方寸匕小便利止後服日二

胃有寒者溫之

大病瘥後喜睡久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜理中丸

氣逆欲吐者抑之

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

淡竹葉

二把

石膏

半斤

半夏

三兩

人參

三兩

麥門冬

四兩

甘草

一兩

嘔者加生姜

一兩

右咬咀每服五錢水一盞半入粳米百餘粒煮取八分

米熟湯成去查溫服

診

風家表解而不了了者十二日愈

勞復續法

後賢主於補虛

海大抵勞者動也動非一種有內外血氣之異焉若勞乎氣則無力與精神者法宜微舉之若勞乎血與筋骨者以四物之類補之若勞在脾內為中州調中可已此為有形病也但見外證則謂之復病非為勞也如再感風寒是已

勞當補其子

勞當補其子

本記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得寧真勞復也予診之曰勞心之所致神之所舍未復其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾王則感之於心矣此勞則當補子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者與荀子言未有子富而父貧同義此治虛與勞所以異也
補脾湯治傷寒得汗瘥後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和

人參 白朮 甘草 橘皮去白

青皮去白 乾姜各等分

右為末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得

海治勞復麥門冬湯氣欲絕者用之有效能起死回生

麥門冬兩 甘草二兩 粳米十合

右麥門冬去心為細末水二盞煎粳米令熟去米約湯

一小盞半入藥五錢七棗二枚去核新竹葉一十五片

同煎至一盞去查溫服不能服者綿滴口中又治小兒

不能灌藥者宜用此綿滴法 此方不用石膏以其三

焦無火熱也兼自欲死之人陽氣將絕者故不用石膏

若加人參大妙

外大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛

乳一升水四升煎至一升如人饑稍稍飲不得多期十日

服不住佳

肘治篤病新起早勞食飲多致勞復欲死燒鱉甲服方寸

七

活雄鼠屎湯治勞復

梔子十四箇 雄鼠屎二十七枚兩頭尖者是 枳殼三枚炒

右為細末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十

粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎

七味葱白湯治傷寒或因起動勞復或因吃食稍多皆成

此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此方

葱白連鬚 乾葛 新豉半合 生姜切一合

麥門冬法 熟地三錢 流水四升以杓揚之

右七味用清水煎三分減二去查分二服漸漸服之取

汗

右傷寒勞復莫若仍用丹溪以參芪歸朮加發散之劑汗之為的當也

陰陽易

虛邪

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裋散主之

燒裋散取婦人中裋近隱處剪燒灰以水和服方寸七日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裋襠燒灰用

嘗治傷寒病未平復犯房室死者命在須臾用獨參湯調燒裋散凡服參一二斤餘得愈者三四人信哉用藥不可執一也

陰陽易續法

寒熱

治傷寒病新瘥陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰膝連腹內痛名為陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病名曰陽易婦人病新瘥未平復而男子與之交接得病名曰陰易若二男二女竝不自相易所以呼為易者以陰陽相感動其毒着於人如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生花四肢拘急小腹絞痛手足拳則死亦有不即死者病苦少腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便恍恍翁翁氣力轉小着床不能動搖起止仰人或牽引歲月方死宜燒裋散猥鼠糞湯竹茹湯青竹茹湯乾姜湯當歸白朮湯選用之

治熱者寒

竹皮湯療交接勞復邪腫腹中絞痛欲絕竹皮青刮一升

至於按正方妙香用條下治雜病陰陽易中有牛黃腦射之類是治其熱症也

海藏云熱者燒裋散竹皮湯寒者猥鼠糞湯當歸白朮湯

用水三升煮取一升絞去查分二服立愈

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致熱氣衝胸手足拘急搐搦如中風狀宜此湯

瓜蒌根兩 青竹茹刮半升淡竹是

右以水二升煮取一升二合去查分二三服

妙香丸方見積熱條

寒者熱治

百一治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

游若陰陽易果得陰脈當隨症用之 若脈在厥陰當歸

四逆湯送下燒視散 若脈在少陰通脈四逆湯送下燒

視散 若脈在太陰四順理中丸送下燒視散所用之藥

各隨其經而效自速也

豨鼠糞湯療傷寒病後男子陰易

豨白根一把 豨鼠糞十四粒兩頭尖者是

右二味以水五升煮取半升去查再煎三沸溫服得效

未汗再服亦理諸般勞復

當歸白朮湯治婦人未平復因有所動小腹急痛腰膝四

肢不任舉動無力發熱者

白朮 當歸 桂枝 附子生

甘草 芍藥 黃芪 人參各二錢半

生姜兩半

右咬咀水煎服食頃再服溫覆取微汗瘥

李良佐子病太陽症尺寸脈俱浮數按之無力余見其內

陰虛與神朮加乾姜湯愈後再病余視之見神不舒垂頭

不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目眩曰唯與

大建中三四服外陽內收脈反沉小始見陰候又與已寒

加芍藥茴香等九五六服三日內約服九六七百丸脈復
生又用大建中接之大汗作而解

山因女色病陰証傷寒者用陳皮熱鍋內炒焦以酒烹下
濾酒飲之

四時傷寒不同

冬為傷寒 春為溫病 夏為暑病 秋為瘧

一歲長幼病相似為溫疫 多眠多汗脈浮為風溫 一

身盡痛為濕 身反張為瘧

四時傷寒

陰陽大論曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此
四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏若能固密則不傷
於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病
惟傷寒為毒者以其最為殺厲之氣也中而即病者為傷
寒不即病者為寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變

溫疫

為暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫
熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也

凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時
應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣
是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也
三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕
五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣
已衰為寒所折病熱亦微其病與溫病及暑病相似但治
有殊者要在辨其病原寒熱溫三者之異則用藥冷熱之
品味判然矣

其冬有非節之暖者名冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫
復有先後更相重沓亦有輕重治亦不同

冬溫應常紀者有三歲少陰司

天之政五之氣陽明司天之政終之氣厥陰司天之政終之氣皆病冬溫其不應常紀而反常者則不可候之而隨時變也 氣候亦有應至而不至者或有未應至而至者或有至而太過者皆成病氣也

丹澤用補中益

氣補治

四時傷

寒

海藏用

神木湯治

濕症

濕

凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯

氣虛者四君子湯加發散劑血虛者四物湯加發散劑東

垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻藁本蒼朮海藏

治風濕無汗者用神木湯有汗者用白木湯治剛瘕用神

木湯加羌活麻黃治柔瘕用白木湯加桂心芫朮治風濕

用白木湯隨證加藥治中暍脈弦細芤遲者用黃芪湯此

皆與仲景所謂辛苦之人觸胃之病傷寒同意也

丹仲景論傷寒而未及乎中寒先哲治胃大寒昏中者用

附子理中湯其議藥則得之矣曰傷曰中未有議其異同

者夫傷寒有即病有不即病因其舊有鬱熱風寒外束肌

腠自密鬱發為熱病邪循經而入以漸而深初用麻黃桂枝輩微表而安以病體不甚虛也若中寒則倉卒感受其病即發而暴因其腠理踈豁一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解此氣大虛不急治則死矣
傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中風中暑中濕亦如中寒之暴受也中寒治法見卒中暴厥門

冬為傷寒

傷寒 從霜降已後至春分已前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也 治法除濕暑瘧疾外皆傷寒法也

春為溫病

溫病 從立春節後其中無暴寒又不冰雪而人有壯熱為病者此屬春時陽氣發於外冬時伏寒變為溫病 春溫應常紀陽司天之政初之氣太陽司天之政初之氣陽明司天之政終之氣太陰司天之政二之氣皆病溫其不應常紀而

反常者不可候之而隨時變易也

冬傷於寒春必溫病全文見

太陽病發熱而渴不惡寒

者為溫病治見

溫毒

陽脈洪數陰脈實大者遇溫熱變為溫毒

論見大治治見發班活人云初

春發班咳嗽為溫毒

風溫

發汗不解身灼熱為風溫其證脈浮汗出身重多眠蓋其病不獨見於春間故另立風溫門

診

尺膚熱甚脈盛躁者病溫也全文見診

夫精者身之本也故

針灸

凡治溫病可刺五十九穴 成註云所謂五十九穴者刺

兩手內外側各三九十二痛五指間各一九八痛足亦如之頭入髮際一寸傍三分各三九六痛巔上一顛會一髮際一廉泉一風池二天柱二內經云氣口靜人迎躁者頭之若氣口人迎皆靜者勿刺

也人迎謂結喉動脈也

王太僕註素問五十九刺云刺頭上五行

五行者以越諸陽之熱逆也

謂頭中行上星額會前頂百會後頂五穴頭第二行兩傍

五穴承光通天絡却王梳十穴第三行兩傍臨泣目窓正營承氣腦空十穴也

大杼膺俞缺盆

背俞此八者以瀉胸中之熱也

氣街三里巨虛上下兼

此八者以瀉胃中之熱也

雲門髃骨委中髓空此八者

以瀉四肢之熱也

五臟俞傍五此十者以瀉五臟之熱

也 謂背第五行兩傍髃戶神堂臆門意舍志室十穴也

溫病續法

活夏至前發熱惡寒頭疼身體痛其脈浮緊者溫病也春月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至已前發為溫病蓋因春溫暖之氣而發也治溫病與冬月傷寒夏月熱病不同蓋熱輕故也升麻解肌湯最良熱多者小柴胡湯主之不渴外有微熱者小柴胡加桂枝嗽者小柴胡加五味子

煩躁發渴脈實大便秘澀者大柴胡湯微利之虛煩用竹葉湯次第服之

仲景活人論濕不同

仲景調溫病壯熱不惡寒活人調溫病發熱惡寒各不同當以仲景為正

升麻解肌湯治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根兩一

黃芩

芍藥各半兩

甘草炙

桂心各一分

麻黃三分去節湯泡

右吹咀每服五錢水一盞半棗子一枚煑八分日三服

三四日不解脈浮者宜重服取汗脈沉實者宜下之

雲傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病也

汗下後過經不解亦為溫病

經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之如太陽症汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太陽

陽溫病也如身熱目疼汗下後過經不愈診得尺寸脈

俱長者陽明溫病也如胸脇痛汗下後過經不愈診得

尺寸脈俱弦者少陽溫病也如腹滿噎乾診得尺寸脈

俱沉細過經不愈者太陰溫病也如口燥舌乾而渴診

得尺寸俱沉過經不愈者少陰溫病也如煩滿囊縮診

得尺寸俱微緩過經不愈者厥陰溫病也是故隨其經而

取之隨其症而治之如發斑乃溫毒也

夏為暑病

中暍忌汗下溫

太陽中暍者發熱惡寒身重而頭痛其脈弦細芤遲小便

已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥

若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

太陽中熱暍者其人汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯

主之活人云夏月自汗惡寒身熱而渴面垢手足冷脈微無力者中暑也白虎湯主之

惡寒身熱而渴者白虎加人參者一物

太陽中暍者身熱疼重而脈微弱此由夏月傷冷水水行

瓜蒂

皮中所致也一物瓜蒂湯主之

一物瓜蒂湯用瓜蒂二七七箇以水一升煮取五合去查頓服

右瓜蒂湯後賢罕用蓋其劑緩故也若果疼痛不退者亦宜用之

暑病續法

暑病有三

活中暑與熱病外證相似但熱病者脈盛中暑者脈虛以此別之甲乙經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不傷形所以脈虛 又有濕溫與中暑同但身涼不渴為異耳

丹暑熱病用黃連香薷飲挾痰者加半夏挾虛者加參芪或用清暑益氣湯

脈洪身熱惡寒

活夏月發熱惡寒頭疼身體肢節痛重其脈洪盛者熱病

為熱病

也冬傷於寒因暑氣而發為熱病治熱病與傷寒同有汗宜桂枝湯無汗宜麻黃湯加煩燥者宜大青龍湯然夏月藥性須帶涼不可大溫桂枝麻黃大青龍須用加減夏至前桂枝加黃芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩蓋桂枝麻黃湯性熱及煖處非西北之比夏月服之必有發黃斑出之失熱病三日外與前湯不瘥脈勢仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者桂枝石膏湯主之此方夏至後代桂枝證用若加麻黃半兩可代麻黃青龍証用也若三月至夏為晚發傷寒梔子升麻湯亦可選用之

桂枝石膏湯治法見前論有汗脈緩為桂枝證無汗脈緊為麻黃青龍證

桂枝

半兩

石膏

一兩

黃芩

甘草

一兩

梔子錢三

白芍藥

升麻

乾葛

生姜已上各三分

右咬咀每服五錢半水一盞半煮至八分去查食頃再服若得汗即停後服

梔子升麻湯治晚發傷寒三月至夏為晚發

生地半斤切碎

梔子十箇

升麻一兩半

柴胡

石膏兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分頓服病不解更

作

脈虛身熱惡寒為中暑

垣靜而得之為中暑中暑者陰證當發散也或避暑熱納

涼於深堂大厦得之者曰中暑其病必頭痛惡寒身形俱

急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所遏

使周身陽氣不得伸越世多以大順散主之是也海藏云靜而傷

暑惡寒脈沉細靜而濕勝傷形者白虎加蒼朮湯主之大順散見局方甘草一錢半乾姜杏仁桃桂各一錢是也

動而得之為中熱中熱者陽證為熱傷原氣非形體受病

也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必

苦頭疼發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄

無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之海藏云動而傷

暑身熱脈洪大動而火勝傷氣者白虎加人參湯主之

活中暑背寒面垢手足微冷煩渴口燥倦怠四肢不痛重

其脈微弱按之無力白虎湯主之方見發熱

本有人頭痛身熱心煩燥渴診其脈大而虛予授以白虎

湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈弦細芤

遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而

脈虛弱所謂弦細芤遲者皆虛脈也仲景以弦為陰朱龐

亦云中暑脈微弱則虛可知

海藏虛身熱自汗惡寒者中暑也白虎加桂湯主之方見
活酒蒸黃連丸治暑毒深伏累取不瘥無藥可治伏暑發
渴者

黃連四兩以無灰
酒浸蒸乾

右為末糊丸熟水下三十九丸胸膈涼不渴為驗

橘皮湯治中暑痰逆惡寒

橘皮二兩
去白 生姜兩一 棗子五枚
去核 甘草炙半
兩

人參錢一 竹茹半

右分五服每服水一盞二分煮取八分去查熱服

竹葉石膏湯治中暑不惡寒方見
勞復

五苓散治中暑頭痛惡心煩躁心下不快方見
渴

海若先飲冷後傷暑者五苓散主之此必心下痞懷生姜

湯調服佳或四君子湯調中亦可中和後或小便不利或

莖中痛宜服下方

蒲黃錢三 滑石錢五 生甘草錢一

中暍脈弦細乳遲黃芪湯主之

人參 黃芪 白朮 甘草

茯苓 芍藥各等
分

右咬咀每服三錢水一大盞生姜三片煎至六分去查

溫服

丹徐三官六月間發熱大汗惡寒戰慄不自禁持且煩渴

予曰此暑病脈之皆虛微細弱而數其人好賭致勞而虛

遂以人參竹葉作湯調辰砂四苓散八貼而安

針灸 雲口開前板齒乾燥者牙乃骨之精今燥者骨熱也針藥

不能治當灸大椎穴

脛冷腹 活濕溫者兩脛逆冷胸腹滿多汗頭痛妄言其人常傷於

濕而無熱者濕

濕因而中暑濕熱相搏則發濕溫其脈陽濡而弱陰小而急治在太陽不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暈如此死者醫殺之耳白虎加蒼木湯主之

本癸丑年故人王彥龍作毗陵倉官季夏時病胸項多汗兩足逆冷譫語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之其脈關前濡關後數予曰當作濕溫治之蓋先受暑後受濕暑濕相搏是名濕溫先以白虎加人參湯次白虎加蒼木湯頭痛漸退足漸溫汗漸止三日愈此名賊邪誤用藥有死之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五邪有實邪虛邪正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病者為正邪又曰假令心病中暑為正邪中濕得之為賊邪今心先受暑

而濕邪勝之水尅火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中最逆也難經曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏暑也小急見於陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕溫是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足汗漉漉未嘗乾每服此藥二三盞即愈

海濕溫汗少者白虎加蒼木汗多者白虎加桂枝

白虎加桂枝方

見

孫保慶門外有酒家姓姜者善歌唱孫愛之忽數日不見使人問之則曰病久將命絕孫診之遍身皆潤兩足冷至膝下腹滿不省人事六脈皆小弱而急問其所服藥取而視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈姜氏既安詣孫謝因請問曰某得病劇蒙尚藥一治而甦願聞治法孫曰汝

病傷暑也始則陽微厥而脈小無力衆醫謂陰病遂用陰藥其病愈厥予用五苓散大利小便則腹減白虎解利邪熱則病愈凡陰病脛冷則臂亦冷汝今脛冷臂不冷則非下厥上行所以知是陽微厥也

保立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微涼自汗四肢沉重謂之濕温蒼朮石膏湯主之即白虎加蒼朮湯是也

蒼朮兩半 石膏三錢 知母二錢半 甘草一錢

右咬咀水一盞煎至一半温服謂內有濕也多不欲飲水如身熱脈洪無汗多渴者熱在上焦積於胃中宜桔梗散此非濕温証乃熱病也

桔梗散 薄荷 黃芩 甘草

梔子各一錢 桔梗三錢 連翹二錢 右剉每服五錢水煮加竹葉如大便澀加大黃半兩

新方 海消暑丹 半夏一斤 茯苓半斤 生甘草半斤

右以醋五升煮半夏盡醋熬乾姜汁作糊無見生水為丸每服五十九丸熱水咽下精意修治用之極效 中暑為患藥下即甦 傷暑發熱頭痛服之尤妙 夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不為害應是暑藥皆不及此 若痰飲停節並用生姜湯下入夏之後不可缺此 又方消暑丸治頭疼惡心煩躁消渴霍亂

菘荳粉四兩 石膏四兩 白礬枯 硫黃各一兩 水浸鉦餅為丸彈子大辰砂為衣用姜汁醋點新汲水化開服之

丹暑風挾痰挾火實可用吐法 玉龍丸治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神效

硫黃 硝石 滑石 明礬各一兩

用無根水調丸

秋為瘧

夏傷於暑秋必病瘧治法見瘧門

診脈陰陽俱盛重於陰者變為溫瘧

一歲長幼疾狀相似為溫疫

非時之氣為瘧春應煖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此非

其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者為時

行溫疫病也論見傷寒

溫疫續法

活一歲之中病無長幼率相似此則時行之氣俗謂之天

行是也老君神明散務成子螢火丸聖散子敗毒散不拘

日數淺深吐下隨症施行所以聖散子不問陰陽表裏也

老君神明散治溫疫

非時之氣者就

白朮錢一

桔梗分一

細辛兩一

附子一兩炮去黑皮

烏頭四兩炮去皮尖

右五味為粗末縫絹袋盛帶之居閭里皆無病若有疫

癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄

三十七以水一碗煮令大沸分三服

聖散子蘇內翰序全文見活人書時毒流行用聖散子者

一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫

之行平旦輒煮一釜不問老幼良賤各一大盞即時氣不

入

草薺十箇炙裹根去皮

猪苓去皮

石菖蒲

茯苓

良姜

獨活去芦

附子炮製去皮臍

麻黃去根

厚朴去皮姜製

藁本

芍藥

枳殼去炒

柴胡

澤瀉

細辛

防風去

白朮

藿香

半夏

吳茱萸湯洗

蒼朮

甘草各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煮取八分去查熱服餘查再煎空心服之

右二方治疫雖不分陰陽然亦寒多表多者宜之

非時之熱者寒之

丹衆人病一般者是謂天行時疫有宜補宜散宜降方

大黃

黃芩

黃連

人參

桔梗

防風

人中黃

滑石

香附

蒼朮

右麩糊為丸每服五七十九分氣血痰作湯使送下氣虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者二陳湯送下熱甚者用童便和前藥同送下

本糞清臘月截淡竹去青皮浸溲取汁治天行熱狂熱疾

中毒并惡瘡毒取汁浸皂角其蔗治天行熱疾

丹解一切災病用粉草五兩細切微炒量病人吃得多少

酒取無灰酒一處研去查溫服須臾大瀉毒亦隨出雖十

分渴亦不可飲水飲水難救

右三方熱多裏多者宜之

潔雄黃丸治疫不相染

禦瘟疫法

雄黃研一兩

赤小豆炒

丹參

鬼箭羽各二兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每日空心以溫水下五丸可與病同床共衣亦不相染矣

活務成子螢火丸主辟疫疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠱諸

毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之

螢火

鬼箭羽去皮

揆藜各一兩

雄黃

雌黃各二兩

礬石一兩燒

羚羊角

鍛竈灰

鐵錘柄入鍛處燒焦

右九味搗為散以雞子黃并雄雞冠一具和之如杏仁大作三角縫囊盛五丸帶左臂上仍可掛於戶上

春涼春應煖而清氣折之則實邪在肝升麻解肌湯主之方見

夏應暑而寒氣折之則實邪在心調中湯射于湯半夏

夏寒調中湯治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱結於四肢則壯

熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或赤壯熱暈悶脈數宜下之

大黃去皮三分 黃芩 芍藥 葛根

桔梗 茯苓去皮 藁本擇真者無則川芎代之

白朮 甘草炙已上各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煮取一盞移時再服之得

快利便止小兒減與服虛冷不吐熱但下利或霍亂者不宜服此

射干湯方見 半夏桂枝甘草湯方見

秋熱秋應涼而反大熱抑之則實邪在肺白虎加蒼朮湯茵陳

汁調五苓散白虎蒼朮湯見

冬溫丹冬溫為病非其時而有其氣者冬時嚴寒君子當閉藏

而反發泄於外專用補藥帶表藥

作人中黃方以竹筒兩頭留節一節中作一竅內甘草於

中仍以竹木釘塞其竅置大糞缸內浸一月取出晒乾用

治瘟疫用此藥一味入補藥帶表同煎服之

活冬應寒而反大溫抑之則實邪在腎宜萎蕤湯方見

診多眠多汗脈浮為風溫

陽脈浮滑陰脈懦弱更遇於風變為風溫論見

發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗

出身重多眠睡鼻息必齟語言難出若被下者小便不禁
直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘵瘵若火
薰之一逆而引日再逆促命期經云傷寒發汗已則身涼
若發汗已身灼熱者非傷
寒乃風
溫也

風溫續法

風溫忌發汗
酒風溫者脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必
喘四肢不收嘿嘿但欲眠治在少陰厥陰不可發汗發即
譫言獨語內煩躁不得臥若驚癇目亂無精如此死者醫
殺之耳姜蕤湯
加減法風溫忌發汗宜姜蕤湯身灼熱者知母乾葛湯
如渴甚者括蕤根湯脈沉身重汗出者漢防已湯
姜蕤湯治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛
喉咽乾舌強胃內疼痞腰背強

葛根兩半

姜蕤分三

石膏一兩
杵碎

白芷兩半

麻黃

用沸湯
泡半兩羌活

去芎
一兩川芎

甘草兩半

杏仁

去皮尖雙
仁者半兩

青木香錢一

右咬咀每服五錢水一盞半煎半鍾日三四服

知母乾葛湯治風溫身體灼熱甚者

知母錢三

葛根錢八

石膏錢六

甘草

黃芩

木香

升麻錢各一

姜蕤錢三

南星

二錢
生

人參

川芎錢各一

麻黃去節

防風

杏仁

羌活錢各二

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一鍾去查服

防已湯治風溫脈浮身重汗出一方無
人參

防已錢四

甘草

黃芪錢各一

生姜兩二

白朮

兩三

人參兩一

右咬咀每服五錢水一盞半煮取一中盞去查飲訖仍

坐被中汗出如虫行或被臥取汗出許學士云風濕誤汗用防已黃芪湯

海熱以白朮加減代姜 海治風濕活人本方姜蕤湯以有麻黃不敢用宜白朮湯

主之方見前太陽病發熱續法 若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡礪
若腰背強硬者加羌活 若舌乾發渴者加人參 若身灼熱甚者加知母 若身體重多汗者加黃芪 若內傷冷者不加

一身盡痛為濕

濕病有

痛而發黃為中濕痛不得轉側為風濕活人又以身痛脈

沉為中濕脈浮為風濕亦通治法見太陽病體痛門

身反張為瘥

有汗為柔瘥無汗為剛瘥治法見柔瘥門

婦人傷寒 熱入血室 妊娠傷寒 產後傷寒

熱入血室

血熱

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之東垣云妄見妄聞夜夢亡人皆肝木火盛而為邪也刺期門與此義同

血結胸者刺期門

許學士云有婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣藥延養數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡已遲不可行也無已則有一馬刺期門穴斯可矣予不能針請善針者治之如言而愈或問曰熱入血室何謂而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而入血室血為邪迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膈中則血結於胸也何以言之婦人平居水當養於木血當養於肝方未受孕則下行之以為月水既妊則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳

皆此血也今邪氣畜血併歸肝經聚於臏中結於乳下故
手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也

書明子夜語婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譫語如見鬼狀
者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈活人云小柴胡和之

○犯胃氣謂下之犯上二焦謂發汗也

衍有一婦人温病已十二日診之其脈六七至而濇寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂乾姜一日寒熱遂止又云我臍下急痛又與抵當丸微利臍下痛痊身漸涼脈漸勻尚不了了仍復與小柴胡湯次日又云我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行次日虛煩不樂

時亦有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生姜加乾姜五味子湯一日咳減二日而病悉愈以上皆用張仲景方
婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故如瘧狀發作有時小柴胡湯主之
熱入血室續法

雲婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室妊娠傷寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥治之

婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脈浮而緩恐熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯

桂枝一兩半 赤芍三兩半 生姜一兩半 大棗六枚

預防熱入血室

右判細每服五錢水煎

婦人傷寒脈浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱入血室宜麻黃加生地黃湯

麻黃二兩

桂枝一兩

甘草兩

生地黃兩

杏仁二十五箇去皮尖

右咬咀每服五錢水煎

活婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜用乾

姜柴胡湯

柴胡四兩

括蕪根

桂枝一兩

牡礪兩

乾姜

甘草各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去查溫服初服

微煩再服汗出而愈

羅小柴胡加地黃湯治婦人室女傷寒發熱經水適來適

地

斷晝日明了夜則譫語如見鬼神亦治產後惡露方來忽間斷欲死

柴胡一兩二錢半

人參

黃芩

甘草炙

半夏湯洗七次

生地各七錢

右為粗末生姜三片棗二枚同煎

雲婦人傷寒身熱脈長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜躁

晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室不實滿者小柴胡加

牡丹皮主之大實滿者桃仁承氣主之

小柴胡加牡丹皮湯

柴胡二兩

黃芩七錢

人參二兩

半夏六錢

大棗三枚

甘草

生姜各七錢半

牡丹皮二兩

右判細每服一兩生姜同煎

桃仁承氣湯方見畜血

不實滿者柴胡牡丹皮

實滿者桃仁承

氣柴胡
加硝黃

婦人傷寒頭痛脈浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水閉而不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀脈沉而數者當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯主之

柴胡二兩

黃芩七錢

半夏一兩

甘草五錢

大黃

芒硝各七錢

大棗三枚

生姜七錢

右剉每服一兩生姜同煎去渣下芒硝再沸溫服若服不沉數即不可下

喘急者
先化痰
後除熱

本辛亥中寓居毗陵學官王仲禮其妹病傷寒發寒熱遇夜則如鬼物所憑六七日忽昏塞涎响如引鋸牙關緊急瞑目不知人疾勢極危召予視之予曰得病之初曾值月經來否其家曰月經方來病作而經遂止一二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從昨日涎生不省人事予曰此熱入血室之證也仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則

明了夜則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上腕喘急息高昏冒不知人事當先化其痰後除其熱予急以一呷散投之兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡加地黃湯三服而熱除不汗而自解矣

自汗身
涼經漸
者桂附
紅花

雲婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽標病少陽本病經水適斷桂枝加附紅花湯

桂枝二兩

芍藥

生姜各一兩

甘草一兩

附子炮

紅花各五錢

右剉細各每服一兩水三盞煎服

表除汗
解經多
者甘芍
地芎

婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經水過多無滿實者甘草芍藥湯

甘草

芍藥

生地

川芎各一兩

右咬咀每服一兩水三盞煎至一盞半去查入髮灰五錢調勻溫服不止者刺隱白

續增妊娠傷寒

潔黃芪解肌湯治婦人妊娠傷風自汗

人參 黃芪 當歸 川芎

甘草錢五 芍藥錢六 加蒼朮生地亦可

右為粗末每服五錢水煎溫服無時

海若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯兩四 桂枝 地骨皮各七錢

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯兩四 麻黃 細辛各半兩

若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛者太

陽標病也宜風濕六合湯

四物湯兩四 防風 蒼朮製各七錢

若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發班如綿紋宜升麻六合湯

四物湯兩四 升麻 連翹各七錢

若妊娠傷寒胸脇滿痛而脈弦少陽症也宜柴胡六合湯

四物湯兩四 柴胡 黃芩各七錢

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急下之宜大黃六合湯

四物湯兩四 大黃錢五 桃仁去皮尖十箇炒

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯兩四 人參錢五 五味子錢五

若妊娠傷寒後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯

四物湯兩四 厚朴 枳實炒各五錢

大法以參芪四物為君汗下之藥佐之

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯兩 梔子 黃芩各五錢

若妊娠傷寒大渴蒸蒸而煩脈長而大者宜石膏六合湯

四物湯兩 石膏 知母各五錢

若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯兩 茯苓 澤瀉各五錢

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯

四物湯兩 琥珀 茯苓各五錢

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯

四物湯兩 阿膠 艾各五錢一方加甘草乾姜黃芪

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合湯

瘥惟四肢厥冷陰症見者未可服

治妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯

葱白十莖 生姜二兩切

右剉水二盞煎至一盞連服取汁

海葱白一物湯用葱白二把以水一升煮熟取汁令食盡

亦主安胎若胎死須臾即出

治婦人傷寒妊娠服藥例 若發熱惡寒不離桂枝芍藥

若往來寒熱不離柴胡前胡 若大渴者不離知母石

膏五味子麥門冬 若大便秘者不離桂附乾姜白朮

若大便秘結者不離大黃黃芩 若月經適來適斷者不

離小柴胡 若胎不安者不離人參阿膠白朮黃芩 若

發汗者不離煎鼓生姜麻黃旋覆 若頭痛者不離石膏

山梔前胡 非傷暑頭痛者不離柴胡甘草石膏 若滿

悶者不離枳實陳皮 若胎氣不安者不離黃芩麥門冬
人參 若斑發黑者不離黃芩梔子升麻

雜方 治娠娠時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝研令極細末調塗臍下三寸乾即易瘥即止

又方 井中泥塗乾即易之 二方出本
事有效

又方 浮萍 朴硝 蛤粉 藍根 大黃 炒

右為末水調傅臍上安胎解熱極妙

治娠娠霍亂二方 附少陰
吐利門

治娠娠發斑變為黑色宜梔子大青湯

黃芩 升麻 梔子仁 各二兩 大青

杏仁 各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半細切葱白三寸煎至一盞
去查溫服

產後傷寒

表 產後中風數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾

嘔汗出雖多陽旦證耳可與陽旦湯 即桂枝湯方
見太陽病

產後中風發熱面赤喘而頭痛竹葉湯主之

竹葉 一把 葛根 三兩 防風 桔梗

桂枝 人參 甘草 各兩 附子 一枚

右咬咀每服五錢棗一枚姜五片水一盞半煎一盞去

查服溫覆使汗出若頭項強用大附子牛錢煎藥揚去

沫嘔者加半夏一錢

產後傷寒續法

產後傷
寒宜補
虛

丹 產後發熱惡寒皆屬血氣虛左手脈不足補血右手脈

不足補氣 惡寒發熱又腹痛當去惡血 惡寒發熱乳

汁不通及脹者無子當消用麥芽二兩炒研細清湯作四

服調下 有子當下用木通通草猪蹄汁調煎服

忌發表 忌苦寒 產後纔見身熱不可發表并一切苦寒藥必用乾姜治之

大發其熱輕則用茯苓淡滲其熱

腹痛者 去活面 大凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等多是

血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效如玉露散或四物加北柴胡等分煎服若便以小柴胡湯及竹葉石膏之類竟不救者多矣

乳不通 者宜壓 熱下乳 玉露散治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澀滯悉治之涼膈壓熱下乳

人參

茯苓

甘草 各半

苦梗炒

川芎

白芷 各一兩

當歸 各一

芍藥 各三

右咬咀每服五錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚大便秘者加大黃二錢半

續增小兒傷寒

大法

緊傷寒表裏攻發 有表證惡風惡寒者當發表 海藏云惡風者

白朮散惡寒者神朮湯

如氣盛能食不大便無表證者可攻裏

春主溫屬木身溫當發汗 海藏云神朮湯 夏主長屬火身熱而

煩躁合大發散 海藏云神朮湯 長夏主化屬土及居四季

同當調其飲食 海藏云四君子湯 秋主收屬金身涼內溫合微

下 海藏云通膈丸 冬主藏屬水身熱而惡寒是熱在外而

寒在內身寒而惡熱是熱在內而寒在外 海藏云熱在內者調胃承氣湯

寒在內者 調中湯丸

潔凡傷寒宜依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法氣升

浮則順發之氣收藏則下之 有汗發熱惡風脈浮緩者

風傷衛桂枝湯 無汗發熱惡寒不當風而自憎寒脈浮

緊者寒傷榮麻黃湯 有汗發熱惡風脈浮緊無汗發熱

惡寒脈浮緩謂之榮衛俱傷青龍桂枝麻黃各半湯 無汗發熱不惡風寒脈沉洪者可下之更詳認其脈與不脈量寒熱淺深而治之 有汗四肢厥脈沉微者名陽厥大承氣湯加膩粉逆湯 無汗四肢厥脈沉微者名陰厥四逆湯 如四肢不厥身熱內外皆陽不動三焦宜涼藥三五服下之 黃芩甘草湯 黃芩白朮湯 黃芩蒼朮湯 黃芩梔子湯 連翹飲子 小柴胡湯 八正散 涼膈散 白虎湯 五黃散 此上中下三焦藥宜選用之 中暑脈虛皆惡寒自汗而渴者白虎湯身涼脈緊熱在內者急下之口燥咽乾不大便是也 無汗身大熱者可發汗升麻湯大青膏天麻膏 有汗身大熱者桂枝湯惺惺散解肌湯小柴胡湯白朮防風湯可選用之 發汗者量四時暄暑燥濕風寒各宜春涼夏寒秋溫冬熱而發之

表証

錢傷風貪睡口中氣熱呵欠煩悶當發散與大青膏表証也索古補遺云小兒外感於風寒拘急呵欠煩悶皮毛濇口中氣熱者當發散秋冬用溫熱藥春夏用涼寒藥

天麻錢一

白附子錢生一

蝎尾去毒生半錢

硃砂研一字

青黛研一錢

天竺黃一字

麝香研七

烏梢蛇肉酒浸

焙乾取末半兩

右同研細生蜜和成膏每服半皂子或一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服

雄黃膏治傷風溫壯熱引飲

雄黃小壺大研

并醋一大盞煮盡

甘草末

川甜稍各三錢

寒水石研細七

腦子一字

硃砂分

右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半皂子大

右大青膏發散貪睡口氣熱呵欠煩悶表症者蓋為三歲已下小兒未能言者設也

活尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之方見瘧

海傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和者四君子加細辛瓜蒌桔梗各一分生姜薄荷煎或加防風川芎各一分內有寒及遇天寒欲發散者則去瓜蒌加桔梗多虛汗夜啼者加麥門冬傷風身熱頭痛氣促者四君子加川芎防風等分細辛羌活減半同煎

活咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯

雲人參羌活散治小兒寒邪及瘟氣時疫瘡疹頭痛體疼壯熱多眠不語潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活

獨活

柴胡

人參

芎藭

枳殼炒

甘草炙各二兩

前胡

桔梗

天麻酒浸炙

地骨皮各半兩白茯苓去皮二兩

右為散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去渣溫服不拘時候

七寶散治時氣頭昏體熱小兒同乳母服大人亦可

紫蘇葉

香附炒各三兩

陳皮

甘草炙

桔梗

白芷

川芎各一兩

右咬咀姜棗煎服

海麻黃黃芩湯治小兒傷寒無汗頭痛身熱惡寒

麻黃

赤芍

黃芩半兩

甘草

桂枝各二錢半

右為粗末水煎服

升麻黃芩湯治傷風有汗頭疼發熱惡風

升麻

葛根

黃芩

芍藥各五錢半

甘草一錢

右咬咀每服二錢水煎溫服

右惺惺散等藥發散頭痛發熱惡風寒表證者蓋為三歲已上小兒能言者設也能言故頭疼惡風寒可問而知也前五方通治有汗無汗惡風惡寒第五方治無汗惡寒第六方治有汗惡風

裏証

錢與大青膏不解散有下證當下大黃丸主之大熱飲水

不止而善食者可微下餘不可下也此裏症也緊古補遺云大熱飲水能食不

大便用大黃丸作散子與服之如清便自調慎不可妄下恐外熱逐於內而變結胸危証多矣

大黃丸治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤飲水不止有

下證者宜服之

川芎兩半

黑牽牛半兩半生

大黃酒蒸

甘草二錢

半炙

右為細末稀糊和丸麻子大二歲每服十九溫蜜水下

乳後服以溏利為度未利加丸數

活頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹飲

三黃丸主之四順飲連翹飲三黃丸並見痘門身體潮熱頭目昏痛心

神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣湯主

之洗心散

頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸主

之方見食

潔如身表無大熱而小便不利是有濕熱結膀胱仍用勝

濕藥白朮茯苓之類利小便則其熱自退

雲小兒傷寒煩熱小便赤澀大便褐色面赤熱者導赤散

錢傷風兼藏兼心則驚悸兼肺則悶亂喘息哽氣長出氣

嗽兼腎則畏明各隨補毋藏虛見故也

傷風兼藏

小便不利

利宜利

為食積

而酸臭

大便白

之

見痘門

之

方見食

之

洗心散

之

見痘門

之

方見食

之

洗心散

之

見痘門

之

方見食

之

洗心散

之

見痘門

之

方見食

之

兼脾則
肢冷或
利或脹
或吐瀉

傷風手足冷脾藏怯也當先和脾後發散和脾益黃散發

散大青膏主之此治陰厥有汗脈沉微者若陽厥無汗脈

傷風自利脾藏虛怯也當補脾後發散補脾益黃散發發散

大青膏主之未瘥調中丸主之有下証大黃丸下之後服

濕驚丸

傷風腹脹脾藏虛也當補肺必不喘後發散仍補脾也去

脹塌氣丸主之發散大青膏主之

傷風吐瀉治見吐瀉門治吐瀉用益黃

湯治夾驚傷寒熱極生風薄荷散

兼心則
驚搐

薄荷葉兩

羌活

全蝎

甘草半

天竺黃

姜蚕

麻黃去節

右為細末每服一錢水小半盞煎至三分加竹瀝少許

妙

兼肺則
喘嗽

雲小兒表傷寒則皮膚閉而為熱盛即生風欲為驚搐血氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之宜大青膏

肺盛復有風冷則胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散散風大青膏主之若止傷寒則不胸滿

腎虛則畏明宜補腎地黃丸有表者間用大青膏發散之

兼腎則
長明
渴分虛
實

傷風下後虛熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力當生胃中津液多服白朮散 小兒結熱於內口乾而渴身黃

體重者宜白朮散

湯傷寒發渴宜白虎湯

潔大熱飲水能食不大便用大黃丸作散服之

右三方白朮散治虛渴為下後而食少胃虛者設也白

嗽分虛實

虎湯大黃丸治實渴為未經下而能食不大便者設也
潔傷寒咳嗽吐清水哽氣長出氣是肺之不足也合用阿
膠散面白如枯骨者死不治 身熱咳嗽吐痰者當用福
銀九方見咳

右二方治咳嗽阿膠散治虛嗽為哽氣長出氣者設也
福銀丸治實嗽為痰盛喘滿者設也若有表証惡風寒
而嗽者當用惺惺散加減四君子湯鼠粘子湯之類是
也

陰厥陽厥見大法條

裏吐分表

潔身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯即小半夏加茯苓湯方見嘔門

枳殼 半夏各半兩

右水一碗姜十片煎至小半碗十歲已下作五服

藿香正氣散治傷寒發嘔

藿香葉 厚朴製 半夏製 甘草炙

陳皮 蒼木米泔浸拘各等分

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗二枚煎至二分去

查溫服

潔大吐者當下之白餅子珍珠丸消積丸三方俱見癖門 潮熱

有時胸滿短氣嘔吐者桃枝丸方見小兒積熱門

右七方治傷寒嘔吐前二方治痰飲而吐中一方治有
表而吐後四方治有裏而吐其桃枝丸治裏熱而吐餘
二方治表寒而吐也

自汗為虛

湯傷寒自汗當補虛和陰陽小建中湯減桂加黃芪人參
地黃

黃芪兩 白芍兩 甘草 人參

熟地各半

右咬咀每二錢水半盞煎至三分去查服

診小兒傷寒形症 頭痛 體痛 鼻塞或流涕 喉內喘

息 兩手脈洪數 頰赤眼澁 身上寒毛起 口鼻出

水 眼赤黃 口乾澁 咳嗽 山根青色 噴嚏

活頭目疼痛而畏人惡寒者此傷寒證也

雲設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷鼻氣熱

為班疹也與傷寒表証相似此胎氣始發自內之外若與

傷寒表證同治者候也當作班疹治之

溫病溫病者春日之溫病而不熱也

田春日溫病 未滿三日先用惺惺散二服後四五日不

解煩渴嘔用白朮散如自汗口燥用製白虎湯至六七日

大便燥結用四順飲子下心腹大實大滿牛黃通膈丸下

初覺之時疑是瘡疹只用葛根升麻湯解肌

傷寒拾遺 和解因時法 溫中法

灰包熨法

祇和改
用仲景
法因時
世

治中風自汗用桂枝湯治傷寒無汗用麻黃湯此仲景表

散之法百世不易者也若元氣暴虧者以參芪與桂枝麻

黃等藥表散此丹溪補仲景之法亦百世不易者也至於

韓祇和戒桂枝而以中風傷寒通作一法治之者此當時

之權變非百世之常行也王海藏云仲景用桂枝當漢之

末也韓祇和戒桂枝當宋之隆也時世之異不可不知今

編祇和之法於篇末以廣後學之見云

寸脈定
發表隨
氣候立
方

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗症及可汗脈或云

脈浮而數或云脈浮緊或云脈浮無汗而喘或云脈浮為

在表今畧舉數條後人但憑其脈之大槩並不分脈浮有陰陽虛盛之理又不知有可汗不可汗之症誤投發表藥則多變成陽毒之患矣今舉病人有汗惡風無汗惡寒分二等及據~~春~~春已後立秋已前氣候輕重各立方治之庶學者易為開悟耳

十關力齊等未可發表

病人二三月已前兩手脈浮數或緩或緊按之差軟寸關尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥此是見裏證未見表脈也宜候寸脈力小如關尺即可投解表藥大抵治傷寒病見證不見脈未可投藥見脈未見證雖少投藥亦無害也凡治雜病以症為先脈為後治傷寒病以脈為先證為後

見傷寒脈未見傷寒症宜和

病人兩手脈浮數而緊名曰傷寒若關前寸脈力小關後尺脈力大雖不惡風不自汗出此乃陰氣已盛先見於脈

也若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明已前宜調脈湯主之清明已後至芒種已前宜葛根柴胡湯主之芒種已後至立秋已前宜人參桔梗湯主之

調脈湯

葛根一兩

防風

前胡去苗三分

甘草炙半兩

右為粗末每服二錢水一盞生姜一塊如小指大劈破煎至七分去渣溫服如寸脈依前力小加棗三箇同煎

葛根柴胡湯

葛根一兩

柴胡去芦一兩

芍藥

桔梗

甘草炙各三分

右咬咀每服二錢水一盞生姜二片煎至七分去渣熱服如寸脈依前力小加葱白三寸同煎服

人參桔梗湯

人參

桔梗各三分

麻黃去節一兩

石膏三兩

甘草炙三分

右每服二錢水一盞荆芥五穗煎至七分去渣熱服如寸脈依前力小加麻黃二分去節同煎服

見中風脈未見

病人兩手脈浮數而緩名曰中風若寸脈力小尺脈力大雖不惡風不自汗此乃陰氣已盛先見於脈若不投藥和之後必惡風自汗出若立春已後清明已前宜薄荷湯主之清明已後芒種已前宜防風湯主之芒種已後至立秋已前宜香芎湯主之

薄荷湯

薄荷一兩

葛根半兩

人參二分

甘草

炙半兩

防風

去芦十兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去渣熱服如三五服寸脈力尚小加薄荷二分同煎

防風湯

防風一兩

桔梗三錢

甘草半兩

旋覆花

兩半

厚朴

三分

右咬咀每服三錢水二盞姜一塊同煎熱服如三五

寸脈力尚小加荆芥五七穗同煎

香芎湯

川芎一分

石膏兩

升麻兩

甘草

炙半兩

厚朴

製半兩

右咬咀每服二錢水二盞煎七分溫服如三五服後寸脈力尚小加細辛二分同煎

前二段文將中風傷寒各立法者何蓋謂病人始得病三日已前或因中風脈緩或因傷寒脈緊然脈雖先見而症猶未見尚可以藥解之故立方耳

病人兩手脈浮數或緊緩寸脈短反力小於關尺脈者此

小於關尺宜清

名陰盛陽虛也若自汗出惡風是邪氣在表陰氣有餘也素問云陰氣有餘為多汗身寒即可投消陰助陽表劑以治之若立春已後清明已前宜六物麻黃湯主之清明已

後芒種已前宜七物柴胡湯主之芒種已後立秋已前宜發表湯主之

六物麻黃湯 麻黃去節一兩 葛根七錢 人參五錢

甘草炙五分 蒼朮七錢

右咬咀每服三錢水一盞棗二枚煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者加荆芥三分三五服後不惡風猶汗者加丁香皮半兩一方又加荆芥七錢

七物柴胡湯 柴胡二兩 蒼朮 荆芥

麻黃各一兩 甘草炙七分

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊棗二枚同煎七分熱服如三五服後汗未止惡風者入葱白三寸如三五服後汗未止者加當歸一兩同煎

發表湯 麻黃去節一兩 蒼朮二兩 人參

當歸各半兩 甘草炙三分 丁香皮三分

右咬咀每服三錢水一盞入姜一塊棗三枚同煎至七分去查熱服如三五服汗未止猶惡風者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗止為度

寸大於尺宜消陽助陰表藥

病人脈浮或然或緩其脈上出魚際寸脈大於關尺者此名陽盛陰虛也若發冒悶口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問曰陽氣有餘為身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解表若立春已後至清明已前宜人參湯主之清明已後至芒種已前宜前胡湯主之芒種已後至立秋已前宜石膏湯主之

人參湯 人參半兩 芍藥三分 石膏二兩

柴胡 甘草炙三分

右咬咀每服三錢水一盞姜一塊煎七分熱服如三五

後熱不解者入豉三十粒同煎服

前胡湯方缺宜尋祗和方補之傷寒便覽有前胡湯方用石膏一兩前胡半兩竹茹

黃芩知母山梔大青各三錢姜葱煎服疑即是此

石膏湯

石膏三兩

芍藥一兩

升麻三分

黃芩三分

柴胡一兩

甘草炙三分

右咬咀每服三錢水一盞半豆一合煎八分熱服如三

五服後熱未解者加知母一兩又未解加大黃一兩

尺寸俱有力宜平之

病人兩手脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此

是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可

用藥平之若立春已後至清明已前宜解肌湯主之清明

已後至芒種已前宜芍藥湯主之芒種已後至立秋已前

宜知母湯主之

解肌湯

石膏二兩

麻黃去節三分

甘草炙

升麻各半兩

右咬咀每服三錢水一盞入豉半合煎至八分去查熱

服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩石膏一兩

芍藥湯

甘草炙半兩

芍藥一兩

石膏三兩

荆芥穗一兩

右咬咀每服三錢水一盞生姜一塊煎至七分去查熱

服如三五服後猶惡風者每服加生姜一塊同煎服

知母湯

知母

石膏

麻黃

升麻各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服三錢水一盞入生姜一塊同煎至七分去

查溫服如三五服後猶惡風者加麻黃半兩升麻半兩

前三段文將中風傷寒一法治者因病人始得病後脈

症俱見若投解劑必不能愈故立前方同法治之

中風傷
寒作一
法治

仲景云傷寒為病脈緩者名中風脈緊者名傷寒今分此
二端何也始因冬寒毒之氣中人其內伏之陽沉潛于骨
髓之內每至春夏發時或因外傷寒而引內邪出或因外
傷風而引內邪出及乎內邪既出而為病一也古人云立
此二端恐後人疑其緊脈與緩脈治別也若中風與傷寒
脈異何故仲景無別法治之此乃後人不究仲景之心也
病人始得病一二日至五六日尚有表脈及表症亦可依
脈症投藥凡投解表及發表藥每一日可飲三服病症甚
可至五服外不可頓服藥也如症未解次日依前再投如
症依前未解可作熱粥投之加葱白亦可如有汗出
勿厚衣蓋覆恐汗出太過作亡陽症也

診

海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解因時法言傷寒之脈
頭小尾大傷風之脈頭大尾小李思訓保命新書亦分尺

寸與仲景同之非若前人總言尺寸脈俱浮而緊尺寸脈
俱浮而緩緊則為傷寒無汗緩則為傷風自汗又有傷寒
有汗者傷風無汗者脈亦互差與症不同前人已盡之矣
惟韓李所言頭小尾大即為傷寒尾小頭大即為傷風人
病間有脈症未顯于尺寸者故韓李述為和解因時法也
又恐後人疑其不與前聖合遂於本方內又立加減法數
條亦不越前人之意何其當哉蓋二公者當宋全盛之時
故又戒麻黃桂枝不可輕用改用石膏升麻葛根柴胡之
平劑當時則可非百代常行之道時世遷移之法也可汗
一篇若隨湯液隨症應見自有定規雖明哲不可踰也
又寸口脈小飲冷與霧露所傷同作中焦治今韓李云傷
寒寸小者勿認與飲冷霧露同傷一體也飲冷霧露所傷
寸口舉按全無是陰氣在胃不和陽氣不能升越也傷寒

寸口小者只於關部下至膀胱本部見之寸口雖小只是舉之微小沉得之有也非若飲冷舉按全無也若果寸口舉按全無卽不可解表只宜溫中不可不知

韓氏溫中法

陰症
夫傷寒之說始自黃帝以開其端至於仲景方陳其條目自後膚淺之學莫知其數立言者只云病在表可發汗病在裏可下或云不可汗不可下未嘗有溫中之說仲景傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也又辨太陰症云太陰病脈浮可發汗宜桂枝湯又手足溫自利不渴者宜四逆湯又腹滿時痛桂枝加芍藥湯辨少陰證云少陰病始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯又少陰病二三日麻黃附子甘草湯又少陰病手足寒身體痛骨節疼脈沉者附子湯又厥

陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯又少陰病脈沉急溫之宜四逆湯今舉仲景論中數條最是三陰病之良法于今世用之尚有未盡證者愚常校之自至和初歲迄於今三十餘年不以歲之太過不及爲則每至夏至已前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細數多是胸膈滿悶或嘔逆或氣塞或腸鳴或腹痛與仲景三陰病說理同而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥方纔見脈沉及胸膈滿便投下藥下之往往不救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者胸中便快其病勢重者半日許滿悶依然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之多藥力大熱後必發煩躁因校量此形證今別立方以治之藥多對證不可不傳焉

病人但兩手脈沉細數或有力或無力或關脈短及力小

胸膈塞滿氣短不能相接者便可隨脈證投溫中藥以治之
病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及
力小於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹滿身
體拘急手足逆冷急宜溫之 若立春已後至清明已前
宜溫中湯主之清明已後芒種已前宜陳皮湯主之芒種
已後至立秋以前宜七物理中丸主之

溫中湯

丁皮兩一

乾姜炮

白朮

陳皮

丁香各二錢

厚朴一兩制

右爲細末每服二錢水一盞葱白三寸荆芥五穗煎至

七分去查熱服如未快手足尚逆嘔吐者加丁香乾姜

各二錢

陳皮湯

陳皮兩一

藿香錢三

白朮

葛根各二錢

厚朴一兩製

右爲末每服二錢水一盞姜一塊同煎至七分去查熱
服如三服未快手足尚逆嘔吐不定者加半夏丁香桂
枝各半兩每服加葱白三寸煎服
七物理中丸

白朮錢五

乾姜二錢半

人參七錢半

桔梗七錢

乾葛七錢半

藿香葉錢五

甘草二錢炙

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一九水一盞煎八
分和查熱服如三服未快手足尚逆嘔者加半夏生薑
各半兩

病人兩手脈沉細無力雖三部脈力停等亦是陰氣盛也
更不須候寸脈短治之或胃脇滿悶身體拘急疼痛手足
逆冷速宜溫中藥和之 若立春已後至清明已前宜厚
朴丸主之清明已後至芒種已前宜白朮湯主之芒種已

後至立秋已前宜橘皮湯主之

厚朴丸

當歸兩半

丁香兩半

厚朴製一兩

細辛二錢半

人參七錢半

甘草半兩

乾姜半兩

右為末煉蜜為丸彈子大每服一九煎至六分

和查熱服三服後脈尚細及寸脈尚細無力者每服加葱白三

寸同煎服

白朮湯

白朮

半夏

當歸

厚朴製

乾姜炮各半兩

丁香七錢

右為末每服三錢水一盞姜一大片煎至七分去查熱

服三五服後脈未有力寸脈尚小者加細辛半兩每服

加葱白三寸同煎服

橘皮湯

橘皮兩半

藿香

葛根各三錢

半夏

厚朴製各半兩

右為末每服三錢水一盞生姜如棗大同煎至七分去查熱服三五服後脈尚小手足逆冷者加細辛半兩病人胸膈滿悶時時嘔逆肢節痛兩脇下痛腹中鳴此是停飲宜二苓湯

赤茯苓

木猪苓

白朮各半兩

滑石一兩

通草

白芫花各二錢半

丁香皮七錢半

陳皮半兩

桂枝五錢

右為末每服三錢水一盞煎至七分去查熱服小便未快加瞿麥七錢半嘔未止加半夏半兩浙浙惡寒甚每服加葱白三寸

灰包慰法

病人服前藥胸膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過上焦有熱腹滿虛鳴時時疼痛此是被陽藥消逐得上焦

陰氣并入下焦也雖是下焦積寒冷奈上焦陽盛更難用
溫下焦藥也當用灰包熨之其法用稻草灰或桑柴灰二
三升許入好醋拌和乾濕得所銚內炒令灰熱以帛包裹
置臍下熨之頻先炒灰包常更換令常熱以腹不滿痛爲
度初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住可也如灰
包熨後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此是
陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而
解病人三部脈沉寸脈小於關尺此爲陰盛當溫中藥以
消陰氣宜厚朴丸

厚朴丸

人參

白朮

厚朴

陳皮

藿香

當歸

細辛

神朮湯亦同治陰躁而渴不可悞用涼藥若熱藥冷服內

有伏陽則可若脈已虛按之全無力或病人素無食養者
只可溫服

醫學綱目卷之三十四

婦人部

婦人治法通論

大法

婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆屬厥陰天癸既絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰者是祖氣生化之原也厥陰與少陽相表裏故治法無犯胃氣及上三焦為三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者同傷寒下早之症利大便則脈數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥制藥之法能不犯此三禁則榮衛自和而寒熱止矣外則和於榮衛內則調於清便先將此法為初治次後詳而論之見症消息同壞症傷寒為之緩治或小便不利大便秘結或積熱於腸胃之間或已成痿或散血氣而為浮腫蓋產理多門故曰同傷寒壞症如發渴而用白虎氣弱而用黃芪血刺痛而用當歸腹痛而加芍藥

已上例症不犯三禁謂產後之久病也若產後暴病又不
可拘也如產後熱入血室者用桃仁承氣抵當湯等藥胃
堅燥者大承氣不可以泄藥言之產後世人多用烏金四
物湯是不分四時之寒熱不分血氣之虛實盲然一槩用
藥如此而愈加增劇是誤也大抵產病天行則增損柴胡
雜症則加減四物又春夏從柴胡秋冬從四物藥性寒熱
病症虛實不可不察也四物湯常宜服餌今立四時增損
法于後

四物加
減治雜
病例

四物湯加減治婦人雜病

四物湯見
治虛實法

春倍川芎

一日春二日脈
弦三四頭暈

夏倍芍藥

一日夏二日
脈洪三日泄

秋倍地黃

一日秋二日脈
澁三日血虛

冬倍當歸

一日冬二日脈沉
三日寒而不食

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合四物湯
四兩玄胡苦練各一兩鈔若小腹痛亦用玄胡六合

若氣滯經脈故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合四物
湯四兩芍藥一兩 若腹中刺痛惡物不下加當歸芍
藥 若婦人血虛心痛腹痛不可忍者去地黃加乾
姜名四神湯 若血崩者加生地黃蒲黃 若血虛虛
冷崩中去血過多加膠艾 若赤白帶下宜香桂六合
湯四物湯四兩桂枝香附各五錢 若以四物湯為末
煉蜜丸如桐子大空心米飲下三四十九丸治高年婦人
白帶良驗 若以四物湯四兩加甘草半兩蜜丸每兩
分作八丸酒醋共半盞用溫湯化下名當歸煎去敗血
生好血 若婦人血積者四物湯加廣茂京三稜桂心
乾漆各一兩 若婦人筋骨肢節痛及頭痛脈弦憎寒
如瘧宜治風六合四物湯四兩羌活防風各一兩 若
婦人或因傷酒或因產亡血或虛勞五心煩熱者宜四

物二連湯四物湯四兩生地黃生黃連胡黃連各一兩
若婦人骨蒸加地骨皮牡丹皮 若婦人傷寒汗下
後飲食減少虛者宜八物湯四物湯四兩黃芪甘草茯
苓白朮各一兩

凡婦人百病只四物湯加吳茱萸煎若陽藏少使茱萸
陰藏多使茱萸無不效者

右加減雜病例

四物加減治胎前例

若保胎氣令人有子四物與硝砂四君子湯各半名八珍

湯 若妊娠胎動不安下血不止者加艾十葉阿膠五錢

葱白黃芪 四物湯加減治妊娠傷寒名六合湯方一十

五道 方見傷寒部 四物湯加減調經方七道 見調經部

右加減治胎前病例

四物加減治產

若產後一月內惡物積滯敗血作病或脹或痛胸膈脹悶

或發寒熱四肢疼痛加延胡索沒藥香白芷與四物等分
為細末淡醋湯或童便調下 若血風於產後乘虛發作
或產後傷風頭痛發熱百節疼痛加荆芥穗天麻香附石
膏藿香各二錢半四物料共一兩中加之水煎服
若產後虛勞日久而脉浮疾宜柴胡四物湯

川芎 熟地 當歸 芍藥

加柴胡 人參 黃芩 甘草

半夏 麩各三錢 右咬咀水煎服

若產婦諸症各隨六經以四物與仲景藥各半服之其效
如神

去血用芎歸

芎歸湯治一切去血過多眩暈悶絕傷胎去血產後崩

中去血拔牙去血金瘡去血不止者舉頭欲倒悉能治之

當歸 川芎各等分

右每服五錢水煎服不拘時 若產後眩暈加芍藥
產後腹痛不可忍加宮桂童便酒浸 娠子死或不
死胎動酒水合煎即下未死者即安 若虛損腹痛少
氣頭眩自汗每服加羊肉一兩生姜十片水煎 若臨
月服之則縮胎易生 若室女婦人心腹疼痛經水不
調水煎服 若娠胎氣不安產後諸疾酒煎服 若
難生倒橫子死腹中先用黑豈一大合炒熱與小便合
煎服 若難產用百草霜香白芷等分童便好醋各一
沸湯浸服甚者再服即分挽矣 若傷藏毒每服加槐
花末五分三日取下血塊即愈若吐血亦服此 若血
氣上喘下腫空心煎艾湯調下 若產後惡血注心迷
悶喘急腹痛依前用黑豈加生姜自然汁煎服 若產
後頭痛加荆芥 若崩中漏下失血不止加炒香附每

虛勞用

兩入甘草一錢沸湯點服 若有白帶者加芍藥半兩
乾姜等分米飲調下

六合

保諸六合治婦人常病及產後常用之藥 治婦人虛勞

已常服
聚寶丹

局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞
也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荆芥散臨臥食後是
治有熱虛勞也 大聖散熟地黃丸人參荆芥散牡丹煎丸並見局方然亦當參考藥味用之

保全也神仙聚寶丹治血海虛寒虛熱盜汗理宜補養琥
珀之燥麝香之散可以用乎面色痿黃肢體浮腫理宜導
濕乳香沒藥固可治血可以用乎胎前產後虛實不同逐
敗養新攻補難並積塊 瘕赤白漏崩宜於彼者必妨於
此而欲一方通治可乎世人以其品貴名雅又喜其常服
可以安神去邪令人有子殊不知久服者無不有禍自非

藏府能言醫者終不知覺及至變生他病何曾歸咎此丹
子姪女形色俱實遲於得子久服此丹癰發於背症候甚
危脉散大而瀉急以四物湯加減百餘貼而安

調經 經閉 血崩

大法

經水或紫或黑論 經水者陰血也陰必從陽故其色
紅稟火色也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升
氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁往往
見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後作痛
者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行
者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其
紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷而行溫熱之劑則
禍不旋踵矣良由病原論月水諸病皆曰風冷乘之宜其
相習而成俗也或曰黑北方水色也紫淡於黑非冷而何

予曰經曰亢則害承乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫
甚則黑也况婦人性執而見鄙嗜欲加倍藏府厥陽之火
無日不起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之蓋于
百一二者也

經色紫
黑為熱

海四物加黃芩黃連湯治經水如黑荳汁

四物湯

四兩

黃芩

黃連

各一兩

右為末醋糊丸服

丹月經黑口渴倦怠形短色黑脉不勻似數

黃栢

炒

黃芩

各三錢

甘草

二錢

赤芍藥

香附末

各半兩

右為末醋糊丸白湯下五六十丸

永康胡八娘子二十歲二月經事不來忽行小腹痛有塊
血紫色

白芍藥

白朮

陳皮各半兩

黃芩

川芎

木通各二錢

甘草些

何孺人氣滯血澁脈不瀉經不調或前或後紫色日苦兩

大腿外臙麻木有時痒生瘡大便秘滯

麻子仁

桃仁

芍藥各二兩

枳殼

白朮

歸頭

葳蕤仙

訶子肉

生地

陳皮各五錢

大黃煨七錢

各為末粥丸如桐子大白湯下五六十九

經色淡為虛

丹經水色淡者氣血俱虛也宜八物湯之類八物者四物

四君子也如蕪它症隨症加藥

樓婦人年四十八因有白帶口渴月經多初血黑色後來

血淡倦怠食少臍上急

白朮一錢半

紅花壹許

陳皮一錢

木通

黃芩各五分

縮砂

甘草各三分

枳殼五分

白芍藥一錢

右煎湯下保和丸三十丸抑青丸二十九

經多為虛熱

四物加黃芩白朮湯治經水過多

四物湯四兩

黃芩

白朮各一兩

經水過多

黃芩炒

芍藥炒

龜板炙各一兩

黃栢炒三錢

香附二錢半

椿樹根皮七錢半

右為末酒糊丸空心白湯下五六十九

丹一婦人脉弦而大不數形肥初夏時倦怠月經來時多

此稟受弱氣不足攝血故行多

白朮一錢半

黃芪生

陳皮各一錢

人參五分

甘草三錢

經少為虛

四物湯加葵花湯治經水澁少

四物湯兩

葵花兩

一方又加紅花血見愁

四物湯加熟地黄當歸湯治經水少而色和

四物湯兩

熟地

當歸各一兩

師曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰曾更下利若汗出小便利者可何以故師曰亡其津液故令經水反少設經下多於前者當所苦困當言恐大便難身無復汗也

將行時痛為滯

海四物四兩加玄胡索苦練棋榔木香各一兩治經事將行臍腹絞痛臨經痛者血澁故也

抑氣丸臨經之時腹痛以四物湯加玄胡索陳皮牡丹皮甘草痛甚以豆淋酒痛少以童便煮香附入條芩為丸經水將來而痛者四物湯加桃仁香附黃連

周壁婦人四十餘月經不調行時腹疼行後又有三四日淋瀝皆穢水口渴面黃倦怠無力

白朮兩

歸身尾六錢

陳皮七錢

黃連三錢

木通

黃芪生

黃芩各二錢

甘草一錢

分八貼下五靈脂九四十粒食前服

仁十三孺人月經不勻血紫色來作痛倦怠惡寒為人性急

青皮錢五

川芎

黃芩

牡丹皮

茯苓錢三

乾姜錢一

甘草五分

分二貼水煎服

一婦人二十歲月經不勻來時先呵欠腹隱疼血紫色食少無力

白朮錢四

黃連

陳皮各二錢半

牡丹皮錢二

木通

黃芩

人參

茱萸一錢

甘草五分

分四貼水二盞煎取小盞食前服

桂枝桃仁湯治經候前腹痛不可忍

桂枝

芍藥

生地各二兩

桃仁四十箇

甘草一分

右為餘末每服五錢水二盞姜三片棗一枚同煎去渣

溫服

柴胡丁香湯治婦人年三十歲臨經預先臍腰痛甚則腹中亦痛經縮二三日

柴胡一錢

羌活一錢

丁香四分

全蝎一箇

當歸身一錢

生地一分

右都作一服水四盞煎至一盞去渣稍熱食前服

一婦人三十歲每因浴後必用冷水淋通身又嘗大驚遂患經來時必先少腹大痛口吐涎水然後經行行後入吐水二日其痛直至六七日經水止時方任百藥不效予診其脉寸滑大而弦關尺皆弦大而急尺小於關關小於寸所謂前大後小也遂用香附三兩半夏二兩茯苓黃芩各一兩半枳實玄胡牡丹皮人參當歸白朮桃仁各一兩黃連七錢川練遠志甘草各半兩桂三錢茱萸一錢半分十五貼水煎入生姜汁兩蜆殼熱服後用熱湯洗浴得微汗乃已忌當風坐臥手足見水并喫生冷服三十貼全愈半年後又因驚憂前病復舉腰腹時痛小便淋痛心惕惕跳驚悸予意其表已解病獨在裏先與灸少衝勞宮崑崙三陰交止悸定痛次用桃仁承氣大下之下後用香附三兩蓬朮當歸身各一兩半三稜玄胡索桂大黃青皮俱醋制

青木香苗香滑石木通桃仁各一兩烏藥甘草縮砂檳榔
苦練肉各半兩木香吳茱萸各二錢分作二十貼入新取
牛膝濕者二錢生姜五片用荷葉湯煎服服訖漸安

經後痛為虛

丹 經過後而作痛者乃虛中有熱所以作痛

新荷姐頭痛口乾經行後身痛腰甚痛

生地 白木 芍藥各一 芫莩

歸身尾各五分 黃柏炒 甘草炙 水少酒煎服

經成塊為帶

丹 治婦人月經壅滯每發心腹臍疝可忍及治產後

惡露不快血上捨心迷悶不省氣絕欲死者琥珀散

京三稜 蓬莪朮 赤芍藥 劉寄奴

牡丹皮 熟地 官桂 菊花

真蒲黃 當歸各一

右前五味用烏豈一升生姜半斤切片米醋四升同煮

荳爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下
空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳
予家之秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血衝心
二服便下常服尤佳予前後救人急切不少此藥亦宜
多合以救人

大 交加散治榮衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛經血諸
疾並皆治之

生姜二斤 生地二斤 白芍藥 當歸

桂心兩 紅花炒無惡血不用 沒藥另研各半兩 蒲黃隔紙炒

玄胡索醋紙包煨熱用布擦去皮各一兩

右將地黃汁炒生姜滓姜汁炒地黃滓各焙乾用諸藥
為細末每服三錢溫酒調下 若月經不依常蘇木煎
酒調下 若腰痛糖酒調下

丹瘀血

香附醋炙四兩

桃仁兩一

牡丹皮

大黃蒸

當歸各一兩

川芎

紅花各半兩

瓦龍子煨醋

晝夜二兩

右炊餅為丸空心溫酒下三四丸

交加地黃丸治婦人經不調血塊氣痞肚腹疼痛

生地

老姜各一斤

玄胡索

當歸

川芎

芍藥各二兩

明沒藥

木香各三兩

桃仁去皮尖

人參各兩半

香附斤半

右為末先以生姜汁浸地黃查以地黃汁浸生姜查晒乾皆以汁盡為度共十一味作一處晒乾研為末醋糊為丸空心以姜湯下

交加散治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血

少結聚為癥產後中風

生地

生姜各五兩各研取汁

右交互取汁浸一夕各炒黃漬汁盡為度末之尋常腹痛酒調下三錢產後尤不可闕

益母草一名天麻未結子時採一檐以水五斗煮半乾去查再熬成膏每用半小盞和酒并姜汁放開服之大治

血熱經不及期者為汚血及血經不調 經不及期者血熱四物湯加黃連

肥人不及日數而多痰者血虛有熱南星白朮蒼朮黃連

血熱

香附川芎作丸

婦人患經血紫黑一月兩次行不思食口乾苦時發熱

麥門冬 當歸身 白芍藥 陳皮

白朮各一兩

人參

地黃

茯苓各半兩

木通錢三

生甘草錢一

按寒

右分十二貼食前熱飲下抑青與點各十五
帶下經水不利小腹滿痛經一月再見者土瓜根散主
之亦主陰癰腫疝

土瓜根

芍藥

桂枝

麩虫各三分

右四味杵為散酒服方寸七日三服

經過期者血少

經水過期血少川芎當歸人參白朮與痰藥過期淡

色者痰多也二陳湯加芎歸過期紫色有塊血熱也必

作痛四物湯加香附黃連

三月一
來為居
經

脈師曰脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為可否

者此為居經三月一來師曰寸口脈微而澁微則衛氣不

足澁則血氣無餘衛不足其息短其形燥血不足其形逆

榮衛俱虛言語謬誤跌陽脈浮而澁澁則衛氣虛虛則短

氣咽燥而口苦胃氣澁則失液少陰脈微而遲微則無精

遲則陰中寒澁則血不來此為居經三月一來問曰婦

人妊娠三月師脈之言此婦人非軀今月經當下其脈何

類何以別之師曰寸口脈衛浮而大榮反而弱浮大則氣

強反弱則少血孤陽獨呼陰不能吸二氣不停衛降榮竭

陰為積寒陽為聚熱陽盛不潤經絡不足陰虛陽往一作實

故令少血時發洒淅咽燥汗出或溲稠數多唾涎沫此令

重虛津液漏泄故知非軀畜煩滿血月稟一經三月一來

陰盛則瀉名曰居經謂右脈浮大左脈反弱也

四物加黃芩湯治經暴下

經暴下為血熱

四物湯

黃芩

如腹痛加黃連一兩夏月不去黃芩

有寒熱宜和

經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其
寒熱後以四物湯和之

婦人血脈不調往來寒熱狀如勞倦

當歸

川芎

甘草

黃芪

官桂

去粗皮各一兩

白朮

白芍藥各二兩

柴胡

阿膠各半兩

右為細末每服五錢棗子一枚水煎空心溫服白湯點

服亦得常服不生帶下調血脈養子宮終身無病

虛實不調

升陽舉經湯治經水不調右尺脈按之空虛是氣血俱

脫大寒症輕手其脈數疾舉指弦緊或澁皆陽脫之症陰

火亦亡見熱症於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲去也當溫

之降之引之燥之此法大升浮血氣補命門之下脫也諸

藥言根近苗處去苗便是

柴胡根

當歸根

白朮

黃芪各三錢

藁本

羌活根

防風根

紅花

白芍藥

獨活根

桃仁

細辛

川芎

熟地水中

人參

黑附子炮去

甘草

稍多各錢肉桂去皮夏不用

右為餘末每服二錢水三盞煎至八分空心稍熱服

陰陽相乘

本治婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫

者一類呼為經病不曾說是陰勝陽是陽勝陰所以服藥

少效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地

凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散

溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當別

其陰陽調其血氣使不相乘以平為期宜紫石英丸

紫石英

研水飛禹餘糧燒醋人參

龍骨

川烏頭

桂心

桑寄生

杜仲炒

五味子

遠志

澤瀉

當歸

石斛

肉苁蓉

乾姜

川椒

牡蠣煨 甘草各半

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九至五十九空心食前服

經過期不止為熱有餘

芩心丸治婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止用黃芩心枝條者二兩米泔浸七日炙乾又浸又炙如此七次為末醋丸如桐子大每服七十九空心温酒送下日進二服

治婦人天癸已過期經脉不勻或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損八益謂女子七數盡而經不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善宜此膏歸散

當歸 川芎 白芍藥炒 黃芩炒各
白朮半兩

右為細末每服二錢酒調下空心食前日三次服即去黃芩加桂枝一兩

脉問曰婦人年五十數一朝而清血二三日不止何以治之師曰此婦人前絕生經水不下今反清血此為居經不須治當自止經水下常五日止者五日愈

針灸

心月經不調 陰獨三分此穴大效須待經定為度在足四指間三吐

東又法內踝下白肉際青脉上灸隨年吐

集又法中極 三陰交 腎俞 氣海

心經閉久忽大崩復又斷絕復又大行不調者 豐隆六分

血止 石門五分 斷經

婦人五旬經斷後再行或多或少或瘀或紅並下腹中氣

滿如胎孕 天樞 中脘 氣海各五分 立愈

用婦人漏下苦血閉不通逆氣脹血海主之 女子胞中

痛月水不以時休止天樞主之千金作腹脹腸鳴氣上衝胸小腹脹滿痛引陰中月水至則腰脊痛胞中瘕子門有寒引髓髀水道主之千金引髓髀作大小便不通

經閉

無腹痛痞嘔症為血枯

血枯經閉者四物湯加桃仁紅花 陰虛經脈久不通小便短澀身疼者四物加蒼朮牛膝陳皮生甘草作湯又用蒼莎丸加蒼耳酒芍藥為丸就煎前藥吞下

右丹溪治血枯大法

中焦閉

經閉不行有三補前人之闕 婦人脾胃久虛形體羸弱氣血俱衰而致經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脈津液所化津液既絕為熱所燥肌肉漸瘦時見渴躁血海枯竭病名曰血枯經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣此症或經適行而有子子亦

不安為胎病者有矣此中焦胃熱結也

下焦閉

或心包脈洪數躁作時見大便秘澀小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血海乾枯宜調血脈除包絡中火邪而經自行矣此下焦胞脈熱結也

上焦閉

或因勞心心火上行月事不來者胞脈閉也包脈者屬於心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來宜安心補血瀉火經自行矣此上焦心脈熱結也

裴澤之夫人病寒熱月事不至者數年又加喘嗽醫者率以蛤蚧桂附投之曰不然夫人病陰為陽所搏溫劑太過故無益反害投以涼劑涼血和血藥則行矣已而果然

大法先降心火後補氣血

女子月事不來者先瀉心火血自下也內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消王註曰大腸胃熱也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾

病則主味不化味不化則精不足故其病則不能隱曲脾土已虧則風邪勝而氣愈消也又經曰月事不來者胞脉閉也胞脉屬於心絡于胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑後服局方中五補丸後以衛生湯治脾養血也

局五補丸補諸虛安五藏堅骨髓養精神

熟地

人參

牛膝酒浸去

白茯苓

地骨皮各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五丸溫酒下空心服

衛生湯

當歸

白芍藥

各二兩黃芪

三兩

甘草

一兩

右為末每服半兩水二盞前至一盞溫服空心如虛者

加人參一兩

右東垣潔古治血枯之法皆主於補血瀉火也補血者四物之類瀉火者東垣分上中下故火在中則善食消渴治以調胃承氣之類火在下則大小秘澀治以玉燭之類玉燭者四物與調胃承氣等分也火在上則得於勞心治以芩連及三和之類三和者四物涼膈當歸等分也潔古先服降心火之劑者蓋亦芩連三和玉燭之類後服五補衛生者亦補氣之劑也

素帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何以得之岐伯曰病名血枯此得之少年時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也帝曰治之奈何岐伯曰以四烏鬪骨一蘆茹二味并合之丸以雀卵大如小菘

以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也腹中論云
王註云烏
鰾魚骨主血閉
王散惡血在卵主血痿
鮑魚主瘰癧
血
河間直明論方烏鰾骨各等分雀卵不拘數和丸小
豈大每服五丸至十九煎鮑魚
湯下食後日三服蜜以美饌

右岐伯河間治血枯之法

下利經
斷者利
止自來

脈問曰婦人病下利而經水反斷者何也師曰但當止利
經自當下勿惟所以利不止而血斷者但下利亡津液故
經斷利止津液復經當自下 問曰婦人病經水斷一二
月而反經來今脈反微澁何也師曰此前月中若當下利
故令妨經利止月經當自下此非軀也 婦人血下咽乾
而不渴其經必斷此榮不足本自有微寒故不引飲渴而
引飲者津液得通榮衛自和其經必復下

有腹痛
疝為
痰汚血老

仲婦人之病因虛積冷結氣為症經水斷絕至有歷年血
寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎沫久成肺癰形

汚血

體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛與臟相連或結
熱中病在關元脈數無瘡肌若魚鱗時着男子非止女身
在下未多經候不勻令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根
氣衝氣衝急痛膝脛疼煩奄忽眩冒狀如厥癰或有憂慘
悲傷多嘔此皆帶下非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十
六病千變萬端審脈陰陽虛實緊弦行其針藥治危得安
其雖同病脈各異源子當辨記勿謂不然

經候過期不行杜牛膝搗汁大半鍾以玄胡末一錢香
附末枳殼末各半錢早調服

六萬病丸治經事不來繞臍痛

乾漆許碎炒 牛膝去苗酒浸一

右為末以生地黄汁一升入二味藥末銀器內慢火熬
可丸即丸如桐子大每服二丸空心米飲或溫酒下

療月水不利臍下愆逆氣脹滿欲嘔不得睡愆逆列切急也

當歸四錢

乾漆三錢炒烟盡

右為末煉蜜丸如桐子大空心温酒下十五丸

治月經壅滯臍腹疔痛 當歸 玄胡索

右為鱗末每服三錢姜三片水一鍾半煎至七分去查

稍熱服

小腸移熱於大腸為伏瘕為沉全文見診病傳變○王註云血澁不利則月事沉滯

而不

有汚血熱

聖治婦人月水滯澁不快結成瘕塊筋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤挫細水五斗煎至一斗去查別以淨器盛熬

成膏食前温酒調下半匙本草云馬鞭草辛涼破血瘕

羅血極膏治婦乾血氣以川大黃為末用醎醋熬成膏子丸如鷄頭大每服一九熱酒化開臨臥温服大便利一二

行後紅脉自下是婦人之仙藥也加當歸頭

仲婦人經水不利抵當湯主之亦治男子膀胱滯急有瘀血者方見傷寒

右經一節方三首皆治汚血有熱而經閉前一方輕劑後二方重劑也

有汚血寒

雲紅花當歸散治婦人經候不行或積瘀血腰腹疼痛及室女月經不通

紅花 當歸尾 紫葳 牛膝

甘草 蘇木細剉各二兩 白芷半兩 赤芍藥八兩

劉寄奴五兩 桂心半兩

右為細末空心熱酒調三錢服之食前臨臥再服若久血不行濃煎紅花酒下孕婦休服

牛膝散治婦人月水不利臍腹疔痛

牛膝兩 桂心 赤芍藥 桃仁

玄胡索

當歸

牡丹皮

川芎

木香各七錢半

右每服方寸七為極細末溫酒調下食前
溫經湯若經道不通遠臍寒痛脉沉緊宜此及桂枝桃仁湯萬病丸

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

蓬莪朮各半兩

人參

甘草

牛膝各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半去查溫服

桂枝桃仁湯方見調經

牡丹皮散治婦人月水不利臍腹疼痛

牡丹皮

大黃炒各兩

赤芍藥

生地黃

桃仁

當歸

桂心

赤茯苓

白朮

各七錢半

石葦去毛

木香各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半生姜三片煎至七分去查

空心溫服

本治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕通經丸

桂心

青皮去白

大黃炮

乾姜

川椒

川烏

蓬莪朮

乾漆

當歸

桃仁各等分

右為末先將四錢用米醋熬成膏和餘六錢末成劑相中杵丸如桐子大晒乾每服二十九用淡醋湯下加至三十九溫酒亦得空心食前服

右方六首皆治汚血有寒而經閉前四方輕劑後二方重劑也

大治月水不通屢試有驗厚朴不以多少姜汁炙香細切

瘧者結痰在上

濃煎去渣空心服不過三四劑瘥形實氣盛者宜之

丹積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子兩一 黃連兩半 吳茱萸兩十 桃仁箇五十

紅麴錢二 縮砂兩三 山查末

右生姜研炒餅為丸

軀脂滿經閉導痰湯加芫連不可服地黃如用姜汁炒導痰

湯即二陳加枳實黃連是也

楊村婦人年二十餘兩年經閉食少乏力

黃連兩二 白朮半一錢 陳皮 滑石各一錢

黃芩兩半 木通分三 桃仁箇十二 甘草些

右丹溪治痰結胸腹而經閉之法皆用輕劑導痰降火也

經云氣上迫肺則心氣不得下通故月事不來今用連朮

之類導痰降火使不上迫於肺故心氣下通而月事來也

丹溪治一婦人久瘧食少經閉兩手無脉每日與三花神

祐丸十餘粒津咽之月餘食進脉出又半月脉愈又一月

經行亦此意也詳見久瘧予嘗體丹溪之意治陳氏婦二

十餘歲形肥痞塞不食每日臥至未牌吃一盞薄粥吃粥

後必吐水半碗仍復臥經不通三月矣前番曾暗通黑色

脉之辰時寸關滑皆有力午後關滑寸不滑詢之因乘怒

飲食而然遂以白朮一兩半厚朴黃連枳實各一兩半夏

茯苓陳皮山查人參滑石各八錢縮砂香附桃仁各半兩

紅花二錢分作十貼每日服一貼各入姜汁二蜆殼間三

日以神祐丸神秘沉香丸微下之至十二日吐止食漸進

四十日平復如故又汪氏婦五十餘形瘦亦痞不食吐水

經不通以前藥方加參朮歸為君煎熟入竹瀝半盞姜汁

服之但不用神祐丸下亦平復若咳嗽寒熱而經閉者當於欬門溫痰條求之

子和凡婦人月事不來用茶調散吐之次用玉燭散芎歸湯三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥也 一婦人月事不行寒熱往來口乾頰赤飲食少旦暮間咳一二聲諸醫皆用蠶虫水蛭乾漆礪砂芫青紅娘子沒藥血竭之類惟戴人不然曰古方雖有此法柰病人服之必臍腹發痛飲食不進乃命止藥飲食稍進內經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故女子不月既心受積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃誘食乃涌出痰一二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自然滯流月事不為水濕所隔自依期而至矣亦不用蠶虫水蛭之類有毒之藥如用之則月經總來小洩反閉他症生

矣凡精血不足宜補之以食大忌有毒之藥偏勝而致天闕多矣 一婦人年三十四歲經水不行寒熱往來面色痿黃唇焦頰赤時咳三二聲問其所服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散驚甲散建中湯寧肺散針艾千百轉劇家人意倦不欲求治戴人憫之先涌痰五六升午前涌畢午後食進餘症悉除後三日復輕涌之又去痰一二升食益進不數日又下通經散瀉訖一二升後數日去死皮數重小者如麩片大者如葦膜不一月經水自行神氣大康矣

月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上

迫肺心氣不得下通故月事不來也

全文見水腫胃病見診病息奔條

雜方 太室女月水不來用雄鼠屎一兩燒存性為細末空心溫酒調下一錢神效

海掌中金丸治婦人乾血氣

川山甲炮

甘草

苦丁香

川椒

苦葶藶

白附子

猪牙皂角

草烏頭各三錢

巴菝一錢全用研

右為細末生蔥絞汁和丸彈子大每用一丸新綿包之內陰中一日即白二日即赤三日即血神效
仲婦人經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下白物礬石丸主之

礬石三錢燒

杏仁一分

右二味末之煉蜜丸枣核大內臟中劇者再內之

針灸

心經脉不通已有寒熱此穴大效三陰交三分立有效如疼時乃經脉要

膻經脈不通心術同

曲池

支溝

三里

三陰交此四穴壅

塞不通則瀉之如虛托不行則補之

月經斷絕

中極

三陰交

腎俞 合谷

東又法

四瀆在丹田傍一寸半

心經脉不通變成癥症飲食如常腹漸大如蠱 氣海用針

通管去其瀉水惡物

陰交

取法亦如上

甲月水不通奔泄氣上下引腰脊痛氣穴主之 女子不

下月水照海主之

婦人少腹堅痛月水不通帶脉主之

月水不利見血而有身則反敗及乳腫臨泣主之

脉師曰有一婦人將一女子年十五所來診言女子年十

四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰若是夫人親

女必夫人年十四時亦以經水下所以斷此為避年勿惟

後當自下

腎脉微瀆為不月

全文見虛實門

診

二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為息奔者
死不治全文見診

血崩

血崩蕪心痛者見心痛

大法

紫色成塊者血熱四物加黃連柴胡之類 氣虛血虛
者皆於四物內加參芪 急則治其標白芷湯調百草霜
甚者棕櫚灰後用四物加炒乾姜調理因勞者用人參帶
升補藥因熱者用黃芩因寒者用炒乾姜

痰氣汚
血宜行
之

丹溪云涎鬱胸中清氣不升故經脈壅遏而降下非開涎
不足以行氣非氣升則血不能歸隧道此論血泄之義甚
明蓋開胸膈濁涎則清氣升清氣升則血歸隧道不崩矣
故其症或腹滿如孕或臍腹疔痛或血結成片或血出則
快止則悶或臍上動其治法宜開結痰行滯氣消汚血

開痰方

江氏婦三十五六歲墮胎後血不止食少中滿倦怠不起
躁煩六脉沉大而數重取微弦予作怒氣傷肝感動胃氣
遂於二陳湯加川芎白朮縮砂二十貼而安

仲旋覆花湯治半產漏下脉弦而大

旋覆花

三兩本草云
王留飲結氣

蔥十四

新絳少

右三味以水三升煮取一升頓服之

千治婦人崩中下血不止以衣中白魚鱗蚕等分為末以
井花水服之日三服差

右三方開痰

羅備金散治婦人血崩不止

香附子

四兩
當歸尾二錢
五靈脂一兩

右為細末每服五錢醋調空心服立效

本治下血不止或成五色崩漏方用香附子春去皮毛中

行氣方

斷之畧炒為末每服二錢用清米飲調下此方徐朝奉傳
其內人有是疾徧服藥不效後服此方遂愈須久服為佳
亦治產後腹痛大是婦人仙藥常服益血調氣

大醋附丸治崩漏帶下積聚癥瘕臍腹疝痛用香附子不
以多少擦去毛用好醋煮出焙碾末醋煮糊為丸如桐子
大每服三十九米飲送下無時婦人數墮胎者此藥尤妙
一方用香附子白芷為丸

縮砂散治血崩用縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為細
末米飲調下三錢

右四方行滯氣

清汚血方

世治血崩用乾荷葉濃煎湯一碗空心服之立愈或調醋
炒香附末尤妙

雲治血崩不止五靈脂二錢炒熱加當歸酒同煎或水酒

童便各半盞同煎服一方五靈脂半生半熟為末酒調服

一方水煎五靈脂半乾去渣澄清再煎成膏入神麴末為
丸如桐子大空心溫酒下二三十丸便止

又方 麻茸醋 當歸各二錢 蒲黃半兩炒

右三味為末溫酒調下五錢七日三服

神桂枝茯苓丸治婦人有癥在臍上動下血不止方見胎動下血

右四方清汚血

脾胃虛者補之

垣當歸芍藥湯治婦人經脈漏下不止其色鮮紅時值七

月處暑之間先因勞役脾胃虛弱氣短逆自汗不止身熱
悶亂惡見飲食亦不思食沉困懶倦四肢無力大便時瀉
後復因心氣不足其經脈再下不止惟覺氣下脫其元氣
逆上全無惟覺心腹中氣不行氣短則不能言是無力以
言非懶語也此藥主之

黃芪半錢

白朮

蒼朮

去皮

當歸身

白芍藥各五錢

甘草炙

生地各三分

柴胡二錢

熟地黄

陳皮去白各五分

右十味為齋末作二味水煎去查熱服空心一服之後漸減次日諸症悉去頓喜飲食所以者何蓋氣通而聞飲食之香得平康故也

仲婦人陷經漏下黑不解膠姜湯主之即芎歸膠艾湯

芎藭

阿膠

甘草各二兩

艾葉

當歸各三兩

芍藥四兩

熟地黄

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去查內膠令

消盡溫服一升日三服不瘥更作一云加乾姜一兩胡洽治婦胞動無乾姜

海四物膠艾湯方見婦人門大法條

通益胃升陽湯治血脫益氣古人之法也先補胃氣以助

生長故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉世皆以為補氣殊不知其能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之一身內穀為寶

黃芪二錢

人參

有嗽者神麩炒各一錢半升麻

柴胡各五分

白朮三錢

當歸身酒浸

甘草炙

陳皮各一錢

生黃琴

二錢瀉盛暑之伏金肺逆秋涼不用

一方用生地

右齋末每服三錢或五錢如食添再加之如食減已定

三錢內更減之不可多服每服二錢水煎去查熱服如

腹痛每服加白芍藥二分中桂少許如渴口乾加乾葛

二分如嗽去人參服不計時候蓋先服此益胃氣升陽湯不止却服後方柴胡

調經湯大舉大升之也

氣陷者升舉之

宜德候經歷家人病崩漏醫莫能效切脉之後且以紙疏其症至四十餘種為制調經升陽除濕湯療之明日而十

減其八前後五六日良愈

調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因飲酒勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜臥四肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆中指下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脉二者受邪病皆在脉脉者血之府也人者脉之神也心不主令胞絡代之故曰心之脉主屬心系心系者胞絡命門之脉也主月事生孕皆由脾胃虛而心包乘之故漏下血水不調也况脾胃為陰陽之根蒂當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

柴胡

防風

甘草

藁本

升麻各一錢

羌活

蒼朮

黃芪各一錢半

獨活五分

當歸酒浸五分

蔓荊子七分

右咬咀水五大盞煎至一大盞去渣稍熱服空心服藥畢待少時以早餅壓之可一服而已如灸足太陰脾經中血海穴二七壯或三七壯立已 此藥乃從權衡之法用風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以救其血之暴崩也若病愈經血惡物已盡主病雖除後必須以黃芪甘草人參當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血藥是也若經血氣惡物下之不絕尤宜救其根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

柴胡調經湯治經水不止鮮血項筋急惱痛脊骨強痛不思飲食

羌活

獨活

藁本

升麻各五分

蒼朮錢一

柴胡根分

葛根

當歸身

甘草各三分

紅花分

右咬咀作一服水煎去查稍熱空心服微汗立止

一婦人經候黑血凝結成塊左廂有血瘕水瀉不止穀食有時一化有時不化至今歲四月血塊暴下併水注俱作是前後二陰有形之血脫竭於下既久經候尤不調水瀉日見三兩行食罷心煩不快飲食減少甚至瘦弱東垣先生曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜若不本四時以順為逆非其治也且治之之法必先歲氣無代天和無盛感無虛遺人天殃無致邪無失正絕人長命故聖人云陽感陰虛下之則愈汗之則死陰感陽虛汗之則愈下之則死大抵聖人立法各自有義且如升陽或發散之劑是助春夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞

殺寒涼之氣此病是也當用此法治之乃升降浮沉之理也夫天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病逆之則殺人矣故經云順天者昌逆天者亡可不畏哉夫人之身亦有天地四時之氣不可止認在外人體亦同天地也今經漏不止是前陰之氣血已下脫矣水瀉又數年不愈是後陰之氣血又下陷矣後陰者主有形之物也前陰者精氣之門戶俱下竭是病人周身之氣常行秋冬之令陰主殺此等收藏之病是也陽生陰長春夏是也在人身之中令氣升浮者穀氣上行是也既病則周身血氣皆不生長穀氣又不升其飢肉消少是兩儀之氣俱將絕矣既下元二陰俱脫血氣消竭假令當日元是熱症今下焦久脫已化為寒矣此病久沉久降寒濕太勝當急救之瀉寒以熱降濕以燥大升大舉以助長生補養氣血不致偏枯聖人

立治之法云濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經云風勝濕是以所勝平之也當調和胃氣次用白朮之類以燥其濕而滋元氣如其不止後用風藥以風勝濕此之謂也此藥便是大舉大升以助春夏二濕之久陷下之至治也又一本云此病次用四物隨濕症加減

大獨聖散治婦人血崩不止用防風去蘆不以多少為細末酒煮白麵清調下二錢空心食前日二服更以麩作糊酒投之極驗 治血崩夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時服

治崩中不止芎藭八兩清酒五升煎至二升半分三服不耐者徐徐進之義云芎不可久服令人暴死

右大舉大升之劑治崩脉沉弦而洪或沉細而數者皆胃氣下陷也或崩而又久瀉者亦胃氣下陷也故舉之

升之其病愈也

脾胃虛宜補宜升

經水漏不住有二補前人之闕 婦人脾胃虛損致命

門脉沉細而數疾或沉弦而洪大有力寸關脉亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者脉必弦細寒作於中有赤帶者其脉洪數病熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行而先發寒熱往來兩脇急縮兼脾胃症出見或四肢困熱心煩悶不得眠臥心下急宜大補脾胃而升降氣血可一服而愈或先貴而後賤或先富而後貧病名脫營者心氣不足其火大熾旺於血脈之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉顏倡不病者此心病也不形於脉故脾胃飲食不調其症顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令惧死而心不動以

心虛宜勸戒

虛挾積
滯者積
中去積

大補血氣之藥補養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補
陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則
陽氣內動發則心下崩數波血也故經曰大經空虛發則肌痺傳為脈痿此之謂也
丁未年冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾殞身失
血自後一次經數日而來今次不止其人心窄性急多驚
以予料之他日必因心氣不足飲食失節得之大方曰容
到彼診得掌中寒脈沉細而緩間而沉數九竅微不利四
肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足飲食
失節脾胃虛弱之證胃脘當心而痛左脇下急縮有積當
臍有動氣腹中鳴下氣大便難諸虛證極多不能盡錄擬
先治其本餘證可以皆去與安心定志鎮墜其驚調和脾
胃大益元氣補其血脈養其心神以大熱之劑去其久寒
凝在皮膚內少加生地黃去命門相火不令四肢痿弱黃

芪當歸人參湯

黃芪錢一

當歸半錢

人參錢一

陳皮五分

草薺七分

神麴半錢消食去脾胃寒

黃連一錢鎮心驚

杏仁九箇研如泥

麻黃錢一不去節表開汗

桂枝半錢必先歲氣

無代天

生地三分去腎火大去和也冬月相火之旺

右為粗末水三大盞先煮麻黃數沸去查入前藥同煎
至一大盞於巳午之前食消盡服之其胃脘痛乃胃上
有客寒與大熱藥草薺九一十五丸其痛立止再與
肝之積藥除其積之根源而愈

右虛挾積滯而崩嘗治一老婦人血崩不止流流不絕
滿牀皆血起牀不得者三月矣腹滿如孕予作虛挾痰
積汚血治之用四物四兩參朮各一兩甘草半兩以治
虛香附三兩半夏兩半茯苓陳皮枳實縮砂玄胡各一

兩以破痰積汚血分二十貼每貼煎乾加荷葉側柏葉湯再煎服之服盡良愈今再不發神效

雲栢黃散療經血不止

虛挾濕
音伏龍
肝燥之

黃芩一兩二錢半 側柏葉 蒲黃各一兩 伏龍肝一兩

右咬咀用水二升煎取八合分為二服

又方治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

芎藭十二分 阿膠 青竹茹各八分 續斷

地榆 小蘗根各三分 當歸六分 生地

伏龍肝各十分

右用水九盞煮取三盞去渣分作三服

衍治婦人血露蚕砂一兩炒伏龍肝半兩阿膠一兩同為

末温酒調空心二三錢以知為度大全名無此散無阿膠

羅伏龍肝散治氣血勞傷衝任脈虛經云非時忽然崩下

或如荳汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛

經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝一兩 甘草半兩 赤石脂一兩 芎藭三分

肉桂半兩 熟地二兩 當歸 乾姜各七錢半

艾葉二兩微炒 麥門冬去心一兩半

右件為粗末每服四錢水二枚水同煎

右四方伏龍肝例蓋燥可去濕也前二方去濕熱後二

方去寒濕按伏龍肝為止血之聖藥先賢治崩用旋覆

花半夏輩治膈間濕痰而崩止者亦是此意

虛脫者
瀝之

大崩中下血不止小腹痛

芍藥一兩微炒 黃芩 栢葉六兩微炒丹溪云栢葉性多燥

右水一升煎取六合入酒五合煎取七合空心分為二

服一方為細末酒調二錢一方有鹿角膠等分酒調治

白帶臍腹痛

世牡礪散治月水不止衆藥不愈者牡礪火煨研細用醋調成丸再煨過通紅候冷研細出火毒却用醋調艾末熬成膏和丸如桐子大每服五十九醋艾湯下

素陰虛陽搏謂之崩陰陽別論

脈數有熱為熱

相火故血走而崩也

生地兩半

黃連分三

黃柏分二

黃芩分一

羌活

柴胡

知母

升麻

川芎

各二分

防風分三

藁本分二

甘草分一

紅花少許

歸身分五

細辛分一

荆芥穗

蔓荆子分一

右咬咀都作一服水三大盞煎至一盞去查稍熱服空

心足太陰脾之經中血海二穴在膝臏上內廉白肉際二寸中治女子漏中惡血月事不調逆氣腹脹其脈緩者是也灸三壯足少陰腎之經中陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之治膝如錐不得屈伸舌縱涎流煩逆溺難少腹急引陰痛股內痛婦人漏下不止腹脹滿不得息小便黃如蠱女子如姪身可灸三壯

大 小薊湯治崩漏不止色明如水得溫則煩悶者此陽傷於陰令人下血當補其陰脈數疾小者順大者逆

小薊莖葉

研取汁

生地黃汁

白朮半兩

右三件入水一盞煎至一半去查溫服

芎藭酒治崩中晝夜不止醫不能治

芎藭

兩

生地汁

盞

右用酒五盞煮芎藭一盞去渣下地黃汁再煎二三沸
分為三服

治崩中去血不止

大小薊根兩白茅根兩

右二味細切用酒五升煮取四升去渣分四服

丹漏下乃熱兼虛四物加黃連

經金華散治血室有熱崩下不止服溫藥不效者

延胡索 瞿麥穗 當歸 乾姜

牡丹皮各一石膏兩 桂心別研為末

蒲黃兩 葶藶仙半七錢

右為細末每服三錢水一盞半空心溫服日二

大治崩中下血黃芩不以多少為細末每服一錢燒秤鍾

通赤投酒中令沸却用其酒調服許學上云崩中多用上血補血藥治之陽乘於

陰前所謂天暑地熱經水
沸溢是也金華散亦妙

丹經水多去不能住以三補丸加莎根龜板金毛狗脊三

者苓連
栢也

和孟官人母年五十餘血崩一載僉用澤蘭丸黑神散

保安丸白薇散補之不效戴人見之曰天癸已盡本不當

下血蓋血得熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哭

悲甚則肺葉布心系為之急血不禁而下崩內經曰陰虛

陽搏謂之崩陰脈不足陽脈有餘數則內崩血乃下流舉

世以虛損治之莫有知其非者可服大劑大劑者黃連解

毒湯是也次以香附二兩炒白芍藥二兩焙當歸二兩焙

三味同為細末水調下又服楨榔丸不旬日而安

恒丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不

脈弦無力
力臍下
冷為寒

節所得經隔少時其脈兩尺俱弦緊而洪按之無力其證

自覺臍下如水求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物雖多
間下如屋漏水下時有鮮血不多右尺脈時微洪屋漏水
多暴下者是急弦脈為寒多而洪脈時見乃熱少合而言
之急弦者北方寒水多也洪脈時出者命門包絡之火也
黑物多赤物少合成屋漏水之狀也

川芎

四分

歸身

一錢二分

生艾葉

一錢

阿膠

六分另後炮入

白芍

三分

熟地

三分以瀉大洪脈

丁香

四分

右為細末作一服水二盞煎至五沸去查入膠艾再上火煎至一大盞空心宿食消盡帶熱服之三服效

太治血崩

熟艾

如雞子大

阿膠

兩

乾姜

一錢

右粗末用水五盞先煎艾葉姜至二盞半入膠消溫分二服空心服

又方治崩中不止丁香二兩為細末用酒三升煮取一升空心頓服必效方用丁香百顆酒煎服又方益智炒為細末鹽米飲調下

血見黑則止

世香礬散治血崩香附不以多少極酸醋浸一宿炒焦為灰存性每一兩入白礬末二錢米飲調服空心神妙一法用荷葉湯調尤妙

氣滯者行氣灰止之

世用香附子去毛炒焦黑存性為細末用極熱酒調下二錢放溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢七如血山崩不止者亦能解之米飲調亦可許學士云治下血不止或成五色崩漏香附子是婦人仙藥也

世婦人血崩不止用檳榔燒灰存性碾末以溫酒調下甚妙

血汚者行血灰

世五靈脂散治婦人血山崩諸藥不止者五靈脂炒令烟

止之

盡為末每服一錢温酒調下一法每服三錢水酒童便各半盞煎服名抽刀散
琥珀散治崩暴下血

赤芍

香附子

枯荷葉

男子髮皂洗

當歸

櫻櫚炒焦存性

烏紗帽是漆紗頭巾取陽氣先出故也

右等分除櫻櫚外其餘並用粗片新瓦上煨成黑灰存性三分為細末每服五錢空心童便調下如人行十里再一服七八服即止若產後血去多加米醋京墨麝香少許一法先以五積散加醋煎投一二服次服五靈脂散

療經血不止

婦人經血正淋漓

舊蓮蓬燒作灰

熱酒一盃調八字

自然安樂更無疑

衍黃牛角鯁用尖燒為黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢白痢

大治漏下不止者鹿角燒灰細研食前温酒調下二錢

又方桃仁燒灰研細食前温酒調下二錢 又方亂髮皂

角水洗淨燒為細末空心温酒調下二錢

世治血久崩夏枯草燒存性為末空心米飲調下此用灰

與前用草不同

大荆芥散治婦人崩中不止用好麻油點燈多着燈心就

上燒荆芥焦色為細末每服三錢童便調下

簡治婦人漏下血不絕槐花鵝不以多少燒作灰細研食

前温酒調二錢七

產治崩中不止不問年月遠近用槐耳燒作灰為末以

酒服方寸七

氣陷者
升氣灰
止之

血熱者
涼血灰
止之

寒者熱
灰主之

大神應散治血崩不止桂心不以多少炒極焦存性為末

每服一二錢米飲調下

如聖散治血山崩

棕櫚

烏梅各一兩

乾姜

一兩五錢並燒過存性

右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久患不

過三服愈

治血崩屢効方

當歸

白芍

乾姜

棕櫚

各等分

右各煨存性研為細末醋調以有節朱筋左攪四十九

轉食前服

脫者流
灰止之

又方用棕櫚白礬煨為末酒調二錢服

治暴崩下血百草霜二錢狗膽汁一處拌定分作二服當

灰雜方

歸酒調下

又方京墨為末二錢七同燒露蜂房為末三指撮酒調服

世治血崩用葫蘆去子穰實荆芥穗燒存性飲湯服

右二十一方皆燒灰黑藥經云北方黑色入通於腎皆

通腎經之藥也夫血者心之色也血見黑即止者由腎

水能制心火故也

運氣運氣血崩皆屬風火經云少陽司天之政初之氣風勝乃

搖候乃大溫其病血崩是也

雜方

海治崩不定或淋淫經年者

白礬

溶開成一兩沒藥

硃砂

五分

黃丹

五分

右件將白礬溶開成汁下餘藥細末一處攪勻就成丸

子如彈子大每用一丸新綿裹定內陰中立效

針灸

通

經血過多不止并崩中

心術

三陰交

行間

各針訖

通理

足小指上二寸刺二分灸二十七壯

三陰交 太衝

東胞門 不閉漏下惡血不禁 氣門在關元傍三寸刺入五分

集血崩 并漏下 中極補 子宮二寸 敗血不止 三

陰交 百勞 風門 中極 腎俞 膏盲 曲池 絕

骨

婦人 不字陰暴出經水漏然谷主之 婦人漏血腹脹

滿不得息小便黃陰谷主之 千金云漏血少腹痛脹 滿如阻熱寒熱腹偏腫 女

子血不通會陰主之 女子漏血太衝主之

脈 問曰五崩何等類師曰白崩者形如涕赤崩者形如絳

黃崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如衄血也

寸口脈弦而大弦則為滅大則為乾滅則為寒乾則為虛

寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下 又見諸

仲 寸口脈微而緩微者衛氣疎疎則其膚空緩者胃弱不

實則穀消而水化也穀入於胃脈道乃行水入於經其血

乃成榮盛則其膚必踈三焦絕經名曰血崩

脈 診婦人漏血下赤白日下血數升脈急疾者死遲者生

診婦人漏下赤白不止脈小虛滑者生大緊實數者死

赤白帶

大法 赤白帶羅先生法或十棗湯或神祐丸或玉燭散皆可

用之虛者不可峻攻實者可行 血虛加減四物湯 氣

虛以朮參陳皮間與之 赤屬血白屬氣主治燥濕為先

濕甚者固腸丸 相火動者諸藥中加炒黃柏 滑者

加龍骨赤石脂 滯者加葵花 白者治白帶 赤者治赤帶 性躁者加

黃連 寒月少加姜附臨機應變先須斷厚味

下多 是濕痰 帶下與夢遺同法治之 肥人有帶多是濕痰用海石半

夏南星炒栝青黛蒼朮川芎 瘦人帶病少如有多是熱

用炒栢蛤粉滑石川芎青黛樗皮 帶漏俱是胃中痰積
流下滲膀胱出於大腸小腸宜升提甚者上必用吐以提
其氣下用二陳湯加白朮蒼朮仍用丸子

治結痰白帶以小胃丹半錢半飽津液下數丸候鬱積行
卻服補藥

白朮兩一 蒼朮兩半 紅白葵花二錢半
白芍半錢

右蒸餅爲丸空心煎四物湯下廿丸

陶遵道外姑年七十形瘦善啖白帶食前姜湯吞大補丸
五十九一二次午膳後及臨臥時各與小胃丹十五丸愈

乳香散治赤白帶下

草菓一箇去皮入射香一小塊用麩餅裹火炮焦黃留性取出和麩用之
右爲細末每服二錢陳皮飲調下重者三錢

帶下不止用椒目白芷 治白帶用椒目爲末米飲調

濕熱者宜乾燥

樗皮丸治赤白帶有濕熱者

芍藥五錢 良姜三錢燒灰 黃栢二錢各炒成灰 椿根皮兩半

右爲末粥丸每服三五十九米飲空心吞下

赤白帶因濕熱勝而下者

蒼朮兩各炒 白芍兩各一 枳殼三錢 椿根皮兩炒二
乾姜兩煨二 地榆兩半 甘草三錢 滑石兩炒

右末粥丸米飲下

治帶下

椿根皮兩二 神麩炒 麥皮麩炒 黃栢兩各炒
芍藥兩半 滑石兩半 枳殼兩半 蒼朮兩
右爲末糊丸桐子大每服五十九空心

固腸丸治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之後用此以燥下濕亦不曾單用看病作湯使椿根皮為末粥糊為丸此藥性涼而燥須炒用一方加滑石一半治白帶因七情所傷脈數者

黃連炒

側柏酒蒸

黃柏炒各半兩

香附炒醋

白朮炒各兩

白芷燒存性三錢

椿根皮炒二兩

白芍一兩

木香錢三

右為末飯粥為丸米飲湯送下

右五方治帶椿皮例涼燥之劑濕熱盛者宜之後一方有黃連香附木香故可治七情所傷

滑脫者宜滋

大地榆膏治赤白帶下骨立者地榆一斤用水三升煎至一半去渣再煎如稠錫絞淨空心服三合日二服 治漏下五色地榆三兩剉用醋一升煮十餘沸去渣稍熱食前

服一合

干治婦人赤白帶下三葉酸漿草陰乾為末空心溫酒下三錢七

右三方治帶地榆例寒澁之劑亦濕熱盛而滑脫者宜之按三葉酸漿草葉細如萍叢生莖端有三葉俗又名布谷飯布谷者鳩也蓋鳩常食之故又名鳩漿草衍義誤入苦蕒條即曰三葉酸漿草豈苦蕒即酸漿歟苦蕒有大如金柑味酸可食故亦名酸漿非三葉也三葉酸漿小葉布地而生葉皆三瓣惟開黃花其莖葉皆酸者

真陰虛者補陰

丹白帶

龜板炙

枳子各二兩

黃柏炒一兩

白芍七錢半

乾姜炒二錢半

香附半兩

山茱萸

苦參

檉皮

貝母各半兩

右為末以酒糊為丸空心下

赤白帶

龜板酒炙二兩 黃柏炒一兩 乾姜炒一錢 枳子半二錢

右酒糊為丸日二服每服七十九

又方治帶下脈數者

枸杞根一斤 生地五斤

右二味以水一斗煮取五升分三服

右三方治帶龜板黃柏地黃例腎水真陰虛者宜之

脾傳之腎病名曰疝瘕少腹寃熱而痛出白一名白蠱當

少腹熱痛者為熱瘕

此之時可按可藥全文見診生死○王註云出白澀出白液也蓋便濁白帶之類戴人云遺溺閉

瘕陰痿疝痺精滑白淫皆男子之疝也血涸不日月罷腰

膝上熱足躄盛乾瘰閉少腹有塊或定或移前陰突出後

陰痔核皆女子之疝也又云女子不謂之疝而謂之瘕也

小腸移熱於大腸為伏瘕為沉全文見診病傳變

赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結于脈故津液涌溢是為赤白帶下本不病結緣五經脈虛結熱

屈滯于帶故女子臍下痛陰中綿綿而下也經曰任脈為

病男子內結七疝女子帶下瘕聚王註云任脈自胞上過

帶脈貫於臍上故男子內結七疝女子帶下帶脈起于季

脇章門似束帶狀今濕熱寃結不散故為病也經曰脾傳

之腎名曰疝瘕小腸寃結而痛出白一名曰蠱所以為帶

下寃結也寃屈也屈滯而病熱不散先以十棗湯下之後

服苦練丸大延胡散調下之熱去濕除病自愈矣十棗湯方見傷寒

苦練丸治婦人赤白帶

苦練碎酒浸 茴香炒 當歸

右等分為末酒糊為丸每服三五十九空心溫酒下如

腰腿疼四物湯四兩加羌活防風各一兩煎湯送下

治赤白帶下腰痛或少腹痛有熱者

檮皮二兩

延胡索

桃仁

側柏葉

川練肉

茴香

當歸各半兩

香附錢八

官桂

烏藥各三錢

麥皮炒一兩

右末酒糊為丸每服五六十九神效

少腹冷痛脈微為寒濕

治帶下并腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋敗膿血所致李無已期須以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍藥白礬各半兩礬燒枯另研餘為末同以蠟丸如桐子大空肚及飯前米飲下十九或十五丸候膿盡仍別以補藥佐之

固真丸治白帶不止臍下冷痛喜乾食惡湯飲者方見寒濕

本治婦人赤白帶下

龍骨半兩

舶上硫黃三錢

右為末每服半錢無灰酒調空心服一日三服不問遠年近日盡效

伏龍肝散治婦人赤白帶下久不瘥肌瘦瘁黃

棕櫚燒存性

伏龍肝

屋梁上塵懸長者炒烟盡出火毒

右等分研和入龍腦麝香各少許每服二錢酒調醋亦可患十年者半年可安有人經年崩漏不止諸藥不效脈濡微與此伏龍肝散兼白礬丸服之愈白礬丸用白礬四兩附子

二兩黃狗頭骨灰四兩為末粥丸桐子大每服三十九

固真湯白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不效診

得心包尺脈極微其白帶下流不止叔和脈經云崩中日久為白帶漏下多時骨水枯言崩中者始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津液復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經為引用為使以

大辛甘油膩之藥潤其枯燥而益津液以大辛熱之氣味補其陽道生其血脈以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥為佐而益元氣名曰補經固真湯

柴胡 甘草各一錢炙 乾姜細末二錢 橘皮不去白一錢

人參二錢 郁李仁一錢去皮尖另研如泥 白葵花七朶去萼

生黃芩一錢細切另入

右件除黃芩外以水二大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至一盞去查空心無宿食熱服之候少時早饍壓之

調經補真湯冬後一月微有地泥水泮其白帶再來陰戶中寒一服立止大進飲食

麻黃半錢不去節 杏仁三箇 桂枝少許 甘草炙五分

良姜一錢 黃芪七分 人參 歸身

白木各五分 蒼朮二分 澤瀉一錢 羌活四分

防風二錢 柴胡四分 獨活 藁本各二分

升麻根 黃芩各五分 乾姜二分炮 白葵花七朶去萼

右除黃芩麻黃外都為粗末先將二味水二盞煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二盞又再入生黃芩煎至一盞去查稍熱服空心宿食消盡日高服之一時許可食早饍

寒帶雜方

本治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶漸漸瘦瘁飲食少味累年無子地黃丸

熟地一兩 山茱萸 白蕪荑 乾姜

白芍微炒 代赭石醋淬各一兩 厚朴

白姜蚕

右細末煉蜜丸如桐子大每服四五十九空心酒下日
 三服此龐老方婦人有白帶是第一等病令人不產育
 宜急治之此扁鵲過邯鄲聞貴婦人所以專為帶下醫
 也

恒桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂錢一 附子錢三 黃栢 知母各五分

如少食常飽有時似腹脹加白芍藥半錢如不思飲食
 加五味子二十箇如煩惱面上麻木如虫行乃胃中元
 氣極虛加黃芪一錢人參七分炙甘草二分升麻半錢
 為粗末作一服水二盞煎至一盞法如常食遠熱服

海香附六合湯治赤白帶下方見婦人大法條即四物加茴香桂也

太治赤白帶下年月深久不瘥

白芍兩二 乾姜兩半

右各炒黃色同為末空心米飲調下二錢日二服

坐藥龍鹽膏

丁香半錢 全蝎五箇 木香半錢 良姜錢一

川烏頭半錢 枯礬半錢 龍骨 茴香

歸稍各二錢 玄胡五錢 炒黃鹽二錢 厚朴三錢

酒防已 紅荳 肉桂各二錢 木通錢一

右為末煉蜜丸如彈子大綿裹留絲在外納陰戶內
 又方勝陰丹為上藥力小再取三錢內加行性熱藥

三奈子 川烏 大椒各五分 柴胡

羌活各二錢 全蝎三箇 大蒜 破故納與蒜同焙

升麻二分 麝香少許 甘松三分

白礬二分

右為細末同前法用制

又方回陽丹

全蝎

升麻各二分

草烏頭三分

水蛭三箇

重三箇去翅足炒

川烏七分

大椒五分

柴胡七分

大蒜

破故紙各二分

三奈子

葶撥各五分

甘松二分

羌活三分

枯礬五分

炒黃鹽一錢必用

之藥去之則不效

右為極細末依前制如指尖大用綿裹納陰戶中覺臍下暖為效

虛寒也

酒煮當歸丸治癩疔白帶下疰脚氣腰已下如在冰雪中以火焙炕重厚綿衣蓋上猶冷不任寒之極也面白如枯魚之象肌如刀削消瘦之速也小便不止與白帶長流而重如山行步欹側不能安地腿膝枯細大便秘結口不能

言無力之極食不下心下痞煩心懊懣不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱竭故噦嘔不止胃寒之極也其脈沉厥緊而澁按之空虛若脈洪大而澁按之無力猶為中寒之證况按之虛空者乎按之不鼓是為陰寒之極也其空虛乃氣血俱虛之極也

當歸兩

茴香兩

黑附子七錢炮制去皮臍

良姜錢

右四味剉如麻苴大以好酒一升半同煎煮至酒盡為度炭火焙乾同為極細末入

炒黃鹽

丁香各半兩

全蝎三錢

柴胡二錢

升麻根

木香各一錢

苦練子

甘草各半錢炙

玄胡索錢四

右與前四味藥末同為細末酒煮麩糊為丸如桐子大

每服二十九空，心宿食消盡，淡醋湯下，忌油膩冷物酒麪。

當歸附子湯治臍下冷痛赤白帶下

柴胡分七

良姜

乾姜

附子各一錢

升麻分五

甘草分六

當歸二錢

錫稻分五

炒黃鹽分三

黃栢許少

右件為粗末，用五錢水二盞煎至一盞，去渣熱服為丸，亦得。

右炒鹽例東垣回陽丹註云必用炒黃鹽無則不效，蓋寒疝之要藥也。

固真丸治白帶久下不止，臍腹冷痛，其寒捫之如冰，陰中亦然，目中溜火，腎水侵肝而上溢，故目中眵眵無所見，齒皆惡熱，飲痛須得黃連末擦之，其痛乃止，惟喜乾食，大惡湯飲，此病皆寒。

濕乘其胞內，故喜乾而惡濕，肝經陰火上溢，走於標，故上壅而目中溜火，腎水侵肝而上溢，故目中眵眵無所見，齒惡熱，飲者是少陽陽明經中伏火也。當大瀉寒濕以丸藥治之，故曰寒在下焦治主宜緩，大忌湯散，以酒制白石脂、白龍骨以枯其濕，以炮乾姜大辛熱瀉寒水，以黃栢之大寒為因用，又為鄉導治法云。古者雖有重罪不絕人之後，又為之伏其所主，先其所因之意，又瀉齒中惡熱，飲也以柴胡為本經之使，以芍藥半錢以導之，又恐辛熱之藥太甚，損其肝經，故微瀉之，以當歸身之辛溫大和其血脈，此用藥之法備矣。

白赤脂一錢燒赤水

乾姜炮四錢

黃栢酒洗五分

柴胡一錢

白龍骨二錢酒飛

白芍分五

當歸三錢酒洗

右為細末水煮稀糊為丸如雞頭大每服三十九空心宿食消盡煎白沸湯放溫送下無令胃中停住待少時以早饑壓之是不令熱藥犯胃忌生冷硬物與酒濕麪

滑以潤燥

右石脂龍骨之澁以去脫蓋濕多滑脫者宜之
補真潤腸湯治白帶下陰戶中痛控心而急痛身黃皮緩身重如山陰中如水一名助陽湯

防風錢一

柴胡二分錢

良姜二錢

乾姜錢一

陳皮五分

白葵花杜

生黃芩五分

郁李仁

甘草各一錢

右為細末剉散只作一服水二盞煎至一盞去查熱服食前

右葵花郁李仁之滑以潤燥蓋枯涸滯着者宜之

丹摩腰丹治白帶腹痛方見腰痛門甚效

虛而有積者先攻後補

潔治帶下少腹寃結而痛者先以十束湯下之次服苦練丸大玄胡散調之是先攻後補之法也

丹治結痰白帶先於半飢時以津下小胃丹十餘粒服至飽積行却用白朮四物等藥補之亦先攻後補之藥也

脈微食少為虛宜補

丹胡安人白帶下月經甚多食少倦怠面黃經中如有血塊者有如筋膜者與參朮等補血氣調脾胃後諸症皆退惟帶未止以檇皮丸主之方見濕熱條

右法治帶下虛而有熱者若虛而有寒脈微面白不澤無力以言者東垣補經固真湯丁香膠艾湯香桂六合湯是也

脈滑大有方為實宜攻

丹和頓頓丘一婦人病帶下連綿不絕白物或來已三載矣命予脈之診其兩手脈俱滑大而有方得六七至常上熱口乾眩暈時嘔酢水余知其實有寒痰在胸中以瓜蒂

散吐出冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹攻以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈 息城李左衙之妻病白帶如水窈漏中綿綿不絕穢臭之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷陽起石硫黃姜附之藥重重燥補污水轉多戴人斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰三二升次日下沃水斗餘行三遍汗出周身至明旦病人云汚已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一男

下利夜熱腹滿為汚血仲問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當以溫經湯主之

吳茱萸三兩

當歸

芍藥

人參

桂枝

阿膠

牡丹去心

生姜

甘草各二兩

半夏半升

麥門冬升一

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服 亦主婦人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水來過多及至期不來

丹赤白帶用五靈脂半生半熟為末酒調服

大治白帶下

茅花一握炒

棕櫚灰三

嫩蓮葉三

甘草節錢一

右為細末空心酒方寸匕

益母散治帶下赤白惡露下不止益母草開花時採搗為細末空心溫酒二錢日三服 香礬散神效方見崩中血見黑止條○

即醋炒香附灰也

雜方

赤白帶皆屬於血有出於大小腸之分黃荊子炒焦為末米飲調服

又方治白帶用白芷以石灰炒去皮茜草少許粥糊丸服

大白芷散治赤白帶下

白芷兩 海螵蛸二箇 胎髮一團

右為細末空心溫酒調下二錢

山治赤白帶下舊蓮房為末入麝香空心米飲下

治帶下用芍藥炒黑為末每服三錢七調酒下

赤白帶用生狗頭骨燒灰存性酒調服或入藥服

治帶下溫水和服雲母末三方寸七立見神效

崔氏四花穴治赤白帶如神取穴法見勞瘵門

赤白帶 中極 白環俞一十半瀉六

又法 中極 白環俞各五 腎俞二十半灸

集 又法 氣海 中極 白環俞不效取後穴 三陽交備多瀉少

東 又法 榮池三分灸三十壯在內踝前後 又法 陰

陽在足拇指下屈裏 又法 三陰交五分 交儀二十

漏陰在內踝下五分微有動脈 又法 三陰交五分 交儀二十

桑 赤帶漸心術如下赤帶不已 氣海六分 中極 委中各

分 白帶漸心術如下白帶不已 曲骨 承陰各七分 中

極在兩傍注 婦人得子多變成白水淋漓而下經久身面虛腫

陰谷二寸 絕骨二寸 如喘滿 魚際透大淵左右共

海帶病太陰主之灸章門穴麥粒大各三壯効

甲 婦人下赤白沃後陰中乾痛惡合陰陽少腹臍堅小便

呼治肺經 水氣極妙

閉曲骨主之 女子赤白帶腰膈主之 女子赤淫大赫
主之 女子絕子陰挺出不禁白瀝上竅主之 女子赤
白瀝心下積脹次竅主之 女子赤淫時白氣瘰月事少
中竅主之 女子下蒼汁不禁赤瀝陰中痒痛引少腹控
眇不可俛仰下竅主之 女子疝少腹腫赤白淫時多時
少蠱溝主之 月事不利見赤白而有身及前陰寒行間
主之 女子疝及少腹腫溏泄癰遺溺陰痛面塵黑目下
背痛太衝主之 女子俠臍疝中封主之 女子疝瘕按
之如以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛經水來下陰中腫
或癢灑清汁若葵羹血閉曲泉主之 婦人下赤白裏急
瘕瘕五樞主之

診

秦腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓皆為瘕大奇論○
急為寒甚不鼓則血不流血不流而寒薄故血內凝而為瘕也

三陽急為瘕三陰急為疝王註云太陽受寒血聚為瘕脈急

者曰疝瘕少腹痛平人氣

脈師曰婦人帶下六極之病脈浮則為腸鳴腹滿緊則為
腹中痛數則為陰中癢痛則生瘡弦則陰疼掣痛 婦人

帶下脈浮惡寒者不治

胎前白帶

有孕白帶

蒼朮三錢

白芷二錢

黃連炒一錢半

黃芩炒二錢

黃柏炒一錢半

白芍二錢半

樗根皮炒一錢半

山茱萸二錢半

右為末糊丸空心溫酒下五十九

濕熱

大學綱目卷之二十四

醫學綱目卷之三十五

婦人部

胎前症

求子

受胎

惡阻

妊娠經來

胎漏下黃汁或如葶汁

胎動不安

胎上逼心

跌撲傷胎毒藥傷胎

妊病可下胎斷胎

胎自墮

十月未足欲產過期不產

難產縮胎法

坐草法

催生法

下死胎法

求子法

大法謂經為先

胎前之道始於求子求子之法莫先調經每見婦人之無

子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作

痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成

孕矣詳夫不調之由其或前或後及行後作痛者虛也其

少而淡者血虛也多者氣虛也其將行作痛及凝塊不散

者滯也紫黑色者滯而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪滯者香附縮砂木香檳榔莖仁玄胡滯久而沉痼者吐之下之脈証熱者四物加苓連脈証寒者四物加桂附及紫石英之類是也直至積去滯行虛回然後血氣和平能孕子也予每治經不調者只一味香附末醋爲丸服之亦百發百中也

肥人多痰宜燥

肥婦人肥盛者多不能孕育以身中有脂膜閉塞子宮以致經事不行瘦弱婦人不能孕育以子宮無血精氣不聚故也肥人無子宜先服調理藥

當歸一兩酒洗

川芎七錢半

白芍

白朮

半夏湯洗

香附

陳皮各一兩

茯苓二兩

甘草一兩

作十貼每貼姜三片水煎吞後九子

白朮二兩

半夏一兩

茯苓半兩

橘紅四錢

川芎

香附各一兩

神麴炒半兩

甘草二錢

粥丸每服八十九丸如熱多者加黃連枳實各一兩服前藥訖却服後蠱斯丸

厚朴

杜仲

桂心

秦艽各二錢

附子

茯苓各六錢

白微

半夏

乾姜

牛膝

沙參各二錢

人參四錢

細辛半兩

右爲末煉蜜丸小豈大每服五丸空心酒下加至十九不妨覺有娠三月後不可更服忌食牛馬肉則難產當

出月

按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者蓋忌於瘦人無血者若肥人濕多者又兼前調理藥而所服丸數十減其

丸只服五分無妨也上三方得之於丹溪之子朱懋誠者累試有效

海大五補丸同上三方丸

瘦人無血攝精宜潤

天門冬

麥門冬

菖蒲

茯苓

人參

益智

枸杞

地骨皮

遠志

熟地各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十九服本方數服後以七宣丸泄之

增損三才丸

天門冬

酒浸去心熟地

人參

遠志

五味子

茯苓

鹿角

一法加白馬

莖

一法加附子補相火不足

一法加麥門冬令人有力

一法加續斷以續筋骨

一法加沉香煖下焦虛冷

右為細末煉蜜杵子下丸如桐子大每服五十九空心

好酒下年老欲補加混元衣全個入藥混元衣者是胎衣頭生兒者佳

用酒浸晒乾細舂為末

紫石英丸治婦人無子

紫石英

天門冬

當歸

川芎

紫葳

卷栢

熟地

禹餘糧

牡蒙

石斛

辛夷

人參

肉桂

牡丹皮

桑寄生

細辛根

續斷

川烏

食茱萸

厚朴

乾姜

牛膝

栢子仁

山蕓

烏賊魚骨

甘草

右二十六味為極細末煉蜜丸桐子大每服二十九酒
米飲任下空心食前日二

寸脈沉者痰積

戴人過譙都營中飲會有一卒說出妻事戴人問其
故荅曰吾婦為室女時心下有冷積如覆盆按之如水聲
以熱手熨之如冰娶來已十五年矣恐斷吾孕是以去之
戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人
診其寸脈沉而遲尺脈洪大有力非無子之候也可不逾
年而孕其良人嘆曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平
軟次服白朮調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣
血合度數月而娠一子戴人常曰用吾此法無不子之婦
此言不誣一婦人年三十四歲夢與鬼神交驚怕異常
及見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年竟無姙娠巫所
覘禱無所不至鑽肌炙肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中滿

積汚血冷

足腫委命于天一日苦請戴人戴人曰陽火盛于上陰水
盛于下見鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之
用兩手寸脈皆沉而伏知胸中有痰實也凡三涌三泄三
汗不旬日而無夢一月而有姙
大盪胞湯治婦人立身以來全不產育及斷絕久不產二
三十年者

朴硝 丹皮 當歸 大黃蒸一飯久

桃仁各三兩 細辛 厚朴 苦梗

赤芍藥 人參 茯苓 桂心

甘草 川牛膝 陳皮各二兩 附子炮一兩半

蜚虫炒焦去翅足 水蛭炒各十枚

右咬咀每服四大錢水酒各半盞煎至六分去渣溫服
空心日三夜一溫覆得少汗必下積血及冷赤膿如小

芎汁斟酌下盡若力弱大困不堪者只一二服止然恐
惡物不盡不得藥力能盡服儘好不爾用坐導藥

坐導藥治全不產及斷緒服前盪胞湯惡物不盡用此方

皂角去皮

吳茱萸

當歸各二兩

細辛去苗

五味子

乾姜炮各二兩

黃葵花

白礬枯

戎塩

蜀椒各半兩

右爲細末以絹袋大如指長三寸餘盛藥令滿縛定納
婦人陰中坐臥任意勿行走小便時去之更安一日一
度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見病出可十日
安之本爲子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則發疼
痛須候病出盡方已不可中輟每日早晚用薺菜煎湯
薰之

秦桂丸論 無子之因多起於婦人醫者不求其因起

忌服款

於何處遍閱古方惟秦桂丸其辭確其意專用溫熱藥近
乎人情欣然授之銳然服之甘受燔灼之禍猶憐然不悔
何者陽精之施陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕乃
成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也
固非一端然欲得子者必須調補陰血使無虧欠乃可推
其有餘以成胎孕何乃輕用熱劑煎熬臟腑血氣沸騰禍
不旋踵矣或曰春氣溫和則萬物發生冬氣寒凜則萬物
消隕非秦桂丸之溫熱何以得子臟溫煖而成胎耶予曰
詩曰婦人和平則樂有子和則血氣均平則陰陽不爭今
得此藥經血必轉紫黑漸成衰少或先或後始則飲食驟
進久則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起焉能成
胎縱然成胎生子亦多病而不壽以秦桂丸耗損天真之
陰也戒之慎之

按秦桂丸施于肥人而少其丸數兼服調
理補藥亦無妨但忌施于瘦人火多者也

督脈主不孕

督脈生病女子不孕

治男子無子者用熱艾一團用鹽填臍滿却於鹽上隨鹽大小做艾丸灸之如痛即換鹽直灸至艾盡為度如一日灸不盡二日三日灸之曾効

東婦人無子胞門在關內左邊二寸灸五十壯

又法氣門在關元傍各開三寸

灸五壯

又法子宮

在中極傍各開三寸針入二寸灸三七壯

中極

又法關元二十壯三報穴

絕子灸臍中令人有子女子手脚拘攣腹滿疝月水不

下乳餘疾絕子陰痒陰交主之

腹滿疝積聚餘疾絕子

陰痒刺石門

千金云奔豚上少腹堅痛下引陰中不得小便

女子絕子衄血在

內不下關元主之

千金云轉胞不得溺小腹滿名石水痛

婦人子門不端

少腹苦寒陰痒及痛經閉不通中極主之 婦人無子湧

診

泉主之 大疝絕子築賓主之

絕子商丘主之

穴在內踝前宛

宛

婦人絕產若未曾產陰廉主之

刺入分半灸下一寸

仲男子脈浮弱而濇為無子精氣清冷

脈婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得

之絕產 脈微弱而澁年少得此為無子中年得此為絕

產 肥人脈細胞有寒故令少子其色黃者曾上有寒

少陰脈浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血

絕產惡寒

受胎

成胎以精血之後先分男女者褚澄之論也愚切惑焉

後閱東垣方有曰經水斷後一二日血海始淨精勝其血

感者成男四五日後血脈已旺精不勝血感者成女此論

亦為未瑩何以言之易曰乾道成男坤道成女夫乾坤陰

男女分 左右

陽之性情也左右陰陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而會精之泄陽之施也血能攝之陰之化也精成其骨此萬物之始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交媾胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系在上下有兩岐一達於左一達於右精勝其血及剛日陽時感者則陽爲之主受氣於左子宮而男形成精不勝血及柔日陰時感者則陰爲之主受氣於右子宮而女形成或曰分男分女吾知之矣其有雙胎者將何如曰精氣有餘岐而分之血因分而攝之故也若夫男女同孕者剛日陽時柔日陰時感則陰陽混雜不屬左不屬右受氣于兩岐之間者也亦有三胎四胎五胎六胎者猶是而已或曰其有男不可爲父女不可爲母與男女之兼形者又若何而分之耶予曰男不可爲父得陽氣之虧者也女不可爲

母得陰氣之塞者也兼形者由陰爲駁氣所乘而爲狀不一以女兼男形者有二一則遇男爲妻遇女爲夫一則可妻而不可夫又有下爲女體上具男之全形此又駁之甚者也或曰駁氣所乘獨見於陰而所成之形又若是之不同耶予曰陰牀虛駁氣易于乘也駁氣所乘陰陽相混無所爲主不可屬左不可屬右受氣于兩岐之間隨所得駁氣之輕重而成形故所兼之形有不可得而同也

右丹溪此論極造精微發前人之未發是知男女之分已定於萬物資始乾元之際陰陽交媾之時昧者不寤是理妄有轉女爲男之法惑矣夫萬物皆資始於乾元獨男女之分不資始于乾元乎

胎前當清熱養血 產前安胎白朮黃芩妙藥也 胎前將臨月以三補丸加炒香附炒白芍藥蒸餅丸服 又抑

雜法

熟以三補用生地膏九本連栢為末地黃膏九之 有孕八九個月必順氣枳殼蘇莖 前至八九月因火動逆作喘急可用條芩香附為末調下

驗胎法

神方驗胎散婦人三兩個月月經不行疑是兩身却疑血滯心煩寒熱恍惚此藥可驗取之內也外已有身病無邪脈以素問脈法推之十得八九矣

真雀腦芎兩當歸全用重一兩者只用七錢

右二味為細末分作二服濃煎好艾湯一盞調下或好酒調服亦得可待三兩個時辰聞覺腹臍微動仍頻即有胎也動罷即愈安穩無虞如不是胎即不動所滯惡物自行母亦安也如服藥不覺効再煎紅花湯調下必有神効

靈芝治婦人經脈住三個月驗胎法真川芎為細末濃煎

診

艾湯下一七投腹內漸動是有胎也

試孕有無 甘草一寸 皂角一寸 黃連少

右為末酒調服有則吐無則不吐每服一錢半

脈婦人懷軀七月而不可知時時衄血而轉筋者此為軀也衄時噎而動者非軀也

素婦人足少陰脈動甚者任子也平人氣象論謂太溪脈也全元起本作足少

陰王水本作手太陰當從全本○王註云動脈者如豆厥厥動搖也一說動甚謂動搖太甚也 陰搏陽別謂之有子陰陽別論○王註云陰謂尺中也搏謂搏動於手也尺脈搏擊與寸脈殊別則為有孕之兆

脈妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脈滑疾重

以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑者五月也此即陰搏陽別之義言尺脈滑數寸脈別者孕脈也 尺脈左

偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實狀陰

搏陽別之義謂尺脈實大與寸脈別別但分男女左右也 婦人妊娠四月欲知男女法左疾為男右疾為女俱疾為生二子王子亨云妊娠三部俱滑而疾在左為男在右為女 遣妊娠人面南行還復呼之左迴首者是男右為首者是女 看上圖時夫從後急呼之左迴首者是男右為首者是女也

右按丹溪云男受胎在左于宮女受胎在右子宮斯言大契是說也蓋男胎在左則左重故迴首時慎護重處而就左也女胎在右則右重故迴首時慎護重處而就右也推之於脈其義亦然胎在左則血氣護胎而盛於左故脈亦從之而左疾為男左大為男也胎在右則血氣護胎而盛於右故脈亦從之而右疾為女右大為女也亦猶經云陰搏陽別謂之有子言受胎處在臍腹之下則血氣護胎而盛於下故陰之尺脈鼓搏有力而與

陽之寸脈殊別也又如癰癤發上則血氣從上而寸脈盛發下則血氣從下而尺脈盛發左則血氣從左而左脈盛發右則血氣從右而右脈盛也丹溪以左大順男右大順女為醫人之左右手蓋智者之一失也

婦人懷孕愛物乃一藏之虛假如肝藏虛其血氣止能養胎不能榮肝肝虛故愛酸物吃

胎動不安或因僵仆或因毒藥重者便致傷墮當以母形色察之母面赤舌青者子死母活唇口俱青兩邊沫出者子母俱死面青舌赤口中沫出者母死子活也

婦人妊娠八月脈實大牢強弦緊者生沉細者死

脈細勻易產大浮緩氣散難產

婦人懷胎一月之時足厥陰脈養二月足少陽脈養三月手心主脈養四月手少陽脈養五月足太陰脈養六月

足陽明脈養七月手太陰脈養八月手陽明脈養九月足少陰脈養十月足太陽脈養諸陰陽各養三十日活兒手太陽少陰不養者下主月水上為乳汁活兒養母懷娠者不可灸刺其經必墮胎陳氏大全論云足厥陰肝脈也足少陽膽脈也四時之令始於春木故十二經云胎養始於肝脾而在一月二月手心胞絡脾也手少陽三焦脈也屬火而旺夏所以養胎在三月四月足太陽脾脈也足陽明胃脈也足陽明屬土而旺長夏所以養胎在五月六月手太陽肺脈也手陽明大腸脈也足少陽腎脈也足太陽膀胱脈也屬金水而旺秋多所以養胎在七月八月九月十月

惡阻

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也

帝曰何以知懷子之且生也岐伯曰身軀有病而無邪

脈也腹中論

妊娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如故脈息和順但覺肢軀沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食鹹酸甚者或

作寒熱心中憤悶嘔吐痰水恍惚不能支持巢氏謂之惡阻但症有輕重耳

禁忌

仲婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此証設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

右絕之者謂絕止醫治候其自安也予常治一二婦阻病吐愈治愈逆因思此仲景絕之之旨遂停藥月餘自安真大哉聖賢之言也

痰症

丹惡阻即從痰治多用二陳湯

羅半夏茯苓湯治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸鹹多臥少起百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

半夏洗一兩 赤茯苓 熟地各七錢半 橘紅

旋覆花千金方無旋覆花有細辛紫蘇 人參 芍藥

川芎

桔梗

甘草各半兩

右咬咀每服五錢姜七片水煎空心煎服茯苓丸 若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母七錢半

若腹冷下利去地黃加炒桂心半兩 若胃中虛熱大便秘小便赤澀加大黃七錢半去地黃加黃芩二錢五分

分

寒痰

茯苓丸治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半夏茯苓湯兩劑後服此藥

赤茯苓

人參

桂心

乾姜

半夏

湯泡七次炒黃

橘皮各一兩

白朮

葛根

甘草

枳殼各二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九米飲下日三服一方加麥門冬肘後加五味子

妊娠嘔吐不止者乾姜人參半夏丸主之

乾姜

人參

半夏

右三味末之以生姜汁糊丸如桐子大飲服十九日三

服大全方論半夏動胎而不用今仲景豈獨不知此而用於此方乎子治婦阻病累用半夏未嘗動胎也經云有故無損是也

天 治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白朮

一兩

人參

半兩

丁香

二錢

甘草

一錢

右為細末每服二錢水一鍾姜五片煎至七分溫服

歸原散治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無効

人參

甘草

川芎

當歸

芍藥

丁香

各半兩

白茯苓

白朮

陳皮

各一兩半

枳梗

炒

枳殼

炒各二錢半

半夏

洗炒黃一兩

熱痰

右咬咀每服三錢生姜五片東一枚水同煎

人參橘皮湯治阻病嘔吐痰水

人參 橘皮 白朮 麥門冬去心各

甘草三錢 厚朴製 白茯苓各五錢

右為粗末每四錢加淡竹茹彈子大生姜三片水同煎

治妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹 橘皮各二兩 生姜 茯苓各四兩

半夏五兩

右細切以水六升煮取二升半去查分三服

治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生蘆根七分 橘紅四分 生姜六分 檳榔二分

右切以水二盞煎七分空心熱服

治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹 麥門冬各三兩 前胡二兩 橘皮一兩

蘆根一握

右切細以水一大升煮半升去查分兩服食前

安胎飲治妊娠惡阻心中憤悶頭重目眩嘔逆不食或胎動不安腰腹疼痛

甘草 茯苓 當歸 熟地

川芎 地榆 白朮 黃芪

白芍藥 半夏泡七次炒 阿膠炒各等分

右咬咀每服三錢生姜四片水同煎

肝火

一婦人孕三月吐痰水并飲食每日寅卯作時覺少腹

有氣衝上然後膈滿而吐面赤微躁頭眩臥不起林四肢

疼微渴此肝火挾衝脈之火衝上也一日甚一日輕脈和

右寸洪大百藥不効者將二月予男病偶用沉香磨水化

抱龍丸一服膈寬氣不上衝二三服吐止眩減食進而安
又應氏婦得胎七月嘈雜吐食脈壅心下滿寒氣攻背兩
肘皆痛要人不住手以熱物摩熨得吐稍疎脈洪大

黃芩二錢

黃連一錢

白朮

半夏各二錢

甘草炙

縮砂各五分

陳皮

當歸

山梔

枳殼炒

香附

人參

蒼朮各一錢

茯苓半錢

生姜片

服二貼後嘈雜吐止心滿塞退但於夜間背肘痛用摩
熨遂與抱龍丸化服其疾如失

丹一婦人年近三十懷孕兩月病嘔吐頭眩自覺不可禁
持以人參白朮川芎等以茯苓等藥服五七日愈覺沉重
召予脈之兩手弦左其而且弱予曰此是惡阻病必怒
氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所

宜教以時用茯苓湯下抑青丸二十四粒五貼目覺稍安
診其脈略有數狀自言口乾苦稍食粥則口酸予意其爲
膈間滯氣未盡行教全以川芎陳皮山梔茯苓生姜煎湯
下抑青丸十五粒十餘貼餘証皆平但食及常時之半食
後覺口酸不食覺易飢予謂肝熱未平則以白湯下抑青
丸二十粒二十日而安予又脈之見其兩手脈雖和平而
左手弱甚此胎必墮此時肝氣既平參朮可用矣遂用始
初參朮等藥補之預防墮胎以後之虛服之一月胎自墮
却得平穩無事抑青丸一味黃連爲丸是也

娠娠經來

陽微陰
滑故今
脈婦人經月下但爲微少師脈之反言有軀其後審然其
脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮衛調和按之
滑浮之則輕陽明少陰各如經法身反灑淅不欲食飲頭

痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則不驚陽多氣溢陰滑氣盛滑則多實六經養成所以月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙姪二胎今陽不足故令激經也滑脈有餘今經又少故知孕也

胎漏下血

大法

丹胎漏因氣虛 因血虛 因血熱

虛

仲師曰婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有

姪娠下血者假令姪娠腹中痛為胞阻芎歸膠艾湯主之

方見血崩

梅治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安死即下

此即催生佛手散方見跌撲傷胎即當歸川芎 姪娠無

故卒下血不止取阿膠三兩炙搗末酒一升半煎令消一

服愈

羅立聖散治姪娠下血不止鷄肝三個用酒一升煮熟共食之大効

保治胎漏二黃散生地熟地等分剉水三盞煎半乾去查

服

梅治胎下血阿膠二兩搗末生地半斤搗取汁以清酒三

升絞汁分三服

大治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

生地汁升 陳酒合五

右同煎三五沸溫三服以止為度

保治婦人胎漏下血及因事下血枳殼湯

枳殼 黃芩各半兩 白朮一兩

右粗末每七錢水一盞煎七分食前服

丹婦人年二十餘三個月孕發瘧疾後淡血水下腹滿口

血熱

虛熱

渴

白芍

白朮

茯苓錢一

黃芩

歸尾

川芎

陳皮分五

東陽婦人三十五歲孕八九個月漏胎不止胎比前時稍

覺收小血色微紫有塊食減平時三之一腹微疼無情緒

人參

白朮炒

白芍錢一

陳皮

川芎

茯苓

縮砂

大腹皮分三

木連藤七葉

同煎食前下三聖丸五十粒

血癥病破

仲婦人宿有癥病經斷來及三月而得漏下不止胎動在

臍上者為癥痼害妊娠六月動者前三月經水利時胎下

血者後斷三月不也所以血不止者其癥不去故也當下

其癥桂枝茯苓丸主之凡胎動多在當臍今動在臍上故知是癥也

桂枝

茯苓

牡丹去心

桃仁去皮

芍藥各等分

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知

加至三丸

本治胎下血不止取桃樹上乾不落莢子燒灰和水服瘥

本草云莢奴破血又治伏梁積氣

胎漏黃汁下或如荳汁

大治妊娠忽然下黃汁如膠或如荳汁胎動腹痛

粳米升五

黃芪兩六

右以水七升煎取二升分為四服

海銀苧酒治妊娠下黃汁或如赤荳汁

苧根細去黑皮切 銀斤一

右水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎分二次

氣虛

血虛

診

虛

固胎常服

服

脈婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也胎漏徐徐下水合暴下而多故知墮胎也

胎動不安

大始娠胎動不安者由衝任經虛受胎不實也亦有飲酒房室過度損動不安者有悞擊觸而胎動者有喜怒氣宇不舒傷於心肝觸動血脈者有信醫宜服煖補反為藥所害者有因母病而胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動及母疾但當安胎其母自愈

永固孕丸

地黃

川芎

黃芩各五分

歸身尾

人參

白芍

陳皮各一錢

白朮半錢

甘草三錢

黃栢些

桑上羊食藤七葉圓者

糯米

十四粒

右咬咀煎服

仲妊娠宜常服當歸散主之

當歸

黃芩

芍藥

芩藟各一兩

白朮

半斤

右五味杵為散酒飲服方寸七日再服妊娠常服即易產胎無苦疾產後百病悉主之

妊娠養胎白朮散主之

白朮

芩藟各四錢

蜀椒三錢去汗

牡礪煨二分

右四味杵為散酒服一錢七日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芩藟心煩痛吐不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服後若嘔以醋醬水服之後不解者小麥汁飲之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之

勿置

胎動不安宜補陰行滯

胎胎動不安取苧根如足大指者一尺咬咀以水五升煮取三升去查服一方有生薑五片○丹溪云

大銀苧酒方見前胎漏條

治胎動不安好銀煮水着葱白作羹食之佳

或動或痛者安之

治妊娠二三月上至八九個月胎動不安腹痛已有所下方

艾葉

阿膠炒

當歸

川芎各三兩

甘草兩一

右細切以水八升煮取三升去查內膠令烊分三服日

三

雲立効散治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰即佛手散方見

門眩

大縮砂散治胎動不安墮在須臾者神効方見毒物傷胎

胎上逼心

逼心滿悶者下氣通陽懸

本紫蘇飲治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子

紫蘇莖葉兩一

大腹皮

人參

川芎

陳皮

白芍各半兩

當歸三

甘草分一

右細剉分作三服每服用水一盞半生薑四片葱白七寸煎至七分去查空心服

曾有累日婦人產不下服遍催生藥不驗予曰此必坐草

太早心懷下一點懼氣結而不行然非不順也素問云恐

則氣下蓋恐則精神怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦

脹氣乃不行矣得此藥一服便產及婦人六七月子懸者

予用此數數有驗不十服胎便近下 陳良甫云治一婦

有孕七個月遠歸忽然胎上衝心而痛坐臥不安兩醫治之無效遂說胎已死矣用葶麻子研爛加麝香調貼臍中以下之命在垂亡召陳診視兩尺脈絕他脈平和陳問二醫作何証治之答曰死胎也陳曰何以知之兩尺脈沉絕以此知之陳曰此說出在何經二醫無答陳曰此子懸也若是胎死却有辨處面赤舌青子死毋活面青舌赤吐沫母死子活唇口俱青母子俱死今面不赤口不青其子未死是胎上逼心宜以紫蘇飲子治之至十服而胎遂下矣

大治胎上逼心煩悶方并治胎動困篤用葱白二七莖濃煮汁飲之若胎未死即安已死即出未効再服此方神妙宜之本本草云葱白通腸氣安胎

胎動上迫心痛取艾葉如鷄子大以頭醋四升煎取二升分溫服 治胎上逼心熱痛下血神麴半斤搗碎和

通心疼 胎中

熟水絞取汁三鍾無時溫服止

道身痛 衝心者 有水

大治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白朮五兩

黃芩二兩

芍藥四兩

右水六升煮取二升半分作三服緣胎有水致痛兼易產

跌撲傷胎毒藥傷胎

跌撲傷 者逐汚 養新

佛手散治婦人妊娠六七月因事築磕着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤不絕用此藥探之若不損則痛

止子毋俱安若胎損立便逐下又治血上衝心腹滿悶者

如湯沃雪此藥催生神効方見眩即當歸川芎等分爲散口噤灌之

大治胎忽因倒地舉動擊重促損腹中不安子死以川芎末酒服方寸匕須臾二三服出

治妊娠從高墜下腹中下血煩悶

生地

益母草各一兩

當歸

黃芪各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去渣無時服

丹婦人因閃挫傷胎肚疼血崩

歸尾

陳皮

白朮

人參

茯苓

白芍

川芎各三錢

甘草五分

右分四貼水三盞煎取一盞下縮砂末一錢五分五靈脂一錢

毒藥傷者解毒和中

大治婦人服草藥胎墮腹痛用白匾芷少許去皮為末米

飲調服方寸匕或濃煎亦可

阿膠散治妊娠或因傾仆或因毒藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣

熟地二兩

白芍

艾葉

當歸

甘草

阿膠

黃芪各一兩

一方有川芎

右咬咀每服半兩姜三片棗一枚同煎溫服無時

痛不可忍命將絕者縮砂酒桂苓丸

治妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍縮砂不以多少和皮炒黑色一方用仁置熨斗內略炒為細末熱酒調下二錢不飲酒者米飲調下覺腹中熱則胎已安矣此方極効

奪命丸治婦人小產下血子死腹中其人憎寒手指唇口

爪甲青白面色黃黑胎上搶心則悶絕欲死冷汗自出或

食惡物或悞服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之

可安已死服之可下若胎腐爛腹中危甚者立可取出此

方的係異人傳授至妙此即仲景茯苓桂枝丸但用淡醋湯下不同耳方即牡丹茯苓桂

枝苑仁赤芍藥等分是也丹溪亦稱妙

姙病可下胎斷胎

下胎方

天治妊娠母因疾病胎不能安可下之取七月七日法麩四兩水二大盞煎取一盞三分綿濾去渣分溫三服立下又方大麩五升清酒一斗煮二沸去渣分五貼隔宿勿食但再服其子如糜母無疾苦千金不傳妙又方麥蘖一升為末和水煮二升服之即下神効又方附子二枚為末以淳苦酒和塗右足去之大良又方取鷄子一枚以三指撮鹽放鷄子中服之立出

斷產方

斷子法

用白麩麩一升無灰酒五升打作糊煮二升半用絹帛濾去渣作三服候前月經將來日晚下吃一服次日五更吃一服天明吃一服月經即行終身絕子

斷產驗方故蚕帟方圓一尺燒為末酒飲調服終身不復懷孕又方油煎水銀空心服如棗核大一丸永斷不

損人

胎自墮

虛熱

丹陽施陰化胎孕乃成血氣虛損不足營養其胎自墮或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推原其本皆因於熱火能消物造化自然病原乃謂風冷傷於子藏而墮此未得病情者也予見賈氏婦但有孕至三月左右必墮診其脈左手大而無力重取則瀋知其血少也以其妙年只補中氣使血自榮時正夏初教以濃煎白朮湯下黃芩末一錢服三四十貼遂得保全其生因而思之墮因內熱而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正屬相火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠等為安胎妙藥耶好生之工幸無輕視

虛寒

大治妊娠懷胎數落而不結實

甘草 黃芪 人參 白朮

川芎 熟地 吳茱萸各等分

右為末空心溫酒調二錢忌菘菜豨李雀肉醋物按丹
皆是虛熱而無寒者今姑存此一方以俟施之於千百而一者也

滯氣 醋附丸治數墮胎方見血崩

針灸 妊子不成時時墮胎後漏下五色疼痛灸胞門關門左邊門右邊二寸名子丸

十月未足欲產過期不產

先期欲產者涼血安胎 婦人懷胎有七月八月而產者有至九月十月而產者有經一年二年乃至四年而後產者各依後法治

知母丸治十月未足而痛如欲產難治產難及子煩用知母一味為細末煉蜜丸如鷄子大溫酒嚼下日三服丸如桐子大飲下二十九

治妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子 蒲黃等分

右為末蜜丸如桐子大溫酒下二十九以痛止為度又方蒲黃如棗核大篩過以井花水調服

干 日月未足而欲產者搗菖蒲根汁一二升灌喉中本草云菖蒲治胎動不安下血

羅 治婦過月不產方

四物湯 香附 芡仁 枳殼

縮砂 紫蘇 水煎服即生

難產縮胎法

虛實

世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴養之家若貧賤辛苦者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其方為湖陽公主作也實非極至之言何者見其有用此方者

過期不產者補血行滯

其難自若予表妹苦於難產後遇胎孕則觸而去之予甚憫焉視其形惟勤於針指構思旬日忽自悟曰此正與湖陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣使平和故易產今形肥知其氣虛久坐知其不運必氣愈弱兒在胞胎因母氣不能自運耳當補其母之氣則兒健易產矣令其有孕至五六個月來告遂于大全方紫蘇飲加補氣藥與數十貼因得男而甚快後遂以此方隨母形色性稟參時令加減與之無不應者因名其方曰達生散

氣虛者
補氣行
縮胎飲
即達生散

大腹皮三錢

人參

陳皮

紫蘇莖葉各五錢

分

歸身尾

白芍

白朮各一錢

甘草二錢

黃楊樹腦七個

或加枳殼縮砂青葱五葉

右作一貼吞下益母丸臨月得二十服易生產後無病

按丹溪云難產死胎此血氣滯病也蓋此方補中行滯

春加川芎

氣虛倍參朮

氣實倍香附陳皮

血

虛加當歸地黃

形實倍紫蘇

性急加黃連

熱急

加黃芩

濕痰加滑石半夏

食積加山查

食後易

饑加黃楊腦

腹痛加木香官桂黃芩冬不用芩

黑神丸一名催生丸一名益母丸

用益母草研末粥丸治婦人臨月

一日三次服之用縮砂飲送下能催生易產產後服能生新血去舊血只以白湯送下虛者煎白朮人參陳皮湯送下

氣實者
耗氣抑
陽

縮胎丸八九個月用之

黃芩

夏一兩秋七錢冬半兩炒

白朮

二兩

茯苓

七錢半

陳皮

三兩

右末粥丸桐子大

又方候九個月用之

黃芩一兩宜熱藥不宜涼藥性人減半

枳殼炒七錢半

滑石七錢五分臨月十日前十便多時加此一味

白木一兩

右為末粥丸如桐子大每服三十九丸空心熱湯下

保束胎丸

白木

枳殼各等分

右燒餅為丸桐子大八月一日食前五十九丸水下服之至產已

本滑胎枳殼散

枳殼

甘草各二兩

右為細末每服二錢百沸湯點服空心食前日三服凡懷孕六七月以上即服令兒易生初生胎少黑一百日肉漸變白此孫真人滑胎易產方抑陽降氣為眾方之冠也

妊娠治衝任脈虛補血安胎內補丸

熟地

二兩

當歸一兩

微炒

右細末煉蜜丸桐子大每服三四十丸溫酒下上三方諸集皆載在人用之如何耳大率婦人妊娠唯在抑陽助陰素問云陰搏陽別謂之有子蓋關前為陽關後為陰尺中之脈按之搏手不絕者任身也婦人平居陽氣微盛無害及其妊子則方閉經隧以養胎若陽氣盛搏之則經脈妄行胎乃不固素問所謂陰虛陽搏謂之崩也抑陽助陰之方甚多然胎前藥唯惡羣隊若陰陽交雜別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾枳殼散差寒若早服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎孕此前人未常論及

雜方

本榆白皮焙乾為末婦人妊娠臨月日三服方寸七令產

極易產下兒身皆塗之信有驗

臨產坐草法

脈訣欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜半覺時應分

誕來辰日午定知生難經云脈一呼三至曰離經一呼一

經夜半竟日身重躰熱寒又頻舌下之脈黑復青及舌

上冷子當死腹中須遣母歸宜面赤舌青細尋看母活子

死定難應唇舌俱青沫又出子母俱死總高拚面青舌赤

沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不

虛陳

正產候

六十產論○一曰正產者婦人懷胎十月滿足忽腰腹作

陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛穀

道挺逆繼之漿破血出兒子遂生此名正產

未正產

二曰傷產者婦人懷胎未產一月已前忽然臍腹痛疼有

如欲產仍却無事是名試月非正產也但一切產母夫

正產之候即不可令人抱腰亦不可令產母妄亂用力

兒身未順總方轉動便教產母虛亂用力使兒子錯落忽

橫忽倒不能正生皆緣產母用力於未當用力之所致也

直待兒子身順臨逼門戶方始用力一送令兒下生此名

傷產

右傷產一法最為切要慎勿輕忽也凡十月未足臨產

腹痛或作或止或痛不甚者名曰弄痛非正產之候或

腹雖痛甚而腰不甚者非正產之候胎高未陷下者非

正產之候穀道未挺逆者非正產之候水漿未破血未

出者非正產之候漿血雖出而腹不痛者非正產之候

凡未有正產候且令扶行熟忍如行不得或凭物坐之

或安臥之或服安胎藥一二服得安即止慎勿妄服催

生藥餌惶惶致令產母憂恐而挫其志務要產母寬心存養調停亦令坐婆先說解諭之如覺心中煩悶可取白蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先困其母直待子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道挺迸時是正產候方可用力并服催生藥也予男婦於未產一月已前腰腹俱痛全似將產其痛至甚但遇已牌稍止如此者將十餘日計無所出因閱此條遂與安胎藥加參朮數服間與內家養之由是平復不痛又二十餘日始產一男是時若妄動亂用力并服催生等藥立見危亡矣

見正產候宜催

三曰催產者若欲產漿破血下已見是正產候但却未生即可服催生以催之忽有經及數日產母困苦亦可服藥助產母之正氣令兒速生此名催生

冬產宜常溫煖

四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以至兒子不

夏產宜適溫涼

能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當滿房着火常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流散使兒易生此名凍產

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事此名熱產

橫產宜正

六月橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰臥後令看生之人先推其手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須是產母仰臥然後推兒徐徐正之候其身正煎催生藥一盞吃了方可用力令兒下生此名橫產

倒產宜順

七曰倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒

子不能廻轉便直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入去不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順云

正偏產宜

八曰偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏柱左腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱一畔不能生下當令產母仰卧令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭後骨偏柱穀道只露其額當令看生之人以綿衣灸溫裹手於穀道外方輕輕推兒頭令正便令產母用力送兒生也此名偏產

機礙礙產宜

九曰礙產者兒身已順而露正頂不能生下盖因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產母仰卧令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下撥其

肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒生下此名礙產

右橫產倒產偏產礙產四法若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命也按倒產者今世往往隨其倒足生下並無後患子母雙全不必依推足上之法亦可又礙產者往往肚帶有纏在兒頂上而兒頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶從兒頭頂過而下之者又有肚帶纏在頂上一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨不必以此礙產法入產門裏撥下之也

坐產法

十曰坐產者言欲臨產時高處繫一手中令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也此名坐產

盤腸產宜

十一曰盤腸產者趙都運恭人每產則大腸先出然後產

子產後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能療偶在
建昌得一坐婆施一法而收之其法以醋半盞新汲冷水
七分調停喫產母面每喫一縮三喫收盡此良法也

丹產後腸不收香油五斤煎熱盛盆俟溫坐油盆中約一
頓食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上妙門

大半夏為末搐鼻中則腸上矣 又方以大紙撚蘸香油
點燈吹滅以烟薰產母鼻中腸即上矣 又方以草麻子
十四粒去殼研如膏貼產母頭頂中心腸上即減去

催生法

禁忌

大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎
等藥或勢不得已則服之又云切不可坐草及令坐婆亂
下手

丹催生只用佛手散最穩當又効捷

凡催生藥必候腰痛甚胎隔下紫血破方可服

方見婦人通論即芎歸湯

滑以流
通滯滯

催生如聖散黃蜀葵子小半合一方二錢重研爛以酒瀘
去查溫服神妙或漏血胎乾難產痛極者并進三服良久
腹中氣寬胎滑即產須見正產候方可服之歌曰黃葵子
炒七十粒 細研酒調濟君急 若遇臨危產難時 免
得全家俱哭泣

丹又方以香油白蜜小便和勻各半盞調益母草末服
一方止用油蜜小便能下難產

秘錄治橫產不得出車前子末酒服二錢七

大催生柞木飲子治產難或橫或倒死胎爛脹腹中此方
屢用神効

苦以
逐閉塞

大柞木枝

大握長一尺洗淨寸剉生用

甘草

大者五寸剉作五段

右用新汲水三升半同入新磁瓶內以紙三重緊封之
文武火煎至一升半令香候產婦腰重痛欲坐草時溫

飲一小盞腰未重痛勿服便覺心下開豁如覺再渴又飲一盞至三四盞覺下重便生此方至驗

梅治難產礙胎在腹中如已見兒胎衣不出胎死者蒺藜子貝母各四兩為末米飲下一匙如相去四五里許不下再服

香以開竅逐汚血

又方通明乳香一塊如皂角子大為末腰痛時用新汲水一小盞入醋少許同煎令產母兩手捉兩石燕坐婆調藥飲水須臾坐草便生無痛楚神良 又方開骨膏乳香研細五月五日午時滴水丸如鷄頭大每服一粒無灰酒吞下 又方催生神効乳珠丹乳香研細以猪心血為丸如桐子大硃砂為衣晒乾每服一粒冷酒化下良久未下再服一粒如大段難產以蓮葉心蒂七個水二盞煎至一盞放温化下一粒良久未下亦可再服此藥靈驗如神合藥

時五月五日午時七月七日三月三日効 又方乳香硃砂等分為細末麝香酒調下 又方腰疼可服乳香人參各一錢辰砂半錢同研細用鷄子清一個調之生姜自然汁放開冷服如橫生倒生即時端順子母平善

大勝金散問曰產難若何答曰胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破與敗血裹其子故難產但服此藥逐其敗血即自生逆生橫生並治之

麝香一錢 鹽豉一兩以青布裹燒紅急研細

右為末取秤鍾燒紅以酒淬之調下一錢

催生丹治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並皆治之

十二月兔腦髓去皮膜研如泥 乳香另研極細二錢半

母丁香香末錢一麝香一字

右三味拌勻以兔腦髓和丸如鷄頭大陰乾油帛裹每

服一丸溫水下即產兒握藥出

勝金丹治難產神妙敗兔毫筆頭一枚燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

氣滯者行氣

草主難產搗益母草取汁七大合煎半頓服立下無新者以乾者一大握水七合煎服

天麻易產天麻丸

即益母草六月間帶根採晒乾

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨產時熟水嚙化一丸能除產後百病

難產

縮砂

香附醋炒

枳殼

甘草

滑石

右為末白湯調服

催生蒲黃地龍陳皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微

黃各為末臍足心三處貼如經日不產各抄一錢七新水調服立產此常親用甚妙

大催生神効七聖散臨產腰痛方用之

玄胡索

沒藥

白礬

白芷

姜黃

當歸

桂心

右為細末臨產陣痛時燒犁頭鉄通赤燂酒調三錢服一二盃立產

山難產吞槐子十四枚逆產燒銅錢通紅放酒中飲之

胞疑先破疲困者固血

大治胞漿先破惡水來多胎乾不得下時須先與四物湯補養血氣次更煎濃葱湯放冷令坐婆洗產戶須是欵曲

洗令氣上下通暢更用酥調滑石末塗產戶裡次服神妙

乳珠丹或葵子如聖散二方見前

催生如聖散治逆產橫生瘦胎

百草霜

香白芷

不見火為末

右二味等分研勻每服二大錢於臨產時以童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗方用酒童便各半蓋同煎總沸即熟服不過再服并法用芎歸湯調血血得生得乾

滑胎方 又方治橫倒生者

明阿膠

滑石末

各一兩 葵子

右水一盞半煎至一盞去渣分二服

治難產五六日不得分娩者疲困虛乏光明水膠二兩用好酒一升半微火焙膠入新鷄子一個鹽一錢七攪溫令產母坐椅上伸腰大口作二次服覺小便重便生緣坐草早驚動故也

破汚血

半夏湯治胎乾而不能產

半夏麴

半一兩

大黃

錢五

肉桂

七錢

菝仁

三十個微炒

右為粗末先服四物湯一二服次服半夏湯生姜三片水煎服 又方當歸為末調方寸匕酒服之

外取方

如聖膏治難產併治胞衣不下兼治死胎

葶蘇子七粒去殼細研成膏塗脚心胞即下速洗去

不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入

一方葶蘇子百粒雄黃一

錢細研用如上法塗之

催生萬金不傳遇仙丹

葶麻子

十四粒去殼

硃砂

雄黃

各一錢半

蛇蛻

一尺燒

右為末漿水餃和丸如彈子大臨產時先用椒湯淋潔臍下次安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以潤帛繫之須生下急取去藥一丸可用三次子一方葶麻子三粒

世三麻四苳脫衣裳研碎將來入麝香若有婦人遭產難貼在臍中兩分張用苳麻子三粒巴苳四粒去壳入射研細貼在臍中

治產危急者立聖丹寒水石四兩內二兩生二兩煨赤取出同生者研細入硃砂同研如深菝花色每用三分井花

水調如薄糊用紙花剪如杏葉大攤用貼臍心候乾再易不過三上便產橫逆惡候死胎不下並治神驗寒水石非

方解石也即今人謂軟石膏也此方國初異人傳之妙

圖經催生令產婦兩手各握石燕一枚須臾子下

救產難經日不生雲母粉半兩溫酒調服入口即產萬不

失一陸氏云已救三五百人効治橫逆產理不順用伏龍肝細研每

服一錢酒調服之以土着兒頭上戴出妙

世如神散治催生累効靈妙於理固難通於事實殊効臨

產時令人路上尋草鞋一隻取耳燒灰溫酒調下三錢七

雜方

針灸

得左足者生男右足者生女覆者兒死側者有驚此藥委是神奇用此送下催生丸尤妙

東婦人將產預先胎破惡水長流坐草早無血可養枯竭

下催生難產及死胎 太衝八分補 合谷補 三陰交

五分瀉立 足小指節三壯心術 產子上衝逼心 巨

時分解 關令正坐用抱頭抱腰微偃針入六分留七呼得氣即瀉

痕向後枕骨有痕 合谷三分留三 三陰交五分瀉

是其驗也神効 張仲文 橫產難產 右腳小指尖頭灸三壯

集又法 獨陰同上法取灸 合谷補 三陰交瀉

難難產 三陰交

下死胎法

天下死胎法方用桂枝二錢麝香當門子一個同研煖酒

寒者熱以行之

熱者寒以行之

燥者滑以潤之

服須更如手推下比之用水銀等此藥不損血氣趙和叔傳一方無麝香單用桂末一錢痛時童便調下名救苦散

鄧知縣傳療死胎不出朴硝研細半兩以童便溫服下屢効 治死胎不下指甲青舌青脹悶口中作屎臭先以平胃散一貼作兩服每服酒水各一盞煎至一盞却投朴硝半兩研細再煎三五沸溫服其胎化血水下 治子死腹中不出其母氣欲絕水銀二兩吞之立効

本治子死腹中不出用辰砂一兩以水煮數沸末之然後取酒服之立出

外療子死腹中真珠二兩為末酒調服盡立出

治妊娠三五個月胎死在腹中不出

大腹子

赤芍藥

榆白皮

各三兩 當歸炒一兩

滑石末

錢七

瞿麥

葵子

茯苓

粉草

黃芩

各半兩

右為粗末每服四錢水煎

子小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口噤不開格口灌

之藥下即活 療妊娠胎死腹中或母疾欲下胎榆白皮

煮汁服二升

天治子死腹中或半生不下或半着脊骨在草不產血氣

上盪母心面無顏色氣欲絕

猪脂升

白蜜升

淳酒升

右三味合煎取二升分溫二服不能飲隨所能服之

世治生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急妙

蛇退

一條全者香油燈上燒研

麝香

右為末童便酒各半盞調一服即生効

楊氏療有孕月數未足子死腹中母欲悶絕取大豈三升

雜方

醋煮濃汁三升頓服立瘥

本治妊娠熱病胎死腹中鹿角屑一兩水一盞葱五莖豈豉半合同煎至六分去渣溫分二服

取死胎烏鷄一隻去尾細剉以水三升煮取二升去鷄通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

產後症 胞衣不下 血暈 血不下

血不止 虛弱 無乳 乳汁自出

陰脫 血塊痛見腹門

產後必用方

大凡生產畢令飲童便一盞不得便卧且宜閉目而坐須臾上床仰卧不宜側卧宜豎膝未可伸足高倚床頭厚鋪茵褥遮圍四壁使無孔隙免致賊風兼時時令人以物從心捍至臍使惡露不滯更三日內令產婦常聞醋炭氣或燒乾漆烟若無乾漆以舊漆器燒之以防血暈不問腹痛

不痛有病無病以童便和酒半盞溫服五七服妙陳藏器云清苧

汁與產婦服之將苧麻與產婦枕之止血暈產婦腹痛以苧安腹上則止

丹產後當大補血氣為先雖有雜症以末治之

熱多者宜清之

大地黃丸治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或胎衣不下失音不語心胃脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口内生瘡咽喉腫毒心中忪悸夜不得睡產後中風角弓反張面赤牙關緊急或崩中如豚肝臍腹疔痛煩躁恍惚四肢腫滿及受胎不穩唇口指甲青黑

生地研取汁 生姜各二斤研 蒲黃

當歸各四兩

右於銀石器內取生地黃汁炒生姜滓以生姜汁炒地黃查各令乾四味同焙研為細末醋煮麩糊為丸如彈子大每服一九食前當歸酒化下神妙一方只用生姜

生地無蒲黃當歸依交加法制之為末每服三錢溫酒調下

丹黑神丸產後服之能生新血去舊血用白湯送下虛者

參朮陳皮湯送下方見催生門益母膏治產婦一切傷損一

切血病方見講經門

大凡婦人因暑月產乳取涼大多得風冷腹中積聚百病

桃仁一千二百枚去皮尖及双仁熬令黃色

右一味搗令極細熟以上等酒一斗五升研三四遍如作麥粥法以極細為佳納小長項窰窰中密塞以糊封之納湯中煮一伏時不停火亦不令火猛使瓶口常出在湯上勿令沒之熟訖溫酒服一合日再服

寒多者宜濕之黑神散治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心腹痞滿

或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾

熟地 蒲黃炒 當歸 乾姜泡

桂心 芍藥 甘草各四兩 黑荳炒去皮半升

右為細末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調服

右黑神散寒多及秋冬者宜之若性急形瘦及夏月宜審之

丹胎前母滯 產後母虛 產後一切皆不可發表 產

後不可用芍藥以酸寒伐生發之氣故也

大不可吃物過多恐成積滯若未滿月不宜多語喜笑驚

恐憂惶哭泣思慮急怒強起離床坐久行動或作針工恣

食生冷粘硬油膩魚肉之物及不避風寒當時未覺滿月

之後即成蓐勞凡產後滿百日乃可交合不爾至死虛羸

百病滋長慎之凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由早行房

禁忌

也
或曰初產之婦好血已虧汚血或留彼黑神散非要藥乎答曰至哉乾元萬物資生理之常也初產之婦好血未必虧汚血未必積藏府未必寒何以藥為飲食起居勤加調護何病之有誠有汚血體怯而寒與之數貼亦自簡便或有他病當求病起何因病在何經氣病治氣血病治血何用海制此方例令服餌設有性急者形瘦者本有怒火者夏月坐蓐者時有火令姜桂皆為禁藥至于將護之法尤為悖理肉汁發陰經之火易成內傷之病也先哲具有訓戒胡為以羊鷄濃汁作糜而又常服當歸丸當歸建中湯四順理中丸雖是補劑並是偏熱臟腑無寒何處消受若夫兒之初生母腹頓寬便啖鷄子且吃夥鹽不思鷄子難化夥鹽發熱展轉生証不知所困率爾用藥寧不悞人

診

數血

予每見產婦之無疾者必教之以却去黑神散與夫鷄子夥鹽諸品肉食且與白粥將理間以此些少養魚羹令淡食之半月後方與少肉若鷄子亦須豁開淡煮大能養胃却疾彼富貴之家驕恣之婦卒有白帶頭風氣痛膈滿痰逆口乾經事不調髮禿躄倦皆是陽盛陰虛之病天生血氣本自和平曰勝曰虛又烏知非此等繆迷有以兆之耶
診婦人生產之後寸口脈洪疾不調者死沉微附骨不絕者生 診婦人新生乳子脈沉小滑者生實大堅弦急者死

胞衣不下

奪命丹治血入胎衣為血脹不得下

附子炮半

牡丹兩

乾漆一分碎之炒尽烟

右為末以醞醋一升大黃末一兩熬成膏和藥丸如桐

子大温酒吞五七丸不拘時此藥逐去胞中之血血散
脹消胞衣自下矣

花蓋石散治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡血奔
心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭煖急以童便調一
錢取下惡血如猪肝終身無血風血氣疾膈上有血化為
黃水即吐出或從小便出也方見跌撲傷損黑龍丸治胞衣不
下神效方見產後血不下黑神散治惡露不快胞衣不下方見產通

牛膝湯治胞衣不出臍腹堅脹急痛即殺人服此藥胞即
爛下死胎亦下

牛膝

瞿麥各四兩

當歸三兩

通草六兩

滑石八兩

葵子五兩

右咬咀以水九升煮三升分三服若衣不下腹滿即殺

人推其源皆胞衣有血奔心是以不出服此藥衣即爛
出

治胞衣不出牛膝一兩葵子一合以水一升煮半升去查
分二服

千備急丹治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊以錦紋
大黃一兩為細末用醎醋半升同煎如膏丸如桐子大患
者用醋七分盞化五丸至七丸服之須臾血下即愈

保治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及
胎乾不能生產半夏湯主之見前催生條

下胎丸

半夏

白欬各半兩

右細末丸如桐子大食後半夏湯下三十九丸漸加至五
十九丸如未効者須廣大其藥榆白皮散主之又不効大
聖散主之有宿熱者宜服人參荊芥散

雜方

大治胞衣不下惟有花葶石散一件最為要緊若鄉居藥局遠者倉卒無之今採得胡氏方一妙法若產訖胞衣不下稍久則血流胞中為血所脹上衝心胃喘急疼痛必致危篤若有此証宜急斷臍帶以少物繫帶必用力牢固繫之然後截斷使其子血脈不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰終自下矣累試有驗 治胞衣不下以蛇退炒為細末酒下二錢如聖膏 方見胎前催生即草麻子法 若胞衣不下腹脹則殺人黑荳一合炒熟入醋一盞煎去荳分三服 胞衣不下取竈內黃土一寸研碎同醋調勻內於臍中續煎甘草湯三四合服之出

針灸

山胞衣不下用取初洗兒湯服下一盞勿令產母知 **集胞衣不下** 三陰交 中極 各瀉之

表

標 又法 照海 內關

甲 女子字難若胞不出崑崙主之 產後血暈

仲 問曰新產婦人有三病一者病瘧二者病鬱冒三者大便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘧亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難 產婦鬱冒謂血暈也

大 產後血暈者氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷但服清魂散即醒

澤蘭葉 人參 各二錢半 荆芥 一兩 川芎 半兩

甘草 一兩先方無

右為末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即開

眼氣定省人事

保治產後風虛血暈精神昏昧荆芥散

荆芥一兩 薤仁五錢

右細末温水下三錢微喘加杏仁炒甘草各三錢

術治產後血暈用荆芥穗為末童便調下二三錢極妙驗
產後血暈身疼直戴眼口角與目外眇向上牽急不知
人取鷄子一枚去殼取清以荆芥末二錢調服遂仍依次
調治若無他疾則不須治甚敏捷

右荆芥例氣虛人不宜服

下血多而暈者但昏悶煩亂而已當補血下血少而暈
者乃惡露不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人
當破血行血

下血少
而暈者

婦人產後血暈此乃虛火載血漸漸暈將上來用鹿角

行血

燒灰出火毒研極細用好酒童便調灌下一呷即醒此物
行血極効

獨行散治產後血暈昏迷不省衝心悶絕五靈脂半生
半炒各二錢為細末温酒調下二錢口噤者幹開口灌之
入喉即愈 一方加荆芥等分為末童便調下

世治下胎或產後血上衝心已死用鬱金燒存性為末二
錢醞醋一合調灌之立活

產後血暈心悶氣絕紅花一兩搗為末分作二服酒二
鍾煎取一鍾併服如口噤幹開灌之速効 一方用紅花

三兩新者無灰酒童便各半升煮取一盞服之

肝治血暈蘇木三兩細剉水五升煮取二升分再服瘥無
蘇木方取緋衣煮汁服之亦得

聖產後血暈不知人及狂語麒麟竭一兩細研為末非時

溫酒調下二錢七

濕紅花散治產後血昏血暈血崩及月事不勻遠年乾血氣

乾荷葉 牡丹皮 川歸 紅花

蒲黃炒等分

右細末每半兩酒煎和查溫服如胎衣不下榆白皮湯調半兩立効

右破血輕劑

無牡丹散治產後血暈悶絕口噤則斡開口灌之

牡丹皮 大黃煨 芒硝各一兩 冬瓜子半

棗仁三十粒去皮尖

右剉每服五錢水三鍾煎至一鍾半去查入硝又煎分二服

產書治產後心煩手脚煩熱氣力欲盡血暈連心頭變寒熱不禁接骨木破之如算子一握以水一升煎取半升分溫二服或小便數惡血不止服之即瘥此木煎三遍其力一般此是起死之方

右重劑血點滴不出者宜用

大花蕊石散治產後氣欲絕惡血奔心至死者但以童便

調一錢取下惡物極妙方見跌撲傷損 黑神散治產後血暈用

細酒調服佳方見產後通用

右二方寒多者用之

芎歸加芍藥湯治產後去血過多而暈方見產後血不止

保又方治產後血暈危困

生地汁一大盞 當歸二錢半炒 赤芍藥二錢半剉

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入童便半盞服

下血多血暈者宜補血

之

起治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕
新羊血一盞飲之日三服妙

大產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也破鷄子三枚吞
之便醒若未醒可與童便一升甚驗 若產後去血多者
又增此疾與鷄子不醒者可急作竹瀝汁一服五合須臾
不定再與五合頻與三五服瘥

婦人年三十餘面白形長心中長有不平事忽半夜誕
子纏分娩後侵晨暈厥不知人遂急於氣海灼艾十五壯
而蘇後以參朮等藥兩月方安

仰一產婦鬱冒其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所
以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛
下厥孤陽上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血

氣虛

陽盛陰虛

雜方

虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴
胡湯主之 鬱冒汗

大治產後血暈全不省人事極危殆者用菲菜切入有嘴
瓶內煎熱醋沃之便密封瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋
氣透入須先扶病人起坐即醒 又方如覺暈即以醋噴
面醒來即與醋細細呷之又以醋塗口鼻并置醋於傍使
常聞其氣 又法治血暈去者急取乾漆燒取烟以向鼻
即醒如無乾漆舊漆器亦可 又方治產後血暈用生半
夏末少許吹入鼻中

本治胎後血上衝心生姜五片切以水八升煮取三升分
三服

丹醋墨防產時血暈好墨半錠火燒赤投醋中如此三遍
出火毒研細每服五分淡醋湯調下

針灸

摘產後血暈不省人事 三里 支溝 三陰交此穴無

標幽又法 陰交 陽別

世又法 神門 內關不應取 關元灸

產後血不下

汚血

保治婦人惡血不下

當歸炒

芫花炒等

右為細末每服三錢酒下又用好墨醋焙末小便酒下
妙

大產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脈皆痛
如以錐刺

當歸分

桂心

芍藥各半

桃仁去皮尖

沒藥研各

蜚虫去翅

水蛭炒各三

右為末醋糊丸如豌豆大醋湯下

右峻劑

治產惡露不下

乾荷葉兩

鬼箭羽

菝仁

劉寄奴

蒲黃各一

右為粗末每服三大錢以童便一大盞姜二片生地一
分搥碎同煎至六分去渣無時熱服

梅治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一升頓服

本治產後血不下益母草搗絞汁每服一小鍾入酒一合

溫攪勻服

千生產後血不去麻子五升酒一升浸一宿明日去渣溫
服一升不瘥再服一升不吐不下不得與男子通一月將

養如初瘥

寒滯

大黑龍丸治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂

死者但灌藥得下無不全活神驗不可言

當歸 五靈脂 川芎 良姜

熟地各三兩

右細研入沙礮中赤石脂泔縫紙筋鹽泥固濟炭火十斤煨通赤去火候冷取開看成黑糟色取出細研却

入後藥

百草霜五錢 硫黃 乳香各一兩 花蕊石

琥珀各三錢

右五味並細研如桐子大頓服立効

產後血不止

虛

芎歸加芍藥湯治產後血崩眩暈不知人事

川芎 當歸 芍藥各等分

右咬咀每服四錢以水一鍾半煎至七分去查無時熱

服

產後血崩如苙汁紫黑過多者四物湯加蒲黃生地汁

阿膠薊根艾白芷煎服

虛中有寒

丹七二孺人產後冒寒哭多血再下身潤脈沉

當歸 白朮 陳皮 川芎

乾姜 黃芩各二錢 芍藥一錢 甘草些

右分二貼煎服

虛中有滯

王孺人因憂慮墮胎後兩月餘血不止腹痛此躰虛氣滯惡物行不盡

陳皮一錢 白朮二錢 芍藥一錢 木通

川芎五分 甘草二分

作湯下五芝丸六十粒食前

陷下者舉之

治產後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒五升煮

取二升半分温再服

之者溢
雲牡礪散治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱頭目昏重煩熱

牡礪

川芎

熟地

茯苓

龍骨各一兩

續斷

當歸炒

艾葉酒炒

五味

人參各半兩

甘草二兩

地榆半兩

右為末每服三錢生姜三片枣一枚水同煎食前

汚血
產書產後猶有餘血水氣者宜服頭淋酒黑豈五升熬令烟盡於甕器內以酒一斗焯之

右頭淋酒治汚血又能發表也

治產後惡血不絕腹中絞痛氣息急

亂髮燒一兩

阿膠二兩

代赭石

乾姜各三兩

馬蹄燒一個

乾地黄四兩

牛角腮五兩

酥炙

寒
右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三四十九日
二服

千治產後崩中下血不止菖蒲一兩半劉酒二鍾煎一鍾去渣分三服食前温

雜方
丹產後血崩取木耳及所者或半斤者燒灰為末用麝香一錢枳殼去穰肉用濕紙包煨令香熟研細入藥每用一錢烏毒湯下

本產後下血不止灸桑白皮煮水飲之

秘錄治胎落下血不止以桑木中蝎虫燒末酒服方寸七日二服

產後虛弱

虛熱
丹產後補虛

人參

白朮各一錢

黃芩

歸身尾各五分

川芎半兩

陳皮二分

右煎服如有寒加乾姜三分茯苓一錢

保

三元湯治產日久虛勞而脈浮大者方見婦人門大法條乃小柴胡合四

治

產後日久虛勞鍼灸不效者三合散此四君子四物小柴胡三方合和是

白朮

川歸

芍藥

黃芪

茯苓

熟地一兩

柴胡一兩

黃芩六錢

人參一兩

半夏

甘草各六錢

川芎一兩

右為粗末每十兩水一鍾半服日三

虛寒

大當歸羊肉湯治產後雖無疾者但覺虛弱兼心腹痛

肥羊肉一斤去脂水一斗

當歸五兩

黃芪四兩

生姜六兩

右以肉汁煮三味取二升五合分為四服若覺惡露不盡加桂三兩惡露下多加芎三兩有寒加茱萸一兩有氣加細辛二兩有熱加生地汁二合

保治產婦虛勞不能食十全散方見治虛實法氣血條

羅當歸建中湯治婦人一切血氣俱損及產後勞傷虛羸不足腹中疼痛吸吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出

方用當歸四兩肉桂二兩甘草二兩白芍六兩姜枣煎服

雲治產後虛損飲食不下四物加建中人參白朮茯苓主之

產後無乳

虛實

大累經產而無乳者亡津液故也須服滋益之藥以動之若雖有乳却又不甚多者須服通經之藥以動之仍以羹

臍引之蓋婦人之乳資於衝脈與胃經通故也大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而其色帶黃所生之子怯弱多病

無乳汁不行有氣血盛而壅閉不行者有血氣弱澁而不行者虛當補之實當踈之踈用通草漏蘆土瓜輩補用鍾乳粉猪蹄鯽魚之屬

實者踈之

六治乳無汁

土瓜

漏蘆各三兩

甘草二兩

通草四兩

右水八升煎取二升分溫三服

集下乳汁括菱子淘洗控乾炒令香熟瓦上搗令白色為末酒調下一七合卧少時產書下乳汁土瓜為末酒服一錢日三服

本下乳汁以京三稜三個水二碗煎取一碗洗取汁下為

度極妙

虛者補之

冊婦人乳不行蒿苳子糯米各一合細研水一碗攪勻入甘草末一字煎之溫呷頻與妙

雲立効方下乳汁

糯米

蒿苳子

各半合並淘洗

甘草半兩

右煎汁一升研藥令細去查分作三服立下

又方

猪蹄一隻

通草四兩

右以水一斗煮作羹食之

羅湧泉散治婦人爛汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬去心

龍骨

川山甲炮黃

王不留行

右為細末每服一錢熱酒調下後吃猪蹄羹少許又用水梳於左右乳上各梳三二十梳日三服依前法

又方治癩汁少

瓜蒌根

薄荷幹身

等分

右為粗末先吃羊蹄汁一碗次服藥後再吃葱絲羊羹湯少許出効

有人乳脈不行已十七日諸藥無効遇有人送赤荳一斗遂時常煮粥食之當夜乳脈通行

乳汁自出

虛實

產前乳汁自出者謂之乳注生子多不育產後乳汁自出蓋是身虛宜服補藥以止之若乳多急痛而出者温帛熨之漏蘆散亦可

漏蘆

二錢

蛇蛻

一條

右為末酒調二錢無時

產後陰脫

一婦人三十餘歲生女二日後產戶一物如手帕下有

帕尖約重一斤予思之此因胎前勞乏傷氣成肝痿所致却喜血不甚虛其時歲暮天寒恐冷乾壞了急與炙黃芪半錢人參一錢白朮五分當歸一錢半升麻五分三貼連服之即收上得汗通身乃安但下齋沾席處乾者落一片約五六兩重蓋脂膜也食進得眠診其脈皆潛左略弦視其形却實與白朮芍藥各錢半陳皮一錢生姜一片煎二三貼以養之 一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀有二岐其夫來求治予思之此子宮也必氣血弱而下墜遂用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日後其夫復來曰服二次後覺響一聲視之已收陰戶訖但因經宿乾着席上破一片如掌心大在席某妻在家哭泣恐腸破不可復生子思之此非腸胃乃糟粕也肌肉破尚可復完若氣血

充盛必可生滿遂用四物湯加人參與一百貼三年後復
有子 治子宮下用黃芪一錢半人參一錢當歸七分升
麻三分甘草二分作一貼水一鍾煎至三分去查食前服
却用五倍子末泡湯洗又用末傅之如此數次宜多服藥
永不下 治陰脫蓋產努力太過致陰脫若脫肛狀及陰
挺出逼近腫痛舉重房勞皆能發作清水續續小便淋露
用硫黃烏賊骨各半兩五味子一分為末傅患處兼服參
芪歸草升麻等補藥 治產後陰下脫人尿燒酒下方寸
七日千金無罽蝎皮散加蟹頭灸亦治方見脫肛

雜方

六治產後陰腫下脫肉出玉門不閉石灰一升炒極熱湯
二升投灰中適溫冷澄清坐水中以口玉門斯須平復如
故 又方以鉄精粉上推內之又灸下橫紋二七壯
一法用鉄精羊脂二味攪令稠布裏灸熱熨推內之鉄精

是鍛鉄灶中飛出如塵紫色而輕虛可以坐磨器皿者
又方單炒蛇床子一升乘熱以布裏煨患處亦治產後陰
戶痛

子母療產後陰下脫燒兔頭末傅之

針灸

東女人胞胎門落頰不收常濕 神關 玉泉五寸 身

交臍下指縫中灸 又法 玉泉傍開三寸灸隨年 女

人陰門令腫 飯來三十

甲婦人陰挺出四肢淫灑身悶少海主之一作照海

醫學綱目卷之三十五

醫學綱目卷之三十六

小兒部

小兒通治

錢氏診

五臟虛

實

錢五臟所主
心主驚 實則叫哭發熱飲水而搐 虛則困臥悸動不

安

肝主風 實則目直視大叫呵欠項急煩悶 虛則咬牙

多欠氣熱則外生風氣溫則内生風

脾主困 實則困睡身熱飲水 虛則吐瀉生風

肺主喘 實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者 虛則

哽氣長出氣短

腎主虛 無實也惟瘡疹腎實則黑陷

更當別虛實證如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝

虛不能勝肺故也若目直視大叫哭項急煩悶者難治蓋

肺病久則虛冷肝強實而反勝肺也宜視病之新久虛實
虛則補母實則瀉子

五藏病證

肝病哭叫目直視呵欠煩悶項急 心病多叫哭驚悸手
足動搖發熱飲水 脾病困睡洩瀉不思飲食 肺病悶

亂哽氣長出氣短氣喘急○腎病目無精光畏明體骨重

五藏雜診

肺藏怯○唇白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣喘促

哽氣者難治肺虛損故也○脾肺病久則虛而唇白脾者

肺之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主唇唇白而

光澤者吉白如枯骨者死此以唇診肺之法也唇白色者肺藏怯也阿膠散主之若手尋衣領及亂捻物者肝熱也宜瀉青丸手搦眉目鼻而者肺熱也宜其枯湯之類是也

心實○心氣實則氣上下行滯若合面臥則氣不得通故

喜仰臥使氣得上下通也瀉心湯主之心氣熱則合面臥實則能臥也

腎虛○兒本虛怯由胎氣不成則神氣不足目中白睛多

顛解顛開面色眇白者皆為難養雖長不過八八之數若

恣色慾不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎

不足則下竄蓋骨重惟欲墜下而身縮也腎者陰也腎氣

虛則畏明皆宜補腎地黃丸主之心氣熱則上竄宜導赤散腎氣虛則下竄宜地黃丸

黃丸是也

肝病勝肺○肝病秋見一作日補肝勝肺也肺怯不能勝肝當

補脾治肝益脾者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青

丸主之

肺病勝肝○肺病春見一作早辰肺勝肝也肝怯故受病當補

肝腎治肺補肝腎地黃丸治肺瀉白散主之

五臟相勝輕重○肝病見秋木旺肝勝肺也宜補肺瀉肝

輕者肝病退重者唇白而死

肺病見春金旺肺勝肝也當瀉肺輕者肺病退重者目淡

五藏相勝見晴令

青必發驚更有赤者當搐海藏云為肝怯故曰痰青也

心病見冬火旺心勝腎也當補腎治心輕者心病退重者

下竄不語腎怯虛也

腎病見夏水勝火腎勝心也當瀉腎輕者腎病退重者悸動當搐

脾病見四旁皆放此治之順者易治逆者難治脾怯當面赤目黃五臟相反隨證治之

右五臟相勝病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法時論之旨實發前人所未發者也假如肝病見於春及早晨乃肝自病於本位也今反見於秋及日晡肺之位知肺虛極肝往勝之故當補脾肺瀉肝也餘倣此

凡病先虛或已經下有合下者必先實其母後瀉其子也假令肺虛而痰實此可下之症先當益脾後方瀉肺也

五藏補瀉法

瀉青丸又名瀉肝丸

導赤散海藏云瀉丙小腸

瀉心湯海藏云瀉心

安神丸

錢氏治心虛痛熱神思恍惚

益黃散

又名補脾散海藏云此劑健脾以燥濕東垣云

吐腹痛瀉

利清胃中寒濕嘔吐

瀉黃散

又名瀉脾散海藏云瀉脾熱

阿膠散

又名補肺散海藏云杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之類也

瀉白散

又名瀉肺

散海藏云治肺熱骨蒸自汗用此直瀉之梔子黃芩亦瀉肺當以氣血分之○已上八方並見臟腑部治虛實法

地黃丸

海藏云治腎虛解頤即懸病也治脈毛而虛○方見勞瘵

熱則從心寒則從腎嗽而氣上從肺風從肝瀉從脾假

令瀉兼嗽又氣上乃脾肺病也宜瀉白益黃散合而服之

脾苦濕肺苦燥氣上逆也其症見瀉又兼面色黃腸鳴吻

吻者宜服理中湯瀉而嘔者宜服茯苓半夏湯如瀉而渴

熱多者宜服黃芩厚朴湯不渴而熱少者宜服白朮厚朴

湯其他五臟若有兼症皆如此類推之更詳後論四時推

移用藥

素石論五臟病與錢氏微異

心自病

心主熱自病或大熱瀉心湯主之 實則煩熱黃連瀉心湯主之 虛則驚悸生犀散主之

五邪乘心法

肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主之 肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯下大青丸主之 脾乘心實邪泄瀉身熱瀉黃散主之 腎乘心賊邪恐怖惡寒安神丸主之

肺自病

肺主燥自病則喘嗽燥則潤之 實則喘而氣盛瀉白散主之 虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散主之

五邪乘肺法

心乘肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散主之 肝乘肺微邪惡風眩暈昏憤嗽羌活膏主之 腎乘肺實邪增寒嗽清利百部丸主之 脾乘肺虛邪體重吐痰洩瀉嗽人參白朮散主之

肝自病

肝主風自病則風搖拘急肝苦急急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之 實則風搖力大瀉青丸主之 虛則風搖

五邪乘肝法

力小地黃丸主之

心乘肝實邪壯熱而搖利瀉丸涼驚丸主之 肺乘肝賊

邪氣盛則前伸呵欠微搖法當瀉肺先補本臟補肝地黃丸主之瀉肺瀉白散主之 脾乘肝微邪多睡體重而搖

先當定搖瀉青丸主之搖止再見後症則別立法治之

脾自病

腎乘肝虛邪增寒呵欠而搖羌活膏主之

脾主濕自病則洩瀉多睡體重昏倦脾苦濕急食苦以燥之 實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散主之 虛則泄瀉色白睡露睛白朮散主之

五邪乘脾法

肝乘脾賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之 心乘脾虛邪

壯熱體重而瀉羌活黃芩蒼朮甘草湯主之 肺乘脾實

邪能食不大便而嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下葶藶丸 腎

乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之

腎自病

腎主寒自病則足脛寒而逆人之五臟惟腎無實小兒瘡疹變黑陷則是腎實水尅退心火

五和乘腎法

心乘腎微邪內熱不惡寒桂枝湯主之 肺乘腎虛邪喘嗽皮澁寒百部丸主之 肝乘腎實邪拘急氣搖身寒理中丸主之 脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之

五臟頭四時補

瀉

凡五臟虛弱是自已正令不行乃鬼賊之所尅害當補本臟之正氣假令肺病喘嗽時於初春見之法當補腎見於

夏救肺見於秋瀉肺見於冬補心瀉本臟又名寒嗽大抵

五臟各至本位即氣盛不可更補到所克位不可更瀉

云五藏子母虛實鬼賊微正若不達旨意不易得而入焉在前者為實邪在後者為虛邪妻來乘夫為微邪夫來乘妻為賊邪本藏自病為正邪

參顏色

瀼肝病面白 肺病面赤 脾病面青 腎病面黃

心病面黑 若肝病驚搐而又加面白痰涎喘急之類此

皆難治餘倣此推之假令春分前風寒也宜用地黃羌活

防風或地黃丸及瀉青丸相間服之春分後風熱也宜用

羌活防風黃芩或瀉青丸導赤散下之立夏後熱也宜用

三黃丸導赤散夏至後濕熱也宜用導赤散瀉黃散合而

服之或黃芩人參木香之類秋分後用瀉白散立冬後用

地黃丸主之謂腎不受瀉也

潔古海藏補錢氏法

海補肝丸四物湯內加防風羌活等分為細末煉蜜丸是也

鎮肝丸瀉青丸去梔子大黃治肝虛 瀉腎丸治脈洪而

實前熟地改生地去山茱萸是也此治左手本部脈若右

尺洪實以鳳髓丹瀉之此地黃丸即仲景八味丸去桂附

若加五味子腎氣丸也此益肺之源以生腎水焉

禁忌

丹慈幼論○人生十六歲已前血氣俱盛如日方昇如月

將圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之道不可不謹童子不衣裘帛前哲格言具在人耳裳下體之服帛溫暖甚於布者也裘皮服溫軟甚於帛者也蓋下體主陰得寒涼則陰易長得溫暖則陰暗消是以下體不與綿綃夾厚溫暖之服恐妨陰氣實為確論血氣俱盛食物異消故食無時然腸胃尚脆而窄若稠粘乾硬酸醎甜辣一切魚肉水菓濕麪燒炙煨炒俱是發熱難化之物皆宜禁絕只與熟菜白粥非惟無病且不縱口可以養德此外生粟味醎乾柿性涼可為長陰之助然粟太補柿太澁俱為難化亦宜少與婦人無知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迨至成人筋骨柔弱有食則不能忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大義亦虧可不慎歟至於乳母尤宜謹節飲食下咽

乳汁便通情欲中動乳脈便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘡則熱或為口糜或為驚搐或為夜啼或為腹痛病之初來其溺必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患於未形也夫飲食之擇猶是小可乳母稟受之厚薄性情之緩急骨相之堅脆德行之善惡兒能速肖尤為關係古之胎教具在方冊愚妄多贅若夫胎孕致疾事起茫昧人多玩忽醫所不知兒之在胎與母同體得熱俱熱得寒俱寒病則俱病安則俱安母之飲食起居尤當慎密不可不知也

田大凡小兒過煖生熱熱極生風提抱生瘡餵飼生癖最宜慎之

錢大喜後食乳食多成驚癇大哭後食乳食多成吐瀉

丹乳下小兒常多濕熱食積痰熱乃是傷乳為病小兒易

怒肝病與脾病最多

雜診

錢脈亂不治弦急氣不和沉緩傷食促急虛驚浮風沉細冷

木候兒脈當以大指按三部一息六七至為平和八九至為發熱五至為內寒脈弦為風癇沉緩為傷食促急為虛驚弦急為氣不和沉細為冷浮為風大小不勻為惡候為鬼祟浮大數為風為熱伏結為物聚單細為疳勞凡腹痛多喘嘔而脈洪者為有虫沉而遲潮熱者胃寒也溫之則愈訣曰小兒脈緊風癇候沉緩食傷多嘔吐弦急因知氣不和急促急驚神不守冷則沉細風則浮牢實大便應秘久腹痛之候緊而弦脈亂不治安可救變蒸之時脈必亂不治自然無過繆單細疳勞洪有虫大小不勻為惡候脈沉而遲有潮熱此必胃寒來內寇瀉利脈大不可醫仔細酌量宜審究雲岐子云未及五歲不可視聽者未可別脈五歲已上方可以脈別浮沉遲數按錢氏論

又不拘五歲上下也

不治症

嬰兒未可方脈者俗醫多看虎口中紋顏色與四肢冷熱取之亦有可驗予作二歌紀之曰紫風紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃即困脾端又冷熱症歌曰鼻冷定知是瘡疹耳冷因知風熱證通身皆熱是傷寒上熱下冷傷食病若能以色脈參伍驗之所得亦過半矣

世百日內不治症 發斑 臍風撮口 馬脾風 龜背

錢不治症目赤脈貫瞳人 胸腫及陷 鼻乾黑 魚口

氣急 吐虫不定 瀉不定精神不好 大渴不定止之

又渴 吹鼻不噴 病重口乾不睡 時氣唇上青黑點

頰深赤如塗臙脂 鼻孔開張 喘急不定

靈嬰兒病其頭毛皆逆上者必死論疾診尺篇

脈小兒病困汗出如珠着身不流者死 小兒病而胸陷

口唇枯乾目直視口中氣冷足與頭相低臥不舉身手足
四肢垂其臥正直如縛掌中冷皆死至十日不可復治之
錢病重面有五色不常不澤者死

生下胎疾

雜方

無小兒初生氣絕不能啼者必是難產或胃寒所致急以
綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置爐炭中燒之
仍撚大紙條蘸油點火於臍帶下薰之蓋臍帶連兒火熏
時有火氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼
哭如常方可洗浴了即斷臍帶

海百壽散小兒初生未滿月已裹用之者老無瘡疥

黃連兩一 硃砂錢一

右水煎令老母拭去口涎淨灌下餘藥傾盆中浴兒遍
身搽妙 又方淨黃連一錢水一盞預先煎下待兒生

未出聲時使用灌下以去腹中惡物臍屎兼解胎中蘊
積熱毒終身不生瘡又去臍風等病

虛實

錢胎實面紅目黑睛多者善笑胎怯面黃目黑睛少白睛
多者多哭更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

胎肥者生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸羸瘦目
白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎浴體法主之

天麻錢二 蝎尾去毒 硃砂各五分 烏蛇肉油浸焙乾

白礬各三錢 麝香一字 青黛錢三

右研勻每用三錢水三碗桃枝一握并葉五七枝同煎
至十沸溫熱浴之勿浴背

胎怯者生下面無精光肌肉薄大便白水身無血色時時
哽氣多噦目無精采亦宜以浴法主之

世母氣不足則羸瘦而肉薄父精不足則解顱眼白多

寒熱

胎熱生下有血氣時時叫哭身壯熱如淡茶色目赤大便赤黃糞稠急釀乳浴法主之

湯小兒在胎時因母有熱或恣食酒麪熱毒之物傳於胎中令兒生下面赤眼閉身體壯熱哭聲不止口熱如湯乃胎熱之候也宜生地黃湯

生地

赤芍藥

川芎

當歸

瓜蒌根

右件等分咬咀每服半兩水一盞煎六分產婦亦可服以此些抹入兒口中

凡胎熱服藥不可求速效治法當釀乳漸解之若處以涼藥攻之必損脾胃加以嘔吐乃成大患宜服生地黃湯用釀乳小兒胎中有寒生下不能將護再傷於風其候面色青白四肢逆冷手足顫動口噤不開乃胎寒之故或寒

胎驚

氣乘虛入臟作腹疼盤腸內疝

胎寒治法見寒腹痛條

田月裏生驚急取猪乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中

神效乳母服防風通聖散三劑其驚自消

三治小兒未滿月驚搐似中風欲死者用辰砂以新汲水濃磨汁塗五心上最效

湯治胎癇驚風皆可服全蝎頭尾全者用生薄荷葉包外以麻線纏火上灸燥為末別研生硃麝香各少許煎麥門

冬湯調下

胎黃

小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如栢汁乳食不思啼叫不止此胎黃之候凡有此症乳母宜服生地黃湯仍忌酒麪五辛之物

生下吐

錢木瓜丸治小兒生下吐者因兒初生下拭口中穢惡不盡咽入喉中故吐木瓜丸主之凡初生急須拭掠口中令

淨若啼聲一發則咽下多生諸病矣

木瓜

麝香

臙粉

木香

檳榔各等分

右同研細末麪糊丸如小黃米大每服一二丸甘草水下無時

田月裏生嘔先用硃砂丸下之如利後用硃沉煎墜其邪氣使穢物自下而不嘔也

生下赤
月裏生赤肌膚如赤丹塗者先用牛黃散托裏續用藍葉散塗外乳母服清涼飲子三大劑

右小兒初生下月裏諸疾蓋胎毒之淺者若一二歲後所生之疾乃胎毒之深者宜權法治之

垣李叔和一日問東垣曰中年來得一子至一歲後身生紅絲瘤不救後三四子至一二歲皆病瘤而死敢問何也

胎瘤

曰予試思之翌日見叔和曰吾得之矣汝腎中伏火精中多有紅絲以氣相傳生子故有此疾遇觸而動發於肌肉之間俗名胎瘤是也汝試視之果如其言遂與滋腎丸數服以瀉腎中火邪補天真之不足忌酒肉辛熱之物其事以六味地黃丸養其陰血受胎五月後以白朮黃芩二味作散與服後生兒至三歲前症不復作矣叔和曰先生乃神醫也遂從受學其子今已年壯矣

胎瘕

丹溪補遺謂小兒心氣鬱而多瘡疽由胎食過而受毒此至論也小兒識見未萌欲想未動心氣何鬱先哲謂乳下小兒常多濕熱與胎食過而受毒又有成胎之時父母氣血有寒熱之偏多能致子之病况形體未堅完盲膜尚脆嫩何為畧而未論向見一人連年疝病新愈而成一男生來三月病熱右腋下陽明少陽之間生一癰甫平左腋下

相對又生一瘡膿血淋漓無復生意醫者王壽甫以四物湯敗毒散加參以香附為佐犀角為使大料飲乳母兩月而安踰三月忽腹脹生赤疹如霞片取剪刀草汁調晚蚕沙傳之隨消半月脹移入胞囊為腫黃瑩可畏越兩日囊裂開兩丸顯露出清水以紫蘇葉承麩炭細末托之旬餘而合夫以父之久病其母寧無憂鬱之火與疔之餘熱毒致此亦不可不知

胎瘡

張進士次子二歲滿頭有瘡一日瘡忽自平遂患痰喘予視之曰此胎毒也慎勿與解利藥眾皆愕然予又曰乃母孕時所喜何物張曰辛辣熱物是其所喜因口授一方人參連翹川芎黃連甘草陳皮芍藥木通濃煎湯入竹瀝與之數日而安何以知之見其精神昏倦受病特深決無外感非胎毒而何 予之次女形瘦性急體本有熱懷孕

三月適當夏暑口渴思水時發小熱遂教以四物加黃芩陳皮生甘草木通因懶於煎煮數貼而止其後生子二歲瘡疾遍身忽一日其瘡頓愈遂成痰瘡予曰此胎毒也瘡若再作病必自安已而果然若於孕時確守前方何病之有

胎淋

鄭廉使之子年十六初生七箇月患淋病五七日必一發其發則大痛水道狀如黍如粟者約一杯許然後定診其脈輕則澁重則弦視其形瘦而長其色青而蒼意其父必因多服下部藥遺毒在胎留於子之命門而然遂以紫雪和黃栢末丸桐子大晒極乾熱湯下百丸以食物壓之又半日痛大作腰連腹水道乃行下如黍如粟者一大碗許其病減十分之八後又與陳皮一兩桔梗木通各半兩作一貼與之又下如黍粟者一合許而安父得燥熱且能

病子况母得之者乎予書此以證東垣紅瘤之事此亦熱在血分也

胎瘤

陳氏女八歲時癩病遇陰雨則作遇驚亦作口出涎沫聲似羊鳴予視之曰此胎受驚也其病深痼調治半年亦可安仍須淡味以佐藥功與燒丹丸繼以四物湯入黃連隨時令加減半年而安燒丹丸方原本未考按類萃用玄精石輕粉各一錢粉霜礪砂各五分研勻入寒食麪一錢滴水和成餅再用麪裹煨黃取出去麪再研細滴水和丸如米大一歲五九二歲十九溫水送下取下惡物為度未知是否

肝主風 角弓反張 搖頭 偏風

驚搐 驚癇 天弔 眼目 眼白多

雀目疳瘡 赤眼 通睛 偏墜

陰腫囊腫脫囊 疝氣 小便不通

淋病 遺尿 喉痺

肝有風目連劄不搐有熱則直視亦不搐得心熱則搐治肝瀉青丸治心導赤散 凡病或新或久皆引肝風風動而上於頭目目屬肝風入於目上下左右如風吹不定兒不任故目連劄也若熱入於目牽其筋脈兩眦皆緊不能轉視故目直視也若得心熱則搐其子母俱有實熱風火相搏故也治肝瀉青丸治心導赤散

角弓反張

錢肝有風甚則身反張強直不搐心不受熱當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸

丹溪云瘥比癩為虛宜帶補多是氣虛有火兼痰用人參竹瀝治之不用兼風藥此論實發前人所未發湯氏雖云瘥候十無一生蓋未嘗有此法施於人也

針灸 明角弓反張鼻上入髮際三分灸三壯 大椎下節間灸

風 虛

針灸

診

三壯
身軟時醒者為癩身強直反張如弓不時醒者為瘖瘖候十無一生

搖頭

風

湯肝風搖頭諸方不載鄭都丞子患七年搖頭三年下血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥無效予既視其病又知其詳亦不明其標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木盛而脾土為木所克脾與肺是子母俱為肝所勝而血遂漬於大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾初亦一時之見只數服而愈十餘日後血止而下白膿遂得以安

犀角屑

甘草各一

瓜蒌根

蛇退皮一錢

防風五兩

釣藤錢子

麻黃去節

黃芪蜜炙

羌活

白芍藥各半

右為末東肉丸食後薄苛湯下只二服作效頭搖即止便血隨愈次間服胃風湯數日頓除沈舍人子服之亦

驗

海食療云蛇脫皮主去風邪明目治小兒一百二十種驚

癩寒熱痔蠱毒安胎瘵用 治癩弄舌搖頭者宜用全脫

偏風

風

全蝎散治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正手足偏廢不舉

全蝎去毒

僵蚕直者

川芎

黃芩去心

甘草

桂枝

赤芍藥

麻黃去節

大麻六錢

大南星

湯泡七次去皮 臍切焙乾五錢

右為麤末每服三錢水一鍾半薑七片煎七分溫服無

時量大小與之一日三四服忌羊肉

驚搐

按驚搐一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者為急驚身冷力小者為慢驚仆地作聲醒時吐沫者為癩頭目仰視者為天弔角弓反張者為痊而治各不同也

藏府旺時補瀉法

國潮熱變發搐在早晨寅卯時者此肝用事之時也身體壯熱目上視手足動搖口内生熱涎項頸強急此肝旺也當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸潔古云木之位肝旺也

因潮熱發搐在巳午未時者此心用事之時也心惕目上視白睛赤色牙關緊急口內涎生手足動搖此心旺也當補肝治心治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸潔古云火之位心熱也

廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿

言八使病錢曰八使過來日午間即無苦也次日午前果作搐急召錢治之三日而愈蓋預見其目直視而頤赤必肝心俱熱更坐石杌子乃欲就冷此熱甚也又肌膚素肥盛而本實其脈急促故發搐尅言午時者自寅至午皆心肝用事之時治之乃瀉心肝補腎自安矣

因潮熱發搐在申酉戌時者此肺用事之時也不甚搐而喘目微斜視身熱如火睡露睛手足冷大便淡黃水是肝旺當補脾益黃散治肝瀉青丸治心導赤散潔古云脾病以桂其強而後補脾為當

徐氏子三歲病潮熱每日西則發搐身微熱而目微斜露睛四肢冷而喘大便微黃請錢與李同治錢問李曰病何搐也李曰有風何身熱微溫曰四肢所作何目斜睛露曰搐則目斜何肢冷曰冷厥心內熱曰何喘曰搐之甚也曰

何以治之曰涼驚丸鼻中灌之必搐止錢又問曰既謂風病溫壯搐引目斜露睛內熱支冷及搐甚而喘併以何藥治之李曰皆此藥也錢曰不然搐者心肝實也身微熱者日西肺用事之時也肺主身溫今且熱者肺虛也目微斜露睛者肝肺相乘勝也四肢冷者脾虛也肺若虛甚則脾母亦弱木氣乘脾四肢即冷治之當先補脾肺用益黃散阿膠散得脾虛症退然後治其心肝以瀉青丸導赤散涼驚丸治之九日愈

因潮熱發搐在亥子丑時者此腎用事之時也不甚搐而臥不穩身體溫壯目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不省當補脾治心補脾益黃散治心導赤散涼驚丸

表裏

傷風發搐因傷風後得之口中氣出熱呵欠頻悶手足動

搖當發散大青膏主之小兒生來怯弱者多此病也

見傷寒

傷風發搐因傷風而得之症同大人傷風寒痰之類當

辨有汗無汗陰陽二症用大青膏小續命之類開發則愈

大青膏陰症小續命陽症也

傷寒發搐因傷食後得之身體溫多睡多睡或吐不思

乳食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神丸

傷食發搐謂不因他症忽然而搐此因飲食過度致傷

脾胃故兒多睡多吐不思飲食脾胃既虛引動肝風則發

搐當先定其搐加羌活防風煎下瀉青丸後用白餅子下

其食漸漸用調中丸異功散養其氣

百日搐

百日內發搐真者不過兩三次必死假者頻發不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃

發搐也欲知假者口中氣出熱治之可發散大青膏主之
及用塗顙浴體法 李司戶孫百日病來搐三五次請衆
醫治或作天弔或作胎驚或作驚癇皆無應者後錢氏用
大青膏如荳許一服發之復與塗顙法及浴體法三日而
愈何以然嬰兒初生肌骨嫩怯一被風傷遂不能任故發
搐也然顙發者輕以客風在內每遇不任即搐輕則易歇
故發頻也搐稀者是內臟發病不可救也顙搐者宜散風
冷故用大青膏亦不可多服蓋兒至小易虛易實多即生
熱止宜用下塗顙法

麝香

字一

蝎尾

去毒為薄苛半末半錢

蜈蚣

牛黃

青黛

各一字

右同研末用熟棗肉劑為膏新綿帛上塗勻貼顙上四
旁可出一指許火上炙手頻慰百日裏外兒可用此塗

顙法

外物驚宜苦寒

外物驚宜鎮平之以黃連安神丸若氣動所驚宜寒水

石丸黃連安神丸

黃連安神丸見燥條寒水石丸見治法

按外物驚者元氣本不病故治以黃連安神之苦寒氣
動驚者不因外物驚元氣自有病故治以寒水石安神
之甘寒也

鎮心丸涼心經治驚熱痰盛

甜硝

白者一兩

人參

一兩

甘草

炙

寒水石

燒各兩半

山藥

白者二兩

白茯苓

二兩

硃砂

一兩

龍腦

麝香

各一錢三味另研

急驚屬陽慢驚屬陰

凡急慢驚陰陽異證切宜辨而治之急驚合涼瀉慢驚合
溫補

右急驚症屬木火土實也木實則搐而力大自上目劄

所謂木太過曰發生其動掉眩癩癇是也火實則身熱面赤土實則不吐瀉睡合睛故其治法合涼瀉而用涼驚丸利驚丸之類慢驚症屬木火土虛也木虛則搖而力小似搖而不甚搖經所謂木不及曰委和其病搖動注恐是也謂手足搖動腹注泄心恐悸也火虛則身冷口氣冷土虛則吐瀉睡露睛故其治法合溫補而用羌活營益黃散有熱者用東垣黃芪益黃散其東垣非錢氏羌活膏治慢驚者謂土虛泄瀉火木乘之謂手掌與腹俱熱之症若火木土俱虛而搖動恐悸注瀉手腹冷者非羌活膏不能治之

慢急驚主痰熱當涼瀉之只用降火下痰養血之藥
慢驚主脾虛所以多死先實脾土後散風邪只用硃砂安神丸更於血藥中求之
急驚屬痰熱慢驚屬脾虛
如四物四君子東垣黃芪益黃散詳用

驚力
大身熱
不吐瀉

緩急驚因聞大聲或大驚而發搖過則如故此無陰也當下利驚丸主之 小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則發搖蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其痰熱不可用巴荳及溫藥大下之恐搖虛熱不消也小兒熱痰客於心胃因聞大聲非常則動而驚搖矣若熱極雖不聞聲及驚亦自發搖

驚急驚者陽症也俱腑受病熱痰客於心肺是少陽相火旺經云熱則生風因聞大聲而作蓋謂東方震卦得火氣而發搖火本不動煽得風而動當用利驚丸導赤散瀉青丸地黃丸搖止宜服安神丸

關急驚內有熱即生風又或因驚而發則目上連劄潮涎搖擗身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故

此急驚症也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之藥一二服如麝香丸鎮心丸抱龍丸辰砂丸紫雪之類候驚勢已定須臾以藥下其痰熱如利驚丸軟金丹桃枝丸之類利下痰熱心神安寧即愈

大黑龍丸治小兒急驚神效方見後急慢驚治條

青礞石研一兩 青黛錢 蘆薈半錢 膽星兩

右為極細末甘草湯為丸如鷄頭大每一丸薑蜜薄苛湯下

錢涼驚丸 右二方礞石膽星瀉濕痰之劑為君痰多者宜之

草龍膽 防風 青黛研各三兩 龍腦研一錢 黃連末五分 牛黃 麝香各一字

右為細末麪糊為丸如粟米大每服一二十九金銀泡湯下之

無治陽癇即急驚風

硃砂研一分 膩粉 麝香各五分 蘆薈

白附子 甘草各二分 胡黃連錢一 蝎稍七

僵蚕蜜炙十條 金箔七片 赤脚蜈蚣一條

右為末二歲已上服半錢七金錢薄苛湯調下三歲一錢七如口不開灌入鼻中

錢利驚丸

輕粉 天竺黃 青黛各一錢 黑牽牛頭末半兩

右同研蜜丸豌豆大一歲一丸溫薄苛湯下食後服海藏云涼驚溫驚利驚自有分別南星胭脂輕粉青黛色味各有輕重

者有力者利之

羅鎮肝丸治小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是肝經風熱也

天竺黃研 生地 當歸 竹葉

草龍膽 川芎 大黃煨 羌活

防風已上各二錢半

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服二丸沙糖水化下先服此後服天麻散

右五方瀉肝木之劑為君前二方輕劑通用後三方峻劑必脈有力血氣實者宜之又闍氏所謂候搖勢定下其痰熱之類是已

五福化毒丹治急驚風生蚯蚓一條研爛入五福化毒丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋灌量兒大小加減服之無不效者

五福化毒丹治驚熱涼心膈

生地 熟地焙各五兩 天門冬 麥門冬焙各

三兩 甜硝 玄參 甘草各二兩炙

青黛一兩半

右上六味為細末後研入硝黛煉蜜丸如雞頭大每服半丸或一九食後熟水化下

安神丸方見治法 鎮心丸方見前表裏條

右三方甘寒瀉火之劑為君小兒血氣虛而急驚者宜之又潔古闍氏所謂候搖止勢減宜安神鎮心之類是已

慢驚力慢驚力 慢驚因大病後或吐瀉或只吐不瀉變成脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時瘳瘳昏睡露睛此無陽也括萎湯主之

慢驚者陰證俱臟受病蓋小兒吐瀉病久脾胃虛損若不早治則成慢驚名曰瘈瘲似搐而不甚搐也因脾胃虛損故大便不聚當去脾間風先用宣風散導之後用益黃散史君子丸平之則其利自止既已失治則脾胃俱虛致被肝木所乘是為慢驚當用溫補羌活膏主之

東都王氏子吐瀉諸醫用藥下之至虛變慢驚其候昏睡露睛手足瘈瘲而身冷錢曰此慢驚也與瓜蒌湯其子胃氣實即開目而身溫王疑其子不大小便令諸醫以藥利之醫留八正散等數服不利而身復冷令錢氏利小便錢曰不當利小便利之必身冷一二日果身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中虛若利大小便則脾胃俱虛當身冷而閉目即死今幸胎氣實而難衰也錢氏用益黃散史君子丸四服令微能飲食至日午果能飲食所以然者謂利

大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻也後又不語諸醫作失音治之錢曰既失音何開目而能飲食又牙不緊而口不噤也諸醫不能曉以地黃補腎錢曰此因用涼藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎尚虛故補腎必安治之半月而能言一月而痊

瓜蒌湯

瓜蒌

白甘遂末

右同於慢火上炒焦黃研勻每服一字麝香薄許湯調服

右瓜蒌湯錢氏治慢驚法脈有力者宜用蓋濕痰積於膈中使風火不得開發而身冷故用瓜蒌湯劫去濕痰使風火得伸而身溫搐止若脈無力者不宜用之便當補脾及溫白丸羌活膏之類

脈無力者溫之

青州白九子治小兒驚風大人諸風

半夏生七兩

南星生三兩

白附子生二兩

川烏生半兩去皮

右為末以生絹袋盛并花水攪出如未出者更以手揉出如有滓更研再入絹袋擺盡為度於磁盆中日晒夜露至曉撇去舊水別用井花水攪又晒至來日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸菜豈大每服三五丸薄苜湯下癱風酒下並無時

錢氏異功散溫中和氣治吐瀉不思食

方見吐瀉門

海驚啼手足瘳癡睡臥不穩四君子加全蝎去尾尖毒炒

釣藤白附子炒等分同煎

方見治虛實法

脾胃虛弱生風多困

四君子加炒半夏麩沒石子等分為細末入冬瓜子少許

同煎服

溫白丸治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷疝洞利及因吐瀉或久病成慢驚癩癲

天麻生半兩

白僵蚕炒

白附子生

天南星剉湯洗焙

乾各一兩

乾蝎去毒一錢

右為末湯浸寒食麩為丸如棗豈大仍於寒食麩中養

七日取出用每服五七九至三十九丸空心生薑米飲

下量病勢漸加丸數服之

寒食麩謂寒食日煮喫麩取之以焙乾貯用也

釣藤飲子治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣藤三分

蟬殼

防風去蘆

人參去蘆

麻黃去節

白僵蚕炒

天麻

蝎尾炒去毒各半兩

甘草炙

川芎各一分

麝香一錢另研

一方有蜣螂

三箇去頭足炙黃

右為末每服二錢水一盞薑三片煎六分溫服量多少

與之寒多者加附子半錢服無時

羌活膏治脾胃虛或吐瀉後為慢驚者亦治傷寒無不效

防風去蘆 川芎 人參去蘆 白附子炮

赤茯苓去皮各半兩 天麻兩 白僵蚕湯浸炒黃

乾蝎炒去毒 白花蛇酒浸焙各一分 川附炮去皮臍

麻黃去節各二錢 肉苳蔻 沉香 母丁香

藿香葉 木香各二錢 輕粉 真珠末

牛黃各一錢半 龍腦半字 麝香 辰砂

雄黃各一錢已上七味各另研入 羌活兩

右為細末煉蜜作劑旋丸如芫大每服一二九食前服

或薄苛湯或麥門冬湯化下實熱急驚勿服性溫故也

海返竟丹治小兒諸癩癩潮發癩瘰口眼相引項背強直

牙關緊急目直上視及諸病久虛變生虛風多睡者因荏

荏不解速宜服之荏荏柔弱也

烏犀剉屑二兩 水銀兩半 天麻酒洗焙乾 檳榔各半兩

僵蚕去絲嘴微炒 硫黃半兩研末入水銀置磁石蓋內慢炒成沙火要緊慢

白附子炮 川烏炒通赤留烟少許入碗內以蓋子蓋上新土圍之待冷取出

獨活去蘆 乾蝎灸 草解炒各一兩 肉桂去麩皮

當歸酒浸焙乾炒 細辛根 防風去蘆 天南星薑汁黃炒

黃炒 阿膠杵碎炒 藿香洗去土 烏蛇酒浸一黃去皮

骨去皮 沉香 槐膠 羌活

白花蛇酒浸一宿炙熟去皮骨 麻黃去節 半夏薑汁浸三宿炒

羚羊角鎊 陳皮去白炒已上各一兩 天竺黃研

木香 人參去蘆 乾薑炮 茯苓去皮

蔓荊子去白皮 晚蚕沙微炒 敗龜板醋酒炙黃 藁本去土

桑螵蛸炒 白芷 何烏米泔浸一宿煮焙

虎骨

酒醋塗炙黃

砂仁

洋浸一宿切焙

枳殼

炒去白

丁香

厚朴

去皮薑

附子

水浸泡

石斛

去根

川芎

龍腦

研水

雄黃

研水

蘇砂

研水飛已

膩粉

研

麝香

另研各

烏雞

一隻上

狐肝

三具已

蠟月內入瓦瓶固濟火

煨赤候冷取出研用

金箔

三十片

右藥五十八味

炮製如法

煉密合和搗

三五千下丸如

桐子

大金箔為衣

每歲兒

溫薄苛自然

汁化下無時

右關氏宗錢氏

治慢驚法

脈無力者宜之

其法以青州

白丸子兼異功散

羌活膏溫白丸

釣藤飲子之類

服之

至有徃徃死中

得生者今如其法

又增入海藏四君子

法次於異功散

之後返菟丹

次於羌活丸膏

之後相參

用之也

湯

凡吐瀉成虛風

慢脾先用奪命散

青州白丸子末煎如

稀糊入蜜調控下

涎後服祛風醒脾等藥

奪命散

方見後通治急慢驚下

治虛風八仙散

風盛者服之

白天麻

白附子

花蛇肉

防風

南星

半夏

冬瓜子

全蝎

各等分

加川烏

右咬咀每服一錢水半盞薑二片

葱半枚煎二分熱服

加薄荷尤佳

醒脾散昏困者服之

白朮

人參

甘草

橘紅

茯苓

全蝎

各半

半夏

木香

各一分

白附子

炮四

南星

炮兩

陳倉米

二百粒

一方無白

木半夏加蓮肉一

文獻通考

卷一百一十五

食醫心鏡

卷之六

方

卷之六

方

卷之六

錢亦

右為末每服一錢水半盞薑二片葱半箇煎二分漸漸服之不可頓服頓服必吐

釀乳方

人參

木香

藿香

沉香

橘皮

神麴

麥芽

各等分

丁香

半

右咬咀每服四錢水一椀薑十片紫蘇十葉葱三枚煎至半椀乳母食後須去乳汁盡方取服之即仰臥霎時令藥入乳之絡次令兒吮數口不可過飽此良法也如嘔定一日急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散如前件藥俱用不效危困可憂須診太衝脈未絕者當灸百會一穴前後髮際兩耳尖折中乃是穴也方書所載但云頂上旋毛中殊不審有雙頂者又有旋毛不正者庸

醫之輩習循舊本悞人多矣灸後即當控涎用青州白丸子末再煎如稀糊入煉蜜調奪命散良久涎下細研靈砂米飲調旋抹口中漸看退證如風盛服八仙散昏困服醒脾散常令減乳乳母服釀乳藥如此調理無不愈者間有稟受不堅五行數短者雖神聖功巧不能奪其造化矣 若涎已離膈但在喉中如鋸藥不能入又不可控當用別法撩之兼搐鼻噴嚏得出次服奪命散庶免再作

撩痰方

川烏尖

白附尖

各七箇去皮生用

蝎梢

七枚

石綠

許少

右為末一處和勻用軟雞翎蘸藥入喉中逐漸抽出頓用帕子拭之

右湯氏治慢驚法先用奪命散白丸子控涎候涎下一
回用八仙醒脾等一回令乳母用釀乳法如危極者却
灸百會及擦痰法但奪命用礞石氣虛者難用必與東
垣益黃散相兼服之可也

陳氏法

陳氏治慢驚風先服芩蝎散用手法幹出寒痰冷涎自不
痴呆次服油珠膏 後服益真湯温壯元氣 時服前朴
散寬上實下

芩蝎散治小兒腦髓受風顛顛開解皮肉筋脈急脹腦骨
縫青筋起面少血色或腹中氣響時便青白色沫或嘔吐
痰涎欲成慢驚搖足脛冷者

川芎

兩

細辛

錢二

葶撥

兩

半夏

酒浸一宿湯洗

焙二錢

蝎稍

去毒

右細末一週見抄一銅錢用數沸湯調稍熱飢服 如

痰滿胸喉中眼珠斜視速與服若目上直視不轉睛者
難救或痰氣壅塞不能嚥藥用一指於兒喉壓腭中探
入就幹去痰涎氣稍得通次用補脾益真湯或以油珠
膏選用此方累世活人多矣

油珠膏治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂

煉黃中揀取如臘者五錢

滑石

半兩

黑附子

炮去皮臍

半夏

酒浸一宿湯洗七次焙乾

南星

醋浸一宿湯洗七次焙乾各一錢

右細末每服一錢用冷清薑汁半盞滴麻油一點如錢
抄藥在油珠上須臾墜下却去薑汁與兒服之更用清
薑汁三五口嚥下肚飢服服訖後一時方與乳食

補脾益真湯治胎弱吐乳便清而成陰癩氣逆涎潮眼珠
直視四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤服涼藥所作

木香

當歸

人參

黃芪

丁香 訶子 陳皮 厚朴薑製

甘草炙 肉蔻麩裹 草菓 茯苓

白木 桂枝 半夏湯泡 附子炮各半兩

全蝎炒每服加一枚

右咬咀每服三錢水一盞半薑一片棗一枚煎六分稍熱飢服服訖令揉心腹以助藥力候一時方與乳食渴者加茯苓人參甘草去附子丁香肉蔻 瀉者加丁香訶子肉 嘔吐加丁香半夏陳皮 腹痛者加厚朴良薑 咳嗽加前胡五味子去附子官桂草菓肉蔻 足冷加附子丁香厚朴 惡風自汗加黃芪官桂 痰喘加前胡枳實赤茯苓去附子丁香肉蔻草菓 氣逆不下加前胡枳殼檳榔去當歸附子肉蔻 腹脹加厚朴丁香前胡枳殼

前朴散治心腹結氣或嘔噦吐瀉腹脹痛驚悸

前胡 白木 人參 陳皮

良薑 藿香 甘草 厚朴各等分

右剉每服三錢水一盞煎七分稍熱空心服

小兒誤服涼藥或用帛蘸水繳口因此傷動脾胃或泄瀉或腹脹或腹中響 小兒面少血色常無喜笑不看上而視下 小兒顙顙高急頭縫青筋時便青糞 小兒肥壯糞如清涕或如凍汁 小兒時時扎眼糞便青白沫有時乾硬 已上五症忽然嘔吐者必成陰癩俗謂慢驚是也 小兒頭雖熱眼珠青白而足冷或腹脹而足冷或瀉而足冷或嘔而足冷或瀉而足冷頭熱目赤痰塞鼻喉咽若無根之火逆也 已上五症忽然吐而作搐者名曰慢脾風速與補脾益真湯一服三錢重加蝎一枚如因驚而搐者前朴散一服三錢重

加附子前胡各半錢同煎

右陳文忠治慢驚法其治之次第自成一家故另錄之
以備採用其醫案所言芴蝎散油珠膏累累取效

雜法

世治慢驚神效用一粒丁香一箇蝎一字辰砂一點血已
上俱為末男用男左手中指血女用女右手中指血蘸末
擦唇上愈

本醒脾丸治小兒慢脾風因吐痢後虛困昏睡欲生風癇

厚朴

白朮

硫黃入豆腐中
煮三五沸

天麻

全蝎

防風

官桂

人參各一錢

右為細末酒浸蒸餅和丸如鷄頭大每一九搥碎温米
飲下

蝎梢丸治小兒胎虛氣弱吐痢生風昏困嗜臥或潮搐

全蝎

微炒

白附

煨裂各半兩

硫黃

半夏

薑汁製焙乾各

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十九荆芥湯下量
兒大小加減服之

世小兒慢驚風身冷瘈瘲

天麻

防風

川烏

全蝎

去翅足薄切

炮

南星

等分水煎服

湯氏治慢驚

真川烏

一枚去皮生用

全蝎

等分

右二件咬咀分二服水二盞薑十片煎半盞旋旋滴入
口中

無陰癇即慢驚風

黑附子

生去皮臍

南星

生

半夏

各二錢

白附子

半錢

右研細井水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂二錢麝香一錢研勻每服一字薄苛湯調下量兒加減一方用黑附子生去皮臍為末每服二錢以水一盞半生薑二片煎至半盞分二服量兒加減吐者入丁香五箇同煎空心服或水浸炊餅為丸如粟米大每服二十九生薑湯下亦可

錢回生散治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風成慢驚大南星重八九錢已上者用地坑子一箇深三寸許用炭火五斤燒紅入好酒半盞在內然後入南星却用炭火三兩條蓋在地坑上候南星微裂取出剉碎再炒勻熟不可稍生放冷為末每服半錢濃煎生薑防風湯調下又方梓朴散

厚朴

半夏

湯洗七次薑汁浸半日曬乾一錢

右米泔三升同浸一百刻水盡為度如百刻水未盡少加火熬乾去厚朴只將半夏為末每服五分或一字薄苛湯調下無時

荳卷散治小兒慢驚多因藥性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱症者有因病愈而致熱症者有反為急驚者甚多當問病幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒藥無不效宜此方

大豆黃卷

水浸黑豆生芽是也晒乾

管仲

板藍根

甘草

炙各兩

右為末每服半錢水煎服甚者三錢藥水內入油數點煎又治吐虫服不拘時

右諸家雜治慢驚其首一方用人血蘸藥末擦唇者甚效後一方解藥太過之毒尤見錢氏憂人之切也

垣驚兒瀉青色先鎮平以硃砂之類勿用寒涼之藥大禁
涼驚丸蓋風木旺必克脾土當先實其土後瀉其木其風
木旺症右關脈洪大掌中熱腹皮熱者是也今立一方黃
芪益黃散主之人參甘草黃芪各等分此三味皆溫能補
脾土益元氣甘能瀉火內經云熱滯於內以甘瀉之以酸
收之白芍藥酸寒能瀉火酸能瀉肝木而大補肺金所
補得金土之位大旺則火虛矣風木何由而來尅土然後
瀉風木之旺脾虛者以火邪乘其土位故也故曰從後來
者為虛邪火旺能實其木木旺故來尅土當於心經中以
甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼故
致脾土中金旺火衰則風木自虛矣
黃芪益黃散治胃中風熱

黃芪 二錢

人參 一錢

甘草 生五分

炙五分

白芍藥 七分

陳皮 不去白一錢

黃連 少許

白茯苓 四分

右為麤末每服水二盞煎五沸去渣溫服

丹治小兒驚而有熱者

人參

茯苓

白芍藥 酒炒

白朮

右入生薑煎服暑月加黃連生甘草竹葉煎服

陳明遠治小兒驚因脾虛肝乘之手足搐動四肢惡寒而食少

白朮 二錢

茯苓 一錢

右煎湯入竹瀝熱下龍薈九二十九保和九二十九

湯奪命散大能控風涎不問急慢驚風痰潮壅盛塞於咽

喉其響如潮名曰潮涎百藥不能過咽命在須臾但先用

此藥入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也

青礞石 一兩

入廿窩子同煅硝一兩炭火煨通紅須硝盡為度候冷如金色取用

通治急慢驚
痰盛氣
實者鎮
墜之

右為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自然汁入蜜調微溫服之良久其藥自裹痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱祛風截驚等藥慢驚風亦以痰涎潮上塞住咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以青州白丸再研為末煎如稀糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服花蛇川烏全蝎蜈蚣等藥

丹 大黑龍丸治小兒急慢驚風神效

膽星 礞石硝煨各一兩 天竺黃 青黛各半

蘆薈二錢 辰砂 蜈蚣燒灰一錢 僵蚕五分

右為末甘草汁為丸如鷄頭大每服一九或二九薑蜜薄苛湯下如慢驚用桔梗白朮湯下

鎮驚丸

琥珀二錢 青黛半兩 辰砂二錢 天竺黃二兩

天麻一兩 真珠母二錢 蘆薈 柴胡各半兩

青皮 甘草各二錢 膽星二兩 雄黃一錢

乳香一兩 青礞石硝煨半兩

右為末甘草膏丸如鷄頭大慢驚參朮湯下急驚薄苛薑蜜湯下

小兒急慢驚風

全蝎四十九箇 辰砂半兩 研極

右取蛭蚓十條洗淨入小瓶內以溫火煨蛭蚓化為水和丸如胡椒大每三丸用順流水化服下

小兒急慢驚風

僵蚕三條 辰砂豆大 全蝎一箇 真珠末撮

右末取蓬蒿中小虫兒每一箇研作一九如麻子大每

一粒用乳汁下

本保命丹治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口噤涎不止

虎睛一對安瓦上以瓦蓋之慢火過乾 硃砂半兩 全蝎半錢

天麻一分 蜈蚣二條去頭尾赤腳者 麝香半錢

右為細末煉蜜丸如大莖大瓦罐貯之又入腦麝窰定

急驚薄荷蜜湯化下慢驚薄荷湯化下各三九

錢温驚丸一名粉

南星為木入膽月牛膽中陰乾百日為末四兩 硃砂一錢半 天竺黃一兩

坯子胭脂半兩 龍腦五分

右用牛膽汁和丸如雞頭大每服一丸小者半丸沙糖

水下

抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣麤風熱痰實壅嗽驚風

潮搖及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時與服之

丹溪云抱龍丸心肺肝藥也

南星如無牛膽者只將生者剉炒熟用四兩 天竺黃一兩 雄黃飛

辰砂另砂各半兩 麝香另研一錢

右為細末煮甘草膏和丸皂莢子大温水化下百日小

兒每丸分作三四服五歲兒一二九大人三五丸亦治

室女白帶伏暑用鹽少許嚼一二九新汲水送下臘月

雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水或新水浸南星三

日候透煮軟三五沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄

切焙乾炒黃色取末八兩以甘草二兩半拍破用水二

碗浸一宿慢火煮至半碗去查漸漸傾入南星末內慢

研令甘草水盡方入餘藥

世奪命散治急慢驚風諸藥不效此藥隨手奏功

白附子三錢 黑附子炮去皮臍半兩急驚不用 南星炮一兩

天麻錢

辰砂另研半錢

半夏各半兩

全蝎去毒七箇

蜈蚣灸錢

麝香半錢

僵蚕炒慢驚不用

右為末三歲兒半錢薄苛生薑自然汁加好酒沸湯各少許調服急驚加輕粉腦子各少許

湯治慢驚甚驗

赤脚蜈蚣酒塗灸一條

白僵蚕炒七條 辰砂另研一字

全蝎用薄苛葉包灸七枚

青州白丸子三十粒

右為末入麝香少許慢驚人參麥門冬湯調下急驚加腦子牛黃各少許金銀薄苛湯調下

羅天麻散治小兒急慢驚風及大人中風涎盛半身不遂言語艱澁不省人事

半夏錢七

天麻二錢半

甘草灸

茯苓

白朮各三錢

右用水一盞入磁罐內煮令水乾將老薑三錢同煮候

乾為細末每服一錢五分薑棗湯調下

經治驚風墜涎天南星一箇重一兩者換酒浸七伏時取

出新瓦上炭火炙乾烈地上去火毒搗末入硃砂一分研為細末每服五分荆芥湯空心及午時各調下一服

田天麻防風丸治小兒驚風身熱喘促多睡驚悸搐掣神昏涎痰不利等症

天麻

防風

人參各一兩

蝎尾去毒半兩

甘草

硃砂

雄黃

牛黃

麝香各一錢 僵蚕炒半兩

右為末煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服薄苛湯下一二丸

雲七味羌活膏治急慢驚風壯熱

氣弱身熱者天麻參蝎

羌活

獨活

天麻

全蝎去毒

人參

僵蚕炒各半兩

烏蛇肉酒浸一宿焙乾一兩

右為末煉蜜丸如皂子大每兩作五十九丸每服一九荆芥湯下

經治小兒驚風全蝎一錢不去頭尾用薄苧葉裹炙乾同研為末作四服湯下

治小兒驚風僵蚕蝎稍等分天雄尖附子尖共一錢炮過為末每服一字薑湯調下

小兒驚風釀乳方用白羊頭一箇丁香同熬至熟乳母空心盡食之

孫女因胎中受濕熱日午發搐唇黑面青每日作一次未半週難與藥且釀乳飲之

白朮

陳皮

半夏

芍藥

青皮各五分

人參

川芎

木通各三錢

右分八服薑五片與乳母煎服

痰積癩者攻積

小兒急慢驚風發熱口瘡手足伏熱痰熱痰喘痰嗽並用涌法重劑用瓜蒂散輕劑苦參赤小荳末酒酸薑汁調服之後用通神散蜜丸服之間以桑牛陰乾研末調服以平其氣

本漏銀丸治小兒急慢驚風積癩

青黛三錢

水銀一皂角子大同

寒食麩

黃明膠炒焦為末各二錢

輕粉炒豆許

雄黃

粉霜

硃砂各一

巴豆共一粒去油

腦麝少許

右研細滴水為丸如麻子大捏漏曝乾篋盒盛之一歲一丸隨意加減煎枣子湯送下不得化破

博治急慢驚風乳香并遂各半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或用童便調下尤妙

右二十方通治急慢驚風蓋謂虛實兩見急慢互出故有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於痰故礞石星半之屬通能治之者也分而言之礞石之屬瀉痰青黛之屬瀉木硃砂之屬瀉火皆治氣實之劑參草之屬補土天麻全蝎之屬補木烏附之屬補火又皆治氣虛之劑故補瀉兼施虛實通治之法也

山小兒驚風猢猻糞燒存性碗覆出火毒生蜜調灌少許
海心神不安四君子加辰砂半分寒湯調下 又有一症欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當用發散藥
瀉驚風或泄瀉等症煩渴者皆津液內耗也不問陰陽宜煎錢氏白朮散使滿意取足飲之彌多彌好

難方

針灸

明急慢驚

印堂

灸急驚瀉
慢驚補

急驚 支正

下廉

小兒慢驚風灸尺澤二穴

各七壯
在肘橫

文內正中注
如小麥大

睡中驚掣

厲兌

睡中驚目不合灸

屈肘橫紋上三壯

咬呀甚者發驚

目赤面青身反拆者生驚

呵欠面青者驚風

呵欠面黃者脾虛驚

目赤兼青者發搐

驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右

視無聲左視有聲相勝故也更有發時症潔古曰男為木

聲右視金位相擊則有聲女為金故右
視金位無聲左視木位亦相擊有聲

李寺丞子三歲發搐自卯至巳目右視大叫哭錢見曰此

逆也男為陽本發左視無聲則順右視有聲則逆所以然

者左肝木也右肺金也逆則二臟相戰金木相擊而有聲

診

也治宜瀉強補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝不能任故叫哭也當瀉其肺後治其心續治其肝若病在秋時同肺兼旺位當大瀉其肺若病在春早晨此肝旺之時尚不能勝肺是肺強而肝火弱也當補其肝腎大瀉其肺若男發搐目右視是肝來勝肺而叫哭當瀉其肝心若病在春夏早晨肝心旺時當大瀉其肝若病在秋冬時同此肺旺之時尚不能勝肝是肝強而肺極虛也當補其肺大瀉其肝所以言目反視者乃肝主目也凡搐則是風熱相搏於內風屬肝故外見於目也今此病男反女症故稍易治於女也先瀉其肺以瀉肺湯主之二日不悶亂知病退也後用地黃丸補腎三服後用瀉青丸各二服以瀉心肝五日而愈 又肺虛不瀉者何也曰假令男目右視木克金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛故當

補其肺慎勿瀉也

湯凡搐男左女右為順易治男右女左為逆難治

心脈急甚為瘈瘲全文見診治法○脾脈急甚為瘈瘲

不治症**陳**驚風不治證 搐而不休休而再搐 驚叫發搐 汗

出足冷 痰滿胸喉 口開目直

禁忌**關**治小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危

病也急驚方搐時但扶持之不可擒捉蓋風氣方盛恐流入筋脈或至手足成拘攣也

驚癇

驚癇即急慢之症但驚癇發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也

陰陽陽癇初作時病先身熱瘈瘲驚啼叫噉而後發脈浮者為陽癇乃急驚也內在六腑外在皮膚為易治若病先身冷

不驚瘈不啼呼而作脈沉者為陰癇乃慢驚也此病內在
五臟外在骨髓劇者難治

五臟所主

錢凡治五癇皆隨臟治之每臟各屬一獸宜以五色丸主

之 犬癇反折上竄犬叫肝也 羊癇目瞪吐舌羊叫心

也 牛癇目直視腹滿牛叫脾也 雞癇驚跳反折手縱

雞叫肺也 猪癇如尸吐沫猪叫腎也

五色丸

硃砂研半兩

水銀一分

雄黃一分

鉛三兩同水銀熬

直珠末研一兩

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

身熱驚

潔如有客痰發熱而有聲煎大黃荆芥湯下五色丸 潮

熱有時積熱也桃枝丸主之壯熱不退當用地骨皮散下

五色丸 風熱當用防風黃芩湯下大青膏 身溫不熱

當用白虎湯加蒼朮下五色丸

本雌黃丸治小兒癩癩欲發眼暗瘈瘲聲惡嚼舌

雌黃

黃丹略一

麝香研一錢

右為末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥末杵

三五百下丸如菉荳大每服三丸溫熱水下 一日三服

此方得自名醫之家極有神效

湯蛇黃丸治驚癇

真蛇黃醋煨碎

鬱金三分一處為末 麝香另研一錢

右為末粳米飯丸如桐子大每服三二丸煎金銀磨

水化服

海古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡疾煮取汁和諸

藥煮服之彌古者尤佳

治癇方治太陽陽明二經為病

荆芥穗四兩 白礬為細末

右束肉為丸如桐子大每服二十九丸荆芥湯下次三十丸四十九丸又次五十九丸俱食前

身冷不驚啼脈沉為陰

羅沉香天麻湯○魏敬甫之子四歲從長老摩頂授記衆

僧念呪因而大恐遂發驚搐痰涎壅塞目多白睛項背強急喉中有聲一時許方醒後每見皂衣人輒發多服硃犀龍麝鎮墜之藥四十餘日前症猶在又添行步動作神思如痴予診其脈沉弦而急黃帝針經云心脈滿大癰瘕筋攣又云肝脈小急癰瘕筋攣蓋小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癰瘕筋攣病久氣弱小兒易為虛實多服鎮墜寒涼之劑復損其氣故添動作如痴內經云暴變癰眩足不任身取天柱穴是也天柱穴乃足太陽之脈所發陽蹻附而行也又云癰瘕癱

不知所苦兩蹻主之男陽女陰潔古云晝發治陽蹻申脈夜發治陰蹻照海先各灸兩蹻各二十七壯次處

沉香二錢 天麻三錢 羌活五錢 防風三錢

益智二錢 川烏炮去皮二錢 甘草炙 當歸各一錢半

半夏湯泡三錢 獨活四錢 附子炮去皮三錢 薑屑一錢

右咬咀每服五錢生薑三片水煎溫服舉痛論云恐則氣下精怯而上焦閉又云從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上行又入太陽之經為引用故以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又養胃氣故以為臣黑附子川烏頭益智仁大辛溫行陽退陰又治寒客傷胃腎主五液入脾為涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯沉香辛溫體重氣清去怯安神故以為使氣味相合

升陽補胃恐怯之氣自得平矣

湯牛黃丸治因驚中風五癩天吊客忤潮涎灌壅

白花蛇酒浸取肉白附子 全蝎 真川烏一枚半兩

生者天麻 薄荷葉各半兩

已上六味先為細末次入

雄黃五兩 辰砂三錢 腦子另研半兩 牛黃三錢

麝香一錢

右為一處和勻麻黃去根二兩酒一升煎麻黃至一盞去麻黃用酒熬藥得所勿至焦赤衆手疾丸如芡實大密器盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯磨化大能發散驚邪

治五癩得效方

露蜂房焙一兩 石綠一兩 桂心 遠志心

濕痰

四治小兒驚癩

人參各半兩 硃砂一錢
右為末粥丸如桐子大每服二三十丸白湯下

膽星二兩 全蝎去翅足炒半兩 白附子一兩 薄荷半兩

僵蚕炒一兩 川芎一兩

右為末粥丸青黛為衣每服一二丸薑湯下

治小兒癩用其遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和其遂末將猪心批作兩片入藥在內以線縛定外濕帛包裹入文武火煨熟不可過度取藥細研入辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸猪心湯化下再服另取猪心煎湯此方神效

虛 **湯**斷癩丹治癩瘡後復作連綿不除服之有驗

黃芪蜜水塗灸 釣藤 細辛 甘草炙

蛇蛻皮各半 蟬蛻去土 牛黃另研

治遠年驚癇心血不足神驗方蝎虎一枚褐色者用剪子取下四足爪連血細研入生珠末麝香腦子各少許同研細薄苛湯調下作一服須先用奪命散控下涎次服之能奪造化雖數年癲癇亦能治之此藥所以神效者蓋癲皆心血不足此物各守宮其血與心血類也取下如室女之紅鉛服之於心故能補也此乃怪重去其足而復能行又再生而活也蝎虎即蝦蟇奪命散方見驚搐門

小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癲當歸末小荳大乳汁灌之日夜三四服

雜方
本治小兒卒得癲用釣藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小兒大日夜三大服

廣濟及崔氏方治小兒驚癲諸湯飲皆用釣藤皮又野豬

黃味辛甘平療癲癇水研如枣核日三服效衍義云野豬黃膽世不常有間得之能治小兒痰癇

李氏一小兒病手足搐搦戴人曰心火勝也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃令掃淨地以水洒之乾令復洒令極濕俛臥兒于地上良久渾身轉側泥漿皆滿仍以井水洗之少頃而瘥

治小兒胃寒重上諸危惡與癲相似者乾漆搗炒烟盡入白蕪荑等分爲細末米飲調下一字至一錢瘥

針灸
小兒癲癇瘈瘲脊強互相引項灸長強穴三十壯在脊舐端跌地取之乃得 小兒驚癲瘈瘲脊急強目轉運上插筋縮主之

小兒癲癇驚風目眩灸神庭穴七壯在鼻直上入髮際五分 小兒風癲灸鼻柱上髮際宛宛中三壯炷如小麥

大

小兒驚癇先驚怖啼叫後乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後青絲脈炷如小麥大旋毛中即百會穴也青絲脈手足少陽瘰脈穴也

明驚癇灸巨闕三壯

小兒驚癇本神及前頂顛會天柱主之 小兒驚癇反

視臨泣主之 小兒癇瘕嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明

眇聵瘰脈主之 羊癇會宗下空主之錢氏云羊癇目

瘰發目上插攢竹主之 馬癇金門及僕參主之 風從

頭至足癰瘕口閉不能開每大便腹暴滿按之不下噎悲

喘崑崙主之 小兒癇瘕遺精溺虛則病癰頰實則閉瘕

小腹中熱善寐大敦穴主之 癇驚如有見者列缺穴主

之并取陽明絡

錢五癇重者死病後甚者亦死

診

天弔

風熱

天弔亦驚風之證但天弔發時頭目仰視驚風則無也

湯小兒瘕瘕不定翻眼擡睛狀若神祟頭目仰視名為天

弔凡有此疾宜服蘇合香丸灸兩手大拇指兩甲肉相半

男先灸左女先灸右及兩足大拇指中間各三五壯又灸

前後手心各五壯此皆得效之法

九龍控涎散治天弔

赤脚蜈蚣酒塗灸一條

滴乳

天竺黃二味另研

各一錢

臈茶

雄黃另研

甘草灸各二錢

荊芥穗炒

白礬枯各一錢

菘豆半生半炒一百粒

右為末每服半錢人參薄苜湯調下

釣藤飲治天弔潮熱

釣藤

人參

犀角屑各半兩

全蝎

天麻各一分 甘草半

右為末每服一錢水煎服

丹癩迷嚼舌仰視牛黃大豆許和蜜水調廣利

眼目

針灸

明目澁羞明狀如青盲 中渚一壯凡小兒艾 兒三五

歲忽生白翳遮睛掩瞳人疼痛不可忍 九椎上灸一壯

妳癰目不明者 肩中膺灸一壯

錢目赤兼青者發搐 目直而射身反折強直者生驚

眼白多

虛

世治眼白多多屬虛

鹿茸兩半

澤瀉

茯苓各一兩

山茱萸兩二

地黃

牡丹皮

牛膝各一兩

右為末蜜丸如桐子大鹽湯食後下二十九

雀目疳眼

痰

羅煮肝丸治小兒疳眼翳膜羞明不見物服十日必退如

大人雀目者一服效

夜明沙

青蛤粉

穀精草各一兩

右件為細末每服一錢五七歲已上二錢純猪肝一大

片批開糝藥在內攤勻麻線纏定以米泔半碗煮肝熟

取出肝湯傾碗內熏眼分肝作三服嚼訖却用肝湯下

一日三服不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如

患多時日二服

熱

龍膽飲子治疳眼流膿生疳翳濕熱為病神效不治寒濕

青蛤粉兩半

羌活

草龍膽各三錢

黃芩炒二錢

蛇蛻皮兩半

麻黃二錢半

穀精草兩半

升麻二錢

鬱金

甘草灸各半錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

針灸

灸雀目疳眼法○小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一

寸內廉橫紋頭白肉際各一壯炷如小麥大 小兒疳眼

灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間

陷中

赤眼

熱

湯導赤散治心熱小便赤眼目赤腫

赤芍藥

羌活

防風各半兩

大黃

甘草各一錢

右為末燈心黑豈煎食後服

余平生無赤眼之患用之如神小人小兒可通用凡眼赤澁之初只用自已小便張目溺出一指接抹眼中便畢

閉目少頃即效此以真氣逼去邪熱也

本治小兒赤熱腫眼

大黃

白礬

右二味等分為末同冷水調作卷子貼眼立效

明眼忽大小皆赤合谷灸三壯 熱毒風盛眼疼灸中指

本節頭三壯

通睛

肝病

湯牛黃丸小兒通睛皆因失慎築打觸着頭面額角兼倒撲令兒肝受驚風遂使兩目閉睛名曰通睛宜服此

牛黃

白附子炮

肉桂

全蝎

芫蕈

石膏煨各一錢

白芷二錢

藿香兩半

硃砂二錢

麝香一分

右為末煉蜜為丸如芡實大三歲已下每服一九薄苛

湯下乳食後忌油麪猪肉

偏墜

雜方

田小兒狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛十四枚熬焦

桂枝半兩二物為散每服八分日再酒調下蜜丸亦通

針灸

偏墜亦宜防葵丸令兒坐於土中午時灸印下偏墜之處

七壯防葵丸未詳

小兒偏墜若非胎中所有在後生者於莖下腎囊前中間弦子上灸七壯立愈

明胎產疝卵偏墜 囊縫後十字紋上灸三壯春灸夏

陰腫囊腫脫囊

滯氣

湯小兒陰腫由啼叫怒氣閉縱於下成此疾宜海蛤散

海蛤三錢

茴香炒三分

薏苡仁

白朮

檳榔各半兩

右末食前溫酒調下大小加減

汚血

陰腫又方

桃仁去皮尖及雙仁者炒三分

牡丹皮

桂枝

白蒺藜炒去刺各半兩

郁李仁湯浸去皮一分

右水煎服

熱

丹脫囊即外腎腫大

木通

甘草

當歸

黃連

黃芩

右水煎服

雜方

錢蚯蚓散治腎子腫硬成疝用乾蚯蚓為末唾調傳常避

風冷濕地先用花椒蔥湯避風處洗却用此傳之累驗

世治小兒囊腫如升用甘草煎汁調地龍末塗之立退累

效

針灸

丹用紫蘇葉為末水調傳上又用青荷葉包之治脫囊效

疝痛

滯氣

湯治小腸疝氣家傳妙方

芫花醋浸炒

木香

檳榔

三稜各半兩

茯苓

青皮

全蝎

桂枝

附子

礪砂各一分

右為末將礪砂浸澄去土頓在湯瓶上候成膏子和糖醋打麪糊為丸如荳大每三十九空心温酒下未效再服

小便不通

汚血

錢捻頭散治小便不通

玄胡

川苦練各等分

熱

湯木通散治心經伏熱小便不通啼叫

木通一兩

牽牛子炒半兩

滑石一兩

右為末燈心葱白煎服

冬葵子散治小兒腹急悶

冬葵子一兩

木通半兩

右為末每服一錢煎服

錢尿深黃色久則尿血 小便不通久脹滿當利小便

淋病

血

湯治血淋神效方

紫草

連翹

車前子各等分

水煎服

又方

海螵蛸

生地

白茯苓

右等分為末栢葉車前草煎湯調下

氣

治氣淋

赤芍藥一兩

檳榔

麩裹煨

右為末燈心同棗子煎湯調下

遺尿

虛

湯治小便不禁或睡中遺出不覺

雞腸草一兩

牡礪粉三錢

龍骨

麥門冬去心

白茯苓

桑螵蛸各半

右件咬咀每服一錢棗子一枚擘破煎食前服

又方破故帛一味炒為末黃柏煎湯調下

外療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄鷄肝等分搗丸如小

荳大溫水下日三服

雜

世小兒夢中遺尿薏苡仁一合許去心不去殼敲碎入鹽

一小撮同炒黃色用水二鍾煎至半鍾空心服之累效

喉痺

凡治小兒喉痺宜於大人喉痺法參用之

上實

湯喉痺別無治法非吐不可生此證萬一危極前法無效

急用官局碧霞丹研細用薄荷自然汁入醋調以鷄翎蘸

藥送入喉內徐徐導引得吐出痰涎為佳本事方論碧霞

丹能害人此不然蓋當時遇有合死之人耳

碧霞丹

石綠

附子尖

烏頭尖

蝎稍

右為末為丸薄荷汁化取涎出

針灸

明喉中鳴咽乳不利

璇璣

急喉痺

天突

一壯不宜灸

醫學綱目卷之三十七

小兒部

心主熱

潮熱

積熱

溫病

變蒸

熱

心痛

弄舌

重舌

木舌

舌白胎

鼻衄

遲言

盜汗

自汗

癰癤

腮腫

惡核瘰癧

赤丹

疥癬

眉煉

耳瘡

附凍耳

面瘡

口

瘡

癩頭瘡

脚凍瘡

痘疹治法通論

痘出太密

痘出不快

痘痒塌

痘灰白色

痘黑陷倒靨

痘寒戰

痘

發熱

痘寒熱

痘渴

痘渴瀉

痘

瀉不渴

痘吐逆

痘腹脹

痘腹痛

痘喘

痘大便秘

痘餘毒

痘入目

痘咽痛

痘風

痘癩搐

痘瘡痛

痘膿而不痂 痘後瘡癤 痘癰 中惡

客忤

五臟熱

肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之 壯熱飲水喘

悶瀉白散主之 壯熱者一向熱而不已也

肺熱手插眉目日西熱甚咳嗽寒熱壯熱飲水甘桔湯主

之若肺虛熱唇深紅色輕者瀉白散重者涼膈散主之

心熱視其睡口中氣溫或合面臥及上竅搖頭咬牙皆心

熱也導赤散主之 心氣熱則心胸亦然欲言不能而有就冷之意故合面睡

脾熱則目黃肚大怠惰嗜臥身熱飲水四肢不收瀉黃散

主之

腎虛則下竅畏明地黃丸主之 頰赤由心臟邪熱上攻

也宜服導赤散

面上證左腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾頰為腎

五臟回

赤者熱也隨證治之 目內皆赤者心熱導赤散主之淡

紅者心虛熱生犀散主之青者肝熱瀉青丸主之淺淡者

補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光者腎虛地黃丸主之

潔古云目中五色甚者瀉本臟色淺者宜補之又云白是寒小便青四逆湯黃赤是熱承氣湯瀉本藏青是腹痛捻

頭散主之桂枝芍藥湯亦主之

表裏 脈 小兒脈沉而數者骨間有熱欲以腹按冷清也

身熱不飲水者熱在外身熱飲水者熱在內

四順飲子治熱在內而不厥 連翹散治熱在外而不

厥

小兒發熱手足伏熱痰熱必用吐法輕劑苦參赤小豈

末重劑瓜蒂散淡蘗汁調服之如不吐用鵝翎探之

虛熱 朱監簿子五歲忽發熱醫曰此心熱也頰赤而唇紅煩

燥引飲遂用牛黃丸三服以一物瀉心湯下之來日不愈

反加無力而不能食又下之便利黃沫錢曰心經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病也錢先用白朮散生胃中津液次以生犀散治之朱曰大便黃沫如何曰胃氣正即瀉自止虛熱也朱曰醫用瀉心湯如何錢曰瀉心湯者黃連一物耳黃連性寒多服則利能寒脾胃也坐久衆醫至皆曰實熱錢曰虛熱若實熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五心煩躁不食而引飲醫曰既虛熱何大便黃沫錢笑曰便黃沫者服瀉心湯多故也錢與胡黃連丸治愈 鄭人齊郎中者家好收藥散施其子忽臟熱齊自取青金膏三服并一服餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言子睡多驚又與青金膏一服又瀉三行加口乾身熱齊言尚有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生他病否召錢氏至曰已成虛羸先用前

白朮散時時服之後服香苳丸十三日愈

香瓜丸即香瓜散方見自汗條

海風熱邪熱四君子湯加生薑荆芥煎

雲小兒客熱在內不思乳食先用導赤散次用益黃散

實熱在內者四順飲之類在上者吐之

方見表裏條

丹小兒熱病六乙散妙藥也

食傷胃熱薰蒸

白朮

兩一

半夏

黃連

各半兩

加平胃散粥食後白湯下

本治小兒驚熱

全蝎

天南星

取心爲末一錢

人參

三錢

蛇蛻

三錢

右爲末薄苛蜜湯調下

錢風溫熱壯熱相似 潮熱時間發熱過時即止來日依

潮熱

驚熱

時又熱此欲發驚候也

壯熱 壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也

風濕熱 風濕者身不熱而口中氣熱又有風濕症者但溫而不熱

傷寒熱 傷寒熱口熱呵欠頓悶項急治見傷寒部

痘疹熱 痘疹熱噴嚏悸動耳尖冷治見痘疹部

變蒸熱 變蒸熱唇上白泡珠起耳冷治不必

疳熱 疳熱面黃喫炭土羸瘦鼻下赤爛治見疳部

驚風熱 驚風熱發搐悸癇脈數煩躁顛叫恍惚治見驚部

診

帝曰乳子而病熱脈懸小者何如岐伯曰手足溫則生

寒則死通評虛實論甲乙經謂婦人乳子者

忌

熱證疎利或解化後無虛證勿溫補熱必隨生

潮熱

熱有作止每日應時而發也

加熱

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

知母

甘草炙

半夏洗七

銀柴胡去

人參

地骨皮

赤茯苓已上各

如有驚熱

加蟬蛻天麻黃芩若加藜蘆名藜蘆飲子

右為細末每服二錢生薑三片水煎食後溫服量大小

加減海藏云地骨皮散即小柴胡湯加減法自汗者地骨皮散無汗者柴胡湯三黃湯仲景所用錢氏改

諸丸散加減並出古法

生犀散治症同前

生犀角控末二錢

地骨皮

赤芍藥

葛根各一兩

甘草炙半兩

右為麤末每服一二錢水煎食後溫服海藏云生犀湯即犀角地黃湯

加減法此少陽陽明相合也

犀角散治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾晚潮熱夜有盜汗

五心煩躁四肢困倦飲食雖多不生肌肉

犀角末 地骨皮 麥門冬 枳殼炒

大黃蒸 柴胡 茯苓 赤芍藥

黃芪 桑白皮 人參 鱉甲醋塗炙 各等分

右為麤末每二錢入青蒿少許水煎量兒大小加減一鍾煎八分食後溫服

丹小兒潮熱盜汗胡黃連柴胡等為細末煉蜜丸芡實大每二丸酒化開入少水煎小沸服

錢朱監簿子五歲夜發熱曉即如故眾醫有作傷寒治者有作熱治者以涼藥解之不愈其候多涎而喜睡他醫以鐵粉丸下涎其病益甚至五日大引飲錢曰不可下之乃取白朮散一兩煎藥汁三升使任意取足服朱生曰飲多不作瀉否錢曰無生水不作瀉縱多不足怪也但不可下

耳朱生曰先治何病錢曰止瀉治痰退熱清神皆此藥也至晚服盡錢視曰更可服三升又煎白朮散三升服盡得稍愈第三日又服白朮散三升其子不渴無涎又投阿膠散二服而安

錢秦芫散治潮熱減食蒸瘦

秦芫去頭切焙 甘草炙各一兩 薄荷葉切焙半兩

右為麤末每服二錢水一鍾煎八分食後溫服

湯潮熱有時胸滿短氣者桃枝丸方見小兒積熱

湯風痰熱晚熱早涼喫水無時此候乃痰作潮而生風熱

即宜金星丸下之或氣弱者不可下宜奪命散以控下涎

次服惺惺散加南星白附子奪命散方見驚風門惺惺散方見痘疹門

金星丸治風熱結聚喉內痰鳴喘麤咳嗽面紅顛腫咽膈

壅塞發熱狂躁多渴

實熱 風痰熱

鬱金末

雄黃另研各一分

臙粉分

巴荳七枚去油

右為末米醋糊丸麻子大薄苛臈茶下

宿食熱脈經云小腸有宿食常暮發熱明日復止此宿食夜熱也
海藏云夜熱屬陰四順飲之類此血熱在夜也

積熱

久熱也疢熱亦久但兼面黃喫炭土鼻下爛也

表裡虛實

無小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便焦黃先以四順清涼飲子利動臟腑則熱去既去復熱者內熱已解而表熱未解也當用惺惺散紅綿散加麻黃微發汗表熱乃去表熱去後又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或以謂不可醫誤致天傷者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽歸內

身體便涼熱重者用銀白散

清涼飲子每服二錢薄荷三錢同煎方見治寒熱法惺惺散方見

痘疹門

紅綿散

下後表熱未解者汗之

白僵蚕炒二兩

天麻生用二兩

天南星切薄片油浸黃二兩

蘇木節另研二兩半

右為末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至六分

溫服凡小兒風熱頭目不清並宜服之若傷寒有表證發熱者每服入去節麻黃末五分有裏熱心燥渴者入滑石末半錢同煎服之

六神散

汗後氣不歸元者和之

人參

白茯苓

乾山藥

白朮

白扁豆

甘草炙各等分

右為末每服一大錢水一小盞薑一枚薑二片同煎至五分服此藥用處甚多治胃冷加附子治風症加天麻治痢加鶯粟殼

銀白散

乾山藥

白朮

白茯苓各半兩

人參

白匾豆

知母

甘草炙

升麻各等分

右為末每服一大錢水一小盞薑一枚生薑二片同煎溫服不拘時候

胸滿短氣者下之

桃枝丸取積熱及結胸又名桃符丸

巴豆霜

大黃

黃栢各一錢

輕粉

礪砂各半錢

右細末麪糊丸粟米大煎桃枝湯下一晬兒五七九五七歲二三十九未晬兒二三九臨臥服

吐者

梔豉飲子治小兒畜熱在中身熱狂躁昏迷不食

梔子仁七枚

豆豉兩

右用水三盞煎至一盞着多少服之無時或吐不吐立效

變蒸熱

診活

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就是五臟之變氣而七情之所由生也蓋見生之日至三十二日一變每變蒸畢即覺性情有異於前何者長生臟腑意智故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至三十二日一變生癸屬足少陰腎藏精與志六十四日二變一蒸生壬屬足太陽膀胱其發耳與眦冷至九十六日三變生丁屬手少陰心經心藏神其性為喜一百二十八日四變二蒸生丙屬

手太陽少腸其發汗出而微驚一百六十日五變生乙屬
足厥陰肝肝藏魂喜哭一百九十二日六變三蒸生甲屬
足少陽膽其發目不閉而赤二百二十四日七變生辛屬
手太陽肺肺藏魄生聲二百五十六日八變四蒸生庚屬
手陽明大腸其發膚熱而汗或不汗二百八十八日九變
生巳屬足太陰脾脾藏意智至三百二十日十變五蒸生
戊屬足陽明胃其發不食腸痛而吐乳又手厥陰心包經
手少陽三焦此二經俱無形狀故不變而不蒸也前十變
五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故
云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日
爲一大蒸計三百八十四日長其經脈手足手受血故能
持握足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之
日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可別

治又六十四日爲二大蒸計四百四十八日又六十四日
三大蒸計五百一十二日共五百七十六日變蒸既畢兒
乃成人也變者變生五臟也蒸者蒸養六腑也所以成人
變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸情能既異輕則發熱
微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼躁
渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變
蒸之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷骭冷上唇發泡狀如
泡珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日
夜不絕變者易也蒸於肝則目眩微赤蒸於肺則嚏嗽毛
聳凡五臟六腑筋脈骨節循環各有證應其治法和平之
劑微表之熱實者微利之或不治亦自愈

湯千金變蒸論云凡兒生三十二日一變六十四日再變
變且蒸九十六日三變一百二十八日四變變且蒸一百

六十日五變一百九十二日六變變且蒸二百二十四日
 十變二百五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三
 百二十日十變變且蒸積三百二十日小蒸畢後六十四
 日大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復大
 蒸凡小兒自生三十二日一變再變為一蒸凡十變而五
 小蒸又三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小
 兒所以變蒸者是榮其血脈改其五臟故一變竟轍覺情
 態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其
 輕者體熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目珠子
 微汗出重者體壯熱而脈亂或汗或不汗不欲食食輒吐
 現目白睛微赤黑精微白又云目白者重赤黑者微變蒸
 畢自精明矣此其證也單變小微兼蒸小劇凡蒸平者五
 日而衰遠者十日而衰先期五日後期五日為十日之中

灸刺

熱乃除耳或違日數不歇切不可妄治及灸刺海藏云言變蒸通一

十八次蓋前三百二十日為十小蒸後二百五十六日為十大蒸也現乎典切不嘔而吐也

無若身熱耳熱尻亦熱此乃他病可作別治

熱久不解者下之

紫霜丸治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯熱汗後熱
 不渴及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐現食癩先寒後熱
 者

代赭石醋碎赤石脂兩巴豆三十粒杏仁五十箇

右先將杏仁巴霜細研為膏却入二石相和更搗一二
 千杵當自相得若硬入少蜜同杵之密器中收三十日
 兒服如麻子大一粒與少乳汁令下食頃後與少乳勿
 令多至日中當小下除熱若未全除明日更與一粒百
 日兒服如小荳大一粒以此准定增減紫霜丸無所不
 治雖下亦不虛人

心痛

心痛當於大人心痛門參用之

診治 心痛吐水者虫痛 心痛不吐水者冷心痛

錢靈礬散治小兒虫咬心痛欲絕

五靈脂二錢 白礬火飛半錢

右同研每服一二錢水一鍾煎至五分溫服無時當吐
出虫

弄舌

脾熱

錢弄舌脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌治勿用冷藥及

下之當少與瀉黃散漸服之田氏云若肥實者用牛黃散治之 或欲飲

水醫疑為熱用冷藥下之者非也飲水者脾胃津液少故也又加面黃肌瘦五心煩熱即為疳宜加胡黃連輩 若大病未已用藥弄舌者凶

重舌

診治

湯重舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重舌其着舌

下如此者名重舌其着頰裏及上腭如此者名重腭其着

齒斷上如此者名重斷皆刺之去血可也

熱痰

田重舌治法用苦竹瀝漬黃栢末點舌上不愈後用真

蒲黃傅之不過三次愈用真蒲黃微炒帑鋪地上出火氣研細每挑此三卷舌下更以溫水蘸

熟帑果括輕輕按之按罷添藥

姚治小兒重舌馬牙硝塗舌下日三度

世治小兒重舌木舌先用新水揉口并舌上下後用皂角

針燒灰入腦子少許每用半字糝舌上下出涎立效

雜方

上

錢治小兒重舌欲死亂髮灰細研以半錢傅舌下日不佳

用之

丹重舌素白皮煮汁塗乳飲之 祕錄又以蜣螂燒末唾傳之

木舌

湯木舌者舌腫漸漸大滿口不急治卽塞殺人也

熱

田木舌治法用局方中紫雪一分竹瀝半合和之時時抹入口中自消

丹小兒木舌百草霜滑石芒硝爲末酒調傳

舌白胎

雜方

丹舌上生如粥粒桑白皮汁傳之三兩次妙

鼻衄

血熱

湯地黃湯治榮中熱及肺壅鼻血生瘡一切丹毒

生地

赤芍藥

當歸

川芎各等分

右咬咀水煎去查量大小加減服如鼻衄臨熟入生蒲

黃少許生瘡加黃芪等分丹毒加防風等分同煎累驗

春冬衄者用生地黃研取汁加生蒲黃少許砂糖井花水

浸服之愈 秋夏衄者用車前草一握洗淨同生薑一處

研取汁入生蜜一匙先拌查塞鼻次用新汲水和蜜并車

雜方 前草生薑汁飲之卽愈 又方生蘿蔔取根搗自然汁仰

頭滴入鼻管中卽止次以新汲水和蜜蘿蔔汁飲之良

遲言

虛

丹菖蒲丸治小兒心氣不足五六歲不能言

石菖蒲三錢

人參五錢

丹參三錢

天麥門冬去心

各一兩

赤石脂二錢

直指有當歸川芎硃砂

右爲細末煉蜜丸如菉豆大溫水下十九丸至二十九日

二三服久服效又有病後腎虛不語宜兼服六味地黃

丸海藏云地黃丸足少陰也與菖蒲丸上下通經

雞頭丸治小兒諸病後不能語

雄雞頭炙一箇 鳴蟬炙焦三箇 大黃煨一兩 甘草一兩

當歸三分 木通 黃芪各半兩 川芎

遠志去心三分 麥門冬去心各三分

右同為細末煉蜜丸如小菘豆大平日米飲下五九空

心日三四服兒大者加之久服取效雞蟬二物宜求死

者用之不可旋殺孫真人所謂殺生求生去生更遠矣

海百舌鳥今之鶯也名反舌主小兒不語炙食之又治虫

咬

腎怯失音相似病吐瀉及大病後雖有聲而不能語此

非失音為腎怯不能上接於陽故也當補腎地黃丸主之

失音乃猝病耳 口噤不止則失音聲遲亦同

灸

明五六歲不語者 心膈三壯

盜汗

錢黃芪散治虛熱盜汗

牡礪煨 黃芪 生地各等分

右為末煎服不拘時

盜汗睡而自汗出肌肉虛也止汗散主之遍身汗香瓜丸

主之

止汗散用故蒲扇灰研細每服三錢溫酒調下無時如無

以故蒲代之

實熱虎杖散治實熱盜汗虎杖水煎服量多少與之無時

海晉郎中子白嬰至童盜汗凡七年矣諸藥不效予與涼

膈散三黃花三日病已蓋腎為五液化為五濕相火逼腎

腎水上行乘心之虛而入手少陰心火炎上而入肺欺其

不勝已也皮毛以是而開腠理玄府不閉而為汗出也出於睡中者為盜汗以其覺則無之故經曰寢汗憎風是也先以涼膈散瀉胸中相火相火退次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本臟玄府閉而汗為之自巳

雜方

世治小兒盜汗用鬱金末塗兩乳下立效

自汗

上下

錢治病有等 張氏三子病大者汗遍身次者上至頂下

至胸小者但額有汗衆醫以麥煎散治之不效錢曰大者與香瓜丸次者與益脾散小者與石膏湯各五日而愈

汗身

香瓜丸

胡黃連

大黃瓜

黃色者一箇

大黃

濕帛裹煨

柴胡

鱉甲

醋炙黃

黃栢

黃連

蘆薈

青皮

各等分

右除黃瓜外同為細末將黃瓜割其頭填入諸藥至滿却蓋口用杖子插定火內煨熟將黃瓜及藥同用麩糊丸如菜豆大每服三三丸食後冷漿或新水下大者五七丸不過十丸

中部汗

胃怯汗上至頂下至臍此胃虛當補胃益黃散主之

頭汗

錢六陽虛汗上至頂不過胸也不須治之 喜汗厚衣臥

而額汗出也止汗散主之

癰癤

表散

湯凡癰癤未見之初微見有紅頭瘰子起隱疹者急用不語唾夜半頻頻塗之飲酒了不可用

治發背癰癤方

羌活

川山甲

炒焦半兩

生人骨

煨存性半兩

麝香

許少

右末煎麻黃薄苜酒調如陰瘡頭平向內者服之即突
出其功效不可盡述若小兒痘瘡黑陷者只一服而起
萬不失一

腮腫

表

本治小兒毒氣攻腮赤腫可畏者

皂角法核

天南星生用

糯米合

右為細末薑汁調塗立效

惡核瘰癧

湯小兒惡核生於項頸上遇風寒所折不消結成瘰癧久
而潰膿生瘡也宜服四味大黃飲即四順清涼
瘰癧又方

升麻

射干

連翹

犀角屑

大黃微

朴硝各半

治標於表

右咬咀水煎大小加減忌酒麪炙煨物

貼惡核方

赤小豆

猪牙皂角

硝石

黃藥

木鱉子各半

右末雞子清調塗患處

貼散瘰癧神效方

白膠香

降真香用心無土氣者

海螵蛸

右等分為末糝患處外以水昏掩之一夜而退

赤丹

田赤遊治法宜服犀角散一法先鑷去惡血服上藥犀角散方

見潮

風熱

湯小兒丹毒乃熱毒之氣極與血相搏而風乘之故赤腫
及游走遍身者又名赤遊風入腎入腹則殺入也大抵丹

毒雖有多種病源一也有赤丹毒遍身痒者或女子十五
六而脈未通者多發丹疹皆由血有風毒乘之宜服防已
散

漢防已

兩半

朴硝

犀角

黃芩

黃芪

升麻各乙

右咬咀竹葉煎大小加減

聖小兒黑斑紅斑瘡痒癩疹並用防風通聖散治之
荆芥散

防風

天花粉

羌活

生地黃

當歸

蟬脫各等分

水煎服

解毒散

寒水石

滑石

石膏

辰砂

右三石等分為末入辰砂少許量兒大小燈心湯下

又方

赤小豆

木鱉子

橡料子

南星

大黃

朴硝

右為末用慈姑薄荷龍青和蜜水調塗患處外用雄黃
圍之却服荆芥解毒二散

聖小兒發斑散毒氣用生葵菜葉絞取汁少少與服之

千治小兒丹發慎火草生一握搗取汁傳之效

秘錄治小兒赤遊丹行於上下至心即死搗芭蕉根汁煎

塗之

秘部治孩子赤丹不止以胡荽汁傳瘡

秘錄小兒赤遊行於體上下至心即死以芒硝納湯中取

濃汁以拭丹上

錢丹瘤熱毒氣客於腠理搏於血氣發於外皮上赤如丹

敷貼正
治法

當以白玉散塗之

白玉粉即滑石

寒水石兩

右末之用米醋或新水調塗

四火丹磨銅鐵水調廁上泥傳之 小兒赤遊風用朝南

燕巢泥雞子清調傳將腫處用針割破鮮魚血塗之尤妙

敷貼反治法

四小兒天火丹臍腰起者赤溜不妨用蚯蚓泥炒研細香油傳之

四又法用牛膝一兩去苗甘草半兩生剉碎水煎一大盞

去查調伏龍肝塗之

四小兒赤丹伏龍肝為末芭蕉油調傳 又方用雉雞毛

及鷺毛燒灰香油調傳

湯又傳丹毒方只一夜消盡用花蕊石生薑薄苛自然汁

調鷺毛刷上患處為妙

虛

張三太尉女十五歲病此諸醫百藥俱試而不能中召

視之以生料四物湯加防風黃芩一日而愈

生料四物湯治血熱生瘡遍身腫痒及脾胃常弱不禁大

黃等冷藥尤宜服之

生地 赤芍藥 川芎 當歸

防風各半 黃芩一錢

右咬咀水煎量大小加減忌酒麪猪羊肉豆腐

四小兒赤溜主傷血熱宜生地黃木通荆芥苦藥帶發表

之類外以芭蕉油塗患處

世丹痒者用韭菜揆些鹽與香油以手摩熱於丹上搯之

立愈

四小兒丹瘤車麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚

效

雜方

本 小兒十種丹癩腫毒所起形候并方治法

一 飛龍丹從頂頭起先腫用葱白研取自然汁塗

二 古竈丹從頭上紅腫痛用赤小荳末雞子清調塗譚氏方同

不拘何處皆治

三 鬼火丹從面赤赤腫用灶心土雞子清調塗按不拘何處皆治妙

四 天火丹從背起赤點用桑白皮末羊脂調塗

五 天灶丹從兩腎赤腫黃色用柳葉燒灰水調塗腎一作臂

六 水丹從兩脇虛腫用生鐵屑為末猪糞調塗

七 胡火丹從臍上起黃腫用檳榔為末米醋調塗

八 野火丹從兩脚赤腫用乳香末羊脂調塗

九 烟火丹從兩脚有赤白點用猪槽下土麻油調塗

十 胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗

右此十種丹毒變易非輕治之或緩則終不救故予不

惜是方能逐一仔細辨認依此方法治之萬不失一如經三日不治攻入臟腑則終不救不可緩也

洗法 **赤遊風**於身上下至心即死荊藿煎汁洗之子母秘錄荊藿即白

花藥也

診 **世** 百日内發必死不治

疥癬

虛熱 **海** 小兒經絡蘊熱頭面及身體生瘡四君子加瓜蒌根桔

梗各半錢煎服

洗法 **湯** 小兒惡瘡天氣溫和頻與澡洗更衣名曰外宣亦不宣

服藥小兒不得已而服藥此乃下法若將養合宜何疾可

侵更令乳哺有節勿令過飽其身乃如藥樹此養生之理

也

湯 惡瘡方頻浴身安外宣無病

春用柳條荆芥 夏用束葉槐枝 秋冬用苦參
煎湯洗

敷藥 傳瘡藥方 剪刀草 黃連 苦參

右等分爲末先洗淨次用麻油輕粉調傳

田瘡癬治法浸淫瘡宜用苦瓠散塗之乾癬宜用羊蹄根
絞自然汁調膩粉塗之濕癬宜用青金散貼之

苦瓠散治小兒浸淫瘡漸展不止

苦瓠二兩 蛇蛻皮燒灰半兩 蜂房微炒半兩 梁上塵一合

右爲細末生油調塗攤帛上貼

青金散治小兒濕癬浸淫瘡

白膠香兩 輕粉半兩 青黛二錢半

右研爲細末乾糝瘡上

錄治小兒風癩不止白礬十二分煖熱酒投化用馬尾

蘸酒塗之

山小兒頭面爛瘡木耳春細蜜調傳又冷水調平胃散傳
俱乾則易之

眉煉

田眉煉治法用青金散傳之如不愈燒小麥存性研細好
油調塗

耳瘡耳凍瘡

雜方 **丹**小兒耳後月蝕瘡蚯蚓糞燒以猪油和傳之 耳上生
瘡竹葉燒末猪脂傳之妙

楊氏以雞子白和傳立瘡 耳月蝕方胡粉和上傳之
耳後月蝕黃連末傳之安

湯白蘂散治小兒凍耳成瘡或痒或痛

黃栢 白蘂各半兩

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

面瘡

世治小兒面瘡通面爛無全膚膿水流滴百藥不效者陳年臙猪油不入塩者傳之神效

口瘡

簡如聖散治小兒口瘡不能喫乳者江子一粒或二粒研爛不去油入硃砂黃丹傳紙絹上少許剝開小兒顙門貼在顙上如四邊起粟米泡便用溫水洗去藥恐成瘡更用菖蒲水洗便安其效如神

塗脚心法

世南星膏治口瘡小兒難用藥以大天南星去皮取中心龍眼大為末却用酸醋調塗脚心甚妙
千治小兒口瘡飲乳不得以白礬如鷄子大置醋中塗兒足底二七次即愈

治法

無牡礪散治小兒口瘡

牡礪煨通紅取出候冷研細以昏異入土中七日出火氣三錢

甘草炙為末一錢

右和勻時時挑少許糝口中或吐皆無害

田口瘡治法乳母同兒宜服洗心散瀉心湯然後用黃栢末研細糝之瀉心湯方黃連一味為末蜜水調不可煎

湯治口瘡驗方

黃栢蜜炙赤 **青黛**一分

右二件為末頻糝口內愈

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上宜附子理中湯

癩頭瘡

上熱正治

世治久癩頭用黃連細末傳之○治年久癩頭內用苦參丸食後服之外用苦參末油傳之二月愈

丹又方用防風通聖散酒製除大黃另研為末再用酒拌

從治法

晒乾為末每一錢水煎服日四五服至三十貼見效
又方

川芎

片苓

芍藥

陳皮

白朮

當歸

天麻

蒼耳

黃栢

粉草

防風

右咬咀煎服四五次服之服過睡片時

反治

小兒癩頭用燒紅炭焯長流水令熱洗之仍用芫荽子煎
猪脂去子用脂傳患處 又法用胡荽子伏龍肝懸龍尾
黃連白礬為末油調傳

雜方

頭瘡方

猪油

雄黃

水銀

右研和勻傳瘡上

又方治小兒癩頭并身癩等證用松皮燒灰白膠香枯礬

大黃黃栢油調傳患處 又方用臘月馬脂油搽患處極

妙

簡頭瘡大筭殼燒為灰量瘡大小用灰調生油傳又加膩

粉佳

秘錄小兒頭身諸瘡燒雞卵殼和猪脂傳之

世治癩頭

松香

白芷

松樹皮

黑龍尾

塵垂

雄黃

白礬

黃丹

雄黃

白礬

右為末以血餘入香油煎爛調傳患處

脚凍瘡

湯生附散治爛脚瘡用生附子為末麩水調傳之愈

痘瘡治法通論

瘡疹惟用溫平藥治之不可妄下及妄攻發受風冷

五溫平者非熱劑如荆芥薄荷防風牛蒡子甘草之類活
人鼠粘子湯與潔古解毒防風湯相兼選用是也丹溪云
鼠粘子連翹山查甘草此
四味痘瘡始終必用之藥

錢診睦親宮中十大王瘡疹云瘡疹始終出未有他證不

可下但當用平和藥類與乳食不受風冷可也如瘡疹三

日不出或出不快即微發之鼠粘子湯之類如瘡發後不多出即

加藥如一日一貼加藥不出即大發之升麻葛根防風羌
活獨活麻黃桂枝

類如發後不多及脈平無証即瘡本稀不可更發也有大

熱者當利小便小熱者當解毒利小便四
聖散之類若不快勿發勿

下攻止用抱龍丸治之瘡疹若起能食者大黃丸下一二

行即止有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾

陷者百祥丸下之不黑者慎勿下身熱煩躁腹滿而喘大

小便澀面赤悶亂大吐此當利小便不瘡者宣風散下之

痲矣

也若五七日痲不焦是內發熱氣蒸於皮中故瘡不得焦

痲也宜宣風散導之用生犀角磨汁解之使熱不生必着

痲矣

紫古海
藏宗錢
氏法

論曰癍疹之病其為證各異瘡發焮腫於外屬少陽三

焦相火也謂之癍小紅靨行皮膚中不出者屬少陽君火

也謂之疹凡顯癍疹若自吐瀉者不可妄治而多吉謂邪

氣上下皆出也大凡癍疹首尾皆不可下恐動則生變此

謂少陽通表宜和之也當先安裏解毒次微發之解毒須

安五臟防風湯是也如大便不秘者須微發之藥宜錢氏

方中選而用之如大便過秘宜微利之當歸丸承變百祥

丸是也初知癍疹若使之併出小兒難禁是以別生他症

也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若既吐利安可下

便宜安裏若不吐瀉者先與安裏藥三五服如能食而大

便秘結內實者宜疎利之若內虛而利者宜用安裏藥一
二服末後一服調以微發之藥要之安裏之藥多發表之
藥少秘則微踈之令邪氣勿壅併而能作番次出使兒易
禁也身溫者順身涼者逆二者宜多服防風湯和之
安裏解毒防風湯

防風

兩地骨皮

黃芪

芍藥

荆芥

枳殼

鼠粘子

各等分

右為末水煎四五錢服若能食而大便實宜當歸丸微
利之

當歸丸

惠變百祥丸

二方並見痘
瘡大便秘門

海夫癩之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而
成毒皆太陰濕土壅滯君相二火之所作也因小兒真氣
既盛正氣又旺邪無所容或遇天寒賊傷表或因傷裏癩

由是而出焉治當何如外者外治內者內治中外皆和其
癩自出至於惡寒者發之表大熱者奪之渴者清之大便
秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以
執一為哉大抵傷寒同治隨經用藥最為高論假令五日
已裏諸病與癩疹不能別辨者不可疑作癩疹必須發之
但各從其所傷應見治之皆不妨癩出若強發之其變不
可勝數矣前人言首尾俱不可下者為癩未顯于表下則
邪氣不得伸越此脈證有表而無裏故禁首不可下也尾
不可下者為癩毒已顯於外內無根蒂大便不實無一切
裏證下之則癩氣逆陷故禁尾不可下也又言溫煖蓋覆
不令通風以癩疥或身表涼而惡寒或天令寒而惡冷溫
煖蓋覆不令通風也癩若已出身熱天暄何必用蓋覆而
不使之通風乎後人執此二句首尾俱不敢下溫煖不令

通風不知天令之所加人身之所盛致使候人多矣大抵前人之言隨時應變後之人不知其變故常執而不移也噫首尾俱不可下者以其始終臟腑元無凝滯也若有一切裏證及大便結者安得不下溫暖不使之通風以其發在冬時故如此也若發在夏時癰雖未出亦不用此也癰之用藥大率以脈為主浮中沉之診平舉按之候察其虛實定其中外則可以萬全矣

如外傷升麻湯主之方見本門 內傷枳實丸主之 大便更

者枳朮丸主之 若傷冷者溫之神應丸三方俱見內傷飲食 惡

寒者發之宜防風蒼朮湯方見本門前條 表大熱者奪之此表

者通言三陽也夫陽盛者氣必上行言奪者治之不令上

行也是知無三陽表證有三陽裏證染於有形也此言表

總三陽之名也 渴者清之大渴者白虎湯暑月用之 小渴

者涼膈散涼膈散去硝黃加甘桔者穩 大便秘結者下之桃仁承氣

湯四順飲子柴胡飲子選用察其在氣在血必內實能食

而秘者可用但當微微潤之 小便不通者利之導赤散

八正散之類當求上下二焦何經而用之 驚者安之涼

驚丸重者瀉之瀉青丸 泄者分之寒則異功散四君子

湯熱則澤瀉茯苓湯

小兒癰疹初發未能辨認間但求所出之由因內因外及

不因外內隨其所傷如法服餌防其變故抑其盛氣比之

他證尤不可緩或發或瀉或解其肌或化其毒求其所起

之由涼血清肺調其臟腑平其飲食謹其禁忌嚴其養攝

適其寒溫將理有法俾盡其道使出無不快之經成無不

痂之潰既愈之後不致毒流汗虛腠目疾膜翳瘡癰癩

瘤喉閉隘腫潮熱汗泄此治癰之大畧也 凡未出而發

播者是外感風寒之邪內發心熱之所作也當用茶粉下
解毒丸犀角地黄湯主之 一發出便密如針頭形熱重
者合輕其表而涼其內連翹升麻湯 若痲已發密重微
喘飲水者有熱證用去風藥微下之 若出不快清便自
調知其表不在裏當微發升麻葛根湯 若青乾黑陷
身不大熱大小便澀則是熱在內煎大黃湯下宜風散
若身表大熱者表證未罷不可下 若痲已出見小熱小
便不利當以八正散利之 若已發後有餘毒未散復有
身熱瘡腫之類當茶粉下解毒丸 凡瘡疹已出後有聲
音者乃形病而氣不病也 瘡疹未出先聲音不出者乃
形不病而氣病也 若瘡疹出而聲音不出者是形氣俱
病也當清其肺氣宜用八風湯并涼膈散去硝黃亦可
丹小兒痘疹分氣血虛實以四君子四物酒炒芩連等服

丹溪分
氣虛虛

實

之

氣虛參朮加解毒藥 血虛四物加解毒藥

右加解毒者酒炒黃芩炒黃連是也海藏云解毒者三
黃湯金花丸之類

丹痘瘡分人之清濁就形氣上取勇怯 痘瘡黑屬血熱
涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷而外白色起遲者
則補氣中畧帶涼血藥

陳氏惟
主溫補

陳痘瘡未出已出之間或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛
速與十一味木香散治之 如已出之間其瘡不光澤不

起發根窠不紅謂之表虛速與十二味異功散治之 如

已出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或瀉渴或腹脹

或氣促是表裏俱虛也連與十二味異功散送下七味肉

荳蔻丸治之 丹溪云木香異功散二藥治寒
的當若虛而不寒者禍不旋踵 如瘡始出

一日至十日渾身壯熱大便黃是表裏俱實也其瘡必光澤必起發必飽滿必易腐而不致損傷若無他疾不宜服藥 表裏俱實者易出易腐表裏俱虛者易出難腐表虛難出裏虛難腐隨症治之

張巽之治痘要法吐瀉少食為裏虛陷伏倒靨灰白為表虛二者俱見為表裏俱虛全用異功散救之甚至薑附靈砂亦可用若止裏虛減官桂若止表虛減肉荳蔻不減官桂丁香若能食便秘而陷伏倒靨者為裏實當用錢氏及丹溪下法若不吐瀉能食為裏實裏實而補則結痘毒紅活綻凸為表實表實而用表藥則潰爛不結痂凡痘但見癍點便忌葛根湯恐發得表裏俱虛也

辨陳氏之偏

丹讀前人之書當知其立言之意苟讀其書而不知其意求適於用不可得也痘瘡之論錢氏為詳歷舉源流經絡

分明表裏虛實開陳施治之法而又證以論辨之言深得著書垂教之體學者讀而用之如求方員於規矩較平直於準繩引而伸之觸類而長之可為無窮之應用也今人不知致病之因不求立方之意倉卒之際據證驗方謾爾一試設有不應并其書而廢之不思之甚也近因局方之教久行素問之學不講抱疾談醫者類皆喜溫而惡寒喜補而惡解利忽得陳氏方論皆用燥熱補劑其辭確其文簡歡然用之翕然信之遂以為錢氏不及陳氏遠矣或曰子以陳氏方為不足歟曰陳氏方誠一偏之論雖然亦可謂善求病情者其意大率歸重於太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易於感脾土惡濕而無物不受觀其用丁香官桂所以治肺之寒也用附朮半夏所以治脾之濕也使脾與肺果有寒與濕而

兼有虛也量而與之中病則已何傷之有今也不然但見
出遲者身熱者泄瀉者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒
熱虛實率投木香散異功散問有偶中隨手獲效設或誤
投禍不旋踵何者古人用藥製方有向導有監制有反佐
有因用若錢氏方固未嘗廢細辛丁香白朮參芪率有監
制輔佐之藥不專務於溫補耳然其用寒涼者多而於補
助一法畧示端緒未曾深及癡人之前不可說夢錢氏之
慮至矣亦將以候達者擴充推廣用之耳雖然渴者用溫
藥痒塌者用補藥自陳氏發之迥出前輩然其多用桂附
丁香辛芳燥熱恐未為適中也何者桂附丁香輩富有寒
而虛者固是的當虛而未必寒者其為患當何如耶陳氏
立方之時必有挾寒而用一偏之方寧不過於熱乎予嘗
會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方至正甲申

陽氣早動正月間邑間痘瘡不越一家率投陳氏方童幼
死者百餘人雖由天數吾恐人事亦或未之盡也

辨瘡疹候

錢傷寒男體重面黃女面赤喘息急各憎寒口中氣熱呵
欠頓悶項急瘡疹則顯赤躁多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷
寒當發散之瘡疹當溫平之有大熱者宜解毒 昏睡喜
嚏悸者將發瘡疹

辨癩證 呵欠 噴嚏 睡中急驚 耳尖冷 眼澀
辨傷寒 口熱 口中醋氣 妳辦不消

錢瘡疹候面燥顯赤目胞赤赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽
嚏噴足稍冷夜臥驚悸多睡此瘡疹症天行之病也

錢氏論
屬五臟

睦親宮十大尉瘡疹衆醫治之王曰疹未出屬何臟腑一
醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢
氏曰若言胃氣熱何以乍涼乍熱若言母腹中有毒屬何

臟也醫曰在脾胃錢氏曰在脾胃何以驚悸皆無以對錢氏曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母腹中穢液入兒五臟食至十月即穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連末粉下其臍糞之穢此亦母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒又遇風寒邪氣相搏而成痘疹也未出欲作之時熱動五臟則五臟之症先見初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷面頤頰赤燥咳嗽噴嚏此五臟症俱見也呵欠頓悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面赤頤頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一症肝水疱肺膿疔心為癩脾為疹腎雖無症其候惡者瘡變倒靨而黑陷則歸腎也此由不慎風冷而不能食內虛所致也今太尉疹子無他證當

用平和藥為治因用抱龍丸數服愈

海藏云本先因微寒入一句并由不慎風

冷而不能食內虛一句勿認作寒証用抱龍丸即知癩疹多熱也

瘡疹始出之時五臟症見惟腎無候但見平症耳尻涼耳涼是也尻耳俱屬於腎其居北方主冷也

痘癩疹始出之症必先見面燥腮赤目胞亦赤呵欠頓悶乍熱乍涼咳嗽噴嚏足稍冷多睡睡驚並瘡疹之症或生膿泡大癩或生小紅癩或生癩疹此三等不同何故俱顯上症而後乃出蓋已上諸症太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面上故顯是症蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸癩症皆從寒水逆流而出也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也非水亦

非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則為男子三日四日五日血脈已旺精不勝血則為女子乃二物相搏長先身生謂之神又謂之精道與釋二門謂之本來面目是也其子在腹中十月之間隨母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神飢渴皆隨母血兒隨日長筋骨皮肉血脈形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻于一隅隱伏而不發直至兒因內傷乳食濕熱之氣下陷合于腎中二火交攻榮氣不從逆於肉理惡血乃發諸癩疹皆出於腎水其湯後聚肉理歸於陽明故三番癩始顯之症皆足太陽壬膀胱尅丙小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆從足太陽傳變中來也

飲熱時

發始發潮熱三日已上熱暈入皮膚即發瘡疹而不甚多者熱留皮膚之間潮熱隨臟出如早食潮熱不已為水泡之類也巳午潮熱為癩疽酉潮熱為膿疱辰戌丑未潮熱為疹也

用藥驗癩是否

驗癩法若三日未覺形迹當以生酒塗身上時時看之狀如蚤痕者是也或曰傷寒傷食潮熱與癩疹不能辨者宜以辛涼之劑調之五日已裏發出即汗五日已外無者非癩也各隨應見而治之

治驗證施

治小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似未能辨認間服升麻葛根湯惺散小柴胡湯甚驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐宜以藥下之海藏云宜以藥下之者當察其所傷何物生硬寒熱不等不可遽以巴豆之類大毒之藥下之升麻葛根湯太陰陽明也惺惺散治風熱咽不利脾不和少陽湯小便利也小柴胡湯治往來寒熱胸膈腹痛少陽也然欲知其經當以脈別之

癰症未
顯服藥

小兒耳冷尻冷手足乍煖乍涼面赤時嗽時噎驚悸此瘡
疹欲發候也未能辨認間服升麻湯消毒散已發未發皆
宜服仍用胡荽酒黃柏膏暑月煩燥食後與白虎湯玉露
散熱盛與紫雪咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散餘依前說
大人小兒同治法惟大小不同耳海藏云消毒散太陽陽藥
也白虎湯治身熱目疼
鼻乾不得臥陽明藥也甘露散肺腎藥也甘桔湯少陽藥
也紫雪雪天冬麥冬黃芩生地為血劑玉露散肺腎藥也石
膏寒水石為氣劑已上
五方皆瀉時暑之藥

升麻

葛根

芍藥

甘草

灸各
等分

右同為細末每服四錢水一盞半煎至一盞無時溫服

海藏云升麻葛根湯太陽陽明之藥陳文中云身熱腹痛者身熱泄瀉者身熱驚悸者身熱汗出者身熱足冷者俱不宜服升麻葛根湯恐發得表虛也
痘見癰點忌葛根湯恐發得表虛也

惺惺散治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澁多睡
咳唾氣壅鼻塞清涕

白朮

桔梗

細辛

瓜蒌根

人參

茯苓

甘草

各等
分

右咬咀每服二錢水一盞生薑三片入薄荷三葉煎至

半盞時時與服活人云加防風川芎亦各隨經也海藏
云惺

惺散治風熱咽不利脾不
和少陽渴小便不利也

右二方發表平劑

王朝奉四物解肌湯

芍藥

黃芩

升麻

葛根

每服四錢水一盞煎至七分去渣服或云小兒傷寒疫

癘潮熱瘡疹五日已衰疑似不能辨別者並皆辛涼之

劑調之即以四物湯解肌之類海藏云此論即有表也
若內傷腹中有物未得

大便而發熱者當以食藥去其物則可若得便後仍發熱在表者亦宜此解肌湯比錢氏升麻葛根湯減甘草加黃芩以有表熱之意也

因防風蒼朮湯治小兒邪熱在表惡風惡寒瘡疹未出可解表發癩疹

防風兩

蒼朮

石膏各一兩

甘草炙半兩

川芎

黃芩各二兩

右為籠末每服二錢生薑三片薄荷七葉水煎日二服

此方惡寒者宜用之

右二方辛涼之劑表有熱者宜之

傷食宜消導之

大便酸臭不消化畏食或吐乃內傷飲食宜枳朮丸傷冷食飲神應丸

脈虛大宜補之

丹一男子年十六歲發熱而昏目無視耳無聞兩手脈皆豁大而畧數知其為勞傷矣時里中多發瘧者雖不知人

與藥則飲與粥則食遂教以參芪當歸蒼朮陳皮大料濃與之飲至二十餘貼痘始出又二十貼則成膿疱身無全膚或曰病勞可畏何不用陳氏全方治之予曰此但虛耳無寒也只前方守之又數十貼而安後詢其病因為先四五日恐有出痘之患遂極力採樵連日出汗甚多

五藏見症

錢五臟各有一證

肝臟水疱

肺臟膿疱

心臟癩

脾臟疹

婦腎變黑

海肝臟水疱色或青肺臟膿疱色或白脾臟疹或如麩糖色心臟癩其色赤變婦腎則色黑矣此五色凡痘疹一色者善或二色三色相合而作者凶 第一大小不等

小兒在胎十月食五臟穢血生下則其毒當出故瘡疹之狀皆五臟之液肝主淚肺主涕心主血脾為裹血其瘡出有五名肝為水疱以淚出如水其色青而小肺為膿疱以

涕稠濁如膿其色白而大心為癩主血其色赤而小次於水疱脾為疹其色赤黃而小涕淚出多故膿疱水疱皆大血榮於內所出不多故癩疹皆小又病水疱膿疱者涕淚俱少以液從瘡出故也譬如泡中容水水去則泡瘦矣

右水疱者俗謂之水痘也膿疱者俗謂之痘子也癩者俗謂之瘡子也疹者俗謂之麻子也痘之形狀最大水痘次之癩瘡又次之麻子最小隱隱如麻子也

更看時月重輕大抵瘡疹屬陽出則為順故春夏病為順秋冬病為逆冬月腎旺又盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿疱夏黑陷秋癩子冬疹子亦不順也

凡瘡疹只出一般者善 先發膿胞後發疹子者順 先發水疱後發疹子者逆 先發膿胞後水疱多者順少者逆 先發水疱後發癩子多者逆少者順 先發疹子後

辨逆順
輕重

發癩子者順

先發膿胞後發癩子者逆

海藏云此一句是以前所云五色各隨五臟

諸臟相合而不齊也用藥亦難矣前所云五色各隨五臟亦有二色相合或有三色即無定也此與前後膿水瘡疹大小不同先後逆順大意相若

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出盡者必重也痘夾疹

者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏白者微

重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑如針孔者熱劇也青

乾黑陷昏睡汗出不止煩燥熱渴腹脹喘喘大小便不通

者困也凡瘡疹當乳母慎口不可令飢及受風寒必歸腎

變黑難治

海藏云或熱極反兼水化者亦能變黑當以涼藥主之不可不察以脈別之可也或有出色正

者內素有熱頭反陷色或灰青似黑中有針眼下陷當急以清涼藥疎之便結者大黃牽牛之類便軟者金花丸之類主之

陳輕者作三次出 大小不一等 頭面稀少 眼中無

根窠紅 肥滿光澤

重者一齊並出 密如蚕種 身熱腹脹 瘡灰白色

稠密無縫 瀉渴不止 頭溫足冷

輕變重 犯房室 不忌口 先曾瀉 飲冷水 餌涼

藥

重變輕 避風寒 常和煖 大便稠 不燥渴 忌生

冷 忌外人

右飲冷水耳涼藥若內有實熱者不須忌之

二日三日痘瘡始見微微纔出如粟米大或如黍米大或如菜豆大似水珠光澤明淨者佳不須服藥

四日五日痘瘡大小不等根窠紅活光澤明淨者輕如稠密陷頂灰白色瀉渴者重

六日七日痘瘡肥紅光澤者輕如身溫氣促口乾腹脹足指冷者重

八日九日痘瘡長足肥滿蒼蠟色者輕如寒戰悶亂腹脹煩渴氣急咬牙者至重也

十日十一日痘瘡當腐瘡痂欲落而愈如身熱悶亂腹脹泄瀉寒戰咬牙者重

錢黃栢膏如瘡疹已出此藥塗面次用胡荽酒外治法

黃栢一兩 菘苳粉二兩 甘草四兩 紅花二兩

右同為細末生油調從耳前至眼眶並厚塗之日三兩次如早塗瘡不至面縱有亦少

彭氏云痘疹護眼人多用脂據元醫云不如錢氏黃栢膏最好諸家護眼法無出此方也

錢痘瘡初出用鼠粘子為末水調傳顙門並無患眼亦妙

胡荽酒 胡荽一味細切四兩以好酒二盞煎一二沸入

胡荽再煎少時用物合定放溫每吸一大口微噴從頂至

足勾遍勿噴頭面病人左右常令有胡荽氣即能辟去汚

塗面護眼法

噴體令快法

氣瘡疹出快

疔痘疹初出時或未出時見時人有患者宜預服此藥多者令少重者令輕以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為末沙糖拌勻乾喫入硃砂末更妙

疔消毒救苦湯治癰症悉具消化便令不出若已出稀者再不生癰十一月立此方隨四時加減惟通造化明藥性者能之

麻黃根

羌活

防風各五分

柴胡

川芎各二分

細辛

藁本二分

升麻五分

葛根

黃芩酒炒各二分

黃連三分

黃柏酒炒五分

紅花許少

蘇木一分

歸身三分

吳茱萸半

白朮一分

蒼朮二分

甘草生

橘皮各一分

連翹半錢初出者成出大者加

生地五分

變重為輕法

右咬咀每服五錢水二大盞煎至一盞去查稍熱服癰疹者因內傷飲食致令榮氣逆故也大禁牽牛巴豆峻藥宜半夏枳實大黃益智仁之類去瀉止吐若耳尖冷呵欠睡驚嚏噴睡泄知必出癰也宜

升麻

葛根

白芍藥

甘草

歸身

連翹各等分

分五藏施治

右咬咀水煎服此定法也後隨症加減

如肺出膿癰先顯喘嗽或氣高而喘促少加人參黃芩

以瀉伏火而補元氣 如心出小紅癰必先見噎乾驚

悸身熱肌肉腫脈弦洪少加黃連 如命門出癰疹必

先骨痛身熱其疼痛不敢動搖少加生地黃柏 諸癰

疹皆為陰症瘡皆因內傷乳食脾胃不足榮氣逆行雖

火勢內熾陰覆其外故錢氏製四物升麻湯發之如有

傳變症依加減法服之

酒如疹痘則發於脾宜陳氏人參清腦散疹者皮膚隱隱如麻名曰麻子

水疱者多因傷寒熱毒而發宜升麻散及羌活散方見

分乾濕治

丹瘡乾者宜退火濕者用瀉濕退火止用輕劑荆芥升麻葛根連翹之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥防風白芷之類痘初起時自汗不妨蓋濕熱薰蒸而起故也

診生死

世痘瘡不治症有七 一憂齒痘黑陷喉中涎喘因先受

風冷血氣虛弱即變此症 二憎寒困倦痘子縮伏 三

瘡作坑內無膿血或黑色泡或瘡跡作黑色 四痘癩壅

腫痘毒變疳口臭齲爛牙落 五聲啞氣噎或咽藥腹中

鳴 六痘初出而半在皮膚帶紫黑色不出者 七誤於

踈轉氣啞者 凡出前後心密及兩手心兩足心密者皆

不可治

陳論痘不治有五 痒塌寒戰咬牙煩躁不止 紫黑色

喘渴不寧 頭温足冷悶亂欲飲水 目睛上視齒齙氣

促泄瀉不止 灰白色陷頂腹脹喘渴不止

禁忌

治小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脈數疑似之間

只與升麻湯解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可踈

轉此為大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表猶不可

轉世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也誤矣海藏云此論雖

當在經則可若熱甚過極足冷或內傷腹熱足冷宜以寒藥如洗心調胃及化食藥通膈之類主之然當求責臟府

秘與不秘脈道何如耳許氏云上熱下冷傷食也痘疹初熱手足亦冷惟傷寒一身盡熱不與足冷相類此傷食非

傷冷也若傷冷不宜用痘瘡已出不可踈轉出得已定

王德孚用感應丸治之 膿血太盛却用踈利亦非也海藏云此言若在經而出不

時後重如痢疾及脈滑在裏者亦當微下大抵瘡疹首尾皆不可下海藏云

疑滯者不可拘此小兒身耳尻冷咳嗽輒用利藥即害人海藏云

言裏和而少陽之氣在經熱者故用化毒犀角湯為氣出裏若氣未出裏未盡求責疎利亦可 凡治疹

痘纔瀉則令內陷決不可輕易轉下惟大小便多日不利宜微微利之及痘已靨尚有餘熱停留或作熱或作瘡瘻或成癰宜四順飲下之不特消餘毒亦免生他症累試累驗 每見疹痘者服發表麻黃藥出汗陽氣盡出膚表遂至癰爛臟虛虛則腹痛自利或作寒戰或作陰癰死者多矣

陳痘瘡自初出至已愈之際父母切忌房事

世凡痘瘡勿令親近狐臭漏腋者房中淫慾者及婦人經候醉酒葷穢硫黃蚊藥一切腥臊疫汚蒸濕誤燒油髮五辛潑糞淋尿熬油煎卵俱當忌之

海瘡疹忌外人及穢觸之物雖不受風冷亦不可擁逼常令衣服得中並溫涼處坐臥

陳痘瘡發熱口乾煩渴不止者切不可與水喫亦不宜與蜜紅柿西瓜橘子等冷物食之 若脈實中有實熱者不必忌生冷 痘瘡

欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與水蜜等冷物食之或頭溫足指冷或瀉渴氣促亦不可與之 十二日十三日瘡痂已落其痂猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可澡浴亦不宜食炙煨物酸辣五辛有毒之物恐熱毒熏膈眼目多生翳障

海世人徒知憐惜過愛信其俗而不藥病已成而方憂摩撫從容無所不從豈知愛之適足以害之惜之適足以棄之始不早治治不全終卒之殞斃勞而無功至是咎醫嗚呼其計亦繆矣

痘出太密

陳疎則無毒密則有毒用涼藥解之雖數十貼亦不妨無

害眼之患

一發便密如針頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹升麻湯主之

垣鼠粘子湯治癩疹已出稠密身表熱急與此藥防後青乾黑陷

鼠粘子炒二錢 當歸身酒浸 甘草炙 柴胡

連翹 黃芩各一錢 地骨皮二錢

右咬咀每服二錢水煎去查溫服空心服藥畢且勿與乳食

田調肝散治瘡疹太盛宜服令瘡不入眼

生犀二錢 草龍膽一錢 黃芪兩半 大黃二錢

桑白皮炒黃兩半 麻黃去節 釣藤子各一錢 石膏兩半

瓜蒌仁去皮 甘草炒各二錢

右為麤末每服二錢水煎食後溫服微利效

海出太多者犀角地黃湯地骨皮鼠粘子湯犀角地黃湯方見切血地

骨皮鼠粘子湯即地骨皮散加鼠粘子是也

丹又解瘡毒藥

絲瓜 升麻 芍藥酒炒 甘草生

山查 黑豆 赤小荳 犀角

右咬咀水煎服

癩已發密重微喘飲水者有熱證用去風藥微下之

丹治男子勞傷出痘昏不知人身無全膚者方見痘未愈

痘出不快

大法 錢氏消毒散 化毒湯活人鼠粘子湯已上三方並見本條中有鼠粘子荆芥

防風皆發痘之要劑也

右三方發瘡痘皆溫平溫涼藥錢氏所謂三日不出或

出不快即微發之者是也如微發不出者即就與前項藥該每服二錢者即加至三四錢該每日二服者即加至三四服如加藥又不出者即用升麻葛根麻黃桂枝大發之如大發後不多及脈平無事者即瘡稀不可更發如脈洪有熱有大熱者當用四聖導赤八正輩利小便便有大熱者當用芩連及金花丸輩解毒若利小便解毒後又不快則勿發勿下止用抱龍丸治之此皆錢氏心法也

虛

丹勉奴痘已出第三日色淡不肯發此血氣俱虛與此方

人參錢一

白朮炒

黃芪酒

婦身酒洗各

陳皮分二

甘草炙少

訶子煨一

荳蔻煨一

右煎入好酒些飲之

右治氣血俱虛

疹痘發未透宜四君子湯加黃芪紫草糯米煎凡醫百病不可損胃氣故用四君子及糯米等助其胃氣出閣孝忠續錢

世六一湯專發痘瘡之膿

黃芪六錢

甘草炙一

右咬咀每服二錢水六分煎入酒二分同煎至半盞溫服更加橄欖同煎尤好加山藥亦得

右治氣虛

活活血散治瘡子或出不快用白芍藥末酒調如欲止痛

只用溫熱水調嚥下

海藏云張和之治四肢出不快加防風大效此症乃太陰藥也

世四物湯治痘瘡出不快不甚紅活不起根窠綠血虛故也此藥能活血調順痘疾無如此方自古及今用之如寶只加甘草服之

虛寒

右治血虛

女子瘧後出痘血氣俱虛又值冬寒熱易退不出

丁香五粒

附子五分

桂枝錢

甘草炙二分

人參兩半

黃芪錢一

陳皮

當歸酒洗各五分

藥異功散治痘瘡已出之間不光澤不起發根窠不紅謂之表虛

木香

當歸各三錢

桂枝

白朮

茯苓各二錢

陳皮白去

厚朴薑製

人參去蘆

肉蔻各二錢半

丁香一錢半

半夏薑製一錢半

附子炮去皮一錢半

右咬咀每服二錢水一盞薑五片葱三枚煎服

右治虛寒虛而不寒者宜用前方血氣俱虛之劑不宜用此必脈虛細四肢身體冷者方可用之

虛熱

藍根散治瘡疹出不快及倒靨一名二聖散救小兒垂死

板藍根一兩

甘草炙七分半

右末每服半錢取雄雞冠血三兩點同溫酒少許食後

調下無時甚則三五服立效丹溪云藍能分散敗血

表裏清便自調宜表

若出不快清便自調知其不在裏當微發之宜升

麻葛根湯

錢消毒散治瘡未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼膈

去痰治咽喉痛

牛蒡子炒三兩

甘草炙半兩

荆芥穗二錢半

右同為麤末每服三錢水一盞半去渣溫服海藏云此藥皆溫平

之劑一法加防風薄荷

活鼠粘子湯治小兒痘瘡欲出未能得透皮膚熱氣攻咽

喉眼赤心煩

鼠粘子炒四兩

荆芥穗

甘草各一兩

防風兩半

右為細末沸湯點服臨臥大利咽喉化痰涎止咳老幼皆宜海藏云太陽少陽之劑首論溫平者此也

海又法用牛蒡子炒熟為末同荆芥煎服右三方消毒飲加減法也

活化毒湯治小兒瘡痘已出未出並宜服之

紫草茸 升麻 甘草各等分

右咬咀水二鍾粳米五十粒同煎此陽明之藥也海藏云出不快者化毒湯本事方用糯米去粳米

活亞玉痘出兩日不甚透食稍進汗微出熱畧減但食物口中覺有惡味此出得遲發未透須微微表之

升麻 甘草炙 紫草 白朮

陳皮 芍藥炒半錢

作一貼加少酒同煎白芍須炒見其大便雖出不多却

白帶溏滑

世透肌湯治痘不透

紫草 白芍藥 升麻 秫米粉炒各半兩

右三方皆化毒湯加減法也

海太陽出不快身之前也 荆芥甘草防已湯

陽明出不快身之前也 升麻加紫草湯聖惠方升麻葛根加紫草

少陽出不快身之側也 連翹防風湯即連翹散

四肢出不快 防風芍藥甘草湯

痘疹煩不得眠者甘桔加梔子湯

桔梗 甘草 梔子 各等分煎服

活治痘出不快煩躁不得眠者水解散麻黃黃芩湯升麻

黃芩湯主之海藏云莫若定其氣血用石膏梔子之類尤佳麻黃黃芩湯升麻黃芩湯亦當求責的是

太陽陽明方可用之

煩不得眠者宜汗利之

水解散治天行頭疼壯熱一二日兼治疱瘡未出煩躁或出尚身體發熱者

麻黃去節 大黃 黃芩 桂心

甘草炙 芍藥各二兩

右為麤末患者以生熟湯浴訖以煖水調下二錢相次二服得汗利便瘥強人服二方寸七風實之人三伏中亦宜用之若去大黃春夏通用

升麻黃芩湯治痘瘡出不快煩躁不得眠 麻黃黃芩湯治痘瘡出不快益煩躁昏憤或出尚身疼熱者已上二方見小兒傷

便瀉宜流行

錢四聖散治瘡疹出不快及倒靨一方有黃芪

紫草茸 木通 甘草炙 枳殼炒

右等分為麤末每服一錢水一鍾煎至八分溫服無時

劉提點云疹痘最要大小分曉錢氏四聖散用木通枳殼極好若大小流利不必苦泥

田紫草迴癰散小兒痘疹出不快或倒靨毒氣入腹

紫草茸 黃芪 桑白皮 木通 枳殼 白木各等分

右為麤末每服三錢水酒各半盞麝香少許同煎服

海紫草木通散治小兒瘡疹

紫草 木通 人參 茯苓 粳米各等分 甘草減半

右為末每服四錢水煎此小便不利之劑也

世人參蟬蛻散治小便不利瘡痘不散燥躁多渴牙咬

齒氣齟喘滿

人參 蟬蛻 白芍藥 木通 赤茯苓 甘草 紫草茸各等分 水煎服

錢紫草散發斑疹

釣藤鈎子 紫草茸各等分

右為細末每服一字或五分一錢溫酒調下無時

海小兒瘡疹出未快可濃煎紫草汁服

右紫草例為通利腠理要藥也

汚血

瘡不綻黃狗蠅四五枚用常酒研細服之未綻再服冬月在耳內取之

雜方

直絲瓜湯發瘡疹最妙絲瓜連皮燒灰存性百沸湯調下

瘡實

丹痒塌者於形色脈上分虛實實則脈有力氣壯虛則脈無力氣餒實痒則勢熾虛痒則氣怯虛痒以實表之劑加

涼血藥實痒以大黃寒涼之藥少許與之下其結糞痘瘡痒塌不掩

白朮一錢半

黃芪各半錢

當歸

陳皮各五分

甘草些

水煎溫服

予治一子七歲痘將出未出之際腹泄數行其泄色黑不發根窠三日後痒塌抓即黑色口渴其根窠如水疥狀不紅澤不起發食少脈浮數有力按之虛遂用參芪歸朮陳皮肉荳蔻為君灸甘草訶子桂為佐使水煎熟好酒些少咽下痒立止食立進根窠紅澤而起發二服全愈

雜方

丹輕者用淡蜜水調滑石末以雞羽潤瘡上

瘡痘痒難任搔之成瘡或膿或血出者敗草散治之切不可用牛糞灰貼則臭穢痲多矣

屋爛草

屋上爛草也如無牆頭上爛草亦可用此草經霜雪雨露而感天地之氣善解瘡毒

右一味為末每研碎篩末若渾身瘡破爛膿水不絕粘貼衣裳難以坐睡可用二三升攤於床褥上令兒坐臥

其效如神

小兒痘瘡痒難任候搔成瘡及瘡痂欲落不落用上好白蜜一味塗於瘡上其痂易落可無紫黑癍痕世傳痘痂落後痘毒不盡

變成癩癬其痒難任用陳年鵝脂油傳神妙

又方用羊髓骨髓煉一二沸入輕粉少許研成白膏羗合盛之塗瘡效

痘灰白色

寒熱

大小利為裏虛為裏實

丹爐灰白色靜者怯者作寒看躁者勇者焮發者作熱看凡痘疹白色將靨如豆殼者蓋因初起時飲水多其靨不齊俗呼倒靨不妨但服實表之劑如毒氣鬱裏消息他大小便如大便閉通大便小便閉通小便無妨

虛寒

吳店小兒周歲痘瘡色白甚痒藥中每加參芪半兩

白朮五分

丁香兩

當歸錢一

官桂三分

黃芪

兩一

水煎服

虛熱

予族姪女笄年出痘灰白色身熱喘嗽渴脈洪有力與八物湯加連翹桔梗犀角骨半夏木通紫草乾葛石膏杏仁連芩前胡瓜蒌仁服之十貼後色紅活喘嗽緩減漸微但熱未除遂於前方減芪香胡枳連芩蒺七味服三十餘貼而安安後髮皆落月餘方起床虛之盛也○又一男子二十餘歲出痘已破未破者灰白色又雜間以黑陷倒靨者發熱寒戰身痛脈洪或時弦亦與八物加木通紅花紫草陳皮連翹服十餘貼而安

痘黑陷倒靨

虛服 圖紫草散治瘡痘黑陷曾服此方愈 元錢皆云有枳殼難

紫草

甘草

糯米

元云此味極好助胃氣

黃芪各等分水煎服

痘瘡黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者用黃芪人參酒炒紫草治之顏色正者如上治法參芪之補佐以紫草之通利也

色淡補血

如將出成就之際却色淡不正者屬血虛宜用補血藥當歸川芎白芍酒洗之類或加紅花

色紫解毒

如將成就之際却色紫不正者屬熱宜用涼藥解毒升麻芩連桔梗連翹之類甚者用犀角屑如用後項諸藥色仍不正者宜兼用二法

治之

大小通利脈浮者宜通表

回生散治瘡疹倒靨黑陷用人牙燒灰存性入麝香少許研細每服半錢用黃芪白芍藥煎湯調下立效錢氏方中用溫酒調下雲岐方中用升麻紫草煎湯調下海藏云若平昔油膩腸垢者通膈丸下之硃砂為衣與宣風散相表裏彭氏云只用紫草湯自好錢氏方用麝香及酒蓋瘡痘最可怕麝香與酒氣觸禁不可用

湯治痘瘡黑陷藥不能發者有驗用川山甲一味燒存性為細末入麝香當門子少許一歲五分三歲一錢溫酒調

下一服取效雖半身黑陷欲絕者亦能暫甦而發紅色但有目閉無翳者不復生矣此方雖驗回生散又佳今詳麝香恐不宜服

衍麻黃湯用麻黃剪去根節五錢用蜜一匙同炒良久以水半升煎候沸去上沫再煎去三分之一不用查病瘡疱

倒靨黑者乘熱盡服之避風俟其瘡復出一法用無灰酒煎更速但小兒不能飲酒者難服以此藥入表也世傳此法累用

痘瘡黑倒靨猪尾湯無比散龍腦膏子無不驗海藏云若

大小結脈實者調和裏

之似勝腦必不得已而後用之可也

猪尾膏治瘡倒靨用小猪尾尖刺血兩點入生腦子少許同研新汲水調下食後立效

龍腦膏子治時疫發痘瘡及出瘡子未透心煩狂躁氣喘
妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不治其毒入臟
決死用生龍腦一錢研細滴猪心血和丸如豆子大每服
一丸心煩狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用溫酒
化下少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息取安

法証極而用故
活人云不得已也

海四董散治癰瘡倒靨黑陷

出御院
藥方

歌曰人猫猪犬臘

辰燒每服三錢蜜水調選甚倒靨并黑陷萬兩黃金也合

消

臘月辰日合
此藥甚驗

子和 人中黃臍月者最佳通風處以火煨成煤水調下三
五錢陷者自出丹溪云子和黑陷甚者用燒人尿卽此方
也

世治疹痘不透乾黑危困用山查肉一味爲末每服二錢

紫草酒送下量兒大小加減徐徐進三四服卽紅活

海劉守真涼膈散治小兒癰疹黑陷亦妙然止能治大便
結硬小便赤澀爲當若大便小便已通不宜用此惟以易
老去大黃硝者最爲穩當

寒戰咬
牙者下
之

錢凡痘疹重者猶十活四五黑者無問何如十難救一其
候或寒戰咬牙或身黃腫紫宜急以百祥丸下之復惡寒

不已身冷出汗耳尻反熱者死何以然腎氣大旺脾虛不
能治故也下後身熱氣溫欲飲水者可治以脾氣生勝腎
寒去而溫熱也治之宜解毒不可妄下妄下則內虛多歸
於腎若能食而頭焦起或未焦而喘實者可下之宜四
順飲 瘡赤陷而耳尻反熱者爲逆用百祥丸牛李膏各
三服不愈者死

百祥丸一名南陽丸治瘡疹黑陷寒戰咬牙憂齒身黃紫

腫

紅牙大戟不以多少陰乾漿水煮軟去骨日中曬乾復納汁煮汁盡焙乾為末

右水丸如黍米大每服一二十九研芝麻湯下吐利同無時此方治戛齒甚妙

牛李膏用牛李子不以多少取汁石器內熬成膏牛李子主野道邊至秋結實黑子成穗如無生者以乾者為末水熬代用每服皂子大煎杏膠湯化下此藥須於九月中取之

睦親宅一大王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留與抱龍丸三服李以藥下之其疹稠密錢氏見大驚曰若非轉下則為逆病王曰李已用藥下之錢曰瘡疹始出未有他症不可下也但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也瘡痂若起能食者大黃丸瀉一二行即止今先下之瘡疹未

能出盡而稠密甚則難治此誤也縱得安其病有三一者疥二者癰三者目赤李氏不能治經三日黑陷後復召錢曰幸不發寒病未困也遂用百祥丸為主牛李膏為助各二大服至五日間瘡復紅活七日而愈蓋黑者歸腎水也腎旺勝脾土不尅水故脾虛寒戰則難治所用百祥丸者以瀉膀胱之腑腑若不實臟自不盛也何以不瀉腎由腎主虛不受瀉如二服不效即加寒而死矣

子和治瘡疹黑陷鐵脚葳靈仙為末炒一錢腦子一分用溫水調服取下瘡痂為效

活無比散治小兒瘡疹惡候

硃砂先研一兩 牛黃 麝香 樟腦

膩粉細研各一錢

右同研細如有患者小兒一字大人五分入水銀少許

用小猪尾上血三兩點新水同調服寧穩得睡者然後
取轉下如爛魚腸蒲萄穗之類涎臭惡物便安小兒用
乳汁調妙海藏云此瀉內熱之極不能開發於外則宜
此內雖過泄外亦開發即透肌膚之藥與至
寶丹同

雲小兒癩疹黑陷方

乾胭脂三錢 胡桃一箇燒
存性

右為細末煎胡荽酒調下藥一錢立效

右治死血黑陷凡前方用川山甲及麝香等藥治黑陷
皆為氣滯者設也

雜方

雲治癩疹黑陷用臘月禿梟腦子一箇或二箇以好酒調
服若乾者以好酒浸少時化開依上條服立效禿梟百
勞鳥也

無箬葉散治倒靨用箬葉一味燒灰為末麝香酒下

鐵瘡黑而忽瀉便膿血并痂皮者順水穀不消者逆何以

診

然且瘡黑屬腎脾氣本強或舊服補脾藥脾氣得實腎雖
用事脾可制之令瘡入腹為膿血及連痂皮得出是脾強
腎退即病出而安也瀉米穀及瀉乳不化者是脾虛不能
致腎故自泄也此必難治海藏云瀉出痂皮根在內也表
裏俱病是為火鬱水穀化者順
水穀不
化者逆
未綻一齊黑者為陷已綻而不齊黑者為將靨

痘寒戰

世憎寒困倦或發寒戰能令痘子縮伏宜用陳文中異功
散方見痘出
不快條

錢寒戰咬牙黑陷者百祥丸下之方見黑
醫條 嘗治痘瘡寒戰

用白朮芪歸加苓治之愈

痘發熱

胡宅痘瘡發熱此血少有餘毒也

熱

陳皮

白朮

歸身

白芍藥各三錢

牛蒡子

研破炒二錢

木通

犀角

生甘節

川芎各一錢半

分六貼水盞半煎食前稍熱服

小兒有解毒

治連翹散治一切熱兼治瘡疹如神

連翹

防風

梔子

甘草各等分

右為末水煎服

海藏云治熱在外而不礙此少陽藥也

易老云涼膈去大黃芒硝者能解六經中熱此不惟解熱

治小兒癩疹熱候亦使發之則本藥與防風荆芥二物各

半白水煎服

河梔子金花丸

黃芩

黃連

黃栢

山梔炒各等分

右末滴水丸如葶子大每服五九白湯下

三黃丸治諸熱

黃芩半兩

大黃煨

黃連各二錢半

右為細末糊丸葶苈大每服五七九至十五二十九食後米飲送下

右錢氏云有小熱者解毒海藏謂解毒者三黃丸金花丸之類是也

四聖散方見出

海藏紫草木通湯方見同上

導赤散方見治虛

煩渴腹瀉喘咳利實小便

八正散方見林部

有初起煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來廢不齊急以涼藥解其標如益元散之類可用

右五方利小便退熱之劑錢氏云有大熱者利小便又云身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐此當利小便蓋此用導赤散之類是也

利小便

後熱不

錢宣風散

檳榔兩箇

陳皮

甘草各半兩

牽牛四兩生半熱半

右為細末三三歲蜜湯調下五分已上一錢食前易老加防風

雲通膈九利上下氣血藥也

大黃

牽牛

木通各等分

右為細末滴水丸如粟粒大每服三五丸量兒大小虛實加減

右錢氏云有大熱利小便不瘥者宜宣風下之

瘡痘得

和蔡河有舟師偶見敗蒲一束沿流而下漸泊舟次似

聞啼聲而微開視之驚見一兒四五歲許瘡疱周匝密不容隙兩目皎然飢而索食因以粥食之其妻怒曰自家兒女多惹瘡疱傳染奈何私料蔡河流緩必不遠持兒一鞋

逆流而上徧問皆曰無此兒行二十里又至一村落舟師呼於市曰有兒年狀如許瘡疱死棄河中今復活忽酒邸中有人出曰我某村某人也兒四五歲死於瘡疱舟師出其鞋其人泣曰是吾兒也奔往視驚見兒活流涕拜謝舟師抱兒歸今二十餘矣此兒本死得水而生第未諗其瘡疱之疾寒耶熱耶

痘寒熱

虛 大和散治瘡痘後寒熱往來嗜臥頓悶躁亂

生地

當歸

地骨皮

人參

甘草炙

白芍藥各等分

右咬咀每服一錢水半盞煎至三分去渣溫服

痘渴

虛 陳十妹年廿歲出痘而有孕七箇半月大渴不甚出透

寒熱交作血虛氣虛

人參

白朮

黃芪

陳皮

甘草炙

歸身各一錢

薑三片酒水各半盞煎服

海瘡疹大腸閉澀或發渴四君子加瓜蒌根桔梗主之

若身熱小渴者六味人參麥門冬散治之如不愈或身熱

大渴者七味人參白朮散治之又不可愈十一味木香散

六味人參麥門冬散

麥門冬去心一兩

人參去蘆

甘草炙

陳皮

白朮

厚朴薑製各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去渣溫服虛人減

厚朴

七味人參白朮散

方見消渴門○已上四君子加減法也

面赤煩躁大小

四初起煩躁渴引飲者急以涼藥解其標

齒為熱

錢身熱煩渴腹滿而喘大小便澀而赤悶亂大吐此當利

小便不瘥者宣風散下之

面白腹脹瀉為寒

陳十一味木香散集驗方本治瘡痘身熱作渴

方見後瀉條

文中云腹脹渴者瀉渴者足指冷渴者驚悸渴者身溫渴

者身熱面皯白色渴者寒戰渴不止者氣急咬牙渴者飲

水轉水瀉不已者已上九證即非熱也乃津液少脾胃肌

肉虛故也宜木香散治之如不愈更加丁香官桂

此說必加審用

之服瀉瀉瀉瀉驚悸渴寒戰渴咬牙渴亦多屬熱者不可不察

痘渴瀉

虛

陳牙兒十九歲出痘有紅癍吐瀉而渴

蒼朮一錢

白朮三錢

黃芪一錢半

陳皮二錢

茯苓

甘草炙

確砂

當歸各一錢半

薑三片同煎服

身熱脈
洪數為

從子六七歲時患瘡痘發熱微渴自利一小方脈視之用
木香散每貼又增丁香十粒予切疑焉觀其出遲因問自
利而氣弱察其所下皆臭滯陳積因腸胃熱蒸而下也恐
非有寒而虛遂急止之已投一貼矣繼以黃連解毒湯加
白朮與十貼以解丁香之熱利止瘡亦出其後肌常有微
熱而手足生癰癩與涼劑調補踰月而安 一男子十餘
歲出痘熱時出根脚密嘔吐不食腰背骨節痛大渴喉痛
腹亦痛全不食者半月餘脈浮弦洪而數與參芪歸朮灸
甘草陳皮半茯苓生薑煎服之至五日日色淡又加桂些少歸
芪再用酒製至七日痒甚加丁香三粒附子些少痒止至
八日九日渴大作而腹泄瀉痒甚至十日寒戰遂用白朮
為君芪陳苓炙甘草歸朮為臣至十一日不屬或痒或謔語
但守前藥半月後自吐出痰多而安

身熱脈
洪數為

虛

或身熱

或發寒

或嘔吐

肚腹

痛

或身熱

四肢

俱冷

者可用

此方

出集

驗

或身熱

四肢

俱冷

者可用

此方

出集

驗

十一味木香散治疹痘腹脹渴其效如神

必須密察的
是寒症六脈

虛細身不甚熱或發寒或嘔吐肚腹痛
或身熱四肢俱冷者可用此方出集驗

木香

大腹皮

人參

官桂

赤茯苓

青皮去白

前胡

訶子皮

半夏

丁香

甘草

灸各
三兩

右咬咀每服二錢水一盞薑三片煎空心溫服

異功散集驗方瘡痘頭溫足冷腹脹瀉渴

方見痘
出不快

表裏俱
虛

張巽之云吐瀉渴少食為裏虛異功散減官桂主之此症

瀉渴不可喫蜜水痘出之間不光澤不起發根窠不紅或

瀉渴或腹脹或氣促是為表裏俱虛與異功散送下七味

肉苳蔻丸治之

異功散方見
痘出不快

痘瀉不渴

虛寒

海瘡疹不渴臟寒下利四君子加乾薑減半主之

痘疹大便不固痘漸黑陷小兒乳母同服

人參 白茯苓 肉苳蔻 黃芪各半兩

甘草錢二

右咬咀每服一錢水半盞薑五片棗一枚煎三分乳母倍服若大瀉手足厥冷加附子用驗

陳苳蔻丸治痘疹泄瀉

木香 砂仁 白龍骨 訶子肉

肉蔻麪裹煨各半兩 赤石脂 白礬枯各七錢半

右為末糊丸如黍米大一歲三十九三歲百丸溫米飲下瀉止勿服

痘吐逆

世痘瘡吐逆無痰益黃散有痰二陳湯或橘皮半夏湯不止者加丁香若吐而瀉者亦宜益黃散及陳氏木香散異

功散 吐而身熱煩渴腹滿喘大小便澀面赤者當利小便不瘥者宜風散下之全文見大法

痘腹脹

熱 勉奴痘後渴肚急小便少發熱

芍藥五分 川芎三分 白朮五分 陳皮五分

乾葛三分 甘草錢一 木通二分 水煎服

寄子五歲痘後肚急

白朮錢一 陳皮 木通各五分 犀角

川芎 白芷各七分 甘草錢三 水煎服

虛寒 陳文中木香散治痘瘡腹脹渴瀉方見痘瀉

實熱 腹滿而喘大小便澀身熱面赤悶亂大吐者當利小便不

瘥者宜風散下之全文見大法

痘腹痛

痘腹痛多是痘毒當臨證消息

寒 吳店子出痘瘡腹痛

丁香二枚 官桂 芍藥各一錢 白朮

當歸各五分

熱 右作一貼服 常治痘始出腹痛或身痛脈洪數者解

表涼藥加芍藥甘草漸安

痘喘

痘瘡痘出後喘急痰盛宜杏仁湯人參清膈散

表熱 杏仁湯治瘡痘煩喘渴躁

麻黃 桑白皮 杏仁 甘草

右等分為麤末每服三錢水一盞煎食後服

瘡疹肺不利紫草甘草枳殼湯

人參清膈散

人參 桑白皮 柴胡 當歸

芍藥 知母 茯苓各半

白朮

黃芪 紫苑 地骨皮 滑石各一兩半

甘草 桔梗各一兩 黃芩半兩 石膏一兩

右吐咀每服三錢水煎溫服

實熱 痰實壯熱胸中壅悶臥則喘急前胡枳殼湯主之

前胡 枳殼 赤茯苓 甘草各五錢

大黃量兒加減

右吐咀每服三錢水一盞煎六分旋服

喘而腹滿大小便澀者利小便不澀者宣風散下之錢氏法

寒 痘出之間或氣促者水香散主之

痘大便秘

虛 海 治瘡疹已出未出大便秘澀或時發渴四君子加瓜蒌

根桔梗治之

實當歸丸

當歸半斤

甘草一分

黃連

大黃各二錢半

先將當歸熬膏十入藥末三味為丸加服之以利為度

海 惠變百祥丸治癩疹大便秘結

紅牙大戟去骨

青州惠去核

右用水二盞同煎至水盡為度去大戟將惠焙乾可和作劑旋丸從少至多以利為度

活 洗心散治痘瘡壯熱大小便不利狂言多渴

大黃

甘草

當歸

麻黃去節

白朮

芍藥

荆芥各等分

雜方

陳

右咬咀量病輕重多少薑薄苜煎溫服則平熱服則澹四五日不大便者可用肥嫩猪脂一塊白水煮熟切如

豆大與兒食之令臟腑滋潤瘡痂易落百無礙滯

痘餘毒

診治

海 癩瘡餘毒或肝虛入眼目或肺虛為癬疥或為癰癤發

在骨節腎之虛也發在肌肉脾之虛也或在筋或在頭或在面或牙齒疳蝕或咽喉腫痛各隨經而見皆毒不散蘊積而成或病人始不早治或醫者失治遺於經絡其所由來蓋有自矣宜服解毒等劑

世 痘毒攻脾則泄瀉身浮攻肝則眼生翳膜攻心則煩躁

啼哭攻腎則耳疼膿聚攻肺則咳嗽痰涎

丹 治小兒痘瘡餘毒未散食穀太早補住毒氣

鼠粘子錢六

甘草五分

犀角錢三

荆芥

防風各一錢

白朮錢三

枳殼錢一

水煎溫服

痘入目

丹溪法

如痘傷眼必用山梔赤芍决明歸鬚連翹防風桔梗升麻小劑末之調服如眼無光過百日後血氣完復則自明矣

張炳治瘡疹後毒氣攻眼或生翳膜赤黑之類宜用四物湯加荆芥防風煎服兼用黑豆皮穀精草海蛤甘草等分爲末用熟猪肝切片蘸服神妙一方治痘毒目翳用江西蛤粉黑豆皮甘草蜜蒙花

丹痘後生翳數服效用葳靈仙仙靈脾等分洗淨不見火與日爲細末每服隨時宜第三次米泔下

錢氏法

錢氏黃栢膏痘初出塗面護眼方見痘大法調肝散治瘡疹

大盛服之不入眼方見痘疹密羊肝散即下蜜蒙散方見活人條

蟬蛻散治癩瘡入眼半年已裏者一月取效

猪羊蹄甲二兩入罐子內鹽泥固封燒存性 蟬殼去土取末一兩

右二味研入羚羊角細末二分拌勻每服一字百日外兒一二分三歲三四分漿水或新水調下日三四夜一二食後一年已上者不治

治瘡疹入眼

馬屁勃兩半 皂莢子十四粒 蛇皮兩半

右入小罐子內鹽泥封固燒存性研細温酒調下三錢食後

治瘡疹入眼或翳

括萎根兩半 蛇皮二錢

右爲細末用羊肝一箇批開入藥末二錢麻線纏定米泔煮熟頻與食之兒未能食肝乳母多食之

又方用蟬蛻末以水煮羊肝湯調服二三錢

海地黃散治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤翳或白膜遮

妙法

睛四邊散漫者尤易治若暴遮黑睛者多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

熟地各一 當歸各一 黃連各一 大黃煨各一

生地去心 木通各一 防風 羌活

生犀末 蠅蛭去土 木賊 穀精草

白蒺藜 沙苑蒺藜已上各一錢 甘草半錢

玄參五分

右為細末每服一字或五分量兒大小加減煎羊肝湯食後調下日三夜一忌口將息大人亦治

東漢法 治痘瘡風熱毒翳膜暈遮睛以瀉青丸治之大效初覺

易治

雲 用竹葉湯和沙糖水化下瀉青丸二丸漸至微利神效

治 瘰入眼用决明撥雲密蒙花通聖蛤粉散之類然無出

活人法

此書游藏云莫若病時隨經而取不使毒氣轉入眼中為尤妙然眼有五輪亦當求責此言為失治者說也

决明散治瘡痘疹入眼海藏云此少陽太陰之劑

决明子 瓜蒌仁各半 赤芍藥 甘草各一分

右為細末入麝香少許令勻每服二錢生米泔調下臨

臥服

撥雲散治瘡痘入眼及生翳用桑螵蛸真者一兩炙令焦

細研搗為末入麝香少許每服二錢米泔調下

密蒙花散治小兒痘瘡入眼及無辜疳氣入眼

密蒙花三兩 青箱子 决明子 車前子各一兩

右末拌勻用羊肝一大片薄批糝上濕帛裹煨熟量多

少空心服之錢氏海藏云即羊肝散

通聖散治疹痘瘡入眼及生翳

白菊花如無甘菊代之然不如白菊好 菘豆 穀精草去根一兩

右為細末每服一大錢柿乾一箇米泔水一盞同煎候米泔盡只將柿乾去核食之不拘時日三枚日近者五七日遠者半月取效

蛤粉散治小兒瘡子入眼

穀精草 蛤粉各等分

右為細末每一錢七猪肝一兩許批開摻藥捲了用竹箸裹麻線縛定水一碗煮令熟入收口斃瓶薰眼候溫取食之日作不過十日退

針灸 明 癰瘡入眼 大杼壯一

痘咽痛

表熱 治 如聖餅子治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛海藏云隨經此一方即是隨經

牛蒡子炒 甘草各一兩 麥門冬去心半兩 桔梗一兩

右為末加竹葉同煎細細服之海藏云減門冬竹葉甘

鼠粘子湯 消毒飲二方並見前痘出不快條

雲 小兒癰出欲透皮膚身熱咽喉不利甘草桔梗升麻湯

甘草半兩 桔梗一兩 升麻半兩

右剉細每服一大錢水煎服

血熱 錢 甘露飲子治心熱咽喉痛口舌生瘡并瘡疹已發未發並可服之治熱上攻牙根腫痛動搖

生地 熟地 天門冬去心 麥門冬去心

枇杷葉去毛 枳殼炒 黃芩去心 石斛去苗

甘草炒 山茵陳

右各等分為麤末每服二錢水一盞煎食後溫服牙齒腫痛則含嗽并服海藏云甘露飲為血劑

田 地黃丸治小兒痘疹口瘡喉腫痛牙疳臭爛

天門冬 麥門冬 玄參各三兩 甘草

薄荷各一兩

右為細末生熟地黃汁和丸櫻桃大每服一九溫蜜水化服

痘風

虛實

丹痘風分氣血虛實以日子守之多帶氣血不足 虛則黃芪生血之劑助之畧佐以風藥 實則白芍黃芩為君連翹白芷續斷之類為佐若屬寒陳氏方可用

楊氏女年十餘歲痘發不透屬落後骨節痛食少夜間或熱此餘毒在內虛甚難於疎導須在補中有通此方主之

當歸

白朮

各一錢

犀角

二分

陳皮

一錢

通草

甘草

根各三分

牛膝

五分

蘇梗

三分

右咬咀生薑二片水煎溫服

男子七歲痘瘡初出不透毒氣攻內骨節作痛兩足不可

直癩痕欠紅活脈浮而和小便赤少

婦身

白朮

各一錢

陳皮

木通

犀角屑

人參

茯苓

各五分

甘草

此

右分二貼煎服

痘癩瘡

風火

錢瘡疹瘡由風火相勝也惟癩疹能作瘡疹為脾所生脾

後因成癩

虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜為熱神氣不安因瘡成癩癩子為心所生心生熱熱則生風風屬於肝二臟相搏風火相爭故發瘡也治之當瀉心肝補

其母括萎湯主之

海藏云諸痛痒瘡皆屬於心火無論虛實皆從心火上說脾虛則肝乘之肝與

心火相合故用括萎湯若脾土實火旺逆乘而成癩者此實邪也便結者瀉青丸便軟者瀉青湯亦當以脈別之

潔凡未出而發瘡者是外感風寒之邪內發心熱之所作

也當用茶粉下解毒丸犀角地黃湯主之

世治瘡痘欲出身熱煩躁忽發驚搐宜驅風膏小如聖飲小便不通八正散涎盛利驚丸抱龍丸量症施之

世欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦此非驚風宜發散藥

世麻痘風搐方
人參 羌活 防風 殭蚕醋炒

南星薑製 白附薑製 甘草炙

右等分生薑三片水煎服其搐立止

錢癩疹病後欲發癩餘瘡難發癩以木勝脾木歸心故也若涼驚用涼驚丸溫驚用粉紅丸即溫驚丸

痘瘡痛

活治痘瘡痛用溫驚丸水化下方見前驚搐條

活治瘡出煩痛五物木香散滯氣

青木香二兩 丁香 零凌香各一兩 麝香一分

白礬一兩

每服四錢水一小盞半煎服之熱盛者加犀角一兩如無犀角以升麻代之輕者一服大效

雜方又方以芒硝和猪膽塗瘡上令動痂落無癍仍用黃土抹之良此病小便澀有血者中壞瘡背黑膿不出膿者死不療

世痘將結靨乾硬而痛宜塗酥潤之靨可揭去則去之如無酥用猪油煎汁代之此痛非服藥可免也

痘膿而不痂痂居牙切瘡靨曰痂

海癩疹膿而不焦此本治失清涼之氣有如五穀得陽氣而成熟非涼風至則不能實也天地嚴肅之氣一加則萬物秀而實矣與癩疹何異須察何經而清涼之或下而成

雜方

嚴肅之氣則瘡氣必不至於膿而不痂矣要當知之餘毒不盡而疾作蓋出於此當是清涼飲子下之是也非陽和則苗不秀非嚴肅則秀不實劉涓子訣云痘發如膿窠不肯腐者但調沙糖水與喫劉提點云亦曾試用但後來結癩痕白錢五七日痂不焦是內發熱蒸於外故不得焦痂也宜宜風散導之用生犀磨汁解之必著痂矣

陳痘已屬未愈之間忽被風邪搏之成疔瘡宜雄黃散綿蠶散治之又不愈多漬骨傷筋殺人

雄黃散治小兒牙齦生疳蝕瘡

雄黃錢一

銅碌錢二

右二味同研極細每用量瘡大小乾貼

綿蠶散治小兒因痘瘡身體及肢節上生疳蝕瘡膿水不絕用出蛾綿蠶以生白礬槌碎入蠶內令滿炭火燒令白

礬汁盡取出研極細每用乾貼瘡口上

凡痘瘡方纔著痂即用菜油不住潤之可揭則揭若不潤及遲揭瘡痂硬即隱成癩痕矣

陳痘痂雖落其癩猶黯或凹凸肉起當用滅癩藥塗之

韶粉兩一

輕粉字一

右研細入煉過猪脂油拌和如膏塗癩上

痘後瘡癩

熱毒

世連翹散治小兒瘡疹癩痘疹餘毒作楚或生於頭面耳疼頰赤生瘡

連翹

黃芩

瞿麥

木通

滑石

柴胡

荊芥

牛蒡子

防風

羌活

赤芍藥

甘草各等分

每服三錢水一盞煎半盞又入生薄荷尤好

痘癘

實熱毒

丹痘癘多是實毒血熱成癘分上下用藥一日不可緩成膿必用清熱涼血為主赤芍藥甘草節連翹桔梗之類上引用升麻葛根下引用檳榔牛膝更助以貝母忍冬草白芷瓜蒌大便秘用大黃寒熱用芩栝此法累效

保木香散治小兒癩後生癘如神

地骨皮一兩

木瓜半兩

川山甲

炙黃三錢半

麝香一字

右為末米飲下二錢

丹痘癘傳藥用貝母南星僵蚕天花粉寒水石白芷草烏大黃猪牙皂角醋調傳患處效

中惡

楊小兒神守則強邪不干正若真氣衰弱則鬼毒惡氣中

之其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死是也凡中惡腹大而滿診其脈緊細而微者生脈大而浮者死即服蘇合香丸未醒以皂角末搐鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓又能辟邪客忤亦宜服

降真香

白膠香

沉香

虎脛骨

酥炙

人參

鬼箭草

草龍膽

各五錢

右為末次入雄黃五錢麝香一錢煉蜜丸乳香湯化又令兒帶及燒臥內尤妙

廣治中惡客忤唾化麝香一錢重研和醋二合服之即瘥

海龍腦膏治小兒發熱在心胃卒不知人方見痘黑陷門即活人方

中暑

湯凡中暑悶倒急扶在陰涼處切忌與冷若得冷即死當用補藥及熱湯熨臍腹間煖即瘥如無湯即掬熱土暈於臍上仍撥小窩子尿於中可代湯熨之良久嚼大薑一塊

以水嚥下續用解暑藥

針灸 甲 小兒口中腥臭膈膈氣滿勞宮主之

客忤

湯 客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或未經識見之人觸之或經歷神廟佛寺與鬼神氣相忤也故謂之客忤亦名中客其狀吐下青黃白色水穀將下時腹痛反倒面變五色其狀若癩但目不上插耳其脈數者是也亦宜服蘇合香丸并真珠散

真珠散治客忤驚風鬼疰驚邪痰熱心舍不寧精神不定心常怔忡睡中驚跳時或咬牙五心煩熱有汗兼喘面赤舌白呵欠煩渴小便赤瀉或吐利黃沫常服辟邪安神

真珠

海螵蛸

滑石

白茯苓

人參

白附子

甘草

全蝎

麝香

腦子

另研各五錢

生珠

另研一錢

金銀箔

金箔十片

銀二片

右末和勻半錢煎燈心麥門冬湯入蜜少許調服日午臨臥各一服

國 客忤因而驚忤者治法用甕中黃土研二兩鷄子一枚去殼二件相和入少許水調先以桃柳枝湯浴兒後將此

藥塗五心及頂門上

陳無擇法用灶中黃土蚯蚓屎等分如此法塗之

治 卒客忤噤口不能言細辛桂心等分納口中效

醫學綱目卷之三十七

醫學綱目卷之三十八

小兒部

脾主濕

吐瀉

吐

吐水吐

泄

瀉

乳食不化

赤白痢

腹脹

附丁

水腫

疳

虛羸

鶴節

宿食

痞

哺露

癖

脾弱多困

渴

大小便秘

黃疸

腹痛

驚口

口

瘡

見心主熱門

口噤

滯頤

撮口

濕痰

世白附丸通治小兒咳嗽有痰感冒發熱吐瀉心神不安

神效

南星 二兩

半夏

白附子

白礬 各一兩

右為細末薑汁糊丸如桐子大一歲兒服八九丸用薄苛

湯化下

南星半夏用冬藏雪水於六月六日浸起晒乾又浸凡九次方用

吐瀉

小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消或白色是傷寒當下之併和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

兒生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有五臟兼見證 肺睡露睛喘氣 心驚悸飲水 脾困倦饒睡 肝呵欠煩悶 腎不語畏明 當先視兒兼臟症先瀉其所實者而補其虛如脾虛益黃散主之此二症多病於秋夏也

五月身熱瀉黃九分下一分補

五月夏至後吐瀉身壯熱者此熱也蓋小兒臟腑十分中九分熱也或因傷熱乳食不消瀉深黃色玉露散主之玉露散一名甘露散

寒水石 半兩軟而微青黑中有細紋者 生甘草 一錢 石膏 半兩堅
墻壁手不可折者如無以方解石代之堅白似石膏敲之段段皆方者是

六月身溫瀉黃

六月大暑後吐瀉身大溫而似熱臟腑中六分熱四分冷也吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃散食後多服玉露散 廣親宮五太尉病吐瀉不止米穀不化眾醫用溫藥一日而加喘吐不定錢氏曰

六月身溫瀉黃日色六分補四分下

當以涼藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服并服之眾醫皆言吐瀉多而米穀又不化當補脾何以用涼藥王信眾醫皆用補脾丁香散三服錢醫後至曰不可服此三日後必腹滿身熱飲水吐逆三日外果如所言所以然者謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃即大吐瀉也醫又行溫藥使上焦亦熱故喘而引飲三日當甚眾師不能治復召錢至見其熱證以白虎湯三服更以白

右同為細末每服一字或五分一錢食後溫湯調下

云非腎熱相火太盛者不宜服此

餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服
四日用石膏湯一服及旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺
黃茯苓以硃砂為衣服五九竹葉湯化下熱退而安

七月瀉
身溫涼
三分下
七分補

七月立秋後吐瀉身溫臟腑中三分熱七分冷也不能食
乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不
渴食前多服益黃散食後少服玉露散 廣親宮七太尉
七歲病吐瀉是時七月其症全不食而昏睡睡覺而悶亂
哽氣乾嘔大便或有或無不渴衆醫作驚治之疑睡故也
錢曰先補脾後退熱與史君子九補脾石膏湯退熱次日
又以水銀硫黃末研和以生薑水調下一字錢曰凡吐瀉
五月內九分下而一分補八月內九分補而一分下此者
是脾虛瀉醫妄治之至於虛損下之即死即當補脾若以
史君子丸恐緩已又留溫胃益脾藥治之醫者李生曰何

食而噦錢曰脾虛津少即嘔逆曰何瀉青褐水曰腸胃至
虛冷極故也錢治而愈

六月身
冷瀉青
一分下
九分補

八月秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾嘔噦瀉青褐
水當補脾益黃散主之不可下也

下後不
愈隨証
用藥

田凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐上津
必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日必愈 如身熱

脈大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫服之 如身涼
脈細小便青早晨益黃散午後玉露散 如過四五日困

弱宜異功散和中丸開胃丸

潔如有風而瀉用防風羌活 謂吐瀉兼肝病
風搐拘急也 有熱而瀉

用黃連黃芩大黃 謂吐瀉兼心
病身熱也 有寒而瀉用附子 謂吐
瀉兼

腎病身冷或足
脛寒而逆也 有濕而瀉用白朮茯苓 謂吐瀉兼本藏
脾病多睡體重

昏倦 有肺病而瀉用芍藥桂心定喘麥冬人參甚者多
也

檳榔大便不通加大黃謂吐瀉兼肺病喘嗽也更詳看病新舊新

則止之久則有腸風之患宜推陳致新法當宣風散導過後用入臟君臣藥調之宜益黃散

冬春治

錢傷寒吐瀉身温乍凉乍熱睡多氣麓大便黃白色嘔吐

身温瀉黃白咳嗽先表後瀉

乳食不消時咳嗽更有五臟兼見症當煎入臟君臣藥先服大青膏後服益黃散如先曾下或無下證慎不可下此

乃脾肺受寒不能入脾也

潔古云身温吐瀉咳嗽是風木入於脾母虛其子亦弱法當煎

身熱瀉黃而瀉

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此為胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發

散藥止渴多服白朮散發散大青膏主之

潔古云吐瀉身熱而渴小便少

身凉瀉青不瀉

傷風吐瀉身凉吐沫瀉青白色悶亂不渴哽氣長出氣睡

先補後表

露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益黃散發散大青膏主之此二證多病於春冬也

潔古云身瀉者則知為寒煎附子桂枝湯下大青膏

小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以温補之不已復以凉

藥治之又不能散謂之本傷風醫者亂攻之因脾氣積虛

內不能散外不能解至十餘日其証多睡露睛身温風在

脾胃故大便不聚而為瀉當去脾間風風退則痢止宣風

散主之後用史君子丸補其胃亦有諸吐痢久不瘥者則

脾虛生風而成慢驚矣

錢吐瀉過多脾胃虛乏欲生風候者四君子加白附子減

半生薑煎服

身熱瀉黃多瀉為熱

錢玉露散方見和中散和胃止吐瀉定煩渴治腹痛

人參

茯苓

白朮

甘草炙

乾葛

黃芪炙

白匾豆炒

藿香各等分

右為細末每服三錢水一盞半末二枚去核生薑五片

煎八分食前溫服海藏云和中散四君子湯加減法

丹小兒周歲吐乳腹瀉

滑石煨二錢

白朮炒三錢

乾葛一錢

陳皮炙三分

右為麤末煎飲之

吐瀉身熱瀉黃多渴錢氏作熱病治在夏秋用玉露散兼

益黃散相間服在春冬用白朮散大青膏亦相間服

丹萬安膏方見吐門

海吐利四肢脹逆腦門低陷四君子加藿香丁香芍藥等

分煎服○錢氏益黃散方見小兒大法條

世和胃丸治吐瀉不止欲生慢驚

肢冷瀉青不渴為寒

丁香

白朮各一兩

半夏五錢

藿香

蝎尾各一錢

右為末薑汁打糊為丸如小豆大三歲兒三十九薑湯

下

關理中丸治吐利不歇米穀不化手足厥冷方見傷寒

金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞多睡

露睛口鼻氣涼欲成慢驚風又治大人陽虛陰盛身冷脈

微自汗吐利小便不禁

舶上硫黃十兩先飛揀去砂石秤研為末用砂盒子盛令八分滿水和赤石脂搗泥回封晒乾

露地先埋一水確盛水滿坐盒子在上又以泥固濟

訖常以三斤火養三日三夜足加頂火一斤煨成冷

右以柞木槌乳鉢研為末每服二錢生薑米飲調下多

服取效大人藥末一兩蒸餅一兩水浸去水餅和丸桐

藥取

子大晒乾每服五十九至百丸米飲空心下

閻氏云吐瀉虛極當速生胃氣宜與理中丸併研金液丹末煎生薑米飲調灌之惟多服乃效俟胃氣已生手足漸熱然猶瘳瘳即減金液丹一二分增青州白丸子一二分同研如上服兼用異功散羌活膏溫白丸釣藤飲子之類仍類與粥雖至危者往往死中得生十救八九沈存中論金液丹見小兒吐利劇氣已絕服之得活者數人須多服方驗

錢 荳蔻散治吐瀉煩渴腹脹小便少

舶上硫黃錢一 滑石分五 丁香 荳蔻各半

右為細末每服一字至半錢米飲調下無時

荳蔻散治虛寒而渴方見本條 白木散治虛熱而渴方見下吐條

吐瀉身溫瀉黃白似渴錢氏作寒熱雜合病治在夏秋用

玉露散益黃散相間服在冬春用益黃散大青膏相間服之

錢 異功散溫中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒虛冷病先與數服以正其氣一方加木香

人參 茯苓 白朮 甘草

陳皮各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑五片葱二枚同煎海

云此方四君子湯補脾湯加減法也

溫中丸治小兒瀉白胃寒故也腹痛腸鳴吐酸水不思飲食霍亂吐瀉

人參 白朮 甘草各等分

右為末薑汁麩糊丸如菘荳大米飲下二三十九無時

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱吐瀉昏睡不露睛者胃實熱

虛熱實熱

胃虛熱治法錢氏白朮散和中散是也胃實熱治法錢氏玉露散河間益元散是也

寒痰 半粟散治小兒脾胃虛寒吐瀉等疾及治寒痰

半夏湯浸切陳粟米陳梗米亦得用三分

右咬咀每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至八分

食前溫服

乳不化 為傷食 微則消 之甚則 下之 **世**白附丸方見上脾 主濕條 錢氏吐瀉乳不化傷食也宜下之

馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食飲錢氏見兒目中黑睛少而白睛多面色眊白曰此子必多病面色眊白者神怯也黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不奈寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱恣酒慾若不保養不過壯年也面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也又虛怯不可

下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但宜以消積丸磨化之為微有食也如傷甚則可下不下則成癖也若實食在內亦可下也下畢補脾必愈隨其虛實無不效者

丹小兒吐瀉黃疸

三稜 蓬朮 陳皮 青皮

神麩 麥芽 黃連 甘草

白朮 茯苓

右為細末生薑燈心湯調服傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加滑石發熱加薄荷

吐

虛 **丹**萬安膏調脾順氣定驚脾胃不足吐乳黃疸治小兒一切等疾

木香錢

沉香錢

檀香錢

香附兩

檳榔兩

白木兩

肉蔻兩

薄芎兩

人參兩

甘草兩

辰砂錢

琥珀

真珠

青黛

犀角錢

黃芪兩

麝香分

史君子兩

天竺黃兩

右為末煉蜜九臨臥服薄芎汁或蜜水米飲化下

世萬安膏治小兒脾胃虛弱腹生疳虫癥瘕食積泄瀉常服消疳去積助胃氣和中踈氣滯

人參兩

木香

沉香

藿香兩

厚朴薑製

甘草兩

陳皮

青皮

乾薑

肉桂各一兩

史君子炮十箇

澤瀉冬不用

用半

右為末煉蜜九如芡實大食前米飲化下如熱薄芎湯

下一方無木香沉香藿香青皮四君子有白木蒼木茯苓猪苓

錢吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷吐稠涎及血皆肺熱久則虛吐痰涎冷者溫之

田朱沉丹治小兒嘔吐不止

硃砂二錢

沉香錢

藿香三錢

滑石兩

丁香粒

右為細末每服半錢用新汲水一盞芫麻油滴成花子抄藥在上須臾墜瀘去水却用別水空心送下

定吐紫金核治小兒一切嘔吐不止

半夏湯洗七次薑製

人參

白朮

木香

丁香

藿香各二錢半

右為細末稀麩糊為丸如李核大後用沉香一錢為末

硃砂一錢水飛二味同研勻為衣陰乾每服一九用小
棗一枚去核納藥在內濕帛裏燒熟嚼與小兒服後以
米飲壓之

錢香銀丸治吐

丁香

乾葛

各一錢

半夏

湯浸切焙

水銀

各半兩

右上一味同為細末將水銀與藥研勻生薑汁丸如麻
子大每服一二丸至五七丸煎金銀花湯下無時

本白朮散治小兒吐嘔脈遲細有寒

白朮

人參

半夏

各二錢

茯苓

乾薑

甘草

各一錢

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去渣

溫服日二三

一方無半夏麴有木香藿香

湯小兒寒吐者由乳母當風取涼解脫致令風冷入乳變

敗兒若飲之故嘔吐也乳母當食後捏去舊宿敗乳急服
理中湯次用釀乳法其候是寒清痰夾乳吐出是也凡有
此候服藥不效胃氣將絕藥不能下當服靈砂丸如大便
通宜來復丹二藥常用驗

丹吐乳尋田中蚯蚓屎研如泥食前米飲下五分不過三

四次妙

聖惠方

錢藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉過度者宜

服

麥門冬

去心焙

半夏

麴炒

甘草

各半兩

藿香

一兩用葉

石膏

兩

右為末每服五分至一錢水一盞半煎七分食前溫服

本治小兒嘔吐脈數有熱麥門冬散

麥門冬

半夏

人參

茯苓

各二錢

甘草錢一

右為末每服二錢水一盞薑二片煎至五分去渣溫服日二三服

錢氏玉露散方見吐瀉

湯治小兒伏暑嘔吐清膈飲子

香薷

淡竹葉各一兩

白茯苓

人參

半夏

檀香

甘草各半兩

白粳米合

右咬咀薑煎溫服大小加減

小兒秋夏伏暑多有熱吐其吐黃涎頭額溫五心熱小便或赤而少乃熱吐也或乾嘔而無物宜香薷飲方見中暑

推積吐

木治小兒疳積黃瘦吐食

川烏錢一

定粉錢三

艾灰錢二

龍骨錢二

右為末滴水丸如龍眼核大捏作餅子每服一餅米飲

風痰吐

磨下

鐵粉丸治涎盛潮搐吐逆

水銀砂子錢二

硃砂一分

鐵粉

天南星各一分炮

去皮臍取末

輕粉二分

右同研水銀星散盡為度薑汁糊丸如粟米大煎生薑湯下十五丸至二三十丸無時

雜方

田氏朱沉煎 紫金核方見上寒條

經治小兒吐不定用五倍子二箇一生一熟甘草一握濕

昏裏炮過同搗為末每服米泔調下半錢七瘥

錢二氣散治虛實冷熱霍亂吐逆

硫黃

不夾石者細研半兩

水銀一分與硫黃同研

右同研如墨煤色不見星為度每服一字至五分乾薑水調下不拘時量兒大小加減此散浮泛難調先洒少

水以指緩緩研之稍稍增湯調之治大人小兒一切吐逆諸藥不效者服此頃刻如神

禁忌 湯凡小兒乳哺不宜飽滿飽滿而必溢故嘔吐 生下吐

針灸 吐乳 灸中庭一壯 吐水吐虫

胃冷 面眊白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之

丹 冬月吐涎多是胃虛寒而虫作吐用錢氏白朮散加丁香二粒

錢 吐水不止者屬心痛胃冷 吐水心痛者虫痛 口中吐沫水者後必虫痛

泄瀉

虛 萬安膏治吐瀉腹痛吐乳 方見吐門

海 吐瀉四君子加陳皮厚朴等分同煎 一法加陳皮薑棗

傷食瀉 臟腑滑泄四君子加訶子五分米飲調下

錢 黃承務子二歲病傷食而瀉衆醫與止之十餘日便青

白乳食不消身涼加哽氣昏睡咸謂困篤召錢錢先與益黃散補肺散各三服三日身温而不哽氣後以白餅子微下之又與益脾散三服利止何以然利本脾虛傷食初不與下之留連十日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子母故也今先補脾則肺病自退即身温不哽氣也然後下其所傷或曰何不先下後補曰便青為下臟冷若先下必大虛今先實脾而後下則不虛矣後更與補之乃安 益黃散方

見小兒大法

寒瀉 温中丸治胃寒瀉白腹痛腸鳴 方見吐瀉

寒瀉 温中丸治胃寒瀉白腹痛腸鳴 方見吐瀉

丹瀉青亦是寒宜用蘇合香丸平胃散各等分蜜湯調服
田便青者因驚風內臟脾氣不和治宜白朮湯

潔凡大瀉引飲者其病不以新久皆宜服白朮散痢病亦
同治

熱瀉
四小兒夏月泄瀉用益黃散 瀉黃赤黑皆熱用益元散
黃栢丸之類

疳瀉
錢史君子丸治疳瘦泄痢腹脹滿方見疳門
脈小兒大便青辨飧泄脈小手足寒難已脈小手足溫易
已

胃冷
乳食不化

錢食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之
潔乳食不消初病忽然氣出冷四肢亦冷面白無光澤精
神不定此乃胃氣不和可以大溫藥治之史君子丸益黃

散主之 若病泄瀉日久不瘥乳食不化是脾胃有風冷
先服益黃散二服後用宣風散導之胃宜再補

赤白痢
丹治小兒痢疾
黃連 黃芩 大黃 甘草
右煎服赤痢加紅花桃仁白痢加滑石末

湯治痢之法若欲取積只用官局進食丸其穩雖取積又
能治痢萬無一失積已下急以四君子湯加荳蔻訶子補
之次服厚腸香連丸得效

丹治小兒赤白痢多體弱不堪下大困重者麻子一合炒
令香熟為末每服一錢七蜜漿水和服效

痢瀉痢日久不瘥見瀉門獨
錢瀉黃紅赤黑者皆熱毒 瀉青白穀不化者胃冷

與熱雜
錢瀉黃紅赤黑者皆熱毒 瀉青白穀不化者胃冷

有積宜
取
熱痢初
宜下

白附香連丸治腸胃氣暴傷乳哺冷熱相雜渴痢赤白裏急後重腹痛扭撮晝夜頻併乳食減少

黃連

木香各錢

白附尖二錢

右末飯丸如粟米大每服十九至三十九米飲下食前日夜各四五服

荳蔻香連丸治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴切痛立效如神

黃連炒三錢

肉荳蔻

木香各一錢

右為細末粟米飯丸如米粒大每服十九至三十九日夜各四服食前米飲下

木香丸治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連

吳茱萸同炒去茱萸一兩

肉荳蔻煨二錢

木香一錢

右為細末麩糊丸如黍米大赤痢粟米飲下白痢厚朴

湯下空心

錢小香連丸治冷熱腹痛水穀利腸滑

木香

訶子肉各一錢黃連半兩

右為細末米飲和丸如葉荳大每服十九至三十九食前頻服之

海赤痢四君子加赤芍藥當歸入粟米少許同煎

湯治熱痢備急方用井花水調臈茶蜜磨生薑渴則飲之

錢黃栢丸治小兒熱痢下血

黃栢去皮半兩

赤芍藥四錢

右為末飯和丸如麻子大每服一二十丸食前米飲下量兒加減

本治小兒赤痢搗青藍汁二升分四服聖惠方治小兒中盛下血

姚治小兒尿血甘草五分以水六合煎取二合去查一歲

熱痢

兒一日服令盡

海 白痢四君子等分加乾薑減半入粟米少許同煎

廣 治小兒久痢淋瀝水穀不消枳實六分搗末以米飲調

二錢七二歲兒服一錢

丹 小兒噤口痢醃乳法

厚朴 枳殼各五分 白朮 芍藥各半

滑石一兩 木通 陳皮 甘草各五分

右分四貼細研桃仁七枚水二盞半煎取一盞與母服

服時去宿乳令盡為妙

黃連例錢氏 加黃柏為二聖丸治痢 加橘皮為橘連丸

加榆仁為榆連丸治痢 加黃芩大黃為三黃丸治積熱

加阿膠茯苓為阿膠丸治痢 加訶子木香為小香連丸

加荳蔻木香為荳蔻香連丸治痢 加木香白附子為

白附子香連丸治痢 加阿膠當歸乾薑為駐車丸治痢

田 小兒脇下滿瀉痢體重四肢不收痙瘳積聚腹痛不嗜

食痰瘧寒熱 脾膈二穴在背十一椎下兩旁相去各一寸五分

明 秋深冷痢不止 臍下二三寸間動脈中二壯 痢下赤

白脫肛 十二椎下節間三壯 又法翠尾骨上三寸骨陷

間三壯炷如小麥大 又法龜尾一壯脊端

腹脹附丁

虛寒 潔腹脹虛寶 凡久病吐瀉之後虛則其脈微細肺主目

胞及腮脾主四肢若色淡黃目胞腮虛腫手足冷先服塌

氣丸後服異功散和中丸四君子湯益黃散之類用諸温

藥養真氣異功散和中丸方見吐瀉四君子湯方見治虛實法

塌氣丸

胡椒一兩 蝎尾半兩

右為末糊丸如粟米大每服五七丸至一二十九陳米
飲下無時一方有木香一錢

本調中丸治小兒久傷脾胃腹脹

乾薑

橘紅

白朮

茯苓

木香

砂仁

官桂

良薑各等分

右細末糊丸如麻子大每服二三十丸食後熟水下

實熱

瀉實則脈洪實不因吐瀉久病後亦不因痢下腹脹而喘
急悶亂更有痰有熱及有宿食不化而腹脹者宜服白餅
子大黃丸解毒丸下之兼須詳認大小便如都不通先利
小便後利大便白餅子方見癖○解毒丸方見喉痺○大黃丸方見傷寒

雲小兒熱結於內腹脹壯熱大便赤黃躁悶煩亂者宜瀉
青丸

實者可下虛者

腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之用紫

不可下

霜丸白餅子

此言未下而喘者為實故可下若誤下而喘者為虛氣附肺不可下也紫霜丸白餅子二

方見不喘者虛也不可下若誤下之則脾虛氣上附肺而

行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛

甚即目胞腮腫四肢黃色治之用塌氣丸漸消之未愈漸

加丸數不可以丁香木香橘皮荳蔻大溫散藥治之何以

然脾虛氣未出故雖腹脹而不喘可以溫散藥治之使上

下分消其氣則愈矣若氣虛已出附肺而行即脾胃內弱

每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛實脾虛則不受

寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱

多生疽病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣上行於四

肢而目腫若水狀腎氣漫浮於肺即大喘也此當用塌氣

丸病愈後面未紅者虛衰未復故也此下後喘故宜塌氣丸若未下而喘宜下

之○治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇未出林以兵攻之

脹未下而喘為實已下而喘為虛

虛脹用
塌氣丸
不愈宜
下

痰積脹

必可獲寇若出林不可急攻攻則必有失當以意漸收之
即順也寇未出林謂虛氣未出而不喘不目胞腫脹故可
用丁香木香大溫散藥上下分清其氣而愈也寇
已出林謂虛氣已出為喘為
目胞腫須用塌氣丸漸消之

治小兒虛腹脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便
黃時微喘脈伏而實時飲水能食者可下之蓋脾初虛而
後有積所治宜先補脾然後下之後又補脾即愈也不可
補肺恐生虛喘

丹阿魏丸治小兒食積腹如蜘蛛狀肚痛小便白濁

阿魏醋浸一宿研
如泥半兩

黃連炒半兩

花碱研如粉
三錢

山查肉一兩

連翹半兩

半夏皂角水浸
一宿一兩

右為末炒神麩糊丸如葡萄子大每服二十九空心米飲
下喫果子多者加胡黃連米食多者加神麩山查肉食
多者加阿魏

又阿魏丸

阿魏一兩

黃連酒煮
六兩

右為末醋浸阿魏一宿研如泥湯浸蒸餅丸如元氣不
足加人參

小阿魏丸

山查肉三兩

石碱三錢

半夏一兩

右為末阿魏半兩醋浸糊丸白湯下

小兒疳病或腹大

胡黃連二錢去
果積

阿魏一兩半
去肉積神麩二錢去
食積

黃連二錢去
熱積

麝香四粒
通竅

右為末每服十二粒白木湯下

無肥兒丸治小兒病多因缺乳喫食太早所致或因久患
臟腑胃虛虫動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精神

黃連

神麩各一兩

麥芽炒半兩

木香錢一

檳榔三箇不火

史君子

肉苳蔻麩裹煨各半兩

右為末糊為丸如桐子大每服三二十九量兒加減熟水吞下

六神丸治如前證

丁香

木香

肉苳蔻用麩裹煨各五錢

訶子煨去核半兩

史君子

蘆薈研各一兩

右為末以枣肉和丸如麻子大每服五丸至七丸温米飲下食前

疳脹異名治法

丁奚者腹大頸小黃瘦是也無辜哺露三候大體相似輕重立名宜服十全丹

十全丹治丁奚哺露神效方

檳榔

枳殼炒

青皮

陳皮

三稜炒

蓬朮炒

砂仁各半兩

丁香

木香各一分

香附兩一

右為末神麩糊丸如黍米大空心食前米飲下百丸一方去香附砂仁丁香三稜枳殼加五靈脂白蔻史君子蘆薈蝦蟆川芎

世治小兒腹如蜘蛛四肢瘦者用黑骨雞子破頂入蜘蛛

一枚於內以濕紙糊竅用文武火煨熟去蜘蛛食其雞子累效必數枚方愈

實者分氣消積

疳中滿分消丸

黃連

枳實

厚朴各五錢

乾薑

薑黃

猪苓

砂仁

澤瀉

茯苓各三分

陳皮

白朮各一分

半夏四分

黃芩一兩二錢

甘草一分

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九溫酒送下
消痞丸快利之劑

黃連半斤

枳實

黃芩

甘草

人參各三錢

厚朴七錢

乾薑四錢

橘皮一錢

薑黃五分

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九隨乳下

丹腹脹

蘿蔔子

蘇梗

乾葛

陳皮各等分

甘草減半

如食減加白朮煎服

虛者升陽滋血

垣升陽滋血湯二月間一小兒未滿百日病腹脹不大便

二日便瘦弱遍身黃色宜升陽氣滋血和血補血利大便

蝎稍二分

神麩三分

厚朴

當歸各錢

桃仁十箇

升麻三分

右作一服水一盞煎至半盞去查食前服

麻黃升麻湯治小兒面色痿黃腹脹食不下正月四月小兒服之神效

麻黃二分

桂枝一分

杏仁

吳茱萸

草薹薺

厚朴

麩末

羌活各一分

柴胡根五分

白茯苓一分

白朮

青皮各五分

升麻根

蒼朮

澤瀉

猪苓

陳皮各一分

黃連五分

黃栢一分

右咬咀作一服水一大盞煎七分去查食前熱服

痘後脹解毒

寄子年五歲痘後肚急

白朮錢一

陳皮

木通各五分

犀角屑

川芎

白芷

蘇梗

甘草各三分

針灸

右咬咀水煎服

田治腹脹引背食飲多漸漸羸瘦黃可灸脾膈二穴七壯
在十一顛下兩傍相去各一寸五分黃疸灸三壯

小兒腹滿不能食飲懸鍾主之

丁奚即脹治見張門丹溪條

水腫

滯氣

白文舉兒五歲身面皆腫尿多

山梔炒

桑皮炒各一錢

黃芩二錢半

白朮

蘇梗各一錢半

右咬咀作三貼水一盞半煎至半盞食前溫服

湯退腫散氣方

赤小荳

陳皮

蘿蔔子

甘草各半兩

木香炮七分

右為麤末薑棗煎服大小加減

又方

白朮炒

木香炮

甘草炙

茴香炒

青皮各半兩巴豆三十粒去膜同青皮炒去巴豆不用

右為末米飲調下

又方用錢氏益黃散加木香去丁香加蘿蔔子去訶子為末大小加減米飲調下

水腫加喘難治

錢腫病腎熱傳於膀胱熱盛逆於脾胃脾虛而不能制腎

水反尅脾土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也若加喘者重也何以然腎水勝而尅退脾土反勝心火心

又勝肺肺為心尅故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘實曰此有二一者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍

侵於肺故令大喘此皆難治

針灸 明水氣浮腫 分水三壯

疳

大法

潔疳者小兒病癖或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小兒易為虛實致令胃虛而亡津液內發虛熱外消肌肉一臟虛則諸臟皆弱其病目胞腫腹脹痢色無常漸加瘦瘠久不痊可是腸胃有風積法當宣風散導之後各依本臟補其母

錢諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香丸熱則胡黃連丸主之疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也宜史君子丸

疳在內 脹滿

史君子丸治臟腑滑及疳瘦下痢腹脇脹滿不思乳食常服安虫補胃消疳肥肌

厚朴 去麤皮薑汁 塗灸半兩

史君子 去殼一兩 麩裹煨

陳皮 去白 一分

甘草 炙剉 半兩

訶子 半兩

半生 半煨 去核

青黛 半兩

是兼驚及帶熱湯者宜此 方如只藏府不調不用青黛

右為細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一九米飲化下 兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下元方無青

黛

厚腸丸治小兒失乳以食飼之不能尅化或生腹脹四肢瘦弱或利色無常

陳皮 三分

麥蘖 五分

半夏 三分

枳殼 五分

蒼朮 三分

青皮 二分

人參 三分

厚朴 二分

麩末 五分

右為細末麩糊丸如麻子大每服二十九溫湯送下忌飽食

本芎朴丸治小兒疳瘦瀉白水腹脹

芫薺 厚朴各一兩 白朮半兩
右為細末煉蜜丸如小彈子大每服一九米飲化下三歲已下半丸

聖治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一兩杵為散每服以猪肝一兩散子一錢七塩少許水煮熟空心頓服

世小兒腹大泄瀉水穀不化喫食不知飢飽累效

神麩炒 麥芽炒 三稜 青皮

香附 山查 厚朴 甘草

藿香 枳實 地黃 砂仁

黃連 芩子各等分

右為末白湯調下量兒加減

丹一富家子年十四歲面黃善喫易飢非肉不飽泄瀉一

為而多食為虫

月來求治脈之兩手皆大怪不甚瘦倦以為濕熱當脾胃而食少今反形健而多食且不渴予意其疾必疳虫作痢也取大便視之果虺虫所為適往他處有一小兒醫在側教其用治虫藥治之禁其勿用去積藥約回途當為一看診而止痢也偶勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口乾予曰此去年治虫而不治疳故也遂以去疳熱之藥濃煎白朮湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子甚瘦予教以白朮為君芍藥為臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈為丸白朮湯服之半月而止禁其勿食肉與甜物三年當自愈

錢大蘆薈丸治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連 白燕蕒用仁 蘆薈

木香 青皮 雷丸破開白者佳赤者勿用

鶴虱微炒各五錢麝香另研一錢

右為細末粟米飲和丸如菘葶大米飲下一二十九不拘時

拘時

胡黃連麝香丸治疳氣羸瘦出白虫

胡黃連 白蕪荑仁各一兩半 黃連

木香各半兩 辰砂另研一分 麝香另研一錢

右為細末麪糊丸如菘葶大米飲下五七丸至十九三五歲已上者十五丸至二十九服無時

榆仁丸治疳熱瘦悴有虫久服充肥

榆仁去皮 黃連去鬚各一兩

右為細末用猪膽七箇破開取汁與二藥同和入碗內

甑上蒸九分每日一次候日數足研麝香五分蒸餅湯浸一宿同和成劑丸如菘葶大每服五七丸至一二十

丸米飲下無時

右四方治瀉而多食為虫疳也

木香丸治時時下利唇口青白 如聖丸治冷熱疳瀉

瀉而少食為冷疳 二方並見本條

沒石子丸治洩瀉白濁及疳利滑腸門痛

木香 黃連各一分 沒石子一枚 葶苈仁二箇

訶子肉三箇 右為細末飯和丸如麻子大米飲下十五丸量兒加減食前

湯 休息痢及疳瀉痢遷延日月百藥俱試飲食不妨便痢

不止用雞子一枚打破鎔黃蠟一塊如指大以雞子和炒

空心喫盡百醫百效無不獲安

小兒疳痢垂死者取益母草炙食之取足瘥止甚佳

右治瀉而少食為冷疳也

獨脹不瀉治法見脹門

疳在外鼻爛

疳在外鼻下臭爛自揉鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生瘡

世走馬牙疳神效乾薑白礬炙子燒焦存性為末傅患處

世鼻疳治法先用甘草白礬湯洗淨後糝蘆薈黃連黃栢

末日三傅 一方用米泔洗黃連末傅日三四次亦佳

世紅鉛散治走馬疳綠礬不以多少色鮮明者入乾鍋用

炭火燒鍋赤傾出以好酒洒拌勻再入鍋如此數遍色紅

研作細末入麝香少許先以溫漿水洗嗽淨用指蘸藥有

疳處貼之

羅乳香丸治走馬牙疳如神

乳香

輕粉

砒研各五分

麝香少許

右先將乳香研細入輕粉麝香共再研勻用薄紙一菲

葉潤去藥內按過揉紙少許丸如黃米大臨臥將藥填

在患處至明則愈忌食醬醋塩等物

錢蘭香散治鼻瘡爛

蘭香葉

燒灰

銅青

五分

輕粉

二分

右末令勻看瘡大小乾貼之

龍骨散治口疳走馬疳

砒霜

一字

粉霜

半錢

龍骨

一錢

定粉

半錢

龍腦

半字

蟾酥

半錢

右先研砒粉極細次入龍骨等研次入定粉等同研每

用少許傅之

經治小兒走馬疳蝕透損骨及小小攻蝕必效方天南星

一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麩裹燒候雄黃作

汁以蓋子合定出火毒去麩研為末入麝香少許拂瘡驗

錢白粉散治諸瘡
烏賊魚骨末七
白芨末七
輕粉七

右末先用清漿水洗拭過貼之

山小兒牙疳用茴香桔梗燒灰存性傳之如乾油調傳

湯五福化毒丹治蠱鼻清膈涼血

玄參
桔梗去蘆各一兩
赤茯苓
人參

牙硝
青黛
甘草各一分
麝香五分

一方有龍腦五分

右除麝香牙硝另研一處為末次和青黛等煉蜜丸如
芡實大金銀箔為衣薄苛湯化下瘡疹餘毒磨生犀角
水下上焦熱壅口齒鮮血宣露臭氣用生地黄汁化下
食後

寒熱

錢大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱疳久病者
為瘦冷疳是也冷者木香丸熱者黃連丸主之冷熱之疳

尤宜服如聖丸

胡黃連丸

胡黃連
黃連各半兩
硃砂一分

右上二物為細末研入硃砂末都填入猪膽內用淡漿
於砂銚子內懸胎煮一飯時久取出研入蘆薈麝香各
一分飯丸如麻子大每服五七丸至一二十九丸米飲下
食後 一方加蝦蟇半兩不燒

木香丸

木香
青黛另研
檳榔
肉蔻去皮各一分

麝香另研一分
續隨子一兩
蝦蟆三箇先用繩繫

右末蜜丸如菉荳大每服三五丸至一二十九丸薄苛湯

下食前

如聖丸治冷熱疳瀉

胡黃連

川黃連

白蕪荑

去皮炒各三兩一本作一兩

史君子

去殼

麝香

另研五分

乾蝦蟆

五箇酒浸煮成膏

右前藥為末與膏丸如麻子大每服人參湯下二三歲五七九已上十九至十五九無時

湯

小兒冷疳多渴好臥冷地煩躁啼叫飲食不進漸成羸

瘦其候難明有若熱證但大便滑泄百藥不效是也因女子百藥俱試而無偶中者竟與錢氏木香丸不數服而愈

後

凡有此證無不獲驗

錢氏肝疳白膜遮睛

筋疳

湯氏肝疳眼白青兩眼睛痒

方見勞瘵節六味地黃丸

驚疳

麝香丸治小兒一切驚疳等病

草龍膽

胡黃連

各半兩

木香

蟬蛻

去頭足洗淨各

一錢

瓜蒂

龍腦

麝香

牛黃

各一錢並各自研

右猪膽為丸如桐子及菘荳大驚疳或秘或瀉清米飲

送下小兒五七粒至一二十粒眼疳猪肝湯下疳渴燂

猪湯下猪肉湯下亦得驚風發搐眼上竄薄苛湯下一

九更水研一丸滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼虫痛苦練根

湯或白蕪荑湯送下百日内小兒大小便不通水研封

臍中有虫候乾漆麝香各少許并入生油一兩點溫水

化下一大丸慢驚勿服

本睡驚丸治小兒一切驚疳食積風癩之證

史君子

五十塊

香墨

一大塊

金銀箔片

各七

膩粉

二錢

右先將史君子存性同墨研細次入金銀箔乳鉢內研
次入膩粉并麝香少許研令極細稀糊丸如桐子大陰
乾每服一九薄苛湯磨下一歲已下半丸一名青金丹
極效

田氏涼驚丸治小兒驚熱疳瘦乳癖方見驚搖

錢氏心疳面黃頰赤身壯熱當補心安神丸主之方見治虛實法

湯氏心疳口内生瘡

呂氏安神丸治心虛疳熱面黃頰赤壯熱驚啼神志恍惚

不寧方見治虛實法

湯驚甲散治疳勞骨蒸

驚甲九助者湯浸用童便塗灸

黃芪蜜炙

白芍藥各一兩

生熟地

地骨皮

當歸

人參去蘆各半兩

右咬咀每服二錢水半盞煎服

猪肚丸治骨蒸疳勞肌體黃瘦

木香兩半

黃連

生地

青皮

銀柴胡去蘆

驚甲

九助者湯浸用童便塗灸各一兩

右為末猪肚一枚入藥於內以線纏之於沙礮內懸胎
煮熟取出細研猪肚為丸如麻子大米飲送下大小加
減不拘時服

無龍膽丸治疳病發熱

龍膽

黃連

史君子肉

青皮各等分

右為末猪膽汁和丸如桐子大每服三十粒量見加減
臨臥熱水下

右四方治疳熱安神丸其寒補心驚甲散其溫補脾後
二方苦寒瀉脾瀉濕熱也

世烏犀丸治小兒疳熱腹内生虫肚大手足疲弱丁奚疳

羸此方治疳熱如神

黑牽牛兩

史君子半

青皮二兩

雷丸二錢

苦練皮半兩

皮用蘆二錢半

鶴虱五錢

右同入鍋內炒焦為末麪糊丸如黍米大三歲兒二十丸米飲下食前烏犀丸食後黃龍丸

二丁丸治乳癰食癰疳熱如神方見瘰癧條

湯疳熱當服進食丸磨積仍間服化虫丸後服鱉甲散退

熱次服肥兒丸進食丸方見癰鱉甲散方見前

治疳熱化虫丸

白蕪荑

黃連

神麩

麥芽各炒等分

右末糊丸如黍米大空心米飲下猪膽汁尤佳

肥兒丸方見前腹脹

右疳熱當以積熱門參用如熱有作止者與潮熱門參

用可也

脾疳

脾疳面黃腹大食泥土當補脾益黃散主之方見治虛實法

湯脾疳食不消胃疳多吐

大胡黃連丸治一切驚疳腹脹虫動好喫泥土生米不

思飲食多睡吼哇臟腑或瀉或秘肌膚黃瘦毛焦髮黃飲

水五心煩熱能殺虫進飲食兼治瘡癬常服不瀉痢唯泥如切

欲嘔聲

胡黃連

黃連

苦練子各一兩

白蕪荑去扇半兩

秋初三錢

乾蟾頭燒存性另研一分

麝香另研一錢

青黛另研一錢半

蘆薈另研一分

右先將前四味為細末猪膽汁和為劑每一丸如胡桃大入巴荳仁一枚置其中用油單紙一重裹之同米一升許蒸米熟為度入後四味為丸少入麪糊丸如麻子

大與十九或十五九清米飲下食後臨臥日三服

大蕪黃湯又名梔子茯苓湯治黃疸土色為熱當小便不利今反利者知黃色髮黃脫落知膀胱腎俱受土邪乃濕熱之症鼻下

斷作瘡者土逆行營氣伏火也能乳者胃中有熱故也喜食土者胃氣不足面色

黑者為寒為痺大便青屬寒褐色血黑色熱畜血中間黃色腸胃有熱治法

當滋營潤燥內除寒熱外致津液

山梔三分 黃栢二分 甘草各二分 大蕪黃五分

黃連一分 麻黃一分 羌活一分 柴胡各三分

防風一分 白朮五分 茯苓三分 當歸四分

右件剉如麻荳大作一服水一盞半煎至一盞去查稍

熱服食前

右三方治疳黃食土前一方便多者宜服後二方便多

者宜之

疳黃食積

白朮 黃連 苦參 山查各等分

右用糊丸如麻子大食後白朮湯下十五九

山小兒疳黃雞彈劍一小竅入巴荳淨一粒紙糊孔煨熟

去巴荳食之隔一日再喫一二箇

丹小兒喫泥石膏黃芩陳皮茯苓甘草白朮散煎服

經治小兒喫泥及臍肚臍粉一分用沙糖搜丸如麻子大

空心米飲下一丸瀉出土瘡臍如掌切脹也

錢初病疳津液少者當生胃之津液白朮散主之唯多則

妙

龍粉丸治疳渴

草龍膽 定粉微炒 烏梅肉焙 黃連各二分

右為細末煉蜜丸如麻子大米飲下一二十九無時

湯 三稜散治小兒尿白濁久則成疳宜踈脾土消食化滯

三稜 炒 蓬朮 炒 益智仁 甘草 各一兩

神麥 炒 麥芽 炒 橘紅 各半兩

右為末白湯調下

世 黃龍丸治停食化積磨積

三稜 蓬朮 各三兩 青皮 陳皮 各一兩半

山查 乾薑 各七錢半 檳榔 兩

右晒乾為末糊丸黍米大三歲兒每二十九食後薑湯下食前烏犀丸相間服此治小兒疳積等證無不效者

烏犀丸方見疳熱條

錢 膽礬丸治疳消癖進食止瀉和胃追虫

綠礬 真者二兩末一錢 膽礬 真者為籠末一錢 大棗 四十箇去核

好醋 一升

已上四物同熬令寒爛候和後藥

史君子 去殼各二兩 枳實 炒三兩 黃連 訶子 去核各為末

各一兩 巴荳 二十七箇去皮破之

已上五味同炒黑約三分乾入後藥

夜明砂 蝦蟆 燒存性各一兩 苦練根皮 五錢

已上三味再入炒候乾同前四物杵羅為末同前膏和入臼中杵干下如未成旋入熟熏肉亦不可多恐服之難化太乾即入溫水亦可丸如菘荳大每服二三十丸米飲溫水下不拘時

丹 肥兒丸治小兒疳積

蘆薈 另研 胡黃連 各二錢 神麩 四錢 黃連

白朮 山查 炒各半兩 蕪荑 炒二錢半

右為末將蘆薈末拌勻猪膽汁丸如粟米大每服六十

丸食前白湯下

本蘆薈丸治小兒疳積秘方

蘆薈

荊芥

黑丑

青皮各等分

右治炮為末麩糊丸如粟米大一歲兒已下一丸或二丸亦不妨量大小加減

肺疳

錢肺疳氣喘口鼻生瘡當補脾肺益黃散主之方見治虛實法

腎疳

腎疳極瘦身有瘡疥當補腎地黃丸主之方見勞瘵即六味地黃丸

湯腎疳齒爪黑

右腎疳羸瘦瘡疥治法當與虛羸門相參用之

骨疳

錢骨疳喜臥冷地

湯木香丸治渴好臥冷地

雜方

世五疳保童丸治小兒乳食不擇冷熱好食肥膩恣食甘鹹臟腑不和生疳

青黛

苦練根皮

夜明砂

五倍子

蘆薈

黃連

龍膽草

白蕪荑

乾蟾各一分

麝香少

蟬腿去嘴爪一分

猪膽大者五箇拌諸藥焙乾

右件粟米煮糊為丸如麻子大一歲兒三九不拘時米飲下日三服忌猪肉

腦疳

聖治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連滴三五日效

湯小兒腦疳者是胎熱所為但頭皮光急頭髮作穗或有頭瘡腫至顙顙腫則多損眼此疾因兒在胎中母臨月房事不已而成項軟倒肥而不瘦天柱骨倒也

附子生去皮臍

南星

右末生薑自然汁調攤貼患處次服防風丸并瀉青丸

疳項軟

世小兒久患疳疾體虛久不進飲食患久諸候退只是天柱骨無力醫者不識謂之五軟用白殭蚕真者去絲炒為末每服五分或一錢薄苛酒調下日三更須貼藥貼藥生筋散

木鱉子三箇 草麻子三十粒

右各取肉同研用一錢津調先烘上令熱貼之

右疳五軟蓋痿屬也不若用地黃丸及黃栢龜板之類為愈

無辜疳

世小兒無辜疳者其候面黃髮直時時壯熱飲食不生肌膚積經日月遂致死者謂之無辜疳也言天有鳥名曰無辜晝伏夜游洗浣衣襦露之經宿或遇此鳥飛從上過將衣襦與小兒穿臥便令兒有此疾如禽獸生下有噤虫若不速去當損其命又腦後有核初生軟而不覺痛其中有

虫如米粉得熱氣漸長大則筋結定虫隨氣血流散所以停留子母相生侵蝕臟腑肌肉作瘡或大便泄膿血致使小兒漸漸黃瘦頭大髮豎手足細弱生十二件無辜疾症
天吊 胡孫噤 鴛口 木舌 懸癩 重齶 着噤 臍風 撮口 重舌 乳淵 龜胸 鱉甲散

鱉甲醋炙三分 檳榔三箇 沉香乙分 漏蘆
甘草炙 牛蒡子炒 史君子 赤芍藥
訶子炮去核各半兩

右為麤末每服一錢水半盞煎六分去渣溫服

針灸 **明**多疳者 願會壯 瘡蝕斷斷臭穢衝人 勞官壯
診 疳皆脾胃病亡津液之所作也因大病或吐瀉後醫又以藥吐下致脾胃虛弱亡失津液且小兒病疳皆愚醫之

所壞病假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當
補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝為
心母法宜先補肝母肝實而後瀉心心得母氣則內平而
潮熱自愈醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝輩諸冷藥
利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如癖病
發作寒熱飲水脇下有形硬痛法當用藥漸消磨之醫反
以巴豆礪砂輩駛藥下之小兒易虛易實下之既過胃中
津液耗損漸成疳瘦又有病傷寒五六日間有下證以冷
藥下之太過致脾胃虛而津液少即便引飲不止而生熱
也熱氣內耗肌肉外消他邪相干証變諸端亦成疳病又
有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩燥亦能成疳
也

小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或

喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞疳以其有癖癥則
令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多即蕩滌脾胃
亡失津液不能傳化水穀其脈沉細益不能飲食致脾胃
虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣

肥疳即脾疳也身瘦虛黃乾而有瘡疥其候不一種種異
端今畧舉言之曰濇或生白膜唇赤身乾黃或黑喜臥冷
地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身
耳鼻皆有瘡髮鬚作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也

不治疳

心疳者苦要驚啼常只喫水少食辛味耳邊有青脈舌

上有焦點者不治○肝疳者目帶青左脇下硬多吐沫眼

頭黑者不治 脾疳者肚大青筋唇口無血色人中平下

痢不止者不治 肺疳者咳逆氣急瀉白水身上黑斑者

不治 腎疳者要喫鹹醋喫水不住小便如粉汁齒黑有

瘡骨出耳乾腦焦不治

虛羸

寒熱

錢虛羸脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後

脾胃尚弱不能傳化穀氣有冷者時時下痢唇口青白有

熱者身壯熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸主之

夏月不可服如有證則少服之熱者胡黃連丸冬月不可

服如有證則少服之虛羸與瘕同治也○木香丸胡黃連丸方並見瘕條

湯小兒疳積其狀漸黃瘦拍背如鼓鳴脊骨如鋸乃積而

生熱成疳也宜服蘆薈丸露星膏

蘆薈丸

龍膽草

黃連

燕蕒

去皮先炒黃色次入前二味一處炒赤色

各一兩

右為末另入蘆薈一分和勻爛飯丸如黍米大三歲兒

服三十九空心米飲送下

露星膏

黃芪

蜜水灸

胡黃連

地骨皮

柴胡各等分

右為末煉蜜丸如芡實大隔宿酒浸露一宿次日澄去

酒薄苛湯浸服之

錢橘連丸治疳瘦久服消食和氣長肌肉

橘皮

黃連

米泔浸一宿一兩半

右為細末另研入麝香五分用猪膽七箇分藥入膽內

漿水煮候臨熟以針微刺破以熟為度煮粟米粥和丸

如菉豆大每服十九至三十九米飲下量兒加減無

時海藏云黃連若燥可

二聖丸治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦宜常服

黃連

黃栢

去粗皮各一兩

右為細末入猪膽內重湯煮熟丸如菘荳大每服二三十丸米飲下量兒加減頓服無妨

虛 小兒疳病肌羸血氣不足同大人勞瘵之疾治之

右以潔古此言論之不拘冷熱虛羸皆用四君子地黃丸與前藥相兼服為得也

雜方

聖 又方治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鰲頭一枚燒灰杵末新汲水下五分匕立可

針灸

明 羸瘦不生肌膚 胃脘壯 灸一

田 小兒疳瘦於胸下骨尖上灸三壯次於脊下端尾翠骨尖上灸三壯

小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸方不瘥者取尾翠骨上三寸骨陷中灸三壯

小兒身羸瘦黃豚腹腫四肢懈惰肩背不舉章門二穴各

灸七壯

診 世母氣不足則羸瘦肉極

鶴節即虛羸之異名也

虛 **湯** 小兒鶴節由稟賦不足血氣不榮肌肉瘦瘠則骨節皆露如鶴之足皆腎虛不生骨髓之故治法宜錢氏地黃丸加鹿茸牛膝

宿食

脾 **湯** 消食丸治宿食不消又名消乳丸

砂仁 陳皮炒 三稜炒 神麴炒

麥芽炒各半兩 香附炒兩

右末麴糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減七聖丸

三稜 蓬朮 川練 青皮

陳皮

芫花

杏仁

右件等分先用醋浸芫花一宿炒漸乾次入蓬稜同炒赤色又入陳練等再同炒一處令微焦取出為末前藥如各半兩杏仁亦用半兩湯浸去皮尖雙仁不用細研入巴芫二十粒去油和勻醋糊丸如黍米大一歲兒常服二九臨臥溫熱湯送下使日間所食之物一夜而化永無疳疾能使黃瘦子頓作化生兒今之小兒可去巴芫只入杏仁名七聖丸是也

痞

虛

潔枳朮丸

方見內傷飲食

○飲食不進四君子加薑棗煎○枳實

理中丸

方見傷寒

實

湯痞者塞也其病腹內氣結脹滿壯熱是也當疎利大便

破結散氣常服進食丸

聖甘遂散治小兒痞結雖服湯藥暫利而滯實不去心下

堅脹按之輒啼內有伏熱破結

甘遂

煨赤

青皮

黃芩

大黃

炒各半兩

右咬咀煎去渣服量大小加減以利則止用之無不效

湯戶部張侍郎小娘子患此蘊積結聚已經年矣其候腹

滿壯熱大小便閉不食諸醫皆作虛熱潮熱或作胃寒不

食治然既不食大小便自然少又欲作疳熱治百藥俱試

而無一中勢已窘迫招予視之問曰合服何藥答曰當服

甘遂大黃張驚駭曰前諸醫者皆用補劑此女不進食久

矣不宜利動腸胃予答曰信我者生逆我者死張曰更有

無甘遂而次於此藥方者可否予令即服大承氣湯二服

而愈次日診之尚有餘滯積實其症必過數日而腹閉須

服前藥始可除根數日後果再閉腹滿痞結再投此藥一

服而痊

小兒急欲乳不能食由客風熱入兒臍流入心脾經即舌厚唇燥口不能吮乳當凉心脾

哺露

虛

湯 哺露者因乳哺不消脾胃衰弱漸不能食血氣減損肌肉不榮柴骨羸露吸吸苦熱謂之哺露也宜麝香進食丸

方見本條

癖

診

湯 小兒積症面黃腫 肚脹 面合臥地 小便

如油 多嘔 眼睛黃 腹內虛鳴 多睡

眼白黃 赤白痢下 髮黃 眼赤 多瀉

實

凡有積滯須辨虛實况孩兒虛瘦長短黑白南北古今不同不可一槩論也予今之法實者可服進食丸虛而微白

及疳瘦者宜服肥兒丸 肥兒丸方見疳門心疳條為丸如黍米大兒一歲十九飯飲下

錢 小兒腹中有癖不食但飲乳是也當漸用白餅子送下

白餅子

滑石 輕粉 半夏 湯洗 焙乾 南星 各一錢 為末

巴菝 二十四箇去皮膜水一升煮水盡為度

右研勻巴菝後入衆藥以糯米飯為丸如小菜菝大捏

作餅子兒三歲已上三五餅四歲已下一二餅蔥白湯

下臨臥服

局 進食丸治乳食不化心胸脹滿疳積肚疼

木香 炮 枳殼 去白 炒 當歸 代赭石

硃砂 另研 三錢 巴菝 去油膜 一錢 麝香 另研 五分

右為細末麪糊為丸如黍米大一歲二丸量兒大小加

減米飲送下

活雙聖丸治小兒身熱頭痛飲食不消心腹脹疼痛大小便不利或下重數起未瘥可再服

巴菝六十箇去皮心膜研去油 甘遂 麥門冬去心三兩

錢五 甘草炙一兩 硃砂另研一錢 牡礪二兩

雞核取仁四兩半另研

右麥門冬甘草甘遂牡礪四味為細末入巴豆硃砂雞仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸兒半歲服如蘇子大兒一歲服如麻子大分為二丸兒二歲服如麻子大一丸兒三四歲服如麻子大二丸五六歲服如麻子大三丸兒七八歲服小荳大二丸兒十歲微大如小荳大三丸以雞鳴時分服之如至日出不下者熱粥飲數合投之即下丸藥皆雙出也若利甚濃煎冷粥數合與之即止

食瘕

錢珍珠丸治小兒一切積聚驚涎宿食乳癖大小便澀滯療腹脹行滯氣

巴豆仁十四箇水浸一宿細研 木香 白丁香

丁香各五分 滑石二錢 輕粉五分留少許為衣

右為末研勻濕紙裹燒粟米飯為丸如麻子大一歲兒一九八九歲至十五歲服八九丸菓子煎湯放冷下如挾風熱難動者先服涼藥一貼乳癖者臨臥服數丸

本消積丸治小兒食積氣濕氣面黃白多腫大便黃赤酸臭

砂仁十二箇 丁香九粒 烏梅肉三箇 巴豆去油三粒

右細末糊丸如粟米大三歲已上五六丸已下二三丸用溫水下無時服大凡小兒身溫壯熱非變蒸之候大便白而酸臭為胃有畜冷宜此藥消下後服溫胃藥若

身温壯熱大便赤而酸臭為胃有畜熱宜此藥下後服
涼胃藥無不愈一方有史
君子七枚

乳癖丹丁香化癖散治乳癖

白丁香 蜜陀僧 硫黃已上各二錢 礪砂五分

輕粉少許

右研細末每一歲兒服五分男病女乳調女病男乳調
出下黑糞為度後用通膈丸泄之

世二丁丸治小兒乳癖

白丁香兩半 丁香 蜜陀僧各一兩 韶粉一錢

硫黃三錢

右細末糊丸如小荳大三歲兒十九日哺時米飲下飲
乳者乳汁下次日當取下惡物熱即隨退加黃鶯屎一
錢尤妙

紫霜

錢紫霜丸

代赭石細研水飛二錢 巴豆二十一粒去油心皮膜

杏仁二十一箇去皮尖

右為細末飯丸如粟米大每服三五丸至十九丸皂莢子
湯下無時海藏云五色加減並見治法

湯驚癖須用礪石藥方可治之

右七方治癖皆峻劑若稍涉虛者必用四君子及益黃
散之類兼服之

氣癖

針灸治小兒氣癖取三稜針作羹粥以米麪為之與乳母

食每日取一匙大與兒喫亦得作粥與羹熟食之治小兒
十歲已下及新生百日無問癩熱無辜疔癖等皆理之妙
不可言者

針灸

針灸小兒癖氣久不瘥者灸中脘一穴章門二穴各七壯章

門在大橫外直臍季脇肋端側臥曲上足伸下足舉臂取之 中腕在上腕下一寸臍上四寸居心蔽骨與臍之中從髑髀下取病人四指定穴併灸臍後脊骨中二七壯無不驗

脾弱多困

虛

脾胃不和四君子加白朮一倍薑薑煎 脾困四君子加木香砂仁人參各半錢煎 脾胃虛弱生氣多困四君子加炒半夏麩沒石子等分為末入冬瓜子少許同煎

人參

冬瓜仁

各半兩

南星

切片用漿水薑汁煮存性一兩

右為細末每一錢水半盞煎二三分溫服

渴

實熱

渴有三種 一者乘熱積於心脾煩燥大渴引飲宜白

湯謂不因吐瀉大病忽然而作

虛熱

二者因久病或取轉過度致脾虛引飲宜白朮散

方見消痺

海藏云治發渴四君子加乾葛枇杷葉

先以水湯煮過炙乾用

各等

分入木瓜少許同煎服亦治虛渴法也

濕熱

三者因患濕熱病熱結膀胱小便不利大渴引飲有表裏症者宜五苓散主之

大小便不通

雜方

無小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水

先嗽口了吸啞兒前後心并臍下手足心共七處每一處

凡三五次嗽口吸啞取赤紅為度須臾自通不爾無生意

有此證者遇此方可得再生矣

生下不大便治法先以硬蔥針縫入肛門如大便不下

後用牛黃散送硃砂丸一時自見

握宣丸治小兒便難燥結或服瀉藥腹脹悶亂命在須臾
可用此丸不移時大小便自利

巴荳一錢 硫黃 良薑 附子

檳榔 甘遂各等分

右為細末粟米飯和丸如菉豆大用椒湯洗小兒男左
女右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用即
止

錢郁李仁凡治檉櫟小兒大小便不通并驚熱痰實欲得
澹動者

大黃一兩酒浸半日炒乾為細末 郁李仁去皮研

滑石細研

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲
兒服三二九量大小與之或乳汁或薄荷湯下食前

黃疸

陽黃

潔陽黃則大小便赤澀身熱是脾土與心火相搏為陽病
法當先利小便後下大便

凡治黃病腹脹當用茵陳蒿湯調下五苓散若欲利小便
去大黃欲利大便則加大黃之類有陽證可服謂面赤飲
水者是也茵陳湯五苓散方俱見傷寒

湯身疼臄背強大小便澀皮膚面目齒爪皆黃小便如屋
塵色利者易治澁者難治宜服五苓散加茵陳煎湯調又
宜服導赤散加茵陳煎或身熱宜服小柴胡湯甚者服承
氣湯

田小兒身體蒸熱胸膈煩滿皮膚如青橘之黃白睛亦然
濕熱所致也宜加減瀉黃散主之此藥能退脾土復腎水
降心火

黃連

茵陳各五分

黃柏

黃芩各四分

梔子

茯苓

澤瀉各三分

右咬咀都作一服水一大盞煎至六分去渣稍熱服食前

陰黃

潔陰黃則清便自調面目及身黃四肢冷是脾虛不能制腎水當用益黃散下史君子丸益黃散方見治法史君子丸方見疳

淡黃白者胃不和也平胃散調中丸渴者人參白朮散平

散方見泄瀉○調中丸方見腹痛○人參白朮散方見消渴○月裏生黃見胎驚條

針灸

明飲水不渴面黃陽剛穴十一

錢黃相似身皮目皆黃者黃病也身痛臍背強大小便澀一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵色着物皆黃渴者難治此黃疸也此一證多發於大病後又有一證不因病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食土渴

者臍疳也又有自生而身黃者胎疸也又書云諸疸皆熱色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯不和也

梔子八枚 黃柏一斤 甘草灸半兩

右水煎去渣溫服

犀角散

治小兒黃疸一身盡黃

犀角一斤 茵陳 乾葛 升麻

龍膽草 生地各半兩 寒水石七錢半

右咬咀白水煎服一方治小兒忽發黃面目皮肉盡乾黃以乾葛汁和蜜調服神珍方無乾葛用瓜萎

連翹赤小豆湯

治小兒傷寒發熱身黃

麻黃 連翹 甘草 生薑

赤小豆

生梓白皮各二兩

杏仁四十箇

大棗十二箇

右咬咀水煎服一方生小麥苗搗汁服之立效

消食丸 治小兒脾胃不和常服寬中快氣消乳食正顏

色 砂仁 陳皮 三稜 蓬朮

神麴炒 麥芽炒 香附米泔浸炒 枳殼

檳榔 烏梅各半兩 丁香二錢半

右為末麪糊丸如葉荳大食後紫蘇湯下二三十丸

茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲水身體

面目俱黃小便不利不得安臥不思食飲

茯苓五分 澤瀉三分 茵陳六分 猪苓

黃芩 黃連 山梔 防已

白朮 蒼朮 陳皮 青皮

枳殼各二錢

右咬咀水煎徐徐溫服

丹 治小兒吐瀉黃疸

三稜 蓬朮 青皮 陳皮

神麴 麥芽 黃連 甘草

白朮 茯苓各等分

右為末溫水調服若傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加

滑石發熱加薄荷

瓜蒂散 治小兒忽發心滿堅硬脚手心熱變為黃疸不

急治則殺人

瓜蒂七箇 赤小荳七粒 秫米七粒

右為末用一字吹兩鼻內令黃水出餘末盡水調服之

得吐出黃水即愈一方瓜蒂一兩赤小荳四兩為末每

服一錢溫水調服藥下即臥當吐清黃汁為效虛者不

搗鼻法

宜服

腹痛

曲腰乾
啼者為
內弟

湯 小兒腹痛曲腰乾哭無淚面青白唇黑肢冷為盤腸內
凡有此證急煎蔥湯淋洗其腹揉之蔥慰臍腹間良久
尿自痛中出其疼立止續次服藥

乳香

沒藥 各少許透
明者細研

右件木香一塊於乳鉢內磨水一分滾數沸調乳沒末
此藥只一服效

錢 釣藤膏治小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸內弔

乳香 研

沒藥 研

木香

薑黃 各四
錢

木鱉子仁 二十
箇

右先將後三味同為細末次研入上二味煉蜜和成劑
收貯每一歲兒可服半皂子大餘以意加減煎釣藤湯

化下無時次用魏香散

魏香散

蓬朮 半
兩

阿魏 一
錢

右先用溫水化阿魏浸蓬朮一晝夜焙乾為細末每服
一字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

無 蒜乳丸治冷證腹痛夜啼

大蒜 一稜慢火煨
香熟研爛

乳香 另研
五分

右研為丸如芥菜子大每服七粒乳汁送下

右四方治寒腹痛屬盤腸內弔其候曲腰乾哭是也

錢 胃虛冷面皸白色腹痛不思食當補脾益黃散主之若

不利者調中丸主之 益黃散治下利而痛也
調中丸治不利而痛也

調中丸

白朮

人參

甘草 炒各
半兩

乾薑 炮四
錢

右為細末蜜丸如菉豆大每服五七丸至十五丸食前

不思飲
食者為
胃冷

溫水下海藏云仲景理中例也

當歸散凡小兒夜啼者臟寒而腹痛面青手冷不吐乳是也宜此方服之效

當歸去蘆頭 白芍藥 人參各一錢 甘草炙五分

桔梗 陳皮各一錢

右咬咀煎五分時時少服愈

右三方治寒腹痛屬胃虛其候不思食是也

熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤黃與三黃丸人

參湯下三黃丸方見治發熱法

丹腹痛夜啼服牛黃如豆大乳化喫之於臍下書田字立

安聖惠方

錢積痛口中氣溫面黃白日無精光或白睛多及多睡畏

食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者白餅子下之後

和胃用白朮散消積丸白餅子方見癖白朮散方見消渴

丹食積腹痛硬必用紫蘇蘿蔔子之類

世小兒好喫粽成肚痛用黃連白酒藥等分為丸服

湯三稜散治積氣肚痛

砂仁 甘草 益智炒去殼 三稜

蓬朮 青皮炒各等分 為末白湯點下

虫痛面觥白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安虫散

主之小兒本怯者多此病田氏云虫痛啼哭俛仰坐臥不安自按心腹時時大呌面無正

色或青或黃唇白又目無精色口吐涎沫此為虫痛

安虫散治小兒虫痛

胡粉炒 鶴虱炒 川練子去皮核 白礬枯二分

右為細末每服一字大者五分米飲調下痛時服

湯治虫動痛極不可忍用乾漆半兩檳榔一枚生用窰老

一塊再煨細研三件一處為末空心熱酒調良久取下虫
立愈驗雀老恐雀中○又方用乾漆一兩搗碎炒令烟盡
出用新汲水入生麻油空心調下

錢安虫丸治上中二焦虛或胃寒虫動及痛

乾漆炒烟盡二分雄黃一分巴豆霜一分

右為細末糊丸如黍米大量兒大小服之取東引石榴
根煎湯下或苦練根或蕪荑湯下五七丸至三十九

發時服

蕪荑散主治同前凡小兒痛時便高聲啼叫人中上鼻頭
唇口一時黑色脈法當沉弱而弦今反脈大是虫症也

白蕪荑乾漆炒各等分

右為細末每服一字或五分或一錢米飲調下發時服

四蛔虫用練樹根為君佐以二陳湯煎下

診

積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛者當口淡而沫自出
治之隨其症用藥虫與癩相似小兒本怯故胃虛冷則虫
動而心痛與癩畧相似但目不斜手不搖也安虫散主之
辛氏女子五歲病虫痛諸醫以巴豆乾漆礪砂之屬治之
不效至五日外多哭而俛仰睡臥不安自按心腹時大叫
面無正色或青或黃或白或黑目無光而慢唇白吐沫至
六日胸高而臥轉不安召錢至錢詳視之用蕪荑散三服
見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則為逆矣至
次日辛見錢曰夜來三更果瀉錢於瀉盆中看如藥汁以
杖攪之見有元藥錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可
治也辛曰何以然錢曰脾虛胃冷則虫動而今反目青此
肝乘脾又更加瀉知其氣極虛也而元藥隨糞下即脾胃
已脫兼形病不相應故知死病後五日昏篤七日而死

胎熱
湯巢氏病源鴛口候者小兒初生口裏白屑滿舌上如鴛口故曰鴛口此乃胎熱而心脾最盛薰發於口也治用髮纏指頭蘸井花水揩拭之睡時黃丹煨出火氣摻於舌上葛氏如用前法其舌上白屑不脫可煮栗莢汁令濃以綿纏指頭拭之若春夏無栗莢可煮栗木皮如用井花水法小兒初出腹有連舌下有膜如石榴子者中隔連其舌下後令兒言語不發舌不轉也可以爪甲摘斷之微有血出無害若血出不止燒髮灰傳之即止

口噤

風痰為口噤

田大人小兒口噤不開牙關緊者諸藥勿效天南星末一錢腦子少許相和研勻用指蘸生薑自然汁蘸藥於左右大牙根上擦之立開

田初生口噤不開不收乳用赤脚蜈蚣去足炙末猪乳汁調下五分三四服愈

聖小兒生下七日口噤牛黃些少竹瀝調下一字以猪乳滴口中口噤搗鼻法用鬱金藜蘆瓜蒂為末水調搗之

滯頤口角垂延是也

需清心導痰九治舌縱涎下方見大人門曾用甚妙

湯小兒滯頤者多涎流出積於頤上此由脾胃冷涎多故也脾之液為涎緣脾胃虛冷不能制其津液故流出於頤

法當溫脾按內經云舌縱涎下皆屬熱此恐湯氏之偏見今兩存之以備參攷

張渙溫脾丹 治滯頤效

白朮 青皮各半 半夏麩 丁香各一

乾薑炮半

右為細末糊丸如黍米大一歲兒十九二歲二十九米

飲下

臍風撮口

脾
錢 小兒洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是胃虛氣不和口頻撮調氣益黃散主之

赤脚金頭蜈蚣一條

蝎稍尾四

僵蚕七條

瞿麥五分

右為末先以鷲毛管吹豆大入鼻內嚏噴啼叫可醫更

用薄荷湯下

雜方

錢 栢墨散治斷臍後為水濕所傷或襦袍濕氣傷於臍中或解脫風冷所乘致令小兒四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜速療之

黃栢

釜下墨

亂髮燒各五分

右為細末每用少許傳之

丹 臍風濕鹽二兩豉二合杵成餅子如錢炙熱熨臍上安又以黃栢末傳之

姚 小兒臍腫桂心炙熱熨之日四五

秘 臍風瘡用年久東壁泥研傳之

聖 臍風久者成瘡不乾伏龍肝傳之 又馬齒莧燒葉末

傳之千金

子 母 治小兒臍赤腫杏仁杵如脂傳臍腫上

聖 治小兒臍中汁出不止并赤腫用枯白礬研細傳之

世 治嬰兒因剪臍傷外風致瘡不乾用白礬煨白龍骨各等分同為末每用少許傳之 又方綿燒灰研細每少許

乾摻之

丹 撮口夜合花枝煮汁拭口并洗愈

田 撮口治法用白殭蚕為末蜜調塗兒穀道又牛黃一錢

竹瀝一合時時抹口中即瘥

經小兒初生一七日內忽患臍風撮口百無一效坐視其死良可憫也有一法世罕知者凡患此證看兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹指輕輕擦破即開口便安不藥神效

針灸

小兒初生臍風撮口諸藥不效者灸然谷穴在內踝前起大骨下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立效

用臍風目上插刺絲竹空

明臍腫 腰對臍骨節間三壯

診

世臍風撮口在百日內不治

醫學綱目卷之三十八

醫學綱目卷之三十九

小兒部

肺主燥

咳嗽

嗽膿血

喘

馬脾

風

悲哭

夜啼

瘡

鼻

龜胸

龜背

脫肛

肛痒

咳嗽

八九月
嗽痰盛
者宜下

錢嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者其病必實非久病也其症面赤痰盛身熱法當以葶藶丸下之若久者不可下也

葶藶丸治乳食衝脾傷風咳嗽面赤痰盛身熱喘促

甜葶藶

去土隔
希畧炒

黑牽牛

微炒

漢防已

杏仁

去皮尖炒另研
如膏各一兩

右為末研入杏膏拌勻蒸陳寒肉和再搗為劑丸如麻子大每服五丸至七丸淡生薑湯下乳食後或臨夜服

量兒加減

潔人參荆芥散治身熱痰嗽胸膈不利宜下痰去熱

人參

兩半

荆芥穗

兩

大黃

二錢

右為細末水煎調檳榔木香細末五分輕粉一字乳後

服如身熱潮熱宜服清涼飲子去大黃三服之後一二

日却入大黃服之令踈利則愈不可便動臟腑

錢十一月十二月嗽者乃傷風寒嗽也風寒從背第三椎

肺腧穴入當以麻黃湯汗之有熱證面赤飲水痰熱咽喉

不利者宜以甘桔湯兼治之若五七日其證身熱痰盛唾

粘加減三拗湯下之

麻黃

去根節三錢水
煮去沫焙乾

桂枝

二錢

杏仁

七箇去
皮尖炒

黃芩

另研
如膏

甘草

炙一
錢

右為麤末入杏膏拌勻每服一錢水六分煎至四分去

查溫服無時以汗出為度量大小加減若自汗者不宜

服之

百部丸治小兒肺寒壅嗽微喘有痰

百部

炒

麻黃

去節各
三兩

杏仁

四十箇去皮
尖微炒研入

右為末熟蜜子丸如皂子大溫水下二三丸無時日三

四服此本方也仲景加松子仁五十箇蜜丸更加胡桃

肉含化大妙一方加甘草二錢

紫蘇子散治小兒咳逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於

肺氣或小兒啼氣未定與乳飲之與氣相逆氣不得下

紫蘇子

訶子

去
核

杏仁

去皮
尖炒

蘿蔔子

木香

人參

去蘆各
三兩

青皮

甘草

炒各一
兩半

右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至五分去查

不拘時服量兒加減

肺盛

有肺盛者欬而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱以瀉白散瀉之若傷寒咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦葶藶丸主之後用化痰藥瀉白散方見虛實法

肺虛

有肺虛者咳而硬氣長出氣喉中有聲此久病也以阿膠散補之痰盛者先入脾後以補銀丸微下之涎退速即補肺如上法補肺法方見治虛實法

澤黃芪湯治小兒咳嗽喘逆身熱鼻乾燥者是熱入肺經為客熱呬呀有聲

黃芪

二兩

人參

二錢半

地骨皮

五錢

桑白皮

三錢

甘草

二錢半

右咬咀水煎放溫頻服之

海涎嗽四君子加杏仁桑白皮等分半夏麩減半同煎○咳嗽四君子末煎紫蘇湯調下

秋冬嗽

潔咳嗽

肺之生病而成嗽大抵秋冬則實春夏則虛更

夏實為虛

詳五臟兼見之證以辨虛實若實則面赤飲水身熱痰涎

盛涕唾稠粘咽乾不利喘嗽面腫吐食皆當先補脾益黃

散後瀉肝瀉青丸若咯膿血是肺痿也用清肺散治之若

虛則面白脫色氣少不語喉中有聲唾痰清利法當阿膠

散補之若亡津液用白朮散主之

錢治嗽大法盛即下之久即補之更量虛實以意加減

福銀丸治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘籠

膈實腹脹喘初為實宜下

巴苳去油膜皮心

水銀五錢

黑鉛二錢半

炒結

麝香另研五分

好墨

火燒醋煉研入錢

右將巴苳末并墨再研勻和入砂子麝香陳米粥和丸如菘豆大捻福一歲兒一九三二歲二三九五歲已上五六九煎薄苛湯放冷送下不得化破更量虛實加減

並食後服虛人先以益黃散實脾後

嗽而吐水或青綠水者百祥丸下之方見痘門嗽而吐痰涎

乳食者白餅子下之方見積門

雜方 世 小兒痰嗽必用吐法詳見喘條

世 白附丸治咳嗽有痰方見脾主濕門

勝金方治小兒咳嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥土以火燒為灰每服一字飯飲下

羅塗唇膏治襁褓小兒咳嗽吐乳久不愈石燕一味為末每用一捻蜜少許調塗兒唇上日三五次無時

診

錢 杜氏子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃外風寒蓄入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺中故也宜以麻黃散輩發散後用涼藥壓之即愈時醫與珠粉丸半夏丸補銀丸諸法下之其肺即虛而嗽甚至春三月間

尚未愈召錢視之其候面青而光嗽而喘促哽氣又時時長出氣錢曰病困十已八九然所以面青而光者肝氣旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽者肺之病肺自十一月至三月肺即虛痿又曾下之脾肺子母俱虛復為肝所勝此為逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也錢急與瀉青丸瀉之後與阿膠散實肺次日面青而不光錢又用補肺而嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛唇白如練錢曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛絕肺病不得時而肝勝之今三瀉肝而肝病症不退三補肺而肺病尤虛此不久生故言死也此證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死

嗽膿血

肺虛熱

錢 有喘而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔湯久嗽者肺亡

津液阿膠散主之咳而痰實不甚喘而面赤飲水者可編

銀丸下之阿膠散即補肺散方見治虛實法編銀丸方見前

甘桔散

桔梗米泔浸一宿焙乾

甘草炒各二兩

右為細末每服一大錢水一大盞入阿膠半兩炮過煎至五分食後溫服

海甘桔湯仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血用

生甘草加減二十餘條

丹小兒咯血黑豆甘草陳皮煎服

錢段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血前醫以桔

梗湯及防已丸治之不愈涎上攻吐喘不止請錢氏下匾

銀丸一大服復以補肺湯補肺散治之或問段氏子咯血

肺虛何以下之錢曰肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎

上潮而吐當下其涎若不吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦能發搐故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎止而吐愈為順治也若先補其肺為逆耳此所謂識病之輕重先後為治也

喘

喘而氣少為肺虛

察肺虛則喘而少氣先益黃散後補肺散二方並見治虛實法

錢京東轉運使李公孫八歲病嗽而喘滿短氣醫者言肺

經有熱用竹葉湯牛黃膏治之三日加喘錢氏云此肺氣

不足復有寒邪即便喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已

用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也前醫曰退熱退涎錢曰何

熱之所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而

風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反調心蓋竹

葉湯牛黃膏治心藥也李師有慙色錢治愈

喘而氣
盛為肺
實

潔肺實則喘而氣盛瀉白散方見治
虛實法

溫冷用藥○東都張氏孫九歲病肺熱咳嗽他醫以珠犀
龍麝牛黃藥治之一月不愈其證咳嗽喘急悶亂飲水不
止全不能食錢氏用史君子丸益黃散張曰本有熱何以
又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無效錢曰涼藥久則
胃寒不能食小兒虛不能食當與補脾候飲食如故即瀉
肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散
瀉肺遂愈張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不
虛也

寒實

雲小兒結熱上氣喘者四順散一名清涼飲子
本治小兒哮喘

黃丹

砒霜

右各薑製為末用枣肉為丸如麻子大每服三九臨臥

冷茶下

痰實

丹痰嗽痰喘並用涌法吐之重劑用瓜蒂散輕劑用苦參
赤小荳末須蝦蟇汁調服之

世萬金丹治洩痰涎喘急方見瘡大
通用

肺中風

湯治肺中風多因嗽而始但服嗽藥不能散其風邪入於
肺臟之絡其候喘急面色青黃目能認人口不能言醫不
能明其證坐以待盡不亦陋乎紹興王尚書女伴老嫗得
此病半月相繼而死庸醫俱不能識又張南軒亦得此疾
而逝醫師滿目環視而立待盡余悔不得一見豈非天命
也哉後有親樓八哥之子病此症是時乃一氣之行諸醫
皆言無術而退子父來告急但欲得別是何疾亦不望其
活矣余往視之尚留殘喘以橘皮桑白皮罌粟殼三件煎
湯化百部丸二服急灸肺膈其喘立定而忽能言繼時索

診

粥自此生矣嗚呼是病有法不遇余者多矣可深惜哉
素帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脈何如岐伯曰喘鳴肩
息者脈實大也緩則生急則死通評虛實論

馬脾風

暴喘而脹滿也

實熱

田暴喘俗傳為馬脾風也大小便哽宜急下之用牛黃奪
命散後用白虎湯平之

牛黃奪命散治小兒肺脹喘滿胸膈起急兩脇扇動陷下
作坑兩鼻竅張悶亂嗽喝聲啞而不鳴痰涎潮塞俗云馬
脾風若不急治死在旦夕

白牽牛

黑牽牛各一兩半
生半熟

川大黃

檳榔各一兩

右為細末三歲兒每服二錢冷漿水調下涎多加膩粉

少許無時加蜜少許

無價散治風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風

辰砂二錢半

輕粉五錢

甘遂麪裹煑焙
乾一錢半

右為細末每服一字用溫漿水少許入滴油一點挑藥
在上沉下去却以漿水灌之立效

針灸

又一法小兒喘脹俗謂之馬脾風又謂之風喉者以草莖
量病兒手中指裏近掌紋至中指尖截斷如此二莖自乳
上微斜直立兩莖於稍盡頭橫一莖兩頭盡頭點穴灸三
壯此法多曾見愈

診

馬脾風在百日内者不治

悲哭

心麻

本治小兒拘哭龍齒散

龍齒

蟬殼去翅足
泥土

鈞藤有鈞
子者

羌活

茯苓

人參各等分

右為末每服一大錢煎六分去渣溫熱服

子和 一小兒悲苦彌日不休兩手脈弦而緊戴人曰心火甚則乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心爍則痛甚故爍甚悲亦甚先令浴以溫湯漬形以為汗也肺主皮毛汗出則肺熱散浴止而啼亦止矣仍命服涼膈散加當歸桔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉膈中之邪熱

錢 小兒驚啼邪熱乘心也當安心安神丸主之

診 小兒驀然忽大啼作聲者必死此火大發則虛其氣故也

夜啼

大法

無 小兒夜啼有四証一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲腰而啼

此寒證也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹煖啼時或有汗仰身而啼此熱也若重舌口瘡要吮乳不得口到乳上即啼身額皆微熱急取燈照口若無瘡舌必重也客忤者見生人氣忤犯而啼也各隨證治之

腹腰面青白而啼為寒

蒜乳丸 治腹痛夜啼

當歸丸 治臟寒腹痛二方見腹痛

五 五味子散治小兒夜啼及腹痛至夜輒劇狀似鬼祟

五
味子

當
歸

赤
芍藥

白
朮各半

茯
神

陳
皮

桂
心

甘
草各二錢半

右為麤末水煎量兒大小加減

仰身面赤而啼為熱

三 黃丸治腹熱痛夜啼面赤唇焦便赤用人參湯吞下

熱痛腰不曲肢不冷也

無 燈花散治熱證心燥夜啼以燈花三四顆研細用燈心煎湯調塗口中以乳汁送下日三服 一法用燈花塗乳

上令小兒吮之無燈花用燈心燒灰亦妙 又一法燈花七枚鵬砂一字辰砂少許研細蜜調抹唇上立安

丹 小兒夜啼

人參二錢半

黃連一錢半

甘草灸五分

竹葉片

生薑片一

水煎服

澹寮 龍齒散治小兒夜啼不止 方見拘哭即上本龍齒散但無羌活一味

世 又方蟬蛻二七枚去足為末入硃砂一字蜜調送下

世 馬齒燒研細傳乳上吮之妙 小兒夜啼黃連薑汁炒

甘草竹葉煎服

口瘡重舌夜啼

世 治小兒夜啼青黛半錢細研清水調下

無 蒲黃散治小兒重舌 方見 牡蠣散治小兒口瘡 方見

客忤夜啼

治客忤夜啼法用本家厨下燒殘火柴頭一箇以火焦頭

為上朱書云吾是天上五雷公將來作神將能收夜啼鬼

一縛永不放急急如太上老君律令勅書了勿令兒知立
在牀下倚牀前脚裏立之男左女右效
灸 明夜啼灸中衝一壯即止

疳

熱痰 世通關散治小兒驚風已退只是聲啞不能言百藥不效者以大天南星一箇炮為末每服一錢猪膽汁調下入喉便能言語

鼻

表 丹治小兒赤鼻

雄黃

黃丹分等

用無根水調傳

或用菖蒲半葉酒蒸為末調服解食毒 無根水者天落水用碗盛之

者是也

辛夷葉

先焙乾

細辛

木通

白芷 木香各五錢 杏仁去皮尖
右為細末用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和勻於瓦石器中熬成膏赤黃色為度於地上放冷入腦麝各一錢拌勻每用少許塗顙上并鼻中神效

龜背

熱 錢肺熱腸滿攻於胸膈即成龜胸

聖治龜背方

大黃炒

天門冬去心 百合

杏仁去皮

木通

桑白皮蜜炙

甜葶藶炒

川朴硝各半

右為末煉蜜丸如芡實大溫水食後化下三歲已上化二丸

丹治小兒龜背

蒼朮

黃栢酒炒

芍藥酒炒

陳皮

防風

山查

葳靈仙

加當歸

又利後加生地黃

為末煉蜜丸食後溫水下

針灸

田小兒龜背緣肺熱脹滿攻胃膈所生又緣乳母食熱麵五辛轉更高起宜灸兩乳前各一寸五分上兩行三骨罅間六處各三壯炷如小麥大春夏從下灸上秋冬從上灸下若不依此法十灸不愈一二也

龜背

藥方

錢兒生下血風入脊逐於骨髓即成龜背治之以龜尿擦胃骨取龜尿法當以蓮葉安龜在上後用鏡照之其尿自出

針灸

田小兒龜背由令兒坐早有客風吹入脊骨而入於骨髓故使背高如龜之狀也雖有藥方多成痼疾以灸法為要當灸第三椎骨節下兩傍各一寸半肺腧穴又第五椎骨

節下兩傍各一寸半心膈穴又第七椎骨節下兩傍各一寸半膈膈穴以小兒中指節為一寸艾炷如小麥大三五壯即止此法累用十有一二得效亦無全效之功

世 龜背在百日內不治

澁可去

湯 治大腸虛弱肛門脫下

龍骨

訶子

煨去核 沒石子 大者 嬰粟殼 醋塗

灸二錢

右為末白湯點服仍用蔥湯薰洗令軟款款以手托入用新磚瓦一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數重壓定使熱氣上透不可過熱令病者以臀坐於布上如覺布溫逐旋減之以常得溫熱為度并常服前藥

五 倍子散治小兒脫肛

五倍子

地榆 各等分

右為細末每服半錢或一錢空心米飲調下

敷

赤 石脂散治小兒因痢後努軀氣下推出肛門不入

建反用力 傍腹也

真赤石脂

伏龍肝 各等分

右為細末每用五分傅肛頭上頻用按入

世 治小兒脫肛用五倍子為末量多少摻患處以物襯手揉入切忌食發風毒物

回 脫肛治法用蒲黃一兩猪脂二兩煉猪脂和蒲黃成膏塗腸頭上即縮入

無 水聖散治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少杵為細末乾貼患處

洗 法

丹 脫肛用東北方陳壁泥土湯泡先洗下後薰上

又方見 脫囊條

針灸

因小兒脫肛瀉血秋深不痊灸龜尾一壯炷如小麥大春端穹骨也 小兒脫肛者灸臍中三壯 小兒脫肛久不瘥及風癩中風角弓反張多哭言語不擇發無時節盛即吐沫者取百會一穴灸七壯在鼻直入髮際五寸頂中央旋毛中可容豆炷如小麥大

明治久痢脫肛見痢門

脫肛痒

勢

四治小兒蛻虫攻下部痒取匾竹葉一握切以水一升煎取五合去渣空腹飲之虫即下用其汁煮粥亦佳心鏡

治虫狀如蝸牛食下部痒取匾竹葉一握水二升煮熟五

歲兒空腹服五合隔宿不食明日早食之尤佳楊氏產乳

腎主虛寒

解顛

顛填

行遲齒遲髮

遲

停耳

呵欠

額黑

唇青為寒

解顛

虛

一小兒解顛乃是母氣血虛與熱多耳用四君子四物有熱加酒炒黃連生甘草煎服外以綿束緊用白藪末傳之

二解顛治法宜用生地散

三解顛生下而顛不合者腎氣不成故也長必少笑更有

目白睛多眇白色瘦者多愁少喜也

湯解顛者顛大頭縫不合如開解故曰解顛此由腎氣不

成故也腎主骨髓而腦為髓海腎氣不成則腦髓不足故

不能合也凡得此者不過千日其間亦有數歲者乃廢人

也人之無腦髓如木無根古人雖有良方吾所以不錄者

勞而無功也亦不可束手待斃宜依錢氏補腎萬一有可

生之理補腎地黃丸方見勞瘵

雜方

錢天南星散治顛開不合鼻塞不通天南星大者微泡去

皮為細末米醋塗調緋帛上貼顛上灸手頻熨之立效
無三辛散治小兒骨應合而不合頭骨開也名曰解顛

細辛

桂心各半兩

乾薑七錢半

右為末以薑汁和傳顛上貼之見面赤即愈

又方用蛇蛻炒焦為末用猪頰車中髓調傳項上日三四
度曾有人作頭巾裏遮護之久而自合亦良法也

針灸

明顛門不合

臍上臍下各五分

二穴各灸三壯灸瘡未發先合

診

世父精不足則解顛眼白多

顛填

診

湯氏小兒顛填其顛高大如物填在上汗出毛髮黃而短

是也若寒氣上衝則牢鞞

頭坵起腫硬日牢鞞音昂

熱氣上衝則柔軟

又小兒臟腑積熱氣上衝於腦亦致顛填而又肝氣盛風

熱衝上而成此候也王環集歌曰顛門腫起定為風此候

應須也不中或若加坑如盞足七日之間命必終

行遲齒遲髮遲

虛

湯小兒稟受血氣不足者則髓不滿骨故軟弱而不能行

腎主髓治法當用錢氏補腎地黃丸加鹿茸五加皮麝香

則髓生而骨強自然行矣外甥黃虬知錄之子三歲不能

行遂合此方服之有驗

行遲

無五加皮散治小兒三歲不能行者由受氣不足體力虛

怯腰脊脚膝筋骨軟足故不能行用真五加皮為末粥飲

調次入好酒少許每服一粟殼許日三服效

錢羚羊角丸補腎肝五六歲不能行

羚羊角

虎脛骨

醋炙

桂枝

生地

黃芪

防風

當歸

白茯苓

酸棗仁

炒各等分

藥

右為細末蜜丸皂子大食後溫水化下久服取效

大川芎 生地各半 山藥 當歸
甘草各一分

右焙為末熱湯調服用擦齒脚

尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮屑塗之即生

髮遲

湯香薷煎治小兒白禿不生髮燥痛

陳香薷二兩 胡粉一兩 猪脂半兩

右用水一大盞煎香薷取汁三分去渣入胡粉猪脂相和合勻塗於頭上日頻用之

治小兒頭生白禿髮不生用椿楸樹葉心取汁傳之大

效

診

小兒長大不行行則脚細齒久不生則不固髮久不

生生則不黑皆屬氣血虛也宜大劑補之

停耳

雜方

紅玉散治小兒膿耳

枯白礬 乾臘脂 麝香各一錢

右同研勻先以綿裹杖子擦淨搽之

湯龍黃散治小兒停耳汁出不止

枯白礬 龍骨末 黃丹炒各半兩 麝香一錢

右同研細先以綿杖子搥膿水盡用散一字半分為兩處吹入耳內日二次

丹停耳碗黃末傳之日一夜一妙

秘要用蚰蟥灰末吹入立效有瘡者傳之孫真人方同

呵欠

診

呵欠面赤者風熱也 面青者驚風也 面黃者脾虛驚

也 多睡者內熱也 氣熱者傷風也

額黑唇青為寒

寒 補陽湯初冬間一小兒二歲大寒證明堂青脈額上青黑腦後青絡高起唇青舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳尖冷眼澁常常淚下出仍多眵目中不利臥而多驚無搐即寒

柴胡 錢三

升麻 錢二

麻黃 錢三

吳茱萸 分五

地龍 錢五

蝎稍 少

生地 分五

婦身 錢三

甘草 錢一

黃芪 分二

黃柏 錢一

陳皮 分一

葛根

連翹 各一

右為釐末作一服水一盞煎法如常乳食後熱服始漸喜睡精神出氣和順乳食旺

診 血氣虛怯為冷所乘則唇青

雜病

寒熱

瘡

繼病

五硬五軟

寒熱

食積

食積寒熱如瘧渴瀉氣急要合地臥此候先當取下積

只用平胃散次常服進食丸

平胃散方見大人泄瀉進食丸方見癖

錢曹宜德子三歲面黃時發寒熱不欲食而飲水及乳不

止眾醫以為潮熱用牛黃丸不愈及以止渴乾葛散服之

反吐錢曰當以白餅子下之後補脾乃以消積丸磨之此

乃解也後果愈何以故不食但飲水者食伏於脾內不能

消致令發寒熱用止渴藥吐者藥衝脾故也故下之即愈

實熱

子和高巡檢子八歲病熱醫者皆為傷冷治之以熱藥欲

飲冰水禁而不與內水涸渴煩躁轉生前後皆閉口鼻俱

乾寒熱往來咳嗽時作遍身無汗又欲灸之適遇戴人戴

人責其毋曰重裊厚被煖炕紅爐兒已不勝其熱尚可灸

乎其毋謝以不明戴人令先服人參柴胡飲子連進數服
下爛魚腸之類臭氣異常渴欲飲水聽其所欲冰雪冷水
連進數杯節次又下三四十行大熱方去又與通膈丸牛
黃丸復下十餘行兒方大痊前後約五十餘行畧計所用
冰雪水飲至一斛向灸之當何如哉

瘡

治小兒瘡疾多與大人同法以出汗為瘡宜桂枝柴胡麻
黃參苓等輩又視其病食病痰以意消息之大抵多是飲
食失節得之須以消導為先可也

濕痰

世萬金丹治大人小兒瘡并哮喘痰涎喘急黑豈四十九粒
信一錢先以黑豆浸去皮端午日以乳鉢研細拌勻作大
小丸之黃丹為衣陰乾治哮喘冷茶清吞一九治瘡空心井
花水吞一九忌熱物葷腥一日如食熱物即吐

寒熱

湯治癰瘡但熱不寒方用黃丹煨通紅臨發蜜湯調下能

飲酒用酒調一法專服小柴胡湯次服人參前胡湯

草果飲治寒多熱少手足厥冷遍身浮腫肚腹疼痛

厚朴

薑製

青皮

草菓

藿香

甘草

炙

丁皮

神麩

良薑

半夏麩

等分咬咀薑棗煎空心服

治久瘡露星散

秦芫

柴胡

白朮

白茯苓

檳榔

常山

黃芩

甘草

半夏麩

官桂

右等分咬咀酒醋一半煎露一宿次日早取再溫瀝去

查服陳舍人令嗣久瘡服驗

小柴胡湯 治小兒瘡疾往來寒熱

人參

半夏

柴胡

黃芩

甘草各等分

右咬咀薑三片枣一枚煎服

青皮湯 治小兒瘧疾作浮腫兼寒熱不退飲食不進

白朮

茯苓

厚朴

青皮

陳皮

半夏

大腹皮

檳榔

三稜

蓬朮

木通

甘草各等分

右咬咀每服三錢薑水煎服

養胃湯 治外感風寒內傷生冷溫中快膈能辟山嵐瘴氣寒瘧脾胃虛寒嘔逆惡心並宜服之

蒼朮

厚朴

半夏

藿香

草果

人參

茯苓

甘草

陳皮

右咬咀每三錢枣子烏梅各一枚同煎食前熱服

久瘧

鬼哭散

止瘧疾久不愈者效

常山

大腹皮

白茯苓

鱉甲醋炙

右咬咀每服三錢桃柳枝各七寸同煎臨發時服畧吐

出涎效

鱉甲飲子 治瘧久不愈腹中結為癥瘕名曰瘧母

鱉甲醋炙

白朮

黃芩

草果

檳榔

芫蕪

橘紅

甘草

厚朴

白芍藥各等分

右咬咀薑棗煎服

瘧浮腫

大腹皮湯 治小兒瘧疾用藥太早退熱變作浮腫外腎腫大飲食不進

大腹皮

檳榔

三稜

蓬朮

枳殼

蒼朮製各二兩

甘草三錢

右咬咀每服三錢加薑皮蘿蔔子同煎

四獸飲 治五臟氣虛喜怒勞逸不節致陰陽相勝結聚

痰飲發為瘧疾兼治癰瘡

半夏

人參

白朮

茯苓

草果

陳皮各一兩半

甘草二錢半

右咬咀加烏梅枣子各一枚生薑三片每服三錢煎服

截

經效截瘧丹治瘧母結癖寒熱無已

真阿膠

湯泡研雄黃各二錢半

硃砂一錢半

右研為細末稀糊丸如桐子大每服一丸人參湯候冷

空心服瘴瘧桃枝湯冷服臨發時磨一丸塗鼻口畔效

診

要畧瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者宜下之弦遲者可溫之弦緊者可發汗浮大者可吐之弦數者

風發也以飲食消息止之

脈瘧脈自弦微則為虛代散則死

針灸

明小兒瘧久不愈灸內庭

在足大指次指外間隔中各一壯

大椎 百

會各隨年壯

繼病

雜考

海小兒瘧病母有娠乳兒有病如瘧痢他日亦相繼腹太

或瘥或發他人相近亦能相繼北人未識其病懷妊者取

百勞鳥毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮註云鴟

博勞也楚詞云在外見鳴鴟言其鳴惡也白澤圖云屋間

鬪不祥即百勞也以此治繼病本草云百勞味平有毒其

毛用之治小兒繼病

聖治小兒生十餘月後母又有妊令兒精神不爽身體萎

痺名為瘧病用伏翼燒灰細研以粥飲調下五分日四五

服效若灸令香熟嚼哺兒亦效即編

無千金論小兒有魘病者是娠婦被惡神導其胎中妬疾小兒令生此病魘亦小鬼也其證微微下利寒熱往來毫毛髮鬢鬢不悅者是也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳亦作魘也令兒黃瘦骨立發熱髮落

龍膽湯治嬰兒出腹血脈盛實寒熱溫壯四肢驚掣吐乳者若已能進哺中滿食不消壯熱及變蒸不解中客入鬼氣并諸驚癇方悉主之

龍膽草 柴胡 黃芩 桔梗

釣藤皮 芍藥 甘草炙 茯苓各二錢半

蜣螂二枚 大黃煨一兩

右為剉散以水一升煮取五合為一劑十歲已下小兒

皆可服若兒生一日至七日分一合為三服八日至十五日分一合半為三服十六日至二十日分二合為三服二十日至三十日分三合為三服皆以得下即止此劑為出腹嬰兒所作若日月長大者亦依此為例必知客忤及有鬼氣者可加人參當歸各二錢半一百日兒加一錢一字二百日兒加二錢半一歲加半兩餘藥皆做此

診 生者為相繼 死者為傳尸 有脈而無氣謂之尸厥 有氣而無脈謂之行尸 丁奚露哺客忤無辜四異病也 陽易陰易百合狐惑四奇病也

診 五硬五軟 五硬 仰頭取氣動搖難氣壅疼連胸腹間脚手心如米冷硬頭仰為風命不還

喫食如何不長肌肉少皮寬軟自離莫教瀉痢當時作靈藥難醫命必危

五歲孩兒不肯行脚軟氣羸命不亨細小不妨榮衛氣長大須應肉自生宜用參芪等藥錢氏地黄丸治之

右五硬即瘕之屬經所謂暴強直皆屬於風是也五軟即痿之屬治見疝維方條

醫學綱目卷之三十九

中風
補遺方

至寶丹療卒中急風不語中惡氣絕中諸物毒暗風中熱客毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蠱毒水毒產後血暈口臭血出惡血攻心煩躁氣喘吐逆難產悶絕死胎不下已上諸疾並用童子小便一合生薑自然汁三五滴入於小便內溫過化下三九至五九神效又療心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語並皆療之

烏犀角研生

朱砂研飛

雄黃研

玳瑁屑研生

琥珀研各一兩

麝香研

龍腦研各一分

金箔五十片半入藥

半為

銀箔五十片

牛黃錢五

安息香一兩半研

以無灰酒攪澄飛過濾去沙土慢火熬成膏

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯

咳唾血

煮凝成後入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如桐子大用人參湯化下三九至五九又療小兒諸癩急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒服二九人參湯化下

桂苓甘露飲

官桂

人參去芦

藿香各半兩

茯苓去皮

白朮

甘草炙

葛根

澤瀉

石膏

寒水石各一兩

滑石二兩

木香一分

右為細末每服一錢白湯下新水生姜湯亦可

消渴

順氣散消中熱在胃而能飲食小便黃赤以此下之不可多利微微利至不欲食而愈

朴硝

製一兩

大黃四錢

枳實二錢

右咬咀每服八錢水二盞煎八分去渣通口服

滯下

膠艾湯治衝任虛損月水過多及妊娠胎動不安男子腹痛下墜

阿膠炒

川芎

甘草炙各二兩

當歸

艾葉

微炒各三兩

白芍藥

熟地各四兩

右剉每服五錢水一盞酒六分煎至八分去渣稍熱服

空心食前日三服甚者連夜併服

滯下

震靈丹此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化冲和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱緩手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎

藏無子服之無不愈者

禹餘糧火煨醋淬紫石英

赤石脂

代赭石如上火煨

滓○已上四味並作小塊入甘鍋內搥泥固濟候乾用炭一十斤煨通紅火盡為度入地出火毒二宿

乳香另研

五靈脂石去沙

沒藥去石研

朱砂水飛過

各二兩

右件前後共八味並為細末以糯米粉煮糊為丸如小雞頭大晒乾每一粒空心溫酒下冷水亦得常服鎮心神駐顏色溫脾腎理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神效

滯下

駐車丸治一切下痢無問新久及冷熱膿血腸滑裏急日夜無度臍腹絞痛不可忍者

阿膠

搗砂炒如珠子為末以醋四升熬成膏

當歸去芦各十五兩

黃連去鬚三兩

乾姜炮十兩

右為細末以阿膠膏和併手丸如桐子大每服三十九食前溫米飲下日二服凡小兒服丸如麻子大更量歲數加減

泄瀉

甘草乾姜湯

甘草

四兩

乾姜

二兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去查分溫再服

暴厥

乾姜附子湯

乾姜

兩

附子

一枚生用去皮

右二味水煎頓服

臂痛

茯苓丸治臂痛如神

赤茯苓

防風

細辛

白朮

澤瀉

官桂

各半兩

瓜蒌根

紫葳

附子

黃芪

芍藥

甘草

各三分

生地

牛膝酒浸

山芋

獨活

半夏酒浸

山茱萸各一分

右十八味為細末煉蜜為丸如桐子大每服十九丸溫酒

送下食前

見血當歸四逆加茱萸湯

當歸

桂枝

芍藥

細辛各一兩

通草

甘草各六錢

茱萸三錢

右水六盞煎服

小兒痘出不快升麻葛根湯

升麻

葛根

芍藥

甘草等分

每服六錢水一盞半煎至八分去渣服

寒多即熱服熱多即溫服

小兒吐瀉開胃丸治乾嘔氣逆不止

半夏麴微炒三兩

人參一兩半

白苳蔻去皮

陳皮去白焙

白朮各一兩

右為細末用生姜汁同枣肉和丸如桐子大每服二十

丸至三十丸不拘時用粥飲送下

辰砂丸

小兒驚搖

辰砂

麝香

牛黃各二錢半

半夏制

丁香

白附子

鐵粉

天麻

南星制各半兩

右為細末煮粳米飲丸如麻子大每服五丸用荆芥湯

不拘時下

內經運氣類註序文

夫運氣之道，上古聖人所以參天地贊化育者也。蓋氣流行於天地間，有化有變，其化也在人爲生育，其變也在人爲疾死。故贊其化育以濟其生者，必先制其疾以拯其死。此則醫道之所由設，使有生者無夭折，享壽考而其德業可與天地參矣。然其道載諸內經者，廣大精微，非淺學所可易知。是以後世悉皆湮晦，今姑舉其大畧言之。五運屬陰，守於地內，六氣屬陽，周於天外，其化生於人也。五運化生五臟，屬內，六氣化生六腑，十二經屬外，其變疾於人也。五運內變，病於五臟，甚則兼外，六氣外變，病於六腑，十二經甚則入內，內外變極，然後死也。五運有平氣，太過不及之殊，六氣有常化，淫勝反勝，相勝之異。五運平氣者，其歲化生皆當本位，如木平氣，敷和之紀，其色蒼，其味酸之類。

病太過

生言應是勝字

福及

為定

是也其變病皆在本臟如木平氣之病在肝也太過者歲變平氣為太過其化生皆兼非位如太過發生之紀其色青黃白其味酸甘辛如兼非位之土金是也其變病皆在巳所勝之臟如木太過則木勝脾土而脾病也其勝乃本氣有餘而勝故不為他氣報復間有復者是不務其德暴虐失常也不及者歲變平氣為不及其化生亦兼非位如木不及委和之紀其果棗李其味酸辛亦兼非位之土金是也其變病皆巳所不勝者乘虛勝之而本臟病勝極則巳所生者報復其勝而勝者之臟亦病如木不及則金勝之而肝病勝則火復金讐而肺亦病也其勝乃乘我之虛而勝勝之根本不固故為他氣報復凡此五運之氣皆有定紀者也六氣常化者天地六位之化各守常位生病各當本處其天地之常化如厥陰司天少陽在泉之歲風化

福及勝

福及勝
相勝

居上火化居下風病行於上熱病行於下之類而不出他位也其六位之常化如厥陰司天之歲初之氣化風燥民病寒於右之下二之氣化寒熱民病熱於中之類而不樵他氣也凡此六氣之常化皆有定紀猶五運平氣也淫勝者天地之氣變常內淫而勝也天氣內淫而上勝於下則巳所勝之臟經受邪而病甚如厥陰司天風淫所勝其病在足太陰脾經也地氣內淫而外勝於內其病在足陽明胃經也凡此六氣之淫勝猶五運太過皆有勝無復其勝之盛雖有定紀其勝之動否則無定紀而不可必也反勝相勝者六位之左右變常乘虛而勝也其乘天地之虛而勝者為反勝左右自有相勝乘虛而勝者為相勝皆視所虛之氣侮不勝巳者勝之勝極則仍為虛者之子復之如所虛之氣屬太陰則所勝之氣屬厥陰而病在脾胃經所

復之氣屬陽明而病在肝膽經也。蓋天地歲氣猶王也。左右步氣猶諸侯也。左右勝天地猶諸侯僭亂。故曰反勝。左右自相勝猶諸侯自相征伐。故曰相勝也。凡此六氣之反勝相勝五運不及。故皆有勝有復。其氣其動皆無定紀。但隨虛而勝。隨勝而復也。諸五運皆有定紀者。陰靜有常也。六氣少有定紀者。陽動多變也。五運之平氣之常化爲常。其化生爲常之常。變病爲常之變。五運之太過不及。與六氣之淫勝反勝相勝爲變。其化生爲變之常。變病爲變之變。太過淫勝爲變之盛。不及反勝相勝爲變之虛。察其常變。以定生死。詳其虛實。以斷補瀉。謹道如法。萬舉萬全也。然其經奉行於世。惟唐太僕令王永氏篤好之。大爲詮註。而其昭彰道要。開示玄微者。於功爲大。但千慮一失。而不得經旨者。亦或有之。爲未盡善也。於是不分常變。釋六氣

勝復無定紀之變。爲有定紀之常。不分盛虛。釋左右乘虛之相勝。爲司天之淫勝。是則運氣之義。不明自此始矣。後雖有林氏校正。孫氏攷誤。與夫托名所著。玄珠密語。天元玉冊。及諸家運氣圖說之類。然皆不能出王氏之右。而救其失。反使運氣之義。愈晦而書愈繁。至於河間所註病機。其形容病化之情狀。推究火熱之衆多。真有發前人未發之妙。奈何又以運氣之所屬。皆爲盛。而不察其所屬各有盛虛。以盛虛所兼非位之化。皆爲似而不察其所兼之盛者。似虛者是爲重失矣。夫王氏釋變氣爲常氣。相勝爲淫勝。則人不識變。而占運氣不應年辰。河間釋運氣之所屬。皆爲盛。所兼非位之化。皆爲似。則人不識虛。而施治法。不對病證。遂使世俗皆愀然不信。而棄之也。其不知變者曰。某氣司天屬陰寒。今反炎熱。某運合太過。今反不及。此乃

上古之天道非可占之於今世也。其不知虛者曰：某病屬熱，投寒劑不痊，某證當瀉，施瀉法反劇。此乃北方之治法，非可用之於南人也。惟戴人云：病如不是當年氣，看與何年氣運同，便向某年求活法。方知都在至真中之歌，似能破世之惑。又引而不發，嗚呼！有定紀之年辰與無定紀之勝復相錯，常變今獨求年辰之常，不求勝復之變，豈得運氣之真哉？六氣之盛寒、盛熱與虛寒、虛熱，同其所屬，今獨求寒熱之所屬，不求寒熱之盛虛，豈得寒熱之情哉？苟以常變盛虛觀運氣寒熱，則古今南北皆可一以貫之。而所謂參天地贊化育如視之掌也。僕自早歲留志是書，鑽研既久，似得二三爰據所知挈其宏綱，開以節目，而類編集之，使常變必分，盛虛必著，或前賢之註未備者，間以己意附之，庶幾運氣之義燦然復明目之曰：運氣補註。雖僭踰

之罪莫逃，然濟生一念，自有不容已者。凡吾同志，幸改正云。

醫學綱目卷之四十

內經運氣類註

五運六氣總論

謂運氣相合而有盛虛損益之變

黃帝問曰天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五臟化五氣以生喜怒思憂恐論言五運相襲而皆治之終期之日周而復始予已知之矣願聞其與三陰三陽之候奈何合之鬼臾區再拜稽首對曰昭乎哉問也夫五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也可不通乎故物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用無方謂之聖夫變化之為用也在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智玄生神神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水故在天為氣在地成形形氣相感而化生萬物矣然天地者萬物之上下也

左右者陰陽之道路也。水火者陰陽之徵兆也。金木者生成之終始也。氣有多少，形有盛衰，上下相召而損益彰矣。帝曰：願聞五運之主時也。何如？鬼臾區曰：五氣運行，各終期日，非獨主時也。帝曰：請問其所謂也。鬼臾區曰：臣積考大始，天元冊文曰：太虛寥廓，肇基化元，萬物資始，五運終天，布氣真靈，總統坤元，九星懸朗，七曜周旋。曰陰，曰陽，曰柔，曰剛，幽顯既位，寒暑弛張，生生化化，品物咸彰。臣斯十世，此之謂也。天元紀大論

此一章論五運六氣之端，變化盛虛之始也。五運者，地之木、火、土、金、水，治政令於內者也。三陰三陽者，天之風、熱、濕、燥、寒，治政令於外者也。帝問五運相襲而治者，其與三陰三陽外治之候如何合之？鬼臾區答：五運陰陽之治，乃天地之道，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本。

始神明之府也。故其治也，物生謂之化，物極謂之變。陰陽莫測之謂神，神用無方，謂之聖。其變化神聖謂之用。在天則為風、熱、濕、燥、寒，三陰三陽之氣；在地則為木、火、土、金、水，燥之氣為土，寒之氣為水，而成五運之形。故在天之形與地相感而萬物育，以爲物生之化也。然天地者，萬物之上下，左右者，陰陽之道路。此在天三陰三陽之氣，右旋于外，以加地也；水火者，陰陽之徵兆，金木者，生成之終始。此在地五運之形，左轉於內，以臨天也。天上之氣有多少，地下之形有盛衰。故天上多少之氣與地下盛衰之形相召而損益彰，以爲物極之變也。其氣之多與形之盛相召者，益益爲變之盛也；氣之少與形之衰相召者，損損爲變之虛也。蓋物生之化者，天地之常氣；在五運曰平氣，在六氣曰

常化也。物極之變者，天地之變氣。在五運曰太過不及。在六氣曰淫勝反勝相勝也。其變之盛者則五運之太過六氣之淫勝也。其變之虛者則五運之不及六氣之反勝相勝也。凡此五運六氣，所謂變化盛虛，經後篇千言萬語，皆所以反覆發明此四者。學者當潛心以究之也。五運氣行各終期日，非獨主時者言木火土金水治政各終一歲之期日，不獨治歲內六步之時令也。蓋經於前篇，但論五運不及六氣，但論主時不及治歲。今始於此篇論五運六氣相感相召而治，不獨五運也。次論五運各治一歲，不獨主時也。

覆論陰陽相錯上下相召而合之以周紀之數

帝曰：善。何謂氣有多少，形有盛衰？鬼臾區曰：陰陽之氣各有多少，故曰三陰三陽也。形有盛衰，謂五行之氣各有太過不及也。故其始也有餘而往，不足隨之；不足而往，有餘

從之。知迎知隨，氣可與期。應天爲天符，承歲爲歲直，三合爲治。帝曰：上下相召奈何？鬼臾區曰：寒暑燥濕風火，天之陰陽也。三陰三陽上奉之，木火土金水地之陰陽也。生長化收藏，下應之。天以陽生陰長，地以陽殺陰藏。天有陰陽，地亦有陰陽。木火土金水地之陰陽也。生長化收藏，故陽中有陰，陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者，應天之氣動而不息，故五歲而右遷，應地之氣靜而守位，故六期而環會，動靜相召，上下相臨，陰陽相錯而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎？鬼臾區曰：天以六爲節，地以五爲制，周天氣者六期爲一備，終地紀者五歲爲一周。君火以明，相火以位，五六相合而七百二十氣爲一紀，凡三十歲，千四百四十氣，凡六十歲而爲一周，不及太過，斯皆見矣。帝曰：夫子之言，上終天氣，下畢地紀，可謂悉矣。余願聞而藏之。上

以治民下以治身使百姓昭著上下和親德澤下流子孫無憂傳之後世無有終時可得聞乎鬼史區曰至數之機迫近以微其來可見其往可追敬之者昌慢之者亡無道行私必得天殃謹奉天道請言真要帝曰善言始者必會于終善言近者必知其遠是則至數極而道不惑所謂明矣願夫子推而次之令有條理簡而不匱久而不絕易用難忘爲之紀綱至數之要願盡聞之鬼史區曰昭乎哉問明乎哉道如鼓之應桴響之應聲也臣聞之甲巳之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲木運統之帝曰其於三陰三陽合之奈何鬼史區曰子午之歲上見少陰丑未之歲上見太陰寅申之歲上見少陽卯酉之歲上見陽明辰戌之歲上見太陽巳亥之歲上見厥陰少陰所謂標也厥陰所謂終

也厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上濕氣主之少陽之上相火主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂六元帝曰光乎哉道明乎哉論請著之玉版藏之金匱署曰天元紀天元紀大論

此一章覆論前章氣有多少形有盛衰上下相召之義也陰陽之氣各有多少者夫三陰三陽之氣各分多少陰多者太陰次少者少陰又次者厥陰也陽多者太陽次少者陽明又次者少陽也形有盛衰謂五行之治各有太過不及者地五運之形各有盛衰土有太少宮金有太少商水有太少羽木有太少角火有太少徵而太者太過少者不及也上下相召者天右旋之陰陽加於地下地左轉之陰陽臨於天上上下下加臨而相召治歲步也天之陰陽風熱燥濕寒又增火爲六數者在天之

熱分爲暑火二氣故三陰三陽各上奉之也地之陰陽木火土金水亦增火爲六數者在地之火分爲君相二形故生長化收藏各下應之也其天之陰陽下加地氣共治歲也則應天之氣動而不息蓋地之治歲君火不主運惟五運循環故天之六氣加之常五歲右餘一氣與地遷移一位而動不息也地之陰陽上臨天氣共治步也則應地之氣靜而守位蓋地之治步其木君相土金水無殊皆各主一步以終期故其上臨天之六氣共治也常六期齊周復於始治之步環會而靜守位也故治歲動者與治步靜者相召外旋上者與內運下者相臨則陰陽相錯而損益盛虛之變所由生也天以六爲節地以五爲制者上下相召之數也蓋天之六氣各治一歲故六期一備地之六位其君火以明相火以位故

五歲一周五六相合凡三十歲爲一紀六十歲爲一周其間相錯之陰或氣類同多而益爲太過之盛者或氣類異少而損爲不及之虛者斯皆可見其變也甲巳之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之地五位一周之數也子午之歲上見少陰熱氣丑未之歲上見太陰濕氣寅申之歲上見少陽相火卯酉之歲上見陽明燥氣辰戌之歲上見太陽寒氣巳亥之歲上見厥陰風氣者天六期一備之數也天地之數五而火熱居三可見天地間熱多於寒火倍於水而人之病化從可推也

論陰陽有不合者在於古象之所通
黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常請天師而問之曰論言天地之動靜神明爲之紀陰陽之升降寒暑彰其兆余聞五運之數於夫子夫子之所言正五氣之各主

歲耳。首甲定運。余因論之。鬼臾區曰。土主甲巳。金主乙庚。水主丙辛。木主丁壬。火主戊癸。子午之上。少陰主之。丑未之上。太陰主之。寅申之上。少陽主之。卯酉之上。陽明主之。辰戌之上。太陽主之。巳亥之上。厥陰主之。不合陰陽。其故何也。岐伯曰。是明道也。此天地之陰陽也。夫推之可數者。人中之陰陽也。然所合數之可得者也。夫陰陽者。數之可推之。可百。數之可千。推之可萬。天地陰陽者。不以數推。以象之謂也。帝曰。願聞其所始也。岐伯曰。昭乎哉。問也。臣覽天元冊文。丹天之氣。經于牛女。戊分。齡天之氣。經于心尾。巳分。蒼天之氣。經于危室柳鬼。素天之氣。經于氐亢昂畢。玄天之氣。經于張翼婁胃。所謂戊巳分者。奎壁角軫。則天地之門戶也。夫候之所始。道之所生。不可不通也。五運大論

此一章覆論前章五運六氣所化陰陽之義也。其論五天之象。所經星宿。爲運氣之化。皆干與支同屬者。及連位者。齊化也。土主甲巳。及丑未之上。太陰主之者。齡天之氣。經于心尾。巳分之象。而心尾者。甲地。巳分者。中宮。故甲與丑連位。巳與未同屬。齊化濕土也。金主乙庚。及卯酉之上。陽明主之者。素天之氣。經于亢氐昂畢之象。而氐亢者。乙地。昂畢者。庚地。故乙與卯同屬。庚與酉同屬。齊化燥金也。水主丙辛。及辰戌之上。太陽主之者。玄天之氣。經于張翼婁胃之象。而張翼者。丙地。婁胃者。辛地。故丙與辰連位。辛與戌連位。齊化寒水也。木主丁壬。及巳亥之上。厥陰主之者。蒼天之氣。經于危室柳鬼之象。而危室者。壬地。柳鬼者。丁地。故壬與亥同屬。丁與巳同屬。齊化風木也。火主戊癸。及子午之上。少陰主之。寅

申之上少陽主之者丹天之氣經于牛女戊分之象而牛女者癸地戊分者中宮故癸與子同屬戊與午連位齊化火熱也干之甲乙屬木位東丙丁屬火位南庚辛屬金位西壬癸屬水位北戊己屬土位中宮支之寅卯配甲乙巳午配丙丁申酉配庚辛亥子配壬癸辰位東南未位西南戌位西北丑位東北爲四維屬戊己故乙卯同屬木丁巳同屬火己未同屬土庚酉同屬金壬癸亥子同屬水也甲寅位東之首癸丑位北方尾而甲丑連位癸寅連位也丙位南之首辰位東之尾而丙辰連位也戊己位木火金水中間在天地爲門戶在四時爲長夏南連午西連申而戊己午申連位故戊己無方位而經獨言戊分己分者表章之也辛戌皆位酉之尾而辛戌連位也獨戊火連申夾未土於中癸火連寅夾丑

土於中者蓋濕土在中火游行其間在天居土前在地居土後而土火常相混也故土旺長夏火熱之內丹溪深悟此理發明濕熱相火爲病十居八九及有濕鬱生熱熱久生濕之論良以此也其五天之象所經星宿分野獨當五運之干位不及六氣之支位者蓋干之與支卽根本之與枝葉經言干則支在其中矣故其化皆干與支之同屬者連位齊化者是根本與枝葉同化者也或曰近世獨以五運之化爲出五天之象六氣之化不言五天之象但將正化對化立說以上正化於未對化於丑金正化於酉對化於卯水正化於戌對化於辰木正化於亥對化於巳君火正化於午對化於子相火正化於寅對化於申又以未酉戌亥午寅之正化爲實無勝復丑卯辰巳子申之對化爲虛有勝復今子所釋經

文一以運氣之化皆出五天之氣與彼說異者何也曰
 經旨皎如日星好事者鑿此正化對化之說也謹按經
 文帝悉陳五運之干六氣之支一併設問非獨問五運
 不及六氣也岐伯之答亦以五天之象所經星宿一併
 答五運之干六氣之支非獨答五運而分出六支不答
 也今何為不究經旨擅將運氣分作二義妄撰正化對
 化異說上亂聖經下惑後學而作軒岐之罪人也至於
 勝復之說經但以子午寅申辰戌六歲之紀氣化大而
 先天無勝復未聞未酉亥氣化少者為實無勝復以丑
 未卯酉巳亥六歲之紀氣化少而後天有勝復未聞子
 辰申氣化大者為虛有勝復也



論天右
轉地左
遷寒暑
相臨上
下相邁
氣相得
則和不
相得則
病

帝曰善論言天地者萬物之上下左右者陰陽之道路未
知其所謂也岐伯曰所謂上下者歲上下見陰陽之所在
也左右者諸上見厥陰左少陰右太陽見少陰左太陰右
厥陰見太陰左少陽右少陰見少陽左陽明右太陰見陽
明左太陽右少陽見太陽左厥陰右陽明所謂面北而命
其位言其見也帝曰何謂下岐伯曰厥陰在上則少陽在
下左陽明右太陰少陰在上則陽明在下左太陽右少陽
太陰在上則太陽在下左厥陰右陽明少陽在上則厥陰
在下左少陰右太陽陽明在上則少陰在下左太陰右厥
陰太陽在上則太陰在下左少陽右少陰所謂面南而命
其位言其見也上下相邁寒暑相臨氣相得則和不相得
則病帝曰氣不相得而病者何也岐伯曰以下臨上不當
位也帝曰動靜何如岐伯曰上者右行下者左行左右周

天餘而復會也帝曰余聞鬼臾區曰應地者靜今夫子乃
言下者左行不知其所謂也願聞何以生之乎岐伯曰天
地動靜五行遷復雖鬼臾區言其上候而已猶不能徧明
夫變化之用天垂象地成形七曜締虛五行麗地地者所
以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也形精之
動猶根本之與枝葉也仰觀其象雖遠可知也帝曰地之
為下否乎岐伯曰地為人之下太虛之中者也帝曰憑乎
岐伯曰大氣舉之也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以
潤之寒以堅之火以溫之故風寒在下燥熱在上濕氣在
中火遊行其間寒暑六入故令虛而化生也故燥勝則地
乾暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂火
勝則地固矣帝曰天地之氣何以候之岐伯曰天地之氣
勝復之作不形於診也脈法曰天地之變無以脈診此之

謂也。帝曰：問氣何如？岐伯曰：隨氣所在，期於左右。帝曰：期之奈何？岐伯曰：從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死，先立其年以知其氣，左右應見，然後乃可以言死生之逆。順帝曰：寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物何以生？化？岐伯曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，其在天為玄，在人為道，在地為化，化生五味，道生智，玄生神，化生氣，神在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在臟為肝，其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其虫毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒，怒傷肝，悲勝怒，風傷肝，燥勝風，酸傷筋，辛勝酸，南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在臟為心，其

性為暑，其德為顯，其用為燥，其色為赤，其化為茂，其虫羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎燥，其眚燔焇，其味為苦，其志為喜，喜傷心，恐勝喜，熱傷氣，寒勝熱，苦傷氣，鹹勝苦，中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在臟為脾，其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其虫倮，其政為謚，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思，思傷脾，怒勝思，濕傷肉，風勝濕，甘傷脾，酸勝甘，西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在臟為肺，其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其虫介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂，憂傷肺，喜勝憂，熱傷皮毛，寒勝熱，辛傷皮毛，苦勝辛，北方生寒，寒生水

水生鹹鹹生腎腎生骨髓髓生肝其在天爲寒在地爲水
在體爲骨在氣爲堅在臟爲腎其性爲凜其德淒愴其用
爲藏其色爲黑其化爲肅其虫鱗其政爲靜其令爲寒其
變凝冽其雋水雹其味爲鹹其志爲恐恐傷腎思勝恐寒
傷血燥勝寒鹹傷血甘勝鹹五氣更立各有所先非其位
則邪當其位則正帝曰病之生變何如岐伯曰氣相得則
微不相得則甚帝曰主歲何如岐伯曰氣有餘則制已所
勝而侮所不勝其不及則已所不勝侮而乘之已所勝輕
而侮之侮反受邪侮而受邪寡於畏也運行大論

此一章論天右旋於外而寒暑六入以舉其地地受天
六入以爲五行左轉化生人物於天之中也天地萬物
之上下左右陰陽之道路者天右旋六節之位也上下
謂在上者司天之位在下者在泉之位左右謂在上之

左右者天左間右間之位在下之左右者泉左間右間
之位也故天之三陰三陽於其六位右旋如巳亥歲上
見厥陰而左間少陰右間太陽至子午歲厥陰右旋下
降則上見少陰而左間太陰右間厥陰常如此逐歲自
上旋降於右也面北命其位言其見者謂司天之位在
南而面北命其左右則西南爲左間之位東南爲右間
之位而言其所見之陰陽也厥陰在上則少陽在下而
左間陽明右間太陰至厥陰右旋下降而少陰在上則
陽明在下而左間太陽右間少陽常如此隨司天旋轉
也面南命其位言其見者謂地之位在北而面南命其
左右則東北爲左間之位西北爲右間之位而言其所
見之陰陽也自天地萬物之上下至此獨論天右旋之
氣也上下相遘寒暑相臨氣相得則和不相得則病者

言天之右旋，遠地方位，而其氣與地方位氣相遘相臨。其遘同類相生之氣，則和；不同類相制之氣，則病也。或氣雖同類相得，亦病者，惟相火臨於君火，爲不當位故也。經下篇云：君位臣則順，臣位君則逆。逆則病，近害速者是也。動靜何如者？帝謂天動能臨於地，地靜不能臨天，而難上下相遘，寒暑相臨之語也。岐伯答上者右行，下者左行，則知天常於上，自右降東南，而旋迴以臨地。地常於下，自左升東北，而循顯明木君相土金水之位，循環臨天，而皆動也。故左右臨動，各皆周天，過則復相會也。然天之右行，卽曆家退度之右行，其實皆如地之左行而東升西降也。應地者靜，帝復難下者左行之言也。岐伯答天地之體動靜雖殊，而其用之變化在地，則五行麗地而載生成之形類，運於內在天，則七曜緯虛。

而列應天之精氣，運於外，其形類與精氣之相隨運動，猶根本之與枝葉，同乎一氣而不殊，故但仰觀七曜之象周旋，雖遠可知其動也。自上下相遘至此，通論天右旋，地左轉之氣也。地之爲下，否乎者，帝謂天象周旋，皆轉於地下，而地居其上。今日下者左行，則地之左行爲下，得非否乎？岐伯答地爲人之下，太虛之中者，則上下之義始明矣。蓋以其所屬言之，則司天在泉之氣屬天者爲上，五行之屬地者爲下，以其所在言之，則司天者爲上，在泉者爲下，而地之五行居中，岐伯以所屬言之，故曰下者左行，帝以所在言之，故難地之左行非下也。馮附也，地居太虛之中，何所馮附而不墜也。大氣舉之，謂風寒暑濕燥火六節大氣旋轉於外，任持其地而乾蒸動潤堅濕以入其體也。故其入也，風寒在下，而風居

東寒居北燥熱在上而燥居西熱居南濕氣在中而居中央火於未入之前在濕上已入之後在濕下而遊行上下之間也自地之爲下至此原地氣一皆本乎天也候診候也言天地之氣及勝復之作統貫六位難以診候唯間氣偏治一位故可隨其所在期之於尺寸左右也凡期之之法陽之所在其脈應陰之所在其脈不應故北政之歲人氣面北而寸北尺南地左間之氣在右寸右間之氣在左寸天左間之氣在左尺右間之氣在右尺所以少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩寸俱不應厥陰在泉則左間少陰而右寸不應太陰在泉則右間少陰而左寸不應少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應厥陰司天則左間少陰而左尺不應太陰在泉則右間少陰而右尺不應也南政之歲人氣

面南而寸南尺北天左間之氣在右寸右間之氣在左寸地左間之氣在左尺右間之氣在右尺所以少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩寸俱不應厥陰司天則左間少陰而右寸不應太陰司天則右間少陰而左寸不應少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應厥陰在泉則左間少陰而左尺不應太陰在泉則右間少陰而右尺不應也從其氣則和者陰陽各當尺寸本位也違其氣則病者陰陽或不當其位或迭移其位或失守其位或尺寸反或陰陽交也不當其位者謂陰陽之見不當尺寸本位也迭移其位者謂陰陽迭皆移轉一位也假如南政少陰司天陰皆在寸陽皆在尺迭皆左轉者則陰皆移左而左不應陽皆移右而右應迭皆右轉者則陰皆移右而右不應陽皆移左而左應之類

是也失守其位者謂本位他位皆失守不見也如陰失守則尺寸皆無陰陽失守則尺寸皆無陽非如迭移而相反相交見於他位也尺寸反者假如北政少陰司天陽在寸陰在尺而陽反見尺陰反見寸之類是也陰陽交者假如北政太陰司天陽在左陰在右而陽反見右陰反見左之類是也寒暑燥濕風火在人合之奈何其於萬物何以生化者言天外旋轉大氣六入地中生化人物其在人臟腑形體者如何合之在萬物如何生化也東方生風者天六入之風居東方地體中為生生之始也自風而生木酸肝筋心矣凡東方性用德化政令之類皆本乎風而內合人之肝氣者也故肝居左象風之生於東筋為屈伸象風之動也南方生熱者天六入之熱居南方地體中為生長之始也自熱而生火苦心

血脾矣凡南方性用德化政令之類皆本乎熱而內合人之心氣者也故心居前象熱之生於南血為人之神象火之明曜也中央生土者天六入之濕居中央地體中為生化之始也自濕而生土甘脾肉肺矣凡中央性用德化政令之類皆本乎濕而內合人之脾氣者也故脾居腹象濕之生於中央肉充一身象土之充實大地也西方生燥者天六入之燥居西方地體中為生收之始也自燥而生金辛肺皮毛腎矣凡西方性用德化政令之類皆本乎燥而內合人之肺氣者也故肺居右象燥之生於西皮毛乾於身表象氣之燥也北方生寒者天六入之寒居北方地體中為生藏之始也自寒而生水鹹腎骨肝矣凡北方性用德化政令之類皆本乎寒而內合人之腎氣者也故腎居後象寒之生於北骨為

百骸象寒之堅也。五氣更立，各有所先，其所先非其位，則邪當其位，則正者謂前五方之氣各治一部之令者也。五氣更立，治令皆各有所先，其所先者風之立，非春令，熱之立，非夏令，濕之立，非長夏令，燥之立，非秋令，寒之立，非冬令，是皆非其位之立，爲勝復之邪也。風當春令立，熱當夏令立，濕當長夏令立，燥當秋令立，寒當冬令立，是皆當其位之立，爲本氣之正也。氣相得則微，不相得則甚者，言非位所立之邪生變之病，其邪與治令之氣相得，則病微，不相得，則病甚也。主氣者亦謂前五方之氣，各治一歲之政者也。歲氣有餘，則制所勝而侮所不勝，如歲木治政之氣有餘，則制土氣而濕化減少，侮金氣而風化大行也。其不及，則已所不勝，侮而乘之，已所勝，輕而侮之，如歲木治政之氣不及，則金氣勝侮。

而乘之，燥化乃行，土氣輕而侮之，濕氣反布也。侮反受邪，侮而受邪，寡於畏者，金侮木不及，從而乘之，則木之子火報復其勝而侮金，反受邪也。侮金受邪，則其不及之木寡於畏而氣復踈伸也。自天地之氣，何以候至此，原人氣一皆本乎天也。

北政人氣面北寸脈在北尺脈在南圖
 乙丙丁戊庚辛壬癸八干每干六歲通該四十八歲
 地左間之氣在右卯酉歲
 寸三陰在地左間右間厥陰
 則右寸不應
 少陰在泉兩寸俱不應
 左間太陰
 寅申歲
 右間太陽 右寸不應
 厥陰在泉
 天右間之氣在右子午歲
 尺三陰在天右間
 則右尺不應
 少陰司天兩尺俱不應
 右間厥陰
 巳亥歲
 左間少陰

地右間之氣在左
 寸三陰在地右間
 則左寸不應
 左間少陰
 辰戌歲
 右間少陰
 太陰在泉
 左間少陽 左寸不應
 天左間之氣在左
 尺三陰在天左間
 則左尺不應
 右間太陽左尺不應
 丑未歲
 右間少陽 右尺不應
 太陰司天
 右間少陰

北政死脈圖

卯酉歲
 右間厥陰 兩寸反應
 少陰在泉
 左間太陰 兩尺反應
 寅申歲
 右間太陽 右寸反應
 厥陰在泉交
 左間少陰 左尺反應
 辰戌歲
 右間少陰 右寸反應
 太陰在泉交
 左間少陽 左尺反應
 司天尺寸反者死
 右間厥陰 兩寸反應
 少陰司天
 巳亥歲
 右間太陽 右尺反應
 厥陰司天交
 左間少陰 左尺反應
 丑未歲
 右間少陽 右寸反應
 太陰司天交
 左間少陰 左尺反應

在泉尺寸反者死
 在泉陰陽交者死
 司天陰陽交者死

左間少陽 左寸反應
 右間少陰 右尺反應
 右間少陽 右寸反應
 左間少陰 左尺反應

南政人氣面南寸脈在南尺脈在北圖
甲巳通該十二歲

天左間之氣在右寸 三陰在天左間則右寸不應		子午歲 左間太陰		地右間之氣在右寸 三陰在地右間則右尺不應		卯酉歲 右間厥陰	
少陰司天 兩寸俱應		右間厥陰		少陰在泉 兩尺俱不應		左間太陰	
巳亥歲		左間少陰 右寸不應		寅申歲		右間太陽	
厥陰司天		右間太陽		厥陰在泉		左間少陰 左尺不應	
天右間之氣在左寸 三陰在天右間則左寸不應		丑未歲		辰戌歲		右間少陰 右尺不應	
左間少陽		天陰司天		太陰在泉		左間太陽	
右間少陰 存寸不應		右間少陽 左寸反應		左間少陽 左寸反應		右間少陰 右尺反應	

南政死脈圖

司天尺寸反者死		子午歲		在泉尺寸反者死		卯酉歲	
少陰司天		左間太陰 兩寸反應		少陰在泉		右間厥陰 兩尺反應	
巳亥歲		右間厥陰 兩尺反應		寅申歲		左間太陽 兩寸反應	
左間少陰		厥陰司天交		厥陰在泉交		右間少陽 右尺反應	
右間太陽 左寸反應		丑未歲		辰戌歲		左間少陰 左尺反應	
左間少陽 右尺反應		太陰司天交		太陰在泉交		右間少陽 右尺反應	
右間少陰 左寸反應		司天陰陽交者死		在泉陰陽交者死		左間少陽 左寸反應	

論天道
右轉六
節盛衰
因見而
命標本
中氣之
所在因
氣應而
察病變
之所生

黃帝問曰。嗚呼遠哉。天之道也。如迎浮雲。若視深淵。視深淵尚可測。迎浮雲莫知其極。夫子數言謹奉天道。余聞而藏之心。私異之。不知其所謂也。願夫子溢志。盡言其事。令終不滅。久而不絕。天之道。可得聞乎。岐伯對曰。明乎哉。問天之道也。此因天之序。盛衰之時也。帝曰。願聞天道。六六之節。盛衰何也。岐伯曰。上下有位。左右有紀。故少陽之右。陽明治之。陽明之右。太陽治之。太陽之右。厥陰治之。厥陰之右。少陰治之。少陰之右。太陰治之。太陰之右。少陽治之。此所謂氣之標。蓋南面而待之者也。故曰。因天之序。盛衰之時。移光定時。正立而待之。此之謂也。少陽之上。火氣治之。中見厥陰。陽明之上。燥氣治之。中見太陰。太陽之上。寒氣治之。中見少陰。厥陰之上。風氣治之。中見少陽。少陰之上。熱氣治之。中見太陽。太陰之上。濕氣治之。中見陽明。所

謂本也。本之下。中之見也。見之下。氣之標也。本標不同。氣應異象。帝曰。其有至而至。有至而不至。有不至而太過。何也。岐伯曰。至而至者。和。至而不至。來氣不及也。未至而至。來氣有餘也。帝曰。至而不至。未至而至。何如。岐伯曰。應則順。否則逆。逆則變生。變生則病。帝曰。善。請言其應。岐伯曰。物生其應也。氣脈其應也。六微旨
大論

此一章論天之陰陽。右周天道之常。所謂上者。右行者也。天道六六之節。盛衰者。天之三陰三陽。右旋天外。更治歲政。每歲各一盛衰。至六歲周遍。通得盛衰之節。六六也。上下有位。左右有紀者。謂每歲陰陽盛衰之位。上下調。司天在泉二位也。左右調。司天之左間。右間。及在泉之左間。右間。為四紀也。凡天右旋之陰陽。臨司天之位者。其天之政盛。至三之氣始布。臨在泉之位者。其地

之氣盛至終之氣始布而上下二位有二節陰陽盛衰也。臨司天之左間者其氣至四之氣盛，右間者其氣至二之氣盛，臨在泉之左間者其氣至初之氣盛，右間者其氣至二之氣盛，而左右四紀有四節陰陽盛衰也。故此六節陰陽每歲各一盛衰而數得六。庚申歲少陽旋來，司天治之，爲初六，少陽之右，卯酉歲陽明旋來，司天治之，爲六二，陽明之右，辰戌歲太陽旋來，司天治之，爲六三，太陽之右，巳亥歲厥陰旋來，司天治之，爲六四，厥陰之右，子午歲少陰旋來，司天治之，爲六五，少陰之右，丑未歲太陰旋來，司天治之，爲六六，太陰之右，周而復始於少陽治之，故曰六六之節盛衰也。凡此三陰三陽爲治之氣，皆所謂六氣之標也。南面待之者，明前少陽之右云云，皆南面立而待之，乃右居西而從西旋過東。

也。少陽之上火氣治之，中見厥陰，陽明之上燥氣治之，中見太陰，太陽之上寒氣治之，中見少陰，厥陰之上風氣治之，中見少陽，少陰之上熱氣治之，中見太陽，太陰之上濕氣治之，中見陽明者，其火燥風寒熱濕爲治之氣，皆所謂六氣之本也。其中見之氣，乃六氣之中氣也。通前六氣之標言之，則本居上標，居下中氣，居本標之中，故曰本之下，中之見也。見之下氣之標也。中氣者三陰三陽各猶夫婦之配合相守，而人之臟腑經脈皆應之也。故少陽本標之中見厥陰，厥陰本標之中見少陽，而互爲中氣相守，則人之膽三焦，少陽經亦絡肝心包，肝心包，厥陰經亦絡膽三焦，而互交也。陽明本標之中見太陰，太陰本標之中見陽明，而互爲中氣相守，則人之胃大腸，陽明經亦絡脾肺，脾肺太陰經亦絡胃大腸。

而互交也。太陽本標之中見少陰，少陰本標之中見太陽，而互爲中氣相守。則人之膀胱、小腸、太陽經亦絡腎、心、腎、心、少陰經亦絡膀胱、小腸而互交也。本標不同，氣應異象者，謂太陽、少陰二氣也。太陽之上，寒氣治之，是標陽本寒，不同其氣應則太陽所至爲寒，生中爲溫，而寒溫異象也。少陰之上，熱氣治之，是標陰本熱，不同其氣應則少陰所至爲熱，生中爲寒，而熱寒異象也。至於脈從病反，如瓜甜蒂苦，葱白葉青，參補蘆瀉，麻黃發汗，根節止汗之類，皆太陽、少陰本標不同之氣異象也。其有至而至，有至而不至，有至而太過者，言陰陽旋來治歲之候。至而其氣化，亦應候至者爲至，而至者和也。候至而其氣化不至者爲不至，旋來之氣不及也。候未至而氣化先至者爲未至，而至旋來之氣有餘也。故

氣化應候至者爲順，未至而至，至而不至者爲逆。逆則勝復之變生，變生則病作矣。物生其應氣脈，其應者覆說應則順之義也。經所謂厥陰所至爲風，生之類，是物生之應，厥陰之至其脈弦之類，是氣脈之應也。

天道六六之節盛衰圖

少陽治寅申歲六節盛衰

陽明治卯酉歲六節盛衰




太陽治辰戌歲六節盛衰

厥陰治巳亥歲六節盛衰



少陰治子午歲六節盛衰

太陰治丑未歲六節盛衰



六氣各有標本中圖

火燥寒風熱濕為本 三陰三陽為標 本標之中見者為中氣

本之下 中之見也 見之下氣之標也

少陽之上火氣 治之中見厥陰 本火氣為本 中厥陰為中氣 標少陽為標

厥陰之上風氣 治之中見少陽 本風氣為本 中少陽為中氣 標厥陰為標

陽明之上燥氣 治之中見太陰 本燥氣為本 中太陰為中氣 標陽明為標

太陰之上濕氣 治之中見陽明 本濕氣為本 中陽明為中氣 標太陰為標



太陽之上寒氣
治之中見少陰

少陰之上熱氣
治之中見太陽

人臟腑經脈應天六氣各有標本圖

五臟六腑為本

十二經絡為標

本標之間所絡者為中氣

臟腑之本居裏

中氣居表裏之間


經脈之標為表

足少陽屬膽絡肝

手少陽屬三焦絡心包

足厥陰屬肝絡膽

手厥陰屬心包絡三焦



本屬膽三焦
之府為本

中絡肝心包於
中間為中氣

標足手少陽
經為標

本屬肝心包
之臟為本

中絡膽三焦於
中間為中氣

標足手厥陰
經為標

足陽明屬胃絡脾

手陽明屬大腸絡肺

足太陰屬脾絡胃

手太陰屬肺絡大腸

足太陽屬膀胱絡腎

手太陽屬小腸絡心

足少陰屬腎絡膀胱

手少陰屬心絡小腸

本屬胃大腸
之腑為本

中絡脾肺於中
中間為中氣

標足手陽明
經為標

本屬膀胱小腸
之腑為本

中絡腎心於中
中間為中氣

標足手太陽
經為標

本屬腎心之
臟為本

中絡膀胱小腸
中間為中氣

標足手少陰
經為標

論地道
左遷以
外列為
感衰而

帝曰善願聞地理之應六節氣位何如岐伯曰顯明之右
君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土

有當位
非位之
正位因
邪之所
中而命
其微甚

氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之相火之下水氣承之水
位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下金氣承
之金位之下火氣承之君火之下陰精承之帝曰何也岐
伯曰亢則害承乃制制則生化外列盛衰害則敗亂生化
大病帝曰盛衰何如岐伯曰非其位則邪當其位則正邪
則變甚正則微帝曰何謂當位岐伯曰木運臨卯火運臨
午土運臨四季金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平也
帝曰非位何如岐伯曰歲不與會也帝曰土運之歲上見
太陰火運之歲上見少陽少陰金運之歲上見陽明木運
之歲上見厥陰水運之歲上見太陽奈何岐伯曰天之與
會也故天元冊曰天符帝曰天符歲位何如岐伯曰太乙
天符之會也帝曰其貴賤何如岐伯曰天行為執法歲會

為行令太乙天符為貴人帝曰邪之中也奈何岐伯曰中
執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其
病暴而死帝曰位之易也何如岐伯曰君位臣則順臣位
君則逆逆則其病近其害速順則其病遠其患微所謂二
火也

六微旨
大論

此一章論地之陰陽左運地理之常所謂下者左行者
也地理應六節氣位者地之四方分為六步更治時令
以應天外六節氣位之治也顯明之右君火之位者曰
出顯明卯地之右在方屬東南在時屬春分卯中之後
為君火之位也君火之右退行一步相火治之者地氣
至南方相火位行令治夏至前後三之氣以應司天之
政布其運主戊癸歲以應司天之政治歲也復行一步
土氣治之者地氣至西南土位行令至秋分前四之氣

以應司天左間之氣盛其運主甲巳歲以應司天之政
治歲也復行一步金氣治之者地氣至西北金位行令
治秋分後五之氣以應在泉右間之氣其運主乙庚歲
以應司天之政治歲也復行一步水氣治之者地氣至
北方水位行令治冬至前後終之氣以應在泉之氣布
其運主丙辛歲以應司天之政治歲也復行一步木氣
治之者地氣至東北木位行令治春分前初之氣以應
在泉左間之氣盛其運主丁壬歲以應司天之政治歲
也復行一步君火治之者地氣至東南君火位行令治
春分後二之氣以應司天右間之氣盛其運周歲相火
代之不主歲也凡此六步治令之時各行本方之氣入
於中國故木於東方治令時春氣西行而中國皆東方
溫氣與泉左間所居之氣也君相於南方治令時夏氣

北行而中國皆南方熱氣與天右間所居之氣也金於
西方治令時秋氣東行而中國皆西方涼氣與天左間
所居之氣也水於北方治令時冬氣南行而中國皆北
方寒氣與泉右間所居之氣也六氣之下各有所制之
氣承之者蓋五行之氣一極則一生而循環相承無一
息間斷也相火之下水氣承之者夏相火極水生承之
從微漸化至冬著也水位之下土氣承之者冬水極土
生承之從微漸化至長夏著也土位之下木氣承之者
長夏土極木生承之從微漸化至春著也木位之下金
氣承之者春木極金生承之從微漸化至秋著也金位
之下火氣承之者秋金極火生承之從微漸化至夏著
也君火之下陰精承之者夏君火極陰精承之從微漸
化至冬著也其意與陰陽家水胎於午金胎於卯等說

大同小異而皆循環相承以爲胎也亢過極也亢則害承乃制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病者言六位之氣過極則必害作承氣乃生於下制之使不過也故制則從微化著承者自外列盛極者自外列衰而生化循環害作則敗壞擾亂而生化大病也盛衰非其位則邪當其位則正者覆明上文制則生化外列盛衰之盛衰也蓋制亢下承生化之盛衰惟歲氣和平則其所化循序漸進從微至著而皆當六位之正其歲氣有太過不及則其所化無序或躡等陵節或乘危往勝故變或兼化而爲半非其位之邪變或復勝而爲全非其位之邪也木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平者言此八歲皆歲與五運相會而氣和平其盛衰皆能循序當六位之正如餘歲

外列謂天之六氣運列於外者非即謂下承之氣也故下文帝復問盛衰何如

不與運會則氣有太過不及其盛衰皆無序而非其位也或曰王氏註文釋水承火下者熱甚則潤溢象水也土承水下者寒甚則水堅象土也風承上下者雨爲疾風吹零也金承風下者風動氣清萬物皆燥也火承金下者火煨金流也林氏校正又引木發而毀拆及厥陰所至爲飄怒大涼等語證之河間又以亢則害承乃制六字之義著書伸二家之說其說皆指六位下承之氣爲旦夕之暴作今吾子獨謂爲四時之循環必將有說通知之而證其得失是非乎曰經下文制則生化外列盛衰盛衰當其位則正非其位則邪數句論下承之義親切詳備足可證其得失是非矣今經云君火之右退行一步相火治之水氣承之復行一步土氣治之木氣承之復行一步金氣治之火氣承之復行一步水氣治

而答以當其位則正非其位則邪所謂同者盛之異者衰之也下文又以天符歲命言其則當其位者可知矣豈有盛者當法之本位衰者當承之正位之理耶

之土氣承之復行一步木氣治之金氣承之復行一步君火治之陰精承之一節乃下承生化之盛衰當其位則正者也蓋其盛衰循序不亂盛者當法之正位衰者當承之正位而各當本位之正故溫當春熱當夏涼當秋寒當冬而氣候和平以為生長收藏焉此則經之本旨論四時循環當位正化也王氏註文所釋下承之義又引林氏所引木發毀折厥陰所至為飄怒大涼之證乃下承生化之盛衰非其位則邪者也蓋其盛衰無序而亂故木發毀折者暴亢極之木飄半兼暴承下之金殺同化而盛衰半非其位為兼化之邪也厥陰所至為飄怒大涼者暴亢極之木飄怒為暴承下之金涼報復而盛衰全非其位為勝復之邪也故溫非春熱非夏涼非秋寒非冬而或和或乖以為人之百病焉此則王氏

林氏誤用旦夕暴作非位之邪釋經當位之正也然其非位之兼化勝復又有太過不及之殊今河間所伸王氏林氏之說以亢則害承乃制六字釋變氣之義有曰木極似金金極似火火極似水水極似土土極似木皆以亢過極則反似勝已之化者有曰制甚則兼化乃虛象者有曰治兼化但當瀉其亢甚之氣為病本不可反誤治其兼化者諸儒此言皆謂五氣變盛之兼化若夫不及者則未之及也謹按五常政大論云木不及曰委和委和之紀其動縵戾拘緩其味酸辛其色白蒼其聲角商火不及曰伏明伏明之紀其動彰伏變易其味苦鹹其色玄丹其聲微羽土不及曰卑監卑監之紀其動蕩漏分潰癰腫其味酸甘其色蒼黃其聲宮角金不及曰從革從革之紀其動鏗禁脅厥其味苦辛其色白丹

其聲商徵水不及曰涸流涸流之紀其動堅止其味甘
鹹其色黔玄其聲羽宮委和所謂綆戾拘緩者綆王註
謂縮短也蓋木之條達不及而極則金兼化縮短承於
非位以勝之也戾肢體曲戾也拘筋脈拘強也木爲金
之縮短牽引而曲戾拘強也緩筋脈緩縱也金勝木則
土寡于畏故土兼化緩縱於其空隙而拘者自拘緩者
自緩也酸辛白蒼角商皆木不及而天極金於非位承
之兼化也伏明所謂彰伏變易者彰火化彰明也伏水
化隱伏也變易火不及水兼之而或彰或伏變易不常
也苦鹹玄丹徵羽者皆火不及而天極水於非位承之
兼化也卑監所謂瘍漏分潰癰腫者瘍癰腫土化壅塞
也漏分潰木化啓折也土化壅塞而爲瘍癰腫木兼化
啓折而爲騰漏分潰其壅塞也酸甘蒼黃宮角者土不

及而天極木於非位承之兼化也從革所謂鏗禁贅
者鏗謂金化鏗聲而爲欬也禁謂閉氣抑喉而禁忍其
欬也蓋金肺太過則欲氣伸而喘喝胸憑仰息金肺不
及則欲氣畜而禁忍鏗咳也贅昏也厥逆也金化鏗禁
而不及則火兼化昏贅厥逆之氣升於禁忍之處也苦
辛白丹商徵者皆金不及而天極火於非位承之兼化
也涸流所謂堅止者堅堅乾止定止也水少堅乾而土
兼之定止也甘鹹黔玄羽宮者皆水不及而天極土於
非位承之兼化也凡此皆氣虛所變之兼化其治法當
補本氣之虛非如氣盛兼化之法當瀉今河間例言治
兼化但當瀉其亢甚之本氣者可乎其所兼之化皆本
氣不足所承者得以勝之而然不治則本氣愈衰承氣
愈勝今例言兼化爲相似之虛象不可反治之者可乎

他言一
極一生
更互相
承乃四
時順行
之序耳
安可謂
之九害
乎

此則河間誤釋太過不及所變之兼化皆為太過也曰
王氏林氏河間氏失經旨意已聞命矣然六位下承之
氣其所以為正化之常者為兼化勝復之變者為和者
為乖者之詳猶有可得聞之而一證之以經旨乎曰至
誠無息者道體也陰陽五行在天地間流行一極一生
而更互相承循環無端者與道為體也故其相承以陰
陽言則冬至陰極陽生承之夏至陽極陰生承之也以
五行言之則五行即陰陽之相承特有盛穉之分耳故
火盛陽水盛陰木穉陽金穉陰土負陰抱陽為冲氣其
在陰陽相承則冬至陰極陽生承之始於長夏土之冲
氣極木穉陽生承之次於秋金之穉陰極火盛陽生承
之終於冬水之盛陰極土冲氣生承之也夏至陽極陰
生承之始於春木之穉陽極金穉陰生承之次於夏君

火之盛陽極陰精生承之終於夏相火之盛陽極陰生
承之而一歲一周也其在五行自相承則君火相火之
下陰精水氣承之水位之下土氣承之者初歲也土位
之下木氣承之者二歲也木位之下金氣承之金位之
下火氣承之者凡三歲周而復始也故混而陰陽分而
五行常如是更互相承循環無端者實由相承之體至
誠無息而然聖人在川上所謂逝者如斯夫不舍晝夜
正謂此至誠無息之體也然以其相承之體言之則至
誠無息隨極而承無常變和乖之殊以其流行之用言
之則極於平氣之紀而當其位承之者為正化之常而
為和極於太過不及之紀而非其位承之者為兼化勝
復之變而為乖也其常者則循序漸進以為四時之周
流其變者則或肆威太過而暴極於非位或勢力不及

而天極於非位故所承者皆隨其極制於下而躡等陵
 節變其本氣以為旦夕之暴化是故半變者本氣半衰
 下承半盛而為半非位之兼化全變者本氣全衰下承
 全盛而為全非位之勝復和而變者為德化政令乖而
 變者為災害告傷也經所謂發生之紀其變振拉摧拔
 之類乃太過之兼化木不勝德則收氣復之類乃太過
 之勝復委和之紀其動縲戾拘緩之類乃不及之兼化
 肅殺炎赫沸騰之類乃德化政令之勝復水發而雹雪
 木發而毀折之類乃災害告傷之兼化厥陰所至為飄
 怒太涼少陰所至為大暄寒之類乃災害告傷之勝復
 也故均是至誠無息之體但其所極所承者有常變和
 乖之不齊則其應見者有正化兼化勝復及微甚灾祥
 之各異王氏林氏不分變化釋變化為變氣河間不分

虛實釋兼化為盛皆不思之過也

地理應天六節氣位左轉圖



混則陰陽當位

分則五行當位

六位之下各有承氣制亢圖 當其位則正

冬至陰盛極陽生承之陰盛亢則害陽承乃制之制生則化至春夏著盛春即釋陽木

夏至陽盛極陰生承之陽盛亢則害陰承乃制之制生則化至秋冬著盛秋即釋陰金冬即老陰水也

相火之下水氣承之夏火亢則害水承乃制之制生則化至冬著盛

水位之下土氣承之冬水亢則害土承乃制之制生則化至春夏著盛

土位之下木氣承之長夏土亢則害木承乃制之制生則化至春著盛

木位之下金氣承之春木亢則害金承乃制之制生則化至秋著盛

金位之下火氣承之秋金亢則害火承乃制之制生則化至夏著盛

君火之下陰精承之

亢則害承迺制制生則化外列盛衰 盛衰當其位則正 非其位則邪

半非位為兼化

火發而曠味火熱之明半兼木承之故曠味

土發而飄驟土濕之雨半兼風承之故飄驟

金發而清明金燥之清半兼火承之故清明

水發而雹雪寒水之零半兼土承之故雹雪

厥陰所至為飄怒大涼風飄之勝全變非位承之金涼復

少陰所至為大暄寒君火之勝全變非位承之寒暑復

太陰所至為雷霆驟注烈風驟雨之勝全變非位承之烈風復

少陽所至為飄風燔燎霜凝相火之勝全變非位承之霜凝

陽明所至為散落温金涼之勝全變非位承之温熱復

太陽所至為寒雪水雹白埃寒暑之勝全變非位承之温埃復

論歲步始終之候而求天地錯合之氣又以非帝曰善願聞其步何如岐伯曰所謂步者六十度而有奇故二十四步積盈百刻而成日也帝曰六氣應五行之變何如岐伯曰位有終始氣有初中上下不同求之亦異也

全非位為勝復

論歲步始終之候而求天地錯合之氣又以非

合命曰立謹候其時氣可與期帝曰願聞其歲六氣始
始於水下一刻終於八十七刻半二之氣始於八十七刻
六分終於七十五刻三之氣始於七十六刻終於六十二
刻半四之氣始於六十二刻六分終於五十刻五之氣始
於五十一刻終於三十七刻半六之氣始於三十七刻六
分終於二十五刻所謂初六天之數也乙丑歲初之氣天
數始於二十六刻終於一十二刻半二之氣始於一十二
刻六分終於水下百刻三之氣始於一刻終於八十七刻
半四之氣始於八十七刻六分終於七十五刻五之氣始
於七十六刻終於六十二刻半六之氣始於六十二刻六
分終於五十刻所謂六二天之數也丙寅歲初之氣天數

始於五十一刻終於三十七刻半二之氣始於三十七刻
六分終於二十五刻三之氣始於二十六刻終於一十二
刻半四之氣始於一十二刻六分終於水下百刻五之氣
始於一刻終於八十七刻半六之氣始於八十七刻六分
終於七十五刻所謂六三天之數也丁卯歲初之氣天數
始於七十六刻終於六十二刻半二之氣始於六十二刻
六分終於五十刻三之氣始於五十一刻終於三十七刻
半四之氣始於三十七刻六分終於二十五刻五之氣始
於二十六刻終於一十二刻半終之氣始一十二刻六分
終於水下百刻所謂六四天之數也次戊辰歲初之氣復
始於一刻常如是無已周而復始帝曰願聞其歲候何如
岐伯曰悉乎哉問也日行一周天氣始於一刻日行再周
天氣始於二十六刻日行三周天氣始於五十一刻日行

四周天氣始於七十六刻日行五周天氣復始於一刻所謂一紀也是故寅午戌歲氣會同卯未亥歲氣會同辰申子歲氣會同巳酉丑歲氣會同終而復始帝曰願聞其用也岐伯曰言天者求之本言地者求之位言人者求之氣交帝曰何謂氣交岐伯曰上下之位氣交之中人之居也故曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣交之分人氣從之萬物由之此之謂也帝曰何謂初中岐伯曰初凡三十度而有奇中氣同法帝曰初中何也岐伯曰所以分天地也帝曰願卒聞之岐伯曰初者地氣也中者天氣也帝曰其升降何如岐伯曰氣之升降天地之更用也帝曰願聞其用何如岐伯曰升已而降降者謂天降已而升升者謂地天氣下降氣流於地地氣上升氣騰於天故高下相召升降相因而變作矣

六微旨
大論

此一章論天之陰陽與地之陰陽相錯而變生所謂動靜相召上下相臨陰陽相錯者也步者帝覆問上章地之六步也六十度有奇者地之六步繞天一周凡三百六十五度以爲一歲之日數而每步各得六十度有奇也故一日爲一度六十日八十七刻半爲一步而不盈日積二十四步凡四歲則其餘奇積盈百刻而成日於歲終以爲一紀也六氣應五行之變者帝覆取上文天道六六之節及地理應六節氣位二章之義合而問之也言天六氣風熱濕火燥寒之盛衰相應地五行木君火相火土金水之治令者同一歲步而其氣錯之變何如求之也位卽步也位有終始者卽天六氣之盛者應地五行之治令者同在一歩而其候有終始也氣有初中者卽每步始終之盛而治令之氣分爲前後前半步

爲初氣主地氣升後半步爲終氣主天氣降也天上地
下之氣相錯於位之終始氣之初中不同而求之之法
亦異也天氣始於甲地氣始於子者求位有終始之法
也言天地之氣皆自甲子歲始求之者謹按其始終之
時則其氣候之至可與之期也歲六氣始終早晏者蓋
天地二氣之始終有步候之分其在步候則一歲六步
每步天地之氣始終各治六日八十七刻半其在歲
候則每歲天地之氣始終各治三百六十五日二十五
刻今帝先問一歲六步之氣始終之候早晏也甲子之
歲始於水下一刻終於八十七刻半者甲子歲六步其
天之氣少陰司天而左間太陰右間厥陰陽明在泉而
左間太陽右間少陽皆各於所在之步更盛而相應地
氣同治其令今初之氣則在泉左間太陽寒氣盛相應

地東北木氣治令而同主春分前六十日八十七刻半
始終之候早晏也二之氣始於八十七刻六分終於七
十五刻者司天右間厥陰風氣盛相應地東南君火治
令而同主春分後六十日八十七刻半始終之候早晏
也三之氣始於七十六刻終於六十二刻半者司天少
陰熱政布相應地南方相火治令而同主夏至前後六
十日八十七刻半始終之候早晏也四之氣始於六十
二刻六分終於五十刻者司天左間濕氣盛相應地西
南土氣治令而同主秋分前六十日八十七刻半始終
之候早晏也五之氣始於五十一刻終於三十七刻半
者在泉右間火氣盛相應地西北金氣治令而同主秋
分後六十日八十七刻半始終之候早晏也終之氣始
於三十七刻六分終於二十五刻者在泉陽明燥氣盛

相應地北方水氣治令而同主冬至前後六十日八十七刻半始終之候早晏也天地之氣在甲子歲六步始終之候早晏餘歲同例推之也歲候者帝因步候而問及歲候也蓋天地於一歲之政天氣之司天在上者共主一歲地氣之主運者居中配之凡二氣之候同其始終於一歲也日行一歲日行一周天也氣始於一刻者甲子歲司天少陰熱氣在泉陽明燥氣中運大宮土氣之候始同治其歲也日行二周天氣始於二十六刻者乙丑歲司天太陰濕氣在泉陽明燥氣中運少商金氣之候始同治其歲也日行三周天氣始於五十一刻者丙寅歲司天少陽火氣在泉厥陰風氣中運大羽水氣之候始同治其歲也日行四周天氣始於七十六刻者丁卯歲司天陽明燥氣在泉少陰熱氣中運少角木氣


之候始同治其歲也此天地之氣在初紀四歲始終之候餘紀同例推之也用者用前歲步始終之候求天地之氣也言天者求之本言地者求之用言人者求之歲交者言用前歲步始終之候也言求天氣者則求風寒暑濕燥火之本氣其標與中氣不必求之也言求地氣者則求木火土金水火之位氣其下承之氣不必求之也言求人氣者則求氣交中所應見之氣其不應見者不必求之也就甲子歲初之氣言之則言求天氣者求司天之熱在泉之燥泉左間之寒也言求地氣者求中運之土本部之木也言求人氣者則求氣交所應見者或熱或燥或寒或土或木五者之氣爲常非是五者皆勝復之邪變也氣交者天地二氣之交接以人之身半天樞爲界天樞之上至司天之位屬天氣主之天樞之

下至。在泉之位屬地氣主之。天地二氣於天樞交接之
界分屬人氣之所從。萬物之所由。故曰氣交也。凡此天
地始終之候。亘古不易之體也。初凡三十度有奇。中氣
同法者。求氣有初中之法也。言每步六十日八十七刻
半。其前三十日有奇。則爲初氣。而日屬陽主。天樞已下
之氣。皆升後三十日有奇。則爲中氣。而月屬陰主。天樞
已上之氣。皆降。就甲子歲初之氣言之。天樞已下者。謂
在泉燥氣。泉左間寒氣。中運土氣。本部木氣。皆上升也。
天樞已上者。謂司天熱氣。下降也。升已而降。降者流地
降已而升。升者騰天。故高下相召。升降相隨。而氤氳錯
雜。勝侮相乘。由是變常化於氣交。而作勝復也。蓋天地
之氣。各皆均平。則於升降之間。各守界分。而應歲步本
位。始終之常化。其有盈虛多少。則盈而同類多者。勝勝


則越出歲步之本位。虛而同類少者。侮侮則爲非歲步
本位之氣。氣乘來勝。故常化變。而勝復作矣。凡此天地
升降之氣。隨時變化之用也。或曰天之陰陽六節。惟司
天在泉二節。統盛一歲。餘四節獨盛一步者。何也。曰司
天在泉二節。正當天地之中。其升降常在中國相持。故
統盛一歲。餘四節各居四方。其升降不在中國。惟治令
一方所居之氣。隨春令西行。夏令北行。秋令東行。冬令
南行。入歸中國盛之。故此四節各隨四時之令。獨盛一
步也。若夫勝復作而出位。變常者。雖不居治令之力。亦
入中國往復也。曰天氣以風暑濕火燥寒爲序。而濕居
火前。地氣以木火土金水爲序。而土居火後。夫濕上一
氣。其位不同。何也。曰在天爲氣。故天以三陰三陽之氣
多少爲序。在地成形。故地以五行之形相生爲序。其以

氣之多少為序者從少漸多則陰之序始厥陰厥陰者
 一陰也次少陰少陰者二陰也終太陰太陰者三陰也
 陽之序始少陽少陽者一陽也次陽明陽明者二陽也
 終太陽太陽者三陽也此則天氣以陰陽之多少為序
 而濕居火前也其以形之相生為序者生生不已則其
 氣始於木初之氣木生火故君火為二之氣相火為三
 之氣火生土故土為四之氣土生金故金為五之氣金
 生水故水為終之氣而復生木此則地氣以五行之相
 生為序而土居火後也王太僕以少陽次太陽陳無擇
 以濕土生相火可謂不究經旨矣


天道六氣與地理五行相錯圖



乙丑歲



丙寅歲



丁卯歲

正南相火

始於三十五刻
天燦司
國北行入中國

中

皆始於十六
天中地
燥木熱
氣通主歲

國

在泉熱氣
始於一十二刻六
終之氣分終於水下百刻
各氣南行入中國
正北水氣

氣

如國風氣
始於一十二刻六
國北行入中國

如國風氣
始於一十二刻六
國北行入中國

如國風氣
始於一十二刻六
國北行入中國

如國風氣
始於一十二刻六
國北行入中國

戊辰歲

正南相火

始於三十七刻六
天燦司
國北行入中國

中

皆始於水下
天中地
燥木熱
氣通主歲

國

在泉濕氣
始於三十七刻六
終之氣分終於水下百刻
各氣西行入中國
正北水氣

氣

如國風氣
始於一十二刻六
國北行入中國

如國風氣
始於一十二刻六
國北行入中國


如國風氣
始於一十二刻六
國北行入中國

如國風氣
始於一十二刻六
國北行入中國

論氣之升降交
接處有
多少盈
縮之空
隙乃邪
氣之所
居也

帝曰善寒暑相遘燥熱相臨風火相值其有間乎岐伯曰
氣有勝復勝復之作有德有化有用有變變則邪氣居之
帝曰何謂邪乎岐伯曰夫物之生從於化物之極由乎變
變化之相薄成敗之所由也故氣有往復用有遲速四者
之有而化而變風之來也帝曰遲速往復風所由生而化
而變故因盛衰之變耳成敗倚伏遊乎中何也岐伯曰成
敗倚伏生乎動動而不已則變作矣帝曰有期乎岐伯曰
不生不化靜之期也帝曰不生化乎岐伯曰出入廢則神
機化滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長壯老
已非升降則無以生長化收藏是以升降出入無器不有
故器者生化之宇器散則分之生化息矣故無不出入無
不升降化有大小期有近遠四者之有而貴常守反常則
災害至矣故曰無形無患此之謂也帝曰善有不生不化

巳 巳 歲



乎岐伯曰悉乎哉問也與道合同惟真人也六微旨大論

此一章論天地陰陽之變寒暑相遘燥濕相臨風火相值其有間乎帝承上章天地初中升降之義而問寒濕燥熱風火等氣其於升降相遘相臨相值之交接處有空隙之間否乎也岐伯答氣有勝復者言天地相遘相臨相值者凡五氣有盈虛多少常於升降之交接處強弱侵凌乘勢勝復無空隙之間也故其勝復之作於升降交接處有為敷和彰顯溽蒸清潔淒滄之德者有為生榮蕃茂豐備繁斂清諡之化者有為曲直燔爍高下散落沃衍之用者有為摧拉炎燥溼潰肅殺凝冽之變者唯變則邪氣居之於人為病死也帝問何謂邪乎言何故謂變為邪也岐伯答物之生從于化物之極由乎變者言變化二氣猶陰陽晝夜之相反而物之生從化

極由變故變之於化更相薄物則化者成之所由而為正氣變者敗之所由而為邪氣是故謂變為邪也氣有往復用有遲速者言變化之氣皆有往復其往復之用皆有遲速也如經所謂春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政者是其化氣往復之類是也冬有慘淒殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復者是變氣往復之類又皆其往復之用遲者也所謂少陰所至為太暄寒陽明所至為散落溫者是其往復之用速者也凡變化必有此往復遲速四者播扇然後化之正風變之邪風始來薄人也成敗倚伏遊於中者即冬傷於寒春必病溫春傷於風夏必飡泄及仲景所謂伏氣伏寒之類是也帝問遲速往復播扇風所由生而化而變故因運氣盛衰之變而常然生風者耳人感其風以為成敗者則倚伏

有期乎
兼動靜
而問但
生化以
動為期
不生化
以靜為
期上已
言成敗
倚伏生
於動故
下但言
靜之為
而死

遊行於中不於當時隨所感發作者何也岐伯答成敗
倚伏生於動動而不已則變作者倚伏之義始明丹溪
所謂傷寒屬內傷十居八九之論深得斯旨也言成敗
倚伏遊於中者皆生於人之所動人動有節而自養則
其氣和而所感者亦化氣之和來居以為成身之生氣
倚伏遊於中焉人動無節而煩勞則其氣乖而所感者
亦化氣之乖來居以為敗身之病根倚伏遊於中焉至
於動而不已煩勞無休而重感變氣以啓之然後舊之
倚伏者始發而變作矣期者變作之期也言變動而不
以之動作也不生不化靜之為期而死矣故曰不生不
化靜之期也故動物靜則以口鼻出入之息廢而神機
化滅為期植物靜則以根柯升降之化已而氣之孤危
為期也故動物非息出入則無以生長壯老已植物非

化升降則無以生長化收藏是以升降出入無器不有
故動植之器乃化生之宅宇氣散則出入升降各相離
分而生化息矣故無不入無不升降化有大小自蠢
動之微至天地之廣期有近遠自蜉蝣之朝生暮滅至
聃彭之壽年千百凡此大小遠近四者之有皆貴乎常
守反常則灾害至而靜期促矣

六化之
常

帝問曰五運六氣之應見六化之正六變之紀何如岐伯
對曰夫六氣正紀有化有變有勝有復有用有病不同其
候帝欲何乎帝曰願盡聞之岐伯曰夫氣之所至也厥陰
所至為和平少陰所至為暄太陰所至為埃濇少陽所至
為炎暑陽明所至為清勁太陽所至為寒霧時化之常也
厥陰所至為風府為壘啓少陰所至為火府為舒榮太陰
所至為雨府為員盈少陽所至為熱府為行出陽明所至

爲司殺府爲庚蒼太陽所至爲寒府爲歸藏司化之常也
厥陰所至爲生爲風搖少陰所至爲榮爲形見太陰所至
爲化爲雲雨少陽所至爲長爲蕃鮮陽明所至爲收爲霧
露太陽所至爲藏爲周密氣化之常也厥陰所至爲風生
終爲肅少陰所至爲熱生中爲寒太陰所至爲濕生終爲
注雨少陽所至爲火生終爲蒸溽陽明所至爲燥生終爲
涼太陽所至爲寒生中爲溫德化之常也厥陰所至爲毛
化少陰所至爲羽化太陰所至爲倮化少陽所至爲羽化
陽明所至爲介化太陽所至爲鱗化德化之常也厥陰所
至爲生化少陰所至爲榮化太陰所至爲濡化少陽所至
爲茂化陽明所至爲堅化太陽所至爲藏化布政之常也
厥陰所至爲飄怒大涼少陰所至爲大暄寒太陰所至爲
雷霆驟注烈風少陽所至爲飄風燔燎霜凝陽明所至爲

六氣之
交

散落溫太陽所至爲寒雪冰雹白埃氣變之常也厥陰所
至爲撓動爲迎隨少陰所至爲高明燄爲熏太陰所至爲
沉陰爲白埃爲晦暝少陽所至爲光顯爲彤雲爲暝陽明
所至爲烟埃爲霜爲勁切爲悽鳴太陽所至爲剛固爲堅
芒爲立令行之常也

六氣之
病

厥陰所至爲裏急少陰所至爲瘍疹身熱太陰所至爲積
飲痞膈少陽所至爲噎嘔爲瘡瘍陽明所至爲浮虛太陽
所至爲屈伸不利病之常也厥陰所至爲支痛少陰所至
爲驚惑惡寒戰慄譫妄太陰所至爲穢滿少陽所至爲驚
躁瞽昧暴病陽明所至爲軌尻陰股膝脾膈胫足病太陽
所至爲腰痛病之常也厥陰所至爲縶戾少陰所至爲悲
妄衄衄爲行勁太陰所至爲中滿霍亂吐下少陽所至爲
喉痺耳鳴嘔涌陽明所至爲脇痛皴揭太陽所至爲寢汗

瘵病之常也厥陰所至為脇痛嘔泄少陰所至為語笑太陰所至為重肘腫少陽所至為暴注暍暴死陽明所至為鼽嚏太陽所至為流泄禁止病之常也

六化勝復

凡此十二變者報德以德報化以化報政以政報令以令氣高則高氣下則下氣後則後氣前則前氣中則中氣外則外位之常也故風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄甚則水閉肘腫隨氣所在以言其變耳

六氣之用

帝曰願聞其用也岐伯曰夫六氣之用各歸不勝而為化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少陰熱化施於陽明陽明燥化施於厥陰厥陰風化施於太陰各命其所在以徵之也帝曰自得其位何如岐伯曰自得其位常化也帝曰願聞所在也岐伯曰命其位而方月可知也

六氣盈虛之變

帝曰六位之氣盈虛何如岐伯曰大少異也大者之至徐

而常少者暴而亡帝曰天地之氣盈虛何如岐伯曰天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居其中而常先也惡所不勝歸所同和隨運歸從而生其病也故上勝則天氣降而下下勝則地氣遷而上勝多少而差其分微者小差甚者大差甚則位易氣交易則大變生而病作矣大要曰甚紀五分微紀七分其差可見此之謂也帝曰善六元正紀

論大

此一章論五運六氣應見之候也六化之正者常氣也六變之紀者變氣也有化有變有勝有復有用有病之六候者其化之一候六化之正應見也變勝復用病五候六變之紀應見也厥陰所至為和平流泄禁止十二節論化變病三候也其曰時化司化氣化德化之常及布政令行之常者論化之候也其曰氣變之常者論變

之候也其曰病之常者論病之候也凡此十二變至言其變一節論勝復之二候也六氣之用至方月一節論用之一候也時化之常者六部生氣之常化也司化之常者司天在泉六位之常化也氣化之常者五運之常化也厥陰所至爲風生終爲肅少陰所至爲熱生中爲寒太陰所至爲濕生終爲注雨少陽所至爲火生終爲蒸溽陽明所至爲燥生終爲涼太陽所至爲寒生中爲溫者其風生熱生濕生火生燥生寒生六者本氣也終爲肅終爲注雨終爲蒸溽終爲涼四者標氣也中爲寒中爲溫二者中氣也夫本之下中之見也見之下氣之標也故其生物之德皆始於本氣終於標氣而中氣常居標本之中故言標本則中氣在其中矣惟少陰太陽言中而不言終者蓋少陰太陽中氣與標氣同故言中

則標氣亦在其中矣德化之常者德生植物之常化也其次德化之常者德生動物之常化也凡此十二變者言前德化政令病變十二節之候若不當歲步主客正位而至者則屬變氣而爲勝復也凡勝復之候至其勝氣變德則報復以德變化則報復以化變政令則報復以政令而其氣之往復不能相移也所變之氣居高則報復亦高居下則報復亦下居後則報復亦後居前則報復亦前居中則報復亦中居外則報復亦外而其位之高下亦不能相移也由是言之則天下風寒暑濕燥火之變常不能同也南方清燥而旱北方雨濕而潦者有之中原冰雪而寒左右鬱蒸而熱者有之況地理有高下形勢有大小高者氣寒多清燥下者氣熱多雨濕小者小異大者大異而錯雜於天道不一之變矣王氏

釋高下前後中外俱作人身生病之所而不及地理之
分野宜乎程子以天下旱潦常不同之義非運氣主歲
之說也風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝
則濡泄甚則水閉肘腫隨氣所在以言其變者勝復爲
病之位也假若風於高處勝則人身亦於高處病頭重
而掉眩風於下處勝則人身亦於下處病足動而戰慄
又如熱於高處勝則人身亦於腰上分野病腫熱熱於
下處勝則人亦於腰下分野病腫熱皆隨六氣勝復之
所在高下前後中外以言其變病之所也六氣之用各
歸不勝而爲化者謂各歸不勝之方月施化也方月者
假如厥陰司天之歲則陽明之位左間其方月東
北初之氣也太陽之位右間其方月東南二之氣也厥
陰之位司天其方月正南三之氣也少陰之位在天左

間其方月西南四之氣也太陰之位左間其方月
西北五之氣也少陽之位右間其方月正北終之氣也
故其歲施用太陰雨化施於東南二之氣太陽之位太
陽寒化施於西南四之氣少陰之位少陰熱化施於東
北初之氣陽明之位陽明燥化施於正南三之氣厥陰
之位厥陰風化施於西北五之氣太陰之位皆各命其
所在之化以徵驗其所施之化於歲同法推之也自得
其位在本位之方月施化也如厥陰之歲則太陰自得
於西北五之氣本位施雨化太陽自得於東南二之氣
本位施寒化少陰自得於西南四之氣本位施熱化少
陽自得於正北終之氣本位施火化陽明自得於東北
初之氣本位施燥化厥陰自得於正南三之氣本位施
風化於歲同法推之也大者之至徐而常者六氣之盈

者為病則其勢反徐而微治法當逆之也少者之至暴而亡六氣之虛者為病則其勢反暴而甚治法當從之也人見其氣暴烈驟用峻劑攻之則熱病未已寒病復始殊不知大者之氣反微少者之氣反甚也

帝曰願聞陰陽之三也何謂岐伯曰氣有多少異用也

帝曰陽明何謂也岐伯曰兩陽合明也帝曰厥陰何也

岐伯曰兩陰交盡也帝曰幽明何如岐伯曰兩陰交盡

故曰幽兩陽合明故曰明幽明之配寒暑之異也帝曰

分至何如岐伯曰氣至之謂至氣分之謂分至則氣同分

則氣異所謂天地之正紀也帝曰夫百病之始生也皆

生於風寒暑濕燥火以之化之變也經言盛者瀉之虛者

補之余錫以方士而方士用之尚未能十全余欲令要道

必行桴鼓相應由拔刺雪污工巧神聖可得聞乎岐伯曰

論天地之五運六氣應人之五臟六腑十二經絡而生病也

審察病機無失氣宜此之謂也帝曰願聞病機何如岐伯曰諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣膹鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱發瘧皆屬於火諸痛痒瘡皆屬於心諸厥固泄皆屬於下諸痿喘嘔皆屬於上諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸痙項強皆屬於濕諸逆衝上皆屬於火諸脹腹大皆屬於熱諸躁狂越皆屬於火諸暴強直皆屬於風諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱諸病附腫疼酸驚駭皆屬於火諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱諸病水液澄澈清冷皆屬於寒諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令其調達而至和平此之謂也

至真要大論

此一章論五運六氣之為病治法也病機一十九條實

察病之要旨而有者求之無者求之盛者責之虛者責之一十六字乃答篇首盛者瀉之虛者補之之旨而總結一十九條之義又其要旨中之要旨也河間原病式但用病機一十九條立言而遺此十六字猶有舟無操舟之工有兵無將兵之帥今負僭竊之罪以補之夫諸風病皆屬於肝也風木盛則肝太過而病化風如木太過發生之紀病掉眩之類俗謂之陽痿急驚等病治以涼劑是也燥金盛則肝為邪攻而病亦化風如陽明司天燥金下臨病掉振之類俗謂之陰痿慢驚等病治以溫劑是也諸火熱病皆屬於心也火熱甚則心太過而病化火熱如歲火太過諸譫妄狂越之類俗謂之陽躁譫語等病治以攻劑是也寒水勝則心為邪攻而病亦化火熱如歲水太過病躁悸煩心譫妄之類俗謂之陰

躁鄭聲等病治以補劑是也諸濕病皆屬於脾也濕土甚則脾太過而病化濕如濕勝則濡泄之類仲景用五苓等劑去濕是也風木勝則脾為邪攻而病亦化濕如歲木太過病食泄之類錢氏用宣風等劑去風是也諸氣贖鬱皆屬於肺也燥金甚則肺太過而病化贖鬱如歲金太過甚則咳喘之類東垣謂之寒喘治以熱劑是也火熱勝則肺為邪攻而病亦化贖鬱如歲火太過病咳喘之類東垣謂之熱喘治以寒劑是也諸寒病皆屬於腎也寒水甚則腎太過而病化寒如太陽所至為屈伸不利之類仲景用烏頭湯等劑是也濕土勝則腎為邪攻而病亦化寒如濕氣變物病筋脈不利之類東垣用復煎健步等劑是也其在太過所化之物為盛盛者真氣也其在受攻所化之病為虛虛者假氣也故有其

病化者恐其氣之假故有者亦必求之無其病化者恐其邪隱於中如寒勝化火燥勝化風及寒伏反躁熱伏反厥之類故無者亦必求之其病之化似盛者恐其盛之未的故盛者亦必責之其病之化似虛者恐其虛之未真故虛者亦必責之凡一十九條病機皆用此一十六字但以病化有者為盛無者為虛而不復求其假者虛者為未備故引經傳以證其得失也

論藥物之氣味應天地之陰陽收能內調五藏之氣外絡之邪

帝曰五味陰陽之用何如岐伯曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽六者或收或散或緩或急或燥或潤或奠或堅以所利行之調氣使平帝曰非調氣而得者治之奈何有毒無毒何先何後願聞其道岐伯曰有毒無毒所治為主適大小為制也帝曰請言其

制岐伯曰君一臣二制之小也君一臣三佐五制之中也君一臣三佐九制之大也寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之堅者削之客者除之勞者溫之結者散之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益之逸者行之驚者平之上之下之摩之浴之劫之開之發之適事為故帝曰何謂逆從岐伯曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已至真要大論

此一章論內氣不調得病者之治法也蓋內氣不調而得病故所病寒熱之邪但可於其氣之微者逆治之如氣甚而逆治之則正邪格拒不能勝邪命將難全故但

當從其寒熱之邪於外伏其所主之劑於中然後正邪相入而邪就擒矣東垣所謂薑附寒飲承氣熱服及仲景於白通湯加尿膽治少陰丹溪於苓栢湯皆熟炒治色目婦人惡寒之類是也

帝曰氣調而得者何如岐伯曰逆之從之從而逆之逆而從之從而逆之至真要大論

此一章論內氣本調因外邪得病者之治法也蓋內氣調而得病故不分寒熱之微甚或逆治之或從治之皆可更不須懼其正邪格拒正固則邪自退矣

帝曰病之中外何如岐伯曰從內之外者調其內從外之內者治其外從內之外而盛於外者先調其內而後治其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其內中外不相及則治主病帝曰善火熱復惡寒發熱有如瘧狀或一

日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會遇之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之節瘧亦同法帝曰論言治寒以熱治熱以寒而方士不能廢繩墨而更其道也有病熱者寒之而熱有病寒者熱之而寒二者皆在新病復起奈何岐伯曰諸寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也帝曰善服寒而反熱服熱而反寒其故何也岐伯曰治其王氣是以反也

不治王氣而然者五味各有所屬也

帝曰不治王而然者何也岐伯曰悉乎哉問也不治五味屬也夫五味入胃各歸所喜故酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常也氣增而久天之由也帝曰善方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上下三品之謂也帝曰三

品何謂岐伯曰所以明善惡之殊貫也帝曰善病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其中外各守其鄉內者內治外者外治微者調之其次平之盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹道如法萬舉萬全氣血正平長有天命帝曰善不治五味屬也一本五味二字至真要大論岐伯曰寒熱燥濕不同其化也故少陽在泉寒毒不生其味辛其治苦酸其穀蒼丹陽明在泉濕毒不生其味酸其氣溫其治辛苦甘其穀丹素太陽在泉熱毒不生其味苦其治淡鹹其穀稔秬厥陽在泉清毒不生其味甘其治酸苦其穀蒼赤其氣專其味正少陰在泉寒毒不生其味辛其治辛苦甘其穀丹白太陰在泉燥毒不生其味酸其氣熱其治甘鹹其穀稔秬化淳則鹹守氣專則辛化而俱治故曰補上下者從之治上下者逆之以所在寒熱盛衰而

逆從法

歲味歲穀

調之故曰上取下取內取外取以求其過能毒者以厚藥不勝毒者以薄藥此之謂也

反佐法

氣反者病在上取之下病在下取之上病在中傍取之治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之故消之削之吐之下之補之瀉之久新同法

內調法

帝曰病在中而不實不堅且聚且散奈何岐伯曰無積者求其藏虛則補之藥以祛之食以隨之行水漬之和其中外可使必已

外治法

帝曰有毒無毒服有約乎岐伯曰病有久新方有大小有毒無毒固宜常制矣大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉菓菜食養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法

治先歲氣

必先歲氣無伐天和無盛盛無虛虛而遺人天殃無致邪無失正絕人長命帝曰其久病者有氣從不康病去而瘠奈何岐伯曰昭乎哉聖人之問也化不可代時不可違夫經絡以通血氣以從復其不足與衆齊同養之和之靜以待時謹守其氣無使傾移其形乃彰生氣以長命曰聖王故大要曰無代化無違時必養必和待其來復此之謂也

五常政大論

約方

帝曰氣有多少病有盛衰治有緩急方有大小願聞其約奈何岐伯曰氣有高下病有遠近證有中外治有輕重適其至所為故也大要曰君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君三臣六偶之制也故曰近者奇之遠者偶之汗者不以奇下者不以偶補上治上制以緩補下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄適其至

所此之謂也病所遠而中道氣味之者食而過之無越其制度也是故平氣之道近而奇偶制小其服也遠而奇偶制大其服也大則數少小則數多多則九之少則二之奇之不去則偶之是謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也帝曰善病生於本余知之矣生於標者治之奈何岐伯曰病反其本得標之病治反其本得標之方 帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

至真要大論

運氣占候補遺序

夫五運六氣上古聖人所以參三才而贊化育者也故位天者天文也位地者地理也通乎人氣之變化者人事也然天道有陰陽多少之殊地理有高下氣至有先後之異人之壽天生化之期則損益盛虛之變也此其上下參錯而不可以定數求者焉若夫五六之會終期之日刻漏而分數之亦陳其梗槩焉耳至於氣至之先後勝復之鬱發安可預擬乎故曰數之可數者人中之陰陽也天地之陰陽不可以數推以象見者也夫象者占候之所始道之所生不可不通也今夫天垂象地成形七曜緯虛五行麗地地者所以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也形精之動猶根本之與枝葉也故形盛則精盛形衰則精衰五星明大減小卽五運之太過不及可得而占也今夫

地道實天道虛實者氣之所寓虛者色之所因也五氣應於下則五色彰於上五天之經緯成而後五氣之至可得而占也地爲人之下太虛之中大氣舉之也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以潤之寒以堅之火以溫之故風寒在下燥熱在上濕氣在中火遊行其間寒暑六入故令虛而化生也故烟埃雲物之態山川草木之容皆可得而占焉至於地理有高低陰陽有多少至高之地陰氣常在至卑之地陽氣常在則高下異占也又春氣始於東夏氣始於南秋氣始於西冬氣始於北行有逆順至有遲速則上下左右異占也是皆形精之必效微而顯信而不爽者歟是故古之至人仰以觀於天文俯以察乎地理中以通乎人事然後可以定神明之紀而成變化之用也世之學者求陰陽於支干配合之間論勝負於主客加臨之位不效

則以爲古書不足信也是豈書之罪也哉間因讎校樓氏醫學綱目書覽其後有運氣補註一篇惜其用意甚勤而尚遺古人占候之法是以取諸內經之旨列占候十五篇命曰運氣占候補遺以續樓氏之後云

嘉靖乙丑季春日婁東玄沙邵弁偉元識

運氣占候補遺序

五運氣至之占

帝曰余聞五運之數於夫子不合陰陽其故何也岐伯曰是明道也此天地之陰陽也夫數之可數者人中之陰陽也然所合之數可得者也夫陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬天地陰陽者不以數推以象之謂也

丹天之氣經於牛女戊分齡天之氣經於心尾巳分牛女

戊癸化火又癸與子同屬戊與午連位巳與未同屬皆土分也心尾蒼

天之氣經於危室柳鬼危室壬地柳鬼丁地壬與亥素天

之氣經於氏亢昂畢氏亢乙地昂畢庚地乙與卯玄天之

氣經於張翼婁胃張翼丙地婁胃辛地丙與辰所謂戊巳

分者奎璧角軫則天地之門戶也戊巳位木火金水中間

為長夏南連午西連申故戊巳無方位而經獨言戊分巳

濕土在中火游行其間在天居土夫候之所始道之所生

不可不通也五氣之至各有五色經于分野氣太過則先
之自然可見此占候之所始道之所生不可不通也○五運行大論

五運太過之占

諸壬歲木太過風氣流行脾土受邪上應歲星歲星光明
分有
災也

化氣不政生氣獨治雲物飛動草木不寧甚而搖落上應

太白星

木餘土鬱化政不布於萬物故生氣獨治也風氣動甚草木不寧甚而搖落金來復之也故太白逆

者危也

諸戊歲火太過炎暑流行金肺受邪上應熒惑星收氣不

行長氣獨明雨水霜寒上應辰星

火氣獨行水氣折之辰星逆凌乃寒災於物也

占辰星者常在日之前後三十度其災之發當至南方

諸甲歲土太過雨濕流行腎水受邪上應鎮星變生得位

謂土旺

時月也藏氣伏化氣獨治之泉涌河衍潤澤生魚風雨大

至土崩潰鱗見于陸上應歲星土不務德木

諸庚歲金太過燥氣流行肝木受邪上應太白星收氣峻

生氣下草木斂蒼乾凋隕上應熒惑星金勝而火

諸丙歲水太過寒氣流行邪害心火上應辰星大雨至埃

霧朦鬱上應鎮星水勝土上臨太陽雨水雪霜不時降濕

氣變物上應熒惑辰星辰戌天符之歲水勝而火絕熒惑

○氣交

五運不及之占

諸丁歲木不及燥乃大行生氣失應草木晚榮肅殺而甚

則剛木辟著悉萎蒼乾上應太白星金侮木之上臨陽明

生氣失政草木再榮化氣乃急上應太白鎮星其主蒼早

丁卯丁酉歲陽明上臨是謂天刑運也木氣既少土氣無制故化氣生成急速鎮星太白潤而明蒼色之物早凋落也

復則炎暑流火濕性燥柔脆草木焦稿下體再生華實齊
化上應熒惑太白火復其金太白白露早降收殺氣行寒雨

害物虫食甘黃脾土受邪赤氣後化心氣晚治上勝肺金

白氣乃屈上應熒惑太白星熒惑益明太白芒滅

諸癸歲火不及寒乃大行長政不用物榮而下凝慘而其

則陽氣不化乃折榮美上應辰星水盛火衰也復則埃鬱大雨

且至黑氣乃辱上應鎮星辰星土復於水也

諸巳歲土不及風乃大行化氣不令草木茂榮飄揚而其

秀而不實上應歲星鎮星木盛土抑也復則收政嚴峻名草蒼

凋蒼穀乃損上應太白歲星金復木也上臨厥陰流水不冰蟄

虫來見藏氣不用白乃不復上應歲星巳巳亥歲也厥陰上臨火司于地

故流水不冰蟄虫不藏歲星如常也

諸乙歲金不及炎暑乃行生氣乃用長氣專勝庶物以茂

燥爍以行上應熒惑星收氣乃後上應太白星火盛金衰也復

則寒雨暴至乃零冰雹霜雪殺物陰厥且格陽反上行上

應辰星水復火也

諸辛歲水不及濕乃大行長氣反用其化乃速暑雨數至

上應辰星土盛水衰也上臨太陰則大寒數舉蟄虫早藏地積

堅冰陽光不治上應鎮星辛丑辛未歲也土氣專盛木不得復故鎮星明也復則

大風暴發草晏木零生長不鮮黃氣乃損其穀不登上應

歲星木復土也凡五星之變應常不應卒氣有卒然而動者星亦不為之變也○氣交變大論

復氣應時占

木不及春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政春有

慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復

火不及夏有炳明光顯之化則冬有嚴肅霜寒之政夏有

慘淒凝凜之勝則不時有埃昏大雨之復

土不及四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓拆之政四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖霑之復

金不及夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應夏有炎爍燔燎之變則秋有水雹霜雪之復

水不及四維有湍潤埃雲之化則不時有和風生發之應四維發埃昏驟注之變則不時有飄蕩振拉之復夫五運

之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之氣之常也故曰天地之變化神明為之紀陰陽之往復寒

暑彰其兆此之謂也氣交變大論

五星應化占

帝曰夫子之言歲候太過不及而上應五星今夫德化政令災眚變易非常而有也卒然而動其亦為之變乎岐伯曰承天而行之故無妄動無不應也卒然而動者氣之交

變也其不應焉故曰應常不應卒此之謂也帝曰其應奈何岐伯曰各從其氣化也如歲星之化以風應之災感之化以熱應之之類是也

帝曰其行之徐疾逆順何如岐伯曰以道留久逆守而小是謂省下以道謂順行留久謂過應留之日數也省下察天下人主之善惡也以道而去

而速來曲而過之是謂省遺過也已去復來逆行而速委曲經過是謂遺其過而

省察久留而環或離或附是謂議災與其德也如環之遠也火議罪金議殺木水議德也應近則小應遠則大近謂犯星猶在遠謂犯星去久大小

常之一其化減小常之二是謂臨視省下之過與其德也德者福之過者伐之是以象之見也高而遠則小下而近

則大故大則喜怒邇小則禍福遠歲運太過則運星北越北越謂背而行也運氣相得則各行以道無尅伐之嫌故守常而各行於中道也故

歲運太過則畏星失色而兼其母如木太過則土星色赤也不及則色

兼其所不勝如木不及則木星色白也○天氣制勝已地氣制已勝天制色地制形色兼其所不勝則

制勝已之謂也帝曰其災應何如岐伯曰亦各從其化也故時

至有盛衰凌犯有逆順五星所至之時王相為盛囚死為

為逆災留守有多少留守日多則災深留守日少則災淺形見有善惡

星喜重也為見善星怒躁宿屬有勝負徵應有吉凶矣二十八宿十

辰有相尅星凌犯遇宿屬尅制則災不成帝曰其善惡何謂也岐

伯曰有喜有怒有憂有喪有澤有燥此象之常也必謹察

之光色圓明不盈不縮怡然瑩然人見之而喜星之喜也

光色勃然臨人芒彩滿溢人見之畏星之怒也光色微

耀乍明乍暗星之憂也光色迥然不彰不瑩不與眾

同星之喪也澤洪潤也燥枯燥也○氣交變大論

五氣動亂占

帝曰夫子之言五氣之變四時之應可謂悉矣夫氣之動

亂觸遇而作發無常會卒然災合何以期之岐伯曰氣之

動變固不常在而德化政令災變不同其候也東方生風

風生木其德敷和其化生榮其政舒啓其令風其變振發

其災散落南方生熱熱生火其德彰顯其化蕃茂其政明

曜其令熱其變銷爍其災燔炳中央生濕濕生土其德溽

蒸其化豐備其政安靜其令濕其變驟注其災霖潰西方

生燥燥生金其德清潔其化緊斂其政勁切其令燥其變

肅殺其災蒼隕北方生寒寒生水其德淒洽其化清澁其

政凝肅其令寒其變凜烈其災冰雪霜雹是以察其動也

有德有化有政有令有變有災而物由之而人應之也氣

變大論

五氣鬱發占

五運之氣鬱極乃發待時而作太過不及其發異也太過

者其數成不及者其數生土常以生也

土鬱之發巖谷震驚雷殷氣交埃昏黃黑化為白氣飄驟

高深擊石飛空洪水乃從川流漫衍田牧土駒化氣乃敷
善為時雨始生始長始化始成雲奔雨府雨府太陰霞擁
朝陽山澤埃昏其迺發也以其四氣雲橫天山浮游生滅
佛之先兆也

金鬱之發天潔地明風清氣切大涼乃舉草樹浮烟燥氣
以行霧霧數起殺氣來至草木蒼乾金乃有聲山澤焦枯
土凝霜鹵佛乃發也其氣五夜零白露林莽聲凄佛之先
兆也

水鬱之發陽氣乃辟陰氣暴舉大寒乃至川澤巖凝寒霧
結為霜雪甚則黃黑昏翳流行氣交乃為霜殺水乃見祥
陽光不治空積沉陰白埃昏瞶而乃發也其氣二火前後
太虛深玄氣猶麻散微見而隱色黑微黃佛之先兆也
木鬱之發太虛埃昏雲物以擾大風乃至屋發折木木有

變太虛蒼埃天山一色或氣濁色黃黑鬱若橫雲不起雨
而乃發也其氣無常木發無時長川草偃柔葉呈陰松吟高山
虎嘯巖岫佛之先兆也

火鬱之發太虛腫翳太明不彰炎火行大暑至山澤燔燎
材木流津廣廈騰烟土浮霜鹵止水乃滅蔓草焦黃風行
惑言濕化乃後刻終大温汗濡玄府其乃發也其氣四動
復則靜陽極反陰濕令乃化乃成華發水凝山川氷雪焰
陽午澤佛之先兆也有佛之應而後報也皆觀其極而乃
發也木發無時水隨火也水發在二火前後亦氣有多少

發有微甚微者當其氣甚者兼其下徵其下氣而見可知
也六元正紀大論○五氣所兼之化如水發而雹雪土發而飄驟木發而毀折金發而清明火發而曛昧皆兼下
之承氣也

地理高下左右占

帝曰四時之氣至有早晏高下左右其候何如岐伯曰行有逆順至有遲速故太過者化先天不及者化後天帝曰願聞其行何謂也岐伯曰春氣西行夏氣北行秋氣東行冬氣南行故春氣始於左秋氣始於右冬氣始於後夏氣始於前此四時正化之常故至高之地冬氣常在至下之地春氣常在

六元正紀大論

六氣正變占

黃帝問曰六化之正六變之紀何如岐伯對曰夫六氣正紀有化有變有勝有復有用有病不同其候夫氣之所至也厥陰所至為和平少陰所至為暄太陰所至為埃溽少陽所至為炎暑陽明所至為清勁太陽所至為寒霧時化之常也厥陰所至為風府為豐啓少陰所至為火府為舒

榮太陰所至為雨府為圓盈少陽所至為熱府為行出陽明所至為司殺府為庚蒼太陽所至為寒府為歸藏司化之常也厥陰所至為生為風搖少陰所至為榮為形見太陰所至為化為雲雨少陽所至為長為蕃鮮陽明所至為收為霧露太陽所至為藏為周密氣化之常也厥陰所至為風生終為肅少陰所至為熱生中為寒太陰所至為濕生終為注雨少陽所至為火生終為蒸溽陽明所至為燥生終為涼太陽所至為寒生中為溫德化之常也厥陰所至為毛化少陰所至為羽化太陰所至為倮化少陽所至為羽化陽明所至為介化太陽所至為鱗化德化之常也厥陰所至為生化少陰所至為榮化太陰所至為濡化少陽所至為茂化陽明所至為堅化太陽所至為藏化布政之常也厥陰所至為飄怒大涼少陰所至為大暄寒太陰

所至為雷霆驟注烈風少陽所至為飄風燔燎霜凝陽明
所至為散落温太陽所至為寒雪水雹白埃氣變之常也
厥陰所至為撓動為迎隨少陰所至為高明焰為曠太陰
所至為沉陰為白埃為晦暝少陽所至為光顯為彤雲為
曠陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴太陽所至為剛
固為堅芒為立令行之常也凡此十二變者報德以德報
化以化報政以政報令以令氣高則高氣下則下氣後則
後氣前則前氣中則中氣外則外位之常也六元正紀大論

在泉淫勝占

歲厥陰在泉風淫所勝則地氣不明平野昧草乃早秀
少陰在泉熱淫所勝則焰浮川澤陰處反明
太陰在泉濕淫所勝則埃昏巖谷黃反見黑
少陽在泉火淫所勝則焰明郊野寒熱更至

陽明在泉燥淫所勝則霧霧清暝

太陽在泉寒淫所勝則凝肅慄慄俱至真要大論

司天淫勝占

厥陰司天風淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流
水不冰

少陰司天熱淫所勝怫熱至火行其政大雨且至

太陰司天濕淫所勝則沉陰且布雨變枯槁

少陽司天火淫所勝則温氣流行金政不平

陽明司天燥淫所勝則木乃晚榮草乃晚生名木斂生苑
于下草焦上首

太陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰俱至真要大論

占六氣之勝

厥陰之勝大風數舉裸虫不滋

少陰之勝炎暑至木乃津草乃萎

太陰之勝雨數至燥化乃見

少陽之勝暴暑消燠草萎水涸介虫乃屈

陽明之勝大涼肅殺華英改容毛虫乃殃

太陽之勝凝凜且至非時水冰羽乃後化

至真要大論

占六氣之復

厥陰之復偃木飛沙保虫不榮

少陰之復赤氣後化流水不冰熱氣大行介虫不復

太陰之復大雨時行鱗見于陸

少陽之復大熱將至枯燥燔灼介虫乃耗

陽明之復清氣大舉森木蒼乾毛虫乃厲

太陽之復水凝雨水羽虫乃死

至真要大論

釋亢則害承乃制

經曰亢則害承乃制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病此數句前人解說極多能會經旨者殊少詳其文意當云亢則害害則敗亂生化大病承乃制制則生化外列盛衰只作兩下解之爲是夫天地之間五類生化互有所勝互有所制地氣制已勝天氣制勝已此以地氣之制已勝者言之也夫六氣之用各歸其所不勝而爲化故太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少陰熱化施於陽明陽明燥化施於厥陰厥陰風化施於太陰此地之四方分爲六步以應天外六節氣令之治者也天地之氣互爲盈虛惡所不勝歸所同和同者盛之異者衰之當其位則盛非其位則衰地氣左遷於中天氣右行於外內外相因盛衰相倚故曰外列盛衰也若夫亢則傷害已勝不受勝已者之施化於是有勝則有復勝復更作敗亂生化之常故

上勝則天氣降而天下勝則地氣遷而上甚則易位氣交
易則大變生而病作矣所謂害則敗亂生化大病者是也
此一勝一制一正一變之異化也河間云亢則害承者之
母氣於是承者乃起而制之是知有非位之勝復而不知
制則生化外列盛衰爲當位之正化也樓氏云火亢則害
水承乃制之制生則化至冬著盛是以夏之暑生冬之寒
化以冬之寒制夏之暑亢恐不相及之甚是知有當位之
正化而不知害則敗亂生化大病爲非位之勝復也安可
卽以今日旣亢之乖氣復爲後日得制之平氣耶殊不知
亢制字義甚明言亢則非平言制則非亢矣生化盛衰乃
當位之常敗亂生化乃非位之變也二家全不分別何也

釋病機十九條

天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以

生喜怒憂思恐故五運之氣內應人之五臟諸風掉眩皆
屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸濕腫滿皆屬於脾諸氣膈
鬱皆屬於肺諸痛痒瘡皆屬於心是也諸厥固泄皆屬於
下調下焦腎肝之疾也諸痿喘滿皆屬於上謂上焦心肺
之疾也此皆五臟之疾病機由於內動者也天之三陰三
陽化六氣以生寒暑燥濕風火內應人之六腑外引十二
經絡諸熱蓄癰皆屬於火手少陽三焦經也諸禁鼓慄如
喪神守皆屬於火手少陰心經也諸逆衝上皆屬於火手
厥陰心包經也諸痙項強皆屬於濕足太陽膀胱經也諸
腹脹大皆屬於熱足太陰脾經也諸躁狂越皆屬於火足
陽明胃經也諸暴強直皆屬於風足厥陰肝經也諸病有
聲鼓之如鼓皆屬於熱手太陰肺經也諸病肘腫疼酸驚
駭皆屬於火手陽明大腸經也諸轉反戾水液渾濁皆屬

於熱手太陽小腸經也諸病水液澄澈清冷皆屬於寒足少陰腎經也諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱足少陽膽經也此皆十二經絡之邪病機由於外入者也劉河間以此著書漫然不分所屬殊不深考何也樓氏但糾其治法之偏而未及乎此故并爲正之云爾

醫學綱目運氣占候終

莊生有言為善無近名為惡無近刑可以事親可以養生可以盡年其惟醫之謂乎余家世賴茲為事親養生之業庶幾免近名近刑之累惟未明莊生言是醫與否然以余家觀之則醫實有類乎莊生之言矣比部履齋曹先生恬然仕宦獨好方書讐校精苦余輩不及也是書篇帙浩博傳寫日久訛缺殆半徵先生幾能成書哉先生

薄軒冕而願鄭重於醫之名耶若夫養志
盡年則仕途與山林所得不翅多矣

玄沙邵弁偉元二 跋