

實用中藥大要

官田武雄 原著
錢信忠 譯

一九四九年八月印

實用中藥大要目錄

第一編 總論	(1)
第一章 調製法	(1)
一、採集與乾燥	(1)
二、生熟與陳新	(1)
三、修治法(炮製法)	(2)
第二章 應用方法	(2)
一、丸藥	(2)
二、散劑	(3)
三、煎藥	(3)
四、酒漬	(3)
五、膏藥	(3)
第三章 藥的性味與效能	(3)
一、性味	(4)
二、效能	(4)
第四章 處方的構成與藥性	(6)
一、處方的構成	(7)
二、君臣佐使之含義	(7)
三、藥之七性	(7)
四、合藥的方式	(8)
第五章 藥的成份	(9)
一、Alkaloide	(9)
二、Glyco	(10)

三、Sapponine	(11)
四、Glyksansen 糖酸	(11)
五、Oetherische Oele 揮發油	(11)
六、脂肪油Fette Oele	(12)
第二篇 各論	(13)
第一章 發汗及解熱劑	(13)
一、茵陳蒿 (白蒿)	(13)
二、黃芩 (條芩)	(14)
三、葛根 (黃芹)	(14)
四、菊花 (野菊花)	(15)
五、荊芥	(15)
六、牛黃	(15)
七、香薷	(16)
八、柴胡	(16)
九、細辛	(17)
一〇、山梔子	(17)
一一、犀角	(18)
一二、松蘿	(18)
一三、升麻	(18)
一四、紫蘇	(19)
一五、常山	(19)
一六、石膏	(20)
一七、知母	(20)
一八、地龍	(21)
一九、竹茹	(21)
二〇、防風	(22)

第二章 健胃劑	(22)
一、黃連	(22)
二、黃蘗 (黃柏)	(23)
三、藿香	(24)
四、甘松香	(24)
五、枳實	(24)
六、苦木	(24)
七、桂枝	(25)
八、厚朴	(25)
九、吳茱萸	(26)
一〇、胡椒	(27)
一一、薑蒲	(27)
一二、生薑	(27)
一三、丁香	(28)
一四、陳皮	(28)
一五、當藥	(29)
一六、橙皮	(29)
一七、肉豆蔻	(29)
一八、香杏	(30)
一九、牡蠣	(30)
二〇、木香	(30)
二一、熊胆	(31)
二二、龍胆	(31)
第三章 瀉下劑	(32)
一、營實	(32)
二、決明子 (江南豆)	(32)

三	、來李	子	(33)				
四	、鼠李	子	(33)				
五	、大黃		(34)				
六	、續	隨	子	(35)			
七	、白桃	花	(35)				
八	、巴豆		(35)				
九	、蓖麻	油	(36)				
一〇	、無	花	果	(36)			
一一	、蘆	薈	(37)				
第四章	收斂與止瀉劑			(37)				
一	、阿	仙	藥	(37)			
二	、拳	參	(38)				
三	、五	倍	子	(38)			
四	、地	榆	(38)				
五	、白	頭	翁	(39)			
六	、蘇	鐵	(千年	裏)	(39)		
第五章	驅蟲劑			(40)				
一	、烏	梅	(40)				
二	、鶴	蟲	(香	鹿	草)	(40)	
三	、苦	楝	皮	(40)			
四	、山	椒	(花	椒)	(41)		
五	、鵝	胡	菜	(海	人	草)	(41)
六	、使	君	子	(42)			
七	、百	榴	(42)				
八	、大	蒜	(43)				
九	、南	瓜	仁	(43)			

一〇、荜椒	(44)
一一、檳榔子	(44)
一二、綿馬	(44)
第六章 祛痰劑	(45)
一、遠志(瓜蔓)	(45)
二、括樓	(45)
三、桔梗	(46)
四、款冬	(46)
五、皂莢	(47)
六、沙參	(47)
七、石蒜	(48)
八、竹節人參(土參)	(48)
第七章 鎮咳	(48)
一、罌粟殼	(48)
二、杏仁	(49)
三、五味子	(49)
四、南天燭	(50)
五、貝母	(50)
六、枇杷	(51)
七、麻黃	(52)
八、蔓陀羅花	(53)
第八章 強心劑	(53)
一、金銀花	(53)
二、樟	(53)
三、鈴蘭(君影草)	(54)
四、福壽草	(54)

五	、萬年青	(54)
第九章	利尿劑	(55)
一	、威靈仙	(55)
二	、越橘	(55)
三	、夏枯草	(55)
四	、甘遂	(56)
五	、玉蜀黍 (蕊)	(56)
六	、牛膝	(57)
七	、香薷	(57)
八	、山扁豆	(58)
九	、酸漿 (燈籠草)	(58)
十	、車前	(58)
十一	、商陸	(59)
一二	、藜草 (十藥)	(59)
一三	、桑白皮	(59)
一四	、蒼朮	(60)
一五	、瀉澤	(60)
一六	、豬苓	(61)
一七	、獨活	(61)
一八	、東瓜子	(62)
一九	、忍冬花金銀花	(62)
二〇	、敗醬苦菜	(62)
二一	、白檀	(62)
二二	、茯苓	(63)
二三	、望之	(63)
二四	、茅根	(63)

二五、木通	(64)
二六、木角豆	(64)
第十章 鎮靜劑	(65)
一、酸棗仁	(65)
二、川芎	(65)
三、釣藤鈎	(66)
四、當歸	(66)
五、半夏	(67)
六、牡丹皮	(68)
第十一章 鎮瀉劑	(68)
一、烏頭	(68)
二、烏藥	(69)
三、鐵草	(69)
四、消夫藍(薔紅花)	(70)
五、芍藥	(70)
六、天南星	(70)
七、白芷	(71)
八、伏龍肝	(71)
第十二章 鎮痛劑	(72)
一、延胡索	(72)
二、胸草	(72)
三、蟾酥	(73)
四、白屈菜	(73)
五、防已	(73)
六、萇苔	(74)
第十三章 滋養、強壯及變質藥	(75)

一	、玉竹(萎蕤)	(75)
二	、淫羊藿	(75)
三	、鼯鼠糞(土龍糞)	(75)
四	、黃耆	(76)
正	、黃精	(76)
六	、海松子	(77)
七	、粳米	(77)
八	、何首烏	(77)
九	、胡桃仁	(77)
一〇	、五加皮	(78)
一一	、山茱萸	(78)
一二	、薯蕷(山藥)	(79)
一三	、女貞	(79)
一四	、蛇牀子	(79)
一五	、穿山甲	(80)
一六	、大棗	(80)
一七	、地骨皮(枸杞)	(80)
一八	、地黃	(81)
一九	、天門冬	(82)
二〇	、天麻	(82)
二一	、黃絲子	(82)
二二	、杜仲	(83)
二三	、土茯苓	(83)
二四	、人參	(83)
二五	、人中白	(84)
二六	、肉蓯蓉	(85)

二七、巴戟天(不凋草).....	(85)
二八、反鼻蛇(蝮蛇).....	(85)
二九、麥門冬(麥冬).....	(86)
三〇、木天蓼.....	(86)
三一、靈菇仁.....	(87)
三二、連錢草.....	(87)
三三、麻角.....	(88)
第十四章 矯味藥.....	(88)
一、甘草.....	(88)
二、土常山.....	(89)
三、薄荷葉.....	(89)
四、蜂蜜.....	(89)
第十五章 止血劑.....	(90)
一、阿膠.....	(90)
二、小連翹.....	(90)
三、艾葉.....	(91)
四、川骨(萍蓬草).....	(91)
五、馬勃(馬屁勃).....	(91)
六、白蔞.....	(92)
七、蒲黃.....	(92)
八、木賊.....	(92)
第十六章 通經劑.....	(93)
一、馬鞭草.....	(93)
二、紅花.....	(93)
三、香附子.....	(94)
四、三稜.....	(94)

五	、草棉	(94)
第十七章 外用劑		(95)
一	、三七 (金不換)	(95)
二	、紫根 (紫草)	(95)
三	、水蠟花	(96)
四	、接骨木	(96)
五	、接骨草	(96)
六	、羊蹄 (金喬)	(96)
七	、連翹	(97)
第十八章 殺虫劑		(97)
一	、苦參	(97)
二	、除虫菊粉	(98)
三	、馬醉木	(98)
四	、百部	(98)
五	、藜蘆	(98)
第三篇 處方集		(101)
一	、茵陳蒿湯	(101)
二	、茵陳五苓散	(101)
三	、越婢湯	(101)
四	、越婢加半夏湯	(101)
五	、黃芩湯	(102)
六	、黃土湯	(102)
七	、黃連湯	(102)
八	、黃連解毒丸	(102)
九	、甘草湯	(102)
一〇	、甘草小麥大棗湯	(102)

- 一一、甘草乾薑湯…………… (102)
- 一二、葛根湯…………… (103)
- 一三、葛根加苓朮附湯…………… (103)
- 一四、葛根加半夏湯…………… (103)
- 一五、葛根黃連黃芩湯…………… (103)
- 一六、乾薑黃連黃芩人參湯…………… (103)
- 一七、乾薑人參半夏丸…………… (104)
- 一八、橘皮湯…………… (104)
- 一九、橘皮竹茹湯…………… (104)
- 二〇、桔梗湯…………… (104)
- 二一、桔梗白散…………… (104)
- 二二、枳朮湯…………… (104)
- 二三、枳實芍藥散…………… (104)
- 二四、芍歸膠艾湯…………… (104)
- 二五、桂枝湯…………… (105)
- 二六、桂枝加芍藥湯…………… (105)
- 二七、桂枝加芍藥大黃湯…………… (105)
- 二八、桂枝加茯苓湯…………… (105)
- 二九、桂枝加茯苓附湯…………… (105)
- 三〇、五苓散…………… (106)
- 三一、吳茱萸湯…………… (106)
- 三二、柔術桂枝湯…………… (106)
- 三三、柴胡桂枝乾薑湯…………… (106)
- 三四、酸棗仁湯…………… (106)
- 三五、三物黃芩湯…………… (106)
- 三六、真武湯…………… (106)

三七、四逆散	(107)
三八、四逆湯	(107)
三九、瀉心湯	(107)
四〇、參連湯	(107)
四一、生薑瀉心湯	(107)
四二、鷓鴣菜湯	(107)
四三、芍藥甘草附子湯	(107)
四四、炙甘草湯	(108)
四五、小青龍湯	(108)
四六、小陷胸湯	(108)
四七、小柴胡湯	(108)
四八、小承氣湯	(108)
四九、小半夏湯	(108)
五〇、小半夏加茯苓湯	(108)
五一、走馬湯	(109)
五二、澤瀉湯	(109)
五三、大青龍湯	(109)
五四、大柴胡湯	(109)
五五、大承氣湯	(109)
五六、大黃牡丹皮湯	(109)
五七、大陷胸湯	(109)
五八、大建中湯	(110)
五九、竹葉石膏湯	(110)
六〇、豬苓湯	(110)
六一、調胃承氣湯	(110)
六二、通脈四逆湯	(110)

- 六三、通脈四逆加熊胆湯…………… (110)
- 六四、當歸芍藥散…………… (110)
- 六五、當歸四逆湯…………… (110)
- 六六、當歸四逆加吳茱萸生薑湯…………… (111)
- 六七、桃仁承氣湯…………… (111)
- 六八、人參湯…………… (111)
- 六九、伯州散…………… (111)
- 七〇、排膿散…………… (111)
- 七一、排膿湯…………… (111)
- 七二、八味丸…………… (112)
- 七三、白頭翁湯…………… (112)
- 七四、白頭翁加甘草阿膠湯…………… (112)
- 七五、半夏湯…………… (112)
- 七六、半夏瀉心湯…………… (112)
- 七七、半夏厚朴湯…………… (112)
- 七八、麥門冬湯…………… (112)
- 七九、備急丸…………… (113)
- 八〇、白朮湯…………… (113)
- 八一、白朮加桂枝湯…………… (113)
- 八二、白虎加人參湯…………… (113)
- 八三、附子瀉心湯…………… (113)
- 八四、附子粳米湯…………… (113)
- 八五、茯苓甘草湯…………… (113)
- 八六、茯苓湯…………… (113)
- 八七、麻黃湯…………… (114)
- 八八、麻黃杏仁甘草石膏湯…………… (114)

- 八九、麻黃連翹赤小豆湯…………… (114)
- 九〇、麻黃杏仁薤白甘草湯…………… (114)
- 九一、木防己湯…………… (114)
- 九二、木防己加茯苓湯…………… (114)
- 九三、木防己去石膏加茯苓湯…………… (115)
- 九四、薤白仁湯…………… (115)
- 九五、薤白附子散…………… (115)
- 九六、苓薤朮甘湯…………… (115)
- 九七、苓桂朮甘湯…………… (115)
- 九八、苓桂甘棗湯…………… (115)
- 九九、龍胆瀉肝湯…………… (115)

實用中藥大要

第一篇 總論

第一章 調製法

調製時當注意採集的時間，乾燥與生熟，陳新與修治等各項，今概述於下：

一、採集與乾燥

採集莖葉當選夏日繁茂時期，朝晨採集最佳。

採掘根於八月以後二月以前，冬季能認清根的藥材，則十二月、一月採掘為最良時期（根中含成份最精）。

採葉於夏秋晒乾，於冬春陰乾。例如：紫蘇、薄荷、益母草之類。七、八月早晨摘其生葉，除去虫砂，最好用水洗，當日曝之，翌日陰之，長久日曝，有損形色氣味。

二、生熟與新陳

生用藥物如芍藥根，使其乾燥而使用之。

熟用藥物如地黃根，經一定的時間煮沸而使用之（別名熟地黃）。

陳新依古代之六陳八新說：吳茱萸、橘皮、狼毒、半夏、枳實、麻黃等六種以陳品為貴。紫蘇、薄荷、蘭花、赤小豆、桃花、澤蘭、槐花、款冬花等八種以新鮮者為良。

要之，採集時有不快臭味，富刺激性者，可緩和一時期，即用陳者爲佳。而有香氣富有揮發成份者，放置有變敗之虞者，一般使用新鮮者爲良。

三、修治法（炮製法）

修治法即是多種多樣的調製法，炮炙，炒焙，煨蒸，蜜製，酒製，醋製，薑製，土製，鹽製，童便製等。

中藥往往同一藥物修治法，因時而異，因用而異，且經不同之修治，藥度與用途亦都改變。今舉香附子爲例：

- | | |
|----------------|------------|
| 1、生者行上胸膈，達外皮膚。 | 6、青鹽炒，補腎氣。 |
| 2、熟者走下肝腎，外腰足。 | 7、酒浸炒，行經路。 |
| 3、炒黑止血。 | 8、醋浸炒，消積聚。 |
| 4、得童便浸炒，入血分補虛。 | 9、薑汁炒，化痰飲。 |
| 5、鹽水漬炒，入血分潤燥。 | |

炮炙之操作，防藥物之變質，避生虫，有良佳之香味、色相，將各種方法列下：

- (1) 炮——用麪粉或厚濕紙包，入熱灰燒之。
- (2) 煨——在熱灰中轉輾之。
- (3) 炙——切成大小適當之片塊，塗以蜜酒、薑汁等在炭火中炙（甘草、黃耆即用此法）。
- (4) 煨——將藥物投入炭火燒（石膏、龍骨即用此法）。
- (5) 焙——炙藥物於厚紙上或瓦上。
- (6) 炒——藥物切後入瓦器中，置炭火上炒之。

第二章 應用方法

上述調製法，製成之藥，適應各種藥物之性質與效用，有丸、散、湯、酒、漬、煎膏等用法。

一、丸藥

製丸藥將各種藥物一一研好，經過炮炒等調製，去其濕氣，入藥碾研爲細末，過篩，至全量都過篩爲止。

數種粉末混合，用蜜及粉糊等練合延爲細長條，左手塗胡麻油，右手指亦蘸上油，搓成適當丸子後，再用金銀箔辰炒等作衣，使乾燥即得。丸藥之大小按藥之用量而決定之。

二、散劑

製散劑藥要乾燥，先用日光或炭火去濕，碾爲細末，用絹篩2—3回，篩過按處方混合待用。

三、煎藥

煎藥即名湯頭，法以藥物細剉投入存水之砂鍋，用炭火中等度之火力，保持小沸，煎液至半量以下，暫離火靜置，待渣沉淀，適合服用之溫度即服之。

一般的煎劑的要領，細剉藥物，——日量20—40瓦，水600西西，煎至200西西爲止。

四、酒漬

用燒酒等酒類浸漬藥物，溶出其有效成份以供藥用，與丁幾相等。

五、膏藥

加動物油與植物油入藥物，煎出供藥用，主要供外科用。

第三章 藥的性味與效能

中藥的性能，上古嘗草知味，決定其藥性，某藥有相當效能，倘與其他藥適當的配伍，更可發揮其協力與綜合作用，比用單味藥效果更能充分。

一、性味

性分寒、熱、溫、涼四性。味分酸、鹹、苦、甘、辛五味（以性味論，效能基於陰陽五行之說）。

四性之性能區別：（1）石膏、芝硝、黃連等屬於寒藥，因其性寒，主治陽症，即用於熱性，炎症，充血等爲目的。（2）附子、乾薑屬熱藥。因其性熱，主治陰症。如應用於寒性水毒等症。（3）當歸、川芎、人參屬於溫藥。因其性溫，主治稍傾向之陰症。（4）半夏、桃仁、芍藥屬於涼藥因其性涼，用於稍傾向之陽症。（5）其他尚有平藥，如甘草之性中立不偏，陰陽皆可用。

五味之學說：（1）酸，脾病禁酸，宜食鹹，酸能傷筋，酸能收緩、斂散。

（2）鹹，腎欲鹹，鹹入腎。心病禁鹹，宜食酸，鹹走血。血病宜多食。

（3）苦，心欲苦，苦入心，苦傷氣，鹹勝苦。壯氣堅酸苦能養氣。

（4）甘，甘能緩急、調中，脾欲甘，甘入脾，甘傷肉，酸勝甘。

（5）辛，辛能散結，潤燥，致津液通氣。肺欲辛，辛入肺。肝病禁辛，宜食甘。

二、效能

神農本草經，依其效能分上藥、中藥、下藥三種。（1）上藥爲養命藥，多服無毒，久用不傷人。（2）中藥爲養生藥，有毒者與無毒者，治病補虛。（古代區別疾與病，病即是慢性病，疾即是急性病）（3）下藥有毒多治病，不能長久服用。

上藥、中藥大體作用緩和，下藥性猛烈，一劑有誤生命之慮。

茲將藥的性味、禁忌、調製法，效能等列一表於後，以示概要：

藥名	性	味	禁	忌	調製法	效能
阿膠	甘	溫	畏	大黃	剉後入土器炒	治勞損，虛羸，崩漏，尿血，經水不調，潤燥，治肺萎，肺痿。
茵陳蒿	苦	寒	忌	火	去根用葉	黃疸要藥，去濕利水，涼熱。
烏藥	辛	溫	—	—	去前後細固處剉焙	治小便滑瀉，腳氣，疝氣，氣厥的頭痛，婦人之血氣，色情之鬱結，順氣。
延胡索	辛	溫	—	—	多剉少焙	治心腹痛，破血通經，行血，中氣，治血暈，血崩。
遠志	苦辛	溫	忌	鐵	洗好去護頭，剉碎浸甘草湯，乾焙。	安神、止驚、鎮心、強志，治健忘。
甘草	甘	平	—	—	削去粗皮剉焙	補脾、溫中，調和諸藥，生用瀉火熱炙則去寒。
桔根	苦	平	—	—	去護頭細剉久焙	治咽喉痛，通鼻塞，開胸、清痰，散風，排膿。
藿香	辛	微溫	忌	火	洗後乾剉	溫中、開胃、止嘔吐，治心腹痛，行氣，發散風寒。
桂枝	辛	熱	忌	火	刮去粗皮剉	發汗，治皮膚風，入手臂，舒筋。
紅花	辛	溫	—	—	去混合物噴酒少焙	除瘀血破留血，止痛，通經閉。
犀角	酸	寒	忌	鹽	去白處，剉	清心、去煩熱、鎮驚、避邪、解毒、治吐血、衄血、下血、惡、癩惡瘡。

芍藥	酸	寒	忌	鐵	水洗到乾 酒漬而焙	制肝、斂肺、去血熱、止 腹痛，治瀉痢。
川芎	辛	溫	忌	火	到浸熱湯	養血，調經，治頭痛、面 風開鬱、行血、中氣。
當歸	辛	溫	畏	藜蘆 生薑	洗去土到焙	補心、去瘀、生血、溫中 ，潤腸。
地骨皮	苦	寒	忌	鐵	洗去土，到焙	退肌熱涼血。
天門冬	甘	寒	惡	款冬 到	浸湯去皮除心 到	潤燥、保肺、定喘、止咳 嗽治痰。
獨活	辛	溫	—	—	洗去土土 去腐到焙	除頸項難動，兩足濕痺與 諸風。
人參	甘	溫	畏	五靈脂	洗去土到焙	補大元氣，止渴、溫寒不 可缺之補藥。
貝母	辛	平	反	烏頭	浸薑汁到焙	止嗽、化痰痰。開肺之 鬱、除煩。
茯苓	甘	溫	—	—	去皮筋到焙	補胃、利小便、去濕、消 痰、保肺。

第四章 處方的構成與藥性

古代醫書把病大別爲陰陽，陰又分三種，太陰、小陰、厥陰。陽亦分爲三種，太陽、小陽、陽明。綜合各患者之症狀確定爲何證，適應此証而處方，分合方主方補助等方，一般用汗、吐、下、和，四種手段達攻病治之目的。

西藥爲利用協同作用增強藥效，除去副作用，而幾種藥配伍應用

。中藥的處方中，用單味者極稀有。

西醫的處方根據主藥，佐藥，矯正藥，賦形藥。而中藥處方同樣根據君臣佐使。在配伍禁忌上有相須，相使，相畏，相反，相殺之用語。

一、處方的構成

處方構成分單方、複方、合方、加減法等種類。

(1) 單方。處方之構成藥物數比較少，為對合方而用之名稱。

(2) 複方。藥物種數比較多的處方。

(3) 合方。二三種以上的處方合併之處方。

(4) 加減法。一定的處方中加一二樣藥或減一二樣藥。此等處方經歷長年日、月及經驗而成，每加減一藥必須注意藥量，藥性及其微妙之效果。

二、君臣佐使之含義

據神農本草經之上藥、中藥、下藥、構成處方，再別為君臣佐使，主治病者為君，助君者為臣，應君者為使。佐與臣意義不差。

譬喻：小柴胡湯的處方：柴胡為君藥，黃芩、人參、甘草、大棗、生薑四種為臣，半夏為使藥。

三、藥之七性

中藥之七性等於配伍禁忌：

(1) 單行。不用輔藥之單方劑。

(2) 相須。同類之藥物有不能離開之關係，例如：人參和甘草，黃蘗和知母，互為君臣之藥性。

(3) 相使。對君藥用之佐使藥，即相須相使二藥，相成併用。

(4) 相惡。藥物奪自己之性能，不能相成併用，例外者，牛黃忌龍骨，而龍骨得牛黃更良佳。

(5) 相反。兩藥不能合併，比相惡更有利害之作用。

(6) 相畏。藥物互相征服，如巴豆對黃連，大黃，藜蘆等爲相畏之藥。

(7) 相殺。能征服他藥之毒；如半夏與生薑併用，生薑制半夏之毒得安全奏效。

相惡相殺有制止副作用之性能。

古來之有名處方犯禁忌者亦多，故不能一概論定。

四、合藥的方式

取大柴胡湯葛根湯爲例，兩者藥物一樣，則取多量而矣。

因 大柴胡湯	因 葛根湯	因 大柴胡湯葛根湯合方
柴胡 8.0	葛根 7.0	柴胡 8.0
芍藥 3.0	大棗 5.0	枳實 4.0
半夏 6.0	甘草 3.0	桂枝 3.5
黃芩 3.0	麻黃 5.0	葛根 7.5
生薑 5.0	桂枝 3.5	麻黃 5.0
大黃 2.0	生薑 5.5	甘草 3.5
大棗 3.0	芍藥 3.5	半夏 6.0
枳實 4.0	——	大棗 5.0
		黃芩 3.0
		芍藥 3.5
		生薑 5.5
		大黃 2.0

以上之合方藥量多少，適當的增減，通常一日量以600西西水，煎至200西西服用，對發汗、嘔吐、瀉下之特別目的，有速效。水量宜多，如稍強，注意勿過濃厚。

第五章 藥的成份

近年來，對和漢藥之成份，作化學分析者甚多，給與學術界很大貢獻，古代之本草家收集新藥品，識別真假，藥效的臨床試驗，各人見解不同，一切以臨床藥效為基礎，今能知其成份，不能不為一段進步。

然而迄今所發現之化學成份，不能斷定為藥效之主要成份，因量少，分解性強，抽出困難，關係藥效。單以化學成份尚不能決定。

今將一般成份述之，蛋白質、糖類、無機鹽類等為一般植物所含有，其他特殊植物所含有者謂固有成份，此即形成和漢藥的有效成份，此有效成份，已被揭曉者化學分類如下：

一、Alkoloide

Alkoloide 有強毒性，含有一般的窒素原子，類似 Alkoloide 性質，此與酸結合形成鹽，Alkoloide 自身不溶於水，若與酸結合為多量水可溶性鹽。含量最多植物，毛茛科，罌粟科、茄科，防已科茜草科等雙子葉植物中。而薔薇科，唇形科，蘭科，含有芳香性植物中少。單子葉比較雙子葉植物亦少。

藥名 Alkoloide 成份。

罌粟……Morphin, $C_{17}H_{19}NO_3$; Norcartia, $O_{22}H_{23}NO_7$;

Codein, $C_{18}H_{21}NO_3$; pheloin,

$C_{19}H_{21}$

NO_3 ; 及其含有他數種 Alkoloide, Pheloin

烏頭……Aconitin, $C_8H_7NO_{11}$ Meaconitin,

$C_{33}H_{45}$

NO11, Hypocainin $C_{33}H_{45}NO_{10}$

石蒜……Lycorin $C_{16}H_{17}NO_4$; Sekisoma
 $C_{16}H_{19}NO_4$ 。

南天燭……Domestini, $C_{29}H_{21}NO_4$; Nandini,
 $C_{19}H_{19}NO_4$ 。

黃連……Beshesin, $C_{20}H_{19}NO_5$ 。

苦參……Matrin, $C_{15}H_{24}N_2O$ 。

阿已……Sinomenin, $C_{17}H_{23}NO_4$; Disinomenin,
 $C_{38}H_{44}N_2O_4$ 。

麻黃……Ephedrin, $C_{10}H_{15}NO$ 。

曼陀羅……Scopolamin, $C_{17}H_{21}NO_4$; Hyoscyamin,
 $C_{17}H_{23}NO_3$; Atropin, $C_{17}H_{23}NO_3$ 。

二、Glycoside, 配糖體

葡萄糖與其他糖類或物質結合成於炭、水、酸、三元素之化合物總稱。爲植物界廣泛存在之成份。

植物中之酵素作用酸或熱共熱分解爲其他物質(如 Phenol Alcohol, 酸及芳香性化合物), 有苦味, 少甘味, 配糖體存在於各種植物之葉、樹皮、根部、種子。其含量因產地時間單次, 生長程度有顯著之差別, 此恐基因於配糖體, 爲植物細胞內炭化水素之新陳代謝產物。

藥名	配糖體成份
營石……	Mulbiblorin, $C_{27}H_{30}O_{15}$ 。
萬年青……	Rhodein ($C_{30}H_{44}O_{10}$)。
車前……	Aucubin, $C_{15}H_{24}O_{10}$ 。
當藥……	Suertromarin, $C_{16}H_{22}O_{10}$ 。

白桃花……Komphesol, $C_{15}H_{10}O_6$ 。

牡丹皮……Peonol, $C_9H_{10}O_2$ 。

三、Saponine

配糖體之一種，有更複雜之份子構造，若振盪其水溶液，生石鹽樣之泡沫，若吸入其粉末發特性之噴嚏一般有毒性，強烈著名 SaPotosin，各種單子葉植物，少數之隱長植物中含有。其成份存在於植物之全草中。

藥名 Saponine 成份

遠志……Polygalit, $C_6H_{12}O_5$ 。

桔根……RiwYosaPnin, $C_{29}H_{48}O_{11}$ 。

皂莢……GlediacoPonin, $C_{59}H_{100}O_{20}$ 。

土參……PanascroPonin, $C_{37}H_{62}O_{10}$ 。

四、Gerbsouren 鞣酸

鞣酸廣泛存在於植物界，有收斂性味，遇鹽化鐵呈色反應遇膠質，Alkoloide 則沉澱，鞣酸即 Tannin 之總稱，藥用為收斂止瀉。

藥名……鞣酸成份。

阿仙藥……Kotechu gerbouse, $C_{15}H_{21}O_6$ 。

越橘……GerdiOure (鞣酸)。

五倍子……沒食子鞣酸 GolluaGerbsOure。

地榆……GerbsOure (鞣酸)。

五、Oetherische Oele, 揮發油

植物中存在之芳香揮發性的化合物之混合物，若與水蒸氣共熱則溜出油狀物質。無單一化合物，多為 Perpen 類。

藥用為芳香性健胃藥，鎮靜藥，矯臭藥。

藥名 Oetherische Oele 成份。

桂皮……Oleum Cinamomi。

- 香薷……………Elsholziaketon ; $C_{10}H_{14}O_2$ 。
- 川芎……………Cnidium locton ; $C_{12}H_{18}O_2$;
 Cnidium sOure ; $C_{12}H_{19}O_2-O-$
 $C_{16}H_{17}$ 。
- 蒼朮……………Atroctylol (SerquiterPenolkohol) ;
 $C_{15}H_{24}O$ 。
- 陳皮……………C₁ Limonan ; $C_{10}H_{16}$ 。
- 薄荷……………Oleum menthar 。

六、脂肪油 Fette oele

一般植物種子含有，不揮發有散發性質，藥用上有瀉下劑，及大
 楓子油治癩病。

- 爲：Oleum Rini (亞麻仁油) 。
- Oleum gynocsidae (大楓子油) 。
- Oleum crotom (巴豆油) 。
- Oleum Ricini (蓖麻子油) 。

第二篇 各論

第一章 發汗及解熱劑 *Dlaphotetjcs er*

Antipyretica

一、茵陳蒿

別名白蒿 (8—9月採集乾燥) (菊科)。

性味 特異芳香苦=苦辛微寒。

禁忌 忌火熱。

品質 採集細葉莖，陰乾有青色，稱棉茵陳爲上品。

成份 全草中含有揮發油 (成分 *Bipinen* *Co-piben*，
 $C_6H_5-C_7H_9$)，(果實中有 *Dimethyl osculetin*)。

藥理 本品之水浸液，注射犬時胆汁分泌著明亢進，有抑制腸管運動作用。抽出 *Dimethyl osculetin* 呈水浸液同樣之藥理作用。

效用 發汗，解熱，利水，淨血藥，古來黃疸之要藥。有驅虫效。

本草提要：溫寒勝熱，發汗利水，爲治黃疸之君藥。

用量 一日量8—15g煎劑

新藥 *Jetemin* 爲茵陳蒿之有效成份，爲利胆藥，用於肝臟病疾患，胆道諸疾患，浮腫，腹水等，一日量1.5—2gm。

處方 茵陳蒿湯：茵陳蒿18.0山梔子6.0大黃2.0水600.0煎成200.0；一日三次冷服 (黃疸病)。

二、黃芩 (別名條芩) (唇形科) (11—12月採其根乾燥)

性味 微苦—苦平

禁忌 畏丹砂，牡丹皮，藜蘆。

品質 茶褐色，堅實者爲上品，老根中宜爲次品，稱枯芩。

成份 有兩種 γ -米利誘導體 Wogonin $C_{16}H_{12}O_5$ 及 Baicalin $C_{21}H_{16}O_{11}$ 。

效用 解熱強壯藥，對嘔吐、下痢有效。

本草提要： 下血閉療痰熱，骨中熱，腹痛，瀉火，除濕去黃，止血痢。

用量 一日量3—10g爲煎劑。

處方 黃芩6.0 甘草0.5 大棗2.0 水600.0 煎成300.0，一日三次分服(解熱)。

三、葛根

(別名黃芹10，——3日採其根)

性味 甘平

品質 新鮮者緻密白色爲上品，有板葛根，方葛根二種。

成份 根含有多量之澱粉，葉有 Odenin Asporogin，及 Gintam in Ockure 等。

效用 古來爲發汗解熱之要，治熱性病之口渴，有去頭痛嘔氣之效。

本草提要： 解肌是熱，生津止渴發汗消炎身大熱嘔吐解諸毒。

用量 一日量8—16g爲煎劑。

處方 葛根湯：

葛根7.0 龍黃5.0 桂枝4.0 大棗5.0 生薑6.0 甘草4.0 水600.0 煎成200.0，一日三次溫服(感冒熱性傳染病)。

(1) 撒布藥：

葛根5.0 天花粉5.0 撒酸0.5以上混合(汗疹濕疹)

四、菊花 (野菊花)

性味 芳香性微苦，有黃白二種。

成份 含有揮發油成份，有一種特異之芳香，皆有 Terpenalkohol $C_{10}H_{16}O_4$ Chom-ziulen $C_{15}H_{18}$ NouglsOure, CoPrinsOure。

效用 發汗，驅風，解熱藥，可作芳香保溫浴湯料。

用量 一日量9 — 10g為煎劑。

處方 發汗劑：

菊花8.0 桂枝1.0 紫蘇葉1.0 薄荷葉1.0 甘草0.6以上分爲三色，服用時沖開水熱湯。(感冒)

五、荊芥

性味 特異芳香=辛苦溫。

禁忌 忌火熱。

成份 含有揮發油，此成份爲石旋 Menthan 非旋光性 Menthan 石旋 Limon (a-limonen) 等。

本草提要：散風熱，清頭目，利咽喉，消瘡腫。

用量 一日量8 — 10g為煎劑。

處方 (1) 荊芥6.0 防風4.0 大黃2.0 水600.0 煎成200.0，一日三次分服。(解熱)

(2) 荊芥7.0 大黃2.0 桂枝6.0 水600.0 煎成200.0。一日三次溫服。(感冒)

六、牛黃

爲山羊、羚羊、牛等胆囊中之結石。

性味 甘涼。

禁忌 惡龍骨、龍胆、地黃、常山、畏牛膝、乾漆。

品質 黃色球圓形，有微小之白點，注意假品。

成份 有幾成份未詳，含有 Bibirolin，即胆汁色素，不溶於水，溶於酒精。

效用 解熱、利胆、利痰、小兒五胆驚風等。

本草提要 清心解熱、利痰、治驚癇、益肝膽。

用量 一日量0.5—1.0g爲散劑。

處方 人參牛黃散

人參牛黃等分爲散，薄荷水調【小兒驚熱】。

七、香鼓

性味 甘寒

成份 含有多量蛋白酵素，有效成份未詳。

效用 消炎解熱，解毒藥有滋養效。

用量 一日量10—20爲煎劑。

處方 搗子鼓湯：香鼓8.0搗子5.0水600.0煎成200.0，一日三次分服（消炎解熱）。

八、柴胡

性味 特異芳香=苦寒。

禁忌 惡皂角藜蘆。

品質 有南柴胡北柴胡，香味完全，質柔軟爲上品，硬而易折爲下品。

成份 有 SoPomine 及脂肪油，其他未詳。

藥理 日本藤氏試驗，溫刺家兔使發熱，用柴胡或其他7種汗藥方之解熱藥。（20：100）往口與以25c.c.柴胡爲最效；1—15時後，體溫至常溫，或常溫以下，停服又上昇，又有人發表柴胡有消滅或阻止瘧原虫之發育作用。

效用 解熱藥，除惡寒戰慄胸部苦悶，特別常用於瘧疾。

本草提要 主下心腹，去腸胃中結氣，飲食積聚，寒熱邪氣；上

推陳致新。

用量 一日量5——10g爲煎劑。

處方 小柴胡湯：

柴胡 10·人參3·5生薑3·5半夏7·0黃芩3·5甘草3·5大棗3·5

水600·0煎成200·0，一日三次溫服（胸襟苦悶寒熱往來，嘔者）。

九、細辛

性味 芳香性辛辣=辛溫。

禁忌 忌山茱萸、黃耆，畏硝石、滑石，反藜蘆。

品質 外面淡褐色，內部白色味甚辛爲上品，市上有假造之土細辛。

成份 含有揮發油，其成份爲 Methylen genol, Asorginisto
mitrinsoure

效用 發汗祛痰藥，感冒頭痛有效，含在口中能去臭氣，治口舌
之瘡。

本草提要 散風邪，故諸風濕痺咳嗽，上氣頭痛脊强者宜之。

用量 一日量3——10g爲煎劑。

處方 細辛2·0半夏2·0茯苓2·0桔梗2·0桂枝2·0甘草1·0水600·0

煎成200·0，一日三次溫服（受寒感冒）。

十、山梔子

性味 芳香性苦味=苦寒。

品質 圓小形、皮薄、黃赤色爲上品，形長大者繪具用。

成份 含黃色素，有 a-crocin 之同一物，其他未詳。

效用 解熱、淨血藥、黃疸、淋疾、腫病有效，其他打撲挫傷和
以麥麩貼用，爲無害之色素料。

本草提要 去熱風毒，解五種黃病，利五淋：利小便，解瀉瀉，
明目。

用量 一日量2—15g爲煎劑。

處方 (1) 梔子鹽皮湯：山梔子5.0黃鹽5.0甘草2.0水600.0煎成200.0，一日三次分服(身黃發熱，心煩者)。

十一、犀角

性味 苦酸味寒。

禁忌 忌鹽。

品質 容易真直縱斷爲特質，斷面如束毛，偽品爲水牛類。

成分 未詳

效用 解熱解毒，強壯藥，古來防麻疹之內攻，常用爲發疹藥。

本草提要 治小兒驚風，涼心、清胃、解毒。

用量 一月量0.5—1.5g煎劑皆可。

處方 犀角湯：犀角、防風、木通、桑白皮、甘草各等分爲煎劑(解熱解毒)。

十二、松蘿 (生於深山樹木灰白綠色)

性味 甘平

成分……爲Borhatins Ü ure; $C_{19}H_{20}O_7$

Usninus Ü ure; $C_{18}H_{16}O_7$ 的地衣酸及含有

Lichenin等。

效用 利尿祛痰藥對結核之解熱及痲癩熱有效。

本草提要 療痰熱濕癩，止虛汗，頭風，女子陰寒腹痛。

用量 一日量2—6g爲煎劑

處方 松蘿6.0甘草2.0水600.0煎成200.0，一日三次分服。

十三、升麻

性味 收斂性苦味=甘苦平。

禁忌 忌火熱。

品質 肉肥大黑色爲上品，肉帶青色細瘦爲下品。

效用 解熱、解毒、淨血藥、口內炎、扁桃腺炎煎劑爲含嗽料，
麻疹亦有效。

本草提要 解毒、散熱、療頭痛、熱風諸惡毒、咽喉腫痛、口瘡、
痘疹。

用量 一日量 5—15g 爲煎劑。

處方 升麻 80 葛根 50 大蜜 10 芍藥 20 生薑 10 甘草 10 水 600.0
煎成 200.0；一日三次分服（麻疹）。

十四、紫蘇

性味 特異芳香性=辛溫。

禁忌 忌火熱。

成分 含有揮發油，成分爲 Perillaoldehyd—Pinin Limonen
等藥的紫蘇油有強防腐力，一石醬油用 20g 有完全之防腐力；Peri-
llaoldehyd-d-antionim $C_9H_{13}-CH=NOH$ 有砂礫 2000 倍之
甘味，且防腐力強，猶爲 Perillaoldehyd。

效用 亢奮性發汗鎮咳、芳香性健胃、利尿藥，有鎮靜鎮痛解毒
之效，紫蘇油爲菓子或其他之賦料。

本草提要 葉：發汗利氣、和血、開胃、下食。

實：潤肺、下氣、止嗽、鎮咳。

用量 一日量 3—10g 爲煎劑。

處方 參蘇湯：

紫蘇、人參、陳皮枳殼、桔梗、甘草、木香、半夏、乾薑
、前胡各 2.0 水 600.0 煎成 200.0；一日三次分服（感
冒發熱發疹凝節）。

十五、常山

性味 辛苦寒

品質 根稱常山；嫩苗稱蜀漆爲同一目的藥用；黃色者爲上品。

成分 未詳，末部含有Berberin，葉含有揮發油。

CamPhen. 7. linolal

效用 爲解熱藥，特別是瘧疾之要藥，莖葉有殺菌之效，故煎汁質驅蟲目的而外用。

本草提要 常山，蜀漆爲治瘧疾之要藥，不可多進，令人嘔逆。

用量 一日量4—7g爲煎劑。

處方 常山甘草湯：

常山6.0 甘草2.0 水600.0 煎成200.0；一日三次分服（熱性病瘧疾）。

十六、石膏

爲天然之含水硫酸鈣。

性味 甘淡

禁忌 忌巴豆與鐵

品質 有兩種石膏：(1)軟石膏，即是含水硫酸鈣 $\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，呈白色者爲上品。(2)硬石膏即是無水硫酸鈣 CaSO_4 。

成份 硫酸鈣以外尚有夾雜，有酸化鐵，硅酸礬土等。

效用 解熱藥，身熱頭痛，譫語，齒痛，咽喉痛有效。

本草提要：清熱降火，解肌，緩脾，益氣，生津，止渴。

用量 一日量4—12g煎劑或散劑。

處方 白虎湯：

石膏10.0 知母6.0 粳米12.0 甘草2.0 水600.0 煎成200.0，一日三次冷服。（熱性諸病）

十七、知母

性味 微苦味=苦寒。

禁忌 忌鐵。

品質 肥大者有黃毛，味苦甘滋潤者爲上品，細長瘦質輕虛爲下

品。

成分 未詳。

效用 解熱藥有鎮咳祛痰之効。

本草提要：潤腎燥及心肺，通小腸，消痰，止渴，熱中，除邪氣，補不足，益氣。

用量 一日量4—10g爲煎劑。

處方 (1)白虎加桂枝湯：知母5.0 石膏13.0 甘草1.6 粳米10.0 桂枝2.5 水400.0 煎成100.0，一日二次冷服。
(熱性諸病)

(2)知母3.0 茅根3.0 桑白皮2.0 麥門冬3.0 水200.0 煎成200.0，一日三次分服。(肺炎)

十八、地龍

別名蚯蚓

性味 鹹寒。

成份 有效成份未詳，含有脂肪蠟蛋白質等。

效用 賞用爲解熱藥有利尿效。

本草提要：清熱利水，治中風，癱，喉痹，痰厥寒。

用量 一日量5—15g爲煎劑。

十九、竹茹

性味 微苦寒。

成份 未詳。

效用 清涼藥，有解熱、鎮咳、止血之效；竹瀝竹葉

有同等藥效。

本草提要：瀉上焦、煩熱、涼血。

用量 一日量3—12g爲煎劑。

處方 竹葉石膏湯：

竹葉3.0石膏12.0半夏4.0人參2.0甘草1.5粳米7.0麥門冬
8.0水600.0，一日三次冷服。(熱性諸病)

二十、防風

性味 特異香氣，緩和微苦=辛甘溫。

禁忌 惡生薑，藜蘆，白藜，芫花，畏草薺。

成分 未詳。

效用 爲感冒藥，有頭痛、發汗、祛痰等效；中風、盜汗亦有用
之者。防風之名稱即有預防邪風之意義；又一說此名稱爲預防中風而
配。

本草提要：發表，清肺，去風，勝濕，散頭目，經絡，滯氣，
習濕。

用量 一日量5—15g爲煎劑。

處方 防風當歸湯：

防風，當歸，大黃，黃芩，柴胡，芍藥，人參，甘草各
3.0滑石8.0水600.0煎成200.0，一日三次溫服(感冒)

第二、健胃劑

Stomachica

一、黃連

性味 強苦味=苦寒。

禁忌 畏牛膝，款冬，惡菊花，玄參，白朮，白鮮皮，芫花。

品質 表皮帶黃褐色，內面深黃色，充實者爲上品。

成份 主要成份爲 Berberin $C_{26}H_{17}NO_5$ ；其他尚含有 Polmatin
 $C_{21}H_{21}NO_4$ Coptianin $C_{19}H_{15}NO_4$ Wornin $C_{19}H_{15}NO_5$ 等成份 C_{19}
 $H_{15}NO_5$ 等成份 ($C_{20}H_{15}NO_4$)。

效用 苦味健胃藥，消化不良，腸加答兒有效。

本草提要 止消渴除水，調胃，厚腸，益胆，療口疳。

用量 一日量0.5—1.5g爲煎劑或散劑。

處方 (1) 黃連1.0黃蘗1.0當歸1.0阿膠1.0甘草0.5水500.0煎成200.0，一日三次分服。(腸加答兒)

(2) 黃連末0.5大黃末1.0桂枝末0.5以上混和，一日三次分服。(健胃)

二、黃蘗(黃柏)

性味 強苦=苦寒。

禁忌 忌乾漆。

品質 深黃色，強粘爲下品。

成分 主要成份爲 Berberin，尙有其他成份，Pomogatin Alkaloide及結晶性之 Reten Obokunon $C_{28}H_{35}O_7$ 苦味質之 Obokuloctoo 等。

藥理 黃蘗製成鹽酸 Berberin 對大腸菌，傷寒菌，霍亂菌，有殺菌作用。其成份中的 Obokulocton 之苦質。對蚯蚓毒力優於山道年，而對蠅虫却劣於山道年。

效用 爲健胃，止瀉解熱藥，對腹痛，消化不良，變質強壯，眼疾(皮眼)等有效。其他打撲，挫骨，以泥狀粉布貼布。

本草提要：療五臟，腸胃中結熱，黃疸，腸痔。

用量 一日量5—10g爲煎劑。

新藥 有 Pulvis Wosa Tanvonin 二種，由黃蘗中抽之 Berberin 主成份，爲健胃整腸殺菌藥。

處方 (1) 梔子蘗皮湯：

梔子14.0黃蘗12.0甘草6.0水600.0煎成200.0，一日三次分服(健胃整腸)。

(2) 黃蘗末1.0桂皮0.5重曹2.0，以上混合，一日三次分服(整腸健胃)。

(3) 黃蘗末、山梔子末，桂皮末各等分，以上混合以蛋

白聯合貼用患部（打撲腫脹疼痛）。

三、藿香

性味 特異芳香=辛甘溫。

成份 一種揮發油，未詳。

效用 健胃鎮吐清涼藥。

本草提要 和中開胃、止嘔吐、去惡氣、進飲食。

用量 一日量7—15g爲煎劑。

四、甘松香

性味 特異芳香，=辛甘溫。

品質 甘松香有兩種，蝦採甘松，外皮灰褐色，根莖稍屈曲多生鱗葉，形以蝦狀爲上品，葉甘松爲下品。

成份 含有揮發油，主要份爲一種 Sordiloben。

效用 爲芳香健胃劑，又爲藥香料。

本草提要 理諸氣、開脾鬱，惡氣卒心，腹痛滿下氣。

用量 一日量3—6g爲煎劑。

五、枳實

性味 特異芳香，性苦味=枳實=苦寒，枳殼=苦酸溫。

成份 揮發油，其他未詳。

效用 爲發汗祛痰，芳香健胃藥。

本草提要 枳殼：破氣、行痰，利胸膈，寬腸胃，枳實：消食、散飲、去胃中溫熱。

用量 一日量6—10g爲煎劑。

處方 枳朮方：

枳實21.0朮6.0水600.0煎成200.0，一日三次分服。

六、苦木

性味 永久殘留之強苦味。

成份 含有 Quassin 苦味質及 tannin 質。

藥理 Quassin 用適量，有促進唾液、胆汁、尿之分泌；若過量則引起咽頭痛眩暈嘔吐，筋力弱下痢等等副作用。

效用 苦味健胃藥，藥局方有苦木丁幾，苦木越幾斯，又有驅蟲之效，故其煎汁可為農用之殺虫藥殺蠅藥；

用量 一日量 0.5—2g 為散劑煎劑。

七、桂枝

性味 特異之芳香性，辛烈微收斂性=辛甘溫。

禁忌 忌火熱。

品質 有 *Cinnomomum laureiric* 紫色味辛甘為上品，本桂皮 *Cinnomomum coss'a* 味辛甘中品，*Yealan* 桂皮 *Cinnomomum zeilanicum* 赤色味甘美中品，含有揮發油（桂皮油），還有 *Eimtaldehyd* 桂酒精醋酸 *Fanin* 澱粉樹脂粘液等。

效用 健胃矯味，矯臭藥，古來藥方為發汗，解熱，鎮痙，頭痛等要藥。

本草提要：主利肝肺氣，心腹寒熱，冷痰，霍亂轉傷，頭痛，出汗，止煩，堅筋骨，止唾，咳嗽通血脈。

用量 一日量 3—15g 為煎劑。

處方 桂皮湯。

桂皮 1.5 芍藥 7.5 生薑 7.5 大棗 7.5 甘草 5.0 水 500.0 煎成 300.0，一日三次溫服。（感冒）

八、厚朴

性味 香性苦味=辛苦。

禁忌 忌溼瀉，硝石，寒水石，黑豆。

品質 國產外面褐色，內面紫黑色，可認白色為細結晶。

成份 揮發油 *Bomagnelol C10O18O2* 等之化合物。

效用 健胃，整腸，祛痰，有治瘧疾，腹痛，嘔吐，霍亂，中暑，利水等效。

本草提要 益氣消痰，療霍亂，腹痛脹滿，胃中冷逆，胸中嘔不止。

用量 (1) 厚朴三物湯

厚朴6.0 枳實3.0 大黃3.0 水600.0 煎成200.0，一日三次分服(痢疾)。

(2) 厚朴6.0 大黃2.0 枳實2.0 芝硝1.0 水600.0 煎成200.0，一日三次分服(瘧疾)。

九、吳茱萸

性味 特異芳香性，味頗辛辣=辛溫。

品質 味苦辛者為上品。

成份 含有 Evoden $C_{10}H_{12}$ 結晶成份及 Evodrom $C_{19}H_{17}N_3$

O Putoecorpein $C_{18}H_{13}NO_2$ 二種有機鹽基。

藥理 服用多量吳茱萸發生錯覺，視力障礙或毛髮脫落。

效用 為芳香性健胃劑，感冒，吐瀉，腹痛，便秘，消化不良，痲痛，脚氣，筋疼痛有效，為保溫浴腸料。

本草提要 能溫腸胃，通關節，除水腫，療心腹冷痛，寒疝脚氣，腎氣。

用量 一日量5 - 10g為煎劑或散劑。

新藥 Kutom'n (止血藥)

處方 (1) 吳茱萸湯：

吳茱萸14.0 人參大棗2.5 生薑5.0 水300.0 煎成100.0 頓服(脚氣)。

(2) 吳茱萸末2.0 木香末1.0 黃連末1.0，以上混合，一日三次分服(健胃)。

(3) 吳茱萸5.0 乾薑3.0 水600.0 煎成 200.0 — 日三次分服
(嘔吐便秘)。

十、胡椒

味性 芳香性，峻烈味=辛溫。

品質 有黑白二種。

成份 主成份有機鹽基之 Piperin 微量之揮發性 Alkoloibc Piperidin。

藥理 胡椒力量有充進食慾之效，若用大量，局部作用刺激胃壁，起充血性之炎症。

效用 健胃驅風藥，又腹痛齒痛有效。腹痛時胡椒 49 粒，乳香 4.0 爲末，男子用生薑酒，女子用當歸酒服下即治，爲香味嗜好料。

本草提要： 燻腸胃除寒濕，取胃虛脹，冷積，陰毒，牙齒浮熱作痛。

用量 一日量 1.5—5g 爲散劑或丸劑。

一一、葛蒲

性味 芳香性苦味=辛溫。

成份 含有揮發油，其他成份 Asaron (Proleulyl-trimethoxybenzol) $C_{12}H_{16}O_3$ ，還有一種 Phenol Barmitin 酸。

效用 清涼健胃藥，有鎮痛，鎮靜，驅蟲之效，婦人之腰冷，腹痛等，爲保溫浴腸料。

本草提要： 開心丸，補五臟，通九竅，明目，出聲音，溫腸胃，止小便利。

用量 一日量 3—8g 爲煎劑散劑丸劑。

一二、生薑

性味 特異芳香性苛烈味=辛溫。

禁忌 惡黃芩，黃連。

品質 生薑剝除外皮，混石灰水煮沸晒乾，乾薑去外皮，使其乾燥。

成份 有結晶性辛味成份 Zingeron $C_{11}H_{14}O_3$ 及油狀辛味成份 Shoyool $C_{17}H_{24}O_3$ 。

藥理 Emgeron 與動物服用無中毒作用，若注入血液中立即起運動麻痺。

效用 辛味性健胃劑，又有驅風，鎮咳，祛痰，鎮嘔，惡心等有效。

本草提要： 散寒，發表，調中，消痰，鎮頭痛，治鼻塞，噁逆，止嘔吐。

用量 一日量 3—8g 為煎劑。

一三、丁香

性味 特異芳香性，峻烈味=辛溫。

禁忌 忌火熱，畏鬱金。

成份 含有揮發油，其他成份為 Eugenol $C_{10}H_{12}O_2$ ，Corgol $C_{15}H_{24}$ 等。

效用 芳香，健胃，驅風藥，亦有製成芳香阿莫尼阿精及芳香而用，驅齒，傷麻質斯浸棉球塗擦。

本草提要： 緩胃、補腎、治胃冷、嘔噦、泄利。

用量 一日量 0.7—1.5g 浸劑或散劑。

一四、陳皮

性味 芳香性苦味=苦溫。

品質 陳皮者已成熟果之皮，青皮者未成熟果之皮。

成份 含有揮發油及 Hesperidin $C_{28}H_{34}O_{15}$ 配糖體，其他果實中，之果酸（拘才緣酸）亦含有 1—3%。

效用 芳香，健胃，發汗藥有鎮咳，鎮嘔，鎮瀉，利尿之效。

本草提要： 療胸中鬱熱逆氣、消痰。

用量 一日量6—15g爲煎劑。

處方 (1) 陳皮10.0 木香6.0 人參6.0 丁香1.0 半夏8.0 水600.0
煎成200.0，一日三次分服(健胃)。

(2) 陳皮末0.5 黃蘗末0.3 黃連末0.3 人參末0.3 甘草0.3
以上混合，一日三次分服(健胃)。

一五、苦藥

性味 強苦味=大苦寒。

成份 含有苦味配糖體 Swertiomarin $C_{16}H_{12}O_{10}$ 苦藥酸

Bwertiosäure 及 gentisin $C_{14}H_{10}O_5$ 及 Swertisin $C_{13}H_{10}O_6$ 等。

效用 苦味健胃藥，對消化不良、腹痛，下痢等有效。

用量 一日量15—5g爲煎劑或散劑。

十六、橙皮

性味 特異芳香之苦味，=苦溫。

品質 外面類褐色粗糙，內面類白色有芳香性臭味。

成份 含有揮發油，其他成份爲石枧 Limonen (未熟果中含有 HeoPeridin配糖體)。

效用 芳香苦味健胃藥，局房中之橙皮糖漿，丁機等應用。

本草提要： 散胃腸惡熱，消食去痰，降氣消積殺疝積痛。

十七、肉豆蔻

性味 芳香性辛味=辛溫。

禁忌 忌銅鐵。

品質 外淡褐色卵圓形，內容充實爲上品。

成份 Pinen Dipentcn, Myristical, Mystsfein 等成爲揮發油脂

醇糖類澱粉色素等。

效用 健胃整腸消化藥，矯味矯臭藥。

本草提要： 暖脾胃，固大腸，治宿食，治小兒吐逆，不下乳，腹痛。

用量 一日量 1—3g 爲 散劑或丸劑。

處方 肉豆蔻末 0.5 桂枝末 0.5 丁香末 0.2 白糖 1.0，以混和，日三次分服（健胃）。

十八 薔杏

成份 未詳。

效用 煎用健胃目的，食用有整腸便通治胃腸之效。

新藥 Anticarcinou。

十九、牡蠣

性味 鹹寒。

禁忌 惡麻黃、辛夷、吳茱萸。

成份 有碳酸石灰、磷酸石灰，硫酸。

效用 制酸健胃藥，身體虛弱用之爲強壯之目的。

本草提要： 化痰清熱除濕斂汗。

用量 一日量 3—8g 爲煎劑、散劑、丸劑。

處方 牡蠣散。

牡蠣 4.0 黃芪 4.0 麻黃 4.0 浮小麥 100 粒水 600.0 煎成 200.0，一日數回服用（止汗）。

二十、木香

性味 特異芳香性，稍有苦味=辛苦溫。

禁忌 忌火熱。

品質 濡紙色，熱灰中埋蒸製，搓去粗皮，若咬有粘感及充分之香味爲上品。

木香分二種，土木香 *Cempositocpflanz* 青木香又稱馬兜鈴。

成份 含有木香揮發性。

效用 爲芳香健胃藥，有利尿，發汗，祛痰，驅蟲，強壯之效，
或作薰香及衣服防虫劑用之。

本草提要 消肺熱，行壅焦氣，治痰嗽，喘促一切氣痛。

用量 一日量0.5—1.5g 爲煎劑。

處方 (1) 香蓮丸，木香末黃連末各等分，混合爲丸，一日量
5g之丸劑(腸加答兒)。

(2) 土木香5.0厚朴1.0白 1.0枳實1.0陳皮1.0水600.
0煎成200.0，一日三次分服。(胃加答兒。)

(3) 馬兜鈴1.5枳椇1.5人參1.0陳皮1.0知母1.0桑白皮
1.0紫蘇1.0甘草1.0水600.0煎成200.0一日三次分服(喘
息)。

二一、熊胆

性味 微焦臭苦味=苦寒。

禁忌 忌防己，地黃。

品質 有真熊胆，有人工熊胆，後者用牛胆黃連，黃蘗膏，蘆薈
，阿位伯樹膠粉等偽造的。

成分 有一般胆汁成份Glycocol Tanroecols ure Chlosterin等。

效用 苦味健胃藥，有興奮鎮痛鎮靜解毒之效，古時急驚常備之
效。

本草提要 療心胸痛，諸腹痛諸痢，痢疾，止嘔吐，消一切卒
患。

用量 一日量0.5—2g 散丸劑。

二二、龍胆

性味 強苦味=苦寒。

禁忌 忌火及鐵。

成份 含有苦味配糖體Gentropicisin $C_{16}H_{20}O_9$ 之糖基Gentieno^o
 $C_{12}H_{18}O_{16}$

效用 苦味健胃劑。

本草提要 瀉胆肝火，除胃中伏熱，療骨間寒熱，盜汗，驚瀾，
 咽喉痛，風熱。

用量 一日量0.3—3g煎成散劑。

處方 (1) 龍胆2.0黃芩1.0大黃1.0水600.0煎成200.0一日三次
 分服(健胃)。

(2) 龍胆末0.5黃蘗末0.5生薑末0.3桂枝末0.5茵香末0.3
 糖化素0.5重曹0.5以上混合，一日三次(胃弱)。

第三章 瀉下劑

Katat.co

一、營實

性味 稍稍甘溫。

品質 成熟者效不顯著。半青半紅的未成熟者有效，貯時當密封，
 臨用時再剉。

成份 瀉下成份爲Multiflorin $C_{27}H_{30}O_{15}$ 及果實之紅色素。

藥理 粉末狀配糖體注射家兔靜脈內最小致死量爲體重1Kg.0.2
 。。依據臨床試驗，成人0.2內服3—9小時後起數次下痢，無不快
 之症狀。

效用 峻下利尿，過量則暴瀉，要注意。

本草提要 主癰疽下停水利關節。

用量 一日量2—5g爲煎劑。

處方 營實2.0大黃2.0水300.0煎成100.0頓服(便秘)。

二、決明子(別名江南豆)

性味 緩和=鹹平。

品質 長形的粒子，外面滑澤呈黃褐色質堅硬。有石決明；即鮫的貝亮。

芝決明 荳科
草決明 茭科
山扁豆 荳科

此三有決明之名易於混同。

成份 有 Emodin $C_{15}H_{10}O_5$ (Xanthylanthracin) 及生葡萄糖之配糖體。

效用 緩下強壯藥，又有肝臟疾類，癱瘓質斯，喘息視力補強之效，其他毒虫毒蛇咬傷後外用。

本草提要： 治肝熱、風眼、赤淚，每日取一匙空心吞之，百日後夜見物光，益腎解蛇毒。

用量 一日量5—10g為煎劑。

三、牽牛子

性味 緩和油樣。

品質 外黑褐色堅脆中白色，仁黑牽牛子為上品，白色為次品。

成份 瀉下成份為樹脂配糖體 Phobitin。

效用 峻下、利尿、瀉下作用顯著，要注意，牽牛子不為阿拉伯根之代用品。

本草提要： 通下焦鬱氣，通水利兩便。

用量 一日量1—3gm為散藥或丸藥。

處方 大黃牽牛散：大黃 2.0 牽牛子 1.0 以上研為細末頓服（便秘）

四、鼠李子

性味 苦涼。

品質 採集後經一年用為佳。

成份 含有 Rompherol $C_{15}H_{10}O_6$ 經水分解生配糖體與 GhryioPta

as Ūro。

藥理 鼠李了的配糖體，作用於下腸下部特爲大腸，其作用仰或腸管自身恐是副交感神經末端麥與奮而反射性刺激腸黏膜，使充進腸蠕動；人內服 0.08 — $9.1g$ · 4 — 6 小時後腸鳴，腹部腫脹及瀉用，本物質有利尿作用Kampherol有與本配體相似，但作用較弱。

效用 緩下、利尿。

本草提要： 療寒熱瘰癧，除水腫脹滿。

用量 一日量 0.2 — $0.3g$ 頓服（便秘）。

五、大黃

性味 特異芳香微苦收斂性=苦寒。

禁忌 惡乾漆冷水。

品質 濃黃褐色爲上品，黑色者不堪藥用。

成份 瀉下成份爲Emodin Qhrsopfan s ūre

其他含有大黃，鞣酸，羧酸，石灰，澱粉。

效用 緩下藥，消炎健胃藥。腹痛便秘，利尿異常，黃疸瘀血，腫毒有效，藥局房有大黃越幾斯，大黃丁，水製大黃丁，複方大黃散，複方大黃丸，小兒散等。

本草提要 蕩滌腸胃，下燥結，除痰熱利水腫通女子經候。

藥理 含有物質，有收斂，緩下之作用，大量於大腸之作用惹起下痢，少量（ 0.05 — 0.2 ）有鞣酸制止分泌，呈便秘作用，大量（ 0.5 — 2.0 ）起緩下作用 2.6 — 10 小時後排出糜粥狀軟便，此作用緩和，衰弱者貧血的恢復期，小兒等適用，又爲慢性便秘有效。

用量 一日量 1 — $5g$ 爲煎劑丸劑散劑。

處方 (1)大黃甘草湯：

大黃 7.0 甘草 3.0 水 300.0 煎成 100.0 ；空腹時頓服（便秘，腹痛嘔吐）。

(2) 複方大黃散

大黃細末 2.0 硫酸鎂 6.0 生薑細末， 1.0 ，以上混和，一次
 2 — $4g$ 頓服。(緩下)

六、復隨子『毒』 (Fleih kians)

性味 緩和油膩苛辣味=辛溫。

成份 含有脂肪油 Euphorhon 質 Aesculetin, $C_7H_6O_4$ 性狀不明
 的結晶性物名等。

效用 利尿，峻下藥，此有強烈之作用，不用多量。

本草提要 行水破血解毒下惡滯物。

用量 一日量 0.5 — $1.0g$ 爲煎劑。

七、白桃花

性味 苦味=苦平。

品質 新鮮的半開蕾爲上品，全開放爲下品。

成份 花中含有 Paeuferol $C_{15}H_{10}O_6$ 配糖體，核仁有配糖體
 Amgddol'o，葉含 Prupereltin Tanin質。

效用 峻下利尿藥，便秘水腫有效，桃仁與杏仁同樣爲鎮咳藥，
 葉可用爲汗疹之浴湯。

本草提要 利大小便，下三虫消腫滿悅憚人面治面泡。

用量 一日量 5 — $10g$ 爲煎劑。

新藥 Resica

由白桃花抽出之配糖體，爲緩下藥用於便秘痔疾頭痛。

處方 桃花大黃湯：

桃花 8.0 大黃 4.0 水 300.0 煎成 100.0 頓服(便秘利尿)。

八、巴豆『毒』

性味 辛辣味=辛溫。

禁忌 畏黃連大黃藥蘆冷水反牽牛。

成份 含有脂肪油（巴豆油）蛋白質，巴豆樹脂等。

藥理 巴豆油作用在小腸起下痢，爲強烈之下痢，半——1滴內服，口腔咽喉起灼熱感，催起嘔氣，三十分鐘至三小時，初步通便後即排出水狀便。

本品刺激性強，若塗擦皮膚上，發赤浮腫水泡，次生膿瘡。皮膚注射起蜂窩織炎，化膿，人的致死量爲20滴，起腸炎霍亂樣下痢，遂起虛脫至死。

效用 頑固便秘，峻下藥用要注意！

本草提要 火燥大瀉開竅宜滯去臟腑泥塞癖積。

用量 一日量1——2粒搗碎用。

九、蓖麻油 Oele Ricini'

性味 緩和油樣，後苛辣味—辛甘。

禁忌 忌鐵。

成份 主要爲 Oele Ricini。

藥理 蓖麻子油作用於小腸惹下痢即在腸中爲醇液；及胆汁一部被鹼化，游離 Glycerin 及蓖麻子油酸蓖麻子油類充進腸蠕動，使緩下，尙未鹼化之油分使便便與腸壁平滑，機械的補助此作用，蓖麻子油刺激性少，不起充血而作用確實。

榨取蓖麻油殘渣中有 Ricini 爲有毒成份，所引起腸胃炎呼吸中樞，血管運動、神經中樞的麻痺，呈猛烈之毒作用。

效用 緩下藥，多數局方蓖麻子油用於急性便秘急性下痢，腸內容物排出，其他有殺虫殺菌之刺激誘導作用，外用於疹癬。

用量 一日量3——10粒搗碎用。

西藥 Castorol Donctis 都是蓖麻子油。

一〇、無花果

性味 甘平

成份 含有糖分酸類 Pepton 化酵素 V. tsimine 等。

效用 緩下淨血消化滋養有效，葉洗滌痔瘡用，葉柄之分泌白汁
外用治疣。

本草提要 開胃治五痔咽喉痛、解酒毒、止洩痢。

用量 一日量 15—25g

十一、蘆薈

性味 特異臭氣苦味=苦寒。

品質 有透明蘆薈 Aloeferose 不結晶。

有肝色蘆薈 Aloe，有結晶。

藥理 給動物蘆薈時貓 0.2—1g，犬 2—5g 內服起下痢，又受
胎動物與以一定量惹起墮胎。

蘆薈 0.2—0.5g 內服 8—13 小時後，排出半圓形之大便，若
給與大量腸中及骨盤器官中起充血。故用爲通經藥，因而月經時妊娠
時出血痔疾等禁忌用，少量有苦味，用於消化不良。

效用 峻下劑又有健胃通經之效，有蘆薈越幾斯，及蘆薈鐵丸等

本草提要：清熱、殺虫、瀉肝、鎮心、除煩、治小兒驚癇五疳。

用量 一回量 0.3—1g 爲煎劑丸劑。

第四章 收斂與止瀉藥

一、阿仙藥 (Katecha)

性味 酸鹹微甘。

成份 主成份爲 Catechin $C_{15}H_{14}O_6$ ，其他阿仙藥鞣酸 Ceter
hugerh s Öure $C_{15}H_{12}O_6$ 等等。

效用 收斂藥，慢性下痢，赤痢等收斂用，或用於止血目的，又
慢性咽喉加答兒爲含嗽料，有阿仙藥丁幾 (Tinctcatechu)

本草提要：清肺、化痰、定嗽、解熱、止渴、烏鬚髮、止下血久

痢。

用量 一日量 0.5 — $2g$ — $2g$ 粉碎用。

處方 阿朮末 0.5 ；阿片末 $0.0.3$ ；白礬末 0.3 ，以上混和，一日
三四分服（腸加答兒）。

二、拳參 (Nstter wsura)

性味 收斂性。

成份 含有 Tanin 酸樹脂澱粉粘液質。

效用 爲收斂藥，內服爲止瀉目的，口內炎可爲含嗽料。

本草提要：治下痢水瀉、失血、治小便淋病及經久。

用量 一日量 3 — $6g$ 爲煎劑。

處方 拳參 6.0 水 600.0 煎成 200.0 ，一日三次分服（止瀉）。

三、五倍子

性味 強收斂。

禁忌 忌鐵。

成份 含有鞣酸、脂肪、樹脂等。

藥理 在一般鞣酸蛋白沈澱，若作用於血清溶液，蛋白質溶液則
凝集沈澱。作用於哺乳動物之腸切片上，收斂而生被膜。又動物的皮
膚出血與以鞣酸有止血作用。

效用 爲收斂藥，下痢出血有效，有五倍子丁爲 酸製成的原料

本草提要：療瀉洩五痔下血脫肛關子腸墜下。

用量 一日量 0.5 — $3g$ 常常炒焦而用。

四、地榆 (Wieseuknopf)

性味 收斂性，微苦=苦酸寒。

禁忌 惡麥門冬、伏丹砂、雄黃、硫黃。

成份 含有多量之 Tanin 質。

效用 收斂藥用於吐血下血咯血赤痢月經過多。

本草提要：除血熱、治傷風、止膿血，諸惡瘡，熱瘡，可作金瘡膏。

用量 一日量 15 - 30g 爲煎劑。

處方 地榆 7.0 阿膠 3.0 大棗 3.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（諸出血）。

五、白頭翁 (Kwchen Schelle)

性味 收斂性苦味。

品質 褐色根頭有白毛者爲上品。

成份 未詳

效用 消炎性收斂止瀉。熱性下痢月經閉止爲目的。

本草提要 治熱痢瘵咽腫，外痔腫痛塗之。

用量 一日量 5 - 10g 爲煎劑。

處方 白頭翁湯：

白頭翁 7.5 黃連 7.5 黃蘗 7.5 黃芩 7.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服。（熱性下痢）

六、靈芝（別名千年棗）

性味 甘溫。

成份 含有 Chofin Adenin Hyatichin 蘋果酸蛋白質，澱粉脂肪糖質。

效用 有收斂止瀉用爲痢疾遺經，俗傳有生長不老之稱。爲強壯藥用。

本草提要 補中益氣，除痰嗽補虛損消食，久服好顏色，令人健肥。用量一日量 10 — 20g 爲煎劑。

第五章 驅虫劑

一、烏梅

性味 強酸味。

成份 有枸橼酸，蘋果酸，核中含有青酸。

效用 有驅蟲殺菌解熱祛痰之效。

用量 一日量 1—2g

處方 烏梅湯：

烏梅三個細齏 3.0 桂枝 3.0 人參 3.0 附子 0.5 黃蘗 4.0 黃連 2.0 干薑 2.0 川椒 3.0 當歸 3.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（蛔虫心痛，久痢）。

二、鶴蟲（活鹿草）

性味 果實——辛苦，葉——微辛甘。

成份 含有一種 Alkaloide 及揮發油，其他不詳。

效用 繼虫驅除藥，蟪虫蚘虫有效，生葉之榨汁，用於害虫刺螫及害虫驅除外用煎汁。

本草提要 果實：殺五臟虫，止虛傳惡瘡良。葉：止血殺虫，解毒，止牙痛蛇咬良。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑或丸劑。

處方 天名精（鶴蟲之別名）10.0 水 200.0 煎成 100.0 頓服。

（驅虫）

三、苦楝皮

性味 特異臭=苦味。

成份 有 Tnin 質與一種苦味質，苦味質含有 Mangassin

效用 繼虫驅除藥，心臟痛疼有效，果肉塗凍瘡有效。莖葉煎汁爲殺虫藥。

本草提要 瀉熱治疔殺痛三虫療疥瘡。

用量 一日量 5—10gm 爲煎劑。

新藥 Sanxeran 是苦楝皮海人等草製劑，爲蠅虫驅除藥。

處方 苦楝皮 10.0 水 300.0 煎成 100.0 頓服。(驅虫)

四、山椒(花椒)

性味 有特異芳香性辛辣=辛苦。

成份 含有揮發油(山椒油)其他成份有 Citronellol Dipenten Xanthasin 等。

藥理 Xanthasein 家兔的靜脈內注射最小致死量爲體重 1 kg · · 10mg · · 先激著明的中毒狀，後癱瘓樣癱瘓，呼吸中樞麻痺而死。經口給與最少致死量增加 100 倍，還不顯固有中毒症狀，單有嘔吐。魚類對本物質最敏銳，金魚及其他小魚放入 0.001% 溶液中，一小時運動活潑，次發生劇烈癱瘓狀態而陷於死。Xantharin Saure Xantros ein 中毒微弱。

效用 蠅虫驅除藥，有消化發汗鎮痛利尿之效。

本草提要：征蠅虫、治皮膚結開胸、治產後出血、壯腸、療陰汗、暖腰膝、縮小便、止吐逆、消宿食、止齒痛。

用量 一日量 5—8g 爲煎劑。

處方 (1) 山椒 5.0 生薑 2.0 水 300.0 煎成 100.0，頓服(驅虫)。

(2) 屠蘇散：

山椒 1.0 肉桂 1.0 白朮 1.0 桔梗 1.0 細辛 1.0 防風 1.0 大黃 1.0 茯苓 1.0 乾薑 1.0，以上混和爲一包。

五、鷓鴣菜(又名海人草)

性味 特異海藻臭黏液性鹹味。

品質 新鮮節青味無砂皮柔軟者爲上品。

成份 有效成份植物鹹及 Digenin 等。

藥理 鷓鴣菜的越幾斯、青蛙、二十日的鼠、家兔與以皮下注射，或經口服，可致呼吸麻痺及自發運動。比較少量使蚯蚓致死；Magnin 爲本植物的製劑，就依此試驗其 20% 的溶液者的蠅虫，一小時後，運動緩慢，呈漸次麻痺狀態，家兔的致死量 1kg·皮下注射 10g·經口 20g·。

效用 蠅虫驅除藥，腹痛粘液排除嬰兒的胎毒等有效。

本草提要：治一切胎毒、生癩或寒熱爲藥下幼虫，尤妙也。

用量 一日量 5—g·爲煎劑。

新藥 驅蠅虫藥的海人草主要製劑。

Digenin (武田)

Helmfal (Yesk)

處方 鷓鴣菜湯：

鷓鴣菜 3.0 大黃 6.5 甘草 3.9 水 600.0 煎成 200.0 頓服(驅虫)

六、使君子

性味 油採微甘=甘溫

成份 一種結晶物質。

效用 蠅虫驅除藥，除果皮用仁，因其不苦味甘，古來小兒驅虫要藥。

本草提要：健脾胃、除虛熱、治五疳便渴瀉痢瘡癩。

用量 一日量 4—8g·爲煎劑。

處方 使君子 6.0 水 300.0 煎成 100.0 頓服(驅虫)。

七、石榴

性味 收斂性=酸溫。

禁忌 忌鐵。

成份 有植物鹼其他成份有 Pelletierin $C_9H_{15}NO$ 。

Niopelletierin Methyl Pelletierin 等其他有 Tanin 等。

藥理 以 Pelletierin 試驗蠶虫，其體溫溫度之食鹽水 1:1000 溶液中放入蠶虫，5—10 分鐘即運動停止而死。

效用 蠶虫驅除藥，用果實之煎汁爲扁桃腺炎，咽喉頭加答兒之含嗽料，又能除口臭。

本草提要：止瀉痢、下血、脫肛崩中帶下。

用量 一日量 10—20g 爲煎劑。

處方 石榴根皮 15.0 水 400.0 煎成 300.0 頓服（驅虫）。

八、大蒜

性味 特異臭=辛溫

成份 含有一種配糖體 Ciacaminol，本品酸加水分解含有硫黃分離揮發油。有效成份惡臭之一種爲含有硫黃之揮發油，其揮發油有殺菌性，其他有 Phytin Arginin 果糖無水特等。

藥理 含有硫黃揮發油，對細菌有強殺菌性，此 0.5% 溶液傷寒菌 5 分鐘即死滅，又大蒜汁混合培養基中約 3%，各種細菌有制止發育之說

又本品酒精流膏用之驅除十二指腸虫有效云。

效用 腸虫寄生虫驅除藥健胃、整腸、鎮靜有效。

本草提要：治中冷霍亂溫病止截瘧疾。

用量 一日量 10—15g 粉末或丸劑。

新藥 Allisotin Allas 爲大蒜製劑之整腸藥。

九、南瓜仁

性味 緩和油樣=甘溫。

品質 新鮮者最有效。

成份 含有脂肪油，果肉內含有黃色素=Corotin andehin Trigo-

mirin 等鹽基。

效用 繼虫驅除藥。

本草提要 補中益氣，然多食發脚氣、黃疸。

用量 一回量 30 — 50g 乳體中加水搗碎成乳劑狀服用。

一〇、蕃椒 (Spanischer Pfeffer)

性味 苦烈味=辛溫。

成份 有辛味成份之 Capsainin $C_{16}H_{21}NO_3$ 果皮紅色 Capsotrin $C_{34}H_{48}O_3$ 及種子的脂肪油 (蕃椒油)。

效用 有驅虫、發汗、食慾催進，皮膚引赤等效。

本草提要：治疝氣、殺虫、解西瓜毒，多食發痔枯血損眼。

用量 一日量 0. 1g

新藥 Capsolin

蕃椒樟腦巴豆油爲主劑，爲鎮痛外用藥。

一一、檳榔子 (Arecaunuf)

性味 收斂性苦溫。

禁忌 忌火

成份 爲 Arecolin 等其他有 Tannin 質脂肪等。

藥理 Arecolin 的生藥作用與 Pilacorpin Nicotin 類似，其作用於中樞神經系及末梢臟器，有兩者之中間位，Arecolin 生理作用強。

效用 繼虫驅除，健胃收斂藥又加在牙粉中。

本草提要：攻堅、去脹、消食、行痰，下水，除風殺虫，醒酒。

用量 一日量 3 — 5g 煎劑粉末丸。

處方 檳榔子 4.0 爲末頓服 (驅繼虫)。

一二、綿馬

性味 收斂性稍稍苛辣。

成份 主成份爲綿馬酸 *Ellaal saure* 或 *Pilmoron C47 H 54O*
16。

藥理 *Pilitin* 對蠶蟲之作用，可麻痺蠶蟲之筋肉，今將 0.01% 的 *Pilitin* 含有之弱鹼性食鹽水中，四小時以內蠶蟲即麻痺。

效用 蠶蟲驅除藥。

用量 一日量 10—15g 爲煎劑。

第六章 祛痰劑 *Expectorantia*

一、遠志

性味 苦辣味=苦溫。

禁忌 得茯苓龍骨冬葵子而良，長珍珠藜蘆。

成份 有 *Saponine Polyglib C6 H12 O5* 結晶物質，*Onelisin C24 H47 O5* 樹脂等。

效用 *Sanego* 根作用爲祛痰藥，古來用爲強壯利尿藥。

本草提要 能通腎氣，止違心強志益智，補精壯陽耳明目，逆傷中，補不足除邪氣治健忘安魂魄。

用量 一日量 2—5g 爲煎劑。

處方 遠志 5.0 甘草 6.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次，分服。(祛痰)

二、括樓(瓜蒌)

性味 根——苦寒，仁——甘。

成份 根含多量澱粉，仁含有脂肪，其他未詳。

效用 根有解熱止渴催乳之效，仁呼吸器疾患的解熱鎮咳鎮痰實
用根製之澱粉名天花粉，濕疹撒布用。

本草提要 根，止狂時疾過小腸。消腫毒，乳癰發背，治癰瘡癰
仁，潤肺，降火，治咳嗽，滯痰結利咽喉。

用量 一日量 5 — 8g 爲煎劑。

處方 (1) 括樓仁末 2.0 貝母末 1.0 半夏末 1.0 混和，一日三次分服(氣管枝加答兒)。

(2) 括樓仁 5.0 桔梗 3.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服(肺結核)。

三、桔梗

性味 辛苦微甘。

品質 肉白肥大有滋養者爲上品。

成份 主成份 PkigasPonine C₂₇H₄₈O₁₁ 其他 Mulin, Phytortero₁ C₂₇H₄₆O 等成份。

藥理 桔梗之有毒力與 Sonege 相似，桔梗 SaPonin 對南京鼠之致死量爲體重 10g 皮下法射 7.7mg。又 1000.0 倍溶液有完全溶血作用，桔梗對赤血球之溶解作用高遠志根二倍云。

效用 鎮咳祛痰藥，又有腫隆排膿強壯之效。

本草提要 治肺熱氣促嗽逆主胸脇痛等。

用量 一日量 3 — 5g 爲煎劑。

新藥 Hustol Plotycolia 等都是桔梗提出之有效成分，鎮咳痰藥。

處方 桔梗湯：桔梗 4.0 甘草 3.0 水 500.0 煎成 200.0，一日三次分服(鎮咳祛痰)。

四、款冬

性味 花：辛溫，根：苦平。

禁忌 惡皂莢、硝石、玄參。畏欠母、辛夷、麻黃、黃耆、黃芩、連翹。

品質 未開的鮮花爲上品。

成份 花含二種 Phylosterol Janin

效用 有鎮咳祛痰，苦味健胃之效。

本草提要：消痰、消熱、止咳、治咳、逆上氣，喉痺諸驚癰塞邪氣。

用量 一日量6—10g 爲浸劑。

五、皂莢

性味 皂莢：辛鹹溫，皂角子辛溫。

禁忌 禁鐵。

品質 肉厚有粘性者上品。

成份 含有 Gleditschias sPonin $C_{59}H_{100}O_{20}$ 及配糖體。

藥理 皂莢 SaPonin 爲淡黃色，無晶形，初味甘後苦辣，誘致著明噴嚏，其他 SaPonin 同樣崩壞赤血球。

效用 爲祛痰藥，又有淋疾利尿殺虫效，爲浴湯料洗酒料。

本草提要：皂莢：消痰破堅殺虫，皂角子治療癰及疥癬。

用量 一日量3—5g 爲煎劑。

新藥 Tusoin Exorin 由皂莢抽出之有效成份爲祛痰藥。

處方 皂莢 5.0 桂枝 1.0 大棗 4.0 生薑 1.0 水 600.0，煎成 200.0，一日三次分服（祛痰）。

六、沙參

性味 緩和微苦=苦微寒。

品質 根細長橫皺，外面淡黃色，內面白色爲良品。

成份 含有一種 SaPonin

效用 爲祛痰藥，又代用人參，

本草提要：專補脾胃，因而益肺與腎，人參補五臟之陽，沙參補五臟之陰，肺熱者用之代人參。

用量 一日量 5—8g 爲煎劑。

處方 沙參 8.0 甘草 2.0 水 600.0，煎成 200.0，一日三次分服

(積炭)。

七、石蒜

性味 辛甘溫。

成份 Lyconin $C_{16}H_{17}NO_4$; Tekisonin $C_{16}H_{19}NO_5$; Homolycorn $C_{18}H_{23}NO_4$ 及數種植物鹼。

藥理 Lyconin之藥理作用，Emetin 屬同類毒性比Emetin弱，催吐作用強。鹽 Lycorin 對家兔之最小致死量，體重18kg 皮下注射0.05，靜脈內注射0.03。又 Lycorin 有解熱作用。

效用 積炭藥有催吐效，為吐根之代用品。

用量 一日量1—3g 為煎劑。

新藥 Melysin 為石蒜抽出之有效成份，為阿米巴赤痢，肺二口虫之治療藥。

處方 石蒜1.5 甘草8.0 水600.0 煎成200.0，一日三次分服(積炭)。

八、竹節人參 土參

性味 稍稍苦味。

品質 外面呈淡黃色的根，內面呈類白色，充實肥大者為上品。

成份 含有 PansaxaPonin $C_{48}H_{80}O_{20}$ 。

效用 積炭藥，有解熱健胃利尿效。

用量 一日量3—5g 為浸劑。

處方 竹節人參5.0 甘草2.0 水200.0 為浸劑，一日三次分服(積炭)。

第七章 鎮咳劑

一、罌粟殼 (Schlofmohn)

性味 特異臭苦味。

成份 少量嗎啡及他植物鹹。

效用 爲鎮咳鎮痛止瀉藥。

本草提要 歛肺瀉腸而固腎，治久咳瀉痢遺精脫肛心腹筋胃諸痛。

用量 一日量 5 — 15g 爲煎劑。

新藥 Opfel 主劑爲罌粟殼與 Saponin 爲鎮咳祛痰藥。

二、杏仁

性味 辛苦甘溫。

禁忌 惡黃芩黃耆葛根。

品質 圓實豐滿外皮的褐色爲上品。

成份 含有脂肪油(杏仁油)及 Amygdalin $C_{20}H_{27}NO_{11}$ 甙糖體，分解而生青酸葡萄糖。

效用 鎮咳祛痰藥，除喘息咳嗽肺熱有效，局方中製成杏仁油及杏仁水供藥用。

本草提要 主溫病脚氣咳嗽土氣喘息除風散寒降氣行痰潤燥消積。

用量 一日量 2 — 4g 爲煎劑。

處方 茯苓杏仁甘草湯：

茯苓 150 杏仁 50 甘草 50 水 6000 煎成 2000，一日三次分服(鎮咳)。

杏仁 30 麻黃 40 甘草 30 水 6000 煎成 2000，一日三次分服(鎮咳)。

三、五味子

性味 酸臭酸味稍甘=酸微甘溫。

禁忌 勝烏頭。

品質 本品備五味(核中辛苦，皮肉甘酸，全體鹹)粒大色黑潤

者爲上品。

成份 未詳。

效用 收斂鎮咳藥有滋養強壯效。

本草提要 主益氣咳逆士氣勞傷羸瘦，補虛退熱欬汗止瀉寧嗽定喘。

用量 一日量 5 — 15g 爲煎劑。

四、南天獨

性味 果實：酸甘枝葉苦酸澀。

品質 純品果肉充實者爲上品。

成份 含有 Nantonin $C_{29}H_{21}NO_4$ 植物鹼根皮樹皮中含有四種植物鹼 Nantonin Berherin Nandozurin Domeusticin。葉以水蒸氣蒸溜液中含有青酸。

藥理 Nandirin 的生理作用最初大腦麻痺，隨意運動減少，溫血動物的呼吸中樞少。最初稍興奮次則麻痺，最顯著的作用像士的年一樣的癱瘓發作。知覺隨局部與末稍麻痺，而來痛覺觸的鈍麻，與消失。

效用 鎮咳藥，喘息百日咳有效，又枝葉有強壯之效。

本草提要 果實：強筋骨益氣力，固精耐顏，枝葉止泄除唾，強筋，益氣力，久服長年令人不饑。

用量 一日量 5 — 10g 爲煎劑。

處方 南天獨 8.0 甘草 2.0 水 600.0 煎成 200.0、一日三次分服（喘息百日咳）。

五、貝母

性味 微甘稍甘味=辛平。

禁忌 惡桃花反烏頭。

品質 不拘大小，外面黃白色，裏面黃褐色，無油臭而圓者爲上

品。

成份 含有 Praxillarlin $C_{25}H_{41}NO_3$ ；Verticin $C_{18}H_{33}NO_2$ ，植物甙等。

藥理 Praxillarlin 對溫血動物麻痺中樞神經，降害呼吸自發運動減少，脈搏心收縮不全，血壓下降。貝母用為鎮咳藥，恐有緩和共呼吸及脈搏頻數作用。

效用 鎮咳祛痰藥，又有止血催乳散氣鬱之效。

本草提要：散肺鬱、潤心肺、清虛痰、治勞傷、煩熱、咳嗽上氣、吐血、肺痿、肺癰、喉痺目眩暈。

用量 一日量 3 — 8g 為煎劑

處方 (1) 桔梗白散：

桔梗末 3.0 貝母末 3.0 巴豆末 1.0 為細末 1g，頓服（咽喉腫痛）。

(2) 貝母 8.0 甘草 2.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（氣管枝加答兒）。

六、枇杷

性味 微苦 = 苦平

成份 含 Amygdalin 族配糖體，枇杷仁蒸餾液含青酸 0.1% 以上，其性質與杏仁水無大差，枇杷葉含 Sapouin。

藥理 枇杷仁含有 Amygdalin 族配糖體，有鎮咳之效。然枇杷幼葉中含有青酸和 Saponin 配糖體已不存在。

效用 枇杷葉用為清涼飲料，防夏時汗疹為浴湯料，仁有鎮咳祛痰效。

本草提要：清肺和胃而降氣消暑治熱咳咽逆口渴。

用量 一日量 10 — 15g 為煎劑。

處方 枇杷葉湯：

枇杷葉、吳茱萸、木香、藿香、甘草各7.0 肉桂裝連各4.0 水600.0 煎成200.0 一日三次分服(預防暑氣、霍亂痢疾)。

七、麻黃

性味 收斂稍有麻痺性=辛苦溫。

禁忌 已饑惡辛夷石葦。

品質 基礎淡綠色者嚼碎苦舌尖麻痺性感覺者爲上品。

成份 主成份爲植物鹼，Ephedain C₁₀H₁₅NO，其他含類似的植物鹼。灰分 Calcium Rallum等。

藥理 有鹽酸 Ephed n 的水溶液有散瞳作用，此作用與 Atropin 異，由於交感神經的刺激。鎮咳藥，喘息藥效確實，其作用弛緩氣管枝。又血壓上昇發汗等生理作用，類似副腎素，兩者的化學構造亦近似。

效用 發汗、解熱、鎮痛、鎮咳藥、喘息百日咳，關節疼痛有效。麻黃根及節地上部作用正相反，有止汗之效，故自汗盜汗產後虛汗又用爲止汗藥。

本草提要：麻黃：開毛孔皮膚，發汗、去寒、入肺治咳嗽、散赤目、腫痛、產後血帶。根及節止汗效、莖發汗、汽駛不能禦，物理之妙如此。

用量 一日量8—10g 爲煎劑。

新藥 Asmos 主劑爲麻黃莖陀羅桔梗竹節人參等有效成份，爲喘息特效藥。

Camponol Anstel 主劑爲麻黃桔梗，爲鎮咳祛痰藥。

Mnenx 爲麻黃有效成份之越幾斯，爲鎮咳祛痰藥。

處方 (1) 麻黃湯：

麻黃9.0 桂枝6.0 杏仁1.0 甘草3.0 水600.0 煎

成 200.0，一日三次分服（氣管枝炎，喘息感冒，麻疹）。

(2) 麻黃 5.0 細辛 3.0 半夏 2.0 五味子 1.0 水 600.0 煎成 200.0 一日三次分服（喘息肺結核）。

八、蔓陀羅花

性味 辛溫

成份 含 Hyoscyomin $C_{17}H_{23}NO_3$ ，Scopolomin $C_{17}H_{21}NO_4$ Atropin $C_{17}H_{23}HO_3$ 等植物鹼，此外有脂肪油硝石等。

效用 鎮咳鎮痛，乾葉製成喘息煙葉的浸劑，有治喘息慢性氣管技加答兒等有效，種子為 Brom 水素酸 Scopolomin 造原料。

本草提要：諸風及寒顯脚氣煎湯洗，又主驚疔及腹肚。

用量 葉一回量 0.2g，一日量 0.6g 過量恐有中毒。

第八章 強心劑

一、金銀花

成份 莖葉中含有植物鹼 Spartein $C_{15}H_{26}N_2$ ，Sarthemin $C_{15}H_{24}N_2$ ，揮發油 Cemsicin $C_{16}H_{28}N_2$ 及無晶形黃色素 AcoPorin。

效用 為強心藥，美國製成 Spartein Sulphate（砒酸斯匹汀）Spareme Sulphate 用於毛地黃不見效之病。

用量 0.01g，一日二三回內服。

二、樟（樟樹）

性味 特異芳香性。

成份 木部含有揮發油 1%，主成份為樟腦 50—60% Camphor 外有（右旋）D-pinen Dipenrin phellandren Cineol Sofrol Engeno（左旋）L-JerPincol 葉中含有揮發油 1.0% 樟腦 30%。

藥理 樟腦為強心興奮藥，為對急性心臟衰弱常用而重要之藥。

深麻醉時血管神經中樞麻痺，若投與樟腦興奮延髓，起血管收縮，顯著的恢復心臟的收縮力血壓亢進。

效用 爲強心興奮，有鎮靜、祛痰、防虫的效力，有許多樟腦的製劑，樟腦酸、樟腦丁、樟腦油、樟腦膏等。

三、鈴蘭（君影草） (Maiflume)

成份 含有甾體配糖體 Couvaliamaria C23H44O12; Conyallin C34H62O11。

藥理 有毛地黃同樣的強心作用，根部強於毛地黃葉23—25倍，葉柄10—15倍，葉部7—8倍，而無毛地黃葉之蓄積作用。

效用 全草有強心利尿作用，很確實。

用量 一回量0.5g，一日量1.5g 爲煎劑。

新藥 有Conalon Convomarin (merk) 皆爲鈴蘭之抽出成份，爲強心利尿。

四、福壽草

成份 含有 Adonin C19H40O9 無晶形之配糖體。

藥理 如毛地黃葉之藥理作用，無蓄積作用。

效用 強心利尿作用。

用量 一日量2—3g 爲浸劑。

處方 福壽草浸 3:100.0 爲煎劑，一日三次分服（強心）。

五、萬年青

成份 含有配糖體 Rhadin C30H44O10。

藥理 Rhadin在循環素的作用，心臟收縮期，刺激發生期刺激傳導期，迷走神經作用，心搏動的振幅及起週期性的變化等與毛地黃毒近似。又調整震顫心臟不整脈，對心臟麻痺毒之障礙心臟能起機能之復活。要之 Rhodein 藥物學之作用與毛地黃作用性質同一云。

效用 強心與毛地黃同樣有效。

用量 服用生根的榨汁或煎劑。

新藥 Baocalin 即萬年青，抽出有效成份製成利尿。

第九章 利尿劑

一、威靈仙

性味 苦溫

禁忌 忌火

成份 含有 Anomonin 與 Anemonol

效用 爲利尿和通經藥，鎮痛有效，古來痛風要藥。

本草提要：推新舊積滯，消胸中痰唾，去瘡癰、蓄膿、惡水、腰膝冷痛。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑。

處方 威靈仙 6.0 芍藥 3.0 防風 1.0 葛根 1.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（痛風）。

二、越橘

性味 收斂性。

成份 主成份爲 Arbutin $C_{12}H_{16}O_7$ 配糖體，其它含有 Unerin 質 $C_{30}H_{48}O_3$ 等。

藥理 Arbutin 在尿中生 Brolobin (Cytrachino) 現防腐作用，並有防腐消毒下熱作用，又有 uva Mersi 藥之利尿作用。

效用 爲利尿藥淋毒尿道炎膀胱炎腎臟炎。

用量 一日量—30g 爲煎劑，

三、夏枯草

性味 苦辛寒。

成份 含有可溶性的無機鹽類，鹽化 Kall 多量存有。植物鹼樣物質含有云不詳。

效用 爲利尿藥淋疾子宮病有效，漢方爲療癰之要藥。

本草提要 治癰癧，散結氣，補養厥陰血脉，退寒熱。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑。

處方 (1) 味夏枯草湯：

夏枯草 8.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次溫服。(療癰)

(2) 夏枯草 8.0 香附子 2.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次服。(利尿)

四、甘遂

性味 苦寒。

禁忌 忌遠志反甘草。

成份 有一種苛烈性成份未詳。

效用 峻烈利尿下泄藥，胸痛，利尿，咳嗽等有效，用之妊婦墮胎有毒不可多用。

本草提要 瀉腎經隨道水濕，達水氣所結之虛，以攻決存用，爲下水聖藥。

用量 一日量 1—2g 爲煎劑。

處方 甘遂半夏湯：

甘遂 0.7 半夏 4.5 芍藥 4.0 甘草 2.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服。(利尿下泄)

五、玉蜀黍(蕊)

性味 甘平

成份 雌蕊中含有 Peroslyase Xylseton Phytosterol。

效用 爲利尿藥，腎臟病，浮腫性疾患有著效。

本草提要 調中，開胃，治小便淋瀝，痛不可忍。

用量 一日量 5—8g 爲煎劑。

藥理 Pietin Toralidin 爲本藥的有效成份，爲腎臟病浮腫之利尿藥。

處方 玉蜀黍 6.0 商陸 1.5 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（浮腫水腫）。

六、牛膝

性味 緩和稍有甘味=苦酸平。

品質 外面淡褐色，質柔軟橫斷面褐色心細肉多爲上品。

成份 含有牛膝 Saponin Ralium 鹽類粘液質等。

效用 利尿、強精、通經有效，緩和打撲，切創淋疾，腹痛等疼痛。

本草提要 益肝腎，強筋骨，療男子陰消老人失溺排膿散惡血止尿血經中痛。

用量 一日量 5—8g 爲煎劑。

處方 牛膝 6.0 大黃 2.0 防已 1.0 牡丹 1.0 桂枝 1.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（浮腫）。

七、香薷

性味 辛溫。

禁忌 忌火。

成份 含有揮發油，其他爲 ELO holtzioketon C 10 H 14 O₂ Senen 等。

效用 利尿、解熱、解腫、鼻衄，治口中臭有效。爲保溫湯。

本草提要：主霍亂、腹痛、吐下、散水腫、去口臭，治霍亂轉筋。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑。

處方 香薷 5.0 澤瀉 2.0 白朮 2.0 茯苓 2.0 豬苓 1.0 桂枝 1.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（利尿）。

八、山扁豆

成份 含有果實中之 Emodin。

效用 爲利尿藥，腎臟炎、水腫、脹滿有效，爲茶之代用品。

用量 一日量 15 — 30g 爲煎劑。

處方 山扁豆 15.0 水 600.0，煎成 200.0，一日三次分服（利尿）。

九、酸漿（燈籠草）

性味 苦寒。

成份 全草中含有無晶形之苦味質，Physolin 果實含微量之植物鹼，枸橼酸。

效用 利尿、鎮咳、解熱有效，有墮胎作用云。

本草提要：治熱解煩利尿。

用量 一日量 3 — 6g 爲煎劑。

十、車前

性味 微苦黏液性—甘寒。

成份 全草中含有配糖體 Aucinlin C15 H24 O10 Plantagin 種子中有粘液琥珀酸等。

藥理 Plantagin 使亢奮分泌神經，增加氣管及氣管枝的黏液，消化液的分泌，又作用於呼吸中樞，呼吸運動深大且緩慢，有善明之鎮咳作用。

效用 爲利尿藥，鎮咳，糖漿、健胃、止瀉等有效，眼病煎服。

本草提要 種子：清肺肝風熱。透膀胱濕熱，利小便；全草：癩血，除血，止吐衄，消癥癩、逆淋、明目。

用量 一日量 5 — 10g 爲煎劑。

處方 (1) 車前子 6.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（利尿）。

(2) 車前草 10.0 甘草 2.0 桔梗 2.0 水 600.0 煎成 200.0, 一日三次分服(鎖豕)。

十一、商陸

性味 無臭味=苦寒。

品質 根白肥大者為藥用，帶赤色者有毒，但能貼毒腫。

成份 含有多量的 Kalium nitros。

藥理 臨床實驗，商陸的酒精浸膏刺戟血管運動神經的中樞，增進血壓，因而尿分泌增加。

效用 為利尿藥，慢性腎臟炎、肋膜炎、心衰水腫、腹水、脚氣等一般水腫有效，無名腫毒貼用有效。

本草提要 與大乾甘遂同功；療水腫，脹滿，癰疽癰腫 痺不通。

用量 一日量 1.5—4g 為煎劑。

處方 商陸 3.0 桑白皮 3.0 檳榔子 2.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0 一日三次分服(水腫浮腫)。

十二、藪草 (十藥)

性味 辛微溫。

成份 含有特異之臭味揮發油其他成份，有 yethylnongikeion Myrcen Coprins O ure 等。

藥理 Cerdalin 有發泡性的作用。

效用 淋疾尿道炎，黴毒，子宮痛等利尿藥，為劑，生葉蒸熱腫物排膿貼用疹毒，疥癬，腰痛為浴湯料。

本草提要 散熱毒癰腫，痔瘡脫肛。

用量 一日量 6—10g 為煎劑。

十三、桑白皮

性味 甘寒。

品質 去包皮爲朮桑白皮，不去包皮爲連桑白皮。皮薄黃赤色爲上品。

藥理 桑白皮煎劑家兔經口投與影響白糖量先上昇後下降。

效用 爲消炎性利尿藥緩和鎮咳有效。

本草提要 去肺中水氣，唾血熱渴水腫腹滿腫脹利便散瘀血下氣行水清痰上嗽。

用量 一日量 4—12g 爲煎劑。

處方 桑白皮 5.0 木通 3.0 澤瀉 2.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服。（水腫）

十四、蒼朮

性味 蒼朮：甘辛苦溫，白朮：甘微苦溫。

成份 含有揮發油，其他成份有 Atroctyol $C_{15}H_{24}O$ 蒼朮特有香味之植物鹼。

藥理 蒼朮揮發油對金錢蛙用少量有鎮靜作用，大量對中樞有麻痺作用。

效用 利尿藥，浮腫發汗，婦人的冷氣有效，蒼朮焚燒有去濕氣之效。

本草提要 蒼朮：燥胃、發汗、除濕、散鬱、通痰。

白朮：燥濕、補脾、利小便、止泄瀉。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑浸劑。

處方 枳朮湯：

枳實 21.0 蒼朮 6.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（利水）。

十五、澤瀉

性味 味淡白＝甘寒。

品質 質重肥大肉白新鮮爲上品。

成份 未詳。

效用 爲利尿藥，利尿減少或瀕數，胃內停水，口渴等有效。

本草提要 入膀胱利小便，瀉腎經之火邪，治消渴、嘔吐、瀉利、淋瀝、血尿，洩精、痰飲、陰汗、腫脹、水痞、疝痛，腳氣、濕熱等之病。

用量 一日量5—15g。爲煎劑。

處方 茯苓澤瀉湯：

茯苓3.0 澤瀉3.0 白朮2.0 甘草1.0 桂枝1.0 水600.0煎成200.0，一日三次分服（水腫）。

十六、豬苓

性味 味淡白=甘平。

禁忌 忌火熾。

品質 皮黑肉白色內容充實爲上品。

效用 利尿藥等有解熱效。

本草提要：解傷寒、濕疫、大熱、治淋腫、腳氣、白濁、帶下、妊娠、子淋、胎腫、小便不利。

用量 一日量3—10g。爲煎劑。

處方 豬苓湯：

豬苓6.0 茯苓6.0 阿膠6.0 滑石6.0 澤瀉6.0 水600.0煎成200.0，一日三次分服（膀胱及尿道疾患）。

十七、獨活

性味 特異峻烈之香味=辛苦微溫。

成份 未詳。

效用 去浮腫、治腳氣、腰痛、頭痛、有效。

本草提要：療伏風頭痛、兩足濕痺、百節痛風。

用量 一日量6—10g。煎浸酒浸飲用。

處方 獨活湯：

獨活 5.0 當歸 2.0 防風 2.0 茯苓 2.0 芍藥 2.0 黃 2.0 葛根 2.0 人參 2.0 甘草 2.0 乾薑 1.0 附子 1.0 黑豆 5.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（腳氣疼痛）。

十八、東瓜子

性味 緩和稍有油樣＝甘微寒。

效用 消痰性利尿緩下藥，治癰腫有效。

用量 一日量 4—8g 爲煎劑。

一九、忍冬（金銀花）

性味 甘溫。

品質 葉爲上品。

成份 含有 Tannin 質。

效用 利尿藥、解熱、驅蠱、淋疾諸瘍等有效。

忍冬茶忍冬酒爲強壯目的用。

本草提要：治寒熱、身腫、久服輕身益壽。

用量 一日量 9—15g 爲煎劑。

處方 忍冬 10.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0 一日三次分服（利尿）

忍冬酒 40：1000.0

二〇、敗醬（苦菜）

效用 消炎性、解凝、排膿性利尿藥，去瘀血、癰腫等有效。

本草提要：除癰腫、浮腫、結風痺之足、產後痛。

用量 一日量 6—10g 爲煎劑。

處方 薏苡附子敗醬散。

薏苡 1.0 附子 1.0 敗醬 2.0 水 300.0 煎成 100.0 頓服。

二一、白檀

性味 特異香氣=辛溫

品質 質緻密、堅硬、黃褐色者爲上品。

成份 含有揮發油、白檀油，此成份爲 Sortalol C₁₅ H₂₄ O；
Saten C₆ H₁₄ 等。

藥理 白檀油速主尿道之灼熱感，抑制分泌尿澄清無作用。

效用 利尿殺菌藥，淋疾有效。

本草提要：殺蟲、上心腹霍亂、腎氣痛、消風熱腫毒。

用量 一日量 3—9g 爲浸劑。

二二、茯苓

性味 特異微臭=甘平。

品質 內部充實、硬粘氣多淡紅色者爲上品，有赤茯苓白茯苓之別，前者爲佳。

成份 含有果糖葡萄糖其他成份不詳。

效用 利尿藥水腫淋疾有效。

本草提要 治驚悸，心下結痛，寒熱、煩滿，舌乾，效逆，嘔噦
中痰水、水腫、淋瀝，泄瀉，遺精。

用量 一日量 5—8g。爲煎劑或粉末。

處方 茯苓 5.0 木通 5.0 桑白皮 5.0 水 600.0 煎成 200.0；一
日三次分服（水腫）。

二三、望之

成份 含有 Emodin Tanin 質脂肪油，粘液質等。

效用 莖葉去水腫，種子下痢，腹痛有效，葉的絞汁用於毒蛇毒
虫咬傷。

用量 一日量種子 15g 莖葉 30g。煎劑。

二四、茅根

性味 稍甘味=甘寒。

禁忌 忌鐵。

品質 多摩川茅根爲上品。

成份 含有果糖葡萄糖，有效成份未詳。

藥理 漢方爲利尿藥，以猪苓茅根木通茯苓四種，而就動物試驗茅根爲最有效。

效用 爲利尿藥又爲止血發汗藥。

本草提要 補中、益氣、除伏熱，消瘀血，利小便，解酒毒，治吐諸症。

用量 一日量 8 — 10g 爲煎劑。

處方 茅根 10.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服。（利尿止血）

二五、木通

性味 淡甘。

成份 有 Akebin ($C_{35}H_{56}O_{20}$) 結晶性配糖體，其他灰分中含多量 Kalium。

效用 消炎利尿藥，有鎮痛排膿通經之效。

本草提要 除脾胃寒熱，消水腫，及諸炎症，下通大小腸膀胱導諸濕熱由小便出。

用量 一日量 3 — 5g 爲煎劑。

處方 當歸四逆湯：

當歸 4.5 桂枝 4.5 芍藥 4.5 細辛 4.5 大棗 4.5 木通 3.0 甘草 3.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次溫服（脚氣腎臟炎）。

二六、木角豆

性味 無味稍有收斂性。

成份 有拘櫟酸，植物鹽，鈣鹽，安息香酸等，其他未詳。

藥理 木角豆少量直接作用於腎臟，增加尿量，用餘量的利尿作用，不起慢性中毒，多量麻痺中樞神經，發生隨意呼吸運動消失，使心臟動物陷於死，但藥用量與中毒量極懸殊，故不致中毒。

效用 爲利尿藥，腎臟諸疾患之水腫有卓效。

用量 一日量 5—10g 爲劑。

處方 木角豆 10.0 玉蜀黍 5.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（利尿）。

第十章 鎮靜藥

一、酸棗仁

性味 油樣微甘＝甘平。

品質 赤色充實者爲上品。

成份 有糖質粘液質。

效用 爲神經強壯鎮靜藥，失眠，煩燥等有效，與諸方配伍，爲緩和藥。

本草提要 補中，益氣，滋脾土，潤心肺，調營行，緩陰血，生津液，悅顏色。

用量 一日量 6—15g 爲劑。

處方 酸棗仁湯：

酸棗仁 4.0 茯苓 2.0 川芎 2.0 知母 2.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（失眠症，神經衰弱）。

二、川芎

性味 特異峻烈的香氣，苦味＝強烈苦辛溫。

禁忌 畏黃連惡火。

品質 表面粗糙暗褐色肉黃白色爲上品。

成份 含有揮發油其他成份 Cindium locton C12 H18 O2 Cin-

dium soufe $C_{12}H_{20}O_3$ Phenol 等植物。

藥理 川芎揮發油少量於延髓，血管運動中樞，呼吸中樞，脊髓反射中樞的亢奮。而生大腦子麻痺，其結果自動運動減少，而鎮靜大
腦腦幹的麻醉加之前記的中樞麻痺，而血壓下降，體溫下降，呼吸困難，共同運動失調，一般的運動麻痺而生虛脫等現象，對心臟麻痺，對末梢血管反有些擴張。

效用 鎮靜藥，及溫性強壯藥，鎮靜鎮痙有效，用於頭痛，眩暈腦病。

本草提要 達頭腦，明目，治頭痛，順產前後氣血，破瘀血，搜風，調經，止痛。

用量 一日量 2—10g。為煎劑。

處方 川芎 3.0 細辛 2.0 香附子 2.0 水 300.0 煎成 100.0，頓服（頭痛）。

三、鈞藤鈎

性味 收斂性味苦=甘微苦寒。

成份 含有結晶性的植物鹼，與 Pinchophyllin。

效用 鎮靜藥，眩暈，頭痛小兒初夜啼，癩症有效。

本草提要 除心熱，平肝風，治大人頭旋目眩，小兒驚啼，熱癩，胎發斑疹。

用量 一日量 6—15g。為煎劑。

四、當歸

性味 特異芳香性=苦溫。

禁忌 惡蘿蔔，濕麵，畏薑瀉，海藻，生薑，制雄黃。

品質 外面灰褐或赤褐色，內部黃白色，臭味完全者為上品，黃色帶木花，不堪藥用。

成份 含有當歸固有香氣之揮發油，其他未詳。

藥理 當歸的生理作用，大腦的鎮靜及麻醉，呼吸機能初期興奮，後期的麻痺，血壓及體溫下降，脈搏緩徐，輕度的整學。但家兔皮下注射上記症狀不顯著，而呼吸麻痺心臟麻痺之後。

效用 鎮靜通經藥，貧血性瘀血有效，婦人病。

本草提要 治頭痛，心腹諸痛，瀉腸胃筋骨皮膚，塊膿止痛，和血，補血，氣血昏亂服之即定，能使血氣各有歸，故名當歸。

用量 一日量 10—15g。為煎劑。

新藥 Fomenal (Merk)。

當歸之液膏月經調整藥。

處方 當歸建中湯：

當歸 1.0 桂枝 生薑 大棗 各 6.0 芍藥 10.0 赤飴 5.0 水 600
• 煎成 200.0，一日三次溫服（婦人產後強壯補血）。

五、半夏

性味 初緩和後刺激性=辛平。

禁忌 惡皂莢畏雄黃乾薑素皮龜甲烏頭忌海藻飴糖。

品質 粒純白者為上品。

成份 辛味成份，一種脂肪油，微量固有香氣的揮發油，灰中含有 Calcium Magnesium 等類植物鹼。

效用 為鎮嘔，祛痰，鎮靜藥，為頑固性嘔吐之要藥。

本草提要 燥濕痰，開胃，除腹脹，下逆氣，止嘔吐，療咽喉腫痛，腸鳴，白帶下，夢精不眠。

用量 一日量 3—15g。為煎劑。

新藥 Esvormin Tabato1 為半夏抽出之有效成份，為鎮嘔鎮靜藥。

處方 半夏加茯苓湯：

半夏 8.0 茯苓 6.0 生薑 1.5 水 600.0 煎成 100.0，頓服

(妊婦嘔吐)。

六、牡丹皮

性味 經 微甘 = 辛苦微寒。

藥用 貝母、大黃、菟絲子。

品質 新鮮，肥大，有香氣者為上品。

成份 含有配糖體 Paeonol $C_{19}H_{10}O_3$ 其他有安息香酸 Pylosterin 等。

效用 鎮靜、鎮痙藥，頭痛，腰痛，瘀血，有效，古來為婦人諸病要藥。

本草提要 主邪氣，腹痛，散惡心，脈血脈，破堅積，寒熱痙攣，利腸筋，大小腸，益氣，固肌膚。

用量 一日量 5 — 10g。為煎劑。

處方 牡丹皮湯：

牡丹皮 5.0 當歸 5.0 芍藥 3.0 生地黃 2.0 陳皮 2.0 白朮 1.0 香附子 1.0 柴胡 1.0 黃芩 1.0 甘草 2.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（ 婦人諸病 ）。

第十一章 鎮痙劑

一、烏頭

性味 辛辣兼毒性。

藥忌 惡藜蘆、枳實、貝母、白欬、白朮，忌鼓汁、畏飴。

品質 烏頭為老根，稚根及形態之差異及名稱之區別。

母根為烏頭，冬至傍生的為附子，附子連生小者為側子，更小者漏蘭子，獨生大者為天雄，兩頭尖嘴者為烏嘴。另有草烏頭用烏頭之別。

成份 Aconitin $C_{34}H_{43}NO_{11}$ Mesaconitin $C_{33}H_{45}NO_{11}$

Hypaconitin $C_{35}H_{45}NO_6$ 及植物鹼。

效用 鎮痛鎮痙藥神經痛，癱瘓質斯癱瘓與內障眠等有效，古來新陳代謝機能的極度沈衰振起興進之要藥。

本草提要：搜風，膝濕閉頑痰，治頑症，惡風寒熱歷節，掣引腰痛，不能步行。

用量 一日量 0.5 — $1g$ 爲煎劑。

處方 真武湯。

茯苓 9.0 芍藥 9.0 生薑 9.0 白朮 9.0 附子 1.0 水 600.0
煎成 200.0 ，一日三次分服（腰痛腹痛）。

二、烏藥

性味 香涼=辛溫。

成份 含有揮發性 **Cinderon** $C_{11}H_{22}O$ 等。

效用 對充血性的頭病、中風、夜尿症、腹痛、霍亂等有效。

本草提要：逐血散風，治中風，中氣及膀胱冷氣、反胃、吐食、霍亂、痢疾。

用量 一日量 2 — $6g$ 爲煎劑或爲末。

處方 烏藥末 2.0 當歸末 2.0 混和，一日三次分服（腹瀉）。

三、纈草 (Valeriana)

性味 特異香氣，辛辣味。

成份 爲揮發油（纈草油）其他成份有（左旋）**L-Pinen**，**L-Camphon**，**DuPenten**，**TerPinea**，**L-trononen** 等，醋酸纈草酸等。

藥理 少量纈草油起發揚性而壓迫昇騰，大量中樞神經麻痺，血壓下降，反射興奮性減退。纈草之有鎮靜作用，又設基因於特異之香氣，但尚難斷定。

用量 一日量 5 — $10g$ 爲浸劑。

新藥 **Vilido** 爲纈草酸之有效成份，偏頭痛妊婦嘔吐等鎮痙鎮

靜藥。

四、泪夫藍（蕃紅花） (Sapron)

性味 特異芳香苦味=甘平。

成份 含有黃色配糖體 Cratin A·B·R；三種 Crocetin 其他結晶性苦味質 Picrocrocin 揮發油脂肪等。

效用 爲鎮痙藥。頭痛、眩暈、通經，婦人諸病有效。

本草提要：心憂鬱積氣悶不散、活血、久服令人心悅又治驚悸。

用量— 一日量 0.5 — 1g 爲浸劑或一回量 0.5g 溫浸服用。

五、芍藥

性味 收斂性微苦=苦平。

禁忌 忌鐵。

品質 附皮爲赤芍藥，除皮爲白芍藥，赤者爲上品。

成份 有安息香酸及 Asporogin等，其他未詳。

效用 鎮痙、鎮痛、通經、止痛藥，婦人諸病，腹痛、胃痙、眩暈、痛風、利尿等有效。

本草提要 主邪風、腹痛、散惡血、順血脈、破堅積寒熱痙攣、利脫朧，大小腸益氣固肌膚。

用量 一日量 3 — 8g。爲煎劑。

處方 桂枝加芍藥湯：

桂枝 6.0 芍藥 6.0 大棗 6.0 生薑 6.0 茯苓 6.0 朮 6.0 甘草 4.0 水 600.0 煎成 200.0 一日三次分服（頭痛眩暈）。

六、天南星

性味 初緩和後苛辣性=苦溫。

禁忌 忌鐵。

成份 一種 Saponin 才詳含有多量的澱粉。

效用 鎮痙，鎮痛，祛痰藥，腦痛胃凝，癱瘓質斯痛風，貼用與

天花粉混合散布，

本草提要 主中風，麻痺，除痰，下氣，利胸膈，攻堅積，消癰腫，散血。

用量 一日量 4-8g。煎劑。

七、白芷

性味 特異芳香性奇烈味=辛溫。

成份 含有一種甾體毒 Argelicotosoin等。

效用 鎮痙藥，產前產後的頭痛，眩暈，逆經，齒痛，下血，鼻衄，痔瘡諸為浴湯料。

本草提要 發表，祛風，散濕，治產後傷風，血虛，頭痛，生肌止痛，解砒毒，蛇傷。

用量 一日量 5—13g。為煎劑。

八、伏龍肝

基本 古灶底燒的團結的燒土，粉碎以供藥用。

性味 氣味無臭=辛微溫。

成份 含有無機鹽類硫酸鈣，鎂 Kalinin 鹽硅酸鎂，酸化鉛食鹽等。

效用 鎮痙藥，妊婦之惡阻，嘔吐，嘔瀉，嘔血等有效。

本草提要 調中止血，去濕，消腫，治咳逆，反胃，吐衄，崩帶，尿血，腸風，癰腫。

用量 一日量 4—12g。為煎劑或粉末。

處方 伏龍肝 15.0 白朮猪苓各 4.5 為粉末，一日三回 4—8g。服用（惡阻嘔吐）。

第十二章 鎮痛劑

一、延胡索

性味 微苦無臭=辛溫。

品質 外面帶黃灰色內面黃色大粒爲上品。

成份 含有 ProtoPis. $C_{20}H_{19}NO_5$ Bulbocapnin $C_{19}H_{19}NO_4$ 非植物鹼的 Phenol 等。

藥理 ProtoPin 對蛙少量 0.002 呈阿片植物鹼同樣之麻痺作用，大量則發生肌肉末梢麻痺。對哺乳動物，樟腦的中毒症狀相似，兩循環器的麻痺，略有區別。

效用 鎮痛藥，頭痛腹痛痲痛月經痛，分娩後陣痛等有效。

用量 一日量 $5-10g$ 爲煎劑。

新藥 Bulbocapnin Hydrochloroc (Merk) 內服注射震戰麻痺。

處方 延胡索湯：

延胡索 4.0 。當歸桂枝各 3.0 乾薑 2.5 水 300.0 煎成 100.0 ，頓服（腹痛月經痛）。

二、駒草

成份 Dicentrin $C_{20}H_{31}NO_4$ ProtoPin $C_{20}H_{19}NO_5$ Methyl Quercetin 等。

藥理 少量 Dicentrin 呈麻醉作用，中等量呈特異的痲痲樣癱瘓發作，本物質 $0.2g$ 溫血動物皮下注射與 0.5 的 Antipyrin 相等的解熱作用，降于常溫以下數小時後高溫，Dicentrin 若欲充分解熱，伴有輕度的呼吸促進。

效用 鎮痛藥，腹痛有效，Dicentrin ProtoPin 有麻醉作用，鎮痛的作用，爲植物鹼。

三、蟾酥

性味 甘辛溫。

基本 蟾蜍的表皮腺分泌乳白毒液，麵粉混和製煉成餅狀塊。

成份 含有麻痺性成份 *Gamain*。

效用 爲鎮痛藥，胃痛、腹痛，伴有咳嗽諸疾患，痔疾，癩瘡性皮膚病疥癬等有效，藥用爲強心目的。

本草提要 摩腰眠陰囊治腰腎冷，並助陽氣，又療牙虫，治發背疔瘡，小兒疳積、腦疾。

用量 一日量 0.3 — $0.1g$ 。爲粉末或丸劑。

新藥 *Sensonin Sensol*，主劑爲蟾酥鎮痛鎮咳強心，喘息、氣管支加答兒、百日咳、胃痛、腹痛、皮膚瘙癢症、痔疾、齒痛、內服或外用。

四、白屈菜

性味 特異臭辛味。

成份 含有 *Chelidonium C₂₀ H₁₆ NO₅ Prutapin Berderin* 等。

效用 爲鎮痛藥，胃腸潰瘍並痛疹有效，又有以胃痙的特效藥，而常用者。

用量 一日量 2 — $5g$ 爲煎劑。

新藥 *Chelidominum ProsPhotium* 爲白屈菜主要成份，用胃潰瘍疼痛。

五、防己

性味 苦味—大苦辛寒。

禁忌 解雄黃毒惡細辛畏女苑葶藶。

成份 含有各種植物鹼 *Sinomenin C₁₉ H₂₃ NO₄ Dinnomenin C₃₈ H₄₄ N₂ O₈ Acotumin C₂₀ H₂₅ NO₈ Sinsidin C₁₉ H₁₁ NO₇*

Diversin等。

藥理 動物注射多量 Sinomenin 時反射機能亢進，發作劇烈的
醫學遂陷於中樞性麻痺而死。

效用 爲鎮痛藥，癱瘓質斯神經痛肩凝腰等有效。古來爲水腫淋
疾之消炎利尿藥。

本草提要：治風濕、口面喝斜、手足拘痛、去腸膀胱、通二便、
療水腫，風腫。

用量 一日量 3—8g 爲煎劑。

新藥 鹽酸喜奴美仁 Sinomenium Hydrochloricum 爲防已之主
要成份，爲癱瘓質斯神經痛之特效藥；另有 Einomin 爲防已之抽出
物（植物鹼）與水楊酸配伍劑，內服治癱瘓質斯神經痛，關節炎等特
效。

處方 (1) 防已 5.0 茯苓 3.0 桑白皮 3.0 木香 2.0 水 600.0 煎
成 200.0；一日三次分服（神經痛癱瘓質斯）。

(2) 防已（木） 6.0 石膏 16.0 桂枝 4.0 人參 8.0 水 60
0.0 煎成 200.0 一日三次服（水腫腎臟炎）。

六、莨菪

性味 臭氣大快苛辣味＝苦寒。

成份 含有 Hyoscyamin $C_{17}H_{23}NO_3$ Scopolomin $C_{16}H_{21}$
 NO_4 Atropin $C_{17}H_{23}NO_3$ 。

效用 鎮痛鎮痙藥，喘息神經痛、胃痛等有效。

本草提要：邪症、疥癬，殺虫、療癲狂，然不可過劑。

用量 一回量 0.01—0.05g 爲浸劑或粉末。

新藥 Scopolin 即莨菪抽出來總的植物鹼，爲鎮痙分泌制止劑
；胃痙攣、胃潰瘍，子宮痙、胆石痛、鎮咳、惡心、呃逆等有效。

第十三章 滋養，強壯及變質藥

一、玉竹（萎蕤）

性味 緩和微甘=甘平。

禁忌 忌鐵。

成份 含有類似的配糖體、含有多量的粘液，加生分解果糖葡萄糖。

效用 滋養強壯藥，小便頻數、遺精等有效。

本草提要：善滋益腎氣，內補不足、衰老、虛勞客熱頭痛，久服去面爲顏色。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑。

處方 玉竹 10.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（強壯）。

二、淫羊藿

性味 緩和微苦=辛寒。

品質 晚春初夏採集爲上品。

成份 含有一種植物鹼。

藥理 淫羊藿的水浸液經口給與動物，認爲交尾力亢進。

效用 爲強壯藥、補精、陰痿、健忘症有效，淫羊藿 60g 酒 1 升以冷浸稱爲仙靈脾酒，爲強壯的目的飲用。

本草提要：主陰痿，絕陽、健忘、勞氣、筋骨痠急，四肢不仁，強心力，堅筋骨，益精氣。

用量 一日量 5—15g 爲煎劑。

處方 淫羊藿 8.0 生薑 2.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（陰痿）。

三、鼯鼠糞（土龍糞）

基本 用鼯鼠燒黑粉碎供藥用。

成份 未詳。

效用 強壯興奮藥；又排膿癰腫膿瘍有效。

用量 一日量 1—2g 用粉末。

四、黃耆

性味 甘溫。

禁忌 忌龜甲白鮮皮。

品質 肥大柔軟者爲上品。

成份 未詳。

效用 緩和強壯藥，利尿排膿，盜汗自汗有效。

本草提要：生固表，無汗能發汗，補陽虛溫，分肉實腠理補肺氣，瀉陰火，解筋熱，久用補中益元氣，溫三焦，壯脾胃，生血生肌。

用量 一日量 5—8g 爲煎劑。

五、黃精

性味 緩和稍甘味=甘味。

品質 粗短似薑根質滋潤者爲上品。

成份 含有一種植物鹼。

藥理 家兔投與黃精越幾斯之際，起血糖增加率，依投與量比例且作用時間而定，黃精越幾斯對副腎素之過血糖有顯著的抑制作用，家兔靜脈注射使血壓下降。

效用 爲滋養強壯藥，病後的虛弱諸症有效。

本草提要：補中益氣，安五臟、益脾胃、潤心肺、填精髓，助筋骨，除風濕、下三尸虫。

用量 一日量 4—12g 爲煎劑。

處方 黃精 5.0 薏苡仁 10.0 沙參 5.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（強壯、肺炎加答兒）。

六、海松子

性味 甘小溫。

成份 含有脂肪油蛋白質，其他未詳。

效用 滋養強壯藥可供食用。

本草提要：逐風痺寒氣虛羸少氣補不足，潤皮膚，肥五臟，主諸風，溫胃腸，久服輕身，延年不老。

用量 適量，無食料時製菓子。

七、粳米

性味 淡白=甘平。

品質 晚硬有上品。

成份 有蛋白質脂肪糖質灰分。

效用 滋養強壯藥，緩和包攝清瀉止血有效。

用量 一日量 5—20g 爲煎劑。

八、何首烏

性味 收斂性微苦=苦溫。

禁忌 忌葱鐵器。

成份 Oxymethylanthrochinon Lecithin 鞣粉等。

效用 爲強壯滋養藥，老衰病後的恢復期，臍病質便秘，補精等有效。

本草提要：消瘰癧、癰腫，治五痔、亦治婦人產後及帶下諸疾，久服黑鬚髮、悅顏色、益精髓，延年不老。

用量 一日量 10—20g 爲煎劑。

處方 何首烏 10.0 青皮 2.0 大棗 2.0 陳皮 2.0 生薑 2.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（強壯）。

九、胡桃仁

性味 緩和脂肪樣=甘平。

成份 脂肪油，其他未詳。

效用 爲滋養強壯藥，胡桃油諸種的皮膚病有效。

本草提要：補氣、養血、潤燥、化痰、益命門，利三焦、治癰腫、疥癩、楊梅、白禿諸症。

用量 一日量 4—10g。

新藥 Juglin 爲未熟之胡桃抽出之有效成份，塗佈汗疱疹凍傷腋臭等有效。

一〇、五加皮

成份 未詳。

效用 爲強壯藥，疼痛陰萎有效，製五加皮酒，本酒爲五加皮之煎汁加麴米釀造，或用五加皮 40g 加酒 1 升，冷浸，中國習慣用五加皮酒，治風濕，去中氣，固筋骨，增精有效。

本草提要：順氣化痰、堅骨、益精、去風，勝濕、逐皮膚瀉血、療筋骨之拘攣。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑。

一一、山茱萸

性味 澀酸味=酸平。

禁忌 惡桔梗防風防已。

品質 肉厚軟，色紫黑色，氣味酸澀，滋潤爲上品。

成份 含有多量之糖份酒石酸林酸沒食子酸等有機酸。

效用 爲強壯藥，陰萎、遺精、小便頻數有效，山茱萸 100 酒 1 升冷浸製成山茱萸酒飲用爲強壯目的。

本草提要：治腦骨痛、療耳鳴、補腎氣與陽道、添精髓、安五臟、止小便利。

用量 一日量 2—7g 爲煎劑。

一二、薯蕷

性味 淡白無臭＝甘平。

禁忌 惡甘遂，忌鐵。

品質 山谷自然生者爲上品。

成份 多量的澱粉粘液質，Mucin Diastase。

效用 滋養強壯藥，虛弱者腸加答兒，遺精，夜尿，盜汗有效。

本草提要 補虛損，治遺精，除寒熱邪氣，益氣力，長筋肉，強陰及筋骨。

用量 一日量 2 — 10g 爲煎劑或粉末。

處方 (1) 山藥末 5.0 人參末 1.0 地黃末 1.0 混和，一日三次分服。(強壯)

(2) 山藥 4.0 人參 4.0 熟地黃 2.0 枸杞子 2.0 山茱萸 2.0 當歸 2.0 杜仲 1.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0

，一日三次分服(虛弱者)。

一三、女貞

性味 苦溫。

成份 含有 Syringin $C_{17}H_{24}O_9$ 酵素 Furocin inc:rlin。

效用 爲強壯藥、葉貼諸症有效。

本草提要 補中安五臟，養精神，強陰，明目，黑髮，除百病諸惡、口舌生症皆佳。

用量 一日量 5 — 10g 爲煎劑。

一四、蛇牀子

性味 稍苦辣＝苦平。

成份 含有 Isovarieliana S^oure horugloster Ysohomenl (左旋) L-Pinen 等揮發油。

效用 爲強壯藥，陰萎、婦人的陰腫等有效。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑或粉末。

一五、穿山甲

性味 鹹微寒。

成份 未詳。

效用 乳汁分泌不足，下痢，裏急疼痛，癰腫等有效。

催乳藥，穿山甲，當歸，桔梗，芍藥，茯苓、木通，川芎，天花粉各等分用之。

本草提要 除癰疾寒熱風痺強直疼痛，通經脈，下乳汁，消癰腫，通竅殺蟲。

用量 一日量 3—10g 爲煎劑或爲粉末。

一六、大棗

性味 緩和甘味=甘平。

禁忌 殺烏頭附子天雄之毒。

品質 形大，肉肥，核小，果皮正赤色爲上品。

成份 含有澱份及粘液質。

效用 爲強壯藥，又有鎮痛解熱利尿之效。

本草提要 補中益氣滋脾土，潤心肺，調營衛，緩陰血，生津液，悅顏色。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑。

處方 大棗 5.0 人參 5.0 吳茱萸 3.0 生薑 2.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服。（強壯）

一七、地骨皮（枸杞）

性味 根皮苦寒，葉：苦寒；子：甘平。

成份 果食中含有 Betain

效用 枸杞子爲強壯滋養藥，虛弱有效，又枸杞子酒（枸杞子 5 升酒 2 斗）枸杞子搗碎浸入酒中，放置二週間即製成，強壯的目的食

用，地骨皮（柳皮）及菟絲子葉有解熱，止渴，有肺結核的解熱藥。

本草提要 菟絲子：堅筋骨、耐老、除風、去虛勞，補精神。

地骨皮：瀉腎火，降肺中伏火，去腸中火，退熱，補正氣。

枸杞葉 除煩補虛，去皮膚骨節間風，消熱毒，消瘡腫。

用量 一日量 6—15g 爲煎劑

處方 枸杞子 6.0 五味子 2.0 肉蓯蓉 2.0 人參 2.0 茯苓熟地黃 2.0
 大棗 2.0 生薑 2.0 甘草 2.0 水 600.0 煎成 200.0 一日
 三次分服。（強壯遺精）

一八、地黃

性味 生：甘平，乾：甘寒，熟：甘微苦微溫。

禁忌 忌銅鐵，得清寒麥門冬而良，惡貝母，畏無灰仁。

品質 分三種：生地黃、乾地黃、熟地黃。

生地黃 採集後貯於陰的砂地、形小指大，肉赤黃色肥大而潤者爲上品，瘦而乾者爲下品。

乾地黃 冬季採集後陽乾，皮灰色肉紫黑色者爲上品，肉黑色而塗黃土者爲下品。

熟地黃 以同量地黃與酸汁蒸乾即得，皮添黑色者爲上品。

成份 含有 M_{ovnis}，其他未詳。

藥理 消渴，在糖尿病使用之植物生物以熟地黃爲煎劑，家兔經口投與觀察血糖量之影響，投與生地黃藥液後，無上昇之變化，初生著明的抑制作用，且抑制率最大。

效用 爲強壯藥，有補血之效，虛弱者賞用，咯血，吐血，子宮出血等爲止血藥。

本草提要 生地黃：主治婦人崩中血不止，治產後腹痛，解諸熱，通月水，利水道。

乾地黃 除寒熱積聚，療折跌，絕經、主男子五勞七傷，女子傷

中胞漏，下血，產後血虛，腹痛，久服延年。

熟地黃 滋腎補血，益髓填精，烏髮黑髮。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑。

處方 當歸大黃湯：

當歸黃耆各 4.0 生地黃，熟地黃，黃蘗，黃連，黃芩 各 3.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服。（虛弱枯槁症盜汗）

一九、天門冬

性味 初甘後苦味=苦平。

成份 含有多量澱粉 Aspargin 蔗糖等。

效用 爲強壯藥，解熱鎮咳，利尿有效。

本草提要 主諸暴風濕、偏痺，強骨腦，殺三虫，去伏尸，久服輕身益氣，延年不饑，保定肺氣，去寒熱，養肌膚，利小便，冷而能補。

用量 一日量 4—10g 爲煎劑。

處方 天門冬 10.0 人參 5.0 熟地黃 3.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（強壯補精）。

二〇、天麻

性味 稍辛味=辛溫。

成份 未詳。

效用 爲強壯藥，眩暈，頭痛，神經衰弱等有效。

本草提要 主諸風濕痺，四肢肢掣，小兒風癘，驚氣，益氣強陰，通經脈，強力。

用量 一日量 4—10g 爲煎劑。

二一、菟絲子

性味 緩和油樣=辛甘平。

成份 含有樹脂樣配糖體，其他未詳。

效用 爲強壯藥，陰萎遺精有效。

本草提要 治男子女子虛冷，添精，益髓。腰疼，膝冷；消渴，熱中，久去面影，悅顏色。

用量 一日量 4—8g 爲煎劑

二二、杜仲

性味 甘微辛溫。

禁忌 惡玄參蛇退皮。

成份 食Guttapercha，其他未詳。

效用 爲強壯藥，鎮痛有效。

本草提要 潤肝燥，補肝虛，治腰痛，益精，強筋骨，補肝腎。

用量 一日量 4—10g 爲煎劑。

二三、土茯苓

性味 苛烈稍味苦=甘淡平。

品質 廣東福州廈門產的，質軟色白形短，粉塵多者爲上品。

成份 未詳。

效用 變質藥，古來治微毒。瘰癧、癰腫之要藥，利尿，泄瀉，骨痛等有效。

本草提要 健脾胃，強筋骨，去風濕，利關節，止泄瀉，治拘攣，骨痛，惡症，解汞粉銀中毒。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑。

處方 土茯苓 10.0 忍冬 3.0 防風 3.0 川芎 3.0 大黃 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服；（微毒）

二四、人參

性味 特異香風，微甘苛辣=甘微寒。

禁忌 異五臟脂、反皂莢、黑豆藥。

品質 人參分：水參、白參、紅參三種。

水參爲採集之生根。白參去外皮陰乾、紅參蒸於日光或火熱而乾燥之。凡潤而軟質重粗微帶苦味者爲上品。

成份 含有 Pansquian C32 H56 O4 Panasopogenol C27 H48 O4 Panaxin 一種配糖體等。人參之特異香氣爲 Panacene C15 H24 其他含有配糖體糖類無機鹽定類等。

藥理 人參有一種配糖體抑制人工的過血糖與糖尿，與動物體中之含水炭素新陳代謝爲密切關係，又能使人體的新陳代謝興奮，且有著明的利尿作用。

效用 爲強壯興奮藥，一般的虛弱者、神經衰弱 Hysterie 婦人病有效。

本草提要：補五臟，安精神、定魂魄，止驚悸，除邪氣，明目、開心、益智、治虛勞、內傷，發汗、自汗、多夢，久服輕身延年。

用量 一日量 5—8g 爲煎劑。

處方 人參甘草湯：

人參甘草白朮乾薑各 9.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（身體虛弱）。

二五、人中白

基本 爲尿壺中自然沉澱固結之固形物。

性味 鹹平。

品質 質極硬爲灰白色的薄片，表面凹凸不平。

成份 主成份恐是尿酸石灰，未詳，其他含有各種尿的成份，又或尿中之一部 Hormen。

效用 爲強壯藥，加入人參煎用爲強壯之目的。

本草提要 治虛勞，淋疾，小便白濁，潤三焦，明目，延年，王公貴人惡其不潔，故秋取童便如法煉作之。

用量 一日量 1—5g

二六、肉蓯蓉

性味 微臭緩和=甘酸鹹溫。

禁忌 忌鐵。

成份 未詳。

效用 爲強壯補精藥，遺精陰萎等有效。

本草提要 滋潤五臟、益髓強筋，治五勞七傷，絕陽不興，絕陰不產，腰膝冷痛，遺精帶下。

用量 一日量 8—15g 爲煎劑。

二十七、巴戟天 (不凋草)

性味 辛甘微溫。

禁忌 惡丹參。

品質 形肥味甘潤者爲上品，此爲肉巴戟。

形連柱狀，質堅實，不潤，味澀爲僞品，此稱柱巴戟。

成份 未詳。

效用 爲強壯藥。

本草提要 治男子夜夢鬼交，精洩，強陰，治風癩。

用量 一日量 4—10g 爲煎劑。

二八、反鼻蛇 (蠃蛇)

基本 蝮蛇燒黑而供藥用，或剝皮去內臟乾燥供藥用。

性味 甘溫。

品質 真假鑑別容易，選頸部完全者，新鮮清潔者爲上品。

成份 未詳。

效用 爲強壯興奮，排膿，癰腫，腫傷等有效，酒浸液稱反鼻酒，補血強壯目的飲用。

用量 一日量 0.3—3g 用以粉末或反鼻酒。

處方 伯潮散：

反鼻霜末 1.0 麝霜末 1.0 鹿角霜末 1.0 混和，一日三次分服
(遠勝惡能痔漏)

二九、麥門冬 (麥冬)

性味 緩和微甘 = 甘平

藥忌 惡款冬，畏苦參，木耳石鐘乳。

品質 去心圓形滋潤者爲上品，不去心兩頭尖，肉白乾，小粒爲下品。又有浸熱湯拔出心者稱丸麥門冬，又有不拔心而乾稱麥門冬。

成份 未詳。

效用 好緩和滋養強壯藥，有消炎鎮咳，祛痰，解熱，催進母乳等之效。

本草提要 去心熟，清心，潤肺，除煩，止咳，強陰，益精，治熱毒，大水瀉面，枝節浮腫，美顏色。

用量 一日量 6 — 10g 爲煎劑。

麥門冬湯：

麥門冬 17.0 半夏 3.5 人參 1.5 甘草 1.5 茯苓 4.2 大棗 2.0

• 水 600.0 煎成 200.0，一日三次冷服，(肺結核喘息百日咳)

三〇、木天蓼

性味 特異香氣酸味微辛 = 苦辛微熱。

成份 含有 Mafatabi S S ure 揮發油，本品存在之特異香氣。

藥理 Mafatabi S S ure 於動物呈麻醉作用，初麻痺大腦，次脊髓，最後延髓。用到巴麻醉的用量，對溫血動物幾乎不影響心臟血管，不生呼吸麻痺，與大量時起呼吸麻痺而死。

效用 溫暖身體有效，用於頭痛腰痛。

用量 一日量 6 — 10g 爲煎劑或粉末。

新藥 Polygamal 爲天木蓼中抽出之有效成份，爲利尿強心藥。

三一、薏苡仁

性味 微甘，有一種香氣=甘淡微寒。

品質 白色大粒，若嚼之於齒粘着者爲上品。

成份 含有糖質澱粉蛋白質脂肪等，其他未詳。

效用 良好的營養劑，有利尿鎮痛鎮痙鎮咳等效；連用薏苡仁有除去疣贅之特效。

本草提要 筋急拘攣不可伸屈，去乾濕脚氣，久服輕身益氣，除筋骨中邪氣，不仁，益胃補肺，清熱消水腫，利小便，熱淋。

用量 一日量 10 — 30g 爲煎劑。

新藥 Myotonin 好薏苡仁抽出的有效成份，爲神經痛癱瘓質斯急性心臟炎肋膜炎等消炎鎮痛藥。

處方 薏苡仁湯：

- (1) 薏苡仁 6.0 常歸 3.0 芍藥 3.0 茯苓 3.0 人參 3.0 五味子 3.0 黃芪 3.0 麥門冬 3.0 桑白皮 3.0 百部 3.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（肺結核）。
- (2) 薏苡仁 5.0 芍藥 苁朮當歸各 4.0，麻黃桂枝各 3.0 甘草生薑各 2.0 水 6.0 煎成 200.0，一日三次分服（中風痛疼）。
- (3) 薏苡仁 10.0 木賊 5.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服速用（除疣）。

三二、連錢草

性味 特異芳香=苦寒。

成份 有揮發油，苦味質 Tannin 質 Cholin。

效用 爲強壯藥，解熱、鎮咳、止瀉、止渴，利尿有效，又治小兒之癩，故有疳取草之名。

本草提要 治小兒癩熱，腹內熱冷，瘰癧、鼠漏，研汁點暴赤眼良，以鹽樣貼腫毒並疔癬。

用量 一日量 6—10g 爲煎劑。

處方 連錢草 5.0 甘草 1.0 水 300.0 煎成 100.0，一日三次分服（小兒疳）。

三三、鹿角

性味 鹿角：溫。鹿角膠：甘平。鹿茸：甘溫。

品質 有鹿角、鹿角霜、鹿角膠、鹿茸、鹿胎子等種類。

鹿角霜：鹿角燒黑而成。鹿角膠煮爛的鹿角屑而製。鹿茸被有皮毛之初生角。鹿胎子即鹿的胎子。

成份 含磷酸、石灰、碳酸、石灰、膠質，其他未詳。

效用 爲滋養強壯藥，虛弱者神經痛內部的病能滋補有效。

本草提要 鹿角散熱、行血、消腫、辟邪。鹿角霜治肺勞嗽，尿精、尿血、瘡瘍、腫毒。鹿茸：補陽益血熱補髓、治遺精、盜汗一切虛損。

用量 一日量 5—10g 爲粉末或丸藥。

第十四章 矯味藥

一、甘草 (Susholy)

性味 特異甘味=甘平。

品質 皮褐赤色而薄，肉黃色，甘味強者爲上品，皮粗、肉淡黃色、味薄爲下品，此外又分去皮甘草與皮甘草。

成份 含有 Glycyrrhizin C₄₄H₆₄O₁₉ 蔗糖葡萄糖 Monicit 林麩酸 Asporagin 等。

效用 爲緩和矯味藥，用爲咽喉諸症、鎮咳、祛痰藥，爲諸藥之君藥，爲金石草木之解毒藥，於諸藥配伍有相助之用，局方有甘草

膏。

本草提要 主五臟六腑寒熱邪氣，去咽痛、長肌肉、解毒協和有效。

用量 一日量 5—10g 爲煎劑。

新藥 G10bin 爲甘草抽出之有效成份，爲祛痰鎮咳兼調聲藥。

處方 排膿湯：

甘草 10.0 桔梗 5.0 大棗 12.0 生薑 5.0 水 600.0 煎成 200.0；一日三次溫服（排膿祛痰）。

二、土常山

性味 特異甘味。

成份 含有甘味成份 Phylidalein $C_{10}H_{14}O_5$ Sophysioducin $C_{10}H_{14}O_5$ 二種結晶性物質，本品甘味強。

效用 爲矯味藥，糖尿病患爲蔗糖的代用品。

三、薄荷葉

性味 特異香氣味峻烈後清涼=辛溫。

成份 含有揮發油，其他成份薄荷腦 Menthol $C_{10}H_{20}O$ A1e. urhon $C_{10}H_{18}O$ A1dehd。

效用 爲清涼矯味藥，鎮癩驅風健胃有效，局方有薄荷腦、薄荷水、薄荷精等。

本草提要 治賊風傷風，發汗、惡氣、心腹脹滿、霍亂、宿食不消，治咽喉痛。

用量 一日量 3—8g 爲浸劑。

四、蜂蜜

性味 特異香氣=爽快甘味。

品質 淡黃色膿稠液體，經過一時爲顆粒狀甘味佳香爲上品。

成份 含有轉化糖、果糖、蔗糖 Deslterin 蛋白質、膠樣物質，酵

素、蠟色素、芳香物質、有機酸、無機鹽類、花粉等成份。

效用 爲滋養甘味藥，鎮咳、緩下有效。用量適宜。

第十五章 止血劑

一、阿膠

基本 獸皮與水長久煮沸而得。

毛皮筋製成者爲皮膠。骨與骨膜製成者爲骨膠；魚翅傍製成者爲魚膠。

性味 甘微溫。

禁忌 畏大黃不使山藥。

品質 黃褐色透明有異臭者爲上品。

成份 有膠質GJatin。

效用 爲止血藥，吐血、咯血、祛痰補滋有效。

本草提要 和血、補陰、潤嗽、定喘、利小腸、治虛勞、噴嗽、肺痿、吐膿、吐血、衄血、血淋、血痔、腸風下利。

用量 一日量4—12g爲煎劑。

處方 白頭翁加甘阿膠湯。

白頭翁6.0黃連6.0黃蘗6.0黃芩6.0阿膠4.0甘草4.0
水600煎成200.0一日三次分服（血便子宮出血）。

二、小連翹

成份 含有一種揮發油。

效用 爲止血藥，切瘡的洗滌料，咽咳的含嗽料，癩麻質斯，疾病的溫敷料，生葉榨汁用於創傷打撲傷。

用量 一日量6—10g爲煎劑。

新藥 Ootogsinin，主劑爲小連翹，爲神經痛癩麻質斯關節炎的法射藥。

三、艾葉

性味 特異芳香苦味=苦辛溫。

成份 含有揮發油等，此成份爲 Cineol Thuizn 等，其他含有 Aderenalin 鞣酸鐵等。

效用 爲止血藥，吐血、衄血、直腸出血、子宮出血、腹痛吐瀉有效，兼有強壯等之效。

本草提要 理氣血、透寒濕、止吐血下痢，婦人漏血、利陰氣、生筋肉、緩子宮、治帶下、心腹冷氣。

用量 一日量5—8g爲煎劑，

處方 芎歸膠艾湯：

川芎8.0阿膠8.0艾葉6.0當歸6.0芍藥4.0地黃6.0甘草2.0水600.0煎成200.0，一日三次分服（子宮出血）。

四、川骨 （萍蓬草）

性味 甘寒。

成份 含有 Naphoridin $C_{15}H_{23}NO_2$ ，

效用 淨血強壯藥，爲破血與止血藥，產前後的出血、切創等有效。

本草提要 補虛益氣力，久服厚胃腸。

用量 一日量6—12g爲煎劑。

五、馬勃 （馬兜勃）

性味 辛平。

成份 未詳。

品質 用外面褐色或灰白色，實質黃褐色治絲樣柔軟。

效用 爲切創或其他創面的止血藥，吐血、咯血咽喉炎等蜜丸劑。

本草提要 清肺、解熱、散血、止嘔，治喉痺咽痛、鼻血失音。

用量 一日量 2 — 4g 爲丸劑。

六、白芨

性味 緩和微苦 = 苦平。

禁忌 忌烏頭。

成份 含粘液質，其他未詳。

效用 爲止血藥，吐血內服，癰腫疔外用有效。

本草提要 入肺止吐血，治癰腫惡瘡敗疽、死肌，除面上腐爛，塗手足皸裂，令人肥滑。

用量 一日量 2 — 6g 爲煎劑。

處方 二白湯。

白發 4.0 白茅花 8.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（吐血）。

七、蒲黃 (Breishlotrigl Rupfeklule)

性味 緩和稍油膩 = 甘平。

成份 含有脂肪油，主成份爲游離脂酸 Barmitin 酸等。

效用 爲止血利尿藥，爲創傷濕疹之撒布藥，葉燒黑稱蒲灰。

本草提要 生、性滑，主行血、消瘀、通經、利小便，祛心腹膀胱之熱，撲打損傷瘡節諸腫。

炒黑，性瀉，主止、治一切血病、崩帶、洩精。

用量 一日量 5 — 10g 爲煎劑。

處方 蒲黃 5.0 阿膠 3.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（止血）。

八、木賊

性味 收斂性苦味甘微苦平。

成份 含有無水硅酸木賊酸。

效用 爲止血藥腸出血、痔出血有效，利尿，發汗、眼疾用之

與麻黃效相類。

本草提要 與麻黃同形性，也能發汗、解肌、治目疾、退翳膜、及疝通、脫肛、腸風、痔瘻、赤痢、崩中諸血病。

用量 一日量 10—20g 爲煎劑。

第十六章 通經劑

一、馬鞭草 (Eisenkraut)

性味 苦微寒。

禁忌 忌火。

成份 含有結晶性配糖體 Verbenalin C17 H25 O10 等。

效用 通經惡、腫、金創等有效。

本草提要 破血、行血、治血、治金創、通月經、治水腫、鼓脹、大腹、水腫。

用量 一日量 4—10g 爲煎劑。

二、紅花 (Forlerdistel)

性味 特異香氣微苦辛溫。

品質 紅花根即以紅花壓榨乾燥成方形板狀。

成份 含有黃色素 Sofflongalk C24 H30 O15 紅色素配糖體 Carthamin C25 H24 O12 等。

本草提要 破血活血消腫、止痛，主婦人月經不調，腹中結塊，崩中、淋露、產後血病。

用量 一日量 2—6g 爲煎劑。

處方 紅花當歸散：

紅花 1.0 當歸 8.0 川芎 7.0 芍藥 3.0 熟地黃 3.0 黃芩 3.0
香附子 3.0 枳實 2.0 延胡索 2.0 小茴香 1.0 厚朴 1.0 柴胡
1.0 陳皮 1.0 三稜 1.0 莢述 1.0 牛膝 1.0 煎成 200.0，一日三次分服

(婦人淨血)。

三、香附子

性味 芳香性緩和=甘微寒。

禁忌 忌鐵，蒼朮，川芎而良。

品質 白色的幼根，帶赤色的老根，大形白者爲上品。

成份 含有揮發油，此成份爲 *Cyperon C15 H24 Cypero1 C15 H24 4o* 等其他含有 Phenal 樣物質的一種脂肪酸。

效用 爲通經、鎮咳、鎮痛藥，古來爲婦人之要藥。

本草提要 散氣痰、利胸膈、降痰熱、消食、療婦人崩漏、帶不自、候不調、胎前後百病。

用量 一日量 4—6g 爲煎劑或粉末。

處方 香蘇散：

香附子 8.0 蘇葉 4.0 陳皮 3.0 甘草 2.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服(頭痛發熱)。

四、三稜

性味 香氣微甘=苦甘平。

成份 未詳。

效用 通經、催乳、鎮痛藥，此藥效力比香附子強烈，伍不可過用，別妊婦禁用。

本草提要 破積氣、消痰損瘀血、脈血不調、心腹痛、產後惡血結血、通月水、墮胎、止痛、利氣、下乳汁、功近香附子而力峻、虛者慎用。

用量 一日量 2—5g 爲煎劑。

五、草棉

成份 種子含有脂肪油(棉實油)根未詳。

效用 新鮮根爲通經藥，種子有母乳催進作用。

用量 根 2g 種子 5g 爲煎劑。

新藥 有 Mamoin Neomilcoin 等爲草棉同類屬植物之原料，爲乳汁分泌催進藥。

處方 (1) 草棉根 2.0 水 300.0 煎成 100.0 順服(通經)。

(2) 草棉子 5.0 甘草 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服(催乳)。

第十七章 外用劑

一、三七(金不換)

性味 甘微苦溫。

成份 未詳。

效用 生葉之榨汁用於毒虫的刺傷，金創止血有效，吐血、衄血等內服。

本草提要 散血、定痛、治吐血、衄血、血崩、目赤，癰腫。

用量 一日量內服 10g 爲煎劑。

二、紫根(紫草)

性味 緩和微甘酸味=甘鹹寒。

禁忌 忌火。

成份 含有結晶性紫色素 Acetylshikonin C₁₈H₁₈N₆。

效用 皮膚病、惡瘡、切症、火傷等，用煎汁或溶出的油脂類、利尿、利便、解熱、疝氣等有效。古來用紫根爲染料。

本草提要 治斑疹、痘毒、活血、利大腸、合腎療小兒症，及面皴。

用量 一日量 3—6g 爲粉末，膏煎或煎劑。

處方 (1) 二聖散：

雄黃末 6.0 紫根末 9.0 混和傷出油塗佈(痘疔)。

(2) 紫根末 10.0 亞鉛華 2.0 橄欖油適宜混和爲塗擦料(皮膚病)。

三、水蠟花

性味 甘溫。

品質 純白色爲上品，試真法：篩置紙上火焙，水蠟花則溶化，而雜質(澱粉滑石)殘存。

效用 剝離疣爲目的而外用，齒痛肺疾有效。

本草提要 生肌、止血、定痛、補虛、續筋接骨、入丸散殺(肺)虫。

用量 一日量 0.7—2g 爲煎劑或散劑。

四、接骨木

性味 微甘後稍奇烈=甘苦平。

成份 含有揮發油，其他成份未詳。

效用 筋骨折傷打撲等煎劑內服，或濕布。發汗利尿有效。葉與木部同樣效用。

本草提要 折傷續筋骨、除風痺、可作浴料，療折傷、瘀血，產婦惡可血、可行煎汁服。

用量 一日量 15—20g 爲煎劑。

五、接骨草

性味 苦寒。

成份 未詳。

效用 骨間諸痺、四肢寒痛、脚腫、風癢、汗疹、等浴湯料。

用量 適宜煎劑。

六、羊絨(金鬚)

性味 苦寒。

成份 含有 CrysaPhansOure Frangulamolin C15 H10O5。

藥理 有大黃類似的藥理作用。

效用 疥癬及其他的皮膚病，以新鮮根搗碎或榨汁塗布用，或爲大黃代用品而作緩下藥。

用量 一日量 5g 爲煎劑。

七、連翹

性味 收斂性—苦平。

禁忌 忌火。

成份 葉中含有 phillyrin 配糖體，果食中成份未詳。

效用 促脈搏用，去脹腫脹，有緩和疼痛作用，濕癬、癩瘡、疥癬等內服，利尿鎮瀉通經有效。

本草提要 散諸經、血滯氣緊、利尿道、殺虫、止痛、消腫、排膿。

用量 一日量 1—3g 爲煎劑。

第十八章 殺蟲

一、苦參『毒』

性味 至苦寒。

禁忌 惡貝母菟絲子、漏蘆、反藜蘆。

成份 根含有植物鹼 Matrin $C_{15}H_{24}N_2O$ 種子含有脂肪油即發性植物鹼 Cytisin。

藥理 Matrin 的皮下注射致死量家兔的體重 1kg 爲 0.4g，其作用最初大腦的麻痺程度，中樞的興奮，發強度的程度。遂起橫膈膜及呼吸機運動末稍之麻痺，呼吸靜止而死。

效用 爲殺虫劑，用全草的煎汁驅除害虫，又健胃、驅虫有效。

用量 一日量 4g 爲煎劑。

二、除虫菊粉 (insekthlone)

性味 有特異香味。

成份 有效成份有第一 Pyrethrin $C_{21}H_{40}O_3$ 及第二 Pyrethrin $C_{22}H_{40}O_5$ 。

藥理 本品有效成份爲一種神經肌肉毒，對溫血動物惹起強烈的顫抖樣痙攣。

效用 爲殺菌藥，粉末作蚊烟香，又爲農用殺虫藥。

蚊烟香作法：花莖葉的粉末用糊膠黏合以竹青着色壓榨成線香。

新藥 Chrysemine 爲白花除菊抽出之有效成份，有丸劑液劑二種。

治 Amyle 赤蛔虫鞭虫蠕虫等驅虫兼殺虫藥。

三、馬醉木『毒』

成份 含有苦味質 Asechotosein 配糖體 Asehotin 等。

效用 莖葉之煎汁驅除毛虱疥癬有效，爲農作之殺虫藥。

四、百部

性味 苦味—甘苦微溫

成份 含有 Stemonin $C_{19}H_{22}NO_2$ Stemonidin $C_{17}H_{27}NO_5$

等。

效用 殺虫劑、疥癬、虫虱等寄生虫的驅除，有鎮咳效。

本草提要 有小毒殺蚊蠅蚊蚋一切樹木蛙虫，能潤肺熱咳嗽。

用量 一日量內服 3—8g 爲煎劑。

處方 百部根 5.0 鹽苡仁 10.0 麻 5.0 杏仁 1.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服（結核肺加答兒）。

五、藜蘆『毒』

性味 特異刺鼻臭—至苦辛寒。

禁忌 反細辛、芍藥、人參、沙參、圓參、苦參、惡大黃。

品質 分白藜蘆根 黑藜蘆根。

成份 含有植物鹼 Jorriin $C_{26}H_{37}NO_3$ ，其他未詳。

效用 爲農用殺虫劑、疥瘡、疝痛、浴湯料、催吐、祛痰、峻下
有效。

本草提要 入口即吐，普通預令噴風，痢症多用之。

用量 一日量 0.02 — $0.1g$ 爲粉末或煎劑。

第三篇 處方集

古醫學選證爲診斷治療的標準，主要依腹證、脈証、舌候的症狀下診斷，適應証而建立處方，所謂「方不離証，証不脫方」。古証與藥方形影相隨，本篇的處方記載的藥量，概以大人的一日量用 Gram 計算，故易，當然並不固定，而依病症的輕重緩急，各自下決研討增減之。

適應症項下所記載的病名爲現代醫學的名詞，不過表示症的適當程度而擬定的，故仍有細察研討之必要。

對古來的處方，當視爲先人許多寶貴經驗的累積；有深刻的考究之必要。然而在實際中下一些苦工夫研究進步與改善也是我們當然的任務。

一、茵陳蒿湯：

茵陳蒿 18.0 山梔子 6.0 大黃 2.0—6.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次冷服。

適應 急性黃疸（便秘、尿量減少、渴、腹部微滿者）。

二、茵陳五苓散：

茵陳蒿 8.0 五苓散 4.0。以上爲常劑三包，一日三次分服。

適應 發黃疸之病。

三、越婢湯：

麻黃 9.0 石膏 12.0 生薑 4.5 大棗 6.0 甘草 3.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 感冒，內攻性腎炎，腳氣，神經痛，皮膚病（浮腫，口渴，發汗或無汗，喘息，咳嗽）

四、越婢加半夏湯：

麻黃 6.0 石膏 8.0 生薑 3.0 甘草 2.0 大棗 4.0 半夏 6.0 水 600

0.0煎成200.0，一日三次溫服。

適應 喘息，眼疾（咳嗽，呼吸困難，眼目疼痛，口渴，煩悶，惡心嘔吐）。

五、黃芩湯

黃芩 9.0 大棗 9.0 甘草 6.0
芍藥 6.0 水 600.0 煎成 200.0，
一日三次分服。

適應 熱性下痢症，大腸加答兒，赤痢（下痢、腹痛、胃部停滯膨滿）。

六、黃土湯：

甘草 4.0 乾地黃 4.0 朮 4.0
附子 4.0 阿膠 4.0 黃芩 4.0 竈中
黃土 10.0 水 600.0 煎成 200.0，
一日三次溫服。

適應 下血，吐血，衄血，痔
出血（腹部軟弱，麻痺的症狀，
利尿不良，下痢貧血）。

七、黃連湯：

黃連 4.5 甘草 4.5 乾薑 4.5
桂枝 4.5 大棗 4.5 人參 8.0 半夏
9.0 水 600.0 煎成 200.0，一日
三次分服。

適應 腸胃疾患，腹痛（腹中

煩熱，胃部停滯，腹痛，嘔吐，
逆上）。

八、黃連解毒丸：

黃連 1.0 黃芩 1.0 山梔子
1.0 大黃 2.0。

以上丸劑，一日三次分服。

適應 咯血、衄血、嗽血；咳
膿血（胃部膨滿，停滯感，精神
不安，熱症）。

九、甘草湯：

甘草 8.0 水 200.0 煎成 100
.0，溫時頓服。

適應 赤白痢，吐瀉，腹痛，
齒痛，藥毒，緩和劑（咽喉疼痛
有劇症狀）。

一〇、甘草小麥大棗湯

甘草 4.5 小麥 24.0 大棗 4.0
水 600.0 煎成 300.0，一日三次
溫服。

適應 神經系疾患，神經病，
不眠症，小兒夜泣（神經症，喜
怒妄想，悲傷啼泣等）。

一一、甘草乾薑湯：

甘草 20.0 乾薑 10.0 水 600

•0煎成200•0，一日三次溫服。

適應 遺尿，肺結核（無痰唾，咳嗽，遺尿，尿利頻數，手足寒冷，口舌煩燥，嘔吐）。

一二、葛根湯；

葛根7•0麻黃5•5生薑5•5大棗5•5桂枝3•5芍藥3•5甘草3•5水600•0煎成200•0，一日三次溫服。

適應 感冒，喘息，肋膜炎，肺結核，熱性傳染病的初期，麻疹，猩紅疹（頭痛，發熱，肩首節凝，下痢，呼吸困難，身體疼痛）。

一三、葛根加蒼朮附湯：

葛根7•0麻黃5•5生薑5•5大棗5•5桂枝3•5芍藥3•5甘草3•5茯苓6•0朮6•0附子0•5—3•0水600•0煎成200•0，一日三次溫服。

適應 慢性氣管支炎，喘息，肥厚性鼻炎，鼻茸，上頸竇蓄膿症，半身不隨，顏面神經麻痺，脊髓勞，神經痛，風濕病（葛根湯症，心悸亢進，尿利減少，或

過多，知覺麻痺）。

一四、葛根加半夏湯：

葛根6•0麻黃4•5生薑5•5大棗4•5桂枝3•0芍藥3•0甘草3•0半夏3•0水600•0煎成200•0，一日三次溫服。

適應 葛根湯，症外，治嘔吐。

一五、葛根黃連黃芩湯：

葛根10•0甘草4•0黃連6•0黃芩6•0水600•0煎成200•0，一日三次溫服。

適應 急性胃腸加答兒，吐瀉，小兒發熱下痢，疫痢，痙攣（肩——脊凝症，發熱，胸中煩悶，心悸亢進，下痢，呼吸困難，發汗）。

一六、乾薑黃連黃芩人參湯：

乾薑7•5黃連7•5黃芩7•5人參7•0水600•0煎成200•0，一日三次溫服。

適應 胃弛緩症，慢性胃腸加答兒，熱性肺結核（胃部停滯膨滿，嘔吐下痢）。

一七、乾薑人參半夏丸

乾薑 1.0 人參 1.6 半夏 2.0

細末生薑汁及米糊作丸，一日三次分服。

適應 惡阻，產後的嘔吐（姪娘嘔吐，胃部停滯滲滿）。

一八、橘皮湯：

橘皮 10.0 生薑 20.0 水 600.0

煎成 200.0，一日三次分服。

適應 吃逆，心臟病（嘔氣，吃逆，手足厥冷）。

一九、橘皮竹茹湯：

橘皮 16.0 竹茹 4.0 大棗 4.0 生薑 4.0 甘草 2.5 人參 0.5 水 600.0
煎成 200.0，一日三次分服。**適應** 慢性胃疾患，氣管支炎，百日咳，吐乳（胸部及上腹部冷感，麻痺感，吃逆）。

二〇、桔梗湯：

桔梗 18.0 甘草 12.0 水 600.0
煎成 200.0，一日三次分服。**適應** 腐敗性及化膿性氣管支炎，急性肺炎，肺壞疽，扁桃腺炎（咽喉痛，咳嗽，瀉痰咯出膿或膿血等咯出）。

二一、桔梗白散：

桔梗 3.0 貝母 3.0 白豆 1.0
，細末，頓服。**適應** 急性肺炎，咽喉腫痛（瀉痰吐出，膿或膿血咯出，咽喉的粘痰咯出——困難者）。

二二、枳實湯：

枳實 21.0 水 6.0 水 400.0 煎成 200.0，一日三次分服。

適應 肝臟硬變症（肝臟或脾臟肥大，心下堅而滲滿，利尿減少）。

二三、枳實芍藥散：

枳實 2.0 芍藥 2.0，細末，一日三次分服。

適應 產婦的腹痛，流產後的腹痛（腹滿，腹痛，煩悶，滲滿）。

二四、芍藥膠艾湯：

川芎 3.0 阿膠 3.0 甘草 3.0 艾葉 4.5 當歸 4.5 芍藥 6.0 乾地黄 9.0 水 200.0 酒 300.0，煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 下血，赤白帶下，痔疾（子宮出血產後惡露盡——後子

宮出血者，妊娠中子宮出血，腹痛者）。

二五、桂枝湯：

桂枝 7.5 芍藥 7.5 生姜 7.5
大棗 7.5 甘草 5.0 水 600.0 煎成
200.0，一日三次溫服。

適應 感冒，鼻感冒，熱性病的初期（頭痛，發熱，發汗，惡風）。

二六、桂枝加芍藥湯：

桂枝 6.0 大棗 6.0 生薑 7.0 芍藥
12.0 甘草 4.0 水 600.0，煎成 200.0，一日三次分服。

適應 有熱性下痢，有熱性消化不良，有熱性腹痛（桂枝湯証外，腹前溼滿，時時腹痛）。

二七、桂枝加芍藥大黃湯：

桂枝 6.0 大棗 6.0 生薑 6.0
芍藥 12.0 甘草 4.0 大黃 2.0 水 600.0，煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 消化不良，消化不良性下痢，輕症赤痢（桂枝加芍藥湯証外，腸內停滯，腹痛甚者）。

二八、桂枝加苓朮湯：

桂枝 6.0 芍藥 6.0 大棗 6.0 生薑 6.0 甘草 4.0 茯苓 6.0 朮 6.0
附子 2.0 水 600.0，煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 頭痛，眩暈，腦出血後半身不隨，顏面神經麻痺，眼疾，耳疾，心臟機能不全，肺氣腫，喘息，痲痺性的疾患，神經痛，風濕症，蠱毒性骨痛，蠱毒性潰瘍，骨及關節結核（桂枝湯証外，惡寒四肢疼痛，利尿減少，動悸者）。

二九、桂枝加苓朮附子湯：

桂枝 6.0 芍藥 6.0 大棗 6.0 生薑 6.0 甘草 4.0 茯苓 6.0 朮 6.0
附子 2.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 頭痛，眩暈，腦出血後半身不隨，顏面神經麻痺，眼疾，耳疾，心臟機能不全，肺氣腫，喘息，痲痺性疾患，神經痛，風濕病，蠱毒性骨痛，蠱毒性潰瘍，骨及關節結核（桂枝湯証外，惡寒四肢疼痛，利尿減少，動

燥者)。

三〇、五苓散：

澤瀉2.5 猪苓1.5 茯苓1.5
朮1.5 桂枝1.0，以上散劑三包，
一日三次分服，或各三倍，水
500.0煎成200.0一日三次分服。

適應 吐瀉病，急性胃腸加答兒，腎臟炎，糖尿病，尿角症，眼病(口渴，發熱，發汗，利尿減少，嘔吐)。

三一、吳茱萸湯：

吳茱萸10.0 人參6.0 大棗6
.0 生薑8.0 水600.0，煎成200.0
，一日三次溫服。

適應 急性胃腸加答兒，胃腸病，脚氣(嘔氣胸部及心下部膨滿)。

三二、柴胡桂枝湯：

桂枝2.5 黃芩2.5 人參2.5
芍藥2.5 生薑2.5 大棗2.5 甘草
1.8 半夏5.4 柴胡7.2 水600.0
煎成200.0，一日三次溫服。

適應 寒胃，氣管支炎，肺結核，頭腺結核，肋膜炎，熱性病，中耳炎(發熱惡寒，頭痛，身

體疼痛，嘔氣，盜汗)。

三三、柴胡桂枝乾薑湯：

柴胡8.0 桂枝3.0 乾薑3.0
黃芩3.0 牡蠣3.0 括萎根4.0 甘
草2.0 水600.0，煎成200.0，一
日三次溫服。

適應 神經衰弱Hysterin不眠症，氣管支炎，肺結核，喘息，肺氣腫，心臟瓣膜病，齒痛(小柴胡湯証外，逆上，口渴，心臟及腹部大動脈——搏動著明)。

三四、酸棗仁湯：

酸棗仁24.0 甘草1.0 知母2.
0 茯苓2.0 川芎2.0 水600.0，
煎成200.0，一日三次分服。

適應 不眠症，多眠症，神經衰弱(煩燥，睡眠不良，或嗜眠)。

三五、一物黃芩湯：

黃芩1.0 苦參7.0 乾地黃14
.0 水600.0 煎成200.0，一日三
次分服。

適應 肺結核，產褥熱(煩熱，胸內苦悶，咳嗽)。

三六、真武湯：

茯苓 9.0 芍藥 9.0 生薑 9.0 朮 6.0 附子 3.0 水 600.0，煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 腹痛，下痢，咳嗽，浮腫（尿利減少，腹痛，嘔氣，下痢）。

三七、四逆散：

甘草 7.0 枳實 7.0 柴胡 7.0 芍藥 7.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 慢性腹膜炎：

三八、四逆湯：

甘草 4.0 乾薑 3.0 附子 2.0 水 300.0 煎成 100.0，頓服。

適應 急性胃腸加答兒（手足厥冷，全身疼痛，惡寒，腹痛，下痢）。

三九、瀉心湯：

大黃 4.0 黃芩 2.0 黃連 2.0 水 200.0 煎成 100.0，頓服。

適應 胃潰瘍，半身不隨，肺結核，衄血，痔出血（精神不安，胃部膨滿，有停滯感，吐血，下血，衄血）。

四〇、參連湯：

人參 2.0——4.0 黃連 3.0——4.0 水 200.0 煎成 100.0，頓服。

適應 瀉心湯証外，如恐有脫力，虛証者用之。

四一、生薑瀉心湯：

半夏 9.0 甘草 4.5 人參 4.5 黃芩 4.5 大棗 4.5 黃連 8.5 乾薑 1.5 生薑 6.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服。

適應 胃弛緩症，胃擴張症，胃酸過多症，急性胃腸加答兒（下痢，吐氣，胃部停滯膨滿，腹中雷鳴）。

四二、鷓鴣菜湯：

大黃 2.0——6.0 甘草 3.0 鷓鴣菜 8.0 水 300.0 煎成 100.0，頓服。

適應 蛔虫，陳久腹痛（腹痛，蛔虫，有胃腸宿毒）。

四三、芍藥甘草附子湯：

芍藥 12.0 甘草 12.0 附子 4.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 腰神經痛，坐骨神經痛

，關節強直症（手足屈伸困難，諸關節疼痛，惡寒）。

四四、炙甘草湯：

甘草3.0 生薑2.0 桂枝 2.0
大棗2.0 人參1.5 阿膠1.5 生地
黃10.0 麥門冬7.0 大麻仁4.5 水
600.0 煎成200.0 後加阿膠使溶
解，一日三次分服。

適應 不眠症，心臟病，肺結
核（心悸亢進，脈結代，咳嗽，
盜汗，血痰）。

四五、小青龍湯：

麻黃3.0 芍藥3.0 乾薑 3.0
甘草3.0 桂枝 3.0 細心3.0 五味
子5.0 半夏6.0 水600.0 煎成20
0.0，一日三次溫服。

適應 感冒，氣管支炎，嗽息
，百日咳，咳嗽；肺炎（頭痛發
熱，惡風嘔氣；咳嗽）。

四六、小陷胸湯：

黃連1.0 半夏18.0 括萎實8.
0.0 水600.0 煎成 200.0，一日三
次分服。

適應 腹痛，腺病質（心下部
少有滲滿與堅感，壓痛）。

四七、小柴胡湯：

柴胡8.0 黃芩3.0 人參 3.0
甘草3.0 大棗3.0 生薑3.0 半夏
6.0 水600.0 煎成200.0 一日三
次分服。

適應 感冒，胃腸加答兒，熱
性病咽喉頭炎，氣管支炎，肋膜
炎，肺結核，黃疸，癰癤（無表
熱時時發熱，無食欲，胸痞嘔吐
咳嗽）。

四八、小承氣湯：

大黃4.0 厚朴3.0 枳實 3.0
水300.0 煎成100.0頓服。

適應 便秘（腹滿，大便堅硬
）。

四九、小半夏湯：

半夏8.0 生薑5.0 水 300.0
煎成 100.0，數回冷服

適應 吃逆，嘔吐，黃疸病（
諸病嘔吐症不渴者）。

五〇、小半夏加茯苓 湯：

半夏6.0 生薑4.0 茯苓 3.0
水 300.0 煎成 100.0，數回冷
服。

適應 妊婦嘔吐(嘔吐有微一渴眩暈動悸者)。

五一、走馬湯：

巴豆2個杏仁3兩。包於木棉細剉，加熱湯 100.0，振湯頓服。

適應 猩紅熱，卒中風，脚氣衝心，急性腦膜炎，中毒症(腹部之膨滿，大小便閉澀)。

五二、澤瀉湯：

澤瀉30.0 白朮8.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服。

適應 水腫，脚氣(尿利減少或頻數)。

五三、大青龍湯：

麻黃9.0 桂枝9.0 甘草 3.0 杏仁3.0 生薑4.5 大棗4.5 石膏 12.0 水600.0 煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 流感，喘息，肺氣腫，膿漏性結膜炎(發熱頭痛，咳嗽，身體疼痛)。

五四、大柴胡湯：

柴胡8.0 黃芩3.0 大棗 3.0 芍藥3.0 生薑5.0 枳實4.0 半夏 6.0 大黃2.0 水600.0 煎成 200

.0，一日三次分服。

適應 急性胃腸加答兒、大腸加答兒赤痢(無熱或有熱，有嘔氣，大便秘結或下痢)。

五五、大承氣湯：

大黃2.0 厚朴4.0 枳實 2.0 芒硝3.0 水300.0 煎成 100.0，頓服。

適應 便秘(下痢便臭，或糞塊乾燥而堅)。

五六、大黃牡丹皮湯：

大黃10.0——20.0牡丹皮6.0 桃仁5.0 冬瓜子8.0 芒硝10.0 ——20.0 水 600.0 煎成 200.0，一日三次分服。

適應 常習便秘，神經衰弱，動脈硬化症，婦人病，尊麻疹，癰，痔瘡，痔疾。

五七、大陷胸湯：

大黃6.0 水300.0 煎成 100.0；芒硝3.7 甘遂末1.1 ——1.1 攪拌頓服。

適應 心臟病神經痛，腳氣衝心，急性肺水腫(實肺「炎症」不濕熱，胸部邊堅滿者)。

五八、大健中湯

山椒3.0 人參3.5 乾薑 7.0
水600.0煎成200.0

膠飴20.0——80.0加再煎20.0，一日三次分服。

適應 胃弛緩，胃下垂症，腸狹窄，麻痺性下痢，麻痺性便秘，腹膜炎（腹壁，胃腸弛緩，胃，子宮下垂，嘔，飲食不能）。

五九、竹葉石膏湯：

竹葉2.0 石膏12.0 半夏 4.0
人參2.0 甘草1.5 粳米7.0 麥門冬8.5 水600.0煎成200.0，一日三次溫服。

適應 寒胃，日射病，肺結核（慢性熱性病，身體枯燥）。

六〇、猪苓湯：

猪苓6.0 茯苓6.0 阿膠 6.0
滑石6.0 澤瀉6.0 水400.0 煎成200.0，一日三次分服。

適應 膀胱及尿道疾患，淋疾，發熱，口渴，或利尿減少，膿血尿漏。

六一、調胃承氣湯：

大黃6.0 甘草3.0 芒硝 3.0

水300.0煎成100.0頓服。

適應 常習便秘，便秘，腹部有壓痛。

六一、通脈四逆湯：

甘草4.0 乾薑4.0 附子 2.0
水300.0 煎成200.0，頓服。

適應 四逆湯証外，有下痢，手足寒冷；腹痛，嘔吐等效。

六三、通脈四逆加熊膽湯：

甘草4.0 生薑4.0 附子 2.0
水300.0 煎成 100.0，熊膽0.7
溶解頓服。

適應 通脈四逆湯証外，有嘔氣，口渴，煩悶，心神不安之效。

六四、當歸芍藥散：

當歸10.0 川芎1.0 茯苓 1.3
朮1.3 芍藥4.5 澤瀉 2.3

以上細末，一日三次溫服。

適應 腦貧血，弱視，衰弱，慢性胃腸病，胃腸痙攣，子宮痙攣，腎臟炎，不孕症，流產癖，婦人病，痔疾，脫肛。

六五、當歸四逆湯：

當歸4.5 桂枝4.5 芍藥 4.5
細辛4.5 大棗4.5 甘草3.0 木通
3.0 水600.0 煎成 200.0—日三
次溫服。

適應 腎臟炎，頭痛，胃凝，
胸痛，咳嗽，腰部彎急，手足冷
感。

六六、當歸四逆加吳茱
萸生薑湯：

當歸3.0 桂枝3.0 芍藥 3.0
細辛3.0 大棗3.0 甘草2.0 木通
2.0 吳茱萸10.0 生薑8.0 水250.
0 酒250.0，煎成200.0，一日三
次溫服（可經水煎劑）。

適應 自我中毒症，脚氣（嘔
吐下痢，惡寒甚，手足厥冷，腹
痛者）。

六七、桃仁承氣湯：

桃仁6.0 桂枝5.0 甘草 5.0
大黃2.0——1.0 芒硝1.0——5.0
水600.0煎成200.0，一日三次溫
服。

適應 常習便秘，動脈硬化症
，半身不隨，喘息，麻疹，痔
疾。

六八、人參湯：

人參7.5 甘草7.5 朮7.5 乾
薑7.5 水600.0 煎成200.0，一
日三次分服。

適應 慢性消化不良，慢性胃
腸加答兒，小兒下痢症，虛弱症
，脾病質，慢性病恢復期。

六九、伯洲散：

反鼻霜1.0 鼯鼠霜1.0 鹿角
霜 1.0，散劑，一日三次分服。

適應 腫毒，頑瘡，頑癬，慢
性化膿性疾患，瘰癧，痔漏。

七〇、排膿散：

枳實6.0 桔梗2.0 芍藥6.0
細末，卵黃一個，混頓服。

適應 結核性膿瘍，化膿性疾
患，瘡癤，皮膚病（化膿性疾患
，瘡癤，皮膚病，大便出膿血，
粘痰嘔吐，咳嗽）。

七一、排膿湯：

甘草8.0 桔梗12.0 生薑 4.0
大棗10.0 水600.0 煎成 200.0，
一日三次溫服。

適應 肥癭，瘡癤，皮膚病（
化膿性疾患，粘痰難吐出）。

七二、八味丸：

地黃3.0 吳茱萸1.5 薯蕷1.5
澤瀉1.0 茯苓1.0 牡丹皮 1.0
桂枝0.8 附子0.8。細末，蜂蜜
丸，一日三次分服。

適應 產後衰弱症，腎臟炎，
糖尿病，女子生殖器病，陰萎，
遺尿。

七三、白頭翁湯：

白頭翁7.5 黃連3.5 黃蘗7.5
黃芩7.5 水600.0 煎成 200.0
，一日三次分服。

適應 熱性下痢，赤痢，急性
大腸加答兒（發熱，下痢，口渴
，腹痛，裏急後重，肛門灼熱等
）。

七四、白頭翁加甘草阿膠湯

白頭翁6.0 黃蘗6.0 黃連6.0
黃芩6.0 甘草4.0 阿膠4.0 水
600.0，煎成200.0，一日三次分
服。

適應 便血，子宮出血，白帶
下，產後下痢，赤痢，痔疾（白
頭翁湯證外有出血，頑燥效）。

七五、半夏湯：

半夏3.0 枳椇3.0 甘草 3.0
水600.0 煎成 200.0，一日三次
分服。

適應 腳氣（衝胸之急劇症狀
）。

七六、半夏瀉心湯：

半夏9.0 黃芩4.5 乾薑 4.5
人參4.5 甘草4.5 大棗4.5 黃連
1.5 水600.0 煎成 200.0，一日
三次分服。

適應 急性慢性胃腸加答兒，
消化不良，赤痢（胃部滯滯，澎
滿，腹中雷鳴，嘔吐下痢）。

七七、半夏厚朴湯：

半夏1.0 厚朴3.0 茯苓 4.0
生薑4.0 乾蘇葉2.0 水600.0 煎
成 200.0，一日三次分服。

適應 咳嗽發作，百日咳，水
腫，神經症，神經性食道狹窄症
，癲癇，妊婦嘔吐（動悸，尿量
減少，浮腫）。

七八、麥門冬湯：

麥門冬17.0 半夏8.5 人參1.5
甘草1.5 粳米4.3 大棗 2.0 水
600.0 煎成 200.0，一三日分浴

服。

適應 肺結核，喘息，百日咳（咳嗽，咽喉不利，顏面充血，惡心，嘔吐，咳痰甚者）。

七九、備急圓：

大黃末1.0 乾薑末1.0 巴豆末1.0。

散或丸，溫湯或酒頓服。

適應 急性胃腸病，急痛，霍亂。

八〇、白酒湯：

知母6.0 石膏16.0 甘草 2.0
粳米12.0 水600.0 煎成 200.0，
一日三次冷服。

適應 麻疹，頭痛，眼目痛，齒痛，咽喉痛，日射病（口舌乾燥，煩燥，身熱）。

八一、白酒加桂枝湯：

知母5.0 石膏13.0 甘草 1.0
粳米10.0 桂枝2.5 水300.0 煎成
100.0，一日二次冷服。

適應 熱性病，麻疹，日射病。

八二、白虎加人參湯：

知母5.0 石膏13.0 甘草 1.6

粳米10.0 人參2.5 水400.0 煎成
200.0，一日三次冷服。

適應 急性胃腸加答兒（白虎湯証外，有胃部停滯，膨滿）。

八三、附子瀉心湯：

大黃4.0 黃連2.0 黃芩2.0

細剉，沸水60，中投直絞別，附子20.0 水60.0 煎成30.0，混和頓服。

適應 腦出血，卒倒（瀉心湯證外有惡寒，汗出故）。

八四、附子粳米湯：

附子2.0 半夏12.0 甘草 2.0
大棗5.0 粳米20.0 水600.0 煎成
200.0，一日三次溫服。

適應 胃腸（腹部膨滿、雷鳴，嘔吐，疼痛者）。

八五、茯苓甘草湯：

茯苓12.0 桂枝8.0 生薑12.0
甘草4.0 水600.0。

適應 惡阻（心下動悸，尿量減少，嘔氣）。

八六、茯神湯：

茯苓4.0 茯神4.5 人參 4.0
薑蒲3.0 小豆40粒，水600.0 煎

成200.0，一日三次分服。

適應 神經衰弱（神經不安，易驚）。

八七、麻黃湯：

麻黃9.0 桂枝6.0 杏仁 9.0
甘草3.0 水600.0 煎成 200.0，
一日三次溫服。

適應 感冒，氣管支炎，肺炎，喘息，熱性病，麻疹，疥癬內攻。（頭痛，發熱，惡寒，身體痛無汗）。

八八、麻黃杏仁甘草石膏湯：

麻黃8.0 杏仁4.0 甘草 4.0
石膏16.0 水600.0 煎成 200.0，
一日三次溫服。

適應 感冒，氣管支炎，喘息，肺炎。

（呼吸促息，發汗或無汗，渴者）。

八九、麻黃連翹赤小豆湯：

麻黃2.0 連翹 2.0 生薑2.0
杏仁 2.0 赤小豆20.0 大棗3.0 甘草1.0 桑白皮5.0 水600.0 煎成

200.0，一日三次溫服。

適應 皮膚病，內攻性腎炎（全身有瘙癢，發熱喘息，咳嗽）。

九〇、麻黃杏仁薏苡甘草湯：

麻黃3.0 甘草4.0 杏仁 4.0
薏苡16.0 水600.0 煎成200.0，
一日三次溫服。

適應 妊婦浮腫，感冒，急性多發性關節炎，斑痧（關節痛，發熱，浮腫疼痛）。

九一、木防已湯：

木防已6.0 石膏16.0 桂枝4.0
人參8.0 水600.0 煎成 200.0，
一日三次分服。

適應 水腫病，心臟病，腳氣，腎臟炎（水腫，腎部膨滿，微有呼吸困難，咳嗽）。

九二、木防已加茯苓湯：

木防已6.0 石膏16.0 桂枝4.0
人參8.0 茯苓8.0 水600.0 煎成 200.0，一日三次分服。

適應 腳氣，水腫，心臟病；

息，尿尿(胃部膨滿，口舌乾燥，尿量減少，浮腫)。

九三、木防己去石膏加茯苓湯：

木防己6.0 桂枝 3.0 人參8.0 茯苓8.0 水600.0 煎成 200.0，一日三次溫服。

適應 心臟病，脚氣，水腫，喘息，尿閉症(木防己加茯苓湯証外，才渴，而動悸強者)。

九四、薏苡仁湯：

薏苡仁5.0 芍藥4.0 當歸4.0 麻黃 3.0 桂枝 3.0 蒼朮4.0 甘草2.0 水600.0 煎成200.0，一日三次分服。

適應 關節病，中風濕痺。

九五、薏苡附子散：

薏苡仁5.0 附子5.0 水600.0 煎成200.0，一日三次分服。

九六、苓薑朮甘湯：

甘草5.0 朮5.0 乾薑10.0 茯苓10.0 水600.0 煎成200.0，一日三次分服。

適應 萎縮腎，遺精，多尿症

(尿量多，腰冷，動悸身體疲勞)。

九七、苓桂朮甘湯：

茯苓12.0 桂枝7.0 朮6.0 甘草6.0 水600.0 煎成 200.0，日一三次分服。

適應 眩暈症，震顛症，神經性心臟亢進，心臟 膜病，內耳疾患，下肢運動麻痺(動悸，眩暈，尿量減少，身體疼痛)。

九八、苓桂朮棗湯：

茯苓12.0 桂枝7.0 甘草4.0 大棗0.5 水600.0 煎成 200.0，成一日三次溫服。

適應 發作性失神症，癲病之發作(臍下動悸，頭痛)

九九、龍膽瀉肝湯：

柴胡5.0 澤瀉5.0 車前子3.0 木通3.0 生地黃5.0 當歸 5.0 膽龍3.0 水600.0 煎成200.0，一日三次分服。

適應 肋間神經痛(有濕熱，脅腹疼痛者)。

