



廣益本草大成



草之部

自中一卷
至中五卷

二 1
3267
2



門 二 1
號 3267
卷 2

本草大成卷之一

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子



○本草辨



撰

昭和十九年
三月二日改
小田吉代
長男友太郎
氏寄贈

古昔神農氏草木金石ノ氣味性功ヲ察メ醫藥ノ道ヲ始ム此ヲ本
草ト云世ニ本草ヲ以テ書ノ号トシ覺者ハ誤ナリ總テ藥石ノ道ヲ
本草ト呼ソレヲ記セル書タルガ故ニ題ノ本草ト号ス素問六節藏象
論曰蒼生五色五色之變不可勝視蒼生五味五味之變不可勝極
ト帝問ニ万物ノ中孰少孰多トヲ以テ岐伯ノ所答如此草ヲ以テ入ル
者ハ万物ノ中草木尤多カ故ナリ是以用藥ノ品類數種アリテ草木
取ニ非ト然草木ノ尤多ヲ以テ一切藥品ノ道ノ總号ヲ本草ト云蓋
草木ノ氣味性能ニ本テ醫療スルガ故ナリ夫神農氏所傳者ハ三百
六十五種ニシテ一歳ノ日數ニ應ス其上藥一百二十爲君三養命申藥

本草

卷之一

一百二十七爲臣三養性下藥一百二十五種爲佐使主治病此神農
ノ代ヨリロツカラ傳者ナリ然凡口傳遂ニ失ヒ易キヲ以テ後人
レヲ方策ニ述テ書傳トシ名テ神農本草經ト云凡テ三卷ニテ
象平漢書第二卷平帝記曰元始五年奉天下通知方術本草者存
所爲篤一封輒傳遺詔京師ト漢書列傳第六十二樓護傳曰護少
誦醫經本草方術數十萬言ト此本草書ノ目始テ所出也然凡此
書傳トスル者ハ何人ノ致ト未詳或華佗カ所致或仲景ノ所述ト云
ノ説アリト雖皆不立也又華佗カ弟子廣陵ノ呂晉李當之等魏晉
以來ニ所用ノ藥品三百六十五種ヲ集テ各醫別録ト号ス又梁ノ
陶弘景ト云者神農本草經ニ彼々各醫別録ヲ附合メ藥日七百三十
種弘景集註ト七卷トシ集註本草ト号ス又唐ノ高宗顯慶中蘇恭
等二十三人ニ命メ弘景カ集註本草ニ藥品一百二十種ヲ增益

ノ八百五十七種目錄合ハシト一卷唐本草凡新修本草凡号ス又此
間ニ於テ藥圖二十卷圖經七卷新修圖二十六卷諸家本草本草
音義等ノ作アリ又唐ノ七王明皇玄宗ノ天寶中單方藥圖ア
リ又五代ノ末偽蜀ノ孟昶韓保昇ニ命メ顯慶中ノ唐本草ト永
徽中ノ圖經七卷トヲ合メ蜀本草十卷トス又宋ノ太祖開寶六
年ニ尚藥奉御ノ馬士等九人ニ命メ諸家ノ本草ヲ校陳藏器カ本草
拾遺李含光カ本草音義等ヲ參合メ開寶詳定本草アリ同七年
ニ開寶重定本草二十卷アリ又宋ノ仁宗嘉祐二年ニ嘉祐補註
本草二十卷圖經二十卷目錄合四十二卷藥品一千八百二十二種ニ
至ル其後次第ニ改正増益メ李時珍カ本草綱目ニ至テ本草ノ
書アルコト四十七家李氏カ綱目五十三卷藥品一千八百九十二
種ニメ此道大ニ備レリトス凡病者ノ所頼ハ醫ナリ醫ノ所頼者ハ

藥也。藥性ノ神義ニ未達ハ、タトヒ神聖工巧ノ四知ニ達スルコト有ト云凡、何ヲ以カ馮邪補正ノ功ヲ致サンヤ。抑藥性ノ深ニ達セント欲ハ、味ノ厚薄、氣ノ陰陽、性ノ寒温、形ノ輕重、質ノ精麁、色ノ五行、其生スルノ時、令等ヲ詳ニ察スルニ非ンバ、本草ノ奧全日ニ至ルコト不能者ナリ。假令蟬蛻ハ皮膚、風熱濕熱ヲ療シ、蠟鮓ハ胞衣ヲ下シ、胎ヲ墮スルカ如キ、其蟬ノ皮殼タルヲ以テ皮膚ニ行、其皮殼ノ久ク風雨寒熱ニ壞サルヲ以テ風熱濕熱瘡癬ヲ治ス。其蟬躰ハ已ガ皮殼ヲ脱出コトノ易ヲ以テ下胞衣墮胎ノ能アリ。其水ハ參ノ元氣ヲ補ヒ、白朮ノ中氣ヲ補ヒ至ニモ、此功アル所以ノ者ハ、其本何ニ從テ然ト云ノ義ニ達セスンハ、日ニ本草數萬言ヲ誦ス凡、藥性ノ奧全日ヲ得者ニ非ス。醫ハ意也。又理也。意ヲ以テ理ニ向ニ非スハ、醫云乎哉。

○藥性辨

藥ニ寒熱温涼微寒微温及平アリテ、四時ノ氣令ニ應ス。寒ハ盛冬十月ノ氣令ノ如シ。大寒ノ者ハ十一月ノ令ノ如シ。熱ハ夏暑五月ノ氣令ノ如シ。太熱ノ者ハ六月甚熱ノ令ノ如シ。温ハ二月ノ氣令ノ如シ。涼ハ九月ノ氣令ノ如シ。微寒微温ハ寒温ノ間ノ者ナリ。平云ニ似タリ。微寒ハ寒ノ甚薄者。平ニ似テ平ヨリハ微寒者ヲ云。彼八月ノ氣令ノ如シ。微温ハ温ノ甚薄者。此亦平ニ似テ平ヨリハ微温者ヲ云。彼二月ノ氣令ノ如シ。平ハ寒熱温涼ノ偏ナク中和者ヲ云。是以其氣ノ寒熱ニ属スル者ハ、其偏性ナルヲ以テ、寒藥ハ温熱ノ劑中ニ合入スレバ、其寒ヲ不減。十一月ノ時ヤ。圍爐重綿コトアリト雖、遂ニ寒令ヲ防コトヲ致シ難ニ同。熱藥モ亦然リ。寒涼ノ劑中ニ合入スレバ、其熱ヲ不減。五月ノ時ヤ。扇テ風ヲ致シ、凉水ニ洗浴スルコトアリト雖、遂ニ熱令ヲ防コトヲ致シ難ニ同。微温微寒ノ者ハ、寒藥ニ引レテ其氣

ヲ移シ易キ者ナリ。温熱ノ藥中ニ合入ノハ。温性ノ如ニナリ。寒涼ノ藥中ニ合
入ノハ。寒性ノ如ニナル。二月九月ノ時。圍爐重綿則温ナルコトヲ覺風ヲ致
シ水ニ洗ハ涼ナルコトヲ覺カ如シ平者モ亦同。凡温者ハ其氣順ニ緩シ
熱者ハ其氣悍ニ速ニ且發テ上ル。寒者ハ其氣嚴ソ下ル。涼者ハ其氣紳
引ノ順ス。又五味各其氣ヲ異ニス。辛ハ開テ散シ。苦ハ疎テサ推或堅入酸
ハ收聚テ且推。其ハ或緩或持鹹ハ寒ニシ。淡ハ泄ノ通スル者ナリ。夫諸藥石
ノ病ヲ治スル所以ノ義ハ其性ノ寒熱温涼。其氣ノ順緩悍速發上嚴下
伸引ト。其味ノ辛甘苦酸鹹淡トヲ合メ各其功ヲ出者ナリ。此ニ其形色
及香氣生時採時。修製トヲ相兼テ無量ノ治功ヲ發者ナリ。深以上ノ
義ヲ盡シ諸藥治功ノ源本ヲ推窮則太古神農氏ノ意。今日ニ著シ醫療ノ
幸甚カラシ。蓋藥性ハ治功ノ深義ヲ極者ハ宛カチ本草家ノ言ニ不拘
限ニ此ヲ治スルト云ト雖考テ不用之コトアリ。此ヲ治スルト云サレバ察
ノ用之コトアリ。若藥性治功ノ詳義ヲ不得者ハ偏ニ本草家ニ所記
ノ言ニシテ從テ察ニ用施ガ故ニ藥石ノ至能ヲ發セシムルコト不能ノ
反テ動スレバ其病邪ヲ助テ膏日ヲ重ス。假令人参ノ如キ。李珣云止
煩躁。元素云止渴生津液。然凡諸煩渴及生津ニ此ヲ通用スヘ
ケンマ。此皆元氣不足ヨリ致所ノ者ヲ治スル。若其本ヲ不知ノ只一
偏ニ此言ニ從テ通用ニスルトキハ過アルコト不サ。故ニ本草家ノ道ニ達
者ハ惟其理ヲ本トシ其言ヲ不信也。本草家ニ所謂ヲ視ニ藥ノ功
能數十病ニシテ藥ヲ以テ諸病ヲ通治スルニ似タリトヘ凡其至能
本功ノ出所ノ根アリテ他ハ皆此ガ枝葉タリ。是以其主治ノ源本ヲ
察レ窮ニ用則他ノ枝葉ニハ不拘也。苟モ其書言ニ執滯シ枝葉ニ泥
ハ。醫療ニ益ナク人ヲ損コト多シ。慎ガルベケンマ

○補氣補血辨

ノ用之コトアリ。若藥性治功ノ詳義ヲ不得者ハ偏ニ本草家ニ所記
ノ言ニシテ從テ察ニ用施ガ故ニ藥石ノ至能ヲ發セシムルコト不能ノ
反テ動スレバ其病邪ヲ助テ膏日ヲ重ス。假令人参ノ如キ。李珣云止
煩躁。元素云止渴生津液。然凡諸煩渴及生津ニ此ヲ通用スヘ
ケンマ。此皆元氣不足ヨリ致所ノ者ヲ治スル。若其本ヲ不知ノ只一
偏ニ此言ニ從テ通用ニスルトキハ過アルコト不サ。故ニ本草家ノ道ニ達
者ハ惟其理ヲ本トシ其言ヲ不信也。本草家ニ所謂ヲ視ニ藥ノ功
能數十病ニシテ藥ヲ以テ諸病ヲ通治スルニ似タリトヘ凡其至能
本功ノ出所ノ根アリテ他ハ皆此ガ枝葉タリ。是以其主治ノ源本ヲ
察レ窮ニ用則他ノ枝葉ニハ不拘也。苟モ其書言ニ執滯シ枝葉ニ泥
ハ。醫療ニ益ナク人ヲ損コト多シ。慎ガルベケンマ

スコト不能假令輕焙キラ強炒黒シサ蜜水ニ製スヘキヲ蜜ヲ濃ソ
用者ハ彼カ弱兵ニ甲鎧又戟ノ重物ヲ授テ戰シムルカ如シ其兵具ノ
重ニ已ガカヲ奪レ失テ遂ニ敵ニ勝コト不能ト同シ其製ノ強カ爲ニ藥
カノ主能ヲ奪レ失テ遂ニ病ニ勝コト不能也又炒黒ニスベキヲ輕ク焙用
或蜜水甚淡シ或不製ノ使若ハ彼申鎧ヲ著セシメスモ戰ノ鈍ヲ授テ
戰シムルカ如シ兵ノ力悍ト雖其兵具ノ善ヲ失ガ故ニ此モ亦遂ニ勝ト
不能ト同シ其製ノ弱カ爲ニ藥力ノ主能ヲ發スルコト不能ノ其邪氣
ト戰シ雖藥力及テ邪氣ニ負テ病平伏セサルナリ凡戰テ勝マ大將
ノ良ニ從テナリ員ヤ兵ノ過ニ非ス大將ノ過ナリ藥ノ病ヲ愈ヤ醫ノ
良ニ從テナリ藥ノ效テキヤ藥ノ過ニ非ス皆醫ノ致ス過ナリ然ルラ庸
醫ハ已ガ理學ノ昧ヲ不知答ヲ古方ニ遺恨ヲ藥性ニ致スマコトニ愚ナ
ルナナ古ノ良醫ハ國家ヲ醫ス況人身ハ尺ノ小病ヲヤ何ゾ不愈者アラ
シ然レ人身ノ病アルコト四百四病其中真死不治者一病ニシ
此必死ノ症ハ四分ノ一ニ居セリ他ハ皆良醫ノ療メ治者也然則
病ニ病重ト云テ死地ニ定ヘカラス已ガ醫案ノ不足ヲ醫方藥ノ未
的ヲ察メ詳ニ四知ヲ盡シ藥性ヲ明シテ救メコトヲ欲スヘシ或遂難
愈者ハ速ニ他醫ニ任テ惟病者ノ命ヲノミ重メ醫ノ私ヲ以テ其
生ヲ天コトナカランコトヲ致セ此意醫家ノ尤切要ナリ夫醫ハ仁
道ノ最トス己ニ曲帶メ人ノ長生ヲ亡コト勿レト云

中
卷
八
一

○草部

人參



甘温○補五藏安神氣止驚悸多
夢保短氣生津液止渴除邪明目
通血脉主健忘養胃氣守肺心治

眩暈自汗頭痛嘔吐痰瀉瀉痢中風中暑痿軟吐血嗽血下血血崩
霍亂痰弱虛熱男婦一切內傷虛證及虛勞△補五藏△八益人參ノ
本ノ字ハ人參也浸ハ浸也浸漸ノ義此草根年久ニ漸長成人ノ
形ニ似テ其功神妙故ニ人參或神草ト号ス然凡參ノ字畫繁ニ
因テ後人遂ニ代テ人參ニ作レリ夫人參ノ生ズルコト三極ニシテ才ニ
應シ五葉アリテ五行ニ應シ其根自人形ノ如ク黃ニシテ中種ノ土色ヲ見
ス且此カ所生ノ上ニ紫雲氣アリ實ニ神妙不測ノ靈草常理ヲ以
テ尋ベキニ非ス是以能五藏ヲ補ノ功アリ本草家ニ謂人參ハ手太

陰肺經ノ藥ト肺ハ諸氣ヲ主フ以ノ故ナリト雖愚按ニ人參ハ胃氣
ヲ補養スルノ聖藥トスヘレ時珍曰色黃屬土而補脾胃ト此義至レリ
盡セリ人ニ神氣真氣清氣宗氣等ノ名類多シ雖總合則皆胃氣ノ別
名タリ東垣曰清氣榮氣衝氣春升之氣皆胃氣之別稱也ト至版
論曰人之所受氣者穀也ト彼肺氣神氣五藏氣モ皆此胃氣ヨリタ
生育ス故ニ稱ノ元氣トス實ニ人身後天元源ノ氣此ヨリ貴ハナレト此
ヲ能補養者ハ人參ニ勝者ナレトス是以外内血氣諸ノ虛證ト云ニ至
テハ皆人參胃氣補助ノ功ニ非ンバ不能致效者ナリ胃氣一度盛ナレ
ハ渾身充實ノ何ノ不足カアラシマ胃氣一度虛スレバ渾身皆不足トテ
虛病蜂起ス世ノ庸工多ハ此義ニ昧メ謂血虛陰虛火旺者人參ヲ服
セシムレバ陽火ヲ扶テ升衝ノ患アリト人參ヲ恐コト蛇蝎ノ如ニスル
者ハ呼謬レリ精血ノ生ズル其本何ニカ在惟中焦胃氣ノ一源ヨリ

發スルノ^{コト}。苟^モ其源ヲ不治^シ。其流ヲ充^シムルコト不能ナリ。然レモ古ノ
明哲ノ醫ニモ亦此^ノ誤アルコト不^レ也。好古^ノ說ニ肺受火邪者服之傷肺
ト。王^ハ論論ニ陰虛火動諸血症勿用人參。陽旺則陰愈消ト。雷^ハ數說ニ
夏月^ハ使^ハ人參發^シ心弦^ト。此皆一理ニ曲滯^ノ陰陽互根ノ義ト其宜不
宜ノ時トヲ不^レ辨者ナリ。言^ハ聞陽起等詳^ニ此^ノ誤說ヲ論^メ。後學^ヲ誘引
ス。夫或血虛或陰虛ノ火熱旺^シ。胃氣^ハ一^ト々不足セズ。火熱肺^ハ升^リ上^ル
者ノ如キ。實^ニ人參ヲ用^{コト}ヲ忌^ム。若^シ其陰血虛極^シ。胃氣不足^ニ心脈ノ
氣モ亦從^テ虛^ニ疲^レ。陰火旺^シノ熱者ノ如キハ。人參^ハ非^レハ不能治^{ナリ}。何
妄^ニ總^シ藥^ノ人參ハ血虛陰虛火旺肺熱者^ハ忌^ムト^シ。センマ肺^ハ二^ノ鬱^シ火^ノ
實熱アル者ハ實^ニ不宜^ニ東垣^ノ謂^フ火與元氣不^レ兩立^ノ理アリテ。肺氣虛
ト陰火^ハ二^ノ乘^レセラレテ。肺熱者ハ人參ヲ用^テ其元氣ヲ補^フ則陰火自退^キテ
熱清^シ是東垣^ノ謂^フ溫能除^ク大熱^ノ義例也。今ノ時師ハ火熱ハ苦寒降^シ沉^シ
陰劑^ニヲ瀉スルト^ノ覺^キ精血ハ純陰ノ劑^ニヲ補^フト^ノ覺^キ其^ハ溫^ク反^テ
火熱ヲ除^ク陽^ヲヨリ^シ陰ヲ長^シ。補氣^ヲテ精血ヲ生^シムルノ義アルコト
ヲ不知^{ナリ}。人參ハ補元氣ノ聖藥タリ。惟元氣ノ虛實ヲ察^シテ用^フ
之^ハ其精虛血虛肺熱血症夏月等^ハ不可^レ拘^ル元氣ヲ主^トノ宜^ニ用^フ之^ハ元
氣ノ虛モ亦其輕重ヲ考^テ用^フ之^ハ故^ニ補五藏^ト云^フモ亦五藏ノ元氣
ヲ補^フ者ト知^ルベシ。安神氣神氣ハ在^リ心^ニ一身ノ主宰タリ。神氣ハ先天^ニ
生^ル後天ノ元氣ニ從^テ養^フル者ナリ。故^ニ人參ヲ以^テ胃氣ヲ補
生スルトキハ神氣自安定ナルコトヲ得^{ナリ}。驚悸怔忡ノ類ナリ。神
氣元氣虛疲^ノ驚^ヘキ事モ非^ニ驚悸^ヲ云^フ。驚悸怔忡ノ症數種アリテ
治方モ亦不同。血虛アリ。痰動アリ。熱躁アリ。夫神ハ胸中心宮^ニ藏^ル
心ハ南方ノ離。離中^ニ陰アレバ人ノ心中^ニ血ヲ生^ズ此ヲ心血トス。神
ハ其血中^ニ含^メ藏^ス。譬^ハ水魚ノ如^シ。心血ハ水ナリ。神氣ハ魚ナリ。彼血

發スルノ^{コト}。苟^モ其源ヲ不治^シ。其流ヲ充^シムルコト不能ナリ。然レモ古ノ
明哲ノ醫ニモ亦此^ノ誤アルコト不^レ也。好古^ノ說ニ肺受火邪者服之傷肺
ト。王^ハ論論ニ陰虛火動諸血症勿用人參。陽旺則陰愈消ト。雷^ハ數說ニ
夏月^ハ使^ハ人參發^シ心弦^ト。此皆一理ニ曲滯^ノ陰陽互根ノ義ト其宜不
宜ノ時トヲ不^レ辨者ナリ。言^ハ聞陽起等詳^ニ此^ノ誤說ヲ論^メ。後學^ヲ誘引
ス。夫或血虛或陰虛ノ火熱旺^シ。胃氣^ハ一^ト々不足セズ。火熱肺^ハ升^リ上^ル
者ノ如キ。實^ニ人參ヲ用^{コト}ヲ忌^ム。若^シ其陰血虛極^シ。胃氣不足^ニ心脈ノ
氣モ亦從^テ虛^ニ疲^レ。陰火旺^シノ熱者ノ如キハ。人參^ハ非^レハ不能治^{ナリ}。何
妄^ニ總^シ藥^ノ人參ハ血虛陰虛火旺肺熱者^ハ忌^ムト^シ。センマ肺^ハ二^ノ鬱^シ火^ノ
實熱アル者ハ實^ニ不宜^ニ東垣^ノ謂^フ火與元氣不^レ兩立^ノ理アリテ。肺氣虛
ト陰火^ハ二^ノ乘^レセラレテ。肺熱者ハ人參ヲ用^テ其元氣ヲ補^フ則陰火自退^キテ
熱清^シ是東垣^ノ謂^フ溫能除^ク大熱^ノ義例也。今ノ時師ハ火熱ハ苦寒降^シ沉^シ
陰劑^ニヲ瀉スルト^ノ覺^キ精血ハ純陰ノ劑^ニヲ補^フト^ノ覺^キ其^ハ溫^ク反^テ
火熱ヲ除^ク陽^ヲヨリ^シ陰ヲ長^シ。補氣^ヲテ精血ヲ生^シムルノ義アルコト
ヲ不知^{ナリ}。人參ハ補元氣ノ聖藥タリ。惟元氣ノ虛實ヲ察^シテ用^フ
之^ハ其精虛血虛肺熱血症夏月等^ハ不可^レ拘^ル元氣ヲ主^トノ宜^ニ用^フ之^ハ元
氣ノ虛モ亦其輕重ヲ考^テ用^フ之^ハ故^ニ補五藏^ト云^フモ亦五藏ノ元氣
ヲ補^フ者ト知^ルベシ。安神氣神氣ハ在^リ心^ニ一身ノ主宰タリ。神氣ハ先天^ニ
生^ル後天ノ元氣ニ從^テ養^フル者ナリ。故^ニ人參ヲ以^テ胃氣ヲ補
生スルトキハ神氣自安定ナルコトヲ得^{ナリ}。驚悸怔忡ノ類ナリ。神
氣元氣虛疲^ノ驚^ヘキ事モ非^ニ驚悸^ヲ云^フ。驚悸怔忡ノ症數種アリテ
治方モ亦不同。血虛アリ。痰動アリ。熱躁アリ。夫神ハ胸中心宮^ニ藏^ル
心ハ南方ノ離。離中^ニ陰アレバ人ノ心中^ニ血ヲ生^ズ此ヲ心血トス。神
ハ其血中^ニ含^メ藏^ス。譬^ハ水魚ノ如^シ。心血ハ水ナリ。神氣ハ魚ナリ。彼血

虚ノ神動スルカ故ニ驚悸者ハ水涸テ魚ノ跳カ如シ。水滿則魚自安
故ニ如此者ハ當歸ノ類ヲ用テ心血ヲ補則愈。又痰飲心竅ニ及
テ神動スルカ故ニ驚悸者ハ水靜ナリト雖人ニ追レ。鳥ニ追レテ魚ノ
跳カ如シ。其追者ヲ除則魚自安シ。如此者ハ茯苓茯神等ヲ用テ
痰ヲ引去則愈。又心熱ノ神躁動テ驚悸者ハ水熱ノ魚ノ跳カ如シ。
辰砂ノ類ヲ用テ愈トス。人參ヲ用テ所治ノ驚悸怔忡ハ水ノ涸ニ
モ非ス。物ニ追ニモ非ス。水ノ熱スルニモ非ス。魚自疲弱テ常ノ風声
水流ニ躁テ跳カ如ク。惟神氣虚怯ノ常ノ呼吸升降等ノ氣ニ動
ノ驚悸者ヲ主治人多ハ遠志ト合用ノ宜。其遠志ハ心腎ノ神志ヲ
ノ能交通セシムルノ物タレバ。人參ニシテ神氣ヲ養。遠志ニシテ神志ヲ定
テ愈之ノ理ナリ。又右ニ所辨ノ血虚痰動熱躁ノ症モ亦其神氣ノ
虚怯ヲ兼者ハ右ノ諸藥ニ人參ヲ合用スヘシ。假令心血虚ノ怔驚

ノ辨アリ。實夢ハ其藏所屬ノ物類有餘ヲ見。虚夢ハ其藏所屬ノ
物類不足ヲ見。假令腎邪有餘スレバ。洪水大瀉等ヲ夢。腎水虚スレバ
水ヲ扶治コトヲ夢類ナリ。凡毎宵同事ヲ多夢者。各五藏ノ別アリ
テ。人參ノ主治ニ非ス。人參所治ノ多夢ト云ハ種々サレノ別モナキ
コトヲ云々多夢者ナリ。此元氣ノ不足ニ因テ所致。人參ヲ用テ宜
野樞曰。多夢。人者加之。下。經ハ八種ハチワリタルヲ云。保短氣呼
吸氣短。息難ヲ云。短氣ノ症モ。痰ノ爲ニ阻レテ致アリ。腎氣胸
中ニ塞テ致アリ。如此者ハ化痰順氣ノ藥ニ宜。人參所治ノ短氣ハ
心肺胃ノ元氣虚ノ息氣短者ニ宜。或腎氣不足ノ短氣ヲ致スアリ。
八味丸等ニ宜。生津液。津液ノ義ハ。靈樞決氣篇及五癆津液別論
ニ詳ナリ。津ハ液ノ清者。液ハ津ノ厚者。骨屬ニ注ク俱ニ

水精ウルホイノ名ナリ。人參ノ生津液ト云ニ至テ深義存セリ。此義ヲ
誤則害不ス少。凡人參ハ補氣陽劑タリ。津液ハ水類陰氣タリ。古人
謂無陽則陰無以生。陽生則陰長。陰盛ノ水ハ寒凝ノ潤流セス。陽
化ノ薄ケレバナリ。春温應ノ寒凝解。水液潤流ス。陽化ノ盛ニ從テナリ。
易ノ坎中ニ。陽アル者モ亦此義ナリ。陽氣ハ陰水ノ母タリ。子母相
連テ氣水合ノ者ナリ。故ニ人身ノ津液モ亦陽温ノ氣化ナリ。時ハ
津液ノ充身テ濡潤スルコト不能譬凝タル水ハ物ヲ潤コト不能ニ同
是。以人參ヲ生津液ト云ハ。津液ノ潤乾レタルヲ。此カ直ニ生スルニハ
非ズ。此ヲ直ニ生スル者ハ地黄當歸ノ類ナリ。夫津液ノ不足ニ於テ
ニ辨アリ。腎水涸テ泉源ノ虚ニ因テ津液ノ流不足者アリ。地黄丸
ノ類ニ宜腎源未涸。津液未乾。雖彼元陽ノ氣化虚スルニ因テ津
液凝テ流サルガ故ニ。周身ニ其津ノ流滯コト不能ニ津液ノ不足ヲ致

者アリ。此人參ヲ用キノ症アリ。人參ハ温ノ化ヲ以テ。津液ノ母タル元
陽氣ヲ補生スルトキハ。津液ノ凝者解テ。渾身ニ滿潤者ナリ。譬膏膏ヲ
火ニ懸テ温時ハ。油液滿カ如シ。然レ火強ノ熱ニ甚則妙者燥燥ス。
故ニ陽生則陰長スルノ義ニ泥テ妄ニ桂附等ノ陽剛ノ劑ヲ太過シ。或
人參ト雖。其ニ過用則反テ陽邪ヲ扶テ。陰液ヲ消ス。只春温ハ。潤シ
夏熱ハ燥ス。温與熱ノ辨アリテ用之。今ノ時節此ニ味ノ補氣ノ劑ハ
扶陽消陰ト云テ人參ヲ恐。陰虛血虛勞瘵症ニ忌之。此皆王倫カ明
醫雜著ノ誤ヲ。始者ナリ。仲景治血虛加人參。東垣用人參。精自生ト
云。丹溪治陰虛四物湯加人參。又古方治血虛養營湯有人參。皆可又
治勞瘵以獨參湯保真湯。何ゾ人參ヲ恐ニヤ。只用之。時アリ。使之二
分量アルノミ。或問。吾子カ言。元是ナリ。然レ元氏正傳或問ニ云。一
アリ。血虛者以參芪補之。真陰虛者固不可。吾子カ言。一異ナル

ハ何ゾヤ。曰天良始テ王綸ガ誤ラ發明シ東垣ノ血全日ヲ起シテ血
虚者宜用人參ト云ト雖其真陰ノ虚症ニハ不可用トハ智者ノ一
失歟夫血與精何ハ異トラン河海異ナリト雖其源ハ一ノ水氣也精
血異ナリト雖其本ハ一ノ陰液也故ニ血虚則精虚ス精虚則血虚ス
精ハ本血ハ標標本合一タリ是以精虚症ニモ四物湯ヲ用血虚症ニ
モ地黄丸ヲ不用ニハ非ナリ何知血虚ハ用人參腎虚ハ必ズ人參ノ
善ニシテ血虚ト雖元氣未衰ハ不宜用人參真陰虚症ト雖元氣ノ
虚衰アラハ人參ヲ用ベレ人參ノ宜與不其精血ヲ以不可別惟元氣
ノ虚實輕重ニ從ヘキノ三君氏カテ藥神書ニ於テ始テ勞瘵真陰虚症
者ニ人參ノ人參湯ヲ用此實ニ千古ノ惑ヲ解天亡ノ患ヲ濟庸醫ノ過
ヲ防者乎止渴渴症ニ種々アリ肺燥ニ渴セハ麥門冬ノ類胃熱ニ
渴セハ葛根ノ類腎熱ニ渴セハ知母ノ類ヲ用テ人參所止ノ渴症ハ

右ノ清液ノ養ト同ク元氣不足スルニ因テ津液滿潤ト不能シテ
渴者ニ用テ此症必冷飲ヲ惡テ温湯ヲ好者ナリ若冷飲ヲ好者
ハ實熱アリ凉劑陰藥ニ宜シ除邪邪ハ思邪ヲ指テ云思邪ノ犯
入者其神氣ノ虚ニ乘ノ致者ナリ神氣ノ守堅固ナル時ハ思神何
ニ從カ犯サシヤ故ニ人參ヲ用テ其神ヲ補則狐狸等一切邪思思
氣迫テ遂ニ退去明目靈樞大惑論曰目者心使也心者神之舍也
素問解精微論曰心者五藏之專精也目者其竅也靈樞大氣篇曰
氣脫者目不明ト眼目ハ神氣ノ會所タリ故ニ神氣虚ノ目不明者ハ
人參ヲ用テ治之今ノ時節眼目ノ病ヲ療スルニ惟火熱ト衝トシ
云テ清涼苦寒ヲ用ヒ人參ハ上衝ニ害アリトノ恐テ不用之亦謬
ト夫目疾種々アリテ人參ノ宜不宣アリ或風寒ニ中テ邪氣其目
ヲ犯者ハ敗毒散ノ類ヲ用テ精血不足ノ熱火上衝者ハ四物湯六味

地黄丸ノ類ニ宜シ。肝火實盛ニシテ者ハ龍胆瀉肝湯ノ類ヲ用ユ。胃氣
不足シ清陽下陷ノ神氣其眼目ニ達スルコトノ薄者ハ補中益氣湯
ノ類。人參ヲ以テ治之。太極目ヲ疾テ温ヲ得ハ快ク右脈虛弱ニシ
不食シ。太便下。實者ハ疾ニ涼劑ヲ用ユト勿レ。人參補陽ノ藥ヲ施シテ
其元氣ヲ温養ス。ヘシ**通血脈**決氣篇曰。壅遏管氣令無所遊是謂氣
上。脈ハ天眞委種ノ氣。血氣ヲ通スル所以ノ者。卽神氣ノ致所ナリ。人
參ハ補神ノ聖藥タリ。故ニ能通血脈ノ血氣ヲ流行セシムルナリ。是以
孫眞人カ生脈散ニ以テ人參爲君。夫生脈散ハ夏月暑熱傷元氣汗大泄
瘥厥症ト成ントスル者ヲ治ス。以テ人參爲君補元氣。下瀉火。以交門
冬爲臣潤肺金。テ腎水ノ源ヲ滋。以テ五味子爲佐。直ニ腎精ヲ生シ。其
酸味ヲ以テ耗氣ヲ收ム。此皆人參ニテ元氣ノ直氣ヲ養。金水ヲ補テ
血脈ヲ通ジ。夏月冒暑者ノ虛熱ヲ治ス。凡中暑者則汗泄氣脫ノ元氣

ノ不足ヲ致ス。故ニ夏月ハ熱令一鱗反テ人參ニ宜所ノ病者多シ。
然ニ雷欒之類ニ云テ。夏月使人參發心疾トハ謬ナリ。王健忘健
物ヲ忘テ健忘ト号ス亦數種アリ。一藥不同。或氣結ノ不順。故ニ
忘者アリ。開鬱順氣ノ劑ニ宜。或痰結ニ因者アリ。化痰ノ藥ニ宜シ。
人參ヲ所用ノ健忘ハ元氣不足ノ事ヲ主持人ルニカイナクシテ多シ。忘
者ナリ。凡覺モ忘モ皆神氣ノ所爲ナリ。天地ノ間ハ常ニ神氣ニ上
スルカ故ニ能覺テ四時ノ道途ニ不忘ノ能行ル。人モ神氣ナシ盛ナレ
バ忘ルト云コトナシ。以テ人參其神氣ヲ補則何ノ健忘ト云コトカマラン。
然レ又腎ハ藏志。志ハ萬事ノ根。カトナリテ遠達通ルル氣ナリ。此志氣
不足則其氣ノ遠及所ナキヲ以テ多忘。故ニ今ヤ好色ノ人ニ健忘。患
者ハ腎志ノ虛スルニ因ナリ。此ヲ治スルニハ遠志ヲ以テ。用後方ニ善忘
者ヲ治スルニ遠志ノ味ヲ以テ服セシム。其人ニ知スルコト勿レ。本紙健忘

症ニハ人參遠志ヲ合用スベシ。養胃氣。胃氣ハ人身後天ノ元氣。此ヨリ
貴ハナシ。養之者ハ人參ニ勝ハナシ。益氣湯。四君子。六君子湯等ノ養
胃氣者モ皆人參ヲ以テ故ナリ。人參ノ主功ハ胃氣ヲ養ニ止ル。他
ノ治功ハ皆枝葉ナリ。言聞ガ陽春生發之氣ト云モ。此胃氣ヲ補所ヲ
以テリ。胃氣ハ清純中ノ和ノ氣。生ノ主ナリ。宗氣。榮氣。衛氣。神氣。眞氣。
津液。精。脉。髓。腦。筋。骨。肌。膚。毛。髮。ニ至テ。胃氣ニ從フ。云々ナシ。况蔵
府ヲヤ。皆胃氣ニ養レテ。ナシ。官ノ職ヲ調者ナリ。人參補之ノ功勝タリ。故
一切ノ病。虛症ノ極ニ於テハ無不用之。若シ元氣虛弱症ニ。或ハ益氣四君
六君等ノ劑ヲ用テ人參ヲ施ス。其效ナキ者ハ本方ニ人參ヲ合用
スルノ外。又別ニ獨參湯ヲ煎服セシム。人參ノ功能發メテ致シ易
シ。今ノ庸醫ハ病ニ至極ノ死ニ向タルニ於テ驚テ人參ヲ加倍シ。
或大劑ノ獨參湯ヲ用カ故ニ渴ノ穿并鬪テ鑄其カ如ク。其治遲ノ益

ナシ。病因脈證ヲ詳ニシテ元氣ノ虛極ニ屬者ハ。病未進前ニ速ニ用
之。其危ヲ防ベシ。自飛霞謂人參回元氣於無何有之鄉。雖胃氣
已ニ絶セントスルニ至テハ。人參ト雖再生氣ヲ致難シ。長病虛病老
病ハ。病ヲ考ヘ時ヲ察メ未極サキニ用之。テ生氣ヲ續シムベシ。此
醫療ノ最要ナリ。且其病因脈證俱ニ胃氣ノ不足ヲ見シ人參ヲ用
ニ及テ氣并食減シ。胸膈悶ノ不快者アリ。慶土多ハ誤之。謂胃氣
根蒂實シ人參ヲ不受ト。此甚誤ナリ。何ゾ病因脈證皆胃氣ノ真
虛ヲ見シ人參ヲ不受ノ理アラシヤ。若シ診候ニ過アル者ハ不知。其
診候眞ニ胃氣ノ虛極タル者ニ於テ。人參ヲ不受コトアルハ。人參ヲ
用コトノ不足カ故ナリ。至眞要大論曰。塞因塞用ト。凡大虛者少補テ
補ヲ不受益大補スベシ。必效アリ。益補劑ハ皆其性重シ明易シ。且人
參ハ浮テ升。故ニ胃氣甚虛ノ不行者ニ用之妙則。胃氣ヲ補ニ不

和語
二六二

足ノ徒ニ其氣升、其性閉。上氣膈滿等ヲ致ス。是ニ於テ醫者有察ノ
人參ヲ倍加スレハ。胃氣根ニ取テ上カノ氣降ル。胃氣行テ膈通シ
中焦開テ食味進ム。此亦醫療ノ關係ナリ。虛極ニ至テハ少劑ノ人
參反テ害アリ。大劑反テ其害ヲ愈スノ義ヲ知テ。總一二分ノ人參
ヲ用ニ。不宜ト云テ捨テ勿レ。神聖工巧ヲ規準準繩トシ。虛極ニ來
定者ハ補劑ヲ用テ不受。又方ヲ改製ヲ代。分量ヲ増減シ。惟神フテ
愈スヘレ。誤テ意ヲ疎通攻劑ニ轉シ。人命ヲ敗コト勿レ。守肺心。肺ハ
諸氣ヲ總心ハ神ノ舍ニシ。肺心ハ俱ニ氣ヲ主者ナリ。人參ハ補氣ノ主
劑タルカ故ニ用之。肺心ノ氣ヲ守テ堅固ナラシム。夫肺ハ皮毛ヲ主リ。其
脈右寸ニ在。故ニ肺氣虛スレハ皮毛疎ニシ。自汗惡寒シ。或息短。或清涕
ヲ流テ外邪ノ如シ。其右寸脈虛弱者ハ肺虛ナリ。外邪ニ非ス。人參ヲ用
テ補之。凡肺氣弱則腠理空疎ニシテ外邪乘。虛感冒者ハ偏ニ表發ノ

精活獨活ノ類ニ人參ヲ合シ用ベシ。厚ノ太者桂枝湯ニシ。風藥ヲ合シ
用ヨ。或問參蘇飲。敗毒散。麻黃湯ハ皆表發ノ劑タリ。然ニ參蘇飲
敗毒散ハ俱ニ人參ヨ。ハユ。麻黃湯ニハ人參ナシ。此義何ゾヤ。且此三方
ノ發散ノ輕重何如。曰麻黃湯ハ發表ノ強者トス。次之者ハ敗毒散
ナリ。參蘇飲ハ發表ノ輕者トス。夫麻黃湯ハ偏ニ表ニ於テ開散ス。參
蘇飲ハ裏ヨリ表ニ發散ス。此ニ人參ヲ用者ハ裏ヨリ其氣ヲ張テ
藥ヲ能表ニ達セシメシコトヲ欲シナリ。然則參蘇飲敗毒散ニ
所用ノ人參ハ反テ表發ノ佐トナル者ニシテ補シガ爲ニハ非ス。庸醫不
知之。人參アルトキハ補テ發表ニ輕ト云ハ誤ナリ。人參ニ從テ反
テ發表ノ功ヲ盛ニスルノ義ニ昧シ。肺氣虛弱ノ風症ニ參蘇飲ヲ用テ
人參ヲ使則此補ヲ兼テ發表ヲ輕スルニ似タリ。雖不然。何如トナ

レハ肺氣虛弱者ハ風寒ノ邪モ亦其虛ニ乘ノ感スルコト深シ。發
表ノ輕ヲ以ハ其邪ヲ散シ難シ。然レ強發散則重テ肺虛ヲ致
ンコトヲ恐ル。故ニ人參ヲ合用シ裏ヨリ其氣ヲ張シメテ發表ノ
功ヲ盛ニセンコトヲ欲メナリ。庸醫ハ此意ヲ不知シ參蘇飲ニ人參
ヲ用ヒ及敗毒散ニ人參ヲ用則皆發表ノ功ヲ薄センコトヲ欲ス
ルガ故ナリト云者ハ誤ナリ。或問補藥ハ性重ノ閉發表ノ劑中
ニ用之恐ハ邪氣ヲ補住センコトヲ何故ニ參蘇敗毒ニ用之乎曰
邪氣アル者用之則充邪氣ヲ補住スト雖參蘇飲敗毒散ノ發表
風邪群聚ノ中ニ此一味ヲ合用則表藥ニ引レテ閉塞ヲ致スニ不至
然レ肺氣ノ弱者ニ非ンバ勿用彼麻黃湯等ヲ用ヘキ所ノ實邪ノ
者ニハ恐之蛇蝎ノ如シ治眩暈敗毒散ヲ云此症數因アリテ不同外
風邪ヨリ致テリ發散ニ宜或内用風ヨリ致者ハ天麻柴胡ノ類ヲ

用ユ或痰氣ノ逆厥ヨリ致者ハ木香附子半夏ノ類ヲ用ユ或婦人
瘀血ヨリ致者アリ。人參所治ノ眩暈ハ元氣虛ノ虛氣浮升テ
眩或胃氣虛ノ下陷シ清陽不升カ故ニ濁陰上ニ塞テ不降ヲ以
眩者テリ。如此ハ人參ヲ用テ元氣ヲ補テ其根ヲ堅スレバ自虛氣
收テ愈或升麻柴胡ト合用シ元氣ヲ補清陽ヲ升提スレバ濁
陰自降テ眩暈愈或曰補胃氣清陽ヲ升提スルニ於テハ人參升麻
柴胡ヲ合用則人參獨用テハ升上セザル者欤曰三聞說ニ人參氣
味俱薄ト薄者ハ能升ル故ニ人參ヲ獨用ト雖金升者ナリ。升ニ非
レバ春温生發ノ胃氣ヲ養コト不能ナリ。收降ハ肅殺秋ノ陰氣
胃氣ノ所不欲ナリ。人參ハ甘温春升ノ氣性アルヲ以テ元氣補養ノ
聖藥トス。故ニ誤用レバ氣ヲ上升セシメテ及テ眩暈眼疾上熱等ヲ
致ス自汗形氣ヲ使動サ子汗自出ヲ云此肺氣弱ノ表ノ守ノ法

が故ナリ頭痛頭痛ノ疾諸因アリ。外邪ヨリ致者多シ。發散ノ宜シ。痰
氣ノ逆上ノ致者アリ。化痰順氣ノ劑ニ宜シ。人參所治ノ頭痛ハ氣虛
ノ痛者ヲ主。黃芪ト合用ノ宜シ。氣虛ノ頭痛ハ作止アリテ。或自汗或
眩暈或四肢冷温ヲ喜フ微冷微風ヲ惡。脈虛弱ニシテ或瀉ヲ兼。人
參黃芪ノ所主ナリ。嘔吐食積酒熱痰結等ノ嘔吐ニハ不宜。胃氣虛者
食飲ヲ不納。或胃氣虛ノ升降不調嘔吐者人參ニ宜。若胃氣ノ虛冷
強ハ或黃芪肉桂ノ類ト合用ス。大抵食滯ノ嘔吐モ後ニハ人參ヲ用
テ止者ナリ。何如下ナレハ始ハ食積胃中ニ塞カ故ニ嘔吐スト雖。已ニ
嘔吐スルト數ナレハ遂ニ其食積ヲ吐盡ス。然レ嘔吐未止者ハ吐
ニ因テ胃氣虛レ胃口萎テ。食藥俱ニ受コト不能吐スルナリ。此時
人參ニ温中ノ劑ヲ合用メ。胃氣ヲ補ヒ。中焦ヲ温順シテ宜シトス
痰癘諸癘ノ總名ナリ。癘ハ風寒ノ外邪ナレハ。初發ニハ人參不宜。然レ

虛癘ノ症ハ初發カラモ人參ヲ使テ胃氣ヲ補助則邪氣ノ容地ナク
ノ愈也。凡截癘ノ劑ニ多ク人參ヲ用者ハ。蓋癘邪ハ胃氣ノ弱ニ因テ陽
明ニ塞者ナリ。故ニ人參ヲ用テ胃氣ヲ補ヒ陽明ヲ張則邪氣ノ
結所ナク。塞所ヲ失テ。其病自愈。猶口傳アリ。大抵癘疾ハ外邪タ
リト雖。皆胃氣ノ不足ヲ兼サルハナレ。苟モ胃氣盛者ハ癘疾ノ患ナ
レ。故ニ癘疾ノ始ハ先發散シ其邪ヲ除。邪退ノ後人參ヲ用テ胃氣ヲ
調則邪氣再復スルコトナレ。瀉痢泄瀉痢病モ其虛實ニ從テ人參ヲ
用ノ善惡アリ。胃氣虛ノ水穀ヲ消化セズノ瀉痢。或胃氣下行ヲ
上行セザルガ故ニ瀉痢後重スル者ハ。初發ヨリ人參ヲ用ユ。或ハ升麻
ト合用ノ能。胃氣ヲ上行セシメテ。虛痢後重ヲ治ス。大抵泄瀉ノ始ハ
水穀ヲ分利シ。痢疾ノ始ハ宿滯ヲ疎通ス。此實人ノ醫療也。如此ノ時
矣。人參ヲ用テ補益スレハ大ニ害アリ。已ニ泄瀉ハ分利シ。痢病ハ疎通

神醫心法卷之十一

ノ治ヲ行_レ凡_レ瀉痢後重未愈者胃氣ノ不足ナリ。此ニ至_テハ其始實症ヨリ病出_ル雖_レ亦人參ニ非_レバ不能愈ナリ。只宿食ノ有無胃氣ノ虛實ヲ察_シ用_フ之尤_ニ右關ノ脉虛弱ノ候アルヲ主_ト用_ヘキナリ。中風_ノ實_ノ辨_{アレ}凡_レ十_ノ中七八ハ神氣胃氣ノ虛症人參ニ宜_シ東垣所_レ謂_フ四十以後肥_テ色白者ノ中風ハ充_テ元氣ノ虛症人參ノ主治スル所ナリ。中風偏枯癱瘓者卒中_ニ皆胃氣神氣ノ虛症ナリ。人參_ヲ久服多服スルニ非_レハ難愈若_シ其因氣因痰者ハ順氣化痰ノ_レ謂_フ二人參ヲ兼_テ用_ユ中_ニ暑_ノ察_古東垣ノ謂_フ靜_ニ得_テ中_ニ暑_ト云_フ症_ハ非_ズ其症ハ夏熱ニ納涼ノ病者ナリ。治法發散_ヲ主_トス人參_ニ宜_シ今此謂_フ中暑ハ直_ニ夏月ノ炎暑_ニ中_レタル症_ヲ云_フ察_古東垣ノ謂_フ動_テ得_テ中_ニ熱_トスル者ナリ。陰陽_ノ應象大論曰熱傷氣_ト。卒痛_ノ曰_ハ是則腠理開_ル榮衛通_ル汗大泄_故氣泄_矣。是ハ熱也。夫夏月ノ衆

人參_ニ宜_シ或汗大_ニ泄_ス雖_レ暑_ハ火熱ノ邪タルヲ以_テ。肺氣_ヲ伐_ス亦氣虛_ヲ致_ス。人參_ニ宜_シ孫真人ガ生脉散東垣ガ清暑益氣湯ハ夏_ノ中_ニ暑_ノ主_方皆人參_ヲ以_テ補_テ元氣_者是_{ナリ}。然_レ凡_レ內經_ニ云_フ用_ハ參_ヲ少_ニ黃藥麥門冬_ノ類_ヲ加_用ノ。火_ヲ制_シ金_ヲ潤_ス水源_ヲ救_ヘシ。此亦治_ル要法ナリ。痿軟_ハ大抵足痿_ハ腎_ニ屬_{スル}ノ說アリ_ト。太陰陽明論_ニ云_フ四支_ニ稟_テ氣_於胃_ト。痿論曰治痿者獨取陽明_ト。陽明_ハ胃經_ヲ指_ス故_ニ手足痿軟_ヲ患者_ハ胃氣虛_ノ水穀_ノ精氣_ヲ其_四支_ニ注_{コト}ノ薄_ガ故_{ナリ}。人參_ヲ以_テ胃氣_ヲ補_テ愈_ス或血虛精虛瘀血_瘀結_ノ者_{アリ}雖_レ此_モ亦胃氣ノ虛_ヲ兼_テ補_スト云_フコトナ_レ。胃氣盛_ニ四肢水穀_ノ精氣_ニ富_則。夕_トヒ精血_瘀痰_ノ滯_{コト}アリ_ト云_フ。遂_ニ痿_軟ノ甚_ニ不至_是以_テ痿症_ヲ治_者ハ人參_ヲ主_ト胃氣_ヲ補_{コト}ヲ主

ト入。痿論ニ足陽明ヲ刺テ痿ヲ治スルノ義ヲ考ヘヨ。吐血嗽血下血
血崩血崩ハ婦人ノ經水不時ニ崩下ヲ云。王綸曰。凡酒色過度損傷
肺腎真陰。陰虛火動。勞嗽吐血。嗽血等證。勿用之。蓋人參入乎太陰
能補火。故肺受火邪。若息之。若誤服參者。其溫之劑。則病日增。服之
過多。則死不可治。蓋其溫助氣。氣屬陽。陽旺則陰愈消。惟宜苦其寒
之藥。生血降火。世人不知。往往人服參者。爲補而死者多矣。實陰虛
火動血症。勞嗽。二人參ノ溫陽ハ難用者ナリ。然凡亦人參ニ非レハ不
愈者アリ。何如。一ナレハ。火ニ兩辨アリテ人參ニ宜。一不。宜ト存。入。精
血虛衰ノ火熱升動シ。血氣逆亂ノ勞嗽吐血。咳血下血等ヲ致。一。陰
元氣未虛ノ只火邪ノ升逆實盛ナル者ハ。實ニ此參其其溫ノ劑ヲ用
コト勿ン。火熱ノ升逆ヲ助ク。王綸謂肺受火邪。勿服參。其陽旺則陰
消トハ是ナリ。又精血虛衰シテ元氣不足シ。陰火乘土。位虛氣與陰火

ハ元氣何ニ從テ力收シマ。元氣不收ハ火何ニ從テ力退シ。血何ニ從テ
力靜ラシマ。東垣曰。火與元氣不兩立。此時以人參。元氣ヲノ勝シム
ルナキハ。邪火退降リテ嗽止血止。此張仲景身熱亡血脉沉遲者。加人
參ノ義。人參能補元陽。生陰血。而瀉陰火トハ東垣ノ說也。虛火可補
參其之屬。陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等證。四物加人參。黃蘗知母。好
色之人。肺腎受傷。嗽嗽不愈。變玉膏王之。肺腎虛極者。獨參膏王之。
トハ。參ノ說ナリ。此皆陰虛火旺ノ勞嗽血症ト雖。元氣ノ虛弱ヲ王トス
ル者ハ人參ヲ用。ニ非ハ治スルコト不能。血藥陰劑モ亦人參ヲ合用セズ
ハ補血ノ力ヲ致コト不能。或黃蘗ノ類。サク佐トノ輕ク清熱スルモ亦法也。
如此。元氣不足ノ陰虛火旺ヲ以テ。元氣有餘ノ陰虛火動ノ症ト合同
ノ偏ニ苦寒降沉ノ劑。黃蘗。知母。生地。黃芩。連ノ類ヲ群聚ノ用。コト

和語本
卷之六
六

アヲハ。昔寒胃氣ヲ伐陰藥重テ元陽ヲ損テ脾ハ血ヲ總コト不能
肺ハ氣ヲ收テ經脈ヲ調コト不能水源ヲ化スルコト不能シテ陰益
表邪火彌熾ニノ嗽血ナラテ遂ニ其生ヲ失ニ至ル恐サルヘケンマ惟
人參ハ精虛血虛火動ニ不拘元氣ノ虛ヲ至トソ用之而已太抵元氣
有餘ノ實火ハ其脈洪大實數元氣不足ノ虛火ハ其脈虛浮虛數或
身熱下雖及ノ脈ハ沉遲ナリ此大法タリ然元氣ノ虛甚ノ陰火ノ
勞熾者ハ反テ脈洪大ナルコトアリ然元氣ノ虛甚ノ陰火ノ
火症ハ大使實シ渴ノ冷水ヲ欲シ能飲不足ノ陰火ハ大使不實渴ノ
熱飲ヲ欲ス或冷水ヲ欲シ多不飲有餘火症ハ食入不足ノ陰火ハ食
ヲ不欲又或餘ノ火症ハ眼勞ヲ候ニ嚴ニノ悍不足ノ陰火ハ眼中ニ
勞乃ナレ或ハ時陰火ニ從テ嚴悍ナルコトアレヒ暫ニ又怯勞ス眼
ハ神ノ舍ナリ病者ノ眼勞ヲ候テ元氣ノ虛實ヲ察ソ用之 **霍亂**

吐瀉同時ニ發者ハ濕霍亂トシ人欲吐不吐欲瀉不瀉ハ乾霍亂ナリ
霍亂ハ太抵中焦宿食ノ停滯ニ因テ升降ノ阻滯ノ致者ナリ故ニ
始ハ中焦ヲ温順シ或吐セシメ或瀉セシメテ宿食去ノ後胃氣ノ虛實
ヲ候テ人參ヲ用之其胃氣甚虛シ脈微ニ四肢厥冷者ハ初發ヨリ
人參ヲ用之或乾姜或肉桂ト合用シ温補スベシ **痰弱** 弱字眼也胃
氣虛弱ニシテ痰液不順ナルガ故ニ痰ヲ生スル者ハ人參ニ宜シ若シ氣
盛ノ痰症ニ長テ用之ハ反テ氣ヲ塞テ痰ヲ加 **虛熱** 氣分虛熱
ハ人參ニ非レハ清コト不能ナリ東垣謂温能除大熱又曰火與元
氣不兩立ノ表是ナリ凡熱ハ人身常ニ存スル所ノ陽氣タリ若
陽氣留滯則熱ニ変ス其陽氣ノ留滯ニ兩辨アリ陽氣有餘ノ滿
が故ニ四逆ヲ熱者アリ此ヲ有餘ノ邪火トス苦寒ノ藥ヲ以テ清
涼者是也又陽氣不足ノ不行ガ故ニ留滯ノ熱者アリ不足ノ陰火

トス。此ニ苦寒清涼ヲ用レハ陽氣ナラ陰藥ニ依テ不行不行則
熱ナラ盛ナリ。惟人參ヲ用テ陽氣ノ力ヲ扶テ能順行セシムレハ
熱自退去故丹溪曰虛火可補參芪之屬。世人誤テ一切ノ虛火ニ
參芪ヲ通用ノ害ヲ致コト不サ。丹溪ノ謂虛火ハ元氣不足ノ虛火
ノミ。或血虛ノ火。陰虛ノ火皆虛火ナリ。此兩ノ虛火ヤ。元氣ノ不足
ヲ不兼ハ必シモ用コト勿レ。若此兩虛火ニ雖元氣ノ虛火ヲ兼者只
亦用之。丹溪虛火可補參芪之屬實火可瀉芩連之屬。一ハ專元氣
虛實ノ火ヲ至ト云。東垣陰火乘土位ト云モ元氣不足ノ火ヲ至ト
云者ナリ。然ニ庸愚醫者人參補火ト云者アリ。此一偏ノ説タリ。
彼元氣有餘ノ熱火ニ用人參ハ實ニ補火ノ義アルヘシ。元氣不足ノ
熱火ニ用ハ人參反テ瀉火ノ劑トナル者ナリ。惟其元氣ノ虛實ニ
從テ補火ニモ瀉火ニモ至コトヲ知ヘシ。今時人ハ内觀ナラズ。氣ハ外

形ノ虧損ノ勞傷古ニ倍シ。元氣ノ損耗者不サ。故有餘ノ
火ヲ希シテ不足ノ陰火ハ多シ。是以苦寒ノ治法多ハ害ヲ致易ク。參
芪其温ノ醫者多ハ回生ノ功ヲ致ス。醫ハ只虛實ノ兩道ニ在。一
男婦一切内傷虛證。人參ハ胃氣ヲ補。肺氣ヲ養。神氣ヲ扶。故男婦
一切内傷虛證ニ至テハ。此ニ非ハ元氣ヲ補助スルコト不能ナリ。太抵
内傷元氣虛證ヲ療スルニ。人參ヲ君トシ。白朮茯苓黃芪ノ屬ヲ使テ
之合用スヘシ。中氣虛者ハ。食味妙。水穀消難。肌肉瘦テ四肢倦怠ス。
白朮茯苓ト合用ス。肺氣虛者ハ。風寒ニ感易ク。汗泄易ク。鼻淵涕泣
流。屬黃芪ト合用ノ宜トス。凡諸病未極ニ於ハ。人參ノ宜不宜ノ論
アリト雖。病已ニ至極ノ死ニ向タルニ於ハ。宜不宜ノ別ナク。唯人參ヲ以
テ元氣ヲ無何有ノ劑ニ回シ。非ハ再生ノ效ヲ得コトナシ。然ハ人參ハ
補氣ノ靈藥。神草ノ名アルコト實ナルカナ。[虛勞] 虛勞勞瘵ハ諸病

補氣ノ靈藥。神草ノ名アルコト實ナルカナ。[虛勞] 虛勞勞瘵ハ諸病

ノ中ニ於テ尤危症タリ。其治始終アリテ人參ノ宜不宣ヲ存入。其始ヤ真陰虛シ相火動ノ肺ニ上衝ス。元氣肺氣未虛故ニ苦寒降火滋陰ヲ用テ宜トス。人參ニ不宣病漸入ノ胃氣疲肺氣耗テ病重ニ進ハ。苦寒降火滋陰ニ不宣ノ人參ニ宜丹溪獨參膏ニテ肺腎虛極ヲ補ヒ。四物湯ニ加人參陰虛ヲ治葛可久。獨參湯ニテ勞瘵ノ極虛ヲ治者ハ。皆其病重ニ至テ元氣ヲ補養シ。陽ヨリテ陰ヲ長セシメ。氣ヨリテ精血ヲ生ゼシム。若シテ始ニ人參ヲ用ヒ。終ニ苦寒ヲ用テ治法ノ前後ヲ過則輕病ヲ重シ。重病ハ死ニ至ラシム。王海藏王倫カ陰虛勞症ニ人參ヲ恐ノ論ハ。勞瘵初發ノ治法ニ宜東垣丹溪葛可久カ以人參陰虛勞症ヲ療スルノ說ハ。勞瘵進至者ノ治法ニ宜然。凡始終苦寒降火ノ愈アリ。初發ヨリ人參黃芪ノ大補一宜者アリ。拘泥スルコト勿レ。諸藥ノ中ニ於テ人參ヨリ貴ハナシ。

總藥

人參ハ胃氣肺氣神氣ヲ養補氣ノ主劑タリ。一切氣虛ノ症ニハ必用之效アリ

使藥

茯苓 馬蘭

然能能使ハ起死回生ノ功ヲ致シ。候ハ皆皆本例ヲ致ス。故ヲ得テトモ速ニ害ヲ致ストモ不輕故能用之者人參ヲ愛スルコト父母ノ如ク不能者人參ヲ恐コト砒石ノ如ク。其愛與恐此皆皆醫ノ賢愚ニ在リ。爲使并麻柴胡ヲ得テ元氣ヲ補ヒ。清陽ヲ升提ス。白朮ヲ得テ能中氣ヲ補ヒ。茯苓ヲ得テ濁陰ヲ引。中下焦ノ元氣ヲ補。麥門冬ヲ得テ肺ヲ潤シ。脈ヲ生シ。乾姜ヲ得テ中焦ヲ能温補シ。黃芪甘草ヲ得テ元氣不足ノ大熱ヲ除キ。陰火ヲ瀉シ。肺氣ヲ大補シ。瘡家内托ノ聖藥トス。毒ノ者不可用。人參ノ者不可用。痰氣塞實ノ喘脈弦緊長實滑數ニシテ有力者。火鬱肉實不可用。痰氣塞實ノ喘者不可用。寒邪束表熱邪在肺。欬嗽者ニ人參ヲ用レバ。肺熱ヲ纏

塞ノ欬ヲ加不可用乾姜ニ宜○久爵ノ結熱肺分ニ塞者不可用
○氣血實滯ノ痛火熱ノ邪氣銳ニ塞テ酸痛者不可用○胸腹實滯
堅積ノ者不可用其中焦不足ニ因テ腹滿シ元氣ノ虛ニ因テ積滯
難解者ハ反テ人參ヲ用則滿消シ積開ク○陰虛火動血症痢疾
勞嗽者胃氣未虛食消シ脈弦數ニ有方者ハ相火ノ有餘タリ虛火
ニ不屬人參ヲ不可用○大抵肥白ノ者ハ多ハ氣虛人參ヲ用易シ瘦
黒ノ者ハ多ハ氣實火鬱人參ヲ難用○左ノ寸關及尺脈虛シ石ノ
寸關脈盛者ハ心肝腎ノ精血虛ノ相火肺脾ニ乘ソ元氣未虛不可用
人參宜用當歸地黃之類○諸瘡ノ始痛甚熱ノ赤色未潰者ハ實
邪也不可用已潰テ後用之瘡口ヲ收ム或元氣虛ノ潰コト不能者
ハ用之潰サレム○外邪アル者用之邪氣ヲ補益ス然凡元氣虛弱ノ者
ハ少人參ヲ兼サレバ發表シ難コトアリ○老人久病ハ大抵人參ニ宜

新病小兒二十前後ノ者ニハ難用然凡必ナスルニハ非ス○日中前
ノ潮熱ハ氣虛トス日中後ノ潮熱ハ陰虛トス用ヒ難シ○不食嘔
吐者不_レ宜也然凡胃氣虛ノ胃口レボミテ不食嘔吐スル者ハ反テ
人參ニ宜トス○以上ノ宜與不_レ宜ハ皆此大藥ノ法例也必然ト決
スヘカラス病ニ臨テ其症因ヲ詳ニシ元氣ノ虛實輕重ヲ明ニシテ
宜不_レ宜ヲ辨スヘレ泥滯印定スルコト勿_レ凡以下ノ諸藥皆此意也
畏惡 人參惡_レ溲疏_レ鹵鹹_レ反_レ藜蘆_レ○說云畏_レ五靈脂_レ惡_レ皂莢_レ黑豆_レ
動_レ紫石英○明ニ藥性ニ達シ詳ニ病内ニ通ズル所ノ上工
ハ權ニ從_レテ或相畏相_レ反相惡ノ者ヲ合用メ治療スルコトアリト雖
此皆精微妙奧ノ神手ヨリノ致者ナリ庸醫此ヲ見テ常法ノ如クニ
ノ用コト勿_レ彼東垣交泰丸ニ人參皂莢ヲ用ヒ古方婦人經閉ヲ治
スル四物湯ニ人參五靈脂ヲ用ヒ胸痰ヲ療スルニ人參藜蘆ヲ用ハ

常人ノ敢テ

及所ニ非ス

附方

人參膏 人參十兩細ニ切剉清水二十盞ニ能浸透テ銀石ノ器ニ入桑柴火ニテ緩ニ煎

メ十盞ニ至時汁ヲ瀝取滓ニ亦水十盞ヲ入煎之五盞ニ至時一
番ノ汁十合ヲ膏ト成瓶ニ收入テ隨病作湯使元氣虛極ヲ補ノ
力充強シ獨參湯 大人參去蘆二兩剉テ水二鐘大棗五箇煎不
拘時細人服之服後宜熟睡出葛可又十藥神書補元氣妙法ナリ

參附湯 附子ノ附方ニ見タリ 胃寒ノ食スレハ即吐者ヲ治ス 人參

丁子 藿香各二盞半陳皮五盞生薑三片水二盞煎之盞ニ至リ温
服出後稗方 胃虛ノ嘔吐惡心有痰者 人參一兩水二盞ヲ入一盞ニ

煎之竹瀝一盞姜汁三匕ヲ入食遠ニ温服ス老人ニ尤宜出簡便方
食入テ嘔吐スルヲ治ス 人參半夏湯 水一斗ヲ用テ枳ニ汲揚ユト
百四十遍ノ其水三升ヲ取 人參一兩半夏一兩五盞生薑十片白

蜜三合ヲ入一升半ニ煮テ服ス 出張神景金匱方 霍亂嘔吐
人參二兩水一盞半煎一盞雞ノ卵ノ白一枚ヲ入再煎之温服ス或

丁香ヲ加出衛生家室方 橫生倒産 手ヲ出ヲ橫生トシ足ヲ出ヲ
倒産ト云人參末乳香末各一錢丹砂末五分研勻雞ノ卵ノ白一枚

生薑汁三匕ヲ入攪勻冷服ス 母子俱ニ安神效アリ 出婦人良方
小兒聞雷驚恐スル者 此元氣ノ虛怯也 人參麥門冬當歸各二兩

五味子五錢水一斗煎五升滓水五升煎二升一升煎ト合煎之膏
ニシ 每服三匕白湯下出簡便方 人參粥 五曹垂死者ヲ治ス 人參

三兩水一升煎四合服ス外別ニ人參汁ニ粟米雞ノ卵ノ白薤白
ヲ入粥ニ煮テ嗽シム 房事後神氣困倦 人參七錢陳皮一錢水一

盞半煎八分食前ニ温服ス 齒縫ヨリ出血 人參赤茯苓麥門冬各
二錢水一鍾煎七分食前ニ温服ス 蘇東坡方 禁口痢 人參蓮肉

二錢水一鍾煎七分食前ニ温服ス 蘇東坡方 禁口痢 人參蓮肉

各三錢。一盞水。二盞入煎。一盞細人呷。或姜汁炒黃連三錢。加
出。經驗方。酒毒傷胃氣。瘀血滯。其中目盲。脈瀉者。蘇木煎湯。二
テ人參末一錢。調服。入。次日鼻兩掌皆紫黑也。此滯血。行。入。
四物湯。蘇木。桃仁。紅花。陳皮。加。人參末。調服。愈。出丹。漢纂
要。傷寒壞症。傷寒服藥。悞。神氣困重。脈沉伏。夢中。垂
死。スル者。七日以後。獨參湯。并水。冷。レテ服。入。鼻頭。汗。出。脈
生。立瘳。神ノ妙方也。出聖一選方。狗咬腫痛。人參一味。置桑柴炭上
燒存性。以盪覆。頃ノ末。レ。搽之。立。瘳。出經驗方。蜈蚣咬傷。蜂
螫。蟻傷。人參末。之。蜂。蟻。傷
ハ人參末。傳之。出證治要訣

愚案

時師人參ヲ恐者多シ。蓋
人參ハ扶火升土スルガ故
ト。愚案スルニ此皆病因ニ不的。藥性ニ不達ガ故。或ノ人參ハ實火ニ
用則扶火。虛火ニ用則瀉火。實升ニ用則升衝セシム。虛升ニ用則降

コトアルノ理ヲ不知。頭面ノ病。熱火ノ症ヲ見テハ。其本。虛症。多ク。人參
入參ヲ不可受ト察メ。孟浪トシ。恐之無用。誤レルカ。夫病ノ外ニ見
者ハ枝葉内ノ虛實ハ根本ナリ。其根本ノ虛タルコトヲ知ハ。何ゾ枝
葉ニ拘ラシマ。或其虛ヲ知テ用レ。凡恐テ少施テ候者アリ。若其
少ノ人參。病ニ不應。則人參不宜ト云テ。此ヨリ恐之。遂ニ不近口。空士
杭白少用。則壅滯。多用。宜通。上。虛ノ大者ニ用之。少則。反テ氣ヲ壅
閉セシム。其虛ニ應。ノ多用。則能元氣ノ力ヲ致テ。反テ順通セシムル
ナリ。故。家法。二。一錢ノ人參ハ。二錢ヲ得テ能降トス。此人參多用
ノ要法タリ。或世ニ言。虛ノ輕者ハ。以沙參代。人參ト。此説。初。古。老人ニ
給レリ。然。凡好古。曰。人參補五藏之陽。沙參補五藏之陰。安得無異
ト。人參沙參其味ハ俱ニ甘ト。鮮其功ニ於ハ
兩參合異ナリ。何合一。互ニ用。コトヲ致サシヤ

修治

人參ハ朝
鮮ヲ上品

トス。今唐人形ニ持來物見トコロハ良ト雖其功ハ朝鮮ニ不及也。
人參ハ色黃ニ潤飮ノ色ノ如クニ。太ク肥重其形難ノ腿ノ如ク。或
人形ノ如ナルヲ極品トス。蘆頭ヲ去剉用。蘆頭ハ耗氣今人吐李子
郁説ニ人參是鐵器然其舊本草ニ不忌李子始テ言ノ三必シモ忌ニ
不及。人參ハ中風見日ハ蛙易シ。蓋人參ノ生スル向陰背陽カ故也。
人參ヲタクツユルニハ。細辛ト合ノ瓦罐ニ納紙ニテ能密封ノ風氣ヲ不
通ヤラニスベシ。或其蛙ヲ惡テ樟腦ニ雜置者アリ。樟腦ノ香氣人
參ニ通テ不宜。若藥店物樟腦ノ香氣アラハ能焙テ涼其香氣ヲツ
クレ去テ用ベシ。生熟言聞曰人參生用氣涼熟用氣温ト。愚按ニ
生熟俱ニ温ナリ。熟則温性強シ。尤補セント欲セハ熟ノ用ヲ。熟スト
ハ紙ヲ隔テ焙用ヲ云。或酒ニ潤透メ焙用コトアリ。升陽補陽ヲ盛
ニセントラ欲メナリ。或塩水ニ浸テ焙過ノ用レハ肺經有火右脈實
者ニモ亦用易シ。蓋塩ハ能潤下ス。且人參ハ鹽ヲ畏カ故也。或

秋名製氏亦良然。凡此不得也。ノ用時ノ製ナリ。惟右脈實者ニ
ハ人參不所好也。土佐向長澤道壽ハ土佐ニ居レリ。世人稱ノキ
佐道壽ト呼道壽療病ニ藥物ノ上品ヲ擇用故ニ今ニ土佐ノ醫ハ藥
ノ上品ニ非ハ不用。是以藥店ニ上人參ヲ以テ。土佐向ト号ス。極品也
孔人參大人參ノ細小者ヲ聚扎テ。形ヲ大ニ作者ナリ。或ハ其量ヲ
重セントラ欲メ。鋤ヲ裏テ偽者アリ。皆功力薄シ。碎人參古ト今
ト不同。京ノ碎ト云物ハ大人參ノ末梢ノ折タル物。或太細小ヲ太
人參ト稱シ難キ物ヲ以テ。碎人參ト稱セリ。今ハ此ヲ聚束テ。孔人
參ニ作ガ故ニ近世ノ碎人參ト稱スル物ハ皆鬚人參ノ中ヨリ揀出
セル者ナリ。功力薄シ。鬚人參或小人參凡号人參ノ根頭ニアル細
毛ノ如者ナリ。功力大人參ヨリ薄ト雖湯參ヨリハ其氣味勝レリ

浮人參或服^ル本^ノ根^ニ謂^ル湯^參也。朝鮮^ニ人參^ヲ完^ナカ^ラ煎^レ用^ス。其^ノ跡^ヲ晒^乾テ本^邦ニ渡^ル物^{ナリ}。功力^甚微^{ナリ}。薩摩^{人參}小人^參。參^氏号^シ薩摩^州ヨリ出^{タリ}ト。今^ハ處^々ニ有^リ之^三種^五葉^紫白^色花^ヲ生^レ子^ヲ結^ル根^ノ大^ハ小^參ノ如^クニ鬚^{アリ}味^甚苦^鬚ハ其^苦ノ微^{人參}ニ似^{タリ}ト雖^モ真^ノ人參^ニハ非^ズ此^草形^本草^圖經^ノ說^ニ合^{スル}ガ故^ニ世^人多^ク以^テ之^ヲ真^{人參}トスル^ハ謬^{ナリ}或^此草^根ヲ取^テ其^草ノ煎^湯ニ煮^浸テ人參^ニ偽^者アリ^{不可}用^{朝鮮}國^來聘^ノ人^ニ此^草ヲ問^ハ百^濟ノ人^參ト答^然凡^東醫^寶鑑^ノ說^ニ不^合朝鮮^人ノ和^人ニ所^答多^ク謬^妄ヲ以^テス^{不可}信^也又^一種^{アリ}葉^微蔽^ニ似^テ根^ハ人參^ノ如^クニ鬚^{アリ}氣^味甚^薄真^{人參}ニ非^ズ又^一種^{アリ}苗^高三^四尺^葉七^頭ニ似^テ小^{房子}ヲ結^此即^漏蘆^ニ真^{人參}ニ非^ズ以上^皆世^ニ稱^ノ薩摩^{人參}ト云^又一^種人參^ト呼^者アリ^加藤^清在^朝

ト不^合白^{山人參}加^賀白^山ニ生^ス根^ノ大^指ノ如^ク氣^味當^改ノ如^レ此^モ亦^{人參}ニ非^ズ此^外防^葵及^白芷^ヲ以^テ蒸^造テ人參^ニ爲^物多^シ誤^用レ^バ害^不少^{不可}不^揀用^{唐人參}清^{ヨリ}來^物也^味辛^ノ微^苦朝^鮮人參^ノ功^力不^及也^惟朝^鮮大^{人參}ノ黃^色潤^肥重^實ニ^謂土^佐向^極上^ノ物^ヲ揀^用ヘ^シ人參^ハ元^氣ヲ無^何有^ノ知^ニ画^入所^ノ要^藥タ^レハ其^極品^ニ非^ハ用^{コト}勿^レト云^參蘆^苦温^〇吐^痰飲[△]參^蘆ハ人參^ノ蘆^頭ナ^リ人參^ハ補^氣其^蘆頭^ハ瀉^氣瀉^氣ト^ハ人^ヲ能^吐シ^ムレ^ハナ^リ吳^緩曰^人弱^者以^{人參}代^瓜蒂^ト瓜^蒂參^蘆俱^ニ能^吐痰^ノ劑^ニ瓜^蒂ハ吐^{スル}コト^強ク參^蘆ハ吐^{スル}コト^柔ナ^リ故^ニ虛^弱ノ人^痰飲^等ノ胸^中ニ積^メ病^者吐^セレ^メ行^欲去^之ハ人參^蘆頭^一味^判テ水^煎シ^用則^能

本草綱目卷之十一 參 〇二十六

吐痰神效アリ。凡人參ハ補元氣其蘆頭ハ吐セシメテ上焦ノ氣
ヲ瀉者ハ物ハ具太極ノ義自然ノ妙道ニ存メ人意ノ及所ニアラス

黃耆

始原 綱本



其微温○補肺氣實皮毛益胃氣
癰疽久敗瘡排膿去肌熱治喘嗽
虛勞自汗腎衰耳聾止渴逐五藏

惡血療崩帶一耆ハ長也此草根ノ色黃ニシテ補藥ノ長タルヲ以
黃耆ト名俗ニ黃芪黃耆ニ作者ハ俱ニ非也補肺氣實皮毛黃耆
ハ耳ノ温氣薄味厚陰中ノ陽也手足太陰氣分ニ入手太陰ハ肺足太
陰ハ脾也黃耆ハ脾肺ニ經氣分ノ主藥タリ左肺氣ヲ補ノ聖劑トス
益肺ハ諸氣ヲ總テ皮毛ヲ主黃耆ハ能皮毛腠理ヲ閉密ノ裏ニ肺氣
ヲ滿シムルノ劑ナリ夫人參ハ元氣ヲ補ヒ黃耆ハ肺氣ヲ補フ肺氣ト
ハ周身ニ所充ノ氣也刺節真邪論曰真氣者所受於天與穀氣并而

充實也ト先天ヨリ此身中ニ受滿ル所ノ氣ハ後天水穀ニ所生ノ氣ト
并合シテ身内ニ充滿ス此ヲ真氣ト号真氣ハ皮毛ヲ以テ收閉テ
不泄カ故ニ身内ニ滿テ生々ノ化ヲ致ス此即肺氣ナリ是以表疎ナ
レ肺氣虚ス表固ケレハ肺氣盛ナリ黃耆ハ能表ヲ收固ス分故ニ
肺氣ヲ補ニ長セリトス或問東垣曰衛氣者所以温分肉而充皮
膚肥腠理而司開闔黃耆既補ニ焦實衛氣ト然則黃耆ハニ焦衛
氣ヲ補ノ主藥タリ吾子何ソ真氣ヲ補ト云マ曰ニ焦ハ名アリテ
形ナシ上中下周身薰蒸ノ陽氣ヲ指テニ焦トス黃耆ハ表ヲ收
テ氣ヲシテ周斡ニ充シムル者ナリ氣ハ陽タリ氣充則上中下三
焦ノ陽氣ヲ補ニ足リ衛氣ハ脈外ヲ行テ外ヲ衛者ナリ故ニ衛氣
ト云黃耆能表ヲ收テ氣ヲシテ外ニ泄ケレメガルトキハ衛氣ノ衛ヲ
實スルニ足リ然則補ニ焦實衛氣ト云者ハ皆余右ニ所辨ノ皮

毛ヲ密テ周身ニ氣ヲ補ヨリ致者ナリ。且黃耆ハ肺氣ヲ補
肺ハ金トシ腎水ノ母タリ氣ハ陽トス火ノ屬タリ黃耆能肺金
ノ陽氣ヲ補ヲ以テ。元素謂黃耆ハ足少陰命門ニ入トス又手少陽
三焦ニ入トス此皆肺氣ヲ補テ水源ノ氣ヲ養皮毛ヲ實陽氣ヲ
充シムルヲ以テ云ナリ。直ニ命門三焦ノ相火ヲ補者ト覺ヘカラス。甄
權謂其補腎者氣爲水母也。嘉謨曰人參補中黃耆實表ト。凡氣虛
者ハ多ハ人參黃耆合用ノ效ヲ致ス。夫人參ハ元氣ヲ補黃耆ハ身
ニ充ノ諸氣ヲ補諸氣衰則元氣モ亦從テ衰元氣衰則諸氣モ亦
從テ衰故ニ氣虛者ハ參耆ヲ合用ノ效アル者ナリ。此ヲ治水ニ譬
言ニ。黃耆ハ堤坊ヲ堅メ流水ヲ不泄ニ比。人參ハ泉源ヲ長メ水勢
ノ盛ナルニ類ス堤坊ハ皮毛腠理ナリ。泉源ハ元氣ナリ。流水ハ諸
氣ナリ。泉源雖不減堤坊弱メ流ヲ防止サルガ故ニ水外ニ泄去リテ
流減ルハ元氣雖未衰表疎ニシテ諸氣外ニ耗散ノ氣虛ヲ致ス。ト
同レ。黃耆ヲ用テ表ヲ實シ其堤坊ヲ固スルニ非ハ氣ヲ充シ
ムルコト不能。若泉源モ已ニ減シ堤防モ亦弱メ流皆減者ハ彼元
氣モ衰表氣モ衰テ氣虛ヲ致シ同人參ヲ用テ元氣ヲ補ヒ黃耆ヲ
用テ表氣ヲ實メ泉源モ深シ堤防モ固スルニ非ハ其虛ヲ補足コト不
能ナリ。此參耆合用ノ奧旨也。○東垣曰黃耆得防風其功愈大ト。
黃耆ハ收表氣分ノ聖藥タリト雖其味厚ノ性純シ故ニ輕肌表上
浮ニ遲是以防風ノ表藥ト合用則此ニ引テ速ニ肌膚上發メ表氣
ヲ實スルノ功盛ナリ。譬兵アリテ戰ニ良ト雖足遲ノ敵陣ニ進コト
鉞ガ如シ此ニ良馬ヲ與則馬ニ乘メ敵陣ニ進テ勝利アルト同。黃耆ハ
兵ナリ。防風ハ良馬タリ。黃耆乘防風肌膚ニ進テ表氣ヲ收ノ功ヲ
致ス。他ニ表藥多ト雖黃耆ヲ引ニハ防風ヲ宜トス。何知トナレハ。他

表藥ハ皆開^ミテ^テ黄者ノ氣ヲ閉塞スルニ害アル者ナリ。
防風ハ達表ノ劑ト雖^モ。妄^ニニ開發セサル者ナリ。故ニ惟^テ黄者ヲ引^テ表ニ
達セシムル耳^ニ。其密表ノ功ヲ害セス。譬^ハ彼兵所乘馬強剛ナレバ。妄^ニ
走跳^テテ反^テテ其兵ヲ損^{コト}アリ。惟^テ良馬ハ從容トシテ能^ク乗^テ快^ク敵
陣ニ進^シムルニ非^ズハ勝利ヲ得^{コト}不能^ニ同^シ。防風ハ黄者力爲^ニハ
良馬ナリ。他ノ表藥ハ彼強剛走跳ノ馬ナリ。實^ニニ古^ノ人ノ藥性ニ達
シ其引藥ヲ合用者神ナルコト如此。千金内托散ニ黄者防風ヲ合
用者皆此義アルヲ以^テナリ。益胃氣^ノ胃ハ土府。其色ハ黄。其味辛。惡
寒^ヲ。欲^ハ温^シ。故^ニ黄者ノ黄色。其温ハ俱^ニ中焦土氣ノ所欲ナリ。是以
益胃氣ノ功アリ。然^レ凡^ハ人參ノ益胃氣ニ不及。黄者ハ專^ク肺氣ヲ補
ノ主藥ニシテ益胃氣者ハ此ガ餘功ナリ。癰疽久敗瘡排膿。癰疽ハ
一朝^ト夕^ノ病ニ非^ズ。日月ヲ積^テテ氣血凝滯^シ。肌肉腐爛^シ生^ス。

表^ノ收^テ内^ノ氣ヲ滿^シメ。裏^{ヨリ}氣ヲ張^レム。膿ヲ排^出シテ。膿
易^ク已^ニ潰^ル。後^モ亦^チ此^ヲ用^レハ生^肉ヲ舉^テ。李^士材^云。托^ハ已^潰之^瘡收^テ
口^ヲ生^肌トハ是^レ也。多^クハ人參ト合用ス。靈樞癰疽篇曰。熱勝則腐肉
肉腐則爲膿。膿不^レ瀉^ス則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則髓消。不當^ク骨空不
得^ク生^肉。血枯^ハ虛^則筋骨肌肉不相^レ榮^ニ。經脈敗^レ漏^シ。薰^テ於^ニ五藏^ヲ。傷^ハ故
充^テ久^ク癰疽早^ク不^レ潰^ル。膿ヲ不^レ排^出トキハ筋骨ヲ腐^ラシ。穢^腐ヲ積^テ
ル^{コト}ト如此。故^ニ黄者人參ヲ合用メ。元氣ヲ盛^ニシ。諸氣ヲ滿^シメ。裏^{ヨリ}
其氣ヲ張^テ。腐^ノ入^{コト}深^カラス。能^ク膿ヲ外^ニ排^シ。ハヤク潰^ル。愈^易ク
此^ヲ内托^ト号^ス。蓋^ニ内^{ヨリ}托^テ出^ヒハナリ。久^ク敗瘡トハ久^ク敗爛^シ。瘡口ノ
不^レ收^ル云^フ。此氣虛^メ不^レ滿^ル。故^ニ肉腐^テ不^レ生^肌者ナリ。黄者ヲ用^テ氣ヲ
充^テ張^シレム。ハ瘡口生^肉ヲ舉^テ愈^テリ。元素謂^ク癰疽家聖藥トハ如此^ヲ

以テリ。或痘疹証肺胃ノ氣虛ノ痘出カタク。或出後凹ニ陷或膿泡
ヲ致カタク。或痘色灰ノ如ク。或痂ヲ結カタク。或痂落テ後渴ノ不食
シ。或痂落テ後癰腫ヲ生スル等ノ症。陽氣ノ虛ニ屬者ハ人參黃耆
ヲ合用ノ氣ヲ充張レムレバ自愈然疔瘡ノ初出難者ニ兩辨アリ
テ黃耆ノ宜不宜ヲ存ス。表氣弱ノ痘ヲ出起ノ氣力怯クテ難出
者ハ用之。其氣ヲ充張レムレバ自出起ス。若外邪ヲ兼テ出カタク
者アリ。或陽明ノ熱邪肌表ニ迫テ難出者アリ。皆黃耆ニ不宜升
麻葛根湯ノ類ニ輕微ニ發散スルヲ宜トス。然疔葛根湯ハ痘已ニ出
テ後ハ亡ニ用カタク。劑トス。詳ニ葛根ノ條ニ見タリ。痘疹陽氣ノ虛
証ニ屬者ヲ治スルニ保元湯アリ。灸黃耆三錢。人參二錢。炙甘草一
錢。生姜一片。水煎メ用ユ。此東垣治慢驚風黃耆湯ノ中。白芍藥ヲ
去者ナリ。凡痘疹陽氣虛ノ難出出後痘頂陷漿行時痘灰色。或濕
ヲ痂ヲ結カタク。或痂後胃氣弱ノ咽渴不食スル等ノ虛虛保元湯
ヲ用ニ宜。或臨症川芎ヲ加。或肉桂或糯米ヲ加用。詳ニ玉機ニ見タリ
去肌熱。此肺氣不足ノ虛熱肌膚ニ在者ヲ去也。元素謂瀉陰火去
虛熱トスル者。モ亦肺氣ノ不足ニ所生ノ熱火ヲ云。大抵人參黃耆俱
ニ陰火ヲ瀉シ氣分ノ虛熱ヲ去者ナリ。故ニ此兩藥多ハ合用ス。若陰
火虛熱ヲ治ルニ參耆合用則何ヲカ君王トセシ。益元氣ノ虛ヲ主
トシ肺氣ノ不足ヲ兼者ハ人參ヲ君トシ。黃耆ヲ臣トス。若肺氣ノ
不足ヲ主トシ元氣ノ不足ヲ兼者ハ黃耆ヲ君トシ。人參ヲ臣トスヘシ
喘嗽喘息欬嗽ハ俱ニ肺ノ病ナリ。然疔虛實ノ兩辨アリ。テ黃
耆ノ宜不宜アリ。或一切外邪ヨリ所致ノ喘嗽。或氣ノ鬱實實痰
ニ屬メ肺氣未疲者ハ絶メ黃耆ヲ不可用。只肺氣ノ虛ヲ主トシ
所致ノ喘嗽ハ黃耆ノ專ヲ主治スル所ナリ。惟黃耆ハ表ヲ閉テ氣

卷之十一
痘疹論

フノ満シムルカ故ニ動スレハ肺氣ヲ閉テ喘嗽ニ害アルコトアリ。
此其虚ニ似テ實タル者ヲ誤テ黃耆ヲ用カ故ナリ。因之世人多
ハ黃耆喘嗽ニ不宜ト云テ忌之者ハ非ナリ真ノ肺虚ヨリ所致ノ
喘嗽ハ何ノ恐アリテカ黃耆ヲ忌ンヤ皆此至愚ノ説ナリ。虚勞
虚勞肺氣ノ勞傷ヲ主トスル者ハ宜用之。虚勞元氣ノ不足ヲ本
トスル者ハ參耆合用ノ宜トス其法右ノ人參ノ條ト參考ス
ベシ。大藥虚勞者色白自汗レ。右寸脈虚弱者ハ熱スト雖參耆
ヲ兼用ルニ宜。自汗肺ハ其氣ヲ皮毛ニ合ス故肺氣虚トキハ
滕理疎ニシ汗自泄。專黃耆ノ主治スル所ナリ。黃耆ハ皮膚ヲ厚
メ不泄ヲ以テ此カ主能ノ根本トス故ニ表虚ノ自汗盜汗ヲ出
或表疎ニシ風ニ感シ易者ハ必用之效アリ。丹溪曰黃耆補元氣肥
白而多汗者爲宜ト肥者ハ其氣怯シ色白者ハ肺氣ノ虚トス故ニ

肥白者ハ多ハ汗出コト多コトヲ致ス。黃耆ヲ用テ收表固衛スルニ
宜トス然ル外邪ニ因テ表氣不順ニシ汗自出者アリ黃耆ヲ不
宜用テラ此ヲ發散ノ邪去則汗自愈ナリ。元素曰無汗則發之
ト。黃耆ハ一切ノ汗症ヲ止メ義右ニ辨スル所ナリ然ニ元素ハ反
テ出汗ト云者ハ何ゾヤ。夫黃耆ハ收表不泄者ナリ。其出汗ト云
者モ亦收表不泄ヨリノ所致ナリ。丹溪耆耆葛根ヲ合用ノ汗ヲ
發シ熱ヲ去此外邪アルノ發表ニ非ス。紫蘇麻黃ノ意ト大ニ異也。
其症氣虚ノ肌表ニ熱ヲ生シ其熱ノ本胃ニ連迫テ然者ナリ此時
冷藥ヲ用テ清熱セント欲スレバ其氣虚ヲ擊コト有コトヲ恐又汗
藥ヲ用テ汗ノ肌熱ヲ去ント欲スレバ表氣ヲ重テ散セシムコトヲ
恐故ニ葛根ヲ用テ連胃熱ヲ清則熱ナラ肌表ニ浮此ニ黃耆ヲ用テ
表氣ヲ收テ不泄則陽氣内ニ滿テ熱其表ヲ蒸蒸則汗出汗出則

從之肌熱自出。致者ナリ。深此意ヲ考テ黃耆發汗ノ義ヲ味
ベシ。黃耆自直ニ汗ヲ出シハ非ス。黃耆ノ收表不泄ヨリメ反テ汗ヲ出
者ナリ。此カ直ニ發表出汗ノ功アルト覺則大ニ害ヲ取コトアル
ベシ。故外感ノ症ニ氣虛ヲ兼テ自汗者アリ。此時表發ノ劑中ニ於
テ少人參ハ加用スルコト有ト雖。黃耆ハ絶テ不用ナリ。此其收表
故ニ外邪ニ補住ヲ恐テナリ。或外感症發汗ノ外邪已ニ去ト雖。其
跡表虛トナリテ自汗不止者アリ。此時ハ黃耆ヲ用テ表氣ヲ收
固ソ宜トス。又盜汗ノ症ニ於テモ陰陽ノ兩辨アリ。陰虛ノ盜汗
アリ陽虛ノ盜汗アリ。然レ黃耆ハ何ノ汗症ニモ皆通用スルノ劑
タリ。黃耆ノ治功ナリ。變萬種ト雖。惟收表不泄ノ根ヨリ致者也。
故一切ノ汗症ニ通用ス。外邪アル者ニハ忌之。腎衰耳聾。黃耆ハ
直ニ腎陰ヲ補ノ劑ト非ス。然レ腎水衰テ耳聾者ヲ治ストハ何
ゾヤ。蓋耳ハ腎水ノ竅タリ。諸ノ聲音ハ肺金ノ所主ナリ。人ノ聞
聲者ハ聲音耳ニ通ノ腎精ニ達ス。其精ノ音氣肺ニ響テ心聞之。
者ナリ。四十難曰。腎者北方水也。水生申。申者西方金。金者肺也。肺
主聲。故令耳聞聲。腎ハ水トシ肺金ノ子タリ。故ニ腎水衰則母
金ノ不足ヲ知ヘシ。且氣水ハ合一ニシテ氣化則水生シ。氣虛則水不
足ス。是以黃耆ノ腎衰耳聾ヲ治スル者ハ黃耆自能。肺氣ノ虛ヲ
補コトヲ得タリ。肺氣盛則金ヨリ水ヲ生シ。氣ヨリメ水ヲ化シ。腎
衰補養ノ助トナル。五行ノ中金ノ三獨聲ヲ發ス。黃耆ヲ用ヒテ金
肺ノ氣ヲ補則金剛ノ彼耳門ヨリ腎ニ通スル精音ノ動ヨク肺
金ニ響クヲタリテ聽コトヲ致者ナリ。甄權曰。其補腎者。氣爲水母
也。若誤テ黃耆ハ直ニ補腎衰者トシ。補陰ノ劑ニ比スルニテアラ
ハ其害不尠。丹溪曰。面黑形寬而瘦者服之。令人胸滿。黑ハ腎氣

從之肌熱自出。致者ナリ。深此意ヲ考テ黃耆發汗ノ義ヲ味
ベシ。黃耆自直ニ汗ヲ出シハ非ス。黃耆ノ收表不泄ヨリメ反テ汗ヲ出
者ナリ。此カ直ニ發表出汗ノ功アルト覺則大ニ害ヲ取コトアル
ベシ。故外感ノ症ニ氣虛ヲ兼テ自汗者アリ。此時表發ノ劑中ニ於
テ少人參ハ加用スルコト有ト雖。黃耆ハ絶テ不用ナリ。此其收表
故ニ外邪ニ補住ヲ恐テナリ。或外感症發汗ノ外邪已ニ去ト雖。其
跡表虛トナリテ自汗不止者アリ。此時ハ黃耆ヲ用テ表氣ヲ收
固ソ宜トス。又盜汗ノ症ニ於テモ陰陽ノ兩辨アリ。陰虛ノ盜汗
アリ陽虛ノ盜汗アリ。然レ黃耆ハ何ノ汗症ニモ皆通用スルノ劑
タリ。黃耆ノ治功ナリ。變萬種ト雖。惟收表不泄ノ根ヨリ致者也。
故一切ノ汗症ニ通用ス。外邪アル者ニハ忌之。腎衰耳聾。黃耆ハ
直ニ腎陰ヲ補ノ劑ト非ス。然レ腎水衰テ耳聾者ヲ治ストハ何
ゾヤ。蓋耳ハ腎水ノ竅タリ。諸ノ聲音ハ肺金ノ所主ナリ。人ノ聞
聲者ハ聲音耳ニ通ノ腎精ニ達ス。其精ノ音氣肺ニ響テ心聞之。
者ナリ。四十難曰。腎者北方水也。水生申。申者西方金。金者肺也。肺
主聲。故令耳聞聲。腎ハ水トシ肺金ノ子タリ。故ニ腎水衰則母
金ノ不足ヲ知ヘシ。且氣水ハ合一ニシテ氣化則水生シ。氣虛則水不
足ス。是以黃耆ノ腎衰耳聾ヲ治スル者ハ黃耆自能。肺氣ノ虛ヲ
補コトヲ得タリ。肺氣盛則金ヨリ水ヲ生シ。氣ヨリメ水ヲ化シ。腎
衰補養ノ助トナル。五行ノ中金ノ三獨聲ヲ發ス。黃耆ヲ用ヒテ金
肺ノ氣ヲ補則金剛ノ彼耳門ヨリ腎ニ通スル精音ノ動ヨク肺
金ニ響クヲタリテ聽コトヲ致者ナリ。甄權曰。其補腎者。氣爲水母
也。若誤テ黃耆ハ直ニ補腎衰者トシ。補陰ノ劑ニ比スルニテアラ
ハ其害不尠。丹溪曰。面黑形寬而瘦者服之。令人胸滿。黑ハ腎氣

ノ足色。瘦タル者ハ氣盛ニ液サシ。肥タル者ハ氣少ク液盛ナリ。故ニ肥白者ハ黃耆ニ宜ク。瘦黒ノ者ハ黃耆ニ不宜トス。然則黃耆ハ直ニ補津液ノ劑ナラザルコト明ナリ。是以耳聾症以黃耆ニ治者ハ金肺ノ氣虚ヲ平トシ此ニ腎液ヲ兼テ致者ニ宜。或腎氣トニ結滯ノ耳聾者ハ黃耆ニ不宜。腎氣ガ故ナリ。不通等ノ腎氣ノ劑ニ宜トス。止渴。渴症ニ種々アリ。肺燥ニ因者アリ。冬ノ類ニ宜シ。肺熱ニ因者アリ。黃耆。冬ノ類ヲ用ユ。胃熱ニ因者アリ。葛根ノ類ニ宜シ。腎熱ニ因者アリ。知母。黃柏ノ類ヲ用ユ。痰燥ニ因者アリ。石蓂貝母ノ類ニ宜シ。外邪鬱熱ニ因者アリ。發散ノ宜トス。黃耆ヲ以テ所治ノ渴ハ肺氣虚シ上焦逼迫ノ致者ニ宜シ。其症多ハ自汗。右脈弱。渴ノ温ヲ喜。冷飲ヲ惡。或渴スレテ反テ多飲ナルハ此皆肺氣ノ虚ヨリノ致者ナリ。夫氣水ハ合一氣虚則津液至コト不能ノ渴ヲ

致ス。人參。黃耆ハ俱ニ氣藥ナリト雖。止渴ノ効アル者ハ此二因ナリ。右ノ人參。止渴ノ條ニ詳ナリ。逐五藏惡血。此モ亦氣水合一ノ義ナリ。血ハ得氣行。氣血ノ能。脈中ヲ流者ハ宗氣衛氣ニ從テ行者ナリ。若其氣不順則血モ亦滯テ。血ノ滯者ハ惡血トス。即瘀血ナリ。故ニ黃耆能逐五藏惡血者ハ其本補氣ノ不足ニ因ナリ。肺氣虚ノ衛氣道虚ノ不行ガ故ニ血行滯滞ニ五藏ノ間ニ惡血ヲ致ス。黃耆ヲ用テ其氣ヲ補則氣行。氣行則血能行テ滯滞ナレ。此ヲ逐五藏惡血ト云。元素曰止痛法。血生血モ皆黃耆能。肺氣ノ不足ヲ補ヲ以テ。氣不足スレバ不行。氣不行。血不行。不生ノ死血トナルヲ以也。黃耆所止ノ痛ハ此氣虚ノ不行。故ニ血氣凝滯ノ痛者ヲ治スルナリ。若氣實血鬱ノ瘀血及血氣實滯ノ痛ニ用之。ハ黃耆ノ氣ヲ閉ニ從テ。彌氣鬱血滯テ瘀血ナラ不行。痛ナラ不止ノ大害ヲ致ス。黃耆則與

本草綱目 卷之十一 補劑 黃耆

紅花俱二瘀血ヲ逐テ活血ノ功アリ下雖男之症雲泥異ナリ紅花ハ
 直ニ瘀血ヲ敗テ血道ヲ行シム黃耆ハ血藥ニ非ス直ニ瘀血ヲ碎タ
 コト不能惟氣虛ノ不行カ故ニ血モ亦不行ノ滿者ハ用之氣ヲ補
 則氣分ニカラ得テ氣能行ニ從テ血行テ惡血ヲ逐者ナリ此等黃
 耆補氣ノ餘ヨリ致者ナリ且黃耆ニ直ニ氣ヲ行テ覺バカラス或ハ
 氣鬱ノ瘀血ヲ致者ハ赤白帶下ノ類直ニ煩氣ノ劑ニ宜此ニ黃耆ヲ
 用レバ加其氣ノ鬱閉ヲヌスク惟黃耆ハ表氣ヲ閉者ナリ故ニ氣
 差ツ不行ハ用之閉其氣閉則氣滿滿則行テ入行ハ黃耆ハ直ニ致
 所ニハ非ス黃耆ニ氣ヲ閉滿セシムルカ故タルコトヲ知則敢テ誤ラ
 致コトナレ療崩帶 婦人經水不時二崩下者及赤白帶下ヲ治ス
 ルモ亦氣虛ニ因テ其血ヲ經絡ニ行シムルコト不能ノ血崩ニ氣虛ノ
 陽氣ノ煩升ナキカ故ニ帶下スル者ヲ治ス日華曰其止崩帶者氣
 壯則無下漏之憂也。黃耆直ニ止血ニハ非ス氣虛ノ血ヲ閉テゲルカ
 故ニ血崩スル者ヲ治スル也其或下焦ノ熱火ニ因或濕熱ノ滯ルニ因
 或氣帶氣動等ニ因テ血崩帶下スル者多シ黃耆ノ宜所ニ非ス用之
 又テ善アル者ナリ好古治咯血下云モ黃耆ハ非補陰非止血氣虛
 為不納カ故ノ咯血ヲ治ス補腎藏元氣下云モ腎藥ニ非ト雖腎水ノ
 母タル金肺ノ氣ヲ補ニ因テリ。醫泉ノ源冷レハ流ノ末モ冷テリ。源温
 ナスハ流ノ末モ温ナルヘレ腎水生化ノ源タル金肺ニ氣ヲ滿者ハ黃耆
 勝レハテ肺金滿則宜腎藏モ亦從テ自元氣ニ富サルヘケシマ好古
 カ説深意存セリ腎藏ノ水ヲ補ト云スト補腎藏元氣ト元氣ノ二字
 ニ深眼ノ余辨ノ意ヲ察スヘシ然是雖所ノ腎元ヲ補ハ
 甚異也彼ハ直ニ腎元ヲ温補ス此ハ肺氣ヲ補ノ餘力也

總藥

李士材曰原其功能惟主氣東垣曰用黃耆温分肉益皮毛實筋

理不令汗出好也。曰是皮表之藥也。嘉謨曰黃耆實表。黃耆ハ作
收表不泄者ナリ。不泄則氣滿ガ故ニ補氣。良劑トハスル也。元氣
ハ胃ニ生メノ裏ニ根ナス諸氣ハ肺ニ滿テ外ノ衛トナル。元氣虛者ハ
人參ヲ主トス。肺氣虛者ハ黃耆ヲ主トス。東垣曰脾胃
一虛肺氣先絶ト。荷胃氣未虛ノ肺氣獨虚スルノ義ナレ故ニ參
ノ兩藥多ハ合用メ互ニ君臣ノ劑トナリ。嘉謨曰内以陽脾胃發
熱惡寒吐泄怠臥脹滿痞塞神短脉微者當以人參爲君黃耆爲臣
此元氣ヲ本トスルガ故ナリ。又白若表虚自汗亡陽瀉癰痘疹陰
瘡者當以黃耆爲君人參爲臣。此肺氣ヲ本トスルガ故ナリ。其虚
ノ本ヲ辨メ君臣ノ別ヲ致ト。神妙ナル者ナリ。東垣謂黃耆與
氣ノカヲ并テ元氣ヲ補メ。肺ヲ温養スル者ナリ。東垣謂黃耆與
人參耳草ニ味爲除燥熱肌氣之聖藥ト。人參補元氣黃耆補肺氣
炎耳草持中氣ト此ニ味ヲ用則互ニ補藥ノカヲ

使藥

茯苓
ヲ以

取方。周麻ノ氣ヲ補ノ功アルコト神妙ナル者ナリ

黃耆ノ使藥トス。陳皮白朮ト同用テ脾人ノ大腸潤ヲ通シ脾肺ヲ
補ノ功ヲ善ス。人參ト合メ能補元氣耳草ト合メ脾胃ヲ補助シ防
阻ヲ得テ能毒。黃耆ハ收表不泄者ナリ。故ニ外邪アル者勿
表ニ達ス。用。面黒形氣實瘦ノ者及右寸脉實者勿用。黃耆
ハ收氣肺ニ滿シムル者ナリ。故ニ肺氣鬱結ノ胸滿者勿用。元肥タ
ル者ハ肺氣ノ不足トス。黃耆用易。瘦タル者ハ其氣滿易。故ニ瘦人ハ
多ハ黃耆ヲ得レハ胸腹痞
滿ヲ致易シ。詳ニシテ用之。
畏惡 惡龜甲 白鮮皮
附方 兒慢驚風
脾胃不足ノ陰火肺金ヲ損木邪乘之致者ヲ治ス。炎黃耆二錢人
參一錢炙甘草五分白芍藥五分水一大盞煎半盞温服。鴻陰火補

肺氣益胃土神治ノ功アリ。東垣製保元湯。胞瘡陽氣ノ虛ヨリ所

致ノ變症ヲ治ス。前ノ辨膿條ニ詳也。氣虛ノ白濁ヲ治ス。黃耆湯

炒半兩茯苓一兩爲末。每服一錢。白湯用。出經驗良方。肺癰吐血。黃

耆二兩爲末。每服二錢。水一中盞煎。六分温服。出聖惠方。孕婦胎動

不安者。腹痛ノ陰ハニ黃汁ヲ流者。黃耆川芎各一兩。糯米一合。水

一升煎。五合服。出婦人良方。氣虛ノ小便不通。黃耆二錢。水一盞煎

一盞温服。

忽微論

愚案

黃耆ハ陰中ノ陽トシ。或純陽トスルノ兩説アリ。雖愚案スルニ東垣謂黃耆得防風其功大

下。此其達表ヲ欲メテリ。然則黃耆自其温ニ陽タリト雖其功能收

氣不泄者ナリ。其收テ不泄ハ陰屬ス。實ニ陰中ノ陽タルノ義明シ。

純陽タラハ何ゾ防風ヲ待テ達表ヲ大ニスルニ至シマ。又李士材此ヲ

酒製ニスルモ亦達表ヲ盡ニセシコトヲ欲メテリ。皆其陰中ノ陽屬メ。

其性ノ遲鈍ナルヲ制セシガ爲ナリ。或蜜水炒ニスル者ハ其性ヲ強

メ補氣ノ功ヲ大ニセシガ爲ノミ。然ニ庸醫古方ニ蜜ヲ濃ノ製スル者ハ

誤ナリ。蜜濃則チナラ直性ノ

泥滯ヲ益テ行難トトヲ致ス。

本草ニ謂綿黃耆ナリ。蘆頭ヲ去。剉用。中焦補氣ノ劑ニ合用也。

ハ水ニ少蜜ヲ滴テ蜜水トシ。黃耆ヲ三寸許ニ切テ二三割。右ノ蜜水ヲ塗

焙テ五六度ノ剉用。焦コト切レ。或剉テ後蜜ニラシ。蒸ノ焙乾

用ユ。或酒ニ浸テ灸用。則能上焦ニ行。表ニ達シ其性遲滯セ入李士

材曰。古人制黃耆多用蜜炙。愚易以酒炙。既助其達表。又行其泥滯

也。或腎ニ行コトヲ欲レ。或婦人血潮。帶下淋疾。便濁等ノ下焦ニ

治ノ藥中ニ用ハ。塩水ニ浸炒用ユ。愚案ニ黃耆能收表補衛氣上

自汗。托瘡聖藥タリ。雖其性純ニ達表。頃行レ難者ナリ。故ニ防風

...

ニ合ノ達表内花ノ功ヲ... 盛ニセント欲下雖... 八動スレバ... 深意アルカク酒ハ陽性... 止ニ... 其物ハ真ノ黄者ナリ... 峽... 者ニ非ス... 其草柔ヲ以テリ... 者ニハ真偽アリテ... 廣益本草大成卷之一終

廣益本草大成卷之二

洛下 法橋 岡本為竹一抱子

甘 草 本 原



甘平ノ補脾胃緩止氣治寒熱邪氣... 長肌肉止渴潤肺去咽痛解百毒療... 小兒胎毒驚癇除火熱通經脈通九

其草性平色黃ニ味甘... 其草性平色黃ニ味甘... 是以内傷不足ヲ補益スルノ劑中甘草ヲ兼用ス...

問寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則温本草匯曰生寒炙温東垣曰
生用則氣平補脾胃不足而大瀉心火炙之則氣温補三焦元氣而
散表寒除邪熱此諸說二從則生甘草性凉寒炙甘草性温タルカ
如シ然ヤ否ヤ曰此說アリト雖實不然夫苦ハ泄辛ハ散酸ハ收鹹
ハ斂其ハ緩此五味ノ性ナリ火熱ヤ陽ニ其氣急烈甘草ノ其
ヲ以火氣ノ急烈ヲ緩則熱火自解瀉ス此本通知相ノ火熱ヲ瀉ス
ルト異ナリ彼ハ苦寒ノ以テ直ニ火熱ヲ清瀉ス甘草ハ惟其味ヲ以
テ火急ヲ緩瀉ス宗奭等其熱火ヲ瀉スルノ功ヲ視テ或凉或寒ト云
ト雖生甘草ノ本性凉寒ノ者ニ非ス平ナルニ若其凉寒ナラハ何ノ
東垣生用則氣平補脾胃不足ト云シマ凉寒ノ者ハ脾胃ノ所惡ニシテ
補益ヲ致コトナシ炙甘草ハ微温ニシ能中焦ノ元氣ヲ補益シ元氣
不足ノ虚熱ヲ除ニ勝タリ本草匯曰性緩諸火理虚熱東垣曰其
温能除太熱ト是ナリ元氣不足ノ太熱ハ參耆甘草合用ノ其功
亦盛ナリ宗奭等謂炙則温タリト雖全温ニ非ス微温ナルノニ
惟實熱實火ノ急烈ヲ除ニ於ハ生甘草ヲ用ユ虚熱虚火ノ急烈
ヲ除ニ於ハ炙甘草ヲ用ベシ凡方劑ノ中ニ惟甘草ト稱ス者ハ
皆炙甘草也生甘草ヲ用則必生字ヲ加置生炙ノ字ヲ不加者ハ皆
炙甘草ト知ベシ蓋脾胃ハ中州ノ土トス土ハ緩ヲ欲シ其ヲコノム
甘草素ヨリ其ト雖炙者ハ其味亦佳宗奭謂生則味不佳ト故炙
甘草ノ其味ノ厚佳ヲ以能中焦ノ緩上ヲ補炙テ微温ナルヲ以テ
胃氣ヲ助ニ宜シ彼火熱ノ實ニ属者ハ生甘草ニ宜トスル所以ハ
炙テ微温ナルトキハ其温ヲ以瀉火ニ害アレコトヲ恐テナリ緩正氣
其草ノ味其ハ緩故正氣ヲ緩和スルノ功アリ凡物急則不濡緩
則充滿ス甘草ハ正氣ヲ緩ヲ以テ參耆ト合テハ能氣ヲ補地

黃芩當歸ト合ノハ能精血ヲ補治寒熱邪氣寒ハ陰邪タリ陰ハ
收斂急迫ノ氣ナリ熱ハ陽邪タリ陽ノ常性ハ緩散ナリト雖已
ニ熱火ノ盛ナルニ至テハ反テ急烈ナル者ナリ然則寒熱ノ兩邪
俱ニ急者ナリ故ニ甘草ノ甘緩ヲ以テ寒熱ニ邪ノ急ヲ緩解テ
治ス此ヲ誤テ寒熱ノ邪ヲ發散スト覺ヘカラス惟邪氣ノ急ヲ緩
ノニ東垣謂散表寒トハ外寒邪在表者ヲ發散スルニハ非ス彼三焦
ノ元氣不足ノ表寒者多ク甘草ノ甘温ヲ以テ三焦ノ元氣ヲ補カ故
ニ表陽不足ノ陰邪ノ急者ハ此ガ緩解スル所ヲ以テ散表寒ト云直
ニ發散スルニ非ズ然元發散ノ劑中ニ多ク用之ニトアリ蓋東垣曰
甘草性能緩急而又協和諸藥使之不爭ト甘草ノ性能急ヲ緩テ
和スル方故ニ金石草木寒熱上下ノ諸藥ヲ合劑メ一方ヲ製スルニ
於ハ甘草ヲ合用ノ方中ノ藥氣ヲ和調セシム是以甘草ノ一名ヲ

國老ト呼老長者ハ若輩ノ喧嘩ト論ノ間ヲモ此ハ能ナクダハアソカ
ウテ和合セシムルノ義ヲ以ナリ甄權曰調和衆藥有功故有國老
之號ト故ニ發表ノ劑中ニ用之者アテカキニ此ガ發散ノ功ナレト
雖其劑中衆藥和調ノ爲ニ用ユ且中官不緩則發表ノ劑ト雖其功ヲ
致ト不能故ニ甘草ヲ以テ中焦ヲ緩クソログルトキハ膚表開易
ノ發表ノ藥力ヲ盛ニス麻黃湯ニ甘草アル者是ナリ夫甘草ハ能緩
急熱藥ニ得之其熱性ヲ緩ス寒藥ニ用之其寒性ヲ緩ス仲景附
子理中湯ニ甘草ヲ用者ハ其速ニ上過ホリコトヲ恐ニトテ此
湯ニ甘草アルハ其速ニ下過ホリコトヲ恐ニナリ此皆用之其藥性ノ
急速ヲ緩ス麻黃湯ニ甘草アル者モ亦亦合ノ裏ヲ緩クソログ
テ發表ヲ助ケ兼テ麻黃桂枝ノ發表速ニ過則汗多ク亡陽アコ
コトヲ恐ニナリ然凡傷寒ノ病急症ニ其治モ亦急ニス彼麻黃

湯承氣湯ヲ用ニ於ハ急ニ汗シ急ニ下コトヲ欲ス故ニ中ノ甘草多ク用コト勿レ多則藥力ヲ減ノ効ヲ致ニ避シ仲景大柴胡湯ヲ製スルニ甘草ヲ不用所以ノ者ハ其表邪未除裏症亦急ナルヲ治スレバ也甘草ノ緩性ヲ用ハ大柴胡湯ノ裏症急ナルヲ治スルニ於テ藥功緩ナラシコトヲ察ノナリ然則急症急方ニ甘草ヲ用ハ減少ノ宜トス

タトヒ急症急方ニ非トイヘ凡甘草ヲ用コトハ多過コト勿レ藥力ヲ減レ不食膈滿ヲ致易シ甘草ノ其厚ナルヲ以テリ薛己云甘草宜少不宜多多則泥膈而不思飲食抑恐緩藥力而少効然此ヲ必トスルコト勿レ症ニ從ヒ方ニ從テ或減或不減ノ用ヨ大抵四君子六君子湯ノ如キ中焦補氣ノ劑中ニ甘草ヲ用ハ大ニ減少スルコト勿レ參朮陳皮等ノ補藥得甘草其功ヲ盛ニスルヲ以テリ若用之不食膈滿ヲ致ハ減セ玉不然古人ノ分量ニ從用テ宜トス今ノ時師

ハ甘草ヲ以テ方劑ノ外ノ如クニ工藥ニ用之微少ナラ其方ノ緩急症ノ虛實ヲ察スルコトナレ大槩補中ノ甘草ハ詳審ニ用ユレ矣ニ偏ニ減少スルコト勿レ一偏ニ減少スルトノ三覺者ハ方意ノ不明ト病因ノ不詳トニ因テ也錢氏肺熱ノ痰痛ヲ治スルニ炒甘草二兩桔梗一兩煎膠半斤ヲ用ユ仲景肺痿多涎傷肺冷者炙甘草四兩炮乾姜二兩ヲ用ユ此皆甘草ヲ主トシ其兩ヲ重ス今ノ世醫ノ如クハ此等ノ甘草ヲモ亦減少スヘケンマ薛己所謂義ハ醫家ノ準繩ヲ發シテ過多テラシムコト恐ノミ必トスル通例ニハ非ス長肌肉肌肉ハ脾胃ノ所主脾胃ハ甘草ヲ欲ス故ニ甘草ヲ用テ脾胃ヲ補中焦ヲ養和セシムルトキハ中氣緩ニ頃出テ能肌肉ヲ生長メ肥盛ナルコトヲ致ス然凡亦甘草ニ不宜者アリ中氣雖未虛積滯中焦ニ滯テ食飲ノ氣此ガ爲ニ支ラレ胃氣此ガ爲ニ不順ノ其肌肉ニ充コト

サ方故ニ瘦者アリ。如此ニ甘草ヲ用コト過多則甘味ナラ中焦ノ積ヲ塞テ反ニ害アリ。惟其積ヲ消シ中焦ヲ開テ胃氣食氣ヲノ順行セシムル時ハ中氣能肌肉ニ薰滿ノ肥盛ヲ致ス。若中焦不足シ中氣急道ヲ胃氣其肌肉ヲ緩滿スルコト不能ノ羸瘦スル者ハ甘草ノ主治スル所ナリ。止渴甘草ハ滋陰ノ劑ニ非トイヘ能生津止渴功アリ。蓋味ノ甘ヲ以テナリ。試之砂糖飴飴ノ類一切甘味ノ物ヲ嚼食則口中必津唾ヲ生ス然則甘草ノ甘味ナル津ヲ生スルコト明ナリ。然凡甘草直ニ津液ヲ生スルニ非ス此能津ヲ持劑タリ。凡草ハ緩トイヘ能緩中ニ亦持ノ義アリ。人一切ノ甘物ヲ食則腸ニ泥腹ニ滿者ハ此甘味ハ緩中ニ持ノ義ア也。故甘草能氣ヲ持氣水合ニ相並行者ナリ。是以甘草ヲ用テ氣ヲ持則氣ニ從テ津液モ亦會持テ止渴後中焦補益ノ劑中ニ甘草ヲ用者モ亦其持津ノ功ヲ兼取何如トレバ脾胃ハ土ト入土乾則不能生物惟緩ニ少濡アリ且泥濕ナキ處ノ土ハ能物ヲ生化ノ盛ナリ。故ニ人身脾胃土ノ氣ヲ養者モ甘草ノ甘緩ニ津ヲ持テ不乾ニ宜トス。多ハ白朮陳皮人參甘草ヲ合並テ中焦ヲ補益ス。乃四君子湯ノ品ナリ。白朮マ中氣ヲ持テ中焦所惡ノ濕泥ヲ去。陳皮マ中焦ヲ順和メ緩土ノ氣ヲ得セシム。譬銅鐵ヲ以テ土ヲ疎テ稼カ如シ人參マ日光ヲ移テ土温ニ物ヲ生スルカ如シ。然凡白朮乾濕陳皮疎之人參温養之則土乾潤ノ不能生物故ニ甘草ノ甘ヲ以テ持津不乾且其甘緩陳皮ノ順和ヲ助亦其甘味ノ持氣マ。白朮人參ノ中氣ヲ持テ助テ能脾胃不足ノ補益ナルコトヲ致ス。潤肺甘草ハ中焦ヲ補益メ且持氣持津ノ劑タリ。肺金ハ脾胃土ノ子ニシテ氣ヲ主津液ハ氣ニ從テ至故ニ甘草ヲ以テ肺金ノ母タル脾胃土ヲ補テ其

黒犬^ニ煎^テ汁^ヲ雖^モ解^ス百^種毒^ノ甘草^ヲ加入^セサレバ^ハ解毒^ノ驗^{アル}コ
トナ^レ故^ニ思^ヒ邈^ク曰^ク甘草^解百^種毒^ノ如^シ湯^沃雪^ノト^シ甘草^{解毒}ノ功^勝タル
可^レ見^ル甄^權モ謂^ク甘草^治七^十二^種乳^石毒^解一^千二^百般^草不^毒ト^シ
故^ニ常^ニ甘草^ヲ懷^中ノ不^可絶^ト若^シ食^物等^ノ毒^ニ中^{コト}フ覺^ハ灸^ト
甘草^一寸^ヲ以^テ番^テ其^汁ヲ煎^ハ即^チ毒^物ヲ吐^出ス不^吐則^チ厚^毒ニ
非^ズ吐^ノ後^灸甘草^三兩^生姜^四兩^水六^升煎^二升^ノ服^ス或^ハ大豆
甘草^等分^煎ノ甘草^湯ト名^ク解^諸毒^奇妙^{ナリ}烏^頭巴^豆ノ毒^ヲ
解^{スル}ニ甘草^亦妙^{ナリ}衛生^ノ士^ハ必^ズ甘草^數寸^ヲ帶^テ中^毒ノ急
ヲ救^{コト}ラ欲^セト葛^洪云^ク常^ニ帶^テ甘草^數寸^ヲ隨^身備^急若^シ經^含其
草^而食^物不^吐者^非毒^物也^コノ毒^物ハ與^毒等^ノ厚^毒ヲ指^ス也^輕毒
ハ不^吐ノ自^愈トス療^小兒^胎毒^驚癇^此ト亦^ハ甘草^解毒^每ヨリ所^致
ト^リ驚^癇ハ驚^風ノ名^{ナリ}小^兒初^テ生^ハ灸^{甘草}一^寸許^判碎^水煎^ス
ノ此^ヲ綿^ニ浸^テ小^兒ノ口^中ニ滴^飲レムルコト規^裁一^スクヒ程^用則^チ
胸^中ノ惡^汁ヲ吐^出メ胎^毒ヲ去^ル驚^風ヲ除^ク痘^瘡サ^ノ且^チ智^慧アリ
此^王璆^選方^ニ見^{タリ}或^ハ甘草^黃連^等分^ニ煎^メ綿^帛ニ浸^吮レムル
モ可^{ナリ}胎^毒胎^熱ヲ去^ルノ治^也本^草滙^曰小^兒初^生加^黃連^煎湯
拭^口有^益夫^胎毒^ノ症^或熱^{アリ}或^ハ寒^{アリ}ト雖^モ胎^寒ハ稀^ニ胎^熱
ノ毒^亦多^ク故^ニ甘草^黃連^湯多^クハ小^兒初^生ノ良^法タリ又^ハ小^兒驚
癇^症多^クハ胎^毒脾^胃ニ属^ス甘草^ノ解^毒補^中ノ者^ニ宜^シ除^火熱^實
火^ハ生^其草^ニ宜^シ虛^熱ハ灸^{甘草}ニ宜^シ此^義右^ニ辨^{スル}ト詳^也
甘草^直ニ火^熱ヲ清^涼スルニハ非^ス只^ハ虛^實兩^火ノ急^烈ヲ緩^テ除^キ
去^者ナリ故^丹波^漢曰^ク甘草^味其^大緩^諸火^ト緩^字ヲ以^テ予^カ辨^ヲ
可^レ知^東垣^モ謂^ク甘草^性能^緩急^下生^其草^ハ只^ハ其^其緩^ニ實^熱ト
急^烈ヲ緩^シコトヲ欲^ス灸^{甘草}ハ其^緩温^和ニシテ虛^熱ノ急^烈ヲ緩

ニトヲ欲スルナリ。謂温能除太熱ノ義タリ。或問東垣曰生用則大
瀉心火下。甘草ハ手少陰ノ藥タル歟。曰不然東垣ノ醫法ヲ察ニ
心ハ南方離火ノ本部タルヲ以テ。實火ヲ心位ニ歸メ云。生甘草ハ大
ニ實火ヲ除フ以テ瀉心火下ス。甘草ハ手少陰ノ藥ニハ非ス。虛火
ハ胃氣ノ不足ニ生ジ。衝脈ノ火下並テ中州ニ起トス。故ニ炙甘草ノ
其温能元氣不足ノ虛熱ヲ除ガ故ニ東垣謂炙之則氣温補ニ焦
元氣而散表寒除邪熱下。此邪熱ハ正氣不足ノ虛熱ヲ指ナリ。散表
寒ノ説ハ右ニ見タリ。通經脈 玉好古曰甘草入足太陰厥陰經下時
珍曰通入手足十二經下。李士曰甘草獨入脾胃李時珍以爲通入十
二經者非也。實ニ李士ノ説ヲ是ナリトス。甘草ノ味甘黄色ナル
ハ專中焦坤土ノ氣色ヲ全メ脾胃ノ本藥タルコト明ナリ好古謂
入足太陰説述之入足厥陰トハ甚非ナリ。時珍謂入十二經トハ

其氣ハ脾胃ノ劑タリ。脾胃ハ土トス。土ハ中宮ニ在テ其氣ヲ四方
四行ニ寄應スルヲ以テ通入十二經ト云乎。○通經脈トハ十二經
脈ニ通入スルニハ非ス。夫經脈ハ榮衛所行ノ道路タリ。榮衛ノ生ス
ルマ。中焦脾胃ノ氣ニ從。甘草能中焦ノ氣液ヲ養コト。右ノ辨ノ如
ナルトキハ。當衛自調和ノ經脈通行スルコトヲ得ベシ且當衛ノ中焦
ニ生スルハ其源ナリ。當衛ノ經脈ニ通行スルハ其流ナリ。源急迫ナ
レバ其流通行セス。故ニ甘草ヲ以テ中焦當衛ノ本源ヲ緩和ナ
ラシムルハ經脈當衛ノ流自通行スルニ至ル。通九竅 九竅ハ中焦ノ
水穀氣液ノ出入往來ノ道路ナリ。九竅ノ不通ハ中焦ノ緩和セザ
ルガ故ナリ。故ニ甘草ヲ以テ脾胃ノ氣ヲ緩和セシムル時ハ九竅自
通行ス。然モ茯苓。楷澤ノ通竅通水トハ不同。彼ハ直ニ淡味ヲ以テ
通利泄ス。甘草ハ直ニ竅ヲ通ズルコト不能中焦緩和ノ餘ニ通九

竅ノ功ヲ致ス此モ亦源ヲ緩和ノ其流ヲ通スルノ義ニ取者也
養陰血 甘草ノ其ハ津液ヲ持ニ因テ然リ直ニ陰血ヲ生化スル
ニ非ズ然レ當歸芍藥地黃等ノ滋陰生血ノ劑ニ合入ノハ自生
血ノ功ヲ發ス凡甘草ハ中央土德ノ氣味ヲ備コトノ全キ物ナリ
且甘草ノ外赤中黃ナルハ離火坤土ノ色ヲ兼タリ其氣薄其味
濃ナルハ陰陽浮沉ノ氣ヲ全ス故ニ甘草ハ可下可上可内可外有
和有緩有瀉有補中道ヲ盡ス諸藥ノ中ニ於テ王道土德ノ化ヲ得
者甘草ニ勝ハナレ然ニ好古ハ謂甘草升而浮陽也下李杲ハ謂陰
中陽也下ハ俱ニ不是甘草ハ居中ノ君子陰陽浮沉升降補瀉寒熱
氣血ノ道ヲ備故ニ諸藥ニ合並ノ事乖コトナキ者ナリ是以陰劑
ニ合ハ能陰血ヲ補陽劑ニ合並ハ能陽氣ヲ補并藥ニ並ハ浮降藥ニ
並ハ沉下隅ニ執滯スル者ニ非ズ故ニ諸ノ方劑ニ甘草ヲ合セサルハ

惟其緩和ノ能ヲ取テ方中ノ臣佐トスレ凡君藥ニ取者皆レ此藥ハ
諸劑ノカイレキトスルニ便者ナリ益疾ナキヲ以テリ仲景小柴胡
湯ニ柴胡黃芩ノ寒人參半夏ノ温アリテ寒温不和故ニ甘草ヲ用
テ此ヲ調和スル類ナリ甘草若陰陽浮沉升降補瀉寒熱氣血ノ間ニ
於テ惟一道ヲ得テ偏奇タラバ何ゾ調和ノ功ヲ致コトアランヤ丹溪
甘草ヲ稱ノ厚徳ノ君子トシ時珍稱ノ王道ノ化ヲ得タリトス實ニ
ルカナ**治瘡腫** 諸瘡ノ生スルヤ氣血ノ凝滯急迫ニ因者ナリ故ニ甘
草ノ其緩ヲ以テ其氣血ノ急迫ヲノ緩和ナラシムレハ愈易シ大抵
瘡腫未潰破者ハ實熱ニ屬ス生甘草ニ宜シ其已ニ潰破ノ後ハ屬虛
灸甘草ヲ用ヘレ益灸甘草ヲ以テ中焦ヲ温養シ肌肉ヲノ長ゼレ
メシコトヲ欲スルナリ**腹脹** 腹脹中滿ノ症虛實ノ二辨アリテ甘草ノ
宜與不宜ヲ存セリ夫胃ハ水穀ヲ納脾ハ水穀ヲ消化ス脾田日盛シ

ナルトキハ能水穀ヲ消化傳送ノ上下升降シ。當衛流行ノ脹滿等ノ
患ナシ。若脾胃一度虛則水穀留滯シ。升降不順。中焦不塞。遂
ニ脹滿ノ患ヲ致ス。故甘草ヲ以テ脾胃ヲ補則中宮消化升降ノ
脹滿ヲ除。此塞因塞用ノ義ニ近。若此虛症ヲ以テ妄ニ疎通順利ノ
劑ヲ用ハ脾胃彌虛脹滿彌厚。コトヲ致ス。然凡王好古曰。甘者少入中
滿中滿者勿服。甘其緩而壅氣非中滿所宜也。此甘草ノ甘々中滿
症ニハ不宜用者トス。蓋脾胃土太過中焦結實ノ脹滿ヲ云。若此中
焦實滿症ヲ治スルニ於テ甘草ノ其緩ヲ用則其味中宮ニ塞リ滿
テ。其滿脹ヲノ加甚カラレム。故ニ中滿者勿服甘草ト云。按好古ハ
謂甘草其甘中滿所宜ト。別錄ニハ謂甘草下氣除滿ト。甄權モ謂甘
草除腹脹滿ト。此三說不同者。虛實ノ不同ニ從テナリ。好古ガ說ハ中
焦脾胃ノ實滿ヲ云。別錄ト甄權トカ說ハ中焦脾胃ノ虛滿ヲ

云也。世人此辨ニ昧ノ一藥ニ中滿症ニハ絶テ甘草ヲ不宜用トス。誤
レルカナ。内經曰以甘瀉之。以甘緩之ト。彼中焦不足ノ脹滿ハ甘草ノ
甘ヲ以テ虛中ノ實邪ヲ瀉シ。虛ノ脹スル急ヲ緩テ其滿脹ヲ治
ス。何ゾ一例ニ甘草不宜トセシヤ。李士材曰。脾得補則善于健運也。
若脾土太過者。慎服則轉加脹滿。故曰脾病人毋多食甘。其能滿中
此爲土實者言也。世俗不辨。虛實每見脹滿便禁甘草。何不思之甚
耶。且世俗謂乳母ニ甘草ヲ用則乳汁ヲ閉澁セシムト。是以乳母ハ
絶ニ甘草ヲ禁者モ亦慎ナリ。蓋此モ亦虛實ノ兩辨ヲ存ス。夫乳汁
ノ閉澁スルヤ。氣血胸腹ニ鬱結シ。痰飲迫膈致者ハ實ナリ。若此ニ甘
草ヲ用則其味泥膈。腹氣痰ナヲ胸中ニ塞リ。乳閉加甚。如此者ハ
痰氣ヲ順シ胸膈ヲ開通ノ宜トス。若其脾胃虛ノ升降不順ガ故ニ
上中ニ焦ノ氣急迫ニシテ乳閉ヲ致者ハ。反テ甘草ノ甘々ヲ以テ中焦ヲ

補則升降能順。胸腹ノ氣急自緩テ乳汁ヲノ通利セシム。然則一藥
甘草ヲ以テ乳母ニ禁否者ハ豈誤ニアラスヤ。凡諸藥ノ禁忌善惡ハ
類云ヘカラス。病ニ臨時ニ從テ當用者ヲ不用不當用者ヲ用ユ故ニ醫
ハ只權ニ在テ變ニ應スルニ非ズ。治療ノ神ヲ致コト不能トス。煩滿胸
膈ノ煩滿者モ亦虛實ニ從テ甘草ノ宜不宜アリ。若上中焦ノ氣實
鬱結ニ屬者用之則其味胸膈ニ填テ鬱塞不開煩滿ナラ盛ナリ。若中
焦虛ノ上焦不行。元氣不足ノ虛火旺ノ胸中煩滿ヲ致者ハ炙甘草
ヲ以テ中焦元氣ヲ補テ宜トス。凡胸中ノ煩スルマ皆胸氣ノ急ナルニ
因。故ニ實煩ノ者モ或生甘草ヲ用テ暫其氣急ヲ緩テ可ナ
ルコトアリト雖實症者多ハ用之不宜其味其膈ニ泥易ヲ以テ也。虛
煩者ハ必用之補緩テ効ヲ致ス。若煩ノ滿スト雖上中焦ノ虛ヨリ
致者ハ甘草ニ宜シ。其滿ヲ恐コト勿レ。止痛諸痛マ皆急迫ニ生ス。故

其急迫ヲ以テ其急迫ヲ緩則諸痛乃止。東垣謂心火乘脾腹中急痛
腹皮急縮者宜倍用甘草。其性能緩急トハ是ナリ。大抵實痛ノ者ハ
生甘草ヲ用ユ。虛痛症ハ炙甘草ニ宜トス。益精 古人謂神腎不如
補脾ト。甘草ハ直ニ下焦腎精ヲ補者ニ非ト雖甘草能脾胃ヲ補
脾ヲ潤ヲ以テ益精ノ功アリトス。蓋脾胃盛則水穀能消化ノ中焦
水穀ノ精液注テ五藏ノ精ヲ養。且肺金ハ腎水ノ母ナリ。故ニ甘草ノ
脾胃ヲ補脾ヲ潤者ハ自益精ノ功ナクハアラス。然ニ李士謂甘草
下焦藥中勿用トハ何ゾヤ。此言ニ辨スル如ク甘草ノ其ハ緩ト雖緩
中ニ自持ノ義ヲ存ス。故ニ下焦ノ藥中ニ用之則藥氣ヲ中焦ニ持テ
下ニ達スルコトノ遲滯セシコトヲ恐テナリ。愚案李士說深意アリト
雖下焦藥中勿用之ト云テ。必トスル者ハ恐ハ不是古人下焦ノ藥中ニ
於テ甘草ヲ用コト多シ。惟下焦藥中ニ用之宜少減多用ト勿ト

云ハ可ナラシノ三壯筋骨筋ハ肝ノ主骨ハ腎ノ主骨雖總テ皮肉血
脈筋骨周躰ハ皆中焦脾胃ノ所養タリ脾胃虛則筋骨柔弱ナリ
中焦盛則筋骨自健ナルコトヲ致ス故ニ甘草ノ甘緩ヲ以テ中焦ヲ
補則筋骨自壯堅ナリ然レ虎骨松節等ノ筋骨ヲ壯ニスルトハ不
同彼ハ同類求テ直ニ筋骨ノ氣カヲノ壯實ナラシム甘草ノ壯筋骨
中焦補益ノ餘ニ致者ナリ補益内傷飲食不節肢勞倦ハ内傷
ノ症皆中焦ノ不足ニ属ス甘草ハ中央土ノ氣味ヲ全ク脾胃ヲ補ノ
功ニ長セリ且脾胃土ハ常ニ緩和ヲ欲メ急迫ヲ惡甘草ノ甘マ脾胃
胃ヲノ緩和ノ土徳ヲ得セシメテ急迫ヲ除故ニ諸内傷補益ノ劑
中ニ必用之補脾胃或問大抵其ハ上行ノ發ス然レ別錄云甘草
下氣トハ何ノヤ曰甘草ハ居中ノ道ヲ盡メ升降浮沉ノ功アリト雖
其能中焦ヲ緩和ス中焦緩和ナルトキハ上焦通メ其氣下行ス

別錄ニ所謂モ其理ナキニ非ス然レ此中焦虛急ニテ上氣ノ不下并
ヲノ甘草ニレヲ下ナレム彼逆氣胸中ニ上實メ不下者ノ如キ其用之
下ト欲セハ反テ其味隔ニ
開テ上氣ナラ不可下ナリ
總藥 甘草ノ主治數品アリト雖其
者ナリ緩ハ緩急ノ義建中湯ニ甘草アルハ脾ノ急ヲ緩テ中焦ヲ
補ガ爲ナリ鳳髓丹ニ甘草アルハ腎ノ急ヲ緩テ下元ヲ生センガ爲
ナリ其外寒藥ニ合メハ其寒ヲ緩シ熱藥ニ合メハ其熱ヲ緩シ上藥
ニ合メハ其上ヲ緩シ下藥ニ合メハ其下ヲ緩スルノ類緩ヨリ所致奉
テ數ヘカラス和ハ和合調和ノ義ナリ寒熱草石相雜ニ於テ甘草ヲ
用則能此ヲ和調シ或相畏相反ノ劑ヲモ能和合シ争シメス故ニ古
方多ハ甘草ヲ入用テ劑中ノ群品ヲ和合セシム惟甘草ノ主治スル
所ハ緩和ノ兩道ヨリ致者ナリ其所入中焦脾胃ノ部ニヨリ他ハ

皆此カ枝葉ニ属ス。蓋甘草ノ緩和スルヤ。中焦ニ入マ。只其味ヨリ致之。生甘草ノ瀉シ。炙甘草ノ補モ。亦味ノ其ニ因テ致之者ナリ。

使藥

木苦參。乾漆ヲ使トス。人參白朮ト合ノ善。脾胃ヲ補。陳皮ト合ノ中官ヲ順和ス。桔梗ト合ノ善。咽喉痛癢ヲ治ス。黑豆ト合煎

ノ能。百毒ヲ解ク。

毒

甘草ハ緩急故ニ一切急症ニ臨テ汗下尅伐ヲ急ニヒント欲セバ勿用之。○中焦ノ實

ニ属スル脹滿者勿用之。其其味中焦ヲ塞テ加滿悶ス。○嘔吐不食痞滿ノ者妄ニ勿用之。動スレハ其味中胸泥膈害ヲ致ス。○酒病ハ濕熱中焦ニ閉。胸膈滿ノ多ハ嘔吐惡心等ヲ致ス。

畏惡

只辛散ヲ欲ノ其味ヲ不喜故ニ酒病ハ甘草ヲ用テ勿。其草惡遠志反大戟。芫花。其遂海藻。○忌豬肉。○東垣結核ヲ治スル消腫潰堅湯ニ甘草海藻ヲ用テ丹溪治勞瘵蓮心飲ニ甘草芫

花ヲ用テ此皆相反ノ物ヲ合劑ノ効アル者ハ何ゾマ。蓋病深ノ甚者ハ其相反ノ相爭ノ勢ニ乘テ病根ヲ拔去ント欲ス。以毒法。其義ナリ。如此ノ法ハ達神明醫ニ非ハ敢テ所不致也。故弘景曰古方亦有相惡相反並乃未爲害。非妙達精微者不能知此理ト。○予常ニ時師ノ古方ヲ施者ヲ視ニ甘草ノ大戟芫花其遂海藻ト反スルコトヲ知テ。多ハ惡遠志ノ義ニ昧ノ古方カノ甘草アル劑中ニ於テ。其遠志ヲ合用ノ施者不少。此本草ニ不詳ノ過也。

附方 子ノ如ク。漸六ニ赤腫桃李ノ如ク。成膿即破テ難愈懸癰ト名ク。大甘草五錢。酒ニ煎テ服ス。出癰疽方。諸毒ヲ治スル甘草黑豆湯。甘草黑豆等分。合煎テ用テ諸藥毒。一切魚鳥等ノ食毒ヲ治ス。出千金方。○飲食ノ後中毒。腦亂レ何ノ毒タルコトヲ不覺ノ急ナル者。甘草薺芫ノ煎湯ヲ用テ死スレハ入口便

活出金匱玉函方 傷寒咽痛ヲ治ス甘草湯 蜜炙甘草二兩 水二升 煮一升半 服之 出傷寒論 痰熱在肺 喉痛者 炒甘草二兩 桔梗一兩 芍藥一兩 每服一匙 五錢 水一鍾半 阿膠半片 入煎服 入出小兒直訣 小兒初生 便閉ノ不通者 甘草枳殼煨ノ各一錢 水半盞 煎服之 出全幼心鑑 小兒初生 臍帶ノ落口ヨリ 風寒ヲ受テ 卒ニ口噤テ 撮ミタル方如ク 臍風撮口トス 小兒ノ口中ニ 錐ニ必小泡子アリ 于身冷 帝テ不飲乳 温湯ニ帛ヲ浸シ 指ニ卷テ 輕入ニ口中 小泡子ヲ搦ツラレ 次ニ生甘草二錢半 水一盞 煎六分 温服スレバ 痰涎ヲ吐ス 次ニ乳汁ヲ口中ニ含スレバ 愈 出金匱玉函 小兒尿不覺タル者 大甘草ノ蘆頭煎湯ニ 毎夜服入 出得效方 小兒羸瘦者 炙甘草三兩 未トノ蜜ヲ以テ 緑豆ノ大ニ丸シ 温湯ニテ服入 出金匱玉函 小兒尿血多下ス 甘草一兩 二錢 水六合 煎二合 一日ニ服入 出至寶方 舌腫塞急 三不飲乳 人甘草ヲ煎 煎シ 熱テ 漱テ 頻ニ吐出 聖濟總錄 陰囊生瘡者 蜜炙甘草ノ末 頻ニ塗テ 愈尤妙也 出千金方 陰囊後陰濕癢者 甘草ノ煎湯ニテ 洗之 日ニ洗コト三五度 出古今錄驗 凍瘡發裂者 甘草煎湯ニテ 洗之 次ニ黃連 黃柏 黃芩ノ末ニ 少許粉ヲ加 胡椒油ニ調テ 塗テ 談楚翁方 湯火瘡 甘草蜜ニテ 煎テ 塗テ 李樓奇方

愚案

甘草ハ惟中焦補土ノ聖劑 諸急ヲ緩和スルノ良藥ナリ。今ノ世醫甘草ヲ以方劑ノ飾ノ如クシテ 此が主功ノ秀タルヲ不知 深氣性ノ所行ヲ不究 漫爾トシ 少用之耳。ニノ分量加減ノ論ニ及者ナシ。恨カテ 假令四君子六君子湯ノ如キ 其四六ノ品味皆居中ノ道ヲ窮故ニ 稱ノ君子トス 其中甘草尤君子ノ徳ヲ全ス 然則四六君子ノ類ハ 專方中ノ眼 甘草ニ在ノミ。然レ時節惟參 示ニ意ヲ留メ 症ヲ察シ 時ヲ考テ 此が分量ヲ加減スルコトアリト 雖甘草ニ於ハ 意ヲ

留テ加減ヲ考者アルコト一々。一例ニ於テ許ラビシノ四六ノ藥數ニ合ス
ルニ此實ニ不_レ思_レ甚ナリ。凡古入ノ方ヲ製スル何ノ藥カ意義ノ
輕物アラシ。一方ノ諸藥盡深意存スルコトアリテ。病ニ從ヒ時ニ從
テ一人其氣味性功ヲ察シ。盡ハ分兩ヲ加減スヘシ。豈甘草ヲ以テ一
縣ニ減少ノ用ガ理ナラシマ。大抵中焦補益ノ劑ハ甘草甚減少ス
ルコト勿_レレ。甘草補土ノ功盛ナレバナリ。急症ニ臨テ急ニ汗_レ急ニ下_レ
急ニ攻伐スルニ於テハ甘草ヲ減少
セヨ。甘草藥カラ緩ノ功盛ナレバ也

修治

甘草ハ太_ニ皮薄ク色
黃ニ堅實ナルヲ粉草
ト名ク。甘草ノ極上ナリ。藥ニ入テ功力強シ。細_ク堅實ナルハ中_品。輕
虛ニ_ノ或蛙_或朽色_或黒色_ニ皮厚_或皮麁_物ハ下_品ナリ。
皆功用甚惡_レ不入_レ藥。凡甘草ヲ使_ニハ大粉草ヲ擇_テ麁皮ヲ去_リ
蘆頭ト尾サキトヲ切_捨テ對灸用_ニ或生_ヲ用_ユ方ニ依_ヒ。甘草ノ

蘆頭尾サキハ入_ラソ_ノ吐逆_セレム。必去_用ヘシ。雲_日。凡使_須去_頭
尾_尖。其頭尾吐_入ト。今ノ醫家人多_ク蘆頭致_吐コトヲ知_テ去_レ
之_也。甘草ノ頭尾致_吐ノ義ヲ忘_テ多_クハ恐_去コトナレ_○和_ノ藥店_ニ
堅_鞭中_鞭切_込ニ亦_各上_中下_品アリ。良_香樣_ト呼_ハ良_香ニ似_テ
細_小ナリ。最_下品_{ナリ}。良_香樣_ノ太_細ヲ藁_{甘草}トス。極_下品_{ナリ}
俱_ニ不足_用。今_今駿州富士山_ニ此_草アリト。或_甲斐州_ノ諸山_ニ皆
此_草アリト。延_喜式_ニハ常_陸陸_奧出_羽。三_箇國_{ヨリ}甘草ヲ獻_スル_ク
目_{アリ}。今_今モ有_マ無_ヤ未_知之_也

甘草稍

甘草ノ稍_ノ細_處ヲ云也。○甘草稍生_ニテ用_レハ胸_中ノ
積_熱ヲ除_陰莖_中ノ痛_ヲ去_也。元_素曰_加酒_煮玄_胡索_苦棟_子充_妙
○龔_庭賢_曰稍_去尿管_澁痛_子除_胸熱_下尿管_ハ陰_莖也_子ト_ハ甘草

岐出タル小枝ナリ

甘草頭

生ニテ用レハ脾胃ニ經ノ瘀血ヲ行レ消腫瘡毒ヲ導癰

白木



本草綱目 白木 補中益氣除濕治風寒濕痺止汗除熱消食去痰逐水腫利腰臍間血温中進食療脹滿利水安胎止霍亂吐下治反胃躄重心下急滿臍腹痛長肌

肉補内傷△此草根枝葉ノ形木字ニ似テ其色白レ故ニ白木ト号
上古ニハ蒼白木ノ別ナレ宋ヨリ以來始テ白木蒼木別テ用來レリ
古方ニ所使ノ木ハ二木ヲ通用セリ或聞古方ノ木ハ皆白木ナリト
時珍云古方ニ木通用ナリ頌云古方所用木者皆白木也ト蓋古人
ハ只木トシニ云テニ木ヲ通用ス陶隱居以來始蒼白ヲ別用ニ從

陳皮青皮ノ例也補中益氣除濕好古曰白木入手太陰少陰足太
陰陽明少陰厥陰六經ト愚案ニ木ハ中焦脾胃ノ聖藥足太陰足
陽明ノ劑タリ李士曰白木得中宮冲和之氣故補脾胃之藥更無
出其右者ト白木ハ全甘温ニ非ス微甘微苦ノ微温ナリ能中焦ヲ
補ヒ元氣ノ益濕ヲ除蓋補中益氣ハ氣味ノ甘温ヲ以テナリ其土
ノ味温ハ寒熱ノ中氣ニ中焦ノ所欲ナリ除濕ノ功アル者ハ氣
味ノ苦温ナルガ故ナリ内經ニ謂以耳緩之以苦燥之ノ義タリ
然正補中益氣除濕ノ功中ニ於テ脾胃ヲ補ノ力勝リ其益氣除
濕ノ功ハ合用ノ劑ヲ以テ其力ヲ盛ニス人參黃耆ト合メ能元氣
ヲ益茯苓ト合メ能除濕凡脾胃ハ中州ノ土タリ土ノ化ハ濕タリト
雖潤濕ハ土ノ本化萬物ヲ生養ス泥濕ハ土所惡ノ濕ニ土中ニ泥
濕在則物ヲ生化スルコト不能故ニ人ノ脾胃土モ亦少津液潤則能

管衛五藏ヲ生化ス。此中焦所欲ノ濕也。若脾胃土或不足。或太過。陰濕中焦盛ナレバ。胃氣コレガ爲ニ阻ラレテ。管衛五藏ヲ生化スルコト不能。此中焦所惡ノ濕也。白朮其濕ヲ除。故ニ中焦補益ノ功ヲ致テ。補土ノ劑中必コレヲ不用。ト云コトナレ。然レ白朮動スレバ。中氣ヲ塞易シ。故ニ少ク陳皮ヲ加用シ。能中焦ヲ補和。何如トナレハ。凡補者ハ必閉塞ノ意アリ。蓋閉則不散。塞則不泄。不散不泄。則能充滿スルニ至ル。是以閉塞ノ意アルニ非ハ。何ニ從カ補益ノ功アラシヤ。故ニ白朮ハ能脾胃ヲ補益スルノ物ナレハ。中焦ニ閉塞レ易コト明ナリ。陳皮ハ苦辛ニシテ。中焦順和ノ劑タリ。白朮補土ノ中ニ陳皮ノ苦辛ヲ兼テ順和則補ハレ閉塞メス。滿レバ不滯。補益順和ノ兩道ヲ兼テ補中ノ功盛ナリ。故ニ古方多ハ白朮陳皮ヲ並用者是ナリ。然レ陳皮ハ白朮ノ五分ヲ用ヨ。陳皮ノ苦辛順和ヲ用コト過則反テ白朮補中ノ力ヲ薄ス。若中焦ノ虛甚者ハ。陳皮ノ順和反テ白朮ノ補ニ害アリ。故ニ中焦甚ハ單ニ白朮ノミヲ用ヨ。白朮ハ中焦ヲ補テ微閉ノ義アリ。陳皮ハ中焦ヲ順シ微疎ノ義アリ。其閉與疎ノ意ヲ得則白朮陳皮合用ノ理ニ達スルコトアツト云。或問元素謂非白朮不能去濕ト。然則白朮除濕ノ功驗ナル者也。吾子謂補中ノ力勝テ益氣除濕ハ合用ノ劑ニシテ其力ヲ盛ニスルハ恐ハ元素所謂ノ説ト反スルニ非ヤ。曰不反。白朮實ニ除濕ノ力勝ト雖然。濕ニ天人ノニ辨アリ。曰天造濕。曰人爲濕也。天造濕ハ雨露水川等ヨリ所受ノ者ナリ。人爲濕ハ多ハ飲食ヨリ受テ。故ニ天造濕ハ皮肉ヨリ始ル。人爲濕ハ中焦ヨリ生ス。元素謂非白朮不能去濕トハ中焦脾胃生スル人爲ノ濕ヲ主トシ云。予所謂人爲濕者。除濕之功盛也。ハ一切ノ濕ニ通用スルノ功ヲ云フニ。且濕ニ寒濕濕熱アリ。白朮能中焦ノ寒

濕ヲ除ノ要藥タリ。或中焦不足ノ濕熱ヲ除ト雖其功寒濕ヲ除
ニ次者ナリ。夫白朮ノ主功本根ヲ厚則味甘ヤ中焦ヲ補ヒ中氣ヲ
持苦ヤ中焦ノ濕ヲ除テ補土除濕ノ兩功勝項ナキカ如トイハレ
補土ノ力盛ニテ除濕ノ力次之者ナリ。今ノ時師ハ譜ヲ久白朮ノ主功
ハ惟除濕其脾胃ヲ補ノ功モ亦除濕ヨリ致トスル者ハ真説非ス
治風寒濕痺痺ハ後世ニ謂白虎歷節痛風也其症風寒濕ノ三邪
交合ノ宮衛ヲ閉澁スルニ因テナリ。其中風勝者ヲ風痺トシ寒勝
者ヲ寒痺トシ濕勝者ヲ濕痺トス。脾胃盛則宮衛ノ運行モ亦盛ニ
メタトヒ風寒濕ノ三邪襲コトアリト云レ閉澁留滯ヒレメテ諸痛
ヲ致ニ不及若脾胃虛則宮衛ノ運行モ亦不順ニメ彼三邪乘虛閉
澁留滯ヒレメテ遂ニ諸痛ノ症ヲ致ス。故ニ白朮ヲ以テ脾胃ヲ補澁
寒濕ヲ除則諸痺自安シ。白朮能除濕則尤凡濕痺ヲ療スル功盛
ナリトス。止汗一切ノ汗ヲ止ニハ非ス。彼中焦虛熱ノ且濕氣脾胃
ノ間ニ在者濕熱肌肉ニ熏ノ自汗スルコトアリ。白朮ヲ以テ中焦ヲ補
ヒ濕ヲ除則虛ニ生スルノ濕熱自去テ汗出ノ患ナレ。黃耆ヲ止汗ハ直ニ
閉表也。白朮ノ止汗ハ中焦不足ノ濕熱ヲ去ハナリ。除熱中焦脾胃本
足ノ虛熱ヲ除ク。諸熱ヲ除ノ劑ニハ非ス。前ノ參耆ノ除熱ト同。東
垣謂陰火乘脾胃ノ熱ナリ。脾胃不足スレバ元氣不足ス。元氣不足
則虛熱從テ生ス。此熱ヤ涼寒ノ劑ヲ以テ直ニ清解スレバ寒劑其元
氣ヲ斃テ虚熱ナラ職ナリ。惟白朮參耆ノ藥ヲ以テ脾胃ヲ補ヒ
元氣ヲ益則熱火自退トテ得テ前ノ人參ノ條ニ詳ナリ。消食消
食ノ義兩辨アリ。直ニ消食物アリ。直ニ壅滯消食脾胃ヲ補リテ消
食者アリ。神麴麥芽等ノ宿食ヲ消化スルハ直ニ其宿滯ノ食ヲ消者
也。白朮ノ消食ハ不然中焦不足ノ食飲ヲ消化スルコト不能故テ食滯

ナリトス。止汗一切ノ汗ヲ止ニハ非ス。彼中焦虛熱ノ且濕氣脾胃
ノ間ニ在者濕熱肌肉ニ熏ノ自汗スルコトアリ。白朮ヲ以テ中焦ヲ補
ヒ濕ヲ除則虛ニ生スルノ濕熱自去テ汗出ノ患ナレ。黃耆ヲ止汗ハ直ニ
閉表也。白朮ノ止汗ハ中焦不足ノ濕熱ヲ去ハナリ。除熱中焦脾胃本
足ノ虛熱ヲ除ク。諸熱ヲ除ノ劑ニハ非ス。前ノ參耆ノ除熱ト同。東
垣謂陰火乘脾胃ノ熱ナリ。脾胃不足スレバ元氣不足ス。元氣不足
則虛熱從テ生ス。此熱ヤ涼寒ノ劑ヲ以テ直ニ清解スレバ寒劑其元
氣ヲ斃テ虚熱ナラ職ナリ。惟白朮參耆ノ藥ヲ以テ脾胃ヲ補ヒ
元氣ヲ益則熱火自退トテ得テ前ノ人參ノ條ニ詳ナリ。消食消
食ノ義兩辨アリ。直ニ消食物アリ。直ニ壅滯消食脾胃ヲ補リテ消
食者アリ。神麴麥芽等ノ宿食ヲ消化スルハ直ニ其宿滯ノ食ヲ消者
也。白朮ノ消食ハ不然中焦不足ノ食飲ヲ消化スルコト不能故テ食滯

ヲ致者アリ。如此ハアナガチニ食飲ヲ太過セルニアラガレ也。常ノ飲食中
 焦ニ宿滯シ。或ハ微食飲ノ常道ヲ過ハ即宿食ト成テ病ヲ致ス。此ニ
 神麴麥芽等ノ直ニ宿食消化ノ劑ヲ用則反ナラ中焦ヲ損傷ス。故
 白朮ヲ以テ惟其脾胃ヲ補テ中氣健ナルトキハ食飲自退退ル者
 ナリ。然則白朮ハ直ニ消食ノ劑ニ非ズ。惟其脾胃ノ虛ヲ補テ自食滯ヲ
 消化セルム。消食ハ補中ノ餘力ナリ。故ニ飲食過飽ノ宿食中宮ニ盛ニ
 中氣未傷者ハ白朮ヲ勿用。反テ食滯ヲ取テ滿悶ヲ加ス。麴麥等類ヲ
 以テ直ニ消化スヘシ。若或中焦不足ノ宿食ト雖。食滯盛ニ。痞滿スル
 者ハ白朮ニ少枳實ヲ合用シ。白朮ヲ以テ脾胃ヲ補ヒ枳實ヲ以テ宿
 食痞滿ヲ消シ宜トス。元氣カ枳實丸是ナリ。乃各テ虛中ノ實証トス。
 白朮ハ暖中燥濕ノ劑ナリ。暖則食消シ燥則飲消スト雖。直ニ消食ノ
 劑ニ非ス。蓋白朮ハ補中ノ力盛ニ。且閉塞ノ意アルトキハ動スレバ食
 飲ノ邪ヲ補任レ易シ。惟補中ノ餘ニ消食ノ功アリト覺則過コトアル
 コトナレ。去痰痰。其津液本ト根也。行テ順ナレバ津液也。若此ヲ滯留ス
 ルトキハ痰飲ト成。其行ト滯ト俱中焦脾胃ノ致ス所ナリ。中氣健ニ
 轉則升降氣道能順行ノ津液流通ス。何ノ痰ト云コトカラシ。若脾胃
 不足ノ中焦不運トキハ。升降氣道順行セズ。津液留滯レ。遂ニ痰飲
 ト成コトヲ致ス。且痰ハ津液ノ留滯タルトキハ即濕化ニ屬者ナリ。故ニ
 白朮ヲ以テ脾胃ヲ補テ中焦ヲ健ニ轉レメ。又能濕氣ヲ除則痰
 自退去ス。然レ濕痰燥痰涼痰熱痰ノ不同アリテ。白朮ハ諸痰ノ通
 劑トハ決レ難シ。惟濕痰涼痰中焦不足ノ虛痰ヲ主治者ナリ。陳皮
 ト合テ除痰ノ功ヲ盛ニシ。半夏ト合テ能濕痰ヲ燥スニ至ル。逐水腫
 水濕ヲ逐去テ水腫ヲ治ス。蓋水腫ノ本ハ腎ニ屬ル。脾胃ハ土ニシテ水ヲ
 剋勝者也。脾胃土健固ナレバ水氣溢コトナク。脾胃氣盛テレバ皮與肉

飲ノ邪ヲ補任レ易シ。惟補中ノ餘ニ消食ノ功アリト覺則過コトアル
 コトナレ。去痰痰。其津液本ト根也。行テ順ナレバ津液也。若此ヲ滯留ス
 ルトキハ痰飲ト成。其行ト滯ト俱中焦脾胃ノ致ス所ナリ。中氣健ニ
 轉則升降氣道能順行ノ津液流通ス。何ノ痰ト云コトカラシ。若脾胃
 不足ノ中焦不運トキハ。升降氣道順行セズ。津液留滯レ。遂ニ痰飲
 ト成コトヲ致ス。且痰ハ津液ノ留滯タルトキハ即濕化ニ屬者ナリ。故ニ
 白朮ヲ以テ脾胃ヲ補テ中焦ヲ健ニ轉レメ。又能濕氣ヲ除則痰
 自退去ス。然レ濕痰燥痰涼痰熱痰ノ不同アリテ。白朮ハ諸痰ノ通
 劑トハ決レ難シ。惟濕痰涼痰中焦不足ノ虛痰ヲ主治者ナリ。陳皮
 ト合テ除痰ノ功ヲ盛ニシ。半夏ト合テ能濕痰ヲ燥スニ至ル。逐水腫
 水濕ヲ逐去テ水腫ヲ治ス。蓋水腫ノ本ハ腎ニ屬ル。脾胃ハ土ニシテ水ヲ
 剋勝者也。脾胃土健固ナレバ水氣溢コトナク。脾胃氣盛テレバ皮與肉

若著テ水ヲ分肉ニ注シムルコトナレ。若脾胃不足則水濕ノ邪侮溢
テ中宮ニ乘レ。分肉ニ注テ水腫ノ病ヲ致ス。彼地中流行ノ水マ堤土
弱則水溢テ堤外ニ注ガ如シ。脾胃土ハ防水ノ堤ナリ。此ガ虚ナルニ從
テ邪水溢テ水腫ト成。白木ヲ以テ脾胃土不足ヲ補益シ。中焦ノ
客濕ヲ除則水氣自土氣ノ堅固ナルニ逐レ防ガレテ腫病消退ス。逐
トハ土尅水ノ意ニ似タリ。直ニ利水ノ劑ト覺ヘカラス。治水腫モ亦
補中除濕ノ餘力也。然凡水腫症ニ虛實ノ兩辨アリ。中焦脾胃土ノ
鬱結太過ニ因テ水液ヲ防止テ水腫ヲ致者アリ。彼堤坊ニ安リニ防
止テ水流反テ溢ガ如シ。如此者悞テ白木補土ノ藥ヲ施則水ナ
ラ溢滿コトヲ致ス。惟平胃利水猪苓澤瀉等ノ劑ヲ用テ中焦ノ太
壅ヲ平治シ直ニ其水ヲ通利ノ愈コトヲ致ス。若或中焦不足ノ水腫
ト雖邪水ノ溢滿盛ニシテ白木ノ補土除濕ノ力ニ不及者ハ導水ノ劑

ヲ兼モ亦權道ナリ。世ニ仲景五苓散ニ白木ヲ用テ利水ヲ見テ謂
白木ハ直ニ通水ノ藥トハ謬説ナリ。凡土能水ヲ尅スト雖亦土ニ
非ハ水行コト不能。故ニ水土ニ辨ノ説アリ。是以仲景五苓散ニ白
木ヲ用ユ。蓋脾胃ヲ補ヒ濕ヲ除テ土堅固則水能流通スルノ義ニ
從直ニ利水ノ劑ト用ルニ非ズ。利水ノ劑ノ佐ナリ **利腰臍間血** 夫
心ハ生血肝ハ納血脾ハ一身ノ血ヲ總統者也。腰臍ノ間ハ血液所行所
際ノ分野也。故ニ白木ヲ以テ脾胃ヲ補養ノ中氣健則血液ヨク流
行ノ瘀血ノ滯留スルコトナレ。是以白木ハ腰臍間ノ瘀血ヲ利スル功ヲ
發ス。此モ亦補中ノ餘力也。本草准曰。脾胃統一身之血而腰臍乃其
分野也。藉其養正之力而瘀血不敢稽留ト。養正ハ中焦ノ正氣ヲ養
ノ義ナリ **温中** 温ハ温養ノ義ナリ。桂附等ノ如ニ直ニ温熱セシムルノ
劑ニ非ズ。右ニ辨スルカ如ク。白木性温トスルノ説アリト雖詳ニ此ガ性

功ヲ察スレバ全温者ニハ非ズ。微温ナル者ナリ。夫温藥ハ直ニ寒涼ヲ
ノ温ナラシム。微温者ハ直ニ温ナラシムト云、ニハ不至。然レハ久クニ用ユト
ヲ積テハ自温ナラシムルニモ至ルベシ。故ニ速ニ中焦ヲ温ユトヲ欲ス
ルニ於テハ白朮ノ所不能也。脾胃不足ノ微寒者ハ白朮ヲ用ニ中焦ヲ
補益スルコト久則其微温ヲ積テ漸ニ温中ノカラテ發ス。若ク中焦
虛ノ寒太者急ニ温補センコトヲ欲セバ。姜桂ノ類ヲ合用ノ可ナリ
トス。且世ニ謂白朮ハ燥劑タリト。此モ亦謬ナリ。蓋白朮ノ性温ニシテ
除濕ノ功アルヲ以テナリ。然レハ白朮微温ニシテ全温ナラス。除濕ノ功アリト
雖アチガチ強テ燥劑トスルノ燥ニ不至。故ニ本草家ノ諸説ニ謂白
朮除濕ト。別録云益津液ト。元素曰生津止渴ト。白朮ハ本燥劑ナ
ラガレテ以テ除濕ト云テ燥トイワス。若ク其燥タラバ何ソ生津止渴
ノ功アリシヤ。世ニ白朮ヲ以テ燥劑トスル者ハ本草滙ヨリ始メ之滙ノ

書善コト多ト雖亦或不詳ノ義ヲ著ス。孟子ニ謂盡信書則不如無
書ノ意知ヘシ。或問吾子謂白朮惟除濕ヲ燥ニ非スト。別録元素ノ
謂生津止渴ヲ以テ證トスルトキハ白朮ヲ以テ潤劑トスルカ。曰白
朮ハ不燥不潤惟除濕ノ劑トスベシ。然レハ除中ニ自微燥ノ意ヲ存ス
ト雖強テ燥劑トスル程ノ燥ニ非ズ。故ニ半夏ト合フ能。濕痰ヲ燥ニ
至ル。或四君子湯ニ於テハ人参ノ温茯苓ノ淡ニ合フハ燥濕ノカアリ。
故ニ甘草ノ長津ヲ加テ燥ヲ防此皆合用ノ劑ニ從テ燥濕トナル
コトアリト雖。草ニ白朮ノミヲ以テ燥劑トスル程ノ燥アルコトナレ。又生
津止渴ト云ト雖。白朮直ニ津液ヲ生スル潤劑ニモ非ズ。中焦ハ津液
氣血ノ家タリ。白朮ヲ以テ脾胃ノ氣ヲ補則氣液ヨク周流シ津液
テ止且濕ハ此停滯ノ氣ナリ。中焦ニ濕アル時ハ氣液其濕滯ニ
留レテ亦周流スルコト不能。遂ニ渴ヲ致ニ至ル。白朮中焦ノ濕ヲ

除則氣液流行ノ渴ヲ潤ス。故生津止渴ノ功ヲ云。李士云元素謂其生津止渴者濕去而氣得周流而津液生矣。此說實三可也。滙云白木性本燥本草言其生津者蓋脾惡濕濕勝則氣不得旋化津何由生故膀胱津液之府氣化則出今用木以燥之則氣得周流津液亦隨氣化而出矣。此說亦是ナリ。雖多燥字ヲ以辨者恐入理ニ於之不令入。白木潤劑ナラシク中氣ヲ補益スルヲ以テ故三氣津流化ノ力ヲ致ス。茯苓ハ淡滲利水ノ劑ニ燥藥ニ近ク雖本草家ニ多ハ謂茯苓能生津液。亦コノ意ナリ。進食脾胃虛ノ不食者中焦虛ノ濕氣胃ニ旺ノ不食者皆白木ヲ以テ補中除濕則安シ或中焦實ノ不食ハ及テ白木害ヲ致ス然レ白木ハ微閉ノ義アルヲ以テ進食ヲ欲者其陳皮ヲ加用ノ可ナリ。此白木ノ補益上陳皮ノ順和ノ相兼ニ能進食ノ功ヲ致ス。療脹滿脹滿ノ症實虛ノ兩辨アリ。實滿者ハ絶ン白木ヲ用コト勿レ。惟中焦虛ノ升降不順濕痰其間ニ在テ脹滿ヲ致者ハ白木ノ善主治スル所ナリ。予常ニ脹滿ノ者ヲ視ニ實脹ハ少ノ虛脹症尤多シ其實脹者ト雖中氣ノ疲ヲ不兼ハチシ荷中氣全健ニシ何ノ脹滿ト云コトカアラシ。故ニ脹家白木ヲ恐ル者希ナリトス。利水前ニ辨スル如ク白木ハ直ニ小便通利ノ劑ニ非ト雖水士ハ一躰氣水ハ合ニテ土堅固ナレバ水能流氣健ナレバ水能通ス。故ニ白木ヲ以テ補中除濕益氣則脾胃土堅固ニ氣行健ニ小便水能通利スルナリ。此モ亦脾胃ヲ補ヒ除濕ノ餘力ナリ。直ニ通水ノ劑ト覺ベカラス右ノ逐水ノ條ト參考スヘシ。安胎李士本草通玄曰安胎者除胃中熱也。愚察ニ此說不是白木除胃中熱者ハ一切ノ胃熱ヲ除ニ非ス。胃中ノ虛熱ヲ除也。然則此通例ノ義ヲラス。余竊ニ考ニ兒ノ母腹ニ在テ母ノ中焦水穀ノ氣液其胞衣臍帶

和語本草 卷之二

ニ注テ此ヲ育母ノ宮衛外ニ行テ胎ヲ養フ。宮衛モ中焦水穀ノ精
脾ノ氣也。故ニ母ノ中焦不足則水穀ノ氣液宮衛ノ行皆不得和
其胎ノ育養不得常遂ニ胎動ノ不安也。譬之土不堅則木根不治ノ
動搖スルニ似タリ。故ニ白朮ヲ以テ中焦ヲ補則水穀ノ精氣宮衛
ノ行盛ニシテ能養胎。胎養治則何ノ動ト云コトアラン。或中焦不足ノ
生濕濕下焦ニ流テ胎動ヲ致者モ白朮ノ補中除濕ニ宜キ者也。
止霍亂吐下。霍亂ハ病名。吐下ハ病症ナリ。上吐下瀉シ吐瀉同時
ニ病ヲ名テ霍亂ト云。夫脾胃土ハ中州ニ位ノ上下升降ノ間ニ居
者也。故ニ中州病則下氣不升ノ瀉シ。上氣不降ノ吐ス。是以霍亂吐
瀉ス。白朮ヲ以テ脾胃土ヲ補テ中氣健テレハ升降能通ノ濁陰ハ
下降シ清陽ハ上升ス。濁氣降則吐止。清氣升則瀉止。故ニ吐瀉者ハ
白朮ヲ缺ヘカラス。若或食飲中焦ニ塞テ吐瀉者ハ消食ノ劑ト相

兼テ用之。治反胃。反胃ハ食不消ノ即吐ス。此專脾胃ノ虛寒ニ因
ノ。故ニ白朮補中暖胃ノ劑ニ宜シ。脾重脾胃不足ニ生ス。蓋脾胃ハ
手足肌肉ヲ主者也。故ニ脾胃虛則手足倦怠シ肉氣不行且脾濕
肌肉ニ注テ形骸重コトヲ致ス。白朮ノ補脾胃除濕ニ宜キコト明シ
心下急滿。中氣不健ノ濕容中焦ハ濁痰填膈心下急迫痞滿ス。白
朮ヲ以テ中氣ヲ健ニシ。濕ヲ除則濁痰自去テ急滿去然。凡或中焦
ノ實滯或氣分ノ鬱實ニ因テ心下急滿者ハ白朮ノ主治スル所ニ
非ズ。脾腹痛。脾腹ハ中焦ノ分野ナリ。若中焦ノ不足ニ因テ痛者
ハ宜用白朮。胃ノ實滯ニシテ痛者ハ不宜用之。長肌肉。肉ハ脾ノ主
ル所也。故ニ脾胃虛則其氣ヲ肉ニ滿シムルコト不能ノ羸瘦ス。然則
白朮補中ノ劑ヲ以テ豈肌肉ヲ長セザランヤ。補內傷。飲食勞倦ハ
內傷ノ病。皆脾胃ノ不足ニ因。故ニ白朮人參耳朮補中ノ劑ハ一切

内傷脾胃虛ノ聖藥トス。人參ハ胃元氣ヲ補白朮ハ脾胃土ヲ補甘草ハ脾胃ヲ令得中結者ナリ

總要

白朮

ハ惟脾胃土ヲ補ヒ除濕ノ良藥也。此ガ主治ノ能多ト雖皆補中除濕ノ餘力ヨリ致ス。元素白朮ノ主功ヲ九ニ辨ノ謂温中一也。去中濕二也。除胃熱三也。強脾胃進食四也。和胃生津五也。止肌熱六也。治四肢困倦脊臥目不能開不思食七也。上湯八也。安胎九也。然此惟補中除濕ノ一根ヨリノ如此ニ主治ノ品ヲ多ス。好古說ニ白朮ハ上ニハ皮毛中ニハ心胃下ニハ腰膈ヲ療スト毒。此ガ所入ノ本宮ハ中焦脾胃ニ在也。脾胃ハ中州其氣ヲ四方ニ注者ナリ。故ニ白朮能中焦ヲ補則其力上下内外ニ不及ト云所アルトナレ。本草匯曰。白朮安脾胃之神品ト云是ナリ

使藥

防風地榆ヲ使トス。又陳皮ヲ加テ善脾胃ヲ補和ス。又實ト令補脾胃消痞

滿黃芩ト合ノ屬熱安胎動。甘草ト合ノ補脾

毒

白朮ハ中焦ヲ補其補所以ハ中

胃除濕亦不燥乾姜ト合ノ中焦ノ寒濕ヲ去氣ヲ留閉トナリ。故ニ脾胃實滿ノ者胃中實熱ニシテ不食者勿用之。○腎虛ノ逆氣攻築テ膈下ニ動氣アル者勿用之。蓋白朮閉氣カ故ナリ。○劉涓子癰疽論曰。潰癰忌白朮以其燥也。而閉氣又生膿作痛也。下愚察ニ白朮實ニ閉氣則生膿作痛ノ義或是アラン。然癰疽甚ノ脾胃既ニ虛衰シ營衛不足スルニ至テハ參朮ニ非ハ此ヲ補助スルコト不能。彼ハ八珍湯大補湯益氣湯ハ癰疽補虛ノ主劑ニ非ヤ。其方皆白朮ヲ以テ君臣トス。若其劉氏ガ論ノ如ナラバ癰疽虛ヲ補ニ於テハ八珍大補益氣湯等ヲ用凡白朮ヲ除去テ可ナリトス。又八珍大補益氣湯等ノ白朮ヲ去ハ何ニ由テ其補益ノ功ヲ致シヤ。不思ノ甚也。或潰癰用白朮宜少ト云ハ可ナラン。思之ト云者ハ恐

ハ不可ナリトス。且劉氏謂燥腎ノ義モ亦是ナルニ非ズ。詳ニ後ノ愚案ニ見タリ。

畏惡

桃李。杏仁。雀肉。青魚。ト忌。

附方

枳朮丸。白朮一兩。土炒ニス。枳實一兩。麩炒ニス。右末トシ。薄荷ノ煎湯ヲ以テ燒タル飯ニテ丸スルコト。梧子ノ大。每服五十丸。白湯ニテ服ス。消痞強胃。久服スレハ善食ノ不滯也。若中氣鬱滯セハ陳皮一兩ヲ加。胃火アラスハ加黃連一兩。濕痰盛ニハ加半夏一兩。胃寒セハ加乾姜五錢。不香ニ錢宿食アラスハ加神麩。麥芽各五錢。紫古製。白朮膏。脾胃虛ノ久瀉久痢ヲ治ス。白朮一兩。切。鍋内ニ入テ水ニ浸過コト二時。不緩不強火ヲ以テ煎半分。渣亦如此。二煎ス。煎スルコト總テ三度。其汁ヲ合シ。熬膏。入罈。一夜ノ明日清。水ヲ傾去。收置。每服二三匙。蜜湯ニテ下ス。出千金良方。參朮膏。補脾胃。虛益元氣。白朮一斤。人參四兩。剉。テ流水十五碗ニ浸。コト一夜ノ

煎。柴ノ不緩不強火ニシテ濃煎シ。汁ヲ取テ熬膏。煉蜜ヲ加入ノ收置。以テ白湯點服ス。出集簡方。温白丸。小兒脾虛ノ久瀉シ。米穀不化。飲食不進ヲ治ス。白朮半斤。夏冬各二錢。半。丁香五分。烏梅。生薑ヲ合タル麩糊ヲ以テ黍米ノ大ニ丸シ。米飲ニテ用。出全効心鑑。全口入。用。不和。冷氣中焦ニ壅テ脹滿スルヲ治ス。白朮二兩。陳皮四兩。烏梅。酒ヲ合タル糊ニテ梧子大ニ丸シ。食前ニ木香湯ヲ以テ服ス。出指迷方。或濕或暑ニ因テ泄瀉者。白朮。車前子等分。炒末シ。白湯ニテ二三錢ヲ服ス。出簡便方。面ニ黥黥多ノ雀卵色ノ者。醋ニ白朮ヲ漬テ日人。拭之。神效アリ。牙齒日ニ長。漸難食者。髓溢病ト名ク。白朮一味煎。ノ。激服ス。出備急良方。吃力加散。婦人血虛。小兒脾虛ノ蒸熱羸瘦。不能飲食者ヲ治ス。白朮。白茯苓。白芍藥。各一兩。甘草半兩。爲散。生薑大棗煎服ス。出外臺秘要。

愚案

吳門。章宜。曰。凡藏皆

屬陰世人但知未能從脾不知此蓋精脾為正邪所子故曰補也寧
知脾虛無濕者用之反致燥竭脾家津液是損脾陰也何補之有木
低陰虛燥渴少血骨蒸痰嗽哮喘唇燥咽塞便閉帶下肝腎攻藥膠
滿動氣者切須急之。思案二白木雖除濕燥劑トスル程ノ燥ニ非ス
何燥腎燥血ノ恐アラシマ夫濕ハ停滯塞過ノ氣脾胃ハ精血津液
ノ家也若脾胃虛ノ濕滯アル時ハ精血津液何ニ由テカ生化流通
スルコトアラシ白木ノ補中除濕ハ又テ精血津液ヲ生化流通セシ
スルノ佐スベシ古人謂補腎ノ意ト同シ且脾虛ス凡無濕者
二角ハ損脾陰トセハ白木ハ一切ノ脾胃虛ヲ補トシ難シ諸藥
ノ中ニ參ヲ補テ元氣者ハ人參ニ勝ハナシ補脾胃者ハ白木ニ越ハナシ
若脾虛ノ無濕者白木ヲ恐ル思ハ何ノ物ヲ以カ其脾胃ヲ補フトセン
由テ考ニ脾虛ノ無濕者モ脾虛ノ燥者モ俱ニ白木ニ非ハ其中ノ虛ヲ

補ニ不足者脾虛ノ無濕者ハ甘草草常補ト合ノ白木ヲ用ユ脾虛
ノ燥者ハ生血潤液ノ劑ト合ノ白木ヲ用ユ何ノ思之ノ義アラシマハ珍
湯ニ白木地黃ヲ用益氣湯ニ白木當歸ヲ用モ亦此意ナリ或問好
古曰無汗則發有汗則止與黃耆同効ト然マ否ベ曰黃耆ハ表氣ヲ
補ヒ白木ハ裏氣ヲ補其發汗止汗ノ功モ亦補中ノ餘力也脾土虛
ノ肺金ヲ不生皮肉疎ノ有汗者或脾土虛ノ肺金ヲ不生陰火乘之
皮肉焦熟ノ無汗者皆白木ノ所主ナリ然凡汗ヲ止或發スルハ
單ニ白木ノニヲ用テ効サシ黃耆芍藥等ニ合ノ善止汗ガ辛散ノ劑
ヲ加入ノ善發汗ノ三益白木ハ中宮中和ノ品ニ偏奇ナラス故ニ血
藥ニ合ノ補血ノ佐トナリ氣藥ニ合ノ補氣ノカヲ加好古曰在氣主
氣在血主血ト然凡補氣ノ助ニ厚ノ補血ノ佐ニ薄レ惟白木ハ補脾胃
開氣除濕ノ良藥ト他ハ皆此力餘力ナルコトヲ知ハ効ヲ致ト盛ニ

選アルコト
ナカルベシ

修治

白木蒼木本一類ニシテ其苗葉根ノ形色氣味微不同コトアリテ各法功ヲ異ニス蒼木

ハ色蒼黒シ肉ハ白形老莖ノ如シ堅骨アリ白木ハ色白ノ指ノ太
ノ如ク形太鼓ノ槌ノ如シ柔ナリ大ナルハ拳ノ如ク辛ノ如シ近代ノ
藥店ニ誤テ白木ヲ蒼木トシ蒼木ヲ白木トシ或老根ヲ以テ蒼木トシ
嫩ヲ以テ白木トシ或蒼木ノ中ニ白木ヲ雜エ白木ノ中ニ蒼木ヲ雜テ
不正或謂和ノ木ハ皆蒼木ニシテ白木ハ本朝ニテハ皆謬也白木
與蒼木俱ニ吾朝ノ處ハ山中ニ多有之二木俱ニ苗ノ高二三尺或
一ニ尺其葉抱莖生シ稍ノ葉ハ棠梨葉ノ如ク根ニ逆キ葉ハ三五
又アリテ皆鋸齒小刺アリ白木ハ葉稍蒼木ヨリ大ニシテ毛アリ他
ハ皆蒼木ニ同シト雖其根ノ形色右ニ辨スルカ如ク大小堅柔蒼白
ノ異アリテ蒼木白木ヲ別彼老嫩ヲ以テ蒼白ヲ分者ハ非ナリ

○米泔水ニ浸コト一二夜ノ土氣ヲ洗去藥店ノ者多ハ粗皮ヲ削出ス
如此ハ其儘割日ニ乾シ炒用若粗皮ヲ留者ハ粗皮ヲ削去テ割日ニ
乾シ炒用ニ脾胃ヲ補メトシ盛ニセント欲セハ東壁土ニ雜炒蓋土氣
ヲ借テ脾胃ヲ助メトス東壁土ハ東方ニ向ノ壁也此常ニ朝日ノ陽光
ヲ受ガ故也○東壁土ニ合シ炒則土末相雜テ難釋故予家傳ノ法
アリ東壁土ヲ以テ水ヲ滴テ粘レ龍眼ノ大ニ丸テ數十丸白木ニ
合シ俱ニ炒用則土氣然能白木ニ移テ且土末紛雜スルコトナシ或脾胃
胃ヲ潤補スル劑中ニ用之則蜜水ニ浸シ炒用ニ或乳汁ニ拌テ炒使
或中焦不足ノ濕痰ヲ去ノ劑或中焦ヲ補ヒ胃氣ヲ行ス劑中ニハ
生薑汁ニ浸炒用ニ方ニ從ヘシ和唐和木ハ性味緩種ナリ唐木ハ
氣性強シ故ニ緩治ハ和木急治ハ唐木ニ宜シトス川白木近代川
白木ト名ル一種ヲ度ス本綱謂削木片木是也藥力薄シ然凡亦和

木ヨリハ其氣味勝タルニ似タリ

蒼



木



苦微辛温。除濕健胃散風發汗治風寒濕痺。主頭痛消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿腹脹腹痛止霍亂吐下暖胃消穀進食治嘔泄冷痢濁帶腸風

大風疥癩諸瘡諸毒除寒熱惡氣弭山嵐瘴氣定冷。此木赤黑蒼色故二蒼木ト名ク白木ノ條ニ辨スル如ク古ハ蒼白ノ別ナシ陶隱居本草兩ト云ヨリ始テ二木ヲ別白者ヲ貴赤黑者ヲ蒼木トシ至能ヲ異ラ用之也除濕白木蒼木俱ニ去濕ノ良藥タリト雖白木ハ其氣味辛烈ニシテ力故ニ除濕ノ功柔ニシ燥ト云程ニハ不至也蒼木ハ其氣味辛烈ニシテ強シ故ニ燥濕ノ要藥タリ宗奭謂蒼木氣味辛烈白木不烈ト李士曰蒼木甘而辛烈性温而燥ト夫蒼白ノ二木ハ本ト類ト雖

其氣味不同トアリ。白木ハ甘微温也故補中ノ功盛也蒼木ハ苦辛烈其氣烈其性全温也故燥濕開胃口且達表發汗ノ強効アリ。補中ノ功ハ懸ニ白木ニ劣リ是以補中ノ劑ハ白木ヲ主トシ燥濕開胃中焦ノ大過ヲ平クルニ於ハ蒼木ヲ主トス通玄曰六依卑監之土宜與白木以培之敦阜之土宜與蒼木以平之。卑監土不及ノ名則脾胃ノ不足ヲ指也敦阜ハ土大過ノ名則脾胃濕土ノ亢實ヲ指也白木ハ中氣ヲ補テ不泄蒼木ハ苦辛温若ハ推テ疎辛ハ發テ散スル力故ニ中焦ノ大過結實ヲ平發ノ功ヲ得タリ。古力平胃散ニ蒼木ヲ以テ脾胃濕土ノ大過ヲ平ノ要藥トスルモ亦此義也。健胃時珍曰蒼木入足太陰陽明手太陰陽明太陽之經ト。愚案蒼木亦白木ト同ク足太陰陽明脾胃兩經ノ藥タリ丹溪曰蒼木爲足陽明經藥李士曰蒼木入脾胃二經ト。蒼木ハ白木ト同類タリト雖

其氣味柔緩ニ善脾胃ヲ補者也。蒼朮ハ氣味苦辛ニ烈シ故ニ脾胃ノ濕ヲ燥シ。中焦ノ結實ヲ開散シ胃ヲ健ニスルノ功アリ。健ニストハ補益ト云程ノ義ニ非ス。惟中焦ノ濕ヲ燥シ。中焦ノ結實ヲ開散シ胃土ヲ平ナラシムル時ハ脾胃自健ナルヲ云ナリ。震亨曰蒼朮氣味辛烈強胃強脾發穀之氣ト是ナリ。胃ヲ開散セシムル時ハ穀食ノ氣ヨク中焦ニ發ス。朮ハ直ニ中焦ヲ補ヒ。蒼朮ハ胃土ノ太過ヲ平テ健ニス。平與補不同。藥用スヘカラス。散風蒼朮ノ故ヤ中焦ヲクツロク。辛ヤ發表出汗故ニ風邪ヲ散スルノ功アリ。凡表ハ裏ヲ以テ根トス。中焦塞則表モ亦開コト不能是以蒼朮ノ苦中焦ヲクツロクルト。辛味ノ開散スルトヲ合シ發汗散風。羌活ト合シ能風濕ヲ散シ。葱白麻黃ト合シ大ニ風寒ヲ散ス。皆蒼朮ノ辛烈ナルヲ以也。白朮ハ補中除濕テ散發ノ勢ナレ。蒼朮ハ辛烈ニ散發ス。故ニ補中

ノ中ハ白朮ニガレリトス。發汗蒼朮ノ辛烈ナル中焦ヨリ出テ皮ニ達シ腠理ニ散テ發汗故ニ發表ノ劑中ニ多用之。或問東垣曰蒼朮能出汗與白朮止汗特異用者不可以此代彼蓋有止發之殊ト然ニ王好古白朮ヲ釋シ云。無汗則發有汗則止。與黃耆同効ト。兩論不向其故何ゾヤ。曰諸補者ハ閉塞ノ義アリ。閉則不泄塞則滿テ補益ノ功ヲ致ス。故ニ白朮ハ能中焦ヲ補益スルヲ以テ止汗ノ功アリ。然元亦或中焦虛シ肉氣怯ノ出汗ニ不足者ハ白朮ヲ以テ中焦ヲ補テ裏氣ヲ滿シムル時ハ出汗ノ力ヲ致ス。彼黃耆ハ止汗ノ本藥タリト雖或表氣怯虛ノ發散ニハ黃耆ヲ以テ反テ出汗ノ義ニ同。此皆補テ止汗ヲ本トシ。其餘ニ或ハ汗ヲ發スト雖直ニ此が發表スルニハ非ナリ。故ニ此が要能トスル所ノ者ハ白朮黃耆俱ニ止汗ノ劑トス。蒼朮ハ辛烈直ニ發汗ノ功アルトキハ實ニ白朮與蒼朮止發ノ功異者也。不可混

治風寒濕痺 蒼朮燥濕發汗風寒濕ヲ散ノ能諸痺ヲ治スルノ要藥
トス 至頭痛 震亨曰 蒼朮出濕上中ト皆有可用一然其蒼朮ハ辛
烈ナリ中焦ノ本藥ニシテ上行ノ氣壯也故ニ上部ノ風寒濕ヲ散シ痰
爵氣爵ヲ解テ治頭痛李杲曰 蒼朮別有雄壯上行之氣ト是ナリ
消痰水 蒼朮善燥濕故痰飲水ノ留滯ヲ消功アリ 逐風間風水結腫
風腫與水腫不同風腫ハ上躰ノ腫盛ニシテ按之窩ヲ成テ不起此風
寒皮間ニ結滯シ水其間ニ流テ腫者ナリ論疾診尺篇云按手足上
實而不起者風水膚脹也下 水腫ハ下躰ノ腫盛ニシテ按之隨手腫起
直ニ皮裏ニ水ヲ裹カ如者此偏ニ水濕ノ邪皮肉ノ間ニ結滯シ腫者也
水脹篇曰以手按其臍隨手而起如裹水之狀此其候也下 蒼朮ハ
水濕ヲ燥シ風濕ヲ散シ辛烈ニシテ皮表ニ達ス故ニ皮肉ノ間ノ風結水
結ノ邪ヲ逐テ諸腫氣ヲ治スルノ要藥トス 除心下急滿 白朮ノ除

心下急滿者ハ中焦不足スルガ故ニ濁陰不能能降ノ然ラハ治ス 蒼朮
所治ノ心下急滿ハ中焦爵結ノ田良氣閉通セサルガ故ニ然ラ除ク
腰脹腹痛 蒼朮ハ中焦ニ入テ燥濕解爵散寒開滯故ニ腰脹腹痛ヲ
治ス然其在中焦ノ虛脹虛痛ノ者ニハ不宜用若或用之白朮ヲ王十
ノ父蒼朮ヲ佐トス多用ト勿レ本草漙云 腹脹痛必有濕也實邪
者用之則邪散而濕除即寬若虛悶痛者用之則耗其氣血燥其精
液虛火益動而愈悶不如調其正氣則悶自是而散矣 止霍亂吐下
中焦不足スルガ故ニ升降不通ノ霍亂吐瀉者ハ白朮ニ宜シ中焦ノ
結滯ニ因テ升降不通ノ霍亂吐下者ハ蒼朮ニ宜シ 在中濕ノ瀉痢
ヲ治スルニ蒼朮ノ功盛也 暖胃消穀進食 蒼朮ハ辛ノ胃口ヲ開キ温
ニシ胃ヲ暖故ニ穀食ノ爵ヲ消テ進食然其神麴麥芽等ノ直ニ消
穀ト不同彼ハ直ニ穀食ノ積滯ヲ剋消ス 蒼朮ハ惟暖胃開胃消穀爵

ヲ嘔吐スルノ三治嘔吐冷痢嘔吐泄瀉ヲ治スルモ亦暖胃中焦ノ爵ヲ
頂シ寒濕ヲ散スルカ故ナリ是以爲冷痢病ニハ蒼朮ノ功尤大ナリトス
濁滯小便赤白濁婦人ノ帶下諸因アリテ不同腎虛ヨリ致アリ脾
胃虚ヨリ生者アリ如此ハ蒼朮ノ主治スル所ナラス夫水ハ土ニ從テ行
且濕ハ濁テ重下故ニ中焦脾胃土ノ濕太過ノ下流スレバ小便因之濁
下焦因之濁液ヲ生シ遂ニ帶下小便濁ノ病ヲ致入此中焦濕土ノ本
過ニ屬ノ蒼朮ノ主治スル所ナリ中焦下焦ノ者ハ妄ニ勿用之腸風本
便道一血ヲ下者腸風ト号腸胃ノ風濕ニ因テ下血者蒼朮ニ宜シ
若脾胃ノ不認血腎虛ノ血液ヲ不治カ故ニ下血者ハ不宜之六風本
風ハ癩病也風寒ノ邪經絡ニ壅リ皮肉ヲ腐シテ致者ナリ蒼朮
ノ風寒濕ヲ散ノ其辛烈發汗ノ勢方ヲ以テ六風ヲ除入癩癧蒼朮ノ
辛温ヲ以テ氣血ノ爵ヲ解ニ功アリ故ニ癩癧癧癧ノ滯ヲ除ク諸癩

諸癩症ハ足陽明胃ニ屬ルコト素問癩癧論ニ詳ナリ且濕ハ物ヲシテ弱
ナラシムルノ氣タリ故ニ諸癩症多ハ脾胃ノ濕ニ屬シ又筋骨經絡ノ濕
ニ屬ス是以蒼朮ノ脾胃ニ行去濕ヲ以テ此癩症ヲ治スルノ功ア
リ丹溪曰徑入諸經疎洩陽明之濕通行致瀉大明曰治筋骨軟弱
諸癩蒼朮ノ若ハ疎辛ハ開散入故ニ痰火濕食氣血ノ六爵ヲ解ニ宜シ
凡脾胃ハ中宮二位ノ痰食氣血ノ家タリ故ニ中氣噴開則何ノ六爵ト
云コトアラン蒼朮ノ若辛能中焦ヲ噴開シ諸爵ヲ解ノ功ヲ出ス蒼朮
與香附俱ニ解爵ノ劑タリト雖其功不同蒼朮ハ中焦ノ諸爵ヲ開散
ノ升降ヲ通ス香附ハ氣爵ヲ噴散スルニ快ノ氣ヲ下コト最速者也
除寒熱蒼朮辛烈ニシテ發汗故ニ寒熱ノ表邪ヲ除ニ宜シ然元表邪盛
者ハ蒼朮獨ノ力ニ不及宜ク發表ノ劑ト合用ユベシ惡氣一切不正ノ
惡氣ヲ除ニ勝リ詳ニ下文ニ見タリ

弭山嵐瘴氣災疹阻ハ止也

冷ハ陰陽ノ亂氣ヲ云。穴冷ハ天地交感ノ冷氣也。瘴ハ山谷ノ間濕熱
薰蒸不正ノ氣ヲ云。此山嵐ノ瘴氣也。蒼木ハ一切不正ノ惡氣山嵐
瘴疫天地穴冷ノ氣ヲ去除ス。疫癘行ノ時。或歲且ニ於テ蒼木ヲ燒
則惡疫ノ邪氣其家ニ入コトナシ。張仲景一切惡氣ヲ辟ニ亦木ヲ以
猪蹄甲ト同燒烟ニ去テ赤木ハ蒼木也。時珍曰病疫及歲且人家
往火燒蒼木以辟邪氣。吾朝中都宜義坊。天神宮ニ於テ除夜ニ
木ヲ求。民家燒之。烟薰シ。歲中ノ穴疫ヲ除ト云モ亦此義ニ從乎。凡
山谷濕熱薰蒸ノ地ニ往來シ。或山嵐。或傳尸。疫癘ノ家。或得暑久雨
ノ時。或人久不在。山嵐等ニ至者ハ皆必蒼木ヲ燒烟ニ其不正ノ
氣ヲ辟ヘシ。方ハ臭氣ヲ薰テ子ハ陰ヲ薰テ。蓋疫癘ノ類ハ男ハ鼻
竅ヨリ化シ。女ハ下焦ヨリ入ハナリ。或平胃散能山嵐不正ノ惡氣ヲ去
モ亦蒼木ノ功ヲ以テテ。蒼木ニ近ク。辟嵐瘴ノ功ニ長セルコト知ヘシ

總彙

蒼木ハ脾胃ノ藥也。中焦ノ太過ヲ平ケ。且能濕ヲ燥ス。白
朮モ亦除濕ノ劑タリト。維。彼ハ中焦除濕ノ藥トス。蒼木ハ

辛烈ニシ皮膚ニ透シ表ヲ發テ汗ヲ出ス。故ニ蒼木ハ中焦ノ濕ヲ燥シ善
皮膚ノ濕ヲ散ス。陶節菴丸味羌活湯ニ蒼木ヲ用ハ足太陽ノ濕熱
ヲ燥シガ爲ナリ。仲景白虎湯ニ蒼木ヲ用者ハ濕熱ノ表邪ヲ開發
セシガ爲ナリ。蒼木ハ脾胃土ノ太過ヲ平ケ。表濕ヲ散シ。辟邪惡
ヲ辟ノ
使藥
葱白。麻黃ノ類ニ合シ善分肉皮膚ニ至テ表ヲ散ス。
要劑也。黃柏。牛膝ノ類ト合シ善下焦ノ濕熱ヲ治ス。
毒
蒼木ハ中焦ノ太過ヲ平者也。故ニ中焦ノ虛甚者ハ斟酌スベシ。○
中焦燥結者。自汗盜汗多者。精血津液ノ燥結者。陰分ノ虛火躁
動者。皆蒼木ヲ用ニ宜カラス。蓋辛
烈ニシ善燥シ善散スルガ故ナリ

畏惡

右ノ白
木ト同

附方

食生
米飲

食ノ濕腸胃ニ滯ニ生蟲善生米ヲ食テ飲食ヲ不思形悴色黃ヲ
治ス蒼朮米泔ニ浸コト一夜剉焙爲末蒸餅ニテ梧子ノ大ニ丸シ每
服五十丸食前ニ米飲ニテ用ユ出揚氏經驗方魏木丸夏月濕瀉
飲食傷ニ屬者ヲ治ス蒼朮米泔ニ浸コト一夜焙神麴炒等分爲末
糊ニテ丸シ梧子ノ大毎服二三十九丸米飲ニテ下入出局方椒木丸
浪世久痢ヲ治ス蒼朮二兩川椒一兩爲末醋糊ニテ梧子ノ大ニ丸シ
每服二十九丸食前ニ溫水ニテ下入惡痢久者ニ八角桂ヲ加出保命集
眼目昏花蒼朮半片米泔ニ浸コト七日去皮切焙木賊各二兩爲末
每服一錢茶酒ニテ下入出聖惠方因風牙根腫痛蒼朮塩水ニ浸
燒テ骨ヲ存シ研末シ牙ニ搯テ風熱ヲ去出普濟方臍蟲腹中鐵石ノ
如ク臍中ヨリ水流其水變蟲身ヲ透痒掃疔不盡蒼朮ノ濃煎湯
ニテ洗浴シ蒼朮ノ粉ニ麝香少許ヲ入水ニ調服ス出益音疾方

思案

本草家ニ謂蒼朮ハ皮表ノ濕ヲ去白朮ハ中焦ノ濕ヲ去ト
思案ニ蒼朮白朮俱ニ中焦除濕ノ要劑タリ白朮ハ補
中ノ功盛ニシ去濕ノ功ハ蒼朮ニ劣レリ蒼朮ハ烈ク燥熱且辛烈ヲ
以テ中焦ヨリ皮膚ニ達シ汗ヲ發シ善表濕ヲ散ス豈蒼朮ハ表
濕ヲノミ除テ中焦ノ濕ヲ不除者ナランヤ白朮蒼朮俱ニ能中焦ノ
濕ヲ除ト雖白朮ハ中焦ノ濕ヲ除ハ表濕ヲ散スルコト不能蒼朮ハ中
焦ノ濕ヲモ燥シ表濕ヲモ開散ス元素曰蒼朮與白朮主治同但此白
朮氣重而沈若除上濕發汗功最大若補中焦除脾胃濕力少不如
白朮腹中窄狹者須用之氣重而沈沈下ハ白朮ヲ指除上濕發汗
上ハ蒼朮ヲ指腹中窄狹者須用之上ハ蒼朮ノ功ヲ云窄狹ハ俗ニ云腹
スホル也思案人ルニ蒼朮ハ味苦辛ニシ其氣溫烈苦ハ疎テ推辛ハ開テ
散ス腹中窄狹ハ中焦ノ結滯收縮ニ屬ス故ニ蒼朮ノ苦辛溫ヲ以テ開

疎寬發セシメテ宜トス。此中焦ノ結實ニ屬スル者ヲ以テ云。若中氣
不足ノ不充ガ故ニ腹中空狹ヲ致者アリ。如此ハ蒼朮ニ不充其
辛温氣烈ヲ以テ反テ中氣ヲ充サラシム。惟白朮ノ沉重ニ中氣
ヲ補持シムレハ胃氣充中空狹自快シ。一藥ニ腹中空狹者ハ蒼朮
ニ宜トシ、實ヘカラス。且蒼朮白朮主治同ト雖、白朮ハ中氣ヲ不開ノ
補ヒ、蒼朮ハ中氣ヲ開テ表ニ散
則ニ朮ノ所治豈同キ者ナラシマ

修治

糯米泔ニ浸コト二日、每
日水ヲ換テ洗清シ上
ノ粗皮ヲ去、到干乾シ焙用ニ。或土炒ニテ油氣ヲ去モ良。土炒ノ法ハ
酢ノ白朮ノ條ニ見タリ。或脂麻ニ拌テ炒。或脂麻ト同蒸コト三次
ノ用エトアリ。脂麻ト同スルハ蒼朮ノ燥氣ヲ制センガ爲ナリ。或藥店
ニテ水ニ浸シ粗皮ヲ去、出者ハ其盛用ヘシ。或鹽水ニ浸シ炒シテ用レハ下
焦ノ濕熱ヲ去也。○按ニ本草注ニハ、糯米泔浸三日ト。通玄ニハ米

泔水浸二日ト。和ノ修治纂要ニハ米泔水ニ浸コト春秋ハ二日、夏
ハ二日、冬ハ四日ト。愚カ家法ハ四時皆浸コト二日ヲ宜トス。浸ニ必
糯米泔ヲ以ス。時珍曰以糯米泔浸去其油ト。和藥ノ評議ハ
前ノ白朮ノ條ニ見タリ

初人白木ノ類ニ長ク
 蘇木折レ以テ熱氣ヲ去ル
 八二日本八四日ノ熱氣去ル
 蘇木好ニ白ク折レ熱氣去ル
 蘇木好ニ白ク折レ熱氣去ル

蘇木本草大成卷之三
 蘇木好ニ白ク折レ熱氣去ル
 蘇木好ニ白ク折レ熱氣去ル

桔梗



辛微温。治胸脇痛、嘔痛、鼻塞、胸膈痛、
 氣、心腹滿脹痛、肺熱氣促、帶嗽、血結、嘔
 吐、肺部風熱、痰涎驚癇、喘氣、口舌瘡、赤

目腫痛、肺癰、肺痿、排膿、下痢、消穀、利頭、自下、一切氣、△桔、ハ結也、此
 草ノ根、結實ニシテ梗直、故ニ桔梗ト名ク、按ニ其氣味辛微温、
 日苦辛ト。時珍曰、當以苦辛爲是ト。故ニ李士材モ謂、桔梗苦辛、氣輕
 味平、入肺經ト、好古モ曰、入手ノ六陰肺經氣分ト、然則桔梗ハ味苦
 辛平ニシテ肺經氣分ノ主藥トスベシ、治胸脇痛、桔梗ハ輕、存シテ善、
 諸藥ノ舟楫トス、壁、六鐵石ノ重ト雖、舟楫ヲ得テハ水立ニ浮テ、
 不能方如ク、大黃等ノ降沈ト雖、桔梗ヲ以テ引則下、
 不能也。

本草綱目卷之四
 蘇木好ニ白ク折レ熱氣去ル

故二桔梗ハ能胸中至高ノ分ニ至リ。肺氣ヲ通利ノ胸痛ヲ治ス。凡胸
痛ハ屬肺。脇痛ハ屬肝。今茲ニ謂胸脇痛トハ胸ヲ主トシ云。胸痛甚
ノ其ガ脇ニ及テ痛ヲ云。此胸中肺分ノ塞滯ニ屬ス。故ニ桔梗ノ主治
スル所ナリ。咽痛 桔梗善高ニ升テ咽喉痛ヲ治ス。若咽痛甚キ者只
甘草ト合用ノ宜。故ニ仲景少陰症ニ三日咽痛ヲ治スルニ桔梗甘草
ヲ用ニ後人名テ其桔湯トス。實ニ咽痛ノ要藥此ニ勝者アルコトナシ。
前ノ甘草條ト參考スヘシ。鼻塞 鼻ハ肺ノ主トス。故ニ鼻病ハ屬肺。
鼻塞者ハ鼻ノ肺氣塞テ上部ノ不開也。桔梗ハ上肺ニ入テ肺氣ヲ開
下者ナレバ也。胸膈滯氣 桔梗ハ輕ノ能浮升。味苦ノ辛ニ苦ハ疎辛
ハ開。故ニ能胸膈滯氣ヲ利スル功アリ。朱肱活人書治胸中痞滿
不痛。凡桔梗枳殼取其通利膈下氣也。心腹滿脹痛 此モ亦心滿
痛ヲ主トシ云。心滿膈引テ腹脹痛ニ及者ナリ。夫桔梗ハ善升テ至

高ニ入ト雖反テ善氣ヲ下スノ功アリ。李士材曰。桔梗枳殼之用。惟其上
入于肺。肺屬壬氣之藏。故能使諸氣下行。世俗泥爲上升之劑。不能
下行。失其用矣。桔梗ハ升テ肺氣ヲ利ス。肺氣上ニ利則濁氣下降
スルニ。譬天雨ヲ降ト欲スル時ハ先必地中ノ水濕乾ニ始ル。此地氣
ノ升コト盛ナルニ從テ地水引テ上ニ達スルガ故ナリ。升ルコト如此則
天必雨ヲ降コトモ亦盛ナリ。升則必降ノ理昭然ナリ。是以桔梗ノ升
テ胸氣ヲ利者ハ善至高ノ氣ヲ降テ有コトヲ知ヘシ。濁氣下降
則心痛心痞。及心痛痞。桔梗善升テ降ス。一升一降ノ上下通則腹
脹腹痛痊。本經ニ治腸鳴別錄ニ利五藏腸胃。大明止霍亂。元素利
竅ト云者。皆升通ノ降ノ用ニ取ノミ。肺熱 滌曰。桔梗爲肺部引經
之要藥ト。其味苦辛ニ疎散ス。故ニ肺部ノ鬱熱ヲ去。凡上焦鬱熱
者用之升散スヘシ。氣促喘嗽 呼吸氣促。テ或喘或嗽者ハ皆上焦

和語本草 卷之三 〇二

肺分ノ氣結ニ屬ス。故ニ桔梗ヲ用テ肺氣ノ結鬱ヲ開散ノ宜シ。血結
血ハ從氣流行ス。氣ハ肺ニ屬者ナリ。桔梗ハ肺氣ヲ利スルノ要劑。故
一用之肺氣利則血從テ流行ス。何ノ血結血積アラシマ此皆桔梗ノ
肺氣ヲ升進スルニ因ノミ。直ニ血藥ニハ非ス。嘔吐此モ亦桔梗ノ胸膈
ヲ利シ氣ヲ下ニ因ノ也。肺分風熱桔梗ハ發散ノ劑ニ非シ。能肺ニ
上テ肺氣ヲ通利スルガ故ニ風熱ノ結鬱ヲ開通ス。蓋桔梗ノ苦ハ疎利
シ。辛ハ開通スレバ也。痰涎一痰涎ハ皆氣化ニ從。氣滯則痰ヲ生シ。氣
利則痰退。氣ハ屬肺。順下ヲ善。故ニ桔梗ヲ用テ肺氣ヲ利シ。胸氣下
降則氣道順行ノ痰涎自退。コレヲ致ス。凡肺中ノ痰鬱ニ宜驚懼悸氣
小兒驚風。大人癩癩恐悸等ハ皆肺心ノ病ニ屬ス。故ニ補氣補血去
痰等ノ劑ノ用ニ桔梗一合ノ諸藥ヲ善。上焦心肺ノ分。膈上ノ行シ
ム。此舟楫ノ功ヲ以ナリ。恐悸ハ恐悸スヘキコトモアラサルニ安ニ

恐テ悸スルヲ云。多ハ心肺ノ氣虛痰動ニ因也。口舌瘡赤目腫痛此モ
亦至高ニ行ノ功ヲ以ナリ。故ニ口舌ノ瘡ニ出ラズ。眼目ノ赤腫痛ニカ
ギラス。一切眼目口舌ノ病。高ニ在者ハ皆用之。效ヲ致ス。士材曰九頭
目口鼻諸症一切主之。桔梗ハ諸藥ヲ載テ至高ニ至シ。舟楫ト
ナルヲ以ナリ。且桔梗ハ升テ爵ヲ開キ。亦ヨク降ス。口舌瘡赤目腫痛
多ハ氣ノ上鬱ニ屬ス。故ニ桔梗ヲ用テ其效アルコト知ヘシ。肺癰肺痿
排膿 肺癰ハ中肺藏ニ癰ヲ生ノ膿血ヲ唾ニ出シ。口中息。胸中疼痛
ス。肺痿ハ久嗽テ不已。胸中痛乾。咳出。大便爛タル。此ノ如ク。或永ノ
脂ノ如ク。或渴。或不渴。其症肺癰ニ似タリト雖。肺痿ハ膿血ヲ不
略。肺癰ハ膿血ヲ略也。桔梗ハ肺中ニ入テ利氣開爵ノ要藥タレハナリ。
排膿トハ肺癰ノ膿血ヲ排ヒ逐コトアルヲ云也。下痢 肺與大腸
表裏タリ。肺氣利則大腸モ亦從テ利ス。且痢疾ヤ氣ノ滯下ノ調

提セザルが故ニ裏急後重ヲ致ス。桔梗能肺氣ヲ利シ。膈下ノ氣ヲ
升開ス。是以下痢ヲ治スルノ功ヲ致ス。丹溪曰痢疾腹痛乃肺經之
氣鬱在大腸也。宜桔梗開之。上。滙云用之痢藥以其能開提氣血也。
有穀此桔梗ノ要能ハ非ナリ。桔梗ハ高ク升ノ劑タリ。人ノ胃腸ノ氣
ヤ升テ下陷セザル時ハ中焦消穀ノ道盛ナリ。故ニ桔梗ノ升ニ高ニ行
ノ氣ヲ以テ胃腸ヲ升開セシムル時ハ自消穀ノ理アルヲ以テリ。然則
此等ハ皆桔梗ノ高ニ行ノ餘ニ出テ主功ニハ非ズ。枝葉タリ。必シモ
食積消冠ノ劑ト覺ベカラス。如此ノ義。諸藥ノ中ニ多ク存セリ。惟其根
要トスルノ能ヲ辨メ。他ノ千變万端ノ主治ハ皆此ガ枝葉タルトヲ明
標病ハ其枝葉餘カヲ以テ治之。本病ハ其本能ヲ以テ治スヘシ。滙云
別錄言消穀者亦藉其升載陽氣而不下陷則脾中陽氣長浮而穀
食自消矣。利頭目下一切氣。桔梗ハ升テ至高ニ行。味苦辛。又疎開

故ニ頭目ノ氣ヲ清利者也。且清腸升則濁氣下降入。故ニ桔梗
ノ善升ヲ以テ善下トコトヲ致ス。是以桔梗ハ一切氣ヲ下ノ效ニ長
セリトス。世俗多ハ桔梗ノ升トコトヲ知。下トコトヲ不知。故ニ其功用ヲ
失コトト少カク。
總條 桔梗ハ升テ肺分ニ入ノ本藥タリ。其味苦辛
糞スヘキカナ。故ニ頭目鼻口咽喉胸膈ノ諸病ヲ主治ノ
鳩尾以上ノ藥也。味ノ苦ハ疎テ且推。辛ハ開テ利ス。故ニ鳩尾以上
ノ劑ヲ開結ヲ利シ塞ヲ疎シ。滙ヲ推。凡諸藥ヲノ上行セシムルコト
ヲ欲セバ必用之。引テ藥カヲ上ニ置ヘシ。或桔梗耳草合用ノ諸藥
ヲ上ニ持テ不下ノ功ヲ盛ニス。桔梗ノ升トコト如此ト雖亦其升ニ從
テ一切氣ヲ下ノ功モ亦盛ナリ。物升
則必降ハ理ノ自然ル所ニアラスヤ。
使藥 徐之才曰。桔梗節
皮爲之使。然凡
時珍曰。徐之才所云節皮不知何物也。枳殼ト合ノ善。胸氣ヲ利シ。

甘草十合ノ善咽痛ヲ療シ。荊芥防風
連翹十合ノ咽口舌ノ諸病ヲ通治ス

療スルノ藥中
畏惡
白及龍膽草ヲ恐。猪肉
ヲ忌。砒石ノ毒ヲ伏ス

附方
其桔湯
咽ノ痛

ヲ治ス。甘草桔梗各等分。煎服ス。加聖湯。右ノ甘草湯。荊芥防風
連翹ヲ加。咽口舌ノ諸病ヲ治ス。若音ヲ失者。加訶子。聲不出者。八
加半夏。上氣ニハ加陳皮。痰嗽ニハ加知母貝母。欬ノ渴者。ハ加五味

子。酒毒ニハ加葛根。氣虛セハ加人參。嘔吐セハ加半夏生。胸滿ニ
ハ加枳實。目赤ニハ加山梔。大黃。面腫ニハ加茯苓。膚痛ニハ加黃耆。

發斑ニハ加防風。荊芥。疫毒ニハ加梔子。大黃。難眠者。ハ加山梔。出醫
壘元戎。胸滿テ不痛者。ヲ治ス。桔梗枳殼等分。煎服ス。出活人書。

桔梗半夏湯。傷寒腹脹者。ヲ治ス。桔梗半夏陳皮各二錢。生薑五

片。水二錢。煎一鐘。出活人書。桔梗湯。肺癰胸滿。振寒。脈數。咽乾。不
渴。滿腫。膿臭ヲ出シ。久米粥ノ如ク。丸膿ヲ吐。二日。桔梗一兩。甘草二

兩。水三分。煮一分。溫服ス。朝暮膿血ヲ吐盡テ。痊。出金匱玉函。齒齲
腫痛。桔梗。薤白。等分。為末。服ス。出永類方。牙根腫痛。桔梗為末。水

肉ニ丸シ。綿ニ裹。咬之。荊芥。煎湯ニテ漱。出經驗方。打身瘀血。在肉時
發動者。桔梗為末。米飲ニテ服ス。出肘後要方。小兒ヲヒエテ。死イリ

不能言者。桔梗ヲ燒。為末。三錢。米湯
ニテ服。麝香サ。許ヲ吞シ。出備急方

思案
桔梗ハ諸藥ノ舟楫
トス。故ニ古方用之

多ハ劑中ノ佐使トス。蓋諸藥ノカイシキトナル者ナリ。或問。元素曰。
桔梗也。白。故為肺分引經ト然ヤ否ヤ。曰。其色ノ白ノミヲ以テ何ノ肺

藥トナルコトヲ得ヤ。其氣升。其性輕。且其色白ヲ以テ肺ニ入ノ要藥ト
ス。獨。白色ノミヲ以テ此ヲ肺藥タリト言ハ。諸。白色者。ハ盡。三肺ニ入

子ヲ致シカ。恐ハ元素ノ説未盡ノ旨アルニ似タリ。或問元素曰與甘草
 同行爲舟楫之劑。下ハ何如。曰然リ。九味ノ其者ハ必胸間ニ持滿テ
 通下スルコト不能故ニ諸藥ヲノ上ニ持シメント欲ヒハ甘草桔梗ヲ
 合用スヘシ。益桔梗ハ浮テ能分ル。然ル氣輕味苦辛ヲ上ニ久持
 コト不能者也。甘草ハ味太甘ノ能持ト雖氣味重厚ニノ升送ス
 ルコト不能也。故ニ桔梗ヲ以テ之ニ引甘草ヲ以テ之ニ持テ諸藥
 ヲ上部ニ置コトヲ得タリ。彼黃耆得防風其功ヲ大ニ陳皮得白
 朮能中焦ヲ補ヒ桔梗得甘草諸藥ヲ上部ニ置コトヲ知者ハ常人
 ノ所及ノ理ニ非ス實ニ
修治 白ノ不腐者味之腥澁カラサル者
 生知ノ致ス所タリ。ヲ擇用ス。醫ニハ腥澁者ハ不使也。
 不可用。蘆頭ヲ去。浮皮及大ト黒腐アル處トヲ削去テ。米泔ニ浸シ
 一夜ノ對テ乾微焙用。ユ或ハ合テ搗爛テ米泔ニ合シ此ニ桔梗ヲ

浸コト一日ノ對焙用。○桔梗蘆頭ハ胸中ノ風熱痰積
 ヲ吐スル劑タリ故ニ常ニ桔梗ヲ用ハム其蘆ヲ去テ用ベレ不然人
 ヲノ必世セシムルコトヲ致ス



當歸 補血和血。養新血。破惡血。止
 耳小温。○補血和血。養新血。破惡血。止
 痛。治氣生肉。療瘡排膿。潤腸胃。筋骨皮
 膚。治癰疽。崩中。瀝血。痿痺。中風。虛勞。下

疾。疾病補。諸不足。虛冷。絕子。定氣血。昏亂。通脈。治帶脈。衝脈。之病。△
 氣血昏亂者。脹之。卽定。此能氣血ヲノ各所當本部ニ歸セシムルコト
 有力故ナリ。是以各テ當歸トス。承曰。妊婦產後惡血上衝。倉卒取效
 氣血昏亂者。脹之。卽定。能使氣血各有所歸。恐當歸之各必因此出
 也。ト士林曰。氣血昏亂服之。而定。能領諸血各歸其所。當之經。故名
 當歸。ト補血和血。當歸ハ補血ノ聖藥タリ。故ニ心脾肝ノ三經ニ入

本草綱目 卷之六 當歸

蓋心ハ生血肝ハ聚血肝ハ藏血也。夫地黃ノ陰中ノ陰ニ腎陰ヲ
補當歸ハ味辛ノ温陽中ノ陰タリ。故ニ心血ヲ補。心血ハ陽中ノ陰
タルヲ以テナリ。味甘ニ補血其温ヲ和血。凡地黃芍藥等ノ純陰
ノ劑ハ陽氣ヲ損傷シ易者也。當歸ハ補血ノ劑タリト雖純陰ノ者
ニ非ス。陽中ノ陰タルヲ以テ陽氣ヲ損傷スルコトナレ。故ニ東垣補中
益氣湯ニ用之。補氣ノ助トスルコトヲ致ス。養新血破惡血。當歸ハ
血ヲ補血ヲ温和ス。故ニ新血ヲ養益血ハ得寒凝得温行。當歸ノ其
温ヲ以ハ和血養血コト明也。破モ亦生血和血ノ餘力ヨリ致ス
者也。壁ニ水ノ中ニ濁惡汚水ノ滯ニ於テ。洪水溢流テ盛ナル時ハ汚
水ヲ推破テ流行力知レ以當歸生血養血和血則血分能流行之瘀
惡血ヲ推流ニ因テ破惡血ノ功ナリ。然則紅花。延胡。桃仁ノ直ニ破血
トハ不同者也。或問當歸頭破血尾止血トハ雷教説也。頭止血尾破

血中身和血トハ張元素説也。頭止血上行身養血中守稍破血下流
全身活血不旁トハ東垣説也。議論如此。之不一何。ソカ是非トセン。
曰東垣元素止血以頭者ハ蘆頭ノ脉紋ワタカマリテ根上ノ止血ノ
ルニ因ナリ。破血以尾者ハ末梢ノ細ノ脉ノルニ因ナリ。故ハ止血以尾
者ハ根下ノ止處タルニ因ナリ。破血以頭者ハ其脉ノ硬實ナルニ因ナリ。
各其理存スルコトアリト雖。元素ノ説ヲ以優劣トスベシ。凡欲止血上
行センコトヲ欲セハ頭ヲ用ヨ。欲破血下行センコトヲ欲セハ尾ヲ用ヨ。諸治
通用セント欲セハ全身ヲ使ベキトシ。止痛心腹ノ諸痛。或頭痛。或齒痛。或
腰痛。或足痛。及諸痛ノ痛ヲ止。葎物枯則急ニ潤則緩。急則痛緩則
不痛。故ニ當歸ヲ用テ養血和血則潤テ其急ヲ緩シ。且瘀血ノ塞ヲ
行ノ諸疼痛ヲ治者也。元素曰血壅而不流則痛。當歸之其温能和
血ト治氣。大明日治一切氣ト好古曰當歸血中氣也。ト當歸

本草綱目

卷之三

五

八補血ノ劑タリト雖其性温ヲ陽中ノ陰タルヲ以テ獨補血ニシテ
亦兼テ氣ヲ行テ一切氣症ニ用ユ然レ獨當皎ノニテ用テ氣ヲ治セント
欲セハカサノ不足行氣補氣ノ劑ト合用則治氣ノ切ヲ發ス且氣行
則血行血行則氣行氣血ハ互ニ並行者也故當皎ノ養血和血ニ從テ
氣モ亦養レ和セラレ此ニ其性ノ温ヲ兼テ氣能行コトヲ致スヘレ古
人治氣ノ劑中ニ用之者皆此義ナリ生肉當皎ハ補血和血ノ故ニ肌
肉ヲ生ズルノ功アリ金瘡破傷ニ用テ能正肉ヲ生セシム瘡瘍當皎ハ和
血亦氣ヲ治スルカ故ニ癰疽諸瘡ニ用テ血氣ヲ和セシム排膿補血和
血治氣且温ナルカ故ニ瘡癰用之能膿シメテ惡膿水ヲ排出潤腸胃
補血則腸胃自潤故ニ六使結燥者尤宜之筋骨皮膚此皆補血
ヲ以テ筋骨皮膚ヲ潤ス當皎ハ唯補血ヲ以テ主本トス其治功多
ト雖皆補血ノ餘力ナリ故ニ當皎ハ女人ノ主藥トス藥性論ニ當皎

補皎子諸不足ト云モ亦補血和血ノ故也古方產後ニ惡血上衝テ
氣血昏亂者用之取效實ニ產後ノ要藥也或問心生血脾養血肝藏
血當皎ハ何藏ノ血ヲ補ヤ曰當皎ハ心脾ノ補血ニ宜レ肝血ヲ充シム
ル者ハ芍藥ヲ以宜トス然レ肝ハ直ニ生血ノ藏ニ非ス心脾ニ生スル
所ノ血ヲ肝ニ納藏者也故ニ當皎ハ肝ノ本藥ナラズト雖當皎ヲ以テ
心脾ノ血ヲ生則其血自肝ニ充レ故ニ肝血ヲ補ニモ亦芍藥等ト合
メ當皎ヲ用ユ然則當皎ハ諸血虛ヲ補ノ主劑タリ是以元素曰治
諸病夜甚ト病夜重者ハ精血ノ不足ニ屬スレハナリ精與血同ク陰
類タリ故ニ地黃當皎多ハ合用ノ精血互ニ相補コトヲ致ス或問當
皎ハ補血ノ要藥トス何如ノ胸中欬逆上氣ヲ治スルマ仲景傷寒ノ
血症及熱入血室者皆當皎ヲ不用ヤ曰血虛則氣ノ附所ナク陽
獨逆ノ上ル故ニ當皎ヲ用テ陰血ヲ補則氣自降皎ニ欬逆上氣症皆

景傷寒血症熱入血室症ニ不用之者ハ此ガ其潤中皖ニ填痰涎ヲ
動シ且其温ヲ以テ邪熱ヲ助コトヲ恐惟生地犀角柴胡等ヲ用テ血
熱ヲ治スルヲ三太低當飯ハ血分虚寒者ニ用テ其功盛ナリ血熱者ハ
非所好然无血熱症忌ムト云ニハ非ズ凉血ノ劑ニ合ノ或用之凡當
飯ハ使ノ劑ニ因テ一切ノ血症ニ通用ノ忌コトナシ生地黄犀角牡
丹皮ノ類ト合ノハ血熱ヲ清シ馬鞭笞化桃仁等ト合ノハ瘀血ヲ破リ
人參黃耆等ト合ノハ氣血ヲ補ヒ香附子等ニ合ノハ氣血ノ鬱ヲ順
行シ肉桂等ニ合ノハ虚寒ヲ温補シ太黃等ニ合ノハ血積ヲ碎シ上藥
ニ合ノハ上行シ下藥ニ合ノハ下行ス實ニ佐使因用ノ劑ニ從テ周身
血分ノ諸症ヲ通治者也治癥瘕癥瘕ハ血分凝滯ノ病タリ凡血虛則
瀉テ不行寒則凝テ不流遂ニ癥瘕等ノ血結ヲ致ス當飯補血和血
温血且行惡血ヲ以テ癥瘕ヲ治スルコトヲ致ス崩中瀝血瀝血ハ俗ニ

云長血白血ノ類經水久不止ヲ云崩中ハ月水不時ノ大ニ下ヲ云
當飯ハ和血補血ガ故ニ崩中瀝血ニ用之血分ヲ調ル也癥瘕瘕ハ
總テ身ノ癥ヲ云癥ハ足癥ヲ云當飯ヲ用テ補血和血則筋骨潤經
脈通ノ癥瘕自安中風中風ノ症外風ヨリ致者アリ内風ヨリ致者アリ
外風ハ或氣虛シ或血虛ノ風邪其虛ニ乘ノ致セタリ内風ハ六ノ風
邪ヨリ致者ニ非ズ内蔵府ノ間ヨリ自風化ヲ生ノ致ス多ハ燥與火ニ
ツテ風化自生ノ然リ凡風ハ物ヲ燥シムルノ氣也故外風内風ノ症
皆血虛ヲ不兼云コトナシ是以中風ヲ治スルニ多ハ當飯ヲ用テ潤養
スルヲ主トス虚勞當飯能補血故ニ虚勞ヲ治スルノ功アリ説ニモ
辨スル如ク精血同類ニシテ補者ハ兼テ精ヲ補ヒ精ヲ補者ハ兼テ
血ヲ補フ故ニ虚勞勞瘵症地黄等ノ劑ニ合ノ用之精血互ニ相補也
好古曰當飯治足下熱痛下足下ノ熱スルハ陰精ノ虚タリ一雖當飯

ヲ以テ神血則精從テ自益コト有ニ
下痢 古人謂利氣則後更除
補血則便膿愈下當飯ノ身温マ獨血分補和耳ニ非ズ兼テ氣ヲ
和スルノ義アリ故ニ元素曰使氣血各有所飯ト是以下痢症用之血
氣ヲ和調則後更便膿俱ニ安コトヲ致ス
痲痺 痲ハ痺病也身ノ強
直反張スルヲ云其症無汗者アリ有汗者アリ無汗者ハ血虚ニ屬ス
風邪乘虚血分ニ容リ經筋燥急ニシテ痲ヲ致ス當飯ヲ用テ補血則
經筋自潤緩テ身自柔也但汗不出痺病ハ當飯ヲ以テ主トスベシ
補諸不足 虛冷當飯ハ補血ノ劑タリ故ニ諸血分ノ不足血分ノ虚冷
ヲ補ト雖血氣當飯ハ合ノ者陰陽ハ互根ノ氣故ニ補氣者ハ兼血
補血者ハ兼氣則氣分ノ不足氣分ノ虚冷ニモ亦當飯ヲ兼用ニ宜シ
然ト雖地黃ノ類ハ純陰ノ劑陽化ヲ代テ補氣ニ害アリ當飯ハ雖
補血陽中ノ陰タル者也故ニ補氣ノ劑中ニ兼用テ補氣ノ助トスレ

是陽化ヲ代テ恐ナレ是以當飯ハ諸血氣不足諸血氣虚冷ニ通用ス
蓋當飯ノ其温ヲ以テ虚冷ヲ補温スルニ宜シ然モ當飯ハ小温ニシテ太温
全温ノ者ハ非入故ニ虚冷ノ太者ハ桂附等ト合用スベシ
絶子 婦
人予ナキ者用之血分ヲ補和レ温則自妊孕ヲ致ス
定氣血昏亂
當飯ハ血氣ヲ本部ニ飯セシムル者ナリ故ニ血氣ノ昏亂ニ常道ヲ
候者用之定之是以當飯ハ産後ノ要藥トス
通脉 脉ハ血府也當
飯補血和血劑タリ故ニ通脉者多ク用之
治帶脉衝脉之病 帶脉ハ
膽肝入二經ニ屬シ衝脉ハ十二經ノ血海トス皆屬血者也故當飯能以
補血帶衝二脉ノ病ヲ主帶脉ノ病ハ少腹痛腰力ナキニシテ患衝脉
ノ病ハ氣逆上ノ胸急痛ヲ患也當飯ノ主治スル所アリテ各有ト雖皆
補血和血ノ餘力
總緊
心ハ生血ノ藏タリ當飯ハ心血ヲ補ノ主藥ト
ス且性小温ニシテ血ヲ和シ血ヲ温兼テ少氣

和語本直

三

一

ヲ助諸血ヲ補ニ於

ハ此ヲ鉄コト勿レ

使藥

芍藥ニ合ノ肝血ヲ補川芎ニ合ノ血中ノ氣ヲ行熟地黃ト合ノ精血ヲ補フ

毒

當酸ハ性小温血熱ノ者ハ少煎藥ヲ合スルニ非ハ勿用之○不食膈滿者及胃氣甚虛者多用ニテ勿レ其其味ノ泥コトヲ恐テ也

○士枕曰脾胃瀉者忌之ト蓋當酸ハ心脾ヲ潤レル者

畏惡

也故脾胃瀉症其潤液ニ過テ瀉下ナラ盛テラテヲ恐テ也

蕭。牡。荊。生。姜。制。雄。黃。毒。

附方

當酸補血湯 血虛ノ發熱渴目赤面紅脉洪大ニテ虛ニ按之全無力

ヲ治ス當酸身酒洗一錢薑著蜜炙一兩水二鍾煎一鍾空心温服

出蘭室秘藏一切虛血半產ノ血多下或產後去血多或崩血過多

或金瘡出血多或拔牙血多出一切出血過多ノ後心煩眩暈テ夢

中ニナル者當酸二兩川芎一兩每一匙五錢水七分酒三分煎七分

熱服出婦人良方 衄不止當酸焙末レ每服一錢米飲ニテ下此聖

濟方 小便出血 當酸四兩剉酒三升煮一升頓服出肘後方 頭痛甚

者當酸二兩酒一升煮六分合飲出外臺秘要 心下刺力如二痛當

酸爲末酒ヲ以テ一匕ヲ服出必效方 大便不通當酸白芷等分爲

末每服二錢米飲ニテ下出聖濟總錄 佛手散 孕婦胎動腹痛者

用之若死胎則下不死則痛止當酸二兩川芎一兩粗末レ每服三

錢水一盞煎ツメテ乾トスル時ニ酒一盞ヲ入再煎ノ一沸レ温服ス出

備急方 小兒臍濕テ不乾 或腫或出水者當酸末ヲ傅或麝香艾許

ヲ加或胡粉ヲ等分ニス若愈後余ニ因テ復作者再傅出聖惠方 倒

產足先出ヲ倒產ト云倒產ノ子死ノ不出

愚案

當酸苦温説アリ或辛太温或

者ハ當酸末酒ニテ一匕ヲ服ス出子母秘錄 其辛温或小温ノ諸説アリ愚案ニ苦ハ燥辛ハ散ス當酸味苦辛

大温ノ物ヲラバ。何か故ニ補血ノ能アラシマ。洞君謂味辛。李當之謂小温下。此說實ニ宜シ。當故ハ辛小温陽中陰ニ可升。可降者ナリ。補血又助氣。佐使ノ藥ニ從テ上下周。

修治

當故ハ薄紫色者良。白色者草當故トテ不宜。蓋頭

身ニ行テ血ヲ補ノ要藥タリ。若草當故トテ不宜。蓋頭ヲ去ホニテエヲ洗淨ノ干。乾割微焙用ユ。愚案ニ水ニ浸洗コト久則。燻テ悪レ干乾コト強則藥弊乾テ潤ヲ失且焙コト強則此亦藥性燥テ皆血液ヲ潤ノ功ヲ失干コトハ俗ニ云シレ。佳焙コトハ微ハシマク宜トスヘシ。當故ハ補血ノ要藥タリ。乾燥セシムル時ハ補血ノ能ヲ失コトヲ恐テ也。行表通經ハ酒浸焙。血虛頭痛等ヲ治スル上行ニハ酒ニテ蒸。或酒ニテ煮有痰者ニハ姜汁ニ浸焙用ユ。吾朝ノ大和山城ヨリ多時シ裁出ス者其色白シ。且來時沸湯ニ煮日ニ晒テ其形ヲ鐵ニス。藥性燥ノ不宜。山中ニ自生者ヲ冬月ニ採テ水ニ洗乾

用則其潤ニ宜シ。瓦罐ニ納置テ蛙ハル様ニス。ハ真當故種ハ越中ノ山中ニ多存セリ。然凡人不之採コトナレ。啓カテ

川



本温。治諸頭痛。面上遊風。目淚出多。

芎



治諸頭痛。面上遊風。目淚出多。涕唾養新血。破宿血。治吐血。衄血。滿血。瘰癧。諸瘡。長肉。排膿。行氣。開胃。燥濕。止瀉。

痲冷寒痺筋牽心腹堅痛脇痛。主婦人無子。經閉。胞衣不下。腰脚痠痛。半身不遂。去諸寒冷氣。治一切風。一切氣。壯筋骨。調衆脈。△芎ハ芎ト向レ入ノ頭。亦テ密窮高也。芎第ハ上行ノ頭腦ノ諸疾ヲ治入。故ニ名テ芎第ト云也。芎ノ蜀中ヨリ出者ヲ川芎ト号。今芎第字畫多ヲ以テ皆通ノ川芎ト呼。治諸頭痛。面上遊風。淚出多。涕唾。川芎ハ辛温。浮ニ升。陽也。能頭面ニ上行シ。其辛ヲ以ハ散通シ。温ヲ以ハ開利入。故ニ諸頭痛ニ鉄コトナレ。然凡頭痛亦諸經ノ別アリテ不同。川

芎八足少陽膽經足厥陰肝經之本藥也故二肝膽兩經ノ頭痛及血虛ノ頭痛ニハ獨用之效ヲ致ス若ク太陽頭痛ニハ羌活陽明頭痛ニハ白芷太陽頭痛ニハ蒼朮少陰頭痛ニハ細辛及厥陰頭痛ニモ亦細辛血虛頭痛ハ多ハ左ニ在當故氣虛頭痛ハ多ハ右ニ在參耆頭項痛藁朮諸頭痛甚者ハ蔓荊子ト合用スベシ佐使ノ劑ニ從テ一切ノ頭痛ニ用ユ若厥陰頭痛甚ノ獨川芎ニシテ不能者ハ吳茱萸安陽頭痛甚ノ獨川芎ニシテ不能者ハ柴胡ト合用スベシ此東垣家ノ法也然レ川芎辛溫ニ散シ易シ故ニ氣虛頭痛ハ參耆ト合用スレテ氣虛甚者ハ藁朮トスベシ或用レ多クコト切レ面ト遊風トハ赤遊風トハ非ズ赤遊風ハ火毒遍身ニ遊行ノ一身赤腫痛丹毒ノ種類也此ニ謂遊風ハ頭面ノ風毒遊行ニ因テ或痛及腫或瘡ヲ生ズルノ類一切頭面ノ風症ヲ云川芎ノ辛溫上テ能風邪ノ結滯ヲ散セバナリ

目淚出多涕唾者モ

風邪ヨリ致ニ宜シ或元氣虛ノ津液ヲ不持カ故ニ淚涕多者ハ勿用之養新血破宿血川芎ハ直ニ補血ノ劑ニ非ズ時珍曰芎藭血中氣藥也川芎ハ血中ノ氣ヲ行者也凡新生ノ血ハ其氣怯ノ行難シ行ガレハ血活カタシ故ニ用之血中ノ氣ヲ行則血能流滿是以養新血ト云四物湯ニ川芎アルモ亦此義ナリ地黃當故ノ所生ノ血ヲ芍藥ニテ收テ不泄川芎導之流行セシムレハ不滯ノ周旋ニ充テ潤コトヲ致ス破宿血モ亦此義也川芎直ニ瘀宿ノ血ヲ破者ニ非ズ蓋血ハ從氣行行則何ノ瘀血ト云コト有ヤ故ニ川芎ヲ用テ血中ノ氣ヲ行則血行行則瘀血流テ留滯スルコトナレ治吐血衄血瀉血川芎ノ辛溫何ガ故ニ諸ノ血症ヲ止ヤ蓋血能經絡ノ滯度ヲ行則何外ニ出溢コトヲセンヤ皆其或滯或塞テ常度ヲ失カ故ニ溢テ外ニ泄出是以血中氣ヲ行者ヲ用テ血ヲ導則不滯不塞ノ常度ニ行血能常

度ニ行則自外ニ溢進コトナクノ止川芎升テ浮故ニ吐血衄血等ノ上
部ノ血症ニ於テ尤宜シ弘景云止齒根出血モ亦此義也療諸瘡長
肉排膿血滯塞則瘡ナリ痛ヲナシ膿ニ入川芎血中氣ヲ行テ血
ヲ導者也故ニ發背疽瘰癧贅痔癰疥瘡金瘡一切ノ瘡毒腫痛
ヲ療ノ肌肉ヲ生長シ膿ヲ排出ス蓋血行則肌内能生長ス且惡
寒ニ川芎ノ辛マ散入故ニ獨血中ノ氣ヲ行スノミナラス一切瘡腫ノ
毒ヲ散發スルコトヲ兼ベキ者欬行氣開鬱川芎ノ辛温行氣尤血
中氣ヲ行ニ宜シ且辛ハ散シ温ハ開ク故ニ氣鬱血滯ヲ開ニ宜シ然レ
香附ノ鬱ヲ治スルト不同香附ハ氣ヲ下テ鬱ヲ順ス川芎ハ鬱ヲ
開テ散スルコト譬ハ風ノ物ヲ吹散ニ似タリ故ニ夕用則元氣ハ散ス
ルノ害アリ或ハ川芎開鬱下ノ説アリト此モ亦升テ開カ故ニ降ス
有ニ取彼桔梗ハ升カ故ニ下氣ノ義ニ類ス燥濕川芎ノ辛温ナルガ

故也尤上部ノ風濕ニ宜シ或問川芎燥濕然何好古謂補肝血
潤肝燥下又古方四物湯ニ用之血液ヲ補ニ至マ日川芎ノ辛温能
濕ヲ燥ス然レ亦能血中ノ氣ヲ行ス肝ハ直ニ生血ノ蔵ニ非ス心
脾所生ノ血ヲ肝ニ納蔵ス者也以ニ川芎ヲ用テ血中氣ヲ行レ
血ヲ肝ニ導レムル時ハ肝血自滿潤ニ至ル是以補肝血潤肝燥ノ
功アリ然レ獨川芎ノミヲ用テ然レコト不能當故地黃等ノ補血
ノ劑ト合用スル時ハ尤血燥ヲ補潤スルニ至ル且生熟地黃等ノ補
陰ノ劑ハ藥性濕重難行滯泥レ易シ故ニ川芎ノ辛温開鬱ヲ兼
テ此ヲ滯泥セシメサルノ義アリ古人四物湯ノ地黃芍藥ノ重藥中
ニ用テ行者實ニ妙ナリ止瀉劑濕瀉ノ症用之或血痢ノ症已ニ瀉
下スト雖腹痛後重未止者ハ陰血虧テ氣鬱スル力故ナリ川芎
ヲ用テ氣行血調テ立ニ止此皆主方ノ藥中ニ加之爲佐也獨用

テ瀉痢ヲ治スルニハ非ズ。治寒痺筋牽痺ハ風寒濕ノ三邪交合ノ
致之。其寒亦勝者ヲ寒痺トス。痺ハ後世ニ謂痛風也。寒痺ノ痛ハ處
ヲ定テ不動筋牽テ伸コト不能。川芎ノ辛温ナル。寒濕邪ヲ散シ
血氣ヲ通行セシメテ治之。心腹堅痛脇痛或寒濕或瘀血或鬱氣ニ
因テ心腹堅痛ヲ治ス。脇ハ厥陰肝ノ部ナリ。川芎ハ厥陰肝經ノ藥。
故ニ脇痛ヲニエル。主婦人無子。川芎ヲ導血流行ニシム。血流行ノ不滯則
婦人自孕ニ至。此モ亦獨川芎ノミヲ用テ然ニ非ス。當故地黃等ノ滋
補ノ劑ニ合用。然者也。經閉。川芎ハ血中氣ヲ行テ血ヲ導行者ナリ。
故ニ婦人經水不通ノ主藥タリ。靈苑方ニ婦人經水不通二三月孕力
不_レ孕カラ驗ニ川芎生ニテ末トシ。空心ニ艾葉ノ煎湯ニテ一匕ヲ服ス。
孕則腹内微動不動者ハ孕ニ非ズ。胞衣不下。胞衣ノ不下マ惡血衣
中ニ瘀血滯氣塞テ不通ノミ。川芎ノ瘀血ヲ破。血氣ノ滯塞ヲ開通

流行セシムルヲ以テ下之ノ功アリ。腰脚軟痛。川芎ハ肝膽ノ二經ニ
入。此二經腰脚ヲ行。故ニ或濕ニ因或瘀血ニ因テ。腰脚或軟或痛ヲ治
然。川芎辛温ニシテ浮升ヲ以テ上部ノ功盛。下部ノ功ハ強カズ。腰
脚軟痛ノ治モ此カ要能トスルニ不足。半身不遂者。氣虛アリ血虛ア
リ。氣虛者ハ參耆貝宜シ。血虛者ハ補血ノ劑中ニ川芎ヲ合用シ。血ヲ導
テ左右ニ周流通セシム。去諸寒冷氣。辛温ナルカ故ナリ。尤上部及經
絡筋骨ノ間ニ塞寒冷氣ヲ散通ス。治一切氣一切風。川芎ノ辛温帶氣ヲ通
爵氣ヲ開テ諸氣ヲ治スト雖。辛ハ散スルカ故ニ氣虛症ニハ斟酌スベシ。且
此カ辛温ヲ以テ一切ノ風邪ヲ散發ス。尤上焦頭面ノ風症ヲ主治ス。及風
痰ニ用テ殊効アリ。或問。川芎一切風ヲ治則諸風症ニ獨用之能散發ス
ルヤ。曰。川芎獨用テ散發ノ劑トスルニハ不足。諸風藥散發ノ劑ニ合入ノ
ハ自發散ノ功ヲ致ス。彼香白氣香蘇散等ニ入テハ。紫蘇羌活ノ風藥ニ

和語本草 卷之三 一五

合ノ自發散ノ勢ヲ致ス獨用テ然ニ非ス若其川芎發散ノ劑タルハ
何四物湯ニ用之虚損ヲ補ノ效ヲ取シマ壯筋骨通脉此皆血中ノ
氣ヲ行テ血ヲ流行セシムルカ故ナリ本草准云川芎性走竅而無
滯能助血流行血中氣藥也
ト血流則筋骨潤脉道通利ス
主藥也且風濕ヲ散シ血中氣ヲ行テ血ヲ流行セシム補血ノ劑ニ合
入ノ血分ヲ引導テ肝血ヲ

使藥

白芷ヲ使トシ能頭痛ヲ治ス
當散地黄芍藥ニ合多能血ヲ

潤シ開鬱利氣要藥ナリ
補ニ桃仁紅花ニ合シ瘀血ヲ破細辛ニ合シ金瘡ヲ療シ痛ヲ止牡
蠣ニ合シ頭風吐逆ヲ治シ紫蘇羌活ニ合シ風ヲ散シ麥芽神翅ニ
合シ濕ヲ治シ瀉ヲ
毒 川芎辛温ニ走散ス故多用久用則真氣
ヲ散亡メ天死ス故ニ元氣虚弱者ハ斟酌

スヘシ血虚ノ症ト雖久用コト勿レ久則氣ヲ散ス氣散則陰彌虚
陰虚ニ熱氣骨中ヨリ蒸カ如ニ熱者ヲ骨蒸ト云骨蒸有汗者勿
用之辛温骨中ニ走竅シ表氣ヲノ開發セシメシコトヲ恐ル○上盛
下虚虚火上衝ノ嘔吐者勿用之○痘疹起發セサル者川芎ヲ使コ
ト有花多用コト勿レ多則上升ス○一切熱アル者ハ詳ニ用之藥
性辛温

畏惡

黃連ヲ畏レ
雌黃毒ヲ伏

附方

跌僕或重ヲ拳テ損傷或
子死腹中者川芎爲末酒

三テ一ヒテ服ス一二服ノ死胎立出千金方ニ出齒取口臭川芎ヲ水
ニ煮三人合出廣濟方崩血下血日夜不止川芎一兩生地黃汁二合酒一
大盞煎五分徐
服之出聖惠方
愚案 川芎久用多用則真氣ヲ散ノ暴死スルノ
義アレ推川芎一味ヲ服用者如此諸藥ニ
合入ノ他藥ノ佐使ヲ得テ用則強テ恐ヘカラス本草准云若具五味

君臣佐使配合得宜寧致此哉。然雖久服常服之。又他藥合入元真氣散之。義アルベシ。妄ニ恐モ不可。妄ニ不恐モ亦不可也。惟藥效ニ中ラハ速ニ止之。過用スルコト勿レ。時珍説ニ辛ハ散肺。川芎辛久用則肺偏ニ勝テ肝木偏ニ絶ノ天死ス。ハ理ノ悞也。夫辛味ハ入肺。辛味少用則肺ヲ養過則肺ヲ傷ル。五味皆然リ。此内經ノ旨。余カ愚意ニハ非ス。然則川芎ノ辛久服則一反テ肺ヲ傷ヘシ。且辛ハ散入肺ハ氣ノ藏。辛ヲ用コト久則肺氣散メ傷ヘシ。何ゾ肺金偏ニ勝。肝木此カ尅勝ヲ受テ偏絶スルノ理。アシマ。時珍説ハ惟五行相尅。上五味其本藏ニ散スルノ義。上泥テ云ナリ。到干乾テ用ユ形六三雀ノ頭腦ノ如ク。重實ニシテ裏色白。油氣ナク嚼之辛耳ナル充良形。小者ハ力少シ。惟爵ヲ開ノ功アルニ。和川芎ニ三品アリ。丹後山城大和豊後肥後ヨリ出。丹後ニ生者雀腦ノ如ク。上品然。正希也。山城大和ニ生者ハ丹後ノ品程ニハ非レ。豊後肥後ニ生者ヨリハ優レリ。豊後肥後者ハ輕虛嫩小ニシテ最下品不足用。或人曰此草牛ノ病ニ良。故ニ和名牛草ト号。丹後ハ牛ノ多處タレハ此草自生セリト。近代和川芎ヲ貴テ漢芎ヲ不用。此蓋由來アリ。中古漢芎高直ニノ一兩ノ價十六錢目セリ。此時人多和芎ヲ採テ漢芎ヲ不用。コレヨリノ遂ニ和芎ヲ貴テ然モ精粗ヲ不擇。考ニ和芎ハ丹後者良ト雖不多他處者ハ多クレ。正不可則惟漢芎ノ形雀腦ノ如ク。重實辛其者ヲ擇用テ可也。○和朝ニ撰スル修治纂要ニ川芎忌火トス。然正本草家ノ諸書ニ遂ニ忌火ノ説ナシ。何ニ從テ然云ヤ未詳也。愚案ニ川芎ハ香氣稍烈。纂要ニ忌火者ハ此カ失香氣ヲ恐ナシク致

修治

八月ニ採テ土氣ヲ洗。盧頭ヲ去

辛温。○治頭面諸疾。癩風邪。表汗。通九竅。破宿血。養新血。止血。症瘕。諸瘧。止痛。

白 綱本



竅破宿血養新血止血症瘕諸瘧止痛

和語本

卷之三

八十二

非張長治女人赤白漏下血閉陰腫解砒毒蛇傷刀箭△徐錯云
初生根幹爲正上此草初ヨリ根正ノ色白ヲ以白芷ト名ク治頭面
諸疾白芷ハ手陽明太腸經ノ本藥也太腸ハ肺ノ府肺大腸ハ俱ニ
金トス金ハ白色辛味故ニ白芷ハ手陽明ニ入又手太陰肺經ニ入
及足陽明胃經ニモ引者也且氣輕ノ升陽也其辛温能開散又故ニ
頭面ノ留滯ヲ散通ノ一切頭痛齒痛眉稜骨痛頭眩目連目癢目
淚流目赤努肉出ヲ治ス以上ノ諸症風熱濕熱ニ属者及手陽明頭
痛ニ尤宜シ或面脂ヲ去顔色ヲ潤ス或細辛ト合ノ鼻病ヲ治ス尤
鼻淵症ニ宜シ鼻淵ハ濁涕多流出テ不止也○以上白芷所治ノ
功ヲ察ニ川芎ノ能ト相同ニ似タリト雖川芎ハ上行ノ滯鬱ヲ開散
ス白芷ハ上行ノ留滯ヲ開散スルコト強ク正ハ通スルコト強シ
故ニ多ハ川芎日芷合用ノ頭目ノ留滯ヲ散通ス療風邪表汗白芷

ハ太腸胃肺ニ經ノ藥也肺太腸ハ表裏ノ皮膚ヲ主リ胃ハ肌肉ヲ
主ル且白芷ハ辛温芳香ノ物ニシテ留滯ヲ開通開散ス故ニ風邪ヲ逐
テ表汗ノ功アリ腸風血風風痺等皆用之風滯ヲ開通ス一過九竅兩
耳兩眼兩鼻孔口前陰後陰此ヲ九竅トス白芷能九竅ノ滯塞ヲ開
通ス然レ愚案スルニ白芷ハ輕ノ浮能頭面ニ上行ス故ニ耳目鼻口ノ
留滯ヲ通スルニ尤宜シ下竅ノ功ハサカラシク破宿血養新血白芷
ハ紅花桃仁ノ如クハ非レ凡亦能瘀血ヲ破者也是以女人ノ月經不
通ニ用ユ養新血トハ瘀血ヲ破ニ因テ云直ニ補養スルニハ非ズ凡古
血ノ瘀滯アル時ハ新血自流行スルコト難シ故ニ破宿血則自新血モ亦從
テ行コトヲ得バセ直ニ此カ血ヲ補養スト心得テ血虛ノ劑中一用ト
勿レ止血症小使血大使血婦人不時大血ヲ漏レ或長血白血ヲ止ム
案ニ白芷ハ諸血症ヲ止ト雖其血分或風濕ヲ祛或瘀血ヲ兼ニ然ル者

右宜血虛ノ血ヲ不收故ニ去血者ハ斟酌スヘシ療諸瘡止痛排膿長肌
白芷ハ破瘀血留滯ヲ開通スルガ故ニ諸瘡ヲ療ス右發背恒瘰癧痔
疥癬女人乳腫及陰戶腫ニ用ユ然レ血虛症ニハ斟酌スヘシ但風熱濕熱ノ
留滯瘀血ノ畜積實症ノ者ニ用之止痛排膿長肌或腰痛者ニ白芷ヲ
用テ止痛亦風熱瘀血ニ屬者ニ宜シ或心腹刺カ如クニ痛者白芷ヲ用
テ止痛者ハ瘀血ノ上衝ノ然ニ宜シ此症婦人ニ尤多トス治女人赤白漏
下血閉陰腫辨皆右ニ詳也漏下ハ不時ニ大ニ月經漏下ヲ云或血崩
疝号長血白血漏下月經閉テ久不通或陰戶ノ腫痛ハ皆コレ風熱
濕熱血分ニ留滯レ或瘀血ノ滯ニ因テ然リ故ニ白芷ヲ用テ留滯ヲ
開通シ瘀血ヲ破テ治之若又全血虛ニ因テ赤白漏下血閉者ハ白
芷ノ宜所ニ非ス解砒毒蛇傷刀箭白芷ハ留滯ノ氣ヲ開通ス故ニ
砒霜石ノ毒工切惡虫ニ傷ラレ或金瘡斃等ノ滯ヲ去痛ヲ止神隱書

云種白芷能辟蛇ト白芷ノ芳香ナル諸蛇ノ畏所也實ニ蛇傷ヲ治
スヘキト明ナリ夷堅志曰徑山寺ノ僧蛇ニ傷ラレ百藥不效白芷末
ニ膽礬麝香サ許ヲ加テ
疹ハ惡水出テ愈タリト
開通ス故ニ頭面鼻目ノ諸症ヲ治シ皮膚分肉ノ間ノ諸邪ヲ逐テ瘡
腫痛癢ヲ治シ尤風熱濕熱ヲ去瘀血ヲ破工切ノ齒痛ヲ治スル要藥
也蓋白芷ハ手足陽明經ノ藥也
ノ齒根ハ手足ノ陽明經ニ屬スル也
麻ト合ノ手足陽明經ニ通行シ亦手太陰經ニ入辛夷細辛ト合
ノ鼻病ヲ治シ川芎ト
合ノ諸頭痛ヲ治ス
毒 白芷辛温故ニ陰虛火熾上衝者ニハ勿
用○白芷風熱濕熱ヲ散スト雖血熱
者ニハ勿用○白芷諸瘡ヲ療スト雖癰疽已潰ノ後ハ新裁去スヘシ

總藥

使藥

白芷ハ辛温ニノ開散ス氣虛者ニハ斟酌スヘシ○白芷ハ足陽明經ノ本藥也足陽明經ハ頭額及面鼻ニ行コト專ナリ故陽明頭痛面鼻ノ諸病ヲ治ス然レ氣味辛温タレハ右關脉實數ニノ胃熱アル者ハ

妄勿

畏惡

旋覆花
ノ惡ト

附方

頭面諸風 白芷切剉萊菔汁浸シ日乾爲末每服二錢白湯三下ス

或鼻ニ吹入出直指方 偏正頭風 天下第一方也白芷炒二兩五錢

川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩每服五錢細茶導引煎湯ニ下出試奇方 風熱痰ニノ眉稜骨痛 白芷黃芩酒浸炒等分爲末

每服二錢茶清ニ下出丹溪纂要 風熱ニノ牙痛 白芷一錢朱砂五分爲末蜜ヲ以艾實大二丸レ頻ニ擦牙出醫林集要 口齒氣臭 白芷

川芎等分爲末蜜ニテ艾實大二丸レ日ニ嚙之出濟生方 脚氣腫痛 白芷白芥子等分爲末生姜汁ニ和ノ塗出醫方摘要 烏金散婦人

產前產後虛損月經不調崩漏及橫產逆產ヲ治ス白芷百草霜等分爲末沸湯ニ童便ヲ入醋ト同調テ二錢ヲ服ス出普濟方 鼻血不止所出血ニ白芷末ヲ調鼻山根ニ塗ハ止出簡便方 一切腫毒熱痛醋

ニ白芷末ヲ調塗出衛生易簡方 刀箭傷金瘡 白芷嚼爛テ塗出集簡方 諸骨明ニ刺者 白芷半夏等分爲末水ニテ一錢ヲ服則出出普濟方 毒蛇傷

白芷ト川芎ト氣味性功大槩相同ノサ異也

醫案

白芷ハ上テ結毒ヲ開散シ白芷ハ上テ凝滯ヲ開通ス川芎ハ辛温ヲ其氣烈故ニ真氣ヲ散スルノ恐アリ白芷ハ辛温ト雖川芎ノ烈ニ不同川芎ハ血中ノ氣藥タリ故ニ補血ノ劑中

ニ用之白芷ハ推宿血ヲ破ノミ故ニ補血ノ助ニ用コトヲ致シ難シ且白芷ハ足陽明經ニ引テ分肉ニ行キ太陰經ニ引テ皮膚ニ行故ニ皮肉ノ間ニ滯留邪氣ヲ除ニ宜トス

修治

二八月ニ採
土氣ヲ洗

麋皮ヲ刮去日ニ乾シ剉微焙用ユ。或黃精ト等分ニ合シ同煎晒乾テ
 微焙用ユ。今人採テ寸許ニ切石灰ニ拌晒テ其色ヲ白シ并蛙ト
 ヲ碎トス此皆藥性ヲ損ノ不宜若如此ヲ用ハ石灰ヲ洗去テ微焙
 用ユ。愚案ニ本朝ニ所撰ノ修治纂要ニ白芷忌火トス此ニ從テ和
 朝唐醫書皆謂白芷忌火ト實ニ誤ナリ本草家ノ諸書ニ白芷微焙ノ
 義アリト雖遂ニ忌火ノ言ナレ今ノ和俗川芎白芷俱ニ忌火者ハ纂
 要ニ誤之ニ因テ也案ニ白芷ハ芳香アリ故ニ古人稱ノ香白芷ト云
 修治纂要ニ忌火者ハ其芳香ヲ失ユトヲ恐テ云狀

芍藥



癩口療血閉固膿和血解肝安脾收胃氣△芍藥ハ婢約ノ義ニ取婢

約ハ美好貞此草ノ花容美好ナルヲ以芍藥ト名ク芍藥ニ赤白ノ
 兩種アリ花赤者ハ根赤花白者ハ根亦白色也其赤白ニ從テ性
 功不同然凡本草ニ此ヲ記コト一條ナリ今神農本草經及別錄并好
 古甄權元素大明時珍等ガ所述ノ芍藥主治ノ功中ヲ考テ白赤
 芍藥ノ兩條ヲ立ユト左ノ如シ入肝脾血分肝ハ血ヲ藏脾ハ血
 ヲ統芍藥ハ肝脾ノ血分ヲ收テ不泄者也故ニ四物湯用之血虛ヲ
 補補肝血不足肝ハ東方ノ木藏木味酸芍藥味亦酸ノ肝ニ行酸
 味收斂ノ不泄者也故ニ肝血不足ヲ補充シム蓋芍藥ハ雖補血此ガ直
 ニ補血者ニハ非ス味酸ヲ以テ津血ヲ收聚テ不泄也不泄則自充滿
 入彼梅酸ヲ食テ必口津ヲ致ニ同シ此梅ガ津ヲ生ハルニハ非ト雖其
 酸味ヲ以テ津ヲ收聚ガ故ナリ是以補血者ハ當酸地黄ノ直ニ生血
 者ヲ主トシ此ガ助ニ芍藥ヲ用ユ芍藥ハ壁言堤坊ノ如シ流ノ源盛ナリ

ト雖是坊ノ防聚者ナキ時ハ水自分散ノ滿大ナルコト不能當彼地
黃ヲ以テ血液ヲ補フ雖芍藥ノ堤坊ナキ時ハ其血分散ノ肝ニ入
滿コト不能也成無已云芍藥之酸飲津液而益營血トハ是ナリ
涼血熱芍藥行血分其性寒タリ故ニ血熱ヲ涼是以虛寒者ハ勿用
或虛寒者不得已ノ用之酒炒ニ其酸寒ヲ減テ用ユ治腹痛丹溪曰
凡腹痛多是血脈凝滯亦必酒炒用然止能治血虛腹痛餘並不治
爲其酸寒收斂無溫散之功也ト此說尤是ナリ芍藥ハ厥陰肝經ノ
血ヲ收者故血虛シ肝經急道ニ腹痛者用之收血滿血則肝急自
潤潤則自緩テ其痛止ル然凡血得寒滯得溫行芍藥ノ寒性血脈ヲ
凝滯セシメシコトヲ恐テ酒炒ニスルノミ或問長澤道壽家ノ藥性傳ニ
芍藥調腹中ト然則芍藥ハ獨血虛ノ腹痛ニノミ不止一切ノ腹痛ヲ
治スヘシ疑丹溪ノ義不是乎曰調トハ過不及ナク和平ヲ致ノ義ナリ

腹中ハ脾胃肝腎大小腸ノ雖所居專此ヲ總主者ハ脾胃ナリ脾
胃ハ甘温ヲ欲ノ寒涼ヲ惡何芍藥ノ酸寒者ヲ以テ腹中ヲ調ノ義
アラシマ且諸腹痛ハ中焦脾胃ニ屬ス甘温ヲ以テ中氣ヲ開順スルニ
宜シ酸寒收斂ハ雖非所好血虛ノ腹痛スルガ如ハ芍藥ヲ用ヒテ調
之然凡其酸寒ヲ惡テ此ヲ酒炒ニ制表ス實ニ丹溪ノ說ヲ得タリトス
ベシ瀉痢芍藥治泄瀉痢疾者深義存セリ世人多ハ芍藥ヲ以テ脾
胃ヲ和シ陽氣ヲ扶テ瀉痢ヲ治ス云ハ甚誤也芍藥ノ酸寒何ハ私
中扶陽ノ義アラシマ夫泄瀉ノ病タル腸胃ノ氣疎豁ニシテ水穀ヲ絞
コトサノ糟粕中ニ水津ヲ並雜テ瀉下ヲ致ス故ニ芍藥ノ酸味收斂
ヲ以テ腸胃ノ氣ヲ收束セシムル時ハ水穀ヲ絞分テ糟粕自堅ノ
泄瀉産譬酒ヲ絞ニ似タリ芍藥ノ酸味收斂ハ絞水ノ如シ未絞ノ醴
酒ハ水穀相分サル泄瀉ノ如シ此ヲ絞水ニカケテ絞則清酒ハ分泄

糟ハ堅分カ如ク。芍藥ノ酸味收斂ノ絞木ヲ以テ腸胃ノ氣ヲ收束
スル時ハ水津ト糟粕ト能相分テ。糟粕堅則大便泄下自愈トヲ致
或熱瀉ノ症ハ芍藥ノ酸寒尤宜シ。中焦虛寒ノ瀉ニハ非所好或用之
酒炒ニ製テ温劑ト合同スヘシ。又此カ痢疾ヲ治スルニ至モ深意存ス
ルコトアリ。蓋痢病ノ由ハ腸胃中ニ積滯物アリテ。此カ通泄セザルガ故ニ
數劑ニ走行是以治法ノ始。檳榔大黃等ノ下藥ヲ以テ其積滯ヲ通
則病自愈。此内經ニ謂通因通用也。芍藥ハ酸味收斂ノ物タリ。痢病
ノ疎通ヲ欲スルニ於ハ似不可然ニ用之。治痢者ハ何ゾヤ。此其疎通ヲ
速ニセシコトヲ欲ノナリ。何如トナレハ。譬流水ノ如キ。堤ヲ校ノ防流ノ末
ヲ留テ防則水倍ノ勢盛ニ速ナリ。檳榔大黃等ノ通下ノ劑中。芍
藥ノ酸味ヲ合同則其酸味收束ニ從テ。檳榔大黃ノ疎通ヲハツミ
シメテ速ニ下則積滯泄去テ痢疾痊。芍藥湯ノ方意此義ナリ。然則

此カ治痢ノ功ハ通利ノ劑ト合同ノ致者也。何此酸味收斂者ヲ獨
用テ治痢ノ義アラシヤ。如此ノ類。諸藥ノ功ニ多存セリ。陳皮補中焦
得芍藥然リ。甘草治咽痛得桔梗然リ。芍藥ニ本草ニ所謂功能一通ヲ
ノミ知テ。其主能ノ由ヲ不辨藥石ノ功ヲ盡コト不能ト云。或問東垣以
白芍藥補脾氣升陽。章宜滙曰。治中氣下陷而成瀉痢。然則此カ
泄瀉痢病ヲ治者ハ補中氣ニ限リ。吾子何酸味收斂ヲ以テ瀉痢ノ
功ヲ立。和中扶陽ノ義ナレト云乎。曰東垣以芍藥中焦ノ陽氣ヲ升
ト示義存セリ。蓋芍藥ノ酸寒者何獨用テ升陽ノ義アラシヤ。東垣
用之升陽トハ。參芪木茸等ノ甘温補氣ノ藥中ニ芍藥ヲ合同則其
酸味收斂ヲ以テ温陽ノ藥氣ヲ收束テ泄シメサル時ハ。陽氣能九
ヲ得テ充滿薰蒸ノ升上ス。譬懸底ノ穴大則陽氣ノ熾升反也。勃也。
其穴ヲ小ニシテ湯氣ヲ釜中ニ收束則陽氣能釜中ニ充滿ノ薰蒸ノ勢カヒ

本草綱目 卷之三 三十三

盛ニ能升上スルコトヲ致入湯氣ハ表未等ノ補藥ニ同シ。既底ノ穴ヲ
小ニシテ不泄者ハ芍藥ナリ。不泄則滿滿則能升故ニ東垣以爲升
陽必補氣耳温ノ劑ニ合ノ然ラ云也。其酸寒何獨用テ升湯ノ義ア
ランマ。章宜雁ニ所謂モ亦右ニ辨ズル東垣ノ義ニ從者ナリ。丹溪先生
芍藥ヲ産後ニ不可用ト云ハ其酸寒ハ生發ノ氣ヲ伐ヲ以ナリ此獨用
テ升陽扶陽ノ義ナキコト知ヘシ。治胎前産後諸疾婦人妊孕ノ道ハ
專血分ノ養當ニ因ナリ。芍藥ハ肝血ヲ補助スルノ劑タリ。故ニ用之産
前後ノ諸疾ヲ治ス。然レ産後ハ血虛不レ雖亦生發ノ陽氣未復
故ニ芍藥ノ酸寒ヲ用則生發ノ陽氣ヲ害ス。是以丹溪先生曰芍藥ヲ
産後ニ用ハ酒炒ニレ其酸寒ヲ減テ用ト。諸失血芍藥ノ酸寒ヲ以テ
血分ヲ收束ノ不泄故ニ大便血ヲ收及諸出血ノ後用之肝血ノ不足ヲ
補滿シム。中滿一肝木ノ和乘脾腹中滿者用之肝ノ丸邪ヲ平則脾土

丸ノ誤也。味酸ハ收斂ノ肝木生發ノ氣ニ反故ニ酸ハ肝邪ヲ平ニ可
方ノ肝不丸則脾胃土自安ノ痞滿産此酸寒何脾胃ヲ補コトアラ
之。腰痛章宜説ニ脾氣虛ノ濕氣流腎腰痛ス。芍藥ヲ以補脾中
氣運行ノ痛愈トハ誤ナリ。愚案ニ肝與膽表裏ス。膽經ハ專腰脇ヲ
流芍藥ヲ以テ肝血ヲ補則膽經モ亦潤緩ノ腰痛愈。或肝ハ三筋
腰ハ筋ノ大會ナリ。故ニ芍藥ヲ以テ肝血ヲ補則經筋潤緩ノ腰
痛愈ヘシ。或曰酸ハ雖走筋酸味ハ收斂者タリ。收斂則縮急スヘシ。然
ニ五字ヲ謂經筋ヲ潤緩ス。緩字疑ハ誤乎。曰酸味ハ收斂ノ血液
ヲ不泄則滿血滿則潤潤則柔緩也。彼枯燥木ハ堅急潤生木ハ柔
緩ナルニ同シ。故肝血滿則筋潤潤則筋緩シ。是以酸味ハ收束ノ縮
急セシムト雖芍藥ノ酸味ヲ以テ血ヲ滿則筋潤テ自柔緩ニシ

縮急ヤス東垣肝血ノ虚急ヲ緩ルニ四物湯ヲ用テ芍藥ヲ主トス
ル者是ナリ **煩熱** 陰不足ノ胸中煩熱者及肝火旺逆ノ煩熱スル
者ヲ治ス **寒熱** 寒熱往來ハ其本熱ニ在芍藥ハ酸寒ノ劑故ニ血熱
ヲ清シ肝火ヲ瀉シ寒熱往來ヲ療ス肝癰症柴胡ト合フ可ナリ
脇痛 脇ハ肝部故ニ脇痛者芍藥ヲ用テ肝血ヲ補ヒ肝邪ヲ瀉シ治之
夫芍藥ハ肝ノ虚實俱ニ療ス蓋芍藥ノ酸味收斂ハ肝血ノ不足ヲ充
シ又其酸寒收斂ハ肝木生發ノ亢烈ヲ逆シ制ノ肝實ヲ瀉ス此處
實ニ要劑ナリ **欬瘡口** 芍藥補血又血熱ヲ清ス且其收斂ヲ以テ
諸瘡ノ破口ヲ斂瘡ス **瘵血閉** 芍藥補血又瘵血ヲ逐故ニ女人ノ月經
閉テ不通ヲ治ス **固瘕** 芍藥ノ酸收ヲ以テ瘵理ヲ收閉テ固クス案ニ
本經ニ諸芍藥益氣ト芍藥ノ酸寒ヲ以テ何益氣ノ義アラシマ此
蓋其瘵理ヲ固スルヲ以テナリ瘵理固收則氣不泄故ニ益氣ト云且

三氣ヲ補益スル者ニハ非ズ **和血** 血熱ヲ清シ血虚ヲ補瘵血ヲ逐テ一切
血分ヲ調和ス **瀉肝安脾收胃氣** 肝ハ將軍官生發ノ氣ナリ
芍藥ノ收斂者其氣ニ逆テ肝有餘ヲ瀉シ又肝火ヲ瀉ス安脾者ハ脾
ハ土ニ屬シ且統血芍藥ヲ以テ肝木ヲ制則脾土ノ尅ヲ免又芍藥ヲ以
テ脾所統ノ血ヲ補則脾自安全ナリ收胃氣モ亦制木尅ヲ除中
氣ノ散耗ヲ收テ不泄カ故ナリ此皆酸味收斂ノ氣ヨリ致所也直ニ
脾胃ヲ補ニハ非ズ夫中焦ハ甘温ヲ欲ソ苦酸寒者ハ非所好芍藥
ノ酸寒何如ゾ直ニ中焦ヲ補マ惟肝木亢テ中焦土位ニ乘スルカ故
ニ脾胃虚者ハ補中甘温ノ劑中ニ芍藥ヲ合同シ木邪ノ有餘ヲ瀉ス
トキハ土尅冠テ中氣安全ナルベシ然ニ過用スルコト勿レ酸收ハ陽氣
ヲ伐易ク寒ハ胃氣
葱既 白芍藥ハ收斂ノ血ヲ不泄故ニ肝血
ヲ損易シ詳ニ用之

其性寒ナルガ故ニ血熱ヲ清シ肝火ヲ除キ升逆ノ氣ヲ折者也

使藥

須丸コノ使ナシ。須丸ハ代赭石ノ一名ナリ。禹錫曰別本

須丸作雷丸。本邪ヲ制シテ中焦ヲ補ニハ白朮ト合ス。肝邪ヲ瀉スルニ川芎ト合ス。補血ニハ當歸地黃ト合ス。腹痛ヲ治スルニ甘草ト合

入。黃連ト合フ屬熱瀉劑ヲ治ス。防風ト合フ痘疹ヲ發ス。夏月腹痛

肺熱アル者ハ。三黃瀉劑ト合ス。惡熱ノ腹痛ハ黃柏ト合ス。惡寒ノ腹痛ハ

肉桂ト合用ス。痢病後重

ニ檳榔子ト合用ス。毒 芍藥ハ收斂寒性ノ者ナリ。故ニ生發

用之。○或血虛者ト鮮血分寒症ハ勿用。或用ハ酒炒シレ。又ハ肉桂ト

合同ス。○産後妄ニ用之。生發陽氣ヲ伐。若用ハ酒炒ニス。○胃氣

下陷者單ニ勿用之。酸寒收斂タレハナリ。○食

傷腹痛中寒腹痛尤忌之。酸寒收束ヲ以ナリ

畏惡

鐵器ヲ忌。石解。苾消

ヲ惡消石。醋中。小劑

附方

血路血 白芍藥一兩。犀角末二錢。半新水ニテ一錢ヲ服。則血止。出古今

録驗 魚骨明ニ立者。白芍藥

愚案

芍藥ノ補血。禹錫曰制逆清熱。者ハ其酸寒收斂ヨリ致者

也。芍藥ノ王能千變五種ト雖。其本ハ唯酸收ノ氣味ヨリ生者ナリ。

好古曰手足太陰行經藥ト案。ニ芍藥ノ白色ト收斂スルヲ以テ

手太陰肺經ノ藥トシ。脾ハ統血。芍藥補血ヲ以テ足太陰脾經ノ藥

トスル乎。疑此說未是。芍藥ハ足厥陰肝經ノ血ヲ補者トスベシ。若

脾肺兩經ノ藥トシ。肺脾不足症ニ妄ニ用之。其酸寒上中焦ノ元

氣ヲ傷テ致害コト不サト云。○或問芍藥ハ微寒。トシ大寒ナラズ。

黃連黃芩山梔黃柏等ノ寒甚ニ異テリ。吾子何恐之。忌コト多乎。

曰。春夏ハ溫暖ニシテ万物ヲ生發ス。秋々ハ微寒タリ。其氣收斂ニシ

万物ヲ殺伐ス。芍藥ハ微寒ニシテ今連施栢ノ甚寒ニ異ナリ。其氣味收斂ニシテ秋殺ノ令ニ似タリ。故ニ寒ニ用之則生發氣ヲ伐サレテシヤ。本草曰。雖微寒如芍藥猶且諄人。出曰。成上。寇氏云。械芍藥以避中寒下。此皆收寒ヲ恐ニシテ然リ。元素謂白芍藥入脾經補中焦ノ説ニ惑テ直ニ補氣補中ノ劑トセバ入テ損ユトサカラレシ。

修治

芍藥ハ二月八月ニ根ヲ採用ユ。人家ニ種者肥大ナリ。其氣味薄。

山野ニ自生者佳。其花單瓣者尤宜。採得テ米泔水ヲ以テ上氣ヲ洗テ乾銅カヲ以テ對用ユ。血熱肝火ヲ涼ニシテ生ヲ用ユ。腹痛瀉痢産後ニ用ハ酒炒ニス。補血ノ劑ニ用ハ醋ニ浸炒用ユ。或肉桂ト合シ酒ニ浸俱ニ拌炒。桂ヲ去テ芍藥ヲ用レバ其寒收性ヲ減シ虛寒者ニモ或用ユ。或謂血虛者ニハ根ノ用ト案ニ唐ヨリ來芍藥ハ和ノ産ト云。其生ト堅重シ。和産ハ信州ヨリ出者良。醫國ノ芍藥ハ多ク乾時ハ白ト雖水

ニ似セハ赤色ニ變ス。信州ノ者ニモ二品アリ。一ハ真ノ芍藥也。一ハ本草ニ謂草芍藥。和ニ謂山錫杖。又土鴉結ト云者ナリ。其形單瓣ノ白芍藥ニ似タリ。故ニ多クコレヲ炮采テ四方ニ貨宜擇テ用ヘシ。赤芍藥酸微寒。○行滯血。下結氣。利小便。消腫。去肝熱。血熱。破聖積。治赤目。腸風。下血。○赤芍藥ノ氣味行經ハ右ノ白芍藥ト同然。凡赤芍藥ハ白芍ヨリモ收斂ノ氣性薄。蓋白芍ハ西方收斂ノ金氣ヲ稟。赤芍ハ南方ノ火氣ヲ兼者也。故ニ能滯礙ノ氣血ヲ破テ癥瘕積聚ノ堅ニ用ユ。又血熱ヲ涼シ氣血ノ滯ヲ破カ故ニ腫毒ヲ消。眼目赤痛ヲ除キ。血熱滯血ノ下血ヲ治ス。又能小便ヲ利ス。然凡此カ直ニ小便通利ノ劑ニハ非ス。夫芍藥ハ津液ヲ收停テ滿シタル者也。津液滿則水道通入。然上雖白芍ハ收斂ノ盛ナル者也。赤芍ハ收斂薄ノ南方陽火ノ行道ヲ得ガ故ニ津液ヲ停ノ間ニ於テ自行ノ義ヲ存

和語本草 卷之三

ノ小便通入。東垣曰古人以酸瀉為收。本經何以言利小便。曰芍藥能益陰滋濕而停津液。故小便自行。非因通利也。愚案二赤芍雖利小便。獨用其功不大。宜通利ノ劑ト合用スヘシ。

總纂

李杲曰白者色在西方故補。赤者色在南方故瀉。血虛ニ

ハ白芍。瘀血結氣ニハ赤芍。血脈ヲ通スルニハ赤芍。血脈ヲ滿シムルニハ白芍ヲ用ニ。本草二芍ノ功同シ。白芍ハ收斂ノ血ヲ不泄。赤芍モ亦雖收斂血。收中ニ於テ推通ノ義ヲ存ス。故瘀血結氣ヲ破リ利小便ノ能アリ。

使藥

白芍藥

毒

血虛産後及癰腫已潰後ハ不可用。他ハ皆右ノ白芍ト同シ。

畏惡

右

白芍藥

附方

痲病ニ赤芍藥一兩。枳實一箇。切。畏煨為末。每一錢。水一盞。煎七分。空心服。出博濟方。収不止。赤芍藥為末。水服二錢。出車林廣記。如神散。婦人不時血大下。及帶下ヲ

治ス。赤芍藥。香附子。等分。為末。每一貼。三錢。鹽一捻。水一盞。煎七分。温服。入舌腫強テ口中ニ滿者ハ急症ナリ。赤芍藥。甘草。煎。水熱シテ

口瘡出。聖

愚案

芍藥治腹痛。血虛ノ腹痛ハ宜。白芍。瘀血ノ腹痛ハ赤芍ヲ用。芍藥治經閉。血虛者ハ白芍。瘀血者ハ赤芍ニ宜。

修治

今ノ藥店ニ多クハ赤芍中ニ白芍ヲ

雜正。白中ニ赤芍ヲ混入。宜撰テ赤白ヲ分明ニシテ可用。其功不同也。

木香

綱本



辛。苦。温。治一切氣。冷氣。痰結。腹痛。心。痛。嘔吐。反胃。霍亂。虫積。瀉痢。腫毒。除邪。氣。消食。安胎。治疝。△木香ノ本名ハ蜜

香。其芳。香。蜜ニ似タルヲ以テ。然。凡沉香ノ中ニ蜜香アリテ。其香同。ガ故ニ弘景コレヲ青木香ト呼。然。凡後人馬兜鈴根ヲ青木香トス。

亦其各同力故ニ此ヲ南木香ト呼フ又後人薔薇ヲ呼フテ木香トス
 實ニ木香ノ名多ク紛亂ス方書ニ惟木香ト稱者ハ南木香ナリ
 治一切氣時珍曰木香乃三焦氣分之藥能并呼諸氣ト木香ノ辛
 ハ散ル若ハ疎シ温ハ行開キ芳香ハ順通メ上中下周身ノ氣ヲ升降
 縱橫ニ調ヘ補藥ニ合メハ補助トナリ瀉劑ニ合メハ瀉トナルカ幾日與
 補藥為レ佐則補ル與泄藥為レ君則泄ス木香ノ主能千方アリト雖此
 カ調氣ノ一種ヨリ致ス然レ凡補氣ニ勞瀉氣ニハ勝リテ上焦肺中ノ滯氣
 ヲ除ニ宜シ然レ凡香附子ノ功ト異ナリ彼ハ胸中ノ鬱氣ヲ順下ス本
 香ハ胸中ノ滯氣ヲ散行シ中下焦ノ結氣ヲ疎破ス蓋上焦ノ散行
 ハ味辛ヲ以テナリ中下焦ノ疎破ハ味苦ヲ以テナリ且此ニ芳香ト其温
 性トヲ合シニ三焦ノ氣道ヲ升降調治ス脾胃ハ中官升降ノ間ニ位シ
 芳香ヲ喜ム故ニ此カ升降ノ氣ヲ調テ其芳香ナルヲ以テ脾胃ノ氣ヲ

和ス好古謂ク脾胃トハ是ナリ直ニ脾胃ヲ補益スルニハ非ス惟中ノ氣
 運者ニ宜シ或ハ小便淋瀝者木香ヲ用ル所以モ亦調氣カ故ナリ氣水
 合シ且水ハ高源ニ出木水ハ上焦氣ヲ散行シ三焦氣ヲ調則水道自
 流通ス或肝氣逆ノ上ニ塞テ怒易者或中氣滯テ不食腹脹者或氣
 疑結ノ上ニ逆ヒサル者肺氣塞滯テ胸中煩悶者皆用之其氣ヲ調テ或
 痞塊痰癖瘕瘕ノ劑中ニ用之者亦其氣ヲ散行スルニ因テナリ然レ凡
 上焦ノ氣滯ヲ治スルニハ獨用之其功盛ナリ中下ニ焦ノ氣ノ結滯ヲ
 治スルニ於テハ宜ク佐使ノ藥ヲ合シ同スベシ元素ハ檳榔ヲ使ト中下ノ
 氣滯ヲ瘳スルニ宜シスレ冷氣木香辛温也故一切冷氣結滯ニ用之痰結
 痰ハ氣ニ從テ故ニ痰劑ニ合シ入レ瘳劑ヲ通ス腹痛心痛木香ハ升降ノ
 氣ヲ通シ中焦ノ滯氣ヲ運シ且其辛温温散ノ義アルニ因テ諸腹痛
 ヲ瘳ス或中焦不足ノ腹痛ト雖補中ノ劑ニ合シ用之之レ冷痛者尤

非不調氣ノ餘功ナリ**安胎**木香ハ補血ニ非ト雖調氣則血ヲ調テ胎ヲ安スルノ功アリ**治疝**諸疝ハ氣滯ニ屬ス故ニ疝氣ノ各アリ木香能調氣治疝且其辛温ヲ以テ濕熱ノ壅滯ヲ開通ノ治疝ニ佳

總論

木香ハ氣分ノ留滯壅塞結滯ヲ治諸氣ヲ升降シニ焦氣分ノ聖藥也肺中ノ氣滯ヲ泄シ中氣ヲ順スル者也陳皮肉豆蔻生薑ヲ佐使ト胸腹ノ間ノ滯氣治

使藥

入ルニ充佳中下太腸ノ氣滯ヲ破ニハ檳榔ヲ佐トス胃氣ノ滯ヲ温和シ及腹中冷痛ヲ治スルニハ乾姜肉桂ニ合ス黃連ニ合シ屬熱藥也**毒**木香ハ雖調氣辛温ニ散シ易シ故ニ氣虛者ハ毒痢ヲ治スルニ用テ勿レ又過用久服セムルコト勿レ肺氣ノ瀉シ易方故肺氣虛ノ有熱者〇血分乾燥者〇元氣虛者〇陰虛肉熱ノ火邪衝上者皆用コト勿レ〇脈數ニ内熱伏火アル者對

畏惡

忌火益苦芳香

附方

木香

陰火ハ命門ノ火ヲ云陰囊下濕臭或作瘰木香好醋ニ浸為末傳以上好醋ニ浸腋下ニ夾

出外臺秘要牙齒痛木香末ニ麝香少許ヲ入牙ニ揩益易ニテ漱

出聖濟錄諸瘡惡瘻癰瘡潰後外風寒ニ傷ラレ惡臭汁出テ不取ニ

木香黃連檳榔等分爲末油ニ調類ニ塗出和劑局方**黑髮**每正月

朔日木香湯ノ洗浴スレバ老ニ

愚案

木香性本經ニ温ト元素好至レ死髮髮黑シ出修養書古ハ熱ト東垣ハ微温トス愚案ニ温ニハ薄ク微温ニハ厚シ温與微温ノ間ナル者ナリ故内熱伏火アル者ニ雖忌之亦獨用之冷寒ヲ温ト云程ノ義ナレ是以熱痢ト雖黃連ニ合ノハ用之冷寒ノ心腹痛ニハ桂附ト合ノ温散ノ功ヲ致ス且諸

痛ハ氣滯ニ屬ス。通氣痛去。木香ハ通氣ノ劑ナリ。故ニ獨心腹痛ノ三
 ナラズ。腰痛耳痛牙痛諸痛ニ用ユ。且辛ハ表ニ達シ。苦ハ裏ニ達ス。木香
 辛苦温ニシテ裏氣ノ結滯ヲ通。又經絡ノ氣滯ヲ通。或問木香ハ補
 氣ノ藥ニモ合シ。瀉氣ノ劑ニモ合則補瀉ノ功何ナカシヤ。曰木香ハ
 留滯塞ノ氣ヲ通則其藥勢ヲ強シ。開鬱順氣ノ類ニ非ス。甄權曰。
 散滯氣。止肺氣。宗稟曰。泄決胸腹間滯塞冷氣。散泄ノ二字ヲ以
 見則補劑ニハ非ス。瀉劑ニ不遠者ト知。彼陳皮其草等ノ補中順和
 ノ諸症ニ通用シ易キ類ニハ非ス。症因
 フ詳ニ。效ヲ致ハ止之過用スルコト勿レ

修治

其儘判用。理氣ニハ
 生ヲ用ユ。大便瀉ヲ

止シテ欲セハ麩ヲ水ニ調木香ヲ畏煨熟ノ用ユ。真木香ハ形枯骨ノ如ク。
 嚼之辛苦香ニシテ齒ニ粘者良。凡煎湯ノ中ニ木香ヲ用ハ諸藥ト同ク
 合劑スヘカラス。木香ハ別ニ細末ノ餘藥ヲ煎アヘテ服スル度ニ其木

香ノ末ヲ振立テ用ユ。此其益也。諸藥ト同ク合煎則其苦香ヲ失シテ
 恐テ也。故ニ古方ノ中ニ木香アルトキハ別研ノ二字ヲ註ス。若其一劑ニ
 木香ヲ用ハ此ヲ細末ノ別ニ包餘藥ヲ煎ノ服之數ヲ以テ木香ノ
 末ヲ分チ。服スルニ臨テ碗中ニ散テ用ユ。然ニ今ノ庸醫此義ヲ不知。諸
 藥ト合劑ノ同煎セシム。誤カテ凡芳香ノ藥ハ多ハ同煎セス。別ニ末ノ
 飲シムルコトアリ。獨木香ノミナラス。今ノ時師ヲ見ニ藥ノ製ヲ失ヒ。法ヲ
 誤テ其主能ヲ盡コト不能者不少。此皆醫學ニ昧ノ過ノニハ血脈ノ

牡丹



治原
 諸疾通關節療撲損續筋骨除風痺下

牡丹者爲上。雖結子而根上生苗故謂之牡丹。牡丹ハ男ノ義。ソク

牡丹者爲上

牡丹者爲上

子ニ不生ノ雅旧根ヨリ生スルヲ以テ牡トス。丹ハ其色ニ從テ各ク
滑瘀血涼血熱行結氣。此牡丹皮ノ主能ナリ。他ハ皆此ヨリ致ス所
ノ餘功タリ。牡丹ノ赤色ナル血分ニ走テ其苦ハ疎。辛ハ開テ瘀血ヲ破
消シ其性ノ寒ヲ以テ血熱ヲ涼シ。又苦辛ノ疎開ヲ以テ氣分ノ結
滯ヲモ行ニ至ル。紅花牛膝等ト合ノ能瘀血ヲ破リ。枳實枳殼等ト合
メ能結氣ヲ破。氣脹。太低脹滿ハ中焦ノ虛ニ屬ス。牡丹ハ血氣ノ瘀
結ヲ破者故ニ虛脹者ハ不宜用。或氣ノ結滯。或血ノ瘀留ニ因テ腹脹
者用之破之。詳ニ實脹ヲ察メ用ヨ。治頭腰痛諸痛。血熱瘀血ノ頭
痛ニ用ユ。又瘀血ニ屬スル腰痛ヲ療ス。太繁諸痛ハ瘀血血熱結氣ヨ
リ致ス。故ニ牡丹皮ハ諸痛ニ用テ效アリ。女子經閉。血虛ノ經閉ニハ四
物湯ノ類ヲ以テ補血則通ス。牡丹皮ハ瘀血ヨリ所致ノ經閉實症ニ
用ユ。或血虛ノ經閉ト雖補血ノ劑中ニ於テ少加之導血コトアリ。

選用スルコト勿レ。血滲。經水ノ外ニ血滲泄テ長血ノ如ナル者ハ多ハ瘀血
ニ因テ血道順行セザルガ故ナリ。或又血熱ニ因テ血分ニ妄行ノ致者ア
リ。俱ニ牡丹皮ヲ用テ瘀血ヲ行シ血熱ヲ涼ス。產後諸疾。產後ハ
補血コトヲ主ニスト雖然凡多ハ瘀血ヨリ諸疾ヲ致ス。牡丹ハ產後ノ
瘀血ニ屬スル諸疾ヲ治ス。或產中ニ惡露下盡サズノ腹痛等ヲ致
者尤宜之。通關節。血ノ流行スル地中ノ水行ノ如シ。水ハ曲屈ノ處
一定。故ニ骨節曲屈ノ分ニハ血液定滯易シ。是以關節ノ諸病多ハ
瘀血ニ屬ス。牡丹皮能通之。瘰癧損。跌撲ノ損傷ハ皆瘀血滯氣ニ
屬スレバ也。續筋骨。此直ニ金瘡等ノ筋骨斷絶ヲ續ニハ非ズ。跌撲
等ノ瘀血ニ屬スル筋骨損傷者牡丹皮ヲ用テ瘀血結氣ヲ通シテ
續筋骨ノ助ニスヘシ。除風痺。風痺ハ痛風也。風濕濕熱經絡ニ塞
テ痛ヲナス。故ニ其症必ス瘀血ヲ兼。牡丹皮其瘀血ヲ通シ且其血

宗ヲ宗ニ風痺ヲ除ニ宜シ下胞常道ヲ以云トキハ胞衣ハ胎ニ從
 テ俱ニ出ヘシ若其胞衣留テ不下則惡血胞中ニ滯テ愈不得下故ニ
 牡丹皮ヲ用テ瘀血ヲ通シ且氣ヲ行則胞衣自下ル排膿涼血兼消
 瘀血故ニ瘰癧ヲ排ノ功アリ治瘰癧排膿ノ理ト同シ瘰癧癩疾癰
 癧ハ瘀血ニ屬スレバ也癩疾ハ惡血血熱ニ屬スレバ也無汗骨蒸陰虛勞
 熱ニ因テ骨髓中如蒸熱者骨蒸ト云骨蒸無汗者手厥陰足少陰ニ
 屬ス牡丹皮ハ此兩經ニ入テ無汗骨蒸ヲ治ス有汗骨蒸ハ足少陰
 手少陽ニ屬ス地骨皮主之古方婦人無汗骨蒸ヲ治スルニ四物湯ヲ
 以テ牡丹皮ヲ加者此義也衄血吐血涼血熱消瘀血故也犀角地
 骨湯ニ以用之考見ヨ煩熱血熱ニ因テ煩熱者用之通用ノ義ニ
 ハ非
總彙 牡丹皮ハ消瘀血涼血熱兼テ結氣ヲ行ノ要劑其
 主治ノ功多端ナリト雖皆此ニ義ヨリ致者ナリ

使藥

生地黃ト合ノ能血熱ヲ涼シ桃仁紅花等ト合ノ
 能瘀血ヲ破リ枳實積殼等ト合ノ能結氣ヲ行ス

毒

婦人血虛ノ血崩者○血虛ノ月經長下者
 ○氣血虛寒者○胃氣怯弱者俱ニ勿用之

畏惡

忌鐵又忌蒜
 胡荽畏貝母

大黃兔絲子砒霜

附方

金瘡內漏內漏ハ俗謂血落胸者也
 牡丹皮爲末水ニテ三指撮テ服スレ

八立處ニ惡血ヲ尿ヨリ下ス出千金方婦人惡血攻上テ面赤多
 怒者牡丹皮半兩乾藤燒テ烟ヲ盡ノ半兩水ニ鐘煎一鐘服ス此
 症產後ニ尤多
愚案 時ニガ説ヲ案ニ古方ニ牡丹皮ヲ以テ
 相火ヲ治ス故ニ仲景腎氣丸ニ用之然ニ
 後人專蓄積ヲ以テ相火ヲ治コトヲ知凡牡丹皮ノ相火ヲ治ノ功更
 ニ蓄積ヨリ勝コトヲ不知ト元素曰丹者赤色火也故馮陰胞中之

火ノ陰胞中之火ハ命門ノ相火ヲ指テ云。實ニ牡丹ノ赤色ハ火也。其花ノ茂茂ノ實スルハ陰ニシ且其性寒ニ屬則命門陰胞中ノ伏火ヲ瀉センコト明ナリ。後ハ何如捨之獨黃柏ヲ主ニスルマ。此皆本草ニ味ノ過ヨリ致ス。或問元素曰牡丹皮治神志不足。下然ヤ否マ。曰牡丹皮ハ其性寒ク。尙ソ神志不足ヲ補ノ義アラシ。此蓋牡丹ハ血熱及陰胞ノ火ヲ涼者ナリ。心ハ血ヲ主リ。陰胞ノ火ハ腎ニ屬ス。神ハ心ニ舍。志ハ腎ニ藏。牡丹ヲ用テ血熱ヲ涼則神定。陰胞ノ火ヲ涼則志收。故ニ治神志不足。下云。此方直ニ補ニハ非ズ。牡丹皮ハ只消瘀血涼血熱。瀉陰火ノ要劑ナリ。補藥ニハ非ズ。時珍曰。赤花者利。白花者補。人亦罕。極宜分別之。實ニ世人芍藥ノ赤白ヲ別コトアレ。氏牡丹ノ赤白ヲ分者。七ノ代ハ。白者補。赤者利。何ソ其白也。クニヲ以テ補ノ功ヲ異ニシ。思家ニ赤花者ハ破血瀉火ノ功。白者ハ破血瀉火ノ功。

功變カルベキノ。彼芍藥ニ

赤白ヲ別ノ義ニ似タリ

修治

ニ八月ニ採根。土氣ヲ洗。銅刀ヲ以テ劈破心ヲ去。日ニ干。

乾ス。肉厚者尤佳。或生。或炙。或酒ニ洗。微焙用。方ニ從シ。雷教說ニ。劉テ酒ニ拌蒸。コトニ時ノ干乾用。ト牡丹ハ山野ニ自生ノ單。辦者良通用。紅花。或白花ヲ用。コトアリ。干辦者及異色者藥ニ勿用。家園ニ植者ハ培養種。ハニノ藥性ノ真ヲ失テ不佳。山城大和ニ多。植出ト雖皆此。真壤ノ他カニ生ノ其真性弱シ。只山中自然生ノ者ヲ採用。ベシ。希人或牡丹枝。梗皮。或五加皮ヲ剝テ雜出ス。宜撰擇。

廣益本草大成卷之三終

洛下

法橋

岡本為竹一抱子

撰

薄荷

本綱

原始



關節止痢治骨蒸利咽喉治口齒諸病去舌胎語澁止血治肩背

痛△本名ハ接蘭音跋薄荷ハ俗稱也原始本草曰蒹葭荷乃花葉

總名葭聲近故俗呼薄荷辛苦溫唐本草辛溫思總曰苦辛元素

曰辛涼今味二辛少苦其性ヲ察スルニ溫涼者欤何如トナレバ

其發汗散風寒者ハ辛溫ニ非ヤ其驚熱骨蒸ヲ治シ頭目ヲ清者ハ

苦涼ニ非ヤ案ニ此ガ淺表ノ氣味ハ辛溫ニ其深裏ノ氣味ハ苦辛

涼也彼穀性屬金平糠性熱麥肉性溫麥皮性涼ナル類ノ如シ眞西

和語本草

日

一

西

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '薄荷' and '法橋'.

山謂物人具太極ノ義タリ。物類相感志曰。凡收薄荷須隔夜以葉水澆之。兩後乃悉刈收。則性涼不爾不涼也。糞水ハ寒者也。澆之其淺表ノ温性ヲ滅テ。深裏ノ凉性ヲ助ノ義ニヨル乎。清頭目除風熱。薄荷ハ浮而升。能高巔皮膚ニ達シ。頭目ノ邪ヲ清シ。皮膚ノ風熱風寒ヲ發散ス。此清字深意存セリ。清トハ壁言。機器ヲ掃洗拭清テ明潔ニスルガ如ク。其辛温ヲ以テハ頭目ノ皮表ニ滲邪ヲ開散シ。其辛苦涼ヲ以テハ頭目ノ肉骨ニ滲邪ヲ除テ。悉頭目ノ表裏ノ邪由氣ヲ清除スルノ義アルヲ云也。薄荷清頭目功。大槩茶茗ニ似テ。薄荷ハ茶茗ヨリモ頭目清利ノ功強者ナリ。故ニ頭痛眼病ニ多用之。發汗去暴寒。其辛温ヲ以テ發汗。暴寒ニ犯者ヲ療ス。或問薄荷ノ發汗輕重何如。曰。薄荷ハ辛温辛苦涼也。其辛温ヲ以テ輕皮毛ノ汗ヲ發ス。發汗ノ後其辛苦涼ヲ以テ分肉ヲ清涼ス。他ノ偏ニ發汗ノ劑ト不同トアリ。故賊風暴寒ヲ去。發毒汗ノ功アリ。暴寒トハ暴ニ冒サレタル輕シク云ニ非ズ。暴瘧ノ烈キ寒ニ傷ラレタルヲ云。賊風暴寒ハ其邪毒烈シク分肉ニ浸透ス。一偏ノ發汗耳ニシ其邪毒ヲ去コト不能。薄荷ノ辛温先發汗。苦涼後ニ清解スルヲ以テ邪毒ノ浸透者ヲ悉ニ竭サレム。故ニ發毒汗ト云。治腹脹宿食霍亂。此三治ハ薄荷ノ要能ニ非ス。標能ナリ。只其辛温ヲ以テ中焦ノ鬱ヲ開散シ。辛苦涼ヲ以テ中焦ノ結滯實熱ノ氣ヲ清シ。腹脹宿食霍亂ヲ治スルノ佐トス。其症屬實屬熱者。餘藥ト合用ノ治之。獨用テ治之ニ不足。小兒驚風風痰驚風症ハ風痰痰熱ニ屬ス。薄荷ノ辛温苦涼ヲ以テ風痰ヲ開。痰熱ヲ涼ス。故ニ痰嗽症或用之。瘰癧薄荷去風痰。瘰癧モ風痰ニ屬スレハ也。瘡疥癩疹。諸瘡ハ屬熱毒。疥疹ハ皮表ノ風熱ニ屬ス。薄荷ノ辛苦涼ハ熱毒ヲ清シ。辛温ハ皮表ノ風熱ヲ解散

本草綱目 卷之四 薄荷

スレハ也。添瘡思邈曰薄荷煎湯洗添瘡。蓋涼熱解表故也。火毒

此モ亦清熱解毒故也。灸火ノ毒氣入内生瘡者尤宜。蜂蟻蛇傷

此皆清熱解表發毒汗故也。猫咬陸農師曰薄荷猫之酒也。宗奭

曰猫食薄荷則醉。物相感爾。故薄荷汁ヲ猫咬ニ塗則立處ニ瘡

其毒ヲ制スルノ義ニ取リ三通關節薄荷ハ骨中ニ達ノ帶爵ヲ清

ス。故ニ通關節。詳義下文ノ骨蒸條ニ註ス。止痢一切ノ痢ニハ非ス。

風熱ニ屬者用之。血痢症多ハ風熱ニ屬ス薄荷尤ニ主之。治骨蒸薄

荷ハ氣味薄浮テ升陽也。故能高巔皮膚ノ病ヲ去。何ノ深骨中ニ達

ノ蒸熱ヲ治スルマ蓋薄荷ヲ嚼味ニ始口中辛ノ温ナリ。漸ノ次ニ辛

苦透舌清涼タルコトヲ覺ユ。故ニ始口中ノ辛温ナル氣ヲ以テハ高

巔及皮膚ニ至ル。漸ノ辛苦透舌ノ氣ヲ以テハ骨中關節ノ深ニ達シ

其清涼ノ氣ヲ以テハ蒸熱ノ爵ヲ清ス。此等ノ義藥性ノ微妙。精神

ノ奧旨。庸學ノ非所及。利咽喉治口齒諸病薄荷ハ浮テ升上ニ壅

風熱ヲ清ス。故利咽喉治口齒。如章宜曰風熱上壅斯爲要藥去舌

胎語澁舌上ニ小白泡子數粒ヲ至スル。名テ舌胎ト云。風熱ノ上壅

ニ屬スル舌胎語澁ハ薄荷主之。止衄血此モ亦上熱ヲ清故也。治肩

背痛風熱肺分ニ爵ノ肩背痛者用之。蓋肩背痛ハ屬肺也。好古曰

搜肺盛有餘肩背痛。肺盛ハ肺氣ノ實ヲ云。有餘ハ風熱ノ邪ヲ指

薄荷ハ辛温芳香解散ノ劑タリ。故肺氣

損耗レ易ヲ以テ。肺盛ニ非スニハ勿用之。

發散レ清熱去痰鳩尾以

上發散清涼ノ要藥タリ

ノ氣ヲ損耗レ易レ。故ニ肺氣虛弱者。○虛寒ノ熱症ナキ者。○自汗

盜汗者。○病愈テ後肺氣不全者皆勿用之。○薄荷ヲ用ハ詳ニ邪氣

使藥

薤下同ク蓋下ノ食ニ相宜レ

毒

薄荷ハ辛温芳香ニ

總纂

薄荷ハ頭面及皮膚ノ風寒ヲ

ノ有無ヲ察ノ病愈ハ速ニ止テ多服久服スルコト勿レ。虚氣虚汗
 七陽ノ患ヲ致ス。通玄曰芳香尖利。多服久服冷入虚汗不止。薄荷
 ハ骨蒸勞熱ヲ治ス。雖陰虛發熱者妄ニ用ルコト勿レ。○薄荷ハ
 風寒ヲ發散ス。雖獨寒耳ニ無熱者ハ斟酌ス。○瘦弱人久
 服スレバ消渴
 病ヲ發動ス

畏惡

忌火。案二本綱ニ忌火義ヲ雖不見。吾朝
 醫火ヲ忌來レリ。此實ニ其芬芳日ヲ失コト

附方

古胎語溢薄荷葉ヲ按絞テ取汁。白蜜生薑
 汁ニ和シ擦。出醫學集成。血痢不止薄荷葉ノ
 煎湯常服入。出普濟方。水入耳中薄荷葉汁。耳中ニ滴入テ效アリ。
 出外臺秘要。蜂螫薄荷ヲ按絞同上。衄血不止薄荷汁ヲ鼻中ニ
 入。或乾薄荷葉ヲ水ニ煮綿ニ裹テ鼻孔ヲ塞。出本草方。
 灸火毒入内。取生瘡汁出者薄荷煎汁ヲ頻々出。醫說

愚案

薄荷ノ功能ハ高巔及皮膚ニ在リ。雖心上焦頭目鼻口ノ

修治

功盛ナリトス。且發散清涼ノ雖有兩功。清涼ノ能盛者也。
 新ヲ佳トス。陳者ハ芳香ヲ失テ不可。採テ陰干ニシ。手ニテ按碎ヤ。細
 末ヲ振去。不然則葉中ニ所包。全砂アリテ惡シ。又不可洗。芳香ヲ
 失也。忌火說尤可也。用ニ枝梗並ヲ去ヘシ。雷牧曰莖性燥。和俗或
 山薄荷ヲ以テ薄荷トス甚謬也。山薄荷ハ本草ニ謂臭蘇也。



微辛微温。○開胃口。進飲食。止霍亂心
 腹痛。治吐逆。要藥。療風水毒腫。快氣温
 中。△豆葉ヲ糞ト云。此草葉似豆葉。且

芬香アリ。故ニ薄荷香ト名ク。開胃口。味微辛。性微温タルヲ以テ開胃口
 進飲食。開胃口。故也。然凡胃熱ニ因テ不食者不可用。中焦寒。及中
 焦不順ノ胃口萎ガ故ニ不食者用之。止霍亂。吐瀉同時ニ發スル瀉

然斥散正氣散ノ紫蘇陳皮等ノ辛温發表ノ劑ニ合ノハ自發表ノ如ニ至ル獨用テ發表ノ義アルコトナシ

修治

今醫 藿香

ノ芳香ヲ釋者ナシ本草ニ其氣芬香ナルコトヲ云則其芬高者ヲ擇用ニ塵ノ雜者ヲ擇去米泔水ニ浸テ葉ノ柔タル時能土砂ヲ洗淨シ水ヲ代コト數度ノ土砂ツキ水清ニ至テ陰乾ニシ則用ニ藥店ニ埋藿香ト云者アリ真ノ藿香ニ非ス青葉ト名者真種也○和ニ謂藿香草ハ多ハ真物ニ非ス誤用則人ヲノ吐セシム本草ノ諸説ニ所合ノ真藿香若香ノ者吾朝ニナキニ非ス詳ニ擇採ヘレ○時珍說ヲ案スルニ古人ハ惟其葉ノミヲ用ニ後人葉ト枝梗トヲ併用ル者ハ葉ニ偽多カ故ト通玄曰今市中售者殊欠芳香定非真種安望其有切耶ト今渡者多クハ芳香少シ疑ラクハ真物ニ非ル歟

香薷



原始不圖

辛微温○治霍亂轉筋腹痛吐下利小便散水腫温胃調中下氣除煩熱瘧也逆冷氣鼻衄脚氣寒熱△香薷本名ハ

香薷其氣香ク其氣ナルヲ以テ号按ズルニ今人多藿ヲ讀テ儒ノ音トス然斥時珍綱目ニ謂藿音柔トス儒ノ音ニハ非ス治霍亂轉筋腹痛吐下香薷辛温且其葉形輕故ニ發表散邪且中焦ヲ温開ク是以外風寒ニ犯サレ内冷寒ノ食飲ニ傷テ霍亂轉筋腹痛吐下者用之夏月納涼ノ感寒暑ヲ冷飲食ニ避テ受寒者多ハ霍亂轉筋腹痛吐瀉ス治之香薷充要劑タリ凡夏月ノ傷暑者多ハ症アリ東垣家ニ謂中暑中熱也炎暑ノ熱ヲ避ト欲ノ扇ニ冷風ヲ受或冷水ニ洗浴レ或冷水冷物ヲ飲食レ此等ノ陰冷ノ邪ニ因テ陽氣止ラレテ外ニ發達スルコト不能故ニ頭痛發熱惡寒煩躁

口渴或吐或瀉或霍亂者ハ香薷ヲ用テ陰邪ヲ發散則愈香薷散ノ類宜之若又直ニ火暑ノ氣ニ中ラレテ太熱大瀉汗大ニ泄煩燥喘息或瀉或吐者此皆倦内傷元氣損虚ノ症ナリ東垣ノ清暑益氣湯或人參白虎湯等ニシテ元氣ヲ補火邪ヲ制ノ症若此症ニ香薷ノ辛温散發ノ劑ヲ用則虚ハ實人ノ害アルコト甚シ利小便散水腫香薷ハ金水ノ兩氣ニ属シ微上微下ノ功アリ故ニ利小便甚捷ニ是以水腫風水ヲ治スルニ尤佳風水トハ水ニ風氣ヲ兼テ腫ヲ云香薷ノ利水解表ヲ以テ宜治之温胃調中其温ヲ以テ温胃其香ヲ以テ胃ヲ喜シ入辛ヲ以テ開胃故ニ調中ト云然此ガ辛温散ノ氣烈ニ調補ノ劑ニハ非ズ中焦冷寒ノ實邪伏者用之胃氣不足者ハ勿用下氣除煩熱辛温ヲ以テ上中焦ヲ開散シ且小便ヲ利スルヲ以テ下氣然此通用ニハ非ズ若陰邪閉表陽氣上焦ニ鬱ノ氣不下胸中煩熱者用之療嘔逆冷氣冷寒氣中焦ニ伏ノ嘔逆者用之此症在夏月ニ在鼻衄香薷細末ノ水ニテ服則鼻衄ヲ止此下氣除煩ニ從ナリ脚氣寒熱脚氣ハ風寒濕熱ノ鬱塞ニ属ス香薷ヲ以テ此ヲ解散ス治寒熱往來モ解表ノ義ニ因也

總既

香薷ハ辛温發表ノ主劑且利小便風水ヲ治スルノ要藥也凡夏月納涼ノ陰邪收表者用之解スルニ宜シ時珍曰香薷ハ夏月解表之藥如冬月之用麻黃ト世人多ハ謂夏月暑時ノ諸症ニハ一切香薷ニ宜シトハ甚謬ナリ夏月伏陰ノ邪アリテ陽氣發越セザルノ症ニ用之他ハ盡此カニ非ズ

使藥

毒

畏惡

治スル所ニ非ズ 霍亂轉筋ヲ治ス 元氣ヲ散ス表 虛自汗胃火ア 忌火亦忌白香薷ヲ服スルコト十兩ニ 至ル者ハ一生白山桃ヲ食コト勿シ

附方

藳朮丸 風水水腫利小便効アルコト如神香藳一升水一
斗ニテ煎爛シ去滓再熬膏トシ白朮末七兩ヲ加合シ梧
桐子大ニ丸シ毎服米飲ニテ十九日五度夜一度服ス出外聖秘要
口臭者香藳水煎
ノ合之出千金方

愚案

世醫以香藳夏月諸暑病ヲ通治ス
ト覺ニ故ニ虛實寒熱外感内傷ノ分
ナク夏月ハ必香藳飲ヲ用ユ或無病人モ亦服之暑病ヲ避ス不
思ヤ夏月ハ汗泄テ真氣ヲ脱シ暑熱傷元氣病多ハ虛氣ニ属ス何
如ソ此辛温開散ノ者ヲ以テ夏月ノ諸症ニ通用シ且無病人ヲノ
飲服セシムルニ至ヤ此反テ助邪伐正ノ害ヲ取ノ三案ニ注穎曰香藳
夏月者飲代茶可無熱病ト此說一度出テ後人ノ惑ヲ致ス不可
不改戒時珍曰今人不知暑傷元氣不拘有病無病槩用代茶謂能
辟暑具藥前說謬也ト○香藳ハ雖治吐逆熱ノ服スルコト勿レ反

修治

去莖葉與穗用忌火藥店ニ長
乃香藳ト云者充佳夏採葉冬
取穗陰干ニス○和俗イヌエト云者ソ香藳トスル誤也○本綱
ソ案ズルニ平地ニ生者ハ葉大也香藳ト号匡石ニ生者ヲ石香
藳ト名葉細也俱ニ通用スヘシ

石香藳



辛香温○調中温胃止霍亂吐瀉心腹
脹滿腹痛腸鳴功比香藳更勝制硫黃
毒○本草蒙筌ニ香藳ハ陳年者其効

捷トス○以上ノ說ヲ考ニ石香藳ハ小葉ニシテ其功勝レリトス蒙
筌大葉者種優下此說何是ナル未考然リト雖石香藳ノ辛香ヲ
ル者ヲ以テ
佳トセン欵

紫蘇



本綱 辛温 ○發表解肌散風寒開胃下氣和血安胎定咳喘消痰治冷氣心腹滿脹止脚氣霍亂轉筋解魚毒△蘇ハ換也

舒暢自蘇性氣血ヲ舒暢ス。且葉色紫也故ニ紫蘇ト名ク 發表解肌散風寒 紫蘇ハ辛温ニシテ發表肌邪ヲ解カ故ニ風寒ヲ散ス抑紫蘇ノ發散マ麻黄ノ發散ニ異也。麻黄ハ直ニ發表一偏ニ汗ヲ發スルノニ。紫蘇ハ不然。蓋此葉赤黑ニシテ紫色陰陽氣血ノ色ヲ備フ。故ニ氣血ノ間ニ行。其於輕浮テ入肺。辛温中焦ヲ温胃ヲ開是以紫蘇ノ發散ハ直ニ表發汗ニハ非ズ。温中開胃行氣順血裏ヨリ漸表ニ透メ發汗。章宜曰爲裏之表藥也。發散ノ緩和者也。故ニ氣藥ニ合メハ行氣不主表發汗。辛温發表ノ劑ニ合メハ能至表發汗發散ノ劑中ニ於テ和者也。開胃 辛温香氣ヲ以テ開胃中焦氣ヲ順入時

珍曰寬中ト是也 下氣 案ニ本草ニ紫蘇辛温ト云ト雖今味ニ辛ノ苦コトヲ覺ユ故ニ辛温浮テ胸中ノ氣ヲ開行レ。苦味其氣ヲ疎テ下降セシム。蘇頌謂下氣トハ開胃下氣ニ取也 和血 色紫ニシテ血分ニ入ト雖。紫蘇ハ本血藥ニ非ズ。手太陰氣分ノ藥ナリ氣行則血行此辛苦香温ヲ以テ氣ヲ行則血從テ自和スヘシ 安胎 氣ヲ行レ血ヲ和スルカ故也 定咳喘 散風寒 下氣 故也。外邪ニ非ル所ノ喘咳ニハ斟酌スヘシ 消痰 辛苦香温ヲ以テ痰鬱ヲ通メ能胸痰ヲ消ス然レ外邪ヲ兼ル實痰ノ者ニ非ハ勿用 治冷氣 辛温故也 心腹滿脹 下氣則心滿ニ宜開胃温中則腹滿ニ宜シ此モ亦上中ニ焦ノ氣分滯實ノ者ニ用ユ。虛人ハ勿用 止脚氣 紫蘇風寒ヲ散レ。又除濕且氣血ヲ行カ故ナリ 霍乱轉筋 外邪ヨリ所致ノ者主之散邪開胃テ宜シ 解魚毒 一切魚肉ノ毒ヲ解ス尤解魚毒ヲ解スルニ宜シ。藿香

正氣散諸食傷ヲ治

總纂

紫蘇ハ發散ノ緩劑也。頃中焦舒胸氣長藥也。

使藥

陳皮破仁ト合ノ行氣安胎。藿葉烏藥ト同ノ温中止痛。香附麻黃ト合ノ發汗解邪。川芎當歸ト同ノ和血散血。木瓜厚朴ト同ノ散濕解暑治霍亂脚氣。桔梗枳殼ト同ノ利胸。寬腸杏仁萊菔子ト合ノ痰ノ消喘息ヲ定ム。

毒

氣虛表虛陰虛者勿用之。

○自汗盜汗症及脾胃虛寒ノ大使泄利者皆禁用。

畏惡

鱈魚ト同食スレバ毒瘡ヲ生ス。

附方

金瘡出血不止 紫蘇葉桑葉同搗ツ貼出永類鈐法 撲傷 紫蘇葉搗ツ傅ツハ自愈出試驗方 一切損傷血出不止 所出血ニ陳紫蘇葉ツ浸ツ接爛ツ傅ツハ不膿ノ愈無癰出永類鈐方 犬咬傷 紫蘇葉嚼ツ傅出千金方 食蟹中ツ毒 紫蘇葉ノ煮汁ヲ飲出金匱要畧

愚案

紫蘇ハ胸中肺氣ノ結鬱ヲ行下ニ宜下維。其温香散ノ劑ツハ虛弱ノ者ニハ不宜用若或用ハ便ツ宜ツ梗ハ下氣藥ヨリモ和緩ナレバ也。雷救曰薄荷並燥紫蘇並和。今人苦香辛味ヲ喜テ朝暮ニ食之者アリ。不思ヤ其香辛久則人ノ真氣ヲ泄コトヲ。妄ツニ又食過服スルツ勿レ。

修治

新者佳陳者佳

者ハ香氣失藥性弱シ其儘到用ユ。○本草ニ忌火ノ説ナリト雖和入ハ以爲忌火其香ヲ失コトヲ恐テ也。○採ツ肥地者背ツ面俱ニ紫色ナルツ佳ツ。○採ツ地者背ツ面皆青ツ者ツ紫ツ色ツ或面背皆白者勿用。六月土用ニ面背俱ニ紫色者ヲ擇ツ採ツ葉ノ細ツ系ツヲ去水ニ洗清ツ陰乾ツス。○山城ヨリ多ツ出ツ之ツ然ツ凡ツ此ツ分量ヲ重ツセツコトヲ欲ツノ葉ツ嫩ツノ間ツニ細砂ヲ包載ス擇ツテ勿用。○藥店者動ハ陳年者ヲ偽出ス色ツ損香ツ微ツナリツ惟ツ色ツ淡ツニ芳香ツツヨキ新葉ヲ擇ツテ用ツ之ツ。

紫蘇子 辛温。下氣治上氣喘嗽。煩氣利膈。寬腸消痰。治風寒濕痺。脚氣止霍亂嘔吐。五瀉利大小便。除寒温中。破癥結。解魚蟹毒。蘇子之功。蘇葉之功。不與。俱。風寒之發散。氣ヲ下シ温中。然凡蘇葉ハ發散ヲ盛ニ下氣ニ弱。蘇子ハ發散ニ弱。下氣温中。トヲ專ニス。上氣喘息咳嗽。煩氣利膈。寬腸消痰。利大小便。ノ功ハ皆下氣ヨリ致者也。霍亂嘔吐。五瀉ヲ治スルハ。其下氣ト温中トヲ以テ致者也。風寒濕痺。脚氣癱結ヲ治スルハ。散邪解表ト辛温開發。功トヲ以テナリ。惟此ガ主能トスル者ハ下氣ニ在リ。故ニ喘息咳嗽。上氣ノ要藥トス。然凡氣ノ逆ノ上者。二肉アリ。下焦腎陰未虛。惟中宮不和。シノ氣上リ。氣上レハ寒。其下ニ生メ逆スル者。喘息咳嗽。胸滿。面赤痰盛。ニ手足逆冷等ヲ致ス。此蘇子ノ所主。陳皮肉桂ト合用。其治之。彼蘇子降氣湯ハ是ナリ。若又腎陰虛ノ陽ヲ撰コト

無ノ上氣喘咳者アリ。惟其陰ヲ補。則氣自下收ル。或元氣虛ノ陽氣ノ本根弱カ故ニ浮上テ然者アリ。惟其陽ヲ補。則氣自下治ル。此兩種ハ俱ニ蘇子ノ宜所ニ非ス。蘇子ハ辛温散氣ノ劑ナリ。虛人ハ妄ニ不可用。然凡陰陽ノ虛ニ因テ上氣喘咳者ハ。蘇子ニ雖不宜。其逆氣甚者ハ不得也。用之此急。則治標ノ義ナリ。若如此ニ用之ハ必補劑ト合メ施シ。效アラハ速ニ止。ヨ過服。單服スルコト勿レ。惟日方書誰不云。蘇子下氣。獨劉氏以爲未然者。爲其能散氣之標。不能散氣之本。蓋師王氣腎納氣之。意今腎虛不能散氣。歸原以致呼吸急促。此先天元氣受虧也。其法當從安腎始。是知蘇子但能降後天喘急逆氣之標病也。

總藥 此が要能ハ下氣上實ヲ

使藥 陳皮ト同ノ下氣ニ宜シ

毒 元氣虛弱者。大便滑泄者。禁用之

畏惡

本草綱目 卷之四

蘇葉ト同然凡葉ハ宜心火ヲハ火
ヲ息ト無古方炒用コトアレハナリ

一七日ニ兩服入出外臺秘要

要畧風寒濕脚氣一切冷氣

九レ空心ニ酒ニテ十

九ヲ服入出藥性論

下氣ノ功ヲ致シマ辛ハ開苦ハ疎レ温

ハ順スルヲ以テ下氣ノ功如此トアリ

炒香用之

附方

夢中泄精蘇子升
煎研末酒ニテ

蘇子良姜陳皮等分蜜ニテ梧子大三

愚案ニ皆謂蘇子辛温ト今味ニ辛

ノ微苦レ苟モ苦味ノ兼ニ非ハ何ゾ

其儘少レ炒用コ

婦人良方ニ隔紙

修治

辛微苦微甘平解諸醇治一切氣利

三焦治憂愁不樂治諸痛諸血婦人胎

產帶下消痰飲積聚婦人開胃聖藥



子 原始

本名ハ莎草此草根ニ如子者アリ此ガ相附連續ヲ以テ附子

ト名ス此ヲ諸香ニ合ノ宜レ故ニ香附子ト号ス香氣アルニハ非ス

解諸醇治一切氣利三焦香附子ハ辛ノ開放レ苦ノ疎レ降レ其ノ

緩和ス上胸膈留滯滯壅ノ氣ヲ解テ下行セム此香附子ノ要

能ナリ故ニ諸氣醇ヲ散シ一切ノ氣滯ヲ開ニ三焦氣ヲ通利セム

諸藥ノ中ニ於テ氣醇ヲ解ニ宜者ハ香附子ニ勝ハナレ故ニ蘇葉謂治

心腹中客熱別錄謂除胸中熱トハ皆氣醇ノ熱ヲ治スルニ取蓋脊

附ハ清熱ノ劑ニ非スト雖解醇則熱自除コトヲ致也東垣謂治霍

亂吐瀉腹痛亦三焦ノ氣ヲ利スルニ取蓋香附ハ脾胃ノ劑ニ非スト

雖三焦ノ氣ヲ利則升降自通吐瀉腹痛ヲ除ニ至也時珍謂消

飲食ハ氣行則中宮自消化スルニ從此ガ直ニ宿食ヲ消ニハ非ス時

珍又謂治痞滿附腫腹脹脚氣ハ此亦利氣ニ因テ也氣行則滿脹

除氣行則水退レ種消レ氣行則風寒濕レ諸邪散レ脚氣愈易レ且癰疽瘡瘍ヲ治スルモ亦利レ氣ニ從ル三諸瘡癰ハ氣血ノ留滯ニ因ハ也治憂愁不樂此症ニ因アリ元陽氣怯ノ然者アリ香附子ニ不宜惟其陽ヲ補則憂愁不起若其元氣雖未虛氣鬱不伸故ニ憂愁ノ情起テ喜樂ノ氣ヲ不能發者アリ此香附子ノ發テ所治ナリ若虛鬱ノ然者ハ香附ノ雖非所主補氣助陽ノ劑ト合メ或テ用テ補中ニ其鬱解ノ三治諸痛諸痛ハ氣ノ留滯ニ屬ス故ニ用テ留滯ノ鬱氣ヲ解則痛愈諸血夫陰ハ從陽運リ血ハ從氣行ル血行則水ニ流ニ入ルコトナシ故ニ香附ハ直ニ血藥ニ非ト雖此ガ能氣行ニ從テ血能常道ニ流行テ吐血下血尿血婦人ノ不時崩血月水不調ノ諸症ヲ療スルニ至ル婦人胎產帶下產前產後ノ諸症ハ血氣ヲ調和スルニ在リ香附子ヲ以テ發テ行氣則血モ亦和利ノ血氣能並行故ニ胎前產後ノ諸症赤白帶下ヲ治ス九婦人ノ赤帶均帶其因多端ナリト雖多ハ氣分ノ留滯ニ始ル故ニ諸帶ヲ治スル者用テ香附トス消痰飲氣鬱則津鬱ノ痰ト成氣行則津行テ痰飲去故ニ香附子ノ鬱ヲ散シ氣ヲ行テ以テ痰飲ヲ消スルニ至積聚香附子能氣ヲ行ガ故ニ積聚ヲ治スルノ功アリ五積六聚ハ氣血ノ留滯ニ屬スレバ也婦人開鬱聖藥好古曰此婦人ノ仙藥也香附子能氣鬱ヲ解ガ故ナリ氣鬱ノ病ヤ獨婦人ノ三有ニ非ズ男婦俱ニ此患アリト雖男子ハ陽熱發動ヲ主トス且男ハ一切外ヲ勤テ其氣散シ易ク又其情意執滯ノ念ナシ故ニ男ノ氣病ハ多ハ氣虛ニ屬ノ氣分鬱實者少シ或ハ有ハ虛鬱症タリ婦人ハ百年ノ苦樂ヲ他人ニ任テ且華月ノ遊行少ク其ノ身モ亦陰ト收靜ヲ主トシ執著ノ思念日ニ積是以婦人ノ諸病多ハ氣分ノ留滯鬱悶ニ生

和語林

卷之四

十三

彼經水不調ノ如モ氣鬱ヨリ始テ血滯ヲ致ス。香附子ハ散鬱氣
行滯氣ノ要藥タルヲ以テ呼ブ婦人ノ聖藥トス。元素謂陽中之
陰。血中之氣藥也。好古亦謂如此婦人ノ脉ハ本以血爲主則香附
子血中ノ氣鬱ヲ散スルノ劑豈
婦人ノ聖藥ニ非ト云者アラシヤ

總條

香附ノ主能ヲ總條則
氣分ノ鬱ヲ散行スル

ニ止ノ三。或問香附ハ血中ノ氣藥トス川芎モ亦血中ノ氣藥タリ。
兩種ノ別何ヲ以テカセン。曰川芎ハ辛温ノ劑香附ハ辛微若平ナル者也。
芎ハ血中ノ氣ヲ導ニ止ノ三。香附ハ血中ノ氣ニ行亦諸ノ氣分ニ行テ
識ノ氣鬱留滯ヲ散行セシム。此其別也。又問香附ハ利ニ焦ト。木香
モ亦謂利ニ焦ト。此辨何如。曰木香ハ氣ノ升降ヲ通ノ利ニ焦香
附ハ胸中留滯ノ氣ヲ散行セシムルガ故ニ。三焦ノ氣ヲ利ス。實ニ木
香ハ三焦ヲ降ノ劑香附ハ上中二焦ノ鬱ヲ散メ。三焦ヲ利スルノ劑

タリ。豈兩種ノ功同者ト云シヤ。又問本草ニ謂香附益氣治心氣
ト。或謂生血トハ何ソヤ。曰此本草家ノ奧旨ナリ。能此道ニ通則神
アリ。若此義ヲ誤則害ヲ致ス。請盡ニ辨之慎聽。曰凡物滯則不滿
ハ自然ノ理ナリ。且物其常則不損失常則損スルモ亦自然ノ道也。
故ニ氣道鬱滯ノ其常ヲ失則不滿不健ノ不足ノ義アリ。香附子
其滯鬱ヲ行テ氣ノ常度ヲ得セシムル時ハ行中ニ自益氣ノ理ヲ存
セリ。汝見ヨ流水ハ勢強レ實也。止水ハ勢弱レ虚ナリ。人身ノ氣血マ
不行則漸ニ不足ヲ致ス。香附ノ行氣者ヲ以益氣生血トスルノ理
此ヲ以曉ベシ。好古曰香附是能益氣而止血也。又能逐去瘀血是
推陳也。正如巴豆治大便秘不通而又止泄瀉同意丹溪亦謂方家高
香附子於老人有益意有存焉。蓋於行中有補理。天之所以爲天者
健而有常也。健運不息所以生人無窮。即此理爾。九瀉中有補補

中有瀉。通中有止。止中有通。本草ヲ閱者。藥性ノ其補瀉通止ノ標本ヲ考テ。此ヲ病因ノ虛實通止ノ標本ニ合ノ用ヨ。妄ニ文ニノ三拘テ。其主能ヲ過コト勿レ。客アリ。問曰。川芎。香附子。俱ニ血中ノ氣藥ニ。俱ニ利氣ノ劑タリ。川芎。久服單服スレバ。元氣ヲ大亡セシムルノ患アリト。何ガ故ニ。香附子獨。是ニ至ラサルヤ。曰。川芎ハ辛温ニ。且香氣烈者ナリ。辛香温ノ氣烈ヲ以テ。元氣ヲ散亡スルニ至ル。香附子ハ辛ノ微。若。滯氣ヲ散。其性平。且烈香ノ氣ナキヲ以テ。元氣ヲ亡失スルニ不至。然。凡香附子能散。行氣ノ力アルヲ以テ。多服單服ヲ恐好古曰。多服亦能走氣上。耗氣ノ義ナキニ非コト知ハレ。

使藥

人參。白朮。甘草ヲ得テ補氣。當歸。地黃ヲ得テ補血。木香。

伏神ヲ得テ心腎ノ二氣ヲ交通セシメ。茵朮。破故紙ヲ得テ氣ヲ下元ニ販セシメ。厚朴。半夏ヲ得テ去痰消脹。中焦ヲ通ス。紫蘇。葱。白。陳皮ヲ得テ邪氣ヲ解散シ。三稜。莪朮ヲ得テ積塊瘀血ヲ消シ。艾葉ヲ得テ子宮ヲ暖メ。血氣ヲ治スルニ宜シ。

毒 氣虛ノ爵ナキ者。○血虛ノ瘀。爵ナキ者。俱ニ勿用之。○香附子散。爵行氣則多服單服スルコト勿レ。氣ヲノ耗散セシム。○世俗ニ謂。香附子宜。女人不宜。男子トハ誤也。爵氣氣滯ニ屬スル者。ハ男女俱ニ用之。

畏惡 鐵器ヲ忌

附方 女人諸病ヲ治ス。四制。香附丸。香附子一斤ヲ四。二分テ制ス。一分ハ酒ニ浸ス。一分ハ醋ニ浸ス。一分ハ塩水ニ浸ス。一分ハ童便ニ浸ス。以上各。春ハ二日。秋ハ五日。夏ハ一日。冬ハ七日。干乾。鳩爛。微焙。爲末。醋ニ煮。麩糊ニテ。梧子ノ大ニ丸シ。酒ニテ。七十丸ヲ服ス。氣虛ニハ。四君子。血虛ニハ。四物ヲ合メ丸。

瑞竹堂方 蜈蚣咬 香附子 嚼カテ塗ハ即愈。出袖珍方 小使血淋

陰莖甚痛者。香附子。陳皮。赤茯苓。等分水煎服。出十便良方。氣鬱
頭痛及睛痛。香附子炒四兩。川芎二兩為末。

每服二錢茶湯ニテ下ス。常ニ服レテ根ヲ除ク。愚案 本草ニ香
附散時氣

寒疫下。因此世人謂香附子ハ外邪ヲ發散ス。此說甚誤ナリ。香附
子獨用テ何ゾ發散ノ義アリ。時珍曰得紫蘇葱白解散邪氣。夫

邪ハ因氣氣滯則邪塞氣行則邪往易レ。故ニ紫蘇葱白等ノ發散
ノ劑中ニ合入ノ氣ヲ行則外邪往易ク。且發表ノ藥氣能行テ解

表ノ功ヲ盛ニス。香蘇散等ノ義此意也。俗見之直ニ發散ノ劑ト覺
者ハ甚。火ニテ毛ヲ燒去銅刀ニテ皮ヲ去石臼ニ入搗碎

認ナリ。修治 少黒色ニ炒用ユ。生ハ行胸膈達皮膚熱走肝
腎至腰足炒黒止血童便浸炒入血分補虛血。鹽水浸炒或蜜水浸

炒潤血燥酒浸炒行經絡發散。薑汁浸炒化痰飲。○
今藥店ニ兩種アリ。梧州大坂ヨリ出者色惡内朽テ不是京西陳

安居院ヨリ出者佳安居院香附子ト号。然凡製之鐵ノ杵ヲ以
碎テ忌鐵ノ説ニ差リ。惟安居院ノ搗碎サル圓香附子凡粒凡

云者ヲ求テ自己鐵製之。辛温。○治頭痛腦動。去風寒濕利九竅。
下氣破痰温中去水出汗行血治咳嗽。開胸中滯結通百節。△根細ノ味辛レ。



細辛 本細 辛温。○治頭痛腦動。去風寒濕利九竅。下氣破痰温中去水出汗行血治咳嗽。開胸中滯結通百節。△根細ノ味辛レ。

故ニ呼テ細辛トス。治頭痛腦動。細辛ハ足少陰厥陰ノ藥。屬陽升
者也。故ニ頭面ノ風寒濕ヲ散通ス。充厥陰少陰ノ頭痛。外邪ニ屬者
ヲ治ス。腦動トハ頭腦ノ中痛テ腦中振動ノ苦ヲ云。此少陰ノ頭
痛也。蓋邪氣腦内ニ留滯スレハ也。按ニ細辛ノ味甚辛ヲ以テ深ク腦

底骨中竅際ニ通ノ滯壅ヲ散入。且其根莖ノ細々加骨空ノ小隙ニ
達シ其性ノ温ト辛味ト合ノ散發ノ功アリ。是以風寒ノ邪氣腦内ニ
滯者用之治入ルニ宜シ。去風寒濕其辛温ヲ以テ發散スレハ也。然
凡惟皮膚ノ淺ニ客ノ邪ハ不及用之。其邪深肉骨ノ間ニ透テ留滯ス
ル者用之。細辛治痛風トハ此義ナリ。利九竅其味辛其莖細其性
温ナルヲ以テ。上下ノ九竅ニ達ノ滯壅ヲ開散通利ス。故ニ明目
治風眼痛淚出療鼻塞不聞香臭治口舌瘡及喉痺齒痛利水道通
大便秘結此皆利九竅ノ功ヨリ出。愚案ニ細辛ハ陽ニ升則上下
九竅ヲ利スト雖上部眼目鼻口ノ竅ヲ利スルノ功右勝トスヘシ宗
輿説ニ治頭面風痛不可缺之ト云モ亦此意ナリ。又中風口禁ノ
不開者細辛ノ末ヲ鼻中ニ吹ノ術モ亦上竅ヲ利スルノ功盛ナルニ取
也。下氣破痰温中。細辛ハ陽ニ升者也。何此下氣蓋細辛ハ陽ニ

ノ升。故ニ胸中滯結ヲ開胸膈ノ滯結開則氣自從テ下。彼桔梗ハ
諸藥ヲ載ル舟楫ノ劑ニシ。此ガ能氣ヲ下ノ義ト同。細辛升テ上ヲ
開ニ因テ下氣ノ功アルト知ヘシ。痰ハ因氣細辛下氣且其辛温能留
滯ヲ開通ス。故破痰右風痰寒痰ノ留著ヲ破ニ宜シ。温中トハ中焦
ノ温ニ非ズ。内寒ヲ温散スルノ義也。仲景少陰症ヲ治スルニ麻黃附
子細辛湯アリ。内寒温散ノ意明ナリ。去水此標能ニテ微也。猪澤
木通ノ如キ水道通利スルニハ非ズ。細辛開胸氣下氣利竅ノ餘力也。
元素曰散水氣ト。水濕風水等ノ沉著留滯者用之。散通ス。出汗辛
温ナルガ故ナリ。出汗頭面ノ風氣ヲ去ニ尤佳。行血氣滯ヲ行ノ餘力
也。婦人月水閉。又血滯或癰痛ノ氣血留滯ニ屬者用之。治咳嗽上
テ胸肺中ノ風寒留滯ヲ散メ治咳嗽外邪ノ留著ニ非バ勿用。開胸
中滯結辛温陽ニ升ガ故也。通乳汁乳核治癰癧者ハ皆此ヨリ

致ノ餘功ナリ。癩症ハ風痰胸中ニ積ニ因バ也。通百節。辛温深ク
骨節ニ達ノ關節ノ留滯ヲ散通ス。故ニ四肢拘牽ヲ治ノ功アリ

總案

頭面ニ深留著者結滯ノ邪ヲ散ス。細辛ノ一能也。次ニ關
胸膈結滯。次ニ關節ノ留滯ヲ通ス。此細辛ノ要能也

使藥

曾青。棗根ヲ使トス。當岐芍藥。川芎。白芷。牡丹。藁本。耳
草ヲ得テ療婦人。決明。鯉魚膽。青羊肝ヲ得テ療目痛

獨活ヲ使トシ
能風寒ヲ散ス

毒

氣虛内熱者。○上盛下虛相火衝升者。○氣
虛自汗盜汗者。○血虛熱狂頭痛。○陰虛咳

嗽。○脾胃虛泄瀉者皆勿用。○細辛空服ニ用ハ弱矣。○通ノ止サテ
レム。○細辛多服單服スルコト勿レ。風藥ノ中ト雖五分ニ不過多
則反テ氣壅ニ悶

畏惡

黃耆。狼毒。山茱萸ヲ惡。生菜。狸肉ヲ
忌。消石。滑石ヲ畏。藜蘆ニ反ス。○本

草ニ已火義ナシ。修治纂要ニ已火トス。何ヲ以テカ此ヲ云未考其
直疑ハ其温陽燥烈

附方

兼金散。口舌ノ瘡ヲ治ス。細辛黃
連等分。爲末。糝之甚効アリ。或黃

ヲ助ニテラ恐テ云飲
栢ト合ス出。三因方。匿齒腫痛。細辛煎湯熱ノ含。冷則吐。出聖惠

方。口臭。細辛ヲ含。弘景說。中風口禁。細辛末吹鼻。出得効方。鼻

息肉。細辛末時々吹鼻。出聖惠方。諸耳聾。細辛末。黃蠟ヲ溶テ丸

スルコト。耳屎大。綿ニ一丸ヲ
按ニ細辛ハ甚辛習入トノ

愚案

舌ニ徹スルコト椒ヨリ甚シ

暴耳中ヲ塞成怒出經驗方
其性温ト雖熱ニ近シ。能升能徹深能散能破。勢烈ノ緩和者ニ非

病ノ實邪ニ非バ妄ニ用コト勿レ。在常服單服ヲ恐ユ。或急症ノ如ハ
此例ニ

修治

土氣ヲ洗。蘆頭子ヲ切去干乾シ用ユ。或土由ノ水
ニ浸コト一宿ノ暴乾用ユ。○雙葉者ヲ擇去ベシ。

誤用ハ人ヲ害ス○和ニ謂細辛ハ多ハ杜衡也此功葉莖氣味細辛
ニ似タリ時珍曰杜衡之亂細辛則根而功用皆彷彿乃彌迤而大亂
也不可不審ト今人家ノ園ニ植テ名葵植之雷電霆ノ災ト云者
也細辛也洛ノ東北賀茂ノ葵祭ニ用者真ノ細辛ナリ凡細辛ニ
者本草ニ多ク存ス審ニ用之

防風



本細 辛其微温○治上焦風邪散頭目中滯
氣瀉肺實去經絡中留濕治頭痛目眩
煩滿金瘡癩瘖風眼冷淚脇痛牽急周身

痛△此草根自然ニ防風ノ良能アリ故ニ呼テ防風トス治上焦風邪
防風其名ニ合ノ風ヲ治ス凡治風諸藥ハ皆解表發汗ノ劑タリ
防風獨解表發汗ノ義ナレト雖其藥性自然ニ風氣ヲ去故ニ他ノ
發表散風ノ力強者アリト雖防風ノ名ヲ得コトナクモ此草ノ此

名アルコトヲ得タリ是以防風ノ治風ハ必シモ解表發汗ノ散スル
ニハ非ス故ニ風邪盛者ハ獨用之不足散發表解散ノ劑ト合
用スシ虚人ノ風症輕ク發センコトヲ欲者宜之蓋防風ノ風ヲ治
者ハ邪氣雖不盛風内ニ鬱滿者用之内ヨリ逐テ外ニ出入壁
蜘蛛ノ滿ヲ卷テ取ガ如シ故ニ周身ノ風痛ニ用之且防風ハ氣
味俱ニ薄ク浮テ升是以身半以上ノ風症ニ其功盛ナリ或防風
稍フ用レハ身半以下ノ治風ノ説アリト雖腰以上ノ功ニハ懸ニ
劣リトス散頭自中滯氣防風氣味薄浮テ升陽也且辛ハ散ニ
其ハ緩テ頭自中ノ滯氣ヲ治ス滯氣トハ正氣ノ滯鬱ニハ非ズ
風寒ノ邪滯ヲ云故ニ頭風痛風眼赤痛冷淚ヲ療ス瀉肺實肺中
ノ正氣鬱實ニハ非ズ風邪肺分ニ實者ヲ云其症肩背痛息麁急
鼻壅胸中煩ス防風ノ所治也去經絡中留濕風濕經絡ノ中ニ留

滯ノ項強脊痛或身表痛痺者ヲ治ス **治頭痛目眩** 東垣頭痛ヲ
 治スルニ常ニ風藥ヲ用ユ蓋風ハ東方ノ木化升發ノ氣タリ故ニ山
 巔常一風氣ヲ存ス是以風邪ノ感人先頭高ニ受或直ニ頭高ニ
 不受ト雖風邪升陽ノ氣ハ升テ頭ニ乘ス故ニ頭自ノ病トカ九ハ
 風邪ニ屬ス且風ハ動搖ノ氣タリ是以風頭高ニ爵則頭旋目眩ス
 防風能上焦頭自中ニ爵スル風氣ヲ逐則頭痛ノ頭旋目眩スル者
 ヲ療ス **煩滿** 風邪肺中ニ爵ノ胸煩滿者ヲ治ス **金瘡** 防風直ニ
 金瘡ヲ治スルニハ非ス彼養血補氣生肉收口瘡藥ノ中ニ此ヲ合
 用則藥氣ヲ能外ニ達セシム内托ノ藥中ニ黃芪防風合用者是
 也或瘡瘍ノ破口ヨリ風ヲ感ノ病者破傷風ト名ク防風主之 李杲
 曰人身身瘡拘倦者風也諸瘡見此證亦須用之ト **療風眼冷淚** 防風
 ハ上焦頭自ノ風ヲ治スルニ宜カ故ナリ 東垣曰爲能散結去上部

風病ト然凡風眼症頸項強惡寒發熱眼中赤痛其風症甚者ハ獨
 防風ノ力ニ不足紫蘇羌活薄荷等ノ辛溫發表ノ風藥ト合入スヘシ
 脇痛脇ハ肝部也左右ヲ分則左脇ハ肝右脇ハ肺ト入 元素曰瀉肺
 實好古曰搜肝氣ト此皆肝肺ノ去風ヲ云故ニ脇痛肝肺ノ風邪
 ニ屬者ハ皆用之 **卒急** 手足屈伸不伸者ヲ卒急ト入 病經筋ノ
 風ニ屬ス 防風主之 **周身痛** 因風身痛者皆用之 逐之蓋防風ハ
 佐使引導ノ藥ニ從テ周身ニ行一定ノ位ナシ故ニ周身痛屬風者ハ
 何ノ所ニモ皆用之 果曰防風治一身盡痛乃卒伍卑賤之職隨所引
 而至ト屬風身痛者多ハ羌活ト **總藥** 防風ハ上焦頭自中ノ
 合用ノ足太陽ノ邪氣ヲ逐ベシ 風ヲ除ス又經絡中ノ留
 濕ヲ去此カ其風ヲ逐マ強テ表ヲ發ニモ非ス又必汗ヲ出ニモ非ス
 自風爵ヲ去ベシ 風爵トハ風氣ノ内ニ爵滿スルヲ云 防風コレヲ内

ヨリ逐テ出

使藥

葱白ヲ得テ發汗行周身澤瀉。藁本ヲ得テ上下表裏ノ風ヲ療ス。當歸芍藥。陽起石

出餘粮ヲ得テ。婦人子藏風ヲ療ス。黃芪ヲ得テ表氣ヲ堅シ。瘡ヲ

ニ合フ

毒

氣虛自汗盜汗者妄勿用。肺虛者妄用則上焦元氣

ヲ以

畏惡

葶藶ヲ畏。藜蘆。白欬。乾姜。芫花ヲ惡。附子毒ヲ殺ス。

發在。又尾者

附方

小兒願又。不令防風白朮柏子仁等分爲末。乳汁ニテ調塗。一日一換。出養生王論解毒方

烏頭。附子。天雄。芫花。野菌。毒ヲ解ス。防風煎湯ヲ飲シム。熱藥ノ毒ニ

愚案

古人治自汗防風末ヲ用ユ。治盜汗防風川芎人參末ヲ

用ユ由テ案ニ防風雖治風解表發汗ノ者ニハ非ス。風ノ

内ニ爵者逐テ其出スヘキハ出ノ後ニ其表ヲノ收密スルノ義ヲ

存セリ。故ニ李杲說ニ黃芪得防風其功愈大ト云。彼癡家内托

者黃芪防風合用則發汗ノ劑ニハ非ス。苟モ後ニ此ガ表ヲ收ノ義

アルニ非ハ。此等ノ主治ヲ致コト不能。故ニ虛人ノ風ヲ逐及風症ニ

汗アル者用之。蓋風ハ汗スルニ非ハ治スルコト不能。然モ症ニ汗ア

ルニ於ハ重テ發表ノ劑ヲ致シ難シ。恐ハ汗多七陽アラシコトヲ。只

防風ノ汗ヲ發スルニ不至ノ風ヲ逐後ニ收表ノ義アル者ヲ用ヒテ治

之。古人自汗盜汗ニ用者モ。全陰陽ノ獨虛ノ致者ヲ云ニ非ス。微邪

ヲ兼テ然者ノ三。或問東垣曰風藥中潤劑也ト。然ヤ否ヤ。曰夫馳

風ノ劑ハ皆辛溫發散津汗ヲ泄シ氣性烈ノ燥劑トス。防風ハ辛

ト雖不猛且蒸ルニ其味ヲ以テス。其性温ト雖亦微シノ芳芬ノ氣ナシ。故ニ此ガ逐風者ハ天然ノ性ヨリ出テ解表發汗ノ烈ニ不至是以風藥ト雖強テ燥劑トスルニ不足。故ニ潤藥トス。此直ニ燥ヲ潤ニハ非ス。又問東垣謂若補脾胃非此引用不能トハ何ゾヤ。曰東垣ノ脾胃辨惑等ノ書ヲ閱スレバ。間補中ノ治ニ防風羌活ヲ用ユ深理存スルコトアリ。夫四時ノ生物在春。和緩春風ノ氣ニ從。人身中ノ中焦ヲ補モ參朮等ノ甘温ヲ以テス。然レ若其虛ノ不行者偏ニ補ハ加不行偏ニ行ハ加虛ス。風藥ヲ合ノ補益スレバ。此カ補藥ヲ引導セシムニ從テ補ハ不瀆行レ亦不虛ノ補與行並行テ。且補劑ノ力ヲ得タリ。彼春風アリテ暖温ヲ行則物能生化スルノ義ニ同シ。○黃耆得防風其功大ノ義ハ前ノ黃耆ノ條ニ詳也。惟防風能黃耆ヲ引テ表ニ行レ此ガ解表發汗ノ義ナク。後ニ收表アルニ取ノミ必不贅

修治

水ニテ土煎ヲ洗淨シ蘆頭ヲ去。判用ユ頭尾ノ又者ハ毒アリ不可用。○案ニ本草ニ焙ノ說ナシ。和ニ撰スル修治

纂要ニ定テ焙トス。此何ニ處ヤ。修治纂要ニ所述ノ製法ニ已カ臆見ヲ以テ不正コト間存セリ。見者詳審ニ用之。近代消防風濱防風薩摩防風ノ數種アリ。俱ニ真物ニ非ス。又一種筆防風アリ。輕虛ニシ不宜。消防風濱防風ハ防葵ノ類ナリ。薩摩ハ證類ニ謂石防風ノ類也。頭風張痛ヲ治スルノ功アルノミ。惟古來所用ノ防風良時珍曰凡使以黃毛而潤者爲佳。白者多沙條不堪。

獨活



草得風不搖。入無風自獨搖。テ活人ノ如シ。故ニ獨活ト名ク。古ハ

苦辛甘微温。○治諸風痛。中風不語。失音。手足不隨。口眼喎斜。目赤。筋骨痠急。牙腫。賁豚。疝氣。破傷風。頭目眩暈。△此

獨活羌活通用ノ別コトナシ。後人別テ兩用ニ入。詳義ハ修治ノ條

ニ見タリ。治諸風痛獨活ト羌活ト本一類二種ナリ。只其氣ノ雄

細剛劣ノ不同ノミ。羌活ハ其氣雄ナリ。故ニ足太陽ヲ治ス。獨活

ハ其氣細ナリ。故ニ足少陰ヲ治ス。此好古カ説ナリ。李士材曰羌

活氣雄可理逆風獨活氣細可理伏風ト。由テ考ニ獨活羌活俱ニ

風濕ヲ治スルノ劑ニシテ。羌活ハ其氣雄剛タルヲ以テ。周身ニ遊浮ス

ル風濕ノ邪ヲ逐ヘシ。獨活ハ其氣細ニシテ筋骨關節ニ伏滯スル風

濕ヲ逐ニ宜シ。故ニ頭風痛痛風齒痛腰痛脊痛等ノ風濕毒滯骨

節筋間ニ伏ノ痛者盡用之。中風不語失音手足不隨口眼喎斜真

中風ノ伏風ニ屬者用之。目赤風毒ノ伏滯ニ因テ眼目赤痛者用

之風ヲ逐ヘシ。筋骨牽急牽急ハ屈伸ヲ云ナリ。風濕ノ毒滯

伏留ノ牽急疼痛者用之。牙腫足少陰ハ腎經タリ。牙齒ハ少陰

腎ニ屬ス。獨活ハ足少陰腎經ノ藥タリ。故ニ風毒ノ伏滯ニ因テ牙根

腫齒痛者皆用之。黃豚腎積ノ名ナリ。腎經ノ伏風ニ因テ此積ア

ル者用之。通用ニ非ス。疝氣疝氣症多ハ風寒風濕邪經筋ノ間ニ

伏滯ス。故ニ用之。破傷風金瘡瘡口ヨリ風ヲ受テ角弓シ瘡口疼痛

甚者用之。其伏風ヲ逐ニ宜シ。頭目眩暈風氣頭目ノ内ニ伏ノ頭眩

目暈者用之。其伏風ヲ逐ニ宜シ。凡風ハ動搖ノ氣故ニ此ガ分肉ニ

則皮肉蠕動シ。筋骨ニ滯則四肢振掉シ。頭目ニ滯則眩暈ス。皆伏

風ノ時也。俱ニ獨活

ノ主治スル所ナリ。

總槩

獨活ハ得風モ不獨則此草ノ性自風氣ニ勝エトヲ得タリ。故ニ能風ヲ逐且

若ハ燥濕辛温ハ發寒。是以風濕風寒俱ニ治ス。然モ其氣細ニシテ經絡

筋骨分肉ノ間滯ニ伏滯スル風濕風寒ノ毒ヲ逐者也。

故ニ風毒ニ屬スル諸節ノ痛ヲ療スルノ要藥ナリ。

使藥

實

ヲ使トス。細辛ト同用テウ
陰頭痛頭暈目眩ヲ治ス

獨活善諸藥ト合
ノ畏惡スル者ナシ

附方

出肘後方。痛風獨活羌活松節等分
風ニテ牙腫痛獨活煮酒熱シテ漱ク

煮酒空心飲
孟出外臺秘要

愚案

ト又諸家ノ本草ニ曰。羌活ハ足太陽經獨
活ハ足少陰經ノ藥トス。此皆其氣ノ剛劣ヲ以テ云。獨活羌活俱ニ

風濕ヲ逐ト雖獨活ハ得風不搖其能勝風性ヲ以テ雖逐風其氣
細ニ雄剛ナラス。故ニ伏風ヲ除ク邪ノ氣ハ羌活ヨリモ劣リ。
是以惟療風ニハ獨活トス。羌活ハ其氣性雄剛ニ能逐風勝濕
風濕ノ兩邪ヲ除ク力盛ナリトス。故ニ獨活療風ト云ニ對シ兼水
羌活ヲ用ノ説アリ。獨活羌活俱ニ風濕ヲ逐ク劑ナリ。獨活ハ風

ノ羌活ハ水ノミト云ニハ非ズ。水トハ水道通利ニ非ズ水濕留滯
ヲ云也。又獨活ハ足太陽羌活ハ足少陰ト云ト雖獨活羌活俱ニ
足太陽少陰經ニ行。蓋足太陽少陰表裏ニシテ太陽ハ表少陰ハ裏也。
獨活ノ氣ハ細ニ裏ニ行。羌活ノ氣ハ雄ニ
ノ表ニ行。故ニ太陽ト少陰トヲ別ト云ノミ
修治
土氣ヲ洗淨シ
皮ト黒腐トヲ削

去剉テ焙用。○俗説ニ獨活羌活ハ一物ノ内ニシテ兩種ニ別チ。獨活ハ
莖ヲ子ノ蟠テ黃色ナル處ヲ云。羌活ハ根ノ末細長別出テ紫色ナル
處ヲ云トハ甚誤ナリ。或云獨活ハ羌活ノ旧根ト。或羌活中ノ大者ヲ
擇テ獨活トス。皆甚謬也。頃曰或擇羌活之大者爲獨活殊未爲當
ト。獨活羌活ハ一類ニ種所出ノ地ニ異アリ。紫色ニシテ節密ナル者ヲ
羌活トス。黃色ニシテ塊ヲ作節疎者ヲ獨活トス。獨活ハ中國ニ生シ。羌
活ハ西羌ニ生ズト。此種頃時珍ガ説ナリ。節ナキ者ハ土當故也。白肉

黑皮芬香ニノ白芷氣ニ似者ハ水白芷也。擇テ勿用之。今所渡ノ活ニ節ナキ者、紫色ナラザル者ヲ雜ニ詳ニ用ヘキノミ

活 卷



始原 南卷活無節 西卷活多節

辛苦温〇治遊風頸項難伸肩背痠痛脚氣腰膝腫痛痛風癩風頭痛目

繖真中風失音不語手足不遂肝脹非時傷寒表症代麻黃瘰癧疔反張除風濕相兼者瘰癧疔散瘡毒△活ノ西卷ヨリ出者ヲ卷活

十号獨活卷活一類二種也治遊風卷活ハ其氣雄ニノ辛温能膚表ニ達ノ風濕ヲ驅散入遊風ハ浮遊ノ風邪ヲ云頸項難伸肩背強

痛此皆足太陽經ノ風症也卷活ハ太陽ノ風ヲ逐ハナリ脚氣腰膝腫痛風濕ニ因テ然者用之痛風癩風此二症邪氣在表卷活在裏獨

活ヲ用ユ多ハ二藥兼用ニ宜シ頭痛目眩太陽ノ風症ニノ然者卷活與川芎合用ノ宜トス真中風六淫ノ風ニ中テ致者真中風ト云裏ニ

者ハカ用實ハ鹿ノ過アリ失音不語手足不遂風邪太陽表ニ然者用之風濕相兼テ致者ハ尚以宜之肝脹眼ハ肝ノ竅タリ肝ハ木藏

風化ヲ主故ニ肝風ニ因テ肝葉脹則眼睛忽垂出テ鼻ニ至リ痛甚コトヲ致ス各テ肝脹ト云卷活ノ煎湯多用テ其風ヲ逐則自愈非時

傷寒表症代麻黃冬月即病正傷寒ノ表症ハ麻黃ヲ用テ其風寒ヲ逐ニ宜シ此時令凜寒氣盛ナレバナリ若春夏温熱ノ時寒ニ傷

レハ表症盛者麻黃ヲ用ハ其發散ニ過コトヲ恐故ニ卷活太陽經ノ風寒ヲ逐ニ雄ナル者ヲ以テ麻黃ニ代テ用之此史國信説也九

味着活湯ノ方意是ナリ然ニ世俗誤テ時ノ寒温病ノ輕重ヲ不察妄ニ麻黃アルノ方ヲ用則恐テ必卷活ニ代テ施者アリ笑ヘトス凡

其病アリテ其藥ヲ用則麻黃ト雖不可恐參茸ト雖不可恐トス

ルニ非入。藥ニ本ヨリ補瀉剛柔ノ定跡ナレ。從病其補瀉剛柔ヲ致
ノミ人參瀉火大黃止瀉利香附子補氣ノ類此ヲ定跡アリトセン
カ。補ノ瀉トナリ。瀉ノ補トナル。此醫中ノ神法ナリ。療角弓反張俗
謂リノ病此太陽經ノ風症ニ屬スレハ也。瘡家ニ此症多シ。除風濕
相兼者獨活モ亦風濕俱ニ逐ト雖風ニ較濕者ハ羌活ノ功更ニ勝
レリ元素曰風能勝濕故羌活能治水濕。脣痒不仁風濕ニ因テ皮
層癢痒シ。風濕ニ因テ氣血塞テ皮膚不仁者用之。散瘡毒羌活ハ
能表ノ毒ヲ驅カ故ナリ。
總槩 獨活羌活ノ主能太槩同ノ俱ニ
毒深者ハ獨活ヲ用ユ。逐風除濕ノ良劑ナリ。惟風裏ニ深
ク關節ニ在者ハ獨活ニ宜シ。風表ニ在者ハ羌活ニ宜シ。且羌活ハ風濕
ヲ逐ノ功獨活ニ勝者ナリ。羌活獨活ハ周身百節ノ風痛
ヲ治スル要藥ナリ。其二活ノ用ハ邪氣ノ淺深ヲ以テ辨之。
使藥

川芎ト同用テ太
陽ノ頭痛ヲ治ス
毒 氣血ノ虛ニ屬者ハ身痛アリト雖勿用益風
茶ハ燥耗スルガ故ナリ。○自汗盜汗者亦

勿
附方 產後子腸出者羌活二兩煎酒服。出必効方。太陽頭
痛甚者羌活防風紅豆等分爲末。鼻ニ吹出。玉機微

義肝脹出益奇
疾方詳義見前
愚案 諸家ノ本草ニ謂羌活ハ關節ノ風痛ヲ
治トス好古曰後人因羌活氣雄獨活

氣細故雄者治足太陽風濕相搏頭痛肢節痛一身盡痛者細者治
足少陰伏風頭痛兩足濕痺不能動止者ト。元素亦謂羌活透關節
節ト此皆逐風剛勁ニ從テ云ノニ。羌活ハ逐風ノ氣剛ヲ以テ關節
ヲ治ト云。愚案ニ獨活羌活俱ニ逐風勝濕透關節者ナリ。然レ凡
羌活ノ氣ハ雄獨活ノ氣ハ細ナリ。雄者ハ表ニ達レ易ク細者ハ骨際
ニ透リ易シ。此理ノ必然タリ。李士材曰羌活色紫氣雄可理遊風

獨活色黃氣細可理伏風下遊風ハ浮遊ノ風伏風ハ伏蔵ノ風夕
 リ此豈卷活ハ表ニ行易ク獨活ハ裏ニ行易キノ義ニ下ラスマ
 後人誤テ卷活ハ骨節風痛ヲ治シ獨活ハ頸項難伸ヲ治ト此
 者轉倒ノ説ナリ頸項難伸ハ太陽症卷活ノ所主也雁曰卷活
 氣雄雄者入太陽獨活氣細香細者入少陰也ト此説亦自獨活ノ
 骨節ニ行コトヲ知ニ足リ蓋
 太陽ハ表ガ陰ハ裏々レハ也
修治
 紫々也ニソ竹節ノ如キ者生
 土氣ヲ洗皮ト黒腐ト
 削去到テ焙用ユ詳義前條ニ見タリ

廣益本草大成卷之四終
 廣益本草大成卷之五

廣益本草大成卷之五



苦寒○清熱治諸瘡諸痛諸血症目疾
 消渴泄痢瘰癧小兒疳蟲及胎毒除濕
 熱△此草根連テ黃色ナリ故ニ黃連ト

各ク清熱黃連ハ手少陰心經ニ入テ火熱ヲ瀉スル主藥也愚案ニ
 黃連ノ苦寒ナル上焦心火ヲ瀉スルノ劑ニシ又中焦脾胃ノ熱ヲ涼
 ニ至ル蓋心與脾胃母其氣ヲ通入且黃連ノ黃色ナルヲ以テハ脾胃
 土ニ不可不行此藥心脾ノ熱ヲ涼ニ宜シ故ニ腹痛消渴瀉痢ヲ
 治者ハ脾胃ノ熱ヨリ致ラ云**治諸瘡** 至真要大論ニ諸瘡ノ心
 火ニ屬スルコトヲ云黃連能心火ヲ涼カ故ニ諸瘡腫ノ初々實熱
 ニ屬者用之其既潰爛ノ虛者ハ妄ニ勿用充上焦ノ腫瘡口瘡

和語本草 卷之五

ヲ治スルニ宜シ。蓋口瘡等ハ心火ニ屬スルヲ以テナリ。或婦人陰中
腫痛ヲ治スルノ義アリ。雖此モ亦直ニ下熱ノ致ニ非ス。心部ノ
實火小腸ニ及テ然ガ故ナリ。諸痛至真要大論病機。諸痛ノ
心火ニ屬スルコトヲ云。故ニ或心腹痛。或諸瘡腫痛。皆心脾ノ實熱
一屬者用之。諸血症。心生血。肝藏血。脾總血。血得熱妄行。故ニ
心脾肝ノ火熱ニ因テ血液妄行ノ或上竅。或下竅ニ血ヲ出者用
之。清熱則血自止。此モ亦實熱ニ因者ヲ治ス。或問黃連心脾ノ熱
ヲ涼者ハ辨証ニ明ナリ。何此ガ肝熱ヲ涼ニ至ヤ。曰肝ハ木トス。心
火ノ母タリ。亦母子其氣ヲ通ス。蓋心ハ南方離火ノ本藏タリ。凡
虛火ノ生スルヤ其部各不同。虛空ニ生スルガ故ナリ。實火ノ諸症モ
亦其部各異。不同心火ヲ主トセス。ト云コトナレ。是以實火ノ諸症
ハ皆使ノ劑ニ合同ノ皆黃連ヲ通用ス。獨心火ノ熱症ニハ不可

正目疾 眼目赤腫痛。淚出暴發者ハ火熱ニ屬ス。黃連ニ宜シ。凡本
草家ニ黃連ヲ以テ目疾ヲ治スル聖藥トス。蓋眼病多ハ實熱タ
ルガ故ナリ。然凡亦虛熱虛寒症アリテ苓連等ノ苦寒ニ不宜者
アリ。一藥ニシテ不可治。消渴ニ焦ノ火熱ニ屬スレバナリ。泄痢。世瀉
痢疾ノ初腸胃ノ實熱。濕熱ニ屬者用之。痢病多ハ濕熱ノ實熱ニ屬
ス。且血痢ト不食禁口痢トハ加腸胃ノ熱滯ニ因コト多シ。故ニ劉涓
子曰。治痢以黃連爲君。然凡虛ヲ主トメ瀉痢スル者アリ。一藥ニ
通用スヘカラス。痞滿 心脾ノ實熱結ニ因テ心下痞滿ノ惡心嘔
吐者用之。小兒疳蟲成無已。曰。就得中則動。得苦則安。上黃連ノ苦
メ濕熱ヲ除ガ故ニ疳蟲ヲ療ス。胎毒 胎中ノ熱毒ヲ云。因此丹毒
癩疹等ヲ發者用之。除濕熱 黃連ハ獨火熱ヲ瀉スルニナラズ。苦ハ
勝濕寒ハ制熱除濕熱瀉痢腹痛ノ治方ニ用之者多ハコノ義ナリ

總纂

黃連ハ心脾ノ實熱ヲ涼。在心火ヲ瀉スルノ要劑タリ。且能中焦濕熱ノ實熱ヲ除ク。太低一切實熱者ハ佐使ノ

藥ニ從テ皆此ヲ合用ス

使藥

黃芩。龍骨。理石ヲ使テス。龍膽草ト合ノ肝膽實火ヲ涼シ。甘草ト合ノ胎毒ヲ除當故

赤芍ト合ノ熱眼ヲ療ム。枳實ト合ノ痞滿不食ヲ治ス。廣木香ト合ノ腹痛下痢ヲ治ス。吳茱萸ヲ佐トシノ吞酸吐水ヲ治ス。蘆薈。白蕪荑。

白槿花。白芙蓉花ト合ノ小兒一切ノ疳熱ヲ治ス。毒。心元不足者。脾胃怯弱者。腎元

皆勿用。凡陽氣虛冷ノ者ハ切ニ用コトヲ禁ズ。畏惡。菊花。玄參。白鮮皮。芫花。白僵蠶。豆ノ毒。惡。疑。冬。花。牛。膝。ヲ。畏。烏。頭。ニ。勝。四。ヲ。解。ス。

附方

疔瘡如雞冠。黃連末加赤小豆末傳出斗門方。痢或痔ニテ脫肛者。黃連末ヲ冷水ニ調塗出經

驗良方。治目中百疾。乳汁。黃連ヲ浸テ此ヲ内外皆ニ點ス。目中

癢ニ痒痛者尤佳。出外臺秘要。口舌瘡。黃連煎酒冷呷。出肘後方。

小兒鼻下赤爛者。先米泔ヲ洗次ニ黃連末ヲ塗。出子母秘錄。小兒

初生。黃連煎汁。一匕ヲ灌。則終身胎毒ノ患ヲ免。出湯液本草。巴豆

毒ニテ瀉不止者。黃連乾姜等分。黃連ハ實火ヲ瀉スル

為末。水ニテ服シ。出肘後方。愚案。要藥トス。其苦寒ナル

ヲ以テ也。夫四時ノ令ヤ。春夏暖陽ヲ得テハ万物生榮シ。秋冬冷

寒ヲ得テハ万物殺傷ス。人身ノ腹内モ亦常ニ春暖生發ノ氣ニ存

則何ノ病カアラン。故ニ苦寒。冷沈ノ劑ハ喜所ニ非ト雖。實熱ノ當瀉

者アルニ於ハ不得不用之。是以若其黃連等ノ苦寒ヲ用ハ。明ニ實

熱タルコトヲ決メ施之藥ノ效アラバ速ニ止テ過用久服スルコト勿シ。且

反佐因用ヲ主トセヨ。古人寒劑ヲ用ニ熱藥ヲ加。熱劑ヲ用ニ寒藥ヲ

加此ヲ反佐トス。又熱劑ヲ服スルニ寒ノ飲シム。寒劑ヲ服スルニ熱ノ
 吸シム。此ヲ因用トス。如此則偏寒偏熱ノ害ナク。病邪與藥氣相拒
 爭コトナシ。今庸醫知之者アルコト希ナリ。或間反佐因用ヲ知凡
 苦寒反テ熱火ヲ生スルノ義ニ昧シ。夫黃連等ノ苦寒ヲ以テ實熱
 ラ瀉者ハ水消火ノ義。世人所知ナリ。若其元氣不足ニ因テ陰火
 生者ハ此龍雷ノ相火タリ。若寒ヲ以テ欲消則炎熱ナラ盛。病惟補
 陽ノ溫藥ヲ以スレバ陰火自退。此義ヲ不知者妄ニ黃連等ノ寒劑
 ラ投シ日ニ攻月ニ擊則元氣加虚レ陰火彌生ノ熱入此寒藥反テ
 生火ノ義ニ非ヤ。宗奭曰慎勿輕用上時珍曰中病則即當止豈可久
 服使庸殺之令常行而伐其生發中和氣乎。李士材曰惟不得已
 而後敢用上。慎恐テ過
 用スヘカラサルコト明也

修治

二八月ニ根ヲ採洗淨シ。蘆頭ヲ
 去。慢火ニテ炒。毛ノ焦ニ至テ太布

ニ包。揉磨ヲモヲ去。ナラ餘ニテ毛ノ殘者ヲ篩去。再色ノ昏程炒
 用ユ。○心火ヲ瀉スルニハ生。肝膽ノ實火ヲ瀉スルニハ 豬膽汁ニ浸炒
 肝膽ノ虛火ヲ瀉スルニハ醋ニ浸炒。總テ上焦ノ火ヲ瀉スルニハ酒ニ浸
 炒。中焦ノ火ヲ瀉スルニハ姜汁ニ浸炒。下焦ノ火ヲ瀉スルニハ鹽水ニ
 浸炒。氣分ノ濕熱伏火ヲ瀉スルニハ茱萸湯ニ浸炒。血分塊中ノ伏
 火ヲ瀉スルニハ乾漆水ニ浸炒。食積ノ火ヲ瀉スルニハ黃土ヲ雜炒。眼
 目ノ劑中ニハ生ヲ用ユ。或人乳ニ浸蒸。○和黃連ハ加賀州ヨリ出者
 上品ナリ。他ハ皆細長多毛。内空ニ黃色薄シ。不堪用
 苦大寒。○瀉心火及肝膽實火。治陰分
 伏熱。一切濕熱。療骨蒸勞熱。消渴。目疾。
 傷寒。方復。黃疸。痔瘡。溫瘧。泄痢。小兒驚



痢不下。食積。婦人胎蒸。去菓子積。此草胡地ニ生。功用黃連ニ

似タリ。故ニ名テ胡黃連トス。瀉心火及肝膽實火。黃連ノ功用ト
大藥同ニ似テ異アリ。胡黃連ハ大苦大寒ニ瀉心火ノ性。黃連ヨリ
甚且黃連ハ瀉心火除脾熱。胡黃連ハ心肝膽ノ火熱ヲ瀉ス。黃連
ハ氣分ノ熱火ヲ涼ニ宜シ。胡黃連ハ陰分ノ熱火ヲ涼ニ宜シ。胡
黃連ハ大苦大寒實火ノ者ニ非バ勿用。治陰分伏熱一切濕熱陰分
ニ伏スル實熱及一切濕熱ノ實積ヲ治ス。此皆其實ニ非バ用テ勿レ
療骨蒸勞熱陰分ノ伏熱ヲ去ガ故ニ骨蒸熱及五心煩熱等ノ勞
熱ヲ除ク。然レ精液甚虚渴シ中焦氣血虚弱者ハ骨蒸方熱ス
雖勿用之。消渴實火ニ屬者ヲ治ス。目疾。眼ハ肝膽ノ所主。故ニ用
之。肝膽ノ熱火ヲ瀉メ目疾ヲ療ス。此モ亦實熱ノ眼病ニ非バ勿用。
傷寒方復傷寒愈テ後不養生ニ從テ餘熱復衰ニ鬱結ノ病再
發者ヲ治ス。此モ亦胡黃連ハ能陰分ノ伏火ヲ去ガ故ナリ。然レ虛

實ヲ詳ニシテ施之。輕用コト勿レ。黃疸。胡黃連ハ能濕熱ヲ除ガ故也。
濕熱ノ實鬱ニ屬ノ胃氣不虛者ニ用エ。痔瘡。濕熱ヲ瀉スルカ故也。
濕癰。寒少熱多。或單ニ熱ノ寒セサルノ癰ヲ治ス。凡癰疾ハ伏熱ニ
生ス。故ニ雖用之。亦ニ施コト勿レ。實熱ノ結伏ニ非バ勿用。泄瀉。泄瀉
痢疾症濕熱ノ鬱實ニ屬者ヲ治ス。小兒驚癇不下食。疳積。苦ハ蟲
ヲ殺シ寒ハ熱ヲ清ス。故ニ驚風ノ熱症及疳熱ヲ治ス。驚癇者不
下食ハ胃口ノ熱實ニ因ハナリ。苦ハ疎テ推者也。故ニ疳病積熱ア
ルヲ療ス。婦人胎蒸。婦人懷胎ノ中ニ勞熱ノ如クニ骨中ヨリ蒸熱
スルヲ云。胡黃連能陰分ノ伏熱ヲ治スルカ故ナリ。去菓子積。菓子實
ノ宿積ヲ去也。苦ハ能消推スルカ故ナリ。然レ久用テ胃氣ヲ傷ル
コト勿レ。大苦大寒ハ
總要
陰分ニ伏スル實火ヲ瀉シ濕熱ノ結
滯ヲ除。小兒ノ疳疾驚風ノ積熱ヲ

去善蟲ヲ逐故毒氣血虛弱者○胃氣不健者○一切冷寒ニ

小兒寒多用之毒禹者皆勿用○味苦ハ胃氣ヲ損易ク性太

寒者ハ陽氣ヲ伐易シ畏惡菊花玄參白鮮皮ヲ惡補肉ヲ忌

故ニ過用スルコト勿シ愚案誤テ合用則漏精巴豆ノ毒ヲ解

スル附方小兒赤白胡黃連末ヲ茶ニテ調

宜シ愚案手足心ニ塗ハ即愈出濟急仙方

ニ似テ其苦寒甚者也實熱修治劉テ生ヲ用ユ○今人當藥

ニ胃氣健者ニ非ハ勿用之修治草ヲ以胡黃連トス甚非也

其形質本草ノ説ニ不合惟甚苦ノニ勿用唐ヨリ來者ヲ用ベシ

苦寒○治肺熱下氣去煩療泄痢熱瘡

赤目喉腥失血熱渴淋閉黃疸骨蒸寒

熱往來女子血閉安胎小兒腹痛火欬



本細 原如 片黃

肺疼秘結壅氣痰熱風熱濕熱皮膚痒痛痞滿上逆喘息△芩ハ説

文作荃此草根黃色ニシ如金故ニ黃芩ト名ク治肺熱黃芩ノ主能

千變万赫ト雖此カ本根トスル所ノ者ハ手太陰ニ入ニ肺熱ヲ涼ニ

在ノニ下氣肺ハ膈トニ在テ諸上氣ハ此カ總主所タリ故ニ熱氣肺

中ニ逆ヒソ不下者ハ用之黃芩ノ寒ヲ以テ清熱苦ヲ以テ氣ヲ下ソ

其逆氣ヲ除去煩肺熱ニ因テ胸中煩悶スルニ宜シ療泄痢泄瀉痢

病症或風熱或濕熱一切屬熱ノ泄痢ニ皆用之蓋泄痢ハ下焦ノ

病タリ黃芩ハ上焦肺分ノ藥トス何ゾ此ガ泄痢ヲ治スルマ夫肺

與大腸表裏タリ源清則流從テ自清シ故ニ黃芩ヲ以テ肺熱ヲ

清則大腸從テ清シ泄痢ヲ治スルノ義明ナラスヤ熱瘡丁瘡乳

癰發背疽等ノ熱ニ屬スル諸瘡ニ用ユ赤目肺熱上衝ニ因テ目

中腫赤痛者ヲ治ス喉腥腥ハ金肺ニ屬ス故ニ喉氣臭ノ腥ハ肺

熱ニ屬ス。黃芩ノ所主ナリ。失血ハ得寒止リ。得熱妄行ス。且血ハ
從氣肺ハ主氣故ニ肺熱則氣熱シ。血熱シ。氣血亂テ或衄血或大
小便血ヲ致ス。黃芩其熱ヲ清則血自止。熱渴肺熱ニ因テ渴者用
之。凡熱渴症。虛實ノ兩辨ヲ存ス。渴ノ冷飲ヲ惡頻ニ熱飲ヲ欲メ
然多不飲者ハ虛熱ノ渴也。切ニ黃芩等ノ苦寒降沉ノ劑ヲ不宜
用。其温補陽ノ劑ヲ用ヨ。渴ノ涼飲ヲ欲シ然善多飲者ハ實熱ノ
渴也。芩連等ノ寒劑ニ熱ヲ清ス。左寸ノ脉實大者ハ黃連右寸ノ
脉實大者ハ黃芩ヲ主トセヨ。淋閉肺熱ニ因テ小便淋瀝閉癢者
用之。蓋肺ハ金トシ氣ヲ主ル。金ハ水ノ母。氣水ハ合一タリ。故ニ肺熱
則氣上ニ逆シ。水津順下スルコト不能メ小便下ニ淋閉ス。黃芩清
肺熱下逆氣則水自通利ス。本經黃芩逐水甄權治五淋十八皆是
也。直ニ小便ヲ通利スルニハ非ス。清肺熱下逆氣ヨリメ此説アリ

黃疸熱ヲ主トスル者用之。骨蒸此症兩辨アリ。陰火ノ伏熱ニ
因テ氣分ノ伏熱ニ因トナリ。黃芩所主ノ骨蒸ハ氣分ニ伏スル結
實ノ熱ニ因テ然者ヲ治ス。寒熱往來惡寒發熱ノ往來者ハ
熱邪表裏陰陽ノ際氣分ニ爵メ急ナルガ故ナリ。黃芩ノ寒其氣
熱ヲ清シ味苦ヲ以テ爵急ヲ疎利ス。小柴胡湯ニ黃芩アル者は
也。凡熱微則氣緩故ニ汗出。熱甚則氣急故ニ汗ナシ。是以苦寒者ニ
非ハ不能清熱何如トナレハ。惟其寒性ヲ以テ雖欲清熱熱甚ニ至
テハ彼氣ノ急ヲ疎利セズンバ熱自清コト不能故ニ寒勝熱苦疎
其功盛ナリ。諸寒熱往來ハ半表半裏少陽ノ病トス。雖惡寒
ズルニ此症以蔵云則肺ニ屬メ氣分ノ急ナルニ始者乎。譬ハ平人ト
雖犯寒氣道憎ト急ナル時ハ惡寒ノ發熱ス。或恐驚メ氣道憎ト
急ナル時モ亦必惡寒ノ發熱ス。寒熱往來ハ氣道ノ急結疎條

セガルカ故ナリ。詳義柴胡ノ條ト參考スベシ。惟天地人身ノ道ハ緩急ノ兩道ニ在リ。天地ノ陰陽五行。人身ノ虛實補瀉。盡緩急ノ二岐ニ止者ナリ。女子血閉氣熱。肺分ニ鬱シ。上逆ノ嘔下セガルカ故ニ。經水不調者。用之。婦人ハ性執ノ氣鬱ス。氣鬱則熱ヲ肺ニ積。肺熱シ氣鬱則上逆ノ不下。氣不下則經水順流スルコト不能ナリ。故經閉ノ症。其因多端タリト雖。氣熱上逆ノ症。黃芩ニ宜者充多シ。安胎胎中ハ清熱養血ヲ以テ法トス。故ニ補血ノ劑中ニ黃芩ヲ合同ス。然氏胎育ノ道。專胃氣ノ培養ニ從。苦寒者ハ胃氣ヲ損傷シ。明ニ氣熱ノ候アルニ非ハ妄ニ用コト勿シ。小兒腹痛。肺金與脾土母子ニシテ其氣相通ス。故ニ氣熱肺ニ鬱ノ此ヲ中焦ニ及則腹絞痛ス。黃芩主之。其症必渴ノ冷飲ヲ欲シ。小便赤澀。大便秘結シ。右寸脈實數ナリ。此症小兒胎熱。肺ニ鬱者ニ多シ。故ニ別錄ニ小兒

腹痛ト云。大人ニシテソノ獨小兒ニシテ此病アルニハ非ス。夫腹痛者多ハ宜温順不欲寒冷。然亦熱厥肺熱ノ腹痛ナキニ非ス。彼昧者ハ仲景少陽證。腹中痛者。去黃芩等ノ法ヲ見テ。絶ノ苦寒ヲ不可用トス。惟其因其脈。其證ニ從テ。或寒或温以勝者。制之。楊士瀛云。若熱厥腹痛。肺熱而小便不利者。黃芩其可不用乎。故善觀書者。先求之理。毋徒泥其文下。此彼仲景腹痛去黃芩。小便不利去黃芩ノ一法ニノニ執滯者ヲ辨セリ。火欬。肺分ノ火熱上逆ニ因テ欬嗽喘急者。主之。若非熱症勿用。肺疼。肺熱ニ因テ胸中疼痛者。主之。其夜。肩背月ニ引テ且胸ノ左右乳上ノ痛。亦急ナリ。秘結。大便秘結者。ハ肺熱ヲ大腸ニ移テ然リ。故ニ黃芩主之。蓋黃芩ニ實空ノ兩種アリ。黃芩堅實者。實腸凡條。芩凡號。大腸ノ熱ヲ瀉スルニ宜シ。秘結泄痢ノ症。用之。黃芩中枯ニ空瀉者。空腸凡片。芩凡號。上焦肺熱ヲ瀉スルニ宜シ。詳

本草綱目 卷之五 黃芩

義ハ修治ノ條ニ見タリ。壅氣肺ハ氣ヲ主ル。氣ハ陽トス。氣壅時則熱
シ。熱時肺黃芩肺ニ入。若キハ疎氣寒ハ清熱スルカ故ニ壅氣ヲ利
スルノ功アリ。在胸氣ヲ利スルニ宜シ。然凡其症熱ニ非ハ勿用一藥
ニ利氣トノニ覺ヘカラス。痰熱風熱濕熱凡除熱ノ藥氣一同ナラス。
或發汗ノ除熱者アリ。或通下ノ除熱者アリ。或行レ或潤ノ熱ヲ除
者アリ。黃芩ハ非出汗非下非行潤惟氣熱ヲ清涼スルノ劑タリ。夫
肺ハ金トス。火ノ爲ニ乗セラレ易レ故ニ諸火熱邪。肺分ニ從スト云フ
ナレ。黃芩能肺熱ヲ清則諸熱ヲ通治スヘキコト明也。然凡熱只其
本藏ニノニ有テ肺ニ乗セサル者アリ。詳ニ用之。大槩痰ハ氣ニ
從風熱ハ皮毛。如ル。肺ハ主氣及皮毛カ故ニ。痰熱風熱邪ナカ
八九ハ肺ニ在。且若ハ濕ニ勝寒ハ制熱。黃芩ノ苦寒ナルハ濕熱ヲ治
スルニ至ル。此モ亦濕熱氣分ニ有ニ非ハ勿用。皮膚痒痛皮膚ハ

肺ノ合タリ。故ニ肺分ノ風熱痰熱等ニノ然者主之。痞滿肺熱
アリテ痞滿者。黃芩ノ苦寒ヲ以テ肺熱ヲ清レ。胸氣ヲ利レテ愈
上逆氣上逆ノ胸中煩熱者主之。喘息喘息症多ハ肺分ノ風
熱痰熱氣熱ニ屬ス。故ニ黃芩ヲ用。然凡元氣
不足ノ虛熱ニ逆セラル者アリ。詳ニテ用之。
ノ熱ヲ除キ。上焦及皮膚ノ風熱ヲ去。
胸中ノ痰熱ヲ退。氣熱ヲ利スル要藥也。
得テハ屬熱腹痛ヲ治ス。桑白皮ヲ得テ能肺火ヲ瀉ス。白朮ヲ得
テ安胎。芍藥ヲ得テ下痢ヲ治ス。柴胡ヲ得テ寒熱往來ヲ治ス。五
味子。牡蠣ヲ得テ子アラレム。黃耆。白朮。赤小豆ヲ得テ癰癤瘰癧ヲ
治。肺虛者。○脾。怯弱者。○肌寒者。
毒 ○肺中ニ寒氣アル者皆勿用之。
畏惡 葱實ヲ惡。丹砂。牡丹。藜蘆。
使藥 山茱萸。龍骨ヲ使。トス。厚朴。黃連ヲ
總槩 肺熱ヲ瀉。レ亦大腸

長

附方

灸瘡血出不止手足冷テ絶セントスル者酒炒黃芩二錢爲末酒以テ服ス出怪證奇方產後飲水不止

者黃芩麥門冬等分小煎之温服ス出家藏方黃芩湯肌熱ノ如燎煩燥引飲痰嗽晝重ハ氣分ノ肺熱也片苓二兩水二鍾煎一鍾服

東垣方眉眶痛風熱痰也黃芩酒浸白芷等分爲末每服一錢茶ニテ下ス潔古方

愚案

李具曰黃芩養陰羅天益

云補氣ト此兩説ヲ見テ直ニ補陰補氣ノ劑ト不可覺養陰トハ火熱ヲ瀉スルカ故ニ云補氣トハ火與元氣兩ナガラ不立熱ハ氣ヲ傷カ故ニ其熱ヲ瀉則氣ノ傷ヲ免故ニ補氣ト云ノニ時珍ハ謂黃芩ハ手少陰足少陽本經ノ藥トス愚案ニ仲景少陽證下後心下滿テ不痛者ヲ治スル瀉心湯ニ黃芩アリ成無己云黃芩苦而人心ト云カ故ニ黃芩ヲ以テ手少陰ノ藥トス其少陽ノ本藥トスル者ハ小柴胡湯ニ黃芩アルヲ以テナリ此義皆不可トス黃芩ハ手少陰手陽

明ノ本藥ニソ手少陰足少陽ノ本藥ニハ非ズ學者決ノ勿惑或問元素謂療上部積血トハ何如曰凡一切積滯則熱又熱則加積滯ス黃芩ハ直ニ逐瘀血者ニ非ト雖其苦ヤ氣血ノ留積ヲ破ルヘシ其性寒ヤ積滯ノ熱ヲ瀉スヘシ太似積血ノ下焦ニ在者ハ血ヨリ始ル上焦ニ在者ハ氣滯氣熱ヨリ始テ積血トナル黃芩利氣清氣熱且上焦ノ藥タリ故ニ上焦積血ヲ療スト云學者深上焦ノ兩字ニ眼則此ガ積血ヲ除ノ意義ニ達スヘキ者乎

修治
腐ヲ去剉用ユ一偏ニ瀉熱トノ三欲セハ生ヲ用ユ又酒ニ浸炒則上行ノ且苦寒ノ氣味ヲ緩ス上焦ノ濕熱ヲ瀉スルニモ亦酒洗炒用ユ○黃芩ノ腐爛ノ中枯輕飄者ヲ枯苓片空腸片片苓片宿苓片号上行ノ肺火ヲ瀉胸氣ヲ利

痰熱ヲ消。風熱ヲ除。肌膚ノ熱ヲ去ニ用之。細實ノ中枯サル者ヲ
 條芩ト云。實腸凡号。大湯ノ火ヲ瀉シ下部ノ濕熱ヲ除下痢秘結ニ用
 之。圓ノ實者ヲ子芩ト号。治功條芩ト同シ。片芩ハ旧根條芩ハ新根
 也。或其上下ヲ分テ黃芩ノ上半身ハ上部ニ用ヒ。下半身ハ下部ニ
 用ユ。各其方ニ從ベシ。○案ニ藥店ニ朝鮮黃芩アリ。色淺苦味サシ
 不堪用。或誤テ南天竹撒沙命起草ノ根ヲ掘テ黃芩ニ偽者アリ。
 絶ノ不可用。宜擇之。

柴胡



煩熱嘔吐筋掣熱痰血凝氣聚食積濕痺婦人經水不調熱入血室
 小兒疳熱宜氣血去肌熱△柴本作此音柴。此草山中ニ生ノ嫩則可
 茹。老則采テ柴トス。故ニ根ヲ呼テ柴胡トス。治寒熱往來柴胡ハ

足厥陰肝。足少陽膽經ノ藥トス。少陽經ハ陰陽表裏ノ際トス。是
 以諸寒熱往來ヲ病者ハ皆少陽經ニ屬ス。且寒熱往來ノ本マ少
 陽ノ熱ニ因。熱其半表半裏ノ間ニ鬱ノ氣道急則惡寒發熱ノ往
 來ヲ致ス。惟寒熱往來ハ少陽ノ熱ニ因テ陰陽ノ氣急ナレバナリ。
 柴胡ハ少陽經ニ入テ清熱且氣薄味苦ヲ以テ其氣ノ急ヲノ緩
 ナシム。故ニ寒熱往來ヲ主治ス。蓋熱邪陽經ニ鬱則惡寒シ陰經
 ニ鬱則發熱ス。少陽ハ陽明與太陰ノ間ニ居ス。故ニ熱邪少陽經ニ
 在則或陽ニ出。或陰ニ入テ寒熱往來ヲ致ス。好古曰前行則惡熱
 却退則惡寒トハ是也。人身十二經ノ中手少陽足少陽アリト雖
 手少陽ハ膈膈ニ流。足少陽ハ上下ニ通行ノ時脇ヲ行。脇ハ腹背
 ノ際トス。背ハ陽經ノ行。腹ハ陰經ノ行タリ。故ニ熱邪足少陽經ニ

在テ引則或腹部或背部ニ往來ノ腹背陰陽ノ經氣ヲ急引セシムルヲ以テ。惡寒發熱ニ往來ヲ致ス。是以寒熱往來ハ獨足少陽經ニ屬シ此ガ本藥タル柴胡ノ主治スル所トス。仲景小柴胡湯モ亦此意ナリ。陽氣下陷足厥陰肝。足少陽膽ハ膈下ニ在テ東方少陽木發生升騰ノ清陽タリ。四時ニ在テハ春陽生物ノ氣トス。故ニ人身ノ腹内ヲシテ春陽發生ノ氣令ラ得セシムル者ハ肝膽少陽ノ木氣ニ在。此氣ヤ順升其宜ヲ得則濁陰下降ノ陰陽交通シ胃氣中宮ニ生發シ。營衛周躰ニ生榮ス。是以東垣常ニ此清陽順升ヲ主トシ。胃氣ヲ補ノ最要トス。柴胡ハ足少陽ニ入テ彼清陽ノ下陷シ上行不能者ヲ順升セシムルコトヲ得タリ。東垣曰能引清氣而行陽道又曰能引胃氣上行升騰而行春令ト。章宜曰肝爲春令主升陽故陽氣下陷者不可缺トハ是ヲ謂ナリ。或問本草謂升

麻引陽明清氣上行。柴胡引少陽清氣上行ト。升麻ハ本經ニ平微寒ト元素曰性溫ト。柴胡ハ本經ニ平。別錄ニ微寒トスルト。遂ニ溫トスルノ說ナシ。夫性溫者ハ實ニ上行スベシ。寒性者ハ當下行。柴胡何ゾ引清氣上行ノ功アルニ至ヤ。曰本草匯曰板柴胡。稟仲春微寒之氣春氣升而生ト。此實ニ章宜ガ明達ニ出テ古人ノ未辨ノ義ヲ發セリ。夫仲春ノ月ハ時陽タリ。故ニ溫氣微アリト雖。曰冬ノ殘陰存ノ其令ハ微寒ナリ。然凡春陽生發ノ氣ハ順升ノ地上ニ行草木萌芽ス。此其令ハ微寒ナリト雖。其氣ハ順升生發ノ氣ヲ存。下焦清陽氣ヲ引テ上行セシムルニ至ル。然凡柴胡獨用テ此功ヲ成コト不能。仲春月微寒タリト雖。溫陽化ヲ兼。非ハ升發ノ政ヲ致コト難。故ニ參朮木茸等ノ補氣溫陽ノ劑ト令入ヌル時ハ能清陽ヲ上行セシムルノ功ヲ明ニス。東垣補中湯ノ

方意是ナリ **傷寒** 傷寒陽症ノ邪熱少陽經ニ入テ半表半裏者用
之仲景小柴胡湯一用之和解者是也若或傷寒熱邪太陽經ニ在
者誤テ柴胡ヲ服スハ熱邪ヲノ及テ少陽ニ入レム若或熱邪既ニ
陰經ニ入者誤テ用之重テ表ヲ傷ル彼庸工未知之傷寒ノ熱邪
表裏ノ辨ニ難者ヲ見テハ必柴胡ヲ用テ治之害ヲ致者間存セ
リ章宜曰世俗不知柴胡之用每遇傷寒傳經未明爲不汗不吐不
下可以裁拙輒混用之不死何待 **瘧疾** 瘧ハ此熱病經足厥陰少
陽ニ屬メ寒熱往來ス故ニ諸瘧症皆用之 **口苦** 膽熱ニ因テ膽汁
ヲ吐ガ故ナリ柴胡ハ肝膽ノ熱ヲ除バナリ又心熱ニシテ口苦者アリ
脈ニ從テ辨之 **耳聾鳴** 足少陽膽經ハ耳後ヲ行耳ヲ貫テ耳前
ニ行故ニ膽熱ニ因テ耳聾耳鳴者ニ用之或陽氣下陷レ濁陰上ニ
壅テ然者亦用之清氣ヲ上達スレバ濁陰下行ノ愈 **脇胸痛** 脇ハ肝

膽部ナリ故ニ脇痛症ハ足厥陰少陽兩經ノ結熱ニ屬ス柴胡主
之左脇痛者尤宜シ或脇ヲ主トシテ胸痛ニ引者亦用之或清陽上
行セズ濁陰上ニ埋テ胸痛者亦用之 **目赤眩暈** 眼ハ肝ノ竅トス
柴胡ハ足厥陰ノ劑ナリ故ニ諸眼病用之眼赤腫痛テ肝膽ノ風
熱ニ屬者尤宜之或陽氣下陷ノ虛眼障翳者亦補氣耳温ノ劑ト
合用スヘシ **頭角痛** 足少陽經ハ頭角ヲ行故ニ少陽經ノ熱ニ因テ
頭角痛者用之 **肩背痛** 足少陽經ハ肩ヲ行背ノ胛骨ニ流故ニ少
陽經ノ熱ニ因テ肩背痛者用之 **潮熱** 時ヲ定テ來熱ヲ潮熱ト云
日中ハ總テ陽虛ノ潮熱日中後ハ總テ陰虛ノ潮熱トス柴胡ハ下陷
ノ陽氣ヲ升提スガ故ニ陽虛ノ潮熱ヲモ主ト治ス柴胡ハ足厥陰ノ
藥ナリ足厥陰肝ハ藏血者ナリ故ニ陰虛ノ潮熱ニモ亦用之 **元素**
謂治早辰潮熱トハ陽虛ノ熱ト云章宜謂治日晡潮熱往來トハ陰

虛ノ熱ヲ云也。蓋柴胡ハ除熱劑タリ。東垣曰諸有熱者宜加之。故
ニ傷寒半表半裏ノ熱寒熱往來ノ熱瘧疾ノ熱ヲ除凡使藥ニ
從テ表裏中外氣血陰陽ノ熱ヲ治ス。心腹結熱肝膽ノ火ニ因テ心
腹ノ間ニ熱ヲ結者用之。心下痞滿清陽氣上行セザルガ故瀉陰不
下ノ心下痞者又肝膽ノ熱火ニ因テ痞者皆用之。煩熱虛實俱
ニ用之。嘔吐肝火乘胃嘔者又清氣不上濁陰不下吐者俱用之。無
熱者ハ斟酌スベシ。筋赤手筋ハ肝膽ノ合タリ。故ニ肝膽ノ熱ニヨツ
テ筋赤者用之。熱痰肝膽ノ熱ニ生スル痰滯ヲ治ス其症多ハ
胸脇ニ塞テ病ヲ致ス。血凝肝熱ニ因テ血分凝滯者用之。若因寒
血凝者勿用。氣聚肝ハ血ヲ納ト雖肝膽俱ニ屬木發生勇猛ノ陽
氣ヲ致ス。故ニ肝熱則血凝氣聚柴胡ハ肝膽ノ腑ヲ順行セシムル
者ナリ。是以氣分ノ積聚ヲ治スルニ至ル。然凡惟熱ノ有無ヲ察ソ

無熱者ハ斟酌スベシ。李杲曰用柴胡以散諸經血結氣聚功與連
翹同也。故ニ瘧家有熱者亦用之。食積神麴麥芽等ノ如ク此
カ直ニ食飲ノ積滯ヲ消化スルニ非ス。蓋柴胡ハ清氣ヲ引テ上
行セシムル者ナリ。清陽一度升則胃氣生發シ中焦健ニ行テ食積
消散スベシ。然則尤カチニ過飽ノ食積ニハ非ス。清氣下陷シ胃氣生發
セザルガ故ニ中焦ノ行不健ノ食積ト成者神中行中藥ニ合用ノ治之
章宜。曰陽升則清氣上升脾胃健行食積消散ト。濕痺濕熱ヲ除
經ヲ行カ故ナリ。滙曰柴胡爲風藥風能勝濕也。又曰氣薄能行經也
婦人經水不調肝ハ納血藏タリ。柴胡ハ肝經ニ入テ氣血ヲ順シ。肝熱
ヲ除ガ故ナリ。熱入血室血室ハ血海也。婦人經水行時ニ或傷寒熱邪
ヲ病或諸熱症ヲ患升熱其血海ニ入テ苦者柴胡ヲ用テ其熱ヲ除
ニ宜シ。小兒疳熱小兒疳熱多ハ肝膽ノ兩經ニ屬スレバ也。宣氣血

若ハ氣血ヲ疎條シ微寒ハ氣血ノ執ツ清シ此ガ清氣ヲ引上スルノ
氣ヲ熱テ氣血ノ結聚ヲ宣通ス去肌熱柴胡氣味薄ノ輕性微寒
故肌熱ヲ去元素日
苦寒以發散表熱也

總條

柴胡ハ肝膽ノ熱ヲ除下焦ノ清氣ヲ
引テ上行セシメ氣血ヲ宣暢ス故ニ
寒熱往來ヲ治シ肌熱及骨髓ノ熱骨ヲ去陽氣ノ下陷ヲ升提ノ
胃氣ヲ上行セシム
尤癰疾ノ要劑也

使藥

半夏ヲ使トス黃連ヲ佐トスレハ瘡熱
ヲ療シ又手足厥陰ニ行黃芩ヲ佐ト
スレハ手少陰陽ニ行三稜莪朮ト合メ堅積ノ滯血ヲ消ス升麻ト合
ノ胃氣ヲ

毒

傷寒熱邪太陽ニ在者用之熱ヲ三陰ニ入シム又三陰
上行セシム
ニ在者用之重テ傷表也陽半表半裏者ニ非ハ疾ニ
勿用○柴胡ハ五勞七傷羸瘦ヲ治スルノ說アリト雖實熱アル
非ハ過用スルコト勿レ東垣曰傷寒外諸有熱則加之無熱則不加

七○勞症雖有熱久用コト勿レ得效早止ヨ宗奭曰熱去即須急止

○下元虛冷シ相火上炎者勿用○實氣上逆ノ嘔吐喘息咳嗽者

俱ニ對
火ヲ忌又銅鐵ヲ忌皂莢ヲ忌女苑藜蘆罌粟ヲ

畏惡

畏○本綱ニ銀カヲ以テ鬚頭ヲ去用ト入門忌

銅鐵ト然ニ今ノ庸工多ハ鐵カヲ以テ柴胡ヲ判實ニ謬リ蓋本綱
ニ所謂銀カハ惟其製法ヲ重スルノ義ノミト覺テ不及用之且世ニ銀カ
ヲ存スル家希ナリ故ニ無ニ任テ惟鐵カヲ用テ銅鐵ヲ忌義ヲ不知

附方

傷寒餘熱傷寒ノ後餘熱經絡ニ入テ躰瘦肌熱者柴胡

四兩甘草一兩每一貼三錢二分水一盞煎服出本事方

積熱ニテ下痢者柴胡黃芩等分半酒半水煎七分浸水冷テ空心

服出濟

愚案

本綱ニ勞症ヲ治スルノ說ナレ後世五勞七傷
勞之羸瘦ヲ治スルノ說アリ故ニ今人勞症ヲ

治スル方中ニ柴胡ヲ不用者アルコト鮮シ。蓋柴胡ハ苦寒劑タリ。熱ノ有無ヲ辨メ用之。夫勞症熱邪アリテ脾胃虛シ陽氣下陷者ハ快用テ清熱下陷氣ヲ升ヘシ。若或無熱者妄ニ過用スルコト勿シ。宗奭曰今人治勞方中鮮有不用者。嗚呼凡此誤世甚多ト。又曰或無熱得此愈甚ト。章宜曰日華子竟信爲實謂補五勞七傷除煩益氣藥性論又謂治勞之羸瘦如此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待可見本草釋註一字不可忽也。明達者固知去取中下者寧不踰其轍哉。愚案ニ宗奭ハ一緊ニ勞症者ニハ不可用トス。蓋本經ニ其說ナキガ故ナリ。然凡勞症有熱者氣陷者寒熱往來者ハ必用ベシ。若或無熱及氣陷者ハ不用ノ可也。然凡勞虛ヲ病テ全ク熱ナキ者アルコトヲ不見。惟病源ヲ詳ニシ加減使ノ道ヲ盡テ用之何ノ恐カラス。章宜說ハ宗奭ガ言ヲ取テ無實熱ノ二字ヲ加テ辨

スト雖未是。蓋柴胡ハ必實熱ニ從テ用者タラハ東垣内傷不足ノ大熱ヲ治スル補中益氣湯ノ中ニ何ゾ柴胡アルニ至マ。不思甚也。柴胡ハ苦トレ凡薄シ寒ナレ凡微ナリ。且氣ハ陽ニノ上行ス故ニ除熱ノ功不烈。使引導ニ從テ虛實表裏氣血諸經ノ熱ニ用ベキノミ。然下雖虛怯者ニハ過用スルコト勿シ。時珍曰精思病原加減使可也。寇氏不分藏府經絡有熱無熱乃謂柴胡不治勞乏。一槩擯斥殊非通論。龐元英談薺曰熱有在皮膚在藏府在骨髓非柴胡不可。此豈盡實熱ノミノ謂ナランヤ。李士材曰銀柴胡主用相微勞癰者尤爲要藥。修治 剉用ニ尤火ヲ忌ムコト甚シ。雷散ハ赤薄皮也。許ヲ削去ト雖強テ不及去之。○上行ニハ根ヲ用酒ニ浸干乾使下行ニハ細ヲ用外感ニハ用生。○和産ニ鎌倉柴胡沙柴胡ノ兩種アリ時

修治

珍曰其苗有_レ如_レ韭葉者_レ如_レ竹葉者_レ以_レ竹葉者_レ爲_レ勝_一。今ノ鎌倉柴胡是也。沙柴胡ハ卽_レ雞腿兒草也。又犂牛柴胡_一云アリ卽_レ猫草根也。俱ニ柴胡ニハ非_レ入_レ不可_レ用_一。近世銀柴胡_一号者_レ渡セリ。根形ハ沙参ニ類ノ大ニ皮皺_レ色黃白_一。肉ニ黃紋アリ_一テ真種ニハ非_レ入_レ。此時珍謂_レ近時有_レ一種根似_レ桔梗沙参_一白色而大市人以_レ爲_レ充銀柴胡_一殊無氣味_一トスル類者ナリ不足_レ用_一。○章宜曰產銀夏者獨勝_レ色微白而軟者爲_レ銀柴胡_一用以_レ治_レ勞弱骨蒸_一也微黑而細者用以_レ解表散熱_一。李念我云治_レ勞與_レ痺證_一乃_レ銀州柴胡_一別爲_レ一種_一。此兩說不同李氏ハ銀州ノ柴胡ハ別種ト入_レ章宜ハ銀夏ニ産スル同柴胡ノ中ニ於_レテ白黑軟細ヲ以_レテ分_レ之_一何力是ナル味詳_一

前胡



若辛微寒○去風除熱_一下氣消痰_一開胃通食_一治_レ吐喘_一息咳_一嗽胸滿_一煩悶_一小兒

夜啼_一婦人安胎_一△前胡ハ何_レニ由_レテ各_レ力其義不明_一時珍曰_レ各義未_レ解_一去風除熱_一下氣_一前胡ノ要能也此力辛寒ハ風ヲ去_一苦寒ハ除熱_一下氣_一在上熱_一下_一宜_一。時珍曰_レ清肺熱_一是也_一消痰_一除熱_一下氣_一力故也熱痰ニ宜_一。寒痰者_一ハ斟酌_一入_レ之_一開胃通食_一苦辛ヲ以_レ開胃_一下氣_一故_一ニ通食_一反胃隔症ニ用_一者此義也然_レ凡_レ中焦虛弱虛寒者勿_レ用_一因_レ實熱_一因_レ結氣_一者宜_一之_一治_レ嘔吐喘息_一咳嗽胸滿_一煩悶_一此皆開胃去風_一下氣_一除熱_一力故ナリ小兒夜啼_一前胡ノ末ヲ蜜ニテ赤小豆ノ大ニ丸_一日_一一丸_一熱水ヲ以_レテ服セシム多用_一コト勿_レレ五_一九_一ニ至_レテ愈_一普濟方_一ニ出_レタリ婦人安胎_一下氣_一除熱_一力故ナリ然_レ凡_レ父用_一コト勿_レレ若_レハ胃氣ヲ損_一寒ハ氣ヲ伐_一易ケレハナリ膽_一二經ノ風痰ヲ去_一膈上ノ熱ヲ除_一下氣_一ノ要藥タリ通玄曰_レ種人功_一力皆是_一搜風_一下氣_一之效_一肝膽經風痰爲_レ患者捨_レ此_一莫_レ能_レ療_一

總攷

前胡 八斤

和語本草 卷之五

使藥

半夏ヲ使トス。杏仁。桑白皮。甘草。桔梗。ト合メ。風痰熱嗽ヲ豁ニ去テ致ス。

毒

氣虛者○下陷者○血虛

症皆勿用之。○陰火盛ニ氣不飯元ノ胸脇滿内熱心煩寒熱往來咳嗽ヲ發メ。外感ニ似者アリ禁用之。○前胡ハ辛ト雖性微寒也。

虛寒者

畏惡

火ヲ忌。皂莢ヲ惡。藜蘆ヲ畏。

附方

小兒夜啼ヲ治方見干石。

愚案

前胡與柴胡俱ニ風痰ノ要劑タリ。故ニ不知者ハ謂柴胡前胡其功均ハ八誤ナリ。前胡ハ手足太陰陽明藥。上焦胸中ノ氣ヲ降ス。柴胡ハ足少陽厥陰藥。ニ下焦清陽ヲ升提セシム。實ニ不同。陶弘景曰與柴胡同功非矣。治證雖同而所入所主則異。李士材曰柴胡主升前胡主降。爲不同耳。

修治

蘆頭ヲ去。土氣ヲ洗淨。割テ日ニ乾用ニ。或甜竹瀝ニ浸。乾用。トアリ。痰火ヲ去者。

宜之。○野葛根。此ト相似。誤用レハ人ヲノ反胃ヲ發セシム。宜釋之。○

本草家ニ謂前胡ニ數種アリトハ非也。其實ハ一物也。其根白色ニノ香氣アリ。蒙筮曰秋月採根。色白兼黃。氣香甚。爾ト藥店ノ者ハ多ハ夏月ニ採テ洗淨。コトヲ不善。故ニ色淡黑。香味不佳ナリ。○本草家言前胡葉野菊ノ如ク。根黑皮白肉ニテ其黑皮ヲ削去トハ誤ナリ。

升麻



辛甘微苦平。○治額鼻牙根痛。肌間風熱邪毒。發浮汗。療瘡疹。治肺痿。行瘀血。治陽胎眩運。胸脇虛痛。久瀉下痢後重。

脫肛。遺精。崩帶。喉痛。衄血。吐血。下血。血淋。狂亂。△此草葉麻ニ似テ其性能。上升入。故ニ号升麻。額鼻牙根痛。升麻ハ手足陽明太陰ノ藥升テ頭高ニ達シ。浮。六皮膚ニ行。且去風除熱。逐毒者ナリ。夫足陽明胃經ハ鼻莖ニ起。牙根及額ニ行。手陽明大腸經モ亦牙根ヲ行。鼻

孔ノ旁ニ至ル升麻ハ手足陽明經ニ入テ去風除熱逐毒故頭額痛或
鼻莖痛或牙根痛腫爛惡臭ヲ發者ヲ治スルニ用之九太陽頭痛ハ
兩頰ニ在陽明頭痛ハ額中痛テ鼻莖ニ引升麻能陽明頭痛ヲ治
入蓋頭痛症ニ因アリ曰虛曰實虛モ亦ニ因アリ曰氣虛曰血虛
也升麻ハ陽明經ニ入テ去風除熱逐毒則陽明頭痛ハ實邪者モ
宜之又胃氣虛シ清陽下陷ノ不升則濁陰上ニ埋テ不降故頭痛
者アリ參芪ノ類ニ合メ用之肌間風熱升麻ハ足陽明胃經ノ藥
胃ハ肌肉ヲ主且升麻ハ浮テ肌表ニ達ス故ニ肌皮間ノ風熱ヲ去
ニ宜シ大抵裏熱者ハ苓連半表半裏ノ熱ハ柴胡肌熱ハ升麻ヲ用
若肌熱ノ其本連胃者ハ葛根ト合用ス邪毒升麻ハ百毒ヲ除ニ
宜シ故ニ疫癘風毒腫及蠱毒ヲ解ス若人毒物ニ中ラル者ハ爵
金ト合用ス毒在上吐在腹下テ愈神ノ妙方也發浮汗汗肉間ニ

浮テ未出者用之發之升麻葛根湯ノ意是也然升麻ハ陽明ニ
入ノ聖藥タリ若邪熱太陽分ニ在者誤テ升麻葛根湯ヲ用則反
テ邪氣ヲノ陽明ニ入シメ害有コト不少詳ヲ宜用之東垣曰初
病太陽證服升麻葛根湯是遺太陽不惟遺經反引太陽邪氣入干
陽明不能解也一療瘡疹好古曰爲瘡家聖藥ト或風斑或口瘡或
豆瘡疹疹去風除熱逐毒治之益癰疹痘瘡ノ初毒迫肉表未解
者用之逐毒解表出發セシム升麻葛根湯症是也豆瘡序病時多ハ
此湯ヲ用テ逐之豆瘡已ニ出ノ後ハ升麻ヲ勿用若其出豆ノ後
用之重テ解表起張スルコトナレ或出後雖元氣弱或泄瀉者ノ
類ハ補中ノ劑中ニ合用ス然升麻少用ニ勿多其升麻葛根湯ハ出豆ノ
後ハ必勿用時珍曰其升麻葛根湯則見其後必不可用爲其解散也
○痘瘡患上古ニ有コトナレ後世父母ノ慎ヲ過テ胎毒盛ナリ故ニ

此患アルコトヲ致ス。是以其始ニハ此カ治法モ亦未具或升麻一味ノ煎湯ヲ以テ綿ニ浸テ瘡上ヲ拭或蜜煎ノ升麻湯ヲ時飲シムルノ治ノ。此痘瘡ヲ療セシ蓋腸ナリ。甄權曰療豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上治肺癆久咳肺癰膿ナキ肺痿升麻ハ升テ肺ニ入除熱毒ヲ逐肺膿ヲ消之宜シ行瘀血陽明胃ノ瘀血ヲ行ス然凡獨此一物ノミヲ以テハ行瘀血ニ弱行血ノ劑中ニ合用ノ此功アリ。古人謂陽明ノ瘀血ニハ吐血衄血者犀角地黄湯ヲ用ニ若犀角ナクハ升麻ヲ代用ト蓋升麻ハ彼地黄等ノ藥ヲ引テ陽明ニ入レメ兼テ瘀血ヲ行カ故ナリ陽陷此升麻ノ要能ナリ。陽陷トハ陽氣ノ下陷ヲ云夫柴胡ハ足少陽ノ清氣ヲ引テ升ス升麻ハ足陽明ノ陽氣下陷ヲ升提ス此東垣益氣湯ノ意也。夫陰ハ降陽ハ升此陰陽ノ常氣也若其陰虛則反テ升陽虛則反テ降陽虛ノ降則人ノ腹内秋冬收殺ノ令トナリテ遂ニ死

惟清陽能升發ノ春令アルコトヲ貴故ニ或飢飽失宜或生冷ニ傷ラレ或勞役ヲ太過ノ脾胃ヲ損元氣ヲ虛ヒシメ内傷ノ諸症ヲ致ス者ハ皆陽氣ノ下陷ニ生ス故ニ補中ノ藥中ニハ必升麻ヲ用テ胃中清陽氣ヲ升發セシメ諸甘温ノ劑ヲ引テ陽道ニ上行セシム此東垣家ノ奧旨也。李杲曰升麻升胃中清氣又引其温之藥上引以補衛氣之散而實其表散元氣不足者用此於陰中升陽云。滙曰升麻稟極清之氣升散提氣功最大得陽氣之全者也故補脾胃藥中非此為引未能取效能升陽氣干至陰之下ト九人五十以上ニ至テハ氣ノ消者多長者少降者多升者少秋冬ノ令勝テ春夏ノ令劣故ニ老病ヲ療者多ハ補氣補中ノ劑ニ升麻柴胡ヲ合用ノ春升ノ令ヲ得セシムルニ宜シ或問方書ニ謂柴胡ハ左ヨリ升レ升麻ハ右ヨリ升ストハ何ゾヤ曰此声面ノ云ノミ左ハ東方ノ木位右ハ西南

ノ間土位ナリ。柴胡ハ肝膽木部ノ清陽ヲ升ス。升麻ハ胃土ノ陽
氣ヲ升ス。故ニ左右ヲ以テ云。此左右ニ不可^カ拘^カ惟^カ柴胡ハ下焦ノ清
陽ヲ升レ。升麻ハ中焦ノ清陽ヲ升ス。左右ニ偏ナレ。有^クフナレ
弦運^ス清陽升提セサルカ故ニ濁陰上ニ爵^スノ眩運者用^ス之。或^ハ清陽下
陷ノ虛眼病亦宜^シ之。其^レ逆上實邪ノ眩運ニハ禁用^ス。胸脇虛痛^ス虛字
ヲ眼^ト入。裏^ニ實滯^{アル}ニ非^ズ。惟^テ清陽不^レ升故ニ濁陰埋^ル上胸脇虛
ノ痛者用^ス之。久^ク瀉^ス下痢後重^シ此皆升提ノ功^ニ從^リナリ。脫肛^此モ亦升
提^{ヨリ}致^ス所^{ナリ}。大^ニ低^ク痢疾脫肛ノ症ニハ必^ズ用^ス之。升提ス。然^レ虛冷ニ
屬^ス者ハ獨^ニ多用^スコ^ト勿^レ。温藥ト合^テ用^スニ宜^シ。遺濁崩帶^{遺精白}
濁婦人崩漏帶下ノ症其清陽下陷ニ屬^ス者用^ス之。喉痛^足陽明經ハ
喉^ノ核^升升麻ハ陽明ノ本藥タリ。故ニ喉痛ヲ治スルノ能^{アリ}。衄^衄
吐血陽明經ノ瘀血ニ因^テ然^者宜^シ之。若^シ其實火ノ升逆ニ屬^スル者
ハ勿^レ用^ス。又陽明胃氣虛陷ノ不^レ能^レ攝^ル血カ故ニ然^者ハ補氣行血ノ劑ニ
合^テ用^ス之。下血血淋^此モ亦升提スルカ故ニ治^ス之。狂^狂亂^狂症ハ皆陽
明ノ熱ニ屬^ス。故ニ清熱行氣開胃ノ劑中ニ用^ス之。藥^ヲノ能^レ陽明上
升^シシ
總既示 升麻ノ功能總^テニニアリ。諸藥ヲ引^テ陽明ニ合
カ^ル爲^セ也。ムル第一也。中焦脾胃土ノ中ノ陽氣ヲ升提セ
シムル第二也。頭面及皮膚ニ行^テ
除熱去風逐毒掃瘡 第三ナリ
痛^石膏^ヲ得^テ陽明ノ齒痛ヲ治ス。參^氏ト合^テ用^ス元氣ヲ升提シ柴胡ト
合^テ用^ス生發ノ氣ヲノ上行セシム。葛
根ト合^テ用^ス陽明ノ汗ヲ發スル也。**毒**
者過用スルコト勿^レ。瘰癧^{瘰癧}ハ
此^ノ後^升升麻葛根湯ヲ用^スコ^ト勿^レ。自汗^{アル}者勿^レ過用^ス。升麻ハ胸
下陷氣ヲ升提ス。此陽氣在下^ニ不^レ升^ラ者ヲ升^シム。若^シ其陽氣下^ニ不^レ

ハ勿^レ用^ス。又陽明胃氣虛陷ノ不^レ能^レ攝^ル血カ故ニ然^者ハ補氣行血ノ劑ニ
合^テ用^ス之。下血血淋^此モ亦升提スルカ故ニ治^ス之。狂^狂亂^狂症ハ皆陽
明ノ熱ニ屬^ス。故ニ清熱行氣開胃ノ劑中ニ用^ス之。藥^ヲノ能^レ陽明上
升^シシ
總既示 升麻ノ功能總^テニニアリ。諸藥ヲ引^テ陽明ニ合
カ^ル爲^セ也。ムル第一也。中焦脾胃土ノ中ノ陽氣ヲ升提セ
シムル第二也。頭面及皮膚ニ行^テ
除熱去風逐毒掃瘡 第三ナリ
痛^石膏^ヲ得^テ陽明ノ齒痛ヲ治ス。參^氏ト合^テ用^ス元氣ヲ升提シ柴胡ト
合^テ用^ス生發ノ氣ヲノ上行セシム。葛
根ト合^テ用^ス陽明ノ汗ヲ發スル也。**毒**
者過用スルコト勿^レ。瘰癧^{瘰癧}ハ
此^ノ後^升升麻葛根湯ヲ用^スコ^ト勿^レ。自汗^{アル}者勿^レ過用^ス。升麻ハ胸
下陷氣ヲ升提ス。此陽氣在下^ニ不^レ升^ラ者ヲ升^シム。若^シ其陽氣下^ニ不^レ

足ノ元氣不升者用之。下益虛ノ元氣愈不足入。此章宜滙ノ發明也。故二李士モ亦謂下虛者勿用。○熱邪太陽ニ在テ未入陽明者勿用。及テ邪氣ヲ陽明引人。附方 李腫毒瘡 升麻ヲ醋ニ磨テ頻ニ塗出。肘後方。胃熱齒痛。升麻煎湯熱ノ口漱。或加生地黃。出直指方。口舌瘡。升麻一兩。黃連三分爲末。綿ニ裹含嚥。出本事方。

愚案

李杲曰。胃虛傷。今爵過陽氣干。

脾土爲火爵之病者。宜升麻葛根。以升散其火爵。ト時珍モ亦如此。一病者。升麻葛根湯ヲ用テ治ノ神效アルコトヲ言世ノ庸醫多ハ升麻葛根湯ヲ以テ外感發散ノ劑トシ。此義アルコトヲ未知。蓋胃ハ陽トシ。脾ハ陰トス。胃陽不足ノ脾ニ陰邪旺者。安リ寒冷物ヲ飲食。則陰邪益旺。胃陽塞リ。遂ニ火爵トナリテ病ヲ致ス。其症實火ニ似。誤テ苦寒陰劑ヲ用。則陽彌爵ノ病加甚シ。故升麻

ヲ以テ胃陽ノ陰邪ニ屈セラル。者ヲノ升發セシメ。葛根ヲ以テ陽明ノ火爵ヲ伸。則陰邪自開。陽氣能和。ノ效ヲ致ス。若其胃氣不足スルコトノ太者。ハ四君子湯與升麻葛根湯合劑ニシ。柴胡。蒼朮。黃芩ヲ加。若其人常嗜酒者。ハ時々温酒サ許ヲ與テ發陽ヲ助。此時珍發明ノ意也。由テ愚案ニ夫酒ハ大熱物也。故ニ酒病者ハ冷寒劑ヲ以テ雖如可治。寒藥及テ閉。陽遏濕不能治。惟辛温劑ヲ以テ陽爵ヲ發シ。濕滯ヲ散。則效アリ。此東垣葛花解醒湯ノ意也。故ニ酒モ亦絶ヘカラス。時温酒サ許ヲ與テ酒爵ヲ發ノ助トスヘシ。酒ヲ絶トキハ酒爵難發。藥力難行。然凡久ク飲シムルコト勿レ。爵稍發。病稍退。ニ至ハ反テ絶テ酒ヲ飲シムルコト勿レ。凡酒病ハ續ハニ酒ヲ與。コトハ愚ガ臆見ニ非ス。河間ノ法也。酒病ハ少與酒藥功ヲ助。若ハ時珍ノ意也。然今醫者酒病ヲ見テハ必酒ヲ恐テ禁之。此皆醫書ニ不傳

過

修治

米泔水ニテ土氣ヲ洗淨シ。黒皮及腐ト蘆頭トヲ削去。若鬚アル者ハ其毛ヲ去。剉用ユ。升麻ハ細黒色

堅實者良。青緑也者。雞骨升麻トス。外黒裏白ノ緊實者ヲ鬼臉升麻トス。有鬚俱ニ用ヘシ。虛火者不堪用。今藥店クリト云者ヲ上升麻トス。惟細黒色堅實者ヲ擇テ第一トスヘシ。和謂升麻ハ忌火ト。然凡本草ニ此説ナシ。案ニ獨此ノミナラス。本草ニ忌火ノ説無シ。和ニ忌火者多シ。蓋本草ニ焙炒ノ製ナキ者ハ皆以テ爲忌火。豈製焙炒セザルヲ以必忌火トセシヤ。或如香氣者。恐失其芳香。忌火ノ新法ヲ立者ハ或可也。升麻ハ芳草ニ非ス。何以力忌火トスルヤ。味審トス。苦寒。治命門相火有餘。瀉肺火。療消渴。熱中。傷寒。入臍。心煩。熱厥。頭痛。骨蒸。勞熱。熱欬。熱痰。陽明熱。知母本ノ名

知母



若寒。治命門相火有餘。瀉肺火。療消渴。熱中。傷寒。入臍。心煩。熱厥。頭痛。骨蒸。勞熱。熱欬。熱痰。陽明熱。知母本ノ名

ハ蠟母也。宿根ノ旁ニ初テ生子。故ニ母ト号シ。根ノ狀蠟蝨ニ似タリ。故ニ蠟ト号ス。後世訛テ作知母。治命門相火有餘。知母ハ氣味俱ニ厚。沉テ下降ス。足少陰腎經ノ本藥也。夫命門ノ相火ヲ以テ獨リ右腎ノ火トスル者ハ誤也。兩腎水中ノ龍火ヲ以テ命門ノ火トス。此火ヤ水靜ニテ潤則水土ヲ養テ陽氣ノ源トナル。水動テ不足則此火熾ニ升テ水ヲ涸シ土ヲ乾シ金ヲ燥シ元氣ヲ賊呼テ命門相火有餘トス。此ヲ清除者ハ知母。黃蘗ニ過者ナシ。蓋黃蘗與知母俱ニ腎火ヲ瀉スル良劑ニシ。間兩藥兼行。雖其清火ノ部有。不同。黃蘗ハ足少陰太陽ニ入テ腎膀胱ノ熱ヲ涼シ。知母ハ足少陰ノ藥ニシ。且手太陰肺ニモ亦入者ナリ。然則知母ハ獨腎熱ノミナラス。腎火ノ上焦肺分ニ薰者ヲ清ス。此龍火ノ炎ノ在上者。上ヨリ逐テ次第ニ降り。下焦冰凍ニ達メ相火ノ熾

砂ヲ涼極ス。黃蘗ハ水中ノ浮火ヲ清ス。知母ハ炎陽ヲ逐テ水底ノ
火ヲ清ス。古人謂黃蘗無知母猶水母之無蝦也。蓋水母無目以蝦
爲目。水母ハ從蝦行。蝦動水母沉テ互ニ依附ス。黃蘗ハ知母ニ從テ
能下焦水底ニ沉。知母ノ肺腎ノ火ヲ清スルニ從テ黃蘗能腎火ヲ
瀉ス。肺ハ金。腎ハ水トス。肺火ヲ瀉スル者ハ化源ヲ清スルノ義。金生
水ノ理ニ合メ。此兩藥相依附ノ其功ヲ合扶者ハ水母與蝦ノ相依附
メ。水母ハ蝦ニ從テ行。ニ似タリ。水母ハ黃蘗。蝦ハ知母ニ譬テ云ナリ。
然則腎水不足ノ無根ノ相火。水底ヨリ熱升テ肺ニ上炎者ハ知母ヲ
用ニ腎水弱ノ相火水面ニ升遊者ハ黃蘗ヲ用ニ瀉肺火肺熱ヲ治
スルノ法ニアリ。久熱惟肺分ニ在者ハ黃芩ヲ用ニ若心脾ノ熱。肺
ニ容者ハ黃連ヲ用ニ。知母ノ治症ハ不然。腎水不足ノ無根相火升テ
肺ニ在者用之。獨肺ノ火熱ニハ反テ勿用。療消渴熱中多食ノ數

消者ヲ消中ト云。多飲テ數洩者ヲ熱中ト云。多食シ多渴シ且數洩
者ヲ消渴ト云。消渴熱中ハ熱火雖在胃其本ハ下焦腎部ノ無根
相火。上中焦ヲ煎熬ノ然シム。故ニ用之。傷寒邪熱陽明胃ニ
入者用之。仲景白虎湯ニ石膏ヲ君トシ。知母ヲ佐トシ。傷寒陽明ノ
邪熱入胃惡熱有汗作渴脈大ニ長者ヲ治ス。或問然則知母ハ瀉
胃火ノ劑タリヤ。曰。元素言入足陽明ト按。知母ハ瀉肺火ト云。腎火
ノ劑タリ。胃ハ肺腎ノ中ニ居ス。故ニ知母ノ上下兩焦ノ火邪ヲ瀉スルニ
從テ中宮ノ火熱ヲ毛亦瀉スルニ至ル。然レ獨胃火ノミナラス。白虎湯ノ
症不眠ノ煩躁ヲ本トス。蓋煩ハ肺熱。躁ハ腎熱ニ出カ故ナリ。此仲景
白虎湯ニ用知母雖治胃火獨胃火耳ニ非ス。熱邪肺腎ニ繫。有ノ
以ノ故ナリ。久癰久字ヲ眼トス。癰熱久ノ陰分ニ入テ肺熱。或夜陰
ニ熱シ盜汗口乾ニ至者用之。心煩腎火升肺胸煩熱スル者ヲ花ス

熱厥頭痛下熱逆厥ノ頭痛者ヲ治ス骨蒸勞熱勞瘵骨蒸ノ
熱ヲ治ス蓋腎火ノ所爲ナレハ也或問本經謂補不足益氣好古
曰滋取月水李杲曰法當用黃蘗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱
下然則知母ハ滋陰補氣ノ劑タリヤ曰諸氣血ヲ補益者ハ其味ノ
劑ニ非ハ不能苦寒劑ハ瀉火損陽者也何如ノ知母ノ苦寒補陰
益氣ノ義アラスヤ夫腎苦燥氣惡火東垣謂火與元氣不兩立上
知母苦寒腎火ヲ瀉ノ其燥ヲ除カ故ニ滋腎水ト云命門相火ヲ
瀉スルカ故ニ益氣ト云ノ直ニ滋陰益氣ト莫ヘカラス凡苦寒劑ハ
損陽伐氣勞熱症ト雖勿過用暫用テ其火ヲ瀉シ火熱稍收則速
ニ止ヨ久用則損胃氣減食泄瀉シ損肺氣及テ咳嗽盜汗ヲ致ス滙
曰苦寒之味非畏養万物者也即實火燔灼亦宜暫用而世皆
以爲滋陰上劑勞瘵神丹虛病夫在何可勝數又問曰腎火者ハ
通ノ可用之マ曰不然腎火症虛實ノ二辨アリ。虛實ハ水部ノ沙
於ニ非ス腎中ノ陽氣ノ虛實ニ因テ此カ可否アリ蓋腎水虛スト
雖水中ノ元火未盡ノ相火上炎者此ヲ實火ト入知母黃蘗等ノ
苦寒ヲ用ユ若腎水虛シ水中ノ元火モ亦從テ不足シ命門ノ虛火
上炎者ノ如キハ桂附等ノ溫劑ヲ用テ其火源ヲ養則虛火自本
位ニ返ス若誤テ知母黃蘗等ノ苦寒瀉火劑ヲ用則加燔灼ノ虛
炎ヲノ上騰セシム此玉水謂人火與龍雷火也下氣未盡實火ハ人
火也得水寒消者也下氣不足ノ虛火ハ龍雷火也得水寒ナラ炎
上入以火逐之虛炎自退者也此二症似同異者難明難治渾スル
コト勿レト云熱欬熱痰腎火升上ノ欬ヲ致シ痰ヲ成者用之陽明
熱仲景白虎湯ニ用之故元素謂治陽明火熱ト然凡陽明熱邪肺
腎ニ繫者ニ非ハ勿用之獨胃火ノ三ノ症ニハ勿用前ノ傷寒ノ條

二詳ナリ

總纂

知母ハ命門相火熾ニノ上焦肺分ニ向テ者肺ヨリ逐テ上下兩焦ノ火實ヲ清者也

使藥

黃蘗ヲ得テ腎火ヲ瀉ス
酒ヲ得テ肺火ヲ瀉ス

毒

久用則損氣伐陽傷脾胃氣弱肺氣
○不食者○大使瀉易者○陽痿

者皆禁用之○胃虛肺虛諸虛寒者勿用之○通玄曰多服令人泄瀉亦令人減食此惟實火燔灼者方可暫用若施之干虛損之人如水益深矣蓋苦寒之味行天地肅殺之令非長養万物者也近世未明期義悞以爲滋陰上劑劣察神丹因而天柱者不可勝數余故特表而出之永

畏惡

鐵器ヲ忌塩
蓬砂ヲ伏ス

附方

紫癩風 知母ヲ醋ニ磨テ捺コト日三度

愚案

古人ノ謂知母ハ氣分ノ火ヲ瀉シ黃蘗ハ血分ノ火ヲ瀉スルヲ以テ故ナリ分ノ火ヲ瀉スル愚案ニ知母黃蘗俱ニ腎火

ヲ瀉スルノ良劑タリ古人何ヲ以テ氣血ニ分マ蓋肺ハ主氣腎ハ精血ノ藏タリ知母ハ肺火ヲ瀉シ黃蘗ハ腎火ヲ瀉スルヲ以テ故ナリ然レ知母ハ肺部ノ本藥ニ非ズ腎經瀉火ノ本藥タリ相火腎ニ旺ニノ肺ニ不向者ハ黃蘗ノ所治腎火向肺者ハ知母ノ所治知母ノ肺火ヲ瀉スルハ餘力ナリ獨肺分耳ニ非ズ何ゾ氣血ノ分アラシマ惟知藥兩種ハ腎部本藥水ハ火ヲ瀉者ナリ通玄曰知母爲腎經本藥兼能清肺者爲其肅清龍雷勿使僭上則手太陰無銷燦之虞也ト時珍謂潤腎燥而滋陰トハ腎火ノ向肺者ヲ瀉則金清ノ金生水ノ義アルニ取必シモ潤燥滋陰ノ劑ニ非ス○或問古人謂小便閉塞ノ渴者ハ淡滲劑ヲ用ユ不渴者ハ知母黃蘗ヲ用ト然則此兩藥俱ニ小便通利ノ劑タリマ曰此東垣說ナリ本經モ謂下水ト蓋渴者肺中ノ伏熱ニ因テ水道不通ノ三故ニ知藥ニ不宜不渴者ハ

熱ノ本腎膀胱ニ在テ其標向肺故ニ知藥ヲ用テ肺腎火熱ヲ除則
 金水ノ氣清ノ水道通利又然凡必シモ渴與不渴ニ不可拘惟肺熱ノ
 ミシ水道不行者ハ知藥ニ不宜腎熱升テ肺ニ伏スルガ故ニ水道
 不行者ハ用之ニ宜トスヘシ夫小使ハ膀胱ヨリ出ト雖專肺氣ノ傳
 送ニ從故ニ水生高源ト云知母黃蘗ハ直ニ通水ノ劑ニ非ト雖此ハ
 腎火ヲ瀉シ肺熱ヲ除則膀胱不熱金氣清水ノ源委俱ニ淨シ水道
 自通ス内經ニ
修治
 鐵器ヲ忌竹刀或銅刀ヲ以テ毛ヲ去リ
 焙用エ○和ニ炙ハ粗皮ヲ去用エ然凡
 本綱ニ去毛ト云テ去皮ノ說ナシ案ニ龔氏萬病回春ニ去皮毛
 ト世人皆從之然ス○腎水不足ノ瀉火ニハ塩水ニ浸焙肺火ヲ瀉
 スルハ酒ニ浸焙乳汁ニ浸焙者ハ胃氣ヲ損コトヲ恐テナリ思實
 火ヲ瀉スルハ生ヲ用エ○知母ハ肥潤裏白者ヲ擇用ヨ○或問

知母常ニ製置テ通用スルハ何ノ製ヲ以ヒン曰酒ニ塩少許ヲ加
 テ浸シ久炒テ褐色ノ如ク用ヨ此李士材ガ法ナリ



微辛微温○主諸風濕治諸痺四肢振
 急眩運頭痛小兒驚風中風癱瘓通血
 脈強筋力利古本疏痰氣中風家要劑

△狀名ノ義未詳此カ本名ハ赤節也主諸風濕天麻一名ハ定風
 草月風不動無風自動故号是以天麻ハ勝風者タルコトヲ知且辛
 温ハ能外ニ發達ス故ニ天麻ハ風濕ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ出入
 心土焦頭面及筋骨經絡ノ間ニ功アリ章宜曰有自内達外之功
 ト是也經ハ足厥陰太陽ニ入足厥陰ハ肝木風化ノ經ニ筋ヲ主ル
 足太陽ハ膀胱水濕化ノ經ニ且骨ヲ主ル故ニ風濕ノ内ニ鬱シ筋
 骨經絡ニ塞者用之逐之治諸痺痺ハ痛風也風濕ノ筋骨經

絡之塞ヲ致ハナリ四肢拘急風濕ノ經絡筋骨ニ鬱ル然者ヲ療

入眩運頭痛至真要大論曰諸風掉眩皆屬于木一諸頭眩運黑者

ハ肝風ノ鬱ト入風木ハ動搖ト主ハナリ天麻ハ足厥陰肝木ノ經ニ入

テ風鬱ヲ逐故ニ眼運ノ良劑トス東垣半夏白朮天麻湯ニ用者

是也羅天益曰眼黑頭眩風虛內作非天麻不能治ト又此カ頭痛ヲ

療スル風熱ノ鬱ニ因者ヲ治ス天麻ニ宜キ所ノ頭痛ハ其症多ハ眩

運頭旋ヲ兼此風鬱ノ兆也ト小兒驚風肝風ヲ逐カ故也中風癱瘓

真中風風鬱ノ手足癱瘓皮膚不仁語言不遂者必用之通血脈風

濕ニ血脈ニ滯者用之強筋力風濕ニ筋骨ノ力衰テ腰膝ニ緩弱

等者用之風濕ヲ去血脈ヲ通則筋力自盛ナリ和舌本筋ハ肝ノ

主ノ下ハ陰器ニ聚上ハ舌本ニ會天麻ハ入肝去風故ニ風ニ因テ肝筋

不和舌本或緩リ或強テ舌不利者用之中風舌麻ノ語ニ不語症

必用之疏痰氣風痰氣上焦頭面ニ鬱塞者用之故ニ風痰ニ屬スル

頭痛眩運ノ治ハ宜之中風家要劑逐風疏痰治癱瘓舌麻諸鼻

中風家ニ必用ノ要劑タリ

羅天益曰爲治風之神藥

頭旋目眩中

風ノ要藥也

皆勿用以上諸症若其風

醫ヲ兼テ音ハ或ハ用之

節煩痛皮膚瘙癢痒面目虛浮天麻半兩川芎二兩爲末煉蜜ニテ丸

茨子大食後一丸茶

酒ニテ下ス出普濟方

者アリ宜驅逐天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

愚案

天麻ハ風劑ノ裏藥ナリ何如トナ

レハ風在表者アリ宜發散風在裏

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム驅逐ノ

者アリ宜驅逐

劑タリ時珍曰今有久服天麻藥遍身發出紅丹者是其祛風之驗也。内風ヲ逐ノ義明ニ知ヘシ。且天麻ハ佐使ノ藥ニ從テ其功ヲ見ス。獨用テハ功力不尪。宗奭曰天麻須別藥相佐使然後見其功。仍須加而用之。

修治
 洗淨ノ酒ニ浸コト一宿。取出濕紙ニ裹テ糠火ノ中ニ煨シ取出テ剉焙用之。○奥州ヨリ天麻ヲ出入。根莖花形皆本草ノ說ニ合ト雖和天麻ニハ枝葉アルコトナシ。本草ノ諸説ニ比枝葉アルコトヲ辨則惟唐ヲ用テ可ナリトス。○天麻ハ煨熟ノ破開シ。明亮堅實者ヲ佳トス。○奥州ヨリ出入所ノ天麻ヲ野人呼テ盜人ノ足草トス。○雷敎說ヲ案ニ御風草ノ一種アリテ似天麻。御風草ハ根莖斑葉背白青黥アリ。若恨テ御風草ヲ用則人ヲノ腸結ノ患アラシムト也。

遠志



原始

若温。強志固精。定心氣。治健忘。陽痿。夢洩。聰明耳目。療驚悸。客忪。腎積。長肌。肉助筋骨。理癰疽。腎ハ藏精。精中ニ志氣ヲ存ス。此藥腎中ノ志氣ヲノ心ノ遠ニ能達セシムルノ功アリ。故遠志ト号。強志夫心ハ藏血。血中ニ存神氣。腎ハ藏精。精中ニ存志氣。心腎ノ神志交通則水火既濟。陰陽精血平和ナルコトヲ致ス。遠志ハ足サ陰腎經ノ氣藥。乃腎中ノ志氣ヲ強シ上心ニ通達セシム。志氣通心則心神モ亦安定也。故ニ遠志有定心氣功。然凡心家ノ本藥ニハ非ズ。定心氣者ハ補腎志ノ餘力也。通玄曰。主治雖多。總不出補腎之功。或以爲心經藥則未也。固精。遠志ハ補陰ノ劑ニ非ズ。腎經補氣劑。陰中氣ヲ補者ナリ。腎中氣虛則精不固。遠志補腎中志氣ヲ強スル則ハ精自固守ニ至ル。時珍益精補陰氣ト云モ亦腎經

志氣ヲ強スルヲ以テナリ。定心氣腎志不通心氣浮動テ不定腎
腎志ハ心氣カ高ニハ牛馬ノ羈縻ノ如シ。羈縻ニ從テ牛馬定テ矣
ニ不動カ如ク。腎志能心ニ通則心氣自定テ矣。妄ニ動キ蹴コトナシ
治健忘此遠志ノ要能ナリ。夫人ノ事ヲ忘サレムル者ハ心腎
神志ノ所致也。然レ獨神獨志耳ニ亦致コト不能。神志ノ兩氣互
ニ通ノ忘コトナカラシム。蓋心神ハ陰陽靈妙無測主人公也。腎ハ北
方水藏タリ。水性能遠ニ達ス。志ハ腎ノ水中ノ神タリ。故ニ心神ノ主
人公ト。腎ノ水神遠ニ達スル所ノ志氣ト。其氣ヲ相通ノ特則永忘
ト云コトナシ。是以健忘症心腎二氣ノ不足ト雖。其本ハ腎志不足
不通心故ノニ。遠志ハ志氣ヲ強ノ心ニ達セシムルノ良劑タルヲ以テ
治健忘ノ要藥トス。陽痿陰莖柔弱ニ不舉者ハ腎中ノ氣虛ト
ス。遠志主之。太者ハ肉桂ト合用ノ下元ヲ温補セヨ。夢洩夢中ニ

洩精者ハ下焦ノ氣虛ノ精固カラサルカ故ナリ。遠志ヲ以テ固精
則夢ミレレ不洩精聰明耳目耳ノ聰ハ精氣ノ盛ニ從。目ノ明ナルハ
精血ノ潤ニ從。遠志ハ腎志ヲ強ノ心ニ達セシムル者ナリ。腎志強ニ上
達則精氣從テ耳目ニ潤故聰明ノ功アリ。療驚悸亡志驚悸者ハ
腎志不足ノ上達セサルカ故ニ。心氣ハ浮取腎氣ハ陷テ。上下ニ氣交通
セサルヲ以テナリ。故ニ遠志ヲ以テ腎氣ヲ強ノ上達セシムレバ。上下ニ
氣互ニ固張テ驚悸ノ患アルコトナシ。客忤小兒睡中ニ旁人ノ息
氣ニ犯サレテ驚者ヲ客忤トス。遠志治之者ハ右ノ療驚悸ノ理ト
同シ。腎積名テ奔豚ト云。臍下ヨリ逆ノ心下ニ升衝此本腎氣弱
ノ下ニ收コト不能故ニ逆ノ奔升。遠志ハ腎氣ヲ強ノ下元ヲ固スレハ
也。長肌肉助筋骨此皆腎氣ヲ補ノ餘力也。一理癰疽遠志多妙ニ
不拘米泔水ニ洗捷去心爲末。每服三錢。温酒一盞ノ中ニ調サ。項澄

テ清酒ヲ飲津ヲ腫上ニ傳此一切ノ癰疽ヲ治ノ神効アル者也出
内方遠志ハ補腎氣ノ良劑也レハ熟地參芪ノ劑ニ入用メ癰疽ノ
不足ヲ補
ニ宜者ナリ

總槩

遠志ハ腎ノ水中氣ヲ強ノ此ヲ上達セシムル
者也下氣ヲ固シ心腎氣ヲ交通シ健忘驚

悸ヲ治スル
ノ要藥也

使藥

茯苓冬葵子龍
骨ヲ得テ良

毒

心腎實火實
逆者勿用之

畏惡

遠志ハ去心宜用不去心煩心セシム珍珠藜
蘆葦蕪齊蛤ヲ畏天雄烏頭附子毒ヲ殺ス

附方

腦風頭痛
甚ノ不可忍

若遠志ノ末梟ニ留山宣明方ニ乳腫小兒口中ノ惡氣ニ吹レテ乳腫
者吹乳ト名ク遠志焙研酒ニテ二錢ヲ服シ滓ヲ腫處ニ傳出袖珍方
或問遠志ハ腎中氣ヲ補ヒ志ヲノ上心ニ達セシムルトキハ
此木上行ノ劑タリヤ否ヤ曰遠志ハ下焦水部ノ氣藥タリ

愚案

此ガ志氣ヲノ心ニ達セシムルノ義アリト雖強テ上行トスルニ不至
惟腎中氣ヲ強クシテ志氣ヲ心ニ通カシムルノ劑トスヘレ上行ヲ必ト
スル劑ニ
ハアラス

修治

米泔水ニテ洗淨シ蘆頭ヲ去甘草湯ニ浸シ
丁宿ノ中ノ骨ヲ去皮ヲ取テ到日ニ乾焙用エ

中ノ骨ヲ不去人ヲノ煩心セシム○案ニ今時師遠志ヲ製スルニ或
忌鐵器者アリ然此本草ニ此説ナレ未詳トス蓋遠志ハ腎經ノ本藥
タリ腎ハ水トノ肝木ノ母トス忌火者火氣ノ燥ヲ恐忌鐵者ハ
伐木傷肝子能母ヲノ虚セシムルノ義ニ取者欤此皆庸工ノ所致
必レモ忌ニ不及○今人葉細ニ紫色ノ小桔便花ノ根ヲ採ニ遠志ト
入然此真ノ遠志ニハ非ズ謬コト勿レ

貝母



辛苦微寒○治心下滿煩熱消燥痰潤
肺散下癰瘰治喉痺乳難咳嗽惡瘡

△形貝子ヲ聚ニ似タリ。故ニ号^{ホウ}治心下滿煩熱。貝母ハ手太陰肺綱ノ藥。苦ハ下シ辛ハ散シ。寒ハ清ノ胸中鬱結ノ氣ヲ下散シ。胸中ノ鬱熱ヲ清メ心下滿及煩熱ヲ治。仲景治結胸小陷胸湯ニ用。貝母作^至者是ナリ。消燥痰。此貝母ノ要能ナリ。半夏ハ濕痰ヲ燥シ去。貝母ハ燥痰熱痰結痰ヲ潤テ消化者也。故ニ陰虛火實ノ燥痰ニ必用之。潤肺貝母雖潤肺麥門冬ノ類ニ非ズ。肺中結熱熱痰アリテ燥者用之。肺氣虛燥者ニハ勿用。苦辛寒ハ肺氣ヲ耗虛シ易カ故ナリ。散項下癭瘰癧。癭瘰癧ハ俗謂古武也。瘰癧ハ瘰癧皮間ニ結核ヲ生ノ累々タル者ヲ云。癭瘰癧ハ皆痰飲ノ結聚者也。貝母ハ手太陰ニ入テ上部ノ痰結ヲ消化ス。故ニ項下癭瘰癧ヲ治スルニ宜シ。治喉痺熱痰邪肺ニ爵ノ喉痺者宜用之。漚日除胸中煩熱喉痺自愈。乳雞婦人乳汁難通者ハ皆胸中ノ氣結結熱結痰ニ屬ス。故

ニ貝母ノ辛ハ氣結ヲ開。苦寒ハ結熱結痰ヲ通。ノ乳汁自出。咳嗽肺中燥痰ニ屬者必用之。惡瘡一切無名ノ惡瘡ヲ療ス。昔江左ノ商入左膊上ニ一瘡ヲ生ス。形如人面。病者戲ニ酒ヲ其口中ニ滴レハ其瘡面赤色ナリ。食ヲ含シムレハ能食。多食シムレハ膊内ノ肉脹不食則臂痺。一醫アリテ諸ノ金石草木ノ藥ヲ含シムルニ皆無所若。貝母ヲ含シムルニ至テ瘡面眉自ヲ聚閉。病者喜テ貝母汁ヲ以テ多^ク灌ハ逐ニ瘡ヲ成テ痊タリ。此實ニ惡瘡ヲ治スルノ兆也。

總條 貝母ハ燥痰ヲ潤去胸中ノ煩熱氣結ヲ除ノ要劑。厚朴。白微ヲ使トス。天門冬。麥門冬。桑白皮。枇杷葉。ナリ。百部。桔梗。甘草ト同ノハ肺熱效嗽胸中煩熱ヲ治ス。百合。百部。薏苡仁。麥門冬。紫蘇子。爵金。童便ト同ノハ肺熱吐血ヲ治ス。番降香。爵金。橘紅。遠志。蘗梗。蘗子。香附子。白豆蔻ト同ノハ爵金

使藥

ヲ開川等。神麴ト同ノハ一切ノ氣鬱ヲ
開ニ宜シ。連翹ト同。眼ノ項下ノ瘤ヲ治ス

毒 寒痰（虚寒）肺
氣怯弱者ハ勿用之

畏惡

秦艽。莽草。礬石ヲ畏。
烏頭ニ反シ。桃花ヲ惡。

附方

燥痰ノ嗽ヲ治。貝母
ノ末ヲ砂糖ニ和シ丸

レ合。惡瘡ノ口ヲ飲。貝母。燒灰ニレ油ニ調塗。以上大明法。目中膚

腎。去。貝母。研末。點目。難産及胞衣不出。貝母七枚爲末。酒ニ

テ服ス。以上甄權法。紫白癜。貝母。南星。等分爲末。生姜汁ニ合シ

擦。蛇蚋咬傷。咬處ヲ縛。毒ヲ不行。貝母末。酒ニテ半兩ヲ服ス。

醉ニ至テ良久ノ酒化。水瘡口ヨリ水出盡テ痊。出。仁濟直指方。目

生。弩。貝母。丁香。等分爲末。乳汁ニ調。目中ニ點ス。出。梅方。

愚案

半夏ハ有毒。且濕痰ヲ燥ス。故ニ世人其毒與燥ヲ恐テ
古方中ノ半夏ヲ貝母ニ代テ用者アリ。蓋半夏ハ辛温

脾胃家ノ濕痰ヲ燥ス。貝母ハ辛寒。肺家ノ燥痰ヲ潤化ス。其位其

功天淵異ナリ。豈代用ヘケンマ肺ハ燥熱ヲ惡。脾胃ハ寒濕ヲ惡。故

寒濕痰食積痰。脾胃濕痰。腎虛邪水。溢痰。痰泄。痰嘔。痰厥。頭痛等ハ

辛温ノ痰藥。半夏。南星。天麻。蒼白朮。茯苓ノ類ニ宜シ。此ニ貝母ヲ代

ハ濕瀰旺シ。痰加甚カラニス。凡古人ノ方ヲ製スル各ニ主トスル所

アリテ。或ハ半夏ヲ用テ脾胃家濕痰ヲ燥シ。或ハ貝母ヲ用テ肺家ノ

燥痰ヲ潤ス。然ニ其方意ノ本旨ヲ不知ノ古方中ノ半夏ヲ以テ

貝母ニ代用。則方劑ノ所向ヲ異ニシ。所治ノ寒温ヲ過テ。反テ害ヲ致

修治

黃白色ニテ輕嫩ヨリテ兩ニ劈ハ中ニ米粒ノ如者ニ

到。糯米ト同。梓炒テ米ノ炒タル度トシ。米ヲ用テ。或ハ姜汁ニ浸焙

用。則大ニ結痰ヲ開。蒙筮曰。黃白。輕。者。爲。良。油。ツキテ。黑。色

重硬者勿用。○皺ナク少圓兩ニ不劈中ニ米顆ナキ者ハ禁也此
ヲ丹龍睛ト号。誤服スレハ筋脉永不收若此毒ニ中者ハ黃精小
藍汁ヲ合服スレハ愈。○今藥店ニ小者ヲ上品トシ。大者ヲ下品
トス。然レ本草ニ以テ其大小辨スルコトナシ。本草原始ニ土貝母ア
リ。頗類栗仁。色黃白。治馬ト云。此ガ形類栗仁ト云。則大者ナリ。然
則藥店ニ大者ヲ下品トスルハ。土貝母ニ類似スルコトヲ嫌ガ故乎。
惟形ノ大小ニ不可拘。黃白色ニモ。輕皺ヨリ。劈ハ兩片ニ分テ。中ニ
一顆アル者ヲ佳トス。左。瘰癧者ハ擇餘ヨ



廣益本草大成卷之五終

