

内注射(慢性症ニ適應ス(二九五)モ之ニ全シ)
 (二九七)芒硝一五〇、〇炭酸加里五〇、〇甘草根末二〇〇、〇爲舐劑日々數回一刀
 尖宛興フ(牛馬)
 (二九八)芒硝三〇〇、〇蜀葵末一〇〇、〇食鹽一五〇、〇爲舐劑一日ニ興フ
 (二九九)人工加兒爾斯泉鹽一五〇、〇蜀葵末一〇〇、〇麵粉適量爲舐劑日々數回一
 刀尖宛興フ(豚)
 (三〇〇)鹽酸莫兒比涅〇、二苦扁桃水二〇、〇偪里設林餉水各一〇、〇一〇一〇一
 二〇滴宛興フ(犬ノ咳嗽)

慢性喉頭加答兒 *Laryngitis Catarhalis chronica*

患畜ヲ安靜セシメ刺鬚與奮ヲ避ケ咳嗽ノ發作ヲ緩和シ外用ハプリースニツツ罨法
 刺戟藥塗布ハ効驗著シカラス蒸氣吸入(水ノクレオリンニ石炭酸、的列並底油一%ノ
 食鹽溶液、礮砂臭剝單寧硝酸銀溶液)祛痰劑金硫黃礮砂ゲルラハ氏ハ黃兒比涅皮下
 注射ヲ用ヘ犬ニハ硝酸銀液(一—五%)ヲ筆ニテ喉頭ニ塗布スデイカーホツフ氏ハ
 ルーゴ—氏液或ハ丹寧(五—一〇%)次硝酸蒼鉛(八—一〇、〇)ヲ二三日毎ニ注射
 ス犬ニハ莫兒比涅及苦扁桃水ノ合劑内服或ハ全藥〇、〇一—〇、〇ニテ餉水ニ溶シ
 皮下注射ス或ハ古堊乙涅臭素加里沃度加里内服ヲ用ウ攝生急性ノ者ニ全シ
 處方(急性喉頭加答兒ノ處方參照)
 (三〇一)礮砂五〇、〇食鹽甘草末各一〇〇、〇非沃斯葉末三〇、〇爲舐劑二日分服

或ハ散劑トナシ每食一食匙ヲ混與ス(馬)

(三〇二)次硝酸蒼鉛五、〇餉水一〇〇、〇爲溶液二三回ニ喉頭注射(馬)

(三〇三)臭素那篤留謀一〇、〇鹽酸莫兒比涅一、〇餉水一五〇、〇一日三回一食匙
 匙内服(犬)

(三〇四)茴香加礮砂精二、〇苦扁桃水八、〇單舍利別四、〇三回分服(犬)

格魯布性喉頭炎 *Laryngitis Catarhalis crouposa*

蒸氣吸入(水或ハ石灰水)プリースニツツ氏罨法或ハ溫巴布水銀軟膏塗布收斂劑
 (硝酸銀明礬)ヲ應用ストラスボー氏ハ刺絡及沃度加里(日量一〇、〇)内服窒息ノ
 恐レアレハ氣管切開術犬猫ニハ吐劑ヲ良シトス即チ少量ノ亞剝莫兒比涅ヲ與フ

聲門浮腫 *Oedema glottidis*

喉頭部ニ刺戟劑ヲ塗布ス例之芥子精(八一—一〇%)奏効ナケレハ速ニ氣管切開術ヲ
 施ス其他ノ療法ハ刺絡、緩下劑氷片嚙下收斂藥ノ吸入及塗布等ニシテ次急性ニ効
 アルモ急劇症ニハ概子奏効セス樟腦及依答兒ノ皮下注射

聲門痙攣 *Spasmus glottidis*

莫兒比涅ノ皮下射抱水格魯拉兒ノ灌腸ヲ行フ又嘔噤仿謨吸入ヲ試ミ効ナケレハ氣
 管切開術ヲ施ス

喘鳴症 *Kehlpoopfweifen* (獨)

單ニ手術ニ依ルノ外術ナシギユンテル氏ハ喉頭ヲ切開シ麻痺セル聲帶併ニ披裂軟骨ヲ截去シ稍ヤ良効ヲ奏シ近時チラー氏ハ先ツ氣管切開術ヲ施シ其創口ヨリ麻痺セル披裂軟骨ヲ切斷ス其成績良好ナリ姑息療法ハ氣管切開術及鼻孔ノ厭迫裝置ニ在リ初期ニハ斯篤利幾尼涅又ハ物刺篤里涅ノ皮下注射ヲ試用ス但密瓦量ヨリ漸次増量シテ三日毎ニ反復ス砒石沃度劑電氣ノ効力ハ未タ確實ナラス○豫防法トシテ本症ニ罹レル馬ハ蕃殖ニ供セズ(手術篇ヲ見ヨ)

○慢性喉囊加答兒

Chronische Katarrh der

Luftröhre (獨)

内服藥及局所刺戟藥ノ應用ハ無効ナリ水蒸氣食鹽參兒石炭酸ノ吸入モ多クハ効ナシ之レ此等ノ藥物喉頭ヨリ狹路ヲ通過シテ喉囊内ニ達スルノ困難ナレハナリ初期ニアリテハ時トシテ奏効ス喉囊切開術ヲ施スヲ主要トス(手術篇ヲ見ヨ)手術後ハ防腐收斂藥ヲ以テ喉囊ヲ洗滌ス

(三〇五) 礬化銅石炭酸各一〇、〇 餾水五〇〇、〇 爲溶液注射用

(三〇六) 粗製礬土一〇、〇 若麗阿曹篤水五〇〇、〇 爲溶液朝夕二回注入

其他收斂藥例之鉛糖水(鉛糖二分水百分)頑固症ニハ硝酸銀(一一一〇〇)初期ニハ硫酸銅丹寧(一一三二一〇〇)石炭酸水(明礬等ヲ用フ

○喉囊鼓脹

Tympanitis der Luftröhre.

(獨)

喉囊穿刺ヲナシ空氣ヲ排除ス

第三分類

氣管及氣管支諸病

○氣管折傷

Fracturen der Luftröhre

(獨)

氣管ノ新折傷ニハ呼吸困難アレハ氣管切開術ヲ行フ栓塞管(*Tamponkanüle*)ニヨリ窒息ヲ防キ且ツ血液ノ流入ヲ防リ得可シ

○氣管變形氣管狹窄

Deformitäten der Luftröhre. (獨)

氣管狹窄ハ人醫ニアリテハ彈力性管ヲ喉頭ヨリ挿入シテ氣管ヲ擴張スト雖凡獸醫術ニアリテハ困難ナク呼吸困難ヲ救フ爲メ氣管切開術ヲ行フ其部位ハ狹窄ノ場所及廣狹ニヨルト雖凡通常狹窄部ノ下位ニ於テスリヒヨルゾン氏ハ變位狹窄セル氣管輪ノ切除ヲ試ミラホツツ氏ハ狹窄部ノ下位ヲ切開シ之レヨリ「コルク」圓筒ニ麻織子ヲ纏絡シタル者ヲ狹窄部ニ挿入シ糸ヲ以テ結着保定シ十日ヲ經テ撤シ別管ヲ裝シ六週間放置シタリシニ氣管ハ擴張シ其後氣導管ナクシテ使役スルヲ得タリス
テイケル氏ハ金屬螺絲施繹ヲ以テ氣管擴張ヲ治セリ

○氣管異物

Fremdkörper in der Luftröhre (獨)

豫防法トシ液藥ヲ與スル際注意スヘシ殊ニ犬馬ニ於テ然リ頭ヲ常位置ヲ超ヘテ高

ク保定ス可カラス牛ニ於テハ危險少ナシ藥物ノ殊ニ充分溶解セサルキハ注意ヲ要ス藥物ヲ内服セシメ咳嗽ヲ發スレハ一時中止ス液藥ヲ投スルニ頸ヲ擦擦スルハ不用ナルノミナラス咳嗽ヲ發シ易カラシム○出血性手術ヲ氣管ニ施ス場合ニハ栓塞氣導管ヲ用ヘ或ハ頭ヲ垂レテ施術ス異物ノ大且ツ硬固ナル者ハ普通氣管切開術ニヨリ除去ス必要ニ應シテ切開口ヲ設ケ大小ヲ酌量ス適當ノ鉗子或ハ小兒ノ手ヲ挿入シテ異物ヲ除去ス時ノ氣管ヲ切開シタルノミニテ異物ハ呼氣ト共ニ開口ヨク呼出セラル、トアリ腫瘍ハ切開後手術ニヨリ除去ス

○氣管支炎 *Bronchitis*

○急性氣管支加答兒 *Bronchitis Cateyhalis acuta*

換氣善良ノ廐舎ニ移シ皮膚ヲ擦擦温包シ廐温ヲ調節シ(十五度)易消化飼料ヲ給ス局所療法トシ吸入藥ヲ用フ水蒸氣食鹽礮砂石炭酸明礮丹寧帝列並底油ノ蒸氣吸入ヲナシ内服ハ食鹽芒硝吐酒石礮砂小動物ニハ鹽酸亞錒莫兒比涅ヲ用フ犬ニハ日量〇、〇〇五〇、〇一ヲ餵水五〇、〇ニ溶解シ毎三時一食匙ヲ投ス礮砂ハ第二期ニ於テ咳嗽乾性ニシテ熱度高カラサルモノニ用フ其一回量八、一五、〇(犬〇、二一)〇ヲ重曹金硫黃ニ和シ馬ニ與フ吐酒石ハ良祛痰劑ナルモ強壯動物ニシテ熱候アル者ニ適シ虛弱ニシテ下痢アルモノ又ハ神經症候アルモノハ忌ム金硫黃モ亦第二期ニ適ス(馬二一五、〇犬〇、〇五〇、〇二)氣管支粘膜炎ノ必泌旺盛ナルキハ的列

並底油(犬内服)〇、一〇、五)遠志根茴香礮砂精ヲ用ウ痛咳ニハ鹽酸莫兒必涅〇、一苦扁桃水一〇、〇茴香水三〇〇、〇ヲ混和シ一日二三回一食匙ヲ投シ古堦乙涅(〇、三一〇、五)ヲ處ス肺水腫肺炎發生ノ虞アレハ衝動藥(樟腦依答兒咖啡亞爾簡保兒)若クハ吐劑ヲ投ス又中度ノ加答兒ニハ明礮酸銀或ハ次礮酸蒼鉛液ノ氣管内注射化膿性加答兒ニハルーゴー氏ノ液ノ注入ヲ試ムヘシ鹽必替皮下注射ヲ試用ス處方

- (三〇七)礮砂甘草羔各五、〇吐酒石〇、五餵水三〇〇、〇一日三回一茶匙乃至一匙匙ヲ犬ニ與フ
- (三〇八)遠黃根浸(一〇ニ一五〇)茴香礮砂精五、〇一日二回一食匙若クハ一茶匙宛與フ(犬)
- (三〇九)金硫黃五〇、〇芒硝二五〇、〇甘草根末一〇〇、〇茴香五〇、〇麵粉ト砥劑トナシ二日乃至三日間ニ與フ(馬)
- (三一〇)白露拔留撒謨〇、五以上膠囊十個ヲ作り毎日一個宛ヲ與フ(犬)
- (三一一)吐酒石〇、一餵水一五〇、〇蜀葵舍利別二〇、〇爲溶液每三時一食匙ヲ與フ(犬)
- (三一二)礮砂一〇、〇芒硝一〇〇、〇過泥子末二五、〇以上爲三包毎日一包宛半瓶ノ亞麻仁煎ニ加ヘテ與フ(犢羊山羊)
- (三一三)礮砂一〇、〇甘草末五〇、〇蜂蜜二伍シ砥劑トナシ毎日一食匙ヲ與フ(豕)

- (三二四)亞爾尼加花浸五、〇(一五〇、〇)安母尼亞茴香精甘草蒸各五、〇爲溶液每三時一食匙(一茶匙)ヲ犬(小)犬ニ與フ
- (三二五)吐根浸一、〇(一五〇、〇)蜀葵舍利別二〇、〇爲溶液每三時一食匙與フ(犬)
- (三二六)安息香酸二、〇白糖一〇、〇散劑十包ニ分チ毎日一回一包ヲ與フ(犬)
- (三二七)鹽酸亞剝莫兒比涅 〇、〇五攪酸一、〇餾水二五〇、〇爲溶液每三時一食匙ヲ與フ(犬)
- (三一八)攪酸亞剝莫兒比涅〇、〇五甘草蒸甘草末各適量爲二十九每二時一丸宛與フ(犬)
- (三一九)人工加兒爾斯泉鹽二〇〇、〇蜀葵末一〇〇、〇水適量爲砥劑二日ニ分服(馬)
- (三二〇)重曹五〇、〇食鹽一五〇、〇金硫黃三〇、〇爲散劑每食一食匙宛混與ス
- (三二一)食鹽一〇〇、〇礮砂五〇、〇甘根末二五〇、〇爲散劑每食一食匙宛混與ス(馬)
- (三二二)芒硝一〇〇、〇吐酒石二〇、〇茴香適量餾水五〇、〇丸劑四個トナシ日々二丸ヲ與フ
- (三二三)食鹽二五〇、〇黑硫化安質母質尼一〇〇、〇杜松子一五〇、〇爲散劑每食餌二一食匙ヲ混與ス(馬)

- (三二四)非沃斯越幾斯五、〇礮砂二〇、〇茴香浸七〇〇、〇一回量(牛)
 - (三二五)吐酒石〇、〇五吐根酒二五、〇一食匙與フ(犬)
 - (三二六)吐酒石、〇三礮砂甘草蒸各五、〇茴香水一五〇、〇爲溶液一日數回一茶乃至一食匙ヲ與フ(犬)
 - (三二七)鹽酸莫兒比涅(、)二五吐根浸二〇〇、〇(二、〇)甘草蒸二〇、〇每三時一茶乃至一食匙ヲ與フ(犬)
 - (三二八)鹽酸莫兒比涅〇、〇五苦扁桃水二五、〇餾水二五〇、〇一日三回一茶乃至一食匙宛(犬)
 - (三二九)重曹五、〇金硫黃一〇、〇白糖二五、〇爲散劑日々四五回一刀尖宛ヲ與フ
 - (三三〇)安母尼亞茴香精五、〇根志根浸二〇〇、〇(五、〇)甘草蒸二五、〇每三時一茶乃至一食匙ヲ與フ(犬)
 - (三三一)的列並底油一〇、〇亞刺毘亞護誤二五、〇橙花水二五〇、〇一日三回一茶乃至一食匙宛ヲ與フ(犬)
- 〇慢性氣管支加答兒 *Bronchitis Calaryhalis chronica.*
 善良易消化ノ飼料(胡蘿蔔油糖ノ類)ヲ與ヘ乾草及藁ヲ減ス治癒ニ久シキヲ要ス療法ハ畧ホ急性炎ニ全シ衝動祛痰劑ヲ用フ則チ的列並底油參兒苦麗阿林礮砂ノ內用吸入ヲ用フ又亞爾加里鹽類鹽酸亞剝莫兒比涅遠志根浸ヲ用井時トノ鹽酸必魯加兒必涅ノ皮下注ヲ試ム用脚ハ馬〇、一犬〇、〇五ナルモ肺水腫ヲ起シ窒息スルヲア

リ注意ヲ要ス又亞砒酸安知母尼劑ヲ用フデイカーホタフ氏ハルーゴー氏ノ氣管内注射ヲ賞用ス

- (三三二) 亞砒酸〇、五金硫黃里硫化安質母尼各一〇、〇混和爲散劑飼料ニ混與
- (三三三) 硝酸銀一、〇餵水一五〇、〇爲溶液氣管内注入
- (三三四) 的列並底油一〇、〇亞刺毘亞護謨一五、〇餵水三〇〇、〇爲乳劑每日三回一食匙宛ヲ與フ(犬)

- (三三五) 參兒三、〇甘草末適量爲丸劑日々數回一丸宛ヲ與フ(犬)
- (三三六) 食鹽五〇〇、〇黑硫化安質母尼一〇〇、〇胡蘆巴末甘草末各五〇、〇爲散劑每飼料ニ一食匙ヲ加與ス(馬)
- (三三七) 結麗阿曹篤一五、〇甘草根五〇、〇蜀葵末水各適量以上爲三丸每日一丸宛與フ(馬)

- (三三八) 芒硝食鹽各一五〇、〇甘草末二〇〇、〇爲砥劑每飼料ニ一食匙ヲ加與ス(馬)
- (三三九) 硫黃華、粗製硫化安質母尼各二五、〇芒硝二五〇、〇甘草末茴香末各一〇〇、〇爲散劑每食餌ニ一食匙ヲ混與ス(馬)
- (三四〇) 百露拔爾撒謨五、〇單舍利別亞刺毘亞護謨各一〇、〇餵水一五〇、〇爲飲劑トナシ每三時一食匙ヲ與フ

○格魯布性氣管支炎 *Bronchitis Cruposa*

氣管切開術ハ急ヲ救フニ足ラサルヲ以テ治癒ハ概テ無効ナリ小獸ハ水石灰水ノ蒸氣吸入法及吐劑ヲ試ミ牛ハ速ニ屠殺ストラスボー氏ハ刺絡ヲ施セハ輕快スト云フ

第四分類 肺臟諸病

○肺充血 *Hyperaemia pulmonum.*

○實性肺充血 *Hyperaemia pulmonum activa.*

大刺絡ヲ施シ救急ス胸壁ニ刺戟擦劑ヲ塗布シ血液ヲ皮膚ニ誘導シ寒冷ノ空氣ニ暴露シ冷水灌漑及灌腸ヲ行ヒ下劑芒硝ノ大量蘆薈越幾斯(二五、〇)越攝林(〇、一)等ヲ投ス犬ノ肺水腫ニハ鉛糖(〇、〇五—〇、三)ヲ用フ

- (三四一) 芒硝五〇〇、〇硝石三〇、〇爲飲劑或ハ砥劑トナシテ與フ(二回分服)
- (三四二) 芒硝二五〇、〇吐酒石一五、〇蜀葵根末及水適量爲砥劑三回分服(馬)
- (三四三) 的列並底油五〇、〇酒精五〇〇、〇半時間毎ニ胸壁塗布(牛馬)

○虛性肺充血 *Hyperaemia pulmonum passiva.*

亢奮藥ニヨリ心臟ノ作用ヲ活潑ニス例之酒精依答兒樟腦亞母尼亞ノ飲用或ハ吸入(實性充血ニアリテモ衰弱ノ徵アレハ之ヲ用フ)ヲ行フ通氣善良ノ麻ニ容レ多量ノ清涼水ヲ飲マシム營養善良ノ動物ニハ刺絡ヲ行ヒ血行ヲ流利シ皮膚ニ揮發性刺

戟擦劑ヲ塗布シ腸ノ蠕動ヲ催進スル爲メ依攝林皮下注射或ハ冷水灌腸ヲ行フ
處方

- (三四四)白葡萄酒五〇〇、()酒精五〇、〇馬ニ頓服
- (三四五)硫酸依答兒五、〇樟腦精二五、〇三回ニ皮下注射ス

○咯血 Haemoptoe.

冷涼ニシテ換氣善良ナル廐舎ニ容レ刺戟ヲ避ク肺充血及急性肺炎ニ原因スルキハ
刺絡ヲ要スルモ他ノ場合ニハ反テ有害トス胸部ノ冷湯冷水ノ飲用止血藥蒸氣ノ吸
入例之五十名%ノ醋溶液〇、五%ノ格魯兒鐵液ヲ用フ蒸氣ノ溫度ハ血溫ヨリ高カ
ル可カラス内服ニハ收斂藥特ニ血管ノ收編ヲ促ス藥品例之硫酸、明礬硝酸銀丹寧
麥角(馬一五—三〇、〇羊五—一〇、〇豕二—五、〇一日數回反復)麥角越幾斯(牛馬
五—一〇、〇羊二—五、〇豕〇、五—二、〇犬〇、二—一、〇)ヲ用フ
處方

- (三四六)純硫酸一〇、〇酒精三〇、〇一食匙宛一瓶ノ水ニ混シテ與フ(馬)
- (三四七)麥角越幾斯餾水各一〇、〇二回ニ皮下注射ス(馬)
- (三四八)的列並底油一〇〇、〇亞刺毘亞護謨五〇、〇蜀葵未八〇、〇丸劑四個トナ

シ必要ニ應シ一丸宛與フ(牛馬)

○肺炎 Pneumonia.

○格魯布性肺炎 Pneumonia crouposa

馬ノ本病ハ模範的經過ヲ取ルヲ以テ特別ノ治療ヲ要セス攝生ヲ主要トス患者ハ屢
々廐房ニ容レ清涼乾燥清潔ニ保チ廐溫ヲ調節シテ十二乃至十五度トナシ最美易消
化ノ食ヲ給シ柔軟ナル牧草青草燕麥等ヲ少量宛與ヘ清涼ノ飲料ヲ給シ皮膚ノ梳式
ヲ能クス胃腸病アレハ杜松子人工加兒爾斯泉鹽亞麻仁過泥子及食鹽(水ニ混シ)ヲ
與フ、胸部ヲ冷湯シ或ハ芥子精(六一八%)ヲ塗布シ熱候高キニ過ケレハ殊ニ心悸
微弱ナルキハ實芟答利斯葉(八一—〇、〇日量)ヲ亞爾加里鹽類ト伍シ舐劑トナシ
或ハ解熱藥安知必林安知歌賴林(一五—二五)ヲ用フレハ効驗アリ規尼涅酒精ハ効
驗稍ヤ薄シ馬ニハ主トメ安知歌賴林ヲ用ウ(三〇、〇)ヲ二回乃三回ニ與フ)之レニ
兼ヌルニ樟腦皮下注射亞兒簡保兒内服白葡萄酒ヲ投シ心悸ヲ亢奮セシム吸收機能弛緩
ナレハプリースニツツ罨法ヲ施シ醋酸加里(一〇〇、〇—一五〇、〇)ヲ杜松子ニ混シ
舐劑トナシテ與フ)肺壞疽ニ陷レハ參兒「クレオリン」吸入ヲ施ス虛弱ノ動物殊ニ
老衰シタルモノハ飲水ニ亞爾簡保兒(一〇〇、〇)ヲ和シテ與フ可シ
牛ノ格魯布性肺炎ハ經過急劇ナルヲ以テ治療ノ閑ナキヲ多シ療法ハ全ク馬ニ全シ
胸部ノ冷湯冷水灌腸解熱藥酒精等ヲ試用スベシ
小動物ノ格魯布性肺炎モ亦馬ト同様ノ所置ヲナス高熱ノ際ニハ攝生ニ注意シ牛乳
粘汁肉汁等ヲ與ヘ體ニ冷濕布ヲ被ヒ解熱等(規尼涅、安知必林)ヲ投シ硬脈及呼吸
促進ニハ胸壁ニプリースニツツ罨法ヲ行ヘ心悸衰弱ヲ發セハ黑咖啡ヲ一食匙ノ武

日ニ與フ(牛馬)

- (三六五)重曹一〇〇、〇茴香、的列並底油各一五〇、〇爲砥劑二日分服(牛)
- (三六六)食鹽二五〇、〇粗製安質母紐膜一〇〇、〇杜松子一五〇、〇爲散劑每食二
一食匙宛混與ス(牛)
- (三六七)礪砂五〇、〇硫酸鐵木參兒各七五、〇蜀葵末適量丸劑四個トナシ牛馬ニ與
フ
- (三六八)礪砂五〇、〇吐酒石一〇、〇甘草根末一五〇、〇以上三包トナシ毎日一包
ヲ一瓶ノ亞麻仁煎ニ加ヘ與フ(牛)
- (三六九)杜松子末二五〇、〇芒硝五〇〇、〇礪砂五〇、〇以上爲散劑毎日其一包ヲ
一瓶ノ亞麻仁煎ニ加ヘ加溫シテ與フ(牛)
- (三七〇)遠志根浸二〇、(三〇〇、〇) 炭酸安母尼亞一〇、〇爲溶液每三時一食匙ヲ
與フ(羊)
- (三七一)金硫黃〇、〇五白糖〇、五以上一包トナシ其五包ヲ作り毎日一包宛與フ
(犬)
- (三七二)醋酸加里液吐松子羔各二〇、〇茴香水五〇〇、〇每三時一食匙ヲ與フ(犬)
- (三七三)礪砂一〇、〇吐酒石〇、五甘草羔二〇、〇餽水三〇〇、〇爲溶液每三時一食
匙(一茶匙)ヲ大(小)犬ニ與フ
- (三七四)礪砂二、〇食鹽五、〇水五〇〇、〇爲溶液鸚鵡ノ飲劑トナス

○異物性肺炎附肺壞疽 *Fremdkörperpneumonie* (獨)

○誤嚥肺炎 (*Verschluckungspneumonie*) ○藥液肺
炎 (*Pneumonia medicamentaria*)

初期ノ療法ハ加答兒性肺炎ニ全シ既ニ肺壞疽ヲ發スルハ治療ハ概子効ヲ奏ヤス須
ラク參兒苦麗阿林「リゾール」「イヒチオール」石炭酸の列並底油等ノ吸入特ニ石炭
酸(2%)の列並底ノ吸入ヲ一日十五乃至三十分宛五六回反復ス又石炭酸ノ内服ヲ
用フルーゴー氏液ノ十五ヲ一日一二回注射ス可シ胸壁ニハ日夜プリースニツツ氏
療法ヲ施シ熱ニ對シテハ安知必林規尼涅ヲ與ヘ敗血症アレハ樟腦亞爾簡保兒甘汞
ヲ用ヘ時トノハ強心藥實麥答利斯ヲ用フ○豫防法トメ飲劑ヲ投スル際大ニ注意シ
粗暴ノ舉動ヲ避クヘシ豚ハ最モ注意ヲ要ス

- (三七五)安知必林三〇、〇樟腦精五〇、〇爲溶液一日三回ニ皮下注射ス(牛馬)
- (三七六)硫酸規尼涅二〇、〇赤葡萄酒五〇〇、〇亞爾簡保兒五〇、〇爲溶液頓服(牛
馬)
- (三七七)的列並底油一〇〇、〇亞麻仁煎汁一〇〇〇、〇爲振盪合劑二回ニ分與ス
(牛馬)
- (三七八)溶製石炭酸二〇、〇蜀葵末八〇、〇水適量爲丸劑二箇朝夕一丸宛ヲ與フ
(牛馬)

(三七九) 硫酸依答兒五〇、〇樟腦一〇、〇爲溶液一日數回十瓦宛皮下注入
(三八〇) 規那皮八〇、〇丹寧酸二五、〇重曹五〇、〇蜀葵末適量以上爲三丸下痢ノ
際ニ與フ

(三八一) 的列並底油一〇、〇亞刺昆亞護謨二〇、〇茴香水二〇〇、〇爲乳劑一日三
四回宛一食匙ヲ犬ニ與フ

(三八二) 結麗阿曹篤三〇、〇樟腦精一〇〇、〇亞麻仁粉適量爲砥劑二日分服(牛)

〇創傷肺炎 *Pneumonia Traumatica*

胸壁ノ挫傷衝突及外傷及創傷性心囊炎ノ經過中(牛)其他釘鍼ノ食道ニ入りテ肺ヲ
傷クル(犬猫)ニヨリテ發ス外傷ニヨル者ハ消炎療法ヲ施シ消毒ヲ嚴密ニシ肺壞疽
ヲ防キ内部ヨリ創傷ヲ受ケタルモノハ治術ナシ内科的療法ハ須カラク肺壞疽ノ如
ク所置スベシ血液胸腔ニ滯溜スレハ穿胸術ヲ行フ
(三八三) 麥角二五、〇硫酸鐵一、〇〇蜀葵末五〇、〇爲砥劑二回分服(馬)

〇微性肺炎 *Pneumomycosis aspergillina*

生前確診シ難キニヨリ治療ハ概テ奏効セス一タヒ侵入シタル黴菌ハ撲滅除去スル
ヲ困難結麗阿林爹兒石炭酸的列並底油ノ吸入ヲ試ム可シ之レ毎時成効スルモノニ
アラス大動物ニハ苦麗阿林石炭酸撒里矢爾酸昇水或ハルーゴ一氏液ノ稀釋液ヲ
氣管内ニ注入ス

〇間質肺炎 *Pneumonia interstitialis*

治療ハ概テ無効唯對症療法ヲ施スニ過キス亞爾加里鹽類或ハ沃度加里内服ヲ試ム
可シ

〇轉位性肺炎(栓塞性肺炎) *Pneumonia metastatica*

s. embolica.

療法ハ無効肺壞疽ノ如ク所置ス可シ

〇肺氣腫 *Emphysemapulmonum.*

〇慢性肺胞氣腫 (*Emphysema Substantialis*)

〇急性肺胞氣腫 (*Emphysema Vesiculare acutum*)

〇胞間肺氣腫 (*Emphysema interstitiale*)

〇慢性肺氣腫ハ肺氣胞壁ノ菲薄トナリ且ツ増大シ數多ノ氣胞相合シテ一大空洞ヲ
生シタルモノニシテ息勞ノ主因タリ治癒困難療法ハ息勞ヲ見ヨ

〇急性肺胞氣腫ハ肺氣胞ノ一部擴張シタルモノニシテ氣胞ノ構造ニハ敢テ變化ヲ
起セサル者ニシテ臨床的價値ナク治療ノ必要ナシ

〇胞間肺氣腫ハ肺氣胞破裂シテ空氣ハ肺胞間結締織及淋沱腔ニ竄入シ肋膜下ニ氣
腫ヲ起シ之レヨリ肺根ニ入り縦隔ノ間ヲ傳ヘ前胸ヲ出テ頸部ノ皮下結締織中ニ竄

入シ終ニハ全身ニ散蔓ス療法ハ皮下織ノ氣腫ハ皮膚ヲ切開シテ按捺シ壓迫縋帶ヲ施スヘシ

○息勞 *Dampy* (獨)

攝生ニ注意シ容積ノ大ナル飼料乾草ヲ減シテ滋養強壯濃厚ノ穀食ヲ與ヘ不潔ノ乾草及藁等ヲ避ク可シ藥物療法ハ多クハ効ヲ奏セス從來砒石ヲ賞用ス即チ○、一、○、五ヲ食物ニ和シテ與ヘ或ハ亞砒酸加里液五、一、五、○ヲ漸次增量シテ與フ又亞砒酸斯篤利幾尼涅一二仙瓦亞砒酸鐵二一三垓瓦ヲ麥酒ニ混シテ與ヘ効ヲ見タル者アリ砒石ノ効力ニ就キテハ諸家ノ說區々タリ必竟動物ノ營養ヲ改良シ外類ヲ美ニスルニ止マルガルゾール氏ハ心臟性ノ息勞ニハ減飲療法ヲ施シ其他慢性氣管支加答兒アレハ亞爾加里劑特ニ人工加爾兒斯泉鹽ヲ用フ時トメハ安知母尼ノ製劑粘劑甘味藥ヲ伍用ス例之少量ノ吐酒石金硫黃甘草等ノ如シ

處方 (三八四)食鹽一五〇、〇重曹五、〇芒硝八〇、〇日々三回食物ニ混シテ與フ

(三八五)人工加爾兒爾斯泉鹽一〇〇、〇日々食餌ニ混與ス

(三八六)法列兒水一〇〇、〇第一日々五瓦次日十瓦第三日十五瓦ト徐増シ一日量五十瓦ニ至ラシム

第五分類 胸膜諸病

○胸膜炎 *Pleuritis*

初期ハ胸壁ニ冷濕布ヲ纏ヒ或ハ冷水灌溉ヲナシ高熱アレハ全身ニ冷濕布ヲ被フ四肢ハ「フランネル」ニテ溫包ス清涼ノ空氣ヲ與ヘ換氣善良ナル潤房ニ繫留ス爾後芥子泥或ハ芥子精(芥子油一二〇、〇酒精二〇〇、〇)等ヲ胸壁ニ塗布ス又吸收ヲ促ス爲メプリースニツツ氏審法ヲ賞用ス之レニ兼ヌルニ下劑甘汞(四、八、〇)吐酒石ヲ芒硝ト伍用ス大熱アレハ安知歇賴林(一回量五、一、二〇、〇)安知必林「フェナセチン」(一、五、一、八、〇)質斐答利斯(二、一、五、〇、一、〇、二)吸收機緩慢ナレハ減水療法、利尿藥下劑發汗劑例之醋酸加里(日量三〇、〇)醋酸安母尼亞(日量一五〇、〇)杜松子の列並底油(三〇、一、五〇、〇)鹽酸必魯加兒必涅(馬〇、一、〇、二牛〇、二、一〇、四、犬〇、〇〇五、一〇、〇〇二)ノ皮下注射ヲ行フ滲出液多量ニシテ呼吸困難ナルカ或ハ滲出液吸收セラレサルキ或ハ膿性及敗膿性滲出液存スルキハ穿胸術ヲ行フ膿性敗膿性ナルキハ穿刺排泄石炭酸一、二%液ノ注入ヲ行フ處方

(三八七)質斐答利斯葉末一二、〇杜松子末一〇〇、〇蜀葵根末五〇、〇亞麻仁適量右混和四丸トナシ二十四時間ニ與フ(馬)

(三八八)醋酸加里三〇、〇芒硝三〇〇、〇龍膽末五〇、〇亞麻仁適量混和爲砥劑三時毎ニ鷄卵大ノ塊ヲ與フ(馬)

(三八九)安知必林一五、〇樟腦五、〇蜀葵末二五、〇爲丸劑一個頓服

(三九〇)食鹽一〇〇、〇吐酒石二〇、〇杜松子一五〇、〇蜀葵末適量爲砥劑一日三四回一錠宛與フ(馬)

(三九一)「フエナセチン」一〇、〇實斐答利末五、〇亞麻仁粉適量爲丸劑頓服

(三九二)醋酸加里五〇、〇實斐答利末一五、〇希臘布邁尼子七五、〇爲丸劑三個一日二丸ヲ與フ(馬)

○犬ノ胸膜炎ノ療法モ器ホ馬ニ全シ解熱藥、滲出液吸收藥(下劑、利尿發汗催唾液)ヲ投ス犬ハ泌結シ易キカ故ニ甘汞、旃那、薊菊巴越攝林等ヲ與ヘ強壯神經亢奮藥肉汁牛肉咖啡葡萄酒規那、鐵劑沃度劑等ヲ用ヘ劇痛ニ對シテハ安靜ヲ命シ莫兒涅比ノ皮下注(〇、〇二一〇、一一回量)ヲ行フ

(三九三)安知必林五、〇鹽水一〇、〇爲溶液一日三四回二一三、〇宛皮下注

(三九四)旃那浸一〇〇、〇(二〇、〇)芒硝三〇、〇甘草舍利別二〇、〇二時間毎ニ一食匙宛

(三九五)杜松浸二五〇、〇精製酒石薄荷舍利別各二五、〇一日三乃至五回一―二食匙宛

(三九六)鹽酸規尼涅五、〇粉末樟腦二、〇亞刺昆亞護謨適量丸劑十二個トナシ毎日二三丸ヲ與フ

(三九七)實斐答利末一五〇、〇(一、五)醋酸加里一五、〇海葱醋蜜五〇、〇每二時一茶乃至一食匙宛

(三九八)リ―ヒ氏加羅越幾斯五、〇沃度鐵舍利別一〇、〇桂皮水一五〇、〇日々三四回一茶乃至一食匙宛(コツホ氏處方)

○胸水 *Hydrothorax*

務メテ飲水ヲ減シ利尿劑強心劑ヲ用フ例之「ジギカリン」實斐答利末葉浸(一―二―五〇)醋酸加里液杜松子稠熬各二五、〇ヲ伍シ毎日三四回一食匙犬ニ與フ「ヂュレチン」ハ犬ニ三時間毎ニ〇、二五―一、〇ヲ粉末或ハ他藥ニ伍シテ與フ甘汞ハ犬ニ効アリ其量〇、〇五―一、〇一テ一日五回内服咖啡涅撒里矢爾酸曹達等モ用フ鹽酸必魯ノ皮下注射ヲ試ム(犬ニハ〇、〇〇五―一〇、〇二)窒息ノ恐レアレハ救急ノ目的ニテ穿胸術ヲ施ス

(三九九)實斐答利末(二、〇二三〇〇、〇)「ヂワレチン」ストロハン丁幾各五、〇

醋酸加里液杜松子稠熬各二五、〇右混和一食匙宛三日間ニ與フ(犬)

(四〇〇)硼砂末五〇、〇杜松子末二五〇、〇爲散劑五包飼料中ニ混與ス(馬)

(四〇一)醋酸加里食鹽各二〇〇、〇杜松子末一〇〇、〇爲散劑每食餌ニ一食匙宛混與ス(馬)

○氣胸 *Pneumothorax*

空氣ハ穿刺術ニヨリ除去シ得ルモ再ヒ蓄積ス對症療法トシ衝動藥ヲ與フ例之樟腦

咖啡涅依的兒亞爾簡保兒ノ類之レナリ
補遺

○喉頭偏癱 *Hemiplegia laryngis*

喘鳴症ニ全シ

○寄生性氣管支炎 *Bronchitis Verminosa.*

(豫防法)幼羊及幼獸ハ春期及初夏ノ候低濕ノ牧場ニ牧放スルヲ禁シ或ハ少クトモ
放牧前ニ乾草及水ヲ與フ屍骸或ハ屠獸ノ氣管支及肺ハ燒却ス可シ○病畜ハ
隔離シ寄生虫及其卵ハ滅却シ熱湯或ハ熱鹵汁石炭酸(五—一〇%)ニテ厩舎
ヲ消毒シ參兒石炭酸「クレオリン」結麗阿曹篤水(一%)或ハ的列並底油ノ蒸
氣吸入ヲ行ヒ(特ニ春期ニ於テ)滋養品ヲ與ヘ強壯藥(鐵劑)ヲ與ヘ鳥類ニハ
過尼子ヲ與フ

(療法)疾病ニ對シテハ特效藥ナシ參兒石炭酸苦麗阿林的列並底油烟草ノ燻蒸及吸
入ヲ試ム可シ此藥物ノ蒸氣ヲ密室ニ充シ患畜ヲ其内ニ入レ置クハ咳嗽ニ
ヨリ氣管支粘液ト共ニ寄生虫ヲ咯出ス然ルモ虫ハ注意シテ滅殺スヘシ豕
ニハ吐劑(勿刺篤利涅〇、〇、二)ヲ用ウ主要トスル所ハ滋養強壯ノ食物ヲ與
ヘ且ツ強壯鐵劑ヲ處シ患畜ノ強健ヲ保ツ可シ近時諸家ハ驅虫藥殊ニ石炭酸
的列並底油「クレオリン」呀囉仿謨「チルケノール」等ノ氣管内注射ヲ賞用ス

鳥類ニアリテハ參兒ノ吸入撒里矢爾酸曹達(五%液)ノ氣管内注入ヲナシ時
トシハ喉頭ヲ切開シ鑷子ヲ以テ寄生虫ヲ摘除スゴホルド氏ハ氣管切開術ニ
ヨリ虫ノ摘去ニテ成効セリ

處方

(四〇二)阿列布油一〇〇、〇的列並底油一〇〇、〇石炭酸二、〇臭性獸油二、〇混和
シ十瓦宛三日間氣管内注射

(四〇三)油及的列並底油各一〇〇、〇苦麗阿林五、〇混和氣管内注射用

(四〇四)硝酸銀一、〇餽水一〇〇、一五〇、〇十瓦宛ヲ三日間ニ氣管内ニ注射

(四〇五)臭素加里二、一五〇常水一〇〇、〇爲溶液毎日三四二十五瓦宛蒸氣吸入

○膿胸 *Empyema (Pyothorax)*

胸腔穿刺術ヲ行ヒ膿ヲ排除シ消毒液ニテ洗滌シルーゴー氏注入

○無氣肺 *Atelactasis,*

○就下充血 *Hypercemia hypostatica.*

○脾變 *Splenisatio*

○肝變 *Hepatisatio*

皆症候的名稱ニシテ其原病ヲ察シ治ヲ加フ可シ

第五類 消化器病

第一分類 口腔諸病

○口炎 *Stomatitis*

○加答兒性口炎

Stomatitis Catarrhalis

加答兒性口炎ハ輕症ニシテ原因ヲ除去スレハ治癒スト雖モ本病患畜ハ食物ノ攝取少ナキニヨリ漸次瘦削スルヲ以テ食料ニ注意スルヲ要ス單純ノ療法ハ屢々冷水ヲ以テ口内ヲ洗滌清潔ニス或ハ之ニ醋ヲ加フ通常用フル口液ハ八分一拉篤ノ醋ヲ水一拉篤ニ混シ食鹽一食匙ヲ加ヘタルモノナリ頑固症ニハ消毒藥例之格魯兒酸加里(一—四%液)硼酸(一—四%)重症ニハ苦麗阿林水(四分一乃至一%)ニテ洗滌及粘膜面塗布過滿俺酸加里液(一%)ハ古來用ヘシモ消毒力少ナク不快ノ味ヲ有ス唾液粘液ノ分泌盛ナレハ收斂藥例之明礬(〇、五%)單寧溶液糊皮煎汁ヲ用フ内服ニハ亞爾加里鹽例之食鹽重曹芒硝等ヲ用ヘ重症ノ者ニハ粗硬ノ食ヲ禁シ流動若クハ軟餌ヲ與フ敗徵セル食物原因タルキハ之ヲ變更スヘシ

(四〇六)食鹽一〇〇、〇醋五〇〇、〇以上一手桶ノ水ニ混シ口内洗滌用(馬)

(四〇七)硼砂五、〇餾水二五〇、〇爲溶液洗滌用(犬)

(四〇八)「ザロール」四〇酒精一〇〇、〇薄荷油華尼爾油各一、〇「クマリン」丁幾

「サツカリン」各〇、五混和シ口腔防臭藥トス

(四〇九)阿仙藥丁幾一〇、〇薄荷水一五〇、〇混和一酒杯ノ水ニ一食匙ヲ混シテ口腔洗滌用

○亞布答性口炎

Stomatitis cynthosa.

粗硬ノ食ヲ禁シ屢々口内ヲ水ニテ洗滌シ消毒收斂藥(硼酸、格魯兒酸加里、苦麗阿林、撒里矢爾酸、丹寧、硫酸鐵收斂性煎汁)加答兒性口炎ニ用フル醋食鹽及水ノ合劑モ試用スヘシ

○潰瘍性口炎

Stomatitis ulcrosa

犬ノ潰瘍性口炎ノ療法ハ外科的ニ屬ス屢々口内ヲ洗滌消毒ス緩和防腐藥例之硼酸撒里矢爾酸格魯兒酸加里ノ如キハ奏効確實ナラス強防腐藥ヲ用フ「クレオリン」ハ防腐及防臭藥トシ妙ナリ本藥一—二%液ニテ潰瘍面ヲ一日四五回洗滌シテ後塗布ス尙有効ナルハ醋酸「トールド」或ハ格魯兒亞鉛昇汞水(千倍)硫酸銅硝酸銀(一—二%)洗滌或ハ熔製硝酸銀ニテ潰瘍面ノ腐蝕(此際注意シテ他ノ粘膜ニ藥品ノ觸レサル様ニス可シ尙液ヲ嗽下セシム可カラス)又酒精劑例之沒藥丁幾、蘆薈丁幾ノ合劑ヲ潰瘍面ニ塗布シテ奏効スル「アリ」齶齒及弛緩セル齒ハ早ク採取スヘシ

(四一〇)鹽酸加里五、〇餾水二五〇、〇爲溶液犬ノ口内洗滌用

(四一一)「ザモール」〇、二五安息香酸三、〇有加里丁幾一五、〇薄荷油〇、七五酒精
一〇〇、〇爲溶液一杯ノ水ニ溷濁スル迄滴加シ口腔洗滌用

〇舌炎 *Glossitis*

硬固粗大ノ飼料ヲ禁シ粉汁牛乳等ヲ與ヘ屢々口内ヲ洗滌ス急性ニシテ腫脹甚々シ
ケレハ亂刺ヲ施シ波動ヲ呈スレハ外科刀ニテ切開ス慢性症ハ治癒困難ナルヲ以テ
液狀飼料ヲ與ヘテ肥肉シ屠殺スヘシ壞疽性ノ者ハ壞疽竈ヲ切除シ腐蝕藥(硝酸銀
棍)ニテ腐蝕シ蘆薈丁幾ヲ塗布ス慢性病ニハ亂刺及沃度劑ヲ使用ス沃度加里(五—
一五、〇)ヲ一拉篤ノ水ニ混シ六日間與フ)深キ亂刺及沃度丁幾注入ハ往々奏効ス特
蔓延シ或ハ舌根ニ限局スルキニ然リ舌端及中央部ニ病局スルキハ充分ノ切開ヲナ
ニスヲ得ルヲ以テ治療シ易シ沃度丁幾ノ塗布ヲ實用スルモノアリ近年諸家ハ沃度
沃度丁幾ノ合劑ノ塗布及沃度加里内服ヲ用フ

〇齦炎 *Gingivitis*

齒石ヲ除去シ患齒ヲ拔去ス拔齒ハ容易ナリ大動物ニハ特別ノ拔齒針子(ギユンタ
一氏)ヲ用ヘ小動物ニハ人醫用ノ者ヲ代用ス拔取後ハ日々「クレオリン」硼酸水、
明礬水、過滿俺酸加里液ニテ齒槽ヲ洗滌シ潰瘍面ニハ蘆薈丁幾及沒藥丁幾ノ合劑
ヲ塗布シ齒窩ニハ消毒液(苦麗曹篤液)ヲ綿ニ浸シテ填塞ス可シ

〇流涎 *Phylism.*

流涎ハ種々ノ疾病(口炎、嚙下困難、狂大病、產孽麻痺、腦病、中毒症等)ノ一症候ト
シテ現ハル故ニ其原病ヲ治療ス可シ流涎ヲ止ムルニハ亞篤魯必涅「ビヨスチン」ヲ
牛馬ニハ〇、〇一—〇、〇二犬ニハ〇、〇〇一—〇、〇〇二ノ皮下注射ヲ宜シトス
(四一二)鹽酸亞篤魯必涅〇、二甘草末甘草羔各適量爲二十九丸毎日一二丸宛與フ(犬)

〇齒換不正 *unregelmässigkeiten in zahnwchsel* (獨)

馬ニ時々目撃ス特ニ隅齒ニ多シギユンター氏拔齒針子ヲ以テ乳齒ヲ拔取ス可シ
(乳齒ハ前方ニ永久齒ハ後方ニ占位ス)柔軟ノ飼料ヲ給與ス

〇齒磨不正 *unregelmässigkeiten in der Abreibung*

der zahne (獨)

動物ハ起立ノ儘開口器ニテ口ヲ開キ齒砲ニテ齒ノ銳突角ヲ擊碎シ或ハ鑿及ヒ槌ヲ
用フ銳角ヲ擊破スレハ齒齧ヲ以テ齒縁ヲ鏝削シ平滑トナス可シ施術中軟部ヲ損傷
セサル様注意スヘシ

〇齲齒 *Caries dentium.*

適當ノ時期ニ於テ齲齒ヲ拔取スヘシ此際注意シテ脆弱ノ齒冠ヲ破碎スルコトナキヲ
要ス拔齒針子ヲ過度ニ螺緊セス注意周到ニ用フ可シ化膿性齒槽炎ヲ起シ或ハ齒ノ
斷裂シタル場合ニハギユンター氏齒針子ヲ用フ

〇裂齒及碎齒 *Spaltung und versplitterung der zahne.*(獨)

裂齒及碎齒ハ拔除スルヲ困難ナラス細碎セル者ハ齒鉗子ニテ除去スヘシ此目的ニハギエンター氏ノ嚙形鉗子ヲ宜シトス

○齒石 *Pentrusdentis*

鈍外科刀或ハ類似ノ器械ニテ齒齦及齒槽ヲ損セサル様撞破スヘシ沈澱物ヲ去リ齒面ヲ露ハス大ハ輕石ニテ齒ヲ磨ク可シ齒齦ニ疾患アレハ之レヲ醫シ齒力弛緩スレハ速カニ拔除ス

○齒槽骨膜炎 *Periostitis alveolaris*

齦炎ノ療法ヲ見ヨ

○齒瘻 *Fistula dentalis*

瘻管ノ切開銳匙ニテ削除烙鐵ニテ燒烙或ハ腐蝕藥格魯兒亞鉛(一、二一〇)ニテ腐蝕スル等外科的療法ニ從フ某氏ハ瘻管ニ乳酸ノ注入ヲ實用ス齒槽ニ疾患アレハ齒ヲ拔取スレハ自然ニ瘻管癒ユ治療ヲ助クル爲メ日々齒槽ヲ消毒液ニテ浸シタル麻織子ニテ洗滌スヘシ又瘻管ニ沒藥丁幾蘆膏丁幾ノ合劑ヲ注入ス

○齦腫瘍

腫瘍ハ切除ス可シ但シ位置ニヨリ手術ニ困難ナリ施術ハ疼痛甚タシキカ故ニ全身迷朦ヲ用ヒ外科刀或ハ銳匙ヲ以テ出來得ル限り腫瘍ヲ切除削除ス可シ或ハ白熾烙鐵ニテ燒烙スヘシバクエリン氏燒烙裝置ヲ用フルヲ便トス

第二分類 唾腺諸病

○耳下腺炎 *Parotitis*

耳下腺炎ニハ決シテ冷湯ヲ用ヘス溫巴布或ハプリースニツツ氏罨法ヲ用フ温ハ分解及化膿ヲ催進ス又解凝軟膏樟腦擦劑沃度加里軟膏莖膏軟膏ヲ塗擦ス化膿シテ波動明了トナレハ切開ス呼吸困難ノ徵アレハ氣管切開術ヲ施ス切開ノ際ニハ神經血管ヲ損傷セサル様注意スヘシ可成局所ノ神經及ヒ血管ト並行シテ切開シ膿瘍中ニアル膿汁ハ壓迫シテ充分排出セシム排膿後ハ石炭酸昇汞水ニテ洗滌ス或ハ格魯兒亞鉛(一、〇%)ニテ腐蝕洗滌ス牛ノ放線菌腫ニ在テハ沃度加里(日量五瓦)ヲ與ヘ或ハ屠殺シテ肉ヲ利用ス屠殺ノ價ナキ者ニハ耳下腺摘出術ヲ行フ(唾腺腫瘍ヲ見ヨ)處方

(四一三)水銀軟膏軟石鹼各二五、〇爲軟膏一日二回塗擦

(四一四)沃度加里七、五水銀軟膏五〇、〇爲軟膏局所塗擦

(四一五)石炭酸三、〇緩和軟膏三〇、〇爲軟膏局所塗擦

(四一六)沃度丁幾五〇、〇偈里設林二五、〇爲軟膏朝夕二回塗擦(腺硬化)

(四一七)沃度加里鹼水各三、〇豚脂五、〇刺納林二〇、〇爲解凝軟膏

○唾石 *Calculus salivaria*

結石ノ外科的摘出ヲ要ス小結石ハ時トノ排泄口ヨリ排出セララル、コアルモ必要ニ

應シテ多少切開ヲ要ス大結石ハ毎時唾液輸送管ヲ切口ス切開口ハ横斷ヲ縱斷ヨリ勝レリトス之レ治癒速力ニシテ且ツ唾瘻ヲ遺サズレハナリ創ハ適當ノ外科的治療ヲ施シ術後二十四―四十八時間ハ絶食スベ―ヤー氏ハ馬ニ於テ縱切開口ヲ設ケ結石摘出後縫合ヲ施セシニ第一期癒合ニテ治癒セリ

○唾瘻 *Fistula salivaria.*

腐蝕藥例之熔製硝酸銀硝酸濃厚石炭酸或ハ白熾熱鐵ニテ瘻管ヲ腐蝕ス痂皮ハ唾液ノ排泄ヲ妨ケ肉芽發生シ癢痕ヲ形成スル迄疏通セス一回シテ奏効ナケレハ反復ス治癒後ト雖モ唾液排泄ヲ常態ニ服スル事困難ナリ時トシテ瘻管ト唾液排泄口トノ癒着ヲ發スレハ探子ヲ以テ開通ス開通後ハ瘻管壁ヲ腐蝕藥烙鐵ニテ腐蝕ス次テ起ル炎症性腫脹ハ再ヒ閉塞(排泄管ノ)ヲ來ス諸家ハ瘻管縫合法ヲ賞用ス其法鑷針ニ糸ヲ通シ皮膚ヲ貫キテ針ヲ挿入シ瘻管口ヲ縫口閉鎖スルニアリ、○唾液ノ口腔内ニ排泄セサルキハ人工排泄口ヲ設クストツクフリース氏ハ排泄管ヲ瘻管ノ後口ニ設ケ套管針ヲ以テ斜メニ頰ニ穿口ス其他種々ノ方アルモ根治療法ハ困難ナリ最後ニハ次ノ三法ヲ試用スヘシ(一)排泄管ノ結紮、瘻管ノ上部ニ於テ排泄管ヲ結紮ス廿四乃至四十八時間斷食シテ爾後液狀飼料ヲ與フ結紮後唾液ハ貯溜シテ腫瘍狀ヲナス唾腺ハ漸次萎縮ス結紮ニハ可成強靱ノ糸ヲ用フ(二)唾液排泄管ノ切斷ハ諸家ノ實驗ニヨレハ良効アリ(三)唾腺ニ強刺戟藥注入 例之苛性安母尼亞液一〇―一五、○其後沃度丁幾苦麗阿曹篤硝酸銀等ヲ用ヘバツシ氏ハ亞爾簡保兒三〇、○注入シ

ラパート氏ハ沃度丁幾二〇―四〇、○沃度加里一、○水六〇、○ノ合劑ヲアラモツト氏ハ沃度丁幾五〇、○ベルゲロン氏ハ乳酸二〇%液ヲ注入ス濃厚沃度丁幾ノ注入ハ烈シキ炎症ヲ起シ時トシテ壞疽ニ陥ルコトアリ

○唾腺損傷 *Verletzung der Speicheldrüsen(獨)*

唾腺中耳下腺及其排泄管ステノニアン氏管最も損傷ヲ受ケ易シ通常全治スルト雖モ時トシテ唾瘻ヲ遺スノ虞アルニヨリ損創部ハ止血消毒ノ後縫合シ二十四乃至四十八時間絶食セシメ且ツ少量ノ亞篤魯必涅ヲ皮下注射シ唾液ノ分泌ヲ制減ス可シ其他ハ創傷療法ノ原則ニヨル

○唾腺腫瘍

小腫瘍ニシテ限局性ノ者ハ外科刀ニテ切除或ハ鋏切ス適當ナル幫助ニヨリ唾瘻ヲ避クルコトヲ得大腫瘍ニシテ散蔓セル者ハ全腺ノ摘出ヲ要ス耳下腺ノ摘出ハ困難ノ手術ニアラスト雖モ周圍ニ血管及神經多存スルヲ以テ注意ヲ要ス本手術ハ呼吸困難ノ場合屠殺スル能ハサル時或ハ高貴ノ動物ニ行フ先ツ消毒法ヲ嚴行シ腺ノ上縁ヨリ下縁迄縱切皮ヲナシ唾腺ト皮膚ト癒着スルキハ之レヲ切離ス皮下隱膜ヲ切り耳下腺ヲ現ハシ先ツ下縁ヨリ腺ヲ切離シ頸動脈露出スレハ之レニ糸ヲ掛ケ或ハ結紮ス二三ノ止血鑷子ヲ用意シ血管ヲ嵌壓止血ス回歸神經ヲ損傷セサル様注意スヘシ鈍刃外科刀或ハ剪刀ヲ以テ(手指ト共ニ)腺ヲ除々ニ離ス海綿或ハ布片ヲ以テ出

血液ヲ拭除シツ、施術セハ危險ナク腺ヲ摘出スルヲ得創面ハ消毒液ニテ洗滌シ沃度仿謨ヲ撒布シ「ユーテ」或ハ麻織子ヲ抵シ包攝ス二十四乃至十八時ヲ經テ包攝ヲ去リテ洗滌消毒シ沃度仿謨丹寧ヲ撒布シ開放創傷療法ヲ行フ三乃至四週ニシテ癒ユ或ハ結紮縫合ヲ施シ創底ニハ消毒麻織子ヲ挿入シ創液ヲ吸收セシメ皮膚ハ創液ノ排泄ニ便ナル丈ク切開シ必要ニ應シテ排膿管ヲ裝ス翌日創面濕潤セハ消毒綿ニテ拭除シ沃度仿謨丹寧(一三三)ヲ撒布ス乾燥痂皮ヲ形成シテ治癒ス

第三分類 咽喉諸病

○咽喉炎 Pharyngitis

流行性ナルキハ豫防法トシ病獸隔離ヲ行フ攝生療法トシ既溫調節換氣ニ注意シ馬體ノ溫包易消化飼料ノ給與患畜ニハ青草柔軟芻質ノ乾草粉粥穀粥等ヲ與ヘ燕麥切菓等ヲ與フ可カラス清涼ノ飲水ヲ給ス唇及鼻口周圍ニ附着セル粘液ハ拭除シ隔木厩房ハ清潔ニシ冷水ヲ以テ屢々口内ヲ洗滌ス(醋、食鹽格魯兒酸加里液ヲ用フ)急性膚列處蒙ニテ劇痛アレハ初期ハ冷湯氷囊ヲ用ヘ次テ化膿ヲ始メ或ハ炎症腫脹輕ケレハプリースニツツ氏罨法ヲ行フ特ニ石炭酸濕溫罨法ヲ宜シトス腫脹淋沔腺ニハ水銀軟膏ヲ塗布ス強刺戟藥(芥子、揮發擦劑、堯菁古管胃謨、堯菁軟膏)ノ應用ハ注意ヲ要ス必竟化膿ヲ催進スルノ目的ニシテ溫濕罨法ノ勝レルニ之カス唯限局性淋沔腺腫脹ニテ迅速ニ化膿ヲ催ス爲メニ用フ反之蔓延性腫脹ニ塗布スレハ劇性ノ

所炎症ヲ起シ腫脹増大シ呼吸困難ヲ來シ組織ノ壞疽ヲ來スノ恐レアリ○膿瘍ヲ發スルハ速カニ切開ス可シ切開後消毒手指ヲ瘡内ニ挿入シ敗壞組織ヲ排除シ後消毒洗滌ス吸入法トシ水蒸氣石炭酸「クレオリン」蒸氣ヲ用フ局所收斂藥ノ應用ハ効アリカイゲル氏ハ鼻孔ヨリ護謨管ヲ咽喉内ニ挿入シテ半%ノ食鹽液千倍ノ昇永水ノ合劑四〇、一六〇、〇ヲ注入シテイカーホツフ氏ハ咽喉内注射ヲ賞用ス即チ硝酸銀溶液(〇、五%)明礬液(〇、五%)乳酸液(一%)及ルーゴー氏液ノ如シ内服藥ハ丸劑及飲劑ヲ禁ス砒劑モ可成避クベシ便秘ニハ石鹼灌腸高熱アレハ頻々冷水灌腸軀幹ニ冷濕布ヲ纏フ安知必林(一〇、〇—二〇、〇等分ノ水)ノ皮下注入敗血熱ニハ樟腦精(一〇、〇—二〇、〇)ヲ數回皮下注便秘ニハ越攝林ノ皮下注ヲ用フ鹽酸必魯加兒必涅及「アレコリン」ヲ用フ可カラス飲水ニ沃度加里炭酸加里(三〇、〇)或ハ格魯兒酸加里ヲ混用ス嚙下シ得ルキハ軟砒劑ヲ與フ例之炭酸加里三〇、〇甘草末一〇〇、〇或ハ甘汞一—二、〇ヲ一日三回舌上撒布窒息ノ徵アレハ氣管切開術ヲ行フ○豕ニハ麥粉濃粉ノ粥液汁青草ヲ與フ初期ニハ吐劑ヲ投ス例之白藜蘆根(〇、五—一、〇)吐根末(一—三、〇)ヲ食餌ニ混與或ハ吐酒石(〇、五—一、五二回分服)輕便ナルハ物刺篤利涅ノ(〇、〇—二—〇、〇三)皮下注射犬ニハ吐劑トシ亞剎莫兒比涅ハ最良ノ吐劑ナルモ豕ニハ無効ナリ嚙下困難ニシテ治療効ヲ奏セサルモノハ速カニ屠殺ス咽頭部ニ強刺戟藥例之堯菁軟膏的列並底油安母尼亞擦劑各五〇、〇巴豆油三十滴ノ合劑ヲ塗布スルヲアリ便秘アレハ脂肪ヲ食ハシメ石鹼灌腸ヲ施ス○犬ニハ咽

喉部ニ温巴布ヲ施シ腺ノ腫脹ニハ樟腦軟膏(一ニ一〇—二〇)水銀軟膏又ハ沃度仿
膜軟膏ヲ塗擦シ收斂藥液(石灰水、硝酸銀水〇、五%丹寧明礬溶液一—二%)ヲ咽頭
粘膜ニ塗布シ内服ニハ重曹次蒼酸蒼鉛ノ類ヲ與ヘ專ラ牛乳ヲ飲マシム
傳染性咽頭炎ニハ氣管切開術ヲ施シ日々ルーゴー氏液ヲ開口ヨリ咽頭ニ注入ス可
シ或ハ次硝酸蒼鉛液ヲ用フ

處方
(四一八)沃度〇、五沃度加里二、五溜水一〇〇、〇爲溶液注入用
(四一九)次硝酸蒼鉛五、〇餾水一〇〇、〇右全

○咽頭異物

○咽頭損傷

○咽頭腫瘍

以上三症ハ食道病ノ條下ニ共述ス

第四分類 食道諸病

○食道炎 *Oesophagitis*

屢々氷片ヲ與ヘ清涼綫和ノ滋養物ヲ給シ收斂劑溶液(丹寧硝酸銀格魯兒酸加里)ヲ
投ス可シ頸部ノ刺擊擦劑ハ無効ナリ狹窄ノ虞アルルハ食道探子ヲ挿入ス

○食道痙攣(痙噎) *Oesophago Spasmus (Dysphagia spastica)*

臭素加里呀囉仿謨莫兒比涅等ヲ用フ其他傳染病ノ經過中(狂犬病、強直症)及癱瘓
僵梗等ノ際ニ發スル食道痙攣ハ對症療法ヲ施スニ過キス

○食道麻痺(痺噎) *Paralysis aeiophagi.*

屢々食道探子ヲ施シ食道經路ニ刺擊擦劑ヲ塗布シ亢奮藥斯篤利幾尼涅沕刺篤里涅
ノ皮下注射並ニ電氣療法ヲ試ムヘシ罕ニハ自然ニ治癒ス

○食道擴張 *Ectasia aeiophagi.*

治療多クハ効ナシ頻次流動又ハ半流動ノ滋養物少量ヲ分與ス可シ食物停滯スレハ
按摩シテ除去シ又ハ探子ヲ挿入スルニ過キ息室ヲ生スレハ粘膜ノ縫合或ハ息室
切除ニヨリ治スルコトアリ本症ニアリテハ卒然呼吸困難ヲ來スコトアルヲ以テ豫メ氣
管切開術ノ準備ヲ怠ル可カラズ

○食道狹窄 *Oesophagostenosis*

屢々食道探子ヲ挿入シテ擴張ヲ試ミ且ツ食塊ノ停滯ヲ防グ牛ニアリテハ鼓腸症ノ
際壓迫狹窄ヲ來ス人醫ニ於テ施スカ如キ強靱探子挿入ニヨリ徐々ニ擴張スル施術
ハ家畜ニハ行ヒ難シ食餌ノ攝生ハ擴張ニ同シ異物嵌留スルルハ「アレコリン」或ハ
必魯加里必涅ノ皮下注射ヲ試ム可シ

○食道裂 Ruptura aesophagi

胸部食道裂ハ治ス可カラス頸部ノ食道破裂ハ往々手術ニヨリテ救助スルヲ得

○食道異物(食道梗塞)

馬 斷食シ時ニ食ヲ與ヘテ嚥下ノ有無ヲ檢シ嚥下シ得レハ新鮮ノ水ヲ與フ食道上部ノ異物ハ手ヲ挿入シテ直接ニ除去ル可シインメルマン氏ハ鹽酸必魯加必涅ヲ皮下注射シ唾液分泌ヲ旺盛ニシ胃物ヲ除去セシメタリシト雖モ本藥ハ此際往々異物性肺炎ヲ起スノ恐レアルニヨリ用量ニ注意ヲ要ス馬ニアリテハ牛ノ如ク食道探子ヲ用フルヲ容易ナラス往々粘膜ノ負傷ヲ來シ或ハ探子ニヨリ異物ヲ壓迫硬固ナラシムルノ弊アリ二十四時乃至四十八時ヲ經過セハ自然降下スルヲ往々アリ又油劑ヲ投シ異物ヲ按摩シ偶然嚥下セシムルアリ

牛 牛ニハ屢々本症ヲ發ス異物除去ニ種々ノ方法アリ(一)異物逆進法 術者ハ動物ノ左側ニ立チ右手ヲ動物ノ頸ヲ超ヘテ右側ニ伸ハシ左右兩側ヨリ異物ヲ探リテ之ヲ壓迫シ上方ニ按ミ上ク可シ食塊逆進ノ食道頭ニ達スレハ動物ハ不穩トナリ頭ヲ伸長ス此瞬間ニ於テ頭ヲ自由ニシ兩手ヲ以テ強キ壓迫ヲ異物ニ與フレハ異物ハ逆進ス一回ニ足ラサレハ反復ス可シ異物ハ喉頭ヨリ手ヲ以テ自由ニ口内ニ達セシムルヲ得可シ(二)異物細碎法 兩手ヲ以テ強力ノ壓迫ヲ加フ馬鈴薯塊、丸藥、乾草塊等ハ細碎移動ノ胃ニ達ス又異物ノ一方ニ木板ヲ置キ木槌ヲ以テ異物ヲ

打碎ス此際食道粘膜ヲ損傷セサルニ注意ス可シ(三)異物胃内壓送法 滑澤ナル面ヲ有スル異物或ハ柔軟ナル異物ハ食道探子ヲ挿入シテ異物ヲ徐々ニ胃内ニ壓入ス牛馬ニハモンローイ氏ノ食道探子之レニ適ス此法ハ尖銳物(魚骨)ニハ行ハス(四)異物摘出法、特別ノ食道鉗子(デルボース氏ヘルトウヒ氏)アリテ之レヲ食道内ニ挿入シ異物ヲ鉗取シテ摘出ス(メラ一氏ノ外科書ヲ見ヨ)(五)食道切開術 最終ノ手段トシテ尖銳物軀ノ内或ハ前四法ヲ施スモ無効ナル内ハ食道ヲ切開シテ異物ヲ除去ス食道ヲ切開スルニ決シテ異物ノ上部ヲ切開ス可カラス必ス其下部ニ於テスベシ(手術簿ヲ見ヨ)

前諸法ヲ施スモ効ナク異物胸部ニ嵌留シタル内ハ粘汁油劑ヲ投シテ異物ノ嚥下ヲ試ム但シ飲用ニ注意シ異物性肺炎ヲ發セサル様投藥スベシ必要ニ應シテ亞剝莫兒必涅ノ皮下注射ヲ行ヒ異物ノ吐出ヲ試ムミヒヤルスキー氏ハ牡牛ニ物刺篤林(○、一酒精一〇、〇)ヲ注射シ長効ヲ得タリ

○食道損傷

豫防法トシテ齒科器械食道探子ノ使用ヲ謹ミ尖銳丸劑ヲ禁ス膿腸頸部ニ發スレハ適當ノ時期ニ注意シテ切開ス可シ切開後ハ内容物ノ排泄唾液及炎症滲出物ノ流利ヲ好クスヘシ食道瘻ヲ發スレハ治癒困難ナリ然ル内ハ昇永線烙ヲ瘻管内ニ挿入シ或ハ瘻管ヲ擴張ス奏効ハ毎時確實ナラス或ハ瘻管ヲ擴張シテ食道ニ開口スル部分ヲ縫合スルノ法ヲ試ム可シ

○食道腫瘍(咽頭腫瘍)

腫瘍ハ摘出ス思畜ヲ横臥保定シ頸ヲ伸長シテ喉頭ノ下部ニ於テ中央ニ縱切ヲナシ手ヲ挿入シテ結締織ヲ破切シ腫瘍ニ達スレハ之レヲ裂除ス可シ或ハ「エクラソール」ヲ使用ス内服ニハ沃度加里ヲ試ム

第五分類 胃腸諸病

○異嗜 *Pica*

原因ヲ探究スルヲ必要トス通常食物ノ異常ニヨリテ發ス故ニ豫防法トシテ食物ヲ變化シ牧場ヲ改良シ人造肥料特ニ硝酸曹達(知利硝石)ヲ用フ本病ノ流行スル土地ヨリ飼料ヲ輸入セス病畜ハ又本病ノ免病地ニ移ス可シ此事實行シ能ハサレハ石灰分ニ富メル食物飲料(石灰加里食鹽ヲ混ス)ヲ與フ消化ヲ助クル爲メ鹽酸食鹽苦味芳香藥ヲ與ヘ或ハ石灰水炭酸麻偏涅失重曹ヲ用フ骨病アレハ燐酸石灰ヲ與フ又吐劑ヲ試ムフエゼル氏ハ鹽酸亞剝莫兒比涅(〇、一)ヲ特效藥トシ三日間皮下注射ニ連用ス諸氏ノ實驗ニヨレハ本藥ハ良効アリ
(馬)ノ異嗜ニアリテハ牧場ヲ改良シ食鹽及燐酸加里ヲ與フ又爹兒石炭酸「クレオリン水」木醋臭性獸油等ノ如キ惡味ノ藥品ヲ與ヘ亞剝莫兒比涅ノ皮下注(〇、〇五)一〇、二ヲ試用ス(豕)ニハ飼料ノ變換骨粉ノ與投吐劑(吐酒石、吐根湯刺篤利涅)等ヲ用フ牝豕カ豚兒ヲ啖ヒ母牛カ胞衣ヲ食フハ眞ノ舐病ニアラス此際ニハ母

獸ニ吐酒石白藜蘆各〇、五ヲ與ヒ暫時ニシテ能ク幼獸ヲシテ哺乳セシメ又甘黍ヲ投シ青草ヲ與フヘシ

羊ノ食毛病 先ツ食物ノ品質ニ注意シ食物ヲ一變シ務テ滋養ノ食ヲ給ス可シ或ハ放牧スルモ可ナリ産後第三週日ヲ經レハ兒羊ハ母羊ヨリ隔離シ日々數回母ニ就キ哺乳セシム模倣ヲ始ムル者ハ隔離シ食鹽重曹苦味藥ヲ與フ近年鹽酸亞剝莫兒比涅(〇、一)一〇、二ヲ特效藥トシ賞用ス
鳥類羽毛投去、亞剝莫兒比涅(〇、〇五)水一〇〇、〇)ヲ飲水ニ混シテ服用セメ食物ヲ一變スヘシ

處方

- (四二〇) 炭酸石灰一〇〇、〇 食鹽三〇〇、〇 泥菖根七五、〇 混和粉末トナシ朝夕二回一食題宛飲水ニ混シテ與フ
- (四二一) 鹽酸亞剝莫兒比涅一、〇 餽水一〇〇、〇 爲溶液一日二回十瓦宛二頭ノ牛ニ二日間注射ス
- (四二二) 食鹽五〇〇、〇 龍膽根末一〇〇、〇 杜松子末二五〇、〇 爲散劑每食餌ニ一食匙宛混與ス(牛)
- (四二三) 人工加兒爾斯泉鹽茴香末各二五〇、〇 爲散劑每食一握手宛與フ(牛)
- (四二四) 食鹽五〇〇、〇 炭酸石灰一〇〇、〇 葛縷子二〇〇、〇 每食一匙宛
- (四二五) 食鹽五〇〇、〇 著草二五〇、〇 爲散劑一日一回一匙宛飼料ニ混與(羊)

(四二六)食鹽五〇〇、○炭酸石灰一〇〇、○杜松子二五〇、○爲散劑一匙宛一握手ノ細碎燕麥ニ混シテ與フ(羊)

○急性胃腸加答兒 *Gastroenteritis Catarrhalis acuta*

馬ノ急性胃腸加答兒

(豫防法)飼養管理ニ注意シ凡テ刺撃性不消化粗硬ノ飼料ヲ避ケ少量ノ食ヲ與フ可シ過食ノ場合ニハ暫時絶食セシム獸体ヲ温包シ日々摩擦シ一二回宛舍外ニ牽出シ運動セシム(内服藥)ハ病狀ニヨリテ異ナル○(一)過食症 芒硝吐酒石例之吐酒石六、○芒硝三〇〇、○蜀葵末及水適量ヲ舐劑トナシ内服甘汞ノ少量(二、五—三、〇)硫酸越攝林(〇、〇八一〇、一)ヲ餽水一〇、〇ニ溶解シテ皮下注射シ或ハ「アレコリン」(〇、〇五ヲ餽水一〇、〇ニ溶解シ皮下注)但シ非常ノ過食ニハ用ヘス○(二)酸酵異常症 ニハ食後一二時ヲ經テ稀鹽酸(一〇、一—一五、〇)食鹽(二〇、一—三〇、〇)重曹(二五—五〇、〇)ヲ散劑トナシ又ハ食物ニ混用ス胃中ノ食物酸敗セハ次亞硫酸曹達(二五〇、〇)白藜根末二五、○蜀葵末及水適量ヲ三回二分與ス「クレオリン」五—一〇、○甘草末二五、○蜀葵末及水適量三丸トナシ一日一丸ヲ與フ○(三)消化力微弱 ニハ稀鹽酸白布聖(一〇、一—一五、〇)又食鹽(一〇〇、〇)芒硝(三〇〇、〇)礪砂(五〇、〇)ヲ散劑トナシ每食一食匙ヲ與フ或ハ大黃根末一五、〇重曹甘草各一〇、○蜀葵末水適量ヲ舐劑トナシ一二回二分與ス又蘆薈越

幾斯五〇、○ヲ丸劑トナシ頓服其他亞爾薩亞泥子茴香等ヲ應用ス○(四)下痢初期屢々下痢シ後ニ到リテ反復惡臭ノ糞少量ヲ瀉下スルキハ少量ノ甘汞(二—三、〇)ヲ用ラ冷水ヲ禁シ乾食(炒麥大麥粥、亞麻仁煎等)ヲ給シ腹部ヲ温包シ下痢尙止マサレハ亞片劑ヲ用フ即チ阿片末五—一五、○ヲ丸劑トナシ或ハ單方阿片丁幾五〇、○乃至一五〇、○ヲ粘汁ニ和シテ頓服セシム或ル場合ニハ阿片丁幾ニ番木鱈丁幾ヲ伍シ其量五、〇—一〇、○下痢尙ホ止マサレハ收斂劑ヲ用フ例之糊皮末又ハ規那皮末五〇、○ヲ炭酸加里重曹ニ混シ舐劑トナス或ハ硫酸鐵明礬二〇、○單寧一〇、○又ハ鉛糖五、○テ亞麻仁煎ニ混ス最後ニハ硝酸銀〇、五—一、〇ヲ礬土ニ和シ又ハ餾水ニ溶解ス糞ノ酸臭ヲ帶フルキハ重曹又ハ炭酸加里ヲ川フ(日量三〇、〇)○(五)直腸ノ加答兒ニ於テハ澱粉又ハ收斂藥ノ灌腸ヲ施ス例之明礬丹寧硝酸銀等ノ如シ近時「タンノフォルム」ヲ實用ストラスボー氏ハ樟腦阿魏各一〇、○ヲ卵黃二三個ニ混シ之ニ一粒篤ノ米泔汁ヲ加ヘ乳劑トナシ一日二回此量ヲ反復ス○秘結ヲ發スレハ下劑及灌腸ヲ用フ

處方

- (四二七)大黃根末一五、○重曹四五、○蜀葵末六〇、○爲丸劑頓服
- (四二八)甘汞二、五糊皮末甘草根末各二〇、○爲丸劑頓服
- (四二九)重曹一〇〇、○芒硝七五、○龍膽末一五〇、○麵粉及水適量爲舐劑三日間ニ

分服

- (四三〇) 蕪香越幾斯二〇、〇芒硝一五〇、〇蜀葵末適量爲丸劑頓服(秘結)
- (四三一) 食鹽一五〇、〇重曹七五、〇亞爾蘇五〇、〇爲散劑每食一食匙宛混與ス
- (四三二) 鹽酸一〇、〇水二〇、〇飲水ニ混シ二回分服
- (四三三) 粗製食鹽二五〇、〇葛縷子末五〇、〇爲散劑每飼料ニ一食匙混與
- (四三四) 重曹食鹽各一〇〇、〇杜松子末五〇、〇爲散劑每飼料ニ一食匙混與
- (四三五) 炭酸麻偏矢亞過泥子各一五〇、〇食鹽五〇、〇混和二回分服
- (四三六) 苦麗阿林五〇、〇甘草末一〇、〇甘草越幾斯黃蠟各適量加水十丸トナシ每日一丸宛ヲ與フ
- (四三七) 白堊食鹽各一五〇、〇龍膽末過泥子各五〇、〇爲砥劑每飼料中ニ一食宛混與
- (四三八) 食鹽二〇〇、〇芒硝一〇〇、〇重曹五〇、〇葛縷子一五〇、〇朝夕二回一食匙宛飼料ニ混與ス
- (四三九) 甘汞二、〇四、〇阿片末一〇、〇蜀葵末二五、〇丸劑トナシ頓服(下痢)
- (四四〇) 蓖麻子油一五〇、〇亞刺毘亞護謨三〇、〇水六〇〇、〇乳劑トナシ駒下痢ノ初期ニ用フ
- (四四一) 重曹大黃二五、〇希臘布過泥子一〇〇、〇水ニテ爲砥劑一日三四回宛二日二分與ス

牛ノ急性胃腸加答兒

病初ハ絶食次テ減食少量ノ易消化物青草良乾草食鹽ヲ加ヘタル飲水牛牀摩擦左腹側按擠便秘アレハ直腸ニ手ヲ挿入シテ排除石鹼水、食鹽水、偏里設林灌腸ヲ施ス内服ハ稀鹽酸(二〇、〇)ヲ四合ノ水ニ混シ日々二三回服用)便秘アレハ亞麻仁半磅ヲ水一升五合ニ煎出シ之ニ半磅ノ芒硝ヲ溶解シ三分シテ三時關毎ニ其一分ヲ與フ又芒硝ヲ龍膽根煎若クハ葛縷子浸ニ和シテ與フ第一胃ノ運動弛緩シテ食慾反芻共ニ振ハサレハ吐酒石(八、〇)白藜蘆根白藜蘆丁幾(一〇、〇)一〇、〇)勿刺篤利涅(〇、一)〇、一五酒精五、〇ニ溶解シ皮下注)或ハ「クレオリン」(一〇、〇)ニ射シ反應ナケレハ五六時ヲ經テ更ニ注射ス)又ブラヴァー氏注射器ニテ第一胃中ニ此藥液ヲ注入スルモ可ナリ鹽酸必魯加兒必涅ハ用ヘサルヲ良トスエベル氏ハ酒石酸越攝林ヲ當用ス「アレコリン」(〇、〇五)皮下注射モ亦試ムヘシ最後ノ療法ハ食道探子ヲ挿入シ或ハ穿胃術ヲ施シ瓦斯ヲ排出スルニアリ

處方

- (四四二) 吐酒石八、〇白藜蘆根末一〇、〇一〇、〇甘草末五〇、〇蜀葵及水適量ニテ砥劑トナシ與フ
- (四四三) 稀鹽酸一五〇、〇一拉篤ノ薄荷煎ニ混シ二日間ニ五回二分與ス
- (四四四) 白藜根吐酒石各一五、〇硫酸麻偏涅矢亞一五〇、〇泥葛根七五、〇爲粉末

三分シ一日間ニ亞麻仁煎ニ混シ内服

(四四五)芒硝五〇〇、〇亞爾薛七五、〇食鹽一〇〇、〇煙草煎汁ニ混シ二回分服

(四四六)芒硝二五〇、〇蘆薈越幾斯三〇、〇蜀葵末二〇、〇微溫湯ニ混シ二回二分

與ス

(四四七)薄荷煎六〇、〇二一〇〇〇、〇稀鹽酸六〇、〇龍膽丁幾九〇、〇一日二回宛

二日二分服

(四四八)稀鹽酸五〇、〇苦味丁幾四〇、〇水二〇〇、〇二日間二分服

(四四九)食鹽三〇〇、〇甘草末亞麻仁淨各一〇〇、〇每食一食匙宛混與

(四五〇)吐酒石五一一〇、〇蜀葵末二五、〇爲散劑一瓶ノ水ニ振盪合劑トシテ與

(四五一)人工加兒爾斯泉鹽三〇〇、〇杜松子一〇〇、〇爲散劑一日二回一食匙宛飼

料ニ混與ス

(四五二)甘草二、〇一四、〇芒硝五〇、〇甘草末二五、〇水ニテ爲砥劑頓服

(四五三)重曹二〇、〇大黃末五、〇爲一包一瓶ノ加密爾列浸ニ加ヘ與フ(犢)

幼獸ノ急性胃腸加答兒 下痢ヲ主徵トス腹部ヲ溫包シ微溫收斂灌腸ヲ行フ明礬或

ハ丹寧ヲ加ヘ〇、五一一%液トナシ灌腸ス其他母獸ノ攝生食物ニ注意シ乳汁異常

ヲ來ス可キ諸感作ヲ除去ス

○慢性胃腸加答兒

Gastro-enteritis Catarrhalis

chronica.

馬ノ慢性胃腸加答兒

飼料ヲ改良シ變敗不消化ノ食物其他ノ有害物ヲ避ケ數次消化シ易キ良美ノ食少量
ヲ分給ス管理及使役ヲ適當ニシ齒磨不正ナルモノハ矯正シ老獸ニハ碎麥ヲ與フ可
シ藥物ハ鹽酸(一〇一一五、〇)亞爾加里鹽類(食鹽重曹、芒硝、硫麻、人工加兒爾
斯泉鹽)或ハ健胃劑(大黃、白蘆根、龍膽末乾薑蘆薈越幾斯)或ハ百布聖(五一
〇、〇)亞刺莫兒比涅(〇、〇五一一〇、二)便秘ニハ芒硝蘆薈(二〇一一五、〇)備
里設林(五一〇、〇)灌腸ト痢ニハ阿片劑收斂制腐藥就中阿片ヲ宜シトス灌腸
ニハ收斂藥又ハ澱粉ヲ用ヘ糞便惡臭ヲ放テハ苦麗阿林(日量一〇、〇)ノ内用ヲ試
ム

處方

(四五四)芒硝一〇〇、〇食鹽五〇、〇重曹一〇、〇爲粉末每食二五一五〇、〇ヲ與

フ

(四五五)炭酸麻偏涅矢亞二〇、〇食鹽一〇〇、〇龍膽末七五、〇粉末トナシ每食一

食匙ヲ混與ス

(四五六)亞砒酸〇、五食鹽一五、〇泥根舊二〇、〇麵粉適量丸劑五個トナシ一日一

丸宛與フ

(四五七)泥舊根末五〇、〇食鹽二五〇、〇重曹一〇〇、〇爲散劑每食餌一食匙宛

(四五八)龍膽末五〇、〇葛縷子一〇〇、〇食鹽二五、〇爲散劑每食一食匙(一茶匙)

ヲ加ヘ馬(駒)ニ與フ

(四五九)粗製食鹽二五〇、〇重炭加里一〇〇、〇鐵粉一〇、〇爲散劑每飼料中ニ一食匙ヲ與フ

(四六〇)阿片末一〇、〇蜀葵末二五、〇水ヲ加ヘ爲丸劑與フ(下痢)

(四六一)阿片末八、〇甘汞二、〇蜀葵末亞刺毘亞護謨適量爲丸劑與フ(下痢)

(四六二)規那皮末五〇、〇蜀葵末一〇〇、〇水適量爲砥劑一日間ニ半量ヲ與フ

(四六三)芥子末五〇、〇過泥子油二五、〇食鹽二五〇、〇爲散劑每食ニ一食匙宛與

(四六四)食鹽三〇〇、〇芒硝一五〇、〇重曹八〇、〇杜松子一〇〇、〇爲散劑一日二回一匙宛

(四六五)芒硝三〇〇、〇重曹二〇〇、〇食鹽一五〇、〇混和變形人工加兒爾斯泉鹽

トシテ腸必泌過多ニ用フ

(四六六)食鹽二五、大黃五、〇茴香油五滴爲散劑食餌ニ混シ頓服
牛ノ慢性胃腸加答兒

食物ノ攝生ニ注意シ一日二三回稀鹽酸(二〇、〇)内服食鹽重曹吐酒石(少量)人工加兒爾斯泉鹽(日量五〇、一五〇、〇)白藜蘆根末若クハ丁幾(一〇、一〇〇、〇)ナ苦味藥又ハ亞爾加里鹽類ニ伍用ス(胃壁弛緩ノ徵アレハ的列並底油(二五―二五、〇日量)ヲ芳香浸劑ニ和シテ與フ物刺篤利涅(〇、〇五―一〇、一)ヲ酒精ニ溶解シ皮下注)苦麗阿林(五、〇宛一日三回)便秘ニハ大量ノ芒硝(吐酒石ヲ伍用ス)蘆薈

(三〇、〇―六〇、〇)硫酸依攝林(〇、一皮下注)酒石酸依攝林(〇、一―〇、三)硬固ノ便秘ニハ吐酒石(一〇、一―一五、〇)蓖麻子油(五〇〇、〇―一〇〇〇、〇)又ハ甘汞(一〇、一―五、〇)凡テ内服藥ヲ撰フニ當リテハ屠殺上ノ關係ヲ一考セサル可カラステフケー氏ハ五十拉篤ノ水ニ稀鹽酸一〇、〇―一五、〇ヲ加ヘテ注入シ尙ホ効ヲ助クルニ灌腸ヲ以テセリ最後ノ治法ハ胃ノ切開術トス
處方

(四六七)硫酸麻脛涅矢亞一五〇、〇亞爾蘇四〇、〇鹽酸一〇、〇一瓶ノ微溫湯ニ混

シテ與フ

(四六八)芒消一五〇、〇蘆薈末四〇、〇葛縷子二〇〇、〇粉末トナシ一日二回一握

手大ノ量ヲ水ニ混シテ與フ

(四六九)龍膽末三〇、〇硫酸麻脛涅叟謨三〇〇、〇混和一拉篤ノ水ニ振盪合劑トナ

シテ與フ

(四七〇)龍膽丁幾鹽酸各二五〇、〇一瓶ノ水ニ加ヘ振盪シテ與フ

(四七一)泥菖根浸(五〇、ニ五〇〇、〇)鹽酸二〇、〇混和飲劑トナス

(四七二)煙草葉末芒消食鹽各二五〇、〇混和爲散劑比飼料中ニ一食匙宛與フ

(四七三)撒里矢爾酸丹寧酸各二、五加密爾列浸一〇、〇(二五〇、〇)二回二分チ四

時間ヲ經テ與フ(積下痢)

(四七四)食鹽一〇〇、〇芒硝二五〇、〇一瓶ノ亞麻仁煎ニ溶シ與フ

(四七五)的列並底油五〇、〇亞麻仁煎二五、〇(三〇〇、〇)振盪合劑トナス二回分與ス

(四七六)亞爾薛浸(一〇、〇ニ二〇〇、〇)重曹二五、〇爲溶液二回分服(羊)

(四七七)稀鹽酸二五、〇酒精五〇、〇一瓶ノ水ニ混シテ與フ

(四七八)次亞硫酸曹達硫酸麻偏溼更謨各三五、〇一日三回二三瓶ノ亞麻仁煎ニ混與ス

肉食獸胃腸加答兒

初期ハ暫時絶食減水次テ數次少量ノ生肉ヲ與フ食物胃内ニ充滿スレハ速ニ吐劑ヲ與フ即チ鹽酸亞剝莫兒比涅(〇、〇〇三—〇、〇〇五)ノ皮下注、白藜蘆根(〇、〇五—〇、二)吐根末吐酒石(〇、五—一、〇)食思欠乏ニハ健胃劑稀鹽酸大黃丁幾(四、〇)チ一日三回内服)下痢ニハ冷水ヲ禁シ葛湯、米飯汁又ハ大麥ノ糞汁類ヲ與ヘ腹部溫包シ赤葡萄酒ヲ與フ之レニ桂皮末ヲ加味ス止瀉藥トシテ阿片丁幾(二〇—六十滴)ヲ護謨漿ト混與シ又ハ陀物兒酸(〇五—一、〇)近時「キセロフオルム」(一回量〇、五)ヲ白糖或ハ護謨漿ニ伍用ス頑固ナレハ單寧(一、〇)日量)蛋白丹寧硝酸銀(〇、〇一—〇、〇五)餽水ニ溶解シ又ハ丸劑トシテ與フ)時トシテ收斂瀉腸例之單寧硝酸銀明礬各一—二%ヲ用フ便秘ニハ甘汞(〇、〇三—〇、一)蓖麻子油(三〇、〇)頓服)嘔吐頻々ナレハ屢々氷片ヲ與ヘ阿片臭素加里抱水格魯拉爾ノ少量ヲ投ス臭剝ハ一回量一、〇又次硝酸蒼鉛(〇、二—一、〇)結麗阿曹篤苦麗阿林數滴ノ沃度丁

幾ヲ試ム異常醱酵ニハ甘汞(〇、〇三—〇、一)又ハ苦麗阿林(一—二、〇)ナフタリ
ン(〇、五—二、〇)等ヲ用フ

處方

(四七九)稀鹽酸五、〇水二五〇〇一日數回一茶乃至一食匙ヲ與フ

(四八〇)稀鹽酸百布聖各五、〇水三五〇〇一日數回一茶匙乃至一食匙宛與フ

(四八一)苦味丁幾五、〇稀鹽酸二、五水一五〇〇一日三回一茶乃至一食匙宛

(四八二)龍膽根浸一〇、〇(一五〇、〇)稀鹽酸一〇、〇每三時一食匙(犬)一茶匙

(猫)

(四八三)人工加兒爾斯泉鹽一五、〇餽水三〇〇、〇爲溶液每三時一食匙(犬)一茶

匙(猫)ヲ與フ

(四八四)龍膽丁幾一〇、〇稀鹽酸二〇、〇餽水三〇〇、〇每三時一食匙宛

(四八五)百布聖〇、五乳糖一、〇以上爲一包其五包ヲ作り與フ

(四八六)規那煎五、〇(一五〇、〇)鹽酸二、〇一日間二三茶匙乃至三食匙ヲ與フ

(四八七)規那丁幾二五、〇大黃丁幾二五、〇一日三回十滴宛(猫)

(四八八)炭酸麻偏溼更謨乳糖各一、〇以上爲一包其五包ヲ作り每三時一包宛

(四八九)亞爾薛丁幾鹽酸各五、〇餽水三〇〇、〇每三時一食(犬)乃至一茶匙(小

犬)宛與フ

(四九〇)大黃丁幾二五、〇單阿片丁幾五、〇每三時半茶匙宛與フ

- (四九一)阿片末〇、二甘朮〇、一白糖〇、五爲散劑與フ(傳染性腸加答兒)
- (四九二)「ナフタリン」五、〇白糖一〇、〇散藥二十包二分チ每回一包宛興フ(右全)
- (四九三)次硝酸蒼鉛白糖各〇、五爲一包犬ニ興フ
- (四九四)「タラニヤ」根煎一〇、(一五〇、〇)苦味丁幾五、〇單舍利別一二〇每三時一食匙(大犬)一茶匙(小犬)チ興フ
- (四九五)「レゾルシン」三、〇餾水一五〇、〇橙皮舍利別一五、〇每日三回一匙宛チ興フ(慢性不消化症)
- (四九六)薄荷浸二五〇、〇稀鹽酸一〇、〇一日三四回一食匙宛(右全)
- (四九七)撒里矢爾酸蒼鉛五、〇桂皮末一〇、〇爲粉未日々數回一刀尖宛(右全)
- (四九八)鹽酸亞剎莫兒比涅〇、〇五餾水五、〇鹽酸一滴混和爲溶液一―二〇皮下注射(吐劑)
- (四九九)薄荷浸二〇〇、〇人工加兒爾斯泉鹽五、〇酒製大黃丁幾二五、〇一日三回一茶乃至一食匙宛(慢性症)興フ
- (五〇〇)「ナフタリン」五、〇餾一〇〇、〇芳香丁幾一〇、〇日々數回一食匙宛
- (五〇一)鹽酸規尼涅二、〇設里酒二五〇、〇一日數回一匙宛
- (五〇二)鹽酸四、餾水二五〇、〇覆盆子舍利別一〇、〇一日四五回一茶乃至一食匙宛

宛系ノ胃腸加答兒

畧ボ犬ニ全シ藥品ハ用量チ多クシ其用法チ異ニス豚ニハ飲劑チ投ス可カラス醫藥ハ食餌ニ混シ或ハ灌腸シ或ハ皮下注射ス食滯又ハ不消化食傷ニハ吐劑トノ物拉篤利涅〇、〇ニテ酒精五、〇ニ溶解シ耳ノ後部ニ皮下注射ス鹽酸亞剎莫兒比涅ハ豚ニハ無効白藜蘆根末(〇、五―二、〇)吐根末(一―三、〇)白藜蘆煎(二―二五、〇)ノ灌腸、便秘ニハ甘朮(一―四、〇)チ白糖ニ和シ舌上ニ撒布ス下痢ニハ阿片末(一―二、〇)單寧等チ應用シ滋養料トノ乳肉蒸麵包穀汁チ給與ス

處方

- (五〇三)吐酒石一、〇白藜蘆根、五―一、五爲粉劑牛乳ニ混シ自由ニ飲マシム(吐劑)
 - (五〇四)丹寧酸蒼鉛一〇、〇規那皮末五〇、〇甘草末三〇、〇爲粉劑食餌ニ混シテ興フ(下痢)
 - (五〇五)食鹽精製酒石過泥子各五〇、〇好食物ニ混シ一食匙宛興フ
 - (五〇六)亞片丁幾五〇、〇偏里設林一〇、〇二乃至三回二分服(下痢)
- 家禽ノ胃腸加答兒
 鶏舎チ清潔ニシ病禽チ温保シ糞麥米飯チ興ヘ小麥葛湯麻實武蘭酒ニ浸セル麵包赤酒(一茶―一食匙)粘汁(亞麻仁煎一水一〇)蜀葵根浸(一〇水二〇〇)一食匙チ興フ
 止瀉藥トノ硫酸鐵(一%チ水ニ和ス)又ハ阿片丁幾一、〇頑症ニハ硝酸銀一%溶液一二茶匙胃弱ニハ蒜胡椒チ牛酪ニ混シ丸劑トナス又薄荷浸(二―六〇)一日三回一

食匙ヲ與フ○便秘ニハ綠食粘劑脂肪油ヲ與ヘ冷水ヲ灌腸シ蓖麻子油ニ食匙旃那葉末一、〇—二、〇大黃〇二—〇、五ヲ蜂蜜ニ伍シ丸劑トナス甘汞〇、五—〇、一小禽ニハ芒硝又ハ人工加兒爾斯泉鹽一、二〇〇、〇ヲ飲料ニ混ス

(五〇七) 薊菊巴根末五、〇精製密一〇、〇小丸劑トナシ作用ヲ呈スル迄與フ

(五〇八) 甘汞〇、〇三甘草〇、〇五混和粉末トナシ三包ニ分チ毎日一包宛

(五〇九) 巴豆油三滴蓖麻子油三〇、〇甘草根末適量爲舐劑與フ

(五一〇) 阿片末撒里矢爾酸蒼鉛各一、〇白糖二、五爲散劑每三時一刀尖宛

○疝痛 Colica

一般療法 疝痛ノ一般療法ニ三要旨アリ一ハ鎮痛ニハ便通三ハ腸炎ヲ豫防スルニアリ即チ病馬ハ廣キ厩舎ニ入レ多量ノ臥藁ヲ敷キ舍内ノ器具ヲ撤去シ次テ負傷ヲ防キ屢々糞束ヲ以テ強ク腹部及四肢ヲ摩擦シ或ハ同時ニ樟腦精ト的列並底油(一〇—二〇—二二)或ハ四三一合劑(的列並底一分安母尼西擦劑三分樟腦精四分)ヲ腹壁ニ塗布スヘシ便秘痛ニアリテハ牽運動ヲナス但シ速歩ヲ禁ス痙攣痛ニアリテハ運動ハ反テ害アリ重性疝痛ニ於テ動物運歩ヲ欲セサルハ強テ運動セシム可ララス次テ直腸ヲ検査シ滯糞ヲ除去シ或ハ結腸及膀胱ノ狀ヲ檢シ微温ノ石鹼水又ハ偪里設林ノ灌腸ヲ施ス他ノ療法ハ疝痛ノ種類ニヨリテ異ナル可成飲劑ヲ避ケ舐劑ヲ與ヘ丸劑ヲ試ミ皮下注射靜脈内注射ヲ行フ

○痙攣疝 Colica Spasmodica S. Nervosa.

潤房ニ移シ多量乾燥蓼葉ヲ給シ腹部温包或ハ馬體全部ヲ温包シ的列並底油及樟腦精(一—二—〇—二〇)ヲ腹側ニ塗布ス温湯ノ灌腸温濕布ノ纏包ハ鎮痙ノ効アリ藥物中鎮痙ノ良藥ハ莫兒比涅トス鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射量ハ〇、三—〇、四ヲ四五ノ鹽水ニ溶解ス大抵一回ノ注射ヲ以テ足レリトス稀ニハ二回ヲ要ス他ノ鎮痙藥莖宥菲沃斯双蘭菊、依答兒囉囉仿謨等ハ莫兒比涅ノ効ニ比カス加密爾列瀉荷茴香亞尼斯ノ浸劑ハ揮發油ヲ含ムヲ以テ鎮痙ノ効アリト雖モ莫兒比涅ニ比シテ弱キノミナラズ浸劑ハ氣道ニ入り異物性肺炎ヲ來スノ虞アリ依攝林ハ禁忌トス患馬ハ運動セシメス靜養ス又阿魏ヲ試用ス可シ經過長ク腸内ニ食物停溜セハ下劑ヲ投シ直腸ニ手ヲ挿入シテ宿糞ヲ排除ス

處方

- (五一一) 鹽酸莫兒比涅〇、四鹽水一〇、〇皮下注射一回量用
- (五一二) 依答兒五〇、〇蓖麻子油五〇〇、〇内服
- (五一三) 加密爾列浸七五〇、〇吐酒石五、〇頓服
- (五一四) 纈草根五〇、〇依答兒菲沃斯越幾斯三、〇四分三拉篤沸湯中ニ溶シテ頓服
- (五一五) 纈草根浸五〇、(五〇〇、〇)依答兒二五、〇混和頓服
- (五一六) 刺賢堙爾花浸百里香浸各二五、〇(五〇〇、〇)依答兒二五、〇頓服
- (五一七) 加密爾列浸二五、(五〇〇、〇)依答兒二〇、〇爲溶液頓服

(五一八)阿魏二〇、〇卵黃二個爲乳劑之二加密爾列浸五〇、(五〇〇、〇)ヲ加へ飲劑トナス

○食滯疝 Colica Crampulosa.

腸蠕動ヲ催進シテ滯食物ヲ排除スルニアリ直腸ニ手ヲ挿入シテ宿糞ヲ除キ且浣腸石鹼微溫灌腸俛里設林灌腸ヲ行ヒ腸ヲ刺戟シ蠕動ヲ亢奮ス又煙草煎汁ノ灌腸ハ有効ナリ煙草ヲ沸湯水中ニ五分間置キテ煎汁(一一一〇)ヲ作り一回或ハ數回灌腸ス後腸部ニ刺戟擦劑ヲ塗布シテ摩擦天氣好クレハ牽運動ヲ命シ劇痛苦悶騷擾セハ莫兒比涅皮下注ヲ試ム如此クニシテ輕快セサレハ下劑芒硝蓖麻子油蘆薈甘汞(五一八、〇)吐酒石(一一八、〇)ヲ與フ硫酸依攝林及鹽酸必魯加兒必涅ハ輕症ノ場合ニノミ良効ヲ奏スルモ重症ニ於テハ胃破裂ヲ促スノ危險アルヲ以テ須カラク其用ヲ節ス可シ巴豆油(一五乃至三十滴ヲ一瓶ノ粘汁ニ混シテ與フ)モ亦良効アリ屢々手ヲ直腸ニ挿入シテ糞ヲ排除シ石鹼水食鹽水冷水ノ灌腸ヲ反復シ時々俛里設林灌腸ヲ行フ痲痛七乃至八時間經過シタルキ或ハ患者疲勞シタルキハ運動ヲ禁ス多日ニ涉ルキハ少量ノ柔軟乾草飲水ヲ給ス近時格魯兒拔留漢ノ靜脈內注射ヲ賞用スルモ之レ亦重症ニ於テハ胃破裂ヲ促スノ虞アリ「アレコリン」モ亦輕症ノ場合ニハ良藥ナルモ重症ニハ忌ム

處方

(五一九)芒硝二五〇、〇吐酒石五一一〇、〇亞麻仁粉末適量爲舐劑一時間二乃至

二回內服

(五二〇)蘆薈越幾斯二〇、一二五、〇甘汞五、〇軟石鹼一〇、〇蜀葵末適量爲丸劑頓服

(五二一)格魯兒拔留漢〇、五餽水一〇、〇爲溶液皮下注射

(五二二)硫酸越攝林〇、一餽水一〇、〇右ニ全シ

(五二三)蘆薈越幾斯二五、〇芒硝三〇〇、〇蜀葵根末適量以上丸劑トナシ一回ニ頓服セシム

服セシム

(五二四)蘆薈越幾斯二〇、〇軟石鹼適量爲丸劑頓服

(五二五)蓖麻子油一〇〇〇、〇溫乳ト振盪合劑トナシ頓服(腸炎併發ノトキ)

(五二六)甘汞八、〇龍膽末七五、〇亞爾答亞根末一〇〇、〇爲舐劑二回ニ分服

(五二七)臭素化水素酸「アレコリン」〇、〇八餽水五、〇皮下注射用

(五二八)芒硝五〇〇、〇蜀葵末二〇〇、〇水適量爲舐劑與フ

(五二九)硫酸苦土五〇〇、〇甘草末五〇、〇蜀葵末三〇〇、〇水適量爲舐劑與フ

(五三〇)吐酒石八、〇適量ノ水ニ溶シ芒硝二〇〇、〇甘草末五〇、〇蜀葵末適量爲舐劑二回ニ分服

(五三一)大黃末三〇、〇蘆薈越幾斯一五、〇重曹五〇、〇芒硝二〇〇、〇蜀葵末及水適量爲塊劑與フ

○血塞疝 Colica thrombo-embolica.

血管ノ變化ハ直接手ヲ下スヲ得サル以テ對症療法ヲ施シ以テ腸麻痺ニ由テ起ル所ノ病症ヲ治スルニ過キス而シテ腸管麻痺スレハ糞塊滯積シ久キニ互レハ粘膜ノ局所炎症及壞死ヲ來スヲ以テ先ツ下劑ヲ投シテ滯糞ヲ除去ス乃チ吐酒石甘汞中性鹽類ノ必要アリ越攝林ハ忌ム病馬ノ体ヲ頻々摩擦シ適當ノ運動ヲ命シ血行ノ碍障ヲ矯正シ灌腸并ニ手ヲ以テ直腸ノ糞ヲ除去ス出血性栓塞腸炎ノ療法ハ胃腸炎ニ全シ攝生ニ注意シ粘膜ノ壞死ニ對シテハ甘汞ヲ與ヘ敗血熱ニハ解熱藥ヲ用フ峻下劑(吐酒石蘆薈巴豆油)ハ用テ避クヘシ

○ 壅塞痢 *Verstopfungskolik* (獨)

○ 便秘痢 *Anschlopfungskolik* (獨)

緩下劑ヲ投シ腹部ヲ按摩シ冷濕布ヲ腹ニ卷キ多量ノ微溫石鹼水ヲ浣腸シ適宜ニ運動セシメ減食通常芒硝又ハ人工加兒爾斯泉鹽ノ大量(二五〇、一五〇〇、〇)ヲ良トス又阿列布油一拉篤ニ蓖麻子油(五〇〇、一、二五〇、〇)ヲ伍用ス或ハ越攝林濕(〇、〇五、一〇、一)必魯加兒必濕(〇、二)「アレコリン」(〇、〇八)ノ皮下注射格魯兒拔留謨ノ靜脉内注射(〇、二五、一〇、五)内服(六一、一〇、〇)蘆薈(三〇、〇)ノ丸劑蘆薈芒硝合劑甘汞巴豆油ヲ與ヘ煙草煎汁ノ灌腸僱里設林灌腸腸部刺戟藥塗布等ヲ用フ本症ノ經過中ニ鼓腸ヲ發スレハ苦麗阿林(毎三時五瓦ヲ緩下劑ニ和ス)ヲ賞用ス其他食滯痢ノ條下ヲ見ヨ處方ハ全食滯痢及便秘ニ對スル處方例參照處方

(五三一)巴豆油十五滴蓖麻子油五〇〇、〇混和頓服

○ 結石痢及砂痢 *Steinikie und Sandkolik* (獨)

粘液性油劑滑動藥ニ下痢テ伍シテ與フ口腔及咽頭乾燥セルヲ以テ舐劑ヲ避クヘシ越攝林ハ腸破裂ノ虞アレハ可成用ヘス唯砂痢ニ於テ少量ヲ試ム可シ必魯加兒必濕モ不確實ナリ蘆薈ヲ賞用ス之レニ中性鹽類巴豆油蓖麻油の列並底油ヲ伍シ脂油或ハ粘滑煎汁ニ混シテ液劑トナシテ與フ吐酒石ハ腸破裂ノ恐レアリ腹部ノ擦擦ハ無効ナリ腹腔切開術ヲ施シ結石ヲ摘出スルヲ最後ノ法トス此法ハ結果疑ハシトラスホー氏ハ直腸ニ重曹ト酒石酸ヲ入レ炭酸ヲ發生セシメ腸石ヲ壓出セシメント企テタルモ其効驗ハ疑ハシ又佛國ノ獸醫ハ砂痢ニ對シ大量ノ水ヲ給與ス(一日百二十拉篤八日間ニ約千五百立突)

處方 (五三一)蘆薈越幾斯二〇、〇芒硝二五〇、〇亞麻仁粉四分三拉篤ノ水ヲ加ヘテ煮沸

蘆過シテ頓服

(五三三)的列並底油五〇〇軟石鹼一〇、〇亞爾答亞煎六〇〇、〇頓服

(五三四)蓖麻子油五〇〇、〇硫酸依答兒二五〇爲振盪合劑要ニ際シテ與フ

(五三五)巴豆油十乃至二十滴薑薑油二五〇、〇半拉篤ノ燕麥煎汁ト混與ス

○ 變位痢 *Verstopfungskolik in Folge von inneren Lag*

erwerbenderung des Darmes. (獨)

鼠蹊臍又ハ腹ノ歐兒尼亞ハ或ハ按壓シテ整復シ又ハ歐兒尼亞囊ヲ切開シ腹輪ヲ截
 擴シ箝頓セル腸ヲ整復ス既ニ腸ノ壞死セルモノハ無効ナリ此他下劑ヲ投シ多量ノ
 微溫湯ヲ直腸ニ注入シ直腸ニ手ヲ入レテ結締織ノ癒着ヲ破リ或ハ反復馬牀ヲ廻轉
 ス阪路ヲ上下セシメ大量ノ水銀ヲ飲マシムルノ法ハ概テ無効ナリ最後ノ手段トシ
 テ腹傍ヲ切開シ手ヲ以テ轉位ヲ整復スルハ合理的ノ法ナルモ診斷確定セザルト手
 術危險ナルヲ以テ通常實行シ難シ○「エルクマン」氏ニ據レハ結腸左層ノ轉軸ハ直
 腸ヨリ左手ヲ入レ第四腰椎ノ附近ニ於テ骨盤入口ノ前方ニ方リ緊張セル後腸間膜
 (索狀ヲ爲シテ緊張シ鉛直ナラスシテ上方ヨリ左下方ニ斜方向ヲ取ルモノ)ニ觸レ
 得レハ疑ナシ但シ之ニ觸ルレハ動物ハ劇痛ヲ感スト云フ轉位セル結腸大ニ充滿膨
 脹スレハ左腹側ノ部ニ於テ第二ノ緊張索(結腸ノ左下層ノ紐帶)ニ觸レ得ヘシエル
 クマン氏ニ據レハ此轉軸ノ整服法ハ挿入セル左手ヲ壁下ニ進メ茲ニ位セル左結腸
 ナ前内方ニ壓ス若シ中線ニ位セハ除ロニ手ヲ上方ニ進メ上結腸ヲ下結腸ト共ニ手
 上ニ載セ常位ニ復歸セシム手ヲ上方ニ導入スルノ際轉位セル直腸ヲ拳上シ以テ上
 下結腸ヲシテ左下腹壁ノ方ニ復歸セシムルヲ努ムヘシ但シ馬ノ後牀ヲ高クスレ
 ハ手術ヲシテ容易ナラシム

○疊積疝 *Verstopfungspolte in folge von invagination*
des Darmes (獨)

下劑ヲ投シ肛門ヨリ多量ノ微溫湯ヲ注入シテ腸内容物ノ液化ヲ試ム腹腔ヲ切開シ

欠

MISSING

(五五三)蓖麻子油八〇、〇 巴豆油五滴甘草末適量爲砥劑一刀尖宛作用顯ハル、迄

與フ

(五五四)甘汞二、〇—四、〇 麵粉二五、〇—二回ニ分與ス

犬ノ痛痛

病原ニヨリ療法ヲ異ニス便秘ニヨレハ灌腸ヲ施シ按腹ヲ行ヒ指ヲ直腸ニ挿入シテ
滯糞ヲ除キ下劑蓖麻子油(三〇、〇)頓服甘汞(〇、〇五—〇、一白糖又ハ蓖麻子
油ニ混シテ與フ)腹部ノ濕濕襪法ヲ施ス頑性便秘ニハ巴豆油越攝林等ヲ用ヘ劇痛
アレハ莫兒比涅(〇、〇二—〇、〇五)ヲ皮下注射シ或ハ挖物兒散(〇、五—二、〇)
又ハ亞片丁幾二五—三〇滴ヲ護膜漿ニ混シテ與フ

(五五五)蓖麻子油六〇、〇 亞刺昆亞護膜五、〇 常水一〇〇、〇 十五分毎ニ一乃至二
匙宛作用顯ハル、迄與フ

(五五六)蓖麻子油六〇、〇 豆巴油五滴每十五分一食匙宛作用顯ハル、迄與フ

○胃及腸潰瘍

Ulcus Ventriculi et intestinale

攝生療法ヲ專要トス粗硬不消化ノ食物ヲ與ヘテ潰瘍ヲ刺撃ス可カラス牛ニハ煮熟
セル流動食ヲ與ヘ醃渣ノ如キ醃酵シ易キ食ヲ避ク可シ馬ニハ麥粉穀粥ノ類ヲ給シ
犬ニハ乳汁生卵細挫肉ヲ良トス藥物ハ過多ノ胃散ヲ中和シ且ツ消化ヲ助クル者例
之亞爾加里劑ヲ用フ人工加兒爾斯泉鹽之ニ適ス又甘汞重曹、芒硝等ヲ蜀葵末草甘
末ト伍用ス鹽酸ハ全ク禁忌トス潰瘍ニ對シテハ收斂藥鉛劑鐵劑撒里矢爾酸鉛蒼次

硝酸蒼鉛(犬)〇、一、〇五)硝酸銀ヲ用井腸出血ニハ單寧硫酸鐵鉛糖ヲ處シ頑固ナル嘔吐ニハ氷塊氷乳ヲ與ヘ阿片古加乙涅臭素加里併ニ結麗阿曹篤苦麗阿林沃度丁幾ヲ試用スヘシ

處方

(五五七)芒硝八〇、〇食鹽二〇、〇重曹五〇爲混劑粉末牛ニハ百瓦馬ニハ五十瓦犬ニハ二一五瓦(一回量)ヲ與フ

(五五八)食鹽重曹甘草末各一〇〇、〇混和爲散劑每食餌ニ一食匙宛混與(馬)

(五五九)格魯兒酸加里五、〇炭酸麻佩涅矢亞一〇、〇大黃末二五、〇爲散劑一刀尖宛水ニ混シ反復與フ(犬)

(五六〇)明礬五、〇阿片末白糖各一、五五包ニ分チ一日二三回一包宛與フ(犬)

(五六一)丹寧酸鉛二五、〇鉛糖五〇、〇亞麻仁三〇〇、〇混和爲散劑一食匙宛飼料ニ混與ス(犬)

(五六二)硝酸銀一、五餽水一〇〇、〇偏里設林一〇、〇液トナシ每三時一茶乃至一食匙宛與フ(犬)

○胃及腸出血 Gastro-haemia et enterorrhagia.

冷水氷片ヲ飲マシメ收斂藥ヲ投ス丹寧明礬過格魯兒鐵液(犬ニハ三一五滴)鉛糖硝酸銀亞片麥角ノ如シ患者ハ安靜ヲ命シ冷水ニ浸シタル布片ヲ腹部ニ纏絡シ冷水灌腸ヲ行フ絶食ヲ命シ次日少量ノ滋養液食ヲ與フ

處方

(五六三)鉛糖阿片末各二〇、〇蜀葵末六〇、〇爲丸劑二個馬ニ與フ

(五六四)硝酸銀〇、二餽水一〇〇、〇偏里設林一〇、〇爲溶液每時一匙宛(犬)

○胃及腸破裂 Ruptura Ventriculi et intestinale

診斷確定セハ腹壁切開術ヲ施シ破裂部ニ腸縫合ヲ施スノ外術ナシ

○胃腸炎 Gastro-enteritis

○單純胃腸炎 Gastro-enteritis Simplex.

攝生ニ注意シ初期ハ絶食セシメ或ハ極メテ少量ノ磨碎麥又ハ炒麥亞麻仁煎護膜漿青草等ヲ與ヘ冷水ヲ給スヘラス腹部ハ藁束ヲ以テ強ク摩擦シ芥子精(八一〇%)又ハ樟腦精的列並底油ノ合劑ヲ塗抹ス四肢モ温包シ時々擦擦スヘシ内服藥ハ緩和包攏劑ヲ主トス即チ粘汁護膜漿阿列布油阿片末阿片丁幾等ヲ與フ大痛アレハ莫兒比涅ノ皮下注射ヲ行フ便秘ニ對シテハ蓖麻子油又ハ甘汞ニ芒硝ヲ伍用ス(甘汞四、〇芒硝五〇〇、〇二回分服)又甘汞ヲ阿片ニ伍スルコトアリ峻下劑ハ禁忌トス

處方

(五六五)阿片末一〇、〇甘汞二、〇蜀葵末適量砥劑頓服セシム

(五六六)阿片丁幾二、〇一五、〇護膜漿一〇、〇餽水一〇〇、〇混和一日三回一食匙宛ヲ與フ(犬)

(五六七)亞麻仁一〇〇、〇水七五〇、〇煎出シ亞麻仁油二五〇、〇ヲ加ヘ頓服(牛)
(五六八)蓖麻子油五〇〇、〇亞刺毘亞護謨五〇、〇水一〇〇〇、〇爲乳劑二回二分
與ス(牛馬)

(五六九)亞片末〇、一甘汞〇、〇五護謨合劑二五、〇頓服(犬)

(五七〇)甘汞五、〇阿片末一〇、〇亞麻仁粉末一〇〇、〇爲砥劑頓服(馬)

(五七一)阿列布油一五、〇亞刺毘亞護謨一〇、〇水二〇〇、〇爲乳劑每時一食乃至
二食匙ヲ與フ(犬)

(五七二)甘汞四、〇芒硝五〇〇、〇二回分服(馬)

(五七三)獬皮煎二〇、〇(二五〇、〇)亞刺毘亞護謨一〇、〇混和每三時一食匙宛(犬)

犬)

(五七四)甘汞〇、〇五阿片末〇、一白糖〇、五爲散劑與フ(犬)

(五七五)「フエナセチン」白糖各〇、五爲散劑四包ヲ作り毎日一二包ヲ與フ(犬)

(五七六)單阿片丁幾五、〇茴香水一五〇、〇爲飲劑每三時一食匙宛(鷄)

(五七七)過泥子二、〇酒精二〇、〇混和每時五ノ十滴ヲ與フ(犬)

○格魯布性腸炎 *Enteris Grouposa.*

畧ホ單純胃腸炎ニ全シ攝生ニ注意シ重曹食鹽芒硝ノ類ヲ用フブルリヒ氏鹽類(重曹食鹽合劑)又ハ人工加兒爾斯泉鹽ヲ持長シ食鹽(一%)及炭酸加里ノ灌腸ヲ行フ可シ

○黴性胃腸炎 *Gastro-enteritis mycotica.*

犬ニハ先ツ吐劑トシ鹽酸亞剝莫兒比涅ノ内服ヲ試ミ次テ下劑ヲ投ス下劑ハ甘汞ヲ最良トス其量犬ニ於テハ〇、一大動物ニアリテハ一回量ニ、五犬ニハ微溫ノ千倍單寧溶液又ハ弱「クレオリン」溶液ヲ以テ腸内ヲ洗滌スル「アリ反芻獸ニハ先ツ鹽類下劑(芒硝等)ヲ試ミ其他亢奮藥例之酒亞爾爾保兒依答兒樟腦「ベラトリン」亞篤魯必涅咖啡涅ノ如キヲ用フ其他單純胃腸炎ノ療法ニ準ス

(五七八)甘汞四、〇阿片末八、〇蜀葵末五〇、〇適當ノ水ニテ丸劑二個トシ與フ(馬)

○中毒性胃腸炎 *Gastro-enteritis toxica*

毒物ヲ除去シ或ハ中和シ其吸收ヲ防ク此目的ニハ吐劑ヲ可成速カニ與フ中和スルニハ解毒劑ヲ與フ牛乳咖啡石鹼水(列並底油(燐)醋(亞爾加里中毒)「インキ」水楊皮糊皮煎(植物鹽基麻醉中毒)等ヲ用フ其他中毒篇ヲ參照セヨ

○腸癰 *Amus praesernaturalis*

通常ノ癰管ニ對スル療法ヲ施ス屢々烙鐵ヲ挿入シテ燒烙シ腐蝕藥ヲ注入シ熔製硝酸銀ニテ燒烙ス或ハ鑷子ヲ以テ皮膚ヲ撮起シ缺ヲ以テ切開シ油劑ヲ塗布ス狹窄ノ恐レアレハ皮膚ト直腸粘膜炎ヲ縫合スヘシ牡ハ膀胱ニ「カテーテル」牝ハ陰腔ニ示指

ヲ挿入シテ方向ヲ明ニシ肛門ヲ被フ皮膚ヲ鋏切除去シ徐々深部ノ組織ヲ切除シ直腸後端ニ達シ開通スレハ油ヲ注入シ置ク可シ

○直腸炎 Proctitis.

粘稠液若クハ緩和液ヲ灌腸ス大動物ニハ澱粉汁小動物ニハ微温油劑ヲ灌腸ス裏急後重ニハ灌腸ニ阿片劑ヲ加フ全時ニ冷湯ヲ行フ肛門周圍ノ被毛ハ鋏切シ洗滌清潔ニシ外傷ニハ沃度仿膜丹寧ヲ散布ス肛門腺膿瘍ハ切開シテ内容物ヲ排除シ洗滌消毒シテ沃度仿膜撒布便通ヲ容易ナラシムル爲メ緩和灌腸(油澱粉汁)ヲ施シ易消化液狀飼料ヲ與ヘ緩下劑ヲ投ス直腸口ニ巴拉賓軟膏ヲ塗布シ創液過多ナレハ丹寧水(一%)或ハ槲皮煎ノ洗滌ヲ用フ

處方

(五七九)芒硝三〇〇、〇重曹七五、〇泥菖根五〇、〇麵粉及水適量ニテ爲疝劑一日

ニ内服(馬)

(五八〇)芒硝八〇〇、〇蜀葵末一五〇、〇混和爲粉末三拉篤ノ水ニテ煮沸シ四回ニ

分典ス(牛)

(五八一)硫酸麻痺涅叟誤一五〇、〇亞麻仁二五〇、〇一瓶ノ燕麥粘汁ニ混與(牛)

(五八二)苦麗阿林五〇、〇槲皮煎二〇〇〇、〇二回ニ灌腸ス

○直腸擴張 Proctectasia

攝生ニ性意シ下劑ヲ投シ灌腸ヲ行ヒテ便秘ヲ防キ微温湯ノ直腸注入ハ宿糞排除ニ

有効ナリ一日二三回直腸ヲ掃除シ宿糞ヲ遣サ、ル様注意スヘシ

○直腸周圍炎 Periproctitis.

本病ハ化膿シタル後ニ發見スルチ常トス故ニ治療ノ要旨ハ膿瘍ヲ破解スルニアリ膿瘍皮下ニアレハ深ク刺シテ膿ヲ排シ深在シテ直腸ノ下壁ニ占位スレハ牝獸ハ刀若クハ指ヲ以テ膿ヨリ破ルチ良シトス直腸ノ上壁ニ占位シ肛門ヲ去ル遠ケレハ彎曲套管針ヲ刺シテ膿ヲ排シ後膿再溜スレハ球頭切隄刀ニテ切開ス切開後ハ灌淨シテ變敗組織ヲ洗除ス且ツ膿ノ流利ヲ能クス

○直腸脫 Protopus recti.

新鮮ナル場合ニハ脫出物ヲ洗滌シ浮腫甚タシケハ亂刺シ收斂藥例之一一五%ノ明礬水ニ浸シ收縮セシメ油ヲ塗リ大動物ハ手小動物ハ指ニテ徐々一齊ニ推シテ還納シ下痢アル者ニハ適藥ヲ投シ裏急後重アレハ粘汁或ハ油ニ亞片ヲ加ヘテ灌腸ス已ニ久シキチ經テ粘膜著シク變化セハ刀若クハ鋏ヲ以テ切除スヘシ直腸脫ニ疊積チ併發スル片ハ整復困難ナリ先ツ患畜ノ后身ヲ前身ヨリ高カラシメ怒噴強ケレハ麻酔藥(抱水格魯拉爾内服犬ニハ莫兒比涅)ヲ投ス大動物ニハ手ヲ以テ小動物ニハ脂燭ヲ以テ徐々ニ還納ヲ試ム整復後ハ看護人ナシテ腰部ヲ壓迫セシメ肛門及直腸發炎ノ徵アレハ清涼劑ヲ投シ緩和灌腸ヲ行フ再脫ヲ防ク爲メ肛門ニ海綿若クハ麻織子ヲ抵ス經久シテ組織變化ヲ來セハ整復スルハ却テ害アリ脫出部ヲ除去スルニ比カス之レニ種々ノ法方アリ〇(一)腐蝕法、硫酸銅及木炭末當分ノ合劑ヲ毎日四五

回散布シ最初ハ發炎シ數日ヲ經レハ壞死シ八乃至十四日ニシテ脱落ス○(二)結紮法、直經二、五長サ六仙迷突ノ木筒ヲ製シ筒ヲ繞リテ淺溝ヲ刻シ脫腸ヲ切開シテ肛門ニ達シ腸中ニ筒ヲ嵌ルシ糸ヲ以テ刀ト共ニ結紮シ腸ノ筒外ニ突出スル部分ヲ缺切ス術後毎日灌腸シ易消化食ヲ給スレハ五乃至六間ヲ經レハ木筒自カラ脱落シ患部癒ユ○(三)縫合法 二針ヲ取り各針ニ長糸ヲ繫ケ肛門ノ直後ニ當リテ脫腸ヲ刺シ糸ヲ通シ二糸ヲシテ腸内ニ於テ相交錯セシメ次ニ刺孔ノ後方一二仙迷ヲ去リ脫腸ヲ切除シ腸内ヨリ糸ヲ引キ出シ其中央ヲ缺斷シテ四條トナシ各絲ノ兩頭ヲ結合シテ四縫合ヲ作ル若シ相對スル漿液膜全ク癒着セサレハ更ニ二糸ヲ通シ合セテ八縫合ヲ作ル可シ此法ハ防腐消毒法ノ嚴密ナルヲ要ス○(四)切除法、經久脫腸ハ單ニ切除スルモ可ナリ頑固經久ノ者ハ漿液膜面全ク生着シテ腹膜腔ヲ破ルノ憂ナキモ結紮或ハ縫合ノ安全ナルニ比カス

○脫肛 *Prolapsus ani.*

擊復法及他ノ療法ハ直腸脫ニ全シ

○肛瘻(痔瘻) *Fistula ani.*

刺擊藥若クハ腐蝕藥例之ビラット氏液ノ注入ハ効ナキニシモフラスト雖凡直腸ニ達シテ之ヲ刺戟シ或ハ腹膜腔ニ達シテ腹膜炎ヲ起スヲアリ注意スヘシ最良ノ手段ハ切開スルニアリ切開スルハ可成肛門括約筋ヲ損傷セサル様ニスヘシ嚙口瘻ハ先少有溝探子ヲ進メ左ノ示指ヲ以テ直腸内ノ瘻口ヲ檢シ指ニ沿フテ瘻管ヲ切開シ

或ハ鉛線ニテ瘻管ヲ貫通シ線ノ兩端ヲ引キ瘻壁ヲ切裂スヘシ肛腔瘻ハ貫線ヲ施シ或ハ瘻孔大ニシテ陰門ノ近傍ニアレハ縫合スベシ切開後ハ創傷療法ノ通則ニ從ヒ處置シ食餌攝生ニ注意ス

○直腸及肛門創傷

腹膜腔ニ通スル貫創ハ豫後甚々不良殆ント治療ノ必要ナシ肉用獸ハ速カニ屠殺ス可シ若シ治療ヲ加ヘントセハ直腸ヲ掃除シ食ヲ禁シ飲料ヲ減シ試ミニ亞片劑ヲ用フ可シ亞片劑ハ腸蠕動ヲ制シ以テ直腸ニ滯糞ヲ防ケ灌腸ハ腸内容ヲ腹膜腔ニ輸傳シ腹膜炎ヲ誘發スルノ恐レアリ○腹膜腔以外ノ創傷ニ於テハ初メ清水ヲ以テ灌腸シ以テ腸内容物ヲ盡ク洗除シ次ニ撒里矢爾酸石炭酸「クレオリン」或ハ五千倍ノ昇汞水ヲ灌腸シ滋味ノ食物(粉粥)少量ヲ給ス肛圍創傷ハ縫合シ出血アレハ血管ヲ結紮シ腸内ヨリノ出血ニハ冷水灌腸ヲ施ス膀胱若クハ護謨球ニ水ヲ盛り腸内ニ挿入シ或ハ直腸ヲ栓塞シ以テ出血ヲ止メ得可シト雖凡患畜ノ不安甚々シ

○直腸及肛門腫瘍

皮膚ニ生スル良性腫瘍及贅疣ハ單ニ刀斷若クハ缺切シ直腸周圍結締織及皮下織内ニ生スル者ハ皮膚ヲ切斷對反シ鑷子若クハ手ヲ以テ腫瘍ヲ可成後方ニ引キ出シ直腸粘膜炎損傷セサル様注意シテ切除スヘシ直腸内ニ生スル者ハ或ハ結紮シ或ハ絞斷シ出血アレハ冷水灌腸若クハ栓塞ヲ施ス

○臍過兒尼亞 *Hernia umbilicaris*

姑息療法及根治療法アリ甲ハ歇兒尼亞繃帶及刺戟藥ノ應用ニ乙ハ歇兒尼亞結紮及縫合、囊針搾法ナリ○(一)歇兒尼亞繃帶、最初脫腸ヲ整復シ扁平ナル麻織子塊ニ列並底ヲ攤布シ之ヲ瘤上ニ抵シ或ハ松脂硬膏粘着硬膏ヲ塗布シ腹帶或ハ繃帶ヲ以テ保定ス五週乃至六週ヲ經テ癒ユ○(二)強刺戟藥ノ應用 牛馬ニ施ス莨菪軟膏硫酸ニ三―五倍ノ水ヲ加ヘ毎日二回宛五―八日間囊ニ塗布ス又強硫酸及硝酸ヲ硝子捧ヲ以テ線狀ニ塗布ス各線ノ距離少ナクトモ一―二仙迷突ナルヲ要シ僅カニ二回ニテ足ル又格羅謨酸加里或ハ格羅謨酸(一〇ニ水五)ヲ一回塗布、莨菪軟膏ハ四―五日毎ニ塗布ス烙鐵ヲ刺戟藥ト並用ス近年食鹽溶液(六―八%)三〇―四〇、〇)ヲ囊ノ前後ニ注入シ四―六週間ニ三四回用フ前記刺戟藥ハ局所ニ炎症腫起ヲ起シ歇兒尼亞囊内容物ヲ腹腔ニ壓シ戻シ皮膚及皮下織ヲ收縮シ臍輪ハ狹窄シ若クハ閉鎖ス但シ幼獸ノ小歇兒尼亞ニ適シ大ナル者ニハ殆ント効ナシ○(三)結紮及縫合法、囊ニ頸アリ輪口小ナルハ結紮ス患畜ヲ仰臥セシメ後肢ヲ屈ケ謹ンテ整復シ彈力結紮ヲ施ス結紮ハ緊ニ過ク可カラス十乃至十二日ヲ經テ囊ト共ニ脱落シ囊ノ紮括部生着シテ脱腸ノ憂ナシ結紮滑脫ノ恐レアレハ太キ針ヲ囊ニ刺シ以テ結紮ヲ支フ可シ囊ニ頸ナケレハ縫合ヲ宜シトス患畜ヲ仰臥セシメ後肢ヲ開キ且ツ屈ケ被毛ヲ剔去シ皮膚消毒シ謹ンテ整復シ彎針ニ絹ノ復線ヲ掛ケ囊ヲ壓扁伸長シ囊端ヲ去ルニ仙米突許リ且ツ腹壁ニ近キ部分ニ於テ刺針シ糸ヲ通シ刺孔ニ近キ所ニ於テ一條ノ糸ヲ缺斷シ之ヲ結合シ針ニ遺ル一條ノ糸ヲ引キ長短ヲ一ニシ第一刺孔ヲ去ルニ仙

迷許ノ所ニ再ヒ針ヲ刺シ糸ヲ通シ刺孔ニ近キ所ニ於テ又一條ノ糸ヲ缺斷シ直ニ之ヲ結合ス如斯進行シテ全囊全ク縫合シ終ル縫合後ハ昇汞水石炭酸水ニテ囊ヲ洗滌シ沃度仿謨古魯胃謨ヲ塗布シ繃帶ヲ施ス爾後防腐ヲ嚴ニスレハ十乃至四十日ニシテ脱落シ創モ亦從ツテ癒ユ○(四)囊針搾法 ハ縫合ニ比スレハ簡單ナリト雖凡第一期癒合ヲ營マス搾子稍ヤモスレハ滑脫シ滑脫ヲ防クニ搾子ノ下ニ針ヲ通シ或ハ特製搾子ヲ用フ鐵製ニシテ其兩端ニ螺旋裝置ヲ具ヘ緩縮開閉ニ便ス其内面ニ齒ヲ具ヘ或ハ側面ニ四圓孔ヲ有シ縫線ヲ通スルニ便ス始メ懂ンテ整復シ可成腹壁ニ密接シテ搾子ヲ施シ去勢術ニ於ケルカ如ク糸ヲ以テ縛定シ或ハ螺旋ニテ固定ス初メハ患畜不安ナルモ十―十四日ニシテ囊脱落ス○前諸法ヲ試ムルモ効ナシト認ムレハ最後ノ手術トメ(五)歇兒尼亞切開術 ナ行フ此法ハ主トメ嵌頓歇兒尼亞ニ用フ之レニ内式及外式ノ二稱アリ○(イ)外式 ハ輪孔縫閉ノ爲メニ施ス先ツ縛倒麻醉仰臥被毛剔去術部消毒ノ後輪孔ノ長經ニ沿フテ皮膚ヲ切開シ剝離外半シ腹膜及内容ヲ還納シ刀ヲ以テ輪緣ヲ薄ク削剝シ若クハ細カニ亂切シ以テ新創面ヲ作り強獸腸線ヲ以テ輪緣ヲ縫合シ次キニ皮膚ノ餘レル部分ヲ切り去リテ莢翻縫合ヲ施シ壓定繃帶ヲ行ヒ腹帶ヲ施ス消毒防腐嚴ナレハ十八―二十五日ニシテ全癒ス○(ロ)内式ハ嵌頓歇兒尼亞整復ノ爲メニ施ス始メ外式ノ如ク進行シ腹膜露出スレハ鉸子ヲ以テ摘起シ刀尖ニテ小孔ヲ穿テ球刀鉈ヲ以テ之ヲ擴大シ示指ヲ挿入シテ内容ヲ推退壓定シ更ニ球頭鉈ヲ以テ輪緣ニ近キ所迄腹膜ヲ割開シ次キニ歇兒尼亞刀ヲ進メ

輪蓋ヲ切り輪孔ヲ潤大ニシ以テ内容ヲ還納シ終リ外式ノ如ク縫合保定ス

○鼠蹊過兒尼亞(陰囊過兒尼亞) *Hernia inguinalis*
S. Scrotalis

療法ハ嵌頓ノ有無ニヨリテ異ナル(一)嵌頓セサル者ノ療法(二)灌腸ヲ施シ宿糞ヲ排除シ仰臥保定後身ヲ高カラシメ内容ヲ還納整復シタル後再脱ヲ豫防スル爲メ罌丸ヲ牽引シテ精莖ヲ摩擦シ腫起ヲ起サシメ次テ馬ヲ立タシメ最初三日間ハ減食シ徐々運動セシメ十二日ニテ癒ユ又一法ハ内容ヲ還納シ鼠蹊輪ノ近傍ニ於テ獸帶ヲ以テ陰囊ヲ結紮シ八日間留置シ腫起スルヲ待チテ之ヲ解ク六乃至八日間ニシテ癒ユ(ろ)爽膜突起閉鎖又ハ狹窄法ニシテ一法ハ刺戟藥(莨菪一分硫酸銅一、五分龍骨木二、五分脂肪十五分)ヲ製シ罌丸ヲ下方ニ牽引シテ陰囊ノ皮膚ヲ緊張シ毎日一回該藥ヲ鼠蹊輪ノ近傍ニ於テ陰囊ニ塗抹シ大抵八―十日連用シ表皮剝離スルニ至リテ止ム爾後微温湯ヲ以テ其部ヲ洗ヒ炎症性狀消散スルニ及ンテ又新タニ塗擦ヲ始ム如斯シテ四―六週ニシテ獸兒尼亞消退ス○他ノ一方ハ鉗搾法ニシテ畧ホ被式去勢術ニ等シク整復ヲ逐ケ搾木ヲ可成鼠蹊輪ニ近ク莢膜上ヨリ施スニアリ搾木ニシテ可成鼠蹊輪ニ近クシメメカ爲メニ弓狀搾木ヲ用フルアリ搾木ハ尋常ノ者ヨリ短カキヲ可トス且ツ嚴ニ消毒シテ用フ可シ初メ麻醉セシメ還納ヲ逐ケ局所ヲ消毒ス高ク搾木ヲ施スヲ障害スルモノハ皮膚及皮下軟部ナルカ故ニ皮膚ハ可成的潤開シテ搾木ヲ創底ニ埋メ鼠蹊輪ノ直下ニ施ス次ニ皮膚ヲ引長シテ搾子ヲ包

ニ皮膚ヲ縫合シテ沃度仿謨ヲ撒布ス翌日ニ到リ熱候其他ニ惡徵ナク又術部大ニ腫起セサレハ搾木ヲ留置スルヲ八日ノ久シキニ涉ルモ敗テ害ナシ防腐消毒嚴正ナレハ搾木撤去ノ後良性肉芽速カニ發生シテ癒ユ○(は)腹輪又ハ鼠蹊輪縫鎖法、腹輪ハ深奥ニ位シテ容易ニ施シ難シ鼠蹊輪ハ容易ニ縫合シ得ルト雖モ其邊縁外ハ斜腹筋ノ隆ヨリ成ルヲ以テ癒合シ難シ要スルニ此法ハ確實ノ法ニアラス(二)嵌頓鼠蹊過兒尼亞ノ療法、最初整復ヲ試ムヘシ縛倒醉麻仰臥後身ヲ前ヨリ高カラシメ後肢ヲ屈シ患側ノ後肢ハ可成的外後方ニ引キテ保持シ過兒尼亞囊ヲ牽引回轉シ且ツ其頸部ヲ按摩シテ内容ノ還納ヲ試ミ之ト全時ニ手ヲ直腸ニ挿入シ腹輪ヲ搜探シ鼠蹊孔ニ陥入セル腸管ヲ細心徐々ニ牽引シ以テ内外相應スヘシ幸ヒニシテ整復シ終レハ馬體ヲ轉シテ健側ニ臥セシメ倒馬器ヲ解脱シ安靜ナレハ十五―三十分間其儘放置シ強テ立タシムルヲ要セス○前記ノ按攤還納法ヲ試ミ半時ヲ經ルモ尙整復シ得サレハ過兒尼亞手術ヲ施ス再ヒ麻醉藥ヲ用非テ充分麻醉セシメ後肢ノ下部及蹄ヲ洗滌シ濕巾ヲ以テ之ヲ包ミ塵埃ノ術部ヲ汚スヲ除キ術部ハ充分洗滌消毒シ陰囊底ニ於テ皮膚及肉様膜ヲ切斷シ指ト以テ莢膜突起ヲ露出スルヲ過兒尼亞囊頭ノ括約最モ緊ナル部ニ及ボシ一方ニハ指ヲ鼠蹊管ニ挿入シテ莢膜突起ノ括約部ヲ按摩シ又一方ニハ直腸ニ手ヲ挿入シ腸管ヲ鼠蹊管ヨリ徐々ニ引キ出タシテ整復ヲ試ムヘシ○嵌頓緊急ニシテ容易ニ整復セサレハ内過兒尼亞手術ヲ行フ其法ハ前法ニヨリ整備露出シタル莢膜ヲ切開シ場合ニヨリテハ過兒尼亞刀ニテ腹輪ヲ切

開瀉大ニス腹輪ハ其前隅ヲ外方ニ向ツテ切ル可シ後隅ノ内方ニハ動脈アリ謹ム可シ
シ切割ハ深キヲ要セス嵌頓部ヲ切ルノ僅カニ數密米ナレハ容易ニ整復シ得可シ既
ニ腹輪ヲ割大シ終レハ腹内器官ノ吸引力ニヨリ内容自カラ還納スルノ屢々アリ整
復シ終レハ搾木ヲ莢膜上ヨリ可成高ク結系ニ施スノ嵌頓ナキ過兒尼亞ト全シ〇畢
丸ヲ保存セント欲セハ陰囊及莢膜ヲ其外側鼠蹊輪ニ近キ部ニ於テ切割シ創口ヨリ
有孔探子ヲ挿入シテ莢膜突起ノ最狹部ニ達シ此部ヲ割大スルニ過兒尼亞刀ヲ以テ
ス皮創ハ縫合シ繃帶ヲ施シ防腐療法ヲ行フ可シ

○鼠蹊間質過兒尼亞 *Hernia inguinalis interstitialis.*

鼠蹊管ノ近傍ニ於テ腹筋破裂シテ腸管陰囊中ニ脱出シタル者ニシテ療法ハ恰カモ
鼠蹊過兒尼亞ニ同シト雖モ搾木ヲ用フル能ハス筋肉ノ裂孔ヲ縫合スルニ過キス

○股輪過兒尼亞 *Hernia Cruralis.*

箱頓セサ 過兒尼亞ハ刺戟藥例之莢膏軟膏ヲ塗布シ八日間起立セシメ十四日ヲ經
テ運動セシム箱頓ヲ起シタルモノハ仰臥整復ヲ試ミ効ナケレハ過兒尼亞手術ヲ施
ス囊ノ切開ハ大ニ過ク可カラス

○腹壁過兒尼亞 *Hernia Ventralis.*

新發シテ未タ箱頓セサルモノハ專ラ消炎法ヲ施シ場合ニヨリ壓迫繃帶ヲ施シ以テ
内容ヲ還納シ瘤ノ膨大ヲ防ク壓迫過度ナレハ皮膚壞疽シ腸脫ヲ來ス經久症ハ過兒

尼亞ノ一般療法ニ從ヒ強刺擊藥塗布、結紮縫合搾木等ヲ施シ尙効ナケレハ過兒尼
亞手術ヲ行フ

○橫隔膜過兒尼亞 *Hernia diaphragmatica*

生時診斷スルノ難ク多クハ死後剖見ニヨリ發見ス治療法ナシ

○腹臟露脫 *Evertatio.*

露脫セル腹臟ヲ充分洗滌消毒シテ全時ニ腹腔ヲ消毒シ還納ス箱頓ヲ起シ腸内瓦斯
蓄積膨大セハ穿刺シテ瓦斯ヲ排除シ還納ス脱露部暗褐赤色ニ變シ或ハ壞疽ニ陷レ
ハ其部ヲ切除漿液膜面ヲ接シテ縫合シ還納後腹壁ハ各々獸腸線ニテ同組織ヲ縫合
シ或ハ莢膜縫合ヲ施ス施術ノ結果ハ大抵不良ナリ術後漸時絶食シ後少量ノ軟粥粉
粥ヲ與ヘ緩下劑ヲ投ス

第六類 胃腸寄生蟲

○縲蟲 *Taeniidae.*

○葉狀縲蟲 *Taenia perfoliata.*

○皺狀縲蟲 “ *plicata*

○乳頭縲蟲 “ *mamillana.*

繚虫ハ前記三種ノ外種々アリ動物ノ種類ニヨリ其類ヲ異ニス馬ニ寄生スル者ハ葉
 狀繚虫牛白繚虫 (*Taenia alia*) 樹枝狀繚虫 (*Taenia denticulata*) 「テニアエキスバ
 ンザア」 (*T. Eapansa*) 羊ニハ「テニアエキスバンザア」犬ニハ「テニアクノク、メリ
 ナ」 (*T. Quemerina*) 「テニアセマルス」 (*T. Quenurus*) 及裂頭繚虫 (*Bothriocephalus*)
 猫ニハ「巨頭繚虫」 (*T. Grassicollis*) 豕ニハ「テニアソリウム」 (*T. Solium*) 等其主
 ナル者ナリ

(豫防法) 動物ヲ清潔ニ保飼シ濕潤ノ牧場ヲ避ケ豕ニハ人蘇ヲ食スルヲ禁シ繚虫及
 卵ハ燒棄シ包虫ヲ含有スル肉ヲ與ヘス之レヲ投スルキハ充分煮熟シテ與ヘ
 包虫宿主タル狐及黃鼠ヲ驅除シ犬ハ初春驅虫藥ヲ投シ蚤ヲ驅除ス

(療法) 驅虫藥ヲ投ス藥物ヲ與フ前一日ハ減食シ流動性飼料及乾草或ハ青草—少量
 ヲ給シ強壯ナル者ニハ下劑ヲ投シ晚食ヲ絶チ翌朝驅虫藥ヲ投ス其主ナル者
 ハ擲椰子粉加麻刺苦蘇綿馬根綿馬越幾斯支奈花石榴根及吐酒石砒石必苦林
 酸臭性獸油の列並底油必苦林酸加里及「タナセチ」草等ナリ就中下痢作用
 ナ兼有スル者ハ投藥後特ニ要セサルモ兼有セサルモノハ投藥後蓖麻子油甘
 永芒硝ノ如キ緩下劑ヲ與フ可シ〇(一)犬ニハ依的兒綿馬越幾斯〇、五—五、
 〇(回量)ヲ膠囊ニ入レ或ハ丸劑トナシテ與フ綿馬根—〇—二五、〇加麻刺
 二、〇—一五、〇擲椰子—〇、—二〇、〇牛酪ト砒劑トナシ與フ或ハ苦蘇花
 一、—二五、〇牛乳ニ混與石榴根皮五—五〇、〇チ一拉篤ノ水ニ二十四

時間浸漬シ後少量ニ煎シ與フ其他酸化銅〇、〇五) 嚙囉仿謨苦麗阿林等ヲ
 用フ〇(二)羊 仔羊ニハ時々流行狀ニ發ス豫防ヲ主要トス療法ハ各ホ犬ト
 全シキ驅虫藥ヲ用フ近時必苦林酸加里〇、五—一、二五)ヲ丸劑トナシ與フ
 「クワシン」 (*Kussin*) 〇、一)モ良効アリ羊ニハ綿馬越幾斯(二—四、〇)加
 麻刺五—六、〇トラスボー氏ハ松實(的列並底油ヲ含有ス)杜松子ヲ仔羊ニ
 自由ニ食ハシムルヲ便法トシスピノラー氏ハ一種ノ混合劑ヲ賞用ス(處方
 ナ見ヨ)〇家禽 ニハ擲椰子末二—三、〇チ牛酪ト爲丸劑與フ七面鳥ニハ
 危險ナリ擲椰子ノ粗末ヲ家禽舎ニ撒布スレハ多クハ之ヲ喰食ス其他加麻刺
 苦蘇綿馬根等ヲ用フ〇他ノ家畜 ニアリテハ治療ハ稀ナリ馬ニハ吐酒石砒
 石の列並底擲椰子ヲ用フ

處方

- (五八三) 苦蘇花二〇、〇 搗綿支奈五〇、〇 甘草末適量爲砒劑頓服 服用後六時ヲ經
 テ蘆薈二五、〇 軟石鹼適量ニテ丸劑ヲ調ヘ與フ(馬)
- (五八四) 亞砒酸二、〇 甘永四、〇 蘆薈末一五、〇 蜀葵末及水適量爲砒劑頓服(馬)
- (五八五) 臭性獸油の列並底油各四〇、〇 蘆薈末三〇、〇 蜀葵末水適量丸劑三個トナ
 シ兩三日ニ與フ(馬)
- (五八六) 吐酒石一五、—二〇、〇 飲水ニ伍シ頓服(馬)
- (五八七) 擲椰子末九〇、〇 每食餌ニ二食匙宛混與ス(馬)

- (五八八) 綿馬根一〇〇—二五〇、亞爾蘇二〇—五〇、蘆薈末三〇、蜀葵末適量爲砥劑兩三日ニ與フ
- (五八九) 必苦林酸加里〇、五—一、二五三包トナシ每三時一包宛武蘭酒ニ溶シ作用ノ顯ハル、迄與フ(仔羊)
- (五九〇) 「タナセチ」草末泥菖根木蓂兒各一〇〇、食鹽五〇〇、水及麩粉ヲ混シテ糞後乾燥シ羊百頭ニ與フ
- (五九一) 檳榔子末各五、〇—一〇、牛酪適量ニテ塊劑トナシ仔羊ニ頓服排糞ナケレハ三時間后ニ全方ヲ處ス
- (五九二) 蓖麻子油五〇、亞刺毘亞護謨二五、〇 餾水一〇〇、頓服下劑(羊)
- (五九三) 臭性獸油一、〇—五、〇 吐酒石〇、二—〇、三、頓服(羊)
- (五九四) 苦蘇五—一〇、〇 麥煎汁ニ混シテ頓服(仔羊)
- (五九五) 綿馬越幾斯二—四、〇 少量ノ麥煎汁ニ混シテ與フ三時間后ニ下劑ヲ投ス(羊)
- (五九六) 綿馬根一五〇、〇 食鹽二五、〇 蜀葵末水適量丸劑爲十個十頭ノ仔羊與
- (五九七) 「タナセチ」葉末一五、〇 粘汁ト混シ振盪合劑トナシテ與フ六—七時ヲ經テ反復ス(羊)
- (五九八) 苦蘇二〇—五〇、〇 蜂蜜三〇、〇 爲砥劑與フ(羊)
- (五九九) 綿馬越幾斯〇、五十個ノ丸劑ヲ調ヘ犬ニ與フ三時間後ニ蓖麻子油二〇、一

- 三〇、〇ヲ與フ(犬)
- 六〇〇) 加滿刺巴拉賓軟膏各一〇、〇 犬ニ頓服
- 六〇一) 苦蘇花末二〇、〇 蜂蜜五〇、〇 爲砥劑與フ(犬)
- 六〇二) 珊篤寧〇、〇 五—一〇、一五 牛乳ニ混シ頓服二時間ヲ經テ反復ス(犬)
- 六〇三) 依的兒綿馬越幾斯二、一八、〇 右ニ全シ(犬)
- 六〇四) 石榴根皮五〇、一—五〇、〇 水一〇〇〇、〇 ニテ煎出シ屢々内服ス(犬)
- 六〇五) 苦蘇花八、〇 複方旃那浸五〇、〇 爲振盪合劑一時間ニ二回分服(犬)
- 六〇六) 苦蘇四、一七、一—五、一三〇、〇 蜜及小麥粉適量ニテ丸劑トナシ頓服爾後二時乃至三時ヲ經テ再ニ同量ヲ反復ス(犬)
- 六〇七) 加滿刺二、一七、五—一二、〇 水ニ混シ振盪合劑トナシ與フ一時ヲ經テ反復ス(下劑ヲ要セス)(犬)
- 六〇八) 酸化銅〇、一五 蜀葵末三、〇 一日三回分服爾後反復ス(犬)
- 六〇九) 臭性獸油三—三〇 滴麵粉及水適量ニテ三丸ヲ調ヘ每三時一丸宛(犬)
- 六一〇) 綿馬根末一〇、一—二五、〇 牛乳ト振盪合劑トナシ一時間二回分服(犬)
- 六一一) 檳榔子一〇、一—二〇、〇 牛酪適量爲塊劑二回分服三時間後ニ排糞ナケレハ蓖麻子油一〇—三〇、〇 頓服
- 六一二) 綿馬越幾斯三、〇—五、〇—一〇、〇 綿馬根末五—一〇、〇 蜀葵末及水適量爲丸劑一乃至二時間ニ與フ

- (六一三) 甘永〇、二一、〇 藟葡巴根〇、六一三、七五 蜀葵末及水適量爲丸劑下劑トシテ與フ(犬)
- (六一四) 嚼曬仿謨四、〇 蓖麻子油五〇、〇 混和二回分服(犬)
- (六一五) 酸化銅〇、〇 五澱粉〇、二爲一包其三包ヲ作り毎日一回一包宛(犬)
- (六一六) 綿馬越幾二、五 綿馬根末五、〇 黃蠟適量爲十包中等大ノ犬ニ頓服
- (六一七) 細挫石榴根皮五〇、〇 餾水二五〇、〇 右十二時間浸出シ全量百瓦ニ至ル迄煮沸シ犬ニ二回分與ス

〇蛔蟲 *Ascaridae.*

〇巨頭蛔蟲 *Ascaris megalocephala*

馬ニ寄生スル者ハ巨頭蛔虫人豕犬牛ノ小腸ニ寄生スル者ハ「アスカクス、ルンブリコイデス」(*Ascuisumblicoides*)ナリ

(豫防法)

糞虫ノ如ク蛔虫及卵ヲ廢棄燒却シ新購入動物特ニ鳩ハ隔離視察シ蛔虫症ニ罹レル動物ハ健畜ヨリ隔離シ厩舎ヲ清潔ニシ熱瀉汁石鹼水ニテ洗滌シ牀板ヲ消毒(五—十%石炭酸水)シ家禽ニハ五—一〇滴ノ過泥子油一—二茶匙ノ橄欖油ヲ豫防藥トシ與フ

(療法) 馬ニハ吐酒石一〇、一—一五、〇ヲ飲水ニ混與シ或ハ砥劑トナシ每三時三乃至四回與フ 珊篤寧一〇—二五、〇ヲ甘永ニ伍シテ用フ 檳榔子末一〇〇、〇—二

五〇、〇ヲ每食一食匙混與砥石一、〇—二、〇丸劑的列並底油一〇〇—二〇〇、〇爲乳劑或ハ臭性獸油二〇—三〇、〇「ベンジン」五〇—一〇〇、〇支奈花一〇〇—二〇〇、〇綿馬根「タナセチ」草亞爾薩阿魏、苦麗阿林等ヲ用フ其他甜菜胡蘿蔔馬鈴薯等ヲ與フ 犬 ニハ珊篤寧〇、〇五—一〇、二(成犬)乃至〇、〇—一〇、〇二(幼犬)砂糖ト混シテ與ヘ後ニ蓖麻子油ヲ與フルカ或ハ珊篤寧ヲ蓖麻子油ニ混シテ與フ其他檳榔子一〇—二〇、〇綿馬越幾斯、必苦林酸加里苦麗阿林等ヲ與ヘ又大蒜煎汁ヲ牛乳ニ混シテ與フ 鶏 ニハ檳榔子ヲ鶏二三、〇鳩二一、〇ヲ與ヘ 豕 ニハ全藥五—一五、〇(日量)ヲ與フ、

處方

- (六一八) 珊篤寧一〇、〇 甘永五、〇 杜松子羔五〇、〇 爲砥劑與フ(馬)
- (六一九) 白砥石二、〇 蘆薈末三〇、〇 亞爾薩葉末二〇、〇 蜀葵末及水適量丸劑二個トナシ與フ(馬)
- (六二〇) 亞砒酸末二、〇 蘆薈末二〇、〇 軟石鹼適量以上爲一丸其二丸ヲ作り與フ(馬)
- (六二一) 的列並底油一〇〇、〇 蓖麻子油五〇〇、〇 頓服(馬)
- (六二二) 綿馬根六〇、〇 甘草根末五〇〇、〇 蜀葵適量砥劑トナシテ與フ(馬)
- (六二三) 吐酒石一五、〇 餾水三〇〇、〇 飲水ニ混シテ朝與フ(馬)
- (六二四) 珊篤寧〇、一 蓖麻子油三〇、〇 一日ニ一食匙(一茶匙)ヲ大犬(小犬)ニ與フ

(六二五) 珊篤寧〇、白糖〇、五以上一包トナシ其三包ヲ作り每三時一包宛(犬)
(六二六) 珊篤寧〇、三菟麻子油五〇、〇混和溶液トナシ每三時一食匙(一茶匙)ヲ犬
犬(小犬)ニ與フ

(六二七) 珊篤寧二五、〇菟麻子油五〇〇、〇馬ニ頓服(馬)

〇ストコンギルス *Strongylidae.*

〇ストロンギルス、アルマトツス *Strongylus curm*

ctus

〇ストロンギルス、テトラカンツス ”

tetro

centlus.

診斷シ難ク之ニ遭遇スル場合少ナシ療法ハ概シテ蛔虫ニ同シ的列並底油ヲ賞用ス
羊ニ寄生スルストロンギルス、コントルツス(*St. Contortus*)ニハ的列並底油臭性
獸油必苦林酸及必苦林酸加里〇、一〇、三ヲ用フ

處方

() 臭性獸油的列並底油各一分酒精三分一日一茶匙宛内服(羊)

〇曉虫 *Oxyuris.*

〇オキシウリス、クルブラ *Oxyuris curbula*

〇オキシウリスビバ *vivipara*

〇オキシウリス、マスチゴージェス ” *mastigodes.*

(豫防法) ハ曉虫及卵ヲ含有スル糞ヲ廢棄燒却ス

(療法) ^{ニシテ}大蒜煎汁偏陣(一二五〇水)石鹼水、醋、稀釋昇汞(千倍—五百倍)ノ灌腸石
炭酸ノ直腸洗滌及石炭酸鉛糖軟膏ヲ直腸及肛門ニ塗布ス

〇馬虻虻 *Oestrus equi (Larvae)*

(豫防法) ハ虻ノ侵襲ヲ防キ皮膚ヲ被ヒ胡桃煎苦蓮煎大蒜胡蘆葉煎等ニテ洗滌シ石
油、扁陣、臭性獸油等ヲ皮膚ニ塗布ス

(療法) ハ驅虫藥例之的列並底油臭性獸油木醋炭酸加里綿馬根必苦林酸加里苦麗
阿林等ヲ用フルモ効果實正ナラスペロンシトー氏ハ硫化炭素二〇、〇(馬)
ヲ膠囊ニ入レテ内服藥ヲ賞用ス諸家ノ實驗ニヨレハ其効良シ

第七分類 肝臟諸病

〇黃疸 *Icterus.*

牛馬ノ黃疸、加答兒性黃疸ハ其徑過ヲ取り自然ニ治癒シ藥物ヲ投スルコト少ナシ攝
生ヲ主トシ易消化液狀食料粉粥穀煮熟馬鈴薯青草等ヲ與ヘ稍ヤ重キ者ニハ亞爾加
里劑食鹽或ハ人工加兒爾斯泉鹽ヲ粘汁ニ混シ一日二回一匙宛ヲ與フ初期ニハ腸管
内容物ノ疏通及消毒ノ爲メ甘汞(駒二—三、〇馬三—八、〇犢二—二、〇牛三—五、

○ヲ賞用ス清涼ノ飲水ヲ與ヘ適當ノ運動ヲ課ス其他蘆薈蓖麻子油(三〇、〇)大黃丁幾(四〇)次硝酸蒼鉛ヲ用フ數週ニ涉リテ癒ヘサレハ肝臟ニ器質變化ヲ起シ肝部ニ疼痛ヲ呈シ疝痛狀ヲ現ハシ下痢秘結ヲ交々發ス(肝臟炎ヲ見ヨ)○羊 毛亦牛馬ト全様ナリ時トノ惡性黃疸ニ罹ルヲアリ

犬ノ黃疸 ハ屢々遭遇ス治療困難特ニ輸汁排泄管ノ閉塞ニ於テ照リ 攝生ニ注意シ肉羔煮熟肉粉粥等ヲ與ヘ初期甘汞(小犬ハ朝夕〇、〇三一〇、〇五六犬ニハ〇〇、五—〇、二)ヲ與ヘ次日蓖麻子油(一茶—一食匙)ヲ與ヘ管ヲ腸内ニ挿入シテ腸内ニ清水灌注ヲ行フ如此クスレハ鞏膜及尿ノ黃色ハ退散ス其後人工加兒爾斯泉鹽、酒石大黃茴香等ヲ與ヘ衰弱ノ徵アレハ咖啡依的兒樟腦赤葡萄酒規即等ヲ與フ器械的療法トノ腹壁按擗ヲ朝夕十分間宛行ヒ膽汁囊ヨリ排泄ヲ催進シ近年電氣ヲ應用ス(シューガムクロツキー氏) 處方

- (六二二八)食鹽二五〇〇重曹龍膽末五〇〇麵粉ニテ砥劑トナシ二三日ニ與(馬)
- (六二二九)食鹽芒硝杜松子各一〇〇〇爲散劑每食一匙宛混與(牛馬)
- (六三〇)人工加兒爾斯泉鹽甘草根末亞麻仁末各一五〇〇爲散劑正午及夕ニ一匙宛飼料ニ混與ス(牛馬)
- (六三一)食鹽一〇〇〇大黃五〇〇〇過泥子一〇〇〇爲散劑每食一匙宛(牛馬)
- (六三二)食鹽酒石酸加里各一五〇〇爲散劑每食一刀尖宛混與(犬)

(六三三)人工加兒爾斯泉鹽一五〇〇過泥子浸五〇〇(一五〇、〇)日々二三回一茶—一食匙宛與フ(犬)

- (六三四)大黃丁幾八〇〇酒石一〇〇〇一匙宛健胃劑トノ與フ(犬)
- (六三五)重曹一〇〇食鹽一五〇〇甘草末二〇〇〇過泥子油三滴爲散劑一日二三回一茶匙宛與フ(犬)
- (六三六)大黃舍利別五〇〇稀鹽酸一〇〇屢々一茶匙宛與フ(犬)
- (六三七)鹽酸規尼涅二〇赤葡萄酒二五〇〇衰弱ノ際一日屢々一匙宛與フ(犬)

○肝充血 *Hypervæmia hepatis*

食餌運動ニ注意シ緩下劑ヲ投ス就中人工加兒爾斯泉鹽ハ最モ適セリ

○肝裂 *Ruptura hepatis*

劇症ハ無効緩慢ノ症ニアリテハ安靜ナラシメ肝部ニ冷水灌漑ヲ施シ收斂藥麥角鉛糖ヲ試ミ出血後ノ衰弱ニハ興奮藥例之樟腦酒精依的兒等ヲ與フ

○肝臟實質炎 *Hepatitis Parenchymatosa*

攝生ニ注意シ清潔換氣善食カ爾廐舎ニ容レ決シテ濕氣多キ廐舎ニ容ル、可カラス之レ門脈鬱血ヲ起セハナリ蒸熱ノ天候ニハ特ニ攝生ヲ怠ラス清涼ノ飲水ヲ與ヘ易消化飼料青草馬鈴薯粉粥犬ニハ粘液肉汁等ヲ與フ藥物ハ中性鹽類人工加兒爾斯泉鹽及下劑ヲ投シ胸腹壁ニブリースニツツ氏器法ヲ行フ本症若シ肺氣腫慢性腸加答

兒胸腹水ニヨリ發シタル場合ニハ不治トス
處方

(六三八) 甘汞五、○ 蘆薈末三五、○ 軟石鹼一五、○ 蜀葵末適量爲丸劑馬ニ與フ

(六三九) 芒硝五〇〇、○ 食鹽二五〇、○ 龍膽末一〇〇、○ 爲散劑每食一—二食匙宛混與ス(牛)

(六四〇) 人工加兒爾斯泉鹽二五〇、○ 甘草末一五〇、○ 爲散劑每食一—二食匙宛混與ス(牛馬)

(六四一) 人工加兒爾斯泉鹽一五〇、○ 薄荷油二五〇、○ 日々屢々一匙宛與フ(犬)

○ 慢性肝間質炎(肝硬變) *Hepatitis interstitialis chronica*

不治症ニシテ姑息療法ヲ施スニ過キス乃チ人工加兒爾斯泉鹽重曹蘆薈大黃丁幾ヲ用井水腫ニハ利尿藥(醋酸那篤留漢實芟答利斯咖啡涅等)ヲ處シ大ニ食餌ニ注意シ給食ノ量ト時トナ一定ニシ馬ニハ青草犬ニハ肉ヲ與フ

○ 肝澱粉變生 *Degeneratio amyloidea hepatis*

療法ハ無効須カラク原病ニ治チ加フ可シ

○ 膽石 *Calculi biliaris*

加兒爾斯泉鹽又ハ亞爾加里鹽類ヲ與ヘ攝生ニ注意シ充分運動スシム

○ 肝蛭 *Distomum hepaticum*

(豫防法)ノ要主ハ有害牧場ヲ避ケ肝蛭卵ヲ撲滅スルニアリ羊ハ本病ニ罹リ易キカ故ニ決シテ疑ハシキ牧場ニ放タス殊ニ仔羊ニハ注意ヲ要ス本虫ノ中間宿主タル蝸牛及蛞蝓ヲ驅除シ動物ノ營養ヲ好クシ強健ニ保チ虫ニ對スル抵抗力ヲ強クス患畜ハ不治ト認ムレハ直ニ撲殺シテ肝ヲ燒却シ斃獸ノ屍體及排泄物ハ滅却ス低濕牧場ハ灌溉法ヲ設ケ土地改良ヲ行ヒ石灰或ハ石膏ヲ撒布シ常ニ食鹽ノ自由砥劑ヲ與ヘ且ツ滋養蛋白質ニ富メル飼料善良乾草燕麥粉粥等ヲ給ス可シ輕症ノ者ハ攝生ニヨリ治スルヲアリ

(療法)攝生、藥物ハ食鹽煨性石灰硫酸鐵磷酸石灰龍膽末、糊皮、杜松子其他臭性獸

油結麗阿曹篤偏陣必苦林酸加里「フェナセチン」的列並底油炭酸加里酸化鐵

等ヲ自由砥劑或ハ散藥トナシ食物ニ混與ス家禽ニハ蓖麻子油二食匙或ハ甘汞(〇、〇六一〇、一二)ノ丸劑或ハ臭性獸油一茶匙ヲ與フ

處方

(六四二) 精製硫酸鐵六〇、○ 泥菖根末或ハ薑末五〇〇、○ 挽割大麥或ハ細碎燕麥二封度水適量ニテ砥劑トナシ百頭ノ羊ニ與フ

(六四三) 精製硫酸鐵三〇、○ 龍膽根末吐松子末各五〇〇、○ 大麥粉或ハ燕麥二封度水適量ニテ砥劑トナシ五十頭ノ羊ニ與フ

(六四四) 蒼草二五〇、○ 杜松子末七五〇、○ 食鹽一〇〇〇、○ 爲散劑白頭ノ羊與
(六四五) 泥菖根亞爾薈各二〇、○ 食鹽煤各六〇、○ 的列並底油一五〇、○ 丸劑トナ

シ十頭ノ羊ニ與フ
(六四六)粗製硫酸鐵七五、○杜松子五〇〇、○龍膽末加兒微實各一〇〇、○粉末ト
ナシテ食物ニ混シ五十―百頭ノ羊ニ與フ

○肝包蟲 *Echinococcus hepatis.*

療法ナシ人醫ノ如ク包虫囊ノ穿刺ヲ試ムヘシ豫防ヲ必要トス公衆衛生上ニ危險ナル虫囊ヲ撲滅シ犬ノ糞蟲ヲ驅除シ且ツ犬ノ數ヲ減シ飼犬ニ適當ノ取締ヲ設ケテ奔脱セシメス

○肝腫瘍

適當ノ療法ナシ

第八分類 腹膜諸病

○急性腹膜炎 *Peritonitis acuta.*

初期ハ腹部ニ冷湯ヲ行ヒ次テプリースニツツ氏器法ヲ施シ溫包シ或ハ刺戟藥ヲ塗布ス腹腔滲出液多量ナレハ穿腹術ヲ行ヒ其液濃厚ナレハ腹部切開術ヲ施シ硼酸水撒里矢爾酸若クハ苦麗阿林水ニテ洗滌シ又ハルーゴ―氏液ヲ注入ス内服ニハ吐酒石硝石芒硝若クハ甘汞ヲ芒硝ニ伍シ便秘アル際ニ用フ又阿片未ノ大量(馬一〇、○)牛一五、○犬〇、一―〇、五)ヲ砥劑又ハ丸劑トナシ與フ或ハ微溫湯ニ和シ灌腸ス滲

出液多量ナレハ利尿藥實莖答利斯咖啡涅「ストロファン」丁幾杜松子、的列並底油醋酸加里等ヲ與ヘ或ハ必魯加兒必涅又ハ「アレコリン」ノ皮下注射ヲ行フ衰弱甚タシケレハ衝動藥ヲ與フ原病ノ療法ハ原ヨリ念ル可カラス例之子宮膀胱ヲ消毒シ膿瘍ヲ切開シ箝頓過兒尼亞ニハ手術ヲ施スカ如シ

(六四七)甘汞一〇、○芒硝二〇〇、○蜀葵末適量丸劑四個トナシ馬ニ二日分服
(六四八)阿片丁幾五、○亞刺毘亞護謨一〇、○餽水一五〇、○一日四食匙宛與(犬)
(三四九)鹽酸莫兒比涅〇、五餽水一五、○爲溶液皮下注射

○慢性腹膜炎 *Peritonitis chronica*

利尿藥即チ醋酸加里杜松子硼砂實莖答利斯咖啡涅海葱及緩下劑ヲ試ム大動物ニハ鹽類下劑小動物ニハ蓖麻子油又ハ甘汞等ヲ用フ滲出液ノ量多キ時ハ穿腹術ヲ施ス病初滲出物少ナキハ腹部ヲ溫包シ沃度加里又ハ沃陣鐵ヲ用ヘ手術ヲ施シタリ後ハ穿孔ヨリルーゴ―氏液(沃度一、○沃度加里五、○餽水五〇、○)ヲ注入ス

○腹水 *Ascites*

先ツ原病ノ治療ヲナス即チ心臟病、肝病腎病肺病全身水腫等ノ處置ヲナス可シ然レハ多クハ充分ノ効ヲ奏セス故ニ姑息ノ目的ヲ以テ滋養食ヲ給シ利尿藥ヲ與フ例之醋酸加里、酒石、食鹽人工加兒爾斯泉鹽、實莖答利斯杜松子海葱(二、○)咖啡涅

(〇、五—二、〇)「ストロファン」丁幾(十乃至二十滴)「ヂューレチン」(每二時〇、五—一、〇)ヲ用フ鹽類下劑及硫酸越攝林ノ皮下注射ヲ用ヘ發汗劑トシ必魯加兒必涅(馬〇、二牛〇、三犬〇、〇一)ヲ與ヘ又「アレコリン」(馬〇、〇八)ノ皮下注射ヲ施ス但シ心臟病アル者ハ之ヲ忌ム○滲漏液過多ナレハ穿腹術ヲ施ス乃チ牡獸ニアリテハ臍ト陰莖トノ中間ニ於テ白線ノ部ヲ穿刺ス若シ前方ニ過クレハ胃ヲ傷ケ後方ニ失スレハ膀胱ヲ損スル恐レアリ○犬ハ心臟病(心臟系狀虫病)ノ爲メニ往々腹水ヲ發ス利尿劑ヲ與ヘ兼テ攝生ニ注意シ生肉、肉汁葡萄酒鐵劑等ヲ與ヘ重曹醋酸加里炭酸亞母尼亞、硼砂海葱質荳答利斯「ストロファン」等ヲ與フ

處方

(六五〇)食鹽一〇〇、〇精製炭酸加里五〇、〇杜松子二〇〇、〇爲散劑每食餌ニ一食匙宛混與ス(牛馬)

(六五一)人工加兒爾斯泉鹽の列並底油蜀葵末各一〇〇、〇爲砥劑正午及夕ニ一菟宛與フ(牛馬)

(六五二)質荳答利斯丁幾一五〇、〇毎日一食匙宛半瓶ノ水ニ混シテ與フ(牛)

(六五三)醋酸加里液洋芹水各七五、〇橙皮舍利別二五、〇毎日數回一茶乃至一食匙宛與フ(犬)

(六五四)硼砂一〇、〇規那皮五、〇茴香三、〇爲散劑毎日三回一匙宛(犬)

(六五五)海葱醋五〇、〇炭酸安母尼亞適量茴香水一五〇、〇毎日數回一茶乃至一食

匙宛與フ(犬)

(六五六)質荳答利斯葉浸一〇〇、〇(一〇、〇)醋酸加里一五、〇杜松子稠煮一〇、〇

毎日三回一匙宛(犬)

(六五七)質荳答利斯葉一、〇(一五〇、〇水)醋酸加里液及杜松子稠熬各一〇、〇一日一二食匙宛與フ(犬)

(六五八)咖啡涅一、〇白糖五、〇混和粉末トナシ五包ニ等分シ一日一包宛與(犬)

(六五九)安息香酸曹達咖啡涅二、〇亞刺昆亞護謨白糖適量爲十丸一日一二丸宛與フ(犬)

(六六〇)海葱浸二、〇(二〇〇、〇)杜松子蒸二〇、〇爲溶液一日一二食匙宛(犬)

(六六一)「ヂウレチン」五、〇餾水一五〇、〇爲溶液每三時一食匙宛(犬)

第九分類 脾臟諸滴

○脾充血 *Hyperaemia lienis*

急性脾充血ハ傳染病特ニ敗血症ノ一症候トシ現ハレ虛性充血ハ血行障害ノ副症トシテ發ス故ニ其原病ノ治療ヲ務ム可シ

○脾炎 *Lienteritis*

脾炎ハ器械的外傷(壓迫打撲挫傷等)膿毒症及ヒ隣部器官炎症ノ蔓延ヨリ來ル療法ハ原病ヲ治療シ兼テ對症療法ヲ行フ

○脾裂 *Ruptura lienis.*

患畜ヲ安靜ニシ止血藥ヲ投ス麥角丹寧鉛糖鐵劑等ノ如シ補遺

○斜齒(稜齒) *Scharfe oder Kantige Gebiss;*

Schiefernahme (獨)

齒砲ヲ以テ斜稜隅角ヲ撞破シ齒齧ヲ以テ摩擦平滑ニス可シ甚タシキ者ハ鑿及槌ヲ以テ擊破ス深奥部ニアリテハ注意シ軟部ヲ損傷セセサルヲ謹ム槌ノ打撲法ハ強且ツ短ナルヲ要ス

○剪狀齒 *Scherengebiss.* (獨)

稜角ヲ齧或ハ鑿ヲ以テ撤去スレハ軟食ヲ與フレハ咀嚼ニ耐ユ齒未タ崩解セス且ツ重症ニアラサレハ之レヲ行フヲ得貴種馬及幼馬ニアリテ齒剪刀ヲ以テ稜角突起ヲ切除スメラー氏ハ此法ニヨリ屢々成効セリ

○滑齒 *Glatte Gebiss.* (獨)

姑息療法トノ柔軟細挫セル飼料粉粥練飼液汁等ヲ與へ咀嚼ヲ容易ナラシムルニ過キス

○齒磨過早 *Vorzeitige Abnutzung des Gebisses* (獨)

柔軟ノ飼料ヲ與へ咀嚼ヲ容易ナラシム乃チ挽割飼或ハ粉汁等ヲ與へ可成永ク勞役ニ服セシムル様攝生ニ注意スル外療法ナシ

○波狀齒 *Wellenformige Gebiss* (獨)

銳角或ハ尖端ヲ齧削ス挽割細碎飼料粉汁等ヲ與へ咀嚼ヲ容易ナラシム過長ノ齒ニテ軟部ヲ損傷スル者アレハ短切スルカ或ハ拔除スヘシ

○階齒 *Treppen Gebiss* (獨)

姑息療法ニ過キス過長ノ齒ハ短切若クハ拔除シ軟食粉汁等ヲ與へ咀嚼ヲ易カラシム

○急性鼓腸 *Tympanitis acuta*

(豫防法)乾草ヨリ青草ニ變スルノ際注意ス可シ牧草殊ニ苜蓿繁茂ノ地ニハ空腹ノ動物ヲ放牧セス先ツ少許ノ青草ヲ與へ漸ラク之ニ慣レシム可シ草ヲ刈リテ貯フルニ堆積セスシテ廣ケ撒布ス可シ又粘稠生黴ノ食ヲ與フ可カラス
(療法)蓄積シタル瓦斯ヲ除去スル爲メ屢々舌ヲ引キ出シ又ハ口ニ藁索ヲ施シ之ニ爹兒脂油ノ類ヲ塗リ頻リニ砥却セシメテ暖氣ヲ促ス又兩手ヲ以テ強ク左腹側ヲ按壓シ且藁ヲ以テ摩擦シ頻リニ冷水ヲ灌キ輕症ハ運動セシム内服ハ衝動藥例之武蘭酒(二五〇—五〇〇、〇四合許ノ冷水ニ加シテ與フ)白藜蘆丁幾(一五、〇—二〇、〇武蘭酒混與)植物性驅風藥例之加密爾列齒香薄荷乾薑

ヲ試ム瓦斯吸收劑苛性安母尼亞水礮砂精(一〇、〇—三〇、〇)ヲ三十倍乃至五十倍ノ冷水ニ和シ半時間又ハ二時間毎ニ反復ス又礮砂精一〇、〇武蘭酒五〇、〇ヲ水一瓶ニ和シテ用フ其他石灰水石鹼水加里溶液の列並底油等ヲ用フ制酸藥例之次亞硫酸曹達(一〇〇、〇—二〇〇、〇)格魯兒酸加里(二〇—六〇、〇)稀鹽酸(一〇、〇—一五、〇)苦麗阿林等ヲ反復服用ス或ハ依的兒(續二五、〇)牛一〇〇—二〇〇、〇ヲ一瓶ノ燕麥粘汁ニ混與スノ内服ヲ用フ但シ屠殺スル場合ニハ之レヲ與ハス之レ肉ニ異臭ヲ附スレハナキ輕症ニハ越攝林必魯加兒必涅ノ少量(〇、一—〇、三)ヲ皮下注射ス内服藥効ヲ奏セザレハ食道探子ヲ挿入シ或ハ套管針ニテ瓦斯ヲ驅出スヘシ〇羊ノ同症モ牛ニ全シク腹部壓迫擦冷水灌漑ヲ行ヒ内服ハ石灰水ノ四分一拉篤ヲ十分乃至十五分毎ニ反復ス又次亞硫酸曹達(一五、〇)的列並底油半食匙格魯兒風謨丁幾(五滴)礮砂精(半食匙水一〇〇、〇)ヲ與フ又樟腦精一食匙ヲ每十五分ニ試ム可シ又牛羊ニ勿刺篤利涅(〇、一)ノ皮下注射ヲ試ム

處方

- (六六二)稀鹽酸一五〇、〇二日間ニ五回ニ分與ス每回一拉篤ノ薄荷浸ニ混ス
- (六六三)白藜蘆根吐酒石各一五、〇硫酸麻僱涅更謨一五〇、〇泥葛根七五、〇混和三分シ十二時間ニ亞麻仁粘汁ニ混シ分服ス(牛)
- (六六四)芒硝五〇〇、〇亞爾蘇七五、〇食鹽一〇〇、〇烟草煎汁ニ混シ二回分服

(六六五)次亞硫酸曹達二五〇、〇蘆薈越幾斯蜀葵末二〇、〇微溫湯ニ混シ二回分服(牛)

- (六六六)吐酒石二、〇—四、〇食鹽五〇、〇—一〇〇、〇混和飲水ニ混シ頓服
- (六六七)白藜蘆根一〇、〇芒硝一五〇、〇一瓶ノ薄荷浸ニ混シテ屢々與フ(牛)
- (羊ニハ白藜蘆丁幾二—三、〇續ニハ一—二、〇ヲ全樣ニシテ與フ)
- (六六八)苛性安母尼亞水一五〇、〇一拉篤ノ石鹼水ニ混シテ與フ(牛)
- (六六九)的列並底油五〇、〇芒硝三〇〇、〇亞麻仁七五、〇微溫湯ニ和シ二回分服(牛)

- (六七〇)的列並底油二五〇、〇石鹼水一〇〇〇、〇十頭ノ牛ニ頓服
- (六七一)酸化麻僱涅矢亞三〇、〇加密爾列浸二五、〇(二五〇、〇)爲振盪合劑每一時一食匙宛(續)
- (六七二)酸化麻僱涅矢亞白藜蘆根末各二〇、〇混和一瓶ノ武蘭酒ニ加ヘ振盪合劑トナシ與フ(牛)
- (六七三)安母尼亞水二〇、〇一瓶ノ冷水ニ能ク混和シテ與フ(牛)

慢性鼓腸

Tympanitis Chronica.

易消化飼料柔軟夏質ノ乾草穀汁等ヲ屢次少量宛給與ス慢性胃加管兒ノ療法ト同シク主トシ稀鹽酸次亞硫酸那篤留謨苦麗阿林中性鹽類食鹽重曹吐酒石(少量)并ニ胃衝動劑例之白藜蘆根的列並底油煙草葉煎汁等ヲ用ヘ頑固症ニハ套管針ヲ挿入スト

ラスボー氏ハ吐根末四、〇一八、〇ヲ實用ス

(六七四)硫酸麻屈涅矢亞一五〇、〇亞爾蘇四〇、〇稀鹽酸一〇、〇一瓶ノ微溫湯
ニ混シ與フ(牛)

(六七五)鹽酸四〇、〇酒精二〇〇、〇一瓶ノ苦蓮煎ニ混シテ二分服(牛)

(六七六)芒硝一五〇、〇蘆薈末四〇、〇葛縷子一二〇、〇爲散劑一日二回小握手宛
飲水ニ混與ス(牛)

(六七七)蘆薈末白藜蘆根末各一〇、〇爲散劑一瓶ノ亞麻仁煎ヲ以テ振盪合劑トナ
シ與フ(牛)

(六七八)加密爾列浸五〇(一〇〇、〇鹽酸五〇右二分服(續))

(六七九)次亞硫酸曹達硫酸麻屈涅矢亞各三五〇、〇一日三回亞麻仁煎ニ混シ振盪
合劑トナシテ與フ

〇第一胃食滯

Pausenberghaltung beim Rinde (獨)

輕症ハ數日間減食運動ヲ命ス適量ノ水ヲ給シ多量ノ飲料ヲ與フ可カラス唾液ノ飲
下止マリ胃内容乾燥シ胃壁ノ運動障害ヲ起シ反芻作用ニ違和ヲ呈スルキハ唾液ノ
分泌ヲ催進スル爲メ藜索ニ食鹽胡椒參兒等ヲ塗布シテ口内ニ挿入刺戟ヲ與ヒ全時
ニ運動セシム次ニ腹部ノ按摩ヲ行フ乃チ左腹側ヲ兩手ヲ以テ輕打按摩ス壓迫ハ強
實ニシテ撞擊ナル可カラス之ニヨリテ効アレハ其後冷水ヲ灌注シテ尙按摩シ次テ
冷濕布ヲ纏包ス數日經過シ尙癒ヘサレハ下劑及吐劑胃衝動劑ヲ與ヘ灌腸ヲ施ス中

性鹽類吐酒石、吐根煙草ヲ用ヘ越攝林必魯加兒必涅ノ少量ヲ與フ但シ饑飢溝ノ充
分緊滿セル際ニハ決シテ用ヘス其收縮弛緩スルノ後(越攝林羊〇、〇一〇、〇五
牛〇、一〇、〇二)必魯加兒必涅(牛〇、二一〇、五羊〇、〇五)ヲ與フ輕度食滯ニハ
粘汁飲料ニ芒硝或ハ硫酸麻屈涅矢亞ヲ苦蓮煎ト混シテ與ヘ烟草葉煎(二ハ一五〇、
〇)ノ灌腸ヲ行フ之ニヨリ反芻作用完カラサレハ吐根(牛五一一〇羊山羊ニハ二
一五、〇)チ一瓶ノ粘汁ニ混シテ與フ(勿刺篤利丁幾(牛一〇一、二五〇)勿刺篤利涅
(〇、〇五一〇、一五)ヲ與ヘ快方ニ向ヘハ稀鹽酸ヲ與フ〇若シ熱發セハ急性胃腸加
答兒ノ症ニシテ刺戟性藥物ヲ與ヘス粘汁煎ニ甘汞ヲ伍用ス頑固症ニハ第一胃切術
ヲ行ヒ内容ヲ除去ス(手術篇ヲ見ヨ)

處方

(六八〇)吐酒石一〇、一ニ〇、〇芒硝二五〇、〇一瓶ノ亞麻仁煎油一〇〇、一二〇〇
〇ト振盪合劑トナシ與フ(牛)

(六八一)白藜蘆根丁幾五、〇一八、〇硫酸麻屈涅矢亞五〇、〇一〇〇、〇半瓶ノ粘
汁ニ溶解シ一二回ニ與フ(羊)

(六八二)的列並底油酒精各一〇〇、〇一瓶ノ亞麻仁煎ニ混シ頓服

(六八三)煙草葉五〇〇、二瓶ノ水ニテ煎出シ二回二分與ス每回一乃至二握手ノ食

鹽ヲ混ス(牛)

(六八四)亞爾蘇浸一五〇、〇勿刺篤利涅〇、〇一酒精三〇、〇頓服(羊)

六八五)甘汞二一五、○蜀葵末四五、○爲丸劑熱發ノ際與フ(牛)
(六八六)白藜蘆根末一〇、○纈草根末二五、○芒硝二五〇、○半拉篤ノ亞麻仁煎ニ
テ合劑トナシ頓服(牛)
(六八七)吐酒石一〇、○餽水三〇〇、○爲溶液一瓶ノ亞麻仁煎ニ加ヘ與フ(牛)

○第四胃及十二指腸加答兒

Labmagenkatarrhund
Labmagenzöfingdarmkatarh beim Rinde

減食易消化飼料ヲ給シ人工加答兒爾斯泉鹽及稀鹽酸ヲ投スサーケ氏ハ單寧ヲ實用ス

○創傷性胃橫隔膜炎

Traumatische Gastrophrenitis
beim Rinds (獨)

豫防法トシテ酪婦ニ鍼釵等ヲ注意セシメ牛舎ノ釘ノ脱落ヲ防キ屢々食物ヲ檢シテ異物ヲ除去シ診斷確定セサレハ急性又ハ慢性胃加答兒ノ治療ヲ施シ確定セハ速ニ屠殺ス可シ又ハ胃切開ヲ行ヒ異物ヲ除去スヘキヤヲ鑑別スヘシ○胃切開ハ左腹部ノ所謂饑窪ノ上ヨリ下ニ向ヒ腰推橫突起ノ下一掌ヲ去リ第一胃ヲ切開シ前下方ニ向ヒテ手ヲ入レ第二胃ノ口ヲ探リ胃底ヲ按診シ異物ヲ探リテ之ヲ除去ス爾後胃ノ創ヲ縫ヒ次テ腹壁ノ創ヲ縫合ス又一法ハ動物ヲ頓仆仰臥セシメ靴ヲ以テ劍狀軟骨ノ左側ヲ弛蹴スルニアリ

○皰息肉

Epyulis

鉄或ハ刀ヲ以テ息肉ヲ切除シ或ハ硝酸銀ノ腐蝕ヲ行ヒ或ハ沃度丁幾ヲ塗布ス出血或ハ潰瘍アレハ濃厚ナル腐蝕藥ヲ塗布ス

附錄

○犬ノ十二指腸虫

Doehmiasis

(豫防法) 患犬ヲ隔離シ寄生虫卵ヲ含有スル糞ヲ廢却シ犬舎ヲ清潔ニシ清潔沸糞

水ヲ與ヘ餌食ヲ清潔ニシ床ヲ乾燥セシム下水潦水等ニ虫卵或ハ幼虫ヲ含有

シ之レヲ砥飲スルニヨリテ傳染ス

(療法) 驅虫例藥之綿馬越幾斯加滿刺、砒石等ヲ用フメグニン氏ハ加滿刺四、○甘

汞〇、五砒石〇、〇一ノ合劑ヲ實用ス攝生ニ注意シ肉食ヲ與フ

第六類

循環器病

第一分類 心臟諸病

○心肥大及擴張

Hypertrophica et dilatatio Cordis.

原因除去トシテ興奮及勞働ヲ避ケ滋養食ヲ與ヘ肥大ニ擴張ヲ兼發スルハ強心劑衝動劑及強壯劑ヲ處シ以テ心臟ノ弛緩ヲ防クヘシ實斐答利斯(馬二、〇一五、〇犬〇、一〇、〇三日量)ヲ與フ但シ持久ス可カラス咖啡涅(大動物五一一〇、〇犬〇、一一〇、

五丸劑又ハ「ストロハアン」丁幾(牛馬一〇、〇—二五、〇犬十—二五滴)用ヘ又衝動劑トノ酒精腦酒精依答兒答若クハ物刺篤利涅ノ皮下注ヲ應用ス

○心囊炎 *Pericarditis*

牛ノ心囊炎 創傷性心囊炎ハ診斷確實ナル者ハ屠殺ス可シ眞ノ初期又ハ察病上疑アルキハ實答利斯葉末(二、一五、〇)咖啡涅(五、〇)「ストロハアン」丁幾(一〇—二五)吐酒石鹽類下劑ヲ試ム

他ノ家畜心囊炎(癩麻質斯性及傳染心囊炎)興奮及運動ヲ避ケ清涼消炎療法ヲ行フ心部ニ氷囊ヲ抵シ或ハ冷水ニテ冷盪シ或ハ冷水灌漑ヲ行フ冷盪ハ間斷ナキヲ要ス四肢ニハ「フランテル」繃帶ヲ纏フテ温包ス冷盪ハ熱候全ク消散スル迄永續ス營養善良ナル者ニハ刺絡ヲ行ヒ血行ヲ流利ス腸管内容ヲ排除スル爲メ蘆薈甘朮芒硝吐酒石硝石硝酸那篤留謨ヲ反復投與ス強心藥實答利斯ヲ數次應用ス心臟部ニ芥子泥或ハ芥子精ヲ施ス「ア」リ緩慢症ニハ下劑及利尿藥ヲ用ヘ樟腦依答兒ヲ與ヘ温厩ニ入レテ温包シ滋養強壯食品テ與ヘ犬ニハ液狀食料牛乳肉汁ニ赤葡萄酒咖啡加味シテ與フ滲出液多量ナレハ穿胸術ヲ施ス其法馬ニアリテハ第五若クハ第六肋骨ノ前緣ニ於テ豫メ皮膚ヲ切り胸ノ下面ヨリ一手ヲ距ク套管針ヲ刺入ス小動物ニ於テハ濁音部ニ「ブ」チズー氏注射器ヲ挿入シテ滲出液ヲ吸取ス主トノ第五肋骨ノ部分ニ刺入ス

(六八四)實答利斯葉末一〇、〇一瓶ノ水混シ振盪舍劑トナシテ與フ(牛)

(六八五)吐酒石一五、〇芒硝七五〇水蜀葵末適量爲舐劑二日間二三回二分與ス(馬)

(六八六)實答利斯葉末一二、〇蜀葵末五〇、〇水適量丸劑二個トナシ一日間ニ與フ(馬)

(六八七)實答利斯葉末二五、〇杜松子一五〇、〇單舍利別適量爲舐劑日々三回一莖宛舌上ニ塗シテ與フ(馬)

(六八八)蘆薈末三五、〇甘朮五、〇蜀葵末一五、〇爲丸劑與フ(下劑)

(六八九)實答利斯浸(二、〇)一二〇、〇吐酒石〇、〇一大黃舍利別二五、〇一日四回一茶乃至一食匙宛與フ(犬)

(六九〇)實答利斯丁幾一〇、〇醋酸加里水二五、〇茴香水二〇〇、〇一日三回一茶乃至一食匙宛與フ(犬)

○心悸亢進 *Palpitatio cordis*

鎮痙藥ヲ用フ鹽酸莫兒必涅(馬〇、三—〇、四)皮下注臭素加里抱水格魯拉爾內服

(二五—五〇、〇)神經性亢進ニハ心臓部ヲ冷湯シ皮膚ニ刺戟擦劑ヲ塗布シ且腸管誘導法トシテ下劑ヲ投ス

處方

(三九一)臭素加里三五、〇飲水ニ混シ二回分服

(六九二)鹽酸莫兒必涅〇、五餽水三〇、〇皮下注射用

○心筋炎 Myocarditis

運動及亢奮ヲ禁シ強心藥ヲ與ヘ滋養食ヲ給ス實莖答利斯(二一五、〇)咖啡涅(一、〇犬)又ハ「ストロファン」ト「丁幾樟腦亞篤魯必涅酒精等」ヲ處シ熱アレハ解熱劑ヲ投ス安知歇貌林之レナリ

○心裂 Puffura Cordis

施ス可キ術ナシ

○急性心内膜炎 Endocarditis acuta

運動及亢奮ヲ避ケ冷湯消炎療法ヲ施ス心臓部ニ冷水灌漑ヲ行ヒ間斷ナク冷湯ス或ハ氷鹽ヲ抵ス吐酒石及中性鹽類ノ内服ヲ與フ傳染熱候現ハレ全身衰弱違和ノ徴アレハ強心藥ヲ投シ合セテ亢奮藥及解熱藥ヲ處ス例之強心藥ニハ實莖答利斯(馬三一六牛五一一〇犬〇、二一〇、五或ハ「丁幾五一一〇滴」)「ストロファン」ト「丁幾咖啡涅、亢奮劑ニハ依的兒酒精亞篤魯必涅解熱劑ニハ規那撒里矢爾酸安知必林」ゾ「ゾ」ヲ赤葡萄酒ニ混與ス

(六九四)實莖答利斯葉末一五、〇硫酸規尼涅三〇、〇亞爾答亞根末八〇、〇三九トナシ毎日一丸宛與フ(馬)

(六九五)硫酸規尼涅五、〇稀硫酸二、五大黃舍利別一五〇、〇日々三四回一茶乃至

一食宛與フ(犬)

(六九六)安知必林二〇、〇樟腦三、〇蜀葵末一五、〇爲丸劑與フ必要アレハ反復ス(牛馬)

(六九七)「ザロール」五、〇葡萄酒一五〇、〇一日三四回一食匙宛與フ(犬)

○辨膜病(慢性心内膜炎) 心辨膜閉鎖不全、脉口狹

窄 Endocarditis chronica, Insufficiencia Valvularis,

Stenosis aetium.

辨膜病ハ代償作用ノ行ハル、間ハ敢テ治療ヲ要セス唯滋養食ヲ給シ亢奮及勞動ヲ避ク可シ肥大セル心臓其固有ノ作用ヲ失シ肺臓及靜脈系統ニ於テ血行ノ障害ヲ來ス時ハ始メテ醫藥ヲ要ス即チ實莖答利斯末若クハ其浸劑(例之實莖答利斯葉一一二、〇沸湯一五、〇ニ浸出シ日々三回一食匙ヲ犬ニ與フ)馬ニハ其末二、〇一五、〇ヲ鹽類ニ混和シ舐劑トナシ牛ニハ四一五、〇又咖啡涅(犬〇、二五一一、〇牛馬五〇〇)「ザウレチン」(毎二時〇、二五一一、〇)ヲ用フ「ストロファン」ト「丁一幾」(大動物一〇一二五、〇犬十乃至二十五滴)又沃度加里(馬五、〇一一〇、〇)ヲ以テ實莖答利斯ノ効ヲ助クル「ア」リ其他對症療法トシ利尿藥例之醋酸加里(犬二、〇一四、〇)甘永海葱杜松子等ノ如シ時トシ鹽酸必魯加兒必涅ヲ用フ或ハ下劑ヲ要スル「ア」リ又胸若クハ腹ノ穿刺術ヲナス「ア」リ大衰弱ノ徴アレハ衝動劑ヲ與フ即チ樟

腦依答兒亞爾爾保兒等ノ如シ心搏動非常ニ亢奮スレハ莫兒比涅(馬ニハ〇、三一〇、四犬〇、〇一〇、〇五)ノ皮下注射ヲ行フ其他臭素那篤留謨「ヒプロン」(〇、五)一、二、〇)等ヲ用フ

處方

- (六九八) 質斐答利斯葉未一〇、〇單舍利別一五〇、〇每日一食匙宛舌ニ塗布(馬)
- (六九九) 質斐答利斯浸一、〇(一五〇〇) 毎日二食匙宛與フ(犬)
- (七〇〇) 質斐答利斯葉末〇、一白糖適量爲一包其十包ヲ作り毎日一包宛與(犬)
- (七〇一) 「ストロファン」丁幾五〇白糖一〇、〇餾水一五〇、〇爲溶液一日一食匙宛與フ(犬)
- (七〇二) 質斐答利斯浸(一、五)一五〇、〇白糖五、〇日々二三茶匙乃至食匙與(犬)
- (七〇三) 「ストロファン」丁幾五、〇橙皮舍利別一五、〇餾水一五〇、〇日々一乃至二茶匙食匙ヲ與フ(犬)

第二分類 脉管諸病

○大動脈瘤 *Aneurysma aorta*

麥角ノ注射鉛糖及沃度加里ノ内服ヲ用フ外表ニ存スルモノハ結紮及切除ヲ施ス四肢ニアル者ハ緊縮帶(驅血帶)ヲ施シテ施術ス即チ之ヲ装着シタル後脉瘤ノ兩側ヲ結紮ス或ハ中心ニ向ヘル部分ノミヲ結紮シテ瘤ヲ摘出ス又化學的物質電流等ニヨ

リテ血液ヲ凝固セシメ治効ヲ奏スルコトアリ有孔針ニテ半格魯兒鐵液ヲ脉管内ニ注入シ或ハ馬毛ノ一片ヲ挿入シテ脉瘤内ニ血液ヲ凝固セシムルノ法ハ人醫ニハ有効ナルモ獸醫術ニアリテハ効力少ナシ烙鐵ニテ燒烙シ或ハ腐蝕藥硝酸銀棍苛性加里應用ヲ試ムヘシ

○大動脈破裂 *Ruptura aortae.*

施スヘキ術ナシ

○靜脉瘤 *Varix.*

根治療法ハ結紮及切除ニアリ結紮ハ脉瘤ノ兩側ニ於テスルヲ宜シトスハ或ハ熾熱(烙鐵「テルモコーテル」)ヲ以テ血液ヲ凝固セシメ治ヲ奏スルコトアリ例ヘハ烙鐵ヲ皮膚ヲ貫通シテ瘤内ニ刺入スルカ如シ又半格魯兒鐵液ヲ注入シ或ハ人醫ニアリテハ麥角(麥角越幾斯「一、〇水一〇、〇」)ヲ周圍組織ニ注入ス血液凝固ノ療法ヲ用フルキハ常ニ輪出血管(脉瘤)ハ壓迫スルヲ要ス然ラサレハ血行ニヨリ凝塊分離溶解シテ栓塞症ヲ起スノ危険アリ

○頸靜脉炎 *Phlebitis Venae jugularis.*

豫防法トシテ刺絡器械ノ消毒ヲ嚴密ニシ創ニハ消毒療法ヲ施シ術後靜養シテ頸靜脉上ニ壓迫及摩擦ヲ避ケ局所ニ血液滲漏ヲ生セサル様注意ス
(療法)初期ハ冷濕法ヲ行ヒ冷水氷或ハ食鹽醋及水ノ冷湯合劑ヲ應用ス皮創尙癒閉

セサレハ昇汞水或ハ石炭酸水ニテ洗滌消毒シテ滲漏血液ヲ排除ス腫脹疼痛甚クシケレハ溫濕器法ヲ行ヒ刺絡創口ヲ球頭外科刀ヲ以テ切開シ或ハ溶製硝酸銀ニテ腐蝕ス膿瘍ハ切開シ排膿ヲ流利シ日々二回宛洗滌消毒シテ敗膿ヲ排除ス此際一手ヲ以テ創ノ下部ヲ壓迫シテ敗膿ノ靜脈内ニ流入スルヲ防ク可シ快方ニ向ヘハ莖膏軟膏ヲ塗布ス慢性炎ニモ全軟膏ヲ用フ或ハ水銀軟膏ヲ塗布ス軟膏塗布ノ際ハ壓迫及摩擦過度ナレハ血塞破壞シテ栓塞ヲ生スルノ恐レアリ

○栓塞症 *Embolia*

根治療法ナシ唯對症療法ヲ施スニ過キス例之心臟亢奮藥ヲ投シテ側枝血行ノ開通スル期ヲ待ツ可シ消炎療法ヲ施シ栓塞ノ組織同化ヲ促スベシ

○血栓症(血塞症) *Thrombosis.*

血栓ハ股動脈腋窩下動脈及腹動脈ニ頻發ス療法ハ充分ノ効果ヲ得難シ沃度加里、亞爾加里鹽類重曹芒硝ノ内用ハ殆ント無効直腸ヨリ血塞ヲ按撫スレハ軟化及吸收ヲ促スアリ又日々定期ノ運動ヲナサシメ以テ心力ヲ強盛ナラシムヘシ或場合ハ反之數日間全ク靜止セシメテ良果ヲ見ルコトアリ

第三分類 水脈及水脈腺諸病

○急性水脈炎 *Lymphangitis acuta.*

(豫防法)トメ外傷ヲ清消毒シ創液滲出液ヲ除ク可シ發生セハ其原因ヲ探究シ目撃スヘキ外傷アレハ消毒法ヲ行ヒ傳染毒ノ侵入ヲ防ク可シ濕温ハ分解ヲ幫助ス溫器法或ハ溫浴ヲ用ヘ兼テ消毒ヲ嚴行シテ一ハ外傷ヨリ傳染毒ノ侵入ヲ防キ一ハ水脈内ニ侵入シタル病毒ヲ剋殺スルヲ爲メ消毒液ノ連續灌漑ヲ行淋尿管周圍ノ膿瘍ハ切開スヘシ慢性症ニアリテハ局所ニ按撫及運動ニヨリテ分解ヲ促進ス○流行性水脈炎ニアリテハ輓轡形烙鐵ニテ結節ヲ破壞シ強消毒腐蝕法ヲ行フ急性炎ノ症候退散セハ沃度加里軟膏灰白水銀軟膏或ハ樟腦軟膏ヲ塗布ス可シ

○水脈腺炎 *Lymphadenitis*

原病ヲ探究シ其治療ヲ怠ル可ラス局部ニハ解凝軟膏例之水銀軟膏「イヒチオール」軟膏沃度加里軟膏樟腦軟膏頑症ニハ莖膏軟膏ヲ塗布シ波動著シキ者ハ切開排膿シ又化膿ヲ促進スル爲メ莖膏軟膏溫巴布藥ヲ施シ熱スレハ切開ス切開後ハ防腐液ニテ洗滌シ膿汁及壞死組織ヲ排除シ沃度仿謨古魯胃謨包攝ヲ行ヒ日々防腐洗滌ヲ施ス乾酪變生ヲ起セハ鉛匙ニテ剝除シ慢性硬結ヲナセハ摘出ス

○甲狀腺腫 *Struma.*

沃度加里ノ内外應用ヲ試ム乃チ沃度加里内服及全軟膏塗擦之ナリ沃度丁幾ノ腺實質内注射モ効アリ其法アラバ―氏注射器ノ針ヲ腺實質ニ刺入シ五―一五滴ノ沃度

丁幾ヲ注入ス注入後炎症症狀ヲ呈スルモ八一四日ニシテ消散ス犬ニハ十%ノ「パ
、ヨチン」液(Papayotin Lösung)ヲ注入シ四十八時ヲ經テ腺腫全ク軟化スレハ之
ヲ刺シテ軟化乳樣液ヲ排除スレハ腺腫縮少ス某氏ハ人類ニ於テ動脈血紮法ヲ試ミ
某氏ハ腺腫ヲ絞斷器ニテ切除シ某氏ハ甲狀腺ヲ露出シテ指ヲ以テ牽引シ捻轉數回
ニシテ結紮シメラール氏ハ皮膚ヲ切り指ヲ以テ腺ヲ露出シ血管現出スル毎ニ直チニ
之ヲ結紮シ終リニ強キ糸ヲ以テ瘤根ヲ結紮シ其解脱ノ恐レアルヲ以テ小許ノ腺質
殘株ヲ遺シテ瘤切ヲ除ス

- (七〇四)沃度加里一三、〇軟石鹼五、〇佩里設林一〇〇、〇爲擦劑每日腺ニ塗布、
- (七〇五)沃度丁幾二〇、〇局所ヲ剔毛シテ二三日間塗布ス可シ
- (七〇六)沃度加里五、〇餾水一五〇、〇爲溶液每日一茶(小犬)乃至一食匙(大犬)宛
内服

補遺

〇飛節靜脉瘤 Blood spavin (英)

靜脉瘤ノ療法ヲ見ヨ

第七類 泌尿器病

第一分類 腎臟諸病

〇腎充血 Hyperaemia renum.

實性充血ニ於テハ原因ヲ除キ若クハ之ヲ避ク屬々腸誘導ノ爲メ緩下劑トシテ芒硝加
兒爾斯泉鹽ヲ投スヘシ虚性充血ハ原病(心膜病肺氣腫肋膜滲出、動脈瘤、血塞、腫瘍
腎靜脉ノ血塞等)ノ治療ヲナシ實答利斯内服ヲ試ム

〇急性腎炎 Nephritis acuta.

攝生ニ注意シ換氣善良乾燥ノ廐ニ容レテ靜養シ血液ノ分配ヲ平均スル爲メ濕溫布
ヲ軀幹ニ纏絡シ四肢ハ「フランネル」ニテ溫包ス犬豕ハ溫浴セシメ漸次其溫度ヲ加
ヘ三十八度乃至四十度ニ至ラシム或ハ湯ヲ飲マシメ牀ヲ溫包ス刺擊性食物ヲ禁シ
緩和和多液易消化飼料(青草、煮熟胡蘿蔔、馬鈴薯柔軟乾草)ヲ與ヘ犬ニハ牛乳卵黃肉
肉白弗聖等ヲ與又蛋白質ヲ多含スル食品ヲ給ス例之犬ニ牛乳ヲ與フ渴ヲ醫スル爲
メ粉汁糠汁牛乳燕麥煎汁等ヲ用フ主要トスルハ腎ヲ可成休止セシメ他ノ器官ニヨ
リ水分ノ排泄ヲ計ルニアリ此目的ニ下劑發汗劑利尿劑ヲ用フ下劑ニハ甘草(五—
八)蘆薈(馬)牛ニハ芒硝ヲ粘汁ト混與シ犬ニハ滿那那鼠李液答麻林度等ヲ與フ
發汗法ニハ前記濕溫ブリースニツツ氏卷法溫包溫浴ノ外發汗劑鹽酸必魯加兒必涅
(馬)〇、二—〇、五牛〇、五—〇、八犬〇、〇〇五—〇、〇二)或ハ馬ニ「マレコリン」
(〇、〇八)ノ皮下注射ヲ行フ利尿藥ニハ醋酸加里重曹實答利斯咖啡涅「ガウレ

チン」等ヲ用ヘ又收斂藥單寧樹皮規那皮烏華烏兒矢葉硫酸鐵鉛糖等ヲ用ヘテ血管ヲ收縮セシメ腎ノ炎症ヲ輕減ニス心機衰弱ニハ強心藥實荳答利利斯「ストロフアント」丁幾(實荳答利利斯馬二—五牛三—六犬〇、一—〇、三「ストロフアント」丁幾牛馬一〇—三五犬一〇—二五滴)ヲ投ス虛弱ニ陷レハ治効ナシ須カラケ屠殺ス可シ處方

(七〇八)旃那浸(一〇、〇)一五〇、〇滿那舍利別二五、〇下痢ヲ起ス迄一匙宛與フ(犬)

(七〇九)醋酸加里一五、〇甘草羔一〇、〇餽水二五〇、〇一日數回一二匙宛與(犬)

(七一〇)實荳答利利斯葉末一二、〇蜀葵末一二〇、〇常水適量爲三九日々一丸宛與フ(牛馬)

(七一)規那丁幾三〇、〇格魯兒鐵液一、〇日々三回十乃至二十滴宛與フ(犬)

(七一二)「ストロフアント」丁幾一〇、〇日々二三回十乃至二十滴宛與フ(犬)

(七二三)烏華烏兒矢葉末「トルメンチル」根末各五〇、〇爲一包一瓶ノ亞麻仁油ニ和シ與フ(馬)

(七二四)單寧酸二、〇餽水一五〇、〇亞刺毘亞護謨五、〇爲溶液每日二食匙(犬)乃至二茶匙(猫)ヲ與フ

(七二五)烏華烏兒矢葉末五〇、〇芒硝二〇〇、〇蜀葵末一〇〇、〇餽水適量爲砥劑二回分服(馬)

慢性腎炎 *Nephritis Chronica.*

(療法)ハ畧ホ急性炎ニ全シ攝生ニヨリ營養及貧血ヲ改善シ強心劑及利尿藥ヲ主藥トシ實荳答利利斯「ヅッレチン」咖啡涅「ストロフアント」丁幾醋酸那篤涅甘汞ヲ用ヘ水腫アレハ鹽酸必魯加兒必涅「アレコリン」ノ皮下注射ヲ行ヒ吸收藥トシ沃度加里内服ヲ處ス

化膿性腎炎 *Nephritis purulenta.*

腰部ヨリ腎膿瘍ノ穿刺或ハ腎割去術ヲ要ス其他對症療法ニ過キス

腎盂炎 *Pyelitis*

原病ニ由リテ取捨ス加答兒治藥防腐藥及收斂藥ヲ主トス例之亞爾加里鹽類硼酸撒里矢爾酸苦麗阿林丹寧等ノ如シ

腎盂腎炎(牛) *Pyelo-nephritis*

概子良効ヲ奏セス可成的早ク診定シ未タ羸瘦セサルニ先チ屠殺スルヲ利トス試驗的ニハ防腐利尿ノ目的ニテ樟腦的列並底油撒里失爾酸格魯兒酸加里烏華烏兒矢葉煎汁(二〇、一五〇、〇)ヲ用フ可シ其他畧ホ腎炎ニ全シ

尿毒症 *Uræmia.*

原因(排尿障害尿分泌障害及膀胱破裂等)ヲ除去シ若クハ治療ス對症療法トシ下劑

(甘永蘆薈那那菊巴)ヲ投シ發汗劑(鹽必魯)ヲ與ヘ利尿藥ヲ用フプリースニツツ
罂法ハ有用ナリ動物ノ脫力ヲ防ク爲メ滋養強壯ノ食餌ヲ給シ亢奮藥樟腦ヲ與ヘ消
毒防腐酸類(安息香酸撒里矢爾酸)其他規那咖啡涅ヲ試用ス心臟衰弱及蛋白尿ニハ
「ストロファンタス」(丁幾ハ牛馬ニ一〇、一五瓦犬ニハ十乃至二十五滴)ヲ與ヘ
痙攣及強直ノ發作ニハ痙攣藥ヲ投ス犬ニハ溫浴ヲ試ム屠獸ハ可成速カニ行フヲ利
トス

處方
(七一六)樟腦五、〇規那皮二五、〇蜀葵末水適量爲一丸要ニ應ジテ與フ(馬)
(七一七)安息香酸那篤留謨咖啡涅五、〇依的兒醋酸鐵丁幾一〇、〇薄荷水一五〇、
〇二乃至三時間毎ニ一茶乃至一食匙ヲ與フ(犬)

第二分類 膀胱諸病

○尿閉 Retentio Urinae.

器械的障害ニヨルモノハ尿道切開術膀胱切開術若クハ刺穿術碎石術等ヲ行ヒ驅尿
筋ノ痙攣ニ於テハ臍又ハ直腸ヨリ膀胱ヲ壓シ「カテテル」ヲ入レテ尿ヲ排出シ或ハ
會陰部ヲ刺戟ス括約筋ノ痙攣ニヨルモノハ腹部及會陰部ニ的列並底油亞泥子茴香
油等ヲ塗布シ且ツ之ヲ内服セシム又莫兒比涅抱水格魯拉爾ヲ用フルモ可ナリ膀胱
ノ痙攣ニハ斯篤利幾尼涅越攝林併ニ電氣ヲ應用ス

○膀胱加答兒 Cystitis Catarribalis.

内用藥物ハ硼酸撒里矢爾酸安息香酸格魯兒酸加里丹寧「ナフタリン」レゾルシ
ン「苦麗阿林」(犬〇、五ノ丸劑三粒)ヲ與慢性症ニハ華爾斯劑例之的列並底油骨液
拔爾撒謨白露拔爾撒謨等ノ如シトラスホー氏ハ自素加里及臭素樟腦ヲ賞用ス外用
ハ防腐劑ヲ以テ膀胱ヲ洗滌スルニアリ列之苦麗阿林水〇、五%硼酸石炭酸、格魯
兒酸加里液(一—三%)昇永水(千乃至五千倍)硝酸銀溶液明礬液等ノ如シ即チ「カ
テール」ヲ挿入シテ此等ノ防腐液ニテ膀胱ヲ洗滌ス牝獸ニハ護謨管ヲ挿入ス
處方

- (七一八)杜松子末五、〇酒精一〇〇、〇混和毎三時十滴宛與フ(犬)
- (七一九)鹽酸加里一〇、〇餾水三〇〇、〇爲溶液每日二回一食匙(一茶匙)ヲ犬大
(小犬)ニ與フ
- (一二〇)的列並底油〇、二五阿列布油〇、五以上膠囊一個ニ入レ其二個ヲ與(犬)
- (七二一)安息香酸一〇、〇蜀葵末及水適量爲抵劑與フ(馬)
- (七二二)烏華烏兒矢葉煎汁(一〇、〇)一五〇、〇毎三時一食匙宛與(犬)
- (七二三)明礬一、〇餾水一〇〇、〇爲溶液膀胱洗滌用

○血尿病 Haematuria.

牛ニアリテハ流行性ニ發スル「ア」リ其際ニハ原因タル可キ刺戟性植物及糸狀菌ヲ

被ル乾葛等ヲ禁シ飲水ヲ改ム又腎炎腎盂炎膀胱尿道炎潰瘍急性傳染病淋病血液
糸狀虫ニヨリテ起リ器械的劑戟即腎損傷膀胱結石損傷尿道結石等モ亦原因ヲナス
ニヨリ此等ノ原因ヲ探究シテ之レニ對スル療法ヲ施シ兼子テ對症療法トシ收斂止
血藥樹皮丹寧鉛糖麥角硫酸鐵等ヲ與ヘ下劑(甘汞)ヲ投シ灌腸ヲ行ヒ劑戟藥(芥子
泥樟腦精、的列並底油等)ヲ皮膚ニ塗擦ス

處方

(七二四)明礬非沃斯油各八〇、〇亞麻仁粉末二〇〇、〇水適量ニテ軟膏トナシ二三
日ノ内ニ四回ニ分與ス(牛)

(七二五)篤爾綿黼刺根一〇〇、〇硫酸鐵五〇、〇樟腦末二五、〇混和粉末トナシ水
及麵粉ニテ砥劑トナシ二日間ニ分與ス(牛)

(七二六)炭酸曹達五〇、〇規那皮末七五、〇蜀葵末一〇〇、〇爲砥劑三四回ニ分與
ス(牛)

(七二七)人工加兒爾斯泉鹽一〇〇、〇丹寧酸五〇、〇亞麻仁二五〇、〇混和爲散劑
每食一匙宛混與ス(牛)

○尿石 *Calculus urinarius.*

内服藥ヲ以テ尿石ヲ溶解セントスルハ無効ニ屬ス石淋術(採石術)ヲ施シ或ハ膀胱
尿道切開術ヲ行ヒ結石ヲ採取除去スヘシ尿道結石ノ除去ハ容易ナルモ膀胱結石ハ
稍ヤ難ク輸尿管及腎盂結石ノ除去ハ更ニ困難ナリ犬ニ於テハ吐酒石内服ヲ試ム可

(石淋術及膀胱切開法ハ手術篇ヲ見ヨ)

處方

(七二八)蜀葵根煎(八〇)一五〇、〇吐酒石〇、一每三時一茶乃至一食匙宛與フ

(七二九)吐酒石〇、一餽水一五〇、〇蜀葵舍利別二〇、〇每三時一茶乃至一食匙

○膀胱脫 *Prolapsus Vesicae*

○膀胱反轉 *Inversio vesicae.*

牝牛豕及牝犬稀ニ産時ニ腔入下壁破綻スルキハ其裂口ヨリ膀胱脫出ス其脫出部陰
門ヲ通過ノ外部ニ脫出ス之ヲ膀胱脫ト稱ス其表面ハ漿液膜ニテ被ハル又尿道破裂
スレハ膀胱反轉ノ其裂口ヨリ脫出ス其表面ハ膀胱粘膜炎ヲ被ル○膀胱脫 ニアリテ
ハ脫出部著シキ變化ヲ起サレハ洗淨消毒シ内容ハ壓迫或ハ消毒套管針ヲ挿入シテ
除去シ次テ腔ヲ消毒シテ還納ス腔ノ裂創ニ注意シ再脫ヲ防キ陰門ニ接近スレハ之
ヲ縫合ス整復後微溫湯ヲ膀胱内ニ注入ス可シ○膀胱反轉 ハ粘膜炎著シキ變化ナ
ケレハ整位ヲ行フ乃チ壓迫ニ由リ内容ヲ排シ脫出部ヲ清淨ニシ後身ヲ少シク高カ
ラシメ鼻捻ヲ施シ尿道ニ指ヲ挿入シ反轉部ヲ推壓シテ整復ス若尿道口狹ク指ヲ用
ユル能ハサレハ球頭棍ヲ以テ之ニ代ヘ尿道ニ挿入ス整復後ハ微溫湯稀釋明礬水
(一一五%)丹寧水(一一二%)ヲ注入シ再轉及炎症ヲ豫防ス若シ粘膜炎ニ陷レハ
整復ハ背示トス膀胱切開術ヲ行フ膀胱ヲ切斷スレハ尿ハ間歇ナク少量宛連流滴下

スルモ牝牛或ハ常役ニ服スル馬ニハ害ナシ○膀胱切除ハ強彈力糸ニヨリ結紮シテ後切除ス其結紮ニ二重ノ者ト單ニ結紮トノ二法アリ

○膀胱腫瘍

腫膀胱腫瘍ハ手術ヲ行フ稀ナリ之レ診斷ノ難キト施術ノ結果疑ハシキトニヨル先ツ尿道ヲ擴張シ鉗子或ハ手ヲ挿入シテ腫瘍ノ除去ヲ試ム可シ全治スルモ其施術ハ容易ナラス牛ニアリテハ屠殺ヲナス能ハサル場合ニノミ施術ス

第三分類 尿道諸病

○尿道炎 Urethritis.

日々二回宛醋礬水(%)ノ注入ヲ行フ或ハ稀釋硝酸銀溶液ノ注入ヲ用フ

○尿道狹窄 Stricture Urethrae.

「カテーテル」或ハ「ブリーヂ」ヲ挿入シテ尿道ヲ擴張シ排尿ヲ流利ス數回反復連用スヘシ大動物ハ尿道切開ニヨリ排尿困難ヲ緩ハラクル場合アリ尿道口ニ接近スル狹窄ニハ切開却ツテ障害ヲ生ス

○尿道損傷

治療ノ要旨ハ排尿障害及尿浸潤ヲ防クニアリ規則的ニ且ツ迅速ニ治癒ス癢痕少ナク狹窄ヲ遺サス、創ハ尿ニ汚染サル様注意シ平滑ナル創ハ獸腸線ニテ縫合スレハ第一期癒合ヲナス肉食獸ハ尿ノ浸潤ヲ起シ易ク從ツテ治癒困難ナリ皮創ハ開放療

法ヲ行フ粘膜創傷ハ皮膚ノ創ヨリ小ナルモハ擴大シ肉食獸ニアリテハ亞爾加里液(5%)ノ炭酸曹達)ヲ以テ創部ヲ屢洗滌シ或ハ沃度防護重曹ノ合劑紛末ヲ創面ニ撒布シ植物食ヲ與フ第一日ニ注意周密ナルヲ要ス肉食發生スレハ尿浸潤ハ減少ス「カテーテル」創傷ニアリテハ二十四時間内ニ強度ノ腫脹及尿閉ヲ來ス尿道切開或ハ膀胱穿刺ヲ要ス

○尿道腫瘍

尿道口ニ接近スル腫瘍ハ鑷子又ハ鉗子ニヨリ摘出ス能ハサレハ尿道下壁ヲ切開シ腫瘍ヲ切除ス

補遺

○尿失禁 Incontinentia Urinae.

諸種ノ疾病特ニ脊髓病ノ症候トシテ現ハレ主トシテ膀胱括約筋ノ麻痺稀ニ驅尿管ノ麻痺ニヨル療法ハ原病ノ治療ニアリ括約筋麻痺ニハ斯篤利幾尼涅電氣ヲ用ヘ又冷灌腸膀胱内冷水灌入ヲ施シ滋養強壯食物ヲ與ヘ體力ヲ強健ニス

處方

(七三〇)硫酸越攝林〇、一餽水二〇、〇爲溶液皮下液(牛馬)

(七三一)硝酸斯篤利幾尼涅〇、〇〇一餽水三〇爲溶液皮下注(小犬)

(七三二)硝酸斯篤利幾尼涅〇、一蒸溜水一〇、〇爲溶液皮下注(牛馬)

○排尿困難 *Dysuria*

直腸ヨリ手ヲ挿入シテ膀胱ヲ按摩シ或ハ「カテール」ヲ挿入ス小動物ニハ腹壁ヲ壓迫シテ排尿セシメ單純ノ膀胱衰弱ニハ硫酸越攝林硝酸斯篤利幾尼涅ノ皮下注射ヲ試ム感冒性膀胱痙攣ニハ溫加密爾列茶ヲ吐酒石ト伍用シ或ハ溫湯灌腸ヲ行フ又纈草根、別敦頓那越幾斯阿魏ヲ用ヘ小動物ニハ莫兒比莫皮下注射犬動物ニハ的列並底油ヲ下腹部ニ塗擦ス膀胱結石其他腫瘍異物等ニヨル者ハ手術ニヨリテ除去ス處方

- (七三三)吐酒石五、○芒硝五〇、○纈草根浸五〇〇、○痙攣性排尿困難ニ用(牛馬)
- (七三四)鹽酸莫兒比涅〇、〇二一〇、一餉水五、○爲溶液皮下注(犬)
- (七三五)別敦頓那越幾斯三、○加密爾列浸五〇〇、○振盪合劑トナシ與(馬)
- (七三六)抱水格魯拉爾三〇、○蜀葵根浸三〇〇、○灌腸用(牛馬)

○排尿窘迫 *Stranguria*

尿失禁ヲ見ヨ

第八類 生殖器病

○淫慾興進 *Satyriasis et nymphomania*

滋養強壯ノ食物ヲ禁シ貧食ヲ興ヘ運動ヲ命シ腸誘導藥トノ下劑(牛ニハ芒硝馬ニ

ハ蘆薈吐酒石)ヲ與ヘ又放血ヲ試ム冷浴ヲ行フ淫慾制止藥トシ抱水格魯拉爾(牛馬二〇一五〇、〇飲水ト共ニ内服)臭素加里臭素那篤留謨「ブルフオナール」莫兒比涅皮下注(〇、二一〇、五牛馬)ヲ用フ又樟腦ヲ投ス無効ナレハ去勢術ヲ最良ノ法トス處方

- (七三七)臭素加里一〇、○纈草根浸五〇、(一〇〇、〇)爲溶液二日分服
- (七三八)甘汞五、○蘆薈末三五、○軟石鹼一〇、○蜀葵末適量丸劑トナシ與(馬)
- (七三九)樟腦八、○蜀葵末水適量爲丸劑一週ニ二三回全量ヲ反復ス(馬)
- (七四〇)吐酒石一五、○爲四包一日一包宛粉汁ニ混與(牛)
- (七四一)鹽酸莫兒比涅〇、二五以上一包トナシ其五包ヲ作り初メ一週間ハ其一包ヲ毎日一回ニ皮下注射シ次週ニハ毎日二包宛用フ(牝牛馬)

○龜頭炎 *Balanitis*

○包皮炎症 *Posthitis S. acrobystitis*

微溫湯ヲ注入シテ包皮龜頭ヲ洗滌シテ包皮脂ヲ除去シ粘液緩和油或ハ收斂藥(明礬)ヲ注入シ腫脹甚シケレハ綳帶ニテ陰莖ヲ懸吊ス包皮狹窄スレハ其下面ヨリ割開シ創縁ニ糸ヲ懸ケ近傍ノ皮膚ニ縫着シ以テ創縁ヲ哆開シ癒着ヲ防ク尙沃度仿謨華攝林ヲ塗布ス要スルニ包皮内外ヲ清淨ニシ防腐液ニテ細菌ヲ剋殺スルニアリ刺戟藥塗布ニヨリ包皮及龜頭ニ發炎スルヲアリ療法ハ局所ヲ洗滌シ明礬或ハブ!

ロ一氏液ノ如キ收斂藥ニテ冷湯シ剥皮爛斑ハ油或ハ亞鉛華軟膏ニテ包搦ス又沃度仿謨丹寧ヲ撒布シ懸吊繃帶ヲ施ス

- (七四二) 明礬五、〇 醋水二五〇、〇 爲溶液犬ノ包皮加答兒ニ用フ
- (七四三) 硫酸亞鉛五—二五、醋水五〇〇、〇 右ニ全シ
- (七四四) 石灰水三〇〇、〇 亞麻仁油二〇〇、〇 局所塗布或ハ注入

〇包莖 *Phimosis*

〇箱頓包莖 *Paraphimosis*

龜頭及包皮ヲ洗滌シ長毛ノ包皮内ニ倒入セル者ハ引キ出シ或ハ鋏切シ數滴ノ油ヲ龜頭及狹窄部ニ點シ患畜ヲ仰臥セシメテ左右ノ示指ト拇指トヲ以テ包皮ノ兩側ヲ握定シ引キ延ハシテ龜頭ニ被ラシム同時ニ助手ヲシテ龜頭ヲ壓シテ包皮内ニ入ラシム之ニヨリ還納シ得サレバ包皮ヲ下面ヨリ切開スレハ陰莖自カラ隱没ス龜頭ノ腫脹甚タシケレハ亂刺ヲ施シ收斂藥ニテ洗滌シ硬化部アレハ水銀軟膏稀釋沃度丁幾或ハ硝酸銀溶液(二—三%)ヲ塗布スヘシ

〇睪丸炎 *Orchitis*

〇副睪丸炎 *Epididymitis*

休養懸吊繃帶ヲ睪丸ニ施シ冷湯(冷水鉛糖水氷囊)ヲ行ヒ腫脹甚シケレハ亂刺ヲ行

フ小動物ニハ古魯胃謨大動物ニハ粘着硬膏ヲ塗布シ適度ノ壓迫ヲ加ヘ内服ノ下劑ヲ用井時ニヨリ局所ニ水銀軟膏沃度加里軟膏別拉敦那軟膏等ヲ試ム傳染毒性睪丸炎ニヨリ高熱ヲ伴フ者ハ去勢術ヲ施ス

- 處方
- (七四五) 灰白水銀軟膏三〇、〇 菲沃斯油一〇、〇 朝夕二回塗布
- (七四六) 佩里設林軟膏三〇、〇 菲沃斯油五、〇 屢々塗布ス
- (七四七) 灰白水銀軟膏二五、〇 沃度一、〇 巴拉賓軟膏五、〇 硬結ヲ生シタルハ塗擦用
- (七四八) 沃度加里五、〇 沃度一、〇 佩里設林二〇、〇 混和塗擦用(硬結)

〇陰囊水腫 *Hydrocele*

〇陰囊血腫 *Haematocoele*

沃度丁幾及沃度加里軟膏ノ塗擦懸吊繃帶ノ應用ハ全ク効ナシ穿刺ニヨリ滲出液ヲ排除スルハ間々効アルモ多クハ再ヒ蓄積ス去勢ハ最モ良法ナルモ之ヲ施ス能ハサルハ消毒穿刺ヲ以テ溜液ヲ排除ス其法患畜ヲ橫臥保定シ睪丸ヲ上方ニ牽キ陰囊ヲ左手ニテ握リ緊張セシメ套管針ヲ刺入シテ液ヲ排除ス充分排除シ終レハ沃度丁幾或ハルーゴ一液ヲ注入ス可シ之カ爲メニ大腫脹ヲ來スト難尼七一八日ニシテ減退ス

○陰囊靜脈瘤 Varicocele.

老獸ニ間々發ス多クハ去勢術施行ノ際發見ス療法ハ去勢術ニアリ但シ擴大セル血管ハ捻轉セス須カラク搾木ヲ應用スヘシ

○精系炎 Spermatis S. funiculitis.

○精系瘻 Samenstrangfistel (獨)

(豫防法)トシテ搾木ノ位置及性状ニ注意シ結紮及搾木ヲ用フル場合ニハ副睪丸帶ノ切斷ヲ避ケ搾木撤去後ハ精莖ヲ囊内ニ還納シテ運動ヲ命シ創液ノ吸收及排泄ヲ促ス本病發スレハ昇汞「ブーシュー」或ハ他ノ蝕腐藥烙鐵等ヲ應用スルモ卓効ナシ最良法ハ精莖ノ患部ヲ切除スルニアリ切除ハ急性腫脹ノ存スル間ハ行ハス其消散ヲ待テ施ス急性腫脹ハ瘻管口ヲ開キテ膿汁及滲出液ヲ排除シ防腐收斂液ヲ注入シ日中ハブロー氏液ニ酒精ヲ加ヘテ冷湯シ夜間ハ水銀軟膏ヲ塗布シ綿ト繃帶トヲ以テ温包シ以テ減退或ハ消散セシムルヲ得可シ精莖ノ切除ハ簡短ナリ適當ナル止血法ヲ設クレハ危險ナシ先ツ馬ヲ仰臥セシメ各側ノ脚ヲ縛着シ術者ハ動物ノ臀後ニ跪居シ術部ハ消毒シ外科刀ヲ以テ卵圓形ニ皮膚ヲ切除ス其大サハ精莖ノ切除及創液排泄ニ適當スルヲ度トス次ニ精莖ニ糸ヲ通シ助手ヲシテ之ヲ伸長保持セシメ刀ヲ以テ結締織ヲ切り總莖膜ヲ探リ其周圍結締織ヲ指ヲ以テ破切シ總莖膜ヲ可成充分ニ露出シ膨大セル精莖ノ上部ニ

於ラ總莖膜ノ上ヨリ搾木ヲ施ス意ノ如ク搾木ヲ施ス能ハサレハ總莖膜ヲ切斷シ精莖ヲ引キ出シテ或ハ結紮シ或ハ搾木ヲ裝ス切斷後ハ創腔ヲ洗滌シ沃度仿謨丹寧ヲ撒布シ綿紗塞子ヲ填入シ繃帶ヲ施ス場合ニヨリ皮創ヲ縫合スルヲアリ繃帶及搾木ハ四十八時間放置シテ後除去シタル後ハ昇汞水ニテ洗滌シ沃度仿謨丹寧ヲ撒布シ其後ハ一般ノ創傷療法ニ則ル結紮ヲ施シタル者ハ八日ヲ經ルモ自カラ脱落セザレハ之ヲ除去スヘシ運動ハ毎日行フ十四日乃至四週ニシテ癒ユ

○菌腫 Champignon (獨)

缺切シ或ハ烙切シ或ハ結紮シ或ハ腐蝕藥ニテ切除腐蝕ス其手術式ハ柳澤博士ニ據レハ先ツ縫線ヨリ約一二仙迷ヲ隔テ、牀ノ中軸ニ沿フテ十乃至十五仙迷ノ長サニ前ヨリ後口ニ横切ヲナシ次テ其中心ヨリ鼠蹊ニ向テ八乃至十五仙迷ノ縱切ヲナス故ニ恰カモ倒丁字形ナリ續テ前後創唇及ヒ縫線附近ニ深ク結束糸ヲ通シ以テ手術間ハ創唇開張ノ用ニ供シ手術終レハ所謂結束或ハ包攝縫合ノ用ヲナス○此如ク用意整フキハ術者ハ瘻口圍ヨリ數仙迷ノ部即チ被瘻膜ノ稠密部ハ之ヲ刀切シ已ニ鬆粗ナル部ニ達スレハ務メテ破切ヲ實行シ刀ヲ使用セサルヲ可トス之レ陰莖部附近ニハ巨大ノ靜脈叢ニ富有ナルカ故ナリ十分ニ菌腫顯ハル、キハ之ヲ切除ス是レニ結紮法烙鐵法絞斷法アリ便宜撰用スヘシ烙鐵法即チ燒斷法ヲ宜シトス

○子宮炎 Metritis.

(一)急性染毒性子宮炎 ハ初期治療ヲ加フレハ効アリ「リゾール」液(一二%)或ハクレオリン「溫液」(五―八拉篤)或ハ牝馬ニハ昇汞水(〇、一%)ニテ子宮内洗滌ヲ行フ初ハ一日四五回トシ内服藥ハ芒硝硫酸麻屈混叟謨重曹榭皮ヲ多量ノ粘汁ト共ニ與フ(二)單純急性子宮内膜炎 ハ溫湯或ハ粘液煎汁ニ苦麗阿林石炭酸等ヲ伍シ子宮内洗滌内服ニハ硝石芒硝等ヲ粘汁ニ混與ス

(三)慢性子宮内膜炎(白帶下) ハ一日二回宛稀釋「リゾール」苦麗阿林溫液(三十度乃至三十六度)或ハ明礬丹寧ノ一%液硫酸銅硝酸銀、石炭酸液等ニテ子宮内洗滌ヲ行ヒ内服藥トシ滋養強壯劑重曹榭皮龍膽亞爾蘇等ノ少量ヲ用フ

處方

- (七四九)苦麗阿林四五、〇水三拉篤牛ノ子宮炎ニ洗滌用
- (七五〇)硼酸三〇、〇微溫湯三拉篤爲溶液慢性子宮炎洗滌用
- (七五一)芒硝四〇〇、〇亞爾蘇五〇、〇榭皮五〇、〇亞麻仁煎ニ混シ頓服
- (七五二)炭酸加留謨一五、〇榭皮煎五〇〇、〇慢性子宮炎ノ灌注藥
- (七五三)昇汞五、〇食鹽二、五、酒精一〇〇、〇五拉篤ノ溫湯ニ溶解シ牝馬ノ子宮炎ニ洗滌用
- (七五四)薩昆那一〇〇、〇龍膽根未七〇、〇的列並底油二五、〇三拉篤ノ熱湯ヲ注キ其四分一量ヲ每三時乃至四時ニ與フ(慢性子宮内膜炎)
- (七五五)粗製明礬一五〇水七〇〇、〇爲溶液每日子宮内ニ注入(右全)

(七五六)硫酸鐵一五、〇水七〇〇、〇爲溶液每日三回子宮内注入(右全)

(七五七)石炭酸二―三、〇水一〇〇、〇一日三四回子宮内注入(染毒性子宮炎)

(七五八)苦麗阿林三―五、〇水一〇〇、〇右ニ全シ(右全)

(七五九)石炭酸八―一二、〇酒精一〇〇、〇常水七〇〇、〇一日四五回子宮洗滌

(豫防法)ハ産科術ニ注意シ術者ノ手指消毒及器械ノ消毒ヲ嚴密ニシ娩墮ハ速カニ除去シ産後子宮内洗滌消毒ヲ行フ

○膣炎 Colpitis S. Vaginitis.

防腐液ニテ膣内洗滌環疽部或ハ格魯布膜ハ銀酸銀棍ニテ腐蝕ス沃度仿謨華攝林或ハ硼酸華攝林ヲ塗布ス

○膣脫 Prolapsus Vaginae.

(豫防法)トメ動物ノ位置ヲ顧慮シ後軀ヲ少シク高クシテ繫留ス可シ多量ノ食物及刺戟性飲料ニ禁ス膣脫ヲ整復スルニハ後軀ヲ前軀ヨリ高ク保定シ術者ハ尿道ニ指ヲ挿入シ先ツ膀胱ヲ空虚ニシ次テ脫出部ヲ洗滌消毒シテ手掌ヲ脫出部ニ抵シテ壓シ陰門ヨリ徐々還納整復ス此際腹壓ニ注意シテ少許休止ヲナシツ、挿入シ整復シ終ラハ漸時手ヲ膣内ニ挿入シ置キテ怒嘖ノ止ムニ至リテ手ヲ放ツ脫出部過度ニ腫脹セル場合ニハ二―三%ノ明礬液ニテ洗滌ス可シ還納後ハ壓迫帶ヲ裝ス可シ

○陰莖損傷

一般ノ創傷療法ニヨリテ處置ス場合ニヨリ陰部切斷ヲ行フアリ

○陰門及腔損傷

旺獸及産後ノ損傷ハ注意ヲ要ス燒墮ハ速カニ除去シ腔及子宮ハ苦麗阿林石炭酸明礬液ニテ洗滌シ牝馬ニアリテハ昇汞(五千倍)水ヲ用フ創面及潰瘍面ニハ石炭酸佩里設林或ハ苦麗阿林佩里設林ヲ塗布ス陰門及其附近ノ損傷ハ格魯兒亞鉛(一二一〇)ニテ洗滌ス

○陰囊損傷

單純ニシテ深カラサル創傷ハ微溫亞麻仁煎二—二%ノ石炭酸或ハ苦麗阿林水ヲ加ヘテ溫湯ス新鮮ナル切創ハ縫合シ翠丸脫出シテ未タ乾燥セス且ツ損傷ヲ受ケサレハ洗滌消毒シテ還納シ創口ヲ縫合シ懸吊繃帶ヲ施シ疼痛ヲ緩ケ治癒ヲ催進ス精系及翠丸ヲ損傷セル場合ニハ去勢術ヲ行フ

○乳房損傷

乳房損傷ハ可成第一期癒合チ期ス可シ然ラサレハ乳癭ヲ起セハナリ創ハ充分消毒シテ縫合ス創位ニヨリ縫合スル能ハサル場合ニハ古魯胃謨絆創膏或ハ創膠ヲ用フハートウイヒ氏ハ明礬及ヒ卵白ヨリ成ル軟膏ヲ三乃至五密米ノ厚サニ攤布ス哺乳期ニハ此等ノ軟膏ヲ用フル能ハス之レ乳汁ノ房内ニ滿干スルニヨリ皮膚ニ皺裂ヲ生スレハナリ大抵第一期癒合ニテ治スルモ若シ能ハサレハ充分ニ消毒洗滌ノ膿汁

沈及膚列虞蒙性炎症ヲ豫防ス可シ乳癭管ヲ發スレハ腐蝕藥烙鐵ヲ應用シ治療中ハ排乳管ヲ裝シテ搾乳ス治癒セサレハ泌乳閉止期迄待ツ可シ其後癭管ハ硝酸銀ノ應用ニヨリテ治ス

○陰莖腫瘍

有莖小贅疣ハ缺ヲ以テ切除シ小出血ハ烙製硝酸銀或ハ烙鐵ニテ止ム大贅疣ハ「エクラソール」ニテ除去ス或ハ彈力結紮ヲ施ス頸ヲ有セザル贅疣及他ノ良性腫瘍ハ未タ小ナル時ハ腐蝕藥(格羅謨酸硝酸硫酸)ニテ破壊ス大腫瘍ハ刀切ス惡性腫瘍ハ陰莖切斷術ヲ行フ

○陰囊腫瘍

良性腫瘍ニシテ大ナラサルモノハ去勢術ヲ行ヘハ治癒ス精系血管擴大セルニヨリ搾木去勢術ヲ行フ之ニヨリ大出血ヲ免ル、¹ヲ得精系廣ク侵サレタル場合ニハ搾木ヲ應用スル能ハス此際ニハ結紮ヲ施シ結紮糸ハ創口ニ垂レ現ハシ置キ五六日ヲ經テ除去ス腫瘍腹腔ニ達スレハ治療ハ功ナシ撲殺スヘシ補遺

○淫慾減耗

Abnormer milder Geschlechtstreif. (獨)

本症ニ体力衰弱ニ由リテ起ル者ト肥胖過度ニヨリテ發スル者トノ二種アリ甲ニアリテハ飼養管理ニ注意シ蛋白質ニ富メル濃厚飼料ヲ給シ消化ヲ催進スル爲メ食鹽

ヲ飼料ニ混與シ強壯劑ヲ處ス乙ニアリテハ減食シ脂肪ニ富メル食品ヲ避ケ運動ヲ課ス催淫藥ハ莞菁ヲ最良トス牝牛ニハ莞菁末二—五、〇牝馬ニハ一—二、〇(丁幾ハ牛二〇、〇馬一〇、〇犬〇、二—一、〇)其他芳香劑拔爾撒謨劑樹脂類依的兒劑酒精劑例之胡椒(牛一〇—一五)生姜芥子質杜松子薩昆那武蘭埏亞爾箇保兒等ノ藥品ハ卵巢及睪丸ノ充血ヲ起シ從ツテ淫慾ヲ興奮ス若シ生殖器ノ變化ニヨル本症ハ治療ノ効ナシ

處方
(七六〇)莞菁末四、一六、〇三包トナシ毎日一包宛麵包ニ混シテ與フ(牛馬)
(七六一)莞菁丁幾二〇、〇酒精一〇〇、〇一瓶ノ水ニ混シ牝牛ニ與フ數日反復

〇陰萎 *Impotentia*

陰萎ニ二種アリ關係的及絕對的陰萎之レナリ甲ハ陰莖ノ疾病例之包莖、箱頓包莖腫瘍陰莖過大勞働過度疼痛性關節炎後軀衰弱腰痠腦脊髓ノ慢性病等ニ歸因スル者ニシテ其原病ノ治療ヲナス即チ滋養食物ヲ給シ電氣ヲ施シ外科的手術ヲナス尙淫慾減耗ノ條下參照絕對的陰萎ハ睪丸ノ變生萎縮肥大等ニ歸因スルモノニシテ全ク治療ノ効ナシ

〇不妊 *Sterilitas*

不妊ニ二種アリ可治的不妊及不可治的不妊之ナリ甲ハ淫慾減耗子宮口ノ閉鎖例之

慢性子宮炎ニテ癥痕組織ニヨル狹窄牛山羊ニハ腔ノ閉鎖變位及子宮腫瘍腔及子宮粘膜慢性加答兒特ニ子宮內膜炎構疹等ノ場合ニ發シ乙ハ卵巢ノ欠乏萎縮變生囊腫癌腫或ハ子宮欠乏變生萎縮等ニ基因シテ發ス甲ハ外科的手術ニヨリテ原病ヲ治療スレハ不妊ヲ癒ヤスヲ得ルモ乙ハ不治トス

〇化膿性子宮炎 *Metritis Suppurativa*

〇子宮實炎 *Endometritis parenchymatosa*

〇子宮外膜炎 *Perimetritis*

〇子宮周圍炎 *Parametritis*

〇加答兒性子宮內膜炎 *Endometritis Catarrhalis*

子宮炎ヲ見ヨ

〇實扶的里性膾炎 *Colpitis diptheritica*

〇加答兒性膾炎 *Colpitis catarrhalis*

〇膿漏性膾炎 *Colpitis blenorrhoica*

防腐療法ニヨル即チ防腐藥撒里矢爾酸(三%)石炭酸(一—三%)苦麗阿林水硼砂

水(三一四%)液ニテ臍ヲ洗滌シ潰瘍及化膿面ニハ石炭酸偏里設林或ハ苦麗阿林偏里設林ヲ塗布ス


○子宮膿腫 *Pyometra*

○子宮水腫 *Hydrometra*

子宮内ニ貯溜スル膿及水液ヲ全ク排除ス動物ノ後牀ヲ低ク斜ニスルヲ便トス排除後微温防腐液ノ注入ヲ行フ石炭酸液(二二〇〇—一五〇)撒里矢爾酸水明礬水(一二六〇—一〇〇)昇汞水二二五〇〇〇之レニ適ス又一、五—二%明礬水一%苦麗阿林水ニ混シテ子宮内ニ注入シ一〇—一五時間子宮内ニ止メ置キ三四回反復應用スレハ慢性症モ癒ユルヲアリ某實驗家ハ子宮頸管ヲ切開シテ套管針ヲ挿入シテ百吉瓦ノ液ヲ排除シ治ヲ致シタル實驗ヲ報告セリ

○子宮脫 *Prolapsus uteri*

先ツ脫出部ヲ軟布ヲ以テ包ミ損傷ヲ避ク可シ未タ甚タシキ損傷ナク器質變狀ヲ呈セサレハ整復ヲ試ム患畜起立スレハ其後軀ヲ少シク高クシテ保定シ横臥セル際ニハ仰臥保定ヲナシ後軀ヲ高クス麻酔藥ヲ施ス乃莫兒比涅(〇、五—一、五牛)或ハ抱水格魯拉爾(二五—四〇、〇)飲用或ハ灌腸之ヲ欠ク場合ニハ五〇〇乃至千瓦ノ武蘭斯(牝牛)ヲ與怒噴ヲ緩和スル爲メ腰部ニ強壓ヲ與ヘ起立セル時ハ砂囊ヲ腰部ニ抵酒〇次キニ脫出部ヲ石炭酸水(三%)ニテ洗滌シ腫脹甚シケレハ明礬水(二%)ニテ洗



フ娩墮停滯スレハレハ之レヲ除去ス整復ハ脫出部ノ最モ陰門ニ接近スル部ヨリ始漸次他部ヲ徐々ニ壓シテ整復ス此際破綻ナキ様施術ニ注意シ且ツ腹壓ノ減セル時ヲ見テ間歇的ニ整位ス可シ整復後ハ可成長ク手ヲ挿入シ置キテ果シテ完全ニ還納シ得シヤ否ヤヲ精檢スヘシ此際出來得ヘクハ緩除ノ運動ヲ命ス次テ氷片或ハ冷水ヲ注入シテ子宮收縮ヲ促シ再脫ヲ防ク如此シテ全ク整復シ終レハ二條ノ紐ヲ取リ(動物ノ長サノ二倍)テ之レヲ屈曲捻繞シテ卵圓形ノ空孔ヲ中央ニ作り其上ノ二條端ハ腰背ヲ通過シテ交叉シ頸環ニ結着シ下ノ二條端ハ兩股ノ間ヲ通過シ下腹ヲ過キ胸ニ至リ頸環ニ結着ス之レニヨリ壓迫シテ再脫ヲ防ク○整復スルコト能ハス且ツ

○產褥熱 *Febis puerperalis*
○產褥敗血熱 *Septicaemia puerperalis*

娩墮ヲ全ク除去シ微温消毒液ニテ子宮内ヲ充分ニ洗滌シ一日數回反復ス内服ハ消炎劑及防腐藥ヲ用フ腹側ニ刺戟擦劑(牛ニハ左側)ヲ塗布シ高熱ニハ解熱劑安知必林安知歇賴林撒里矢爾酸曹達(大動物)ヲ與ヘ全身ニブリースニツツ氏器法ヲ行ヒ衰弱ニハ亢奮藥強心藥ヲ投フ(染毒性子宮炎ヲ見ヨ)

處方

(七六一)安知必林一五、○樟腦五○蜀葵末三五、○爲丸劑與フ(馬)

(七六二)苦麗阿林一五、○的列並底油一〇〇、○亞刺昆亞護謨蜀葵末各適量爲舐劑
一日ニ與フ(馬)

(七六三)安知歇賴林一、○丹寧〇、三白糖〇、五丸劑三個ヲ作り犬ニ與フ

(七六四)樟腦三、○依答兒一〇、○皮下注射(一回量)

(七六五)石炭酸五一一〇、○稀酒精一〇〇、○亞麻仁煎六〇〇、○一日一乃至二回
二分與ス(牛)

(七六六)樟腦三〇酒精一五、○爲溶液三回ニ皮下注射ス(犬)

○產褥急癩(產褥麻痺) *Edempsia puerperalis*

(豫防法)多乳ノ牝牛ニアリテハ分娩前三四日ヨリ搾乳ス滋養物ヲ禁シ産後二三日

モ亦滋養飼料ヲ給セス天氣晴明ナレハ自由ニ運動セシム

(療法)ハ(一)皮膚ノ官能ヲ旺盛ニスル爲メ背腰膝部及四肢ヲ擦擦腰部ノ毛ヲ剔去シ廣サ三〇仙迷突兒方形ノ部ニ芥子泥ヲ厚ク塗布ス(十分ヲ經テ除去ス)或

ハ芥子油の列並底油安母尼亞水、巴豆油トの列並底合劑等ヲ塗用ス項及額部ニハ冷湯ヲ行フ(二)乳房ノ作用ヲ亢奮スル爲メ務メテ屢々搾乳シ乳頭ヲ擦擦ス膀胱ニ加帝的兒ヲ挿入シ排尿シ直腸ニ手ヲ入レテ宿糞ヲ排除シ石鹼水、虞里設林烟草煎等ノ灌腸ヲ施シ劇シキ鼓腸アレハ穿胃術ヲ行ヒ刺絡ハ稀ニ試用ス(三)内服藥 ハ危險ナリ之レ嚙下困難ノ爲メ異物性肺炎ヲ起スノ恐アレハナリ唯初期ニ於テ服藥ヲ用フ内用藥ハ加密爾浸薄荷浸ヲ初メニ與ヘ次テ下劑峻下劑ヲ與ヘテ宿糞ヲ排シ兼テ腸管誘導ノ目的ニ供ス芒硝(食鹽ト伍用)蘆薈ヲ芳香浸汁ト與或ハ巴豆油(一五—二五滴)ヲ粘汁煎ト伍用ス又吐酒石、越攝林(〇、二)必魯加兒必涅(〇、四)皮下注射ヲ行フ心臟衰弱昏睡體温沈降ニハ亢奮藥例之咖啡依答兒酒精、硝酸斯篤利幾尼涅等ヲ與ヘ又酒武蘭埤醋酸亞母尼亞等ヲ與フ(日本酒一合ヲ毎二乃至三時ニ反復内用)樟腦精(一〇、〇)ヲ四乃至五時毎ニ皮下注射ス撒里矢爾酸曹達咖啡涅ノ皮下注射ヲ近年賞用ス麻痺ニ對シテハ神經亢奮藥例之樟腦硫酸依答兒的列並底油阿魏斯篤利幾尼涅等ヲ用フ電氣ノ應用モ麻痺ニ効アリ體温急ニ沈降シ經過急劇ナレハ適當ノ時期ニ屠殺ス

處方

(七六七)吐酒石二五、○芒硝五〇〇、○泥菖根一〇〇、○爲粉末五包ニ分チ每二時一包宛ヲ麥酒ニ混シ與フ

- (七六八) 蘆薈末四〇、〇芒硝二五〇、〇咖啡湯ニ混シテ二回分服
- (七六九) 樟腦油二〇、〇二回ニ皮下注射
- (七七〇) 硫酸越攝林〇、二〇〇水一〇、〇皮下注射
- (七七一) 勿刺篤利丁幾一五、〇酒精二五〇、〇一拉篤ノ亞麻仁粘汁水ニ混與ス
- (七七二) 番木鱉三〇、〇吐酒石一五、〇食鹽一〇〇、〇芒硝五〇、〇混和六包トナシ
每三時若クハ一時間ニ一包宛與フ
- (七七三) 撒里矢爾酸那篤留謨咖啡涅五、〇硫酸越攝林〇、二五〇水二五、〇爲溶液
一回乃至二回ニ皮下注射ス

〇急性乳房炎 *Mastitis acuta*

〇乳房間質炎 *Mastitis interstitialis*

外用塗劑トンギリベルト氏ハ古魯胃謨ヲフオーゲル氏ハ水ニ食匙澱粉四食匙的列
並底一食匙ヲ熔和シタル軟膏ヲ塗布ス或ハ頻々搾乳シ二三日間溫罨法(溫湯ニ醋
ヲ加フ)或ハ粘滑汁炭酸加里ノ罨法ヲ行ヒ次テ石鹼擦劑安母尼亞擦劑鉛糖樟腦軟
膏ノ塗用ハ効アリ輕症ノ者ニハ初メ按摩及前記ノ塗藥擦劑例之石鹼精或ハ石鹼擦
劑ヲ塗布シ内服ニ硼砂ヲ與ヘ重症ニハ溫罨法ヲ施シ皮膚ニ沃度丁幾酒精等分ノ合
劑ヲ一日四五回塗布ス沃度丁幾ノ代リニ石鹼擦劑古魯胃謨、フオーゲル氏軟膏樟
腦鉛糖軟膏等ヲ用フ膿瘍ヲ生セバ切開シ防腐療法ヲ行フ〇攝生トノ忠告ハ初期廐

内ニ放養シ次テ牧場或ハ放牧欄ニ放チ適度ノ運動ヲ命ス食物ハ初期ハ絶食或ハ減
食ス按摩ハ本病ノ治癒ヲ幫助ス
(七七四) 鉛糖樟腦各三〇、〇軟石鹼一二〇、〇爲軟膏乳房塗布用

〇創傷性乳房炎 *Mastitis traumatica*

乳房ハ創傷及挫傷ニヨリテ發炎ス創傷ハ乳房結締織或ハ深ク乳腺ヲ損傷シ治チ怠
レハ癒合セスシテ乳癭管ヲ生ス創傷新鮮ニシテ經過善良ナル豫見アレハ消毒シテ
繃合シ古魯胃謨ヲ塗布スヘルトウイヒ氏ハ明礬及卵白ノ合劑ヲ三―四密迷突ノ厚
サニ塗布セリ局部ニハ乳加帝的兒ヲ挿入シテ搾乳ス可シ如此クセハ創傷治癒スル
モ若シ發炎シ乳癭管ヲ生スレハ腐蝕藥烙鐵ヲ用ヘ消毒ヲ嚴行シテ膚列虞蒙及膿汁
沈降ヲ防キ治療中ハ常ニ乳加帝的兒ヲ挿入搾乳ス乳癭管ハ硝硫銀ヲ用フ挫傷ニヨ
リ乳房炎ヲ起シ血液ヲ漏スアレハ乳房ヲ清潔消毒シテ染毒ヲ避ク可シ乳加帝的
兒ヲ挿入シ血液及乳汁ヲ排泄ス可シ初期ハ冷湯ヲ行ヒ次テ吸收ヲ催ス爲メ溫罨法
ヲ行フ

〇膚列虞蒙性乳房炎 *Mastitis phlegmonosa*

他部ノ丹毒或ハ膚列虞蒙性炎ノ療法ト全シ冷湯ハ用ヘス中性脂肪油牛酪石炭酸
油水銀軟膏依的兒軟膏等ヲ塗布ス頻々搾乳ス乳頭ニ創傷アレハ消毒溫湯ニテ洗滌
ス房ハ綿ニテ溫包シ吸收分解ヲ催進スヘシ

(豫防法) トノ乳房殊ニ乳頭創ノ傷ハ清保シ消毒液洗滌チナシ防腐藥例之硼酸軟膏
 (硼砂) 巴拉賓軟膏(一一一〇)チ塗布ス可シ
 (七七五) 水銀軟膏軟石鹼各三〇、〇爲軟膏塗擦用

○乳房實質炎 *Mastitis parenchymatosa.*

清潔乾燥ノ腺ヲ給シ感冒ヨリ來ル者ハ皮膚ヲ擦シ溫包ス粘汁或之ニ芳香浸或ハ炭酸加里チ混和シタル溫液ニテ器法チ行フ屢々搾乳シ輕キ按摩チ行ヒ脂肪チ塗布シ或ハ偏里設林四分次醋酸鉛水一分ヨリ成ル溫液チ塗布ス非沃斯油樟腦軟膏チ塗用ス硬腫ニハ軟石鹼樟腦的列底油、安母尼亞水チ用フ化膿チ生スレハ屢々搾乳シ必要ニ應シテ乳頭チ切除ス表面ノ化膿熱スレハ切開シ膿瘍腔ハ石炭酸洗滌チ行フ瘻疽チ發スルハ溫番法チ施シ壞死組織チ切除ス○食餌ニ注意シ滋養物チ與ヘ體力チ強壯ニシ鹽酸チ飲水ニ混與シ或ハ強壯藥品チ與フ

(七七六) 的列並底油亞母尼亞水各四五、〇雲薑油九〇、〇爲擦劑
 (七七七) 非沃斯油軟石鹼各四〇、〇樟腦一〇、〇軟膏トナシ塗擦
 (七七八) 樟腦一〇、〇薄荷葉末杜松子各一五、〇混和爲粉末六包二分チ一日三回一包宛與フ(牝牛)

○加答兒性乳房炎 *Mastitis Catasshalis*

(豫防法) トノ乳房ニ於ケル外科的施術殊ニ探子「ブーシー」乳加帝的兒等チ排乳管

或ハ乳竇ニ挿入スルノ際注意ト消毒トヲ要ス流行性ニアリテハ患畜チ隔離シ搾乳者チ別ニシ之レニヨル傳染ヲ豫防ス、○炎症ニ對シテハ消炎療法チ施ス乃チ屢々(一時間毎ニ)搾乳シ輕按摩チ用ヘテ粘液凝塊チ排除シ乳房ハ溫保シ脂肪チ塗布シ綿チ以テ包ム乳房皮膚ニ沃度丁幾酒精等分ノ混合劑チ塗布ス傳染毒ヨリ來ル者ハ乳ノ鏡檢チ要ス消毒液チ乳房内ニ注入ス

處方 (七七九) 「リゾール」〇、五鹽水一〇〇、〇爲溶液乳頭ニ注射ス

○膿腫性乳房實質炎 *Mastitis parenchymatosa apo stematosa*

○壞疽性乳房炎 *Mastitis gangrenosa.*

膿瘍性及瘻疽性乳房炎療法ノ要旨ハ傳染ヲ豫防シ現症チ治スルニアリ甲ノ目的ニハ乳房施術特ニ乳加帝的兒探子其他ノ器械チ挿入使用スルノ際消毒ニ注意スヘシ本病既ニ流行性ニ發スレハ(特ニ壞疽性ニアリテハ)患畜ノ隔離及廐舎ノ消毒チナシ特別ノ看護人チ附シ交通チ遮斷スヘシ壞疽性炎ハ羊ノ媒介ニヨリ傳染ス膿腫性炎ニアリテモ流行性ニ發スレハ全様ノ處置チナスヨークイン氏ハ老癩不長ノ藁ハ本病ト關係チ有スト云ヘリアイカーホツフ氏ハ廐舎廐壁櫃等チ熱湯汁ニテ洗ヒ石灰チ撒布セリ又病乳房ヨリ搾取セル乳及其容器チ消毒セリ

(療法) 屢々搾乳シ病毒ノ蕃殖ヲ制止シ疼痛アレハ輕打擦ヲ用ヘ分泌及炎症滲物ノ排泄ヲ務ム可シ此際加帝的兒ノ使用ヲ忌ム之レ乳塊容易ニ管ヲ閉塞スレハナリ攝生ニ注意シ泌乳ヲ最少限ニ達セシノ全時ニ鹽類下劑ヲ用ヘ場合ニヨリ刺絡ヲ施ス次テ乳房内傳染毒ヲ撲滅シ炎症作用ヲ剋服スル爲メ消毒液ヲ用フト雖モ其藥効ハ實驗家ニヨリ其意見ヲ異ニス或者ハ有効ト稱シ或者ハ無効ト云フ概シ壞疽性炎ニハ効力ナキカ如シト雖モ膿腫性炎ニハ効アリ消毒液ハ大ナル輸乳管ニハ達スルモ細小乳管及乳小房ニハ達セス普通使用スルモノハ硼酸(四%)昇永水(1/5—1/4%)ヲ護謨注射器ニ入レ軟壓ヲ加ヘテ液ヲ注入分配セシメ十—十五分毎ニ搾乳スフランク氏ハ明礬水(2%)或ハ石炭酸水(2.5%)ヲ實用スキークヘエフエル氏ハ4%ノ硼酸水ヲ注射シタル後○、5%ノ昇永水ニテ乳房ヲ洗滌シテ卓効ヲ見シト云フ若他側ノ健乳房ヨリ多量ノ乳ヲ排出スルモ石炭酸ノ使用ヲ忌ム之レ乳ニ惡臭ヲ興フレハナリ膿腫性炎ニアリテハ消炎療法トシテ温湯法及温包ヲ用フバンク氏ハ亞麻仁粉巴布ヲ用ヘ或ハ木綿又ハ毛布片ニ温湯ヲ浸シテ乳房ヲ被包シテ温ム或ハ稀釋油汁石鹼水ノ温蒸ヲ用フ腫脹及疼痛減セハ麵粉糊ヲ塗布シテ綿ヲ以テ温包スフオーゲル氏ハ水ニ食匙濃粉四分僱里設林二十食匙的列並底一食匙ヲ熔和糊狀トナシテ塗布シ十四日間續行ス之ニ按捺ヲ兼施ス劇痛ニハ初期緩和塗劑例之脂肪或ハ灰白水銀軟膏等ヲ塗布スヨーン氏ハ灰白水銀

軟膏綠石鹼及脂肪等分ノ合劑ヲ用ヘフランク氏ハ非沃斯油八分苛性安母尼亞水二分樟腦一分ノ合劑ヲ實用ス膿腫皮膚ニ達スルハ切開シテ膿竈ヲ洗淨消毒ス本病ノ經過中ニ生スル乳凝塊ハ按摩法ニヨリ解凝セシムルヲ得可シ○壞疽性炎ニアリテハ可成速カニ壞疽竈ヲ切開シテ消毒ヲ行フ壞疽蔓延スルモ全乳房或ハ病局部ノ切斷ヲ行フエセル氏ハ屢々羊ニ於テ病局及乳房ノ切斷ヲ行ヘリ止血後創面ハ沃度仿膜ヲ撒布シ木參兒ヲ塗布セシニ五頭中一頭死シ他ハ全治セリノカー氏ハ本病ニハ凡テノ藥液注射ハ無効ニシテ切除シタル後硫酸銅ニテ腐蝕スルヲ實用セリ

○慢性乳房炎 mastitis Chronica

本病ハ結核放線狀菌腫及「ボトリオミューズ」(Botryomycose)ニ由リテ發シ治療困難ナリ高價ノ馬匹ニノミ手術ヲ施シ服役ヲ永續セシム即チ患部或ハ全乳房ヲ切除スルニアリメラ氏ハ切除法ニヨリ良効ヲ得タリ

○乳管狭窄及閉塞 Verengerung und Verschluss der Zitzenkanals (獨)

(一)乳管狭窄 ハ屢々「ブーシュー」ヲ挿入シテ擴張ス可シ二—三仙迷ノ長サヲ有スル獸腸腺ノ一端ニ結節ヲ附シタル者ヲ搾乳前或ハ其後直チニ乳管ニ挿入シ暫時止メ置クヘシ傳染病毒ノ侵入ヲ防クカ爲ニ「ブーシュー」ハ用前消毒乾燥セシム其他加

帝的兒探子他ノ器械ハ勿論消毒無菌ナルヲ要ス此法若シ効ナケレハ乳管ヲ切開スルカ或ハ乳頭端ヲ切除ス切開ニハ細小ナル切離刀或ハ特別ノ乳針ヲ用フ切開ハ乳房内ニ乳ヲ滿有セサル際ニ行フ先ツ鼻捻ヲ附シ左手ヲ以テ乳頭ヲ把ミ乳ヲ乳管ニ充シ器械(切開刀)ヲ一―二仙迷挿入シテ切開スレハ乳ハ斜方向ニ流出スルカ故ニバンク氏ハ前乳頭ハ後方ニ於テ後乳頭ハ前方ニ於テ切開ス切開後ハ創傷癒合收縮シテ再ヒ狹窄スルヲアリ加之全ク閉塞スルヲアリ又消毒ノ不完全ヨリ細菌侵入シテ乳房炎ヲ誘發スルヲアリ故ニ切開前ニ充分乳管腔ヲ消毒シ千倍昇汞水ヲ注入シ滅菌乳針ニテ切開シ閉塞ヲ防ク爲メ十字形切開ヲ要スルコトアリバンク氏ハ此切開法ニテ狹窄ヲ醫スル能ハサルニヨリ乳管ノ開口部ニ於テ乳頭端ヲ切除スルヲ唱用ス即チ先ツ後肢ヲ開張保定シ皮膚ヲ可成節約シテ乳頭端ヲ強銳鋏ニテ切除ス此際勿論充分ノ消毒ヲ要ス切除後乳ハ間斷ナク流出スルカ故ニ護膜管ヲ裝シテ壓迫シテ止ム後瘻痕組織ノ收縮ニアリ流出止マリ排乳適度トナル

(二)乳管閉塞 乳頭上部ノ乳塊ニ由ル閉塞ハ細キ套管針ヲ挿入スレハ疏通ス套管ハ暫時挿シ置ク可シ之ニ「コルク」栓ヲ抵シテ乳ノ流出スルヲ防キ置クヲ可トス乳管口ノ粘膜皺襞ニ由ル閉塞ハ套管針ヲ挿入スルモ其効力一時的ナリ此場合ニハ乳針ヲ以テ切開皺襞ヲ切除ス可シ

○乳房腫瘍 *Enter-Tumoren* (獨)

乳頭ノ贅疣ハ切除シ表面ヲ硝酸銀ニテ腐蝕止血ス搾乳スレハ疼痛ヲ與フルニヨリ

面ノ癒合スル迄加帝的兒ニテ排乳ス可シ乳房表面ノ贅疣ハ搾乳ヲ障害スル場合ニ於テノミ切除ス切除スル際ニハ腺實質ヲ損傷セサル様注意ス可シ但シ手術ハ泌乳閉止期迄猶豫シ其間ハ加帝的兒ニテ排乳セシム可シ犬ニ於テハ惡性腫瘍モ性命ニ危険ヲ及ボサス摘除スルヲ得可シ其法ハ消毒原則ニ從ヒ皮膚ヲ腫瘍ヨリ切離シ周圍組織ヨリ腫瘍ヲ分離シ後其基底ヲ結紮シテ切除ス後綿紗或ハ麻織子塞子ヲ腔ニ抵シテ結束縫合ヲナシ翌日之レヲ開キテ創面ヲ洗滌消毒シ沃度仿謨撒布爾後開放創傷療法ヲ行フ再發スレハ再ヒ施術ス

第九類 眼病

第一分類 眼球外膜諸病

○角膜炎 *Keratitis*

○角膜表層炎 *Keratitis Superficialis*

暗廠通氣善良ニシ原因ヲ除キ結膜ヨリ繼發セル者ハ酸硫亞鉛明礬、硼酸、硝酸等ヲ用ヒ異物アレハ之ヲ除去シ眼瞼内膿症ニヨル者ハ外科牛術ニヨリテ之レヲ治スレハ角膜ノ炎症ハ自然ニ消散ス又溫罨法甘汞(粉末)或ハ赤降汞一分巴拉賓十分ノ軟膏ヲ用ウ羞明甚タシケレハ點眼水ニ亞片或ハ古加乙涅ヲ加フ濕罨法ハ最モ有効ニシテ之レニ亞兒加里鹽(〇、五%)或ハ昇汞(二千倍)ノ稀溶液ヲ用ウ膿瘍外方ニ

破裂スレハ防腐液ノ洗眼ヲナス、水泡性角膜炎ノ小水泡ハ自カラ消散スルモ經久スルモノハ切開ス「パヌス」(Pans)ヲ發スレハ輕症ハ甘汞粉、黃降汞軟膏ヲ用フ慢性ニハ單寧酸、硝酸銀水ヲ用井頑固症ハ外科手術ニヨリテ除去ス内服下劑處方

(七八〇)昇汞〇、二韶水一〇〇、〇洗眼用
(七八一)硼酸二、〇韶水一〇〇、〇洗眼用

○角膜實質炎 *Keratitis parenchymatosa.*

原因即チ異物刺戟物ヲ除去シ硼酸溶液(二%)ノ溫罨法甘汞、赤降汞、黃降汞軟膏、羞明疼痛ナケレハ按摩法ヲ賞用ス(フォーゲル氏)亞篤魯比涅ノ點眼暗室ニ容レ刺戟ヲ避ケ内服ニ下劑ヲ投ス芒硝ヲ賞用ス

○角膜深層炎 *Keratitis profunda*

角膜實質炎ノ療法ヲ見ヨ

○創傷性角膜炎 *Keratitis Traumatica.*

原因タル異物ヲ除去シ防腐法ニヨリ洗滌シ後亞篤魯比涅點眼疼痛甚タシケレハ古加乙涅點眼冷罨法刺創アレハ壓迫繃帶ヲ施シ靜養ス處方

(七八二)硼酸五〇、韶水二五〇、〇洗滌用犬ニ用ツ

○傳染性角膜炎 *Keratitis acuta infectiosa.*

傳染ヲ豫防ス療法ハ消毒法ノ一途ニシテ五千倍ノ昇汞、百倍ノ石炭酸水、百倍ノ苦列阿材水及二—四%硼酸水或ハ硝酸銀水(一—二%)ニテ洗眼ス結膜囊ノ消毒ニ注意シ唧筒ヲ以テ藥液ヲ注射ス治療術者ハ其手ヲ消毒シ他ノ傳染ヲ豫防シ又交通遮斷隔離法ヲ行フ

○角膜潰瘍 *ulcus Corneae*

洗眼用トシテ格魯兒水ノ純液或ハ同液ノ二—三倍ノ水ヲ以テ稀釋セルモノ千倍ノ昇汞或ハ二—四%硼酸水ヲ用ウ又硼酸水(三—四%)ノ溫罨法ヲ施シ通常一日三回之レヲ行フ角膜穿孔セハ更ニ頻々行フ角膜若シ穿孔セントスル危險アルトキハ亞篤魯比涅及越攝林ノ應用ヲ利トス越攝林(一—二%)液ヲ一日二三回點眼ス亞篤魯比涅ハ某氏ハ用ルヲ批難ス前房ニ膿蓄積スレハ角膜穿孔術ヲ行フ患畜ヲ安靜ニシ光線ヲ遮斷シ下劑内用處方

(七八三)鹽酸越攝利涅一、〇韶水一〇〇、〇點眼用
(七八四)格魯兒水五〇、〇二三倍ノ水ニ和シ洗眼用

○角膜淡翳、濃翳、白翳 *Nubeula, Mdeula, geucoma Corneae*

血行及吸收催進ノ爲メ濕褻法ヲ行フ甘汞粉末ヲ吹入レ赤降汞、黃降汞軟膏(巴拉賓一ニ一〇)ハ効アリ又沃度加里軟膏ヲ用ウ最モ有効ナルハ按摩法ニシテ軟膏ヲ上眼瞼内ニ押入シ二指ヲ上瞼上ニ抵シ輕壓ヲ加ヘテ環狀ニ動搖シ以テ瞼上ヨリ溷濁部ヲ撫擦ス無機物(鉛等)ノ沈澱ニヨル者ハ其位置表面ニアル時ハ截除法ヲ行フ割刺法モ行ヒ翳ヲ黑色ニス即チ二%ノ古加乙涅ニテ脱覺シ縫針尖ニテ角膜ノ上皮層ヲ連刺シ〇、〇五プロ昇汞水ニテ摺レル支那黑濃汁ヲ該部ニ注キ指頭ヲ以テ輕擦シ角膜ヲ水洗シ點斑ノ成否ヲ檢シ一回ニシテ尙ホ盡サバレハ同法ヲ反覆ス

處方 (七八五) 乳酸二〇、〇 眼濕褻法用

(七八六) 白降汞二、〇 華攝林一六、〇 一日二三回眼塗布

(七八七) 赤降汞〇、一〇、一五 華攝林五、〇 二三回豌豆大宛眼塗布

○角膜葡萄腫 *Staphyloma Corneae.*

外觀ヲ裝スルニ止マリ視覺ヲ挽回スル能ハス角膜ノ前面ニ突出セルモノハ剪刀ヲ以テ切除シ腐蝕藥等ニテ其再生ヲ防止スベシ又膨出部ノ基根ニ結紮(獸腸)ヲ加ヘ剪刀ヲ以テ切除スルモ可ナリ豫防トシテ角膜ノ創傷炎症潰瘍等ヲ治療スルニ際シ注意ヲ加ヘ葡萄腫ノ發生ヲ防止スベシ

處方 (七八八) 硝酸銀〇、一〇、二 鹽水一〇〇、〇 日々點眼

○圓錐角膜 *Keratoconus (Cornea Conica)*

特ニ施スベキ療法ナシ切除ハ有害無効ニシテ角膜穿孔ヲ招クノ危險アリ

○角膜瘻 *Fistula Corneae.*

角膜ニ深サ前房ニ達セサル小孔アリテ眼房液不絶溢出スルノ症ニシテ亞魯比涅ノ連用十四日ニシテ白點ヲ殘シテ癒合セリトノ例アリ一度癒合スルモ再發シ易シ

○角膜膨出 *Keratocoele*

單寧酸及明礬ノ如キ收斂藥ヲ用井テ洗滌シ緩下劑ヲ投シ亞魯比涅及越攝林涅ヲ反覆交用スベシ

○眼翳 *Pterygium.*

先天性ノ贅片ニシテ弛ク角膜ヲ覆ヘルモノハ刀若クハ剪刀ヲ以テ容易ニ切除スルヲ得可シト雖モ角膜溷濁ヲ免ル、能ハス癍痕翼狀贅片ハ患畜ニ休養ヲ命シ刺撃ヲ減シテ贅生物爾後ノ發育ヲ防止スルニ過キズホフマン氏ハ外觀ヲ粧フ爲メ割刺法ヲ賞用ス

○鞏膜炎 *Scleritis*

溫褻法及亞魯比涅點眼、劇性ニハ局所放血内服撒里失爾酸末期ニハ按摩法ヲ賞用ス

鞏膜創及鞏膜損傷

防腐療法トシテ布片ヲ以テ患眼ヲ纏ヒ消毒藥ニテ之レヲ濕潤シ或ハ點滴法ヲ以テ化膿性全眼球炎ヲ豫防スヘク眼球ニ對スル強壓力ハ務メテ避クベシ故ニ診查ノ際ニモ強壓ヲ加フカヘラズ、脈絡膜ノ脫出セル場合ニハ之レヲ還納シ久キヲ經タル者ハ切除ス大創傷ニアリテハ縫合ヲ行フ

○第二分類 葡萄膜諸病

○虹彩炎 *Iritis*

○單純虹彩炎(原發虹彩炎) *Iritis idiopathica Simplex.*

靜養、暗廠ニ繫キ病眼ヲ覆フ虹彩ノ癒着ヲ防ク爲メ亞篤魯比魯涅點眼ハートウヒ氏ハ非沃斯越幾斯甘汞末各一分阿列布油十五分ノ擦劑ヲ實用スジーダムグロツキー氏ハ誘導法(背部ニ串線法)ヲ用ウ眼球ノ強劇ナル緊張ニ於テハ虹彩切除術ヲ用ヒ僂麻質私諸病ニ併發セサルモノハ原病ヲ治療ス内服ニハ下劑及撒里失酸曹達ヲ用フ

(七八九)非沃斯越幾斯、甘汞各一分阿列布油十六分毎日一回兩眼臉塗布ス
(七九〇)水銀軟膏一五、○非沃斯油五、〇一日二三回眼臉塗布ス

○症候性虹彩炎(轉移性虹彩炎) *Iritis Symptomatic a S. Metastatica.*

虹彩癒着ヲ豫防スル爲メ亞篤魯必涅ノ點眼ヲ實用ス亞篤魯必涅ハ又虹彩及毛樣筋ヲ麻痺スルノ効アルヲ以テ炎症性刺戟物蔓延ヲ幫力スベキ筋ノ收縮ヲ制止スル利アリ前房ニ滯溜セル炎症性滲出物殊ニ膿液排除スル爲メニ往々角膜穿孔術ヲ行フ然レトモ注意ヲ要ス

○創傷性虹彩炎 *Iritis traumatica.*

角膜縁ノ創傷ニ對スル療法ハ昇汞水(千倍)硼酸水、格魯兒水ヲ以テ清淨法ヲ嚴行シ唧筒ヲ以テ結膜囊ヲ洗滌スベシ患畜ヲ暗所ニ繫キ防腐藥液ニ浸セル布片ヲ以テ眼ヲ覆フベク凡テ繼發スヘキ合併症ニ對シ深キ注意ヲ以テスベク角膜ノ創傷ハ其性状ニヨリテ對症療法ヲ施スベシ

○虹彩充血 *Hyperaemia iridis*

眼冷湯ヲ行フ

○瞳孔膜遺殘 *Membrana pupillaris persistens.*

特ニ指名スベキ効驗ヲ有スルモノナシ之レカ吸收催進ノ手段ニ至リテモ顯効ヲ奏スル甚タ罕ナリ

○瞳孔閉鎖 *Occlusio pupillae.*

瞳孔閉鎖ハ二症アリ一ハ虹彩癒着症ニシテ虹彩ノ瞳孔縁ハ其全部ヲ以テ水晶體前囊ヲ蓋ヒ且ツ之ニ癒着シテルモノニシテ其癒着未タ固定セザル時ハ亞篤管必溼ノ點眼能ク之ヲ解脱スルヲ得レトモ此法若シ効ヲ奏セザレハ虹彩ノ一部ヲ切除シ以テ人為的瞳孔ヲ設ケルノ法(虹彩切除術)ヲ存ス又人工ニテ水晶體前囊ヨリ虹彩ヲ剝離スル法(虹彩離開術)アリト雖モ効少ク施行困難ニシテ全治ハ望ムヘカラス一ハ葡萄体異常ノ發育ニ歸因スルモノニシテ手術ニヨリテ治スルヲ得但シ其切除術式ハ虹彩切除術ト同一ノ定則ニ準據ス

療法ナシ

○虹彩缺損 *Caloboma iridio*

療法ナシ

○脈絡膜缺損 *Calobomachoroidae*

療法ナシ

○毛様體炎 *Cyclitis.*

亞篤管必溼點眼ヲ有効トス毛様筋ヲ麻痺シ疼痛ヲ減シ炎症作用ノ蔓延ヲ防キ且ツ虹彩癒着症ヲ豫防スルノミナラス散瞳藥ハ後部ニ存スル滲出物ノ前房ニ排出スルヲ容易ナラシメ隨テ吸收ヲ便利ナラシム

○脈絡膜炎 *Choroiditis.*

原因ヲ除去ス若シ異物存在スレハ直ニ之ヲ除ク疼痛甚タシケレハ麻醉藥卷法及古加乙涅點眼ヲ實用ス光線ノ遮斷及亞篤管必溼ノ點用ヲ施ス之レ亞篤管必溼ハ脈絡膜炎ニ於テ最モ忌ムヘキ虹彩及毛様體ノ運動ヲ制止スル効アレハナリ豫防法トシテ眼珠創傷虹彩或ハ毛様體炎ノ諸症ニ遭遇セバ須ク先ツ其炎症作用ノ脈絡膜ニ波及スルヲ防クベシ

○虹彩脈絡膜及毛様體炎 *Iridochoroiditis et Cyclitis.*

月盲症ノ場合ニ能ク目撃スル症ニシテ一般定則ニヨリ攝生ニ注意シ亞篤管必溼ノ點眼ニヨリ一ハ毛様筋ニ安靜ヲ與ヘ一ハ其散瞳的藥効ニヨリ虹彩後癒着ヲ豫防スルニアリ

○散瞳症 *Mydriasis.*

原因ヲ詳ニシテ原因療法ヲ施シ對症療法トシテ瞳孔縮小藥硫酸越攝林涅、鹽酸必魯加兒必涅「ムスカリナム」等ヲ點眼ス處方

(七九一)硫酸越攝林○、○二蒸餾水三、○右溶液トシ毎回一滴結膜囊ニ點入

(七九二)鹽酸必魯加兒必涅○、一餾水一○、○毎回一滴結膜囊ニ點入

○縮瞳症 *Miosis.*

原因療法ヲ施シ對症療法トシテ療法亞篤管必溼「ヒヨスチン」「ホムアトロピン」

ツボイシン」等ノ散瞳藥點眼

○虹彩脫 *Prolapsus iridis*

虹彩炎ヲ見ヨ

○虹彩損傷

創傷若シ單純ニシテ倅ヒニ速ニ摘出シタル後ハ他ニ危險ナル繼發症ナクンハ不良ノ結果ナクシテ全治スヘシ然レトモ炎症症候ヲ帶フル時ハ亞篤魯比涅ヲ點眼シ壓定細帶ヲ用ヒ專ラ消炎法ヲ勉ムベシ其危篤ナル續發症ヲ生セシ時ハ豫後甚々悪シク到底治癒ヲ望ムベカラズ

○全眼球炎 *Panophthalmitis*

專ラ消毒藥ヲ用フ殊ニ角膜鞏膜ノ深創若ハ貫穿創ニ於テ最モ緊要ナリ就中昇汞硼酸僱里設林等ハ有効ナリ其用法ハ藥液ニ浸醃セル輕布片ヲ以テ患眼ヲ庇覆シ或ハ時々結膜囊ニ注射スヘク小動物ニハ點眼ヲ施ス此際眼ニ壓力ヲ加ヘサル様戒慎スヘシ消毒療法効ナク化膿性全眼球炎ヲ發生クレハ眼球ノ存保ハ望ムヘカラス不絶消毒藥ニテ患部ヲ洗淨シ可成速カニ炎症ヲ消散セシム、ベシ眼球摘出術ハ外觀ヲ損スルカ故ニ妄ニ行フ可カラス唯炎症作用ヲ速カニ消散セシメ以テ可成早ク動物ヲ使役セント望ム場合ニ行フ

○間歇性眼炎(月盲) *Iridochorioiditis recidiva opt*

th almia periodica.

(豫防法)患馬ハ蕃殖用ニ供セス隔離シ牧場ヲ變更シ排水法ヲ設ケテ土地ヲ乾燥シ發作ノ初期ニ眼球摘出術ヲ行ヒ健眼ノ傳染ヲ防キ攝生飼料ニ注意シ穀類ヲ禁シ夏ハ青草ノミヲ與ヘ便秘アレハ下劑灌腸ヲ施シ眼充血ヲ防キ暗厩ニ入レ温包ス患眼ノ(治療)ニハ厩舎ヲ暗黒ニシテ眼ヲ覆ヒ亞篤魯必涅(一ブロ)液ヲ毎日二三回點眼シテ癒着ヲ防ヤ冷卷法ヲ施シ疼痛甚々シケレハ古加乙液ヲ點眼シ滲出液吸收ヲ促ス爲メ鹽酸必魯加兒必涅ノ皮下注ヲ試ム英式療法ハ消炎及誘導療法ニシテ甘汞或ハ蘆薈内服ヲ連用シ營養善良ナル者ハ刺絡(一驛動脈)ヲ行フ第二期ニ於テハ甘汞或ハ「ベラドンナ」軟膏(二二三〇油)油ヲ塗布シ誘導法トシテ芫菁軟膏ヲ咬筋部或ハ項部ニ塗布シ或ハ烙鐵ヲ施ス或ハ加里液(一%)芳香浸汁ニ酒精ヲ伍シテ眼ノ洗滌及覆法ヲ行フ結膜囊ニハ黃降汞軟膏ヲ塗ス近時「ピオクタンニン」(〇、一%—一%)ヲ毎日結膜囊内ニ點眼スルヲ賞用スル人アレトモ本藥角膜及鞏膜ヲ經テ傳染原ヲ撲滅スルヤ否ヤ疑ハシ虹彩切除術及角膜穿刺術ヲ試ミ癒着セル虹彩ヲ切除シ滲出液ヲ排除シテ眼内壓ヲ減スル等モ又効アリト雖モ毎時養効スルモノニアラス施術ノ困難ト貽患ノ多發トハ未タ確實チル手術トシテ賞用スルニ足ス虹彩切除術ハ馬ヲ充分麻醉セシメ(同時ニ古加乙涅點眼)次ニ眼瞼及眼球ヲ固定シ鎗狀刀ヲ以テ角膜ノ上外椽ニ一刺ヲ行ヒ次ニ彎攝子ヲ角膜創口ヨリ眼房内ニ挿入シ虹彩ノ瞳孔椽

ヲ把取シ剪刀ヲ以テ剪除ス此時虹彩斷根ハ創口ニ接近セルヲ以テ徐ロニ之レ
 ナ眼房内覆ニ還シ後チ覆蔽シテ動物ヲ靜養セシムベシ角膜ノ創口ハ日ナラツ
 シテ癒合スベク虹彩ノ斷面ヨリ眼房ニ溢出セル血液ハ數週ノ後全然吸收シ去
 ルヲ法トス要スルニ本病ノ療法トシテ古來試用シタル藥物及方法ハ頗ル多様ナ
 リト雖モ確効ヲ擧クレモノ少ナシ本症病原ヨリ推セハ消毒法ニ若クモナシト
 雖モ病竈ノ位置常ニ内部ニ存シ消毒藥ヲ其効ヲ逞フセシムル事頗ル困難ナ
 リ須カラク亞篤魯比涅ノ點眼ニヨリ瞳孔ヲ散大セシメ毛様筋ヲ麻痺セシメ一
 ハ虹彩癒着ヲ防キ一ハ疼痛ヲ減シ虹彩ノ運動ヲ制シテ該部ノ刺戟ヲ緩ラゲ其
 附近ニ傳染毒ノ蔓延ヲ防クニ止マル其他攝生食物ニ注意シ下劑ヲ連用スル等
 ニ過キス頑固慢性ノ者ハ眼球摘出術ヲ行フ

處方

(七九三) 硫酸亞篤魯必涅〇、一 瀝水一〇、〇 一日二三回點眼
 (七九四) 鹽酸必魯加兒必涅〇、〇五—〇、一 瀝水一〇、〇 皮下注射

○ 葡萄膜腫瘍

腫瘍ハ早晚眼球ノ亡滅ヲ來スモノナレハ生前ニ發見スレハ眼球摘出術ヲ決行スベ
 シ

第三分類 網膜及視神經諸病

○ 網膜炎 Retinitis

療法ノ効ヲ奏スルハ炎症ノ初期ニ限ル療法トシテ腸ニ對スル誘導法限ニ對スル光
 線刺戟ヲ遮斷シ及本病ヲ誘發セル原病治療ノ外他ニ途ナシ

○ 視神經頭炎 Neuroretinites S. papillitis

療法網膜炎ニ同シ

○ 視神經幹炎 Neuritis retrobulbaris.

眼球内或ハ腦ニ於ケル炎症作用ヲ制止スルハ本病療法ノ最要點トス其他ハ食物攝
 生ニ注意シ且ツ光線空氣等眼ノ生理的刺戟ヲ避クヘク時ニヨリテハ下劑ヲ投ス

○ 網膜剝離 Anotia S. Sublatisretinae.

療法ハ効驗凡テ微弱ナリ人體眼科ニ於テ本病ノ治不治ハ方今未定ノ問題ナリ近來
 ニ至リマククロツキー氏頻リニ馬ノ剝離ノ治スヘキヲ主張セリト雖モ其說タル月盲
 ニ歸因セル網膜剝離ニ對スル經驗ニ出テタルモノニ非サリシナリ

○ 黑内障及弱視 Amaurosis, Amblyopia.

原病ニヨリテ處置ス 腦震蕩ニヨルモノハ外誘導法ヲ用項部ニ串線打膿法、環插法
 刺擊擦劑ヲ用ヒ峻下劑内服、衝動劑、亞兒尼加煎汁ニ稀酒精ヲ加ヘテ眼翳法、瞞瞞
 窩ニ烙鐵、的列並底油塗布、轉位ニヨルモノハ峻下劑利尿劑、誘導法、炎症ニヨルモ
 ノハ下劑内服衝動吸收藥塗布芳香劑液ノ翳法、水銀軟膏ノ塗布中毒ニヨルモノハ

鹽類下劑刺絡頭部冷湯亞片少量ヲ用フ殊ニ出血ヲ防止スルコト豐饒ノ營養ヲ給スルコト看護ノ懇篤ナルコト等ハ主要ナルモノニシテ營養失常ノ如キハ可能的速力ニ之ヲ補ヒ以テ視神經ヲ十分ニ榮養スヘク原病ノ炎症作用ニ起レルヲ知ラハ病期ニアリテ治ヲ施スヘク中毒ニ基クハ毒物ニ對スル措置ヲ行フヘシ但シ中毒ニ因スル視力ノ障害ハ幸ニシテ危險ナラサルヲ常トス藥物ハ主トシテ斯篤利幾尼涅ヲ賞用ス番木鱈未五、〇チ一日量トシ沃度加里ト交用ス本症ノ原因ト認ムヘキ病的變化ヲ發見スル能ハサル時ハ藥劑ノ處スヘキモノナシ故ニ治癒ニ長日月ヲ要ス網膜及視神經ニ變化ヲ呈セルモノ殊ニ視神經ノ瘦削ヲ來セルモノニアリテハ斯篤利幾尼涅ノ効薄弱ナリ

○網膜出血 *Apoplexia retinae*

原病ノ治療ヲナス殊ニ腸ノ誘導法ヲ必要トス

○網膜腫瘍

家畜ニハ極メテ稀レナリ療法ナシ

第四分類 水晶體及硝子體諸病

○白內障 *Cataracta*

溷濁ヲ消散セシメントシ或ハ之レカ吸収ヲ催サントスルカ如キ藥物療法即チ刺戟

軟膏或ハ串線打膿法ノ如キ誘導法ハ殆ント無効下劑砒石等モ効力ナシヴイヅール氏ノ賞用セル燐油モ亦効驗疑ハシ唯々有望ナルハ外科手術ノ一途アルノミ手術ニ水晶體墜下法 (*Reclinatio*) 及水晶體摘出法アリ此等ノ手術モ亦確効ヲ奏セス馬ニアリテハ水晶體摘出ノ爲メ遠視眼トナリ盲目ヨリ却テ使役上不便ヲ來ス犬ニ於テハ幼年白內障ハ手術ノ爲メニ大ニ視力ヲ改善シ或ハ全ク恢復スルコトアリメラ―氏ニヨレハ水晶體ノ墜下法ハ常ニ困難ニシテ成蹟可ナラスト雖モ水晶體截開術及摘出法ハ犬ニ應用シテ効力アリ(手術式ハ眼手術篇參照)

○硝子體動脈遺殘 *Atrisia hyaloiden persistens.*

胎生期間血液ヲ運行シタル硝子體動脈ノ遺殘シテ灰白若クハ暗色不透明ノ物質ヲ硝子體內ニ止マルモノニシテ視覺ヲ障害スルコトアリ療法ノ之レニ施スヘキナシ

○硝子體溷濁 *Glaspörperturbungen (獨)*

初期ニ於テ溫濕法ヲ用フ溫濕法ハ吸収ヲ催スノ効アルヲ以テ自然良能ノ未タ吸收機能ヲ停止セサル間ニ在リテハ溷濁ノ消散ヲ督進スルヲ得ヘシト雖モ經久ノ溷濁ニアリテハ療法ナシ角膜穿孔術ヲ反覆試用スヘシ

○硝子體融化 *Syochysis Oosposis Vitreum*

硝子體ノ既ニ久シク病ニ罹レルヲ證明スルモノニシテ常ニ眼球ノ萎縮及瞳孔ノ綠色ヲ合併ス治方ナシ

第五分類 綠内障及水腫眼

○綠内障 *Glaucoma*

原病ヲ察シテ之レカ治療ヲナシ對症療法トシテ眼内壓ヲ減スル爲メ越攝林「ピロカルピン」點眼ヲナシ高度ニアリテハ角膜穿刺術及鞏膜切開術ヲ行フ又人醫ニアリテハ虹彩切除術ヲ賞用ス

○水腫眼 *Hydrophthalmos*

有溝針ニテ眼球ヲ穿刺シ水液ヲ排除スウインクレル氏ハ水腫眼ニ罹レル犬眼ノ角膜ニ套管ヲ刺入シ唧筒ヲ以テ房水ノ一部ヲ排除シタルニ八日間ニシテ治癒セリ故ニ時日ヲ經サルモノハ此法ヲ試用スベン伊太利獸醫ハ牝牛ニ於テ良効アルヲ報告セリ越攝林點眼モ亦試用スベシ

第六分類 眼球保護器諸病

○結膜炎 *Conjunctivitis*

○單純結膜炎 加答兒性結膜炎 *Cory. Simplex S. Catarrhialis*

異物其他ノ刺戟物ヲ除去ス大動物ニアリテハ異物ヲ除去スルニ束髮針或ハ屈曲セル黃銅線ヲ用ユ又屈曲セル帽針ヲ賞用ス異物存在ノ疑アルモノ之レヲ認ムル能ハサレハ徃々結膜囊ヲ灌溉シテ其存在ヲ認知スベシ異物ヲ驅除セントシ或ハ之レガ存

ヲ決定センニハ大動物ニアリテハ食指ヲ結膜囊ニ挿入スルヲ可トス食指ハ豫メ消毒シ馬ニアリテハ内背ニ於テ瞬膜ヨリ之レヲ挿入スレハ容易ニ結膜囊底ニ達ス其他凡テ眼ニ對スル刺戟物ハ微細ト雖モ之レヲ排除セサルヘカラス患畜羞明甚タシケレハ暗處ニ移シ或ハ布片ニテ眼ヲ覆フ炎症ニハ收斂藥即チ硫酸亞鉛、明礬、醋酸鉛、硝酸銀(一%)ノ類ヲ用フ疼痛甚タシケレハ古加乙涅(二—三%)點眼ヲ行フ之レニ昇汞水及撒里失爾酸飽和溶液同量ノ混和液テ之レニ混用スル人アリ劇痛ニハ單味粘汁或ハ粘汁ニ麻醉藥ヲ和シテ用ユメル氏ノ賞用スル點眼劑ハ硼砂一、○苦扁桃水及椶櫚漿各二〇、○鹽水一五〇、○ナリ硝酸銀ヲ用フル時ニハ點眼後二三秒ヲ經テ二%ノ食鹽溶液ヲ點眼スヘシ慢性結膜炎ニハ徃々熔製硝酸銀ヲ用フ殊ニ結膜ノ腫脹ヲ來セル者ニ効アリ結膜炎症ノ眼瞼内瞼ニヨルモノハ手術ヲ施ス食物ヲ減シ便秘アレハ下劑ヲ投ス

處方 (七九五)硫酸亞鉛(〇、五%)カ〇、〇亞片丁幾二十五滴一日二回點眼

○膿漏性結膜炎 *Cory. purulenta S. Pleorrhoea*

特種傳染毒ノ撲滅ヲ唯一ノ療法トス此目的ニハ消毒液ヲ以テ結膜囊ヲ洗滌シ滲出液膿汁等ヲ排除ス其藥液ハ五千倍昇汞水、百倍石炭酸水、格魯兒水、(一二〇)硼酸水(二—四%)クレチリン水(〇、五—一%)等ナリ化膿性葡萄狀菌ハ硝酸銀(一%)昇汞(五千倍)液ニ遇ヘハ直チニ死滅スルカ故ニ硝酸銀水ノ點眼ハ有效ナリ石炭酸

ハ刺戟強キヲ以テ賞用セス初期ニアリテハ消毒藥ヲ混セル水液ノ冷湯法ヲ行ヒ腫脹過度ナレハ亂刺及温罨法ヲ施ス疼痛甚タシケレハ古加乙涅ヲ用フ第二期ニアリテハ收斂劑例令鉛糖、硫酸亞鉛、硝酸銀(〇、五—一%)點眼ヲ行フ眼瞼ノ膠着ヲ防クニハ巴拉賓ノ塗擦ヲ最良トス角膜潰瘍ヲ併發スレハ越攝林ヲ用ヒテ眼内壓ヲ減シ角膜ノ穿孔ヲ起セハ格魯兒水(一%)ト越攝林トヲ交互點眼スヘシ要スルニ本病ハ藥液ヲ點眼シ結膜囊ヲ清滌スルヲ主眼トシテ犬ニアリテハ毛筆ヲ用ユ其法先ツ眼瞼ヲ翻轉シ靜ニ結膜囊中ニ毛筆ヲ挿入シ爲シ得ル限リ堆積セル分泌物ヲ排除シ次ニ藥液ヲ粘膜ノ表面ニ塗布スルニアリ、傳染性ヲ有スルニヨリ隔離其他ノ豫防法ニヨリ蔓延ヲ防キ病眼ニ觸レタル海綿及其他ノ器具ヲ健眼ニ使用スルヲ禁ス又洗眼點眼ノ際角膜ヲ傷ケザル様注意ス病眼ニ接セル手ハ消毒ス

結膜實質炎 *Oxj. parenchymitosa*

原因殊ニ化學的刺戟物ハ特ニ注意ノ除去ス炎症ノ消散ニハ冷罨法之レニ適ス硝子若クハ血液ノ如キ外觀ヲ呈セル強度ノ腫脹ニアリテハ亂刺ヲ行ヒ後ヲ收斂劑(明礬單寧二%皓礬)等塗用スヘシ此等ノ藥物ハ亂刺ヲ用ヒサルモ亦克ク適應ス處方(結膜炎)

- (七九六) 炭酸加里〇、二—〇、三 澗水二五、〇 溶液トナシ一日三四回點眼
- (七九七) 昇汞〇、〇〇五 澗水一〇、〇 洗眼用
- (七九八) 赤降汞一、〇 萃攝林二〇、〇 毎日豌豆大宛眼ニ塗布ス

(七九九) 白降汞〇、五 屈里攝林一〇、〇 日ニ屢々眼ニ塗布ス

(八〇〇) 結麗阿曹篤三 澗水二五、〇 爲振盪合劑 毎日三四回宛三—五滴ヲ眼瞼間ニ點下ス(慢性結膜炎)

- (八〇一) 皓礬〇、〇二—〇、〇五 澗水一〇、〇 洗眼用
- (八〇二) 熔製硝酸銀〇、〇二—〇、一 澗水一〇、〇 洗眼用
- (八〇三) 單寧酸〇、一 澗水一〇、〇 洗眼用
- (八〇四) 硫酸銅〇、〇五—〇、五 澗水一〇、〇 毎日四五回洗眼
- (八〇五) 硫酸亞篤魯必涅〇、〇二—〇、〇九 澗水一〇、〇 羞明ニ每三時一滴宛點眼

○ 結膜腫瘍

結膜ニハ贅疣脂肪腫、癌腫、肉腫皮樣腫等ヲ發生スルコトアリ外科手術ヲ以テ腫瘍ヲ截去ス腐蝕藥ハ用ユルヲ得ザルヲ常トス場合ニヨリテハ格魯兒酸ノ濃液ヲ用フ通常古加乙涅ニテ奪覺シ次テ彎刃外科剪刀ヲ以テ剪去ス有頸腫瘍ハ結紮ヲ用ユルモ截離スルニ若カス

○ 瞬膜損傷 *Verwundung des dritten Augenlides (獨)*

自然ニ癒ユルモ若シ創傷頑拗ニシテ癒ヘサレハ瞬膜稍ヤ全部ヲ截去スベシ又過剩ノ贅生物ヲ繼發セハ剪刀ニテ截除スヘシ其法ハ捻攝子又ハ結紮糸ヲ以テ瞬膜ヲ引出シ剪刀ニテ截去スルニアリ術後ノ出血ニハ眼瞼ヲ閉鎖シ壓迫ヲ加ヘ以テ自カラ止マルヲ俟ツ可シ

○瞬膜腫瘍

纖維腫上皮腫軟骨腫「ハルヴェル氏」腺ノ腺腫等アリ剪刀ニテ切除ス之レト同時ニ瞬膜ヲモ摘出ス

○淚囊炎

Lacrymocystitis.

ホールマン氏ハ鼻腔ニ於ケル淚管排泄孔ヲ開キ之ニ皓礬水ヲ注射シテ其効ヲ收メウオルフ氏ハ一日三四回淚囊ヲ壓迫スルコト四日間之レニ〇、二五%皓礬水ヲ下淚管ヨリ注射シタルモ効驗ナク後チ上淚管ヲ分割セリ其方法ハ哥羅仿謨迷朦ヲ施シ彎曲セル「ウエベル」氏消息子ヲ上淚管ニ挿入シ鉛頭外科刀ヲ以テ淚管ノ長經ニ沿フテ之レヲ切割シタルニ出血多カラズ後之レニ溫罨布ヲ加ヘ〇、三%石炭酸液或ハ撒里矢爾酸ヲ注入セリ其後五週ヲ經テ治セリパーイエル氏ハ彈力消息子ヲ挿入シ收斂藥ヲ注射スル數週日ニシテ全治セシメタリ要スルニ注射洗滌ニ際シ内容物ヲ充分ニ排泄スルヲ主トシテ之レヲ得ザレハ切割法ヲ斷行スヘシ

○流淚

Epiphora

淚管ノ鬱塞及閉鎖慢性眼病特ニ慢性結膜炎淚管ノ結石等ニ由リテ起ル原因療法ヲ施スヘシ

○淚腺炎

Lacrymoadenitis

溫罨法、濕巴布、水銀劑特ニ水銀軟膏ノ塗布

○淚腺囊腫

Lacrygops

穿刺シテ内容物ヲ排除ス

○淚瘻

Fistula lacrymalis

骨質膨大ニヨリ排泄管ノ閉鎖シタルモノハ不治トス先ツ消息子ヲ挿入シテ障害ノ性狀ヲ察シ障害ヲ發見セバ淚管ノ下口ヨリ消子ヲ挿入シ「アーシー」或ハ太キ腸線ヲ貫通スベシ之レニ依テ天然排泄孔ノ通路ヲ開クヲ得ハ瘻管ハ自カラ治癒ス尙ホ瘻ヘサレハ熔製硝酸銀ニテ瘻管壁ノ腐蝕ヲ行ヒ創面ヲ新鮮ニシ消毒收斂液(硼酸石炭酸クレオリン)ニテ洗滌ス慢性頑固症ニハ淚管ノ經路ニ芒菁軟膏ヲ塗布格魯兒亞鉛、硫酸銅液ヲ注入ス其他瘻孔ノ縫合ヲ賞用ス

○淚管閉塞及狹窄

Verstopfung und Verchluss der Tränen Kanals (獨)

馬ニアリテハ防腐液ヲ混和セル微溫湯ヲ下排泄孔ヨリ淚管ニ注射ス或ハ彈力探子若クハ犬用尿道加帝的兒ヲ下ヨリ挿入シテ障害物ヲ排除スルプラン氏ハ彈力探子ヲ馬ノ淚管ニ一條線ヲ通シ其端ニ小環ヲ結附シ其脱落ヲ防クノ法ヲ用ヒタリ或ハ下排泄孔ノ截開ヲ試ミ屢次硝酸銀液ヲ注入ス又消息子ヲ以テ淚管及淚囊ヲ經テ顔面ニ至ル細キ串線系ヲ通スルノ法ヲ施セル人アリ

○眼瞼炎

Blepharitis

原因ニヨリテ處置ス乃チ他ノ重症ノ爲メ久シク動物ノ横臥ヲ許サザル時ハ屢々位置ヲ變換シテ瘻瘡ヲ豫防スベシ頭絡ノ摩擦ニヨルモノハ頭絡ノ釘着緊急ニ失シタルカ爲メ馬ノ之ヲ免レントスル結果ニヨル次テ之カ豫防ニハ約掌大ノ硬革ヲ頂革ニ結着シ願革ヲ二重ニ装着スルヲ可トス眼瞼ノ挫傷ニアリテハ適當ノ冷罨法ヲ施スヲ以テ足レリトス外皮ノ剝脫セルモノニアリテハ散布藥單寧沃度仿膜及澱粉ノ散布或ハ緩和ノ脂肪鉛糖又ハ皓礬ヲ用ヒ濕疹及其他ノ皮膚病ニアリテハ各々適應ノ療法ヲ處スヘク膿瘍ニアリテハ速ニ切開スヘク皮膚壞疽ニアリテハ一般ノ壞疽療法ニ從フヘシ

○眼瞼外反 *Ectropion*

先ツ結膜炎ヲ治療ス結膜ノ炎症去ルモ眼瞼猶正位ニ復セサレハ癢痕組織ニヨリ治療スルノ法ニヨルヘシ其法ハ下瞼ノ外半部ニ於テ幅〇、五—一仙米ナル尖頭穹窿形ニシテ殆ント三角形ヲナシ其尖端下方ニ向ヘル皮膚辨狀切除ヲナシ創縁ヲ縫接スルニアリ之レト同時ニ動物ノ外容ヲ裝フカ爲メニ他眼ニモ亦對等ノ縫合ヲナスコトアリト雖モ如此ハ敢テ必要ナラス

○眼瞼内反 *Entropion*

經久セサルモノハ結膜炎ノ消散ニヨリ自カラ治癒スト雖モ經久症ニアリテハ手術ヲ行フ其手術ハ剪刀ヲ以テ翻轉セル瞼縁ヲ截除スルニアリト雖モ容姿ヲ損ス他ノ

一方ハ通常鑷子ヲ以テ眼瞼ノ皮膚ヲ撮起シテ幅〇、五—一仙米ナル皺襞ヲ作り反轉セル眼瞼ノ復位スルヲ度トシ瞼縁ヲ去ルコト〇、五〇Mノ所ニ於テ剪刀ヲ以テ之レヲ切除スルニアリ術後ハ創孔縫合スルノ要ナシベルリン氏ハ犬ノ外眥ノ下方ニ於テ眼ヲ距ル七MMノ部分ニ鼠齒鑷子及外科刀ヲ加ヘテ橢圓形ノ皮膚切開ヲナス而シテ其創孔患犬ノ牀積及内反ノ程度ニ由リテ大小一ナラスト雖モ中等大ノ犬ニアリテハ横徑約三五MM縫徑十六—十八MMナベルン刀ヲ下スニ先チ剃刀又ハ剃刀ヲ以テ毛ヲ刈除ス豫メ切除部ノ位置大小及形狀ヲ正シク期定スルヲ要ス創口ノ縫合ハ管ニ要ナキノミナラス行ハザルヲ以テ却テ良効ヲ得ヘシ

○眼瞼炎 *Blepharitis marginalis.*

眼瞼炎ニ同シ

○眼眶癒着 *Anchyloblepharon*

缺ヲ以テ癒着眼眶ヲ切離ス(眼眶成形術)

○眼球癒着 *Synblepharon*

適當ノ療法ナシ辛苦以テ癒着ヲ分開スルニアルノミ乍チ再癒ヲ來シ多クハ効ヲ得ス

○眼瞼癒着 *Atrisia palpebrarum*

剪刀ヲ以テ上下眼瞼ヲ切離シ再癒着ヲ豫防スル爲メ熔製硝酸銀ヲ以テ創縁ヲ燒烙

シ脂肪若クハ萃攝林ヲ塗布シ爾後日々洗滌ス

○眼瞼腫瘍

具頸贅疣ハ剪刀ヲ以テ截除スヘク無頸腫瘍ハ外科刀ヲ以テスヘシ但シ其際意ヲ深ク再發ノ豫防ニ用ヒサルヘカラス藥劑ハ格魯謨酸強溶液克ク之レニ應ス

○眼窩損傷

Verletzungen der Orbita (獨)

創縁新鮮ナレハ專心消毒ヲ主トシテ創傷ヲ清潔ナラシメン爲メ務メテ死滅セル組織ヲ省除シ格魯兒亞鉛液(十%)ヲ以テ洗滌スベシ若シ眼球ヲ維持シ得ル望アレハ硼酸水(二―四%)或ハ昇汞水(〇、五%)ヲ之レニ灌漑スヘク第一期癒合ノ望ナクシハ創傷ヲ屢次洗滌スヘク若シ望アラハ鄭重ニ消毒ヲ施スノ後創ヲ縫合シ大動物ニアリテハ密封繃帶ヲ加フヘシ創傷重ク軟部ノ挫傷或ハ毀損甚タシク到底第一期癒合ヲ期スルヲ得サレハ消毒液點滴法ヲ持續スヘシ此法常ニ偉功アリト雖モ若場合ノ之レカ實行ヲ許サレハ屢次消毒液ヲ以テ創傷ヲ灌漑スヘシ但シ之レニ用ユヘキ藥物ハ濃厚ナルベカラス其之レニ撰用スヘキモノハ硼酸(二―四%)苦麗阿林(一%)明礬醋(二%)ノ類トス

○眼窩腫瘍

眼球及贅生物ノ摘出ハ時ニヨリ奏効ナキニシモ非ラスト雖モ性質不良ナル腫瘍ニアリテハ之レカ再發ヲ防遏スルニ困難ヲ感スヘシ

○眼球脫

Prolapsus oculi (Exophthalmos)

咬傷或ハ暴壓ニヨルモノ、如キ脫位ノ新鮮ナル者ニアリテハ成ルベク速ニ整復ヲ計ルヘシ脫位愈々久シキヲ經バ復位愈々困難トナリ眼ノ危害愈々加ハル之レ患部ハ時ヲ經ルニ從ヒ血液及炎症ノ滲出物漸ク加ハルカ故ナリ整復法ハ先ツ微温湯ヲ以テ眼球ヲ洗滌シ上下ノ眼瞼ヲ緊張シテ角膜ヲ覆ヒ兩手ノ拇指ヲ以テ之ニ壓迫ヲ加ヘツ、眼球ヲ窩内ニ復納スルコトヲ務ムヘシ手術困難ナレハ脫出ノ眼球ニ少許ノ油劑ヲ加フヘシ如斯スルモ復位ヲ得サレハ鉤頭剪刀ヲ以テ三―五MM間外眥ニ切開ヲ行フテ瞼裂ヲ延大スヘシ眼球復位後ハ再脫ヲ豫防スル爲メニ截開部ノ縫合ヲ要ス脫出後多ク時日ヲ經過セス窩内ニ於テ軟部未タ腫脹ヲ生セサル間ハ此方法ニヨル復位常ニ容易ナラノミナラス術後眼球ヲ其本位ニ保持スルコト亦難カラスト雖モ既ニ再脫ノ虞アルニ至ラハ結膜ヲ傷ケスシテ眼瞼ノ外皮ニ一若クハ二點ノ縫合ヲ加ヘテ之レヲ防禁スヘシ施術後ハ特ニ肉食獸ニ於テ約二十四時間ハ餌食ヲ禁ス之レ咀嚼ノ爲メ再脫ノ虞アレハナリ脫出後十二―二十四時間ヲ經過シ角膜ノ表面既ニ乾燥スルカ或ハ窩内ニ腫瘍ヲ存スルアリテ復位スルコト得サル時ハ眼球ヲ摘出スルノ外術ナシ且ツ同時ニ腫瘍ヲモ切除スヘシ其法ハ彎刃剪刀ヲ以テ行フヘキモノニシテ鈞狀鑷子ヲ以テ角膜ノ近傍ニ於テ眼球結膜ヲ撮起シ先ツ之レヲ鞏膜ヨリ切除シ徐ロニ剪刀ヲ挿入シテ圍繞ノ軟組織ヲ切離シ終ニ視神經ヲ切斷スルニテ

アリ眼球摘出後ハ消毒液(昇汞水石炭酸水)ヲ以テ眼窩ヲ洗滌シ石炭酸綿糸的或ハ

繃帶材料ヲ之ニ填充シ眼瞼ノ外皮ニ二一三ノ絳合ヲ加ヘテ一ハ填充物ヲ保定シ一ハ出血ヲ止ムルノ用ニ供ス但シ大血管ノ切斷ヲ要スル時ハ豫メ之レヲ結紮スヘシ二十四時間ヲ經バ繃帶ヲ除去シ其後ハ日々一―二回消毒藥ヲ以テ眼窩ヲ洗滌スヘク肉芽發生セハ相應ノ處分ヲ行フベク創口全ク癒ユル後ハ飼主ノ望ニ應シテ偽眼ヲ用ユルコトアリト雖モ犬猫ニアリテハ多ク之レヲ厭フテ自カラ其眼ヲ搔傷スルノ困難ニ會ス偽眼ニハ硬護膜製ノ者之レニ適スト雖モ使用ノ間屢々眼ヲ洗滌セサヲ得サルヲ以テ高價ノ馬ニアラサレハ之レヲ用ウルコトナシ

○斜視 Strabismus

斜視手術ヲ以テ之レヲ醫セントス如キハ家畜ニアリテ實際殆ントナシ

○眼球顫動 Nystagnus.

中毒腦症腦脊髓膜炎ノ場合ニ發ス原病ノ治療ヲ施スヘシ構成異常ニヨル先天的顫動ハ素ヨリ不治トス

第七分類

○眼調節異常 Accommodatioanormalis (獨)

○眼折光異常 Refraktionsnormalis des Auges (獨)

○亂視 Astigmatism (獨)

家畜ニアリテハ視力ニ精密ノ分別力ヲ要スルコトナク又一方ニハ眼鏡ヲ用井テ折光異常ヲ匡正スルカ如キハ家畜ニ於テ爲シ得可カラス

第八分類

○溷睛虫 Filaria pellicida.

手術ニヨリ寄生虫ヲ除去ス此手術ハ良効ヲ奏ス先ツ手術前患眼ニハ完全ナル麻醉ヲ要スルヲ以テ古加乙涅ノ局所麻醉ヲ施シ次ニ角膜ノ周邊ニ於テ白內障手術ノ如ク一刺ヲ行ヒ鑷子ヲ以テ寄生虫ヲ撮除スヘシ但シ角膜穿孔ノ際此虫往々房水ト共ニ射出スルコトアリ術後へ白內障手術ニ於ケルト同シク患畜ヲ暗廐ニ移シ數日間飲食攝生ニ注意ス

○淚蟲 Filaria lacrymalis.

細檢シテ鑷子ヲ以テ之ヲ摘出除去ス

○囊虫 Cysticercus.

療法未タ詳ナラス其前房ニ存スル者ハ溷睛虫ニ於ケルカ如ク同法ヲ以テ寄生虫ヲ驅除スヘシ

補遺

○全角膜葡萄腫 Staphyloma Corneae totalis.

角膜ノ前面ニ突出セルモノハ切除シ腐蝕藥ヲ以テ其再生ヲ防止スヘシメルレル氏ノ實驗ニヨレハ膨出部ノ基根ニ結紮(腸線)ヲ加ヘ剪刀ヲ以テ切除セリ角膜ノ創傷炎症及潰瘍ヲ治療スルニ際シ豫メ注意ヲ加ヘ葡萄腫ノ發生ヲ防ク可シ

○局限角膜葡萄腫 *Staphyloma Cornuae parviale.*

前症ニ同シ

○前房蓄膿 *Hypopyon*

角膜穿刺術ヲ行ヒ或ハ角膜潰瘍ヲ切開シテ蓄膿ヲ排除ス術後越攝林點眼ヲ行フ

○漿液性虹彩炎 *Iritis Serosa*

○化膿性虹彩炎 *Iritis purpurativa S. parenchymatosa.*

虹彩炎ヲ見ヨ

○虹彩後癒着 *Synechia posterior.*

虹彩炎ノ結果トシ生ス散腫藥(亞篤羅必涅)ヲ點眼シテ癒着ヲ開離スヘシ新シキ者ハ癒ユルモ經久ノ者ハ縱令ヘ一タヒ開離スルモ再ヒ癒着ヲ來ス

(八〇六)硫酸亞篤羅必涅〇・〇二—〇・〇九 醃水一〇・〇 每三時—五時點眼

(八〇七)撒里矢爾酸越攝林〇・〇三 醃水一〇・〇 爲溶液前藥ト交互シテ三—五時毎ニ點眼ス

○虹彩前癒着 *Synechia anterior.*

前症ニ同シ

○虹彩環狀後癒着 *Synechia posterior. Circularis S. Totalis*

前症ニ同シ

○前房出血 *Hypaema]*

出血ノ量少ナキトキハ壓定縋帶ニ依テ吸收ヲ促セハ消失スト雖モ間斷ナク出血スルトキ或ハ多量ノ滲漏アルトキハ血液ト異物ハ同一ノ障害ヲナシ虹彩ノ病症ヲ誘起シ甚々悪キ轉歸ヲ取ル此場合ニ注意シテ穿孔術ヲ施シ滲漏血ヲ洩出セシム之ヲナスニハ一時ニ全量ヲ取ラハ眼中卒然空隙ヲ生スルヲ以テ再ヒ出血スルノ虞アリ故ニ可成除々ニ血液ヲ流出セシムルト同時ニ一指ヲ眼瞼上ニ置テ輕壓ヲ加ヘツ、全ク洩出シ終ラハ凡ソ十分間ハ強キ壓定縋帶ヲ施ス

○虹彩顫動 *Iridodonesis S. iritis tremulans*

或疾病ニヨリ水晶牀其位置ヲ變シ若ハ治療ノ爲メ之ヲ摘出シタル後虹彩ハ其支礎ヲ失フニヨリ眼筋ノ收縮ニヨリテ眼球ノ運動スル毎ニ虹彩ノ震動スル現象ヲ云フ

療法ナシ
○多腫症 *Polyponie*

○瞳孔偏位 *Corectopia*

腫孔ノ位置尋常ノ如クナラスシテ一方ニ偏位シタルモノナリ

○異色眼 *Heterophthalmus.*

虹彩ノ色澤兩眼ニ於テ異ナル者ニシテ先天性多シ療法ナシ

○虹彩断裂症 *Iridodialis*

療法ナシ

○秃睫 *Madarosis.*

○脂睫 *Seborrhoe*

◎麥粒腫 *Hordeolum.*

温湯穿刺シテ腫内容ヲ排除ス

○霰粒腫 *Chalazion.*

「メイボーム」腺排泄開液ノ滯溜シタル症ニシテ温湯穿刺

○「メイボーム」腺炎 *Meibonitis.*

初期ハ冷湯化膿ヲ發スレハ切開ス

○重睫 *Distichiasis.*

姑息療法トシテ重生毛ヲ除去シ根治的ニハ局所ノ皮膚ヲ切除シ縫合ヲ施ス

○倒睫 *Trichiasis.*

鏡子ヲ以テ倒生セル睫毛ヲ拔去スルヲ最モ簡便ノ法トス再生セハ再ヒ拔去ス根治法ハ毛根ヲ化膿セシメ再生ヲ防クニアリ之カ爲メニ毛根アル部分ニ糸線ヲ貫ク

○包瞼 *Blepharophimosis.*

眼瞼閉鎖症ヲ見ヨ

○兔眼 *Lagophthalmos*

○垂瞼 *Ptosis.*

先天性或ハ眼球筋肉麻痺眼瞼病變ニヨル者ハ原因療法ヲ施ス皮膚ヲ卵圓形ニ切除シ皮膚及筋肉ヲ縫合スヘシ

○第十類 耳病

○外聽道炎 *Otitis externa*

○外聽道表層炎 *Otitis externa superficialis*

○外聽道深層炎

profunda

急性炎ニアリテハ頻々聽道ヲ洗滌シ收斂藥ヲ用フレハ癒ユ柔軟ナル海綿ノ小片ヲ棒ニ結着シ微溫湯或ハ鉛糖水ニ浸シテ聽道内ニ入レ徐カニ棒ヲ廻轉シテ分泌物ヲ拭除シ後鉛糖ヲ注入ス但シ藥液ハ海綿ヲ以テ盡ク拭去ル可シ爛斑ニハ二%ノ硝酸銀水ヲ塗布シ激痛アレハ微溫菲沃斯油ヲ滴下ス或ハ鉛糖水ニ阿片丁幾ヲ伍用ス毎日一回此療法反復シ分泌全ク止ム迄連續スヘシ慢性外聽道表層炎ニアリテハ始メ微溫石鹼水ニ浸シタル綿ヲ以テ聽道ヲ清拭シ次キニ藥液ヲ以テ之ヲ濕シ或ハ散末ヲ以テ之ヲ埋ム藥液ハ丹寧酸撒里矢爾酸酒精溶液(五%)ヲ用フ散藥ハ次硝酸蒼鉛一分澱粉十分ノ混合劑或ハ粉末硼酸「レゾルシン」沃度仿謨又ハ澱粉二十分酸化亞鉛十分丹寧五分撒里矢爾酸一分ノ合劑ヲ用フ藥液ハ拭去リテ耳内ニ滯溜セサル様注意シ散藥ハ耳内ニ填充シ紙線(ヨヨリ)ヲ以テ深奥ニ入ラシムノカハ撒里矢爾酸十分華攝林百分ニ安息香丁幾二十滴ヲ加ヘタル軟膏ヲ應用セリ藥用後ハ耳門ヲ閉塞シ綿帶ニテ耳ヲ頭ニ縛着シ置クヘシ肉芽發生セハ尖刃科刀ニテ剔除スヘシ慢性外聽道深層炎ニアリテハ日々洗滌シ消毒腐蝕藥等ヲ用フ然レモ治療困難ナルモノ多シ(内耳炎ハ家畜ニ稀ニシテ且ツ生時診斷困難ニシテ臨床上嗜味小ナシ)

處方
 (八〇八)安息香酸一、○酒精一〇〇、〇一日數回耳内注入

(八〇九)丹寧酸撒里矢爾酸各五、○酒精一〇〇、○爲溶液右ニ同シ
 (八一〇)硝酸銀五、○酒精二五〇、○爲溶液一日一回耳内注入

○耳癭 Olfistel (獨)

癭管ハ其底迄切開シテ齒囊腫ヲ除去シ其囊壁ハ腐蝕藥格魯兒亞鉛格羅謨酸(一一〇)ニテ腐蝕ス四一六週ニシテ癒ユ

處方

- (八一) 格魯兒亞鉛四、○餾水五〇、○一日二回注入ス
- (八一) 硝酸銀八、○餾水一〇〇、○(黑色壞ニ入レ)前ニ同シ
- (八一) 昇汞五、○酒精五〇、○前ニ同シ
- (八一) 四) 結麗阿曹篤五、○酒精五〇、○前ニ同シ

○聾 Taubheit (獨)

療法ナシ

補遺

○耳漏 Otorrhoea

濃汁ヲ漏出シ聽道皮膚上ニハ肉芽發生シ時々顛顛骨疽ト併發ス又鼓膜ノ穿孔内耳炎ヲ見ル消毒收斂藥(藥液又ハ粉末)ヲ處シ肉芽ハ腐蝕ス其他外聽道炎ノ療法ニ從フ

處方

- (八一五) 單寧酸五、○酒精二五〇、○爲溶液犬ニ用フ
- (八一六) 苦麗阿林三、○酒精三〇〇、○爲溶液外用滴耳
- (八一七) 石炭酸三、○酒精三〇〇、○右同
- (八一八) 「ザロール」五、○酒精二〇〇、○右同(犬)
- (八一九) 硼酸二五、○苦麗阿林〇、五耳内吹入藥

○耳血腫 *Othaematoma*

小血腫ハ按嚮ニヨリ吸收ヲ催進ス耳ノ縱經ニ從ヒ血腫ヲ切開シ内容ヲ排除洗滌シテ創内ニ麻織子或ハ綿紗ヲ挿入シテ皮膚ノ癒着ヲ防ク可シ然ラサレハ皮膚ハ第一期癒合ヲナシ再ヒ其内ニ血液漿液或ハ膿汁ヲ貯溜シ再切開ヲ要スレハナリ創面ヲ清保スル爲メ沃度丁幾塗布或ハ沃度仿謨撒布シ耳ハ繃帶ニテ頭部ニ縛着シ置ク可シ

○耳出血 *Othaemorrhoea*

收斂乾燥藥ヲ撒布シ(粘礬末擲皮末各二五、○)麻織子栓子ヲ施ス其他一般止血法ノ原則ニ據ル

○耳内肉腫 *Othypersarcoma*

「テルモコテール」「ガルパノコテール」ヲ用ヒテ破壊ス或ハ腐蝕藥(格羅謨酸、格魯

兒亞鉛等)ヲ注入ス耳門ニ近キ者ハ結紮ヲ行フ其他腫瘍療法ノ通則ニ從ヒ處置ス

第十一類 皮膚病

第一分類 非寄生性皮膚病

○濕疹 *Eczema*

○單純濕疹 *Papulos-Vesiculäre Ekzema*. (獨)

○苔癬 *Schwind Flechten* (獨)

○暑疹(夏癬) *Hitznötchen*; *Sommerjüde* (獨)

○鞍癬 *Schalenöten*; *Sattelrüde* (獨)

馬匹ノ單純濕疹ハ多クハ良性ニシテ皮膚炎ノ各期ヲ經過スレハ自然ニ癒ユ禿部ニ毛ヲ生スルヲ以テ治療ヲ要セス若シ必要ト認レハ僱里設林豚脂又ハ綠石鹼ヲ塗布シ參兒酒精等分又ハ苦麗阿林一分酒精五——〇分若クハ「イヒチオール」ヲ施スヘシ犬ノ濕疹ノ療法ハ病ノ時期ト動物ノ性質ニヨリ差アルモ先ツ原因ヲ探リテ之ヲ除去シ癢痒ノ原因タル刺戟ヲ除去スレハ發疹自カラ癒ユ此事容易ナルカ如キモ獸畜ニマリテハ太々實行シ難シ犬ニ於テハ往々癢痒過劇ニシテ如何ナル手段ヲ施スモ搔癢ヲ防ク能ハサルコトアリ(一)輕症及初期 紅斑期小結節期及水疱期ニハ消炎劑及綫和包攝劑ヲ施ス如シ例之亞鉛華又ハ鉛糖ノ軟膏ノ如シ撒布劑例之亞鉛華五、

○澱粉二〇、〇又ハ次硝酸蒼鉛一分澱粉三分又ハ單寧一分撒里矢爾酸二分木炭末三分等ノ合劑ノ如シ頑固症ニハ白降汞軟膏(二二一〇)ヲ妙ナリトス但本劑ハ奇効アルモ之ヲ紙ムレハ中毒ノ虞アリ注意ヲ要ス〇(二二)劇症 劇症濕疹ニ於テハ先ツ刷毛ヲ以テ皮膚ノ濕潤面若クハ化膿面ヲ洗滌シ硝酸銀溶液六%ヲ塗布シ又ハ硝酸銀軟膏(一一一〇—一二〇)單寧軟膏(五三五〇)ヲ塗抹シ大ニ濕潤セル者ニハ沃度仿謨一分擲皮末十分若クハ苦麗阿林二十四分硼酸百分ノ合劑又ハ白降汞軟膏ヲ施スヘシ〇(三)慢性濕疹 參兒ヲ主藥トス參兒ハ單用シ或ハ之ニ酒精軟石礮ヲ加ヘテ擦劑トナス例之參兒酒精各二五、〇又ハ參兒一分軟石礮二分酒精三分ノ如シ其用法ハ先ツ毛ヲ剪去シ擦劑ヲ塗リ繃帶ヲ施シ以テ搔癢嘔嚙ヲ防クヘシ一回參兒ヲ塗レハ大約四五日間ハ放置シ尋テ痂皮ト共ニ之ヲ洗滌スヘシ或ハ參兒ノ代用ニ苦麗阿林ヲ供ス苦麗阿林軟石礮各一〇〇、〇酒精五〇、又ハ苦麗阿林一分酒精十乃至三十分若クハ苦麗阿林軟膏(一一一〇—一二〇)ノ如キ是ナリ(處方後出)

○慢性鱗屑濕疹 *Chronische squamöse Ekzem* (獨)

○糠粃疹 *Pityriasis*

○乾癬 *Psoriasis*

馬匹ノ慢性鱗屑濕疹 ハ皮膚ノ拭淨ニ注意シ軟石礮又ハ偏里設林ヲ以テ痂皮鱗片ヲ軟化セシメ參兒「クレオリン」ノ軟膏若クハ擦劑又ハ撒里矢爾酸酒精溶液(十

%ヲ施ス但參兒及「クレオリン」ハ慢性炎ヲシテ急性ニ轉セシメ以テ癒合ヲ促ス「クリサロビン」軟膏亦全樣ノ効アリ

犬ノ鱗屑濕疹 ニハ參兒又ハ苦麗阿林ト酒精林(二二一〇—二二〇)偏里設林(水等分)若クハ軟石礮ヲ施ス但軟石礮ハ不純物ヲ含ミ大ニ皮膚ヲ刺戟スルヲ以テ注意ヲ要ス又「クリサロビン」一乃至五分巴拉賓軟膏二十分「オキシナフタリン」軟膏(一一一〇)又ハ「イヒチオール」ヲ單用ス病犬ハ減食シ便秘アレハ灌腸シ緩下劑(蓖麻子油)ヲ投シ頑症ニハ法列兒水五—十滴ヲ數週間連用シ或ハ沃度加里ノ内服ヲ試ム(處方後出)

○疥癬樣濕疹 *Chronische grindartige Ekzem*. (獨)

○蠶癬 *Mihnengrind*. (獨)

○尾癬 *Schweifgrind*. (獨)

○縛癬 *Plica S. trica polonica*.

○鼠毛癬 *Fattenschweif* (獨)

馬ニ發ス其療法皮膚濕潤面ノ乾燥清潔ヲ旨トスヘシ此目的ヲ達スル爲先ツ紛錯ノ毛ハ其根ヨリ剪去シ參兒若クハ苦麗阿林ノ擦劑ヲ塗布シ或ハ收乾燥ノ撒布劑ヲ施ス例之沃度仿謨擲皮末若クハ單寧撒里矢爾酸木炭末等ノ如シ硝酸銀ノ溶液(六

- (八五〇) 水參兒五、〇豚脂五〇、〇爲軟膏塗用(右全)
- (八五一) 木參兒五、〇阿列布油二〇、〇爲擦劑(右全)
- (八五二) 沃度五、〇佩里設林一〇、〇爲溶液用フ(右全)
- (八五三) 硝酸銀三、〇餾水五〇、〇爲溶液用フ(右全)
- (八五四) 苦麗阿林綠石鹼各一〇〇、〇酒精五〇、〇爲軟膏(犬鱗屑濕疹)
- (八五五) 「ベタナフトール」一〇〇、〇酒精一〇〇、〇爲溶液(右全)
- (八五六) 沃度仿謨二五、〇丹寧四〇、〇撒布劑
- (八五七) 丹寧酸五、〇佩里設林五〇、〇爲溶液塗布(右全)
- 頑固慢性症ノ處方
- (八五八) 法列兒水三〇、〇馬三一〇—八〇滴犬五一〇滴ヲ毎日二三回宛與フ
- (八五九) 黑硫化安質母尼二五〇、〇茴香末一〇〇、〇毎日二三匙宛食餌ニ混シテ與フ(牛)
- (八六〇) 沃度加里〇、一二—〇、二〇以上ノ十四包ヲ作り毎日一包宛水ニ溶解シテ與フ(犬)
- (八六一) 亞鉛華軟膏四〇、〇毎日三四回痂皮ヲ洗除シタル後ニ塗布ス
- (八六二) 軟石鹼五〇、〇苦麗阿曹篤三、五右全
- (八六三) 硫酸銅五、〇餾水一〇〇、〇爲溶液右全
- (八六四) 酸化亞鉛二五、〇華攝林一〇〇、〇撒里矢爾酸二、〇右全

- (八六五) ナフタリン一〇、〇丹寧酸四〇、〇爲撒布劑
- (八六六) ナフタリン二、〇硼酸二〇、一四〇、〇右全
- (八六七) 亞砒酸二、〇—五、〇甘草末三〇、〇蜀葵末及水適量丸劑十個トナシ朝夕一丸宛與フ(馬)
- (八六八) 沃度加里五、〇ト包ヲ調ヘ毎日一包宛水ニ混與ス(馬)
- (八六九) 熔製硝酸銀六、〇餾水一〇〇、〇爲溶液屢々患部洗滌及塗布
- (八七〇) 丹寧酸九、〇巴拉賓軟膏五〇、〇濕潤濕疹ニ用フ
- (八七一) 苦麗阿林二—四、〇硼酸一〇〇、〇撒布劑トナス
- (八七二) 硝酸銀二、〇巴拉賓軟膏三〇〇餾水滴量爲軟膏犬ニ用フ
- (八七三) 硼酸二五、〇明礬燐皮未各五〇、〇爲撒布劑

○水疵 *Mauke* (獨)

○紅斑疵 *Dermatitis erythematosa.*

紅斑疵ハ皮膚乳嚙疥ノ充血ニ過キス特ニ治療ヲ要セス休憩ヲ命スレハ自然ニ治癒ス若シ治ヲ施サントセハ冷湯ニテ足ル

○濕疹疵 *Dermatitis eczematosa*

病馬ニ休養ヲ命ス運動ハ輝裂及贅生ノ原因トナル微溫湯石鹼ヲ以テ皮膚ヲ洗滌消毒シ昇汞水石炭酸水或ハ苦麗阿林水ヲ皮膚面ニ注キテ消毒シ乾布ヲ以テ充分ニ乾

拭シ沃度仿謨丹寧(一三三)ヲ撒布シ或ハ赤降汞軟膏(一三五刺納林)ヲ綿ニ攤布シ
 創面ニ貼布シ繃帶ヲ纏フ繃帶ハ滲出液ノ浸出スル迄ハ改裝テ要セス如此治療スレ
 ハ大抵八日間ニシテ癒ユ腫裂ヲ發スレハ軟膏塗布ニテ休憩ヲ命スレハ癒スルヲ易
 シ若シ創面ニ贅生肉芽ヲ發スレハ初メ明礬丹寧ノ如キ收斂乾燥末ヲ撒布シ効ナケ
 レハ硫酸銅、熔製硝酸銀ニテ腐蝕ス又無機酸類ヲ用ヘテ贅生物ヲ腐蝕スルヲアリ
 此際深蝕シテ腱鞘ヲ傷ケザル様注意スヘシ大贅生ハ刀ヲ以テ切除スヘシ術前二十
 四時間消毒液ニ浸シタル繃帶ヲ纏ヒ置キ或ハ苦麗阿林脚沿ヲナシ充分術部ヲ消毒
 シテ後馬ヲ縛倒シ古加乙涅ヲ患部ノ皮下ニ注入シ局所脱覺ヲ持チテ後病的贅生物
 ナク切若クハ刀斷シ壓迫繃帶ヲ用井テ止血ス安靜ナル動物ハ起立ノ儘ニテ施術ス
 ルヲ得術後可成乾燥シタル所ニ起臥セシメ八乃至十四日ニシテ癒ユ近時フレイナ
 ー氏ハ頑固ノ水疔ニ於テ麗苦阿林脚沿必苦林酸五%ノ水溶液及「タン」ノ「フォルム」
 撒布一〇%硫酸沃度丁幾格魯兒亞鉛八%溶液及格羅謨酸一〇%ノ水溶液塗布等ノ
 諸法ヲ數月間比較シ格羅謨酸水溶液ノ効驗廻ニ他藥ニ勝レルヲ見タリト又沃度澱
 粉(沃度一分澱粉四十分或ハ沃度丁幾十二分澱粉三十分)及必苦林酸(一〇—一五
 %)ハ濕潤甚タシキ者ニ卓効アリ患部ハ施藥後繃帶ヲ纏フ靜養ヲ命ス創面乾燥ス
 レハ硼酸軟膏赤降軟膏ヲ塗布ス
 (豫防法)濕氣寒冷ノ繫部ニ及ホス感作ヲ防キ繫部ヲ清潔ニシ蹄形異常ヲ矯ム
 處方

- (八七四)沃度仿謨一〇、〇丹寧酸三〇、〇爲撒布劑
- (八七五)レゾルシン五、〇偏里設林五〇、〇爲塗布劑
- (八七六)沃度丁幾六〇、〇偏里設林五〇、〇爲塗擦劑
- (八七七)硼酸三〇、〇樹皮末六〇、〇木炭末四〇、〇爲撒布劑
- (八七八)明礬末五〇、〇「ナ」タリン「煤烟各三〇、〇爲撒布劑
- (八七九)苦麗阿曹篤一〇、〇酒精六〇、〇爲溶液塗布
- (八八〇)格魯兒亞鉛一、〇餾水一〇〇、〇爲溶液外用

其他濕疹ノ處方ヲ見E

○壞疽疵 *Dermatitis gangrenosa.*

(豫防法)冬期殊ニ融雪ノ候ニハ勞動後脚ヲ洗滌シ全ク乾燥セシメ廐房内ニハ乾燥
 セル鋸粉藁等ヲ敷キ勞役ノ前ニハ油或ハ脂肪ヲ繫凹ニ塗布シ以テ泥汚水ノ
 皮膚面ヲ浸スヲ防キ脚ニ創傷アレハ縱令ヘ微小ナリト雖モ能ク洗滌シ參兒
 或ハ苦麗阿林ヲ塗有シ置クヘシ如此クスルト本病ヲ未發ニ豫防シ既ニ本病
 ニ罹リ皮膚ノ一部壞死セハ敗液ヲ除キ日中ハ昇汞苦麗阿林若クハ石炭酸ノ
 脚浴ヲ行ヒ夜中ハ一〇%格魯兒亞鉛若クハ樟腦泥劑ヲ以テ濕シタル繃帶ヲ
 患部ニ纏ヒ一—五%ノ「ピオクタン」液ニ浸シタル綿ヲ繃帶ニテ縛ス可
 シ皮膚ノ壞疽部ハ缺切若クハ剝離シ肉芽贅生スレハ腐蝕藥及壓迫繃帶ヲ用
 井テ肉芽ハ萎縮セシメ皮膚ノ壞疽片深奥ニ殘留シ慢性化膿炎ヲ發シ爲ニ蹄

球ニ瘻管口ヲ開クコトアレハ昇汞水ノ脚浴ヲ行ヒピラット氏液若クハ強昇汞液ヲ瘻管ニ注入シ若シ出來得可クハ瘻管ヲ切開スヘシ

○疣疵

Dermatitic chronica verrucosa.

患部限局シテ小ナレハ烙鐵ヲ施ス即白熾熱鐵ヲ以テ燒烙シ消毒液ニ浸シタル繃帶ヲ行フ患部廣大ナレハ格魯兒石灰、苦麗阿林若クハ昇汞水ノ脚浴ヲ施シ五%ノ苦麗阿林液一%ノ格魯兒亞鉛苦麗曹篤一分酒精六分等ノ液ニ浸シタル繃帶ヲ纏フ又硫酸酒精(一一一〇一一〇)ヲ塗布シ且全液ニ浸シタル繃帶ヲ施スハ有効ナリ疣ノ大ナル者ハ缺切シ去リ繃帶ハ毎日改裝シ且之ヲ緊縛シ患部ヲ壓迫スヘシ壓迫ハ贅生ヲ防ケ病的產物ヲ吸收セシムルノ効アリ軟膏ハ用ルテ避ケ唯表面乾燥スルノ後ニ到リテ赤降汞軟膏(巴拉賓或ハ刺納林)ヲ用フ可シストラウベ氏ノ療法ハ樟腦ヲ依的兒ニ溶解シ之ヲ三倍ノ華搦林ニ混シ表皮ニ塗擦シ石炭酸綿ヲ以テ包ミフラン子ルヲ纏ヒ以テ蒸發ヲ防キ初メハ繃帶ヲ改裝スルコト毎日一回後ニハ二日若クハ三日毎ニ一回トス内服ニ砒石ヲ試用ス凡テノ療法ハ患部全ク乾燥シテ些ノ分泌ヲ見サル迄持續スヘシ

○擊輝

Schruinden Maouke (獨)

擊輝トハ繫凹皮膚濕疹ノ經過中ニ發スル皮膚ノ皸裂ヲ謂フ或ハ過劇ノ運動器械的暴力理化學的刺擊ニヨリ卒然繫凹皮膚ニ皸裂ヲ發スルコトアリ輕症ノ者ハ緩和軟

搦林糊酸軟膏等ヲ塗布シ繃帶ヲ施セハ癒ユ其他凡テ濕疹疵ノ療法ヲ用フ處方ハ濕疹及濕疹疵ノ條下ヲ見ヨ

○膝輝

Psoriasis Carpi.

○飛輝

Psoriasis tarsi.

繫輝ニ全シ

○蕁麻疹

Urticaria

概テ治療ヲ要セス單ニ減食ス獸牀ヲ被包スレハ足ル稍ヤ重キ全身症アレハ緩下劑(中性鹽)若クハ下劑(吐酒石蘆薈甘汞)ヲ處ス可シ豕ノ本病モ亦良性ニシテ定型性經過ヲ取ルヲ以テ攝養ノ外醫療ヲ要セスト雖モ重症ニハ石鹼水ヲ灌腸シ甘汞一乃至四五ヲ投スヘシハウブネル氏ハ硝石五、〇芒硝五〇、〇ヲ蜂蜜ニ混シ舐劑トナシテ與フ皮膚ノ炎腫ニハ瀕リニ冷水ヲ灌クヘシ

○天疱瘡(大水疱瘡)

Penphigus (Dermatitis bullosa)

皮膚發炎セル者ニハブロー氏液ノ冷褻法ヲ行フ水疱ハ切開シ内溶漿液ヲ排除シ洗淨後撒布劑ヲ施シ又痂皮ヲ生シタル者ニハ緩和軟膏ヲ塗布ス犬ニハ擲皮煎汁溫浴ヲ用フ又石炭酸苦麗阿林(一一五%)液洗滌ヲ行フ

○脫毛症

Alopecia ○症候性脫毛症 ○局所脫毛症

(八八一)樟腦一〇、〇蜀葵末一五、〇硫黃華四〇、〇石灰水五〇〇、〇洗滌用

小動物ニハ浴大動物ニ石鹼或ハ滴汁ニテ皮膚ヲ洗滌シ刺戟藥酒精石鹼精樟腦油稀釋莨菪丁幾(丁幾一分酒精又ハ豚脂五分)ヲ塗擦ス局所脫毛症ニハ白露拔爾撒謨(一分酒精十分)苦麗阿林(一分酒精十一二十分)「イヒチオール」(一分酒精十分)沃度丁幾酒精等分ヲ數日間塗布スヘシ
處方

- (八八二)石鹼精一〇〇、〇一日一回患部塗布
- (八八三)莨菪丁幾二〇、〇酒精一〇〇、〇(右全)
- (八八四)「イヒンチオール」二〇、〇餾水一〇〇、〇酒精五〇、〇朝夕患部塗布
- (八八五)莨菪丁幾四、〇白露拔爾撒謨一〇、〇豚脂五〇、〇右全
- (八八六)牛脂六〇、〇蓖麻子油二五、〇丹寧酸二、〇毎日二三回塗布
- (八八七)沃度丁幾酒精各五〇、〇局所塗用
- (八八八)白露拔爾撒謨五、〇酒精五〇、〇犬猫ニ毎日二回塗布
- (八八九)石炭酸二、〇規那丁幾二五、〇佩里設林五〇、〇屢々洗滌用

○瘰癧及癰腫 *Aene et Furunculosis.*

膿瘍ヲ切開シ消毒ヲ施ス白露拔爾撒謨及苦麗阿林軟膏(一一一〇)ハ良効アリ切開後硝酸銀棒ヲ以テ瘍腔ヲ腐蝕スルヲ可トス頑症ニハ全患部ノ皮膚ヲ截去スヘシ豫防法トシ外來ノ刺戟ヲ避ケ鼻梁瘻ニ於テハ口籠ヲ全廢シ若クハ之ニ軟膠ヲ附シ以テ再發ヲ防ク可シ馬ノ瘰癧ハ病源ヲ除去スレハ自然ニ治スルコトアリ

○血肝症 *Haematidrosis.*

貴種馬ノ皮膚小出血ハ殆ント治療ヲ要セス冷水ヲ以テ洗滌スレハ足ル全身素質ニハ麥角流動蘇合膏越幾斯單寧鉛糖ノ如キ止血藥ヲ内服セシム

○象皮病 *Elephantiasis*

硬化皸裂皮膚ヲ乾燥シ皮膚滲出液ノ吸收ヲ催ス爲メ發汗劑ノ内服例之加密爾列花亞爾尼加接骨木花浸ノ内服鹽酸必魯加兒必涅ノ皮下注射皮膚ヲ擦擦シ體ヲ温包シ局所ノ按據ヲ行ヒ後樟腦精石鹼精安母尼亞水或ハ的列並底油ヲ塗布シ濕布ヲ以テ之ヲ被ヒ「フラネール」繃帶又ハ壓迫繃帶ヲ施ス又時々温脚浴或ハ石鹼脚浴ヲ試ム可シ硬化及結節ハ腐蝕若クハ切除スヘシ
處方

- (八九〇)法列兒水一五〇、〇食鹽五〇、〇水二〇〇、〇毎日一食匙宛(馬)
- (八九一)沃度加里一〇、〇重碳酸加俚謨二五、〇飲水ニ混シ二回分服(牛馬)
- (八九二)鹽酸必魯加兒必涅〇、一水一〇、〇牛馬ニ皮下注入
- (八九三)蘆薈越幾斯一〇、〇大黃五〇、〇食鹽一二五、〇蜀葵末水適量丸劑六個トナシ毎日二丸宛與フ(馬)
- (八九四)硼酸三〇、〇丹寧四〇、〇木炭末四〇、〇混和粉末トナシ濕潤部ニ撒布
- (八九五)苦麗阿林一、〇硼酸五〇、〇撒布劑トス
- (八九六)リコホシユム酸化亞鉛各三〇、〇撒布用

- (八九七)木參兒綠石鹼各五〇、〇酒精二五、〇擦劑トナス
- (八九八)沃度加里一〇、〇沃度二、〇樟腦五、〇豚脂五〇、〇硬化部ニ塗布ス
- (八九九)粗製明礬五〇、〇「ナフタリン」煤烟各三〇、〇撒布用
- (九〇〇)酸化亞鉛三、〇澱粉三〇、〇撒布劑
- (九〇一)丹寧酸二〇、〇沃度仿謨一〇、〇撒布劑
- (九〇二)「クレオリン」加里石鹼各五〇、〇酒精各五—二五、〇爲擦劑一日數回用フ
- (九〇三)苛性加里液五〇、〇腐蝕藥トシ一日一回用フ
- (九〇四)木參兒五〇、〇偲里設林二五〇、〇家禽ノ患部ニ外用ス

第二分類 植物寄生性皮膚病

〇秀性匍行疹 *Herpes tonsurans.*

- (豫防法)患畜ノ隔離厩舎ノ清潔消毒藥ノ燒却等ヲナシ馬匹手入具及看護者ヲ別
- (療法)先ツ軟石鹼ト微温湯ニテ痲皮鱗屑ヲ洗去シ日々數回患部ニ苦麗林軟膏硫黃軟膏撒里矢爾酸酒精溶液(一一一〇)又ハ沃度丁幾(酒精等分若クハ一二五)ヲ施スヘシ石炭酸結麗阿曹篤「ナフトール」參兒等軟膏皆効アリ灰白水銀軟膏白降汞又ハ赤降汞軟膏亦佳ナリ但シ牛ハ中毒ノ虞アルヲ以テ之ヲ忌ム
- (九〇五)赤降汞軟膏七五、〇塗布用(馬)

處方

- (九〇六)苦麗阿林一〇、〇巴拉賓軟膏一〇〇、〇塗布用(牛)
- (九〇七)撒里矢爾酸七、五酒精一五〇、〇塗布用(犬)
- (九〇八)苦麗阿曹篤五、〇木參兒軟石鹼各一〇〇、〇爲軟膏塗布用(牛)
- (九〇九)木參兒八、〇的列並底油四、〇甘汞四、〇豚脂二二、五塗擦用
- (九一〇)偲里設林二〇、〇昇汞〇、〇五塗布用
- (九一一)依的兒二〇、〇酒精一〇、〇「チモール」二〇、〇前藥ト交互ニ用フ
- (九一二)石灰水八、〇石油三二、〇塗布用

〇白癬 *Trichomys.*

- (豫防法)患畜ノ隔離厩舎ノ洗淨消毒木器ハ熱湯汁ニテ洗淨、厩壁ニハ石炭酸(一〇%)水ノ灌注藥燒却ヲ行フ
- (療法)概ネ匍行疹ニ全シ痲皮ヲ軟化セシムル爲メ油類、脂肪偲里設林華攝林等ヲ用ヘ苦麗阿林昇汞石炭酸等ノ消毒藥ヲ伍用ス

處方

- (九一三)白降汞五、〇華攝林三〇、〇—四〇、〇塗擦用
- (九一四)赤降汞五、〇豚脂四〇、〇塗擦用
- (九一五)石炭酸二、〇軟石鹼二〇—四〇、〇塗布用
- (九一六)硫酸銅三、〇餾水一〇〇、〇塗布用
- (九一七)熔製硝酸銀二、一、四、〇巴拉賓軟膏四〇、〇右全

- (九一八) 亞鉛華軟膏六〇、〇 苦麗阿林六、〇 右全
- (九一九) 粗製焦木醋五一〇、〇 餾水一〇〇、〇 與黑壤塗布用
- (九二〇) 結麗阿曹篤二、〇 酒精四〇、〇 塗布用
- (九二一) 石炭酸三、〇 綠石鹼六〇、〇 每日一回塗布

○傳染性膿疱皮炎(加奈太馬痘) *Dermatitis Contagio sapustulosa.*

(豫防法) 患馬ノ隔離鞍腹帶馬具輓具ノ消毒ヲ行フ又厩舎消毒ヲ施ス
 (療法) 輕症ハ休養ヲ命シ患部ノ摩擦刺戟ヲ避クレハ醫療ヲ要セスシテ治癒ス重症
 ニハ潰瘍ニ防腐藥ヲ施ス例之「クレオリン」(三%) 石炭酸昇汞(千倍) 硫酸銅
 皓礬水(一一%) ノ如シ大浮腫ニハ患部ノ刺戟ヲ避ケス濫リニ病馬ヲ使役
 シ潰瘍ノ防腐ヲ怠リ不潔ノ鍼ヲ以テ亂刺法ヲ施スモノ多シ須ラク清潔消毒
 チ主トシブロー氏液ノ冷罨法ヲ行ヒ緩下劑利尿藥ヲ内服セシム

處方

- (九二二) 醋酸鉛一五〇、〇 粗製明礬七五、〇 樟腦二〇、〇 混和爲散劑一瓶ノ水ニ溶シテ外用
- (九二三) 硼酸樟腦各五、〇 巴拉賓軟膏五〇、〇 爲軟膏深潰瘍ニ用フ
- (九二四) 硫酸銅六、〇 餾水三〇〇、〇 爲溶液洗滌用

第三分類 動物寄生性皮膚病

- 疥癬 *Scabies.*
- ザルコプト疥癬 *Scabies. equi Scroptica.*
- プソロプト疥癬 *S. equi psoroptica S. Dermatocoptica*
- シンピラツト疥癬 *S. equi Symbiotica S. dermatophagica*

(豫防法) 病畜ヲ隔離シ疥癬痂皮ヲ滅却シ厩舎及厩舎具ハ熱油汁熱湯生石灰硫肝石炭酸水ヲ以テ消毒シ不用具ハ燒却シ毛布ハ乾燥シ馬具輓具ハ石鹼水ニテ洗滌シ石炭酸水ヲ撒注シ土床ハ新土ト交換シ蓆藁ハ燒棄シ患畜ハ健畜ト接觸ヲ禁ス

(療法) ノ順序ハ(一) 患部ノ毛ヲ剔去ス周圍ノ健部ニ掛ケテ剪毛スルヲ宜シトス
 (二) 痂皮ヲ洗滌ス即チ剪毛後軟石鹼或ハ石炭酸偏里設林ヲ塗布シ一時間ヲ經テ微溫湯又ハ炭酸加里液(〇五%) ヲ注キ刷毛ヲ以テ痂皮ヲ洗ヒ去リ能ク患部ヲ乾燥セシム夏日ハ日光ニ晒スヘシ然ルモ疥癬虫痂皮ヨリ匍脫スルカ故ニ藥効一層確實ナリ(三) 疥癬藥ヲ施ス之ヲ應用撰擇スルニハ次ノ

注意ヲ要ス(イ)患者ノ體質動物ノ種類等ニ注意シ衰弱動物ニハ治療ヲ省約シ種類ニ由リ藥物ノ撰用ヲ慎ム(ロ)確診病局ハ充分ニ治療シ其周圍及疑ハシキ部分ヲモ治療シ蔓延ヲ防ク可シ(ハ)藥物ハ一定時間ヲ經テ用フ一回ノ施藥ニテ疥癬虫殊ニ卵ヲ撲滅スルヲ難シ故ニ四五日間ヲ隔テ、數回反復スヘシ施藥ハ最モ綿密ニス可シ刷毛ヲ以テ丁寧ニ塗擦セサレハ深部ニ達セス但シ偏痺ノ如キ刺戟藥ハ塗擦ス可ラス(ニ)藥物ヲ撰フニハ殺虫力ノ確實ナル者中毒ノ虞ナキ者藥價廉ニシテ得易キ者、皮膚ヲ甚タシク刺戟セサルモノヲ撰用ス可シ

疥癬藥其種類多シ石臘油、的列並底油偏痺、結麗阿曹篤、(一分酒精十分水二十分或ハ一分薑薑油三十分)木參兒(殺虫力強クレハ中毒シ易ク且刺戟性强シ鬚尾疥癬ニ適ス參兒硫黃花各一分軟石鹼酒精各二十分合劑)煙草煎(一二二〇—二五)苦麗阿林(一〇%液)「グツール」(一一—二%溶液又ハ油劑其効ナルモ高價)硫肝一〇、〇炭酸加里二、〇脂肪三〇、〇(トラスボー軟膏)硫肝二五〇、〇水一拉篤(コテツクス氏法)硫黃華百分苛性加里八十分豚脂五百分合劑(コルメリツク氏軟膏)、砒石ハ屢々應用ス即チ亞砒酸一分明礬十分水百分(マシウ氏液劑)亞砒酸炭酸加里各一分水醋各百分(ヴァイボルク氏液劑)又石炭酸溶液、昇汞食鹽各一分水百分(毎日百瓦乃至千瓦宛塗布シ凡ソ一週間ニテ全身洗滌)灰白水銀軟膏(小部ニ用フ)其他蘇合香、百露拔爾撒謨臭性獸油亞爾加里劑等アリ例之加里滿汁綠石鹼炭酸加里炭酸曹篤等

ハ痂皮ヲ軟ケ藥液ヲ深部ニ達セシムル効アリ他ノ殺虫藥ト伍用スヘシ
牛馬ノ疥癬 石炭酸油偏痺里設林華攝林炭酸加里液等ニテ痂皮ヲ軟ラゲ微溫湯ニテ洗滌シ亞砒酸昇汞苦麗阿曹篤參兒苦麗阿林軟膏、灰白水銀軟膏等ヲ塗布ス牛ハ水銀劑ヲ禁忌トス馬ノ脚疥癬ニハ偏痺油苦麗阿林水或ハ「ナフトール」軟膏ヲ用フ
羊ノ疥癬 剪毛後痂皮ヲ軟ラケ(石炭酸油「クレオリン」軟膏ニテ)疥癬浴ヲ行フ
レナイ氏ニヨレハ二、五ノ苦麗阿林水浴(六、五拉篤ノ苦麗阿林ヲ二五〇拉篤ノ水ニ混シ百頭ノ羊ニ用フ)一浴三分時間一週間ヲ經テ第二回浴ヲ反復ス其他煙草葉煎汁ニ粗製石炭酸及剝答亞斯ヲ加ヘタル者ノ浴ヲ用フ
犬ノ疥癬ニハ百露拔爾撒謨ヲ最良トス蘇合香ヲモ試用スヘシ其他苦麗阿林參兒石炭酸結麗阿曹篤等ヲ賞用ス處方

- (九二五)「ナフトール」一〇、〇巴拉賓軟膏一〇〇、〇馬ノ脚疥癬ニ用フ
- (九二六)木參兒黃硫華各二八〇、〇綠石鹼酒精各五六〇、〇刷毛ニテ塗布(牛馬)
- (九二七)苦麗阿林綠石鹼各一〇〇、〇酒精八〇〇、〇爲擦劑(馬)
- (九二八)苦麗阿曹篤二五〇、〇酒精二五〇、〇水五〇〇〇爲溶液用フ(牛)
- (九二九)烟葉草煎一〇〇、〇昇汞一、〇日々二回宛塗布
- (九三〇)結麗阿曹篤六、〇阿列布油六〇、〇右全
- (九三一)亞砒酸炭酸加里各一、〇常醋及水各一〇〇、〇右全
- (九三二)臭性獸油六〇、〇的列並底油六〇、〇毎日三回塗布

- (九六五) 剝答亞斯一、三吉瓦石灰二、五吉瓦格魯兒石灰一、一吉瓦鹿角油一、吉瓦參兒〇、七吉瓦硫黃末〇、五吉瓦糞水一〇〇拉篤水二〇〇拉篤右全
 - (九六六) 石炭酸酒精各二、五吉瓦炭酸那篤留謨三吉瓦煙草煎汁百拉篤(煙草葉一〇吉瓦)右全
 - (九六七) 粗製石炭酸一、五吉瓦苛性石灰一、吉瓦洗濯曹達三、吉瓦煙草葉煎五〇拉篤(五一一五、吉瓦)疥癬浴
 - (九六八) 砒石二、五吉瓦明礬二五、〇吉瓦水六〇〇拉篤三十分煮沸ス可シ
 - (九六九) 烟草葉四、五吉瓦水二五〇拉篤半時間煮沸シ石炭酸一、〇吉瓦剝答亞斯一〇吉瓦ヲ加ヘ百頭ノ羊ノ疥癬浴
 - (九七〇) 煙草煎汁一〇〇拉篤(一〇吉瓦)石炭酸二、五吉瓦酒精二五吉瓦食鹽三吉瓦羊百頭ノ疥癬浴
 - (九七一) 砒石一、五吉瓦硫酸鐵一〇吉瓦水三五〇拉篤ヲ三分二容量迄煎シ詰メ之レニ的列並底油一吉瓦礫砂精〇、五吉瓦或ハ明礬六吉瓦ヲ加フ
 - (九七二) 苦麗阿林六、五拉篤水二五〇拉篤浴後三分間刷毛ヲ以テ擦入シ再ヒ浴セシム
- 家禽ノ疥癬藥處方
- (九七三) 結晶石炭酸二、〇華攝林二〇、〇每日二三回塗布
 - (九七四) 苦麗阿曹篤一、〇「フルメント」酒三〇、〇塗布用

- 九七五) 百露拔爾撒謨二〇、〇塗布用
 - (九七六) 過泥子油一、〇阿列布油二〇、一五〇、〇塗布用
 - (九七七) 結麗阿曹篤一、〇豚脂二〇、〇塗布用
 - (九七八) 偏陣二、〇薑薑油二〇、〇塗布用
 - (九七九) 蘇合香一〇、〇酒精三〇、〇羽毛ノ間ニ塗布ス
 - (九八〇) 百露拔爾撒謨一〇、〇酒精三〇—四〇、〇(右全)
- 羊ノ疥癬浴補遺
- (九八一) 土產烟草煎七五〇〇(五〇〇、〇)石炭酸一〇〇〇、〇粗製苛性石灰一〇〇〇、〇混和シ水ヲ加ヘ溶液二五〇拉篤トナス
- 〇顆粒性皮炎(火蟲) *Dematitispurpuriginosa* S. green Iosca.
- 吉來應用セル法ハ緩和藥灌水偏里設林水銀軟膏點狀烙鐵過格魯兒鐵液ノ塗布石炭酸水洗滌杜松子油百露拔爾撒謨強發泡膏硫酸銅昇汞砒石等ナレモ奏効確實ナラス或ハ創面ヲ截除シ烙鐵ヲ以テ劇シク燒烙シタル等種々アリ就中冷水ノ連續灌漑ハ効アルカ如シ又某氏砒石ヲ實用シ粉末トシテ創面ニ撒布シテ繃帶ヲ施スルハ痒覺次第ニ消散シテ創面モ乾燥シテ癒ユブレース氏ハ依的兒嚙嚙仿謨及沃度仿謨ヲ施用シテ良好効ヲ認メタリト云フ即廿四時間乃至四十八時間ニ每二分間ニ施藥シ一兩日ノ後古魯胃謨ヲ創面ニ施シ繃帶スルルハ大凡十五日ニシテ治ス伊人バルヘロー氏ハ