

丹溪活套云凡腹痛多是血脈凝澁不行必用酒炒
白芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃柏如腹
痛欲以物柱按者屬虛用人參白朮乾姜官桂之
類如腹痛手不可按者屬實宜用建中湯加大
黃或調胃承氣湯桂枝加之而愈如因飲食過
傷而作痛者必問因傷何物如傷生冷硬物而作
痛者東垣木香見睪丸三稜消積丸之類如傷熱
物而作痛者枳實道滯丸三黃枳朮丸之類看強
弱緩急用而下之如氣虛之人因飲食過傷而

作痛者宜補瀉兼施用二陳湯加川芎白朮神麴
麥芽人參蒼朮之類或送下前推積等丸子以下
之 如腹中常覺有熱而暴痛暴止者此爲積熱
宜調胃承氣湯之類下之 如因跌撲損傷而作
痛者此瘀血証宜桃仁承氣湯抵當湯之類逐去
其血卽愈 如因事損傷或酒後涉水血凝腹痛
者大承氣湯加桂

腰痛

內經曰足大陽脉令人腰痛引項脊尻背如重狀少

陽腰痛如以針刺其皮中循循然不可以俛仰不可
以顧陽明腰痛不可以顧顧如有見者善悲足少陰
腰痛引脊內廉厥陰腰痛腰中如張弓弩弦大陰
腰痛熱甚生煩腰下如有橫木居其中甚則遺洩又
曰大陽所至爲腰痛巨陽虛則腰背頸項痛是動則
病項如拔俠脊痛腰似折髀不可以曲又曰腰者腎
之腑轉搖不能腎將憊矣脉經曰凡有所用力舉重
若入房過度汗出如浴水則傷腎腎脹者腹滿引背
央央然腰脾痛又有腎着之病從腰以下冷腰重如

帶五千錢若夫腰痛之証雖有六經見候之不同控
閃腎着之或異或瘀血或風寒或濕痰流注種種不
一原其所由未必不因房室過度負重勞傷之所致
也經曰邪之所湊其氣必虛是也治法虛者補之杜
仲黃栢肉桂當歸五味兔絲子天門冬熟地黄之類
風者散之麻黃防風羌活獨活之類寒者溫之肉桂
乾姜附子之類控閃者行之當歸蘇木乳香沒藥桃
仁紅花之類瘀血者逐之大黃牽牛桃仁水蛭虻虫
之類濕痰流注者消道之蒼朮撫芎香附白芷枳實
橘紅半夏茯苓之類宜各推類而治之不可執一而
論也

脉法

脉經曰尺脉沉腰背痛凡腰痛時時失精飲食減少
其脉沉滑而遲此爲可治

腰痛之脉皆沉弦而急者爲寒沉弦而浮者爲風
沉弦而濡細者爲濕沉弦而實者爲挫閃

丹溪曰脉必沉而弦沉爲滯弦爲虛濇者是瘀血緩
者是濕滑者伏者是痰大者是腎虛也

方法

丹溪曰有腎虛有瘀血有濕熱有挫閃有痰諸腰痛不可用補氣藥亦不宜峻用寒涼藥

腎虛腰痛用杜仲黃柏龜板知母枸杞子五味子猪脊骨髓丸服

瘀血宜行血順氣用補陰丸胡桃仁紅花外用三稜針于委中穴出血以其血滯于下也

濕宜燥濕行氣用黃柏杜仲蒼朮木川芎之類

戴氏曰痰之不已為腎虛也日輕夜重者是痰

血也遇天陰及久坐而發者是濕也

痰宜南星半夏加快氣藥佐之使痰隨氣運

腰曲不能伸者針人中立愈

腎着為病其體重腰冷如水飲食如故小便自利腰以下冷痛而重治宜流濕兼用溫藥

腎着湯 治腎着腰痛

乾姜 泡

茯苓

各一錢五分

甘草

炙五分

白朮

二錢五分

右水煎服

三因青娥丸 治腎虛腰痛常服壯筋補虛

杜仲一斤 炒 生姜十兩 炒 破故紙一斤 炒

右為細末用胡桃肉一百二十箇湯浸去皮膜
研為膏煉蜜些少丸如梧桐子大每服五十九
鹽湯下

三因立安丸 治五種腰痛常服溫補腎元壯健腰

脚立效

破故紙炒 乾木瓜各一兩 五錢 牛膝酒洗 一兩

草薺二兩 杜仲姜汁炒 絲斷 續斷各一兩

石為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九溫

酒下

補骨脂丸 治腎虛及寒濕一切腰痛

草薺四兩 一兩用童便浸 一兩用米泔浸 一兩用鹽湯浸 一兩用酒浸 各浸一日夜

杜仲四兩 炒絲斷 補骨脂三兩 炒香

胡桃肉八兩 浸去油 膩另研如泥

右以前三味共為細末不犯鐵器入胡桃肉用
木杵搗千餘下以糯米糊為丸秋冬煉蜜為丸
如梧桐子大每服五十九空心用溫酒下乾物

壓之

獨活湯 治勞役腰痛如折

羌活 去蘆

防風 去蘆

獨活 去蘆

澤瀉 去毛

肉桂 各三錢 去粗皮

大黃 酒浸煨 熟

甘草 各二錢

川歸 五錢

連翹 五錢

枳實 酒炒

黃柏 酒炒各二錢

桃仁 三十個 研

每服一兩酒水煎

摩腰丹 治寒熱腰痛

附子尖

烏頭尖

天南星 各二錢 五分

硃砂

乾姜 各一錢

雄黃

樟腦

丁香 各一錢 五分

射香 當門子 五粒

右為末蜜丸如龍眼大每服一丸生姜汁化開

如厚粥樣烘熱置掌中摩腰上令書粘着肉烘

綿衣縛定腰熱如火間三日用一丸妙或加吳

茱萸桂枝

煨腎丸 治腎虛腰痛

杜仲 三錢炒 絲斷

右為細末以猪腰子一雙薄切作五七塊用椒

鹽醃去腥水摻藥末在內以荷葉包裹更加濕
紙二三重外包慢火煨熟食之無灰酒送下

膏丸 治腎虛腰痛 方見虛損門

蒼朮湯 治濕熱腰腿疼痛

防風 黃柏 各一錢 柴胡 二錢

蒼朮 三錢

每服水一盞半煎去粗溫服

川芎肉桂湯 治瘀血在足大陽足少陰足少陽三
經腰痛

漢防已 防風 各一錢 神麩 炒

獨活 各四分 川芎 柴胡

肉桂 當歸稍 甘草 炙

蒼朮 各一錢 羌活 一錢 菝仁 五個去皮
尖另研

每服好酒三鍾煎去粗稍熱食遠服

地龍散 治腰脊痛或打撲損傷或從高墜下惡血
在大陽經令人腰脊痛或髀股脛膈中痛不可忍

當歸稍 二分 中桂 地龍 各四分 鹽
水拌炒

麻黃 五分 蘇木 六分 獨活

黃栢鹽酒炒

甘草各八分

羌活一錢二分

桃仁六個去皮尖研細

每一服水二盞煎去粗溫服

拈痛湯 治濕熱為病肩背沉重肢節腰脇疼痛胸

膈不利

白朮四分

人參去蘆

升麻

苦參酒炒

葛根

蒼朮各五分

防風去蘆

知母去毛酒洗

澤瀉

黃芩

猪苓去皮

當歸各六分

甘草炙

生黃芩酒洗

茵陳酒炒

羌活各六分

每服水二盞煎去粗溫服

蒼朮復煎散 治寒濕相合腦後痛惡寒項筋脊骨

強肩背膝眼膝臏腰痛無力行步沉重

紅花一分

黃栢一分

柴胡去蘆

藁本

澤瀉

白朮

升麻各五分

羌活一錢

蒼朮四兩

右細切先以蒼朮一味用水三大盞煎去粗入

前藥復煎去粗空心稍熱服取微汗為效忌酒及濕麵

一粒金丹 治腰膝走注疼痛如虎咬之狀不可忍者此効

草烏頭 泡製 五靈芝 各四兩 木鱉子 一兩去壳

白膠香 二兩 地龍 去泥淨一兩 京墨 二錢五分

乳香 二錢五分 當歸 五錢 沒藥 五錢

射香 二分五厘

為細末再研千餘下糯米糊丸如梧桐子大每

服一丸或二丸多至三丸温酒下服藥後微汗

為神効

元戎丸加味四物湯 治瘀血腰痛

本方加桃仁泥酒紅花二味煎服

二因安腎丸 治腎虛腰痛

破故紙 炒 胡蘆芭 炒 茴香 炒

川苦練 炒 續斷 炒各三兩 桃仁 炒

杏仁 炒 山藥 茯苓 各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九

鹽湯下

如神湯 治挫閃腰痛甚者不過三服平安

川歸

肉桂

玄胡索

各等分
杵碎炒

右為細末每服二錢熱酒調下或細切用酒煎

亦可

獨活寄生湯 治因腎虛坐臥冷濕當風所得

獨活 一錢

桑寄生

杜仲 炒

細辛

牛膝

秦艽

茯苓

白芍

桂心

川芎

防風

甘草 炙

人參

熟地黃

當歸 各五分

右細切作一服用水二盞煎至一盞去粗空心

溫服

五積散 治寒濕及清痰流注經絡腰膝背脇疼痛

白芷

川芎

桔梗

芍藥

陳皮

厚朴 姜製炒

茯苓 去皮

甘草

三才補腎丸 卷之四 腰痛 四

麻黃

乾姜泡

官桂

川歸

半夏

皮臍俱去
湯泡七次

蒼朮

米泔浸
五七日

枳壳

各五分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞
溫服

丹溪活套云凡因房勞辛苦而腰痛者四物湯加知

母黃栢五味子杜仲之類吞補腎丸或大補陰丸

因風寒濕流注經絡而作痛者二陳湯加麻黃蒼

朮川芎白芷防風羌活獨活之類因挫閃跌撲

致死血流于本經而作痛者四物湯加桃仁紅花

蘇木之類脉實人壯盛者用大承氣湯加桂下

之安有因醉飽入房大盛而酒食之積乘虛流

入于本經致腰痛難以俛仰四物湯合二陳湯加

麥蘖神麩杜仲黃栢官桂砂仁葛花桔梗之類

三才圖會卷之四十一 婦人經水不調 腰痛

脇痛

論

內經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人喜怒虛則目
瞢瞢無所見耳無所聞善恐如人將捕之又曰怒則
氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣蓋心主血肝納血
因大怒而血不歸經或隨氣而上出于口鼻或留于
本經而為脇痛又或歲木大過而本氣自甚或歲金
有餘而木氣被鬱皆能令人脇痛經曰病脇下滿氣
逆二三歲不已病名曰息是亦肝木有餘之証也

外有傷寒發寒熱而脇痛者足少陽膽足厥陰肝二
經病也治以小柴胡湯無有不効者或有積痰食積
流注脇下而為痛者或有登高墜仆死血阻滯而為
痛者又有飲食失節勞役過度以致脾土虛乏肝木
得以乘其土位而為胃脘當心而痛上支兩脇膈噎
不進飲食不下之証醫者宜于各類推而治之毋認
候以為真也

脈法

內經曰肝脈搏堅而長色不青當病墜若搏因血在

脈下令人喘逆其奕而散色澤者當病溢飲溢飲者暴渴多飲而易人肌皮腸胃之外也

脈經曰肝脈沉之而急浮之亦然若脇下痛有氣支滿引小腹而痛時小便難苦目眩頭痛腰背痛足爲逆寒時癢婦人月水不來時無時有得之少時有所墜墮

脈雙弦者肝氣有餘兩脇作痛

方法

丹溪曰屬肝木氣實 因怒氣大逆肝氣鬱甚謀慮

不決風中于肝皆使木氣大實故火盛肝氣急也
有死血 因惡血停留于肝搏于脇下而作痛病則自肝痛甚按之益甚也

痰流注 因痰積流注于厥陰之經亦能使脇下痛病則欬嗽氣急引脇痛

當歸龍薈丸 瀉肝火大盛之惡藥因內有濕熱兩脇痛甚伐肝木之氣肝實宜之

當歸

龍膽草

梔子仁

黃連

黃芩

大黃

酒濕漉
火炒

蘆薈

青黛 各五錢

木香 一錢五分

射香 五分 另研

右為細末神麩糊丸如梧桐子大每服二十九
生薑湯下

一方加柴胡五錢青皮一兩熱甚者烘熱服

一方木氣實者用川芎蒼朮青皮芍藥柴胡甘草
龍膽草各等分水煎服

左金丸 濕肝火行濕為熱甚之反佐

黃連 六錢 吳茱萸 一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服三五
十丸淡姜湯下

一方破血行氣治死血作痛之証

桃仁 去皮留尖另研 紅花 酒拌焙乾 川芎

香附 童便浸 青皮 各等分

每服水煎服之

加味二陳湯 治濕痰流注脇內作痛

本方加泡南星蒼朮川芎姜水煎

肝苦急急食辛以散之用撫芎蒼朮或用小柴

三才補腎學正傳 卷之四
胡湯蓋本方爲脇痛發寒熱者必用之要藥也
左脇痛以柴胡爲君加佐使藥川芎青皮龍膽草
之類

兩脇走痛或用控涎丹 因清痰流注作痛者可

用蓋痰在脇下非白芥子不能達 方見痰門

治咳嗽脇痛者二陳湯加南星青皮香附青黛姜

汁一云四物湯加青皮等藥以疎肝氣

氣弱之人脇下痛脈細緊或弦多從勞役怒氣得
之八物湯加木香青皮或桂心水煎服

去滯氣用青皮蓋青皮乃肝膽二經藥人多怒脇

下有鬱積固宜以解二經之實者若二經氣血

不足先當補血氣少加青皮可也 此承上條

意思而言

肥白人氣虛發寒熱而脇下痛用參芪補氣柴胡

黃芩退熱木香青皮調氣

瘦弱人寒熱脇痛多怒脇必有瘀血宜桃仁紅花

柴胡青皮大黃之類行之

發寒熱脇痛似覺有積塊必是飲食大飽勞力所

致必用龍薈丸治之

解痛治標藥外用琥珀膏貼之 又方用芥菜子

水研敷 又方以吳茱萸研水調敷 又方以

韭菜葉搗細炒熱貼而以熨斗盛火熨之

推氣散 治右脇痛甚脹滿不食

片姜黃

枳殼 麩炒

桂心 各五錢

甘草 灸三錢

右為細末每服二錢姜湯調下水煎亦可

治左脇疼痛不可忍

枳實 麩炒

川芎 各五錢

甘草 灸一錢五分

右為細末每服二錢姜棗湯或酒調下

異香散 治腹脇膨脹痞悶噎塞腹脇疼痛

蓬莪朮 煨

益智仁

甘草

京三稜 各一錢

青皮

陳皮 各五分

石蓮肉

厚朴 姜制三分

每服加生姜三片大棗一枚白鹽少許煎溫服

分氣紫蘇飲 治腹脇疼痛氣促喘急

五味子

紫蘇葉

桔梗 去蘆

三民地補醫學正傳 卷之四 五十四

蜜炙 黃色

桑白皮

草果仁

去白

大腹皮

茯苓

陳皮

去白 炙各 五分

每服加生姜三片白鹽少許水一盞空心温服

芎藭湯 治脇下疼痛不可忍者

桂枝

川芎

細辛

乾葛

防風

去蘆各 八分

芍藥

枳壳

麻黃

人參

甘草

炙各 四分

每一服加生姜三片水一盞半煎温服

丹溪活套云凡脇痛者多是肝木有餘也宜用小柴

胡加青皮川芎芍藥龍膽草甚者煎成正藥入青

黛射香 痰流注者本方倍半夏加橘紅南星蒼

白朮茯苓川芎之類 瘀血作痛者小柴胡合四

物湯加桃仁紅花或乳香沒藥煎服痛甚而元氣

壯實者桃仁承氣湯下之而愈 性急多怒之人

時常腹脇作痛者小柴胡加川芎芍藥青皮之類

煎服甚者以前煎藥送下當歸龍薈丸其効甚速

諸氣

論

內經曰百病皆生于氣也故怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收炅則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣急夫人身之正氣與血爲配血行脉中氣行脉外一呼脉行三寸一吸脉行三寸氣血並行周流乎一身之中灌溉乎百骸之內循環無端運氣不悖而爲生生不息之妙用也經曰一息不運則機緘窮一毫不續則穹壤判若內無七情之所傷外無六淫之所感何氣病之有哉其不善攝生者五志之火無時不起五味之偏無日而不傷是以釀成膠痰固積留滯于六腑鬱火邪氣克塞乎三焦使氣血失其常候腑臟不能傳道是故外邪得以乘虛而奏襲矣以致清陽不升濁陰不降而諸般氣痛朝輟暮作而爲膠固之疾非良工妙手莫易治焉若夫爲脇痛爲心腹痛爲周身刺痛甚則爲反胃爲膈噎等証卽此之由也大抵男子屬陽得氣易散女子屬陰遇氣多鬱是以男子之病氣者常少女人之病氣者常多故治法曰婦人宜調其血以耗其氣男子宜調其

氣以養其血此之謂也學者宜致思焉

脉法

脉經曰脉滑者多血少氣濇者少血多氣大者血氣俱多脉大而堅者血氣俱實小者血氣俱少

脉來細而緩者血氣俱虛 代者氣衰 細者氣

少 浮而絕者氣欲絕 辟大而滑中有短氣

尺脉濇而堅爲血實氣虛尺脉細而微血氣俱不足也

劉立之曰下手脉沉便知是氣沉極則伏濇弱難愈

其或沉滑氣兼痰飲病也

方法

丹溪曰周流乎一身以爲生者氣也苟內無所傷外

無所感何氣病之有今冷氣滯氣逆氣上氣皆是

肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚

而轉成劇病局方例用辛香燥炆之劑以火濟火

咎將誰歸 又曰氣無補法世俗之論也以其爲

病痞滿壅塞似難于補不思正氣虛者不能運行

邪滯着而不出所以爲病經曰壯者氣行則愈怯

者着而爲病苟或氣怯不用補法氣何由行又
曰冷生氣者出于高陽生之謬言也病人自覺冷
氣從下而上者非真冷也蓋上升之氣自肝而出
中挾相火自下而上其熱爲甚火極似水陽亢陰
微又曰凡氣有餘便是火是皆爲治之正論也
可不究與

調氣用木香然木香味辛氣能上升如氣鬱而不
達固宜用之若陰火冲上而用之則反助火邪而
病甚矣故當用黃栢知母而少用木香佐之

稟受素壯而氣刺痛當用枳壳烏藥若因氣不舒
而刺痛當用木香調達之若肥白人氣刺痛者
宜于人參白朮加枳壳木香

一方解五臟諸氣益少陰經血用梔子炒令將黑
爲末以生姜汁入湯同煎飲之其効甚捷

清膈丸 治因濕熱氣滯

黃芩

黃連

各五錢炒

香附

一兩五錢

蒼朮

二兩

右爲細末新取紅熟瓜萸去皮搗爛和丸如棗

豆大每用白湯下三五十九

正氣天香湯 治婦人一切諸氣作痛或上奏心胸
或攻築脇肋腹中結塊發渴刺痛月水因之而不
調或眩暈嘔吐往來寒熱無間胎前產後一切氣
候並皆治之

烏藥 一錢五分

香附 六錢

陳皮

紫蘇

乾姜 各六分五厘

每服白水煎稍執服

子和木香枳榔丸 此藥疏濕潤燥推陳致新滋陰

抑陽散鬱破結活血通經治男子婦人嘔吐酸水
痰涎不利頭目昏眩并一切酒毒食積及米穀不
化或下痢膿血大便秘塞風壅積熱口苦煩渴涕
唾稠粘膨脹氣滿等証

木香

枳榔

青皮 去穰

陳皮 去白

黃栢

莪木 煨

枳壳 麩炒

黃連 去毛

大黃 酒拌濕紙包煨

黑丑 取頭末

香附 各一兩重便浸

當歸 一兩半

右為細末滴水為丸如梧桐子大每用溫水下

五七十九丸以利為度

蘇合香丸 大能順氣化痰并治傳屍骨蒸勞瘵卒

暴心痛小兒驚搐大人中風卒屍等証

沉香

射香 另研

訶子 煨去核

木香

丁香

華撥

安息香

另研用無灰酒一升煮為膏

白木

白檀香

各二兩

薰陸香 另研

蘇合油

和入安息膏內

龍腦

另研各一兩

硃砂

另研飛

烏犀角

各五錢

右為細末研勻入安息膏及煉蜜和勻丸如梧

桐子大空心温酒化下四九白湯亦可一方有

香附二兩

蘇子降氣湯 治氣不升降痰涎壅塞氣滿氣痛等

証

川歸

去酒

甘草 炙

前胡

去蘆

厚朴

美制各五分

肉桂

去些皮

陳皮

去白各七分

半夏

泡

紫蘇子

另研各一錢

每服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎去粗

不拘時服

異香散 治胃氣不和飲食不化腹脇膨脹一切冷氣結聚作痛等証 方一 痧痛門

沉香降氣湯 治陰陽雍滯氣不升降胸膈痞悶噫

醋吞酸

沉香 四錢

砂仁 五錢

甘草 炙一兩 二錢

香附 童便浸一宿四兩

右為細末每服二錢入鹽少許白湯調下

復元通氣散 治跌撲損傷或負重坐閃致氣滯于

血分作痛并一切氣不宣通瘀血凝滯周身走痛

舶上茴香 炒

空山甲 溻火煨脆

木香 各一兩 五錢

玄胡索 碎砂

白丑 取頭末

甘草 炙

陳皮 去白各一兩

當歸 一兩 五錢

今加乳香

沒藥 各五錢

右為細末每服二錢熱酒調下不飲酒人白湯

下病在上食後服病在下食前服

木香流氣飲 治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虛

浮四肢腫滿口苦咽乾大小便不利

藿香葉 洗

木香 不見火

厚朴 姜制

青皮 去白

香附 去毛童便浸

麥門冬 去心

白芷 各七分五厘

甘草 五分

陳皮 去白一錢

大腹皮 酒洗浸

乾木瓜

人參 去芦

蓬莪朮 煨

丁香皮 不見火

半夏 湯泡各二分

赤茯苓 去白

石菖蒲 各三分

草果仁 五分

紫蘇葉

檳榔

白朮

肉桂

木通 各六分

沉香 七分五厘

右作二服每服加生姜三片大棗一枚水一盞

半煎去粗服

丹溪活套云蒼天之氣貴乎清淨若浩然克塞乎宇宙之間以為生生不息之妙用者此一元之正氣也彼為雲為霧為風雲為雷霆鼓舞于天地之間者皆山澤濕熱薰蒸之氣也在人者亦由是焉其清純之元氣與血並行循環無端未嘗有盈虧也彼沖擊橫行于臟腑之間而為痛為痞滿為積聚等証者亦由天地間雲雷之鼓舞因濕熱鬱蒸而發者也濕熱鬱蒸之久在天地則為霖雨雹雪等物在人身者為積聚為痞癥為痰氣痞滿之類治

之之法在胸臆之間而爲痞滿刺痛伏梁等証者
二陳湯加枳實黃連桔梗瓜蒌仁木香之類在下
焦而爲奔豚七疝等証者本方加桃仁山查梔子
枳核茴香川練橘核之類在兩脇攻築作痛者本
方加青皮柴胡芍藥草龍膽之類在中焦而爲痞
滿脹急者本方加木香厚朴檳榔枳壳或用平胃
散以平其敦阜之氣惟婦人胎前產後一切氣疾
一作楚者俱用四物湯爲主治加踈通行氣之藥此
治氣之大法也學者詳之

疝氣

論

內經曰肝脉大急沉皆爲疝又曰三陽急爲瘕三陰
急爲疝難經曰任脉之爲病其內苦結男子爲七疝
夫所謂七疝者寒水筋血氣狐癩七者是也子和曰
寒疝者囊冷結硬如石陰莖不舉或控睪丸而痛得
之于坐臥濕地或寒月涉水或值雨雪或坐臥磚石
或風冷處使內過勞宜以溫劑下之久而無子水疝
者其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫狀如水晶或囊

癢而搔出黃水或小腹按之作水聲得之于飲水醉酒使內也勞汗出而遇風寒濕之氣聚于囊中故水冷令人爲卒疝宜以逐水之劑下之筋疝者其狀陰莖腫脹或潰而爲濃裏急筋縮或莖中作痛痛極則癢或挺縱不收或出白物如精隨洩而下得之于房室勞傷及邪術所使宜以降心火之劑下之血疝者其狀如黃瓜在小腹兩旁橫骨兩端約紋中俗名便癰得之于重感春夏大熱勞于使內氣血流溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑

下之氣疝者其狀上連腎膪下及陰囊多得于號哭忿怒則氣鬱之而脹號哭怒罷卽氣散者是也有一法治以針出氣而愈蓋針有得失宜以散氣之藥下也或小兒亦有此疾俗名偏墜得之于父已年老或年少多病陰痿精怯強力入房因而有子稟胎病也此症難治惟築賓一穴有灸之而愈者狐疝者其狀如仰瓦臥則入小腹行立則出腹入囊中如狐晝出穴而溺夜入穴而不溺此疝出入往來上下正與狐相類也亦與氣疝大同小異宜以逐氣流經之劑下

之癩疝者其狀陰囊大如升斗不癢不痛者是也得之于地氣卑濕故江淮之間多有之宜以去濕之劑下之女子陰戶凸出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便認爲虛寒而溫之補之本名曰瘕宜以苦藥下之以苦堅之愚按子和論七疝病源至爲詳悉但其處方一以攻下之法爲主治不能使人無疑耳旣曰多由房勞致虛而作其可例施之以攻下之法乎大抵七疝爲病若非房勞所致卽是遠行辛苦涉水履水熱血得寒而滯凝于小腸膀胱之分或濕熱乘虛而流入于足厥陰之經古方一以爲寒而純用烏附等熱藥爲治我丹溪先生獨斷爲濕熱此發古人之所未發者也夫熱鬱于中而寒束于外宜其有非常之痛故治法宜驅逐本經之濕熱消道下焦之瘀血而以寒因熱用之方立法處治卽邪易服而病易退也其攻下之法愚故未敢試而行之以俟識者再詳學者宜致思焉

脉法

內經曰肝脉大急沉皆爲疝心脉搏滑急爲心疝肺

脉沉搏爲肺疝又三陽急爲瘕三陰急爲疝 又
曰大陰脉滑則病脾風疝厥陰脉滑則病狐疝少
陰脉滑則病肺風疝陽明脉滑則病心風疝大陽
脉滑則病腎風疝少陽脉滑則病肝風疝
脉經曰寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則
惡寒緊則不欲食弦緊相搏則爲寒疝

跌陽脉浮而遲浮則爲風虛遲則爲寒疝寒疝繞
臍痛若發則自汗出手足厥寒其脉沉弦者烏頭
湯治之爲主

方法

丹溪曰疝氣者畢丸連小腹急痛也有痛在畢丸者
有痛在五樞穴邊者皆足厥陰之經也或無形或
無聲或有形如瓜或有聲如蛙自素問而下皆以
爲寒蓋寒主收引經絡得寒則收而不行所以作
痛然亦有踢水涉水終身不病此者無熱故也大
抵此証始于濕熱在經鬱而至久又得寒氣外束
不得疎散所以作痛若只作寒論恐爲未備或曰
厥陰經鬱積濕熱何由而致予曰大勞則火起于

筋醉飽則火起于胃房勞則火起于腎大怒則火起于肝火積之久母能令子虛濕氣便盛濁液凝聚併入血隧流于厥陰厥陰屬木係于肝爲將軍之官其性急速火性又暴爲寒所束宜其痛之大暴也有以烏頭梔子作湯服之其効亦捷後用此方隨形証加減與之無不驗但濕熱又當分多少而治濕則腫多癩病是也又有挾虛而發者當以參朮爲君踈道藥佐之脉甚沉緊而豁大無力者是也其痛亦輕但重墜牽引耳聾主肝經與腎絕無相干切不可下劫藥神効蓋濕熱因寒鬱而作用梔子以降濕熱烏頭以破寒鬱况三三物皆下焦之藥而烏頭爲梔子之所引其性急速不容留中停留也又謂按之不痛者屬虛須加肉桂以姜汁丸服

一方定痛用海石香附爲末姜汁調下

又方治諸痛定痛速効用枳實梔子糖丸

卽山查

柴萸各炒濕盛者加荔枝核炒爲末丸服用長流水調末子空心服一二錢一本有川練子

又方治食積與瘀血盛痛者 一云少腹痛者有
瘀血及有積熱

梔子仁

桃仁

山查

枳實

萊菔

各等分

右為末順流水入姜汁作湯調服

又方治陽明經受濕熱傳人大腸惡寒發熱小腹
連毛際結核悶痛不可忍用山梔桃仁橘核並
炒山查等分入姜汁煎熱服

按之不痛者屬虛必用桂枝山梔炒烏頭炮

右件為細末姜汁打糊丸如梧桐子大每服
五十丸刮痛効

一方治癩腰痛者

本腰不痛者
本治癩腰藥

蒼朮南星白芷

山查半夏川芎枳實神麴糊丸服

諸疝發時用海石香附二味為末姜汁入湯調服
亦治心痛因清痰而作痛者

又治疝方橘核炒桃仁研梔子炒萊菔炒川烏炮
水煎服

小腸氣腎核脹痛蒼朮陳皮川練子各二錢半

草五分紫蘇一錢半細末酒水各一盞連鬚煎
白五莖煎服

刮疝藥用烏頭梔子炒搗細順流水入姜汁調服
陰囊腫脹大小便不通

白牽牛 二兩 桑白皮 白朮

木通 去節 陳皮 各五錢

右為細末每服二錢姜湯調下空心服

凡疝氣挾虛者必以參朮為君佐以疎道之藥如
川練子茴香枳實山查梔子之類

三因茛菪白散 治一切寒証作痛

川芎 當歸 枳壳 炒

厚朴 乾姜 官桂

青皮 茴香 炒 川練

茯苓 麥蘖 炒 三稜 炮

神麴 炒 莪朮 炮 熟地黄

白芍藥 木香 人參 各等分

右細切每服五錢加茛菪白三莖塩少許水煎空
心溫服

又方桃仁枸橘各用十四箇瓦上炒山梔子九枚
去皮吳茱萸七粒山查子十四箇並炒生姜一
指大搗細以順流水一鍾盪起煎至數沸連粗
服之

又方治癩不痛用蒼朮神麩白芷山查川芎梔子
半夏入姜煎服

凡癩症非痛斷房事與厚味不可用藥

凡治七疔須先灸大敦穴 一名大順穴在足大
姆指相去瓜甲如韭葉大須灸三五壯足厥陰

井也

治疔氣神方 其病甚至氣上衝如有物築塞心

臟欲死手足冷者二三服除根

硫黃

不拘多少火中溶化
即投水中出毒研細

荔枝核

為末炒
焦黃色

陳皮

右三味各等分為末飯丸如梧桐子大每服十
四五丸酒下其痛立止自己覺疼甚不能支持
略用五六丸再不可多也

又治疔方

蒼朮

香附

冬一盞炒

黃柏

酒炒已上為君

青皮

玄胡索

益智

桃仁

已上為臣

茴香

附子

鹽炒

甘草

炙已上為使

每服五錢順流水煎服

五葉湯

洗疝瘡立効

枇杷葉

野紫蘇葉

椒葉

蒼耳草葉

水晶蒲桃葉

右五味不拘多少量水煎湯浴洗

一方肥人腫疝作痛發熱惡寒

五苓散加茴香

煎服神効

吳茱萸湯

治厥疝腹中冷痛積氣上逆致陰冷囊

寒作痛

吳茱萸

五分湯泡七次

川烏頭

炮去皮

細辛

各七分五厘

良姜

當歸

乾姜

炮

官桂

各二分五厘

右細切一服水一盞煎七分溫服日進三服以不痛為度

茴香練實丸

治控睪小腸痛結上而不下冲心膈

茴香炒

練實去核炒

食茱萸泡

陳皮各一兩

馬藜花醋炒一兩

芫花醋炒五錢

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服十九至

二十九空心温酒下

蒺藜湯 治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也喜

欲房勞痛不可忍

蒺藜去刺炒

附子炮去皮臍

梔子仁各一錢

右作一服水一盞煎至六分食前温服亦治前

控睪小腸痛

木香散 治心疝小腹痛悶絕不已

木香

陳皮各五分

良姜

訶子皮

赤芍藥

枳實炒各二分五厘

草薹菹

川芎

黑丑各一分

每服水煎去粗温服

香殼散 治小腸氣臍腹疝痛筋急陰股中痛悶暈

不省人事

舶上茴香鹽炒

枳實炒各一兩

沒藥五錢

右爲細末每服一錢溫酒調不拘時并進二三服神効

寶鑑沉香桂附丸 治中氣虛弱甚脾胃虛寒臟腑積冷心腹疼痛手足厥逆冷便利無度七疝引痛喜熱物慰盪証

沉香

附子炮

川烏炮

乾姜炮

良姜

官桂

吳茱萸

湯泡去苦

茴香

炒各一兩

右爲細末醋煮麩糊爲丸如梧桐子大每服五

十九至七十九空心米飲下

元戎加味五苓散

治疝氣卒痛小便秘澀

本方

加川練子一分

右爲細末每服二錢空心米飲調下

茴香練實丸

治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川練子

茴香

山茱萸

吳茱萸

青皮

陳皮

芫花

醋煮前方減半

馬蔞花

食茱萸

各等分

較之前方多吳茱萸青皮山茱萸

王氏增補醫學正傳 卷之四
右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服三十九
空心溫酒下

天台烏藥散治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香炒

青皮

良姜

炙各五錢

檳榔二枚

川練子十枚

巴豆

七枚

右先以巴豆微打破用川練子麩炒黑去麩及
巴豆不用其餘藥同爲細末每服一錢溫酒調
下甚者姜酒調下

濟生葵子湯

治膀胱實熱腹中小便不通口舌乾

燥膀胱作痛

赤茯苓

猪苓

冬葵子

枳實

瞿麥

木通

黃芩

車前子

滑石

各五分

甘草

二分五厘

每服加生姜二片水煎空心服

丁香練實丸

治男子七疝痛不可忍婦人寢裏帶

下皆任脉所主陰經病也乃腎肝受邪故治同法

當歸

附子炮

茴香炒

川練子各一兩

細切用好酒三升同煮酒盡為度焙乾為細末

每末重一兩入

丁香

木香各五分

玄胡索五錢

全蝎十三箇炒

右為末與前藥同拌勻酒糊為丸如梧桐子大

每服三十丸加至一百丸空心温酒送下

一捏金散 治七疝奔豚氣痛甚者神効 方見氣門