


PETRI MORELLI  
FORMVLÆ  
REMEDIORVM.





P E T R I MORELLI  
GALLOCAMPA NI,  
Medici Regij, 11172

# FORMVLE

## RE MEDIORVM

*Studio & operâ*

IO. IACOB à BRVN N,  
Phil. & Med. D. Pract. Med.  
in Acad. Basil. Professoris  
Ordinarij.

Cuius accedit

S Y S T E M A · MATERIAE  
MEDICÆ,

Indicibus huic postremæ editioni  
additis.



ROTHOMAGI,  
Sumptibus IOANNIS BERTHELIN,  
Bibliopolæ.

M. D C. L.



Admodum Illustri Amplissimoquē

D.D. IO VESLINGIO  
MINDANO

E Q V I T I,

In celeberrimo Gymnasio Patauino  
Anatomiae, & Pharmacie  
Professori Primario.

Hortique Medici Praefecto

Paulus Frambottus.


F. P.

 Esideratus diu mul-  
torum votis liber  
mea cura concinnior  
emendatiorque nul-  
lius nomen rectius ambit, quam  
celesti illud tuum, à cuius splen-  
dore autoritatem tutelamque si-  
bi promittat. Quamvis enim lon-  
gè lateque sparsa multiplicis do-  
ctrinæ tuae fama non leue ipsi pre-  
ā iiij

tium addideris, tuotamen iudicio  
Medicorum filios tantum ipsi  
concedere certum est, quantum ne-  
mini; qui è supremo Gymnasij  
Patauini suggesto idem argu-  
mentum scitè adeo doctèque ad  
rationes vocas, ut ne Protago-  
nes de coloribus quidem senten-  
tiam equius tulerit. Non enim,  
quod plerisque contingit, aliena  
fide, sed tuis usus oculis rariores  
Palestine, & Ägypti stirpes per-  
lustrasti, acièque curiosa Democri-  
ti exemplo Nili monstrarimatus,  
intimum naturæ artificium depre-  
hendisti, medelas iuxta mortali-  
bus salutares asseruisti, ea ingenij  
dexteritate sermonisque elegantia,  
ut quidquid ante longis peregrina-

tionum tædis plerumq; partū, apud  
nos temporis amæni compendio sub  
conspectum veniat. Nec vero in  
postremis habendum censeo, quod  
meas exegeris operas præclaris in-  
genij tui monumentū, quibus ma-  
gno dilectionis incremento ren-  
tibi literariam plurimum deuinxi-  
sti. Eminet in iis noua pene atq; ad  
vium elegantissimè formata hu-  
mani corporis fabrica, opus tuo ge-  
niomemorique posteritate dignissi-  
mum. Mitto cetera, quorum spem  
labentibus optato lustris extendas  
precor, perpetuum exiguo hoc pi-  
gnore testatus obsequium, quod  
eximiæ virtuti suæ eruditorum  
chorus defert. Maëte ista gloria,  
ut plurimos diu sospites.

Patauij Cal. Ian. 1647.



## PROLEGOMENA.

**M**EDICAMENTORVM  
compositio dupliciter cō-  
siderari potest. *Uno modo*,  
secundum formam exter-  
nam. *Alteuo modo*, secun-  
dum internam: quæ om-  
nino ad methodum medendi pertinet.  
Hæc rursum bifariam perpendi po-  
test. Velenim docet, ex qua basi, corri-  
gentibus, conseruantibus, dirigentibus  
constare debeat medicamentum compo-  
situm, quæ omnia ex indicationum natu-  
ra omnino desumenda: vel si alterans  
medicamentum, V. G. calefaciens, puta  
in secundo, ex variis simplicibus, calidis  
V. G. in primo, secundo, tertio, frigidis  
etiamnum in 1. 2. & 3. ita suadentibus  
indicationibus, iisque paucioribus pluri-  
busue sit componendum, docet, tradit-  
que quænam singulorum dosis sumenda  
sit, ut gradus ille quæsusus inde adéquate

# PROLEGOMENA.

resultet. Hanc posteriorem medicamentorum compositionem secundum formam internam consideratam haudquam hinc perscrutamur, sed priorem, quæ perspicuè docet, qua ratione materia Medica in varias & conuenientes formas concinnari possit, prout nimisrum, vel ipsa ægrotantis libido quæ non una omnibus, vel affectus, vel causæ morbiæ, vel affectæ partis varia constitutio expostulat. Quandoquidem vero, juxta Philosophum, i. poster. Analytic. ab initio

τῶν θεωρημάτων τοῦ παθήσαντος διατίθεται ἐπιγνώσκειν γένεται γνῶση: omnis doctrina, & omnis disciplina procedit ex præmissa cognitione; eapropter & nos huic tractatu ei ea prætermissemus, quorum notitiam priùs habere operæ pretium est. Ad quatuor vero capita omnia Prolegomena reduci possunt. *Primum* erit de ponderibus, ac mensuris medicis. *Secundum*, de abbreviationibus & notis Medicorum. *Tertium*, de differentiis formularum ac distributione Tractatus. *Quartum*, quænam capita in singulis formulis sint observanda.

# PROLEGOMENA:

## I.

### *De Ponderibus, ac Mensuris medicis.*

**C**Vm tota compositionis ratio è sim-  
plicum proportione dependeat,  
quæ pondere, mensura, numero, aceruo,  
seu mole æstimatur, horum in primis no-  
titiam præmitti operæ pretium est.

**P O N D E R E** arida ferè expendun-  
tur; quorum variaz cùm sint differentia,  
ex antiquorum monumentis, sequentia  
tamen sunt vñitatoria apud Medicos no-  
strates in formulis præscribendis.

**G r a n u m**; ponderis initium & basis, ( vt  
& numerorum vñitas, ) albi pipetis gra-  
num pondere adæquans.

**S c r u p u l u s**; qui, cùm grana 24. haberè  
debeat, tamen ex vsu iam male recepto  
in officinis 20. tantum possidet.

**D r a c h m a** continet scrupulos tres.

**V n c i a** habet drachmas octo. De qua  
obiter aduerte: vbi tres præscribuntur,  
mensuræ nomine **Quartarium** appellari;  
quod quartam libræ partem expleat.

**L i b r a** habet vncias duodecim.

# PROLEGOMENA.

MENSVRÆ, quibus liquida æstimantur, sunt vasa libtis, & vnciis designata. Non enim certis quibusdam vasis concavis, vt veteribus in mote erat positum, Medici hodiè liquida dimetuntur: sed mensurarum modum ad pondatum rationem constituunt, vt quælibet mensuræ ponderibus exactè respondeant. Et quandoquidem non idem est liquidorum pondus, ( major enim quantitas olei respondet vnciæ, minor vini, adhuc minor mellis,) hinc quoque triplices liquidorum mensuras usurpant: alias scilicet vino, & aquis destillatis, alias melli, alias oleo mensurando destinatas.

*ACERVO* seu *MOLE* prescribitur medicamentorum quantitas per *manipulos, fasciculos, pugillos.*

*Manipulus*, est quantitas, quam manus tota complecti potest: atque vnciæ dimidiæ ferè respondet.

*Fasciculus*, quantum vlna, sive brachio complicato tenere possumus.

*Pugillus* vel *maior* est, vel *minor*. *Major*, si capiatur tantum, quantum omnibus quinque digitis extremis simul junctis assumi potest. *Minor*, si tantum accipiat

# PROLEGOMENA.

tur, quantum tribus primis digitis apprehendi potest.

Major pugillus drachmam integrum,  
Minor drachmam semis pondere aequat.

*NVMERO* tandem etiam aliquando medicamentorum quantitas definitur: coque pari, vel impari. V. G. caricarum pinguium num. 3. 4. &c.

*In specie* vero nunc, si classes Medicamentorum species,

*Radices, cortices & ligna* ponderantur.

*Folia* manipulis: &c, si pro balneis praescribantur, fasciculis metimur.

De foliis illud etiam notandum, quod passim in purgantibus potionibus ad tertiam manipuli partem assumantur.

*Seminem* dosis pondere ut plurimum exprimitur. Hordeum tamen, & ciceræ pugillo mensurantur. Leguminæ item & semina majora numero etiam definitiuntur.

*Flores* itidem pugillo definiri certum est.

*Fructus* vel sunt maiores, vel minores. Si minores, vt vx Corinthiacæ, passulæ, pondere plerunque, vel etiam numero exhibendi. Si maiores, vt poma, pruna, caricae, ficus, numero prescribuntur.

# PROLEGOMENA.

*Aromata, gummi, resinae, &c. pondere de-  
ficiuntur.*

*Liquores efficaces ac pretiosi, & olea de-  
stillata guttis.*

## I I.

*De abbreviationibus, & notis  
Medicorum.*

**M**EDICI minori cum molestia & temporis jactura suas præscripturi compositiones, certas habent literas ac notas, quibus vel pondera loco vocabulorum in formulis frequentius exprimunt, vel initium, aut clausulam formulæ designant: certas item abbreviationes, quibus vel primam tantum aut alteram vocabuli, seu ingredientis syllabam ponunt, vel sub uno quandoque titulo pluta medicamenta designant, tūm *simplicia*, tūm *composita*.

# PROLEGOMENA.

## NOTÆ PONDERVM.

Gr. gr.		<i>Gramm.</i>
ð. ß.		<i>Scrupulum dimidium.</i>
ð. j.		<i>Scrupulum.</i>
ð. j.		<i>Drachmem.</i>
ð. ß.		<i>Drachmam dimidium.</i>
ð. j.		<i>Vnciam.</i>
ð. ß.		<i>Vnciam dimidium.</i>
lb. j.		<i>Libram.</i>
lb. ß.		<i>Libram dimidium.</i>
M.	deno-	<i>Manipulum.</i>
M. ß.	tat	<i>Manipulum dimidium.</i>
P.		<i>Pugillum.</i>
quart.		<i>Quartarium.</i>
añ.		<i>ana, e. i. Äquale pondus, aut mensura duorum vel plurium medicar- memorum.</i>
ñ. par		<i>singulorum partes equi- les.</i>
xq.		<i>quantum satis, vel suffi- cientem quantitatem.</i>
q. l.		

# PROLEGOMENA.

Sub uno titulo generali plura quandoque simplicia comprehenduntur:

*etq;*

## S I M P L I C I A.

Radices s. apetientes maiores,	<i>Apij.</i> <i>Fæniculi.</i> <i>Asparagi.</i> <i>Petroselini.</i> <i>Rusci.</i> <i>Graminis.</i>
Radices s. apetientes minores,	<i>Rubie.</i> <i>Eryngij.</i> <i>Capparis.</i> <i>Ononidie.</i>
Herbae emollientes s.	<i>Malva.</i> <i>Alibæs.</i> <i>Vinaria.</i> <i>Merciorialis.</i>
	<i>Acanthus, seu bræca vrsina.</i> <i>Quibus alij Parietarium, Betam &amp; Ariplicem annumerant.</i>
Herbae capillatae s.	<i>Adiantum nigrum, seu capil. Veneris.</i> <i>Adiantum albū, seu ruta muralis.</i> <i>Polytrichon aureum.</i> <i>Trichomanes.</i> <i>Ifflevium, seu Ceterach.</i>

# PROLEGOMENA.

Quatuor semi-	{	<i>Anisi.</i>
na calida ma-		<i>Fœniculi.</i>
jora,		<i>Carvi.</i>
		<i>Cinnimi.</i>
Quatuor semi-	{	<i>Ammeos.</i>
na calida mi-		<i>Amomi.</i>
nora,		<i>Apij.</i>
		<i>Danci.</i>
Quatuor semi-	{	<i>Cucumeris.</i>
na frigida ma-		<i>Cucurbitæ.</i>
jora,		<i>Citrulli.</i>
		<i>Melónum.</i>
Quatuor semi-	{	<i>Endiviæ.</i>
na frigida mi-		<i>Scallopæ.</i>
nora,		<i>Lactuce.</i>
		<i>Portulace.</i>
Quinque gene-	{	<i>Citrini, seu flavi.</i>
ra Myrobalan-		<i>Chebali.</i>
orum.		<i>Indi, seu nigri.</i>
		<i>Emblici.</i>
		<i>Bellirici.</i>
Quatuor flore-	{	<i>Borraginiæ.</i>
cordiales,		<i>Buglossæ.</i>
		<i>Rosarum.</i>
		<i>Violarum.</i>

# PROLEGOMENA.

Fragmenta	Saphiri.
<i>quinque</i>	Granati.
<i>lapidum</i>	Smaragdi.
<i>pretioso-</i>	Hyacinthi.
<i>rum.</i>	Sardæ, seu Carneoli.

*Cardui Mariae.*

Quatuor aquæ	Taraxaconis.
<i>pleuriticæ,</i>	Cardui-benedicti.
	Scabiosæ.

## C O M P O S I T A.

Tria olea sto-	<i>Absynthij.</i>
<i>machica,</i>	<i>Cydoniorum.</i>

*Mistichinum.*

Quatuor vnguen-	<i>Argon.</i>
<i>ta calida.</i>	<i>Mariatum.</i>

*Altææ.*

*Agrippæ.*

*Albinæ camphoratum.*

Quatuor vnguen-	<i>Rosatum Mæsue.</i>
<i>ta frigida,</i>	<i>Populeon.</i>

*Populeon.*

*Irfrigidans Galeni.*

## I I I.

*De differentiis Formularum, ac distri-*  
*butione tractatus.*

FUNDAMENTI loco, FORMULÆ MEDICÆ voce hic

# PROLEGOMENA.

Intelligimus medicamentum compositum magistrale, h. e. in rem præsentem à Medico præscriptum : ad differentiam officinalium. De quibus ex professo hic non agemus, sed incidenter tantum, propter argumenti affinitatem.

Totum verò Tractatum in duos libros diuidemus : quorum PRIOR est de Medicamentis iuernis, POSTERIOR de Medicamentis externis.

LIBER PRIMVS constat sectionibus tribus. Prima, de formis Medicamentorum liquidis. Secunda, de formis Medicamentorum mollibus. Tertia, de formis Medicamentorum solidis.

## CAPITA, ET FORMVLÆ SECTIONIS I.

CAP. I.	<i>De Apozemate.</i>	1
II.	<i>De Inlepo.</i>	31
III.	<i>De Potione.</i>	40
IV.	<i>De Syrupo.</i>	67
V.	<i>De Vomitoris.</i>	95
VI.	<i>De Vinis medicatis.</i>	115
VII.	<i>De Emulione.</i>	130
VIII.	<i>De Amygdalato.</i>	134

# PROLEGOMENA.

ix. <i>De Hordeato.</i>	135	
x. <i>De Latte, &amp; Sero latit.</i>		
	137.	
x i. <i>De Hydromellite.</i>	139	
x i i. <i>De HydroSaccharo, &amp; Prisa-</i>		
<i>n.a.</i>	142	
x i i i. <i>De Dieta.</i>	143	
	<i>&amp; Bocheto.</i>	158
x i v. <i>De Decotto Galli.</i>	160	
x v. <i>De Destillato inflammatore.</i>	163	
x v i. <i>De Insulis.</i>	169	

## CAPITA, ET FORMVLÆ SECTIONIS. II.

CAP. i. <i>De Bolo.</i>	171
ii. <i>De Opiata.</i>	177
iii. <i>De Eclegmate.</i>	183
iv. <i>De Condito.</i>	193

## CAPITA, ET FORMVLÆ SECTIONIS. III.

CAP. i. <i>De Pissa regia, Morsellis.</i>	
	196
ii. <i>De Pandalone.</i>	199
iii. <i>De Massa panis, &amp; Pince;</i>	

# PROLEGOMENA.

	latio.	200
IV.	<i>De Tabellis.</i>	201
V.	<i>De Pilulis.</i>	206
VI.	<i>De Trochis.</i>	215
VII.	<i>De Pulvere.</i>	219

L I B E R S E C V N D V S constat sectionibus duabus. *Prima* de Remediis communibus pluribus partibus. *Secunda*, de Remediis propriis partium quarundam.

## CAPITA, ET FORMVLÆ SECTIONIS I.

CAP. I.	<i>De Epibemate.</i>	224
II.	<i>De Lotione.</i>	230
III.	<i>De Fatu.</i>	233
IV.	<i>De Inseſſu &amp; Semicupio.</i>	237
V.	<i>De Balneo.</i>	239
VI.	<i>De Stupha, vèl Sudatorio.</i>	241
VII.	<i>De Embrocatione.</i>	245
VIII.	<i>De Linimentis.</i>	250
IX.	<i>D: Vngueno.</i>	251
X.	<i>De Cersto.</i>	257
XI.	<i>De Empheſtro.</i>	260
XII.	<i>De Spanedriapo.</i>	262
XIII.	<i>De Cataplasmate.</i>	265

# PROLEGOMENA:

x i v. <i>De rubifican-</i>	{	<i>Dropace.</i>	269
<i>tibus,</i>		<i>Veficator.</i>	272
x v. <i>De Sacculis.</i>			274

## CAPITA, ET FORMVLÆ SECTIONIS II.

Remedia propria partium quarundam  
sunt vel

### CAPITIS. *Frontale.* CAP. I.

*De quo.* 278

*Oxyrrhodinum.* II. 280

*Cicupha.* III. 281

*OCVLORVM.* *Collyrium.* IV. 283

*ORIS.* *Gargarisma.* V. 292

*Apophlegmatismus.* VI. 293

*Dentifricium.* VII. 296

*NARIVM.* *Errbinum.* VIII. 298

*Suffimentum.* IX. 303

*Odoramentum.* X. 310

*STOMACHI.* *Scutum.* XI. 313

*UTERI.* *Pessatum.* XII. 319

*Nascale.* XIII. 320

*Suppositorium.* XIII. 320

*Clyster.* XIV. 323

Sub quo continentur.

*Iniectiones variae.* XV. 331

# PROLEGOMENA.

## I V.

*Quānam capita in singulis formulis  
obseruanda.*

**I**N singulis formulis describendis tria maximè perpendemus. 1. *Compositiōnem.* 2. *Vsum.* 3. *Utilitatem.*

In *compositione* docebimus, quanam ex materia ratione *qualitatis*, *quantitatis*, & *ordinis prescribendi* concinnetur quilibet formula. Vbi in genere notandum, ratione *qualitatis* semper eligenda simplicia 1. *Maximè appropriata* & *efficacia*: ut quantum quidem fieri potest, æger quam citissimè sanitati restituatur. 2. *Tria*, quinetiam, ut, si non prosint, saltem non obsint ægris: licet tamen in affectibus desperatis quandoque, sed exquisito iudicio adhibito, periculosa medamenta experiri. 3. *Grata* & *incunda* colore, odore, sapore, cum morbo tamen pugnantia. Sic enim naturæ sucum facimus utilissimum. 4. *Expertæ* & *vnu* *sepius* approbata. His enim longè fælicius tuisque morbi curantur, quam inexplicatis in corpore humano, quæ vel doctis,

# PROLEGOMENA.

Genus Medicus magna ratione adhibita  
excogitarit. Ratione *quantitatis continue*  
in genere omnia sint moderata, neque  
vicia imperetur drachma vbi sufficerit.  
In *Specie*. verò ingrata & tristia medica-  
menta sapore vel odore, quia nec facile  
sumuntur, nec retinentur, ob id mino-  
re copia cum aliis miscenda. Ratione  
*quantitatis discrete*, siue *numeri* ingredien-  
tium simplicium, ut non tentandum  
composito, simplici quod effeceris; sic in  
compositione simplicium vitandæ sunt  
vastæ illæ atque in molem theriacalem  
exstructæ compositiones, quæ præter-  
quam quod ad ostentationem potius,  
quam ætri utilitatem faciunt, ægro in-  
super nauseam in assumendo, Pharmaco-  
copæo verò molestiam in compónendo  
non paruam pariunt, hacque ratione  
*omissionis occasionem* præbent; Medi-  
cum proin spe, ægrotantem medicamen-  
ti fructu, cum sanitatis dispendio,  
priuant. Ratione *ordinis prescribendi*, et si  
nihil medicamento virium decedat,  
quocumque ordine simplicia præscriban-  
tur, modò interim rectè præparetur, ele-  
gantius tamen & pulchrius est, obser-  
vare ordinem in præscribendo talcm,

# PROLEGOMENA:

qualem in singulis formulis descripsi-  
mus : adeò ut in genere hic circa ordi-  
nem nihil ulterius habeamus aduersione  
dignum.

In usu prescriptæ formulæ conside-  
rabitur primò *quantitas*, sive *dosis*; dein-  
dè *tempus*; postea utendi *modus*: deni-  
que verba subne<sup>c</sup>tentur, quibus formu-  
la ipsa concipi solet.

In utilitate tandem fructuum vniuer-  
sum, qui ex qualibet medicamenti for-  
mula emergit, breuiter ac perspicue, tūm  
in genere, tūm in Specie, demonstrabi-  
lius.

L I B E R



# LIBER PRIMVS.

## SECTIO I.

### DE MEDICAMENTIS LIQUIDIS

 LIQVIDIS

CAP. I.

### DE APOZEMATE.

 VOD Latini Decocta , Graci vocant Apozemata , ἀπόζημα , quod est decoquo , feruefacio , proprie deducta .

Nibil autem est aliud APOZEM A , quam medicamenti forma liquidis , ex liquore , qui vires variarum stirpium ebiberit , constata , saccharo , vel melle condita , clarificata , & aromatizata , in quatuor aut quinque doses , ad alterandum vel purgandum comparatur .

Apozema duplex est , aliud veterum iam obsoletum , aliud recentiorum operiosioris laboris , quod persequimur , quodque ab effectu duplex potissimum statimius , Alterans , & Purgans .

## E Method. Præscribendi

### Apozema Alterans.

*Apozema seu decoctum alterans appello, quod aliâ quânis, quâm purgandi per cathartica vi, perfusum est, tûm corpus, tûm contenta, humores maxime, vario modo innitens.*

*Corpus autem vel alterat tantum in qualitatibus, & hoc alterans propriè vocatur in genere, ac prout ex simplicibus proprietate quidam varias panes speltantibus conficitur, cephalicum, hepaticum, &c. in specie dici meretur.*

*Vel etiam ristatè, studio futurae purgationis prospera, corpus obstructionibus impeditum refusat, unde Aperiens nuncupatur.*

*Humores etiam alterat in primis, & secundis qualitatibus, idque vel sine consilio purgandi, & hoc simpliciter alterans, calefaciens pitâ, &c. dicitur; vel quia secunda est purgatio, ut humores catarticis siant obedientiores, & hoc in genere Coquens appellatur, in specie vero pro variâ humorum idâ, pituitam concoquens, &c.*

*Cæterum ad Apozema revocabis varia decocta, quibus utimur passim ad menses prouocandos, vrinas, sudores, &c. qualia sunt Hydrotica inferius recensenda.*

Quicquid sit, quia ista methodum mendendi magis spectant, in Apozemate alterante tria consideranda. 1. *Compositio.*  
2. *Vsus, seu forma prescribendi.* 3. *Utilitas.*

**C O M P O S I T I O.** In Compositione sex maximè accuratiùs methodice consideranda.

1. *Materia*, ex quâ vis medicatrix elicí debet.

2. *Liquer*, in quem traducenda, trahendáque materia.

3. *Decoctione ipsa, & decoctionis.*

4. *Quænam dissoluenda sint in ipso.*

5. *Clarificatio ejusdem.*

6. *Aromatizatio.*

**M A T E R I A.** In materia tria consideranda ; *qualitas, quantitas, prescribendi ratio ac ordo.*

Quod ad *qualitatem*, materia, ex qua sunt prescribuntur que Apozemata, ut & quævis alia decocta, sunt radices, cortices, ligna, folia, semina, fructus, flores, aromata.

Quod ad *quantitatem* seu *dosis*, quæ ista pro Apozemate prescribi debent, prescribuntur.

Radices ad  $\frac{3}{4}$  iiiij. vel vj. ad summum.

Cortices (si assumantur) ad  $\frac{3}{4}$  j. vel  $\frac{5}{6}$

#### 4 Method. Praescribendi

ij. ad summum.

Ligna, si præscribantur, cådem dosi.

Folia ad M. viij. vel x. ad summum.

Semina ad  $\frac{3}{2}$  ij. vel  $\frac{5}{2}$  j. B. raro  $\frac{3}{2}$  ij.

Fructus, vel sunt minores, vt passulæ,  
& præscribuntur bifariam ; pondere ad  
 $\frac{3}{2}$  j. vel  $\frac{5}{2}$  ij. vel numero, eoque pari, quod  
vulgò effterunt, ad paria 4. 6. 10. 20.

Vel sunt majores, & hi numero tan-  
tum, eoque pari vel impari, si maximi  
( vt poma incisa numero duo, tria, &c.)  
pari verò, si paulò minores, vt caricarum  
pinguium paria decem.

Flotes ad P. iiiij. vel vj.

Atomata præstat in aromatizatione,  
quam in decoctione præscribere : si ta-  
men opus est, in purgantibus à  $\frac{3}{2}$  ij. ad  $\frac{5}{2}$   
B. ad summum.

Quod ad ordinem præscribendi, vt hoc à  
pharmacopœo decoqui, sic etiam præ-  
scribi debent à Medico : videlicet 1. ra-  
dices, ( cortices deinde & ligna, si ve-  
niant in usum:) 2. folia. 3. semina. 4. fru-  
ctus. 5. flores, & cum iis aromata.

L I Q U O R. In liquore, in quo ma-  
teria ista decoquenda, duo consideran-  
tur, qualitas & quantitas.

Quod ad ipsius qualitatem, eligitur is-

pro intentione Medici : passim autem in omnibus Apozematibus aqua fontana prescribitur, *putalis, optima, queque* : saepè autem, & usitatè etiamnum aqua bordei, quod alias *decoctionem bordei* appellatur, ubi refrigerandum & detergendum, ut in biliolis : *hydromel tenue*, maximè ubi attenuandum, & incidendum, detergendū, calefaciendum, in pituitosis : *serum lactis*, in melancholicis ; aqua chalybeata aliquando, in obstructionibus viscerum : in quibus prescribitur etiamnum saepius à Practicis, *Fiat decoctio in aqua & vini partibus aequalibus* ; sed præstat vinum tantummodo in fine prescribere.

*Quantitas* liquoris non definitur, prescribitur à Medico quantum satis, vel sufficiens quantitas.

**DECOCTIO & DECOCTVM.** Materiâ Apozematis enumeratâ, ac dispositâ prescribitur, *Fiat decoctum* (in liquore scilicet iam dicto.) Illud autem vulgo imperatur simpliciter, neque definitur ad quam liquoris consumptionem: tamē etiam aliquando usitatè solet exprimi, *Fiat decoctio ad lib j fl. vtrumuis feceris, non errabis,* Decoctione absolutâ (vnde

**6**      *Method. Præscribendi*  
decocti nomen ) præscribitur, capiatū  
de colatura lib j ss. vel quartaria sex. Apoze-  
ma enim in quatuor doses instituitur, &  
hoc modo singulis dosibus 3 iiiij. ss. con-  
tingunt; fin autem volueris, in quinque  
doses 3 xx. imperentur, nec plutes, cum  
alijs ante finitum usum corruptatos  
Apozema, vel trahat situm.

**DISSOLVENDA.** Dissoluenda in  
ipso decoctio, tum ad conseruationem,  
tum ad gratiam saporis gustui, vires etiā  
Apozemati conciliandas, considerantur  
ratione qualitatibꝫ & quantitatibꝫ.

Ratione qualitatibꝫ dissoluuntur.

1. *Vel* syrups tantum, isque idoneus;  
affectum & affectam partem respiciens,  
& ferè semper quia & edulcorat Apoze-  
ma, & simul vim communicat, quā im-  
butus est; unde & hac ratione resarcitur  
virium defectus ipsius Apozematis, ab  
incuria pharmacopœi minus seduli ali-  
quando, aut auati malitia oboriundus.

2. *Vel* saccharum tantum in affectibus  
quibus suis, humoribus, naturis calidis,  
frigidis.

3. *Vel* syrpus & saccharum simul.

4. *Vel* etiam mel aliquando, in omni-  
bus affectibus frigidis, capitis & pectoris.

is maximè , vt & hyeme , ac illud vel  
simplex , vel medicatum , *resatum colatum*  
puta , *antibosatum* , in affectibus capitis à  
copiosa illucie pituitosi humoris.

5. Præter ista dulcorantia , quorum  
vnum vel duo perpetuò , & semper in  
omni Apozemate dissoluenda , aliquan-  
do etiam utilissimè ad maiorem vim cō-  
ciliandam , & efficaciam dissoluuntur ;

Vel succi depurati herbarum variarum  
in ratiōs fines , à varietate indicantium ;  
sic passim succus fumariae , lupulorum in me-  
lancholicis , borraginis , buglossæ in iisdem ,  
& biliosis , vt & acetosæ mercurialis in vte-  
ri affectibus variis , suppressione mensū ,  
&c. aut fructuum , fermè acidorum , & in  
calidis affectibus ferè , vt limonum in bi-  
liosis , pomorum redolentium in melancho-  
licis , granatorum etiam in biliosis , & ubi  
vitriæ mouendæ .

Vel liquores alij , vt 1. *Acetur* , in cali-  
dis & biliosis ad æstum potenter extin-  
guendum , in obstructionibus , vel etiam  
frigidis ad aperiendum , humores crassos  
dicendos , & attenuandos : quia tamen  
vtero molestum , abstinentum in mulie-  
re. 2. *Vinum* in frigidis affectibus , & na-  
tutis , humoribus crassis , lentis , obstru-

## 8 Method. Praescribendi

& tioneibus, & vbi vis medica altius ad partes dissitas ducenda. 3. Aquæ ritæ aliquando eodem consilio, quo vinum.

Notandum vero, quod ubi succi dissoluuntur, aut alij liquores, ex dulcorantibus supra dictis saccharum solum ferè prescribi, raro syrupo.

Ratione quantitatis dissoluuntur. Dulcorantia quidem ad  $\frac{3}{4}$  iiiij. vel  $\frac{3}{4}$  vij. ad sumnum: sic enim cuique dosi apozematis  $\frac{3}{4}$  j. vel  $\frac{3}{4}$  j. s. continget, quæ ratio communis dosium est.

Vbi autem syrups, & saccharum simul prescribuntur, usitate desinatur syrapi dosis ad  $\frac{3}{4}$  iiij. sacchari vero dicitur q. s. quod tamen facile est definire:

Succi vel liquores validiores, ut acetum, aqua ritæ ad  $\frac{3}{4}$  j. vel  $\frac{3}{4}$  ij. ad sumnum: alias possunt dissolvi dosi dulcorantium.

## CLARIFICATIO & AROMATIZATIO.

Clarificatio & Aromatizatio imperantur deinde, prescribiturque, Fiau Apozema clarificatum & aromatizatum pro qualibet dosibus.

De Clarificatione vide postea.

Quoad aromatizationem, in ea duo consideranda, qualitas & quantitas.

Ratione *qualitatis*, vel fit cum aromate aliquo simplici : in refrigerante quidē Apozemate cum *santalō citrino, rubro, &c.* in calefaciente verò passim cum *cinnamo-*  
*mo*; ( poteris & cum *zingibere, croco* etiam in melancholicis, & vbi mouendi men-  
ses: ) in affectibus autem pectoris frigi-  
dis usitatē cum *puluere ireos Florentij*, vel fit cum puluere ele&t. alicuius officina-  
rum, in calidis quidem affectibus passim cum *puluere ele&tuarij trium santalorum*, in frigidis verò usitatē cum *aromatico resato*.

Ratione *quantitatis*, dosis aromatizan-  
tis est à 3 j. ad 3 ij. si cum simplici aromati-  
te fiat; si enim cum puluere ele&tuarij  
alicuius, 3 j. vel j. s. sufficiet.

VSVS & FORMVLA PRÆSCRI-  
PTIONIS. R. &c. ( i. e. *materiam di&lam*)  
fiat decoctio in liquoris supra dicti q. s.  
vel sufficiente quantitate, cape de colat-  
tura, &c. in quibus dillolute, &c. fiat  
Apozema clarificatum & aromatizatum  
cum &c. pro iiiij. dosibus matutinis, vel  
etiam vespertinis, tribus horis ante cibū.

VTILITAS. Hæc medicamenti for-  
ma liquida in genere frugifera, vbi alte-  
randi humores, ( vel etiam purgandi, vt  
postea ) vel affectus p.n. altius delitescūt,

fluida enim vis altius se insinuat ad eorum radices, & penetrat ad diffusa virtus integroribus; vel etiam frugifera, ubi corpus aut affectus siccitate squalidus, madore simul vult perfundi: vel quando humores crassiores sicciores, ut in obstructionibus melancholicorum: hos enim humiditas diluit cum fructu, & maiore dein effectu propinati medicamenti.

In specie vero alterans Apozema inscritum maxime.

I. *Præparationi ad purgationem facile*  
*felicemque, quæ in duobus, humorum*  
*& corporis apparatu, consistit. Præscri-*  
*buntur enim tūm ad humorum coctio-*  
*nem, seu præparationem corundem in*  
*primis & secundis qualitatibus, frigidos*  
*calefaciendo, crassos attenuando, inci-*  
*dendoque, lentos & viscidos detergen-*  
*do, feruidos attemperando, incrassando*  
*tenuiores, quod medicamento cathartico*  
*trahenti, naturæ expellenti facilius ce-*  
*dant, eliminentur: tūm etiam ad corpo-*  
*ris præparationem, apertiendo obstru-*  
*tiones, ipsum meabile reddendo, &*  
*ivedere, quod in offensio cursu feratur hu-*  
*mor: hinc depum magis felicissima*

*cum fructu & agrotantis iuforia.*

2. Alterationi etiam corporis & humorum conuenit extra consilium ullius purgationis : ubi partes in pristinam temperiem reuocandæ vario modo : sed calcinando, refrigerando maximè humores etiam, bilis feruida præcipue, contemperanda, vel alij humores quâuis ratione, juleporum loco, alterandi.

3. Obstructionibus expediendis, si ab humore crasso adusto fuerint, alijs si à frigido, Apozema esto catharticum.

4. Vrinis mouendis, ciendisque, detergendis etiam renibus, & expurgandis arenulis.

5. Mensibus provocandis, licet etiam huic negotio hodiè ferè purgantia admiscantur.

Notandum tamen, hodiè ferè usu in maluisse apud recentiores Praeticos, omne Apozema alterans & purgans simul prescribere, ut iam dicitur, & in alterantiis locum iulepum aut laudula serè successisse, usitatissimè tamen, alterans simpliciter vocatur in usum in febribus continuis, intemperiebus partium calidis, & humorum fervore, item in vrinis ciendis, astutum, & quarumvis partium extinguendo, reliquis causarum mortificarien absundendis,

*& in declinatione febrium per urinas fit usus  
tissimè.*

Caterūm præscribuntur Apozematz  
Vere maximè & autumno ; adde & aesta-  
te , cùm per illa tempora anni herbæ vi-  
rescant, sintque ad manus, possunt & per  
hyemem, ex siccis stirpium partibus ma-  
jore efficaciâ , si adfuerint , aliâs syrups  
& julepis erit vtendum , quæ vicem ge-  
rât Apozematum, debiliore licet à ipso.

### Apozema Purgans.

*Apozema purgans, usu hodiè receptissimum,*  
neque olim Mesnae imitatum , dicitur , quod  
humores præparare , collas simul , unâ & eâ-  
dem operâ , partitis vicibus ( quartuor scilicet  
vel quinque ) sensim per Etixegem educit , ca-  
thartorum propriè dictorum vi , affectibus  
chronicis , & multis humoribus , am conum-  
cibus , maximè conueniens.

Hoc autem , pro varia humorum indole,  
phlegmagogum aliud est , melanagogum , chor-  
tagogum , hydragogum .

In eo tria perpendenda : *Compositio.  
Ysus. Uritas.*

In eius COMPOSITIONE duo ma-  
xime consideranda.

1. *Materiis* , ex quâ decoctum fiat ca-  
tharticum.

*i. Dissoluenda in ipso.*

MATERIA , ex qua Apozema purgans fit , sunt cathartica simplicia , cum suis correctiis , pro humorum idèâ variâ , vnâ cum materiâ , vel decocto Apozematis alterantis decocta , aut in hoc simul infusa.

In illis autem tria consideranda , qualitas , quantitas , & prescribendi decoquendig series ac ordo .

Ratione qualitatis , simplicia cathartica , quæ usitatè tantum decoquuntur , sunt Senna , Polypodium , Carthamus , Turbita , Hermodactyli , Agaricus , Epithymus , Helleborus , Esula , Semen ebuli .

Quæ verò usitatiùs infundi debent ; vel leuiter admodum decoqui , Rhabarbarum , Myrobolani , Tamarindi , Cassia aliquando .

Ratione quantitatis , istâ dosi prescribenda , quæ in 4. aut 5. sufficiet . In genere autem , quia inter decoquendum virtus cathartica , vel solet vanescere , vel non extrahi sufficienter , vnumquodque purgans simplex , pro quâuis dosi constituantur , debet prescribi in decocto copiâ multò maiore ; proportione scilicet ad dosin , quâ datur in substantiâ , duplâ

14 *Method. Praescribendi*

in validioribus, triplâ vel quadruplâ in mediocribus, sextuplâ etiam & octuplâ in leuioribus; ita tamen, ut leuiorum duæ sint partes, validiorum vñatantûm, vel etiam quarta pars: & in omni ferè Apozemate purgante hæc tria probasi præscribantur, *Senna*, *Polyptodium*, *Carthamus* maiori quantitate, reliqua verò pro humoris specie addantur, sed dosi minore ab  $\frac{3}{2}$  j. ad  $\frac{3}{2}$  j. β. ad summum: consultis interim humoris naturâ, eiusdem vitio in 1. & 2. qualitate, quantitate demùm corporis etiam temperamento, constitutione, ad purgationem consuetudine, aut *idiopathia*, regionis conditione, cœli statu, anni tempore, sexu, ætate, & alii s legitimam *καρδιαν* limitantibus, & quæ ipsam facilcm, aut difficilem futuram ostendunt, cathartica proprie leuiora, validiora, maiore, minoréue dosi esse exhibenda.

*In specie* igitur in omni ferè Apozemata, illa tria pro basi (purgantia enim Apozemata pituitæ, & melancholiæ, serofis humoribus, ferè debentur, vt bili etiamnum aliquando, cui senna maximè conuenit) sic solent apud Monspelienses ysitatem præscribi.

*Filiorum seminæ orient. dis mundatorum*

*Medulla seminis carthami conusi*

*Polypondy quercini recentis an. 3 ij. 3 ij. 3.*  
*3 ij. pro basi, ita tamen, ut modò huius  
 illiusue quantitatem maiorem possis pre-  
 scribere, prout hunc, vel illum humo-  
 rem magis purgare consilium.*

*Quod si pituita veniat enacianda,  
 huic basi insuper hæc solent adscribi.*

*Turbith gummosi & elestii 3 fl. 3 vj.*

*Hermodactylorum 3 fl. 3 vj.*

*Agarici recenter trochiscati, in nodule li-  
 gati, vel ligatura positi 3 fl. 3 vj.*

*Rhabarbari (aliquando) elest. in nodu-  
 lo positi, vel seorsim infusi 3 fl. 3 vj.*

Licet turbith non sit addendum, vel  
 hermodactyli, nisi ubi validius agere  
 propositum, & à longinquis trahendus  
 humor: alias enim postrema duo suffice-  
 te poterunt.

Quod si melancholia educenda, ( de-  
 tracto ex basi dicta, si volueris, cartha-  
 mo, aut à reliquorum dosi ) addantur

*Epihymi Cretici 3 vj. 3 j.*

*Radicis veratri nigri, vel, ramentorum bel-  
 lebori nigri 3 ij. 3 fl. ( sed rarius, & tantum  
 in melancholiâ contumaci. )*

*Saxpius verò agaricum, & rhabar. me-*

16 *Method. Praescribendi*

Ianagogis permiscent, quod fortè eorum obstrunctiones pertinaces, à viscidis mucilaginosis humoribus foueantur.

Quod si etiam bilis leniter purganda, senna (ad fuligines adustas expurgandas) pro basi tantum prescriptæ, adscribes.

*Tamarindor.* 3 j. 8. 3 ij.

*Rhabarbarb. cleft. &c.* vt suprà 3 8. 3 vj.

*Corticis myrobalanorum citrinorum*, oleo amygdalarum dulcium confricatarū 3 fl.

Tamen myrobalanos præstabit tantum infundere, ne maiorem adstrictiōnem, præter scopum, Apozemati conciliens.

Quod si ducendæ aquæ, serosique humores exhaustiendi, basi dictæ adjunges.

*Rad. ireos nostratis*, in taleolas differtæ, 3 j.

*Corticis medianæ sambuci vel ebuli* 3 ij.  
3 iii.

*Fol. soldanelleæ M. j.*

*Hermodactylorum* 3 8.

*Rad. mechoac.* seorsim infusa 3 8.

*Efula*, (vbi agendum fortius) aceromæcerata 3 j.

Permiscentur & phlegmagoga suprà dicta.

Iis catharticis sua corridentia addenda, vt dictum suprà. Horum autem do-

fls à 3 ij. ad 3 ß.

Quod ad ordinem praescribendi , (& decoquendi ) cathartica in Apozematis formulâ collocantur passim post fructus , ante flores , aromata etiam seu correctiva statim post purgantia : *Polypodium* autem , quia initio semper decoquitur , ideo & initio prescribi inter radices potest.

**DISSOLVENDA.** Colato decocto , vel dissoluuntur tantum dulcorantia , sùprà in Apozemate alterante enumerata , dosi dicta ibidem , quando nempe decoctum Apozematis purgatis sat fuerit catharticum : sin contrà leuius extiterit , in decocto colato dissoluuntur insuper alia cathartica , in quibus considerantur qualitas , & quantitas .

Ratione qualitatis dissoluntur .

Vel syrapi purgantes , id que semper , si nullum dulcorans dissoluetis , vt , *rosarium solutum* in biliosis & serosis humoribus , vt & recepto more in omnibus : de *cichorea composita* in biliosis : de *fumaria* in iisdem & melancholicis .

Vel , succus *roscarum pallidarum* recenter expressus , aut infusio earundem completa , ( quod usitatissimum Veris tempore , in purgationibus illis prophylactis )

18      *Method. Præscribendi*

cis, biliosorum maximè, & eorum, qui  
ferosis humoribus scatent;) sed tūm præ-  
scribendum, addatur sacchari q. s.

Et hæc præscribuntur in colatura sta-  
tim dissoluenda.

*Vel etiam dissoluuntur Electuaria offi-*  
*cinarum, quæ vel opiatæ, vt passim in*  
*pituitosis, diaphænicum, quod & biliosis,*  
*idèò tertianis nothis utile, in biliosis,*  
*diaprunum simplex, &c solminum, elekt. de*  
*psyllio cùm extat, manu aliquando: in*  
*melanchollicis, confessio Hæmech, sed cau-*  
*tè; electuarium lenitum, seu diasenna solu-*  
*tina, vel tabellæ, vt in pituitosis, elekt. de*  
*carthamo, in biliosis, elekt. de succo rosarum,*  
*in biliosis & pituitosis, vt & in melanclo-*  
*licis elektuar. de citro solutiaum.*

Et hæc præscribuntur dissoluenda in  
ultima dosi tantum, usus tempore, idque  
demum, si Apozema non fatis fuerit pur-  
gans. His enim alias abstinendum.

Ratione vero quantitatis, dissoluuntur  
Syrupi ad 3 iiiij. 3 vj.

Succus, vel, infusio rosarum ad 3 iiiij.

Opiatæ, & tabellæ ad 3 ij. 3 iiiij. prout  
ipsæ, & decoctum valida fuerint.

VSVS & FORMVLA PRÆSCRI-  
PTIONIS. Eadem est, quæ Apozemaz

tis alterantis; hoc tantum differt, quod dicitur. R. &c. fiat Apozema clarificatum, ( vel, ubi volumus, agat validius, non clarificatum ) & aromatizatum, &c. pro quatuor dosibus matutinis, in quarum ultimâ dissolue *eleutherium* aliquod, ( quando adest eradicandi consilium, vel quando Apozema non satis expurgaverit) fiat potio.

Item differt, si ante usum Apozematis non minoratum fuerit exhibitum, dicitur in formula, pro quatuor dosibus matutinis, in quarum prima & ultima dissolue *eleutherij* talis, &c. fiat potio.

**V T I L I T A S.** Apozemata hodierna ut plurimum purgantia simul, & alterantia. Sic enim sensim humores preparantur, coquuntur, & quia unâ vice eradicari toti non poterant, educuntur hac ratione per partes, sensim, simul, per *stageas*, sine violentia. Remedium fælicissimum in morbis chronicis & diuturnis, quos humores pituitosi, aut melancholici copiosi fouent, rebelles, consumaces, altè inhærentes, unde affectuum pertinacium scaturigo, qui hâc arte eradicantur. In calidis morbis, ab humoribus feruidis, minus conueniunt, & si

aliquando vrgeat indicatio, præscriben-  
da ex leuioribus cholagogis, vt quando  
multa. Pauca materia namq; non indiget  
euacuatione partitâ, sed simplici altera-  
tione, quam dein vnâ vice facilè exturbe-  
t corpore. Censentur etiam utilissima in  
morborum declinatione, ad subducen-  
das corum reliquias, & in prophylaxi, ad  
eos præcauendos.

Cæterū ferè receptum est, ante vsum  
ciusmodi Apozematum, medicamen-  
tum minorans, seu minuens formâ po-  
tionis, boli, pilularum, præscribere,  
deinde humores hac ratione, sensim pur-  
gando, ad eradicationem apparare.

### ANNOTATIONES.

**I. CIRCA MATERIAM** hoc in pñ-  
mis obseruandum, quosdam varietatem illarum,  
& numerum diversarum partium dimidiate in  
decoctis confundis; sed quia illud hodie rece-  
ptum apud Prácticos elegantes, licet id ad for-  
mulae quendam pompa esse videatur, decoctis  
ciusmodi longa, ut vocant, seu apozemata ex  
rad. fol. sem. fruct. flor. simul præscribenda:  
hoc unum improbandum, ubi quatuor, quinque  
foliorum genera, indicationum varietati suffi-  
cere possunt, plura si concernes, & ut explicas  
**V. G. latitudinem dosecos seminum in Apoz-**

imue, octo vel duodecim diuersorum an. 3 j.  
prescribas, si duorum, trium an. 3 b. sufficiet :  
illud enim est decoctum in molem iberiacalem  
extruere, pharmacopœis tedium & molestiam  
in dispensatione parere, omissionis occasionem  
præbere, Medicum proinde ſpe, agrotantem  
medicamenti fructu, cum sanitatis dispensio,  
priuare.

2. Quod ad QUANTITATEM seu DO-  
SIN ingredientium alterius Apozema, dubiū  
admodum, nec quid certi statuunt, quod imi-  
teris cum fructu : lex praescripta statua est, vſu  
apud Monspelicenses, & utilitate apud agratos  
confirmata, ne cuiquam doſis maior videatur,  
aut ab ipſi abborre : vim enim medicatricem,  
efficacem, vegetamque parca & illiberalis ma-  
nus non dederit, affectionibus expugnandis ido-  
neam: ſi enim Apozema efficax volueris & fæ-  
cundum virute simplicium, quandoquidem  
effentia copiosa non habetur, niſi ē multa co-  
pia, maiore quantitate praescribas; quid namque  
virium à libra ſemis materie, pro quatuor do-  
ſibus Apozematis ſperes ? cùm præterea ſepiuſ  
pharmacopœi minus induſtrij virio, vel ince-  
riā, coſtitionis breuitate, aut præpoſterā eiusdem  
fæcundatione, ( vi vincula quibus coercita re-  
rum facultas ſolvi non potuerint, ) non elique-  
tur, eliciatur que ſufficienter, vel eadem virius

22 Method. Praescribend  
coctionis nimiclate, aut caloris & ignis virgen-  
tiâ, vasis etiam demum, quo vulgo decoctiones  
celebrari male solent, apertione exspiret,  
exhaleret, defectum illum, iacturam hanc, ra-  
tione hac, compensabis legitimè, decocta effi-  
cacissima, & simplicium virtutibus uberrimè  
prægnantia comparando, non aqua, & qua  
medicum, agrotumue frustrenatur suo voto. Ergò  
in genere dosi præfinitâ prescribantur, vix  
maiore, paulò minore, si simplicia arida &  
sicca, quia efficacissima, si qualitas acuta &  
naturâ, ac viribus excellentia, sapore amaro,  
aciore, si ingrata, si decoctum velis quantitate  
paucum, sin item debilius & contrâ.

Speciatim vero notandum circa radices,  
apud quasdam Practicos, que vocantur ape-  
rienes, cum prouocantibus sudorem, ut in  
variolis aliquando, permisceri, (sorte quò at-  
tenuantur humores, & felicius, facilius in  
saporem, sudoremq; resolvantur,) quod certè  
faciendum dosi minore, ad  $\frac{3}{2}$  ij. vel  $\frac{3}{2}$  iiij. ad  
sumnum: alias humores attenuatos ducent ad  
vias urinæ sudores minuentis, quo scopo Ara-  
bes, & badierni ipsas permiscunt lentiū deco-  
cto, ad variolas: quæ etiam valde amara tan-  
tum ad  $\frac{3}{2}$  vi.  $\frac{3}{2}$  j. vi gentiana, bryonia emu-  
la, & si sicca, ad  $\frac{3}{2}$  b.  $\frac{3}{2}$  vj. prescribuntur.

Sic & folia amara minore dosi, nisi decocto,

etum velis efficax admodum, quod exceptandum; unde & passim amarissima simul videoas in ob-  
structionibus frigidis coniuncta, centaurium  
minus, absynth. ad M. ij. iiij. liij. Fructus  
vero, vel ad alterandum tantum prescribun-  
tur, refrigerandum puta, pruna acida, po-  
ma, calefaciendum, passulæ, caricæ ad par.  
x. xij. ubi vero aliud mollienda, detergenda,  
purgandum, passulæ, ficus, pruna dulcia,  
daetyli ad paria xx. plus minus prescribatur:  
in affectibus vero pectoris & pulmonum, cali-  
dis & frigidis, passim largiore manu passulæ,  
iuiubæ, sebesten, pruna dulcia, &c. ad  
paria nim. 30. 40. 50. prescribuntur: tamen  
vide, ne decoctione crassius, & viscidius, ac co-  
latu difficultius inde evadat: unde ubi carice  
pinguis ingredientur, dosi semper minore, ad  
paria 4. 8. prescribuntur.

Aduerendum etiam obiter, licet semina  
pondere prescribantur; hordeum tamen, &  
cicera rubra, vi flores, P. j. M. B. semper  
prescribi, ut & epithymum etiam aliquan-  
do cum ipsis ad P. j. licet etiam alijs pondere  
imperetur ad 3 j.

Circa fructus, si minores, ut vix Cotin-  
thiacæ, aut si partes quasdam eorum detrahi-  
mus, aliquas tantum in usum vocantes, (ut  
cum daetyli à fibris mundati prescribantur),

*tunc non numero, vel paribus; sed pondere usi-  
tate prescribuntur, si integri, numero: tama-  
xindi solo pondere, pallulæ sive integræ, sine  
mundata, numero & pondere.*

*3. Quod ad QUANTITATEM CA-  
THARTICORVM in purgantie Apozemate,  
ut illius ratio incatur securè, notandum in gene-  
re, vim catharticam in decoctis, vulgari viâ  
non haberi copiosam, nisi maiore copiâ prescri-  
bantur, eualescere putâ, vel non elici sufficien-  
ter, ob rationes suprà recensitas; quibus &  
hanc adde, catartica in liquore Apozematis  
decoqni denum, simplicium alterantium sub-  
stantiâ tenuiore iam imprægnatâ spissiore, ac  
sæpius viscidâ: vim ideo minus ubere in elici-  
posse in liquorem: quod hic alterantium sub-  
stantiâ imbibitus, hanc respuer, & quia cras-  
sior factus, alte se, atque facile insinuare non  
possit in materiæ commissaæ partes, & essentiæ  
purgativicem in decoctum resoluere, hoc enim  
tenuitatis opus. Ergo dosi maiore prescriben-  
da, hanc ferè proportione, ut & eorum, quæ in  
substantiâ dosi semper minore exhibentur, ubi  
in infusione prescripseris, maiorem prescribas,  
duplam putâ ad eam, quâ in substantiâ, in de-  
coctis veð maximum, (ob rationes allatas, )  
& illam quidem duplam, ubi vebementia, (ut  
turbith, hermod. veratrum, &c.) triplam,*

vbi mediocria, ( ut agaric. &c. ) vbi leniora,  
 quadruplicata, ( ut senna, polypod. carth.  
 epith. tamarind. ) ex auctorum consensu,  
 reiq; veritate prescribas. Ex hoc fundamento,  
 quandoquidem Apozema quoduis in q. ferè do-  
 ses prescribitur, cathartica ea quantitate assu-  
 menda, quæ sufficiant in illas 4. b. e. 4. cornu  
 doses in decoctione, quâ solent, erunt assumen-  
 dæ, ut semper illa tria, senna, polypodium  
 cartham. ex recepto more, veluti probasti con-  
 stitutas. Vacuandum V. Cr. plegma 4. vicibus  
 continet, si sennæ 3 j. 3 j. fl. polypod. tan-  
 tundem, carthami etiamnum prescriferis ad-  
 dideris quartum insuper, agaricum putâ, ad  
 3 fl. 3 vj. babebis intentum. Quod si præter  
 agaricum, alia phlegmagogæ etiam exoptes,  
 turbith. V. G. hermodactylos, tunc ho-  
 rum, vel illorum dosis erit minuenda, aut  
 minor saltus validiorum prescribenda. Atque  
 hac ratio universalis erit ita ubique locorum,  
 sine discrimine, minorum tamen poteris pre-  
 scribere, sexus consideratione, aetatis, tem-  
 peris, &c. Montpelienenses multò maiorem, ex  
 recepto more, passim prescribunt, ut supra in  
 compositione vidimus, ita ut leniora in deco-  
 ctis, contra communem illum consensum, assu-  
 mante proportione passim sextuplâ, vel octu-  
 plâ; rebemantiora etiam ( turbith ) quadru-

26      *Method. Præscribendi*  
plā, licet autem id securè fiat Monspellijs, adhuc  
bitis interim circumscriptionibus necessariis, &  
tamen id ubiq̄ locorum non est persequendum,  
neq; ita dosis indiscriminatum præscribendū,  
stāndū potiūs à communī consensu suprà di-  
cto, vel singulorum doses explorandæ in sub-  
stantiā, ex quib; analogiā descriptā, singu-  
lorum doses in decoctis inuestigabis facilimē.  
Nota obiter, licet ex hac proportionis regulā,  
tamarindi coqui deberent ad 3 viii. propor-  
tione quadruplicā: quia in substāniā dantur ad  
3 ij. tamen vix in decocto transcedi dosis,  
quā dantur in substāniā, quia viscidi, deco-  
ctum lentum admodum reddunt, ac viscidum,  
colatu ac clarificatiū difficiliū: item, licet  
myrobal. vix purgent, nunquam dosi maiore  
esse præscribendas, sed minore, ad sumnum ad  
3 3. 3 vij. quia decoctum adstringēt, præ-  
ter consilium redderent, leniter erion idēc de-  
coquendā, in Apozemate verē catarrīco, in-  
fundendā potiūs, consilio etiam iſ ſuis Mesuae,  
& reſtē, contr. quod vulgè fieri ſolēt.

4. Ceterum, materia Apozematis viriū ſi  
non promiscuē, ORDINE quoq; in ſormula  
præscribenda, ſed certo, ſecondū naturā  
decoquendōrum, & ordinem, quem pharma-  
copæi, ex præscripto artis, in parandis decoctio-  
nibus obſeruant, vt I. radic. 2. folia, &c. re-

Equi deinceps seriatim, ut supra desinitum, decoquunt. Licet verò ita sit, tamen radix liquoritiae, quia in ordine florum, ob substantiam tenuitatem, decoquitur, hinc & in eorum serie saepius prescribitur, & si passim etiam in ordine radicum: ligna odorata, cortices aromatici, cinnamomum, quia ultimè decoqui debent, ob spiritum resolubilem facile, postremè etiam, inter vel ante flores, prescribenda.

Seminum series post folia, tamen quatuor semin. frig. maiora, melonum, & cucurbitæ maximè, etiam passim, & saepius ante flores prescribuntur: cicera verò rubra semper antè, vel inter flores prescribuntur: hordeum autem varius in seminum, passim & ferè semper, in ordine florum, cum tamen in primis decoquendum. Semina mucilaginosæ, ut altheæ, maluæ, &c. saepius ante flores rectè, ne diuturniore coctione decoctionem spissius, & turbidum efficiant.

Cathartica diximus ante flores prescribenda, tamen polypodium quercinum, quia ita decoquitur, idèo & virtutate inter radices prescribi poterit, epithyinum verò passim inter flores, & saepius etiam eorum pondere, (pugillo nempe,) prescribitur, corrigentia satione post purgantia locanda.

5. Circa LIQUOREM notandum, vinum in Apozematis sibi admitti, in affectibus frigidis, obstructionibus; ubi crassi humores attenuandi, vel, ubi vis medica ducenda aliis est, male verò fieri in eius, & aquae partibus aequalibus, cum id fiat sine fructu: si enim vel lenissimo calore, immò tempore, spiritum vini, seu aquam vitæ, (à quo tota illius cibaria, & acumen, & sine quo vinum aqua sine vita est,) confessim in eius distillatione, ascendere videamus, & eleuari in eius elixatione cum vase aperio, igne urgente, quid aliud speres, quidam eius exhalationem omnino modum? unde potius deum ad suens affundendum vinum.

6. Notandum, radices quidem aperientes perfundit acetum in cerari, optimo quidem consilio, male verò, qui deinceps acerum, vel vinum, quo infuse fuerint, effundunt, radices solite iam efficas sine virtute coquunt: commenauit natuq; in ipsum virtus, quans bac ratione profundis, quandoquidem acidi quinvis liquores, rerum vim & essentiam omnium potentissime elicunt, ut videre est in extractis. Liquor ergo non est effundendus: infernit enim pro dissoluendis.

6. Notandum, T E R M I N U M D E C O C T I O N I S ambiguè definiri. In genere simpli- ci: bac lege videntur decoquenda, ut vim om- nia ponant in liquorem: quod in specie alijs mu-

extreme coloris, & faciei alteratione definiuntur,  
ut dura mollescant, alias contabescant. Galenus  
ad tertias, alias ad medias, mesuens ferè ad  
medias, recentiores vary. Ut elucescat veri-  
tas, medicamentorum facultas & natura consi-  
deranda: quorum enim virtus facile resolvitur,  
breuore tempore coquenda, & ad tertiae ferè,  
vel etiam quartæ consumptionem: ne sim-  
pliciter vis tenuis evanescait. Quorum virtus  
difficulter exhalat, ad tertias; qua medio mo-  
do, ad medias: & quod responderet, qua aquæ  
quadruplicem obtinenter ad tertiae consumptionem;  
qua octuplum, decuplum, ad tertias; qua sex-  
uplum, ad medias, ut ferè Apozemata, &  
alia decocta. Vnde & hoc obiter notandum,  
simplicia substantia solida, dense, dura, vi ra-  
dices, ligna inodora, coriace, decoqui velle  
liquoris octuplo: qua rara, tenuis, mollis, sub-  
tilis, ut flores, aromata, cathartica, quadruplo:  
media inter bas substantia, ut folia, semina,  
fructus, sexuplo.

7. De CLARIFICATIONE. Nota, si  
decoctum velimus fortius, non esse clarificandum.  
Dilete enim eos facere, qui denudcoquunt, &  
cum albumine ovi clarificant: quia vis ipsius  
& essentia perit. Hoc igitur statuendum vide-  
tur, ipsum in Balneo Mariae ponendum, vel in  
olla bene clarifa & obrurata, super cineres.ca-

lidas : sic vi: ipsius conservatur, facies ac resi-  
dentiae, quæ aliæ chissimè ipsum ad præredicione  
dileximus, subfidiunt, ac in fundo colliguntur:  
liquor autem tenuis in superiore parte clarus, ac  
si clarificatus esset, conservatur.

8. Circa FORMVLAM PRÆSCRI-  
PTIONIS hæc lenissima erit notanda.  
Concepta nempe verba, in præscribendis formu-  
lis, & ingredientibus, esse accuratè obseruandæ  
ab artifice, ne irridetur, aut videatur mi-  
nus peritus: hæc autem sequentia sic solent vifi-  
tatem præscribi.

R. Radic. commun. vel aperitiu. vel diure-  
tic. per noctem in vino albo, (pro obstruictioni-  
bus frigidis, & quibus acerum nocet,) vel acetio  
maceratarum.

*Liquiritia recentis rafæ, & parùm confusa.*  
*Corticis radic. capparum.*

*Corticis mediani fraxini.*

*Corticis mediani tamariſci, qui tres cortices,*  
*ſimil ſemper in obſtruictiōibus, & affectibus*  
*melancholicis, præſcribuntur apud Monſpe-  
lienes.*

*Folior. borrag. bugloss. demis leonis, acetos. ci-  
chor. endiu. cum radicibus, vel cum toto.*

*Suumitar. fumar. lupul. malu. hyſſop. ab-  
ſinth. Pontici, vel comarum eiusdem.*

*Herdei integri, ubi magis detergendum &*

aperiendum; bordei mundi, ubi leniendum, &  
in affectibus pectoris.

Seminiis melon. & cucurb. mundat. vel me-  
dulla suavis. melon. & cucurbita.

Cicerum rubrorum.

Baccarum Iuniperi.

Pomorum curtipend. mundat. & incisor.  
n. 2. 3. &c.

Passularum mundatar. purgator. enucleator.  
ab acinis mundatarum.

Dactylor. à fibris mundatorum.

Caricarum pinguium.

Primorum dulcium.

Nucleorum pini lotorum.

Fiat decoctio in aquâ bordei perfectè colti.

## C A P. II.

### D E I V L E P O.

**M**EDICAMENTVM dicatum  
alterationi, veteribus Gracis ignotum,  
Arabum inuentum est, ex eo, quod è delicatis  
& suavibus ferè siebat, aut saccharo saltem,  
nomen adeptum, voce Inleb, vel Inleb apud  
Persas potionem dulcem significante. Juniore  
Graci, Arabum imitatione, Zuhâmîr, alij  
yezû Lohâmîr, nuncupantur: quæ nomina

32      *Method. Praescribendi*  
apud Medicos bodiè admic vñitata, et si res ipsa  
item obsoleta.

Duplex autem reperitur apud autores,  
alius veterum appellandus, aliis verò recen-  
tiorum.

Iulepus veterum, à nosiro totâ facie dicer-  
sus, syrups est, sed simplex, ex succô, aquâ  
destillatâ, infusione bordei, decocto unius rei  
tantum propriè, & saccharo constans, viendi  
tempore eliam plerumq; conficiendus, qualis olim  
vñitatisissimus Iuleptosatus, alijs dictu: Ale-  
xandrinus, & Regius, ad finim, & astum  
elegantiissimus.

Iulepus: verò recentiorum, qui bodiè passim  
prescribitur, veterum quidem nomen reriuiri,  
non formam, & vocatur passim Iulepus, vel  
Iulep, licet qui nuperissimis annis scripsierunt  
syrupum, & sirapum nuncuparint: quemad-  
modum & bodiè adhuc sapiùs Itali: quod for-  
tè Iuleporum basi syrupus. Nomenbelij Iulepum  
nam appellant.

Est autem *IVLEPV S*, medicamentum flui-  
dum instar aquæ, ex liquore idoneo, & syrupo  
(vel saccharo aliquando) simul ex tempore,  
sive coctione, permixtum, in tres aut quatuor  
doses, ad humores coquendos, vel alterandum  
quouis modo, aut roborandum, comparatum.

Hinc duplex statu potest hoc medicamentum

alterans; vel emin humores preparat ad regidam, seu coquit, veterum grecorum & romani purgationum universalium, patio veluti præcursoria, qui coquens idèò rectè appellatur, vel extra ullum purgandi scopum aut consilium alterat humores, spiritus, corporis partes alijs, quod perirent, roborans, cardiacus.

In eo tria consideranda. *Compositio.*  
*Vitæ. Utilitas.*

In COMPOSITIONE duo perpendenda. 1. *Liquor idoneus*; ex quo. 2. *Dissoluenda in ipso.*

In LIQUORE duo attenduntur; *qualitas, & quantitas.*

Ratione qualitatis, vel prescribitur sola aqua stillatica, affectum, & affectam partem respiciens; quod usu frequentissimum pro lulepo humores præparante, hyemis tempore maximè herbarum defectu: tunc etiam alterante alio quovis modo, atque roborante.

Vel aqua destillata, & succus simul, quod passim usitatissimum pro lulepo cardiaco, & roborante.

Vel decoctum potionum simplicium, dosi ferè mediâ Apozematis, & eadem ratione prescribendum: quod in humorum coctione, aut alteratione, sapientius

34 *Method. Præscribendi*  
*faciendum.*

Ratione verò *Quantitatis*, pro quilibet dosi liquoris, præscribendæ  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  jj. ac proinde cùm Iulepus in ttes doses pa-

sim, aut etiam quatuor imperetur, quan-

titas totius liquoris pro Iulepo erit,  $\frac{3}{4}$  viij.  
 $\frac{3}{4}$  xij. si pro trib. dosibus: xij. xvj pro qua-

tuor: habito interim ad ætatem & corpo-

ris magnitudinē respectu: magnis enim

corporibus  $\frac{3}{4}$  jj. vix sufficient, nisi liquor

virtute, aut sapore efficax extiterit.

Aduertendum, quod, ubi aquæ destil-

latæ, & succus simul præscribuntur, co-

rūm modò ana partes æquales imperari,

modò ut hic, (succus,) aut illa, (aqua)

alterum vnciis duabus, tribus, quatuor-

ue superet. Obiter tamen notandum,

ubi succi acidiores ingredientur, sat esse,

si pro Iulepo trium dosum,  $\frac{3}{4}$  j. vel  $\frac{3}{4}$  jj.

corum præscripseris.

**DISSOLVENDA** in liquore iam di-

cto, considerantur ratione tūm *qualita-*

*tis*, tūm *quantitatis*.

Ratione *qualitatis*, vel saccharum so-

lum, quod ratus, vel, quod vsu ferè tan-

tūm receptum, syrups idoneus, partem

affectionem, & affectionem respiciens.

Præter horum dulcorantium aliquod,

pérpetuò in omni Iulepo dissoluendum,  
etiam aliquando dissoluuntur.

1. In Iulepo quidem humores præpa-  
rante, si ipsum ex deocto præscripseris  
instar Apozematum, eadem quæ in Apo-  
zemate alterante dissoluenda, suprà di-  
ximus: quandoquidem ciu smodi Iulep  
veluti minus Apozema est.

2. In cardiaco verò Iulepo, & robo-  
rante, vel confectio cardia ca dissoluend  
a præscribitur, caque sola, vt confectio  
*Alkermes*, & *de byacinto*, maximè vbi ro-  
borandum alui diluuiio præsente, in va-  
riolis, etiam, vermibus, poterit & *ibetiacas*  
in statu contagioso.

*Vel puluis cardiacus solus*, iſq; aut sim-  
plex, & hic tursum vel aromaticus, vt  
*santalorum*, vel non aromaticus, vt  
passim in variolis *rashia cornucerkii*, *eboris*,  
*corallorum*, *perlarum*, *unicornis*, *lapidis lezoar-  
dici*, vt & in malignis humoribus, in lum-  
bricis etiamnum, vt & *corallina* in iisdem,  
&c. aut compositus, electuarij alicuius  
officinalis, vt *diamargariti frigidi*, &c.  
prout ferunt indicationes.

*Vel confectio*, & puluis simul, sed qua-  
ratione hac Iulepus cardiacus ex iisdem  
ex quibus potio corroborans, conficitur;

illius loco sibi sibi soleret præscribi ciusmodi potus in unam dosim, & pro usus necessitate reiterari: utrumuis tamen feceris, non peccabis.

Præscribitur etiam cum hodiè frequenter dissoluendus vitrioli spiritus, in magno præsertim humorum, & partium incendio restinguendo, contagionis etiam aut putredinis labore arcenda, contemperandæ. Poterit & utiliter permisceri, ubi humores crassi erunt attenuandi, siue calidi, siue frigidi, aut apertuendæ obstruktiones.

Ratione vero quantitatibus, pro una quidem dosi usitatè præscribuntur.

Dulcorantia ab  $\frac{3}{4}$  j. ad  $\frac{3}{4}$  lb. ad summum. Succi depurati, vel liquores, in Iulepo ex decocto conflato, siquidem validiores, ut sunt acidi, ad  $\frac{3}{4}$  lb. sin contraria, ad  $\frac{3}{4}$  j.

Confectiones à 3 j. ad ij. ad summum,

Pulueres à 3 j. ad ij. ad summum, si tamen ratiiores, parciore dosi, ut *Lapis bengalensis*. ad gr. iiiij. vj. *Vnicornis* ad 3 lb. *perlæ* à 3 lb. ad 3 j. pro ditiotibus.

Ex iis erit facile, quantitatem dissolendorum pro Iulepo 3. aut 4. dosum tolligere: & quia confectiones, ac pul-

ūtrēs cardiaci vnum aestimantur, si vna præscribantur, non erit arduum, corum dosin simul junctorum limitare.

*Spiritus verò vitrioli, si vocetur in usum, dolis hac ratione præscribetur legitimè, ipsius nempe q. s. ad gratam aciditatem conciliandam, (quæ sc. linguam non feriat acrius, aut stuporem dentibus conciliet,) imperando.*

V S V S & FORMVLA PRÆSCRIBENDI. R. &c. (id est, liquorem, & dissoluenda idonea,) fiat Iulepus pro 3. aut 4. dosibus matutinis: (potest & circa vesperam assumi, & pro unica dosi aliquando præscribi, in cardiacono maximè.)

2. Quod si Iulepus ex decocto extiterit, ratio præscribendi eadem, quæ Apozematis.

3. Si præter liquorem & syrupsos idoneos, (ex quibus solis simpliciis, & visitatiis alterans Iulepus, & præparans cōponitur,) puluerem roborantem simplicem, vel compositum admiscete consilium fuerit, gratiâ aromatizationis præscribetur. Fiat Iulep, qui talis pulueris 3 j. 3 j. β. aromatizetur pro 3. 4. dosibus.

4. Infantorum Iulepi præscribuntur ex cochleari, bis, ter in die assumendi.

## 38 Method. Prescribens

VITILITAS. Iulepi fructus vberrimus,  
& celebris hodiè usus est. 1. Vbi præpara-  
ratio ad ~~receptam~~ prævia desideratur, hac  
enim formâ dupli humorum conco-  
ctio ferè perficitur, Iulepo, vel Apoze-  
mate: & vt hoc vere potissimum, ac au-  
tumno in istum finem præscribitur, ita  
Iulepus concoquens hyemis tempore,  
maxime simplicium aut virentium her-  
barum defectu, aut siccum, vel mino-  
re colligendi opportunitate, loco Apo-  
zematis in eundem scopum usurpatu-  
vel etiam, vbi per temporis angustias  
aut vrgentiam affectus, Apozema, aut  
aliud alterans maioris operis, non licet  
apparare, tunc ad extemporaneam Iu-  
lepi ex aquarum destillatarum, & syru-  
porum miscelam, & confectionem con-  
fugitur, pauperum inopia simul consu-  
lendo: ita vt Iulepus concoquens Apo-  
zematis alterantis fit veluti succedaneū.  
Licet verò hac ratione morbis citò oc-  
curratur, tutò, jucundè, non tamen id  
fit cùdem efficaciâ, vires enim Apoze-  
mati longè vegetiores.

2. Vbi quouis alio, quam purgationis  
consecutrix consilio, animus est altera-  
re tūm corpus, tūm humores, tūm spiri-

tus; sed extinguere præsertim ferorem ipsorum quemuis; vel febres, & affectus calidos quosuis, aut eorundem malignitatem refrænare.

Sic passim ad calidas intemperies maximè, quibus priuato iure ferè consecratur, vt ad capitis ardore depulsandos, æstum cordis, febres continuas, ardentes alias quasuis, feroce immodico molestas, epatis, tenui, viscerum incendium, ad sitim leniendam, &c.

Ita etiam humorum ardor extinguitur & si quæ malignitas conjuncta, commodissimè frangitur, liquore cardiaco refrigerante. Ita usitatè ad cor corroborandum, & arcendam quamvis labem malitiæ, vites exhaustas instaurandas, & spiritus ac robur firmum & constans, per morborum impetum & sauitiam, ipsis, vñâ cum affectuum alteratione, concilianda.

Sic & ad motum humorum coercendum, vt per hemorrhagias ex idoneis, & sanguinem vndiquaque erumpentem, vt pleuritidis initio: ad spirituum agitationem præpostaram, vt per vigilias exacerbantes.

In summa, hæc forma liquida utilis

## 40 *Method. Praescribendi*

est, vbi præparandi humores ad purgandum, cor corroborandum, vires instaurandæ confessim, vel alterandum quo-cunque consilio; sed citò & promptè, ac vbi partes afflictæ, humores, affectus, altius in corpore delitescunt, ad quæ alterans medicamen alià formâ mindùs ei-  
tò, aut facile commeat.

## C A P. III.

### DE POTIONE

**P**O T I O medicamenti forma est liquida,  
ex rebus facientibus ad scopum, laxati-  
vis, cardiacis, aut alijs, dissolutis in liquore  
idoneo, conflatis, sed in unicam dosin præscri-  
benda, sumenda quia formâ potus, (hinc nomen,) ad purgandum, vel roborandum, aut alteran-  
dum quouis alio modo comparata.

Vnde potis hodiè triplex existit: purgans;  
& cardiotica, seu roborans: & alterans alio  
modo.

#### Potio purgans.

Potio cathartica, generis nomine potio sa-  
piùs simpliciter dicitur, ut cuius appellatio ab-  
solutè pro purgante usu recepta ferè habeatur.

Quidam nuperimè dosin nuncupabant, quod non nisi unica vice, nec pluribus continuo, nisi interiesto aliquot dierum, & temporis intervallo, priuato iure effe profinanda.

Est autem forma remedij liquidæ, ex medicamento laxante decocto, vel infuso, aut cum aliquoqure dissoluto, & syrupo passim constata, unica vice exhibenda, certum humorant vel plures, vi catarratica, electiæ per diuum ducens.

Hinc potionis catarraticæ differentiæ consti-  
tuunt pro humorum purgandorum vario  
discrimine, ut alia cholagoga, phlegmagoza,  
melanagoza, bidragoga, vel ex his mixta exi-  
bas.

Quicquid sit, in eâ tria consideranda?  
Compositio. Vsus. Utilitas.

In COMPOSITIONE duo maximæ  
perpendenda. Liquor idoneus ex quo, &  
dissoluendus in eo:

L I Q U O R dissoluendis potionis ca-  
tharticæ medicamentis idoneus, ratione  
tum qualitatis, tum quantitatis conside-  
ratur.

Ratione qualitatis, prescribitur in ge-  
nere.

1. Vel decoctum aliquod.

2. Vel infuso, seu infusioni.

## 42 Method. Prescribendi

3. Vel *virmq; decoctum & infusum*  
simul.

4. *Velliquor alius, ad scopum Medici*  
*& intentionem faciens.*

*In specie verò. I. DECOCTVM, quod*  
*pro potionē purgante conflāda vītate*  
*præscribitur, triplex est, purgans, & al-*  
*terans, vel vīrumq; simul.*

*Decoctum purgans, vītate componitur*  
*præscriptā solā sennā, pro liquore potio-*  
*nis melanagogz, & phlegmagogz, ad 3*  
*lb. 3 vj. 3 j. (prout purgare consilium, aut*  
*alterius cathartici officinalis, electuarij*  
*putā, vel syrapi purgantis plus minūs, in*  
*liquore jam colato dissoluere propositū,)*  
*additis correctiuis propriis, vt aniso, ga-*  
*ryophylo ad 3 j. vel etiam insuper flori-*  
*bus cordialibus, borrag. bugloss. vel violar.*  
*ad P. j. & huiusmodi decoctum, Mon-*  
*spelij vītate etiam decoctum purgans*  
*simpliciter appellant, audiuntq; de ipso*  
*absolutè, quando catharticum aliquod,*  
*Diatribatum V. G. cum decocto purgan-*  
*te præscribunt exhibendum.*

*Posset conflari etiamnum huiusmodi*  
*decoctum, præscriptis aliis catharticis,*  
*quantitate, quā sufficerent in unam do-*  
*sim, pro specie humorum diuersis, addi-*

tis propriis correctiuis, vt carbamo, turpebo, bermodactylis, pro phlegmagogâ potionē: polypedio, epibymo, sennâ, pro melanagogâ, sed illud minūs usitatum: cum præterea liuorem senna catharticû possit suppeditare, qui ipsorum naturâ, & indicationibus variis respondeat. Cæterum necessariò aliquando, & utiliter prescribunt huiusmodi decocta purgantia, quando electuarii officinali purgante caremus proprio, seu, quod humoris purgando soli appropietur, quod in positione phlegmagoga, & melanagogâ pafsim accidit, cùm enim nullum sit electuarium merè phlegmagogum, si tale tamen exoptet, & exigat indicatio, decoctum prescribas ex sennâ vt basi, addito carbamo, & si agendum valentiūs, aut trahendum à remotis, turpebo, bermodactylis; quarâ parte doseos Apozematis purgantis, additis correctiuis. Sic quia nullum in officinis efficax melanagogum: ( dia-senna enim debilis) vel tutum, confectio namq; Hanc etiam maior periculosa dosi, effectu purgandi anceps admodum, id est ratiūs usitata; minor verò ad melancholiā ita decantata; bili potius competit: nam obiter neque scindanu admittit præ-

#### 44 Method. Praescribendi

cipuum melanagogum, & tota compo-  
sitio melanagogar eorumque benignior-  
um, partes decem habet tantum in odd,  
cholagogar vero, h.e. *scammoniae* partes,  
seu doses summas 48. ita ut cholagogas  
partibus tribus superent melanagogas,  
tunc ob has causas, vbi purganda melan-  
cholia sola, recte prescribemus decoctum  
*ex semina, epilibymo, polypodio, fumaria, &c.*  
Hoc de decocto purgante.

*Decoctum alterans*, vsu hodiè passim re-  
ceptum, duplex recte statui potest; offici-  
nale, seu *vsuale*, quod vbiique apud phar-  
macopæos sine Medici præscriptione  
prostat, sit, paraturque. Aliud quod in  
tem præsentem. recenter prescribitur,  
quod *magistrale*, si vis, appelles.

*Officinale triplex* est; *Decoctum commune*  
*medicinae*, *Decoctum florum*, & *fructum cor-  
dialium*, *Decoctum pectorale*.

1. *Decoctum*, seu *decoctio communis me-  
dicinae* (quod ea communiter ad medici-  
nas, seu potionis purgantes confieien-  
das usurpetur, omni parti & humoris co-  
ueniens, sic dicta) obiter componitur ex  
bordei P. j. prunor. dulc. yar iij. vj. passulay.  
liquir. rafse, patum contusæ ana ȝ. anis.  
fænicul. (hyemis tempore) quatinor sem.

frig. maior. (æstatis) ana 3 ij. trium flor. cord.  
ana P. j. fiat decoctio.

Cæterūm , sic particulatim non solet  
vitatè præscribi à Medico : quia passim  
prostat , sed simpliciter in formulâ con-  
notari solet , quod etiam audiendum est  
de decocto florum , & fructuum , & in  
decoctione pectorali.

Huius autem decocti usus triplex est:  
inseruit enim vel dissoluendis purganti-  
tibus simplicibus , sed maximè composi-  
tis , eleuentiis , syrups , pro potionibus ,  
quod receptissimum , vel infundendis  
simplicibus catharticis , vel decoquendis  
denique in eundem scopum .

2. *Decoctum florum , & fructuum cordia-  
liam* , fit ex liquiritiæ rafæ , &c. tamarind.  
ana 3 ij. passul. mundat. 3 ℥. in iub. sebeſt. pru-  
ner. dalcium ana par. iiiij. flor. borrag. bugloss.  
ana P. j. &c. F. decoctio.

In Italiâ , apud quos in usu frequentiſ-  
simum , hoc ipsum passim reddere solent  
catharticum , additâ sennâ ad 3 ℥. 3 vj.  
& usurpare ad potiones purgantes dis-  
soluentis alijs medicamenti , bilioſis ,  
pectori , renibus maximè dicatum .

3. *Decoctum* , seu *Decoctio pectoralis Me-  
fuxi* , affectibüs pectoris priuatim man-

## 56 Method. Præscribendi

cipata, constat ex hordei integri P. j. liquirit. passular. ana ȝ. capill. Veneris M. j. hyssopi siccii M. ȝ. caricar. ping. iuiubar. sebestena paria iiij. vel numero vj. Fiat decoctione. Huius usus præcipuus in affectibus pectoris frigidis, dissoluendis puta medicamentis, quæ pituitam expurgant, vel iisdem infundendis, decoquendisque.

Aliquando purgans ipsum efficitur, additâ sennâ, ut iam dictum, in decoctione cordiali.

*Magistrale*, seu *decoctum alterans*, quod in rem præsentem à Medico recente præscribitur, neq; prostat apud Pharmacopœos, componitur ex variis partibus stirpium, præscribendis hac dosi, ut quartam partem Apozematis alteratis adimplent: (ut enim hoc in quatuor doses, ita potio in unam tantum instituitur;) licet ob molestiam dispensationis, saepius possis non omnes plantarum partes, dietas in Apozemate, simul congerere, sed aliquas tantum pro lubitu, & priuatum folior. duorum, trium ana P. j. aliquando præscribere.

Cæterum decocti huiusmodi præscriptio recens frugifera admodum, & necessaria, quoties licebit præscribere, quò

medicamentum purgans dissoluēndum, cūm ad partes sāpiūs indifferenter se habeat, ipsis approprietur, aut, si humor vacuādo non sit omnīnd consentaneum, hac ratione ipsi respondeat: vnde scili debent ad eiusmodi decocta, simplicia, quæ proprietate partes laborantes affectent, vt ad ipsas Catharticum manu veluti ducatur, dirigaturque, aut humorem purgandum priuatā indole respiciant: hinc enim demum medicamenti purgantis propinati fructus yberrimus efflorescit.

Huius autem usus maximē est, catharticis idoneis decoquendis, vel infundendis, aut etiam dissoluendis aliquando.

Nonnunquam pro decocto alterante, in eundem funem, usurpatur juscum pulli, alterati foliis endimiae, acetos. capill. vener. borrag. &c. huius usus maximē est in calidis affectionibus, & xstatis tempore præcipue, catharticis dissoluendis.

*Decoctum alterans & purgans frequentissimā impetratur, ob rationes iam dictas, idque bifariam.*

1. Vel præscriptā solā sennā, decoctāque cum decocto communi officinæ supradicto, aut decocto magistrali, pro potio-

48 *Method. Praescribendi*  
ne melancholiam aut pituitam educen-  
di, quod vsitatisimum hodiè est.

2. *Vel* etiam aliis aliquando catharti-  
cis, decoctis cum iisdem, ut iam dictum  
est, in decocto purgante: quod etiam re-  
ceptum.

Huius autem usus idem est, qui supe-  
riorum, ad infundenda nempe, deco-  
quenda, dissoluenda cathartica.

II. *INFUSIO.* Quod ad infusionem,  
per eam hoc loco audio catharticorum  
macerationem, factam in liquore ido-  
neo, quod vis ipsorum à terrena mole so-  
lutâ, tintutarum more trajiciatur in li-  
quorem, qui istâ vi imprægnatus, infu-  
sum, ac etiam dilutum appellatur.

In illa duo considerantur, 1. *Infunden-  
da cathartica*, 2. *Liquor*, in quo maceran-  
tur.

*In utrisque qualitas, & quantitas.*

*Infundenda*, ratione qualitatis, possunt  
esse omnia cathartica, ut *senna*, *agavie*. &c.  
( *mammam* excipe, *aloëm*, *colocynthia*, ob-  
amatotem: ) *cissiam* enim Pariliis iam  
etiam quidam infundunt.

Ratione vero quantitatis, si ipsorum  
infusio sola debeat purgare, absque alio  
cathartico simplici, vel composito, in  
colatura,

colatura , aut expressione dissoluendo,  
dosi majore præscribenda , quæm si den-  
tur in substantia proportione scilicet du-  
plâ, si validiora, aut triplâ si leuiora, ad-  
ditis correctiuis propriis , proportione  
subquadruplâ in validioribus , in leuio-  
ribus subsextuplâ.

*Liquor* , ratione qualitatis , vel simplex  
est , vt aqua communis , quæ segniter rerum  
facultatem elicit , aqua destillata quædam ,  
in affectibus calidis maximè , serum lactis ,  
in melancholicis , iuscum carnis , aqua  
vina , quæ eximiâ facultate attrahendi re-  
rum vim , seu dissoluendi spiritus , & sub-  
stantiam rerum energeticam , ac in se in-  
fundendi , omnes alios liquores superat :  
idèò ut iliter usurpanda in affectibus fri-  
gidis , & infusionibus ad pituitam , & me-  
lancholiæ naturalem , potionem ipsius  
admixtâ ad ȝ j. V. G. vinum album huic  
proximè succedit , vim rerum , quas in-  
fuderis totam cibens , affectibus frigidis  
idoneum ; in eius & aquæ partibus aqua-  
libus infusione factâ , vel alias humor  
idoneus .

*Vel* compositus , decoctum aliquod ex  
superioribus tempè .

Ratione vero quantitatis , hæc non de-

50 *Method. Præscribendi*

finitur, relinquitur arbitrio pharmaco-  
pœi, præscribitur à Medico q. s. vel in  
ſufficiente quantitate.

Licet autem in genere ſic ſe habeat ca-  
tharticorum infuſio, & omnium, vti di-  
ctum, legitime fieri poſſit, in purgatio-  
nis uſum, & maiore cum emolumen-  
to, quām cūm decoquuntur, vt dictum in  
Apozemate, tamen in ſpecie hodiē ferē  
inualuit, duo tantūm infusionis genera-  
uſuppare, pro liquore potionis catharti-  
cæ, quæ uſitatissima, & paſſim præſcri-  
bi ſolita.

1. Infuſum ( nempe ) vel *Rhabarbarb.* ſo-  
lius ad 3 j. 3 j. 6. addito, pro correſtione  
*cinnamomo*, vel *ſpicā* in frigidis ad gr. vj. 3  
6. vel in calidis ſuſtalo curino, ad 3 6. pro  
liquore potionis cholagogæ; vt receptiſ-  
ſimum, aut etiam phlegmagoga.

2. Vel infuſum *rhabarbari* ad 3 j. 3 j. 6.  
addito. *agarico* recenter trochiſcato, ad  
3 ij. cum corridentibus, pro potione  
phlegmagoga, aut ubi pituita bili ad-  
mixta.

Fit autem infuſio paſſim in *aquis endi-*  
*uisæ*, *cichorij*, vt in bilioſis, *aqua plantag-*  
*obi* fluxus alui. potest & in decocto alte-  
xante, aut etiam purgante, vel aliquo ſu-

priorum, vel alio idoneo liquore.

III. *DECOCTIO & INFUSIO simili*, pa-  
sim etiam usitatissima, dum prescribitur,  
in alicuius decocti superioris purgantis,  
& alterantis q.s. infundatur aliquod ca-  
tharticum, cum suis correctiuis, in quem  
usum ferè tantum, ex recepto more, ad-  
mittuntur *Agaricus*, *Rhabarbarum*. sic usu  
receptissimum, & hodiè frequentissimum,  
decoctum *sennae*, & infusionem *rhabarba-*  
*ri* solius, aut *agarici* simul prescribere,  
prout ferant indicationes, pro potionē  
phlegmagoga, melanagoga, aut bilem  
adustam vacuante.

IV. *LIQUOR* etiam *alii* quilibet, qui  
satisfaciat intento Medici, aliquando  
assumitur, pro potionē purgatoria, dis-  
soluendisq; catharticis, dum prescripto  
horum aliquo, *dissolvamus* V. G. ad 3 ℥.  
3 vj. imperatur, cum aqua tali, iuseculo,  
&c. dissoluatur, & fiat potio, hoc au-  
tem usitatum maximè est, ubi aliquan-  
do, ( ut in casu præcipiti per urgentiam  
affectionis, per temporis breuitatem, vel  
otium, aut alia incommoda, ) non licet  
decocta, vel infusa apparare.

Seligitur autem ratione qualitatis, aqua  
destillata quadam, affectionem partem, & ha-

motem euacuandum respiciens : *infusum*, ( sic passim *manna* cum juscule p<sup>t</sup>x scribitur sumenda, simplici carnium, vel pulli alterato cum foliis refrigerantibus, pro biliosis : sic ad pituitam tabellam ele<sup>ct</sup>uar. diacarthami praescribunt sapidum cum eodem : ) *vinum* aliquando *albuni*, cum quo passim mechoaca, & radix *lalap*, ( quæ nuper venit in usum ad eadem, ad quæ mechoaca, ) praescribuntur assumenta, in substantiâ ad 3 j. 3 j. 8. post quam etiam leuiter infuderint, pro pituitosis, & humoribus serolis serum *lactis*, *hydromel*, &c. sed res praescripto triplici superiori modo usitatiūs peragitur.

Ratione vero quantitatis, dosis liquoris, pro soluendis aliis medicamentis idoneis, varia existit, pro ratione etatutum maximè. Pueris enim 3 ij. sufficiunt, adultis 3 iiij. grandibus. iiij. v. ad summum, quod cum majorem quantitatem catharticorum postulent, ut purgentur, nisi ipsa copiosiore humore diluas, portiones nimis inspissentur, & fiant ingratiores.

DISSOLVENDA in liquorem praescripto, considerantur ratione qualitatis & quantitatis.

Ratione qualitatis, dissoluuntur.

1. *Vel* purgantia : quando scilicet licet quorū potionis , vel nihil , vel non satis catharticus extiterit , quod cùm passim accidat , ferè semper cathartica dissoluuntur.

2. *Vel* alterantia, dulcorantia sc. sapotris dulcioris, & gravioris causā, perpetuā dissoluenda.

PURGANTIA dissoluenda sunt *vel* simplicia, *vel* composita.

Simplicia sunt *vel* mollia , *manna*, *casfa* , quæ vñstatissima in biliosis leuiter purgandis, & leniendis affectibus pectoris, & renūm.

*Vel* dura aut sicca , formā pulueris sc: ut passim pulvis rhabar. in hæmoptoë, dyfenteriâ , & quoquis alui diluvio , &c. mechoac. pro pituitosis , & serosis humoribus vñstatissimè , radicis jalap , quæ iam recenter in vñsum venit in locum mechoacæ.

Composita sunt *vel* officinalia, *vel* magistralia.

Officinalia sunt *vel* syrupi, Rosar. solutio. de cicchoreo compositus cum rheo , de fumari. compos. de pomis Regis Sabor , si existet, *vel* rosar. colatum.

*Vel electuaria, quæ vel mollia, opiatæ  
sc. vel solidæ, tabellæ alias. Opiatæ con-  
veniunt vel humoribus omnibus, carboli-  
cum : pituitæ, diaphænic. Indum minus,  
benedicta laxatia. bicra picra, sed ingratior  
bili, diaprum. simplex, diacassia, triphænic per-  
fica, diaprum. solutin. eleæt. rosæ. Mesuæt. eleæt.  
de psyllio ; pituitæ & bili simul, diaphæni-  
cum, Indum minus : melancholiæ, carboli-  
cum optimum, diaesenna solutina, confectio  
hamœch minor, serosis humoribus, benedicta  
laxatina. Eleæt. solida respiciunt vel bi-  
lem, eleæt. de succo rosæ. pituitam, diaca-  
rbam. eleæt. de ciuro solutinum : bilem & pi-  
tuitam, eleæt. de ciuro solutinum, diacarbaz-  
num.*

*Vel puluis aliquis in officinis extans, &  
diaturbub in Germania pro pituitosis, &  
serosis.*

Magistralia, à Medico præscribi soli-  
ta, in usum præsentem, sunt infusæ Rhæ-  
barb. semper, pro biliosis maximè, dum  
visitatè & frequentissimè præscribitur, dis-  
soluatur infusio 3 j. 3 j. Rhæbarb. eleæt.  
faæta in aquis endiu. cicbor. vel expressio  
3 j 3 j. vel Rhæbarb. infusi 3 j. 3 j. idem  
enim hæc tria sunt.

ALTERANTIA seu DVLCORANTIÆ

perpetuo, præter iam dicta, (*manna tam  
en sè sola cum iusculo, diacaribamini  
etiam Rhubarb. mechoaca.* cum vino albo  
præscribuntur sumenda) & usitatè sunt  
syrupi.

Hi autem ratione *quoditatis*, vel altè-  
rantes tantum usurpati, si decoctum,  
vel infusio satis purgans extiterit, aut  
etiam, si satis purgantium in decocto co-  
lato, vel infusione expressa fuerit disso-  
lutum, itaque partem afferat, & humo-  
rem respicientes, unde fructus purgatio-  
nis uberrimus.

*Vel* purgantes simul, quando contrà se  
tēs habet, talis autem receptissimus in  
omni ferè potionē, *Rosar. solutius.*

Ratione verò *quantitatis*, dosis purgan-  
tium dissoluendorum in genere quidem  
erit maior, vel minor, prout decoctum,  
vel infusio, vel utrumque simul, aut nihil,  
vel magis aut minus purgans extiterit.  
*Cathartica* enim hac quantitate dissol-  
uenda, ut cum simplicibus purgantibus,  
(si fuerint decocta vel infusa,) unam  
dosis integrā, legitimamque consti-  
tuant: quod facile est ex simplicium, &  
compositorum purgantium dosibus co-  
gnitis colligere, V. G. dosis *senae* in de-

cocto, vt sola mediocriter purget, est  $\frac{3}{j}$   
 $\frac{3}{j}$  j. Rhabarbarb. in infusione, vt etiam  
 mediocriter purget,  $\frac{3}{j}$  j.  $\frac{3}{j}$   $\frac{3}{j}$ . iam si de-  
 coctum præscribas ex semine  $\frac{3}{j}$   $\frac{3}{j}$ . in quo in-  
 fusa fuerit, deinde rhabarbari  $\frac{3}{j}$  j. pro pi-  
 tuitoso purgando; quandoquidem semine  
 decocte  $\frac{3}{j}$   $\frac{3}{j}$ . est tantum vna tertia do-  
 seos integræ, id est  $\frac{3}{j}$  j.  $\frac{3}{j}$ . qua purgat de-  
 dum mediocriter, Rhabarbarb. verò infusæ  
 $\frac{3}{j}$ . est etiam tantum  $\frac{3}{j}$  doseos eiusdem  
 Rhabarbari integræ, sit, vt hæc simul  
 juncta, conficiant tantum  $\frac{3}{j}$ ; quæ non  
 dum sunt dosis integra mediocris; de-  
 sunt enim adhuc  $\frac{1}{j}$  doseos perfectæ, ad  
 quam complendam, tantumdem dissol-  
 uendum erit ele $\delta$ quarij idonei, V.G. di-  
 carthami; cuius dosis cùm sit  $\frac{3}{j}$  vi. si ab  
 ipsis  $\frac{3}{j}$  mutuetis, h. e.  $\frac{3}{j}$  ii  $\frac{3}{j}$ . habebis do-  
 sim, qua legitimè soluitur, vt cum aliis  
 potio mediocriter corpus evacuet, in om-  
 nibus etiam mediocriter se habens. At-  
 que hac ratione dosis dissoluendorum  
 examinanda, vt omnia exactè, tutò, non  
 fortuitò periculosè peragantur.

In specie verò, quando liquor potionis  
 nihil, vel leviter purgans extiterit, solui  
 poterit Monspelij, in corpore mediocri-  
 ter se habente,

*Manna*, ad  $\frac{3}{2}$  ii.  $\frac{3}{2}$  iii.

*Cassia*, parca dosi soluenda, & non nisi summè exigente indicatione, ( vt s<sup>x</sup>pè in affectibus renum, & pectoris leniens, ) cò quòd potionē admodūm inspissat, & ingratas reddat, si sua dosi legitima dissoluenda, ideo ipsius sat erit  $\frac{3}{2}$  iii.  $\frac{3}{2}$  iv. & vt ipsius quantitas diminuta compensetur, addendo fortiora electuar. ad  $\frac{3}{2}$  iii.  $\frac{3}{2}$  b. vnde & obiter, vt potionibus sit acceptior, potius infundenda, vt iam Parisis.

*Rhabarbarum* in substantia si dissoluatur, ad dysenteriam, alui fluxum, &c. id fit à  $\frac{3}{2}$  i. ad  $\frac{3}{2}$  b.  $\frac{3}{2}$  i. puluis enim purgans  $\frac{3}{2}$  i. multūm non excedet : potio enī aliās crassior inde & ingratiōr euadet.

*Melchoreana*, ad  $\frac{3}{2}$  i.  $\frac{3}{2}$  i b.

*Radix jalap*, ad  $\frac{3}{2}$  i.  $\frac{3}{2}$  iv.

*Syrupus rofar. solutius recens*, ad  $\frac{3}{2}$  iii.  $\frac{3}{2}$  iv. vetus enim vix soluitur.

Alij ad purgandum rārd soli usurpan-  
tur dissoluunturque, vt neque *rofar. solu-*  
*tia*. nisi aliquando in delicatiōibus, &  
qui facile purgantur, vel etiam aliquan-  
do, ubi decoctum valde purgans existit.

*Electuaria officinarum opiatæ forma*,  
si leuiora, vt *diapryna. simpl. diacass. tripher.*

58 *Method. Præscribendi*  
*persica, diasebast. catabolicum, ( licet rariissimè, ) ad 3 j. 3 j. B. maiore enim copia nimis incrassant : diaprum. solutiu. elect. de psyll. ad 3 B. ad 3 vj. ad 3 j. B. ad summum, pro robustis : Indum minus, Diaphœnic. à 3 iij. ad 3 vj. benedict. laxatau. à 3 iij. ad 3 v.*

*Quæ verò forma tabellarum, ut *diacantham. de citro solutiu. de succo rosar.* à 3 iij. ad 3 vj. ad summum, pro robustioribus.*

*Infusionis Rhabarbarb. dosis suprà expressa.*

Dulcorantes syropi vbi alterantes, licet usitatè tantum purgantes dissoluuntur, ad 3 j. 3 j. B. vbi purgantes ad 3 j. 3 j. B. ad summum, nisi solis ipsis solutis velis purgare. quod rarius fit.

**VSVS & FORMVLA PRÆSCRIBENDI.** Formula varia existit pro liquoris vatietate.

I. Si liquor ex decocto superiorum aliquo constituerit, prescribitur. R. &c. ( id est, *materiam dictam* ) fiat decoctio in ( liquoris idonei) q̄ s. ad 3 iij. vel 3 iiiij. vel sine hac expressione, fiat decoctio in, &c. q̄ s. cape de colatura 3 iij. 3 iiiij. vtrumque enim usitatissimum, in quibus dissolue, &c. fiat potio, quam sumas cras manè, cum custodia, leui cœna præcedente.

Quod si nolueris decocti formulam

ad longum præscribere, sat fuerit definitis laxantibus, & propositis, præscribere decocti V. G. endiu. agrimon. capillor. ventris q. s. fiat potio, &c.

II. Si ex decocto officinali. R. &c. (*dissoluenda*) cùm decocti talis q. s. fiat potio, &c. aut in uerso ordine, R. &c. (id est *decocti talis* 3 iij.) in quibus dissolute, &c. fiat potio.

Hoc idem etiam usurpatur passim, cùm decocto purgante communi officinarii.

III. Si ex infusione. R. &c. id est, infundenda, fiat infusio in liquoris dicti, q. s. (suprà cineres calidos, per horas 12. vel per noctem, si lubeat, vel sine hac temporis notatione,) expressione facta, dissolute, &c. fiat potio.

Alias breuius prescribitur. R. exp. pressione 3 j. 3 j fl. Rhabarbari factam in aqua idonea, in qua dissolute, &c. fiat potio.

Notandum etiam, ubi infunditur mechoaca, & radix jalap, prescribi specia-  
tim, in vino albo, infundatur, exhibeat-  
urque manè cum custodia, (sine facta  
expressione) ad 3 j. 3 j fl.

IV. Si ex decocto & infusa. R. &c. id est, necessaria decoquenda, fiat decoct-

Etio in liquoris idonei q. s. in colatürz sufficienti quantitate infunde, &c. id est, suprà dicta in infusione, expressione facta dissolue, &c. fiat potio, quæ ratio hodiè vñstatissima.

V. Si absque his, cum alio liquore potio præscribatur. R. &c. catharticum dissoluendum, V. G. *diamantami* ʒ vi. pro pituitoso purgando, cùm talis liquoris s. q. fiat potio.

**V**ITILITAS. Potio *in genere* quidem vtilis, vbi adest purgandi indicatio, & humores morbifici, vel ante coctionem minuendi: minorare, & medicamentum minoratiuum vocant, vel iam cocti, præparatiue ad euacuationem, corpore libero ac meabili eradicandi, aut aliàs excludendi, sine hoc apparatu; quod cùm triplici medicamenti forma soleat fieri, potionē, bolo, pilulis, (puluis enim & tabellæ purgantes, vt & syrupi non nisi liquore soluta, forma potionis, in vsum commode veniunt. )

Potio *in specie* præferenda;

Vbi humores, ratione situs, in prima regione maximè stabulantur, & illuc circa vllam corporis perturbationem educendi, ne quæ trahendi à longinquis. Hac

enim forma liquida, quandoquidem vis purgatrix, cum liquore in aluum ilicò prolapsa, eam cum ipso confessim permeat, egrediturque, non potest vis purgatrix in ventriculo, & aluo, per exiguae motam, spiritum suum catharticum copioius, vel altius in remotiora diffundere, ( licet ab ipsis etiam, per consecutionem, quædam euacuatio consequatur ) nisi validiora medicamenta decoquas, vel dissoluas, ac majore copia, quod ita tutè minimè perficitur, quo in casu pilule idè meliores, quibus diutiis cunctatibus, vis eorum tandem, etiam in habitum diffunditur. Ergo potio in affecto ventriculo, partibus vicinis, pancreate, mesenterio, liene, hepate, & aliis regionis inferioris, utilissima.

Ratione verò speciei humorum euacuandorum, forma potionis, ( vt etiam boli, ) melius conuenit temperamento, naturis, affectibus biliosis, quam pilularum solida forma: quia ad humectandum, leniendum, refrigerandum etiam ( qualia postulat ista constitutio calida, & secca,) sorbilia, & actu liquida aptiora, idè usurpanda, nisi ventriculi summa adsit imbecillitas, & discinctum robur, quod

Equida magis dissoluunt: tunc enim bo-  
lo vel pilulis vtendum.

Vtilissima etiam melancholiæ purgan-  
dx, quòd hic humor siccitate squalidus,  
madore etiam actuali velit perfundi, vię  
simul , per quas euacuandus lubricari,  
omnia laxari,humeftati.Pituitosis etiam  
potio vtilis , nisi ventriculus admodum  
infirmus, & modò pituita in regione pri-  
ma , vel etiam secunda reperiatur : vbi  
enim in tertia consistit , & partibus re-  
motis vix frugifera, nisi ex validioribus,  
& copiosis catharticis, à quibus pericu-  
lum.

Confett etiam præsentibus obstru-  
ctionibus , à crassis, siccis, densatis hu-  
moribus , æstatis tempore , vt lieme  
pilulæ.

### Potio corroborans.

*Potio corroborans* , que aliquando & julep;  
& potus , alias etiam potio cardiaca appellata-  
tur , est formaremedy liquida , ex confectione,  
vel puluere cardiano, ac syrupo , dissolutis in  
liquore idoneo , ad partium principum robur  
confirmandum , vires infirmas invigorandas,  
& proprios cordis affectus.

In eo tria perpenduntur. *Compositio,*  
*Vsus. Utilitas.*

In COMPOSITIONE duo consideranda,

1. *Liquor idoneus, ex quo*
2. *Dissoluenda in eo.*

LIQVOR potionis cardiacæ, consideratur ratione tūm *qualitatis*, tūm *quantitatis*.

Ratione *qualitatis*, prescribitur

1. *Vel aqua stillaticia cardiotica sola, borraginis, &c.*

2. *Vel aqua destillata, & succus simul, quod visitatissimum. Rarissime enim solus succus, ut & raro & inusitate, decocta vel infusa assumentur.*

Ratione *quantitatis*, dosis eadem, quæ potionis purgantis, & iulepi, ʒ. iiij. vel ʒ iiiij, existit, licet æstate, vigente calore per fèbres, & calidos affectus, maior ipsius quantitas possit prescribi.

DISSOLVENDA attenduntur ratione *qualitatis & quantitatis.*

Ratione *qualitatis*, dissoluitur perpetuò syrups cardiacus idoneus.

Præter hunc dissoluuntur etiā semper.

1. *Vel confectio cardiotica sola, vt pasim & visitatissimè, confectio alhermes, &c.*

64 Method. Praescribendi  
byssinio, &c. vide Iulepum.

2. *Vel* puluis cardiacus solus, si quē vel  
simplex, vt *rāsura cornu cervini*, *corallium*,  
*bolus armenia*, *terra sigillata*, *perla*, *fragmen-*  
*ta pretiosa*, *unicornu*, *lapis bezoar*, aliquan-  
do praescribendus, atque pro urgentia &  
varietate affectuum, ac indicationum se-  
ligendus, vel compositus, puluis scilicet  
electuarij alicuius officinalis, (vt *diamar-*  
*gar*. *frigid*i, &c.) passim visitatissimus, &  
praescribi solitus, pro eiusmodi cardiacis  
potionibus, vt simplex aliquando tan-  
tum, sed rariis.

3. *Vel* confectio, & puluis simul.

Ratione quantitatis, praescribitur syru-  
pus ad  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  ff.

Confectio cardiaca à  $\frac{3}{4}$  ff. ad  $\frac{3}{4}$  i.  $\frac{3}{4}$  j. ff.  
ad summum.

Puluis cardiacus à  $\frac{3}{4}$  j. ad.  $\frac{3}{4}$  ij. vel  $\frac{3}{4}$  j.  
ad summum.

Quod si tamen rarer fuerit, & pre-  
ciosior,  $\frac{3}{4}$  j. non excedat, sic fermè ad  $\frac{3}{4}$  ff.  
ad  $\frac{3}{4}$  j.

Fragmenta etiam pretiosa, *unicornu*, à gr.  
v. ad  $\frac{3}{4}$  ff.

*Lapis bezoar*, ad gr. iiiij: vj.

Confectio, & puluis simul, ita pra-  
scribuntur, vt dictam dosin compleant,

modò huius, illiusue, pro lubitu, maiorem quantitatem assumendo, vel partes æquales.

VSVS est in vnam dosin, vt gente necessitate, quacunque diei hora, vel morbi tempore.

Hæc autem FORMVLA PRÆSCRIPTIONIS: R. &c. i. e. liquorem in quo dissolue, &c. fiat potio, vel potus, quem sumat tali hora.

Aduerte, quia quædam dissoluuntur in potionē cardiaca, posse formula jam dicta præscribi, vel, sine hac expressione dissolutionis, vñitatissimè omnia ingredientia præscribi, additantūm, fiat potio.

UTILITAS: insignis est ad proprios cordis affectus varios; syncopen, palpitationem, &c. malignos affectus, venena, & ubi robut ipsi afferendum, à quocunque morborum impetu debili, ac prostrato, vires eiusdem, ac partium principum, & totius, per corum suavitatem, & durationem præsentes fouendas, deperditas instaurandas, debiles confirmandas, & reponendos exhaustos spiritus,

## Potio alterans.

Potionem alterantem appello, formam etiam medicamenti liquidam quamlibet, quæ neque purgandi humoribus noxiis, neque confirmandi viribus afflictis dicata, ad alterandum variо modo, aut etiam vacundum, sine purgante sanen, ( ut ad calidum rerum excludendum; &c.) in unam vicem, unamque tantum dosim, sumendam, præscribitur.

**COMPOSITIO** ipsius eadem quæ corroborantis est, ex liquore sc. ad scopum idoneo, aqua destillata sola, vel addito ipsi succo, aliquando decocto commodo, puluere conuenienti, pro indicationum varietate admodum diuerso, & syrupo apto ad intentionem: quæ omnia præscribuntur dosi, & formula potionis corroborantis, ut ex uno altero-  
ue sequenti patebit.

Potio somnifera, virēs à vigiliis exhaustas instaurans, ac roborans.

R. aq.papaver. rheas, vel nenuphar. & laetuc. ana ʒ ij. Syrup. papau. albi ʒ j. Syrup. violac. ʒ B. conf. alkerm. ʒ B. sim potio, quam sumat hora somni.

Potio ad lumbricos, quæ simul cardia-

R. aq. portulac. gram. ana 3 ij. conf. de byacinth. 3 ℥. puluer. lumbr. terrest. siccator. 3 j. corallinx, & rasur. cornu cervi, ana 3 ℥. syrup. de limonib. 3 j. fiat potus.

Potio ad partum promouendum.

R. Vini Hippocr. ex infusione cinism. & diam. cum vino albo facta, 3 iiiij. vel 3 v. aq. cinamom. 3 ℥. confect. alkerm. 3 j. cruci. 3 ℥. syrup. de artemis. 3 j. fiat potus.

## C A P. IV.

### D E S Y R V P O.

**S**IMPLICIA varia, herbae, radicēs, semina, fructus, flores; & cætera, aut horum succi, vrgente necessitate, in promptu ad manus, & usum semper quouis tempore, hiemis & autumni præsertim, non prostant, ex quibus decocta, infusa, aut alia medicamenta parentur: aut etiam satis integra, vel viribus inde-libatis semper allaruari diutiūs non possunt, sine labore: vel si suppetunt intermerata, affectus vrgentia, aut alia incommoda non dant perpetuò illas inducias, quibus facile aut promptè apparari possunt utiliter in varijs formas, aut facul-

tates eorundem elici; Syruporum occasio hinc & necessitas: vires stirpium namque diuersæ sic afferuatæ, reconditæque, sacchari vel mellis beneficio, forma syrapi, premente necessitate, in promptu ad usum præstò sunt, explendis indicationibus variis, et que integræ sine vitio conseruantur, saporis gratiam habentes sibi comitem, ita ut syrapi sint conditura veluti quedam liquoris medicati, succi, decocti, infusionis, in quantum simul latent medicamentorum facultates.

*Syrupus autem Arabum medicorum inuenitum est, & Græcis veteribus vix innovuit: oxy-mellitus folius, & mulse mentio apud Galenum, & Hippocratem, quorum exemplo Manritani, suam Pharmaceuticam syruporum suppellefiliæ varia exornarunt. Recentiores Graci, ut Altharius, Serapium vocant eum.*

*Nominis vero rationem, alij Græcam faciunt, quasi τῆς Ενείας ὄντος, alij Arabicam; sed res est non magni momenti.*

*Quicquid sit, sumitur bodiè etiamnum syrupi nomen, vel propriè, pro eo, quem describemus, & qualis passim varius extat in officiis, vel impropriè pro decocto humores coquente, seu Apozemate, vi Roudlelii & Lamber-*

tus scripsérunt, vel pro Iulepo etiam alterante,  
ut & hodiè pàssim in Italia Serapium appelle-  
lant, quòd fortiè Iuleporum basi syrups,  
Monspelijs verò ian.

**S Y R U P V S**, est medicamenti forma fluida ex  
decocto, vel succis, aut infusione conflatæ, sac-  
charo, vel melle condita, atque in eam confisten-  
tiam cocta, ut gutta in marmore non diffundat,  
ad alterandum, vel purgandum comparata.

Duplex statuitur in præsentiarum : Alter-  
ans, quadem veteres, & nuperimi cui Me-  
dici maxime usurparunt, & Purgans.

### Syrups alterans.

Alterantis syrni definitio repetenda ex iis,  
qua supra diximus in Apozemate alterante,  
ut & differențiae ibidem relata.

Est autem incidioris methodi, usus, pre-  
scriptionis gratia, duplex : Officinalis & Ma-  
gistralis.

Officinalis seu usualis est, qui pàssim prostat  
apud Pharmacopœos, cuius hic mentionem fa-  
ciemus, quia in eius usu, & ratione prescri-  
bendi, multe occurruunt scitu necessaria, post  
deinde enumeranda.

Hic autem varie dividitur, tūm ratione  
virium, tūm ratione compositionis.

## 70 Method. Praescribendi

Differentia sumptu à viribus, considerantur  
vel in genere, quod aliis sit calidus, frigidus,  
humectans, & siccans, temperatus.

Vel in Specie, respectu ad humores, aut car-  
poris alias partes.

Ratione humorum, non alterat vel in pri-  
mis, quod pro ipsorum specie varia pertinet,  
alterans, coquens, digerens, præparans  
bilem, pituitam, melancholiam, san-  
guinem; vel in secundis, quo censu continetur  
incidentis, attenuans, incrassans, deter-  
gens, adstringens: vel in tertii, quod refe-  
runtur bechici, lenientes, expectoran-  
tes, diuretici, sudotiferi, saxifragi,  
menagogi, pycnotici, alexiterij, corro-  
borantes.

Ratione partium, aquas proprietate magis  
affectant, alij cephalici, cardiaci, &c. quos  
in materia medica pem licebit inquirere: offi-  
cialiū dinitionem proponemus iam, secundum  
compositionem & facultates, secundum genera  
solunmodò consideratas; quia reliqua ad mate-  
riam medicam spectant magis: visitatorium ca-  
atalogum simul exhibituri, quia allibet in usu  
sunt, qui alibi obsoleti, & contraria, nec idem  
apud omnes in usu numerus, notandum erit obser-  
ter, quibus affixus erit asteriscus, illos Mon-  
spelij ex recepto more visitatores esse,

*Syrupus officinalis alterans, cōponit tur vel ex*  
**I. SVCCIS SOLIS,** & hic vel est.

Temperatus, de succo borrhaginis. b. \* de  
*buglossā*, \* *Byzantinus Mesuæi*, de *fumariâ*,  
*simplex*, \* *oxymel simplex*.

Refrigerans, \* *Acetosus simplex seu oxy-*  
*sacchar.* \* de *agrestâ*, seu *de omphacio*, *acetosæ*  
*succo*, *Alexandrinus*, seu *Inulep rosatus*, de  
*acetositate ciri*, *berberis*, i. e. *oxyacanthæ*,  
\* *cydoniorum*, *cichorij succo*, *endiviæ succo*,  
\* *granatis acidis*, *granatis dulcibus*, \* *lime-*  
*nibus*, \* *pomis redolentibus*, *vibes*, \* *violæ*.

Calefaciens, de *betonicâ simplex*, *mina*  
*cydoniorum* moderate, *mina cydoniorum*,  
*aromatica*, *oxymel scylliticum*, moderate.

### II. INFUSIONE, estque.

Refrigerans, de *nymph. simpl.* b. \* *papa-*  
*neris rhead*, \* *de rosis siccis*.

### III. DECOCTO, estque vel

Refrigerans, \* *de cichoreo compos.* \* de  
*inimicis moderatè*, b. \* *papaveris albi*, b.

Calefaciens, de *Alibæ Fernelij*, de *be-*  
*tonicâ compositus*, de *corticibus ciri*, de *calat-*  
*minibâ*, \* *bryssopo*, \* *prassio*, *duguet radici-*  
*bis*, \* *g. radicibus*, \* *de stœchade*: \* *detuf-*  
*filagine*, b.

### IV. INFUSIONE FACTA IN SVCCIS & DECOCTIONE simul estque vel

*Refrigerans, oxyfaccb. compos. de ponit  
lacâ, b.*

*Calefaciens, \* de absymb. \* membr. oxy.  
mel comp.*

**LIQUORE ALIO & DECOCTIONE**  
*estque vel*

*Temperatus \* capill. ven. liquir. calid.  
moderatè.*

*Calefaciens, de arthennisâ.*

**V. DECOCTO & SVCCO. estque re**

*Temperatus, byzaminus compositus.*

*Refrigerans, acetos. comp. moderatè, di  
endinâ compositus, \* myrtinus de nymph. cip.*

*Calefaciens, de empor. de fumac. compoſ.*

*Caterum, ut ex his simul elucescit, quando  
se habeant syrapi alterantes in primis qual-  
itatibus actius, ita & nores obiter, ratione  
passinarum omnes exsiccare simul, paucos ven-  
quibus affixa litera h. humectare, quem au-  
tem ex his partes varias respiciant, aut humo-  
res diuersos concoquunt, ex materia medica  
repetendum.*

*Magistralis est, qui in rem presentem, ex  
paucioribus, aut pluribus simul, pro indicatio-  
num varietate, quibus satisfaciant, à Medico  
recenter praescribitur.*

*Hanc divisione, ac differenciam, ex illis que in  
syrupo officinali, tunc supra in Apozemate  
alterante*

*alterante diximus, petendit.*

In eo tria consideranda. *Compositio.*  
*Vsus. Utilitas.*

**COMPOSITIO.** In Compositione  
quatuor consideranda. *Materia ex quâ,*  
*scu Liquor : Dissoluenda : Clarificatio : & A-*  
*romatizatio.*

**MATERIA ex quâ,** consideratur ra-  
tione *qualitatis, & quantitatis.*

Ratione *qualitatis* duplex est, Remo-  
ta, simplicium scil. variæ partes dictæ in  
Apozemate: Propinqua triplex, *Decoctum,*  
*Succus, Infusum* aliquando, ex priore va-  
rio modo comparata, de qua agendum  
in præsentia.

I. *Decoctum* autem, ex quo fit syrpus;  
idem est, quod decoctum Apozematis  
alterantis, ratione eadem, ex iisdem, co-  
dem modo, ac formulâ conflandum, atq;  
prescribendum, de quo plura hoc loco  
non differemus.

II. *Succus* ex foliis, fructibus, & flori-  
bus contulis expressis elicetur, isque de-  
potatus efficaciter, & utilissimè assumi-  
tur, ac uberiore cum fructu, quam de-  
coctum, siue sit roborandum, siue alte-  
randum vario modo.

Trifariam autem pro syrupo conficien-

**74** *Method. Præscribendi*

*do venit in vsum.*

1. *Vel enim merus assumitur, siue solus, siue ex variis depromptus, idque aut ex foliis, (borrag. bugloss. Lupul. in melancholic. acerof. cichor. endiu. in biliosis, &c. & aliis, pro varietate quorum uis indicantium,) aut ex fructibus, (vt ex limonib. in biliosis, pomorum, in melancholicis,) estque calore blando, ac residen- tiâ accuratè depurandus à fæcibus, à qui- bus occasio corruptionis.*

2. *Vel in eo ad majorem efficaciam, aut alium scopum, ex indicationum con- filio exultante, alia decoquuntur, & usi- tate ferè, succorum depuratorum  $\frac{1}{2}$  iij.  $\frac{1}{2}$  iiij. pro quantitate syrapi comparandi, assumuntur, decoquenda verò, partem, affectum, humorem respicientia, dimi- diâ dosi Apozematis præscribenda.*

3. *Vel commodius in eundem finem, specifica, & efficacia idonea tantum in- funduntur, radic. seu. flor. aromat. ma- xime & ferè pro syrapi quantitate succi  $\frac{1}{2}$  j. s. siue ij. præscribuntur, infundendo- rum verò pro eorum efficacia, & energ-  $\frac{2}{3}$  ij.  $\frac{2}{3}$  iiij.*

III. *Infusum aliquando, pro materiâ liquidâ syrapi assumitur, comparandum*

et idoneis, agendi vi insignibus; aromatis ferè, (cuius ratio ex superioribus, in potionē purgante, petenda.)

Ratione *quadruplici*, dosis decocti colati, ac succi depurati, vel infusi, est  $\frac{1}{2}$  j.  $\frac{1}{2}$  j.  $\frac{1}{2}$  ij. ad sumnum, prout usum syrupi volumen esse breuem, diuturnum, ratiorem, & frequentiorem.

DISSOLVENDA in iam dietis, ad eorum conseruationem, addo & sapientiam gratiam, perpenduntur ratione.

*Quidam.* Dissoluitur 1. vel saccharū, quod quidem omnibus calidis affectib. & frigidis aptius, & ægrotantibus acceptius efficitur, vel aliquando mel, in affectionibus frigidis capitis, thoracis, vel ubi magis calefaciendum, incidendum, detergentendum, recreandus languens calor satius.

2. Vel sèpè etiam simul cum saccharo syrups officinalis; sed tūm minuendum saccharum; syrups enim saccharum solutum est, prescribiturque tunc, sacchari q. f.

3. Præter dulcorantium dictorum aliquod, perpetuò dissoluendum, etiam aliquando ad majorē energiam, dissoluuntur in syrupo quidem ex decocto

D ij

## 56 Method. Præscribendi

maximè, aliquando & in eo, qui ex infusione, succi depurati foliorum fructuum, suprà in Apozemate alterante, liquores alij, *acetum*, *vinum*, &c. quæ omnia ibidem vide.

Quantitas. Saccharum dissoluitur pari cum liquore quantitate. Vide aduersiones. Mel etiamnum ubi assumitur, syrups ad  $\frac{3}{4}$ v.  $\frac{3}{4}$ v.j. sacchari, verò q. s. succi ad  $\frac{3}{4}$ v.j. plus minus, pro decocti vel infusi quantitate.

CLARIFICATIO & AROMATIZATIO. Vide suprà in Apozemate.

VSVS & FORMVLA PRÆSCRIBENDI. In vsu syrapi tunc officinalis, tunc magistralis tria methodicè considerabimus, *quonodo*, *quantum*, *quando*, præscribi debeant, & exhibeti.

1. *Quo modo*, siue *consistens*, an per se forma, qua conspiuntur, fluida, an ve  
tùl luteporū instar, diluti liquore idoneo.

2. *Quā quantitate*, seu *dosi*.

3. *Quō tempore*. Neque plura circa re  
ctam & legitimam eius administratio  
nem ac præscriptionem videntur esse  
perpendenda.

*Quod ad modum*, quandoquidem syru  
pus per se sumptus, nec ullo liquore solv-

tus , minùs altè penetrat , nec subitò aut  
facilè , cum virium eodem seruato teno-  
re , vel in partes affectas , aut humores  
alterandos tardius agat , syrpus verò  
forma Iulepi dilutus , contrà altius , faci-  
lius , ac promptius se insinuat ad partes , &  
humores noxios , visciditate nil moran-  
te , atque viribus integroribus ad distan-  
tiores , & penitus recessus perue-  
niat , ac penetrat , quam ubi sincerus : ci-  
tius alteret , quæcumque tetigerit , pro  
partium affectarum , affectuum , caufa-  
tum alterandarum vicinia , ac distantia ,  
ac discrimine , hac vel illa forma præser-  
tim erit utendum .

Hinc syrapi sinceri , per se præscri-  
buntur passim , sumunturque ,

1. Ad intercipiendas , inhibendasque  
traffando fluxiones , impetu in fauces ,  
pulmonem , ventriculum irruentes . Len-  
toris enim ope diutius in ore cunctantes ,  
nec præterlabentes , subitò humorem  
illapsum facilè sistunt , suntque ex co-  
chleari sumendi , exèque diutius conti-  
nendi .

2. Vbi gutturis raucedo , & lenienda  
tracheæ asperitas : quod lentore suo obli-  
sciente commodissime præstant , sensim

78 *Method. Præscribendi*  
deglutiendo, vel lambendo ex cochleari  
in instar eclegmatum.

3. Ad expectorationem, & materiæ  
in pulmonibus infarctæ, atque collectæ  
atragéssæptæ, sensim ex cochleari lam-  
bendo, aut cum baculo liquiritiæ sumen-  
do.

4. Ad tussim mitigandam, ex cochleari  
, vel cum baculo liquiritiæ etiamnum  
sensim lambendo.

5. In ventriculi morbis, & affectionibus,  
frigidis maximè, (calidi enim & siccii, ut  
& affectiones eiusdem biliosæ, feruidæ,  
humiditate volunt perfundi, nisi robur  
ipsius omnino dissolutum, ) licet & usi-  
tatiùs soleant dissolui liquore parciore, si  
syrupum de absynthio ferè excipias, &  
ubi præsertim adest roborandi & ad-  
stringendi consilium.

6. In partibus etiam ventriculo vici-  
nis, ad quas sine vehiculo facile peruenit.

*Dilatus verò, solmūisque formâ Iulepi;*

1. Affeçto hepate, liene, mesenterio.

2. Laborantibus verò præsertim capi-  
te, corde, pulmone, renibus, vesicâ,  
vtero, habitu corporis, artubus: ad quæ  
syrupi virtus vel vix, vel tardius, vel ad-  
modum refracta aliàs peruenit.

Præscribitur autem dissoluendus cum liquore idoneo, & appropriato, qui vel humorē, vel affectum, vel partem, vel omnia simul respiciat: visitate vero cum aquā stillaticiā idoneā; cum decocto appropriato, quod aquā longè efficacius, cum iuscule carnium pulli, eoque simplici, vel, ad majorem vim & effectum, radicibus, foliis conuenientibus alteratum, ut infrā.

*Quod ad quantitatem, considerati poterit tūm continua, tūm discreta.*

*Quod ad continuam, seu dosin, syrups officinalis alterans præscribitur ab ʒ ſ. ad ʒ j. ʒ j ſ. ʒ ij. ad summum, circa quam dolio strictius definiendam, quatuor maximè perpenduntur.*

1. Partis affectū, & alterandū situs, atque distantia: ubi enim syrapi vis ad distita remotaque meare debet, dosi majore, & summā, si volueris, erit præscribenda: alias vix fructum ullum ex operatione percipies, quod itinere longo vites ipsius admodum frangantur, nisi liquor, cum quo dissoluitur, efficax.

2. Affectus ipsius, & causarum mortificarum aetio, qualitas intensa, vel remissa, illa medium, vel summam dosin

80      *Method. Praescribendi*

postulat, haec minorem.

3. Aetas, infantulis eniū minima  $\frac{3}{2}$  ℥.  
pueris minor  $\frac{3}{2}$  j. erit pro summâ.

4. Syrupi ipsius efficacia, & vis agen-  
di insignis : hinc *syrum de papaveri* ab  $\frac{3}{2}$   
℥. ad  $\frac{3}{2}$  j. satis fuerit praescribere, ob vim  
ipsius narcoticam : insuetas etiam mi-  
norem postulat, ut passim in *syro de ab-  
syntio*, ad  $\frac{3}{2}$  j.

5. Modus utendi : qui enim sensim  
lambendo, ad varios asperæ arteriæ, pul-  
monum affectus deglutiendus, quia ma-  
jore quantitate non possunt assumi, &  
illicè præterlabuntur, sine multo effectu,  
ideoque saepius iterandi ; in frequentem  
usum, saepius repetendum, ad  $\frac{3}{2}$  iiiij. v. vij.  
praescribuntur, ita ut non contineantur  
tunc sub istâ regulâ tradita. Idem dicen-  
dum de iis, qui ad sicciori per morborum  
astum extinguendum : quia eorum usus  
frequens, ideo & ad  $\frac{3}{2}$  iiiij. v. vij. praescri-  
buntur.

Liquoris vero quantitas, pro iis dissol-  
vendis, se habet ad instar luleporum, ad  
 $\frac{3}{2}$  iiiij.  $\frac{3}{2}$  iiiij. minis tamen praescribere po-  
tetis in ventriculo affecto, & partibus vi-  
cinis, plus vero ad situm moderandam,  
ut per febres, & in calidis, & astuanti-

būs, quibusuis morbis, & state maxime.

Quod ad quantitatē discretam, digesti possunt assumi, manē & vesperi longē à pastu; qui verò ad fitim, ad tuſsim, ~~ārāzāgēm~~, ſæpius & frequenter; qui ad ſomnum, ſemel horā ſomni, neque niſi vrgente neceſſitate repetendi. Cæteri rariuſ, ſæpius, aſſumuntur, prout indicantia ferunt.

Quod ad ſumendi Tempus: Syrupi præparantes, & ad humorum digestionem compositi, manē 4. vel 5. horis ante cibum, ne ipſorum viſ à cibo recenter aſumpto, vel nondum confeſto, obtundatur, poſſunt & circa vſperam ſumi, vbi humorum digestio acceleranda, ſed longē à pastu, ventriculo inani, qui ad tuſsim, quāuis horā ipſa moleſtat: qui ad ſomnum, & ſiſtendas fluxiones, horā ſomni: qui ad ~~ārāzāgēm~~, ſiue expeſtorationem, manē: qui ad fitim, ipſa vrgente; cæteri quiuſ, quantum fieri poterit, vacuo ventriculo exhibeantur.

Quod ad Syrupum magistralem; uſus ipſius eſt etiam vel per ſe, vel diluītur cū aqua, aut liquore idoneo, jufculo ſimplici, vel composito, ſumiturque uti diſtum de officinali.

## Hęc autem FORMULA PRÆSCRIPTIONIS.

1. Si ex decocto. R. materiam Apozematis alterantis, fiat decoctio in &c. q. s. cape de colatura, &c. in quibus dissolute, &c. fiat syrupsus perfectè coctus; clarificatus, & aromatizatus cum &c. repenatur in ampulla vitrea, in loco tuto. Capiat de eo syrupo ʒ j ʒ j ℥. ʒ iij. per se, vel cum &c. tali hora, teties in die, &c. vide suprà.

2. Si ex succo eoque metro. R. succi de tali re contusa, recenter expressi, reetè depurati, &c. in quibus dissolute, &c. fiat syrupsus.

3. Si ex succo, cui alia decoquuntur, vel infunduntur. R. succi recenter expressi, ac depurati, &c. in quibus decoque vel infunde, &c. cape de colatura, &c. in quibus dissol. &c. fiat syrupsus.

4. Si ex infuso. R. &c. infundantur, in talis liquoris q. s. cape de colatura leui expressione adhibita, &c. dissolute.

**V**TILITAS Syrupi iam in genere satiis suprà declarata, siue officinalis existat, siue magistralis, vniuersim enim institutus ad conseruandas varias vites stirpium, quibus decocta ex iis parata,

succi expressi , infusiones fuerint imprægnatæ , quod ad manus esse possint , vt gente necessitate , integræ , & efficaces , ad varios usus .

Officinalis etiam in specie inseruit , variis medicamentorum formis effingen-  
dis , constituendisque ; sic & Apozema-  
ta ingreditur , & Iulepos , ac potiones ,  
ad dulcorem , gratiam , & vires etiam nū ,  
sic & ad opiatas , pilulas , condita , ecleg-  
mata , trochiscos assumitur , ad formam ,  
consistentiam , & unionem compositi  
medicamenti , atque ciudem conserua-  
tionem .

Magistralis verò ut olim , sic & hodiè ,  
& nuper in usu maxime fuit , ad præpa-  
rationem humorum , & corporis , pro  
zāpō felici necessariam , de qua vide  
alterans Apozema : ad alterandum vario  
modo tūm corpus , tūm eiusdem partes  
varias , ipsarum intemperies varias emen-  
dando , tūm humores vario modo pec-  
cantes : vide ibidem alterans Apozema .

In summa , ad omnes internos affectus  
ad causas eorum procreatrices , ad par-  
tes ab ipsis vario modo afflitas alteran-  
das , & roborandas , idonea & specifica  
quævis medicamenta , ab indicantibus

suggesta, in syrupo formam reduci possunt: ita ut ipsius utilitas quam latissime se extendat, ad quosvis demum affectus ad hydrope, luem, &c. praescribi autem maximè potest, ubi diutius alterandum, vel vires fouendæ perenniter: (cum alias iste labor cum noua Apozematis, Iulepi, potionis præscriptione, sapientia esset recenter cum molestia repetendus.) Hinc in morbis & affectibus longis, chronicis intemperiebus partium, quæ iam altè radices egere, ita ut continuò sit alterandum, utilissimus. Tamen, quia visualis ferè prostat in eum finem, nisi putaueris vel minus efficacem esse in eo vim, vel exoletam, vel non constet ex iis, quæ specificæ indicationes postulant, vel spes posse haberri efficaciorem, rarius prescribendus.

### Syrupus Purgans.

*Syrupi purgantis definitio, ac diuisio, praebiuncrum varietate, etiam ex Apozemate referenda.*

*Est autem syrupus purgans duplex in presentia: Officinalis, & Magistralis.*

*Officinalis dividitur hic maximè, ratione tum compositionis, tum virium principiarum, ut patet ex hac tabula.*

		Succo , & purgat melancholiā , ut syrpus de fumaria comp. *
	{ decoctio, facto in	Melancholiā de epithymo.
	aqua , & pur- gat	bilem * de cichori- comp.
Symp-		mixtos humores diuersos.
pus of- ficina- lis pur- gans		
cōpo- nitur vel ex		Succo , & melancho- purgat liam de pa- mis regis fa- bor , V . G.
	{ infusione in	rosar. sol. * violatus ex nonerosi infu- soribus.
	aqua & pur- gat	bile , de flor. persi- cor.
		pituicā , { melrosat- colat.

Magistralis definitio , ac dimissio , ex super-  
rioribus satis manifesta.

In hoc tria consideranda. Compositio.  
Uſus. Utilitas.

In COMPOSITIONE quatuor.

1. Materia , ex qua fiat catharticus.
2. Dissoluenda.

3. *Clarificatio, & aromatizatio.*

MATERIA ex quâ remotior, ratiōne  
qualitatis, sunt cathartica simplicia, cum  
suis correctiuis, cāque vel decocta, vel  
infusa: vnde propinquæ materia duplex  
statui potest, decoctum purgans: Infusum  
purgans.

- *Decoctum purgans*, nihil aliud est, quam  
decoctum: cathartici Apozematis, ex  
iisdem tūm alterantibus, tūm purganti-  
bus, pro scopo diuersis, eodem modo, &  
ordine præscribendis, adhibitis condi-  
tionibus ibidem recensitis.

Hoc aduertendum solummodo, cir-  
ca dosin catharticorum decoquendo-  
rum, Monspelienses pro syrupo pur-  
gantia Apozematis ferè duplicare, sat  
fuerit apud vos quantitatem illam sim-  
plicium assumere, vel me suadente, etiam  
duplicem; perinde namque est, si vel  
etiam triplicem: sic enim minore dosi  
erit exhibendum, & minore cum fa-  
stidio ægrotantium modò dosin ex ar-  
te & legitimè, & accuratè definias, non  
dubitanter, vt passim: vide usum.

Notandum, vbi succi idonei suppe-  
tunt, efficaciter etiam in eorum 3 iiiij. v.  
vj. decoqui ista cathartica, cum suis cor-

rectius.

*Infusum purgans*, quomodo sit parandum, ex iis, quæ suprà diximus in potionē purgante, facile erit colligere, quomodo autem decocto sit præferendum, vide in Aduersionibus.

DISSOLVENDA in decocto, vel infuso, considerantur ratione *qualitatis*, & *quantitatis*.

Ratione *qualitatis*, dissoluitur;

In decocto quidem, vel saccharum, vel mel aliquando; vide alterans Apozema: vel vñā cum saccharo, syrpus aliquis officinalis, isque aut alterans, aut a tharticus.

Priuier illa dulcorantia, perpetuò ad conseruationem dissoluenda, etiam aliquando, in finem suprà dictum, dissoluuntur.

1. *Succus idoneus*, isque vel alterans, foliot. fructuum, pro indicatione; vide Apozema: vel purgans, ut *rosar. succus*, veris tempore maximè, pro bile, *fumar. lupul.* pro melancholiâ.

2. *Infusio rosar. pallidatum completa*, veris tempore maximè, quo suppetit, &c efficax est.

3. Aliquando *infusio ipsius Rhabarbari*,

si ferat indicatio , scotum facta , ad finem tantum addenda : alias si initio , antequam syrpus perueniat ad consistentiam , vis ipsius exhalat , coctione diutinâ.

In infuso verò , eadem , si succos iam dictos excipias , quos præstabit pro infusione facienda , statim præscribere ab initio .

Ratione *quantitatis* , saccharum , mel & quali cum colatur à quantitate , quæ ad ibi j. ibi j. &. sèpiùs præscribenda . Hoc aduertendum soluminodò , sacchari vel mellis quantitatem exactè esse definendam , contrà quām vulgò Medici male faciunt , neque relinquendam arbitrio pharmacopœi : alias de dosi certò nunquam poteris decernere , quæ alia , vbi parùm sacchari , alia verò , vbi multum . Hinc titubant passim practici , vbi dosis præscripti à se cathartici definita , & jubent à minore semper quantitate esse inchoandum , ut experiaris sine errore .

Si syrpus admittitur , id ferè ad 3 v. 3 vj. viij. & quia hic pro saccharo habetur , subtractione ad huius quantitate facta , facile erit tunc dosin sacchati definire . Perinde autem est , siue alterans ,

aut purgans existat, modò huius rationem, pro dosi inuenienda habeas in supputatione.

Succi ad  $\frac{3}{2}$  vj. viij. si cathartici memineris, in dosi constituenda.

**CLARIFICATIO & AROMATIZATIO.** Vide in Apozemate.

**VSVS & FORMVLA PRÆSCRIBENDI.** In vsu syrapi purgantis, tūm officinalis, tūm magistralis, etiam tria breuiter considerabuntur, quomodo præscribi, & exhiberi debeat, quā dosi, quā tempore.

Officinalis quod ad medium vel per se ex cochleari, vel dilutus præscribitur: illud ratus, omnis enim ferè dissoluitur, idque liquore idoneo, ut suprà dictum.

Quod ad dosin, in vniuersum hæc constituitur; ab  $\frac{3}{2}$  j. nempe, pro minimâ ad  $\frac{3}{2}$  ij.  $\frac{3}{2}$  iij.  $\frac{3}{2}$  iiij. quæ summa, quam tamen in syrupo de fumariâ & de epithymo, ad  $\frac{3}{2}$  v. vj. poteris extendere, consultis interim circumstantiis illis, quæ in Apozemate purgante dosin catharticorum dimicimus legitimè limitare.

Tempus autem exhibendi idem, quod aliorum purgantium, matutinum, ventriculo inani, ne vis ipsorum obtundatur.

90 *Method. Præscribendi*  
tur, cibo vel chylo præsente, vel tardetur  
corundem operatio.

Magistralis quod ad modum usurpa-  
tur etiam vel, per se, vel ex cochleari,  
vel, quod usitatius, cum liquore idoneo  
solutus, vide suprà.

Quod ad quantitatem, eamq; continuam,  
dosin ipsius vulgo ab  $\frac{3}{4}$  ij. ad  $\frac{3}{4}$  iiij. male  
definiunt: catharticorum quidem quan-  
titatem inspiciunt, sed per transennam,  
nescij forsan interim, quo pondere sac-  
charum Pharmacopœus addiderit; hinc  
& circa dosin incerti. Ego in genere  
statuo, istam esse posse,  $\frac{3}{4}$  b.  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j b. ij.  
iiij. v. vij. prout catharticis copiosis vel  
validis, liquor, cum quo saccharum in  
syrupi consistentiam coquitur, fuerit im-  
prægnatus. Sic autem se res habet. Pur-  
gantium decoctorum, infusorum, dis-  
solutorum, doses numerandas, & notan-  
dum, quot vicibus sint purgando ista  
omnia cathartica simul: V. G. suffe-  
rint pro octo vicibus. Iam vero liquoris  
istorum catharticorum vi imbuti  $\frac{1}{2}$  j. ad-  
das sacchari puri  $\frac{1}{2}$  j. decoquas in syru-  
pum: si illas  $\frac{3}{4}$  xij. in viij. partes diuiseris,  
(nam sunt viij. doses purgatrices, ha-  
bēbis pro dosi  $\frac{3}{4}$  j b. addideris tantum,

sacchar. ʒ viij. pro syrupo confiendo,  
habebis pro dosi ʒ j. &c.

Quod ad *discretam*, semel vel bis in  
mense v̄sitatē exhibetur, in morbiō chro-  
nicis, vt sic sensim illuuies, quæ cumula-  
ti solet, euacuetur, nēq; aggeri in molem  
morbificam possit.

*Tempus* verò sumendi matutinum, vt  
suprà.

**UTILITAS** in morbiō chronicis maxi-  
ma est, in quibus præcautio perennis, vel  
euacuatio sensim per *ēm̄p̄aor* facta ne-  
cessaria, ne aliās in intemperatis illis cor-  
poribus, & cachecticis visceribus, humo-  
res excrementitij congerantur parituti  
vatiōs affectus, quibus hāc ratione ob-  
diām itur, & rescinditur occasio futuro-  
rum affiectuum.

## ANIMADVERSIONES de Syrupo.

*Circa SACCHARI QUANTITATEM*  
passim controvenerunt admodūm, & vix ullum  
præceptum reperias firmum, ac rei natura con-  
seguente. Mesuaeus ipse artis parens varius,  
Alias enim in syrups frigidis ex succīs

maximè, pro liquoris lib. j. sacchari præscribit  
*z* viij. ut in syrupo de agrestà, ut saccharum  
 tertiarà parte liquor superet: alias liquor duplus  
 ad saccharum, in syrupo de pomis Sabor:  
 alias triplus, syr. acidus ex prunis, quadru-  
 plus, acidus de pomis, & quod in irum vulgo  
 sextuplus, acidus ex cydoniis: alias etiam  
 saccharum liquorem superat, dupla serè parte:  
 ut liquoris sint *z* vj. pro sacch. lib. j. alias liquoris  
*z* viij. sacchari xij. alias liquoris & sac-  
 chari ana partes aequales præscribit. In calidis  
 autem syrupis, Mesueus sepiùs sacchari & li-  
 quoris ana partes aequales, paulò minùs, paulò  
 plus, præscribit.

Recentiores rixantur valde inter se. Modo  
 enim liquoris & sacchari ana constitutum, pro  
 regulâ syrporum, modo vero sacchari vel li-  
 quoris plus, quantitate diuersâ præscribunt;  
 præcipui pharmaciae authores, Sylvius, Fernel,  
 Ioubert. Rondelet.

In syrupis enim ex succis, in genere liquor  
 saccharum superat: in specie vero pro liquoris  
 lib. j. alias ponuntur sacchari *z* viij. *z* viij. *b.*  
*vlij. z* viij. *b. viij.* alias eorundem ana.

In syrupis ex infusione, passim infusi & sac-  
 chari ana. In syrupis vero ex decoctione, eo-  
 rum passim ana vel etiam vsuatisimè, ut sem-  
 per liquor una parte saccharum superet.

Mibi vero negotium habere videtur se indiferenter. Syrupi natura accuratius solummodo perpendenda. In quo duo maximè considerandas saccharum, ( aliquando & mel,) quod in syrupo se habet tantummodo ut subiectum, essentiam simplicium ad vires conseruandas excipiens. 2. vis illa, seu essentia in succo, infuso, & decocto delitescens, à quâ syrupi vis & iuxta, ut à saccharo essentiæ in syrupo conservatio, ab vitroque syrupus ex eorum unione resultans, aquositatæ evaporatione.

Iam vero nostrum annes sacchari lib. j. V. G. quacunque humoris copiâ lib. j. ij. iiiij. pluribus, ( ut Iohannes pro suo indepo in syrupo de agrestâ,) dissolueris, in illam consistentiam syrupi coccione facile esseabituram. Illud etiam conspicuum, & apud eos qui extractorum rationem nōrunt experium, menstruum ut vocant Spagirici, seu liquorem, per quem essentia diffusa, aut in quo fuit elicita, (cuique respondent succi,) siue sint ipsius lib. ij. iiij. siue vj. viij. &c. balneo Mariae, vel cinere calido, evocari posse tortam, essentiâ paulatim crassescere in consistentiam, quam volueris, syrupi putâ, vel solidiorem. Quæ cum ita se habeant, de viriusque proportione frustâ tam anxiè disceptant: quandoquidem ex quacunque syrupi formâ facile resulter. Nāque si syrupum

componemus, saccharum nempe liquore solutum, succi, infusa, decocta, quaecumque demum eorum fuerit quantitas, colligere & evaporatione partium aquarum in illam syrupi vulgaris consistentiam sola & seorsim deduci possunt, quidni hæc simul iuncta sub quavisdem quantitate? Si Ionberto & Sylvio lib. j. sacchari cum liquoris tribus in syrum rectè decoquatur, quidni & cum liquoris medicari, succi, infusi, decolli tandem, illud idem fieri poterit? & conira, si sacchari lib. iij. cum lib. j. liquoris, ut Rondel in syrupo de limonibus, quidni & illud idem fieri poterit? Ita ut in saccharo pro syrupo destinando, non cum liquoris quantitas sit assimilanda, quam ipsius, & Medici propositum ac intentio; virtutis enim seu essentia, V. G. 3 iij. 3 iiiij. quas simplicium decoctionum vel infusorum lib. j. profuderit, si in decocti, vel infusi colati lib. iiiij. v. g. diffundantur, & istius liquoris & sacchari ana lib. j. prescripseris, ut vulgo pro syrupo, syrum quidem conficiet; sed virtutis exigua, & in cuius lib. j. sit tantum essentia 3 j. ad summum, & in 3 j. tantum g. v. si vero ista 3 b. essentia per liquoris lib. ij. tantum diffundatur, & ex huius & sacchari lib. j. syrum prescribas, conficies etiamnum; sed efficacem, & in quo sunt essentia 3 ij. & in quaq; vinciâ 3 b. si

liqnoris istas ℥ ij. in quibus latent ʒ iiiij. istius essentia, cūm sacchari ℥ j. dissolueris, habebis efficacissimum, in quo nempē sint essentiae ʒ iiij. ʒ ℥. in quāvis vnciā ʒ j. & efficaciorem adhuc, si pro liqnoris istius ℥ ij. sacchari remātum ℥ ℥. in hoc enim etiam erunt essentiae ʒ iiij. ʒ ℥. sed in quālibet vnciā erunt ipsius ʒ ℥. ʒ ij.

Ergo non tam inspicienda liqnoris quantitas maior minorue, quam virtutis, seu essentiae in ipsum traiecit, aut in eo delitescentis moles, quæ à pauca materiæ quantitate, quo cinq̄ue deum humoris pondere decoixeris, infuderisue ℥ j. ℥ ij. ℥ iiiij. &c. Hoc aduenturā sedulū, quod certior de syrapi viribus & efficaciā esse possis, & pro scopo debiliores efficacioresue præscribere, semper vim & quantitatem ipsius facultatis considerandam potius, quam ipsum liqnotem. Sequere rationem iam dictam, vel vim communem, quā ferè liqnoris & sacchari ana partes aquales præscribuntur.

C A P. V.

*D E V O M I T O R I S.*

**H**VMORES excrementitij, siue naturalē copiosi, siue p. n. quācun-

que demum quantitate, cum sanguine  
in venis permixti, aut extra venas vbi cū-  
que stabulantes, eacochymix ideam con-  
stituunt, & euacuationem, quō maximē  
vergunt, per conferentia loca postulant,  
& volunt euacuati, siue purgationem  
particularēm spēctes, siue vniuersalem,  
vrinā, sudore, transpiratione insensili,  
alio, vomitu, celebrandam.

Licet autem medicamenta, quæ id  
præstant, in genere purgantia dici pos-  
sint, in specie tamen talia censentur, quæ  
per aluum, & vomitum excrementa cor-  
poris educunt, & quæ per inferiora, ab-  
solutè adhuc generis nomine, per excel-  
lentiam, cathartica dicta, & eorum ope-  
ratio, purgatio: quæ per superiora verò  
mouent, vomitoria.

Est autem Vomitorium non tām for-  
ma medicamenti liquida, quām faculta-  
tis vocabulum, ab ipsā operatione no-  
men habens. vtrumque tamen usitatē si-  
gnificat, medicamentum nempē motum  
illum, seu excretionem per superiora  
concitans, & formam ipsam, quā pra-  
scribitur, de quā hic agere propositum.

*VOMITORIVM* itaque est remedij forma  
liquida, ex medicamento emetico simplici, deco-

ffo, vel infuso, aut dissoluto, comparsata: noxia quæq; ventriculi, redundantiæ cibi, humores excrementis aliarum etiam partium vicinarum, vi & imperio per os euacuans, denudans, atque renelleans.

Ab effectu hinc triplices statui potest: Vacuoprium, Reunifacitum, & Deriuatorium.

A modo vero operandi, aliud levius existit, cathartico emollienti, malattico, & eccoproctico analogum, quantitate ferè suâ operans; aliud mediocre, qualitate magis, aliud validior, catharticis propriè diffis respondens, vi specificâ, & internâ, motum ijsium per superiora concitans.

Est etiam Venitorium aliud simplex, aliud magis compositum.

SIMPLICIVS constat ex aquâ simplici tepida, affaīm ad cyathum, seu poculum unum basistâ, aquâ hordei tepidâ copiosè, & confertim bibitâ, iuscule carnium pingui, ubertutem sorpro hydromellite largiter sumpto, quod etiam Galenus imperavit, potu quoque copioso, subito & confessò, hydrelæ ad  $\frac{3}{4}$  viliij. x. oleo communis, ad  $\frac{3}{4}$  viliij. vj. tepide, butyro liquore calido.

Quibus & aliis similibus vomitoriis levissimis, imptoptriè admodum talibus, timur maxime ubi, quæ hac viâ sunt

excernenda, siue assumpta, siue diuersa impuritatum, & vitiosorum humorum genera, in ventriculo continentur; suntque ita in procinctu ad excretionem apparata, vt vel minimâ datâ occasione facile sive negotio, vel perturbatione possint extrudi, siue natura id molimini non aggrediatur, siue sponte quidem insurgat ad ipsa excutienda, sed vel minus celeriter, vel minus sufficienter, tunc leuioribus hisce excretici, si quiescat, occasionem motus, & veluti principium damus; aut si imperfectius moueat, conatum ipsius faciliorem reddimus, quod etiam sapius, nullo exhibito vomitorio, procuramus digito in gulam altius immisso, pennâ oleo intinctâ, & gulae immissa. Sed hæc, quæ quantitate tantum sua, & humiditate tepida, aut pinguedine excreticem mouent, minus proficia, vbi excernenda per vomitum, vel non sunt in ventriculo, sed in vicinis, aut remotioribus etiam partibus concepta, vel si sint in ipso, altius tunicis ipsius impasta haerent, vel minus preparata, non nisi majore labore, & cohatu eliminari possunt; tunc cuim utilius venitur ad Composita.

In COMPOSITO vomitorio duo perpendenda:

1. *Materia*, ex qua.
2. *Dissoluenda*.



MATERIA vomitorij compōñit dūplex, *liquida*, & *solida*, seu *cocta*.

*Materia liquida* (seu *liquor*,) qua vomitorium definiuimus quoque ferè tantum visitata, est vel *vomitoria*, vel non *vomitoria*.

*Liquer emeticus*, est vel *decoctum*, vel *infusum*, vel aliquando *aqua*, vel *liquor de- stillatus*.

Quod ad *DECOCTVM VOMITORIVM*, in eo duo considerantur:

1. *Materia*, ex qua fiat emeticum.
2. *Liquor*, in quo ista decoquatur.

In utroque *qualitas*, & *quantitas*.

*Materia ex quâ*, seu *decoctum ingrediens*, ratione *qualitatis*, sunt vomitoriorum simplicium, eorumque medicorum, (valida enim rariūs ad decoctum assumentur,) variæ partes: radic. cortic. fol. aliquando, semin. flor. quorum 2. 3. simul 4. præscribenda.

Ratione vero *quantitatis*, vomitoria ista mediocria potionum pondere ferè præscribuntur, vt summatim ad 5 j. 5 ij.

E ij

100 *Method. Præscribendi*  
g. iij. ad summum ingrediantur, & priua-  
tim, si iam dicenda aliis addantur,  
vnum, duo, vel usurpentur sola, hæc dosi  
ferè præscribas.

Radix asari, ad 3 j. 3 ij. 3 iiij.

Cortex median. iugland. ad 3 j. vel 3 ij.

Radix pepon. sicc. ad 3 ij. 3 ss.

Flor. genist. 3 ij. 3 iiij. vel pugillos to-  
tidem.

*Pro liquore*, quo ista decoquantur, ra-  
tione *qualitatis*, assumes commodissimè  
*aquam simplicem*, vel vbi simul humores  
vitiosi à ventriculo detergendi, *aqua*  
*bordei* utiliter, siue decoctum, (maximè  
vbi siccī, acres, calidi,) hydromel, (vbi  
crassi, lenti, frigidi attenuandi, inciden-  
di, detergendi,) oxymel aquosum, in utro-  
que casu, *fuscum pingue & leniens*, vbi  
temperanda acrimonia, siue humorum,  
siue assumptorum venenorum, siue etiam  
vomitoriorum acrium, *hydrelæm*: quæ  
ideò maximè conuenient, quod etiam  
vulgò recensentur inter vomitoria beni-  
gna.

Ratione *quantitatis*, relinquitur Phar-  
macopœi arbitrio, tamen ex supra dictis  
in apozemate & potionē, potēris defini-  
re, modò obserues; quandoquidem pro-

vomitorio liquoris debentur ʒ viij. ferè, etiam dupla quantitate vomitoria illa mediocria esse præscribenda.

*INFUSVM VOMITIVVM*, rationē qualitatis, infundendorum, paratur maximè ex vomitoriis illis validioribus, quæ rectius sola infunduntur, quād dentur in substantia, vel etiam decoquantur. Illa duo maximè agendi vehementia nobilissima; *Helleborus albus*, majoribus, *Antimonium*, neotericis celeberrimum. Et licet ad illud negotium assuvi ritè possint mediocria, *asarum*, *rapbanum*, *radix peponis* secca, *cortex medianus iuglandis*: tamen, quia ab ipsis vel in substantia datis, aut decoctis nullum discrimen ferè, idcō tantūm decoquenda præscribuntur. His verò validioribus infusio omnino bene conuenit, vi spirituali tantūm communicatā, nullā verò substantiæ portione relictā, quæ purgationem diurniorem faciat, aut excretricem diutiūs laceſſat.

Igitur duo maximè inseruiunt compaſſando infuso, *Helleborus albus*, olim longè nobilissimus, non solum in contumacibus affectibus & desperatis, sed & levioribus, hodiè vix dum in illis, & non nisi prudente cautela usurpandus, quā

duce ad 3 fl. 3 j. 3 j. S. ad summum potē-  
tis in iuscule maxime infundere, additis  
cardiacis ad 3 j.

Huius veluti succedaneum, pomum  
excavatum radice Hellebori albi repletum,  
coctum, illa exempta comedunt, vt &  
radix raphani; eadem transfixa, cocta,  
esta.

In Hellebori locum, ( quod & hodiè -  
passim usurpatur ) rectius *antimonium* ad-  
mittas, illo exulante. Neque horrorem  
incutiat, quod haec tenus ab inexpertis  
fuerit rejectum, cum illo longè tutius, si-  
ne ullo omnino suffocationis, conuulsio-  
nis, aut symptomatum ingentium peri-  
culo, suam operationem producat. In  
illam finem alij ipsum crudum usurpant,  
alij vitrum eiusdem varium infundunt,  
alij regulum. Præstabit in istum finem,  
istam Antimonij præparationem eligere,  
quam vocant *crocum metallorum*; quando-  
quidem sic paratum, sulphur quoddam  
fetidum exuit, quod aliás scepīs causa  
graviorum symptomatum.

In istum finem. R. *Antimon.* sic præpa-  
rat. 3 j. 3 fl. infunde in vini albi 3 liij. 3 liij.  
supra cineres calidos, trajiciat ut liquor  
per chartam emporcticam; Detur. Ex

Ecce fit aqua illa vulgo benedicta, Spey-  
vasser. Loco croci dicti vitru quodvis in-  
fundere poteris ad 3 j. in liquore idoneo.

Quod ad quantitatem infundendorum,  
iam expressa pro his validioribus defini-  
ta fuit. Si alia mediocria volueritis vfor-  
pare, praescribi poterunt.

*Radix asar.* à 3 j. 6. ad 3 iij. 3 6.

*Rad. pepon. sicc.* à 3 j. ad 3 iij.

*Semen vitic.* à 3 j. ad 3 6.

*Cortex ingland.* ad 3 iij. 3 6.

Sed iam dicto antimonio prestatbit uti.

Quod ad *LIQUOREM DESTILLATVM*, ratiüs à Medico praescribitur, si  
exciplias à vulgo in usum medicum trans-  
latum, *acetum destillatum*, operandi effectu  
violentissimum, cautè usurpandum, &  
in robustissimis. Praescribitur autem bi-  
fariam: vel enim solūm ex Alembico  
plumbeo, liquor ipsius destillatur, vel vt  
Monspelij mulietculis usitatum, panis  
albus, è furno recenter extractus con-  
fcinditur: in lib. ij. iij. aceti infunditur fit  
destillatio, & liquoris usus, vt & supe-  
rioris, 3 iij. 3 iiij. in febribus maximè in-  
termittentibus, diuturnis, ante & in ipso  
paroxysmo, exhibentur. *Habenus de liqne*  
*re vanitatis.*

*Liquor non vomitius etiam passim assu-*  
*mitur, sine ullius vomitorij facta in ipso*  
*decoctione, vel infusione, in quo postea*  
*vel iuuantia vomitum, atque preparantia*  
*tantum pro leuiore vomitorio, vel puluis*  
*emetici alicuius simplicis, statim, iulepi*  
*instar, dissoluuntur.*

*Qualis autem sit, vide supra in qualita-*  
*te liquoris, pro decoctione vomitorio.*

*Ratione vero quantitatis, ad  $\frac{2}{3}$  iix. x.*  
*recte prescribiur.*

*Habentur de materia vomitoriorum liquida*  
*ex qua, ut diximus, hodiè usitatè tantum*  
*ipsa formantur, quæque id est vomitoria*  
*supra definitus, ut quæ esset forma ex-*  
*hibendi magis recepta. Possunt quidem*  
*& formâ non fluida exhiberi, pulueris nem-*  
*pe, vel boli, emetico aliquo puluerisato,*  
*cum conserua incorporato, (sic certè se-*  
*piùs recentiores Antimonij vitrum, crocum*  
*metallorum, Mercurium vita usurpant) quod*  
*idem fieri poterit cum aliis vomitoriiis,*  
*quæ agunt majore quantitate, ut asaro,*  
*radice pepon. &c. si hellebor. album exci-*  
*pias, à quo in substantia exhibendo ab-*  
*stinendum, infusione vis ipsius catharti-*  
*ca elicienda. Forma liquida videtur com-*  
*modior: quod humiditate ventriculus*

pēfundatur, laxetur, minori vi excet-  
nenda isto moṭu excutiantur, & faciliūs,  
quōd simul omnia diluantur, nec ita ad-  
hētere possint, quod aliās s̄e piūs sit. Item,  
quōd ventriculus repletus, & sic faci-  
liūs excernat. Aliās enim inanior toto  
fundo ad os superum adduci debet, &  
inveri, ad eorum excussionem. Quic-  
quid sit, si formam istam solidiorem vo-  
laeritis usurpare, id facietis pulvere se-  
quente sumpto, vel per se ex cochleari,  
cum paucō liquore, vel mixto cum con-  
scrūx idonea 3 ij. 3 iij. forma boli. Sic  
autem pr̄scribentur hactenus quidem  
vſitata.

*Radix afari* à 3 j. ad 3 iiij.

*Radix pepon.* sicc. à 3 ij. ad 3 j.

*Semen vrtic.* à 3 ſ. ad 3 j.

*Semen rapban.* à 3 iij. ad 3 ſ.

*Cortex ingland.* ad 3 j.

Sin autem recentioribus vſitata, ex  
mineralibus vomitoria affumas.

*Animonij virrum* ad 5 g. vj. viij. x. pr̄-  
scribes pro robustis.

*Crocini metallorum* ad 5. vj. viij.

*Sal. vitriol.* ad 3 j. 3 ſ.

*Vitriolum Roman.* vel *album preparatum*,  
à 3 ſ. ad 3 j.

**DISSOLVENDA** vel nulla vsurpantur, vbi propositum agere admodum leuissime, & occasionem tantum motus excretrici dare, vt suprà: item vbi liquor sat vomitorius fuerit, sed maximè, si excernenda ad euacuationem illam per superiora sunt præparata: sin contrà res se habeat, alia dissoluuntur in liquore iam dicto, quæ statui possunt duplia, *vomitoria*, & non *vomitoria*.

*Non vomitoria* in decocto vomitiuo sapit, & visitatiuo vsurpanda, vt & in liquore non vomitiuo, ratione qualitatis, triplicem finem maximè respiciunt; excretricis impulsionem, excernendi humoris præparationem, & correctionem symptomatum, quæ ab eo, aut vomitorio euenire possent.

*Aliæ* enim oleaginosa, pinguia, quæ ventriculum subuentendo, excretrici licet irritatae, difficulter tamen agenti, occasionem dant, ideo ferè tantum in leibus vomitoriis, vbi ventriculus facile est vomiturus, aliâs minùs prosunt, utiles etiam ad humorum, vel assumptorum, & venenorum acrimoniam compescēdam; talia sunt *oleum communie*, *oleum semi. lili*, *butyrum*.

*Aliæ usurpantur ad frangendam vim succorum biliosorum, mordacium, ut acetum, oxymel simplex, syrpus acerosus.*

*Aliæ* (qui etiam præcipuus dissoluentium scopus, ) humoris excernendi præparationem respiciunt; suntque vel detergentia, ubi humores vitiosi eluendi à ventriculo, vel quando lenti, viscidi, pertinaciter adhærentes, qualis passim pituita, talia sunt, oxymel simplex, oxymel scylliticum, saccharum, mel: vel incidentia, & attenuantia humores crassos, oxymel simplex, syrpus acerosus. Notate obiter, male quosdam oxymel & syrpus acerosum recensere inter vomitoria, contra experientiam, cum acetum, ( odoratum huic sumptum, ) à quo præcipua ipsorum vis, adstringere videamus, sanguinis eruptions ab isto sisti, alui fluxus, vomitus, ita ut forsitan ipsorum sit usus ad humores præparandos, quod facilius sine labore possint excerni.

Ratione quantitatis, ab  $\frac{2}{3}$  j. ad  $\frac{5}{3}$  j. scilicet  $\frac{2}{3}$  ij. præscribuntur. Ceterum ista in vomitorio ex infusione, vel liquore alio destillato non dissoluuntur, cum ante illorum exhibitionem præparatio ferè præcedere soleat, tunc etiam, quod liquore

108 *Method. Praescribendi*  
ille acetum isti scopo satisfaciat: tamen ne-  
que errabis, si dissoluas.

*Vomitoria* verò usurpanda ( ubi liquor  
nullo modo est vomitorius ) sunt aliquot  
ex supra dictis, dosi etiam ibidem relatâ.

**V S V S.** In eo tria consideranda , quo-  
modo , quantum , quando .

Quod ad modum, ut vomitoria usitatè  
& commodiùs liquida usurpantur , sic &  
tepidè sumi debent. Nauseam enim sic  
facilius concitant , & excreticem ad  
expulsionem molestant. Quod si formâ  
boli exhibeantur , sumenda erunt , ut &  
ipso solent. Sed commodum erit, post di-  
midiam horam , vel integrum elapsam  
liquorem aliquem tepidum exhibere , ad  
ejectionem faciliorem.

Quod ad quantitatem, seu *dosis* : simplex  
vomitorium ad fib. j. ritè sumi potest ab  
adultis & grandioribus : sic enim ventri-  
culi excretrix grauatur magis.

Compositum ex decocto , idque me-  
diocre ad  $\frac{3}{4}$  viij. x. dosis infusi ( liquoris  
etiam vomitiui ) & ubi dantur in sub-  
stantia , supra expressa: quantitas etiam  
liquoris non vomitorij ad  $\frac{3}{4}$  viij.  $\frac{3}{4}$  x.

Quod ad horam exhibendi , in motbis  
chronicis manè , jejunio ventriculo pur-

gantium aliorum instar, ritè poterunt assumi, maximè, si humores nauseam facientes sint tenuiores: sic enim facilis sequitur vomitio: vbi contrà lenti, crassì, viscidi, post cibum sumptum erit expeditius, & cum minore labore; in morbis periodicis, febribus intermittentibus maximè, hora paroxysmi: quandoquidem & naturam videamus passim tunc temporis, hac via euacuationem molitis quavis autem hora sumuntur, noxia qua-  
uiste, (ut veneno) assumptā.

### Hæc autem erit FORMVLA PRÆ-SCRIBENDI.

1. Si ex decocto. R. &c. fiat decoction in &c. q. s. cape de colatura, &c. fiat vomitorium, quod sumat tepidè, tali horâ, & si paulò pòst non rejecerit, vomat dìgito in fauces immisso: si quidam volueris dissoluere, addes, cape de colatura, &c. in quibus dissolute, &c.

2. Si ex infuso. R. &c. fiat infusio in &c. colentur omnia, & filtrantur per chartam emporeticam; ( quandoquidem enim ex validioribus constat ferè infusum: si sola colatura esses contentus, metus esset, ne quid crassioris substantiæ vñia effunderetur, quæ postea ventriculi

**TIT.** *Method. Praescribendi*  
vnicis diutiūs adhærens , ad vomitūm  
diuturniorem , & molestum ipsum con-  
citaret,) fiat vomitorium, &c.

3. Si ex liquore destillato. R. Liquo-  
ris talis , &c. sumat , & paulò pōst vo-  
mat.

4. Si ex liquore non vomitorio R.&c.  
in quibus dissolute, &c. fiat vomitorium.

5. Si forma solidiore , & pulueris qui-  
dem. R. &c. sumat ex cochleari , cum  
liquore idoneo : boli verd, R.puluer. &c.  
misce cum conserua tali, fiat bolus, quem  
sumat, & paulò pōst vomat.

**UTILITAS.** Vomitus , siue vomito-  
ria olim apud antiquos , tūm ad ~~αγριό-~~  
~~καιτίην~~ , & morbos præcauendos , tūm ad  
~~αγεωνίας~~ fuēre vñitatissima ; in more  
siquidem majoribus fuit , sanitatis tuen-  
dæ gratia singulis mensibus vomere , vt  
passim apud Hippocratem ; unde & ob-  
hanc consuetudinem vomitoria vehe-  
mentiora facilè ferebant.

Hodie ferè tantū ad ~~αγεωνίας~~ , &  
minūs frequentes sunt , qui ad morbo-  
rum præseruationem in statu sano vñsur-  
pent , nisi intemperantix admodūm de-  
diti , neque etiam a tuo nostro in morbis  
ipsis passim indifferenter vñsurpantur ;

sed contumacibus ferè & chronicis.

Vomitorij autem in genere vtilitas alia est *particularis* ventriculum respi- ciens, alia *vniversalis*, regionem publicam aut partem aliquam regionis alicuius, humorē peccantem ipsarum euacuans: aut deriuans, vel si aliunde in ipsas altius influat, reuellens, conferente ad illum motum naturæ, & humoris incli- natione, seu vergentiâ partium, seu locorum, in quibus restagnat, aut in quas illabitur, & viarum, per quas fieri debet illa deriuatio ac reuulsio, cum illis & ventriculo proximitate, & vicinia, aut Continuitate, & communione, metatibus patentibus, & omnibus naturaliter dispo- sitis. Ita ut vomitorium in genere reme- dium sit vacuans, seu catharticum, tūm particulare, ventriculi; tūm vniuersale, deridans, atque reuellens.

Vacuat autem in specie, 1. quidem ventriculum, ab omnibus humoribus excrementitijs, biliosis, pituitosis, ma- xime tenuibus, crassis, viscidis, vitio proprio congestis; vel è toto corpore, capite, visceribus, venis cò delatis, quos sinceros ex ipso fonte, siue in ventriculi capacitate inundent, siue tunicis illius

impaeti, excludit. Hinc affectibus ventriculi idiopathicis confert, præsertim appetentiæ languenti, nausea, vomitui crebro, ventriculi doloribus, cardialgiæ, &c. unde & per consequens prodest alias partium morbis, per ~~mutus~~ *Stix*, quam illæ habent cum ventriculo, contractis: exhaustâ enim ipsâ scaturigine, unde manabant, statim euanescent. Hinc Galenus dicebat pericranio opitulari, epilepsia, vertigini, suffusioni etiam nū, omnib[us]que aliis capitis affectibus, per consensum ventriculi genitis, translato illuc humore morbifico, vel vapore tantum expirante ab illuie ventriculi suscitato: ventriculum etiam statim, & commodè hac viâ alii assumptis expurgat, nimio nempe, vel prauo cibo, potu, crapulâ, cruditate, veneno.

Vacuat deinde ex Galeno, & primam regionem à variâ impuritate, & ipsam illuicem, ex cauis hepatis, liene, pancreate, mesenterio, venis mesaraicis, atque vicinis aliis ventriculo partibus sicutram expurgat, & vt ipse notauit, quam aliud vehemens catharticum sapientius non potuerat exturbare, excludit, quâ ragione morbi istarum partium ad in�aculum

contumaces fuere sanati. In ventriculum enim ex iis locis viæ breues, & expeditæ, hinc & istarum partium affectibus variis confert, non tantum idiopathicis : cachexiæ, ictero, hydropi, licnis, & hepatis obstructionibus, febribus intermittentibus, quæ ibidem habent suum fomitem, &c. sed etiam prodest, ut dicebamus, ventriculo, aliarum partium morbis ex consensu iam dictarum otiundis, quarum impuritates causæ antecedentes istorum affectuum sympathicorum hac viâ ex Galeno commodissimè evacuantur.

Postremò, ex eodem Galeno lib. 1. de Febribus, secundam etiam regionem expurgat, & tertiam ; sed per consecutionem quandam, nisi utaris validioribus, ut veteres olim suo Hellebotismo, quo etiam ex partibus remotissimis excrementitious succos in ventriculum alliciebant, eadem ratione, quâ cathartica valida videmus attrahete. Vnde, quandoquidem non est tutum uti validioribus ad vacuandum, ratione istatum regionum reuellens censetur remedium.

Vtiliter etiam prodest, ubi humor in partibus ventriculo vicinis continetur,

aut in eas etiam aliunde delabitur, quí  
hac via per vomitum commodissimè de-  
triuatur: qua ratione prodest inueteratis  
affectionibus hepatis, lienis, mesenterij, in-  
testinorum. Hinc hypochondriacis affe-  
ctionibus prodest, modò dictarum partium  
morbi non fiant ex flatu, intemperie ca-  
lida, tumore.

Reuellit etiam humorum impetum in  
varias partes, siue fluxionis origo sit ven-  
triculus, siue partes prima regione con-  
tentæ, & vitiosos succos, in eas illabétes,  
ad ventriculum reuocat, unde extrudit  
per vomitum. Unde, vt suprà, affectioni-  
bus capitis per sympathiam confert, al-  
ii fluxionibus, ischiadicō & articulorum  
dolpri. Ita vt Galenus concludat vomi-  
tum esse omnium purgationum saluberi-  
stimum, modò facile fieri, & moderatè:  
quæ autem in eo prouocando sint obse-  
vandæ cautelæ, vide apud Hipp. in  
*Aphorismis.*

## C A P. VI.

## DE VINIS MEDICATIS.

**V**INVM medicatum, ut in usu fuit etiam  
num apud veteres, quemadmodum vide-  
re licet apud Dioscoridem : ita hodie frequen-  
tissimum, maximè apud Septentrionales, &  
delicatos plurimos passionis, qui ab alterantibus,  
& purgantibus decoctis, syrups, infusionibus,  
potioribus vulgaribus abhorrentes, ob injunc-  
tum diutius eiusmodi vino, simplicium  
corundem virtutibus imbuta, amplexantur,  
nec sine fructu, qui inde uberrimus emergit  
tum quod vinum vires medicatas rerum bibat  
penitus, ac eliciat, tum quod easdem, spi-  
ritu suo tenuissimo ducente, altè trajiciat in pro-  
fundissimos quoque recessus. Adde, quod, cum  
vino absinthite plerique, probante gustu, fa-  
miliariter vitantur, ut & Hippocratico dicto,  
occultis sub horum sapore variis purgantibus  
falli possint ad purgationem difficiliores, ut non  
deprehendant.

**E**st autem VINUM MEDICATVM,  
quod vires variorum medicamentorum simpli-  
cium, in se infusorum, ebiberit, ad purgandim  
vel alterandam comparatum.

*Hinc duplex statui possest in rem præsentem  
aliud Purgans, aliud Alterans.*

**COMPONITVR** autem vtrumquæ in genere, i. vel ex musto, quale vindemia- rum tempore tantum, idè & maiore copia, parandum est, ad usum diuturnum sc. quem requirunt chthonici affectus. Hac autem ratione conficitur. Medicamenta sicca inundata, crassiusculè con- tundantur, & sacculo lineo rariori incla- sa, indantur in dolium, ( majus, minus, pro vini parandi quantitate majore, mi- nore, & usu brevi, diurno, ) musto re- centi plenum; ita ut medio musto iuma- tet, bulliant simul, ac fermententur per aliquot dies: mustum ubi decreuerit, no- rum subinde affundendum, ubi verò de- ferbuerit, macerentur omnia vase clau- fo, per 15. 20. dies: vinum sic defæca- tum transuasetur, ( ne longiore macera- tione ingredientia corruptelam, situm, ingratum quid, ac noxiū trahant, idque vitium vino concilient, ) ac in usum re- conde.

. . 2. *Vel ex vino iam defæcato ac reposi- to, quale quovis tempore parabitur, idè & minore, si lubeat, quantitate con- ciendum, pro usus necessitate hoc mo-*

do. Medicamenta sicca, mundata, contundantur crassiusculè, conjiciantur in vas vitreum, ( maius, minus, pro vſu, & quantitate quam exoptas ) affundendo vini albi optimi, vel alterius generosi triplum, quadruplum, sextuplum, octuplum, ( vel etiam plus, prout illius dosin largam, parcam, vſum diurnum, vel breuem esse volueris: ) omnia vasa obsignato macerentur per 8. 12. 15. 20. dies, ( si maior copia paretur,) aliàs per 3. 4. si minor & maximè, si vſum proximum desideres, coletur deinde, & transuasatum reponatur ad vſum. *Vel* ( ad odorem, & saporem gratissimum, & delicias,) transcoletur s̄xpiùs per manicam Hippocratis, ( si minor paretur quantitas, aliàs p̄t̄stabit iam dicenda in illud trāscolatum immittere,) dulcoretur, & aromatizetur, cum facchar. q. s. sic fiet, quod claretam, vel claretum, vel vinum Hippocr. purgans, aut alterans possis appellare, maximè si aromata sat copiosa simul infuderis.

In specie vero, quia quædam in utroq; obseruanda, speciatim etiam de utroque agemus, exorti à purgante.

## Vinum medicatum purgans.

*Vinum medicatum purgans dicitur, quod variorum simplicium purgantium infusorum vi imbutum est; ad unum pluresque humoris vacuandos comparationem.*

*Est autem illud ratione Compositionis vel simplex, ex uno tantum simplici carbarico constans; additis tamen proprijs correctiis, vel compositum, quod vel ex pluribus purgantibus, solis tantum cum suis correctiis, est concinnation, vel cui infusa sunt finalis alterantia, partem, humorum respiciens.*

**II.** Ratione vero qualitatis ipsorum purgantium, & humorum vacuandorum, aliud est catholicum, &c.

**III.** Denique vel sine dulcioratione, & amarizatione, ex iam dictis solis constatur, & vinum medicatum purgans simplicitet dicitur, vel insuper saccharo conditur, & aromatizatur cum cinamomo, colaturque sapienter manica Hippocratis, & Clareta, vel Claretum, ac vinum Hippocraticum purgans appellatur: (*absolutè enim sonat vinum illud, quod ad delicias.*)

In eo tria consideranda: *Compositio*  
*Vsus. Utilitas.*

In COMPOSITIONE tria examinanda;

1. *Vinum*, ex quo.
2. *Infundenda* in eo.
3. *Dissoluenda* aliquando.

In omnibus expendenda *qualitas*, & *quantitas*.

VINVM ratione *qualitatis*, vel non-dum defecatum est, ac recens, quod aliis mustum appellatur: quod ad hoc opus laudatur maximè: quandoquidem huius beneficio, ac feroore color melius occultatur, & sapor alienus infundendum: vel vinum iam defecatum, & iam in usum repositum, rubrum, vel album.

Ratione vero *quantitatis*, hanc in genere quidem sic limitabunt usus, dosis infundenda, vt si usus diuturnus esse debeat, brevis: dosis maior, minor, largius vi-num, parcus sit assumendum: vt habito simul respectu ad infundenda sit octuplum, sextuplum, quadruplum, triplum qui namque duodecuplum affundunt, & plus etiamnum, id faciunt forsan in gratia bibulorum. Præstabit enim semper pro vino purgante quantitatem minorem adhibere, vt dosis ipsius minor existat, & acceptior.

*Speciūm* vero, cathartica infundenda, & vini dosis futura maior minorque, vini quantitatem sic accuratè definiunt. **Vinum purgans praescribendum, V. G.** in 12. dies continuos, vel alternos usurpandum, ( ex leuioribus ad humores morbificos sensim expurgandos, ) prescribantur catharticorum doses in infusione 12. addantur corridentia propria, & si opus fuerit, alterantia etiam idonea; horum omnium quantitas postea supputetur, sintque V. G. corum 3 viii. iam si vini futuram dosin velis esse 3 j. 6. 3 ij. circiter, ipsum triplum prescribas, et si deinceps pro libitu, eadem via, eadem ratione procedendum, ubi vinum paratur, vere catharticum, ex purgantibus leuioribus, & facilitioribus, 4. 5. 6. vicibus assumendum, per debita interualla, more syruporum magistralium.

**INFUNDENDA** ratione qualitatibus, sunt 1. vel cathartica sola, cum suis correctiis, ( inter quæ *cinnamomum* maximè admittitur, ob aromatis gratiam & saporem : tunc etiam *calamus officinarum* aromaticus, ob odorem jucundissimum, ) unum, plura; seligenda maximè quæ non sint alieni omnino, & ingredi saporis, qualia

qualia sunt *senna*, *polypod.* *epithym.* *hellebor.* *niger*, ( pro melancholicis maximè, ) *carn-*  
*tham.* *turbitb.* *hermedact.* ( pro pituitosis, )  
*scammon.* *castia*, *manna* aliquando, ( pro bi-  
*lliosis* *delicatis*, licet raro, ) *mecboac.* *sem.*  
*ebuli*, ( pro setosis humoribus expurgan-  
*dis* ) ex quibus ad humores quoquis pur-  
*gandos*, *vina* *commode* patari poterunt,  
*usque* *solis*, *vel*, pro humorum & indica-  
*tionum* *complicatione*, mixtis.

1. *Vel* etiam simul cum iis infundun-  
*tur* alterantia varia *sicca*, *ligna*, *radic.* *cor-*  
*tic.* *fol.* *sem.* *flor.* *aromata*, *pauciora*, *plu-*  
*ra* simul, que humorem, partem respi-  
*ciunt*, quò ipsi *vina* reddantur magis ap-  
*propriata*: passim autem Germani, qui-  
*bis* placet, *absinthium* admiscent.

Ratione *quantitatis*, ( siue sit *vnum*  
*tantum* *simplex* *purgans*, siue *pluta* *si-*  
*mul*, ) *eam* *definiet* *numerus* *dosum*, in  
*quas* *vinum* *parare* *consuetum* est: V. *G.*  
*vinum sennatum* desideratur in 20. *dosest*  
*senna* autem *dosis* in *infusione* *recte* *facta*  
*z* *B.* 3 *vj.* ergò *ipsius* *z* *x.* *xv.* erunt *pre-*  
*scribendæ*, & *addenda* *correctiua*, *pro-*  
*portione* *suprà* *dicta*.

Si *vinum* *ex* *pluribus*, *leuioribus*, *for-*  
*tioribus*, *purgantibus* *simul* & *alteranti-*

122 *Method. Prescribendi*  
bus etiam præparetur, hæc proportio fe-  
rè obseruanda:

Catharticorum leviorum, probasi sc.  
sit pars vna.

Catharticorum validiorum subqua-  
druplum, vt vulgè, ( licet etiam subtri-  
plum, subduplum adderes, perinde esset,  
modò dōlin vini rectè definias. )

Correctiua subquadruplā proportio-  
ne ad cathartica, vel etiam subtriplā vbi  
validiora.

Alterantia subduplā ad cathartica, ne-  
que obstat si subtriplā, ( vbi efficacio-  
ra, radic. siccæ, semin. aromata maxi-  
mè, ) aduertendo obiter, folia siccâ ma-  
nipulis, vinciis, & drachmis præscribi, vt  
& flores pugillis, vinciis etiam, drach-  
misque.

DISSOLVENDA ratione qualitatib.,  
( si aliquando scil. sapor, vel odor, deli-  
catiorum palato minus arrideat, ) sunt  
saccharum, & aromata aliquot, præfer-  
tim cinnamomum, quæ vel in vinum conji-  
ciuntur, ( si copiosius,) vel si contraria pau-  
cius, in manicam Hippocratis, & vinum  
sæpiùs super ipsa colatur, fitque hippo-  
craticum purgans.

Ratione verò quantitatis, pro lib. j. vin-

cathartici, sacchari sint  $\frac{3}{4}$  iiij. vel  $\frac{3}{4}$  jjij. cinnamon.  $\frac{3}{4}$  ij. quemadmodum etiam Apozemata, Iulepi, & Vinum Hippocraticum vulgo fieri solent, & aromatizari.

Quod ad V S V M , in eo duo maximè consideranda, quantum, & quando.

Quod ad quantitatem , seu propinandi vini defin , hæc vniuersim non una est, sed diuersa admodum , quam, cum quacunque tandem quantitate catharticerū, vel vini , vinum composuetis , ex atque hac ratione sic inuestigabis , ac legitimè definies.

Vinum medicatum, cùm transuasatur, vel colatur, mensures, & ex mensurâ pōdus collige, vel aliâ ratione id facias: sicut vero ipsius V.G. lib. iij. hoc autem factum fuerit purgans ad melancholiā, cum senna  $\frac{3}{4}$  liij. polypod.  $\frac{3}{4}$  ij. epibym. & hellebor. nigr. ana  $\frac{3}{4}$  j. B. additis correctiuis ad  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j. B. Hæc omnia infusa , quandoquidem doses purgantes xvij. quæ in xvij. vices sufficiunt, si vinum in totidem diuiseris, habebis inuentum sine errore, eritq; do sis ipsius  $\frac{3}{4}$  ij. si purgandum vnâ vice fortius : sin eodem uti consilium est ad purgandum per dñm xp̄m, per aliquot dies, do sis dimidia sufficiet.

Quod ad *Tempus*, quandoquidem vi-num medicatum affectibus chronicis, & contumacibus, frigidis maximè, desti-natur, (quales ab humore mucilaginoso, & fæculento plurimi inueterascunt,) quo-rum causas non confessim, sed non nisi paulatim exscindas, vsus ipsius erit diu-turnior, ad plures dies (hiemis tem-po-re præsertim,) 10. 15. 20. continuos, vel etiam alternos tantùm, instar pilularum vñzialium, sic manè, vel duabus horis ante prandium poterit propinati; quòd si non instituatur in purgationem huius-modi, quæ fit per *Dixipanū*; sed ad eua-cuationem vnâ vice validius, vsus erit qui aliorum eradicantium, manè, præ-scente purgandi indicatione: aut si syrupi magistralis loco præscribatut, vsus ipsius idem erit, semel vel bis in mense, manè aliorum catharticorum more.

FORMVLA autem PRÆSCRIBEN-DI ex componédi ratione satis eluccescit.

**V**TILITAS. Quod ad vtilitatem, in genere quidem, siue respicias simplicium, quæ insunduntur prolectandas vires, quas vinum in se copiosè resoluit, elicit ac effundit, siue attendas trajectiōnem carundem in penitissima quaque corpo-

ris, spiritu tenuissimo ducente; vel confidetis ipsius cum naturæ genio familiaritatem, ob quam ab ea amicissimè excipitur: aut aduertas indolis propriæ symbolum, quo substantiâ suâ aëreâ cognatum est symphyto partium solidarum humido, calori, ac spiritui, propter quod in ipsa sine negotio facessit, iis vnitur intimè, & simul cum ipso vis rerum energetica, quam maceratione biberit altissimè, in continentia, contenta ducitur, fructus certè ipsius non potest esse nisi vberimus: ita vt siue sit purgandum, & secernenda illuuies, humoribus, spiritibus, partibus solidis confusa, id fiat perfectissimè, in quæuis, ob naturæ familiaritatem & symbolum, vti dictum, altissimè se insinuante, agente proin vi, quâ imbuitur efficacissimè: siue sit alterandū vario modo, reliquæ impuritatum acerbatur absumenda, pristinus vigor restituendus appropriatis, aut partium robur confirmandum, id fiat hac eadem ratione efficaciter, ob naturæ sympathiam, qua illis vnitur cum virtute medica penitissimè. Licet autem tanta sint vni medicatiæ beneficia, tamen non ita passim apud quasvis gentes, & regiones in vsu,

neque quoquis anni tempore: frequentius enim iis usurpatum, qui solum algidum inhabitant, per hiemem maxime, vete, & autumno.

*In summa, regione frigidiore, anni tempore etiam frigidiore, corporis temperie, &c. ut speciatim vinum purgans sit utilissimum, in affectibus chronicis, frigidiore anni tempore: delicatis passim, ad pallidos colores prescribitur, ad asthma, obstrunctiones viscerum pertinaces, & diuturnas, paralyticis etiamnum; licet vino iis interdicatur, cuius certe loco oenomel excellentius existit: in ventriculi affectibus, debilitati à crudis frigidisque humoribus, vinum absynthites purgans eximum.*

### *Alterans vinum medicatum.*

*Vini alterantis ambitu continentur vina variis facultatibus imbuta, que tunc partes quasdam proprietate respiciunt, blemorum morborum reliquias in iis atterunt, & delectent vestigia morborum, & simul specificè corroborant, (qualia ex simplicibus, vinum saluatum, affectibus cerebri frigidis, enularū, hyssopi, pectoris, absynthites, ventricula-*

familiares, ) tum que vacuant; sine cathartico-tamen, ( ut vina diuretica, sudorifica, que ad calculum, menses mouendos prescribuntur, ) tum etiam, que vires partium principum excitant, fount, confirmant, qualia que ex aromatibus, ad corroborandum, conficiuntur.

Est autem, ut purgans, ratione compositionis, vel simplex, vel compositum.

Ratione operationis, vel alterans in primis; secundis, tertis qualitatibus, corpus, humoris, spiritus: vel corroborans.

Insuper, vel sine dulcoratione, & aromatizatione conficitur, & simpliciter vinnum medicatum alterans, vel una iis conditur, trahaturque saepius per manicam Hippocraticam, ut supra, & Claret a vel vinnum Hippocraticum dicunt, licet tale, vi supra, quod ad delicias.

In ipso tria etiam perpendenda. Compositio. Vsus. Utilitas.

**COMPOSITIO** eadem, quæ vini purgantis est, vel enim cum musto, (quando usus debet esse longus, in affectibus chronicis, contumacibus alterandis,) ex uno simplici medicamento sicco, vel pluribus, affectum, humorum, & partem proprietate respicientibus, vel cum vino iam reposito.

Quæ autem proportio esse debeat mu-

sti, vini, & ingredientium siccorum, suprà initio, & in vino purgante declaratum. Addas tamen obiter: quia vina alterantia maiore dosi propinari possunt, ac debent, vinum etiam maiore quantitate, decupla, vndecuplaque posse affordi.

*Quantitatem* verò vini & ingredientiū, definiet dosis futura major, minor, usus breuitas, longitudo, simplicium etiam qualitas debilior, efficacior, qualem vim aromata profundunt.

Eiusmodi vina si trajiciantur per manicam Hippocr. & dulcorentur, diximus suprà appellari *Claretum*.

Huc etiam pertinet, quod alias *Hippocraticum* simpliciter appellant, quod simul est corroborans, ex variis aromatibus, odore, sapore, gravioribus; *cinnamom. zingib. gr. am. paradis. card. mom. piper.* infusis ad 3 ij. in vini rubri lib. per horas aliquot, colatis denique per manicam, addendo *sacchari* q. s. vel 3 ij. 3 iiiij. passim verò sit simplicius, & visitatius ex solo *cinnamomo*.

Cæterum, si loco sacchari vinum medicatum melle condiatur; non erit inutile, imò frugiferum in affectibus frigi-

dis, quibus vinum meracum innocentius aliquando est, ut in Paralyssi, &c. melle eximioperante, vocarique poterit *œmamel*, seu *mulsum*, aut *vinum mulsum*, quale etiam olim veteres usurpabant; ex melis parte 1. & vini 2. 3. additis aromatisbus, si opus, proportione subdupla, subquadrupla, subquintupla.

*VSVS quando, & quantum* continebit.

*Quod ad Tempus*, exhiberi poterit singulis vel alternis diebus, vel etiam longiore temporis interstitio, prout morbus requiri per horam 1. 2. 3. antè prandium.

*Quod ad quantitatem*, dosis ipsius pro quantitate, & qualitate ingredientium: ac vini proportione, varia existit: ubi enim ex paucioribus & minus efficacibus rebus infusis, ac vino copioso, sextuplo, decuplo fit, eò maior semper dosis exhiberi poterit, & contrà.

In genere verò, ab  $\frac{5}{3}$  j. ad  $\frac{7}{3}$  iiiij.

*FORMVLA autem PRÆSCRIBENDI*, patet ex superioribus.

*VTILITAS* etiam ex superioribus clucessit: Efficacissimè operatur in reliquis morborum alterdìs, discutiendis, abscondendis, partibus per affectus chro-

nicos languidis confirmandis, corroborandisque, sudoribus etiam mouendis, urinis, mensibus: & nullus ferè affectus, modò chronicus, frigidus, qui ab eo frumentum non percipiat.

## C A P. VII.

*DE EMULSIONE.*

**E**MULSIO medicamentum alterans iuniorum inuentum est, à demulcendis affectibus, vel certè potius, quia lattei similis, aut quod lactea illa substantia affusione liquoris, lactis instar, eliciatur, nuncupatum.

Est autem EMULSIO medicamentum formâ liquidum, petulcentum, ex medulla frumentorum seminum quorundam confusa, affuso liquore idoneo, instar lactis emulsum, ( unde nomen ) ad alterandum vario modo in rem presentem comparatum.

In ea tria considerantur : *Compositio. Vsus. Utilitas.*

In COMPOSITIONE tria.

1. *Materia*, ex qua confusa lac istud elicetur.

2. *Liquor*, cum quo emulgetur.

3. *Dissoluenda in eo.*

In omnibus qualitas, & quantitas.

MATERIA ex qua, ratione qualitatis, sunt tūm fructus, amygdalæ nempè dulces excorticatæ, tūm semina, q. nempè frigida maiora, ex quibus vulgo passum emulsiones vītate parantur.

His adduntur etiam aliquando alia, tūm fructus; nuclei nempè pincorum, in affectibus thoracis, & vbi cum humectatione restaurandum, vt in hæticis; tūm semina, vt passum papaveris albi, lactucae, portulaca, vbi somnus conciliandus, vel magis refrigerandum, aut tenues humores feruidi incrassandi, & eorum actinomia simul demulcenda.

Ratione quantitatis, in genere, tūm fructus, tūm semina ad 3j. 3 iij. præscribuntur. In specie verd, fructuum sint 3j 6. 3 ij. sem. 3j. 3j 6.

LIQVOR ad laetearum illam substantiā emulgendam, ratione qualitatis, est vel aqua simplex, vel vītate bordei decoctum, maximè vbi detergendum, vel prisana, aut decoctum radic. liquirit. vbi lenendum magis, vel decoctum aliarum terum iucundatum, facientium ad scopum.

Ratione quantitatis, pro quaue dosi 3 iij. 3 iiiij. sufficient: vnde cūm emulsio-

132 *Method. Prescribenzi*  
nes in tres doses ferè tantum vslitatè pre-  
scribantur, ( plures enim diù sine labe  
non asseruantur, ) liquoris  $\frac{3}{4}$  viij. vel  $\frac{3}{4}$ .  
j. erunt præscribenda.

**DISSOLVENDA.** Ratione *qualitatis*,  
præscribitur aliquando *saccar.* solum,  
vel quod passim receptum, syrpus ali-  
quis idoneus sapore gratissimus, qui hu-  
meet, leniat, aut refrigeret, ut passim,  
*syrpus violaceus, capillor. vener.*

Aliquando & ad gratiam maiorem &  
delicias, iis præterea *aqua roscarum* addi-  
tur.

**Qui** manum Christi perlatam aliquan-  
do dissoluunt pro tabulis, non male fa-  
ciunt.

Quod ad *quantitatem*, dulcorantium  
 $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j. summum pro dosi sufficiet, *aqua*  
*roscar.* pro tota emulsione,  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j. ma-  
nus Christi pro quavis dosi,  $\frac{3}{4}$  j.

**V S V S.** In eo tria : *Medius, quantum,*  
*quando.*

Quod ad *medium*, sumitur vel per se,  
forma potis, vel ctiam sepè ipsius præ-  
scribuntur  $\frac{3}{4}$  iiij.  $\frac{3}{4}$  iiiij. cum decocto aut  
juscule pulli alterato sumendæ.

Quod ad *quantitatem*, dosis ex iam di-  
atis clucescit.

Quod ad *tempus* seu *horam*, manè & vesperi assumitur: quod si præscribatur ad somnum conciliandum, hora somni.

FORMVLA PRÆSCR. R. &c. contundantur in mortatio marmoreo, affundendo sensim, &c. in colatura dissolue, &c. fiat emulſio pro 3. vel 4. dosibus. Vtatur ut dictum.

VTILITAS. Non tantum emulſio præscribitur leniendis, & demulcendis affectibus pectoris, pulmonum, calidis & siccis maximè, renum ardori, veficæ, vrinæ actimoniz, feroori, gonorrhœæ, &c. vt passim volunt; sed & ad alios usus: ad sitim, ad quemuis aestum in morbis calidis quibusuis contemporandum, proinde in febribus continuis utilissima ad leniendam simul siccitatem, istorum morborum comitem, unde & in hebetis usitatè, ad somnum conciliandum, ad alterandum etiam in febribus, & aliis affectibus calidis, vice Apozematum.

Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum.

## C A P. I I X.

## D E A M Y G D A L A T O.

**C**OLORE & sapore non multum differt ab emulsione, nisi quod spissius existat vis-tatius. Duplex enim est; aliud liquidius, ex amygdalidis elicita lactea quadam substantia, instar emulsionis, ut supra sine vltâ coctione; aliud verò crassius, coctione inspissatum, de quo in præsemia.

Est autem MEDICAMENTVM ALL-MENTOSVM syrapi substantiâ paulò liquidiore, lactis instar, (vnde & tremor & lac amygdalinum vocatur) elicium, saccharoque conditum, ad alterandum simul & nutriendum comparatum.

Licet autem à Medico præscribi non soleat minutum; sed imperari tantum, Medicus in ipso tria considerabit; Com-positionem. Vsum. Utilitatem.

Quod ad COMPOSITIONEM, conficitur passim ex amygdalarum excertis. 3 ij. quæ teruntur in mortario marmoreo, af-fundendo sensim aquæ feruentis 1b. B. co-lantur deinde, additur sacchar. 3 j. 3 j B. 3 ij. pro lubitu, deinde parum coquun-

tur, exhibetur.

Nota, quod si ægrotans amygdalatum spissius exoptet, amygdalarum plus & sacchari esse addendum, & contraria.

Nota etiam, amygdalatum ubi ad vigilias vel somnum conciliandum instituitur, (quod sæpè fit,) *semen papaveris, laetucæ recipere.*

VSVS : quod ad *tempus*, exhibeti quidem potest quavis hora commoda ; sed passim hora somni visitatè exhibetur.

FORMVLA PRÆSCR. R. &c. vide emulsionem.

UTILITAS eadem ferè quæ emulsionis, temperat, lenit, refrigerat, humectat, hinc passim in affectibus pectoris demulcendis, expurgandis, in febribus, & aliis calidis affectibus, in vigiliis, &c. Vide emulsionem.

## C A P. I X.

### DE H O R D E A T O.

**Q**VOD nos bodiè à materia HORDEATVM, veteres, à modo parandi hordeum, Ptilanam vocabant, qui cibus erat ex hordeo pinsendo ab exteriore cortice mundato, (miozus

136 . Metbod. Prescribendi  
emim , pinsø , decorico , ) & aqua confectus :  
vulgè tremor hordei : nostra autem prisana  
potus est.

Et si autem vix præscribatur , C O M -  
P O N I T V R tamén vel crassiore mo-  
do , ex cocto hordeo mundato , quod  
vnà cum iuscule exhibetur , addito sac-  
charo ad lubitum : sed sanstantùm tale  
conuenit.

Vel , quod re verà hordeatum , ex hor-  
dei mandati ȝ ij. decoquantur igne len-  
to , in aqua limpidissima , quæ feruefacta  
abjiciatur , noua addatur , coquatur per  
4. vel 5. horas igne blando : hordeum de-  
inde colo trajiciatur , colato sacchari ȝ j.  
ȝ j. ȝ ij. ȝ ij. addantur , parum deinde tur-  
sum coquatur.

V S V S . Olim cibus erat febrentium ,  
hodiè datur sere circa horam somni , &  
tunc si vigiliæ vrgeant , additur simul pa-  
rùm emulsionis , cum papæ . abo præpa-  
ratæ.

V T I L I T A S . Summa in febribus , in  
quibus medicamentum alimentosum , re-  
frigerans , detergens , multum nutrit , eu-  
chymum : humectat , pectoris affectibus  
& hecticis optimum .

## C A P. X.

## DE LACTE, ET SERO LACTIS.

**L**ACTUM SEPISIMÈ VENIT PRÆSCRIBENDUM;  
IN PLATIFICIS & DYSENTERIA MAXIMÈ, IDQUE  
CUM CUCUMERA, TÙM IN LACTIS SPECIE, TÙM IN DOSI,  
TÙM IN MODO IPSO EXHIBENDI, ASININUM LANDA-  
TUR MAXIMÈ IN HECTICIS, QUIA RESTITUAT GEMINA-  
TUM HUMIDITATEM, SI QJ, BUBULUM: BUBULUM  
PONGISSIONUM, BURYROSUM MAGIS: OUILLUM CA-  
SIALEM: CAPTRINUM MEDIUM, EXTREMIS VILE.

Quod ad VSVM, DOSIN & MO-  
DVM PRÆSCRIBENDI, hic est. R.  
Lactis asinini, (vbi vis refrigerate, de-  
tergere; vbi verd magis nutrit, lactis  
captrini,) ʒ iiiij. sacchar. vel mellis, (ne  
corrumptatur aut acefcat,) ʒ j. idque pro  
prima dosi, pro secunda augendo ʒ j. ad  
ʒ v. donec venerit ad ʒ x. vel xij. deinde  
retrogradiendo ad primam quantitatē  
redeundo: sumatur autem 4. horis antē  
cibum, & ab ipso assumpto neque dor-  
miant, neque corpus agitet validius. Nun-  
quam autem nisi corpore repurgato usus  
ipsius incundus.

**VITILITAS.** Hecticis maximè dica-

fur, impinguat, citò reficit : in v̄su ipsius cauendum à corporibus impuris, quia in ventriculo frigido acescit, in calido æstuante nidorem inducit, vnde capit̄ dolor. hinc nec febrentibus, nec hypochondriis inflitis vtile : in dysenteria etiam valdè proficuum, tūm ad leniendum, detergendum simul, & vlcus solidandum, maximè si chalybeatum cum terræ sigillatæ 3 j. ad scutellam exhibe-ris, manè & vesperi, 4. horis ante vllum cibum. *Hac de lacte, sequitur.*

. SERVM LACTIS. Non est alimento-  
sum sed medicamentosum : vacuat sero-  
sos humores & adustos liberaliùs sum-  
ptum, refrigerat, febrentibus vtile, hepa-  
tis, renum ardori, per æstatis decursum :  
in melancholia vtilissimum, & affectibus  
ab ipsa profectis, lepra, scabic, &c. ma-  
xiñiè, si fumaria in cofuerit macerata.

Hic autem VSVS & FORMVLA  
PRÆSCRIBENDI. R. Serum Laetis,  
coletur, deinde bulliat, (tūm quia flatu-  
lentum, tūm vt quicquid inest casei, sub-  
sideat,) tunc in eo per noctem macere-  
tur, in lib. ij. scil. eius, fumaria M. j. Cichor.  
M. S. colato adde sacchar. 5 j. 5 j. S. secun-  
do autem die huic dōsi 3 ij. addendæ,

donec veneris ad it<sup>m</sup> iiiij. deinde serie præ-  
postera sensim ad it<sup>m</sup>. j. redeundo. Alias  
lib. j. sufficit singulis diebus assumenda  
per mensem, infundendo eandem fume-  
niam, addendo in colatura sacchar. 3j.  
& efficaciter in melancholicis, succi po-  
norum redolentissim tantudem: alias etiam  
ad febres & ardores simpliciter usurpa-  
tur, acetosa in ipsius 3 viij. macerata, &  
aliis refrigerantibus: idque manè hora v.  
vel vj. quatuor nempè horis ante cibum.

## C A P. X I.

## DE HYDROMELLITE.

POTVS mellitus est veteribus celeberrimus: illis melicratum, ditæ Mulsæ di-  
ctus hodiè etiam usitatissimus in abstemiosis, aut  
quibus vinum nocet.

Est autem duplex, vulgare & medicatum;  
sive simplex, sive compositum.

VULGARE duplex est, aquosum seu di-  
lutum, & vinosum.

Aquosum componitur quidem apud  
Mesuxum, ex mellis una parte, aquæ 8.  
hodiè dilutius ex aquæ 10. vel 12. pag-  
tibus.

Coquitur usque dum non spumescat amplius, ad quartæ sc. vel quintæ partis consumptionem, colatur, seruatur, conditum etiamnum ad gratiam, si voluerit assumens, cinamomo pauco 3 ij. iiij. 3 s. &c.

*Vinosum* est metacius, sic dictum, quod vini generosi saporem, & calidam vim æmuletur: sitq; veluti nectar maluaticū. Fit autem ex mellis parte una, aquæ partibus iiij. alij vij. alij viij. (perinde tamen, quandoquidem coqui debet, usque dum euum crudum innatet, reconde in vase præsertim vitro, occludatur, insolentur, vel in calido teneatur per mensim, aut 14. dies. Tale ferè Anglorum *meteglin*, nisi quod postea fermentum in nucleo ligatum suspendant in vase, ad 3 ij. V.G, & addant aromata ad 3 s. 3 ij. pro quantitate mellis iam definita, h. e. ad lib j.

**VVS & UTILITAS.** Pro potu ordinatio præscribitur, in affectibus frigidis & pituitosis præsertim, & ubi vini abstinentia juuat, vel usus noxius, ut in paralyssi: vel ubi vires eximias, & in frigidis humoris alterandis potentes, corroborando calori nativo querimus, mirè

conseruat à putredine: vt autem frigidis & senibus eximiè confert, sic noxius in febrentibus, biliosis & calidis: quia citò bilescit & amarescit, quemadmodū coctione nimiā & vetustate licet experi-ri. Hinc & Hippocr. in παροχόναις prohibet, & μηκετελάχιστος in quibus audiūs rapitur & confessim: unde crudita-tes & flatus incredibiles progignit. Est etiam Hippocr. diureticum, arcuata mitè detergens & expurgans.

Vinosum ista elegantiūs præstat, & in-  
star maluatici potenter coquit humores  
frigidos, expellet, roborat stomachum,  
coctionem, discutit flatus, & cruditates  
coquit, quemadmodum vulgare apud  
Galenum: ἀράκαθηπερ mirè promouet,  
efficax in Asthmaticis.

MEDICATVM componitur facile ex  
hydromellite simplici, cui incoquantur  
simplicia sicca, partem cui destinatur re-  
spicientia, & ea, quæ pro potu suauiora.  
Decoquantur autem postquam despu-  
matuni fuerit: sint V.G. herbarum M.iiij.  
coque, in colatura infundantur per 2.3.  
horas aromatum ȝ. s. ȝ vj.

UTILITAS efficacissima, & specifica  
vis, præter suprà dicta, in morbis tollen-

142 *Method. Praescribendi*  
dis, maxime frigidis inuetetatis, ut pa-  
galyfi, &c.

C A P. XII.

DE HYDROSACCHARO;  
& Ptisana.

**H**YDROSACCHARVM potus suauior  
est & delicatior quam hydromel: & in  
quibus hydromellis vsum ob calorem formida-  
mus, ad eadem ferè efficax, & abstemias maxi-  
mè conueniens.

Fit aquæ fontanæ, quæ fetuore re-  
purgata fuerit, partibus. 12. & sacchari  
albi parte vna, plus minùs.

Poteris aromatizare cinnamomio, vel  
santal is in febribus, ad 3 iij. 3 ß. Utatur  
pro potu.

**P**TISANA veterum cibus fuit, qui ho-  
diè vocatur Hordeatum. Nostra potus est, tūm  
suis, tūm febrentibus, & rbiæsius presens  
aut imminens, neque locus vino idoneus.

Fit autem varie pro sumentium libitu.

Vcl enim simpliciter ex hordeo inte-  
gro, & aqua fontana fit, vt illius pars vna  
sit, huius partes 10. 15. melius 20. vt pas-  
sim in officinis: coque ad cōsumptionem  
ib v. & usq; hordeum intumescat, (malè

Nicolaus ad consumptionem lib. xv. nisi  
id procibo) & eiusmodi decoctum vulgo  
in officinis vocatur aqua hordei, vel deco-  
ctum hordei.

Vel liquiritia, passula, gramen, radix ace-  
tosa, & alia pro lubitu ægrotantis simul  
decoquuntur, parca manu; sed vix ho-  
diè à Medico præscribitur.

**UTILITAS.** Humeat, refrigerat;  
detergit, alimentum præbet paucissimum,  
biliois & sanguineis accommodatissi-  
mum: febricitantibus, affectibus calidis  
hepatis, ventriculi, renum.

**NOTA.**, aquam hordei, seu ptisanam no-  
stram, vel decoctum hordei, constare ex hor-  
dei integri parte l. aquæ 20. cocti usque dum  
intumescat. Cremorem etiam hordei, usque  
dum rumpatur. Hordeum mundatum, coctum,  
usque dum abeat in pullem, Ptisanam veteram  
referre: si trahatur per seracum, vocari suc-  
cum Ptisana.

## C A P. XIII.

### D E D I A T A.

**N**OMINE Dieta audimus non tam re-  
gimen sex rerum non naturalium, quam

decocta varia ex sudorificis vñilibus hodiernis comparata, per quorum usum, quandoquidem exacta viuendi ratio, & accurata sobrietate obseruanda, hinc & ipsa Diæta fuere appellata, unde nominis origo.

Est enim DIÆTA, quam audiimus, decoctum ex uno sudorificorum quatuor vñitorum vel pluribus, in liquore idoneo factum, ad alterandum simpliciter, vel vacuandum insensibiliter, aut sensibiliter per sudores, comparatum.

Hinc Diæta eiusmodi duplex rectè statui posset: Alterans, vel Vacuans.

### Alterans Diæta.

Licet quatuor illæ hydrotica vulgaria, sudori proliendo tantum videantur esse dicata; tamen & præscribuntur s.e piùs cum magno frumento, in pluribus affectibus sine sudore efficacissime. Hinc & Diætam alterantem appello.

In hac tria consideranda: Compositio. Usus. Utilitas.

In COMPOSITIONE tria quoque: Materia, ex qua, Liquor, & Dissoluenda.

In materia qualitas, & quantitas.

MATERIA ratione qualitatis, in genere duplex.

1. Sudorificum aliquod ex vulgaribus;

Guaiaicum,

*Guaiacum, China, Sassafras, Salsaparilla.*

2. Alterantia varia, radic. fol. semin. flores, affectum, humorem peccantem, partem laborantem respicientia.

In specie verò variè seligitur ista matētia, pro varietate partium maximè, quibus inhærent expugnandi affectus.

In partium enim quarumvis affectibus pituitosis, in ueteratis, potenter alterandis expugnandisque, assumitur *Guaiacum, China, Salsaparilla*, sola vel mixta, una cum alterantibus iam dictis idoneis.

In affectibus verò pectoris, asthmate, phtisi, tabe, &c. (in quibus etiam passim hodiè usitatè & fetè tantum diæta eiusmodi alterans præscribitur, & decoctum pectorale passim etiam appellatur) seligitur sumitürque *China* sola, vel aliquando etiamnum ipsi additur, *Salsapar.* aut *lignum Sassafr.* una cum alterantibus thoracicis idoneis.

Ita ut ex dictis Diæta alterans duplex statu posse. 1. Non pectoralis, variarum partium affectibus pituitosis insensibiliter absumentis.

2. Pectoralis, decoctum nempe ex *Chinâ*, (aliquando & addita *Salsapar.*) fructibus & seminibus pectoralibus, comparatum: qualis

bodiè ferè tantum præscribitur.

Ratione quantitatis, sudotifica illa indiæta non pectorali, sola vel mixta, præscribuntur ad  $\frac{3}{2}$  vj. plus minus, habitæ ratione temporis, ætatis, regionis, &c. Alterantia verò, rad. fol. sem. flor. omnia simul vel ipsorum quædam, dosi media Apozematis præscribenda.

In Dixta autem pectorali, cuius basis China est, hæc si sola, (vt passim) ad  $\frac{3}{2}$  j. præscribitur, si vñā addantur reliqua dicta, horum  $\frac{3}{2}$  ij.  $\frac{3}{2}$  iij. ipsius (scil. chinoæ,)  $\frac{3}{2}$  vj. præscribuntur.

Alterantia verò, fructus pectorales ad  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  ij. ~~sem~~. pector.  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  j. ~~sem~~. et si aliquando in phthisi caro cancerorum, & testudinis abluta præscribatur: id fit ad  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  ij.

LIQVOR ratione qualitatis, in diæta alterante non pectorali est aquæ communis, vel liquor aliis idoneus, dictus in Apozemate, hydromel maximè: quandoquidem decoctum eiusmodi frigidos affectus & humores respiciat. In pectorali verò etiam aqua simplex, vel decoctus hordei sumitur; hac tamen cautela, quod in hoc liquore China infundatur, per horas aliquot, deinde hæc in ventre pul-

Ti vel gallinę exenterati concludatur, vna cum fructibus & semin. pectoralibus: coquantur deinde in liquore dicto, ad putrilaginem usque.

Ratione verò quantitatis, lib. 10. 12. vel q.s. ad perfectam coctionem requiruntur.

DISSOLVENDA. Ratione qualitatis, in non pectorali aliquando syrpus, vel saccharum, ( vna cum aromatizatione facienda) præscribitur dissoluendum, ut in Apozemate alterante.

In pectorali passim sacchar. rost. ptz: scribitur: potest & syrpus idoneus.

Ratione quantitatis, ista pro quaque dosi ad 3 j. 3 j. fl. dissoluuntur.

V S V S. In ipso tria: Modus, quantitas, tempus.

Decoctum non pectorale quod ad modum bibendo quidem; sed sine sudore usurpatur.

Quod ad quantitatem continuum, seu dominum, 3 liij. vj. sufficiunt. Quod ad discretionem, per 10. 15. dies usurpandum.

Quod ad tempus, manè sumi debet alterans eiusmodi.

Pectorale verò, quod ad modum, etiam sine sudore usurpatur.

Quod ad quantitatem, etiam 3 vj. quant.

*titatem verò discretam, per dies 15.*

*Tempus vero manè.*

## Hæc autem FORMULA PRÆSCRIBENDI.

—In decocto quidem non pectorali. R. &c. fiat decoctum, seruetur in vase vitro, pro 4. aut 5. dosibus matutiniis, quo corpore priùs purgato vtatur per 10. 15. dies, obseruato vietu sobrio & exiccente, ac pro potu vtatur decocto secundario, vel Bocheto.

In pectorali verò. R. (chinam vel alia) infunde in aquæ, &c. ponantur deinde in ventre pulli, vna cum fructuum, &c. coquantur deinde ad putrilaginem, addendo sub finem decoctionis, folior. &c. (præparantia,) exprimantur omnia, colectur, in colatura lib. j. dissolue, &c. produabus dosibus, manè calidè continendo sc in lecto per horas 2. 3. sine sudore, & continuando per dies 15. 20. 30. corpus autem priùs cum manua repurgandum, vt & singulis 15. diebus : & interim viuendum sobriè, ac pro potu decocto chinæ vtendum, vel hydromellite.

VITALITAS : insignis omnino est ista omnibus diuturnis affectionibus, vbi consilium adest, humorum illuuiem, chroui-

corum eiusmodi affectum fomitem, attenuare, resoluere, & insensibiliter vacuare, absumere, vias simul & ductus, per quos digeri debent, rarefacere, aut preparare etiam potenter ad purgationem. Neque tamen in iis licet uti tutò sudore, ut in asthmate & phtisi maxime, in qua ferè hodiè tantum diæta eiusmodi alterans prescribitur, in quibus affectibus purgantia noxia sunt, ut & sudorifica. Neque tamen humores istorum affectuum fomites, in thorace stabulantes, alia ferè ratione vix licet absumere, aut evacuare.

### Vacuans Diæta.

*Diæta vacuans, qualis hodiè ferè tantum prescribitur, auditur hic, que causas morbi- ficas per sudores exhauit, euacuat.*

*Est autem duplex: alia sudorifica tantum, alia verè simul cathartica.*

*SUDORIFICA tantum hodiè propriè Diæta appellatur: estque ut iam dixi, que sensibili- ter causas antecedentes, vel coniunctas morbo- rum, per sudores euacuat.*

*In hac tria considerantur: Compositio. Uxus. Utilitas.*

In COMPOSITIONE duo perpēndenda.

1. *Materix*, ex qua comparatur eiusmodi decoctum.

2. *Liquor*, in quo ipsa decoquitur.

In utroque *qualitas*, & *quantitas*.

**MATERIA EX QVA**, ratione *qualitatis*, est vel sudorifica, vel alterans etiā simul aliquando.

Quod ad sudorifica; componitur *vel* ex *Guaiaco* & *cortice eiusdem solo*: *sola China*, rariūs ex sola *salsaparilla*; vix vno, quam ex solo *sassafras*.

*Vel ex Guaiaco* vt basi, cūm aliorum modò uno, modò duobus admixtis, ob varias medici intentiones, vel maximè, quò *Guaiaci* ferver, & nimia caliditas obtundatur, cum eodem sudandi fructu.

*Vel ex China* vt basi, & *salsaparilla*, auct *ligno sassafras* ubi minus consilium est calefacere; exsiccare tamen non minus potenter, & absumere vitiosas humiditates.

Quod ad alterantia; utilissimè cum iam dictis, ad finem decoctionis, etiam aliquando decoquuntur, addunturque varia simplicia alterantia, quæ partem affectam proprietate respiciunt & humo-

rem; vnde sudorificum eximum euadit: vel tantum adduntur hoc fine saepius, ut Guaiaci caliditas & siccitas obtundatur; ne hepar incalescat: ad hoc autem felicitantur radic. fol. semin. fructus, flores, plura, pauciora.

Quod ad *quantitatem*, sudorifica sola praescripta, vel mixta, pro quaue dosi ad  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j. b. praescripta sufficiunt, ita vt, quandoquidem decoctum hydroticum in 4. tantum doses prescribi debet,  $\frac{3}{4}$  iiii.  $\frac{3}{4}$  vij. sint prescribenda, quæ dosis potest minui, augeri, pro ratione temperamenti, ætatis, virium, temporis anni, constitutionis morbi, regionis, &c.

Alterantia verd ubi assumuntur, dosi dimidia Apozematuni, & quoad ordinem, post sudorifica prescribenda. Ad hoc passum in decocto guaiacino liquirit. p. *cularum* ana  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{3}{4}$  j. b. usurpantur.

LIQVOR: ratione qualitatis, passum aqua fontana usurpanda prescribitur.

Quod ad *quantitatem*, licet ex artis precepto aqua in decoctione radicum, ligotum, debeat esse octupla; tamen quia in infusione hydroticorum illius multum absunitur, debet esse duodecimpta, h. e. pro  $\frac{3}{4}$ ;  $\frac{3}{4}$  j. & tunc obiter

G iiii.

152 *Method. Præscribendi*

decoquendum ad medias , quæ ratio vñtatissima. Potest & ibj. s. præscribi , & tunc ad tertias consumendum.

V S V S . Quod ad quantitatem ; de eiusmodi decocto sudorifico 3 viij. bibuntur.

Quod ad modum ; calidè , tegendo corpus plùs solitò , multis vestibus ac stragulis.

Quod ad tempus , manè , ratiùs & circa vesperam repetitur , in robustis , valdè pituitosis , & copiosis excrementis refertis.

**F O R M Y L A P RÆSCRIBENDI**  
*exemplo Guaiaci. R. Rasuræ ligni sancti 3 iiiij. cortic. eiusdem 3 ij. infundantur in ibj. vj. vel ix. aquæ fontanæ per 24. horas , seu diem naturalem , supra cineres tepidos vel calidos , vase clauso accurate. Decoquantur deinde igne lento , prunis luculentis sine fumo , donec redeant ad medias , refrigerentur ; colentur poste à per manicam Hippocratis ( & ubi decoctum validius expetitur , exprimantur leniter , ) dulcoretur decoctum sacchari 3 iiiij. iiiij. aromatizeturque cinamom. 3 j. s. 3 ij. ( dulcoratio tamen & aromatizatio possunt omitti in minùs delicatis , )*

ferponatur ad usum in ampullâ vitrea.  
Capiat de hoc decocto 3 viij. calidè, manè, tegendo corpus plus solito, sudando ad placitum.

Nota, quod (vbi alterantia cum sudorificis prescribuntur,) imperetur in formula, sub finem coctionis adde talia, &c.

R. Residentiam decocti superioris, (vbi scilicet nulla alia simplicia addita,) addere si volueris sudorifici alicuius recentis 3 j. infunde in aquæ fontanæ lib. xij. per horas 8. vel 12. decoquantur ad tertiaræ vnius, vel quartæ tantum consumptionem: colaper manicam Hippocratis, aromatiza, & dulcora cum sacchar. q.s. cinamom. 3 j. 3 ij. fiat decoctum secundarium, seu bochetum pro potu ordinario.

Obserua hanc vietus rationem per 15. 20. 30. dies, (nisi vites labescant, tunc enim triduum, quatriduum licebit intermittere,) quo tempore utatur assis potiis, quam elixis; auiculis montanis & campestribus, cinnamomo, garyoph. &c. transfixis, gallinis, caponibus, pane biscocto, anisato, passulis, amygdalis torrefactis, &c in ultima mensa coriandro, aniso saccharato, &c. Utatur secundario decocto espresso, colato, aro-

matizato cum sacchar. & cinnam. q. s. pro  
potu ordinario : quod si alius fuerit ad-  
strictior, iniciatur clyster cōmuni, vel,  
quod optimum, singulis vj. viij. diebus  
reiterentur pilulae, potio, aut alia purgā-  
tia præscripta, ( vt crassior materia scil.  
quaæ absumptis partibus tenuioribus re-  
stagnare solet in alio, deturbetur, ) quo  
die abstineat à decocto sudorifico,

Vt autem antè dixit vsum purgari de-  
bent, sic & duodecimo, vel undecimo  
quoque die.

Solent etiam in diætis præscribēs accu-  
li duo ex cephalicis digerentibus, cali-  
dissimè capiti ( detonso priùs capillitio )  
applicandi, per horæ quadrantem, do-  
nec sudor crumpat è facie, statim ab  
hausto sudorifico, ad sudorem promo-  
uendum, & post detersum etiam sudo-  
rem, in affectibus capitum maximè, ad di-  
gerendum magis absumendumue, qui-  
bus sublatis caput munitur stupris can-  
nabinis calefactis, & suffitu communi  
suffitis.

**V**TILITAS eximia & amplissima, non  
solum in affectibus exteris; sed & in-  
ternis, contumacibus maximè, quorum  
causæ altius egere radices, vt nec pur-

gantibus vulgatis , aut alterantibus exscindi potuerint , ita ut egeant his medicamentis , quæ subtilitate partium , & attenuatione maximâ istum fomitem resoluant insensibiliter , aut per sudores manifestè dissipent , ac discutiant reliquias vitiosorum humorum : sic ad fluxiones capitis inueteratas , cathartos diuturnos , cachexiam , hydropem , ad alios eiusmodi affectus ab humoribus pituitosis copiosissime , in lue veneteâ , &c.  
Hac de Dieta sudorifica.

**DIÆTA SYDORIFICO-CATHARTICA** est decoctum , in diatis iam dictis sudores mouens , & per alium simul enactens , usur pandum , medicorum recentium maximè innotatum est , & amè paucos annos vix usitatum , neque tamen sine spe fructus uberrimi excogitatum : cum biuis ope humorum partibus tenuioribus resolventis per sudores , reliqui crassiores , que alias solent , perinaciter restagnare in alio & aliis partibus , bac ratione simul viriliter eradicantur , neq; est quod diversos & contrarios motus conclamant , calor enim natius instrumentum facultatis excreticis , vna cum facultate expultrice indifferenter se babet ad omnem morum suum , & quædæ porta , velliente , vel trabente medicamento , ad rci moris

bificæ expulſionem insurgit, experientia probant, confirmante. Hinc & nomen, & definitio elinceſcit.

In hac autem tria considerantur, *Compositio. Uſus. Utilitas.*

In COMPOSITIONE duo maximè: *Materia, ex qua: Liquor.* In utroque *qualitas, & quantitas.*

Quod ad MATERIAM, ratione *quantitatis* assumitur decoctum superius, constans ut dictum ex solis sudorificis, vel etiam simul aliquando ex simplicibus alterantibus additis, unde sudorifici appellatio.

Huic materiæ, ut decoctum fiat simul catharticum, adduntur quæ dicta sunt in Apozemate purgante, purgantia basin constituentia, *ferma, carbam. polypodium,* tūm etiam alia cathartica, humorē puitosum maximè respicientia, *Turbib. Hermodact. Rhabarb. Agaricum,* pauciora, plura, pro scopo, vñā cum suis correctiuis.

Quod ad *quantitatem*, sudorifica & alterantia vide suprà. Purgantia verò dosi ferè Apozematis purgantis præscribenda, paulò tamen ( quarta nempè parte ) minore, quod vires non ferant copiosas

ciusmodi , per habitum & aluum purgationes.

Liquor , ratione qualitatis , &c quantitatis . vide suprà .

VSVS . Quod ad quantitatem , ad  $\frac{3}{4}$  iiiij . vel v .

Quod ad tempus , manè , idque per quartiduum ferè , initio eiusmodi diætarum , reliquis enim diebus sequentibus , detraetis laxantibus , diæta simplicior sudorifica usurpatur .

Et quod ad FORMVLAM , hæc est : R. &c. i. e. diæta suprà , siue decoctum sudorificum , sub finem decoctionis adde purgantia iam diæta , vel una simul cum alterantibus , colentur , &c. vide suprà . Finito hoc decocto purgante , & 4 dosibus matutinis absoluto , vtatur eodem , deinde detraetis laxantibus , per dies 10 . 15 . 10 . &c.

VTILITAS . Diæta ciusmodi apud recentiores hodiè usitatissima , in corporibus admodum cacochymis & robustis simul , quæ duplicem illam euacuationem postulant , ad humorum morbiforum in 1. 2. 3. regione stabulantium partes crassiores tenuioresque simul , una & eadem opera euacuandum . Utileissima au-

158 *Method. Praescribendi-*  
tem maximè omnium est, & visitatissimā  
in lue venerea curanda, tractanda.

## ANIMADVERSIONES.

*NOTANDVM CIRCA SVDORIFICA*  
in formulis speciatim dici de ligno Guaiac.  
R. Rasure ligni sancti resinosi : de ligno Salsapras. R. ligni Sassafras recentis cum suo  
cortex minutim & frustulatim incisi, aut es-  
salatim dissesti : de rad. Chintz. R. Rad.chi-  
nae ponderosa non exesa aut cariosa, in taleolas  
dissecta, &c, de rad. Salsaparillæ. R. rad.  
Salsaparill. in taleolas incisa & dissecta, cum  
suis capillamentis.

Notandum, decoctum chinæ in cineribus ca-  
lidis, vel loco calido esse afferuandum, alijs  
aceescere : decoctum ligni sassafras amittere,  
diutius afferuatum, odoris gratiam.

## C A P. X I V.

### D E B O C H E T O.

**B**OCHETVM potus est diatarum iam di-  
clarum vilissimus : alijs in affectibus,  
in quibus vinum tunc non porrigitur, vel ubi  
exicare sensim, aut humorum illuuiem absu-  
mere consilium.

COMPONITVR autem breuiter in diætis, ex residentiâ præscripti decocti sudorifici, ( modò nulla alterantia vel purgantia simul fuerint incocta : vti supra declaratum in formulâ diæta sudorifica : aliâs enim recens parâdum & præscribendum, ) additâ aliquando insuper  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  jj. eiusdem vel alterius simplicis hydroticî , infundantur omnia per horas 12. in aquâ  $\frac{1}{2}$  xij. vt supra, coquantur ad quartâ vel tertiat partis cōsumptionem, extimantur colenturque per inanicam Hipp. additur sacchar.  $\frac{1}{2}$  lb.  $\frac{1}{2}$  j. vel ad placitum, cinamom.  $\frac{3}{2}$  iiij.  $\frac{3}{2}$  ss. fiat decoctum secundarium, seu Bochetum, seruetur in ampullâ vitreâ pro potu ordinario.

Vel paratur alias in rem præsentem, siue quod nulla diæta præcedens fuerit præscripta ; ex cuius residentiâ fieri possit, ( siue quod illa ex sudorificis alterantibus, & simul purgantibus constituerit, quorum vis pro potu ejusmodi ordinatio non desideratur,) ex aliquo, vel pluribus sudorificis, ad  $\frac{3}{2}$  ij.  $\frac{3}{2}$  jj ss. codem modo, vt supra dictum, præscriptis, fiat Bochetum, quo utatur, vt dictum.

VSVS, FORMVLA, V T I L I T A S  
iam satis declarata.

## C A P. XIV.

*DE DECOCTO GALLI.*

**N**OMINIS ratio plana. Inventio vero veterum fuit. Uſus recenioribus hodiè admodum confirmatus.

Est autem DECOCTVM GALLi iuscum quoddam, ex Gallo veteri, & sudorificis quibusdam, alterantibus, vel etiamnam catbaricis, ad alterandum vel purgandum comparatum.

Hinc duplex decoctum eiusmodi: Alterans, vel Catharticum.

*Decoctum Galli alterans.*

In Alterante consideratur: *Materia* maximè, & *Liquer*. In utroque *qualitas*, & *quantitas*.

Quod ad MATERIAM, ratione qualitatis, Gallus vetus pro basi veluti affumitur.

Huius venter sarcitur deinde, vel etiā ad finem tantum decoquuntur alia, quæ sunt tūm sudorifica passim, ut *china*, *salsaparilla*, *sassafras*, sola, mixta, in asthmate

& melancholia hypochondriaca, visita-  
tissimè præscribenda, tūm alterantia rad.  
fol. sem. fructus, pluta, pauciora.

Quod ad quantitatem, sudorifica ad  $\frac{5}{2}$  ij.  
præscribuntur, alterantia verò dosi ferè  
Apozematis alterantis paulò minore.

**Liquor**, ratione qualitatis, aqua  
passionis.

Ratione quantitatis, q. s.

VSVS: quod ad quantitatem, ad  $\frac{3}{2}$  vj.  
vel viij.

Quod ad tempus, manè continuando  
per 15. dies, vel spatium mensis unius.

Hæc autem FORMULA. R. Gallum  
veterem rufum, decrepitum, vel 4. aut 5.  
annorum, cursu, verbieribus fatigatum,  
deplumetur viuus, iuguletur, & exente-  
retur, huius venter repleatur sudorif-  
fructibus, seminibus dictis, consuatur,  
coquatur deinde in olla vernisata, vel  
stannata, cum aquæ sufficienti quantitate  
perfectè, donec carnes contabescant &  
separentur ab ossibus, ubi autem juscum  
despumatum fuerit, adde radic.  
&c. sub finem verò decocti, folia, flores,  
&c. coquantur usque supersint iusculi  $\frac{1}{2}$   
ij. exprimantur fortiter, colentur, serue-  
tur decoctum in ampulla vitreā, in loco

frigido omni pinguedine detracta, capé de eo juscule 3 viij lb s. manè, addendo si volueris, maximè in affectibus thoracis, sacch. vel syrup. idonei 3 j. continuando per 15. dies, vel spatium mensis vnius.

• **V T I L I T A S** summa in obstru<sup>c</sup>tio-  
nibus contumacibus, hinc passim pre-  
scribitur in melancholia hypochondria-  
ca, in quā vfitatē præscribuntur pro eius-  
modi juscule radic. petrosel. cicoriū, gram.  
asp̄ar. folia ceterach, meliss. bugloss. pimpi-  
nell. agrim. vvx corintbiac.e : aliquando  
*China* & lignum saffapbr. In quauis etiam  
pertinaci viscerum opilatione : iten  
& in affectibus pectoris, asthmate præ-  
sertim, ad quę vfitatē *china* ferè usurpa-  
tur, cum fructibus thoracicis, in dolori-  
bus arthriticis cum ligno saffapbras, palli-  
dis coloribus, &c..

### Decoctum Galli purgans.

Non differt à superiori, nisi quòd pre-  
ter dicta adduntur etiamnum cathartica  
ferè hyc, semini, polyp. carthamus, hotum  
ana 3 ij. 3 ij s. Agarici 3 j. Epithymi tan-  
tundem, quę ventri Galli includuntur,

præscribiturque, siat decoctum ad lib. ij.  
in quo sacchar. dissoluitur, si volueris, ad  
3 iiiij. aromatizaturque etiamnum pro 4.  
dosibus matutinis, singulis mensibus  
usurpandis. Estque huius usus, & utilitas,  
principiè & passim in melancholia hy-  
pochondriaca, obstruktionibus visce-  
rum, pallidis coloribus, arthritide, co-  
lica; vix autem usurpatur in asthmate.

## C A P. X V I.

## D E D E S T I L L A T O.

Instaurante.

**V**BI agrotantes, propter vires summe di-  
tritae à morborum vi, longitudine, aut  
evacuacione insigni, quo'uis alios cibos diffi-  
culter & digerunt, & in deperditorum spiri-  
tuum locum restitunt, aut etiam alia qua'uis  
cum n'sus recusant; vires tamen & augeri  
instaurariq; & conseruari debent, ut sit atè hodiè  
passim, aqua destillata ex carnibus eucynamis,  
& mulieris præscribitur, ex recentiorum  
innento. Ab effectu destillatum restaurans  
sive instaurans, ut & aliquando, à materiâ  
principiè usitata, aquam caponis appellant.

*Est autem DESTILLATUM IN-*

*SI AVRANS*, aqua destillata, sine liquor per alembicum elicitus, vi & facultate carni, caponin maxime, alimentaria, & medicamentosa simul conseruarum, puluerum, aquarum, succorum variorum imbutus, ad vires spiritusque resarcierendos maxime comparatus.

In hoc autem tria consideranda. *Compositio. Vsus. Utilitas.*

**In COMPOSITIONE** duo maximè: *Materia ex qua, Dissoluenda.*

Quod ad **MATERIAM**, vulgo carnem caponis vnius, vel gallinæ, perdicum duarum, dissectam, ab ossibus & pinguedine purgatam, lotamque aqua quadam cardiaca, ut *rosar.* vel *vino albo*, &c. assumunt, admiscéntque conseruas, condituras varias, pulueres cardiacos, auri folia aliquot, & omnia irrorata liquore idoneo, in Balneo Mariæ destillant. Sed quia hac ratione vis carnium alimentaria paucissima, vel nulla habetur, idèò hic modus etiamnum improbatur, rèsque accuratiùs peragitur: quod fieri, si carnium dictatum, vel aliarum, perfectissimè & ad putrilaginem usque decoctarum, expressarum deinde, collatum jus assumas, in quo postea iam dicenda diluas, destillésque.

Materia autem ejusmodi destillati  
erit duplex. *Alimentaria*, & *Medicamen-*  
*tos*. Quod ad *alimentariam*, ratione qua-  
litatis, & quantitatis, etiamnum vilitate  
capo optimus assumitur, ( potest & *Gal-*  
*lina* assumi ) isq; solus, vel etiam ipsi una  
*perdix* additur, aut *arimus vitulinus*: vt &,  
si eiusmodi destillatum pro hectico &  
phthisico instaurando prescribatur, *cara-*  
*testudinis* nemoralis vnius, duarum, coxae  
etiamnum aliquæ *Ranarum* vilitate pre-  
scribuntur.

Hæc materia alimentaria coquitur in  
aqua s. q. addunturque ipsi (pro medica-  
mentis.) variæ stirpium partes, (vt vulgo  
etiam in jusculis condiendis alterandis  
que fieri solet,) rad. fol. sem. flor. gratio-  
ra ferè odore, sapore, quæ affectum, cau-  
sam istius dissipationis virium, maximè  
respiciunt, idque dosi ferè Apozematis  
alterantis, paulò tamen minore, quâ ra-  
tione & virium instaurationi, & altera-  
tioni simul unâ & eadem operâ consu-  
litur.

Vbi omnia sunt percocta ad putrila-  
ginem, vt carnes ab ossibus abscedant,  
colatur josculum, reliqua fortiter expri-  
muntur, & vbi omnia fuerint refrigerata,

Seruatürq; juscum, *materia propinquas*  
futura destillati, quod comparatur ex  
huius juris lib. iiiij. iiiij. aquar. cardiac. ido-  
nearum ȝ viij. xij. in quibus miscentur  
postea conseruarum, conditurarum ido-  
nearum, ȝ iiiij. v. vij. (aliquando & con-  
fectiones assumuntur, vt alkerimes in  
summâ debilitate, vt & Theriaca vbi  
malignitas, ad ȝ iiiij. ȝ ȝ. ) puluerum car-  
diacorum simplicium, vel electuariorum  
officinal. vt diamargar frigidi ȝ ȝ. ȝ.  
vbi minus pretiosi. Vbi notandum obi-  
ter est, frustrâ perlas, fragmenta pretiosa, bo-  
lam, terram sigillatam, auri folia, & simi-  
lia admisceri quandoquidem in eiusmo-  
di destillatione leui, per balneum Mariæ,  
nullam de se vim energeticam seu spiri-  
tum efficacem fundant: cum & virgin-  
tiore calore vix haberi possit, eoque sic-  
co, adhibitâ etiamnum diligentissimâ  
præparatione. Ista omnia permixta  
alembico committuntur, destillantürque  
postea in balneo Mariæ, vt vocant. Obi-  
ter nota, quod si ambræ vim, vel moschi  
desideres, hæ ad ȝ. v. vij. ȝ. ȝ. in nodu-  
lo ligata, & alembici naſo alligata, effe-

appendenda, vt liquor transiens eorum vim secum ducat, quæ hæc ratione commodiùs & certiùs habetur, quæcum si cum aliis permisceas. Liquor destillatus in ampullâ vitrèâ in loco frigido asseruatur.

**D I S S O L V E N D A**, licet ea rarius usurpentur; tamen & aliquando succi idonei cardiaci, vt de *limonibus*, in febribus, *granatorum acidorum* utiliter ad  $\frac{3}{2}$  iij.  $\frac{3}{2}$  iiiij. pro liquoris destillati quantitate dissoluuntur; licet cum jure caponis & equis cardiacis antè destillationem possint permisceri.

**V S V S.** Quod ad *modum*, vel per se ex cochleari usurpatum liquor eiusmodi destillatus, vel in jusculis aliis, aut pantellis dissolutus.

Quod ad *quantitatem*, ad  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  ij.  $\frac{3}{2}$  iiij. assumitur.

Quod ad *tempus*, ad lubitum; idquæter, quater, vel sibiùs in die.

**F O R M U L A.** R. carnem caponis vnius optimi, vel gallinæ, (vnâ cum carnis aliis, vt dictum,) distillatam, ab ossibus vel pinguedine saltem purgatam, pone in olla vernisata cum aqua f. q. coquantur, addendo sub finem radic. &c. h. c. alterantia, vbi omnia fuerint ad pa-

trilaginem cocta, colentur, exprimantur fortiter, pinguedine omni ablata, cape de hoc jure lib. iiiij. lib. v. cui adde (conservas, &c.) destillentur omnia in Balneo Mariæ, liquor exceptus reponatur in ampulla vitrea in loco frigido, de quo capiat, &c. per se ex cochleari, &c.

**V T I L I T A S** eadem quæ analépticorum, ad vires nempè, spiritus subitò instaurandos reficiendosque, à morbi diuturnitate & inedia, vel vacuatione nimia absumptos exhaustosque: partium nobilium robur languidum recreandum: in quibusvis affectibus siue cordis, siue partium aliarum, non tantum calidis ferè usitatum; sed & frigidis, vulgaribus, malignis, febribus continuis, hereticis, phtisicis.

In summa, ubi vires effæctæ admodum & languidae, quævis alia alimenta ad vitæ conservationem non possunt digerere, resarciri tamen volunt subitò: unde & destillata eiusmodi restaurantia ad vires recreandas, & spiritus reparandos potius, quam ad nutriendum firmiter & solidè comparata.

## C A P. XVII.

## DE IV SCVLIS.

**S**æpius etiam Medicis iuscula præscriben-  
da hoc fine , vt alterando simul nutritio-  
mus , & viis medicamentorum bac ratione  
bauriantur cuiuslibet à partibus ipsis , sub specie  
alimenti , atq; ipsis minus sine molesta .

*Sunt autem vel Alteritia, vel Restaurantia.*

*Alteritia* varie fiunt , pro scopo Me-  
dicis: cum pullo sæpius, vt Monspelijs vſi-  
tatiſſimè juscum pulli, alteratum foliis  
hepaticis, & radicib. etiam frigidis in fe-  
ribus. A Medicis minutim non præ-  
ſcribuntur , imperatur tantum , vtattur  
juscule pulli alterato foliis talibus , &c.  
duobus, tribus, quatuor, manè vel etiam  
circa vesperam : in calidis morbis maxi-  
mè vſitata.

*Restaurantia* , ad vires instaurandas  
comparata , quæ aliàs ab actionis modo  
& cōſumptione consummata appellantur.  
Fiunt ex gallinâ pingui , ( vel capone  
exenterato,) quæ in partes minutas con-  
cisa, in olla vernisata, vel alembico co-  
clusa accuratè, ne quid exspireret, coquitur

in Mariæ Balneo ad putrilaginem, co-  
lantur omnia, succus exprimitur, ab eo  
pinguedo separatur, afferuaturq; in am-  
pulla vitrea ad vsum, in loco frigido. In  
hoc jure aliquando & passim alia dissol-  
vuntur, in eius nempè libris singulis, vici  
albi, si scopus ferat, vel succi cardiaci, aut  
liquoris idonei ʒ iij. sacchari ʒ ij. cinn-  
amom. & confect. alkermes ʒ j. Fruent  
omnia, dum saccharum dissolutum fue-  
rit, colantur, seruantur ad vsum. Fru-  
strè qui auri folia, & ad pomparam sine  
fructu, in eiusmodi consummatis juscu-  
lis usurpant.

V S V S qui destillati. V T I L I T A S  
eadem, nisi quod eiusmodi consumma-  
ta sint πλύπερα, & solidam ipsam sub-  
stantiam copiosè refarciant, nutriant  
que.

## LIBRI PRIMI

## SECTIO II.

DE FORMIS MEDICAMENTORVM  
MOLLIBVS.

## CAP. I.

## DE BOLLO.

**B**OLVS est forma medicamenti, mel-lis ferè consistentiā, paulo trassiore, ad purgandum vel alterandum com-parata: & quod sit frustum medicamenti, quantum ferè bucca capere potest, inde nomen habetur.

Est autem bolus triplex, purgans scil. & alterans, atque roborans.

## Bulus Purgans.

Bulus purgans quid sit, & quenam ipsius differentiae ex purgandorum humorum varie-tate desumenda, ex superioribus in Apoge-mate enarratis satis patet.

In eo autem tria consideranda. *Compositio. Vetus. Utilitas.*

In COMPOSITIONE, *Materia ex qua maximè, in qua consideratur qualitas, & quantitas.*

*Quod ad qualitatem MATERIAE, in genere componitur ex catharticis simplicibus & compositis, ut puluere aliquo purgante, simplici vel composito, & faccharo.*

*Quod ad quantitatem, bolus 3 vj. in genere, aut 3 j. non debet excedere: ratio enim ad 3 x. prescribitur, nisi constet ex leuioribus.*

*In Specie vero quod ad materiam, componitur bolus purgans.*

1. *Vel ex Cassia sola, quæ ferè basis boli est, (aut pulpâ etiam tamarindorum, in biliosis maximè; ) licet præstet ex cassia & alio purgante simul, opiatæ scilicet, aut electuatio solido, componere, ut stimuletur nempè vis ipsius purgans, quæ leniens ferè tantum est, ne diutiùs aliàs in intestinis motam trahens ipsa afficiat, & tunc quod ad quantitatem, cassia 3 lb. 3 vj. opiatæ vero, vel tabellæ purgantiis 3 ij. 3 iiiij. plus minus præscribentur; examinando nempè doses cau-*

tionē, quam suprà notauiimus, vt siue 1.3. misccantur cum cassia, dosis tandem completa habeatur.

*Nota*, vñ esse receptissimum in renūm & refīcā affectibꝫ, bolūm ex iam dīlā cassia vt bñsi p̄aescrībere, ad 3 vj. cū addantur Terebinth. lora in aqua violar. parietat. 3 ij. cū pulv. liquitit. & sacchari sufficienti quantitate: in quēm finem etiam sepius sola Terebinth. p̄aescrībitur, vt infra addito nonnunquam rhabarb. 3 j.

2. *Vel* ex opiatā purgante officinali, quā vel sola p̄aescribitur, dosi & quantitate, quam suprà in potionē, & infra definiēmus: *Vel* vna ipsi additur tabella, vñ celest. solidum purgans, hac dosi, vt ista simul iuncta dosim completam confiant; hae verò proportionē, vt opiatā paulò plus p̄aescribas.

*Nota* insuper, aliquando his duobus junctis, vel opiatā soli addi puluerem purgantem, cūmque aut simplicem, vt Rhab. mecheac. &c. à 3 ſ. ad 3 ſ. aut compositum, vt Diaturbirb. à 3 ſ. ad 3 j. prout cetera maiore quantitate fuerint p̄aescipta: *Vel* etiam aliquando nōn purgantem; *sed* vel dirigentem, corrigeunt, corroborantem ad 3 ſ.

3. Vel ex tabella, seu electuat. solidis  
et que ~~ant~~ solo, dosi suprà in potionē &  
infrā dicenda, cum syrupo & saccharo,  
~~am~~ addita aliquando opia, vel puluere  
purgante, ut iam dictum.

4. Vel quod r̄sumi, ex solo puluere  
purgantium simplicium & composito-  
rum syrupo & saccharo excepto. Sed hęc  
ratio minus accepta.

5. Vel (quod boli purgantis nomen  
vix meretur, & in affectibus tenuis, ve-  
sicæ maximè usurpatur,) ex terebinth. lo-  
ta aqua viol. &c. ad 3 ij. vel 3 iij. cum  
puluere liquir. 3 j.

VSVS. Quod ad modum, deuorando  
quidem, seu deglutiendo assumitur, quod  
commodissimè fiet ex cochleari, cum  
syrupo idoneo; grato tamen.

Quod ad quantitatem, suprà definita.  
Tempus verò exhibendi manè est, mo-  
re aliorum catharticorum.

### FORMULA PRÆSCRIBENDI.

Vbi quidem cassia assumitur. R. me-  
dulla cassiae recenter extractæ, (& ali-  
quando additur, in vapore decocti ali-  
cuius, V. G. bordei, liquir. malv. pro te-  
nibus,) vel pulpæ, vel floris cassiae, &c.  
cum saccharo fiat bolus.

Si ex opiate. R. &c. cum saccharo fiat bolus.

Vbi autem bolum sicciora consti-  
tuunt, ut tabell. & pulu. copiosi, ita ut  
boli formâ cohætere posse non videan-  
tur, dicitur, R. &c. humectentur cum  
tali syrupo, & cum saccharo in boli for-  
mam reducantur, quem sumat, &c.

Vbi verò bolus ex tereb. R. Terebinth.  
lotz, &c. F. boli, qui nebulis inuoluantur,  
& ex cochleari cum syrupo idoneo, ut  
capill. ven. violar. &c. deuorentur, manè  
iii. iiiij. horis antè prandium, idque uita-  
tē per triduum.

**V T I L I T A S** eadem quæ potionis  
existit, vbi nempè vitium in inferiore  
regione, aut partibus vicinis existit. Pri-  
uatum verò bolus ex cassiâ in affectibus  
renum, vesicæ usurpatur, & in aliis affec-  
tibus, in quibus leuiter agendum, ac  
leniendum ferè tantum.

### Bolus roborans.

In eo tria consideranda: *Compositione*  
*Vitae. Vitalitas.*

Quod ad **COMPOSITIONEM** ra-  
tione qualitatib, comparatur.

1. *Vel ex conseruis officinalibus & puluere, qui vel electuarij alicuius officinalis, vel alias aromaticus, ut cinnam. v. G. cum saccharo.*

*Nota, aliquando vnâ cum conseruis dietis confectiones cardiacas assumi, vt Alkermes, de Hyacyntha.*

2. *Vel ex confectione officinali sola corroborante.*

*Quod ad quantitatem, bolus in generis 3 iiiij. 3 ℥. vix excedit.*

*In Specie verò quantitas, dosis, & proportio primi modi, hoc est, vt*

*Conseruarum sint 3 iiiij. 3 ℥.*

*Pulueris 3 j.*

*Confectionis, si admittatur, 3 j. 3 ℥.*

*Secundi verò modi, confectio neimpè, prescribetur ad 3 j. 3 j ℥.*

**V S V S.** *Quod ad tempus, solet quidem prescribi postridie medicamentū purgantis, duabus horis antē prandium ut paſſim, veletiam aliās hotā commoda, ad roborandum simpliciter, nullā purgatione praegressa.*

*Quod ad modum, deuorando ex cochleari, si volueris, cum syrupo, superbibendo parum vini diluti, vel liquoris alterius pro scopo.*

FORMULA PRÆSCRIBENDI.  
R. &c. cum saccharo fiat bolus, quem sumat, &c.

VITILITAS ex titulo satis patet. Vide potionem cardiacam. Visitatē autē & passim post præscripta medicamenta purgantia usurpantur, ad confortandum tūm ventriculum, tūm partes afflitas & in medicamentis, & à morbotum vi, tūm etiam ad corroborandum simpliciter, nullā præcedente cathartī, quotiescunq; vires quacunque de causa debiles & fatiscentes illud suadent : tūm & alternandum etiam quovis modo, & roborandum tamen simul : sic ad fluxum alvi utiliter sumuntur eiusmodi boli.

## C A P. II.

### D E O P I A T A.

VETERES medicamenta, quæ opium, aut alia narcotica in sui compositionem admittabant, proprio vocabulo iure opiate vocabant, hodiè abusivè medicamenta, quæ etiam sine opio comparantur, ad roborandum, alternandum, purgandum, opiatas vocant impropriè, idq; solūm propter consistentiam quâ efformantur.

*tur, iheriacæ, & alijs eiusmodi opiatis similem.*

*Vocant alijs rectius electuaria, quod cum  
bodiè, vsu recepto, sit duplex, solidum, quod  
alijs tabellam seu tabellas vocant: molle, hoc  
alijs opiatam nuncupant, vitrumq; Græci anti-  
dotum, licet hoc nomen ad purgationem non  
extendatur, ut opiate nostra appellatio.*

*Est autem OPIATA medicamentum  
consistentia syrupo crassiore, & difficulter flui-  
dâ, ( iheriacæ veræ opiatæ simili, ) ex rebus  
variis, melle aut syrupo exceptis, in usum di-  
turniorum ad purgandum, alterandum, roboran-  
dum, comparatum.*

*Hinc duplex-existit: Purgans & Alterans,  
seu Roborans.*

### Opiata Purgans.

*Quid sit ( & ipsius differentia) ex Apo-  
mate & potionē purgante repetendum.*

*Duplex in præsentia recensenda: Magistra-  
lis, & Officinalis.*

*Magistralis quid sit, vide in syrupo pur-  
gante.*

*In hac autem tria consideranda. Com-  
positio. Usus. Utilitas.*

*Quod ad COMPOSITIONEM  
comparatur.*

I. *Vel ex pulueribus solis, exceptis solo melle, vel syrupo, aut utroque simul.*

Pulueres autem passim usitatè defumuntur ex catharticis simplicibus, ( aliquando & si sint in usu ex speciebus elequariorum purgantium) cum suis corridentibus idoneis, simplicibus, compostis, ut & dirigentibus.

Quod ad quantitatem, pulueres ejusmodi purgantes debent praescribi pro numero dosium & usus, in quem opiatam purgantem exoptas: ut si pro viij. vicibus opiatam exoptes, sex doses purgantes in substantia praescribas, additis correctiuis. Quod ad quantitatem verò excipientis, mellis vel syrapi, vulgo male q. l. praescribunt, ut notatum in syrupo purgante: ut enim ibidem dictum, horum quantitas definienda. Proportio autem ad puluerem debet esse tripla vel quadrupla, eaque expressè est definienda, ut sis certus de dosi.

*Nota obiter, quod ubi Cassia, & alia, que habent consistentiam mellis, admittuntur, pro melle excipiente haberi.*

II. *Vel cum hodiè raro ex pulueribus solis prescribantur, usitatè iam conficiuntur ex opiatis officinalibus purgantibus.*

tibus, additâ simul *cassia*, ubi leuius agendum, est, vel etiam simul addito ele-  
quar. solido purgante officinali, ut &, si  
volueris, pulvere simul cathartico cum  
correcciuis iam s̄p̄ius dictis, quæ om-  
nia syrupo idoneo sunt excipienda.

Hæc autem eorum proportio.

Opiatae 3 j. habeat pulueris à 3 j. ad  
5 ij.

Ferè autem opiatarum eiusmodi 3iiij.  
præscribuntur. Syrupi dosis relinquitur  
indefinita. Paucus enim requiritur.

3. *Vel* ex purgantibus simplicibus mol-  
lioribus solis, ut *Cassia*, *Tamarind*. *Mannā*,  
*pulpa prunorum*, *pæſſul*. *sebeſten*, additis,  
correcciuis, cùm tantum lenire volueris,  
vel si insuper purgare magis, additis pul-  
ueribus purgantibus simplicibus, pro-  
portione jam dictâ.

4 *Vel* ex simplicibus illis lenientibus,  
opiatis officinalibus, pulueribus purgan-  
tibus, cum syrupi proportione jam dictâ.

### Officinales visitatores.

*Cubelicon. o.*

*Diacassia. b. m.*

*Diaphnum simplex. b.*

- Diasenna, seu.  
 Electuar. lenitius. m.  
 Hieræ picra. p.b. que omnes obiser etiam leniores.  
 Diaprun. solut. b.  
 Elect. de psyll. b. m.  
 Dispœn. p. & bilem.  
 Benedicta laxat. p. & seros. humor.  
 Confect. hamech. b. m.

## Minus usitatæ.

- Elect. Mesuati. b.  
 Triphera persica. b. m.  
 Indum minus. p. b.  
 Hieræ Pacciij. p.

## VSVS OFFICINALIS.

Quod ad modum, vel per se sumitur formâ boli, vel liquore idoneo formâ potionis, quam suprà vide.

Quod ad tempus, manè more cathartitorum.

Quod ad quantitatem, seu dosin, res sic se habet :

## DOSIS infima, media, summa.

Diassebesten.	3 vj.	3 j. B.	3 ij.
Diapr. simplex.	3 j.	3 j. B.	3 ij.

<i>Disp. solutum.</i>	$\frac{3}{2}$ ℥.	3 vj.	3 j.
<i>Elett. ros. Mesuci</i>	$\frac{3}{2}$ ℥.	3 vi.	3 i.
<i>El. de psyllio.</i>	$\frac{3}{2}$ ℥.	3 vi.	3 i.
<i>Diacatbolicum.</i>	$\frac{3}{2}$ vj.	3 x.	3 ii.
<i>Tripber. persica.</i>	$\frac{3}{2}$ i.	3 i ℥.	3 ii.
<i>Diaphænicum.</i>	3 ii.	3 iii ℥.	3 vi.
<i>Indum minus.</i>	3 ii.	3 iii.	3 v. $\frac{3}{2}$ ii.
vel	3 ii ℥.	3 iii. $\frac{3}{2}$ ij.	3 vii.
<i>Bened. laxat.</i>	3 iii.	3 ii ℥.	3 ℥. $\frac{3}{2}$ ii.
			( vel 3 v.

## VSVS MAGISTRALIS.

Quod ad modum, & tempus vtendi, vt officinalis.

Quod ad quantitatem, in genere etiam vt officinalis, in specie vero non potest definiri, nisi supputatis dosibus catharticis, vt diximus aliàs, perpenso deinde totius opiatæ purgantis pondere. Tota enim tandem moles ipsius in tot partes, quòd sunt doses catharticæ, diuidenda.

## FORMULA PRÆSCRIBENDI.

R. &c. cum syrum. aut mellis s. q. quæ tamen definienda, vt sis certus de dosi, tripla nempè vel quadruplicata, siat opiatæ, de qua sumat, &c. per se in forma boli, vel diluas cum iusculo, decocto, vel quo- uis liquore idoneo, idque singulis quin decim diebus, p̄xmisso clystere pridiè.

VITILITAS eadem quæ syrūpi purgantis, & ut hic æ statis tempore, sic illa hyemis magis exoptatur: fructus autem præcipuus est, vt collectos in nobis vitiros humores sensim, per certa temporis interualla repurgemus, neque caco-chymiam eosque excrescere patiamur, vt iam morbum patere posset: utilissima idcirco in naturis cacochymis, & quæ malâ complexione viscerum multos excrementitious humores solent accruare, vnde motborum propago & perennitas, quæ hâc arte præcauetur..

Cæterum, cùm alia sit leniens, alia purgans electiuè, illa vtendum maximò in affectibus renum, vesicæ, thoracis vſitatem, & ad aluum mouendam etiam, ac hepatis ardoribus, constatque ferè ex pulpa *cassiae*, *tamarindorum*, *prunorum*, sebest. *mamme*, & pulueribus alterantibus idoneis: notandum insuper hac forma medicamenti vtendum maximè in iis, quibus æstuat hepar, quod pilulatum viu magis incandescit.

### Opiata roborans.

Prater opiatos lenientes & purgantes, præ-

184 *Method. Præscribendi*  
scribuntur etiam aliae recenter in rem præsentem  
a medico, non ad corroborandum solomonmodo,  
& vires instaurandas confirmandasq., quas  
hoc nomine roborantes appellamus, ut suprà di-  
ctum est, in corroborante potionē; sed & ad al-  
terandum alio modo in primis, secundis, ter-  
tiisq., qualitatibus.

In roborante autem tria consideran-  
da. *Compositio. Uſus. Utilitas.*

In COMPOSITIONE duo maximè:  
*Materias, & Informans.* In utroque quali-  
tatis, & quantitas.

MATERIA ratione qualitatis, vel  
*humidior, vel siccior.* Humidior, conserua  
officinalis, ex qua vt basi opiate roborans  
componitur.

Huic aliquando additur, pro scopo,  
conditura etiam officinalis, eaque radic.  
caulium, fructuum, corticum.

Item &, si scopus ferat, confectiones  
dictæ, vt *Confetti Alkerm.* de *Hyacinbo,*  
item *Iberiaca, Mithridatum, &c.*

Siccior, quæ perpetuò ingreditur cum  
conserua, est puluis corroborans, siisque  
vel simplex aromatum, & rerum corro-  
borando idonearum, vel compositus,  
electuarior. corroborantium, vt *aromatici*  
*rosari, &c.*

Ratione vero quamitatis, quandoquidem totius opiatæ roborantis moles 3 vj. viij. vel viij. non debet excedere, iam dictorum hæc ferè est proportio, ut Conseruarum sint 3 iij.

Conditurarum, si admittantur, 3 iij.  
3 ij.

Confect. si admittantur, 3 ij. 3 iij. 3 ss.

Puluerum vero ad iam dicta hæc proportio, ut illorum 3 j. puluerum habeat 3 j. 3 j. ss. 3 ij. ad sumnum, prout eorum qualitas efficacior, aut opiate plus minus fuerit efficax, vel prout puluis rarus aut pretiosus existit.

INFORMANS ratione qualitatris, syrpus est officinalis idoneus, vel syrpus conseruationis condituræ aliquibus appropriatus.

Quod ad quantitatem, non exprimitur, dicitur q. s. tamen cum, ut suprà dictum fuit, in opiate purgante, debeat esse triplus aut quadruplus ad puluerem, defiri facile poterit.

Obiter aduertendum, ubi materia recte sita vniuersim prescribitur, hunc ordinem obseruari, ut 1. conseru. 2. conditur. 3. confect. 4. pulueres. 5. syrpus denum prescribatur. Item passim Am-

*barum, Mescbum addi ad g. aliquot, & cùm  
mirobalani ingrediuntur, numero vnum,  
duo, vel 3 β. 3 j. præscribi.*

V S V S. Quod ad modum, formâ boli  
assumitur, idque si lubeat, & scopus fe-  
rat, superbibendo momentum vel vini  
puri, aut diluti, vel alterius liquoris pro-  
intentione, (quò nihil hæreat in faucibus  
aut œsophago, & deducatur in ventri-  
culum.)

Quod ad quantitatem, dosis 3 ij. iiij. 3 β.  
plus minus, prout à puluerum qualitate,  
& quantitate, vt & confectionis, opiate  
validior existit, alias peculiariter prescri-  
bitur, de opiate ad magnitudinem auel-  
lanæ aut castanæ, pro ipsius facultate,  
capiatur..

Quod ad tempus, pèr horam, aut duas  
antè prandium passim prescribitur, si  
ventriculus aut alia viscera interiora sint  
toboranda, idque diebus alternis, quibus  
à pilulis visualibus abstinebit, vt passim.  
Hæc enim duo, pilulæ visuales & opiatæ  
corrobantes, in corporibus valde ca-  
cochymis, aut visceribus admodum in-  
temperatis, alternatim utilissimè impe-  
rantur. Poterit & antè cœnam bis in die  
surpari, ubi confortatione maiore opus

erit : in affectibus cephalicis post prandium, aut cœnam inutiliter non assumentur : sic enim cum ciborum vis seu spiritus medicamentorum vna facillimè eleuatur : quod si non corroborans ; sed simpliciter alterans, vel vacuans per urinas, aut uterum, vel ad obstrukiones, aut alias intentiones prescribatur, iejuno stomacho, quo vis ipsius non obtundatur, antè cibum longè uitium prescribetur.

## FORMULA PRÆSCRIBENDI:

R. &c. cum syrupo, &c. fiat opiate, de qua sumat, &c. h.e. 3 ij. 3 iiiij. vel ad magnitud. auellan. aut castan. per horam antè prandium, &c. superbibendo medicamentum, &c.

V T I L I T A S summa est ad robur partibus debilibus afflictis restituendum, consuetudinque, & ubi diutinè corroboracione opus est in morbis prolixis & chronicis, in quibus vna pilule usales prescribuntur. Horum alternus usus imperatur. Fiant & ad alterandum vario modo, ut diximus, varias partes, diuersos affectus, à dissimilibus humoribus, in primis, secundis, tertiijs qualitatibus : item ubi vacuandum sive purgandum,

expediendæ obstrunctiones, menses mouendi, calculi conterendi, excludendi, eliminandi, &c. aut ubi vix quævis maligna arcenda, &c.

## C A P. III.

## D E E C L E G M A T E.

**Q**uod Arabes *Lob*, Græci, ἔκρηκτα ab *κίνηται*, lambo, Latini *Linætum* vocant, omnes à lingendo seu sensim lambendo, à formando nomine desumpto.

Est autem medicamentum consistentia melis, vel mediæ inter syrum & opiatam, ex variis thoracicis compositum, variis affectibus asperæ arteriæ, pulmoni, pectoris dicatum, quod ore contentum lentore lubrico sensim eliquescens, primi suam bechicam partibus istis impertit.

Est autem duplex, Officinale & Magistrale;

sanum & expertum,  
de pineis.

Ecleg ma of- ficiinale est	<i>calidum</i>	<i>de farfara.</i>	<i>Tu ssi</i>
	<i>incidens</i>	<i>de caulibus.</i>	<i>Ch</i>
	<i>&amp; deter- gens:</i>	<i>de pulm. vulpis.</i>	
	<i>frigidum &amp; in- crassans.</i>	<i>de papauere.</i>	
		<i>de psyllio.</i>	

In Magistrali tria considerantur. Compositio. Viscus. Virtus.

Quod ad COMPOSITIONEM, va-

tia existit.

1. *Vel enim componitur ex pulueri-*

*bus, liquore, vel potius melligine idonea*

*exceptis, formâ opiate.*

Pulueres isti ratione qualitatis, sunt be-  
chici pro scopo idonei, iuxtaq; vel simplices  
tadic. fol. sem. succor. exilicato. bechi-  
corum, vel electuarior. thorac. ut dia-  
mox, soli vel mixti, quibus serpentis, si scopus  
ferat, sacchar. vel peridia præterea addun-  
tur.

Ratione quantitatis, ad  $\frac{3}{4}$  j. ferè præ-  
scribuntur, cum excipientis rei quadru-  
plo, ut iam dicetur, ita ut usitatè eclegma  
non excedat  $\frac{3}{4}$  iij. vel iiiij.

Excipientes istos pulueres ratione quali-  
tatis, usitatè est syrups idoneus, aliquan-  
do mel, serpenta, mucilag. semin. conuenien-  
tium; gummatum, vinum dulce, &c. prout  
sitè indicatio; sed usitatius syrupo exci-  
piuntur.

Quod ad quantitatem, non exprimitur,  
dicitur. q. s. potest tamen ita definiti, ut  
syrups sit quadruplus, vel etiam quin-  
tuplus. Eclegma enim opiatâ debet esse

liquidius.

2. *Vel* fit ex decocti, quod vim bechicorum idoneorum, maximè autem folior. fructuuni, seminum, ebiberit; mucilagine, cum saccharo, vel ipsi analogo, melle, sapo, additis aliquando puluerib. idoneis.

Quod ad mucilaginem illam extrahendam, præscribitur primò decoctum ex thoracicis sua naturà mucilaginosis, hac ratione, ut sint radic. ( licet rariùs ) 3 jj. 3 iij. folior. M. iiij. v. fructuum majorum, par. 18. minor. 20. 24. 3 j. fl. semin. 3 j. 3 j. fl. fitq; decoctio in liquore idoneo ad putrilaginem usque, exprimuntur deinde omnia fortiter ex torculari, cum tela noua, trajiciunturque.

Recipitur huius mucilaginis quartarium unum ( sufficiet namque : ) idcirco & ingredientia decoctum, pro illa elicienda, dosi minore præscribenda: quam enim tradidimus libram ferè dabit. Huic mucilagini additur vel sacchari solius 3 j. 3 j fl. vel insuper puluetis elecutuar. aut aliarum rerum idonearum ab 3 fl. ad 3 j. plus minus pro consistencia mucilaginis.

3. *Vel* ex pulpa fructuum, ad 3 j. pul-

et. ad  $\frac{3}{2}$  vj. syrup. q. f.

4. *Vel* ex looch officinarum ad  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  ij.  
puluer. ad  $\frac{3}{2}$  ij. iiij. syrup. q. f.

5. *Vel* ex fructibus thoracicis, semini-  
bus, succis etiam, simul contusis, cibra-  
tis, trajectis, cum syrupo, melle, muci-  
ligine, pro scopo, exceptis; hac quan-  
titate & proportione, vt sint fructuum  
 $\frac{3}{2}$  ij. sem.  $\frac{3}{2}$  j. succor.  $\frac{3}{2}$  b. syrup. q. f. & no-  
ta, puluerem aliquando addi ad  $\frac{3}{2}$  b.

6. *Vel* quod usitatissimum, simplex sy-  
rupus pectoralis pro looch prescribitur,  
ad  $\frac{3}{2}$  iiiij. vj. cui insuper &, si volueris,  
pulueres idonei adduntur, proportione  
dicta in primo modo.

7. *Vel*, sed maximè in phthisicis, ex con-  
seruis adstringentibus ut ex basi, ad  $\frac{3}{2}$  ij.  
puluetibus variis, ad  $\frac{3}{2}$  vj.  $\frac{3}{2}$  j. syrup. q. f.;  
potest tamen major omnium quantitas  
prescribi: quia usus debet esse frequens  
& quotidianus.

Nota, etiam aliquando prescribi ex  
butyro, cum sacchari aut mellis duplo, in  
respi & tracheæ asperitate, cui aliquando  
adduntur puluer.  $\frac{3}{2}$  ij. syrup. q. f. & in-  
super in materia frigida detergenda, tere-  
binth.  $\frac{3}{2}$  j. vel loco huius etiam insuper olei  
mygda. dulc.  $\frac{3}{2}$  i. in pleuritide & phthisi,

192

V S V S *officinalis* : quod ad *modum*, si  
*syrupus* tantum praescribatur, præcipi-  
tur, de hoc capiat sæpius ex cochleari,  
sensim lambendo : si fuerit eclegma com-  
positum, vtatur cum baculo liquiritiæ  
contuso, sensim etiam lambendo.

Quod ad *quantitatem*, Eclegma non de-  
bet excedere 3 iij. iiij. vj. nisi pro exteris  
praescribatur : tunc enim etiam ad 10 j. si  
frequens debet esse usus, excurri potest,  
vt &c cum praescribitur ad phtisim. *Dosis*  
*particularis* est cochleare : vel quantum  
baculo liquiritiæ contuso excipi potest.

Quod ad *discretam*, sæpius & frequen-  
tissime usut pandum. Looch de papau. fe-  
mel hora somni.

Quod ad *tempus*, longè à pastu , ante  
post cibum, vel etiam quavis hora virgen-  
te necessitate: manè, ubi expectandum,  
post somnum : vesperi , ubi humor fluens  
est incrassandus.

V S V S *magistralis* idem est.

FORMVLA. R. &c. fiat looch, quo  
vtatur æger capite erecto , ( vel potius  
prono ad pectus, vt epiglottis, qua la-  
ryngi incunbit , magis dehiscat , cum  
baculo liquiritiæ, &c. vel ex cochleari.

UTILITAS. Praescribuntur tantum

in affectibus pulmonum & pectoris, ut  
in asthmate, tussi, &c. catarrhis, vitiis  
tracheæ. Ita ut hodiè imperentur ferè,  
vel ad leniendam asperitatem ipsius ob-  
humorum actimoniam, vel alijs otium-  
dam; ex bechiçis dulcibus gratis, vel ad  
spumum facilitandum, attenuando, inci-  
dendo crassos humores ex dulcoacidis;  
detergendo lentos, ex dulcoamaris, his  
poterioribus; vel ad fluxiones in pectus  
sistendas, incrassandas si tenues, ex visci-  
dis mucilaginosis; vel ad adstringendum  
in hæmoptoe, ex agglutinantibus, & sic-  
candum in ulceribus pulmonum; sed  
cautè; quia spiritus viam intercludit.  
Facilis autem spiratio sit ad vitam opot-  
tet.

## C A P. IV.

## DE CONDITO.

**I**VNIORVM invenitum est, à similitudi-  
ne cum floribus in conseruam sacchari bene-  
ficio conditis, sic nuncupatum.

Est autem medicamentum suave, formâ me-  
diæ inter opiatas & palueres, ex variis rob-  
oribus, ad partium principum robur, & vi-

194 *Methodus Praescribendi*  
*rium instauracionem confitum : unde & re-*  
*staurans ab effectu appellatur.*

In hoc tria considerantur. *Compositio-*  
*Vsus. Viilitas.*

Quod ad COMPOSITIONEM, illud comparatur ratione *qualitatis*, ex conseruis, ut basi, quibus additur aliquando confect. cardiaca, semper vero puluis cardiacus, & saccharum.

Quod ad conservas, ratione *qualitatis*, eliguntur corroborantes & cardiacæ, cæque suaves, tūm & simul radic. fructuum varie conditæ, quæ pro uno estimantur ; ratione *quantitatis*, 3 iiiij. sufficient.

Confœctio si assumatur, cardiacæ ratione *qualitatis*, ut de Alkerues maximè; quia grata ; ratione *quantitatis*, à 3 j. ad 3 ij.

Puluis ratione *qualitatis*, etiam cardiacus, corroborans, idque vel simplex, perlæ, fragmenta pretiosa, &c. vel simplicium cardiacorum semin. &c. vel compositus elestialiorum, quibus pro ditioribus annubis annumeratur : quod ad *quantitatem*, pro quâuis conserua 3 j. pulueris sint 3 j. Æ iiiij. ad summum.

Saccharum album, vel rosat. tabulat. scilicet ligitur, idque duplum, triplum ad istum

omnia, vel q. s. imperatur.

His omnibus anni foliis etiam numero vii. addentur, ad ornatum magis, quam fructum.

VSVS : quod ad modum, per se vel dilutum usurpatur liquore idoneo, aqua simplici, alia quamvis, iulepo, vino, juscule.

Quod ad quantitatem, ad cochleare. i, j & z.

Ad tempus, si proficacitate animali roboranda, hora somni vel post cibum, pro vitali, quamvis urgente necessitate, pro naturali, antea cum, post cibum.

FORMVLA. R. &c. fiat mixtura vel conditum auro coopertum, quo utatur ad cochleare, i. &c.

V T I L I T A S ad robur partium principum conseruandum, virium jaqueratam in morbis resaciendam, unde conditi usus analepticus, naturæ, & virtibus consulens potins, quam motbo, cuius tamen est habenda ratio. Hinc & condita fiunt calefacentia, refrigerantia, astringentia, &c. Frequens eorum usus in melancholia hypochondriaca, palpitatione, phtisi, ventriculi & hepatis imbecillitate, &c.

L I B R I P R I M I  
S E C T I O III.

*D E F O R M I S M E D I -  
C A M E N T O R V M  
S O L I D I S.*

C A R. I.

*D E P A S T A R E G I A , M O R S E L L I S.*

**R**ecentiorum etiam inuentum est me-  
dicamentum illud, quod consisten-  
tiā pincolato simile, ex variis si-  
mul subactis instar pastæ (vnde no-  
men) & saccharo soluto liquore id mea tabula-  
toq; exceptis, conficitur in bolos, ut conserua-  
toriarum sicca, (vnde Morselti appellatio,) qui  
semper exsiccati conseruantur ad usum, aut  
aliquando obduicti: dicitur autem Pasta regia  
ob eximias vires in affectibus pectoris, pulmo-  
num, & corporibus extenuatis.

In hac tria etiam notanda. Compositio  
Usus. Utilitas.

Quod ad COMPOSITIONEM  
bifariam fit.

1. *Vel* sine pulpa animalium, vt iam dicitur, fructibus, semin: bechicis & saccharo.

Fructus autem isti ferè, *amygdalæ excorticatae*, *lotæ*, *maceratæ*, *contusæ*, *pinei*, *pistachia*, etiam *lota aquâ idoneâ*, *violarum*, *saccharo*.

Ad quantitatem eorum, 3 *iiij.* prescribuntur.

Semina sunt, quatuor frigida maiora visitata, incisa, contusa, quibus, vbi somnus conciliandus, & semin. *papau. alb. laetucæ*, adduntur.

Ratione quantitatis, 3 *ii.* 3 *ii. 8*, prescribantur.

Saccharum scilicet album, solutum liquore idoneo: quod ad quantitatem, dicitur q.s. ferè tantum debet esse duplo.

2. *Vel* fit ista pasta analeptica ex carne *testudinum nemoralium* lota, cocta in aqua hordei, capite & cauda ablatis, hinc postea vocatur testudinatum: aut carne, *tencrorum fluviatilium*, *caponis*, *perdiciis*, solis, vel simul additis fructibus dictis, seminibus, pulueribus etiam in condito disquis, & saccharo soluto in aqua rosatum,

1 *iij.*

hac dosi & proportione.

Carnis,  $\frac{3}{2}$  iiij.  $\frac{3}{2}$  iiiij.

Fructuum,  $\frac{3}{2}$  iiij.

Semin.  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  j. 6.

Puluerum verò 3 j respondeat dictorū

$\frac{3}{2}$  j. minore tamē quantitate pretiosiores.

Sacchari autem dicitur q. s.

Additur aliquando *ambra*, *mosch.* parca  
dosi, ad  $\bar{g}$  aliquot, & auro etiam alias pa-  
sta obducitur.

V S V S. Modus per se, vel ex juseulis.

Quantitas continua, seu dosis ad  $\frac{3}{2}$  6.  $\frac{3}{2}$  j.  
Morsellus num. i. ii.

Discretæ, sc̄piùs cum cibo, inter pastus.

Tempus expressum.

F O R M U L A. R. &c. fiat confe-  
tio in morsellis, additur aliquando in-  
star pineolati. Utatur.

V T I L I T A S. Pasta non analeptica vtilis  
in affectibus pulmonum, pectoris variis,  
ad incrassandum, leniendum, detergen-  
dum, expectorandum, &c. Analeptico  
verò in iisdem, in atrophia, extenuatis,  
& debilibus ab vlcere pulmonum: nutrit,  
exiccat, fluxiones incrassat. Usus igitur  
omnino resumptius, affectibus simul,  
vnde illa *ægria* & virium prostrator  
consulens.

## C A P. II.

## DE PANDALEONE.

**A**RABVM, & immixtu inuentum, medicamentum est peitoris & pulmoni dicatum, materia suave, sine cum eclegnate omniā conueniens, formā tantum different, quā consenserit cum tabellis, à quibus tamen in hoc differt, quod illæ in figuram certam effingantur, hoc vero quod, ubi saccharum ritè coctum est, permixtis ingredientibus infunditur pyxidi, & ibi solidescere permittitur, ac usus tempore frumentum aliquod culiro, cochleari, demitur, &c.

Est igitur medicamentum solidum tabularum more, pyxide instar placenta conceptum, ex pulueribus, conseruis bechicis, & saccharo soluto tabulatoq; confectum: ad eosdem usus, in quos eclegma, institutum.

In hoc autem tria consideranda. Compositio. Usus. Utilitas.

**C O M P O S I T I O** bifariam fit.

1. *Vel ex pulueribus bechicis simplicibus, compositis, solis, mixtis, & saccharo liquore idoneo soluto, cocto, hacten & proportione, ut sint puluer. 3 lb. plus minus, sacchari soluti 3 iiii. vel q.s.*

I iiii

2. *Vel ex fructibus, seminibus thoraci-  
cis, pulueribus electuariorum, saccharo-  
soluto, hac proportione.*

*Fruetuum 3 ij. sem. 3 j. pulueris 3 iiij.  
sacchari q. s. Nota, conseruas, aliquando  
addi, ad 3 iiij. 3 β.*

*VSVS. Modus, ore continetur, vt sen-  
sum cliquetur, & instat looch sensim de-  
glutiat, ut atque frequenter.*

*Quantitas, de hoc cum cochleari vel  
cultro frustum modicum desumitur.*

*Tempus idem quod eclegmatum.*

*FORMULA. R. &c. fiat pandae-  
leon in pyxide idonea, de quo, &c.*

*VENTILITAS eadem quæ eclegma-  
tum, à quibus forma tantum differunt,  
& quodd ferè hæc constent ex iucundis-  
simis.*

### C A P . I I I .

## DE MASSA PANIS, ET Pineolato.

**M**ARCIPANIS vel MASSA PA-  
NIS iuniotibus confectio gratissi-  
ma, polytropha, macilentis, pulmo-  
num affectibus pro bellariis conueniens,

*ij. le 2ij. et 2ij.*

Componitur ex amygdal. excortic. ʒ iij. pistachior. mundu. ʒ j. Contusis in mortario marmoreo cum parum aq. res. addita sacchar. albiss. ib. s. fiat pasta, hinc placentalæ coquendæ leviter in furno ad colorem flauescensem & duritatem medium. Alia iucunda addi possunt ad gratiam, ut cinnamomum.

PINEOLATVM in eundem finem fit, ex æquis partibus pineorum & sacchari soluti. Ex quibus fiunt morselli, addito moscho ad gratiam, si volueris. Hæc autem ferè solent à medico imperati, non prescribi.

C A P. IV.

D E T A B E L L I S.

**Q**uod electuvinum solidum vocant, alias Tabella dicitur à plane forma, & quia saccharum, ex quo fiunt, collum & tabulatum, complanatumq; scinditur in varias figuratas, quadratam, binc Tessellæ, & Lorenzæ vulgo pharmacopœis, aut quia fieri solent in manus Christi formam rotundam, binc & rotule, & orbiculi, à rotunditate etiam figura, appellantur.

1714 p. 1714 quare s

*Medicamentum solidum est è puluere maxi-  
mè, & saccharo soluto, cocto q̄ supra syrapi  
consistentiam, atque tabulatio confectum: ad al-  
terandum vel purgandum comparatum.*

*Hinc tabella duplices: Purgantes & Al-  
terantes.*

### *Tabellæ Purgantes.*

*Definitio & differencie vt supr. Sunt au-  
tem duplices: Officinales, Magistrales, de qui-  
bus hic potissimum.*

*In Magistrali tria consideranda. Com-  
positio. Usus. Utilitas.*

*Quod ad COMPOSITIONEM,  
sunt ex pulueribus, & saccharo soluto in  
liquore idoneo, coctoque supra syrapi  
consistentiam, aliquando & tabellæ pur-  
gantes, vel species electuarior. purgan-  
tium adduntur.*

*Puluis vel est purgans, simplex, vel al-  
terans, corrigenſ nemp̄ idoneus aroma,  
aut species electuarij alicuius.*

*Quod ad quantitatem, vt dictum supra  
in opiatâ purgante, doses catharticorum  
maximè suffundandæ. Quicquid sit,  
quandoquidem tota massa tabellarum  
3 iiiij. vel vj. non debet exceedere, sat fue-*

rit puluer. ʒ j. sacchari soluti triplum, quadruplum præscribere; licet vulgo, sed male, non definiant.

V S V S. Quod ad modum, vel per se sumitur, vel diluta idoneo liquore. Vide potionēs.

Quod ad dosis, Vide opiatam purgantem.

Quod ad tempus, manē, ut alia purgantia.

FORMULA. R. &c. cum sacchari soluti in liquore idoneo, &c. fiant tabellæ, pondere ʒ iij. ʒ g. capiat, &c.

Sed plerūnque loco magistralium solent præscribi officinales tabellæ purgantes, eodem modo, dosi, ac tempore sumendæ.

UTILITAS cadem quæ opiatæ; ad purgandum.

### Tabellæ Roborantes.

Quid sint, & differentias, vide in portione cardiaca.

Quod ad COMPOSITIONEM, ex puluere roborante vario, simplici aromatum, & rerum idonearum, aut compoſito electuarij officinalis, & saccharo fo-

luto in liquore idoneo, vt massa 3 vj. non excedat, hâc dosi & proportione singulorum, vt:

Pulueris sit vna pars.

Sacchari vj. vel viij. x. prout tabellas validiores, vel debiliores volumus, aut pulueres grati, ingrati, efficaces, plûs minus existunt; licet sacchari passim q. s. dicatur, puluerum dosis tantum exprimitur, ad 3 v. 3 vj. ferè.

Nota puluetibus hisce aliquando utliter addi confectionem, vt alkermes, ad 3 ij. ex qua sola etiamnum Monspelij tabellas jucundissimas conficiunt, item & aliquando conseruas idoneas, ad 3 iij.

Ad roborantes referri possunt, quæ sine medicamentis cardiacis, ex variis rebus ad alterandum pro scopo compantur, eodem modo puluerisatis, & saccharo exceptis, èdem dosi: licet possint & majore; saccharo triplo tantummodo prescripto, cuius generis in officinis quamplurimæ, ad varios medici scopos ac intentiones, prostant.

V S V S *reborantium*. Quod ad modum per se maximè usurpatur, vel solutæ liquore idoneo.

Quod ad quantitatem, à 3 j. ad 3 iij. pro-

ingredientium energia.

Quod ad *tempus* tribus horis antē prandium, vel etiam cœnam, idque postridiè purgationis si præcesserit, vel si pilulæ vſuales fuerint præscriptæ, alternatim sumēdæ diebus alternis, vel aliās, vbi simpliciter roborandum est, quo quis tempore poterunt vſurpari.

V S V S *alterantium*. Quod ad *modum* idem.

Quod ad *quantitatem*, ad 3 j. 3 ij. 3 iiij. pro puluerum facultate & scopo.

Quod ad *tempus*, hoc limitabit affectus præsentia; ut iliter tamen vacuo stomacho assumentur.

V S V S *officinalium*. Quod ad *modum* & *tempus* idem, tūm & *quantitatem*.

**F O R M U L A P RÆS C R I B E N D I.**  
R. &c. cum sacchari soluti in &c. q. s. hant tabellæ ponderis 3 j. 3 ij. quarum vnam capiat, &c.

**V T I L I T A S** roborantis, vide ſu-  
p̄a in opiate confortante, vt & alteran-  
tis ibidem: quæ obiter etiam paſſim ad  
defluxiones in pectus ſiſtendas præſcri-  
buntur, ex adſtrigentibus & incrassan-  
tibus, quatum etiam vna quod ad uſum  
præſcribitur, ſeptiū ſin ore continenda.

## C A P. V.

## DE PILVLIS.

**L**ATINS à parme pilæ similitudine di-  
lata, Gracis ex eo, quid non dilata; sed  
integra denorentur, à nativis, deglutio, cata-  
potia appellantur.

Medicamenti forma est solida, globuli effi-  
gie spherica, ex puluerib[us], aliquando & gumi-  
natibus, succis, liquore glutinoso exceptis ef-  
formata: ad purgandum maxime, vel etiam  
aliquando ad alterandum, vel corroborandum  
comparata.

In presentia clarioris explicatiois gratia,  
triplices statui possunt: Purgantes: vsuales  
dictæ: alterantes.

## Pilulæ Purgantes.

Etsi pilulæ propriè loquendo sint catharticae,  
quia tamen in variis usus comparari possunt,  
& quæ, quæ purgant, faciunt id vel efficaci-  
ter, vel debiliter, ac corroborando potius, bas-  
vsuales cum vulgo, illas purgantes appella-  
mus, quæ à medico variis prescribuntur, cùm  
officinalibus barum loco r[ati]o soleant, tamen co-  
rrian conficiendi r[ati]o posleda patet.

Sunt autem vel Officinales : vel Magistrales. Officinales vel non purgant , vel purgant.

Non purgant pilulae de Bdellio , cynoglosso : hypoglottides albae , nigrae , que tamen obiter hoc non spectant.

Purgantes vel sunt visitatores , vel non.

Visitatores sunt , aureæ b. alephangina , b. p. aggregat. b. p. sine quibus , o. b. agarice , p. eschia , p. lucis maiores , p. aq. bermodaethyl. p. aq. Indæ , m. p. fætidæ maiores.

Minùs visitatæ sunt , de Rhubarb. b. assaiereth , b. eupatoria , b. imperiales , b. Rifi , b. de hiera , b. p. arthriticæ , b. p. Arabica , p. de s. myrobalan. b. p. m. masticin. p. de aloë , sagapen. sarcocoll. antè cibum , p. b. stomach. de s. maria , m. lapide lazuli , m. b. p.

Magistrales. Quod ad COMPOSITIONEM , conficiuntur.

I. Vel ex puluere idoneo , liquore etiam onco excepto.

Pulvis est rationē qualitatis , tūm catharticū Simplex , ita tamen ut aloë , (quæ basis omnium pilularum est, ) semper ingrediatur , tūm corrigens idoneum atque dirigens , vt in opiate purgante.

Nota , Lachrymas gummi , vt ammopiac. opopanax addi posse.

Quod ad *quantitatem*, pulueris 3 j. sufficiet, raro 3j. s. quia quandoquidem dosis pilularum sit 3 j. in viij. vices purgando, atque in semestre sufficiet. Huius vero pulueris dux partes sint veluti purgantes, via corrigitum.

*Liquor excipiens ratione qualitatibus*, potest esse sapo, suceus idoneus, mucilago, sappiūs mel coctum despumatumque, paſſim verd & vītate syrpus aliquis idoneus.

Quod ad *quantitatem*, dicitur q. f.

2. Vel quod erit efficacissimum, extraheturum more decoquantur purgantia, praescribanturque ad 3 iiiij. vj. cum suis corrigitibus, in liquore vel succo idoneo mote Apozematist: facta deinde ferti expressione & colatura in huius vnciis vij. viij. viij. dissolute in Balneo Matrix, ~~aloes~~ succorrinæ 3 vj. 3 j. pro diutino vſu, deinde coagula ad mellis consistentiam, addatur. postea puluis idoneus corroborans, ad 3 iiij. vt & scammoneum, si scopus fecrat, quandoquidem non decoquitur, ad 3 j. iij. iij.

V S V S Officinalium. Quod ad *modum*, decuantur.

Quod ad *quantitatem*, validiores, à 3 j.

paeris, ad 3 j. viris & adultis: vt sunt,  
*aurea, cochlea, fætidæ maiore;* *arthritica,* *In-*  
*dx, de lapide lazuli, de hermodactylis.*

Mediocres à 3 ij. ad 3 iiiij. *aggregatae;*  
sive quibus, *de agarico, de aloë, de succo myro-*  
*bal, de fumaria.*

Leuiores à 3 j ad 5 ij. *de rhubarb. assai-*  
*terb, alephang. ante cibum, mysticina, de-*  
*esp. Rufi, hiera.*

Sin vtrd. more visualium usurpentur,  
3j. 3. s. sufficiet duabus horis antè ci-  
bum, prandium & cœnam.

Quod ad tempus manè, vt alia cathar-  
tica.

Magistralium VSVS. Quod ad modum  
& tempus, idem.

Ad quantitatem, vide opiatam purgan-  
tem.

**F O R M U L A P RÆSCRIBENDI**  
*officinales.* R.&c.i.e. massæ pilularum ta-  
lium, &c. *diagridij* g. iiiij. v. (in biliosis &  
frigidis stimuli loco, vt & aliquando  
trochisc. alhandali g. iiiij. v. pro pituitosis,  
caustorei etiamnum g. v. in affectibus ca-  
pitis frigidis,) cum aqua tali, fermentur  
pilulae vj. viij. viij. quæ decuratæ suman-  
tur summo mane, vel etiam post medium  
noctem, si à cerebro debent trahere,

cum custodia, leui cœna præcedente, vel  
horâ somni, si pro capite vt cum beni-  
gno leuioris cœnæ halitu vis cathartica  
ad cerebrum feratur.

**F O R M U L A P RÆS C R I B E N D I**  
*magistralis.* R. &c. cum &c. fiat massa pi-  
lularum, que oleo amygdalarum dul-  
cium vel anisi, &c. obliterata obuolu-  
tur, reponaturque in pyxide idonea, ca-  
piat de hac massa, &c. fermentur, &c.

**V T I L I T A S.** Insignis in purgan-  
do ab habitu corporis & tertia regione  
est. Hæc forma tunc eligenda maximè,  
quia diutius moratur vis purgans in ven-  
triculo, nec confestim prolabitur in inte-  
stina, hinc per illam motam vberrimè  
effunditur in peripheriam cum fructu.

**V**sus autem earum præcipue in pitui-  
tosis, minus in biliohs, hyemis etiam  
tempore potius, quam aestatis, valent  
etiam in obstructionibus expediendis  
ob rationem dietam, præsertim si am-  
moniacum admittant; vix autem in me-  
lancholicis: quia siccior eorum aluus vis  
diluitur, nisi ammoniacum etiam ha-  
beant, atque tum vtiliter juscui paru-  
superbabitur.

## Pilulæ vsuales.

Purgant quidem, sed sensim admodum & potius sunt corroborantes, quarum usus quandoquidem frequens in hebdomada, est, iſq[ue] sine custodia, usuales id est dicuntur.

Quod ad COMPOSITIONEM, ex aloë, ut basi, sunt succotrinae, ad 3 fl. 3 vj. additis leuioribus purgantibus, Rb. b. agar. ad 3 j. 3 ij. & corroborantibus simplicibus, ut *cinnamomo*, *garriophyllis*, *masticæ* compositis elect. ad 3 j. 3 ij. cum syrupi absynth. &c. q. s.

Nota *ammoniacum* solutum passim utiliter addi in obstructionibus, ad 3 j. 3 ij. vt & *myrrham*. Item, in forma utiliter praescribi, alioem sc̄co absynthij nutritum. Item *Rhabarbarum* liquore idoneo, donec mollescat, irroratum.

V S V S. Quod ad modum, vt suprà.

Quod ad quantitatem, & tempus, de malla praescripta sumitur 3 fl. ex qua formantur pilulæ iiiij. quarum duas sumat manè, duabus horis ante prandium, duas alias duabus horis ante cœnam; bis vel ter in hebdomade: diebus quibus abstinet ab opiate corroborante, si fuerit

212 *Method. Praescribendi*  
præscripta, alias sine hac admonitione  
passim enim, ut & supra, una præscribun-  
tur.

Hec autem FORMVLA. R. cum &c.  
sunt massa pilular. de qua, &c.

V T I L I T A S summa corporibus  
valde cacochyinis, pituitosis maxime,  
quibus ventriculus scatet pereni phleg-  
matis illuie, unde manat in vniuersum  
varia morborum series: valde enim cor-  
roborant ventriculu, coctionem juuant,  
si quid excrementium in eo expurgant,  
nec sinunt noxia vlla accumulatori: hinc  
utilissime in omnibus affectibus inde  
oriundis, mesenterij, vel capitis, hepatis,  
articulorum, &c.

### Pilulæ corroborantes, & alterantes.

Licer omnes pilulæ purgantes propriè esse de-  
beant; tamen & ad alios scopos bac formæ li-  
da medicamentii solent & possunt componi, ad  
corborandiam & alterandum vario modo in pri-  
mis, secundis, tertiiis qualitatibus; ubi medi-  
camenum sc. volumus diutius hæcere vel mo-  
vari, nec transire subito, ut vis medica agit  
efficiens in parte in qua est, vel propter eandem  
moram diffundi etiam liberalius posse ad alias

consentientes, & distribui per occultos & patientes meatus.

Hæ autem vel ore continentur, neque deglutiuntur, vel deuorantur.

Ore continentur pilule bechicæ à sphero-  
ca forma, ( vel etiam lupinari, vnde & has  
ad trochisces passim referunt, ) & vi insigni in  
sedandâ tuſſi ſic dictæ, ve & ab uiendi modo  
hypoglottides, vulgo ſublinguales, quod ſub  
linguâ, vel ſuprà poſiūs continentur, donec  
ſenſim hoc paſto liqueſcant, tuſſi & affectibus  
asperæ arteria, pectoris dicata.

C O M P O N V N T V R autem ex  
puluere thoracicotum lenientium, vt  
ſucco liquatur. gummi tragacanth. Arabic.  
Amylo, penidiis, ſacchar. ſem. pap. v. albi, &c.  
ad 3 j b. 3 ij. pro uſu neceſſitate, & lon-  
gitudine.

Excipitur autem iſte puluis ſufficiente  
quantitate mucilag. gummi tragacanthæ, ex-  
tractæ in aqua roſar. vel cydonior. &c. vel  
etiam cum ſyrupo pectorali.

V S V S & F O R M V L A. R. &c.  
cum mucilag. &c. fiat mafſa, ex qua for-  
metur pilul. hypoglottides, quarum  
vnam paſſim & ſepiuſ contineat ſub lin-  
guæ, donec liqueſcat, & ſenſim deglu-  
tatur.

V T I L I T A S suprà ad sedandam  
tussim, leniendam arteriæ asperæ & fau-  
cium asperitatem, vocis raucedinem, &  
expectorationem difficultem.

Huc possent referri trochisci lupina-  
res, ad fluxiones sistendas ore conti-  
nendi.

Deglutinuntur autem pilulae reborantes, vel  
vario modo alterantes, utiliter in affectibus  
ventriculi à cruditate statuum, & parum  
consentientium, capitis maxime, ac vicinarum,  
hepatis, &c. ex reborantibus idoneis, in affec-  
tibus capitis idiopathicis idoneae, ob moram  
quam trahunt in ventriculo, maxime si possi-  
cibum suuantur. Sic enim ascendit spumosa  
vis. Ita, & conferunt ad affectus oculorum,  
corum caliginem ex ophtalmicis, vel dum iuxta  
dormitum.

Tales etiam sunt hypnoticae officinales, pilu-  
lae de Cynoglosso, quales & passim prescri-  
buntur ad fluxiones sistendas, simul & absor-  
bendas, somnum etiam conciliandum: huc &  
laudanum iam receptissimum referri potest,  
ad g. i v. v. ad summum prescribendum, pre-  
scribuntur etiam ad fluxum alui ex corroboran-  
tibus & adstringentibus, ante, & cum cibo  
sumende, ad hepatis atoniam, gonorrhœam,  
renum, vesicae ulcera, ad calcinum, meri vs.

ris affectus, &c.

**C O M P O N V N T V R** autem ex puluere idoneo faciente ad scopum & intentiones, quas suggesterent affectus propositi, eoque ad  $\frac{3}{2}$  fl.  $\frac{3}{2}$  v.  $\frac{3}{2}$  vj. præscripto, qui excipiatur syrupo conuenienti.

**V S V S.** Quod ad *quantitatem*, ex massæ  $\frac{3}{2}$  j. formantur pilulæ vi. quarum dux semel, bis in die assumuntur.

Quod ad *tempus*, manè, vesperi, antè, post, cum cibo, ut supra dictum in condito.

Quod ad *modum*, deuorantur, & si ad partium inferiorum, hepatis, viscerum, renum, vesicæ, vteri affectus præscribantur, utiliter parum liquoris idonei appropriati superbibitur, quò ad istas partes vis medica citius perferatur cum fructu.

**V T I L I T A S** suprà satis fuit explicata.

## C A P. VI.

### D E T R O C H I S C I S.

**A**lias etiam à formâ Gracis *marilandica* & *spicata*: Latinis *pastilli*, *orbiculi*, *sigillina*, *lupinares*.

Medicamenti forma solida duraque lupinorum figuræ similis, ex pulueribus variis lique excepitis in pastam, quæ deinde in orbiculos effigiata, exsiccata, afferuataque.

Sunt autem vel Officinales, vel Magistrales.

Vtrique Interni, vel Externi.

Officinales interni vel sunt

Purgantes, agnicus trochiscatus, albal dal. de violis.

Alterantes, vel sine opio theri acali, ut de viperis, scyllitici, cypbeos, Hedyachroi, vel cum opio, ut alkekengi, ad Ren. Ves. carab ad vterum.

Cardiaci Gallia moscat. aliptam oscat.

Bechici seu pectorales, albi nigri.

Aperientes quædes sunt Diarribod. ad Hep. de Rbo, Hep. de eupat. absynth. lacca. Hep. Lien. myrrha, Vtero.

Magistrales ut olim fuere usitissimi, sic hodiè vix prescribuntur, nisi ad suffusus, ad quos receptissimi ut posita, ut ad tussim & defluxionem, quales pilulæ subling. supra. Fiant & usitate ad ulcera vesicæ, renum, ardorem urinæ, sanguinis, seminis, & idvi, ad astringendum aperiendumq; possunt & ad corroborandum. In summa, loco puluerum efficaciores prescribi possunt, quia vis medica non cuanescit;

quænescir; sed assertur hanc ratione commode  
dissimile.

**C O M P O N V N T V R** autem ex  
puluere retum variarum idoneo, liquore  
etiam conuenienti excepto, permixto,  
donec pilularum & pastæ formam acqui-  
rat, ex quâ deinde orbiculi effinguntur in  
umbra ticcandi, reponendique, chara-  
ctere sepiùs impresto: suntque ponderis  
3 j. 3 j. 6. 3 ij. ij. ad summum, pro in-  
gredientium vi & summa efficacia. Pul-  
uis autem qui assumitur, è vegetabilium  
singulis partibus, præsertim quæ pulue-  
risari possunt, nec non & ex gummati-  
bus puluerabilibus, vt *cerasorum*, *styra-  
ce*, *gummi tragacanthæ*, succis inspissatis,  
*Acaciæ hypoxystide*, scilicet.

In suminâ ex rebus idoneis pulueratu  
facilibus.

Quod ad quantitatem, eiusmodi puluis  
ad 3 j. 3 j 6. 3 ij. pro usus necessitate, &  
longitudine prescribetur: 3 j 6. enim  
aliando sufficiet.

Excipiens eiusmodi puluerem, vel est  
tenue, aqua, vinum, aqua destillata, sucii  
herbarum, vel viscidum, mucilage gummis  
*tragacanthæ*, *Arabici*, extracta cum aqua  
idonea.

Quod ad quantitatem, praescribitur q. C.

V S V S & F O R M U L A. R. &c.

Sunt trochisci lupinares vel pastilli ponderis, &c. siccentur in umbra, usus tempore teratur unus, duo, pro ponderis ratione, & efficacie, soluatur liquore idoneo. Utatur & intra, & extra. Fiunt enim, ut dixi, trochisci ad usum tum internos, tum externos.

Nota tamen obiter, qui fiunt ad suffitum non dissolui, ut neque hypoglottides appellati: de quibus suprà.

V T I L I T A S iam satis expressa. Hac enim formâ aptati possunt alteratia vario modo, corroborantia. Trochisci enim prius inventi sunt ad conseruandam vim puluerum infraactâ, quam quod sint priuata quædam medicamenti forma. Integris enim non utimur, sed solutis prius liquore idoneo, si hypoglottides, & quæ ad suffitum, excipias.

Hec autem formæ ratio utilissima, quod pulueres, maximèque cardiaci, & tenuis essentiæ facilè exhalabiles, hac ratione viribus infraactis diù perstent adversus aëris injutiam, neque exsoluatur facultas, sed unita in efficacem energiam conspiret.

*Ad Trochiscos referendi sunt  
M V S C A R D I N I.*

Pastilluli enim sunt, ab odore quem à moschis habent, sic dicti, ad balitus maximè comparati suavitatem, & venereos complexus. Tales exiam trochisci de Gallia efficacissimi.

C O M P O N V N T V R autem, vel simpliciter ex ambra, moschi, g. iij. iv. &c. ut volueris, & sacchari soluti in aqua res. q. s. cum amyli tantillo.

Vel sunt compositiùs, ex puluerē tenui aromaticarum suavis odoris, vt cinnamoni, santal. 3 j. moschi, ambr. g. iij. iv. pro libitu, sacchar. &c. fiant trochisci, quoniam unum teneat sapiùs in ore.

## C A P . V I I .

### D E P U L V E R E .

P U L V E R V M usus admedium necessarius, tūm ut medicamenta solida vel ingra in usum commodius venire possint, tūm in aliis remediorum formis facilius miscantur. Quod autem in genere Latini puluerem appellant, Arabes trifariam nuncupant:

K ij

*Suffus, puluerem quemlibet crassum: Alkool,  
temissimum: Siet, quorundam trochiscorum  
attritionem, que sit in Tote, cum aqua idonea  
ad affectus oculorum. Est autem puluis vel of-  
ficialis, vel magistralis: de quo nobis sermo.*

*Magistralis est Internus, vel Externus.*

*Internus alius purgans, corroborans aut  
alterans existit.*

### Puluis Purgans.

*Definitio, & differentiae ex superioribus.*

**C O M P O N I T V R** ex simplicibus  
catharticis, ferè suauioribus, additis pro-  
priis correctiuis, proportione saepius iam  
dictâ.

*Quod ad quantitatem, ad 3 j. 3 j. s. ad  
sumnum prescribitur. Et nota, saccha-  
rum aliquando pro delicioribus ad-  
jungi; sed dosi parcâ, vel pondere pari,  
etque definito.*

**V S V S**: quod ad modum, cum iuscule,  
vel alio liquore conuenienti.

*Quod ad quantitatem, doses catharti-  
corum supputandæ.*

*Tempus manè cum custodia.*

**F O R M V L A. R. &c.** fiat puluis, de  
quo, &c.

**V T I L I T A S** ad purgandum. Vide  
suprà.

## Puluis Roborans.

Licer ad varias partes corroborandas praescribi possit, pro medentis scopo; tamen ferè ventriculo confirmingando, vocaturq; vulgo digestinus, vel cordi, cardiacus dicitur aut Alextorius: licebit & ad alios usum; hepar robandum, intestina, &c.

**C O M P O N I T U R.** I. *Digestinus* in genere ex rebus stomachicis, coctionem iuuantibus, flatus discutientibus, adstringentibus.

*In Specie* vero cerasandrum preparatum ad 3j. basis est, addunturq; flatus discutientia, anisum ad 3 ss. 3 vj. corroborantia deinde stomachica, simplicia, composita, ad 3 ij. iiij. ad summum, cum sacchar. rosat. tabular. q. s.

II. *Cardiacus*, vel etiam alias partes roborans, componitur ex simplicibus & compositis pulueribus, eleuar. idoneis ac specificis, ad 3 ss. 3 vj. 3 j. prout usus debet esse longus; ita tamen ut cardiana pretiosiora minore quantitate, subquadrupla, subsextupla ingrediantur: & ij vel soli prescribuntur, vel ad gratiam sacchar. rosat. tabul. triplum aut quadruplum adjungitur.

**V S V S & F O R M U L A.** *Digestini*

K. iiij.

quidem, R. &c. fiat puluis, de quo sumat  
cochlearc vnum, post singulos pastus,  
nihil superedendo, vel bibendo.

*Cardiaci* verò, vel *alterius roborantis*, vt  
hepatici, &c. R. fiat pulu. de quo sumat  
3 j. ij. iij. cum aqua, juscule, vel li-  
quore idoneo. Idque manè jejuno ven-  
triculo, vel alias urgente necessitate,  
maximè si fuerit Alexiterius.

**V T I L I T A S.** Expressa, ad robur  
partium principum, & aliarum etiam-  
num, ventriculi, intestinorum constanter;  
ferè ex calidis; tamen eodem roborandi  
fine ex frigidis appropriatis comparari  
poterunt.

Huc pertinet alterans-vario modo in  
qualitatibus primis, secundis, pro scopo  
ex rebus idoneis, vt qui passim praescri-  
bitur ad obstructiones ex Chalybe, addi-  
tis aperientibus, ad 3 j. 8. 3 ij. cum sac-  
chari portione pari, de quo manè co-  
chlearc vnum, superbibendo parum vini  
aut liquoris idonei, assumitur. Sic ad cal-  
culos & arenulas ex lithontripticis, ad  
3 j. 3 j 8. & sacchar. q. s. de quo 3 j. 3 j  
8. cum liquore diureticō; sic ad partum  
& menses, ad astringendum, sanguinis  
deiectiones per aluum, vterum, velicam;

ad fluxus omnes , & alterandum vario modo, vbi humiditas adjuncta fucrit.

*Hæc de puluere inferno.*

*Externus puluis etiamcum aliquando prescribitur.*

*Estq; Medicus vel Chirurgicus.*

*Medicus* roborans ferè est , qualis ētiā ferè tantūm cerebro confottando exsiccandōque destinatur , ex rebus idoneis, radic. fol. &c. cephalicis , ad  $\frac{3}{2}$  ij. præscriptis; addito sēpē puluere violaceo, Cypriso, ad  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  j. plus minūs. Ferè autem sumuntur radic,  $\frac{3}{2}$  ij. sem. 3. vj. flor. 3 iii. aromat. 3 ij.

**V S V S & F O R M U L A. R. &c.**  
sat puluis paulò crassior , quo exsiccatur caput manè , quod usitatissimum post lotiones ipsius.

**V T I L I T A S** ad cerebrum corroborandum , pituitosum exsiccandum , absundendas humiditates ipsius capitis pilorum excrementicias.

*Chirurgicus.* Varius ferè , à chirurgo tantūm præscribendus ad ulcera detergenda , replenda , glutinanda : ad vulnera, hemorrhagiam, &c. Quorum dosis & quantitas præscribendi pro usus necessitate est.

LIBER SECUNDVS  
*DE REMEDIIS*  
*externis.*

SECTIO I.

*DE REMEDIIS COM-  
 MVNIBVS PLVRIBVS  
 PARTIBVS.*

CAP. I.

*DE EPITHEMATE.*

**S**i vim nominis species, dicitur in generis omne remedium exterum, quibusvis partibus applicandum. sed e vero primo quodammodo appellatur medicinum, partibus corporis nostri nobiliorum, cordi, & hepatis praeferum, adueniendum, ad ipsas alterandas corroborandasq.

*Est autem duplex, Liquidum & Solidum.  
 Epithema liquidum.*

*Ratio nominis clara. Est autem aquae vel latere instar fluidum, ex liquore idoneo & per-*

ueribus cardiacis maximè composta.

In hoc tria consideranda : *Compositio-*  
*Vsus. Utiles.*

**I N C O M P O S I T I O N E**, Materie  
ex qua; quæ vel *liquida*, vel *sicca*, ( *puluis  
idoneus* ) vel *media*. In iis consideranda  
*qualitas & quantitas.*

**L I Q U O R** ratione *qualitatis*, pro  
basi passim & ferè semper aqua destilla-  
ti est, parti & affectui respondens, eaque  
vel sola, vel huic insuper alia adduntur,  
ad penetrationem maximè, aut maiorem  
efficaciam, ut passim & ferè semper, vi-  
num *album*, pro corde *acerum* pro hepate;  
sic & aliquando ad maiorem vim, succi  
fructuum, ut *limonum*, vel foliorum ido-  
neorum.

Liquor aliquando decoctum liquidif-  
fimum est, ex idoneis, sed raro.

Quod ad *quantitatem*, dosis epithema-  
tis lib. j. ℥ xv. unde si aqua assumatur, ad  
istam quantitatem præscribenda: si vero  
alia liquida simul addantur, hæc propor-  
tio; aquæ, ℥ viij. succi, ℥ ij. ℥ iiij. vini,  
aceti, ℥ iiij. ℥ j.

**P V L V I S** ratione *qualitatis* vel sim-  
plex, rerum cardiacatum, hepaticarum,  
signorum maximè corticum, florum, se-

min. vel compositus, eleſtuarior. roboreſtantum, aliquando & trochisci atomatiſi.

Quod ad *quantitatem*, pro liquoris 3 j. pulv. 3 j. aut 3 ſ. ad ſumatum ſufficiet: ita ut ſummatim ad 3 ſ. vel 3 vj. ſit præſcribendus: ita tamen etiam, ut ſpecie-rum eleſtuariorum 3 j. 3 ij. tantum afflu-mantur.

**M E D I A**, ratione *quadratis*, aliquan-do, præter liquorem & puluerem, (ex quibus ſemper epithema,) præſcribitur, opiata ſc. corroborans, vel confeſſio cardiaca, ut *alkermes*, ad 3 j. 3 ij. præſcri-benda.

**VSVS.** Quod ad *medium*, cum panno ſcarlatino, vel linteo imbuто & leuiteſſpresso applicatur tepidè, & ubi ex-a-ruerit aut refrixeſit, renouatur, vicebus repetitis, continuando per horæ qua-drantem, bis in die.

*Quantitas* nulla definiſtur:

*Tempus* manè & vefperi, ſi affectus fri-gidus, vel hyemis, aliàs ter, quater in die, ubi calidus, aut aſtas, & nota obiter, poſt uſum liquidi ſolidum poſteà utiliter ad-moueri, viribus admodūm collaſiſ.

**FORMULA PRÆSCRIBENDI**

R. &c. fiat epithem. liquidum, in vase  
vitreo reponendum, vsus tempore pan-  
nus scarlatinus, &c.

**V T I L I T A S.** Ferè tantum sit ad  
corroborandum; sed refrigerandum si-  
mul, ratiùs ad calcificandum: ad hoc  
enim solidum visitatiois: ad intemperies  
cordis & hepatis maximè calidas, præ-  
scribitur, roborandum simul, malignita-  
tem præterea, si quæ suspicio, abigen-  
dam: æstate maximus eorum usus in fe-  
bribus.

**Nora obiter,** liquida etiam eiusmodi to-  
ti pectori posse utiliter admoueti, in fe-  
bribus ardentibus & hecticis, ex humi-  
dis & frigidis aquis, aut decoctis majori  
quantitate præscriptis: item & in capitis  
ardoribus, phrenitide, &c. Vide oxy-  
rhodinum.

Aliquando & testiculis applicanda in  
ardoribus magnis, ob consensum eni-  
cum uniuerso, & uniuersus corporis ha-  
bitus, & sanguis maximè refrigeratur.  
Hinc & in hemorrhagia utileissimum. Ad  
hoc oxyratum ferè usurpat. Eodem si-  
ne aliquando carpis manuum applican-  
tur refrigerantia, ad æstum cordis, & in-  
teriorum viscerum, sic & ad crysipelata

faciei, &c. In summâ enim ista omnia epithematis nomine comprehensa, possunt utiliter usurpari parte inflammata, aut affectu calido obfessa, licet epithema propriè de corde vel hepate audiat.

### Epithema solidum.

*'Appello quod inflat aquæ fluidum non est: licet variâ consistentiâ, & molliore etiam prescribamur.*

In hoc autem tria consideramus. *Compositionem. Usus. Utilitatem.*

Quod ad COMPOSITIONEM vario modo conformatur.

I. Vel enim, quod usitatissimum, op. i. et forma, ex conseruis florum, pulueribus electuariorum, ratiùs verò simplici, & confectionibus supra dictis, cum idoneo liquore, aqua destillata simplici; composita, sueco appropriato, &c.

Quod ad quantitatem, in genere 3 iiiij. vix excedit, speciatim verò sint conservarum 3 iiij. confectionum 3 iiij. puluerum, 3 j. 3 ij. ad sumnum, talis liquoris q. s.

II. Vel linimenti forma, maximè in cordis affectibus calidis, possunt & in fri-

gidis, vt in hepatis affectibus; ex vnguenti  
resac. cer. vii semalini 3 ij. confetu. idonea-  
rum 3 fl. 3 vj. pulu. cardiac. 3 fl. 3 ij.

III. Vel cum pipione per medium dif-  
fuso, quod visitatissimum, qui consper-  
gatur deinde 3 j. pulueris cardiaci elec-  
tus 3 ij. pulueris pro epithematibus or-  
dinariis.

Huc referri possunt catelli dissecti ca-  
piti applicandi, in declinatione phreni-  
tidis maximè, aut aliàs, conspersæ pul-  
vere digerente & roborante, ex flor. ro-  
sar. camomilla, granis tintorium, & similibus  
ad 3 fl.

V S V S. Quod ad modum, solidum:  
opiatæ forma extendatur suprà pannum  
scarlatinum liquore idoneo imbutum, ac  
leuiter expressum, actepidè regioni cor-  
dis admouetur, idque vel post liquidii-  
vsum, vel aliàs etiamnum.

Tempus indifferenter se habet, & bis;  
ter in die poterit renouari.

FORMULA patet ex compositione.  
R. &c. fiat epithema, &c.

UTILITAS solidi opiatæ forma,  
pro corde, ad corroborandum & calc-  
faciendum maximè, vt & linimenti for-  
mâ atque cum pipione comparatum: pos-

**230** *Method. Praescribendi*

funt & ad cor refrigerandum cum conservis & formâ linimenti fieri, linimenti formâ, hepatici præcipue dicatum est ac utilissimum.

In summa vero sunt ad alterandum & corroborandum maximè, ubi vires admodum collapsæ.

**C A P. II.**

**D E L O T I O N E.**

**N**O MINIS ratio & definitio patet: est enim priuatum veluti quoddam balneum capiri, pedibus maximè dicatum: vnde & duplcam facio: Cephalicam, & pro pedibus.

**Lotio Cephalica.**

**C O M P O N I T V R** ex decocto cephalicorum, in quo duo considerantur, Materia: *Liquer.* In hic qualitas & quantitas:

**M A T E R I A** ratione qualitatis & quantitatis; radic. ad  $\frac{3}{2}$  ij. iij. fol. à M. iv. ad viij. semi.  $\frac{3}{2}$  j. ij. flor. P. iv.

**Nota**, addi aliquando aromaticæ, ad  $\frac{3}{2}$  fl.  $\frac{3}{2}$  vj. & ubi siccandum valde est, sulphur viuum ad  $\frac{3}{2}$  fl. item & usitatè ubicacut purgandum priuatim post uniuersa-

*ha folior. senn. 3 j. agar. albi 3 g.*

**L I Q V O R** ratione qualitatibus lixiuum fermentorum, vel barbitonorum vulgare, addito vino albo, si volueris, & ad vinum etiamnum aqua ad 3 iv. quod ad quantitatem q. f. vini vero una pars, vel ana part. aequales.

**V S V S.** Quod ad modum, hoc decocto caput ex alto irrigatur sub radiis solariis; sereno & tranquillo celo, vel loco calidiore; caput deinde probè efficandum cum spongiis aqua vita mactatis, & stupis cannabinis obtegendum, suffimine aliquo prius suffitis.

**Tempus**, manè lauatur, duabus horis antè prandium, alio prius exonerata.

**F O R M U L A. R. &c.** fiat decoctio, &c. lauetur caput, &c.

**V T I L I T A S** post purgationes maxima, ad materiarum coniunctæ dissipacionem, & absundendas reliquias, ut passim, caput simul corraborandum, affectibus ipsius & cerebri frigidis ferè tantum dictata: fieri etiam ad alios usus possunt, ut ad capitis affectus externos, tineam, furfures, pediculos, sordes, ex detergentibus actriotibus cum urinæ & lixiuid, additis semper cephalicis.

254 Method. Praescribendis  
etiam addito analogo, ) & cera, illo de-  
finito ad 3 ij. iiij. iiiij. &c. huius verò q.s.  
proportio tamen patet, vt suprà.

III. Vel, quod erit compositius, & mo-  
re receptissimum, & statim initio indica-  
tum, ex oleo, cera, puluere, proportione  
dictâ, quæ in calidis vnguentis valet, in  
quibus etiam aliquando pulueris 3 j. ff.  
pro olei 3 j. prescribi poterit. In frigidis  
verò, vt in *vnguento de turbia*, *desiccatione*  
*rubro* videre est, 3 j. olei, puluer. 3 ff. contra  
regulam. Quicquid sit, in calidis, vi-  
dictum pro 3 j. olei, pulu. 3 j. 3 j ff. ceram  
indefinitè q. s. prescribitur.

Nota, huic rationi vnguenta aliquan-  
do officinalia admisceri, ad 3 j. 3 ij.

IV. Vel, quod etiam usitatissimum &  
efficax admodum ex oleo & succis, quæ  
simul ad succorum consumptionem bul-  
lierint, hac ferè dosi, vt olei sint 3 iiii. vii.  
viii. prouisu & parte, succorum tantum-  
dem vel minùs, quibus additur poste  
vel cera sola q. s. vel una cum hac pulvi  
idoneus proportione ad oleum dictâ, vel  
insuper aliquando & vnguentum offici-  
nale ad noc. ii. simul adjungetur.

V. Vel quod etiam usitatissimum, ex  
vnguento officiali, puluere, oleo, cera

bus, & astutis quibusuis affectibus  
cipitis, cerebri maxime, ad somnum con-  
ciliandum.

## Cap. III.

## DE FOTV.

**F**omentum aliás, è quod suo calore partes  
quibus admittuntur, foneat, sic dicitur :  
una enim fomenta ferè calida sunt effectu, raro-  
cuent frigidæ.

Est autem duplex. Humidus & Siccus.

## Fotus humidus.

**H**umidus : liquor est paribus variis, linteis,  
fili, spongea beneficio applicandus : ad v. cridas  
intensiones.

Est rursum duplex : Simplex, & magis  
Compositus.

**S**implex liquor, pro fotu aliquando usi-  
tate præscribi solitus, ratione qualitatis,  
est aqua calida vel tepida, vbi relaxan-  
dum in doloribus à tensione, vinum, vbi  
discutiendum, roborandum : aqua & vi-  
num, vbi utrumque simul, vel temperatè  
agendum, lac in doloribus ; alerū com-

234 *Method. Præscribendi*

mune, vel aliud, vbi emolliendum ad dolores, digerendum pro scopo: *hydrexum*, *oxycratum*, quò referri potest & *oxyrrhodinum* in calidis affectibus, *lixiniuum fermentorum* in frigidis, vbi digerendum, siccandum fortiter.

Quod ad *quantitatem*, usus longitudine vel partis amplitudine definienda. Sic pro oculo  $\frac{3}{4}$  iiiij. V. G. sufficient, pro ventriculo  $\frac{1}{2}$  j.  $\frac{1}{2}$  j. S. pro hypochondriis & abdomen, ut in obstructionibns,  $\frac{1}{2}$  iiij.

*Compositus* fit ex decocto variarum partium plantarum, & liquore idoneo, in quibus consideratur *qualitas*, & *quantitas*.

Quod ad *qualitatem materi.e*, præscribuntur rad. fol. fructus sem. flor. in modò omnia simul, vbi maior quantitas paranda, modò quedam tantum.

Quod ad *quantitatem*, varia pro partium diuersitate, pro oculis verbi gratia præscribatur dosi potionum; seu quartâ parte Apozematis:  $\frac{3}{4}$  iiij. enim sufficiunt, vel vj. ad summum pro ventriculo dosi media Apozematis, aut paulò maiore: pro abdomen integrâ dosi Apozematis.

*Liquor*, in quo decoctio facienda, est aqua simplex, aqua & vinum simul, lac ali-

q[ua]ndo, vbi leniendum, *lixinum*, vbi digerendum, *aqua fabrorum*, vbi adstringendum, &c. pro scopo: quod ad *quintam*, p[re]scribitur q. s.

Nota, aliquando decocto factio collatoque, varia addi; ut *vinum album* in obstructionibus viscerum, ad ℥ j. ℥ j. f. *cerum* aliquando in lienis affectibus ad ʒ vj. v ij. viij. ad penetrationem, *aqua vite*, pro ventriculo ad ʒ ij. ʒ iiij. ad roboreandum simul; olea idonea ad ʒ iiiij. ℥ f. &c. Passim etiam in usu pratico in obstructionibus viscerum, post usum praescripti Apozematis statim praescribi. R. decocti Apozematis praescripti ℥ iiij. iiiij. adde vini, &c. fiat fatus abdominalis.

**V S V S & F O R M U L A. R. &c.**  
fiat decoctio pro fotu, quo foueatut locus affectus, linteo duplicato, filtris, spongia imbutis, & leuiter expressis, vel etiam vesica suilla semiplena, manè & fetò, vel urgente necessitate, calidè per horam dimidiam, unam: vicissim ubi refrixetit applicandum.

Nota, in fotu hypochondriorum dici, foueatut regio hypochondriaca, manè 2.3. horis ante prandium, vel etiam ante cenam per triduum, aut quatriduum.

frequenter mutando, ne frigescant, præcipitur autem passim post fōtum, pars deinde vngatur tali oleo, linimento, vnguento calidè. *Vſus* autem post purgationes vniuersales, aliàs vrgente necesse.

**V T I L I T A S** latè patens, vt nulla ferè pars, quæ vt foueri potest, sic & frācum indè non percipiat, vt & oculis affectis præscribatur, horum dolori, inflammationi, &c. obstructionibus lienis, viscerum, &c. doloribus variarum partium, ad mouendos menses, colicis, nephriticis, inflammationi, variis tumoribus, cutim rarefacit, hinc contenta facile digeruntur, attenuat, resoluit, tenuia, dura emollit, in halitem digerit, calore blando suaui iuuat: hinc ad dolores, laxandum, emolliendum, digerendum, siccandum, adstringendum, robotandum, calefaciendum, aliquando & ad refrigerandum, sed tunc potius *vſus* est epithematum, vt in inflammatione bilioſa.

### Fotus siccus.

*Sic appello ab effectu fōtum, fācculos, qui ad resolendum maximè præscribantur; unde*

& sacculi discurrentes vulgo dicuntur, de quibus postea.

## C A P. IV.

D E I N S E S S V  
& Semicupio.

**I**NTER foton & balneum medium, hoc minus, illo maius, cuius usus, quando fotina pars tegi nequit, à quo alijs materia & militate non differt; ita ut sit dimidium balneum, cui ægri insident à feminibus, cruribus actibiis extra porrectis, vel etiam ab imis pedibus, usque ad umbilicum vel ventriculum; unde Gracis ènæstis, Latinis Inseffio dicitur; & si inseffio sit in sella perforata, hanc quidam Vaporarium vocant, affectibus ventris inferioris, aut partium infernarum dicatum.

Duplex statim potest: Semicupium propriè dictum, & Inseffio, quam vocant Vaporarium.

**S E M I C V P I V M**, quod non sit integrum balneum; sed dimidia veluti cùpulas dicatum, **C O M P O N I T V R** ex iisdem quibus foton, dosi Apozematis summa duplicata, vel balnei dimidia, ut nihil aduertendum prætereat.

**V S V S & F O R M V L A. R. &c.**

fiat decoctio, pro semicupio, vbi æger insideat à pedibus ad umbilicum, manè & vesperi longè à pastu, exonerata alio, per biduum aut triduum, prout opus, tepidè sine sudore : mora autem sit in eo per duas horas, & deterso madore, lecto se componat, vñcto deinde loco affecto, si volueris, linimento idoneo.

Nota, in affectibus ani, vteri, vesicæ maximè, materiam sacculo, cui insideat, commodè includi.

**V**ITALITAS eadem quæ fotūs, maximè autem in affectibus partium abdomine contentarum, aut etiam inferiorū, cùm balneare non audemus corpus universum, ob varias causas : fere autem & utiliter ad dolores sedandos, ( quod visitatissimum in nephriticis, ex emollientibus idoneis,) haemorrhoides tumidas cum dolore, dysuriam : tibiarum etiam, & coxendicum doloribus ex emollientibus, anodynis, discutientibus, vesicæ vitiis, vt urinæ difficultati eximiū, vteri affectibus, intemperiebus emendandis, mensibus mouendis, sistendis, ani vitiis omnibus, ad aluum emolliendā insigne, ad dolores etiam colicos, &c.

**V**APORARIUM, quod alias *Inseffum*

eriam vocant, paratur cum non in liquore sedet  
ager; sed vapor ( unde vaporarium, vel suffitus  
dici posset ) ex sellâ perforata exhibetur, olla  
subditâ, decocto calente idoneo plenâ, quo frigi-  
do aliud inditur.

MATERIA & DOSIS ipsius  
pro decocto ut in fotu: quantitate clyste-  
ris aut paulò maiore praescribenda.

VSVS & FORMULA. R. &c.  
fiat decoctio, cuius vaporem excipiat  
ex sellâ perforata, olla subdita decocto  
isto plenâ, &c.

UTILITAS tantum ferè ad veteri  
& ani affectus, dolore, intemperies va-  
rias, haemorrhoides, menses mouendos  
utilissimum. Possunt & ad vesicæ varia  
vitia prescribi. Vide suffitum humidum.

## CAP. V.

### DE BALNEO.

**A**d delicias clim Romanis usitatissimum;  
hodiè tantum ad custodiam sanitatis &  
marmorum expugnationem. Quid sit, clarum.  
Duplex autem est: Aereum, quod Laconicum  
vocant, de quo postea: Aqueum, cum in vase  
sui cupâ sedentes lauantur, & dicitur bal-

neum.

240 *Method. Praescribendi*  
nem; letio nemp̄ totius corporis ad affectus ca-  
lidos siccōs ferē, rariūs ad frigidos, ad quos con-  
venientius Laconicum.

*Est autem duplex: Simplex, Compositum.*

*Simplex* fit ex aqua sola tepida, in he-  
ticis maximē, & ubi marcōr emaciatis  
squalidisque corpōribus, quæ benigno  
madore perfundit, & intemperiem si-  
mul alterat, cui aliquando oleum, bīxy-  
rum, lac ad maiorem humectationem  
additur: ut & in nephritico dolore, con-  
vulsione: lac solum pro ditionib⁹ in eun-  
dem finem: lac & aqua, oleum solum in  
dolotib⁹ partium neruosatuim, nephri-  
tide, conuulsione à siccitate, puncitura,  
vrinæ suppressione, &c. hydrelæm ad ea-  
dem, &c.

*Compositum* fit ex decocto, in quo per-  
penduntur *materia*, *liquor*, & aliquando  
*dissoluenda*.

**MATERIA** ratione qualitat⁹ &  
quantitat⁹ sunt, rad. à lb iij. ad v. vij. ad  
sumnum, herbae io. aut 12. recensitz,  
singulæ ad M. iij. iiiij. vel priuatim her-  
barum vij. viij. ana fasciculus unus:  
semin. ab ȝ iiiij. ad lb j. fructus aliquan-  
do idque ad lb j. ȝ. flor. quatuor ana  
P. liij. vij.

**LIQVOR**

**L I Q V O R** ratione qualitatis & quantitatis, aquæ dulcis q. s. pro balneo.

**D I S S O L V V N T V R** vel adduntur aliquando in decocto facto, utiliter pro varietate indicationum, quæ dictæ sunt in fotu, dosi triplâ, quadruplâ sic utilatissimè pro hecticis, olei, butyri ana lb iiij. vini albi lb iiiij. vt & aliquando ad finem decoctionis in affectibus frigidis, in quibus rarum balneum.

**V S V S & F O R M V L A. R. &c.**  
est decoctio pro balneo, quod ingrediatur manè & vesperi longè à pastu ( vel. etiam urgente necessitate, vt in doloribus, ) exonerata prius aluo, per biduum aut triduum, tepidè sine sudore : mora autem sit per duas horas, vel pro viribus, & deterso madore post egressum balnei utilitatè imperatur, vngatur regio hepatis, renum, vnguento refrigerante.

**V T I L I T A S** ad affectus extērnos cutaneos, scabiem, ad cutim squalidam, pruritum, &c. tñm etiam ad internos utilissimum, & præsertim balneum aquæ dulcis hecticis conuenientissimum, emaciatis, humectans simul, & intemperiem illam calidam emendans : conuenient etiam febribus ephemeras, vt passim in

more fuit Galeno : laxat enim poros, & aperit, per quos inquinamenta facile excluduntur: conueniunt maximè ad hepatis astum, omnem intemperiem, calidam maximè: in humida enim balneorum usus ferè obsoletus, ut & ferè in frigida: solemne namque Laconicis pro causæ continentis expugnatione uti. Fiunt tamen etiam calefacientia ad roborandum, ut passim ad conceptum iuuandum ex veterinis: ad menses mouendos ex aperientibus & emollientibus hystericis: ad viscerum obstrunctiones, hydrozem, dolores colicos, nephriticos, vesicæ, ex laxantibus emollientibus, ad laßitudinem . ad omnem affectum denique, qui eget refrigeratione & humectatione, vel calefactione, & humectatione simul.

## C A P. VI.

D E S T V P H A , V E L  
Sudario.

**A**LIAS appellant Laconicum; quod ab Lacones maximè veterentur, ut Balneum Romani, alij Vaporarium appellant: hic agit

nullo liquore immergeatur; sed solo vapore calido  
seco, vel calido humido, incalescit, & sudat,  
vnde nomen.

Stuphain autem duplicem statuo: humidam,  
& secam.

### Humida.

Fit cum vapore alicuius decocti, quo conopeo  
seum incalescit.

**C O M P O N I T U R** autem erekto  
cum cupa conopeo, orbe ligneo imposi-  
to, & huic linteis aut stragulis.

A vapore autem vario modo incal-  
scit.

1. *Vel* enim super lamina ferri dispo-  
nuntur 10. 12. lapides fluuiatiles can-  
dentes, in quos decoctum dicenduna  
conjiciatur.

2. *Vel* decoctum prius infunditur; ita  
tamen, ut æger non tangat, & in hoc si-  
lices candentes injiciuntur.

3. *Vel* quod commodius, paratur de-  
coctum in duobus lebetibus, qui vicissim  
calentes cum materia decocti in cupam  
immittuntur.

decoctum autem paratur ex rad. sol-  
lem. flor. idoneis, calidis ferè, cepha-  
licis odoratis, tenuium partium, qua-  
titate, dosi summa Apozematum,

VSUS & FORMULA. R. &c.  
sat decoctum , cuius vaporem capiat  
æger sub conopeo benè clauso , sudet ad  
placitum : bis ingrediatur in die longè i  
pastu, alio exonerata, idque per biduum:  
mora autem sit in balneo pro viribus  
post egressum detergatur sudor, lecto se  
componat, &c. Huius autem usus hyeme  
& vere, vt balnei, æstate.

### Sicca.

Talis appellatur, que ignis solo calore incit  
lescit.

COMPONITVR autem, seu fit

1. Vel per viam hypocausti & forna-  
culi , vt in Germania, & Laconicum vor-  
catur propriè.

2. Vel silices candentes sub conopeo  
iam dicto super lamina am ferream dispo-  
nuntur.

3. Vel , vt hodiè pro luc venetea , et  
textura lignea sit, instar caueæ cuiusdam  
qua ætri obducuntur , stragulae impo-  
nuntur , subditis lapillis aliquot igneis  
donec sudor eliciatur copiosissimus;  
præbibito Guaiaci, aut altetius sudorifico  
decocto.

V S V S vt aliorum est, mora pro vi-  
ribus, quæ maximè dissipantur, & vix ho-  
re quartam partem ferè, vel dimidiam.

V T I L I T A S. Materiam diffusam  
per corpus calcfacit, attenuat, cutim la-  
mat, vacuat: valdè valet in affectibus fri-  
gidis, humidis, humoribus laxis, hydro-  
pe, leucophlegmatia, potenter enim hu-  
mores liquat, absmit per sudores, emcit,  
obscis etiam proficia valdè, cacochymis  
maximè, si humorum illuvies circa habi-  
tum vel in venis. In lue venereà passim  
surpatur sicca. Non vtendum nisi vacua-  
lo corpore, sic enim reliquæ facilius per  
sudores eliminantur.

## C A P. VII.

### DE EMBROCACTIONE.

PROPRIE non est certa forma medicamenti;  
sed modus utendi tantum, cum partem  
tempè liquore aliquo vel oleo perfundimus,  
idq; vel aliè diffundendo, vel blandè tantum  
friundo. Vtq; enim modo Practici bodiè  
surpant nomen Embrocationis, & passim con-  
fundunt cum irrigatione: iubet enim signi-  
ficat pluo, irrigo, & immergo. Quicquid sit,

L. iii.

246 Method. Præscribendi  
distillationis gratiâ distribuimus in Irrigatio-  
nem seu perfusionem, & Embrocationem.

## Irrigatio.

Perfusio est liquoris ex alto, pluviæ instar, in  
partem aliquam, (maxime in caput) copiosè  
facta destillatio ex proboscide vasculi, à fætido  
modo viendit. mūm differens. Alias Instillatio  
vocatur & Implunium, ut & Græcis iubetur.

COMPONITVR autem vario modo

1. Vel ex decocto variarum partium  
stirpium calidarum, frigidarum, pro scopo,  
dosi lotionis, in aqua, vel vino fa-  
cto (pro indicatione) ad tertiarę partis  
consumptionem: in quo colato adduntur  
aliquando, ipsius nempè libræ vni, acer-  
vel vini, aut aquæ vita, prout affectus ex-  
lidus, vel frigidus, 3 ij. iiij.

2. Vel ex oleo solo copiosè irrigato; sed  
præstat linteis immersis embrocationem  
facere, in conuulsionibus, & nervis affec-  
tis præsertim.

3. Vel ex oleo, aqua destillata, aceto  
in affectibus capitis calidis. Vide Oxy-  
rhodinum.

V S V S & F O R M U L A. R. &c  
decocti lib. j. ij. iiij. fiat irrigatio ex alto

cum gutturnio in partem affectam, &c.  
Vide Lotiones.

**V T I L I T A S.** Calidis affectibus maximè dicatur, capitis p̄cipue, cerebri, meningum inflammationibus, idque supra synciput: tūm & ad somnum conciliandum in calidis affectibus, ad peutigilias; et si hodiè lotio pēdum magis sit v̄sitata. Vtilis etiam in febribus pr̄sente delirio. Fit etiam maximè ad affectus capitis calidos: vis enim refrigerandi ineſt maxima; quia ex alto altius penetrat: quia etiam perpetuō nouus liquor impluit, & pars refrigerata subinde magis euentatur. Potest etiam ad ipsius affectus frigidos fieri vtilissimè, vt ad lethargum ex calidis. Vide Lotiones, cum quibus h̄ec irrigatio in materia, domi, &c. conuenit.

Fieri etiam possunt ad aliarum etiam partium affectus tūm frigidos, tūm maximè calidos, quibus pr̄sertim competit, quando sc. magis volumus refrigerare, vt inflammationum initio ex decoctione refrigerante, oxyrrhodino, in erysipelate ex oxycrato. Fieri etiam possunt ad affectus frigidos ex idoneis, sed ra-

riūs, sotu enim potius utimur, vt & in inflammatione resoluenda. In fracturis etiam & luxationibus, vbi vincula soluere non est tutum, tamen dolor urget, cuti oleo violaceo vel repellendum cum rofacio, &c.

Nota, stillicidium aquarum thermaticum huic esse referendum.

### Embroatio.

*Non sumitur pro irrigatione bīc ex alto; sed ut bodiē usitatum, vel pro blanda partis frictione cum oleo facta: vel etiam pro lana, linici in oleo, aut liquore idoneo immersione, & applicazione: īp̄fīxō enim significat etiam immersio, ut supra, pluo, irrigo.*

COMPONITVR inde precipitūq;

1. *Vel lana aut linteo (aliás vocant splenium) immerso (inde nomen Embrocationis,) imbutōq; oleo solo, vel liquore idoneo partiq; imposito instat epithematum, sāpiūs renouando.*

*Liquor autem, vel oleum solum, vel succi soli, vel aquæ destillatae solæ, vel omnia simul, hac proportione: olei 3 iiiij. succi, aquæ ana 3 iiiij.*

2. *Vel, ut hodiē usitatissimè sumitur*

Embrocatione, pro blandâ frictione facta cum oleo idoneo, stupis deinde cannabinis, linteo vel cotone, eodem imbutis, vel non imbutis superimpositis.

Fit etiam cum solo succo, vel ex his mixtis.

*Dosis* autem eorum simul, vel seorsim, ʒ iiiij. vj.

V S V S & FORMVLA. R..&c. pro embrocatione, fricitur pars leviter, tegatur poste à linteo, cotone, stupis imbutis eodem oleo, vel non imbutis.

*Vel secundum* priorem modum. R.&c. intingantur stupæ vel linteæ, applicentur sèpiùs renouando.

V T I L I T A S embrocationis èx oleis, post balneum & fatus frequentissima: utilis etiam ad repellendum in inflammationibus, crysipelate, phrenitide, vigiliis, capitis doloribus, ad omnes corporis partes externas internas calefaciendas, post balnea passim, deterso madore usurpantur, præcedente semper euacuatione. Maximè autem conferunt in affectibus externis.

## C A P. I X.

## DE LINIMENTO.

**L**INIMENTVM, alijs litus, medicamentum liquidum est, quod extra illinitur, consistentiâ oleo crassius, unguento vero liquidius, ad varios usus comparatum, cuius basis oleum est.

In hoc tria consideranda : *Compositio.*  
*Usus.* *Vtilitas.*

Quod ad COMPOSITIONEM, vario modo ex variis conficitur.

1. Vel ex oleis, & butyro, liquatis simul sine cera vlla, ( quam quidem linimentum non ingredi malè volunt. )

2. Dosis autem totius linimenti 3 iiiij. vj. viii. pro partis & usus amplitudine. Hæc autem ingredientium proportio : Olei sunt tres partes vel dux, butyri una, raro pondere pari.

NB. His aliquando, si ferat scopus, unguias addi & pinguedines, recentes, veteres medullas, mucilagines, unum duo, pluta simul, quæ cum habeantur pro butyro, proportione etiam ipsius prescribenda.

NB. etiam, licet rariis, pulueres addi ad 3 fl. pro olei 3 j.

II. *Vel* contra opinionem plurium, qui certam non admittunt, cum qua commodissime conficitur, sit ex oleo idoneo, & cera, vt olei 3 j. ceræ drachmam habeat, vel, quod vulgo. q.s. passim autem oleorum. 3 iiiij. vj. præscribentur, ceræ q.s. fiat linimentum, cui & puluis, vt dictum, usitatisse addi potest.

III. *Vel* præscribitur voguentum officiale ; duplum ad oleum, addito etiam puluere, si vis, vt dictum.

In summa linimentum 3 iiiij. vj. viij. non excedit.

**V S V S & F O R M V L A R.** &c.  
fiat linimentum, quo illinatur pars affeta, post fotum si præcesserit, vt sèpè fit, vel alijs.

**V T I L I T A S.** Ferè paregorica ad dolores sedandos, ex intemperie frigida aut calida, ad laxandum densa, dura emolienda, tumores, lassitudinem, unde cum veteribus dicta, ad duritiem splenis, hepatis, ad laxandas partes, utrum in partu difficulti, in calculo, ad inflammations omnes digerendas, discutendas. Fiunt & ad calcfaciendum, hu-

mectandum, siccandum; licet vnguentum  
efficaciora, ad refrigerandum vero uti-  
lior embrocatio.

## C A P. IX.

## DE VNGVENTO.

**A**RABES cera & vnguenta sape eodem nomine vocant vnguenta, & hodiè etiam sape linimenta & vnguenta confundunt; licet propriè vnguentum topicum sit inter linimentum & ceratum medium, consistentiâ mellis ex oleo, puluere, cera, ad varios usus confectum.

In eo autem tria consideranda. *Compo-*  
*sitio. Usus. Utilitas.*

Quod ad COMPOSITIONEM. in genere, ex tribus maximè comparari volunt, oleo, cera, puluere, hac quantitate, ut tota massa  $\frac{3}{4}$  iij. lb.  $\frac{3}{4}$ . lb j. contineat, pro partis amplitudine, & longitudine usus. Hanc autem proportionem statuunt, ut in genere quidem

Olei sit  $\frac{3}{4}$  j.

Ceræ  $\frac{3}{4}$  ij.

Puluere.  $\frac{3}{4}$  j.

*In specie* vero, vario modo sic conficitur.  
1. vel sine igne ac cera, contra opinio-

nem, solà nutritione, ac subactione comparatur, vt *vnguentum de lythargyrio*, vel de *balo*, vocántque nutritum.

Fit autem nutritum eiusmodi ex oleo, liquore idoneo, puluere.

*Oleum* vel solum sumitur, pro scopo varium, vel simul olei analogia, unum, duo, plura simul, adjunguntur.

*Puluis* ferè & passim mineralis usus, lotus, &c. de quo postea.

*Liquor*, succus foliorum aliquis, acetum, si ferat intentio.

Ex illis tribus constat nutritum, quorum dosis aut proportio retinetur, & pilis, ferè tantum exprimitur dosis puluerum, & rectè, V. G. ad  $\frac{1}{2}$  j.  $\frac{1}{2}$  ij. olei verd & liquoris q. s. quantum sc. pulueris possint absumere.

Hæc autem FORMVLA nutriti obiter. R. &c. h. c. puluer. cum olei aut analogorum uno, duobus, &c. q. s. agitentur fortiter in mortario marmoreo, cum pistillo plumbeo, ad vlcera, sensim affundendo liquorem idoneum, fiat nutritum.

II. Vel cum igne, quod visitatissimum in praxi, paratur, quæ ratio est receptissima & simplicissima ex oleo (solo aut

**254 Method. Praescribendi**

etiam addito analogo, ) & cera, illo definito ad 3 ij. iiij. iiiij. &c. huius verò q. s. proportio tamen patet, vt suprà.

**III. Vel**, quod erit compositius, & more receptissimum, & statim initio indicatum, ex oleo, cera, puluere, proportione dicta, quæ in calidis vnguentis valet, in quibus etiam aliquando pulueris 3 j. & pro olei 3 j. praescribi poterit. In frigidis verò, vt in *vnguento de tubis, desiccatis rubro* videre est, 3 j. olei, puluer. 3 j. & ceram indefinite q. s. praescribatis.

Nota, huic rationi vnguenta aliquando officinalia admisceri, ad 3 j. 3 ij.

**IV. Vel**, quod etiam usitatissimum & efficax admodum ex oleo & succis, quæ simul ad succorum consumptionem bullierint, hac ferè dosi, vt olei sint 3 iiiij. vij. viij. pro usu & parte, succorum tantundem vel minùs, quibus additur postea vel cera sola q. s. vel una cum hac pulvis idoneus proportione ad oleum dicta, vel insuper aliquando & vnguentum officinale ad noe. ij. simul adjungetur.

**V. Vel** quod etiam usitatissimum, ex vnguento officinali, pulvere, oleo, cera;

vnguenti ʒ ii. iiiij. iiiij. pulv. ʒ 6. ʒ vj. olei & ceræ dicitur q. s. illud tamen ex regula proportione ad puluerē poterit definiri.

VI. *Vel*, quod vsitatum quandoque, sine villa alia additione vnguentum officinale solūm ad ʒ iiiij. vj. &c. præscribitur.

**V S V S & F O R M U L A**, vt limenti: quod ad modum tamen, tepidè, calidè, frigidè, pro intentione administretur, & ſexpiis præscribitur: addatur vntionis tempore aceti parum, in frigidis maxime ad penetrationem, vt & potest in calidis, aquæ vitæ etiam parum addi. *Tempus* utendi varium omnino pro indicationibus existit.

**V T I L I T A S** patens latissime est, vt ad omnes partes & affectus ſe extendat, qui alia remedia non ferunt facile, vel ubi etiam efficacius operari volumus, quam cum oleo fieri poſſit: ad alterandum vario modo in primis & secundis qualitatibus, emolliendum, digerendum, detergendum, &c.

### Aduersiones.

**N o t a**, circa communem illam regulam,

256 Method. Praescribendi  
quâ pro olei 3 j. sumuntur cera 3 ij. pulu. 3 j.  
ut & Galenus statuit, valere in vnguentis ca-  
lidis, ut supra, in quibus etiam pulueres ad 3  
j. b. excurrunt, in frigidis verò vnguentis non  
observantur in antidotarij, quod pauci aduerte-  
runt, & vnguentis, quæ ad ulceræ detergenda,  
exsiccanda, ad coquendam, iuwendam, quæ con-  
stant ferè tantum ex mineralibus, in quibus si  
examines, reperias pro puluer. V.G. 3 j. olei 3  
ij. cera 3 b. 3 v. 3 vj. Eiusmodi uueni pul-  
ueres minerales possim minium, tuthia, plu-  
bum, terra sigillata, bolus, lapis calami-  
paris, cerussa, lythargitum, quæ duo po-  
strema basin veluti constituentia dosi ferè tripla  
ad alias praescribuntur.

Ceterum, in vnguenti compositione pro oleo  
censentur, sunt q. ipsi analogæ, pinguis varia,  
ut axungia, medulla, buzyrum, & syphus, muco-  
lago, mel ierebinubina, & similia; quæ omnia  
habentur pro oleo: unde & ad ea ceterorum  
dosis proportione mensuranda: quæd si oleum  
& analogæ sunt praescribas, id sit pondere pa-  
ri, maiore vel minore, si volueris.

Circa ceram, in calidis flaus, in frigidis  
alba feligatur. Illi analogæ censentur gumma-  
ta, ut ammoniac. bdellium, myrra, &c. acq.  
eormin in compositione ratio idèo habenda, &  
obicer aduenire, aestate plus, byeme minus cera

prescribendum esse quam ferat regula.

Quod ad pulueres, ex omni rerum genere, frequenter tamen ex vegetabilibus, desumuntur, ex eorum radicibus, lignis, herbis siccis, succis, densatis, resinis, & gummatisbus puluerabilibus: rarius ex mineralibus, nisi in frigidis vnguentis, ubi secundum, detergendum, in externis maxime, &c. ut ulceribus. In calidis forsan nunquam: rarissime ex animalibus: quia vix puluerabilia: que enim ex illis desumuntur, potius liquabilis, ut caxaria, medulla, &c.

## C A P . X.

### D E C E R A T O.

**N**OMEN à Cerâ habet, vocant & Ceratum; licet vulgo hodiè emplastra Chinensi sic appellant. Fiebat olim ex oleo & cerasum. Ceterum confundunt cum vnguento sa- piis, ut Ceratum album refrigerans, Ce- tatum Santal. (qua sunt vnguentis) Cerata appellantur.

Propriè tamen medicamentum est consisten- ti medium inter vnguentum & emplastrum, illud durum, hoc mollius.

**C O M P O N I T U R** autem in genero

258 *Method. Praescribendi*  
ex oleo, puluere, ceta; hac proportio-  
ne: olei  $\frac{3}{2}$  j. pulu.  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  j. ceræ oncia  $\frac{3}{2}$ .  
*In specie* verò fit;

1. *Vel* propriè, vt olim, ex cera &  
oleo, vnde nomen, proportione iam  
dictâ.

*Quod* autem Galenus in *cerato refrige-*  
*rante* pro olei  $\frac{3}{2}$  j. ponit ceræ  $\frac{3}{2}$  ij. tan-  
tum, vnguentum reuera facit: vel si vis,  
ceratum liquidius appelles: vocat etiam  
ipse ceratum liquidum. *Quod* autem  
idem 10. Meth. pro olei  $\frac{3}{2}$  j. ceræ  $\frac{3}{2}$  jj.  
ponit, ceratumque solidum appellat, re-  
uera emplastrum est, materiam forsan  
potius, h. e. ceram, quam formam atten-  
dens. Res autem dicto modo se habet:  
pro olei  $\frac{3}{2}$  j. ceræ  $\frac{3}{2}$   $\frac{3}{2}$ . vel  $\frac{3}{2}$  v.

*Quod* ad quantitatem obiter praescri-  
bendi cerati, totius massæ dosis, vt in vu-  
guentis, à partis amplitudine, aut usu  
diuturnitate definienda, ad  $\frac{3}{2}$  viij. lib. j.  
&c. & priuato in usu pro magno cerato,  
 $\frac{3}{2}$  iiij. veluti sufficient, pro mediocri  $\frac{3}{2}$  iiij.  
pro minore  $\frac{3}{2}$  j.

2. *Vel* magis impropriè ceræ & oleo  
(ex quibus ceratum veterum) adduntur  
i. vel tantum analoga ceræ folius, olei  
folius, utriusque, cautione & dosi ibi-

dem dictis. 2. Vel pulueres tantum ad-  
duntur, ex quibus cum oleo & cera Ce-  
ratum vulgo fieri diximus, hac dosi: pro  
olei onc. i. pulu. 3 j. 3 j. aliquando 3 ij.  
3 iiij. sed tantundem tunc de cera ferè  
de trahendum est. 3. Vel analoga dicta &  
pulueres simul.

3. *Vid* etiam ex emplastris officinali-  
bus oleo liquatis, vbi scil. illa partes do-  
lentes, aut alijs affectæ non ferunt, em-  
plastri 3 ij. iiij. iiiij. &c. olei q. s. fiat Ce-  
ratum.

4. *Vel* etiam uno verbo fieri potest ex  
his omnibus, ex quibus vnguentum, mo-  
dò obseruetur durities, & proportionam  
dicta.

VSVS & FORMVLA vt emplastro-  
rum est, extenditur super alutam, &c.

VTILITAS varia, in genere, ne oleum  
scil. diffuat sine fructu, aut vis ipsius dis-  
sipetur, vel vbi partes dolentes maximè  
duritiem emplastri, quod postularent,  
non ferunt, vt in fracturis usitatissimè:  
vel vbi partes molliores ob flexuram em-  
plastrum non admittunt, vt in hepate af-  
fecto, ventriculo, pro quibus fiunt usita-  
tissimè, liene obstructo, pro utero, ossibus  
fractis, luxatis, visceraum scirrho, hernia,

&c. sunt ubi calefaciendum, humectandum, laxandum, emolliendum, coquendum, digerendum, maturandum: possunt & ad siccandum, adstringendum, vix ad refrigerandum, sic & Ceratum refrigerans Galeni vnguentum est.

## C A P. XI.

## DE EMPLASTRO.

**V**NGVENTA, Cerata, Emplastrorum, ut  
materiam & viribus conuenient, sic diffe-  
rent maximè consistentiā. Est autem EMPLA-  
STRVM topicum illis consistentiā crassius; sed  
tiscidum, quod linteo vel alio & inductum cu-  
ti applicatur, & tenacius adhaerescit. Arabes  
Cerata ferè vocant, Graci veteres Emplastrorum  
ab ēpurrādo, sermo, milaxo, aut ab effectu &  
ri emplasticā tenaciō.

Est autem duplex, Officinale, Magistrale, de  
quo porissimum in præsens.

Magistrale COMPONITVR, ut sum-  
matim dicam, ex iisdem, ex quibus vn-  
guentum; oleo, cera, analogis, puluere,  
horum aliquibus, pluribus, omnibus, hac  
proportione, quæ anceps admodum  
apud authores; qui pro olei 3 j. puluer,

3 iiij. ferè, ceræ 3 iiiij. præscribunt, cùm tamen nullum omnino exemplum repetias. Sic autem habe.

Pro emplastro minus duro, legitimo tamen, olei 3 j. puluer. 3 3. ceræ 3 j.

Pro duriore, olei 3 j. puluer. 3 vj. ceræ 3 j 3. vt passim est usitatissimum.

Pro durissimo olei 3 j. puluer. 3 vj. aliquando 3 j. ceræ 3 ij: quod enim triplum statuunt, audias si absint pulueres: quod autem quadruplum præcipiunt, non recipies ullum exemplum in antidotariis.

Totius autem massa pro usu, vt sèpè dictum, definienda; & pro priuato usu, se habet, vt in cerato.

*In Specie* autem fit,

1. *Vel ex oleo, puluere, cera, vt dictum in vnguento, additis passim (si ferat scopus) quæ maximè viscida; vt resina, terebinthina, pix, gummata, in quotum dosi & proportione definienda videndum, ceræne an olei sint analogæ: sic facilè astimabis.* Quicquid sit, vbi terebinthina poterit admitti, quia glutinosa, quod requiritur in Emplastro, præscribatur, vt & gummata, si scopus ferat.

2. *Vel ex oleis, succis, pulueribus, cera;* & huius analogis, si opus. Vide vnguenta,

3. *Vel ex emplastro officinali, pulueribus, cera, & oleo, atq; passim terebinthina*  
*hac proportione, vt emplastrum 3 j. 3 ij.*  
*præscribantur, puluer. 3 3 vj. ceræ, &*  
*olei q. s. addendo parum terebinthinæ,*  
*vel illis omissis præscribitur, incorporen-*  
*tur cum terebinth. q. s.*

4. *Vel etiam tantum Emplastrum of-*  
*ficinale præscribitur, dosi pro parte, &c.*

5. *Vel aliquando gummata sola, pistil-*  
*lo calido liquata, extensa super alutam*  
*ad 3vj. 3 j. vt passim in suffocatione: ad-*  
*di possunt puluer. & olea.*

6. *Vel etiam aliquando pulueres terū*  
*idonearum ad 3 vj. possunt præscribi, qui*  
*pici naualis 3 j. excipiuntur, vel tere-*  
*binth. q. s. addique etiam possunt gum-*  
*mata ad 3 j.*

V S V S & F O R M U L A. R. cum  
 &c. fiat emplastrum, quod extendatur  
 super alutam, & applicetur oleo illitum;  
 vel puluere conspersum, si nolis tenaciùs  
 adhæreat: figura autem ipsius præscri-  
 bitur pro partis ratione. Pro capite in-  
 star literæ T, pro ventriculo scuti, pro  
 splene oblonga, vtero rotunda, renibus  
 quadrata.

V T I L I T A S. Inuenta vt vis re-

medij diutiūs hæreat , nec euaneat :  
utilia ad corroborandum, calefaciendū,  
exsiccandum, ad coquendum, maturan-  
dum , calorem enim augent , dum cutis  
spiracula stipant , ad digerendum etiam  
valent , & infixā pertinaciter in partibus  
per i<sup>nt</sup>erūm euocanda : ad durities  
emolliendas, corroborandum, ad vlcera  
glutinanda , purganda , siccanda , cica-  
trizanda , ad fracturas, raro ad refrige-  
randum , nisi ex adstringentibus & re-  
pellentibus, aliquando ad fistendas flu-  
xiones præscribuntur.

## C A P. XII.

## DE SPANADRAPO.

**T**ELEM sic vocantur inq, emplasticam;  
vulgo telam Gualteri , sersan ab autore:  
nihil autem est , quām lincum veruitate de-  
critum , in modum fascie effictum , vel alia  
figurā , inumerum in emplastrum liquidius,  
exempliā , extensum , deinde , & ubi resixe-  
rit ad usum laeigatum.

C O M P O N I T U R autem,

1. Vel ex emplastro idoneo liquato,  
addito , si volucris , paucō oleo , si du-

rius, in quo tela vetusta immergitur, &c.

2. *Vel* pro indicatione recenter prescribitur, idq; cùm ferè fiat ad fluxiones inhibendas, & siccandum, ex astringentibus, vt bolo, terrâ sigillatâ, sanguine dracunculi, balauſtij, resis, mastice, oleo adstringente, myrtino, &c. cera: aut si ad vlcera detergenda, ad incarnandum, cicatrizandum, fracturas, ex idoneis pulueribus sc. oleo, cerâ, analogis, ex quibus hoc emplaſtrum conſtat. Proporatio atque horum emplaſtro molliori repondeat: ferè autem olei 3 viij. puluer. 3 iij. ceræ 3 viij. Si analoga dicta admittas, facile est definire. Pannus imbueundus pretetur in fascias latas digitos 3. 4. longius debite.

**V S V S & F O R M U L A. R. &c.**  
fiat spanadrap. in brachiis, cruribus, tibiis, fiat instar ligaturæ expulsiæ. His enim partibus maximè accommodantur. Possunt & aliis applicari, vt vlcera bus quibusuis; sed formâ planâ idoneas.

**V T I L I T A S** ad ossa fracta solidanda, partes roborandas, ad vlcera detergenda, glutinanda, cicatrizanda, ad fluxiones in tibias, &c. maximè vlceras prohibendas, qua ratione intercipientur

pientia remedia vocati possunt proptie,  
& pro ligaturis expulsiis proponi. Bra-  
chiis, tibiis, cruribus, & aliis, fluxione,  
ulceribus affectis maximè dicantur. Huc  
referri possunt telæ medicatæ ad fucum,  
& ornatum manuum, faciei, gratiam iu-  
uencularum aucupandam ex idoneis. Sic  
maximè elegans erit, ex talci lanigeti 3 j.  
olei papau. albi 3 iij. campb. 5 j. borracis 3 i  
b. cera albissima sappius lotæ 3 iij. vel q. s.  
fiat tela ad nitorem facici, ad ruborem  
eiusdem & albedinem.

## C A P. X I I.

## DE CAPPLASMATE.

**V**ETERVM Malatum epicum molle est,  
puluis ferè consistentiâ ad varios us  
comparatum.

COMPONITVR autem vario modo.

1. Vel, quod usitatissimum, ex muci-  
lagine variatum partium stirpium, cui  
adduntur polteâ vel olea tantum, vel  
etiam usitatissimè simul pulueres hac  
proportione. Sint mucilaginis seu mate-  
riæ contusæ & trajectæ 3 x. lib. pul. O-  
da ij. On. iij. On. iv. olci aut ipsi analogo-

rum 3*iiij.* *iiiij.* vel expressa tantum analogorum dosi, olei q. s. ita ut totum cataplasmum ibi j. f. non excedat; multò minus, pro partis & usus amplitudine.

Quod ad *mucilaginem*, fit ratione qualitatis, ex decoctis radicibus, pinguibus; maxime, ut *althea*, *lilium*. &c. foliis, seminibus, fructibus præsertim, dosi quod ad quantitatem fatus præscribendis, coquendis deinde in liquore idoneo, perfectè contundendo deinde omnia, trajiciendo per setaccum cribrandoque: vel summatim, quia cataplasmum passim post fatus præscribitur, residentia decocti facti præcipitur contundenda in mortario, & huius ibi j. addenda, quæ dicta sunt. Pulueres ratione qualitatis ferè leguminum sunt, *farin. bord. fabar. lini, fænugræc.* *iiij.* soli: vel etiam aliarum rectum, ut ad discussendum, *ireos*, *cunini*, *flor. chamomill.* &c. *iiique* etiam soli: vel ambo simul, dosi dicta.

2. *Vel* aliquando ex fructibus maturis, immaturis, ut sunt *pom. pruna, cydonia, &c.* decoctis sub cineribus, vel in liquore idoneo, ac contusis, additis pulueribus idoneis, dosi dicta, ut in aliis fluxu & dysenteria cum pulpa cydoniorum, & puluc-

ribus adstringentibus. Sic ad oculos ex  
pomo. Vide Collyrium.

3. *Vel* aliquando in alui fluxu, vomitu, ventriculo roborando, crusta panis vino macerata, tosta præscribitur, quæ pulueris adstringētis roborantisq; jij. conspergatur, & ventriculo admouetur.

Pertinet huc mica panis albi macerata in lacte ad th. 3. cui vitelli ouorum numero 2. croci 3. olei idonei q. s. additur, pro cataplasmate ad dolores.

4. *Vel*, vt Chirurgi, ex pulueribus solis adstringentibus, ad 3 j. 3 ij. oui albumine exceptis, quos cum stupa' macerata in aceto vel vino, instar cataplasmatis, vulneratis admouent, & Medici in alui fluxibus abdomini applicant.

**V S V S & F O R M V L A. R. &c.**  
fiat cataplasma, extendatur in linteum, admouetur. Et nota, quod antè ipsius usum utilissimum sit, partes priùs fovere decocto, ex cuius residentia paratum cataplasma, admouetur autem semel, bis, in die.

**V T I L I T A S.** Fiunt præsertim ad dolores leniendos in partibus inflammatiis & aliis : ad duritiem emollienda non utilissime, ad humores maturandos, sup-

purandōsque, ad eorundem causam dī-  
gerendam, resoluendāmque, ad discu-  
tiendos flatus, calefaciūnt potiūs, quām  
refrigerant, tamen & vſitatē ad repel-  
lendum, & humorum fluxiones inhiben-  
das ex astringentibus præscribuntur.  
Fiunt & vtilissimē ad vrinam mouen-  
dam, ex *parietaria* cum *oleo de scorpionibus*  
peſtini admouenda: laxant enim, emol-  
liunt, euacuant valde.

### *Ad Cataplasma referenda quoque*

*P V L S.*

*A Cataplasmate differens ferè tantum, quod*  
*illud vſitatiūs sit ex mucilaginibus decoctus;*  
*hec autem ex farinis coctis in consistētione*  
*pultis, vnde nomen.*

### *C O M P O N I T V R autem,*

1. *Vel ex farinis leguminum idoneis,*  
*ad  $\frac{2}{3}$  vj. coctis in liquore idoneo, quibus*  
*adduntur postea olea, vel, si scopus ferat,*  
*axungia, aut olei aliquod analogum, ad*  
 *$\frac{2}{3}$  iij. vel  $\frac{2}{3}$  iiiij.*

2. *Vel ex mica panis, vt suprā, pro ano-*  
*dyno veluti cataplasmate & maturante,*  
*ibidem.*

3. Vel ex mucilagine idonea cum pulueribus & oleofis; sed reucta potius est Cataplasma. Vide suprà.

V S V S & F O R M U L A vt in Ca-taplasmate.

V T I L I T A S maximè ad dolores; ad digerendum, resoluendum. Vide Ca-taplasma.

## C A P. XIV.

### D E R V B I F I C A N T I B V S.

**A**CERATIS, Emplastris, Cataplasmatis, forma quidem vix differunt Dropax, Si-napismus, Vesicatoria, Phænigmus, discre-pant tantum effectu. Quæ omnia in genere rubificantia dici possunt; licet hoc nomen princi-pium Phænigmorum, de quibus breuiter sic babe.

### Dropax.

Dropax, picatio propriè veteribus usitatissima, topicum est; forma emplasti, raro cata-plasmatis, ad alimoniam partibus ac vitam conciliandam, vel etiam ad viua antiquata, & continuacione educenda comparatum.

**C O M P O N I T V R** autem,

1. *Vel simplicius ex picis 3 j. 3 j. olei  
3 fl. 3 vj. liquatis simul, &c in alutam ex-  
tensis.*

2. *Vel compositius, simplici additis  
pulueribus calidis gradu 2. 3. vt pipere,  
pyrubro, zingib. stercoribus animalium,  
&c. ad 3 fl. 3 vj.*

3. *Vel, vt hodiè in usu est, ad attractio-  
nem humorum & discussionem more  
recepto, bifariam : 1. ex puluere rerum  
calidatum, aromatum, tenuium partium  
ad 3 vj. semine snapi, stercore columbino ad  
3 j. excipiuntur picis & terebinth. q. s. fiat  
emplastrum pro sincipite. 2. ad eundem  
finem ex emplastr. demucilaginibus 3 iij. cum  
iam dictorum puluerum 3 j. & olei irini.  
q. s. formetur emplastrum, instar literæ  
T pro sincipite, aut incorporentur cum  
terebinth. & fiat emplastrum, &c. Ma-  
lè vulgò vesicantia vocant, cum sine ve-  
sicis operentur, & fiat ante vesicatorias  
ferè, & post eadem aliquando, in affecti-  
bus capitis maximè contumacibus, ad  
causas morbificas ex alto hauriendas,  
digerendas, vacuandas, quæ Dropacis  
ratio in praxi hodiè est usitatisima, &  
utilissima simul.*

V S V S *Dropacis veterum* erat , vt applicaretur parti calidè , dèrasis capillis, repeteretur antequàm fieret frigidus, idque sxpiliis , dum rubor in parte effloresceret , qui terminus *Dropacis* : tūm remouendus , quo remoto , si ad alimento attrahendum fuerit admotus , aut calorem , ne vttumq; exspiret , pars *oleo chamomilla, &c.* illimitur , quo claudantur pori.

*Dropacis nostri Vsus* ferè in affectibus capitis contumacibus , extenditurque super alutam , vt Emplastrum , instar litteræ T sincipi ad mouendum , abraso prius capillitio , ex quibus formula ipsius prescribendi etiam patet. Potest & ad alias partes forma idonea applicari.

**V T I L I T A S** *Dropacis veterum* , ad partes extenuatas , languidas nutriendas , viuificandas , alimento calore , spiritu ad ipsas euocato , idem & hodie nos in partibus refrigeratis , resolutisque utiliter imitamur.

Vsurpabant & ad alia , ad corpora humidiora exsiccanda , affectus frigidos contumaces , humores attrahit ex alto , discutit : paralysi , catharris , affectibus hiunc oriundis , phtisi , &c. epilepsia , ce-

272 *Method. Praescribendi*  
phalex, & aliis affectibus eiusmodi, vbi  
exhauriendum potenter: vnde & olim  
hæc remedia dicta ~~memorata~~.

*Nostri utilitas* hic posterioribus respō-  
det, usurpaturque maximè in affectibus  
capitis frigidis diuturnis, vel partium  
inferiorum, quæ inde scaturiunt, expu-  
gnandis. Discutiet enim & exhaaurit po-  
tenter, ut suprà, stabulantes in cerebro  
causas morbificas.

### Vesicatorium.

*Veteres* olim babebant in usu *Sinapisum*,  
forma cataplasmatis ferè ex sinapi maximè,  
( vnde nomen ) qui si mitior esset & rubificaret  
tamùm curim, propriè *Phænigmus* dicebatur;  
fortior verò & vesicas excitans, *Vesicatorium*.

*Sinapismus* obiter fiebat olim ex cari-  
carum maceratarum pulpa, & puluere  
sinapis, hac proportione. Pro forti, si-  
cuum pars una, sinapi, duas; pro me-  
diocri, ana part. et quales: pro debili ficiū  
duæ, sinapi una: admouebatur usque  
cum pars ruberet, vnde nomen *Phæ-  
nigmī* ut *Sinapismi* à compositione.

*Hodiè* loco istorum *Sinapisorum*, usitata  
sunt *Vesicatoria*, ditta ab effectu, quæ & qui-

dam Phænigmes appellant.

**COMPONITVR** autem hodiernum Vesicatorium in praxi usitatum.

1. *Vel* formâ emplastri, idq; bifariam; I. vel ex emplastro officinali Vesicatorio, si existet, ad  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  j. S. pro partiis amplitudine. II. *Vel* sumuntur emplastr. de mucilag.  $\frac{3}{2}$  ij.  $\frac{3}{2}$  iij. cantharidum  $\frac{3}{2}$  ij  $\frac{3}{2}$  iij. incorpotentur cum terebinth. & super alutam fiat Emplastrum vesicatorium.

2. *Vel* formâ cataplasmati, quod usitissimum, ex fermenti veter.  $\frac{3}{2}$  ij. cantharid.  $\frac{3}{2}$  ij. cum aq. vita vel aq; malaxatis, fiat vesicatorium.

Dosis tamen haec mediocrem respicit magnitudinē partis quo<sup>r</sup> alias minuendas si enim V. G. ponē aures admouendum,  $\frac{3}{2}$  j. sufficit ad sumnum.

Nota, aliquando addi præterea pulvrum actiorum, vt piperis, zingib. euphorb.  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  j. S. sem. sinap.  $\frac{3}{2}$  S.

**V S V S & F O R M U L A. R. &c.** fiat vesicatorium magnitudinis debitæ, applicetur, &c. donec vesicæ excitentur, quo<sup>r</sup> acu aperiantur, & sinantur diu fluere, imponendum folium brasic. torrefactum leuiter; & oleo illitum, (ne exsiccantur,) sinantur autem apertæ, donec

**V T I L I T A S.** In genere ad humorres varios vacuandos, reuellendos, deriuandos , ad humores infixos etiam valent, tenaces , qui neq; mollientibus, attenuantibus potuerunt discuti. Sic enim liquati trahuntur resoluunturque : sic conferunt hydropicis, ischiadicis, capititis articulorum contumacibus doloribus, omnibus frigidis affectibus pertinacibus, ac veluti deploratis, reuellens insigne remedium est, catharris eximum in varias partes , soporosis excitandis, lethargicis apprimè utile, venenatis pincturis, mortibus, carbunculis, bubonibus malignis volunt conferte. Pituitosum morborum remedium potius quam biliosorum.

## C A P. X V.

### D E S A C C U L I S.

**A**B effectu varij & multiplices statui possunt : discutientes nim. sine resolventes, corroborantes, anodynī, emollientes, &c.

Quicquid sit, in his tria consideranda  
Compositio. Vsus. Utilitas.

In COMPOSITIONE materia,  
ex qua vilitatè sacculi parantur, & excipiens materiam seu continens.

MATERIA ex qua ratione qualitatis, sunt varia simplicia scopo præsentis conuenientia, concisa & contusa ; radic. cortic. ligna, fol. flor. semin. aromat. gummi : vnum, duo, pluta, pro scopo.

Ratione quantitatis, mensuram ac pondus totius materie definiet partis, cui applicandas sacculus, magnitudo & moles. Pro corde enim v.g. 3 j. 3 j. sufficit : pro capite 3 ij : pro ventriculo 3 ij. 3. iiiij. pro toto abdome major copia requiritur. Singulorum ergo doses ita moderandæ, ut tota compositio non excedat molem parti affecte conuenientem.

**EXCIPIENS** seu **CONTINENS**  
hanc materiam est pannus lineus, vel sericus, præsertim pro partibus nobilio-ribus. Ex quo postea effinguntur sacci variis formis, quadrati, oblongi, vel alterius figuræ, pro partium idem. Qui capiti imponendi, pilei formam habere debent ; qui pro ventriculo parantur, scutiformes sunt ; qui pro hepate, Lunæ crescentis ; qui pro liene, lingua bubu-

lx figuram exprimunt.

*Nota 1.* Materiam nonnunquam , antequām includatur sacculo , torrefieri in ~~sartagine~~ , sensim affundendo vīni generis , vel aquæ vitæ q. s. præsertim ubi discutiendum.

. 2. Pulueres pretiosiores & tenuiores , aut pro partibus nobilitoribus præscriptos , bombaci aut cotoni expanso inspergi , vt molliūs corpori insideant.

3. Ne materia in vnum locum labatur & conglomeretur , acu interpungi atque intersui.

. V S V S. Quod ad modum , sacculi aliquando ita aridi & sicci parti adhibentur , vt qui capiti vel cordi imponuntur , aliquando verò priùs humore perfusi , idque duobus modis. *Vel* enim vino , acetato , aut alio liquore idoneo irrigati , ad eorum operationem accelerandam , lapidi vel lateri ab igne calefacto imponuntur , ac subinde calore contracto parti admouentur : *vel* in liquore idoneo parùm decoquuntur , & postmodum compressi loco admouentur . Sæpiùs duo parantur sacculi , vt alternatim calentes adhiberi possint.

Quod ad tempus , quando & quaudiu

gestandi sacculi aut usurpandi, ipsa affectis ratio docebit.

FORMULA ex precedentibus partet.

**V T I L I T A S.** In genere ad calcificandum prossunt, siccandum, extenuandum, discutiendum, attrahendum, & corroborandum, dolores minuendos, humores euocandos, & absorbendos, flatuūmq; copiam consumendam.

In specie Sacculi cephalici usurpantur ad varios capitum affectus, in primis frigidos & diuturnos, ac flatuosos, distillationes inhibendas, &c. Pectori admouentur in pleuritide notha & flatulenta, ac aliis thoracis doloribus. Hypochondriis in obstructionibus ac tumoribus hepatis, lienis; regioni renum in cruciatu nephritico. Abdomini in passione colica, iliaca, &c. Partibus denique quibusvis applicantur sacculi, ad tumores carundem scirrhosos, œdematosos, flatulentos, & ad dolorem, vt in arthridide.

# LIBER SECUNDVS

## SECTIO II.

### *DE REMEDIIS PRO PRIIS PARTIVM QUARVN DAM.*

#### CAP. I.

#### *DE FRONTALI.*

**I**N genere vocari potest quavis forma medicamenti externe fronti applicata, priuatum tamen significat topicum refrigerans & hypnoticum, ex cephalicis frigidis contusis, sacculo linea latus 4. 5. digitoris exceptis Graeci vocant *anomus*; eis si hoc propriè notet medicamentum, quod ex emplasticis, ut farinâ volatili, & adstringentibus ut bolo, sanguine Draconis, acacia, aceto & qui albumine exceptis fronti applicatur, ad hæmorrhagiam, hæmaturiam impetum & flexiones in oculos sistendas.

In nostro Frontali tria consideramus.  
Compositionem. Usus. Utilitatem.

**C O M P O N I T V R** i. vel formâ  
ficiiore, quæ propriè frontale est:ratio-  
ne qualitatis, passim ex floribus & semin-  
cephal. frigidis, vt *flor.*, *viol.*, *ros.*, *nymph.*,  
*semin. pap.*, *albi*, *laetucæ*.

Ratione quantitatis, *flor.* pugill. 3. 4.  
*semin.* 3  $\beta$ . præscribuntur.

Nota, his addi aliquando ad robur &  
discutiendum, *flor.* *chamom.* *melilot.* ana  
*P. B. semin. coriandr.* *anerbi.* ana 3  $\beta$ .

*Nota*, etiam utilissimè ex solis foliis la-  
etuc. *hyoscyami* ad M. ij. iiij. contusis, oleo  
violar. & aceto imbutis fieri eiusmodi  
frontale, vt & aliquando priori modo  
horum M. j. addi.

2. *Vel* formâ humidiore: idque I. instar  
linimenti, ex *vnguenti populei* V. G. aut ro-  
sat. 3 vt. *ol. viol.* &c. 3  $\beta$ . aut solo vnguento  
populeo. II. Forma cataplasmatis ex  
foliis, *flor.* *seminib.* *dictis*, contusis, ad-  
dito pauco oleo & aceto.

**V S V . S & F O R M U L A.** *Sicciori*,  
*R.* &c. contundantur & includantur pânu-  
no linco raro, fiat frontale, quod vapore  
acetii perfusum aut irroratum, fronti &  
temporibus admoueatur, hora somni.

*Liximenti.* R. &c. illinantur frons & tempora, hora somni, atque 4. 5. horis clapsis abstergatur, renoueturque.

*Cataplasmatis.* R. &c. fiat instar cataplasmatis, quod duplici linteo exceptum fronti & temporibus applicetur.

**V T I L I T A S** præcipuè ad refrigerandum, ad capitis ardores, ut per febres, phrenitidem, ad somnum conciliandum in vigiliis, quæ per istos affectus vites admodum dejiciunt, & mentem exagitant: ad vapores compescendos in febribus, ad repellendum aliquando, ut & ad capitis dolores, &c.

## C A P. II.

### DE OXYRRHODINO.

**A**LII ad epibema, alij ad embrocationes referuntur, ex aceto & oleo rosato nomen habens; tamen cum sit forma medicamenti, que videatur capiti propriè dicata, frontalì liquidiori subiecto.

**C O M P O N I T V R.** I. *Vel* simplicius ex olei rosati partibus tribus, acetii parte quarta, simul agitatis, ita ut tota compositione 3 viij. vel lb j. ad sumnum non exceedat.

2. *Vel* compositiis, ex oleo rosato & aliis  
cephalicis oleis, aceto Rosato, & aquis  
cephalicis frigidis, hac proportione:  
oleor.  $\frac{3}{2}$  iiii.  $\frac{3}{2}$  vj. acetii  $\frac{3}{2}$  ij.  $\frac{3}{2}$  iiij. aquæ  
 $\frac{3}{2}$  iiiij. agitentur.

3. *Vel* aquatum loco ex succis, cum  
ijsdem, eadem dosi præscribitur.

**V S V S & F O R M V L A. R. &c.**  
agitentur omnia fortiter simul, & huic  
mixturae linteola immersa, imbutaque  
admoveantur capiti, fronti, & temporibus,  
mutando sepius.

**V T I L I T A S.** Insignis in phreniti-  
de & deliriis, ad repellendum humores  
tenues, & fumos à capite arcendos: in fe-  
bribus etiam ardentibus, ubi metus de-  
lirij.

### C A P. III.

#### D E C V C V T H A.

**A**LIAS pileolus dicitur, affectibus cere-  
bri frigidis & humidis dicatus.

**C O M P O N I T V R** ratione quadri-  
partita, ex rebus cephalicis, suauiter fra-  
grantibus, radic. foliis siccis, flotibus,  
lignis, aromatis (*garyophyll. cinam.*) tard.

ex seminibus. Gummata, vt Benzoin, aliquando & Styrax, quia facile puluerantur moschus & ambra pro ditioribus addi possunt.

Hæc autem eorum dosis & proportio. Radic. 3 j. folior. siccorum M. ij. iiij. quæ & pondere 3 lb. 3 vj. præscribi possunt i. flot. P. ij. iiiij. qui & pondere, 3 ij. 3 iiiij. aromatum 3 iiij. 3 lb. gummat. 3 j. 3 ij. moschi 3 lb. 3 j. &c. ita vt tota compos. 3 iiij. 3 iiiij. non excedat.

Nota, puluer. violaceum quem vocant, & cyprium aliquando addi ad 3 lb.

V S V S & F O R M V L A. R. &c.  
fiant puluis, qui excipiatur cotone, vel  
bombace moscatellino, & cum panno  
seticeo interpunkto, seu interbastato, vt  
vocant, fiant cucupha supra caput gestan-  
da, vel pileo affuenda. Aliquando duæ  
præscribuntur, tûmque puluis duplican-  
dus, diciturque fiant duæ cucupha, qua-  
rum unam gestet de nocte, alteram pileo  
affutam interdiu, & quando erunt pim-  
guedine delibutæ, remoueantur, reno-  
uenturque.

V T I L I T A S. Insignis in affectibus  
cerebri frigidis, humidis, vnde manant  
in inferiora varij morbi : maximè autem

præscribuntur post purgationes vniuersales, ad exhauriendas materiæ morbiæ reliquias, ad dolores capitis frigidos diuturnos, ad catarrhos, fluxiones omnes detinendas, absumendas, fistendas, spiritus animales recreandos, robur capiti, cerebro conciliandum, ( vnde obiter medicamenta tenuium partium esse debent, quò penetrent cranium, ) ne de novo impuritates suscipiat aut generet, &c,

## C A P. IV.

## D E C O L L T R I O.

**T**OPICVN est ophthalmicum, oculorum affectibus primo quodam iure dicatum, à fistendis fluxionibus maximè dictum Gracis romæor, ὁ δὲ τὸ κομᾶς τὸ πέτι.

Est autem duplex, Humidum, recentioribus absolute Collyrium appellatum: Siccum, Arabibus propriè Sief.

## Collyrium Humidum.

Duplex est: Liquidum, quod liquoris formâ cenis instillatur: Crassis, mellis, vel linimentis consistens, quod inungitur.

Vapor autem non dicitur collyrij species, quia tamen cum passim in oculorum affectibus prescribatur, de hoc prius agimus: ita ut collyrium humidum triplex statu: Vaporosum, Liquidum, Melliforme.

VAPOROSVM non tam collyrij, quam formam medicamenti, humores vel oculos preparans, ut aliorum vis maiore cum efficacia recipiat, ut insuffione, maculis, &c. prescribitur tamen etiam per se ad discutiendum, que forma omnino optima. Item, ubi visus clarificandus, &c.

COMPONITVR autem, seu fit  
1. vel per balitum proprium, aut alterius,  
ut pueruli, qui ore prius abluto mandat  
semen fæniculi, &c. inhalet deinde in oculum,  
qui sapientis diuque fouendus, prout opus.

2. Vel prescribitur decoctum, dosi clysteris ex foliis, sem. flor. oxydorcieis,  
discutientibus, rarefacientibus, idque in  
vino albo, sapientis & aqua, addita nonnunquam urinâ pueruli, ad 3 ij.

VSVS & FORMULA decocti.  
R. &c. fiat decoctio in &c. pro suffitu:  
huius decocti vaporem vel summum recipiat ex olla patua, vel per tubulum  
anum, in oculum, reseratis paribus,  
+ petit fluyam

mànè & serò longè à cibo, (per dies, quibus opus erit,) deinde per horæ quadrantem foueantur etiam oculi spongia decocto imbuta, vel sacculis simplicibus ipsius repletis, qui tepentes viciissim applicentur oculo laboranti, per horæ quadrantem, aut dimidiā.

**V**TILITAS expressa est. Fieri etiam possunt ad adstringendum, in dilatatio- ne pupillæ ex idoneis : in fluxionibus, lachrymis, sed ille usus obuius passim magis est. *Hac de Vaporeso.*

**L I Q U I D V M** absolvè dicitur collyrium, eisfi olim collyrii propriè fuerint siccæ, trochis corum ferè formâ, quos usus tempore diluebant liquore idoneo.

**C O M P O N I T V R** autem vario modo, præscribiturque i. vel aqua destilata sola, quæ simplex, aut composita :

*Simplex, idonea, una, duæ, plures, ad ʒ iiiij. præscribitur, fiat collyrium.*

*Composita, quæ magistralis est, & maximè digerendo, discutiendo, detergen- do, visui acuendo, delendis suffusioni- bus, &c. dicata, à Medico præscri- benda, fit ratione qualitat̄, ex oxydor- cicis fol. seminibus, tūm etiam cephalī- cis calidis foliis, seminib. aromatib. qui-*

busdam, ut ringibere, pipere: additis vñ-  
tate felle, vrina pueri impubis, vino albe-  
melle.

Quod ad quantitatem, oxydorcicorum  
foliot. M. vj. viii. sem. ʒ j ſ. ʒ ij. cepha-  
licor. folior. M. ij. aromat. ʒ ſ. ʒ vj. fel-  
lis ʒ ij. vrinae lib. ſ. lib j. lib ij. mellis lib ſ.  
lib j. vini lib ij.

FORMULA. R. &c. macerentur  
per octiduum in vase vitreo, in loco ca-  
lido, vel sumo equino: destillentur postea  
in balneo Maris, reponatur aqua in am-  
pulla vitrea, seruetur ad usum, qui idem  
ut aliorum est.

2. Ex solis succi folior. maxime, depu-  
ratis, filtratis, infusis in oculum, vel lin-  
teo admotis.

3. Vel ex decocto solo, aliquando, foliot.  
femin. flor. idoneorum, dosi potionis  
præscribendorum: ʒ iiiij. enim sufficiunt  
pro collyrio.

4. Vel ex Infusione sola metallicorum, ut  
antimonij ʒ j. in aqua ʒ iiiij. eximia ad vi-  
sum clarificandum, hic & vitrioli ʒ. ij. iij  
in aqua rosar. & saeniculi, ad ruborem  
& dolorem oculorum eximum: vel ve-  
getabilium idoneorum facta in aquæ de-  
stillatae, succi, decocti, &c. ʒ iiiij. vj.li-

quore deinde colato, filtrato, in ampulla reposito ad usum.

5. *Vel ex aqua destillata, succo, infuso, decocto:* horum duobus, tribus, simul confusis pro intentione ad  $\frac{3}{4}$  iiiij.  $\frac{3}{4}$  iiiij.

6. *Vel alijs liquores soli usurpantur, pro scopo: ut vinum, aqua, albumen enorum, in doloribus, &c.*

7. *Vel puluis præterea iam dictis solis, vel mixtis, additur, scopo idoneus, ex ophtalmicis desumendus.*

Quod autem ad quantitatem pulueris,  $\frac{3}{4}$  j. iij. prescribuntur ad sumnum: fortes  $\frac{3}{4}$  j. non excedant, cum liquor.  $\frac{3}{4}$  iiiij. v. vij. fiat collyr.

*Nota obiter, opiumum esse colare collyrium, ob asperitatem puluerum, nisi ubi detergendum.*

V S V S & FORMVLA. R. &c. fiat collyrium, cuius guttae aliquot 2.3. instilantur in oculi maiorem canthum, vel præterea, quod mihi placet, linteolum eodem imbutum admoueatur, sibi mutando, fiat veluti fatus aut epithema, vel, ubi liquores benigniores, resupinus erger, collyrium ampulla conceptum, cuius extremitas oculum ambire possit, admoueat.

V T I L I T A S liquidi bumidi maximè ad refrigerandum, ardorem oculorum extingendum, ad dolores, inflammations repellendas initiò, deinde discutendas. Item & ad repellendum, & fluxiones omnes inhibendas, ad siccandum, lachrymas absumendas, detergendas quævis eorum vitia, ad visus acutmen, nebulas, humores crassos discutiendos. Hac etiam de collyrio liquido: sequitur

M E L L I F O R M E. Sic appello, quod fit consistens mellis, idq. trifariam, specie finimenti, multis, cataplasmatis.

Litus fit. 1. Vel ex puluer. idoneis leuigatis in Alcool. & excipiente idoneo, quod varium pro scopo, mucilago idonea, mel, bixyrum, vnguentum rosat. &c. pro iudicationibus.

Quod ad quantitatem, tota compositio fit vnc.j. pulu. nimirum  $\frac{2}{3}$  ij. iij. excipientis  $\frac{2}{3}$  b. 3 vj.

2. Vel sine puluere ex mucilaginibus scemini idoneorum, vt cydoniorum, &c. prior ratio visitatiot.

Cataplasmata & Puls fit ferè tantum ad dolores leniendos, idque 1. ex medulli penis  $\frac{2}{3}$  ij. macerata in lacte q. s. cui additur aliquando mucillago p/yllij ad  $\frac{2}{3}$  b.

vijj g. ij. &c. 2. *Vel* ex sola *pulpa* ponit, sub cinceribus, aut in lacte cocti, ad vnc. ij. 3. *Vel* ex vtrōq. 4. *Vel* ad repellendum, ex *pulpa* cydonior. coctorum ad 3 ij. 5. *Vel* maximē ad discutiendum, more cataplasmatum, ex residentia decocti digerentis oxydorcici contusa & traiecta ad 3 ij. Vide Vaporosum.

**V S V S & F O R M V L A.** *Litus* quidem. R. fiat instar linimenti, quo illinantur oculorum canthi, ut sensim penetrant ad interiora, vel etiam penicillo palpebris applicetur ē regione affectus.

*Cataplasmatis.* R. fiat instar pultis, vel cataplasmatis, ex linteolo madido liquore idoneo applicetur.

**V T I L I T A S.** *Litus* præcipua est, vbi palpebratum vitiis occurrentum, vbi detergendum, ad quod omnino vtilissimus, item ad siccandum, fieri etiam potest vtiliter ad discutiendum. Item & ad dolores; sed praefat forma pultis. Fiunt etiam hac formā collytia, vt pulueres hac ratione diutius hærentes, in parte agant efficacius, iūm, si quæ medicamenta acriora, sic demulcentur. *Cataplasma* & *puls* ad dolores ferentium, possunt & ad discutiendum,

290 Method. Præscribendi  
xepellendum, vt suprà.

Hæc tenus de Collyrio humido, sequitur

### Collyrium siccum.

Dupliciter fieri solet, formâ pulueris, tro-  
chisci.

PVLVIS laxigatis medicamentis idoneis  
in Alcool, sit diciturq; Arabibus proprie Sief.

COMPONITVR ex rebus oph-  
thalmicis idoneis laxigatis in Alcool ad  
3 fl. 3 j. ad summum præscribendis.

VSVS & FORMVLA. R. &c.  
fiat in eote cum liquore idoneo puluis  
instar Alcool subtilissimus, de quo parum  
V.G.ij. insufflentur in oculum cum te-  
nui calamo, deinde palpebra leuiter,  
diuque confricetur: vel istud Alcool li-  
quore idoneo excipiatur, fiat collyrium,  
aut fiat litus, vt dictum soprà.

VTILITAS maxima & præcipua  
est ad detergendum, suffusiones, &c. si  
solus puluis insuffletur, vt & ad cicatri-  
zandum, vel si diluat, vt dictum, ad  
varios usus fieri possunt, licet hoc minùs  
usitatum.

TROCHISCI visita:issimè fiunt sine  
dicto in trochiscis, ex puluerum variorum

tum Alcool ad 3 vj. 3 j. ad summum, qui  
liuore idoneo excipiuntur. Vide Tro-  
chiscos.

**V S V S & F O R M U L A. R. &c.**  
cum &c. fiant trochisci lupinares, vel pa-  
stilli ponder. 3 j. V. G. siccentur in um-  
bra, teratur unus, soluatur pro collyrio,  
aut linimento confiendo, cum iam di-  
ctis.

**V T I L I T A S** ad quasvis indicatio-  
nes esse potest, cum hi trochisci sint tan-  
tum formâ pro seruandis medicame-  
torum viribus: Non enim per se usur-  
pantur, sed diluti: passim autem ad  
secundum, detergendum, &c. inflam-  
mationem oculorum cum opio, ut trech-  
abi Rhaphis, qui & valent ad ruborem,  
ad digerendum inflammationes, ad ci-  
cattices extenuandas, & eiusmodi alias  
intentiones. Hac forma pulueres idonei  
conseruari possunt, qui præstò sint, ad  
usum litus aut collyrij, vel etiam pul-  
ueris vocandi, pro scoporum varia-  
te, de quibus suptà.

## C A P. V.

## DE GARGARISMATE.

**M**EDICAMENTVM liquidum  
est, affectibus oris, gingivarum, faucium,  
laryngis, aliquando & capitis dicatum, gar-  
garisando, vt vocant, fauces colluens, sine de-  
glutitione.

**C O M P O N I T V R** 1. ex *Aquis,*  
& *Dissoluendis idoneis.*

*Aqua* sunt aquæ destillatae, quod ad  
quantitatem ad ℥ j. ℥ j. ℥.

*Dissoluenda* semper, syrpus idoneus  
ad ℥ iiiij. iiij. aliquando pro scopo, *diamo-*  
*ren*, *dimicrum*, *mel* ad ℥ j. ℥. ℥ ij. item ali-  
quando succus idoneus affectui conue-  
niens, vt & *acetum*, *omphac.* in repellenti-  
bus ad ℥ ij. iiij.

2. *Vel* ex aquis & succis maximè frigi-  
dis: illarum ℥ viij. x. horum ℥ iiiij. cum  
dissoluendis dictis.

3. *Vel* quod passim, ex decocto varia-  
rum partium stirpium pro scopo, pauca-  
rum, plurium, dosi ferè clysteris, facto  
in liquore idoneo, in cuius colaturæ ℥ j.  
℥ j. ℥. iam dicta dissoluuntur.

V S V S & FORM V L A. R. &c. fiat  
gargacisma, quo colluat os sàpè, per ho-  
ram antè prandium & cœnam, vel etiam  
omni hora si opus, frigidè si repellamus,  
tepidè si digeramus.

V T I L I T A S varia pro affectuum  
varietate, ad repellendum initio inflam-  
mationum, ad omnem intemperiem ca-  
lidam oris, ad defluxiones, ad detergen-  
dum, ad digerendam in inflammationi-  
bus, oris fætorem, & varios ipsius &  
faucium affectus. Aliquando (et si rarijs)  
fit ad pituitam è capite purgandum, ex  
decocto incidentium, detergentium &  
tenuium cephalicorum. Sed masticatoria  
præstant.

## C A P. VI.

## DE APOPHLEGMATISMO.

CAPUT furgij ut recent species est, vi G  
errhinum, effectibus cerebri pinnatis eli-  
cta, & elicendo ab eo phlegmati: unde ab  
effectu nomen Apophlegmatismi. Quod autem  
quidam masticatorium appellant, abusu: fit  
enim & Apophlegmatismus liquidus, licet ho-  
de in usu praktico ita sit receptum: quia Apo-  
N. iij

*Method. Praescribendi*

294

*pblegmatissimi forma solidius usitator est, ut per Apophlegmatismum audiant simpliciter masticatoria: licebit discernere.*

*Quicquid sit duplum status: Siccum: Liquidum.*

*Apophlegmatissimus Siccus.*

*Hac Caput purgij formam masticatorium alias propriè, vulgo etiam Apophlegmatismum appellant.*

**C O M P O N I T U R**, seu praescribitur 1. vel ex simplicibus idoneis Apophlegmatizantibus, vide materiam, ut passim radic. pyretbr. macerata per noctem in aceto ad 3 j 3 ij. quam manè masticet.

2. Vel ex puluere iam dictorum actiorum tenuiorum ad 3 iij. 3 ss. qui excipitur cere q. s. vel etiam sola mastice, alij aliter, cera magis conuenit: sic enim puluis coheret magis.

3. Vel ille idem puluis panno linea rato, forti tamen, excipitur, & fit nodulus: pro quo passim mastices 3 j. pro basi, aliorum actiorum 3 ij. 3 iij. praescribuntur, sicut noduli.

**V S V S & F O R M V L A , secundum**

modi. R. &c. cum &c. fiant pilulæ, vel formulæ saliuales, vel globuli instar pilulæ majoris, vel formæ lupinafes, vel trochisci forma lupinorum, aut auellana- rum pondere 3 ij. 3 j. fiant trochisci man- siles, quotum vnum masticet, & voluet s̄expiùs in ore, manè ieiuno stomacho, id- que per semihoram capite prono, ex- spuendo s̄expiùs quod dissoluitur, hos deinde abluat aquâ tepidâ, vine, &c. vt reliquæ hærentes cluantur. Poterit repeti etiam duabus horis antè cœnam.

**V T I L I T A S.** Insignis est post vni- uersales purgationes ad ~~xaq̄ap̄m~~, cerebri particularem; reliquias nempe humorum pituitosorum, præsertim è cerebro, maximè circa basin ipsius & ventriculos priores exhauriendas, vt & vicinis parti- bus: pituitam fundit, attenuat, elicit, af- fectibus cerebri frigidis in veteratis exi- nius. Purgat etiam vicinas partes, præ- cipue gingiuas, maxillas, dentes, (in quo- rum doloribus passim,) os, fauces, & quo- vis caloris se diffuderit.

### Apophlegmatismus Liquidus.

*Est veluti gargarisma, quod Purgans poter- is appellare.*

**C O M P O N I T V R** ex decocto cepha-  
licorum attenuantium, incidentium, ra-  
dic. folior. semin. florum, dosi garga-  
rismatis additis etiam apophlegmatizan-  
tibus ad vnc. j. vnc. j. f. vnc. ij. facto in  
vino, hydromelite, &c.

*Nota*, ut iliter catharticum effici, de-  
cocta *semis*, *caribamo* aliquando, turpibus  
ad vnc. f. 3 vj.

*Quæritis ipsius & dissoluenda, ut in ga-  
garisme.*

**V S V S & F O R M V L A** eadem.  
Est enim revera gargarisma purgans.

**V T I L I T A S** quæ masticatorij, ta-  
men, quia gargarisatus altius in fauces  
delabitur, longius quoque prolicit ex  
amygdalis, œsophago : videtur etiam  
potentius trahere ex ipso cerebro.

## C A P. VII.

### DE DENTIFRICO.

**R E M E D I V M** hoc et si videatur tantum  
cosmeticum : tamen & saepius à Medicis  
ad alios eorum affectus prescribitur.

**C O M P O N I T V R** i. vel aqua  
formæ, quâ aut abluuntur dentes, aut

linco imbuto confriicanūt. Huc pertinet M̄quor vittioli, sulphuris, paucus, aqua panca dilutus, quo dentes fricantur. Mitē deterget, dealbat, vindicat à carie: cautē tamen; quia fragiles reddit.

2. Vel forma pulueris præscripti ad 3 j. vnc. j. fl. &c.

3. Vel formā linimenti, ex pulueris 3 vj. vnc. j. cum mellis rosat. q. s. fiant imitari opiatæ pro litu.

4. Vel forma trochiscorum, suppositorij instar, quibus resictatis & induratis dectes fricantur. Fiant autem ex puluer. vnc. j. fl. vnc. ij. cum mucilaginis gummi tragacanthi. q. s. fiant trochisci suppositorij instar, exsiccentur.

V S V S & F O R M U L A. R. &c. fiant, &c. quo vel abluatur os sapius, &c. vel illinantur, aut fricentur dentes, postea os abluatur liquore idoneo, aqua, vino, &c.

V T I L I T A S. Præscribitur maximè ad dentes dealbandos, detergendos, stabiiliendos, vindicandos à carie, gingivas etiam firmandas; incatenandas, à fluctione defendendas.

*Nota obiter circa materiam, usitatissimam & utiliter ad detergendum præscribitur.*

*tarum, corallia, crustam panis vestam, sal; et  
septæ, punicem, &c. quibus odorata pro-  
ditioribus, moschus, ambra possunt addi.*

## C A P. I I X.

## DE ERRHINIS.

**M**EDICAMENTVM in genere, quod  
naribus inditur, unde nomen, vel ad  
capitis vel narium proprios effectus compara-  
tum, prius ad purgandum, posteriorius ad alteran-  
dum vario modo, ut duplex à me rectè statui pos-  
sit: *Purgans & Alterans.*

## Errhinum purgans.

*Cerebro purgando à variis viciis humoribus  
dicatum, quod sū vel sine sternutamento, &  
absolue tunc Errhinum appellatur, quod alijs  
etiam Caputpurginum vocant; vel cum sternu-  
tamento, & priuatum vocatur Ptarmicum, seu  
Sternutatorium.*

ERRHINUM ABSOLVTE  
dictum.

*Cerfbrum evictans sine sternutamento,*

*ratione forme triplex; Liquidum, Molle, Solidum.*

*Liquidum. COMPONITVR et vel ex succis solis caputpurgiorum, qui ex folior. M. liij. incisis, contulis, cum vini albi etiam vnc. iiiij. exprimitur. Liquor seruatur in ampulla vitrea ad usum. Hoc alias usitatè breuius sic prescribitur. R. succi recenter extracti cum vino albo, ex fol. virid. herbarum, &c. vnc. iiij. viij. raro enim tib. j. nisi pro diutino usu, & in dictis ferè prescribitur.*

*Nota; ut sit magis cephalicum, aliquando betonic. &c. usurpari simul, vel parum decocti cephalici, & ut magis penetret, aquæ viae vnc. i. permisceri.*

2. *Vel ex decocto cephalicorum omnino ut Apopblegmatissimus, admixtis foliis errhinorum, de cuius colatura 3 vj. vnc. viij. prescribuntur, in quibus nihil dissoluitur, vel aliquando succi idonei, ad vnc. ij. vnc. iiij. aquæ viae, &c.*

*Nota, quosdam ad purgandum magis opiatas dissoluere: præstat idoneum purgans cum aliis decoquere.*

**V S V S & F O R M U L A. R. &c.**  
fiat errhinum, seu caputpurgium, reponatur in ampulla vitrea. Hoc autem uta-

tur tepidè, manè duabus horis autè prandium, vel etiam antè cœnam, ex vola manus, ore aqua pleno, ter, quater per triduum, quattiduum, aut, si diæta quædam fuerit instituta, toto diæta tempore.

**Molle COMPONITVR** 1. vel linimenti forma ex succor. idoneor. & ol. ires ana vnc. ij. decoque ad succorum consumptionem, adde cere q. s. fiat linimentum, cui puluerum acriorum 3 j. s. potest addi, vel quod optimum, elaterij 3 s. 3 j.

2. Vel opiatæ ferè consistentia, ex succorum dictorum vnc: ij. vini vnc. j. s. mell. q. s. coque leuiter in opiatæ consistentiam. NB. Addi insuper posse pulueres acriores, vel etiam purgantes, vt elater. colocynthis ad 3 j.

Nota etiam, opiatam hanc fieri posse sine succis, ex puluer. 3 ij. 3 iiij. mellis q. s.

**VSVS & FORMVLA. R. &c.** fiat &c. cum digito, vel penna nares illinantur, & capite prono humores sic è cerebro proliciantur, optimum postea, nares abluere. *Vide Errbinum.*

**Solidum. COMPONITVR** 1. vel forma pulueris idoneorum, ad 3 ij. 3 iiij. vnc. s. 2. Vel solida, quæ propriè Nasale

*Formulas Remedior.* 302

dicitur, ex eorum puluer. 3 ij. 3 iiij. excipie cum mucilagine idonea, vel *terebinth.* q. s. & *cera,* fiat Nasale forma pyramidis.

**V S V S & F O R M U L A.** *Pulueris* R. &c. insuffletur patum, V. G. 3 fl. 3 j. cum calamo in nares manè, &c. *Nasalis.* R. &c. fiat forma pyramidalis, quæ oleo imbuta naribus indetur.

**V T I L I T A S** post purgationes universales, in capitis affectibus, frigidis maximè, contumacibus, tūm & qui à biliosis serosisque humoribus, à quibus sappè acerrimi dolores: ad affectus omnes à cerebri illuvie originem trahētes. Hinc in Diætis utilissimum & perpetuum, cerebri ventriculos anteriores, meninges maximè, expurgat: oculis affectis cautè-

**P T A R M I C V M.**

**C O M P O N I T V R**, ex puluerē simplicium ptarmicorum, ad 3 j fl. 3 ij. quia valida.

**V S V S & F O R M U L A.** R. &c. fiat puluis tenuissimus, cuius vel vapor tantum naribus attrahendo inspiretur, vel (maximè quando cephalica admixta,

**302** *Method. Praescribenda*  
pondetē & quali) tantillum v. g. 1. 2.  
mediante calamo in natem insuffletur,  
tempore matutino. Possunt & quavis  
horā usurpati sopito cerebro, & ubi ex-  
cludendus fœtus.

**VITALITAS.** Insignis ad cerebrum  
évacuandum à vapore crasso, muco, ex  
antica parte, diuturnis affectibus utile,  
soporofis, item ad fœtum excludendum,  
haustis priūs, quæ partum iunant: poten-  
ter è meningibus trahit, hinc & affecti-  
bus earum à biliosis humoribus utile.

### Alterans Erthimum.

*Appello, quod priuatim narium affectibus  
variis dicatum vario modo percurandi: hocq;  
etiam triplex statu: liquidum, molle, soli-  
dum.*

**C O M P O N I T U R** 1. vel ex succis  
idoneis folior. extractis cum aqua, li-  
quore idoneo, ad vnc. vi. vnc. viij. in  
quibus dissoluuntur postea vel *mel*, vel  
*syrup.* idoneus ad 3 j. b. 3 ij. aliquando  
& puluer. ad 3 b.

*Vel ex decocto idoneo, dosi clyste-  
ram. Dissoluitur vel *mel*, vel succus si-  
mul idoneus, ad 3 ij. 3 iiij.*

3. Vel forma linimenti, ex idoneis, ut  
supra.

4. Vel forma solidiore, turundæ, ut  
vocant, ex puluer. maximè astringen-  
tium & siccantium ʒ iij. (pro vna sc.)  
ovi albumine, succo idoneo, melle exce-  
ptorum, adiectis etiam aliquando pilis  
leporinis minutim dissectis. Fiat veluti tu-  
runda, indatur.

**V S V S & F O R M U L A** quæ Er-  
thini : tamen omni ferè hora usus esse  
potest, & priuatim dum ibit cubitum, tu-  
rundam vnam indat, alteram sequenti  
die.

**V T I L I T A S** summa in narium affe-  
ctibus priuatis, ozæna, polypo, ulceribus,  
fætore, hæmorrhagia, ad quam turundæ  
vel formæ linimenti maxime usurpantur.

## C A P. IX.

### D E S V F F I M E N T O:

**S V F F I T V S** differt ab odor. mentis, quod  
haec sine igne suum odorem fundant, illi  
contra non nisi ignis contactu mediatu, imme-  
diato.

*Duplicem autem facio, alium voluptatis,*

304 *Sanitatis alterum. Virtusque siccans, vel bioni-*  
*dum. Ille Suffimentum dicitur, & Supina;*  
*hic Vapor potius appellandus.*

Suffitus ad voluptatem.

*Cultui aulico & delitiis dicatus, ex rebus*  
*fauenter odoratis constans. Est autem siccus,*  
*vel humidus.*

*Siccus. COMPONITVR* 1. *vel*  
*forma pulueris, cuius materia tum gumi-*  
*mata odorata, styrax, benzoinum maximum,*  
*tum radic. vt acori: ligna, xylo aloe, folia*  
*maiorem. &c. cortices, citri, arantiorum:*  
*flor. cephalicis, aromatz, macis garyophyll.*  
*cinnam. item caprea, ambra, mosch. zibe-*  
*stan, &c. horum plura, pauciora.*

*Quod ad quantitatem, dosis totius 3j.*  
*3ij. prout ex pretiosis, (si tamen pro suf-*  
*itu operimentorum capitii fiat, ad 3 iiii.*  
*ex minùs pretiosis imperetur,) dosis igit-*  
*tur vnc. j. vnc. ij. ita ut gummatum sint*  
*3 iiiij. 3 vij. puluer. 3 iiij. vel ana part.*  
*æquales, ambra, moschus, zibera, pro lu-*  
*bitu.*

2. *Vel formâ trochiscorum, dicto pul-*  
*uere excepto cum eliquatione gummi*  
*tragacanthæ, facta cum aqua idonea,*

Sunt trochisci, &c. ponderis 3 j. siccenn-  
tut.

3. *Vel forma avicularum cyprearum,*  
ut vocant: ex gumatis odoratis ad 3 iij.  
pulueribus dictis ad vnc. 3 vj. carbo-  
nibus salicis vnc. ij. vnc. iiij. cum cliqua-  
tione gummi tragacanth. &c. aut *ad. mē*  
liquati q. fiant auiculae, vel candelæ  
odoratæ perfume. *Moschus, amba* addi-  
tur pro libitu, ad 3 B. 3 j.

**VSVS & FORMVLA Pulueris. R. &c.**  
sunt puluis, qui conjiciatur in carbones  
ardentes, & fumus excipiatur cubiculo,  
vel vestibus. *Trochisc.* R. &c. fiant &c.  
conjiciatur unus, duo, in carbones, &c.  
*Auicularum.* R. &c. accendatur una ad  
odorem cubiculi.

**V T I L I T A S.** Et si videatur ad vo-  
luptatem, tamen cum constent ex cepha-  
licis cardiacis pretiosis, non possunt non  
cerebrum, cor, & eorum spiritus reficere,  
recreare, vindicare simul à malignitate.

*H YM I D V S* hodiè usitatissime compara-  
tur, & Cassoletam vocant.

**COMPONITVR** commodissimè ex  
gummatum, ut *flyracis, benzoini*, v. c.  
vnc. ij. & si lubuerit, puluer. pauciorum  
3 ij. 3 iiij. omnia solvantur cum aqua.

306      *Method. Præscribendi.*  
odorata, vt, *rosarum*: *Cassoleta*, vt ve-  
cant, induntur instar pastæ, ad longum  
usum. *Vsus tempore conspergitur* *Cas-*  
*ssoleta cum aqua rosar.* v. g. igne subdito  
*exspirat vapor iucundissimus, qui vt pla-*  
*ceat tunc commodissimè moscb.* g. iij. iiiij.  
adduntur.

## V T I L I T A S eadem. quæ siccioris.

### Suffusus ad sanitatem.

*Suffusus sanitati dicatus ab effectu duplex*  
*statu potest. Roborans partes principes, fi-*  
*xitus reficiens, ex rebus ferè iisdem, quæ ad*  
*voluptatem: Alterans, vt cerebrum exsiccans,*  
*pulmones expurgans, ad menses mouendos, suf-*  
*focationem, &c.*

*A forma vero etiam duplarem facio, scilicet;*  
*& humidum.*

*S I C C U S* in genere fit ex rebus, quæ  
vaporem exspirent, cùmq; suauem, vi-  
danum, florax, benzoinum, &c. suprà dicta,  
& aliquando Junodii, vt galbanum, assafe-  
tid. Cassoreum, &c. quorum usus per in-  
feriora, in uteri variis affectibus. Fit etiā  
ex pulueribus rerum scopo inservientiū;  
radicum, lignorum, &c. Ergo in genere  
fit ex gummatibus, & pulueribus.

*In Specie verò COMPONITVR i. vel  
forma pulueris ex iam dictis, ab vnc. j. ad  
vnc. iiij. prout usus debet esse diuturnus;  
priuatum autem sint gummatum partes 4.  
puluer. 3. v. g. gummata. vnc. ij. pulu.  
vnc. l. &c. modò plus minus, prolu-  
bitu.*

*Nota, in vteri affectibus inter pulueres  
passim assumi, Galliam & alyptam mosca-  
tam ad 3 fl. 3j. vt & aliquando pulueres  
electuarior. roborantium ad 3 j.*

*Item, aliquando suffitum fieri ex sola  
Nicoliana iniecta in carbones, vel fumo  
instrumento, aut infundibulo excepto;  
cerebrum mirè expurgat, & pectus à pi-  
tuitosis & biliofis excrementis.*

*2. Vel forma trochiscorum, vide supra.*

**V S V S & F O R M U L A Pulueris.**  
R. &c. fiat puluis, de quo conjiciatur in  
carbones ardentes: fumus excipiatur, si  
pro capite, ore hiante, vel suffitis ipsius  
operimentis, quod passim in affectibus  
aliarum partium ab eo pendentibus,  
phthisi, &c. si pro pectori, ore patulo:  
si pro vtero & alijs cavitatibus, per in-  
fundibulum, vt & cum sella perforata in  
vtero: si pro doloribus juncturarum,  
suffiatur lana, bombax, apponatur. Tro-

308 Method. Prescribendi  
chischor. verò R. &c. siant trochisci. Vide  
suprà.

V T I L I T A S vel ad roborandum,  
vt dictum , vel alterandum vario modo,  
passim ad cerebrum exsiccaendum, catar-  
rhos adsumendos , roborandum : ad pi-  
tuitam pectore conceptam in varijs affe-  
ctibus , ad vlcera pulmonum siccandi ,  
*ex nicotiana* , *tus filzg. sulphure &c.* ad men-  
ses mouendos , sistendos , ex idoneis : al-  
vi fluxus etiam vt dysenteriam; ad suffo-  
cationem , ex graueolentibus per supe-  
riora, suauibus per inferiora ; ad vterum  
siccandum , roborandum , pro conceptu  
utilissima. Ad vlcera autium, narium, oris  
pulmonum, recti , &c. ad lucem ex *cinnabari* vt passim , ( cuius fumus toto corpo-  
re conceptus in conclavi labet illam  
ptyalismo excludit ) & affectus simul in-  
de pendentes, vlcera, dolores sanat. Sic  
autem passim forma pulueris trochisco-  
rum ; *cinnabaris* vnc. j. fl. gummat. 3 fl.  
3 vj. puluer. robotantis 3 ij. 3 iiij. fiat pul-  
uis aut cum serebinis, trochisci.

H Y M I D V S. Vapor alias propriè appel-  
latur, siq; ex liquore ad scopum idoneo , va-  
porum via coctionis exspirante.

C O M P O N I T V R l. vel ex sive

plici liquore, acero, vino, aqua vita & sif. &c.  
ex olla, &c. Nota, aliquando lapidem py-  
ram ardentem injici in acetum, in tu-  
moribus duris, œdematosis discutien-  
dis, vt & laterem ignitū aceto extingui,  
& vaporem excipi, quod & tempore pe-  
stis fieri solet.

2. *Velex decocto idoneorum, dosi fo-*  
*tus præscribendo, aut pro partis amplitu-*  
*dine: hinc auribus affectis tertia pars suf-*  
*ficiet.*

V S V S , F O R M V L A . R. &c. fiat  
decoctum, cuius vaporem sumat in vte-  
ri & aliis affectibus, per sellam perfora-  
tari, & fistulam plumbeam, aut infun-  
dibulum. Vide Infectionem. In aurium  
affectibus per tubulum, aut infundibu-  
lum, quod Embotum vulgo vocant.

V T I L I T A S maxima, in veteri af-  
fectibus præsertim, mensibus sistendis,  
aut mouendis, ex emollientibus & atte-  
nuantibus: in dysenteria ex astringenti-  
bus: in ani variis affectibus, prociden-  
tia, haemorrhoidibus sistendis, leniendis;  
ad affectus aurium & oculorum etiam  
præscribuntur. In summa, ad siccandum,  
adstringendum, laxandum, emollien-  
dum, discutiendum, aperiendum, &c.

## C A P. X.

## DE ODORAMENTIS.

**PARTIM** ad voluptatem, partim ad sanitatem prescribuntur, maxime vero cerebri alterandi gratia, spiritus recreandi animalis, ad graves odores fugandos, ad auram pestilentem; ad cordis etiam vires & spiritus, vapore odorato per narres in fauces una cum aere, deinde in cor effuso.

Fiunt autem ex suauiter fragrantibus: suntque sicca, & humida.

## Odoramenta sicca.

**COMPONVNTVR** i. vel forma pulueris, vide Suffitum. Huius autem dosis prouidendi modo: si pro sacculis maioribus, praefat uti puluere violaceo aut cypreo: pro minoribus vero sufficient puluer. vnc. ij. vnc. iiij. ita tamen, ut gummatum dosis minuatur, vide supra. Fiat puluis, qui vel pyxide conclusus perforata, aut alijs, quoties videbitur, naribus admoueatur, vel nodulo, aut sacculo serico includatur ad usum.

2. *Vel forma pomi odorati*, ex puluere dicto in suffitu ad voluptatem ad vnc. j. vnc. j.  $\frac{1}{2}$ . vnc. ij. addito moscho, ambra, zibera ad  $\tilde{g}$ .vj.  $\tilde{g}$   $\tilde{g}$ .  $\tilde{g}$  j. ad lubitum. Excliptur autem vel *granni tragacantha*, soluto in aqua rosarum, fiant poma odorata numero duo, manibus gestanda, odoranda sappiis, vel, quod melius, ladano soluto incorporetur. Fiat pomum, quod illinatur oleo odorato. Et nota obiter, præstare ambram, moschum, zibetum in compositionem non vocate; sed his solutis superficiem pomi illinere, ut & oleo cynam. gryoph. solis, mixtis, ac sappiis renouare.

3. *Vel forma globularum*, ex eadem pasta, ex qua potum, dosi tamen pro eorum quantitate. Quibus Pharmacopœi addunt ad molem, carbones salicis.

4. *Vel forma saponis odorati*, pro manibus & capite abluendis, ex saponis Veneti, vel alterius albi vnc. iv. pulu. odor.  $\tilde{g}$  vj. &, si lubet, moschi, amb.  $\tilde{g}$ . iij. iv. cum aqua rosarum q. s. incorporentur, fiant globuli, seu pilæ maiores.

V S V S. Odore vapor sappiis excipiatur, sapo vcto ad manus abluendas, aut caput à sordibus.

**Y T I L I T A S.** initio expressa.

## Odoramenta humida.

**C**O**M**PONVNTVR 1. forma aquæ odoreæ. Hæc autem vel simplex, aquæ naphæ, quam alias Practici aquam currectorum appellant, ad cuius v. g. vne. iiij. ambr. moscb. maximè 3. ij. iiij. addere potes. Composita fit ex rebus odoratis liquidis, vt aqua ros. naphæ 3 vj. aq. cinam. 3 j. siccis, puluer. odoratorum 3 ij. 3 iiij. 3 iv. moscb. ambr. si vis, grana aliquot.

2. Vel forma linimenti, Balsamum hodie vocant odoratum, ex ceræ albæ spissius liquatæ, lotæ 3 j. olei idonei 3 j. & simul si vis, ambr. zibeta, moschi grana aliquot: vel crassius ex pulu. odorati 3 b. ceræ 3 iiij. olei de Been, vel amygdal. dulcium q. s. fiat linimentum, addito mosclo, ambr. &c. ad grana aliquot.

**V**S**V**S. *Aqua* pro lotione manuum, barbæ, capillorum maximè est, Balsami usus idem, & utilitas, quæ odoramenti. Possunt & tum manus leuiter, tum natrum interiora oblini, ad factorem maximè fugandum, cerebrum, cor confundendum, & horum spiritus.

## C A P. XI.

## D E S C V T O.

**I**N generetopicum stomachicum est solidum,  
scinti forma effigiatum, quod cum emplastris  
effigie & sacculi formari soleat, vsus ferè in-  
uidit, ut & sacculus reborans sapientis pro scuto  
vsuperetur.

**C O M P O N I T U R** igitur 1. vel  
formula sacci, ex pulueribus stomachicor. calidor. iis obseruatis omnino,  
quaे in cucupha, à qua etiam forma tan-  
tum differt in usu, ita ut dosis pulueris  
sit ʒ ij.

2. Vel forma emplastri, ex massæ em-  
plastri stomachici, vt de mastice ʒ. ij.  
puluer. stomachic. ʒ. 6. cui aliquando  
gummata odorata ad ʒ ij. adduntur, ex-  
cipianturque terebinth. q. s.

**V S V S & F O R M U L A. Saccu*m*i.**  
R. &c. siat puluis crassiusculus, qui ex-  
cipiatur cotone muscatellino, vel flocci.  
panni coccinei, & cum panno sericos  
bat sacculus scutiformis, interpuctus vel  
intestbastatus, qui collo appensus, geste-  
tur supra regionem ventriculi, ittoratus

O

## 314 Method. Præscribendi

aliquando, si lubeat, pauca aqua vitæ.

Emplasti. R. &c. fiat emplastr. scutiforme super alutam, ventriculo applicetur, illatum, si vis, oleo, aut puluere conspersum, ne adhæreat.

V T I L I T A S. Insignis post purgationes ad ventriculum robotandum, intemperiem frigidam, robur, coctionem, ad vomitum, &c.

## C A P. X I I.

### . DE PESSARIO, ET NASCALI.

M E D I C A M E N T U M sanguini pudoris indendum, variis vteri affectibus expugnandis, à varia forma varicè olim nominatis.

Pessarium dicitur, quod figuram habet longam digitum indicem, crassam pollicem, rectem, alias Pessus: quidam ~~variam~~, quae vero rotunda instar noduli, Nascallia.

Duplex autem statu ab effectu: Purgans, & Alterans.

Purgans.

C O M P O N I T V R i. vel ex opis

ta laxante sola, ad  $\frac{3}{4}$  j. fl.  $\frac{3}{4}$  ij. pro duobus  
nempe: (bina enim semper præscriben-  
da, vt altero extracto alterum indatur,) incorporetur cum succo aliquo, v. g.  
*mercurialis.*

*Nota*, huic opiatæ addi aliquando pul-  
ueres, vel aperientes acres uterinos, ad  
 $\frac{3}{4}$  j. fl.  $\frac{3}{4}$  ij. vel purgantium simplicium,  
aut compositorum, ad  $\frac{3}{4}$  ij. cum succo  
incorporentur. Item horum loco, *gammæ*  
*ammoniacum*, *mynba* adduntur sèpiùs ad  
 $\frac{3}{4}$  ij.

2. *Vd ex puluere simplicium cathar-  
ticorum, aut compos. electuar. vt, bieræ  
picræ ad  $\frac{3}{4}$  vj.  $\frac{3}{4}$  j. vnà cum alterantium  
uterinorum  $\frac{3}{4}$  fl.  $\frac{3}{4}$  ij. cum melli, vel suc-  
ci, vel vitriusque q. f. incorporentur.*

3. *Vel ex succis cum melle coctis ad  
opiatæ consistentiam, additis pulueribus  
catharticis hac proportione: succi  $\frac{3}{4}$  ij.  
 $\frac{3}{4}$  iiiij. mell.  $\frac{3}{4}$  fl. pulu.  $\frac{3}{4}$  fl.*

**V S V S & F O R M U L A. R. &c.**  
cum santalo rubro, vel panno sericeo,  
fiat pessus, vel cum pauco cotone exci-  
piatur, obvoluat urque panno sericco ru-  
bro, fiat pessus magnitudinis debitæ, qui  
filo coxæ alligatus, (vt extrahi possit  
pro libitu, quod sit post 4. 6. horas, quæ

O ij

sordes eluantur, posteà iterum idem vel  
alius immittitur, idè duplex solet effun-  
gi,) indatur, vesperi maximè hora somni.

*Nota*, antequam indatur, dici passim,  
ipse, vel interiora vuluae illinantur oleo  
idoneo. *Vsus* autem per triduum, qua-  
triduum est.

**V T I L I T A S.** Post purgationes,  
maximè autem in intemperie frigida,  
qua accumulantur excrementsa pituitosa  
copiosa, & sordes: vnde sèpiùs steri-  
litas, &c. item aliquando ubi instituta  
diata, atque tunc toto ipsius decursu  
vspantur. Estque optimum; vt compo-  
nuntur ex purgantium & corroboran-  
tium ana part. æqual. Valet etiam ad  
menses mouendos. Mirè enim alliciunt,  
si moscham maximè & zibetum addas. Vti-  
lissimum etiam, & usitatum, conficerè  
purgantia & roborantia simul, vt iam dī-  
ctum pro conceptione iuuanda, quorū  
vnū autè viri congressum indat, alie-  
rūm posteà, ex solis roborantibus, ad-  
stringentibus.

Alterans & Roborans.

*Pessaria, que non purgant, binariam pri-*

*scribuntur, vel ad reborandum veterum, vel ad  
alterandum vario modo.*

**COMPONITVR** i. *vel forma opiatæ*  
*ex puluere idoneorum veterinorum, ra-*  
*dic. folior. aromat. &c. quæ incorporan-*  
*tur idoneis.*

Dosis autem puluerum ʒ vj. ʒ j. ali-  
quando ʒ j. ʒ. Incorporans, *vel mel q. s.*  
*vel succus q. s.* atque tunc usitatè coto-  
istà mixturà imbuitur, fiat pessulus ob-  
uolatus, &c. nam ubi cum melle exci-  
pitur, quandoquidem consistentia cras-  
hor, non opus cotone, fit pessus, &c.  
cum panno sericeo. Potest & syrupo ex-  
cipi idoneo.

*Nota*, utiliter etiam cum succis fieri  
coetis cum melle, in formam opiatæ.

*Item nota*, aliquando praescribi opiatâ  
officinaliæ, ut *tripheram persicam sine opio*,  
ad vnc. ʒ. pulu. ʒ ij. vnc. ʒ. mote opia-  
tarum.

1. *Vel formâ linimenti, ex pulue. ʒ vj.*  
*ʒ j. cum olei nardini & ceræ q. s.* fiat instar  
linimenti, quo imbuitur coto, vel lana  
carminata : formatur pessarium, tenui-  
panno sericeo obuoluendum.

2. *Vel formâ suppositorij, ex mellis ʒ j. ʒ.*  
*ʒ ij. coeti cum succi idonei ʒ ij. ʒ ij.*  
*O ij.*

addendo, si vis, pulueris  $\frac{3}{4}$  s.

4. *Vel ex solis vnguentis idoneis, qui cotone excipientur, vel alias, vbi adstringendum, ex vnguenti comitiss. & pulueri idoneorum ana*  $\frac{3}{4}$  *j.*

5. *Vel ex herbis viridibus ad M.j. contusis, cum melle, vel succo incorporatis, addito, si lubet, puluere ad*  $\frac{3}{4}$  *s. 3 vj.*

6. *Vel ex cotone solo, maximè in veteri suffocatione, ziberi  $\frac{3}{4}$  s. imbuto, aut mosco soluto, & aliis odoratis, statim indito.*

*Item ; coto pro pessario utileiter, ad alios scdpos, imbuitur succis idoneis, ad  $\frac{3}{4}$  ij.  $\frac{3}{4}$  iij. quod efficax vbi astringendum, quibus, vt passim, pulueres addi possunt ad  $\frac{3}{4}$  s. 3 vj. vt supra, vel alia idonea, vt *bunyr. axungia, pinguedo*, ad emolliendum, &c.*

**V S V S & F O R M V L A.** Vide Putgans. Pessarium solidum præstat etiam semper pannosericco rarissimo inuolente, vt commodius possit extrahi; liquatur enim: item quia adstringendum, siccandum, sepius renouari debet.

**V T I L I T A S.** Ad roborandum utrum, vt dixi: tum etiam alterandum variо modo, ad ipsius inflammationes, da-

titiēm emolliendam, intemperie svatas, ad omnein fluxum vterinum, prolapsū, suffocationem, factum excludendum, ad secundinas, ad menses mouendos; sed talia ferè simul fiunt purgantia: quibus non vtendum, nisi post purgationes vniuersales, ad vlcera ecrucis, vt ad vterisuffus.

Hac de Pessario, sequitur  
N A S C A L E.

Alij idem quod Pessarii flatum: alijs habent pro Nodulo, vt vocant, vel Penicillo. Inueniunt vel propter virgines, præ pudore pessaria recusantes, vel etiam cùm mulieres pessaria admittere nequeunt, vt quando adsumt vlcera, &c.

Quicquid sit, **COMPONVNTVR** penicilli in nodi effigiem, suntque molliissimi ex cotonis, vel lanæ flocculo aut haplo, qui insuccatur, vel succo idoneo, vel vnguento, vel aliis supra dictis, quorum dosis vix definitur: *bapsus lanæ* ferè v. g. præscribitur, qui imbuatur rei talis f. q.

Tales etiam fiunt ad suffocationem: cotonis flocculo zibeto leuiter imbuto,

O iiiij

**320** *Method. Prescribendi*  
vel moscho oleo nardino soluto v. c. vt supra.  
**V S V S** pessariorum.

**V T I L I T A S** in virginibus eadem  
quæ pessariotum, fiunt &c ad ulcera cer-  
nici, ad dolores, &c.

## C A P. XIII.

### DE SVPPOSITORIO.

**T**OPICV M<sup>m</sup> anno dicatione, est medica-  
mentum oblongum 3. 4. digitos, figura  
tereti & rotundâ candela instar, olim glandis  
formâ, unde Gracis Béhemo, bode vulgo  
Suppositorium, ad aluum solicitandam maxi-  
mè, & ad alios effectus comparatum.

*Est autem vel simplex, vel compositum.*

#### Simplex.

Fit vel ex caule, ac radice betæ, brasili-  
cae, altheæ, detraicto cortice externo, qui-  
bus aliquando, ad augendam vim irri-  
tandi, sal aspergitur, & oleo illita in-  
duntur: ex canle etiam porributyro inun-  
dato, sapone albo in formam glandis acumi-  
nato, vt etiam mel solum coctum in duri-  
tatem: sic enim acre euadit.

## Compositum.

Fit ex melle, vt basi, cocto, & indurato  
vsque digitos amplius non inquiet, ac  
puluertibus ipli cocto additis hac dosi:  
vt mellis ʒ j. excipiat puluer. Ʒ liij. Ʒ j.  
ad summum, prout puluis levior, aut  
etiam fortius agere volumus, quæ com-  
positionis quantitas pro duobus, tribus,  
suppositoriis sufficiet.

Mel autem per se coquitur, vel cum  
succis, ad irritandum, aut alios scopos,  
idoneis: sit autem succi Ʒ j. Ʒ j ȝ.

**V S V S & F O R M V L A. R. &c.**  
hant suppositoria; quorum unum oleo,  
vel butyro illitum indatur, urgente ne-  
cessitate, ita vt si sint purgantia, semel,  
bis in die sufficiat; si ad alterandum, sæ-  
pius possint admoueri; si ex narcoticis,  
ad dolores, diutiū ne morentur, ne pa-  
ralysin inducant, (hinc & filo alligari  
solent, vt retrahantur pro lubitu,) nec  
sepius immitti.

**V T I L I T A S.** In generē duplex,  
vel ad aluum & expulricem irritandam,  
vel ad proprios ani & recti intestini af-  
fectus.

Suppositorio autem alius sollicitatur,  
quod sic ferat ætas, quæ clysterem facile  
saltem non admittat, ut passim in lactan-  
tibus & puerulis : quia etiam consuetu-  
do, & morositas quorundam clysterem  
renuit, ut virgines. Item ubi clysteres  
tardiis operantur, ut in colica sèpè : vel  
ubi medicamenta assumpta non operan-  
tur : ubi fæces in alio hærent; ubi rectum  
ob fæces induratas clysterem non ad-  
mittit : ubi facultas expultrix immemor  
officij.

Item ad reuellendum, ubi humores ad  
superiora vergunt, ad caput, praecordia,  
aut alijs ubi reuulsionis gratiâ à supetio-  
ribus reuellendi purgandique, veluti  
passim in affectibus capitis frigidis &  
soporosis, quibus hac ratione simul fa-  
cultas sopita excitatur ; ubi etiam à cly-  
steribus offenduntur ægri, &c.

Præter illum laxandi scopum sunt  
etiam ad proprios ani effectus atq; recti  
intestini ex melle, ut basi, atq; materia  
ad intentionem idonea modò supra di-  
cta : sic ad hemorrhoides aperiendas  
cum acribus, ad fistulas cum idoneis, ad  
tenesimum, ad ascariides, vlceta, sphyn-  
cteris laxitatem & paralysin, dolores

cum puluctibus appropriatis melli, uti dictum, dosi allata permixtis.

*Aduerse obiter*, circa materiam suppositorum laxantiū, alia esse leuiora, simplicia, supra recensita pro infantibus, alia fortiora, que constant ex sale, stercore muris, pulueribus purgantibus simplicibus, aloës, agar. senex, compositis, hieræ picra pessim: alia insuper valida, quorum usus maxime in sepe-  
sus, sal gemm. sal. ammon. nittrum, Purgantia simplicia, colocynth. composita, hiera, diaocolocyn. ad 3 fl. 3 j. Item si ad dolores opium admittatur, causè ob meum paralysis, & rix ad 3 fl.

## C A P. XIV.

### D E C L Y S T E R E.

**A**blucionem significat ἀκόλω, abluo, Gra-  
cè καυτηρ, καύσμα, καυτίσμα, & ab  
injectione Enema, ab ēsinu, injicio, in gene-  
re significat quamvis ablucionem aut injectionem  
in partem quamlibet, priuam verò que  
in anum.

Triplex autem statui potest: Purgans, Al-  
terans vario modo, Roborans.

## Clyster purgans.

**C O M P O N I T V R** ex liquore idoneo, in quo vna cum melle, saccharo, &c., purgantia etiam varia dissoluuntur. Vnde etiam totidem in ipsius compositione sunt consideranda: summam verò duo; *Liquor ex quo*, & *Dissoluenda*.

Quod ad **L I Q U O R E M**, ratione qualitatibus vel est decoctum commune clysteris in officinis usitatum, vel decoctum magistrale, quod è re nata, pro intentione, ex idoneis prescribitur. Estque alterans, vel purgans.

*Alterans* (quod usitatum ferè tantum) componitur ex idoneis emollientibus, calefacientibus, refrigerantibus, pro intentione, radic. fol. sem. fruct. floribus, hac ferè proportione: ut radicum 3 ij. iij. fol. M. iiiij. sem. 3 vj. 3 j. 3 j. β. ad sumnum, fructuum par. viij. flor. P. iiij. prescribantur.

*Purgans* si volueris efficere, (quod tamen rarius, quia postea purgantia usitate dissoluuntur, quæ sufficiunt,) id facies pro pituita semini, carthami contusi 3 vj.

$\frac{3}{2}$  j. agaric. in nodulo  $\frac{3}{2}$  iij. turbitb. el. &c.  
 $\frac{3}{2}$ -ij. pro melancholia polypod.  $\frac{3}{2}$  j. sennae  
 $\frac{3}{2}$  vj. quæ omnia post radices , aut  
etiam semina præscribenda & deco-  
quenda. Cæterum ista omnia decoquun-  
tur in liquore idoneo , vel in aqua tan-  
tummodo.

Quod ad quantitatem liquoris , varia est,  
pro ætatis ratione maximè , infantulo  
v. g. 4. 5. mensium , si admittant clyste-  
rem,  $\frac{3}{2}$  iij. sufficient , adultiori  $\frac{3}{2}$  v.  $\frac{3}{2}$  vi;  
adultis pletunque lib. j. in vastis hominibus  
lib. j. s.

Aduertas obiter, in grauidis, hydropi-  
eis , flatulentis , senibus, infrà subsisten-  
dum , vt totus clyster libram non exce-  
dat, item ubi diutius volumus retineri.

DISSOLVENDA ratione quali-  
tatis , sunt alterantia; vel purgantia.

Alterantia , quæ passim dissoluuntur ;  
sunt mel , & succharum , item & semper  
oleum , à qua tamen commodissimè pote-  
ris abstinere , ubi expultrix acriter erit  
follicitanda, vel ubi reuellendum poten-  
ter. His aliquando & sal additur , sed  
gemmae usitatè , ubi magis est irritandum,  
in soporosis maximè .

Purgantia vero sunt opiate officina-

§ 26 Method. Præscribendi  
les, lenientes tantum, vel catharticæ pro  
varietate humorum purgandorum &  
temperamenti corporis diuersæ.

Aliquando harum loco pilulæ dissol-  
vuntur in affectibus soporosis.

Quod ad quantitatem, alterantia, mel,  
saccharum, in adultis ad  $\frac{3}{2}$  ij. iij. ad sum-  
mum dissoluuntur: in infantibus quarta  
sufficiet & minor: oleum, in adultis ad  
 $\frac{3}{2}$  iij. sal ad  $\frac{3}{2}$  fl. 3 j. opiatæ dosi dupla  
ad eam, qua per os assumuntur; visitatè  
autem ad  $\frac{3}{2}$  j. fl. nisi admodum lenien-  
tes, vel agendum validius: tunc enim  
 $\frac{3}{2}$  ij. præscribentur, in infantibus quar-  
tam præscribas. Quod si pilulas præ-  
scripseris, ( quod rarissimum ) ad  $\frac{3}{2}$  ij.  
 $\frac{3}{2}$  iij. id feceris.

V S V S & F O R M U L A. R. &c.  
fiat decoctio, cape de colat. &c. in qua  
dissolue, &c. fiat clyster. injiciatur longè  
à pastu vacuo stomacho: tamen & quâ-  
vis horâ, vrgente necessitate, poterit  
præscribi, ut in soporosis, &c.

V T I L I T A S. 1. quidem ad inte-  
stinorum facies expurgandas, & humo-  
res excrementitos varios, vnde cùnque  
fuerint cumulati, expurgandos. 2. Ad  
partes vicinas, renes, vetricam, mesenter-

trium, ventriculum ab ijsdem vacuandas. Poterò etiam remotiores, vt caput, pectus, &c. expurgatis enim inferioribus consecutione quadam superiores exonerantur, idèò & pro reuelentibus remedii habentur.

### Clyster alterans.

**C O M P O N I T V R** etiam ex liquore idoneo, & dissolnendis propriis.

**L I Q V O R** ratione qualitatis, varius admodum est pro scopo, vel enim simplex est, vel compositus.

*Simplex*, vt aliquando lac, aut decoctum capitum, intestinorum veruecis pro li- quore anodynō, vt in dysenteria, colica, &c.

Aliquando ex oleo solo, vt in flatibus, colica, vino generoso, aut Hippocratico in iisdem.

Aliquando & ex lacte ferrato, pro astringente: aliquando & aliàs ex decocto bordei, vel simul furfuris, rosmarin, pro detergente, quod passim fit, iis tribus ad P. j. præscriptis.

Ex juscule carnis pulli caponis, &c. pro nutritiente.

*Compositus liquor*, qui passim in usu est pro ciusmodi clystere, est decoctum variatum partium stirpium suprà dictarum, plutum, pauciorū, quę respiciant partem affectam, & effectū, dosi dicta in purgāte.

Quod ad quantitatem liquoris, vide ibidem.

**DISSOLVENDA** in alterante ratione *qualitatis*, varia omnino sunt pro varietate indicationum, (licet obiter raro alterans sine purgante, nisi indications omnino dissuadent, vt in anodynō, nutriente, &c.)

Dissoluuntur autem passim, *mel*, *saccharum oleum*, dosi dicta.

Aliquando *oleum* nullo modo; sed tantum *mel* & *saccharum*, vt in detergente: & contra in emolliente *oleum* præpollet, vt & *baryrum*, si voluetis, & pinguia ciusmodi.

Præter hæc, vel etiam sine his, pre indicationum præsentia, aliquando succi dissoluuntur, vt in adstringente clystere, ex foliis, (qui obiter etiam in catharticis utiles, ex vellicantibus sc.) item & pulueres adstringentes, vt passim fit in aliis fluxibus & dysenteria maximè. Aliquando *serum bircinum* in dysenteria, ad dolo-

pe

tēm & oblinendam veluti faciem internam, ne acres humores magis exalcerent, obiterque nota, om̄i vitello dissoluendum, alias statim congelascit. Aliquando *vrina*, ut in ascite. Sic & *philonium*, pro narcotico.

Pro nutriente verd̄ profundunt conseruæ idoneæ, *sacchar. album*, consummata, confessio etiam *Alkermes*; ubi simul maximè corroborandum: *theriaca etiamnum*, de qua obiter notetur, in hypercathartis & dysenteria epidemica recetitem mirò operari, & subitò.

Quod ad quantitatem, varia etiam omnino est, pro dissoluendorum diuersitate.

*Mel. sacchar.* ad 3 ij. 3 iii.

*Butyrum*, & alia pinguis, ad 3 iiij.

*Succi*, ad 3 ij. 3 iiij.

Pulueres, ad 3 vj. 3 j. plus, minus pro efficacia.

*Sebum*, 3 fl. 3 j. loco cuius & candela vulgaris usurpari potest, cuius lito videmus etiam excoriationes statim perfanari.

*Vrina*, ad 3 ij. 3 iii.

*Philonium*, ad 3 ij. à 3 j.

*Conseru.* ab 3 fl. ad 3 j fl.

330 *Method. Praescribendi*  
*Sacchar. album*,  $\frac{3}{2}$  ij.  $\frac{3}{2}$  iij. vt & eon-  
summata.

*Confect.*  $\frac{3}{2}$  j.  $\frac{3}{2}$  ij. pro ditiorib.

*Tberiaca*, recens, à 3 ℥. ad 3 j. vel paulò  
plus.

*Videlli omorum numer.* I. 2. in anodyno  
leuiter detergente, nutritive.

**V S V S & F O R M V L A.** Vide. In-  
jicitur autem hora commoda quacunque  
vrgente necessitate.

N.B. Nutrientes maiore copia præscri-  
bi, sèpiùs reiterati, diutiùs afferuati de-  
bere; contà de aliis.

**V T I L I T A S.** Primiò quidem in  
vitiis & affectibus intestinorum, crasso-  
rum maxime, pro eorum diuersitate va-  
ria emergit, deinde vicinatum, &c. Fung  
& ad alterandum vario modo intestina,  
corpus vniuersum, vt ad refrigerandum  
in affectibus variis, & partium vicinarū  
intemperiem calidam, ad emolliendas  
fæces, humorum acrimoniam leniendā,  
ad dolores demulcendos intestinorum;  
renum, vesicæ, vteri: ad flatus discu-  
tiendos, ad detergendum tūm humores  
excrementitios, tūm ulcera dysenteri-  
corum, ad ea consolidanda, ad fluxus  
alui adstringendos, sistendos, ad yet-

mēs eliciendos, enecandos, ad nutritiūdum, & nulla ferē affectio, vel corporis pars, quæ à clystere solamen non percipiat, maximē co, qui aluum expurgat, qui idēt etiam omni purgationi utilitēt præmittitur, vt facilior fiat & expeditior viis patentibus purgatio, sine tormine vel vomitu, cum alias impuritates variæ retineantur, quæ vel ipsæ remeant in varias partes, vel tetricis inde exspirantibus vaporibus, vario modo ipsas afficiunt succos bonos, spiritus contaminant, calorem obsuscant, opprimunt,

## C A P. X V.

## DE INJECTIONIBVS

variis.

**P**RÆTER iniectiones, que in animis sunt, aliae etiam in varias corporis nostri partes prescribuntur: in aures, vicinum, vesicam, penem, fum, fistulas maximē, quæ generis nomine Clysteres etiam appellantur.

In Aures.

COMPOVNTVR. I. *Vd ex folijs*

**332** *Method. Praescribendi*  
*oleis, succis, aquis, decoctis idoneis,*  
*pro varietate affectionum.*

2. *Vel ex horum duobus, tribus, g-*  
*mul mixtis, in quibus aliquando varia-*  
*scopo inseruientia dissoluuntur; sed par-*  
*ca dosi, & quæ ferè etiam sunt liquida.*

*Quod ad quantitatem liquidorum.*

*Oleor. 3 fl. 3 j. 3 ij. sufficient, pro-*  
*tius efficacia & usus longitudine.*

*Succi, aquar. decoct. 3 j. 3 ij. siue so-*  
*la, siue mixta, sat erunt, pro usu &*  
*efficacia.*

*Quod ad quantitatem, soluendorum-*  
*parca est, propter exquisitum sensum &*  
*paruitatem partis, & si sint pulueres, ad*  
*3 fl. 3 j. si pinguis, 3 ij. mel ad 3 fl. &c.*

**V S V S & F O R M U L A.** R. &c.  
instillentur in aurem gutt. 2-3. plures, pro  
medicamenti facultate: aliquando & li-  
quore autis poterit adimpleri; sed paulo  
post reclinato capite expurgari, ut maxi-  
mè cum decocto utimur: si oleum sit so-  
lum, guttae quedam infunduntur, obtu-  
ratur deinde autis cotone muscatellino,  
maxime si affectus frigidus.

**V T I L I T A S** maximè ad inflam-  
mationes, dolores, ulcera, tinnitus,  
surditatem, vermes, & alios aurium par-

sculares affectus, vide materiam.

### In Vterum.

Vocantur alias Clysteres uterini. Syringa vero, per quam liquor in uterum infunditur. Græcis dicitur μητρική, unde & ipsa medicamenta Metrunchytica.

**C O M P O N I T U R** 1. ratione quartariorum, ex decocto radic. folior. &c. dosi clysteris, de cuius colatura cape  $\frac{3}{4}$  iij. iv. fiat inie<sup>c</sup>tio: seruatut tamen habet i. pro pluribus injectionibus.

*Nota*, sic fieri simpliciter iniectionem, alias vero etiam huic liquori usitatè addi varia pro scopo, ut dictum in alterante clyster, eaque dosi dimidiâ, vel potius subtriplâ.

2. *Vel* ex succis herbarum depuratis.

3. *Vel* ex aquis destillatis.

4. *Vel* alio simplici liquore, vide Clysterem.

5. *Vel* ex iis mixtis, ita ut  $\frac{3}{4}$  iij. iiiij. pro iniectione sufficient, in quibus, ut dictum, si quæ faciant ad intentionem, dosi dicta poteris dissoluere.

**V S V S & FORMVLA R. &c. fiat**

334 *Method. Prescribendi*  
inie<sup>c</sup>ti<sup>o</sup> in vterum tepidè per metrè  
chytem.

V T I L I T A S ad varios vteri affe-  
ctus, ad inflammationes, vlcera, dolores,  
flatus, calefaciendum, refrigerandum,  
intenses mouendos, sistendos, secundir-  
ias, vteri prolapsum, impuritates va-  
tias detergendas. Materiam vide in hy-  
stericis & aliis tabulis.

In Vesicam, & Penem.

C O M P O N V N T V R ex liquore id-  
œ, vt saepius dictum, simplici, com-  
posito, vide cylsterem alterantem, hunc  
& ex emulsionibus, vt passim in gono-  
rhatâ, ad ardores.

Quod ad quantitatem, 3 iij. 3 iiij. suf-  
ficient.

Nota; in hoc alias nihil, alias aliquan-  
do dissolui mel præsertim, vel syrups  
idoneum ad 3 j. nonnunquam rerum v/  
tarum puluerem, sed laxigatum in al-  
cool ad 3 j. 3 j. 8. 3 ij.

V S V S. R. &c. fiat inie<sup>c</sup>ti<sup>o</sup> per syri-  
gam: aliquando, ubi via in vesicam præ-  
pedita, illud cum cathetere perfici-  
endum imperatur.

V T I L I T A S maximè ad detergen-  
tum tum mucum vesicæ orificio adhæ-  
rentem, tum ulcerum sordes, ad dolores,  
exulcerationem, carnis excrescentiam,  
&c. ad ardorem & inflammationem, ut  
passim in gonorrhæa virulenta, ad ulce-  
ra exsiccanda, &c.

In sinus & fistulas.

C O M P O N V N T V R ex liquore ido-  
neo, cuius dosis pro fistulæ amplitudine,  
in quo dissoluuntur idonea, idque dosi  
liberaliore: vbi injectiones alias priuatas  
imitare, quod ad quantitatem liquoris, &c.  
dissoluendorum scil.

V S V S. Fiat infectio per syringam.

V T I L I T A S. Ad callorum obfuscationem, maximè detersionem, carnis generationem, ad cicatricandum, quo-  
rum materiam vide suo loco.

S O L I D E O G L O R I A.

CATHARTICORVM DOSES IN  
substantia, quarum frequens est usus in  
trattatu de compositione medi.  
camentorum.

## CHOLAGOGA.

Mitio-	{ Cassia ab $\frac{1}{2}$ fl. ad $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ ij.
ra.	Manna $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ ij. $\frac{1}{2}$ iiij.
	Tamer. $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ ij. $\frac{1}{2}$ iiij.
	Succ. Ros. $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ ij.
Medio-	Aloe $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ ij. $\frac{1}{2}$ ij fl.
	Rheubarb. $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ j fl. $\frac{1}{2}$ ij.
	Myrr. cinn. $\frac{1}{2}$ ij. $\frac{1}{2}$ iiij. $\frac{1}{2}$ fl. M. $\frac{1}{2}$ v.
Vehe-	Scammon. $\frac{1}{2}$ vj. x v. $\frac{1}{2}$ j. Diol.
ment.	Paul. Aëtio $\frac{1}{2}$ j. Mel. ad $\frac{1}{2}$ g xij.

## MELANAGOGA.

Mitio-	{ Senna D ij. $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ j fl. $\frac{1}{2}$ ij. quid. $\frac{1}{2}$ iiij.
ra.	Polyp. querc. $\frac{1}{2}$ ij. $\frac{1}{2}$ iiij. $\frac{1}{2}$ fl.
	Epibrynum $\frac{1}{2}$ ij. $\frac{1}{2}$ iiij. $\frac{1}{2}$ fl.
Vehe-	Hellebor. nig. $\frac{1}{2}$ xv. $\frac{1}{2}$ fl. $\frac{1}{2}$ ij. Mel.
	Lap. arm. lat. $\frac{1}{2}$ fl. $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ j fl. illor.
	Lapis Lazuli $\frac{1}{2}$ fl. $\frac{1}{2}$ j. $\frac{1}{2}$ j fl. Mel. tus ad $\frac{1}{2}$ j.
	à $\frac{1}{2}$ ij. ad $\frac{1}{2}$ ij. fl.

PHLEG-

## PHLEGMOGOGA.

Mitius. *Carbamus* 3 j. 3 fl. 3 vj.

Medioct. *Agaricus* 3 ij. 3 j. 3 ij. (ad 3 ij.)  
 { *Turbinib.* 3 ij. 3 j. 3 iv. *Mef. à* 3 j.  
*Hermedea* 3 j. 3 j fl. *M. à* 3 j fl.  
 (ad 3 iij.)  
 Vehem- *Mecoboaca* 3 ij. 3 j. 3 j fl. vel ij. ad  
 ent. *Rad. Talip.* 3 ij. 3 j. 3 iiiij. (summū.  
*Colocynth.* gr. vj. xv. 3 j. *Diosc.* 3 ij.  
*Opopanax* 3 fl. ad 3 j.  
*Sigapenum* 3 fl. ad 3 j.  
*Euphorb.* gr. iiij. viij. xij.

## HYDRAGOGA.

Mitiota. *Ebul.* { *semen* 3 j.  
*ontex* 3 ij.  
*succus* 3 fl. 3 vj.

*Sambucus* eodem modo.

Vehement. { *Soldanella* 3 j. 3 j fl. 3 ij.  
*Ires succus* 3 fl. 3 vj. 3 j.  
*Elaterium* 3 vj. 3 fl. 3 xv.  
*Eula jasper.* 3 vj. 3 fl. 3 xv.  
*Mecoboaca* & *Talip.* Vide sup.

# I N D E X

## R E R V M.

### A

<b>A</b>	<i>Cetum destillatum.</i>	103
	<i>Apozema Alterans.</i>	1. 3
	<i>Eius usus.</i>	10
	<i>Aperiens.</i>	3
	<i>Purgans.</i>	12
	<i>Apophlegmatisma secus.</i>	294
	<i>Liquidus.</i>	295
	<i>Amygdalatum.</i>	296
	<i>Antimonij infusum.</i>	134
	<i>Vitrum.</i>	103
	<i>Aqua benedicta.</i>	ibid
	<i>Aromatizatio.</i>	6

### B

<b>B</b>	<i>Alneum simplex.</i>	239
	<i>Compositum.</i>	240
	<i>Balsamus odoratus.</i>	310
	<i>Bocherum.</i>	318
	<i>Bulus Purgans.</i>	15
	<i>Roborans.</i>	171
		175

<b>C</b> <i>Assia in potionē.</i>	53
<i>Cataplasmā.</i>	265
<i>Ceratum cum vnguento confunditur.</i>	257
<i>Clyster Purgans.</i>	314
<i>Alterans.</i>	327
<i>Nutriens.</i>	329
<i>Collyrium humidum.</i>	283
<i>Liquidum.</i>	285
<i>Siccum.</i>	290
<i>Melliforme.</i>	288
<i>Conditum.</i>	193
<i>Crocus metallorum.</i>	102
<i>Cucubba.</i>	281

**D**

<b>D</b> <i>Ecoctum.</i>	5
<i>Decoctum Purgans.</i>	42
<i>Alterans Officinale, &amp; Magistrale.</i>	44
<i>Decoctum Galli.</i>	160
<i>Alterans.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Purgans.</i>	161
<i>Corroborans.</i>	62
<i>Dentifricium.</i>	296
<i>Desyllatum instaurans.</i>	163
<i>Dixta.</i>	143

*Alterans.**Vacuans.**Sudorifica.**Sudorifica cathartica.**Dropax.*

144

149

ib.

155

269

## E

**E** *Clezma. Lach linches*

188

*Officinale, & Magistrale.*

ibid.

*Plectuaria in potionē.**Embrocation.*

57

*Emplastrum.*

245. 248

260

*Officinale, & Magistrale.**Emulsio.*

ib.

*Epithema Liquidum.*

150

*Solidum.*

224

*Epithymum in decoctis.*

225

*Errinum.*

27

*Purgans.*

295

*Liquidum.*

ibid.

*Molle.*

299

*Solidum.*

300

*Alterans.*

ibid.

301

## F

**F** *Otus Humidus.*

227

*Siccus.*

226

## I N D E X.

341

<i>Frontale.</i>	278
<i>Fruitus minores pondere praescribuntur; integri numero.</i>	23

## G

<b>G</b> <i>Argarisma.</i>	292
<i>Judiberi tela.</i>	263

## H

<b>H</b> <i>Ellebori albi infusio.</i>	101
<i>Hordeatum.</i>	135
<i>Hydromel.</i>	139
<i>Simplex, Aquosum, &amp; Vinosum.</i>	<i>ib.</i>
<i>Medicatum.</i>	141
<i>HydroSaccharum.</i>	142

## I

<b>I</b> <i>Allapae infusio.</i>	57
<i>Iniectiones.</i>	331
<i>In Aures.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Vterum.</i>	333
<i>Penem, &amp; Vesicam.</i>	334
<i>Sinus, &amp; fistulas.</i>	335
<i>Insectorum Iulepi.</i>	37

# I N D E X.

<b>342</b>	<b>I N D E X.</b>
<i>In sessus.</i>	237
<i>Irrigatio.</i>	246
<i>Inditus.</i>	31
<i>Duplex.</i>	32
<i>Vsus eius.</i>	37
<i>Insula, Alterantia, Restaurantia.</i>	169

## In classib.

<b>L</b>	<b>Ac.</b>
<i>Laconicum.</i>	137
<i>Lithenum.</i>	242
<i>Lapis Cephalica.</i>	250
<i>Pedum.</i>	230
	232

## M

<b>M</b>	<b>Affapanis.</b>
	200
	<i>Mechoaca infusa.</i>
	57
	<i>Mercurius vitæ.</i>
	104
	<i>Mlinuens medicamentum.</i>
	20
	<i>Monspeliensium Apozemata purgantia.</i>
	14
	<i>Morsuli.</i>
	196
	<i>Muscardini.</i>
	219
	<i>Mlyrobilani non coquendi.</i>
	16

## N

<b>N</b>	<b>Nascere.</b>
	319

## O

O	Doramentum.	310
	Siccum.	ibid.
	Humidum.	312,
Opiæ purgantes officinales visitatores ; minus		
visitatae.		180
Opiæ.		177
	Purgans.	178
	Roborans.	183
Oxymel non est vomitorium.		107
Oxyrrhedinum.		280

## P

P	Andaleon.	199
	Pasta regia.	196
	Pessatum purgans.	314
	Alterans, & Roborans.	316
Pilule.		206
	Purgantes Diagyrates.	ibid.
	Vsuales.	211
	Corroborantes, & Alterantes.	212
Pintolatum.		201
Perio.		40
Perio corroborans.		62
Alterans.		66

<i>Pteromichia.</i>	301
<i>Purgans.</i>	40
<i>Eius usus.</i>	65
<i>Prisana.</i>	141
<i>Puls.</i>	268
<i>Pulvis Purgans.</i>	250
<i>Reborans.</i>	221
<i>Aliorans.</i>	222
<i>Externus.</i>	222
<i>Purgantium doſis.</i>	223
	217

Q

*Quercinum polypodium.*

27

R

*Rubiflans.*

269

S

*Sacculi.*

274

*Scutum.*

313

*Semicupium.*

237

*Serum laetis.*

337

*Sinapisinus.*

273

*Sparadrapum.*

267

*Styphabunida.*

243

	I N D E X.	343
<i>Sicca.</i>		244
<i>Sudatorium.</i>		242
<i>Suffumatum.</i>		303
<i>Suppositorium.</i>		320
<i>Simplex.</i>		<i>ibid.</i>
<i>Compositum.</i>		321
<i>Syrpus.</i>		67
<i>Aliorans.</i>		69
<i>Officinalis.</i>		<i>ibid.</i>
<i>Magistralis.</i>		72
<i>Purgans.</i>		84
<i>Officinalis.</i>		83
<i>Magistralis.</i>		<i>ibid.</i>
<i>Syrpus acerosus non est vanitorius.</i>		107

## T

<b>T</b> <i>Abella.</i>		101
<i>Purgantes.</i>		202
<i>Roborantes.</i>		203
<i>Trochisci.</i>		215
<i>Magistrales parum usitati.</i>		216

## V

<b>V</b> <i>Aporurimum.</i>		238
<i>Vapor.</i>		304
<i>Vesicatorium.</i>		272

## 346      I N D E X.

<i>Vinum medicatum.</i>	115
<i>Purgans.</i>	118
<i>Alterans.</i>	126
<i>Virrioli Spiritus.</i>	36
<i>Vnguentum.</i>	252
<i>Vomitorium.</i>	95
<i>Triplex.</i>	97
<i>Vsus eiusdem.</i>	108



# SYSTEMA MATERIAE MEDICÆ

CONTINENS

MEDICAMENTORVM

Vniuersalium & Particularium,  
Simplicium ac Cōpositorum

SERIEM AC STLVAM,

Methodo medendi , ac formulis  
Remediorum præscribendis.

ACCOMMODATVM

à

IO. IACOBO A BRVNNO,  
Phil. ac Med. Doctore, & in Acad. Ba-

sil. Pract. Med. Profess. publico,

INSTAVRVM APOLLINEORVM,  
*in gratiam,*

Conscriptum , & hac formâ adornatum  
Indiceque auctum.

ROTHOMAGI.

---

M. DC. L.



P R A E F A T I O  
ad

Myſtas Apollineſs.

**V**IT artifex cum ſuo commode nihil eſſicit idoneam deſtituit materialia; etiamſi modus operandi ſit eidem notissimus: ſic Medicus in agrotanum ſaltem, fine variā medicamentorum ſuppelletile idoneas cornuſdens formulas concinnare non poterit; licet rationem componendi perfecte nōrit. Hinc materia medicea neceſſitas & uilias, cuius in hoc ſystemate ſeriem ac ſymptom exhibemus, ex variis plantarum partibus, (radicibus puta, corticibus, lignis, foliis, floribus, ſeminibus, fructibus, aromatis,) & humoribus, ſuccis nimirum, reſtais, ac gummatisib;: animalibus item, integris, caruque paribus, humoribus, (ut ſunt pinguedines, adipes, & medulla.) excrementis, nec non terra in utiq; naſcentibus corporibus, metallicis, terris, ac lapidibus varili, marinis: compoſiti; item effinalibus, congeſtam, & incertas classes, inter ſeriem indicationum, digeſtam: ut ex eſt, tanquam locupletiſſimo penſu, ac facundo gremio, mithode mendendi duce, uberrima remediorum materiis de promi poſit, ad polydadaliam illam compoſitorum medicaminum uarietatem & turbam fabricandam. Hunc itaque noſtrum laborem, Myſta Apollinei, id uerbi gratiam uceptum, a quo bono animo uiciſſipere.



# PROOEMIVM.

## *DĒ MATERIÆ*

### *Medicæ nomine, definitione, ac distributione.*

**M**OX MATERIAE MEDICÆ ambigua est, duo præcipue denotans. 1. Subiectum Medicinæ, sive materiam, in quam agit Medicus, quæ est materia Æruræ, sive passione. 2. Materiam instrumentis, i.e. instrumentis, et instrumentis, quæ sub se comprehendit instrumenta sanationis, extra intellectum in rerum natura existentia, sive ēlēs Bonifacius, materiam auxiliorum medicorum, quam rectè cum Gal. 1. alim. fac. cap. 1. distinguimus ab ipso auxilio, quod est prædictæ materici imago & idea, in mente Medici existens, illam tēm ad vnguentem re-

præsentans. In posteriori hac significatione usurpatur vel generaliter, pro omnibus instrumentis sanitatis, quibus illa vel conseruatur, vel restituitur: cujusmodi organa sunt triplicia. Alimenta, Medicamenta, & Operationes manuales: vel *specialiis* adhuc, quandoquidem morborum curatio ut plurimum Medicamentorum ope perficitur, Medici materix medicæ nomine intelligunt syluam Medicamentorum, simplicium, compositorum, quam etiam hic tractandam suscepimus. Sed hæc obiter de nomine.

Est itaque *Materia Medica*, hoc loco ordinata series medicamentorum simplicium & compositorum, methodo mendendi, & formulis medicamentorum prescribendis, accommodata.

*Distributionem* quod attinet materix medicæ, eam prima fronte ita distinguimus, ut vel *universalis* sit, nullam certam partem respiciens, vel *particularis*, ad certam corporis partem, eiusdemque affectum spectans.

*Vniuersalis* in tres alias partes subdividitur. *Prima* respicit causam morbificam & biuis consistentem. *Secunda*, morborum summa genera. *Tertia*, Symptomata,

communissima , maximēquē vrgentia , qux Medicī operam quandoquē seorsim à causa & morbo exigunt.

Particularis constabit quatuor sectionibus. 1. De Remediis *capitis*. 2. De Remediis *thoracis*. 3. De Remediis *venarum* *inferiorū*. 4. De Remediis *artuum*.

---

# LIBER PRIMVS DE MATERIA MEDICA V N I V E R S A L I . P A R S L.

*De Remediis causam morbificam respicientibus.*

**E**c pars constat sectionibus quatuor. 1. Continet medicamenta respicientia causam morbificam qualitate peccantem. 2. Medicamenta respicientia causam morbificam peccantem *quantitate* , & *substantia*. 3. Continet medicamenta respicientia causam peccantem *mōta*. 4. Comple&titur medicamenta

causam morbificam quiete peccantem  
spectantia.

## S E C T. I.

*De Medicamentis respiciemibus causam mor-  
bificam peccantem qualitate.*

## Typus Sectionis.

Medica- menta causam quali- tate peccan- tem re- spicien- tia, fe- ferunt ad cau- sā pec- cantem qualita- te, vel	Ma- nife- stā, eaq; vel	Se- cū- dā, ni- mi- rū	Primā : Alterantia.
			Attenua- tia.
Craf- sitie	Incidentia	Tenuitate: Inca- fanta.	Incidentia.
			Duritie : Emol- lientia, quod spectat & gru- mos dissoluentia.
Lentore	Deter- gentia.	Acrimoniā : Epi- cerastica.	

Occultā. Alexipharmacā.

ALTERANTIA.

Quanquam alterantia, generatim lo-

quēndo, nūncupentur omnia illa, quæ non modò manifestis qualitatibus, iisq; tūm primis, tūm secundis in nos agunt, sed & tota substantiā seu occultis qualitatibus nos immutant, hoc tamen loco specialiter & ~~rat~~ ἐξέχει. Alterantis vox denotat medicamentū, excessum qualitatis primæ morbos & contratiā suā qualitate corrigens & emendans, siue in humoribus ac contentis, siue in partibus corporis. Genera alterantium tot sunt, quot intemperies, vt suum vnicuique intemperiei contrarium alterans opponatur. Contrariæ verò qualitatis in quolibet alterante gradus sunt quatuor, & totidem mansiones in singulis gradibus. Materiam alterantium nullam proponimus, tūm quia superuacanea: nam siue humores sint altetandi, siue partes, non utimur alterantibus ita generalibus & indeterminatis, sed respicientibus determinatum humorem, vel partem: tūm quia ad hanc methodum componendi medicamenta secundūm formulas externas non adeò necessaria est, vt potè in qua non habetur ratio gradūs, vel mansionis, quemadmodum in alterā methodo componendi, quæ considera-

354

tur secundum formam internam , ac docet modum componendi medicamentū certo gradu tale, V.G. calefaciens in secundo gradu , ex pluribus simplicibus calidis , frigidis , 1. 2. 3. gradu , ita proportionaliter in uicem mixtis , vt gradus inde qualitus adiquatè resulget.

## ATTENVANTIA.

A i n t u m n a' Græcis dicta sunt , quæ crassos ac compactos humores comminuant ac diuellunt , vt sub eadem quantitate maiorem locum occupent . Hæc in genere omnia tenuis substantiæ esse debent , ob quam facile penetrare possunt ac insinuate sese in humoris crassi substantiam . Speciatim verò attenuantium quedam sunt frigida , vt succus limonum , acetum , oxymel , sed partium valdè tenuium , quedam , & pleraque quidem , calida ; & sicca , à gradu 2. ad 3. qualia ferè sunt acria , aromata praesertim . Uſus horum tūm internus est , ad varias viscerum obſtructiones expediendas , ad expurgandam pituitam è thorace , menses mouendos , calcylum frangendum , &c. : tūm externus : ad

humorēs frigidos cuti impactos calore fundendos, liccitate verò & substantiæ tenuitate comminuendos, & extenuandos, ut posteà vel sponte, vel discussione, & attrahentium usu dissipentur.

*Materia* horum, vel interna est, ad usus internos, vel externa. Internæ materiæ tabulâ nullâ peculiari opus est, cum ex diuersis illa colligi possit ac debeat, pro scopo & intentione, diureticorum vid. sudorificorum, menses mouentium, & aliorum attenuandi vi præditorum, ut patebit ex singulorum descriptionibus. Materiæ verò externæ tabula pro usibus externis hæc est.

*Radices*: apij, aristolochiz, enulae campanæ, ireos.

*Folia*: anethi, abrottoni, absinthij, calaminthæ, centaurij minoris, chamæpitys, hyperici, hyssopi, lauti, majoranæ, menthæ, origani, pulegij, rosmarinii, rutæ, satuteiæ, thymi.

*Flores*: aneti, chamomillæ, hyperici.

*Semina*; anisi, apij, cuminii, fœniculi, rutæ, sinapi.

*Fruitus*; baccæ juniperi, lauri.

*Adipes* & *exang*; & vetustiores, maximè vulpina, vespina.

356

*Olea*; amygdalarum amaratūm; anethi, hyperici, irinum, lautinum, nucum, guttæ, Scorpionum, terebinthinae, vulpinum.

*Vnguentæ*; Agrippæ, & Aregon.

Ex quibus variæ externæ formulæ fieri possunt, fatus, embrochæ, vnguentæ, &c.

## INCIDENTIA.

*Tumores*, incidentia ab attenuantibus non reipsa & facultate, sed objecto tantum differunt, ac modo. Nam attenuantia conueniunt crassis humoribus; incidentia etiam lentis ac viscidis. Eadem autem facultate crassi ac viscidii humores inuicem abscedunt; nisi quod incidentia validiora sint attenuantibus. *Agrius* enim diuiditur viscidum ac glutinosum, quam crassum simpliciter. *Materia* proinde incidentium cadent, quæ attenuantium validiorum.

## EMOLlientia.

*Materie* Græcis dicta, sunt, quæ dura emolliunt. Sed cum durum tribus

modis fieri possit , siccitate , repletione  
ab humore flatuue , & concretione , siue  
ex propria partis intemperie , siue humo-  
ris influentis naturâ ; emolliens medi-  
camentum id propriè dicitur , non quod  
sicca humectat , nec copia distenta cu-  
cuat , sed quod concreta excalefacit ,  
soluit , atque colliquat . Talia in genere  
calida sunt omnia in actiuis , cum fiat  
concretio à frigore ; in passiuis moderata-  
tè sunt sicca aut temperata , quia siccitas  
maior est duritiei : proinde quæ inter  
emollientia vulgo resata aliter se habent ,  
( ut ammoniacum , galbanum , opopa-  
nax , quæ validè exiccant ; oleum amygdalarum dulcium , violar . &c. quæ ma-  
nifestè humectant , contraria temperan-  
da , vt fiant perfectè emollientia . In  
specie gradus caloris non est idem , sed  
humori concreto proportionaliter res-  
pondens . Nam si contumacior sit , vt in  
tumoribus scirrhosis , requiritur calor ad  
2. vel 3. gradum , vt vinci possit frigiditas  
humoris concreti : si mitior sit affec-  
tus , moderatus calor sufficit , vt saluari  
possit Galeni sententia §. simpl. c. 7. 8.  
emollientia temperata statuuntis , cius ni-  
mirum affectus ratione , cui adhibentur .

*V*sus emollientium potissimum est extēnus, in partium quarumuis scirrhosae constitutione, abdominalis, lienis, hepatis, &c. in clysteribus emollientibus. Materia sequens est.

*Radices*; altheæ, bryonix, cepa cocta, cucumeris agrestis, ireos, liliorum album, liquoritiae.

*Folia*: atriplicis, betæ, bis maluæ, botraginis, brançæ vrsinæ, buglossæ, maluæ, parietariae, sambuci, violarum.

*Semina*; lini, fœnigræci, maluæ.

*Flores*; chamomillæ, violarum, maluæ, meliloti, crocus.

*Fruitus*; amygdalæ dulces, caricae pinguis, vux pastæ, jujubæ.

*Liquores*; aceti acerimi vapor, ex lapidis pyritis, aut silicum candentium injectione exiccatus, & ita exceptus à parte, vt exhalare minimè possit; parte tamen priùs oleis, emplastris, & fomentis emollita aliquantum: decoctum intestinorum, capitis, & pedum veruccis.

*Resinæ*; pini, terebinthina.

*Gummi*; ammoniacum usitatissimum, bdellium, galbanum, opopanax, styrax.

*Axungia*; potcina, humana, vitulina,

gallinacea, caponum, anatum, ceruina,  
vaccina, fuilla recens, taxi.

*Sem:* hircinum, caprinum, taurinum.

*Excrements animalium:* butyrum, œsy-  
pus, cera pinguis, propolis, sterlus bu-  
bulum, mellis fauus, lanarum prima lo-  
tura.

*Olea:* coliuatum, lini, liliorum alborum,  
violarum, amygdalarum dulcium, lum-  
bricorum, anethi, petroleum, chamo-  
millæ, irinum.

*Vnguentia;* de althaea, resumptiuam.

*Emplastræ;* de mucilaginibus, diachyl-  
um simplex, & cum gumm. de meliloto.

*Nata.* Gummata vetusta discutere po-  
tiūs, quam emollire; nisi aliorum humi-  
dorum miscela emendentur.

Adipes & pinguedines magis emol-  
liunt, quam olea: & recentes magis; quā  
retuſta, (quæ ſunt attate calidiores,  
acres & ſalſæ,) juuenum, quam ſenum.

Adipes acriores & ſalſæ aqua ſepiūs  
abluendæ, vt exuant ſiccitatem.

Ex emollientibus validiora ſunt, radix  
bryoniae, cucumeris agrestis, iros, Item,  
teſinæ & gummata.

## GRVMOS DISSOLVENTIA.

Hæc usus quidem ratione referuntur ad emollientia, quia sanguini & laeti concreto soluendo conueniunt, quamvis ratione facultatis ad validè attenuatio[n]e & incidentia referenda sint. Talibus namque grumi sanguinis soluuntur, & laetis, ut ex sequenti tabula videre est.

*Radices*; aristolochiae rotundæ, vince toxicis.

*Folia*; apij hortensis & montani, rutæ hortensis, artemisiæ, absinthij, ab rotuni, saturciæ, thymi.

*Semina*; cumini aceto triti, raphani.

*Succi*; calaminthæ montanæ, acetum scilliticum: lixium juniperinum, sanguititum cum aceto, vel melle.

*Syrnpi*; oxymel simplex, scilliticum, hydromel.

*Animalium partes*, & excrementa; mollitia, coagulum leporis, hædi, cancrorum fluuiatilium vstorum cinis.

*Gummi ammoniacum aceto solutum.*

*Carbones tiliæ aceto restinæ.*

*Chymica salia ex diureticis, spiritus salis, terebinthinae.*

Quibus omnibus emollientia miscenda, althaea præsertim, malva, & butyrum.

## DETERGENTIA.

In genere dicuntur, quæ lentoſ & glutinoſ humores corpori adhaereſcen-  
tes, aut impactoſ contactu ſuo rapiunt,  
& tranſeundo ſecum deducunt. Na-  
turæ ſunt calide, vel etiam frigidæ in  
actiuiſ; ſed efficaciora ſunt calida: in  
paſſiuſ ſicca ſunt, cum aliqua partium  
cratiuſ, cuius ope aliquandiu moran-  
tur, & conſequenter vellicando, &  
abradendo lentoſ humores, donec ce-  
dant, poſteā faciliuſ eodem ſecum de-  
ducunt & expurgant. In ſpecie verò iux-  
ta Gal. 5. ſimpl. 12. duplia ſunt deter-  
gentia; *perforatio*, *extergentia*, & *expurgo*,  
*dubſeruentia*: illa poros cutis expurgant,  
tenuis cuiuſdam & nitroſa substantiæ;  
hęc verò internos meatuſ ab infarctu  
liberant, ac ut ſuo loco dicitur à præ-  
parantibus humores re ipsa non diſfe-  
nuot, vnde etiam petenda. Hic ergo me-  
niuam tantuſ proponemus *perforatio*,  
quoruſ rufi in ſordibus, quæ tūm cutiſ  
ſuperficieſ ac meatibus, tūm ulceribuſ

*Succrescerē solent, expurgandis.*

*Radices; apij, aristolochiae vtriusque, aronis, cyperi, cucumeris asinini, dantij, iridis, gentianæ, plantaginis, gilli Salomonis.*

*Folia; absinthij, apij, anagallidis matris & fœminæ, agrimoniarum, chamædrys, centaurij minoris, chelidoniæ, betæ, marrubij, plantaginis.*

*Semina; vrticæ, plantaginis, apij, atriplicis.*

*Fructus; seminis lini, fenestræci, cicerum, lupinorum, hordei, orobi, fabarum: quo etiam refer furfur.*

*Succi; saccharatum, aloc, vinum, fæces vini, lixiuum omne: huc etiam lac virginalre refer.*

*Animarium excrements; vrina, fel, serum lactis, mel.*

*Resine; terebinthina, thus, myrrha.*

*Mineralia; alumén, vitriolum, ærugines, chalcitis, tuthia, salnitrum, auripigmentum, æs vistum, spodium, chrysocolla naturalis, factitia.*

*Olea; amygdalarum amararum, terebinthinarum, tartari.*

*Vnguentia; Apostolorum, Ægyptiacum Sapo, maximè niger.*

## EPICERASTICA.

*E'mpapenkæ* sunt, quæ humoris acrimoniam, sensumque partis exasperatum retundunt, vel vi sua emplastica, vel temperata humiditate. De emplasticis suo loco. Epiceraistica simpliciter dicta sunt sequentia.

*Radices*; althæx, liquiritix, maluæ.

*Folia*; maluæ, nymphæx, semperuii, portulaçæ, lactucæ.

*Semina*; hordei decorticati, hyoscyami albi, lactucæ, lini, papaveris albi, oryza.

*Fruitus*; iuiubæ, passulæ, pomæ dulcia, pruna dulcia, sebesten, amygdalæ dulces, pinea.

*Succi & liquores*; lac amygdalarum, amyllum, aqua hordei, ius pingue, lac sonchi, tremor ptisanæ, succus foliorum solani, halycacabi.

*Animalium excrementa*; albumen ovi, butyrum, lac omne, serum lactis: partes animalium; vituli caput, & pedes, ut & agni caput, eorumque ius.

*Mucilagines*; seminis psyllij, cydoniæ, seminis & radicis althææ, seminiis

*lini, malux, radicis borraginis.*

*Ole.; olivatum, violarum, amygdalarum dulcium, feminis cucurbitæ expressum, hyoscyami albi, papaveris albi, oleum plumbi.*

*Vagenta; rosatum, album camphoratum.*

*Syrupi; violaceus, è pomis, de althea Fennel; liquiritia, iuiubis, papaveris portulaca.*

*Varia officinalia; pulpa cassiae, diacodium, diapenidium, saccharum candidum violatum, iulcus violaceus, mel violaceum.*

## ALEXIPHARMACA.

Horum quædam communia sunt, quæ venenis omnibus resistunt, quædam propria, peculiari cuidam veneno opposita. De communibus hoc loco, ad quæ ferè semper configimus, præsertim cùm nos latet species veneni: quorum, rarius diversati: veneni, non usus, alia inter quæ peculiarem habent usum in peste, febribus malignis, venenis assumptis alia externi, quæ medentur mortibus, aut ictibus venenatis.

## Internat.

Radic. angelicæ, anthoræ, bistortæ,  
cruciatæ, seu gétianæ minoris, dictamni  
albi, enulae campanæ, eryngij vtriusque,  
b.e. vulgaris & marini, gentianæ majoris,  
imperatoriae, leuisticæ, pimpinellæ saxi-  
fragæ, scorzonerae, tormentillæ, vineæ,  
toxici.

Cortices & ligna; lignum aloës, san-  
tala omnia, cortices citri.

Folia; absinthij, dictamni, quinque-  
folij, ( majoris repens, ) rutæ hottensis,  
& capratiae sine galogæ, scabiosæ, scot-  
dij, valerianæ majoris, ylmatiæ, vero-  
nicæ.

Semina; anisi, acetosæ, cardui-benedi-  
cti, citri, coriandri, grana juniperi, grana  
kermes, hyperici, leuisticæ, napi, ocymi,  
pimpinellæ saxifragæ, portulacæ.

Flores; borraginis, buglossæ, carye-  
phyllorum, crocus, ericæ flos & coma  
*Dioscorid.* calendulæ, centaurij minoris,  
hypericæ, nymphæ, rosmarini, rosa-  
tum rubrarum, violarum.

Fruitus; glans querna, nux juglans,  
poma citri, arantiorum.

*Aromata*; cinnamomum, caryophylli aromatici, macis, nux moscata, cardamomum, pipet omne, longum præsertim, zedoaria.

*Succi*; citri, arantiorum.

*Resine ac gummi*; myrrha, camphora, laserpitium, vel benzoinum.

*Animalium partes, excrements*; caro phianorum, castoreum, coagulum leporis, mumia, moschus, unicornii, eburi, os cordis cerui, cornu cerui recens, seu parvulum, lapis bezoar.

*Terra*; bolus verus, terra sigillata vera.

*Lapides pretiosi*; coralla, perlæ, rubinus, smaragdus, hyacinthus, sapphirus, topazius.

*Marina*; ambra, succinum.

*Confectiones*; theriaca, mithridatum, confect. hyacynthi, alkermes.

*Condita*; corticis citri, myrobalanum.

*Conserue*; florum buglossæ, violarum, rosarum rubrarum, nymphææ, rosmarii, calendulæ.

*Species*; aromatici rosati, de gemmis, diambræ, triasanti, dianthos, diamochi, diascordij, puluis rubeus Pannonicus, Saxonicus.

Ex quibus omnibus varia fieri possunt  
antidota magistralia, aquæ, extracta, conditi-  
ta, tabella, pulueres, &c.

## Externa.

Ad mortus venenatos usurpantur, in-  
trinsecus quidem, 1. *Alexipharmacæ* præ-  
dicta cardiacis commixta. 2. *Puluis vi-  
perarum*, qui paratur ex carne viperæ, (reli-  
quo corde & jecore,) vino albo lota, &  
lentè in furno exsiccata, ut puluerisari  
possit, additis, si velis, aliis alexiteris.  
*Dosis* 3 fl. circiter cum vino aromatico.  
3. Ad mortum canis rabidi, *Antidotus Galeni*, ex iburis parte j. gentianæ parti-  
bus v. cinerum cancerorum suuiasilium parti-  
x. *Dosis* 3 fl. 3 j. 3 ij. cum vino.

*Extrinsecus* vero, 1. *Alexipharmacæ* mix-  
ta cum attrahentibus ad cutem. 2. *Cæ-  
renati animalis* cuiuscunque, mortui vel  
ictui admota.

L I B R . I   P R I M I  
 P A R T I S   P R I M Æ  
 S E C T I O   I I .

*De Medicamentis respicientibus causam morbificam peccantem quantitate.*

Type Sectionis.

Medicamenta causâ mor- bificâ quan- titate pec- cantem spe- ctantia, vel sunt	Preparâtia Vacuantia vniuer- salia,	Humorès, Di- gestina dicta.
		Corpus, A- perientia.
		Purgatia pro- priè dicta, Vomitoria.
		Diuretica.
		Sudorifica.

# PRÆPARANTIA HVMORES, seu DIGESTIVA.

**D**I<sup>G</sup>E<sup>S</sup>TIV<sup>A</sup> seu præparantia humores sunt, quæ humorum viția in primis & secundis qualitatibus, quæcumque coctioni impedimento sunt, per contrarias emendant, hæcque ratione quasi præparant, partim ad fœliciorem coctionem à natura instituendam, partim ad commodiorem vacuationem arte moliendam. De qua præparatione intelligendus est aph. 2 2. f. 1.

Hæc triplicia sunt : alia enim bilem, alia pituitam, alia melancholiam præparant.

## - *Bilem præparantia.*

*Bilis flava* ratione primarum qualitatum, cùm sit calida & sicca, postulat refrigerantia & humectantia ; ratione vero secundatum, cùm alia sit tenuis, *bilis flava* dicta, alia crassa vel adustione, vel crassorum humorum permixtione, ut *vitellina*, *porracea*, *eruzinosa*, & *carnnea*, illa est incrassanda, hæc attenuanda. Bilem itaque alterantia sunt duplia, *Incrif-*

*santia, & Attenuantia.* De quibus nota;  
quod tametsi non omnia sint humida, frigiditate tamen qua pollent, calorem remittant, & exsiccationem ulteriorem prohibeant; siveque per accidens humectent.

*Incrifantia.*

*Radices; huglossæ, plantaginis.*

*Foliæ; portulacæ, plantaginis, lactucæ, folani hortensis, semperuii maiotis.*

*Semina; cydoniorum, lactucæ, maluxæ, papaveris albi, plantaginis, psyllij.*

*Flores; nymphæ, violarum, papaveris rheas, rosarum, maluxæ.*

*Fruitus; iuiuixæ, cydonia, granata, pyra, prunæ dulcia, sebesten.*

*Gummi; tragachantæ, arabicum.*

*Succi; foliorum & fructuum in hac tabula modò dictorum, amyllum.*

*Aqua; foliorum & florum prædictorum.*

*Syrupi; foliorum, florum & fructuum prædictorum, in officinis usitati, ut & feminis papaveris albi.*

*Conserue; florum nymphæ, violarum, rosarum, maluxæ.*

*Species; diatragacanthi frigidi, diacy-*

donites sine speciebus, diamargaritum  
frigidum, diapenidion.

*Attenuantia.*

*Radices*; asparagi, acetosæ, cichorij,  
graminis.

*Folia*; acetosæ, capillares omnes her-  
bæ, ( h. e. *adiantum*, *polytrichum*, *cete-*  
*rach*, *salvia vitæ* ) quatuor intybacca,  
h. e. *endivia*, *cichorium*, *cicerbita*, *scariola*  
seu *endivia*: dens leonis, *chondrilla*, he-  
patica, *trifolium acetosum*, *lingua cetui-*  
*na*, h. e. *phyllitis* *Dioscor.*

*Semina*; acetosæ, endiuix, hordeum,  
quatuor frigida maiora.

*Flores*; cichorij, endiuix.

*Fructus*; arantiorum, limonum, citri,  
melones, pepones, pruna acida, cerasa  
acida, ribes, berberorum.

*Gummi*; camphora.

*Succi depurati*; foliotum & fructuum;  
in hac tabula recensitorum, item om-  
phacium.

*Aqua*; herbarum etiam predictarum;  
quæcunque haberi possunt ad manus.

*Syrupi quoque foliorum*: & fructuum  
recensitorum, qui in officinis prostant.

*Conserue cichorij, acetosæ, citri,  
Species diatrum f antalon.*

*Pituitam præparantia.*

*Pituita* ratione primarum qualitatum, vel est frigida ac humida, vt *insipida*, *acida*, ac *vires*, & hæc corrigenda est calefacentibus, & exiocantibus: vel calida & sicca, vt *salsa pituita*, & hæc præparat ut bilis, admixtis tamen pituitam respicientibus. Ratione secundarum qualitatum omnis pituita crassa est, lenta ac glutinosa, hinc corrigenda attenuantibus, incidentibus, ac detergentibus.

*Radices*; quinque aperientes, ( h. e. *af-  
paragi*, *petroselini*, *fœniculi*, *apij*, *rufci*, ) *acori*, *angelicæ*, *arystolochiæ*, *cypeti*, *calami aromatici*, *enulæ campanæ*, *chi-  
nx*, *galangæ*, *iteos Florentinæ*, *impe-  
ratrix*, *liquiritiæ*, *pœoniæ*, *salsæ parilla*, *walerianæ*, *zedoariæ*.

*Folia*, *absinthij*, *agrimoniæ*, (tempeta-  
ta,) *betonicae*, *calaminthæ*, *chamædrys*, *chamæpitys*, *fœniculi*, *hyssopi*, *hypetici*, *lauri*, *maioranae*, *marrubij albi*, *menthæ*, *melissæ*, *origani*, *pulegij*, *rosmarini*, *rutæ*, *saluix*, *satureiæ*, *serpilli*, *thymi*.

*Semina*; quatuor calida maiora & minora, cardui benedicti, coriandri, citri, leuisticii, pœoniarum, sileris montani, vrticæ, sinapi.

*Fruitus*; baccæ lauti, juniperi, nux Indica, ficus.

*Flores*; anthos, calendulae, centaurij minoris, hypericonis, lauendulae, lilij conuallij, saluix, stœchados.

*Cortices & ligna*; guaiacum, salsaphras, cortex citri, arantiorum.

*Aromata*; omnia.

*Resine*; myrrha, nraftix, storax, thus.

*Animal*; mel, moschus, castoreum.

*Marina*; ambra, succinum.

*Aqua*; foliorum recensitorū quæcunq; extant in officinis: aqua vitæ, cœlestis, imperialis, theriacalis.

*Syrupi*; de absinthio, byzantinus, capillorum Veneris; syrups condituræ acori, conseruationis corticum citri, & zingiberis, hyssopi, menthæ, mel rosa- tum, oxymel simplex, & scilliticum, sy- turpus de prassio, de duobus & quinque radicibus, de stœchade.

*Condimenta*; radicis acori, enulæ campanæ, zingiberis, myrobalanorum em- blicarum, chebularum, nucis moscatæ,

nucis juglandis, coticum citri, arantio-  
rum, oliuꝝ conditꝝ.

*Conserue*; florum anthos, stœchados,  
faluiꝝ, absinthij.

*Pulueres*; aromaticum roſatum, caryo-  
phyllum, dianthos, diambra, diamof-  
chum dulce, diarrhodon Abbatis.

*Confectiones*; aurea Alexandrina, the-  
niaca, Mithridatium.

*Trochisci*; de absynthio, gallia, & aly-  
pta moschata, cupatorio.

*Olea destillata*; anisi, cinamomi, cumi-  
ni, garyophyllum, coticum arantio-  
rum, ſceniculi, nucis moschataꝝ, roſmati-  
ni, maioranꝝ, succini..

### Melancholiæ præparantia.

*Melancholia* duplex est, aduſta ſiō  
attrabilaria, quæ cum ſit valdè calida,  
ſicca & crassa, poſtulat frigida, valdè  
humectantia, & attenuantia. Recurren-  
dum itaque hic ad tabulam bilem craſ-  
ſam attenuantium, in primis verò hic  
commendatur ſuccus pomoram redolentissi-  
mum, ex quo etiam poterit parari ſyrupus. Vel  
non aduſta, ſuccus melancholicus dictus, qui  
fua natura frigidus, ſiccus, & crassus,

ideoque moderatè ealefacientibus, humectantibus, & attenuantibus præparandus. Materia horum sequens est, ubi nota, quod si quedam sicciora occurrant, ea humidioribus esse temperanda.

*Radices*; aronis præparata, buglossæ, enulæ campanæ, filicis, polypodiij quercenti, satyrlionis, quinque aperientes, liquoritiae, quæ semper præscribenda ad sicciorum naturam temperandam.

*Cortices*; citri, radicum capparum, mediani fraxini, tamarisci, sambuci.

*Folia*; borraginis, buglossæ, beccabungæ, cuscute, centaurij minotis, ceterach, cochleariaæ, capillorum Veneris, fumariæ, lupulorum, melissæ, nasturtij, scolopendriæ, thymi.

*Semina*; quatuor calida maiora, apij, agni casti, basiliconis, cardui benedicti, citri, cuscute, nasturtij, petroselini.

*Flores*; quatuor cordiales, ( h. e. borraginis, buglossæ, rofarum, violarum, ) & nymphææ, ad temperanda sicciora, calendulae, genistæ, leucoji, tamarisci, sambuci, crocus.

*Fruitus*; cappares, passulæ maiores & minores.

*Gummi*; ammoniacum, lacca.

*Animal.* blatta, os de cordē cērui, mēl,  
sericum.

*Aqua*; foliorum ac florum prædicto-  
rum vſitata in officinis.

*Syrupi*; de fumaria, buglossa, cortice  
cītri, de ſ. radicibus, capillorum Veneris,  
byzantinus.

*Confēt.* alkermēs, theriaca.

*Conferue*; florū buglossæ, botraginis,  
enulæ campanæ, capillorum Veneris.

*Condituræ*; corticis cītri, mirobalano-  
rum, zingiberis.

*Species*; diambrae, diamoschi dulcis,  
de gemmis, lætificantis Galeni.

*Trockisei*; de absinthio, capparibus, gal-  
lia moscata, dialacca, eupatorio.

*Olea destillata*; aniſi, fœniculi.

*Salia*; absynthij, fraxini, tamarisci.

## PRÆPARANTIA CORPVS.

*Corpus præparans* ſive aperientia ſunt,  
quæ remouent impedimenta facilis pur-  
gationis, humorum videlicet crallitiem,  
& meatuum obſtructionem: de quibus  
intelligendus aphorif. 9. f. 2. qualia ſunt  
attenuantia, incidentia, & detergentia.  
*In genere* vocantur *āiſquuntia* (quæ vox

ad omnes internos ductus expedien-  
dos accommodari potest ) aperien-  
tia , item ἐκφράσις de obstruentia , ab-  
vsi sic dicta , quia meatus aperiunt , & in-  
farctu liberant vias , per quas humores  
debent fluere : neque differunt à præpa-  
tantibus humores re-ipsa ; sed tantum-  
modo subiecto : Solet enim quandoque  
accidere , vt humores etiam non crudi ,  
vel præparati iam minis tamen fœliciter  
evacuentur , eò quod crassi lenti humo-  
res adiungit , vias intercludentes , per quas  
ducendus est humor peccans ; vnde hu-  
ius præparationis necessitas elucescit ;  
quam etiam in morbis acutis & turgen-  
te materia requirit Gal. I. aph. com. 14.  
præsente nimisrum viscidarum crudita-  
tum copia . In specie aperientia duplia  
sunt , calida , humoribus pituitosis & me-  
lancholiæ naturali , vel frigida , bili cras-  
sa & melancholiæ adustæ consecrata .  
Calida quidem repetenda sunt ex tabu-  
la præparantium pituitam & melanco-  
liam naturalem : frigida vero ex tabula  
præparantium bilem crassam & melan-  
choliam adustum . Inde ergo petenda .

## PURGANTIA PROPRIE

dicta.

*Uitata*

Purgantia medicamenta vel *impropriæ* sic dicuntur, vel *propriæ*. *Illa* *laxativa*, *lenientia*, *bac* speciatim *Cathartica* vocantur. *Lenientia* in quadruplici sunt differentia. *Alia* enim aluum turbant *lubricando*, quecumque *purgantia* sua pingui & humectante intestinorum superficiem intermixta alijs sicciorum vel asperam ita laxuant, ut fæces nequeant adhærere, qualia sunt oleum *amygdalarum dulcium*, *butyrum*, *iusculæ pinguiæ carnium*. *Aliæ* dicuntur *abluentia* & *abstergentia*, quæ copiosa humiditate fæces diluunt, & ablunt intestinorum superficiem. *Talia* sunt, *aqua fæla*, *serum lattis*, *lac*, *bœta*, *parietaria*, *brasifica*, *spinacia*, & horum iuscula. *Alia* *comprimentia*, quæ vasa & intestina comprimendo, humores contentos exprimunt; hac ratione *cydonia* ultima mensa sumpta aluum laxant: sic plurimos vina cruda & acerba admodum purgant, non certè alia, quam vi adstringendi. *Alia* denique *erodentia*, quæ mordendo virtutem expultricem extimulant,

Eius gēnēris omnia calida & actīa, prī-  
terea tenuium partium sunt, item salsa  
nonnulla. Sic auriga quidam non pau-  
cos febre diurna laborantes, haustu-  
rini exhibito, in quo manipulum salis  
priūs dissolauisset, liberauit: nam per vo-  
mitum & dejectionem purgati sunt ma-  
gna violentia, qui hauserunt. Hoc ferē  
modo cibi multum saliti, aut aromatiza-  
ti aluum purgant stimulando; eodem  
planē modo hunc spontanē vacuatio-  
nes. Hoc pacto etiam pharmaca vmbili-  
co imposita purgant: quale est vnguen-  
tum de arthanita. Et hæc omnia sunt  
impropriè purgantia, quæ quemlibet hu-  
morem obuium absque ullo delectu-eua-  
tuant. Propriè autem dicta purgantia,  
non quemuis humorē, sed certum ele-  
ctioē purgant. De quibus nunc agemus.

Purgantium propriè dictorum classes  
sunt quatuor: *Cholagogia*, *Phlegmagoga*, *Mela-*  
*nagogia*, *Hydragoga*. *Cholagogia* sunt; *cassia*, *man-*  
*na*, *tamarindi*, *succus rosarum*, *aloë*, *rhabarba-*  
*rum*, *myrobalani*, *scammonia*. *Phlegmagoga*  
sunt; *carthamus*, *agaricus*, *turbita*, *bermoda-*  
*styli mechanica*, *radix Lalap*, *colocynthis*, *opopa-*  
*nax sagapenum*, *euphorbium*. *Melanagogia* sunt  
sequentia; *seneca polypodium*, *quercinum*, *epiz-*

ibyllum, bellaborus niger, lapis armennus; lapis  
lapis Lazuli. Hydragoga denique sunt; ebdic  
sambuci semen, cortex, succus: soldanella, iure  
succus elaterium, esula preparata, mechoacis,  
& radix Ias. sp. Quibus annumerantur  
plurima alia obsoleta, quæ ab usu recesse-  
re, referenda potius ad impropriè dicti  
purgantia, vel preparautia humores:  
composita item, syrapi, electuaria, pilulæ  
purgantes, &c. quorum mentio facta in  
tractatu de formulis prescribendis. In  
singulis autem praedictis purgantibus ses  
capita considerabimus. 1. *Genus.* 2. *Ele-  
ctionem* siue *notas* veri & non adulterati  
purgantis. 3. *Qualitates* tum primas, tem-  
peramentum scilicet; tum secundas ac  
tertias, sub quibus etiam comprehendim-  
us partes, quibus prosunt, & affectus;  
quibus resistunt; sexum item & aetatem;  
quibus conducunt. 4. *Corrigentia.* 5. *Dis-  
infimam*, *medium*, *summam.* 6. *Formam*,  
qua commodissime exhibentur; licet pos-  
stremum hoc methodum componendi  
magis sapiat.

PVRGANTIVM I. CLASSIS,  
in qua tractantur,

CHOLAGOGA.

CASSIA.

Genus.

*Cassia* ( hoc loco ) est fructus arbotis cuiusdam Indicæ, Pyri magnitudine, foliis mali persicæ, floribus genistæ similibus; luteis, garyophyllum redolentibus. Fru<sup>ctu</sup>s hic est siliqua oblonga, rotunda, nigrescens, exterius lignosa, interius repleta medulla multa & nigra, seminibus quoque multis, rotundis & planis, membranis ligncis & transuersis à se inuicem diuisis. Et appellatur *Cassia Arabum* ab inuentoribus, Actuatio *cassia nigra*, aliis *cassia fistula* aut *siliquosa*, item *cassia solida*, ad differentiam *cassia Gracorum* & *cassia Poëtarum*. Nam *cassia Gracorum* nihil aliud est, quam *cinnamomum officinarum*, vulgo *canella* dictum, & differentia gratia *cassia lignea*, siue *cassia edorata* appellatur, *Cassia Poëtarum* est herba

coronaria, quam Theophrastus *Cneorum* appellat, cuius figuram proponit Matthiolus. Nostræ cassia pulpa tantum est in usu, quam florem *cassiae* & *cassias* extractam vocant: licet Fallopius & Marsinus canne quoque, & seminibus optimè contritis vim purgatoriam, eamque majorem, quam ipsi pulpæ adscribant: quam sententiam non probant. Ant. Massa & Garcias ab Horto.

### *Effectus.*

Eligenda est fistula insignis, tenuis ponderosa & plena, quæ sc. concussa non resonat, splendens, foris ac intus in pulpa pinguis. Nec antè usum extrahi debet, cum diutius reposita pulpa penitus acescat.

### *Qualitates.*

Quoad primas qualitates non multum est intemperata cassia. Nam Aujenius lib. 2. cap. 197. scribit. eam in actiuis temperatam, in passiuis nonnihil humectare. Serapio l. simpl. cap. 12. eam constituit temperatam. Melc. 6. simpl. nonnihil

ad calorēm accedere scribit. Ant. Mu-  
sa in exam. simpl. calidam humidamque  
ordine primo aut secundi initio. Quoad  
secundas qualitates , lenit admodum;  
emollit. laxat: purgat bilem, pituitam, &  
sanguinem purum reddit. Quoad par-  
tes, & affectus, dicata est pectori ac pulmo-  
nibus, hepati, renibus ac vesicæ. Hinc  
utiliter v̄surpatur in pleuriticis, febribus  
ardentibus, jecoris intemperie calida, re-  
num ac vesicæ ardore, calculo item : in  
gonorrhœa ex materia acri & semine  
bilioſo. Quod ad ætatem & sexum, omni-  
ætati tuta, & grauidis est utilis.

## Coriellia.

Præter utilitates recensitas hoc habet  
incommodi cassia , quod flatulenta sit,  
aut nimis lubricet, aut tarda sit opera-  
tionis. Hinc nocet flatulentis, ventri-  
culo debili & humidiori, alioque nimis  
lubricæ minus commoda , ulceribus  
etiam vesicæ ac renum infensa: eos item,  
qui alio sunt difficili , non multum iu-  
uat, nisi vitia ipsius corrigantur. Corri-  
gitur autem , quatenus flatulenta, sezin-  
anis. fænicul. curri ad 3 ℥. vel 3 j. quatenus

334

nimis lubricat, puluer. cortic. myrobal. rhubarb.  
cinam. mastices, maximè vero semin. coriander.  
præparati : quatenus cardæ est operatio  
nis, acuitur opiatis vel tabulis purganti;  
bus ad 3 ij. vel 3 fl.

*Dosis.*

Datur plerunque pueris ad 3 iiij. 3 fl.  
'Adultis 3 j. 3 j fl. 3 ij. Prægnantibus aut  
etiam imbecillibus 3 j. Si cassia cum  
canna assumitur, dosis eadem. Commu-  
nis cassiae & frequentissima dosis est ab  
3 fl. ad 3 j fl.

*Modus exhibendi.*

Accipitur cassia forma boli vel potionis.  
Boli forma si assumatur, huius basis est  
cassia ad 3 j. vel 3 j fl. pro necessitate:  
additis corrigentibus, aut partem affe-  
ctam respicientibus ad 3 fl. 3 j. vel  
acuentibus ad 3 ij. 3 iiij. plus minus, &  
cum s. q. sacchari fiat bolus. V. G. In affe-  
ctibus pectoris. R. Cassiae recenter extractæ  
3 j. plus minus. flor. sulph. vel alterius pe-  
ctoral. puluer. 3 j. vel 3 fl. semi. amis. aut al-  
terius corrigentis 3 ij. cum sacchar. fiat  
bolus.

bolus. In febribus ardentibus, R. *cassiae*  
 3 j. V. G. *sem. citr.* puluerisat. 3 j. cum sac-  
 charo fiat bolus. In renum ac vesicæ af-  
 fectibus præscribitur *cassia* ad 3 vj. cui  
 adduntur terebinth. lotæ aq. parietar. 3 ij.  
 cum puluer. liquirit. & sacchar. f. q. fiat bo-  
 lus. In gonorrhœa. R. *cassiae* q. l. pro in-  
 dicatione, & miscentur cum ea, quæ se-  
 men suppriumunt, ut *corall.* *mastic.* *bolus*  
*oriental.* *trochisc.* *de carab.* ad 3 ℥. 3 ij. &  
 cum saccharo fiat bolus, optimum medi-  
 camentum. Si accuenda est vis cassiae,  
 R. *cassiae* 3 vj. 3 ℥. opiat. vel tabell. purg.  
 V. G. *di. sprun.* *Lixat.* vel *eleettuar.* *de succ. ro-*  
*sar.* 3 ij. 3 iii. *sem. coriandr.* *præpar.* 3 ij. cum  
 sacchar. fiat bolus. In iis, qui lubrica sunt  
 alio, adduntur alia purgantia robotandi  
 & adstringendi vi prædicta. V. G. Ad *cass-*  
*iae* 3 j. sume puluet. *rhisb.* vel *certic.* *myrob-*  
*lum.* 3 j. cum aliquius ex corrigit. 3 ℥.  
 & fiat cum saccharo bolus. Quod si fer-  
 me *portionis* assumatur, sumendus erit ali-  
 quis liquor, in quo postea dissoluenda est  
 cassia. Liquor antem vel est aq. destill.  
 V. G. *acetos.* *end.* *cichor.* vel decoctum ex  
 plantis idoneis. Sume V. G. *cassiae* 3 j. ℥.  
 quam dissolute in f. q. liquoris, fiat potio.  
 Hodiè Lutetia cassiam exhibent ex in-

fusionē, qui modus est omnium optimūs: quia cassia in forma boli ingrata est ob nimiam quantitatem, dissoluta verò cum liquore idoneo, potionē nimis reddit spissas. Proinde satius est, si cassia infundatur in aliquo liquore in loco calido, & in infusi colati s. q. dissoluatur, si opus, aliud quoddam catharticum, & ita exhibeatur. V. G. in febribus ardentibus, R. aq. acetos. q. v. in qua infunde cassia recent. exir. 3 j. fl. vel minus. In colatura s. q. dissolu. elect. de succo rosar. 3 ij. plūs minus, fiat potio.

## M A N N A.

## Genus.

*Mannæ* vox ambigua est. Vel enim de manna thuris intelligitur, quæ nihil est aliud, quam micæ thuris concusso clisso dum conuehitur, vel manna voce intelligitur ros condensatus. Hoc loco posteriorem mannam intelligimus. Huius variz quidem sunt differentiae à prouisiis petitæ, ea tamen in officinis usitatæ est, quæ communiter *Calabrica* nominantur: quia in Calabria circa canis ortum

Ex Fraxino & Orno, ab incolis in usum medicum colligitur. Quæ duplex, granata, quod minoribus granis constet, & mastica, quæ majoribus, & mastices guttis propè æqualibus. Illa manna foliorum appellatur, quod ex foliis colligatur: hæc corporis, quia ex ramis arboris habetur. Est autem hæc manna cœlestis omnino, h. e. cœlius delapsa foliis insidet, non autem gummi instar ex arbore exudat & concrevit, ut voluit Altimarus & Monachi, qui in Mesuem scripsere: quia non solum in arborum foliis spectatur, sed etiam in pratis, adeo ut sœniscet ob mannam à Sole solutam, falces ab herbis nequeant explicare. Quod verò ex Fraxino tantum & Orno colligatur, in causa est occulta potestas Fraxini ad mannam, quæ sola mannam in se cohabet ac condensat, cum ex reliquis arboribus eadem instar mellis statim defluat in subjectas herbas.

## Eleffio.

Eligenda candida, recens, anno non vetustior: (rufa enim & fusca inueterata est,) rotunda, cujus grana disrupta,

R ij

non sunt spongiosa, nec cinericia, sed so-  
lida & alba.

### *Qualitates.*

Auicenn. & Mes. temperata. Auerrhoi  
calida & humida. Aperit, emollit, laxi-  
gat. Aluum blandè mouet : bilem edu-  
cit, & serofos humores purgat. Asperz-  
arteria & thoraci dicata. Hinc utiliter  
surpatur in febribus hecticis, siti extin-  
guenda. In febribus ardentibus mihius,  
prodest, ob dulcedinem, quam propter  
facile in bilem mutatur. Vtero gerenti-  
bus & pueris tutò exhibetur.

### *Corrigentia.*

Corrigitur, quia flatulenta, *cinnamomum*-  
*anis.* vel *zingib.* momento : quia tarda  
operationis, acuitur *syr.* *resar.* *solut.* vel de-  
cocto purgante leuiter : quidam addunt  
*diagrid.* *gran.* *ij.* *iiij.* *iv.*

### *Dosis.*

Ab  $\frac{2}{3}$  j. ad  $\frac{2}{3}$  ii.  $\frac{2}{3}$  iii. communiter  $\frac{2}{3}$  j. b.  
Pueris  $\frac{2}{3}$  j. Mes. à 3 vi. ad 3 xv. sed

fortè intellexit mannam optimam masti-  
tinam.

### Formula.

Exhibetur formâ potionis diffoluta autem  
in iure pulli gallinacei, in quo vix percipi-  
tur: aut in sero lactis, aut in decocto  
aliquo, aut in aqua conuenienti. In co-  
licis cum oleo amygdalat. cui aliquid  
addendum vini maluatici. Aliquando  
mandenda præcipitur.

### T A M A R I N D L

#### Genus.

*Tamarindus* est fructus arboris cuius-  
dam Indicæ, quem Arabes ad genera  
palmularum siue dactylorum referunt,  
ac si esset palmæ sylvestris Indicæ fru-  
ctus, q. d. dactylus Indus siue palinula  
Indica: *tamar* enim eorum lingua *dæ-  
tylem* siue *palmulan* denotat. Verum  
hunc fructum non proptie vocarunt da-  
ctylos, quasi cius arbor è palmatum esset  
generibus, aut similis palmæ, sed respi-  
cientes ad similitudinem fructus, qui

etiam officula in se continet, sicut da-  
styli, cum aliud nomen aptius non inue-  
nerint. Caterum huius fructus pulp-  
tantiū est in usu abjectis nucleis.

*Elettio.*

Optimi sunt tamarindi, qui sunt pin-  
gues, ex obscuro rubentes, acidi & mol-  
les: vndē Oxyphænica dicuntur.

*Qualitates.*

Frigidi sunt & secchi ordine secundo  
Mesux: & quidem intenso Brasauolz:  
Auerthoi autem tertio. Leniunt humo-  
res praefatos, ac demulcent bilem. Al-  
uum cident, & bilem soluunt. Proinde  
utiliter usurpantur in vomitu, siti extin-  
guenda, insania, obstructis, hydropicis,  
arquatis, & lienosis. Faciunt etiam ad  
omnes cutaneas exulcerationes à sangu-  
ine praefatto, scabiem videlicet, leptas,  
vitiligines & lichenas.

*Correſtio.*

Nocent frigiditate sua ventriculo fri-

gido, & tardæ sunt operationis. Proinde corriguntur mici, mastice, cinamom. vel spica. Acumuntur sero caprino, succo fumar, vel lupulor, manna vel cassia.

## Dosis.

Ab  $\frac{3}{4}$  j. ad  $\frac{3}{4}$  ij.  $\frac{3}{4}$  iiij. quæ variat ratione modi exhibendi.

## Modus exhibendi.

Exhibentur formâ boli vel potionis. Formâ boli si exhibendi, tunc eorum substantia pistillo subacta, per setaceum cibrum eliquatur, & postea additis corrigentibus, (dosi in cassia dicta,) cum saccharo fiat bolus. At plerunque non soli tamarindi exhibentur, sed ad pulpe tamarindor.  $\frac{3}{4}$  B. additur cassia  $\frac{3}{4}$  j. & additis corrigentibus, ut dictum, cum cassia fiat bolus. Potionis forma usurpantur in infuso vel decocto. Infusio fit ita. Macerantur in aqua endiuim ad horas tres, postea expressione facta, cum saccharo exhibetur colatura. Decoctum ita fit. R. Tamarindor,  $\frac{3}{4}$  j. coq. in seri laet. vel iutis alterati lupulo vel fumaria  $\frac{3}{4}$  x. ad consummationem R. iiij

392

ptionem 3 ij. Colentur per linteum densum. Capi de colatura 3 ij. 3 v. 3 vj. cum saebaro fiat pottis. Dofit decocti & infus eadēm est, ab 3 ij. ad 3 v. 3 vj.

S V C C V S R O S A R V M.

Rox, in offici nis vſitatæ.	{ <i>Vulgares.</i>	
	Alba	{ <i>Moscata.</i>
	Punicæ, siue rubræ.	
	Pallidæ, siue incarnatæ.	

*Genus.*

Est succus elicitus ex roſis pallidis ſuē incarnatis, vel etiam albis, non vulgari bus tamen illis, quibus paſſim roſetæ florent, verū in Damascenis ſiue moscatis.

*Elefio.*

Melior est succus ex roſis moscatis, ſiue Damascenis vocatis, quam pallidis: præterea succus roſarum completarum quoque melior est.

*Qualitates.*

Hic succus calidus est & siccus primo gradu ; et si rosæ frigidæ sint primo & siccæ secundo. Ratio secundum Mes. quia est à substantia terrestri & frigida secreta. Discutit, abstergit, deobstruit : purgat bilem, & aquas citterinas maximè : menses mouet. Quare grauidis non propinatur. Hepati ac cordi confert : hinc obstructioni hepatis, & palpitationi cordis opem fert, febribus item biliosis : ( purgat enim humores causantes hos affectus. ) Viscera purgando simul corroborat : & nulla in eo malignitas.

*Dosis, ac Modus.*

Ab 3 j. ad 3 ij. cum aqua saccharata, aut secundum Mes. cum sero lactis aut melle, exhibendo 3 j. succi ros. cum seri laet. 3 ij. 3 iiij. Apud nos verd paratur infusio rosat, pallidar. ex hac verd syr. ros. solut. simplex ( Mucharum ) & compositus, item mel rosat. solut., ex succo verd paratur elect. de succo rosatum ; sed rubrarium.

## R H A B A R B A R V M.

## Genus.

Per antonomasiam sic vocatur radix quedam insignis populi Barbari, seu Indici, vel prouinciæ cuiusdam Barbaræ, Troglodyticæ dictæ, sed male. Nam ut autor est Garc. ab Horto lib. I. c. 37. & Linscot. par. 4. Ind. orient. cap. 29. nullum est rhabarbaricum aut Indicum, sed solummodò Chinense; quia nullibi, nisi in China, prouenit: vnde per Tartariam Ormuz defertur; & hinc in Indiam, ac iterum per Tartariam in Turciam, hinc Venetias: vnde reliqua regna Europæ petunt. Radix hæc Dioscoridi & Galeno ignota fuit, vndè male quidam rhabaponticum Dioscoridis & Galen. cum nostro rhabatbaro confundunt. Nam rheum Diosc. non habet vim purgatticem, & nois veri Rhab. caret. Rhabaruni enim substantiæ compactum est, ponderosum & aridum, sapore amarum, odore acre: colore exteriori subnigro ac rufescente, intus ex rufo flauescente, & ad nucis moscatæ colorim internum

accidentē, ac maccratum vel manduca-  
tum tingens croceo colore. Rhabonti-  
cum non est compactum, sed rarum; non  
ponderosum, sed leue; non aridum, sed  
lentum; non amarum, sed subacre; non  
odoratum, nec colore simile rhabarba-  
ro. Neque etiam pseudo rhabarbarum  
illum monachorum, seu hippolapathum  
Dioscoridis cum hoc nostro debet con-  
fundi. Nam huic genuini Rhabarbari vi-  
res non sunt.

*Elección.*

Eligendum est rhabarbarūm, quod ad  
notas praedictas quam proximè accedit.

*Qualitates.*

Calidum & siccum est ordine secūn-  
do Mesuæ. Quod tamen simpliciter &  
citra distinctionem intelligi nequit. Nam  
ex eodem Mesue Rhabarb. duplii con-  
stat substantiâ, crassiore vñâ & adstrin-  
gente, quæ aquæ est & terrea: alterâ  
tenuiore, quæ aërea est, & ignea. Ob du-  
plicem hanc substantiam mistam habet  
temperaturam, & consequenter etiam

mistas facultates. Ratione enim tenuioris substantiae facultatem habet purgandi bilem & pituitam, ac deobstruendi, ratione crassioris substantiae purgando simul adstringit. Si pars specie<sup>s</sup>, hepatici maxime dicatum est remedium, quod maxime confortat, vnde à nonnullis anima hepatis, & theriaca hepatis vocatur. Quoad affectus, confert omnibus affectibus ab obstructione natis, E. G. Ictero, hydropi, tumori splenis, febribus putridis diuturnis, dolori hypochondriorum punctorio, ratione sc. tenuioris substantiae. At ratione crassioris & adstringentis summe insuper confert vomitioni, licenteria, dysenteria, sputo, cruento, sanguini undecumque erumpenti, ruptis & contusis. Nocet tamen iis, qui patiuntur ardorem urinæ, quem auget, quia diureticum est ac vesicam petit. Omni etiam tempore tutò datur, ac ex motbo convalescentibus.

Corre<sup>tio</sup>.

Corrigitur ipsius tarditas cinam. schænck. ad 3 f. 3 j. spica ad gr. iii. iv. pro 3 j. shabar. ab hac tamen abstinendum

in grauidis, febribus, & iis, qui facile vomunt. Quidam corrugunt *mæstice*, sed præstat Rhab. primum irrorare aquavitæ, & postea infundere liquoribus convenientibus.

### Dosis.

In substantia exhibet Mef. à 3 j. ad 3 iv. in infuso à 3 j. ad 3 iii. Hodie in substantia nullus exhibet ultra 3 j. vel 3 iv. in infuso raro adscendimus ad 3 ii. nunquam ad 3 iii.

### Modus exhibendi.

Datur vel in *substantia*, vel in *infuso* aut decocto. In *substantia*, vbi adstringendissimul consilium est, & vbi maiore adstringione opus, thabarbarum insuper torrefieri debet. In *infuso* aut *decocto*, vbi magis animus est purgandi. Nam mactando vis purgatrix tenuior in humorem transfertur, adstringens verò & terrea remanet. *Substantia* ipsius variis modis exhibetur. 1. *Formæ pilularum*: sic plures sunt massæ pilularum officinalium recipientes rhab. vt *pilul. aggreg. pil. de tribus*,

& pil. sine quib. pilul. de rhab. Mesua. 2. Forma potionis, soluendo puluerem rhab. in liquore idoneo, putà jusculo, sero lactis caprii, aq. destill. conuenienti, ut plantag. apij, iurybi, vino albo, additis corridentibus, interdum etiam syrupo ros. solut. R. V. G. liquor. 3 ij. plus minus, rhab. 3 j. 3 iv. corrident. 3 fl. 3 j. syr. ros. solut. 3 j. Fiat pòtio. 3. Forma boli: miscendo puluerem ipsius cum cassia, passifl. caric. saccharo rossoeo: vel cum succo ros. aut syrup. ros. solut. cum paucō cinamom. & sacchar. in consistentiam boli, quem solibus æstiuis parùm fermentari permittimus. 4. Forma rotularum, pro pueris. R. Rhab. 3 j. cum sacchar. solut. aq. conuen. s. q. fiant rotulæ, quas pueri facile comedent. 5. Forma placentularum, etiam pro pueris, rhabarbaro melle subacto & cocto ad consistentiam placentæ. 6. Informa cydoniati miscendo rhab. cum diacydonio intercoquendum. Vel sume malum cydonium, & diuidatur, ac sublatis loculis & cellulis seminum imple cauitates puluere rhab. vel sena, aut carbam, aut agrici: deinde vniuantur partes, & papyro inuoluuntur, coquantur in clibanō, vel foco ad tabem: hinc soluatur, &

abjectis mèdicamentis pulpa manducetur. *Infusum rhabarb.* etiam variè exhibetur. 1. Communiter *rhab.* cum corrigent. maceratur in liquor. idonei s. q. vel 3 ij. 3 iiij. &c. & postea exprimitur : expressum sumitur , vel in eo insuper dissoluitur *syr. ros. solut.* 3 j. aut *electuar.* de *succo rosar.* 3 j. 3 j fl. &c. fiat potio. 2. *Forma placentalium* pro pueris , sumendo infusionem ipsius, addendo farinam, vel puluerem panis , quibus simul mixtis fiat pasta, ex qua formantur placentulæ. 3. *Vel* hac ratione pro delicatulis. *R. Rhab.* pulueris st. q. v. infunde in ~~aq.~~ *vite* ad extantiam iv. digitorum, in B.M. per quartiduum , coloratum vinum effunde , & nouum infunde, idque toties, dum color nullus reddatur. Infusionem hanc destilla, & ad restibilis succi in fundo 3 j. adde *ol. cinnamon.* 3 ij. Pro infantibus ac prægnantibus pretiosum ac innoxium. *Dosis* 3 j. cum vini albi cochleari. *Decoctione Rhabarb.* paratur coquendo ex tempore Rhabarb. cum corrigentibus in liquoris idonei s. q. postea exprimendo: expressum deinde sumitur , vel in eo insuper dissoluitur *syr. rosar.* vel *electuar.* de *succo ros.* vt suprà.

## ALOE.

## Genus.

Aloë est succus concretus plantæ cibuliformis, quam describit Dioscorides lib. 3. cap. 21. quæ foliorum effigie sedum majus refert, & ob viuacem eius naturam semperuum marinum à quibusdam vocatur. Eius duo sunt genera : aloë caballina, sic dicta, quod veterinarij implantantur ad purgandos equos, asinos, mullos ; & aloë hepatica, quod hepatitis modo coacta sit, cuius differentia laudatissima est succotrina, sic dicta, non à succo citrino, ut voluit Fuchsius l. r. d. compos. medic. c. de aloë, sed à solo natali Socotra insula. Hinc nonnulli succotrinam peculiarem differentiam constituunt, distinctam ab hepatica; cum differant tantum gradu bonitatis.

## Electio.

Eligenda est aloë succotrina. Nam caballina est tantummodo fæx & sedimentum aloës, hepatica vero deterior.

est succotrina. Notæ vero optimæ aloës sunt *substantia*, *pondus*, *color*, *odor*, *sapor*, in quibus singulis conditiones quædam spectandæ. *Substantia* ipsius debet esse solida, ac hepatis modo coacta, friabilis tamen, & facile liquefcens, si in aqua ponatur, non arenosa, sed pinguis ac leuis. *Pondere* leuis est, quoque leuior, eð præstantior, quia indicatur ex levitate, non esse admixtam arenam. *Coloris* est subflavi vel rufi, pellucidi & transparentis; opaca enim & obscura signum est vetustatis. *Odoris* est boni, ad odorem myrræ inclinantis. *Saporis* secundum Galen. parum adstringentis & multum amari.

### *Qualitates.*

Calida est ordine secundo remisso, veð primo intenso, & sicca tertio, secundum Galen. quamuis, eodem autore, non simplicis, sed mixtæ sit naturæ. Nam modice etiam adstringit, licet valde amara sit. Quoad secundas qualitates, intus sumpta habet vim aperiendi orificia venarum, & abstergendi partes, quas permeat: ob id vitanda his, qui hemorrhagiae obnoxij

sunt ex orē, aluo, vtero : hinc noxia prægnantibus. Purgat bilem & pituitam crassam : bilem suā substantiā : crassos verò & pituitosos humores vi suā abster- soriā ; sed ultra hepatis non ascendit ipsius vis. Euacuat enim tantum ex primis venis. Galen. 8. compos. med. local. in hierzx mentione. Quoad partes, ventri- culo maximè dicata est , si quicquam aliud, inquit Galen. & Mesue iphi prærogatiuam tribuit super omnia purgantia in ventriculo roborando. Prodest etiam capiti per consensum ventriculi affecto, oculis item, & hepati. Quoad effectus & morbos, utilissimè adhibetur in nausea, cruditate, lumbricis, ictero, cachexia, lip- pitudine , somno turbulentō citra fe- brem, &c. Temperaturis prodest frigidis & humidis : siccis verd , vt biliosis juve- nibus & senibus , aut extenuatis , vt he- tericis, nocet : nisi quum ingens est humi- dorum excrementorum prouentus. Hinc etiam ventriculo, ac hepati calido siccō, & frigido siccō obest. Febricitantibus quoque cautē adhibenda.

Corre<sup>c</sup>tio.

Tria sunt in aloē , quæ corre<sup>c</sup>tionē

tgēnt. 1. Quod tardus sit operationis.  
2. Quod debilis sit operationis. 3. Quod  
anastomotica est, & orificia venarum  
aperit. Primum incommode corri-  
gendum est, additis aromatibus essentię  
tenuioris & acribus, vt sunt, *macis*, *nux*  
*moscat garyophylli*, *cinnamom.* *spicanard.* *ca-*  
*lam.* *arenat.* *cubeb.* *schoenanth.* *crocus.* Alterum  
incommode corrigitur à Ruffo  
quidem addita *terebinthina*, vel alia resina  
criore: Mef. verd admiscet alia purgantia,  
vt *celocynth.* *turbiab.* & similia. Recen-  
tiores verd abluunt eam in decocto rha-  
barb. vel infusione rosar. & sic reddunt  
robustiorem. Tertium vitium corrigitur  
commiscendo *masticem*, *tragacanthor.* *bdel-*  
*lium*, & similia. Vel abluendo eam aqua  
endiuiæ, aut cichorij: quia hæc simplicia  
frigida & humida bonam partem sub-  
stantiaz medicamentosz illi lotione sub-  
trahunt. Recentiores omnes noxiam  
aloës corrigit sequentibus præparatio-  
nibus. 1. Quidam ita præparant. R.  
Aloës lib. j. *aceti rosar.* par. ij. *aq.rosar.* *odoratiß.* part. j. *amborum sc.* q. f. Bulliant si-  
mul bis velter, colentur ac exprimantur:  
Quod colatum est & expressum lento  
igne semper agitando coquatur ad pri-

ſtinam aloës cōſiſtentiam, ac rēſerūetur  
in vſum. 2. Alij aloëm ſuccotrinam in-  
fundunt in ſuccis quibusdam, V. G. bor-  
ragineſ, bngloſſ. violar. roſar. rubr. cardui-be-  
nedict. veron. chamaepit. chamomill. ſolis vel  
mixtis inuicem; ſumendo tib. ſ. aloës, ſuc-  
corum tib. j. ſ. vel plus etiam, expri-  
mendo poſteā, & coquendo ad ſpiſ-  
ſitudinem. 3. Alij puluerem aloës nu-  
triunt ſerolattis, ſuccorofar. vel endiu. & ad  
ſolem vel fornacem, aut in B. M. exſic-  
cant: exſiccata iterum in puluerem  
redigunt, nouum ſuccum affundunt, ad  
denuo ſiccant: tandem tertio, vel etiam  
ſeptiūs nutritam & puluerifatam aloëm,  
nouo ſucco imbuunt, & in cōſiſtentiam  
reductam, vel omnino exſiccata, vſui  
reponunt. 4. Alij denique parant eam  
in formam extracti. R. Aloës ſuccotrin.  
q. v. affunde ſpiritus vin. vel aqua. end. acerof.  
q. f. maceretur in B. M. donec liquor co-  
lotetur, qui deinde ſeparetur per inclina-  
tionem, & recens affundatur, toties reite-  
zando, dum nullum amplius colorem li-  
quor affusus reddat. Tandem omnis hu-  
mor collectus & transcolatus, redigatur  
in cōſiſtentiam extracti exhalatione  
vel destillatione. Seructur ad vſum.

## Dosis.

A 3 j. ad 3 ij. Mef. Infusa ab aūrēō vno, h.e. 3 j. ad 3 iiij. cūm sc. purgādi consilium est: quod si tantum aluus soluenda, exhibetur à 9 j. ad 3 j. consideratis tamen considerandis.

## Formula.

Exhibetur 1. *Forma potionis* in decocto aromatum suprà dictorum, aut sero latissimacera & expressa. Sed hæc forma propter nimiam amaritudinem respuitur, nisi in affectibus soporiferis facultatem sopitam excitandam. 2. *Forma elētuarij*, vt in hiera picta Galeni. Sumendo scilicet aloëm cum suis corridentibus, & cum melle coquendo in consistentiam elētuarij. Aloës sunt partes tres, corridentium una, mellistriplum, vel quadruplum ad puluerem. 3. *Forma pilularum*, idque visitatissime. Sic omnes fetè pilularē officinales aloëm recipiunt. Pilulae autem ex aloë variè formantur, prævaria aloës præparatione. Quid si enim veterum more corrigatur & præparetur

aloë, sumuntur eius part. ij. corrigit pars j. & cum idoneo succo vel liquore formatur massa pilular. Ita sunt *pilula de aloë latæ* incerti autoris, ex aloës succo ros. lot. 3 j. agar. trochise. 3 iiij. mastic. 3 ij. spec. diamosch. dulc. 3 ff. cum vino maluatico. Quod si verò ex recentiorum sententia præparetur, tunc vel ex ea præparata sola ac per se possunt formari pilulæ, cum aliquo liquore, si opus. Sic ex aloë rosata formantur cum vino pilulæ. Ex 3 j. quot voles: vel insuper poterit addi succus aliquis inspissatus, vel alijs liquor, cum corrigitibus aut dirigenibus, & formari pilulæ, quarum dosis à 3 j. experiundo ad 3 j. vel plus. Ita parentur pilulæ Angelicæ dictæ.

## M Y R O B A L A N L

### Genus.

*Myrobalani* sunt prænorum quedam genera, quæ Avicennæ & Serapionis interpres *Myrobalana* vertit citra rationem. Nam *Myrobalanos* significat nucem, vel glandem vnguentariam, ex qua oleum ad pretiosa vnguenta exprimitur.

De qua Diſcor. lib. 4. cap. 154. At noſtra Myrobalana nee glandium ideam reſer-  
nunt, nec pretiosum vnguentum redi-  
lent. Sunt autem eorum quinque gene-  
ra in officiis vſitata, à diuersis arbori-  
bus producta: *citrinæ*, *chebulæ*, *Indæ*, *embli-  
æ*, & *belliricæ*: quarum cortex tantum in  
uſu. *Citrinæ* dicuntur à colore citrino,  
corticem habent paruum ac tenuem, nu-  
cleum magnum. *Chebulæ* maximæ ſunt  
omnium & longissimæ, rugosæ & angu-  
loſæ, paruum habentes nucleum. *Indæ*  
paruæ ſunt & valdè nigræ. *Emblia* frag-  
menta potius ſunt, quam integra pruna.  
*Belliricæ* rotundæ ſunt inſtar gallæ, corti-  
cem ac nucleum craſſum habentes.

## Elettio.

*Citrinæ* commendantur, quæ in vitidi  
flavescunt, ponderoſæ vel graues, quia  
carne multâ & densâ infatctæ, gummo-  
ſæ, ſi frangantur, oſſis exigui. *Chebulæ*  
præſtant, quæ p̄t cæteris craſſiores, co-  
lore nigro purpuradente, & quæ in  
aqua m dejectæ fundum quam citiſſime  
petunt. *Indæ* excellunt, quæ maximè ni-  
glicant, craſſæ, ponderoſæ, nullo iutus

osse, & quæ confractæ in vnum compate cernuntur. Emblicæ laudantur, quæ in maiora, crassiora, densiora & pungitiora frusta diuiduntur, & quæ minus ossis quam pulpæ habent. Belliricæ optimæ sunt magnæ, multæ & densæ carne, graues, & quibus crassus sit cortex.

### Qualitates.

Myrobalani omnes frigidæ sunt primo, & siccæ secundo gradu, exceptis emblicis, quas Mes. dicit, frigid. & sicc. in primo tantum gradu, sed intellige admodum intenso. Vnde quoad secundas qualitates, omnes purgando simul adstringunt: hinc fluxionibus omnibus dicatæ, & hæmorrhoidibus conferunt. Ventriculo, cordi, ac jecori dicatæ. In specie autem cirrini sunt Cholagogæ. Inde melancholiæ ducunt, & exhilarant. Chebulæ & emblicæ phlegmagogæ sunt. Belliricæ ea omnia possunt, quæ priora.

### Correlio.

Corrigitur adstrictio ipsorum additis  
aperientiis

spérientibus & vrinam cíentibus, vt sunt  
sem. oderata : vel si fricentur, & inun-  
gantur oleo amygdalar. dulc. vel bursyro, dum  
aut cuuantur & comminuuntur.

## Dosis.

Puluer. 3 ij. Decocti aut infusi 3 fl. 3 vj.

## Modus.

Exhibitentur vel conditæ, vel in infusionē  
aut decocto. Conditæ, si roborandi consi-  
lium, sumendo pluribus diebus unam à  
cibo. In infuso vel decocto, ubi magis va-  
cuandum. Coquuntur autem vel infun-  
duntur in aqua, iure, sero & vino ad 3 vj.  
per se, vel 3 fl. cum aliis, additis corri-  
gentibus. In expressione dein alia solv-  
untur, vt dictum, in Rhabarbaro.

## SCAMMONEA.

## Genus.

Est succus concretus plantæ eiusdem  
nominis, qui ex incisa radice lactei succi  
plena colligitur, & reseruatur. Cuius va-

ix sunt differentia ratione loci natalitij  
apud Dioscoridem, Plinium & Mesuem;  
optima tamen est Antiochena.

Electio.

Notæ optimi Scammonij sunt substantia,  
pondus, color, odor & sapor. Substantia  
læue est, rarum, & fungosum, instar spon-  
giorum tenuissimis foraminibus seu fistulis  
friabile ac tenerum, pulueratu facilis-  
mum, ac citò liquefcens. Pondere quam  
leuissimum Plinio. Colore splendidum  
ac nitidum: instar gummi, transluens  
instar glutinis taurini: cum frangitur, ful-  
uum, linguis verdè affricatum, vel aqua  
dilutum, lactescens. Odore non tetro, li-  
cet non suavi. Sapore insipidum, neque  
vehementer linguam excalfaciens, quod  
admixti tithymali argumentum est.

Qualitates.

Temperamento calidum est, & sic-  
cum scammonium, & quidem ordine  
tertio secundum Mesuem, ac proinde  
calidis & siccis naturis nocium. A cu-  
jus tamen sententia cogimur discedere;

Nam si legitimum sit scammonium , nec iuthymali succo adulteratum , statuendum potius calidum & siccum moderatè , quandoquidem nec acre gustu , nec amarum , vt malè sentit Mef. , sed potius insipidum. Purgat à partibus remotis bilem tenuem , aquas citrinas & serofos humores confertini. Magna enim trahendi facultate est prædictum. Hinc si paulò largiore copia sumatur , humores acres Confertim attracti & prolapsi in intestina , grauia inducunt symptomata. Nam acrimonia sua intestina abradunt , vnde tormina , dysenteria , & tenesimus : venarum item orificia aperiunt , vndo immoderatae alii fluxiones nonnunquam ad sanguinem usque : præterea status quosdam mordaces exspirant , quibus cor , hepar & reliqua viscera conturbantur , & ventriculus usque adeò lacescit , vt sumentibus nauseam concitet : denique acrimonia sua spiritus corporis inflammant , hinc febres facile excitantur . Quæ omnia symptomata Mef. & alij propriæ scammonij naturæ adscibunt , cùm potius humoribus mordaci bus , quos propria quadam facultate confertim attrahit , accepta sint ferendi ,

quandoquidem purum ac legitimū  
scammonium talem naturam non ha-  
beat, qualēm ipsi attribuunt.

## Correttio.

Corrigitur scammonium, quia credi-  
tur prædicta symptomata per se excita-  
re, cum adstringentibus, refrigerantibus,  
lenientibus, cardiacis, hepatios, stoma-  
chicis : ex quibus variæ sunt præpara-  
tiones scammoneæ, quas videre licet  
apud Mesuem. Usitatissima tamen cor-  
rectio fit cum succo cydonior. cortic. myrob.  
citrinor. & mastice, ex quibus s.a. fiunt tro-  
chisci : ad ib. j. scammon. elechi sumuntur  
cortic. myrobalan. mastic. ana ʒ. B. succi  
cydon. lb. B. & ʒ. B. fiunt trochisci. Vel  
scammonium tritum in malo cydonio  
excauato, & pasta obuoluto, coquitur in  
clibano aut prunis. E pomo refrigerato  
scammonium eximitur, & usui reserua-  
tur. Vera autem scammoneæ præpara-  
tio fit cum succo limonum depurato, in  
quo dissoluitur in B.M. & feruens adhuc  
per linteum transmittitur : quo pacto  
crassa & impura eius substantia, quæ non  
nisi noxiam parit, secessnitur. Scammo-

nium sic præparatum ac corréctum ap-  
pellatur Diagrydium.

*Dosis.*

Dosis præparati scammonij , h. ē. diag-  
rydij à ȝ. vj. ad ȝ. xij. ȝ j. Mes. à ȝ. v.  
ad xij. Dioscor. & Ruffus vsque ad ȝ j.  
Paulus & Aëtius vsque ad ȝ ij. Quicquid  
sit, Græcotum scammonium fortè mitius  
erat, nec ut hoc tempore succo tithymali  
adulteratum. Standum itaque potius in  
dosi Mesuȝ, quam Græcorum : ut dosis  
infima sit ȝ. v. vel vj. media ȝ. xij. sum-  
ma ȝ. xv. vel ȝ j.

*Viendi modus.*

Usurpatūr diagrydium , forma potionis,  
boli, elec̄tuarij , pilularum , pulueris. Potionis  
forma exhibuit Dioscorid. cum aqua pu-  
ta, vel mulsa. Elegantiis hodiè cum ol.  
amygdal. dulcium aut syr. ros. solut. simplic. &  
aqua destill. conuenienti. R. V. G. syr. ros.  
solut. simplic. ȝ j. diagrydij ȝ. viij. pliis mi-  
nus, cum aqua cicbor. f. q. hat potio. Bolus  
conficitur ex Diagryd. ȝ. xij. xv. cum con-  
serua roscar. ȝ ij. & ol. garyopbyl. destillat. gutt.

iv. gratissima purgatio. Ele<sup>t</sup>harū form<sup>r</sup>  
 usurpatur in ele<sup>t</sup>usario de succo rosarum &  
 diacydonio lucido purgante, cuius utriusque  
 dosis ad 3 iij. quamuis ele<sup>t</sup>. de succo rosar.  
 per se non usurpetur ferè, sed dissolutum  
 aqua destill. conuenienti in formam po-  
 tione. Fit etiam iucundissimum ele<sup>t</sup>.  
 ex mucilaginis pomorum duplo ad sac-  
 charum, cocto ad consistentiam iustum:  
 addendo deinde infusum scammonij  
 hac proportione, vt 3 j. ele<sup>t</sup>. recipiat  
 3 j. infusi: iterum dein coquendo ad  
 iustum consistentiam fiat ele<sup>t</sup>. instar  
 diacydon. Dosis ad 3 iij. Infusum autem  
 scammonie fit in aqua vita, quod dein  
 per chartam emporeticam trajicitur. Pi-  
 lular. form<sup>r</sup> usurpatur cum in multis ma-  
 fiss pilular. officinal. tum etiam formando  
 pilulas magistrales, ex diagrydij certa  
 dosi, V. G. g. viij. ix. xij. cum succo vel  
 syr. idoneo. Puluis denique ex diagrydio  
 sic fit. R. Cremer. tar. 3 ij. vel 3 j. diagryd.  
 g viij. vel plus pro indicationibus, M. B.  
 fiat puluis, qui sumatur in juscule.

Quicquid in fructu  
 satis est, ut possit

PVRGANTIVM II. CLASSIS;  
in qua tractantur,

PHLEGMA GOGA;

CARTHAMVS.

*Genus.*

Est semen enicis satiui, cuius medulla tantum ad purgationes utimur; proinde etiam in receptis vulgo prescribitur medulla seminis carthami contusi.

*Elegia.*

Melius est semen, quod est album & planum, crassum & plenum: cuius medulla est vntuosa & pinguis, & cortex tenuis.

*Qualitates.*

Mefux calidum 1. & siccum 2. ( Galenus & Paulus calefacere dicunt in tertio, si quis extrinsecus vtatur.) Purgat pungitam & aquas, mitet flatus discutit; pro-

S iiiij

inde colicis & anasarex confert. Thoraci & pulmoper studet; sed ventriculo aduersatur.

### Corrigentia.

Corrigitur, quatenus laedit ventriculum, stomachicis, qualia sunt *anisum*, *cinnamom.* *galanga*, *mastix*, & similia, quatenus tarda est operationis, additis acribus, ut *cardamomo*, *zingibere*, *sale geminae*.

### Desit.

Ab 3 fl. ad 3 vj. 3 j.

### Medius.

Exhibetur tardò extra compositionem officinalem *dicarbami* in liquido ac sōido. Apud Mesuem tamen ex sua & aliorum sententia usurpatur, 1. *Forma pilularum*, formando ex *medallæ carbam.* 3 x. cum *cardamom.* 3 j. pilulas instar ciceris, & dando 3 v. pro una dosi. 2. *Forma syrapi melliti*, *oxymellitis* sc. ; *medallæ carbami* panino ligata, & *oxymelli**ti squillijico*, dum coquitur, immersa,

qua id solutium efficitur. 3. *Forma boli.*  
*R. Medull. carbam. 3 xij. penidior. 3 iv.*  
*cardamom. 2zincib. ana 3 j. cum melle,*  
*fiant boli instar nucis, quorum vnum,*  
*vel duos sumat. 4. Forma potionis, ea-*  
*dem medulla ad 3 fl. cum corrigentium*  
*momento, in iure galli cocta & pro-*  
*pinata.*

## A G A R I C V S.

### Genus, & ele<sup>tio</sup>.

Est fungus adnatus trunco laticis; no-  
men habens ab Agaria, Sarmatiæ regio-  
ne, in qua præstantissimum nascitur,  
quamuis optimum quoque habeatur ex  
Delphinatu Galliæ, montibus Tridenti-  
nis, nec non Rhetorum, Vindelicorum,  
& Noticorum trætu.

Nomina optimi Agarici hoc disticho con-  
tinentur.

*Res frangi præstid, pretiosus Agaricus esto;*  
*Candidus & Splendens, bonus in libra*  
*leue pendens.*

Improbatur nigricans, grauis, corto-  
fus, & qui caudici prope adnatus in-  
haesit.

*Qualitates.*

**C**alidus est primo, siccus secundo grati-  
du: incidit, attenuat, terget, aperit, & dis-  
cutit. Purgat pituitam, crassam præcipue  
ac lentam, & bilem utramque à cerebro,  
neruis, musculis, sensoriis, spina dorsi,  
thorace, pulmone, ventriculo, hepate,  
liene, renibus, utero, articulis, venenis  
quoque resistit. Vnde forsitan à Democri-  
to medicina familiæ appellatur; quod ad  
omnes corporis partes conformitatem  
habeat, earumque obstructions, atque  
ab illis genitos morbos inueteratos tollat.  
**O**mni ætati tutus est.

*Corrigit.*

Duo vitia corrigenda sunt in Agaricis  
1. Tarditas ipsius. 2. Leuitas, ob quam  
ad fundum ventriculi ægrè descendens  
nauseam & vomitum facit, & intestinis  
adherentis ea lacinando & pungendo,  
fluxionesque concitando dolores patit:  
que vitia varie quidem apud Mesuem  
corriguntur; optima tamen ratio est, si  
trochiscetur agaricus, cum s. q. vini albi,

Vel maluatici , in quo zingibet fuerit infusum.

*Dosis ac Modis.*

Puluis trochiscati & non trochiscati à 3 ij. ad 3 j. 3 ij. In decocto vel infuso à 3 ij. ad 3 iv. 3 v. Exhibitetur formâ potionis, pilulari, boli. *Potionis forma*, si puluis agarici, præsertim trochiscati, conuenienti liquore dissoluatur, & exhibeatur : vel in eodem decoquatur aut infundatur, & posteà colatura propinetur. *Pilularum forma*, cùm in pilulis officinalibus, tùm etiam magistralibus, formando ex certa dosi agarici, additis, si lubet, deducentibus ad partem affectam, cum melle vel syrupo idoneo pilulas. *Boli* denique formâ, sumendo quantitatem agarici, & cum *diaphœnico* vel *conservâ resar.* formando bolum.

*TURBITH.**Genus.*

*Turbith* est radix, ex aliqua harum platarum, quæ lacteum succum fundunt, ac-  
S vj

cepta. Sed qualis illa sit, anceps est controvērsia; vnde alij aliter iudicāt. Actuar. modo pityusæ radicem, modo alypum Dioscor. existimat: Serapio & Auicenna radicem tripolij Dioscorid. Brasauolus putat tithymali myrtinitis radicem. Alij, inter quos Fuchsius, thapsiæ, alij scammoniæ radicem autumant. Vnde Clusio monente in Garciam, loco turpethi in multis Hispaniæ locis vntuntur radice thapsiæ, & aliis locis Europæ radice scammoniæ.

### *Electio.*

Laudatur ponderosum & subalbidum, aut cineticium, recens ac fractu facile, intus gummosum. Adulteratum enim in extremitatibus tantum gummosum est.

### *Qualitates.*

Calidum est in tertio, & siccum in secundo gradu intenso. Purgat pituitam crassam & tenacem, ac putrem ex ventriculo, pectore, & partibus remotis, ut juncturis. Vnde confert arthriticis, febribus pituitosis, præscruat à psora, lepra

& aliis vitiis pituitosis cutis, secundum  
Mes. Nocet ventriculo, nauseam vomi-  
tumque excitans. Pueris, senibus, ac gra-  
uidis non dandum.

### Correſtio.

Corrigitur, quatenus tardæ & debilis  
est operationibus, acribus, vt *zingiber*. qua-  
tenus ventriculo nocet, stomachicis, vt  
*mafice*, *pipere*, & aromaticis, quatenus  
corpus extenuat, mitigantibus, vt *oleo*  
*amygd. sero lactis syr. viol. paffalis, fæcbaro-*

### Dofsi.

Puluer. à 3 ij. ad 3 j. 3 iv. Mes. à 3 j. ad  
3 ij. in decocto dosi duplâ datur.

### Modus.

Exhibetur 1. Formâ pilular. ex 3 j. V.G.  
pulugetis ipsius, additis corrigentibus pro-  
portione subtripla, formando pilulas  
cum syr. idoneo. V. G. *violacea*. 2. Formâ  
puluer. R. *Turbith*. 3 j. corrigentium 3 j.  
*fæcbar*. duplum ad puluer. M. S. siat pul-  
uis sumendus in iuscule. 3. Formâ tabula-

*Vinn*, sumendo puluerem, & cūm facchato soluto formando tabulas. 4. Formā boli, miscendo puluerem cum *conservae rosar.* N. B. In vermbus vtilissimum exhibere turbith cum Rhabatbaro. 5. Formā *decoffi*, seu *potisionis*. R. V. G. Turbith ʒ ij. vel ʒ iiij. cum corrigent. coq. in liquoris idon. L. q. exhibendo colaturam, vel in ea dissoluendo insuper alia, vt *syr. violac.*

## HERMODACTYLVS.

## Genus.

Est radix seu bulbus *iridis tuberosæ* Lobel. que exsiccata ad nos fertur, & *versus Hermodactylus Pauli* censemur. Cuius loco, vt antehac, sic etiamnum magno cum clamino, multis in locis usurpatur *hermodactylus vulgaris*, qui est radix, seu bulbus *Colchici*, quod aut est venenum, ideoque intra corpus sumi non debet. Quale est illud, quod in Colchide nascitur; aut non purgat, vt nostras; aut purgat quidem, sed non est Pauli hermodactylus, vt *Syriachum.*

### Elefſio.

*Notæ hērmodaſtyli boni hoc distichō continentur :*

*Laus tibi de jure datur, Hermodaſtyle duro;*  
*Ac ſolidus ſiſis, albi cū ſigna coloris.*

Solidum hic opponitur raro, laxo, & friabili. Ad has notas minime accedit bulbus Colchici. Hic enim ſiccatus, rugofus euadit, & foris, intuſque nigrificat, vel obſcurè rubeficit.

### Qualitates.

Calidus eſt, ac ſiccus ordinis ſecundi initio, cum humiditate tamen, ut Mel. loquitur, excrementitia, flatulenta, nauſeabunda, qua ventriculo aduersatur. Pituitam lentam & humores viſcidos ab articulis efficaciter trahit : vnde, Paulo auctore, arthriticis priuatim dicatus eſt.

### Correſtio.

Corrigitur tenuantibus, cimino, zingib. ſpica, cinamomo, & ſimilibus ſtomachicis & arthriticis, quæ vim ipsius ad articulos deducunt.

## Dosis, ac modus.

Mef. à 3 j. ad 3 ij. Vsurpatūr 1. Formā  
pulver. R. 3 j. hermodactyl. cum puluer,  
zīngiber. & piper. 2. Decotti. R. hermodactyl.  
3 ij. corridentium aliquot ana 3 j.  
contundantur crasso modo & liquore  
idoneo coquantur. 3. Pilular. in pilul.  
de hermodactylis Mesux majoribus,  
quarum descriptio in Augustano. 4. Tro-  
chiscor. sumendo secundūm Mef. hermodac-  
tyl. cum suis corridentibus, & cum suc-  
co raphani aut scillæ, formando trochi-  
scos.

## M E C H O A C A.

## Genus.

Est radix bryoniæ peregrinæ, ex Me-  
choaca, nouæ Hispaniæ Insula, allata,  
quæ duplex: Mechoaca alba seu vulga-  
ris, & Mechoaca nigra, quam à loco na-  
tali Massilienses Lalapium vel Gelapo  
vocant vulgò radix Lalap.

*Natæ viri usque.*

*Fulgari*s* Mechoac*a* diligenda albicans  
ac recens. Improbatur quæ valdè candi-  
da, aut nigra, aut cariosa: adulteratur ga-  
dicibus bryoniae in taleolas dissectis &  
resiccatis ad formam Mechoac*x*. Dolus  
deprehenditur teneritudine Mechoac*x*;  
cum bryonia habeat substantiam longè  
tudiorem. *Mechoac*a nigra** priori similis,  
sed cortice nigricante vestita, interius  
rufescens, quæ tessulatim incisa rotunda,  
magnitudine & figura calculum aleato-  
rium representat: gusto est non ingrato  
& gummoso, & ob copiosam gummosi-  
tatem igni admotaflammam concipit,*

*Qualitates.*

Calida est in primo & secca secundo  
gradu, insipida ferè; nec ullius acrimoniæ  
particeps, secus quam bryonia sylue-  
stris, que acris est, & calida multum. Pur-  
gat pituitam & aquas, ac purgando par-  
tes robotat. Tussi veteri, colico: dolori  
& lui Venereæ plutimum confert. Omni-  
tati utilis. Sed Lalapium vulgarem Me-

choacam facultate superat. Nam ob  
gummi copiosum fortius humores sero-  
los purgare existimatur.

### *Correctio, ac Dosis.*

*Corrigitur cum cinamom. anisi, aut masti-  
ces tertia parte. Dosis à 3 fl. ad 3 j. vel  
3 ij. Radix Lalap. ad 3 j. tunc exhibi-  
betur.*

### *Modus viendi.*

Sumitur in substantia ferè tantum, su-  
mendo puluerem ipsius cum liquore  
idoneo, præsertim cum vino, quamvis  
etiam cum juscule sumatur. In decocto  
non datur. Nam experientia comper-  
tum est, coctione vim ipsius perire &  
exolui. In infusione cum præscribitur,  
liquor non solus exhibendus, sed puluis  
infusus.

### **C O L O C Y N T H I S.**

Est fructus cucurbitæ sylvestris, cuius  
pulpa alba & leuis, à seminibus purgata,  
in usu est.

Calida & sicca est tertio gradu. Purgat pituitam & alios humores crassos glutinosos, è profundis & remotis partibus, ut cerebro, nervis, musculis, articulis, pulmonibus, thorace: quo nomine usurpatur in cephalalgia, hemicrania inueterata, apoplexia, epilepsia, vertigine, asthmate, tussi, dispnæa, morbis articularibus frigidis, dolore colico flatulento, ad pituitam vitream ex intestinis deturbandam. Nocet valde ventriculo & intestinis, quorum fibris adhæret. Pueris, senibus, & prægnantibus est inimica.

*Corrigitur* vel forma trochiscorum, qui vocantur *trochisci albandali*, & nihil aliud sunt, quam colocynthis præparata, quæ ingreditur omnes compositiones colocynthidem recipientes: vel additis cardiacis, hepaticis, stomachicis, & rebus lentis, ut *tragacanth. ol. amygdal.*

Dosis à gr. vj. ad gr. xv. 3 j. Diosc. 3 ij.

Usurpatur commodissimè formâ pilularum, quamvis & in electuor. vt in biera diocolocynth. Pilulae ita formari possunt. R. *Pulpe colocynth. g. x. cinam. gingib. ana g. vi. moschi g. j. cum syr. idoneo formentur pilul. aliquot.* Potest etiam usurpari formâ exiracti hoc modo,

Affunde pulueri ipsius spiritum vini ad extantiam sex digitorum, digere per dies 20. vel vlt̄rā : posteā per inclinationem effunde, tandem ad spissitudinem mellis redige : addendo ad 3 j. succi , olei cimicif. mem. 3 j. Dof. 3 B. cum syr. rosato.

## O P O P A N A X.

Est succus panacis Heraclei, secundūm Diosc. Galen. & omnes ferē , excepto Mesue , qui ex ferulaceo Panace siue Asclepio, ac aliis nonnullis, qui ex Chironio fieri volunt.

Quicquid sit , probatur valdē amatūs; internē albus aut subfuluus , pinguis, tener, friabilis, statim liquefcens , odore graui.

Calidus & siccus in tertio Mes. at Galen. sicc. in secundo. Pituitam crassam & viscidam à remotioribus partibus & articulis allicit secūdum Mesuem, quamvis nec Diosc. nec Galen. ei vim purgandi tribuant. Nocet ventriculo , & tarda est operationis: ac proinde corrigitur tercia parte mastice , spicae, zingib. cinnamom. & enuf. campana.

Dosis ad 3 j. à 3 B. Mes. à 3 j. ad

3 ij. Brassæ vol. ad 3 iij. Vsurpatut in pilulis, ( hinc pilul. de opopanace Mesuxi. ) R.V.G. 3 j. opopon. acue cum diagr. gr. iv. &c. & cum syr. fiant pilul.

## S A G A P E N V M.

Est succus plantæ cuiusdam, quæ & ipsa Sagapenum dicitur, Galen. 8. simplic. ac ex Media ortum ducit.

Laudatur translucidum, foris colore fulvo, intùs albido, gustu acri, odore grati, substantia crassa, facilè liquecens in vino.

Calidum ordine tertio, siccum secundo. Purgat pituitam crassam & alios humores lento secundùm Mes. à Græcis facultas dejectoria silentio prætermissa est.

*Corrigentia*, vt opopanax.

Dolis à 3 ſ. ad 3 j. Vsurpatur in pilul. R. sagapem 3 j. mastic. cinam. zingib. anag. iij. fiant pil. cum syr. aliquo.

## E V P H O R B I V M.

Est succus arboris Libycæ, ab Euphorbo Medico Iubæ Regis Mauritaniz nomen habens.

*Elegans translucens, & ex rūfo pallidum, in granula concretum, quod leui-ter gustatum os diū accensum tenet.*

Calidum & siccum est in quartogra-  
du. Purgat pituitam crassiam & lentam,  
& aquosos humores : ob id valentissi-  
mum est medicamentum in affectibus  
inde natis, vt arthritide, colicis dolori-  
bus, & hydropē ; sed vehemens est me-  
dicamentum, & auxietatem quandam  
excitat.

Quapropter corrigendum est medica-  
mentis acrimoniam ipsius mitigantibus,  
vt *ol. amygd. dulc. succo citri* : præterea cat-  
diac. & stomachicis, vt *masticē*, *croco*.  
Optima ipsius præparatio fit cum aceto  
destillato, succo limon. depurato, aut  
phlegmate vitrioli imprægnato suo spi-  
ritu : in quibus dissoluendum est eu-  
phorbiū in B. M. & adhuc calens per  
linteum trajiciendum.

*Dosis à gr. iij. ad viii. vel xij.*

Vsurpatur, vel in *pilulis*. R. V. G. Eu-  
phorb. gr. vi. mitigantium aliquot. V. G. si-  
min. laetuc. portul. endiu. flor. rosf. ar. ana gr. iiiij  
& cum *succo limon.* fiant pilolz. Vel cum  
aqua aut *succo endiuiz solutum*, instas  
potionis. Vel boli formā cum *cassia*. R.

V.G. *Cassia* Drach. iij. *euphorp. prep.* g iiij.  
cum saccharo fiat bolus.

PVRGANTIVM III. CLASSIS;  
in qua tractantur

M E L A N A G O G A.

S E N A.

Est planta siliquosa , è rēgionibūs  
orientalibus ad nos primum allata , col-  
latae admodum similis , cujus folia in  
rūm veniunt , quamvis folliculi effica-  
ciores sunt Mesuæ. Quod intelligendum  
est folliculis decerptis virentibus & suc-  
culentis , mōxq; siccatis , non autem de-  
caducis & in planta arefactis .

Sed cùm folliculi ad nos non feran-  
tur , eligenda sunt folia senæ viridia , probè  
reficata , non maculosa , nec teredine  
atrita , & à stipitibus mundata ac re-  
purgata .

Quoad qualitates , folia sunt cal. sicc.  
Primo. Purgat melancholiā , bilem  
adustam & pituitam à cœbro , pulmo-  
ne , hepate , liene , ventriculo & mesente-  
rio : proinde dictarum partium morbis

ab eiusmodi humoribus proficiscientibus medetur. Omni etatib[us]tuta, ac etiam prægnantibus. Utileissimum catharticum.

*Corrigitur*, quatenus flatulenta & ventriculo obesse creditur, zingib. cinam. aniso, garyophyll.

Dosis à 3j. ad 3j. 6. 3ij. quidam ad 3iij.

Exhibetur vel in *substancia*, vel in *infuso* aut decocto. *Substantia* variè exhibetur. 1. Formâ pilular. R. V. G. Pulu. sen. Drachj. zingib. cinam. ana Æb. saL mirr. gr. v. fiant pilul. cum syr. aliquo, quæ vel omnes sumi possunt, vel aliquot saltem instat usualium. 2. *Potionis*, soluendo pulucrem *senæ* cum corrigentibus in liquore idoneo, præsertim sero lœtis. 3. Formâ placentalar. pro pueris, pulucre *senæ* cum cinam. melle subacto, & cocto ad consistentiam placentæ. 4. Formâ cydoniati, ut dictum in Rhabarbaro. *Infusum* senz etiam variè exhibetur. 1. Communiter folia *sen.* infunduntur dosi dupla, ad eam, qua in *substancia* dantur cum corrigentibus, in vini albi s. q. postea fit expressio: quæ vel per se exhibetur, vel aliis insuper in hac dissolutis, ut in Rhabdiatum. I. I. Formâ extracti L. a. patati cum aq. Jupali,

sq. *Impuli*, *scolopendr.* *borrag.* *fumar.* addita  
portione *caryophyll.* *zingib.* *semin.* *fænicul.*  
*&c.* *3.* Formâ *spiritum senneti.* R. *Fol.* *senæ*  
*purgat.*  $\frac{3}{2}$  *ijj.* *cremor.* *tartar.*  $\frac{3}{2}$  *ij.* *cinam.*  $\frac{3}{2}$  *j.*  
*mac.*  $\frac{3}{2}$  *lb.* *spec.* *diagal.*  $\frac{3}{2}$  *j.* *lb.* *zingib.*  $\frac{3}{2}$  *lb.* Infundc  
triduum in spiritus vini vel com-  
munis, vel maluatici lb *ij.* poste à coletur  
& seruetur. *Dosis* ab  $\frac{3}{2}$  *lb.* ad  $\frac{3}{2}$  *vij.* *Deco-*  
*ctum* *senæ* eodem modo fit, ut decoctum  
*Rhabarb.* mutatis mutandis.

## P O L Y P O D I V M.

Est herba similis filici, in muscosis pē-  
tris & vetustis arborum cāudicibus na-  
scens, vnde *dendropteris*, *filix arborea* di-  
citur: cuius radix, quæ sola in usum ve-  
nit, habet multos nodos & cirthos poly-  
porum piscium ritu, hinc nomen.

*Eligendum*, quod in quercu nascitut, &  
vicens est, ac nodosum. Inueteratum  
adstringit.

Quoad *quæditates*, bilem adustam & pi-  
tuitam purgat. Opitulatur colicis. Lie-  
ni peculiariter prodest, vnde in affecti-  
bus hypochondriacis utilissimum.

Sed quia admodum desiccatur, corrigen-  
dum est *liquiritia*, & ad ipsius operatio-

De Materia  
434  
nem iuuandam, tertia parte, anisi, fænicu-  
li, zingib. &c.

Dosis à 3 ij. ad 3 iiij. & 3 g.

Exhibetur in decocto vel infuso facto,  
cum liquore idoneo. h: e. partem & affe-  
ctum respieiente. V. G. cum sero latris in  
scabie ab vista biles, aqua bordei in febribus  
quartanis: additis corridentibus idoneis  
proportione subtripla.

## E P I T H Y M U M.

Est planta, quæ thymo, hyssopo, satu-  
reis, serpillo, aliisque plantis cuscute  
modo circumnascitur, à qua differt figu-  
rà, loco natali, & qualitatibus; licet mul-  
ti epithymum & cuscutam promiscue  
sumant. Quicquid sit, hæc medicamen-  
ta potius apientium quam purgantium  
rationem habent, & præstat cum aliis,  
quam iis solis vti. Ac proinde rectius ad  
alterantia referenda fuissent, ad quorum  
etiam classem relegamus.

## HELLEBORVS NIGER.

Helleborus niger duplex est, adulteri-  
sus & verus. Adulterinus iterum vel est

*bortensis*, quem Fuchsius Eristvurken appellat, & *sylvestris*, siue *helleboraster*. *Verus helleborus niger* aliis est, quem Matthiolus *flore purpureo* vocat, aliis *sanicula fæmina* Fuchs. aliis, quem Matthiol. *Pseudo-helleborum* vocat, & habet flores buphthalmi. In usu eligendus est verus helleborus, & in eius defectu adulterinus hotensis. Visuprantur autem solæ radices tenui medulla projecta, quæ vino cydoniorum maceratae loco tepido, postea exsiccantur & reponuntur ad usum.

Quoad qualitates, calidus & siccus est in tertio gradu. Purgat melancholicum siccum, & alios humores adustos solutum contumaces: proinde omnibus morbis melancholicis prodest, ut mania, melancholia, elephantiasi, quartanariis, &c. Vbi notandum, elleborum nigrum rectè usurpatum innoxium esse medicamentum, ut tutò pueris, grauidis & debilibus corporibus dati possit.

Corrigitur cardiacis & stomachicis, ut cinam. aniso. fæniculo, &c.

Dosis in substantia, à gr. xv. ad 3 ss. Dij. Mef. 3 j. In infuso vel decocto, à 5 j. ad 3 ij. vel 3 ij. ss. Quidam ad 3 ss. sed ascendendo à 3 j.

T ij

Exhibetur vel *substantia ipsius*, vel *infusum*, vel *decoctum*. *Substantia ipsius* exhibetur. 1. *Formâ puluer.* sumendo ellebori nigr. 3 ij. zingib. mastic. rosar. rubr. cinamom. anis. ana gr. iv. Misce in juscule vteri. In pueris sume 3 j. 2. *Formâ pilular.* formando ex praedicto puluere cum syridon. pilul. 3. *Formâ placentularum*, vt dictum in sena, & rhubarbaro. 4. *Formâ cydoniati*, vt dictum in rhubarbaro. Infusum hellebori fit 1. *Communi modo* in liquore idoneo, puta, decocto, hydro-melite, aqua hordei, &c. vt sibi ipsius dictum. 2. *Extracti forma*: vbi notandum, quoad menstruum, nonnullos sumere aquam anisi additis corridentibus: nonnullos solam aquam pluuiam accipere sine corridentibus, eo quod notant hellebori malitiam, vel potius vim purgantem aromatum admixtione intendi ac augeri. *Dosis extracti* est 3 j. *Decoctum quoque* fit dupli modo. 1. *Communiter* in liquore idoneo, vt alia purgantia. 2. *In pomo belieberato.* Pomum transfigitur radice hellebot. nigri & caryophyllis, charta coperitur aqua frigida madefacta, atque coquitur in cineribus: inde extracto helleboro & caryophyll. pomum

cum saccharo comedendum offerimus.

## LAPIS ARMENS.

Lapis Armenus non modò in Armēnia prouenit, sed etiam iauenitur in argentifodiniis Germanicis, ex quo color paratur in vsum pictorum.

Optimus est lœuis, cœruleo-viridis, non lapidosus & friabilis.

Calidus siccus secundo gradu. Purgat melancholiam, & curat eosdem affectus cum helleboro nigro.

*Corrigitur minutissimè tritus, frequenti lotione cum aquis cardiacis, resar. bugloss. &c. toties facta, donec aqua nullum amplius vel colorem, vel saporem induerit.*

*Dosis lori, à 3 fl. ad 5 j. 3 j fl. Illati, ad 3 j.*

Sumitur omnibus modis, vt lapis Lazuli.

## LAPIS LAZULI.

Lapis Lazuli vel cyaneus, aut cœruleus, magnam cum Armenio, tūm ratione originis, tūm facultatis & virium cognac-

T iii

438

tionem habet, vt alter alteri facilè substitui possit.

*Eligendus* est autem lapis lazuli aureis maculis distinctus, seu in cuius fracturis radiantes quedam aureæ stellæ micant, unde à Mesuxo lapis stellatus vocatur.

Calidus secundo & siccus tertio. Eadem cum Armenio vires, sed debiliores habet.

*Corrigitur* vt armenius.

*Dosis*, à 5. fl. ad 3 j. 3 j. fl. Mes. à 3 ij. ad 3 ij. fl.

Uspurpatur, 1. Formâ pilular. R. 3 ij. vel 3 j. lap. Lazuli præparat. cum cinam-zingib. camph. ana gr. vj. Misc. & cum succo aliquo fiant pil. 2. Formâ pulueris, sumendo puluerem ipius subtilissimè tritum cum aromatibus quibusdam, in iuscule vel alio liquore. 3. Formâ boli, miscendo prædictum puluerem cum conseru. berbag. 4. Placentæ formâ, sed tūm in alcohol redigendus est lapis, ne puluis dentibus hæreat. 5. Formâ potionis, in vino odorato sumendo puluerem. 6. In jentaculo quodam idoneo. Nota, semper in tenuissimum puluerem redigendum esse.

PVRGANTIVM I V. CLASSIS,  
in qua tractantur,

## HYDRAGOGA.

## SAMBVCVS &amp; EBVLVS.

*Ebulus*, & *Sambucus* similes sunt plantæ foliis, flore & fructu, sola magnitudine apud Dioscor. differentes. *Ebulus* enim est *sambucus* minor seu chamaœacte: *Sambucus* verò in arborem assurgit. Vtriusque & semen & cortex medianus, & succus radic. foliorum ac fructuum in v̄su sunt, ad aquas educendas.

Dosis, seminum baccar. 3 j. cortic. 3 ij.  
succi 3 fl. 3. vij. Corriguntur cinamomo.

Vsurpatut. Semen puluerisatum in vino potenti vel absinthite: vel decocto cibam apitb. in podagricis. Cortex maceratur, vel decoquitur in vino ad 3 iij. sed coctione vis eius purgandi perit. Diosc. Succus ad 3 j. sumitur in vino, vel iuscule alterato absinthio. Ut & fuccus inspissatus cum melle. Additur aqua cinamomi. Plerunque hæc non sola, sed cum alijs à Præticis vsurpantur.

## SOLDANELLA.

Est brassica marinā Dioscorid. cuius  
folia & succus in usu sunt.

Calida & sicca est secundo gradu,  
nonnullis tertio. Ad aquas educendas  
optimum remedium, ita tamen, ut sem-  
per aliquid bilis permixtum sit.

Sed quia stomacho inimica, semper  
corrigenda cinamom. zingib. &c.

Dosis, 3 j. 3 j. 6. 3 ij. succi 3 fl.

Exhibitentur foli. 1. In *acerario* ex ol.  
sale & aceto, cuius 6. boli aquas mitē  
educunt in hydrope. Nonnunquam etiam  
in iure ebullitur ut brassica sativa. 2. In  
*pulvere*, addito, si velis, *rhabarbaro* & *cabe-  
lis*, qui imponitur vel juri, vel jentaculo,  
aut placentulis, pro puerulis hydropicis.  
3. In *decocto*, ut alia, additis corridenti-  
bus. 4. In *pilulis*, sed tunc sumenda mi-  
nor quantitas, & addenda alia accentia,  
ne ob puluer. leuitatem excrescat nu-  
merus pilularum. Succus verò exhibitetur  
cum *Rhabarbaro* forma *infusi*, & aquas uti-  
liter educit.

## S V C C V S I R E O S.

Hic succus exprimitur ex radice iridis nostratis, illius maximè, quæ purpureum profert florem, qui calidus & siccus est tertio gradu, & potenter aquas citrinas educit: sed pueri, seni & grauidis male tutus. His enim mouet menses, illis autem validior est.

*Corrigitur cinamomo. Dosis ab ʒ ſ. ad ʒ vi. ʒ j.*

Sumitur 1. cum pauco vino & cynamomo, vel cum juscule, in quo coxere passulae cynamom. & ſpica. 2. Forma ſyrupi, si succus depuratus cum ſaccharo coquatur, cujus *dosis* ʒ ij.

## E L A T E R I V M.

Est succus cucumeris agrestis insipitus, & in paſtillos conformatus.

Optimum eſt vetuſtissimum, quodque lucernis admotum lumen extinguit, & priuſquam extinguat, ſcintillare ſurſum ac deorsum cogit.

Calidum ac ſiccum tertio gradu. Aquam ducit, ſi quicquam aliud. Nam

cum reliqua ferè eam tamūlū aquam  
educant, quæ in venis adhuc continetur,  
elaterium eam aquam elicit, quæ in ab-  
domen effluxit extrà venas.

*Corrigitur*, quia acre est, & anastomoti-  
cūm, & partes principes lredit, *bile, traga-  
carbo, bdellio*, & corroborantibus idoneis,  
ut *cinnam. Spec. diarrhod. abbai. & cor-  
dialibus*.

*Dosis*, gr. vij. Æ fl. gr. xv. quidam non te-  
merè vltar̄. grana adscendunt.

Exhibetur 1. in pilulis. R. Pilul. faci-  
lium, V. G. *distribui cum Rhab. alephang. de  
bier.* 3 fl. vel Æ ij. elaterij gr. v. vel  
etiam x. fiant pilulae : ita enim indomita  
vis refrenatur. 2. *Extracti formâ*, extra-  
hendo s. a. essentiam eius cum spiritu  
vini santalato, vel diamargarito, cuius  
essentiæ extractæ vinciæ affunde olei ci-  
namom. & nuc. mosch. ans Æ j. *Dosis* est Æ fl.  
cum aliquo liquore, vel etiam in forma  
pilularum.

## E S V L A.

Efulæ nomine omne genus tithymal-  
lorum officinarum comprehendunt ; siqui-  
dem experientia constat, ab omnibus

āquas ēduci. Aliud tamen atque aliud genus diuersi eligunt Autores , alij cypa-  
nissiam, alij esulam dulcem Tragi: alij platy-  
phyllon : alij pepulūm siue esulam rotundam,  
alij esulam majorem siue pitynsam. Dioscor.  
quaꝝ nū ab vſu recessit.

Calida sicca tertio gradu. Purgat pi-  
tuitam & bilem , sed præsertim aquas à  
remotis partibus.

*Corrigitur cinnamono , nuc. mosch. tragac.*  
*mucilag. psylli.* Omnia optimè macera-  
tur per 24. horas in aceto, vel succo pot-  
tulacæ, aut succo limon.

*Dosis, certicis, radic. à gr. vij. ad 33.gr.*  
*xv. succi verd vellatit à gr. iiii. ad vj. vij.*

Vsurpatur omnibus modis , quibus  
vnumquodque aliud catharticum ha-  
ctenus vsurpari diximus:præsertim verò  
extractum inde paratur s. a. cuius dosis  
gr. xv.

*Et hactenus quidem de Purgantibus propriè*  
*sic dictis sat abunde aet min est. Sequuntur huic*  
*Vomiteria.*

## V O M I T O R I A.

Dicuntur medicamenta , quaꝝ noxia  
quaꝝque ventriculi, redundantiam cibi,

aliarum etiam partium vicinarum hū-  
mores excrementitios, vi & impetu per  
os euacuant, deriuant, atque reuellunt.  
Idque faciunt facultate vel manifesta, la-  
xando orificium superius ventriculi, vnu-  
de retentrice labefactata, ventriculi fa-  
cultas expultrix irritata humorum copia  
vel acrimonia, quicquid suo ambitu con-  
tinet, per superiora expellit, inferioribus  
partibus sese constringentibus, quibus  
maxime utimur, vbi nauis seu vomen-  
di conatus adeat, cum otis amaritudine  
& præcordiorum dolore : talia sunt,  
*oleum simplex, aqua simplex tepida, baryrum,*  
& omnium pingua & oleaginosa: vel id  
faciunt qualitate occulta, ob quam po-  
tiūs per superiora, quam inferiora pur-  
gant. Horum omnium materia in usum  
præticum distinguitur in leuiora, me-  
diocria, & violenta. N.B. *Dosis adjuncta*  
*illud tantum vomitorium denotat, cui immediata*  
*& annexa & subjuncta est.*

### Leuiora.

*Simplicia. Aqua simplex vel hordei té-  
pida affatim ad cyathum vnum hausta  
jusculum carnium pingue vbertim for-*

VOLYI

ptum : oleum commune tepidum ad  $\frac{2}{3}$   
 iv.  $\frac{3}{4}$ vj. butyr. liquatum calidum. Compo-  
 sitione. Hydromel largiter sumptum : hy-  
 dræleum ad  $\frac{3}{4}$ vij.  $\frac{3}{4}$ x. oxymel scum aqua-  
 tepida, syrpus acetos. cum aqua tepida:  
 fucus recentes comedit, superhausta aqua-  
 tepida.

## Mediocria.

Radices; atriplicis, asati à  $\frac{3}{4}$ j. ad  $\frac{3}{4}$ iv. In  
 infuso à  $\frac{3}{4}$ j.  $\frac{3}{4}$ lb. ad  $\frac{3}{4}$ iii.  $\frac{3}{4}$ lb. betonicæ, ex  
 hydromellite in potu, Dioscor. cucume-  
 ris sativi, eupatorij Auicenn. Gesn. l.2.  
 epist. 11. fol. 63. melonis, narcissi bulbus:  
 peponis puluer. à  $\frac{3}{4}$ ij. ad  $\frac{3}{4}$ j. in infuso à  
 $\frac{3}{4}$ j. ad  $\frac{3}{4}$ iiij raphani.

Cortex; medianus iuglandis ad  $\frac{3}{4}$ j. In  
 infuso ad  $\frac{3}{4}$ iiij.  $\frac{3}{4}$ lb. maximè eius iuli fur-  
 no siccati.

Semina; janethi, atriplicis, cucumeris fa-  
 tiui, crucæ, raphani à  $\frac{3}{4}$ iiij. ad  $\frac{3}{4}$ lb. vrticæ à  
 $\frac{3}{4}$ lb. ad  $\frac{3}{4}$ j. Infus. à  $\frac{3}{4}$ j. ad  $\frac{3}{4}$ lb.

Flores; anethi, juli juglandis vt suprà,  
 ad  $\frac{3}{4}$ j. ex vino albo in colicis, ac nephri-  
 ticitis.

Succus raphani ad  $\frac{3}{4}$ ij.

Rasura proprij vnguis hausta ex vino.

*Electuarium* diaſari Fernel. lib. 7. méth.  
cuius doſis 3 iij. ex aqua hordei , mulſa,  
vel ſero laetis.

*Violenta.*

*Radices cataputiæ , cyclaminis, ebuli,*  
gratiolæ ad 3 j. maceratae verò à 3 j.  
ad 3 j ß. vel 3 ij. hellebori albi infuſi in  
juculo maxime , ad 3 ß. 3 j. 3 j ß. ad  
ſumnum , additis cardiacis ad 3 j. ſed  
cautè, naſturtij.

*Cortices; radicis ebuli & ſambuci.*

*Semina ; cataputiæ 10. 12. à putamini-  
bus delibrata, tula &c in ouo forbili deuo-  
rata , vtiliter exhibentur iis, qui philtrea,  
aut veneficia deuorarunt , geniftæ à 3 ij.  
ad 3 ß. naſturtij, ricini.*

*Flore; ebuli, geniftæ. Nux vomica.*

*Succi ; cyclaminis , acetum cùm panis  
ſilaginei medulla deſtillatum, ad 3 ij. va-  
lidissimum in febribus intermittentibus.*

*Chymica. Vitrum ḡ quoduis infu-  
ſum ad 3 j. in liquore idoneo, Mercurius  
vitæ dulcis ad ḡ v. ad ſumnum cùm 3 j.  
pilular. Antimonium præparatum, quod  
reſtè usurpatum , inſigne emeticum ac  
tutum. De huius autem præparatione,*

dōsi, ac vtēndi modo, cùm variae sint Chymicorum sententiæ, optima tamen præparatio est, quam vocant *crocum metallorum*, cuius 3 j. infunditur in vini malaūatici optimi 3 j. per 14. dies, loco tepido, agitando indies. Postea reponendo ad vīum. Dosis 3 j. vel 3 j. fl. in cochleari sumpta. Insigne remedium cùm aliis in morbis, tam febribus, quarum minera altas egerunt radices.

*Composita*; Tabulæ stibiatæ ad 3 j. co-  
mestæ, vel solutæ liquore idoneo, V. G.  
*aqua metiſſ.* Infusum sequēs. R. *Radio bryon.*  
*cyclam.* ana 3 iij. *ellebor.* albi 3 vj. diligenter mundatæ puluerisentur ac siccentur in aëre, affundatur aqua vitæ ad extantiam duorum digitorum, digere aliquot dies in B. M. Destilla, & quod in fundo remanserit, iterum puluerisetur, affundendo aquam priorem denud, idque ter repetendo. Huic liquori immerge apicem plumæ, ac vino malaūatico iterum clue, quod propinatum illicē vomitum excitabit.

## D I V R E T I C A.

*Diuretica* dicuntur, quæ subsistentem

in corpore aquositatem per vrinas euacuant. Et sunt duplicita, alia *propriè* talia, alia *impropriè*. *Propriè diureticae* sunt calida sicca ad tertium gradum, tenuis naturæ ac substantiæ, quæ facile ad venas penetrant, ibique sanguinem liquant & fundunt, serofumque à crasso secernunt, non secus ac in lacte fieri solet, quando coagulatur. Vnde postea quod crassum est, in se coit; quod serofum est, vi insita à renibus attrahitur. Talia autem sunt.

*Radices*; apij, asari, calami aromatici, cardui cuiusquæ; cyperi, dauci, erysimi, fœniculi, ononidis, petroselini, taphani, rubiæ, rufci, saxifragiæ, valerianæ.

*Folia*; absinthij, apij, Betonicæ, calamithæ montanæ, diptamni Cretici, lauri, nasturtij, petroselini, pulegij, satreiæ, serpilli.

*Flores*; camomillæ, genistæ.

*Corticæ*; medianus genistæ, lauti, raphani.

*Semina*; anisi, apij, cardamomum, cerefolij, cicera rubra, cubebæ, dauci, fœniculi, juniperibaccæ, leuisticæ, miliij Solis, petroselini, palyuri, saxifragiæ, seseli Massilieusis, vtticæ.

*Fruitæ*; amygdalæ amaræ, fucus.

*Aromata; xylocassia, seu cinamomum.  
Resina; terebinthina, laricea.  
Liquores; vinum album.*

*Animal. Canthatides ad g ij. vel iiij. sed  
his conditionibus, vt exhibeantur 1. reli-  
quis omnibus tentatis. 2. integræ, ex 1r.  
simplic. 3. nunquam solæ, sed mixtæ cum  
jusculo pingui alterato malua, althæ:  
locustæ seu cicadæ ad 9 ij. sanguis hirci.*

*Officinales aquæ; fæniculi, apij, & suprà  
dictorum.*

*Syrupi; de 5. radicibus, & 2. radicibüs.  
Species; lithontribon Nicolai.*

*Conseruae; florum genistæ, betonicæ,  
absinthij.*

*Impropriè dictæ Diuretica sunt, quæ san-  
guinem non fundunt, sed vel partium  
tenuitate serum ad vias urinarias pellunt  
ac motent, caloremq; habent vel temer-  
sum, vel ad frigidum vergentem, quibus  
utendum in calidis affectibus, vbi me-  
tus, ne calida diuretica, sanguinis serum  
absumendo, urinas potius sistant: vel  
vias urinæ leniunt, qualia sunt, *albæ,*  
*malæ, liquoritiae,* & similia lenientia, quæ  
admodum impropriè diuretica dicun-  
tur. Prioris generis sunt*

*Radicæ; asparagi, acetosæ, eryngij, fra-*

## *De Materia*

450

gorum, graminis, oxylapathi.

*Felix*; acetosæ, asparagi summitates, capillorum Veneris, herniariorum, parietariorum.

*Semina* 4. frigida majora, acetosæ, alkengi, hordeum.

*Fruitus*; fraga, nuclei cerasorum, oscula mespilotum, limones, pepones, cucumeres, cucurbitæ.

*Succi*; limonum, parietariorum.

*Gummi*; camphora.

*Officinalia*; aquæ acetosæ, graminis, hordei, parietariorum.

*Syrapi*; de succo acetosæ, capillorum Venetis, limonum. *Trochisci* de camphora.

*Chymica*; sal prænelliæ à 3 fl. ad 3 j. cum aqua, addito syrupo jucundo, ut violato.

Ex his omnibus diureticis variorum remediorum formulæ, tūm internæ, tūm externæ componi possunt.

## S V D O R I F E R A.

Dicuntur, quæ totum per sudores euant, Græcis Hydrotica dicta. Horum natura cognata est diureticis. Calor enim tenuis alte se insinuat in corpus & humores, quos attenuat & resoluit in hali-

tūs, corporis verò meatus rarefacit: vnde halitus spontè exspirant, & in sudorem condensantur. Materia verò eadem szpc. & vrinam & sudores prouocare potest: illatn, si renes calidiores, cutis densa; hos, si renes sunt frigidī, cutis rara. Taliā sunt

*Radices*; apij, angelicæ, bardanæ, chinæ, fæniculi, lupuli, petroselini, pimpinellæ, quinquefolij, salsaparillæ, tormentillæ, zedoaria.

*Ligna*; buxi, guaiacum, juniperi, sassafras.

*Folia*; cardui-bened. capillorum Venetis, camædris, chelidonij majoris, cerasifolij, fumariæ, pimpinellæ, scabiosæ, violæ matronalis.

*Flores*; chamomillæ.

*Semina*; hordeum, milij, lentium.

*Sæci*; rob. sambuci, ebuli.

*Terra* sigillata in peste & morbis contagiosis.

*Animalium partes*; cornu cerui, lapis bæzoar.

*Chymicæ*; Sal absinthij, fraxini, scabiosæ ad g. x. xij. cum aqua card. ben. (scabiosæ: antimonium diaphoreticum, ad g. iv. vij. cum conserua idonea,

*Compositæ*; Ex his vatia sunt composta, quibus tamen omnibus præferuntur potiones ex decoctis potissimum, vel infusis; aut dissolutis sudoriferis in liquote idoneo, ac licet boli vel alia forma sumantur, præstat tamen semper potionem superbibere. Huc refertur syrpus S. Ambrosij, qui constat ex milio cocto in aquæ partibus duabus & una vini.

*Officinalia*, sunt aquæ cardui-benedicti, cerefolij, fumariæ, florum sambuci, item therica & mithridatiuum; aliaque, & eleetuarium de ouo, & similia.



## LIBRI PRIMI

## PARTIS PRIMÆ

## SECTIO III.

*De Medicamentis, causam morbificam  
motu peccantem spectantibus.*

## Typus Sectionis.

Medicamenta, causā mor- bificā motu peccantem spectantia, Tunt ratione	Materiæ fluentis , In- crassantia.
	Partis recipientis , Re- pellentia : quibus fini- tima Emplastica.
	Intercipientia. Viarum.

## INCRASSANTIA.

ΠΑΧΤΗΤΙΚΑ' Græcis dicta sunt;  
quæ tenues ac fluxos humorē crassiores;

adeoque minus fluxos reddunt. Qualia sunt in actiis frigida, aut temperata, citta vllam actinoniam : substantia crassæ ac terrenæ, cuius commixtione humores tenuiores consistentiam crassiorum acquirunt, non secūs, ac terrâ aquæ mixtâ fit lutum. *Materiam* quod attinet incrassantium, quandoquidem qualitate conueniant cum repellentibus, adstringentibus, emplasticis, glutinantibus, epuloticis, & supra dictis billem incrassantibus, ex illorum ergo tabulis petenda.

## R E P E L L E N T I A.

A' *maxima* Græcis dicta, sunt, quæ humoris influxum prohibent, vel cum, qui influxit iam in partem, nondum tamen impactus est, sed remeabilis adhuc, reprimunt & repertutiunt. Naturæ sunt frigidæ, sed alia insuper sicca & terrenæ substantia, quæ validiora & proprie talia ; alia vero insuper humida & aquæ, quæ leuiora. Nam quo qualitas prima in subiecto est densiore, eo efficacius operatur. *Vsus* primarius ad inflammationum ortus & incrementa prohibi-

bēnda, secūndarius in quois rheūmatismo à plēthora , vel cacochymia. *Materia* horum talis est: è quibus quæ valentiora, sapore acerbo vel austero facilè dignoscuntur.

*Radices*; pruni sylvestris, pentaphylli, bistortæ, tormentillæ.

*Cortices*; radicis mandragoræ, querctus circa radicem, malicorium, h. c. cortex granatorum.

*Folia*; lentisci, cupressi, tubi, solani, plātaginis, myrthi, vītis pampinus, sumach seu rhus obsoniorum, folia quercus, liguītī, hyoscyami, semperuii, vmbilici Veneris, portulacæ, lactucæ, endiuīæ, cichorij, polygoni, auriculæ muris, lentis palustris, equiseti, pyri.

*Semina*; psyllij, plantaginis, myrtillorum, rosarum.

*Flores*; rosarum rubrarum, balausticum. h. c. sylvestris puniceæ flos, cytinus, h. e. satiæ puniceæ flos.

*Fruitus*; cydonia, sorba, berberis, cotna, bucces cupressi, myrtilli, gallæ virides, mespila, pyra sylvestria.

*Succi*; acacia, hypocistis, omphacium, acetum, succus granatorum, limonum, mororum immaturorum.

*Animal. excrem. albumen oui.*

*Mineralia; alumem, vitriolum, cerasa,  
plumbum, sal, tuthia.*

*Terra; bolus armena, terra sigillata.*

*Cinni; sanguis draconis.*

*Aqua; foliorum in hac tabula recensitorum, quæcunque sunt usitatæ in officiis, rosarum.*

*Olea; rosarum, myrtillorum, cydoniorum, omphacinum, lentiscinum, masticum.*

*Vnguentæ; comitissæ, refrigerans Galeni, populeonis, de bolo.*

*Emplastræ; contra rupturam, de mastice.*

## EMPLASTICA.

Dicuntur, quæ corporis meatibus & poris illita, iis tenaciter adhaerent, h. e. oblinunt, oppalent, atque obstruunt meatus. Quoad qualitates, in actiuis temperata sunt, sine cvidenti calore aut frigideitate, sine vlla acrimonia, aut mordicatione: in passiuis, quædam illorum habent consistentiam crassam & terrenam omnino, citram mortuum desiccantem, quædam insuper etiam aquo vel aëtreo humectare.

moxē pērfusa , vnde fiunt tenacia ac len-  
ti. *Vjus* horum in fluxionibus omnibus  
coēcēndis, hēmorrhagia quauis , nariū  
prāfertim : vulnetibus & ulceribus hu-  
midioribus , quæ fōuentur à fluxione,  
exsiccāndis. Secundatiō etiam ad sup-  
putandum ; cutis enim meatus opplent,  
& calorem continent, quō tumores faci-  
liūs māturentur. Talia sunt sequentia,  
quæ in formam cataplasmatis , empla-  
stri, vel pultis maxime prāscribuntur.

*Radices*; althea , liliorum, malux, sym-  
phyti.

*Folia*; alceæ, malux, portulacæ.

*Semina*; fœnogræci, lupinorum, sesami.

*Fruētus*; vux passæ, ficus, nuclei pineo-  
tum aqua macerati.

*Gummi*; arabicum, tragacanthæ, sanguis  
draconis, mastice, sarcocolla, thus & eius  
cortex.

*Animalium pētes*, excremēt. & mumia, cē-  
ra, oni albumen , adipes recentiores , &  
medullæ quadrupedum , butyrum re-  
cens, caseus recens, œlypus, agni caput,  
porci pedes, vituli caput, & pedes : spo-  
dium de ebore, h.c.materia dentium ele-  
phantinorum.

*Terræ*; bolus armena, terra sigillata,

*Farina*; tritici, amyolum, farina volatilis, fabarum.

*Mucilaginea*; cuiuscunque generis.

*Mineralia & metallica*; alumén, lithargyrium, cerusa, stibium, plumbum vstuum, cadmia, pompholix, calx.

*Lapides*; hematites, gypsū, calaminaris.

*Resinæ*; omnes, pix.

*Marina*; corallium, cochlear, succinum.

*Oles*; omnia temperata.

*Vnguentæ*; album Rhafis, vnguentum nutritum, diapompholygos, vnguentum desiccatum rubrum.

## INTERCIPIENTIA.

Vulgò *Defensus*, quæ facultate frigida & adstringente humoribus in ipsa via aditum intercludunt, ne ad partem affectam pertingant. A repellentibus solum ratione loci differunt. Hęc enim adhibentur parti affecta; intercipientia verò viis, per quas humor defluit. *Materia* itaque intercipientium eadem cum repellentibus.

## ADSTRINGENTIA.

Alias *Occidencia*, *Constringentia*, *Contractio*.

*bentia & Obstruētia* nominantur. Græcis  
 σύκα, συμάκα, συπάκα. Communiter  
 verò ac generaliori significatu adstrin-  
 gentis vox sub se comprehendit etiam  
 repellentia, condensantia, incrassantia,  
 partes robotantia. Strictè verò hoc loco  
 denotat tantum medicamenta grandio-  
 res corporis meatus, ut sunt, venarum,  
 uteri, intestinorum, &c. coarctantia, &  
 vndique constringentia, ad differentiam  
 condensantium, quæ tenues tantum &  
 exiles poros cutis constringunt. Sub-  
 stantiae secundum Galen. 5. simplic. fac.  
 c. 14. sunt crassiæ, frigida & sicca : quo-  
 rum usus in alii fluxibus, dysenteria,  
 catarrhis, & humorum quousque impetu  
 coercendo, ac sensibili quauis excretio-  
 ne cohibenda. Qualia sunt sequentia,  
 quibus semper calidiora, quæ partes ro-  
 borant, commiscenda.

*Radices*; bistortæ, consolidæ maioris,  
 tormentillæ, rhabarbarum tostum.

*Corticæ*; myrobalanorum, granatorum,  
 thuris, glandularcalices.

*Ligna*; santala.

*Folia*; plantaginis, centinodis; (poly-  
 geni laifolijs, ) equiseti, bursæ pastoris, pi-  
 losellæ, inyrtthi.

*Flores*; balaustia, rosarum.

*Semina*; acetosæ, portulacæ, myrtillorum, plantaginis, papaveris albi, rosa-  
rum; acini vulturum passerum, oryza.

*Fructus*; cydonia, pyra, sorba, corna, me-  
spila, granata, ribes, berbetis, mora im-  
matura, nucæ cupressi, gallæ.

*Succi & liquores*; amyllum, acacia, hypo-  
cistis, succus cydoniorum, agresta, vinum  
austerum, lac chalybeatum, ferratum.

*Anim. & cornu cerui vesti, cibur, mumiæ.  
Gummi*; tragacanthæ, maitix ad 3 j. san-  
guis draconis.

*Lapides & terre*; lapis hematites, terra  
sigillata, bolus armeni.

*Metallica*; jalumen, ferrum, crocus Martis.

*Marina*; cotallia, succinum, margarithæ.

*Aqua*; rosarum, plantaginis, portula-  
cæ, centidonia, acetosæ.

*Syrupi* cydoniorum, rosarum siccaturum,  
granatorum, myrtinus, miua cydoniorum.

*Conditæ*; cydonia condita, corna con-  
dita.

*Conserua & confectiones*; conserua rosa-  
rum vetus, diacodium, philonium, the-  
siaca recens.

*Trophisci*; de rhubarbaro, spedio, catabe.

L I B R I   P R I M I  
PARTIS PRIMÆ.  
S E C T I O iv.

# *De Medicamentis, causa peccanti quiete dicatis.*

## Typus Sectionis:

		<i>Discr-</i>
		<i>tientia.</i>
		<i>Absor-</i>
		<i>bentia.</i>
Materia	Insen-	
parti im-	sibili-	
posta e-	ter.	<i>Attrabē</i>
vacuatur		<i>manifestā.</i>
per me,		
dicamē-		
ta laxan-		
fia		
		<i>Extrahemiat-</i>
	Sēsibi	<i>Ichoris, Vesicantia.</i>
	liter,	
	sub	
	forma	<i>Puris,</i>
		<i>Suppurantia.</i>
		<i>Aposiemata-</i>
		<i>perientia,</i>
		<i>Vijj</i>

## L A X A N T I A.

**X**AΛΑΣΤΙΚΑ' propriè dicta sunt, quæ materiam in parte collectam euacuant, vel insensibiliter, vel sensibiliter. Insensibiliter quidem euacuant attenuantia, emollientia, rarefacientia, discutientia, nonnunquam attrahentia, & absorventia, aliquando, ut initio inflammationum, repellentia. Sensibiliter vero, ubi repelli, aut dissolvi nequit materia, primùm maturantibus pus est præparanda, deinde euacuanda pus aperientibus. Quæ omnia, pro modo & diuersitate affectus, sola, mixta usurpantur: de quibus proprio loco partim actum, partim agendum. Adeò ut non opus sit laxantibus propriam classem assignare, cùm eandem cum prædictis materiam obtineant.

## DISCUTIENTIA.

**D**iaphoretica, discutientia, digerentia, resoluentia, communiter vocantur medicamenta humores in halitus dissoluentia, & noxiā materiā per aeris agmina eu-

cūantia. Quorum alia levia sunt, & debiliter digerentia. *Rarefactionis* dicta; de quibus paulò post in secunda parte huius libri: alia verò fortiora, & validius digerentia, *Diaphoretica simpliciter* nuncupata, quæ calida siccāque sunt, partiūmque tenuium: hæc enim penetrando crassos & viscidos humores in aliqua parte hærentes attenuant, & in halitus dissolunt, vt postea per se facile dissipentur & discutiantur. Facultate cognata sunt flatus discutientibus, aut potius eadem cum illis. *Materia* ergò petenda ex tabula attenuantium & emollientium validiorum, ex tabula item flatus discutientium. Quæ vide suo loco.

## A B S O R B E N T I A.

Quæ valida attenuandi exsiccandi quæ vi, humorem emolitum & attenuatum, citra dissolutionem depascunt & absument, dicuntur medicamenta *Absorbentia*. Quorum usus est in tumoribus cædematolis, nonnunquam etiam scirrhosis; sed post usum emollientium, & attenuantium. Talia sunt sequentia, quæ forma vaporis, aut fatus cum spongia, vnguen-

ti, vel emplasti v surpari possunt.

*Liquore;* acetum, miria, aqua marina, lixiua è cineribus fermentorum & similiis, vt ab extincta clotaque calce.

*Cinis;* omnis, siculneus maximè, fermentitus, ex ilice, brassica, & herbis aliis nitrosis.

*Mineralia;* alum, sal, nitrum, sulphur, calx.

*Olea;* Philosophorum, petroleum, euphorbij, castorei, coquinum.

## ATTRAHENTIA.

E' *Attrahentia* à *attrahere* sunt, quæ humores altè impactos in superficiem eliciunt. Id que qualitate vel occulta, de quibus mox; vel manifesta: eaque vel insita, vt *thapsia*; vel acquisita à putredine, vt *similis columbinus*. Talia sunt calida sicca & tenuium partium, caloris enim est trahere: siccitas est lima caloris, tenuitas partium actionem caloris accelerat. Quoad gradum, alia sunt leuiora attrahentia, calida sicca 2. alia validiora, quæ simul etiam discutinnt, *percutere* & *icta*, calida sicca 3. *Vsus* in humoibus, spiritibus & flatibus altè impactis eliciendis ad-

Cutēm, V.G. in abscessibus criticis, bubo-nibus, ischiade, hydrope, venenis tabi-dis, ad alimentum reuocandum.

Materiā hęc est.

*Radices; thapsiæ, enulæ campanæ, iridis, aristolochiæ rotundæ, cyclaminis, pyre-thri, arundinis, narcisi, cępæ, allium.*

*Herbæ & foliæ ibetidis, calamintax, thlaspi, anagallidis purpureæ, hederæ, tithymali, & esulæ omnes, flantula, lepidium, arom, saponaria, dictamnus Creticus, ranunculus (principiè sylvestris,) vrtica, hydropiper, chamelæa, thymelæa, lauteola.*

*Semina; sinapi, vrticæ, nasturtij, thlaspi, staphisagriæ, verbasci, cardamomum, capsicum.*

*Gummi; ammoniacum, euphorbium, galbanum, sagapenum, bdellium, oponanax.*

(*Quæ tamen, vt obiter monem, secundum vulgarem consuetudinem, in hac & aliis tabulis, ad gummata referimus; ne immores in lectione materiæ Medicæ aut Receptarum turbentur: alias Bdellium propriè est resina; reliqua verò sunt succi inspissati.*)

*Resinæ; pix arida, resina vulgaris.*

*Excrements; mel, sterlus caprinum, fi-*

mus columbinus, asininus, & omnes.

*Animal.* cantharides, scorpiones, cæstorum.

*Lapid.* & mineral. magnes, sulphur.

*Marina:* succinum, sive electrum.

*Emplastræ:* oxytroceum, de meliloto, fermentum acerrimum.

## EXTRAHENTIA.

Sub attrahentibus comprehenduntur, que occulta qualitate venenum, spicula, vel alia vulneribus infixi, extrahunt: quorum indefinitus cum sit numerus, nondum satis constet cujusque extrahendi corporis analogum medicamentum epipasticum, eapropter communibus potissimum & indeterminatis, cuiuscunque corporis infixi extractionem adjuuantiibus, contenti erimus. Veluti sunt sequentia.

*Radices;* atistolochiæ, rotundæ, iridis nostratis, arundinis, pastinacæ sylvestris, ari, bulbi omnes, eryngij radix cum melle trita.

*Folia;* genistæ, dictamnus Creticus, rhabacum, (quæ duo venenum extrahunt,) anagallis vtraque, verbascum vulgare.

*Cortex; medianus tilix.*

*Semina; verbasci, sinapi.*

*Gummi; ammoniacum, galbanum, opopanax.*

*Animal. cochlear, terrestres tritæ cum putamine, lacertæ caput in puluerem tritum, lingua vulpis præparata, (codem modo quo pulmo ipsius,) vino rubro, vel decocto aristolochia rotundæ macta, valet ad extrahendum plumbum.*

*Excrem. propolis.*

*Lapides: magnes præparatus ferrum trahit, lapis lyncis paleas, &c herbarum caulinulos.*

*Mariæ succinum etiam paleas trahit.*

*Emplastræ: apostolicum, fermentum.*

*Vnguentum nigrum, seu fuscum Nicolai.*

## V E S I C A N T I A.

Ab effectu nomen sortita sunt medicamenta, quæ vel parti tantum ruborem inducunt, unde *Pbœnigmi* dicuntur; vel insuper etiam vesicas excitant, quibus apertis serofus humor effluit, unde *Vesicaria* nominantur. Naturæ sunt calidæ 4. gradu; sed substantiæ tenuis, cuius

causa superficiem partis penetrare possunt. *Vſus*, cùm materia neque attenuantibus, neq; mollientibus, neq; attrahentibus disconti potest; violenter enim attrahunt, dissoluunt & colliquant, cuticulam instar feruentis aquæ in vesicam attollunt, in quam, quicquid humoris attractum, colligitur. *Materiam* quod attinet, multa quidem ex attrahentium tabula buc solent referri, operationem vesicantium juvantia; paucissima tamen sunt, quæ ad hanc classem per se possunt referri, nimirum.

*Cantharides* cum aceto fortissimo malaxatæ.

*Thapsia*, eius nimirum radix & flos.

*Flammula Louis.*

*Radix ranunculi minoris.* h. e. 5. Matthiol. & 3. Fuchs, qui etiam *flammula* dicitur *Gesnero*.

*Fermentum vſum.*

## S V P P V R A N T I A.

*Exstirpatione* seu suppulantia medicamenta sunt, quæ naturam in puris generatione adjuvant, quorum *vſus*, si discutientibus medicamentis malum non cedat, in tumoribus sanguineis, vel cum

sanguinē mixtis, vtpote qui soli suppura-  
ri possunt. In tumoribus enim ex bile &  
melancholia vix sine periculo adhiben-  
tur suppurantia, quin degenerent & cor-  
ruptantur hi humores, vt cancerum &  
maligna ulcera excitent. Naturæ se-  
cundūm Galen. 5. simpl. cap. 8. 9. sunt si-  
millimè corpori & parti, cui adhibentur,  
(in calore sc. & humore,) vt calorem  
ionatum ageant & foueant, qui huius  
concoctionis autor est : prætereà em-  
plastica, quæ lentore suo cutis spiracula  
occludunt, spiritus & calorem intus co-  
hibent, vt auctior redditus, humorē fa-  
cilius maturare possit. Qualia sunt se-  
quentia, è quibus si quædam sicciora vel  
humidiora videntur, aliorum mistione  
contemperanda.

*Radices*; altheæ, lillorum albotum, tu-  
filaginis, bryoniaæ recentis, cucumeris  
sylvestris recentis, cępa cocta.

*Folia*; altheæ, maluæ, acetosæ, brancae  
vitis, viscum.

*Semina*; lini, fœnogræci, hordei, tritici.

*Farinae*; hordei, tritici, panis triticei,  
etobi.

*Fruitu*; caricæ pingues, passulæ, dy-  
alyli pingues.

*Gummi*: ammoniacum, bdellium.

*Resinæ*: terebinthina laricea, thus, styrax liquidus, pix, resina vulgaris.

*Animal*, adeps galinaceus, anserinus, axungia porci, medulla vituli, butyrum, cœsypus, vitellum oui, cera flava, propolis, lac.

*Seruum quodcunque.*

*Sacci & liquor*. sapa, aqua calida perfusa, hydrelæum, ladanum.

*Oles*: oleum dulce, amygdalarum dulcium, seminis lini, liliorum album.

*Vnguentæ*: altheæ, resumtium, basiliconis, Agrippæ, aureum.

*Emplastræ*; diachylum simplex & compositum cum gummi, fermentum.

## APERIENTIA APOSTEMA.

Varia quidem sunt, quæ pusi apertunt, inter quæ simus columbinus, tanunculus, cantharides, lac ficalneum: attamen tumores maturati vñstatiūs ferro & igne, sive cauterio actuali, vel potentiali aperiuntur solent.

# LIBRI PRIMI

## PARS SECUNDA.

*De Remediis respondentibus morborum  
summa genera.*

DIATYPOSIS hujus PARTIS.

**M**ORBORVM summa genera  
tria sunt. Intemperies, Mala com-  
positio, Vnitatis solutio.

Intemperies vel est simplex, cui oppo-  
nuntur *Alterantia*: vel cum materia, quæ  
habet rationē causæ, & postulat remedia  
*causis opponenda*. De his actum parte prima.

Instrumentorum vitia, quæ quidem  
medicamentis tolluntur, sunt. 1. Angu-  
stia meatuum insensibilium: Densitas ni-  
mirum, cui opponuntur *Rerefacientia*. 2.  
Dilatatio mearum insensibilium, cui  
*Condensantia*; sensibilium, cui *Adstringen-  
tia* (suprà explicata) opponuntur. 3.  
Morbi quidam ab hypersarcosi nati, ut  
constipatio cauitatis, magnitudo velnu-

*F*abri Medicinae

merus auctus, qui requirunt Cabareticā,  
vbi de Pyrricū in genere.

Reliquorum malorum compositionis morborum remedia vel sunt Praeservatoria, opposita eorum causis, cum quibus una tolluntur, adeòque hic non repetenda; vel Chirurgica, adeòq; huc impertinetia. *enitatis*

Vnitas soluta, vel est simplex, & requirit Glutinaria, quod spectant Vulneraria; vel conjuncta cum deperditione substantiarum, huc Sarcorica, Epulotica, Callum generantia. De quibus singulis in specie.

## R A R E F A C I E N T I A. *et pertinentia*

*Αράχνη* Græcis dicta sunt, quæ cutis meatus, ac poros aperiunt, ad insensilem transpirationem procurandam. Talia sunt calida moderatè, nostróque simillima calori, humida, ut laxent; nam siccata coarctant; tenuium partium, ut penetrant. *Vsm* præcipue externus, ad internas maximè putredines cuitandas; vaporibus & fuliginibus sanguinis hac ratione difflatis: in tumoribus superficiariis, vbi materia est calidior, pars vero natura mollis & tara, ut humor in parte con-

tentus, tumorem doloremque excitans, solutus, in vapores melius exhalare possit. Qualia sequentia existunt.

*Radices; altheæ, liliorum alborum.*

*Folia; anethi, malvae, violæ, sambuci, tibuli, branæ, vrsinæ, mercurialis.*

*Flores; chamomillæ, meliloti, sambuci,*

*Semina; lini, fœnogræci.*

*Fruitus; ficus atidæ.*

*Adipes & axungiae; porcina, vitulina, gallinacea, humana, anserina.*

*Excrements; butyrum recens, æsopus.*

*Aqua; chamomillæ, liliorum alborum, aqua tepida, ciuisque balneum.*

*Olea; oliuatum, liliorum, alborum, violatum, amygdalarum dulcium, lunibricotum, chamomillæ, anethi, seminis lini, irinum, jasminum.*

*Vnguentæ; resumptium, altheæ.*

## CONDENSANTIA.

Numenæ sunt, quæ pores cutis contractant, ad insensibilem transpirationem cohibendam. Naturæ, respectu adstringentium (de quibus supra) magis aqueæ. Quorum usus ad nimium sudorem, & spirituum dissolutionem inhibendam.

Materia sequens est.

*Folia; semperuium maius & minus, la-  
etula, portulaca, umbilicus Veneris, en-  
diuia, cicerbita, dens leonis, psyllium,  
nymphaea, lenticula palustris.*

Aqua frigida. Summatim, quæ cuncte  
refrigerant, sed non adstringunt, tenues  
quidem poros contrahunt; sed totam  
partem valentius adstringere nequeunt.

## P Y R O T I C A.

Pyrotica in genere dicuntur, quæ ca-  
lore suo excedente, non secus ac ignis,  
vel aqua feruens, cutim in variis usus  
adurunt. Vnde igneæ protinus naturæ  
esse necesse est. Differunt tamen gradii  
bus caloris & modo materiæ. Primi ge-  
neris sunt *Rubificaria*, & *Vesicantia*, om-  
nium mitissima, de quibus suprà. Secun-  
di generis sunt *Caliberetica*, excedentia, si-  
ue corrodentia, sarcoticis opposita, quæ  
in superficiem tantum agunt, citra vicinæ  
partis corruptionem, eamque leniter, ac  
sensim arrodunt, atterunt, detrahunt atque  
absumunt. Calida sicea in 3. & 4.  
gradu, substantiæ tenuis, ut se in mate-  
riam absumendam insinuent, & prius

quām longius penetrare qūtant, dissipentur. Tertij generis sunt *Sepica*, vel putrefacientia, cāthæreticis acriora, quæ altius penetrant, carnemque tenuem colliquant, putrefaciunt, & corruptunt. Idque faciunt non tam summi caloris beneficio, quām malignā qualitate, quam propter calori nativo infensissima, eius nymphae destruunt, vnde sequitur humili primigenij dissolutio, & cadauerosa putrilago. Substantiæ sunt multò etiam superiora, quām superiore, ( moderatè tamen, cùm sint aliàs leptomera; ) tenuior enim à calore nostro facilè dissipatur. Quarti generis sunt *Escharotica*, aliàs *Castrica*, & *Canteria potentialia*; ( licet alij discretim constituant inter Escharoticum, & Causticum, vt illud sit mitius, hoc vehementius, ) quæ altissimè penetrant, nec modò cuticulam, sed veram etiam cutim, instat ignis, repente adurunt, crastā duriore inductā, quam Escharam vocant. Calidissima sunt in 4. gradu, substantiæ absolute etiam & terrene, ob quām summus calor non facilè diffidatur, sed tenaciter adhærens violenter vrit, vellicat. Vnam : *Cathæreticorum*. In excrecentia carnis, seu morbis ab hyper-

sarcosi natis; in polypo, tuberculis, verrucis, callis absumendis, detrahendis. *Scorpiorum.* In tumotibus variis, polypis, ozenis, in callis, & excrescentiis, ulceribus putridis, phagedænicis, malignis, partibus corruptis auferendis. Sed hæc potius, quia labem in emendabilem reliquunt, ex agro Chirurgico exterminanda essent, eorumque loco usurpanda, si opus, Detergentia, Cathæretica, Escharotica. *Escharotorum* siue *Causticorum.* Cilm cutis quavis de causa aperienda est, & laborans sectionem vel vstionem per cautetum actualē ferre nequit, tunc utimur medicamento caustico: Item, ubi sanguinem suppressimere volumus & vasorum erosione erumpentem, non crustam inducit, tanquam operculum, parti, è qua sanguis fluit. Pyroticis annumerantur. *Psilorrhæ,* seu medicamenta depilatoria, h.e. partem pilosam glabram reddentia: habent enim & ipsa facultatem erodentem & causticam.

### Materia Cathæreticorum.

*Radicis aristolechiae rotundæ in furo siccata, asphodeli, cucumeris sylvestris*

quæ mitiora; hellebore nigri, quæ validior.

*Cineres*; testatum conchatum, tithymalorum, gallatum vistarum.

*Lapides*; pumex crematus, lapis lazuli illotus: quæ mitiora.

*Mineralia*; vitriolum calcinatum, plumbum vstum, alumen vstum, argentum viuum præcipitatum, rugo, sublimatum; ztis squamma, calx, chalcitis, misy, sory, antimonium calcinatum peculiariter ad caneros, sal ammoniacum, cinabrium.

*Oles*; vitrioli, sulphuris. *Aqua ferris*.

*Vnguentia*; apostolorum, ægyptiacum, Isidis.

*Trechisci*; Musæ, Passionis, Androis.

## Materia Septicorum.

Purum.

*Arsenicum*

Sublimatum.

Auripigmentum.

Cedrinus liquor.

Chrysocolla.

Sandaracha Græcorum.

Acqnitum,

Dryopteris.

Pithyocampé.

Materia Causticorum siue Escharou-  
cotorum.

Materia *caustica* est ferè lixiuum, è quo sapo conficitur, ex quo vel solo cauterium fieri potest, quod sexcentis aliis præfert Heurnius l. i. meth. ad praxim, quem vide ibidem. Propria materia est multiplex, ac vix Chirurgus existit, qui nō aliquid secreti jaicit; alias enim lixiuio addit vitriolum sublimatum, auripigmentum, salem ammoniacum, nitrum, fel vitri, cinctes clauellatos, sal gemmæ, &c. ex quibus variè componiunt *sua cauteria*.

## P S I L O T H R A.

Ad depillandas partes, alij vrenti actu usurpant, (aurum maximè,) alij potestate agentia, qualia sunt:

Lixiuum forte.

Calx viua.

Oua formicarum.

Sandaracha.

Arsenicum,

*Autripigmentum.*

*Oleum.* { *Sulphuris.*  
*Vitrioli.*

**G L V T I N A N T I A.**

Kommunque medicamenta sunt , quæ labra recentis vulneris conjungunt. Talia in calore sunt temperata , ne acrimoniâ feriant : in reliquis qualitatibus desiccant cum adstrictione , & substantiæ crassitie , sic enim prohibent , ne inter labra coitura aut influat , aut succrescat humor. *Vsus* in cruentis vulneribus , quamuis & ulceribus , vbi mundata sunt . Hæc autem materia visitatior.

*Radices;* pentaphylli , tormentillæ , symphyti .

*Folia;* saniculæ , pyrolæ , pilosellæ , herniariæ , cynoglossi , plantaginis , hypetici , verbenæ , salicis , scabiosæ , atitaclylis , isatidis , chamæpyteos , centauri minoris , millefolij , betonicæ , bugulæ .

*Gummi;* sarcocolla , sanguis draconis .

*Resinæ;* thus , myrrha , pix , terebinthina .

*Succi;* aloë , hypocistis .

*Animalia;* mumia , lumbrici , pili leporis vesti .

Mineralia; lithargyrum, plumbum, cadmia, lapis calaminaris.

*Vnguentum de lithargyrio, de betonica.*

## V V L N E R A R I A.

*Traevulsa* medicamenta sunt, è quibus potioncs vulnerariæ vulgè dictæ componuntur: quorum vis est singularis sanguinem expurgandi, & ab omni excrementitiorum humorum collusione vindicandi, vt ex eo, tanquam laudabili materia, caro & quævis alia substantia deperdita promptè reponi possit, & pars pristinæ vñioni restitui. Vide Parænum lib. 18. c. 28. *Vñsus in ulcerum & vulnerum difficiliore curatione.*

*Materia* ita se habet.

*Radices*; tormentillæ, consolidæ vtriusque, zedoariz, galangæ, angelicæ, bistortæ, aristolochiz rotundæ, liquiritiaz, caryophyllatæ.

*Herba ac folia*; limonij, saniculæ, pyrolæ, verbenæ, alchymillæ, persicariae, virginæ peruvineæ, agrimoniz, ophioglossi, claminis, virgæ autæ, vel consolidæ Sarracenicæ, equiseti, betonicæ, pimpinellæ, sanguisorbæ, ceterach, artemisiæ, lilijs, comuallij,

conuallij, centaurij minotis, vēronicæ,  
polygonati, plantaginis, sabinæ, cardui  
benedicti, pilosellæ, hyperici, tanace-  
ti, herniatix, scordij, serpentariæ.

*Fruitus*; cicera rubra, grana juniperi  
contusa, nux juglans.

*Animalia*; cancri fluuiatiles, astaci,  
mumia, oculi cancri.

*Marina*; sperma ceti.

*Lapid. ac terræ*; corallum rubrum, al-  
bum, bolus, armena.

*Aqua* destillatæ ex herbis prædictis.

## S A R C O T I C A.

Medicamenta sunt, quæ remouent im-  
pedimenta naturæ in carnis generatio-  
ne; videlicet, duplex excrementum, quod  
in ipsa carnis generatione perpetuò gi-  
gnitur: tenui nimirum, quod ichor sive  
sanics vocatur, unde vlcus humidum  
redditur: & crassum, sive fordes, unde  
fordidum efficitur. Illud exsiccandum,  
hoc detergendum est. Naturam itaque  
habent Sarcotica moderatè calidam &  
sicciam, infra secundum ordinem, & de-  
tergentem sine motu. Quod enim cali-  
dius, carnem colliquat; frigidius adstrin-  
git, & sanguinem ad generationem car-

nis fluentem repellit : siccus absumit  
quod influit : detergens cum morsu non  
modò sanguinem in carnem concrefere  
non sinit, sed & mordicando fluxiones  
excitat. *Vsus* in vulneribus aut ulcere-  
ribus cauis.

*Quoad materiam*, quæ inter Sarcotica  
recessentur, vix merè talia sunt, quin  
simul vel glutinantia, vel detergentia,  
vel pus mouentia existant; aliorum proin  
temperanda mixtione. Propriè verò ta-  
lia sunt sequentia, inter quæ sicciora sic-  
cioribus, minus siccæ humidioribus adhi-  
benda sunt corporibus.

*Radices*; *Tymphyti*, *iridis*, *aristolochiae*.

*Folia*; *hyperici*.

*Succi*; *aloë*.

*Farina*; *bordei*, *orobi*, *erui*, *scenogræci*.

*Resinae*; *thus*, *colephonia*, *mastix*, *resinsa*,  
*pini*, *lachryma abietis*, *pix*, *terebinthina*,  
*myrrha*.

*Gummi*; *tragacantha*, *sanguis draconis*,  
*farcocolla*.

*Mineralia*; *cadmia*, *cerosa*, *tuhia*, *pom-*  
*pholix*, *lithargyrum*, *plumbum* *vstum* &  
*lotum*.

*Vnguentia*; *aureum*, *desiccatum* *ru-*  
*bruin*.

**E P V L O T I C A.**

*Cicatrizantia sunt, quæ vlcus carne repletum cicatrice obducunt. In passiuis valde sunt sicca, vt non modò absument humorē influentem, sed & eum, qui in carne vlcetis est : crassioris substantiæ, vt adstringant & contrahant. In actiuis frigida potius, quam calida, ac si ne mortu : licet multa inter epulotica numerentur, cum mortu desiccantia, du rioribus tanum corporibus conuenientia. Uſus patet. Materia hæc est.*

*Radices ; aristolochiæ rotundæ, tormentillæ.*

*Folia ; plantaginis, myrthi, granatorum, cauda equina, numulatia.*

*Cortices ; granatorum, glandium callices.*

*Cineres & vſla ; lanæ crematæ, linteorum, gossypium vſtum, spongia vſta, pili leporis vſti, testæ fornacum vſtæ.*

*Gummi & succi ; sanguis draconis, acacia.*

*Fruſtas ; cupressi, gallæ immaturæ.*

*Flores ; balaustia, roſarum.*

*Terra*; Lemnia, Armenia, crēta alba.

*Lapides*; hæmatites, calaminaris, gypsum.

*Metallica*; scoria ferri, alumēn vſtum, plumbum vſtum & lotum, plumbi puluis de quo vide Fernel. lib. 6. m. m. c. 16. æs vſtum, cerusa, lithargyrium, chalcitis, cadmia lota, pompholix, sulphur, ari-pigmentum, vitriolum, tuthia vſta, lota, antimonium vſtum, calx lota, spodium.

*Animal.* cornu cerui vſtum, os sepiæ, ebur vſtum, ostrex testa.

*Marina*; corallia.

*Vnguentæ*; album Rhasis, nutritum, vel de lithargyrio, de cerusa, de tuthia, de minio, deuccatiuum rubrum.

## CICATRICES DE LENTIA.

*Adipes & medullæ*; humana, asinina, cervina, axungia thymali piscis.

*Olea*; myrræ, vitellorum ouorum, camphoræ, balsamum orientale.

*Farina*; fabarum, & succi hederae.

*Semina*; erucæ, sinapi.

*Mineraria*; borax, nitrum.

*Aqua*; florum liliorum, & fabarum. Ex quibus varia sunt vnguenta, linimenta,

## CALLVM-GENERANTIA.

*Propriæ* dicuntur; non quod propriæ callum generant: hoc enim naturæ opus: sed quod naturam hoc in opere adjuuant. Talia in actiuis moderatè sunt calefacientia, (ne resoluant & consumant succum, è quo callus generari debet,) in passiuis desiccant: quoad secundas qualitates, incrassant, indurant, adstringunt. Suntque

*Internæ*; succus primulæ veris, radicis agrimonix succus aut puluis: cum primis lapis osteocolla ad 3j. cum aqua symphyti.

*Externæ*; aloë, acacia, bolus Armena, fatina volatilis, lapis osteocolla, nux cupressi, thus, gümnnii tragacanthæ.

# LIBRI PRIMI

## PARS TERTIA.

*De Remediis resipientibus symptomata communissima, maximèque urgentia.*

### T Y P V S.

Symptomata cōmuniſſima, ma- ximēque vrgē- tia ſunt ſequen- tia, iſque op- poſita remedia.	Dolor, cui oppoñū tur.	Anodyna. Narcotica. Vigiliæ, Hypnotica. Sanguinis fluxus. i- gumenta. Syncope. Reficiēria pī- ritus.
---	------------------------------	--

### A N O D Y N A.

**A**NODYNA, vel Paregorica ſunt, quæ perſiſtente cauſa doloris, neque ta-  
men ſenſus ſopiendo, dolorem leniunt:  
qualia ſunt in actiuis qualitatibus quam  
maximē temperata, & calor in oſtro ſimi-

līma: in passūis humida; siuē aquēa, siue  
aërea: substantiæ tenuis, omnis adstri-  
ctionis expertia. Hęc enim blando suo  
calore partis calorem fouent, tenuitate  
substantiæ in partes subeunt, benigna  
humiditate easdem laxant: quod causa  
doloris in parte contenta, per adhuc  
dyspepsia facilius discutiatur, & evacue-  
tur. Materia horum talis est, quæ sunt  
topica externa potissimum.

*Radices*; althææ, liliorum, maluxæ.

*Folia*; sambuci, maluxæ, violariæ, anethi.

*Semina*; lini, scenogræci, tritici eiusque  
farina, hordei.

*Flores*; chamomillæ, meliloti, verbasci,  
crocus.

*Animal. partes, excrem.* lac tepidum, bu-  
tyrum recens, insulfum, cœsypus, vitellum  
oui, caro animalium adhuc calens, omen-  
ta animalium, pulmones animalium re-  
cens extinctorum.

*Medulla*; omnes officinales.

*Adipes & axungiae*; suilla, anserina, gal-  
linacea, humana.

*Olea*; oliuarum dulce, lumbricorum,  
rosatum, chamomillæ, amygdalarum  
dulcium, liliorum, seminis lini, vitello-  
rum ouorum, hydrelxum, anethinum;

jasminum, keirinum, sesaminum.

Panis triticus mediocriter coctus, calens.

*Medulla panis albi.*

*Mucilagine ; seminis malvae, psyllij, althææ, fernogräci.*

*Seua ; caprinum, ceruinum, hircinum.*

*Vrgmenta ; pectorale, althææ.*

Ex quibus varia sunt anodyna, fo-  
menta, linimenta, pultes, cataplasmata.

## NARCOTICA.

*Narcotica medicamenta sunt, quæ pat-  
tibus sensum auferunt, vel stuporem in-  
ducunt, ne id quod dolorificum est pet-  
cipiant : quorum usus in vehementissimis  
doloribus. Omnia quidem vehementer  
frigida, sed non tam manifesta frigidita-  
te, quam occulta stuporem inducunt.*

*Radix ; mandragoræ, hyoscyami.*

*Folia ; hyoscyami, mandragoræ, pap-  
averis, solani somniferi, tabaci.*

*Flores ; hyoscyami, papaveris, croci.*

*Seminæ ; papaveris albi & nigri, hyo-  
scyami, lolij.*

*Sacci inspissati mandragoræ, hyoscy a-  
mi, opium.*

*Syrupi; papaveris albi, erratici.*

*Olea; mandragoræ, & feminis papaveris albi.*

*Opiaæ; theriaca recens, requies Nicolai, philonium Romanum, & Persicum.*

*Pilulæ; de cynoglosso.*

*Laudanum opiatum, siue nepenthæ ad g iij. iv. v.*

## H Y P N O T I C A.

*Somnifera medicamenta dicuntur, quæ suaves æquummodatæ ad caput mittunt, & calidos siccos, & acres vapores temperant. Quorum usus maximè, ubi à vaporibus acribus vigiliæ proueniunt. Cujusmodi sunt sequentia.*

*Folia lactucæ, semperuii, anethi.*

*Semina; lactucæ, frigida majora, papaveris albi.*

*Flores; violarum, nymphæ, rosarum.*

*Fruitæ; amygdalæ dulces, nuclei persicorum.*

*Aqua; violatum, nymphæ, lactucæ, portulacæ, solani, rosarum.*

*Syrupi; violatum, nymphæ, papaveris.*

*Conserua; violatum, nymphæ.*

*Condita; caules lactucæ italicæ conditi.*

*Succi*; *lactucæ*, *nymphæx*, *solani*.

*Species*; *diamargariti frigidi*.

*Oles* ad inungendum frontem, tempora, & plantas pedum: *oleum violatum*, *nymphæx*, *papaueris albi*, *amygdalarum dulcium*, *anethi*, *salicis*, *mandragoræ*, *ratanum*.

*Medalla*; *crutum vituli*, *cetui*.

*Vnguentum*; *populeonis*. Ex quibus omnibus variare media ad somnum conciliandum, tūm interna, tūm externa, comparati possunt.

## PROFLVENTEM SANGVINEM Cohibentia.

*Torquæma* sunt medicamenta sistentia sanguinem vberius prorumpentem ex vena: siue aperta aut excessa sponte, siue rupta, aut in vulnere praecisa. Præstant autem id, præter medicamenta caustica, quæ venas utendo crustula ( tanquam opérculo ) obducunt, quæ omnia cohabet, alia insuper medicamenta variis modis: videlicet, vi emplastica, quando crassa aut lenta substantia constat, vénarum exitus infarciente atque implete: aut vi refrigerandi, adstringendi

& siccandi, aliaeque quadam proprietate.  
Quorum omnium *materia communiter*  
sequens traditur.

*Radices*; symphyti, pentaphylli, thabarbari totrefacti, vrticæ..

*Conices*; granatorum, cortex pini.

*Folia*; plantaginis, centinodis, equiseti, vincæ peruvincæ, pimpinellæ, sanguisorbæ, androsæmæ, vrticæ, salicis, lenticulariæ palustris, lactucæ, portulacæ, solani, semiperuini vtriusque, rubi germina..

*Flores*; balaustia, cytini.

*Fruitus*; mala cydonia, pyra austera, sorba, mespila, rubi, mora immatura, thus obsoniorum, gallæ immaturæ, gallæ exustæ, moxque aceto, vinoue extinctæ.

*Succi & liquores*; acacia, hypocistis, aloë, acetum, oxycratum, vel posca, omnipodium, aqua frigida, succus cucurbitæ, portulacæ, vinum austerum.

*Resinae*; thus, myrrha, mastix, resina srica. §. m. n. 3.

*Gummi*; sanguis draconis.

*Marina*; corallia.

*Animalium partes, excrements*; glutén; mumia interne, externe: albumen ouï, tela aranæ, præsertim cui pollen è præstrina adhæsit, sanguinis grumus exsicca-

tus, spodium de ebore, plumæ gallinacē & combustæ, pili leporis & hominis combusti, ossa cremata.

*Lapides*; hæmatites, schistus, jaspis, gypsum lotum.

*Terra*; puluis communis 8. simpl. bolus, terra sigillata.

*Farine*; tritici, fabarum, amyrum.

*Fuligines*; fuligo à clibano, vel lebete anco derasa, fuligo thuris vel mastices.

*Mineralia*; lithargyrium, cerusa, pompholix, vitriolum, alumem.

*Marina*, spougia, quæ est fungus marinus.

## REFICIENTIA SPIRITVS.

Non est hic sermo de iis, quæ causas spiritus resoluentes tollunt, & per accidens eosdem reficiunt: neque de iis, quæ cordis calorem roborant, ad cardiaca releganda, sed de solis illis, quæ grato suo halitu & vapore subito spiritus reficiunt, quorum usus in aniini deliquio & syncope. Qualia sunt:

*Radices*; acori veri, angelicæ, caryophyllatæ, cyperi, iridis Florentinæ.

*Cortices & ligna*; citri, atantiorum,

*lignum aloës, santala, maximè citrina.*

*Folia; calamintha montanæ, Hyssopi, lauendulæ, majoranæ, melissæ, mentha, ocymi, rosmarini, pulegij, serpylli, thymi.*

*Flores; arantiorum, garyophyllorum, citri, jasmini, lilij conuallij, limonum, spicæ omnes, rosatum, viola purpurea.*

*Baccæ; juniperi, lauti,*

*Fruitu; cotonea benè matura, poma redolentia.*

*Aromata; caryophylli Indici, cinamomum, macis.*

*Resinæ ac gummi; styrax, camphora.*

*Excrements; moschus, zibetum.*

*Aqua & acetæ; aqua cinamomi, florum citri, arantiorum limonum, lauendulæ, jasmini, rosarum, acetum generosum, garyophyllatum, rosatum.*

*Olea odorata; cinamomi, costinum, de nuce moscata, spicæ, camphoræ, jasminum, garyophyllorum, oleum balsami, cotticum citri, & similia.*

N.B. In mulieribus hæc odorata naribus non admouenda, ubi adegit metus suffocationis vieni sed potius graevolentia, ut castoreum, ruta, &c.

est res in  
veneris.

## LIBRI SECUNDI

De Materia medica Particulari.

## SECTIO I.

De Remediis capitis.

Typus Sectionis.

	Cephalica.
Cerebro	Caput purgia. Errhina. Sternutatoria. Apopblegmatizantia.
Capitis remedia dictata sunt vel	Oculis, Ophtalmica. Flegmone. Anodyna. Repellentia. Digerentia. Detergentia.
	Auribus, Otica.
	Dentibus, Odontica.

## CEPHALICA.

**C**EPHALICA propriè dicuntur; quæ cerebri calorem natuum & ~~invenientiam~~ conseruandi & instaurandi vim obtinent, cerebrumque ab omni causarum illuvie expurgatum confirmant. Quorum (ut & omnium aliorū corroborantium, à partibus ipsis denominationem habentium) *Vſus* tamen antequam morbi invaserint, tūm in ipsis, & post ipsos expugnatos: passim verò post vniuersales purgationes, ad robur partibus restituendum, (vnde nomen corroborantis,) ne posteà vitiosos humores, indeque nouos affectus, suscipiant aliundè, aut fiat recidua. Licet verò eiusmodi corroborantium facultas videatur occulta; caliditatem tamen, vel frigiditatem conjunctam habent, quarum ope intemperici calidæ frigidæve vestigia simul tolluntur. In specie verò etiam Cephalica duplia sunt, calida, affectibus cerebri frigidis, & frigida, affectibus eiusdem calidis & siccis, vt deliriis, mificandis idonea.

## Calida.

*Radices, aristolochiae, insignis in epilepsia ab utero, calami aromatici, acori & galangae ad flatus, paeoniae maris ad epilepsiam & pauores, viscum quercinum etiam, iridis Florentinæ, cyperi, zedoarum.*

*Folia; betonicæ, majoranæ ad flatus, saluicæ angustifoliæ, & centaurij minoris ad neruos firmandos, rosmarini ad tremorem & paralysin, lauri, myrthi ad catarrhos, calamenthæ montanæ, lauendulae, primulæ veris, ocymi gariophyllati, saturejæ, hyssopi, melissæ, origani.*

*Corticæ & ligni; cortex citti, guajaci, sassaphras, xyloaloë.*

*Semina; coriandri, fœniculi, sileris montani, baccae juniperi, lauti, myrthi; grana kermes, seu tinctorum, paeoniae, melanthij. seu nigellæ semen.*

*Flores; stœchados Arabicæ, cælestri, ac neruorum q. vita, vertigini, epilepsiarum, ac melancholiæ saluberrima: lilij conuallij, tiliæ, spicæ nardi, centaurij minoris, betonicæ, anthos, meliloti, chamomillæ.*

*Fruitur*: anacardia, sed cautè, cùm sanguinem adurant.

*Aromata*: nux moschata, cubebæ, &c v.  
quotidiè deuorata, cardamomum, mace,  
garyophylli aromatici, cinamomum,  
zingiber, piper ad humidum cerebrum.

*Resinæ*: thus ad obliuionem, mastix, styrax, benzoin.

*Animalia*: castoreum eximium, moschus,  
cenis hirundinum, & sterlus pauonum in  
epilepsia.

*Minera*: ambra, succinum.

*Aqua*: foliorum prædictorum stillæ-  
titæ, aqua vitæ cum castoreo, theriacalis  
cum succo betonicæ imperialis, cœlestis,  
cinamomi.

*Oleum*: nucis moscatæ, garyophyllorum,  
cinamomi, majoranæ, succini, rosmarini.

*Syrupi*: de stœchade, betonica, mel rosa-  
rum, anthos, oxymel simplex, & compo-  
situm.

*Conseruae*: florum anthos, betonicæ, sal-  
viae, stœchados, tiliæ.

*Condita*: corticum citri, acori, myroba-  
lanorum, nucis moscatæ. Coriandrum  
obductum.

*Confectiones*: theriaca, Mithridatum  
vetus: confect. auræa Alexandrina, ana-

*cardina; sed cautè.*

*Species dictæ in pituitam præparan-*  
*tibus.*

*Trechisci; de carabe, gallia moscata.*

### *Externæ.*

*Semen; nigellæ, vel cumini torrefacta, &*  
*linteo inclusa sincipiū admota.*

*Olea; myrtinum, rutaceum, laurinum,*  
*nardinum, nucis moschatæ per expre-*  
*sionem.*

*Emplastræ; de betonica, de baccis lauri,*  
*& in pertinaci dolore de Vigo cum*  
*Mercurio.*

*Ruta & serpyllum, ad dolores, deliria,*  
*mentis perturbationem, & vigilias.*

*Eodem modo Verbena.*

### *Frigida.*

*Herbe; acetosæ, lactucæ, portulact,*  
*violatum, cucumeris, capreoli vitium*  
*(die glaben.)*

*Lignæ; santala, citrina, rubra, alba.*

*Flores; rosarum, violarum ad somnum,*  
*symphœæ.*

*Semina; 4. frigida majora, lactucæ, p. syl-*

*Lij*, papaveris albi.

*Succi*; citri, granatorum, r̄ib̄es, acetum,  
omphacium, opium.

*Gummi; camphora.*

*Aqua fillatia*; ex foliis & floribus  
prædictis.

*Conserue*; ex floribus modò dictis.

*Condita*; caules lactucæ, & cucurbitæ  
cato condita.

*Specie*; diamargatiti frigidi, diatrum-  
santaloni, diatragacanthi frigidi.

*Trockisci*; de camphora.

### Excretæ.

Simplicia prædicta, quibus addenda  
folia hyoscyami, solani, semperuii mai-  
oris, mandragoræ, salicis, pampini vitis.

*Oleum*; ex floribus prædictis ac semine  
papaveris albi, omphacinum; ex flori-  
bus salicis, pro inunctione narium &  
temporum.

*Vnguentum*, rosatum, refrigerans Gal. po-  
puleonis: ceratum santalinum.

Cephalicis opponuntur, quæ capiti  
nocent. Qualia sunt seqq. lib. 2. compos.  
f. l. c. 1. sub finem. Semen agni casti: fuc-  
cæ absinthij: oliuæ nigrae & maturæ:

arbuti fructus: myrra, thus secunda vel  
letudine haustū, vt Diosc. vult: nam alijs  
secundūm Auicen. obliuioni confert:  
hederæ cacumina, corymbi : fructus  
lentisci: crocus, peucedanum: cyclaminus  
sicca cum vino pota. Styrax multus som-  
nos turbulentos facit, paucus tristitiam  
discutit. Omnia denique nimis odorata  
raeſſæuaſ inducunt, caput vaporibus re-  
plendo, in plethoricis præſeruim.

## ERRHINA.

*Nasalia*

Sunt medicamenta naribus indita,  
(vnde & Latinis Nasalia,) ad superfluam  
pituitam circa meninges & cerebrum  
per nares expurgandam, vel citra mani-  
festam cerebri agitationem, excrementis  
spontē ad nares affluentibus, vel cum  
sternutamento, quæ propriè Sternutato-  
ria. Censentur calida tenuia, actia, &  
detergentia: inter quæ eligenda, quæ si-  
mul etiam Cephalica sunt. Materia ho-  
rum vel simplex est, vel composta.

*Simplicia* sunt vel *siccæ*, vel *būmīdæ*.

*Siccæ.*

*Pulvis*, acori, castorei, croci, garyo,

phyllorum, elaterij; ( sed cautè & aliis  
liquidis errhinis dissolutus: ) hellebori  
albi & nigri, nucis moscatæ, piperis albi,  
pyræthri, zingiberis.

*Radices cyclam. & betæ instar turundæ  
naribus indita.*

*Felix nicotianæ siccata, naribus indita,  
optimum.*

*Fumus majoranæ, hyssopi, & thymi, ta-  
baci item per fistulam haustus.*

*Humida.*

*Succus: anagallidis purpureæ, betæ,  
brassicæ, betonicæ, chelidonix maioris,  
cyclaminiis, cucumeris sylvestris, radicis  
itidis, hederæ arboreæ, hyssopi, majora-  
næ, marrubij, nicotianæ, nigellæ, ori-  
gani, pulegij, saluix, sabinx, sam-  
buci.*

*Butyrum recens naribus illatum.*

*Composita. Mel rosatum, anthosatum,  
oxymel simplex & scilliticum. Syrupus  
de hyssopo. Confectio mustarda dicta,  
Alexandrina aurea, anacardina, theriaca  
& Mithridatium antiqua. Olea ex pipe-  
ribus, iurecos.*

## STERNUTATORIA.

Ptarmica sunt errhina validiora & tenuiora, acriora, fortius expultricem cerebri irritantia. Inter quæ visitior, sequentia existunt.

*Radices*; iugos, hellebori albi, euphorbium, quo nihil promptius, admixto parum calorei: pyrethrum: pulvis nicotianæ inflatus. Ex quibus & aliis errhinis acrioribus subtilissimè puluerisatis fiunt pulueres, ad 3 j. fl. 3 ij. admixtis cephalicis & quali pondere, quorum 3 j. i. j. mediante calamo, in narcs insuffletur, vel, si vehementia sunt, pyxidi æneæ inclusa, mota pyxide natibus admoueantur. Vel nodulus paratur, ex pyrethr. 3 fl. helleb. nig. 3 j. nasturtij 3 fl. puluerisatis & inclusis in nodulo, qui maceratus in aq. ros. nascodordandus admoueatur. Sternutamentum securè citra molestiam excitat.

## APOPHLEGMATIZANTIA.

Sunt medicamenta, quæ masticata, gargatizata, vel palato illita pituitam &

cerebro in os eliciunt, calore suo & acrimonia, qua tūm materiam capite conceptam attenuant, fundunt ac liquant; tūm simul expultricem cerebri stimulant. Talia sunt sequentia.

*Radices*; acoti, angelicæ, ireos, costi, cypri, gentianæ, galangæ, imperatoriae, pyrethri, valerianæ, zingiberis.

*Corticis*; radicum capparum, arantiorum.

*Aromata*; cubebæ, nux moscata, garyophylli, piper, grana paradisi.

*Folii*; hyssopi, lauti, lepidij, hydropiperis, majoranae, nasturtij, nicotianæ.

*Semen*; anisi, fæniculi, sinapi, staphisagriae, thlaspi, seseli, fileris montani.

*Fruitu*; ficus, passulæ, amygdalæ amatoæ, baccæ juniperi, lauri.

*Gummi*; mastix, ammoniacum, myrrha.

*Animal. castoreum.*

Hæc simplicia quo ad *vsum*, vel mastificantur: ut passim rad. pyrethri macerata per noctem in aceto ad 3 j. vel puluis prædictorum ad 3 iiij. 3 fl. excipitur s. q. cerat, & hunc trochisci lupinorum instar, quorum unus masticatur, & voluntat sibi in ore.

## OPHTHALMICA.

Dicuntur in genere, quæ in variis oculorum affectibus persanandis usu recepta sunt. Et in tres præcipuas classes dividuntur. Prima continet *oxydorcica*, h. e. visum acuentia. Secunda, medicamenta inflammationi dicata, & quidem eius initio, *repellentia*, *anodynæ*, *statu* & *declinatione*, *digerentia*, vel *discutientia*. Tertia *detergentia* complectitur, in ulceribus, maculis, suffusionibus & similibus usitata.

*Oxydorcica.**Interna.*

*Radices*; fœniculi, chelidonizæ majoris, garyophyllatæ, valerianæ.

*Folia*; euphrasix, chelidonizæ, fumariæ, fœniculij, verbenæ, rutæ, hormini.

*Semina*: sileis montani, raparum, raphani, fœniculi, carui.

*Succi depurati*: fœniculi, euphrasix, verbæ, majoranæ, rutæ.

*Aqua stillantia*: euphrasix, verbenæ, chelidonizæ, fœniculi, rutæ.

*Vinum*

*Vinum euphragiatum.*

Econtrà visui nocent, raphanus, alium, cepa, sinapi & nasturtium.

*Extrema oxydorica.*

*Aqua mellis*, si à tunicarum crassitię caligo fiat. *Aqua destillatæ ex superioribus oxydorcicis sim plicibus*, mixtis: additis, felle, vrina pueri impubis, vino albo, melle.

Antimonij 3 j. in aqua 3 iv. infusa.

*Saxi prædicti oculis instillati*: erucæ succus, salicis florentis succus, qui incisq; cortice fluxerit.

*Anodyns.*

*Mucilagine; seminis psylli, seminis pauperis albi, vbi simul leniendum; seminis cydoniorum, vbi simul adstringendum.*

*Aqua; rosarum peculi rosatum, plantaginis, solani, semper viui maioris, potutacæ.*

Lac muliebre. Albumen oui agitatum in aqua.

Poma dulcia sub cineribus, vel in a-

*Ete cocta. Succus pomorum.*

Medulla panis macerata & cocta in laete, addito pauco croco, ad g. iv. v.

Trochisci albi Rhasis, ubi vehemens dolor.

Opium in extremo dolore, ad g. ij. in collyriis liquidis.

### *Repellentia.*

*Aqua; rosarum, myrtillorum, plantaginis, violarum, portulacæ, solani.*

*Succi; cydoniorum, pomorum acidorum, granatorum, albumen oui.*

*Mucilago: seminis cydoniorum. Pulpæ cydoniorum cocta in aqua adstringente, ut peculi rosarum.*

### *Difcentientia.*

*Decocta; fœnogræci, chamomilla, meliloti.*

*Fatu & vapor; ex iisdem, & oxydercicis.*

*Aqua: aqua vitæ, euphrasiae.*

*Animalium partes & excrementa: lac muliebre, sanguis columbatum & turtugum, pennis pipionum sanguine præ-*

gnantes extracte, & expressæ in oculum:  
tel piscium.

Gammæ; sarcocolla nutrita in la&te.

Resinæ: myrrha, thus.

Succi: aloë, omphacium, vbi ardor si-  
mul adest.

Tandem crocus.

### Detergantia.

*Aliæ* sunt leuiora sine mortu, quorum  
vſus in inflammationū declinatione, vt,  
saccharum candi, mel succus rosarum  
tubrarum, antimonium lotum, cadmia,  
pompholix, tuthia, os sapix, lapis pumi-  
cis, plumbum vſtum & lotum. *Aliæ* sunt  
validiora cum mortu: quorum vſus ma-  
xime in ſuſſione, panniculo, aliquando  
& ulceribus: vt ſunt, fellæ pifcium, quæ  
leuiora; quadrupedum, quæ media; auīū,  
quæ fortissima: quibus adde fel ſerpen-  
tum & viperarum. ( *Nota.* Fel perdi-  
cum omnium validissimum, gallinæ  
mitissimum. ) Succi cydoniorum, fœni-  
culi, chelidonix, anagallidis cætulex,  
vrina, aqua mellis composita ex oxydor-  
cicis. *Aliæ* ſunt fortissima: vt, vitriolum  
vſtum, & rugo, vitriolum album, cuius li-

quorū cum ouorum albumine eximius in ophthalmia, rubidine, & pruriitu oculorum ; antimonium crudum.

## O T I C A.

Dicuntur aliás *auxiliaria*, remedia auditum juuantia : quæ duplia sunt, *Internæ* & *Externae*. *Internæ* sunt *cephalica* recensita, quæ humorēm, vel flatum in interiore auris cavitate contenta alterant, absunt, & discutunt, siue calida sunt, dum malum est à crassis frigidisque humoribus, siue frigida, cùm à calidis surditatis causa existit, quod in morbis acutis accidere solet, post crisiū, materia ad aures protulsa. *Externae* quoque duplia sunt, *Calida* & *Frigida*.

### *Calida* sunt sequentia.

*Aqua*; aqua vite simplex: aqua vite composita ex infusione *cephalicorum*, aliorūmque, quæ lentum ac crassum humorēm incident, detergent, digerunt, facta in vino albo. Infunduntur autem in hunc usum, radices raphani, porri, celerum, cyclaminis, heliebori albi: casto-

reum, crocus, nitrum, fel vaccinum, præter cephalica.

*Decocts;* ex iisdem facta in aqua vita, aceto simplici, vel scillitico.

*Succi;* ceparum, porri, raphani, rutæ, fraxini.

*Olea communia,* vt amygdalarum amararum, nardi: & destillata, præter cephalica suprà dicta, sequentia: salviæ, rutæ, seminis cimini, carui, fœniculi, baccharum lauri, spicæ.

Pinguedo anguillæ destillans, dum in terra assatur, auti instillata; habet enim vim molliendi, & laxandi à pingui sua substantia, attenuandi & digerendi partim ab igne, partim à foliis lauri, quæ interfiguntur frustis anguillæ, dum assantur. Suffitus in aures ex prædictis factus per tubulum æneum. Moschus cum lana bombycina impositus.

### *Frigida sequentia usurpantr.*

*Oleum nympheæ, rosarum, violatum: lac muliébre tepidum.* *Succus* vitium, dum amputantur, lacrymæ. *Decocts* ex frigidis, V.G.rosa, malua, violis, salice, lactuca, nymphæa.

Y iii.

## ODONTICA.

Dicuntur, quæ dentes roborant, & sordes detergendo dealbant, materia pro dentifriciis. Sunt autem sequentia.

Ex plantis; pimpinella, parietaria, beta, capill. Veneris, caules: *folia* myrti, lentisci, oleastri, pulegij, origani, hyssopi, menthae, salviae, rosmarini, separatis, vel pluta vsta, & in cincres redacta.

Ex animalibus: os sepiæ, oculi caneri, cornu cervi, concharum omnium genera, cochlearum terrestrium testæ.

Ex lapidibus; pumex, lapis spongix, alabastrum, specularis. Omnibus egredi comminutis, aut, si xgrè fiat, prius vstis.

Offa, seu nuclei dactylorum, myrobalanorum, oliuarum, nucum cupressi, vsta marina; corallia, spuma maris.

Succi terrestres; sal commune, sal gemmæ, alumæ, nitrum, supra tegulam ad dentem fusa, & vsta. Sal alkali; & eius dissoluti innatans pinguedo, axungia vitri dieta. Tartarium vini albi. Crusta panis vsta.

Hinc addenda odorata, vt pulueres  
aromatatum, ligni aloës, plantarum odo-  
ratarum, radicis ireos, moschus & am-  
bra; & ad corroborationem gingiu-  
rum, mastix, thus, myrra.


---

## LIBRI SECUNDI

## SECTIO II.

*De Remediis thoracis.*

## Typus Sectionis.



## CARDIACA.

**CARDIACA** medicamenta sunt, quæ cordi roborando, malignitati arcendæ, & spiritibus generandis sunt idonea. Talia sunt omnia alexipharmacæ interna suprà proposita, nisi quod calida cum frigidis confusa sint, quæ in usu sunt discernenda. Sed præter illa conueniunt sequentia, quæ ibi non extant.

*Calida.*

*Radice; doronici, zedoarix, pentaphyl-*  
*li, gariophyllatæ, petalitidis.*

*Cortex; arantiorum, citri.*

*Folia; cardui-ben. saluix, calamenthæ*  
*montanæ, cardiacæ, hederæ terrestris,*  
*menthae, ocyti, rosmarini.*

*Flores; saluix, lili j conuallij, spicæ.*

*Resinæ; thus, styrax, benzoin.*

*Animal. mumia, sericum.*

*Marin. saccinum.*

*Aqua; cardui-ben. melissæ, scabiosæ,*  
*saluix, cinamomi, theriacalis.*

*Oleæ; garyophyllor. cinam. croci.*

*Condita: corticū citri, radicis scorzonereæ.*

*Trockisci: de gallia, & alipta moschata.*  
*Species : lacticantis Galeni.*

*Frigida.*

*Radices : acetosæ, buglossæ.*

*Folia : acetosæ, trifolij acetosæ, borraginis & buglossæ, nymphæ, myrtus.*

*Semina : cydoniorum, plantaginis.*

*Fructus : cerasa acida, pomæ redolentia, ribes, cydonia, granata acida.*

*Flores : salicis.*

*Succi : acetosæ, rosatum & fructuum modò dictorum.*

*Lapis granatus.*

*Mineralia, & marina : aurum, argentum, corallus, perlæ, mater perlaruin præparata.*

*Aqua rosatum, violarum, buglossæ, nymphæ, acetosæ, cerasorum.*

*Syrapi : acetosus, citri, granatorum, limonum, agrestæ, de succo acetosæ, violarum, rosatum, cydoniorum, nymphæ, pomorum, ribes, oxyfaccharum.*

*Conserua rosarum.*

*Condita : limones conditi, oxyacantha, ribes, cerasa acida condita.*

*Species : diamargariti frigidi.*

*Trechisci; de spedio, camphora.*

*Vnguentum, rosaceum, santalinum.*

## B E C C H I C A.

Sunt medicamenta, quæ contenta in pectoro & pulmone excrementa apta reddunt, ut tussi facilè expurgari queat, sic dicta à modo euacuandi per tuſſim. Græcum enim nomen θυſſι signiſcat, hinc θυγωτός: aliás ſputum mouentia & anacathartica, vt & à parte euacuanda thoracica, & expeſtorantia. Ea-que ſunt duplia, pro varietate excre-mentorum, attenuantia videlicet, & in-creßantia: illa humores crassos atte-nuando, incidendo & detergendo; hæc verò tenues humores incrassando, & ſi-mul leniendo expeſtorant. Vbi notan-dum, quòd si inter attenuantia quædam acriora videantur, ea lenientibus eſſe temperanda, ne tuſſis nimirūm irritetur, aut crassus humor nimium illorum vſu exicctetur.

*Materia antemuraria.*

*Radices; aristolochia utriusque, althææ,*

āngel. ati, ēnulx campanx, irēos, scilla,  
cepa, zingiber.

*Folis*; adianthi, capilli Veneris, calaminthæ, hederæ terrestris, hyssopi, nico-tianæ, pro syrupo & suffitu; origani, pullegij, pulmonariæ, præstij: pes cati, h. e. gnaphalium montanum, scabiosa, ros Solis, tussilago, seu vngula caballina, aliæ beccchium.

*Semina*; anisi, brassicæ, carthami, fœniculi: nasturtij, seseli Maliblicenfis officinis, sileris montani, vrticæ.

*Baccæ*; lauri, juniperi.

*Flores*; anthos, chamomillæ, scabiosæ, crocus à Æ B. ad Æ j.

*Fruktus*: amygdalæ amarae, cariæ, seu fucus in furno aut sole exiccatæ, cappates.

*Resinae*; myrrha, terebinthina.

*Animalia*. mel, pulmo vulpis vino ablutus & exiccatus 3 B. 3 j.

*Chymicae*: flores sulphuris in eclegmate, & tabellis beccchiciis. Oleum sulphuris, cuius guttæ aliquot miscentur eclegmati.

*Aqua*; cardui-benedicti, hyssopi, tu-silaginis, scabiosæ.

*Syrupi*; capillorum Veneris, hyssopi,  
Y vj

prassij, tussilaginis, pedis cati, oxymel  
simplex, & scilliticum.

*Conseruæ*: enulae campanæ, capillorum  
Veneris, anthos, tussilaginis.

*Fulvæ*: diairecos simplex, & Salomo-  
nis, diacalaminthæ.

Loch de pulmone vulpis, & similia in  
singulis officinis vslitata.

### *Externa.*

*Oles amygdalarum amaratum, iros,*  
*chamomillæ.*

*Vnguentæ*: resumptium, dialthæ.

*Emplastrum*: filij Zachariæ.

### *Materia incrassantium, & lenientium.*

*Radices*; liquiritiæ.

*Semina* 4. frigida majora, papaveris al-  
bi, lactucæ, maluæ, hordeum.

*Flores*: nymphæ, (officiniæ nenuphar)  
violarum, papaveris theæ.

*Fruſtæ*: amygdalæ dulces, daſtyli,  
jujubæ, nuclei pineorum, pistacia, pruna  
dulcia, passulæ, scabestena pruna.

*Succi*, liquiritiæ, amylium, penidia,  
opium.

*Animal. butyrum.*

*Aque* ; violarum , papaveris rheas, nymphæx.

*Sympi* de liquicitia, jujubis, nymphæx, papaveris rheas , violarum , papaveris albi , mel violarum,

*Conseruæ* ; violarum, nymphæx.

*Species* ; diatragacanthi frigidi, diapenidium.

### Externæ.

*Oleæ* violarum, nymphæx, amygdala-  
rum dulcium.

*Vnguentum* rosatum.

### P N E V M O N I C A.

Sunt medicamenta intemperaturis pulmonum corrigendis idonea : quorum materia eadem est cum becchicis. Inter quæ ad calefaciendum pectus excellit usus florum sulphuris ad 3 j. cum uno sordibili, & terebinthinæ 3 ij. dissolutæ in oxy-mell. 3 ij. Externè , thermæ sulphureæ. Ad pectus verò frigesciendum , usus acidularum, lactis, nisi impediat catarrhus, decocti ligni rhodij, santali rubri ad tabem incipientem , & haemopticam imminentem. Item conserua rosarum acidula facta, frequenter usurpata, manè , &

## LAC GENERANTIA.

Dicuntur vel *propriè*, vel *impropriè*. *Propriè* lac generant, quæcunque multum & bonum sanguinem efficiunt, cuiusmodi sunt alimenta polytropha, & eucyema, ac medicamenta temperata, quorum lac effectus est materialis. *Impropriè*, quæ moderata incidendi facultate sanguinem fluidum reddunt, & ad mammas deducunt, ut ibi in lac conuertatur, de quibus hic sermo. Vbi nota, quædam ex illis proprietate quadam impellere sanguinem ad mammas. Sunt autem alia *Interna*, alia *Externa*.

*Interna.*

*Folia*; Smyrnium Diosc. seu petroseum Macedonicum verum, anethum, apium, sion, polium, omnia vicentia: polygala, lactuca in calidis; nam in frigidis minuit.

*Semina* recentia anisi, fœniculi, erucæ, nigelliæ.

*Succus*; cicerbitæ, taraxaci, tragopogi cœrulei, ptisana.

*Pulvis*; crystalli tenuiss. ad 3 j. i; li-

quore idoneo. Lac lunæ pondere 5 j.

### Externæ.

Mollientia simplicia, vt radix althææ:  
*Folia* anethi, maluæ. *Semen* lini. *Flores* ca-  
 momillæ, admixtis etiam foliis & sêmi-  
 nibus modò dictis, pro fotu. Item rubi,  
 sciantia, sic cætera non iuuerint.

### L A C M I N V E N T I A.

Minuunt lac, quæcumque vchementè  
 refrigerando sanguinem incrassant, vel  
 nimio calore digerunt, aut exiccant, vel  
 tota etiam substantia laetis generatio-  
 nem impediunt. Qualia sunt vel *Internæ*  
 eaque *calida*, vt, ocytum, ruta, calamen-  
 tha, salvia, agnus castus: *frigida*, vt, por-  
 tulaca, sempervivum, cucurbita, campho-  
 ra. Vel *Externæ*. 1. *Cataplasma* ex calidis  
 modò dictis in oleo coctis appositum. 2.  
*Limeola* omphacio intincta, & applicata.  
 3. *Apium* cum acetotritum, & applica-  
 tum. 4. *Spergia* immersa in decocto cu-  
 minis, vel coriandri, facto cum aceto  
 acerrimo, & admota, Secretum quo-  
 fundam.

# LIBRI SECUNDI

## SECTIO III.

*De Remediis ventris inferioris.*

### TYPOS SECTIONIS.

Ventrис inferioris partium medi- camēta propria sunt se- quen- tia,	Ventriculi, Stomachica.
	Intestinorum, <i>Flatus discutientis</i> , quibus præcepit.
	teris partibus
	omnibus competunt. <i>Vermes necantia.</i>
	Hepatis, Hepatica.
	Lienis, Spleenica.
	Renum, Nephri. <i>Lementia.</i> <i>tica : cāque vel Detergencia.</i>
	<i>Lubentriptica.</i>
	Vesicæ, Cystica.
	Testium, Semen. <i>Generantia.</i> <i>Extinguentia.</i>
	Vteri, Hysterica. <i>Corroborantia uterina.</i> <i>Mouentia.</i> cāq; vel <i>Menses</i> <i>Sistentia.</i>

## STOMACHICA.

**S**TOMACHICA sunt, quæ pœculi vi humores in ventriculo contentos alterant, & simul concoctionem cœterasque ventriculi functiones adjuuant & confirmant. Quorum alia sunt calida, alia frigida. Vt raque non nimis aperientia & diuretica, sed adstringentia esse debent.

## Calida.

*Radices calami aromat. cypri, galanga, gentianæ majoris, zedoarizæ.*

*Cortex acanthiorum, citri. Lignum aloës.*

*Folia absynthij, betonicæ, menthae, origani, rosmarini, saluiæ.*

*Semina anisi, citri, cumini, foeniculi, grana tinctorum.*

*Flores betonicæ, saluiæ.*

*Fructus amygdalæ amarae, nuclei persicorum.*

*Gummi mastices 3 fl. cum momento zingiber. aut zedoar. ex quo forbili sumpta.*

*Aromata omnia, zingib. præcipue,*

*piper integrum deuoratum.*

*Marina*: ambra, succinum.

*Aqua*: foliorum dictorum, cinnamomi,  
aqua vitæ, spiritus anisi.

*Olea de fill.* garyophyll. nuc. mosc. cina-  
mom. macis, cumin. succini.

*Syrupi*: absynthij, menthæ, betonicæ.

*Conseruae floruri*: absynthij, betonicæ,  
saluix.

*Caudita*: cortex citti, acorus condit.  
nux mosc. nux juglans, zingib. condit.

*Confert.* alketmes, mithridat. theriaca.

*Species*: aromatici rosati, diagalangæ,  
diacydonij cum speciebus.

*Trechisci*: de absynth. rhabarb. gallia  
moscata.

### *Externæ.*

*Oles*: absynthij, menthæ, mastices, nū-  
cis moscatæ per expressionem : nardi-  
num.

*Emplastæ*: de baccis lauri, pro stoma-  
cho.

### *Frigida.*

*Radices*: acetosæ, cichorij, plantaginis,

*Folia*: acetosae, endiuix, cicerbita, cychorij, s. capillar. dens leonis, myrti folia.

*Semina*: 4. frigida majora & minora, hordeum, myrti.

*Flores*: cichorij, rosarium rubrum. cynthus, h. e. malum puniceum.

*Ligna*; santala omnia.

*Fructus*: berberis, cydonia, granata, cerasa, mespilla, sorba, fraga, malum citrum, myrobalani omnes, singulariter.

*Succi*: foliorum & fructuum: item acacia, hypocistis.

*Gummi*: camphora, additis leviter adstringentibus.

*Maria*. corallium.

*Aqua*: rosarium, plantaginis.

*Syrnpi* de agresta, de succo acetosae, cydoniorum, granatotum, myrtinus, miua cydoniorum.

*Condita*: cerasorum. cydon. ribes, berber. vua acerba condita.

*Conserue*: florum cichorij, rosarium, capillorum Veneris, acetosae.

*Species*: diatrium-santalon, diarrhodon Abb. diamargaritum frigidum.

*Trochisci*: de camphora, spedio, eupatorio.

## Externæ.

*Oleum lentisci, cydoniorum. Unguentum  
rosatum.*

## VERMES NECANTIA.

Vermes necantia sunt, quæcunque qualitate, vel manifesta, vt acrimoniam, amaritudinem, falsedinem, vel aciditatem, quos sapores lumbrici fastidiunt; vel occulta vermibus inimica, illis exitium pariunt. Vbi nota: extrâ febrem calidioribus, in febre autem minus calidis, h. e acidis, vel mixtis utendum esse.

*Radices aristolochiae, asclepiadii, anchusa, bistortæ, dictamni albi, gentianæ majoris & cruciatæ, filicis maris & fœminæ, carolinæ, helenij, succisæ, tormentillæ, pedoariæ, thabarbari, rubriæ, personataæ, petasititis.*

*Cornices radicum mori, & capparum.*

*Folia absynthij (Pontici & Seriphij.) thymii, menthae, rutæ, dentis leonis, polii, asarinæ Matthioli, sabinæ, martubij, calamintæ, tanaceti, pericariæ, persici, cardiace, carduibenedicti, rutæ caprariæ*

*Flores centaurij minoris, lupulorum,  
hyssopi.*

*Scrub contra lumbricos, lupinorum,  
caulium, coriandrum preparatum, por-  
tulacæ, citri, arantiorum, atriplicis, ane-  
thi, hedyfari, nigellæ, pseudomechanthij,  
nasturtij, erucæ sativæ & sylvestris, napi,  
leuisticæ, lupuli, acetosæ, cannabis, porri.  
Baccæ lauri.*

*Gummi: juniperini, Myrrha quæ resina.*

*Animal. rasura cornu cerui & cervis,  
puluis lumbricorum terrestrium, bouis  
astragali, vnicornu.*

*Terræbolus Armena, & terra sigillata.*

*Mineralia: sulphur, sal nitrum, argen-  
tum viuum ad Æ. B.*

*Marin.; corallina, seu muscus marinus;  
corallum rubrum.*

*Succi; ex enarratis, omphacium, limo-  
num, portulacæ.*

*Aqua; absinthij, gentianæ, graminis,  
portulacæ, raphani matini, vincæper-  
vincæ, rutæ, menthæ, florum pruni sil-  
vestris, endiuixæ, cichorij.*

*Conditæ; corticum arantiorum, citri.*

*Syrupi; absynthij, endiuixæ, cichorij, de  
succo citri, arantiorum, berberis, ribes, de  
succo acetosæ; byzantinus.*

*Conferunt*: florum persicorum; &  
garyophyllorum arantiorum, citri.

*Olea*: olinarum, amygdalarum amara-  
rum, nucleorum persicorum, vitrioli,  
gutt. iiij. iiij.

*Confetti*. theriaca, mithridatum.

### Externa.

*Oleum*: absynthij, rutæ, colocynthidis, h.  
c. colocynthis oleo infusa, & cocta,  
oleum laurinum.

*Vnguentæ*: de arthanita, vnguentum ad  
vermes Augustanor. fellæ umbilico sa-  
perposita, ac ventri inuncta.

## FATVS DISCVTIENTIA.

*Carminatrices* dicuntur, quæ cognata  
sunt diaphoreticis, suo loco dictis: *vsm*  
in colicis, & veterinis doloribus.

*Radic.* angel. galangæ, imperatoriaz,  
spicæ Indicæ.

*Cortic.* arantiorum, in' colico dolore  
præseruando, & curando.

*Folia*: lauri, calaminth. origani, anethi,  
majoranæ, satureiæ, rutæ, puleg. hyssopi,  
menthæ, ocymi, thymi.

*Semina* : anisi, fœniculi, catui, cumini, dauci, amicos, petros. agnicasti, angelicæ, arantiorum, citri.

*Flores* : camomill. centaur. minoris, ad flatus hypochondriorum.

*Fruitus* : baccæ lauri appropriatae colicis & vterinis : iuniperi.

*Aromata* ; macis, crocus, garyophylli, zingiber. cinamom. piper.

*Animal.* castoreum.

*Aqua* : cinamomi, vitæ, &c f oliorum suprà diCrum.

*Oleum* stillat. anisi, fœniculi, catui, chamomille optimum.

*Eleítrur.* de baccis lauri, theriaca, diastellaron, 3 j. cum vino.

*Species* : diacimini, diagalangæ, rosata nouella.

### *Externæ.*

*Olea* ; absynth. anethi, tutæ, menthæ, laurinum, oleum ex maceratione seminum & flor. agnicasti, optimum in colicis.

*Emplastr.* de meliloto. *Canaplasma*, & facculi ex prædictis fol. sem.florib, in colicis utilessime.

Cucurbita cum multa flamma parti

inflatae imposita, & in colicis supra umbilicum, est instar incantamenti Galcuae.

## HEPATICA.

*Hepatica* sunt medicamenta, quæ hepatis intemperiem corrigunt, & obstructionem, cui maximè obnoxium, prohibent, vel eidem medentur: & simul etiam substantiam ipsius leviter adstringunt, ut spiritus & calor hepatis, seu principis partis, conseruetur. Qualia sunt incidentia, abstergentia citra vehementem calorem, ac præterea nonnullam adstringendi vim possidentia.

### Calida.

*Radic.* cyperi, enulæ campanæ, calamari aromatici, rhabarbari, peucedani.

*Folia*; absynthij, agriunoniae, chamaedrys, chamæpitys, fumariae, lupulorum, marrubij albi, menthae, betonicae, schœnanthi, rosmarini.

*Semina*; 4. calida majora.

*Flores*: anthos, centaurij minoris, spikenardi.

*Aromata*: garyophylli, zingiber, nux moschata.

*Fructus*; pistacia, passulæ.

*Aqua*; ex prædictis foliis & floribus destillatæ.

*Syrupi*; absynthij, agrimoniarum, betonicæ, byzantinus, fumariæ, mentharum, &c. & s. radicibus.

*Condita*; acori, nucis juglandis, nux moscata condita.

*Confert.theriaca, mithridaticum.*

*Conservæ florum anthos, salviae, absynthiæ, enulæ campanæ.*

*Species*; aromatici rosati, diarrhoden, diambriæ, lœtificantis Galeni.

- *Trochisci*; absynth. cupatorij, dialacæ, de rhubarbaro.

*Exierunt, olea absynthij, nardinum, menth mastic. nux moscat. per expressio- nem.*

### *Frigida.*

Omnia, quæ in tabula stomachicorum frigidorum continentur, in hunc quoque censum hepaticum refrigerantium referri debent; quibus adde sequentia, quæ stomacho minus profundunt, hepatici autem dicata sunt.

*Radices*; rufi, asparagi.

330 *De Materia*  
*Foliis agrimoniarum, fragariarum, lentis aquaticarum, graminis.*

*Semina alkekengi. Flores violarum.*

*Aquae agrimoniarum. Syrupus byzantinus, de 2. & 5. radicibus, ubi validæ obstrunctiones adsunt.*

### *Externa.*

*Oleum; rosum, omphacinum, nymphæ.*

*Vnguentum; rosum, refrigerans Gal. ceratum Santalinum.*

*Epithemata; ex aquis destillatis & speciebus utilissima.*

### **S P L E N I C A.**

Similia genere sunt medicamenta hepaticis, secundum Galenum, sed valentiora attenuantia & aperientia, quæ minus adstringunt, propter crassiora ipsius excrements. Sunt autem duplia: calida, melancholiarum naturali dicata; & frigida; atque bili collectrix conuenientia.

### *Calida.*

Vide tabulam melancholiam naturam.

Item (melancholicum succum dictum)  
præparantium. Quibus adde seqq.

Radic. calami aromatici, aristolochia, asari, bryoniae, raphahi, acori veri, seu galanga majoris, iridis, scillæ, lupuli.

Folia; betonicæ, calamintæ, hyperici, chamædrys, rutæ, pulegij.

Semina; rubiæ, fraxini.

Fruitæ; baccæ hederæ.

Aromata; crocus, cinamomum.

Mineral. chalybs præparatus.

Liquor; acetum scilliticum optimum.

Syrapi; oxymel simplex & scilliticum.

Conseruæ. floruri tamarisci, genistæ.

Condit. acorus conditus.

Species; diacurcuma, dialacca.

Oleæ; illat. cumini, cinamomi, vitrioli.

### *Externæ.*

Oleæ; de capparibus, tamarisci, leucojii, rutaccum, amygdalarum ammararum. Vnguent. de althæa. Emplastr. de mucilaginibus, diachylum cum guimmis. Et alia magistralia vnguentia in quibus omnibus fere gummi ammoniacum & bdellium, cum puluere iridis, asari, & cyclaminis præscribenda. Aliæ item formulæ qua n-

plures ex superioribus ex tempore com-  
positæ, maximè ex ruta, nasturtio, vrtica,  
finapi, centaurio minore, asaro, & cy-  
clamine.

### Frigidæ.

Repetantur ex tabula bilem attenuan-  
tium, quæ simul etiam melancholiæ adu-  
stæ in siene collectæ conueniunt. Quibus  
sedde oxylapathum & exicornæ topica se-  
quentia.

*Olea*; violarum, nymphææ. *Vnguentum*  
refrigerans Galeni, rosatum, ceratum  
santalimum. Acetum acerrimum.

### Animadversio.

Dulcia per se spleni nocent, sed aliis  
addita pro vehiculo sunt. Pithagoras,  
cum quidam ei exprobraret: Nimiùm  
me irrides, respondit.: Τοῖς ἀνθεμοῖς,  
τὸις μὲν δρυσίς καὶ πηγὴ φρίνη, τὰς δὲ λαύρια  
βλαστεῖσθαι. Splenicis acris & amara pro-  
funt, dulcianocent. Regula practica est.

### N E P H R I T I C A.

*Nephritica* medicamenta ex ipsa re-

nūm strūcturā, officio, & peculiaribus affectibus, quibus renes obnoxij sunt, triplicia sunt: *Lenientia*, quorum *usus* in rem scabritie, & asperitate, & ardore, siue acrimonia vrinæ. *Detergentia*, quorum *usus* in suppressione vrinæ à calculo, humore viscido, arenulis; hæc sub diureticis comprehenduntur: & *Lithonripiæ*, calculos frangentia: quorum *usus* in calculo contetendo & comminuendo, vt commodius expelli possit. Detergentia repetenda sunt ex tabula diureticorum, cum quibus conueniunt, nisi quod ibi usum habent vniuersalem, hic particularem. Sermo itaque tantum erit de lenientibus, & lithonripticis.

### *Lenientia.*

*Radic.* althææ, liquiritiæ, graminis, asparagi, eryngij.

*Folia*; plantago, adiantum omne, parietaria, acetosa, lactuca, malua, nymphæ, portulaca, sonchus.

*Semin.* althææ, bombacis, malvae, lini, sœnogræci, &c. semina frigidæ majora & minora, plætæginis, psyllij, papaveris albi.

*Flores*; violarum, chamomillæ, nymphææ, papau. rheas.

*Fructus*; amygdalæ dulces, juiubæ, fē-  
besten, pistacia, passulæ, pruna dulcia, ca-  
ricæ, poma.

*Gummi*; tragacanthæ, amygdalæ ama-  
ræ, &c cerasi, camphora.

*Animal.* butyrum, lac, serum laetis.

*Succi*; liquiritiæ, lac amygdalarum.

*Chymica*; spiritus vitrioli, sal prunellæ.

*Aqua*; foliorum in hac tabula dictorū.

*Syrupi*; violarum, juiubarum, nymphæ, pomorum, de althæa Fernel.

*Conseru.* violarum, nymphæ.

*Conditæ*; caules lactucæ conditi, caro  
cucurbitæ condita.

*Species*; diatragacanthi frigidi, diape-  
nidium.

*Olea*; amygdalarum dulcium, cam-  
photæ.

### Externæ.

*Olet*; violarum, nymphæ. *Vnguent.*  
rosatum, refrigerans Galeni.

### Lithonriptica.

*Lapidem comminuentium aliæ id faciunt*  
*vi manifesta incidendi, & detergendi,*

absq; excellenti caliditate, vt Galen.l.5.  
Simpl. c. 13. asserit ; talia enim per angu-  
stos meatus in profundum subeunt, sic  
que per omnes patres penetrando conti-  
nuitatem soluunt : nimius autem calor  
concretum calculum magis coquit &  
obdurat. *Alias* sua asperitate superficiem  
calculi abradendo lapidem commi-  
nuunt. *Alias* proprietate occulta id cre-  
duntur facere, quibus autor de dignos-  
cendis & curandis rerum affectibus pa-  
tum confidit. Quicquid sit, propone-  
mus materiam omnium eorum, quæcun-  
que in calculo atterendo ab Autoribus  
vsurpantur, exceptis iis, quæ in tabula  
diureticorum continentur, quæ cum di-  
cendis sunt copulanda, ceu vsus eius-  
dem. Vbi obiter *nota*, quibus affixus est  
asteriscus, illa excellentiora esse.

*Radices* ; aristolochiæ, damasonij, enu-  
læ campanæ, filipendulæ, galangæ, acori,  
hippolapathi, itidis, leuisticæ, pimpinellæ  
saxifragæ, pœoniz, raphani marini, rubi,  
vriticæ, scillæ.

*Folia* ; abrotoni, bupleuri, \*, h. e. auti-  
culæ leporis, capillares herbeæ, chamædrys  
chamæpitys, brassica, nardus celtica, par-  
thenium, hedera terrestris, \* origanum,

polium, hyssopus, veronica, quercus & salicis folia, scordium, empetrum Dioſe. virga pastoris, virga aurea, lamium Fuchsij, ad vesicæ calculum.

*Corticēs*; glandium, coryli medius.

*Flores*; consolidæ regalis.

*Semina*; anethi, carui, cumini, sileris montani, ammi, petroselini Macedonici, coriādri, cretæ marinæ. h.e. fœminiculi matini, brusci, ocymi, raphani, hyperici, spinæ albæ, fraxini, nigelle; nasturtij, pimpinellæ, lupinorum, genistæ\*, xanthij\*.

*Fruitus*; baccaæ lauri, nuclæ persicorum, baccaæ hederæ arboreæ\*, spongiolæ in cynosbato.

*Aromata*; zingiber, xyloaloe, santala tubra, nux moscata, macis, garyophylli, piper, carpobalsamum, cubebæ, spica, schœnanthum, crocus, quæ simul etiam gratiam addunt medicamentis.

*Omnia*; cerasorum, prunorum, juglandis, vitis, Arabicum, tragacantha, clemi, olibanum, bdellium.

*Resinæ*; laticea, abietina, terebinthina vera.

*Animal.* sanguis hirci præparatus. 3 j. cum vino, sanguis leporis\*. Cineres lumbricorum\*, erinacci terrestris, hepatis

afini, plumarum palumbatum, leporis integri, cum corio, carne & sanguine combusti, vel saltem pellis illius sanguine madentis combustæ\*, passeris troglo-dytæ (*Bamseblipperlein*) scorpionis, mil-lepedum, scarabeorum\*, renum leporis. *Pulveres* cranij honinis, callorum & un-gularum equi pedum, astragali leporis, ciboris, maxillæ lucij piscis, cancerorum fluuiatilium, cochlearum operculorum hyemalium, ouorum testarum, oculorum cancri, stercoris mutium, calculorum ab homine excretorum, alcyon 3. *Diosc.* la-pides in felle bouis.

*Lapides*; spongiæ, lyncis, nephriticus\*, judaicus\*, crystalli preparati.

*Marina*; succinum. *Interreras*, ochra.

*Mineral*. vitri combusti cineres.

*Succi*; acetum aqua conuenienti dilutum, acidulæ, succus arantiorum acido-rum, baccarum halicacabi, millefolij, fœniculi.

*Aqua destillata*; parietariæ, malox, al-thæx, florum genistæ, corticum fabarum, anonidis, saxifragie, asparagi, pettoselinii fœniculi, osyridis\*: quibus efficaciores sequentes, sij Crateuæ, fœniculi marini, raphani, baccarum hederæ, & alkcken-

gi, chamomilla, verbena, nucleorum pér-  
flicorum, terebinthinæ laticeæ.

*Olm*; nucleorum perflicorum, ceraso-  
rum, aut amygdalatum amarafum ex-  
pressi, ad 3 j. seminis citri, lappæ utrius-  
que, terebinthinæ, aut lariceæ, oleum vi-  
trioli, siue chalchanti.

### *Alimentoſa.*

Raphanus in acetatio comestus : ra-  
phanus marinus cum amygdalis con-  
sus pro bellario : petroselini radices co-  
ctæ : asparagorum & lupulorum teneri-  
tates : lion Crateux \*, si symbrium & na-  
sturtium \* in acetariis : fœniculi marini  
folia condita, \*, limonia mala, cynosba-  
tos rectè pro bellario cum vino cocta,  
caro leporina. Passer troglodytis, vel  
cauda tremula.

ii

### C Y S T I C A.

Eadem, quæ renibus profundunt, etiam vé-  
sicæ conueniunt, nisi quod valentiora  
requirit situs vesicæ, ne vires, antequam  
ad locum affectum perueniant, euane-  
cant. Speciatim in intemperie calida,

& ardore vrinæ vide, quæ hepat refrigerant, & renes leniunt: quia lotium acre redditur, vel ab hepatis, vel renum intemperie calida.

## SEMEN GENERANTIA.

Generant semen, vel propriè, tūm alimenta optimi succi, tūm medicamenta calore temperata, & humida: vel impro priè, excitando semen ( de quibus hic potissimum ) & Venerem stimulando, qualia sunt actia & flatulenta.

*Radic.* eryngij, satyrationis, rapæ satiux, bulbi esculenti, asparagi, erucæ, galange, zingiber viride, napus.

*Folia;* eruca, horminum, nasturtium, scorodoprasum.

*Semen;* cicera rubra, faba, erucæ, napi, vrticæ, phaseoli, fraxini, lini.

*Fruitus;* nuces pineæ, pistacia, nucis Indicæ medulla, scolymus, cius caput & caules.

*Animal.* priapus tauri & cerui, scincus, moscus, zibethum, gallinacei testes, cerebella passerum, ostreæ.

*Arom.* crocus, piper, nux moscata, gryophylli.

*Marijn.* ambra cum ovo sorbili sumptis.  
*Condit.* radicis satyrij, eryngij, zingiberis, diasatyr. ad 3 j.

*Nota.* Multa valdè calida & acria in hanc classem referri, vt & salsa, quæ semen acrius reddendo, non generando, Venerem stimulant: quò refertur etiam vsus cantharidum, quæ ad exulcerationem usque irritant.

## SEMEN EXTINGVENTIA.

Sunt valdè vel refrigerantia, vel discutientia. Illæ sunt, V.G. nymphæa, lactuca, camphora, portulaca, cicuta, &c. Hæc verò inter alia, agnus castus, ruta, mentha, semen anethi, agni casti. Thus, Syrupus de nymphæa. Oleum de nymphæa externè renibus inunctum, aut perinæo, ad tentiginem impediendam.

## H Y S T E R I C A.

Hysterica à fine *alia* sunt vacuantia uterum, ea scil. quæ menses monent, foetum ac secundinas ducunt, uterumque ab omni humorum illuvie expurgant... *Aliæ* adstringentia, immodicum eius fluorin si-

ſtentia. Alia denique corroborant, quæ  
iheratgeas, & calorem ipsius natura-  
lem conſeruant: quorum uſus in aetio-  
nibus vteri juuandis, concepcione ſcil. &  
partu: ( vnde conceptionem juuantia, &  
partum conſeruantia huc reducuntur;  
quæ ſimul etiam adſtringunt: ) vel in  
ſympotomatibus, quæ actiones vteri, &  
vniuersi poſſunt perturbare; in suffoca-  
tione ſcil. vteri ſedanda.

## MENSES MOVENTIA.

*Menses monentia* dicuntur vel *impropriè*,  
vel *propriè*. *Propriè* menses mouentia ſunt,  
quæ venarum vteri obſtrutiones ape-  
riunt, & ſanguinem ad vterum dedu-  
cunt, calida 2. vel 3. ſicca verò 1. vel 2. fe-  
rè ad ſummum: ſubſtantiae non planè te-  
nuis, ſed mediocriter crassæ, ne vittus ci-  
tò diſſoluoatur, inter quæ efficacissima,  
quæ amaritudinem aliquam acrimoniam  
permixtam habent. *Impropriè* menses  
monentia ſunt diuretica, quæ ſanguinem  
crassum attenuant ac fundunt, vt tem-  
pore mēſium liberius fluere poſſit. Ve-  
rū ſola hæc uſurpa. i non debent, (eūia  
abductione ſerositatis ad vias urinæ, ſan-

guis posteà crassior reddatur; vnde rē stagnant menses;) sed mixta cum appropriatis. De propriè dictis hic sermo, ex quibus valentiora partum quoq; juuant, secundinas pellunt, & fœtum mortuum educunt. *Materia* talis est.

*Radices*; ari, aristolochiæ, asari, bryoniæ, bilinguis, cyperi, cyclaminis, centaurij minoris, dictamni, gentianæ, gladioli, iridis, lauri, liliorum, pœoniæ, seseli, valerianæ.

*Folia*; artemisiæ, abrotoni, bellidis hortensis, capillorum Venetis mitè, cardiacæ puluis cochleatis mensura partum juuat, liliorum, matricariæ, matrisyluz, majoranæ, melissæ, melissophyli, mentiski, mercurialis, ocymi, origani, polij montani, prassij, polytrichi, sabinæ, sclareæ, scordij: sion ad fœtum, salvia, ruta, trifolium odoratum.

*Semina*; agnicafti, amomi, ameos, basiliconis, nigellæ, pœoniæ, rutæ.

*Flores*: abrotoni, calendulæ, centaurij minoris, hypericonis, leucoji sive keiri flos siccatus, liliorum alborum, crocus ad secundinas juli nucum (h. e. flores juglandis in puluere ad 3 j. eximum rhæ, ad suffocatione vteri,) matricariæ, spica

*Gummi*: affa fœtida, bdellium, galbanum, myrrha, opopanax, sagapenum, styrax calamita.

*Aromata*; omnia, præcipue crocus, & cinnamonum,

*Animal.* castoreum, sterlus accipitris; aut falconis, ʒ j: ex vino : puluis testiculorum equi castrati, in taleolas diffusorum, & vino albo ablutorum, & exiccatorum in furno, ad ʒ j. cum vino Hippocratico ad partum juuandum. Turtur assatus, cuius venter infarctus cinamomo, baccis lauri, juniperi, alternis aut aliquot ante partum diebus comedus. Secundina ouis succata, & data in puluere. Succus scordij, ʒ ⅔. ad fœtum cum croco.

*Mineral.* borax nativa eximia ad fœtum, ad Ʒ j. ex liquore.

*Aqua*: ex prædictis herbis, quæ sunt vñitatæ in officinis quibusuis.

*Syrupi*: de artemisia, prassio, betonica.

*Oleum stillatissimæ*: castorei, sabinæ, cinnamoni, de myrrha.

*Trochisci*: de myrrha, ad ʒ j. forma pilularum.

## Externæ.

*Olea*; liliorum, chamomillæ, leucojî.

*Lapis*; ætites femori alligatus, ad pat-  
tum, & magnes læua manu gestatus.

*Fel*; bubulum : cucumber sylvestris, co-  
locynthis in pessariis.

*Vngulae*; asini suffitius ad foetum & se-  
cundinas.

## MENSES SISTENTIA.

Hæc quoniam coincidunt cum ad-  
stringentibus suprà expositis l.l. p.i. f.3.  
idcirco materia istorum medicamen-  
totum ex tabula adstringentium peten-  
da est.

## CORROBORANTIA VTERVM.

*Radic.* bistortæ, calami odorati, costi  
cypri, galangæ.

*Folia*; betonicæ, majoranæ, saluix,  
quæ duo eximia : rosmarini, melissæ,  
melanthij.

*Flores*; in majoranæ, anthos, saluix.

*Fruitus*: baccae lauri, juniperi.

*Animalium excrements ; moschus, zibeta.*

*Mariæ; succinum, cotalla, ambra.*

*Resinæ; styrax, benzoin, thus, mastice.*

*Aromata ; nux moschata, garyophylli, macis, spica nardi.*

*Aqua ; betonicæ, majoranæ, melissæ, saluix.*

*Syrupus ; de betonica.*

*Olea ; succini, garyophyllot. macis, nucis moscatæ.*

*Condita : acorus conditus : nux juglans & moscata condita : myrobalani & satyrium condita.*

*Opiata ; tryphera magna cum & sine opio : thetiaca, mithridatum.*

*Trocobisci : gallia & aliptæ moscatæ.*

*Species : aromatici rosati, diambriæ, dia-moschum.*

### *Extrema.*

*Olea : nucis moscatæ per express. nardinum, myrtinum. Emplastr. pro matrice, & contra rupturam Nicol. Præpositi, emplastr. de mastice. Nots, his selectioribus alij plura addunt ex me-nagogis.*

## LIBRI SECUNDI

## SECTIO IV.

*De Remediis Arthrum.*

## ARTHRITICA.

**A**RTHRITICAE medicamenta di-  
cuntur, quæ partibus neuosis &  
menibranosis, ex quibus constant arti-  
culi, corroborandis dicantur, quorum  
*vſus* in arthritidis, eiusque specieſum  
præcautione, & curatione. Suntque  
duplia: *Interna* & *externa*. *Internorum*  
materia eadem est cum cephalicis, siue  
*calida* ſpeces, cum defluxio eſt à mate-  
ria frigida, siue *frigida*, cum defluxio eſt  
à materia calida: quandoquidem ner-  
uorum eadem eſt atque cerebri ratio.  
Priuatim verè articulis conueniunt ſe-  
quentia mox recenſenda. *Externa* ſive  
topicā conueniunt vel initio arthritidis,  
*aydorem* & *dolorē* lenientia; vel in fine,  
*reliquias* *impacti* *humoris* (ne in tophum:

concrescant (*dissipans*. Singulorum tunc  
internorum, tunc externotum materia  
talis est.

*Anbritica interna præcipua.*

*Radices*: acori, enulæ campanæ, ireos,  
pentaphylli.

*Folia*: verbasci, primulæ veris, cha-  
mæpitys, sive iua arthritica, calamin-  
tha, centaurium minus, hypericum,  
betonica, salvia.

*Lignum*: sassafras, quod mirandum.

*Flor. rosarum rubrarum.*

*Animal. castoreum, cinis cornu cervi,*  
*& cranij humani.*

*Marin. corallum rubrum vstum.*

*Aromat. spica Indica.*

*Resinæ quæcunque, maximè terebin-  
thina.*

*Succi; opopanax.*

*Conseru. chamæpityos in causa frigi-  
da: rosarum, in causa calida.*

*Externa ardorem, & dolorem leni-  
tia sum.*

*Folia: solanum, plantago, althæa,*

hyoscyamus, semperium vtrumque,  
malua, parietaria, ebulus, sambucus,  
lens aquatica.

*Fler. rosarum.*

*Succi*: acetum, phlegma vitrioli, al-  
bumen oui, oxyctatum: sal prunellæ  
solutum aqua papaveris rhœados.

*Gummæ*: camphora.

*Mucilagines*: seminis psyllij, sem. cy-  
doniorum.

*Aqua*: rosatum, solani, plantaginis,  
papaveris rhœados.

*Olea*: violarum, nymphæ, rosatum,  
oleum ex sanguine humano, elixit hu-  
manum vocatum.

*Vnguent. rosatum, populonis.*

*Externæ dissipantiæ reliquias humorum,  
& dolorum.*

*Radic. enule camp. cyclaminis, bryo-  
nix, cucumeris asinini.*

*Folia*, verbasci, primulæ veris, cha-  
mapityos, calamintæ, nasturium,  
centaurium min. nepetha, puleg. ebu-  
lus, hypericum.

*Resin. mastix, bdellium, terebinth.*

*Frustræ*: hermodactyli.

*Succi inspissat.* ammoniacum, opopanax, euphorbium.

*Animal.* castoreum.

*Adipes* : cati, taxi, vulpis, vrsi, serpentis.

*Vnguentæ* : martiatum, de althæa.

*Olea* : de latetibus \*, castoreo, terebinth. hypericonis, mellis, ceræ, irinum, vulpinum, de euphorbio, ( quod cautè usurpandum,) sambucinum.

*Emplastræ* : de Vigo \*, de mucilaginij lus, meliloto, oxycroceum.

*Arthriticis amitterantur.*

## NERVOS ROBORANTIA.

*Quæ* nervos roborant, facultate conueniunt cum arthriticis, siquidem articuli, nerui omnes & partes nervosæ, (membranæ, tendines, ligamenta,) articulos ambientes & colligantes, eiusdem sint naturæ: Horum usum nervorum in affectionibus, paralysi & stupore : tremore & conuulsione. *Quoad* materiam, alia calida, alia frigida.

*Nðreñxæ calide.*

*Radic.* acori, eryngij, imperatoriz, peu-

*Cedani, thaponticum, costus.*

*Lignæ: sassafras, viscum quercinum.*

*Folia; chamædtios, hyssopi, lauendula, majoranæ, primulæ Veris, rosmarini, saluix, serpylli, spicæ nardi, Celicae, Italicae, tragoriganum.*

*Fructus; anacardia, nuclei pinei.*

*Grana, juniperi, kermes.*

*Aromata; cinamomum, piper omne, zingiber, macis, nux moscata, garyophylli, cardamomum.*

*Resinæ, ac gummæ; myrrha, terebinthina Veneta, cum puluere chamæptyos, opopanax, sagapenum.*

*Animal. cerebrum lepotis affum, castoreum ad Æ. j. forma pilularum.*

*Conserua: rosmarini, primulæ Veris, saluix, cryngij, betonicæ.*

*Confection. theriaca, Mithridatum, confectio anacardina.*

*Species: diagalangæ, pleresarchonticon.*

*Aqua: theriacalis, majoranæ, laudulæ, saluix.*

### Externa.

*Adipes: viperinus, vulpinus, ceruinus, humanus.*

*Oleæ: Philosophorum, ceræ, chàmomillæ, hypericinis, lumbricorum, nucis moscatæ per expressionem, terebinthinæ, vulpinum, viperinum, costinum, petroleum, anethinum, ricininum, rutaceum.*

*Tbernae; sulphureæ, nitrosæ, bituminosæ, & parum aluminosæ, harumq; stillicidium ad principium spinæ, limus itē ex his extractus, & illinitus sedi affectu.*

*Pinguendo auferis destillans, dum in ventu assatur, repleti thure, myrrha, bdellio, mumiæ, &c.*

*Aqua vitæ particulis resolutis affusa plurimum prodest.*

*Fomenta & balnea ex artemisia, conyzæ, calamenta, ruta, camomilla, anthemio, salvia, chamæptyde, origano, hyperico, nitro, sale.*

*Cataplasmatæ ex iisdem.*


*Næcissæ frigida.*

*Eadem cum cephalicis frigidis, quibus addenda.*

*Inter semina, hordeum.*

*Species: diarrhodon Abbatis, diatrium-fantalon.*

*Inter extera, mucilago psyllij, folia vitis, acetum, & aqua rosacea: aqua chalybeata fluuialis, aquæ thermales ferratæ.*



## APPENDIX. *DE REMEDIIS,*

*ad*

### *AMBUSTA.*

**R**EMEDIA ad ambusta ex Ferocie  
lio lib. 6. m. m. c. 20. triciplia sunt:  
*alia* inflammationem sedant, & extin-  
guunt empyreuma: *alia* pustulas prohi-  
bent, & dolorem leniunt: *alia* excoria-  
tas aut exulceratas partes dolentes le-  
niunt, & moderate siccando ad sanita-  
tem perducunt.

**PRIMI GENERIS** sunt.

I. **FRIGIDA** omnia, quæ extin-  
guunt inflammationem: ut sunt,

*Succi & liquores*: aqua, acetum, oxyctas-  
tum, oui albumen, succus semperuii,  
lactucæ, endiviæ, solani, byoscyami,  
plantaginis, portulacæ.

*Aqua.*

*Aqua gallitia herbarum praedictarum.*

*Terra*; quævis obuia, maximè Cimolia, bolus Armenia succo aquaue conuentienti, aut oxycrato-soluta & illita:

*Mineralia*; cerusa, alumen aquâ solutum, cum oui albumine, attramentum scriptorium ex aqua illinit Dioscor.

*Gummi*; camphora.

II. *CALIDA* quadam ardorem cuocantia: vt,

*Folia*; ari, & porri illita: sambuci, & cebuli imposita.

Cepæ cum sale contusa, ambustæ partitæ impositæ.

*Radici*; asphodeli in oleo decoctæ succus, ad perusiones, & ambusta.

SECVNDI GENERIS remedia sunt sequentia.

*Folia*; ligustri, saluix, myrti, cerato, vel adipe suillo excepta, & imposita.

Eadem viridia contusa, admisita axungia illita.

*Folia*; maluæ, & papaveris corniculati codeni modo.

Gluten calidæ aquâ emolitum. Diſcorid. Myrti foliorum vſtorum puluis cum oui luteo.

Sal nitrum cum oleo rofaceo, vel olio-  
rum.

*Aqua* florū verbasci, plantaginis,  
solani, rosarum, addito interdum lanta-  
lo rubro, & camphora.

Succus fœniculi, & vinum album cum  
aqua frigida, fusā supra ambustum lo-  
cum.

- TERTII GENERIS remédia  
hæc sunt.

Vanguentum de calce vīsa lota, q̄tod  
componitut ex calce lota, & oleo rofa-  
ceo, vel baeyto, additis allis, si velis, vt  
cerusa, camphora, mucilaginibus.

Oleum hyperici cum calce lota, effi-  
cax in quavis vītione, etiam ex puluere  
sclopetario facta.

Vnguentum album R̄balis, vel de ce-  
rusa.

Pluta vide apud Ferriē. loco citato.  
Hæc solūq̄, coronidis loco, ad comple-  
tas paginas, adjicere placuit.

Formularium Medicarum tractatus  
habet libros duos continentres.

A Medicamenta interna.

liquida.	apothe mata
	julepus.
	potio.
	syrupus.
	vomitoria.
	vina med.
	emulsio.
	amygdal.
	hordeatum.
	lac. & serum laet.
mellia.	hydromel.
	hydro saec. ptif.
	dixta, boch.
	decoct. gall.
	destill. instaur.
	juscula.
	bolus.
	opiata.
	eclegma.
	conditum.
solidia.	pasta reg. morselli.
	pandaleon.
	massa panis, pincol.
	tabellaæ.
	piluleæ.
	trochisci.
	pulueres.

A a ij

A

Exter-  
na.Cōmū.  
plurib.  
Part,Pro-  
pria  
partiū  
qua:ū-  
dam.

epithema.  
lotio.  
fotus.  
infessus, semicupium.  
balneum.  
stupha, sudator.  
embrocatio.  
linimentum.  
vnguentum.  
ceratum.  
emplastrum.  
spanadrapum.  
cataplasma

rubifrons

sacculi.

dropax.

vesicat.

frontale.  
oxyrhod.  
cucufa.  
collyrium.  
gargarismus.  
apophleg.  
dentifric.  
erthimum.  
suffiment.  
odòrament.  
scutum,  
pessarium.  
nascale.  
suppositorium.  
clyster.

## Materia medica est vel

Vniuersi, resp.

Causam morbiſcam peccantem

Quieſcere	Motu.	Quantit.	Qualit.	magis	qualiterantia.
				2.	atten. incid. tenu. incrass. dur. emoll. grum. diss. lentid et erg. act im. epice rast.
adstringere	vac vino. præp.	vaccinio. præp.	corpus aperientia.	occ. Aleipharmacæ. hum. digestiua.	
				purgantia. vomitoria. diuretica. diaphoretica. mat. flu. incrassantia. partis recip. repell. viam.	
attrahere	infensib.	attrahē qual.	adstringentia. discutientia. absorbentia.	intercipientia	
				manif occul ta.	
formam	sēsib. sub.	for mā.	ichoris vesicāt puris	suppo. apoſt a periēti	

		simplex, alterantia.
	int̄e	cum materia, habet tat-
	per.	causæ.
Morboiū summa gen.	origo	ang meat. insens. Rarefac.
	dil. meat.	sens. adstrin. insens. con- dens.
	hyper- fatu.	constip. cauit. magn. & num- aud.
	sol.	simpl. Glutin. vulner.
	vn.	cum dep. substantiæ, Sarc. epul. c. g.
Symptomata cōmuniſſima maximè vr- gentia.	Dolor, cui opponuntur.	Anodyna. Narcotica.
	Vigiliz, Hypnotica.	
	Sang. fluxus, Toxæmia.	
	Syncope, Spir. reficien- tia.	

Capi-  
ti re  
me-  
dia  
dica-  
ta.

Tho-  
racē  
rēspe-  
ctan-  
tia.

Ven-  
tri  
conse-  
crata.

		cephalica.	)
Cere- bro.		errhina. caput. purgia.	sternut. ipoph.legm. άγνωστα.
Oculis	Ophal- mica.		anodyna. repellentia. digerentia. detergentia.
		Autibus, otica. Dentibus, odontica.	
Cor,	cardiaca.		
Pulmones.		bechica. pneumonica.	
Mammas, lac		generantia. corruptentia.	

### Ventriculo, stomachica.

Intestinis.		flatos discutient. vermes necant,
Hepati,	hepatica.	
Lieni,	splenica.	

Renibus ne-	lenientia: detergentia/ lithontriptica:
phriticā.	
Vesicæ, cystica.	
Testibus, se- men.	generantia. extinguentia.
Vtero hi- stetica.	corrob. vt { mou- menses. } fist,

A	Artu- bus dica- ta.	Interna	calida	quemadmodum
				cephalica.
		exter.	in principio ardorem , , &	dolorem lenientia.
			in fine reliquias impeditis	humores dissipantia.

F I N I S.

# INDEX

## R E R V M.

*A**B*

**A** *Borbenia.* 463  
*Adstringentia.*

458

*Acaricus.* 417

*Alexipharmacæ.* 364

*Interna.* 365

*Externa.* 367

*Aloe.* 400

*Alierentia.* 352

*Ambusilis* *remedia.*

552

*Anodyna.* 486

*Applegmatizonia.*

502

*Apostema aperientia.*

468

*Aperientia.* 472 567

*Antroscopicæ.* 546

*Attenuantia.* 354 371

*Alrabernia.* 466

**B** *Deltium, resina.*

465

*Bebica.* 514

*Bilem attenuantia.* 371

*Incrassantia.* 370

*Præparantia.* 369

*Purgantia.* 378

*C*

**C** *Allum generan-*

*tia.*

483

*Cardiaca.* 512

*Carthamus.* 415

*Cassia.* 381

*Carbaretica.* 472

*Causica.* 473

*Cephalica.* 495

*Cholagogæ.* 381

*Cicatricæ deletia.* 485

*Colocynthis.* 416

*Condensaria.* 473

3

*Cystica.*

538

G

**D** *Energetia.* 361*Digestiva.* 369*Discutientia.* 462*Dirigentia.* 447*Diaphoretica.* 462*Dulcia Spleni nocina:*

532.

E

**E** *Balsus* 439*Elaterium.* 441*Emollientia.* 358*Emplastica.* 456*Epiceratifica.* 363*Epithymum.* 434*Epulotica.* 483*Erbinus.* 500*Escarotica.* 413*Esnis.* 442*Luphorbiun.* 429*Exurabentia.* 466

F

**F** *Latm discutientia.* 526*Formularum schema-**sismus.* 555**G** *Luminaria.* 479*Grumos diffi-*  
*uentia.* 360

H

**H** *Elleborus niger**Hepatica.* 528*Hermodactyli.* 422*Hydragoga.* 439*Hypnotica.* 489*Hysterica.* 540

I

**I** *Alapa.* 425*Incidentia.* 356*Incrassaria.* 370.451*Intercipientia.* 458*Ireos succus.* 441

L

**L** *Ac generaria.*

518

*Minuentia.* 519*Lac virginis.* 361*Lapis Annensis.* 437*ibid.**Lexonitis.* 462*Levientia.* 378*Lubonisrica.* 534

## INDEX. 553.

<i>Linfus.</i>	155	<i>Oxydorcia</i>	504
<i>M</i>		<i>Oleum palmi</i>	504
<b>M</b>	<i>Anne.</i> 386	<b>P</b>	<i>Aregorica.</i> 486
	<i>Mechoaca.</i>		<i>Pbæmigmi.</i> 467
	424		<i>Pituitam prepararia.</i>
<i>Bilemcholiam preparata.</i>			372
<i>Purgativa.</i>	374	<i>Purgantia.</i>	415
<i>Purgativa.</i>	431	<i>Rhenonica.</i>	517
<i>Menses momentia.</i>	541	<i>Polypodium.</i>	433
<i>Sistemia.</i>	544	<i>Psilotbra.</i>	476
<i>Myrobalani.</i>	406	<i>Purgantia.</i>	379
<b>N</b>		<i>Pyrosis.</i>	472
<b>N</b>	<i>Arctica.</i> 488		<b>R</b>
	<i>Nasalia.</i> 500		<i>Arefaciemta.</i>
<i>Nephritica.</i>	533	<b>R</b>	472
<i>Nervos roboratia.</i>	549	<i>Repellentia.</i>	454
<b>O</b>		<i>Rhabarbarum.</i>	394
<b>O</b>	<i>Dontica.</i> 510	<i>Rosarin succus.</i>	392
<i>Odorifera</i>	mn	<i>Rubificantia.</i>	472
<i>Heribus periculosa.</i>			<b>S</b>
	493	<i>Agapenum.</i>	429
<i>Opopanax.</i>	418	<i>Sambucus.</i>	439
<i>Orbitalmica.</i>	504	<i>Sanguinem cohivenia.</i>	
<i>Anodyna.</i>	505		490
<i>Repellentia.</i>	506	<i>Sarcotica.</i>	481
<i>Detergentia.</i>	507	<i>Scammonia.</i>	409
<i>Discutientia.</i>	506	<i>Semen generantia.</i>	539
<i>Otica.</i>	508	<i>Extinguentia.</i>	540

<i>Sens.</i>	431	<i>Supurans.</i>	468
<i>Sepica.</i>	472	<i>Succi insipissati.</i>	465
<i>Soldanella.</i>	440		V
<i>Somnifera.</i>	489		
<i>Spiritus reficiens.</i>			
	452		
<i>Splenica.</i>	530	<i>Vesicaria.</i>	467-471
<i>Sternutatoria.</i>	502	<i>Vomitoria.</i>	444
<i>Stomachica.</i>	521	<i>Vterum roborans.</i>	
<i>Sudorifera.</i>	450		
		<i>544</i>	
		<i>Vulneraria.</i>	480



# Remedes.



essentia carminativa Medicis medici et  
expertissimi.

Alcipe.

Radicum Zedoaria unciā unam, cardine,  
galanga minoris <sup>īn</sup> unam unciā semis,  
corticem aurantiorum, seminis anisi et  
Semino carvi, florū chamomilla Romana,  
Cariophyllorum aromaticorum, Baccharum  
lauri excoartatum, acori veri ān drachmam,  
unam semis, Macis drachmam unam.  
Misce et pulveriza grasso modo, extrahantur  
confusa et concisa cum spiritu cortex  
Citri recent: fact: 3ij. vel uniiij. Sex, qui  
post digestionem dierum 14. Serv: adde  
spiritus nitri glauberiani, ex nitro crudo  
pulverisato et oleo vitrioli facti et dulcificati  
cum et vini rectificatissimo; unciā  
unam digere denuo dies aliquod, post  
filtrationem servetur adi cuius dosis ad  
guttas viginti, quadraginta et ultra in infusione  
thee.

Yires

non tantum ad flatus pellendos, sed et dolores  
colicos, cardialgiam suffocationes hypochondriacas  
driaces commendat, insuper quoque

ventriculum Roborat, et coctionem juvat  
inde ad omnes stomachi vicia successu-  
bona commendat.

Ms. B. la formule de ce remède a été  
donnée par un apothicaire de Weissenburg  
en Alsace. Seulement Geoffroy à qui elle fut  
donnée, avoue qu'il n'avoit pu parvenir  
à y fixer le sel de Glauber. On peut avoir  
des gouttes de Védelius en Alsace, celles qu'on  
faroit en France ne seraient pas sûres, puis  
que le célèbre Geoffroy a avoué modérément  
qu'il n'avoit pu y réussir.

### Remède Pour la goutte

Prenés une once de moelle de Boeuf, une  
once de Beurre frais, une bonne pincée de  
cimette de Sauge; faites fondre le beurre avec  
la moelle de Boeuf, à petit feu; et pendant que  
le tout se fendra, mettez-y les cimettes de Sauge  
et faites-le passer ensuite à travers un linge  
en l'exprimant fortement. ajoutez-y après  
cela une cuillerée distillée de fleurs de Sauge  
et autant de bonne eau de vie; remuez le tout  
ensemble, et le laissez refroidir; il s'en fera  
un onguent avec lequel vous frotterez la  
partie légèrement y mettant dessus un  
papier et l'envelopperés avec un linge  
un peu chaud.

### Maniere

#### d'employer quelques Remedes

theriaque

on se sert de la theriaque dans tous les maux  
du estomach, dans les defaillances, dans les —  
faiblesses, depuis demie drame jusqu'à un,  
drachme et demy, toutes Sculle ou melangée  
avec un peu de vin, de l'eau de fleur d'orange —  
ou de canelle. Confection  
la confection de hyacinthe et d'alKermes  
sont employées dans les mesmes cas. celle  
de hyacinthe est beaucoup plus douce et plus  
faible que celle d'alKermes, et on les meole  
tres souvent ensemble pour remplir les  
memes indications que nous avons déjà  
marqué pour la theriaque, et la Doze est  
l'amecone. *Diacordium.*

le Diacordium de fracastore est aussi un  
leger cordial, mais comme le fait au num entre  
dans sa composition, on le regarde comme  
un stomachique et un calmant qui convient  
dans les indigestions, dans les cours de ventre,  
dans les dissenteries. on en donne depuis  
une demie drame, jusqu'à une drame et  
demie, qu'on prend tout seul, ou avec un peu  
de vin delicate, ou avec l'huile d'amandes  
souces, quand il y a une irritation un peu  
grave dans les Broyaux.

felicité de propriété doit être regardé comme le plus puissant Stomachique, et qui remède plus promptement aux languurs des stomachs dégouillés; à l'admission des forces qui surviennent principalement à la fin des grandes maladies. Sa dose est depuis trois ou quatre gouttes jusqu'à huit dix ou douze.

#### Gouttes anodines.

Ces gouttes anodines ou laudanum liquide convient dans toutes les cas de douleurs irritation et par conséquent dans bien des maladies; on en donne depuis dix gouttes jusqu'à quarante augmentant peu à peu selon la violence de la douleur et selon que le malade n'est plus ou moins accoutumé. Vingt gouttes de laudanum liquide valent un grain de laudanum solide ou un extrait.

#### Baume de Perou

Le Baume de Perou convient principalement dans toutes les coupures, les échinoises, les contusions. Il en est de même de l'eau vulneraire qu'on applique immédiatement sur la partie dont on la baigne.

#### Caux cordialles

L'eau de canelle, celle des carmes, et l'eau theriacale, sont des eaux cordiales rachafaudantes.

qu'en donne dans les Sincopes, dans les maux d'estomach, dans les preludes d'apoplexie, dans le froid & de quelque violent accès, à la dose d'une demie cuillerée à café jusqu'à une demi-une et demie. on se sert également de la Reine d'Hongrie, mais cellecy est bien coup plus forte plus piquante. on s'en sert principalement pour l'exterieur, on enfrotte le néo, les mains, les tempes du malade ded qu'il est en faiblesse.

L'eaude fleur d'orange se prend intérieurment à la dose d'une de 2 et 3 cuillerées dans les petits maux d'estomach, dans les indigestions légères et pour les vapeurs.

### Kinkina.

on ne parle pas de l'application de Kina de la Rhubarbe et du tartre emétique que tout le monde sait devoir convenir dans les cas des indigestions, je n'avais levains ramassés dans les premières voyages et la dose en est présente par petits paquets.

### Tincture de castor.

La tincture de castor se donne depuis huit gouttes jusqu'à un flacon dans une potion cordiale et histrique pour raladre les vapeurs et rebabrir le ressort de l'estomach on peut le prendre seul dans une cuillerée

de fleur d'orange, dans le même cas -  
depuis huit jusqu'à douze gouttes.

### Baume de copahüe

Le Baume de Copahüe est excellent pour  
toutes les playes recentez, applique dessus  
sur le champ. on s'en Sert interieurement  
pour diviser les glaires qui se forment aux  
Reins, et qui empêchent le cours des  
urines. Son principal usage est de l'employer  
deterger et consolider l'ulcere des gonnorees.  
on le prend depuis dix gouttes jusqu'à vingt  
entre deux couches de Syrop de Capillaire,  
le matin au jeun, ou bien dans une  
cuillerée de lait, ou enveloppé dans du  
Sucre en poudre, auquel on peut former de  
petits Bals.

### Baume de Canada

Le Baume de Canada est regardé comme  
un Specifique pour deterger et consolider  
l'ulcere des poumons. Son effet est doux  
en ce qu'il ne porte pas beaucoup de chaleur  
dans la masse du Sang. il facilite le crachet  
en adoucissant la matiere et la masse des  
liqueurs. on le prend de la même maniere  
que le baume de Copahüe et on peut s'en  
servir dans les gonnorees aux personnes  
qui sont d'un tempérament tellement par  
préférence au Baume de Copahüe.

la ciel préparé à la Rose se prend à la première cuillerée de soupe à dîner pour aider la digestion, corriger les vices de ce viscere, dissipper les obstructions empêchant plus de fluidité à la masse des liqueurs en rétablissant les digestions, d'usage en est long et n'exige aucune précaution.

---

### Rémede de ch. chicoyneau

P. Médecin du Roy pour guérir les migraines qui prennent par accès.

Prenez Kina concassé deux onces, Racine de fraisier, de graminet et de chicoree sauvage, de chacune, une once, Sommité d'absinthe, de petite sauturee, de Camepitis et de Camomille de Chaequin une pincée.

Sené monde six drames et deux drames cristal minéral dans Sept livres d'eau réduites à deux bouteilles il faut en prendre trois gobelets par jour, un le matin à jeun, le second après dîner, le troisième en se couchant.

---

(6)

Remède pour guérir les dissenteries  
flaue de Sang, ténèbres et épreintes  
et toute sorte de dérangement  
d'estomach.

Prenéo pour deux sols d'écopie de  
Scimmaroba, faire en une ptisanne  
de la quantité d'écopots d'eau réduite  
à trois bouteilles et prenez en trois verres  
par jour, trois jours. Seulement

---

Pommade excellente pour  
guérir les engelures au visage les  
plus tenaces et les plus invétérées  
de Mr. Souchay chirurgien de Paris  
extrait d'un ouvrage de ses lettres.

" Cette pommade est une dissolution de  
" mercure dans le poix de nitre, le mercure  
" étant bien divisé par le poix de nitre, on  
" l'incorpore dans le Saindoux, on mele  
" bien le tout ensemble, et lorsque la  
" pommade est refroidie, on la met dans  
" un pot de sagane, où l'on en fait des  
" tablettes.  
" Pour y parvenir, prenez deux gros ou  
" quatre de mercure revivifié d'acinaise  
" mettez le dans une phiole ou bouteille  
" de verre que vous ferrez doucement

chauffer sur les cendres chaudes, versés  
dessus le vif argent, autant d'esprit de  
nitre qu'il en faudra pour diviser entière-  
ment le matrice, et le réduire totalement  
en liqueur, alors verser cette dissolution  
dans une quantité de Saindoux proportion-  
née à la liqueur, et faire comment est  
marqué cy dessus. prenez garde sur tout  
de recevoir la vapeur de la dissolution  
elle vous porteroit à la teste et pourroit  
vous faire beaucoup d'mal. au reste  
cette composition ne laisse pas d'être  
difficile à faire quand on n'en a pas  
l'usage.

Cette pommeade est un remède reprobé  
et d'un succès assuré pour guérir les  
engelures et les crevasses qui se font à  
la peau sous l'nez et au menton par  
le grand froid et le hasler, et les rougeurs.

## du Cassis

au mois d'août et de septembre et au printemps  
qui sont les saisons où le cassis pousse plus  
fortement ses feuilles, il en faut faire provision  
et les faire sécher à l'ombre, les tenir dans un  
lieu sec pour bien servir au besoin avec le sucre  
de l'art qui leur donne presque la même vertu  
quelles avaient dans leur fraîcheur. quand on  
manque de cassis dans toutes ces saisons, il faut  
recourir à la plante. Le bouton que l'on trouve  
aux branches en tout temps et le corce-méme  
pilé et arrosé de vin blanc pourront entraîner  
facilement le suc pour le même effet que le  
feuille. Si l'on n'a pas de vin blanc on peut se  
servir de vin rouge pour le faire infuser, il est  
moins mauvais pour les mauvaises couches et  
d'estomac et le vin blanc préférable pour le  
sable et la gravelle.

Ceux qui ont de l'aversion pour le vin peuvent  
prendre le cassis avec de l'eau dans laquelle on  
aura bouillir les feuilles comme celles de thé. Si  
ces feuilles sont sèches on fera l'infusion plus forte  
Si elles sont en poudre, il faudra prendre l'eau  
avec la poudre presque l'un et l'autre auront  
bouilli ensemble, mais avec ce cas on ne  
prend moins: pour laide de 24 on en peut prendre  
un verre le matin et un autre le soir avant  
le souper.

Les feuilles fraîches ont plus de vertu la façon  
de bien servir c'est de les mettre infuser dans  
l'oreiller vin pendant 24 heures l'assurer  
bouteille de verre qui ait le col large. on met  
une poignée de ces feuilles on scelle bien  
la bouteille pour qu'elle ne se rompe point

il faut en boire une tasse deux fois le jour  
et davantage. Il est nécessaire quatre ou cinq  
tasses au verre, et remettre, au bout de  
du vin au proportion dans la bouteille, en sorte  
que le vin <sup>servage</sup> ~~servage~~ toujours au dessus des feuilles  
autrement il saigniroit. Les mêmes feuilles  
peuvent servir 15 jours si on les tient dans  
un lieu frais et qu'on ne les laisse point éventer.

effets

Le cassis est un remède infatigable pour toutes  
les fièvres plus press. Il chaffe le ventre  
en prenant en poudre comme le café ou comme  
le thé après luy avoir fait faire un bouillon  
dans l'eau. On s'en est abondamment servi pour  
grêrir les fièvres hivernales quentes et continuées  
c'est le remède pour réveiller un apoplexique  
le plus prompt et le plus efficace. Il est l'ouvrain  
contre le sommeil l'éthargique et contre les affoiblisse-  
ments qui précèdent les vapours des femmes. Il donne  
le mouvement et le sentiment à quelque partie  
du corps qui l'auront perdu par l'abondance de  
quel que humeur froide comme celle de la goutte  
en appliquant les feuilles fraîches ou sèches  
bremées dans du vin blanc sur les parties  
engourdis, il ne faut les appliquer que deux ou  
trois jours après en avoir senti les premières  
attintes de peur de l'arrêter.

Le cassis est une plante également céphalique  
et cordiale. Tenant aux lèvres il purge le cœur et  
les rejouit et le fortifie empêche qu'on ne  
s'enflame et préserve d'avénir. Il guérit la  
migraine et est fort bon pour toutes les douleurs  
de tête en appliquant les feuilles sur la  
tête.

c'est un remède prompt pour le ver à pelle. Sans  
saignée quel fait eviter.

Le cassis guérit les coupures d'instruments. Il est  
bon remède pour fortifier l'estomac il en fait effet  
la douleur et donne grand appetit de quelque chose  
que on le prenne pendant quelques jours. Il est  
spécifique pour guérir la jaunisse les paules coulent  
il décompose la vesse et le foie et empêche que l'opulence  
n'ait des suites fâcheuses.

Il guérit les enflures du visage, de l'estomac, et  
de l'hypochondrie. Si on bien sert de bouteilleure, le  
prendant en syrop ou avec le vin ou à l'eau chaude  
il guérit du Sable et de la gravelle et même fait  
rendre des pierres.

Le cassis est un excellent préservatif pour guérir  
le venin le prenant au moins lorsqu'on est obligé  
d'aller dans les mairoux infectés.

Il tempère aussi les fonges de la bile et guérit la  
colique quelle que ce soit, il fortifie le cœur et le rein et  
par ce moyen il abat les vapeurs fâcheuses  
de la melancholie de quelque manière qu'on  
le prenne ou par infusion ou en boles.

Enfin on peut acouper sur dans toutes les maladies  
commencer les remèdes par le cassis. Il n'aura  
jamais de mal à personne.

Lorsqu'on se sont griffé de quelque bestiole ou animal  
ou quand les chiens enragés, si on a des feuilles  
de cassis, il en faut aussitôt piler deux bonnes  
poignées et en casseriner le jus dans une cuiller  
blanc et le faire prendre au malade. Il faut  
ensuite scarifier la gorge pour en faire  
sortir du sang, y mettre la moitié d'un

petit pain chaud pour attirer le venin et presser  
gardi quaeun animal ne le mange et y  
appliquer le suc avec le marc des feuilles expri-  
mées, assez souvent il n'en faut faire qu'une poche  
mais il faut observer le malade et si le combat  
est trop grand entre le remède et le venin il faut  
doublez l'adoise. Si on n'a point de feuilles fraîches  
mais seulement des sèches, il faut promptement  
les pulvriser et en faire prendre une bonne  
pinte au malade avec du vin blanc et une autre  
potion cordiale.

Pour les blessures aux piqûres venimeuses  
de moucheron guêpe etc. il faut en faire  
infuser quelques feuilles dans du vin blanc et  
après avoir fait degoutter la plante y appliquer ces  
feuilles. on fera la même chose avec les  
boutons et le coeur du cassis pulé et misé dans  
du vin et on n'eût au malade. Si on n'a ni  
feuilles ni boutons ni coeur de cassis le  
Syrup de cassis quelque venin qu'on ait dans  
le corps le retrouvera au moyen d'une ou de  
deux cuillerées que l'on donnera au malade  
la conserve de cassis de la grosseur d'une  
noix ou des tablettes en même quantité  
feront le même effet.

Pour les panaris ou tumours aux doigts causés  
par une humeur maligne, on exprime les  
feuilles dessus avec le marc et on enveloppe  
bien le bout des doigts avec ces feuilles.

Le cassis n'est pas moins utile aux bœufs mais  
il faut augmenter l'adoise en proportion de leur  
grandeur il a guéri des bœufs abandonnés et  
laissés comme morts des brebis chevaux  
coquidines empoisonnés ou malades.

maniere de faire le syrop de cassis

il faut avoir un grand coquemar avec son couvercle  
le remplir de feuilles de cassis et le bien presser avec  
la main relaisant que quatre doigts de rondeur au bout  
du coquemar, mettre sur ces feuilles le meilleur vinaigre blanc  
le laisser tournoyer de 2 doigts sur les feuilles ensuite  
mettre le couvercle et du papier qui le forme si bien quil  
ne puisse prendre froid. le tenir dans un lieu froid pendant  
huit ou neuf jours pour le faire macerer ou fermenter  
il est necessaire de le visiter chaque jour pour y ajouter  
du vin afin que les feuilles ne demeurent jamais de cou-  
vertes et ne montrent point. apres quelles six bientent  
mois il faut mettre a la presse le vin et les feuilles  
quelques uns le repasser plusieurs fois par le marteau  
pour en tirer toute la peinture d'autres font  
bouillir au peu le vinaigre blanc avec les feuilles avant  
que de les mettre a la presse. Sur une liere de la  
liquer ou peut mettre une loure et de la couvrir  
de sucre et faire bien cuire le tout pour la conserver  
longtemps. on peut faire aussi le syrop avec de l'eau  
tout grec pour faire de la conserve de cassis

il faut dans la saison que les feuilles ont plus de virginité  
en faire secher a l'ombre et pour faire la conserve  
il faut en mettre au poivre que ce que on voudra et  
ajouter par que les feuilles seules conservent moins  
les poivres que le poivre. enduite il faut faire cuire le  
sucre jusqu'à ce qu'il soit froid, il durcisse en roche  
puis lors il faut le hacher au feu et etant en eau  
tout bouillant mettre sur une denie liere de sucre  
un sixieme ou un peu plus de poivre et les bien  
meler ensemble avec une spatule ou cuillere  
d'argent jusqu'a ce quil soit presque froid.

R emède contre la pleurésie ou fasse.

pleurésie à pr' de abrégé d'el a medecine  
pratique traduit de l'anglois par m. d. et. a  
Paris chez l'about place de Cambrai et ganeau  
rue St. Severin . p. 152 .

prenez deux ou trois bonnes racines de scorsonere  
avec la feuille ; si ce n'est pas dans l'été nettoyez  
bien la racine et la soupe au fort petit morceau  
et ensuite faites prendre au jeun au malade cette  
décoction toute chaude et que le malade se  
tienne couvert sans prendre l'air pendant deux  
heures durant lesquels il sera au repos. Si c'est une  
pleurésie on le lessuera bien envoit et ou lui  
donnera un bouillon . Si la fièvre et le mal de  
côté ne sont pas entièrement passés avec le mal  
de poitrine il faut relier le lendemain comme  
ça depuis , mais il faut que le mal de naît rien  
plus auparavant , il sera bon de commencer  
par une seule saignée

autre contre la pleurésie et fièvres  
comme les pauvres trouvent difficilement  
la scorsonere , on peut se servir pour le  
meme mal du cerfeuil et des pissenlins ou  
d'ont de l'ion , prenant une poignée de l'un et de  
l'autre et apres l'avoir pilé y ajouter un bon  
verre de vin blanc ensuite couler le tout  
dans un linge presser un peu le marc et faire  
avaler cette boisson aujeun au malade et tout  
le reste comme on avie dans l'autre remède  
ça dessus , ayant commencé sil se peut par  
une saignée qui doit précéder le remède  
l'ensemble est excellent pour toutes sortes  
de fièvres fureuses et quartes

Preflexions générales sur la saignée  
traduit de l'anglais par C. ut infra.

De tous les remèdes il n'y en a pas en général  
dont on tire plus de service et d'avantage que de la  
Saignée; il n'y en a pas non plus qui soit suivi à tout  
quatre plus d'angoisses quand on l'ordonne indifferem-  
ment et sans jugement. La cause réelle d'un grand  
nombre de maladies est une trop grande abondance de  
sang.

Tous toutes les maladies inflammatoires, sans en-  
excepter une, ce seroit un crime, d'obmettre la saignée  
comme au contraire ce seroit s'exposer aux plus  
grands dangers qu'il de la prescrire lors qu'ellemate  
et la circulation sont languissantes, parce qu'alors  
les esprits sont dans un épuisement trop grand et la  
nature est trop frible pour soutenir la moindre  
évacuation. On doit par conséquent l'ordonner tôt,  
et l'arrêter selon l'énergie la violence et la durée  
de la maladie dans les pleurésies et les purpura-  
manies (inflammations du poumon) & les premiers jours  
que commencent ces attaques; mais lors  
que lorsqu'au moins la suppuration a pris son cours  
ceste vaïm que l'on espéreroit quelque ressource  
de la saignée: car alors la matière qui cause la  
maladie doit se chasser par l'expectoration que  
la saignée retarde nécessairement.

Tellement dans les apoplexies les dysenteries ou flux  
de sang et dans les chaleurs qui fatiguent beaucoup  
les intestins, il faut saigner proportionnellement à la  
maladie, ce qu'on doit faire suffisamment parlant  
au commencement des fièvres; mais la saignée ne  
doit plus avoir lieu sur le declin de ces maladies, car  
pour lors d'inflammatoires quelles étoient, elles

deviennent assez souvent très vives. Dans cette conjoncture on doit appliquer librement les saignées.

Il est aussi fort à propos d'ordonner la saignée dans les grands abcs lorsqu'il se forme une humeur excessive occasionnée par la révolution de la floraison des humeurs, ou lorsque la nature se trouve dans une grande oppression que cause une chaleur immorale car en ce cas c'est l'irritation du sang la suppuration n'arriverait que plus tard et si, presque immédiatement dans la petite verolle, la saignée même répétée en quelques cas peut être très avantageuse aussi bien que dans les maladies pléthoriques (ou de plénitude de sang) pour quelque temps de la maladie que ce soit, à l'exception cependant des enfans pendant le picotement des nerfs avant l'éruption, car en ce cas l'expérience journalière apprend qu'en la saignée rend la maladie mortelle.

En un mot pour les maladies des yeux, la sciatique partout sèches dont les crachats sont épais, les rhumatismes, les inflammations du bas ventre ou de l'utérus, les gommeuses virulentes, les bubons, les douleurs vénériennes, les hemmoroides enflées, les rhumatismes chevrons, la colique, la stranguerie, la gravelle, les douleurs nephretiques, pour toutes, les hémorragies ou fuites de sang, la galle invétérée et toutes les autres maladies semblables, la saignée est l'un usage et d'une utilité toute particulière.

mais dans les hydrocéles, dans la jaunisse, la goutte et dans toutes les maladies qui proviennent d'un trop grand relâchement

où une obstruction de vaisseaux, on doit employer les remèdes spécifiques pour chaque mal en particulier. Sans penser à les augmenter par une saignée qui ne peut être que teméraire et hors de propos.

### Observat. Sur les fièvres inflammatoires.

les fièvres inflammatoires dégénèrent souvent en fièvres de la classe des malignes. Pour lors le pouls est extrêmement déprimé, les parties du corps tombent en convulsions et la circulation paraît être aux abois. Dans cet état déplorable, les médicaments d'une nature chaude avec des vermiculaires du plus haut degré produisent quelquefois des effets surprenants. Pour cette raison il est fort utile alors de donner un denrée gros de l'électuaire suivant avec trois ou 4 cuillerées d'un julep diaphorétique toutes les 4 ou 6 heures.

### Cordial

Prenez de la poudre de contrayera composée 2 onces; de la racine de serpentaire de Virginie en poudre, une once avec une quantité suffisante de Syrop d'orange faites un électrum de la pharmacopie brad. de Langlois p. 19.

### Sur les hémorroïdes quidom

il faut remarquer que lors que les hémorroïdes externes coiffent entumés avec des taches noirâtres au milieu, nous devons au moyen de la lancette procurer un écoulement au sang coagulé qui aussi bien ne rentre jamais dans la masse du sang mais qui devient fréquemment la cause des facheux accidents que cette méthode doit prévenir infailliblement.

19

pour la jaunisse ayurd.  
premier de savon de Castille <sup>ou aparis</sup>; de Rhubarbe  
en pouître, à la poudre de hierapierre de chevre  
une demi once avec du syrop d'orange faites au  
electroire.

ce qui rend ce Savon si celebre cest la propriete  
qu'il a de purger le foie pendant la jaunisse et  
d'aider la secretion de la bile car fault de cet  
expedient elle restera mestee avec la masse du Sang  
et donne une tainture a la peau.

#### observ. sur la diarrhee ayurd.

Dans toutes les diarrhees il y a une matiere  
piquante et visqueuse qui s'attache a la membrane  
des intestins et cest cette matiere qui occasionne  
ces evacuations excessives. Dans ces cas la  
Rhubarbe est fort utile pour deux raisons, par  
cequelle chasse hors des intestins cette matiere  
qui le ravage et par ce quelle rebberre les fibres  
qui sont dans un mal arachement considerable  
et quelle le remet dans leur etat sain et naturel.

#### observ. sur le mal scorbutique qui il y faut desunir Separer et detruire les viscosites et concretions grossieres qui bouchent et quiivonge les capillaires et les plus grosses glandes

##### sur la thermique ej.

cest un cordial et un cephalique tres puissant  
parce quil est compose de plusieurs ingredients  
propres a repandre a presque tout ce dont la  
nature a de besoins. Il ne merit pas de  
montrer eloignez pour l'averta qu'il a de  
procurer le repos car en fait de medicament  
destines a cet usage il n'en a point qu'un  
peu il faudra donner avec plus de Surete et moins  
de crainte, puisque les effets dangereux

de l'opium y sont admirablement prévues par  
l'astuce d'une partie particulière qui entre dans la  
composition. elle opère pour ainsi dire des miracles  
dans toutes sortes de fièvres ou le pouls est bas  
Surtout lorsque le sommeil manque au malade  
Si l'on en prend toutes les 6 ou 8 heures un  
Scrupule ou un demi gros plus ou moins  
Selon les circonstances les forces et la constitution  
du malade avec leurs autres circonstances le jalon  
volatil : il produit et entretient une sueur douce  
et très désirable parce qu'elle est communément  
lavante pour l'oreur d'une crise fort heureuse . ce  
seroit une contumace très sage d'appliquer les  
vesicatoires pendant des tems dans ces sortes  
de fièvre parce qu'elles provoquent une circulation  
et chassent la matière par des sécrétions  
(crotions régulières)

---

obs. Sur les vesicatoires q.  
cest un remède qui faut savoir employer  
avant d'entreprendre les vesicatoires , il faut  
considérer si la fièvre est inflammatoire  
ou nerveuse : Si elle est inflammatoire , il faut  
aigner au contraire vesicatoires et suivre une  
méthode propre à adoucir rafraîchir et humecter , pour calmer la chaleur et la bouillition qui se  
trouve dans le sang , estermettre aussi par  
l'egrés dans une proportion convenable , a quoi  
contribueront beaucoup des lauemens emollients  
et donnés à propos et avec toutes les précautions  
nécessaires .  
Il n'est bien autrement des fièvres nerveuses  
que dans lesquelles les symptomes sont

tout a fait contraires auau des feux. D)  
inflamm; car comme dans les flèves nereu  
des le pouls en bas et languissant, que les  
esprits sont presque épuisés et que les yeux  
bien loin de montrer quelque signe d'infiam-  
mation n'ont plus qu'une hure extrémement  
faible, cest à lors qu'il faut user des verication,  
et mesme considerablement si ce remède  
produisoit une retention d'urine, ce qui  
arrive quel que fois; des emulsions par  
intervalles, avec une quantité convenable  
de gomme arabique remédieront à cet  
inconvénient

Emulsion huileuse ej.  
prenez d'huile dolive une once et demie  
de syrop blanc un once de eau de fontaine  
quatre onces, desprit de corne de cerf persé  
un demi gros meslé le tout pour en faire  
une emulsion

les medicameus huileux étant de nature  
à s'insinuer et amollir et a relacher sont  
nécessaires dans plusieurs occasions. Surtout  
dans la gravelle et maladie de la gierre, pour  
une oppression de poitrine. La dose de  
l'emulsion est de deux ou trois cés dans  
les intervalles.

Savement simple ej.  
prenez les 3 quartz d'une chopine d'eau  
de lectuaire lenitif une once; de sel  
commun trois gros meslez les

laveur pour l'adverserie est  
pris d'empapis blanc un gros et demi, delages  
le dans six onces d'eau chaudiée ajoutés y de  
theriaque deux gros.

La Horaque qui entre dans cette compo, l'a fait  
placer dans la première classe de remèdes propres  
foliflor de sang parce que la qualité d'épium tend  
les intestins insensibles à l'action de ces particules  
acides et piquantes qui déchirent leur membrane  
douce, tandis que la propriété glutinante de  
l'épium est comme une emplâtre qui boucher les  
orifices des vaisseaux ce remède loquace vefit  
à souhait lorsqu'e tout autre expédient n'a eu  
aucun succès.

Lorsqu'une inflammation monte avec certain  
degré elle est toujours accompagnée d'évacuations  
sanguines; il faut par conséquent saigner et  
répéter selon l'état du malade.

Il faut employer l'ypécamaha cefamente medicament  
car cette drogue est non seulement émettique et purgative  
mais elle a aussi une qualité arrêtante qui lui est tout  
particulière pourvu cependant qu'on la donne en petite  
quantité auquel elle ne recouvre pas toute sa force contre  
l'estomac en effet aussi un ulcérant très puissant  
pour arrêter le flux de sang. ainsi les praticiens  
modernes ordonnent d'en prendre deux ou trois  
grains dans un bol de diabordium tous les huit  
ou dix heures, avec quelque julep convenable a  
cette maladie mais on ne doit pas entreprendre  
cette méthode avant que de le donner en tincture  
en substance comme émettique sans retarder  
la maladie.

## Lavement de Savon

lavement de Savon mowune demie once faites  
l'infusare en 10 onces d'eau chaude l  
le Savon duise rarefie et attenué les viscosites les  
plus fortes. cest pour cette raison qu'on l'emploie  
dans les obstructions et sur tout dans la jaunisse  
puis qu'il cause de son efficacite pour penetrer, fin  
siner et nettoier, non seulement il deloit des intumesc  
tions matieres hysteroptiques et coquille que il contiennent  
mais qu'aussi il peut contribuer beaucoup a la fin  
quon de propose, soit en stimulant les fibres qui  
reçoivent ainsi les moindres impressions soit en  
introduisant ses parties delices dans les vaisseaux  
des entochies qui sont capables de les absorber dans  
les tranches seches ou le matieres sont retenues  
trop long temps sans pouvoir s'ecouler. si apres  
avoir esté Seigne suffisament et avoir pris sans  
succes d'autres medicaments on avale une doz e  
cette composition de Savon (y defaut) elle  
facilite et opere sur le champ la sorties des  
matieres et arrete le progrede de l'inflammation  
qui peut conduire a la mort.

---

infusion pectorale ej. pour  
adoucir un sang charge de particules autres  
et de sels heterogenes. pour le scorbut aussi  
prendre des feuilles de lierre terrestre 1 once

poignees; de racine de reglisse coupeé par  
tranches d'une once; faire infuser le tout  
pendant trois heures dans quatre pintes  
d'eau dure bouillante apres quoy vous  
les passerez pour en servir.

en ajoutant six onces de manne et six  
grds de nitre purifie elle devient une infusion  
factice et durable que on devra bonne pour  
la poitrine et les poumons pris avec le ch

infusion de roches rouges et  
prunes de conserves de roches rouges six gros que  
vous ferez infuser pendant 3 heures dans trois  
chopines d'eau bouillante passez la et apres le  
refroidissement ajoutez-y un demi gros d'huile de  
vitrail.

et au grand relaxement des parties solides en  
doi beaucoup esperer de cette infusion et comme elle  
a une qualite astringente elle fortifie l'estomac des  
premiere voyes et aide l'esprit en produisant dans  
les parties des sensations d'aise et agreables. elle est  
aussi fort utile dans les peutes excessives des femmes  
Il ne faut prendre trois ou quatre verres par jour

### Julep Commun - ejusd.

prenez l'eau de fontaine quatre pintes; de Syrop  
d'oranges deux onces que vous mesurer pour en  
faire un julep.

la simplicité de ce mélange ne doit pas faire  
objecter contre son utilité, puisqu'il produit lui seul  
plus d'effet quin autre qui servit dix fois plus composé.  
la véritable destination de toute forme de cette espece  
est de servir comme véhicule pour introduire les  
poudres leobolistic carnetoyantes peffages

### pour faire du Syrop d'orange

prenez du jusse de l'essence des meilleures oranges  
huit onces; de la eau bouillante cinq livres; faites  
le macérer pendant une demie journée dans une  
vaisselle couverte; ensuite passez la liqueur, faites  
y dissoudre de sucre fin reduit en poudre une  
quantité suffisante pour faire un Syrop.

### nota ej.

La plupart des apothicaires ne font la distillation  
que d'eux seuls cest pourquoi l'esprit est ordi-  
nairement charge d'une huile puante qui lui  
donne une forte et tenace forme sensible au  
toucher.

hoquet      julep de chasse ej. restaurant  
prenez de la muce un gros et des sucre deux  
onces; battez les bien ensemble, ajoutez y ensuite  
deau de fontaine dix onces et deau spirituare  
de canelle quatre onces meslez le tout pour en  
faire un julep. (adorez en ce deau 3 fleurs de  
cette espèce de julep est tres bonne dans le hoquet  
malade du diaphragme qui devient dangereuse  
en certaines occasions. Le muce est réputé  
pour un cordial très puissant. L'expérience a  
fait connaitre qu'il est une grande utilité pour  
le hoquet soit en le prenant intérieurement.  
Soit en l'appliquant au nombril. Il est bon contre  
les vapours et très efficace pour ceux qui sont  
sujets à avoir les esprits déprimés. Il est très  
propre à dissipper l'attristesse et la melanolie  
qui accompagnent ordinairement la langueur  
du sang et ses sueurs vitales.

    julep volatil ej. restaurant  
prenez de sel volatil de corne de cerf une demie  
once; d'eau de fontaine trois chopines; D'eau  
absinthe spirituare trois onces; de sucre fin  
deux onces faites en un julep.  
cela est bon pour ouvrir les pores de la peau qui  
sont bouchés et de cause une meilleure salutaire. Ce  
julep est donc utile non seulement dans les fièvres  
mais aussi toutes les fois que le corps est abattu  
par la fatigue ou surcharge de boisson, et qu'il a  
besoin de reprendre quelqu'énergie afin de gagner  
plus de force et une nouvelle vivacité: dans ce cas,  
quelques cuillérées de ce julep mises au lit et  
réparties par intervalles convenables, produiront  
d'agréables impressions et délivreront les parties  
du corps de la fatigue de la chaleur et des froides  
sensations douloureuses, et par ce moyen

## Looch commun est

prendre d'huile d'olive trois onces, de syrop blanc deux onces; de conserve d'arachis rouge une demi once; d'huile de vitriol un demi gros que vous mélerez pour en faire un looch.

Dans les fièvres et picotements coronation causé par la crmonie. une cuillerée de chaque sorte.

mixture ej. pour les vomissements  
fièvres et dysenteries

prendre de Sel d'absinthe deux gros; de jus de citron trois onces; l'eau de fontaine six onces; l'eau spirituelle de canelle une once, de syrop d'orange six gros. faire une mixture.

Cette composition a été inventée par le fameux rivière. on en doit prendre une cuillerée à chaque envie de vomir.

Dans les fièvres elle produit une sueur douce et tempérée, et dans les fièvres intermittentes elle prévient quelquefois le retour des symptômes lorsque le Kunkhina n'apporte en défaut la dose même suffisante. D'aucunes occasions cest de deux ou trois cuillérées toutes les quatre ou six heures.

## mixture calmante ej.

prendre de Syrop de Diacode trois onces; deux de fontaine six onces; deux cuillerées d'argile brûlée deux onces faites une mixture.

Tout le foir qu'on manque de sommeil et de repos on peut s'en procurer en prenant quatre cuillérées de cette mixture lors qu'on va se coucher et cest l'autant plus avantageusement qu'il n'est pas besoin de recourir à l'opium remède qui exige la science la plus profonde. On donne de la mixture calmante dans la fièvre pour éteindre toute fièvre quelles que soient les causes.

pillules pour la goutte et  
et pour l'asthme. L'asthme

prend de gomme ammoniac deux gros,  
de scylla en poudre un gros; de sauge de Castille  
trois gros; et avec une quantité suffisante de  
Syrup blanc faites en une composition grevoue  
diviseez par gros de chacun desquels vous  
ferez dix pillules.

C'est tout à faire pour les maladies hystériques  
et l'hystropisie on doit en prendre six trois  
matin et soir

Poudre pour le epilepsie ej.

Prenez de la racine de valeriane sauvage  
deux Scrupules; de cincabre d'anti moine  
un Scrupule; meslez les ensemble en  
les réduisant en poudre.

Les qualités chaudes et aromatiques de la  
valeriane rendent cette poudre efficace en  
plusieurs occasions. Sa vertu sedative qui  
est certaine. elle a aussi une propriété  
detergente et diurétique. Ses effets se voient  
sur les obstructions d'ovaires et sur les  
maladies hystériques et convulsives qui  
mettent les esprits dans une agitation ebune  
impétuosité extraordinaire. quelquefois cette  
poudre opere des merveilles dans les malades  
qui attaquent les nerfs et surtout dans celles qui  
souffrent de epilepsie car pour lors ille opere  
d'une maniere sansegale. le meslange que  
on fait avec l'anti moine la fait regarder  
comme une poudre de la première classe  
de celles qu'on doit prendre matin et soir.  
On doit ranger dans la même classe  
l'esprit de lavande lorsquel sagit de la

question des maladies des nerfs - cest cet  
esprit que one estime depuis si longtems comme  
un/pecifique remedie contre les langues  
et les defauts de la vieillesse et contre les  
attaques convulsives et apoplectiques, telles  
que sont la paralysie et la perte de memoire  
et que tout le monde connoit sous le nom de  
gouttes paralytiques on peut en prendre  
chaque fois qu'apres 20 jusqu'en 30 gouttes avec  
de sucre en pain

Onguent pour l'agalle ey.  
Prenez de soufre quatre onces, de sel  
ammoniac reduit en poudre fine deux gros  
avec de la graisse de porc : battez les bien  
ensemble pour en faire un onguent —  
Si l'on frotte bien les parties galloes avec cet  
onguent on peut etre sur du succes, quelque  
remede que la galle puisse etre. L'nga point  
de remede qui lui soit superieur. La purgation  
doit accompagner l'application de cet onguent  
elle saignee doit en general et l'usage.

explication des poids et mesures ayant  
un grain est égal au poids d'un grain  
d'orge.

un Scrupule contient vingt et quatre grains.  
un gros contient trois scrupules  
3 Scrupules.

une once contient huit gros  
une livre contient seize onces  
une Pincée autant que l'on peut  
prendre avec les trois doigts.

une Poignée est ce que la main  
peut contenir.

une goutte est la plus petite mesure  
des liquides et qui équivaut au grain

une Cuillerée est égale à une demi once.

un Verre contient une once et demie  
environ

extraits de l'hist. de la fuite que  
M. de Chasserey a Paris chez l'auteur  
Lavelier rue St-Jacques 1752.

"J'ay commencé par interdire l'usage de toutes  
sortes d'alimens: j'ay fait autant qu'il a été  
possible étendre le feu, ouvrir les portes et les  
fenêtres des chambres (l'autour a été quel a voit  
trouvé les malades accablés sous le poids des  
convertis et de lair enflé par un grand feu)  
"j'ay fait décharger les malades du poids des  
couvertures leur permettant de garder une loge  
et leur ai non seulement permis de traverser  
hors du lit mais leur ai conseillé... je remarquai  
que j'ay obtenu ce que ceux qui étoient couchés  
sur la plume s'en trouvoient plus mal et quid  
trouvaient dans un grand besoin quels soient  
"Sur une suffisante quantité de bonne paille  
je conseillai à ceux qui ne vouloient pas sortir  
d'alit de rester sur leur feut, où du moins de sy  
tenir l'entrete forte élevée. il y a long temps que j'ay  
obtenu qu'en obligeant les malades à sortir du  
lit ou de sy tenir au moins la teste forte élevée  
on diminua souvent la fièvre ou l'on empêche  
que la teste ne tombe; et cela ma veuf pour  
réager la teste quand elle étoit pesante ou  
douloureuse quand il y avoit transport ou  
mal assise avec un peu de grand dur ou  
ombelle.  
"Il faut des chemises des bonnets des draps natis  
et bien sec: lorsqu'il n'est pas possible de  
changer de drap j'y faisois couler des  
serviettes sur les malades. sans quoy il  
arrive que les poies absoitent de la peau

font rentrer dans le corps une partie de l'humect.

pour qu'une moiteur soit salutaire il ne faut pas qu'elle soit accompagnée d'une chaleur de peu beaucoup plus considérable que celle d'une personne saine . ce n'est pas dans le cas d'une moiteur qui fait changer de linge .

quant au bouillon je le ferois faire avec le maigre de veau et surtout avec le jarret y faisant bouillir quelques laitries, le tout sans sel absolument. au défaut de bouillon d'emaiquer de veau ou de poulet, on peut se servir d'une légère crème de riz, ou d'orge mondé ou dégermément ou de gruau ou même de seigle qui est encore plus rafraîchissant, et même en cas de besoyn une decoction de pois ou d'haricots. toutes ces crèmes se préparent en faisant bouillir suffisamment quelquesunes de ces graines dans une suffisante quantité d'eau quel pourra épaissir ensuite.

je ne permets aux malades d'user de vin et de bouillons de boeuf que quand la chaleur de leur peau est devenue peu considérable.

### Definition de la médecine q.

la bonne et unique médecine consiste à refraîchir ce qui est trop chaud, et à chauffer ce qui est trop froid; à déseccher ce qui est trop humide, et à humecter ce qui est trop sec; à fortifier ce qui est trop faible, et affaiblir ce qui est trop fort; à vider ce qui est trop plein et à vider ce qui est étranger et nuisible, et quand on repoussera corrigé, par example ce qui est trop nude; à ramollir ce qui est trop

et adoucir ce qui est trop mou; a fondre ce qui est trop épais; et a graisser ce qui est trop sec; a adoucir ce qui est trop acide, ou trop aigre cest a rebattre le mouvement et l'ordre naturel et convenable des liquides et des solides; ce en quoi consiste la santé . . . .

En jay en occasion de prouver que généralement il falloit moins saigner dans les gais et dans les tems chauds & surtout humides, que dans les tempérés dans les secs et dans les froids, principalement quand le sang des malades refroidi; dans les galettes ou dans d'autres vaisseaux profonds n'est point coenue ni dur ni sec et quand les selles des malades sentent trop mauvais et qu'en contrarie la purgation n'y produisent de très bons effets.

.... quand les malades étaient fort frilez et qu'ils avoient le pouls mou et petit pour de chaleur a la peau souvent moins que n'est de santé et cependant qu'ils avoient ferme docte et valoir par le haut ou par le bas je leur faisois prendre le tartre stibie ou autres purgatifs dont de bon vin ou quelque potion conduite de deux jours l'en par perdes doctes de lour aise . . . . dans le commencement des malades n'est pas leau d'eire ve sont mortels . . . il y a pourtant des cas dans les maladies ou un peu de bon vin fait un fort bon effet cest lors que les malades n'ont point la langue sèche et que la chaleur de leur peau n'excede point la naturelle, quel tyle hiver et d'ailleurs n'hémorragie .

Et surtout lors que les malades ont été affaibles  
par les remèdes. . . .

il ya 2 sortes de faiblesses, la véritable et la  
fausse faiblesse.

la véritable est la suite d'une longue abstinence  
des graines hemorragies couv de ventre &c. elle  
n'est accompagnée ni de chaleur ni de soif  
notable, le pouls est mollet plus petit que grand  
et la peau moins chaude que dans l'état de  
'Santé'. Il faut de bons remèdes administrés  
meilleurs que de bons alimens.

la fausse faiblesse est plutot un accabllement  
de forces qu'un défaut. ordinairement le  
pouls des malades est grand, fort, ou dur;  
quelquefois il est concentré et petit; quelquefois  
aussi il est semblable a celui des personnes en  
'Santé' et pour lors c'est un signe de malignité;  
Ses toutquand ce pouls se trouve combiné  
avec quelque symptome ou accident plus  
considérable que la nature de la fièvre ne le  
comporte. ces especes de pouls sont telles  
que les commencements ou dans l'augmenta-  
tion et même dans le fort de la maladie,  
et sans que les malades ayent été affaiblis  
par les causes qui produisent la véritable  
faiblesse, et sont l'effet d'une trop grande  
quantité ou d'une trop grande rarefaction  
du sang ou de son épaississement, d'un  
poison, de quelque grande passion, des ven-  
nous des matières indigestes, putrides ou  
malignes qui se trouvent dans les gommeux  
voies, d'une inflammation ou d'une  
disposition inflammatoire de quelque  
partie interne, et particulièrement du

" le cerveau ou du cervelet ou de l'estomac  
" n'accident qui produit souvent le même effet  
" que l'oreille causé par les bons spiritueux  
" laquelle produit aussi la fausse fièvre.  
" dans ces circonstances les continue chauds  
" le vin &c. sont pernicieux. Des saignées  
" des purgatifs, des emetiques, des lavements des  
" bouchons un régime convenable, un air, et un  
" lit tempérés et quelquefois gels un peu plus  
" froids que chauds, quelquefois l'élevation de  
" la tête et d'autres secours analogues sont les  
" seuls qu'on peut employer. ....

" il faut convenir que si ces accidents sont  
" compliqués avec une ou plusieurs causes de  
" la véritable fièvre, et qu'ils soient  
" caractérisés par ses signes, la saignée  
" n'y convient pas souvent et même y est  
" presque toujours préjudiciable - mais quand  
" ils se trouvent compliqués avec les causes de  
" la fausse fièvre la saignée les purgatifs  
" ne employés par une personne prudente font  
" les effets les plus avantageux.

### Sur les precautions de ceux qui

voient les malades att. de contagion  
" bien des gens se persuadent que les médecins  
" ne se garantissent des maladies contagieuses  
" qu'en moyen de quel que préservatif, mais il  
" faut leur apprendre notre secret. nous sommes  
" exempt de la crainte et notre régime dans  
" le temps de ces maladies est plus exact que  
" jamais, nous ne mangeons rien de venu;

ne part change mesme de regime avalez nolot  
Salive dans le ventre ou l'air est fort mauvais,  
nous l'avons ou du moins nous estoys assis  
nos mains apres avoir taste le poils des  
malades, surtout quand ils suent ou queud  
nous suons nous mesmes ou queud nous  
Sommes fort echauffes. Dans ces circonstances  
nous fassions d'attendre un moment avant  
que de leur baster le goutte, ou de leur toucher  
implément la peau et mesme d'approcher  
de fort près d'eux. nous ne y regroupons  
point de près, ni long tems leur haleine;  
nous changeons souvent de linges, nous  
prendrons plus or un peu moins, que plus de  
bons alimens et de facile digestion; nous  
entourons mesme les boitsons trop echauffantes  
nous faisons de notre mieux pour entretenir  
notre corps dans un état de chaleur tempérée  
quant aux preservatifs, comme le vinaigre  
des voleurs, le camphre, le theriacal, cely  
ou l'on fait infuser des feuilles de rie ou  
d'absinthe ou autres plantes d'odeur forte  
les eaux ou les fontaines spiritueuses  
plantes aromatiques dont on se frotte le néo  
et les temples, qu'on respire ou mesme dort  
on avale un peu, les parfums comme l'encens  
le genisore le serpore le vinaigre brûlé d'au  
nul rechaud; il se font souvent d'autre effet  
que d'empêcher de sentir la mauvaise odeur  
des malades et peut être que d'assiper la lachante  
par la confidence qu'il ya car rien n'est plus  
propre que la lachante à causer des malades  
épidémiques.

Baume excellent pour les enflures  
corps, mal de gareau intention et  
longement de nerfs encelouure, cloze  
trouz attirer et farcir corde.

### Composition

Cire blanche neuve 1. once; Cire jaune  
neuve 1. once, poix Blanche 1. onç;  
poix noire 3. onçes; Thérebantine  
commune, 2. onçes; populeura 3 onces;  
huile olive, 1 livre; huile camomille  
2. onçes; huile impellicome 2. onces;  
Le tout soit mis dans un pot de terre  
vernissé, le faire fondre a petit feu  
et il faut toujours remuer jusqu'au fond  
jusqu'au ce qu'il bouille un peu et que le  
tout soit bien fondu, pour lors vous ne  
remuerez que dessus la superficie et  
quand il aura comme cela bouilli un  
quart d'heure, vous le retirerez de devant  
le feu et le laisserez refroidir et vous  
le mettrez dans une bouteille de verre  
afin de le conserver. Il est non seulement  
pour les chevaux mais encore bon  
pour les hommes pour les contusions  
foulures argeures et douleurs en  
frottant la partie affligée le plus  
chand quelconque pourra.

manier et de se faire sur du Baume  
pour les chevaux :  
pour les enflures du corps quand vous  
vous apperceverez du mal ; il faut aujour  
du poil et faire fondre dessus le mal  
avec feuille de la plus chaude que le  
cheval puisse l'entourer et le frotter  
au bout du poil.  
pour les corps des pie' vous en ferés  
le mesme  
espoir les atteintes vous aurez soin  
de faire bien netoyer la plage et  
couper le poil et luy faire fondre dessus  
du baume chaud dans la plage .  
a l'egard des piquures ou clous drux  
vous aurez grande attention de bien  
faire ouvrir faire ou le clou aura été  
etrouve faire fondre dedans du dit baume  
tout bouillant et vous y mettrez deux  
bonnes pinces de poivre et une figue  
par dessus faite avec de la vielle corde  
et du ruf , et une ou deux ferés refermer  
et il refaut pas que le cheval aille a  
l'eau de quelques jours l'eau est un  
poison pour les jambes ou autres .  
a l'egard des nerfs il faut fondre le poil  
et le frotter au bout du poil le plus long temps  
que vous pourrez .  
ce Baume est de velours de la main et  
on le incapte au nez et au demoyot de  
cavalerie

10 Medicine  
un quartieron de casse en baton  
deux onces de manne en larme  
2 gros de sel de som.

20

וְיַעֲשֵׂה כָּל-כָּלָבִים וְכָל-בָּנָי  
וְכָל-בָּנָתִים וְכָל-בָּנִים וְכָל-בָּנִים  
וְכָל-בָּנִים וְכָל-בָּנִים וְכָל-בָּנִים  
וְכָל-בָּנִים וְכָל-בָּנִים וְכָל-בָּנִים

$$2 \div 1 = 2 \quad 2 \times 2 = 4$$

לְמִזְבֵּחַ בְּעֵדֶת יְהוָה וְנִזְבֵּחַ  
לְבָרְכָה כִּי לְאַלְפָיִם וְלֹא  
לְאַתָּה לְעֵדֶת

לְמַנְחָה + וְעֵדֶת הַמִּזְבֵּחַ כִּי תֹאמַן בְּעֵדֶת  
- לְמַנְחָה וְעֵדֶת לְשֵׁוחַת וְאֶת-מִזְבֵּחַ וְעֵדֶת  
לְמַנְחָה וְעֵדֶת כְּבָשָׂר וְעֵדֶת שְׂלֵמָה וְעֵדֶת  
וְעֵדֶת כְּבָשָׂר וְעֵדֶת כְּבָשָׂר וְעֵדֶת כְּבָשָׂר  
לְמַנְחָה וְעֵדֶת כְּבָשָׂר וְעֵדֶת כְּבָשָׂר

$\frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 = 0$

Hémide pour la langrine.

mettes de racine de quinquina à infuser dans de l'eau et servez vous en l'avage pour bapiner avec un lingé la partie langrinoise sur laquelle vous laisserez une compresse imbibée de cette eau de quinquina

Hémide pour toutes les faulures

de Sel ammoniac un demi gros le mettre fondre dans 3 poisons d'eau de vie et mettre une compresse matin et soir sans faire chauffer l'eau de vie. de m'heraut ch. de paty

Pour ouvrir la matrice et procurer les saignées la teinture de marrhe est cephalique, est bonne pour provoquer les mois ouvrir la matrice etc. v. la page 12

extrait du journal étranger may 1757. p. 42

Secret d'éclatante de larchine

on commence par prendre une certaine quantité d'eau que l'on filtre jusqu'à ce quelle soit parfaitement claire on y fait déposer un peu de gomme et de musc et donne à cuire au feu douze- pendant que l'eau est à infuser on ouvre des noyaux deabricots bien secz on enlève l'amande et après l'avoir fendue on la remet dans chaque noyau on roule ensuite ces noyaux dans des feuilles de choux qu'on aplatis avec un fil d'fer puis on les met au four pendant 24 heures, après qu'elles soient refroidies on les pilé dans un mortier couvert de peau et on les réduit en poudre très fine cette poudre fabriquée avec leau qu'on a préparée sur une table de marbre poli s'apprécie à la même façon qu'on broye les couleurs quand la poudre a pris une certaine consistante on la met dans des moules de cuivre

u'on a frotté aux parties malades  
l'anche pour éviter la mauvaise odeur

Rémedé pour l'hydropisie fréquentes  
extraot du journal stranger may 1757. p. 46.  
ext. d'une lettre écrite de bath et insérée dans un  
des london magazin ..  
que 2 personnes à london y avoient été guéries  
l'hydropisies bien formées en frottant fréquem-  
ment et soin pendant une heure l'abdomen avec  
de bonne huile d'olive ce qui se feroit avec fa-  
mme q' n'eust point de bien chauffé. (l'huile  
est le vase)... nous ordonnes en conséquence  
des friction huile apres le trois me jours de  
friction l'urine n'a la maladie augmente considérable-  
ment et l'enflure commence à diminuer  
au bout des 15 jours elle disparaît tout à fait, la petit  
la digestion est le sommeil reviennent comme auparavant  
et la maladie recouvre ses forces. 6 semaines apres  
ses purgations périodiques reviennent leur cours, et  
elle sout à présent de la meilleure santé. cette cure  
a fait beaucoup de bruit et y a l'ordre et déterminé  
plusieurs hydropiques affirment que leur  
parfaitement guéris. l'autre astreintes malades  
qu'il frotte d'huile peu ou 3 semaines et qu'elles  
toussent les cuisses et les jambes fort enflées  
l'autre et tout age de 60 ans.

Notre en 1755. j'indique ce remède au médecin  
de grandville en normandie il l'expagia sur une  
hydropique et il n'a pas que ce remède  
l'agent fort forcé l'urine est d'ailleurs  
moins fort et analogue à l'hydropisie et  
ne peut jamais favorancer mal

42

L'antidote de miroir se trouve toute faite  
chez les apothicaires & on prend depuis 10 gouttes  
jusqu'à 15. dans du thé et jamais dans un  
autre temps que 6 à 10 jours avant celui des  
règles aussi bien que les règles sont parvenues faut  
les cesser et non pas prendre de 10 à 15 jours  
après la fin des règles. cette tisane é-  
coule le sang et chauffe beaucoup

Premier pour la tympanie ou les vents  
de clofleur de camomille pris en guise  
de thé. échantante...

Premier pour les taches ou tâches qui  
viennent sur les yeux provenant de la  
petite verolle ou autrement  
une pinte de vin blanc  
une poignée de gros sel  
une poignée de froment en grain  
un cuir de six francs

Il faut que le vase dans lequel on met ces  
drogues soit de cuivre jaune  
laissez le tout pendant huit jours et remués  
le souvent. passez le tout à travers un papier  
brouillard mis sur un linge. cela produit  
une liqueur verte que l'on fait d'ordinaire  
l'air avec un cuirécat. il faut en mettre  
plusieurs fois le jour jusqu'à parfaite  
guérison.

Il faut bien se garder de bouire de la Compôte  
d'orange et de pieds pour quelle empoisonne

## Rémede pour les panaris

il faut prendre un ou deux ou trois en poudre le matin il faut diluer le panaris avec de la forte eau de vie jusqu'à ce que cela fasse une espèce d'onguent que l'on appliquera sur le doigt malade

## Pour la fièvre d'allez

une once de Diaprin Solutif

une once de fleur de Pêcher

une once de quinquina

24 grain de sel ammonial

autant faire une opiatte partagé en 24 -  
bols prendre 2 bols le matin et 2 bols le  
soir continuellement 6 jours sans interruption et  
prendre un bouillon gras ou maigre une heure  
après

## Pour les coliques nephritiques et d'estomac

et faire sortir les mois des femmes

Supprimés ou arrêtés

prenez une noix verte avec son scorle  
avant quelle soit en cornou et que le fruit  
nest encore qu'en eau mettés celle noix toute  
entière avec son scorle à secher dans l'apothecier  
la plus chaude (de la châlotte.) lorsqu'elle est  
lau enu noir seche et rdee rase en en  
poudre de quoy couvrir une pille de 24 sols  
mettés en dans du vin the ou bouillon dans  
une grande cuiller et mangé et faire le  
boire au malade

1. Pomade pour faire reviver les cheveux  
une demie liore de graisse de porc masle  
une demie liore de graisse d'oeur  
un quartier ronde graissée de mouton  
et deux bonnes poignées de feuilles de moye et qui  
l'ouvrerent, apresqoy vous mettrez le 2 feuilles  
dans votre graisse dont vous aurez ofte avant les  
poix et les petites filandres. vous le faites bouillir  
le tout ensemble en remuant toujours et quand  
la graisse se videra au fond que vous posse rez le tout  
dans un lingot et en ferez une forte expression  
pour que l'air des feuilles passe bien et alors on y  
peut ajouter toutes les sortes d'oeufs quantmel  
et en l'autre pomades /

pour les herbes apres  
de l'eau de vie brouillée avec du safran et  
enfroter la partie malade

Remede pour calmer les passions amoureuses  
5 a 6 grammes de Camphre par semaine en  
bolles avec de la poudre de negligé dessus on  
ne peut prendre 2 grains par jour et laisser  
un jour d'intervalle d'une prise a l'autre

pour exciter les passions amoureuses  
Dans un homme ou femme d'un tempora-  
ment trop froid

une fort petite pincée de mouche et cantharides  
dans du Caffe ou du vin mais le trop soit  
par la droite ou le frequent usage peut laisser  
des grande ecchardis comme de faire vendre  
du Sang par la verge donne des inflamma-  
tions et a vessie et retention d'urine la  
permettre

