


本經逢原

本

經

達

原



愧生先生重存

朱逸峯敬贈

大緒二年上海圖書
集咸豐書

本經逢原小引

醫之有本經也。猶匠氏之有繩墨也。有繩墨而後有規矩。有規矩而後能變通。變通生乎智巧。又必本諸繩墨也。原夫炎帝本經。繩墨之創始也。六觀證類。規矩之成則也。瀕湖綱目。成則中之集大成。未能達乎變通也。譬諸大匠能與人規矩。不能與人智巧。能以智巧與人。達乎變通之道者。黃帝靈素之文。也能以炎黃之道。隨機應用。不爲繩墨所拘者。漢長沙一人而已。長沙以天縱之能。一脈相承。炎黃之道。信手皆繩墨也。未聞炎黃而外。別有繩墨也。嘗思醫林學術。非不代有名人。求其端本澄源。宗乎本經主治者。五函金匱而外。未之聞也。長沙已往。唐逸士千金方。獨得其髓。其立方之峻。有過於長沙者。後世未由宗之。以故集本草者。咸以上古逆順反激之用。槩置不錄。專事坦夷以適時。宜其閼鎖鎖固。無足論。卽瀕湖之博洽今古者。尙爾舍本逐末。僅以本經主治。冠列諸首。以爲存羊之意。惟仲淳繆子開鑿經義。迥出諸方。而於委宛難明處。則旁引別錄等說。疏作經言。朱紫之混。能無戾乎。昔三餘喬子。有本經註疏一冊。三十年前。於念我先生齋頭。曾一寓目。惜乎未經刊布。不可復覩。因不自揣。聊陳鄙見。略疏本經之大義。并系諸家治法。庶使學人左右逢原。不逾炎黃繩墨。足以爲上工也。上工十全六。不能盡起肉骨而生之。吾願天下醫師。慎勿妄恃已長。以希苟得之利。天下蒼生。確遵有病不治。常得中醫之戒。跳出時師國繢。何

繩墨之可限哉。

康熙乙亥春王石頤張璐畫於雋永堂時年七十有九

本經逢原目錄

卷一

水部

諸火

火部

諸火

土部

諸土

金部

金

古文錢

蜜陀僧

鐵精

鐵繡

錫

鉛

赤銅

鉛粉

銅青

鐵落

鍼砂

自然銅

鉛丹

石部

玉

丹砂

靈砂

滑石

石鍾乳附孔公孽

慈石

曾青

磐石

河沙

霹靂礮

雲母

銀硃

雄黃

石脂

石灰

代赭石

綠青

砒石

石燕

白石英

水銀

雌黃

爐甘石

浮石

禹餘糧

扁青

礞石

石蟹

紫石英

輕粉

石膏粗理
黃石

無名異

陽起石

空青

石膽

花蕊石

蛇黃附蛇
含石

食鹽

戎鹽即青

鹹礆

凝水石

玄精石

朴硝

硝石

硝砂

礬石

綠礬

山草部

甘草

桔梗

肉蓯蓉

狗脊

淫羊藿

丹參

白及

黃芩

前胡

玄明粉

風化硝
石硫黃

達砂

人參

歲麌

白朮

巴戟天

玄參

紫草

黃連

柴胡

獨活

沙參

知母

蒼朮

遠志

地榆

白頭翁

胡黃連

銀柴胡

羌活

升麻

貝母

細辛

苦參

山慈姑

杜衡

白蘚皮

白茅根

白微

延胡索

草龍膽

白前

卷二

芳草部

當歸

葵本

牡丹皮

高良薑

縮沙蜜

肉豆蔻

蓬莪朮

排草

芎藭

白芷

木香

草豆蔻

益智子

補骨脂

荆三稜

藿香

撫芎

白芍藥

甘松香

草果

草蔻

薑黃

香附

薰香

蛇牀

赤芍藥

山柰

白豆蔻

蒟蒻

鬱金

茉莉

蘭香

澤蘭

荆芥

薄荷

隰草部

菊

茺蔚

旋覆花

大薊小薊

胡蘆巴

鶴虱

甘蕉

石龍芻

熟地黃

馬蘭

紫蘇

香薷

艾

微銜

青葙子

續斷

惡實

蓀菜

製荷

燈心

牛膝

香薷

蘇子

紫菀

茵陳蒿

夏枯草

紅藍花

漏蘆

蒼耳

箬

麻黃

生地黃

紫菀

爵牀

冰蘚

青萬

劉寄奴

臘脂

牛根黃芩

天名精

蘆根

木賊

乾地黃

麥門冬

麥門冬

蘆草

秋葵子

龍葵

淡竹葉

冬葵子

酸漿

敗醬草

蜀葵花

地膚子

欵冬花

王不留行

葶藶

車前子

馬鞭草

光明草

鯁腸草

連翹

瞿麥

藍寶大青

青黛

蓼子

萹蓄

白蒺藜

沙菀蒺藜

穀精草

海金沙

地椒

半邊蓮

地丁

見腫消

狼毒

澤漆

毒草部

大戟

狼牙

大黃

續隨子

防葵

蘭茹

甘遂

黃耆子

常山

蜀漆

藜蘆

川烏

天雄

側子

射罔

白附子

天南星

蚤休

鬼臼

射干

鳳仙子

曼陀羅花

羊躡躅

蕘花

莽草

茵芋

蔓草部

兔絲子

五味子

覆盆子

使君子

木鼈子

馬兜鈴

青木香

預知子

牽牛

紫葳

施花

驥齒營實

月季花

栝蔞實

栝蔞根

土瓜根

葛根

天門冬

百部

何首烏

草薢

土茯苓

白斂

山豆根

附子

草烏

半夏

玉簪根

芫花

鉤吻

四

黃藥子

白藥子

威靈僊

茜草

防己

木通

通草

木蓮

紫萬

葎草

清風藤

藤黃

水草部

澤瀉

羊蹄根

石菖蒲

蒲黃

苦草

水萍

草

海藻

石草部

昆布

石菖蒲

蒲黃

石斛

骨碎補

石菖蒲

海藻

石胡荽

地錦

石菖蒲

蒲黃

苦草部

石藥

石菖蒲

蒲黃

陟釐

卷柏

石菖蒲

蒲黃

倒掛草

苔

卷三

穀部

諸米

穀米
杯米

亞麻

阿芙蓉

麻子仁

薏苡仁

嬰粟殼

諸豆

白豆
黑豆
赤豆
綠豆
大豆
黃豆

胡麻

神麴紅麴

飴糖

酒

蒸餅

醋

菜部

韭

薤

葱

蒜

靈臺

白芥子

無青

菜菔

生薑

乾薑

胡荽

懷香

斬菜

菠菜

蕹菜

同蒿

芥菜子

寬子

馬齒莧

蘿白草根

蒲公英

落葵

蕺菜

蕨

黃獨

薯蕷

百合

茄

苦瓠

冬瓜子

越瓜

胡瓜

南瓜

絲瓜

苦瓜

紫菜

石花菜

杏

桑耳

香蕈
雞㙮

土蕈

棗

木瓜

楊梅

果部

李根白皮

杏仁

梅

桃仁

栗

棗

梨

柿蒂

山楂

柰

林檎

橘核

安石榴

柑皮

青皮

柚

橘葉

柑

橙

楊梅

柏櫟

金橘

枇杷

葉

櫻桃

瑣瑣葡萄

龍眼

檳榔

無花果

水果部

西瓜

葡萄

蓮藕

蓮房

烏芋

味部

蜀椒

銀杏

橡實

橄欖

大腹子

枳根

大腹子

瓜子仁

甘蔗

蓮實

荷葉

慈姑

秦椒

胡桃

槲皮

榧子

大腹皮

馬檳榔

荔枝

甜瓜蒂

沙糖

石蓮子

芡實

菱實

椒目

長生果

荔枝

松子

馬檳榔

荔枝

甜瓜子

石蜜

蓮鬚

菱實

芡實

菱實

豬椒根

胡椒

畢澄茹

吳茱萸

食茱萸

荅

香木部

柏子仁

柏葉
節油

松脂

松節

杉

肉桂

桂心

牡桂

箇桂

桂枝

辛夷

沈香
蜜香

丁香
丁皮

旃檀

紫檀

降真香

烏藥

茴香

楓香脂

薰陸香

沒藥

麒麟竭

安息香

蘇合香

龍腦香

樟腦

阿魏

蘆薈

喬木部

黃檗
小檗

厚朴

杜仲

乾漆

梓白皮

楮葉皮

桐實

椿樗根皮

海桐皮

秦皮

肥皂莢

柳華

蕪荑

烏柏根

灌木部

桑根白皮

桔根白皮

枸橘

蕤仁

鼠李子

南燭

川棗子

合歡皮

無患子

檉柳

蘇方木

巴豆

灌木部

桑椹

楮實

梔子

山茱萸

女貞實

五加皮

槐實

皂莢

沒石子

水楊

樸木皮

大楓子

灌木部

桑葉

枳殼

酸棗仁

金櫻子

枸杞

枸杞

槐花

皂角刺

詞梨勒

榆根白皮

櫻櫞

相思子

灌木部

桑枝

枳實

白棘

郁李仁

衛矛

地骨皮

洩疏

紫荆皮

蜜蒙

放枝木

寓木部

茯苓

雷丸

皂木部

竹葉

竹黃

藏器部

錦

弓弩弦

石南

木槿皮

木棉

接骨木

茯神

桑寄生

竹姑

震燒木

竹姑

震燒木

皂木部

禪禡

敗蒲扇

蒲蘆

牡荆

芙蓉

柞木

柏木

琥珀

松蘿

竹添

裹脚布

漆器

蔓荆子

山茶

黃楊

豬苓

竹添

蠶柄

燈蓋油

炮單布

敗頭皮

卷四

蟲部

蜂蜜

蠅白蠟

雀糞

蠹退

蜻蛉

葛上亭長

蠍

蟻螬

蟬脫

螢火

衣魚

蠅白蠟

桑蠶蛾

水蛭

地膽

樗雞

蠹沙

原蠶蛾

蜜蠟

紫鉤

露蜂房

五倍子

白殼蠹

桑螺蛸

蠶繭

蜜蠟

露蜂房

蠅白蠟

蠶繭

蠅白蠟

蠶繭

九香蟲

芫青

蠶繭

蠶繭

蜘蛛

蛆

蠶繭

蠶繭

桃蠹蟲

天牛

蠶繭

蠶繭

蠅白蠟

蟻螬

蠶繭

蠶繭

鼠婦

蠅白蠟

蠶繭

蠶繭

蜚蟲卽蠶

蛙

蝸牛

龍蛇部

龍骨

鱗鰭甲

蛇蛻

蝮蛇

魚部

鯉魚

闊口魚

鰓膠

鯧魚

蟾蜍

蝌蚪

龍齒

石龍子

蚺蛇膽

蚺蛇膽

鱗魚

鯔魚

勒魚

鯽魚

蟾酥

蜈蚣

龍角

守宮

白花蛇

白花蛇

青魚

白魚

鰐魚

石斑魚

蛤蟆

蚯蚓

鼈甲

蛤蚧

烏蛇

連魚

石首魚

嘉魚

鮑殘魚

海粉

靈魚

鰐魚

河豚

烏賊骨

介部

龜版膽汁

蟹

真珠

螺

石蠍

寄居蟲

燕窩

鑊

鮑魚

江豚

鮫魚

江豚

珊瑚

蠟

石決明

魁蛤殼

即瓦楞子

淡菜

郎君子

鱈魚

鱈魚

黃頸魚

比目魚

海馬

海馬

鼈甲

牡蠣

文蛤

車螯

海蠃

甲蠃

甲魚

甲魚

江珧

鮀魚

蝦

龍甲

龍甲

蚌

蛤蜊

貝子

田瀛

鵝頂

鵝雞

鷄鴟

雀卵

鷄卵

鷄勞

鷄屎白

鷄休

獸部

豬牛

牛酪

牛黃

鶴骨

鶴雉

鶴鴟

鶴鴞

伏翼

鶴鵠

鶴鴟

鶴鴟

鶴鴟

鶴鴟

鶴鴟

鶴鴟

鶴鴟

鵝鴟

鵝鴟

鵝鴟

鵝鴟

五靈脂

啄木鳥

鵝鴟

斑鳩

鵝鴟

斑鳩

鵝鴟

鵝鴟

鵝鴟

鵝鴟

鵝鴟

鵝鴟

鵝鴟

鵝鴟

象皮



麋羊角



山羊角

熊脂



鹿茸

熊膽



鹿角膠



鹿胎



麋茸



麋鹿肉



鹿脊




貓




狸



兔



狐




水獺肝



膾肺膾



鼠



刺鯛皮



人部



頭垢



乳汁



人牙



人中黃



金汁



溺白塗



秋石




胞衣水



天靈蓋




胎元



人胞



人胞



胎元



胎元

爪甲

乾糞灰

紅鉛

初生贍

本經逢原卷一

長洲石禎張璐路玉父纂述

水部

諸水。古人服藥必擇水火。故凡湯液多用新汲井華水。取天眞之氣浮於水面也。宜文火煎成。候溫緩服之。金匱云。凡煮藥飲汁。以解毒者。雖云救急。不可熱飲。諸毒病得熱更甚。宜冷飲之。此言治熱解毒及辛熱藥味。當確遵此例。一切調補藥。卽宜溫飲。苦寒祛火藥。則宜熱飲。熱因寒用之法也。○仲景煎實脾藥。作甘瀾水。揚之萬遍。取其流利。不助腎邪也。○杓揚百遍。名百勞水。取其激揚。以除陳積也。成無己曰。仲景治傷寒痰熱在裏。骨黃麻黃連軺赤小豆湯。煎用潦水。取其味薄。不助濕熱也。○以新汲水煎沸如廬。名麻沸湯。取其輕浮。以散結熱也。○以水空煎候熟極煮。名清漿水。取其下趨。不至上涌也。○服涌吐藥用鹽水。取其味潤。引疾上竄。以吐諸痰飲宿食。酸苦涌泄為陰也。○煎湯滌邪穢藥。用東流水。本經云。東流水為雲母石所受。鍊雲母用之。○煎利水藥。用急流水。取性走也。○煎水逆嘔吐藥。用逆流水。取其上涌痰涎也。○煎陽盛陰虛目不得瞑藥。用千里流水。取其性之疾瀉也。○煎中暑神昏藥。及食楓樹齒咬不止用地漿水。急掘牆陰地作坎。取水置水攪澄者是也。取救垂絕之陰也。○煎中暑亡汗藥。及霍亂泄利不止。用酸漿

水。糯米釀成點乳餅者或水磨
作內點真粉之酸水亦可。

取收欲脫之陽也。○黃露雨水洗瘡疥減斑痕。○白露雨水洗肌面減顏

色。○秋露質清止瘡除煩。○臘雪氣燭助陽攝火治天行時氣瘧疫解丹毒。○霍水性暴動風發癲。○夏
冰陰凝發瘡成瘍。○柏葉菖蒲上露並能明目。○韭葉上露去白癬風。○靈霄花上露能損人目。○凌藍
水解毒殺蟲誤吞水蛭腹面黃者啜此水蟲下卽安。○瓶中養花水有毒傷人臘梅者尤甚。○鹵水鹹苦
大毒。凡蝕躉疥癬及毒蟲生子入肉者塗之卽化。但瘡有血者不可塗之。六畜食一合當時死人亦然。○
生熟湯入鹽微鹹霍亂者飲一二升吐盡痰食卽愈。○方諸水。大蚌水也。向月取之得至陰之精華故能
明日止渴除煩。湯火瘡敷之有效。○上池水。竹籬頭上水也。長桑君飲扁鵲能洞鑑藏府見垣一方人。○
東阿井水煎烏驥皮膠治逆上之痰血。○青州范公泉造白丸子利膈化痰二者皆濟水之分流也。○至
若古壞廢井澤中停水山巖泉水有翳及諸水經宿面有五色者皆有毒非但不可服食煎藥卽洗滌亦
忌之。

火部

諸火。北方炊食都用煤火。以地屬坎足勝其氣且助命門真火人食煤火長氣於陰所以膂力強壯南
人食之多發難毒受其毒者以鹽汁解之。然煤火處置大缸水於旁則毒從水解。○南方炊食都用薪火。

人食熟火。異氣於陽。氣多輕浮不實。不似北方之藥氣剛勁也。○凡煎補藥文火緩煎。濕藥武火急煎。膏用柔柴火最良。抱朴子云。一切神仙藥。不得柔柴不服。然不若煎收並用文火。則不傷藥性。○上古炊食。都用燧火。是爲陽火。今皆擊石取火。則陰火也。用以炊食。猶之可也。若點艾炷。尤非所宜。灸艾宜取太陽真火。否則真麻油燈。艾莖點於炷上。則灸瘡至愈不痛。○神鍼火治寒濕癆附骨陰疽。凡在筋骨隱痛者。鍼之。火氣直達病所。○燔鍼卽燒鍼。病在經筋所發諸癆。用之其效最捷。經云。治在燔鍼劫刺。以知爲度。以痛爲愈。○馬矢燻煨風癆藥。取其性緩。通行經絡也。○葦薪火炒漏陽藥。取其輕揚。不損藥力。二者皆內經法也。○燈火淬小兒諸驚。及頭風腦痛。風癆緩急。以油能解風毒。火能通經絡也。○燈花治小兒邪熱在心。夜啼不止。以二三顆燈心湯調抹乳吮之。○燭燼治療腫。同胡麻鍼砂等分爲末。和醋敷之。治九漏。與陰乾馬齒莧等分爲末。和臘豬脂敷之。取烏柏之餘力。以化歹肉也。○至於烟草之火。方書不錄。惟朝鮮誌見之。始自閩人吸以祛瘴。向後北人藉以辟寒。今則遍行寰宇。豈知毒草之氣。熏灼藏府。遊行經絡。能無壯火散氣之慮乎。近日目科內障丸中。間有用之獲效者。取其辛溫散冷積之翳也。不可與冰片同吸。以火濟火。多發煙毒。不可以藤點吸。恐其有蛇虺之毒也。吸烟之後。慎不得飲火酒。能引火氣薰灼藏府也。又久受烟毒。而肺胃不清者。以砂糖湯解之。烟筒中脂污衣上。滌之不去。惟嚼西瓜仁揉之。卽

資除瘀垢之力可知。世以瓜子仁生痰，不亦謬乎。

土部

諸土。脾土喜燥惡濕。故取東壁太陽所照之土。引真火生發之氣補土而勝濕。則吐瀉自止。用以制藥。皆爲脾胃之引導耳。昔人以東壁土調水。治小兒嗜食泥土之病。取土入蟲口。而祛之下行也。○道塗中熱土。治夏月暍死。取溫以散熱也。若沃以冷水。虛陽立鍼。死不救矣。○白堊土。苦溫無毒。本經主女子寒熱癰瘕。月閉積聚。取土之間氣。以祛婦人間廁之積也。千金治婦人帶下等疾者。以土能勝濕。而白則兼入氣分也。惟邯鄲者爲勝。○黃土。甘平無毒。乃中央正色。不占穢瀆。故色不黑。治泄利冷熱赤白。腹內絞痛下血。解諸藥毒。閉口椒毒。野蕈毒。○蚯蚓泥。治小兒陰囊熱腫。取寒能解毒也。熱病譫語狂亂。無燥結可攻者。蚯蚓泥涼水調服。○蜣螂轉丸。土治反胃吐利霍亂。湯淋絞汁飲之。醋調塗項上癰瘤。○土蜂窩上細土。主頭風腫毒及蜂蠻傷。醋和傅之。○胡燕窩土。主風癩癰瘡。及惡刺瘡。浸淫瘡。並水和傅之。小品治濕瘍疥瘡。外臺治蠅蠍尿瘡。千金治癰疽丹毒。○鼠壤土。通督氣。解毒邪。取其搜風達竅也。○螺蛳泥。主反胃吐食。取螺蛳一斗。水浸取泥晒乾。每服一錢。火酒調服。○犬屎泥。治妊娠傷寒。塗腹保胎。○井底泥。治妊娠。

熱病塗胸臍丹田護子并治湯火燒瘡。○伏龍肝乃竈心赤土本經云味辛微溫主婦人崩中吐血千金名釜月下土言正對釜臍處也然必日用炊飯者良若煮羹者味鹹不堪入藥止欬逆吐血消癰腫毒氣蓋以失血過多中氣必損故取微溫調和血脉也消癰腫毒氣者辛散堅也日華子主催生者取溫中而鎮重下墜也其胎漏不止產後下利並宜煮水澄清去滓代水煎藥取溫土藏和營血也千金方治中風口噤狂不識人並用攬水澄服又久利不止橫生逆產胞衣不下皆醋調塗臍腹效小兒重舌和苦酒塗之發背酒調厚敷乾卽易平乃止杖瘡腫痛香油調塗灸瘡腫痛煮水熱淋皆孫真人法也外臺治一切癰腫和蒜泥貼乾再易之○百草霜燒百草之煤也止血散瘀上下諸血悉主之又陽毒發斑取溫以解毒散火也○釜臍墨治陽毒發狂黑奴丸中用之千金治卒中惡卒心痛舌卒腫大等患又下死胎方用百草霜二錢伏龍肝五錢爲細末酒調童便服二錢少頃再服三服卽下○梁上塵一名烏龍尾治妊娠胎動橫生逆產及金瘡鼻衄疔腫惡瘡小兒赤丹取其輕浮以散久積之氣也○清煙墨灰止吐衄血逆行上行或生藕汁或萊菔汁或鮮地黃自然汁磨服卽止然須燒灰出火毒用之但勿用乾地黃和水搗磨柏葉汁甘蔗汁咸非所宜往往止截後有瘀積之患飛絲入目及一切塵物入目磨濃墨點之自出或燈心醣墨汁頻捲之○砂鍋取年久炊食者研細水飛治黃腫積塊酒服五錢潞州者佳○孩兒茶一名

烏參泥性澀收斂。止血收濕。爲金瘡止痛生肌之要藥。○白磁器研細水飛。傳癰腫可代鍼砭。又點目去翳。○糞坑底泥。治背瘡疔腫癰毒。陰乾爲末。新水調敷。其痛立止。○坑塗同蟬蛻全蠍末作餅。香油煎滾溫服。以滓傅疔四圍。其疔自出。

金部

金 生金辛平有毒。金箔無毒。發明 金能制木。故可療驚癇風熱肝膽之病。然須爲箔。庶無重墜傷中之患。紫雪方用赤金葉子煎水。取制肝降痰逆也。若成塊錠金及首飾之類。非特無味。且有油膩。良非所宜。○銀箔功用與金不殊。但入氣分。不入血分。稍爲不同。時後方治癰腫。五石湯用之。

赤銅 苦平微毒。發明 賊風反折。以赤銅五觔燒紅。內二斗酒中百遍。服五合。日三服。以效爲度。赤銅落乃打銅落下之屑。與自然銅同類。故亦能接骨。煅赤醋沃七次。同五倍等。則染髮黑潤。藏器曰。赤銅屑能鋸人骨及六畜。有損。細研酒灌。直入骨損處。六畜死後。取骨視之。猶有鋸痕可驗。

銅青 酸苦平小毒。發明 銅青藉醋結成。能入肝膽二經。以醋蘸擦喉中。則吐風痰。爲散療喉痹牙疳。醋調揩腋下治胡臭。薑汁調點爛沿風眼。去疳殺蟲。所治皆厥陰之病。

自然銅 辛平小毒。火煅醋淬七次。置地七日出火。毒水飛用。銅非煅不可入藥。新煅者火毒燥烈。慎勿

用之。發明。自然銅出銅坑中。性稟堅剛。散火止痛。功專接骨。骨接之後。卽宜理氣活血。庶無悍烈傷中。走散真氣之患。

古文錢。辛平小毒。發明。古錢以生薑汁塗刮青點目。去障消瘀散赤腫。一點卽愈。但初點熱淚茂面。然終無損。惟作瘡者。與肝腎虛而內障生花者。不可用也。婦人逆產五淋者。汁用之。便毒初起。與胡桃肉同嚼食二三枚。卽消。便毒屬肝。金伐木也。

鉛黑錫

甘寒無毒。凡用取未經銀治新鉛。鎔淨去渣。再鎔成液。同硫黃煅。如焰起以醋酒之候成黑灰。

研之不黏滯爲度。如煅不透。服之令人頭痛。以陰降太速。陽火無依故也。發明。鉛稟北方癸水之性。陰極之精。內通於腎。故局方黑錫丹。宣明補真丹。皆用之。得水交感。卽能治一切陰陽混淆。上盛下虛。氣升不降。噎膈反胃。嘔吐眩暉諸疾。又搘成薄片。置燒酒中半月許。結成白霜。取其酒徐徐飲之。降陰火最捷。但性帶陰毒。恐傷心腎。不可多服。鉛性入肉。故女子以之粧耳。孔卽自穿。

鉛粉胡粉

辛寒無毒。本經治伏尸毒蠶殺三蟲。發明。韶粉與黃丹同類。內有豆粉蛤粉。而無硝鹽。但入氣分。功專止痛生肌。亦可入膏藥代黃丹用。本經治伏尸毒蠶殺三蟲者。取鉛性之重。以鎮攝其邪。金匱甘草粉蜜湯。治蛇病吐涎心痛。專取胡粉殺蟲。甘草安胃。蜜以誘入蟲口也。陶弘景云。療尸蟲病。

鉛丹黃丹

辛微寒無毒。本經治吐逆胃反。驚癇癲疾。除熱下氣。發明。鉛丹體重性沉。味兼鹽礬。

而走血分。能墜痰止瘡。本經言止吐逆胃反。治驚癇癲疾。除熱下氣。取其性重以鎮逆滿也。仲景柴胡龍骨牡蠣湯用之。取其入膽以祛痰積也。但內無積滯誤服。不能無傷胃奪食之患。傅瘡長肉。墜痰殺蟲。皆鉛之本性耳。目暴赤痛。鉛丹蜜調貼太陽穴立效。

蜜陀僧。鹹辛平小毒。發明。此感鉛銀硝石之氣而成。其性重墜。直入下焦。故能墜痰截瘡。療瘡腫。治驚氣入心包絡。瘡不能言語者。用蜜陀僧末一七茶清調服卽愈。驚則氣亂。取重以去怯而平肝也。但入口則漾漾欲吐。以陰毒之性能傷胃氣也。聖惠方鼻竅赤炮。蜜陀僧細研人乳調夜則塗之。丹方治背瘡初起。以醋煅七次。桐油調圍患處卽消。同枯礬治汗癥體氣合五倍子染髭鬚。同鷹屎白滅瘢痕。水磨服解砒霜硫黃毒。

錫。辛寒微毒。發明。錫爲砒口。故新造錫器不可盛酒。越宿制瓶藏藥。須舊錫雜鉛乃佳。昔人過飲燒酒。昏迷欲絕。或令以錫器貯沸湯。蓋取氣水飲之卽甦。此與炊單布治湯氣薰灼無異。同氣相感之力也。

鐵落 辛寒有毒。卽燒鐵赤沸砧上爆下之屑也。鐵鎚內煅赤醋沃七次用。本經主風熱惡瘡。瘍痕癩氣在皮膚中。發明 素問云。有病怒狂者。治以生鐵落爲飲。漬汁煎藥。取其性沉。下氣最疾。不可過服。過服令人凜凜惡寒。以其專制陽氣也。本經主風熱惡瘡等疾。皆肝心火熱所致。辛寒能除二經之熱也。蘇恭以之炒熟投酒中。療賊風瘡病。借酒以行之。膚中氣也。

鍼砂 酸辛無毒。作鍼家磨鑄細末也。發明 鍼砂寒降。善治濕熱。脾勞黃病。於鐵鎚內煅通紅。醋沃置陰處。待半月結塊生黃。化盡鐵性。用爲消脾胃積黃腫之專藥。丹溪溫中丸用之。又以製過鍼砂一兩。入乾漆灰半錢。香附三錢。合平胃散五錢。蒸餅爲丸。湯酒任下。治療與溫中丸不殊。

鐵精 平微溫小毒。本經明目化銅。發明 鐵之精華也。出鍼竈中。紫色輕如塵者佳。取至陰沉重之性。得純陽火鍊而輕浮上升。故可以療驚悸。定風癇。破胃脘積血作痛。本經主明目。取其鎮攝虛火之義。以其得火氣之多也。但胃氣虛寒人服之。往往有奪食發呃之虞。以純陰鎮攝太過。而傷犯陽和之氣也。

鐵繡 一名 鐵衣。辛寒無毒。發明 陶華云。鐵繡水和藥服性沉重。最能墜熱開結。又能平肝消腫。治惡瘡疥癬。和油塗之。婦人產後陰挺不收。和冰片研水傅之。蠅蠻蜈蚣咬。和蒜塗之。

石部

玉 平淡無毒。發明 玉減瘢痕。日日磨擦。久則自退。研細水飛去目翳。珊瑚瑪瑙寶石玻璃水晶爲屑水飛皆能磨翳。不獨玉屑爲然也。

雲母 甘平無毒。凡用選白瑩者。擘薄片取雨水或流水瀆去砂土。更以秋露瀆數十日。同露煮七日夜。磨令極細。擦指無復光明者。乃可用之。或同鹽入重布袋。接之沃令鹽味盡。懸當風處。自然成粉。弘景曰。鍊之用礬則柔爛。忌羊血者。以其能解諸藥之性也。與胡蒜尤爲切禁。犯之必腹滿作渴。黑者有毒傷人。本經主身皮死肌。中風寒熱。如在車船上除邪氣。安五藏。益精明目。久服輕身延年。發明 雲母生泰山山谷。色白者良。本經言雲母甘平。詳其性升。亦應有甘溫助陽之力。故能辟一切陰邪不正之氣。主身皮死肌。以其能辟除陰毒也。其治中風寒熱如在車船上。以其能鎮攝虛陽也。局方雲母膏。治一切癰毒。仲景方治牝瘻多寒。千金方治久利帶下。小便淋疾。及一切惡瘻。深師方治瘻飲頭痛。何德揚治婦人難產。溫酒調服三錢。入口即下。金刃傷傳之止血最速。且無腐爛之虞。陰疽腸癰亦多用之。皆取助陽之力也。久服能使身輕尸解。孫真人恆服之。但石藥性偏助陽。凡陰虛火炎者。慎勿誤與。

白石英 甘溫無毒。出泰山。以六稜瑩白如水晶者爲真。林北海先生本草綱目必讀。但收紫而不及白。

世解真者可知。本經治消渴陰痿不足。欬逆。胸膈間久寒。益氣除風濕痹。發明。白石英入手太陰足陽明氣分。肺癰潰久。瘦瘠不起者宜之。本經主消渴陰痿不足諸病。功專溫肺無疑。但石性慄悍。不可久服。仲景金匱風引湯。只令碎如米粒。不欲其淬入胃也。干金五石等方。俱鍛過水飛入丸。而五石丸專以鍛乳爲君。合紫白石英赤石脂石膏專溫藏氣。而石膏清胃。以解諸石之悍。且既經煅過水飛。不慮其淬之留中蘊熱也。

紫石英。甘溫無毒。出泰山。以五稜明淨深紫大塊者良。浙產者塊小亦可入藥。經火則毒生。研極細水飛三次用。時珍云。煅赤醋淬七次水飛用非。本經主心腹欬逆邪氣補不足。女子風寒在子宮絕孕十年無子。發明。紫石英入手足少陰厥陰血分。上能鎮心定驚悸。安魂魄。攝逆氣重以去怯也。下能益肝填補下焦。散陰火止消渴。溫以煖血也。女子經阻色淡不孕者宜之。本經治女子風寒在子宮絕孕十年者。服之能孕。非特峻補兼散濁陰留結之驗也。若血熱紫黑者禁用。爲其性溫也。干金云。婦人欲求美色者勿服紫石英。令人色黑。非溫血之謂乎。故婦人絕孕由於陰虛火旺。不能攝精者禁用。

丹砂一名硃砂。甘微寒無毒。研細水飛用。入火則烈。毒能殺人。急以生羊血童便金汁等解之。本經主身體五臟百病。養精神。安魂魄。益氣明目。殺精魅邪惡鬼。久服通神明。不老能化爲汞。發明。丹砂體陽。

性陰外顯丹色。內含真元。不熱而寒。離中有坎也。不苦而甘。火中有土也。嬰兒姹女。交會於中。鎮心安神。是其本性。用則水飛。以免鎮墮。不宜見火。恐性飛騰。本經治身體五藏百病。安定神明。則精氣自固。火不妄炎。則金木得平。而魂魄自定。五藏皆安。精華上發。而氣益目明。陽明神物。故應辟除不祥。消散陰惡。殺厲之氣。仲淳繆子經疏之言也。同遠志龍骨則養心氣。同當歸丹參則養心血。以人參茯神濃煎。調入丹砂。治離魂病。以丹砂末一錢。和生雞子黃三枚。攪勻頓服。治妊娠胎動不安。胎死即出。未死即安。又以丹砂一兩爲末。取飛淨三錢。於一時頃分三次酒服。治子死腹中立出。慎勿經火。若經伏火及一切烹煉。則毒等於砒礦。惟養正丹則同鉛汞硫黃煅之。以汞善走而火毒不致蘊發也。

銀硃 辛溫有毒。忌一切血。發明 水銀和硫黃煅煉成硃。轉咤爲墨。故專殺蟲治瘡。以毒攻毒而已。今食品往往用之。良非所宜。觀其同蟹殼燒之。則臭蟲絕跡。和棗肉薰之。則瘡癩頓枯。其性悍烈可知。

水銀一名汞 辛寒有毒。水銀陰毒重著。不可入人腹。古法治誤食水銀。令其人臥於椒上。則椒內皆含水銀。今有誤食水銀。腹中重墜。用豬脂一筋。切作小塊焙熟。入生蜜拌食得下。亦一法也。本經主疥瘻瘍。瘍白禿。殺皮膚中蟲。墮胎除熱。殺金銀銅錫毒。鎔化還復爲丹。發明 水銀乃至陰之精質。重著而性流利。得鹽礬爲輕粉。加硫黃爲銀硃。煬成罐同硫黃打火升鍊。則爲靈砂。同硝皂等。則爲升降靈藥。性之

飛騰靈變無似之者。此應變之兵，在用者得其肯綮而執其樞要焉。本經主疥癬白疕皮膚中蟲及墮胎除熱。俾男子陰則陰消無氣。以至陰之精能消陽氣故不利男子陰器也。和劑局方之靈砂丹專取硫黃以製汞。養正丹兼取伏火丹砂以製鉛。深得交通陰陽既濟水火之妙用。非尋常草木可以例推也。千金治白癩風癩。外臺治蟲癬疥癩。梅師治療瘡作痒。肘後治一切惡瘡。藏器有云。水銀入耳能蝕人腦。令人百節掣縮。但以金銀箸耳邊卽出頭瘡切不可用。恐入經絡必緩筋骨。百藥不治。

輕粉一名膩粉 辛燥有毒。發明 水銀加鹽礬鍊爲輕粉。化純陰爲燥烈。而陰毒之性猶存。故能通大腸。傳小兒疳疽瘻瘍。殺瘡疥癬蟲。風癩瘡瘍。但以陰性暴悍。善刲溼穢。徽瘡食之竄入筋骨。莫之能出。久久發爲結毒。致成廢人。然必仍用水銀昇鍊入三白丹。引拔毒之藥同氣相求。以搜逐之。癘風醉仙丹。通天再造散。用以搜滌毒邪。從齒縫出。錢氏利驚丸。白餅子皆用之。取痰積從大便出。眞瞑眩之首推也。

靈砂 甘溫無毒。按胡演丹藥祕訣云。昇靈砂法。用新鍋安道遙爐上。蜜揩鍋底。文火下燒。入硫黃二兩鎔化。投水銀八兩以鐵匙急攪。作青砂頭。如有焰起噴醋解之。待汞不見星。取出細研。盛入水火鼎內。鹽泥固濟。下以自然火升之。乾水十二盞爲度。取出如束鍼紋者成矣。庚辛玉冊云。靈砂有三。以一伏時周天火而成者。謂之金鼎靈砂。以九度抽添用周天火而成者。謂之九轉靈砂。以地數三十日炒鍊而成。

者謂之老火靈砂。並宜桑灰淋醋煮。伏過用之於硃砂中鍊出者。謂之真汞。尤爲神效。發明時珍曰。此以至陽釣至陰。脫陰反陽。故曰靈砂。爲扶危拯急之靈丹。虛陽上逆。痰涎壅盛。頭眩吐逆。喘不得卧。寤不得寐。霍亂反胃。心腹冷痛。允爲鎮墜虛火之專藥。但不可久服。凡胃虛嘔吐。傷暑霍亂。心肺熱鬱。禁用。雄黃。辛苦溫微毒。武都者良。入香油熬化。或米醋入蘿蔔汁煮乾用。生則有毒傷人。本經主寒熱鼠瘻。惡瘡疽死肌。殺精物惡鬼邪氣百蟲毒。勝五兵。發明。雄黃生山之陽。純陽之精。入足陽明經。得陽氣之正。能破陰邪。殺百蟲。辟百邪。故本經所主。皆陰邪濁惡之病。勝五兵者。功倍五毒之藥也。其治驚癲痰涎。及射工沙蠍毒。與大蒜合搗塗之。同硝石煮服。立吐腹中毒蟲。千金方治疗腫惡瘻。先刺四邊及中心。以雄黃末傅之。聖惠方治傷寒狐惑。以雄黃燒於瓶中熏其下部。和劑局方酒癩丸。同蠍尾巴豆。治酒積痛利。肘後方以雄黃礬石甘草湯煮。治陰腫如斗。經驗方以雄黃白芷爲末酒煎。治破傷風腫。家祕方以雄黃細研。神麌糊丸。空心酒下四五分。日服無間。專消瘧母。急救良方。以雄黃五錢麝香二錢爲末。作一服酒下。治風狗咬傷。外臺祕要雄黃敷藥箭毒。攝生妙用。雄黃硫黃棗豆粉。人乳調傅酒瓶鼻赤。不過三五次愈。痘癰證治。以雄黃一錢。紫草三錢爲末。臘脂汁調。先以銀簪挑破搽痘。疗萬氏方治壅瘍漫腫。色不歛。赤明。雄黃細末三分。雞子破殼調入。飯上蒸熟食之。重者不過三枚卽消。聖濟錄以雄黃豬膽

汁調敷白秃頭瘡。○熏黃治惡瘡疥癬殺蟲蟲和諸藥熏敷。千金方有欬嗽熏法。

雌黃 辛平有毒。本經主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蟲身瘡邪氣諸毒。發明 雌黃出山之陰故單治瘡殺蟲而不能治癰瘍痰疾。本經治惡瘡頭禿痂疥與雄黃之治寒熱鼠瘡迥乎陰陽之分矣。其殺毒蟲身瘡較雄黃之殺精物惡鬼邪氣解毒辟惡之性則一而功用懸殊。治狂瘲勝金丹用之不過借爲搜陰邪之嚮導耳。別錄治鼻中瘻肉不宜久服令人腦漏。

石膏 辛甘大寒無毒清胃熱煅用治中暯熱生用一種微硬有肌理名理石主治與粗理黃石相類。本經主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡。發明 古人以石膏萬根並爲解利陽明經藥蓋石膏性寒葛根性溫功用詎可不辨。葛根乃陽明經解肌散寒之藥石膏爲陽明經辛涼解熱之藥專治熱病腸病大渴引飲自汗頭痛溺濇便閉齒浮面腫之熱證。仲景白虎湯是也。東垣云立夏前服白虎令人小便不禁降令太過也。今人以此湯治冬月傷寒之陽明證服之未有得安者。不特石膏之性寒且有知母引邪入犯少陰非越婢大青龍小續命中石膏佐麻黃化熱之比先哲有云凡病雖有壯熱而無煩渴者知不在陽明切勿誤與白虎本經治中風寒熱是熱極生風之象邪火上衝則心下有逆氣及驚陽明之邪熱甚則口乾舌焦不能息邪熱結於腹中則堅痛邪熱不散則神

昏譏語。等乎邪鬼。解肌散熱外泄。則諸證自退矣。卽產乳金瘡。亦是鬱熱蘊毒。赤腫神昏。故可用辛涼以解泄之。非產乳金瘡可泛用也。其金匱越婢湯。治風水惡寒無大熱。身腫自汗不渴。以麻黃發越水氣。使之從表而散。石膏化導胃熱。使之從胃而解。如大青龍小續命等製。又不當以此執泥也。至於三黃石膏湯。又以伊尹三黃河間解毒。加入石膏麻黃香豉薑。全以麻黃開發伏氣。石膏化導鬱熱。使之從外而解。蓋三黃石膏之有麻黃。越婢青龍續命之有石膏。白虎之加桂枝。加蒼朮。加人參。加竹葉麥門冬。皆因勢利導之捷法。千金五石丸等方。用以解鍾乳紫白石英石脂之熱性耳。別錄治時氣頭痛身熱。三焦大熱皮膚熱。腸胃中熱。氣解肌發汗。止消渴煩逆。腹脹暴氣喘息咽熱者。以諸病皆由足陽明胃經邪熱熾盛所致。惟喘息略兼手太陰病。此藥能散陽明之邪熱。陽明熱邪下降。則太陰肺氣自盪。故悉主之。○精理黃石破積聚去三蟲。千金鍊石散。醋煅水飛。同白斂鹿角。治石癰。以火鍼鍼破傳之。

滑石 甘寒無毒。色青赤者有毒。本經主身熱溲澀。女子乳難癥閉。利小便。蕩胃中積聚寒熱。益精氣。發明。滑石利尿。不獨利小便也。上能散表。下利水道。為蕩熱散濕通利六府九竅之專劑。取甘淡之味。以清肺胃之氣。下達膀胱。也詳本經諸治。皆清熱利竅之義。河間益元散。通治表裏上下諸熱。解時氣。則以葱豉湯下。傷生則以香油聚水調服。暑傷心包。則以本方加辰砂末一分。使熱從手足太陽而泄也。惟

元氣下陷。小便清利。及精滑者勿服。久病陰精不足。內熱以致小水短少。赤澀雖有泄瀉。皆爲切禁。而本經又言益精氣者。言邪熱去而精氣自復也。

赤石脂。甘酸辛溫無毒。五色石脂並溫無毒。本經養心氣。明目益精。療腹痛腸澼。下痢赤白。小便利。及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產難胞衣不出。發明。赤石脂功專止血固下。仲景桃花湯治下利便膿血者。取石脂之重濁。入下焦血分而固脫。乾薑之辛溫。緩下焦氣分而補虛。粳米之甘溫。佐石脂而固腸胃也。火熱暴注。初痢有積熱者勿用。本經養心氣明目益精。是指精血脫泄之病而言。用以固斂其脫。則目明精益矣。療腹痛腸澼等疾。以其閉泄無度。日久不止。故取濁以固之也。治產難胞衣不出。乃指日久去血過多。無力逆下。故取重以鎮之也。東垣所謂胞衣不出。濁劑可以下之。設血氣壅滯。而胞衣不出。又非石脂所宜也。其白者。斂肺氣。涩大腸。金匱風引湯用之。專取以杜虛風復入之路也。青者入肝。黃者入脾。黑者入腎。總取治崩利水之功。各隨其色而用之。

爐甘石。甘溫無毒。發明。爐甘石得金銀之氣而成。專入陽明經而燥濕熱。目病爲要藥。時珍常用。爐甘石煅飛。海螵蛸研砂等分爲細末。點諸目病皆妙。又煅過水飛。丸如彈圓。多攢簪孔燒赤。煎黃連汁淬數次。點眼皮濕爛。及陰囊腫濕。其功最捷。

舞名異。甘平無毒。本經主金瘡折傷內損。止痛生肌肉。發明。無名異本經主折傷內損。今人治打傷腫痛。損傷接骨。又試效方。臨杖預用酒服三五錢。則杖不甚傷。蘇頌謂磨傅腫毒者。亦取活血涼血之功耳。

石鍾乳。甘溫無毒。以甘草紫背天葵同煮一伏時。杵粉入鉢細研。水飛澄過。再研萬遍。磁器收之。若不經煅煉。服之令人淋。本經主欬逆上氣。明日益精。安五藏。通百節。利九竅。下乳汁。發明。鍾乳乃山靈陽氣所鍾。故瑩白中空。純陽通達。專走陽明氣分。若質實色渝。必生陰壑。不無蛇虺之毒。誤餌傷人。惟產乳源。形如鵝翎管者最勝。然性偏助陽。陰虛之人。慎毋輕服。內經云。石藥之氣悍。服之令陽氣暴充。形體壯盛。昧者得此。自廢益肆。溼汙精氣。暗損石氣。獨存孤陽。愈熾久之。榮衛不從。發爲淋濁。及爲癰疽。是果乳石之過歟。抑人之自取耶。惟肺氣虛寒。欬逆上氣。哮喘痰清。下虛脚弱。陰痿不起。大腸冷滑。精泄不禁等疾。功效無出其右。本經主欬逆上氣者。取其性溫而鎮墜之。則氣得歸元而病自愈。五藏安。則精自益。目自明。其通百節。利九竅。下乳汁者。皆取甘溫助陽。色白利竅之力也。昔人言鍾乳與白朮相反。而千金方每多並用。專取相反之性。激其非常之效。予常親試。未嘗有害。孔公孽。孔竅中通附垂於石。如木之孽。卽鍾乳之狀。本經利九竅。下乳汁之功。與鍾乳無異。而殷孽卽孔公孽之根。又爲瘡疽癰痔癥瘕溫散。

結氣之用。惜乎世鮮知者。

石灰 辛溫有毒。本經主疽瘍疥癬。熱氣惡瘡。頰疾死肌。墮肩殺痔蟲。去黑子瘻肉。發明 石灰稟壯火之餘烈。故能辟除陰邪濕毒。觀本經所主疽瘍疥癬。熱氣惡瘡。頰疾死肌等。皆外治之用。去黑子者。火氣未散。性能灼物。故能去黑子。瘻肉及墮肩也。本經雖不言有毒。而內服之方。從無及此。其毒可知。寇氏治中風口渴。以石灰醋炒調塗。左塗右。右塗左。立便牽正。千金治身面疣。用苦酒浸石灰六七日。取汁頻頻滴之。自落。又治溺死之人。用化過細灰裹下部。以滲其水即活。又治瘻瘍不合。古塚中石灰厚傅之。集玄方治面疊疣。碱水煮滾化礦灰。插糯米半入灰中。經宿色變如晶。以鍼微撥動。點少許於上。半日汁出。剔去藥不得著水。二日即愈。便簡方治痄腮腫痛。醋調陳年石灰傅之。肘後方治湯火傷灼。年久石灰油調傅之。又治刀刃金瘡。石灰裹之。即痛定血止。但不可著水。著水即爛肉也。

浮石一名海石 鹹平無毒。煅過水飛用。發明 海石乃水沫結成。色白體輕。故治上焦痰熱。止嗽。點目翳。傅痘癰。功效最捷。又治諸淋。散積塊。皆取鹹能軟堅之意。消癰瘍。結核。瘧氣。然惟實證宜之。虛者誤投。患亦最速。以其性專克削肺胃之氣也。南海有浮水之石。沉水之香。專取物類之相反。以治病氣之阻逆也。陽起石本經名白石 鹹溫無毒。色白。揉之如綿。不脆者真。質堅脆者偽。煅過燒酒淬七次。杵細水飛用。

本經主崩中漏下。破子藏中血癥瘕結氣。寒熱腹痛無子。陰痿不起。補不足。發明。陽起石乃雲母之根。右腎命門藥。下焦虛寒者宜之。黑錫丹用此正以補命門陽氣不足也。本經治崩中漏下。陽衰不能統攝陰血也。又言破子藏中血癥瘕結氣。是指陰邪畜積而言。用陽起石之鹹溫散其所結。則子藏安和。孕自成矣。陰虛火旺者忌用。以其性專助陽也。

慈石本經名玄石
俗名矂鐵石

辛鹹微寒無毒。入藥煅過。醋淬七次。研細水飛用。

本經主周痹風濕。肢節中痛。不可持物。

洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾。發明。慈石爲鐵之母。腎與命門藥也。惟其慈。故能引鐵。千金慈硃丸。治陰虛龍火上炎。耳鳴嘈嘈。腎虛瞳神散大。蓋慈石入腎。鎮養真精。使神水不外移。硃砂入心。鎮養心血。使邪火不上侵。耳目皆受蔭矣。本經主周痹風濕。肢節中痛。洗洗酸消。取辛以通痹而祛散之。重以去怯而鎮固之。則陰邪退。聽而肢節安和。耳目精明。大熱煩滿自除矣。濟生方治腎虛耳聾。以慈石豆大一塊。同煅穿山甲末。綿裹塞耳中。口含生鐵一塊。覺耳中如風雨聲即通。

代赭石本經名
須丸

苦甘平無毒。擊碎有乳形者真。火煅醋淬三次。研細水飛用。

本經主鬼疰賊風蠱毒。

腹中毒邪。女子赤沃漏下。發明。赭石之重以鎮逆氣。入肝與心包絡二經血分。本經治賊風蠱毒。赤沃漏下。取其能收斂血氣也。仲景治傷寒吐下後。心下痞硬。噫氣不除。旋復代赭石湯。取重以降逆氣滌。

痰涎也。觀本經所治皆屬實邪。卽赤沃漏下亦是肝心二經瘀滯之患。其治難產胞衣不下。及大人小兒驚氣入腹。取重以鎮之也。陽虛陰瘻。下部虛寒忌之。以其沉降而乏生發之功也。

禹餘糧本經名白餘糧與太乙餘糧功用皆同

甘平無毒。細研水淘澄之。勿令有砂土。

本經主欬逆寒熱煩滿。下赤白

血閉癰痕大熱。鍊餌服之。不饑輕身延年。

發明 重可以去怯。禹餘糧之重爲鎮固之劑。手足陽明血

分藥。其味甘。故治欬逆寒熱煩滿之病。其性澀。故主赤白帶下。前後諸病。仲景治傷寒下利不止。心下痞鞚。利在下焦。赤石脂禹餘糧丸主之。取重以鎮痞逆。澀以固脫泄也。抱朴子云。禹餘糧丸日再服。三日後令人多氣力。負擔遠行。身輕不饑。卽本經輕身延年之謂。

空青 甘酸大寒無毒。本經主青盲耳聾。明日利九竅。通血脉。養精神。益肝氣。久服輕身延年。

發明

空青感銅之精氣而結。故專入肝明目。本經主耳目九竅諸病。皆通血脉。養精神。益肝氣之力也。久服輕身延年者。銅性善滌垢穢。垢穢去而氣血清純。毋伐天和矣。時珍曰。空青與綠青皆生益州及越雋山有銅處。東方甲乙是生肝膽。其氣之清者爲肝血。其精英爲膽汁。開竅於目。血者五藏之英。皆因而注之爲神。膽汁充則目明。減則目昏。銅亦青陽之氣所生。其氣之清者爲綠。猶肝血也。其精英爲空青之漿。猶膽汁也。其爲治目神藥。蓋亦以類相感耳。但世罕得真。鑒亦罕識。以故俗諺有天下有空青。人間無瞽目。

之說。不知此雖貴品。銅官始興涼州高平饒信等處。亦皆有之。出銅坎者。銅質隱隱。內涵空綠。生金穴者。金呈粲粲。內涵空青。總取得肝膽之精靈。通空竅之風氣也。予嘗以此驗之。攷之張果玉洞要訣云。空青似楊梅受赤金之精。甲乙陰靈之氣。近泉而生。故能含潤。然必新從坎中出者。則鑽破中有水。若出礦日久。則乾如珠矣。安有藏久不乾之理。近世必以中空涵養者爲真。若爾。則當名空漿。不當名空青矣。但須驗其中空。內有青綠如珠者。卽真空青。急不可得。綠青可以代用。活法在人可執一乎。

曾青曾音層。其青層層而生。故石形如蚯蚓屎者真。微酸小毒。發明。止淚出。風痹。利關節。通九竅。破癥。堅積聚。久服。輕身不老。發明。曾青治目。義同空青。以其並出銅礦。與綠青同一根源。曾青則綠青之祖氣也。古方太乙神精丹用之。扁鵲治積聚留飲。有曾青丸。並見古今錄驗方。曾空二青。近世絕罕。千金云。當取崑崙綠代之。卽綠青也。

綠青俗名石綠。微酸小毒。發明。痰在上宜吐之。在下宜利之。綠青吐風痰眩悶。取二三錢。同龍腦少許調匀。以生薄荷汁合酒溫服。便臥。涎自口角流出乃愈。不嘔吐而功速。故著之。

扁青俗名石青。甘平無毒。本經主目痛。明目。折跌癰腫。金瘡不瘳。破積聚解毒氣。利精神。發明。石青走肝磨堅。積故本經所主。皆肝經積聚之病。時珍用吐風痰研細溫水灌下。卽吐肝虛易驚多痰者宜之。

形如縮砂者。名魚目青。主治與扁青無異。

石膽俗名膽礬 酸辛寒有毒。產秦州嵩岳及蒲州中條山出銅處有之。能化五金。以之制汞則與金無異。本經主目痛。金瘡諸癰瘻。女子陰蝕痛。石淋寒熱。崩中下血。諸邪毒氣。發明 石膽酸辛氣寒。入少陽膽經。性寒收斂。味辛上行。能涌風熱痰涎。發散風木相火。又能殺蟲。本經主目痛。金瘡癰瘻。取酸辛以散風熱痰垢也。治陰蝕崩淋寒熱。取酸寒以滌濕熱淫火也。又爲咽喉肺乳蛾諸邪毒氣要藥。涌吐風痰最快。方用米醋煮真鴨嘴。膽礬末醋調。採吐膠痰卽瘥。又治紫白癥風。膽礬牡蠣粉生研醋調摩之。風犬咬傷。膽礬末水服。探吐。蜜調傅之立愈。胃脘蟲痛。茶清調膽礬末吐之。走馬牙疳。紅棗去核入膽礬煅赤研末傅之。追出痰涎卽愈。百蟲入耳。膽礬和醋灌之。卽出。千金方也。

礬石 辛熱有毒。久服令人筋痙。煅法以黃泥包炭火燒一日一夕。乃可用之。惡羊血。不入湯液。本經主寒熱鼠瘻。蝕死肌風癆。腹中堅癖邪氣。發明 時珍云。礬石與砒石相近。性亦相類。但砒石略帶黃暉。礬石全白。稍有分辨。而古方礬石與礬石常相渾書。二字相似。故誤耳。然礬石性寒無毒。礬石性熱有毒。不可不審。甄權除膈間積氣。冷濕風癆。瘡瘻積十年者。仲景云。生用破人心肝。嚴冬以此置水中。則水不冰。其熱毒之性不減砒石。今藥肆中往往以充砒石。而礬石僅可破積攻癆。不能開痰散結。是以勝金。

丹成瘡丹。眼之不效者。良由誤用礬石之故。按王子敬靜息帖言。礬石深是可疑。凡喜服寒食散者。輒發癰毒。故云深可疑也。以其毒烈。乾汞最速。故丹房目爲仙藥。凡山中有礬。則春不生草。冬不積雪。而鼠食則斃。蠶食則肥。物類之宜忌。有不可解者。其特生礬石。有蒼白紫桃花色金星銀星等類。其毒不異。惟出金穴中者。名握雪礬石。雖溫無毒。與上迥爲不同。

砒石 出信州故又名信石 苦辛大熱大毒。色白有黃暈者名金脚砒。鍊過者曰砒霜。色紅者最劣。不堪入藥。畏菜豆芽茶冷水。入藥醃煮用。或與芽茶同用。或與浸濕生菜豆仁同研以殺其毒。中其毒者以生羊血解之。冷水多灌亦解。若犯火酒必不可救。發明 砒霜瘡家常用。入口則吐利兼作。吐後大渴。則與菜豆湯飲之。砒性大毒。誤食必死。奈何以必死之藥治必不死之病。豈不殆哉。然狂癩之病。又所必需。勝金丹用之無不應者。枯痔散與天靈蓋同用。七日痔枯自落。取熱毒之性以枯死肉。天靈蓋以透骨髓。散宿垢長肌肉也。

礞石 辛鹹平無毒。色青者入肝力勝。色黃者兼脾次之。硝石煅過杵細水飛用。發明 青礞石厭陰之藥。其性下行。治風木太過。挾制脾土。氣不運化。積滯生痰。壅塞膈上。變生風熱諸病。故宜此藥。重墜以下泄之。使木平氣下。而痰積通利。諸證自除矣。今人以王隱君滾痰丸。通治諸痰怪證。不論虛實寒熱緊

用殊爲未安。不知瘀因脾胃不能運化。積滯而生。膠固稠粘者。誠爲合劑。設因陰虛火炎。煎熬津液凝結成痰。如誤投之。則陰氣愈虛。陽火彌熾。痰熱未除。而脾胃先爲之敗矣。況乎脾胃虛寒。食少便溏者得之。泄利不止。禍不旋踵。若小兒多變慢脾風證。每致不救。可不慎歟。

花乳石一名花藥石

酸辛溫無毒。出陝華諸郡。色黃中有淡白點。以此得名。又代州山谷中有五色者。制法

以花乳石五兩。同硫黃二兩。入煬成罐內。鹽泥固濟。加頂火煅過研細水飛用。發明。花乳石產硫黃山中。其性大溫。厥陰血分藥也。葛可久治虛勞吐血。有花藥石散。以其性溫善散瘀結也。和劑局方治金刃箭傷。打撲垂死。外有損處。以煅過細末。摻傷處。血化黃水。再摻卽活。如內有損血入藏府。煎童子小便入酒少許。調灌一錢七立效。婦人產後惡血衝心。昏暈不省。或胎死腹中。胞衣不下致死。但心胸溫暖者。急以童便調灌一錢。取下惡血卽安。若膈上有血。化爲黃水。卽時吐出。或隨小便出。甚效。但陰虛火炎。中無瘀積者。誤用必殆。

河沙 微寒無毒。發明。河沙得水土之氣。故夏月發癩子。通石淋。主絞腸痧痛。用沙炒熟。冷水淬之。澄清服效。又風濕頑痹。不仁筋骨攣縮。六月取河沙曝熟。伏坐其中。冷卽易之。取微汗。忌風冷勞役。不過數次愈。其王田沙。夏月發麻疹良。

石燕 甘寒無毒。發明 石燕出祈陽西北江畔砂灘上。形似蚪而小。堅重於石。俗云因雷雨則自石穴中出。隨雨飛墮者妄也。其性寒涼。乃利竅行濕熱之物。故能療眼目障翳。磨水不時點之。熱淋煮汁飲之。婦人難產。兩手各執一枚卽下。然不若磨汁飲之。僅似有理。

石蟹 甘寒無毒。發明 石蟹生南海近海州郡皆有之。體質石也。與蟹相似。或言崖州榆林港內土極細最寒。蟹入不能運動。片時成石。亦妄言也。其性鹹寒質堅能磨翳積故青盲目淫膚翳丁翳漆瘡皆水磨點塗。催生下胎。療熱極血暈。熟水磨服。

蛇黃 温微毒。發明 蛇黃生蛇腹中。如牛黃之類。世人因其難得。遂以蛇含石。醋燬水飛代之。取蛇之性竄入肝也。蛇含石入手足厥陰血分。與代赭之性不甚相遠。為小兒鎮攝驚癇之重劑。脾風泄瀉者宜之。

霹靂碁即雷楔 温無毒。發明 雷楔稟東南水火之氣。治小兒驚癇。磨汁服之作枕辟惡夢不祥。鎮邪瘧。刮屑殺瘻蟲。下蠱毒。置箱匣不生蛀蟲。佩之安神。治驚邪之疾。

齒石部

食鹽 鹹寒無毒。本經主結熱喘逆胸中病。令人吐。發明 鹹走腎走血。腎病血病人無多食鹽。以

血得鹹則凝也。補腎藥用之。不過借爲引導耳。乾霍亂及臭毒頭瘡腹痛。多用鹽水吐之。本經所主結熱喘逆者。以鹹能下氣。過鹹則引涎水聚於膈上。而涌之也。好食鹹者。人多黑色。耗血之驗也。病水腫忌食。以其走腎助邪水之逆滿也。千金治妊娠橫生逆產。先露手足。以鹽摩產婦腹。并塗兒手足。急以爪搔之。卽縮入而正產。又殺蠱毒。凡水蛭蚯蚓。得鹽卽化爲水毒蟲蟹者。以鹽擦之。其毒卽解。鹽之味鹹性降下。氣最速。治下部驟瘡。吐胸中痰澼。止心腹卒痛。不可多食。傷肺。高枕。扁鵲云。能除一切大風痛。炒熟熨之。今人救朱魚喰雷電暴雨欲死。但口微動者。速將鹽少許調水。貯魚於中。時時微動其水。卽活。鱗尾有損處。以鹽塗之。卽生出鹽爲水之精。專得潤養之力也。今人食暴雨潦水腹脹。以鹽湯探吐。卽安。其解水毒可知。

戎鹽

一名石鹽。俗名青鹽。與光明鹽同類。

鹹寒無毒。

本經主明目痛。益氣堅筋骨。去毒蠱。發明。戎鹽稟至陰之氣。凝結而成。不經煎鍊。生涯淡之陰。功專走血入腎。治目中瘀赤昏澀。金匱茯苓戎鹽湯。治小便不通。取

其補腎利膀胱也。又能固齒明目。治目痛。益氣堅筋骨。一皆補腎之力。本經首主明目痛。是熱淫於內。治以鹹寒。又言去毒蠱者。鹹能更堅。蠱毒邪氣。不能浮長矣。

鹹鹹

一名石鹹。

苦鹹微寒無毒。

本經主大熱消渴。狂煩。除邪及下蠱毒。柔肌膚。

發明。

鹹味鹹性走故。

能消痰磨積。祛熱煩蠱。毒消渴屬實熱者宜之。肌膚粗者。以湯洗之。頑皮漸退。是卽柔肌膚之謂也。○水鹹乃鹽灰淋湯。沖銀礬脚所造。性能發麵。故麵鋪中無不用之。病人食之多發浮腫。故方後每忌濕麵。觀其善滌衣垢。尅削可知。

凝水石卽寒水石 辛鹹寒無毒。近世真者絕不易得。欲驗真僞。含之卽化爲水。否卽是僞。石膏亦名寒水石。與此不同。本經主身熱腹中積聚邪氣。皮中如火燒煩滿。發明 寒水石生積鹽之下。得陰凝之氣而成鹽之精也。治心腎積熱之上藥。本經治腹中積聚。鹹能軟堅也。身熱皮中如火燒。鹹能降火也。金匱風引湯。局方紫雪。皆用以治有餘之邪熱也。如無真者。戎鹽玄精石皆可代用。總取鹹寒降泄之用耳。

玄精石 辛鹹寒無毒。青白龜背者良。本經除風冷邪氣。濕痹益精氣。發明 玄精石裏太陰之精與鹽同性。故其形皆六出。象老陰之數也。本經言味鹹氣溫。傳寫之誤。其氣寒而不溫。其味辛鹹沉降。同硫黃硝石。治上盛下虛。收陽助陰。有扶危拯逆之功。來復丹用之。專取一陽來復之義。寒因寒用。深得本經諸治之奧。

朴硝 辛苦鹹寒有毒。黃者傷人。赤者殺人。入藥必取白者。以水煎化。澄去滓。入茱萸自然汁同煮。傾入盆中。經宿結成如冰。謂之盆硝。齊銜之硝。上生鋒芒。謂之芒硝。川晉之硝。上生六稜。謂之牙硝。取芒硝再

三以萊菔汁。燥去鹹味。懸當風處吹去水氣。輕白如粉。謂之風化硝。以芒硝牙硝同萊菔汁甘草煎。遇晴
皚昇。煥。謂之玄明粉。本經主五藏積熱。胃脹閉滯。薈結飲食。推陳致新。除邪氣。向錯箇在硝石條內今
非硝石所能。發明。熱淫於內。治以鹹寒。堅者以鹹更之。熱者以寒消之。不出本經推陳致新之妙用。
仲景大陷胸湯。大承氣湯。調胃承氣湯。皆用芒硝更堅去實。且帶微辛。所以走而不守。若熱結不至堅者。
不可輕用。小兒赤遊風。以硝傾湯中。取布蘸濕拭之。

玄明粉御藥院方。辛甘微寒無毒。發明。玄明粉用芒硝煅過多。遍佐以甘草。緩其鹹寒之性。用治
膈上熱痰。胃中實熱。腸中宿垢。非若芒硝之力峻傷血也。然脾胃虛寒。及陰虛火動者。慎勿輕用。以取虛
虛之咎。

風化硝。甘鹹寒無毒。發明。風化硝甘緩輕浮。故治上焦心肺痰熱。而不致於泄利者宜之。并治經
絡之痰濕。但重著而非痠痛者。用之有效。指迷茯苓丸。治痰濕流於肩背之陽位。而隱隱作痛。最爲合劑。
然惟體肥氣實者爲宜。眼瞼赤腫。和人乳點之。

硝石即焰硝。辛苦鹹溫有毒。溶化投甘草結定取用。本經主百病。除寒熱邪氣。逐六府積聚。固留癖能
化七十二種石。諸家本草皆錯簡在朴硝條內。詳化七十二種石。豈朴硝能之。發明。焰硝屬火。其性上升。能破積散堅。治諸寒熱交

錯之病。升散三焦火鬱。調和藏府虛寒。除寒熱邪氣。逐六府積熱。不出本經主治也。別錄言天地至神之物。能化七十二種石。抱朴子亦云。能消柔五金。化七十二石。其錯簡可知。與硫黃同用。卽配偶二炁。均調陰陽。有升降水火之功。治冷熱緩急之病。蓋硫黃性緩而利。其性下行。硝石性緩而散。其性上行。一升一降。此制方之妙也。

礮砂 鹹苦辛熱有毒。醋煮乾刮下。用番禹者良。畏酸漿水。忌羊血。中其毒者。生菜豆研汁恣飲解之。發明 矣砂大熱。乃鹵液所結。秉陰毒之氣。含陽毒之精。破積攻堅。無出其右。故能治噎膈反胃。積塊肉癥。其性能柔金銀。故鍛藥用之所言。化人心爲血者。甚言其迅利也。外用治惡肉。除疣贅。去鼻中瘻肉最捷。但不可過用。用過急以甘草湯洗之。觀金銀有僞。投礮砂罐中。悉能消去。況人腹中有久積死胎。豈不腐潰。但其性毒烈。苟有生機。慎勿輕試。

蓬砂一名鵬砂 甘微鹹無毒。甘草湯煮化微火炒鬆用。發明 蓬砂味甘微鹹。氣溫色白而質輕。能去胸膈上焦之實熱。素問云。熱溼於內。治以鹹寒。以甘緩之是也。其性能柔五金而去垢膩。故主痃嗽。喉痹。破癥。結治噎膈積聚。骨鯁結核惡肉。取其能柔物也。含化嚥津。治喉中腫痛。膈上痰熱。取其能散腫也。眼目障翳。口齒諸病用之。取其能滌垢也。昔人治骨鯁。百計不下。取含嚥汁。脫然如失。此軟堅之微也。

石硫黃。酸鹹大熱有毒。以菜菔挖空入硫黃蒸熟用。或入豆腐中煮七次用。或醋煅用。或豬臍中制用。各隨本方。硫是礬之液。礬是鐵之精。磁石是鐵之母。故鍼砂磁石制入硫黃。立成紫粉。硫能乾汞。見五金而黑。得水銀則赤也。本經主婦人陰蝕疽瘡惡血。堅筋骨。除頭禿。發明。硫黃稟純陽之精。賦大熱之性。助命門相火不足。寒鬱火邪。冒脫結痛。腳冷疼弱者宜之。其性雖熱。而能疏利大腸。與燥澀之性不同。但久服傷陰。大腸受傷。多致便血。傷寒陰毒。爪甲純青。火焮散。屢奏神功。陰水腹脹。水道不通。金液丹服之卽效。本經治陰蝕疽瘡。乃熱因熱用。以散陰中蘊積之垢熱。但熱邪亢盛者禁用。又言堅筋骨者。可以治下部之寒濕。若濕熱痿痹。更非所宜。人身陰常不足。陽常有餘。苟非真病虛寒。胡可服此毒熱類。按有久服硫黃人漸縮小之例。石頑親見李堯占服此數年。臨斃縮小如七八歲童子狀。正內經所謂熱則骨消筋緩是也。

礬石。酸澀微寒無毒。明如鵬砂。起橫樞者。名馬齒礬最勝。生用煅用。各隨本方。生者多食破人心肺。本經主寒熱洩利。白沃陰蝕惡瘡。目痛。堅骨齒。發明。白礬專收濕熱。固虛脫。故本經主寒熱泄利。蓋指利久不止。虛脫滑泄。因發寒熱而言。其治白沃陰蝕惡瘡。專取滌垢之用。用以洗之。則治目痛。漱之則堅骨齒。弘景曰。經云。堅骨齒誠爲可疑。以其性專入骨。多用則損齒。齒乃骨之餘也。爲末去

鼻中瘻肉。其治氣分之痰濕癰腫最捷。侯氏黑散用之。使藥積腹中。以助悠久之功。故蠟礬丸以之爲君。有人過身。生瘻如蛇頭。服此而愈。甄權生含嚥津。治急喉痹。皆取其去穢之功也。若濕熱方熾。積滯正多。誤用收濁。爲害不一。岐伯言。久服傷人骨。凡陰虛咽痛。誤認喉風。陰冷腹痛。誤認臭毒。而用礬石必殆。綠礬一名皂礬 酸寒無毒。發明 皂礬專除垢膩。同蒼朮酒麴醋丸。治心腹中滿。或黃腫如土色。甚效。蓋礬色綠味酸。燒之則赤。用以破血分之瘀積。其效最速。金匱治女勞黑癰。硝石礬石丸。專取皂礬以破瘀積之血。緣其未經註明。嘗有誤用白礬濁收。殊昧此理。又婦人白沃經水不利。子藏堅癥。中有乾血白物。用礬紅杏仁蜜丸納陰。中日一易之。

山草部

甘草一名國老 甘平無毒。反海藻大戟甘遂芫花。補中散表炙用。漏火解毒。生用中心黑者。有毒勿用。本經主五藏六府寒熱邪氣。堅筋骨長肌肉。倍氣力。解金瘡腫毒。發明 甘草氣薄味厚。升降陰陽。大緩諸火。生用則氣平。調脾胃虛熱。大瀉心火。解癰腫金瘡諸毒。炙之則氣溫。補三焦元氣。治藏府寒熱而散表邪。去咽痛。緩正氣。養陰血。長肌肉。堅筋骨。能和衝脈之逆。緩帶脈之急。凡心火乘脾。腹中急痛。腹皮急縮者。宜倍用之。其性能緩急。而又協和諸藥。故熟藥用之緩其熱。寒藥用之緩其寒。寒熱相兼者。用之得

其平本經治藏府寒熱邪氣。總不出調和胃氣之義。仲景附子理中用甘草恐僵上也。調胃承氣用甘草恐速下也。皆緩之意。小柴胡有黃芩之寒。人參半夏之溫而用甘草。則有調和之意。炙甘草湯治傷寒脈結代心動悸。渾是表裏津血不調。故用甘草以和諸藥之性而復其脈。深得攻補兼該之妙用。惟土實脹滿者禁用。而脾虛脹滿者必用。蓋脾溫則健運也。世俗不辨虛實。一見脹滿便禁甘草。何不思之甚耶。凡中滿嘔吐。諸濕腫滿。酒客之病。不畧其甘藻戟。遂蕩與之相反。亦迂緩不可救昏昧耳。而胡治治痰澼以十聚湯加甘草大戟。乃痰在膈上。欲令通泄以拔病根也。古方有相惡相反並用。非妙達精微者。不知此理。其梢去莖中痛節解癰疽毒。條草生用解百藥毒。凡毒遇土則化。甘草爲九土之精。故能解諸毒也。千金方云。甘草解百藥毒。如湯沃雪。有中烏頭巴豆毒。甘草入腹卽定。驗如反掌。方稱大豆解百藥毒。予每試之不效。加甘草爲甘豆湯。其驗甚捷。嶺南人解蠱。凡飲食時。先用炙甘草一寸嚼之。若中毒隨卽吐出。

黃耆 甘溫無毒。入益氣藥炙用。入解表及托裏藥生用。肥潤而軟者良。堅細而枯者。食之令人胸滿。

本經主癰疽久敗。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。發明 黃耆甘溫。氣薄味厚。升少降多。陰中陽也。能補五藏諸虛。入手足太陰手陽明少陽。而治脈弦自汗。漏陰火去肺熱。無汗則發。有汗則

止入肺而固表虛自汗。入脾而托已潰癰瘍。本經首言癰疽久敗排膿止痛。次言大風癩瘍五痔鼠瘻皆用生者。以疏衛氣之熱性雖溫補而能通調血脈流行經絡可無礙於壅滯也。其治氣虛盜汗自汗及皮膚痛是肌表之藥。治咯血柔脾胃是中州之藥。治傷寒尺脈不至補腎藏元氣不足及嬰兒易感風邪發熱自汗諸病皆用炙者。以實衛氣之虛乃上中下內外三焦藥。卽本經補虛之謂。如痘疹用保元湯。治脾胃虛熱當歸補血湯。治血虛發熱皆爲聖藥。黃耆同人參則益氣。同當歸則補血。同白朮防風則運脾濕同防己防風則祛風濕。同桂枝附子則治衛虛亡陽汗不止爲腠理開闔之總司。又黃耆性專實衛溫補下元而當歸補血湯曷不用地黃之屬。反用此三倍於歸其義何居。蓋陰血之虛而發熱明係陽從陰亢自必峻用陰中之陽藥爲君兼當歸引入血分自然陽生陰長陰邪退聽而亢熱除矣。若用純陰滋膩徒資膠滯熱無由而散也是須黃耆固護其營不使重奪其汗而陰自守熱自除矣。昔人言無汗不得用黃耆服之令人胸滿此指表實形瘦色蒼胸中氣盛者而言。若衛氣虛衰之人感寒雖用表藥多不能作汗須用黃耆建中之屬始得汗解不可拘於俗見而廢聖法也。唐許尚宗治柳太后病風不能言脈沉而口噤乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如烟霧一夕便得語也。此義惟玉屏風散得之黃耆性畏防風然得防風其功愈大蓋相畏而相使者也。

人參古作

甘苦微溫無毒。適高麗者良。反藜蘆。畏鹹鹽。陰虛火炎。欬嗽喘逆者。青鹽製之。本經補

丑

藏。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心益智。久服。輕身延年。發明。人參甘溫。氣薄味厚。陽中微陰。能補肺中元氣。肺氣旺。四藏之氣皆旺。精自生而形自盛。肺主諸氣故也。古人血脫益氣。蓋血不自生。須得補陽氣之藥。乃生陽。生則陰長。血乃旺耳。若單用補血藥。血無由而生也。素問言。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。故補氣必用人參。補血須兼用之。仲景言。病人汗後。身熱亡血。脈沉遲。下利。身涼。脈微。血虛。並加人參。蓋有形之血。未能卽生。希微之氣。所當急固。無形生有形也。丹溪言。虛火可補。參者之屬。實火可瀉。芩連之屬。後世不察。槩謂人參補火謬矣。夫火與元氣勢不兩立。正氣勝則邪氣退。人參既補元氣。又補邪火。是反復之小人矣。又何與甘草茯苓白朮爲四君子耶。凡人面白面黃面青。黧悴者。皆脾肺腎氣不足。可用也。面赤面黑者。氣壯神強。不可用也。脈浮而芤濡。虛大遲緩無力。沈而遲滯。弦細微弱。結代。或右手關部無力。皆可用也。若弦強緊實。滑數洪盛。長大有力。或右手獨見脈實。皆火鬱內實。不可用也。漱古謂喘嗽勿用者。痰實氣壅之喘也。若腎虛氣短喘促者。必用也。仲景謂肺寒而嗽。勿用者。寒束熱邪。壅滯在肺之嗽也。若自汗惡寒而嗽者。必用也。東垣謂久病鬱熱在肺。勿用者。乃火鬱於內。宜發不宜補也。若肺虛火旺。氣短自汗者。必用也。丹溪言。諸痛不可驟用者。乃邪氣方銳。宣散不宜補也。若裏虛。

吐利及久病胃弱虛痛。嘗按者必用也。節齋謂陰虛火旺。吐血勿用者。乃血虛火亢能食脈強。服人參則陽愈旺。陰愈消。未有不引血大脫也。若自汗氣短肢寒脈虛者。必用也。古今治勞莫過於葛可久。其獨參湯保真湯。未嘗廢人參而不用。惟麻疹初發。身發熱而斑點未形。傷寒始作。證未定而熱邪方熾。不可用耳。喻嘉言曰。傷寒有宜用入藥者。發汗時元氣大旺。外邪乘勢而出。若元氣素弱之人。藥雖外行。氣從中餒。輕者半出不出。留連致困。重者隨元氣縮入。發熱無休。所以虛弱之人。必用人參入表藥中。使藥得力一涌而出。全非補養之意。卽和解藥中。有人參之大力居間。外邪遏正。自不爭而退舍。亦非偏補一邊之意。而不知者。謂傷寒無補。邪得補彌熾。斷不敢用。而市井愚夫。乃交口勸病人不宜服參。醫者又避嫌。謗謠。一切可生之機。悉置之不理。殊失本經除邪氣之旨矣。古今諸方。表汗用參蘇飲。敗毒散。和解用小柴胡。解熱用白虎加人參湯。竹葉石膏湯。攻下用黃龍湯。領人參深入驅邪。卽熱退神清。從仲景至今。明賢方書。無不用人參。何爲今日醫家屏絕不用。以阿諛求容。全失一脈相傳宗旨。殊不知誤用人參殺人者。皆是與黃耆白朮乾薑當歸肉桂附子同行溫補之誤所致。不與羌獨柴前芍半枳桔等同行汗和之法所致也。安得視人參爲砒鴉刀刃。固執不用耶。又痘疹不宜輕用參者。青乾紫黑陷血熱毒盛也。若氣虛項陷。色白皮薄。泄瀉漿清。必用也。故博愛心鑑治痘。以保元湯爲要藥。人參得升麻補上焦之氣。

漏中州之火。得茯苓補下焦之氣。漏腎中之火。東垣交泰丸。用參皂莢。是惡而不惡也。治月閉用四物加人參五靈脂。是畏而不畏也。痰在胸膈。以人參藜蘆同用。而取涌越。是激其怒性也。惟右手獨見脈實者。爲肺經本有火。故不宜用。若右手虛大而嗽者。雖有火邪。此爲虛火上炎。腎水不足。乃刑金之火。非肺金之火。正當以人參救肺。但須多用。方始得力。若少用。必增脹滿。本經言安五藏。定魂魄。止驚悸。明目。開心益智者。以藏氣安和。心神寧定。當無驚悸昏昧之慮矣。其除邪氣者。以甘溫之力。協諸表藥。助胃祛邪。譬諸坐有君子。則小人無容身之地矣。繆子經疏云。人參論其功能之廣。如本經所說。信非虛語。第其性亦有所不宜。世之錄其長者。或遺其短。摘其瑕者。并棄其瑜。是以或當用而後時。或非宜而罔投。或蒙其利。反見其害。二者之誤。其失則一。使良藥不見信於世。粗工互騰其口說。豈知人參本補五藏真陽之氣者也。若夫虛羸尪怯。勞役饑飽所傷。努力失血。以致陽氣短乏。陷入陰分。發熱倦怠。四肢無力。或中暑傷氣。氣無以動。或嘔吐泄瀉。霍亂轉筋。胃弱不食。脾虛不磨。或真陽衰少。腎氣乏絕。陽道不舉。或中風失音。產後氣喘。小兒慢驚。痘後氣虛。潰瘍長肉等證。投之靡不立效。惟不利於肺家。有熱嗽。吐痰。吐血。衄血。骨蒸勞瘵。陰虛火動之候。蓋肺者清肅之藏。真氣無虧。則竅濫清淨。以受生氣之熏蒸。而朝百脈。苟縱恣情欲。虧損真陰。火空則發。起於下火燦乎上。則肺先受之。火乃肺之賊邪。邪氣勝則實。實則肺熱鬱結。

爲痰嗽癢而血熱妄行溢出上竅。王好古所謂肺熱還傷肺是也。若誤投之鮮克免者。此皆寶實之誤於人參何咎哉。○產山西太行山者名上黨人參。雖無甘溫峻補之功。却有甘平清肺之力。亦不似沙參之性寒專泄肺氣也。○參蘆能耗氣專入吐劑。涌虛人膈上清飲宜之。鹽哮用參蘆涌吐最妙。參蘆涌吐參鬚下泄與當歸紫菀之頭止血身和血尾破血之意不殊。參鬚價廉資乏之人往往用之。其治胃虛嘔逆欬嗽失血等證亦能獲效。以其性專下行也。若治久痢滑精崩中下血之證。每致增劇。以其味苦降泄也。其蘆世罕知用。惟江右人稱爲竹節參。近日吾吳亦有用之者。其治漏利腰血崩帶精滑等證俱無妨礙。如氣虛火炎喘嘔嗽血誤用轉劇。昔人用以涌吐者取其性升而於補中寓瀉也。此義前人未發。因屢驗而筆之。

沙參 甘淡微寒無毒。有南北二種。北者質堅性寒。南者體虛力微。反藜蘆。本經主血結驚氣除寒熱。補中益肺氣。發明。沙參專泄肺氣之熱。故喘嗽氣壅。小便赤澀不利。金受火尅。陰虛失血。或喘欬寒熱。肺痿等疾宜之。本經主血結驚氣者。因驚氣入心。心包熱鬱而血結也。除寒熱者。鬱熱解而寒熱也。補中益肺氣者。用以清理肺胃之虛熱。則津液復而正氣受益矣。潔古言肺寒用人參。肺熱用沙參。好古言沙參性寒。補五藏之陰。總未達輕虛泄熱之義也。衛生方治肺熱欬嗽。沙參一味水煎服之。肘後方

治卒然癇痛。自汗欲死。沙參爲末。酒服立瘥。證治要訣。治婦人白帶。沙參爲末。米飲服之。蓋沙參專開肺。氣。肺氣清。則木邪散而癇自除。帶自愈矣。時珍云。人參甘苦而溫。其體重實。專補脾胃元氣。因而益肺與腎。故內傷元氣者宜之。沙參甘淡而寒。其體輕虛。專清肺氣。因而益脾與腎。故金受火尅者宜之。此卽本經補中益肺氣之謂。一補陽而生陰。一補陰而制陽。不可不辨。

桔梗

本經名
薺苑

辛甘苦微溫無毒。甘者爲薺。苦者爲苦梗。咬之腥濶者爲木梗。不堪入藥。本經主胸

癇痛如刀刺。腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣。

發明

桔梗上升。清肺氣利咽喉。爲肺部引經。又能開發皮膚。

故與羌獨柴胡荊蘚輩同爲解表藥。與甘草同爲舟楫之劑。諸藥有此一味。不能下沉也。傷寒邪結胸膈。

則痛如刀刺。邪在中焦。則腹滿腸鳴幽幽。辛甘升發。苦淡降泄。則邪解而氣和矣。其主驚恐悸氣者。心脾。

氣鬱不舒。用以升散之也。朱肱用桔梗治胸中痞滿。總不出本經主治。仲景治寒實結胸。同貝母巴豆取。

其溫中消穀破積也。治肺癰唾膿血。用桔梗甘草。取排膿而清濁氣也。治少陰證二三日咽痛。用甘桔湯。

取其調寒熱通陰氣也。千金治喉痹毒氣。桔梗二兩水煎頓服。加甘草連翹荆防。名如聖湯。通治咽喉

諸病。桔梗有甘苦二種。甘者曰薺。苑。千金治強中爲病。莖長興發不交精出。取其能升解熱邪於上也。又

乾咳嗽。乃痰火之邪鬱在肺中。亦宜甘以潤之。痢疾腹痛。乃肺金之氣鬱在大腸。則宜苦以開之。甘升而

苦降也。此藥升降諸氣。能入肺使諸氣下降。俗泥爲上升而不能下行。失其用矣。痘疹下部不能起發。爲之切忌。以其性升能阻藥力於上。不得下達也。惟陰虛久嗽不宜用。以其通陽泄氣也。其性吐膈。上風熱。寶痰。生研末。白湯調服二三錢。探吐之。

黃精 甘平無毒。勿誤用鈎吻。鈎吻即野葛。葉頭尖有毛鈎子。又名斷腸草。誤服殺人。黃精則莖紫花黃。葉似竹葉也。發明 黃精爲補中宮之勝品。寬中益氣。使五藏調和。肌肉充盛。骨髓堅強。皆是補陰之功。但陽衰陰盛人服之。每致泄瀉痞滿。不可不知。

葳蕤本經名女萎 又名玉竹 甘平無毒。肥白者良。入發散風熱藥生用。入補藥蜜水拌飯上蒸熟用。本經主中風暴熱。不能動搖。趺筋結肉諸不足。久服去面黑點。好顏色。潤澤。輕身不老。發明 萍蕤甘潤性平。滋肺益腎。補而不壅。善調厥陰久襲之風。故本經治中風暴熱等病。皆取其養正祛邪之力也。別錄主心腹結氣。虛熱腰痛。莖中寒。目痛皆爛淚出。甄權主內補不足。去虛勞客熱。頭痛不安。千金治風溫自汗身重。語言難出。萎蕤湯以之爲君。其源本諸麻黃升麻湯。深得仲景之義。時珍用治虛勞寒熱。痞瘧不足之證。用代參耆。不寒不燥。大有殊功。不止於去風熱溫毒而已。又主小便卒淋。發熱口乾。眼黑頭眩。目赤澀痛。其性雖潤。而無傷犯脾胃。尋食泄瀉之虞。但其性之緩耳。

知母 苦甘寒無毒肥白者良鹽酒炒用。本經主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣發明。知母沉降入足少陰氣分及足陽明手足太陰能漏有餘相火理消渴煩蒸。伊景白虎湯酸棗湯皆用之下則潤腎燥而滋陰上則清肺熱而除煩但外感表證未除漏痢燥渴忌之脾胃虛熱人誤服令人作漏減食故虛損大忌近世誤爲滋陰上劑勞瘵神丹因而天枉者多矣本經言除邪氣肢體浮腫是指濕熱水氣而言故下文云下水補不足益氣乃濕熱相火有餘燼灼精氣之候故用此清熱養陰邪熱去則正氣復矣。

肉蓯蓉 甘鹹微溫無毒酒洗去甲及腐切片焙用。本經主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏。強陰益精氣多子婦人癥瘕。發明 肉蓯蓉與瑣陽總是一類味厚性降命門相火不足者宜之峻補精血驟用反動大便滑泄本經主勞傷補中者是火衰不能生土非中氣之本虛也治婦人癥瘕者鹹能更堅而走血分也又蓯蓉止洩精遺瀝除莖中寒熱痛以其能下導虛火也鎖陽治腰膝軟弱以其能溫補精血也總皆滋益相火之驗老人燥結宜煮粥食之但胃氣虛者服之令人嘔吐泄瀉強陽易興而精不固者忌之。

天麻本經名離母一名定風草莖名赤箭辛平微溫無毒濕紙裹煨熟切片用。本經主殺鬼精物蠱毒惡氣久服益氣

力長陰肥健。發明 天麻味辛濃厚性升屬陽爲肝家氣分藥。故肝虛不足風從內生者。天麻葛鷹以補之。諸風掉眩眼黑頭旋風虛內作。非天麻不治。小兒驚癲風熱。服天麻卽消。天麻乃定風草。久服則過身發出紅斑。是驅風之驗也。按天麻性雖不燥。畢竟風劑。若血虛無風。火炎頭痛。口乾便閉者。不可妄投。本經言殺鬼精物蠱毒惡氣者。以其能定風。鎮八方之邪氣也。久服益氣力。長陰肥健者。其性屬陽。陽生則陰長也。

白朮一名山朮 甘溫無毒。○雲朮肥大氣壅。台朮條細力薄。盜國狗頭朮皮赤梢大。然皆栽灌而成。故其氣澀。不若於潛野生者氣清。無壅滯之患。○入諸補氣藥。飯上蒸數次用。入肺胃久嗽藥。蜜水拌蒸。入脾胃痰濕藥。薑汁拌晒。入健脾藥土炒。入瀉痢虛脫藥。炒存性用。入風痹痰濕利水破血藥。俱生用。然非於潛產者。不可生用也。本經主風寒濕痹死肌瘻疽。止汗除熱。消食作煎餌。久服輕身延年不饑。發明
白朮甘溫味厚。陽中之陰可升可降。入脾胃二經。生用則有除濕益燥。消痰利水。治風寒濕痹死肌瘻疽。散腰臍間血。及衝脈爲病。逆氣裏急之功。製熟則有和中補氣。止渴生津。止汗除熱。進飲食安胎之効。本經主風寒濕痹死肌瘻疽者。正以風寒濕三者合而成。痹者拘攣而痛是也。經曰。地之濕氣感則害人皮肉筋骨。死肌者。濕毒侵肌肉也。瘻者。風寒乘虛客於肝脾腎經所致也。疽者。脾胃虛而濕熱瘀滯也。如

上諸證莫不由風寒濕而成。尤有除此三者之功，故能祐其所致之疾也。止汗除濕進食者，濕熱盛則自汗。濕邪客則發熱。濕去則脾胃燥。燥則食自消。汗自止。熱自除矣。又主大風在身而風眩頭痛。目淚出。消痰水。逐皮膚間風水結腫。除心下急滿。及霍亂吐下不止。利腰臍間血。益津緩胃。消穀嗜食。得參苓大補中氣。得枳橘健運飲食。本經言消食作煎餽。留其滓以健運脾氣。食自化矣。仲景五苓散。祖素問澤尤靡衡湯。並用生者。但彼兼麋衡以統血。則汗自止。此兼桂枝以通津。則渴自除。潔古枳朮丸。祖金匱枳實湯。彼用生者以健胃。則逆滿自愈。此用熟者以助脾。則飲食自強。且以荷葉裹飯爲丸。取清震之氣。以鼓冠運之力也。蓋白朮得中宮冲和之氣。補脾胃藥以之爲君。脾土旺則清氣升而精微上。濁氣降而糟粕輸。仲淳有云。白朮稟純陽之土氣。除邪之功勝。而益陰之效虧。故病屬陰虛血少。精不足。內熱骨蒸。口乾脣燥。欬嗽吐痰。吐血。鼻衄齒衄。便閉滯下者。法咸忌之。朮燥腎而閉氣。肝腎有動氣者勿服。劉涓子云。癰疽忌白朮。以其燥腎而閉氣。故反生膿作痛也。凡藏皆屬陰。世人但知白朮能健脾。寧知脾虛而無濕邪者。用之反燥脾家津液。是損脾陰也。何補之有。此最易誤。故特表而出之。

蒼朮本經名

苦辛溫無毒。產茅山者味甘形瘦多毛最良。吳郡諸山者次之。越中大塊辛烈氣燥者爲下。製用糯米泔浸。刮去皮切片。同芝麻炒。或麻油炒通黃。去焦末。或去皮切片。蜜水拌飯上蒸用。又白露

後以泔水淨置屋上晒露一月。謂之神朮。本經主風寒濕痹死肌瘻疽。發明。蒼朮辛烈性溫而燥。可升可降。能徑入諸經。疎泄陽明之濕而安太陰。辟時行惡氣。因經泔浸炒。故能除上濕發汗。與白朮止汗則異。腹中窄狹者須之。本經治風寒濕痹死肌瘻疽等證。總取性專開腠。故能發汗而去風寒濕氣。祛濕而去死肌。瘻疽下氣而消痰食飲癖。又能總解諸變。佐以香附快氣之藥。下氣最速。一升一降。則鬱散而氣平也。脾精不禁。淋濁不止。腰背癰瘍。用以斂脾津。津生於穀氣也。同黃檗爲二妙。治下部濕熱痿腫。又蒼朮一味麻油製過爲末。煮大棗肉爲丸。治脇下飲滯。許叔微患飲滯三十年。始因少年夜坐寫文。左向伏几。是以飲食多墜左邊。飲酒止從左下有聲。脇痛食減嘈雜。飲酒半杯即止。十數日必嘔酸水。暑月左半身絕無汗。服雄附礬石牽牛遂戟等皆無効。自揣必有澼囊。如水之有窠。曰不盈科不行。乃悉屏諸藥。以前丸服三月而疾除。暑月汗亦周身。燈下能書細字。皆蒼朮之力也。然惟素稟肥盛多濕者爲宜。若形瘦多火者禁用。○其神朮已經露製。轉燥爲清。用以發散上部頭風痰濕諸證。故治時行頭痛有神朮湯。此得制度之妙也。

狗脊本經名
百枝苦平微溫無毒。酒浸炒去毛用。本經主腰背強。關機緩急。周痹寒濕膝痛。頗利老人。發明。狗脊爲強筋骨要藥。故本經主腰背強。周痹寒濕等疾。頗利老人者。補益腎氣而堅強筋骨也。其

性味形類與草薢相似。而功用亦不甚相遠。四寶丹用金毛狗脊去毛鹽泥固澱根紅蘇木草薢川烏頭生用等分爲末。醋和丸。溫酒鹽湯下二十九。治男婦毒風脚軟。腎氣虛弱。又病後足腫。煎湯洗効。

貫衆別錄名草鴟頭

苦微寒有毒。

本經主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲。

發明 貫衆苦寒而降。辟時行疫癘不正之氣。疫發之時。以此藥置水食之。則不傳染。且能解毒更堅。治婦人血氣。本經治腹中邪熱氣諸毒。

以其性專散結積諸毒。而蟲積皆由濕熱所生。苦寒能除濕熱。故亦主之。王海藏治夏月痘出不快。快班散用之。云貫衆有毒。而能解腹中邪熱殺三蟲。病從內發者多效。王璆百一選方。冒食鯉魚羹。爲肋骨所鰻。百藥不効。或令以貫衆煎濃汁連進一略而出。可見軟堅之功。不但治瘡治血而已。病人虛寒無實熱者勿服。

巴戟天 辛甘微溫無毒。酒浸去心焙用。川產者良。本經主大風邪氣。陰痿不起。強筋骨。安五藏。補中

增志益氣。

發明 巴戟天嚴冬不凋。腎經血分及衝脈藥也。故守真地黃飲子用之。卽水經治大風邪

氣之謂。以其性補元陽而兼散邪。真元得補。邪安所留。是以可愈大風邪氣也。主陰痿不起。強筋骨。安五藏。補中增志益氣者。脾胃二經得所養。而諸虛自瘳矣。又治脚氣補血海。病人虛寒功用之。有人嗜酒患脚氣甚危。或教以巴戟半兩。糯米同炒去米。大黃一兩炒爲末。熟蜜丸。溫水下七十丸。仍禁酒遂愈。惟陰

虛相火熾盛者禁用。

遠志苗名小草 辛苦溫無毒。甘草湯泡去骨。製過不可陳久。久則油氣耗人喉。本經主欬逆傷中。補不足。除邪氣。利九竅。益智慧。耳目聰明。不忘。強志倍力。久服輕身不老。發明。遠志入足少陰腎經。氣分非心經藥也。專於強志。益精。主夢泄。蓋精與志皆腎所藏。腎氣充。九竅利。智慧生。耳目聰明。邪氣不能為害。腎氣不足。則志氣衰。不能上通於心。故迷惑善忘。不能閉竅封藏。故精氣不固也。小便赤濁。用遠志。甘草。茯神。益智。爲丸。棗湯服。効取其爲陰火之嚮導也。昔人治喉痹失音作痛。遠志末吹之。涎出爲度。取其通腎氣而開竅也。又治婦人血噤失音。及一切癱瘓。揩鼻治腦風。殺烏附毒。惟水虧相火旺者禁服。以其善鼓龍雷之性也。本經言治欬逆傷中。詳遠志性溫助火。非欬逆所宜。當是嘔逆之誤。以其性稟純火氣。通諸竅。竅利則耳目聰明。強志不忘。皆益腎氣之驗。別錄云。去心下膈氣。非嘔逆之類乎。一切陰虛火旺。便濁遺精。喉痹腫痛。慎用。苗名小草。亦能利竅。兼散少陰風氣之結也。

淫羊藿一名仙靈脾

辛溫無毒。羊脂或酒炒用。

本經主陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志。

發明

淫羊藿。手足陽明三焦命門藥也。辛以潤腎。溫以助陽。故本經治陰痿絕傷等證。真陽不足者宜之。堅筋骨。消瘡癩。一切冷風勞氣。筋骨痺急。四肢不仁。補腰膝。強氣力。一味仙靈脾酒。爲偏風不遂之要藥。惟陰

盛走精。強陽不癆禁服。

仙茅。辛溫有毒。忌犯鐵器。酒浸焙乾用。發明。仙茅性熱。補三焦命門之藥。惟陽衰精冷。下元痿弱。老人失溺無子。男子稟賦素虛者宜之。若體壯相火熾盛者服之。反能動火爲害。叵測。按醫說云。一人中仙茅。舌脹出口。漸大與肩齊。以小刀斬之。隨破隨合。斬至百數。始有血一點出。曰可救矣。煮大黃芒硝與服。以藥摻之。應手消縮。此皆火感性淫之人過服之害也。然川產者少。僞充者多。不可不辨。
玄參一名黑參。苦微寒。無毒。反藜蘆。本經主腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。令人明目。發明。

黑參入足少陰腎經。主腎水受傷。真陰失守。孤陽無根。亢而僭逆。咽喉腫痛之專藥。又治傷寒陽毒。汗下不解。發斑咽痛。心下懊憹。煩不得眠。心神顛倒欲絕者俱用。玄參專清上焦氤氳之氣。無根之火。本經治腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。并可清有形熱滯。故消癰癧結核治目赤痛腫。本經又云。補腎氣。令人明目。不特治暴赤腫痛。總皆散結清火之驗也。但其性寒滑。脾虛泄濁者禁用。

地榆。苦澀微寒無毒。去梢酒拌炒黑用。本經主婦人乳產瘻痛。七傷帶下五漏。止痛止汗。除惡肉。療金瘡。發明。地榆入足厥陰。兼行手足陽明。體沉而降。善入下焦理血。本經主乳產瘻痛。七傷帶下五漏者。是指去血過多。肝風內生之象。又云止汗止痛除惡肉。療金瘡者。以其能和血也。若氣虛下陷而崩

帶及久痢。膿血。瘀晦不鮮者。又爲切禁。性能傷胃。誤服多致口噤不食。又諸瘡痛者加地榆。癰者加黃芩。以其能散血熱也。燒灰香油調敷火燙。乃借火氣引散血中之火毒耳。稍專行血不可混用。

丹參 苦平微溫無毒。酒炒用反藜蘆。本經主心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿益氣。發明 丹參氣平而降。心與包絡血分藥也。本經治心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水等疾。皆瘀血內滯而化爲水之候。止煩滿益氣者。瘀積去而煩滿愈。正氣復也。按四物湯治婦人病。不問胎前產後。經水多少。皆可通用。惟一味丹參散。主治與之相同。蓋丹參能破宿血。生新血。安生胎。落死胎。止崩中。帶下。調經脈之神品。然其性長於行血。妊娠無故勿服。大便不實者忌之。

紫參即牡蒙又名童腸○三四月間遍地茸生高三五寸逐層起臺開紫花者是也 苦辛寒無毒。反藜蘆。本經主心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅利大小便。發明 紫參入足厥陰。兼入足太陽陽明血分。故治諸血病。及寒熱血痢。癰腫積塊。卽本經治心腹積聚。寒熱邪氣之謂。瘀血去則九竅利而二便通矣。古方治婦人腸覃。烏喙丸中用牡蒙。卽紫參也。仲景治下痢肺痛用紫參湯。取其散積血也。但市人罕識其真。詳痢下肺痛。皆胸中氣結之故。每以紫菀代之。雖氣味之寒溫不同。疎利之性則一。

紫草 甘鹹寒無毒。色深紫而脆者良。淡紫質堅者曰紫梗。不入藥。本經主心腹邪氣。五癰補中益氣。

利九竅。發明。紫草入心胞絡及肝經血分。其功專於涼血活血。利大小腸。故痘疹欲出未出血。熱毒盛。大便閉澀。色乾枯而毒不得越者。宜之。已出而紫黑便閉者。亦可用。蓋紫草涼血。血涼則毒出。世俗誤以爲宣發之藥非也。若已出而色紅活者。不宜。或白陷及大小便利者。忌之。本經言治心腹邪氣五癥者。乃活血利竅之義。發痘卽活血利竅之大端也。言補中益氣者。營血和。則中氣受益矣。

白頭翁一名野丈人

苦微寒無毒。產齊魯。苗長葉白者力優。生柴胡中短小者力薄。得酒良。本經主溫瘡。

狂狦寒熱。癰癩積聚。癰氣逐血止腹痛。療金瘡。

發明。白頭翁味苦微寒。入手足陽明血分。本經言苦

溫者。傳寫之誤也。其治溫瘡狂狦寒熱等症。皆少陽陽明熱邪固結之病。結散則積血去而腹痛止矣。別錄止鼻衄。弘景止毒痢。亦是熱毒入傷血分之候。仲景治熱痢下重。有白頭翁湯。蓋腎欲堅。急食苦以堅之。痢則下焦虛。故以純苦之劑堅之。男子陰疝偏墜。小兒頭秃鼻衄。及熱毒下痢紫血鮮血。用此並効。但胃虛大便完穀不化。痢久下稀淡血水者勿服。以其苦寒降泄也。

白及 苦辛平微寒無毒。反烏附。

本經主癰腫惡瘡。敗疽傷陰死肌。冒中邪氣。賊風鬼擊。癰緩不收。

發明。白及性潤而收。得秋金之氣。故能入肺止血。生肌治瘡。本經主敗疽傷陰死肌。皆熱壅血傷。冒中邪氣。亦邪熱也。賊風癰緩。皆血分有熱。濕熱傷陰所致也。其治吐血咯血。爲其性斂也。用此爲末。米飲服。

之卽止。試血法。吐水盆內浮者肺血。沉者肝血。半浮半沉者心血。各隨所見。以羊肺肝心煮熟。醤白及末。每日食之。其治金瘡及癰疽方多用之。

三七綱目名山漆
一名金不換

甘微苦溫無毒。

廣產形如人參
者是有節者非

發明 時珍云此藥近時始出南人軍中。用爲金

刃箭瘡要藥。止血散血定痛。爲末。捲之。吐血。衄血。崩中下血。血痢。產後惡血不下。並宜服之。凡杖撲傷損。瘀血淋漓者。隨卽嚼爛罨之。青腫者卽消。若受杖時失服一二錢。則血不衝心。杖後尤宜服之。此陽明厥陰血分之藥。故能治一切血病。獨用研服尤良。取其專力也。一種庭砌栽植者。以苗擣敷腫毒。卽消亦取散血之意。

黃連 苦寒無毒。產川中者中空色正黃。截開分瓣者爲上。雲南水連次之。日本吳楚爲下。治心藏火。生用治肝膽實火。猪膽汁炒。治肝膽虛火。醋炒褐色。治上焦火酒炒。中焦火薑汁炒。下焦火鹽水炒。氣分鬱結肝火。煎吳茱萸湯炒。血分塊中伏火。同乾漆末炒。食積火黃土拌炒。○解附子巴豆輕粉毒。忌豬肉。本經主熱氣目痛。皆傷泣出。明目。腸澼腹痛下痢。婦人陰中腫痛。發明 黃連性寒味苦。氣薄味厚。降多升少。入手少陰厥陰。苦入心寒勝熱。黃連大黃之苦寒。以導心下之實熱。去心竅惡血。仲景九種心下痞。五等漏心湯。皆用之。漏心者。其實漏脾。實則漏其子也。下痢胃口虛熱口噤者。黃連人參煎湯。時時呷。

之如吐再飲但得一呷下咽便好諸苦寒藥多漏惟黃連芩檗性寒而燥能降火去濕止渴病故血痢以之爲君今人但見腸虛滲泄微似有血不顧寒熱多少便用黃連由是多致危殆至於虛冷曰痢及先渴後痢之虛寒證誤用致死者多矣諸痛瘍瘡皆屬心火眼暴赤腫痛不可忍亦屬心火兼挾肝邪俱宜黃連當歸治痢及目爲要藥故本經首言治熱氣目痛及腸澼腹痛之患取苦燥之性以清頭目堅腸胃祛濕熱也婦人陰中腫痛亦是濕熱爲患尤宜以苦燥之古方治痢香連丸用黃連木香斑連散用乾薑黃連佐金丸用黃連吳茱萸治消渴用酒蒸黃連治口瘡用細辛黃連治下血用黃連胡蒜皆是寒因熱用熱因寒用而無偏勝之害然苦寒之劑中病即止豈可使肅殺之令常行而伐生發冲和之氣乎醫經有久服黃連苦參反熱之說此性雖寒其味至苦入胃則先歸於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也近代庸流喜用黃連爲清劑殊不知黃連漏火若虛火而妄投反傷中氣陰火愈逆上無制矣故陰虛煩熱脾虛泄濁五更腎泄婦人產後血虛煩熱小兒痘疹氣虛作濁及行漿後泄濁並皆禁用。

胡黃連苦大寒無毒忌豬肉犯之令人漏精發明胡黃連苦寒而降大伐藏府骨髓邪熱除婦人胎蒸小兒疳熱積氣之峻藥同烏梅止小兒血痢同雞肝治小兒疳眼同豬胰療楊梅瘡毒同乾薑治藥子積皆取伐肝腎熱邪也小兒腎氣本實故可當此若脾胃腎藏不足者服之奪人天元爲害不淺惟徵

瘡用胡黃連。當歸甘草豬脰水酒煎服。二劑輒効。以其直達下焦。善搜淫火之毒也。

黃芩苦寒無毒。中空者爲枯芩。入肺細實者爲子芩。入大腸並煮熟酒炒用。本經主諸熱黃疸。腸澼泄利。逐水下血閉。治惡瘡疽蝕火瘍。發明黃芩苦燥而堅腸胃。故濕熱黃疸。腸澼。瘧痢爲必用之藥。其枯芩性升。入手太陰經。清肌表之熱。條芩性降。瀉肝膽大腸之火。除胃中熱。得酒炒上行。主膈上諸熱。得芍藥甘草。治下痢膿血。腹痛後重身熱。佐黃連治諸瘡痛不可忍。同黑參治喉間腥臭。助白朮安胎。蓋黃芩能清熱涼血。白朮能補脾統血也。此惟胎熱升動不寧者宜之。胎寒下墜及食少便溏者慎毋混用。丹溪言黃芩治三焦火。仲景治傷寒少陽證。用小柴胡湯。汗下不解。胸滿心煩。用柴胡桂枝湯。溫病用黃芩湯。太陽少陽合病。用葛根黃芩黃連湯。心下痞滿。用瀉心湯。寒格吐逆。用乾薑黃芩黃連人參湯等方。皆用黃芩以治表裏諸熱。使邪從小腸而泄。皆本經主諸熱之綱旨。其黃疸腸澼。瀉痢之治。取苦寒以去濕熱也。逐水下血閉者。火鬱血熱之所致。火降則血行。水下而閉自通矣。昔人以柴胡去熱不及黃芩。蓋柴胡專主少陽往來寒熱。少陽爲樞。非柴胡不能宣通中外。黃芩專主陽明蒸熱。陽明居中。非黃芩不能開泄蘊熱。一主風木客邪。一主濕土蘊著。訛可混論。芩雖苦寒。畢竟治標之藥。惟軀殼熱者宜之。若陰虛伏熱。虛陽發露。可輕試乎。其條實者兼行衝脈。治血熱妄行。古方有一味子芩丸。治女人血熱。經水暴下。

不止者最効。若血虛發熱。腎虛挾寒。及妊娠胎寒下墜。脈遲小弱。皆不可用。以其苦寒而伐生發之氣也。
秦艽 苦平微溫無毒。雷公云。左文列爲秦。治濕病。右文列爲艽。發脚氣。今藥肆多右文者。慎勿混用。
本經主寒熱邪氣。寒濕風痹。肢節痛。下水利小便。 發明 秦艽陰中微陽。可升可降。入手足陽明。以其去濕也。兼入肝膽。以其治風也。故手足不遂。黃疸。酒毒。及婦人帶疾。須之。陽明有濕。則身體瘦痛。肢節煩疼。及攀急不遂。有熱則日晡潮熱。用以祛風勝濕。則愈。凡痛有寒熱。或浮腫者。多挾客邪。用此以祛風利濕。方爲合劑。故本經治寒熱邪氣。寒濕風痹。肢節痛等證。若久痛虛羸。血氣不能營養肢體。而痛及下體虛寒。瘦瘥枯瘦等病。而小便清利者。咸非秦艽所宜。今庸師喜用秦艽。且不辨左文右文。凡遇痛證。動輒用之。失其旨矣。

柴胡卽茈 苦平無毒。入解表藥。生用清肝炒熟用。本經主心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。明目益精。發明 柴胡能引清陽之氣。從左上升。足少陽膽經之藥。膽爲清淨之府。無出無入。禁汗吐下。惟宜和解。以其經居半表半裏。本經治心腹腸胃結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。使清陽之氣上升。而胃中留結宿滯。亦得解散矣。仲景治傷寒寒熱往來。脇痛耳聾。婦人熱入血室。皆爲必用。小兒五疳羸熱。諸瘡寒熱。咸宜用之。痘疹見點後。有寒熱。或脇下疼痛。於透表藥內用之。不使熱留少陽經中。則將來

無咬牙之患。虛勞寒熱多有可用者。勞有五勞。病在五藏。若勞在肝膽心包絡有熱。或少陽經寒熱。則柴胡爲必用藥。勞在脾胃有熱。或陽氣下陷。則柴胡乃引清氣退熱之藥。惟勞在肺腎者不可用。東垣補中益氣用之者。乃引肝膽清陽之氣上行。兼升達參耆之力耳。瘡疽用之者。散諸經血結氣聚也。今人以細者名小柴胡。不知小柴胡乃湯名也。若大柴胡湯而用銀州者可乎。按柴胡爲少陽經藥。病在太陽服之太早。則引寇入門。病在陰經用之。則重傷其表。誤人不可勝數。其性升發。病人虛而氣升者忌之。嘔吐及陰火炎上者勿服。若陰虛骨蒸服之。助其虛陽上逆。勢必耗盡真陰而後已。奈何操司命之權者。多所未悟也。

銀柴胡 甘微寒無毒。銀州者良。今延安府五原城所產者長尺餘。肥白而軟。北地產者如前胡而軟。今人謂之北柴胡。勿令犯火。犯火則不效。發明 銀柴胡行足陽明少陰。其性味與石斛不甚相遠。不獨清熱。兼能涼血。和劑局方治上下諸血。龍腦雞蘇丸中用之。凡入虛勞方中。惟銀州者爲宜。若用北柴胡升動虛陽。發熱喘嗽。愈無寧宇。可不辨而混用乎。按柴胡條下本經推陳致新。明目益精。皆指銀夏者而言。非北柴胡所能也。

前胡 苦微寒無毒。甄權曰。甘辛平無毒。白色者良。去尾用。發明 前胡入手足太陰陽明少陽。其功

長於下氣。故能治痰熱喘嗽宿膈諸疾。氣下則火降。痰亦降矣。爲痰氣之要味。治傷寒寒熱及時氣內外俱熱。按二胡通爲風藥。但柴胡主升。前胡主降。有不同耳。又按前胡治氣實風痰。凡陰虛火動之風痰。及不因外感而有痰者禁用。

防風。甘辛溫無毒。叉頭者令人煩喘。叉尾者發人痼疾。本經主大風頭眩痛。惡風風邪。目盲無所見。風行周身。骨節疼痛。發明。防風浮而升陽也。入手太陽陽明。少陽厥陰。兼通足太陽。治風去濕之仙藥。以風能勝濕也。其治大風頭眩痛。惡風風邪等病。其性上行。故治上盛風邪。瀉肺寶喘滿。及周身痹痛。四肢攀急。目盲無所見。風眼冷淚。總不出本經主治也。防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。風藥中潤劑也。若補脾胃。非此引用不能行。蓋於土中瀉木也。凡脊痛頸強。不可回顧。腰似折。項似拔者。乃手足太陽證。正當用之。凡瘡在胸膈已上者。雖無手足太陽證。亦當用防風爲能散結。去上部風熱也。經驗方治婦人風入胞門崩中不止。獨聖散用一味防風麪糊酒調丸服。然惟血色清稀。而脈浮弦者爲宜。如血色濃赤。脈來數者。又屬一味子芩丸證。不可混也。惟肺虛有汗喘乏。及氣升作嘔。火升發嗽。陰虛盜汗。陽虛自汗者勿服。婦人產後血虛發癰。嬰兒漏後脾虛發搐。咸爲切禁。

獨活。辛苦微溫無毒。香而紫黑者真。本經主風寒所擊。金瘡止痛。奔豚癆。女子疝瘕。發明。獨

活不搖風而治風。浮萍不沈水而治水。因其所勝而爲製也。本經治金瘡爲風寒所擊而痛及賣豚癰瘻。女子疝瘕皆邪風內賊之候。獨活生益州。較羌活其氣稍細。升中有降。能通達周身。而散風勝濕。與細辛同用。治厥陰頭痛目眩。又足少陰經伏風頭痛。兩足濕痺不能動止者。非此不治。甄權以獨活治諸風濕冷。奔喘逆氣。皮膚枯瘠。手足攀痛。勞損風毒齒痛。皆風濕相搏之病也。但氣血虛而遍身痛。及陰虛下體瘦弱者禁用。南方無剛猛之風。一切虛風類中。咸非獨活所宜。

羌活 苦辛溫無毒。香而色紫者良。發明 羌活生於羌胡。雍州隴西。西川皆有之。治足太陽風濕相搏。一身盡痛。頭痛肢節痛。目赤膚癢。乃却亂反正之主帥。督脈爲病。脊強而厥者。非此不能除。甄權以羌活治賊風失音不語多癢。手足不遂。口面喎斜。瘡疥血癩。皆風中血脈之病也。蘇恭曰。療風宜用獨活。兼水宜用羌活。風能勝濕。故羌活能治水濕。與芎藭同用。治太陽厥陰頭痛。發汗散表。透關利節。非時感冒之仙藥也。但內傷元氣血虛頭痛。及遍身肢節痛。皆非所宜。昔人治勞力感寒。於補中益氣湯中用之。深得補中寓瀉之意。

升麻 甘苦平無毒。忌見火。鮮者苦毒。本經辟瘟疫瘴氣。邪氣蠱毒。入口皆吐出。中惡腹痛。時氣毒癘。頭痛。寒熱風腫諸毒。喉痛口瘡。發明 升麻能引清氣上升。足陽明本藥也。本經治疫瘴蠱毒。取性升

上行也。治中惡腹痛。取開發胃氣也。治喉癰口瘡者。取升散少陽陽明火熱也。同葛根則發散陽明風邪。同柴胡則升提胃中清氣。引甘溫之藥上升。故元氣下陷者。用此於陰中升陽。以緩帶脈之縮急。凡胃虛傷冷。鬱遏陽氣於脾土。宜升麻葛根以升散其火鬱。故補脾胃藥。非此引用不効。脾痹非此不除。升麻葛根湯。乃陽明發散藥。若初病太陽便服之。發動其邪。必傳陽明。反成其害也。又升麻葛根能發痘。惟初發熱時可用。見點後忌服。爲其氣升。發動熱毒於上。爲害莫測。而癰瘍尤爲切禁。誤投喘滿立至。按升麻屬陽性。力能扶助陽氣。捍禦陰邪。故於淋帶漏痢脫肛方用之。取其升舉清陽於上也。古方治噤口痢。用醋炒升麻。引人參蓮肉。扶胃進食。大有神効。凡上盛下虛。吐血衄血。欬嗽多痰。陰虛火動。氣逆嘔吐。怔忡癲狂諸證。皆在所禁。

苦參 苦寒無毒。反藜蘆。本經主心腹結氣。癥瘕積聚黃疸。溺有餘瀝。逐水除癰腫。補中明目止淚。發明。苦參黃檗之苦寒下降。皆能益腎。蓋取其苦燥濕寒除熱也。熱生風。濕生蟲。故又能治風殺蟲。惟腎水燥而相火勝者宜之。若脾胃虛而飲食減少。肝腎虛而火衰精冷。及年高之人。不可用也。久服苦參。多致腰重。因其性降而不升也。觀本經主治。皆濕熱爲患之病。詳補中當是補陰之誤。以其能除濕熱。濕熱去而陰自復。目自明矣。然惟濕熱者宜之。沈存中苦腰重。久坐不能行。此因病齒痛數年。用苦參揩齒。

其氣味入齒傷腎所致也。後施昭先亦用苦參揩齒歲久亦病腰重。自後悉不用之。腰疾皆愈。或云苦參既能補陰明目。何久服反病腰重乎。殊不知苦寒之性。直入心腎。內有濕熱者足以當之。始得之則有輔陰祛邪之力。清熱明目之功。濕熱既去。而又服之。必致苦寒傷腎。腰重脚弱。在所不免。理固然也。何疑之有。

白蘚皮一名白羊鮮 苦鹹寒無毒。本經主頭風黃痺。欬逆淋瀝。女子陰中腫痛。濕痹死肌。不可屈伸。起止行步。發明。白蘚皮氣寒善行。味苦性燥。足太陰陽明經去風濕熱藥也。兼入手太陰陽明爲諸黃風癆要藥。本經所主。皆風濕熱邪。蘊釀經中之病。千金治嬰兒風癆。熱則生風。胸中有痰。白羊鮮湯取其善祛風熱也。世醫祇施之於瘡科。淺矣。下部虛寒之人。雖有濕證勿用。

延胡索即玄胡索 苦辛溫無毒。上部酒炒。中部醋炒。下部鹽水炒。發明。延胡索色黃入脾胃。能活血止痛。治小便溺血。得五靈脂同入肝經。散血破滯。炮炙論曰。心痛欲死。急覓延胡。以其能散胃脘氣血滯痛也。蓋當歸芍藥調腹中血虛痛。延胡五靈治胸腹血滯痛。又延胡善行血中氣滯。氣中血滯。與當歸桂心治一身上下諸痛。及經癸不調。產後血虛而暈。咸非所宜。宜之。若經事先期虛而崩漏。產後血虛而暈。咸非所宜。

貝母。甘苦平微寒無毒。反烏頭川者味甘最佳。西者味薄。次之象山者微苦。又次之一種大而苦者。僅能解毒。並去心用。凡肺經藥皆當去心。不獨貝母也。其獨顆無瓣者名丹龍睛。誤服令人筋不收持。本經主傷寒煩熱。淋瀝邪氣。痘痕喉癰乳難金瘡風癰。發明。貝母乃手太陰肺經氣分藥。兼入手少陰心經。一名蠶。鄒風言采其蠶。善解心胸鬱結之氣。故詩人以此寓焉。肺受心包火乘。因而生痰。或爲邪熱所干。喘嗽煩悶。非此莫治。詳本經主傷寒煩熱者。甘寒能解煩熱也。淋瀝者。熱結二腸也。清心肺鬱熱。而淋瀝通矣。痘痕者。足厥陰之邪干手厥陰也。經曰。診得心脈搏滑急。爲心痘。少腹當有形也。喉癰者。熱鬱結於上也。經云一陰一陽結。謂之喉癰。心主三焦之脈。皆絡於喉也。則難者。鬱熱結於手足厥陰也。風癰者。金瘡熱鬱生風而成癰。總取解散鬱結之邪也。仲景治傷寒寒實結胸外無熱證者。小陷胸湯主之。白散亦可。一方一主。熱痰內結。一主寒實內積。雖同一例。治不可混也。俗以半夏性燥。用貝母代之。不知貝母寒潤。治肺家燥痰。痰因鬱結者宜之。半夏性燥。治脾胃濕痰。痰因濕滯者宜之。二者天淵。何可代用。若虛勞欬嗽。吐血咯血。肺痿肺癰。癰疽及諸鬱火證。半夏乃禁忌。皆貝母爲嚮導也。至於脾胃濕熱涎化爲痰。久則生火。生痰。上攻昏憤。僵仆蹇滯諸證。生死旦夕。豈貝母可治乎。浙產者治痘痕喉癰乳難金瘡風癰。一切癰瘍。又同苦參當歸。治妊娠小便難。同青黛治人面惡瘡。同連翹治項上結核。皆取其開鬱散結。

化瘀解毒之功也。

山慈姑金燈花根也。九月開花朱色。
與葉不相見故又名無葉草

甘微辛小毒。發明。

山慈姑攻堅解毒。治癰腫瘡瘍。瘰疬結核。

等證。紫金錠用之亦是解諸毒耳。丹方治面上瘢痕。用山慈姑末和輕粉硼砂末各少許。先用鹹水筆塗患處。次捲上藥。太乙膏蓋。日易一次。俟疣瘡消盡後。以鷹屎白蜜陀僧末蜜水調護。數日勿見風日。效惟眼胞上者不可治。以其眵動不斂也。

白茅根一名地筋

甘寒無毒。與百脈根相類。百脈根出巴西。他處罕得。

本經主勞傷虛羸補中益氣除瘀

血。血閉寒熱利小便。發明。甘寒能降。除伏熱利小便止渴。治傷寒呃逆喘噦。主吐衄便濁諸血。治黃

疸水腫。胃反上氣。五淋癰熱。及痘瘡乾紫不起。但嘔逆吐衄。亦有因於寒者。即非所宜。本經主治勞傷虛

羸者。以甘寒能滋虛熱。而無傷犯胃氣之虞也。言補中益氣。胃熱去而中氣復。是指客邪入傷中州。漸成

虛羸而言。非勞傷本病所宜。昔人攷本草功用。言白茅根與百脈根相類。今肅州不行歲貢。百脈根無從

可得。而止渴去熱之用。白茅根裕如也。其茅花甘溫。色白輕虛。力能上升入肺。散熱止衄。屋上敗茅研傅斑瘡濕爛。取其收濕之力也。

草龍膽 苦澗大寒小毒。去蘆或酒炒。或甘草湯浸一宿用。凡用勿空腹服。令人小便不禁。本經主骨

間寒熱蠶癧邪氣續絕傷定五藏殺蟲毒。發明草龍膽苦寒沉降。主肝經邪熱。下焦濕熱。酒燙黃腫目病赤腫瘀肉。小兒肝氣去腸中小蟲。蓋肝膽濕熱。取苦寒以瀉之時珍曰。相火寄在肝膽。有瀉無補。故瀉肝膽之熱。正益肝膽之氣。但大苦大寒。過傷胃中生發之氣。反助火邪。亦如久服黃連。反從火化之義。本經主骨間寒熱。是指熱傷腎水而言。熱極生風。則發驚搐。重則變爲癲癇。濕熱邪氣之在中下二焦者。非此不除。以其專伐肝膽之邪也。肝膽之邪去。而五藏安和。經脈之絕傷續矣。殺蟲毒者。去濕熱之患也。凡胃氣虛人服之必嘔。脾虛人服之必瀉。雖有濕熱。慎勿輕用。

細辛 辛溫無毒。產華陰及遼東者良。反藜蘆。本經主欬逆頭痛腦痛。百節拘攣。風濕痹痛死肌。明目利九竅。發明 細辛辛溫上升。入手足厥陰少陰血分。治督脈爲病脊強而厥。本經治欬逆頭痛腦痛。善搜厥陰伏匿之邪也。獨活爲使。治少陰頭痛如神。亦主諸陽頭痛。諸風藥用之。治風濕痹痛。百節拘攣。去死肌明目者。取辛以散結。而開經脈竅隧之邪也。味辛而熱。溫少陰之經。故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯。辛溫能散。故凡風寒風濕頭痛口瘡喉痹齦齒諸病用之。取其能散浮熱。亦火鬱發之之義也。辛能泄肺。故風寒欬嗽上氣者宜之。辛能補肝。故膽氣不足。則肝氣有餘。驚癲眼目諸病宜之。辛能潤燥。故通少陰諸經。及耳竅閉塞者宜之。又主痰結濕火鼻塞不利。凡口舌生瘡者。用細辛黃連末摻之。凡血虛

內熱火鬱頭痛。發熱欬嗽者戒用。以其辛烈耗散真氣也。細辛之極者用不過五分。

杜衡俗名馬蹄香
又名杜葵

辛溫無毒。

發明

杜衡香竄與細辛相似。故藥肆以之代充細辛。亦能散頭目風

寒。下氣消痰。行水破血。但其氣濁。不能搜滌少陰經中之寒。稍遜細辛一籌耳。

白微

苦鹹平無毒。

本經主暴中風。身熱肢滿。忽不知人。狂惑邪氣。寒熱痰癆。溫瘡洗洗。發作有時。

發明

白微鹹平降泄。抑陽扶陰。爲足陽明經本藥。兼行足少陰手太陰。本經主暴中風。身熱肢滿。是熱

鬱生風。痰隨火湧。故令忽不知人。狂惑邪氣。寒熱痰癆。皆熱邪所致。溫瘡乃冬時伏邪。至春而發。繆氏

經疏言。暑邪所傷。秋必發爲溫瘡。恐非經旨。別錄療傷中淋露者。女子傷犯陰中營血。而成淋露之疾。用

以除熱益陰。則前證瘳矣。下水氣利陰氣者。總取益陰之功。真陰益而邪水下。性善降泄。故久服利人。

金匱治婦人產中虛煩嘔逆。安中益氣。竹皮丸中用之。千金治風溫發汗後。身灼熱。自汗身重多眠。鼻息必

鼾。語言難出。萎蕤湯中用之。又治婦人遺尿。不拘胎前產後。有白微芍藥湯。取其有補陰之功。而兼行手

太陰。以清膀胱之上原。殊非虛寒不禁之比也。古方多用治婦人者。以別錄有療傷中淋露之功也。凡胃

虛少食泄渴。及喘欬多汗。陽氣外泄者禁用。

白前 甘辛微溫無毒。

發明

時珍曰。白前入手太陰。長於降氣。肺氣壅實而有痰者宜之。金匱治欬

嗽而脈沉者用澤瀉湯以中有白前也。深師治久嗽上氣體腫短氣倚息不得臥常作水雞聲者用白前湯外臺治久嗽吐血用白前桔梗桑白皮甘草皆取其下氣耳。若虛嗽常哽氣者不可用也。白前較白微稍溫較細辛稍平專搜肺竅中風水非若白微之鹹寒專泄肺胃之燥熱亦不似細辛之辛竄能治腎肝之沉寒也。

本經逢原卷一終

長洲石頑張 瑞路玉父纂述

芳草部

當歸 甘辛溫無毒。蜀產者力剛可攻。秦產者力柔可補。凡治本病酒制有瘀薑汁制白者爲粉歸。性劣不入補劑。本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱。灑灑在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍。金瘡。煮汁飲之。發明。當歸氣味俱厚。可升可降。入手少陰足太陰厥陰血分。凡血受病及諸病夜甚。必須用之。本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱。洒洒。婦人漏下絕子。皆取辛溫潤血之功。產後惡血。上衝亦必用之。別錄溫中止痛。甄權治下痢腹痛。女人瀝血腰痛。好古治衝脈爲病。逆氣壅急。帶脈爲病。腹痛。腰溶溶若坐水中。其功專於破惡血。養新血。潤腸胃。榮筋骨。澤皮膚。理癰疽。排膿止痛。蓋血壅而不流則痛。當歸甘溫。能和營血。辛溫能散內寒。使氣血各有所歸。入手少陰心主血也。入足太陰脾裏血也。身能養血。尾能行血。同人參黃耆。則補氣而生血。同牽牛大黃。則行氣而瀉血。同桂附吳萸。則熱。同大黃芒硝。則寒。血虛以人參赤脂爲佐。血熱以生地條芩爲佐。仲景治陽邪陷陰。手足厥寒。脈細欲絕。用當歸四逆湯。於桂枝湯加當歸細辛通草。以通其血脉。即下痢脈大。氣不歸附。亦用此湯以歸附之。凡血虛發熱者。宜當歸桂枝湯加當歸細辛通草。以通其血脉。即下痢脈大。氣不歸附。亦用此湯以歸附之。凡血虛發熱者。宜當歸。

補血湯。方用當歸三錢。黃耆一兩。作三服。心下刺痛者。一味當歸酒煎服。專主血分諸病。海藏言。當歸血藥。何本經治歟。逆上氣。按當歸辛散。乃血中氣藥。故歟逆上氣。有陰虛陽無所附者。用血藥補陰。則血和而氣降矣。凡衝任督帶病。皆不可少。惟泄瀉家痰飲家禁用。

芎藾綱目名川芎

辛溫無毒。蜀產者味辛而甘爲上。他處產者氣味辛烈爲下。反藜蘆。葉名蘆薈。本經主

中風入腦頭痛。寒痹筋攣緩急。金瘡。婦人血閉無子。發明。芎藾辛溫上升入肝經。行衝脈。血中理氣藥也。故本經治中風入腦頭痛等證。取其辛散血分諸邪也。好古言。搜肝氣補肝血。潤肝燥補風虛。又治一切風氣血氣及面上遊風目疾多淚。上行頭目下行血海。故四物湯用之者。皆搜肝經之風。治少陽厥陰頭痛。及血虛頭痛之聖藥。助清陽之氣。去濕氣在頭頭痛必用之藥。血痢已通而痛不止。乃陰虧氣鬱藥中加芎藾。氣行血調。其痛立止。靈苑方驗胎法。以生芎藾末艾湯服一錢。七腹中微動者爲胎。千金方治子死腹中。以芎藾末酒調方寸匙。須臾二三服立出。凡骨蒸盜汗。陰虛火炎。歟嗽吐逆。及氣弱之人。不可服。其性辛散。令真氣走泄而陰愈虛也。

撫芎。辛溫無毒。產江左撫州。中心有孔者是。發明。撫芎升散專於開鬱寬胸。通行經絡。鬱在中焦。則胸膈痞滿作痛。須撫芎開提其氣以升之。氣升則鬱自降。故撫芎總解諸鬱。直達三焦。爲通陰陽氣血。

之便。然久服耗氣令人暴亡。

蛇牀 苦辛溫無毒。本經主男子陰痿濕癰。婦人陰中腫痛。除痹氣。利關節。癩癧惡瘡。發明 蛇床辛香性溫。專入右腎命門。少陽三焦氣分。本經列之上品。不獨助男子壯火。且能散婦人鬱抑。非妙達本經精義。不能得從治之法也。但腎火易動。陽強精不固者勿服。

藁本 辛苦溫無毒。香而燥者。更臭而潤者勿用。本經主婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急除風頭痛。長肌膚。悅顏色。發明 藁本性升屬陽。爲足太陽寒鬱經中頭項顛頂痛。及大寒犯腦。連齒頬痛之專藥。女人陰腫疝疼。督脈爲病。脊強而厥。亦多用之。霧露之邪。中於上焦。須兼木香。風客於胃泄瀉。脾胃藥中。宜加用之。今人只知藁本爲治顛頂頭腦之藥。而本經治婦人疝瘕。腹中急陰中寒等證。皆太陽經寒濕爲病。亦屬客邪內犯之候。故用藁本去風除濕。則中外之疾皆痊。豈特除風頭痛而已哉。云長肌肉悅顏色者。外用作面脂之類是也。但頭痛挾內熱。春夏溫病熱病。頭痛口渴。及產後血虛火炎頭痛。皆不可服。
白芷 卽都梁香 苦溫無毒。本經主女人漏下赤白。血閉陰腫。寒熱頭風。侵目淚出。長肌膚。潤澤顏色。可作面脂。發明 白芷辛香升發。行手陽明。性溫氣厚。行足陽明。芳香上達。入手太陰。爲解利陽明風熱。頭痛。及寒熱頭風。侵目淚出之要藥。其所主之病。不離三經。如寒熱頭風。眉稜骨痛。頭目齒痛。三經之風。

熱也。漏下赤白癰疽。頭面皮膚風癆燥癢。三經之濕熱也。風熱者辛以散之。濕熱者溫以除之。都梁丸治崩漏赤白。深得本經之旨。性善祛風。女人漏下赤白。皆風入胞門所致。辛香入脾。故又能溫散血閉陰腫及寒熱頭風。侵目淚出。總取辛散利竅之功。其長肌膚潤澤顏色者。則有排膿長肉之力。所以外科用之。痘疹起脹。連皮腫者。於解毒藥內用之。預杜將來發癟之患。今人用治腸癰。有敗膿淋露不已。腥穢殊甚。遂致臍腹冷痛。須此排膿膿盡。乃以他藥補之。燒烟辟蟲蛇。爲末新汲水調頻灌。解蛇毒內攻。和臍礬麝香。捲蛇傷潰爛。但性溫而升。味苦而散。故嘔吐因於熱者。漏下赤白因於火者。勿用。癰疽潰後。亦宜漸減。以其能耗胃氣也。

白芍藥。酸苦平微寒無毒。入補脾藥酒炒。入止血藥醋炒。入和營藥。及下痢後重。血熱癰毒藥。並酒洗生用。入血虛水腫腹脹藥。桂酒制用。反藜蘆。本經主邪氣腹痛。除血痹。利小便。益氣。發明。白芍藥酸寒。斂津液而護營血。收陰氣而瀉邪熱。蓋瀉肝之邪熱。所以補脾之陰。卽本經主邪氣腹痛益氣之謂。故仲景以爲補營首藥。入肝脾血分。及陽維寒帶脈腹痛。補中下二焦。能於土中瀉水。爲血痢必用之藥。然須兼桂用之。方得斂中寓散之義。建中湯之妙用。人所不知。蓋瀉痢皆太陰之病。建中專主太陰腹痛也。其治血痹。黃耆桂枝五物湯中用之。非深達本經妙理者不能也。又得炙甘草治腹中急痛。同白朮

補脾同芎薑瀉肝。從人參補血虛。從黃連止瀉痢。同薑棗溫經散濕。在用者各得其宜耳。凡人陽氣虛衰。陰氣散漫。患腹脹滿急。於補中益氣藥中加白芍藥一味。以收陰。則陽虛不受陰制之脹。待陽藥便消矣。然氣虛內寒者不可用。古云減芍藥以避中寒。誠不可忽。產後不可用。以其酸寒瀉肝。伐生發之氣也。小便不利者禁用。以膀胱得酸收斂愈祕也。而真武湯中又用以利小便者。深得本經之旨。蓋真武湯本治少陰精傷。而證見虛寒。非太陽膀胱經閉之候。以其能益陰滋血。培養津液。小便自行。非通利也。至於桂枝湯中用以護營血。使邪不得內犯。建中湯中用以培土藏。而治陽邪內陷腹痛。此皆仲景用藥之微妙。端不外本經之義。其除血癆。破堅積。治寒熱痼瘕。止痛利小便。皆指赤者而言。與白芍無預。因本經未分赤白。故一貫例之。

赤芍藥 酸苦微寒無毒。酒洗用。本經除血癆。破堅積。寒熱痼瘕。止痛利小便。發明 赤芍藥性專下氣。故止痛不減當歸。蘇恭以爲赤者。利小便下氣。白者止痛和血。端不出本經除血癆。破堅積。止痛利小便之旨。其主寒熱痼瘕者。善行血中之滯也。故有瘀血留著作痛者宜之。非若白者酸寒收斂也。其治血癆利小便之功。赤白皆得應用。要在配合之神。乃著奇勳耳。

牡丹皮 苦辛平無毒。酒洗去鹹土。曝乾勿見火。本經主寒熱中風瘻癰。驚癲邪氣。除癥堅癥。血留舍

腸胃五藏癰癧瘡

發明

牡丹皮入手足少陰厥陰治血中伏火故相火勝腎無汗骨蒸爲專藥本經

主寒熱中風癲癇癰癧瘡等證以其味辛氣竄能開發陷伏之邪外散惟自汗多者勿用爲能走泄津液也。痘疹初起勿用爲其性專散血不無根脚散闊之慮王安道云志不足者足少陰病也故仲景腎氣丸用之後人惟知黃柏治相火不知丹皮之功更勝也又癥堅瘀血留舍腸胃五藏及陰虛吐血衄血必用之藥以能行瘀血而又能安好血有破穢生新引血歸經之功故犀角地黃湯用之凡婦人血崩及經行過期不淨屬虛寒者禁用又赤者利血白兼補氣亦如赤白芍藥之義諸家言其性寒安有辛香而寒者乎。木香 辛苦溫無毒形如枯骨味苦色淡黃者良味鹹色黑勿用生用理氣煨熟止漏本經主邪氣辟疫強志止淋露 發明 木香氣香味厚不獨沉而下降蓋能理胃以下氣滯乃三焦氣分之藥兼入肺脾肝三經能升降諸氣故上焦氣滯腹鬱宜之者金鬱則泄之也然雖入肺而肺燥氣上者良非所宜其中焦氣滯不運宜之者脾胃喜芳香也下焦氣滯後重宜之者塞者通之也若治中脘氣滯不運心腹疼痛以檳榔佐之便氣下則結痛下散矣本經辟疫毒邪氣強志止淋露以其辛燥助陽善開陰經伏匿之邪大明治心腹一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂瀉痢健脾消食安胎甄權治九種心痛積年冷氣痃癖癰塊脹痛壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺痛不可忍然香燥而偏於陽肺虛有熱血枯而燥及陰火

衝上者勿服。

甘松香。甘溫無毒。發明。甘松芳香升竄。能開脾鬱。少加脾胃藥中。甚醒脾氣。主惡氣卒心腹痛滿。風瘡齒齦。得白芷白附子良。脚氣膝腫。煎湯淋洗效。一

山柰。辛溫無毒。發明。山柰芳香入陽明緩胃。辟瘴癘惡氣。治心腹冷氣痛。寒濕霍亂。風蟲牙痛。皆芳香正氣之力也。

高良薑。辛大溫無毒。煨熟用。子名紅荳蔻。發明。良薑辛熱。純陽上升。入足陽明太陰二經。爲客寒所犯。則逆冷霍亂。腹痛諸病生焉。辛溫暖脾胃而逐寒邪。則胃中冷逆自除。霍亂腹痛自愈。甄權治腹內久冷氣痛。去風冷痺弱。大明主轉筋瀉利反胃。解酒毒消食。蘇頌治惡心嘔清水。皆取暖胃溫中散寒之功也。而寒疝小腹掣痛。須同茴香用之。產後下焦虛寒。瘀血不行。小腹結痛者。功用之。若胃火作嘔。傷暑霍亂禁用。爲其溫燥也。○紅荳蔻辛溫。主水瀉霍亂。心腹絞痛。止嘔逆。食大補命門相火。故正元丹中用之。然能動火。傷目致衄。不宜久服。

草豆蔻。辛溫無毒。麪裹煨熟去麪用。發明。草豆蔻性溫。入脾胃二經。東垣曰。風寒客邪。在胃口之上。當心疼痛者。宜之。丹溪曰。草豆蔻性溫。能散滯氣。若明知口食寒物。胃脘作疼。或濕鬱成病者。用之。

神效。若熱鬱者不可用。恐積溫成熱也。然多用能助脾熱。傷肺損目。故陰虛血燥者忌之。

草果亦名豆蔻 辛溫濁無毒。去殼生用。
發明 草果與草豆蔻總是一類。其草果治病取其辛熱浮散能入太陰陽明。除寒燥濕。開變化食利膈上痰。解麴濕魚肉諸毒。與知母同用治瘴瘧寒熱。取其一陰一陽。無偏勝之害。蓋草果治太陰獨勝之寒。知母治陽明獨勝之火也。然瘧亦有不由於風瘴氣而實邪不盛者。忌服。凡濕熱癰滯傷暑暴注。溲赤口乾者禁用。

白豆蔻俗名蔻 辛溫無毒。忌見火去淨隔膜。不爾令人隔滿。凡草果草豆蔻縮砂皆然。不獨白豆蔻也。
發明 白豆蔻辛香上升。入肺脾二經。散肺中滯氣。治脾虛瘧疾。嘔吐寒熱能消能磨。流行三焦營衛。一轉諸證自平。古方治胃冷積氣嘔逆反胃。消穀下氣。寬膈進食解酒毒。皆相宜也。若火升作嘔。蘊熱作痛者勿服。

縮砂密俗名砂仁 辛溫濁無毒。
發明 縮砂屬土。醒脾調胃。爲脾胃肺腎大小腸膀胱七經之氣藥。能引諸藥歸宿丹田。治脾虛泄瀉宿食不消。漏痢白沫。腹中虛痛。寒飲脹痞。噎膈嘔吐。和中行氣止痛安胎。用之悉效。同熟地茯苓納氣歸腎。同檀香豆蔻下氣安肺。得陳皮白朮和氣益脾。惟新產婦忌之。恐氣驟行。動血也。今人治血痢亦多用之。若積欲盡時。更非所宜。又血虛火炎。欬嗽禁用。妊娠氣滯者宜服。若氣虛。

者多服反耗其氣。多致難產。南人性喜條暢。食品每多用之。北人性喜潛藏。藥中亦罕用者。

益智子 辛溫無毒。去殼鹽水炒用。發明 益智行陽退陰。三焦命門氣弱者宜之。脾主智。此物能益脾胃。理元氣。補腎虛滑精。胃虛多唾。女人崩漏。治心氣不足。夢泄。夜多小便。及冷氣腹痛。於土中益火也。集驗方縮泉丸。治脬氣不足。方用益智子鹽炒去鹽。與烏藥等分爲末。酒煮山藥粉爲糊丸。如梧子大。空心鹽湯下七十丸。丹方治夜多小便。取二十四枚。入鹽同煎。服之有驗。按益智功專補火。如血燥有火。濕熱暴注。及因熱而遺濁。色黃乾結者。不可誤用也。

薑麥 辛大溫無毒。醋浸刮去皮子。免傷肺上氣。發明 薑麥辛熱浮散。爲頭疼鼻淵要藥。取其能入陽明經。散浮熱也。性能溫中下氣。治霍亂水瀉。心腹滿者宜之。然辛熱耗散。能動脾胃之火。多用令人喘。勿目昏。腸虛下重。以其走泄真氣也。

蒟葉子名
蒟醬 辛溫無毒。發明 蒹葉辛熱。能下氣溫中。破瘀散結。氣解瘴癘。嶺南人以葉合檳榔食取其辛香。能破瘴癘之氣也。其子可以調羹。故謂之醬。薑麥之類也。

肉豆蔻俗名
肉果 辛溫無毒。糯米粉裹煨熟用。勿犯鐵。發明 肉豆蔻辛香。入手足陽明。溫中補脾。寬脹。固大腸。爲小兒傷乳吐逆泄瀉之要藥。二神丸合補骨脂治腎瀉。蓋取補脾以治腎邪也。按脾土性喜

芳香故肉果與脾胃最爲相宜。以其能下氣者脾胃得補則健運。非若厚朴枳實之峻削也。熱鬱暴注禁用。以其辛溫性滯也。

補骨脂

俗名破故紙字音相近之誤也

苦辛大溫無毒。鹽酒浸焙乾用。與胡麻同炒良。忌薑薑羊肉諸血。發明。補

骨脂屬火。收斂神明。能使心胞之火與命門之火相通。使元陽堅固。骨髓充實。濡以固脫也。胡桃屬水。潤燥養血。屬陰惡燥。故油以潤之。佐補骨脂有水火相生之妙。故局方青娥丸用之。孫思邈言。補腎不若補脾。許學士言。補脾不若補腎。腎氣虛弱。則陽氣衰劣。不能薰蒸脾胃。令人痞滿少食。譬如釜底無火。雖終日不熟。陽衰則飲食亦不能消化。濟生二神丸治脾胃虛寒泄瀉。用補骨脂補腎。肉豆蔻補脾。加吳茱萸以平其肝。加木香以順其氣。使之斡旋。若精傷漏赤瀦痛者。去木香易五味子。腰膝痠疼。腎冷精流者。用之屢効。凡陰虛有火。夢泄溺血。大便閉結者勿施。

薑黃。辛苦溫無毒。藏器曰。辛少苦多。性熱不冷。或云大寒誤矣。有二種。蜀川生者色黃質嫩。有鬚折之中空有眼。切之分爲兩片者爲片子薑黃。江廣生者質粗形扁如乾薑。僅可染色。不入湯藥。今藥肆混市誤人。徒有耗氣之患。而無治療之功也。發明。薑黃鬱金蓬朮三物形狀功用皆相近。但鬱金入心。專治心包之血。薑黃入脾。兼治血中之氣。蓬朮入肝。兼治氣中之血。爲不同耳。古方三痹湯用片子薑黃治

風寒濕氣手臂痛。戴元禮曰：片子薑黃能入手臂治痛，其兼理血中之氣可知。能治癰瘍癰疽，通經消腫毒。功力烈於鬱金。但血虛臂痛者服之，病必增劇。

鬱金辛苦平無毒。本草以爲性寒誤矣。安有辛香而寒之理。蜀產者體圓尾銳如蟬腹狀。發苗處有小孔。皮黃而帶黑。通身粗皺如梧桐子紋。每枚約重半錢。折開質堅色黃。中帶紫黑。嗅之微香不烈者真。若大小不等。色黃皮起細橫紋。有鬚如線。折之中空質柔。內外皆黃。其氣烈者卽片子薑黃也。體圓首尾相似。通身橫紋。發苗處無小孔。折開氣烈觸鼻者染色薑黃中之小者也。蓬朮則大塊色青黑。最大者爲廣茂。與此不類。蘇恭不能分別。乃爲一物謬矣。發明：鬱金辛香不烈。先升後降。入心及包絡。治吐血衄血。唾血血腥。破惡血血淋尿血。婦人經脈逆行。產後敗血衝心。及宿血心痛。並宜鬱金末加薑汁童便同服。其血自清。痰中帶血者加竹瀝。又鼻血上行者。加入四物湯。一婦患失心風癲十年。用鬱金四兩。佐明礬一兩爲丸。硃砂爲衣。纔服五十丸。心間如有物脫去。再服而蘇。以鬱金入心去惡血。明礬化頑痰。硃砂安神故也。又能化癰痕爲水。嶺南蠭毒爲害。初覺胸腹痛。卽用升麻或膽礬吐之。若膈下急痛。以米湯調鬱金末三錢服之。卽漏出惡物。或合升麻鬱金服之。不吐則下。此李異岩爲雷州司理。鞠獄得此方。活人甚多。按以上諸治。其功皆在破宿生新。今世誤以爲諸血聖藥。病者不惜重費。醫者藉爲射利。咸以薑黃

代充爲害非淺。凡屬陰虛失血及陰火迫血上逆。咸爲切禁。

蓬莪茂卽蓬

苦辛溫無毒。入肝經藥醋炒入心脾藥麪裹煨熟。入四物湯調經。羊血或雞血拌炒。發

明。蓬莪茂入肝破血。治婦人血氣結積痛。瘀癥冷氣。跌撲損痛下血。及內損惡血。通肝經聚血。蓋此藥專破氣中之血也。按蓬莪誠爲磨積之藥。但虛人得之。積不去而真已竭。更可虞也。須得參朮健運補中。濡潤。乃得力耳。

荆三稜 苦平無毒。生荆楚地。故名荆三稜也。真者絕少。今世所用。皆草三稜也。醋炒用之。發明 三稜

肝經氣分藥也。能破血中之氣。散血結。通肝經積血。主寒癥結塊。破產後惡血。血結腹痛。通月水墮胎。以其力峻。故難久服。有人病癰瘕腹脹。用三稜莪蕘。酒煨煎服。下一黑物如魚而愈。按潔古云。三稜能瀉真氣。虛者勿用。東垣破積諸方。皆與人參贊助。如專用冠削脾胃愈虛。不能運行。其積亢逆益甚矣。

香附卽莎草根

辛微苦甘平無毒。產金華光細者佳。入血分補虛。童便浸炒。調氣。鹽水浸炒。行經絡。酒浸炒。消積聚。醋浸炒。氣血不調。胸膈不利。則四者兼製。肥盛多痰。薑汁浸炒。止崩漏血。便製炒黑。走表藥中。則生用之。發明 香附之氣平而不寒。香而能竄。乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥。兼入衝脈。開鬱氣。消瘀食。散風寒。行血氣。止諸痛。月候不調。胎產崩漏。多怒多憂者之要藥。治兩脇氣妨。心忪少氣。是血中

之氣藥也。薑血不自行。隨氣而行。氣逆而鬱。則血亦凝滯。氣順則血亦隨之而和暢矣。生則上行胸膈。外達皮毛。故能散風寒。熱則下走肝腎。外徹腰足。故能調血氣。得參朮則益氣。得歸地則調血。得木香則流滯和中。得沉香則升降諸氣。得芎藭蒼朮。則總解諸鬱。得山梔黃連。則降火清熱。得茯苓則安心腎。得茴香補骨脂。則引氣歸元。得厚朴半夏。則決壅消脹。得紫蘇葱白。則解散邪氣。得三稜莪朮。則消磨積塊。得艾葉則治血氣。煖子宮。乃氣病之總司。女科之主帥也。惟經水先期而淡。及失氣無聲無臭者勿用。血氣本虛。更與利氣則行之愈速矣。

茉莉花 辛熱無毒。恨熱有毒。發明 茉莉花古方罕用。近世白痢藥中用之。取其芳香散陳氣也。其性熱有大毒。以酒磨一寸服。卽昏迷一日。乃醒。服二三寸。二三日醒。惟接骨脫臼。用以傅之。則不知痛也。

排草香 辛溫無毒。發明 芳香之氣皆可辟臭去邪惡氣。鬼魅邪精。天行時氣。並宜燒之。水煮洗水腫浮氣。與生薑芥子煎湯浴風瘡効。

蠶香 辛微溫無毒。廣產者良。但葉甚少。土人每以排草葉偽充。最難辨別。須於莖上擇去色綠未經微壞者方效。發明 蘭香入手足太陰。芳香之氣助脾醒胃。故能止嘔逆。開胃進食。溫中快氣。去瘴氣。止

霍亂治心腹痛。凡時行疫癘。山嵐瘴瘧。用此醒脾健胃。則邪氣自無容而愈矣。但陰虛火旺。胃虛作嘔。內無留滯者不可用。恐反傷正氣。引邪內入。江浙土產者。伐胃消食。其莖能耗氣。用者審之。

薰香即零陵香 甘平無毒。廣產者良。雲陽產者氣濁不堪入藥。發明 薰香辛散上達。故心痛惡氣。齒痛鼻塞皆用之。單用治鼻中癥。肉鼻。龜香以養鼻也。多服作喘。爲能耗散真氣也。

蘭香 辛溫無毒。菜部移此瀕湖綱目。芳草部有蘭草。菜部有蘭香。名曰羅勒。種類不同。因攷正之。按蘭有三種。一種曰蘭草。其氣濃濁。卽今之省頭草也。一曰蘭香。植之庭砌二十步內。卽聞香。俗名香草。以子能去目翳。故又名醫子草。一種名羅勒。莖葉較蘭香稍粗大。形雖極類。而氣單濁。以嫩時可食。僅入菜部。不堪入藥。本經利水道。殺蟲毒。辟不祥。久服益氣。輕身不老。通神明。發明 蘭氣芳香。能辟疫毒。惡氣。楚人以之爲佩。又能辟汗濕之氣。故又名辟汗香。入手足太陰陽明。力能調中。消食去惡氣。治嘔嘔。脾痪。口中時時溢出甜水者。非此不除。按蘭性芳香。辛溫。專走氣道。故能利水。調肝和脾。其功倍於藿香。善調嘔逆。散積久陳鬱之氣。素問云。五味入口。藏於胃。以行其津。氣津液在脾。令人口甘。此肥美所發也。其氣上溢。轉爲消渴。治之以蘭。除陳氣也。東垣治消渴生津。飲用蘭葉。蓋本於此。又治牙疼口臭。有神功丸。亦用蘭香。云如無以藿香代之。近世有誤認幽蘭爲蘭香者。大可噴飯。觀本經利水殺蟲毒。辟不祥之。

治。豈幽蘭能之乎。古方治癩風蘭香散去其散肺胃中之濕熱蟲毒也。普濟方治反胃。蘭香和甘蔗汁服之。錢氏治小兒鼻疳赤爛。蘭葉燒灰二錢。銅綠半錢。輕粉二字爲末。日傅三次即愈。○子治目翳。及塵物入目。以三五顆內目中。少頃其子濕脹。與物俱出。又主暴得赤眼後生脣膜。用蘭香子一粒。入蜜內閉目少頃。連膜俱出。蓋此子得濕卽脹。故能染惹眵淚浮膜爾。然目中不可著一座。而此可納三五顆。亦不妨礙。又小兒食肥甘口臭齒黑。名曰崩砂。漸至齦爛。名曰潰槽。又或出血。名曰息露。重則齒落。名曰腐根。用蘭香子末。輕粉各一錢。蜜陀僧煅赤。醋淬妍末半兩。和匀。每以少許傅齒。及齦上。內服甘露飲立效。○時珍曰。蘭香須三月。棗葉生時種之乃生。否則不生。常以魚腥水泥溝水。冷泥水澆之。則香而茂。不宜糞水。著糞則萎。其子大如棗而褐色不光。七月收之。種時防蟻。濕則有脂浮脹。須以枯炭末掩之。

澤蘭 苦甘微溫無毒。取葉酒洗用。本經主金瘡癰腫瘍膿。發明 澤蘭入足太陰厥陰血分。專治產後血敗。流於腰股。拘攣疼痛。破宿血。消癰痕。除水腫。身面四肢浮腫。本經主金瘡癰腫瘍膿。皆取散血之功。爲產科之要藥。更以芎歸童便佐之。功效勝於益母。

馬蘭 辛平無毒。赤莖者良。發明 馬蘭入陽明血分。與澤蘭功用相近。故能破宿生新。丹方治婦人淋濁痔漏有效。喉痹腫痛。以馬蘭根葉搗汁。入米醋滴鼻孔。或灌喉中。取痰自開。絞腸痧腹痛。以馬蘭細

嚼曬汁立安。水腫漏滴。馬蘭一握。墨豆小麥各一撮。酒水煎服效。蛇傷擂汁和醋擦之。皆取散血解毒也。

香薷 辛微溫無毒。江西白花者良。

發明

香薷辛溫。先升後降。故熱服能發散暑邪。冷飲則解熱利

小便。治水甚捷。世醫治暑病。以香薷飲爲首藥。然暑有乘涼飲冷。致陽氣爲陰邪所遏。遂病發熱惡寒頭痛。煩躁口渴。或吐或瀉。或霍亂者。宜用此發越陽氣散水和脾。若飲食不節。勞役作喪之人。傷暑發熱大渴。煩渴喘促者。乃勞倦內傷之證。必用清暑益氣。如大熱大渴。又宜人參白虎之類。以瀉火益元。更有汗出如雨。吐瀉脫元。四肢清冷。脈微欲脫者。又須大順漿水散等方救之。若用香薷飲。是重虛其表。頃刻脫亡矣。今人不知槩用沉冷代茶。若元氣虛人服之。往往致病。蓋香薷乃夏月解表之藥。如冬月之用麻黃。氣虛者豈可漫用。深師香薷丸。治通身水腫。以香薷熬膏丸。白朮末。日三夜一服。米飲下之效。

鵝牀俗名赤眼
老母草

咸寒無毒。本經主腰脊痛。不得擣牀。俛仰艱難。除熱可作湯浴。

發明 鵝牀善通

血脈。蘇恭言。療血脈下氣。杖瘡搗汁塗之立瘥。觀本經諸品。不出活血舒筋之用也。

荆芥又名假蘇

辛微溫無毒。產後止血。童便制黑用。凡食河豚及一切無鱗魚與驢肉俱忌之。食黃鱠魚後服之。令人吐血。惟地漿可解。與蟹同食動風。

本經主寒熱鼠瘻癰瘍生瘡。破結聚氣。下瘀血除濕疽。

發明 荆芥穗入手太陰足厥陰氣分。其功長於祛經絡中之風熱。觀本經所主。皆是搜經中風熱痰血。

之病。又能清頭目。去瘀血。破結氣。消瘡毒。故風病。血病。瘡病。產後爲要藥。治風氣治血者。以其入風木之藏。卽是藏血之地。故並主之。華元化治產後中風。口噤發瘧。及血暈不醒。荆芥末三錢。豆淋酒調服。神效。產後血暈。熱童便調服。而表虛自汗。陰虛而赤者禁用。今人但遇風證。槩用荆芥。此流氣散之相沿耳。

紫蘇 辛溫無毒。葉紫者能散血脈之邪最良。發明 蘇葉味辛入氣分。色紫入血分。升中有降。同橘皮砂仁。則行氣安胎。同藿香烏藥。則快氣止痛。同麻黃葛根。則發汗解肌。同芎藭當歸。則和營散血。同木瓜厚朴。則散濕解暑。同桔梗枳殼。則利膈寬中。同杏仁菔子。則消痰定喘。然不宜久服。泄人真氣。單用煮汁解蟹毒。若脾胃虛寒人過服。多致滑泄。往往不覺也。其梗能行氣安胎。但力淺薄。難於奏效。亡血家大虛。及妊娠產婦發散。用苞最佳。本乎天者親上。取其包含子氣。且氣味皆薄。而無過汗傷中之患也。

蘇子 辛溫無毒。粗而色深紫者真。細而色淡者假。發明 諸香皆燥。惟蘇子獨潤。爲虛勞欬嗽之專藥。性能下氣。故胸膈不利者宜之。與橘紅同爲除喘定嗽。消痰順氣之良劑。但性主疎泄。氣虛久嗽。陰虛喘逆。脾虛便滑者。皆不可用。

水蘇一名雞蘇 辛溫無毒。子名桂子。本經下氣殺穀除飲食辟口臭。去邪毒。辟惡氣。發明 水蘇卽蘇之野生色青者。其氣芳香。故本經所主。一皆胃病。專取芳香正氣之義。局方用治血病者。取以解散血中

之氣也。氣散則血亦散矣。

薄荷 辛平無毒蘇產者良去梗用。發明 薄荷辛涼上升入肝肺二經。辛能發散專於消風散熱涼能清利故治歎噦失音頭痛頭風眼目口齒諸病利咽喉去舌胎小兒驚熱及瘧癧瘡疥爲要藥。其性浮而上升爲藥中春升之令能開鬱散氣故逍遙散用之然所用不過二三分以其辛香伐氣多服久服令人虛冷瘦弱人多服動消渴病陰虛發熱歎噦自汗者勿施。

隰草部

菊 黃者苦甘平白者苦辛平皆無毒野生者名苦蕙可搗塗癰腫疔毒服之傷人腦。本經主諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痹久服利血氣輕身耐老延年。發明 菊得金水之精英補水以制火益金以平木爲去風熱之要藥故本經專主頭目風熱諸病取其味甘氣清有補陰養目之功蓋益金則肝木平而風自息補水則心火制而熱自除矣其治惡風濕痹者以其能清利血脉之邪而辨濕得以開泄也又黃者入金水陰分白者入金水陽分紫者入婦人血分觀金匱侯氏黑散千金秦艽散俱用菊花爲君時珍所謂治諸頭目其旨深矣近有一種從番舶來六月開花但有正黃而無間色豈特貧州脫瓣爲異哉。

艾 苦辛溫無毒。斬州者爲勝。發明。艾性純陽。故可以取太陽真火。可以回垂絕元陽。服之則走肝脾腎三陰。而逐一切寒濕。轉肅殺之氣爲融和。生用則性溫。炒熟則大熱。用以灸火。則透諸經而治百病。蘇頌言其有毒誤矣。夫用藥以治病。中病則止。苦素有虛寒痼冷。婦人濕鬱帶漏之病。以艾和歸附諸藥治之。夫何不可。艾附丸調經而溫子宮。兼主心腹諸痛。膠艾湯治虛痢。及胎妊產後下血。雷火鍼同丁香麝腦熨。寒癆攀痛。若老人臍腹畏冷。及寒濕脚氣。以熟艾入布兜之。惟陰虛火旺。血燥生熱。及宿有失血病者爲禁。有人患風癩癰瘍。不時焮發。以絹裹擦之。卽消。亦取其辛散開發之力。

茵陳蒿 苦平微寒無毒。本經主風濕寒熱邪氣。熱結黃疸。發明。茵陳有二種。一種葉細如青蒿者。名綿茵陳。專於利水。爲濕熱黃疸要藥。一種生子如鈴者。名山茵陳。又名角蒿。其味辛苦小毒。專於殺蟲。治口齒瘡絕勝。並入足太陽。本經主風濕寒熱。熱結黃疸。濕伏陽明所生之病。皆指綿茵陳而言。仲景茵陳蒿湯。以之爲君。治濕熱發黃。梔子柏皮湯。以之爲佐。治燥熱發黃。如苗澇則濕黃。旱則燥黃。其麻黃連轺赤小豆湯。以之爲使。治瘀熱在裏而身黃。此三方分治陽黃也。其治陰黃。則有茵陳附子湯。各隨燥濕寒熱而爲主治。按茵陳專走氣分而利濕熱。若畜血發黃。非此能治也。外臺治齒齦宣露。千金治口瘡齒蝕。並用燒灰塗之。有汁吐去。一宿卽效。而殺蟲方中一味煎湯內服外洗。皆用角蒿。專取逐濕化熱之。

功也。

青蒿 苦寒無毒。莖紫者真根莖子葉不可並用。恐成痼疾。葉主濕熱。子治骨蒸俱宜童便制用。本經主疥癩癩痒惡瘡殺蟲。留熱在骨節間明目。發明 青蒿亦有二種。一種發於早春。葉青如綿茵陳。專瀉內丁之火。能利水道。與綿茵陳之性不甚相遠。一種盛於夏秋。微黃如地膚子。專司甲乙之令。爲少陽厥陰血分之藥。故莖紫者爲良。其治骨蒸勞熱。有殺蟲之功。而不傷伐骨節中陽和之氣者。以其得春升之令最早也。此與角蒿之性大都相類。又能明目善清在上之虛熱。燒灰淋汁。和石灰點治惡瘡。恩肉癰癩。蘇恭生搗敷金瘡。經驗方和桂心治寒瘲。但性偏苦寒。脾虛虛寒泄瀉者勿服。

茺蔚俗名益母 辛甘微溫無毒。忌犯鐵器。其子微炒香蒸熟。烈日曝燥。杵去殼用。本經茺蔚子明目益精。除水氣。莖治癩疹可作浴湯。發明 茬蔚入手少陰足厥陰血分。活血行氣。有補陰之功。凡胎前產後所恃者血氣也。胎前無帶。產後無虛。以其行中有補也。然所謂補者。是散其瘀而營血受蔭。非補養血氣之謂。丹方以益母之嫩葉陰乾。拌童便陳酒。九蒸九曬。入四物湯料爲丸。治產後諸證。但功專行血。故崩漏下血。若脾胃不實。大腸不固者勿用。爲其性下行也。近世治番痧腹痛嘔逆。用以濃煎。少加生蜜。放溫恣飲有效。取其能散惡血也。其子能明目。功耑益精利水。水虧而瞳子收小者宜之。若火盛隨子散大者。

切忌。爲其辛散能助火邪也。白花者名紫茉嫩苗可食。故謂之菜。藏器主心腹脹滿。今人治白帶用一味爲末服之大效。

薇銜 苦澗溫無毒。素問謂之麋銜。唐本曰鹿銜。千金曰鹿藥草。言鹿有疾銜此草卽瘥也。其葉大而面綠背紫者爲真。蘇恭言有大小二種。保昇言葉似茺蔚。叢生有毛者吳風草也。本經主風濕痹歷節痛。驚癇吐血。悸氣賊風。鼠瘻癰腫。發明 鹿銜本經專主風濕痹歷節痛。素問同澤尤治酒風身熱懈惰。汗出如浴。惡風少氣之病。亦取其能除痹著血脉之風濕也。又治驚癇悸氣吐咯諸血。以其能走胃與腎肝血分。專理血中邪濕。而無留滯之患。近世治吐血咯血用之。以其能溫補衝督之精血也。陝人名爲鹿胞草。言鹿食此卽能成胎。其性溫補下元可知。今吳興山中間亦產此。每於初夏。羣鹿引子銜食乃去。洵爲確真無疑。採得曬乾。一味浸酒。最爲有益。但性專助陽。力能走散陰精。故藏器云。婦人服之絕產無子。良有見乎此也。其子名延壽。果味微澗而甘。惟秦地有之。不特有益於老人。而嬰兒先天不足者。尤爲上藥。惜乎南方罕得也。

夏枯草 苦辛溫無毒。本經主寒熱瘰疬。鼠瘻頭瘡。破癩散癰結氣。脚腫濕痹輕身。發明 夏枯草本經專治寒熱瘰疬。有補養厥陰血脉之功。以辛能散結。苦能除熱。而癰結癰氣散矣。言輕身者脚腫濕

癒而無重著之患也。佐以香附甘草治目珠疼夜甚者。以其栗純陽之氣。而散陰中結滯之熱也。又能
解內熱。緩肝火。從治之法。并治痘後餘毒。及肝熱目赤有效。久服亦防傷胃。以營走厥陰。助肝木之氣耳。
劉寄奴 苦溫無毒 發明 劉寄奴破血下脹。又能止血。故產後餘疾。及金瘡血大小便血皆用之。千
金方治折傷瘀血。用劉寄奴骨碎補延胡索水煎。加童便服。集簡方治大小便血。劉寄奴末空心茶清調
服。衛生易簡方治血氣脹滿。劉寄奴紅酒煎服。時珍治小兒尿血。取劉寄奴研末服效。丹方治大便血。用
劉寄奴半兩。臘茶一錢。烏梅半枚。煎服即效。但性走散。不可過服。令人吐利。

旋覆花 本經名金沸草 酸甘溫小毒 本經主結氣脇下滿驚悸。除水去五藏間寒熱。補中下氣。發明 旋
覆花升而能降。肺與大腸藥也。其功在於開結下氣。行水消痰。治驚悸。祛痞堅。除寒熱。散風濕。開胃氣。止
嘔逆。除噫氣。故肺中伏飲寒嗽宜之。仲景治傷寒汗下後心下痞堅。噫氣不除。有旋覆代赭石湯。金匱半
產漏下。有旋覆花湯。胡治治痰飲在兩脇脹滿。有旋覆花湯。皆取其能下氣也。但性專溫散。故陰虛勞嗽。
風熱燥熱。不可誤用。用之嗽必愈。基本經言補中下氣者。甘能緩中。酸能潤下。痰氣下而中氣安。脇下滿
結。寒熱驚悸。水氣皆除矣。

青葙子 即雞冠花 苦微寒無毒 本經主邪氣皮膚中熱。風癧身癩。殺三蟲。子治唇口青。發明 青葙子治

風熱目疾。與決明子同功。本經雖不言治目疾。而主晝口青。爲足厥陰經藥。其明目之功可推。其治風癩、身癩。皮膚中熱。以能散厥陰經中血脈之風熱也。

紅藍花即紅花 辛溫無毒。發明 血生於心。包藏於肝。屬於衝任。紅花汁與之同類。故能行男子血脈。通婦人經水。活血解痘毒。散赤腫。產後血暈及胎死腹中。並宜和童便服。之少則養血。多則行血。過用使人血行不止。且性兼上行。不可不知。亦主蠱毒下血。堪作胭脂。治小兒聤耳。解痘疔毒腫。產後血悶。以紅花十斤。煮湯盛桶。置於橫格之下。昇婦寢上薰之。湯冷再加。半日乃蘇。

臘脂 甘平無毒。臘脂有四種。一種以紅藍花汁染胡粉而成。一種以山燕脂花汁染粉而成。一種以山榴花汁作成者。一種以紫錦汁染綿而成。皆可入血病藥用。又落葵子亦可取汁。和粉而成。可作面脂。不入藥用。紫錦查名火漆。匠工補水用之。發明 臘脂色紅。並可爲活血之藥。其治痘瘡肌肉結硬。用綿臘脂同紫草煎湯。乘熱頻將臘脂擦之。漸軟。卽能發出。又痘瘡護眼黃柏膏。用油臘脂調塗。則痘無入眼之患。

大薊小薊 花甘溫。根微涼無毒。發明 大薊小薊。皆能破血。大薊根主女子赤白沃下。止吐血。鼻衄。涼而能行。行而帶補。兼療癰腫。小薊根專於破血。不能消腫。有破宿生新之功。吐血。血崩之用。但其力微。

只可退熱。不似大薊能破瘀散毒也。丹方治吐血不止。用小薊。山查生地一服即止。止中寓漏。劫劑中之良法。近世醫師咸用其花。總取散血之義。然其性皆下行。故脾胃虛弱。泄瀉少食者忌用。

續斷本經名屬折別錄名接骨

苦微溫無毒。去根尾酒炒用。本經主傷中補不足。金瘡癰瘍。折跌續筋骨。婦人乳

難。久服益氣力。發明。續斷入肝。主續筋骨。爲婦人胎產崩漏之首藥。又主帶脈爲病。久服益氣力。利關節。治腰痛。緩子宮。療金瘡折傷。散癰腫瘀血。療婦人乳難。本經治傷中補不足等病。總取和血通經之義。又能止小便多。治遺泄。古方血痢。用平胃散一兩。續斷三錢爲末。每服三錢。水煎服。即愈。甯無顧名思義之寶乎。

漏蘆本經名野蘭

苦鹹寒有毒。本經主皮膚熱毒。惡瘡疽痔漏下。乳汁。發明。漏蘆苦寒解毒。乃足

陽明經藥。本經治熱毒惡瘡。下乳汁。以其能利竅也。爲消毒排膿殺蟲要藥。古方治癰疽發背。以漏蘆湯爲首稱。蓋鹹能軟堅。寒能解毒。故服之必大便作瀉。使邪從下而出也。昔人治嬰兒瘡毒。令母服此。使藥性從乳中過之。每致乳子利下白沫。大損元氣。故氣虛及瘡瘍不起發者。咸非所宜。而妊娠尤爲切禁。

苧麻黃麻甘寒無毒。發明。苧麻耑行滯血。產婦枕之。治血暈。產後腹痛。以苧安腹上。即止。漬苧水。療熱渴。苧根治小兒赤瘍。○黃麻苦溫。專散陳久瘀血。取陳年者燒灰存性。酒調服之。絡膝根燒灰治

鎖喉風神效

胡蘆巴 苦大溫無毒。發明 胡蘆巴乃海外胡蘿蔔子。聲音相近之譌耳。右腎命門藥也。元陽不足。冷氣潛伏。不得歸元者宜之。小腸奔豚偏墮。及小腹有形如卵。上下走痛不可忍者。用胡蘆巴丸。腎氣不歸。上熱下寒厥逆嘔吐者。用黑錫丹。皆與金鈴子一寒一熱同用。其導火歸元之功可知。

惡寶又名鼠黏子牛蒡子
大力子皆別名也

辛平無毒。發明

鼠黏子肺經藥也。治風濕癰瘍。咽喉風熱散諸腫瘍

之毒。痘疹之仙藥也。痘不起。發用此爲末。刺雄雞冠血和酒釀調。胡荽湯下。神效。瘡瘍毒盛。生研用之。卽

出瘡頭。酒炒上行。能通十二經。去皮膚風。消癰瘍毒。惟氣虛色白。大便利者不宜。

蒼耳古名
菜耳

實甘溫葉苦辛小毒。酒浸炒用。忌猪肉。發明 蒼耳治頭風腦痛。風濕周痹。四肢拘攣。惡

肉死肌。皮膚瘻瘍。脚膝寒痛。久服亦能益氣。其葉久服去風濕有效。服蒼耳人最忌猪肉。及風邪觸犯。則過身發出赤丹也。婦人血風攻腦。頭旋悶絕忽倒。不知人事者。用蒼耳草嫩心陰乾爲末。酒服甚效。此味善通頂門。連腦能走督脈也。

天名精本經名蝦蟆藍一
名地菘子名鶴蟲

甘寒無毒。發明

本經主瘀血血瘕欲死。下血止血。利小便。發明 天名精功

專散血。有破宿生新之功。故本經言下血止血。又能涌吐風痰。殺蟲解毒。擂汁服之。能止瘧瘧。漱之止牙

瘡。搗之敷蛇傷。煎服除溼穢邪毒。從小便泄出。凡乳蛾喉嚨腫痛。及小兒急慢驚風。牙關緊急。不省人事者。搗絞和酒灌之。咽喉腫塞。痰涎壅滯。搗汁鵝翎掃入。去痰立效。亦治猪瘧。

鶴蠶 苦平無毒。發明 鶴蠶入厥陰肝經。善調逆氣。能治一身痰凝氣滯。殺蟲方中最要藥。錄驗方療蛇攻心痛。一味丸服。小兒蟲痛。亦單用鶴蠶研末。肥肉汁服。其蟲自下。藥肆每以胡蘆葛子代充。不可不辨。

蕷荳 辛苦寒小毒。採葉陰乾。入甌中層層灑酒與蜜。九蒸九曬用。發明 蕷荳苦寒。略兼微辛。故有小毒。爲祛風除濕而兼活血之要藥。蕷荳丸治風濕四肢麻痹。骨節冷痛。腰膝無力。甚效。但脾胃兩虛。陰血不足。而腰膝無力。骨痛麻痺者。大非所宜。時珍曰。生搗汁服。則令人吐。故云有小毒。九蒸九曬。則去風痹。故云無毒。或云甚益元氣。不稽之言也。生者搗服能吐風痰。其能傷胃可知。

箬 甘寒無毒。發明 箬生小竹而葉最大。故可以之爲笠。燒灰治吐衄。咯。及便溺諸血。又能通小便利肺氣。散喉痹。消癰腫。每服不過一錢。匕。又治痘瘡倒嚼。以箬葉灰一錢。七入麝香酒調服之。箬帶煎湯。治胃熱呃逆。其性較柿蒂稍平。取灰以香油調塗。湯火傷甚良。

蘆根舊名蘿蔔莖名蓬蘽 甘寒無毒。發明 蘆根甘寒。主消渴。胃中客熱。利小便。治噎膈反胃。嘔逆不下。

食妊娠心熱時疫寒熱煩悶解河豚諸魚毒其筍尤良。蘿蔔治臍下堅癧小便不利。○蕈莖中空專於利竅。善治肺癰吐膿血臭疾。千金蕈莖湯以之爲君。服之熱毒從小便泄去最捷。蘿蔔煮汁治乾霍亂心腹脹痛。著燒存性。治吐衄諸血。

甘蕉卽芭蕉 甘大寒無毒。發明 甘蕉性寒。治天行狂熱。解消渴煩悶。利小便。治濕熱黃疸。和酒服療癰腫。并以滓塗腫處。良。小兒遊風。臥蕉葉上。卽愈。治火燙。以筋插入出筋瓶盛。取油塗之。別錄治癰疽結熱。肘後治發背腫毒。聖惠治血淋澑痛。蘇頌治風癆欲倒。飲之取吐效。惟陰疽不赤腫者禁用。

薑荷卽芭蕉之色白者 辛溫有小毒忌鐵。發明 薑荷有毒而能攻毒。爲主蠱之最。中蠱者服薑荷汁。并臥菜上。卽能呼出蠱主姓名。其治喉舌瘡爛。婦人月閉。及傷寒時氣。壯熱頭痛。口瘡。用之皆取其辛散也。麻黃 苦溫無毒。去根節。湯泡去沫曬乾用。若連根節用。令人汗不絕。其根專能止汗。本經主中風傷寒頭痛。溫瘡發表。出汗去邪熱氣。止欬逆上氣。除寒熱。破癰堅積聚。發明 麻黃微苦而溫。中空而浮。陽也升也。入足太陽。其經循背下行。本屬寒水。而又受外寒。故宜發汗去皮毛。氣分寒邪。以泄寒實。若過發則汗多亡陽。或飲食勞倦。及雜病自汗。表虛之證。用之則脫人元氣。禍患莫測。麻黃治衛實之藥。桂枝治衛虛之藥。二物雖爲太陽經藥。其實營衛藥也。心主營血。肺主衛氣。故麻黃爲手太陰肺經之劑。桂枝

爲手少陰心經之劑。傷寒傷風而欬嗽。用麻黃湯桂枝湯。卽湯液之源也。麻黃乃肺經之專藥。故治肺病多用之。仲景治傷寒無汗用麻黃湯。有汗用桂枝湯。夫津液爲汗。汗卽血也。在營卽爲血。在衛卽爲汗。寒傷營。營血不能外通於衛。衛氣閉固。故無汗發熱而惡寒。風傷衛。衛氣不能內護於營。營氣不固。故有汗發熱而惡風。是證雖屬太陽。而肺實受邪。氣蓋皮毛外閉。邪熱內攻。肺氣怫鬱。故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪。達之於表。佐以杏仁泄肺而利氣。是麻黃湯雖太陽發汗重劑。實爲發散肺經邪鬱之藥也。腠理不密。則津液外泄。而肺氣自虛。虛則補其母。故用桂枝同甘草。外散風邪。以救表。內伐肝木。以防脾。佐以芍藥泄水而固脾。皆是肺脾之藥。是則桂枝雖太陽解肌輕劑。實爲理脾救肺之藥也。又少陰證發熱脈沉。有麻黃附子細辛湯。少陰與太陽爲表裏。所謂熟附配麻黃。補中有發也。本經治中風。是主緩風癰疾而言。云溫瘡係濕瘡。乃傳寫之誤。破瘡堅積聚者。表裏兼治。非神而明之。難效其法也。

木賊 甘微苦無毒去節用。發明 木賊與麻黃同形同性。故能發汗解肌。升散火鬱風濕。專主眼目風熱暴翳止淚。取發散肝肺風邪也。多用令人目腫。若久翳及血虛者。非所宜。傷暑或暴怒赤腫。亦勿用之。

石龍芻 一名龍鬚
卽麻草

苦微寒無毒。本經主心腹邪氣。小便不利淋閉。風濕鬼疰。

發明

龍芻生水中。

性專利水。本經所主心腹邪氣。亦是因水濕滯積所致。其敗席治淋及小便不通。昔人用以煮服。莫若燒灰酒服更良。

燈心草。甘寒無毒。欲入丸劑。粳米飲漿磨之。發明。燈心輕虛甘淡。故能瀉肺利水。治急喉痹。燒灰吹之。又燒灰塗乳上。飼小兒止夜啼。燒灰入輕粉麝香治陰疳。

生地黃。本經名地髓。又名芍。音戶。甘苦寒無毒。禁犯鐵忌。萊菔諸血。採得鮮者。卽用爲生地黃。炙焙乾收者。爲乾地黃。以法制過者。爲熟地黃。本經主傷中。逐血痹。填骨髓。長肌肉。作湯除寒熱積聚。療折跌傷筋。久服輕身不老。生者尤良。發明。生地黃性稟至陰。功專散血。入手足少陰厥陰。兼行足太陰手太陽。錢仲陽導赤散與木通同用。漏丙丁之火。別錄治婦人崩中血不止。及產後血上薄。心胎動下血。鼻衄吐血。皆擣汁飲之。以其能散血消瘀解煩也。其治跌撲損傷。面目青腫。以生地黃搗爛罨之。卽消。此卽本經治傷中血痹。折跌筋傷等證之義。蓋肝藏血而主筋。肝無留滯。則營血調而傷中自愈。筋無邪著。則三氣通而血痹自除。作湯除寒熱積聚者。血和則結散。而諸證平矣。其曰填骨髓。長肌肉者。邪無著。而形神自復也。昔人治心痛。以鮮地黃汁作冷淘。食之取吐。不吐則利。出長蟲如辟宮而安。此卽本經除寒熱積聚之驗。其於服食方中用之。取以輔助諸藥。辟除三蟲。使從幽門化出也。因思千金靈飛散中。生地黃急不可得鮮

者咸取乾者應用。乃知本經末後續出生者尤良一語。見古聖之苦心。無所不用其極也。愚按生地黃與乾地黃功用不同。豈可混論。按徐之才別錄云。生地黃乃新掘之鮮者。爲散血之專藥。觀本經主治。皆指鮮者而言。祇緣諸家本草。從未明言。且產處遼遠。藥肆僅有乾者。鮮者絕不可得。是不能無混用之失。曷知乾地黃既經炙焙。力能止血。安有傷中血癆折跌筋傷等治乎。至於傷中日久。積聚內形寒熱外顯。並宜鮮者作湯。統領他藥。共襄破宿生新之功。設混用乾者。則瘀傷愈結。安望其有髓充肉長之効乎。予嘗綜覽諸方。凡藥之未經火者。性皆行散。已經炙焙。性皆守中。不獨地黃爲然也。

乾地黃 苦微甘寒。無毒。產懷慶者。丁頭鼠尾皮粗質堅。每株重七八錢者力優。產亳州者。頭尾俱粗。皮細質柔。形雖長大而力薄。產江浙者。細軟無力。僅可清熱。不入補劑。無問產於何地。但枯槁質輕者。謂之天黃。不堪入湯藥。發明 乾地黃心紫通心。中黃入脾。皮黑歸腎。味厚氣薄。內專涼血滋陰。外潤皮膚。澤病人而有熱虛者。宜加用之。戴元禮曰。陰微陽盛。相火熾強。來乘陰位。日漸煎熬。陰虛火旺之證。宜生地黃以滋陰退陽。同人參茯苓石蜜名。瑞玉膏。治虛勞欬嗽唾血。同大麥門冬熟地人參名。固本丸。治老人精血枯槁。於固本丸中加枸杞熬膏。名集靈膏。治虛羸喘嗽乏力。其瑞玉膏雖用鮮者。搗汁桑火熬膏。散中寓止。與乾者無異。固本丸集靈膏並用乾者。而集靈變丸作膏。較之固本差勝。易簡方曰。男子多

陰虛宜熟地黃。女子多血熱。宜生地黃。虞搏云。生地黃涼血。而胃氣弱者。恐妨食熟地黃補血。而痰飲多者。恐泥膈。或言生地黃酒炒。則不妨胃。熟地黃薑制。則不泥膈。然須詳病人元氣。病氣之淺深而用之。若產後惡食泄瀉。小腹結痛。虛勞脾胃薄弱。大便不實。胸腹多疾。氣道不利。升降窒塞者。咸須遠之。湖產者專於涼血潤燥。病人元氣本虧。因熱邪閉結。而舌乾焦黑。大小便祕。不勝攻下者。用此於清熱藥中通其祕結最妙。以其有潤燥之功。而無滋潤之患也。愚按本經地黃雖列上品。而實性稟陰柔。與鄉愿不異。譬諸宵人。內藏隱晦。外示優容。是以舉世名家靡不藉爲滋陰上藥。止血神丹。雖或用非其宜。得以稍清旺氣。服之仍得暫安。非若人參之性稟陽明。象類君子。苟有過人。皆知之。是以師家斂手不敢用。病家緘口不敢嘗。直至瀆危。不得已而用之。每至下咽卽斃。是以左右之人。靡不交口歸咎於人參。曷知其爲從前誤藥所致。夫藥之遺患於病。比比有之。莫如地黃。門冬之屬。陰柔最甚。至死不覺其非。故不擇瑣屑。特表而出之。

熟地黃 甘溫無毒。製地黃法。擇取原株重六七錢者。以好酒浸。入縮砂仁末。拌木佩瓦鍋。九蒸九曬。得太陽真火。入劑方始得力。蓋地黃性泥。得砂仁之香竄。而通調五藏冲和之氣。歸宿丹田也。發明 熟地黃假火力蒸曬。轉苦爲甘。爲陰中之陽。故能補腎中元氣。必須蒸曬多次。得太陽真火。確有坎離牙濟。

之妙用。若但煮熟不加蒸曝。雖服奚益。好古曰。生地黃治心熱。手心熱。益腎水涼心血。其脈洪實者宜之。若脈虛者。則宜熟地黃。錢氏六味丸以之爲君。天一所生之源也。若命門真火素弱者。必須崔氏八味丸。得桂附共襄之力。方得陰陽兼濟之功。湯液四物湯以之爲主。乙癸同源之治也。其功專於填骨髓。長肌肉。生精血。補五藏內傷不足。通血脈。利耳目。黑鬚髮。男子五勞七傷。女子傷中。胞漏下血。經候不調。胎產百病。滋腎水。真陰療臍腹急痛。病後脛股痠痛。坐而欲起。目睭瞓如無所見。蓋臍下痛屬腎藏精。傷脛股瘦。係下元不足。目睭瞓如無所見。乃水虧不能鑒物。皆腎所主之病。非熟地黃不除。今人治目翳內障。往往用六味丸配磁石丸服。良非所宜。地黃禁鐵。磁爲鐵之母。安得不忌。予嘗用當歸代地黃。借其辛溫。以助發散之勢。火盛則用芍藥代山茱萸。借其酸寒。以收耗散之陰藥。雖異而功不殊也。愚按。地黃本手少陰經藥。功專清熱散血。非經蒸曝。不能入足少陰經。得水火既濟之功。轉苦成甘。變紫爲黑。故直入腎藏。填補真陰。兼培黃庭。后土。土厚載物。諸藏皆受其蔭。是以崔氏八味。錢氏六味。爲培養真陰真陽之總司。後人藉此各隨所稟之偏。而爲增減。無往非受其益。如陰氣不固。則加鯉膠。藜陽氣不充。則加鹿茸。河車中氣不舒。則加沉香縮砂。下氣不吸。則加牛膝。車前上氣不津。則加門冬。五味。肝氣內盛。則減萸倍澤精。氣下脫。則減澤倍萸。各得補偏救弊之妙用。其陰火旺者。加知柏於六味方中。此與鳩酒止渴無異。他

如四物湯中之熟歸。卽六味丸中山萸之義。十全大補中之耆桂。卽八味丸中桂附之義。方得陰陽相濟之妙用。須知八味十全。平調血氣。且湯液性味易過。地黃與參並用。略無妨礙。六味丸中切不可雜一味中焦藥。如人參白朮甘草之類。咸非所宜。昔人有以六味丸加參而服。下咽少頃。輒作迷迷不爽。或令增麥冬五味。功力倍常。深得金水相生之妙用。非專工藥性者之可與討論也。

牛膝本經名百倍 苦酸平無毒。懷產者長而無傍鬚。水道滻滲者宜之。川產者細而微黑。精氣不固者宜之。忌牛肉。本經主寒濕痿痹。四肢拘攣。膝痛不可屈伸。逐血氣。傷熱火爛。墮胎。發明。牛膝氣薄味厚。性沉降泄。乃足厥陰之藥。本經專主寒濕痿痹。四肢拘攣等病。不及補養下元之功。豈聖法有所未盡歟。丹溪言。牛膝能引諸藥下行筋骨。痛風在下者。宜功用之。其性雖下行走筋。然滑利之品。精氣不固者。終非所宜。得酒蒸則能養筋。生用則去惡血。其治腰膝痛不可屈伸。足痿之病。非取其養血營筋之力歟。其治癰腫惡瘡。金瘡折傷。尿血淋痛。婦人經祕不通。非取其活血破瘀之力歟。外臺以生牛膝一味濃煎。治積久勞瘧。肘後以二斤浸酒。治卒暴瘧疾。延年以之同葵子煎服。下胞衣衛生以之搗罨折傷。梅師以之搗塗金瘡。千金以之搗敷毒腫。集驗以之通利溺閉。皆取其性滑利。竅消血解毒之功。雖強陰強筋而氣虛下陷。大便易泄。夢泄遺精。妊娠崩漏俱禁用。惟川者氣味形質。與續斷彷彿。庶無精滑之虞。蓋腎司閉。

藏肝司疏泄。此味專司疏泄而無固熱之功。世俗妄謂益腎而培養下元藥中往往用之。與延盜入室何異。其土牛膝亦能解毒利竅。專治血鼓。一味濃煎。恣意服之。又鎖喉風諸治不效。以土牛膝和醋搗絞取汁。蘸雞翎探吐稠痰。不過二三次神驗。

紫菀

白者名女菀

苦辛微溫無毒。或酒洗或蜜水炒用。

本經主咳逆上氣。胸中寒熱結氣去蠱毒痰癖。安

五藏。女菀治風寒洗洗霍亂泄利。腸鳴上下無常處。驚癇寒熱百病。發明。紫菀肺經血分之藥。本經止欬逆上氣。胸中寒熱結氣。取性疏利肺經血氣也。去蠱毒痰癖者以其辛苦微溫能散結降氣。蠱毒自不能留。瘧癇由肺熱葉焦。紫菀專通肺氣使熱從溲便去耳。別錄療欬唾膿血。大明消痰止渴皆滋肺經血氣之效。金匱澤漆湯用以治欬而脈沉者。欬屬肺。脈沉則血分之病也。亦治下痢肺痛與紫參同功。其性辛而不燥。潤而不寒。補而不滯。善調五勞體虛。止嗽定喘。療驚悸吐衄諸血。又能通調水道。故溺濁便血單服一兩卽效。然大泄肺氣陰虛肺熱乾欬禁用。以其性專溫散而無培養之力也。白者曰玄菀。大泄肺氣。本經主風寒洗洗霍亂洩利。腸鳴上下無常處。驚癇寒熱百病。一皆氣分受傷之病。肘後方治人面黑令白方。用女菀三分。鉛丹一分爲末。醋漿服。一刀圭日進三服。十日大便黑。二十一日面白便止。過用則太白矣。千金方用酒服。男十日。女二十日。黑色皆從大便去。三十歲後不可服。以肺氣漸減不可

復洩也。

麥門冬

本作
靈冬

甘寒無毒。去心用。卽不煩心。

本經主心胸結氣。腹中傷餽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕

身。不老不饑。

發明

麥門冬陽中微陰。入心肺腎。及足陽明之經。定心熱驚。療肺痿吐。膿專泄而

不專收。寒多人禁。服肺中伏火。脈氣欲絕者。加五味子。人參爲生脈散。專補脈中元氣不足。東垣云。六七

月間。漏熱方盛。人病骨乏無力。身重氣短。頭旋眼黑。甚則痿軟。故孫真人以生脈散補其天元真氣。脈者

人之元氣也。人參之甘溫。漏陰火而益元氣。麥門冬甘寒。滋燥金而清水源。五味子之酸鹹。漏內火而補

庚金。兼益五藏之氣也。時珍曰。麥門冬以地黃爲使。服之令人頭不白。添精補髓。通腎氣。定喘促。令人肌

體滑澤。本經主心胸結氣。腹中傷餽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。一氣貫下。言因過飽傷胃。而致心胸氣結。脈絕

不通。羸瘦短氣。故宜以此滋其津液。通其肺胃。殊非開豁痰氣。消蔻飲食之謂。其陰虛羸瘦。喘欬上氣失

音失血。及風熱暴嗽。咸非所宜。恐寒鬱熱邪。牢不可破。多成虛損之疾。麻疹欬嗽。不可誤用。以其性寒助

陰。固斂陽邪。不能發越也。凡脾胃虛寒泄瀉。及痘瘡虛寒作瀉。產後血虛瀉渴。皆非所宜。

萱草一名忘憂。一名宜男。甘平無毒。發明。萱性下走入陰。故根治沙石淋。下水氣。及酒癰大熱衄血。搗酒服

治吹乳腫痛。○花治酒癰。利濕。其花起層苔。有毒勿食。

淡竹葉 甘寒無毒。發明 淡竹隰生嫩苗葉綠花碧根鬚結子與竹絕然不同性專淡滲下降故能去煩熱清心利小便。根能墮胎催生。

冬葵子

向日葵子也

甘寒滑無毒。

本經主五藏六府寒熱羸瘦破五癃利小便。發明 向日葵質堅耐

寒入冬不凋故名冬葵性滑利竅能治藏府寒熱羸瘦破五淋利小便婦人乳房脹痛同砂仁等分爲末。

熱酒服三錢其腫即消孕婦難產不下專取一味炒香爲末芎歸湯下三錢則易生取晨暮轉動靈活耳夏子益奇疾方云有人手足忽長倒生肉刺如錐痛不可忍但食葵菜即愈亦取其寒滑利竅之用也。

蜀葵 甘寒滑無毒。發明 葵以蜀中最勝種類最多其子入藥皆性滑利竅能潤氣血之燥千金稱

其味客熱利腸胃是言其榮也東垣取其花之白者治白帶赤者治赤帶隨其色而爲所用被狗齧者食之瘡永不癒。

秋葵子 甘寒滑無毒。發明 葵色種種惟花於秋者獨稟金氣而色黃其子性專潤下治小便淋。

及催生用之與向日葵不殊其花消癰腫浸油塗火傷其痛即止。

龍葵

即老鴉眼晴草

苦微甘滑寒無毒。發明 龍葵性滑如葵言苗葉也消熱散血壓丹石毒去婦人敗血。

老鴉眼睛言其子也善能續筋消疔腫與苗葉不異根利小便與木通煎服効。

酸漿一名通龍草。俗名掛金燈。 苦寒無毒 本經主熱煩溼定志益氣利水道 發明 酸漿利潤除熱清肺治嗽化痰。痰熱去而志定氣和矣。又主咽喉腫痛。蓋此草治熱痰欬嗽。佛耳草治寒痰欬嗽。故其主治各有專司也。

敗醬草一名苦菜。又名鹿腸。根作敗醬氣故名。 苦平無毒 本經主暴熱火瘡赤氣疥瘡疽痔馬鞍熱氣。發明 敗醬乃手陽明厥陰藥。善除暴熱火瘡。皆取苦寒散毒之用。其治疽痔馬鞍熱氣以其性專下泄也。金匱薏苡附子敗醬散。治腸癰固結未潰。故取薏苡下達。敗醬苦降。附子開結。而為熱因熱用之嚮道。深得本經之旨。若膿成熱毒勢脹。不可用也。而婦人下部疽蝕方中亦恒用之。近世醫師罕有識者。惟徽人採取笮乾曰苦笮菜。惜乎不知治療之功用也。

款冬花 辛溫無毒。紫色有白絲者真。蜜水拌微炒。本經主欬逆上氣。善喘喉痹。諸驚癇寒熱邪氣。發明 款冬味辛入氣分。色紫歸血分。雖其性溫却無燥血。故能輕揚上達。觀本經主治一皆氣升火炎之病。古方用為溫肺治嗽之要藥。潤肺消痰止嗽定喘。喉痹喉瘡。肺痿肺癰咸宜用之。有人病欬多日。或令燃款冬花三兩放無風處。以管吸其烟。數日果愈。婺源失合。陰虛勞嗽禁用。以其性溫也。

鼠麴草卽鼠耳草。又 甘平無毒 發明 別錄鼠耳主寒癇寒熱欬嗽。東垣佛耳治寒嗽及痰除肺中

寒大升肺氣。日華云。大抵寒嗽多是火鬱於內。寒覆於外。故佛耳款冬爲之必用。宣明透膈散治寒鬱肺絡之嗽。用佛耳款冬。鍾乳雄黃爲末。並於爐中燒。以筒吸烟嚥下。有涎即吐去。屢效。

決明子。鹹平無毒。別錄云。苦甘微寒無毒。炒研用。本經主青盲目淫膚赤白膜。眼赤痛淚出。久服益精光輕身。發明相感志言。園中種決明蛇不敢入。丹溪言。決明解蛇毒本此。入藥明目。本經治青盲目淫眼赤淚出。取其苦寒清熱也。以水調末塗腫毒。貼心止鼻衄。貼太陽穴治頭疼。作枕治頭風。別錄療口瘡。是主肝經畜熱之驗也。不宜久服。久服令人患風。伐肝搜風太過。反招風熱也。本經言久服益精光輕身。是指目疾人肝熱內滯者而言。若肝虛血弱者。過用虛風內擾在所必致耳。

地膚子一名落帶

又名黃蒿。甘寒無毒。本經主膀胱熱利小便。補中益氣。久服耳目聰明。輕身不老。發明

衆病皆起於虛。虛而多熱。則小便不利。精氣日燔。故本經主以清利膀胱邪熱。中氣自復。耳目聰明矣。具能祛熱利小便。去陰火。治客熱丹腫。葉主老人夏秋間熱淋。用此搗自然汁服之。卽通。男子白濁用地膚子白斂爲丸。滾湯下。婦人白帶。地膚子爲末。熱酒服之屢效。○苗葉燒灰煎霜。制砒石粉霜。水銀硫黃雄黃硝砂。毒。

瞿麥家種者
曰洛陽

苦寒無毒。本經主關格諸癟結。小便不通。出刺決癟腫。明日去。醫破胎墮子下閉血。

一發明。瞿麥利小便爲君主之用。故本經專主關格諸癥結。小便不利。有水氣。其人苦渴者。用栝蒌瞿麥丸。古方通心經利小腸爲最要藥。若心經雖有熱。而小腸虛者。服之。則心熱未退。而小腸別作病矣。以其降泄太過也。本經又言。出刺取鮮者。搗塗竹木刺也。破胎墮子下閉血。皆利竅所致。故妊娠產後小水不利。及脾虛水腫禁用。以性專泄氣也。

王不留行卽剪金花俗名金盞銀臺。苦甘平無毒。發明。王不留行。專行血分。乃陽明厥陰衝任之藥。能通乳利竅。其性走而不守。故妊娠禁服。一婦患淋臥久。用此煎服再劑而愈。其利小便。出竹木刺與瞿麥同功。

葶藶。辛苦寒小毒。酒淨焙用。療寶水滿急生用。本經主癰瘕積聚結氣。飲食寒熱。破堅逐邪。通利水道。發明。葶藶苦寒不減硝黃。專泄肺中之氣。亦入手陽明足太陽。故仲景瀉肺湯用之。肺氣壅塞。則膀胱之氣化不通。督之水注上竅。閉則下竅不通。水濁泛溢爲喘。滿爲脹。爲積聚。種種諸病生矣。辛能散苦。能泄大寒沉降。能下行逐水。故能療本經諸病。亦能泄大便。爲其體輕性沉降。引領肺氣下走大腸。又主肺癰喘逆。痰氣結聚。通身水氣。脾胃虛者宜遠之。大戟去水。葶藶愈。服用之不節。反乃成病。葶藶有甘苦二種。緩急不同。大抵甜者下泄性緩。雖泄肺而不傷胃。苦者下泄之性急。既泄肺而復傷胃。故以大棗輔之。然肺之水氣膶滿急者。非此不能除。但水去則止。不可過劑。金匱方云。葶藶傳頭瘡。壅氣入腦殺。

人。

車前子。甘鹹寒無毒。酒浸焙用。本經主氣瘤。止痛利水道。除濕痹。久服輕身耐老。
發明 車前子入足太陽少陰。能利小便而不走氣。與茯苓同功。本經治氣瘤止痛。通腎氣也。小便利則濕去。濕去則痹除。別錄治女子淋瀝等病。專取清熱利竅之功也。男女陰中有二竅。一竅通精。一竅通水。二竅不兼開。水竅得氣化乃出。精竅得火動乃泄。車前專通氣化行水道。疏利膀胱濕熱。不致擾動真火。而精氣甯謐矣。故凡瀉利暴下病。小便不利而痛者。用車前子爲末。米飲服二錢。利水道分清濁而穀藏止矣。又治目疾水輪不清。取其降火而不傷腎也。時珍用以導小腸熱。止暑濕濁。取甘平潤下之用耳。陽氣下陷。腎氣虛脫。人勿服。其葉搗汁溫服。療火盛泄精甚驗。若虛滑精氣不固者禁用。

馬鞭草一名龍牙草 苦微寒無毒。發明 馬鞭草色赤入肝經血分。故治婦人血氣腹脹。月經不勻。通經散瘕。治金瘡行血活血。生搗汁飲。治喉癰癰腫。又搗敷治下部疊瘡。及蠼螋尿。男子陰腫。惟陰血虛而胃弱者勿服。

光明草即狗尾草 發明 眼赤拳毛倒睫者。翻轉目瞼。以一二莖蘸水。蔓去惡血甚良。
體腸草即旱蓮草 一名金陵草 甘酸平無毒。發明 體腸草腎經血分藥。灸瘡發洪血不可止者。傅之立已。汁

塗眉髮生瘡而篩皆益腎養血之驗。故烏鬚髮方用之。千金方有金陵煎能益髓髮變白為黑也。單用熬膏治大便下血。腎主二便。但脾胃虛大便易漏者勿服。

連翹 苦平無毒。根名連韜。甘寒平小毒。本經主寒熱鼠瘻癰癧。腫惡瘡癰瘤結熱疘等。●發明連翹輕清而浮。本手少陰厥陰氣分藥。漏心經客熱破血結散氣聚消腫毒利小便諸痛瘡瘍皆屬心火。連翹漏心爲瘡家聖藥。十二經瘡藥中不可無此。乃結散之之義。本經專主寒熱鼠瘻癰癧癰瘤結熱等病。皆由足少陽膽經氣鬱而成。此藥正清膽經鬱熱。癰瘍惡瘍無非營衛壅遏得清涼以散之。蟲毒所結得辛香以解之。然苦寒之性僅可以治熱腫。故癰疽潰後。膿清色淡。及胃弱食少者禁用。○根寒降專下熱氣治濕熱發黃。濕熱去而面悅好。眼目明矣。仲景治瘀熱在裏發黃。麻黃連韜赤小豆湯主之。奈何世鮮知此。如無根以實代之。

陸英一名蒴藋又接骨草 苦寒無毒。本經主骨間諸癆。四肢拘攣疼痠。膝寒痛。陰痿短氣不足。脚腫。●發明陶藏本草甄權藥性皆言陸英卽蒴藋。田野村墟甚多。人家所植。高大色赤者是陸英。田野所出不紅葉。上有粉者是蒴藋。二味所主大率相類。外臺千金方多用之。世以其賤而全置不講也。

藍寶 大青 小青 苦寒無毒。有二種。大者曰大青。苗高如蓼。小者曰小青。葉光如景天。向搗在麻後今併此

本經解諸毒殺蠅蚊同
痘瘡鬼蟹毒

發明

本經取用藍寶乃大青之子是卽所謂蓼藍也性寒至陰

其味苦寒故能入肝本經取治疊症諸毒專於清解溫熱諸邪也陽毒發斑咽痛必用之藥而莧葉性味不異主治皆同日華子治天行熱狂疔腫風疹朱肱治發斑咽痛有犀角大青湯大青四物湯皆取其葉以治溫熱毒盛發斑之藥非正傷寒藥也蓋大青瀉肝膽之實火正以祛心胃之邪熱所以小兒疳熱丹毒爲要藥○小青搗敷腫癰甚效治血痢腹痛殺百藥毒解狼毒射罔斑蝥砒石等毒千金以藍葉搗汁治腹中鼈瘕夏子由奇疾方用板藍汁治腹內應聲蟲陳實功以藍同貝母搗敷人面瘡皆取苦寒以散蘊結之熱毒也○藍瀉以藍浸地坑一宿入石灰攪澄去水爲瀉其解諸毒傳熱瘡之用則一而殺蟲之功更効蟲爲下膈非此不除今人以染缸水治噎膈皆取其殺蟲也

青黛一名
藍
鹹寒無毒
發明
青黛乃藍瀉浮沫攪澄掠出收乾瀉肝膽散鬱火治溫毒發斑及產後熱痢下重于金藍青丸用之天行寒熱頭痛水研服之與藍同類而止血拔毒殺蟲之功似勝於藍又治噎膈之疾取其化蟲之力也和潤白堦冰片吹口瘡最效

蓼子
生水旁者曰水
蓼俗名紅草
鹹微溫無毒
本經明目溫中耐風寒下水氣療面浮腫癰瘍
發明
蓼實治消渴去熱及療癰瘍瘡瘍皆取其散熱消積之功卽本經下水氣面浮腫癰瘍之用其莧草子專治瘡

積鵝鵠丸用之。蓼葉治大小腸邪氣。黃帝云。蓼食過多。毒發心痛。婦人月事來不可食蓼及蒜。善爲血淋。帶下。扁鵲云。蓼食之令人寒熱。損骨髓。殺丈夫陰氣。

萹蓄 苦平無毒。本經主浸淫疥癬瘡痔。殺三蟲。發明 蔴蓄利水散濕熱。治黃疸霍亂。療小兒慶病。女子陰蝕。本經專主浸淫疥瘡瘡痔。所主皆濕熱之病。三蟲亦濕熱所化也。

白蒺藜 苦辛溫無毒。酒浸焙焦去刺研用。本經主惡血。破癰結積聚。喉痹乳難。久服長肌肉。明日輕身。發明 白蒺藜性升而散。入肝腎經。爲治風明目要藥。風入少陰厥陰經者。爲嚮導。目病爲風木之邪。風盛則目病。風去則目明矣。本經專破惡血積聚。治喉痹乳難。以苦能泄温能宣。辛能潤也。此言刺蒺藜之功用耳。久服長肌肉。明日輕身。以其入腎益精氣也。此則專主沙苑蒺藜而言。其治痰消癰腫。搜腎藏風氣。又須刺者。爲破敵之先鋒。千金方治白濶風。以一味爲末。湯服二錢。日二服。服至半月。白處見紅點。至一月效。

沙苑蒺藜 甘溫無毒。產沙苑者色微黑。而形似羊腎。若色微綠。雖產秦中。非沙苑也。酒蒸搗用。藥肆中以一種野田開紅花之土蒺藜爲充。咬之亦生豆氣。但缺處有尖鈎稍異耳。發明 沙苑蒺藜。產於沙漠北。得漠北之氣。性降而補益腎。治腰痛。爲泄精虛勞要藥。最能固精。故聚精丸用此佐鯨膠。大有殊功。以

之點湯代茶亦甚甘美。益人但腎與膀胱偏熱者禁用。以其性溫助火也。

穀精草 辛溫無毒 發明 穀精草性體輕浮能入陽明分野治目中諸痛甚良而去星尤爲專藥。明目退翳之功在菊花之上。痘後生翳亦用之。此草免性喜食故目疾家專用。與望月砂功用不殊。

海金沙 甘寒無毒。市鋪每以沙土雜入須淘淨取浮者曝乾撚之不沾指者真。發明 海金沙生於葉上。小腸膀胱血分藥也。熱伏二經血分者宜之。故小便熱淋莖痛爲要藥。腎藏真陽不足者忌用。地椒一名水楊梅生水邊條葉叢生似菊莖端開黃花實類椒而不赤 辛溫無毒 發明 地椒制丹砂粉霜見庚辛玉冊綱目名水楊梅時珍主治療瘡腫毒。

半邊蓮 辛平無毒 發明 半邊蓮小草也。生陰濕塍塹邊就地細梗引蔓節節生細葉秋開小花淡紅紫色止有半邊如蓮花狀故名專治蛇傷搗汁飲以渣圍之。

地丁 苦辛寒無毒 發明 地丁有紫花白花二種。治療腫惡瘡兼療癰疽發背無名腫毒其花紫者莖白白者莖紫故可通治疗腫或云隨疔腫之色而用之。但漫腫無頭不赤不腫者禁用以其性寒不利陰道也。

見腫消 酸瀉微毒 發明 見腫消專消癰腫及狗咬搗葉貼之傷寒餘毒發於耳前後用此一握同

白及白斂。大黃大薊苧根共搗成餅入芒硝一錢。白蜜少許和貼留頭乾卽易之。

毒草部

大黃本經名黃良。一名將軍。

苦寒無毒。產川中者色如錦紋而潤者良。若峻用攻下生用邪氣在上必用酒浸上

引而驅熱下行破瘀血。韭汁製虛勞吐血內有瘀積。薤汁拌炒黑用之。大腸風祕燥結。皂莢綠礬酒製。又尿桶中浸過能散瘀血兼行滲道。妊娠產後慎勿輕用。實熱內結勢不可緩。酒蒸用之。凡服大黃下藥須與穀氣相違得穀氣則不行矣。本經下瘀血。血閉寒熱。破癰瘕積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五藏。發明。大黃氣味俱厚。沉降純陰。乃脾胃大腸肝與三焦血分之藥。凡病在五經血分者宜之。若在氣分者用之是誅伐無過矣。其功專於行瘀血導血閉通積滯破癰瘕消實熱。瀉痞滿潤燥結。數腫毒總賴推陳致新之功。本經與元素皆謂去留飲宿食者以宿食留滯中宮久而發熱故用苦寒化熱。宿食亦乘勢而下。後世不察以爲大黃槩能消食謬矣。蓋胃性喜溫惡濕。溫之則宿食融化。寒之則堅滯不消以其能蕩滌腸胃。食積得以推蕩然後穀氣通利。中氣調暢。飲食輸化五藏安和矣。若食在上脘雖經發熱只須枳實黃連以消痞熱。宿食自通。若誤用大黃推蕩不下反致結滯不消爲害不淺。如瀉心湯治心氣不足吐血衄血者乃包絡肝脾之邪火有餘也。雖曰瀉心實瀉四經血中伏火。

也。仲景治心下痞滿。按之濡者。用大黃黃連瀉心湯。此亦瀉脾胃之濕熱。非瀉心也。若心下痞而復惡寒。汗出者。其人陽氣本虛。加附子以溫散之。病發於陰而反下之。因作痞。乃痰實與邪氣乘虛結於心下。故曰瀉心。實瀉脾也。病發於陽而反下之。則成結胸。乃熱邪陷入陰分而結於膈上。仲景大陷胸湯丸。皆用大黃。亦瀉脾胃血分之邪。而降其濁氣也。若結胸在氣分。則用小陷胸湯。痞滿在氣分。則用半夏瀉心湯矣。若病本陽邪。或兼停食。而攻發太過。正氣消乏。實結不解。擬欲攻之。而正氣不能行其藥力。則加人參於桃核承氣中。以助硝黃之勢。如陶氏黃龍湯之製。乃先輩之成則也。蓋大黃芒硝瀉腸胃之燥熱。牽牛甘遂瀉腸胃之濕熱。巴豆硫黃瀉腸胃之寒結。各有定例。至於老人血枯便祕。氣虛便難。脾虛腹脹少食。婦人血枯經閉。陰虛寒熱。脾氣痞積。腎虛動氣。及陰疽色白不起等證。不可妄用。以取虛虛之禍。商陸一名當陸赤者。性劣色白者良。辛寒有毒。銅刀刮去皮。水浸一宿。或醋炒。或黑豆拌蒸用。其赤者服之傷人。令人見鬼。同生水服殺人。本經主水腫瘤瘕等疾。與大戟甘遂異性同功。胃氣虛弱者不可用。腫滿小便不利者。以赤根搗爛入麝香三分。貼於臍心以帛束之。得小便利即腫消。或以大蒜同商陸煮汁服。亦治腫疾。仲景治大病後腰以下腫。牡蠣澤瀉散用之。以其病後不堪受邪。故用急迫以散之也。然水腫因脾虛者。若誤用之一。

則雖效未幾再發決不可救

狼毒 苦辛寒大毒陳者良。醋炒用出東魯泰山與防葵相類置水沉者爲狼毒浮者卽防葵也。本經主歎逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸。發明狼毒大毒非恆用之品。本經治歎逆上氣惟質寶氣壯暴歎者宜之。又能破積聚飲食寒熱水氣以其迅利也。性能殺飛鳥走獸其治惡瘡疽蝕蠱所不待言。肘後方以狼毒二兩附子半兩治心腹連痛脹急加旋覆蜜丸日服三丸治腹中冷痛及兩脇氣結又爲散擦惡瘡疥癬○愚按狼毒與防葵同根但質有輕重之別雖本經主治不同一皆瞑眩之品功用亦不甚相遠。今狼毒內有輕浮者卽係防葵無疑但本經條下有堅骨髓益氣輕身之說其性善走散力能攻逐三蟲故有益氣輕身之功本經不言攻蟲而攻蟲之用與狼牙無異。

狼牙本經名
牙子 苦辛寒有毒以其形似獸牙故名白者良。中濕糜爛生衣者殺人。本經主邪氣熱氣疥瘡惡瘡瘻痔去白蟲。發明狼牙較狼毒之性稍緩而所治亦相類金匱九痛丸用狼牙局方用狼毒方用附子三兩狼牙人參吳茱萸乾薑各一兩巴霜一錢蜜丸梧子大日服二三丸治九種心痛並卒中惡腹脹滿久連年積冷流注心胸痛及冷衝上氣落馬墜車血疾皆主之。本經治邪氣熱氣去白蟲蓋

心痛多有屬蟲積者。故前方用之亦治惡瘍瘡瘍。金匱外臺千金並以煎洗陰瘡瘍。搗汁治射工溪毒。肘後以之搗貼金瘡。外臺以之蜜丸。漿水服一丸。治寸白蟲。皆取殺蟲解毒之功也。

防葵 辛寒有毒。本經主痘瘡腸泄膀胱熱結溺不下。歟逆濕瘡癩癰驚邪狂走。久服堅骨髓益氣輕身。發明 防葵辛寒性善走散能治痘瘡腸泄膀胱熱結等證。而別錄又言療五藏虛氣小腹支滿臚服口乾除腎邪強志中有火者不可久服。令人恍惚見鬼。二說各有主見。一以治濁邪支塞驚邪狂走。故須久服。開除積垢自然髓充骨堅。正氣自復。一以療五藏虛氣腎邪逆滿故不可久服。久服恐正氣愈虛不能制五志之火。引領痰濕上侮君主。令人恍惚見鬼。同一防葵而有治驚邪狂走與久服見鬼之不同。此嘗攷于金方。防葵爲治風虛通血脈之上藥。每與參朮鍾乳石英並用。取其祛逐風虛通利血脈而正氣得復。腎志自強。當無助火爲虐之慮矣。

蘭茹 辛寒有小毒。折之汁出凝黑如漆。故名漆頭蘭。如色白者名草蘭茹。本經主疽蝕惡肉敗瘡死肌。殺疥蟲。排膿惡血。除大風熱氣。善忘不寐。發明 蘭茹本經治惡肉敗瘡等病。而素問四烏鵲一應茹丸。當非此蘭茹可治也。聖惠治頭風旋眩。千金治小兒癰疽。並用漆頭蘭茹。姚僧坦治癰疽去惡血。有白蘭茹丸。二者皆能散血。其治善忘不寐亦是因風熱侵犯心包膽府所致。散其風熱則無不寐善忘之。

患矣

大戟 苦辛大寒有毒。反甘草。入藥惟用正根。誤服傍株令人冷渴。棗煮則不損脾。乘軟去骨用。本經主蠱毒十二水。腹滿急痛。積聚中風皮膚疼痛吐逆。發明 大戟性稟陰毒。峻利首推苦寒下走腎陰。辛散上瀉肺氣。兼橫行經脈。故本經專治蠱毒十二水。腹滿急痛等證。皆濁陰填塞所致。然惟暴脹爲宜。云中風者。是指風水膚脹而言。否則傳寫之誤耳。夫大戟甘遂之苦以泄水者。腎所主也。痰涎之爲物。隨氣升降。無處不到。入於心則迷竅而成癲癇。妄言妄見。入於肺則塞竅而成欬唾稠粘。喘急背冷。入於肝則留伏蓄聚而成脇痛。乾嘔寒熱往來。入於經絡則麻痺疼痛。入於筋骨則頸項胸背腰脛手足牽引隱痛。三因方並以控涎丹主之。大戟能泄藏府之水濕。甘遂能行經隧之水濕。白芥子能散皮裏膜外之痰氣。惟善用者能收奇功也。痘瘡變黑歸腎。棗變百祥丸用大戟製棗去戟用棗以瀉肝邪。非瀉腎也。實則瀉其子。因腎邪實而瀉其肝也。仲景云。心下痞滿。引脇下痛。乾嘔短氣者。十棗湯主之。其中亦有大戟。夫乾嘔脇痛。豈非肝膽之病乎。百祥丸之瀉肝明矣。至玉樞丹。同續隨子山茨茹等解蠱毒藥。則又不獨肝膽矣。其脾胃肝腎虛寒。陰水泛濫。犯之立斃。不可不審。

澤漆本經名
本經

苦寒小毒。別錄曰。華陶氏皆言是大戟。苗綱目名猫兒眼睛草。時珍云。江湖源澤多有之。

揩莖有白汁粘人故名。本經主皮膚大熱。大腹水氣四肢面目浮腫。丈夫陰氣不足。發明。澤漆利水。功類大戟。遂誤以爲大戟。苗本經言利丈夫陰氣。則與大戟不相侔也。其治皮膚大熱。面浮腹大等證。兼挾表熱而言。其性與大戟亦相類也。金匱澤漆湯方用澤漆半夏紫參白前甘草人參桂心生薑。以治肺熱上氣。厥沉。大明言止瘧疾。消痰退熱。肘後聖惠易簡。伏瘕水腫脚氣皆用之。

甘遂。苦甘大寒有毒。麪裹煨熟用。反甘草。其根皮赤。肉色白。作連珠大如指頭。質重不蛀者。貞赤皮者。其性尤烈。本經主大腹疝瘕腹滿。面目浮腫。留飲宿食。破癰堅積聚。利水穀道。發明。甘遂色白味苦。先升後降。乃漏水之峻藥。本經治大腹疝瘕。面目浮腫。留飲宿食等病。取其苦寒迅利。疏通十二經。攻堅破結。直達水氣所結之處。仲景大陷胸湯。金匱甘草半夏湯用之。但大漏元氣。且有毒不可輕用。腎主水凝則爲痰。飲溢則爲腫。脹。甘遂能泄腎經濕氣。治痰之本也。不可過服。中病則止。仲景治心下留飲。與甘草同用。取其相反而立功也。肘後方治身面浮腫。甘遂末二錢。以雄猪腎一枚。分七片。入末拌匀。濕紙裹煨令熟。每日服一片。至四五服。當腹鳴小便利。是其效也。然水腫鼓脹。類多脾陰不足。土虛不能制水。治當辛溫補脾實水。兼利小便。若誤用甘遂大戟。商陸牽牛等味。禍不旋踵。而癲癇心風血邪。甘遂二錢爲末。以猪心管。和藥入心內縛定。濕紙裹煨熟。取藥入辰砂末一錢。分四圓。每服一圓。以猪心煎湯下。

大便利下惡物爲效。未下更服一圓。凡水腫未全消者。以甘遂末塗腹。邊臍令滿。內服甘草湯。其腫便去。二物相反。而感應如此。塗腫毒如上法亦得散。又治肥人卒然耳聾。甘遂一枚綿裹塞耳中。口嚼甘草耳。卒然自通也。

續隨子卽千金子

辛溫有毒。去殼取色白者。以紙包壓去油取霜用。發明 繼隨子下氣最速。然有毒損。

人與大戟澤漆甘遂莖葉相似。主療亦相似。其功長於利水解毒。故玉樞丹用之。服後漏多。以醋同粥食。

卽止。若脾虛便滑之人。誤服必死。黑子疣贊。續隨子搗爛時塗之自落。或以煮線繫瘤根。時時緊之漸脫。

蕡菪一名天仙子

子苦寒根苦辛有毒。本經主齒痛出蟲。肉癆拘急。多食令人狂走。發明 蕁菪入癩

狂方用。然皆用其子耳。故言勿令子破。則令人發狂。本經治肉癆蟲蠶。用其毒以攻治也。千金治石癰。

堅硬不作膿者。蕡菪子爲末。醋和傅瘡頭。根卽拔出。打撲折傷。羊脂調蕡菪子末傅之。○蕡菪根主治與

子不殊。瘧疾不止。蕡菪根燒灰水服一錢七節。止惡癬有蟲。蕡菪根搗爛和蜜傅之。惡刺傷人。蕡菪根水

煮汁浸冷。卽易之。箭頭不出此亦主之。皆千金神方也。狂犬咬人。蕡菪根和鹽日三傅之。此外臺祕要方

也。今人用根治噎膈反胃。取其性走。以祛胃中留滯之邪。噎隔得以暫開。虛者誤服。爲害不測。時珍云。蕡

菪之功。未見如所說。而其毒有甚焉。煮一二日。尚能生芽。其爲物可知矣。服蕡菪雲實防葵赤商。陸皆令

人狂惑見鬼者。蓋此類皆稟陰毒。能使痰迷心竅。閉其神明。以亂視聽故耳。

蓖麻子。甘辛溫有毒。去殼取仁白者良。禁食炒豆犯之必脹。發明。蓖麻屬陰。其性善收。能追臘取毒。拔邪外出。爲外科要藥。能出有形之滯物。故取胎產胞衣剩骨膠血者用之。時珍云。蓖麻甘辛有熱毒。氣味頗近巴豆。亦能利人。故下水氣。其性善走。能開通諸竅經絡。治偏風失音口噤口目喝斜。頭風七竅諸病。不止於出有形之物也。蓋鵝鴨油能引藥氣入內。蓖麻油能拔病氣出外。故諸膏多用之。偏風手足不舉。同羊脂穿山甲麝香煎膏。日摩漸正。研塗瘻瘍痘毒癰腫卽消。蓋能引毒外出耳。一人病手臂結塊腫痛。用蓖麻仁搗膏貼之卽愈。一人病氣鬱而偏頭痛。用此同乳香食鹽搗敷太陽。其痛立止。一婦產後子腸不收。搗貼丹田卽上。此藥外用屢奏奇効。但不宜內服耳。

常山一名恆山。苦辛溫有毒。川產淡黃細實如雞骨者良。醋炒則不吐人。本經主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒。胸中痰結吐逆。發明。夫瘧有六經五藏。痰濕食積風邪瘴疫。須分陰陽虛實。不可一槩論也。常山治瘧。有刲瘻截病之功。須在發散表邪。及提出陽分之後。服之得宜。生用多用。則上行必吐。若酒浸炒透。則氣少緩。稍用錢許。亦不致吐也。得甘草則吐得大黃則利。蓋無痰不作瘧。常山專在驅逐痰水。楊士瀛云。常山治瘧人皆薄之。瘧家多畜痰涎黃水。或停滯心下。或結澼脣間。乃生寒熱。法當吐涎逐水。常山豈

容不用。所以本經專主寒熱溫瘧。痰結吐逆。以瘧病多由傷寒熱或時氣溫疫而致。痰水蓄聚心下也。夫水在上焦。則常山能吐之。水在腸下。則常山能破其澼而下其水。但須行血藥佐之。如桃仁達赤。穿山甲之類。其有純熱發瘧。或蘊熱內竇之證。投以常山。大便點滴而下。似泄非泄。須用大黃爲佐。瀉利更行。然後獲愈。常山陰毒之草。其性暴悍。雖有破癥逐飲之能。然苦損真氣。所以仲景治瘧方中。從無及此。而夏傷於暑。秋必疚瘧。及瘧在三陰。元氣虛寒人。則常山穿山甲輩。皆爲戈戟。

蜀漆 苦辛溫有毒。本經主瘧及厥逆寒熱。腹中癰堅。積聚邪氣。蠭毒鬼疰。發明 蜀漆卽常山之苗。故本經治瘧。及厥逆寒熱。積聚蠭毒。功效與之相類。金匱治牝瘧獨寒不熱者。有蜀漆散。用蜀漆雲母龍骨酢漿水服之。溫瘧加蜀漆一錢。用酸漿者。取酸收以斂蜀漆之辛散也。

藜蘆 辛苦寒有毒。反五參。服之吐不止者。飲葱湯卽止。本經主蠭毒咳逆。泄痢腸澼。頭瘡疥癩惡瘡。殺諸蟲毒。去死肌。發明 藜蘆服錢匙則惡吐。而本經治蠭毒厥逆。泄痢腸澼。是指積氣內盛者而言。積去則欬與利止矣。又通項令人嘔。按常山吐瘧痰。瓜蒂吐熱痰。烏附尖吐濕痰。藜菔子吐氣痰。藜蘆則吐風痰者也。凡胸中有老痰。或中蠭毒。止可借其宣吐。切勿沾口。大損胃中津液也。若厥逆泄利腸澼等證。苟非實邪壅滯。慎勿輕試。不可因本經之言而致惑也。別錄治喉痹不通。鼻中瘻肉。並爲散吹鼻孔效。

附子。辛熱大毒。反半夏。瓜萎。貝母。白蔹。古方以一兩一枚者爲力全。近時專取大者爲勝。用鹽過多。雖一兩五六錢。製熟不及七八錢。且容易腐爛。若欲久藏。須同竈灰入罐中。置近火處。庶可經久。其性熱有毒。必正節角少。頂細臍正者爲上。頂粗有節多鼠乳者次之。傷缺偏綱者爲下。有兩岐者名烏喙。此稟氣不正。耑主大風頑痹。附子生用則散陰寒。熟用則助真元。生用去皮臍。熟用甘草童便制。若欲久藏。一味甘草濃煎汁煮。汁盡爲度。入陽虛補劑用黃連甘草制。凡中其毒。生萊菔汁及黃連解之。近時烏附名產陝西。其質粗。其皮厚。其色白。其肉鬆。其味易行易過。非若川附之色黑皮薄。肉理緊細。性味之辛而不烈。久而愈辣。峻補命門真火也。本經主風寒欬逆邪氣。寒濕痿蹙拘攣。膝痛不能行步。破癰堅積聚。血瘕金瘡。發明。附子氣味俱厚而辛烈。能通行十二經。無所不至。煖脾胃而通膈噎。補命門而救陽虛。除心腹腰膝冷痛。開肢體脾濕痿弱。療傷寒呃逆不止。主督脈脊強而厥。救寒疝引痛欲死。斂癰疽久潰不收。及小兒脾弱慢驚。並須製熟用之。附子爲陰證要藥。凡傷寒陰證厥逆。直中三陰。及中寒夾陰。雖身熱而脈沉細。或浮虛無力者。非此不治。或厥冷腹痛脈沉細甚。則唇青囊縮者。急須生附以峻溫散之。本經治風寒咳逆。當是陰寒呃逆亥豕之謬。詳本經所主諸證。皆陰寒之邪乘虛客犯所致。其主金瘡者。是傷久氣血虛寒。不能收斂。非血出不止之金瘡也。別錄又主腰脊風寒。脚氣疼弱。心腹冷痛等病。總取溫經。

散寒之力耳。附子稟雄壯之質。有斬關奪將之能。能引補氣藥行十二經。以追復散失之元陽。引補血藥入血分。以培養不足之真陰。引發散藥開腠理。以驅逐在表之風寒。引溫暖藥達下焦。以祛除在裏之冷濕。附子以白朮爲佐。乃除寒濕之聖藥。然須並用生者。方得開通經絡。若氣虛熱甚。宜少用熟附。以行參耆之力。肥人多濕。亦宜少加烏附。行經附子得乾薑。灸甘草。名四逆湯。主少陰經寒證。得桂枝。甘草。薑棗。名桂枝附子湯。治風濕相搏。身體疼痛。不能轉側。得白朮。甘草。薑棗。名朮附湯。治風虛頭重眩。極得麻黃細辛。名麻黃附子細辛湯。治少陰病發熱脈沉。得大黃芩連。名附子瀉心湯。治心下痞而惡寒汗出。得大黃細辛。名大黃附子湯。治胸下偏痛。發熱脈弦緊。得參朮芩芍。名附子湯。治少陰病。始得之背惡寒。得茯苓白朮芍藥生薑。名真武湯。治少陰病腹痛小便不利。四肢疼痛目利。得乾薑葱白。名白通湯。治少陰病利下脈微。若厥逆無脈。乾嘔而煩。面色赤。加葱白以通陽氣。此皆得配合之神妙。能起死回生於反掌間。生熟各隨本方。趙嗣真云。生附配乾薑。補中有發。熟附配麻黃。發中有補。宜生宜熟。不出此中妙用也。至於崔氏八味丸。用爲少陰嚮導。後世認爲補藥誤矣。東垣治陰盛格陽面赤目赤。煩渴引飲。脈來七八至。但按之卽散者。用乾薑附子湯。加人參半斤。服之得汗而愈。時珍云。陰寒在下。虛陽在上。治之以寒。則陰氣愈盛。治之以熱。則拒而不納。熱藥冷服。下咽之後。冷性既消。熱性便發。病氣隨愈。此熱因寒用之法也。

附子性沉。著溫脾逐寒。烏頭性升發溫脾去風。若寒疾卽用附子。風疾卽用烏頭。二藥俱走而不守。故墮胎爲百藥長。然妊娠脈弦發熱。胎脹惡寒。小腹如扇。金匱用附子湯以安其胎。此神聖之妙用也。若傷寒發熱頭痛皆除。熱傳三陰而見厥逆脈沉。此厥深熱深之候。證必先發熱頭痛。七八日或十餘日後。而見厥冷脈沉。此爲陽厥。大便必不瀉而閉。及溫疫熱伏厥逆。與陰虛內熱火鬱於內而惡寒者誤用。不旋踵告變矣。附子乃退陰回陽必用之藥。近世疑而不用。直待陰極陽竭而用已遲矣。且夾陰頭痛足冷上熱下寒。陰邪內盛。陽氣外衰。急需人參健脈以益其原。佐以附子溫經散寒。捨此不用。將何救之。

川烏頭 辛熱有毒。入祛風藥同細辛黑豆煮入活絡藥同甘草炮製。按烏頭乃附子之母。春生新附。卽採其母。諸家本草未嘗發明。但云春採者爲烏頭。故舉世誤認烏頭爲春時取附子之小者。往往以側子代用。誤人多矣。反半夏。發明 烏頭得春升之氣。故治風爲嚮導。主中風惡風。半身不遂。風寒濕痹。心腹冷痛。肩臂痛不可忍。仰及陰疽久不潰者。潰久瘡寒。死肉不斂者。並宜少加以通血脈。惟在用之得宜。小兒慢驚搐搦涎壅厥逆。生川烏全蠍加生薑煎服效。其烏附之尖爲末。茶清服半錢。吐癲癧風痰。取其銳氣從下焦直達病所。借茶清涌之而出也。夫藥之相反者。以烏頭半夏爲最。而金匱赤丸及普濟方俱二味同用。非炒達聖義者。難以語此。

天雄

辛溫大毒。卽附子之獨顆無附。大倍附子者制法與附子同。

本經主大風寒濕痹。歷節痛。拘攣。

緩急。破積聚邪氣。金瘡。強骨髓。輕身健行。發明。天雄稟純陽之性。補命門。三焦。壯陽。精強腎氣。過於附子。故本經用以治大風寒。開濕痹。歷節。拘攣諸病。陽氣衰痿者。佐人參用之。天雄。附子。性皆下行。若上焦陽虛者。當用參耆。不當用此也。且烏附之尖。皆是向下生者。其臍乃向上生苗處。宗奭元素皆誤認尖爲上。惟震亨以爲下部之注者得之。肘後三建湯。治元陽素虛。寒邪外入。厥冷脈沉。及傷寒陰毒。川烏附子。天雄。炮制等分。每服四錢。加生薑十五片。溫服。金匱治男子失精。用天雄龍骨。桂枝。白朮。爲散。酒服半錢。淮南用天雄一枚。納雄雞腹中。煮爛搗食之。令人勇取壯肝腎之氣也。

側子卽剪 辛熱大毒。發明。側子乃散生烏附之旁側體。無定在其氣輕揚。宜其發散四肢。充達皮毛。爲治風之藥。唐元希聲治癱瘓。有側子湯。見外臺祕要。○又附子之初生。瑣細未成者。曰漏藍。言其小而籃不能盛。漏出籃下也。專治冷漏惡瘡。

草烏頭一名毒公 辛熱大毒。卽烏頭之野生者。或生用。或炮用。各隨本方。有兩岐相合。如烏之喙者。名烏喙。本經主中風惡風。洗洗出汗。除寒濕痹。欬逆上氣。破積聚寒熱。其汁煎之。名射罔。殺禽獸。發明。草烏頭射罔。乃至毒之物。非若川烏頭附子之比。自非風頑急疾。不可輕投。此藥止能搜風勝濕。潤頑痰。治頑。

瘡以毒攻毒而已。本經治惡風洗汎汗出。但能去惡風而不能回陽散寒。可知昔人病風癬服草烏頭木鼈子藥過多。甫入腹遂麻痺不救。烏附五種主治攸分。附子大壯元陽。雖偏下焦。而周身內外無所不至。天雄峻溫不減於附。而無頃刻回陽之功。川烏耑搜風濕痛痹。却少溫經之力。側子善行四末。不入藏府。草烏悍烈。僅堪外治。此烏附之同類異性者。至於烏喙氣不純。服食遠之可也。

射罔 苦溫大毒。人中射罔毒。以甘草藍汁。小豆葉浮萍冷水。薺蕘皆可一味禦之。發明 烏喙射罔至毒之藥。雖有治尸疰癰堅。瘻瘍毒腫及蛇咬。先取塗肉四畔。漸漸近瘡。習習逐病至骨。瘡有熱膿。及黃水者方可塗之。若無膿水。有生血及新傷破。卽不可塗。立能殺人。

白附子 辛甘溫小毒。發明 白附子純陽引藥勢上行。乃陽明經藥。治肝氣風癬陰瘡。洗肝黑。入面脂。用其性燥血耗氣。是以類中風證。雖有痰壅禁用。小兒慢驚勿服。

天南星本經名虎掌 苦辛溫有毒。治風痰生用。須以礬湯浸。若熟用。以濕紙包於燭火中炮製用。造膽星法。以南星磨末。篩去皮。臘月入黃牛膽中。懸當風處乾之。年久多拌者良。或兼蜂蜜以潤其燥。但色易黑。不能久藏。本經主心痛寒熱結氣。積聚伏梁筋痿拘緩利水道。發明 天南星之名。始自開寶。卽本經之虎掌也。以葉取象。則名虎掌。根類取名。故曰南星。雖具二名。實係一物。爲開滌風痰之耑藥。本經治心。

痛寒熱結氣。卽開寶之下氣利胸膈也。本經之治積聚伏梁。卽開寶之破堅積也。本經之治筋痿拘緩。卽開寶之治中風除麻痺也。本經之利水道。卽開寶之散血墮胎也。夫水由血不歸經所化。蘊積於經而爲濕熱。則風從內發。津液凝聚爲腫脹。爲麻痺。爲眩暉。爲頭仆。爲口噤。身強爲筋脈拘緩。爲口眼喎斜。各隨身之所偏而留著不散。內爲積聚。外爲癰腫。上爲心痛。下爲墮胎。種種變端。總由濕熱所致。蓋緣一物二名。後世各執一例。是不能無兩歧之說。卽仲淳之明。尙以開寶之文衍之爲疏。而本經主治置之罔聞。何怪諸家採集藥性。一皆舍本逐末乎。按天南星味辛而麻。故能治風散血。氣溫而燥。故能勝濕除痰。性緊而毒。故能攻積拔腫。而治口喎舌瘻。諸風口禁。更以石菖蒲人參佐之。南星半夏。皆治痰藥也。然南星專走經絡。故中風麻痺。以之爲嚮導。半夏專走腸胃。故嘔逆泄瀉。以之爲嚮導。千金治婦人頭風攻目作痛。掘地作炕燒赤。入南星於中。以醋沃之。蓋定候冷。爲末酒服半錢。易簡治面生疣子。醋調南星末塗之。其新生之芽曰由跋。本經治毒腫結氣。千金方用之。取其開結熱之用耳。

半夏 辛溫有毒。湯浸同皂莢白礬煮熟。薑汁拌焙乾用。或皂莢白礬薑汁竹瀝四製尤妙。咽痛醋炒用。小兒驚癇發搐。及膽虛不得眠。猪膽汁炒入脾胃丸劑爲細末。薑汁拌盦作糊。候陳炒用。反烏附者。以辛燥鼓激悍烈之性也。忌羊血海藻飴糖者。以甘膩凝滯開發之力也。本經主傷寒寒熱心下堅胸脹。欬

逆頭眩。咽喉腫痛。腸鳴下氣止汗。發明。半夏爲足少陽本藥。兼入足陽明太陰。虛而有痰氣。宜加用之。胃冷嘔噦。方藥之最要。止嘔爲足陽明。除痰爲足太陰。柴胡爲之使。故小柴胡湯用之。雖爲止嘔。亦助柴胡黃芩主往來寒熱也。本經治傷寒寒熱。非取其辛溫散結之力歟。治心下堅胸脹。非取其攻堅消痞之力歟。治欬逆頭眩。非取其滌痰散邪之力歟。治咽喉腫痛。非取其分解陰火之力歟。治腸鳴下氣止汗。非取其利水開痰之力歟。同蒼朮茯苓治濕痰。同桔梗黃芩治熱痰。同南星前胡治風痰。同芥子薑汁治寒痰。惟燥痰宜栝蔞貝母。非半夏所能治也。半夏性燥。能去濕豁痰健脾。今人惟知半夏去痰。不言益脾利水。脾無留濕。則不生痰。故脾爲生痰之源。肺爲貯痰之器。半夏能主痰飲及腹脹者。爲其體滑而味辛性溫也。二陳湯能使大便潤而小便長。世俗皆以半夏南星爲性燥悞矣。濕去則土燥。痰涎不生。非二物之性燥也。古方治咽痛喉痹。吐血下血。多用二物。非禁劑也。按靈樞云。陽氣滿。則陽躋盛。不得入於陰。陰虛則目不瞑。飲以半夏湯一劑。通其陰陽。其効立至。半夏得栝蔞實黃連。名小陷胸湯。治傷寒小結胸。得雞子清苦酒。名苦酒湯。治少陰咽痛生瘡。語聲不出。得生薑名小半夏湯。治支飲作嘔。得人參白蜜。名大半夏湯。治嘔吐反胃。得麻黃蜜丸。名半夏麻黃丸。治心下悸。忪。得茯苓甘草。以醋煮半夏。共爲末。薑汁麪糊丸。名消暑丸。治伏暑引飲脾胃不和。此皆得半夏之妙用。惟陰虛羸瘦。骨蒸汗泄。火鬱頭痛。熱傷欬嗽。

及消渴肺痿。欬逆失血。肢體羸瘦。禁用。以非濕熱之邪。而用利竅行濕之藥。耗竭其津液之罪也。豈藥之咎哉。

蚤休卽草紫河車金線重

苦微寒有毒。本經主驚癇。搖頭弄舌。熱氣在腹中。發明。蚤休足厥陰

樓俗名七葉一枝花

。能治驚癇。瘧疾。癲癇。癰腫。詳本經主治。總取開結導熱。而驚癇。搖頭弄舌之熱邪。自除。元氣虛者。禁

用。醋磨敷癰腫。蛇毒有効。

鬼本經名九曰。一名天曰。一名馬目。毒公。又有尤律草。害母草。獨脚

辛溫有毒。本經殺蟲毒鬼疰

痘。蓮羞天花。璣田草。山荷葉。八角盤。唐婆鏡。鬼藥。爵犀解毒等名。

辟惡氣。不祥。逐邪。解百毒。

發明。鬼曰。辛溫以毒攻毒之猛藥。本經殺鬼疰蟲毒。辟惡逐邪。甯無

顧名思實之意。其治邪癇。陰疽。蛇毒。用之良方。一字神散。治子死腹中。無灰酒下一錢。立效。射工中人。寒熱發瘡。鬼曰葉一握。苦酒搗汁服一升。日二次效。

射干本經名烏扇。其葉叢生橫鋪。一而如烏翅及扇之狀。故有烏翫。烏吹。烏浦。鳳翼。鬼扇。扁竹。仙人掌等名。

苦辛微溫有毒。米泔浸煮熟炒用。本經主

欬逆上氣。喉痹咽痛。不得消息。散結氣。腹中邪逆。食飲大熱。發明。苦能下泄。辛能上散。本經治欬逆上氣。喉痹咽痛。不得消息。專取散結氣之功。爲喉痛咽痛要藥。痘中咽痛。隨手取效。以其力能解散毒鬱也。治腹中邪逆。食飲大熱。是指宿血在內發熱而言。卽別錄療老血在心脾間之謂。金匱治欬逆上氣。喉

巾水鷄聲。有射干麻黃湯。又治瘧母鼈甲煎丸。用烏扇燒過。取其降厥陰之相火也。火降則血散腫消。而癥結自解。千金治喉癰有烏扇膏。中射工毒生瘡。烏扇升麻煎服。以淬敷瘡上。效治便毒。射干同生薑煎服。利兩三行。卽效。以其性善降。服之必瀉。虛人禁用。苗名鳶尾。根名鳶頭。又名東海鳶頭。千金治蠱毒方用之。

玉簪根鵝白鶴花 苦辛溫有毒。發明 玉簪入骨更堅。故能下骨癰。以根搗自然汁。於竹筒灌入喉不可著牙齒。刮骨取牙。玉簪根乾者一錢。白硇七分。蓬砂三分。歲靈仙三分。草烏頭一分半。爲末。點少許。疼處自落。

鳳仙子又名急性子 苦溫小毒。發明 凤仙子性最急速。故能透骨軟堅通竅。搜頑痰。下死胎積塊。噎膈骨癰。治狂癇。勝金丹用之。取其性急。領砒藥吐泄也。庖人煮肉硬者。投子數粒。卽易爛。是其驗也。性與玉簪根同。不可著齒。多食戟人咽。入砒點疼牙即落。同獨瓣蒜搗塗瘡塊。卽消。加麝香阿魏尤捷。花治蛇傷。搗酒服之。卽解。

曼陀羅花實名風茄 辛溫有毒。發明 此花浸酒治風。少頃昏昏如醉。動火之患也。故麻藥爲之首。推八月採此花。七月採麻子花。陰乾等分爲末。熱酒調服三錢。少頃昏昏如醉。剜瘡灸火。宜先敷此。則不覺苦。

也寒濕脚氣煎湯洗之。

羊躡躅卽鬧羊花 辛溫大毒。惡諸石及麪。不入湯劑。本經主賊風在皮膚中。溼溼痛。溫癰惡毒諸癆。發明。羊躡躅治中風癱瘓。性祛風寒濕邪。故可以治諸癆惡毒。正與本經之治相符。用其毒以攻毒也。然須諒病人虛實而用。和劑局方伏虎丹中用之。南方治蠱毒有躡躅花散。其性之猛烈可知。此物有大毒。曾有人以根入酒飲。遂致於斃。不可近眼。令人昏翳。同天南星川烏草烏助虐尤甚。中其毒者。以菉豆解之。

芫花 苦辛溫有毒。陳者良。水浸一宿。曬乾醋炒以去其毒。弘景曰。用者微熬。不可近眼。反甘草。本經主咳逆上氣。喉鳴咽腫短氣。蠭毒鬼燭。痘痕癰腫。殺蟲魚。發明。芫花消痰飲水腫。故本經治咳逆咽喉腫。痘痕癰毒。皆是痰濕內壅之象。仲景治傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而渴。或喘或利者。小青龍湯主之。苦表已解。有時頭痛。汗出惡寒。心下有水氣。乾嘔。痛引兩脇。或喘或渴者。十棗湯主之。蓋小青龍湯驅逐表邪。使水氣從毛竅而出。內經開鬼門法也。十棗湯驅逐裏邪。使水氣從大小便而泄。內經潔淨府去菀陳莝法也。芫花大戟甘遂之性。逐水瀉濕。能直達水飲窠囊隱僻處。取効甚捷。不可過劑。泄人真元。

蕘花 苦寒有毒。熬黃用。芫花葉尖如柳。花紫似荆。蕘花苗莖無刺。花細色黃。與芫花絕不相似。或言無
蕘花以芫花代之。性相近耳。本經主傷寒溫瘧。下十二經水。破積聚大堅癰瘕。蕩滌腸中留滯飲食寒
熱邪氣。利水道。發明 蕘花苦辛能破積聚癰瘕。治瘀飲欬逆。去咽喉腫閉。本經治傷寒溫瘧者。卽苦
寒以攻蘊積伏匿之邪也。言下十二經水。又治飲食寒熱邪氣者。以其苦寒峻利飲食之邪亦得蕩滌而
寒熱自除也。仲景用此止利以行水。水去則利止矣。又小青龍湯云。若微利者去麻黃加蕘花。蓋亦取其
利水也。愚按芫花蕘花雖有辛溫開表苦寒走滲之不同。而破結逐水之功用彷彿。本經雖無芫花利水
之說。而仲景十棗湯耑行利水。是以藥肆皆不辨混收。醫家亦不辨混用。猶夫食穀得以療饑。食黍亦可
療饑。混用可無妨礙。若礬石。雲石。字形相類。藥狀亦相類。可不辨而混用耶。

莽草一名蘡卽鼠莽。本生菌字。此物有毒。食之令人迷罔。故 辛溫有毒 本經主頭風癰腫痘痕。除結
氣。疥癩。殺蟲魚。發明 莽草大毒。善殺魚鼠。其性可知。本經治痘痕結氣。蕩滌在內之宿積。也。療癰腫
頭風。搜逐在外之邪毒也。但性最猛烈。服之令人瞑眩。千金方每與茵芋同爲搜風滌惡之峻劑。近世罕
能用之。惟毒魚之外。僅以浴頑癱濕風。及煎漱蟲牙。然沐時勿令入眼中。其毒甚。惟草紫河車磨水服之
可解。黑豆煮汁服之亦解。以豆汁澆莽草根則爛。物類之相制如此。至於茵芋人所未識。毋怪近世醫術之

卑也。

茵芋 苦辛溫有毒。生泰山川谷。春生苗高三四尺。莖赤葉似石榴而短厚。又似石南。四月開細白花。五月結實。今彭城海鹽杭州雍州絳州華州皆有。四月採葉。七月採莖陰乾用之。本經主五藏邪氣。心腹寒熱羸瘦如瘧狀。發作有時。諸關節風濕痹痛。發明 茵芋大毒。世亦罕用。本經雖有治羸瘦如瘧狀一語。皆是五藏有邪氣。心腹寒熱所致。非能療虛羸寒熱也。其治關節風濕痹痛是其正治。時珍曰。千金外臺諸方治風癆。有茵芋丸。治風癆有茵芋酒。治婦人產後中風。有茵芋膏。風濕諸方多用之。茵芋石南莽草。皆古人治風妙品。近世罕知。

鈎吻 本經名野葛。紅花者名火把草。

辛溫大毒。

本經主金瘡乳瘻中惡風。欬逆上氣水腫。殺鬼疰蠱。

黃花者名黃藤。千金名黃野葛。毒。發明 野葛之毒甚於戈戟。故有鈎吻之名。而風毒蠭瘻用之以毒攻毒。苟非大劇。亦難輕用。紫者破血。青者破瘀積。其葉與黃精葉相似。但鈎吻葉有毛鈎二箇。黃精葉似竹葉而無毛鈎。可以明辨。慎

食鈎吻葉。飲冷水卽死。以死尸懸樹上。汁滴在地。卽生菌子。收之名菌藥。毒於野葛。蕹菜搗汁解之。取蕹菜汁滴野葛苗。卽萎死。中野葛毒急。不可得蕹菜。多飲甘草汁。人尿汁。或白鴨血。白鵝血。羊血灌之亦解。

蔓草部

菟絲子本經名
菟蘿

辛甘平無毒。酒煮搗爛作餅焙乾用。雷公曰。凡使勿用天碧草子。真相似。只是味酸澀。

并粘也。菟絲最難得真。有人以子種出。皆水犀草。今藥肆所賣。俱係此類。然服亦有微功。不似假石蓮子。

之大苦大寒。大傷胃氣。伐人天元也。至賤之物。尙爾若此。況珍貴之品。能無偽乎。

本經續絕。傷補不足。益氣力肥健人。

發明 菟絲子去風明目。肝腎氣分藥也。其性味辛溫質粘。與杜仲之壯筋暖腰膝無

異。五味之中。惟辛通四氣。復兼四味。經曰腎苦燥。急食辛以潤之。菟絲子五味子之屬是也。與辛香燥熱

之辛迥乎不同。此補脾腎肝三經要藥。本經言續絕傷補不足。益氣力肥健人者。二經俱實而絕傷續不足。補氣力長。令人肥健矣。其功專於益精髓。堅筋骨。止遺泄。主莖寒精出。溺有餘瀝。去膝脰痠軟。老人肝

腎氣虛。腰痛膝冷。合補骨脂杜仲用之。諸經膜皆屬於肝也。氣虛瞳子無神者。以麥門冬佐之。蜜丸服效。

凡陽強不痿。大便燥結。小水赤澀者勿用。以其性偏助陽也。

五味子 酸溫無毒。產遼東者佳。微焙搗碎用。本經主益氣欬逆上氣。勞傷羸瘦。補不足。强陰。益男子。

精。發明。五味子右腎命門本藥。本經主欬逆上氣。強陰。益男子。精心腎不交者。宜之。兼入肺腎二經。

味酸而斂耗散之。金性溫而滋不足之水。生津止渴。益氣強陰。壯水鎮陽。收瞳子散大。定喘斂汗。加乾薑

治冬月肺寒欬嗽。同人參門冬。治夏月精神困乏。而虛熱久嗽。不可悞用表散。須以此去核之辛溫助火。

但用皮肉之醜藥以滋化之。不宜多用。恐吸收太過反致閉塞而成虛熱也。黃昏嗽乃火浮於肺。不宜涼藥。宜五味子斂而降之。但風邪在表。痘疹初發。一切停飲。肺家有實熱者。皆當禁之。

覆盆子

本經名蓬蘽

甘平微溫無毒。酒浸一宿炒用。

本經安五藏。益精氣。長陰。令人堅強。志倍力有。子久

服輕身不老。

發明 覆盆子乃蓬蘽之實。本經言蓬蘽者。藥即實也。或云蓬蘽是覆盆苗。分之爲二。殊

爲未當。宗奭云。覆盆益腎。藏縮小便。服之當覆其溺器。故名。本經專於緩子藏。服之令人多子。別錄言益氣輕身。令髮不白。甘溫補血。與桑椹同功。惟秦地山中有之。近世真者絕罕。藥肆每以樹莓代充。欲驗真

僞。以酒浸之。色紅者是真。否即是假。

使君子

甘溫無毒。微煨去殼。發明 凡殺蟲藥都是苦辛。惟使君子甘而殺蟲。不傷脾胃。大人小兒

有蟲病者。每月上旬。清晨空腹食數枚。或爲散肥湯服之。次日蟲從六便出。忌飲熱茶。犯之卽漏。凡蟲皆脾胃虛弱。飲食停滯而生。此物甘溫。既能殺蟲。又益脾胃。所以能斂虛熱而止漏。爲小兒蟲積上藥。

木鱉子 土木鱉苦溫小毒。番木鱉苦寒大毒。又附子之初生未成者。曰漏藍子。炮炙論名木鱉子。與此不同。發明 木鱉有二種。有殼者曰土鱉。去殼搗爛。帛裹塞鼻。起倒睫拳毛。又爲末。唾調貼痔瘻。七日卽消。一切癰腫。醋磨塗之。一種無殼者曰番鱉。治熱病喉瘻作痛。和山豆根青木香磨汁噙之。癰瘻入眼。

番木鱉半个同輕粉冰片麝香爲末。左目吹右耳。右目吹左耳。日二次。癰瘡自退。又能毒狗。狗性大熱。此性大寒。寒熱相反。激之便死。

馬兜鈴 苦辛微寒無毒。去殼微焙用。發明 諸藥之性輕浮者。皆能入肺散氣。燈心馬勃之屬皆然。諸家言其性寒。專於劫痰定喘。不知其苦中帶辛。寒中帶散。是以肺熱痰喘。聲音不清者宜之。錢氏補肺阿膠散用之。取其清熱降氣邪去。則肺安矣。性善湧泄。故纂要治蛇蠍毒一味濃煎服之。探吐其毒即解。嬰兒癩瘡內陷。喘滿聲瘡者。宜加用之。若肺冷金寒。喘嗽失音者禁用。

青木香卽馬兜鈴根 辛苦微寒無毒。發明 青木香苦寒香細。入足少陰。善降陰氣上逆。故治風溫歲蛇湯用之。并治癰腫痰結氣凝諸痛。唐本治熱腫蛇毒。水磨傅之。肘後治蠍毒酒水和煎服之。毒從小便出。昔人言多服令人吐利。肺寒欬嗽。寒痰作喘。胃虛畏食人勿服。以其辛香走竄也。

預知子 苦寒無毒。大明曰。溫。發明 預知子專殺蟲療蠍。其治痘癬蛇毒。總是殺蟲之功。相傳取子二枚綴衣領上。遇有蠍毒。則聞其子有聲。故名預知。蜀人極貴重之。

牽牛 苦辛溫有毒。東垣云。辛熱有毒。有黑白二種。名黑丑白丑。凡用生磨取頭末。發明 牽牛專一行水峻下之劑。曰者屬金利肺。治上焦痰飲。除壅滯氣逆。通大腸風祕。除氣分濕熱。黑者屬水濡腎而氣

漏脾胃之濕。消腫滿脚氣利。大小便祕。但病在血分。或病人稍弱而痞滿者。不可用東垣云。牽牛非神農藥也。各醫續注云。味寒能除濕氣。利小便。治下注腳氣。此說氣味主治俱誤。凡用牽牛。少則動大便。多則泄下如水。乃漏氣之藥。其味辛辣。久嚼猛烈雄壯。所謂苦寒安在哉。夫濕者水之別稱。有形者也。若受濕氣。不得施化。致大小便不通。宜暫用之。況牽牛止能泄氣中之濕熱。不能除血中之濕熱。每見酒食過傷病痞者。多服牽牛散。取快一時。藥過仍痞。以致久服脫人元氣。猶不知悔也。東垣治下焦虛腫。天真丹用牽牛以鹽水炒黑。佐沉香杜仲。補骨脂觀桂諸藥。深得補漏兼施之妙用。方見醫學發明。

紫葳一名凌霄

酸微寒無毒。本經主婦人產乳餘疾。崩中癥瘕。血閉寒熱。羸瘦養胎。發明

凌霄花手

足厥陰血分藥也。能去血中伏火。本經主婦人崩中癥瘕。又治血閉寒熱羸瘦。云養胎者。以有積瘀在內。瘀散則胎自安也。與金匱桂心茯苓丸中用桃仁丹皮治妊娠癥瘕害無異。癥瘕血閉。血氣刺痛。癰風惡瘡。多用之。皆取其散惡血之功也。若無瘀血。而胎息不安者。禁用。

施花一名纏枝牡丹

甘辛溫無毒。制雄黃。本經主面酐黑色。媚好益氣。根主腹中寒熱邪氣。發明

凡藤

蔓之屬。象人之筋。所以多治筋病。施花根細如筋可啖。本經言主腹中寒熱邪氣。別錄言其久服不饑。時珍自京師還。見北地車夫每載之。云暮歸煎湯飲可補損傷。則益氣續筋之說尤可徵矣。筋被研斷者。用

施花根搗汁瀝斷處。仍以渣敷。日三易。半月卽續。

薺薇 子名
營實 酸溫無毒。本經營實主癰疽惡瘡。結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳。利關節。發明。薺薇乃野生之白花者。性專解毒。其實兼能散結。結肉跌筋敗瘡陰蝕皆得療之。本經所主皆言其實。根能入陽明經除風殺蟲。故癰疽瘡癬常用之。千金治消渴尿多。以根煮飲。又治口瘡之神藥。聖惠治小兒遺尿。酒煮服之。皆取其溫足陽明而足太陽受蔭矣。

月季花 俗名月紅 甘溫無毒。發明。月季花爲活血之良藥。搗敷腫瘍用之。痘瘡觸犯經月之氣而伏陷者。用以加入湯藥卽起。以其月之開放不失經行常度。雖云取義亦活血之力也。

栝蔞實 甘寒無毒。去殼紙包壓去油用。反烏附。發明。栝蔞實甘寒潤燥。宜其爲治嗽消痰止渴之要藥。以能洗滌胸膈中垢膩鬱熱耳。仲景治喉痹痛引心腎。欬喘息及結胸滿痛。皆用栝蔞實取其甘寒不犯胃氣。能降上焦之火。使痰氣下降也。其性較栝蔞根稍平。而無寒鬱之患。但脾胃虛。及嘔吐自利者不可用。

栝蔞根 卽天花粉 苦寒無毒。反烏附。本經主消渴身熱。煩滿大熱。補虛安中續絕傷。發明。栝蔞根性寒。降膈上熱痰。潤心中煩渴。除時疾狂熱。祛酒瘴濕黃。治癰瘡解毒排膿。本經有安中補虛續絕傷之稱。

以其有清胃祛熱之功。火去則中氣安。津液復則血氣和而絕傷續矣。其性寒降。凡胃虛吐逆。陰虛勞嗽誤用。反傷胃氣。久必泄瀉喘嗽。病根愈固矣。凡痰飲色白清稀者。皆當忌用。

土瓜根卽王瓜根

苦寒無毒。藏器云。有小毒。本經主消渴內疽。瘀血月閉。寒熱癰瘍。益氣愈聲。發明

王瓜產南方者。稟濕熱之氣最盛。患瘡腫癰毒者食之。爲患轉甚。產北地者。得春升之氣最先。患消渴內疽者用之。其效頗捷。其根治黃疸消渴。與栝萎之性不甚相遠。但不能安中補虛。續絕傷。調和經絡諸血也。金匱治婦人經水不調。帶下少腹滿。一月再見者。土瓜根散主之。深得本經主瘀血月閉之旨。方用土瓜根芍藥桂心麌蟲等分爲末。酒服方寸匕。日三服。蘇頌治小兒發黃。土瓜根生搗汁服三合。不過三次效。又治黃疸變黑。土瓜根汁平旦溫服一小升。午刻黃水從小便出。其治寒熱癰瘍。皆祛濕熱之驗。南陽治陽明經熱。大便不通。削之爲導。以下濕熱。其子治肺痿吐血。腸風漏血。赤白痢。及反胃吐食。惜乎世醫未知用也。

葛根 甘平無毒。色白者良。入陽明表藥生用。胃熱煩渴。煨熟用。本經主消渴身大熱。嘔吐諸痹。起陽氣解諸毒。發明 葛根性升屬陽。能鼓舞胃中清陽之氣。故本經主消渴身熱嘔吐。使胃氣數布。諸痹自開。其言起陽氣解諸毒者。胃氣升發。諸邪毒自不能留而解散矣。葛根乃陽明經之常藥。治頭額痛。眉

稜骨痛。天行熱氣嘔逆。發散解肌。開胃止渴。宣癥發痘。若太陽經初病。頭腦痛而不渴者。邪尚未入陽明。不可便用。恐引邪內入也。仲景治太陽陽明合病自利。反不利但嘔者。俱用葛根湯。太陽病下之。遂利不止。喘汗脈促者。葛根黃芩黃連湯。此皆隨二經表裏寒熱輕重而爲處方。按證施治。靡不應手神效。又葛根葱白湯。爲陽明頭痛仙藥。斑疹已見點。不可用葛根升麻。恐表虛反增斑爛也。又葛根輕浮。生用則升陽。熟用則鼓舞胃氣。故治胃虛作渴。七味白朮散用之。又清暑益氣湯。兼黃柏用者。以暑傷陽明額頤必脹。非此不能開發也。○花能解酒毒。葛花解醒湯用之。必兼人參。但無酒毒者。不可服。服之損人天元。以大開肌肉。而發泄傷津也。

天門冬卽天
棘根 甘寒無毒。焙熟去心。用肥白者良。忌鯉魚。本經主諸暴風濕偏痹。強骨髓。殺三蟲。去伏尸。久服輕身益氣。延年不饑。發明 天門冬手太陰肺經。氣分藥。兼通腎氣。欬逆喘促。肺痿肺癰。吐血衄血。乾歎痰結。其性寒潤能滋肺。肺氣熱而燥者宜之。肺爲清虛之藏。涼則氣甯。熱則氣騰。天門冬能保肺。使氣不受火擾。合地黃麥門冬。主心肺虛熱歎吐。衄血。又能治熱淋。同參耆定虛喘。蓋肺肅則氣化乃能出。若脾虛而泄瀉惡食者。雖有前證。亦莫輕投。以其降泄太過也。時珍云。天門冬清金降火。益水之上源。故能下通腎氣。入滋補方用之有效。若脾胃虛寒。人久服必致滑腸。反成痼疾。以性寒能利大腸故也。

本經治諸暴風濕偏痹。蓋熱則生風。暴則屬火。偏痹者。濕熱所致。故治風先清火。清火在養陰也。其三蟲伏尸。皆脾腎濕熱所化。清二經濕熱。則無三蟲伏尸之患矣。又能延年不饑。故辟穀方多用之。

百部 苦微甘小毒。肥白者良。抽去心用。則不煩悶。本經主欬嗽上氣。火炙酒漬飲之。發明 百部爲殺蟲要藥。故肺熱勞瘵癰噦。有才白蟲宜之。韓愬瑜及傳尸骨蒸多用之。時珍云。天寒門冬之類。皆主肺疾。但百部氣溫。肺胃寒者宜之。二冬性寒。肺胃熱者宜之。脾胃虛人勿用。以其味苦傷胃也。又濃煎洗牛馬蟲。樹木蟲蛀。用填孔中。更削杉木塞之。其蟲卽死。殺蟲之功。於此可知。

何首烏一名夜交藤 苦澗微溫無毒。其形圓大者佳。須赤白並用。製法以竹刀刮去皮。拌黑豆九蒸九曬候用。禁犯鐵器。忌萊菔諸血。勿與天雄烏附薑辛仙茅等同用。爲其性斂味澗也。發明 何首烏足厥陰少陰藥也。性稟陰中之陽。產南方者最勝。北地所生。雖極大者。殊不足珍。以地偏屬陰。而無陽生之力也。白者屬氣。分赤者屬血。分腎主閉藏。肝主疏泄。以此氣溫味苦澗。苦走腎。溫補肝。能收斂精氣。所以養血益肝。固精益腎。健筋骨。烏鬚髮。爲滋補良藥。不寒不燥。功在地黃天門冬諸藥之上。氣血大和。則風虛斑腫瘻瘍之疾可愈。生則性兼發散。主寒熱痃癰。及癰疽背瘡皆用之。今人治津血枯燥。及大腸風祕。用鮮者。數錢煎服。卽通。以其滋水之性最速。不及封藏。卽隨之而下洩也。與蕤蓉之潤燥通大便無異。而無助

火之廣。腸風藏毒。用乾者爲末。米飲日服三錢有效。蓋其內溫肝腎。外祛少陰風熱之驗也。丹方治久瘧。用生乾何首烏一兩。柴胡三錢。黑豆隨年數加減。煎成露一宿。清晨熱服。若夜瘧尤效。乃散中寓收。補中寓散之法。

草薢 苦甘平。無毒。產川中。大塊色白而鬆脆者爲草薢。若色黃赤者。卽菝葜也。一種小塊質堅韌者爲土萆薢。不堪入藥。忌若醋。本經主腰脊痛。強骨節。除風寒濕周痹。惡瘡不瘳。熱氣發明。草薢苦平。胃與肝家藥也。入肝搜風。本經主腰脊痛。強骨節。入肝祛風。入胃祛漏。故本經主寒濕周痹。惡瘡。熱氣等病。昔人稱其攝精之功。或稱逐水之效。何兩說相懸耶。不知胃氣健旺。則濕潤去。而胃無邪濕之擾。腎藏自能收攝也。楊氏草薢分清飲。專主濁病。正得此意。又主陰痿失溺。老人五緩者。總取行陽之力。以利關節。助健運也。若陰虛精滑。及元氣下陷。不能攝精。小便頻數。大便引急者。誤用。病必轉劇。以其溫散不利於陰也。菝葜與草薢相類。別錄主腰背寒痛。風痹。皆取祛濕熱利水堅筋骨之義。

土茯苓俗名冷飯團 甘淡平。無毒。忌鐵器。發明。土茯苓古名山牛。入胃與肝腎。清濕熱利關節。止拘掣。除骨痛。主楊梅瘡。解汞粉毒。時珍云。楊梅瘡起於嶺南。風土炎熱。風瘴薰蒸。挾溼穢濕熱之邪。發爲此瘡。今則遍行海宇。類有數種。治之則一。屬厥陰陽明。如兼少陰太陽陽明。發於咽喉。兼太陽少陽發於頭角。

蓋相火寄在厥陰。肌肉屬於陽明。若用輕粉剝劑。毒氣竄入經絡筋骨。莫之能出。變爲筋骨掣痛。發爲絃
毒。遂成痼疾。方用土茯苓一兩。薏苡忍冬防風木瓜木通白蘚皮各五分。皂莢子四分。人參當歸各七分。
日服三次。忌飲茶燒酒及牛羊雞鵝魚肉麩麪鹽醬。并戒房勞百日。渴飲土茯苓湯半月全愈。

白斂 苦甘辛微寒小毒。反烏附解狼毒毒。本經主癰腫疽瘡散結氣。止痛除熱目中赤。小兒驚癇溫
瘡。女子陰中腫痛。帶下赤白。 發明 白斂性寒解毒。敷腫瘍瘡有解散之功。以其味辛也。但陰疽色淡
不起。胃氣弱者非其所宜。本經治目赤驚癇溫瘡。非取其解熱毒之力歟。治陰腫帶下。非取其去濕熱之
力歟。金匱薯蕷丸用之。專取其辛涼散結。以解風氣百疾之蘊蓄也。世醫僅知癰腫解毒之用陋哉。同地
膚子治淋濁失精。同白芨治金瘡失血。同甘草解狼毒之毒。其辛散之功可知。而癰疽已潰者不宜用。
山豆根 苦寒無毒。 發明 山豆根大苦大寒。故能治咽喉諸疾。蘇頌言含之嚥汁解咽喉腫痛極妙。
或水浸含漱。或煎湯細呷。又解痘疹熱毒。及喉癰藥皆驗。蓋咽證皆屬陰氣上逆。故用苦寒以降之。開寶
言解諸藥毒。止痛消瘡腫毒。發熱欬嗽。善治人馬急黃。殺小蟲。時珍云。腹脹喘滿。研末湯服。血氣腹脹。酒
服三錢。卒患熱厥心痛。磨汁服。總賴苦寒以散之。但脾胃虛寒作瀉者禁用。

黃藥子 苦平無毒。 發明 黃藥子治諸惡腫瘡瘍喉痹。及蛇犬咬毒。研水服之。并用外塗。王金治癰

疾。以黃藥子半斤。無灰酒一升。浸藥固濟瓶口。糠火煨候香。瓶頭有津卽止。時飲一杯。不令絕。三五日卽消。勿飲。不爾。令人項細也。又專治馬牛心脾熱病。

白藥子葉名剪草 辛涼無毒。發明。白藥子辛涼解毒。故能治金瘡出血太多發熱。用以涼血清熱。則痛自止。肌自生。又主喉中熱塞不通。時常痛腫。醋煎細呷。治諸骨鰓。在上卽吐出。在下卽便出。解野葛生金巴豆藥毒。又治馬脾肺熱病。

威靈仙 苦辛溫小毒。發明 威靈仙性善下走。通十二經。故能宣通五藏。治胃脘積痛。脚脛痺。濕痛風之要藥。消水破堅積。朝食暮效。辛能散邪。故主諸風。溫能泄水。故主諸濕。而痘疹毒壅於上。不能下達。腰下脛膝起灌遲者。用爲下引立效。其性利下。病人壯實者。誠有殊効。氣虛者服之。必虛瀉而成痼疾。以其耗血走氣也。血虛而痛。不因風濕者勿服。

茜草素問名蘆茹。又名茜草。茹蘆俗名血見愁。 苦辛微溫無毒。本經主寒濕風痺。黃痺補中。發明 茜根色赤而性溫。味苦而帶辛。色赤入營。性溫行滯。味辛入肝。手足厥陰血分藥也。本經又以治寒濕風痺。黃痺者。是濕熱之邪。辨著營分。用以清理邪濕。則脾胃健運。寒濕風痺無所留著。而黃痺自除矣。其治女子經水不通甚効。詳素問四烏鵲一蘆姑丸。治婦人脫血血枯。千金翼治內崩下血。皆取以散經中瘀積也。病人雖見血證。

若泄瀉飲食不進者勿服。

防己 辛苦寒有毒。本經主風寒溫瘧熱氣諸病。除邪利大小便。發明 防己辛寒純陰主下焦血分之病。性劣不純。善走下行。長於除濕。以辛能走散。兼之氣悍。故主風寒溫瘧熱氣諸病。除邪利大小便。此本經主治也。別錄療水腫膀胱熱通腠理利九竅皆除濕之功也。弘景曰：防已是療風水要藥。漢防已是根入膀胱去身半已下濕熱。木防已是苗走陽躡治中風急風痹濕熱。金匱防己黃耆湯。防己地黃湯。木防己湯。五物防己湯。皆治痰飲濕熱之要藥。而千金治遺尿小便澑有三物木防己湯。水腫亦有三物木防己湯。總取其通行經脈之力也。能瀉血中濕熱。通經絡中滯塞。險健之類。用之不得其宜。下咽令人心煩。飲食減少。至於去濕熱腫痛。下注脚氣。膀胱積熱。誠通行十二經之仙藥也。如飲食勞倦。陰虛內熱。以防己泄大便。則重亡其血。其不可用一也。大渴引飲。及久病津液不行。上焦濕熱等證。防己乃下焦血藥。其不可用二也。外感邪傳肺經。氣分濕熱。而小便黃赤。此上焦氣病。其不可用三也。大抵上焦濕熱。皆不可用。卽下焦濕熱。又當審其二便不通利者。方可用之。

木通原名通草 平淡無毒。色淡黃細香者佳。本經除脾胃寒熱。通利九竅。血脈關節。令人不忘。去惡蟲。發明 木通娶奠根也。入手足太陽手少陰厥陰。瀉氣分濕熱。防己瀉血分濕熱。脾胃不和。則水道不利。

乃致變爲寒熱。爲腫脹。爲淋祕。爲痹痺。俱宜木通淡滲之劑。分利陰陽。則水行火降。脾胃和而心腎平矣。本經除脾胃寒熱者。以其通利濕熱也。曰通利九竅。血脈關節者。以其味淡滲也。曰令人不忘。及去惡蟲者。竅利則神識清。濕散則惡蟲去。以其通達九竅。行十二經。故又能催生下乳。散癰腫結。惟胃虛腎冷。及傷寒大便結燥。表虛多汗者。禁服。恐重傷津液。耗散胃汁也。時珍曰。木通上能通心清肺。達九竅。下能泄濕祛熱。豈止利小便而已哉。蓋能泄丙丁。則肺不受邪。能通水道。水源既清。而諸經之濕熱。皆從小便泄去。故導赤散用之。

通草原名通脫木 平淡無毒。發明 通草輕虛色白。專入太陰肺經。引熱下降。而利小便。入陽明胃經。通氣上達。而下乳汁。東垣言。漏肺利小便。治五淋水腫癃閉。取氣寒降味淡而升。仲景當歸四逆湯。用以通在裏之濕熱也。妊娠勿服。以其通竅也。

鈎藤一名鈎藤 甘微苦寒。無毒。取鈎用良。發明 鈎藤手足厥陰藥也。足厥陰主風。手厥陰主火。小兒急慢驚癇瘍癰。內釣腹痛。客忤胎風。大人肝風頭旋目眩。婦人帶下赤白。皆肝風相火之病。肝木風靜火息。則諸證自除矣。

木連俗名鬼頭 實甘平。澀葉酸平無毒。發明 木連辟惡實也。性耐風霜。嚴冬不凋。故能治一切風癬。

惡瘡爲利水治血通乳要藥。古方以木蓮二枚用猪前蹄煎湯飲汁盡。一日乳汁卽通。無子婦人食之亦能有乳。其葉主背瘡。取葉搗絞汁和蜜飲數升。以渣敷之後利卽愈。煎湯主賊風疼痛。乘熱熏洗。日二次。痛止爲度。取藤搗絞汁治白癩風癰癧惡瘡疥癬。消腫散毒。療腸痔心痛陰頬。但南方有瘴氣人不可用。紫葛 甘苦寒無毒。生山谷中。苗似葡萄。長丈許。根紫色。今在所皆有之。發明 紫葛和血解毒治癰腫惡瘡。取根皮搗爲末。酢和封之。千金紫葛丸用之爲君。以其能散寒熱結氣也。

葎草一名勒草。一名葛。勦蔓俗名割人藤。 甘苦寒無毒。發明 葎草蔓生道傍。多刺勒人。故又名萬勒蔓。專主五淋利小便。散瘀血。並搗汁服。千金專主膏淋。以醋和服之。

忍冬卽金銀花。 甘溫無毒。發明 金銀花芳香而甘。入脾通肺。主下痢膿血。爲内外癰腫之要藥。解毒祛膿。漏中有補。癰疽潰後之聖藥。今世但知其消腫之功。昧其能利風虛也。但氣虛膿清。食少便渴者勿用。痘瘡倒陷不起。用此根長流水煎浴。以痘光壯爲效。此卽水楊湯變法。

清風藤 辛溫小毒。發明 清風藤入肝經氣分。治風濕流注。麻節鶴膝。麻痹瘡。同防己浸酒治風濕痹痛。一切風病。熬膏酒服一匙。將患人身上拍一掌。其後遍身發瘡不可當。急以梳梳之。欲瘡止。飲冷水一口卽解。風病皆愈。避風數日自安。

藤黃 酸澀有毒。發明 藤黃性毒而能攻毒，故治蟲牙蛀齒點之即落。毒能損骨傷腎可知。

水草部

澤瀉 甘鹹微寒無毒。白者貞利小便。生用入補劑。鹽酒炒油者伐胃傷脾不可用。本經主風寒濕痹。乳難。養五藏。益氣力。肥健消水。久服耳目聰明。不饑延年。發明 澤瀉甘鹹沉降陰中之陽。入足太陽氣分。素問治酒風身熱汗出。用澤瀉生朮麋銜。以其能利膀胱濕熱也。金匱治支飲冒眩。用澤瀉湯以逐心下痰氣也。治水畜煩渴。小便不利。或吐或瀉。用五苓散。以泄太陽邪熱也。其功長於行水。本經主風寒濕痹。言風寒濕邪。痹著不得去。則爲腫脹。爲癃閉。用此疏利水道。則諸證自除。蓋邪干空竅。則爲乳難。爲水閉。澤瀉性專利竅。竅利則邪熱自通。內無熱鬱。則藏氣安和。而形體肥健矣。所以素多濕熱之人。久服耳目聰明。然亦不可過用。若水道過利。則腎氣虛。故扁鵲云。多服病人眼。今人治泄精。多不敢用。益爲腎與膀胱虛寒。而失閉藏之令。得澤瀉降之。而精愈滑矣。當知腎虛精滑。虛陽上乘。面目時赤者。誠爲禁劑。若濕熱上盛。面目腫。相火妄動。而遺泄。得澤瀉清之。則目腫退。而精自藏矣。何禁之有。仲景八味丸用之者。乃取以瀉膀胱之邪。非接引也。古人用補藥。必兼瀉邪。邪去則補藥得力矣。

羊蹄根俗名 辛苦寒小毒。傍莖有鈎。如波稜菜狀。夏末結子。便枯者是也。本經主頭癩疥瘡。除熱女

子陰蝕。發明。羊蹄根屬水走血分。爲除濕殺蟲要藥。故本經治頭秃疥癩。女子陰蝕之患。新採者醋搗塗。鮮殺蟲。加輕粉尤效。

菖蒲。辛溫無毒。解巴豆大戟毒。本經主風寒濕痹。欬逆上氣。開心孔。補五藏。通九竅。明耳目。出音聲。主耳聾。癰瘍。溫腸胃。止小便利。久服輕身。不忘不惑。延年益智。高志不老。發明。菖蒲乃手少陰厥陰之藥。心氣不足者宜之。本經言補五藏者。心爲君主。五藏係焉。首言治風寒濕痹。是取其辛溫。開發脾氣之力。治欬逆上氣者。痰濕壅滯之喘欬。故宜搜滌。若肺胃虛燥之喘欬。非菖蒲可治也。其開心孔。通九竅。明耳目。出音聲。總取辛溫利竅之力。心孔開。九竅利。則癰瘍之毒可解。腸胃喜溫惡寒。腸胃既溫。則膀胱之虛寒。小便不禁。自止。久服輕身者。除濕之驗也。不忘不惑。延年益智。高志不老。皆補五藏。通九竅之力也。又主肝虛心腹痛。霍亂轉筋。消伏梁癲癇。普通心脾痰濕可知。千金治胎動不安。半產漏下。或搶心下血。及產後崩中不止。並以菖蒲一味煎服。凡陽亢陰虛。脾胃失合者禁用。以其性溫。善鼓心包之火。與達志之助相火不殊。觀本經之止小便利。其助陽之力可知。

蒲黃。甘微寒。無毒。筋能行血。羅去粗筋取粉用。本經主心腹膀胱寒熱。利小便。止血消瘀血。發明。蒲黃手足厥陰血分藥也。故能治血治痛。本經主心腹膀胱寒熱。良由血結其處。營衛不和故也。又言止

血消瘀血者。以生則能行。熟則能止。與五靈脂同用。名失笑散。治一切心腹疼痛。能破瘀。積消癰腫。去產婦兒枕痛。然胃氣虛者。入口必吐。下咽則利。以五靈脂性味濁惡也。宋度宗一夜忽舌脹滿口。用蒲黃乾薑末乾摻而愈。以蒲黃之涼血活血。乾薑之引火外散。深得逆從兼濟之妙用。然舌根脹痛。亦有屬陰虛火旺者。誤用前法。轉傷津液。每致燥滯愈甚。不可不審。

苦草 苦溫無毒 發明 苦草香竄入足厥陰肝經。理氣中之血。產後煎服。能逐惡露。但味苦伐胃氣。竄傷腦。膏梁柔脆者服之。減食作漏。過服則晚年多患頭風。昔人畏多產育。以苗子三錢。經行後麴淋酒服。則不受妊。傷血之性可知。煎湯主婦人白帶。又治嗜食乾茶。面黃無力。爲末和炒芝麻。不時嚼之。

水萍 辛寒無毒。浮水面小而背紫者是。本經主暴熱身癢。下水氣勝酒。長鬚髮。止消渴。發明 浮萍發汗。勝於麻黃。下水捷於通草。惡疾癩風遍身者。濃煎浴半日多効。其性輕浮。入肺經。達皮膚。故能發揚邪汗。本經主暴熱身癢者。專疏肌表風熱也。下水氣者。兼通陽明肉理也。勝酒者。陽明通達。而能去酒毒也。長鬚髮者。毛竅利而血脈榮也。止消渴者。經氣和而津液復也。浮萍爲祛風專藥。去風丹用紫背浮萍爲末。蜜丸彈子大豆。淋酒下一丸。治大風癩風。一切有餘風濕脚氣。及三十六種風皆驗。而元氣本虛人服之。未有不轉增劇者。至於表虛自汗者。尤爲戈戟。

尊。甘寒無毒。發明。草性味滑。常食發氣令關節急。患痔漏脚氣積聚皆不可食。爲其寒滑傷津也。
千金方治熱渴嘔逆漏氣。澤瀉湯麥門冬湯並用之。取其清胃胱之熱逆也。又能壓丹石解百藥毒。
海藻 苦鹹寒小毒。反甘草。本經主癰瘤結氣散頸硬核。療癰腫瘍瘕堅氣。腹中上下雷鳴。下十二種
水腫。發明。海藻鹹能潤下。寒能泄熱利水。故本經主癰瘤結核癰腫瘍散十二經水。及除浮腫腳
氣。留飲痰氣之濕熱。使邪從小便而出。經云。鹹能軟堅。營氣不從外爲浮腫。隨各引經藥治之。凡海中諸
藥性味相近。主療一致。雖有不同。亦無大異。

昆布。鹹寒滑小毒。發明。鹹能軟堅。故癰堅如石者。非此不除。能破陽邪水腫與海藻同功。然此物
下氣久服瘦人。海島人常食之。水土不同故耳。凡海中菜皆損人。不獨昆布海藻爲然。

石草部

石斛 甘淡微苦。鹹平無毒。酒浸用種類最多。惟川者味甘淡色黃無岐。可無傷胃之虞。古稱金釵者爲
最。以其色黃如金。旁枝如釵。故有是名。近世絕無此種。川者差堪代用。其餘雜產味苦色晦中虛多岐者。
啖皆極苦。誤用損人。凡入湯藥酒浸曬乾。入丸劑薄切米漿飲曬乾磨之。本經主傷中除婢下氣補五
藏虛勞羸瘦。強陰益精。久服厚腸胃。發明。石斛足太陰少陰脾胃之藥。甘可悅脾。故厚腸胃而治傷

中鹹能益腎。故益精氣而補虛羸。爲治腎中虛熱之專藥。又能堅筋骨。強腰膝。膝骨痿痺。弱囊濕精。少小便餘瀝者宜之。

骨碎補俗名
救蠱 苦溫無毒。蜜水焙用。發明 骨碎補足少陰藥也。骨傷碎者能療之。故名。主骨中毒氣風氣耳鳴牙疼。骨痛破血止血。折傷接骨。又治腎虛久漏。以之爲末。入猪腎中煨熟食之。戴元禮治痢後骨痿。入虎骨四斤丸用之有効。但其性降收不可與風燥藥同用。

石韋 苦微寒無毒。凡用去黃毛不爾。射人肺令歎不已。去梗微炙用。本經主勞熱邪氣。五癃閉不通利小便水道。發明 石韋蔓延石上。生葉如皮。其性寒利。故本經治勞熱邪氣。指勞力傷津。癃閉不通之熱邪而言。非虛勞之謂。治妊娠轉胞。同車前煎服。

景天一名慎火草
俗名火丹草 苦寒無毒。本經主大熱火瘡。身熱諸邪惡氣。發明 慎火草性能涼血解毒。故

本經治大熱火瘡。日華治熱狂赤眼。頭痛寒熱遊風。女子帶下。千金慎火散以之爲君。專主血熱崩中帶下之病。搗汁塗小兒丹毒發熱。及遊風熱瘡。外用並效。一切病得之寒濕惡寒喜熱者勿投。

石胡荽卽天胡荽俗名鵝不透
草又名雞腸草 辛溫無毒。汁製砒石雄黃。發明 鵝不食草。氣溫而升。味辛而散。故能透達頸項。人但知其揩鼻道而疔瘻肉。不知其治頭風之功最捷。而除瘧之功更奇。按塞鼻中。腎膜自落。

故碧雲散用以取嚏則濁氣宣通而醫自除。是昔人以開鍋蓋法喻之。

地錦一名地肤 苦平無毒。發明 地朕多生庭除磚縫。莖赤葉青。繁絲如錦。故有是名。能通流血脈。治崩中痢下。功專散血止血。通利小便。千金治淋方用之。

苔草部

陟釐 甘溫無毒。生於水底石上者。蒙茸如髮。謂之陟釐。發明 陟釐與水苔同生水中。但浮於水者。謂之水苔。千金治協熱下痢嘔逆。溫食則吐。有陟釐丸。爲痢證之首方。日華搗汁治天行心悶。別錄主心腹大寒。溫中消穀。強胃氣止泄痢。並取其性溫而能利水也。

石蕊一名蒙頂茶 甘溫無毒。生蒙山頂石面及枯株上。與木耳無異。發明 石蕊明日益精氣。潤咽解熱化痰。同生薑能解陽明頭額肩稜骨痛。本乎天者親上也。

卷柏 辛平無毒。桐君雷公云。甘寒無毒。鹽水煮半日再以井水煮半日用。生用破血。炙用止血。本經主五藏邪氣。女子陰中寒熱痛。癰瘕血閉絕子。久服輕身和顏色。發明 卷柏足厥陰經血分藥也。詳本經諸治。一皆女子經癸之病。總厥陰與衝脈之患也。千金大澤蘭丸。紫石英天門冬等丸皆用之。經疏言妊娠禁用。以其能寒子藏中血氣也。

馬勃 辛平無毒。多生竹園濕地腐脹而成。凡用以生布張開。將馬勃於上摩擦。下以盤承取末用之。
發明 馬勃輕虛上浮。力能散肺中邪熱。故治欬嗽喉痹。衄血失音諸病。東垣治大頭病咽喉不利。普濟消毒飲用之。然須生蜜拌接。入水調散不浮。方可煎服。

倒掛草 苦甘無毒。發明 倒掛草生井口邊。千金斷酒方於端午午時取燒研水服。勿令知。卽惡酒不飲。其樹孔中生者。千金用治癰瘤。取其倒垂而根不著也。

苔 甘寒無毒。發明 井中蒼苔得至陰之氣而生。火瘡傷爛脫皮者。以苔炙末每錢入冰片二分。杵極細。掺上痛即止。不過三度愈。如無井中者。墻陰地上者亦可用之。

長洲石禎張 瑞路玉父纂述

穀部

譜 米甘平無毒。發明。米受坤土精氣而成。補五藏而無偏勝。秔者曰稻。糯者曰黍。資生之至寶也。其南秔溫。北秔涼。赤秔熱。白秔平。晚白秔涼。新秔熱。陳秔涼。新陳黃白。總謂之粱。通名曰稷。雖能益人。然不可過食。過食則傷中州之氣也。有人嗜食生米。久成米瘕。治之以雞屎白。取其殺蟲也。未經霜新米。病人所禁。下痢尤忌。作食動風氣。陳者下氣益脾。病人尤宜。本草言。秔米溫中和胃氣。長肌肉。仲景白虎湯。桃花湯。竹葉石膏湯。並用之。皆取晚秔得金之氣居多故也。○陳倉米開胃進飲食。年久者治久痢甚良。○秫米俗云糯米。益氣補脾胃。但磨粉作稀糜。庶不粘滯。且利小便。以滋肺而氣化下行矣。若作糕餅。性難運化。病人莫食。○泔水善消鴨肉。又製二丸宜之。○紅蓮米入心脾補血。○籼米溫中益氣。除濕止瀉。○穀芽啟脾進食。覓中消穀而能補中。不似麥芽之削尅也。○稷米苗高如蘆。俗名蘆稈。穗曲下垂。如鉤者。良治熱壓丹石毒。解苦瓠毒。不可與附子同食。○粟即小米。利小便止痢。壓丹石熱。解小麥毒。發熱。○稗米厚腸胃。濟饑。其苗根治金瘡。血出不止。搗傅或研末掺之。其血即止。○菰米即雕胡。菱草之子。止渴。

解煩。○春杵頭糠能治噎膈。取其運動之性。以消磨胃之陳積也。然惟暴噎爲宜。

諸麥 甘平皮寒無毒。發明 素問云。麥屬火。心之穀也。鄭玄云。麥有孚甲屬木。許慎云。麥屬金。金旺而生火。旺而死。三說各異。而別錄云。麥養肝氣。與鄭說合。孫思邈云。麥養心氣。與素問合。參考其功。除煩止渴。收汗利溲。止血。皆心之病。當以素問爲準。蘇恭云。小麥作湯。不令皮坼。坼則性溫。不能消熱止渴也。可知方中用麥。皆取外皴之力。仍取溫性內存。以輔助之。愚按五穀中。惟麥得春升之氣最早。故爲五穀之長。察其性之優劣。則南北地土所產之不同。北麥性溫。食之益氣添力。南麥性熱。食之助濕生痰。故北人以之代飯。大能益人。養肝氣。去客熱。止煩渴。利小便。止漏血。唾血。令婦人得孕。南方氣卑地濕。久食令人發熱。鄉土不同故也。乾麵益胃。強肝濕麵生痰。助濕初夏新者尤甚。新麥性柔。助濕熱尤甚。而收穫時遇雨色變者。食之令作嘔。能傷胃氣。○麸皮多筋而性寒。能發肝風。傷脾氣。且最難剋化。受其傷者。惟草果能消去之。其治走氣作痛。用釀醋拌麸皮炒熟。袋盛熨之。○小麥粉乃麸皮洗筋澄出。積善堂方。烏龍膏。治一切腫毒未潰者。用陳年小麥粉炒黑醋調糊熬如漆。磁罐收貯。用時攤紙上剪孔貼之。其腫自消。藥力盡自脫。用經霜桑葉大黃末和蜜調傅尤良。○浮麥輕虛象肺。能斂盜汗。取其散皮腠之熱也。○麥奴乃麥將熟時。上有黑蠶者。朱肱治陽毒溫毒。熱渴斑狂。麥奴丸用之。方用小麥奴梁上壅釜底煤。突

墨同黃芩麻黃硝黃等分爲末。蜜丸彈子大。水化服一丸。汗出或微利卽愈。取從火化之象也。○大麥卽半麥。健胃化食。主消渴除熱。久食令人多力健行。○大麥作蘖。溫中消食。既經發萌。大能耗伐腎氣。凡人小便多者禁之。王好古云。麥蘖神麴二藥。胃氣虛人宜服之。趙養葵曰。此不稽之言也。今人造飴。必用麥蘖始化。傷中消導可知。產婦乳腫。不欲乳哺。用麥蘖半兩入四物湯服之。卽斷。傷耗精血可知。○雀麥一名杜姥草。益肝和脾。丹方以此草同苦瓠葉。醋漬炮熟。內口中。齒外邊熨之。冷則易熱者再熨。更取銅器置水。浸熟草與葉。乘熱漱痛齒。得蟲長三分。老者黃色。小者白色。多者得數十枚。少者得二三十枚。出干金方。○壽麥甘平。動風發熱。能鍊腸胃滓穢積滯。降氣寬胸。治白濁白帶。氣盛而濕熱者宜之。孟詵言。益氣力者殆未然也。炒焦熱水衝服。治絞腸沙腹痛。小兒丹毒赤腫。醋調塗之。然須北方者。良南方者味苦性劣。不堪服食。久食令人動風頭眩。不可與豬羊肉食。令人鬚眉脫落。又不可合黃魚食。其稈燒灰淋汁。卽鹼用化石灰。能去醫癰惡肉。

諸豆 甘平無毒。發明 大豆曰。菽色黃。入脾漏而不補。色黑入腎。漏中寓補。本經云。生研和醋塗癰腫。煎汁飲殺鬼毒止痛。日華云。制金石藥毒時珍云。水浸擣汁。解礬石砒石烏附射罔。甘遂巴豆芫青斑蝥。百藥之毒。古方取用甚多。炒熟酒淋。治風毒脚氣筋脈拘攣。產後中風口喎。頭風破傷。並宜炒熟酒

淋服之。○黃大豆生泄利熟壅氣。生痰動嗽。諸病皆非所宜。惟痘後餘毒發癰。炒黑研末。以香油調傅之。生浸細磨。和滓炒熟。傅腫瘍背瘡。冷則換熱者。頻傅卽消。誤食毒物。生擣研水灌吐之。諸菌毒不得吐者。濃煎汁飲之。又試內癰及臭毒腹痛。並與生黃豆嚼。甜而不惡心者。爲上部有癰。及臭毒發痧之真候。○其生黃豆葉。嚼爛罨蛇蠍傷立効。○白蘿豆入脾經氣分。能和中止嘔。得木瓜治傷暑霍亂。金匱云。蘿豆病寒熱者不可食之。以其能滯氣也。若脾虛寒熱不止。則蘿豆又非禁劑。一種紫黑者入脾經血分。治失血血痢。俱炒黑用之。○蘿豆花治下痢膿血。赤白帶下。葉治霍亂吐下。吐利後轉筋。生擣一握。入酢少許。絞汁服之。立癒。○細黑豆一名稽豆。俗名料豆。入腎經血分。同青鹽旱蓮草何首烏蒸熟。但食黑豆則鬚髮不白。其補腎之功可知。今人以製何首烏。取以引入腎經也。黑豆炒焦淋酒。卽豆淋酒也。頭風脚氣。咸取用之。以其直達腎經血分也。○大豆黃卷。黑大豆發芽是也。本經治濕痹筋攣膝痛。除胃氣結積。益氣解毒。金匱薯蕷丸用之。取其入脾胃散濕熱也。○赤小豆卽赤豆之小而色黯者。俗名豬肝赤。其性下行。通利小腸。故能利水降火。久食令人枯燥。瓜蒂散用之。以泄胸中寒實。正以其利水清熱也。生末敷癰腫。爲傷寒發頤要藥。發芽同當歸治便紅腸癰。取其能散畜積之毒也。○綠豆甘涼解毒。能明目。解附子砒石諸石藥毒。而與榧子相反。誤犯傷人。○綠豆粉治癰疽。內托護心丹。極言其効。○真粉乃綠豆所作。

取陳者蜜調敷瘧毒瘡瘍濕爛不結痂疎者乾撲之貞。○綠豆殼治痘生目翳。○蠶豆甘溫性滯中氣虛者食之令人腹脹積善堂方言一女子誤吞針入腹諸醫不能治有人教令煮蠶豆同韭菜食之針自大便同出誤吞金銀物者用之皆効。○豌豆一名畢豆補中益氣燒灰治痘瘍黑疔。○神黃豆產緬甸形如槐子近時稀痘方用之一陽日用清水磨服。○淡豆豉用黑豆淘淨伏天水浸一宿蒸熟攤乾蒿覆三日候黃色取晒下甕築實桑葉厚蓋泥封七日取出又晒酒拌入甕如此七次再蒸如前卽是主傷寒頭疼寒熱煩悶溫毒發斑瘴氣惡毒入吐劑發汗并治虛勞喘吸脚膝疼冷大病後胸中虛煩之聖藥合梔子治心下懊憹同葱白治溫病頭痛兼人中黃山梔腦茶治溫熱疫癟虛煩喘逆與甘桔姜蕤治風熱燥咳皆香豉爲聖藥蓋瓜蒂吐胸中寒實豆豉吐虛熱懊憹得葱則發汗得鹽則湧吐得酒則治風得薤則治療得蒜則止血生用則發散炒熟則止汗然必江右製者方堪入藥入發散藥陳者爲勝入涌吐藥新者爲貢以水浸絞汁治誤食鳥獸肝中毒服數升愈。○豇豆補腎健胃解莽草毒。○刀豆緩補元陽其子治病後呃逆不止燒灰存性白湯調服二錢卽止亦取其降濁氣之力也。

胡麻本經名巨勝子千金
名烏麻子卽黑芝麻葉名青蕷莖名麻蘚甘溫無毒本經主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦久服輕身不老發明胡麻甘溫質潤性燥專入足少陰血分巨勝子丸以之爲君專補腎藏

陽虛兼行肝心脾肺四經。益脾滋肺降心包之火。滋肝木之陰。平補五藏。但不若附桂之雄健耳。其白者名白油麻。亦能潤肺除燥。下通脾約便難。赤者專發腎經之毒。錢氏治小兒痘疹變黑歸腎。用赤芝麻煎湯送百祥丸。○青蘿巨勝苗也。本經主五藏邪氣。風寒濕痹。益氣補腦髓。堅筋骨。○胡麻花爲末。麻油塗生髮。長眉毛。外臺干金用之。○麻莖燒灰。點痣去惡肉。又治小兒鹽哮。以淡豆腐蘸麻莖灰食之。○白麻作油微寒。解毒潤腸。主產婦胞衣不落。熬膏生肌長肉。止痛消腫。○燈盞油。吐風痰食毒。亞麻俗名蠶 胡麻 微溫無毒 發明 亞麻性潤入陽明經。專於解散風熱濕毒。爲大麻風必用之藥。故醉仙散用之。

麻子仁即麻子實 甘平無毒。入藥微炒研用。入丸湯泡去殼。取帛包煮。沸湯中浸至冷出之。垂井中一夜勿著水。次日日中曝乾。按去殼。簸揚取仁。本經實名麻仁。補津益氣。久服肥健。不老神仙。○花名麻勃。治二十種惡風黑色。遍身苦癩。逐諸風惡血。女人經候不通。發明 麻仁入手陽明足太陰。其性滋潤。初服能令作瀉。若久服之。能令肥健。有補中益氣之功。藏府結燥者宜之。仲景治陽明病。汗多胃熱便難。脾約丸用之。取潤脾土枯燥也。日華止消渴。通乳汁。主催生難產。及老人血虛。產後便祕宜之。麻勃治身中伏風。同優鉢羅花爲麻藥。砭癰腫不知痛。葉絞汁服五合。下蛇蟲。搗爛敷蠍毒俱効。黃麻破血利小便。麻

根搗汁治產難胞衣不下。煮服治崩中不止。生走而熟守也。併治熱淋下血不止。根葉並治撻打瘀血。心腹滿痛。搗汁服之皆效。陳黃麻燒灰。酒服方寸匕。散內傷瘀血。

薏苡仁卽米

甘微寒無毒。入理肺藥。薑汁拌炒。入利水濕藥生用。本經主筋急拘掣。不可屈伸久。

風濕痹下氣。久服輕身益氣。根下三蟲。發明。薏苡甘寒。升少降多。能清脾濕。祛肺熱及虛勞欬嗽。肺痿肺癰。虛火上乘。皆宜用爲下引。又能利筋去濕。故本經治久風濕痹。拘急不可屈伸之病。蓋治筋必取陽明。治濕必扶土氣。其功專於利水。濕去則脾胃健而筋骨利。痹愈則拘掣退而脚膝安矣。然痹濕須分寒熱。蓋寒則筋急。熱則筋緩。大筋受熱弛縱。則小筋縮短而變急不伸。故宜用此。若因寒筋急而痛者。不可用也。其治虛人小便不利。獨用數兩水煎數沸。服之卽通。若津枯便祕。陰寒轉筋。及妊娠禁用。以其性專下泄也。取根搗汁。治心痛。生根下三蟲。又肺癰以根汁沖無灰酒服。初起可消已癧。可斂屢效。

瞿粟穀子名御米

溫微。蜜炙止嗽。醋炙止痢。發明。粟穀性濶。却痰嗽。止下痢。肺虛大腸滑者宜之。

若風寒欬嗽。瀉痢初起。有火邪者誤用。殺人如劍戒之。○御米治反胃。胸中痰滯。

阿芙蓉一名阿片

俗名鴉片。酸澀溫微。天方國以瞿粟蕊竹針刺破青苞。次早液出。竹刀刮取陰乾者是也。○

土鴉片。亦能澀精止瀉。但力薄少效。發明。京師售一粒金丹。通治虛寒百病。用阿芙蓉一分。粳米飯

搗作三丸。每服一丸。不可多服。忌酸醋犯之。腸斷。又忌葱蒜漿水。古方治漏痢脫肛。久痢虛滑。用一二分米飲送下。其功勝於粟殼。又痘瘡行漿時。漏泄不止。用四五釐至一分。未有不止者。今世服餌少用。惟房中術外用之。誠爲濬精助火之首列也。

蒸餅 甘平無毒。寒食日以單麵所造。酵水發成。發明 温中健脾。消食化滯。和血止汗。利三焦。通水道。用以打糊丸。健脾胃藥良。

神曲酒麵紅 麵女麵
甘微苦辛平無毒。造神曲法。夏日用白麵五斤。入青蒿蒼耳野蓼自然汁各一碗。杏仁泥四兩。赤小豆二兩。煮研拌麵作曲。風乾。陳久者良。炒香用。舉世以相思子作小豆大謬。發明 神曲入陽明胃經。其功專於消化穀麥酒積。陳久者良。但有積者能消化。無積而久服。則消人元氣。故脾陰虛胃火盛。當禁也。○酒麴亦能消食去滯氣。行藥力。但力峻傷胃。○紅麴乃粳米所造。然必福建製者爲良。活血消食。有治脾胃榮血之功。女人經血阻滯。赤痢下重。宜加用之。○女麴是女人以完麥。罨成黃子。消食下氣。止漏痢。破冷血。千金方恆用之。

膠飼即飼糖 甘溫無毒。白色者良。發明 餘糖甘溫。入脾經氣分。潤肺氣。止暴嗽。補虛冷。益津氣。除唾血。仲景建中湯。用治腹痛。取稼穡之甘以緩之也。治傷寒腎。虛尺脈不至。是寶土以隄水。非伐腎也。而中

滿吐逆病。皆不可食。以其生痰助火最當也。丹溪云。大發濕中之熱。小兒多食。損齒生蟲。熬焦酒服。能消食積。下瘀血。解附子烏頭毒。拌輕粉熬焦爲丸。噙化。療鹹哮喘嗽。大吐稠痰。卽愈。

醋 卽酢一
名苦酒 酸寒無毒。凡制肝藥用爲引導。發明 醋名苦酒。專取米釀成者。味帶酸苦。若酒飴所造。則兼酸甜矣。然酒之與飴。總皆米製。但功力稍遙耳。宗奭曰。米醋比諸醋最醇。入藥多用。穀氣全也。仲景少陰病。咽中傷生瘡。不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。內有半夏之辛以發聲音。雞子之甘以緩咽痛苦。酒之酸以歛咽瘡也。調敷藥則消癰腫。制藥味則歛毒性。諸惡狂妄。及產後血暈。燒炭淬。醋以辟惡寒也。北人感冒風寒。用醋湯。胡椒雞麵熱食。汗之則愈。以北方素鮮生發之氣。但取以助方宜之不足。則邪自不能爲虐耳。東南木氣用事。肝火易動。諸病皆當忌食酸。喜入肝。酸寒收歛病邪。得之難於發泄耳。

酒糟 燒酒 辛甘大熱。新者有毒。陳者無毒。味甜者曰無灰酒。方可入藥。發明 酒嚴冬不冰。其氣悍以侵明。其性熱而升。走醉後則體軟神昏。振寒戰慄。本草止云有毒。不知其溫中發熱。近於相火也。酒類多種。醞釀各異。甘苦懸殊。甘者性醇。苦者性烈。然必陳久爲勝。其色紅者能通血脈。養脾胃。色白者則升清氣。益肺胃。至於扶肝氣。悅顏色。行藥勢。辟寒氣。其助火邪。資痰濕之性。則一醉當風。臥成惡風。醉浴冷水。成痹痛。醉飽飲水成癖積。皆宜切慎。○豆淋酒。以黑豆炒焦。紅酒淋之。破血去風。治男子中風口喎。陰毒。

腹痛及小便尿血。婦人產後一切諸證。○燒酒一名火酒。又名氣酒。與火同性。得火則然。其治陰寒腹痛最捷。然臭毒發痧。誤用立斃。又入鹽少許。治冷氣心痛。下咽則安。性大熱。與薑蒜同飲。令人生痔。○糟性最助濕熱。病水氣浮腫勞嗽。吐血人忌食。惟罨撲損行瘀止痛。及浸水洗凍瘡。數蛇咬蜂叮毒有效。

菜部

韭 生辛澀熟甘溫無毒。葉細根紫者良。韭子入藥。蒸熟曝乾。簸去黑炒黃研用。韭初生芽。食之傷人心氣。發明。韭入足厥陰經。下散血積。生用治死血留於胃口作痛。及婦人經脈逆行。打撲損傷。搗汁和童便飲。然須善食便實者宜之。有腎氣上攻心痛者。宜用韭汁和五苓散爲丸。空心茴香湯下。昔人言治噎膈。惟死血在胃者宜之。若胃虛而噎勿用。恐致嘔吐也。其心腹有痼冷者勿食。食之必加劇。黃帝云。凍韭不可生食。動宿飲。飲盛必吐水。○韭花食之動風。風氣人勿食。○韭子辛溫壯火。治夢泄溺血。白帶白淫。男子隨溲而下。女子綿綿而下。惟腎氣過勞不能收攝者爲宜。若陰虛火旺。及亢陽不交。獨陰失合。誤用是抱薪救焚矣。大抵韭之功用全在辛溫散結。子則包含少火未散。故能寄精而壯火熾。盛則爲戈戟。今人以韭子熏齒出蟲。然能傷骨壞齒。不可不知。

薤 辛苦溫無毒。似韭而葉闊者是黃帝云。薤不可共牛肉作羹。食之成瘻。韭之氣味相類。功用亦相類。

如無薤處。以韭代之。本經治金瘡瘍敗。輕身不饑耐老。發明。薤白味辛氣溫。入手陽明除寒熱。溫中去水。專泄氣滯。故四逆散加此。治泄利下重。胸痹。薤白酒湯。專用以泄胸中痹氣也。本經治金瘡瘍敗。取辛以泄氣。溫以長肉也。弘景云。仙方及服食家皆須之。卽本經輕身不饑耐老之謂。諸瘡中風寒水腫。生搗敷之。搗汁生飲。能吐胃中痰食蟲積。屢驗。金匱救卒死。搗汁灌鼻中。効薤葉治肺氣喘急。千金方用之。以薤善散結。蒜能消癥。各適其用也。

葱胡葱。瓦蓬。葱
卽龍爪葱

辛平無毒。服地黃常山蜜桂者犯之無効。生葱尤忌。生葱與雞雉犬肉食之。令人動血。

本經作湯治傷寒。寒中風。面目浮腫。能出汗。發明。葱莖白辛溫上升。入手太陰足陽明經。專主發散。以通上下陽氣。卽本經作湯已下主治。故傷寒頭痛如破。用連鬚葱白香豉湯。少陰病下利清穀。裏寒外熱。厥逆脈微者。白通湯內用葱白。以其辛溫通陽氣也。妊娠風邪喘嗽。非葱白橘皮不除。且能安胎順氣。金瘡折傷。血出疼痛不止者。用葱連葉煨熟傅之。冷卽頻易。其痛立止。更無瘢痕也。以葱葉專散血氣。葱鬚專行經絡。葱花主心癲痛如刀刺。葱子明日補中氣不足。蟠葱專主冷熱疝氣。胡葱化五石消桂爲

水療腫毒。

蒜小者曰蒜
大者曰胡

辛溫小毒。服雲母人切禁。胡蒜獨顆蒜尤忌。發明。胡之與蒜。功用彷彿。並入手太陰。

卷三 药部

陽明氣味薰烈能通五藏達諸竅去寒濕辟邪惡消癰腫化癥積肉食主溪毒下氣治蠱敷蛇蟲沙虱瘡此其功也。夏月食之解暑多食傷氣損目養生者忌之。艾火炎用獨顆蒜甚良以其力專也。凡中暑毒人爛嚼三四瓣下咽卽知又鼻衄不止者擣貼足心衄止卽拭去之。蒜薑水頓服二升吐腹中蟲積噎膈食不得下腹熱如火手不可近者皆效但胃虛少食者誤投是速其咎也。脚氣風病及時行病後忌食爲其能鼓舞餘毒也。服雲母鍾乳人勿食爲其能攬散藥力犯之必腹痛泄利前功盡棄也。○小蒜主霍亂腹中不安溫中除邪癆毒氣黃帝云食小蒜噉生魚令人奪氣陰核疼不可共韭食令人身重。

薑 即油菜 辛溫無毒發明 藝薑破血故產婦宜食之然須藏久者庶無泄漏之虞若舊患脚氣者不可食胡臭人不可食食之加劇遊風丹腫取葉搗敷如神無葉時以子代之時病瘥後不可食一切生菜令手足腫○其子打油名香油癰疽及痔漏中生蟲以香油塗之卽盡臘肉蛀孔中滴入其蟲卽滅治蟲之功可知。

白芥子 辛溫微毒發明 痰在脇下及皮裏膜外非此不能達控涎丹用白芥子正此義也。辛能入肺溫能散表故有利氣豁痰散痛消腫辟惡之功昔有脇痛諸治不效因食芥鹽而愈者偶中散結開痰之效其治射工瘡氣上氣發汗者亦取辛散祛毒力耳此雖日用常品然多食則昏目動火泄氣傷精肺

經有熱虛火亢者切忌。○陳年鹹芥鹹治肺癰吐盡臭痰穢毒卽愈然惟初起未潰宜之。

燕蕷一名蔓菁

卽諸葛菜 苦溫無毒 發明

蔓菁治熱毒風腫乳癰寒熱和鹽少許生搗塗之熱卽易不過三

五次瘥子能明目千金面脂方用之令人面潔白悅顏色但不可久食令人氣脹。

萊菔子 辛甘平微溫無毒其子多種惟春種夏收子細面色黯者佳服地黃何首烏人忌之 發明

菔子治痰有推牆倒壁之功長於利氣生能升熟能降升則吐風痰降則定痰嗽皆利氣之效同蘇子白芥子爲三子散治痰喘胸滿其根生升熟降生則冠血消痰熟則生痰助濕生萊菔汁治火傷垂死灌之卽蘇打搣損傷青紫搗爛署之卽散煨熟揩摩凍瘻二三日卽和偏頭風痛取近蒂青色者半寸許搗汁滴鼻孔左痛滴右右痛滴左左右俱痛兩鼻皆滴滴後臥少頃日滴一次不過六七日永不復發欲令鬚髮白者以生地黃汁一升合生萊菔汁一升飲之卽白傷血之驗可徵也小兒丹瘤遊風搗塗立消能消麵積解附子毒性最耗氣傷血故脾胃虛寒食不化者勿食丹方取苗葉陰乾治痢隨色之紅白用赤者砂糖調服白者糖霜調服然惟初痢爲宜若久痢胃虛畏食者不可用也。

生薑宿根謂之母薑 辛溫無毒解半夏黃芩厚朴毒本經久服去臭氣通神明 發明 生薑辛溫而散肺脾藥也散風寒止嘔吐化痰涎消脹滿治傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣嘔吐等病辛以散之卽本經去臭氣

通神明。不使邪穢之氣傷犯正氣也。同大棗行脾之津液而和榮衛。凡藥中用之。使津液不致沸騰。不獨專於發散也。煥熟則降而不升。止腹痛泄利。扶脾氣散鬱結。故逍遙散用之。同蜂蜜熬熟。治風熱欬逆痰結。取蜜之潤。以和辛散之性也。生薑搗汁。則大走經絡。與竹瀝則去熱疾。同半夏則治寒痰。凡中風中暑。及犯山風霧露毒。卒病。薑汁和童便灌之。立解。薑能開痰下氣。童便降火也。甄權云。搗汁和蜜食。治中熱嘔逆。不能下食。取薑以治嘔。蜜以和胃也。薑爲嘔家聖藥。蓋辛以散之。嘔乃氣逆不散。以其能行陽散氣也。○乾生薑溫中主嗽。治脹滿霍亂。嘔吐不止。腹痛者宜之。較生薑稍守。較乾薑稍緩。爲屑和酒服。治偏風頭痛。○薑皮辛涼。能消四肢浮腫。腹脹痞滿。五皮散用之。古云秋不食薑。令人瀉氣。而新薑尤當忌。之目。疾病瘡勿食。患癰疽人食之。則生惡肉。妊娠嗜食。令子餘指。

乾薑其嫩者曰白薑 辛熱無毒。或生用。或炮黑用。炮法厚切鐵鎊內烈火燒。勿頻動。俟鎊面火然。略噀以水。急挑數轉入鐸中。勿泄氣。候冷則裏外通黑。而性不烈也。本經主胸滿欬逆上氣。溫中止血出汗。逐風濕。痹。腸澼下痢。生者尤良。發明。乾薑稟陽氣之正。雖烈無毒。其味本辛。炮之則苦。專散虛火。用治裏寒。止而不移。非若附子行而不守也。生者能助陽。去藏府沉寒。發諸經寒氣。腹中冷痛。霍亂脹滿。皮膚間結。氣止嘔逆。治感寒腹痛。腎中無陽。脈氣欲絕。黑附子爲引。理中湯用之。以其溫脾也。四逆湯用之。以其回

陽也。生則逐寒邪而發。表膚滿熱逆。上氣出汗。風濕痹宜之。炮則除胃冷而守中。溫中止血腸澼下利宜之。曷觀小青龍四逆等方並用生者。甘草乾薑湯獨用炮者。其理中丸中雖不言炮。在溫中例治。不妨隨緩急裁用。然亦不可過多。多用則耗散元氣。辛以散之。是壯火食氣也。少用則收攝虛陽。溫以順之。是少火生氣也。同五味子以溫肺。同人參以溫胃。同甘草以溫經。凡血虛發熱。產後大熱。須炮黑用之。有血脫色白。天然不澤脈濡者。宜乾薑之辛溫以益血。乃熱因熱用。從治之法也。又入肺利氣。入腎燥濕。入肝引血藥生血。於亡血家。有破宿生新。陽生陰長之義。如過用涼藥。血不止。脈反緊疾者。乃陽虧陰無所附。加用炮薑炙甘草可也。陰虛有熱。血熱妄行者勿用。以其散氣走血也。

胡荽一名芫荽 辛溫微毒。服白朮牡丹皮者忌食。發明 胡荽辛溫香氣。內通心脾。外達四肢。能辟一切

不正之氣。酒後煎湯漱洗。則絕無酒氣。痘瘡出不快者。搗濕衣被發之。如春夏陽氣發越時用之。反助熱毒。恐變黑陷。不可不慎。華陀云。患狐臭人勿食。口氣齷齒人食之加劇。服雲母鍾乳人勿食。爲其辛溫。能解諸藥之力也。

懷香 辛平無毒。發明 草懷香入足太陽手足少陰。能開胃進食。專治膀胱疝氣及腎氣衝脹。如刀刺痛。喘息不便者。生搗熱酒絞服。以其辛香不竄。善降濁陰之氣也。下焦多火。強陽易舉者勿食。

新水芹

甘微辛小毒。本經主女子赤沃下血。養精保血脈益氣。令人肥健嗜食。發明。按斬有兩

種。一種生平田者曰旱斬。稟青陽之氣而生氣味辛。竄能清理胃中濁濕。故本經主女子赤沃。濁濕去則胃氣清純。而精血有賴。令人肥健嗜食。一種水陂澤者曰水斬。得濕溼之氣而生氣味辛。濁有蟲子在葉間。視之不見。食之令人爲患。面青手青。腹滿如妊。痛不可忍。作蛟龍病。但服輒餳二三升。吐出便差。大抵是蛇蠍之毒爾。其根白盈尺者曰馬斬。食之令人發瘡疥。以其濕熱之氣最盛也。和醋食之損齒。有齶痕人不可食。

菠蘿 甘冷滑無毒。發明。凡蔬菜皆能疏利腸胃。而菠蘿冷滑尤甚。多食令人脚弱。發腰痛。動冷氣。與鯧魚同食發霍亂。取汁煉霜制砒。伏雌黃。硫黃。毒。

蕹菜 甘平無毒。發明。蕹菜軟柔。如蔓而中空。以之橫地。節節生根。南方之奇蔬也。專解野葛毒。生搗服之尤良。搗汁和酒服治產難。取汁滴野葛苗。當時萎死。其相畏如此。

同蒿 甘溫無毒。發明。同蒿氣濁能助相火。禹錫言多食動風氣。薰人心。令人氣滿。王金言安心氣。養脾胃。消痰飲利腸胃者。是指素稟火衰而言。若腎氣本旺。不無助火之患。

芥菜子 肥菜 辛微溫無毒。本經明日治目痛。淚出。除癆。補五藏。益精光。發明。芥菜卽芥之大而

有毛者與薺之性不甚相遠。其子專於明目。千金治目暗去翳方用之。亦治目中胬肉。搗飾爲末。夜夜點之。久久其膜自落。甄權以薺治青盲。不見物。補五藏不足。二薺之性。總不出本經主治也。

莧子 甘冷利無毒。本經主青盲。明目除邪。利大小便。去寒熱。發明時珍曰。莧子去青盲白醫。與

青葙同類異種。故其治目之功彷彿。聖惠以莧子治大小便不利。無外乎本經主治也。

馬齒莧 酸寒無毒。芥曰辛溫。卽莧之赤色者。發明馬齒莧功專散血消腫。故能治血瘤。及多年惡瘡。搗敷不過兩三遍即愈。解馬汗射工毒。塗之瘥。燒灰和梳垢封疔腫。先灸後封之。其根卽出。不可同籠

食。令成瘻痕。

翻白草根 甘微苦平無毒。發明 翻白草出救荒本草。楚人謂之湖雞腿。淮人謂之天藕。時珍曰。湖雞腿生近澤田地。高不盈尺。一莖三葉。尖長而厚。有皺紋鋸齒。面青背白。四月開小黃花。結子如胡荽子。中有細子。根狀如台朮兩頭尖。剝去赤皮。其內白色如雞肉。食之有粉。小兒生食之。荒年掘以和飯食。兒科痘瘡拔疔方用之。取其涼潤解毒也。

蒲公英 俗名奶奶汁草苗。高尺餘者良。甘平無毒。發明 蒲公英屬土開黃花。味甘解食毒。散滯氣。然必鮮者搗汁和酒服。治乳癰效速。服罷欲睡。是其功驗。微汗而愈。

落葵一名藤葵亦名臘脂菜俗名染綠子

酸寒滑無毒。發明。

落葵蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟紫所在

有之採取汁紅如臘脂女人節面點唇及染布帛謂之胡胭脂亦曰染綠子但久卽色易變別錄言滑中散熱時珍云利大小腸子仁可作面脂和白蜜塗鮮華立見

蕺草一名魚腥草

辛微溫小毒。發明。魚腥草方藥罕用近世僅以煎湯薰滌痔瘡及敷惡瘡白疕又治

咽喉乳鴉搗取自然汁灌吐頑痰殊效別錄主蛇蠍尿瘡又云多食氣喘患脚氣人勿食千金言素有腳氣人食之一生不愈時珍云散熱毒癰腫脫肛斷痔疾解硝合上諸治總不出辟諸蟲毒瘡毒卽治痔瘡亦是濕熱生蟲之患專取穢惡之氣以治穢惡之疾同氣相感之力也。

蕨甘寒滑無毒。發明。蕨性寒滑不可生食。搜神記言有甲士折蕨食之覺心中快快成疾後吐一

小蛇漸乾成蕨孫真人云久食成瘻信與前說相符耳。

黃獨卽土

甘辛寒小毒不可溺灌灌之則苦。發明。土芋解諸藥毒生研水服當血出惡物便止煮

熟食甘美不饑厚人腸胃去熱嗽小兒熟食止稀痘解痘毒瘡其藤燒灰敷痘瘡成瘻可無瘢痕

薯蕷卽山藥因唐宋名預

甘平無毒同麵食發動氣微焙用本經治傷中補虛羸除寒熱邪氣補

中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑延年。發明。山藥入手足太陰色白歸肺味甘歸脾。

大補黃庭。治氣不足而清虛熱。故本經治傷中寒熱邪氣。補而不滯。溫而不熱。又能益氣力。長肌肉。強陰固腎。止泄精小便頻數。肺爲腎之上源。源既無滋流。豈無益全。置八味丸用以強陰也。薯蕷丸以之爲君。而主虛勞不足。風氣百病。甘溫平補而不礙久積之邪也。其鮮者和生鯽魚腦搗敷腫。又搗爛和芎藭末。白糖霜塗乳癩結塊。及諸痛日久堅硬不潰。但塗上奇癢不可忍。忍之更久漸止。不過數次即愈。○子名零餘子。補虛損。強腰脚。益腎。○一種曰甘。諳色較薯蕷稍紫。味較薯蕷稍甜。質較薯蕷稍膩。性較薯蕷稍溫。補脾強腎之功較薯蕷稍勝。廣人以之代糧。今徽寧亦多種之。名曰薯音孺。與諳字形切音並相類。傳久之訛耳。

百合。甘平無毒。白花者補肺。赤花者名山丹。散瘀血藥用之。本經主邪氣腹脹心痛。利大小便。補中益氣。發明。百合能補土清金。止嗽利小便。仲景百合病。兼地黃用之。取其能消瘀血也。本經主邪氣腹脹心痛。亦是散積畜之邪。今世所昧也。其曰利大小便者。性專降泄耳。其曰補中益氣者。邪熱去而脾胃安矣。然性專降泄。中氣虛寒。二便滑泄者忌之。○紅花者活血。治婦人崩中。其蕊敷疔腫惡瘡。按中吳紀聞云。百合乃蚯蚓所化。此洵有之。余親見包山土罅中有變化未全者。大略野生百合。蚓化有之。其清熱解毒。散積消瘀。乃蚓之本性耳。

茄 一名落蘇

甘寒小毒。

發明 茄性寒利多食腹痛下利。女人能傷子宮。發動痼疾。秋後多食損目。老裂

苔燒灰治 裂根治凍瘡。裂煮湯漬之良。其白茄根入風濕藥。浸酒服。其白茄蒂蘸硫黃末擦白癩風。紫茄蒂蘸硫黃末擦紫癩風。取其散風毒瘀血也。丹方治腦疽初起用茄蒂燒灰存性酒服。未潰卽消。又方用茄蒂中骨七枚。生何首烏一兩煎服。連進三服卽愈。

苦瓠 即細頸葫蘆

苦寒有毒。 本經治大水面目四肢浮腫。下水令人吐。發明 瓢有甜苦二種。甜者雖

言無毒亦不利人。扁鵲云患脚虛脹者不得食之。患水不差。苦者尤傷胃氣。不可輕試。凡苦寒藥皆能伐胃。不獨瓠也。本經治大水浮腫。又云下水令人吐。大傷中氣。今人治黃疸水氣。大小便不通。或浸火酒飯上蒸。或蜜糖霜煅存性。必暴病實證。庶可刲之。若久病虛誤服。必致吐利不止。往往致斃。可不慎歟。其子煎汁。或酒浸治鼻窒氣塞。少少滴入。又目疾努肉。血醫藥中亦有用者。取苦寒以降火也。○長柄葫蘆燒灰存性。腋下癰瘤研末擦之。以愈爲度。

冬瓜子仁 冬瓜

甘寒子甘平無毒。 本經令人悅澤。好顏色。益氣不饑。輕身耐老。發明 冬瓜利大

小腸。壓丹石毒。其子治腸癰。云面黑潤肌膚及作面脂。卽本經悅澤好顏色之用也。○瓜練絞汁服治五淋。壓丹石毒。

越瓜卽菜瓜俗名生瓜長可尺餘有青白二色青者尤勝

甘平小毒。發明。越瓜生於越中今湖州等處最多僅供蔬菜故名。菜瓜生食動氣令人心痛臍下癥結脚弱不能行天行病後不可食惟解酒毒利小便宜之燒灰數口瘡及陰莖熱瘡以其能解熱毒收濕氣也。

胡瓜今名黃瓜張騫使西域得種故名胡瓜

隋時避石勒名改呼黃瓜至今因之。北人坐臥坑床故以此爲珍品南人以之供蔬甚不益人多食動氣發寒熱發瘡疥發脚氣令人虛熱上逆天行後不可食小兒切忌作漏生疳其治咽喉腫痛用老黃瓜去子以芒硝填滿陰乾爲末每以少許吹之杖瘡癰腫取黃瓜入磁瓶中河水浸之每以水掃瘡上立效火眼赤痛老黃瓜挖去瓤入芒硝令滿懸陰處待硝出刮下甕罐收貯留點眼甚效湯火傷灼五月五日以黃瓜搗碎入瓶內封掛簷下取水刷之皆取其甘寒以解毒也。

南瓜種出南蕃故名

甘溫有毒。發明。

至賤之品食類之所不屑時珍既云多食發腳氣黃疸不可同羊肉

食令人氣壅其性滯氣助濕可知何又言補中益氣耶前後不相應如此。

絲瓜 甘寒無毒。發明。絲瓜嫩者寒滑多食漏人蔬菜中最不足取其老者經絡貫串房隔聯屬故能通人經脈支絡而解熱消腫祛毒殺蟲及治諸血病故痘瘡不快用老絲瓜近蒂三寸連皮燒灰存性

爲末。砂糖水服甚效。以其甘寒解毒而無滑瀉之虞也。其立冬後小絲瓜。煅入硃砂。服之能稀痘。其絲瓜藤取近根三五寸。燒灰存性爲末。治鼻渊時流臭濁水。酒調日服方寸匙效。其葉搗汁生服。解一切蛇傷之毒。卽以滓盦傷處乾卽易之。

苦瓜荔枝一名錦 苦寒無毒。發明 錦荔枝有長短二種。生青熟赤。生則性寒。熟則性溫。閩粵人以長者去子。但取青皮煮肉充蔬。爲除熱解煩清心明目之品。短者性溫。其子苦甘。內藏真火。故能壯陽益氣。然須熟赤方有殊功。

紫菜 甘鹹寒滑無毒。發明 凡癰結積塊之疾。宜常食之。鹹能堅之。義多食令人腹痛。發冷氣。吐白沫。飲熱醋少許卽消。

石花菜 甘鹹寒滑無毒。發明 石花煮肉。夏月必凍。下部虛寒及脾氣不充者勿食。

木耳 甘平小毒。發明 木耳喫濕土之氣而生於朽株。故有衰精冷腎之患。然治痔瘡。膿。腫。崩中漏下。大驗。俱炒見烟爲末。酒服方寸匙效。

桑耳桑上寄生 甘平有毒。有桑蛾桑雞桑黃桑巨等名。本經黑者主女子漏下。赤者治血病。癰。瘕。積。聚。陰瘤。陰瘍。寒熱無子。發明 桑耳涼潤。善祛子藏中風熱。不但主漏下血病。併可以治寒熱積聚。積聚去。

不難成孕。本經專取黑者達腎。赤者走肝。補中寓漏。漏中寓補之機具見言外矣。其黃熟陳白者。止久洩益氣。金色者。治癖飲積聚。及腸風漏血。衄血。五痔下血。瘰疬虛勞。咽喉痹痛。一切血證咸宜用之。○槐耳。治五痔脫肛。○柳耳。治反胃吐痰。○柘耳。治肺癰欬吐膿血。不問已成未成。皆可用之。

香蕈 甘平無毒。發明 諸蕈稟土之熱毒。浮長所以有毒傷人。惟香蕈柄木上糯米種出。大益胃氣。與蘑菇雞塊性味不殊。蘑菇亦埋桑楮諸木於土中。澆以米泔而生。其長大色白柔軟中空。如雞腿者。名雞腿蘑菇。狀如羊肚。有蜂窠眼者。名羊肚菜。其出雲南。生沙地間。高脚繖頭者。曰雞塊菜。皆能益胃清神。磨拭兼能化痰。雞塊兼能治療。一得桑楮餘澤。一鍾山川靈氣。故其性各有不同耳。

土蕈 蕈通菌

甘寒有毒。發明 處處山中有之。以其得嵐嶂鬱蒸之氣而生。助長濕熱最甚。過食令人

腹痛顛脹。或發痰氣嘔逆。其在初春蟄蟲未起之時。爲毒尚淺。夏秋濕熱盛行之時。毒邪尤甚。以其多有蛇蠍之毒也。卽生朽株上者。除槐榆松柳杉桑及蘡蘆根者。食之無虞。然日久蟲生。味苦亦不宜食。他如皂莢苦竹茅根生者。不無小毒。食之多發瘡疥。而生於楓樹上者。食之毒攻心包。令人笑不止。急以苦茗地漿。或生白礬研新汲水解之。諸菌之可食者。首推雷鳴菌。次則糖菌松花菌。味極鮮美。若味苦或辣。爲有毒。切不可食。至如光白如銀。中夜有光。上有毛。下無紋。底無贊禡。仰卷色赤。欲爛無蟲。洗之水黑。煮

之不熟者。並有大毒傷人。中其毒者。非地漿清糞不能救之。昔聞有人得一大菌。光潤可愛。置之瓶中。蠅蚋撲上。卽死。究其所得之處。乃在古塚穴中。洵爲妙物之毒無疑。今人煮菌。每以銀飾併燈心草置鍋中。但驗其銀色黑者。卽爲有毒。近見食蕈而死者。與河豚無異。特表而出之。

果部

李根白皮 苦微鹹寒無毒。炙黃用。發明 藥性論云。入藥用苦李根皮。而仲景治奔豚氣。責豚丸。用甘李根白皮。時珍疑爲二種。不知仲景言甘。是言李之甘。藥性言苦。是言根之苦。但宜用紫李根。則入厥陰血分。若黃李根。則入陽明氣分矣。別錄治消渴奔豚。大明治赤白痢。下千金燒存性。數小兒丹毒。甄權治消渴脚氣。孟詒治婦人赤白帶下。皆取苦鹹降逆氣也。李核仁。苦平。入肝。療僵仆瘀血骨痛。又能清血海中風氣。令人有子。故承澤丸用之。其性散結。故能解硫黃白石英附子毒。爲末和雞子白敷面。一宿卽落。千金方也。黃帝云。李子不可和白蜜食。蝕人五內。

杏仁 苦辛甘溫小毒。湯泡去皮尖研如泥用。兩仁者有毒傷人。凡果花六出者必雙仁。得純陰之氣也。本經主欬逆上氣。雷鳴喉下氣。產乳。金瘡。寒心。竇豚。發明 杏仁入手太陰經。辛能橫行而散。苦能直行而降。遂爲散邪降氣。定喘泄滯。散結潤燥。除肺中風熱欬嗽。總不出本經主治也。千金以童便浸七

日研如泥。治欬嗽寒熱。仲景麻黃湯用杏仁者。爲其利氣。瀉肺解肌也。至於昭胸麻仁等圓。皆熬黑研膩。如油。則知此物之性。愈熬黑。愈潤下矣。入肺寒喘逆。發散藥。連皮用之。又能治瘡殺蟲。用其毒也。本經治金瘡。寒心者。傷處風藉內入胞絡。而心下惡寒。用以塗封瘡口。拔散風熱之邪也。言治賁豚者。辛能散結。潤能下氣也。元素言潤大腸氣祕之才。言解錫毒。別錄言殺狗毒。炒香消狗肉及索粉積。故六神薑用之。扁鵲云。杏仁不宜久服。令人面目鬚髮落耗。氣之驗也。今人以之混治陰虛喘嗽。轉耗胸中大氣。爲患不淺。亡血家尤爲切禁。以其味辛性溫。大能破血也。雙仁者。搗爛以車脂調。鍼斷入肉。及箭鏑在咽喉諸隱處。數之卽出。巴旦杏仁。則甘平無毒。能止欬下氣。消心腹逆悶。杏實味酸。傷人筋骨生者尤甚。

梅 檬梅

酸平無毒。本經主下氣除熱煩滿。安心止肢體痛。偏枯不仁死肌。去青黑痣蝕惡肉。發明

梅花開於冬而實熟於夏。得木之全氣。故其味最酸。人舌下有四竅。兩竅通膽液。故食則津生。類相感應也。所主之病。皆取酸收之義。梅之種類最多。惟榔梅最勝。相傳是真武折梅枝插榔樹株而著。曰吾道若成花開果實。其種從均州太和山來。榔卽榆樹中之一種。其梅如杏而鬆脆異常。故近世謂之消梅。食之開胃生津。清神安睡。乃榔之本性也。本經下氣除熱煩滿。安心止肢體痛。皆指陳藏者而言。若青梅則凝滯氣。決非偏枯不仁者所宜。凡穀食菜果皆爾。不獨青梅爲然。烏梅酸收。益津開胃。同建茶乾薑治

休息痢能斂肺滯腸止嘔斂汗定喘安竚仲景治竚厥烏梅丸用之蟲得酸卽止用丸不用湯者欲留有形之物入於蟲口也今治血痢必用之中風驚癇喉痹腫痛瘧厥僵仆牙關緊閉者取烏梅擦牙齦卽開血痢不止以烏梅燒存性米湯服之漸止惡瘡胬肉亦燒灰研敷惡肉自消此卽本經去死肌惡肉之驗又丹方治女人脚上雞眼烏梅肉飯上蒸爛和米醋研如糊塗上一夕卽去○白梅鹹酸主中風牙關緊閉擦牙根涎出卽開去努肉方多用之竹木鍼刺在肉中者嚼敷卽出○梅核仁明目益氣除煩熱能清婦人子藏中風氣積滯千金承澤丸用之梅葉煮汁治休息痢及乾霍亂効以之漬水洗萬則不脆洗夏衣生徽點卽去有驗

桃仁苦甘平無毒去皮尖生用卽和血連皮尖炒用卽破血同乾漆拌炒大破宿血雙仁者有毒勿用本經主瘀血血閉癥瘕邪氣殺三蟲發明桃仁入手足厥陰血分爲血瘀血閉之專藥苦以泄滯血甘以生新血必竟破血之功居多觀本經主治可知仲景桃核承氣抵當湯皆取破血之用又治熱入血室瘀積癥瘕經閉癰癧心腹痛大腸祕結亦取散肝經之血結熬香治癩瘕痛瘻千金法也○桃實甘酸多食令人腹熱作瀉○桃奴殺百鬼精物療中惡腹痛瘀血癥堅破血酒磨服止血燒灰服○桃樹上膠最通津液能治血淋石淋瘡瘍黑陷必勝膏用之○桃葉治傳屍有水灸法方用桃葉一斗艾葉厚朴各

二兩分二囊盛置。以火酒數斤煮沸。更迭煮藥。熨患人脊背。酒盡爲度。不過三次。療蟲永絕。又瘡中小蟲。搗爛塗之。

栗。鹹溫無毒。發明。栗。腎之果也。腎病宜風乾者食之。若脾腎虛寒暴注。須煨熟食之。栗楔一越。三顆中扁者。療筋骨風痛。又能破冷症。癬。生嚼。署惡刺。出箭頭。栗蕤。肉上薄皮也。燒存性。治骨鯁在喉。吹入。卽下。栗殼煮汁。治反胃消渴。毛毬。外刺包也。煮汁洗火丹毒腫。栗花。治療癰。栗樹皮煮汁。洗沙蟲溪毒。并丹毒瘡毒。根治偏墜腎氣。酒煎服之。

大棗。甘平無毒。入藥取大紅棗。擘去核用。多食令齒生齶。本經主心腹邪氣。安中養脾氣。平胃氣。通九竅。助十二經。補少氣少津液。身中不足。大驚四肢。重和百藥。發明。棗屬土而有火。爲脾經血分藥。甘先入脾。故用薑棗之辛甘。以和榮衛也。仲景治奔豚。用滋脾土。平腎氣也。十棗湯用以益土勝邪水也。而中滿者勿食。故仲景建中湯。心下痞者減飴。與甘草同例。此得用棗之法矣。金匱治婦人藏燥。悲愁。慟哭。有甘麥大棗湯。亦取其助肝脾肺三經之津液。以滋其燥耳。本經主心腹邪氣。亦是和榮衛邪之義。平胃氣者。以其甘溫健運。善平胃中敦阜之氣也。素問以棗爲脾家之果。故本經又主身中不足。大驚。四肢。兼用此補益脾津。而神氣自寧。肢體自捷矣。古方中用大棗。皆是紅棗。取生能散表也。入補脾藥。宜用

南棗。取甘能益津也。其黑聚助濕中火。損齒生蟲。入藥非宜。生聚多食。令人熱渴氣脹。瘦人多火者。彌不可食。

梨。甘微酸寒無毒。發明。別錄著梨。止言其害。不錄其功。蓋古人論病。多主傷寒客邪。若消痰降火。除客熱。止心煩。梨之有益。蓋亦不少。近有一人。患消中善饑。諸治罔效。因煩渴不已。恣噉梨不徹。不藥而瘳。一婦鬱抑成勞。欬嗽吐血。右側不得貼席者半年。或令以梨汁頓熱服盞許。卽時吐稠痰結塊半盞。是夜便能向右而臥。明日復飲半盞。吐痰如前。已後飲食漸增。雖尋常食品。單刀直入。可以立破沉疴。而梨之種類最多。惟乳梨鵝梨消梨。可以療病。然須審大便實者。方可與食。元氣虛者。不慎而誤噉之。往往成寒中之患。豈可概謂食之有益乎。

木瓜。酸溫無毒。發明。木瓜酸收下降。所主霍亂轉筋。吐利脚氣。皆取收攝脾胃之濕熱。非肝病也。轉筋雖屬風水行脾。實由濕熱或寒濕之邪。襲傷脾胃所致。用此理脾而伐肝也。多食木瓜。損齒及骨。伐肝之明驗。患頭風人。以鮮者放枕邊。引散肝風。日久漸安。凡腰膝無力。由於精血虛陰不足者。及脾胃有積滯者。皆不利於酸收也。

山楂。卽棠子。甘苦微酸溫無毒。去核則不發熱。童便浸薑汁拌炒黑。去積血甚捷。發明。山楂八

足陽明太陰厥陰三經血分大能剋化飲食本經言其酸冷然其功長於消肉積行滯血性溫可知。若胃中無食積脾虛不能運化不思飲食者服之反剋伐脾胃生發之氣良非所宜炒黑治產後兒枕作痛亦以其能消血也。今痢疾初起多積垢者用薑汁炒治偏墜疝氣爲散酒服不過半月效。用核尤捷若外感風寒兼傷飲食舉世以發表消導並進中氣實者幸而獲痊虛者表邪乘虛陷入於府而生內變者多矣。

○東魯棠球子酒後嚼數顆良與糖作膏尤爲精品。

柰俗名
頹婆

甘溫無毒

發明

柰生北地與南方林檎同類異種雖有和脾之能多食令人肺壅腫脹病

人尤當忌食。

林檎俗名
花紅

溫無毒

發明

林檎雖不傷脾多食令人發熱以其味溫性溫也病人每好食此多致

復發或生痰涎而爲欬逆壅閉氣道使然其核食之煩心助火可知。

柿蒂

澗平無毒柿蒂同食則吐利腹痛木香可解發明柿之生青熟赤生澗熟甘渾是陰內陽外

之象獨蒂之澗始終不改故取以治陰內陽外之病濟生方治呃逆專取柿蒂之澗以斂內蘊之熱丁香生薑之辛以散外鬱之寒深得寒熱兼濟之妙用嘗考古方中有單用柿蒂以降逆氣者是以丹溪但執以寒治熱之理而不及從治之法矯枉過矣至三因方又於濟生方中加良薑之類是真爲寒而反助其

熱乎。○其乾枯白霜專清肺胃之熱。在元氣未漓可勝寒潤者用之固宜。但虛勞煩嗽喘乏得此鬱閉虛陽病根日固與埋薪灰燼何異。

安石榴 子甘酸皮滷溫無毒。發明 榴味甘酸。具木火之象。故多食傷肺損齒而生瘡涎。其皮滷溫能治下痢滑脫。一種小者曰酸石榴。治痢尤捷。千金治痢方皆用之。酸兼收斂。故能止下痢漏精崩中下血。丹方以酸石榴連皮子搗汁入薑茶煎治寒熱利。又久痢用榴皮燒灰。人參湯下一錢。屢驗。○榴花曝乾研細吹鼻止衄最速。千瓣者更良。功在山茶花之上。

橘皮 苦辛溫無毒。產粵東新會。陳久者良。陰虛乾渴蜜水製用。婦人乳房壅癰。醋拌炒用。本經主胸中痰熱逆氣利水穀。久服去口臭。下氣通神。發明 橘栗東南陽氣而生。故以閩粵者最勝。其踰淮而北則變爲枳。此地氣使然。與人之鄉音習俗無異。橘之文采煥發於外。故其功用都在於皮。專行脾肺二經氣分。本經主治胸中痰熱逆氣。爲消痰運脾之要藥。留白則補脾胃。去白則理肺氣。同人參白朮則補脾胃。同人參甘草則補肺。獨用則瀉肺損脾。其治百病。總是取其理氣燥濕之功。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升。同降藥則降。脾乃元氣之母。肺乃攝氣之籥。故爲二經氣分藥。但隨所配而補瀉升降也。同生薑則止嘔。同半夏則豁痰。同杏仁治大腸氣祕。同桃仁治大腸血祕。皆取其通滯也。○橘紅專主肺

寒嗽多痰虛損方多用之。然久嗽氣泄又非所宜。接橘皮下氣消痰。其潤生痰聚飲一物而性之殊異。如此。

青橘皮。辛溫無毒。醋炒用。剗去酸水。作四界者。曰蓮花青皮。細如豆者。爲青皮子。中有小橙。莫能辨别。發明。青橘皮古方所無。至宋時醫家乃用之。入足太陰厥陰。破滯氣。削堅積。及小腹疝瘕。用之以疏通二經。行其氣也。小兒消積多用之。青皮最能發汗。多汗者勿用。久瘧熱甚。必結癖塊。宜多服清脾飲。內有青皮疎利肝邪。則癖自不結也。中氣虛人禁用。以其伐肝太甚。而傷生發之氣也。

橘核。苦溫無毒。去殼焙香研碎用。細者爲橘核。粗即橙核。發明。橘核沉降。入足厥陰。與青皮同功。故治腰痛癰疽在下之病。不獨取象於核也。然惟實證爲宜。虛者禁用。以其味苦。大傷胃中沖和之氣也。橘葉。苦平無毒。發明。橘葉苦平。導胸膈逆氣。消乳癰。搗爛和麵。熨傷寒胸膈痞滿。又治肺癰絞汁。一劑服。吐出膿血愈。

柑。辛苦微寒無毒。發明。柑皮產廣東化州者最勝。與橘皮雖同爲下氣之品。然性之溫寒各異。故開竅取利腸中熱毒。解丹石。止暴渴。利小便。皆取辛寒以散熱滯也。世罕知用。惟千金方中用之。云甘皮者。自此。

橙酸寒無毒。發明 橙性酸寒。方藥少用。其鮮者惟殺魚蟹毒。和鹽貯食。止惡心。解酒病。痞瘧寒熱。

禁食。以其酸寒能滯邪氣也。其核治閃挫腰痛。炒研酒服三錢卽愈。

柚酸寒皮甘辛無毒。發明 柚能解酒。辟飲酒人口氣。皮能下氣化痰。與金橘性相類。但金橘甘酸。下氣尤捷。

柑櫞柑櫞舊作枸櫞

柑字形相似之誤。

柑甘溫無毒。

發明

柑櫞乃佛手。香櫞兩種。性味相類。故綱目混論不分。蓋

柑者佛手也。專破滯氣。今人治痢下後重。取陳年者用之。但痢久氣虛。非其所宜。櫞者香櫞也。兼破痰水。近世治欬嗽氣壅。亦取陳者。除去穰核用之。庶無酸收之患。丹方治鼓脹諸藥不效。用陳香櫞一枚連穰。大核桃肉一枚連皮。縮妙仁二錢去膜。各煅存性爲散。砂糖拌調空腹頓服。服後水從臍出。屢驗。

金橘一名金柑

酸甘溫無毒。

發明

金橘形如蟬丸。金柑形如牛奶。一皆酸甘香竄。並能下氣快膈。止渴。

解醒而圓者尤佳。

枇杷葉 辛苦平無毒。刷去毛實炙用。發明 枇杷味甘色黃。爲脾家果。然必極熟。乃有止渴下氣潤五藏之功。若帶生啖。酸力能助肝伐脾。食之令人中滿泄瀉。○其葉氣味俱薄。故入肺胃二經。治夏月傷暑氣逆最良。近世治勞嗽。無不用之。蓋取其和胃下氣。氣下則火降痰消。胃和則嘔定。止然冒寒嘔吐。

及風寒欬嗽忌之。○其核大寒而伐肝脾。以之同落蕪入麩醬。則色青翠。同蟹入鍋煮。則至熟不赤。性寒走肝可知。

楊梅 甘酸溫無毒。發明 楊梅爲心家血分之果。兼入肝脾心包。能止渴除煩。燒灰則斷痢。鹽藏則止嘔嘔消酒。但血熱火旺人不宜多食。恐動經絡之血而致衄也。其性雖熱而能從治熱鬱解毒。其根皮煎湯能解砒毒。燒灰油調塗火傷。核仁療脚氣。然須多食。以柿漆拌核。爆即自裂也。

櫻桃 一名含桃 甘熱小毒。發明 櫻桃屬火而發濕熱。舊有熱病及喘嗽者。得之立發。一種小者。名山櫻。桃性味甘平而不發熱。能止腸澼滑精。豈以形之不材。而反食之無害耶。其核今人用以升發麻斑。力能助火。大非所宜。在春夏尤爲切忌。

銀杏 俗名白果 甘苦平潤無毒。發明 銀杏定喘方用之。生嚼止白濁。降痰消毒殺蟲。塗鼻面手足去皺炮點。黯生搗能浣油膩。同水搗漿衣殺蟲蟲去瘀滌垢之功可例推矣。熟則壅遏閉氣。多食令人臚脹昏悶。昔有餓者薄暮食此過多次日脹悶欲死。急以鵝翎蘸香油探吐。方可得生。羹清灌之亦生。取其能降泄也。

胡桃 一名核桃。又名羌桃 甘平溫無毒。入藥連皮用。發明 補骨脂屬火。能使心包與命門之火相通。胡桃屬

水潤燥養血。佐補骨脂。有水火相生之妙。胡桃肉類三焦。而外皮水汁皆青黑。故能通命門。助相火。同補骨脂杜仲。青鹽名青蛾丸。治腎虛腰痛。以其能補腎也。同人參名應夢散。治肺寒喘嗽。以其能斂肺也。同生薑咀嚼。亦治寒痰喘嗽。若多食動風。脫人眉毛。詳其同錢細嚼。卽與銅俱化。與甘蔗同嚼。則蔗渣消融。其消肺爍肝可知。丹方用其瓤燒令黑。和松脂傅療癧有效。又以連皮胡桃肉。同貝母全蠍枚數相等蜜丸。治鼠瘻癰核。總取以通鬱結也。但肺有痰熱。命門火熾者勿食。其殼燒灰存性。治乳癰。取灰末一錢酒調服之。未腫卽消。已潰漸斂。但不可以其烟薰衣。衣卽易毀。青胡桃皮塗髭髮皆黑。

長生果一名落花生 甘溫無毒。發明 長生果產閩地。花落土中卽生。從古無此。近始有之。味甘氣香。能健脾胃。飲食難消運者宜之。或云與黃瓜相反。予嘗二者並食。未蒙其害。因表出之。

貨賈葡萄 甘微鹹溫無毒。發明 貨賈葡萄似葡萄而貨細。故有貨賈之名。生於漠北。南方閩亦有之。其榦類木而係藤本。其子生青熟赤。乾則紫黑。能擗精氣歸宿腎藏。與五味子功用不甚相遠。凡藤蔓之類。皆屬於筋。草木之實。皆達於藏。不獨此味爲然。此物向供食品。不入湯藥。故本草不載。近時北人以之強腎。南人以之稀痘。各有攸宜。強腎方用貨賈葡萄人參各一錢。火酒浸一宿。侵晨塗手心。摩擦腰脊。能助膂力強壯。若臥時摩擦腰脊。力助陽事堅。強服之尤爲得力。稀痘方用貨賈葡萄一歲一錢。神黃豆

一歲一粒。杆爲細末。一陽夜蜜水調服。併擦心窩腰眼。能助腎祐邪。以北地方物專助東南生氣之不足也。然惟稟質素弱者用之有益。若氣壯偏陽者勿用。恐其助長淫火之毒也。

橡實 苦溫無毒。發明。橡實消穀止痢。厚腸胃。令人強健。且能治痔漏脫肛。千金方治石癰堅硬如石。不作膿。用樣子一枚。蘸醋於石上磨汁塗之。乾則易。不過十度即平。共穀爲散。及煮汁服。止下痢。併染鬚髮。

榔皮一名赤龍皮 苦澀無毒。發明。榔皮煎服除蟲。及漏惡瘡甚效。能治赤白痢。腸風下血。肘後方治下部敗爛瘡。赤龍皮散以之爲君。千金方治附骨疽瘻疾。及蠱毒多用之。皆取苦澀化毒也。

荔枝 肉甘溫核澀無毒。治痘取建產潤脣之核良。發明。荔枝實氣味純陽。能散無形之滯氣。瘤贊

赤腫。宜之。多食發熱。煩渴口乾。而核入厥陰經。行散滯氣。其實雙結而核似臘丸。故治癩癧囊腫。有述類象形之義。時珍治癩癧氣刺痛。婦人血氣刺痛。小而肉似龍眼。其核尖小。僅堪磨擦。療癩治痘無效。

龍眼俗名圓眼 甘平無毒。桂產者佳。粵東者性熱。不堪入藥。發明。龍眼補血益肝。同枸杞熬膏。專補心脾之血。歸脾湯用之。治思慮傷心脾。皆取甘味歸脾。能益人智之義。然中滿家嘔家勿食。爲其氣壅也。師尼寒婦勿用。以其能助心包之火。與三焦之火相煽也。

橄欖

一名青果

滌甘溫無毒

發明

橄欖先滌後甘。生津止渴。開胃消痰。醉飽後及寒痰結喉宜之。熱嗽

不可誤食。病人多食令氣上壅。以其性溫而滌聚火氣於胃也。又能消酒解鰐鮀河豚諸魚鼈毒。觀朱魚食橄欖查卽斃。能解魚毒可知。故嚼汁嚥之能治魚骨梗有效。患痘瘡者宜多食。以其解毒而助胃中溫和之氣。令痘起發也。又核燒灰蜜丸同黃獨服能稀痘。但性專搜滌胎毒。過服令人嘔瀉。嬰兒初生胡桃肉細皮三枚。橄欖核燒灰一枚。硃砂雄黃各一分研細和甘草汁。生白蜜絞去滓。開乳前頓熱服之可代化毒丹。但化毒丹治胎熱面赤。此治胎寒面白不可混也。又灰末敷金瘡無瘢。生核磨水搽癩漸減。

榧子 甘溫溫有毒。本經主腹中邪氣。去三蟲蛇蠍蟲毒。鬼疰伏尸。發明 樕實肺家果也。性溫散氣。故能去腹中邪氣三蟲諸疾。火炒食之引火入肺。多食則大腸受傷。小兒黃瘦有蟲積者宜食。與使君子同功。觀本經主治可知。

松子 甘溫無毒。發明 海松子甘潤益肺。清心止嗽潤腸。兼柏仁麻仁之功。溫中益陰之效。心肺燥痰。乾嗽之良藥也。

檳榔 苦辛溫無毒。發明 檳榔泄胸中至高之氣。使之下行。性如鐵石之沉重。能墜諸藥至於下極。故治衝脈爲病。逆氣裏急。及治諸氣壅腹脹後重如神。胸腹蟲食積滯作痛。同木香爲必用之藥。其功專

於下氣消脹。逐水除痰。殺蟲治癆。攻食破積。止瘧療疝。脚氣瘴癧。若氣虛下陷。人及隔上有瘻疾。結氣者得之。其瘻滿昏塞愈甚。又凡漏後瘧後虛痢。切不可用也。閩廣瘴毒之鄉。人常食此。必以蒟蒻裹嚼。之所云飽能使之餓。醉能使之醒者。以其能下氣也。云饑能使之飽。醒能使之醉者。以蒟蒻辛溫。能開發中外之氣。以散瘴癧之邪也。

大腹子 卽大腹 檳榔 辛澀溫無毒。此味與檳榔皆性堅難切。須用滾水泡瀆切之。若以水浸潤。不但失其性味。反有傷於胃氣也。發明 大腹子偏入氣分。體豐濕盛者宜之。夫檳榔偏主血分。腹滿多火者宜之。時珍謂大腹與檳榔同功。似未體此。

大腹皮 辛澀溫有毒。鳩鳥多集其樹上。宜酒洗後。再以菉豆湯洗過用。其內粗者耗氣。宜摘去之。發明 檳榔性沉重。泄有形之積滯。腹皮性輕浮。散無形之滯氣。故痞滿膨脹。水氣浮腫。腳氣壅逆者宜之。惟虛脹禁用。以其能泄真氣也。

馬檳榔 苦甘寒無毒。發明 馬檳榔生滇南夷地。不入湯藥。熱病食數枚。冷水下之。腫毒惡瘡。嚼一枚并塗腫處。產難臨時細嚼數枚。井花水送下。須臾立產。再以四枚去殼。兩手各握一枚。惡水自下。欲斷產常嚼一枚。久則子宮冷。自不孕矣。

蟠花果 寶甘平。葉微辛無毒。發明 無花果出雲南。揚州亦多有之。今吳楚閩越人家折枝插成枝柯如枇杷樹。三月發葉。五月不花而寶。寶出枝間。狀如木餛頭。熟則紫色軟爛。其味如柿而無核也。食之開胃止洩。治咽喉痛。葉主五痔腫痛。煎湯頻煎洗之。

枳根一名雞距子
俗名蜜屈律 甘平無毒。發明 枳根金鈎樹之子也。本草止言木能敗酒。屋外有此木。屋內釀酒皆不佳。丹溪治酒病。往往用其實。又能止渴除煩。去膈上熱。潤五藏。利大小便。多服發蛇蟲。以其大甘助濕熱之所化也。

水果部

西瓜 甘寒無毒。發明 西瓜瓤色赤味甘。能引心包之熱。從小腸膀胱下泄。以其得西方金氣於三伏中。故能解太陽陽明中暯。及熱病大渴。故有天生白虎湯之稱。而春夏伏氣發瘧。熱病覓得隔年藏者。噉之。如湯沃雪。緣是世醫常以治冬時傷寒壞病煩渴。從未見其得愈者。良由不達天時。不明鬱發之故耳。近有舶上來者。五月便熟。不必覓隔年藏者。方宜時世之不同若此。

瓜子仁 甘淡微溫無毒。發明 西瓜甘寒降泄。子仁甘溫性升。以中藏烈日之氣。不無助火之責。其開益漿涎。是其本性。世人咸謂瓜子生痰。安有甫入口而便變痰涎之理。按相感志云。食西瓜後食其子。

卽不噏瓜氣。其溫散之力可知。綱目言其主治與甜瓜仁同。豈甜瓜仁亦爲生痰之物耶。

甜瓜蒂俗名苦丁香 苦寒有毒。熬黃用。本經主大水。身面浮腫。下水殺蟲毒。咳逆上氣。及食諸果。病在胸腹中。皆吐下之。發明 酸苦涌泄爲陰。仲景瓜蒂散用瓜蒂之苦寒合赤小豆之酸甘。以吐胸中寒邪。

金匱瓜蒂湯治中暯無汗。今人罕能用之。又揩鼻取頭中寒濕黃。瘴得麝香細辛。治鼻不聞香臭。瓜蒂乃陽明除濕熱之藥。能引去胸膈痰涎。故能治面目浮腫。咳逆上氣。皮膚水氣。黃疸漏熱諸證。卽本經主治也。凡尺脈虛。胃氣弱。病後產後。吐藥皆宜戒慎。何獨瓜蒂爲然哉。故膈上無熱痰邪熱者切禁。

甜瓜子卽甜瓜瓣 甘寒無毒。發明 甜瓜仁專於開痰利氣。別錄治腹內結聚。破潰膿血。爲腸胃內癰要藥。干金治肺癰有葷莖湯。腸癰有牡丹大黃湯。予嘗用之。然必黃熟味甜者方不傷胃氣。若生青味苦力劣不堪入藥。其瓤亦能去暑。然脾胃虛人食之。每致瀉痢。不可不知。

蒲桃俗名葡萄 甘寒無毒。本經治筋骨濕痹。益氣力。強志。令人肥健。耐饑忍風寒。可作酒。發明 葡萄

之性寒滑。食多令人泄濁。丹溪言東南人食之多病熱。西北人食之無恙。蓋能下走滲道。西北人稟氣厚。故有本經所主之功。無足異也。

甘蔗 甘平無毒。發明 蔗脾之果也。其漿甘寒。能瀉火熱。煎煉成糖。則甘溫而助濕熱也。蔗漿消渴。

解酒。自古稱之。而孟說乃爲共酒食發疾者。豈不知其有解酒除熱之功耶。日華子又爲砂糖能解酒毒。則不知既經煎煉。便能助酒爲熱。與蔗之性異矣。卽如甘草遇火則熱。麻油遇火則冷。此物性之異。醫者當知。近世用以搗汁治痢。服之有效。以其甘寒養胃而清濕熱也。

沙糖色黑如油者是。甘溫無毒。發明。沙糖性溫。能和脾緩肝。故治脾胃及漏肝藥用爲先導。今人好吸烟草。受其毒者。用此點湯解之。但性助濕熱。不可多食。熬焦治產婦敗血衝心。及虛羸老弱。血痢不可攻者。最效。

石蜜卽冰糖也。散白如霜者曰糖霜。山蜂蜜結石上者不同。

甘平無毒。發明。

凝結成塊。如石者爲石蜜。輕白如霜者爲糖霜。

比紫沙糖稍平。功用雖同。但白入氣分。紫入血分爲異。白糖霜亦能解烟草之毒。惟色黃者性熱。有濕熱者遠之。世言糖性濕熱。多食令人齒齦生瘡。近見患口瘡者。細嚼冰糖輒愈。取其達瘡以磨濕熱凝滯也。又暴得咳嗽吐血乍止。以冰糖與燕窩茶同煮連服。取其平補肺胃而無止截之患也。惟胃中有痰濕者。令人欲嘔。以其甜膩戀膈故也。

蓮藕。甘平。澀無毒。發明。蓮出淤泥。而無濁氣沾染。其根通達諸竅。聯繫諸絳。允爲交媾黃宮。通調津液之上品。入心脾血分。冷而不泄。澀而不滯。產後血闊。及血淋尿血。宜之。新產生冷。皆忌。獨生藕不禁。

爲其能止熱渴。破留血也。生食止霍亂虛渴。蒸食開胃實下焦。擣浸澄粉服食。治虛損失血。吐利下血。又血痢口噤不能食。頻服則結糞自下。胃氣自開。便能進食。但市者皆豆麥菱粉僞充。不可混用。○藕節之味大澗。能止驟脫諸血。產後血悶。隔水頓熱。和童子小便飲之一。人患血淋脹痛。白藥不應。以生藕汁調髮灰服之。三日血止。痛除。以其性專散血。而無傷耗真元之患也。

蓮寶 甘平澗無毒。去心中苦憇。則不傷胃。 發明 蓮子得水土之精英。補中養神。益氣清心。固精止渴。除崩帶赤白濁。能使心腎交而成既濟之妙。昔人治心腎不交。勞傷白濁。清心蓮子飲。補心腎益精血。有瑞蓮丸。皆取其補益黃庭。寶堤禦水之義。

石蓮子 甘寒無毒。 發明 石蓮子本蓮寶。老於蓮房。墮入淤泥。經久堅黑如石。故以得名。爲熱毒噤口痢之專藥。取水土之餘氣。補助脾陰。而滌除熱毒。然必兼人參之大力。開提胃氣。方始克應。若痢久胃氣虛寒。口噤不食。則爲戈戟也。況乎世鮮真者。今藥肆中乃以一種水寶僞充。其子出自粵東。大苦大寒。大傷胃氣。醫者不察。誤投傷殘之軀。往往輕者爲重。重者致斃。至於腎虛精滑之人。誤認體藏有熱。而峻用苦寒。鎗伐虛陽。精愈不能收攝。得無虛虛之患乎。

蓮鬚 甘澗溫無毒。忌地黃葱蒜。 發明 蓮鬚清心通腎。以其味澗。故爲祕薦精氣之要藥。三因固

真丸巨勝子丸用之。然惟慾勤精薄者爲宜。亢陽不製者勿用。恐其兜瀆爲患也。○蓮花性味與鬚相類。

惟取白花將開者。陰乾入藥。久服延年不饑。故經進萃仙丸用之。

蓮房 苦瀆溫無毒。發明 蓮房入厥陰功專止血。故血崩下血漏血皆燒灰用之。雖能止截。不似櫻灰之兜塞也。

荷葉 苦瀆平無毒。發明 荷葉得清震之氣。故潔古枳朮丸用荷葉燒飯爲丸。東垣治雷頭風證頭面腫痛疙瘩。憎寒發熱。狀如傷寒。證在三陽。不可過用寒藥。清震湯治之。用荷葉升麻蒼朮煎服。又痘瘡爲風寒外襲。而變黑倒曬。聞人規用荷葉合殭蠶解結滯之氣。而痘自起。又燒灰單服可消陽水浮腫。入健脾藥。但用其蒂。謂之荷鼻。取其味厚勝於他處也。戴元禮云。服荷葉令人瘦劣。非可常服。觀丹士縮銀法。用荷葉同鋟。則銀質頓輕。其性之消爍。無有甚於此者。

芡實俗名雞頭實 甘平無毒。本經主濕痹腰脊膝痛。補中除暴疾。益精氣強志。發明 芡生水中而能益脾利濕。觀本經所主。皆脾胃之病。遺精濁帶。小便不禁者宜之。

茭實俗名菱角 甘平無毒。發明 茭實多種。滯氣則一紅瀉白補。生降熟升。僅供食品。略無取於治療。患癰癩人勿食。過食令人腹滿腹脹。古法用麝香點湯解之。近人以沉香磨汁導之。總取芳香散滯之力耳。

烏芋俗名孽薑又名黑三棱

甘寒無毒

發明 烏芋善毀銅爲消堅削積之物。服丹石人宜之。痘瘡乾紫不能

起發。同地龍搗爛入白酒釀絞服卽起。又治酒客肺胃濕熱。聲音不清。及腹中熱積蟲毒。丹方治痞積。三伏時以火酒浸曬。每日空腹細嚼七枚。痞積漸消。故有黑三棱之名。凡有冷氣人勿食。多食令人患腳氣。虛勞咳嗽切禁。以其峻削肺氣兼耗營血。故孕婦血渴忌之。

慈姑 苦甘微寒無毒。發明 主治百毒。產後血悶攻心欲死。產難胞衣不出。並生搗汁服之。有脚氣癱緩風人勿食。以熟食壅氣也。葉治小兒遊風丹毒。搗爛塗之卽消。

味部

蜀椒 辛溫小毒。去目勿炒用。蜀產者微辛不辣。色黃者氣味微辛。散心包之火最勝。色紅者氣味辛辣。壯命門之火最强。形如鴿鈴者真。以子種出。其葉十三瓣者。蜀椒也。閉口者有毒傷。入誤中其毒吐沫者。地漿水解之。本經主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌。寒熱癆痛下氣。久服頭不白。發明 椒乃手足太陰少陰厥陰氣分之藥。稟五行之氣而生。葉青皮紅。花黃膜白子黑。其氣馨香。能使火氣下達命門。故本經謂之下氣。其主邪氣咳逆等證。皆是脾肺二經受病。肺虛則不能固密腠理。外邪客之爲咳逆。脾虛則不能溫煖肌肉。而爲痛痹等證。其治嘔吐服藥不納者。必有蛇在腸間。但於嘔吐藥中加川椒數十

粒。蓋就聞藥則動。遇椒則頭伏也。故仲景治蛇厥。烏梅丸用之。又能開痹濕。溫中氣。助心包命門之火。本經言。久服頭不白者。辛溫上通腎氣之力可知。今烏鬚髮方用之一。人腰痛痰喘。足冷如冰。六脈洪大。按之却軟。服八味丸無功用。用椒紅茯苓蜜丸鹽湯下。甫二十日而安。但其性辛溫氣竄。陰虛火旺人禁之。

秦椒 辛溫有毒去目炒。去汗取紅用。其葉九瓣者秦椒也。閉口者有毒。誤食之。戟人咽喉。氣欲絕。或吐下白沫。身體痹冷。肉桂煎汁飲之。多飲冷水一二升。或食蒜。或飲地漿。或濃煎豆豉飲之。並解。本經除風邪氣。溫中去寒痹。堅齒髮明目。

發明 秦椒味辛氣烈。過於蜀椒。其溫中去痹。除風邪氣。治吐逆。癟。下腫濕氣。皆取辛烈。以散鬱熱。乃從治之法也。不宜多服。令鬚髮易白。以其氣辛。非蜀椒之比。吳毒瘡。毒腹痛。冷水下一握效。其能通三焦。引正氣下惡氣可知也。

椒目 苦平無毒。發明 椒赤目黑。水能制火。故專瀉水降火。治腎氣逆上喘急。又妊娠水腫喘逆。用椒仁丸。能引諸藥下行滲道。所以定喘下水。治腎虛耳鳴。同巴豆菖蒲研細。以松脂黃蠟溶和爲挺。納耳中揣之。一日一易效。

豬椒根即蔓 苦溫無毒。其葉七瓣者豬椒也。本經主風寒濕痹。歷節疼。除四肢厥氣膝痛。煎湯蒸浴。取汗。發明 豬椒根蔓生氣臭。故能通經脈。去風毒濕痹。千金治肝虛勞損。關節骨疼。筋蠻煩悶。虎

骨酒用之。又取枝葉煎熬如飴治通身水腫。每日空腹食之。

胡椒 辛大溫小毒。發明 胡椒大辛大熱。純陽之物。走氣助火。昏目發瘡。多食損肺。令人吐血。心腹冷痛。反胃吐利。霍亂氣逆。及魚蠶蕈毒宜之。嚴冬泡水磨墨。則硯不冰。勝於皂水火酒。傷筆易秃也。

畢澄茄 辛溫無毒。發明 時珍曰。畢澄茄海南諸番皆有之。與胡椒一類兩種。正如大腹之與檳榔耳。珣曰。向陰生者爲澄茄。向陽生者爲胡椒。主治與胡椒相類。而熱性稍遙。治反胃吐出黑汁。諸藥不効。用此一味爲丸。薑湯服之。痘瘡入目。爲末以少許吹鼻中。三五次動鼻塞不通。用此半兩同薄荷葉三錢。荆芥穗一錢半。蜜丸芡實大。時時含嚥之。但陰虛血分有熱。發熱欬嗽禁用。

吳茱萸 辛苦溫小毒。揀去閉口者。否則令人躁悶。揀淨以滾湯泡七次。去其濁氣。則清香扶胃。而無辛燥之患也。本經溫中下氣止痛。除濕血痹。逐風邪。開腠理。欬逆寒熱。發明 吳茱萸氣味俱厚。陽中之陰。其性好上者。以其辛也。又善降逆氣者。以味厚也。辛散燥熱。而臊入肝行脾。本經主溫中下氣止痛。欬逆寒熱。專取辛溫散邪之力。又言除濕血痹。逐風邪。開腠理者。以風寒濕辨。辨不由脾胃而入。辛溫開發表裏。宣通而無拒閉之患矣。至於定吐止瀉。理關格中滿。脚氣疝瘕。制肝燥脾。風厥氣上逆。陰寒膈塞。氣不得上下。腹脹下痢。及衝脈爲病。逆氣裏急。並宜苦熱以泄之。東垣云。濁陰不降。厥氣上逆。甚而脹滿。

者。非吳茱萸不可治。仲景吳茱萸湯。當歸四逆加吳茱萸生薑湯。治厥陰病。及溫脾皆用之。寇氏言其下氣最速。陽虛人服之愈甚。凡病非寒滯者勿服。按椒性善下。茱萸善上。故服茱萸者有衝膈衝眼脫髮咽痛。動火發瘡之害。其治暴注下重。嘔逆吐酸。肝脾火逆之證。必兼苦寒以降之。如佐金丸治肝火痰運嘈雜最效。小兒痘瘡口一嚼吳茱萸抹之即開。亦取辛散之意。

食茱萸 辛苦大溫有毒。本經主心下邪氣。寒熱溫中。逐寒濕。去三蟲。久服輕身。發明 食茱萸與吳茱萸性味相類。功用彷彿。而本經之文。向來錯簡在山茱萸條內。詳其主心下寒熱。卽孟詵治心腹冷痛之謂。溫中逐寒濕。脾卽中惡去藏府冷之謂。去三蟲。卽藏氣療蠱毒飛屍之謂。雖常食之品。辛香助陽。能辟濁陰之滯。故有輕身之喻。已上主治。豈山茱萸能之乎。其治帶下冷痢。暖胃燥濕水氣浮腫用之。功同吳茱萸而力少遙。多食動目火。目痛者忌之。

若 苦甘微寒無毒。服草薢歲靈仙土茯苓忌之。本經主癰瘡利小便。去痰熱止渴。令人少寐。有力悅志。發明 若乃茶之粗者。味苦而寒。最能降火消痰。開鬱利氣。下行之功最速。故本經主癰瘡利小便。去痰熱之患。然過飲卽令人少寐。以其氣清也。消食止渴。無出其右。合醋治傷暑泄利。同薑治滯下赤白。兼香豉葱白生薑。治時疫氣發熱頭痛。一味濃煎治風癩。茶之產處最多。惟陽羨者謂之真界。凡亦皆能

降火清頭目。其陳年者曰臘茶。以其經冬過臘故以命名。佐劉寄奴治便血最效。產徽者曰松蘿。專於化食。產浙紹者曰日鑄。專於清火。產閩者曰建茶。專於辟瘴。產六合者曰苦丁。專於止痢。產滇南者曰普洱茶。則兼消食辟瘴止痢之功。蒙山者世所罕有。近世每採石苔代充。誤人殊甚。其餘雜茶皆苦寒伐胃。虛血弱之人有嗜茶成癖者。久而傷精。血不華。色黃瘁。痿弱。嘔逆。洞泄。種種皆傷茶之害。而侵晨啜茗。每傷胃氣。酒後嗜茶多成茶癖。又新茶飲之令人聲音不清。以其能鬱遏火邪也。至於精氣寒滑。觸之易泄者勿食。宜以沙苑蒺藜點湯代之。茶子味苦氣肅。善於降火。專治頭中鳴響。天白蟻之病。江右人每以打油味最清香。浸油沐髮最佳。取茶子餅煮汁澆花。以辟盆中之蚯蚓。煎湯滌衣垢。則不退顏色。總取其質之輕清而不沾滯也。

香木部

柏子仁 甘平無毒。蒸熟曝乾自裂。入藥炒研用。色黃油透者勿用。本經主驚悸。益氣除風濕。安五藏。久服令人潤澤美色。耳目聰明。不餓不老。輕身延年。發明。柏子仁性平而補。味甘而辛。其氣清香。能通心腎。益脾胃。宜乎滋養之劑用之。本經言除風濕者。以其性燥也。別錄療恍惚及歷節腰中重痛。即本經主驚悸除風濕也。經疏以爲除風濕痹之功。非潤藥所能當。是葉之能事。豈知其質雖潤。而性却燥。未

有香藥之性不燥者也。好古以爲肝經氣分藥。時珍言養心氣潤腎燥安魂定魄。益智寧神。卽本經之安五藏也。昔人以其多油而滑痰多作漏忌服。蓋不知其性燥而無傷中泥痰之患。久服每致大便燥結。以芳香走氣而無益血之功也。

柏葉

節油

苦微寒無毒。酒浸焙熟用。

發明

柏葉性寒而燥。大能伐胃。雖有止衄之功。而無陽生之力。故亡血虛家不宜擅服。然配合之力。功過懸殊。如金匱柏葉湯。同薑艾治吐血不止。當無止慮矣。若濟急方。同黃連治小便血。聖濟總錄。同芍藥治月水不斷。縱藉酒之辛溫。以行苦寒之勢。但酒力易過。苦寒長留。每致減食作渴。瘀積不散。是豈柏葉之過歟。○柏節堅勁。用以煮汁釀酒。去風痹歷節風。燒取其油。療癰瘍疥癩。柏脂治身面疣。同松脂研勻塗之。數日自落。根白皮以臘豬脂調塗。火灼熱油湯。瘡能涼血生毛髮。

松脂

本經名松膏俗名松香

苦甘溫無毒。

本經主癰疽惡瘡。頭瘍白疕疥癩風氣。安五藏除熱。久服輕身不老。

延年。

發明

松脂得風木堅勁之氣。其津液流行皮幹之中。積歲結成芳香燥烈。允爲方士辟穀延齡

之上藥。然必蒸煉始堪服食。本經所主諸病。皆取風燥以祛濕熱之患耳。今生肌藥中用之者。取其清以

斂之也。

松節 苦溫辦毒。發明。松節質堅氣勁。久亦不朽。故筋骨間風濕諸病宜之。但血燥人忌服。○松花潤心肺。益氣除風濕。今醫治痘瘡濕爛。取其涼燥也。

杉 李微溫無毒。發明。杉氣芬芳。取其薄片煮湯薰洗。無不獲效。其性直上。其節堅勁。有杉木湯治脚氣痞絕。腋下有塊如石。方用杉節橘葉各一升。大腹檳榔七枚。連皮碎搗。童便三升。共煮減半服之。大下三行。氣塊通散。此鄭間美治柳州法也。杉葉治風蟲牙痛。同菖蒲細辛煎酒含漱。杉子治疝氣痛。一歲一粒研酒服。

肉桂 辛甘大溫無毒。去麩皮用。凡桂皆忌葱勿見火。以辛香得火轉烈。恐動陰血也。色深紫而甘勝於辛。其形狹長。半卷而鬆厚者良。若堅厚味淡者曰板桂。今名西桂。不入湯藥。近世船上人每以丁皮混充。不可不辨。發明。肉桂辛熱下行。入足太陰少陰。通陰蹻督脈。氣味俱厚。益火消陰。大補陽氣。下焦火不足者宜之。其性下行。導火之源。所謂腎苦燥急。食辛以潤之。利肝腎。止腰腹寒痛。冷痰霍亂。轉筋。堅筋骨。通血脉。元素言。補下焦不足。沉寒痼冷之病。下部腹痛。非此不能止。時珍治寒痹風濕。陰盛失血。漏痢。驚癇。皆取辛溫散結之力也。古方治小兒驚癇。及泄瀉病。宜五苓散。以瀉內火。滲土濕。內有桂抑肝風而扶脾土。引利水藥入膀胱也。赤眼腫痛。脾虛不能飲食。肝脈盛。脾脈弱。用涼藥治肝。則脾愈虛。用緩藥助

脾則肝愈盛。但於溫脾藥中。倍加肉桂。殺肝益脾。一治而兩得之。同丁香治痘瘡灰塌。以其能溫托化曬也。又桂辛散能通子宮。而破血調經。消癰瘍。破瘀墜胎。內托陰疽。癰癧久不斂。及虛陽上乘。面赤戴陽。吐血衄血。而脈營營虛大無力者。皆不可缺。有胎息虛寒下墜。服黃芩白朮輩安之不應。小腹愈痛愈墜。脈來弦細或浮革者。非參耆桂附十全大補溫之不效。昔人又以亡血虛家。不可用桂。時珍以之治陰盛失血。非妙達陰陽之理。不能知此。惟陰虛失血。而脈弦細數者切忌。今人以之同石灰等分爲末。摻黑膏上貼。癖塊效。亦取辛溫散結之力。然惟藜藿之人。皮膚粗厚者宜之。

桂心 辛甘大溫無毒。卽肉桂之去外色淡。但存中心深紫。切之油潤者是。發明 桂心既去外層苦燥之性。獨取中心甘潤之味。專溫營分之裏藥。故治九種心痛。腹內冷痛。破痃癖等病。與經絡軀殼之病無預。非若肉桂之氣通經脈。和營衛。堅筋骨。有寒濕風痹等治也。

牡桂大桂 辛甘微苦溫無毒。甜厚而闢者是。本經主上氣欬逆結氣。喉痹吐吸利關節。補中益氣。久服通神。輕身不老。發明 牡桂辛勝於甘。而微帶苦。性偏溫散。而能上行。故本經治上氣欬逆。成無己利肺氣。皆取辛散上行之力。時珍不察。乃與桂枝同列。非智者一失歟。蓋桂枝是最上枝條。亦名柳桂。言如柳條之嫩小也。蓋牡者陽也。牡桂是稟離火純陽之氣。故味帶苦。且大且厚。與桂枝絕不相類。何可混

言本經言治上氣欬逆。導下焦之陰火逆上也。治結氣。辛溫開結也。曉辨吐吸同氣相招以引浮游之火下泄也。然必兼苦寒降泄之味用之。利關節從內而達於表也。補中益氣。久服通神輕身不老。補助真元。陽生陰長也。然須詳素稟豐腴。濕勝火衰者爲宜。若瘦人精血不充。火氣用事。非可例以爲然也。其治心腹冷痛。癰瘕血瘀。筋脈拘攣。冷痰霍亂。其功不減肉桂。但治相火不歸下元虛冷。力不能直達下焦爲稍遙耳。

筒桂俗名官桂

辛甘溫無毒。

本經主百病。養精神和顏色。爲諸藥先聘通使。久服面生光華。媚好常如童子。

發明

筒桂辛而不熱。薄而能宣。爲諸藥通使。故百病宜之。本經言其養精神和顏色。有辛溫之功。

無壯火之患也。爲諸藥先聘通使。凡開提之藥。補益之藥。無不宜之。久服面生光華。媚好常如童子。以其質薄性輕。無桂心肉桂牡桂等雄烈之氣。力勝真陰之比。別錄治心痛。肠痛。肠風。溫經通血脈。止煩出汗。皆薄則宣通之義。綱目乃以別錄元素二家之言。皆混列牡桂之下。蓋牡桂是桂之大者。功用與肉桂相類。專行氣中血滯。筒桂則專行胸脇。爲脹滿之要藥。凡中焦寒邪拒閉。胃氣不通。嘔吐酸水。寒痰水癖。奔豚死血。風寒痛痹。三焦結滯。並宜薄桂。蓋味厚則泄。薄則通也。

桂枝 辛甘微溫無毒。發明 麻黃外發而祛寒。過徹皮毛。故專於發汗。桂枝上行而散表。透達營衛。

故能解肌。元素云。傷風頭痛。開腠理。解肌發汗。去皮膚風濕。此皆桂枝所治。時珍乃以列之牡桂之下。誤矣。按仲景治中風解表。皆用桂枝湯。又云無汗不得用桂枝。其義云何。夫太陽中風。陽浮陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。衛實營虛。故發熱汗出。桂枝湯爲專藥。又太陽病發熱汗出者。此爲營弱衛強。陰虛陽必湊之。皆用桂枝發汗。此調其營。則衛氣自和。風邪無所容。遂從汗解。非桂枝能發汗也。汗多用桂枝湯者。以之與芍藥調和營衛。則邪從汗去而汗自止。非桂枝能止汗也。世俗以傷寒無汗不得用桂枝者。非也。桂枝辛甘發散爲陽。寒傷營血。亦不可少之藥。麻黃湯葛根湯。未嘗缺此。但不可用桂枝湯。以中有芍藥酸寒。收斂表腠爲禁耳。若夫傷寒尺脈不至。是中焦營氣之虛。不能下通於衛。故需膠飴加入桂枝湯方。取稼穡之甘。引入胃中。遂名之曰建中。更加黃耆。則爲黃耆建中。借表藥爲裏藥。以治男子虛勞不足。千金又以黃耆建中。換入當歸。爲內補建中。以治婦人產後虛羸不足。不特無餘邪內伏之虞。并可杜陽邪內陷之患。非洞達長沙妙用。難以體此。詳桂枝本手少陰血分藥。以其兼走陽維。凡傷之邪。無不由陽維傳次。故此方爲太陽首劑。昔人以桂枝湯爲太陽經風傷衛之耑藥。他經皆非所宜。而仲景三陰例中。陰盡復陽。靡不用之。卽厥陰當歸四逆。未嘗不本桂枝湯也。○桂附各具五體。各有攸宜。內桂雖主下元。而總理中外血氣。桂心專溫藏府營血。不行經絡氣分。牡桂性氣上行。統治表裏虛寒。薄桂善走胸脇。

不能直逕下條桂枝調和營衛解散風邪而無過汗傷表之厄。真藥中之良品。尤爲湯液之祖也。本經之言牡桂兼肉桂。桂心而言。言筒桂兼桂枝而言也。其他板桂木桂僅供香料食料。不入湯藥。

辛夷卽木筆花 辛溫無毒。剝去毛瓣取仁用。忌火焙。本經主五藏身體寒熱頭風腦痛面黓。發明 鼻

氣通於天。肺開竅於鼻。辛夷之辛溫走氣而入肺利竅。其體輕浮能開胃中清陽。上行通於天。故本經治陽氣鬱遏。身體寒熱。頭風腦痛面黓。辛溫能解肌表。芳香上竅頭目。逐陽分之風邪。則諸證自愈。軒岐之後能達此理者。東垣一人而已。凡鼻鼽鼻淵鼻塞。及痘後鼻瘡。並研末入麝香少許。以葱白蘸入甚良。腦鼻中有漏氣。久窒不通者。宜之。但辛香走竅。虛人血虛火熾而鼻塞。及偶感風寒。鼻塞不聞香臭者。禁用。沈香 辛甘苦微溫無毒。咀嚼香甜者性平。辛辣者性熱。修製忌火。香藥皆然。不獨沉香也。產海南者色黃。鋸處色黑。俗謂銅筋鐵骨者良。產大宜白棕紋者次之。近有新山產者。色黑而堅質不鬆。味不甘苦。入藥無效。番舶來者氣味帶酸。此爲下品。其浮水者曰速香。不入藥。發明 沈水香性溫。秉南方純陽之性。專於化氣。諸氣鬱結不伸者宜之。溫而不燥。行而不泄。扶脾達腎。攝火歸源。主大腸虛祕。小便氣淋。及痰涎血出於脾者爲之要藥。凡心腹卒痛。霍亂中惡。氣逆喘急者。並宜酒磨服之。補命門三焦。男子精冷。宜入丸劑。同廣藿香香附治諸虛寒熱。同丁香肉桂治胃虛呃逆。同紫蘇白豆蔻治胃冷嘔吐。同茯苓人

參治心神不足。同川椒肉桂。治命門火衰。同廣木香。附治婦人強忍入房。或過忍尿以致轉胞不通。同肉蔻。蕊麻仁。治大腸虛祕。昔人四磨飲。沈香化氣丸。滾痰丸用之。取其降泄也。沈香降氣散用之。取其散結導氣也。黑錫丹用之。取其納氣歸元也。但多降少升。氣虛下陷人不可多服。久服每致失氣無度。而黃少食。虛證百出矣。○一種曰蜜香。與沈香大抵相類。故綱目釋名沈水香蜜香二者並稱。但其性直者毋論。大小皆是沈水。若形如木耳者。俗名將軍帽。即是蜜香。其力稍遜。僅能辟惡去邪氣尸疰。一切不正之氣。而溫脾暖胃。納氣歸元之力。不如沈香也。

丁香一名雞舌香

辛溫無毒。有子而大者曰母丁香。去蒂及子。用忌見火。發明

丁香辛溫。入手太陰足

少陰陽明經。溫胃進食。止嘔逆。定瀉。虛冷下痢白沫之要藥。乾霍亂不吐不下。及嘔逆不止。厥冷脈沈者。並宜服之。冒寒肝虛。呃逆嘔噦。在所必用。但渴欲飲水。熱噦呃逆。不可誤投。小兒痘疹不光澤不起。發氣虛灰白。或脹或渴或渴。或氣促。表裏俱虛之證。並宜加用。凡胃逆嘔吐者。健胃消痰藥中。加三五粒甚效。不宜多用。但其性易於鬱上。過用則損肺傷目。非屬虛寒者。槩不可施。○丁皮即丁香皮。似筒桂皮而堅厚。色深紫。較之肉桂味稍枯。氣稍滯。專治一切心腹冷氣。腹脹惡心。泄瀉虛滑。水穀不消。及齒痛諸證。方家用代丁香。今舶上人每以偽充肉桂。不可不辨。

旃檀 辛溫無毒。禁用火焙。發明 白檀香善調膈上諸氣。散冷氣引胃氣上升。進飲食氣通陽明之經。輕抑不舒。嘔逆吐食者宜之。癰疽潰後。膿多禁用。

紫檀 酸平無毒。發明 白檀辛溫氣分藥也。故能理衛氣而調肺脾。利胸膈。紫檀鹹平血分藥也。方能和營氣而消腫毒。療金瘡各有攸宜。

降真香 辛溫無毒。禁用火焙。發明 降真香色赤入血分而下降。故內服能行血破滯。外塗可止血定痛。刃傷用紫金散。卽降真香用磁瓦刮下。和血竭研末是也。又虛損吐紅色瘀昧不鮮者宜加用之。其功與花蕊石散不殊。血熱妄行。色紫濃厚。脈實便祕者禁用。

烏藥 热溫無毒。酒浸服。乾用不可見火。發明 烏藥香竄能散諸氣。故治中風中氣諸證。用烏藥順氣散者。先疎其氣。氣順則風散也。性溫能理七情鬱結。上氣喘急。用四磨六磨。婦人血氣諸痛。男子腰膝麻痺。用烏沈湯。並借參之力。寓補於瀉也。大抵能治氣血凝滯。霍亂吐瀉。痰食稽留。但專泄之品。施之藜藿相宜。若高粱之輩。血虛內熱者服之。鮮不蒙其害也。

茴香 辛溫小毒。去子用。小而味淡者曰木蟹。不入藥。發明 舶上茴香。性熱味厚。性入肝經。散一切寒結。故黑錫丹用之。若陰虛肝火從左上衝頭面者。用之最捷。蓋茴香與肉桂吳茱萸皆厥陰之藥。萸則

走腸胃。桂則走肝藏。茴則走經絡也。得鹽引入腎經。發出邪氣有效。但耗血發熱。目病瘡瘍忌之。

楓香脂

一名白膠香

辛苦平無毒。

發明 楓性疎通。故木易蛀。爲外科透毒要藥。金瘡筋斷。一味爲末。傅

之于金治咳唾。膿血取其開發肺氣也。血熱生風。齒頰腫痛。爲末擦之。燒過揩牙。永無牙疾。

薰陸香

卽乳香

苦辛微溫無毒。以酒研如泥。水飛曬乾。或箬上焙去油。同燈心研易碎。

發明 乳香香

竊能入心經。活血定痛。故爲癰疽瘡瘍要藥。諸痛癰瘡皆屬心火也。產科諸方多用之。亦取其活血調血之功耳。凡人筋不伸者。薰洗敷藥。宜加乳香。其性能伸筋也。瘡疽潰後勿服。膿多勿數。胃弱勿用。

沒藥

苦平無毒。修治與乳香同。

發明 乳香活血。沒藥散血。皆能止痛消腫生肌。故二藥每每相兼

爲用。凡刃傷打損墜馬。並宜熱酒調服。若妊娠胎氣不安。勿用。產後惡露去。多腹中虛痛。癰疽已潰而痛。及筋骨胸腹諸痛。若不因瘀血者。皆不可服。

麒麟竭

卽血竭

甘鹹平無毒。試之透指甲爲真。嚼之不爛如蠟者爲上。草血竭色紫。亞於瓜竭。

發明

血竭木之脂液。如人之膏血。爲止痛和血。收斂瘡口。散瘀生新之要藥。治傷折打損。一切疼痛。血氣攬刺。內傷血聚。並宜酒服。乳香沒藥。雖主血病。而氣入氣分。此則專於肝經血分也。但性最急。却能引腫。不宜

多服其助陽藥中同乳香沒藥用之者取以調和血氣而無留滯壅毒之患。

安息香 辛苦微甘平無毒。出西戎及南海波斯國。樹中脂也。如膠如飴。今安南三佛齊諸番皆有之。如飴者曰安息香。紫黑黃相和如瑪瑙研之色白者爲上。粗黑中夾砂石樹皮者爲次。乃渣滓結成也有屑未成塊者爲下。恐有他香夾雜也。燒之集鼠者爲真。修製最忌經火。發明 安息香乃外番入貢之物。香而不燥。竄而不烈。燒之去鬼來神。令人神清。服之辟邪除惡。令人條暢。能通心腹諸邪氣。辟惡蟲。理霍亂。止卒然心痛嘔逆。治婦人爲邪祟所憑。夜與鬼交。燒烟薰丹田穴。永斷故傳。尸癆療咸用之。其蘇合香丸。紫雪丹用之各有轉回天之功。洵非尋常方藥可比也。凡氣虛少食陰虛多火者禁用。爲其能耗氣也。

蘇合香 甘溫無毒。出天竺崑崙諸國。安南三佛齊亦皆有之。其質如鯨膠者爲蘇合油。色微綠如雉斑者貞。微黃者次之。紫赤者又次之。以簪挑起徑尺不斷如絲。漸漸屈起如鉤者爲上。以少許擦手心。香透手背者真。忌經火。發明 蘇合香聚諸香之氣而成。能辟惡殺鬼精物。治溫瘧蠭毒癰癰。去三蟲除邪。能透諸竅藏。辟一切不正之氣。凡痰積氣厥必先以此開導。治痰以理氣爲本也。凡山嵐瘴濕之氣襲於經絡。拘急弛緩不均者。非此不能除。但性燥氣竄。陰虛多火人禁用。

龍腦香片

辛苦溫有毒。息見火。

發明 龍腦香竄入骨風病在骨髓者宜之。若風在血脈肌肉用

之反引風入骨髓也。其味大辛善走故能散熱。通利關格結氣。張雲岐人參散柏子仁湯等方多用之。其治目痛喉癆下疳。取其辛溫而散火鬱也。時珍曰。古方皆言龍腦辛涼入心。故目疾驚風及痘瘡心熱血瘀倒瞼者。用猪心血爲引。使毒散於外則瘡發。此似是而非也。目痛驚風及痘皆火病。火鬱則發。之從治之法。辛溫發散故也。使壅塞通利。經絡條達。而驚熱自平。瘡毒能出。然不可多用。多用則真氣立耗矣。人有急難。欲自盡者。頓吞兩許立斃。爲其性烈。立能散盡真氣也。世人誤以爲寒。不知辛散之性。似乎涼耳。治火證舌出寸許。用冰片末掺上。卽縮引火歸元也。目病屬陰虛者。不宜入點。

樟腦一名腦子
又名韶腦

辛熱有毒。息見火。

發明

樟木性稟龍火。辛溫香竄。能去濕辟惡氣。故治乾霍亂。以

樟木屑煎濃汁吐之中。惡卒死者。以樟木燒烟熏之。待蘇用藥。韶郡諸山樟木最多。土人以之蒸汁。煎煉結成樟腦。與烟硝無異。水中然火。其焰益熾。今丹爐家及烟火方皆用之。去濕殺蟲。此物所長。燒烟薰衣。能辟蟲蠅。治腳氣腫痛。或以樟腦置兩股。用杉木作桶盛湯濯之。或樟腦烏頭等分。醋丸彈子大。每置一丸於足心踏之下。以微火烘之。衣被圍覆。汗出如涎爲效。

阿魏 辛溫有毒。驗真僞法。置熱銅器中一宿。沾處白如銀色者爲真。

發明

阿魏消肉積殺蟲治癬。

積爲主藥。故能解毒辟邪。治瘧痢。瘍勞諸病。久瘧用阿魏硃砂等分爲末。米糊丸。皂子大。空心人參湯服一丸。卽愈。如痢用黃連木香湯下。蓋瘧亦多起於積滯耳。同麝香硫黃蘇合貼。一切塊有効。然人脾胃喜芳香而惡臭烈。凡脾胃虛人。雖有積滯。不可輕投。

蘆薈 苦寒小毒。發明 蘆薈入厥陰肝經及衝脈。其功專於殺蟲清熱。衝脈爲病。逆氣裏急。及經事不調。腹中結塊上衝。與小兒疳熱積滯。非此不除。同甘草爲末。治頭項頑癬。甚效。但大苦大寒。且氣甚穢惡。僅可施之藜藿。若胃虛少食人得之。入口便大吐逆。每致奪食泄瀉。而成羸瘦怯弱者多矣。有人背瘡愈後。餘熱不除。或令服蘆薈藥三服。不數日而斃。傷胃之性。於此可徵。

喬木部

黃檗根名
檀桓

苦寒無毒。生用降實火。酒製治陰火上炎。鹽製治下焦之火。薑製治中焦痰火。薑汁炒黑治濕熱。鹽酒炒黑治虛火。陰虛火盛。面赤戴陽。附子汁製。本經主五藏腸胃中結熱。黃疸腸痔。止泄痢。女子漏下赤白。陰傷蝕瘍。○檀桓主心腹百病。安魂魄。不餓渴。久服輕身。延年通神。發明 黃檗苦燥。爲治三陰濕熱之專藥。詳本經主治。皆濕熱傷陰之候。卽漏下赤白。亦必因熱邪傷陰。火氣有餘之患。非崩中久漏之比。其根治心腹百病。魂魄不安。皆火氣內亢之候。仲景梔子檗皮湯治身黃發熱。得其旨矣。按

黃耆味厚而降。入腎經血分。凡腎水膀胱不足。諸痿厥無力。於黃耆湯中加用。使兩足膝中氣力湧出。瘓弱卽愈。黃檗蒼朮乃治瘻要藥。凡下焦濕熱腫痛。并膀胱火邪。小便不利及黃濁者。並宜黃檗知母爲君。茯苓澤瀉爲佐。凡小便不通而渴者。邪熱在氣分。主治在肺不能生水。不渴者。邪熱在血分。主治在膀胱。不能化氣。亦宜黃蘖知母。昔人病小便不通。腹堅如石。脚腿裂水。雙睛凸出。遍服治滿利小便藥不効。此高粱積熱。損傷腎水。致膀胱不化。火氣上逆。而爲嘔噦。遂以滋腎丸主之。方用黃蘖知母。入桂爲引導。服少時。前陰如火燒。瀉卽涌出。顧盼腫消。金匱治誤食自死六畜肉中毒。用黃蘖屑搗服方寸匕解之。不特治高粱積熱。蓋苦以解毒。寒以泄熱也。大抵苦寒之性。利於實熱。不利於虛熱。凡脾虛少食。或嘔或瀉。或好熱惡寒。或腎虛五更泄瀉。小便不禁。少腹冷痛。陽虛發熱。瘀血停止。產後血虛發熱。癰疽腫後發熱。陰虛小便不利。痘後脾虛。小便不利。血虛煩躁不眠等證。法皆忌之。一種小而實如酸石榴者。名曰小蘖。性亦不甚相違。子金翼阿伽陀丸用之。

厚朴 苦辛溫小毒。紫厚者佳。薑汁炒用。忌黑豆。宜用滾水泡數次切之。不可久浸。氣滯有傷脾氣。本經主中風傷寒。頭痛寒熱。驚悸逆氣。血痹死肌。去三蟲。發明。厚朴苦溫。先升後降。爲陰中之陽藥。故能破血中氣滯。本經中風傷寒。頭痛寒熱者。風寒外傷於陽分也。其治驚悸逆氣。血痹死肌者。寒濕入傷。

於腰理也。濕熱內著於腸胃而生三蟲。此藥辛能散結苦能燥濕。溫能祛蟲。故悉主之。消風散用之深得本經之義。今世但知厚朴爲溫中散滯之藥。而治腸胃濕滿寒脹。溫中下氣。消痰止吐。平胃散用以治腹脹者。味辛能散滯氣也。若氣實人誤服參耆。脹悶作喘。宜此湧之。與枳實大黃同用。能瀉實滿。所謂消痰下氣也。與荅朮橘皮同用。能瀉濕滿。所謂溫中益氣也。然行氣峻猛。虛者勿服。氣溫即止。不可久服。

杜仲 辛甘溫無毒。鹽酒炒斷絲用。本經主腰脊痛。補中益精氣。堅筋骨。強志除陰下癟。濕小有餘瀝。發明 杜仲古方但知補腎。而本經主腰脊痛。補中益精氣等病。是補火以生土也。王好古言。是肝經氣分藥。蓋肝主筋。腎主骨。腎充則骨強。肝充則筋健。屈伸利用。皆屬於筋。故入肝而補腎。子能令母實也。但腎虛火熾。夢泄遺精而痛者勿用。以其辛溫引領虛陽下走也。

椿樗根皮鳳眼草 香者名椿。甘平無毒。臭者名樗。苦溫有毒。樗樹有蟲。謂之樗雞。樗樹有莢。莢中有實。狀如目珠。名鳳眼草。子嗣門中練真丸用之。專治髓藏中濕熱。高年素享豐厚者宜之。發明 椿根白皮。性寒而能瀉血。治濕熱爲病。漏利濁帶。滑夢遺精諸證。有燥痰之功。但痢疾滯氣未盡者不可遽用。崩帶屬陰虛者。亦不可服。蓋椿皮色赤而入血分。久痢血傷者宜之。椿皮色白而入氣分。暴痢氣滯者宜之。不可辨而混用也。

乾漆漆葉 辛苦鹹溫有毒。炒令烟盡。否則損人腸胃。今人多用漆渣僞充。必凝結如磚者佳。本經主絕傷補中續筋骨。填髓腦。安五藏。五緩六急。風寒濕痹。生漆去長蟲。久服輕身耐老。

發明

乾漆灰辛

溫性善下降而破血。故消腫殺蟲通月閉。皆取去惡血之用。而本經治絕傷補中。是取其破宿生新之力也。蓋胃中有瘀積留滯。則陽氣竭絕。不能敷布中外。故藏府筋骨髓腦。皆失營養。乃致健運失常。肢體緩

繼。用此以鍼除瘀積。中氣得復。絕傷皆續。而緩急和矣。生漆去長蟲。故千金去三蟲方以之爲君。三蟲去

輕身長年。所不待言。但恒人難於久服耳。元素云。削年深堅結之積滯。破日久凝結之瘀血。斯言盡乾漆之用矣。無積血者切忌。以大傷營血。損胃氣。故胃虛人服之。往往作嘔。此與本經之義。似乎相背。而實不

相違。產後血暈。以舊漆器燒烟熏之。卽醒。蓋亦取下血之義。而破經絡中血滯。用真漆塗鱉鰐甲殼入藥。

破血最捷。婦人血虛經閉。爲之切禁。凡畏漆者。嚼椒塗口鼻。免生漆瘡。誤中其毒。以生蟹搗汁。或紫蘇解

之。○漆葉塗紫雲癰。面生紫腫。取其散瘀之功也。○漆子專主下血。千金方用之。審無瘀滯。慎勿漫投。

梓白皮 苦寒無毒。取根去外黑皮用。本經治熱毒去三蟲。發明 梓皮苦寒。能利太陽陽明經濕

熱。仲景麻黃連轺赤小豆湯用之。其治溫病復傷寒飲。變爲胃噃者。煮汁飲之。取其引寒飲濕邪下泄也。

梧葉皮 苦寒無毒。本經主惡蝕陰瘡五痔。殺三蟲。發明 梧之與桐。本是二種。梧子狀如胡椒。性

熱助火。欬嗽多痰者勿食。梧葉消腫毒生毛髮。本經治惡瘡。肘後治髮落不生。醫林正宗治癰疽發
背大如盤。臭腐不可近用。梧葉醋蒸貼上。熱退痛止。漸漸生肉收口。梧皮煎汁。療小兒丹毒惡瘡。本經治
五痔。殺三蟲。今人煎湯熏洗腸痔脫肛。卽本經治五痔之應。浸水塗鬚髮黑潤。過用則髮黃赤。助火之驗
也。

桐實 辛寒有毒。發明 桐子不入食品。專供作油。其狀如碧。摩塗疥癬毒腫。吐風痰喉痹。以桐油和
水。掃入喉中。則吐。誤食吐者。得酒卽解。

海桐皮一名刺桐 苦平無毒。發明 海桐皮能行經絡達病所。治風濕腰脚不遂。血脈頑痹。腿膝疼痛。赤
白漏病。及去風殺蟲。蟲牙風痛。煎湯漱之。疳蝕疥癬。磨汁塗之。目赤膿腫。浸水洗之。此藥專去風濕。隨證
入藥服之。無風濕者勿用。

川棟實即金鈴子。苦寒。小毒。酒浸蒸熟去皮核。取淨肉捻作餅。焙乾用。本經主溫病傷寒。大熱煩狂。
殺三蟲。疥瘡利小便水道。發明 川棟苦寒性降。能導濕熱下走滲道。人但知其有治瘧之功。而不知
其蕩熱止痛之用。本經主溫病煩狂。取以引火毒下泄。而煩亂自除。其溫病之下。又續出傷寒二字。以溫
病原從冬時伏邪。至春隨陽氣而發。故宜苦寒以降泄之。其殺三蟲利水道。總取以苦化熱之義。古方金

鉛子散。治心包火鬱作痛。卽婦人產後血結心疼。亦宜用之。以金鉛子能降火逆。延胡索能散結血。功勝失笑散。而無腥穢傷中之患。昔人以川棟爲痘氣腹痛。殺蟲利水專藥。然多有用之不效者。不知川棟所去。乃癰腫甚強太痛濕熱之痘。非痛引入腹厥逆嘔涎之寒痘所宜。此言雖迴出前輩。然猶未達至治之奧。天痘痕皆由寒束熱邪。每多掣引作痛。必需川棟之苦寒。兼茴香之辛熱。以解錯綜之邪。更須察其痛之從下而上引者。隨手輒應。設痛之從上而下注者。法當辛溫散結。苦寒良非所宜。諸痛皆爾。不獨痘痕爲然。近有一人。牙宣出血不止。諸治罔效。或令以棟實研細。綿裹塞齒齦。卽止。詳血從內出外治。何能卽應。因以少許置舌上。其苦直透諸齦。况有罅漏。安得不滲入於經也。○苦棟根治蠱毒。煎湯服之。卽時吐出。又能殺蟲治瘧。○其花燒烟辟蚊蟲。亦本經殺蟲之驗。

槐實俗名梶角 苦酸鹹寒無毒。取子入牛膽中陰乾。日服七枚。久服有明目通神。白髮還黑之功。有痔及便血者尤宜服之。本經主五內邪氣熱。止涎唾。補絕傷五痔火瘡。婦人乳痕。子藏急痛。發明。槐者虛星之精。益腎清火。與黃蘗同類異治。蓋黃蘗專滋腎經血燥。此則專滋腎家津枯。觀本經主治。皆脾胃有熱。陰津不足之病。止涎唾。腎司閉藏之職也。下焦痔瘻腸風。風熱便血。年久不止者。用此一味熬膏。煉蜜收服。婦人乳痕。子藏急痛。皆肝家血熱之患。用以清熱滋燥。諸證自安。上皆指槐角而言。其角中核子。專主

明目。久服鬚髮不白。益腎之功可知。惟胃虛食少。及孕婦勿服。槐枝燒灰塗瘡。有清火潤燥之功。千金方也。

槐花 苦寒無毒。溫水滌去灰。焙香用。發明 槐花苦涼。陽明厥陰血分藥也。故大小便血。及目赤腫痛皆用之。目得血而能視。赤腫乃血熱之病也。腸血痔血。同柏葉微炒爲末。烏梅湯服。腸風藏毒。淘淨炒香爲末。腸風荆芥湯服。藏毒蘿蔔猪藏。日日服之。但性純陰。虛寒無實火禁用。

秦皮 苦微寒無毒。本經治風寒濕痹。洗洗寒氣除熱。目中青翳白膜。久服頭不白輕身。發明 秦皮浸水色青。氣寒性濇。肝膽藥也。本經治風寒濕痹。取其苦燥也。又主青白翳障。取其苦降也。小兒驚癇。取其平木也。崩中帶下。熱痢下重。取其濇收也。老子云。天道貴嗇。此服食之品。故本經有久服頭不白。輕身之說。而仲景白頭翁湯。治熱痢下重。以黃蘖黃連秦皮同用。皆苦以堅之也。秦皮黃連等分。治赤眼腫痛。又一味煎湯洗赤目甚效。其味最苦。胃虛少食者禁用。

合歡皮 一名合昏。千金名黃昏。俗名烏糉樹。 甘平無毒。本經安五藏和心志。令人歡樂無憂。久服輕身明目。發明

合歡屬土。與水補陰之功最捷。單用煎湯。治肺癰唾濁。合阿膠煎膏。治肺痿吐血。皆驗。與白蠟同熬膏。爲長肌肉續筋骨之要藥。而外科家未嘗錄用。何也。按合歡所主諸病。不過長肌肉。續筋骨。故用以填補肺

之潰缺。而本經安五藏和心志等語。豈特諸疾而已。嵇康養生論云。合歡蠲忿。萱草忘憂。蓋無顧名思義之實乎。

皂莢一名皂角 辛鹹溫小毒。入藥去皮弦子酥炙用。本經主風痹死肌邪氣。頭風淚出。利九竅。殺精物。發明 皂莢辛散屬金。治厥陰風木之病。觀本經主治。風痹死肌。頭風淚出。皆取其去風拔毒。通關利竅。有破堅積。逐風痰。辟邪氣殺蟲毒之功。吹之導之。則通上下之竅。煎之服之。則治風痰喘滿塗之擦之。則散腫消毒。去面上風氣。熏之蒸之。則通大便祕結。燒烟熏之。則治臘瘡濕毒。卽本經治風痹死肌之意。用之無不效驗。凡人卒中風。昏昏如醉。形體不收。口角流涎者。急用稀涎散吐之。若南方類中。由於陰虛火炎者。誤用涌劑。愈竭其津液矣。得不在所切禁乎。然治濕熱痰積。肺癰吐腥。及痰迷顛妄。干縉湯。皂莢丸來甦膏等。誠爲聖藥。惟孕婦禁服。按大小二皂所治稍有不同。用治風痰。牙皂最盛。若治濕痰。大皂力優。古方取用甚多。然入湯藥最少。有瘍醫以牙皂煎湯。涌吐風痰。服後遍體赤痛。數日後皮脫。大傷元氣。不可不慎。至於鎖喉風證。尤爲切禁。常見有激動其痰。鎖住不能吐出。頃刻立斃者。其子燒灰存性。能治大腸風祕。燥結。祛風逐穢之性可知。

皂角刺 辛溫無毒。去尖用。否則脫人鬚髮。

發明

皂角刺治風發蟲與莢略同。但其銳利。直達病所。

爲藥。其治瘧瘈氣滯。不能起頂灌膜者。功效最捷。而氣虛者。慎勿誤用。恐透表過銳。反生虛泡也。若血滯不能起頂灌膜。又需陵鯉。當非角刺所宜。丹方治大風惡疾。眉落鼻崩。用皂角刺三筋。燒灰爲末。食後煎大黃湯。調一匕服之。不加劑而愈。腫瘍服之。卽消。潰瘍服之難斂。以其性善開泄也。

肥皂莢。辛溫有毒。去皮弦子。取淨肉用之。發明。肥皂滌除頑痰垢膩。不減二皂。癰病勝金丹用之。亦取涌發。不使砒性留於腸胃之意。其子亦治大腸風祕。須去硬殼及黃膜。但取其仁炒研用之。庶不致有傷腎氣耳。

無患子俗名鬼見愁。苦平無毒。發明。無患子言其辟邪之功也。澣垢去面。野喉痹研納喉中立開。又主

飛尸。子中仁燒之。辟除惡邪。煨食辟惡氣。去口臭。

沒石子一名無食子。苦溫無毒。發明。沒石子合他藥染鬚。仲景用治陰汗。燒灰先以湯浴之。以灰撲之甚良。又血痢及產後下痢俱用之。綿裹塞牙痛效。取溫散腎經濕熱也。

詞齋勒卽訶子。苦澗溫無毒。六棱者佳。去核用。發明。訶子苦澗降斂。生用清金止嗽。煨熟固脾止渴。

古方取苦以化痰涎。澗以固滑泄也。殊不知降斂之性。雖云澗能固脫。終非甘溫益脾之比。昔人言同屬梅五倍則收斂。同橘皮厚朴則下氣。同人參則補肺治嗽。東垣冒嗽藥不用者非也。然此僅可施之於久

嗽喘乏真氣未艾者。庶有劫截之能。又久嗽陰火上炎。久痢虛熱下迫。愈則愈滯。豈特風寒暴嗽。濕熱下痢爲禁劑乎。曷觀世醫用潤肺丸。益黃散之功過可知。

柳華 柳葉 苦寒無毒。本經主風水黃痺。面熱黑。發明 柳華性寒。故能療風水黃痺。本經雖云柳絮。柳華也。絮則隨風飛揚。何從覓之。千金治女人積年不孕。吉祥丸中與丹皮桃仁同爲散血之用。亦屬柳華無疑。柳葉治惡瘡癰瘍。煎湯洗之立愈。以其力能殺蟲也。痘瘡生蛆。以兒臥柳葉上。其蛆立化。無葉時。根皮亦可用之。

檉柳 俗名西河柳 甘鹹平無毒。發明 檉柳獨入陽明。故其功專發瘻疹。兼解酒毒去風。煎湯浴風瘡瘍。其治剝牛馬血入肉者。取以火炙熨之。亦可煮汁浸之。其毒即解。

水楊 苦平無毒。枝硬葉潤條不下垂。其材可造矢者爲水楊。其枝硬葉細條葉下垂者謂之柳。發明 柳葉殺蟲。痘瘡生蟲。用鋪臥下。其蟲即出。煎湯洗漆瘡惡瘡。楊枝解毒。浴之消癰腫瘍。根治痘瘡頂陷。紫滌。博愛心鑑有水楊浴法。如無水楊根。以忍冬藤煎湯代之。然南方皮腠薄弱。良非所宜。肘後治乳癰用柳根。永類鈴方以水楊根。搗貼乳癰。其熱如火。再貼遂平。大抵二根。性味不甚相遠。

榆根白皮

本經名
桑榆

甘平滑無毒。

本經治大小便不通利。水道除邪氣。發明 榆有二種。一種二月

生莢其莢飄零故謂零榆一種八月生莢皮有滑汁謂之榔榆性皆滑利然入手足太陽手陽明經本經治大小便不通取其有逐濕利竅之功故五淋腫滿及胎產宜之本草十劑云滑以去著冬葵子榆白皮之屬蓋亦取其通利滲漏消留著有形之物耳榔榆甘寒其下熱淋利水道之功則一但服之令人睡駭零榆之除邪氣稍有不同二者性皆疎利若胃寒而虛者服之恐泄真氣良非所宜

蕪荑 辛平無毒去穀取仁微炒用 本經主五內邪氣散皮膚骨節中溼淫濕行毒去三蟲化食 發明 蕃荑辛散能祛五內皮膚骨節濕熱之病近世但知其有去疳殺蟲及腸風痔瘻惡瘡疥癬之用殊失本經之旨千金治婦人經帶崩淋之病每同澤蘭厚朴藁本白芷細辛防風柏仁石斛輩用之取其去子藏中風熱垢膩也和猪脂搗塗瘡和蜜治濕癬及治腹中氣血瘀酒諸癖以蕪荑仁炒香兼暖胃活血理氣藥爲散服之

蘇方木 甘鹹平無毒 發明 蘇木陽中之陰降多升少肝經血分藥也性能破血產後血腫服悶欲死者苦酒煮濃汁服之本虛不可攻者用二味參蘇飲補中寓瀉之法凜然可宗但能開泄大便臨證宜審者因惱怒氣阻經閉者宜加用之少用則和血多用則破血如產後惡露已淨而血虛腹痛大便不實者禁用

樟木皮 苦平無毒。發明 樟皮能收肥膩。故用以治濕熱癰風癰毒。取其能辟惡氣。殺蟲蟻也。開寶治諸黃痘。濃煮汁飲之。以其能利小便也。和劑治遍身瘡疥如癟。及癰癧搔癢。面上風刺。婦人粉刺。靈苑方治乳癰腫痛結硬。欲破燒存性。無灰酒服之。

櫻櫬 苦澑平無毒。陳久者良。發明 櫻灰色澑。失血去多瘀滯已盡者。用之切當。取澑以固脫也。如積瘀未盡。誤服則氣滯血瘀。益增痛結之患矣。

烏柏根 辛苦溫有毒。發明 烏柏味苦而辛。性沉而降。故能主暴水癰結積聚。功勝大戟。氣虛人不可用之。○葉治食牛馬六畜肉。腹中疔痛欲死者。搗自然汁一二盞。頓服大利。毒去則愈。冬用根皮搗爛。和酒絞服。○柏油塗頭。變白爲黑。塗一切腫毒瘡疥。○柏油燭。抽去心。導大便祕結効。

巴豆 辛熱大毒。去殼及心。炒紫黑。或燒存性。或研爛紙包壓去油取霜。各隨方製。本經主傷寒濕瘧。

寒熱。破癰痕結聚。堅積留飲痰癖。大腹蕩練五藏六府。開通閉塞。利水穀道。去惡肉。除鬼毒蠱疰邪物。殺蟲魚。發明 巴豆辛熱。能蕩練五藏六府。不特破癰痕結聚之堅積。并可治傷寒濕瘧之寒熱。如仲景治寒實。結胸用白散。深得本經之旨。世本作溫瘧。當是濕瘧。亥豕之謬也。其性峻利。有破血排膿。攻痰逐水之力。宜隨證輕重而施。生用則峻攻。熟用則溫利。去油用霜。則推陳致新。隨證之緩急而施反正之治。

峻用則有戡亂刦病之功。少用亦有撫綏調中之妙。可以通腸。可以止瀉。此發千古之祕也。一老婦久病溏泄。遍服調脾升提止瀉諸藥。則瀉反甚。脈沉而滑。此脾胃久傷。冷積凝滯所致。法當以熱下之。則寒去利止。自後每用以治瀉痢。積聚諸病。多有不瀉而病痊者。妙在得宜耳。苟用不當。則犯損陰之戒矣。按巴豆大黃同爲攻下之劑。但大黃性寒。府病多熱者宜之。巴豆性熱。藏病多寒者宜之。其殼燒灰存性。能止瀉痢。亦劫病之效也。孕婦禁用。以力能墮胎也。元素曰。巴豆乃斬關奪門之將。不可輕用。世以治酒病膈氣。以其辛熱能開通腸胃鬱熱耳。第鬱結雖通。血液隨亡。其陰虧損。傷寒結胸。小兒疳積。用之不死亦危。奈何庸人畏大黃而不畏巴豆。以其性熱劑小耳。試以少許輕擦完膚。須臾發泡。況下腸胃。能無熏灼潰爛之患乎。卽有急證。不得已而用之。壓去其油。取霜少許入藥可也。

大風子 辛熱有毒。去殼取仁用。發明 丹溪曰。粗工治大風病。佐以大風油。殊不知此物性熱。有燥痰之功。而傷血特甚。甚至有病將愈而先失明者。時珍曰。大風油有殺蟲刦病之功。然不可多服用。用之外塗。其功不可沒也。

相思子 苦平小毒。發明 相思子味苦有毒。立能吐人。其粒半黑半紅。故以命名。能通九竅。去心腹邪氣。止熱闊頭痛。風痰瘡瘍。殺一切蟲毒蠱毒。取三七枚研水服之。卽當吐出。今人皆認此爲赤小豆。以

之配入六神鞠中。鋪家以誤認而罔名。醫家亦不辨而混用。噫醫之過可勝道哉。

灌木部

桑根白皮 甘寒無毒。須蜜酒相和。拌令濕透。炙熟用。否則傷肺泄氣。大不利人。根見土面者有毒。傷人發明。桑根白皮。瀉肺氣之有餘。止嗽而能利水。肺中有水氣及肺火有餘者宜之。肺虛無火。因風寒而欬者服之。風邪反閉。固不散。而成久嗽者有之。甄權治肺中水氣。唾血熱渴。水腫腹滿。臘脹利水道去寸白蟲。可以縫金瘡。縫後以熱雞血塗之。桑皮之功用盡矣。

桑椹 甘溫無毒。本經主傷中。五勞六極。羸瘦。崩中絕脈。補虛益氣。發明。桑椹手足少陰太陰血分藥。本經所主。皆言桑椹之功。而宗奭云。本經言桑甚詳。獨遺其椹。卽瀕湖之博識。尙不加察。但以其功誤列根皮之下。所以世鮮採用。惟萬壽酒用之。

桑葉 苦甘微寒。小毒。蜜水拌蒸用。本經除寒熱出汗。發明。桑葉清肺胃。去風明目。取經霜者。煎湯洗風眼下淚。同黑芝麻蜜丸久服。鬚髮不白。不老延年。本經言除寒熱出汗。卽大明蒸熟。搗譬如風痛出汗之謂。煎飲利五藏。通關節下氣。煎酒服治一切風。桑根燒灰淋汁。與石灰點面上。風減癢去惡肉。桑枝 苦平無毒。發明。桑枝清熱去風。故遍體風癢乾燥。水氣脚氣。風氣四肢拘攣。無不宜之。時珍

云煎藥用桑者。取其能利關節。除風寒濕痹諸痛也。觀靈樞治寒痹。用桂酒法。以桑炭炙布巾熨療處。治口僻。用馬膏法。以桑鈎鉤其口。坐桑灰上。又癰疽發背。流注頑瘡。久不愈者。用桑木灸法。未潰則拔毒止痛。已潰則補接陽氣。其法以桑柴劈作小片。束作小把。然火吹息灸患處。每吹灸片時。瘀肉漸腐。用此以助內服之藥。又治久嗽不止。用桑枝煎湯。渴卽飲之。桑柴灰熬膏。點大風惡疾。或淋取汁洗頭面。不過十度卽癒。此聖惠法也。

柘根白皮 甘溫無毒。發明 時珍曰。柘能通腎氣。故聖惠方治耳鳴。耳聾藏器煮汁釀酒服。止風虛耳聾。勞損虛羸腰腎冷。千金治耳鳴汗出。皆由腎虛。或一二十年不瘥者。方用柘根三十斤。菖蒲五斗。古鐵二十斤。燒赤浸三宿。用米二石。麯二斗。用上三味汁釀如常法。制服必效。方具千金二十卷中。

楮實俗名穀樹子根
皮名穀白皮

甘平無毒。發明

楮實走肝腎血。分別錄治陰痿水腫。益氣充肌明目。大明言

壯筋骨。助陽氣。補虛勞。健腰膝。益顏色。而修真祕旨言。久服令人骨軟。濟生祕旨言。治骨鯁。用楮實煎湯服之。豈非軟骨之徵乎。脾胃虛人禁用。○楮根白皮。別錄主逐水利小便。甄權治水腫氣滿。吳普治喉痹。總取散風祛毒之義。

枳殼 辛苦平無毒。陳者良生熟各隨本方。本經主大風在皮膚中。如麻豆苦癢。除寒熱結。

發明

枳殼破氣化痰。泄肺走大腸。多用損胸中至高之氣。枳殼主高。枳實主下。高者主氣。下者主血。故殼主胸膈皮毛之病。本經所治大風在皮膚中。如麻豆苦癢。除寒熱結。是指表病而言。實主脾胃心腹之病。本經所謂止痢。長肌肉利五藏。益氣輕身。是指裏病而言。凡人藏府清利。則氣自益。身自輕矣。詳枳殼枳實皆能利氣。氣下則痰喘。止氣行則痞脹。消氣通則刺痛已。氣利則後重除也。仲景治胸脇痞滿。以枳實爲要藥。諸方治下血痔痢。大腸祕塞。裏急後重。又以枳殼爲通利。則枳實不獨治下。枳殼不獨治高也。然枳實性沉。兼能入肝脾血分。而消食積痰氣瘀血。有衝牆倒壁之喻。枳殼性浮。兼通肺胃氣分。而治喘欬霍亂水腫。有乘風破浪之勢。與桔梗同爲舟楫之劑。故柴胡枳殼除寒熱痞滿之專藥。凡夾食傷寒感冒。與表藥同用。皆無妨礙。妊娠胞胎。有瘦胎飲。乃因氣壅阻滯而設。設素稟怯弱者誤服。令母氣耗難產。子亦氣弱難育。是取虛虛之禍也。

枳實 辛苦平無毒。本經止痢。長肌肉利五藏。益氣輕身。發明 枳實入肝脾血分。消食瀉痰滑竅。破氣。心下痞。及宿食不消。並宜枳朮。故潔古枳朮丸。以調脾胃。實祖金匱治心下堅大如盤。用枳實白朮湯之法。腹即軟消。潔古曰。心下痞。及宿食不消。發熱並宜枳實黃連。好古曰。益氣佐則之以參朮乾薑。破氣剛佐之以大黃芒硝。此本經所以言益氣。而潔古復言消瘀也。李士材云。自東垣分枳殼治高。枳實治

下好古分枳殼治氣。枳實治血。然究其功用皆利氣也。凡氣弱脾虛致停食痞滿。治當補中益氣。則食自化。痞自散。若用枳殼枳實。是抱薪救火矣。

枸橘 辛溫無毒。發明 枸橘與枳同類。其幹多刺。故破氣散熱之力過之。時珍治下痢。膿血後重。今人解酒毒用之。總取其破氣之力也。丹方以枸橘煅末存性。酒服方寸匕。治胃脘結痛。又以醋浸熬膏。攤貼內傷諸痛。貼向痛止。但須久貼。方不復發。

梔子 苦寒無毒。入吐劑取肥梔生用。入降火藥以建梔薑汁炒黑用。本經主五內邪氣。胃中熱氣。面赤。酒皰。皯癧。赤癩。瘡瘍。發明 梔子仁體性輕浮。專除心肺客熱。本經治五內邪氣。胃中熱氣等疾。不獨除心肺客熱也。其去赤癩白癩瘡瘍者。諸痛瘻瘍皆屬心火也。炮黑則專漏三焦之火。及痞塊中火。最清胃脘之血。屈曲下行。能降火從小便中泄去。仲景治傷寒發汗吐下後。虛煩不得眠。心中懊憹。梔子豉湯主之。因其虛故不用大黃。既亡血亡津。內生虛熱。非此不去也。治身黃發熱。用梔子柏皮湯。身黃腹滿。小便不利。用茵陳梔子大黃湯。取其利大小便而蠲濕熱也。古方治心痛。恆用梔子。此爲火氣上逆。氣不得下者設也。今人泥丹溪之說。不分寒熱通用。虛寒何以堪之。大苦大寒能損伐胃氣。不無減食泄瀉之虞。故仲景云。病人虛有微滯者。不可與之。世人每用治血。不知血寒則凝。反爲敗證。治實火之吐血。

順氣爲先。氣行則血自歸經。治虛火之吐血。養正爲主。氣壯則自能攝血。此治療之大法。不可少違者也。
酸棗仁 實酸平。仁甘平無毒。本經主心腹寒熱。邪結氣聚。四肢厥痛。濕痹久服安五臟。發明 酸
棗仁味甘而潤。熟則收斂津液。故療膽虛不得眠。煩渴虛汗之證。生則導虛熱。故療膽熱好眠。神昏倦怠
之證。足厥陰少陽本藥。兼入足太陰脾經。按酸棗本酸而性收。其仁則甘潤而性溫。能散肝膽二經之滯。
故本經治心腹寒熱。邪氣結聚。瘦痛血痹等證。皆生用以疏利肝脾之血脈也。蓋肝虛則陰傷而煩心。不
能藏魂。故不得眠也。傷寒虛煩多汗。及虛人盜汗。皆炒熟用之。總取收斂肝脾之津液也。歸脾湯用以滋
養榮氣。則脾熱自除。單用煮粥。除煩益膽氣。膽氣寧而魂夢安矣。今人專以爲心家藥。殊昧此理。

白棘 辛寒無毒。本經主心腹痛。癰腫潰爛。止痛決刺結。發明 白棘乃小棗樹上針。故能決刺破
結。本經主癰腫潰爛。與皂刺不甚相遠。別錄治丈夫虛損。陰痿精自出。補腎氣。益精髓。療喉痹不通。又治
腹脇刺痛。尿血痔漏。皆取其透達肝腎二經也。

蕤仁 甘溫無毒。去殼湯浸去皮尖水煮過研細紙包壓去油用。本經主心腹邪熱結氣。明目赤痛。
傷淚。目腫皆爛。發明 蕤仁甘溫而潤。能治諸經風熱之邪。心腹邪熱結氣。不獨治目疾也。眼風癢。
或生翳。或赤皆黃連蕤仁去皮研膏等分。以乾棗去核填入。煎水點眼甚驗。但不因風熱而因於虛者勿

用

山茱萸 酸溫無毒。去核微焙用。核能泄精。發明 滑則氣脫。濇以收之。山茱萸止小便利。祕精氣。取其酸濇以收滑也。甄權治腦骨痛。療耳鳴。補腎氣。興陽道。堅陰莖。添精髓。止老人尿不節。治面上瘡。能發汗。止月水不定。詳能發汗。當是能斂汗之誤。以其酸收。無發越之理。仲景八味丸用之。蓋腎氣受益。則封藏有度。肝陰得養。則疏泄無虞。乙癸同源也。命門火旺。赤濁淋痛。及小便不利者禁服。○本經食茱萸主治。從古誤列山茱萸條內。今移入彼庶不失先聖立言本旨。具眼者辨諸。

金櫻子 甘酸濇溫無毒。剖開去核及毛用。發明 金櫻子止小便遺泄。濇精氣。取其甘溫而濇也。夫經絡隧道。以通暢為和平。而昧者無過服之。以取快慾則不可。若精氣不固者服之。何咎之有。但陰虛多火人誤服。每致溺濇莖痛。不可不慎。

郁李仁卽棠棣一
名雀李 仁辛苦平無毒。湯浸去皮及雙仁者研如膏勿去油。忌牛馬肉及諸酪。本經主大腹水氣。面目四肢浮腫。利小便水道。發明 郁李仁性潤而降。為大便風祕專藥。本經治大腹水氣。面目四肢浮腫。取其潤下之意。利小便水道者。水氣從之下趨也。搜風順氣丸用之。雖有潤燥之功。而下後令人津液虧損。燥結愈甚。老人津液不足。而燥結者戒之。根治風蟲牙痛。濃煎含漱。冷卽吐去更含。勿嚥。

汁以其能降泄也。

鼠李 當作楮李子。一名牛李子。熬汁可以染綠。今造紙馬鋪取汁刷印綠色故又名綠子。 苦涼微毒。本經主寒熱瘻瘍。發明。牛李生青熟黑而帶紅紫。入肝腎血分。其味苦涼。善解諸經伏匿之毒。本經治寒熱瘻瘍。大明治水腫腹滿。蘇恭治下血。及痘痕積冷。搗敷牛馬瘡中生蟲。時珍治疥癬有蟲。總取其去濕熱之功。惜乎世鮮知用。惟錢氏必勝膏。治痘瘡黑陷。及出不快。或觸穢氣黑陷。方用牛李熬膏。桃膠湯化皂子大一丸。如人行十里再進一丸。其瘡自然紅活。蓋牛李解毒去濕熱。桃膠辟惡氣活血耳。

女貞實 苦甘微寒無毒。其子黑者爲女貞實。若紅色者卽爲冬青。非女貞也。發明。女貞少陰之精。但性稟純陰。味偏寒滑。脾胃虛人服之。往往減食作瀉。以本經枸骨主治。誤列此味之下。後世繆認女貞有補中安五藏之功。多致誤用。滋患特甚。因表而出之。

枸骨 一名猫兒刺俗名十大功劳。 微苦甘平無毒。本經補中安五藏。養精神。除百病。久服肥健。輕身不老。發明。枸骨本經諸家本草。皆誤列女貞條下。味苦甘平。有補中安五藏。養精神。除百病。久服肥健。輕身不老之功。皆指枸骨而言。女貞至陰之物。安有如上等治乎。其木嚴冬不凋葉生五刺。其子正赤。允爲活血散瘀。堅強筋骨之專藥。又爲填補髓藏。固斂精血之要品。僅見丹方。不入湯丸。古方惟浸酒補腰脚。令健枝葉。

燒灰淋汁或煎膏塗白癩風。今方士每用數斤去刺入紅棗三斤熬膏蜜收治勞傷失血癰軟往往獲效。以其能調養血氣而無傷中之患也。其脂爲鴉以粘禽鳥其能滋培精血可知。

衛矛

箭羽 即鬼

苦寒無毒。生山石間。小株成叢葉似野茶。三四月生小黃綠花實如冬青子條上有羽如箭。

視之若三羽故名之若三。本經主女子崩中下血。腹滿汗出。除邪殺鬼毒疊症。發明。鬼箭專散惡血。故本經有崩中下血之治。別錄治中惡腹痛。去白蟲。消皮膚風毒腫。卽腹滿汗出。除邪殺鬼毒蟲症之治。今人治賊風歷節諸痹。婦人產後血暈。血結聚於胸中。或偏於脇肋少腹者。四物倍歸加鬼箭羽紅花玄胡索煎服。以其性專破血力能墮胎。妊娠禁服。

南燭牛筋樹也

俗名烏葉

苦平無毒。發明。凡滋腎藥皆能傷脾。此獨止泄除睡者。氣與神通藏器。言久服輕

身不饑。變白不老者。强精益氣之驗。于金月令方用之。今四月八日煮汁。造青精飯是也。

五加根皮

辛溫無毒。

本經主心腹疝氣腹痛。益氣療蹙。小兒三歲不能行。疽瘡陰蝕。發明。五加

者。五車星之精也。爲風濕痿痹。壯筋骨助陽氣之要藥。本經治心腹疝氣腹痛。益氣療蹙。小兒三歲不能行。其溫補下元。壯筋除濕可知。別錄治男子陰痿。囊下濕。小便餘瀝。女人陰癰。腰脊痛。脚癆風弱。大明治

骨節拘攣。蘇恭主四肢攀急。種種皆須釀酒。則力勢易行。非湯藥中所宜。

枸杞 甘平無毒。河西及甘州者良。本經主熱中消渴。久服堅筋骨。耐寒暑。發明。枸杞子味甘色赤。性溫無疑。根味微苦。性必微寒。緣本經根子合論無分。以致後人或言子性微寒。根性大寒。或言子性大溫。根性苦寒。蓋有惑於一本無寒熱兩殊之理。夫天之生物不齊。都有豐於此而濶於彼者。如山茱萸之肉濶精。核滑精。當歸之頭止血。尾破血。橘實之皮滌痰。膜聚痰。不一而足。卽炎帝之嘗藥。不過詳氣味形色。安有味甘色赤。形質滋腴之物。性寒之理。本經所言。主熱中消渴。堅筋骨。耐寒暑。是指其子而言。質潤味厚。峻補肝腎。衝督之精血。精得補益。水旺骨強。而腎虛火炎。熱中消渴。血虛目昏。腰膝疼痛悉愈。而無寒暑之患矣。所謂精不足者。補之以味也。古諺有云。去家千里。勿食枸杞。甚言補益精氣之速耳。然元陽氣衰。陰虛精滑。及婦人失合。勞嗽。蒸熱之人慎用。以能益精血。精旺則思偶。理固然也。

地骨皮 甘淡微寒無毒。泉州者良。本經主五內邪氣。周痹風濕。久服堅筋骨。輕身不老。發明。地骨皮。枸杞根也。三焦氣分之藥。下焦肝腎虛熱。骨蒸自汗者宜之。熱淫於內。漏以甘寒也。人但知芩連治上焦之火。知柏治下焦之火。謂之補陰降火。不知地骨之甘寒平補。有益精氣退邪火之妙。時珍嘗以青蒿佐地骨退熱。屢有殊功。又主骨槽風證。亦取入足少陰。味薄卽通也。本經主五內邪氣。周痹風濕。輕身不老。取其甘淡化熱。苦寒散濕。濕散則痹著通。熱化則五內安。其氣清。其味薄。其質輕。誠爲修真服食之

仙藥。按續仙傳云。朱孺子見溪側二花大逐入枸杞叢下。掘之得根形如二犬。烹而食之。忽覺身輕。本經之輕身不老可確徵矣。則枸杞之滋益不獨在子。而根亦不止於退熱也。苗葉微苦。亦能降火。及清頭目。澆疏正骨。苦平。一云辛寒無毒。本經主皮膚中熱。除邪氣。止遺溺。利水道。發明。澆疏與枸杞相類。先哲雖以有刺無刺。樹高樹小分辨。然枸杞未嘗無刺。但樹小則刺多。樹大則刺少。與酸棗白棗無異。本經枸杞條下主五內邪。氣熱中消渴。卽澆疏之除邪氣也。枸杞條下主周痹風濕痊。澆疏之止遺溺。利水道也。除去五內之邪。則熱中消渴愈矣。疏利水道之熱。則周痹風濕痊矣。澆疏利氣化無滯。子藏安和。觀千金方。與梅核仁。辛荑蕡。本澤蘭子。萬上亭長。同清子藏三十六疾。其清利風熱之性可知。或云巨骨卽地骨之大者。按種樹書云。收子及掘根。種肥壤中。待苗生。剪爲蔬食。甚佳。澆疏之名。未必非此。石南。辛苦平無毒。本經養腎氣。內傷陰衰。利筋骨皮毛。發明。石南嚴冬不凋。凌霜正赤。性溫益腎。可知本經養腎氣。內傷陰衰。利筋骨皮毛。皆取益腎之功。古方爲風痹腎弱要藥。今人絕不知用。蓋由甄氏藥性論。有令人陰痿之說。殊不知服此藥者。能令腎強。嗜慾之人。藉此放恣。以致痿弱。而歸咎於藥。良可慨也。

牡荆卽黃

實苦溫。根葉甘苦平。莖瀝甘平無毒。

發明

荆爲治風逐濕祛痰解熱之藥。實除骨間寒。

熱下氣治心痛及婦人白帶。炒熟酒煎服治小腸疝氣。浸酒治耳聾。葉治霍亂轉筋。下部濕蠶脚氣腫滿。以荆莖入鐸中燒烟薰湧泉穴及痛處。汗出則愈。搗爛薑蛇傷根主頭心肢體諸風。解肌發汗。莖治火灼瘡爛。煎水漱風牙痛。荆瀝除風熱。開經絡。導痰涎。行血氣。解熱痢。千金翼云。凡患風人多熱。嘗宜以竹瀝荊瀝膏汁和勻熱服。以瘥為度。熱多用竹瀝。寒多用荊瀝。二汁同用。並以薑汁助送。則不凝滯。但氣虛不能食者。則用竹瀝。氣實能食者。則用荊瀝。

蔓荆子 苦辛溫無毒。本經主筋骨間寒熱。濕痹拘攣。明目堅齒。利九竅。去白蟲。發明 蔓荆子入足太陽。體輕而浮。故治筋骨間寒熱。濕痹拘急。上行而散。故能明目堅齒。利九竅。去白蟲。及風寒目痛。頭面風虛之證。然胃虛人不可服。恐助痰濕為患也。凡頭痛目痛。不因風邪。而血虛有火者。禁用。瞳神散六尤忌。

紫金皮 苦平無毒。苦如膽。而紫厚者良。發明 紫荆木之精也。入手足厥陰血分。能破宿血。下五淋。通小腸。解諸毒。治傷寒。赤臍黃耳。活血消腫。為杖瘡必用之藥。治癰疽流注諸毒。冷熱不明者。用紫荆皮獨活赤芍白芷白蠟炒為末。葱湯調敷。痛甚筋不舒者。加乳香甚驗。

木槿根皮 甘苦微寒無毒。發明 極為癬科要藥。潤燥活血。川中所產質厚色紅。稱勝而世不易得。

土櫟皮亦可用之。但力薄耳。其治腸風下血。取其清熱滑利也。其治痢後作渴。餘熱在經津液不足也。○其花以千瓣白者爲勝。陰乾爲末。治反胃吐食。陳糯米湯下二錢。日再服。紅者治腸風血痢。白者治白帶白痢。並焙入藥。○子治偏正頭風。燒煙薰患處。并用爲末。酒服一錢七效。

芙蓉 辛平無毒。發明 芙蓉葉散癰疽。殊有神效。瘍醫祕其名。爲清涼膏鐵箍散。皆此藥也。加生大黃赤小豆末麝香。其功甚捷。

山茶花 苦溫無毒。發明 山茶色紅味苦。開於青陽初動之時。得肝木之氣而生心火。肝藏血。心主血。故吐血衄血下血爲要藥。生用則能破宿生新。入童便炒黑。則能止血。其功不減鬱金。真血家之良藥也。

密蒙花 甘平微寒無毒。誤之卽噠者真。揀淨酒浸一宿。漉出眼乾用。發明 密蒙入肝經血分。潤肝燥。爲搜風散結目疾之專藥。治青盲昏翳。赤腫多眵淚。消目中赤脈。及小兒痘瘡餘毒。疳氣攻眼宜之。

木棉子 辛溫微毒。發明 木棉葉青花黃莖赤。棉白子黑丸爲溫走命門之品。取子燒存性。不獨解徽瘡毒。而痔漏脫肛下血。每服半兩。黑豆淋酒服之。其油然燈能昏人目。以其助溼火也。

梓木皮 苦平無毒。發明 梓專利竅。故治黃疸鼠瘻。催生。並燒示用之。

黃楊 苦平無毒。發明 黃楊性斂而降。婦人難產。入達生散中服之。則痛陣便緊。又搗葉塗瘡癥。以其性斂也。

放杖木 甘溫無毒。發明 放杖專治一切風氣血氣。理腰腳。老人浸酒服之一月放杖。故名。

接骨木 一名續骨木。又名木
蒴藋。俗名扦扦活。 甘苦平無毒。發明 此木專主折傷。續筋骨。除風癆。齒可作浴湯。根

皮主痰飲水氣。瘀滯打傷瘀血。一切血不行。並煮汁服之。不可多服。以氣腥傷伐胃氣也。

寓木部

茯苓 甘淡平無毒。入補氣藥。人乳潤蒸。入利水藥。桂酒拌晒。入補陰藥。童便浸切。一種裁薄而成者曰
薄苓。出浙中。但白不堅。入藥少力。凡用須去盡皮膜。則不傷真氣。以皮能泄利津液。膜能阻滯經絡也。
本經主胸脇逆氣。憂恚驚邪恐悸。心下結痛。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾。利小便。久服安魂養神。不饑延年。
發明 茯苓得松之餘氣而成。甘淡性平。能守五藏真氣。其性先升後降。入手足太陰少陰。足太陽陽明。
開胃化痰。利水定悸。止嘔逆泄濁。除濕氣。散虛熱。本經治胸脇逆氣。以其降泄也。憂恚驚悸。心下結痛。以
其上通心氣也。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾。利小便。以其導熱滋乾。流通津液也。本草言其利小便。伐胃邪。
東垣云。小便多者能止瀉者能通。又大便瀉者可止。大便約者可通。丹溪言。陰虛者不宜用。義似相反者。

何哉。蓋茯苓淡滲上行生津液開腠理溢水之源而下降利小便潔古謂其屬陽浮而升言其性也。東垣言其陽中之陰降而下言其功也。經言飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則知淡滲之性必先上升而後下降膀胱氣化而小便利矣。若肺氣盛則上盛下虛上盛則煩滿喘乏下虛則痿躊軟弱而小便頻。茯苓先升後降引熱下滲故小便多者能止也。大便濁者胃氣不和不能分利水穀偏滲大腸而泄注也。茯苓分利陰陽則濁自止矣。大便約者以膀胱之水不行膀胱硬滿上擗大腸故大便不能下通也。宜茯苓先利小便則大便隨出也。至若肺虛則遺溺心虛則少氣遺溺下焦虛則遺溺胞遺熱於膀胱則遺溺膀胱不約爲遺溺厥陰病則遺溺皆虛熱也必上熱下寒當用升陽之藥非茯苓輩淡滲所宜故陰虛不宜用也此物有行水之功久服損人八味丸用之不過接引他藥歸就腎經去胞中久陳積垢爲搬運之功耳是以陰虛精滑而不覺及小便不禁者皆不可服以其走津也。赤者入丙丁但主導赤而已其皮治水腫膚腫通水道開腠理勝於大腹皮之耗氣也。

茯神甘淡平無毒卽茯苓中之抱根而生者。發明 神農本經只言茯苓明醫別錄始添茯神而主治皆同後人治心病必用茯神故潔古云風眩心虛非茯神不能除然茯苓未嘗不治心病也陶弘景始言茯苓赤瀉白補此發前人之祕時珍謂茯苓茯神只當云赤入血分白入氣分如牡丹芍藥之義。茯神

中所抱之木。治風濕筋骨攣縮。與松節同功。

琥珀 甘平無毒。出番禺。楓木脂膏所化。俗云茯苓千年化琥珀。此誤傳也。發明 古方用琥珀利小便。以燥脾土有功。脾能運化。肺氣下降。故小便可通。若陰虛內熱。火炎水涸。血少不利者。反致燥結之苦。其消磨滲利之性。非血結膀胱者。不可誤投。和大黃鼈甲作散。酒下方寸匕。治婦人腹內惡血。血盡則止。血結腫脹。腹大如鼓。而小便不通者。須兼沉香輩破氣藥用之。又研細傅金瘡。則無瘢痕。亦散血消瘀之驗。凡陰虛內熱。火炎水涸。小便不利者勿服。服之愈損其陰。滋害彌甚。

豬苓 甘淡微苦平無毒。本經主痃瘧。解毒蠭疰不祥。利水道。久服輕身耐老。發明 豬苓入腎與膀胱血分。性善疏利經府。世人但知爲利水專藥。不知其有治痃瘧蠭疰之功。仲景治消渴脈浮。小便不利微熱者。豬苓散汗之。病欲飲水而復吐。名曰水逆。五苓散主之。豬苓專司引水之功。久服必損腎氣。昏人目。利小便之劑。無如此駢。故不入補劑。非澤瀉之比也。而本經又云。久服輕身耐老。是指素多濕熱者而言。不可一律而推。

雷丸 苦鹹寒。小毒。竹之餘氣所結。皮黑肉白者良。入藥炮用。赤黑色者殺人。本經殺三蟲。逐毒氣。胃中熱。利丈夫。不利女子。發明 雷丸功專殺蟲。楊勔得異疾。每發語則腹中有小聲。漸漸聲大。有道士

曰此應聲蟲也。但讀本草取不應者治之。讀至雷丸不應。遂頓服數粒而愈。此追蟲下積之驗也。本經稱其利丈夫。別錄云久服陰痿。似乎相反。不知利者疎利之也。疎利太過。則閉藏失職。故陰痿也。千金治小兒傷寒。不能服藥。治方中恆用之。取其逐毒氣之功也。

桑寄生 苦甘平無毒。本經主腰痛。小兒背強壅腫。充肌膚。堅髮齒。長鬚眉。安胎。發明 寄生得桑之餘氣而生。性專祛風逐濕。通調血脈。故本經取治婦人腰痛。小兒背強等病。血脈通調。而肌膚眉鬚皆受其蔭。卽有癰腫。亦得消散矣。古聖觸物取象。以其寓形榕木。與子受母氣無異。故爲安胎聖藥。別錄言去女子崩中。產後餘疾。亦是去風除濕益血補陰之驗。惟西蜀南粵。不經飼蠶之地。始有。故真者絕少。今世皆榕樹枝實充慎勿誤用。其真者。絕不易得。故古方此味之下。有云如無以續斷代之。於此可以想象其功用也。

松蘿 苦甘平無毒。本經主顛怒邪氣。止虛汗頭風。女子陰寒腫痛。發明 松蘿是松上女蘿。又名兔絲。能平肝怒。去寒熱邪氣。其去頭風止虛汗者。本乎天者清上也。別錄療瘧熱溫瘧。可爲吐湯利水道。故肘後方同瓜蒂杜衡酒漬再宿。旦飲一合。取吐胸中瘧熱頭痛。千金方同瓜蒂恒山甘草水酒和煎。取吐胸膈痰癖。以其輕清上涌。故吐藥用之。

苞木部

竹葉 甘微寒小毒。本經主欬逆上氣。療筋急惡瘍殺小蟲。發明 諸竹與筍皆甘寒無毒。惟竹葉受陰風烈日氣多。故不無小毒。本經主欬逆上氣者。以其能清肺胃之熱也。療筋急惡瘍者。以其能化身中之氣也。氣化則百骸條暢。何有小蟲之患乎。仲景治傷寒解後。虛羸少氣氣逆。有竹葉石膏湯。金匱治中風發熱面赤頭痛。有竹葉湯。總取清肺胃虛熱之義。

竹茹 甘寒無毒。取竹茹法。選大青竹。磁片刮去外膜。取第二層如麻縷者。除去屑末用之。發明

竹茹專清胃府之熱。爲虛煩煩渴。胃虛嘔逆之要藥。欬逆唾血。產後虛煩。無不宜之。金匱治產後虛煩嘔逆。有竹皮大丸。千金治產後內虛煩熱短氣。有甘竹茹湯。產後虛煩頭痛。短氣悶亂不解。有淡竹茹湯。內虛用甘以安。中悶亂用淡以清胃。各有至理存焉。其性雖寒而滑。能利竅。可無鬱遏客邪之慮。

竹瀝 甘寒無毒。

取竹瀝法。以青竹斷二尺許。劈開火炙。兩頭盛取用之。如欲多取。以鐔埋土中。濕泥糊好。量鐔口大小。用篾籠二道。鑿入鐔口。多著炭火於竹頂上炙之。

發明 竹葉兼行肌表。故能療瘡

癰瘍。竹茹專清胃府。故能止嘔除煩。竹瀝善透經絡。能治筋脈拘攣。疾在皮裏膜外。筋絡四肢。非竹瀝不能化之。純陰之性。雖假火逼。然須薑汁鼓動其勢。方得應手取效。千金治風痙攣。無痛四肢不收。志亂不

甚有竹瀝飲子。詳本經療筋急。專取竹瀝之潤以濡之也。干金治四肢不收。則兼附桂羚羊之雄以振之也。一以舒急。一以收緩。妙用不可思議。或言竹瀝性寒。僅可使之熱癆。不知入於附桂劑中。未嘗不開發濕痰寒飲也。惟胃虛腸滑。及氣阻便闊者誤投。每致呃逆。不食。脫漏不止。而斃。陰柔之性。不發則已。發則必暴卒。難挽回也。

筍 甘微寒小毒。發明 諸筍多食皆動氣。發冷癥。令人心痛。與羊肝食之損目。脾胃虛弱。大腸滑瀉。皆不宜食。俗醫治痘。往往勸啜筍湯。及加入湯藥。不知痘瘡不宜大腸滑利。而筍有刮腸籠之名。若腸胃不實。尤忌。惟血熱。毒盛者爲宜。其乾筍淡片。利水豁痰。水腫葶藶丸用之。

竹黃 甘寒無毒。發明 竹黃出大竹之中。津氣結成。其味功用與竹瀝同。而無寒滑之害。涼心經去風熱。爲小兒驚癇。風熱痰湧失音。治痰清熱之要藥。以其生天竺國。故名天竺黃。今藥肆多燒諸骨及葛粉雜入。不可不辨。

震燒木 發明 雷氣通於心。故可治失心驚悸之病。又掛門戶。大壓火災。

藏器部

錦 新絳 黃綢 紹 發明 錦灰主失血。血崩。金瘡出血。新絳治婦人血崩。絲本主血。加以色絳。又

用煅灰。所以取治失血有效。自然黃絲絹煮汁服。止消渴。及產婦胞損。爲補膀胱要藥。綿灰能止吐衄崩中。及大小便諸血。

裨福 發明 仲景治陰陽易病。身重少氣。腹急引陰。膝脛拘急者。燒罷散土之。取罷中近隱處。燒灰水調方寸匙。日三服。小便卽利。陰頭微腫則愈。男用女視。女用男視。

裹脚布 發明 男子裹脚布取纏軟者。遶其腹。則腹痛漏痢便止。婦人欲回乳。以男子裹脚布勒住。一宿卽止。功效勝於服藥也。

鑿柄 發明 鑿柄治妊娠難產。燒灰酒服。取其開鑿孔竅也。銃楔燒服。取其迅發之疾也。

弓弩弦 發明 難產取弓弩弦縛腰。及燒弩牙納酒中飲之。皆取發機快疾之義。時珍曰。弓弩弦催生。取其速疾也。折弓弦止血。取其斷絕也。

敗蒲扇蒲席 發明 蒲性本寒。加以爲扇至敗。汗漬日久。鹹寒相濟。故用以燒灰和粉撲身。取扇動招風止汗之義。敗蒲席取久臥者。燒灰酒服二錢。治墮胎惡血。同蒲黃當歸赤芍朴硝煎湯調服。汗出。血液沾滿日久。用以燒灰。同氣相感之應也。

漆器 發明 漆本散血。故用燒烟治產後血暈。熏之卽甦。又殺諸蟲。

燈蓋油。苦辛寒小毒。發明。油性熬之愈寒。燈油得火氣最深。故取以治卒中風不省。喉瘡瘍厥。用鵝翎蘸掃喉中。涌吐頑痰。通其上逆。然後用藥。

炊單布。發明。炊單布受餽熱氣最多。故用以治湯火薰蒸。面目浮腫燒末敷之卽消。以類相感也。金匱治瘻馬。一切筋骨傷損亦用之。青布燒灰。蜜調敷熱毒瘡痏。

敗鼓皮。平無毒。發明。敗鼓皮專主蠭毒。取其形空而聲響遠振也。燒作屑。水和服之。病人卽喚蠭主姓名。往呼本主。取蠭卽瘥。梅師云。凡中蠭毒。或下血如鵝肝。或吐血。或心腹切痛。如有物咬。不卽治之。食人五藏卽死。欲知是蠭與否。但令病人以唾吐水。沉者爲是。浮者卽非。用敗鼓皮燒灰。酒服方寸匕。須臾自呼蠭主姓名。外臺祕要云。治蠭取敗鼓皮。廣五寸長一尺。薺薇根五寸。如拇指大。水一升。酒三升。煮二升服之。當下蠭毒卽愈。

本經通原卷三終

本經逢原卷四

長洲石頑張 瑞路玉父纂述

蟲部

蜂蜜 甘平無毒。入調補藥用白蜜。漏火藥用赤蜜。味酸者不堪入藥。不可與生葱獨蒜萐蔔同食。令人下利。凡煉蜜炭火慢煉。掠去浮沫。至滴水成珠爲度。煉成每斤入陳酒四兩。再熬沸。和藥爲丸。則藥力易化。本經主心腹邪氣。諸驚癇瘡。安五藏。補不足。益氣補中。止痛解毒。除眾病。和百藥。久服強志輕身。不饑不老。發明。蜂采無毒之花醞釀而成。生則性涼清熱。故能治心腹之邪氣。熟則性溫補中。安五藏。諸不足。甘而和平。故能解毒。柔而潤澤。故能潤燥。緩以去急。故能主心腹肌肉瘡瘍之痛。仲景治陽明結燥大便不通。用蜜煎導法。取其能通結燥而不傷腸胃也。凡滋補藥。俱用煉白蜜丸。取其和脾潤肺也。赤蜜味酸。食之令人心煩。惟降火藥用之。白蜜雖補肺脾。然性涼潤。脾胃不實。腎氣虛滑。及濕熱痰滯。胸痞不寬者。咸須忌之。故瓊玉膏用糖霜。枳朮丸用荷葉裹飯。佐金丸用米飲。牛黃丸用蒸餅。黑錫丹用酒麴。慈硃丸用神麴。虎潛丸用酒。香連丸用醋。茸珠丹用紅棗。滾痰丸用水泛。各有所宜。今人修製丸劑。槩用蜂蜜。殊失先哲用方之義。

蜜蠟 淡平無毒。本經主下痢。膿血補中續絕傷金瘡。益氣不饑耐老。發明 蜜成於蠟。萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚此薄彼耶。仲景治痢有調氣飲。千金治痢有膠蠟湯。蓋有見於本經之義也。淡爲五味之本。胃爲五藏之源。故能補中續傷。蓋有得於太極也。甄權治孕婦胎動下血不絕欲死。以雞子大一枚。煎三五沸。投美酒半升服立瘥。又能解毒。故蠟蠏丸用之爲君。華陀治下痢食入卽吐。用白蠟方寸匙。雞子黃一枚。石蜜苦酒髮灰黃連末各半。雞子殼先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻。乃納連末髮灰熬至可丸乃止。二日服盡神効。

露蜂房 苦鹹平有毒。本經主驚癇瘍瘍。寒熱邪氣癲疾鬼精。蠱毒腸痔火熬之良。發明 露蜂房陽明藥也。本經治驚癇癲疾。寒熱邪氣。蠱毒腸痔。以其能祛滌痰垢也。瘡瘍齒痛及他病用之者。皆取其以毒攻毒殺蟲之功耳。

蠅蠂一名果蠃
細腰蜂也 辛平小毒。本經治久聾欬逆毒氣。出刺出汗。發明 詩言蠅蠂有子。蠅亂負之。言細腰之蜂。取青蠅之子。教覩變化成子也。六朝治聾。遂生研蕊管。竹木刺。卽本經出刺出汗取其毒之銳。以出其刺也。

蠅白蠅 甘溫無毒。益明。蠅樹屬金性專收斂。堅強之氣。其葉能治瘡腫。蟲食其葉而成與桑蠅蠅。

無異爲外科之要藥。取合歡皮同入長肉膏中神效。今人治下疳服之未成卽消。已成卽斂。以半兩入鯛魚腹中煮食。治腸紅神效。

紫鉢 卽紫草 甘鹹平小毒。發明。紫鉢乃驥驥竭樹上蠟壤。聚其脂液而成。與蜂釀蜜無異。出真蠟爲上波斯次之古方。治五藏邪氣。金瘡崩漏。破積血。生肌止痛。今人專治痘瘡。有活血起脹之功。無鹹寒作瀉之患。其功倍於紫草。故以紫草呼之。實非紫草同類也。

五倍子 卽川文蛤 苦酸鹹平無毒。產川蜀如菱角者佳。法釀過名百藥煎。每五倍末一斤。入桔梗甘草真茶各一兩爲末。入哮糟二兩。拌和置糠中。窖待起如發麪狀。卽成矣。作餅晒乾用。發明。川文蛤善收頑痰。解熱毒。黃昏欬嗽。乃火氣浮於肺中。不宜用涼藥。宜五倍五味斂而降之。若風寒外觸暴嗽。及肺火實盛者禁用。以其專收而不能散也。故痰飲內盛者誤用。則聚斂於中。往往令人脹閉而死。爲末收脫肛。及子腸墜下。○百藥煎性浮。味帶餘甘。治上焦痰嗽。熱渴諸病。含噙尤宜。煅過主下血。烏鬚髮。消腫毒。斂金瘡。治喉癰口瘡。捲之便可進食也。

桑螵蛸 甘鹹平無毒。桑枝上螳螂子也。火炙黃用。本經主傷中。疝瘕益精生子。女子月閉腰痛。通五淋。利小便水道。發明。桑螵蛸肝腎命門藥也。功專收濬。故男子虛損。腎衰陽痿。夢中失精。遺溺。

白濁方多用之。本經又言通五淋。利小便水道。蓋取以泄下焦虛滯也。桑螵蛸散治小便頻數如稠米泔。心神恍惚。瘦悴食少。得之女勞者。方用桑螵蛸。遠志。龍骨。菖蒲。人參。茯苓。當歸。龜甲各一兩。臥時人參湯調下二錢。如無桑樹上者。以他樹上者。濃煎桑白皮汁佐之。若陰虛多火人誤用。反助虛陽。多致漫赤壅痛。強中失精。不可不知。生研爛塗之出箭鏃。

雀囊 一名帖蟬俗名載毛 甘平小毒。本經主寒熱結氣。蠱毒鬼疰。小兒驚癇。發明 雀囊。蟬殼也。其蟲夏生葉上。背上有刺。蟻人故名載毛。秋深葉盡。欲老口吐白沫。凝聚漸硬。在中成蛹。如蠶。至夏羽化而出。其形有似蜻蜓而翅黑稍闊。放子葉上而生蟬。謂雀囊者。以雀好食其蛹也。入藥惟取石榴樹上者。連蛹炙焙用之。蘇頌曰。今醫家治小兒驚癇。用雀囊子連蛹。同白僵蠶全蝎各三枚。微炒搗末。煎麻黃湯調服一字。日三服大效。藏器治小兒撮口不得飲乳。但先燎口傍見血。以雀囊打破。取汁塗之。

原蠶蛾 鹹溫小毒。取未交雄蛾紙封焙乾。拌椒蜜藏則不蛀。本經主心腹邪氣。起陰痿。益精氣。强志生子。好顏色。補中輕身。發明 蠶之性喜溼。火力專助陽。其子在臚月中。非以重鹽鹽透水漬曝乾。則繭不能繅絲。出子之後。非柔不食。本經主心腹邪氣。皆桑之餘力。猶僵蠶之治風痰。蠶繭之療癰腫。蠶沙之去風濕耳。其起陰痿。益精氣。強志生子。卽別錄之益精氣。強陰道。交精不倦。亦能止精。若合符節。好顏

色令人面色好之互辭。補中輕身者。以其善補真陽。陽主輕捷故也。詳參經旨。洵爲原蟲主治無疑。奈何集本草者。悞列樗雞之下。致力正之。

白殼蠶。鹹辛平無毒。色白者良。入藥惟取直者爲雄。去黑口及絲炒用。本經主小兒驚癇夜啼。去三蟲。滅黑點。令人面色好。男子陰瘍病。發明。殼蠶蟲之病風者也。功專祛風化痰。得乎柔之力也。本經治驚癇。取其散風痰之力也。去三蟲。滅黑點。男子陰瘍。取其滌除浸淫之濕。三蟲亦濕熱之蟲也。凡咽喉腫痛。及喉癆用此。下咽立愈。其治風痰結核頭風。皮膚風疹。丹毒作癰。疳蝕金瘡。疔腫風疾。皆取散結化痰之義。

蠶繭。甘溫無毒。發明。蠶繭治癰腫無頭。燒灰酒服。次日卽破。煮湯治消渴。繅絲湯及絲綿煮汁。功用相同。

蠶退卽馬明退。甘平無毒。卽老蠶眠起所蛻皮。入藥微炒用。今以出過蠶之紙爲馬明退。非也。發明。蠶

非桑葉不生。得東方水氣之全。故能治風病血病。而蛻治目中翳障。較之蟬蛻更捷。惜乎一時難覓。

蠶沙。甘辛溫無毒。微炒用。發明。蠶沙療風濕之專藥。有人病風癆。用此焙熟。絹包熨之。治爛弦風眼。以麻油浸蠶沙二三宿。研細塗患處。過宿卽愈。蠶沙置酒罇上泥。好色清味美。然惟晚者爲良。早蠶者

不堪入藥。以飼時火烘。故有毒也。

九香蟲 鹹溫無毒。發明 九香蟲產貴州。治膈胱滯氣。脾胃虧損。壯元陽攝生方。烏龍丸用之。
雪蠶即雪 蜈蚣 甘寒無毒。發明 雪蠶生峨眉山北。積雪歷年不消。其中生此大如瓠。味極甘美。故能解內熱渴疾。方物中之最益人者也。

蜻蛉一名靖蛉 赤者名赤卒 微寒無毒。發明 蜻蛉生水中。而能煖水藏。強陰蓄精。而赤者性猶壯。熱助陽藥用之。

樗雞即紅娘子 苦平有毒。不可近目。去翅足。同糯米炒去米用。發明 樗雞厥陰經藥。也能活血散血。治目翳。撥雲膏中與芫青斑蝥同用。亦是活血散結之義。能通血閉。行瘀血。主癩癰。辟邪氣。療瘡犬傷。治偏頭風。用紅娘子青娘子各七枚。去翅足。炒爲末。同葱莖搗塗痛處。周時起泡去之。孫一奎治血癰。用抵當丸。以樗雞易水蛭。三服血下脹消。形神自復。與薛新甫治水腫椒仁丸中芫青不殊。一走血而下瘀。一走氣而破水。皆峻劑也。綱目以本經原蠶蛾主治。誤列於此。今正之。

芫青即青娘子 辛溫有毒。去翅足。同糯米炒去米用。發明 芫青居芫花上。而色青。故能泄毒攻積。破血。墮胎。功同斑蝥。而毒尤猛。芫花有毒故也。其治癰犬傷。消目翳。却偏頭風。塞耳聾。皆取其毒銳也。又治月

閉水腫椒仁丸方用之。

斑蝥。辛鹹溫有毒。去翅足同糯米炒熟或醋煮用之。本經主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡瘍。能破石癰。發明。斑蝥人獲得時尾後惡氣射出。臭不可聞。其性專走下竅。利小便。故本經言破石癰。能攻實結。而不能治虛祕。不過引藥行氣。以毒攻毒而已。但毒行小便必濇痛。當以木通滑石導之。其性猛毒。力能墮胎。虛者禁用。瘋犬傷先於患人頭上拔去血髮二三莖。以斑蝥七枚。去翅足炙黃。同蟾蜍搗汁服之。瘡口於無風處刲去惡血。小便洗淨。髮灰敷之。服後小便當有瘀毒泄出。三四日後當有肉狗形。三四十枚爲盡。如數少再服七枚。若早服雖無狗形。永不發也。

萬上亭長。辛溫有毒。去翅足同糯米炒去米用。發明。亭長大毒。普通淋及婦人經脈不通。以五枚研末服三分。空心甘草湯下。須臾腑腹急痛。以黑豆煎湯服之。卽通。此蟲五六月爲亭長。頭赤身黑。七月斑蝥。九月爲地膽。隨時變化。其毒可知。

地膽。辛溫有毒。同糯米炒去米用。本經主鬼疰寒熱。鼠瘻惡瘡死肌。破癩痕墮胎。發明。地膽有毒。而能攻毒。性專破結墮胎。又能除鼻中瘻肉。下石淋。功同斑蝥。力能上涌下泄。

蜘蛛。微寒有毒。其種類不一。惟用懸網者入藥。發明。仲景治陰狐疝氣偏有大小。時時上下者。蜘蛛

蜘蛛主之。以其入肝性善循絲上下。故取以治瘻丸上下之病。別錄治大人小兒瘻痘。又治乾霍亂。服之能令人利。其邪得以下泄也。搗汁塗蛇傷效。

壁錢 無毒。發明 生壁間似蜘蛛而形扁。其膜色白如錢。故名。治鼻衄及金瘡出血不止。取蠍汁注鼻中。及點瘡上。同人中白等分燒研治瘡。又治喉痹。

蠍 辛平有毒。被蠍者以木梳合之卽愈。去毒及足用。亦有獨用其尾者。其功尤捷。滾醋泡去鹹。炒乾用。發明 蠍產於東方。色青屬水。治厥陰諸風掉眩。及小兒胎驚發搐。最爲要藥。左半身不遂。口眼喎斜。語言蹇濶。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾無聞。疝氣帶下。無不用之。蠍尾膏治胎驚發搐。用蠍梢二十一枚。麝香少許。屢效。東垣治月事不調。寒熱帶下。有丁香柴胡湯。方用羌活柴胡。當歸生地。丁香全蠍。蓋取以散血分之風熱耳。

水蛭 鹹苦平有毒。水蛭是小長色黃。挑之易斷者勿誤用。泥蛭頭圓身闊者。服之令人眼中如生烟。漸至枯損。凡用水蛭曝乾。猪油熬黑。令研極細。倘炙不透。雖爲末經年。得水猶活。入腹尚能復生。凡用須預先熬黑。以少許置水中。七日內不活者方可。本經逐惡血瘀血。月閉。破血瘕積聚無子。利水道。發明 鹹走血。苦勝血。水蛭之鹹苦以除畜血。乃肝經血分藥。故能通肝經聚血。攻一切惡血堅積。本經

言無子。是言因血瘕積聚而無子也。別錄云。墮胎性劣可知。昔人飲水誤食水蛭。腹痛面黃。飲泥漿水數碗乃得下。蓋蛭性喜泥。得土氣隨出。或用牛羊熱血同猪脂飲亦下。或以梅漿水多飲。則蛭溶化而出也。蛆苦寒無毒。漂淨炙黃。擣細末。同糖霜食之。發明。蛆出糞中。故能消積。治小兒諸疳積滯。取消積而不傷正氣也。一法用大蝦蟆十數隻。打死置罇內。取糞蛆不拘多少。河水漬養三五日。以食盡蝦蟆為度。用麻布紮住罇口。倒懸活水中。令污穢淨。取新瓦燒紅。置蛆於上。焙乾。治小兒疳積。腹大脚弱。腎膜遮睛。每服一二錢。量兒大小服之。無不驗者。勿以其鄙而忽諸。

狗蠅鹹溫無毒。發明。蠅食狗血。性熱而銳。力能拔毒外出。故治痘瘡倒黡色黑。脣口冰冷之證。以數枚搗細。醋酒少許。調服。聞人規方也。

蟾蜍鹹微溫有毒。本經主惡血。血瘀癆氣。破折血在脰下堅滿。通月閉。目中溼膚。青翳白膜。發明。蟾蜍穴土而居。與蚯蚓不異。故本經所治皆瘀血之證。金匱治虛勞瘀血。大黃䗪蟲丸方用之。取其去腸下堅滿也。許學士治筋急。養血地黃丸中用之。亦取其治血瘀也。取汁滴目去翳障。散血止痛。千金研末。敷小兒臍瘡。加豬脂調治。小兒脣緊。經驗方治瘀傷腫痛。肘後擣塗竹木刺。蘇頌擣汁點喉痹。得下即開。藏器塗遊風丹疹。又治麥芒入眼。以蟾蜍在目上隔布摩之。芒著布上即出。

桑蠶蟲 甘溫小毒。色白帶黃。而腹中無穢。按之無水者爲真。若頭硬而腹中不淨者。卽雜樹內蟲也。如一時難覓真者。則以載毛殼。煅灰存性代之。 發明 桑蠶蟲食木。柔能勝堅。故治痘瘡毒盛。白陷不能起發者。用以絞汁。和白酒釀服之。卽起。但皮薄脚散。及泄瀉畏食者服之。每致駭裂而成不救。不可不慎。千金治崩中漏下赤白。桑蠶燒灰溫酒服。亦治胎漏下血效。

桃蠹蟲 辛溫無毒。本經殺鬼邪惡不祥。 發明 桃實中蟲食之令人美顏色。與桃蠹不異。其蟲屎能辟溫疫。令不相染。爲末水服方寸匕。

蚱蟬 鹹甘寒無毒。本經主小兒驚癇夜啼。癲病寒熱。 發明 蟬主產難下胎衣。取其能蛻之義。聖惠治小兒發癩。有蚱蟬湯散丸等方。今人只知用蛻。而不知用蟬也。

蟬蛻 鹹甘寒無毒。去翅足用。 發明 蟬蛻去醫膜。取其蛻義也。治皮膚瘡瘍。風熱破傷風者。炒研一錢。酒服神效。痘後目翳。羊肝湯服二錢。則翳漸退。更主痘瘡發癩。若氣虛發癩。又當禁服。小兒夜啼。取蟬蛻四十九枚。去前截用後截。爲末分四服。鈎藤湯服之。卽止。驚啼加硃砂二字。若用上截。卽復啼也。小兒驚瘴夜啼。痼病寒熱。並用蟬腹。取其利竅通聲。去風熱痰之義。較蛻更捷。

蟻鰯 鹹寒有毒。去足火炙用。勿置水中。令人吐。 本經主小兒驚癇瘴瘍。腹脹寒熱。大人癲疾狂瘴。

補明 蜈蚣手足陽明足厥陰藥也。本經等治總不離三經之證。其治暴噎吐食。用一枚入生薑內燶。以陳橘皮二錢同巴豆炒過去巴豆。將蜈蚣陳皮爲末。每服二分。吹入喉中。吐痰二三次卽愈。又治箭鏃入骨。用巴豆微炒。同蜈蚣擦塗。痛定必癢。忍之待極癢不可忍。乃撼動拔之。又燒灰入冰片少許。治大腸脫肛。摻上托入擣丸塞下部。引痔蟲出盡。永瘥。其蜈蚣心貼疔瘡拔疔。貼半日許血盡根出則愈。然蜈蚣畏羊肉。食之卽死。

天牛 甘溫小毒 發明 天牛乃木中蠹蟲所化。楊樹中最。多桑樹中獨勝。長鬚如角。故有天牛之名。利齒善嚼。是有噉桑之號。其性最銳。取治疗腫惡瘡。出箭鏃竹木刺最捷。與蠍姑不殊。一噉木而飛。一穴土而出。其穎脫之性則一。如無噉桑。他樹上者亦可焙乾爲末。蜜調傅之。

蠍姑 酸寒小毒。去翅足炒用。本經主產難。出肉中刺。去潰腫。下哽噎。解毒除惡瘡。發明 蠍姑性善穴上。故能治水腫。自腰以前甚濬。能止大小便。自腰以後甚利。能通大小便。取以治水最効。但其性急。虛人戒之。本經治難產者。取其下半煮湯服之則下也。出肉刺潰癰腫惡瘡者。生擣塗之。肉刺卽出。瘡腫卽潰也。下哽噎者。炙末吹之。哽噎卽下。非噎膈之謂也。千金治箭鏃入肉。以蠍姑杵汁滴上。三五度自出。延年方治胎衣不下。以蠍姑一枚。水煮數沸灌下。入喉卽出。小兒臍風。蠍姑甘草等分爲末敷之効。

螢火卽燭燭本經名夜光

辛溫無毒。本經明目。發明。螢火本腐草所化得大火之餘氣而成入胞絡三焦。

能辟邪明目。取其照幽夜明之義。務成子螢火丸。辟五兵白刃虎狼蛇虺之毒。惡鬼疫癘之邪。麗安常亦

極言其効。惜乎世鮮備用。

衣魚卽蠶魚

鹹溫無毒。卽衣帛書畫中之蠹碎之如銀有粉者是。本經主婦人痘痕小便不利。小兒中

風項強背起摩之。發明。衣魚主中風項強。摩之卽安。驚癇天吊。口喝淋閉。服之卽愈。皆手足太陽經病。乃神農本經之藥。古方盛用。今人罕知。合鷹屎白殼。敷瘡癥減。

鼠婦本經名蟬蟲

酸鹹無毒。發明。金匱治久瘡。鼈甲煎丸中用之。以其主寒熱去瘀積也。古方治

瘀癆血病多用之。厥陰血分藥也。千金治產婦遺尿。以鼠婦七枚。熬研溫酒服之。痘瘡倒醫爲末。酒服一字。卽起。又解射干蜘蛛毒。

麤蟲本經名地鱉

鹹寒有毒。或去足炒用。或酒醉死去足搗汁用。本經主心腹寒熱洒。血積癆痕。破堅

下血閉。發明。麤蟲伏土而善攻隙穴。傷之不死。與陵鯉不殊。故能和傷損散陽明積血。本經治心腹寒熱洒。亦是積血所致。金匱大黃麤蟲丸。用水蛭麤蟲。取其破堅。下積血耳。無實結者勿用。跌撲重傷。焙乾爲末。酒服一錢。接骨神效。

蟲蟲 即蠍

苦微寒有毒。卽噉牛血蠍去翅足炒用。本經逐瘀血。破血積。堅痞寒熱。通利血脈。

蟻 發明

蟲食血而治血。因其性而爲用。肝經血分藥也。本經治癰瘍寒熱。是因癰瘍而發寒熱。與蟻蠍治腹脹寒熱不殊。仲景抵當湯丸。水蛭蟲雖當並用。二物之純陰懸殊。其治經閉。用四物加蟲蟻作丸服甚良。以破瘀而不傷血也。苦走血。血結不行者。以苦攻之。其性雖緩。亦能墮胎。

蟾蜍

皮辛涼微毒。肉甘平無毒。捕取風乾泥固煅存性用。其目赤嘴赤者有毒。○一種色青而生陂澤中者曰鼴。與此不同。○發明。蟾蜍土之精也。習土遁者賴之。其形大而背多疣者。是土性厚重。其行極遲。土生萬物。亦能化萬物之毒。故取以殺疳積。治鼠瘻。陰蝕疽癟。燒灰傅惡瘡並效。弘景治溫病發斑困驚。用以去腸。生搗一二枚。啜其汁。無不瘥者。治猘犬傷。先於頂心拔去血髮三四莖。卽以蟾蜍一二枚搗汁生食。小便內見沫。其毒卽解。又破傷風用二枚。生切如泥。入椒一兩。同酒炒熟。入酒二盞。乘熱飲之。少頃通身汗出而愈。發背疔腫初起。以活蟾一隻。繫定放腫上半日。蟾必昏憒。卽放水中以救其命。再換一隻。如前。蟾必踴躍。再易一枚。其蟾如舊。則毒散矣。其金蟾丸。治腫脹腹滿。并治小兒疳勞。腹大脛細。用大蟾一隻。以砂仁入腹令滿。鹽泥固濟。煅存性黑糖調服一二錢。七下盡。青黃積糞卽愈。未盡過二三日再服。以腹減熱除爲度。若糞不能濺注。而滴淋不前者。此元氣告匱。不可救也。

蟾酥 辛溫有毒

發明

蟾酥辛溫。其性最烈。凡用不過一分。齒縫出血。及牙疼。以紙紝少許。燃之即

止。蟾酥丸治發背疔腫。一切惡瘡。拔取疔瘡最捷。入外科有奪命之功。然輕用能爛人肌肉。

蝦蟆 甘寒小毒

本經主邪氣。破癰堅壅腫陰瘡。服之不患熱病。

發明

蟾蜍蝦蟆同類異種。故其

功用亦不甚相遠。服之不患熱病。卽弘景治溫病發斑困篤之意。時珍言古方多用蝦蟆。近方多用蟾蜍。

蓋古人通稱蟾爲蝦蟆。而蝦蟆不復入藥矣。

鼈俗作

甘寒無毒

發明 時珍曰。鼈產於水。與螺蚌同性。故能解熱毒。利水氣。但係濕生之物。其骨

性復熱。食之小便苦淋。妊娠食蛙。令子壽夭。小蛙多食。令人尿閉。臍下酸痛。擂車前水飲之可解。戴厚禮云。凡渾身水腫。或單腹脹者。以青蛙一二枚。去皮炙熟食之。則自消也。嘉謨曰。時行面赤項腫。名蝦蟆瘡。以金線鼈搗汁。水調空腹頓飲極效。

蝌斗 發明 蝌斗生水中。蝦蟆子也有尾。如魚漸大。則脚生尾脫。因其所稟之毒未化。故藏器取治火感熱毒。及腫瘍瘡。並搗碎傅之。或化水塗之。或配入敷藥中。並效。又得效方。多用蝌斗陰乾。待桑椹熟。等分置瓶中。密封懸屋東。或搗汁浸埋東壁下。百日化泥。取塗鬚髮。永黑如漆。

蜈蚣 辛溫有毒

火炙去足用

本經主鬼疰蠱毒。噉諸蛇蟲魚毒。殺鬼物老精。除溫瘡。

去三蟲。

發明

蓋行而疾者。惟風與蛇蜈蚣能制蛇故亦能截風厥陰經藥也。嶺南有蛇瘴項大腫痛連喉用赤足蜈蚣二節研細水下卽愈。又破傷風欲死研末擦牙邊去涎沫立瘥。本經言噉諸蛇蟲魚毒悉能解之。萬金散治小兒急驚。蜈蚣一條去足炙黃入硃砂輕粉乳汁爲丸服少許卽安。雙金散治小兒天吊目久不下口噤反張。蜈蚣一條酥炙去頭足入麝香爲末以少許吹鼻至眼合乃止。若眼未下再吹之。小兒撮口刮破舌瘡。蜈蚣末敷之。千金治射工毒瘡。蜈蚣炙黃爲末敷之。小兒禿瘡。蜈蚣浸油搽之。直指方治痔瘡疼痛。蜈蚣炙末入片腦少許唾調敷之。急救方治溫瘡洒酒時驚涼膈散加蜈蚣蠍尾服之。摘要治婦人趾瘡。甲內雞眼及惡肉突出。蜈蚣一條去頭足焙研入麝香少許去硬蓋攤烏金紙留孔貼上一夕卽效。如有惡肉外以南星末醋和傅四圍其祛毒之功無出其右。

蚯蚓 卽地龍 鹹寒小毒白頸者良。解熱毒入鹽化水用通經絡炙乾用。本經主蛇瘻去三蟲伏尸鬼疰蠶毒殺長蟲。發明 蚯蚓在物應土德。在星爲軫水體雖卑伏而性善穴竄專殺蛇蠶三蟲伏尸諸毒。解濕熱療黃疸利小便通經絡故活絡丸以之爲君。地龍湯治痘瘡脾胃虛熱矯紅五六日漸變乾紫伏陷者同牽膏搗和酒釀服之卽起。若乾紫色黯皮堅爲肝脾血熱。卽宜犀角紫草黃連清解非地龍所宜。溫病大熱狂妄天行大熱和人尿搗絞服之熱毒從小便而去也。小便暴祕不通亦宜用之。入葱化爲水。

療暴疎

蠍牛。鹹寒小毒。發明。蛤蝓蠍牛。生下濕地。陰雨卽出。至陰類也。治諸腫毒。痒漏。制蜈蚣蠍蟲。諸毒研爛塗之。取其解熱消毒之功耳。其形尖小而緣柔上者。謂之緣柔羸。治大腸脫肛。和豬脂蜜之立縮。此羸諸木上皆有。獨取柔上者。正如桑螵蛸之義。

龍蛇部

龍骨。甘平無毒。粘舌色白者。良。煅赤水飛用。飛之不細。粘著腸胃。令人寒熱。本經主心腹鬼疰。精物老魅。欬逆泄痢。膿血。女子漏下。癰痕堅結。小兒熱氣驚癇。發明。瀦可以去脫。龍骨入肝斂魂。收斂浮越之氣。本經主心腹鬼疰精魅諸疾。以其神靈能辟惡氣也。其治欬逆泄利膿血。女子漏下。取瀦以固上下氣血也。其性雖滯。而能入肝破結。癰痕堅結。皆肝經之血積也。小兒熱氣驚癇。亦肝經之病。爲牛黃以協濟之。其祛邪伐肝之力尤捷。許洪云。牛黃惡龍骨。而龍骨得牛黃更良。有以制伏之也。其性收陽中之陰。耑走足厥陰經。兼入手足少陰。治夜夢鬼交。多夢紛紜。多寐泄精。衄血吐血。胎漏腸風。益腎鎮心。爲收斂精氣要藥。有客邪。則兼表藥用之。故仲景治太陽證火劫亡陽驚狂。有救逆湯。火逆下之。因燒針煩躁。有桂枝甘草復骨牡蠣湯。少陽病誤下驚煩。有柴胡龍骨牡蠣湯。金匱治虛勞失精。有桂枝加龍骨牡蠣

湯子金方同遠志酒服。治健忘心忡。以二味蜜丸。硃砂爲衣。治勞心夢泄。梅師同桑螵蛸爲末。鹽湯服二錢。治遺尿淋瀝。又主帶脈爲病。故崩帶不止。腹滿。腰溶溶若坐水中。止瀦藥中加用之。止陰瘡。收濕氣。治休息痢。久痢脫肛。生肌斂瘡皆用之。但收瀦太過。非久痢虛脫者。切勿妄投。火盛失精者誤用。多致溺赤瀦痛。精愈不能收攝矣。

龍齒 滯平無毒。煅赤醋淬七次水飛用。形如筆架。重數兩外。光澤如鑄。碎之其理如石。內如龍骨。舐之粘舌者真。亦有微黑。而煅之色如翡翠者。爲蒼龍齒。較白者更勝。其小如筍尖。或如指狀。海鰓齒及骨也。叢生如貫衆根者。海馬齒也。舐之亦能粘舌。世多以等類僞充。不可不辨。本經主殺精物。大人驚癇。諸瘧。癲疾。狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五驚十二癇。發明 龍者東方之神。故骨與齒皆主肝病。許叔微云。肝藏魂能變化。故遊魂不定者。治之以龍齒。古方有遠志丸。龍齒清魂散。平補鎮心丸。皆收攝肝氣之劑也。又龍骨以白者爲上。取固上氣以攝下。齒以蒼者爲優。生則微黑。煅之翡翠可愛。較白者功用更捷。產後血暈爲要藥。取其直入肝藏也。予聞神龍蛻骨之說。初未之信。及從藥肆選覓龍齒。見其骨有變化未全者。半與牛骨無異。始知宇宙之大。無所不有。卽如蛇蟲之屬。皆能蛻形化體。豈特雲龍風虎而已哉。龍稟東方純陽之氣。故能興雲致雨。東方木氣主乎生也。其耳獨不司聽者。陽神別走於角也。春

夏發現而秋冬潛伏者。隨陽氣之鼓舞也。虎粟西方陰暴之性。故嘯則生風。西方金令主乎殺也。其項獨不能仰者。陰威併振於尾也。晝潛伏而宵奮迅者。乘陰氣之暴虐也。以是推之。則虎骨能搜風氣。健筋骨。療瘡。重睛能定人魄。魄者陰之精也。龍骨能薦精氣。收神識。止滑脫。齒能清人魂。魂者陽之神也。然龍性飛騰而骨獨粘者。正以其滯而欲蛻之。始得飛沖御天。非飛沖後而蛻其骨也。觀本經驚癲癲疾結氣。甄權鎮心安魂魄等治。總皆入肝斂魂。用以療陽神之脫。同氣相求之妙。許叔微云。肝藏魂能變化。故魂遊不定者。治之以龍齒。時珍曰。龍者東方之神。故其骨與齒皆主肝病。

龍角 甘平無毒。發明 龍稟東方木氣。而角又督脈所發。故治驚癲癲疾。神魂不寧。龍火上逆。身熱如火。及邪魅不詳。深師五邪丸用之。而千金治心病有齒角同用者。

鼈甲本經名鼈魚 酸微溫小毒。本經治心腹癰瘕伏堅。積聚寒熱。女子小腹陰中相引痛。崩中下血五色。及瘡疥死肌。發明 本經鼈甲所主之證。多屬厥陰。其功在平肝木。治血殺蟲。與鼈相類。亦能治陰瘡。千金有鼈甲煎。今藥肆多懸之。云能辟蠭。亦殺蟲之意。

陵鯉甲俗名穿山甲 酸微寒小毒。或酥炙。或黃土。或蛤粉炒。發鬆研用。尾甲更勝。發明 穿山甲入厥陰。陽明及陰陽二蹻。通經下乳。瘡疾癰腫。發瘡爲要藥。蓋其穴山而居。寓水而食。出陰入陽。能竄經絡。達於

病所。凡風濕冷癆之證。因水濕所致。渾身上下。強直不能屈伸。痛不可忍者。於五積散內加穿山甲七片。全蠍炒十個。葱薑水煎。熱服取汗。避風甚良。癰疽潰後不宜服。

石龍子。鹹溫小毒。綱目作鹹寒誤。產平陽山谷。荆襄等處。其類有四。一種生岩石間。頭扁身長。尾與身等長七八寸。大者尺餘。其狀若蛇而脚似梅花鱗。目五色者爲雄。色黃身短者爲雌。此物最惜鱗甲。故見人不動。捕之亦不蟻。以其生岩石間。故本經謂之石龍子。以其善於變易。吞瞿吐瞿。有陰陽析易之義。故字林謂之蜥蜴。楚人名爲蠟螈。寶一物也。入藥雌雄並用。去頭足。酒浸酥炙用之。入傅屍藥。醋炙用之。一種生草澤間。頭大尾短身粗。其色青黃。有傷則唧草自敷。故謂之蛇醫母。能入水與石斑魚合。故又名水蜥蜴。不入藥用。一種生人家屋壁。形小身細。長三四寸。色褐斑黑者。謂之蝘蜓。吳俗名爲壁虎。以其居壁而善捕蠍蠅也。或云飼之以朱點宮娥臂。故名守宮。一種似守宮而頭圓身細。長五六寸。色白如銀。通身細鱗。雌雄上下相應而鳴。情恰乃交者。蛤蚧也。荆襄嶺澤皆有。而西川產者最勝。捕得成對。線纏炙乾。無本經。豈本經之文有所殘缺歟。抑本經之文誤註別錄歟。其治五癰邪結氣利小便水道。破石淋下血者。以蜥蜴能吐瞿。故治癃淋利水道。是其本性。千金治癰結水腫。屍疰留飲。有蜥蜴丸。外臺治陰癀。

方用之。皆取其長於利水道耳。按蜥蜴卽是石龍。今房術藥中用之。以其興發助陽而無止濁之患也。
守宮一名蝘蜓俗名壁虎。鹹寒小毒。發明。守宮食蠍。蠍薑乃治風要藥。詳守宮所治風症癰癧諸病。猶蜈蚣之性能透經絡也。且入血分。故又治血病瘡瘍。以毒攻毒。皆取其尾善動之義。麻城移痘方。治痘出眼目及正面稠密。用以移痘於不傷命處。其効最捷。觀術士以守宮尾杆爲細末。彈熟肉上。其肉便翕翕蠕動。移痘方得非從此悟出。陶弘景云。蝘蜓喜緣籬壁間。以碟飼之。滿三斤。研乾末。以塗婦人臂。有交接事便脫。故名守宮。蘇恭曰。飼硃點婦人臂。謬說也。張華言必別有術。今不傳矣。時珍曰。守宮祛風石龍利水。功用自別。不可不知。

蛤蚧 甘鹹溫小毒。生嶺南城垣榕樹間。及粵西橫州等處者。長七八寸。蜀中產者。不過五寸。頭圓肉滿鱗小而厚。形似守宮。鳴則上下相呼。雌雄相應。情恰乃交。兩相抱負。自墮於地。人往捕之。亦不知覺。以手劈之。至死不閼。取以曝乾。爲房中要藥。卽尋常捕得者。功用亦相髣髴。但驗其吻圓成對。捲榕樹皮中者。卽真無疑。入藥去頭留尾。酥炙用之。口含少許。疾走不喘者。是其益氣之驗也。發明。蛤蚧味鹹歸腎。經性溫助命門。色白補肺氣。功兼人參。羊肉之用。而治虛損痿弱。消渴喘嗽。肺痿吐沫等證。專取交合腎肺之氣。無以逾之。愚按蛤蚧龍子。性皆溫補助陽。而舉世藥肆中。皆混稱不分。醫者亦不辨混用。龍子則

剖開如皮。身多赤斑。偏助壯火。陽事不振者宜之。蛤蚧則纏束成對。通身白鱗。專溫肺氣。虛喘乏者宜之。虛則補其母也。

蛇蛻。鹹甘平小毒。火熬用之。本經主小兒二十種驚癇。蛇癆。癩疾。瘻癰。弄舌搖頭寒熱。腸痔蟲毒。發明。蛇蛻屬巽。走肝。故本經治小兒驚癇等病。一皆風毒壅於經中之象。其入藥有四義。一能辟惡。取其性靈也。故治邪辟鬼魅。蟲瘻諸疾。二能驅風。取其性竄也。故治驚癇。癥瘕。偏正頭風。喉舌諸疾。三能殺蟲。故治惡瘻。痔漏。疥癬諸疾。用其毒也。四有蛻義。故治眼目瞼膜。胎衣不下。皮膚之疾。會意以從其類也。

蚺蛇膽卽南

甘苦寒小毒。發明。蚺蛇產嶺南。稟已土之氣。其膽受甲乙風水。其味苦中有甘。所主

皆厥陰太陰之病。其治心腹疎痛者。蟲在內攻噉也。下部瘻瘍者。蟲在外侵蝕也。濕熱則生蟲。燥濕則殺蟲。內外施之。皆可取用。更能散腫消血。故直諫之臣。受廷杖者。臨服少許。則血不凝滯於內。又能明目涼血。除疳殺蟲。惜乎難得真者。

白花蛇。甘鹹溫有毒。產蘄州者良。禁犯鐵。凡用去頭尾。酒浸酥炙。炭火緩焙。去盡皮骨。此物甚毒。不可不防。脇有方勝尾。上有拂者真。發明。蛇性竄能引藥。至於風癆處。故能治一切風病。其風善行數變。蛇亦善行數蛻。所以能透骨搜風。爲大風白癩風。風癆驚搐。癩癬惡瘻要藥。取其內走藏府。外徹皮膚。無

處不到也。陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡服蛇酒藥。切忌見風。開蟬時。須避其氣。免致面目浮腫。凡

癘風曾服過大楓子仁者。服白花蛇無效。

烏梢蛇 甘平無毒。劍脊細尾者佳。心犯鐵器。發明。蛇性主風。而黑色屬水。故治諸風頑痹。皮膚不仁。風瘡癰疹。疥癬熱毒。眉鬚脫落。瘡瘍等瘡。但白花蛇主肺藏之風。爲白癲風之專藥。烏蛇主腎藏之風。爲紫雲風之專藥。兩者主治懸殊。而烏蛇則性善無毒耳。

蝮蛇 肉大熱。膽微寒。並有毒。發明。諸蛇皆是。唯蝮蛇破母腹出。惡毒尤烈。故以蝮名。其狀較諸蛇迥異。形短而粗。嘴尖鼻反。故又名反鼻蛇。有頭斑身赤如錦紋者。有黃黑青黑而斑白者。皆蝮蛇也。有頭扁與土同色而無紋者。土虺也。亦名曰蛇。字形相類之誤也。時珍曰。蝮大虺小。其毒則一。抱朴子言。蛇類最多。惟虺中人甚急。卽時以刀割去瘡肉。投之於地。其熱如炙。須臾毒盡。人乃得活。一種形如蠍。長一二尺者。千歲蝮也。年久脚生。能跳上樹。噉人。噉已還樹。垂頭聽人哭聲。頭尾相類。大如搗衣杵。俗名望板歸。言被其噉必死。專望板歸以備殃具也。蘇頌以細辛。雄黃等分爲末。內瘡口中。日易三四次。又以桔梗根桂末著管中。密塞勿令走氣。佩之中。其毒者急敷之。野談翁方。急以黃荆葉搗爛敷之上。皆解救之法。然有用其毒。以攻疾厄之毒者。別錄取蝮蛇肉釀酒以療癩。蝮蛇膽磨汁以塗瘡。總取殺蟲攻

毒之用耳。竊謂攻毒急救之藥頗多。奚必藉此而爲異端之術哉。姑存以備解救之法可也。

魚部一

鯉魚 甘平無毒。其目能健動者有毒。藥中有天門冬者勿犯。天行病後勿食。發明 魚性逆水而上。動鬚翹尾。其力最勞。且目不夜瞑。故釋氏雕木象形。以警世之昏惰者。鯉性跳躍急流。故取以治水腫之病。河間云。鯉之治水。鷺之利水。因其氣相感也。黃痺脚氣濕熱。孕婦身腫宜之。便血同白蠟煮食。腦髓治耳卒聾。齒治石淋。膽治目赤腫痛。取汁點之。鱗治產婦滯血。燒灰治吐血崩中。十灰散中用之。

鱗魚本名鰩魚
歸音潭 甘溫無毒。發明 鱗魚多蓄池中。飼草而長。與青鯉混雜。故名曰鱗。江湖亦皆有之。食品之長味也。時珍言。暖中和胃。此指池中蓄者而言。李廷飛言。能發諸瘡。此指湖中獲者而言。各有至理。膽味苦寒。能出一切竹木刺在喉中。以酒化二三枚。溫呷取吐即出。

青魚 肉甘平。膽苦寒無毒。發明 東方色青。入通於肝。開竅於目。故膽有點目治視之功。肉有補肝逐水之用。同薤白煮食。治腳氣疼腫。目睛生汁注眼。能黑夜視物。以其好噉螺蜆。螺蜆能明目也。乾青魚膾。水磨點喉。辨瘡瘍。與熊膽同功。

鱸魚本名鰐魚

甘溫無毒。發明

池魚大都無毒。兼此魚恒食諸魚之遺。其毒雖少。不無助長濕熱之虞。

有皂白二種。皂者頭大。白者腹腴。雖食品之下。而有溫中益氣之功。與鱗魚無異也。

闊口魚

本名鮑魚

甘溫無毒。發明。鮑生海中。與石首同類。以之剖腹曝乾。亦與石首作兼無異。以其領

下有骨。撐開故有闊之稱。能開胃進食。下膀胱水氣。病人食之。無發毒之慮。食品中之有益者也。

鰯魚

古名劖魚

甘溫無毒。發明。鰯魚縮項。性不喜動。嚴冬善息土中。故食之能調胃氣。而無動風發熱

之慮。與白魚之性相彷。但無利水之功耳。

白魚。甘平無毒。發明。白魚入肺利水。開胃下氣。金匱治淋病小便不利。滑石白魚散用之。取其佐滑石以利氣。兼亂髮以破血。血氣通調。而淋漓止矣。同聚食之。令人腰痛。以其滲泄脾胃也。

石首魚

俗名蝗魚

甘平無毒。乾者名白鰩。發明。石首魚生鹹水中。而味至淡。故諸病食之。無助火之虞。

與河豚之性稟陰毒。迥殊。腦中石鈎主石淋。腦骨爲末。入有嘴壺中。薰腦漏然。惟暴患得效。痢疾切忌油膩。惟白鰩食之最宜。

鰓膠。鹹平無毒。凡用入丸。切作小塊。蛤粉炒成珠。方可磨末。煉蜜調劑。須待涼用。又不可搗。搗則粘韌。難爲丸矣。發明。諸魚之鱠。皆可爲膠。而石首魚者。膠物甚固。故齋精方用之。合沙苑蒺藜。名聚精丸。爲固精要藥。丹方又以一味炒研。砂糖調。日服一錢。匕治療最良。經久痔自枯落。燒灰治產後風癆。破傷

風癲。取其滋榮經脈。而虛風自息也。

勒魚 甘平無毒。發明 勒魚腹下有骨。勒人因以得名。以其甘溫開胃。有宜於老人之說。作參尤良。脊骨治癰。以一寸入七寶飲酒水各半煎露一宿服之。

鰣魚 甘溫無毒。發明 鰣魚性補。溫中益虛。而無發毒之慮。其生江中者大而色青。味極甘美。生海中者小而色赤。味亦稍薄。觀其暗室生光。迥非常魚可比。其鱗用香油熬。塗湯火傷效。

嘉魚 甘溫無毒。發明 此魚食乳水。功用同乳。食之令人肥健悅澤。腎虛消渴。勞瘦虛損者食之最宜。

鯧魚 此魚骨柔肉脆。能益胃氣。食之令人肥健。腹中子性寒有毒。多食令人痢下。

鯽魚 甘溫無毒。烏背者其味最美。以其居濁水中。雖肥不無小毒。然此恆用食品。未嘗見其有毒傷人。

發明 諸魚性動屬火。惟鯽魚屬土。有調胃實腸之功。故有反厚朴之戒。以厚朴泄胃氣。鯽魚益胃氣。故

大明言溫中下氣。保昇言止痢厚腸。皆言其補益之功也。生搗塗瘻核。乳癰堅腫。以猪脂煎灰服治腸癰。合赤小豆煮汁食。消水腫。炙油調塗婦人陰瘡。同白礬燒研。治腸痔血痢。入綠礬泥固煅。治反胃吐食。與

胡蒜煨。治膈氣痞滿。凡煅俱不可去鱗。以鱗有止血之功也。

石斑魚。有毒。發明。石斑魚生南方溪澗水石處。長數寸。大不過尺餘。有雌無雄。二三月與蝴蝶交合水上。其子毒人。令人吐瀉。醫說云。用魚尾草汁少許解之。

鱠殘魚。俗名銀魚。甘平無毒。發明。鱠殘出蘇松浙江。大者不過三四寸。身圓無鱗。潔白如銀。小者尤勝。鮮食最美。曝乾亦佳。作羹食之。寬中健胃。而無油膩傷中之患。

海粉。鹹寒無毒。發明。海粉色碧微鹹。專行肝腎。云是海中介。屬得東南水土之氣而成。與蜂之釀蜜無異。土人採得而貪之。以供食品。能散癰瘤。解毒熱。但性寒滑。脾胃虛人勿食。

燕窩。甘平無毒。發明。鳥啣海粉作窩。得風日陽和之氣化。鹹寒爲甘平。能使金水相生。腎氣上滋於肺。而胃氣亦得以安。食品中之最馴良者。惜乎本草不收。方書罕用。今人以之謂補虛勞。咳吐紅痰。每兼冰糖煮食。往往獲效。然惟病勢初淺者爲宜。若陰火方盛。血逆上奔。雖用無濟。以其幽柔無剛毅之力耳。

鱸魚。甘平小毒。發明。鱸魚鬆脆。與石首魚相類。補五藏。益筋骨。和腸胃。治水氣。多食宜人。作鮓尤良。鱸魚。甘平小毒。發明。鱸性疎利。有補虛益胃。去腹內惡血小蟲之功。醫說有邵氏女年十八。病勞。

瘳。累年偶食鱖魚羹，遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。臘治骨鯁及竹木刺入咽喉，不拘大人小兒，或入腹刺痛，服之皆出。臘月收大鱖魚膽，懸北簷下陰乾，遇有梗者，用皂子大酒研溫服，得吐則鯁隨涎出。未出再服。以出為度。酒隨量飲，無不出者。如無鱖魚膽，鯩魚青魚鯽魚膽用鮮者，酒調服之亦出。

鰨魚即鱖魚俗名里魚

甘寒無毒

發明

體性伏土而能勝水，故治水腫。療五痔。治濕癆。主脚氣。妊娠面浮

腳腫者，合赤小豆煮食甚効。丹方治水腫腹大，用活鰨魚去腹垢，入獨顆蒜令滿，外塗濕黃泥炭火炙食，屢效。有瘡者不可食。令癥白。

鰣魚 甘平小毒。闊嘴者為鰣，尖嘴者為鰐。發明 鰣魚雖有毒，性能補虛益陰，久病勞瘵宜之。大便濡泄勿用。其功專在滋補真陰，殺勞瘵蟲，與蛇同類，故主治亦近之。

鱠魚 甘大溫無毒。發明 鱠魚稟已土之氣，能補中益血。婦人產後惡露淋滯，腸鳴濕癆，並宜食之。暴乾煖灰存性，治老人虛痢。大鱠魚重筋骨者，能助勢力。食後遍體疼脹，盡力搥之，大力丸方用熊筋虎骨當歸人參等分為末，酒蒸大鱠魚取肉搗爛為丸，每日空腹酒下兩許，氣力驟長。鱠魚血力能助陽，壯年陽道不長，育龜丸用之。方用石龍子蛤蚧生犀角，生附子草烏頭乳香沒藥，血竭細辛，黑芝麻五倍子，陽起石等分為末，生鱠魚血為丸，碌砂為衣，每日空心酒下百丸。曾有人服此，得以嗣續宗祧者，不可以

房術論。其尾血療口眼喎斜。同麝少許。右喎塗左。左喎塗右。正卽洗去。其骨燒灰。香油調塗。流火甚效。
甲魚本名鱠魚 甘溫小毒。發明。鱠魚無鱗而有甲。故俗名爲著甲。江淮黃河遼海水深處皆有之。長二
三丈。逆上龍門。能化爲龍。味極肥美。但發氣動風。和蕎麥食。令人失音。其肝味勝河豚。食之令人血膚乾
脫。亦動風之驗也。

鱗魚本名鮒魚。生江中長丈餘身。無鱗鼻與身等亦鱗屬也。 甘平無毒。發明。此魚味雖美。而發諸藥毒。動風氣。發一切瘡疥。久食令人腰痛。服丹石人忌之。勿與乾筍同食。發癱瘓風。小兒食之。成欬嗽及癰痘。作鮓雖珍。亦不益人。
鯉魚本名鯉魚。卽鰣魚。 甘溫小毒。赤目赤鬚無腮者殺人。不可合牛肝食。反荆芥。發明。鯉魚類蛇。故能治
風。凡口眼喎斜。切活鮎魚尾尖。朝吻貼之。卽正。

黃頸魚 甘平微毒。反荆芥。發明。無鱗之魚不益人。發瘡疥。不獨黃頸爲然。

江鱠一名鱠魚 甘平小毒。發明。諸魚皆用翅尾游行。惟鱠不勞翅尾。逐隊齊行。故以命名。種類不一。獨
產江水中者。應春而起。啄極鮮美。性專降泄。故敗疽痔漏人忌食。諸鱠皆然。

河豚 甘溫有毒。海中者大毒。江中者次之。淡水中者又次之。有大小二種。大者謂之河豚。背淡青黑。無
赤斑。腹白而翅傍色黃者可食。小者名斑魚。背脊黑。有文點。多赤色。其毒最甚。以稟蛟龍之氣最甚也。海

人言三月後斑魚得水氣全盛之時。尤不宜食。其雙尾獨目。翅赤嘴赤異常。背有赤印。領內無腮。腹中多血。獨腴無膽。皆大毒傷人。製食之法。須去其子與嘴目。及脊中肝內惡血。并去周身脂膜。則不氣腥。煮忌煤火。及煤焰落。入與荆芥桔梗。菊花甘草附子烏頭相反。故食河豚。一日內不可服藥。河豚子必久瀆石灰水中。而後煮食。曾見水浸一夜。大如芡實也。中其毒。則脣舌麻聾。頭旋目眩。足不任履。行步欹側。急宜探吐。隨覓荻芽。或蘆根。搗汁灌之。橄欖汁。甘草汁。皆可解。又槐花乾胭脂等分爲末。水調服之。若腹中絞痛昏迷倒仆者。急用糞清灌之。遲則不救。發明 凡物之美者。謂之尤物。靡不賣毒傷人。如妲己亡殷。夷光傾吳。蒙其禍而不自覺也。河豚嗜鹹。內藏信智。外顯文刺。窄口巨腹。陰毒內蓄可知。凡陰毒之物。必藉陽氣而爲鼓舞。得春升之令。而浮游水面。非信而乎。散子必入淡水。旣生必歸巨海。非智而乎。得鹹則肥。得淡則瘦。所以淡水中者。其毒漸解。而不致傷人之甚也。以其味美。人爭食之。春初最爲貴品。其腹腴呼爲西施乳。南人有云。凡魚之無鱗無腮無膽有聲。目能睫者。皆有毒。河豚目能開闔。觸之則曳曳有聲。嗔怒則腹脹如毬。浮起水面。故人得以取之。其毒入肝助火。莫有甚於此者。患癰瘍脚氣人。切不可食。助濕發毒動風。其患最速。惟取其子。同蜈蚣燒研。香油調搽疥癬有効。抉其目。拌輕粉埋地中化水。拔婦人腳上雞眼瘡。可以脫根。

江豚 鹹腥無毒。發明 江豚形如水牛。藏器雖有飛屍蠱毒瘴瘧之治。從未見有用之者。以之熬油點燈。照燭蒲則明。讀書紡織即暗。俗言嬪婦所化也。

比目魚 甘平無毒。發明 比目形如箸。故俗以是稱之。爾雅所謂東方有比目者是也。魚各一目。相並而遊。今吳中崑山最多。孟詭雖有補中益氣之說。而多食動氣。亦是助濕生熱之故。此必溺於伉儷者之所化也。

鮫魚 一名沙魚 甘鹹平無毒。發明 鮫魚生南海。背皮粗錯可飾刀靶。其肉作膾補五藏。皮治屍疰蠱毒。燒灰解鰐鱗魚毒。

烏賊骨 卽烏鰡骨俗名海鰡鮠 鹹微溫無毒。發明 烏鰡骨厥陰血分之藥。兼入少陰。其味鹹而走血。故治血枯血痕。經閉崩帶。陰蝕腫痛。丈夫陰腫下痢疳疾。厥陰本藥也。寒熱瘧疾。聲嘶少腹痛。陰痛。厥陰經病也。目晉流淚。厥陰竅病也。厥陰爲藏血之室。少陰爲隱曲之地。故諸血病。陰病皆治之。按素問云。有病胸脇支滿。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。吐血。四肢清目眩。時時前後血。病名曰血枯。得之年少時。有所大脫血。或醉入房中。氣竭肝傷。月事衰少不來。治之以四烏鰡骨一丸。以雀卵大如小豆。每服五丸。飲以鮑魚汁。所以利腸中及傷肝也。觀此入厥陰血分可知。

鮑魚。辛臭溫無毒。發明。鮑魚腥穢可淡曝而不可著鹽乾則形如塊肉。耑取腥穢以滌一切瘀積。同氣相感也。入肝散血。煮汁送四烏鰡一薑姑丸治女子血枯經閉。內經用以療傷肝利腸而不傷伐元氣。惜乎世罕用之。今庖人用以煮肉。則脂沫盡解。滌除垢膩之驗也。秦始皇死沙邱。會暑屍腐。令輶車載鮑魚以亂其臭。始皇本呂不韋萌孽。溷廁宮幃。非取其滌除遺臭之義歟。

海馬。甘溫無毒。發明。海馬雌雄成對。其性溫暖。有交感之義。故孕婦帶之於身。臨時煅末服之。并手握之云易產。又陽虛房術多用之。可代蛤蚧之功也。

鰐俗作蝦鰐。甘溫小毒。鰐無鬚。腹下通黑色者食之傷人。發明。鰐性跳躍。生青熟赤。風火之象。生搗數小兒。赤白遊風。絞汁入藥。托腫吐風痰。皆取風能勝濕也。制藥壯陽。取熱能助火也。白者下乳汁。專入氣分也。

介部

龜版。日本經名。曰神屋。鹹甘平小毒。入藥取腹去背。酒浸酥炙。或熬膠用。色黑產水中者爲水龜。其色黃出山中者爲秦龜。秦龜不入補腎藥。一種呷蛇。龜腹折見蛇則呷而食之。其性最毒。不可誤用。方書皆用灼過敗龜之版。取其用過。無闕生命也。世以自死龜殼爲敗。既死精氣已脫。取用何益。悞服反受其毒。以其爲蛇。

感所傷也。今藥肆所賣龜膠。每以鹿角膠腳。沖入則易凝結。亦有以黃明膠和入者。凡製膠須去背甲。以淨腹版。水浸去外衣。則膠無腥濁之氣。本經主漏下赤白。破癥瘕痃瘶。五痔陰蝕。濕痹四肢重弱。小兒頗不合。發明 龜稟北方之氣而生。乃陰中至陰之物。耑行任脈。上通心氣。下通腎經。故能補陰治血。治勞。大凡滋陰降火之藥。多寒涼損胃。惟龜版炙灰則益。大腸止泄瀉。故漏下赤白。亦能療之。其治小兒頗不合。專取滋水堅骨之功。皆龜之所主。其破癥瘕痃瘶。五痔陰蝕。濕痹重著。皆秦龜之功用。以能入脾經。治風濕也。時珍云。龜鹿靈而壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其腹。以補心。補腎。補血。皆養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角。以補命門。補精補氣。皆養陽也。觀龜甲所主之病。皆屬陰虛精弱。腰脚痠瘻。可心解矣。燒灰酒服。治痘瘡。又合鹿角灰等分。入四物湯服。治血崩。炙末酒服。主風痹脚弱。燒灰傅小兒頭瘡。婦人陰瘡。鱣魚血調塗。流火濕瘡。但胃虛少食。大便不實。及妊娠禁用。以其無陽生之力耳。膽汁苦寒。治痘後目腫。經月不開。取汁點之。良。溺滴耳治聾。點舌下。治大人中風舌瘡。小兒驚風不語。摩胸背治癰胸瘡。背欲取其溺。以猪鬃刺其鼻。卽出。

玳瑁卽璫 甘寒無毒。入藥生者良。發明 玳瑁入心主血。有解毒解熱之功。故蘇頌以之磨汁服。解蠱毒。日華破癥結。消癰毒。止驚癇。土真療心風。解煩熱。行血氣。利大小腸。時珍治傷寒熱結狂言。解毒清

熱之功。等於犀角。同犀角解痘毒。痘瘡黑陷。乃心熱血凝。用生犀玳瑁磨汁。入猪心血少許。紫草湯調服。則熱解血和。而陷痘起矣。但虛寒而陷者勿用。

鼈甲一名上甲

鹹平無毒。九肋七肋者佳。以其得陽數也。然多有摘去下肋。偏充七肋者。亦有半邊隻肋者。

邊雙肋者。此圓魚與鼈交合而生。不若純隻肋者爲優。醋煅酥炙。各隨本方治瘡。母淋灰湯。煮糜如飴用。

龜用大者力勝。鼈用小者力優。妊娠勿食鼈肉。與莧菜鴨卵合食尤忌。

本經主心腹癰瘍。瘕。堅積寒熱去。

痞疾。息肉。陰蝕。痔核惡肉。發明。鼈色青入厥陰肝經。及衝脈。爲陰中之陽。奇陰偶。故取隻肋爲肝

經之嚮導。其所主者。痃瘞。瘧母。虛勞寒熱。癰瘍。痞疾。經水陰瘡。不出本經主治也。凡骨蒸勞熱。自汗。皆用

之。爲其能滋肝經之火也。與鼈甲同類。並主陰經血分之病。龜用腹。腹屬腎。鼈用肋。肋屬肝。然究竟是削

肝之劑。非補肝藥也。妊娠忌用。以其能伐肝破血也。肝虛無熱。禁之。煅灰研極細末。療湯火傷。皮綻肉爛。

者並効。乾則麻油調敷。濕則乾。摻其痛立止。其解火毒。療骨蒸。殺瘻蟲之功。可默悟矣。鼈頭燒灰。酒服療

小兒脫肛。婦人陰脫下墜。取其善縮之性也。生血塗尤效。○沈聖符曰。食品中惟鼈最爲叵測。其間多有

大毒。不減河豚者。如三足兩頭。人所共棄。項強腹赤。毒可傷人。子隣余子坦。曾見蛇盤屢跌而成鼈者。四

生之中。物物皆有變化。無足異也。且有鼈寶生鼈腹中之說。說者以爲誕妄。姑置罔聞。近日楓江吳氏買

一鼈烹之輒作人言。其家以爲怪也。添火烹之剖腹果得一物。約長三寸。鬚眉宛然。聖符邀予往看。驗其鼈形。背高聳起。稍異尋常。聖符屬筆命記。以爲嗜味傷生之警。

龍甲 甘平無毒。發明 龍甲炙黃酒浸。治療癰殺蟲。逐風惡瘡。痔瘻風頑疥瘡。功同鼈甲。但鼈走肝而龍走脾。故其主治稍有不同。

蟹 鹹寒小毒。未被霜者有毒。多食腹痛泄瀉。生薑紫蘇或汁蘆根汁。並可解之。其性喜入蛇穴。得其毒則驟長。故重一筋以上者誤食殺人。又兩目相向。足斑目赤者大毒不可食。本經主胸中邪氣熱結。痛喝辟面腫。能敗漆燒之致鼠。發明 蟹之外骨內肉生青熟赤。陰包陽象無疑。性滯破血。故能續斷絕筋骨。本經主胸中邪氣熱結痛。喝僻面腫。皆是瘀血爲患。性能敗漆。今人生搗治漆瘡。塗火湯。皆取散血之意。日華治筋骨折傷。生擣署之藏器云。能續斷筋。去殼用黃搗爛微炒。納入瘡中。筋即連也。可知其功不獨散而能和血矣。凡物之赤者皆熱。惟蟹與柿性寒。所以二物不宜同食。令人泄瀉。發癩瘻。妊娠忌食。以其性專逆水橫行也。其爪爲催生下死胎胞衣專藥。千金神造湯治子死腹中。并雙胎一死一生服之。令死者出生者安。神驗方也。但以一邊運動。一邊沈著者。即是無疑。方用蟹爪一升。甘草一尺。東流水一斗。以草薪煮至二升。去滓。入真阿膠一兩。令烊頓服。或分二服。若人困不能服。燙入卽活。取蟹之散血而

爪觸之卽脫也。然必生脫者。連足用之。丹方治營血發黃。胸脇結痛。而不浮腫者。蟹殼煅存性黑糖調無
灰酒下三錢。不過數服效。若浮腫者。爲氣病。無藉於蟹之散血也。婦人乳癰硬腫。蟹殼灰一服卽散。又以
塗硃燒烟辟臭蟲。薰之卽斃。則殺蟲之功。從可知矣。○蟹之相類多種。如蝤蛑擁劍不常見外。其蟛蜞蟛
蜞。春時甚多。蟛蜞螯光無毒。可醯而食。蟛蜞毛有毒。悞食令人吐下。又有一種生沙穴中。見人則避者。
沙狗也。時珍雖言不可食。今海錯中用之。非蟛蜞之可比也。

蠶 辛鹹平微毒。發明 蠶善候風。外殼內肉。與蟹無異。其血蒼色。其肉鬆脆。亦如蟹臍。能散肝腎結
血。故產後癆不止。及腸風漏血。崩中帶下。用尾燒灰米飲服。卽止。聖惠方治積年欬嗽。呀呷作聲。用蠶魚
殼半兩。貝母桔梗。入牙皂末少許。蜜丸噙一丸。噙汁服三丸。卽吐出惡涎而瘥。

牡蠣 鹹平微寒無毒。煅赤用左顧者良。本經主傷寒寒熱。溫瘡酒洒。驚恚怒氣。除拘緩鼠瘻。女子帶
下赤白。發明 牡蠣入足少陰。爲軟堅之劑。以柴胡引之。去脇下痛。以茶引之。消項上結核。以大黃引
之。消股間腫。以地黃引之。益精收濬。止小便。腎經血分藥也。本經治傷寒寒熱。溫瘡酒洒。是指傷寒發汗
後。寒熱不止而言。非正發汗藥也。仲景少陽病犯本。有柴胡龍骨牡蠣湯。金匱百合病變渴。有桔梗牡蠣
散。用牡蠣以散內結之熱。卽溫瘡之熱。從內蘊。驚恚之怒氣上逆。亦宜鹹寒降泄爲務。其拘緩鼠瘻。帶下

赤白。總由痰積內滯。端不出軟堅散結之治耳。今人以牡蠣濁精而治房勞。精滑則慮其鹹降。治亢陽精傷。又恐其斂滯。惟傷寒亡陽。汗脫溫粉之法最妙。其肉糟製。即蠣黃醬也。

蚌肉甘寒。殼鹹寒無毒。發明。蚌與蛤皆水產。而蛤則生鹹水。色白入肺。故有軟堅積化頑痰之功。蚌生淡水。色蒼入肝。故有清熱行濕。治雀目夜盲之力。蓋雀目則肝腎之病也。初生小兒啞驚。活蚌水磨墨滴入口中。少頃下黑糞而愈。生蚌炙水。治湯火傷甚效。古方用方諸水。清神定魄。以大蚌向月取水是也。

真珠。鹹甘寒無毒。發明。珍珠入手足厥陰二經。故能安魂定神。明目退翳。解痘疔瘡。及痘瘡入眼。治耳暴聾出水。研細末吹之。待其乾脫自愈。煅灰入長肉藥。及湯火傷敷之最妙。然不可著水。著水則反爛肉。

石決明一名珍珠母。鹹平無毒。九孔者佳。麪裹煨熟水飛用。反雲母。發明。石決明味鹹軟堅。入肝腎二經。爲磨醫消障之專藥。又治風熱入肝。煩擾不寐。遊魂不定。本事方珍珠母丸。與龍齒同用。取散肝經之積熱。須與養血藥同用。不宜久服。令人寒中。非其性寒。乃消乏過當耳。

文蛤。鹹平微寒無毒。卽蛤蜊之殼厚口。光有紫斑文者。用酸漿水。或醋煮半日許。搗粉用。本經主惡

瘡蝕五痔。發明。文蛤鹹寒。走足少陰經。爲潤下之味。故能止渴利小便。別錄治欬逆胸痹。腰痛脇急。鼠瘻崩中。卽本經主惡瘡蝕五痔之義。取鹹能軟堅。入血分也。仲景傷寒太陽病。用水劫益煩。意欲飲水。反不渴者。及金匱渴欲飲水不止。並用文蛤散。其治反胃吐後。渴欲飲水而貪飲者。則有文蛤湯。總取鹹寒滌飲之效。

蛤蜊鹹寒無毒。紫口者良。六都鹹寒之物。皆能清熱。開胃止渴。其殼煅赤杵粉。能清肺熱。滋腎燥。降痰清火。止欬定喘。消堅癖。散癰瘤。無不宜之。炒阿膠膠用之。以其味鹹能發滯性也。單方治乳癰。每三錢入皂角刺末半錢。溫酒調服。治肺癰。一味童便煅研。甘桔湯日進三服。屢驗。然須冬時取枯棗實。和穰子同搗。仍入殼中。懸當風處陰乾。以供一歲之用。否則難於取應也。

蝗 甘平無毒。發明。蝗生江湖中。與蚌蛤相類。閩人以田種之。謂之蝗田。其肉可爲淡乾。腸臍糟之。以充海錯。婦人產後虛熱宜之。

魁蛤殼俗名蠅子。肉甘平。殼鹹平無毒。發明。蛤肉僅供食品。雖有溫中健胃之功。方藥曾未之及。其殼煅灰。則有消血塊。散瘀積。治積年胃脘瘀血疼痛之功。與鼈甲蟲蟲同爲消瘡母之味。獨用醋丸。則消胃脘瘀積。觀製蛤餅者。以蛤殼灰泡湯。搜糲粉。則發鬆異常。軟堅之力可知。

車螯 一名蜃。鹽蜃。 鹹冷無毒。發明。車螯是海中大蛤。以其吐氣成樓。故名曰蜃。所謂雀入淮爲蛤。鳩入海爲蜃者是也。其肉解酒毒。消渴。殼治瘡腫癰毒。燒赤醋淬爲末。同甘草等分酒服。并以醋調敷之。日華法也。

貝子 鹹平小毒。燒赤搗細如麪。以清酒淘過用白者入氣分。紫者入血分。花者兼入血氣。本經主目翳五癰。利水道。鬼疰蟲毒。腹痛下血。發明。貝生南海。雲南極多。土人用爲錢貨交易。因其味鹹軟堅。故本經專主目翳。其治五癰等病。取鹹潤走血之力。千金脚氣丸中用之。專取鹹能破堅之意。雖數年之疾。靡不克效。以其透入骨空。搜逐濕淫之氣。和諸藥蒸蒸作汗。次第而解之。古方點目用貝子粉入龍腦少許。有瘻肉加珍珠末吹點。亦入老醫諸方。紫貝治小兒癰疹目翳。今人用以研紙。謂之研羸。大者曰珂。亦名馬軻螺。治目消翳。去筋膜努肉。與貝子相類。分紫白煅灰用之。

石蠍 一名龜腳。 甘鹹無毒。發明。石砌生東南海中石上。蚌蛤之屬。形如龜腳。殼似海螯。與吐蚨等同爲海錯。而此稍遜。然其有利小便之功。吐蚨不如也。

淡菜 甘溫無毒。發明。淡菜生鹹水而味不沾鹹。爲消癰之善藥。兼補陰虛勞傷。精血衰少。及婦人帶下。理腰腳氣。不宜多食。久食令人陽痿不起。及脫人髮。一切海中苔菜皆然。不獨淡菜也。

海瀛屬名
甲香

鹹平無毒

發明

海瀛肉甘寒。食之能止心痛。生螺汁洗眼止痛。經二三十年者輒應入。

黃連末點之尤良。○磨性閉藏。能斂香氣。經月不散。獨燒則臭。與沈麝諸香及諸花和蠟煎成者曰甲煎。可作口脂。千金方用之。唐李義山詩所謂沈香甲煎爲庭燎者是也。其殼五色璀璨。爲鉢最精。燒過點眼。能消宿翳。惜乎專目科者罕知。

蠃蠑即螺

甘寒無毒

發明

蠃蚌蛤蟹鼈鼈之類。皆外剛內柔。壳離火之象。雖居泥水而性寒。治火熱。

之毒最捷。用珍珠黃連。嵌入良久。取汁注目中。止熱壅目痛。生搗絞汁。和無灰酒飲。治黃疸小便不利。田中大螺去掩入冰片少許。埋土中一伏時。化水療瘡瘍。又搗爛和麝香貼臍上。引濕熱下行。治噤口痢。土牆上爛殼燒灰。敷痘瘡。及臙瘡濕毒。生田中者。得土氣多而形大。生水中者。得水氣多而形小。其治水腫黃疸。目赤腫痛。痔腫脫肛。消渴解酒之功。則一產徽州溪澗中者。其肉青碧可愛。土人取肉焙乾。以充方物。但性冷利。人過食。令人腹痛泄瀉。急磨木香酒解之。

寄居蟲 甘溫無毒 發明 藏器曰。寄居蟲在螺殼間。非螺也。候螺蛤開。卽自出入螺蛤欲合。已還殼。中海族多被其寄。南海一種似蜘蛛。入螺中負殼而行。觸之卽縮入螺。火炙乃出。婦人難產。以七枚擣酒服之。或臨產兩手各握一枚。與相思子無異。弘景云。食之益顏色。美心志。惜乎一時不易得也。

郎君子卽相思子。發明。相思子狀如螺中之子。大如小豆。藏篋笥積歲猶活。置醋中卽盤旋不已。婦人難產。手把之便生。屢驗。

禽部

鶴頂。辛溫大毒。發明。鶴食蛇虺而頂血大毒。力能殺人。之欲求自盡者。服之卽斃。而嘉祐又以鶴血益氣力。補虛乏。去風益肺。恐未必然。胞中砂石子磨水服。能解蠱毒。

鶴骨。甘寒小毒。發明。鶴骨治尸疰。喉痹。蛇虺傷。專用其毒。以攻伏匿之毒也。嘴及脚骨尤良。卵能預解痘毒。水煮一枚。與兒啖之。令不出痘。或出亦稀。與鶴卵同功。

鶴鳴卽鶴鵠。鹹寒無毒。發明。鶴鳴好喫魚蛇及鳥雛。故治痞積有鳴鶴丸。用之爲君。治食魚蟹成瘕者尤效。其骨酥炙和南蓬砂吹喉治骨哽。忍之須臾。輕輕咯之。骨與痰涎俱出。

鵝鳴卽鵝鵠。鹹溫滑無毒。發明。淘鵝油性走。能引諸藥透入病所拔毒。故治聾癆。腫毒諸病。其舌治疔瘡。取八心拔毒外出也。

鵝白者甘平無毒。蒼者有毒。嫩者尤劣。發明。鵝氣味俱厚。發風發瘡。莫此爲甚。別錄謂其性涼利五藏。是指蒼者而言。韓氏謂其疎風。是言白者之性耳。昔人治癲風方中。取純白鵝通身之毛。及嘴足之

皮與臍肝內皮同。固濟。煅灰存性。和風藥用之。爲風藥之嚮導也。然不可遺失一處。其處卽不能愈。又不可用雜色者。若有一處色蒼。風愈之後。其處肌膚色黑。此與蛇發風毒。白花蛇善解風毒之義不殊。白鵝脂祛風潤燥。解譽石毒。血能涌吐。胃中瘀結。開血膈吐逆。食不得入。乘熱恣飲。卽能嘔出病根。以血引血。同氣相求之驗也。中射工毒者飲之。并塗其身。卽解。以其能食此蟲也。尾腺內耳中治聾。及聰耳。取以達三焦之氣也。涎治誤吞稻芒。亦物性之相制耳。白鵝屎絞汁。治小兒鵝口瘡。蒼鵝屎傅蟲蛇咬毒。

雁 甘溫無毒。本經主風攀拘急偏枯。血氣不通利。發明 雁爲信鳥。豈宜食之。故道家謂之天厭。性善通利血氣。風攀拘急偏枯。取肉炙熟帖之。昔黃帝製指南於鴈脰骨空中製鍼。取其能定南北也。但覓之不易。今人於鯉魚腦中製之。以其性專伏土。定而不移。可定水土之方向也。

鷺即家 甘溫無毒。嫩者有毒。老者無毒。發明 鷺之逼火而生。唼水而長。未出卵時。先得火氣。故不憚冰雪。偏喜淫雨。而尾腺最甚。故羣雌一被其氣。皆得生化之機。不待薦尾之過也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。男子陽氣不振者。食之最宜。患水腫人。用之最妥。黑嘴白毛者。治腸胃久虛。葛可久白鳳膏用之。取金水相生之義。綠頭老鴨。治陽水暴腫。外臺鴨頭丸用之。取通調水道之義。白鴨生血。能補血解毒。勞傷吐血。衝熱酒調服。屢効。中射工溪毒。及野葛砒霜毒。灌之卽解。悞吞金銀入腹。乘熱頓飲數升。

其金卽下諸鴨涎治穀麥芒入喉及小兒瘞風反張滴之卽消。卵能閉氣以混沌未分塞人聰慧諸病忌食而滯下尤禁。白鴨通殺石藥毒。凡服藥過劑昏迷眩暈者。取白鴨通一合湯漬澄清服之卽解勿以其穢而棄諸。

鳬卽野鴟

甘平無毒。發明。鳬逐羣飛夏藏冬見。與鴻雁不異。其在九月以後立春以前味極甘美。病人食之全勝家鴨。以其肥而不脂。美而易化。故滯下泄濁。喘欬上氣虛勞失血。及產後病後無不宜之。雖有安中利水之功。而方藥曾未之及。孟詵除十一種蟲等治未能深信。摘玄方解挑生蠱毒。取生鳬血熱飲探吐。於此可悟。生鴉血可吐胸腹諸蟲血積。總以血引血。同氣相應之力耳。

雞

甘平小毒。諸雞有五色者。黑雞白首者六指者死足不伸者並不可食。發明。雞屬巽而動風。外應乎木。內通乎肝。得陽氣之最早。故先寅而鳴。鳴必鼓翅。火動生風之象。風火易動而易散。人之陽事不力者不宜食雞。是以昔人有利婦人不利男子之說。而東南之人。肝氣易動。動則生火。生痰。病邪得之為有助也。北方陽氣潛伏最宜發越。病邪得之便能作汗。以其能助肝氣也。姑以物性之常變言之。諸雞中惟烏骨白絲毛者最良。異象變坎。得水木之精氣。肝腎血分病宜之。烏骨雞丸治經癸胎產虛熱諸病。以其峻補肝血也。今人治賊風痛癆。專取五爪烏骨雄雞置病人痛處。任其鳴啄。少頃其痛自止。雞之五爪

者有毒。此專取其毒。以引其毒外泄也。丹雄雞治女人崩中漏下赤白沃通神明。殺惡毒辟不祥。中惡魔魅。以血灌鼻卽蘇。中風口眼喎斜。乘熱塗患處。卽正。雞冠血和酒釀調陵鯉甲末。治痘瘡肝熱毒盛。而變青乾紫黑陷伏黃雌雞治產後虛羸。煮汁煎藥最宜。黑雌雞治妊娠胎息不安。泰和老雞內托小兒痘瘡。近世治產後虛羸寒熱亦取用之。以其能助肝經生氣也。雄雞肝取不落水者研爛和蜂蠟酒釀頓熱治小兒疳積壞眼。日服無間。醫盡爲度。雞脾脰俗名雞內金。治食積腹滿反胃泄利及眼目障翳。雞卵治傷寒發狂。歎噏失音。並生食之。以雞卵略敲損。勿令清漏浸尿中。冬三夏一日。取煮食之。治哮喘風痰。雞子清治伏熱目赤喉痛。雞子黃治產後胞衣不下。並用生者。又以煮熟去白取黃。同亂髮香油熬化塗嬰孩。胎毒熟瘡。抱出卵殼研細爲末。去目中癰。醫燒灰蜜潤塗嬰兒頭身諸瘡。卵殼中白皮。同麻黃紫菀治久欬氣結。煅雞子乃不爭之卵。取以同犬屎敷腫瘍。其痛立止。千金方也。雞矢白爲散。無灰酒下一錢。七治疊脹腹滿。內經雞矢醴也。潛矢和石灰末塗疔腫。半日許卽能拔出。

雉卽野雞 甘酸溫小毒。發明。俾雅云。蛇交雉則生。蜃爲雉入大水所化。推其變化之源。必由異氣所感。水經云。蛇雉遭卵於地而爲蛟。其卵遇雷則入地。不過雷則仍爲雉。於此可悟。其化蜃總由靈蛇之性。未混不得山靈之氣。遂其飛騰。則得滄溟之氣。恣其吞吐。是與虹蜺奚擇哉。別錄言其補中益氣力。止

泄痢除蟻癧。此指尋常之雉而言。千金以之治蟻癧。因其喜於食蟻。乃用以製之也。周禮庖人供六禽。雉是其一。亦食品之貴。然有毒不可常食。有病人尤非所宜。而春夏不可食者。以其食蟲蟻也。時珍曰。雉屬離火。雞屬巽木。故煮雞則冠變。煮雉則冠紅。火性暴烈。發痔發瘡。與家雞子同食。令人發症。週身疼痛。爲患種種。惡得謂之無毒乎。

烏鵲 酸甘平無毒。種類有四。小而純黑者爲烏。大嘴而腹下白者爲鴉。並入藥用。其項白而大者爲燕。嘴赤而小者爲山烏。皆不入藥。 發明 慈烏反哺性稟孝慈。嘉祐雖有補勞治瘦之功。骨蒸羸弱。歎歟。治之。然血肉之中。豈無他味。而忍傷孝慈之物哉。○烏鵲嘴大。貪戾傷生。時珍取治暗風癆疾。勞傷吐血。欬嗽殺蟲等病。專取搜逐風毒之用。與慈烏之調補虛羸。各有仁慈剛柔之用。奚啻大淵。

鶲鶲重 甘寒無毒。發明 鶲性靈慧。能知吉凶。觀其營巢開戶。必背太歲而向太乙。非鶲鳩之可比。別錄用之爲下石淋專藥。以其鳴必掉尾。取其週身之氣。恐向下通也。藏器有云。燒灰淋汁飲之。令人淋石自下。蘇頌言。婦人不可食。以其相視而通音感而孕也。其腦燒之。入酒同飲。令人相思。蘇頌之說。非緣此。○鶲重巢日華取多年者燒之。療頭狂鬼魅。及蠱毒。仍呼祟物名號。亦敷瘡瘍。千金治婦人癰。取多年生育相安之義。

鷄鳩 甘溫小毒。發明。此物食烏頭半夏苗。好啖此者。多發咽喉頭腦腫痛。甘草生薑。並可解之。唐本言。鷄鳩治嶺南野萬菌子生金毒。及溫瘧久病欲死者。台毛熬酒漬服之。或生搗汁服最良。日華云。酒服主蠭氣欲死。孟說云。能利五藏。益心力。令人聰明。

鶉 甘平無毒。發明。鶉主腹大如鼓。解熱結。療小兒疳。按鶉乃蛙化。氣性相同。蛙與蝦蟇皆解熱結。治疳利水消腫。則鶉之消鼓脹。蓋亦同功。食後下如鵝脂數次。卽愈。

鴿 鹹平無毒。發明。鴿之品類頗多。惟白者入藥。能解諸藥毒。久患虛羸者。食之有益。調精益氣。治惡瘡疥癬風瘡。白癩風。療癰瘍風。煮熟酒服。無不宜之。鴿卵能稀痘。其矢氣臭之能殺瘵蟲。虛勞家咸多畜之。

鶯 俗作鶯卽黃鸝。月令名倉庚。 甘溫無毒。發明。此鳥感春陽先鳴。故能補益陽氣。食之令人不妬。以陽和之氣。能勝陰毒也。按陽變止妒論云。梁武帝鄰后性妒。或言倉庚爲膳。療治遂令食之。妒果減半。

雀卵 甘溫無毒。服尤人忌食。發明。雀屬陽而性淫。故能強壯陽事。火衰陰痿精寒者最宜。陰虛火盛者禁用。雀卵治血枯。素問有四烏鵲骨一蘊茹丸。用之最妙。如無雀卵。生雀肝代之。頭血主雀齒。腦用綿裹塞耳治聾。雄雀尿名白丁香。去目中翳膜。及面上黑。但取直者。卽雄與假鼠糞無異。入藥有効。

伏翼卽蝙蝠屎
名夜明沙 咸平無毒。伏翼煅灰用。夜明砂淘淨焙用。本經主目眞癢痛。明目。夜視有精光。其屎治面癰腫皮膚。洗洗時痛。腹中血氣破寒熱積聚除驚悸。發明 本經治目眞癢。痛用伏翼。近世目科惟用夜明砂。鮮有用伏翼者。要皆厥陰肝經血分藥也。其伏翼屎能破結血消積。故目瞖障翳。膀胱帶瘻癰癧皆用之。然蝙蝠食之大能利人。稍虛者不可輕用。

五靈脂卽寒號蟲矢
又名鴟鳴 苦酸寒小毒。研細酒飛去砂石。晒乾。生用則破血。炒用則和血。發明 鴟鳴候時鳥也。晉地有之。春夏羽儀豐盛。冬時裸形。晝夜哀鳴。故楊氏丹鉛錄謂之寒號蟲。屎名五靈脂。謂狀如凝脂。而受五行之靈氣也。其氣腥穢。其味苦酸。大傷胃氣。綱目言其甘溫。恐非正論。雖有治目瞖中脫疼痛之功。惟藜蘆可應用。終非膏粱所宜。同蒲黃名失笑散治一切心胸腹脇少腹諸痛。及產後結血血崩。目中生翳。往來不定。其性入肝散血最速。但性極羶惡。脾胃虛者不能勝其氣也。

斑鳩 甘平無毒。發明 斑鳩補腎。故能明目。治虛損益氣。食之令人不噎。目科斑鳩丸錦鳩丸用之。取氣血爲引導。以助補腎明目之功也。

伯勞 平有毒。發明 方藥未有用者。其毛治小兒繼病。俗作慄病。取毛帶之。繼病者母有娠乳兒。兒病如瘡痢。他日相繼腹大。或瘻或發。他人有娠相近。亦能相繼也。北人未識此病。

鸚鵡俗名
八哥

甘平無毒。發明。

鸚鵡目和乳汁滴目。令人目明。能見晝外之物。甚言明目之効耳。肉治。

噎逆。及五痔止血。並炙熟食之。

啄木鳥 甘酸平無毒。形色與畫眉鳥相似。但頭頂有紅毛一片。嘴與爪皆堅銳如鐵。故能啄木取蟲。不可不辨。發明。啄木性專殺蟲。故能治人藏府積蟲之患。時珍治勞瘵癆瘍。皆取制蟲之義。燒灰存性。治療漏蟲。管納孔中。不過二三次愈。丹方治噎膈。諸藥不效。以之熬膏。入麝香一錢。七晝夜六時嗅之。膈塞自消。蓋噎膈多有因鬱積所致。以其善開木鬱之邪也。

鷦鷯即水老鴉

酸鹹溫微毒。或云鹹寒誤。發明。鷦鷯性寒利水。能治腹大如鼓。體寒者。以鷦鷯燒存性。

鷦鷯水飲服之。其骨煅灰蜜調綿裹。治魚骨鱗。與白鷺骨同功。嘴骨尤効。○鷦鷯屎多在石上。色紫如花。就石刮取。名蜀水花。能去面上黓黑。癰瘍。減瘢痕及湯火瘡痕。和猪脂敷疔瘡。

鷹屎白 微寒無毒。本經主傷撻滅瘢。發明。虎嘯則風生於地。鷹揚則風動於天。具體雖殊。機應則一。鷹具雄健之翮。不能長恃無虞。至秋火伏金生。令行改革。勁翮漸脫。弱羽未振。卽有雄風。未遂奮揚。是以衆鳥侮之。月令所謂鷹乃祭鳥是也。古聖觸物致思。專取鷹之屎白。滅傷撻痕。雖取穢惡滌漬。實取其翮之善脫也。後人推而廣之。用以滌除目中宿翳。吹點藥中。咸取用之。其屎中化未盡之毛。謂之鷹條。

入陰丹陽丹不特取其翮之善脫以治難脫之病并取其屎中未化之羽以消目中未脫之翳。穎脫之妙用。崇古未宣。因顯示後起毋失本經取用之義。

鷓溫小毒。發明。鷄鴨鷄骨皆能接骨。以鶩鳥之力在骨故以骨治骨。從其類也。折傷斷骨燒灰每服一錢酒下。在上食後。在下食前。骨即接如初。但在三日內者易治。三日外則難治。以氣血凝滯不能合轍也。

鷄鹹平小毒。發明。鷄頭治頭風目眩。顛倒癇疾。千金治頭風眩轉。面上游風有鷄頭酒。聖惠治旋風眩。買有鷄頭丸。總取旋風健搏之力。

鷄甘溫小毒。發明。鷄治風癆噎食。取初生無毛者一對。黃泥固濟。煨存性爲末。每服一匙。溫酒服之。頭主痘瘡黑陷。用臘月者燒灰。酒眼之當起。

鷄鴨俗呼貓酸微鹹小毒。發明。鷄鴨不祥之物古方罕用。近世治傳屍勞瘵專取陰毒之味。以殺陰毒之蟲也。方用鷄鴨酒煮焙乾同大蝦蟇七條。雞頭芍上蒸爛和薯蕷一筋。搗焙細末爲丸。空腹酒下三錢。功用與癰肝彷彿。方士用以昏夜齋戒。以聚鬼魅。是以至陰之味誘至陰之物也。

鷄大毒。發明。鷄產蠱毒瘴癥之鄉。鍾毒最烈。非宿樞櫟不能自安。以其無枝人莫能捕也。人欲求

自盡者以廻羽調酒服之立斃。與鶴頂之毒無異。別錄云。鳩喙殺蝮蛇時珍言。蝮蛇中人。刮末塗之卽愈。如極惡之人。有以用之未嘗不解危救急也。

獸部

猪 甘平無毒。同驢馬肉食之。令人霍亂。同羊肝食之。令人心悶。與生胡荽同食。傷人臍。發明 猪屬水獸。性煩善淫。飽食無所用力。周身脂膏不流。故人食之助濕生痰。莫此爲甚。而肥盛之人尤非所宜。種蹄甲白者。有金水相生之象。稍異尋常。鹽漬風乾。製爲南腿。有補養脾胃之能。病人食之。略無妨礙。良非鮮者之比。丹溪云。猪肉補陽。陰虛者切宜少食。蓋肉性入胃。便作濕熱生痰。痰生則氣不降。而諸證作矣。故痰嗽家最忌。然肺燥乾咳。及火嗽痰結者。食之痰卽易出。其嗽便止。但不宜過鹹耳。當知助濕生痰。惟中間膘脂一層。專助脾濕。若皮則走肺益氣。精者補肝益血。但嫌難尅化耳。其汁則全是膘脂鎔化食之。滲入經絡。故東垣言之頗詳。千金治打傷青腫。炙精豬肉搗之。小兒火丹。生豬肉切片貼之。漆瘡作瘻。宜啖豬肉。并以豬脂塗之。男女陰蝕。肥猪肉煮汁洗之。不過三十觔瘥。山行石蛭著人足。則穿肌入肉。但以臘脂膏和鹽塗足脛趾。卽不著人也。急救方。治竹木刺入肉。以多年熏肉。切片包裹卽出。其腎性堅難化。且藏淫火。最不益人。而治腎虛腰痛。豬腎切開。入人參末一錢。濕紙裹煨。每日空心嚼一枚。或入青蛾

丸中煮食並効。其治水脹用豬賸丸。便血用藏連丸皆用以爲引藥入病處耳。心血治驚風癲癇。蓋以心歸心。以血導血之意。得冰片入心經也。卒中惡死。尾血溼之。取其動而不息之意。并縛豚枕之卽活。蛇入人孔割母猪尾。血滴入卽出。用肝者。肝主藏血。血病用爲嚮導。故脫肛肝虛雀目用之。脰卽三焦能消除腎藏邪毒垢膩。故同胡黃連等藥治徽瘡最捷。用膽者。取其瀉肝膽之火。故仲景白通湯用爲嚮導。蓋寒能勝熱。滑能潤燥。苦能入心也。傷寒熱邪燥結。有豬膽導法。又膽汁和香油等分。亦治徽瘡結毒。清晨連服七日。大便下泄邪毒最捷。未盡停七日更服。七日餘邪自盡。屢驗。尿脬治產婦傷膀胱。急用上好人參一兩。入脬中煮食。日日服之。稍或遲延。氣血衰冷。不可療矣。齒治齷齪。乳能斷酒。千金方用之。其屑者。皮上白膏是也。取其鹹寒入腎。用以調陰散熱。故仲景治少陰病不利咽痛。胸滿心煩。有豬膚湯。予嘗用之。其効最捷。豕卵治陰莖中疼。齷齪鬼氣蠱。毒除寒熱。貢豚五瘻邪氣攀縮。豬蹄煮湯去油煎催乳藥及醃塗紙上貼乾。則易之。禮記云。食豚去腦。孫真人食忌云。豬腦損男子陽道。酒後尤不可食。延壽書云。以鹽洗潰瘍有効。蹄甲本經治五痔。伏熱在腹中。腸癰內蝕。今日疾外障亦用之。豬腦治風眩腦鳴。凍瘡癰疽。塗紙上貼乾。則易之。酒食豬腦。是自引賊也。豬骨燒存性爲末。水服方寸匕。治食諸果中毒。又解馬肝漏脯等毒。豬毛燒灰麻油。調塗湯火傷。留竅出毒。則無痕。豬屎古方取用頗多。千金治患霧氣。心煩少氣。頭痛項急。起則目眩。欲

倒戰掉不安。憎寒微熱。心中欲吐。吐時無物。用新豬屎一升半。內好酒一觔。攪令散。以生布綃取汁。更以綿瀝頓服之。卽地鋪暖覆臥。面前著火。常令汗出。得汗待其自乾乃起。亦治風勞蠱毒。燒灰治痘瘡黑陷。無價散用之。又衝沸湯蒸麻疹。陷伏卽起。總取穢惡以辟不祥之氣。同氣相應之用耳。

狗 鹹酸溫無毒。熱病後忌食。妊婦食之。令子無聲。發明。狗屬土而有火。故歹人履其地。雖臥必眚。天時亢熱。則臥陰地。下元虛。人食之最宜。但食後必發口燥。惟啜米湯以解之。敗瘡稀水不斂。日噉狗肉最佳。痔漏人歲久不愈。日食自瘥。凡食犬肉不消。心下堅。或腹脹。口乾大渴。心急發熱。妄語如狂。或洞泄。以杏仁一升。合皮熟研。沸湯三升。和取汁。分三服。利下肉片大驗。狗膽本經主明目。取其夜能見物也。陰莖治傷中陰痿不起。除女子帶下十二疾。狗頭骨煅末。止婦人崩中下痢。取其溫而能散也。狗屎中米名戌腹糧。又名白龍砂。主噎膈風病。及痘瘡倒黴。用此催聚爲最。取其性溫熱也。若乾紫黑焦。爲血熱毒盛。慎勿誤用。其血能破妖邪。以性屬陽。陰邪不能勝之也。

羊 甘溫有毒。羊類多種。惟白羯者良。胡羊毛捲。洮羊毛豐。肉厚皮薄。並可爲裘。牂羊墳首。璠羊色黃。形羸味薄。不堪供饌。凡煮羊忌用銅器。有宿熟者不可食。大病食之必發熱。瘡家及痼疾家食之必發。以其食百草之毒也。羊肉不可共生魚鮓食。能害人。白羊黑首。食其腦作腸癰。羊肝共生椒食之。傷人五藏。羊

蹄中有白珠者名羊懸食之令人癲。羊獨角及四角者鬚外有之皆有毒不宜食。發明 羊爲肺家之

獸目無瞳子周身之氣皆聚於肺故其氣最腥膻而性味甘溫色白補肺是以昔人有人參補氣羊肉補形之說。匱治產後腹中虛痛及少腹寒疝並用當歸生薑羊肉湯專取羊肉之甘溫煮湯去滓以助當歸生薑辛散之力虛滯得以開矣。羊腎治腎虛膀胱畜熱胞癆小便淋瀝疼脹千金腎瀝湯以之爲主。羊石子卽羊之外腎治腎虛精滑本事金鎖丹用之。羊脬治下虛遺溺溫水漂淨入補骨脂焙乾爲末臥時溫酒服半兩不過四五服卽瘥。羊肝補肝專主肝經受傷目無精光之病膽治青盲目暗膽開竅於目膽汁充則目明膽汁減則目暗古方碧雲膏臘月取羯羊膽以蜜盛滿懸簷下待霜出取藏點眼神効。羊乳潤而且補反胃人宜時時食之。取開胃脫潤大腸之燥也。青羊者尤良。羊肺治嗽止渴久嗽肺虛者宜之。羊膽主反胃止汗治虛羸小便數羊脂生主下痢脫肛取潤以導之補中寓瀉也。熟主賊風瘧癆潤肌膚入膏透經絡風熱毒氣婦人產後腹中絞痛丸劑中最宜。羊脾滌除藏府垢膩與豬脾同功而入肺祛痰尤捷。羊骨稟西方堅勁之氣最銳得火煅以濟之可以消銅鐵故悞吞銅鐵者用之觀磨鏡者非此不明其治賊風癆痛同虎骨煅灰酒服皆隨痛處取用。羊鬚燒灰敷小兒頰瘡并療蠅蝶尿瘡羊胎炙乾入藥亦能補人與鹿胎紫河車同入六味地黃丸中名三胎丸調補腎虛羸瘦最爲得力。羊血解石藥毒外臺

云。凡服丹石人忌食羊血。十年一食。前功盡亡。凡服石藥覺毒發。刺羊血熱飲一升。卽解。服地黃何首烏補藥者忌之。

殺羊角

殺音古
黑羊也

鹹平無毒。

本經主青盲明目。止驚悸寒泄。久服安心益氣輕身。殺毒蟲。入山燒之。辟

惡虎狼。

發明

殺羊與羚羊俱是野獸。殺則雄猛倍甚。角亦起稜。與羚羊不殊。但色黑如漆。故專伐腎

邪。辟不祥。

與羚羊大都彷彿。互參本經。此言青盲明目。卽羚羊之專主明目也。此言止驚悸。卽羚羊之治魔

寐也。此言止寒泄。卽羚羊之去惡血注下也。此言久服安心益氣輕身。卽羚羊之益氣起陰氣也。此言殺

毒蟲。辟惡鬼虎狼。

卽羚羊之辟蠭毒惡鬼不祥也。但此主寒泄。本乎腎虛不能攝津。彼主惡血注下。係乎

肝傷不能統血。而別錄治蠭毒吐血。又與羚羊主治相符。究其大綱。此專補救瞳人。彼專消磨翳障。一皆

證治之常。至於燒之辟惡鬼虎狼。如此奇突。迥出意表。非尋常之可擬也。

牛 甘溫無毒。

同猪肉食之。生寸白蟲。獨肝牛善噉蛇。食之傷人。春月自死牛肉。及生疔牛肉食之。令人

癰。急以生甘草煮汁解之。剝瘻牛傷手足者。令人脹滿。急宜解之。遲則不救。

發明 黃牛肉補氣。與黃耆同功。觀丹溪倒倉法論。而引仲觸類。則牛之補土。可心解矣。又以黃牛肉取四蹄各五斤。熬膏去滓收

乾。如鹿膠法。名霞天膏。主中風偏廢。口眼歪斜。痰涎壅塞。五藏六府留痰宿飲癖塊。手足皮膚中痰核。及

大病後極虛羸瘦。每斤入茯苓四兩。頓熔空腹酒服三四錢。肥盛多痰者。每斤入半夏麯四兩。廣皮二兩。丸服大效。牛本屬坤土。而膽主風木。故能鎮肝明目。臘月用釀南星末陰乾。歲久多製。則苦潤不燥。治經絡風痰。及小兒驚痰。其功不減牛黃。牛骨髓補中填骨髓。久服增年。能潤澤肌膚。黃牛腦和藥。治頭風腦漏。牛角腮。本經下閉血瘀。血疼痛。女人帶下血崩。燔之酒服。宗奭曰。燒灰主婦人血崩。大便下血。血痢。牛血性溫。能補脾胃諸虛。治便血。血痢。一切病後羸瘦。咸宜食之。其醫乃肺系肉團。瓦上燔乾爲末。酒服治喉痹氣壅。古方多用之。或以製藥益佳。取引入肺經。以通氣結耳。與猪羊髓療治不殊。牛齒燒灰治小兒癩。牛乳補虛羸止渴。噎膈反胃。大便燥者宜之。入生薑葱白。止小兒風熱吐乳。牛馬肉共生魚食之成鼈瘕。牛尿治水腫。但胃虛少食人勿用。牛屎燒灰。傳小兒痘瘡潰爛。產寶治子死腹中。以濕牛糞塗之。牛齡草絞汁。治反胃噎膈。取其沾涎之多也。

馬辛溫有毒。綱目作甘涼。非馬腳無夜眼。白馬黑頭。白馬青蹄者。皆不可食。鞍下肉食之殺人。肝亦不可食。以鞭驅之傷。皆聚於肝也。食馬肉中毒欲死。以香豉杏仁各二兩。蒸熟杵末服之。或煮蘆根汁飲之。發明 按靈樞經云。卒口僻急者。目不合。熱則筋縱目不開。頰筋有寒則急。引頰移口。有熱則弛縱緩不勝收。故僻治之以馬膏。膏其急頰。以白酒和桂。塗其緩筋。以桑鉤勾之。卽以生桑灰置之坎中。高下以坐。

等以膏熨急煩。且飲美酒。噉炙肉。不飲酒者自強也。爲之三拊而已。世多不知此方之妙。竊謂口煩喝。乃風中血脉也。手足陽明之經絡於口。會太陽之經絡於目。寒則筋急而僻。熱則筋緩而縱。故左中寒。逼熱於右。右中寒則逼熱於左。寒者急而熱者緩也。急者皮膚頑痹。營衛凝滯。治法急者緩之。緩者急之。故用馬膏之甘平柔緩。以摩其急。以潤其痹。以通其血脈。用桂酒之辛熱急束。以塗其緩。以收其縱。以和其營衛。以通其筋絡。柔能治風痹。通節竅也。病在上者。酒以行之。甘以助之。故飲美酒。噉炙肉云耳。馬白睛。治癲癧時發。千金方用之。馬心食之善忘。馬肺食之寒熱萎陽。馬鞍下肉食之。傷人五藏。馬乳祛風止渴。白馬蹄。本經主驚邪癰癧。乳難。辟鬼氣。鬼毒。蠱疰。不祥。別錄止衄。內崩。齶齒。白馬者。治婦人白崩。赤馬者。治婦人赤崩。養毛。王小兒驚癎。女子崩中。赤白。隨其色用之。燒灰止血。塗惡瘡。尾主女人崩。中小兒客忤。白馬陰症。本經主傷中絕脈。陰不起。強志益氣。長肌肉。肥健生子。野馬陰莖食之。令人陰萎。野馬肉食之。成馬癆。筋脈不能自收持。馬溺微寒。小毒。治癰痕有驗。反胃有蟲積者。亦能治之。潰瘍。著肉腐爛徹骨。毒能傷人。馬矢煨風痹藥酒。取其透達。直入病所也。馬通止血解毒。千金梅師治吐血衄血。肘後治卒中。惡吐利不止。經驗治絞腸沙腹痛。欲死俱絞汁服之。又治破傷腫痛。以馬屎燒烟熏之。聖惠治疗腫傷風腫痛。以馬屎炒熟。千金治筋骨破傷。以熱馬屎敷之。又治破傷腫痛。以馬屎燒烟熏之。聖惠治疗腫傷風腫痛。以馬屎炒熟。

熨之靈樞椒鹽桂酒置馬矢煜中。助一切藥力也。今人以馬屎煨烟熏蠶蟲臭蟲無不斃者。食馬肉心煩者飲美酒則解。飲濁酒則劇。

驢 甘溫無毒。綱目作甘涼誤。發明 驢肉食之動風脂肥尤甚。日華子言治一切風。是指烏驢而言。烏驢皮治風補血。東魯阿井水煎膏用之。驢髓熬膏能長鬚髮。與馬鬚同功。驢莖強陰壯筋。與白馬莖同功。驢糞療黃疸濕熱止渴。驢尿專於殺蟲利水止脹。其治噎膈或單服或入四物湯服之效。驢屎炒熨風腫漏瘡。絞汁主心腹疼痛。治水腫服五合良。

駝峯 甘溫無毒。發明 駝峯八珍之一。味雖極美。但能動風。宿有風氣人勿食。駝脂摩風去頑皮死肌取熱氣透肉也。

酪 甘平無毒。發明 凡牛羊駝馬之乳並可作駝。南人惟知熱酒沖食。北人必以熬熟沖茶漿服。大能清胃。不助濕熱。止煩解渴。除心膈熱門。潤腸胃燥結。摩腫生精血補虛損。壯顏色。戴原禮云。駝乳液之屬。血燥者宜食。較之人乳尤勝。以其無怒火溼毒也。華元化云。蠅蚋入耳。以酪灌入卽出。

酥醕 一名 酥醕 甘寒利下無毒。酥酪不可與生魚膾同食。令人腹內生蟲。發明 酥酪醍醐性皆滑潤。救血熱枯燥之人。咸宜用之。又傷熱失音。用以通聲最妙。凡炙一切氣血堅勒筋骨藥俱不可少。但脾胃虛滑

者禁用。

阿膠。甘平微溫無毒。辨真偽法。以頂有鬃文。極圓整者爲真。折之沉亮。不作屑。不作皮。蛤粉炒成珠。經月不軟者爲佳。京阿產者。雖假猶無妨害。其水膠入木煤瀆造。有傷脾氣。慎不可用。本經主心腹內崩。勞極。洒洒如瘧狀。腰腹痛。四肢酸疼。女子下血安胎。久服輕身益氣。發明。阿井本淄水之源。色黑色輕。故能益肺補腎。煎用烏驥必陽。谷山中驗其舌黑。其皮表裏通黑者。用以熬膠。則能補血止血。本經治心腹內崩。下血安胎。爲諸失血要藥。勞證欬嗽。喘急。肺痿肺癰。潤燥滋大腸。治下痢便膿血。所謂陰不足者。補之以味也。

黃明膠即廣。甘平無毒。發明。明膠治吐血衄血。下血。血淋血痢。妊娠胎動下血。風濕走注疼痛。打撲傷火傷。一切癰疽腫毒。治血止痛。潤燥利大小腸。皆取其有滋益之功。無滑利之患。

牛黃。苦平小毒。試真假法。揩摩透甲。其體輕氣香。置舌上先苦後甘。清涼透心者爲真。喝迫而得者。名生神黃。圓滑外有血絲。嫩黃層多者爲上。殺後取者。其形雖圓。下面必扁者次之。在角中者名角黃。心中剝得者名心黃。膽中得之名膽黃。則又次之。產西戎者爲西黃。產廣東者名廣黃。本經主驚癇寒熱。盛狂症。除邪逐鬼。發明。牛有黃。是牛之病也。因其病之在心及肝膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

膽之病。本經治驚癇。寒熱狂瘲邪鬼。皆痰熱所致。其功長於清心化熱。利痰涼驚。安神辟惡。故清心牛黃丸以之爲君。其風中心藏者。亦必用之。若中經中府者誤用。引邪深入。如油入麪。莫之能出。宜詳審而用可也。

狗寶 甘苦溫小毒。狀如白石。微帶青色。擊碎其理如蠶白臘者真。發明 狗寶專治噎膈反胃之病。取苦能下降。溫能開結也。予嘗推廣其用。凡癰疽潰瘍不收。癲狂冷瘻積結。無不可用。惟鬱結傷脾氣血枯槁者誤投。則有負薪救火之厄。

獅油 辛溫有毒。色微黑者真。發明 獅爲百獸之長。性最難馴。一吼則百獸辟易。爾雅言其食虎豹熊。太古言其乳入牛羊馬乳中。皆化成水。西域人捕得。取其油入貢。以供宮人滌除衣垢之用。又能去紙上墨跡。刮少許。隔紙熨之。卽脫。予嘗試用。垢雖去而衣易毀。紙易脆。僅供一時之用。雖係方物。方藥罕用。近世醫師以之治噎膈病。蓋噎膈皆鬱痰瘀積所致。用取滌垢之意。試之輒驗。由是方家爭爲奇物。但性最猛烈。力能墮胎。孕婦忌用。豕油亦能去垢潔疾。但不能去墨跡耳。

虎骨 辛微熱無毒。骨取黃潤者良。若帶青黑色乃藥箭射者。有毒勿用。酥炙黃脆用之。發明 虎陰也。風陽也。虎金也。風木也。虎嘯風生。木承金制。陽出陰藏之義。故骨能追風定痛。強筋壯骨。風病尋急。骨

節風毒爲之要藥。虎之一身。節節氣力。皆出前足。故膝脰爲勝。而前左脰尤良。以臥必用左脰爲枕也。然按病之前後左右取用。其效尤捷。入陰陽二蹻。虎睛定魄。千金治狂邪。有虎睛湯丸。並酒浸炙乾用。一時不可得。以珍珠煅末代之。總取定魄之用也。虎膽治反胃吐食。新瓦上煅存性。入平胃散末。和匀空腹白湯服三錢效。虎頭骨治頭風。藥中浸酒服。作枕止癇。虎長牙辟邪殺蟲。傳尸方用之。

象皮 鹹溫無毒。發明 象秉西方金氣。金令主藏。不宜擅鳴。鳴主金象。大非所宜。其皮專於收斂。其肉壅腫。人以斧刀刺之。半日卽合。故治金瘡不合者。用其皮煅存性敷之。若入長肉諸膏藥。切片酥拌炙之。象牙甘寒。能解癰腫諸毒。磨水服之。造筋磨礪之末。生蜜調塗。治諸鐵雜物入肉。舊梳刮薄片。屑溫湯頻服。治竹木刺及諸魚骨鯁。卽時吐出。不吐再服。以吐出爲度。非刮下薄片。不能應手也。

犀角 苦微鹹。大寒無毒。镑成以熱手掌摸之。香者爲真。臭者卽假。忌酒鹽烏附。孕婦勿服。能消胎氣。

發明 犀之精靈。皆聚於角。足陽明胃爲水穀之海。飲食藥物。必先受之。故犀角能涼血散血。及畜血驚狂。斑痘之證。皆取以通利陽明。血結耳。別錄治傷寒溫疫。頭痛寒熱諸毒。抱朴子云。犀食百草之毒。及衆木之棘。所以能解毒。凡蠭毒之人。遇有飲食。以犀筋攬之。有毒則生白沫。無毒則否。宗奭曰。鹿取茸。犀取尖。其精銳之力。盡在是也。其治吐血衄血。大小便血。犀角地黃湯爲之專藥。若患久氣虛。又爲切禁。以其

能耗散血氣也。痘瘡之血熱毒盛者尤爲必需。然在六七日灌漿之時又爲切禁。以其能化膿爲水也。而結痂後餘毒癰腫則又不忌。惟氣虛毒盛之痘一切不可犯。其性大寒無大熱邪者慎不可用。凡中毒箭以犀角刺瘡中立愈。又感山風瘴氣射工溪毒用生犀磨汁服之卽解。

熊脂肉 甘溫無毒。本經主風痹不仁筋急。五藏腹中積聚。寒熱羸瘦。頭瘍白禿。面上肝炮。發明。熊糞雄毅之性。故其脂可開風痹不仁等疾。可服可摩。但不可作燈烟氣薰目。使人不能遠視。本經所主不出風痹筋急之用。風爲陽邪。熊爲陽獸。其性溫潤能通行經絡。開通血氣也。熊筋亦能壯筋強力。與虎骨之搜風壯骨無異。熊肉振羸。其氣有餘。癩病人食之終身不愈。

熊膽 苦寒無毒。試法取少許研滴水中。掛下如線。直至水底不散者爲真。發明。熊膽苦入心。寒勝濕。手少陰足厥陰藥也。其性潔不染塵。故能清心平肝。爲時氣熱盛變爲黃疸之要藥。又能殺蟲明目。除翳瘡瘍。療蟲牙蛀痛。小兒驚癇瘧癆。以竹瀝化豆大許服之。去心中涎。痔瘡赤腫。水化點之卽消。凡實熱之證用之咸宜。苟涉虛家。便當嚴禁。

麝羊角 卽羚羊角 鹹寒無毒。鎔碎胸前煨熱令脆。研如粉。不則粘人腸胃。本經主明目益氣起陰。去惡血注下。辟蠱毒鬼。不祥麌寐。發明。羚羊屬木。入足厥陰。伐肝最捷。目暗翳障。而羚羊角能平之。痘瘡

正面稠密不能起發。而羚羊能分之。小兒驚癇。婦人子癟。大人中風。搐搦。及筋寒。厯節痛。而羚羊角能舒之。驚駭不寧。狂越麌寐。而羚羊角能安之。惡鬼不祥。而羚羊角能辟之。惡血注下。蠱毒犯腫。瘡腫瘻瘍。產後血氣。而羚羊角能散之。濕熱留滯。陽氣不振。陰器衰痿。而羚羊角能起之。煩懣氣逆。噎塞不通。鬱爲寒熱。而羚羊角能降之。詳本經所主。皆取散厥陰血結耳。愚按諸角。皆能入肝散血解毒。而犀角爲之首推。以其專食百草之毒。兼走陽明。力能祛之外出也。故痘瘡之血熱毒盛者。爲之必需。若痘瘡之毒。并在氣分。而正面稠密。不能起發者。又須羚羊角以分解其勢。使惡血流於他處。此非犀角之所能也。人但知羚羊角能消目翳。定驚癇。而散痘瘡惡血之功。人所共昧。羖羊角治青盲目暗。與羚羊角不殊。而辟除邪魅。蟲毒。亦相彷彿。惜乎從未之聞。惟消乳癖。丹方用之。白羯羊角。亦能消乳癖。而方家每用琉璃角燈。磁片刮取薄屑。置胸中候。脆杵細酒服方寸匙。屢效。專取宿腐之味。以消陳積之殆也。其鹿角刮屑。善消虛人乳腫。未潰卽消。已潰卽斂。卽本經主漏下惡血之治。龍角治神魂不寧。功用與龍齒略同。千金方中有齒角並用者。牛角腮。專主閉血血崩。牛之一身。惟此無用。而本經特爲採錄。千金尤爲崩漏要藥。可見天地間無棄物也。

山羊血 鹹溫無毒。苗人以麋竹通節削鋒利活刺。心血收乾者。良宰。取者不盡用。

發明

山羊產滇蜀諸山中。性善走逐。好鬪。肉能

療冷勞山風瘧痢。婦人赤白帶下。其心血綱目失載。性溫味鹹。爲和傷散血之神藥。其治跌撲損傷。單用酒服取醉。醉醒其骨自續。每用不過分許。不可多服。雖不傷耗元氣。而力能走散陰血。然必初患便服。得效最速。若過三五日。血凝氣滯。無濟於治矣。但舉世用者絕罕。間有收取而市者。其價重等於牛黃。且心血絕不易得。滲血丹用之。真虛勞失血之續命丹也。

鹿茸 甘溫無毒。形如茄子。色如瑪瑙者良。紫潤圓短者爲上。毛瘦枯綢者爲下。酥炙酒炙各隨本方。但不可過焦。有傷氣血之性。炙後去頂骨用茸。 本經主漏下惡血。寒熱驚癇。益氣強志。生齒不老。發明。鹿是山獸屬陽。性淫而遊山。夏至得陰氣而解角。從陽退之象。麋是澤獸屬陰。性淫而遊澤。冬至得陽氣而解角。從陰退之象。鹿茸功用專主傷中勞絕。腰痛羸瘦。取其補火助陽。生精益髓。強筋健骨。固精攝便。下元虛人頭旋眼黑。皆宜用之。本經治漏下惡血。是陽虛不能統陰。卽寒熱驚癇。皆肝腎精血不足所致也。角乃督脈所發。督爲腎藏外垣。外垣既固。腎氣內充。命門相火。不致妄動。氣血精津。得以凝聚。扶陽固陰。非他草木可比。八味丸中加鹿茸五味子。名十補丸。爲峻補命門真元之專藥。傳尸癆瘵。脊中生蟲。習習痒痛。淅淅作聲者。同生犀鼈甲。入六味丸中。其殺蟲之力。與天靈蓋同功。近世鹿茸與麋茸。罕能辨别。大抵其質粗壯。而腦骨堅厚。其毛蒼鶯而雜白者。爲麋茸。其形差瘦。而腦骨差薄。其毛黃

澤而無白毛者爲鹿茸。鹿茸補督脈之真陽。麋茸補督脈陰中之陽。不可不識。

鹿角膠 甘微鹹溫無毒。河南者味甘溫爲上。泊上者味鹹辛爲下。又生取成對者力勝。解下單角力薄。凡角大而毛色淡白者。卽爲麋角。能補陽中之陰。熬膠法。取角寸截。用長流水浸三日刮淨。入黃蠟煮三日夜乾。卽添水三日夜足。去角取汁。重煎滴水不化。膠成切片。陰乾不可日曬。曬則融化成水矣。今市者多以黃明膠加楮實偽充。不可不察。取嫩角寸截。置小鐸中。酒水相和。盆蓋泥封。糠火煨三伏時。搗細如霜。名鹿角霜。本經主傷中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣力。婦人血閉無子。止痛安胎。久服輕身延年。發明 鹿角生用則散熱行血。消腫辟邪。熬膠則益陽補腎。強精活血。總不出通督脈。補命門之用。但膠力稍緩。不能如茸之力峻耳。互參一條經旨。乃知茸有交通陽維之功。膠有緣合衝任之用。然非助桂以通其陽。不能除寒熱驚癇。非龜鹿二膠並用。不能達任。而治羸瘦腰痛。非輔當歸地黃。不能引入衝脈。而治婦人血閉胎漏。至若膠治傷中絕勞。卽茸主漏下惡下也。膠之補中益氣力。卽茸之益氣強志也。膠之輕身延年。卽茸之生齒不老也。歷攷別錄外臺千金等方。散血解毒居多。非如近世耑一溫補爲務。殊失聖賢一脈相傳之義。○鹿角霜治火不生土。脾胃虛寒。食少便溏。胃反嘔逆之疾。取溫中而不粘滯也。古方多製應用。今人每以煎過膠者代充。其膠既去。服之何益。○生角銷尖屑。消乳癰腫毒。○煅灰行崩中積

11. ○鹿骨。安胎下氣。作酒主內虛。續絕傷。補骨除風。千金鹿骨丹用之。

鹿胎 甘溫無毒。其嘴尾蹄合與生鹿無異者爲真。其色淡形瘦者爲鹿胎。若色深形肥者爲麋胎。慎勿誤用。能損真陽。又獐胎與鹿胎相類。但色皎白。且其下唇不若鹿之長於上唇也。其他雜獸之胎與鹿胎總不相似也。入藥取真者。酥炙黃用。發明 鹿性補陽益精。男子真元不足者宜之。不特茸角莖脂入藥。而全鹿丸合大劑參耆桂附。大壯元陽。其胎純陽未散。宜爲補養天真。滋益少火之良劑。然須參耆河車輩佐之。尤爲得力。如平素虛寒。下元不足者。入六味丸中。爲溫補精血之要藥。而無桂附辛熱傷陰之患。但慎勿悞用麋胎。反傷天元陽氣也。

麋茸 甘溫無毒。修治與鹿茸同。發明 麋肉大寒。食之令人陽痿。而麋茸大益陽道。以其陽精都聚於角也。其角煎膠勝於鹿角。茸亦勝於鹿茸。然鹿之茸角補陽。右腎精氣不足者宜之。麋之茸角補陰。左腎血液不足者宜之。此乃千古微旨。治虛損有二至丸。兩角並用。但其藥性過溫。偏於補陽。非陰虛者所宜。其麋膠主治與鹿膠無異。而兼補陰血之功過於鹿膠。但驗其角大而毛者卽是。惜乎本經但言麋脂療癰腫惡瘡死肌。寒熱濕痹。四肢拘緩不收。風頭腫氣通腠理。從無及乎茸角之用。彭簽延齡方有麋角粉。千金變爲麋角丸。以麋性喜食菖蒲。故修鍊服食方用之。金匱云。麋脂及梅子。若妊娠食之。令子青盲。

男子傷精皆性冷傷厥陰肝經之驗也。

麋鹿肉。麋肉甘寒。鹿肉甘溫無毒。發明。凡獸之有角者。皆能助肝腎之力。而麋鹿之角多岐故力能拒虎。爲角獸之冠。則鹿肉之補陽。麋肉之益陰。所不待言。鹿之一身所稟皆陽。最能益人。人以陽氣爲主也。麋之一身所稟皆陰。惟角爲陰中之陽。較之鹿角純陽無陰。倍勝而週身血肉筋骨。皆不足取。鹿肉之生者。主中風口僻不正。剗碎蘸貼。上正急去之。不爾復牽向不僻處矣。○鹿血起陰器。止腰痛。療折傷和酒服。治肺痿崩中諸氣刺痛。飲之立愈。鹿筋。大壯筋骨。食之令人不畏寒冷。但須辨骨細者爲鹿。粗者卽是麇筋。慎食多致陰痿。○凡服丹石藥人勿食鹿肉。以其食百草之毒。善解諸藥之性也。

麋有寒無毒。發明。麋之性怯畏人。以其膽白易驚也。其肉雖肥。但能悅澤人面。不能助人膂力。以其善躍而無久常之力也。膳能治人粗豪之氣。若人素常膽怯者。爲之切禁。其骨主虛羸泄精。麋稟偏陰而骨主精氣也。綱目言其甘溫。安有膽白易驚而性甘溫之理。

麝臍。辛溫無毒。不可犯火。妊娠禁用力能墮胎。今人以荔枝核燒灰。入燒酒拌和混充。不可不察。本經辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲蠭毒。溫爐驚癇。發明。麝香辛溫芳烈。爲通關利竅之專藥。凡邪氣著人。淹伏不起。則關竅閉塞。辛香走竅。自內達外。則毫毛骨節俱開。從此而出。故本經有辟惡氣。殺鬼精物去

三蟲蠱毒諸治也。其主溫瘡驚癇者。借其氣以達病所也。嚴氏言。風病必先用麝香。丹溪謂。風病必不可用。皆非通論。蓋麝香走竅入筋。能通筋竅之不利。開經絡之壅遏。若諸風諸氣諸血諸病。驚癇瘡癰諸病。經絡壅閉。孔竅不利者。安得不用。爲引導以開之通之。惟中風表證未除。而悞用之。引邪入犯。如油入麪。莫之能出。致成痼疾。爲之切戒。而救苦丹治壅腫結塊方。用硫黃辰砂。入麝烊化。隔紙壓成薄片。以少許灸患處。無不立應。濟生方治食瓜菓成積作脹。及飲酒成消渴者。皆用之。蓋果得麝則壞。酒得麝則敗。此得用麝之理也。

貓 甘酸溫無毒。發明。貓捕生鼠。虎噉生人。大小雖異。稟性不殊。虎嘯風生。而治風瘡腫痛。貓聲鼠竇。而主鼠瘡寒熱。故肘後方取貓肉作羹。消鼠瘡結核。已潰未潰皆愈。但助濕發毒。有濕毒人忌之。其頭骨及腦眼酥炙。亦治瘰癧鼠瘡。其毛煅存性。傳療瘻潰爛。貓尿治蟬聾入耳。滴入耳出。以薑擦貓鼻。或生葱刺鼻取之。尿治瘡瘍倒陷。臘月取乾者。燒存性用之。貓胞治噎膈反胃。以純陽之性未散。故取以開陰邪之結也。方用一具酥炙爲末。入腦麝牛黃鬱金各少許。津唾化服之。予嘗以格致之理論物類。貓之體陽而用陰。性稟陰賊。機竊地支。故其日夜視精明。而隨時收放。善跳躍而嗜腥。生不熟食。而能消化血肉生物。一皆風火用事。得雪水則蠢動。以雪之體陰而用陽。物類相感之應若此。而食江中鱠魚之骨。其胎

必隕。按異物志云。鱗是鱠鳥所化。故腹內尚有鳥脣二枚。與雀入淮水爲蛤無異。其肉中細骨如毛。粘腸不脫而致傷胎。物類感觸之應。則又如此。

狸 甘溫無毒。發明。狸之與貓同類異種。以性溫散。故其骨炙灰。善開陰邪鬱結之氣。鼠瘻寒熱爲之專藥。千金以肉治遊風。蘇頌作臞治鼠瘻。元化取頭骨。千金用陰莖。總取攻毒破結之義。時珍曰。狸骨。貓骨性皆相近。可通用之。

狼 肉鹹熱無毒。發明。狼脂摩風首推。而本草不錄。亦一欠事。狼肉補五藏厚腸胃。填骨髓。有冷積人宜食。○狼性追風逆行。故其矢燒烟能逆風而上。燒灰水服治骨鯁。以其性專逆行而無阻滯也。

兔 辛平無毒。妊娠忌食兔肉。合乾薑食之成霍亂。發明。兔無脾。故善走。二月建卯木位。木克戊土。故無脾。其肉性寒。能治胃熱嘔逆。腸紅下血。其腦爲髓之精。性善滑胎。故兔腦丸爲催生首藥。然須臘月取活兔用之始驗。○兔肝明目。目屬肝。稟氣獨勝。且得至陰之精。可救目暗之疾。其尿謂明月沙。又名望月沙。治目中浮翳痘瘡患眼。但瞳人無損者。用以煅灰存性。日日服之。其翳自退。又方兔屎一味爲末。生雞肝搗爛爲丸。空腹穀精湯服之。醫厚加雞內金尤捷。兼治勞瘵五疳痔瘻。殺蟲解毒。黃帝曰。兔肉和癩

肝食之成遺戶。

狐陰莖 甘平有小毒。發明 狐屬陰類。故其莖主女子絕產。陰中癰。小兒陰癩。卵腫。以狐陰善縮入腹也。

水獺肝 甘鹹平小毒。發明 獺者水獸。水性靈明。故其性亦多智詭。性專嗜魚。魚之生氣都聚於肝。是以獺肝專主傳尸癆。療殺蟲之性與獺之捕魚不殊。蘇頌曰。諸畜之肝皆有定數。惟獺一月一葉。十二葉間有退葉。斗柄建寅之月。值其氣退之時。反爲諸魚所蝕。月令所謂獺祭魚是也。以其治療有驗。故仲景治冷勞。有獺肝丸。崔氏治蠭症。亦有獺肝丸。孟詵云。症病一門悉患者。以獺肝一具火炙。水服方寸匕。日再服之。葛洪言。尸疰乃五症之一。病則使人寒熱。沉沉默默。不知病之所苦。無處不惡。積月累年。淹滯至死。死後復傳他人。乃至滅門。覺有此候。惟以獺肝一具。陰乾爲末。水服方寸匕。日三。以瘥爲度。如無獺肝。獺爪亦可應用。小兒鬼疰。及諸魚骨癩。皆燒灰酒服。獺肝之用。當不出乎此也。

山獺莖 甘熱無毒。發明 山獺稟南奧純陽之氣。故其性最溼。專主陽虛陰痿精寒。山中有此。凡牝獸皆避去。獺無偶。則抱木而枯。凡女春時入山。獺聞婦人氣。躍來抱合。牢不可脫。因扼殺而取之也。

膾肺臍一名海狗腎 鹹大熱無毒。以漢椒樟腦同收則不壞。發明 和劑局方。治諸虛損。有膾肺臍丸。滋陰丸。藥中用之。精不足者。補之以味也。今人多於房術方中用之。亦可同糯米法麴釀酒服。但功專補陽。

陰虛切忌。此物牝者最多。而牡者絕少。海州人捕得牡者。以家狗外腎用筋縫上。熨貼如生成無二。然牝戶與穀道連合爲一。雖用生筋縫熨。其孔較牡者大而且長。以此辨之。最爲有據。

牡鼠 甘溫無毒。取膽法用活鼠繫定。熱湯浸死。破喉取膽。真紅色者是也。誤食鼠噉之餘。令人發瘡瘍。以貪慾之火。蘊積餓涎也。發明。癸水位在於子。通氣於腎。其目夜明。其精在膽。故膽能治耳聾目盲。睛能明目。骨能生齒。皆益腎之驗。肘後方治三十年老聾。卒聾不過三度卽愈。令人側臥。瀝膽汁入耳。膽一枚。須臾汁從下耳出。初時益聾。十日後乃瘳也。生鼠血。蘸青鹽擦牙宣有効。初生小鼠。香油浸腐化。取塗火燙效。少水能制壯火也。若生毛則不能消融矣。牡鼠糞。俗名兩頭尖。驗其直者。方是牡鼠之矢。入足厥陰少陰。故煮服治傷寒勞復。陰陽易腹痛。研末服治乳癰。燒灰存性。傅折傷疔腫。所主皆厥陰血分之病。又犬咬先洗去牙垢惡血。用鼠糞炒研。黑糖調塗卽愈。

猾皮 苦平無毒。細剉炒黑。或酥炙用。本經主五痔陰蝕。下血不止。陰腫痛引腰背。酒煮殺之。發明猾者。胃之獸也。故肉治反胃。胃脘痛最捷。其皮除目中翳障。本經主五痔陰蝕。取其銳利破血也。酒煮治陰腫痛引腰背。取筋脈能收縱也。南方金蠶蠱。用猾皮爲末。酒服探吐之。猾腦猾肝。治療瘻漏。千金方用之。但不可食其骨。令人瘦劣。

人部

髮 苦微溫無毒。揀去白者。先用滾水洗淨。入燶成罐。外用鹽泥固濟。候內外罐通紅。冷定研末。置地去火毒用。本經主五癰。關格不通。利小便水道。療小兒驚。大人瘧。仍自還神化。發明 髮者血之餘。故能治血病。雖曰補真陰。療驚癇。理欬嗽。固崩帶。止血暈。而實消瘀生新。能去心竅惡血。並燶過服。若燶之不透。反能動血。合雞子黃香油煎之。消化爲水。則治小兒胎驚及塗癩瘡有效。用入膏藥中。則長肉消瘀。本經治五癰。關格不通。利小便水道。皆取其利竅散瘀之功。其療小兒驚。大人瘧。以能達肝心二經。開通瘀血之滯也。仍自還神化者。言服自己之髮。則勝用他人之髮也。但胃虛人勿用。以其能作嘔瀉也。亂髮功用與此不殊。而剃下者尤勝。取長之速也。小兒胎髮灰。大解胎毒。而補先天血氣。以純陽未離也。頭垢 鹹苦溫小毒。發明 頭垢乃相火之餘氣結成。專開鬱結之氣。乳癰初起。燶灰酒服。卽消。以其善祛胃中積垢也。

人乳汁 甘鹹平無毒。發明 乳汁治目之功甚捷。目得血而能視。乳卽血之源也。用以點眼。豈不相宜。老人服食尤良。但脾虛易瀉者勿食。日中曝乾。入參苓丸服。尤爲合宜。

爪甲 甘鹹小毒。發明 爪乃肝氣之餘。其性銳利。故能催生下胞衣。利小便。治尿血。及陰陽易病。破

傷風去目翳。刮末治鼻衄。嚼之立止。又能治乳蛾。用爪指甲不拘多少。研爲末。蓬砂白礬各一錢。西牛黃一分。烏梅白梅肉各五枚。共搗如泥。含彈大一丸。痰大湧出三四丸即愈。但其方酸收太速。不無萌發之患。莫若探吐頑痰。迅掃病根爲愈。

人牙 甘鹹熱有毒。發明 牙乃腎之標骨之餘。痘瘡倒黴。用人牙散。因痘瘡爲風寒穢氣所觸而變黑倒黴。用此煅灰。以酒麝達之。竄入腎經。發出毒氣。乃劫劑也。若伏熱在心。晝冒不省人事。及氣虛色白。癰瘍不能作膿。熱痛紫泡之證。正宜涼血解毒。苟誤用之。則鬱悶聲嘶。反成不救。臨證審諸。

人中黃 甘鹹寒無毒。造法用大竹截段兩頭留節。削去外皮。傍鑽一孔。用甘草細末。入滿於中。以蕉扇柄削圓塞孔。冬至浸大糞池內。立春後取出。懸風處晒乾。取用。又法如前製竹。不入甘草。但用蕉扇柄或杉木塞孔。浸糞池中。以取其汁。與金汁無異。僅供一時取用。不能久藏。糞清亦解瘧熱諸毒。又誤食毒菌楓樹上菌。及過食銀杏。脹閉欲死者。悉能解之。并解砒石野葛野芋等毒。卽家芋三年不收。花開如蓮者。亦能殺人。急取灌吐。方可得生。 發明 人中黃取糞土之精。以解天行狂熱。溫毒發斑最捷。然汁則性速。而能下泄。甘草製者。則性緩而能解毒。兼治河豚菌毒。一切惡瘡災病。用人中黃酒大黃末等分。無咸酒服。須臾瀉利。毒卽隨出。雖大渴不可飲水。飲水則毒邪不散。而難救也。急切不可得以糞坑垢代之。

金汁 苦寒無毒。臘月取糞置鐔中埋土內越三年取出如水者是。發明 金汁得土氣最久大解熱毒。故溫熱時行昏熱勢劇者用以灌之下咽其勢立減。初生小兒週時內毒邪不散服二二合勝化毒丹。胎毒盡解無痘疹患此屢驗者。但胎稟虛寒體瘦色白者不可誤用誤用反奪天眞多致夭枉不可不審。國叟用以灌諸草木卽花葉茂盛且無過壅傷花之患。

乾糞灰 鹹平無毒。發明 人屎取乾者煅灰治小兒痘瘡黑陷解時行大熱狂走蜜調塗疔腫拔毒出根總取解毒之迅耳。

溺 鹹寒無毒。童子者佳不可見火見火則腥臊難服。發明 人溺療寒熱頭疼取其鹹寒降泄也有客邪。沖熱葱頭湯服之汗出卽止而童子小便性純一切熱勞吐血陰虛火動骨蒸勞瘵用以降火最速。產後血暈溫飲一杯壓下敗血惡血卽除蓋溲溺滋陰降火消瘀血止吐衄諸血每用盞許入薑汁一二匙徐徐服之久自有效然須乘熱服之以接生陽之氣冷則生氣散矣時珍云童便入胃隨脾氣上歸於肺通調水道下輸膀胱乃其舊路也故能清肺導火下行若多服久服亦能損胃滑腸故食少便溏者禁用。傷寒少陰證下利不止厥逆無脈乾嘔欲飲水者加人屎猪膽汁鹹苦寒物於白通湯薑附藥中其氣相變可無恐拒之患。但胃虛欲作嘔者勿與恐助嘔勢反致不測也。

漏白壘卽人中白。鹹平無毒。煅過用。發明人中白能漏肝火膀胱火。從小便中出。蓋膀胱乃其故道也。今人病口舌諸瘡。用之有効。降火之驗也。但積垢之滓。僅堪滌熱。略無益陰之功耳。

秋石鹹溫無毒。陰煉淡秋石法。將大缸一隻。近底三寸許。文火燒三十餘炷。打成一孔杉木塞之。秋月取童子溺入缸內。衝河水攪澄定。去木塞放去上水。每日增童便河水。如前攪之。只留缸底者。積至月餘。用絹篩。襯紙濾乾收之。○又陰收秋石法。將鉛球大小數十枚。俱兩片合成。多鑽孔眼。入尿桶中浸。每日傾去宿尿。換溺浸之。經秋收取。置鉛罐藏之。此爲最勝。○陽煉秋石。將草鞋數百隻。舊者尤佳。長流水漂晒七日。去黃色。浸尿桶中。日晒夜浸。一月許。曝乾。烈日中燒灰。須頻挑撥令燒盡。滾湯淋汁澄數日。鍋內燒。重加雨水煮溶。篾篩紙數重。濾淨再澄。半月餘。銀缶器內煮乾。色白如霜。鉛罐收之。○又陽煉法。以童子小便入鍋熬乾。其鍋先燒通紅。香油熬過洗淨。則不粘滯傷鍋。初如油脚。入煬成鱠。或小鐵釜中。煅通紅。用熱水熔化。置有嘴壺中。將草掩塞壺口。徐徐傾出。下以竹篩。襯紙濾清。再以文火收乾。鉛罐收之。則不溶化。○又煉秋冰法。以秋石入秋露水煮化入煬成鱠內。新鐵盞蓋定。鹽泥固濟。昇打三炷香。取出再研。如前昇打。盞內用水徐徐塗之。水不可多。多則不結。又不可少。少則不昇。從辰至未。退火冷定。盞上昇起者爲秋冰。乃秋石之精英。真虛羸之神丹也。○凡人力制造之藥。每多僞充。而秋石之真者。尤不易。

得有以食鹽瀘水煮成者。有以朴硝溶化製造者。有以鐵硝烊化傾成錠式者。其偽不一。苟非雇庸督製。總難輕用也。試真偽法。入滾豆腐漿中。不結腐花者爲真。若結者。卽鹽之偽充也。入口令人作渴。入滾豆腐漿中。起水紋而微苦者。卽玄明粉之偽充也。入腹令人作瀉。其傾成錠式。入熱水不易化者。卽鐵硝之偽充也。下咽令人發熱。又以秋石化水。入青菜葉。有頃色不變者爲真。又以少許入眼。不澁痛者。必真無疑。其淡秋石入滾水不化者。卽熟石膏末。及滑石末混充也。發明。秋石以秋命名。專取秋氣下降之意。他時製者。功力則殊。製法以童溺煅煉。去其鹹寒。轉成溫補。能滋陰降火。而不傷胃。補益下元。真火散瘀血。助陰精。降邪火。歸真陽。止虛熱。嗽血。骨蒸勞瘵之仙品也。火盛者宜生。宜淡。陰虛者宜熟。宜鹹。凡勞瘵陰火亢極。而不受參耆補益者。立秋石丸三方。次第施治。或服或噙。則喘欬氣息漸平。痰亦易出。嗽亦省力。以其性味鹹降。而無上逆之患也。先用蓮汁炒黑大黃淨末。與秋石等分。煮紅棗肉爲丸。空心服三錢。清熱散血。次用貝母秋石末各等分。生甘草末減半。仍用紅棗肉爲丸。服之。以止嗽消痰。後用人參秋石等分。炙甘草末減半。亦棗肉丸。以補氣安神。製劑之多少。隨瘀熱元氣而施。不可限以分兩。其陰煉淡者。性最下滲。苟非陰分熱極。難以輕投。陰虛多火。小便頻數。精氣不固者誤服。令人小便不禁。甚則令人夢泄。其鹹者可代鹽蘸物食之。喘欬煩渴不得寐者。以半錢匙衝開水服之。卽得安寐。覺時滿口生津。亦

不作渴。補陰之功可知。陰煉淡秋石。治夏暑熱淋。小便不通。及濁淋沙石淋。老人絕慾太早。小便淋瀝澀痛。一服卽效。

紅鉛。鹹大溫無毒。卽室女初通經水中之結塊。如櫻桃者是也。發明。紅鉛流穢之餘。其性大熱。峻補命門溼火。陳酒服一枚。少頃蒙昧如醉。若連服二枚。則邪火內拒。令人暴亡。壯火食氣之驗也。

天靈蓋。鹹溫小毒。制法以香水潔淨。酥炙杵細入藥。或煎酒。或煅末。隨證取用。忌鐵器。發明。腦爲髓海。諸陽之會。能辟一切陰邪不正之氣。故曰天靈。凡人身中氣血安和。諸邪不能侵犯。陰陽乖戾。則屍疰之氣。得以乘虛襲入。是卽療蟲之根氣也。若其人平昔陽衰。則蟲攻脊脈。脊中溼淫作癰。隱隱作痛。轉側不能自安。或時凜凜畏寒。或時翕翕發熱。手足四末常清。脈來弦細乏力。非天靈蓋散不能療之。若其人素累陰虛。則蟲蝕藏府。胸中嘈雜如饑。默默不知所苦。無處不苦。動則時欬時嘔。靜則善寐。善忘。面上忽時喫熱。脈多弦勁搏指。此屬癲肝丸證。非天靈之所宜。其天靈散方。用炙淨三指大一片。赤檳榔三粒。白甘遂。麝香。真安息各三分。阿魏二分。辰砂一分。矯羅爲散。桃枝煎湯。五更調進一服。約人行十里。頃蟲不下。再進一服。天明進第三服。取下蟲物。急擒入油鑄熬之。其蟲嘴黃赤者。可卜病人血氣未艾。治之可愈。青黑向者。血氣已竭。治之難已。然亦得斷傳染之患。凡修合勿令病人知。擇僻淨處。忌雞犬婦人孝服。

蟲。蟲下後。忌肥鮮及鹽半月。白粥調養漸安。如病久不勝。甘遂阿魏等攻逐。只以大靈蓋香水滌淨。仰置銀缶器內。盛以醇酒。隔水煮一官香。酒耗旋添。候一炷香足。取酒服之。少頃頭旋顫。瘡蟲隨嘔吐出。卽以燼火燎之。將養三日後。取前蓋骨製服如前。蟲盡。卽以蓋骨仍埋舊處。其炙淨細末。并治小兒痘瘡灰白。陷伏不長。煩躁不寧。酒服四五分。卽起。然皆不得已而用之。至於傳下部瘡。入枯痔散。乃以人之至高之骨。置之汚下不潔之處。雖極其神驗。殊非仁人君子之用心。舍此豈無他藥可治乎。

人胞

卽紫河車

甘鹹溫無毒。取厚小色鮮者。挑去血絡。漂淨血水。入椒一握。沸湯泡去腥水。以蜂蜜和長流水於舊錫器內。隔水文火煮爛如糜。綿絞去滓。代蜜糊丸藥良。發明。紫河車稟受精血結孕之餘液。得母之氣血居多。故能峻補營血。用以治骨蒸羸瘦。喘嗽虛勞之疾。是補之以味也。自丹溪極言其功。而吳球創大造丸。雖世所推重。然方中生地黃柏。天冬麥冬龜版。一派滋膩傷胃之品。雖有人參一味。反助羣陰之勢。服之每致傷中嘔泄。未見其可。惟永類鈴方。河車丸方。用人胞一具。山藥二兩。人參一兩。茯苓五錢。酒糊爲丸。近世改用鮮者。隔水煮搗作丸。尤爲得力。卽虛人服之。未嘗傷犯胃氣。

胞衣水。鹹潤微涼。無毒。臘月取紫河車。置有蓋瓦罐內。深埋土中。臨用取出。不可留久。久卽乾矣。或與生甘草末同入罐中。埋於土中。三五年後掘出。卽爲藥也。發明。胞衣之性本熱。而得土氣之化。善能

攝火歸元。小兒丹毒諸熱毒發。寒熱不歇。狂言妄語。頭上無毫髮豎。虛痞等證。天行熱疾。咽痛及虛勞咽痛。飲之立効。反胃久病。飲一鍾。當有蟲出。

初生臍帶。發明。臍帶者。人之命帶也。用以煅末入硃砂少許。蜜水調服。以解本嬰之胎毒。與內傷之用骨灰無異。

胎元。鹹大溫小毒。發明。胎元雖墮下胎息。溼火未離。天真未剖。較河車之性倍甚。古方鮮用。惟金剛丸用之。雖以人補人。然獸相食。且人惡之。況人食人。能無惻怛之念乎。