

善
510.87
12-1
9

9



63280

重刊孫真人備急千金要方卷之七

論風毒狀第一 十六章



論曰考諸經方往往有脚弱之論而古人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有遭者顧表江東有支法存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此一二公又宋齊之間有釋門深師師道人述法存等諸家舊方為三十卷其脚弱一方近百餘首魏周之代蓋無此病所以姚公集驗殊不殷懃徐王撰錄未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以關西河北不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不習水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居然而患之者良由今代天下風氣混同物

類齊等所致之耳然此病發初得先從脚起因即脛腫時
人號爲脚氣深師云脚弱者即其義也深師述支法存所
用永平山敷施連范祖耀黃素等諸脚弱方凡八十餘條
皆是精要然學者尋覽頗覺繁重正是方集耳卒欲救急
莫測指南今取其所經用灼然有效者以備倉卒餘者不
復具述

論何以得之於脚

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也答曰夫人
有五藏心肺二藏經絡所起在手十指肝腎與脾三藏經
絡所起在足十趾夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕
皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人也必先中脚久而
不瘥遍及四肢腹背頭項也微時不覺痼滯乃知經云次

傳問傳是也

論得已便令人覺不

凡脚氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因
他病一度乃始發動或奄然大悶經二兩日不起方乃覺
之諸小庸醫皆不識此疾漫作餘病治之莫不盡斃故此
病多不令人識也始起甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起
脚屈弱不能動有此爲異耳黃帝云緩風濕痺是也

論風毒相貌

夫有脚未覺異而頭項臂膊已有所苦有諸處皆悉未知
而心腹五內已有所困又風毒之中人或見食嘔吐憎
聞食息或有腹痛下痢或大小便秘澀不通或胃中衝悸
不欲見光明或精神憎憤或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭

痛或身體酷冷疼煩或覺搏筋或腫不腫或脛腿頑痺或
時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌
也亦云風毒脚氣之候也其候難知當須細意察之不爾
必失其機要一朝病成難可以理婦人亦爾又有婦人產
後春夏取涼多中此毒深宜慎之其熱悶掣癢驚悸心煩
嘔吐氣上皆其候也又但覺臍下冷痞幅幅然不快兼小
便淋瀝不同生平即是脚氣之候頑弱名緩風疼痛爲濕
痺

論得之所由

凡四時之中皆不得久立久坐濕冷之地亦不得因酒醉
汗出脫衣靴鞮當風取涼皆成脚氣若暑月久坐久立濕
地者則熱濕之氣蒸入經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若

寒月久坐久立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則
四體酷冷轉筋若當風取涼得之者病發則皮肉頑痺諸
處顫動漸漸向頭凡常之日忽然暴熱入皆不能忍得者
當於此時必不得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得
受之皆生病也世有勤功力学之士一心注意於事久坐
行立於濕地不時動轉冷風來擊入於經絡不覺成病故
風毒中人或先中手足十指因汗毛孔開腠理疏通風如
急箭射或先中足心或先中足趺或先中膝已下脰脰表裏
者若欲使人不成病者初覺即灸所覺處三三二十壯因此
即愈不復發也黃帝云當風取涼醉已入房能成此疾
論冷熱不同

問曰何故得者有冷有熱答曰是有三陰三陽寒中三陽

所患必冷暑中一陰所患必熱故有表裏冷熱冷熱不同
熱者治以冷藥冷者療以熱藥以意消息之脾受陽毒即
熱頑腎受陰濕即寒痺

論因脚氣續生諸病

雖患脚氣不妨乳石動發此日須服麝石藥療之夫因患脚
氣續生諸病者則以諸藥對之或小便不利則以猪苓茯苓
苓及諸利小便藥治之大便極堅者則以五柔麻人丸等
治之遍體腫滿成水病者則取治水中諸治水之藥治
之餘皆倣此更無拘忌

五柔麻人丸見第十五卷

論須療緩急

凡小覺病候有異即須大怖畏決意急治之傷緩氣上入
腹或腫或不腫脊脅逆滿氣上者息急者死不旋踵寬者

數日必死不可不急也但看心下急氣喘不停或自汗數
出或不寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者皆死
論虛實可服藥不可服藥

凡脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂
故脚氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得畏虛故預
止湯下服也如此者皆死不治也

論看病問疾人

世間大有病人親朋故舊交遊來問疾其人曾不經一事
未讀一方自騁了了談作明能談說異端或言是虛或道
是實或云是風或云是蟲或道是水或云是痰紛紛謬說
種種不同破壞病人心意不知孰是遷延未定時不待人
歛然致禍各自散走是故大須好人及好名醫識病深淺

探蹟方書博覽古今是事明解者看病不爾大誤人事竊
悲其如此世衆故一一顯折具述病之由狀令來世病者
讀之以自防備也但有一狀相應則須依方急治勿取
人言議自貽憂悔但詳方意人死不難莫信他言以自悞
也余嘗爲人撰門冬煎此方治脚氣大有驗病者須用之
方見第十一卷

論脈候法

凡脚氣雖復診候多塗而三部之脈要須不違四時者爲
吉其逆四時者勿治餘如脈經所說此中不復具載其人
本黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白
不耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難愈也
論腫不腫

凡人久患脚氣不自知別於後因有他病發動治之得瘥
後直患嘔吐而後脚弱余為診之乃告為脚氣病者曰某
平生不患脚腫何因名為脚氣不肯服湯餘醫以為石發
狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得一向以腫為候亦
有腫者有不腫者其以小腹頑痺木仁者脚多不腫小腹
頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死
在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水剋心火故也

論須慎不慎

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜葷菜松菜蔓菁
瓠子酒麪酥油乳麩猪雞鴨有方用鯉魚頭此等並切
禁不得犯之并忌大怒惟得食粳梁粟米醬豉葱韭蒜椒
薑橘皮又不得食諸生果子酸酢之食犯者皆不可瘥又

大宜且生牛乳生栗子

論差能治其幾日可瘥

凡脚氣病在死者衆略而言之有二種一覺之傷晚二驕
狠恣傲三狐疑不決此三種正當在死之色故世間誠無
良醫雖有良醫而病人有性靈堪受入者更復甚少故雖
有藥驥而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其爲枉橫亦
猶此也今有病者有受入性依法使余治之不過十日可
得永瘥矣若無受入性者亦不須爲治縱令治之恐無瘥
日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人
必服法爲信者施不爲疑者說

論灸法

凡脚氣初得脚弱使速灸之并服竹瀝湯灸訖可服八日

散無不瘥者惟急速治之若人但灸而不能服散服散而
不灸如此者半瘥半死雖得瘥者或至一二年復更發動
覺得便依此法速灸之及服散者治十十愈此病輕者登
時雖不即惡治之不當根源不除又又期於殺人不可不
精以爲意

初灸風市

次灸伏兔

次灸犢鼻

次灸膝兩眼

次灸三里

次灸上廉

次灸下廉

次灸絕骨

凡灸八處第一風市穴可令病人起正身平立垂兩臂直
下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上是灸
之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六
百壯勿令斷灸二三報之佳第二伏兔穴令病人累夫端坐
以病人手夫掩橫膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際

當中央是灸百壯亦可五十壯第二犢鼻穴在膝頭蓋骨
上際外骨與平處以手按之得節解則是一云在膝頭下
近外三骨箕踵中動脚以手按之得窟解是灸之五十壯
可至一百壯第四膝眼穴在膝頭骨下兩傍陷者宛宛中是
第五三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是一云在膝
頭骨節下三寸人長短大小當以病人手夫度取灸之百
壯第六上廉穴在三里下一夫亦附脛骨外是灸之百壯
第七下廉穴在上廉下一夫一云附脛骨外是灸之百壯
第八絕骨穴在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸穴灸
不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中灸令盡壯
數為佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病
皆多兩脚又一方云如覺脚惡便灸三里及絕骨各一處

兩脚惡者合四處灸之多少隨病輕重大要雖輕不可減
百壯不瘥速以次灸之多多益佳一說灸絕骨最要人
患此脚弱不即治及入腹腹腫大上氣於是乃須大法灸
隨諸輸及諸管關節腹背盡灸之并服八風散往往得瘥
者諸管輸節解法並在第二十九卷中覺病入腹若病人
不堪痛不能盡作大灸但灸胃心腹諸穴及兩脚諸穴亦
有得好瘥者凡量一夫之法覆手併舒四指對度四指上
中節上橫過爲一夫夫有兩種有二指爲一夫者此脚弱
灸以四指爲一夫也亦依支法存舊法梁丘犢鼻三里上
廉下廉解谿太衝陽陵泉絕骨崑崙命陰陵泉三陰交足太
陰伏溜然谷涌泉承山束骨等凡一十八穴舊法多多灸百
會風府五藏六腑輸募項來灸者悉覺引氣向上所以不

取其法氣不止者可用之其要病已成恐不救者悉須灸之其足十趾去指竒一分兩足凡八穴曹氏名曰八衝極下氣有效其足十趾端名曰氣端日灸三壯並大神要其八衝可日灸七壯氣下即止病者非深相委悉慎勿爲人灸之慎之慎之凡灸八衝須小作艾炷

論服湯藥色目

風毒之氣入人體中脉有二品內外證候相似但脉有異耳若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑應瘥若風盛宜作越婢湯加白朮四兩若脉浮大緊轉駛宜作竹瀝湯若病人脉微而弱宜服風引湯此人脉多是因虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駛此是二品之中最惡脉也

或沈細而駛者此脈正與浮大而緊者同是惡脈浮大者
病在外沈細者病在內治亦不異當消息以意耳其形尚
可而手腳未容至弱數日之中氣上即便命終如此之脈
往往有人得之無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要湯
勢常令相及勿令半日之中空無湯也此湯竹汁多服之
若不極熱輒停在心更爲人患每服當使極熱若服竹
瀝湯得下者必佳也若已服三劑竹瀝湯病及脈勢未折
而苦脹滿可以大鼈甲湯下之湯勢盡而不得下可以圓
藥助湯令下下後更服竹瀝湯趣令脈勢折氣息料理便
停服三十二物八風散佳凡初得病便摩野葛膏日再頓
痺脚弱都令心乃止若服竹瀝湯脈勢折如未病時氣力轉
勝脚故未能行體力充足然後漸微行步病重者瘥後半

年始能扶人行耳既覺脈及體內瘥但當勤服八風散勿以脚未能行輕加餘治餘治未必全得益更生諸惡失此諸治也猥人邊亦勿行野葛膏有人聞竹瀝湯云恐傷腰脚者即勿與治宜知此法此皆人無受入性不可與醫故也不爲疑者說此之謂也竹瀝湯有二首輕者服前方重者以次第服後方此風毒乃相注易病人宜將空缺服小金牙散以少許塗鼻孔耳門病人及新亡人喜易人強健人宜將服之亦以塗耳鼻乃可臨近亡人及視疾者緣囊帶一方寸匕男左女右臂上此散毒服宜從少爲始金牙散方見第十二卷病人惟宜飲赤小豆飲冬服側子金牙酒續命湯治風毒病初得似時行毒病而脈浮緩終不變歎此不治或數日而死或十日而死或得便不識人或

發黃或發斑或目赤或下部穿爛者此最急得之即先服
續命湯一劑須服葛根湯麻黃湯下之若故不折更與續
命湯兩三劑必瘥此病大急常令湯勢相接不可使半日
關湯即便殺人續命湯方見第八卷

湯液第二 方三十八首 果表時方附

第一 **續命湯** 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫

按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝伍升 甘草 秦艽 葛根 黃芩

麻黃 防己 細辛 桂心 乾薑各壹兩

防風 升麻各壹兩 茯苓各壹兩 附子貳枚 杏仁伍拾枝

右十五味咬咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服取

汗千金醫方無茯苓杏仁有白木壹兩

第一 **大竹瀝湯** 治卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺攣
急風經五臟恍惚志怒心無常手足不隨方

竹瀝壹斗 獨活 芍藥 防風 茵芋

甘草 白朮 葛根 細辛 黃芩

芎藭各貳兩 桂心 防己 人參 石膏

麻黃兩 生薑 茯苓各三兩 烏頭壹枚

右十九味咬咀以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取

汗一狀相當即服

第二 **竹瀝湯** 治風毒入人五內短氣心下煩執手足煩疼

四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方

竹瀝壹斗 防風 茯苓 秦艽各三兩 當歸

黃芩 千金翼作芍藥 人參 芎藭千金翼 防己

細辛

桂心

甘草

升麻

千金翼作通草

麻黃

白木

各貳兩

附子

貳枚

蜀椒

壹兩

為根伍兩

生薑

捌兩

右十八味以竹瀝煮取四升分五服初得病即須

摩膏日再痺定止

千金翼無麻黃蜀椒生薑

麻黃湯

治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不能

言毒氣衝心有人病者但一病相當即服此第一服次服

第一第二第四方

麻黃

壹兩

大棗

貳拾枚

茯苓

叁兩

杏仁

貳拾枚

防風

白木

當歸

升麻

芍藥

芍藥

黃芩

桂心

麥門冬

甘草

各貳兩

右十四味以水九升清酒二升合煮取二升半分

四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服 **獨活湯** 方

獨活 肆兩 乾地黄 兩 生薑 伍兩 葛根 桂心

甘草 芍藥 麻黃 各貳兩

右八味以水八升清酒二升合煎取一升半分四

服日三夜一脚弱持忌食瓠子藪菜犯之一世治不愈

第三服 **兼補厚朴湯** 并治諸氣欬嗽逆氣嘔吐方

厚朴 芍藥 桂心 乾地黄

當歸 人參 各貳兩 黃耆

甘草 文口參三兩 吳茱萸 貳升 半夏 柒兩 生薑 壹斤

右十二味以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升

去上肥肉清酒三升合煮取三升分四服相去如人行

二十里久

第四服**風引獨活湯**兼補方

獨活肆兩 茯苓 甘草各三兩 升麻壹兩 人參

桂心 防風 芍藥 當歸 黃耆

乾薑 附子各貳兩 大豆貳升

右十三味咬咀以水九升清酒三升合煮取三升半分
四服相去如人行二十里久更進服

防風散治脚痺并治毒氣上衝心肯嘔逆宿癖積氣疝氣

一病相當即服之方

防風 麻黃 芎藭 人參 芍藥

當歸 茯苓 半夏 甘草 橘皮各壹兩

鼈甲 生薑 桂心各貳兩 杏仁壹兩 赤小豆壹升

貝子

烏梅各伍枚

大棗貳拾枚

吳茱萸伍合犀角

羚羊角各半兩

薤白拾肆枚

右二十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服一日令盡一方用水一斗二升間食糜一方半夏二兩隨時用

獨活湯治脚痺方

獨活肆兩

當歸

防風

茯苓

芍藥

黃耆

葛根

人參

甘草各貳兩

大豆貳升

附子壹枚

乾薑叁兩

右十二味咬咀以水一斗清酒二升合煮取三升分三

服

越婢湯治風痺脚弱方

麻黃陸兩

石膏半升

白朮肆兩

大附子壹枚

生薑 參兩

甘草 貳兩

大棗 拾伍枚

右七味咬咀以水七升先煮麻黃再沸去沫入諸藥

煮取三升分三服覆取汗胡洽方只五味若惡心風者加附子壹枚多燉水者加白朮

肆兩

治脚弱神驗方

防己

蜀椒

細辛

桂心

麻黃

石膏

獨活

防風

黃芩

茵芋

葛根

芎藭

芍藥

甘草

生薑

茯苓各參兩

烏頭貳枚

方十七味咬咀以竹瀝一斗煮取四升分六服令一日

一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱先服常用

竹瀝湯四劑未覺增損作此方後覺得力又云脈沈細

駛風在內者作此湯也

風引湯

治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行方

麻黃

石膏

獨活

茯苓

各貳兩

吳茱萸

附子

秦艽

細辛

桂心

人參

防風

芍藥

防己

甘草

各壹兩

乾薑

白朮

參兩

杏仁

陸拾枚

右十七味以水一斗六升煮取三升分三服取汗

大龍骨湯

治脚弱風毒攣痺氣上及傷寒惡風溫毒山水

瘡氣熱毒四肢痺弱方

鼈甲

貳兩

防風

麻黃

白朮

石膏

知母

升麻

茯苓

橘皮

芍藥

杏仁

人參

半夏

當歸

芍藥

參朮

甘草

麥門冬

各壹兩

羚羊角

大黃

壹兩

犀角

青木香

雄黃

各半

大棗

貝齒

烏頭

生薑

薤白

拾肆

麝香

赤小豆

吳茱萸

伍合

右三十一味，以水二斗，煮取四升，分六服，相去十里，以得下止。一方用大黃半兩，畏下，可止，用六銖一方。

用羚羊角半兩，毒盛可用十八銖。胡治有山茱萸半升，無知母升，麻橘皮芎藭。

窮人參當歸萎蕤

小續命湯

治身體虛脹如微腫，背心痞滿，有氣壯熱，小腹

厚重，兩脚弱方。

藜蘆

黃芩

升麻

麻黃

羚羊角

桂心

杏仁

各叁兩

前胡

肆兩

烏梅

貳拾

薤白

叁拾

右十味咬咀以水一斗煮取二升七分三服此常用
若體強壯欲須利者加大黃二兩

風後湯 治脚弱舉體痺不仁熱毒氣入藏骨中滿塞不通

食即嘔吐方

獨活

麻黃

犀角各參兩一方

半夏壹升

大棗

烏梅貳拾枚

桂心

鼈甲

升麻

橘皮

枳實

甘草

吳茱萸

大黃各壹兩

生薑

石膏各陸兩

貝齒柒枚

右十七味咬咀以水一斗四升煮取四升分五服日三

夜二不瘥至三劑必瘥

治脚氣初發從足起至膝脛骨腫疼者方

取蟬麻葉切擣蒸薄裹之日二三易即消蟬麻子似

牛蟬蟲故名蟬麻也若冬月無蟬麻取蒲葶藶根蟬麻

和酒糟三分根一分合豆蒸熟及熟封裹腫上如前法

日二即消亦治不仁頑痺此方非湯不當見此然以

出不分

若腫已入腔至小腹脹小便澀少者方

取烏特牛乳一升二服日二取消乃止千金云取牛乳

壹分牛乳合豆蒸乳淨結乃服之

若腫已消仍有此候者急服此湯方蘇長史方神驗

麻黃 射干 人參 茯苓 防已

前胡 枳實各兩 半夏 犀角 羚羊角

青木香 橘皮 杏仁 升麻各壹兩 生薑伍兩

獨活叁兩 吳茱萸壹升

右十七味咬咀以水一斗二升煮取四升分五服相去
二十里以中間進少粥以助胃氣此湯兩日服一劑取
病氣退乃止以意消息之若熱盛喘煩者加石膏六兩
生麥門冬一升去吳茱萸若心下堅加鼈甲一兩
夫脚氣之疾先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痺
或兩脛腫滿或行起澀弱或上入腹不仁或時冷熱小便
澀澀喘息氣衝喉氣急欲死食嘔不下氣上逆者皆其候
也若覺此證先與

犀角旋復花湯方

犀角

旋復花

各二兩

橘皮

茯苓

牛薑

各參兩

大棗

茶枝

香豉

紫蘇葉

白八味炒咀以水八升煮取二升七分三服相去十

里久服之以氣下小便利為度崔氏名小犀角湯加其

大犀角湯療脚氣毒衝心變成水身體遍腫悶絕欲死方

犀角 旋復花 白朮 桂心 防己

黃芩 生薑 橘皮 茯苓各貳兩 香豉壹升

桑白皮 前胡各肆兩 紫蘇葉壹握 大棗拾枚

右十四味以水九升煮取二升七分三服相去

十里久取下氣為度若得氣下小便利脚腫即消能食

若服湯竟不下氣急不定仍服後犀角麻黃湯崔氏又

代白朮無防己黃芩
桑白皮各旋復花湯

犀角麻黃湯方

犀角 麻黃 防風 獨活崔氏用茯苓

防己 芎藭 白朮 羚羊角崔氏用附子

當歸

黃芩

各貳兩

石膏

生薑

甘草

杏仁

崔氏用細辛

桂心

各叁兩

右十五味以水一斗煮麻黃去沫取汁八升下藥

煎取三升分三服相去十里久服訖覆取汗若不瘥五

日後更一劑取汗同前

柴黃湯

治脚氣入腹困悶欲死腹脹方蘇長史方

吳茱萸陸升

木瓜兩顆切

右二味以水一斗二升煮取三升分三服相去如人行

十里久進一服或吐或汗或利或大熱悶即瘥此起死

小風引湯

治中風腰脚疼痛弱者方胡洽名大風引湯

獨活

茯苓

人參

防風

當歸

甘草

乾薑

胡洽作桂心

石斛

各貳兩胡洽作黃耆

附子 壹枚 大豆 貳升

右十味咬咀以水九升酒二升煮取三升分四服服別

相去如人行十里胡洽云南方治脚弱與此別用升

味本只有十味減當歸石解各小風引湯刪繁方無石解以療肉極寒肌肉變舌痿各曰惡風脚弱

四物附子湯

治風濕相薄骨節煩疼四肢拘急不可屈伸

近之則痛白汗出而短氣小便不利惡風不欲去衣或頭

面手足時時浮腫方

附子 貳枚

桂心 肆兩

白朮 叁兩

甘草 貳兩

右四味咬咀以水六升煮取三升分三服微汗愈大汗

煩者一服五合體腫者加防已四兩悸氣小便不利加

茯苓二兩既有附子今加生薑二兩

治脚弱風毒實及嶺南瘴氣面腫下寒下熱似瘡狀脚腫

氣上心悶效嗽攤緩頑痺方

麻人

升麻

麻黃

射干

葛蒲

芒消

甘草

大黃

豉

各半
合

右九味以水六升煮取二升半內芒消又煎二沸
分三服微利一二行解毒熱有腫滓薄之凡覺氣滿輒
服一劑佳

道人深師**增損腎痿湯**治風虛勞損挾毒脚弱痿痺或不

隨下焦虛冷背脊中微有客熱心虛驚悸不得眠食少失氣
味日夜數過心煩迫不得臥小便不利又時復下湘東王
至江州王在嶺南病悉如此極困篤余作此湯令服即得
力病似此者服無不瘥隨宜增損之方

黃耆

甘草

芍藥

麥門冬

人參

肉蓯蓉 乾地黄 赤石脂 茯神 地骨白皮

當歸 遠志 礞石 枳實 防風

龍骨各壹斤 桂心 芎藭各貳斤 生薑肆兩 五味子合

半夏壹升 大棗拾 白羊腎壹具

右二十三味咬咀以水二斗煮羊腎取汁一斗二升內

諸藥煮取四升分為五服不利下者除龍骨赤石脂小

便澁以赤茯苓代茯神加白朮二兩多熱加黃芩一兩

遺溺加桑螵蛸二十枚胡洽方無黃耆茯苓赤石脂地

有黃芩為

石膏湯治脚氣風毒熱氣上衝頭面面赤矜急鼻塞去來

來時令人昏憤心肯恍惚或苦驚悸身體戰掉手足緩縱

或酸痺頭目眩重眼反鼻辛熱氣出口中或患味甜諸惡

不可名狀者方

石膏

龍膽

升麻

芍藥

貝齒

甘草

鼈甲

黃芩

羚羊角各壹兩

橘皮

當歸各貳兩

右十一味以水八升煮取三升分為三服

半夏湯治脚氣上入腹腹急上衝背氣急欲絕方

半夏壹升

桂心捌兩

乾薑伍兩

甘草

人參

細辛

附子壹兩

蜀椒貳合

右八味以水一斗煮取三升分三服初稍稍進恐

氣衝上格塞不得下小小服通人氣耳

烏頭湯治風冷脚痺疼痛攣弱不可屈伸方


烏頭


細辛

蜀椒各壹兩

甘草

秦艽





二夜二

附子湯 治濕痺緩風身體疲

痛如欲折肉如錐刺刀割方

附子 冬夜

芍藥

桂心

甘草

茯苓

人參 冬夜

白朮 肆兩

右七味 以水八升 煮取三升 分三服

防風湯

治肢體虛風微瘳發熱肢節不隨恍惚狂言來去

無時不自覺悟南方支法存所用多得力溫和而不損人為

勝於續命越婢風引等湯羅庶以州一門南州士人常用亦

治脚弱甚良方

防風

麻黃

秦艽

獨活

生薑

半夏 各貳兩

當歸

遠志

甘草

防已

人參

黃芩

升麻

芍藥 各壹兩

石膏 半兩

麝香 陸銖 一方用白木壹兩

右十六味咬咀以水一斗三升煮取四升一服一升初服厚覆取微汗亦當兩三行下其間相去如人行十里久更服有熱加大黃二兩先煮冷心痛疾者倍用當歸加桂心三兩不用大黃

甘藷湯 治脚弱舉身洪腫胃反食穀吐逆胃中氣結不安而寒熱下痢不止小便難服此湯即益亦服女麴散利小便腫消服大散摩膏有驗方

甘草 人參各壹兩 半夏壹升 桂心 蜀椒各壹兩

小麥捌合 大棗貳拾枚 生薑捌兩 吳茱萸貳升

右九味咬咀以水一斗三升煮小麥取一斗去小麥肉諸藥煮取三升分為六服女麴散見第十卷第八篇中

怕山甘草湯 若寒熱日再二發可服此方

怕山 參三兩 甘草 壹兩

右二味咬咀以水四升煮取一升半分三服相去五里
又一服

丹參牛膝煮散 治脚痺弱氣滿身微腫方

丹參 牛膝 桑白皮 杏仁 升麻

猪苓 茯苓 各四兩 犀角 黃芩 橘皮

防己 白朮 澤瀉 桂心 秦艽 各三兩

生薑 李根白皮 各二兩 大麻人 壹升

右十八味擣麤篩以水一升半內散方寸匕煮取七合
輕絹濾去滓頓服日再夏月熱不得服圓散此煮散須
年常用大驗

治腰膝不隨兩脚攣腫方

蜀椒四升以水四斗煮取二斗半藥盛下著火曝之
懸板為橋去湯二寸許以脚躡板拄膝坐以綿絮密
塞勿令泄氣若疲即出入被以粉摩之一食久更入
甕常令甕下火不絕勿使湯冷如此消息不過七日
得伸展并腫亦消

諸散第七方

例曰大法春秋宜服散

八風散治風虛面青黑土色不見日月光脚氣痺弱準經

面青黑主腎不見日月光主肝宜補腎治肝方

菊花 石斛

天雄 各壹兩半 人參

附子

甘草 各壹兩陸錄

鍾乳

蔓菁

續斷

黃耆

澤瀉

麥門冬

遠志

細辛

龍膽

秦艽

石韋

菟絲子

牛膝

葛蒲

杜仲

茯苓

乾地黃

柏子仁

蛇牀子

防風

白朮

乾薑

車釐

山茱萸

各壹兩

五味子

烏頭

略半

茯苓 貳兩

右三十三味治下篩酒服方寸匕日三不效加至二匕

大八風散

治諸緩風濕痺脚弱方

巴戟天

黃耆

桂心

細辛

天雄

車釐

茯苓

牡荊子

薯蕷

菊花

萎蕤

山茱萸

秦艽

黃芩

石斛

白朮

礬石

礬石作厚朴

龍膽

人參

蜀椒

各半

附子

五味子

各十八銖

葛蒲

茯苓

牛膝

千金翼

乾薑

烏喙

遠志各壹兩

桔梗

三十

芎藭

白斂

芍藥

各陸銖

右三十二味治下節酒服半寸匕日三未驗稍增令微

覺胡洽無桔梗

內補石斛秦苧散

治風虛脚弱手足拘攣疼痺不能行脚

跌腫上膝小腹堅如繩約氣息常如憂恚不能食飲者皆由五勞七傷腎氣不足受風濕故也此方悉主之

石斛

附子

天雄

桂心

獨活

天門冬

各壹兩

秦苧

烏頭

人參

乾薑

當歸

防風

杜仲

各三銖

山茱萸

莽草

桔梗

細辛

麻黃

蒺藜

五味子

各十八銖

蜀椒

白芷

白朮

右三十二味治下篩酒服方寸匕日再服不知稍增至
二匕虛人三建皆炮實人亦可生用風氣者本因腎虛
既得病後毒氣外滿則灸泚其氣內滿則藥馳之當其
救急理必如此至於風消退四體虛弱餘毒未除不可
便止宜服此散推陳致新極為良妙此既人情可解無
可疑焉

秦艽散治風無久新卒得不知人四肢不仁一身盡痛偏
枯不隨不能屈伸洒洒寒熱頭目眩倒或口面喎僻方

秦艽

乾薑

桔梗

附子

各壹兩

天雄

當歸

天門冬

人參

白朮

蜀椒

各十銖

烏頭

細辛

各十銖

甘草

白芷

山茱萸

麻黃

前胡

防風

五味子

各半兩

右十九味治下篩酒服方寸匕日三若老人少服之胡

無天門冬前胡白芍草桂心
已單辭白欬黃耆為二十一味

單服松脂治一切風及大風脚弱風痺方薰陸法亦同

松脂三十斤以搜皮袋盛繫頭鐺底布竹木置袋於

上以石三五顆壓之下水於鐺中令滿煮之膏浮出

得盡以後量更二十沸接置於冷水中易袋洗鍋更

煮如此九遍藥成擣篩為散以麤羅下之用酒服一

方寸匕日二初和藥以冷酒藥入腹後飲熱酒行藥

以知為度如覺熱即減不減令人大小便秘澀若澀

宜食葱薑仍自不通宜服生地黃汁微取泄利除忌

大麻子以外無所禁若欲斷米加茯苓與松脂等分

蜜和為圓但食淡麪餅日兩度食一食一小攪勿

多食也作饅飢法硬和麪熟按煮五十沸漉出冷水
淘更置湯中煮十餘沸然後漉出食之服松脂三十
日後即覺有驗兩脚似有水流下是效如恐秘澀和
一片松脂茯苓今與棗栗許大酥即不澀服經一百日
後脚氣當愈仙經曰服松脂一年增壽一年服二年
增壽一年及服之十年則增壽十年

淮南八公 **石齋膏藥散** 治風濕痲腰脚不隨方

防風

茯苓

菊花

細辛

蜀椒

乾薑

雲母

茯苓

人參

乾地黃

附子

石斛

杜仲

遠志

菟絲子

天雄

萆薢

桂心

牛膝

蛇牀子

白朮

薯蕷

巴戟

菖蒲

續斷

山茱萸 各青兩

五味子 半兩

右二十七味治下篩酒服方寸匕日再

采更散 治冷風脚跛偏枯半身不隨晝夜呻吟醫所不治

吳茱萸

乾薑

白欬

牡荊 千金翼作牡荊

附子

天雄

狗脊

乾漆

薯蕷

秦艽

防風 各半兩

右十一味治下篩先食服方寸匕日三藥入肌膚中淫

淫然三日知一月瘥

酒醴第四 例一首方十六首

例曰凡合酒皆薄切藥以絹袋盛藥內酒中密封頭春夏

四五日秋冬七八日皆以味足為度去滓服酒盡後其滓

搗酒服方寸匕日三次法冬宜服酒至立春宜停

石斛酒 治風虛氣滿脚疼痺孳弱不能行方

石斛 丹參 五加皮 各伍兩 側子

秦艽 杜仲 山茱萸 牛膝 各肆兩 桂心

乾薑 羌活 芎藭 橘皮 黃耆

白朮 蜀椒 茵芋 當歸 各叁兩 薏苡人升

防風貳兩 鍾乳捌兩 搗碎別緇袋盛繫大藥袋內

右二十一味以清酒四斗漬三日初服三合日再稍稍加以知為度

烏麻酒 方

烏麻五升微熬搗碎以酒一斗漬一宿隨所能飲之盡更作甚良

鍾乳酒 治風虛勞損脚疼冷痺羸瘦孳弱不能行方

鍾乳 捌兩

丹參 陸兩

石斛

杜仲

天門冬 各伍兩

牛膝

防風

黃耆

芎藭

當歸 各肆兩

附子

桂心

秦艽

乾薑 各叁兩

山茱萸

薏苡仁 各壹升

右十六味 㕮咀以清酒二斗 漬之三日 初服三合 日再

後稍加之以知為度

拘杞薑酒

治緩急風四肢不隨行步不正口急及四體

不得屈伸方

拘杞根 壹伯片

薑蒲 伍片

右二味 細剉以水四石 煮取一石六斗 去滓 釀一斛米

酒熟 稍稍飲之

虎骨酒

治骨髓疼痛風經五臟方

虎骨 伍斤 酒 壹斗 煮取 伍升 飲之

虎骨一具炭火炙令黃白槌刮取酒浸三日得效去毒
酒六升浸五宿隨性多少稍飲之易云羌嘯風生龍吟雲起此亦有情與無情相感治風之效故亦無疑

美酒

治胃管冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧脚

冷服此酒十日後目既精明體又充壯方

八月三日取蓼曝燥把之如五升大六升把水六石
煮取一石去滓以釀酒如常法隨多少飲之已用莖
效甚速

小黃耆酒

大治風虛痿痺四肢偏枯兩脚弱手不能上頭

或小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜喜夢
悲愁不樂恍惚善忘此由風虛五臟受邪所致或久坐腰
痛耳聾卒起眼眩頭重或舉體流腫疼痺飲食惡冷瀉瀉

惡寒背脊中痠滿心下寒疝藥皆主之及婦人產後餘疾風虛積冷不除者方

黃耆

附子

蜀椒

防風

牛膝

細辛

桂心

獨活

白朮

芎藭

甘草

各參兩

烏頭

集驗用薯蕷參兩

秦艽

大黃

薯蕷根

乾薑

山茱萸

各貳兩

當歸貳兩

右十八味咬咀少壯人無所熬練虛老人微熬之以絹

袋中盛清酒二斗漬之春夏五日秋冬七日可先食服

一合不知可至四五合日三服此藥攻痺甚佳亦不令

人吐悶小熱宜冷飲食大虛加茯苓二兩下利加女萎

三兩多忘加石斛葛蒲紫石各二兩心下多水者加茯苓

苓人參各二兩薯蕷二兩酒盡可更以酒二斗重漬滓

服之不爾可曝澤擣下酒服方寸匕不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風冷神良

黃耆酒治風虛脚疼痿弱氣悶不自收攝兼補方

黃耆 烏頭 附子 乾薑 秦艽

蜀椒 芎藭 獨活 白朮 牛膝

茯苓 細辛 甘草各參二兩 葛根 當歸

芎藭各貳兩半 山茱萸 桂心 鍾乳 柏子人

天雄 石斛 防風各貳兩 大黃 石南各壹兩

右二十五味咬咀無所燂練清酒二斗漬之先食服一

合不知可至五合日三以攻痺為佳大虛加茯苓下利

加女萎多忘加芎藭各三兩胡治有澤瀉參二兩茯苓各貳兩

藥各壹兩無秦艽芎藭生一膝茯苓甘草芎藭根當歸芎藭蒲鍾乳大黃為二十二味名大黃耆湯

茵芋酒 治大風頭眩重目瞽無所見或仆地氣絕半日乃蘇口喎噤不開半身偏死拘急痺痛不能動搖歷節腫痛骨中酸疼手不得上頭足不得屈伸不能躡履行欲傾跌皮中動淫淫如有蟲啄軫癢搔之生瘡甚者狂走有此諸病藥皆主之方

茵芋

烏頭

石南

防風

蜀椒

女萎

附子

細辛

獨活

卷柏

桂心

天雄

秦艽

防己

躑躅

右十五味咬咀少壯人無所熬練虛老人薄熬之清酒

二斗漬之冬七日夏三日春秋五日初服一合不知加

至二合寧從少起日再以此微痺為度

胡洽無蜀椒獨活卷柏為十二味

大金牙酒 沈瘴癘毒氣中人風冷濕痺口喎面欠半身不

遂手足拘攣麻止節腫痛其甚者小腹不仁名曰脚氣無所不治方

金牙青片 側子 附子 天雄 人參

茯苓 茯苓 當歸 防風 黃耆

薯蕷 細辛 桂心 萆薢 萎蕤

白芷 桔梗 黃芩 遠志 牡荊子

芍藥 地骨皮 五加皮 杜仲 厚朴

枳實 白朮 牛膝 丹參略 獨活半片

茵芋 石南 狗脊略 礞石拾兩 薏苡仁

麥門冬各壹升 生石斛捌兩 蒟蒻肆兩

生地黃切貳升

右三十九味以酒八斗漬七日溫服一合日四五

夜一石藥細研別絹袋盛其藥同漬藥力和善主治極多凡是風虛四體小覺有風痾者皆須將服之無所不治也服者一依方脩合不得輒信人大言浪有加減

鍾乳酒

治虛損通順血脉極補下氣方

鍾乳

石斛

菴蓉各五兩

附子

甘菊各二兩

右五味以酒三斗漬服二合日再稍增至一升

秦克酒

治四肢風手臂不收解脚疼弱或有拘急攣縮羸

指偏枯痿臂痛小不仁頑痺者悉主之方

秦克

天門冬

五加皮

牛膝

附子

桂心各三兩

巴戟天

杜仲

石南

細辛各二兩

獨活各五兩

薏苡仁

壹兩

右十二味以酒一斗漬之得氣味可服二合漸加

至五六合日三夜一

木膏酒

治脚弱風虛五勞七傷萬病皆日主之方

生白木淨洗一石五斗

搗取汁參三斗煎取半

濕荆二十五束束別三尺圍各長二尺五寸徑頭二

寸燒取汁參三斗煎取半

青竹三十束束別三尺圍各長二尺五寸徑一寸燒

取汁參三斗煎取半

生地黃根五大斗麤大者搗取汁參三斗煎取半

生五加根

參拾陸斤淨洗訖別於大釜內以水肆石煎之去滓澄清取汁參三斗以銅器中盛大

釜內水上煎之取汁參三斗伍升其煎諸藥法一準五加例

右件白木等五種藥總計得汁九斗五升好糯米一石五斗上小麥麴八斤曝乾為末以藥汁六斗浸麴五日

待麴起第一投淨淘米七斗令得三十遍下米置淨席
上以生布拭之勿令不淨然後炊之下饋以餘藥汁浸
饋調強弱更蒸之待饋上加生然後下於席上調強弱
冷熱如常釀酒法醞之甕中密蓋頭二日後第一投更
淘米四斗一如前法投之二日後即加藥如左

桂心

甘草

白芷

細辛

防風

當歸

麻黃

芍藥各陸兩

附子伍兩

牛膝玖兩

乾薑

五加皮

各壹斤

右十二味咬咀訖第二投以米四斗淨淘如前法還以
餘汁澆饋重蒸待上加生下置席上調冷熱如常釀法
和上件藥投之二三日外然後嘗甘苦得中訖密封頭一
七日乃壓取清酒一服四合日再服細細加以知為度

温酒不得過熱慎生冷酢滑猪鯉魚蒜牛肉等

松葉酒主脚弱十二風痺不能行服更生散數劑及衆治不得力服此一劑便能遠行不過兩劑方

松葉六十斤咬咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此力者甚衆神妙

治脚氣方

好豉三斗蒸一石米下曝乾如是三上以酒五斗漬七日去滓飲惟醉為佳酒盡更以一斗半漬之飲之如初

側子酒治風濕痺不仁脚弱不能行方

側子 牛膝 丹參 山茱萸 蒟蒻根

杜仲

石斛

各肆兩

防風

乾薑

蜀椒

細辛

獨活

秦艽

桂心

芎藭

當歸

白朮

茵芋

各參三兩

五加皮

兩

薏苡

以人升

右二十味以咀絹袋盛清酒四斗漬六宿初服三合稍

加以知為度患目昏頭眩者彌精

膏第五

例一首

方八首

例曰凡作膏常以破除日無令喪孝汚穢產婦下賤人雞犬禽獸見之病在外火灸摩之在內溫酒服如棗核許

神明白膏

治百病中風惡氣及頭面諸病青盲風目爛背

管醫耳龍耳鼻寒齩齒齒根挺痛及癰痔瘡癩疥等方

吳茱萸

蜀椒

芎藭

白朮

白芷

前胡

各膏并崔氏作白前

附子

參拾枚

桂心

當歸

細辛

各貳兩

右十味以豉咀淳苦酒於銅器中淹浸諸藥一宿以成煎
猪膏十斤炭火上煎三沸三上三下白芷黃芩為候病
在腹內溫酒服如彈丸一枚日三目痛取如黍米內兩
眦中以目向風無風可以扇扇之諸瘡痔齧齒耳鼻百
病主之皆以膏傅病在皮膚炙手摩病上日三
脂後九
味無桂心

續命膏 治百病久風頭眩鼻塞涕淚出霍亂吐逆傷
寒咽痛脊背頭項強偏枯拘攣或緩或急或心腹久寒積
聚疫痛欬逆上氣往來寒熱鼠漏瘰癧歷節疼腫關節盡
痛男子七傷臙脹腹滿羸瘦不能飲食婦人生產餘疾諸
病癰疥惡瘡癰腫陰蝕黃疸發背馬鞍牛領瘡腫方

當歸

括婁根

乾地黄

甘草

蜀椒各陸

半夏

茶合桂心

芎藭

細辛

附子各肆

黃芩

桔梗

天雄

藜蘆

皂莢各壹

厚朴

烏頭

莽草

乾薑

人參

黃連

寄生

續斷

戎鹽各叁黃野葛貳

生竹茹升陸

巴豆貳拾石南

杏仁貳壹猪脂叁斗

苦酒壹斗陸升

右三十一味咬咀諸藥以苦酒漬一宿以猪脂微火上煎之三下三上膏成病在內以酒服如半棗在外摩之

日三

神明青膏

治鼻中干灌之并摩服方

蜀椒

伍合

皂莢

黃芩

石南

黃連

雄黃

桂心

藜蘆各五分

白朮

芍藥

大黃

澤瀉各五分

烏頭

莽草

續斷

人參

各五分

半夏

當歸各五分

乾地黄

各五分

枳實各五分

萎蕤

細辛各五分

附子

桔梗各五分

乾薑

陸氏

戎鹽

杏子大壹枚

右二十五味咬咀以苦酒一斗漬之羊髓一斤為東南

三隅竈內諸藥炊以葦薪作三聚新好土藥沸即下置

土聚上三沸三下訖藥成以新布絞去滓病在外火多

摩之在內溫酒服如棗核日三後稍益以知為度

大傳曰

治百病傷寒咽喉不利頭項強痛腰脊兩脚疼

有風痺濕腫難屈伸不能行步若風頭眩鼻塞有附息肉

生瘡身體隱軫風搔鼠漏瘰癧諸疽惡瘡馬鞍牛領腫瘡

及久寒結聚在在心腹痛膏痺煩滿不得眠飲食效逆上氣
往來寒熱婦人產後餘疾耳目鼻口諸疾悉主之亦曰太

一神膏方

蜀椒壹升升麻切壹升附子叁兩巴豆各叁

杏人伍合狸骨各壹細辛兩半白芷半兩甘草貳兩

白木陸兩一方用當歸二兩

右十二味咬咀苦酒淹漬一宿以猪脂四斤微火煎之

先削附子一枚以繩繫著膏中候色黃膏成去滓傷寒

心腹積聚諸風腫疾頸項腰脊強偏枯不仁皆摩之日

一癰腫惡瘡鼠瘦癩疥炙手摩之耳聾取如大豆灌之

目痛淚出縹白翳如珠當瞳子視無所見取如糝米傅

白上令人久自以手掩之須臾即愈便以水洗視如平

復且勿啞風三十日後乃可行鼻中痛取如大豆內鼻
中并以摩之齶齒痛以綿裹如大豆著痛齒上啞之中
風面目鼻口啞僻以摩之若晨夜行辟霜霧眉睫落數
數以鐵漿洗用膏摩之

曲藥膏

治風濕痲痺四肢躄弱偏跛不仁并癰腫惡瘡方

大黃

黃芩

莽草

巴豆

野葛

牡丹

躑躅

芫花

蜀椒

皂莢

藜蘆

附子

各等分

右十二味咬咀以苦酒漬藥一宿以成煎猪膏二斤微
火煎三沸一下別內白芷一片三上三下白芷色黃藥
成去滓微火炙手摩病上日三

治惡風毒腫痲痺不仁瘰癧惡瘡癰疽腫脰脚弱

治惡風毒腫痲痺不仁瘰癧惡瘡癰疽腫脰脚弱

偏枯百病方

野葛

犀角

蛇疔

莽草外其臺作

烏頭

桔梗

升麻

防風

蜀椒

乾薑

鼈甲

雄黃

巴豆

各五兩

丹參

參兩

躑躅花壹升

右十五味攷咀以苦酒四升漬之一宿以成煎猪膏五

斤微火煎三上三下藥色小黃去滓以摩病上此方不

可施之猥人慎之

胡洽無丹參躑躅有細辛又蘇恭以白芷防已只其莖附子當歸代巴豆

雄黃蛇疔
防風鼈甲

蒼梧道士**陳元膏**治一切風濕骨肉疼痺方

當歸

細辛

芍藥各壹兩

桂心伍寸

天雄叁拾

生地黃叁斤

白芷壹兩

丹砂貳兩

乾薑拾累

烏頭叁兩

松脂 捌兩 猪肪 拾斤

右十二味 咬咀 以地黄汁清藥一宿 煎猪肪去滓 內藥

煎十五沸 去滓 內丹砂末 孰攪 用火炙 手摩病上 日千

遍瘥 胡洽有人參防風各二兩附子各三拾枚雄黃貳兩

兩半大酢叁升為十五 味 崔氏與辛金翼同

飛尸 治卒中風毒腹中絞刺痛飛尸入藏及魘寐

不寤尸厥奄忽不知人宿食不消溫酒服如棗核大得下

止若毒氣甚咽喉閉塞不能嚥者折齒內葱葉口中以膏

灌葱葉中令下病腫者向火摩腫上若歲中多溫欲省病

及行霧露中酒服之內鼻中亦得方

蜀椒

當歸

雄黃

丹砂 各貳兩

烏頭

巴豆 各壹升

薤白 壹斤

莽草 肆兩

右八味咬咀苦酒二升漬一宿用猪脂五斤東向竈裏
薪火煎之五上五下候薤白黃色絞去滓研雄黃丹砂
如粉內之攪至凝乃止膏成盛不津器中諸蜈蚣蛇蜂
等毒者以膏置瘡上病在外悉傳之摩之以破除日合
一方用礬石一兩蜈蚣一枚是名八毒膏

主母膏

肘後不用肥
別其并草名

重刊孫真人備急千金要方卷之七

善
 510.87
 12-1
 1377 v.9
 書 號 碼
 著 譯 者 孫思邈
 書 名 (甄別孫真人) 備急千金要方

號 數 借 期 還 期

出借得不

出借得不

借閱者注意

- (一) 加意愛護勿失原有形狀
- (二) 損壞或遺失應照原價加倍賠償
- (三) 借閱以二星期為限期滿欲續借者須持書至館聲明但本館於必要收回時須即繳還
- (四) 逾期不歸還者應照章納金

善
 510.87
 12-1
 63280 v.9
 圖書號數
 圖書冊數
 登記號數

