

醫酉壘元戎

醫學子食氣病
卷之三

					漢書門
				一	
				二	
				三	
				四	
				五	
				六	
				七	
				八	
				九	
				十	
				十一	
				十二	
				十三	
				十四	
				十五	
				十六	
				十七	
				十八	
				十九	
				二十	
				二十一	
				二十二	
				二十三	
				二十四	
				二十五	
				二十六	
				二十七	
				二十八	
				二十九	
				三十	
				三十一	
				三十二	
				三十三	
				三十四	
				三十五	
				三十六	
				三十七	
				三十八	
				三十九	
				四十	
				四十一	
				四十二	
				四十三	
				四十四	
				四十五	
				四十六	
				四十七	
				四十八	
				四十九	
				五十	
				五十一	
				五十二	
				五十三	
				五十四	
				五十五	
				五十六	
				五十七	
				五十八	
				五十九	
				六十	
				六十一	
				六十二	
				六十三	
				六十四	
				六十五	
				六十六	
				六十七	
				六十八	
				六十九	
				七十	
				七十一	
				七十二	
				七十三	
				七十四	
				七十五	
				七十六	
				七十七	
				七十八	
				七十九	
				八十	
				八十一	
				八十二	
				八十三	
				八十四	
				八十五	
				八十六	
				八十七	
				八十八	
				八十九	
				九十	
				九十一	
				九十二	
				九十三	
				九十四	
				九十五	
				九十六	
				九十七	
				九十八	
				九十九	
				一百	
				一百一	
				一百二	
				一百三	
				一百四	
				一百五	
				一百六	
				一百七	
				一百八	
				一百九	
				二百	
				二百一	
				二百二	
				二百三	
				二百四	
				二百五	
				二百六	
				二百七	
				二百八	
				二百九	
				三百	
				三百一	
				三百二	
				三百三	
				三百四	
				三百五	
				三百六	
				三百七	
				三百八	
				三百九	
				四百	
				四百一	
				四百二	
				四百三	
				四百四	
				四百五	
				四百六	
				四百七	
				四百八	
				四百九	
				五百	
				五百一	
				五百二	
				五百三	
				五百四	
				五百五	
				五百六	
				五百七	
				五百八	
				五百九	
				六百	
				六百一	
				六百二	
				六百三	
				六百四	
				六百五	
				六百六	
				六百七	
				六百八	
				六百九	
				七百	
				七百一	
				七百二	
				七百三	
				七百四	
				七百五	
				七百六	
				七百七	
				七百八	
				七百九	
				八百	
				八百一	
				八百二	
				八百三	
				八百四	
				八百五	
				八百六	
				八百七	
				八百八	
				八百九	
				九百	
				九百一	
				九百二	
				九百三	
				九百四	
				九百五	
				九百六	
				九百七	
				九百八	
				九百九	
				一千	
				一千一	
				一千二	
				一千三	
				一千四	
				一千五	
				一千六	
				一千七	
				一千八	
				一千九	
				二千	
				二千一	
				二千二	
				二千三	
				二千四	
				二千五	
				二千六	
				二千七	
				二千八	
				二千九	
				三千	
				三千一	
				三千二	
				三千三	
				三千四	
				三千五	
				三千六	
				三千七	
				三千八	
				三千九	
				四千	
				四千一	
				四千二	
				四千三	
				四千四	
				四千五	
				四千六	
				四千七	
				四千八	
				四千九	
				五千	
				五千一	
				五千二	
				五千三	
				五千四	
				五千五	
				五千六	
				五千七	
				五千八	
				五千九	
				六千	
				六千一	
				六千二	
				六千三	
				六千四	
				六千五	
				六千六	
				六千七	
				六千八	
				六千九	
				七千	
				七千一	
				七千二	
				七千三	
				七千四	
				七千五	
				七千六	
				七千七	
				七千八	
				七千九	
				八千	
				八千一	
				八千二	
				八千三	
				八千四	
				八千五	
				八千六	
				八千七	
				八千八	
				八千九	
				九千	
				九千一	
				九千二	
				九千三	
				九千四	
				九千五	
				九千六	
				九千七	
				九千八	
				九千九	
				一萬	
				一萬一	
				一萬二	
				一萬三	
				一萬四	
				一萬五	
				一萬六	
				一萬七	
				一萬八	
				一萬九	
				二萬	
				二萬一	
				二萬二	
				二萬三	
				二萬四	
				二萬五	
				二萬六	
				二萬七	
				二萬八	
				二萬九	
				三萬	
				三萬一	
				三萬二	
				三萬三	
				三萬四	
				三萬五	

醫學館寄宿
寮書籍之記



大學東
校典藉
局之印

醫壘元戎卷第八

趙州教授兼提舉管內醫學王好古進之筌次

太陰證

草豆蔻散 食前服思食食後服消食

草豆蔻

麩裏煨熟去皮取仁 縮砂仁 各半兩

乾木瓜

去一兩半高子 益智仁 三錢半

甘草

薑屑 陳皮

鹽 炒各三錢

右一法加神麩一兩麥蘖七錢半一法加烏

梅肉三錢

局方草豆蔻散 主治修製並見本方

醫壘元戎卷八

四十一

草豆蔻丸 王海藏法

右以草豆蔻為細末生薑汁打糊為丸桐子大每服二三十九米飲嚼服亦得

易簡縮脾湯

解伏熱除煩消暑毒上吐下利霍亂之後服

熱藥過多煩燥宜服之

草果

烏梅

縮砂仁

甘草

各四兩

乾薑 二兩

右以熟水浸冷極冷旋旋服之一方治尊年人

加附子一兩一方加炒白扁豆二兩暑月多

以此代熟水飲之極妙若傷暑頭痛發熱宜

用此下消暑丸若因飲食生冷過多至霍亂

吐瀉者宜用此先以治中湯二陳湯之類煎

服煩燥甚者方以浸冷香薷湯服之自然平

治今人往往屬香薷飲之證才見霍亂遽亦

投之殊不知夏月伏陰在內因食生冷以致

霍亂豈可投以浸冷之藥故合先治中脘方

以此藥解其煩燥不可不知若飲水過多小

便赤澁當服五苓散 若盛夏於道途間為

暑氣所悶倒不省人事急扶在陰涼之處切
 不可與冷水以布巾衣物等蘸熱湯熨臍下
 及丹田氣海及瀆以湯淋臍上令微臍腹溫
 煖即漸甦醒若商賈及傭顧之人倉卒無湯
 掬路中熱土於臍上撥開作竅令溺其中并
 以大蒜爛碾以水調灌下一法用道中熱土
 急爛碾冷水調服仍以蒜少許置鼻中氣透
 則甦續以白虎湯竹葉石膏湯之類凡覺中
 暑者急嚼生薑一大塊冷水咽下暑氣中人
 慎不可以冷水亦不宜單用冷水灌之來復

丹消暑丸皆可用也

橙皮丸 調中順氣生津止渴

烏梅肉一兩 乾生薑二錢 木瓜

糖霜各二兩 白茯苓 白朮 橙皮

沈香各五錢

右為細末煉蜜為丸每兩作二十五丸欲作
 湯水用水化開寒熱溫涼任意飲之噙化亦
 可

法製陳皮消食化氣寬利胸膈

烏梅肉兩半 白檀二錢半 茴香二兩 甘草二兩

乾生薑兩半青鹽一兩陳皮半斤去白取四兩切細條

右除陳皮外並為細末用水一碗藥末三兩同陳皮一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時別用乾藥拌勻焙乾每用不以多少細嚼嚥下無時

薑麩丸

此方與衍義同治下之後不能食食後必胸痞常服益氣消食衍義有陳皮

薑屑 麥蘖 神麩末炒各等分

右麩糊丸梧桐子大米飲湯下三十丸

御方思食丸並見治法

神麩 麥蘖 烏梅肉各一兩

人參 木瓜 茯苓 桂各五錢

甘草七錢 乾生薑二錢半

右為細末蜜丸每兩作十丸

口苦舌乾 菘胡 烏梅 寒

木則補脾胃

思食丸

白朮 陳皮 半夏麩各五錢

木香一錢 沉香 烏藥各一錢 麥蘖一兩

檳榔 人參 各二錢

右件為細末煉蜜丸桐子大每服三十丸米
湯飲下一法有烏梅肉神麩麥蘖乾生薑為細
末蜜丸

蘭省香爛飯丸

丁香 神麩 三稜 青皮 各三錢

沈香 木香 白檀 陳皮

藿香 各二錢 益智仁 廣茂 縮砂仁

麥蘖 各五錢 甘松 甘草 香附米 各一兩

右為細末蒸餅丸

大生薑丸

補脾胃治口苦舌乾中脘不和脹滿嘔吐食
不化酒病翻胃

丁香 桔梗 川芎 白朮

炙甘草 各五錢 人參 良薑

丁皮 桂心 縮砂仁 各一兩

右為細末蜜丸每兩作十五丸細嚼一丸米
飲湯空心服日三

木瓜湯 此一方當在草豆蔻散後

木瓜

一斤去皮子切作片子

生薑

切作片

甘草

白鹽

各四兩

右四味拌勻甑鉢內淹一宿焙乾為細末每

服一二錢點服一法加神麴

三奇六神麴法

白虎白麴 一百斤

朱雀赤小荳

三斤煮軟去湯碾細與前件相伴和

蘇勾陳蒼甘汁

三升

大青龍青蒿汁

三升即黃蒿自然汁

騰蛇野蓼子汁

四升

玄武杏仁

四斤去皮尖香麴乾濕用之

右一處拌勻稍乾為度用大盆淹一宿子伏

內上寅日踏極實為度甲寅乙卯庚辰乃三

奇也全有前物為六神少則非也踏乾先用

稗草鋪地上後用蒿鋪之排麴於上麴上却

用蒿草蓋之勿令透風候一月取出安在見

風處更四十九日可用如作風麴才踏下用

桑葉紙裹發過懸在風道中亦須四十九日

每米一斗不過十兩

嘔噦例

嘔噦一條本出於胃當例陽明條下以其脾
 病連及於胃若食生冷硬物先入胃次傳脾
 所以中州之病並稱之曰脾胃故叔和云脾
 臟象中坤安和對胃門後又云二斤十四兩
 三斗五升存是為脾連及於胃也戊與己配
 何嘗有二哉今此嘔噦諸證湯丸等劑雖屬
 於胃姑例於大陰條下古人交經用藥何嘗
 相離

王朝奉嘔論

嘔者病源云熱在脾胃也胃家虛冷亦嘔也

噦者胃家虛冷也又病人本虛伏熱在胃則
 胃滿故冷氣逆故噦 傷寒證桂枝證小茈
 胡證合病葛根加半夏證黃芩加半夏證小
 青龍證四逆證真武證梔子等湯證皆有嘔
 各自主治然小茈胡湯專主嘔也嘔而發熱
 者小茈胡也嘔而胸滿者具茈萸湯乾嘔吐
 涎沫者吳茈萸湯金匱諸嘔吐穀不得下者
 小半夏湯去茯苓胸中似喘不喘似嘔不嘔
 似噦不噦徹心憤然無奈者生薑汁半夏湯
 噦逆陳皮竹茹湯乾嘔而利者黃芩加半夏

生薑湯嘔噦手足逆冷者小陳皮湯嘔噦胸
滿虛煩不安大橘皮湯

仲景云傷寒咳逆脉散者死成注云火刑肺金

也朱奉議以噦者為咳逆非也噦胃也非咳

逆可知奉議小半夏茯苓湯生薑煎小半

夏橘皮湯生薑煎汁半夏湯橘皮湯陳皮生

薑二味煎

大橘皮湯理氣調中

陳皮 甘草 生薑 各二錢 人參 五錢

右咬咀分作二服水煎服之

橘皮青竹茹湯

陳皮 甘草 各二錢 人參 二錢 竹茹 二錢

右作三服薑煎

溫中丸治脾寒嘔吐咳嗽自利

半夏 湯泡 乾薑 各等分

右為細末生薑和汁丸桐子大每服一十九丸

木瓜湯下薑湯亦可

海藏橘皮茯苓生薑湯 治咳逆解酒毒止嘔

吐

陳皮 一兩 炙甘草 生薑 各三錢 茯苓 五錢

一法加葛根神麴半夏切生薑煎服

活人治嘔噦手足逆薑橘湯

橘皮 生薑

活人大半夏湯 治痰飲脾胃不和

半夏 茯苓

右為粗末水煎如熱痰加炙甘草脾胃不和

加陳皮

活人半夏生薑湯 治嘔飲欲絕

半夏 生薑 二味同煎服

桔梗半夏湯

治冷熱不合令胸中痞痛痰涎

噦

半夏 桔梗 陳皮 各等分

右為粗末水煎細末薑糊丸亦可

活人橘皮竹茹湯 治嘔逆

陳皮 竹茹 人參 甘草 各等分

右剉薑棗煎服

大橘皮湯

治動氣在上不可下食入則吐隨證加減

陳皮 人參 甘草 生薑

竹茹 棗

右吹咀水煎服

橘皮半夏湯

治積氣痰痞不下飲食嘔吐不止

陳皮 半夏各二兩 生薑一兩

右吹咀水五盞煎至二大盞去滓分三服食

後臨臥服

半夏茯苓陳皮湯 消飲止嘔和中順氣

茯苓去皮 半夏泡 陳皮去白 生薑各一錢半

右吹咀水二盞半煎一盞去滓臨臥溫服

易簡二陳湯

治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

並宜服之

陳皮去白 半夏各五兩 茯苓三兩 甘草

右吹咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一

箇煎至六分去滓熱服無時傷寒後不敢進

燥藥者亦宜服餌如痞疾加草菓一兩半下

紅丸子如因酒食所傷發為黃疸亦宜用此

二藥嘔吐甚者加丁香並服半硫丸一法仍

用半夏為末每一兩入丁香一錢旋以生薑
 自然汁丸如桐子大先以湯二盞煎沸次下
 丸子藥煮令極熱以匙挑服用藥汁嚥下夏
 服養正丹或來復丹黑錫丹之類俟大便利
 即愈如姪婦惡阻古方用茯苓半夏湯服者
 病反增劇不若用此藥極有神驗一方名枳
 實半夏湯治痰飲停留胸膈痞悶或咳嗽氣
 塞頭目昏重喘嘔惡心項背拘急半夏陳皮
 各一兩枳實減半加生薑煎服一方名丁香
 茯苓湯治久積陳寒流滯腸胃嘔吐痰沫或

有酸水全不思食用木香丁香乾薑附子半
 夏橘皮肉桂縮砂仁等分加生薑煎服一方
 名曰白朮半夏湯治脾虛停飲痰逆惡心中
 腕刺痛腹脇攪疼頭目昏暈肢節倦怠不思
 飲食用白朮丁香赤茯苓各一兩半夏六兩
 肉桂半兩陳皮二兩半亦加生薑煎服生薑
 乃嘔家聖藥凡嘔吐宜多用之為佳

易簡四七湯

治喜怒哀思驚恐憂之氣結成痰涎狀如破
 絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此

七情之氣所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中脘嘔逆惡心並宜服

半夏

五兩

茯苓

四兩

厚朴

三兩

紫蘇葉

二兩

右咬咀每服四兩水一盞半薑七片棗一枚煎至六分去滓熱服無時若因思慮過度陰陽不分清濁相干小便白濁用此藥下青州白丸子最為切當婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一名大七氣湯局方七氣湯有半夏三兩人參甘草官桂各一兩生薑煎服

大治七氣並心腹絞痛然藥味大甜恐未能止疼順氣一方治七氣所傷中脘不快氣不升降腹脇脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩煎服尤妙好事者謂其耗氣則不然蓋有此病而服此藥也

赤茯苓湯

順氣消痰止嘔調中益氣補胃祛濕

陳皮

半夏

川芎

人參

白朮

赤茯苓

右為粗末生薑水煎服

衍義有人曾患氣嗽將期或教以服陳皮生薑焙乾神麩等分爲末糊丸桐子大食後臨臥服三十丸米飲下舊有膀胱疾自此皆愈乳和薑皮湯治赤白下痢神驗

陳皮 一兩 薑屑 三錢

右二味用牛乳一大盞和藥煎熱去滓入生牛乳一半頓服

治胃和痰丸 治中寒停飲胸膈痞塞痰涎

半夏 兩洗三 橘皮 去白 乾薑 炮 白朮 各一

右爲細末薑汁糊丸桐子大每服二十九薑

湯無時下

大橘皮丸 末趙十一郎家製

陳皮 去白 茯苓 甘草 鹽淹薑

葛根麩

右爲細末煉蜜丸彈子大細嚼白湯下

小七氣湯

當在大半夏湯條下治虛冷上氣喘塞不通

半夏 錢洗六 桂心 人參 各一 生薑 五錢

右四味咬咀水四盞煎至二盞去滓分二服

相繼無時服

活人小半夏加茯苓湯

治諸嘔噦心下堅滿膈間有痰火心悸

半夏湯洗七次五兩 茯苓去皮三兩

右剉如麻豆大每服半兩水三盞煎一盞秤

小生薑四錢取自然汁投藥中更煎三兩沸熱

服無時

青龍散 治咳嗽上氣不臥

人參 陳皮 紫蘇葉 五味子

大右為細末每服三錢水一盞生薑五片煎至

七分去滓溫服

活人橘皮湯 治傷寒痰逆惡心

陳皮 甘草 人參

小右為粗末竹茹生薑棗煎如不惡寒者加竹

葉為末煎水飲下 大煮棗坐薑下

玉液丸 玉芝丸 主治修製並見局方

文潞公生犀丸 並見藥準秘 小兒驚風

易簡消暑丹 並見藥準秘 並見局方

局方玉壺丸 主治脩製並見本方易老

治頭風口眼喎斜及風痰等證並見活法機

要 南星 半夏 天麻 白朮

辰砂化痰丸治半夏湯天麻白麪

易老水煮金花丸治修製並見活法機要

文淵南星半夏天麻雄黃

正氣生薑白麪寒水石生薑

右為細末滴水丸桐子大煮熟生薑湯下

小黃丸治修製並見活法機要

黃芩南星半夏生薑

右薑汁打糊為丸寒熱並服

定喘丸治虛人咳嗽胸滿及鼻息音大喘行坐無時

連年不已或遠或近並能治之

人參二錢南星半夏苦葶藶兩

右為末以生薑自然汁糊丸黍粒大每服三

五十丸生薑湯下漸加亦可小兒服減丸數

二炒丹治精滑夜夢鬼交溲出白液飲食少虛勞病

或嘔或吐木豬苓各半斤

同炒為末黃芩半

醫聖元戎卷八

五十四

國立公文書館

National Archives of Japan

右先以豬苓去皮切作片子同炒微黃色半
夏另為細末用陳米飯搜和為丸豌豆大風
涼一夜次日將豬苓為粗末炒熱下丸子同
炒稍乾為度乘熱以紙裹至冷用木合子盛
貯一法酒糊丸

消痰丸

細辛 桔梗 陳皮 旋覆花

神麩 枳實 半夏 白茯苓

麥蘖 白朮 各等分

右為細末生薑汁打糊丸如梧桐子大生薑

湯下三五十九食後服

安和丸

治脫證虛弱嗽年老虛人尤宜服之

大粟殼 炒 陳皮 各二兩 炙甘草 二錢

一法加烏梅半兩為細末薑糊丸

玉芝丸 玉液丸

加生薑人參藿香名人參半夏丸

易簡參蘇飲 惺惺散

主治並見少陽茈胡例

仲景葶藶大棗瀉肺湯

治肺癰不得臥兼治支飲不得息又見金匱

苦葶藶

炒香搗

大棗

二十枚

右丸如彈子大每用水三升大棗十枚煎二

升化一丸再煎一升頓服

三聖丸 治喘嗽面目微腫

甜苦二葶藶

右末棗肉丸茶豆大每服三十丸臨臥薑湯

下

仲景豬膏丸 此本少陰為豬膚故入豬肚膽

汁例

治少陰病下痢咽痛胸滿心煩邪氣自少陽

經傳夫少陰客熱

右用豬膚一斤水一斗煮取五升去滓入白

蜜一升白粉五合熬香和粗得所分作六服

水畜入腎豬膚解熱潤燥除煩粉以益氣斷利

仲景白通豬膽汁湯

四逆豬膽汁湯

並見仲景本經

仲景豬肚丸

白朮

四兩

牡蠣

燒研

苦參

二兩

右為細末豬肚一枚內藥末纏定煮軟熟切碎碾泥成膏和丸桐子大每服三十丸米飲

下

又豬肚黃連丸 見本草

錢氏香連丸 橘連丸 並見本方

豬肚丸

治骨蒸唇紅頰赤氣粗口乾身壯熱多虛寒

大便秘小便赤食減少

鼈甲醋炙 苡胡 木香 青蒿

黃連 生芋各一兩 青皮半兩

右為細末嫩大豬肚一枚入藥在內繫定蒸軟藥肚仍碾勻可丸菘豆大每服三十九米

飲下食前服三服忌熱物濕麪 良本方

補真丸 一名天真丸

天門冬去心三兩 羊肉三斤去筋膜

肉苁蓉六兩去粗皮 當歸五兩去芦

右已上俱作片子焙乾為末焙先將羊肉煮

去羊肉水洗淨再煮至熟去絲細筋膜研爛

再入無灰酒煮至成膏入止項藥末及糯米

粉子半斤再煮數十沸至稠粘膏子為度再

入下項藥

黃耆六兩 遠志 白朮 枸杞各二兩

沈香半兩神麩五兩赤茯苓四兩乾山藥二兩

右為細末入上件膏子內同和更入宿蒸餅麩十數兩搜和成劑至可丸即止丸如桐子大每服空心溫酒送下七八十丸至百丸

豬蹄湯

古知母貝母牡蠣炒過赤作粉各等分

右為細末豬蹄四箇慢火煮軟熟用調服三錢七後滋味汁一碗投之少時熟蹄任意食用或先食豬蹄飽後服亦得

海藏評解利傷寒丸藥雜例並見本方注後

玄胡丸

玄胡各半青皮陳皮三稜各五

廣茂雄黃另研細入上末同研

乾薑各五

無右為細末醋糊丸酒糊亦得每服二三十丸白湯無時下解利內外傷

紫霜丸

治傷寒溫肚內夾冷食或因得汗身熱不除及變蒸發熱日久不解飲食成癩俗呼為食迷風

代赭石

火煨醋淬一兩

杏仁

五十箇去皮尖

赤石脂

為末一兩

巴豆

三十箇去皮心膜油炒研

右合碾勻湯浸蒸餅為丸黃米大小兒生三

十日以外可一丸一年二年可三丸乳下米

飲亦得

無名丸解內外傷與四生丸例相似在半夏條下

代赭石

貫眾

茯苓

各一兩

寒水石

黑豆

去皮四兩

自然銅

三兩三錢醋淬九次

右件共為細末水糊丸菴豆大每服三五

丸薑湯下米飲亦得

無名丸料

寒水石

洗粉

黑豆

去皮各一兩

貫眾

茯苓

各為末

代赭石

火燒酒淬末之各三錢半

自然銅

酒淬七錢半為末

右無名丸此藥不知來例別無解利味數止

是貫眾治頭風有毒大抵解疫癘毒氣則効

非若古法之分經也本草云代赭石苦甘寒

治鬼疰賊風自然銅辛平無毒療折傷散血

止痛貫眾治頭風半夏治傷寒寒熱巴豆辛

溫主傷寒溫瘧寒熱豉煎亦解利右此三藥

雖云治傷寒只治因內感而發出者多効若
外感一日太陽受之不宜用此等之藥性者
不可執此以解利外傷此藥大抵只治內而
不治外不能行經若要行經非湯液不能也
代赭石自然銅二味兼以醋淬過煨以苦酒
上火力同能上行故解也若以代赭石自然
銅二石性論下行之體無疑更宜詳紫霜丸
主治傷寒溫壯內夾冷食一旬即知無名體
也

天麻辰砂丸

天麻 四兩 巴豆 二百粒去皮膜油 雄黃 各五錢
硃砂 三錢

右為細末每服三五丸白湯送下溫酒亦得
食後蠟和丸黍米大

玄胡丸內有雄黃乾薑苦酒與此一體解利在
厥陰門木香檳榔例後

安先生傳易老解利二藥

狼毒 大戟 草烏頭 生各等分
右為末醋糊丸桐子大每服五七丸或十九丸

溫水送下

解利傷寒噤藥

乾山藥 一兩 藜蘆 連鬚一錢

右細末以紙撚噤之

楊氏內解丸

芫花 各等分 紅藥子 各等分

右細末醋糊丸綠豆大溫水下二丸無時以

葱白醋米湯投之

四生丸

南星 半夏 芫花

自然銅 等分皆生用

右為細末醋打蕎麥麪糊為丸綠豆大如酒積痰飲胸膈脹滿飲食不消每用五丸臨臥溫水下忌熱物如傷寒時疾煎豉湯下一十丸三服解如心氣大痛醋湯下海藏云非湯液所用丸藥解利世多不同皆取此例

拾遺

大腸泄 小腸泄 大痕泄 飧泄

洞泄 寒中 寒濕 澹泄

泄瀉 濕淫 燥濕 濕熱

風濕 驚澹 胃泄 脾泄

脫肛 臟毒 瘀血

凡此數條俱見湯液大法後

翻胃例

御醫楚侍藥白龍丸

治膈氣翻胃吐食大便結硬要大便如常者

不可服

輕粉半錢 半夏半錢 白麪各三錢

右拌末和勻水和作棊子或丸湯煮熟漉出放溫臨臥作一服生薑湯下取下燥糞核為度

生薑半夏湯 止嘔吐開胃消食

半夏湯洗 生薑各三錢

大有剉量水多少煎至七分

雞屎醴散 治蠱脹且食不能暮食不已

帝曰膚脹鼓脹可刺邪岐伯曰先泄其脹血絡

後調其經刺其血絡也

薑棗湯 此後三藥辛甘以助天五之氣

乾棗去核一斤 甘草三兩 生薑五兩

右拌盆盛布蓋淹一宿焙乾為末每一盞入

鹽少許點服鹽二兩炒白另入藥

棗艾丸補胃

乾棗

去核 熟艾 熬如棗核 入棗中

右以綿纏定濕紙裹澆灰火內煨紙焦為度

至九日後日減一箇至三箇依前再加一箇

三遭當進飲食也胃氣壯即止不飲酒鹽湯

太陰拾遺

肘後辨脾胃所傷變易形法

凡諸脾脉微洪傷苦澁物 微弦傷冷硬物

微澁傷辣辛物 微滑傷腥鹹物

微遲傷冷痰積聚惡物

弦緊傷酸硬物 又主脾冷

微實主胸間有伏痰 或吐逆 洪緩傷甜爛物

緊惡膈間有硬積寒熱 單伏主物不消化

微浮胸中有小虫動 又主寒熱 單緊主胸中急痛

單弦主胸中氣聚喘促 單滑主脾寒吐逆

單洪主寒熱吐逆不食 單浮胃寒不進食

浮洪而數皆中酒

海藏所定脾脉一十七道安方大畧

六十一

六十一

六十一

六十一

六十一

傷苦澁物經云鹹勝苦

傷辛辣物經云苦勝辛

傷腥鹹物經云甘勝鹹

傷酸硬物經云辛勝酸

傷甘爛物經云酸勝甘

傷冷硬物經云溫以克之

冷痰積聚惡物溫胃化痰膈間有伏痰

夏吐之 秋冬導之

膈間有硬積寒熱溫化

胃中有小虫檳榔之類

物不消化 麩蘖 二稜 茂之類

胃中急刺痛理中丸之類

胃中氣聚喘促勻氣湯

寒熱吐逆不食

橘皮 半夏 白朮 茯苓

脾寒吐逆枳實理中湯

胃寒不進食烏梅白朮

浮洪而數皆中酒葛根陳皮茯苓

金匱痰飲咳嗽病脈證治後代名醫所說皆取

此為法

問曰夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有

溢飲有支飲又問四飲何以爲異師曰其大
 素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲
 後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水
 流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼痛
 謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得臥其
 形如腫謂之支飲水在心心下堅築築短
 氣惡水不欲飲水在肺吐涎沫欲飲水
 水在脾少氣身重水在肝脇下支滿而痛
 水在腎心悸夫心者有留飲其人背寒
 冷大如手留飲者脇下痛引缺盆欬嗽則

輒已一作甚胸中有留飲其人短氣而渴四肢
 歷節痛脉沈者有留飲膈上之病滿喘
 欬吐發則寒熱背痛腰疼目眩自汗出其人
 振振身潤劇必有伏飲夫病人卒飲水多
 必多暴喘兀食少飲多水停心下甚者則悸
 微者氣短脉反弦者寒也皆大下後善虛
 脉偏弦者飲也肺飲不弦但苦喘短氣支
 飲亦喘不能臥加短氣其脉平也病痰飲
 者當以溫藥治之心下痰飲胸膈支滿目
 眩以茯苓桂枝白朮甘草湯主之方

茯苓四兩 白朮五兩 炙草二兩 桂枝二兩

右咬咀以水六升煮取三升去滓分溫服作

三服小便則利夫氣短有微飲當從小便赤

也亦以上藥主之腎氣丸亦主之方見胸氣論中

病者脈伏其人當自利利者反快雖利心下

續堅滿此為留飲欲去故也以甘草半夏湯

主之方

甘遂大者 半夏二十枚 溫水洗次用水一

芍藥三枚 炙草大者 右四味咬咀水三升煮取半升去滓以蜜半

升和藥煎取八合頓服之

夫病懸飲者十棗湯主之方

芫花熬 甘遂 大戟各等分

右三味搗篩以水一升五合熬大棗十枚煮

取八分去滓內藥強人一錢七弱人半錢平

旦溫服之不可者明日更加半錢下後糜粥

以養之

病溢飲者當發其汗宜大青龍湯方

麻黃去節 桂枝去粗皮 炙草二兩 生薑二兩

石膏小雞子 杏仁四十枚 大棗十枚

右六味細研 石膏大細研 杏仁去皮尖 大棗去核

六十六

六十六

六十六

六十六

右七味呔咀以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升被覆令汗出汗者溫粉撲之一服汗出者勿再服若復服汗出多者亡陽逆虛惡風煩燥不得眠也

病溢飲者當發其汗小青龍湯主之方見肺痿論

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉

沈緊得之數十日醫吐下之不愈防已湯主

之方

防已二兩 桂枝二兩 人參四兩 石膏雞子大

右四味呔咀以水六升煮取二升去滓分溫再服虛者即愈實者三日復愈如不愈者宜去石膏加茯苓芒硝湯方

防已三兩 桂枝三兩 人參四兩 茯苓四兩

芒硝三合

右五味呔咀以水六升煮取二升去滓內芒硝再微煎分溫再服微利止心下有支飲其人苦眩胃澤瀉湯主之方

澤瀉五兩 白朮二兩

右二味呔咀以水二升煮取一升去滓分溫

再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之方

厚朴

一尺去皮

大黃

六兩

枳實

四枚熬

右三味以水五升煮取二升去滓溫再

服

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之方

見肺癰條下

嘔家本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏

湯主之

半夏

洗一升

生薑

半斤各

切薄片

右以水七升煮取一升半去滓分溫再服

千金

云半夏加茯苓湯主之

腹滿口乾舌燥此腸間有水氣防已椒目葶藶

大黃湯主之方

防已

椒目

葶藶

大黃

各一兩

右四味為末蜜和丸桐子大米飲服一丸日

三服稍增口中有津液止渴者加芒硝半兩

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓

湯主之方

半夏

洗一升

生薑

半斤

茯苓

三兩一

方四兩

右以水煎服

師曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數為客
 熱不能消穀胃中虛冷故吐也脈弦者虛也
 胃氣無餘朝食暮吐變為翻胃寒在於上醫
 反下之今脈反或名曰虛寸口脈微而數則
 無氣無氣則胃虛胃虛則血不足血不足則
 胸中冷跌陽脈浮而濇浮為虛濇則傷脾脾
 傷則不磨朝食暮吐宿食不化名曰反脈浮
 而濇其病難治 病人欲吐者不可下之
 噦而復滿視其前後知何部不利利之則愈
 嘔而胸滿者茱萸湯主之方

吳茱萸升一人 人參二兩 生薑六兩 大棗二十枚

右四味以水五升煮取一升去滓溫服
 七合日三則乾嘔吐涎沫頭痛者茱萸湯主
 之

嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之方

半夏三斤 黃芩三兩 人參三兩 炙甘草三兩

乾薑三兩 黃連一兩 大棗十二枚

右七味以水七升煮取六升去滓再煎服一
 升日三服

乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之方

黃芩三 炙草三 半夏半升 芍藥三

大棗十二枚 生薑鉤兩半

右咬咀水一斗煮取一升去滓分溫三服日

二服夜一服

諸嘔吐穀不得化下者小半夏湯主之方方見痰

嘔吐而病在膈上後思水者急與解之豬苓湯

主之方

豬苓去皮 白朮各等分 茯苓

右咬咀水煎服

欬滿則止而復更渴衝氣復發者以細辛乾薑

為熱藥此法逐渴反不止者為支飲也支飲法當治胃胃冷者必嘔水復與半夏以去其水方

茯苓四兩 乾薑三兩 五味子半斤 細辛三兩

炙草三兩 半夏湯洗七次去滑半斤

右六味咬咀以水八升煮取三升分溫三服

去嘔則止其人形腫可內麻黃以其欲逐痺

故不內麻黃乃內杏仁也若逆而內麻黃者

其人必厥所以然者為其血虛麻黃發其陽

故也

茯苓四兩 乾薑三兩 甘草三兩 五味子碎半

細辛三兩 半夏洗 杏仁去皮尖

右咬咀以水一斗煮取三升去滓溫三服

面熱如醉狀者此為胃中熱上薰其面令熱

加大黃湯主之

茯苓四兩 乾薑二兩 細辛二兩 大黃二兩

五味子碎 半夏洗 甘草炙 杏仁去皮尖

等分

右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓分溫

三服並見千金方

先渴却嘔為水停心下此屬飲家小半夏加茯苓

茶湯主之方見上

金匱嘔噦下痢病脈證治後代名醫諸書率皆

取此以為法

夫嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡則已先嘔

却渴此為欲解先渴却嘔為水停心下此屬

飲家嘔家本渴今反不渴者以其心下有支

飲故也此屬支飲八問曰病人脈數數為熱

當消穀引飲而反吐者何也師曰以發其汗

令陽微膈氣虛脈乃數云見前

假令病人臍下有悸者吐涎沫而顛眩水也五

苓散主之方見局方

如心胸中有停飲宿水自吐出水後心胸中虛

氣滿不能食消痰氣今能食茯苓飲方附方

茯苓三兩人參二兩枳實兩生薑四兩

失神白朮三兩橘皮二兩

右咬咀以水六升煮取一升八合去滓分溫

三服如人行八九里進之見外臺

嗽家其脈弦為有水十棗湯主之方見上

夫有支飲家嗽煩胸中痛者不卒死至二百日

一歲與十棗湯久欬數歲其脈弱者可治

實大數者死其脈虛者必苦胃其人本有支

飲在胸故也治屬飲家欬逆倚息飲小青

龍湯主之方見肺癰中青龍已下多唾口燥寸沉

尺微手足厥逆氣少復上衝胸咽手足痺其

人面赤如醉因復下溜陰股小使難時復冒

者可與桂枝五味子甘草湯治其氣衝方

茯苓四兩桂枝四兩炙甘草三兩五味子半斤

右四味咬咀用水八升煮取三升去滓分溫

三服

衝氣即低而反更欬滿者茯苓五味子甘草去

桂加乾薑細辛治之方一名甘草五

茯苓四兩炙草三兩五味子半升

細辛三兩乾薑三兩

右以咀水八升煮取三升去滓分溫三服

嘔吐而滿在膈上後息水者豬苓散主之方前見

嘔而脉弱小復復利身有微熱見厥者難治四

逆湯主之方

炙草二兩乾薑二兩半附子一箇去皮

右三味以咀咀以水三升煮取一升三合去滓

分溫再服強人可大附一枚乾薑三兩

嘔而發熱者小茈胡湯方

茈胡 人參 黃芩 生薑煨三

大炙草 半夏 大棗一枚

右七味以咀咀水一斗二升煮取六升去滓再

煎取三升溫服一升分三服

胃反嘔吐者大半夏湯主之方又主隔

半夏洗用人參白蜜一升

右三味以泉水一斗二升和蜜揚之二百四

十遍煮藥取二升半去滓溫服一升餘分再

服千金云治胃反不受食食已即吐外臺云治嘔心下痞硬者長篇分四

食已即吐者大黃甘草湯主之方二兩四

大黃四兩炙草二兩

胃右二味以水一升煮取一升去滓分溫

再服外臺云又

胃反吐而渴欲飲水者茯苓白朮澤瀉湯主之

方茯苓半斤澤瀉四兩桂枝二兩炙草二兩

白朮三兩生薑四兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再

煮取一升半去滓溫服八合日二服外臺云

脈絕胃反不食又有小麥一升今古醫方卷之八

吐後渴欲得飲而貪水者文蛤湯主之方兼主

脈緊頭痛文蛤五兩麻黃三兩炙草二兩石膏五兩

生薑三兩大棗十二枚杏仁五十枚

右七味以水六升煮取二升去滓溫服

一升汗出愈

乾嘔吐逆涎沫半夏生薑散主之方

半夏洗生薑各等分

各等分

七十四

七十四

七十四

七十四

右二味并為散取方寸匕漿水一升半煎取
七合頓服之

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦澀心
中憤憤然無奈者生薑汁半夏湯主之方

生薑 一升 半夏 半升洗半

右二味以水三升煮半夏取二升內生

薑汁煮取一升半去滓水冷分四服日三夜

若一服止停後服

乾嘔噦若手足厥冷者橘皮湯主之方

橘皮 四兩 生薑 八合

右二味切以水七升煮取三升去滓溫服一

升下咽即愈

噦逆者橘皮竹茹湯主之方

橘皮 二升 竹茹 三升 大棗 三十枚 生薑 半斤

人參 一兩 炙草 五兩

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服

一升日三服

右此痰飲嗽一章內有治傷寒數方仲景用

治雜病今余錄之使後人知云治傷寒有法

治雜病有方者非也傷寒雜病同一治矣

嘔吐噦亦附錄之下痢數方錄在太陰土卷後

欲斷除今余驗之對勞人服之亦效於寒濕水

濕水煎寒水煎三章白蘇白蘇湯寒濕水煎最用

長甘

古六刺知用取本一半煎取三長去飲監用

有人參之補交草

醫壘元戎卷八終

欲滋養滋養於滋養是之次

欲滋養滋養於滋養是之次

醫壘元戎卷第八終

