


聖王濟總錄纂要

四之十一


庫文閣内	
番號	漢 12635
冊數	4 ( 2 )
函號	300 220





醫國醫館寄宿  
察書 聖濟總錄纂要卷之四

養安院藏書



新安

程

林雲來

纂

錢塘

陳

繼新澹持

較

新安

江

湘鄂上

閱

傷寒乾嘔

傷寒乾嘔

傷寒心悸

傷寒乾嘔

傷寒乾嘔

論曰傷寒乾嘔者嘔而無所出也此因邪熱在胃或汗解後胃中不和尚有蓄熱氣薰上焦心中痞結故令乾嘔且諸邪氣在胃胃氣上逆皆為乾嘔冷即寒痰凝結嘔出涎沫熱即津液消燥獨其氣逆故乾嘔不已施治者不可不察

竹茹

半夏

甘草

五

人參

芦根

一

前胡



葛根 分五 姜水煎五錢服

芎根湯 治心脾虛熱乾嘔煩熱不下食

芎根 西一 人參 赤茯苓 竹茹 西一 甘艸 西五

水煎五錢入小麥一撮姜一分溫服日二

枇杷葉湯 治乾嘔煩渴不止

枇杷葉 去毛 蜜炙 麥冬 人參 葛根 分三 白茯苓

甘艸 分一 姜水煎三錢服

人參煮散 治胃氣虛冷乾嘔不止

人參 西一 白朮 白芍 杏仁 陳皮 枳殼

高良姜 西一 甘艸 乾姜 西五 姜水煎三錢稍熱服相

白朮 飲 治邪熱雖退胃中不和乾嘔不已甚則吐逆

白朮 西一 紫朴 西一 枇杷葉 去毛 炙 西五

傷寒嘔噦 煎三錢空心溫服日二

桂枝湯 善東酒水煎五錢去滓入阿膠一片今洋畫溫服日二

桂枝 西一 赤茯苓 西一 白朮 西一 甘艸 西一 陳皮 西五 白朮 西五

傷寒痞滿 論曰傷寒病發于陰匿候下之邪氣入裏胃中虛客氣上

逆心下滿不痛按之不堅此為痞也法宜瀉心唯表未解

者未可攻之當先解表然後攻痞若表解而裏未和或瀉

心而痞不解其人口燥煩渴皆隨症處治其眩冒而經脈

動惕者久則成痞若表裏俱虛之人有氣痞陰陽氣并竭

無陽則陰獨復加火針因胸煩面青黃膚潤者難治其脈

微浮而氣上冲咽喉不能息者非痞乃有寒在胸中故也

治屬吐法

半夏瀉心湯 治心下痞但滿不痛者

半夏 西一 乾姜 西一 人參 西二 片苓 西一 川連 西一 甘艸 西五

半夏 西一 乾姜 西一 人參 西二 片苓 西一 川連 西一 甘艸 西五

半夏 西一 乾姜 西一 人參 西二 片苓 西一 川連 西一 甘艸 西五

半夏 西一 乾姜 西一 人參 西二 片苓 西一 川連 西一 甘艸 西五

半夏 西一 乾姜 西一 人參 西二 片苓 西一 川連 西一 甘艸 西五

半夏 西一 乾姜 西一 人參 西二 片苓 西一 川連 西一 甘艸 西五

半夏 西一 乾姜 西一 人參 西二 片苓 西一 川連 西一 甘艸 西五

半夏 西一 乾姜 西一 人參 西二 片苓 西一 川連 西一 甘艸 西五



大黃黃連瀉心湯 治傷寒大下之後復發汗心下痞惡

寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃攻痞解

表宜桂枝湯攻痞宜此湯

大黃黃連瀉心湯 以廣黃沸湯漬三錢須臾絞取汁

溫服

浮心湯 治傷寒汗解後胃中不和心下痞硬噫食須臾

下有水氣腹中雷鳴下利

人參 甘草 川連 乾姜 枳芩 半夏 晒

甘 瀉心湯 治傷寒中風匡反下之其人下利日數十

行完穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不

得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非

結熱但以胃中虛客氣上逆故使硬也

灸甘草 枳芩 干姜 半夏 川連

旋復花代赭石湯 治發汗若吐下後心下痞硬噫氣不除

水煎四錢大棗二枚溫服

旋後花 代赭石 人參 半夏 甘草

藜藹湯 治胸中痞滿心腹氣滯不思飲食

紫藜葉 大腹皮 旋復花 陳皮 赤茯苓

半夏 姜棗水煎四錢溫服日二

異効丸 治五六日大下後心中痞滿氣息喘逆欲絕

人參 白朮 甘草 枳殼 赤茯苓 枳櫬 陳皮炒

木香 乾姜 共末蜜丸 桐子大空心米飲下二

草豆蔻湯 治傷寒汗後胃氣不和心下結痰噫氣食須

臍下虛滿虛鳴下利

草薢 陳皮 枳殼 人參 半夏 甘草

乾姜 姜棗水煎五錢溫服日二



傷寒霍亂

傷寒小便不通

傷寒大便不通

傷寒霍亂

論曰嘔吐而利病名霍也此由邪氣在中焦使陰陽二氣

不能升降則心腹俱痛而作吐利其候先心痛則先吐腹

後痛則先利心腹俱痛則吐利並作古人以其病風暴揮迅

霍之間便致捺故名霍亂傷寒霍亂亦由中焦陰陽不

和所致故其狀有熱而者有寒而不渴者有發熱惡寒汗

出厥逆者有病勢已而身躄疼痛不休者不可驟以法治

理中湯治霍亂吐利寒多不喜飲水

人參白朮甘草乾姜二兩

共末蜜丸彈子大沸湯化一九溫服日三夜一

五苓散治霍亂頭痛發熱多欲飲水

猪苓白朮桂心赤茯苓澤瀉

芎藭人參湯治霍亂心煩乾嘔

芎藭人參麥冬赤茯苓枇杷葉

藿香湯治霍亂轉筋嘔吐不止

藿香人參附子木瓜桂心川芎

生薑水煎三匙溫服日二

吳茱萸湯治霍亂吐利腹脹轉筋手足冷飲食不消

吳茱萸紫朴一兩桂心丁香木瓜甘草

霍香人參姜水煎三錢服二

白朮湯治霍亂吐利轉筋

白朮陳皮一兩木瓜二兩姜水煎三匙溫服日二

傷寒小便不通

論曰傷寒小便不通者或因發汗過多津液虛少胃中乾

燥或小腸有伏熱氣道不宜皆令小便不通也方論云胃

中乾則無小便慎不可利蓋言汗後亡津液也若下焦有



熱而小便不利又當隨症利之  
赤茯苓木通湯 治下焦有熱小便不通

赤茯苓 木通 滑石 車前子 水煎五錢溫服日二  
猪苓湯 治脉浮發熱渴欲飲水小便不利

猪苓 赤茯苓 滑石 沢瀉 水煎五錢去渣入阿膠末一錢再沸溫服日二

五苓散 治傷寒汗後小便不利微熱消渴  
猪苓 赤茯苓 白朮 桂心 沢瀉

共末水下三錢  
雞糞湯 治小腹急痛小便不利

雞糞 木通 滑石 杏仁 炙葵子 石韋  
去毛 把一 生地 水煎五錢溫服

傷寒大便不通有胃府實也 因大陽病若汗若下若  
論曰傷寒大便不通有胃府實也 因大陽病若汗若下若  
利小便便七其津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大

便難此陽明症也當下之然有陽明症不可下者當問其  
小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不  
久出為小便數少津液當還胃中故知不久當大便如此  
則傷寒吧多雖有陽明症不可下明矣凡胃中有燥屎常以  
湯水和之湯入腹中轉失氣者此所謂有結燥下之無害  
若不轉失氣者此但初硬後必溏不可下下之則脹滿不  
能食也

小承氣湯 治陽明病潮熱若不大便六七日恐有燥屎  
欲知之法少與小承氣湯陽入腹中轉失氣者有  
燥屎也乃可攻之若不轉失氣者但初頭硬後必溏  
不可攻攻之必腹脹不能食也欲飲水者與水則噦  
其後發熱者必大便硬而少也以小承氣湯和之

大黃 酒洗 紫朴 姜汁炒 枳實 炒  
水煎五錢溫服當更衣不爾者再服更衣者勿服  
後若不轉失氣者不可攻

後若不轉失氣者不可攻



大承氣湯

治傷寒病不大便五六日，繞脐痛，煩燥，發作

有時此為有燥屎，宜此湯。

入芒硝一錢，數沸，溫服。仲景云：少陰病六七日不

大便者，此湯主之。

跌

六仁丸 治傷寒，跌湯，脈浮而滿，浮則胃氣強，澁則小便

數，浮澁相搏，大便則硬，其脾為約。

杏仁 炒二

蜜膽導

治大便秘澁，服茶不通。先將蜜入銅器中，

白蜜 三

校

微火慢熬二十沸，入膽汁，將桃子不佳，手攪，慢煎成

傷寒下利

此論誤以下利為痢病

渴

論曰：傷寒下利者，其種因多端，然皆由表實裏虛，寒熱溫氣乘虛，客搏于腸胃之間，故腸胃隨其所傷而下。若傷寒則下青白，傷熱則下黃赤，寒熱相雜則赤白俱下。若兼以濕毒，則又下膿寒，如魚腦，如爛肉也。其候不同，有下利而脈虛者，有下利而脈實者，有濕毒勝而腹痛者，有熱氣盛而煩滿者，有津液搏滯而腸垢者，有屎燥結聚而妄言譫語者。其要在審別虛實以治之。

白頭翁湯

治傷寒下利，飲水者內有熱也，及熱利後重。

桃花湯

治傷寒少陰病二三日，至四五日，腹痛，大便不利，下利不止，及便膿血。

赤石脂

水一升者，薑米并不研，石脂候米熟，用汁一小鐘入。

假

石脂末一錢，再沸，溫服，日三。



四逆湯 治自利不渴者屬大陰以其臟有寒故也當溫之

炙甘草 附子 乾姜 水煎五錢溫服

又治傷寒後下利清穀不止身疼痛急當救裏

犀角湯 治熱毒不解日晡壯熱腹痛純下鮮血

犀角 片芩 川連 葛根 地榆 小枝

水煎五錢入薤白五寸溫服

黃柏湯 治下利膿血

黃柏 阿膠 川連 山枝 水煎三錢食前服日三

龍骨丸 治臟腑虛冷下白濃腹痛

龍骨 乾姜 附子 醋糊丸 桐子 大米 飲下三十九日二

竹茹湯 治利下血不止

竹茹 白芍 子芩 木通 升廣 黑水耳 灰燒

水煎三錢去滓入生地汁一分溫服

傷寒陰毒 傷寒陽毒 傷寒發斑

傷寒陰毒

論曰陰氣獨盛陽氣暴衰陽為陰所勝內外皆陰故成陰

毒傷寒有初得病便成陰毒者有腹紫經五六日不差變

成陰毒者以病本屬陰因服寒藥過多或臟腑內外受寒

陰氣轉盛陽氣不復所致其候四肢逆冷臍腹築痛身如

被擊吐下利其脈微細而疾

陰毒甘艸湯 治傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥

後自變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣

攻心心中堅強短氣不得息吧逆唇青面黑四肢厥

冷其脈沉細身如被杖五六日可治至七日不可治

甘艸 升廣 圭心 川歸 川椒 雄黃

水煎五錢溫服日二

氣壅喘悶方 治陰毒手足厥冷或生斑點

附子 二枚 火燒黑 為末用沉香磨水米飲下二錢

正陽湯 治傷寒陰毒唇青面黑張口出氣心下硬身



熱額上出汗煩渴不止舌黑多睡四肢逆冷

附子 甘草 乾姜 皂莢 廣香 研

共末水煎二匙稍熱腹

正陽丹 治陰毒手足厥冷脉沉細面目青

硫黃 硝石 大陰玄精石 同研入瓶內鹽泥封

附子回陽散 治傷寒陰毒面青唇黑四肢逆冷腹痛

身躄如火并一切卒暴冷氣

附子 為末用生薑自然汁半鍾冷酒拌勻下三匙

更以冷酒逆下相次再服良久脐下如火偏身和暖為度

傷寒陽毒 論曰陽氣獨盛陰氣衰陰為陽所勝內外皆陽故名為

陽毒傷寒有得病便成陽毒者有服藥經五六日不差變

成陽毒者蓋以病本屬陽或以火劫其汗或因灸熯陽

氣轉盛陰氣內消所致其候面赤發狂走妄言或發斑

如綿紋或咽喉疼痛或涕吐膿血或下痢黃赤其脉洪實

滑促是其證也 升廣湯 治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成

陽毒腰背疼痛煩悶不安面赤狂言或見鬼神或下

痢脉浮大數面赤斑紋如錦咽喉痛吐膿血五日可

治七日不可治 升廣 犀角 射干 人參 片苓 甘草

枝子湯 治陽毒壯熱百節疼痛 水煎五錢温服少頃又服取汗未汗再服

枝子 赤芍 大青 知母 石羔 片苓

杏仁 炒 二 甘草 五 柴胡 兩 一

黑奴丸 治傷寒時行熱病六七日未得汗脉洪大或面

赤目張身大熱煩渴狂言欲走渴甚又五六日以上

不解熱在胸中口噤不能言心下而暖灌菜下咽即



治兼治陽毒及癰狂

麥奴山麥未熟時中自有不成者上有

廣黃去根節

大黃西一片芩 芒硝 釜底煤 竈突煤 梁上塵

共末蜜丸彈子大取新汲水化下一丸渴者與

冷水盡量飲之須臾當寒寒過汗出即差若服某日

移五尺不汗再服一丸差昂止須微利下此藥須病

人大渴倍常燥盛者乃可與之不爾不可與

大青湯 治陽毒煩躁不解或下利危困

大青兩二犀角兩二山枝 甘艸 川連五秦艽兩一

水煎五錢入豆百粒薤白七寸空心服

犀角湯 治傷寒陽毒和初得身大熱目赤便黃心悶頭痛

煩渴不止四肢疼痛語言錯亂眠卧多驚

犀角兩一赤茯 陳皮 甘艸 廣黃 細辛

茵陳蒿兩一人參三姜朮水煎五錢服

傷寒癰斑

論曰傷寒癰斑者陽盛故也其病在表或未經癰汗或已

經癰汗未解或吐下後邪熱不除毒氣內盛因表虛熱毒

裏虛出于皮膚癰為斑疹如綿紋若色赤癰在五六日內

者可治色黑過七日乃癰者難治甚則身躰喉舌皆成瘡

黃芩湯 治傷寒熱病十日內未得汗表裏有熱遂癰斑

點時或狂言目色黃心中煩熱大便不利

片芩 大青 升廣 朴硝 山枝兩一

茵陳蒿兩一川連 甘艸五竹葉三七片水煎五錢服

石羔湯 治癰黑斑

石羔兩二廣黃 葛根 川連三故鞋一細切去

川椒分炒一圭心五水煎五錢溫服取汗

傷寒癰黃 傷寒癰腕豆瘡

傷寒剛症 傷寒瘡

傷寒癰黃

論曰傷寒癰黃之狀身躰盡變黑黃或如橘色是也凡陽



背

急

明中風大陽中濕皆令人發黃蓋由得病無汗小便不利  
 寒濕不散則熱結脾胃滕理閉塞痰熱之氣與病穀相搏宿  
 而膏蒸不化消散故二便結澀不通令人身體面目皆變  
 黃色其病腹滿身疼發熱若其人小腹滿急服葶苈散鼻骨眼  
 痛兩膊及項強腰脊急者是也但得小便快利漸愈仍不  
 用大便多即令人心腹又有急黃者身躄黃甚卒然而發  
 心滿氣喘命在須臾故名急黃者初得病便黃者初不知  
 急黃死後方變黃者此病亦因脾胃痰熱本天行時氣  
 作宜細辨之但發熱心戰者乃是發黃之候  
 茵陳蒿湯治陽明發熱汗出此為越熱不得發黃也但  
 頭汗出小便不利渴飲水漿此為痰熱在裏身必發  
 黃下之宜此湯又傷寒七八日身黃如橘皮小便不  
 利腹微滿者宜此湯  
 茵陳蒿五錢兩六 枳子兩十 大黃兩生三 共為粗末水煎粗  
 五錢兩三 服後小當利下如皂莢汁狀乃愈

渴

廣黃連翹湯 治痰熱在裏發黃  
 廣黃兩二 去根節 連翹兩二 生薑兩二 杏仁兩四 皮尖炒  
 生梓白皮兩一 車前兩一 大棗兩十二 甘草兩一 水煎五錢熱服  
 枳子栝皮湯 治傷寒身黃發黃  
 枳子兩十 枳殼兩五 黃栢兩二 甘草兩一 水煎三錢  
 抵當湯 治傷寒大陽身黃脈沉細小腹鞭小便利者為  
 無血也小便自利其人如狂者血諦證也  
 水蛭兩三 炒 虻蟲兩三 炒 桃仁兩十 炒 大黃兩三  
 水煎三錢服  
 龍膽湯 治發黃煩熱皮肉皆黃小便赤不利  
 龍膽兩一 枳殼兩一 山梔兩一 木通兩一 知母兩一 柴胡兩一 地骨皮  
 白芍兩一 甘草兩一 麥冬兩一 升麻兩一 羚羊角兩一 水煎五錢  
 黃芩湯 治傷寒發黃或先服利藥未差宜以內消以折熱氣  
 片芩兩一 茵陳蒿兩一 升麻兩一 犀角兩一 山枝兩一 紫胡兩一  
 龍膽草兩五 水煎五錢入生地汁一合



茅根湯 治傷寒發黃 通身如金色

茅根 山梔 甘艸 茵陳蒿 地骨皮

姜水煎五錢入豉三七粒熱服

枚子湯 治傷寒急黃

山梔 柴胡 朴硝 茵陳蒿 水三七鍾煎二

大鍾 去渣入硝分三服取利

茵陳蒿散 治傷寒時氣急黃疼痛

茵陳蒿 片苓 枝子 大青 大黃 朴硝

白鮮皮 葛根 升半 共末新汲水下二錢得利差

傷寒發豌豆瘡

論曰傷寒熱毒內盛多發胞瘡者以病人表虛裏實故也

裏實則毒氣不能內消表虛故乘虛發于肌肉而成瘡其

瘡大小形如豌豆其色或白或赤若頭作瘰癧戴白濃者

其毒則輕若紫黑色作根隱在肌肉裏者其毒則重甚

者周匝偏身五內七竅皆有也

參廣湯 治傷寒熱病生豌豆瘡并胞瘡煩悶昏迷

玄參 升廣 乾藍葉 甘艸 犀角 水煎五錢入葱白三寸豉一撮熱服日二

豌豆瘡四邊赤腫

胡荽 把 生地 二味搗取汁空心服盡許

犀角湯

治傷寒熱毒氣盛瘡如豌豆 水煎五錢日二

犀角 廣黃 川連 木香 水煎五錢日二

內消散

治傷寒熱病欲生豌豆瘡毒未出令不成

京墨 燒去烟 用酒三合磨令頓服

紫艸湯

治傷寒斑疹豆瘡 水煎三錢熱服日二

紫中

傷寒發狂

論曰重陽者狂謂陽氣獨盛也傷寒熱毒既盛內外皆熱

則陽憤噴而發為狂越使人狂走妄言或罵詈不避親疎

或妄見妄聞棄衣而走登高而歌或數日不食踰垣上屋



蓋四肢諸陽之本，熱盛而四肢實，是為重陽。故所上之處，皆非素所能而病乃能也。若乃因火為邪而發為驚狂，及內有瘀血而外症如狂，其為病雖不同，然其為陽氣有餘則一也。

犀角湯

治傷寒十數日，頭戰掉，大汗出，恍惚狂走，眼見鬼神。

犀角

山枝

五分

白芍

生地

麥冬

茯神

兩

茵陳蒿

分三

水煎五錢入竹葉二十一片，發後服。

羚羊角湯

治汗後熱毒未盡，因有所驚，狂言欲走。

羚羊角

犀角

防風

片苓

升廣

玄少

茯神

五分

龍齒

甘中

兩一分

人少

竹茹

骨皮

水煎

五分

抵當湯

治大陰病六七日，表症仍在，脈微沉，反不結，其人發狂者，以熱在下焦，少腹當滿，小便自利者，下血乃愈，所以然者，以大陽過經盡而瘀熱在裏，故水煎五錢，服當下瘀血，不下再服。

大黃 酒浸炒 兩 桃仁 炒七枚

絳雪丸

治傷寒發狂，眼赤，二便血，出身如金色，兼治六七日狂躁發熱。

硝石

兩

丹砂

一分

研細粟米飯丸，彈子大，砂糖冷水

傷寒剛症

論曰：傷寒病發，汗過多，因致症，其狀令人搖頭發熱，頭項強急，惡寒，背反張，瘖瘖口噤，謂之剛症者，特以無汗而反惡寒故也。

葛根湯

治傷寒大陽症，無汗，小便反少，氣上沖胸，口噤。

葛根

欲作剛症

芍藥

白芍

廣黃

去根節

甘草

桂心

兩

姜朶

水煎五錢，熱服，取微汗。

大承氣湯

治傷寒剛症，胸滿口噤，臥不着席，腳掣急，必

大黃

兩

枳實

兩

紫朴

五分

水煎

五錢，去滓入芒硝

元文



五分二沸服

羚羊升廣湯 治傷寒剛瘧 仰目壯熱 筋脈不舒 牙關緊

羚羊 升廣 白鮮皮 龍齒 木通 百合

防風 石羔 水煎五錢 入豉百粒 葱白五寸

小續命湯 治傷寒剛瘧 無汗惡寒 口噤皆強

附子 防己 防風 姜水煎五錢 日三夜二

傷寒柔瘧 論曰柔瘧之狀 搖頭發熱 項強急 腰身反張 或瘕瘕口

噤與剛瘧同 然謂之柔瘧者 特以其自汗不惡寒 故也 瘧

又謂之瘧者 蓋以瘧一類 古之時以強直名之

桂枝加葛根湯 治傷寒柔瘧 項背強 及汗出惡風

桂枝 葛根 白芍 甘草 姜棗水煎 五錢 取汗

桂木湯 治傷寒柔瘧 手足厥冷 筋急汗不止

桂心 白朮 人參 附子 甘草 防風

乾姜 水煎五錢 日二

五味子湯 治柔瘧 汗出身軀強直 手足多寒

五味 木香 附子 枳榔 白朮 甘草

乾姜 桂心 水煎五錢 日三

紫胡飲 治柔瘧 四肢逆冷 汗不止 腹中痛 筋脈急

紫胡 赤茯苓 圭心 良姜 枳榔 煨 五味子

傷寒壞病 傷寒陰陽易 傷寒鼻衄 傷寒狐惑 傷寒百合

傷寒壞病 論曰傷寒大陽病 三日已發汗 吐下溫 針仍不解者 多變

為壞病之 陽病轉入少陽 已吐下發汗 少陽忘罷 此為壞

病 知犯何逆 以法治之 此由陽寒病在諸經 給發汗吐下

傷寒壞病 傷寒陰陽易 傷寒鼻衄 傷寒狐惑 傷寒百合

傷寒壞病 論曰傷寒大陽病 三日已發汗 吐下溫 針仍不解者 多變

為壞病之 陽病轉入少陽 已吐下發汗 少陽忘罷 此為壞

病 知犯何逆 以法治之 此由陽寒病在諸經 給發汗吐下

傷寒壞病 傷寒陰陽易 傷寒鼻衄 傷寒狐惑 傷寒百合

傷寒壞病 論曰傷寒大陽病 三日已發汗 吐下溫 針仍不解者 多變

為壞病之 陽病轉入少陽 已吐下發汗 少陽忘罷 此為壞

病 知犯何逆 以法治之 此由陽寒病在諸經 給發汗吐下

紫



而病不除又感異氣有寒暑燥濕風不同病亦隨變故謂之壞病又有傷寒過經再受邪熱留蓄臟腑病候多變者及傷寒解後虛羸少氣餘症未除者皆謂之壞病

知母 廣黃湯 治傷寒壞病差後或十日二十日終不惺惺精神昏言語亂又無實熱

端治藥而效或朝夕潮熱頰赤或似瘡由發汗未盡餘毒在心胞絡間所致

水煎五錢半日內可相次三服取汗未汗再服若心煩不眠欲飲水者稍與之令胃中和即愈

黑奴丸 治壞病頭與骨肉俱疼狂言妄語醫所不治

廣黃 片苓 甘中 芒硝 竈突黑 豉 炒一

共末 蜜丸彈子大新汲水下 一丸 此丸與陽毒黑麥冬湯 治傷寒壞病經久不差潮熱不退身躄 煩同

赤茯苓 甘中 鼈甲 醋炒 水煎三錢入烏梅

肉一枚 小麥五十粒 溫服日二

傷寒狐惑 論曰狐惑之病初得狀似傷寒或因傷寒而變皆與症也

貴蝕其喉為狐使人聲啞貴蝕其下部為惑使人咽乾其

俱皆默欲眠不得臥起居不得安惡飲食面目乍赤乍

白乍黑是也由傷寒病腹內熱飲食少腸胃空虛而貴為

之不安故隨食上下部而病名狐惑也

赤小豆當歸散 治傷寒變成狐惑脈數無熱微煩默

欲臥汗出得之三四日眼赤得之七八日目四背黑

能食者膿已成也

赤小豆 浸洗 川椒 共末水煎三錢溫服日二

黃芩湯 治傷寒不發汗變成狐惑脈數無熱微煩二日

赤但欲眠睡咽乾不能食

片苓 射干 甘中 竹茹 知母 前胡 五

川連 分炒三 水煎五錢日二



黃連犀角湯 治病後瘡出下部

川連五 犀角一 木香一 烏梅七 水煎三錢日二

木通湯 治傷寒陰陽不和變成狐惑目如鳩赤面色班紋如綿

木通一 甘草一 桂心一 細辛五 吳茱萸三 兩炒

姜枣水煎五錢葱白三寸

雄黃導氣湯 治傷寒狐惑下部蠱瘡

雄黃研 青箱子一 川連一 苦參五 桃仁炒

共末生艾汁和如棗大綿裹導下部扁蓄汁更好冬

月無艾蓄用根

掩膈湯 治傷寒狐惑病在上焦

苦參一 甘草一 作一服水煎五更服良久即吐

薰洗四皮湯 治狐惑攻下部肛內生瘡

槐白皮 柳白皮 桑白皮 桃白皮二

換柳丸 治未汗變狐惑毒蝕肛門痒不止下濃血

水煎四兩薰洗下部

核

換柳 丹砂五 丁香一 杏仁四 共末用飴

糖和如棗校大先用椿根槐白皮各二兩水煎洗肛

門將菜內之

雄黃薰方 治狐惑食下部肛外如蠱痛痒不止

雄黃研 用瓶一筒口稍大者入灰半瓶灰上放火

將黃末燒之候煙出坐瓶口上薰之良

傷寒百合

論曰傷寒百合者謂百脉一宗悉致其病也其狀飲食復

不能食常默欲得臥又不能臥欲出行又不能行食欲

有時美赤有時不美如有寒又如無寒如有熱又如無熱

口苦小便赤黃得菜則吐利者是也此由傷寒及大病後

臟府共虛榮衛耗弱不能平復變成斯病然以百脉一宗

悉致其病又無復經終故其病疢變異治之各隨其疢

百合鷄子湯 治傷寒病吐之後

百合七 鷄子黃一 水漬合一塊更小煎去渣入子黃攪服

宿



百合知母湯 治傷寒已經汗後

百合七枚 知母一兩 水浸百合一宿更水煎分二服

百合滑石散 治傷寒變發熱

百合一兩 滑石半兩 共末空心飲下二錢日二

百合地黃湯 治傷寒不經汗吐下後病形如初

百合七枚 生地黃汁鍾 水煎百合取汁和生地汁温

服中病勿更服大便當如漆

百合半夏湯 治傷寒病不差不思食欲成勞

百合二兩 半夏一兩 赤茯苓 川連炒 知母一兩

生地半兩 姜水煎五錢日二

百合紫苑湯 治傷寒病似勞形狀如瘡

百合二兩 紫苑一兩 柴胡 杏仁 白茯苓 半夏 甘中

傷寒陰陽易

論曰凡傷寒大病後氣血未復若房事太早不時令病人

勞復因爾染易男病傳女女病傳男由轉易然故名陰陽

易其狀身躄重少氣熱上冲胸頭重不能舉目昧四肢拘

急苦小腹急痛力弱著狀不能轉側柔動憑人不急治則

死或經歲日漸至羸困亦死

枳實湯 治傷寒勞復陰陽易

枳實 山枝 枳殼 雄鼠糞 粒炒

水煎二服未効又服

燒視散 治傷寒陰陽易身腫氣少小腹急陰中拘攣熱

上冲胸頭重不欲舉眼目生花膝胫拘急

女人中視取對陰戶者水燒灰水服方寸匕日三

立效湯 治陰陽易身重小腹重急陰頭微重

韭白 雄鼠糞 水煎一日服汗出愈

萎蕤湯 治陰陽易氣冲心胸頭重不舉

萎蕤 木香 圭心 荊芥穗 雄鼠糞 七枚

兩 一 三 五 二十



炒水煎五苓温服日二  
二灰散 治傷寒陰陽易  
手足指甲用二十六片男病  
燒灰研末分三服酒下  
犀角湯 治病未平復陰陽易壯熱頭痛鼻出血  
犀角 竹茹 丹夕 葛根 石羔

傷寒衄血 論曰傷寒衄血者由熱氣蘊甚血溢妄行蓋心生血肝藏  
之肺主氣鼻則通之心肝為熱邪所傷則血隨氣妄行所  
以後鼻出也人謂陽盛則衄者蓋陽盛則熱盛熱盛則宜  
衄故傷寒大陽症衄血乃解謂是故也至于陰病則不宜  
衄蓋陰症自無熱安得而衄故少陰病但厥無汗強發之  
必動其血或從口鼻耳目出者是謂下厥上竭為難治  
茅花湯 治傷寒衄血不止

從  
傷寒衄血 論曰傷寒衄血者由熱氣蘊甚血溢妄行蓋心生血肝藏  
之肺主氣鼻則通之心肝為熱邪所傷則血隨氣妄行所  
以後鼻出也人謂陽盛則衄者蓋陽盛則熱盛熱盛則宜  
衄故傷寒大陽症衄血乃解謂是故也至于陰病則不宜  
衄蓋陰症自無熱安得而衄故少陰病但厥無汗強發之  
必動其血或從口鼻耳目出者是謂下厥上竭為難治  
茅花湯 治傷寒衄血不止

黃連散 治熱病鼻衄不止或兼吐血  
川連 竹茹 伏龍肝 片苓 山枝 甘中  
姜東水煎五苓入生地汁半合 亂髮灰五分一沸

阿膠湯 治衄不止此陽毒攻肺  
阿膠 片苓 葱白 熟艾 豉 砂  
作二服水煎温服入生地汁分

刺薊湯 治傷寒衄血吐血心中堅硬一身疼痛四肢煩悶  
刺薊 麥冬 生地 竹茹 紫蘇 白茯苓

黃土湯 治衄血去五藏熱毒  
黃土 薑東 水煎五苓服

黃土 薑東 水煎五苓服

生地 圭心 竹茹 水煎五苓服

髮灰散 血衄不止

髮灰散 血衄不止

髮灰散 血衄不止



髮灰 广香 同研極細新汲水下二匙又吹鼻中少許

四生散 治衄血心胸煩悶 生地 生藕 生薑 白芥子

斤字汁字 誤丸

升广湯 治衄血不止頭痛吐熱 生刺薊 五共微温分二服

升广 紫蘇 白芍 青蒿 犀角 芒硝

地黄飲 治血衄不止 水煎三匙入生地汁一合

懷生地黃汁 白蜜 攪勻頓服即愈

生地汁飲 治時疾壯熱頭疼血衄不止 生藕汁 生薑汁 白生蜜

傷寒吐血 傷寒舌腫脹 傷寒喉痛 傷寒口舌生瘡 傷寒毒攻手足

傷寒 和勻分三服微煎食後臥服

則

論曰傷寒吐血者熱在陽經邪盛于表應汗而不汗熱毒入深結于五臟遂成瘀熱薰蒸于上焦血隨氣妄行并入胸中胃得血刺滿悶氣逆故爾吐血也

麥冬湯 治傷寒頭疼手足煩熱吐血不止 麥冬 生地 片苓 甘中 吳藍 茅根

黃連湯 治吐血不止由心肺積熱血得熱即妄行 黃連 水煎五錢入豆百粒 熟艾葉 側柏葉

紫河車散 治吐血煩躁 紫河車 朴硝 甘中 蛤粉

蜜汁方 治傷寒病後余毒不解心臍熱極吐血不止 生藕汁 生地黃 惡實根汁 刺薊根汁

生白蜜 和勻頻服 温服 一合

生藕汁 生地黃 惡實根汁 刺薊根汁

生白蜜 和勻頻服 温服 一合



傷寒瘀血

論曰傷寒病在表當汗不汗邪無從出熱結在裏皆成瘀血然大陽病不解熱結膀胱其人如狂者小腹硬滿小便自利下血乃愈又陽明病其人喜忘者本有瘀血大便難硬反易其色必黑或赤病人腹不滿反自言其滿者亦為瘀血在裏皆宜下之待瘀血得下即愈診其脈沉結者亦瘀血病也

抵當湯

治傷寒湯明症喜忘者必有蓄血所以然者本

有瘀血故令喜忘大便雖硬反易其色必黑

水蛭

三枚去 蟅蟲三十枚 桃仁二十一枚

桃仁承氣湯

治大陽病不解熱血膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外已解

但小腹急結者乃可攻之

芒硝

五錢

水煎五錢去渣入硝再沸分三服

芍藥地黃湯

治傷寒病溫沓汗而不澀內有蓄血及

衄血吐血不盡面色黃大便黑

白芍

三錢 地黃 丹皮 犀角 水煎三錢

傷寒口舌生瘡

論曰傷寒口舌生瘡此脾經受熱薰于口舌又或因冬時

發汗吐利後重亡津液表裏俱虛熱勢不已毒氣攻上焦

致口中糜爛生瘡

升廣湯

治口舌瘡赤爛

升廣

麥冬 丹皮 甘中 水煎五錢入竹

葉

十一片 大棗 二枚 溫服日二

苦酒湯

治少陰病咽中生瘡語聲不出

半夏

十四枚 雞子 一枚 苦酒 留中 又以半夏入苦酒

內以鷄殼放煎刀環中安火上者二沸少含咽



羚羊角湯 治病後余熱上冲口舌生瘡

羚羊 射干 麥冬 白芍 木通 芦根

升广 水煎五錢食後服

傷寒舌腫脹

論曰傷寒舌腫脹者病在三陰也大陰之脉連舌本散舌下少陰之脉循喉嚨挾舌本厥陰之脉循喉嚨之後又手少陰心經其氣通于舌凡此經絡為風熱所乘隨脉至舌熱氣留于面血氣壅滯故令舌腫脹診其脉數急者是其候也

升广湯

治熱病喉嚨閉塞連舌根腫痛熱氣聚于胸中

升广 麥冬 石羔 竹茹 木通 黃栢

朴硝 玄參 前胡 水煎五錢服

犀角湯

治脾肺虛熱毒氣壅塞喉嚨連舌根肺痛

犀角 川芎 白芷 升广 甘中 杏仁

治心脾熱舌腫痛

生地汁 生白蜜 慢火煎稠含化半匙日二

傷寒咽喉痛

論曰傷寒咽喉痛老少陰受邪邪毒壅遏于上焦微則咽

喉痛甚則痛而生瘡又傷寒過經而熱內盛薰于上焦亦

令人咽喉痛各隨症治

甘草湯 治傷寒少陰二三日咽痛

炙甘中 水煎空心分作四服

桔梗湯

前服甘中湯不差者服之

桔梗 炙甘中 水煎分二服

苦酒湯

治少陰咽痛生瘡不能言語聲不出

半夏 洗七次 鷄子 將鷄子去黃用白和苦酒半

夏復入蛋中安火上令三四沸少嘔之不差再服

半夏湯

治少陰咽中痛

半夏 桂心 甘中 水煎放冷少咽之



地黄煎 治時氣肺熱咳嗽咽痛

地黄汁半 白芍 玄參 升麻 貝母分 麥冬二

柴胡 竹葉一 白蜜二 水五大鐘煎去渣入蜜汁慢煎三

傷寒毒攻手足

論曰傷寒毒攻手足者熱勝則腫也熱毒之氣容于腑藏

邪結在裏循經而出注于四肢故令人手足煩熱赤腫疼痛

連翹湯 治毒氣攻手足腫滿疼痛心神煩悶

連翹 麥冬 犀角 片苓 枳壳 川歸一 大黃一

炒 木香 防風 羌活 惡實五 射干一

共末水煎服

又方 治毒氣攻手足虛腫疼痛欲死

蒼耳子五 搗爛絞取汁漬洗手足

鉛丹膏 治毒氣攻冲手足虛腫

鉛丹五兩 明松香 乳香五 黃臘一 廣香一

研另先將松香煉化次入黃臘化去渣入鉛丹乳末慢

煎成膏入廣香攪勻候冷用絹攤貼腫處凡一切腫

毒并宜貼此膏

傷寒後夾勞 傷寒後勞復 傷寒後骨接煩疼

傷寒後虛煩 傷寒後盜汗 傷寒後驚悸

傷寒後失音不語 傷寒後咽喉閉塞不通

傷寒後夾勞

論曰傷寒差後復夾勞者由病人先有風疹因汗下之後

榮衛虛弱氣不充足形體羸瘦時有盜汗寒熱不常喘嗽

痰唾鼻中臭氣飲食不消肢躄痠痛面黃頰赤不即治之

則致危殆

人參湯 治夾勞骨節疼痛渾身壯熱氣力虛冷

人參 白朮 白木 白芍 桔梗 大茴香

紫苑一 柴胡二 陳皮 蒼朮 羌活二 甘艸半

秦艸三 共粗末姜枣水煎二錢不拘時溫服

黃耆鼈甲湯 治傷寒病差後夾勞形躄羸瘠或寒或熱

瘠



病如瘡狀四肢煩疼等症

鼈甲 黃耆一兩 白朮 甘草 陳皮三分 知母

桑白皮五錢 葱白 姜水煎 五錢 食後服

柴胡湯 治夾勞五心煩熱背膊痠痛手足無力不能飲食

柴胡 黃耆 鼈甲 赤茯苓兩 秦艽 枳殼炒白

地骨皮 片苓 葛根五錢 人參 甘草一分

姜水煎三錢服

人參 鼈甲湯 治傷寒差後夾勞寒熱往來進退不時頭

疼 眩痛 口舌咽乾 不思飲食

人參 鼈甲 附子 柴胡兩 白芍 知母

烏梅肉炒 五味 桃仁炒 圭心 陳皮 羌活

秦艽 川芎五錢 姜水煎三錢溫服

傷寒後勞復

論曰內經謂熱病少愈食肉則復多食則遺此其禁也蓋

傷寒後新差後脾胃尚虛氣血尤弱穀氣未復津液未通

若將養失宜輒嗜肉食則脾胃虛不能消殺或因勞形干事

皆令邪熱乘虛還入經絡復成大病故名勞復當隨其症

候或表或裏依法治之

知母湯 治新差後勞動用力或飢食過傷勞復

知母 鼈甲 柴胡 廣黃 葛根三分 雄鼠糞炒

水煎五錢入豆百粒葱白五寸食後溫服喫葱

粥取汗

石羔 黃芩散 治食肉勞復如初壯熱頭痛心煩欲吐小

便黃赤

石羔一兩 片苓 山枝 人參 川連 知母 葛根

共末葱白竹葉湯下二錢空心服日三以差為度

知母湯 治勞復小腹硬甲縮疼痛欲死

知母 柴胡 麥冬 甘草半兩 葱白三錢 水浸一宿

煎至小半入童便二盞絞心半合再煎五六沸入地

黃汁二合更煎微沸空心頓服汲利即差



傷寒後骨節煩疼

論曰傷寒後骨節煩疼者由津液不足血脈皆虛余毒客于經絡榮衛澁滯于骨節之間故令骨節煩疼診三部脈細而遲澁者乃其候也

柴胡飲

治傷寒病後骨節疼痛咬嗽不能食口舌乾燥

柴胡 升廣

人參

白芍

茯苓

百合

地骨皮

片苓

麥冬

犀角

鼈甲

石羔

甘中

分

水煎五苓入竹葉生薑食後服日二

百合湯

治差後四肢煩熱骨節疼痛

百合

知母

鼈甲

柴胡

葛根

桑白皮

羌活湯

水煎五苓入生地汁一合食後服日二治傷寒病差後下焦風虛骨髓痠痛腰脚頑痛

羌活

不仁

防風

丹多

白芍

不寒仁

牛膝

五加皮

桂心

木通

川椒

姜水煎

五苓

空心服

日二

獨活

黃耆

傷寒後虛煩

論曰傷寒病後煩躁者有虛煩有穀煩陽氣偏多謂之虛煩病差後食穀太早新虛不勝穀氣胃內遂熱謂之穀煩

若陰陽和調則虛煩自己損其穀食則穀煩者差

竹葉湯

治傷寒後虛煩狀似傷寒病但身不疼痛不惡寒內外皆不可攻者

淡竹葉

半夏

石羔

人參

甘中

麥冬

兩

分

製

生薑水煎

三苓入粳米百餘粒温服

梔子豉湯

治傷寒汗後虛煩不得眠劇者心反覆顛倒

心中懊憹又治傷寒發汗若下之虛煩心中空痛

山梔

去十四枚

豉

水煎

三苓

不拘時服

日二

五苓散

治傷寒中風發熱六七日不解心煩躁悶有表



裏症具渴飲水水入內即吐谷水逆  
猪苓 赤茯苓 白木 圭心 沢瀉

猪苓湯 治少陰病下利六七日 咬而渴吐而煩不得眠

猪苓 赤茯苓 阿膠 滑石 沢瀉 水煎三匙温服

麥冬湯 治傷寒病後余熱不解或寒或熱四肢瘦弱虛

麥冬 赤茯苓 人參 白木 黃耆 陳皮 地骨皮

六神湯 治病後虛煩不安 水煎三匙温服

人參 黃耆 白茯苓 山茱 百合 防風

傷寒後盜汗 論曰汗者心之液傷寒差後眠寢有汗者由心氣偏虛榮

衛不足膝踈表弱目寢寐之間汗出故名盜汗久不已日

漸羸瘦肢躄痿弱 治傷寒病後躄氣虛弱夜臥汗出不止頭旋惡

人參湯 心日漸羸瘦不思飲食 黃耆 廣黃根 牡蛎

杜仲湯 治病後虛弱夜多盜汗 白木 黃耆 白茯苓

白芍 炒 茯苓 牡蛎 廣黃根 水煎五匙温服

白木散 治盜汗不止 為末 葛蒲湯下二匙 不許時服

粉汗方 治病後盜汗 廣黃根 水煎

牡蛎 燒紅童便 共末寢寐中有汗使人傳之

傷寒後驚悸 論曰傷寒後心氣不足風邪乘之則令人精神不寧恍惚



驚悸曰於憂思慮致心氣虛邪氣內乘故神氣不得奉  
定而生驚悸也

前胡湯 治伏熱在心怔忡驚悸

前胡 茯神 人參 遠志

姜棗水煎服

人參茯神湯 治心虛驚悸恍惚不寧

人參 茯神 陳皮 杏仁

姜棗水煎三服

茯神丸 治心力勞倦四肢羸弱心忪驚悸短氣補虛

茯神 麥冬 熟地 人參 丹皮 黃耆

沃瀉 甘中 牛膝 圭心

共末蜜丸桐子大食前酒下二十九

傷寒後失音不語 論曰傷寒後失音不語由風寒客于會厭會厭為音聲之

戶邪氣傷之故卒然無音又肺主聲而通于氣人之五臟

有五聲皆稟氣而通之若邪客于肺則氣道不調亦令人

語無聲音當隨其輕重治之

杏仁煎 治暴嗽失音談不出

杏仁 桑白皮 百合 木通 五味 貝母 紫苑

六味 去渣下杏仁姜汁蜜糖砂糖微煎枚如錫樣枚

貯水煎半匙不拘時服

豆竹湯 治失音不語

黑豆 青竹 姜每節如算大四寸洗淨 用水五大碗同

黑豆 青竹 姜每節如算大四寸洗淨 用水五大碗同

黑豆 青竹 姜每節如算大四寸洗淨 用水五大碗同

黑豆 青竹 姜每節如算大四寸洗淨 用水五大碗同

羚羊角散 治失音不知人口眼不正舌強

羚羊角 廣黃 石羔 片苓

麥冬 升廣 乾葛 水煎五匙溫服日二

二瀝湯 治失音不語

竹瀝 大燒取瀝 荆瀝 梨汁 陳特汁

竹瀝 大燒取瀝 荆瀝 梨汁 陳特汁



各瀉過和勻分四服早晚用

挂心湯 治邪氣傷肺失音不語

挂心 石菖蒲 水煎三匙温服取微汗未退再

芥子酒熨方 治肺中風冷失音不語

白芥子 乾研洗 用白酒三鍾煮令半熟以布帶熱包

最令人熨頭項周遍冷則易之

傷寒後咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒蘊積內搏經絡上

攻咽喉也足大陰之脉上膈夾咽而喉則肺氣之所通故

脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後余毒未盡上攻咽喉故

亦令閉塞不通

黃芩湯 治咽喉瘡痛口瘡煩躁頭痛毒氣上攻

黃芩 大青 山枝 耳中 升广 麥冬

升广湯 水煎三匙入竹葉食後服日三

升广 木通 白芍 射干 羚羊角 芦根

葛根湯 治傷寒後咽喉疼痛

葛根 竹茹 倉粳米 合 生姜水煎三匙食後服

貼喉膏 治喉痛舌強邪熱上攻

蜜 甘中 猪脂 以脂蜜煉化入甘中煎

赤黑色瀉去渣收貯頻取半匕含化

射干煎 右咽喉疼痛閉塞不通

射干 研末 楮脂 先煎脂化益下于數黑色

又方 瀉過再熬成煎收貯綿裹彈子大含化

又方 熱病後喉痛閉塞不通毒氣上攻腫痛

黃明膠 如掌心大一片用水煮軟貼頸外差

傷寒後變成瘰 傷寒後脚氣

傷寒後下利濃血 傷寒後壘瘡

辟温疫令不相傳染



傷寒後變成瘧

論曰傷寒後變成瘧者因病差後外邪未散其臟尚虛因為勞事致二氣交爭陰勝則振寒陽勝則發熱陰陽更勝則往來寒熱休作有時也一日再發者得汗必解若傷寒八九日得之熱多寒少其人不可吐清便自調者欲自愈也或陽明症煩熱汗出日晡所發熱者脈浮宜解表脈實宜攻裏又婦人熱入血室發熱而更作寒者當詳辨之

升前胡陽 治變成瘧寒熱燥渴

烏梅肉 山梔 白芍 知母 木通 朴硝

生薑大棗水煎五錢去滓入生地汁二合煎二三沸

黃芩 鼈甲湯 治傷寒後變成瘧久不差

片芩 柴胡 山梔 烏梅肉 鼈甲

甘草 芍藥 大棗 柳枝 大鼓 半合 芩 五錢 入薑

同浸一宿次早五更煎減半去渣入生地汁一合

茯苓飲 治寒熱不退變成瘧

赤茯苓 鼈甲 地骨皮 知母 柴胡

枳殼 水煎五錢去滓入生地汁一合再沸食

後良久服如人行五六里再服

傷寒後脚氣

論曰傷寒後脚氣者緣其人腎經水虛風濕毒氣乘虛客入腎腎主腰脚故邪氣沉滯則脚弱而痛雖傷寒已若邪熱未益風濕毒氣與熱相搏上冲于心肺其状令人心胸煩滿上氣息急甚者致死於左尺脈洪而數者脚氣也服

羚羊角湯 治脚氣上冲心曠煩悶

羚羊角 白茯苓 半夏 陳皮

吳茱萸 枳殼 生薑水煎五錢空心服



紫菀木香湯 治脚氣冲心 心神煩乱 吐逆 減食 脚膝痠疼

紫菀 白芍 沉香 木香 木通 赤茯苓

吳茱萸 枳榔 陳皮 姜水煎三錢 食前服

赤小豆湯 治脚膝腫滿 氣急 大便秘澀

赤小豆 桑白皮 枳榔 紫菀

水五鍾 姜一分 煎減半 空心分二服

吳茱萸散 治脚氣心腹妨悶 脹病 坐臥不安

吳茱萸 木香 川椒 枳榔 郁李仁

水煎三錢 空心温服 日二

傷寒後下利 膿血

論曰 傷寒後變成膿血利者 因本病差後 熱毒未散 乘虛

容干 腸胃之間 與津液相搏 故下利膿血 毒氣盛則臟熱

而痛 兼以濕氣加之 則所下如魚腦 或如爛肉 雞鳴肝之

屬又傷寒未解 陰病下利 便膿血者 亦濕熱相搏 故也

地榆湯 治熱毒不解 日晚吐熱 腹痛下利膿血

地榆 川連 片苓 犀角 蒿根 山梔

水煎三錢 入薤白二寸 不拘時服

桃花湯 治傷寒少陰病 二三日 至四五日 腹痛 小便不

利 下利膿血不止 糯米

赤石脂 乾姜 糯米

水煎五錢 温三服 得愈止

黃連湯 治熱病差後 下利膿血不止

黃連 阿膠 片苓 梔子

水煎三錢 空心服 日二

赤石脂湯 治下利膿血 腹痛不止

赤石脂 黑乾姜 附子 川芎 白芍

水煎五錢 空心温服 日二

傷寒後蠱瘡

論曰 傷寒蠱瘡者 因腹中有熱 其人少食 胃中空虛 三虫

須食 或食五臟 或食下部 隱僻有瘡 故名蠱瘡 其服薑無



色舌上盡白四肢沉重忽喜眠甚則唇裏有瘡其瘡在上唇裏如粟米心內懊懣痛者此與食五臟之疔若下唇裏有瘡其人喜眠者此與食下部之疔若肛爛見五臟者死故名曰蠱瘡

桃仁湯 治傷寒後蠱瘡 桃仁去皮尖 槐角子炒 熟艾一兩 大棗十五枚

水煎分三服 槐角子炒 苦多 乾漆炒 木香 枳榔一兩

槐角子丸 治濕蠱與食下部心中煩懣 槐角子炒 苦多 乾漆炒 木香 枳榔一兩

桃仁去皮尖 熊胆 共末蜜丸 桐子大空心荆芥湯下二三十丸

羚羊角散 治心中煩躁唇口生瘡與食下部 羚羊角散 黃耆 玄參 柴胡三分 龍膽 升麻

共末用槐角子湯空心下二錢日二

雄黃散 治蠱瘡 雄黃

雄黃酒研一分 川連 苦多 青箱子兩半 槐仁去皮尖炒研三分

共末空心飲下一錢五分蠱右下部以綿裹少許

槐皮湯 治與食下部

桃白皮 榧實 槐角子一兩 石榴根皮五錢

大棗水煎五錢空心溫服日二以差為度

天行下部蠱瘡 烏梅肉五錢 獨蒜一枚 屋塵三合

用苦酒一升于銅器中共煎候可丸即丸如棗核大

內下部中少頃易之差 傷寒不究心仲景則變證不知新證不識今總錄中變

證備載仲景祖方一無遺漏按方療治神明在人矣水

家藏發明仲景傷寒書自郭白雲龐安常成無已後約

五十餘家節庵非仲景衣鉢不與焉行將剗傷寒註公諸字內則學有淵源方有祖法為醫家大宗至此



余之所厚望於來學也

康熙辛酉花朝靜觀居士程林識於維揚三一齋中

辟瘟疫令不相傳染

論曰凡時行瘟疫皆四時不正之氣感面病者長少大率

相似此病苟不辟多致傳染宜方術預防

敗龜板湯治辟時行瘟疫令不相傳染

馬牙硝 紫苑 前胡 大青 白芍 羚羊角

蒼耳子散 宜預先服之辟瘴疫時氣

蒼耳子 午日乾 三兩

為末空心井花水下二匙

又方 燕薯 不拘多少 搗取汁立春後值庚子日合家大小宜溫服

則永除瘟疫之患

音味下

塗傳方 辟瘟疫時氣

雄黃 一兩 丹砂 一兩 鬼臼 一兩 石菖蒲 一兩

共末井水調和塗五心及額上鼻中耳門辟瘟甚驗

調中丸 治四時疫疠非時之氣

大黃 兩 炒 五 麻仁 兩 研 一 枳壳 炒 白茯苓

白芍 兩 前胡 兩 梧桐子 大 空心飲下二十九微利臥服佳

聖濟總錄纂要卷四終



聖濟總錄纂要卷之五

新安程林雲來纂

開東劉世英含初

新安江席居中允叔

新安湘郢上閱

瘧疾門  
寒瘧  
温瘧  
寒熱往來瘧  
瘴瘧

諸瘧統論

論曰夏傷于暑秋成瘧瘧該于夏而作也有夏之時陰居干内暑雖人之勢不能動候得秋氣陽為之動變汗出過遇風乃成此疾故名曰瘧瘧皆生于風蓄作有時其氣陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽併于陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓顛正陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生于内故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則内熱内外皆熱則喘而渴故欲冷飲因

成元本  
威  
頷



傷于暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也令人汗空踈腠理開因得秋氣汗出過風及得之于浴浴水氣舍于皮膚之內與衛氣並居衛氣者晝行于陽夜行于陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作者氣之舍深也作之早晏者隨風府日下一節也是以或先寒後熱或先熱後寒或但熱無寒或本于痰或本于瘴疔或本于鬼神或本于邪氣大槩外傳經絡內入五藏症既不同治法亦異凡治瘧者不辨陰陽虛實概以吐葉投之有非痰實而真氣受斃者固多其內經論五臟皆不同明指邪氣所傳不可一槩而論今備載諸症本未參以治之輕重要在在隨症而施庶幾乎無一曲之蔽也

寒瘧  
論曰寒瘧之狀內經謂先寒而後熱病以時作是也蓋傷早汗出腠理開因遇復氣連滄之水寒其氣藏于皮膚

腠理之中秋傷于風則病成矣其症先起于毫毛伸欠乃作寒慄鼓顛腰脊俱痠寒去則內外皆熱頭痛冷飲是也

換柳湯 治寒瘧神効  
換柳 常山 桂心 陳皮 甘草

鼈甲常山酒 治瘧先寒戰解即壯熱  
鼈甲 常山 酒

菜一宿次早如水煎未發時溫服得吐為効  
菜 一宿 次早 如水 煎 未發 時 溫 服 得 吐 為 効

蜀漆散 治寒瘧  
蜀漆 雲母 龍骨

烏梅丸 治寒瘧不止  
烏梅 肉桂 茯苓 芍藥 甘草 附子 干姜 黃連 川椒

烏梅丸 治寒瘧不止  
烏梅 肉桂 茯苓 芍藥 甘草 附子 干姜 黃連 川椒  
共末蜜杵丸 桐子大空心酒下二十九至三十九



虎骨丸

治一切寒瘧無同遠近

虎骨

酥油炙

人多

甘中

圭心

烏梅肉

炒五

桃仁

尖炒

肉蓯蓉

常山

升广

附子

五

广香

研一

豉

炒一

共末

蜜丸

相子大末

飲下三十九

二姜散

治寒瘧不差

黑乾姜

高良姜

同炒黑為末

空心酒下一匙日三

寒瘧塗方

鼈甲

醋炙

烏賊魚骨

甲五

附子

如

常山

炙甘草

兩

酒煎五匙次日以酒塗手足并背上心不瘳即止瘳時飲此酒二鍾

又方

附子

生一枚

為末用酒和塗病人背心上佳

溫瘧

論曰溫瘧之狀內經所謂先傷于暑後傷于寒其症則先熱後寒病以時作是也蓋風為陽氣寒為陰氣風氣大勝

瘧 髓

故先熱而後寒得之冬中風寒氣藏于腎內至骨髓至春

陽氣大發邪氣不能自出至夏大暑體燥肌內消腠理

空洩或者有所用力邪氣與汗俱出故氣從內之外其法宜

先治其陽後治其陰則瘧疾自除

芦根湯 治初壯熱後寒戰骨節痠疼口乾煩渴

芦根

石羔

一兩

麥冬

升广

葛根

山梔

五

水煎五匙入竹葉十片未瘳前連三服

知母湯 治瘧骨節疼痛時吐朝瘳暮解暮瘳朝解

知母

一分

甘中

石羔

三兩

圭心

粳米

一合

水煎五匙入米一撮候未熱未瘳時先服

常山飲 治溫瘧壯熱微寒

常山

如鷄骨

淡竹葉

把

小麥

一合

水浸一宿次早煎未

瘳時空心溫服 老年久病之人虛弱者煎三匙服

寒熱往來

論曰陰陽相勝而寒熱互作者以邪氣相并也故氣并於



陰則為寒，氣并於陽則為熱。寒則振慄，鼓頷以陰實。陽虛故也。熱則渴而飲冷，以陰衰。陽勝故也。

柴胡桂枝湯 治瘧寒熱往來  
柴胡 四兩 桂枝 人參 芍藥 甘草 各二兩 半夏 半升 黃芩 二兩

人參湯 治寒熱瘧時作面色黃  
人參 五兩 甘草 二兩 白芍 二兩 黃芩 二兩 陳皮 三分 白朮 三分

水煎五支入茶末燈心去滓入酒半鐘未發時先服  
取吐如未吐再服以痰盡為度

鼈甲大黃丸 治瘧寒熱往來久不差  
鼈甲 大黃 附子 人參 甘草 常山 蜀漆 白薇 西

論曰瘧瘧之狀內經必謂但熱不寒陰無先絕陽氣獨發  
少煩冤手足熱而欲吐是也得之邪熱留于身中厥逆

上冲氣實而不外洩因有所用力勝理開踈風寒客牛皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛不及于陰故但熱不寒氣內藏于心外舍于分肉之間令人消燦肌肉名曰瘧

瘧以瘧陽無陰故也  
白虎加桂湯 治瘧疾陰氣孤絕陽氣獨發脈微少氣煩滿手足熱欲吐但熱而不寒邪氣內藏于心外舍于分肉之間令人消燦肌肉

石羔 研一兩 知母 鹽酒炒 甘草 蜜炙 粳米 炒半  
用汲水一升煮茶五支入粳米一撮以未爛為度去滓入桂末三支再煎取四合作一服稍熱服取汗先

寒發熱汗出愈  
豉心湯 治瘧瘧但熱不寒

柴胡 鼈甲 雄鼠屎 炒二 童便 三升 黑山枝 分三  
生薑汁 一分 桃枝心 柳枝心 各一

柴胡 鼈甲 雄鼠屎 炒二 童便 三升 黑山枝 分三  
生薑汁 一分 桃枝心 柳枝心 各一

柴胡 鼈甲 雄鼠屎 炒二 童便 三升 黑山枝 分三  
生薑汁 一分 桃枝心 柳枝心 各一

柴胡 鼈甲 雄鼠屎 炒二 童便 三升 黑山枝 分三  
生薑汁 一分 桃枝心 柳枝心 各一

柴胡 鼈甲 雄鼠屎 炒二 童便 三升 黑山枝 分三  
生薑汁 一分 桃枝心 柳枝心 各一

柴胡 鼈甲 雄鼠屎 炒二 童便 三升 黑山枝 分三  
生薑汁 一分 桃枝心 柳枝心 各一

柴胡 鼈甲 雄鼠屎 炒二 童便 三升 黑山枝 分三  
生薑汁 一分 桃枝心 柳枝心 各一



除尿屎地姜汁小便將菜入  
浸一宿于星月下  
次早煎去滓入尿屎地姜汁煎分三服一日用  
石羔湯 治瘴癘熱甚不差

石膏 兩研二 白粳米 五十粒 常山 三分 水煎五匙入竹  
葉二七片 空心欲祭與正祭時各一服靜臥勿與人  
語候過祭時再洗午面飲食七日內禁房事及酒麪  
熱物久瘧不過二濟

車前草湯 治瘴壯熱不止渴欲飲水  
車前草 常山 生甘中 升 大豉 炒五 粳米  
合半 水浸五匙于星月下露一宿上橫刀一把次早五  
更煎空心溫分二服良久即吐吐定以漿粥止之

常山飲 治瘴癘但熱不寒煩渴不止  
常山 生甘中 烏梅肉 炒 青蒿 匙 四 五 竹葉 二十片  
以童便白酒各一大鐘微煎露星月下一夜上橫刀  
一把次早空心溫服及當祭時各一服以差為度

問日瘧 痰瘧 瘵瘧 勞瘧 久瘧  
鬼瘧 瘧母  
論曰問日瘧者邪氣着于陰不得與陽氣俱出也衛氣晝  
行於陽邪氣不得出故必再會而後祭是以問日乃作  
醇醑湯 治問日瘧

常山酒 常山 甘中 半 炙西 水煎三匙未祭先服  
常山 兩 蒜 一 獨頭者 糯米 共粗搗以白  
酒一升浸上件露星月下一宿上橫刀一口次早煎  
未祭時三分飲一分如未吐更服一分得吐差

糯米煮散 同  
糯米 九 山 十 常山 淡竹葉 烏梅肉 炒 炙其中  
神聖丸 治問日瘧先寒後熱 大棗 三枚飯上 共研極  
黑豆 一少者 白砒 一細研 炙 三枚飯上 共研極

神聖丸 治問日瘧先寒後熱  
黑豆 一少者 白砒 一細研 炙 三枚飯上 共研極



細須於五月五日或七月七日修合丸如豌豆大丹  
砂為衣陰乾涂茶清下三丸忌食熱物一伏時合  
丸時忌女僧尼姑鷄犬

痰癘

論曰痰癘之狀胸中不利頭痛振寒快慄而不能食食即  
吐故謂之痰癘  
心下支滿痰積胸中氣逆煩

石羔散 治一切痰癘

石羔 三 常山 二 淡竹葉 三 生甘草 烏梅肉 二

粳米 合半 水煎五匙空心溫服吐痰差 如熱甚加大黃一兩

犀角散 治痰癘吐

犀角 升廣 玄參 常山 五 細辛 甘草 生

松羅 山枚 分一 水煎五匙空心徐溫服取吐痰涎効

痰癘 論曰痰癘者以癘發該時或日作或閉日作也夫衛氣流

行合于晝夜陰陽邪氣內舍于榮隨衛氣以出入而應于

風府其作之早晏皆以時發寒溫瘧癘動作亥時故內經

統謂之痰癘其狀伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊痛寒去則內

外皆熱頭痛如破渴欲飲冷飲

六黃丸 痰癘發作有時

六黃 一 去根節 常山 甘中 知母 大黃 生五

共末蜜杵丸小豆大未發前空心飲下五七丸臨發再下

鼈甲漬酒 治痰癘以時發

鼈甲 醋炙 附子 甘中 常山 烏賊魚骨 甲

酒三鍾漬菜五匙明早先以酒塗五心次溫飲一二鍾

常山酒 治痰癘先寒戰後壯熱日發及間日作者

常山 洪竹葉 一 鼈甲 醋炙 甘中 共粗搗酒

浸五匙於星月下露一宿次早水煎未發時先溫服

取吐效

知母丸 治一切癘



拒

知母 烏梅肉 炒二  
炙甘草 人參 圭心 常山 肉蓯蓉 豉 炒二  
共末蜜丸桐子大酒下二十九

胸脂 阿魏 許曰研 入大蒜肉研和為膏用火核桃

一枚劈開去仁取一片以茶填核肉炷時將茶核覆  
右午虎口上男左女右令茶着肉以帛縛之過宿乃去

勞瘵

論曰勞瘵者以久瘵不差氣血俱虛病雖間歇勞動即炷  
故名曰勞瘵蓋邪氣日深則氣息愈耗表裏既虛故令人  
食減肌瘦色悴力劣而寒熱如故也治宜補養氣血

柴胡湯

治勞瘵經久不差

柴胡 西 人參 黃耆 片苓 甘中 括婁根 五

祛勞湯

治瘵經年不差寒熱瘵瘦

薑朮 水煎五爻未炷時先服日二 青蒿 枳殼 炒

驚甲

常山 知母 甘中

圭心 西 木香 五 姜朮 水煎三爻入柳枝心七段葱

柴胡枳殼湯

治勞瘵經久不差 煖 炷熱骨節疼痛不

下食小便赤澁日漸消瘦

柴胡 枳殼 升 麥冬 驚甲 甘中 苑仁 西

水煎三爻未炷先服日二

常山丸

治積勞寒熱

常山 知母 蜀漆葉 白薇 炙甘中 烏梅肉 炒

麥冬

升 地骨皮 三 驚甲 姜蕤 五 大豉 炒

石羔

共末蜜丸小豆大空心飲下十九未炷

前再服

加丸數以差為度

烏梅丸

治積年虛不差顏色羸瘦無力

烏梅肉

炒 人參 圭心 炙甘中 升 五

桃仁

去 炒 肉蓯蓉 常山 三 豉 微炒 共末蜜杵

九桐子

大空心飲下二十九未炷前服二十九

九

未炷前服二十九



牛膝飲 治瘧經久不差

牛膝 生一 水煎空心分二服

常山湯 治瘧經年不差

常山 知母 鼈甲 甘中 柴胡 青蒿 枳壳 炒

圭心 桃枝心 柳枝心 水煎五爻入葱白

薤白各三寸空心温服日二

烏梅五補丸 治瘧經年不差狀如勞疾

烏梅肉 黃耆 圭心 肉蓯蓉 柴胡 杏仁

赤茯苓 人參 升廣 川歸 常山 懷生

地 甘中 升廣 廣黃 共末蜜杵丸小豆大空

心酒下二十九加至三十九

二物湯 治久瘧食少肌瘦

童子小便 白蜜 同入磁瓶內煎數沸分三服

久瘧 論曰久瘧者瘧疾經久不差發汗吐下過甚真氣虛耗邪

氣深沉以內搏衛氣不應也積歲月而難治雖有虛痞不

可攻治常先其發時用湯液以發汗蓋浸漬薰蒸邪氣方

出出則微汗今小便利者表裏俱和則久瘧自差矣

黃耆散 治瘧四肢虛汗出不止

黃耆 牡蛎 人參 知母 廣黃根 各一 共末末

發前小麥湯空心下三爻未差又服

車前中湯 治久瘧憎寒壯熱不止渴欲飲水

車前中 常山 升廣 甘中 大豉 炒 白糯米

合炒半 水浸三爻露星月下一夜上橫小刀一口次早

煎空心温服相次又服良久得吐吐定即食稀粥

枝子湯 治久瘧經年不差

枝子 常山 車前子葉 粳米 餅

常山湯 治久瘧不止

常山 烏梅肉 生甘中 姜水煎三爻空心

水煎五爻空心温服以吐利為度

常山 烏梅肉 生甘中 姜水煎三爻空心

常山 烏梅肉 生甘中 姜水煎三爻空心

常山 烏梅肉 生甘中 姜水煎三爻空心

常山 烏梅肉 生甘中 姜水煎三爻空心

常山 烏梅肉 生甘中 姜水煎三爻空心



温服、祭時再服、以差為度、

鬼癩

論曰、鬼癩者、外邪之所乘也、凡人真氣內虛、神守不固、則鬼邪投間而入、故恍惚喜怒、寒熱更作、若有所持、而屢祭屢止、治宜禳解、兼以祛邪安神之劑、而愈、

獨勝丸

治鬼癩經久不差、

桃仁一枚、和皮尖劈二片、一片書奉勅斬鬼四字、一片書奉勅殺鬼四字、合作一枚、以彩線紫定、五更新、

汲水吞下、

三聖丸

治鬼癩、

雄黃雌黃、大黃生各一兩、各研末、用井華水浸蒸餅

丸小豆大、祭日清晨、取汲水向東方下二丸、宜五日

阿魏雄黃丸

治鬼癩經久不差、

阿魏雄黃、柳枝心、桃枝心、取向東者、各

丹砂

衣一分、外一分、共末、以三家糶角、小豆大、丹砂丸為

癩母

論曰、癩母者、因病癩久不差、結為癥瘕、是也、邪伏于陰、故久而成形、不治其母、作雜或時差、已而復發、其本未除、故也、

治以破結、削癥之劑、除其病本、則癩自除、

鱉肉煎丸、治癩久不差、結為癥瘕、名曰癩母、

生鱉肉半斤、治、片苓、葶藶子紙、柴胡、蟻蛄頭去

五翅足、炒、桃仁湯、炮、研、去、皮、大黃生、牡丹皮、紫死

瞿麥、穗、去、梗、半、夏、湯、炮、去、滑、人參、黑乾姜、大戟

阿膠、蛤、粉、海藻、水、洗、去、鹽、麩、炒、嵐、婦、炒、去、圭、心

紫朴、桑、螵、蛸、炒、一、石、韋、脂、炒、焦、黃、羊、心

射干、米、取、紫、色、一、者、用、赤、芍、藥、分、共、末、取、竈、下、灰、三、升、

白酒、二、升、用、竹、籬、盛、灰、以、酒、淋、取、灰、汁、澄、清、用、汁、煎、



九  
鱉肉令爛絞去肉將汁入菜末同煎成膏試可九即  
止丸如桐子大末末空酒下二十九

雄黃丸 治遠年瘡結成癥瘕  
雄黃研 丹砂 廣香五 鱉甲醋浸 白薇微

虎頭骨炙 木香 羚羊角 知母 烏犀角 廣黃

去根 防風 柴胡 茯神 草龍胆 川椒洗酒

牡蛎童便 赤芍藥 猪苓 升廣 枳榔 鱉甲炙

玄參 烏梅肉 地骨皮淨洗 山枝 川連 安息香

阿魏醋研入麩 葶藶 桃仁去皮 鱉各三

共末入蜜杵丸如梧子大末末空酒下二十九

臨空再下

瘡疾發熱身黃小便不利 瘡痢 瘡氣

瘡疾發熱身黃小便不利

論曰寒熱凌瘡于人各為瘡病瘡而發熱小便不利者身

必發黃此蓋熱氣下迫入于小腸水道既澁故小便不利

常山飲 治手足若煩發熱陽躁通身悉黃小便不利

常山 柴胡 山枝 甘中一 石羔 赤茯 蜀漆

知母湯 治發熱煩渴咽乾口燥身黃急愒小便澁

知母 升廣 人參 麥冬 柴胡 犀角 地骨皮

鱉甲 石羔二 甘中半 赤茯三

水煎四錢入豉五十粒

柴胡湯 治大渴煩躁引飲身黃小便不利

柴胡 人參 麥冬 知母 杏仁去皮尖

炙甘中五 水煎四支服利為度

赤茯湯 治發熱煩躁身面黃小便不利

赤茯 片苓 圭心一 升廣 甘中 常山

赤茯苓湯 蜀漆炒 水煎五支服以利為度

赤茯苓湯 目前



瘡痢

赤茯苓 白芍 白朮 木通 瞿麥穗

生薑葱白水煎五匙温服以利為度

論曰瘡痢者瘡久不差寒熱邪氣內搏腸胃間也其病寒

熱往來利下膿血赤白相雜腸中切痛隨其陰陽而治之

黃連犀角丸 治傷寒病瘡兼痢疾無間下者白水穀完

出又下鮮血并皆主之

川連 犀角 鼓 竜骨 牡蛎

共末蜜丸桐子大飲下三十九日二

前胡丸 治傷寒瘡氣急黃并痢

前胡 赤茯苓 片苓 白芍 枳壳 去白炒 大

仁 研兩半 大黃 兩生一 共末蜜丸小豆大空心飲下十

丸以溘利為度又利服十五丸

瘴氣

論曰傳言瘴氣乃山川毒厲之氣又云江山霧氣多瘴丸

以其氣爵蒸而然也閱諸方論治瘴氣之法不一或謂其

症與傷寒相類有在表可汗者有在裏可下者有在腸可

吐者或以治癘法治之者蓋原廣南山川地形瘴氣所生

之因及春夏之交又瘴氣所起之時與夫人染瘴氣極治

之法悉著于篇庶可考焉且陽生于子盛于巳陰生于午

盛于亥陽不極則陰不萌陰不極則陽不長而廣南位當

巳午則陰陽之氣蘊積于此可知矣天不滿西北地不滿

東南西北陰也土地高厚東南陽也地土卑下而陰陽二氣所

蘊積是以四圍之山崇高相環百川之流悉皆歸赴及秋

中木不凋瘴令蟄蟲不伏藏寒熱之毒蘊積不散霧露

之氣易以傷人此岐伯所謂南方地下水土弱蓋霧露之

所聚也故瘴氣獨盛于廣南然瘴氣所起其名有二孟夏

之時瘴名芳中而終于秋孟冬之時瘴名黃芒而終于春

四邪皆能傷人而七八月間山嵐煙霧蛇虺毒毒之氣尤

甚當是時疾瘴大作不論先少或因飢飽過傷或因榮衛

甚當是時疾瘴大作不論先少或因飢飽過傷或因榮衛



虛弱或冲煙霧或涉濱澗但呼吸斯氣皆成瘴疾其狀頭  
疼身痛胸膈煩滿寒熱往來咳嗽多痰全不思食癸渴引  
飲或身黃腫脹眉髮脫落此皆毒屬箭蒸之氣所致夫生  
于凌者安于凌其土人宜無所慮矣然且日食換柳蓋換  
柳之性破堅毒除蘊積故耳治法先以磁石下收其陰次  
以丹砂上正其陰陽陽氣正中滿自消然後以換柳解其  
陰蘊毒斯愈矣

磁石丸 治瘴氣下收其陰

磁石 三兩醋 研極細醋煮糊丸小豆大汲水下三十九日二

丹砂散 治瘴氣上正其陽

丹砂 三兩明亮者 蜜水下五分且一服

秦凡湯 治山嵐瘴氣如瘧疾

秦凡 柴胡 常山 糯米 烏梅肉 炒

元氣十補丸 治傷寒瘴氣人虛弱而黃不思食或因或

省心腹脹滿痞氣耳鳴

巴戟天 肉蓯蓉 白朮 石斛 五加皮 鹿茸

去毛 兔絲子 煮 人參 柏子仁 甘菊 分

香椿散 治瘴氣惡心四肢痛口吐酸水不思食憎寒壯

熱 瓷過引飲二廣閩中多山嵐煙霧蛇虺箭毒之氣

當秋七八月之間芒華祭時此疾大作俗謂之黃芒

瘴又謂之芳草瘴是也蓋人或因饑飽或因虛怯或

冲煙霧或沙溪澗遂得此疾謂之黑脚瘴蝦蟆瘴

瘴其名不一並皆治之

香椿嫩葉 酒浸 炙甘草 南壁土 取者 臘茶 一

共末酒下二匙如患久者加入柴胡甘遂各五匙空心臨臥服

菖蒲散 治瘴氣久治不差

石菖蒲 川芎 白朮 炒 蒼朮 香 荆芥穗

炒山梔 兩 吳茱萸 甘中 硝石 側柏 炒黃

椿



荷葉五 共末薄荷湯下二匙如患熱疾姜枣煎服

煮黑豆丸 治山嵐一切瘴氣

白木 蒼木 甘中 貫象二 共末蜜丸彈子大用

黑豆一合入鈔內令平將茶安豆中入水高豆一指

許慢火煮乾復暴乾以絹袋盛之用新汲水吞二十

粒有患處空心一服如涉遠過饑水下五十粒至百

粒可充饑餒

烏菜湯 治嵐氣一切瘴氣

烏菜灸一 半夏汁 姜生 甘中二 馬鞭中

陳皮炒 白炒 荆芥四 姜水煎三匙服

瘴癘

論曰人與天地流通萬物一氣故有感于山川毒癘之氣

而為病者瘴癘是也以其寒熱相似于瘴故名瘴癘傳謂

兩山夾水多瘴蓋陰氣多而陽氣少則易為寒熱之疾也

白薇湯 治瘴癘經百日并一年者

白薇 知母 升廣 竜胆中 炙甘中 蜀漆葉炒

片苓 苦多 常山 大黃微炒 淡竹葉三

鼈甲醋 豉合 獨蒜枚 石羔 赤茯苓 酒水合

煎三匙先時及發時各一服仍以姜汁塗手心并面

木香丸 治一切瘴癘盡毒等瘧

木香分 升廣 玄多 猪苓分 甘中 煨榔

炙鼈甲 犀角剉 豉炒 共末蜜丸小豆大空心

酒下三十九日二

砒霜丸 治山嵐瘴氣寒癘解邪毒

白砒分 澱花一 鐵砒上末 共研入廣香

少許金銀箔各十斤 糯米九分 實大酒下一丸吐瀉差

常山散 治瘴癘寒熱往來二三日一發

常山 紫朴一 中豆蔻二 煨榔 炙甘中五

烏梅肉枚 水煎三匙候冷未發前先服如熱服即吐

保安湯 治瘴癘久不差



常山 朮仁 知母 青蒿 姜水煎二支稍熱服

中暍門 中熱暍 中熱悶絕

論曰盛夏炎熱人多冒暑涉路途熱毒易傷微者容於陽經

令人吧逆頭眩心神煩悶汗少惡寒身熱發渴即時不治

乃至熱氣伏留經絡歲久不除遇熱即發俗名暑氣甚者

熱毒入內與五臟相併容邪熾盛發瘵不宜致陰氣卒絕

陽氣暴亡經絡不通故奄然悶絕謂之中暍此乃外邪所

擊真臟未壞若遇芟救氣通則甦但治熱暍不可飲以冷

物冷則熱不流通若外以冷觸則熱蘊積於內反不得宣

發故也

中熱暍 論曰熱暍之病由胃犯暑熱邪氣其脈弦細芤遲其狀汗

出惡寒身熱而渴身重疼痛小便已則灑然毛聳四肢

厥冷微勞動則熱口開齒燥經所謂脈虛身熱是為傷暴

此不可汗下若汗下之則惡寒更甚宜去熱邪芟治之

則愈

白虎湯 治中熱暍頭痛汗出惡寒發熱而渴

知母 石羔 研一 甘中 兩生 糯米 合六

水煎五支空心溫服 一方加人多

小香薷飲 治伏暑吐逆中暍

香薷穗 二 人少 兩 白扁豆 炒五

水煎三支空心溫服

竹茹湯 治中暍煩渴不止

竹茹 一 月中分 烏梅肉 炒七 水煎時 細呷愈

消暑散 治中暑煩躁多困乏力

人多 白麩 兩 共末空心汲水下二支

甘露散 治暑氣 吳茱萸 洗 同炒黃黑色地上火毒去

川連 一 西 吳茱萸 洗 同炒黃黑色地上火毒去



用連為末食後茶清或汲冷水下二分

甘露丸 治中暑熱躁悶

寒水石 七日煨放井中浸

生甘中 冰片 研五

共末 糯米粥九莫實大姜蜜水下

救生散 治中暑毒煩躁渴悶

脂廣 慢新火者三兩 為末用新汲水下三匙以差為度凡

中暑悶絕

論曰中暑之病令人悶絕者乃熱毒傷于臟也蓋心臟神

而惡熱若冒觸暑毒蘊蓄於五臟則陰陽不能升降經絡

不能宣通故奄然悶絕然真臟未壞救療有方便呼吸之

氣宜通即甦亦不宜待其自甦又不可使之犯冷若外犯

冷則與熱氣相拒令氣反不通而連斃宜慎之

熱喝欲死悶氣方

生地汁 鍾 令旋灌之即甦

中暑毒熱喝不省方

上白麩 用熱湯和三匙令人灌之即差

中熱不省人事方

大蒜 搗爛 用新汲水調和灌之差

又方 以濕泥團中渴人脣使

路上無渴可用乃令人溺取溫有湯不心溺也仲景不

云泥及車釐蓋此物必冷喝人忌冷若得熱湯和泥及

火燒車釐可用也

又方 生菖蒲 搗取汁微溫一鍾令人灌之愈

又方 掘地作小坑子以蜜半鍾傾坑內人新汲水二三鍾攪

勻取起放碗內澄清水漿一鍾灌之差



中熱暈死方  
取路上熱塵上以壅其心冷後易之假患人氣通乃止

陳皮湯

陳皮去白 黑乾姜 灸甘草一兩 水煎三匙 稍冷啖

霍亂門

霍亂吐利 霍亂心腹痛 霍亂嘔吐不止

霍亂統論

論曰三焦者水壳之道路氣之所終始也因風冷或飲食傷內至中焦不利則正氣不守而邪得內于揮霍之間使至撩亂故名霍亂蓋清濁相干于腸胃之間便至撩亂腹痛即利甚者吐利俱發其不利謂之乾霍亂亦次令食暴爭於中而不得出也然脈必代者以氣不足也脈大能言者為可治若脈微氣者而不欲言為難治

霍亂吐利

論曰霍亂吐利者以三焦氣不升降而清濁相干於腸胃五內悶亂先心痛則吐先腹痛則利心腹並痛則吐利俱作治此者當清中焦為本中焦既和則清濁自分而吐利止矣

藿香湯

藿香五 白芷 砂仁一兩 丁香一分 水煎三匙稍熱啖

大豆飲

大豆 陳皮 香茹 竹茹 前胡 芦根 枇杷葉

理中湯

姜水煎五匙服以差為度 治霍亂吐利虛冷

胸滿腹痛吐下者加川芎紫朴姜炒各二兩

四須湯

乾姜 人参 甘中二 附子一枚 水煎五匙空心温



服 一方下甚者加竜骨二兩腹痛不止加川椒二兩  
香茹丸 治冷熱不調霍亂吐下

香茹 半兩 扁豆 木香 丁香 香皮 益智仁 一分  
零陵香 藿香 共末 糊丸 桐子大 藜湯下 二十九

青金散 治吐逆午足厥冷面青諸茶不效者  
硫黃 一兩 水銀 一兩 研細用冷水瓜湯

和氣黃散 治吐利冷熱不和  
胡椒 藜豆 人參 共末 水煎 三匙 空心 稍熱服 日二

霍亂吐不止 論曰霍亂吐不止者胃氣逆故也胃氣逆則氣止而不  
下故吐不止也若上下升降陰陽和平而吐自止矣

人參 藿香 湯 治霍亂 人參 藿香 湯 治霍亂

枇杷葉 半夏 甘草 丁香 草豆蔻 乾姜 青皮

香茹湯 治吐逆不止煩悶 痰益氣 定吐 止心腹刺痛進飲食化

香茹 陳者 扁豆 紫朴 水酒合煎 五匙 及

紫朴湯 治吐逆不思食 水坐 頓冷 分一服 未効再服

紫朴 姜汁炒 人多 白木 半夏 陳皮

返魂湯 治吐逆年足厥冷 姜束 水煎 三匙 空心 溫服 日二

食塩 分 生薑 用童便 碗半煎 一碗 分三服

人參湯 治下焦熱氣逆上吐不止 名曰走哺 人多 山枝 片苓 知母 菴蕪 白茯 陳皮

四汁煎 治吐逆不止 白木 石羔 姜水煎 三匙 服 日二



生藕汁

生葛汁

木瓜汁

生姜汁

同慢火煎如錫頻服一二匙含化徐徐津液飲下

藿香散

治吐逆開胃和氣

藿香

兩

人參

五

丁香

五

訶勒皮

十

石蓮心

二

百

糯米

三百

共末

煨生薑

大棗

煎濃湯

下二匙

霍亂四逆

論曰四肢為諸陽之本陽氣之所通也霍亂吐利陽氣暴厥故四肢逆冷而脈微欲絕也古法治四逆專于通脈蓋

榮衛流行氣道升降則手足自和逆者順矣

理中湯治傷寒霍亂吐逆四逆厥冷煩悶汗出食不化

心腹虛滿拘急短氣

大麥冬 干姜 六 人參 白朮 五 附子 白茯苓 三

甘中 水煎三匙空心溫服少頃又服

龍骨湯治吐利手足逆冷

白龍骨 黑附子 黑干姜 炙甘草

生薑水煎三匙空心溫服以差為度

霍亂心腹痛

論曰霍亂心腹痛者由脾胃虛弱客風冷之氣便陰陽不和致水壳相并清濁莫分變亂于腸胃之間令人心胸煩

慎劇亂不安故名霍亂然邪氣上干於陽絡則心痛而吐

吐下搏於陰經則腹痛而瀉利故謂之霍亂心腹痛也

桂心湯治心腹痛疼煩嘔不止

桂心 三 紫朴 四 枳實 五

姜水煎三匙溫服日二

抵聖散治霍亂宿食不消心腹疼痛

紫朴 四 白朮 二 人參 白茯苓 高良姜 炒

木香 吳茱萸 炒 草豆蔻 枳壳 其中 陳皮 白

石菖蒲汁湯治霍亂心腹痛急如中惡

石菖蒲 水洗搗汁取一鍾分四服熱湯和汁溫服

石菖蒲 四 水

石菖蒲 四 水

慎



厚朴湯

治霍亂心腹痛煩不止或吐

大

紫朴

炒姜汁

圭心

枳壳

去白炒

白芍

炒

檳榔

煨微

縮砂散

治心腹冷痛吐逆惡心滑泄不止

砂仁

陳麩

白朮

赤石脂

黑干姜

吳茱萸

炒洗

川芎

竟骨

共末

熱米飲下

二錢

乾霍亂

中惡霍亂

霍亂乾吐

霍亂轉筋

乾霍亂

論曰乾霍亂之狀中氣喘急而不吐不利是也蓋腸胃挾

急

實與正氣相搏正氣暴衰神志昏冒上下隔塞白汗自出

治之稍緩則不可救

鹽便湯

治不吐不利冷汗自出氣悶將絕

食鹽

熬半匙

童便

鐘

和勻

溫服

少頃吐下即愈

紫蘇丸

治乾霍亂

紫蘇

陳皮

人參

圭心

高良姜

西

共末

蜜丸

梧子大

二十九日二

人多湯

同上

人多

白茯苓

紫朴

兩

圭心

甘中

高良姜

炒五

煎

姜水

並三錢

溫服

日二

黍米飲

治乾霍亂

黍米

合二

水研

澄清

取白汁

呷

盡即愈

不得吐利方

食鹽

合一

汲水

升

同煎

令鹽消

服之

吐出涎沫便愈

活命飲

如不吐

又如上法

飲之

令吐佳

治命飲

治脾元虛損

霍亂不吐

利腹脹如鼓

心胸痞壅

食鹽

合一

生姜

葛根

五

丁香

五

分

作一服

用童便煎

溫分二服

未差再服

中惡霍亂

論曰中惡霍亂者

由客邪內干

正氣暴亂

使胃中食物不



化气道否然不得宣通令人心腹卒通吐利煩悶甚則精  
神冒昧靡所知識此得之鬼气所作也  
麝醋方治中惡霍乱

白木湯治中惡吐利手足麻痺轉筋  
白木一細研 米醋一鍾 共和勻分二服

白木湯治中惡吐利手足麻痺轉筋  
白木一細研 米醋一鍾 共和勻分二服

霍乱乾呕

論曰霍乱乾呕者胃气逆也木於吐利之後脾胃俱虛三  
焦不理气時逆上但呕逆而無所出故名乾呕

木瓜湯治乾呕

木瓜一枚 乾姜兩 紫朴五

水煎五匙温日二

薤白湯治乾呕不止

薤白一尺 水煎二服以知為度

厚朴湯治脾弱吐不止

紫朴兩 白朮兩 白茯苓兩 扁豆葉兩

水煎五匙服

霍乱轉筋

論曰霍乱轉筋者緣風冷傷于三焦傳于脾胃脾胃得冷  
則陽气不得宣行致四肢筋絡不得舒緩此由中气不足

其候胃悶不安脛筋挛結胸内紧痛久急于上盖足陽明  
之經膀胱之脉寒也至足陽明之脉其支者起胃下口循

腹裏下至气衝中而合以下髀開抵伏兔下入膝臏中下  
循髀外廉足大陽之經其脉循髀外後廉下合胛中貫膈

内是動則痛髀不可曲轉胛如結膈如裂治宜調胃脘温  
膀胱則小水得宜寒冷自下胃府温和霍乱可愈轉筋之

疾無由作也

川椒湯治轉筋

川椒一分 烏梅肉七枚 水煎入蜜少頃頓服老



人亦可

肉豆蔻湯 治霍乱轉筋

肉豆蔻 熟 藪 煨 人多 一两 圭心 吳茱萸 一两 炒

姜水煎三匙服

鷄屎白湯 治轉筋 絕欲死

鷄屎白 一合 胡椒 二十粒 木瓜 六兩 白木 圭心 高良姜 一两 水煎五匙温服 日二

木瓜湯 治轉筋 吐利不止

木瓜 一两 青茺 銅錢 九枚 烏梅肉 炒 五枚

水煎分二服

藿香子散 治吐利轉筋 煩悶

藿香子 炒 人多 陳皮 五兩 甘草 石菖蒲

木香 懷香子 炒 人多 陳皮 五兩 甘草 石菖蒲

生姜酒 治轉筋 入腹欲死

共末 冷米飲下三匙 頃再下

生薑 五兩 酒 一升 煎八合 頓服 差

鷄屎白湯 同

鷄屎白 炒 一两 水煎二匙 頓服 勿令病人知

附子湯 治轉筋 淋足

附子 一枚 葱白 半斤 生椒 綿 五 生姜 一切 各 水 一斗 煎

數沸 去渣 以鹽漿水 解之 淋洗 立差

鹽搨法 同

食鹽 三合 水 五升 煎 三升 浸青棉布 搨轉筋上

苦酒絮裹足法 同

苦酒 斤 以絮內酒中煮酒 裹患處 差

又方

木瓜 二枚 水煎湯 以青棉布 漫裹

浸 五

神聖香薷飲 治胃氣 虛霍乱 吐利 轉筋 腹痛

香薷穗 半兩 川連 微 紫朴 二兩 白扁豆 炒 一

用生薑汁 四兩 慢炒 連朴 紫黑色 入二味 同搗粗末



酒水令煎五錢用益乘入井中漫冷連進二服至死

治轉筋方

糯米<sup>二</sup> 人多 生甘中 乾姜<sup>二</sup> 錢 共為末用新汲水下三匙以差為度

聖濟總錄纂要卷五終  
程外林雲來纂  
王之策殿揚  
羅乘亮米臣  
江湘鄂上開  
較

聖濟總錄纂要卷之六

泄痢門

水瀉

濡瀉

飧瀉

洞瀉寒中

鷺瀉

聖濟其作俱

又為作危

飧

泄痢統論  
論曰脾與胃合其象土外榮肌肉內熱水克風寒水濕鬱  
於外則留連肌腠傳于脾胃若飲食不節害於內腸胃乃  
傷不化糟粕皆能為病所得之源不一故立為多端且久  
風入中則為飧泄濕勝則為濡泄寒中則為洞泄暑勝則  
為毒痢而或冷或熱或赤或白或色雜或腸垢或滯下  
或休息或痢或益之類種種不同悉由養搜失宜飲食不  
慎致腸胃不調邪氣交攻施治之法則有宜調補宜攻化



滲

宜收歛宜沙泄各隨所宜以治

水瀉

論曰內經謂諸厥洞泄皆屬於寒暴注下迫皆屬於熱蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水亮不分濕飲留滯水走腸間禁固不能故令人腹脹下痢有如注水之狀謂之注泄名為水瀉

紫朴散

治一切水瀉冷痢

紫朴

白朮

乾姜

甘草

五苓

陳皮

三分

共末飲下三錢

日二

霍亂吐瀉新汲水下

肉豆蔻散

治水瀉無度腸鳴腹痛

肉豆蔻

一兩

姜汁

二合

白麩

二兩

將蔻為末用汁和麩

棗末

煨熟飲下二錢

黃蠟丸

治水瀉不止傷冷虛極

硫黃

黃蠟

一兩

研

硫化

蠟和勻

九

梧子大汲水

紫朴散方又治暴水瀉不止

紫朴

白朮

川連

甘草

赤茯苓

干姜

白豆蔻

訶勒

共末

飲下二錢

訶梨勒丸

治水瀉腸滑不禁

訶勒

龍骨

干姜

赤石脂

一兩

共末糊為丸如梧子大飲下二十九

正氣散

治水瀉腹痛日夜不止

砂仁

附子

白朮

人參

龜骨

石榴皮

甘草

肉蔻

吳萸

地榆

干姜

赤石脂

一兩

共末

飲下三錢

又方

治水瀉水散不化日夜不止

熱艾

併

慢炒

合

熱

包裹

坐之

冷再炒

濡瀉

論曰

肉經云

濕勝則濡瀉

甲乙經曰

寒客下焦

傳為

濡瀉

夫脾為五藏之至陰其性惡寒濕令寒濕之氣內客于脾



熟

則不能俾助胃氣腐熱水壳清濁不分水入腸間虛莫能  
制故洞泄如水隨氣而下謂之濡泄  
肉豆蔻散 治腸胃受濕濡泄不止

肉蔻 川連 訶勒 白木 甘中

赤茯 干姜 紫朴 共末 飲下二錢

又方 治腸胃受濕濡泄不止 共末 飲下二錢 日二

附 紫朴 甘中 肉豆蔻 共末 飲下二錢 日二

陽桂丸 治濡泄水痢不止 共末 飲下二錢 日二

五至心 附子 乾姜 赤石脂 兩

共末 蜜丸 梧子大 飲下二十九

白木丸 治脾胃受濕濡泄不止 紫朴 炒 兩 生薑 兩

白木 人參 乾姜 炒 兩 紫朴 炒 兩 生薑 兩

共末 蜜丸 梧子大 飲下二十九

生薑黃連散 治水土瀉久泄 將薑切片與連全入 錫慢炒

生薑 黃連 川連 阻片 將薑切片與連全入 錫慢炒

善赤色去善用連為末 臘茶下二錢 二服止

論曰 內經云 清氣在下 則生飧泄 又曰 久風為飧泄 夫脾

胃土也 其氣冲和 以化為事 今清濁交錯 風邪之氣 得以

干胃 故冲氣不能化 而食物完出 夕食 謂之飧 以食難化

者 尤在于久 故食不化 而泄出 則謂之飧泄 此俗所謂水

壳痢也

白木湯 治風吟入中 飧泄不止 脈虛而細 日夜數行 口

乾腹痛

白木 紫朴 熟艾 龍骨 川飯 兩

善水煎 三錢 溫服

洞泄寒中

論曰 內經云 謂長夏苦病 洞泄寒中 洞泄者 謂食已 即泄

乃飧泄之甚者 此因春傷于風 邪氣留連 至夏 為飧泄 入

至長夏 為洞泄 蓋當春之時 陽氣在表 為風邪所中 入

至長夏 為洞泄 蓋當春之時 陽氣在表 為風邪所中 入



容于經未至臟府夫風者陽氣也東方木也木能勝土脾  
胃受之仲夏則陽盛之時以陽邪之氣逢陽盛之時重陽  
必陰病在脾胃故為飧泄陰生于午至未為甚是長夏之  
時脾土當旺脾為陰中之至陰故陰氣盛陰氣既盛則生  
內寒故令人臟腑內洞而泄是為洞泄寒中之病  
附子丸 治洞泄寒中注下水壳或疝赤白食已即出食  
物不消

附子 烏梅肉炒一兩 川連炒二兩 干姜炒兩

溫中丸 治脾胃虛寒洞泄不止

附子 乾姜 菟骨 硫黃 肉豆蔻二兩

火輪輸散 治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止  
附子 枝 肉蔻五 干姜一分 共末空心飲下二錢

驚塘

論曰脾氣衰則驚塘蓋陰中之至陰脾也為倉廩之官若  
脾胃氣虛弱為風冷必乘則陰氣盛陰氣盛則臟寒致糟  
粕不化故大便色黑狀如驚塘也又大腸有寒又冷驚塘  
吳茱萸丸 治脾氣不足驚塘青黑  
吳茱萸 乾姜 陳麩 川飯 赤石脂分二

紫朴一兩 共末蜜丸梧子大飲下二十九

菟骨黃連湯 治脾氣不足驚塘青黑  
菟骨一兩 黃連三兩 川飯 干姜

白滯痢 冷痢 熱痢 赤痢  
甘中五 姜水煎三錢空心溫服日二

白滯痢 論曰白滯痢者冷痢之類蓋腸虛受冷留而不去與津液  
相搏結滯如膿或如凝脂而下故曰滯痢  
人多湯 治白滯痢及小便色白  
人多 菟骨 白茯苓 川飯 甘中 干姜五 紫



朴<sup>一</sup>水煎五<sup>二</sup>温服日二

赤石脂散<sup>一</sup>治白滞痢

赤石脂<sup>一</sup>乾姜<sup>一</sup>共末飲下一<sup>二</sup>未差再服

善附子九<sup>一</sup>治臟寒下痢白膿心腹痛

乾姜<sup>一</sup>附子<sup>一</sup>竜骨<sup>一</sup>訶勒皮<sup>一</sup>共末飲下二<sup>二</sup>

冷痢

論曰下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也此因腸胃虛弱寒氣乘之故令人大便秘下青黑<sup>若</sup>其痢色白而食不消者寒中也當診其脉沉則生浮則死其人素有積聚即久冷痢有濃也

牡蛎湯<sup>一</sup>治冷痢腹痛

牡蛎<sup>一</sup>燒<sup>一</sup>紅<sup>一</sup>白木<sup>一</sup>川椒<sup>一</sup>干姜<sup>一</sup>竜骨<sup>一</sup>煨<sup>一</sup>三<sup>一</sup>赤石

脂<sup>一</sup>附子<sup>一</sup>炮<sup>一</sup>人多<sup>一</sup>白芍<sup>一</sup>甘<sup>一</sup>中<sup>一</sup>五<sup>一</sup>

肉豆蔻丸<sup>一</sup>治冷痢青白色黑者

肉豆蔻<sup>一</sup>炙<sup>一</sup>甘<sup>一</sup>中<sup>一</sup>水煎三<sup>一</sup>温服日二

訶勒湯<sup>一</sup>治脾胃虛冷下痢滑泄不思食及一切冷氣

訶勒<sup>一</sup>紫<sup>一</sup>朴<sup>一</sup>白<sup>一</sup>木<sup>一</sup>甘<sup>一</sup>中<sup>一</sup>陳<sup>一</sup>皮<sup>一</sup>豆<sup>一</sup>蔻<sup>一</sup>二<sup>一</sup>西<sup>一</sup>

生薑大棗水煎三<sup>一</sup>温服日二

吳茱萸丸<sup>一</sup>治冷痢下膿血脐腹痛脹滿食不化

吳茱萸<sup>一</sup>乾<sup>一</sup>姜<sup>一</sup>半<sup>一</sup>紫<sup>一</sup>朴<sup>一</sup>川<sup>一</sup>椒<sup>一</sup>兩<sup>一</sup>陳<sup>一</sup>麩<sup>一</sup>

赤石脂丸<sup>一</sup>治多年冷痢飲食不化或骨或黃四肢沉重

赤石脂<sup>一</sup>起<sup>一</sup>即<sup>一</sup>目<sup>一</sup>眩<sup>一</sup>手<sup>一</sup>足<sup>一</sup>逆<sup>一</sup>冷<sup>一</sup>乾<sup>一</sup>姜<sup>一</sup>川<sup>一</sup>椒<sup>一</sup>兩<sup>一</sup>半<sup>一</sup>烏<sup>一</sup>梅<sup>一</sup>肉<sup>一</sup>炒<sup>一</sup>五<sup>一</sup>

共末蜜丸梧子大飲下二十九

四白散<sup>一</sup>治一切冷痢

白竜骨<sup>一</sup>白石脂<sup>一</sup>胡<sup>一</sup>粉<sup>一</sup>炒<sup>一</sup>柘<sup>一</sup>礬<sup>一</sup>五<sup>一</sup>共<sup>一</sup>研<sup>一</sup>極<sup>一</sup>細<sup>一</sup>飲<sup>一</sup>下<sup>一</sup>二<sup>一</sup>

熱痢論曰凡痢色赤黃並熱也甚則下血汁此由腸胃虛弱邪

骨疑青字

熱



热气乘虚入客于肠间故其志下刺兼黄赤或血杂下腹  
中热小便赤洗身热烦渴故名曰热刺

生地黄汤 治热刺不止 地榆<sup>三</sup> 水煎三<sup>分</sup> 空心温服日二

甘中汤 治夏月暴下热刺 地榆<sup>三</sup> 水煎三<sup>分</sup> 空心温服日二

蒲根汤 治热刺 生薑<sup>五</sup> 白蜜<sup>一</sup> 浆水五合煎分二服日二

黄連湯 治热刺腹痛日夜百行 粟米<sup>二</sup> 水煎三<sup>分</sup> 温服日二

川連介 附子<sup>一</sup> 白朮 竜骨 赤石脂 干姜

阿膠 川飯<sup>一</sup> 水煎五<sup>分</sup> 空心温服日二

赤刺 論曰热刺之盛者為赤刺本由腸虛為風邪外傷又挾邪  
热血得热而妄行乘虛必透渗入腸中與刺相雜其色純  
赤名為赤刺若腸虛不復則又為父赤刺變成吧噦疝

之候矣 黃栢九 治刺下黃赤水或黃赤膿四肢煩皮膚冷  
川栢 片苓<sup>一</sup> 川連<sup>二</sup> 熟艾<sup>五</sup> 共朱蜜三<sup>兩</sup> 蠟

六神湯 治赤刺腹痛或下純血 一<sup>兩</sup> 化丸梧子大飲下二<sup>三</sup> 十九

川連 車前子<sup>三</sup> 陳皮<sup>一</sup> 去白炒 山枝 甘中<sup>灸</sup>

地榆<sup>五</sup> 水煎五<sup>分</sup> 宜心湿服日二 空

血刺 膿血刺 赤白刺

論曰邪氣客於血脉之中腸胃虛弱血隨热行流滲腸間  
同便血下故名血刺其脉見虛小者生身热疾数者难治

茜根湯 治刺下鮮血 茜根 川連 地榆<sup>一</sup> 山枝<sup>二</sup> 犀角<sup>一</sup> 剉<sup>分</sup>

艾葉飲 水煎三<sup>分</sup> 入薤白三寸香豉一撮温服 治血刺不能止小腹刺痛

艾葉飲 治血刺不能止小腹刺痛

艾葉飲 治血刺不能止小腹刺痛



艾葉 川連 川飯 竜骨 訶勒皮<sup>二</sup> 水煎<sup>三</sup> 三<sup>五</sup> 服<sup>温</sup>

三物散 治一切血痢 烏梅肉 竈下土<sup>一</sup> 共末<sup>茶</sup> 下二<sup>五</sup>

葛粉飲 治血痢日夜無度 白蜜<sup>一</sup> 汲水四合和勻服

地榆湯 治血痢日夜無度 甘中<sup>二</sup> 煎<sup>五</sup> 水煎<sup>五</sup> 炙<sup>温</sup> 服<sup>日二</sup>

人多散 治一切血痢腹痛 烏魚骨<sup>二</sup> 共末 飲下二<sup>五</sup>

通聖散 治血痢腹痛日夜無度 干姜<sup>三</sup> 共末 姜枣水煎<sup>三</sup> 服

膿血痢 論曰春傷于風邪氣留連夏為洞泄若遇熱氣乘之則血

隨熱行滲入大腸與腸中津液相搏致積熱結血化為膿

膿血相離故成膿血痢秋冬診脾脉微澁者是也其脉滑

大或微小沉細虛遲者皆生若懸絕或實疾或數大身熱

者皆死 黃連丸 治下痢膿血羸瘦 熟艾<sup>一</sup> 白<sup>一</sup>

川連 竜骨 苦<sup>一</sup> 紫朴<sup>一</sup> 熱艾<sup>一</sup> 枯礬<sup>一</sup> 赤石

脂 甘<sup>一</sup> 陳麩<sup>一</sup> 干姜<sup>五</sup> 共末 蜜丸如梧子大飲下二十九

柏葉丸 治膿血久痢腹痛 阿膠<sup>一</sup> 地榆<sup>一</sup> 川端<sup>五</sup>

側柏葉 川黃連 共末 蜜丸梧子大飲下二十九

乾姜丸 治膿血痢日久不止 附子<sup>一</sup> 甘中<sup>一</sup> 熱艾<sup>一</sup> 烏梅

干姜 川連 川栝<sup>一</sup> 附子<sup>一</sup> 甘中<sup>一</sup> 熱艾<sup>一</sup> 烏梅

二宜散 治新久痢下膿血 共末 蜜丸如梧子大飲下二十九

川連 吳茱萸<sup>二</sup> 各製為末 赤濃多莫末<sup>一</sup> 連末

赤白痢 倍之 白膿多連末倍于莫末俱飲下

連末倍于莫末  
恐當作莫末  
倍于連末



論曰赤白痢者由腸胃虛弱必熱相乘客于腸間夏而為痢蓋熱乘于血流滲腸內即赤冷氣入搏津液凝滯則白其候裏急後重數至圍而不能便膿血相雜故名赤白痢重者狀如濃涕而血雜之輕者血膿上有赤脉薄血狀如魚脂腦世謂之魚腦痢

蓮連散 治赤白痢腹中痛口乾作寒熱  
 川黃連 炒三  
 白木 片苓 甘中 乾姜  
 烏梅肉 五 芎膠 二 共末水煎三匙温服  
 白木九 治赤白痢及水壳冷熱氣痢  
 白木 川畝 竜骨 犀角 赤白脂 烏梅 三分  
 紫朴 川連 干姜 甘中 共蜜丸梧子大飲下二十九  
 烏梅散 治赤白痢久不止腹痛下血脫肛  
 烏梅肉 川歸 地榆 赤石脂 川連 樗根白皮  
 干姜 三分 甘中 一分 共末飲下二匙  
 加減姜黃丸 治冷熱赤白痢

乾姜 川連 炒二 各末糊丸各收 白痢冷浮姜九三  
 十九 連丸減半空心飲下 赤痢下血姜九十五連  
 九倍之 赤白相雜姜連各半  
 竜骨散 治赤白痢腸胃虛清  
 竜骨 五 川連 牡蛎 兩 烏梅肉 三分 共末飲下二  
 阿膠丸 治赤白痢  
 阿膠 枳壳 五 川連 白芍 木香 炒 羊生 訶勒皮  
 乾姜 甘中 一 川歸 地榆 半 共末酒糊丸梧子  
 大飲下二十九  
 黃連散 治赤白膿血痢  
 川連 竜骨 二 人參 三分 地榆 紫朴 干姜 一  
 片苓 兩 赤石脂 兩 共末飲下二匙  
 艾葉丸 治赤白痢多痛不可忍  
 艾葉 木香 羊生 川連 肉豆蔻 三分 地榆 一兩  
 阿膠 炒 務 川歸 五 共末蜜丸梧子大飲下二十九



阿膠丸

治赤白痢腹痛不止

阿膠

川連

胡粉

川飯

共末糊丸飲下二十九

黃連丸

治赤白痢不問遠近

川連

赤茯苓

當飯

共末蜜丸如梧子大飲下二十九

四神散

治赤白痢後重腸痛

川連

乾姜

川柏

川歸

共末

烏梅湯下二錢

赤痢

加黃柏

白痢

加干姜

後重

腸痛加黃連

腹痛

加當歸

丸泄

痢宜食酸苦

蓋酸牧

苦堅故也

木香散

治一切赤白痢

木香

枳實

肉蔻

乾姜

共末

飲下二錢

和中散

治冷熱痢腹痛裏急

附子

川連

乳香

各為末

冷痢

熱痢

連附末

共一錢

乳末一字

飲下末止

赤痢

附末五分

連末倍之

乳末一字

白痢

附末二錢

連末減半

乳末全前

白痢

附末

黑豆湯

治赤白痢服茶不止

黑豆

半升

炒去皮

甘草

兩

用綿裹

入糊水

三升煎

白礬丸

治赤白痢

白明礬

鉛丹

全入瓶

中封固

火煨為末

糊丸為

如梧

桐子大

飲下

二十九

氣痢

休息痢

盡痢

久痢

論曰

氣痢者

內冷氣

停于腸

胃間

致冷熱

不調

脾胃不和

腹脊

虛滿

腸鳴

腹藏

便痢

赤白

名為

氣痢

治宜

厚腸

胃調

冷熱

補脾

氣痢

當自愈

縮砂丸

治氣痢

胃與

腸虛

不能

制伏

日夜

無度

黃瘦

食

不生

肌困

重無

力眼

目昏

澁多

年不

愈

砂仁

陳皮

川歸

赤石

脂

川連

肉豆

蔻

共末

蜜丸

語子

大飲

下二

三

十

九

痛



黃連丸 治久氣痢不止或差或劇 九

川連 川歸 烏梅肉 訶勒皮 共末蜜丸梧子

猪肝丸 治冷勞氣痢久不差 雄猪肝一具 炙 陳皮 烏梅肉 干姜 訶勒皮 煨 取

木香丸 治氣瀉不止 共末用肝蒜研糊丸梧子大飲下二十九 皮 圭心 川歸 兩 川連 紫朴 二 姜 炒 兩 大蒜 煨 取

木香丸 治一切氣痢不止 木香 丁香 砂仁 肉豆蔻 赤石脂 訶勒梨

木香丸 治一切氣痢不止 木香 藿香 共末糊丸梧子大飲下三十九

木香丸 治一切氣痢不止 木香 肉豆蔻 砂仁 赤石脂 共末用枣肉為

香艾丸 治氣痢腹痛臥眠不安 香艾 陳皮 共末酒糊丸梧子大鹽湯下二十九

烏梅丸 治氣痢不止瘦劣痢成冷勞 烏梅 草薹 紫朴 甘草 川歸 訶勒皮

肉菴 乾姜 草揅 圭心 猪肝 煮研糊大

木香砂仁散 治氣痢腹脹虛鳴 木香 砂仁 枳壳 訶勒皮 共末飲下三

肉豆蔻散 治氣痢腹脹不下食 肉豆蔻 訶勒 木香 甘草 白朮

草揅煎 治氣痢久不差及諸痢困弱者 草揅 乾姜 共末飲下二

草揅煎 治氣痢久不差及諸痢困弱者 草揅 牛乳 慢煎其中頓服神效

休息痢 論曰腹中宿挾因滯每遇飲食不節停飲不消即乍差乍

之劑即愈 癸故取名為休息痢治某當加之以治飲消削陳寒痼滯



枚

阿膠湯 治休息痢

阿膠 川連 龍骨 艾葉

倉米 炒二合 水煎 服

黃丹散 治休息痢 諸菜無效

黃丹 炒三西 束肉 紙三十枚 煨研末 搗 川連 枳壳

砂仁丸 治休息痢

砂仁 一 肉豆蔻 羊肝 炒半斤 共末 拌勻 麩包紙

裏煨熱 研米糊丸 梧子大 飲下 三十丸

黃連湯 治休息痢

川連 龍骨 熱艾 阿膠 水煎 三味 去滓 入

阿膠再沸 分二服 每服後 濃煎艾湯 飲之

玉液丹 治休息痢

枯礬 二 硫黃 硝石 全研化 研末 糊丸 小豆大

砂仁丸 治冷氣腹痛 不止 休息氣痢 勞損 消化 水壳 温

脾胃冷滑 下痢不禁

砂仁 附子 干姜 紫朴 陳皮 肉豆蔻 五錢

四神丸 治多年休息痢

川連 龍骨 川連 烏梅 肉 共末 用 薤

白取汁 杵丸 小豆大 温水下 二十九丸

當歸丸 治多年休息痢

川連 烏梅 肉 共末 薑汁 丸 梧子 大 厚 朴

湯下 二十九丸

金石散 治多年休息痢

石 灰 者 風 化 鉛 丹 炒 一 糲 米 炒 黑 將 灰 丹 全 入 鍋

慢炒 一炊 久 入 米 全 研 末 空 心 飲 下 二 匙

蓋痢

論曰 凡下痢 膿血 間雜 瘀黑 有片 如鷄鴨肝 與血 皆下者

蓋痢也 此由 歲時 寒暑 不調 温毒 之氣 襲入 經脈 漸至 臟



疝毒氣挾熱與血相搏客于腸間如病蓋注之狀故名蓋疝  
茜根飲 治蓋疝下血如鷄鴨肝腹痛難忍

茜根 升廣 片芩 犀角 川栢 桔梗 白藜

升廣湯 治毒疝下血片疝下刺痛  
地榆 水煎三錢溫服  
片芩 茜根 犀角 山枝

久疝 論曰久疝不差則元氣日耗腹胃損傷濕氣散入肌肉浮  
腫以胃土久虛故也蓋因虛動上食于腸則吐逆煩悶下

相半腥不可近者是謂五藏俱損五液雜下其病難治  
紫朴湯 治久疝經年不差  
紫朴 川連 熱艾 干姜 阿膠 炒 石榴皮

水煎三錢溫服  
水煎 五錢 入生地 薤白 香鼓 溫服 日二

茯苓丸 治久疝脾胃虛弱食不消腸鳴痛  
白茯苓 龍骨 川飯 干姜 川栢 赤石脂

陳麩 川連 附子 人多 甘中  
共末 蜜丸 如梧子大 飲下二十九

黑神散 治腸滑久疝神效無比  
酸石榴 一板 研末 水煎 石榴

久疝不止 辦取汁下二錢 久厚亦治

生薑 砂糖 拌勻 紙煨 五更初作一服以嚼茶嚼下

泄疝門 下疝裏急後重 痢後脫肛 痔瘻 濕

下疝裏急後重 論曰下疝裏急後重者有瘕聚也經所謂大瘕泄者裏急

後重數至圍而不能便莖中痛是矣法當和氣而祛蘊滯

川脾胃平和飲食腐化 膿血自消大腸自固也

川當作則



當飯黃連湯

治後重下赤白滯下腹內結痛

川飯犀角

赤茯苓

川連

甘中

紫朴

地榆

姜束水煎三匙溫服

聖功散

治冷熱不和下痢赤白疝腹痛裏急後重

干姜

五倍子

甘中

訶勒皮

共末飲下二匙

白頭翁湯

治熱痢下重

白頭翁

川連

川栢

秦皮

水煎三匙溫服

當飯湯

治冷痢裏急後重

川歸

胡椒

干姜

阿膠

川連

紫朴

通神丸

治濃血雜痢後重疼痛久不差

共末

醋熬膠末為膏九梧子大陳皮湯下二十九

沒藥

乳香

五靈脂

巴霜

共研水丸小豆

大木瓜湯下五七丸

小兒減半

痢後脫肛

論曰下痢脫肛者因大腸虛弱冷氣僂滯致不能便極力

于下肛門脫出故名脫肛濕其藏則愈古方有坐湯溫熨

之菜皆良法也

黑聖散

治痢久脫肛痛

大知蛛

黑飯

泥合燒

研末入黃丹少許先用白礬

葱根湯洗拭乾

滲菜在軟帛上按托肛頭即不下

豬肝散

治洞泄脫肛

豬肝

一片

川連

阿膠

川芎

烏梅

二兩

艾葉

醋炒

共末酒下二匙

壁土散

治脫肛

故室東壁土

土合

皂莢

共末

傳肛上

取皂莢灰

煖更互熨入

枳實熨方

治積冷下痢脫肛

枳實

一枚

石上磨令滑

沃鑽

安柄子

蜜塗灸

令煖

熨之

冷易肛入即止

一方以猪脂和蒲黃

傳肛上

手按

令入日二三愈

膿



疔毒  
論曰疔有五種久變為盞其毒二曰白疔令人皮膚乾燥  
而無潤澤之色二曰赤疔令人毛髮枯焦三曰燒疔令人  
腰脊強重四曰疔毒令人下部卒急脊強不能俯仰五曰  
黑疔患者必死令人五臟俱損或下瘀血此血腸胃俱虛  
嗜肥甘過度致脾胃緩弱氣衰微衛氣虛損腸間諸蟲  
因虛而動蟲蝕于上則手足煩疼心中懊懣嘿嘿不欲飲  
食睡脊無力食不知味精神恍惚夜夢倒顛咽喉生瘡齒  
斷黑點損爛膿血俱出胃氣妨則變吧噦下蝕腸胃便疔  
膿血或下瘀黑久不已則肛門爛開漸至危殆  
治積年疔痢面黃瘦  
硫黃 川連 熱艾 白蜜 水一升煮連艾取  
汁入黃末數沸綿濾過入蜜數沸分三服  
疔痢久不差羸瘦欲死浸  
羊屎升 水一斗漫一宿明且絞汁頓服至日亦惟食

水煮飯極重不過三服差  
二白湯 治久痢變疔下部生惡瘡惡寒壯熱  
桃白皮 槐白皮 苦參 大棗 熱艾  
要五月五日 用水五升煮半入熊胆一匙大換勻以  
取者者炒 一升灌下部余分三服  
治久痢成疔 百方不差  
丁香 廣香 川連 共末用竹筒吹入下部

濕毒  
論曰凡下痢不止或癸之餘為水濕所乘客于腸胃令九  
蟲皆動侵蝕臟腑故為濕毒之病所謂毒者蟲動干匿而  
難尋故也謂蟲因濕而動故名濕毒其志上蝕唇口下食  
肛門上唇生瘡是蟲蝕五臟令人心煩懊懣下唇生瘡是  
蟲蝕下部令人肛門傷爛若胃虛氣逆則變為吧噦芑則  
臟府彼傷齒上下斷皆生瘡齒色暗黑是其候也下痢出  
痰血者不可治



黃連湯 治疳濕蠱蝕口齒及下部

川連<sup>四</sup> 熱艾<sup>二</sup> 苦<sup>多</sup> 槐白皮<sup>三</sup>

水煎五錢重者不過三服

猪膽煎 治疳蠱下部上攻除熱殺蟲

猪膽<sup>一</sup> 米醋<sup>五</sup> 煎醋百沸入膽汁再熬滿口飲之

與死差

塗方 治疳蠱無問所在皆治

死蝦蟆<sup>一</sup> 燒<sup>一</sup> 研末<sup>一</sup> 油<sup>和</sup> 塗患處

丁香散 治疳濕蠱洗<sup>一</sup> 煎下部

丁香<sup>一</sup> 廣香<sup>一</sup> 甘<sup>中</sup> 犀角<sup>三</sup> 共末以鹽椒各

三合豆二合水三升者乘熱用綿蘸洗<sup>一</sup> 煎

聖濟總錄纂要卷六終

聖濟總錄纂要卷之七

新安

程 林雲來  
巴 一 曷雲扶  
吳從殷尚木  
呂 垣薇斗  
較 纂

咳嗽門

咳嗽 暴嗽 久嗽 冷嗽 熱嗽 呷嗽

五臟諸嗽

咳嗽

論曰肺主皮毛皮毛先受寒邪乃為咳嗽五臟六腑又皆稟氣于肺故以其時感寒而受病亦能為咳形症不同治亦隨異學者審之

桑白皮湯 治咳嗽胸滿氣急

桑白皮 半夏 川貝母 知母 五味子 款冬花

紫蘓<sup>一</sup> 人參 炙甘草 紫朴<sup>五</sup> 姜水煎三錢服日二



百邪煎

治咳嗽久不已

百部 生薑汁 生地汁

白蜜 麥冬汁 大棗肉

內慢煎下蜜又將束肉搗爛入汁內收底煎湯化日類服

貝母散

治咳嗽

貝母 甘草 阿膠

訶勒散

治咳嗽

訶勒 為末每以二錢用雄猪胰一枚去脂切

五味子湯

治咳嗽晝減夜增不得眠食即吐逆

白茯苓

杏仁 桑白皮 百合 廣黃

施復花

枳殼 紫苑 圭心 款冬花

姜水煎

三錢入糯米一撮温服

暴嗽

論曰肺感于寒微者即成咳嗽盖肺主皮毛寒傷膚腠則

肺先受之其狀咳嗽語声嘶破咽喉不利也

杏仁湯治中冷暴嗽上氣喘逆惡寒出清涕

杏仁 紫苑 片苓 甘草 川歸 陳皮 廣黃

圭心 木香 大黃 水煎三錢温服日二

貝母煎治暴嗽胸膈不利痰逆喘急

川貝母 紫苑 杏仁 桑白皮

甘草 百部 五味子 白前

用水一斗入諸味煎取汁二升瀉去滓入生地汁五

合麥冬汁五合白蜜三合牛酥二兩慢煎成錫類

含化一七飲下

錫糖煎

治暴嗽肺寒

飴糖 干姜 豉 分二劑煎去渣入糖姜末服

久嗽

論曰肺主毛皮易感風邪寒邪傷于肺則為咳嗽五臟各



而當作面

以其時受之為五臟之欬久不已傳于六府六府不已三焦受之是為久嗽其人咳而腹滿不欲飲食多唾而腫氣逆乃其症也

人參煎 治積年咳嗽  
人參兩 酥油 栝樓 搗 蜜糖 兩 飯上蒸九次晒

乾為末空心湯下一匕日二  
蛤蚧丸 治久咳嗽喘急  
蛤蚧酥一對 半夏 杏仁 去皮炒 栝樓 大者二枚 研

阿膠散 治久咳嗽  
阿膠 炒 蛤粉 人參 五 青皮 去白炒 干姜 兩 煮二

共末蜜丸如小豆空心飲下二十九  
阿膠 人參 黃香 炙甘草 杏仁 去皮 桑白皮

紫苑 桔梗 共末用猪胰一枚去油膜切拌  
末二錢葱白三寸 塩少許温紙包煨熟細嚼酒下

欬冬花散 治肺寒久咳嗽  
欬冬花 治肺寒久咳嗽

欬冬花 不拘為末燒煙令病人吸之愈  
阿膠飲 治久咳嗽  
阿膠 兩 人參 兩 共末用豆汁入葱白煎三錢若嗽頻

痰蘘貝母湯 治久欬嗽  
白疾梨 川貝母 百合 赤石脂 紫苑 廣黃 根

節 天雄 枳壳 半兩 五味 川連 地榆 桑根白  
皮 東引 圭心 貫衆 兩 片苓 五 施復花 兩 炒三

姜水煎三錢服  
冷嗽  
論曰形寒飲冷內外合邪因而客之則為肺咳蓋肺主氣

外合皮毛其經環循胃口故內外得寒皆能傷之而為冷  
痰嗽其候吸呼氣寒口如飲冰雪吧吐冷沫胸中急痛昼

靜夜甚得温則止遇寒即發是也  
乾姜湯 治冷痰嗽  
干姜 廣黃 一兩 根節 圭心 炙甘草 兩 紫苑

廣黃 一兩 根節 圭心 炙甘草 兩 紫苑

紫苑



五味子五枚 杏仁去皮尖炒 水煎三匙空心温服

細辛散 治肺寒咳嗽喘滿

甘草 五味子 干姜 赤茯苓

共末湯下二匙蜜丸亦可

乾姜 糖煎 治冷嗽及一切嗽 化飴糖拌勻蒸熟頻含化之

干姜 三炒而末 膠飴糖 化飴糖

杏仁九 治冷嗽呼吸氣寒 吐沫胸中急痛

杏仁 炒香 杏仁皮尖 生薑片 焙干切 陳皮 去白炒

共末蜜丸如梧子大空心酒下二十九

熱嗽 論曰熱嗽之狀嗽而少涎由邪熱蒸于上焦客于肺經使

津液內燥搏干咽嗌喉嚨不利隨其吸呼而咳嗽也

百部九 治肺氣熱嗽胸膈煩滿

百部 黃耆 杏仁 圭心 天冬 括樓

馬兜令 紫苑 紫蘘 玄多 半兩

共末蜜丸如梧子大烏梅甘草湯下二十九

阿膠九 治客熱嗽止嗽化痰

阿膠 人參 礪砂 丹砂 甘草 冰片

共末蜜丸如芡實大含化一九日二

華蓋湯 治上喘咳嗽兼治隔熱

桑白皮 陳麩炒 桔梗 人參 百合

杏仁 去尖炒 炙甘草 水煎三匙温服日二

涼膈散 治肺熱咳嗽

甘草 雄猪胆汁浸五日炙香為末蜜丸如梧桐

子薄苛湯下二十九

馬兜湯 治肺熱嗽氣急喘悶

馬兜令 桑白皮 苦葶藶 炙甘草

半夏 姜汁製 姜水煎三匙空心温服

論曰呷嗽者咳而胸中多痰結于喉間與氣相擊隨其吸

呷嗽

論曰呷嗽者咳而胸中多痰結于喉間與氣相擊隨其吸



呼呀呷有音故名呷嗽宜調順肺經仍加消痰破飲之劑  
射干九 治久嗽喉中作声亮即偃卧不得

射干 半夏 陳皮 百部 款冬 細辛

干姜 五味子 貝母 白茯苓 皂莢 射干 郁李仁 共末蜜丸如梧子大空心飲下二十九

杏仁丸 治呷嗽有音 杏仁 甘草 大黃 葶藶 牙硝 杏仁 共末蜜丸如梧子大空心姜湯下二十九

紫苑杏仁煎 治肺臟氣積呷嗽不止因肺虛損致勞疾  
相侵或胃中冷膈上熱者

紫苑 杏仁 貝母 姜汁 大棗 五味子 人參 白茯苓 甘草

桔梗 地骨皮 白蜜 生地 合化一匙 日 共末與蜜汁同煎百沸器盛蒸三五次成飴煎仰用

喉

五臟諸咳嗽

論曰內經謂肺咳之狀咳而喘息有音甚則吐血心咳之狀咳而心痛咳中介如梗狀甚則咽腫喉痺肝咳之狀咳而兩脅下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿脾咳之狀咳而右脅下痛陰引肩背甚則不可以動則咳劇腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳涎五臟之咳久而不已乃傳六府六府之咳內聖論之詳矣

前胡湯 治五臟諸咳嗽 前胡 五味 生地 沃泻 半夏 貝母

廣黃 人參 山藥 白朮 白茯苓 杏仁 甘草 葛根 烏梅 姜水煎三匙宜空心溫服

五靈脂湯 治肺咳嗽及諸嗽 五靈脂 馬兜鈴 杏仁 桑白皮 陳皮 杏仁 姜水煎二匙宜空心溫服

桑白皮 陳皮 杏仁 姜水煎二匙宜空心溫服



人参桔梗散 治心咳嗽咽喉肺痛

人参 一两 桔梗 一两 炙甘草 一两 白茯苓 一两 牛房子 一两 炙甘草 一两

木乳散 治肝咳嗽两脅下满 木乳即皂荚树根皮

木乳 酥炙 杏仁 去尖 炙甘草 一两 贝母 二两 炙甘草 一两

半夏陈皮汤 治脾咳嗽

半夏 陈皮 杏仁 赤茯苓 柴胡 广黄 一两

四味散 治肾咳嗽

补骨脂 炙 牵牛子 炒 杏仁 一两 郁李仁 一两

黄耆散 治大腸咳嗽

黄耆 人参 白茯苓 桑白皮 炙甘草 一两

半夏桔梗汤 治脾肺寒热劳咳痰盛吐逆

半夏 桔梗 桑白皮 胆南星 一两

阿膠散 治肺胃不調久咳不差

阿膠 甘草 桔梗 炒 桑白皮 炙甘草 一两 细辛 一两

鹿角膠湯 治大腸咳嗽

鹿角膠 杏仁 炒 炙甘草 一两 半夏 一两

人参丸 治脾胃虚弱痰壅咳嗽

人参 木香 诃梨勒 炙甘草 一两

咳嗽上氣 共末蜜丸梧子大空心飲下二十九

論曰諸氣皆屬於肺氣和平則升降自若若為寒邪所傷則肺氣壅則不得宣通故咳嗽而上氣其症咳嗽多涕

塞



唾甚者面目浮腫久而不已肺氣虛極風邪停滯令人胸背痛以至唾膿血也

潤膈丸 治積年咳嗽上氣涎吐稠黏五心煩躁不思食

肺經留熱 阿膠 熟地 人參 山藥 五味 白茯苓 遠志 柏子仁

防風 麥冬 貝母 杜仲 丹參 茯神 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

百部 共末蜜丸如彈子大水煎一九服 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣 香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑湯 治咳嗽上氣 紫苑湯 治咳嗽上氣



共末將酥汁蜜慢煎入末和勻終成煎用磁瓶盛貯  
既上蒸頻服一二七湯下內有白蜜五兩

咳嗽唾膿血

論曰咳嗽唾膿血者由肺感寒氣咳嗽傷于陽也心主血  
肺主氣血隨氣上逆故咳而有血寒邪壅熱于肺間津液  
相搏凝滯蘊結故化為膿因咳而哈吐膿血也

百部丸

治咳嗽上喘吐膿血胸滿隔不利咽喉腫痛

百部

天冬 貝母 桔梗 紫苑 欵冬花

桑白皮湯

治咳嗽吐膿血痰涎

桑白皮

麥冬 欵冬花 貝母 甘草 黃明膠

萊菔子湯

治咳嗽唾膿血痰涎

萊菔子

水煎三匙溫服

來菴子

白蜜 牛酥 桃仁 杏仁 皮尖 同去

蛤蚧湯

治咳嗽哈血吐膿

蛤蚧

人參 貝母 杏仁 甘草 知母 鹿角膠

葛根

桑皮 枇杷葉 水煎三匙溫服

五味子湯

治咳嗽吐膿血連胸膈痛

五味子

生地 桔梗 桑皮 紫苑 續斷 赤小

豆

甘草 水煎三匙入竹茹一九煎溫服

薤白湯

治久咳嗽肺虛吐血將成勞病

薤白

阿膠 甘草 鹿角膠 水煎三匙入薤白三寸服

鼈甲

阿膠 甘草 鹿角膠 水煎三匙入薤白三寸服

栝樓湯

治咳嗽哈血喘滿肺痿

栝樓

二枚 去核 炒 葛根 防己 杏仁 貝母 馬兜

杏仁湯

治肺氣壅熱咳嗽上氣吐膿血

杏仁

甘草 阿膠 水煎三匙入蜜少許溫服

杏仁

桑皮 紫胡 甘草 桔梗 紫苑 廣黃

去根

欵冬 川連 茜根 半夏 水煎三匙溫服

咳嗽失聲

欵冬 川連 茜根 半夏 水煎三匙溫服



論曰咳嗽失音者蓋肺氣上通於喉龍之者肺之系肺感寒微者成咳嗽不已其氣奔迫窒塞喉中故因而失音也

杏仁煎 治咳嗽失音語不出

杏仁一升 炙去皮 五味子 木通 貝母 紫苑一兩

桑白皮兩五 姜汁 飴糖升 分三劑每水四鍾煎去滓入杏汁糖三之一成煎貯器中含化一匕

補肺人參湯 治氣虛咳嗽言語嘶飲食減少日漸消瘦

人參 黃耆 熟地 圭心兩 白朮 紫苑三分 干姜 杏仁 紫苑 五味五 鹿角膠兩 束水煎

三棗溫服

漏聲散 治咳嗽聲不出

五味子 欬冬 人參 木通 細辛 竹茹 石菖蒲 牛酥兩三 杏仁 白蜜 姜汁升 束肉二升 圭心三 水煎諸味去滓入酥汁蜜束慢熬稠酒下一匕日三

紫苑九 治肺感風冷咳嗽音嘶

紫苑 貝母 欬冬 圭心兩 杏仁 甘草二兩 陳皮 人參 白茯苓 百部兩 共末蜜丸如梧子大

空心飲下三十九

風冷音嘶

論曰其風冷音嘶者其音嘶嘎不過暢也蓋肺象金主聲音人五臟有五聲皆稟肺氣而過之今風冷乘于肺經則氣道不調故音不出而嘶嘎也

杏仁煎 治風冷失聲語音不出

杏仁研去皮 炙爛 圭心兩 五味子 貝母 細辛

紫苑兩一 共末水煎去滓入蜜飴糖姜汁杏膏慢煎酒下

石菖蒲散 治風冷搏肺氣寒不通音嘶不出

菖蒲 五味子 細辛 陳皮 紫苑 乾姜 五棗

訶梨勒 杏仁一兩 共末酒下二棗

通聲辛日煎 治肺氣虛為風寒所傷語音嘶嘎氣息喘

通聲辛日煎 治肺氣虛為風寒所傷語音嘶嘎氣息喘



急不通痰逆上气咳嗽

真酥 白蜜 飴糖 姜汁 百部汁 束肉 一斤

杏仁 研 一斤 用微火慢煎成煎酒下一匕

諸氣門

諸氣

上氣

上氣喉中水鷄声

短氣

陽氣

諸氣統論

論曰內經云百病所生生于五臟肺之所生獨主於氣不足有余蓋內虛實故所病不同其症亦異怒則氣逆甚則吐血及飧泄故氣逆也喜則氣和榮衛通利故氣緩也悲則心系急肺布葉舉使上焦不通榮衛不散熱氣在內故氣消也恐則精怯怯則上焦閉則氣還則下焦脹故氣不行也寒則腠理閉氣不行故氣收也熱則腠理開榮衛通汗大洩故氣淺也驚則心無所倚神無所歸意無所定故氣亂也勞則喘急汗出內外皆越故氣耗也思則心

有所存神有所歸正氣留而不行故氣結也

七氣丸 治寒熱愁怒驚思恚氣

大黃半兩 人參 半夏 細辛 柴胡 干姜

吳茱萸 桔梗 菖蒲 赤茯苓 川芎 甘草

石羔 桃仁 去尖炒 川椒 三分

共末蜜丸如梧子大飲下三十九 一方加圭心

麝香丸 治一切氣逆胸膈否悶中腕不快痰癖留滯吐惡心肢體倦不思飲食

麝香 丹砂 紫朴 木香 肉桂 五分 半夏

檳榔 兩 丁香 乳香 兩 圭心 三分

共末用姜汁煮半夏末為膏丸小豆大陳皮湯下二十九

藿香湯 治諸氣不調胸膈痞滯升降不勻

藿香 紫朴 干姜 兩 甘草 青皮 三分 圭心 五分

枇杷葉 兩 生姜大束 水煎五錢空心溫服日二

上氣



論曰凡人一日一夜共一萬三千五百息呼隨陽出氣於是外吸隨陰入氣於是乎降一升一降陰陽交通氣乃和融所謂上氣者蓋氣上而不下升而不降喘息有邑是也本于肺臟之虛復感風邪肺脹葉舉諸藏氣又上冲而壅遏此所以有上氣之候也

地黄煎 治上氣之急 牛酥半斤 白蜜升 淡竹葉半斤

生地汁 生薑汁 炙甘草 貝母 蘇子 赤茯苓

杏仁 水四升煮竹葉耳茯蕪苑去滓入汁蜜熬成

煎重陽煮攪稀飴含化一匕

款冬花湯 治上氣咽中不利

款冬 五味子 半夏 射干 細辛 紫苑

廣黃 薑水 水煎三棧空心温服

酥蒜煎 治上氣喘急 以酥煮蒜煮去蒜入薑汁成煎頻服已

雙仁丸 治上氣喘急不安 桃仁 杏仁 俱去皮

爛研水和生麩為丸如梧桐子大薑蜜湯下二十九

上氣喉中如水鷄壹 論曰肺主氣上通于喉嚨肺經客寒則喉嚨不利痰唾凝

結氣道奔迫喘息有邑壹如水鷄 半夏丸 治上氣咳嗽喉中作壹坐卧不得

半夏 紫苑 桑皮 百部 款冬 射干 陳皮

五味 貝母 皂莢 赤茯苓 杏仁 細辛

射干湯 治咳而上氣喉中如水鷄壹 共水 蜜丸如梧子大薑水湯下二十九

射干 半夏 五味 款冬 紫苑 細辛 廣黃

生地 大棗 水煎五棧温服

短氣 論曰短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短氣不能臥其形

短氣 論曰短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短氣不能臥其形

短氣 論曰短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短氣不能臥其形



如腫者飲也短氣上喘氣道促急者肺虛而寒邪實也如是者不可概而論之

紫蘓湯 治卒短氣

紫蘓 二 陳皮 五

拘杞湯 治短氣

拘杞

大棗酒水煎三匙溫服

姜棗水煎三匙溫服

陽厥

論曰內經云有病怒狂者生于陽也陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥夫陰陽未可偏勝則氣逆陽厥者陽勝而氣逆不調也蓋陽氣暴折則鬱而不散故多怒而狂怒則氣上故頸脈動而大疾者為陽厥之症也其治奪食即已蓋食入於陰長氣於陽盛故厥逆怒狂奪食者所以平其氣也

鐵落飲 治陽厥善怒除煩下氣

鐵落 漿即深息錄 每服重湯溫一鍾飲之

竹瀝石羔湯 治陽厥多怒狂躁不安上攻頭頸

竹瀝 石羔 山枝 生地 玄參 赤茯

升廣 知母 姜水煎三匙入竹瀝服

犀角丸 治陽氣偏勝氣厥多怒如癡狂狀心胸煩滿愈

犀角 愈多怒頸脈疾動

犀角 防風 甘草 枳殼 石羔 升廣

其末蜜丸如梧子大飲下二十九

定神丸 治陽厥怒狂

白茯 遠志 人參 防風 栝子仁 甘草

龍骨 牡蛎 東肉 枳殼 栝子仁 甘草

共末蜜丸如梧子大湯下二十九

羚羊角湯 治陽厥氣逆喜怒狂妄不常

羚羊 五味子 沙參 棗仁 茯神 遠志

龍骨 煨五 為粗末姜水煎三匙服日二

其末蜜丸如梧子大飲下二十九



積聚門

積聚

肥氣

伏梁

痞氣

息賁

賁豚

積聚統論

論曰積者五藏所生氣之所積名曰積其始發有根本其痛不離其部由陰氣所生也聚者六府所成氣之所聚名曰聚其始發無根本其痛亦無常處由陽氣所生也然又有癥瘕癖結者乃積聚之異名也症狀不一原其病本大約相類但從其所得或診其症狀以立名爾且癥者為隱現腹內按之形症可驗也瘕者為聚推之留移不定也癖者癖側于骨肋結者沉眠結強于內然有得之于食有得之于水有得之于憂思恚怒有得之于風寒種不一凡便氣血沉滯留結而為病者治須漸磨漬削使氣血流通則病自愈矣

積聚

論曰經云病有積有聚何以別之夫積者陰氣也聚者陽

氣也經云而伏陽浮而動故氣之所積名曰積氣之所聚

名曰聚然積者五臟所生聚者六府所成積之為病其始

發有常處其痛不離其部上下有始終左右有所窮盡聚

之為病其始發無根本其痛亦無常處上下無留止此積

聚之分別也

鼈甲丸 治腹內積聚心助氣滿時吐清水惡寒不下食

鼈甲 醋 炒 大黃 炒 枳殼 榔 二 人參 附子 前胡

白木 黑干姜 枳殼 防葵 川歸 桔梗 甘草

食茱萸 紫朴 三 梧子 大 空心酒下二十九

萬靈丸 治積聚滯氣胸膈否悶心腹刺痛

雄黃 陳皮 煨 白 大黃 白丑 一 肉蓯蓉 京三

稜 稜 杏仁 巴豆 法 乾漆 炒 青皮 訶勒皮

椒 分 三 天南星 製 木香 藿香 白木 傷食 姜湯 下

共末 薄荷汁糊為丸 如小豆大



三五九 傷酒姜湯下十九  
三五九 治五積胸膈否悶腹脅脹滿宿食不消積氣

成塊心腹痛不能飲食

礪砂 芫花 乾漆 木香 全後 巴豆 心去油

皂莢 子去皮 烏頭 味去及 醋三升 熬膏 五 大黃 炒 京

三稜 煨 鼈甲 炒 醋 川歸 陳麩 青皮 去白炒 桂

心分三 共末用膏丸如小豆大茶酒任下五七丸欲疎利服丸

十味五積丸 治五積氣 吐酸水 心腹脹悶 不思食

沉香 陳皮 炒 白 甘松 京三稜 五 芫花 醋炒

牽牛 搗取 木香 甘遂 連珠 大戟 姜黃 西

共末 糊為丸 如梧子大 用陳皮湯空心下二三十丸

木香丸 治五種積聚成塊

木香 煨 柳 人參 郁李仁 訶勒皮 大黃 微煨

蘓子 白芍 赤茯苓 枳殼 炒 白 黑干姜 礪石 西

共末 入蜜為丸 如梧子大 酒下二三十丸

肥氣

論曰 凡人積氣在左脅下 如覆杯有頭足者 谷曰肥氣 乃

肝之積也 蓋肝藏血 故陰多而陽少 發為積氣 由肺病傳

肝 肝傳脾 脾以李適王 而不得傳 是邪氣留于肝 故積為

積氣 久不愈 令人欬逆 痰流連 歲不已 此陰盛陽虛 整

蓬累根湯 治久積結癖 氣不散 左脇下 如覆杯 吐酸水

面色黃 此名肥氣 并女人血瘕

蓬累根 懷生地 西 川歸 赤芍 茺 丹皮

枳殼 炒 圭心 分三 生薑 煨 五 水煎 三 莖 空心 溫服 日二

青蒿汁湯 治久積肥氣 寒熱 瘕瘕

青蒿汁 合 生薑汁 童便 合 常山 柴胡 分三

烏梅 肉 炒 鼈甲 炒 醋 炙甘草 分一

水煎 五 莖 去滓 入三 汁 少許 沸成 日二

酸棗 仁 丸 治肝積肥氣 久不已 變成寒熱 瘕瘕 令人熱

多寒 少 小便 赤 澀 咳 逆



酸枣仁 生 藜子 木通 薏苡仁 黄耆 枳壳 炒 麦 麸

木香 坐骨草 升广 大 黄 麥門冬 赤茯苓 一 兩

石韋丸 治肝積肥气 共末入蜜杵丸如梧子大 麥冬湯下二三十丸 日二

石韋 銹 京三稜 附子 陳皮 川椒 炒 目 吳朱 黃

伏梁 論曰內經謂病有小腹盛上下左右皆有根名曰伏梁 畏

大濃血居腸胃之外不可治之每切按之至死又曰人

有身體髀股胛皆腫還臍而痛病名伏梁此風根也夫气

之所聚名曰聚氣之所積名曰積聚陽氣也故無留止積

陰氣也故有形狀伏梁心之積也起于臍上故小腹盛上

下左右皆有根大膿血居腸胃之外故環臍而痛此為

風水之病使身體髀胛皆腫名曰伏梁以其若梁之隱於

伏也其症有淺源居臍上為逆以邪氣之逆上行也居臍

下為從以邪氣之順下行也治法不可動動之為水溺蓄

之病故曰論在刺法中 鱉甲湯 治伏梁積气 鱉甲 炒 醋 白芍 京三稜 大腹皮 一 兩 懷生地

柴胡 川歸 半 圭心 生姜 三 合 水煎三 朮 入木香少許服日二

桃奴散 治伏梁積气 桃奴 暴乾為末空心温酒下三 朮 差再服

訶梨勒丸 治憂積伏梁气 訶梨勒 二 枳 榔 大 黃 炒 三 兩 防 葵 柴 胡 枳 壳 炒 白 羚羊角 川連 赤茯苓 生姜 子 芩 木通 一 兩 共末入蜜杵為丸如梧子大空心飲下三 朮 丸

痞氣 論曰凡積气在胃脘覆大如盤者脾積也痞結不達故名 痞气此本肝病傳脾之當傳腎腎以冬適玉而不受邪气



留于脾故結為積久不愈令人四肢不收發為黃疸使飲食不為肌膚所以然者脾藏肌肉之氣能與胃行其津液以榮養四肢若為積氣所留則不能榮養故有四肢不收飲食不為肌膚之症也

平氣丸

治脾積痞氣腹脅膨脹心胸悶痛不思食

煨榔一微煨 京三稜 砂仁 胡椒 青皮

烏梅因半炒西 巴豆 皮二去油

共末糊為丸如小豆大姜湯下三九

白木湯

治脾積痞氣脅助滿悶

白木 紫朴 炒姜汁 圭心 柴胡 炙甘草

煨榔十枚 生姜水煎三匙空心溫服日二

勻氣湯

治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

大腹皮 白木 圭心 牽牛 麥蘗 紫

朴姜汁 郁李仁 半炒生 甘草 陳麩 高良姜

生姜大棗水煎五匙空心溫服再晚服

息賁

論曰凡積氣在左脇下覆大如杯者肺積也氣上賁衝息有所妨名曰息賁此本心病傳肺之當傳肝以春適玉而不受邪氣復賁于肺故結為積若久不已令人漂浙寒熱喘咳發肺癆所以然者肺主氣外合于皮毛今肺氣留積故有咳喘寒熱肺癆之病

枳實湯

治肺積息賁上氣冲胸滿咳逆

枳實 木香 煨榔 炙甘草 葶蘗 吳茱

黃芩 杏仁 炒去皮 姜水煎三匙空心溫服日二

桑白皮湯

治肺積息賁上氣脹滿咳嗽涕吐膿血

桑白皮 麥門冬 圭心 甘草 陳皮

皂牙 一五皮 炙 生姜水煎三匙溫服日二

半夏湯

治肺積息賁咳嗽

半夏 細辛 桑白皮 前胡 訶梨勒煨

桔梗 炒 人參 川貝母 白木 甘草 紫胡



生姜大棗水煎三錢空心溫服

賁豚

論曰凡積氣發于小腹上至心下若豚狀或上或下來往無時者腎積也蓋腎水乘心其狀賁衝如豚名曰賁豚此本脾病傳腎腎當傳心心以夏令適王而不受邪氣復留于腎故結為積久不已令人喘逆骨疼少氣所以然者腎藏骨髓之氣若其氣留積不能榮養骨髓故變為喘逆骨疼

四味丸

治久積賁豚氣時攻膀胱痛

川椒

附子 肉蓯蓉 懷香子

共末

蜜丸如梧桐子大酒下

桃仁丸

治腎積氣賁豚

桃仁

酒二升煎成膏

共末膏

梧子大酒下三十九

化氣沉香湯

治腎積

沉香

木香 人參 附子 黃耆 烏藥 甘草

五味

大茴 牛膝 石斛 陳皮 高良姜 巴戟

天桂心

生薑水煎三錢溫服日二

李根白皮湯

治賁豚氣冲心汲之短氣發作有時

李根白皮

人參 附子 甘草 半夏

赤茯苓

黑乾姜 圭心 水煎三錢溫服日二

吳茱萸湯

治賁豚氣上冲心胸逆渴

吳茱萸

人參 甘草 半夏 圭心

木香散

治一切風及腎藏賁豚氣上冲心胸滿悶

木香

白芷 沉香 杉木節 蓬莪木 懷香子

磁石散

治賁豚冷氣上冲昏亂四肢軟弱不收

磁石

木香 煨榔 肉豆蔻



共末葱白酒下二匙日二  
壓氣木香丸 治賁豚氣上冲胸膈

木香 丁香 肉豆蔻 白豆蔻 吳茱萸炒五

沉香分五 青皮分一 麝香分二

共末用硃砂猪胆汁和九梧子大酒下二十九

木香換柳散 治腎積氣不散結伏賁豚發即上冲心胸

令人喘逆骨痿少气等疾

木香 換柳 白芷 沉香 磁石 大茴 川芎

訶勒皮 牡蛎五 圭心 陳皮分三

共末生姜塩湯下二匙

諸癥 結癥 疝气 酒癖

諸癥

論曰積氣在人腹中久不差則牢固推之不移者癥也此由寒温失宜飲食不節致臟腑气虛弱飲食不消按之其狀如杯盤牢結久不已令人躄瘦而腹大至死不消診其

脉弦而堅其狀不轉動者此其症也

鰲甲丸 治諸癥塊冲心气滿不下食手足煩悶

鰲甲 訶勒皮二 人參 炙甘中 防葵 大黃微

半兩 白朮 郁李仁 圭心 杏仁五 研成膏

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸

夾食丸 治癥癖食气食勞五膈痰逆

乳香 木香 川歸 肉蔻 干姜 京三稜 煨

附子 丹砂 青皮 巴豆去油 紫苑 鰲甲醋炙

丁香 共末入蜜杵丸小豆大丹砂為衣酒下三五丸

結癥

論曰諸癥者積聚之類也聚積久不散謂之結浮流腹内按抑有形謂之癥結之症候形躄瘦痺飲食不作肌膚過陰寒冷温之氣則發而脇塊硬隱然痛者是也癥之症候腹中气痛動轉橫連脅下有如癖气遇脾胃有冷陽气不足而發動者是也



紫葛丸

治結瘕腹脹堅硬如石肚上青筋浮起

紫葛

郁李仁兩 木香 桔梗分三 訶勒皮分三

大黃

半炒 兩 紫苑分三 牽牛子生 五分 麥半 炒

共末入蜜杵丸梧子大木通大棗湯下二十九

瘕氣

論曰瘕氣謂臍腹左右紫硬而痛橫逆如臂取象如弓弦之急故謂之瘕氣蓋因寒溫失宜房勞過度真陽虛憊陰冷内生所以水飲入於胃而不能銷鑠流於脅下經久不去遂成痼疾若遇陰寒或食冷物則作痛久之則不能飲食致肌膚消瘦

訶梨勒丸

治瘕氣胸脅大腸常澀

訶勒

圭心 白芍 大黃炒 甘草 烏藥

防葵

兩 驚甲兩 共末入蜜杵丸如梧子大姜湯下二十九

附子草薹丸

治瘕氣急痛吐酸水

附子

草豆蔻兩 圭心 吳茱萸兩 木香五

桃仁

皮三 兩 去三 丁香分三 木香五

共末

入糊丸梧子大姜橘湯下二三十丸

大黃丸

治瘕氣急痛吐酸水大便不通滿悶

大黃

竹二 兩 煎二 丁香 枳榔分三 木香

訶梨勒

皮兩 取圭心 枳榔分三 木香

共末

同煎杵丸小豆大酒下二三十丸

京三稜丸

治五積瘕癖氣塊

京三稜

木香 青皮 枳榔 石三稜 鷄爪三稜

共末

用姜汁糊丸梧子大姜湯下二三十丸

緩中丸

治瘕氣急痛腹脹胃脘痛不下食吐逆

乾姜

甘草分一 人參 附子 白芍 陳皮 枳榔

圭心

枳壳 驚甲 半夏 紫朴分五 姜水煎服

酒癖

論曰胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣

論曰

胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣

酒癖

論曰胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣

論曰

胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣

論曰

胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣

論曰

胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣

論曰

胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣

論曰

胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣



道否塞酒与飲俱不化停在胸助結聚其癖其狀按之有  
形或按之有苞脇下弦急脹滿或致痛悶肥瘦不能食因酒  
得之故謂之酒癖

乾姜丸 治酒疰癖水飲不消兩脇脹滿時嘔吐腹中水苞

乾姜 葛根 枳壳 白朮 陳皮 甘草

共末入蜜杵丸梧子大飲下三四十九

枯萎散 治酒癖脅下脹滿不能下食

枳萎實 陳麩

共末空心葱白湯下二支日二

聖濟總錄纂要卷七終

聖濟總錄纂要 卷之八

吐血門

吐血 吐血不止

吐血統論

論曰吐血病有三種一則緣心肺蘊熱血得熱則妄行下  
流入胃胃受之則滿悶气道賁衝故令吐血一則虛勞之  
人心肺內傷恚怒氣逆肝不得藏血乘虛而出因怒氣之  
甚則吐血三者緣酒食過飽胃間不安或強吐之氣脈賁  
亂損傷胃心血隨食出此名傷胃

黃耆散 治吐血

綿黃耆 白芨 白欬

鹿引糸白膠注同  
黃明膠 共末空心飲二支  
黃明膠即今水膠乃牛皮所化

程世佐燧四  
程量入上慎  
程志治齊先  
程其武與繩



綠雲散 全前

百合 人参

神效鹿角散 治吐血容血

鹿角膠 川栢炒五 杏仁二十一 共研入白麩水下二钱

阿膠散 治咯血吐血

阿膠 白芨 白欵 川栢蜜炙 共末飲下二钱

藕汁茯苓散 治吐血不止 懷生地 炒黑蒲黃分

補肺煮肺散 治吐血咯血等

杏仁一百二十枚 百合四 葱白三 熟糯米

異攻散 治吐血不差 研極細五更時打鷄子清和服二三钱

黄茱萸子 防己符 共末用小麦湯下一钱吐甚者一

艾灰散 治吐血 艾葉 燒灰存性為末新汲水空心下二钱

竹葉為藥湯 治吐血衄血大小便出血

洪竹葉合六 赤芍 甘草一分 阿膠三 川歸兩

地黄藕汁飲 治心肺熱極喘悶吐血

生地汁 生藕汁 生姜汁 小蘗根汁 生牛蒡子

地黄飲 治吐血不止 懷生地 鹿角膠一兩 童便五合煎沸入汁末

吐血不止 論曰藏真高于肺而主氣藏真適于心而主血藏真散干

十数沸分 三服

地黄飲 治吐血不止

懷生地 取汁 鹿角膠一兩 童便五合煎沸入汁末

吐血不止 論曰藏真高于肺而主氣藏真適于心而主血藏真散干

十数沸分 三服

地黄飲 治吐血不止

懷生地 取汁 鹿角膠一兩 童便五合煎沸入汁末

吐血不止 論曰藏真高于肺而主氣藏真適于心而主血藏真散干

十数沸分 三服

地黄飲 治吐血不止

懷生地 取汁 鹿角膠一兩 童便五合煎沸入汁末



肝而藏血是三者或因憂愁思慮與失志怒氣逆傷之則  
氣亂而血妄行下入于胃胃受之則脹滿其氣貫衝于上  
故吐血不止也

白金散 治吐血肺元受傷

上白麩 石菖蒲 共末空心水下二錢暑毒氣薑汁蜜水下

白飲湯 治吐血咯血不止

阿膠 用酒水合煎三錢去滓入生地

汁半合沸服

生犀桔梗散 治吐血似鵝鴨肝晝夜不止

生犀角 生桔梗 共末空心温酒下二錢晚下二錢

補肺百花煎 治吐血不止兼咳嗽

生地汁 生藕汁 生姜汁 乾青柿 作糊 五枚研

黃牛乳 胡椒肉 大棗 好白酒 一升全

上數味煎如錫入後茶

黃明膠 杏仁 秦艽 同上合煎

減半入蜜 四兩養成煎空心用糯米飲下一二匙日三

服酒下並可

阿膠湯 治吐血不止

阿膠 熟艾 白芍 地榆 小薊根

本草苔部

土馬駿湯 治心肺蘊熱志怒氣逆便血妄行日夜不止

土馬駿 人參 白茯苓 秦艽 炙甘草 枳實

炒懷生地 柴胡 水煎五錢空心温服日二

嘔血 唾血 舌上出血 汗血

吐血

論曰憂愁思慮則傷心志怒氣逆上而不下則傷肝蓋心  
主血肝藏血二臟俱受傷則血溢妄行流散不止氣逆則  
吐血而出血也

三汁飲 治吐血吐血衄血等

麥冬汁 生地汁 生藕汁 熟冷水 白茅



和勻温服一二鐘以差為度  
生地黄湯 治憂愁恚怒 吧吐出煩悶少氣胸中痛

懷生地并 阿膠研粉炒 炙甘草中半兩  
用大棗水煎五匙空心温服日二

荆芥穗飲 治吧血不止

荆芥穗 山枝仁 片苓 蒲黃兩一 水煎五匙空心  
温服晚再服以差為度

唾血

論曰邪熱薰于肺則損肺恚怒氣逆傷于肝則損肝肺肝  
傷動故令人唾血如唾中有若紅縷者屬肺臟如脇下先

苦痛而後唾鮮血者屬肝經俱可拆而治之

紫花散

治肺氣內傷邪熱薰積欬唾有血

紫苑

川歸 川芎 附子 欬冬 五味子 白木

圭心

生地 甘草 細辛 側柏葉 杏仁去皮尖炒研

貝母

共末入蜜少許和滾湯空心下二匙晚再下

蒲黃散

治唾血不止

蒲黃

生一兩 研羅細末用冷水和三匙空心下日二

舌上出血

論曰心主血在竅為舌若心臟蘊熱血得熱而妄行或溢

于心之竅故有舌上出血之症甚者出如涌泉

升麻湯

治心臟有熱舌上出血勢如涌泉

升麻

黃根 小薊根兩 熟艾一把 凝水石

水煎三匙去滓入生地汁半合再沸服日二

阿膠散

治舌上出血不止

阿膠

研粉炒 黃耆蜜炙 蒲黃新者 共末用生地汁空心下

熟艾葉湯

治心臟熱舌上出血及一切失血

熟艾葉

用糯米全用 松黃 側柏葉兩

水煎三匙空心温服日二

汗血

論曰內經云臟經通于心血脉之氣行焉又曰肝藏血故



人臥血滯于肝，然血雖藏于肝，而妄則行之。若肝心二藏俱傷于邪，則血隨心液為汗而出，是為汗血也。  
人參湯 治肝心二藏傷邪汗血

人參 赤芍 白朮 甘草 圭心 川歸 淡竹

茹 川芎 子芩 水煎三錢，空心溫服，日二。

神白散 治血汗從膚滕中出。人中白，用瓦上炙乾，研成末，入麝香末少許，和勻，空心酒下二錢。

如聖散 治汗血不止。郁李仁，去皮尖，研爛，用梨取汁，下一錢，日二。

竹茹湯 治吐血汗血尿血。竹茹，土人參，白芍，生地，甘草，川歸，桔梗炒。

川芎 圭心 水煎，空心溫服，以差為度。

鼻衄 衄不止，用大衄，衄蟻。

鼻衄

論曰：脾移熱于肝，則為驚衄。是木剋土也。蓋脾土熱氣移于肝木，則神魂驚恐而血行不由其道。夫肺主氣，閉竅于

鼻，血隨氣上，今血既妄行，故于鼻出而為衄也。

生地 藕節湯 治邪熱上攻鼻衄。水煎五錢，空心溫服，以差為度。

蒲黃散 治鼻衄。校摺 燒灰 存性 川歸 阿膠 亂髮灰 柏子仁

一錢 燒研 共末，用藕節汁，空心下二錢。如肺損傷吐血，

生地汁下。腸風下血，樗根皮湯下。女人赤白帶。

艾葉湯下，日二服。

貼背膏 治上息肺壅熱鼻衄。京三稜 一錢 者 溫紙包煨熟，乘熱爛搗，用醋煮糊，貼背

上第三推骨。

貼鼻方 鹿角膠 用沸湯浸軟，一薄片，貼鼻坳上差。



紮耳方 治肺壅熱鼻衄

玄胡索 為末綿包紮耳內左衄紮右右衄紮左左右俱衄

吹鼻方 治同前

石榴花 取白葉者 陰乾為末用少許吹鼻中即差

葱白汁 同前

葱白汁 以汁入酒少許點二三匕滴入鼻中愈

衄不止

論曰榮衛之行常與胃氣相隨則氣與血未嘗一刻相離蓋肝藏血肺主氣榮衛和平則氣血調順若入臟府有熱熱榮血氣血性得熱流溢妄行夫肺開竅于鼻故其發為鼻衄衄不止者藏虛血盛故也內經又云脾移熱于肝則為驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱于肝則木不能制土明矣肝藏血其神魂故為驚衄之病

髮灰散 治衄不止

亂髮灰 人中白髮五分 麝香 研一字

共研用少許吹鼻中立愈

車前子散 治衄血不止欲死者

車前子 牛耳肉 垢等

用車前子為末與垢同研和成挺子塞耳中差

柳枝散 同前

柳枝 寒食日收 人參 一分 共末空心溫水下二錢日二

人參蓮心散 治血衄不止

人參 一分 蓮子心 一分 共末空心溫水下二錢以差為度

玉粉散 治鼻衄日夜不止頭痛心煩

石羔 研 牡蛎 淨便 共研極細溫水下二錢日二

二花散 同前

酸石榴花 黃蜀葵花 一兩 共末水煎三錢溫服日二

栗灰散 治衄不止

生栗 七枚 取連皮燒灰末 入麝少許研勻酒下三錢日二



法紙散 治衄血不止  
以紙接血將紙焙乾燒灰溫水和服但不可

與病人知  
燈心散 同前

燈心 為末 丹砂 飛過 共末空心飲下三錢頃再服

大蒜貼足 治衄血不止諸茶無效者  
研爛用帛攤錢大右竅出貼左足心右竅

出貼右足心兩鼻並出二足並貼血止急洗去

通神散 治衄不止心神悶亂頭旋欲倒

亂髮燒灰 伏龍肝 兩

共末用溫水空心下二錢頃再服

茅花湯 治血衄不止

茅花 用水煎濃汁二碗分二服如無花以根代之

論曰大衄者口鼻皆出血是也蓋血為榮而藏于肝氣為

衛而生于肺肺開竅于鼻互者相為流通若熱氣乘血熱

盛則氣血妄行與衛氣錯溢于上竅故鼻衄不止而口鼻

皆出血也是名大衄

南天竺飲 治血妄行九竅皆出服茶不止者

南天竺草 生薑 燈心 把一  
是生薑麥者 山枝 枝三十 生薑 兩

灸甘草 大棗肉 枚五 用水一大碗煎減半空心溫服

苦參湯 治大衄口耳皆出血不止

苦參 川連 山枝 枝七 大黃 微炒 兩半

水煎五錢去滓入生地汁服

阿膠湯 治大衄不止

阿膠 牡蛎 研 水煎三錢去滓入生地汁服急帛繫兩乳

白龍骨散 治大衄不止

白龍骨 煨 為末用少許吹鼻中立止

生地飲 治大衄出血血上心胸氣急勞熱

此左右之字必有一字之誤



懷生地兩四 子芩兩 赤芍兩 青竹茹兩 地骨皮兩五 水煎五苓空心温服晚再服以差為度

衄蟻汗血

論曰内經謂膽移熱于腦則辛癩鼻淵傳為衄蟻瞑目夫血得熱則涌溢得寒則凝泣若膽受胃熱循脉而上乃移熱于腦盖陽絡溢則血安行在鼻為衄在汗空為蟻蟻者皆熱厥血溢之過也今之治衄蟻者專于治血不知血之行留氣為之本猶海水朝夕兩潮乃陰陽之氣便然也明夫經絡順逆則血與氣俱流通而無妄行之患矣

青竹茹湯

治熱盛所致衄血汗血白芍藥 麥門冬

蒲黃

水煎五苓空心温服以差為度

地黄散

治血汗不止

刺薊湯

治熱氣上行衄血汗血

獨聖湯

治血熱妄行或衄或蟻

子芩

用酒浸微炒水煎七苓空心温服立差

脚氣門

脚氣統論

論曰風毒中人隨處悉能為病偏著于脚何耶盖五藏經絡心肺起于十指肝腎脾起于足十指地之蒸濕毒氣足先受之久而不差漸至四肢腹背頭項古人所謂微時不覺痲滯乃知所以謂之脚氣其症不一或見食吧吐憎聞食臭或腹痛下利或二便秘塞不通或胸中忡悸不欲見明或精神昏憤或善忘語錯或壯熱頭疼或身軀冷痛或時覺轉筋或小腹不仁或髀腿頑痺或縱緩不隨或腫



痺俗字六  
各故痺  
痺也渠云  
切  
痺兵謎切音  
秘從文溼  
病也

或不腫或百節率急只是之症皆脚气候也治法固多唯  
孫思邈云不得大補亦不得大泻故須湯劑為治法之最  
學者宜加意焉

風毒脚气

論曰内經謂暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝  
則地裂寒暑風濕之氣皆本乎地人或履之所以毒亦易  
中于足也因病從脚起故謂之脚气况五藏流注脾與腎  
肝之經絡皆起足指故有風毒脚气之病其症或見食吐  
吐或腹痛下利或便澀不通或胸中驚悸不欲見明或言  
語錯忘或頭痛壯熱或身躄冷疼轉筋脛腫痺痺緩縱其  
狀不一治不可緩稍緩氣上入腹或腫或不腫胸中逆滿  
上氣肩息者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但  
者心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脉促短  
而數吐吐不止者死故不可緩也

木从虎骨丸 風毒脚气疼痛少力筋脉拘急行步艱難

木瓜 虎脛骨 沒朮 當歸 麒麟竭 骨碎補

木香 自然銅 敗龜版 楓香 安息酒 重湯

桂心 甜瓜子 地龍 乳香 研五全沒朮酒麟竭

瓜豆一斗水先安木 共末膏丸入酒少許九梧子大木瓜湯下三十九日二

大續命湯 脚气痺率不隨風毒攻四肢壯熱如火頭項

率急气冲胸中

當歸 人參 防風 廣黃 節去根 石羔 芎藭

杏仁 炒微 赤芍 黃耆 炙甘草 桂 兩一兩

越婢湯 風毒脚痺率行步不遂

廣黃 石羔 白朮 附子 炙甘草

姜水煎四支

木香散 脚气緩弱大肉頑痺肢節疼痛

木香 牛膝 草薺 羚羊 陳皮 杏仁 獨活

兩三 兩二 兩一 兩一



丹參 杜仲 秦艽

桂 兩

車前 五

姜水煎三匙日三

犀角丸 風毒脚氣上冲散入四肢虛腫無力

犀角 兩 白朮 枳柳 人參 川芎 赤茯苓 羌活

木香 防風 石斛 牛膝 兩

蜜丸 梧子大酒下二十九日二

五桑丸 腎虛冷腎風或頭風兼風毒脚氣

大黃 一升 蒸 前胡 半 白芍 半夏 蕤蓉

葶藶 赤茯苓 細辛 當歸 兩

蜜丸 梧子大飲下五七九日二以利為度

蘆根湯 風毒脚氣昏煩壯熱頭疼吐口乾

芦根 半生 兩 赤茯苓 葛根 知母 淡竹葉 麥冬 三

灸甘草 水煎五匙日二

淋滌方 風毒脚氣腰膝痛痺腫行履不得皮膚如虫行

羊桃 菟藿 蒼耳 海桐皮 柴胡 白茯苓

柳木蠹末 水紅花 兩

水五斗煎二斗去滓林洗慎避風冷

林洗方 風毒脚氣腰膝痛痺腫行步不得皮膚如虫行

水五斗煎取汁三斗避風淋洗 附子 露蜂房 茵芋 兩 川椒 兩 菟藿 兩

脚氣痺李

論曰脚氣痺李者寒氣多也寒搏於筋脉結而為病則筋

急不能轉側行步艱難甚則不可屈伸也

肉蕤蓉丸 風温脚氣寒搏筋脉痺李不仁

蕤蓉 牛膝 天广 黄耆 何首烏 木瓜 酒 五

浸一日曬 狗脊 續斷 草薺 兩

共末用木瓜三枚剉空入青塩一兩閉口飯上蒸研

膏入上件和丸如乾加酒糊丸梧子大塩湯酒任下

三十九

秦艽湯 脚氣行步痺李



秦艽 枳壳 白木 丹参 羌活 人参 柴胡  
陳皮 紫蘊 薏仁 桑皮 防风 石斛

大广仁 炙甘草 水煎五匙日二  
石南九 脚气痺痺去風虛活血脉益元氣

石南 白木 牛膝 天广 防风 枸杞  
黄耆 鹿茸 桂 共末用木瓜一枚去皮瓢

大腹湯 脚气痺痺寒痺筋脉不能轉側  
大腹 防己 青皮 木通 羌活 紫蘊 草薢

川芎 地骨 訶勒皮 木香 五加皮 浸炙  
姜枣水煎三匙日二

脚气疼痛不仁 論曰脚气疼痛皮膚不仁者蓋人之氣血得温則流通遇  
寒湿則凝滯今脚气之疾緣風寒湿毒客於氣血榮衛虛  
弱不能宣通故有脚气疼痛麻痺之症

牛膝丸 下經氣弱風湿毒氣與氣血相搏皮膚不仁足  
痛不能履地上攻眼目迎風流淚

牛膝 山萸 防風 羌活 烏頭 川芎 地龍  
炒 煨 共末酒糊丸梧子大塩湯下二十九

整痛膏 脚气腫痛行履無力及打撲折痛  
烏頭 乾姜 五靈脂 浮麥 炒黑

共末用醋一鍾入茱三匙熬成膏攤紙上傳患處又  
以麩醋炒熱裹耐痛處如患脚气先燒熱砧將茱石

敗龜散 脚心熨之引脚中氣消腫止痛  
敗龜 醋 白芥子 研 芸苔子 研 木別子 研 去殼

自然銅 醋淬七 地龍 炒 硫黃 兩  
共末用末與麩醋和貼

牛膝丹參酒方 脚气入冬即苦脚痺弱或筋骨疼不能  
屈伸皮膚痛痛不仁手脚指節腫痛悶或四肢腫腰膝直

滿



牛膝 丹参 薏仁 生地<sup>八</sup> 白术<sup>土</sup> 生姜 五加<sup>斛</sup>

皮<sup>五</sup> 側子 赤茯 草解 防風<sup>四</sup> 独活 石解

九兩 茵芋葉 人參 天雄 石南葉<sup>灸</sup> 川芎<sup>三</sup>

細辛 升廣<sup>二</sup> 磁石<sup>醋淬七</sup> 桂<sup>三</sup> 白酒<sup>五斗</sup> 浸

柴胡湯 風寒濕毒脚氣痛皮膚不仁緩弱瘡痺足脛腫

滿心下急大便澀

柴胡 猪苓 紫蘊<sup>半兩</sup> 防已 陳皮 郁仁<sup>炒</sup>

大广仁<sup>炒一</sup> 桑皮<sup>半兩</sup> 水煎五<sup>日</sup> 二

脚氣上氣 脚氣腫滿 脚氣心腹脹滿

脚氣冲心煩滿

脚氣上氣 論曰風濕毒氣之中人多從下起足先受之故各脚氣毒

氣循經上入於肺則气道奔迫升降不順故令上气喘滿

桑白皮湯 脚氣面目腫上氣眠臥不得氣欲絕

桑皮<sup>炙一</sup> 陳皮<sup>西</sup> 葶藶<sup>炒研</sup>

共末水煎姜枣湯入末三<sup>匙</sup>再沸温服頃又服當利

一二行腫氣下即差三五日服一次

腹

大腸湯 脚氣脹滿

大腹<sup>四枚</sup> 杏仁<sup>三枚</sup> 童便水煎三<sup>匙</sup>日二

枳實散 脚氣上氣

枳實<sup>炒二</sup> 白朮<sup>一</sup> 赤茯<sup>西</sup> 桂<sup>四</sup>

共末酒下二<sup>匙</sup>日二

烏豆湯 洗脚氣上氣搗肩喘冲心痛

烏豆 水五斗煮汁二斗半入甕中浸足令人從膝上

向下淋洗百遍病者不過再洗差服後丸

加減木香丸 洗脚後服

木香 白芍 枳壳 大黃<sup>炒二</sup> 枳榔<sup>四</sup> 桂<sup>五</sup>

共末蜜丸梧子大酒下十五丸日二漸加至三十九

杏仁煎方 脚氣乘肺上气喘促



杏仁炒

百合

一分水干

生甘

廣黃

射干

五

久停惟旋合

茯苓入百合汁中煎一升去滓日服二合此茶不得

久停惟旋合

久停惟旋合

木香換柳丸

脚氣冲心煩悶上气喘滿

上气喘滿

上气喘滿

水香

換柳

葱水並三

去滓下紫雪二

去滓下紫雪二

汁中合童便一合

紫雪治脚氣最

妙

淋洗

脚氣攢肩喘

脚氣攢肩喘

脚氣攢肩喘

豌豆

葱白

川椒

水五斗煮半令人從膝

水五斗煮半令人從膝

上淋洗下百遍患極者洗三次故

脚氣腫滿

論曰脚氣風濕毒氣客搏腎經腎者胃之關也關門不利

則裏水而生病水性就下故令腎氣不化小便不利濕寒

之氣下注足脛腫脹不消故謂之脚氣腫滿

赤茯苓湯 脚氣上攻身躰腫滿小便赤澀

赤茯苓

防己

桑皮

陳皮

旋復

杏仁

廣黃

白朮

紫蘓

兩

水煮黑豆汁鍾半煎芡五

旋復花湯

脚氣腫滿上冲心胸煩悶氣急

旋復

犀角

前胡

杏仁

桑皮

紫蘓

赤茯苓

兩

姜水煎三

去滓

脚氣足脛腫上氣偏身疼脹風引

脚氣足脛腫上氣偏身疼脹風引

脚氣足脛腫上氣偏身疼脹風引

大豆湯

脚氣足脛腫上氣偏身疼脹風引

脚氣足脛腫上氣偏身疼脹風引

脚氣足脛腫上氣偏身疼脹風引

脚氣足脛腫上氣偏身疼脹風引

脚氣足脛腫上氣偏身疼脹風引

脚氣足脛腫上氣偏身疼脹風引

大豆

炒香

附子

枳壳

澤瀉

陳皮

炙甘

草

赤茯苓

防風

水煎黑豆取汁煎芡三

水煎黑豆取汁煎芡三

水煎黑豆取汁煎芡三

水煎黑豆取汁煎芡三

三若腫痛止去大豆澤瀉

脚氣心腹脹滿

論曰風毒之中人也必先中脚久而不差徧及四肢其氣

淫溢則腹脅脹滿小便不利氣喘息高者其病為重也

訶梨勒丸

治脚氣疼痛發熱腫悶上攻心腹脹滿吐逆

治脚氣疼痛發熱腫悶上攻心腹脹滿吐逆

治脚氣疼痛發熱腫悶上攻心腹脹滿吐逆

訶勒皮

木香

防己

大腹

紫蘓

白芍

杉木節

羗活

沉香

水煎五

日二

日二

日二



羚羊角九 脚气心腹妨悶 兩脅虛脹 不思食 漸覺心滿  
氣隔不通

木香 防風 升广二 大广仁 赤茯三 旋復  
羚羊 茯神二 独活半二 大腹七枚 連皮

共末 蜜丸 梧子大酒下四十九日 一服  
冷加附子二 大腸秘澀加 大黃半炒兩 氣滯加枳  
柳二 心胸膈熱加 麥冬三 筋急掣痛加 牛膝二  
皮膚風痒心下妨悶加 枳壳半炒兩 臟氣羸弱加 薑香兩

前胡飲 脚气攻心 腹脹滿 吐不下食  
前胡 生姜 羚羊角 半夏 大黃炒 赤茯五

松節湯 脚气入腹 心腹脹急 煩躁腫痛  
松節 桑皮 紫蘆 炙甘草 枳壳 分  
水煎三 入燈心 生姜童便 日二

脚氣衝心

論曰脚氣衝心之狀 令人胸膈滿悶 上气喘急 甚者吐  
是也 蓋風濕毒氣 初從足起 縱而不治 上入于腹 小腹痛  
痺不仁 毒氣上冲 是謂甚水 尅心火 故名脚氣 冲心 孫思  
邈云 凡小覺病候 有異 即須大怖 畏决意急治之 不可  
以腫為候 亦有不腫者 正謂此也  
吳茱萸湯 脚气冲心 煩悶 腹脹 氣急 欲死  
吳茱萸 水瓜 換柳 二

水煎 五 入竹葉一把 以快利為度

独活湯 脚气冲心

独活 犀角 石斛 側子 川芎 防風 當歸  
防己 炙甘草 丹參 白芍 赤茯 桂  
姜水煎 五 入日三 凡服一二劑後 隔五日 一服 若覺  
腹內氣散 兩服有力 行動無妨 宜常服 香豆酒

香豆酒方 同前

香豆升 酒三升 浸 隨量頻飲 覺利多即止



其菜更換柳湯 脚氣毒氣攻心欲死者

吳萸炒四 換柳枚七 木瓜 陳皮一兩 厚朴二兩

竹葉水煎三錢

木瓜湯 脚氣風濕毒氣攻心煩悶午足脉絕

木瓜 吳萸等分 水煎三錢頃又服

犀角湯 脚氣若風熱輕但毒氣入胃唯心胸煩熱索水

灑胸面乾吧好叫氣欲斷絕者

犀角 木香 人參 羚羊角 竹茹 沉香 射干

麥冬 赤茯苓 雞舌香 麝香一兩研 石羔三兩

水煎四錢去滓入麝末五分再沸服頃又服覺眼明

心悟是效若吧逆不下食加半夏二兩 生姜一兩 陳

木香湯 脚氣攻心悶絕欲死

木香 換柳兩 赤茯苓 郁仁 牛膝 大黃炒 吳

萸 桂三兩 水煎桑皮木通汁入菜三錢服如重又服

木香湯 方脚風毒攻心悶亂狂躁口乾氣欲絕或秘澀

青木香 生黑豆皮二兩 大黃炒 紅雪一兩即

水煎五錢入紅雪三錢分二服頃再服當下燥蠶

烏頭湯 風毒脚氣攻心心悶倒仆失音不語困甚者

烏頭一升水四升 甜竹葉把 桑皮三兩 大腹七枚

用豆汁浸菜一日次早煎分二服頃再服已死者幹

開口灌之愈及灸脚心七壯男左女右

麻仁湯 脚氣冲心上氣二便澀小腹急痛

大广仁炒微 赤小豆半升

水七升煎二升半分三服過二日又一劑

朴硝湯 脚氣攻心悶絕

朴硝 白芍 柴胡 旋復 紫葳五錢 大腹 桑白

皮分三 換柳枚一 生姜兩一

作三貼水煎去滓入朴硝二錢分二服

樊石湯 脚氣冲心

脚氣冲心



白礬一兩 漿水一斗五升煎浸脚良十五  
九味木香丸 脚气冲心胸膈煩滿喘急吐

木香 訶勒 枳壳 桂二兩 白芍 柴胡半兩 厚朴  
姜汁 煨榔二兩 大黃炒三兩 白芍  
其末 蜜丸 梧子大酒下二三十丸  
脚气語言蹇澁 乾濕脚气

脚气語言蹇澁  
論曰風毒脚气語言蹇澁者脾腎氣虛風濕中其經絡也  
腎之經循喉嚨挾古本脾之經挾咽連古本散古下二經  
為風濕所中故令舌本強硬語言蹇澁也

大八風湯 脚气上攻心脾語言蹇澁  
當歸 大豆三兩 白芍 烏頭 黃芩 遠志 独活  
五味 防風 川芎 廣黃 人參 秦艽 干姜  
甘草 杏仁 石斛 白茯苓 升麻 紫苑 黃耆  
桂二兩 酒水煎三莖

桂心湯 風毒脚气痺痺不仁語言蹇澁

桂心三分 廣黃 當歸一兩 防風升方 犀角  
煨榔二兩 黃芩 赤茯苓半兩 東水煎三莖

乾濕脚气

論曰脚气有乾濕之異者蓋陰陽所以分也在臟為陰在  
腑為陽然皆由風濕毒氣乘虛而入其症大同小異故乾  
脚气之狀血脉痞澁皮膚癢痺胫細痠疼食減躄瘦臟府  
秘滯上冲煩悶濕脚气之狀脚先腫滿或下注生瘡肌汗  
流下兩脚疼上攻心腹咳嗽喘急面浮膝腫見食吐  
四根湯 年深十九種乾濕脚气

桑麻根節心 松木根節心 柏木根節心 松木根  
節心 並細剉炒 茯苓酒浸 五靈脂 石龍芮炒  
天雄一兩 天雄一兩 紫檀香 地龍炒 木香各一兩  
麝香五錢 乳香 沒藥一兩 共末 木瓜酒下二莖日三  
立應湯 乾濕脚气冲注四肢



大腹 煨 木香 防已 紫蘓 白芍 羌活  
訶勒皮 木瓜 杉鉢 沉香 水煎五錢 日二

四斤丸 乾濕脚氣差後常發令永不發  
牛膝 木瓜 菝葐 天广介 酒五升浸一日晒乾

杉木節湯 乾脚氣頭痛腰脚痠疼心躁渴悶汗出氣喘  
杉木節 升 橘葉 升 大腹 連 七枚 童便 升 二

同煮取半分二服如一服快利便止唐柳宗元乾脚  
氣夜半痞絕左脅有塊如大石且死困天寒不知人

三日家人皆號哭榮湯鄭洵美傳此方服之半食間  
氣通立愈

防已湯 乾脚氣脚膝腫滿  
防已 猪苓 郁仁 栝柳 合 木通 枳壳

紫蘓 五 赤茯 炙甘草 西 姜水煎四錢  
海桐皮散 濕脚氣及腎藏風下注滿脚瘡疼痛濃水出

海桐皮 草烏 炒 地龍 炒 蒺藜 炒 一  
共末 酒下二錢 日二

脚氣變成水腫  
論曰昔人論脚氣謂脾受陽毒即熱痺腎受陰濕即寒痺

是知脚氣之病脾腎得之為多今變成水腫者亦緣脾腎  
俱虛多蓋腎虛則不能行水脾虛則不能制水故水氣散

溢滲于皮膚流于四肢所以通身腫也  
葶藶丸 脚氣成水腫上氣急咳嗽二便若洪所服利

水菜 及利大便小便及洪  
葶藶 三 防已 炙甘草 一 杏仁 貝母 半 一 兩

為末 束肉丸梧子大大枣桑皮粳米飲不三十九小  
便未快加十九

栝柳散 脚氣浮腫漸變成水心腹脹滿二便不通氣急  
喘息  
白栝柳 枝 五 大腹皮 枝 七 木香 一 兩 大腹細剉 二 味



為末用童便一鐘煎大腹一枚香末二支去滓入換

猪苓湯 脚气兼水气膈气通身腫滿氣急小便不通坐

臥不得

猪苓 防已 赤茯苓 木香 郁仁 沢澤

桑皮 五兩 大腹 七枚

水煎五支服下小便立效日三

脚气大小便不通 江東嶺南瘴毒脚气

脚气雜治膏茶淋滌

脚气大小便不通

論曰脚气二便不通者中風濕之氣搏于脚膝上攻胸腹

脅肋墳蒲榮衛痞膈三焦之氣升而不降所以傳導變化

皆不能出而上便不通蓋腎氣化則二便利脚膝者腎之

候今脚气上攻則腎氣不得化腎氣不化致二便不通也

桑白皮湯 男女風毒脚气及偏身拘急刺痛二便赤澀

不思食吐逆或寒熱

桑皮 木通 青皮 紫蘓 羌活 荆穗

懷香子 根 木瓜 独活 枳壳 大腹

姜葱水煎三支日二

栝柳湯 脚气腫滿坐臥不得上气冲心二便秘澀

栝柳 枝 木香 郁仁 桑皮 木通

水煎三支去滓入牽牛末一支二便利气快為度

江東嶺南瘴毒脚气

論曰內經謂南方者其地水土弱霧露之所聚也江東

嶺南大率如此春夏之交山水蒸蔚風濕毒氣為甚足或

感之遂成瘴毒脚气其候脚先屈弱漸至痺疼膝脛微腫

小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時作寒熱便澀不通甚者

控心勢迫治不可緩支法存所以留意經方編善斯術者

豈非江左嶺表此疾得之為多欤

犀角湯 江東脚气小欲動作斯覺心悶脚腫痠疼煩熱



不止

犀角

木香

前胡

竹茹

麥冬

半

大腹皮

全用

用水煎

五朮

羚羊角湯

江東脚氣盛發上冲脾胃胸膈妨悶意氣不

暢口乾目不知人

羚羊角

犀角

木香

升

旋復

麥冬

快利為度

大腹

五枚

和

前胡

水煎

五朮

快利為度

旋復花飲

乍處嶺南未伏水土飲食不宜兼早濕脚氣

發動時復心悶面目脚膝浮腫氣急唇口青黑胸膈

煩熱見食吐吧心腹妨痛冷氣結聚如有此疾急服

旋復

前胡

郁仁

半夏

赤茯

大腹

五枚

吳萸

合

姜水

五朮

日

二要

踈利

加

揅

末

犀角湯

脚氣之疾先起嶺南稍來江東皆由卑濕得之

或微覺疼痺或二胫腫滿行起痺弱或上入腹不仁

或時作冷熱皆其候也若先覺此症食吧不下氣上

逆者宜急服

犀角

旋復

赤茯

陳皮

紫蘘

揅

握

末

姜末

水煎

五朮

豆

合

獨活酒

嶺南脚氣發動地氣箭蒸熱毒風盛脾肺常有

風熱

獨活

生地

海桐皮

惡寒根

桂

頻服

黑豆皮

生

大广仁

炒

生

白酒

三斗

浸

頻服

脚氣雜治膏茶淋珠等

論曰脚氣症候不一隨症用茶備載于前然有一方兼治

数症者有膏酒淋傳者皆昔經驗用之多効今復詳類于

後

木瓜丸

脚氣諸疾

木瓜

乳香

甘菊

青塩

將

瓜

去

瓢

子

入末

封固

蒸

研

九

梧子

大酒

下

五十九

日三汗香為

驗并

膝

脚

等

症

皆

治



桑葉煎 脚氣曾用諸方苦脚弱宜服

白桑木 用生桑椹者抹水一石煎五斗又加水五斗

煎去滓慢煎成膏約二升即止收貯頻含化一匙服

七日覺四肢通暢頻々洩氣已後兩脚或腫勿怪乃是

得芽力病差之候 牛膝酒 脚氣極冷着厚夜蓋覆不覺煖

牛膝 生地伴 紙包泥裹不用紙包泥固乾灰火養

半日次 火燒一伏時取出漬酒服

蒜酒 初覺似有脚氣宜服

蒜 一斤 桃仁 一斤 豆 一斤 酒 一斗 浸服

石斛酒 脚氣痺弱筋骨疼痛

石斛 四兩 人參 丹參 川芎 杜仲 白朮 甘草 炙 白茯苓

黃耆 五味子 防風 陳皮 牛膝 酒 五斗 浸服

乾姜 山茱 當歸 桂 牛膝 酒 五斗 浸服

菽麥 五斗 水 石 麵 二十斤 浸 二日 白糯米 一石

蒸 攤入汁 麵拌勻 內甕中常法取酒服

脚氣發心 隔悶宜北方

取新磚 塊 中心鑿孔如毬子大勿令透過將火燒紅

用醋 澆之 便入川椒 干孔內以物蓋着温煖以脚踏

廣黃 裹足方 久蘊風熱足多冷麻 隱痛難行夜常轉筋

如風所吹 皆脚氣之症

廣黃 二斤 令極熱以帛包貯 裹二足勿透氣良久脚

上有汗候 廣黃温不用却着棉襪無令風吹如此數

芥子膏 風濕脚氣 腫痛無力

白芥子 草麻 木別 芸苔子

胡桃 五枚

搗干杵成膏加彈子大塗患處

鹿角膠 白膠香 一兩



黑豆煎下脚气

黑豆 五升

桑皮

五兩水三斗  
同豆煮汁

姜活

菰藜

吳萸

海桐皮支五

共末入汁煎膏酒下

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 聖濟, 總錄, 纂要, 卷之八, 終, etc.]*

聖濟總錄纂要 卷之九

新安

程林雲來纂  
黃吉士庶常  
方願善安止較

江湘郢上閱

膈氣門

五種膈氣

膈氣咽喉噎塞

膈氣呃逆不下

飲食

膈氣痞結

膈氣統論

論曰胸中者氣之府呼吸升降之道也陰陽升降順理則  
氣道通調胸中乃治喜怒寒熱不調則氣聚于胸而為膈  
氣夫膈氣有五憂膈寒膈熱膈是也憂膈之病  
胃中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦無力恙膈之病  
心下若實呃輒噫醋心食不消心下痞結積結在于胸中  
大小便不利氣膈之病胸脇逆滿咽塞不通惡聞食臭寒



膈之病心腹脹滿咳逆膈上苦冷臍腹常鳴食不生肌熱  
膈之病臟在熱氣五心中熱肉爛生瘡骨煩四肢重唇口  
乾燥身體頭面手足或熱脾背疼痛胸痺引背水穀不消  
不能多食羸瘦少氣此五膈為病之症也人之和氣一有  
憂思恚怒寒熱飲食悉皆傷之致陰陽不和臟腑生病氣  
痞于胸膈之間故曰膈氣諸方之論不一又有十膈症各  
不同其發之原不越于此也

五種膈氣  
論曰人之胸膈升降出入無所凝滯命曰平人若寒溫失  
節憂恚不時飲食乖宜思慮不已則陰陽拒膈胸皖痞塞  
故名膈氣曰憂曰恚曰氣曰寒曰熱五種雖殊其為膈病  
則一  
建中丸 治男女五種膈氣及一切氣不思食  
白豆蔻 胡椒 甘草 陳皮 高良姜 藿香子  
兩 紅豆蔻 人參 川芎 芍藥 黑乾姜 一炒

藿香葉 五錢 共末入蜜杵丸芡實大酒下二丸姜湯下亦可  
備急沉香散 治霍亂吐瀉氣逆結胸膈氣刺痛不思食

沉香 丁香 京三稜 黑乾姜 蓬莪朮 五錢  
肉豆蔻 人參 木香 赤茯苓 藿香葉 桂心 一兩

高良姜 甘草 胡椒 共末用塩點茶下二錢  
五膈丸 治五種膈氣噎塞胸中滿悶不下食

白木 木香 陳皮 訶勒皮 桃仁 去皮 尖炒  
梔布 三分 燒灰 圭心 大黃 半夏 炒 薑汁 枳實 燒炒

煨榔 琥珀 研一 共末入蜜杵丸如梧子大姜東湯下二十九  
人參白木湯 治膈氣咽塞憂結不散

人參 白木 甘草 京三稜 訶勒皮 陳皮 法白  
木香 桂心 煨榔 草豆蔻 赤茯苓 枳殼 炒 五

生姜水煎二錢溫服日二  
人參丸 治膈氣咽喉噎塞不下食

人參 煨榔 紫朴 薑汁 枇杷葉 兩 半夏 姜炒 五錢



共末糊丸如梧子大姜湯下二三十丸日二

導氣散 治膈氣咽塞不下 人參 紫朴 羚羊角 草撥一兩 共末飲下二

昆布丸 治膈氣噎塞不下食 昆布洗淨燒 椿椿 杵頭細糠一合 共研用老牛涎一合

生栢葉汁一合 慢煎入蜜攪成膏與末杵丸芡實大 每用一丸含化嚥下

膈氣吐逆不下食

論曰膈氣吐逆不下食者由胃氣不足風熱乘之或憂志

氣結不得宣通故令膈腕痞滿氣塞胸中縱能食而卒不

下或入胃中多致不消與留飲相擊則變為吐逆也

丁香丸 治膈氣吐逆不下食壅悶惡心 丁香二枚 木香一兩 枳榔微 肉豆蔻一枚

青皮一枚 白炒 半夏一分 姜炒 共末入蜜杵丸梧子大姜湯下九九

人參赤茯苓 治膈氣吐逆不下食或憂志氣不宣通

人參 赤茯苓 細辛 白芍藥 枳殼炒 白 黑乾

姜 圭心 炙甘草一兩 枳榔 訶勒皮半

共末入蜜杵丸如梧子大用酒下二十九 如覺有

物在喉中即丸三五丸如彈子大津嚥含化一丸

五膈丸 治胃氣素弱因于憂志膈氣虛弱吐逆不思飲食

人參一兩 附子 川椒 細辛 遠志 乾姜五錢

炙甘草 麥冬 圭心三錢 共末大蜜杵丸如彈子大

食後含化一丸津液嚥下覺胸中氣逆即服一丸日三

膈氣疼結 論曰膈氣疼結者謂結疼在胸膈之上喉間噎塞咳唾稠

濁氣滿胸中妨塞飲食蓋緣脾肺久虛氣道痞澁不能升

降水飲停結聚而為疼久不差則變虛弱上喘之病

木香丸 治膈氣疼結吐酸水 木香 益智仁 肉豆蔻兩

廣木香 青皮 白朮 圭心 益智仁 肉豆蔻兩



吳茱萸 細辛 黑乾姜 麩 共末用酒煮陳米糊丸

如小豆大 生姜湯下十丸至二十九日二

妙紅散 治膈氣疼結 吧逆吐食

紅麴炒 人參 丁香 白茯苓 藿香 麩

共末 飲下二錢 日二

五膈丸 治膈疼結物中不利

赤茯苓 陳皮 桑白皮 紫蘊 枳榔 煨 八日二

紫朴 姜炒 一兩 生姜 焙 二 旋復花 兩 共末 入蜜 杵丸

如梧桐子大 飲下二三十丸

吧吐門

吧吐 乾吧

吧吐統論

論曰人之陰陽升降三焦調順脾胃和勻乃能腐熟水穀  
變化糟粕傳瀉行導下走腸間若脾胃虛冷水穀不化則  
陰陽痞隔三焦不調濁陰之氣不能下行冲奔上下故為

為吧吐然吐逆之病有得之于膈實者有生于中滿者有  
發于下焦者種之不同悉本于胃氣逆則吧吐蓋胃者水  
穀之海三焦者乃水穀之道路胃氣宣通則上焦如霧中  
焦如漚下焦如瀆命曰平人若胃氣虛弱水穀遲化停滯  
三焦格拒升降不勻其氣虛滿得食則吧而又有朝食暮  
吐暮食朝吐者有食已即吐者有吧吐穀不得前者有但  
吧而無所出者有先吧却渴者有先渴却吧者有吧家本  
渴而反不渴者治求其本各自不同假令內格拒逆食不  
得入是有火也病吧而吐食久反出是無火也舉此二者  
乃知吐之各則一而治法各異雖治有冷熱有虛  
實之別要在安胃氣為本便陰陽升降呼吸平均吧吐之  
病順而愈矣

吧吐

論曰吧吐者胃氣上而不下也譬之空餅小口頓漑不入  
乃升氣所礙人病吧吐其理如此蓋脾胃氣弱風冷干動



使留飲停積、飲食不化、胃氣虛脹、心下澹澹、其氣上逆、故令嘔吐也。

厚朴丸 治脾胃虛寒、痰盛嘔吐。

紫朴 去皮一斤 半夏 斤半 生姜 三斤 取汁入 將

汁全朴半共入砂鍋內慢火煮乾為末、肉桂、如梧

藿香散 治脾胃虛寒、痰盛嘔吐不止、飲食不化。

藿香 紫朴 二 桂心 炙甘草 五 青皮 三分 炒

枇杷葉 去毛炙 乾姜 兩 姜朮水煎三錢服

七寶湯 治脾胃虛冷、嘔吐痰涎、胸膈痞悶、不思食。

人參 白朮 甘草 一 大腹皮 用 半夏 姜製

草豆蔻 煨四枚 訶勒皮 五 姜朮水煎三錢服

濟急丸 治脾胃虛寒、痰飲留滯、嘔吐不止。

附子 大者一枚 丁香 附子九枚 以姜自然汁浸附

和胃湯 治食飲不下、嘔逆、清水、面目虛腫。

人參 二 赤茯苓 兩 半夏 茅草根 一 木通

青竹茹 三分 甘草 五 姜朮水煎三錢、空心服。

人參 半夏 九 治嘔吐不下、食頭痛。

共末、蒸大棗、去皮核、杵成丸、如梧桐子大、空心姜湯

下二十九丸、晚再服。

乾嘔

論曰、嘔而欲吐、吐而無所出、故名乾嘔、此由陰陽不和、胃

虛弱、氣逆上行、不能下降、故有乾嘔之症。

麝香平氣丸 治胃氣虛弱、乾嘔、心膈痞悶、痰逆、惡心、吞

酸噫、食腹脹疼痛、和脾胃、進飲食、辟除邪氣。

麝香 木香 沉香 肉豆蔻 乳香 研成膏 煨 枳榔

丁香 丹砂 圭心 紫朴 煨汁 半夏 製 薑汁

共末入膏糊丸、如梧子大、空心飲下二十九丸。



四倍散

治胃氣不和乾嘔惡心  
訶梨勒煨取皮 人參一兩 白茯苓飯上蒸 白朮陳

安中散

治乾嘔  
共末鹽湯下二錢 或姜朮水煎服之 大補虛損

桂苓湯

治乾嘔煩悶不下食  
共末空心寒湯下二錢 日二除邪熱和胃氣進飲食

和安湯

治胃氣上逆乾嘔不止  
陳皮一兩 甘草二分 姜朮粟米水煎三錢 服

參栗湯

治乾嘔不下食  
全入礪慢炒搗為粗末 姜朮水煎三錢 空心服

胡椒

胡椒一粒 木香二錢 熟糯米一合

痰飲門

痰飲統論  
論曰人之有形藉水飲以滋養水之所化憑氣脈以宣流

痰癖

支飲 留飲

痰飲

蓋三焦者水穀之道路氣之所終始也若三焦調適氣脈

咳唾

咳唾引痛謂之懸飲 飲水流行歸于四肢當汗出而不汗

腫

腫謂之支飲 此飲疾之大概也 然有五飲及水在五臟



飲流移不定曰流飲。沉伏于內曰伏飲。因酒多而成名曰酒癖。因寒多所致。即曰冷痰。因熱邪所傷。即曰熱痰。病雖多端。悉由三焦不調。氣道否澁。而生病焉。是以氣行即水行。氣滯即水滯。故知飲之為病。在人最多。善治者以宣通其氣。脈為先。則水飲無所凝滯。所以治痰飲者。當以溫藥和之。蓋人之氣血得溫暖則宣流也。及結而成堅癖。則兼以消痰破飲之劑。攻之。堅癖自消。痰飲自愈。

論曰痰癖之病。由三焦氣不升降。水飲停滯。留于脘下。寒氣乘之。則令脘肋堅脹。按之瀝瀝。有聲。有時而痛。妨害飲食。久不施治。令人肢體羸瘦。謂之痰癖。

枳殼丸 治痰癖脘肋刺痛。勻氣寬膈。  
枳殼 人參 五味子 柴胡 甘草 石斛  
訶梨勒 共末蜜丸。如梧子大。飲下三十九。  
消飲白木丸 治痰癖及飲酒停痰。積聚不利。嘔吐目昏。

耳聾腸中水色  
白木 半夏 姜汁搗餅 枳殼 乾姜 炒  
共末蜜丸。如梧子大。空心飲下三十九。

支飲 論曰水飲停積胸膈。不能消化。支乘于心。故名支飲。其狀令人心中築悸。咳逆喘息。飲食不下。身體虛浮。形如水腫。是也。

參苓丸 治支飲不消。胸膈滿悶。  
人參 赤茯苓 膽南星 半夏 生薑 晉礬  
將生薑南星半夏搗成餅。慢炙黃。與參共末。糊丸。如梧子大。姜湯下二十九。

甜葶藶丸 治支飲氣喘不得息。  
甜葶藶 木香 半夏 共末 姜汁糊丸。如梧子大。空心姜東湯下二十九。

栝榔丸 治支飲胸膈否滿悶。  
栝榔 肉豆蔻 麩包煨 半夏 青皮 炒



乾姜一炒 共末姜汁糊為丸如小豆大姜湯下五九  
以差為度

留飲

論曰留飲之病得于三焦壅否氣脈凝澁致飲水不消留

聚胸膈之間令人否滿短氣背下脹滿喜渴數飲是其候也

赤茯苓治膈間留飲 吧逆頭眩短氣多渴

柴胡 白木 枳壳 檉柳 杏仁

半夏分三 人參 旋復花五 姜水煎三錢空心服

半夏湯治留飲不除胸中疼冷

半夏兩五 人參 附子 圭心 甘草 赤茯苓兩二

白木兩三 姜水煎三錢空心服日二

枳實湯治留飲不消心下痞堅時復作痛

枳實二 楚炒 白木三 圭心一 姜水煎三錢空心服日二

沉香茯苓丸治留飲

沉香兩一 白茯苓 半夏製 人參去 丁香兩二

甘草 陳皮白 肉豆蔻 煨下 換柳五 共末蜜丸如

梧子大姜湯下二十九 溫脾胃利胸膈和氣血

單撥煮散治留飲食癖

單撥 炙甘草 大腹皮 下香 訶梨勒 干姜五炒

白木 草豆蔻 陳皮去 白炒 圭心三

共末姜水煎三錢服

痰飲門

冷痰 熱痰 膈痰結實 膈痰頭痛

冷痰

論曰氣為陰陽不足者不能消燥水飲遇脾氣虛弱氣道

否膈則聚飲而成痰浸漬腸胃上為吧逆吞酸下為洞泄

寒中久不已則令人消瘦倚息短氣妨害飲食昔人治痰

飲多以溫茶和之為此故也

半夏湯治冷痰癖飲胸膈否滿嘔逆不止

半夏 湯泡二次 姜製三兩 人參 白木 附子 甘草



赤茯苓 圭心二 姜水煎三匙服日二

吳茱萸湯 治胸中塞疼心下煩滿欲吐不下食

吳茱萸 炒洗 人參 半夏 煨汁 桂心二 甘草 一

姜朮水煎三匙空心温服日二

半夏湯 治胃中冷疼嘔逆消食温胃止逆

半夏 杏仁 陳皮二 圭心 甘草一 木香 一

乾姜 姜水煎三匙空心温服

吳茱萸湯 治胃中冷疼吐酸水胸中不利

吳茱萸 煨洗 附子 半夏 姜汁炒

丁香半夏丸 治胃中冷疼利胸膈和脾胃進飲食

丁香 半夏 姜汁炒 人參 木香 藿香 姜

肉豆蔻 煨二 陳皮 姜 共末姜汁糊為丸姜湯下二十九

法製半夏 治冷痰利胸膈一切諸痰並治

半夏 酒浸一湯日 白礬 丁香皮 草豆蔻 兩

全入酒浸春夏七日秋冬十五日取夏洗過焙乾每

熱痰

論曰熱痰者由氣滯壅塞津液不通熱氣與痰水相搏聚

而不散若咽喉乾燥或寒或壅頭目昏重咳唾稠濁面目

赤熱是其候也

鵝梨煎丸 治熱痰凉心肺利胸膈解毒補元益氣

鵝梨 大者二十枚 皂莢 水揉取汁 懷生地黃 水搗

木香 肉荻蓉 白蜜 牛膝 半夏 一

雪白木 恙活 枳榔 山茱 青皮 炒白

防風 炙甘草 桔梗 分

共末搗膏為丸如梧桐子大荆芥湯下二十九

千金散 治熱痰壅盛胸膈不利

半夏 姜汁 蛤粉 甘草 恙活 凝水石 煨過



共末水下三匙空心服以利為度

九

丹砂丸 治熱痰壅盛虛煩躁渴  
丹砂半為 膽南星 枯礬一兩 炙甘草五二 半夏二兩 姜汁

麥冬湯 治胸間熱痰不思食  
麥冬 人參 前胡 葛根 犀角兩 桔梗五

肺痰結實 治肺痰結實  
芦根二 水煎五匙空心服日二

論曰肺痰者氣不升降津液否澁水飲之氣聚于膈上久而結實故令氣道奔迫否滿短氣不能卧眠甚者頭目旋運常欲嘔吐是也

金箔丸 治膈痰結實咽喉不利咳嗽喘息  
金箔五十 牛黃 麝香五分 冰片 珍珠無油而白 馬牙硝

半夏丸 治膈痰結實滿悶喘逆化痰  
半夏 姜汁製 皂莢 水煎半夏 生薑 搗作餅炙乾

犀角湯 治膈痰結實頭目昏運不思食咳嗽煩渴  
犀角 人參 片苓 柴胡分 麥冬 白茯苓

八珍丸 治膈痰結實滿悶喘逆不能眠者  
丹砂 犀角 羚羊角 茯苓 牛黃 研

神仙墜痰丸 治膈痰結實滿悶或痰飲否塞等症  
皂角 不蛀者去皮弦炙 白礬生一兩 黑牽牛一兩 取頭

右為末滴水丸如梧子大每日服三十丸漸如至百

九空心溫酒送下

此方用牛膝恐不實或牛膝者誤為牛膝字



膈痰風厥頭痛

論曰痰生於脾胃宜實脾燥濕又隨氣而升宜順氣為先分導次之風動於肝宜疎泄如治也未當則脾受木制而痰由自<sup>生</sup>久而鬱結胸膈隨火上升以致頭痛發暈甚而至於風厥風厥者即肝厥也凡治此者宜豁其痰而燥其脾疎其肝而其胃則痰自不生厥自愈而痛自止矣

玉壺丸 治膈痰風厥頭痛目眩等症

天南星 生半夏 一各 天广 兩 頭白麵 三兩  
右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三十九丸用水一大盞先令沸下茶煮五七沸候茶浮即熟漉出於溫別生姜湯下不許時候

玉真丸 治膈痰厥逆不可忍

硫黃 二兩 石羔 燂通 半夏 湯洗 硝石 一兩 研各  
右為細末研勻生姜汁為丸如桐子大陰乾每服二十九丸姜湯或米飲下更多閉元百壯虛寒甚者去石

羔用鐘乳粉一兩

芎辛道寸痰湯 治痰厥頭痛

川芎 細辛 南星 陳皮 去白 茯苓 己上各  
半夏 二錢 枳實 燂 甘草 各二錢  
右作一服水二鍾姜七片煎至一鍾食後服渣再煎服甚者三四服必止

川芎丸 治膈痰頭痛眩暈

川芎 一兩 天广 四兩 用 鄆  
右為末蜜丸每兩作十服每服一丸細嚼茶酒下取効最速

消渴

論曰消渴一症有標本之異當審其所起辨其所發而施治焉庶不舛錯悞人若六氣為病其本有之三陰三陽為病其標有之一曰消渴以渴而不利引飲過甚言之二曰消中以不渴而利熱氣內消言之三曰腎消以渴而復利腎燥不能制約言之此久不愈能為水腫癰疽之病宜順



者服菜之外當以絕嗜慾淡滋味為本

二

消渴論曰消渴者渴而引飲乃復澀少是也得之五石之氣內燥津液腎氣不化故渴甚而澀少也久之不治則經絡壅澆留于肌肉變為癰疽腫毒瘡瘍之候

桃紅散

治三消渴病

石羔

赤石脂

白石脂

栝樓根

炙甘草

五

共末空心溫水下二錢日二

沃焦散

治三焦渴病飲水無度小便短少

泥鱖魚

一條陰乾去頭尾燒灰研

荷葉

陰乾

共末

研勻用新汲水下三錢日二不思水即止

葛根丸

治消渴日飲水數斗不止

葛根

附子

栝樓根

鉛丹

炒一兩

共末

入蜜杵丸梧子大用茅根湯下二三十丸

神應丸

治消渴津液內耗飲水不止溺少

桂府滑石

寒水石

研五

用鷄子一枚取孔去黃

將清和末如膏入殼封固外以塩泥包裹曬乾煨赤以菜細研大人飲下二錢小兒五分

止渴

栝樓飲

治因好熱炙磚及熱菜并乳石三焦氣

臍心

肺乾熱

口乾舌焦飲水無度小便數多心欲狂

亂服此急救

栝樓

一枚要黃熟者

指冬瓜

中樣大者一枚去

元本乾

用黃土泥裹瓜半脂厚陰乾以火燒通赤去泥乾熟

將瓜爛研絞汁約七八合入蜜二兩和勻稍冷分作

三服藏府熱渴即不思水小便自無如栝樓末熟時

獨燒冬瓜服之亦妙

止生津丸

治消渴疾津液內耗飲水不止澀少

青蛤粉

白滑石

一兩

共研勻用黃鱖魚涎和丸小

豆大

陳粟米飲下二三十丸日二

猪脊骨飲

治消渴久不差



雄猪脊骨<sup>五</sup> 炙甘草<sup>半</sup> 黑干姜<sup>半</sup> 大枣肉二十枚

竹龍散 用水三升煎二升發時和熟水不拘時服以差為度

五靈脂 醋化瀉 黑豆<sup>五</sup> 共末用冬瓜湯下二匙無

瓜時用葉與子煎湯日二小可渴只用一服差後

八味丸 不可服熱惟宜服八味丸仍用五味子代附子

懷熟地<sup>四</sup> 山茱 山萸肉 白茯苓 牡丹皮<sup>二</sup>

沢澤 五味子 圭心<sup>一</sup>

共末入蜜杵丸梧子大塩湯下二三十丸

甘露散 治消渴飲水不止

猪胞<sup>十</sup> 燒板<sup>者</sup> 剪破洗淨以火燒烟止研末空心酒下一

二匙日二

生津液梅蘓丸 治消渴暈熱煩躁

白鳥梅<sup>白梅肉</sup> 紫蘇 烏梅肉<sup>五</sup> 人參<sup>一</sup> 炙甘草<sup>半</sup>

訶勒皮<sup>一</sup> 百葉煎<sup>二</sup> 麥冬<sup>三</sup> 共末用黃獵汁和

九芡實大津化一九嚥下 暑月行路止渴甚妙

人參煎方 治消渴

人參<sup>一</sup> 葛根<sup>二</sup> 共末發時用猪湯一升入末三

匙蜜<sup>二</sup> 慢煎取汁三合自稠如錫收貯夜飯後含化

一匙津下重者不過三服

牛膝丸 消渴下元虛損經久不止

牛膝<sup>五</sup> 生地汁<sup>五</sup> 以汁浸末夜浸日曝汁盡為

度入蜜杵丸梧子大酒下三十九丸久服壯筋骨駐顏

色黑鬚髮

姜魚丸 治消渴飲水不止

生姜 切片焙乾為末用鯽魚膽汁和丸梧子大米飲

下七丸至十九

鷄腕脰散 治久渴不差旬日見效

鷄腕脰黃反 鷄腸<sup>五</sup> 鹿角膠 白竜骨 煨



白石脂一斤 桑螵蛸二十一枚炙 土瓜根三斤 川黃連二斤  
牡蠣一斤 苦參二斤 漏芦一斤 共末空心飲下二錢二日

黃連牛乳丸 治消渴 麥冬二斤 牛乳 生地汁 生葛汁四斤  
川連一斤 去鬚 二味共末用乳汁煎沸拌九梧子大空心飲下二三十丸日二

竹葉湯 治消渴飲水不輟多至數斗 赤林米一石 鹿蹄四隻 湯  
甘竹葉切 大广仁炒 薤白二斤 鹿蹄四隻 湯

毛骨細研 白茯苓一斤 薤白二斤 鹿蹄四隻 湯  
共分八服先以水三鍾煎广仁竹葉取汁入菜煎一

消渴煩躁 飲之渴止為度

論曰消渴煩躁者陽氣不藏津液內燥故令煩渴而引飲

且躁也內空謂諸躁狂越皆属于火蓋以心腎氣乘水火

不相資故也 蘆根湯 治消渴心脾中熱煩燥不止下焦虛冷小便多

蘆根一斤 枳椇根二斤 牡蠣一斤 黃耆二斤 知母三斤  
生麥冬六斤 水煎三棗空心溫服日二

翠碧丸 治煩渴不止咽乾躁熱昏悶 葛根 懷生地二斤 枳椇根三斤 寒水

青黛三斤 麥冬 知母五斤 共末用陳米糊丸梧子大  
石三斤 膽南星 共末用陳米糊丸梧子大

天冬煎方 治消渴煩躁引飲無度驚悸不安 金箔為衣煎人參竹葉湯下十五丸至二十九日二

生天冬一斤 白蜜五斤 用水五鍾煎天冬至三鍾以汲水淘數次別以熱水

白茅根飲 治丹石并熱茶發動毒氣不宜心肺躁熱煩  
渴飲水不止旋作小便久之即為癰疽腫毒

白茅根 麥冬半斤 白茯苓三斤 桑白皮二斤 露蜂房  
炙黑一斤 共粗末如黍米大水煎四棗泔竹葉十二片大



東二枚温服

消渴小便白濁

論曰消渴飲水過多久則滲漏脂膏脫耗精液下流胞中與水液渾濁隨其所之與小便利下凝膏故謂之消渴小便白濁也

腎瀝湯

治消渴小便白濁如脂

白羊腎脂切 五味 杜仲 生姜 黃耆半兩

懷生地一兩 人參五錢 大棗五枚 磁石三兩 黃水打碎洗去 芎藭二劑 先以水四升煎腎與磁石二升入芎藭再煎八合去滓分二服

山茱萸丸

治消渴飲水極多肌體瘦弱小便如米泔腰膝冷痛諸方不能治者

山萸肉 括樓根 苦參 土瓜根 龍骨研兩

川連兩三 共末用生括樓汁搗丸梧子大飲下三十九日二

川連丸

治消渴飲水不知休小便如脂舌乾口渴

川連 括樓根兩五

共末用生地汁搗丸梧子大牛乳下三十九

肉蓯蓉丸

治消渴下焦冷小便如脂油

肉蓯蓉 用皮 川芎 五味子 巴戟天 地骨皮

白龍骨 韭子 甘草 懷熟地 沢泻兩一 磁石碎醋

赤石脂 人參半兩 白朮 禹餘糧兩三 桑螵蛸

共末入蜜杵丸梧子大牛膝湯下三十九日二

久渴 消渴後成水 消渴後成癰疽 消中 消腎

久渴

論曰消渴之病本於腎氣不足下焦虛熱苦病久不愈者邪熱蘊積榮衛滯澁精血衰微病多傳變宜知慎忌九忌有三一飲酒二房室三鹹食及椒麪炙燂久消渴病經百日止者當忌針刺若妄針灸則瘡上漏水變成癰疽矣



腎瀝湯 治久消渴飲水不絕

遠志 赤茯 人參 川歸 龍骨 沢泻 懷熟地

川芎 片苓 圭心二 五味分三 麥冬二 羊腎

升廣黃芩丸 治久渴不止 用水三鍾煮半腎取汁煎芑五錢入姜束温服二日

升廣 片苓 麥冬五 人參 生地三 苦參八

括樓根七 川連 川栢五 共末用牛乳和丸梧子大飲下三四十九

消渴後成水 論曰脾土也土氣弱則不能制水消渴飲水過多脾土受

濕而不能有所制則泛溢妄行于皮膚肌肉之間聚為浮腫脹滿而成水也

瞿麥穗湯 治消渴欲成水氣面目膝脛浮腫小便不利

瞿麥穗 沢泻 滑石五 子苓 大黃分炒 桑螵蛸兩 防己分三 水煎三錢温服頃又服

赤茯苓湯 治消渴後頭面脚膝浮腫胃氣虛弱不能下

赤茯 人參 白朮 前胡 紫蘊一 陳皮 枳榔

木香 桂心分三 甘草錢五 姜束水煎三錢服

消渴後成癰疽 論曰消渴則隨飲而出皆作小便由少服乳石所致久則

榮衛損傷精血不足肌膚減耗石氣增熾隨附經絡津液

內竭經絡凝澁榮衛不行熱氣留滯故變為癰疽此當精

窮治法恐毒氣不出穿通臟府也 熱毒助陽藥固一治

玄參散 治渴利後絡經痞澁榮衛留滯壅熱結成癰疽

玄參 犀角 木香 沉香 芑硝 黃耆 羚羊角

甘草分三 共末空心温水下二錢日二

磁石散 治消渴後經絡壅熱結成癰疽

磁石十引 鐵者醋淬二 生地 黃耆 地骨皮分三

枳榔 五味子 圭心 枳壳錢五 共末温水下三錢日二

十五



石羔湯 治消渴後成癰疽

石膏 知母兩半 栝樓根無生去皮半斤 搗取汁如

犀角 升廣分三 土瓜根無生去皮者半斤 搗取汁如

水煎茶三錢入小麥少許去滓入二汁各半合溫服

日二

桑白皮湯 治消渴後心肺氣獨盛結成癰疽

桑白根皮煉引者蜜

用水煎三錢空心溫服日二以差為度

消中

論曰消中者不渴而多澀一名內消以邪熱薰鍊五藏然後外及肌肉形體也得之少年餌石房室太甚真氣耗憊石氣孤立結于腎則腎實腎實則消水漿故不渴而小便利多不得潤養五藏便所食之物皆消為少便治宜滋腎水養津液則差  
天冬九 治初得消中食已如飢手足煩熱背脊悶小便白濁

天冬去心 雞內金三錢 知母 土瓜根 五味

子兩半 桑螵蛸十枚 鹿茸去毛 沢瀉 赤石脂

半兩 牡蛎童便 苦參兩

共末入蜜杵丸梧子大飲下二十九

齋芫湯 治內消所食物皆化作小便兼治強中

齋芫 大豆 人參 白茯苓 石羔 葛根 栝樓根

子芩 甘中 知母 磁石醋 水煎五煎溫服日二

牡蛎丸 治消中食已即飢手足煩熱背脊疼悶小便稠

濁

牡蛎醋 赤石脂 栝樓根 因蓯蓉兩 知母 澤

泻毛 天門冬 土瓜根 桑螵蛸炙 五味子

鹿茸 川連 子芩分三 懷熟地兩

共末入蜜杵丸梧子大飲下二十九日二

猪肚黃連丸 凡消渴變為消中者飲食到胃府即時消

化小便多即色白飲食過入而不覺飽者是為消中



雄猪肚一枚燒 川連去芦 以大广子仁二合研  
和 水四升調如杏酪汁煮肚候爛入連末蜜縫熬極爛

肉蓯蓉丸 治消中真氣耗憊小便無度  
肉蓯蓉二兩 人參 五味子 巴戟天 炙甘草

括樓根 地骨皮 丹皮 沢浮 懷熟地 韭菜子  
脂一兩 桑螵蛸十枚 禹餘糧燒紅醋淬 龍骨 赤石

消腎 論曰消腎者由少服石茱房室過多精血虛竭石勢孤立  
腎水燥涸渴引水漿下輸膀胱小便利多腿脛消瘦細小  
小便數或赤似血色骨節痠疼故名曰消腎  
地黃湯 治消腎腿脛消瘦細小小便數似血色藏府虛  
懷熟地 麥冬二兩 桂心 炙甘草 川續斷 白茯苓

山茱萸丸 治消腎自腰以下瘦弱無力小便數不禁  
山茱萸 牛膝 圭心 韭菜子炒 黃耆炙

肉蓯蓉 杜仲鹽酒 韭菜子炒 黃耆炙  
共末入蜜杵九梧子大黃耆湯下二十九日二

人參鹿茸丸 治消腎肢體瘦弱無力小便數  
人參 黃耆炙 鹿茸一兩 括樓根 桑螵蛸炙

兔締子 杜仲鹽酒 山萸肉分 鷄腕脰黃皮  
共末入蜜杵九梧子大東肉湯下三十九日二

磁石湯 治消腎小便白濁如凝脂形體消瘦  
磁石六兩 搗如米包 分作二煎  
黃耆炙 杜仲鹽酒

金銀箔丸 治消腎口乾眼淚陰痿手足煩疼小便多  
水三鐘先煮羊腎一對切片煎取汁二鐘入磁石  
分再煎鐘半用汁煎茱四莖服日二



金箔 銀箔片一兩 葛根 白茯苓 懷生地三

肉蓯蓉 天冬 麥冬半兩 川連四 栝樓根

丹砂兩一 黑干姜 五味 巴戟天 沢泻兩

共末入蜜杵丸梧子大丹砂為衣空心飲下二十九

人參附子湯 治消腎飲水無度腿膝瘦細小便白濁不

差 人參 附子 青黛五

水煎楮葉二片取汁煎二錢過服日二

聖濟總錄纂要卷九終

聖濟總錄纂要卷九終

水病門

程 林雲來 纂

方一燧宏度 較

方願德公茂 閱

水腫

論曰內經謂腎者胃之關也

關門不利故聚水以從類上

下溢于皮膚而為明腫明腫者聚水

微腫若新卧起然頭脈微動時作咳嗽

乾不得正偃正偃則咳清水不得卧卧則驚而咳甚則小

便黃澁以手按腫處隨手而起如暴水之狀是也以脉別

之脉沉者水病也洪大者可治微細者難治水病有不可

治者五唇黑傷肝一也缺盆平傷心二也脐出傷脾三也

足下平滿傷腎四也背平傷肺五也盖脾腎氣虛三焦閉

風水

石水

大腹水腫



塞至陰之氣內蓄巨陽之氣不得宣通如是則水通不利  
飲濕攻脾散于肌內而為水腫之病矣

水腫  
論曰水腫之病以脾胃氣虛不能制水水溢妄行溢手皮  
腫其脛股冷膚腫時作咳嗽不得安卧小便黃澁以手按  
腫處隨手而起是也  
妙香散治一切水氣四肢腫滿

烏茶 青皮 良姜 藁香子 水煎三錢溫服  
煖腎散 全前 木香 苧蘆 沉香 一分

巴戟天 甘遂 醋炒 芫花 醋炒 麥蘆 五錢 臍粉 一錢 沢浮 一分  
陳皮 煖柳 二枚 熟 共末用猪腰切透末二錢紙包煨先食  
粟米葱粥半碗吃腰又食粥臨卧服至五更大小便  
下赤黃惡物愈  
大黃湯 治水腫腹滿

六黃 醋炒 桑白皮 人參 甘草 桂心 二細辛

煖柳丸 治水腫 水煎五錢入棗二枚去滓入白錫二匕沸服日三利便三五升沸

乾姜 微煨 附子 防已 紫朴 吳萸  
枳椇仁 海藻 廣黃 節 白木 黃香  
桂心 兩 共末蜜丸梧子大飲下二十九二便利為効

論曰十水之病腫從脚起上氣而咳名為白水其根在肺  
腫從面目起名為清水其根在肝腫從腹內起名為黃水  
其根在脾腫從脾趺起名為黑水其根在腎腫從心起名  
為赤水其根在心腫從腹起名為氣水乍實乍虛乍去乍  
來其根在大腸腫從頭面起至足名為垂水其根在膽腫  
從內起堅塊四肢小腫名為石水其根在膀胱腫從四肢  
起腹大名為風水其根在胃腫從腹內起名為裏水其根



在小腹凡此十水生於藏府各從其根究其所末則肺與  
腎而已故內經云其根在腎其本在肺皆積水也又曰津  
液充郭其魄獨居精孤于內氣耗于外形不可與衣相保  
蓋腎氣虛弱水氣脹滿上攻于肺肺氣孤危腎為水害子  
不救母故陰精損于內陽氣減于外三焦不溢水道不通  
水滿皮膚身體痞腫治之之法備見內經故曰平治於權  
衡去菟陳莖微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門  
潔淨胸精以時服五陽已布疏滌五藏則精自生形自盛  
骨肉相保巨氣乃平  
賜名神助散 舊名葶藶散 治十種水病百方不愈面  
目四肢俱腫氣息喘急眠卧不安小便漸澀腹脹氣  
悶水不入口垂命欲絕者  
椒目 微炒 三兩 猪苓 沃浮 兩四 牽牛 炒香 五兩  
共末姜水煎三麥入葱白三莖酒半鍾稍熱下良  
久喫葱白粥一碗酒一鍾面東熱喫至子後二便通

利嗜定腫積間再服百日盡消

補藥木香丸 取下水氣

木香 青皮 莪朮 共末糊丸梧子大湯下十九

靈保丸 治十水

滑石 兩 臙粉 兩 共研木瓜汁丸小豆大五更飲下

七九日只一服服七日覺脐腹撮痛小便多為效忌

鹽百日覺効便服補脾胃菜

再蘓丸 治十種水氣大通三焦此方仙經所載天台山

金壇石室中鑄記但令人忌口無不差者

大戟 炒 甘遂 炒 圭心 乾姜 春大麥麩 炒

巴豆 麩炒 油炒 大黃 炒

共末蜜丸小豆大茶下十九取利為度

桑白皮飲 治氣水面目浮腫胸滿短氣小便不利

桑白皮 赤芍 郁李仁 百合 木通

大腹皮 水煎五棗空心溫服日二



風水

三

論曰內經云腎者北藏也腎主水故人勇而勞腎則汗  
 出腎汗既出復感于風不得入于藏府外不得出于皮膚  
 容於玄府行于皮裏傳為附腫本之于腎名為風水其脈  
 自浮其外症骨節疼痛而惡風且身腫如裹水之狀頸脈  
 動時咳者是也金匱方云脈浮而洪浮則為風洪則為氣  
 風氣相搏身體洪腫汗出乃愈惡風者為風水不惡風者  
 小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗二者之症不可不察  
 廣黃石膏湯 治風水偏身洪腫骨節疼痛惡風汗出不仁  
 廣黃去根節 石羔兩 白木兩 附子一枚 甘中兩  
 姜朮水煎服  
 大豆湯 治風水一身腫滿短氣欲絕  
 杏仁兩 防風 白木兩 赤茯 防已 廣黃根  
 節 甘中兩 黃耆兩  
 水煎五錢入大豆酒一合日三利小便愈

防已湯

治風水脈浮浮為在表其人或頭面汗出而表  
 無化病但腰已下附腫

防已

白木兩 甘中兩 黃耆兩 姜朮水煎三  
 錢空心溫服日二如喘加廣黃去根 身重胃中  
 不和加至心圭 心下久寒加細辛每服茶取汗愈

石水

論曰腫從內起堅塊四肢遊腫名為腎水其根在膀胱蓋  
 腎主水與膀胱膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出  
 矣今腎水則膀胱氣弱膀胱氣弱則不能化氣而隱滯不  
 能行水液停結于脘腹故其症胸腹鼓滿按之如石腹  
 下脹滿其脈沉遲身體發熱四肢頭面皆腫也

桑白皮湯

治膀胱石水四肢瘦

桑皮

射干 赤茯 猪苓 澤漆

澤瀉

水煮大豆半合取汁煎三錢溫服

日二

防已



楮白皮湯 治石水 四肢細瘦 獨腹腫大 狀如懷孕 心中妨滿 食即氣逆

楮皮 桑皮 防已 兩 白木 射干 赤茯苓 兩

杏仁丸 同上

杏仁 去皮 苦瓠 炒 一兩 微

共末 糊丸 梧子大 飲下 二

大腹水腫

論曰 內經云 水病下為跗腫 大腹 又曰 上下溢于皮膚 故為跗腫 其症腹大 四肢小 陰下泄 手足逆冷 腰痛 上氣 咳嗽 煩疼 是也 蓋三焦閉塞 水道不通 流溢皮膚 榮衛否澁 內連腹 則至陰動 脹急如鼓 得病之本 多因大病之後 或積虛勞損 或新熱食畢 入水自漬 及浴冷水 水氣不散 連宜然也 治大腹水腫 氣息不通 症候危篤者

牛黃 五錢 昆布 牽牛 海藻 桂心 兩 椒目

葶藶 炒紫 三分 共末 蜜丸 小豆大 飲下 十九 小便利為度

蘓香合丸 治水氣腹大腫

蘓合香 水銀 時後煮 一伏 白蘘末 兩

丹參酒 治久患大腹病 其狀四肢細瘦 腹大有勞苦 則

胫腫滿 食則氣急 此病服下利 菜不差 宜用此酒 以

散 徐風濕利小水

丹參 鬼箭羽 白木 兩半 知母 赤茯苓 兩

秦艽 分 猪苓 海薄 洗水 真獨活 桂心 分

共為粗末 以白酒五升 浸五日 每服一鍾 日三 水腫欬逆上氣 水氣偏身腫滿 水盪

膜外氣

水腫欬逆上氣

論曰 內經謂腎為水腫 肺為喘呼 氣逆不得卧 蓋腎主水



肺主气，肾虚不能制水，水气胀满，上乘于肺，肺得水而浮，故虚而咳嗽。古方有云：「肿从脚起，上气而咳，名曰白水。」其病在肺。

褚澄防己煎散 水腫上气

防己 澤漆葉 澤浮 白木 丹參 赤茯  
桑白皮 陳皮 木通 郁仁合

水煎五支，入生姜日三，小便利為度。

防己湯 水气欬逆上气，四肢浮腫，坐卧不安。

防己 甘草 木通 桑白皮 赤茯  
陳皮 澤漆 郁李仁 百合 水煎五支

鯉魚湯 水腫腹大喘咳，胸脅滿不得卧。

鯉魚 鱗 紫苑 桂 防己 黃芩  
硝石 研 人參 用水一斗，煮魚取汁五升，每二鐘煎末五支，日三。

雌鷄湯 胸中喘嗽逆，水气身腫，利小便。

雌鷄 白木 半夏 澤漆 炙甘草

節

粗搗節，用東流水五升，煮鷄取汁，入茱萸五支，姜朮赤

澤漆根湯 水在肺，令人咳喘上气，腹大脚腫，目下如卧蠶，微渴不得卧，小便難少而數，胸滿隱痛，此水气迫

肺宜利小便 人參 麥冬 炙甘草 赤茯

澤漆根 生四 魚 利為度，未利稍增，寒加生薑

論曰：腎生水，脾胃主土，土剋水，胃為水穀之海，其气虚不能傳化水气，使水气浸漬水臟，又脾得水湿之氣，土衰不能制水气，溢歸于腎，腎虚三焦不泻，經絡閉塞，故水气溢

于皮膚，傳流四肢，所以通身腫也。其候上气體重，小便黃

洪腫，按之隨手而起是也。

木通湯 徧身腫



木通 苦葫芦<sup>半兩</sup> 防己 澤浮<sup>分三</sup> 猪苓 海蛤<sup>兩一</sup>

酒煎五<sup>錢</sup>入葱白温服當下小便救升腫消

鯉魚湯 水病通身洪腫

鯉魚<sup>介一</sup> 澤漆<sup>微炒</sup> 人參<sup>半兩</sup> 杏仁<sup>炒五</sup>

共末水三升煮魚以汁煎末三<sup>錢</sup>日三小便利乃止

海蛤丸 水腫腹滿四肢瘦喘促小便澁妨悶

海蛤<sup>兩一</sup> 木香 防己 厚朴 訶勒皮 旋復花

共末蜜丸梧子大大腹皮湯下二十九

枳實湯 水氣

枳實<sup>炒白</sup> 白木 升广 炙甘中 紫苑 知母

桑白皮 赤茯 黃耆 秦凡 麥冬 黃芩<sup>分五</sup>

葱白 水煎三<sup>錢</sup>

白木湯 水氣渴腹脹滿

白木 人參 赤茯 炙甘中 水煎五<sup>錢</sup>服

平補鹿茸丸 水氣平愈軀瘦如舊

鹿茸<sup>炙</sup> 菝葜 地黃 兔絲子<sup>酒炒</sup> 柏子仁<sup>兩一</sup>

白茯 黃耆 防風 遠志 車前子 五味子

桂<sup>五</sup> 蜜丸梧子大飲下三四十九

水盞

論曰水腫之狀腹膜腫脹皮膚粗黑搖動有邑此由脾胃

氣虛濕氣滯溢久不治則害人如盞之毒故謂之水盞

大黃湯 水盞二便不通急脹壅塞

大黃<sup>醋炒</sup> 麥冬<sup>分三</sup> 川連 甘遂<sup>微炒</sup> 茅根<sup>兩一</sup>

貝母<sup>分三</sup> 水煎二<sup>錢</sup>

瞿麥湯 水盞腹脹滿急小便不通縱有少而黃赤

瞿麥 穗 車前 滑石 茅根 甘遂<sup>炒</sup> 苦參<sup>等</sup>

水煎二<sup>錢</sup>日三

分水氣海蛤丸 水盞腹脹喘嗽

海蛤<sup>兩一</sup> 凝水石 滑石<sup>兩一</sup> 臧粉 粉霜<sup>分一</sup>

白丁香<sup>枚五十</sup> 共末麩和作餅子紙包煨熟為末糊丸



菘豆大酒下二十九

鼠尾草丸 水盞

鼠尾中 馬鞭中 脩五 水五斗煮二斗取汁再煎成

膏為丸小豆大以輕粉為衣飲下三九

惡實丸 水盞身體洪腫

惡實 微 為末糊丸梧子大飲下十九勿嚼破

瓠瓢煎 同前

瓠瓢 一枚 水二升煮一炊去滓煎堪丸即丸小豆大飲

下十九取小便利後勿飲水作小豆羹食之

楮枝煎 盞病水腫

楮枝 併 水五升煎半取汁入黑豆末半升煎成頓服

膜外氣

論曰諸家方書論水病甚詳未嘗有言膜外氣者唐天寶間有從都子者始著膜外氣方書本末完具自成一家今

并編之然究其義本于肺受寒邪傳之腎腎氣虛弱脾土又衰不能制水使水濕氣散溢于皮膚之間氣攻于腹膜之外其病令人虛脹四肢腫滿按之沒指是也

徒都子論病本

膜外氣者或謂之水病起于他疾不可常定或因患瘰或因積勞或因腎藏中風或因肺府傷冷或因膈上氣或因衝熱遠行或因酒肉半所得始下肺終于腎或因咳嗽或多涕唾或因蓄聚冷氣壅塞不散遂使肺臟邪氣攻心冷氣化為水流溢膀胱右大腸膜外所以切脈不能知針灸不能及蓋人腎為命本不可虛也本固枝葉茂本虛即枯槁况四時衰旺皆乘腎藏之氣腎損則五藏皆衰是致胃閉而脾不磨氣結而小便澁輕重之候在大小便耳若小便不通則氣壅攻擊腹內衝出膜外化為水使人手足頭面浮腫若二便微澁則微腫極澁則極腫二便俱不通三日即徧身洪腫則陰亦腫夫陰腫有二有腫而小便自



出者有腫而小便澀者又有莖囊連小腹臍皆腫者此並  
為死候宜速治之若患此腫病亦不常定或先手足面目  
浮腫或先腰肋微腫或先手足小腫其候或消或甚三五  
日稍愈又發亦以小便通澀為效積漸變成洪腫女人得  
之與此畧同凡患此疾令人腹脹煩悶胸間氣急此由肺  
脹甚至喘如牛吼坐卧行立不得或中夜逆氣攻心胸重  
者一二年方死有一二月死者若將息失度悞食毒物十  
日半月即甚也愚醫多以針灸出水為功又以鯉魚赤小  
豆為菜又令病人飲黃牛尿服高陸根反有所損少有差  
者大抵此病尤忌針灸犖陀云患水病勿過良醫第一不  
可針灸言氣有膜外已化為水水出即引出腹中氣水盡  
則死有病疾者宜向陽行坐遇陰雨則愈覺壅滯房中  
常須存火服菜後夜卧覺胸間熱甚宜含紅雪與好茶之  
類慎勿飲酒及冷菜茶冷水若渴宜喫五靈湯錄在卷後  
尤忌塩生冷醋滑

五靈湯

膜外水氣

木通

訶勒皮

防己

赤茯苓

陳皮

一兩

水煎

五苓覺熱喫好菜

紫蘓煮散

膜外水氣

紫蘓

防風

白木

桑皮

等

共末水煎覺熱去白木加甘草功效如前方又有  
蛇蠱狀如水病相似四肢如故小便不甚澀但腹急  
腫而盡脹不下食凡醫多悞作水氣治之宜只細詳  
審



聖濟總錄纂要 卷之十一

新安

程夏允大  
程濬冲士喆  
程量越自遠  
程浚葛人

較

黃疸門

黃疸

急黃

陰黃

酒疸

穀疸

胃疸

黑疸

女勞疸

黃汗

三十六黃

黃疸統論

論曰疸病症有五種一曰黃疸二曰黃汗三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸黃疸者偏身面目悉黃如橘黃汗者身軀黃腫汗出如漿汁不渴狀如風水穀疸者食畢頭眩心中怫鬱不安而發黃酒疸者心中懊痛足腫滿小便黃面發赤斑黃黑由大醉當風入水所致女勞疸者一身面目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大熱房



室過度此五者症狀雖異大率因酒食過多水穀相並積於脾胃復為風濕所搏熱氣鬱蒸所以發黃為疸其症食已如飢曰胃疸額上黑足下熱曰黑疸其因傷寒時氣後變成黃者緣陽明病無汗小便不利熱瘀在裏心中懊懣身必發黃若被火額上微汗出但小便不利亦發黃其狀如橘色腹微滿此由寒濕不散瘀熱有于脾胃故也又有九疸三十六黃其症其名悉各不同治皆有法其載後章凡黃病當利其小便而渴者其病難治疸而不渴其病可治

黃疸論曰內經謂目黃者曰黃疸又曰安卧脉盛謂之黃疸其外症身體面目及爪甲小便盡黃其因症食已如飢此由酒食過度脾胃有熱復為風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故發是疾若面色微黃身軀或青赤黑色皆見者與純熱之症不同當于濕家求之諸黃疸發于陰部其人必吐

于陽部其人必振寒而發熱也

茵陳蒿湯 治黃疸目黃小便如血心煩躁悶口苦頭痛

茵陳蒿 麥冬 山枝仁 木通 柴胡 枳椇根

木通湯 治黃疸脾胃積熱皮肉皆黃煩躁口苦小便赤澀

木通 瞿麥穗 懷生地 大青 赤茯苓

黃連湯 治黃疸面目偏身皆黃水便盡黃

白茅根 秦艽 水煎五支 溫服日二 茵陳蒿 山枝仁

川連 大青 人多 地骨皮

子芩 柴胡 芒硝 大黃

桃根湯 治黃疸面目一身如金色及一切疸病

桃根皮 東引者一把如釵股者佳 水煎取汁空心頻

白鮮皮散 治一切黃疸面目皮肉如金色小便赤黑口



乾煩渴

白鮮皮二兩

芒硝

大黃三兩

土瓜根

茵陳蒿

栝樓根

白芍 川連

柴胡

山枝兩

子芩一兩

真珠三十枚

大青半兩

共末用白茅根取汁下三匙

柴胡湯

取利至晚不利再服服了以葱豉粥投之取利為効

治黃疸身面黃口渴

秦艽煮散

灸甘中分 白茅根把

水煎溫服未差再服

茵陳蒿丸

治一切黃疸并小便如金色及身皮皆黃者

茵陳蒿

用牛乳二鐘半煎鐘半分二服未差再服

吳藍飲

治黃疸身腫發熱汗出而渴汗著衣正黃

吳藍

白芍 麥冬 白鮮皮 山枝仁 桑白皮

防己

水煎五匙溫服日二

急黃

論曰諸發熱心顫定必發為急黃謂其卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故名急黃也有初得病身熱面目即發黃者

有初不知是黃死後變黃者但先有其症當急治之此由脾胃有蓄熱及客氣鬱蒸又因熱毒所加故發為此病也

茵陳蒿湯 治急黃小便赤黃如枝子汁色心中煩悶

茵陳蒿 子芩 山枝仁 川連 大黃微炒 白鮮皮

水煎五匙去滓入朴硝五分沸服日二

茵陳川連湯 治天行急黃身目如金色

茵陳蒿 川連 子芩 大黃炒 人參 灸甘中

水煎五匙空心溫服日二

龍膽草湯 治急黃面目身熱如金躁欲飲水

龍胆草 石羔二兩 木通 土瓜根 大黃微炒

白茅根 石硝研 犀角一兩 山桅五

大黃兩半

山枝仁

山枝仁

山枝仁



水煎三匙去滓入朴硝末五分沸服

黑豆煎 治急黄烦热口乾偏身悉黄

黑豆升 用水五大鍾煎汁二鍾入生地汁藕汁麥冬

汁白蜜各二合酥半合慢煎成膏含化一七日三夜一

陰黃 論曰陰黃者面黃頭痛不發熱不欲聞人声音此由陽伏

于陰邪氣熱盛沉潜散于肌肉身黃如橘故謂之陰黃昔

人有言下之後身目發黃者當於寒濕中求之此其類也

秦艽湯 治陰黃不欲聞人言語小便不利

秦艽 用牛乳 赤茯苓 炙甘草 旋覆花

茵陳蒿散 治陰黃身面如橘色小便不利

茵陳蒿 白朮 猪苓 赤茯苓 圭心

泥瀉 治陰黃小便色不變欲自利腹滿而喘者必噦

半夏湯 治陰黃小便色不變欲自利腹滿而喘者必噦

半夏 湯泡 人參 葛根

赤小豆散 治陰黃

赤小豆 丁香 麝香 瓜蒂

青棉布灰 共末熟水下 一匙日二 以吐為度 又取

少許吹鼻中有黃水出效

酒疸

論曰胃虛穀少醉以入房冒犯風邪胃中熱毒隨虛入裏

小便黃赤濕毒內聚心下懊懣疼痛薰發肌肉則是目赤

黃或發赤斑足胫浮腫或下之早則變為黑疸令人心如

病饑大便黑痰皮膚不仁治法緊宜先去濕毒後分小水

茵陳蒿湯 治酒疸心中懊懣痛小便黃赤

茵陳蒿 葛根 赤茯苓 升麻 秦艽

枳椇根 山枝仁 水煎三匙溫服日二

艾葉湯 治酒疸身目俱黃心中煩痛



艾葉 生一把如 麻黃 二根 大黃 四兩

用酒煎四支入大豆半合空心温服日二

疑水石散 治酒疸小便不利或飲少澀多如白泔色

疑水石 煨 白石脂 括樓根 一兩 知母 圭心

兔節子 二兩 酒煮 共末空心飲下二支日二

小麥飲 治酒疸 用水煎二合取汁頓服未差再服

追毒飲 治酒疸偏身發黃

狗脊 去毛 白芥子 炙甘草 一分

用酒一升煎半升分二服以利下為度未利再服

大黃湯 治酒疸心懊痛脛腫波黃面赤

大黃 二兩 山枝仁 枳實 一兩 大豉 三分

赤小水煎四支温服日二

穀疸 論曰夫饑飽甚則胃中滿塞穀氣未化虛熱薰蒸遂為穀

疸其症心下煩悶顛睡心忪佛爵發煩小便不利身黃如橘是也

茵陳蒿湯 治穀疸食則目眩心忪佛爵不安久不發黃

茵陳蒿 柴胡 四兩 子芩 龍胆草 枳實 二兩 麩炒

大黃 炒 山枝仁 升麻 三兩 水煎五支温服日二

若病人羸瘦氣弱去大黃用懷生地五兩山枝仁 四兩

苦參枝子丸 治穀疸 苦參 子芩 山枝仁 竜胆中 一兩 共末用雄猪膽

汁和丸如梧子大空心飲下二十九日二

胃疸 論曰已食如饑者胃疸也夫胃熱則能消穀今已食如饑

者以胃氣但熱而無陰也然胃為足陽明陽明之脉絡属

于心陽明得熱則心火上行陽火過矣故單陽成瘴心嘈

雜而身面黃小便赤色也

瀉熱湯 治胃中有熱食已如饑不生肌肉面色萎黃



生大黃 廣黃去根 子芩四兩 甘草五 陳皮去  
 杏仁去皮 赤茯苓 芒硝研 沢瀉兩 白去

蘆根湯 治胃疽壅盛食已如餓面黃口燥

蘆根 麥冬 枳椇根一兩 甘艸 知母 赤茯苓三

生薑 水煎三匙入小麥一撮竹葉生地一分温服日二

赤茯苓湯 治胃積熱食已即餓面黃肌瘦胸滿脇脹

赤茯苓 陳皮 沢瀉 桑白皮三兩 白芍藥

白朮四兩 石羔兩 人參兩 圭心二兩 半夏六兩

生薑水煎四錢温服

犀角湯 治胃實熱嘔逆不下食

犀角屑 葛根三分 麥冬 枇杷葉去毛

生薑水煎三匙服

黑疸

論曰諸黃疸酒疸女勞疸久不已皆變為黑疸其狀小腹

滿身躰尽黃額上及黑足下熱大便黑是也黃水脾病脾者土也脾病不已傳其所勝腎斯受之腎為水藏其經足少陰其色黑病在腎故小腹滿色黑大便黑足下熱是皆足少陰經受病之症

當歸湯 治諸疸久不差變成黑疸小腹滿身黃額黑

川飯三兩 桂心六兩 麥門冬 大黃炒一兩 黑干姜

黃耆炙 茵陳蒿 子芩 赤苓 炙甘草

石羔研 川連 白芍藥 人參兩

共十四味判如广豆大用生薑水煎三匙空心温服日三一方無黃耆

土瓜根飲 治諸疸成黑疸諸醫不能治者

土瓜根 水煎取汁每日空心服半鍾其病隨小便出

即愈須強壯人可半鍾羸瘦人只一合無生者判乾

者一兩水煎服

女勞疸



論曰脾胃素有濕熱或緣大暑醉飽房勞過度引熱歸腎  
濕氣交攻小水不利小腹堅脹濕毒流散于肌肉之中則  
四肢身面發黃故謂之女勞疸然其症又有額上黑微汗  
出手足心熱薄暮即發膀胱急小便自利者各宜隨其症  
而治之

硝石礬石散 治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急  
小便難出大勞大熱房室傷損濕毒散于肌肉

硝石 礬石 一燒枯 共末空心飲下一匙覆衣取汗隨

犀角湯 治女勞疸及勞氣熱渴額上汗出手足熱小便  
赤澁

犀角 龍胆草 一兩 升麻 炙甘草 五錢 麥冬 三錢 去心

髮灰散 治女勞疸身目俱黃惡寒發熱小腹滿急小便難  
亂髮 一錫子 六錢 猪脂 半斤 用油慢火煎髮令髮消尽温

水下一匙不拘時頻服以小便利為度

黃汗

論曰黃汗者汗出沾衣色正黃如檿汁故名曰黃汗由脾  
胃有濕痰熱伏留薰發肌肉散而為汗其症使人身軀浮  
虛骨節疼痛發熱汗出而不渴是其候也

黃耆苦酒湯 治黃汗身腫發熱汗出而不渴狀如風水  
汗沾衣色黃如檿汁脈沉由天汗出入水中浴水從  
汗孔而得之

黃耆 蜜炙 兩 白芍藥 桂心 三兩 用苦酒 二鍾 煎五匙

吳藍湯 治黃汗身重發熱汗出而不渴狀如風水汗出  
衣黃

吳藍 防己 白鮮皮 山枝 桑白皮 麥冬

白芍藥 水煎三匙温服未効再服



茵陳蒿湯 治黃汗身熱不退大小便不利

茵陳高 木通 黃耆 赤芍藥 赤茯苓 炙甘草

一兩 大青 兩二

水煎五支溫服頃再服以二便通利為度

山枝拈樓丸 治黃汗身熱大小便不利

山枝仁 拈樓根 苦參 共末用醋浸鷄子二枚

和丸梧子大水下三十丸日三四服

蔓蒼子散 治黃汗如漿汁沾衣身虛浮

蔓蒼子 為末用井花水空心下二支日二以差為度

三十六黃

一曰心黃 二曰肝黃 三曰脾黃 四曰肺黃

五曰腎黃 六曰鬼黃 七曰毒黃 八曰血黃

九曰人黃 十曰髓黃 十一曰癩黃 十二曰急黃

十三曰氣黃 十四曰癩黃 十五曰白黃 十六曰陰黃

十七曰膽黃 十八曰驚黃 十九曰風黃 二十曰走精黃

二十一酒黃 二十二鷄黃 二十三蜚蚰黃 二十四火黃

二十五走馬黃 二十六房黃 二十七黑黃 二十八厭黃

二十九水黃 三十瓜黃 三十一腸黃 三十二犢黃

三十三氣黃 三十四猪黃 三十五土黃 三十六蝦蟆黃

右三十六黃有焙法有炙法有方法中多奇證大約是瘟疫中壞證必有之惡候也然三法俱難用故下刊載今存其名以備醫家博覽

胸痺門

胸痺 胸痺噎塞 胸痺心下堅痞急

胸痺

胸痺統論

論曰虛極之人為寒邪所客氣止奔迫痺而不通故為胸痺其症堅滿痞急或胸中幅幅如噎塞或胸背皆痛或胸滿短氣咳唾引痛煩悶自汗出或心痛徹背或肌痺皮痛是皆閉塞而不可通也夫脈常取大過與不及陽微陰弦則



胸痺而痛久去胸痺之病喘息咳唾背痛短气寸口脉沉而遲關上緊是皆胸痺之候也

胸痺

論曰胸痺之病其脉陽微而陰弦陽虛則知在上焦陰弦故令胸痺心痛古方用理中湯取緩其中氣則可也然背者胸之腑或築或悸或渴或腹痛或寒或腹滿其候不一治當隨症加減

理中湯 治胸痺

人參 白朮 炙甘草 黑乾姜 水煎五朮溫服

項又服 若築者此腎氣動也去白朮加桂心 悸者加白茯苓 渴者加白朮二兩 腹中痛加人參一兩 寒者倍乾姜 腹滿去白朮加附子服後以稀粥投之取汗

枳椇實湯 治胸痺

枳椇實 半夏 四兩 薑炒 五朮 生薑 三片 煎溫服 日二 堅痞急痛 徹背短氣煩悶 自汗出

生薑水煎五朮入薤白服 日二

噎塞

曰胸痺噎塞之病以胸中痞結不通故有噎塞之症蓋寒氣容于五藏六府因虛而發上冲胸間則氣否而不通

芒則為噎塞也

視布丸 治心胸氣悶喉中噎塞

昆布 三分 洗燒灰 木香 赤茯苓 枳實 煨 檳榔 五朮 半 訶梨勒 五朮 甘草 干姜 一分 共末入蜜杵丸如梧

子大空心溫服下三十九日二

赤茯苓湯 治胸中氣壅噎塞

赤茯苓 三兩 炙甘草 一兩 杏仁 四十九枚 去



水煎三匙温服日二

胸痺心下坚痞急

論曰：脉虛之人，寒氣客之，氣結胸膈而不散，故為胸痺。其症心下坚滿痞急，甚者疼痛，搶心如刺，手不得犯。治之當辨至微，殆不可忽也。

五物湯 治胸痺心下坚  
陳皮炒 白芍 川芎五 木香分 桔梗兩

生姜水煎五匙服

桔梗湯 治胸痺心下气坚滿，痞急刺痛，不可挽仰，气促咳吐引痛，不能飲食。  
桔梗炒 陳皮炒 甘草兩 栝樓實炒

生姜大棗水煎五匙，入薤白五寸，空心温服，日二。

五味丸 治胸痺心下坚痞急  
附子 黑干姜兩 桂心 栝柳 訶勒皮兩

共末入蜜杵丸如小豆，大酒下二三十丸，日二。

白豆蔻湯 治胸痺心下痞急

白豆蔻 人參 水香 桂心五 黑干姜 京三稜醋煮 炙甘草 陳麩兩 陳皮 大麥蘖炒 生姜水煎三匙，入塩少許，温服，日二。

胸痛

論曰：胸痛者，胸痺痛之類也。此由脉虛挾風，又遇寒氣，加之則胸膈兩乳間刺痛，甚則引背膊，或徹背脊，咳唾引痛是也。

桔梗黃耆湯 治胸膈痛

桔梗兩 人參 川芎 甘草 蘓葉五 川芎 黃耆 沉香兩 水煎三匙，温服，日二。

白朮枳實散 治胸痺  
白朮炒 枳實炒 陳麩兩 共末，酒下二匙，日二。

拍實散 治胸痺

栝子仁兩 桂心半 共末，飲下二匙，日二。

此方補血氣，行滯之方。

聖濟總錄纂要卷十一終





Red square seal impression with stylized characters, likely a library or collection stamp.



