

已上三方許學士試効者治水腫無逾此矣

雄黃神金散

雄黃

蓼蕘

米炒熟澤瀉

一兩

澤瀉

甘遂

桑皮

一錢

大戟

巴戟

茯苓

芫花

醋浸日炒

一兩

澤瀉

肚腫加椒目

後陰腫加

巴戟

右為末空心用井花水調服每一錢加至五
錢以利為度忌鹽醋生冷油膩之物

從脚腫加蓼蕘

肚腫加椒目

後陰腫加

巴戟

澤瀉面腫加茯苓從心腫根在肋加雄
黃從肢腫根在皮加甘遂從口腫根在

小腸加巴戟

從腰腫根在腎加大戟

從

膝腫根在肝加

芫花

三白散

治膀胱蘊熱風溫相乘陰囊腫大

二便不利

白丑

桑白皮

白朮

陳皮

木通

各等分

為末每服二錢空心姜湯調下小兒減半

秘方

治鼓脹如神氣鼓則放屁水鼓則下水而

大戟

白商陸

甘遂

錢三

陳皮

大腹皮

枳榔

白朮

海帶

海藻

各二

為末每

用三錢和白麵三兩水拌做一塊分作三小

塊每塊捍碗口大薄餅一箇共作三箇無油
鍋內烙熟空心服一餅酒送下茶過口坐卧
忌風生冷油膩鹽一箇月不能斷葷者不可
治也此藥試過每用一餅僅行水四五度並不瘦人
一方 用乾鷄屎一升炒黃好酒三碗淬下煮作
一碗絳瀝去渣飲之少頃腹中氣大轉腸鳴從
大便利下脚膝及蹄上下先皺起漸消至腹
如一次消不盡再服一劑以田螺二枚滾酒內
渫熟食之即止後以溫粥調養而安

此方治一切水氣濕發腫効

三因消腫丸 治水腫喘滿小便不利

滑石 木通 白朮 黑丑炒茯苓 半夏

陳皮 鐙木香 蘿麥 丁香各五分

為末酒糊丸梧子大每五十丸灯心麥門湯下
亨蘆丸 治涌水証如溢囊裹裡漿或遍身腫滿
按腹不堅疾行則濯有聲或喘效不定

葶苈炒澤鴻參 椒目 桑白皮 木猪苓

杏仁 鐔五 為末煉蜜丸梧子大每二三十丸葱

白湯下不拘時服以利為度

局方神助散

治十種水氣面目四肢浮腫以手

按之隨手而起亥嗽喘急不得安卧小便赤澁

大便不利

黑丑末

澤瀉

一兩

椒目

半兩

猪苓

二兩

葶藶

三兩

右為末葱白三莖水煎入酒調服

三錢

兩

薏苡根散

治水腫

薏苡根

君

木香

檳榔

黑丑

右為末酒調服妙

聖惠氣寶丸

又氣丸

順治腰脇俱病如抱一甕

肌膚

堅硬按之如鼓脚腫不能屈伸自頭至腰中瘦

脊露骨胷膈痞悶四肢無力

木香

茴香

炒

羌活

木瓜

川芎

當歸

陳皮

炒檳榔

地骨皮

葛根

大黃

一兩

黑丑

二兩

皂角

四兩

右為末熬皂角膏為丸梧子大每六

十九溫酒下一方無木瓜生姜灯心湯下

治一切氣血凝滯風毒熾盛脚氣走注作腫

或大便閉脚氣入腹滿悶寒熱往來狀如傷

寒並宜服之

簡易方 治水蠱不問年月深者

大戟 當歸 陳皮 酸一兩

水二升煮七分頻服利二三斗即愈

元戎方 治十種水氣垂死

鯉魚一頭重一斤者和葱白冬瓜羹食之

又治皺氣方

滑石 輕粉 鐘一錢 槐花半錢

右不犯鐵氣為細末生地黃自然汁生姜自

然汁停滯在裏中為丸梧桐子大一日服三

丸次日服四丸五日以來早辰只一服用生

地黃汁溫送下小便中水盡為度得睡後日

服嘉禾散十日永不再發

治陰水腫之劑

五皮散 治風濕客于脾經氣血凝滯以致面目俱浮四肢腫滿心腹膨脹上氣喘促

五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮

茯苓皮 水煎熱服 一方加牽牛

澹寮方無地骨皮五加皮 加陳皮桑白皮
白术木香散 治腫滿喘嗽欲變成水病者不能
食不眠卧小便秘

白术 猪苓 甘草 澤瀉 赤茯苓 鎔五
木香 檳榔 鎔三 橘紅 二官桂 鎔 滑石 三兩

右每服一兩半生姜三片水煎溫服木通一方加
拔萃聖靈丹 治肺有濕喘滿風盛小便赤澁
苦葶苈炒四兩 防已 一錢 赤茯苓 麵炒木香
檳榔 木通 人參各一分

為末以棗肉丸梧子大每服五十丸桑白皮湯下
續隨子丸 治通身虛腫喘悶不快

人參 防已 赤茯苓 麵炒續隨子 木香

檳榔 海金沙另炒五錢 各苦葶苈炒四兩

右為末棗肉丸梧子大每五十丸桑皮湯下
退腫損氣散 治積水驚水或飲水過多停積于
脾故四肢而身熱用藥惟內消其腫自退

赤豆 陳皮 蘿蔔子 甘艸炙各五錢 木香二錢半

每服一兩生姜三片棗一枚水煎食前服

復元丹 治水腫皮膚盈溢心腹堅脹喘急不得正偃正偃則咳嗽腿腹冷口苦舌乾小便不利

夢中虛驚不得安卧

附子 炮木香 煙茴香 炒川椒汗 獨活 厚朴

白术 炒 吴茱萸 炒 桂心 酒一澤瀉半兩 肉果 煙

檳榔錢五

為末糊丸梧子大每服五十丸

荔枝湯下一日三服先便旋利如傾次乃腫潰
喘止此藥能助真火以養真土運樞機禁慾
絕鹽半年乃不再作

當歸散 治同前

川歸 赤芍藥 牡丹皮 白术 赤茯苓

陳皮

枳榔

木香

桂心

木通

各半分

脚膝頭面腫大小便不快每服二錢水一鍾
紫蘿葉二片木爪一片同煎八分溫服日三
服稍覺愈只早晚服二次但覺氣下小便長
是効 腸虛去枳榔 脣凸加大腹皮猪苓
各一兩 忌鷄魚肉酸鹹之物及海味

大半夏湯 治土不能制水水漬于腸胃溢于皮

膚癰、有聲怔忡喘息名曰水脹

橘紅 半夏 茯苓 甘草 桔梗 檳榔

等分每服五錢姜三片水煎服

赤茯苓丸 治同上

木香 五錢 善草歷炒四兩 防已 二兩 赤茯苓 二兩

為末棗肉丸梧子大每服三十丸桑皮湯下

人參 茅蘆丸 治一切水腫及喘滿不可當者

人參 一兩 善草歷炒四

為末棗肉丸梧子大每三十丸桑白皮湯下

神秘湯 治水氣上乘于肺肺得水而浮水腫不
卧臣則喘

白茯苓 木香鑠五葉白皮 紫蘿葉陳皮

人參錢七姜七片水三鍾煎鍾半食後分五服

無礙丸 治脾病橫流四肢腫滿

木香醉蓬木炮三稜炮梅榔 郁李仁炮去皮各一兩

大腹皮 二兩為末麥芽麵糊為丸梧子大每服

三十丸生姜湯吞下

香薷散 治水氣虛腫小便赤澁

陳皮去白防已

木通

紫蘇葉錢五

右為末每服二錢姜三片水煎食前服

小葷蕩丸

治腫滿腹大四肢枯瘦小便澁濁

甜葷歷炒

薑菜根等分研蜜丸彈子大每服一

丸陳皮湯嚼下只三丸小便清數病愈

牡蠣澤瀉散

治脾胃氣虛不能約制腎水水溢

下焦腰以下腫

牡蠣

炒澤瀉

蜀葵

腥

去

草薢炒

爪萎根

白商陸根

海藻洗等分為末白湯調服方寸

七 小便利止後服

鍊鑿飲子

治水氣遍身浮腫喘呼氣急煩渴大

小便不利服熱藥不得者

澤瀉

赤小豆

白商陸

大腹皮

茯苓皮

羌活

椒目

木通

秦艽

檳榔等分

薑五片水煎服

大橘皮湯

治濕熱內攻腹脹水腫小便不利大

便滑泄

陳皮半

兩木香二錢滑石六錢

檳榔錢茯苓一兩

一兩

猪苓 白术 澤瀉 肉桂各五 甘草三錢

生姜五片水煎服

實脾散

厚朴 白朮 木瓜 附子炮 木香 茯苓

大腹子 草果仁 乾姜各一 甘草錢五

姜五片棗一枚水煎服

加味枳朮湯 治氣為痰飲所膈心下堅脹名曰

氣分○枳殼

白朮 陳皮

檳榔

桔梗

木香

桂 紫蘿梗葉

五靈脂

炒各二分半夏

茯苓

甘草各一
分半

姜三片水煎服

調榮散

治瘀血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名

曰血分

細辛

莪朶

桂

赤芍

川歸

川芎

玄胡索

白芷

大腹皮

桑白皮

檳榔

瞿麥穗

陳皮

赤茯苓

葶藶炒

大黃

一錢各半

甘草

各半

每服五錢

姜棗煎食前眼

大荳湯

治風水通身腫百節痛惡風自汗眼合不得短氣欲絕其脉浮

大荳

杏仁去皮炒

麻黃

防風

防已

豬苓

酪 四澤鴻

黃芪

烏頭

炮

各

半夏

茯苓

白木酪

五

甘遂

炒

甘艸

炙

各

姜七片

水二鍾酒半鍾煎一鍾服以大小便利為度

如不利加生大戟五莖歷炒

兩

香

無不利矣

內甘遂甘草本相反故用之以成功屢試屢

効非泛常所可測也

澤漆湯

治石水四肢瘦腹腫不喘其脉沉

澤漆洗去腥

桑白皮

六兩

射干米泔水

黃芩

茯苓

白术

四

澤鴻

防已

各二

每服五錢水三鍾先用黑豆一合煎至二鍾

入藥同煎七分空心食前服一日三次

附子菉豆湯

治寒客皮膚殼然而堅腹大身

腫按之陷而不起色不變病名膚脹一劑未知

大附子

大者一

枚

菉豆

二兩

生姜切

水二鍾煎一鍾分三服空心午晚各一服

芩歷防已丸

治面目浮腫肺氣喘咳不安赤瀉便

防已一兩

木通

芩歷

杏仁

去皮尖貝母

各煨

兩右為末棗肉丸梧子大每服五十丸食遠服

桑白皮煎湯送下

酒腫丸 治酒腫及脾虛發腫

蘿蔔 十枚 皂角 五枚 二味用水煮乾去皂角將

蘿蔔搗爛蒸餅糊為丸 芝實大蘿蔔煎湯如意送下

犀角湯 治結陽症四肢腫滿熱菀不散或毒攻注

犀角 玄參 連翹 柴胡 各五分 麻木通

錢一錢 沉香 射干 甘草 炙各七分 芒硝三錢

麥門冬 三錢 分二服水煎

消腫湯 治水腫喘滿大小便不利

白朮 山梔子 赤芍芩 蘿蔔子 錄三毫釐

椒目 蘿子 錄一沉香 分三木香 五分 水煎服

又方 繼前服已上二方神効

草歷二錢 椒目一錢 猪苓半錢 泽瀉八分

葱白三根 水煎吞牛膝末為丸 則大小便俱通

二奇方

白朮 五錢 滑石 三錢 水煎服七服全愈

白朮芩湯 治水腫 開鬼門潔淨府 机要方

白茯苓

澤瀉 酥

二郁李仁 五錢

水煎臨服

入生姜自然汁服

或作粥飯或和麵作糲

食之五七日後俟脹下乃與白朮散

又方

大田螺大蒜生車前草和研為膏作大餅

敷于臍上少頃水從小便出數日愈

病機白朮散

服前白茯苓湯利後以此補之

白朮

澤瀉 鐘

五錢

為末以茯苓三錢煎湯調下

或丸服亦可每三十丸從少至多後以黃芪

建中湯之類調補

脹滿門 一名鼓脹

內經曰諸溫腫滿皆属于脾

蓋言脾虛不能運化此脹滿之所由生也

又曰濁氣在上則生脹

此清濁相干而為脹也其 中亦有寒熱之分

靈樞曰脹者皆因厥氣在下寒氣逆上榮氣留止

真邪相攻兩氣相搏合而為脹又曰內虛不足

中寒溫令人中滿又曰胃中寒則脹滿

針經云脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水為脹

也 並以脹為寒也

內經曰諸腹脹大皆属于熱

丹溪曰七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土受傷轉輸失職胃雖受谷不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞濕鬱為熱；又生溫熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似于鼓又名蠱者若重侵食有蠱之義是以脹滿為熱也

陽熱為邪則身體有熱脹滿而咽乾陰寒為邪則吐不下食脹滿而自利

又有穀脹水脹氣脹血脹不可不別

失飢傷飽痞悶停酸旦食暮不能食者是為脹脾土受湿不能制水；漬于腸胃而溢于肌膚澀；有声怔忡喘息是為水脹

七情鬱結氣道壅隔上不得降下不得升身腫大而四肢瘦削是為氣脹

煩躁漱水迷忘驚狂痛悶嘔惡虛汗厥逆小便多大便黑婦人尤多見之是為血脹

又有五臟六腑之脹

出《夷樞脹論篇全在医旨緒餘全

靈樞曰心脹煩心短氣卧不安 肺脹虛滿而喘咳 肝脹脇下滿而痛引小腹 脾脹善噦四肢煩悅體重不能勝衣臥不安 腎脹腹滿引背央、然腰髀痛 胃脹腹滿胃脘痛鼻聞焦臭防于食大便難 大腸脹腸鳴而痛澀、冬日重感于寒則餐泄不化 小腸脹小腹脹引腰而痛 脳胱脹少腹滿而氣癃 三焦脹氣滿于皮膚中輕々然而不堅 膽脹者脇下痛脹口中苦善太息

大槩有虛實之辨實者腹中常脹外堅內痛按之不陷法當竦利 虛者時脹時減虛氣留滯按之則濡法當以溫藥和之

又有五積久而成脹滿者有外感寒邪傳入于裏寒變為熱作胃實而脹滿者有痰癟久而成脹滿者治療之法在體認詳明按而治之可也久病羸乏變為脹滿喘息不得及脹脹而肌肉崩潰足脰流水唇黑缺盆平脣突背平足心滿此數者皆為五臟損敗不治之症也

陳無擇曰：脹滿皆臟氣不平，勝乘相因，為病如怒傷肝；尅脾，氣不正，必脹于胃，名曰勝尅。怒乘肺，氣不傳，必脹于大腸，名曰乘尅。

丹溪戒云：醫家不察虛實，急于作効，病者苦于脹急，喜行利藥以求通快，不知寬得一日半日，其腫愈甚，病邪深矣，真氣傷矣。

脉訣舉要曰：脹滿，脈弦，脾制于肝，洪數，熱脹遲弱，陰寒浮為虛滿，緊則中實，浮則可治，虛則危急。丹溪云：宜大補中氣，行濕，此乃脾虛之甚，必湏近。

音樂斷厚味，大劑用人參白朮佐以陳皮，茯苓、蒼朮之類。有脉實堅，人壯盛者，或可攻之，便可收補，用參朮為主。凡補氣必帶厚朴，寬滿以其味辛能散其結也。湏用姜汁製之。肥胖人初脹未久，以胃苓湯服。如面白人腹脹是氣虛，宜參朮厚朴陳皮。如瘦人腹脹是熱，宜黃連厚朴香附白芍。如因有故蓄血而腹脹者，宜抵當丸下死血。如因有食積而腹脹有熱者，用木香檳榔丸。有寒者用木香厚朴丁香砂。

仁神麴香附

如因外寒束內熱而腹脹者用

藿香麻黃升麻乾葛桂枝

因大怒而腹脹者

宜青皮陳皮香附木香梔子仁蘆薈

實者按

之堅湏下之次消之次補之虛者溫之升之補之

朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛終日急

氣血俱虛

腹脹不寬滿者食肉多用黃連一

兩阿魏半兩醋浸餌餅為丸同溫中丸白朮湯

下食肉多三補丸料內加香附半夏麴蒸餅

糊丸服

皺脹說

生生子曰脹滿之疾穀食不消小便不利腹皮脹急而光內空然如皺是矣俗知謂之皺脹不察其致之者有由也內經曰脹取三陽三陽者足太陽寒水膀胱經曰下焦溢而為水靈蘭秘曲曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣歷考三書可見小便之不利由下焦原氣虛寒以致溫氣壅遏于膚裡膜外之間不得發越勢必腫滿是腫滿之疾起于下元虛寒也若非

溫補下元則小便何能獨利且夫人之胃如釜
旣然釜底火旺則熱氣薰蒸旣炊易熟若徒有
水而無火則無氣上升物何由熟即此可以例
觀矣故治脹滿者先宜溫補下元使火氣盛而
濕氣蒸發胃中溫煖穀食易化則滿可寬矣夫
清氣既升則濁氣自降濁氣降則為小便也小
便利脹有不消乎語謂地氣上為雲天氣下為
雨惟此氣流行斯為雲為雨也今之醫者一遇
此疾則曰內經有言諸湿腫滿皆屬脾土土虛

則濕停濕停則滲透肌膚遍身腫滿不可不通
利也輒用利小便及補中之劑如五苓散胃苓
湯加木通車前子大腹皮滑石之類法未為爽
謬不然顧服之愈多而小便愈少腫脹愈急何
故哉不溫補下元而徒以通利之藥施之也果
若此豈惟不効則下元益虛真氣益弱殆期且
至安望其有瘳乎余嘗究心靈素叅會易理憬
然有得于中且施之病者隨試輒効故筆之于
冊以公我之同志

補壯原湯于後

治氣脹之劑

平肝飲子 專治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭運嘔逆脉來浮弦

防風 桂心 枳殼 赤芍 桔梗一炒各人參
甘艸 紅檳榔 當歸酒洗川芎 陳皮錢五

每服五六錢姜五片水煎服

紫蘇飲子 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉有声大小便不利脉虛緊而澀 方在痞門

調中順氣丸 治怒氣傷肝三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香 白豆仁 青皮 橘紅 三稜炮各

半夏泡大腹子

各二兩

砂仁 檳榔 沉香

各一錢

糊丸梧子大每服三十九

陳皮湯下

木香順氣湯 治濁氣在上則生腹脹及七情

陳皮 厚朴各四

川歸分草豆蔻

麴煨去皮

木香

蒼朮米泔洗各三分

青皮 益智仁

白茯苓

澤瀉

半夏泡乾生姜 吳茱萸 升麻

柴胡各二

加姜水煎服

直指橘皮湯 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿
香附米 半夏 橘紅 酥二甘草半錢

每服一兩姜五片棗二枚水煎服

四製枳殼丸 治腹脹鼓疾

陳枳殼去穰四分四製

同炒一兩乾漆一兩同炒

一兩用蒼朮一兩用

茴香一兩同炒一兩用夢葡萄子一兩同炒一兩同炒

炒枳殼黃色為度

去同炒藥只用枳壳為末却將蒼朮等四味

煎湯去渣打麵糊為丸梧子大

每服五十粒米飲湯吞下

烏藥順氣散 脹滿痞塞七情憂思所致此方如神
天台烏藥 香附 沉香 砂仁 橘紅

半夏 為末每服二錢灯心湯調

寬中八寶散 治全前方

木香 歸尾 蘿蔔子 真蘿子 檳榔

砂仁錢半沉香 牙皂錢一

共為末每服一錢或二錢黃酒調下

小水不利并水腫加苦葶苈子末一錢五分

蟻蟎後段灸末一錢入前方內

治寒脹之劑

大正氣湯 治脾胃虛寒外為風寒濕氣擾動心
腹脹滿 蕃香 厚朴 陳皮 半夏 白朮
錢各二分半 檳榔 桂枝 枳殼 乾姜 炮各一錢三分 甘草

炙五分

佐二帖

姜三片水煎服

大半夏湯 治肝氣太盛尅勝于脾；鬱不行結
聚涎沫胃中脹滿其脉弦遲

半夏 桂心

附子炮

人參 甘草 炙厚朴

兩各五分

川歸 茯苓 枳實

兩各二分

川椒

炒去汗用開口無目者八百粒

每服四五錢姜棗煎服

沉香降氣湯 治中脘脹滿時吐脇疼每噫則竢
氣快不噫則悶漸寬面浮磨檳榔入紫蘿同煎
下神保丸五七粒

香附 一兩 沉香 五分 砂仁 二錢 粉草 三錢

右為末每服一錢入鹽少許沸湯服

神保丸 治諸寒積脹滿急痛大便不利

木香 胡椒 一錢 全蝎 七個 巴豆

十粒去皮研

右為末飪餅丸麻子大硃砂為衣每服五丸

腰脇疼痛茴香酒下餘陳皮湯下、

順氣木香散 治氣不升降嘔逆惡心胸脇痞悶
脇脹滿及酒食所傷噎食吞酸心脾疼大便
不調及婦人血氣刺痛一切冷氣服此寬中利
氣和胃進食

丁皮 砂仁 良姜 桂心 乾姜 炮甘草各一
橘紅 厚朴 蒼朮 桔梗 茴香炒各三兩

每服五七錢加姜棗水煎服

草澄茄丸 治痞滿脹痛穀脹氣脹通用

草澄茄 白豆蔻 砂仁 青皮 蘿蔔子

木香各二肉豆蔻 茴香炒 丁香 桂各一

陳皮分

右為末麵糊丸梧子大陳皮湯吞下

導氣丸 治諸痞塞腹脹如鼓大便秘結等症又

腎氣小腸氣疼功效尤捷

青皮

水炒去蟄等分

同

莪朶蠶等分

同

檳榔

同炒

胡椒

去班同炒

同

三稜乾漆

同

吳茱萸

黑丑同炒

赤芍藥

川椒去班同炒

同

石菖蒲桃仁同炒

同

乾姜

硝砂

同炒去硝砂

同

大附子青鹽同炒去青鹽

同

右十味為末酒糊

為丸梧子大每服五十丸加至七十丸紫蘿
湯下

沉香飲 治腹脹氣喘坐卧不安

沉香 木香 枳殼錢五 蘿蔔子兩炒一

每服五錢姜三片水煎服

木香化滯湯 破滯氣心腹滿悶

甘草炙白檀香 蕤香 陳皮 桔梗 大腹

皮 檳榔 木香 白荳仁各二 砂仁 人參 青皮

分各四

水煎服

縮砂飲 治氣脹氣鑑等病如神

蘿蔔子汁研砂仁不拘多少以蘿蔔子汁浸透炒
乾又浸又炒不厭次多愈多愈透炒

妙為細末每服一錢米飲下

四炒丸 治年高人患鼓脹獨只腹脹肢體如柴

舉動之力 木香 檳榔各一兩

二味剉如芡實大四製

一分同炒用蘿蔔子一兩

子不用茴香一分用乾漆一兩炒深黃色去蘿蔔

分用茴香

一兩炒深黃色去茴香

一分用義

黃色去炒右只留木香檳榔為末以四味同炒

藥煎湯打糊為丸菉豆大每服七八十丸米
中滿分消湯 治中滿寒脹寒疝大小便不通陰

躁足不收四肢厥冷食入反出下虛中滿腹中寒心痞下寒沉厥奔豚

益智仁 半夏 木香 茯苓 升麻各分七錢

川烏 人參 青皮 當歸 生姜 柴胡

乾姜

黃連

草澄茄

錢五

黃芪

吳茱萸

草豆蔻

厚朴

錢五

右每服一兩水煎溫服大

忌房勞溫麵生冷

一方

有麻黃澤瀉各二錢五分黃柏五分

錢氏塌氣丸

胡椒

一兩 蝎梢半兩

為細末麵糊丸如粟米大

每服五七丸至一二十九陳米飲下

木香塌氣丸 治單腹脹

丁香

胡椒

錢二

鰐尾半兩

枳實一兩

白牽牛一

郁李仁

四錢

木香

檳榔各半

為末飯丸

豆大每服十丸至十五丸陳皮生姜湯任下

木香散 治單腹脹

木香

青皮

白朮

姜黃

草豆蔻各半

阿魏

草澄茄

錢一

右末醋糊丸菉豆大每服二十丸生姜湯下

又方 治皺氣

大癩蝦蟆一隻新瓦二片相合鐵線纏定盛在
內外用鹽泥固濟慢火煅存性為末溫酒調服
下三五錢

治熱脹之劑

中滿分消丸 治中滿皺脹氣脹大熱脹水脹

人參

白朮

姜黃

黃芩

黃連

半夏泡

枳實

炒各五錢

甘草

灸火

猪苓

各一錢

知母

炒四錢

澤鴻

橘紅

乾生姜各二錢

厚朴

姜製兩錢

知母

炒四錢

橘紅

錢三錢

右研末

苓澤鴻

生姜各為末餘共為末和

勻金餅為丸梧子大每服百丸白湯吞下
沉香交泰丸 治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而
不伸為腹脹 沉香 白朮 橘紅各三錢茯苓

澤鴻

枳實

去穰各一錢

吳茱萸

湯當歸

酒浸兩錢

厚朴

姜製五錢

木香

各一錢

大黃

酒浸一兩

青皮

去白五錢

湯浸餅為

丸梧子大每服七八十九白湯下微利即止
廣茂潰堅湯 治中滿腹脹內有積塊堅硬如石
令人坐卧不安大小便澀滯上氣喘促遍身腫
厚朴 黃芩 益智 草豆蔻 當歸各五錢 吳

茱萸

紅花

酒

升麻

廣茂鎔

二

甘草

柴胡

澤鴻

神曲

炒

陳皮

青皮

錢各

三

黃連

錢六

半夏

錢每服七錢

姜三片

水煎服

渴者加葛根錢四

雞屎

醴飲

治鼓脹旦食暮不能食痞滿壅塞

雄雞屎

乾一月取晒兩

川芎

一兩

二味各為極細末

和勻麵糊丸梧子大

每服五十丸溫酒下

推氣丸

治三焦痞塞氣不能降胸脇脹滿大便

又方 加大黃

兩每服二錢

姜湯下

秘小便亦

陳皮

檳榔

枳實

黃芩

大黃

黑丑分等

為末蜜丸梧子大每服五

七十丸臨睡白湯下

大異香散

治穀脹失飢傷飽痞悶停酸早食暮

不能食

陳皮 青皮 京三稜 義术 益

智仁 香附子

藿香 半夏曲

桔梗

錢各五

枳殼

五錢甘草分三

每服五六錢姜棗煎服

木香分氣丸

善治脾胃不和心腹脹滿兩脇脹

脇胸膈注滿痰嗽喘急刺心乾嘔咽喉不利飲

食不化並皆治之亦治穀脹

木香 檳榔 青皮 義木 煥當歸 姜黃

白朮 枳殼 燉橘紅 肉果 乾生姜 玄胡

索 京三稜 煥 赤茯苓 秋冬加丁香 炒

各等分為末麵糊丸小豆大每服三五十丸

生姜湯下 忌生冷茄子馬齒莧

補下元之劑

壯原湯 治下焦虛寒中滿腫脹小水不利上氣

喘急陰囊兩腿皆腫或面白有浮氣

人參 白朮錢二 索苓 破故紙錢一 桂心

大附子 乾姜 砂仁各五 陳皮 七分

水煎食遠服 有痰加半夏錢一 喉中痰声

加桑白皮錢一 咳嗽亦加 脚趺面腫加薏苡

仁錢二 中氣不轉運不知餓加厚朴木香

氣鬱不舒加沉香烏藥臨服磨入 氣虛甚

者人參加作五錢大附子加作一錢半 汗

多者再加桂枝五分白芍藥酒炒過八分

若夏月喘乏無力或汙多者加麥門冬一錢

五味子十一粒 夜夢不安者加遠志一錢

兩脇氣硬加白芥子八分若面浮腫脇下氣
硬加白芥子紫蘿子五分若身重不能轉
動加蒼朮一錢澤瀉七分溫盛加桑白皮

赤小草

治血脹

人參芎歸湯 治小便多大便黑痛悶喘惡血名曰
當歸 半夏分川芎一義木 煙甘草灸木香
砂仁 烏藥各五分 人參 桂 五靈脂一分
每服三五錢紫蘿葉四姜片五棗一枚水煎服

一方 治血皺腹脹如盆

三稜 煥 羞木 乾漆炒烟牛膝去芦酒洗蜜蠟糯米
琥珀 肉桂 硬砂 水蛭炒赤石灰大黃各等分

為末用生地黃自然汁和米醋調勻為丸梧
子大每服十丸空心溫酒下童便下亦可
鷄屎醴散 治旦食暮不能食血脹痞滿

大黃 桃仁去皮尖乾鷄屎醴等分

為末每服一錢生姜三片煎調食後臨睡服
治積塊不消發為脹滿之劑

治五蠱脹丸 忌鹽四十日

官桂

歸尾

檳榔

橘紅

枳壳

炒義木

三稜

炒大黃

酒煮

青皮

黑丑

君白

商陸

芫花

君大戟

甘遂

去心包煮

麵

赤小豆

椒目

木香

砂仁

乾漆

炒盡君

枳實

炒

醋糊為丸

梧子大初服三日每服九十丸過三日服八十九丸又過三日服七十九丸每用葱七根煎湯送下空心服以行四五次為度行後以溫粥補之不行而吐者亦妙次用補法

補方

青皮

桔梗

義木

三稜

枳實

枳壳

木香

砂仁

茯苓

檳榔

陳皮

芍藥

細辛

歸尾

人參

香附

等分

每服

四五錢水煎服須要過四五十日後

方許食鹽醬

食鹽用藥法

鯽魚去腸將五苓散末入魚腹中焙乾為末白

湯調服方許食鹽

已上三方乃一宗方極

峻利非積固體厚者未敢謾試

始錄此以備參考

溫白丸

治心腹積聚心下堅結大如杯碗傍攻

兩脇心痛食不消化

桔梗 柴胡 菖蒲 紫苑 黃連 乾姜

桂皮 茯苓 川椒 吳茱萸 巴豆膜去皮心油

炒人參 厚朴各五錢 川烏炮二兩 皂莢去皮子炙五錢

右為末入巴霜和勻煉蜜為丸梧子大每服卅丸紫蘇湯下取下積滯如魚腦爛綿而安小檳榔丸 治脾虛腹脹不進飲食快氣寬中
蔓葡萄炒 檳榔 煨 黑丑炒 木香各五錢

為末麵糊丸梧子大每服三四十丸姜湯下

治蠱脹將愈內有痞塊用此消之

青皮 枳壳 三稜 義术 蒼朮 厚朴

桂皮 香附各一 砂仁 草果 針砂 白芷各五錢

錢烏藥 乾漆 乾姜各一 酸尾半兩 檳榔一

木香二錢半 阿魏錢 一方有录礬斤 陳皮一

為末棗肉丸梧子大每空心好酒吞下五十丸漸加至二錢

治脾虛之劑

強中湯 治啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成腹脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

乾姜炮白术各二青皮去人參丁香各三草

果仁附子泡去皮厚朴姜製甘草錢五

每服四五錢姜棗煎服嘔者加半夏

如食麵脹滿加蘿蔔子錢各五

溫胃湯治憂思鬱結脾肺氣凝大腸與胃氣不

平脹滿冲咳食不得下脉虛而緊濇附子炮

歸尾厚朴生人參陳皮白芍甘草各

一乾姜兩二錢半川椒半錢每服五六錢水煎服

草荳蔻湯治腹中虛脹

澤瀉分木香分神曲四半夏枳實益智

草豆蔻黃芪春夏甘草各五青皮陳皮各

分茯苓當歸各七

生姜三片水煎服冬再加黃芪五

通氣生姜丸治三焦虛脹

人參茯苓神曲炒麥芽炒各官桂歸尾

陳皮炒六半夏洗一生姜去皮切厚朴六

右為末以生姜汁煮麵糊為丸梧子大每服三十丸空心食前米飲下

治脹而喘嗽之劑

定喘葶苈丸 治鼓脹喘嗽

葶苈 木香 貝母 等分

為末飪餅糊丸梧子大硃砂為衣煎桑白皮湯下或即以四味為末仍以桑白皮湯下妙

附雜方

敷藥 治腹硬如石或陰囊腫大先用熟水嚼甘草後以藥敷肚上 大戟 芫花 甘遂

海藻等為末醋調塗或用白麵調藥敷肚上

慰法 治腹脹如鼓澑如木皮樣

杜烏藥

并荆芥

蒼朮

茵草

山茵陳

二

桑沙

松毛

橘葉

椒目

烏頭

赤豆

樹葉

葛

各等分作二次炒熟以布袋盛

熨之冷又炒熨三四十度或復用煎水薰洗或服神保丸微溏泄其氣

獨聖散

治脾胃不足過食生冷心腹痛脹

鹽

五合

以水一升煎化頓服自然吐即定

食麵多腹中飽脹以熱酒和生姜汁飲一二盃即消

桂香丸 治大人小兒過食雜菓腹脹氣急

肉桂一兩 不覲少射香另研

為末飯丸菉豆大小

兒七丸大人十五丸白湯下二三服神效

西來方 治腹中積塊作脹作痛大小便不利

硼砂二錢 善草菔子 海金沙一錢
各錢半 乳香半錢

沒藥 半錢 牙皂半錢 檳榔 三稜各二錢

木香錢 仁為末每服五分滾水調下

蟲蠶

生生子曰按皯症內經靈樞水脹篇只有水與膚

張鼓張腸覃石瘕石水六者又脹論篇載五臟六腑皆有脹狀甚著後代諸書論脹鮮有發明予在吳下時有同志友吳生諱震號九宜者博雅君子也每與予討論多善予一日偶談及皯脹乃詰予曰皯有蟲否乎予卒不敢應俛思久之對曰或有之當以疑辭對者蓋以目未見而書無考也按許學士本事方云臍腹四肢悉腫者為水但只腹脹而四肢不甚腫者為蠶註謂蠶即皯脹也由是參之古人曾以蠶皯同名矣

且蠭以三虫為首豈無旨哉愚謂皯脹即今云氣虛中滿是也以其外堅中空腹皮絅急有似于皯故以皯脹名也彼蠭症者中實有物積聚已久濕熑生虫理或有之吳生曰子質何其敏也予堂嫂病皯三載腹大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳名劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火灸燒至腹忽响聲如炮人皆駭然乃見虫從腹中炮出高二三丈許燒所之天為昏俄而墜地細視之皆蛔也不下千萬數大者長尺餘虫腹中

復生小虫多者十五六條或十數條或五六條虫在人腹中蓄息若此曷不令人脹哉區々藥劑豈易瘳哉顧蠭以多虫為首于義始見許之以蠭名皯者旨可徵矣惜乎諸書未有言及子既為後人立言幸繹數方以備後之治皯疾者知有此蠭字義也予聞之恍然如夢始覺然猶未親見其異也歲萬曆癸巳赴督漕理刑吳比部之召而至淮陰有王鄉宦者其子年十六新娶後腹脹大按之有塊形如稍瓜四肢瘦削發

熱晝夜不退已年半矣族醫惟以退熱消脹之劑投之其脹愈大其熱愈熾甚且喉中兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其腹則疼又多嗜肥甘余思諸凡腹疼者唇色淡不嗜飲食今若此得非虫乎投以阿魏積塊丸服之果下虫數十大者二一紅一黑長尺餘虫身紅線自首貫尾虫腹中有虫大者數條小者亦三四條虫下則熱漸減脹漸消三下而愈此余所親治者益信前聞之不虛也世之奇症書所未載者

大率類此胡可以未聞未見者而輕議之也余因紀其聞見贅其方于皰症之末

治虫蠱之劑

八毒赤丸 治男婦染着神鬼謂之鬼疰病服之甚効治虫積蠱脹如神 雄黃另研礞石 破砂
研牡丹皮 附子炮藜芦 巴豆各一兩 蟠蚣条
右為末煉蜜丸如小豆大每服五七丸至十丸冷水送下無時昔有副使許可道至雄州請醫看脉乍大乍小乍短乍長氣血不均邪

氣傷正本官說去路至邯鄲驛中夜夢一婦人著青衣不見面用手于脇下打了一拳遂一點痛往來不止寒熱不食乃鬼驚也可服八毒赤丸本官言讀名醫錄中看李子豫八毒赤丸為殺鬼丸子遂與藥三粒臨卧服明日下清水二斗立効製藥時宜志誠齋戒

紫金丹 治虫蠱并虫積

大黃 檳榔各三錢 菖蒲根皮二兩各半 貫仲 牙皂 香附
各三錢 雷丸 黑丑各二兩 史君子一兩 半 白

蕪荑 峩練根皮二兩各半 右為末每服三錢五更時沙糖湯調服至天明下虫積不問黃腫皰
脹心痛一服即効 小兒減半看大小輕重

又方 治全

黑丑 五灵脂熬酒 檳榔各五錢 大黃一兩 阿魏二錢
桃仁去皮尖研如泥不拘分兩但可丸為率

右為末以桃仁膏為丸梧子大每服二錢白湯送下

積塊丸

治癥瘕積聚癥塊一應難消難化腹中飽脹或
血積疼痛皆能取効若神不傷元氣

京三稜

義木各用

蛇含石各燒

木香一錢 雄黃 錦蛇全用
紅醋淬七錢 蟠蛇全用
次二錢 鐵華粉用
半錢 煙燶各辰砂八分

阿魏 全蝎洗全用
乾各四錢 炒一錢 芦會
沉香八分 天竺黃

右為極細末用雄黃研為丸黑狗胆汁
丸妙丸如梧桐子大或服七八分重者一錢
五更酒送下塊消即止不必盡劑

痞氣門

內經曰太陰所至為積飲痞隔
痞者心下痞滿而不能食也

仲景云滿而不痛為痞滿而痛為結胸

劉河間曰痞與否同不通泰也謂精神營衛血氣
津液出入流行之紋理閉塞而為痞也

東垣曰脾無積血不痞夫痞者心下滿而不痛是
也太陰者濕土也主壅塞乃土来心下為痞滿
也傷寒下太早亦為痞乃因寒傷其營氣者血

也心主血邪入于本故為心下痞悶仲景立瀉心湯數方皆用黃連以瀉心下之土邪其効如响應桴故活人書云審知是痞先用桔梗枳殼湯非以此專治痞也蓋因先從錯下必成痞症是邪氣將陷而欲過胸中故先用截散其邪氣使不致于痞先之一字早用之義也若已成痞而用之則失之晚矣不惟不能消痞而反損胸中之正氣則當以仲景痞藥治之經云察其邪氣所在而調治之正謂此也非止傷寒如此至

于酒積雜病下之太過亦作痞蓋下多亡陰亡陰者謂脾胃水穀之陰亡也故胸中之氣因虛下陷于心之分野故至心下痞宜升胃氣以血藥薰之若全用氣藥導之則其痞益甚甚而復下之氣愈下降必變為中滿鼓脹皆非其治也又有虛實之殊如實痞大便閉者厚朴枳實湯主之虛痞大便利者白芍陳皮湯主之如飲食所傷痞悶者當消導之去其胸中窒塞上逆兀兀欲吐者則吐之所謂在上者因而越之是也

王海藏曰治痞獨益中州脾土以血藥薰之其法無以加矣

傷寒痞者從血中來雜病痞者亦從血中來雖俱為血症大抵傷寒之症從外至內從有形至無形故無形氣症以苦泄之有形血症以辛甘散之中滿者勿食甘不滿者復當食也中滿者腹脹也如自覺滿而外無腹脹之形即非中滿乃不滿也不滿者病也當以甘治之可也

綱目云無形氣症以苦泄之者枳實黃連之類是

也有形血症以辛甘散之者仲景人參湯之類
是也劉宗厚曰痞之為病由陰伏陽蓄氣血不運而成虛心下位中央膜滿痞塞皆土之病也與脹滿有輕重之分痞則內覺痞悶而外無脹急之形脹滿則外有形也前人所論皆指悶下而致之亦有不因悶下而然者如中氣虛弱不能運化精微則為痞飲食痰積不能施化則為痞濕熱太盛土乘心下則為痞既痞與湿同治惟上下分消其氣如果有內實之症庶可畧與疎導世

人痞塞喜行利藥以求速効暫時通快痞若再作益以滋甚是不察夫下多亡陰之意也

統旨曰痞有虛實之殊而又有濕有熱有痰有鬱有風寒不消有脾胃虛弱有飲食過傷者當有所因而分治之如實痞大便閉以黃連枳實厚朴苦以泄之虛痞大便利以芍藥陳皮酸以收滑石澤鴻以滲之鬱者則流滯不通食難消化之溫者四肢困重小便短少宜蒼朮茯苓半夏宜撫芎香附蒼朮枳實以開之熱則煩渴溺赤

用黃連黃芩葛根升麻以發之便結者即而利之痰則胸中窒塞用半夏瓜萎枳實黃連以豁之欲吐者因而越之飲食後因冒風不消而痞宜吳茱萸砂仁草豆蔻藿香溫以化之脾胃弱而轉運不調為痞宜四君子湯等甘以補之飲食過傷則腹飽爰氣而致痞塞者又當以青皮枳實厚朴山楂麴蘖以消導之至于痰挾血成窠囊而痞者用桃仁紅花香附大黃之類若脉右閔多弦弦而遲者必心下堅此肝木克脾土

欝結涎閉于臟腑氣不舒則痞木香順氣湯如
下多則亡陰而痞者四物加參苓白朮升麻柴
胡少佐以陳皮枳殼監制或大病後元氣未復
而痞補中益氣湯加陳皮凡此痞滿不可執全
在活法詳脉證虛實而治之也

劉河間曰三陰三陽之標本治各不同有用寒藥
而為熱痞大黃黃連之類也有用寒熱藥者陰
與陽不和而痞大黃黃連加附子之類也有用
辛熱藥多而寒藥少者陰盛陽虛而痞半夏生

薑甘草瀉心三方之類瀉心湯者非瀉心火之
熱乃瀉心下之痞也通而論之其藥陽多而陰
少蓋病發于陰而得之有大黃黃連瀉心湯獨
為陰心下痞而脉疾一証桂枝後用從太陽浮
弱所變餘皆陰陽雜用

直格云傷寒裏之陰分已受熱邪是病發于陰也
或熱微而下証未全誤下之早則裏熱除去表
熱乘虛入裡而作痞也故仲景攻痞多用大黃
黃連黃芩寒藥爾後或加附子乾姜之類者是

以辛熱佐其寒藥欲令開發痞之怫熱結滯也
非攻寒耳

劉宗厚曰河間論瀉心湯分陰陽寒熱多少而用藥可謂詳切矣而此論則專主於熱二者似乎不同要之各有所當蓋直格是言其受病之本河間是論其用藥之標若以為痞有陰寒之症耶則仲景瀉心五方何皆用黃芩黃連之藥若以為痞無陰陽之異耶何瀉心湯又有兼用附子乾姜半夏生姜之類者也一言其本標而已

治熱之劑

仲景大黃、連瀉心湯 治心下痞按之濡其脉
閑上浮或寸沉閑浮而有熱者

大黃二兩黃連一兩

右剉以麻沸湯漬之須臾絞去渣分溫再服

劉宗厚云此少陰經藥也出陽明例成無已
云大黃、連以導瀉心下之虛熱以麻沸湯
漬服者取其氣薄而泄虛熱也又按伊尹湯
液論大黃、連黃芩湯共三味今監本無黃
芩脫落之也又保命集
無黃芩加甘草乙兩

散寒瀉熱之劑

仲景附子鴻心湯 治心下痞而復惡寒汗出脉沉遲也

大黃二兩

黃連

黃芩

附子

一枝

炮去皮

別取汁

右剉以麻沸湯浸之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

半夏鴻心湯

治汗下後身寒痞滿而嘔飲食不下

脈微按之不痛非柴胡症

半夏泡半升

黃芩

乾姜

人參

附子

三枝

黃連

一兩

大棗一枚

甘草

附子

右七味以水一斗煮取六升去渣再煮取三升溫分三次服

生姜鴻心湯 治汗下後胃中不和乾噫食臭自利腸鳴腸下有水氣而心下痞滿

即半夏鴻心湯加生姜四兩

乾姜只用乙兩

甘草鴻心湯 治下之後腹中雷鳴心下痞硬再下之痞益甚此非結熱以胃中虛客氣上逆也即半夏鴻心湯去人參甘草加作四兩

劉宗厚云以上諸鴻心湯元戎云手少陰藥以其心下痞故入陽明例况服梔子黃芩黃柏

大黃為上下通經之
劑安得不例陽明乎

秘藏大消痞丸 治一切心下痞悶及積年久不

愈者 黃連 炒黃芩 各六錢 姜黃 白朮各一錢

甘草 炙砂仁 乾生姜 神曲 炒人參各一錢

枳實 炒橘紅各五錢 濤鴻三錢 厚朴 製二錢

半夏 錢四錢 右為末餅糊為丸梧桐子大每五

十九漸加至百丸白湯送下

枳實消痞丸 治右關脉浮弦心下虛痞惡食懶

倦開胃進食

枳實 黃連各五錢 乾生姜 二錢 厚朴 製四錢 人參

白朮 半夏麵 甘草 炙各三錢 袋芩 二錢 大麥麵 二錢

右為末餅糊丸梧桐子大每服五六十九

白湯送下失笑丸少

劉宗厚云以上二方並半夏鴻心湯加減法也內有枳實湯四君子五苓平胃等利溫消痞之藥也

溫中散飲之劑

枳實理中丸 治中脘痞滯氣不宣通積寒停飲食不消化

人參 乾姜炮 白朮 枳實 甘草炙各一兩

右為末煉蜜丸如鷄子黃大每服一丸細嚼白湯下或沸湯化下活人書有茯苓

理氣之劑

活人桔梗枳殼湯 治傷寒痞氣胸滿欲絕

桔梗

枳殼去穰炒各三兩

右剉水煎分作二服

此云活人用此非治痞也。活人書云審知是痞先用桔梗行氣下膈故効海藏氣將陷于胸中故先用此使不致于痞也。若已成痞復而用之則失之晚而冒中之氣愈痞矣。先之一字預早之意也。

宣明檳榔散 治傷寒陰証下後成痞滿而不痛

按之虛軟

檳榔

枳殼等分

為末每服三錢煎黃連湯調下

寶鑑三脘痞氣丸 治三焦痞滯水飲停積脇下

虛滿

木香 白豆仁 青皮炒

京三稜炮

半夏

橘紅

檳榔

砂仁 沉香各五錢

大腹皮

一為末麵糊丸梧桐子大每服五六

十九食後陳皮湯送下

東垣木香消痞丸 治因憂思氣結中脘腹皮厚

微痛心下痞滿不思飲食

木香 紅花 乾姜 錄五 柴胡 錄四 橘紅 錄三 當歸

尾錢 半夏 甘草 炙各一兩

為末餌餅糊丸菉豆大白湯送下七八十九
七氣湯 治憂思鬱結心腹悶 方見氣門

薰治濕熱之劑

東垣黃連消痞丸 治心下痞滿壅塞不散煩熱
喘促不寧

黃連 黃芩 澤瀉 酸枳實炒半夏 錄七 乾

姜錢 白朮 茯苓 甘草 炙各一錢 姜黃 錄一錢 猪苓

右為末餌餅糊為丸梧桐子大每服五七十
丸食前白湯下

蘿橘飲 治氣壅發虛浮腫甚効

陳紫蘿葉 錄四 全陳皮 二片 砂仁 六枚 甘草 六寸

生姜 十片 藕 五個

右水煎服

紫蘿飲子 治憂思傷脾心腹膨脹喘促胸滿腸
鳴氣走滌；有聲大小便不利脉虛緊而濇

蘆子一兩 木通 半夏 厚朴 木香 草果

陳皮 枳實 人參 白朮 粉草 大腹皮
錢各五 每服五錢姜棗煎服

陳橘皮散 治腹內諸痞脹

橘紅 紫蘓 大腹皮略乙 漢防已錢木香五

檳榔 木通 赤茯苓各三

每服五錢加姜煎服

雜治

東垣木香消痞湯 治因憂氣鬱結中脘腹皮急

微疼心下痞滿不思飲食：亦不化常覺痞悶

柴胡 木香各七半夏 生姜 枳實各二

陳皮八甘草分五歸尾二錢

草豆仁一錢紅花少許

水煎食前熱服忌酒麵等物

王海藏云少陰下痢面赤心下痞瀉心湯加減例

易老單用黃連瀉心湯用錢氏法後隨証加減

煩者加山梔 躁者加香豉 嘔加半夏 滿

加枳實厚朴 腹疼加芍藥 脉遲加附子

下焦寒加乾姜 大便硬加大黃 如用姜附

先煎令熟使熱不僭後加黃連同用

內傷之劑

枳木丸 治痞消食強胃

枳實去穰麸炒黃色二兩 白木二兩

為丸梧桐子大每服五十九

橘紅枳木丸 治老而元氣虛弱飲食不消臟腑

不調心下痞悶 前方加橘紅一兩

古庵橘連枳木丸 補脾和胃瀉火消痰

即前方再加姜炒黃連一兩

平補之劑

平補枳木丸 調中補氣血消痞清熱

白术三

白芍

酒炒一兩半

陳皮

枳實去穰

黃連

姜

炒各人參一兩

木香錢五

右為末

荷葉打米糊

丸梧桐子大每服六七十丸米飲下

古庵云自木補脾氣為君白芍藥補脾血為臣陳皮以和胃枳實消痞黃連清熱為佐人參以補元氣木香以調諸氣為使如此平補氣血均去痰火兼通氣道則病邪日消而脾胃壯矣

丹溪云心下痞須用枳實黃連

此亦是苦以泄之

王著
卷之二
七

攻補兼施之劑

東垣黃芪補中湯 脾虛不能滲濕內痞外浮

人參八分 黃芪 甘草 白朮 茯朮 陳皮 各

分茯苓 猪苓 澤鴻洛各三

水煎溫服送下大消痞丸

補中益氣湯 治中氣虛心下痞

脈緩有痰而痞加半夏黃連 脉弦四肢滿閉便難心下痞加柴胡黃連甘草 大便秘燥加黃連桃仁少加大黃歸身 心下痞悶者加白

芍藥黃連 心下痞腹脹加五味子白芍藥砂

仁 天寒月加乾姜或肉桂 心下痞中寒者

加附子黃連 心下痞嘔逆者加黃連生姜陳

皮假如冬月再加黃連入丁香藿香葉 能食

而心下痞加黃連五分枳實三錢 如不食心

下痞者勿加止照本方服之 食已而心下痞

別服橘皮枳木丸

一 治痰之劑

濟生瓜萎實丸 治胸膈痞痛徹背脇脹喘急妨

閑

瓜萎實研枳實去麸炒半夏 桔梗各等

為末姜汁打糊為丸梧子大每服五七十丸

食後淡姜湯下

按此方瓜萎以潤肺降痰枳壳破滯氣半夏
豁痰燥濕桔梗開膈載藥可謂善治痞悶喘
急矣然痰因火動者加黃連尤妙

蓋黃連佐枳壳消痞甚速

五卷終

赤水玄珠第六卷目錄

吐酸門

論吐酸屬熱

辨素問東垣

論酸不同

停飲

論雜病吐酸

與病机外邪不同

痰飲門

怔忡驚悸門

心澹澹動門

怒門

善太息