


婦人大全良方



十五十八

共八



新編婦

人大全良方卷之十五

婦人經水不調

草果婦 妊娠泄瀉方論第一凡三

論曰凡妊娠泄瀉冷熱不同水瀉青白或黃白或

水穀不化腹痛腸鳴其脈弱而緊此內傷冷也謂

之洞泄寒中若泄注如水深黃色及有完穀小便

赤腹脹滿煩躁喜飲時時嘔逆或下利清水或

小便不利得熱則極脈虛大而數由氣虛熱入於

胃溼滲下焦津液不分併於大腸謂之快熱利先

以五苓散利小便次以黃連阿膠圓或三黃熟艾

湯凡泄瀉色黃而有沫腸鳴腹脹滿微痛其脈沉

緊而小數謂之冷熱不調宜戊己丸和之凡暴下

或青或白水穀或化或不化腹脹或不脹或



痛或不痛但謁生熱氣全不思食其脈內虛外實  
右關脈沉緊者謂之殮泄先去沉積宜感應圖後  
調和之凡治瀉先須理中焦如理中湯元是也  
次即分利水穀如五苓散是也治中不效然後漸  
下即用禹餘糧赤石脂是也亦可就第八卷第  
八論選方通用  
厚朴圓治妊娠洞泄寒中論選方通用  
乾姜  
厚朴去粗皮  
右等分先杵令爛水拌同炒令乾再為末水煮  
麩糊為圓如梧桐子大每服五十圓食前米飲  
下  
草果散治妊娠藏氣本虛宿扶風冷脾胃久弱藏  
府虛滑臍腹痛日夜無度

厚朴浸去粗皮 姜汁  
草菓炒黃二兩  
草豆蔻一個

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去  
滓熱服

三黃熟艾湯方凡第  
卷第十論

理中圓 理中湯 五苓散 黃連阿膠圓

戊己圓 感應圖 己上並見和劑局方大鼎  
妊娠下痢赤白黃水方論第二凡第  
五方

論曰夫妊娠之人胞血既閉臟氣不理脾胃日易傷  
或恣食腥肥生冷脾胃停滯不能尅化冷熱相搏  
致令心腹攪刺疼痛膿血赤白雜下古書所謂滯  
下是也原疾之由皆因冷熱不調大腸虛冷熱氣



客於腸間熱氣乘之則赤冷氣乘之則白冷熱相  
交則赤白相雜而運滯水止名為滯痢也其狀如  
膿如涕而有血雜亦有血少者如白膿涕而有赤  
脈如魚腦此名魚腦痢又有血痢者熱乘血入於  
大腸為血痢也血之隨氣外行經絡內通臟腑常  
無滯積若觸冒勞動生熱熱乘血散滲入大腸腸  
虛相化故成血痢也

療妊患痢膿血狀如魚腦髓小腹絞痛難忍  
阿膠二兩 地榆二兩 酸石榴皮三兩  
薤白升切一 黃連一方是黃蘗皮  
右用水七升煎取二升溫分三服忌生冷肥膩  
療妊白膿痢腹中冷

乾姜四兩 赤石脂六兩 粳米一升  
右用水七升煎取二升溫分三服忌如前

黃連一方是 石榴皮一兩 當歸各三  
右用水六升煮取二升溫分三服忌如前

黃連八分 厚朴製 阿膠灸  
療妊腹痛下痢膿血不止

當歸各六分 艾葉各四 黃蘗各四  
乾姜五分

右為細末空心米飲調下方寸匕日三服  
療妊胎下刺痛大便白晝夜三五十行



根黃厚者蜜 大蒜煨令熟 右以根黃為末研蒜作膏為圓如梧子大空心  
粥飲下三十元日三服妙

一方不用根黃用當歸以為藥煎湯吞下  
療妊婦痢黃水不絕

厚朴姜汁炙 黃連一兩 肉豆蔻五箇  
右用水二升煮取一升頓服忌如前並出產寶

文仲療妊婦下痢不止方  
黃蘗 乾姜 赤石脂各一

酸石榴皮一枚  
右細切以水八升煮取二升分三服

古今錄驗療妊婦下痢方

酸榴皮 黃芩 人參  
檉皮各四 粳米三合

右細切以水七升煮取二升分三服  
療妊婦挾熱下痢冷熱不調子金翼同

黃蓮一升 黃蘗一升 梔子仁三升  
右為末每服五錢水二錢浸三時久煮十沸頓

服 一方治中暑挾熱下痢無梔子仁用姜錢半脂煎

服 時後方療妊婦下痢赤白如魚腦腹中絞痛

阿膠炒 黃蘗 地梅 酸榴皮各三  
當歸各一



右為細末葱白粥飲調二錢

療姪娘下痢腹痛不食

甘草半兩 糯米一合 當歸炒 地榆各兩

右為散以水七升煮取二升去滓溫分三服

療姪娘下痢腹痛小便澀

糯米二合 當歸炒 黃耆各兩

右細切和停以水二盞煮取一盞二分去滓溫

藥分四服

治姪娘臨產下痢

右梔子不以多少燒存性為細末每服一大錢

空心熟水調服甚者連進四五服即止

治姪娘臟腑氣素弱頻併下利時時腹痛漸覺羸

瘦面色痿黃不羨飲食

厚朴兩半 白朮 川芎

白芍藥 當歸炒 熟地黃各兩

乾姜一分 人參各兩 可子各一分

甘草

右吹咀每服四錢水一盞煮至六分溫

療姪娘下痢赤白

鳥雞子一枚 絞刺疼痛

黃丹一錢 入雞子殼內 留黃均厚

右每服二錢米飲調下一服愈者是男兩服愈



者是女

論曰夫妊娘大小便不通者由臟腑氣實而生於

熱熱者隨停之處則成病也若熱結於大腸則大

便不通結於小腸則小便不通若大小腸俱為熱

所結故煩滿而大小便皆不通也

小品療妊娘子淋大小便並不利氣急已服猪苓

散不差宜服甘遂散下之太山赤皮甘遂

右一味為末以白蜜二合和服如大豆粒多覺

心下煩得微下者日一服下之後還將猪苓散

不得下日兩服漸加至半錢以微利為度經心

錄同

猪苓散療妊娘小便澀痛兼療胎水

猪苓去五皮

右為末白湯調方寸匕加至二匕日三夜二不

差宜轉下之服前藥

古今錄驗療妊娘得病六七日以上身熱入藏大

小便不利安胎除熱葵子湯

葵子二升 滑石碎四兩

右以水五升煮取一升去滓盡服須臾當下便

愈

又方 葵子一合 川朴消二兩 至六日愈

右研每服三錢水一錢煎至六分去滓溫服

治妊娘大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食午

足煩熱



檳榔 赤茯苓 大腹皮  
木通 郁李仁 北五味  
桑寄生 甘草 苦梗  
右為粗末每服三錢水一錢煎至六分溫服  
治妊娠大小便不通熱閉心膈腹脹妨悶妨害飲食

大黃 木通 檳榔  
枳殼 大腹子 訶梨勒  
煨羊 三枚 四箇  
生

右為末以童便一盞葱白二寸同煎至六分調  
下二錢  
當歸散 治胎前諸疾或因怒中氣充子藏或充腠

脈腹急肚脹腰腹時疼可思飲食四肢浮腫氣急  
時喘大便忽難小便忽澀產門忽腫

當歸 赤茯苓 枳殼

白芍藥 川芎 川白薑  
木香 粉草

右以咀每服三大錢水一錢半姜三片煎至八  
分去滓無時溫服如稟受氣弱及南人枳殼減  
大半如氣實及北人於內加參兩服之或連日大

便秘澆加蜜同煎

初虞世治妊娠大便秘澆方

枳殼 防風 甘草  
右為細末沸湯點服一二錢空心日三



又治虛羸大便秘方 枳殼製阿膠炒等

右為細末煉蜜和劑杵二十下圓如梧子大

別研滑石末為衣溫水下二十圓半日未通

再服三十圓止於五十圓

又方 車前子一斤 大黃半斤

右為細末每服三錢空心蜜湯調下

論曰夫妊娠小便不通者由小腸有熱熱入於脬

內熱結甚者故令小便不通也若小便不通則心

脹小腹氣澁而喘急也陳無擇云凡妊娠胎滿逼

脬多致小便不利者或心腎氣不足不能便脬冷

清濁相干為諸淋病或胞系了戾小便不通名曰

轉胞又胎滿尿出不知時名曰遺尿治之各有方

古今錄驗療妊娠卒不得小便

杏仁二十箇 去皮

右一味搗圓如大豆燈心煎湯吞七粒立得利

又方 以滑石末水和泥脬下

又方 用車前草汁調滑石末塗脬肆畔方四

寸熱即易之

治妊娠卒然小便不利方 滑石末 杏仁等

右先搗杏仁令爛次入滑石末以軟飯搗和為

圓如小豆大每服二十圓白湯送下

治妊娠小便不通脬下妨悶心神煩亂

葵子研 梅白皮一切 葱白七莖



又右以水一大瓊煎取一盞三分去滓分三服  
又方用紫苑去苗為末井花水調下二錢方

苦參圓治妊娘小便難飲食如故

又方用當歸去心具母炒苦參各三

滑石半兩

右為末密圓如小豆大以米飲下二十圓不拘

時

葵子散治妊娘小便不利身重惡寒起則眩暈及  
水腫者王子亨云妊娘小便不通特避寒藥又各

茯苓湯子金葵子五兩赤茯苓三兩

右二味為末每服二錢米飲調下小便利則愈

治婦人一方無茯苓有梅白皮一兩

八味圓病飲食如故煩熱不得卧而反倚

息以脬系了戾不得溺故致此病名轉脬但利小

便則愈以此藥有茯苓故也此藥雖局中有賣

熟地黃兩山藥兩山茱萸四兩牡丹皮去心

附子炮桂心各二牡丹皮去心

茯苓去皮沢泻各三

右為末密圓如梧子大每服二十圓空心温酒

下

妊娘子淋方論第五凡五方

論曰夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則  
小便數也膀胱熱則小便行澆而數不宜妊娘之



人胞繫於腎腎間虛熱而成淋疾甚者心煩悶亂故謂之子淋也

地膚大黃湯小兒療妊娘患子淋宜下

川大黃

地膚草各三

知母

黃芩

猪苓

赤芍藥

通草

川升麻

枳實

甘草各二

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

經心錄療妊娘患子淋小便數出少或熱疼痛及

足煩

地膚草三兩

右細切水四升煮取二升半去滓分三服日三

服文仲小兒同

療妊娘患淋小便澀不利小腹水道熱痛

冬葵子一升

芍藥二兩

黃芩

赤茯苓

車前子各三

右吹咀以水七升煎至二升溫分三服

療妊娘數日小便淋澀疼痛心煩悶亂不思食

瞿麥穗

赤茯苓

桑白皮

木通

葵子各一

黃芩

芍藥

枳殼

車前子各半

右為粗末每四錢水一盞煎至六分溫服

療妊娘子淋小便澀痛

冬葵子

滑石

木通各等

十



右為末每服四錢水一盞葱白七寸煎至六分

去滓服  
猪苓散療妊娘子淋小便澀痛子母秘錄療妊娘胎水

方見本卷第三論

妊娘遺尿方第六

凡三方

白薇散療妊娘尿不知出時胎滿故也宜服

白薇

芍藥

各一兩

右為細末溫酒調二錢

又方

白礬

牡蠣

等分

右為

細末

溫酒調

二錢

亦可治

又方

用雞毛灰末之酒調方寸匕

亦見第八卷第四論

妊娘尿血方論第七 凡五方

論妊娘尿血者由勞傷經絡有熱在內熱乘於血

血得熱則流溢滲入膀胱故令尿血也

千金療妊娘卒下血及子淋方

葵子

研一升

右以水五升煮取二升分溫三服

又方

生艾葉

一升

右以酒五升煮取二升分三服

又方

生地黃

一升

右以酒四升煮取二升分溫三服亦療落身後

續斷湯治妊娘下血及尿血



當歸 生地黃 續斷 各一兩

赤芍藥 一分

右為末空心葱白煎湯調下三錢

療妊娠尿血

阿膠 熟地黃 三兩

右各等分為細末空心粥飲調二錢

產寶論曰夫妊娠胎水腫滿方論第八

不尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫

小便秘澁陳無擇云凡婦人宿有凡寒冷濕妊娠

喜脚腫俗呼為跛脚亦有通身腫滿心腹急痛名

曰胎水

論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣

安穩若中風寒邪氣及有所觸犯則隨邪而生病

也凡妊娠經血壅閉以養胎若忽然虛腫及胎中

挾水水血相搏脾胃惡濕主身之肌肉濕漬氣弱

則肌肉虛水氣流溢故令身腫滿也然其由有自

或因泄瀉下痢臟腑虛滑耗損脾胃或因寒熱虐

疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆能使頭面或手足

浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎多損壞及其

臨產日脚微腫乃胞藏水少血多水出於外故現

微腫則易生也宿有寒氣因寒冷所觸故能令腹

脹腫滿也

產乳集養子論



娠娘自三月成胎之後兩足自脚面漸腫眼膝以  
來竹步難辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於  
脚指間有黃水出者謂之子氣直至強方消此  
由婦人素有風氣或衝任經有血風未可妄投湯  
藥亦恐大段甚者慮將產之際費力有不測之憂  
故不可不治於未產之前也古方論中少有言者  
按名醫錄云宋少主元徽與徐文伯微行學鍼法  
文伯見一娠婦足腫不能行少主脉之此女形也  
文伯診之曰此男胎也在左則胎黑色少主怒欲  
破之文伯惻然曰臣請鍼之胎遂墮男形而黑色  
此娠娘足腫之說見於古者今巢氏病源中但有  
子煩之論千金并產寶方亦略言之劉禹錫續傳

廣信方以謂娠婦有水氣而成胎太平聖惠亦言之  
皆非也元豐中淮南陳景初名醫也獨有方論治  
此病方名初謂之香附散李伯時易名曰散也  
天仙藤散方

天仙藤 洗略

香附子 炒 陳皮

甘草

烏藥 不須要天台者但得

右等分淨秤為細末每服三錢水一大瓊姜三  
片木瓜三片紫蘇三葉同煎至七分放溫澄清  
空心食前服日三服小便利氣脉通體輕腫漸

消更不須多服 元豐末王荊公居金陵舉家病

居藥石切到家何所寄一初日舉旅負病煩

立生寶療娠娘身腫有水氣心腹脹滿小便少



茯苓 杏仁 檳榔 各三

旋覆花 郁李仁 各一

右為粗末以水六升煮取二升去滓分温三服

小便通即差

崔氏療妊娠體腫有水氣心腹急滿

茯苓 白木 旋覆花 各四

杏仁 黃芩 各三

右細切以水七升煮取二升半分温三服忌桃

李雀肉鮮物錄金救急同古今

療妊娠遍身洪腫

葶藶子 白木 茯苓 各三

桑白皮 郁李仁 各八

右為粗末以水六升煮取二升分温三服小便利即差

又方

澤瀉 葶藶子 白木 茯苓 各三

又方

澤瀉 枳殼 白木 茯苓 各六

右細切以水六升煮取二升分温兩服小便利即差

澤瀉散治妊娠氣壅身軀腹脹浮腫喘急大便不通小便赤澀

枳殼 桑白皮 木通 赤茯苓 等分

右吹咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去

十四



澤食前温服

防已湯治妊娠脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小  
便不利

防已 三分

桑白皮

紫蘇莖葉

赤茯苓 各一兩

木香 一分

右為粗末每服四錢水一盞姜四片煎至七分

去澤食前温服

子金鯉魚湯治妊娠腹大胎間有水氣

白木 五兩

茯苓 四兩

當歸

芍藥 各三兩

右細剉以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚  
不用每服四錢入魚汁一盞半姜七片橘皮少

許煎至七分去澤空心服集驗同

商陸赤小豆湯治妊娠手足腫滿言急

赤小豆

商陸 等分

右咬咀每服一兩用水一椀煎至七分澄清汁  
服集驗千金方有澤漆 產寶方無澤漆有桑

腎著湯治妊娠腰脚腫

茯苓

白木

乾姜

甘草 各二兩

杏仁 三兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分食前服

指迷方治胎水五皮散尋常脾虛腫滿亦治

大腹皮

桑白皮

生姜皮



茯苓皮 橘皮 各等

右咬咀每服半兩水二盞濃磨木香水一呷同

煎至八分去滓空心溫服亦治男子脾虛腫滿

一方無桑白皮有白朮倍之各白朮散

妊娠腹內鍾鳴方第九 凡一方

治孕婦腹內鍾鳴用鼠窟前後土為細末研麝香

酒調下二錢其產立愈

襲慶德孕癰方第十 凡一方

治孕癰方立効

烏藥 研出洪州軟

右用水一盞五牛皮膠一片同煎至七分溫服

妊娠不語論第十一 無方

孕婦不語非病也間有如此者不須服藥臨產月

但服保生圓四物湯之類產下便語得亦自然之

理非藥之切也醫家不說與人臨月則與尋常之

藥產後能語則以為醫之切豈其切也哉黃帝問

重身九月而瘖此為何也岐伯對曰胞之絡脈人

也帝曰何以致之岐伯曰胞之絡脈人少陰之

脈貫腎繫於腎少陰之絡脈之絕

之奈何岐伯曰無治也當十月復

經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五

味陰之五官傷在五味若妊子飲食不節生冷毒

物恣性食噉致傷脾胃故妊娠傷食最難得藥唯

此二方最穩捷 木香圓治婦人有孕傷食



木香 二錢  
三稜  
人參

白茯苓 各三錢

右為細末 麩糊圓 如綠豆大 熟水吞 三四十圓

白木散 治妊娠氣不調 和飲食易傷

白木 炒 各三錢  
白芷 各三錢  
青皮 各半錢  
甘草 一分  
川芎 一分  
乾紫蘇 各一錢  
人參 一分  
呵子皮 一分

服 愚詳小七香圓方 此局保氣散 見十六卷 豈無良

效 右為末 每服二錢 水一盞 姜三片 煎至七分 溫

服 愚詳小七香圓方 此局保氣散 見十六卷 豈無良

效 右為末 每服二錢 水一盞 姜三片 煎至七分 溫

效 右為末 每服二錢 水一盞 姜三片 煎至七分 溫

效 右為末 每服二錢 水一盞 姜三片 煎至七分 溫

妊娠臟燥悲傷方論第十三 凡一方

許學士云 卿里有一婦人 數欠無故 悲泣不止 或

謂之有崇 祈禳請禱 備至終不應 子忽憶有一證

云 婦人臟燥悲傷 欲哭家如神靈 數欠者 大棗湯

予急令治 藥盡劑而愈 古人識病製方 種種妙絕

如此 誠而後知

大棗湯 治婦人臟燥悲傷 欲哭象若神靈 數欠者

皆主之

甘草 三兩  
小麥 一升  
大棗 十枚

右 呶咀以水六升 煮取三升 去滓 分溫三服 亦

補脾氣 專治婦人方名 甘草湯

則慘生程虎卿內人黃氏 姓娠四五箇月 遇

而皆無益 僕年十四 正在齊中 習業 見伯同 說

而皆無益 僕年十四 正在齊中 習業 見伯同 說



記憶先人曾說此方者之甚喜對證笑而非大  
愈投而愈虎鄉借方者之甚喜對證笑而非大  
愈投而愈虎鄉借方者之甚喜對證笑而非大

新編婦人大全良方卷之十五

新刊婦人大全良方卷之十六  
坐月門坐月避忌產寶方周頰序第一

頰聞至靈者人最重者命人皆知命之所重而不  
知養命之方天年未終疾病攻奪嗟乎世無良醫  
著述則急難倉卒尋醫其舛誤多矣醫之中惟產  
難為急子母性命懸在片時頰勤志方書常思救  
療每覽名醫著述皆誌於心且夫男女構精陰陽  
分氣就中女弱疾狀頗多蓋其稟柔質以為人有  
血藏而抱育姓娘之內尊理有常至於飲食之間  
動靜之際尤多制忌以節性情及乎既產鮮保安  
者蓋是損觸藏府傷動筋骨將理稍失疾患便生



更值昏醫取次下藥致其所苦積漸懸危日復一日  
至至于死可不痛哉故易曰天地之大德曰生  
則知在天地之間以生育為本又豈因生產而反  
危人之命乎自惟攝理因循藥餌差謬致其產婦  
不保安全且婦人生產方二三次血氣未衰飲食  
易進但能節性則無病生縱或偶有微病不難醫  
治至於四五次迨乎七八次傷敗已深血氣衰微  
子藏虛弱穢敗內滯風邪外攻若有病生宜須審  
療醫若不子細疾便危殆此醫殺之理甚明矣且  
仕俗之家婦人產後復乳其子產既損氣已甚乳  
又傷血至深蠱命耗神莫極於此稍失常理便合  
急醫或以家貧不及厚給醫者醫者怠慢須臾困

篤吁人之生產非小事也而醫者圖財侮而致死  
此醫殺之理又明矣且夫產前產後血氣未寧一  
疾苟生而疾同作古人所以著方論於產乳者正  
在此也至若鯉魚阿膠能治胎動芎藭當歸善療  
胎痛極如胎動胎痛非一理也有因母疾而胎動  
者痛亦如此之略舉大綱蓋須知醫者之功也降  
及地黃益血生薑助氣為藥止痛黃耆補虛用之  
得聞其效如聖用之失理不如不醫乃知醫人不  
可苟作類以此病心常思著方以濟危急而學解  
不博未能自信所以偏採產術志在廣行復見外  
段產寶感子深入醫門乃大中歲相國向敏中傷  
茲婦人多患產難詢訪名醫思救人命或人舉段



相國迎召問其產乳段乃撰方三卷贄於相國相  
國重其尚要命曰產寶此方雖存得者甚少願志  
在愈疾常恨不家藏一本故輒敢序之蓋欲開其  
衆聽凡五十二篇三而七十一方兼拾晉氏之遺  
作小論三篇次於序末庶幾妊娠之家自得覽斯  
為家內明師爾時丁巳歲秋八月序  
將護孕婦論第三  
凡婦人妊娠之後以至臨月藏府壅塞關節不利  
切不可多睡須時時行步不可食粘硬難化之物  
不可飲酒不可亂服湯藥亦不可妄行針灸須  
寬神減思慮不得負重或登高涉險若偶然胎不  
安腰痛者須服安胎藥一二服得安即止周頴論

曰生產雖然觸穢排比須要在先八月一日貼產  
圖并日遊胎殺所在并借地法於妊婦房內北壁  
上仍依位設床帳厚鋪茵蓆周密使無孔竅夏月  
亦鋪厚薦用好油單薄席紗帳以備之當焚香冷  
潔淨備辦湯藥器物既覺欲產不得喧闐人力雜  
亂大小惶惶驚動產婦宜預擇年高歷練生婆一  
人并穩當曾經慣婦人一兩人扶持不得揮霍恐  
產婦憂驚又忌閑雜外人并來考穢觸之人者視  
切不可得驚動傷早若坐婆拙不能體候胎氣方轉  
動之際便為欲生多端下手驚動傷早則橫倒之  
憂從此而致也  
產寶方云妊娠欲產腹雖痛而腰不甚痛者未產



也且令扶行熟忍如行不得則凭物扶立行得又  
行或衣漿先下然後作陣若腹痛眼中如火生此  
是胎離腎經兒逼產門也即服催生藥二服即  
扶上養草切不可坐草早務要產婦用力存養調  
停亦令坐婆先說諭之如覺心中煩悶可取白蜜  
一匙用新汲水調下或覺飢即喫軟飯或粥少許  
亦須預備勿令飢渴恐產婦無力困乏也若不飢  
渴亦不須強食大凡生產自有時候不可強服催  
生滑胎等藥或因坐草早勢不獲已則服之若無  
事強腹恐憂生他疾又須戒之

凡姓娘已滿十月形體成就神識咸備分氣趨產

宜服滑胎湯藥  
滑胎枳殼散瘦胎易產胡陽公主每產累日不下  
南山道士進此方

高州枳殼二兩

粉草一兩

右為細末百沸湯點二錢服空心日三服凡懷

孕六七箇月已上服之令兒易生初生胎小微

黑百日已後因漸變白此雖孫真人滑胎易產

方然柳陽降氣為衆方之冠此方分兩出必用

方以此為正

一方枳殼六兩甘草一兩故加枳殼減甘草蓋

也末產前一兩日香茶

一方有糯米半升淘洗控乾同炒為末米飲



湯調下二錢

溫隱居加當歸木香各等分

張氏方治妊娠胎肥壅隘動止艱辛臨月服之

縮胎易產煎治腸中諸疾下氣寬亭枳殼

甘草半兩香附子三兩炒為末姜煎湯點亦可

如丈夫婦人冷氣攻刺臍肋疼痛者用葱白三

寸同煎服婦人脾寒血氣成塊作痛熱酒調

服大小便不通白牽牛為末煎湯調服

選奇方香附子枳殼各二

甘草半兩

內補圓治妊娠衝任脉虛補血安胎

熟地黃一兩當歸一兩

右為細末煉蜜圓如梧子大溫酒下三四十圓

許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋

抑陽助陰之藥甚多然胎前藥唯惡羣隊若

陰陽交錯別生他病唯是南山道士枳殼散

所以抑陽四物湯所以助陰故爾然枳殼散

差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補

圓佐之則陽不至強陰不致弱陰陽調停有

益胎嗣此前人未嘗論及也

易產滑胎方其藥性滑利小便

車前子散右為末酒調方寸匕服不能飲者水調

詩云

茶首能令婦人樂有子矣陸機注云治婦人



產難愚詳孔子序詩云樂然而生易於生育後  
人以為注喜誤矣

神寢圓瘦胎滑利易產臨入月服之極有神效知  
新州施少鄉方新州徐太丞傳

通明乳香別研枳殼一兩

右為細末煉蜜圓如梧子大空心溫酒吞下三

十圓日一服懷孕九箇月以後亦可服

六代方名落生圓乳末日酒只一

榆白皮散治妊娠滑胎易生

甘草各二兩葵子一兩

右為糊末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫

服

一方無榆白皮名葵子散

主孕九箇月將產消息

猪肚一全具

依法用葱五味煮熟食食如不盡更食以盡為

度不衍與別人食無効

保氣散安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜

偶然頓仆胎動胎痛漏胎下血煎服佛手散見方

神寢圓枳殼散見前此三藥八月內大宜常服

香附子四兩山藥二兩縮砂仁一兩

木香四錢粉草一分益智仁

紫蘇葉各半

右為細末白湯點二錢服



月空方位例第四  
惠外臺同  
太平聖  
易於生奇後

正月  
二月  
三月  
四月  
五月  
六月  
七月  
八月  
九月

十一日  
十二日  
十三日  
十四日  
十五日  
十六日  
十七日  
十八日  
十九日

己上  
在丙  
士  
在甲  
庚  
在丙  
士  
在甲  
庚

逐月安產藏衣忌向方位第五

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布大平聖惠方

云凡姓婦初八月便寫產圖一本以朱書某月某

日空貼在某位如正月在丙士可於士位安產婦

床帳兩位藏衣之類貼掛在產婦房內北壁上若

但閏月只看節氣用之又云每月產圖有雷公招

搖運鬼力士天狗軒轅大時咸池吳時豐隆白虎

大夫天候狂虎凡十三神并從月建易其位所謂

月空者按內經云月廓空無寫王冰注云論月輪

中空日也即非十三神之數今太平聖惠方以六

陽月在丙士以六陰月在甲庚正如外臺所言正

月在丁士至十二月在申庚之類其理一也但外

臺言之詳聖惠言之簡耳今人多依聖惠方者特

從其簡而已或云凡逐月安產藏衣並向月德月

空方位所有十三神殺並從節氣更換若交次月

節便作次月用書產圖者非也假如正月十四日

立春若姓娘十三日乳卧豈可作去年十二月用

也必依月多困之乃是若依節氣更換則天德月

德所在差矣然月空與士謂之中天空頗相類議



者以為天空者非十三神之數蓋課中有天乙貴  
 人其位無可與對者故此空是謂天空值此神百  
 事不恒止宜安產婦床帳藏衣之類耳集聖歷云  
 天德正月在丁二月在坤三月在壬四月在辛五  
 月在乾六月在甲七月在癸八月在艮九月在丙  
 十月在乙十一月在巽十二月在庚  
 又堪輿曆有豎年白虎殺神在太歲後一辰如大  
 歲卯則白虎在寅餘倣此推之若產及藏衣犯之  
 則子母皆不利也  
 三子亭云難產逆生論稱犯一切神殺固有是  
 理然亦有自然難產兒自逆生者及有產腸胃  
 俱下者產已則復如故此非疾病所致血氣所

主天下之理蓋有不可究詰者亦宜知之

五	四	三	二	一
坤	艮	震	巽	坎
坤	艮	震	巽	坎
坤	艮	震	巽	坎
坤	艮	震	巽	坎

凡婦人以血氣為本氣順則血順氣逆則血逆  
 理和今富貴之世往往保措產中  
 出入身坐卧皆宜  
 流暢胎不轉動  
 絕一也且如  
 甚易何候  
 則婦人惟  
 胎形已具而  
 胎氣已合  
 胎氣已合  
 胎氣已合



者以為天空者非十三神之數蓋課中有天元貴  
人其位無可與對者故曰空是謂天空值此神百

天德正月在  
日在乾六月在  
十月在乙  
又地與曆  
則子母皆不

學

北

癸	辛	丁	壬	己	癸
甲	庚	丙	庚	乙	甲
乙	丁	庚	甲	丙	乙
丙	甲	乙	丁	庚	丙
丁	乙	丙	甲	乙	丁
戊	丙	丁	乙	丙	戊
己	丁	戊	丙	丁	己
庚	戊	己	丁	戊	庚
辛	己	庚	戊	己	辛
壬	庚	辛	己	庚	壬
癸	辛	壬	庚	辛	癸

新編婦人大全良方卷之十七

產難門

立產難論第一

世以感

故夫治療之方不同今具言之

凡婦人以血為主惟氣順則血順胎氣安而後生  
理和今富貴之家往往保惜產母惟恐運動故差  
出入專坐卧曾不思氣閉而不舒快則血凝而不  
流暢胎不轉動以致生理夫宜臨產必難甚至悶  
絕一也且如貧者生育日夕勞苦血氣舒暢生理  
甚易何俟乎藥則孕婦常貴於運動者明矣  
則婦人妊娠已經六七箇月胎形已具而世人不  
知禁忌恣情交合嗜慾不節使敗精瘀血聚於胞

廿六



中致令子太母小臨產必難二也何以知之生下  
孩于頭上有白膜一片滯膩如膠俗強名曰戴白  
生兒身有青有黑俗強名曰宿痣此皆是八月交  
合所致也如此則不特母病其子亦生浸淫赤爛  
瘡瘍俗謂之胎蛆動逾歲月不差可不戒乎  
則臨覺太早大小揮霍或信卜筮或說鬼祟多方  
誤恐致令產母心驚神恐憂惱怖懼又被閑雜婦  
人喪孝穢濁之人衝觸若不預為杜絕臨產必難  
三也何以知之如偷生之女不正之屬既無產厄  
子母均安其理可知凡臨產初然腹痛或作或  
止名曰弄痛坐婆踈率不候時至便令試水試水  
頻併胞漿先破風眩產門產道乾澁及其兒轉便

令坐草坐草太早兒轉亦難致令產難四也直候  
痛極眼中如火此是兒逼產門方可坐草即令易  
產如坐草指久用力大過產母困眩抱腰之人又  
不穩當致令坐立傾側胎死腹中其為產難五也  
時當盛暑宜居深幽房室日色遠處開啓窗戶多  
貯清水以防血運血胸血溢妄行血虛發熱之證  
如冬未春初天色凝寒宜密閉產室室塞罅隙內  
外生火常令暖氣如春仍下部衣服不可去綿方  
免胎寒血結母致產難六也凡孕婦入月斷不  
可洗頭方免產難及橫生逆產自明謹論  
揚子建十產論第二  
凡人生產先知此十產證候則生產之婦永無傷



損性命生產之間性命最重幸而孩子易生人不  
知福萬一有少艱難則須臾之間子母之命懸於  
絲髮但世人所患者惟看生產收生之人少有精  
良妙手緣此而多有傾性命予因傷痛其事不為  
無補外有盤腸產僕  
一曰正產  
正產者蓋婦人懷胎十月滿足陰陽氣足忽然腰  
腹作陳疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹疼痛極甚  
乃至腰間重痛穀道撻迸繼之漿破血下兒子遂  
生此名正產

二曰傷產

傷產者蓋婦人懷胎忽有七月八月而產忽至九

月十月而產忽有經一年二年乃至四年五年而  
後產者今獨以十月滿足為正產蓋一人之生陰  
注陽定各有時日不可改移今有未產一月已前  
忽然臍腹疼痛有如欲產仍却無事是名試月非  
正產也但一切產母未有前面正產證候即不可  
令人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋欲產之婦臍  
腹疼痛兒身未順收生之人却教產母虛亂用力  
兒身總方轉動却被產母用力一逼遂使兒子錯  
路忽橫忽倒不能正生皆緣產母未當用力之所  
致也凡產母用力須待兒子順身臨逼門戶方始  
用力一送令兒下生此方是產母之用力當也若  
未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下



生譬如握苗而助之長非獨無益而又害之此名傷產

三曰催產 催產者言婦人欲產漿破血下脬腹作陳疼痛其

痛極甚腰重穀道挺逆已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之忽有經及數日產母困苦

已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產母之正氣令兒速得下生此名催產

四曰凍產 凍產者蓋言三冬之月天氣寒冷產母經血得冷

則凝結而不散因其血之不散以至兒子不能生下此之一弊為害最深然世人不知覺若冬月產

婦下部不可脫去綿衣並不坐卧寒冷之處當滿房著火令遍房常有暖氣常令產母背身向火令

脬下腿膝間常有暖氣若背心上心前少聞寒冷須是暖灸綿衣以包之貴其血得熱則流散使兒子

易生此名凍產若春秋之間天地少有陰濕寒冷之氣亦可就房中以微炭火暖之為妙

五曰熱產 熱產者蓋言盛夏之月欲產之婦當要其溫涼得

所不可因熱恣意取涼反有傷損胎氣又生產之處不可多著人數切恐人多熱氣逼襲產母蓋人

之血氣得熱則散熱過則損今當夏暑炎熱之盛而產母氣虛人氣一逼則其血沸溢而血得熱則



止蒸能令產母發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事世有名血暈者緣此而成也此名熱產若值夏月少有清涼之氣陰雨之夜寢產母亦不可任意取涼恐生大病

六曰橫產

橫產者蓋兒子下生先露其手忽先露其臀此因未當用力而產母用力之過也脘腹疼痛兒身未順則是產母用力一遍遂致身橫而不能生下不幸而有此證候當令產母安然仰卧令看生之人推而入去凡推兒之法先推其兒身令直上漸漸通乎以中指摩其肩推其上而正之漸引指攀其耳而正之須是產母仰卧然後推兒直上徐徐正

之候其身正門路皆順煎催生藥一匙令產母喫了方可令產母用力令兒下生此名橫產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恐其愚以傷人命

七曰倒產

倒產者蓋因其母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉順生便只直下先露其足也治之之法當令產母於床上仰卧令看生之人推其足入去分毫不得令產母用力亦不得驚恐候兒自順若經久不生却令看生之人輕輕用手內人門中推其足令就一畔直上令兒頭一畔漸漸順下直待兒子身轉門路正當然後煎催生藥令



產母服一盞後方始用力一送令兒生下此名倒  
產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣  
其愚以傷人命

八曰偏產

偏產者蓋因兒子回轉其身未順生路未正却被  
產母用力一逼致令兒頭偏柱左腿忽偏柱右腿  
致令兒雖近人門而不能生下但云兒已露頂然  
不知兒之所露即非頂也忽左額角忽右額角而  
已謂兒頭偏柱一畔以此不能生收之之法當令  
產母於床上仰卧令看生之人輕輕推兒近上以  
手正其頭令兒頭頂端正向人門然後令產母用  
力一送即便兒生子下若是小兒頭之後骨偏柱

穀道即令兒却只露額當令看生之人以一件綿  
衣灸令溫暖用裹手急於穀道外旁輕輕推兒頭  
令正即便令產母用力送兒生也此名偏產凡於  
穀道外旁推兒頭正須推其上而正之仍是小用  
輕力推些上兒而正之也若看生之人非精良妙  
手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

九曰礙產

礙產者蓋有兒身已順門路俱正兒子已露正頂  
而不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露  
正頂而不能生此名礙產收之之法當令產母於  
床上仰卧令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手  
以中指按兒肩下其肚帶也仍須候兒身正順方



令產母用力一送使兒子下生此名礙產若看生  
之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷  
人命

十日坐產

坐產者蓋言兒子之欲生當從高處牢繫一條手  
中令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非  
令產母臨生兒時坐著一物此名坐產若是產母  
兒將欲生却令坐著一物即抵著兒路不能生也

十一日盤腸產

續漆

趙都運蒸人每臨產則子腸先出然後產子產子  
之後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能療  
偶在建昌得一坐婆施之一法而收之其法遇產

後子腸不收之時以酥半盞新泔冷水七分碗調  
停喫產婦面每喫一縮三喫收盡此良法也後學  
不可不知

治推腸生方又名盤腸產

右以半夏為末搐鼻中則腸上矣

又方以大紙撚以麻油潤了點燈吹滅以烟熏  
產婦鼻中腸即上矣

又方以草麻子十四粒去殼研如膏貼產婦頭  
頂中心腸即上即拔去

催生方論第三凡三十六方

五行論命以年月日時支干所遇五行所屬相生  
相值以推人之貴賤其間最切要者時也若林開



命書以年為父母為己身月為兄弟僚友日為妻妾上官時為子孫帝座蓋人之生也得其時則終身富貴失其時則終身貧賤信乎人生之時不可忽也然則人生之時其可催乎殊不知娠有諸生產之難若臨產起坐既久勞力困乏須妙藥催赴以救其危常此之時又何暇論其時耶又聖惠方有推娠婦行年法若行年有與本命相值所產歲月者即鋪驢馬皮於灰草上令娠婦臨產時踐之午攀鞍轡頭則易產今之醫者便以此等物為產卧所需之物誠謬論也其所以然者謂妊婦行年湯與本命相值於所產歲月慮有諸般艱難之厄故以此厭穰之取其快速之意耳如或不值則無

用矣今錄催生數方皆名醫士夫歷用良驗者以幸有緣產寶方論曰夫產難者內宜用藥外宜用法蓋多門救療以取其安也療產難坐草數日用之不能生此為母先有病經絡俱閉所然

**催生柞木飲子治產難或橫或倒死胎爛脹於腹**

中此方屢用神妙

生大柞木枝一文握長一尺淨洗寸割甘草文者五寸剉作五段

右用新汲水三升半同入新沙瓶內以紙三重

緊封之文武火煎至一升半令香覺腹痛便準

備候產婦腰痛重痛欲坐草時温温飲一小盞便

覺心一開豁如覺再渴又飲一盞至三四盞覺

下重便生更無諸苦切不可坐草早及坐波女亂



下年如催生若藥只消一服此方至驗乃上蔡張不愚方也

**催生如聖散**療逆產橫生瘦胎兼治產前產後虛損月脉不調崩漏一名催生黑散香名烏金散一名二神散

石草霜

香白芷

不見火為細末

右二味等分研停每服二大錢於臨立產時以

童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗用

酒童子小便各半盞同煎纔沸即調停熱服甚

者不過再服

血得黑則止此藥大能固血免得乾生其妙在此

**催生如神散**

黃蜀葵花不以多少焙乾為細末熟湯調下

二錢神妙或有漏血胎臍乾澁難產痛劇

者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下

如無時只用葵子爛研小半合以酒調瀉

去滓溫過頓服尤妙亦治打撲傷損如胎

死不下煎紅花溫酒調下

用子歌曰經驗用子四十九粒

黃金內子三十粒細研酒調能備急

命若懸絲在須臾即令眷屬不悲泣

曹秀戈方用葵子一味研墨或研朱砂為衣每

服四十粒溫酒吞下

**催生丹**療產婦生理不順產昏艱難並宜服之出聖

惠方局方同宣天醫曰合



十二月兔腦髓去皮膜研如泥通明乳香研

右四味錢拌停以免腦髓和圓如雞頭攘大陰乾

用油紙密封貼每服一圓溫水下即時產隨男

又方 通明乳香一塊如皂子大右為末覺腰痛時用新汲水一小盞入醋少許

同調扶立令產婦兩手捉而石燕坐婆飼藥飲

之先令妊婦念醫靈藥聖三遍然後服之仍略

扶行數步須臾坐草便生更無痛楚神良

經驗方如神開骨喜乳香不以多少五月五日午

時令二人在僻背捧乳鉢在攬上令一童兒以筆

管透辟縫內逐粒從筆管中過入乳鉢內研令極

細以童兒面北滴水圓如雞頭大每服一粒無灰

酒吞下海上方用乳香朱砂等分為細末麝香酒

調下  
治難產或倒橫不順方  
蛇蛻全一條蟻蛻紙一張  
右入新瓦瓶中鹽泥固濟燒存性為末煎梅白  
皮湯調下一錢三服覺痛便生○一方云臨產  
腰痛用藥三字麝香一字溫酒調下右二妙散  
催生萬金不傳遇仙丹  
草麻子去殼朱砂  
蛇蛻一尺雄黃各半



右為細末漿水飯和圓如彈子大臨產時先用  
椒湯淋溼脐下次安藥一圓於脐中用蠟紙敷  
重覆藥上以闊帛繫之須臾生下急取去藥一  
圓可用三次

**如聖膏**

治難產並治胞衣不下兼治死胎

用草麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞衣  
即下速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸  
自縮入如聖之妙一方男用七粒女用十四  
粒一方用草麻子百粒雄黃末一錢同研並  
用如前法

**寸金散 治產難**

用敗兔毫筆燒為灰細研為末生藕汁一盞

調服立產若產婦虛弱及素有冷病恐藕汁  
動氣當於銀石器內重湯調溫服

陸氏方云此難產第一方

金竹油三片 兔毫筆頭三箇燒為

右二味和停用蠟為圓如梧子大作一服溫酒  
下

又方

大朱砂隨多少端午日曬至百日不

右用臘月兔腦髓和圓如菘豆大欲覓產粥飲

下一圓良久便生其藥男左女右午中把出

又方

臘月兔頭一枚燒為



右為細末葱白煎湯調二錢立生臨產時先用  
催生**兔血散**指迷方

臍月兔血蒸餅切作片子蘸之以紙袋盛掛  
當風處陰乾為末煎乳香湯調下二錢

又方

臍月兔腦髓塗於一張薄紙上更用一張合  
搨以秤砣三五十下每過難生看大小書  
天生兩字作符以醋湯調下極妙一服立愈

又方

兔皮和毛燒為灰末之以酒調方寸匕服之  
即產衣不下者服之即下

治橫倒生者或先午足者

明阿膠用炒一方滑石末各一兩葵子 二合

右水一盞半煎至一盞去滓分二服

治難產五六日不得分娩疲困虛乏者

光明水膠二兩

右用好酒一升半微火溶膠入新雞子一箇鹽

一錢匕攪溫令產婦坐楮物上伸腰大口作

二次服之覺小腹重便生緣坐草早驚動故

也

救產難經日不生

雲母粉半兩溫酒調服入口當產不順者即

產萬不失陸氏方云是何德楊方云已救

臨時取一團如雞子大  
細取以無灰酒調下



治橫逆產理不順子死腹中

伏龍肝細研每服一錢酒調服之以士著兒

頭止戴出妙

廣濟療難產三日不下方

吞鷄子黃三枚并少苦酒服

集驗療橫產及胎死腹中以三姓雞卵各一枚三

姓鹽各一錢三姓水共一盞相和煮五七沸分溫

二服令產母東首服之立出

療難產日久氣力乏盡不能生此是宿疾

赤小豆二升以水九升煮熟取汁入炙了明

黃膠一兩同煎少時一服五合未效再服不

過三四服即產

備急方療難產三日不出

吞槐子十四枚即下廣濟方有蒲黃一合子

金集子崔氏同

又方

當歸為末酒調方寸匕服

**催生如意散**

臨產腰疼方可服之

人參為末

乳香各一辰砂半錢

右三味一處研為產之時急用雞子清一箇調

藥末再用生姜自然汁調開冷服如橫生倒生

即時端順子母平善傳於鄂倅施漢鄉屢見

切効

陳氏催生神效七散臨產腰疼不可服之



魁婦延胡索絞頭海沒藥神效下白礬

如白芷 姜女黃 酒調當歸以士著記

桂心等珍 研每 善 專 效 得 外 時 驚 厥 暴 見

右為細末臨產陣痛時燒鐸刃鐵是也令通赤

淬酒調藥三錢服一二杯立產此方鳳州河池

服錢引一道遇一土友揚濟伯密得之屢試屢驗

催生神妙乳珠丹

乳香研細以猪心血為圓如梧桐子大以朱砂

為衣日乾每服一粒如催生冷酒化下良久未

下再服一粒如大段難產時以蓮葉心蒂七箇

水二錢煎至一盞放溫化下一粒良久未下亦

可再服此藥靈驗如神無有不下者如胞漿先

破惡水來多胎乾不得卧時須先與四物湯及

通真圓補養其血氣次更濃煎葱湯放冷如鱧

令坐婆洗產戶須是款曲洗令氣上下通暢仍

更用酥調滑石末塗產戶裏次服前催生藥則

萬全矣如胎死不下者用黑豆三合好醋半外

煮令豆爛取汁一盞放溫化下藥一粒須更便

下矣萬一未下亦可再服如胎下胞衣未下者

服此亦便下也若胎橫逆不順即先服如神散

方見再服此藥復以此藥催之合藥時要五月

五日午時極妙或七月七日或三月三日及月

初上辰日合亦得

小品療逆產方 鹽塗兒足底又可急搔爪之并



以鹽摩產婦腹上即產  
又方以鹽和粉塗兒面足下即順矣

集驗方療逆產 燒錢令赤納酒中飲之  
又方取夫陰毛二七莖燒以猪膏和圓如豆大

水吞下兒手即握出神驗 ○刪繁療產難方取  
車軋中膏盡腋下及掌心崔氏文仲小品千金

集驗備急同  
療逆逆胞衣不出方 取甕屋黑塵研為細末酒

調方寸匕 一方用梁上塵  
張文仲產橫生逆產服諸符藥不捷者灸右脚小

指尖頭三壯艾炷如小麥大  
小品療橫生倒產手足先出方 並出外臺

用粗針刺兒手足二分許兒得痛驚轉即縮  
自當回順文仲備急千金

橫產逆產二條其理雖別療法蓋同可以意量  
逐善參用也

郭稽中產難方論第四凡三方

論曰產難者何胎側有成形塊為兒枕子欲生時  
枕破與敗血裹其子故難產但服勝金散逐其敗

血即自生若逆生橫生並皆治之  
勝金散方

麝香一錢 鹽豉一兩以舊香布裹了燒  
右為末取枰錘燒紅以酒淬之調下一大錢

陳無擇評曰產難不只胎側有兒枕破與敗血裹  
四十



凝傷其胎息因緣自有難易其如橫逆多因坐草  
太早努力過多兒轉未速或已破水其血必乾致  
胎難轉若先露脚謂之逆先露手謂之橫法當以  
針刺之使自縮入即服神應黑散以固其血必自  
轉生 養生方云倉皇之間而命所係不可不廣  
傳蓋贊黑散之叩也或以鹽塗兒脚底抓搔之  
**神應黑散方** 見前即催生如轉散

產難子死腹中方論第五 凡十八方

夫產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌  
致令產難皆因穢沃先下產時未到穢露已盡而  
胎枯燥故子死腹中其候產母舌青黑及胎上冷  
者子已死也故產處坐卧須順四時方面并避五

行禁忌若有觸犯多招災禍也

治妊娠三五箇月胎死在腹內不出

大腹子 赤芍藥 梅白皮 各三兩

當歸 一兩 滑石末 三分 瞿麥

葵子 炒 茯苓 粉草

子芩 各半兩

右為粗末每服四錢水一盞煎至七分去滓不  
拘時溫服  
療死胎腹內不出母已危殆不得已者立效方

水銀 半兩 桂末 一錢

右只作一服溫酒調下粥飲亦可

又方



以利斧煨赤置酒中待溫飲之其子便下  
治妊娘胎死腹中候其母面赤舌青者是宜  
**錫粉圓**出指

錫粉 水銀各一錢  
右同研不見水銀為度以棗肉和圓如豌豆大  
煎服雀麥湯吞下

十全博救療胎死腹中

以好辰砂一兩水煮數沸研令極細酒調二錢服

又方

以雞子黃一枚用姜汁一合調雞子黃令均  
頓服分晚後喫芸薹粥飲

趙和叔傳下死胎方

桂心末二錢 麝香當門子一箇  
右同研溫酒調服須臾如手推下比之用水銀  
等藥不損血氣

何氏方無麝香每用桂末二錢痛陣密時用濕薑  
子小便調下名觀音救正散兼治產難及橫倒生  
療胎死腹中不出母欲絕

又方

水銀二兩頓吞之兒立出  
又方  
草用水銀如彈子大以棗肉均研和如大豆許  
水吞下立出  
救急治子死腹中



取夫尿三升煮令沸飲之

文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草不產血氣上盪心母面無顏色氣欲絕方信

猪脂煎一升 白蜜一升 淳酒二升

右三味合煎取二升分温兩服不能飲隨所能服之

又療子死腹中不出○以矢屎塗母腹上立出 崔氏療胎死

甘草一尺 蒲黃二合 茵桂四寸

香豉三升 鷄子一枚

右細切以水六升煮取三升頓服胎胞穢惡盡去大良

產經數日不出或子死腹中母氣欲絕

瞿麥六兩 通草 桂心各三

牛膝四兩

右吹咀以水九升煎取三升去滓分温三服

一字神散治子死胎不下胞破不生此方累有效

救人幾萬數

鬼臼不拘多少黃色者去毛碾為末以手指

撚之如粉極細為度每服二錢用無灰酒一

錢同煎至八分通口服立生如神此藥不用

羅只碾令極細

鄧知縣傳方療死胎不出

朴消為末每用二錢温童子小便調下知洪















成欬嗽之戒誠過慮也然醋墨本破凝結之血然  
不可用大醞之醋仍不可太多即不至傷肺然所  
在皆同亦有不喫者更產後三日內令產婦嘗聞  
醋炭氣或燒乾漆煙若無乾漆以破舊漆器燒之  
以防血逆血逆血運不省之患夏月宜於房門外  
燒磚以醋沃之置於房中夏月房中不宜著大  
燒之後須更且食白粥一味不可令太飽類少與  
之為妙逐日漸增之煮粥時須是煮得如法不用  
經者者又不可令溫冷不調恐留滯成疾仍時與  
童子小便一盞飲之亦須先備小便若遇新產後  
不問腹痛不痛有病無病以童子小便以酒和半  
盞溫服五七服妙一膳也七日之後方可少進醇酒

并些小鹽味一法纔產不得與酒綠酒引血逆  
入四肢兼產母臟腑方虛不禁手聲酒力熱酒入腹  
必致昏悶七日後少進些酒不可多飲如未出月  
間欲酒喫或服藥者可用淨黑豆一升炒令烟出  
以無灰酒五升澆淋之仍入好羌活一兩先碎同  
浸尤妙當用此酒下藥或時時飲少許可以辟風  
邪養氣血下惡露行乳脉也如產婦素不善飲酒  
或夏月之間亦不須強飲一膳之後恐喫物無味  
可爛煮羊肉或雌鷄汁略用滋味作粥飲之或喫  
爛煮猪蹄肉白忌脚猪肉及不可過多多食早凡喫物  
補益也三月之後方可少食溫麵食成腫疾  
過多恐成積滯若未滿月不宜多語喜笑驚恐憂



惶災泣思慮恚怒強起離床行動久坐或作針線  
用力工巧恣食生冷粘硬菓菜肥膩魚肉之物及  
不避風寒脫衣洗浴或冷水洗濯當時雖未覺大  
損滿月之後即成蓐勞午脚及腰腿痠冷痛骨  
髓間腫脹如冷風吹縫有名醫亦不能療大都產  
婦將息須是滿百日方可平復大慎觸犯此多致  
身體強直如弓角反張名曰蓐風遂致不救又不  
得夜間獨處綠去血心虛恐有驚悸切宜謹之所  
右血衣洗躍不得於日曬曝免致邪崇侵傷又不  
不得濯之恐血氣攻下又得刮古心傷刷齒及就  
下低頭皆成血逆血運此產家謹護之常法也滿  
月之後尤忌任意飲食觸冒風寒恣意喜怒梳頭用

力高聲作勞工巧房慾

詳見產後通  
用方第一

及上高廁便

溺之類如此節養攝至百晬始得血氣調和臟腑

平復自然安帖設不依此即致產後餘疾矣小可

虛羸失於將補便成大患終身悔而不及或有諸

疾不論臣細後並有方藥醫療不得信庸醫妄投

藥餌經云婦人非止臨產須急產後大須將理慎

不得恃身體和平取次為之乃縱心恣意無不所

為若有觸傷便難整理犯時微若秋毫感病重如

山岳知命者可不謹之

### 產後調理法第二

若產後將息如法四肢安和無諸疾苦亦須先服  
黑神散四服亦略備補益圓散之類不可過多又



恐因藥致疾不可不戒橘如四物湯四順建中湯

或產婦血盛初經生產覺氣悶不安者調七寶散

在十九卷中服之若寧怡不須服若三日後覺壯熱

頭痛胸膈氣刺者不可便作傷寒傷風治之此是

乳脉將行宜服王露散一二服如無此證若因床

帳大暖或產婦氣盛或素多喜怒覺目眩暈如在

舟車精神鬱胃者此是血暈即須服血暈藥一二

服止方見第仍須看承之人照管問當也或覺粥

食不美虛困即服四順理中圓一二服若不須服此

若於兩三日間覺腹中時時撮痛者此為兒枕作

痛必須服治兒枕藥一二服方見第若大便秘或

小便澀切不可服通利藥以其無津液故也若投

通利之藥則滑泄不禁不可治也切須戒之若必

甚必欲通利方可服和暖藥即通方見第二論

產後通用方論第三凡二十三方

千金云凡產後滿百日乃可會合不爾至死虛羸

百病滋長慎之凡婦人患風氣膈下虛冷莫不

由此早行房故也凡產後七日內惡血未盡不

可服湯候膈下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不

在此例候兩三日消息可服澤蘭圓比至滿月九

藥盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可

救者服五石澤蘭圓補之服法必七日外不得早

服也凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹

中積聚百病竟起迄至於死百方療不能產桃仁



煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一二劑以至年內常將服之佳

**黑神散** 治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心

胸痞滿或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之

熟乾地黄 蒲黃炒 當歸

乾姜炮 桂心 芍藥

甘草 黑豆炒去皮

右為細末每服二錢酒羊盞童子小便半盞同

煎調服

**烏金散**

治產後十八疾方論有人選集為神散十

八首言錄

一曰產後因熱病胎死腹中者何但服**烏金散**

二曰產難者何但服**烏金散** 三曰產後胞衣

不下者何但服**烏金散** 四曰產後血暈者何

但服**烏金散** 五曰產後口乾心悶者何但服

**烏金散** 六曰產後乍寒乍熱者何但服**烏金**

**散** 七曰產後虛腫者何但服**烏金散** 兼**朱砂**

**圓** 八曰乍見鬼神者何但服**烏金散** 九曰

產後月內不語者何但服**烏金散** 十曰產後

腹內疼痛兼瀉者何但服**烏金散** 兼用止瀉調

氣藥 十一曰產後遍身疼痛者何但服**烏金**

**散** 十二曰產後血崩者何但服**烏金散** 十

三曰產後血氣不通咳嗽者何但服**烏金散**



十四日產後乍寒乍熱心痛月候不來者何但服烏金散

十五日產後腹脹滿嘔逆不定者何宜服烏金散

次服朱砂圓三二日炒生姜醋湯下七圓

十六日產後口鼻黑氣及鼻衄者何論同此證不可治

十七日產後喉中氣喘急者何論同十死不治

十八日產後中風者何但服烏金散

已上論與郭稽中二十一論問答同故不詳錄

**柳仁煎**

療萬病婦人產後百病諸氣方

桃仁一十二百枚去皮尖及双仁熬令黃色

右二味搗令極細熟以上等酒一斗五升研三

四遍如作麥粥法以極細為佳納小長項瓷餅

中密塞以麵封之納湯中煮一復時不停火亦

勿令火猛使餅口常出在湯上勿令沒之熟訖

出溫酒服一合日再服丈夫亦可服

千金增損澤蘭圓療產後百病理血氣補虛勞

澤蘭 甘草 當歸

川芎各七 附子附子 乾姜

白朮各七 白芷各七 桂心各七

北細辛各四 北防風各四 人參

牛膝各五 栝子仁各五 熟地黃各五

石斛各六 厚朴各六 藁本各六

燕莖各二 麥門冬去心

右二十味為末煉蜜圓如梧桐子大溫酒下二



產後醋墨

松煙墨不拘多少用炭火煨通紅以米醋淬之  
再煨再淬如此七度研令極細用絹羅過總產  
子喫醋墨二錢用童子小便調下

四味湯

療產後一切諸疾總分號喫一服尤妙

當歸

如心高煩

延胡索

氣同喘急

血竭

力惡露不

沒藥

加心腹撮痛

各等分

右為細末每服各抄半錢用童子小便一盞煎  
至六分通口服

玉露散

治產後乳脉行身體壯熱疼痛頭目昏痛  
大便澀滯悉能治之涼膈壓熱下乳

人參

白茯苓

甘草

苦梗炒

川芎

白芷

當歸一分

芍藥三分

右為細末每服二平錢水一錢煎至七分溫服  
如煩熱甚大便祕者加大黃二錢半

地黃煎

治產後諸疾

生地黄汁

生姜汁

藕汁

大麻仁三兩去殼為末

右和停以銀器內慢火熬成膏溫酒調半起服

更以北木煎膏半盞入之尤佳人產寶方無麻

仁用白蜜治產後虛憊盜汗嘔吐

理中圓

治新產血氣俱傷五臟暴虛肢體羸瘦之



氣多汗總產直至百晷日常服壯氣補虛和養臟  
氣獨除餘疾消穀嗜食

甘草

白木

人參

乾姜

白木

人參

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大溫米飲下三

十圓空以服總產子以童子小便打開點服七

日內日三服產乳方云此乃大理中圓加甘

草兩倍耳然其功比之四味等分大故不同蓋

取甘味以緩其中而通行經絡之功最勝者也

此產婦月內不可闕者出月不須服矣古方

中有婦人補益之藥如大澤蘭圓聖小白薇圓熟

乾地黃圓大聖散之類其藥味稍眾而中下之

家村落之地卒何以致且藥肆中少有真者不

若以四順理中圓易之較其功比澤蘭圓之類

主治頗多也

**黑龍丹**治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡

疾垂死者但灌藥得下無不全活神驗不可言

當歸 五靈脂 川芎

良姜 熟地黃 各一

右細剉以沙合盛赤石脂泚縫紙筋鹽泥固濟

炭火十升煨令通赤去火假冷取開看成黑糟

色取草細研却入後藥

百草霜 五兩 硫黃 各一 乳香 各半

花藥石 琥珀 錢各重



右五味並細研與前五味再研如法修製和勻以米醋煮麵糊圓如彈子大每服一圓炭火燒令通赤投於生姜自然汁與童子小便入酒漉虫控乾研細只用此酒調下茂恂寧初從事灑上幕府郡之薦醫胡者為予言數政之前有朱汁水部施黑龍丹凡產後諸病危甚垂死者無不愈郡中及村落入賴以全活甚衆汁受代婦人數子號泣遮道送行尚有一二粒未之施也先人自三峯謫官淮陽家嫂馬氏薦中大病醫者康從憂投丹立愈訪之乃得於汁也且言每鷺一粒輒受子錢必其獲厚利不欲求之後起守汝海從憂餞別一驛臨行出此方

為獻每以救人無不驗者廬道原侍郎再師涇原時媿母姓娘至臨潼就薦後數日有盜夜入其室驚怖成疾衆醫不能治乃以恂弟嘗遺此藥服之遂安家人金萃君在秦生文度數日苦頭痛未止又心痛痛斃兩晚上下走注疾勢甚惡昏躁煩憤目視燈如金色勺飲不下服藥甚衆無效恂弟曰黑龍丹可服初以半粒投之即能飲粥而他藥入輒吐出不受覺痛稍緩又投半粒又得安眠自中夜服藥至五鼓下惡物數升頭痛頓減又至食時復下數升渙然醒愈蓋敗血所致其效如此建中靖國元年五月二十日郭茂恂記仲氏嫂金萃君在秦產七日而不



食始言頭痛頭痛而心痛作既而目暗痛如割  
如是者更作更止相去總瞬息間每頭痛甚欲  
取大石壓食久漸定心痛作則以十指抓壁血  
流掌痛定目復痛又以兩午自刻取之如是者  
十日不已國醫二三輩郡官中有善醫者亦數  
人相顧無以為計且言其藥北芎可以愈頭痛  
犯姜黃可以治心痛率皆悠々不根之言竟不  
知病本所起張益困頓醫益術彈子度疾勢危  
矣非神丹不可愈方治藥而張召予夫婦付以  
諸子與仲氏別慘怛不復言予噴目戒張曰第  
安心養疾亟出石伯氏曰事急矣進此丹可乎  
仲氏尚遲遲以兩旬不食恐不勝任黃昏進半

粒疾少間中夜再服藥下瞑目寢如平昔平旦  
一行三升許如煌虫子三疾減半已刻又行如  
前則頓愈矣遺荆叙輩視之奄殆無氣午後體  
方涼氣方屬乃微言索飲自此遂平復大抵產  
者以去敗惡為先血滯不快乃至是爾後生夫  
婦不習此理老媪庸醫不能中病所以疾苦之  
人十死八九大數雖定豈得無大不遇良醫終  
抱遺恨今以施人俾終天年非祈于報者所冀  
救疾苦養性命爾崇寧元年五月五日郭忱序  
**當歸散** 治療產後氣血俱虛慎無大補恐增容熱  
別致他病常令惡露快利為佳

當歸 為藥 川芎



黃芩各一 白朮半兩 右為細末溫童子小便或酒調下二錢出指迷

周頊傳授濟急方四道出指迷 頊嘗見人傳經効諸方自曾修合實有大切遂經於卷末普用傳授以濟急難治產後血暈血氣及滯血不散便成癥瘕兼瀉而色黃腫嘔吐惡心頭痛目眩口吐清水四肢羸弱五臟虛怯常日睡多喫食減少漸覺羸瘦年久變為勞疾如此所患偏

亘服勝金圓

- 沃蘭葉四兩
- 甘草
- 芍藥
- 當歸
- 薤白
- 芎藭各六

- 乾姜
- 枳梗
- 吳茱萸
- 烏頭
- 南椒
- 石斛
- 白芷
- 藁本各一
- 桂心各半
- 細辛
- 栝子仁
- 白薇
- 石領
- 茯苓各三
- 人參
- 石膏
- 厚朴
- 防風
- 枳殼
- 蒲黃
- 白朮
- 青木香

右揀擇上等州土如法修製為末煉蜜圓如彈子大有所患熱酒研一圓入口便愈大忌腥膩熱麪豉汁生葱冷水菓子等若死胎不下胎衣在腹並以炒鹽酒研服未効再服



**聖散子** 治產後諸疾 方與局方 **大聖沃蘭散**

同但無地黃阿膠枳梗故不錄

**黑散子** 治產後一切疾神效人口野愈大忌野愈

式鯉魚皮燒灰 芍藥 蒲黃各 圓

當歸 沒藥 桂心

好墨 卷栢 青木香

麝香各 一 丈夫髮灰 鐳墨各 半

右為細末以新瓷器盛密封勿令走氣每產後

以好酒調下一錢七如血暈衝心下血不盡脍

下攪刺疼痛不可忍塊血癥疾甚者日加兩服

不拘時候忌冷物菓子粘食

**保生圓** 方與局方同却無麻仁有川椒故不復

錄

**朱砂圓**

治產後虛中有積結成諸疾

黑附子 桂心 白薑各 半

巴豆一錢醋浸 煮去皮研

右為細末入巴豆研停醋煮麵糊圓如麻子

每服三圓至五圓冷茶下服之取瀉為度

**薑粉散**

治產後此蕩盡兒枕除百病

當歸 人參 木香

黃耆 川芎 甘草

茯苓 芍藥 桂心

知母 大黃炒 藜蘆

白木 訶子 良薑



青皮

熟地黄

附子

重羊西

右陈地黄附子外各等分焙乾生薑一片研取

自然汁於椀中停留食久傾去清汁取下面粉

脚攤在藟葉上入焙籠焙乾擣羅為末終產後

用藥三錢水一盞姜三片棗一箇煎至七分熱

服服後產母自然睡著半日以來睡覺再服全

除腹痛每日只三服至九日不可服肚中冷也

地黃酒

治產後百病未產一月先釀產訖可服

地黃汁

好麴好淨秫米各二

右先以地黃汁漬麴令發準家法釀之至熟封

七日取清者服常令酒氣相接勿令絕忌蒜生

冷酢滑雞猪肉一切毒物婦人皆可服之但夏

三箇月不可合春秋宜合以地黃汁并滓內米

中炊合用之若作一碩十碩準此一升為率先

服當歸湯後服此妙

地黃圓

治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀

或胎衣不下失音不語心胸脹滿水穀不化口乾

煩渴寒熱往來口内生瘡咽喉腫痛心中忪悸夜

不得睡產後中風角弓反張面赤牙關緊急或崩

中如豚肝脐腹痛煩躁恍惚四肢腫滿及受胎

不穩唇口指甲青黑一方地黃減半當歸一兩

黃圓治胡一琥索珀各一兩名琥珀地

生地黄

留研取汁生薑各取汁二升研

蒲黃

當歸各取汁四升



右於銀石器內用慢火取地黃汁炒生薑滓以  
生薑汁炒地黃滓各令乾四味同焙乾為細末  
醋煮麪糊圓如彈子大每服一圓食前用當歸  
酒化下神妙

**琥珀散**

治產後一切危困之疾

琥珀

朱砂

香麝

香墨

白薑

當歸

鯉魚鱗

桂心

百草霜

白附子

梁上塵

羊兩

右為細末

炒生薑熱酒調下二錢

產後一切病

服之奇效

**黑神散**

治產後諸疾如產臥畢切須用童子小便

調數服除百病如無小使用白湯亦可或產勞力  
過度或下血頗多或微熱惡露來遲

馬尾

大當歸

洗一兩半

右在未產前修製為末如遇產有疾無疾若產

了但用童子小便調服令產婦月後並無他證

杲有神效

療產後雖甚通利唯覺心腹滿悶脹咳嗽不能  
食大便不通眼淚行坐心腹時痛

白朮

當歸

桑白皮

大黃

細辛

桂心

生薑

右咬咀用水二升煎取一升分為三服如人行



七八里久再服此湯當得利利又不宜過多所  
 利者為不獲已而微利之其不然未合令利既  
 初產後覺身皆虛尚藉藥食補之豈宜取利此  
 緣病熱既要不利苟以當塗服湯得通氣息安  
 帖利既未止即便須急取三匙醋飯喫即止止  
 後但須適寒溫將息後取痊復飯食之節量其  
 所宜如利不減宜依後方服之產後不宜輕易  
 投大黃如不  
 弱而已後人更  
 得用之方得穩  
 當強

當歸 細辛 四分 桂心 白朮 八分 甘草 七分 人參  
 生薑 各三分 桑白皮 六分

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下三十

圓  
 產後血氣不通當時不甚覺如在產出血少皆成  
 癥結心便疼硬乍寒乍熱飲食不進不主肌肉心  
 腹有時刺痛口乾粘手足沉重有此狀者宜此藥

當歸 芍藥 甘草 牛膝 鬼箭羽 人參 各三分  
 牡丹皮 虎朮 白朮 各六分  
 大黃 八分 乾地黄 七分 朴消 十分  
 烏梅肉 炒 白薇 桂心 各四分  
 水蛭 炒 蒲黃 各三分 蜜 十分  
 右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下二十圓  
 日兩服外臺有赤石脂十分 許公不在西京為女  
 六十



人後仁則女婚尋得依狀相

產科序論

陳無擇

不

京

十

四

世傳產書甚多千金外臺會王產寶馬氏王氏崔氏皆有產書巢安世有衛生寶集子母祕錄等備則備矣但倉卒之間未易歷試惟李師聖序郭稽中產科經驗寶慶集二十一一篇凡十八方用之頗效但其間序論未為至當始用料理簡辨於諸方之下以備識之者非散好辨也愚詳產後要病無一論一十方有益於世多矣或否亦不可不詳而究之不效雖陳無擇所評或壯丹散然其中有大黃芒首况新產後氣血大虛豈宜輕服又云去血過多而暈者或有之若言疾暈者宜小續命湯僕以有問子中熱方加減信書則不如無之謂也效孟

胞衣不出方論第四 凡二十二方

夫有產兒出胞衣不落者世謂之息胞由產初時用力此產兒出而體已疲倦不能更用刀產胞經停之間而外冷氣乘之則血道澆故胞衣不出須急以方藥救治不妨害於兒所奈者胞係連兒臍胞不出即不得以時斷臍浴洗冷氣傷兒則成病也舊法胞衣不出恐損兒者依法截臍而已產處須順四時方面并避五行禁忌者若有觸犯多令產婦難產雖腹痛者未產也欲腹痛連腰痛甚者即產也所以然者腎候於腰胞係腎故也診其脈轉急如切繩無殊者即產也郭稽中論曰胎衣不下者何答曰母生子訖流血入衣中衣為血所脹



是故不得下治之稍緩脹滿腹中以次上衝心曾  
疼痛喘急者但服**奪命丹**以逐去衣中之血血散  
脹消胎衣自下而無所患更有牛膝湯等用之甚  
效錄以附之

**奪命丹**

附子羊西

牡丹皮一兩

乾漆

一分 碎之 炒令煙盡

右為細末以醪醋一升大黃末一兩同熬成膏  
和藥圓如梧桐子大溫酒吞五七圓不拘時

必效方**牛膝湯**治胎衣不出臍腹堅脹急痛即殺

人服此藥胞即爛下死胎

牛膝

瞿麥各四兩

當歸三兩

通草六兩

滑石八兩

葵子五兩

右細切以水九升煮取三升分三服若衣不下

腹滿即殺人推其源皆是胞衣有血奔心是以

不出也或坐婆生踈斷帶收兒其衣失於繫住

則帶縮入腹中便不得出宜服此藥衣即爛出

也廣濟集驗子金崔氏同

**花蕊石散**

治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈

惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭暖

急以童子小便調一錢取下惡物如猪肝終身無

血風血氣疾膈上有血化為黃水即吐出或小便

中出也若先下胎衣則沒之藥不能達若先治

血問則尋常之藥無此效無如此藥有兩全之效



花菜石 一介 上色 硫黃 四兩  
 右二味相拌令均先用紙和膠泥固瓦罐子一箇內可容藥候泥乾入藥在內密泥封口子焙籠內焙令透熱便安在四方磚上書八用炭一秤籠置周匝自己午時從下生火令漸漸上徹有墜下火放夾火上直至經宿火冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以絹羅至細齋合內盛依法用之尋常人是療時瘡花菜石防急難至妙  
 有一親戚婦人產後胞衣不下血脹迷惘不記人事告之曰死矣僕曰某收得趙大觀文局中真花菜石散在笥中謾以一貼贈之以童便調灌藥下

即甦衣與惡物旋即隨下乘興無恙

**牛膝散** 治妊娠五六月墮胎胞衣不出合時中

牛膝 川芎 朴消

蒲黃 各三兩 桂心 半兩 當歸 半兩

右為粗末每服四錢水一錢姜三片生地黄一分煎至六分去滓溫溫頻服

若胞衣不出若腹脹則殺人

黑豆 一合 炒

右入醋一盞煎三五沸去豆分為三服酒煮亦可

必効方療胞衣不出方 服蒲黃如棗大集驗子

金崔氏同



又方以生地黃汁一升苦酒三合煖服之

救急一方 以水嚙產婦面神驗

又方 以水嚙產婦面神驗

延年方 以洗兒水令產母飲半錢其衣便下

令產婦知 以洗兒水令產母飲半錢其衣便下

又方 牛膝 葵子 一合

右搗碎以水一錢半煎至盡去滓分二服

廣濟療胞衣不出方

右以末竈突中土三指撮以水服之集驗子金

備急文仲同

又方 竈下土 研碎 用好醋調令相合納臍中

續煎生甘草湯三四合服

又方 以醋湯飲之出

又方 雞子一枚苦酒一合和飲之立出

一方 用草麻子名如聖膏 見產難門

延年方 療胞衣不出腹脹則殺人

吞雞子黃三箇仍解髮刺候中令嘔即出若困

極以水煮蟻蛭一枚二十沸灌入口中汁下即

出崔氏同

救急方 用赤小豆 男用七粒 女東流順水吞下

產乳療產後惡血衝心或胞衣不下腹中血塊等

疾備急同

右大黃一兩為末以好醋半升熬成膏以藥末

搜膏為圓如梧桐子大溫醋湯吞五圓良人取



又下思物不可多服  
療胞衣不下  
取子研

拈樓實一箇

右酒與童子小便各半  
煮至七外去滓溫服

根如無得

又方 紅花 一兩 酒煮濃汁服

又方 以鹿角銹屑三分為末煮葱白湯調下

凡欲產時必先脫常所著衣以龍窰胞衣自下仍

易產神驗

廣濟方云 取夫單衣蓋井上立出千金集驗救急

崔氏小品同

治胞衣不下訣

婦人百病莫甚於生產產科之難臨產莫重於催

生既產莫甚於胞衣不下惟有花蕊石散一件最

為緊要如黑神散琥珀散諸方之類雖皆有驗然

鄉居或遠於藥局倉卒之間無法可施今採得胡

氏寶慶方一妙法云若產訖胞衣不下停待稍久

非特產母疲倦又且血流入胞中為血所脹上衝

心胸喘急疼痛必致危篤若有此證宜急斷臍帶

以少物繫墜後以物繫墜之時宜用心先繫然後

其子血脉不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱

淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰終自下

矣累誠有驗不可輕信坐婆妄用午法多有因此

而亡深可浩嘆所以胡氏重引親見其說為據



論曰產後血暈者由敗血流八肝經眼見黑花頭  
目旋暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈  
細酒調黑神散最佳庸醫或作暗風中風治之凡  
暈血熱乘虛逆上湊心故昏迷不省氣閉欲絕是  
也然其由有三有用心使力過多而暈者有下血  
多而暈者有下血少而暈者其暈雖同其治特異  
當詳審之下血多而暈者但昏悶煩亂而已當以  
補血清心藥治之下血少而暈者乃惡露不下上  
搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血  
行血藥治之古法有云產婦絕多孫子預燒秤錘  
或江中黃石子硬炭燒令通赤置器中急於床前

以醋沃之得醋氣可除血暈產後一臈不妨時作  
為妙崔氏云凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空  
所致欲分曉者第一須先取釀醋以塗口鼻仍置  
醋於傍使聞其氣兼細細飲之此為上法如覺暈  
即以醋噴面甦來即飲醋仍少與解之一云仍少與水解之  
一法燒乾漆令烟濃熏產母面即醒如無乾漆以破漆器以  
之猛亦得

郭稽中論曰產後血暈者何答曰產後氣血暴虛  
未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚  
者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼  
為暗風若作此治之病必難愈但服清魂散即省  
清魂散方







童子小便 合雞子清 三枚 此方

右煎三四沸後入雞子清攪停作一服

產後血暈狂語不識人狂亂

童子小便 五合 生地黃汁 八合 此方

赤馬通 七枚 紅雪 八分

右以上二味浸赤馬通絞去滓下紅雪温為兩服

**獨得散**

治產後血暈昏迷不省衝心悶絕 衛生方 各立應

散

五靈脂 羊生 二兩

右為末温酒調下 二盞口噤者物開口灌之入

喉即愈一方加荆芥等分為末童便調下

又方治產後血暈

右神麩為末熟水調二錢

療產後血暈狂言煩渴不止

生香附子 去毛

右為末每服二錢水一錢姜三片棗一箇煎至

七分温服

治產後血暈危困國醫以此方獻禁中用之大效 厚獲賞賚時庚寅歲也 人負問 此方

生地黃汁 一錢 當歸 炒 赤芍藥 炒

右水煎三五沸温服如覺煩熱去當歸入童子

小便半盞妙

張氏方治產後血暈全不省人事 極危殆者



用菲菜切入在一有甬甬瓶內煎熱醋沃之  
便密縛瓶口以瓶背向產婦鼻孔令醋氣透  
入須先扶病人起惡血衝心故有此證菲能  
去心之滯血加以醋氣運達之用無不效  
近効方療血暈絕不識人煩悶言語錯亂惡血不  
盡復中絞痛胎死腹中

**紅藍花酒**

紅花

右為末分二服每服酒二盞童子小便一盞煮  
取盡半候冷分為二服留滓再併煎一方無

童便

崔氏療產乳暈絕方

以洗兒水飲三合良

或以惡血服少許

良

又方 半夏洗不以

右為末圓如大豆內鼻中即省亦療五絕指迷

文仲同

又方 生赤小豆搗為末取東流水和服方寸匕  
不瘥再服救急同

**奪命散**治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失

志及產後百病

沒藥

血竭等分

右細研為末纒產下便用童子小便與細酒各  
半盞煎一二沸調下二錢良久再服其惡血自  
循下行更不衝上免生百疾專治婦人方只用



白湯調 五羊洪運使上下天子舍孺人產後語  
言顛倒謔語不已如有神靈服諸藥無效召予  
診之六脉和平僕以此藥兩服而愈

產後顛狂方論第六凡三方

療產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟宜用

局方大聖沃蘭散

除是自合加好辰砂研令極細

每服加一字許煎酸枣仁湯調下一服可安

何氏方療產後因敗血及邪氣入心如見祟物顛

狂方

用大辰砂一二錢重研令極細用飲兒乳汁三

四茶脚許調仍掘紫項活地龍一條入藥候地

龍衰三衣取出地龍不用不令帶藥出但欲得

地龍身上涎耳却入無灰酒與前乳汁相合七

八分盞重湯溫過疾作分服三二

余家荆布方產一日忽見鬼物言語顛倒遂

取自合蘇合香圓

一錢重以童子小便調服

即醒神思如故

產後狂言謔語如有神靈方論第七方凡一

夫產後言語顛倒或狂言謔語如見鬼神者其原

不一須子細辨證用藥治療產後驚凡言語亂道

如見鬼神精神不定者研好朱砂酒調下龍虎丹

見局三圓作一服煎琥珀地黄圓服之一則因

產後心虛敗血停積上于於心而狂言獨語者當

在第十九卷第一論求之二則產後臆虛心中



驚悸志意不安言語錯亂不自覺知神思不安者  
當在十九卷第二論求之 三則宿有風毒因產  
心虛氣弱腰背強直或歌笑嗔笑言語亂道當作  
風痙治療當在十九卷第三論求之 四則產後  
心虛中凡心神恍惚言語錯亂當在十九卷第四  
論求之 五則產後多因敗血迷亂心經而顛狂  
言語錯亂無常或暈悶者當於本卷第五六論求  
之 六則因產後感冒風寒惡露斬然不行增寒  
發熱如瘧晝日明夕暮則譫語如見鬼狀當作熱  
入血室治之 宜琥珀地黄圓及四物湯 只用生乾  
地黄加北柴胡等分煎服如不退者以 小柴胡湯  
加生乾地黄如黃芩分兩煎服愈難然已上諸證

大抵胎前產後之疾自有專門一定之法毫髮不  
同如產後首當逐敗生新然後子細詳辨疾證不  
可妄立名色白立新意妄自加減方藥大且對證  
依古法施治未有不安者也

**琥珀地黄圓**

方見十九卷第二論

**四物湯**

方見二卷第五通方

**小柴胡湯**

方見六卷第五論

治產後敗血衝心發熱狂言奔走脈虛大者男六德續

乾荷葉

生地黄 乾

牡丹皮

等分不

右三味濃煎湯調

生蒲黃二錢七

一服即定

產後不語方論

第八凡二方

論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後



虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又  
心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如  
此但服**七珍散**

人參 石菖蒲 生乾地黄  
川芎 各一錢 細辛 一錢 在防凡

右為細末每服一錢薄芎湯調下不拍時

**胡氏孤鳳散** 治產後閉目不語

白礬 研細 右每服一錢以熟水調下

新編婦人大全良方卷之十八



