

急救良方序

卷之四

同治

年

古有疾醫掌養萬民之疾病凡民之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于醫師于時民故得以壽終而無短折札瘥之患後世王政多缺而醫師之置徒備虛文塵市之坻富貴之室猶能自以其貲迎師而荒村寒戶否矣扣首抑心閔閔待斃此一患也草木禽魚之物五石之藥多聚於國都而陬窮壤僻之所即有高貲亦不能致錙銖此一患也時師踈豎恒以及劑殺人而茹悲吞釐不敢訟言其非此又一患也予蓋惻然傷之是時急救方一本每携以

自隨或以自治或以治人亦多徵應間有新得輒從其類附益之其譌舛無驗者則刪黜之遂付梓人刻焉夫人之情一也孰不愛其身亦孰不愛其父母骨肉乎而疾苦無所舒往往束手以斃不得已或竭力於禱禮機禳至蕩貲破產而卒莫攸濟也此其於仁孝之心何如哉是方而行庶幾濟於黔細萬分之一要非所以薦於隆富者乎

皇明嘉靖二十有九年歲次庚戌夏六月望四明芝園主人張時徹著

急救良方目錄

卷之一

五絕死第二

虛勞第二

諸風第三

傷寒時疫第四

中諸毒第五

諸虫蛇傷第六

頭痛第七

咽喉第八

心病第九

腹痛第十

腰痛第十一


疝氣第十二

諸氣第十三

脚氣第十四

水蠱第十五

咳嗽第十六



胃病嘔噎第十七

衄血第十八

消渴第十九

霍亂第二十

瘡第二十一

熱第二十二

痘第二十三

淋濁遺精遺尿第二十四

大小便不通第二十五

痔漏第二十六

卷之二

痢瀉第二十七

面第二十八

眼第二十九

耳第三十

口第三十一

舌第三十二

牙第三十三

指第三十四

癰疽疔毒第三十五

疔毒第三十六

雜方第三十七

婦人第三十八

小兒第三十九

急救良方卷之一

四明世嗣生人集

五絕死第一

益都堯崗山人校

治五絕死

自縊死 溺水死 打撲跌搥木石壓死 產後血迷暈死 中惡鬼擊死 夜魘死

凡心

頭溫者皆可救治用半夏湯泡七次為末丸如豆

大吹入鼻中噴嚏即活或用皂莢為末吹入鼻中

亦妙 又方急於人中穴及兩腳尖母指甲離甲

一韭葉許各灸三五壯即活臍中灸百壯亦効

救自縊

凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷

上下安被臥之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮

常令弦急勿使緩縱一人以手按據胸上數磨動

之一人摩捋臂脛屈伸之若已強直但漸屈之并
按其腹如此一頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引
按不住須臾以少桂湯及粥清灌令喉潤漸漸能
嚥乃止更令兩人以蘆管吹其兩耳無不活者自
旦至暮雖冷亦可救自暮至旦陰氣盛為難救爾
又法以一人兩手掩其口鼻勿令透氣一人用
手摩其頸痕兩時氣急則活

救溺水死一宿者尚活用皂莢為末綿裹塞糞門須
臾出水即活 又方救起放火櫬臥着脚後橈拈
起磚二塊却用鹽擦臍中令氣自流出切不可倒

提出水但心下溢者皆可

又方急解衣帶

灸臍中仍令兩人以蘆管吹其耳中即活 又方
溺水救起者即將牛一頭以溺水人肚橫覆在牛
背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹中之
水如醒以蘇合香丸之類或老姜擦牙若無牛以
活人於長板橈上仰臥即令溺水人如前法將肚
相抵活人身上水出即活

救木石壓死并跌搯傷從高墜下死氣絕不能言
者急拍開口以熱小便灌之 又方撲打墜損
血攻心悶亂疼痛用乾青蒿五片燒令煙盡空

以童便溫一鍾調下三錢。三服。又方被打惡血攻心用小便一碗溫服。

救中惡鬼擊客忤一切卒死用葛蒲根生搗絞汁灌鼻中或口中即活。又方治卒死心頭熱者用百

草花曬乾水漬封埋百日砂鍋內連水煎稠丸如皂莢子大放一九入患人口內須臾即活。又方

用井底泥塗目畢令人垂頭於井呼其姓名便起。又方韭搗汁灌鼻中。又方以雄雞冠割取血

蘆管吹入鼻中并塗其面乾後復塗仍以灰圍四傍立起。又方治鬼擊病。以刀刺胸腹內

痛不可按熟艾不煮服若卒。疰客氣胸中者

當吐出虫物。又方卒死而口張反折者灸兩手

足大指甲後各十四壯。又方卒死四肢不收失

便者用馬糞一升水三斗煮取汁二斗以洗之又

取牛糞一升溫酒和灌口中灸心下一寸臍上二

寸臍下四寸各一百壯。又方卒死脉動而無氣

用葛蒲屑末納耳鼻孔中吹之及着舌底。又方

治胸脇腹內絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或

吐血衄血用熟艾如拳大水五鍾煮三鍾頻服

又方用鹽一盞水二盞以冷水噴之即差

治魘寐卒死諸暴絕証名手其散用半夏不拘多少
湯洗七次為末每用少許吹入鼻中心頭溫者可
治倉卒無藥急於人中穴及兩脚大母指內離甲
一韭葉許各灸三五壯即活 又方救夜睡魘死
者不得近前叫喚但絞痛其脚跟及足母指甲際
多唾其面不省者移動此少臥處徐徐喚之原有
燈則存無燈切不可點照 又方用皂莢為末吹
入鼻中 又方用桃枝柳枝取東邊者各三四寸
煎湯二鍾候溫灌服 又方用竈中心對鍋底土
槌碎為末每服二錢新汲水一匙更挑半指甲許

吹入鼻中 又方用蘆管吹耳或以鹽湯以
或搗韭汁半盞灌鼻中冬月掘根研汁

救夏月途中熱死者不可用冷水灌沃及以冷物逼
外得冷即死宜移置陰處急取路上熱土於死人
臍作窩多令人尿溺於臍中又取路上熱土并大
蒜同研爛水調去渣灌下 又方濃煎灰蓼汁一
碗灌之即活

救冬月凍死及落水凍死微有氣者脫去濕衣解活
人熱衣包之用大米炒熱熨心上或炒竈灰令熱
以囊盛熨心上冷即換之入之暖氣通溫以熱酒姜

治魘寐卒死諸暴絕証名手長散用半夏不拘多少
湯洗七次為末每用少許吹入鼻中心頭溫者可
治倉卒無藥急於人中穴及兩脚大母指內離甲
一韭葉許各灸三五壯即活 又方救夜睡魘死
者不得近前叫喚但絞痛其脚跟及足母指甲際
多唾其面不省者移動此少臥處徐徐喚之原有
燈則存無燈切不可點照 又方用皂莢為末吹
入鼻中 又方用桃枝柳枝取東邊者各三四寸
煎湯二鍾候溫灌服 又方用竈中心對鍋底土
槌碎為末每服二錢新汲水或更挑半指甲許

吹入鼻中 又方用蘆管吹耳或以鹽湯或
或搗韭汁半盞灌鼻中冬月掘根研汁

救夏月途中熱死者不可用冷水灌沃及以冷物逼
外得冷即死宜移置陰處急取路上熱土於死人
臍作窩多令人尿溺於臍中又取路上熱土并大
蒜同研爛水調去渣灌下 又方濃煎灰蓼汁一
碗灌之即活

救冬月凍死及落水凍死微有氣者脫去濕衣解活
人熱衣包之用大米炒熱熨心上或炒竈灰令熱
以囊盛熨心上冷即換或暖氣通溫以熱酒姜

湯或粥飲少許灌之即活 又方用氈單或藁薦
裹之以索繫定板平穩處令兩人對面輕輕滾轉
往来如捍氈法四肢溫和即活切不可用火烘之
逼寒氣入內即死

虛勞第二

治虛勞用豬肚子釀黃糯米蒸熟搗為丸白湯下并

治小兒疳疔黃病 又方用青蒿細切水三碗童

便五碗煎取一碗半去渣熬成膏以甘草末為丸

如梧桐子大空心溫酒吞二十九 又方用枸杞

葉半升細切粳米二合瓦器中煮作粥五味調和

食之 又方用連實去皮留子不拘多少酒浸一

宿入於豬肚內水煮熟取出切碎焙乾為末酒糊

丸如雞頭大每服五七十九溫酒食前服 又方

用童便兩盞無灰酒二盞以瓦瓶貯之全豬腰子

一對放在內用泥泥瓶口日晚以慢火煨熟至中

夜止至五更初再以火溫之發瓶飲酒食腰子病

篤者一月効瘦怯亦可服此 又方治骨蒸勞熱

及五痔腸風下血傳尸勞氣并虫咬心痛用鰻鱺

魚酒醋五味煮食 治諸傳尸勞氣殺虫去毒用

川椒二斤擇去子并令少出汗為末以酒糊

九如梧桐子大空心服之十次効 又方用死人
枕煮汁服之 治自汗并夜間盜汗用五倍子末
唾調填滿臍中束定一宿即止 又方用浮麥炒
為細末每服二錢米飲下 又方用陳米不拘多
少麩皮同炒令黃色研細為末米飲調下不拘時
或白煤豬肉蘸食之 治陽脫証或因大吐瀉後
四肢厥冷元氣不接不省人事或傷寒新差誤行
房事小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗出不救
即死用蔥白連鬚三七根細切砂盆內研細用酒
二碗煮至一碗分作三服灌之陽氣即回 又方
用生姜二兩切碎酒煎服之炒蔥白或鹽熨臍
下氣海勿令氣冷

諸風第三

治中風心煩恍惚或腹痛或絕而復甦用竈中對鍋
底土一塊研碎水調服口噤者強開灌之得入便
効 又方卒中風不語者用竹瀝灌之 又方用
香油或姜汁灌之或吐或利即愈 又方中風口
噤不開痰涎壅塞用皂莢一挺去皮弦塗豬脂以
火炙黃為末每服一錢氣實盛者二錢溫酒調服
牙關不開白梅揩齒口自開口 灌藥下吐出風痰愈

又方用白礬二錢為才生姜自然汁調灌之

又方治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮

於上膈氣閉不通用豬牙皂莢四條肥實不蛀者

去黑皮白礬一兩光明者共為末輕者半錢重者

七分溫水灌下但微出冷涎一二升便醒次緩調

治 又方用側柏葉一握去枝葉白一握連根細

研如泥無灰酒一鍾同煎一二沸去渣溫服不

拘時如不飲酒分作四五次服 又方治癱瘓大

風一切諸風仍治脚氣并癩瘻傷折及破傷風服

過百粒即為全人用紫色浮萍七月半擇取淨者

不拘多少以盆盪水以竹節盛萍墜於水盆上曬

乾為細末煉密丸如彈子大每服一粒豆淋酒空

心食前化下 造豆淋酒法用黑豆半升揀淨炒令

取酒用之 亦可常服 又方治中風身體強直不得屈伸反

覆用枸橘樹皮細切一升以酒二升浸一宿每日

溫酒服半升酒盡再作 又方治暗風倒地用北

細辛為末每挑一字搐鼻中 又方治中風失音

用白姜蚕七枚為末酒調服 又方用韭菜搗汁

服 又方產後中風不語角弓反張用大蒜三十

片水一碗煮半碗灌下 台 眼喎斜用瓜蔓搗

又方用白礬二錢為才生姜自然汁調灌之

又方治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮

於上膈氣閉不通用豬牙皂莢四條肥實不蛀者

去黑皮白礬一兩光明者共為末輕者半錢重者

七分溫水灌下但微出冷涎一二升便醒次緩調

治 又方用側柏葉一握去枝煎白一握連根細

研如泥無灰酒一鍾同煎一二沸去渣溫服不

拘時如不飲酒分作四五次服 又方治癱瘓大

風一切諸風仍治脚氣并癩瘻瘍折及破傷風服

過百粒即為全人用紫色浮萍七月半擇取淨者

不拘多少以盆盛水以竹篩盛萍閣於水盆上曬

乾為細末煉密丸如彈子大每服一粒豆淋酒空

心食前化下 造豆淋酒法用黑豆半升揀淨炒令

取酒用之亦可常服 又方治中風身體強直不得屈伸反

覆用枸橘樹皮細切一升以酒二升浸一宿每日

溫酒服半升酒盡再作 又方治暗風倒地用北

細辛為末每挑一字搐鼻中 又方治中風失音

用白姜蚕七枚為末酒調服 又方用韭菜搗汁

服 又方產後中風不語角弓及張用大蒜三十

片水一碗煮半碗灌下 台 眼喎斜用瓜蔓搗

爛絞取汁和蕎麥麵指子食了令熱熨如正便
止不令大過 又方用鱧魚一條以鍼刺頭上血
左歪塗右歪塗左如平正即洗去鱧魚放之則
不發 又方用水調石灰如前法塗之 治白虎
風歷節痛甚肉理枯虛生虫遊走痒痛無身體麻
木無治傳尸勞虫甚効用真川椒紅大者去子并
合口者以黃稗紙二重於爐上炒出汗取頓地上
用砂盆蓋以灰圍盆弦約一時為末老酒浸白糕
為糊丸如梧桐子大每服四十九食前鹽湯下若
治麻木辣桂煎湯下腰痛茵香酒下 又方治虎

風走注痛痺用二年陳醞醋二碗蔥白二斤煮
沸漉出布帛熱裹當患處熨之 又方用芥菜子
為末雞子白調傅患處 治麻木不知痛痒用芥

菜子研細醋調塗 又方霜降後採桑葉煎湯洗

又方用麻子炒香小便浸服 治風濕麻痺四

肢拘攣用蒼耳子三兩水一碗半煎去渣分作三
服或為細末糊丸如梧桐子大每服五十九溫酒

吞下 又方治手足為風濕所傷無有脚氣用晚

蚕沙以米醋拌炒令熱用綿絮包熨之 治大風

肌肉麻痺皮膚壞爛了是灰二斗熱湯淋取

汁洗頭面次用大豆乃...
一日一洗面却用側柏葉
乾白膠香各等分

為末蜜丸溫水卜三七粒日三服
又方治大風

惡疾雙目昏眉髮自落鼻梁崩倒肌膚瘡爛苦不

可救用皂莢刺三斤炭火蒸久曬乾為末濃煎大

黃湯下二錢服旬日間眉髮再生肌膚悅潤眼目

自明 又方治大風不拘久近用真麻油半綱入

坐其中浸七日無不差者 又方大風癩疾用煉

成松香白色者不計多少研為細末煉蜜和丸如

梧桐子大每服一十九食前蜜湯下一月後大効

治諸風癩俗呼馬風病用生白礬一兩好臘茶

半兩煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九再用臘

茶湯下久服風涎由大便出

傷寒時疫第四

治傷寒時疫及傷風初覺頭痛身熱用帶根蔥頭一

箇切碎以醋一盞煎稀粥飲一碗乘熱喫下以被

蓋汗出即解 又方治傷寒已發汗未發汗頭痛

如破生姜二兩連鬚蔥白半斤用水二碗煎令減

半去渣分三服 又方初覺 寒傷食傷酒傷風

以酸薤汁三大碗煎三啣 避風處先飲半碗

以手揉肚再飲半碗又用手一肚更飲更揉直至
厭足心無所容以雞翎探喉 令吐後煎蔥醋辣

湯投之以衣被蓋覆汗出愈或用百沸湯依前法
飲揉探吐亦妙或用甜菜搗汁飲之 又方導引

一法盤脚而坐用兩手交十指 攀腦後風池風府
二穴乃是風門也向前叩首幾至于地如此連點

一百二十數急以蔥醋粥辛辣 湯投之汗出立解
又方治傷寒鼻中出血不止 用茅草花一大把

無花用根以水煎濃汁食後服 治陰證用蔥白
一大把如茶盞大用紙捲緊却 以快刀切齊一指

厚片安於臍上以熱熨斗熨之 待汗出為度一片
未効再切一片熨之 又方治 陰毒傷寒用芥菜

子末新水調如膏藥貼臍上汗 出為愈 傷寒戒
忌病新差後得少喫糜粥常令 稍饑不得飽食及

此則復不得早起不得梳頭洗 面不得多言不得
勞心費力及此則復及差後百 日內氣體未得平

復犯房事者死又忌食羊雞六 肥膩諸肉汁及醃
藏鮓膷油餅麪食病再發

治天行病熱盛用蚯蚓以鹽塗之 化成水去泥飲之
亦治交接勞復或陰匝宿入 痛 又方天行病

心悶用水中細苔搗汁服
方治時行病新好

後多傷飲食其病復發用杏仁五兩去皮尖醋二

碗煎半碗服取汁服愈
治時行病後犯房熱復

發男病以婦人裊襠燒灰女病以男子裊襠燒灰

湯服
治孕婦遭時疫令子不安頓用井底泥塗

足心
又方用竈中對鍋底土研細末水調服仍

塗臍上方五寸乾再換
治天行瘟疫傳染將初

病人衣服於甑上蒸過則一家不染若親戚鄉里

有患瘟疫欲去看問先將清油抹鼻孔後出外又

將紙撚於鼻內採取噴嚏三五箇則不傳染
又

方用雄黃研細水調以筆濃蘸塗鼻竅中與病人

同床亦不相染初洗面後及臥時點之
又方凡

入病久房內須舌頂上腭努力閉氣一口使氣充

滿毫竅則病不能染者
又方五月五日收蒼耳

草陰乾水煎服

中諸毒第五

治誤食諸毒草并百物毒救入於必死用板藍根乾

四貫衆一兩青黛別生甘草
右為末蜜丸如

梧桐子大以青黛別為衣如稍覺精神恍惚惡心

即是誤中諸毒急取藥一
爛嚼新汲水下

又方凡中毒及蛇虫咬傷，上好青黛，雄黃各等為末，新汲水調服二錢。又方治中諸物毒。

用晉礬，建茶，洛等為末，每服二錢，新汲水調下。

得吐即效，未吐再服。又方治蠱毒，名丹砂丸用。

雄黃另研，硃砂另研，各五錢，藜蘆，略，鬼臼，巴豆去殼心，膜油各。

二錢五分為末，蜜丸如豆六，每服三丸，空心乾姜湯下。

當轉下惡物，并蠱等如煩悶，後以鴨為羹食之。

又方治五種蠱毒用：雄藜末，麝香末各等取。

生羊肝如指，入以刀開內，裹藥吞之。又方用汁。

麻三錢，溪水調服。又方用馬兜鈴根三兩，搗篩。

分為三貼，每一貼以水一大鍾煎至五分，去渣空。

心煩服，當時吐蠱出未快，再服之以快為度。又。

方救中蠱毒用白礬一塊，嚼之覺甜不澀，次嚼黑。

豆不腥者便是有蠱，也用木梳齒上垢膩不拘多。

少服之，吐出惡物。又方用石榴皮煎汁飲之，即。

吐出活虫無不愈者。又方用蚕蛻紙不拘多少。

搥作紙條，蘸麻油燒存性，為末水調一錢，頻服諸。

中毒面青脉絕昏迷如醉，只學吐血服之即愈。

又方取鷓鴣熱血隨多少，吐。又方取白雞鴨。

血灌口中立效。又方取白根搗汁半盞和酒。

服其蠱立下 又方解計

腹內毒虫用藍青

葉研水服 又方治中毒

者用蝟皮燒為灰

細研水調下二錢日進三服立愈

解中砒霜毒用漢椒四十九粒黑豆十四粒烏梅二箇甘草

節二寸碎之右以咀用六一碗煎至七分溫服 又方

白扁豆 青黛 甘草各等分 巴豆一錢去殼 右以

咀為末以砂糖一大塊水化開調一大盞飲之毒

隨利去却服五靈散之類 又方用白扁豆一合

為末冷水調下 又方用清油一碗灌之 又方

用早禾稗燒灰新汲水淋汁生絹濾過冷服一碗

毒從下利即安 又方旋刺下羊血或雞鴨血執

服無解鼠莽毒及丹藥毒 又方藍根砂糖二味

相和搗水服之或加薄荷汁尤妙及解巴豆毒

又方以地漿調鉛粉末服之立解豆豉汁亦佳

又方用醬調水灌下

救食河豚急以清酒多灌之吐出即愈 又方用五

倍子白礬等分為末水調灌之 食諸魚中毒用

橘皮汁大豆汁馬鞭草汁薑椒汁紫蘇汁飲之

食鱧蟹蝦蟆毒用豆豉一六合新汲水半碗浸令

豉水濃溫服之即愈此方治人小便秘臍下痛

有至死者 食蠟中毒濃者紫蘇飲一兩盞解之

食六畜肉中毒以壁上黃土水調服二錢即差

食牛肉中毒以豬牙燒灰為末水調一錢服

又方飲井水一碗自消 食馬肉中毒搗薑棗汁

飲一盞無作湯浴之即解 食風狗肉中毒用杏

仁三兩和皮細研和勻分作三服以熱湯三盞下

其狗肉皆全片出即差 食豬肉中毒燒豬糞為

末水調服一錢不過三服差 食鴨肉中毒以糯

米泔溫服二鍾 食牛馬肉中毒用粉草五兩細

切微炒搗細量患人喫得多少酒取無灰酒一處

研去渣溫服酒更大大吐瀉毒亦隨去雖十分渴不

可飲水飲火難救并解一切諸毒 食菜中毒用

雞糞燒為末水調服一錢未解更服 食野菌中

毒用甘草不拘多少以麻油一盞煎數沸冷服其

毒即解 又方掘新地坑汲井水於內攪之令澄

清取飲而解

治中諸藥毒用生甘草 黑豆 淡竹葉各等分 右次

咀用水一鍾溫煎服 又方用五倍子二兩研細

用無灰酒調服毒在上即吐在下即瀉 又方用

蛻紙燒灰研細每服一錢冷水調下頻服取差雖
面青脉絕腹脹吐血服之立效亦治牛馬食花蚘
蛛腹脹欲死者 中巴豆毒以黃連大豆苜蓿汁
並解之 中烏頭天雄附子毒用大豆汁解 又
方遠志防風棗肉飴糖並能解 中鼠莽毒用枯
礬細茶為末各少許新汲水調服累驗 又方用
大黑豆煮汁服之如欲試其驗先用鼠莽草葉以
豆汁澆其根從此敗爛不復生矣 中丹毒用竈
中對鍋底土水調服 誤食桐油令人嘔泄飲熱
酒乃解

諸虫蛇傷第六

救虎傷用生姜汁服無洗傷處白礬末傅瘡上 救

毒蛇傷并諸色惡虫毒氣入腹者用蒼耳草嫩葉

搗汁灌之將渣厚敷傷處大交煮汁服之 治惡

蛇惡犬蜈蚣蝎子咬傷用細辛 白芷錢雄黃

一錢麝香許右為末以好酒調服一錢 又方用具

母為末酒調令病者盪量飲之少頃酒自傷處為

水流出候水盡却以藥渣傅瘡上即愈 又方用

艾於傷處灸三五壯按去毒即愈 又方用清油

燈心點燈以傷處於煙上熏之其痛即愈 又方

用雞糞塗之 又方用柘極葉魚腥草皺面草草
決明一處研細傅上亦佳 治蛇咬傷用白礬置
刀上燒汁執燒咬處亦以礬湯服之 又方用青
木香不拘多少煎服其痛即止 又方用雄黃
五靈脂 貝母 香白芷 各等分 右為末每服二錢
熱酒調服 又方用白礬滾水泡洗傷處 治蛇
咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁 又方
用灰蓼搗汁飲之渣傅傷處仍以頭髮縛兩頭
又方用香白芷 去心 麥門冬 去心 濃煎湯調下頃刻咬
處出黃水盡腫消皮合仍用此藥渣塗傷處 又

方用水萍搗絞汁服 又方急於無風處以麻皮
縛咬處上下重者刀剗去傷肉小便洗令淨燒鐵
物烙之然後填蚯蚓泥次填陳年石灰末絹扎住
輕者鍼刺瘡口并四傍出血小便洗淨以蒜片着
咬處艾灸三五壯

治風犬傷急於無風處啣去瘡乳血或是乾孔鍼刺
去血小便洗令淨用半瓣胡桃殼以人糞填滿瘡
瘡孔艾灸一百壯後一日灸一百壯百日止急服
者用蝦蟆乾一箇斑貓二十箇去頭翅足用糯米
炒黃只用斑貓與蝦蟆為末酒調或水調服之分

為四服以小便瀉下惡物為度未見惡物量輕重
再服者用韭菜汁一盞常敷者用虎骨末和石灰
臘豬脂調傅之禁飲酒食雞魚豬肉肥膩終身忌
食大肉蚕蛹春夏初交太多發狂被咬者無出於
灸七日當一發三六日不發可全免如見痛定瘡
合便以為好不治者必死犬狂者其尾必直下不
捲口流涎舌黑色 又方去毒血以漿水洗淨紙
上炒黃丹赤色貼之妙 又方用紫蘇葉細嚼敷
患處即不痛 又方治咬傷及經久復發者用雄
黃黃明者麝香五分右研勻以酒調服二錢服後得

睡為佳俟其自醒利下惡物再進一服即見効

又方用生南星 防風各等分右為末先以口噙漿

水洗淨傷處用綿拭乾以藥粉上更不發無膿易

差 又方云此病雖為小可乃九死一生之病可

急用斑狗七箇去翅足為末酒調服於小便盆內

見衣沫似狗形亦不再發也此方累試經驗 又

方用蔥白心四十九根搗爛如膏用生蜜一同調

和用濕筒兒盛放用紙封一七日貼傷處瘡口上

七日又用蔥白皮封着如瘡口大再換膏子貼共

二七日切忌諸般葷腥 一百日外用消風散一錢

用熟健豬肉七片蔥白一匙蜜一小匙和撲弄入
原煮豬肉汁泡使蔥白熟令患人熟食小兒用肉
七小片消風散一錢蜜半匙煮服 又方取小兒
胎髮炒新香附野菊花研細酒調服盡醉 又方
用紫蘇口嚼碎塗之 治常犬傷用蚯蚓泥和鹽
研傅之亦治狂犬及毒蛇傷 又方以砂糖塗之
又方急於無風處啣去瘡孔血小便洗淨用熟
牛糞傅或鼠糞為末和豬脂傅或韭菜和石灰搗
成餅子陰乾為末和豬脂傅更以韭菜生姜搗汁
服之 又方先以蔥湯洗後以研爛杏仁塗傷處

又方用單麻子五十粒去殼非水研成膏先以
鹽水洗咬處敷貼 又方浸椒水調莽草末塗之
亦治猫傷 又方白礬為末糝瘡內畏之 又方
用虎骨屑傅上即愈

治馬咬及踏傷用艾灸瘡上并腫處又用婦人月經
或人糞或馬糞或鼠糞燒為末和豬脂傅之皆効
又方人體先有瘡因乘馬為馬汗或馬毛入瘡
中或為馬氣汗蒸致腫痛宜數易冷入漬之難漬
處以布浸濕搗之 又方割雞冠血三五滴入瘡
內大馬用雌雞小馬用雄雞 治豬咬用屋霽中

泥塗之可今之承溜也

治猴咬用薄荷汁塗之

治鼠咬用猫毛燒灰麝香少許津唾調傳之

治諸惡虫傷用蛇蛻煮湯洗三兩度或以眼粉生薑

汁調傳傷處 治蜈蚣咬以麻鞋底揩之 又方

用蚯蚓泥搥之或刺雞冠血塗或以桑樹汁傳之

又方用香附子嚼搥患處立効 治蜂螫毒用

野苧葉擦之如不便急以手就頭爬垢膩傳之或

用鹽擦或用人尿洗之或桑樹汁傳之 又方油

木梳火上炙熱熨之 又方解九里蜂毒用皂莢

鑽孔貼在蜂叮處就皂莢孔上用艾灸三五壯即

安 治蝎螫用白礬半夏各等為末好醋調貼

痛止毒出 又方先以鍼刺螫處出血冷水浸之

水稍温即易之有難浸處以舊布浸冷水頻換搦

之 又方治蝎螫雄者在一處痛用井底泥傳之

雌者牽諸處痛當簷下泥傳之或以白礬末水調

先挑出黑刺即塗之 治蜘蛛傷遍身成瘡用蔥

葉一莖小頭作一孔益蚯蚓一條攪兩頭不令透

氣搖動化為水點傷處 又方嚼韭白傳或雄黃

亦可遍身腫服藍汁 又方蜘蛛咬遍身生絲用

羊乳一味飲之極妙或用鹽和油傳上數數搥之

治蛇蝎咬或於地上坐臥不覺咬既陰腫鹽湯
溫洗數次甚效 治辟風用蜈蚣淨曬乾燒烟燻
之則云青鹽水遍灑床席即絕 治八脚虫傷其
虫隱於壁間以尿射入遍身生瘡狀如湯火傷用
烏雞翎燒灰雞子白調傅 又方用生甘草煎湯
洗之或嚼梨葉傅之或搗韭汁塗之或將麻子傅
之 治天頭蛇毒用落蘇即金絲草金銀花藤五
葉紫葛天蒼麥切碎用十分好醋煎煎先燻後洗

頭痛第七

治頭痛用皂莢為末吹入鼻中得嚏則止 又方治

遠年近日一切偏正頭疼用蘿蔔取汁一規殼令
病人仰臥右疼注入左鼻左疼注入右鼻左右皆
疼兩鼻並注之 又方用葶撥為末令患者令水
左邊疼左鼻吸一字右邊疼右邊吸一字即效
又方用大蒜一枚去皮研取汁令病人仰臥
頭以筋蘸點入鼻中急入腦眼中淚出 又方用
葶麻子一兩去皮研爛貼痛處

咽喉第八

治纏喉風以桐油灌之或燈盞底油灌之吐出風痰
立愈 馬蘭 早晚取葉冬取根搗汁和

醋滴入

又方

以閉後巡不救用皂莢

皮子半兩為細末筋頭點少許在痛處更以醋糊

調藥末塗之須臾便破血出立效 又方用蛇

蛻燒灰每用一錢以竹筒吹入喉內 又方用生

白礬研細塗於綿緘上按於咽中立破綿緘用榆

條上以綿裹作棗大是也 又方用射干即扁竹

定取新者不拘多少搗爛取汁吞下或動臟腑即

解或煎醋同研取汁噙引立愈 又方用嫩艾

葉研取汁吞下亦佳或用鼓裡草土牛膝二味生

搗爛取汁灌下 又方於病人項下左右頭髮

用手拗拔之剝然有聲立效 又方用鼠竅吹

咽喉中立止 又方以布緘於病人兩手大母指

側去爪甲一韭葉許刺二分以手引出血再以白

湯口中含漱立愈 又方治難乳蛾用皂莢

雜草燒錢繡草即百一錢為末冷水加清油數

灌下或用燈草燒灰傳上 又方治喉間長腫如

蒂鍾者鹽煨過雞毛醮傳上即消不須刺破破則

傷人 治纏喉風用紅花搗汁服之無濕者浸乾

者服 治喉閉用膽礬 白礬冬等分研極細末

合為一處如因喉閉時用簪筒將此藥吹入

急效良方卷

痛處閉口切勿熱

口涎下流

方稍

用溫水嗽之如此一二次即消腫痛矣如覺遲已
成赤紫如皂莢子大者此藥可加數次亦能消
之白滾湯可用忌生冷之物 又方用草藥名喚
金鎖匙即馬蹄草以根搗并其水調下立效

心病第九

治心痛用生地黄取汁搜麩作餅或作冷淘

多少但忌用鹽久服能療一切久心癆 又方

用地上隔年蔥搗汁一杯和香油半盞煎服 又

方用荔枝核七箇燒存性煮酒調

醋一盞加生白礬一小塊如皂莢

分溫服 又方用橘皮去白煎之 又方以新

嫩槐枝一握切去兩頭水二鍾煎一鍾去渣分

二次熱服 又方治急心痛執用窰中心對鍋

底泥為末冷水服若冷痛以酒服 又方治狂不識

人 又方七箇烏梅八箇棗十箇杏仁同處搗鹽

酒送下七丸兒不害心疼直到老 又方治虫咬

心痛香油鹽熬熱服一盞 又方治白虫咬心

痛用酸石榴東行根二兩 米三十粒水濃煎空

心服 又方治惡 或連腰膠 各隨如雞子大

青布包燒赤投酒中飲為日惡物

治狂言鬼語用蝦蟆一箇燒五
茅酒調服 治心恙

狂惡用無火酒二碗真麻油四兩共和湯枝二
十條逐一條攪一二下換遍楊枝直俟酒相和

膏煎至七分狂者強灌之令熟睡或吐或不吐
甕來即醒 治發狂欲走着邪祟 角蚕蛇紙

灰酒調服 治顛狂不止得之為
憂之極者用絲

瓜蒂半兩為末每服一錢井水調
盡畏之即止

吐後熟睡勿令驚起即效 又方治邪王
欲眠妄行不休用白雄雞二隻煮熟

養食之

腹痛第十

絞腸沙用好明礬末滾水調服 今方若陰沙

痛而手足冷有身上紅點以燔草蘸油點火燒之
湯沙則腸痛而手足暖以鍼刺其 鼎近爪甲處

分半許出血即安仍先目兩睛持下其惡血令
聚指頭刺出血 又方治絞腸沙痛不可忍用炒

鹽一兩熱湯調服危迫者灌入口中或吐或利腸
痛即止 又方以手蘸溫水於病人膝腕用力拈

打有紫黑處以鍼刺去惡血即愈 又方好酒和

姜汁温服

治心腹惡氣口吐清水用艾葉搗汁飲之乾薑汁服

又方治一切冷氣鬼邪毒氣艾和乾薑末為丸

每服三十丸 又方治腹痛氣惡用高良姜炒焦

煎服或用胡椒研碎酒煎服 治腹脹滿用獨

囊大蒜煨熟去皮綿裹塞竅治 換亦治關格

脹滿大小便不通 又方治腹脹痛用荷葉酒

煮服 又方用皂莢去子皮弦為末小兒丸如

桐子大肉汁下利後忌肉一月 治腹中腐塊

硬如石者取白楊東南枝去青皮切寸許

焦紅袋盛用酒一斗浸窰封二五日 治

逆服之 又方治腹中石塊如石痛如刀割者月

向陸良 拘多少搗碎蒸之以新土與食氣痛處

再換 又方治蛔虫日夜咬人腹內痛不可忍者

用苦練樹白皮二斤去麤皮切碎 水一斗煎至

引去渣於砂鍋內慢火熬成膏每日於五更初

用温酒調下半匙以虫下為度 又方治三虫搗

桃葉絞取汁空服一盞 又方治寸白虫用酸

石榴根一握以水濃煎神心无對肉脯次服石

榴根汁則虫盡云

腰痛第十一

治腰痛用杜仲去皮炒橘核少等分右為末每服二

錢入鹽少許食前溫酒調下 又方治腰痛併或

時挫閉用杜仲 破故紙 胡桃仁冬等分右用酒

服立効 又方用西瓜青為片陰乾為細末以

鹽酒空心調服 又方用橘核炒 殼酒服或用

少鹽及炒茴香二包不住手更煨熱熨 又方用

茴香甚 搗汁一碗分三服渣傳 曬處

治腰痛用二黍炒熟熨之

治小兒疳積用杉樹子一歲一升燒研

粒少者一二次服 愈註有神方

又方用橘核曬乾去厚薄殼兩 自研每服

錢用老酒一二盞砂鍋中煮四五沸空心服再用

熱酒一二盞確盛餘藥服盡一切 邪誌疾皆瘳

又方用荔枝核火燒存性為末酒調服 又方

用杜茴香一斤以老生姜二斤以自然汁浸茴香

一夜約姜汁盡入茴香內以好青鹽二兩同炒亦

取出焙燥碾羅為末無灰以黃糊為丸如梧桐子

大每日空心食前服三十九或五十九溫酒或米

飲下 又方治疝氣走入腎囊痛用五月五日採
穀樹葉陰乾為末空心酒下 又方用棟樹葉
碎切臨發時酒送下 又方於脚中指下中節橫
紋上灸二壯愈 又方灸外踝穴在兩脚外羅撈
下一指乃圓骨下灸三壯即愈又云灸內踝穴
不再發 治男子陰腫赤大如斗 不能治者以
馬鞭草搗爛塗之

諸氣第十三

治諸氣攻刺及感之風 者濕飲食所傷也 虎骨
嘔吞酸用陳皮洗淨新汲水可治

注風毒疼痛用芥菜子末以雞

方治走氣疼 爛用醪 澤麩皮炒熟熨之 治氣

卒奔上呼吸 有聲喘急欲死者用 燕搗汁飲之

治氣結聚 心下不散用桃樹上不落乾桃子三

兩為末每服 二錢空心温酒調下 又方用生姜

杏仁煎服

脚氣第十四

治脚氣疼痛 柳楮桑桃同煎湯洗能消腫任痛先

飲酒三杯 又方用水紅 煮汁浸之 又方每

夜用鹽擦腿 膝至足甲淹少時却用熱湯淘洗甚

在內以篋載封其口於瓦罐內煮爛取出去藥
熱食豬肚宜食五七箇見功

咳嗽第十六

治痰喘用胡桃肉三箇生姜三片臨睡細嚼飲湯

流枕又再嚼如前飲湯即安又方用飛羅白

薯五倍子等分為末每服二錢以生豬肝炙熟

應藥食後臨臥服治痰厥用白芨一兩水一碗

煎半碗入蜜少許再煎少時臨服即愈吐如不

再飲熱水一盞即吐治暴忘痰厥不省人事

油一盞灌入喉中酒更逐出痰涎立愈治

氣喘促用蘿蔔丁搗羅為末白湯調五錢食後

服之或用蜜作劑為妙

治咳嗽久患連嗽四五十聲者用生薑汁半合蜜

匙煎熟溫服三服立効又方治氣喘咳嗽用杏

仁去皮尖胡桃肉等分研為膏入蜜少許和丸如

彈子大每服一二丸食後臨臥細嚼姜湯送下

又方治久嗽氣逆諸藥不効用蝙蝠一箇去翅足

燒令焦為末水飲調下又方治咳嗽用皂莢燒

研為末白湯調二錢下治壯實人久嗽用

嬰粟殼去筋膜蜜炙為末蜜湯下又方治咳嗽

不止胸膈氣雍滯者取桃仁一升去皮尖燹皮同炒令黃細研貯瓶中以酒九升浸密封三日後每溫服一鍾日進三四服 又方用蟬蛻七枚研末粥飲調服 又方治久新咳嗽咯血用烏梅一兩嬰粟殼一箇雀炙為末每服二錢煎烏梅湯下

胃病嘔噎第十七

治傷食傷米食用白麩一盞白酒藥兩丸為末炒過滾水調服 又方治傷食食用棠蔞去核煎漿又方用紫蘇濃煎汁杏仁爛研同服 又方用蘆根五兩切碎水三鍾煎一鍾服

治乾嘔噎或致手足厥冷用橘皮四兩生姜半斤每服水七鍾煎至三鍾去渣旋溫服 治轉食嘔吐

用陳蜆殼燒白灰米飲下亦治痰嗽 又方用黃

栢末熱酒調三五錢食後服 又方用生姜一兩

切如米大醋漿一碗煮半碗空心和渣呷之 又

方用千葉白蓮樹花陰乾為末陳米湯調送三五

口再轉再服之 又方治翻胃吐食用真蚌粉每

服二錢姜汁米飲調下 又方治吐逆不止用真

黃丹四兩研細用米醋一盞煎令乾更以火煨通

紅候冷為末粟米飯為丸如梧桐子大醋湯吞七

九不拘時服

諸血第十八

治吐血并鼻中出血用藕節搗汁飲之 又方用竈
中對鍋底土一合為末新汲水一碗淘取汁和蜜
頓服 又方中好綿燒灰麩糊為丸酒調下 又
方治鼻中出血用千葉石榴花焙乾研為末吹入
鼻中 又方治吐血用側柏葉攤新瓦上焙乾為
末每服三錢米飲調食後服一月除根 又方用
側柏葉陰乾煎湯當茶服之 又方治勞心吐血
用蓮子二十一粒為末酒調二錢食後服 又方

用百草霜不拘多少研細止血糯米飲調下鼻中
出血用一字吹入鼻中二效皮肉破處及灸瘡出
血糝半錢立止 又方治吐血鼻中出血用薤白
研汁入鹽服一盞立效或以薤白汁藕汁仰頭滴
入鼻中 又方治鼻中出血用亂髮燒灰井水調
下更吹鼻中 又方每發時用亂髮一束熬緊燈
火燒出油急塞鼻中 又方用大蒜塗脚心即止
或以蔥白搗汁入酒少許滴鼻中 治失音不能
言或咯血或中風用槐花新瓦上炒香熟三更後
床上仰臥隨意食之

治大小便下血用亂髮燒灰研大酒調服二錢治
腸風下血用炒槐花荆芥穗等分酒調服亦治泄
瀉又方用茄蒂燒存性為末米飲調服又方
用栝子仁十四枚搥絹囊盛內好酒三鍾煎至八
分初服未効加多再服立止非飲酒而致斯疾以
艾葉煎湯服効勝他藥又方用椿根白皮北行
根者去粗皮酒浸曬乾為末粟肉為丸如梧桐子
大每服三十五丸淡酒送下又方用豬臟一條
控乾炒槐花為末填入臟內兩頭線縛定以好醋
於磁器內慢火煮爛切片砂鉢內研爛為丸如梧
桐子大每服一二十九丸温酒下又方治大便下
血不止用烏梅三兩燒存性為末好醋打米糊為
丸如梧桐子大每服七十九丸空心飲下治尿血
用蝦蟆衣草搗汁空心服或用淡豆豉一撮煎湯
服又方用刮竹青一大塊水煎服又方用苧
麻根十枚水煎服又方取籬下竹根斷入土多
年者不拘多少水淨洗煎湯併服數碗立止又
方用茅根煎湯飲多煎頻服為上又方治精竭
出血用麩皮炒香煮肥豬肉醮食之

消渴第十九

治消渴用田螺五升水一斗浸經宿渴即飲水每日
換水浸 又方用繅絲湯飲之如無以生絲煮汁
飲之 又方用五倍子為末以水調方寸匕不拘
時服 又方用深掘大瓜萐根削去麤皮寸切以
水浸一日一換浸五日取出爛研細絹絞汁如作
粉法乾之水調方寸七日三四服入牛乳尤好
又方用糯稻稈取中段燒灰淋汁飲或不燒煎服
亦妙或用生牛乳細呷或生蘿蔔取汁時服亦許
又方用舊屋上瓦兩片洗淨槌碎以水煮濃汁
食後溫服一小盞 又方用活蝸牛四十九箇以
水一碗於磁器中浸一宿以器蓋之其蝸自沿壁
上取水溫服之重者不過三服

霍亂第二十

治霍亂轉筋用皂莢末吹鼻中得嚏即止 又方治
霍亂轉筋吐瀉用扁豆葉生搗以少醋浸汁服
又方治霍亂心腹脹滿痰痛不吐瀉冷汗出氣絕
者用極醃鹽汁三碗熱飲一碗探喉中令吐盡宿
食不吐更服吐訖再服三吐乃止此法大勝諸方
俗人以為田舍淺近鄙而不用守死而已惜哉
又方以淨地掘一潭用新汲水一桶傾在內攪令

渾候澄河連飲三五盞立愈大忌飲白米湯 又
方治霍亂轉筋入腹痛極將死用生姜一兩槌碎
酒五盞煮熱服 又方治霍亂吐瀉服藥即出無
法可治用井水半碗白沸湯半碗相合服之 又
方治霍亂吐瀉心腹作痛用炒鹽一碗布包頓其
胸前并腹肚上熨斗火熨令氣透又以炒鹽熨其
背則愈 又方治霍亂轉筋欲死惟腹中有煖氣
者以鹽納於臍中令實沈鹽上灸七壯

瘧第二十一

治瘧疾用生姜四兩連皮搗碎取汁夜露至曉空心

冷服 又方用狗蠅一箇去翅足以蠟丸之當發
日冷酒吞下 又方用牛膝草根水煮不時服

又方名截瘧丹五月五日取獨蒜不拘多少春爛
入好黃丹再春乾濕適勻丸如圓眼大曬乾收貯
但瘧疾二三發後臨發日雞鳴時以藥一九略槌
碎取井花水而東服之即止不再發 又方用雄
黃 人參 神麪各五錢 右三味為末五月五日午
時用粽尖子七箇和為丸如赤豆大病未發時面
東服七丸無根水送下

熱第二十二

治發熱口乾小便赤用甘蔗搗汁服 又方用雞子
三箇白蜜一合和服之 又方用天麻子五合研
碎水二升煮去半分服四五劑差 又方治煩熱
少睡用小麥作飯食之 又方治煩悶用野紅花
苗根絞汁飲或水煎服 又方用葛根搗汁飲亦
治孕婦熱病心悶 又方用大豆半升水二升煮
濃汁食後服

疸第二十三

治黃疸黑疸酒疸食疸用豬脂八兩亂頭髮如雞子
大二塊同煎臨服絞去髮分二服病從小便出

又方治黃疸用絲瓜連子燒灰為末因麩得病麩
湯下因酒得病酒調下數服可愈 又方治黑疸
急用土瓜根一斤搗碎絞汁溫服當有黃水從小
便出未出更服 又方治通身黃疸用絲瓜蒂焙
乾三四錢為細末每用半字於鼻內吹入一日一
度併三日如不愈用黃芩末煎湯下五錢 又方
治黃疸身眼黃如金色者用東引桃樹根一握如
筋太者切細以水一碗煎取半碗空心溫服後三
日疸黃離離漸散忌食豬魚肉麩麩 又方治食
勞黃目黃身黃者用皂礬不拘多少放砂鍋子內

木炭燒通赤用米醋點赤為末棗肉為丸如梧桐子大每服二三十丸食後姜湯下或治目黃用蒼耳子安舌上出涎 又方治酒疸用田螺七枚水養云土槌碎取螺頭切碎以熱酒浸服或用田螺煮服 治好飲茶并乾茶葉而黃無力用花椒去核為末糊丸如梧桐子大茶湯下一十九 又方用苦草為末和炒熟芝麻不時乾服

淋濁遺精遺尿第二十四

治男子白濁婦人白帶用陳年冬瓜子仁炒為末每服五錢空心米飲調下 又方治赤濁用石蓮肉

蓮心六兩甘草炙一兩為末每服二錢燈心煎湯調下 治諸淋病小便赤澁疼痛用三葉酸漿草洗淨搗汁一盞酒一盞攪勻空心服立通 又方

治石淋用螻蛄七箇鹽三兩同鋪於新瓦上以火焙乾研為末溫酒調下二錢即愈 又方治五淋以多年木梳燒存性空心冷水調下男用男梳女用女梳 又方用白礬為細末填臍中滴以井水通即去 又方治淋痛痰不可忍及砂石淋以大蘿蔔切作一指厚四五片用好蜜蘸淹少時安鐵鏟上慢火炙乾又蘸又炙取盡一二兩蜜翻覆炙

令香熟不可焦候冷細嚼以鹽湯送下 又方治

五淋用苧麻根兩莖切碎以水一碗煎半碗服立

通 又方治血淋用蒜一柿燒存性為末米飲調下

治精氣虛滑遺泄不禁名玉瑣丹用龍骨 蓮花蕊

雞頭實 烏梅肉各等分 右為末用熟山藥去支

為膏和丸如小豆大每服三十九空心米飲下

又方治精滑夢遺及小便後遺瀝名金櫻丸用金

櫻子 雞頭實各一兩 白蓮花蕊 龍骨煨各半兩 右為

末糊丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽酒下

又方治精不禁危急者名秘元丹用龍骨酒炙

為末 靈砂水飛各一兩 砂仁兩半 訶子小者熟灰煨取肉半兩 右為末

糯米糊丸如菉豆大每服三十九空心溫酒下臨

臥白湯下 又方名樺樹根丸用良姜三錢燒灰 黃柏

芍藥各二錢燒灰存性 樺樹根皮一兩五錢 右為末麩糊丸

如梧桐子大每服三十九空心茶湯下 又方治

小便淋瀝用葵花一握水煎五七沸服之 治夜

多小便用純糯米蒸糕一片臨臥多令軟熱啖之

仍以溫酒下不飲酒白湯下多啖愈佳行坐良久

待心下空便睡一夜十餘行者當夜即止 又方

用胡桃慢火煨熟臨臥溫酒同嚼下 治睡中遺

尿用熱窠中草燒為末水調服 又方用雞肫肝
一具并腸淨洗燒灰男雌文雄為末酒調服 又
方用小豆葉搗汁空心溫服一小盞

大小便不通第二十五

治小便不通用蚯蚓搗碎以冷水濾濃汁服半碗立
通 又方治腹脹小便不通用瓜萋仁不拘多少
為末每服三錢溫酒調下不飲酒以米湯調溫服
以通為度 又方用鹽填滿臍中艾灸鹽上 又
方以烏梅肉為末水調三錢服或以麻皮一握細
切入甘草少許同煎服 又方用炒鹽半斤布裹

乘熱熨小腹 又方治小便難小腸脹用蔥白三

斤細切炒令熱以布裹分作兩處更替熨臍下即
通 又方用豬膽投熱酒中服立通 又方用棕

皮毛燒灰存性以薄酒調下即通利累試甚驗

治大小便不通關格不利用皂莢燒研末粥飲下三
錢 又方用連根蔥一二莖帶土生姜一塊淡豆

豉二十一粒鹽一撮同研爛捻作餅子烘熟掩臍
中以布絹扎定久之氣透自通不然再換一劑

又方用明礬末一撮安臍中冷水滴濕須臾立通

治大便不通用豬脂二兩水一碗煮三沸飲汁立通

又方治大便秘結至極昏不知人用大田螺二
三枚以鹽一小撮和殼生搗碎置病者臍下一寸
三分用寬帛緊緊繫之即大通未效用烏柏木根三
寸研爛調水服亦效就研爛付臍下亦妙 又方
用獨頭大蒜煨熟去皮綿裹塞糞門內即通 又
方用不蛀皂莢安瓦上燒着置馬桶內坐上熏糞
門自通 又方用豬膽一箇入好醋少許扎鷲毛
管上灌入糞門効 又方用蘿蔔子一合研碎皂
莢燒研末冷水調二三錢服 又方用生麻子不
拘多少研爛水調服之 又方用蜜四兩置銅杓
內微火煎之凝如膏以杖攪之勿令焦乘熱取出
急捻作挺子如指長插入糞門內以手按住大便
來時去之

痔漏第二十六

治痔瘡大便下血用槐樹上木耳為末米飲調一錢
日三服 又方治痔漏用蟋蟀不拘多少焙乾為
末先用白礬水洗淨貼之 又方用槐花炒枳殼
去穰各一兩為細末醋糊為丸如梧桐子大每服
二十九米飲湯空心食前下 又方用鳳眼草赤
皮蔥椒三味搗渣同煎百滾盛坐盆內令熱氣熏

痔但通手洗之如此不過三次愈矣 治五痔用
蒼耳二兩搗為末食前粥飲調下一錢効 又方
鼠乳痔用蜘蛛絲纏其上自然消落 又方治痔
瘡下血用馬齒莧洗去土搗碎絞汁緩火煎成膏
停冷每自取少許作丸納所患處 又方肛門邊
腫硬痒痛不可忍者以白礬三分碎研用熱童便
二盞化開洗痔上一日二三次効 又方用桃樹
根煮汁一日二三次洗之或用鹽湯洗之 又方
用枳殼燒烟熏一方枳殼煎湯洗一方枳殼為末
米飲調服甚効 又方用魚腥草 其狀三角一邊
青山中多有之

其葉若竹葉米多生佛殿陰處
以指擦鼻魚腥相似也

以草挹痔即愈 又方治痔瘡用鰻鱧燒熏蠶
痔虫盡死 治漏瘡惡水自大腸出用黑牽牛研
細去皮細末一分入豬腰子內以線扎青荷葉包
火煨熟細嚼溫鹽酒下

急救良方卷之一

三十九

急救良方卷之一終

