

滇南草本

醫門舉其以上卷目錄

四診總論

一曰望氣色

二曰聞聲音

三曰問病情

四曰切脈論

浮沉遲數論

脈訣歌

左寸關尺論

左手脈部圖說

右手脈部圖說

左寸心脈浮主病論

左關肝脈浮主病論

左尺腎脈浮主病論

右寸肺脈浮主病論

右關胃脈浮主病論

右尺命脈浮主病論





左寸心脉沉論

左關肝脉沉論

左尺腎脉沉論

右寸肺脉沉論

右關胃脉沉論

右尺命脉沉論

左寸心脉遲論

左關肝脉遲論

左尺腎脉遲論

右寸肺脉遲論

右關胃脉遲論

右尺命脉遲論

左寸心脉數論

左關肝脉數論

左尺腎脉數論

右寸肺脉數論

右關胃脉數論

右尺命脉數論



南京中医药大学图书馆

醫門要上卷

鄉後學管 暄較

明楊林蘭 茂號止菴手著

鄉後學管 清訂

四診總論

診法有四望聞問切是也古人四診並用所以知病之  
而治之無差世人粗忽自恃所長往往偏執其一以治之  
輒曰已知之矣此皆苟且粗率之士非聖賢競業之心夫  
望色聞聲問病切脉四診皆盡而治之尤有偏害者况不  
兼而審之乎然或疑其太鎖屑者誠非也病雖危急如能



治愈不在遲延一二時間如在遲延一二時而即死者是  
其氣數已盡雖聖賢亦不能救矣至或病人之家雖苦  
尚遲當為之寬解以細審其病情若粗忽而妄投一藥  
不可及矣况自矜所長而又畏人之笑其迂拙不兼四診  
以審之則是以人之生死而為釣名之地將所謂仁心  
安在耶故必四法兼盡其有不合則深思其故必得其應  
以不合之由然後對症立方以治之庶不至有事後之悔  
也且病人之家請人治病而不由人兼盡其四診之法則  
是猶除賊而閉之門也可不悲乎茲故為兩戒之四診也

法條列於後

望氣色

望之而面赤心火盛也其脈左寸浮宏治法宜滋腎水以平肝木如六味湯加知柏或金匱腎氣湯亦可女子四物加知柏之類或用補心湯養心湯以滋陰而降火如望之而面青肝木虛也其脈兩關與左寸俱浮緊宜引大歸源湯知柏六味湯麥味補中湯之類治之

望之而面黃脾土弱也其脈兩關與右尺俱遲緩治法宜

用香砂六君湯加苡仁治之或十味補中湯之類治之

再多食健脾之飲食更妙婦人若白帶宜歸脾湯或後  
烏雞丸亦可

望之而面白可知其肺虛唇舌淡為金亦寒其脈右寸大  
與右尺遲治法如大補湯之類治之男子多遺精女  
多白帶之症

望之而面黑可知其腎虛眼眶青黑為水尤枯其脈右尺  
浮疾左尺浮空左關浮緩若左關浮空即為不治之症  
須以大劑救陰湯治之此皆男女多慾之故也



聲為正聲音為餘音聲應六腑音應五臟咽喉有病聲音  
不明乃其常理喉中無病而亦不明是肺之病也若非肺  
病則當辨其所病之臟焉呼而吸者肝之病笑而雄者心  
之病歌而漫者脾之病哭而促者肺之病呻吟而低微者  
腎之病六腑之病亦各統於其臟之所屬也至於好言為  
熱懶言為寒言壯邪實言微正虛大概可知自喉出者為  
宮應乎脾自口出者為商應乎肺自唇出者為羽應乎腎  
自齒出者為徵應乎心自舌出者為角應乎肝亦可按其  
音以知其病矣若為風寒所開肺火抑遏則其聲音重濁

乃肺之病易治者也若久啞不能大言則肺氣衰而難治矣若因疼痛呼號而微啞者乃肺氣受傷病愈則自復舊矣不須治其啞也

### 問病情

問病情者問其素習壯弱飲食勞逸喜怒悲憂思恐為何如曾用何藥與否週身疼否之地位寒熱何如大小便之通塞渴不渴之異飲冷飲熱之分也婦人則必問其經期若何孕育產後之異小兒則必問其朝夕提抱之人乃知其得病之由但因人而問各有不同總在臨病之時適其



宜而推測之

切脈論

凡診脈之道先調自己氣息氣息者自己呼息之氣也必須  
平心靜氣不得粗浮方可診視男先左手女先右手下指  
必定先尋關脈關脈在高骨之下關前為寸關後為尺尋  
定關脈次定寸脈再定尺脈寸關尺三部尋定乃靜審脈  
氣先尋寸脈得一息四至診至三四息俱皆四至及診關  
尺亦皆如是兼初輕診之三部俱得一息四至又重診之  
亦得一息四至更輕重診至三四息俱皆一息四至概無





多少出入在常人則為平脈無病在病人則為滯兆佳脈  
若內中或關脈有出入則尋關脈之病寸尺有出入則尋  
寸尺之病且三部中無論何脈四至少者固屬有病至四  
至以上者更不待言矣如是靜審潛尋則病在何經與見  
何情似不能逃矣

一診脈必須清晨之時以平旦之氣未散已之真氣固清病  
人之血氣亦未亂且無人喧嘩澄心靜氣之時更兼四診  
以參着未有不中病情者也病情既得而處方亦無偏執  
皆能合宜者自無不萬病回春矣若病情未真且執傲乖

方寸圖無益而實害之者矣

一三指下定若關脈之情既得必復多審寸尺二部其少  
一樣無參差者方為心腎交或寸脈出而尺脈不出其  
入而尺脈不入是為不交亦不可不知也

一脈者血氣之本也血氣盛則脈盛血氣衰則脈衰血弱則  
脈微氣弱則脈遲長人則脈長短人則脈短長疏下指  
短人密下指胖人脈細瘦人脈洪胖人重下指瘦人輕下  
指性急人脈急性緩人脈緩男子尺脈常弱女子尺脈常  
盛反之則逆又不可不化裁變通於其間也然此所謂



北京中医药大学图书馆版权所有

與人規矩不能使人巧者至於能巧則俟乎神而明之者

### 浮沉遲數論

脈有 浮 沉 遲 數 浮數為陽 沉遲為陰

心脈宜洪 肝脈宜長 脾脈宜實 肺脈宜浮 腎脈宜沉

命脈宜細 當其令而見本脈者固順非其時

或見者則逆也至與本脈相反者更無論矣

### 四時主脈

春屬木肝脈為主 夏屬火心脈為主 月季屬土脾脈

為主 秋屬金肺脈為主 冬屬水腎脈為主故春位



夏洪 秋毛 冬石 反之亦逆也

一初按之而即應指者曰浮 浮有浮洪浮滑浮瀦浮空之

分 浮洪浮瀦為陽 浮滑浮空為陰 浮而有力皆虛

熱 浮而無力是血虛浮緊為數為陽在表宜汗

一重按之而乃應指者曰沉 沉有沉緊沉細沉滑之分

沉緊沉細為陽 沉滑為陰 沉而無力為虛 沉而有力

力為實無力宜升提有力宜下古人以沉為陽宜下然

不可概言下若遇沉滑而下則氣脫矣學者遇沉滑沉

之脈祇可從容和解至久病之人脈沉細而不疾不治

為佳兆若疾滑則為凶兆矣

一診之一呼息二三至者曰遲 遲有遲緩遲沉遲空之分

遲緩為陰是虛症 遲沉為陽是積滯 遲空則陰陽皆

絕矣 遲而無力者不治 遲而有力者可治學者凡遇

遲脈要皆以提補為主

一診之一呼息六七至者曰數數有數洪數滑數緊數沉之

分 數洪為陽 數滑為陰 數緊汗在氣分宜用氣藥

表之 數沉汗在血分宜用血藥表之 數在左尺之人

則汗在陰分宜以陰分之藥表之



脈訣歌

甲胆乙肝丙小腸 丁心戊胃己脾鄉  
庚屬大腸辛屬

壬屬膀胱癸腎藏 三焦陽府瀆歸丙  
包絡還從

火旁

陰陽脈歌

太陽小腸足膀胱 陽明大腸足胃當  
少陽三焦足胆

配 太陰手肺足脾鄉 少陰心經足為腎  
厥陰包絡

足肝方

陽脈歌



小腸膀胱係太陽 陽明腸胃是他鄉 若問少陽為何部 三焦與胆是其方

陰脉歌

下 歸脉同脾屬太陰 少陰心腎漫相尋 厥陰包絡肝居 部位分明要細心

妊娠歌

左尺洪疾是男形 兩邊一樣是雙生 右尺洪疾是女娠 左疾是男右是 十二經穴起上歌



手肺少商中府起 大腸商陽迎香二 足胃頭維厲

三 脾部隱白大包四 手心極泉少衝來 小腸少

聽宮去 膀胱睛明至陰間 腎經湧泉俞府位 心包

天池中衝隨 三焦關衝耳門繼 胆家童子膠敦矣

厥陰大敦期門至 十二經穴始終歌 學者銘於肺腑

記 各詳圖註

左寸關尺論

一左尺為坎右尺為離坎為水離為火不知坎中有火離中有水  
有水兩尺猶天秤然不可任其偏勝不偏勝為水火既濟





之象自無病矣若一偏勝則水火不濟故百病生焉  
氏錦囊有加減六味湯十法以治兩尺脉偏勝之病  
古不易之方也

一人之有尺脉如樹之有根本葉枝雖枯能培養其根本則

葉自有發榮之日治法必以培根本為主若徒養其枝葉

而尅伐其根本未有根本壞而枝葉不害者也故凡遇

癆之症總以六味湯治之蓋壯其水火病未有不癒者

一浮脉諸病皆責之於腎蓋水為萬物之母水生木木生火

火生土土生金金生水若水虧則不能制火火尅金金



木木尅土土尅水故其脉浮然生水又責之於脾胃蓋脾  
胃強盛則飲食消化而津液自生生不息矣故古人云調  
養脾胃乃醫家王道 氏曰人身病有百種其實不過三  
者一曰陰虛以六味湯投之二曰陽虛以八味湯投之三  
曰中氣虛以補中湯投之學者先於此三方體貼去自不  
悞人切切

三陽脉

太陽經 小腸 膀胱也其脉浮洪 寸關尺俱浮為太

陽病

陽明經 大腸 胃也 陽明脉長

少陽經 三焦 胆也 少陽脉弦胆藏魄

三陰脉

太陰經 肺 脾也 其脉沉細 寸關尺俱沉為太陰

少陰經 心 腎也 少陰脉沉 腎藏魂

厥陰經 包絡 肝也 厥陰脉微緩

一左尺屬陰陰盛則寸關俱緊宜表宜散

寸包絡相火 心君火 高關 胆 甲木

肝 喜乙 酸未

尺小腸丙火

膀胱壬水 腎真 喜天 鹹



一右尺屬陽陰無則寸關俱緊宜下宜解

寸臆中胸中

肺辛金

骨關

胃戊土

脾

己土

尺大腸庚金

三焦相火

命

真地二  
喜秋



# 左手脈圖形



心  
包絡  
丁火  
相火

腎  
膀胱  
小腸  
壬水  
癸水  
亥水

尺  
腎  
膀胱  
真水

寸  
心  
君火  
人迎

高  
關  
胆  
肝  
甲木  
乙木

手少陰  
手厥陰

足少陰  
足太陰  
足厥陰  
足少陽






左手圖說

關前一分為人迎脉人迎大於氣口是外感宜表腎為坎  
水坎中滿水中有火求水必求於火治之 用八味湯之  
類是也 凡三部皆洪緊宜表宜散

# 右手脈圖形



手太陰  
足陽明  
足太陰  
手陽明  
手少陽

右手圖說

關前一分為氣口脉氣口大於人迎是內傷且解命門為  
離火離中虛火中有水求火必求於水治之 用金匱腎  
氣湯之屬是也 凡三部皆洪緊宜解宜下

但是病不外陰陽欲知陰陽全以兩尺脉為主何以分之要  
體認熱甚則脉疾寒甚則脉遲實則有力虛則無力且陰  
盛宜表陽盛宜下陰盛之脉浮陽盛之脉實故

仲景曰陰盛陽虛汗之則宜下之則死陽盛陰虛下之則宜  
汗之則死可見陰盛宜汗陽盛宜下學者若過傷寒汗下



南京中醫藥大學圖書館藏書




最要小心切不可使汗悞下致害不淺切切記之

左寸心脉浮主病

主太陽眩暈兩目暈花心神恍惚頭疼室女經閉頭暈風  
痰症中風不語顛狂二症

浮宏 主太陽眩暈兩目昏花心神恍惚經閉頭暈



南京中醫藥大學

南京中醫藥大學圖書館

浮滑 主風痰症中風不語顛狂症

浮沉 主頭疼

左寸心脈浮病源

太陽眩暈兩目昏花心神恍惚經閉頭暈四症由心血虧而虛火妄動也

一中風不語痰症此症平日多算多謀之人多得此症

痰在包絡也經曰見痰休治痰氣盛痰自化見風休治風

血足風自滅見血休治血氣足血自安觀此而知中風不

語一症因氣血兩虧心不能生血肝不能藏血脾不能統



血肝無血養則肝枯而生風脾無血養則脾濕而不舒去  
至脾濕而不舒則不能消化飲食將糟粕不能化為津液  
而化為痰又遇肝風挾攻遂成風痰之症此病係正氣  
而邪氣盛凡治此症祇可補正攻邪不可獨攻其邪氣  
養正則邪氣自除理之所有伐正而能保身理之所無

顛狂症痰症

由肝脾二家逼起心家之火心為二家所逼則心火亦不  
甯而妄動矣所以風因痰生痰隨風甚均成顛狂然顛為  
陰狂為陽顛宜補狂宜下不可不知

通鑑

心家虛火上炎也

左寸心脉浮治法

太陽眩暈兩目昏花心神恍惚

男子年少者因色慾過度 六味湯主之

年老者因思慮過度 金匱腎氣湯主之

婦人多鬱 逍遙湯主之

婦人年老者因氣血兩虧而脾不舒暢 歸脾湯主之

室女經閉頭暈 逍遙湯加紅花續斷砂仁治之或桂枝



承氣湯亦可

中風不語 十全大補湯八珍湯之類治之或蘇合香  
參湯亦可再用如意丹吹入鼻內有涕者生無涕者  
用頂上肉桂研末開水調服

顛狂症

宜先吐之即用生菜菹子或酸漿或花椒目研末  
調服以吐為度後以四君湯加桂附紅花半夏  
頭疼 六味湯加川芎白芷之類治之

顛狂症治法甚多此處不詳合古方上詳之可也





經曰心兮本虛應物無迹虛靈之象多生虛火蓋心火生於  
肝木心火之動還因肝火之動而肝火之動又因腎水虧  
不能養肝木也故治法用六味逍遙二湯主之然亦有實  
火乃上焦包絡之火也故治法用苓連之屬瀉之夫心為  
君象日處深宮寂然不動包絡為輔治之臣包絡受別經  
之侮則包絡不甯而心亦因之不甯矣

左關肝脈浮主病

主好怒火眼疼背疼脇疼跌打損傷咳嗽吐血羊癇症癆  
熱瘧疾燥癰癭瘰耳鳴大便不通疝氣膀胱疼

浮宏

主火眼疼背疼脇疼好怒瘧疾跌打損傷癩瘰耳鳴癭袋

浮沉

主癆熱大便不通

浮緊

主咳嗽吐血

浮緊而下墜

主疝氣膀胱疼

浮滑

主羊癩症

浮大而弦

主瘧疾

左關肝脈浮病源

火眼疼好怒咳嗽吐血癩瘰癭袋耳鳴肝氣上冲而肝



南京中醫藥大學

1951

版權所有

火動也

背疼脇疼

肝氣鬱也

跌打損傷

肝血動也

瘧疾

由中氣虛而脾土濕又兼外感風寒暑熱冒家痰食

相搏沖動肝經故肝為之不甯而作瘧也所以兩關脉弦者為瘧疾

羊癇症

仆地不省人事目瞪口流白沫多出羊馬之聲由

肝血虛木枯而生風風生火風火相搏故見此症及至風

息火滅而人自省按古人治此症多為痰症治之則左矣



北京中醫藥大學  
1954  
版權所有



惟石頑老人治法責之於肝風用逍遙湯加劑治之為要  
古之神方也

癆熱 肝血弱也肝血弱由腎水虧

疝氣膀胱疼 肝氣下墜也

大便不通 肝司大便肝氣鬱則不能送之下

肝屬木而藏血血虧則不能養肝而肝氣鬱矣遂至木枯  
生火皆由腎水不足之故也

左關肝脈浮治法

火眼疼 歸芍六味湯加柴菊治之婦人有因白帶而疼



者八珍湯加劑治之亦有四物換靈散

好怒 逍遙越鞠二湯主之

背疼 逍遙倍加杭芍治之

脇疼 逍遙湯加木香萊菔治之


咳嗽 十味補中湯加桑皮貝母治之如腎脈又洪即以

此藥送六味丸 又久服八仙長壽湯更好

吐血 男子吐血起於腎六味湯 女子吐血起於肝四

物湯二方中各加萸芩貝母浙冬五味紅花治之

瘰癧 逍遙湯加紫背天葵夏枯草治之外擦金果欄帛



南京中醫藥大學

南京中醫藥大學圖書館

版權所有

觀音膏

瘰癧袋 海白菜 海螵蛸 麥芽 各一兩 生黃豆 四十粒 去皮

分十付服

耳鳴 補湯中加廣子 姜皮 治之 金匱湯更好

跌打損傷 生地四物湯加五靈脂 我朮 血竭 紅花 乳香

沒藥 大黃 治之 或芋櫚 或咳漿草 搗汁 點水 酒服 將渣

救急處

瘰癧 未分者 柴平湯下 如面色青黃者 補中湯加首烏

燕甲常山甘平藥散子



南京中醫藥大學圖書館

濟熱 四物湯加黃芩白朮板丹皮骨煎之

疝氣腫脹疼 逍遙湯大加升麻治之

大便不通 六味湯加葶藶養歸火礪杏仁桃仁治之

羊癇症早服定子藥午服九樂晚服湯藥 逍遙湯加黃

丹鬱金白礪治之

### 九藥方

人參四兩 白朮三兩 黑姜一兩 黑附一兩 玉金一兩

炙草一兩 蜜丸開水服

### 定子藥方



王金 黃丹 白礬各二錢 研末入瓦罐內用泥封口煨

香一炷取出猪心血為丸開水服

又方用百草霜鮮猪血調熱服

左尺腎脉浮主病

主頭疼眉骨疼頸經疼眼疼才疼喉疼唇焦口乾舌燥耳

管疼陰戶疼滑精淋症小便淋瀝婦人血枯經水不調

浮宏 主唇焦舌燥口乾

浮緊 主頭疼眉骨疼頸頸疼眼疼喉疼腎管疼陰戶疼耳

浮疾 主小便淋瀝症凡經在前





滑緩 主月經在後

浮滑 主滑精

左尺腎脉浮病源

唇焦口乾舌燥 虛火上炎也是因水虧不能制

頭疼眼疼眉骨疼頸頸疼喉疼牙疼 虛火上炎也

月經不調 在前為血枯而熱在後為血枯而弱

不濟之症

淋症小便淋漓 由腎伏邪火水虧不能制之故

動也



滑精 腎水虧陰虛火動也

腎管陰戶疼

此症體實者多在浮脈體虛者多在沉脈

腎伏邪火水虧不能制之故虛火動也

左尺腎脈浮治法

唇焦口乾舌燥 八仙長壽湯加鹿茸龜板治之

亦可

頭疼眉骨疼 六味湯加川芎白芷治之

眼疼 歸芍六味湯加柴菊治之

牙疼喉疼耳疼 六味湯加元參桔梗治之



經不調 六味湯加麻黃桂枝菟絲白芷治之

經不調 在前逍遙湯加紅花續斷砂仁治之 在後黃

芪補血湯加紅花阿膠治之 或八珍湯加黃芪阿膠紅

花亦可 有行經肚疼者用生山查肉桂黑姜沙糖水煎

服愈

症小便淋漓 麥冬淮膝各一兩開水泡服 又方用

五葉草水煎點水酒服 或芭蕉根搗汁點酒服 亦可或

草薺分清飲八正散治之 通利後服金匱腎氣湯

精 熟地棗皮淮葯艾實蓮鬚蟹甲瑣陽浙冬金櫻桑

蝶以仁治之或歸脾湯加桑螵蛸柏仁蓮鬚亦可

管陰戶疼 先用草薢分清飲分利之後用腎氣湯加

琥珀治之體實者即用草薢首烏銀花甘草煎服亦可

不愈加木通車前猪鬃草

### 右寸肺脉浮主病

肺脉浮本脉也但浮宜和平若浮緊而散主傷風咳嗽痰

癧水癧吼喘鼻塞淵鼻糟痰

浮緊而散 主傷風咳嗽

浮緊 主鼻塞淵鼻疼鼻糟



浮滑 主痰癰水癰吼病喘病

右寸肺脉浮病源

傷風 肺主皮毛故風邪之感在於肺家

咳嗽 肺為金主氣外感風邪入肺肺氣閉塞而不通

咳矣

痰癰水癰 肺為清虛之府不容一物痰積於肺則為癰

癰水積於肺則為水癰

吼喘 肺氣塞而不通故肺脹而氣粗也

鼻塞鼻疼 風邪入肺也





鼻淵糟鼻 肺家大傷也

右寸肺脉浮治法

傷風 人迎大於氣口為外感症人參敗毒散九味羌

湯 氣口大於人迎為內傷症麥味補中湯

咳嗽 只桔二陳湯

痰癔 酸礬飯糊為丸治之

水癔 四君湯加大劑香附治之白朮生用

乳喘 生脉散定喘湯金匱腎氣湯治之大便秘不利下之

鼻淵鼻疼鼻淵鼻糟 四症治法九味羌活湯加辛夷



南京中醫藥大學圖書館藏書

蘇飲亦可 或六味湯加元參桔梗倍加澤瀉 或  
子降氣湯 或獨用澤瀉一劑鼻糟用黃柏泡水擦於  
鼻上四症吹鼻之法用鷺不食草晒乾為末入青黛搽  
芎藭少許吹入鼻中 或用生蘿蔔搗汁吹入鼻中又用  
雀烏煎湯沖松蘿茶服頭風服此更妙

### 右關胃脉浮主病

主胃脘疼兩脇疼停食不安 食反胃哽食噎食吞酸痰症  
瘧疾

浮宏 主胃疼火症不容揉

浮緩 主胃疼寒瘕喜揉

浮宏而有力 主停食

浮宏而無力 主反胃噎食噎食

浮緩 主不安食

浮宏而弦 主瘧疾

浮滑 主吞酸痰症

右關胃脉浮病源

胃脘疼由人好食酸冷又煎氣性不平者多有此症其症

有二一曰寒症胃氣寒也一曰火症胃火盛也寒症舌



白火症舌紅寒症容揉火症不容揉揉之更痛然舌白  
亦有火症須以冷水滾水試之喜啣冷水而痛減者是  
火症喜飲滾水而痛減者是寒症再以容揉不容揉分  
之則寒熱之症無差已若又兼肝脉浮洪而痛者為挾  
氣疼兩脇上揆而痛者為挾痰此症最易誤人宜小心

兩脇疼 痰與食結也

停食 胃中有積食也

不安食 胃火盛也

吞酸 胃火盛也亦有胃寒者

反胃即食即吐 咽食哽食 三焦水乾而邪火妄動故食

不安

痰症 好食厚味又飲冷水故糟化為痰也

瘧疾 好食酸冷致內傷飲食亦感風寒也

之關胃脉浮治法

火症胃脘疼 杭芍炒梔香附神糶舌黃者加兵壳大黃

治之

寒症胃脘疼 良薑香附只實神糶法昆台烏砂仁舌白

者加黑姜治之白厚者加黑附



南京中醫藥大學

1954

數字圖書館



西寒痛 梳靈脂木香為末以酒送

挾氣痛 胃脘疼三方中各加元胡一劑

挾痰痛 胃脘疼三方中各加萊菔一劑

反胃咽食哽食 金匱腎氣湯主之五香散送麝香一分

停食舌黃者平胃散加山查麥芽神糶大黃下之如人弱

去大黃加豬皮雞羊骨糊飯各灰調湯服

吞酸 香砂六君湯加烏梅杭芍治之

不安食六部俱宏而本脉更宏是火症

香砂六君湯加

大劑炒杭黃連瀉之



痰症 生菜服子研末冷水調服吐之白礬飯為丸亦可

瘧疾 柴平湯主之小兒平胃散寸金丹姜湯主之

如久瘧不止 加味補中湯主之再不止用大補湯提之

再不止用十棗生姜湯主之再不止加蜜陀僧一錢煨

十棗生姜湯方

大棗十枚 生姜一片 檳榔二錢 草葉子二十一粒

水煎透露一夜次早又煎用桃尖三個或麻尖三個

蜜陀僧末一錢沖服 又方太乙紫金錠沖服亦可

右尺命脈浮主病



主眼疼牙疼背疼腰疼脚疼腹疼熱痢暑瀉大便不通  
帶吞酸咳嗽不能卧結胸慾淋

浮宏 主眼疼牙疼吞酸

浮緊 主背疼腰疼脚疼腹疼熱痢大便不通結胸咳嗽

能卧

浮滑 主暑瀉肚瀉

浮宏而有力 主慾帶淋症

右尺命脉浮病源

眼疼牙疼 虛火上炎也



背腰脚疼 火爍金而大腸乾燥不能利大便為大便澀阻滯而疼也

咳嗽不能卧 由大便不利火爍金大腸生火庚金剋木  
金故卧時咳愈甚

熱痢腹痛 由胃家虛熱積於大腸裏急後重之症也

暑瀉肚瀉 由相火弱而大腸寒濕又兼外感暑濕也

吞酸相火盛也 又有相火弱者

慾淋慾帶 相火動也

大便不通 火爍金而大腸乾燥不制大便也



結胸 由相火尅君火包絡結住將胃口閉塞也 此症

左尺亦浮緊 此症宜下有下至數次自汗而愈者邪

氣盡也如不下而悞汗則去死不遠至

### 右尺命脈浮治法

眼疼 歸芍六味湯加知柏治之

牙疼 六味湯加元參桔梗治之

背腰脚疼大便不通 平胃湯加只壳山查麥芽大黃下

熱痢 秦歸杭芍車前木香廣子萊菔甘草如腹疼加厚

朴大黃暑濕加烏梅治之





暑瀉 烏梅廣子煎服

肚久瀉 羌防建中湯或參苓白朮散去滑石黃連

吞酸 香砂六君湯加杭芍烏梅治之如腎脉又浮宏而

大吐者腎氣湯加鹿茸龜板沉香香附烏梅治之

咳嗽不能卧 平胃散加山查麥芽只壳只宣神糶大黃

下之年少者服蒙石滾痰丸

結胸 大柴胡湯治之

肚疼 理中湯加杭芍如不愈加元胡亦有用大將軍湯

慾淋 知柏六味湯主之如不愈加車前木通

慾帶 知柏四物湯主之或用白蓮花加蜜焙乾為未開

水送下

左寸心脉沉主病

主懶惰呵欠冷淚倦忘心顫驚悸夜夢顛倒

沉細 主懶惰呵欠冷淚倦忘

沉疾 主悸症

沉滑 主心顫驚症夜夢顛倒

左寸心脉沉病源

懶惰呵欠冷淚倦忘 心血虧而神氣不足也



顛驚症及夜夢顛倒 氣不運痰痰積於包絡也

悸症 心血虧不能制火虛火妄動其見症吵鬧罵人舌

紅面紅

驚悸夜夢顛倒三症腎脉必沉浮肝脉必沉遲心腎亦不

交矣

左寸心脉沉治法

懶惰呵欠倦忘 十全大補湯主之柏子養心湯主之

冷淚 十全大補湯加益母草夏枯草治之少者以益母

草夏草煎服

顛症驚症夜夢顛倒 先吐之即用生藥煎子方後用沉

心湯治之 顛症由肝胆虛切忌發散之藥

悸症 先用小麥甘早湯後以補心血之劑治之

附定心湯方

神砂一錢 琥珀二錢 乳香一錢 木香一錢

白蜡五錢 上桂一錢 金箔小五張

去皮

共為細末先化白蜡後入合藥末拌勻空心白湯

下一錢

左關肝脉沉主病

主雀蒙眼腰疼不能直脚疼四肢無力肌肉消瘦吞酸

疥瘡疼血塊症大便不利月經不調不孕室女經閉

沉疾 主痞疼血塊疼

沉緩 主雀蒙眼癬疥腰疼脚疼四肢無力大便不通吞酸

沉細而緩 主經水不調不孕室女經閉肌肉消瘦此數症

若脉沉疾則為癆症矣

左關肝脉沉病源

雀蒙眼 肝血枯而生虫也

腰疼不能直 庚金無水不能利大便為大便阻滯而也



四肢無刀脚疼 經曰足得血而能行血虧則不能運行  
之故也

肌肉消瘦 氣不能生血血虧則不能養肌肉也

痞疼血塊疼 肝氣鬱不能藏血血結而疼也經曰氣滯

無形血乃有形無形之氣能生有形之血氣虛不能

血故積為血塊治法不可不去其積又不可不養其

若酸 肝氣本順血不養肝則肝氣鬱而上逆也

癩疥 肝血虧不能養皮膚也

大便不利 肝氣鬱也



月經不調不孕室女經閉 肝血虧也

左關肝脉沉治法

雀蒙眼 羊連貼水紅花子青並蒸服湯藥方用紅花並

母草夏枯草煎服

腰疼不能直脚 舒肝和血散主之然肝為腎之子養肝

莫妙於滋水腎氣湯治之尤多腰疼燒腰散治之亦可或

白朮杜仲二味煎服更好

四肢無力 十全大補湯加鹿茸龜膠虎骨紅花治之

肌肉消瘦 十四味建中湯加鹿茸龜膠治之或鹿二



仙九

疝疾血塊疼 八珍湯主之 所以養其血也 用午運

硝醃乾磁瓦灰水紅花子研末調服 所以去其積

吞酸 香砂六君湯加歸芍烏梅大棗治之 婦人八珍

或十全大補各加烏梅治之

大便不利 補中湯主之

月經不調不孕 八珍湯加黃芪阿膠紅花砂仁治之

孕加益母草吳黃治之 或用大劑秦歸黃芪阿膠

室女經閉 調經卷 血湯主之 至脉不沉 桃仁承氣湯

癬疥 十全大補湯去肉桂加銀花牛旁虫退骨皮加三

治之

外治方

蜜陀僧五錢

硫黃五錢

花椒二錢

茜查五錢

耳粉 五錢飛

共為末蓖麻子半斤研末加香油四兩拌勻擺在草  
紙上捲筒點火滴油用滴出之油拌藥末擦之

左尺腎脈沉主病

沉腎之本脈也但沉宜得中若沉緊主肌肉消瘦淋症

便短月經在前不

孕沉疾腎管疼沉緩主白帶青家眼



沉滑主遺精

沉緊 主肌肉消瘦淋症小便短月經在前不孕

沉疾 主腎管疼

沉緩 主白帶青蒙眼

沉滑 主遺精此症体寔者多在浮脉体虛者多在沉脉

左尺腎脈沉病源治法

肌肉消瘦 乃腎水不能養肝木肝血虧則不能養肌肉

也治法用十四味建中湯加鹿茸龜膠治之或龜鹿二九仙

淋症 乃濕熱所致宜分利之而後補但淋症皆由腎虛



南京中醫藥大學 版權所有 大學圖書館



雖有虛實二症均宜補腎為主虛者右尺必浮疾分利  
之後宜急補之 治法先用草薢飲後用金匱腎氣湯  
小便短 乃腎家有濕熱也古人以小便責之於肺小便  
短宜順肺氣不知腎為肺之子補腎即所以補肺故經  
曰治小便當治水位故也 治法用大劑六味湯主之  
加車前水通

月經在前 此腎水不能養肝木肝血枯而熱也 治法  
用逍遙湯加紅花續斷砂仁治之

不孕 由腎水不能養肝木肝血虧而不能受孕也 治

法用八珍湯加黃芪阿膠紅花砂仁益母草治之或黃芪補血湯加阿膠亦可或加吳萸

白帶青蒙眼 經曰目得血而能視腎水虧則目昏也

治法用八珍湯加黃芪海蛸紅花虫退肉桂菊花治之

腎管疼 腎伏邪火水虧則邪火妄動也 治法同浮脉

外治白帶方

炙芪 二小

秦歸 三小

砂仁 一小

同煮烏骨雞煮熟去葯加鹽食留雞骨打碎入葯渣再熟煎熟取汁用汁煎蘆子三錢空心用湯送下

鹿角霜三錢神效

右寸肺脉沉主病

主頭疼目乾疼鼻不通背疼虛咳小便不利結痰

沉緊 主頭疼目乾疼背疼結痰

沉緩 主鼻息不通虛咳小便不利

右寸肺脉沉病源治法

頭疼目乾疼 由腎水虧不能養母所以肺氣上冲故頭

目作疼然不用治肺之葯經曰肺為清虛之府葯力不能到凡治肺病皆當責之於腎故肺病摠以滋水為主



治法 六味湯加風散之劑眼疾忌白芷

鼻息不通 由腎氣不能上升肺竅壅塞又兼外感風邪

腠理閉塞以致肺氣無出之路蓋鼻通肺竅肺氣不行

故閉塞而不通也治法 六味湯加細辛辛夷麻黃發

散之外治方以蘿蔔搗汁滴入鼻孔即通

男先灌左孔  
女先灌右孔

小便不利 小便診脈皆在腎今何在肺不知肺屬金主

氣氣行小便行令肺脈沉緩肺氣不行小便何由利乎

治法 大劑六味湯土之再加車前木通尤妥

背疼 肺主皮毛皮毛之氣不舒故疼治法 用姜葱搗



汁敷之或用大麻子葉火烘貼之

虛咳 由腎虛不能養母經所謂水涸金鑠之症也其咳

出之痰皆是白沫名曰腎咳亦名癆瘵治法搃以滋水

為主切不可用肺家之藥治之亦不可用抽薪之藥

治法用長壽湯主之或補中加麥冬五味送下六味丸

尤妥

結痰 脾濕不能養金金聚頑痰日久則乾故結 治法

用酸漿 六君湯枳桔二陳湯

外方

中國醫藥研究所藏 圖書



鼻息不通去月... 方用

我焉不合方此方在右寸脉浮治法上

右關胃脉沉主病

主腰疼四肢無力臍下疼食不消化不思飲食吞酸反胃  
噎食唾食停食虛汗乍寒乍熱大便結澁胃脘疼

沉緊

主腰疼膝下疼停食乍寒乍熱虛汗大便不利四肢疼而  
無力火症胃脘疼

沉緩



主不思飲食食不消化反胃噎食哽食吞酸四肢無力不  
疼寒症胃脘疼

右關胃脉沉病源治法

腰疼四肢疼而無力 由庚金無水大糞乾燥阻滯於大

腸氣觸中宮故腰痛不能直四肢疼而無力也 腰疼

一症左關必沉緩 治法補中湯加杜仲治之或用白

朮杜仲二劑煎服亦可

四肢無力不疼 由胃家寒濕不能生津液也疼者以大

劑鞅地秦歸火麻桃仁治之如面色黑者微加紅花若



再大便不利即用礞石瓦灰水飛細早服一二不如年老  
者上方潤之不下用生蘇仁生杏仁生芝蔴研末滾水  
調去渣和蜜調服不疼者用養臟湯或十四味建中  
湯加虎骨鹿茸龜膠治之

臍下疼 胃家停食重而成積也重者是痞症治法 理  
中湯主之體寔者用平胃散加推食之劑

食不消化 由命門火弱不能燻蒸脾胃故飲食不化也  
治法 八味湯加鹿茸龜膠治之或香砂六君湯

不思飲食 乃胃家潮濕不能受食也 此症面食不消化治之

吞酸 由胃家潮濕脾不能運動糟粕所飲之水皆停積於胃而變為酸水也治法 用香砂六君湯加杭芍烏梅白蔻黑姜治之重者金匱腎氣湯加烏梅治之如不愈加麝香

反胃 胃家潮濕不能安食也又因大腸乾枯大便不利又噎食哽食停食由相火衰弱不能燻蒸脾胃而化食也治法 均用八味湯重加鹿茸龜膠治之或金匱腎氣湯

虛汗 由食不消化津液枯竭腎虛火動也治法 用歸

芍六味湯主之

乍寒乍熱 由傷食日久大便乾燥結在大腸燻蒸胃家

將所食之物蒸乾而變為痞邪氣發時乍熱邪氣敗時

乍寒或潤或下俱要將燥糞去盡病方得愈治法同

四肢疲而無力若大便不能下即用牛連貼方治之体

實者大將軍湯下之舌白者挾黃者加附片

大便結澁 庚金無水不能滋潤故乾燥而結也治法

用平胃散加消食之劑治之或養臟湯亦可

胃脘疼 治法同胃浮脉



右尺命脉沉主病

主痿症悸症驚症不思飲食食不消化寒痢大便結澁小

腹疼白帶

沉緩

主痿症不思飲食食不消化寒痢白帶大便結澁

沉緊

主驚症悸症小腹疼

終不拘脉之緊緩俱以寒症論

右尺命脉沉病源治法

痿症

水火不齊也血氣兩虧

用腎氣湯大補湯十四



南京中醫藥大學圖書館藏

味建中湯加鹿茸虎骨龜膠治之

驚症悸症 由腎虛火炎相火上冲而尅動君火也

知柏六味湯主之再悸症甘麥湯主之

不思飲食食不消化 由相火衰弱不能燠蒸脾胃

潮濕不能受食故飲食不化 用八味湯重加鹿茸

膠治之

寒痢 相火衰而大腸寒濕也 用四君湯加山藥澤瀉

黑姜木香共為末白糖調服 又以烏梅廣子粟壳煎

煎服重者桂附養臟湯治之



白帶 相火衰也 用八珍湯加鱘海螵蛸紅花治之

大便結澁 由庚金無水不能滋潤故結澁如脈沉澁者

附子理中湯脈沉緊者用藟地秦歸火蘇桃仁治之或

養臟湯亦可

小腹疼 疼在臍上為胃脘疼 臍下為寒食疼 疼在小腹

為海底疼 指甲辰青者即陰症 用附子理中湯治之

若人六脈俱沉者不緊不疾則為佳脈

左寸心脈遲主病

與左寸沉其病

同但遲要有力部數有準若一息一至



或二息一至是為代脉即為不治之症若兩尺有力猶可治當以大劑獨參湯主之切不可見尅伐之藥

左關肝脉遲主病

主目乾疼目昏背疼冷淚腹寒疼吞酸食不消化肌肉消瘦病卧不起冷痢便血驚症顫症

遲疾 主目乾疼背腹疼

遲緩 主吞酸肌肉消瘦冷淚目昏食不消化病卧不起

遲緊 主驚症顫症

遲滑 主冷痢便血

左關肝脉遲病源治法

目乾疼目昏冷淚 目為肝竅 肝血虧則不養目也治

法四物湯八珍湯腎氣湯各加虫退紅花白菊還少丹

亦可腎氣丸亦可或用十全大補湯或六味湯各加夏

枯益母草治之年少者即以夏枯益母草白菊花紅花

煎服

背疼腹疼 中氣大虛也 用理中湯大加杭芍治之

吞酸 肝氣不舒而尅脾土也 此病面色必黑 治法男

子香砂六君湯加烏梅杭芍 秦歸大棗治之 婦人八珍



湯大補湯各加香附烏梅治之

食不消化 由肝水不能生心火心火不能生脾土也

故治法用香砂六君湯燥起肝木以生心火而生脾土也

肌肉消瘦 由肝血虧而不能養肌肉也 用龜鹿二仙

湯四物湯加炙芪紅花主之

病臥不起 有二症有中氣大虛而病臥不起者蓋肝水

為人身之中柱血虧不能養肝水則木枯不能立也有

癯憊而不能起者經曰筋乃肝之餘肝氣不舒則筋不

活動也 如中氣虛者十四味建中湯加虎骨鹿茸龜

膠治之 外治方以大麻子葉火烘貼之服久方有功

癰瘰症用大補湯加風散之劑治之外用透骨草煎洗

便血 肝不藏血血滴於大腸也 治法男子大補湯

婦人補血湯各加紅花炒荆芥秦艽地榆治之以補氣

血為主切不可濫歸脾湯亦可

驚症顫症 經曰胆藏魄胆氣虛則不藏魄而主驚顫也

用十全大補湯歸脾湯主之二方中各加琥珀

冷痢 肝不藏血血滴於大腸腐濕也此由肝氣不舒之

甚 治法用附子理中湯主之或養臟湯亦可切不可

左尺腎脈遲主病

主反胃吞酸不思飲食小便多滑精淋症腎管疼經水退  
後不孕血崩白帶昏昧陰戶疼血淋血帶咳嗽失音大  
便如羊糞倦忘驚症顫症肚腹鼓脹

遲滑 主滑精小便多經水退後

遲緊 主淋症腎管陰戶疼

遲緩 主反胃吞酸不思飲食不孕白帶血崩

才便如羊糞倦忘驚症顫症

遲疾 主咳嗽血淋血帶肚腹膨脹失音

左尺腎脈遲病源治法



反胃吞酸 三焦水乾也 用腎氣湯加鹿茸龜膠香附

沉香治之反胃加烏梅麝香

不思飲食 此腎水不能養脾也用八味湯重加鹿茸龜

膠治之

小便多 火不能制水也 用腎氣湯加白果益智仁

滑精 此脉名曰漏精由玉關不緊或由心腎不交其病

竅重方前有

淋症 由腎伏邪火水虧不能制之故邪火妄動而淋精  
也此脈不必分利即以金匱腎氣湯加琥珀治之



腎管陰力疼 用腎氣湯加琥珀治之因腎家虛火動

經水退後 腎水不能養肝木肝血枯而弱也 用八珍

湯加黃芪紅花阿膠砂仁治之

不孕 腎水虧極而肝血枯故不能受孕也 用八珍

加黃芪紅花砂仁益母草又加茱萸燒姜少許亦可或

黃芪補血湯加阿膠治之

白帶 腎水不能養脾又有心腎不交而帶者 用八珍

湯加黃芪海螵蛸紅花治之或歸脾湯去木香加海螵

蛸亦可烏骨雞方尤妙





咳嗽

由腎虛不能養母經所謂水涸金燥之病也其咳

出痰皆是白沫名曰腎咳亦名勞瘵

用大劑八仙長

壽湯主之

失音

腎絕也為不治之症

用八仙長壽湯加石菖蒲

訶子治之服十服不愈不治

肚腹鼓脹

腎虛口滿也腫症有三有氣腫水腫濕腫

即浮氣腫也按之有窩水腫也按之如石濕腫也此

由腎虛中滿中滿者膀胱水滿也女子濕腫則為血

子宮名曰血腫其症最重

治法可腎氣其加香附

香鹿茸龜板倍加車前澤瀉茯苓治之 又方火硝

蘿蔔晒乾滾水服此方是腫症俱治之

大便如羊糞 腎水不能養庚金大腸枯燥故大便乾

如羊糞也 用養臟湯長壽湯通幽湯主之不愈不

血淋血帶 腎水不能養肝木肝血弱而下滲也 用

味湯加淮膝琥珀治之或用淮膝浙冬泡開水服

再血帶 用腎氣湯歸脾湯主之早服生白朮研末冲

漿服

昏時倦忘驚症顛症 腎虛不能藏魂也 用十四味

中湯還少湯主之或獨參湯更妙養心湯亦可

以上諸症皆水虧火敗為不治之症若脉

息和緩

為可治倘見疾脉須以大劑八仙長

壽湯治之

亦或能救人詳之

右寸肺脉遲王病

遲疾 主肺癰

遲緩 主肺痿皮肉乾枯皮膚瘙癢皮起白屑

遲滑 主痰癆水癆

右寸肺脉遲病源治法



肺癆 肺大傷有毒而生瘡也 用神仙活命飲臭靈丹

治之生脉湯加白朮

肺痿 肺縮也 用六味湯主之加麻黃枳殼阿膠

皮膚燥癢起白麩皮肉乾枯 肺主皮毛肺氣虛不能行

血以養皮膚則皮肉乾枯燥癢白麩皮枯生風也 用

大補湯去肉桂加銀花虫退骨皮加皮治之用渣加荳

蘇煎湯洗之

又皮肉乾枯 用大補湯主之龜鹿二仙丸十味補中湯

送六味丸

痰癥 肺為清虛之府痰積於肺則為痰癥 用香砂六

君湯白朮生用

水癥 由水積於肺則為水癥 用四君湯加大劑香附

治之白水生用

以上諸症皆以補脾為主年少者香砂六君湯年老

者歸脾養心湯

右關胃脉遲主病

主反胃吞酸不思飲食噎食哽食痞疼冷痢腹寒疼遺精

食不消化冷瀉





遲緩 主反胃越時方吐吞酸不思飲食食不消化噎食

遲緊 主腹寒痠痞疼

遲滑 主冷痢冷瀉遺精

右關胃脉遲病源治法

反胃 或早服晚吐或晚服早吐

田脾胃潮濕不納飲食而化食

也 用腎氣湯加鹿茸 龜膠沉香香附治之

吞酸 由胃家潮濕脾不能運動糟粕所飲之水皆停積

於胃而變為酸水也 用吞砂六君湯加杭芍香附砂

仁烏梅治之或補中湯腎氣湯加劑亦可



不思飲食 由脾胃潮濕不能受食也其食不消也

相火衰弱不能燻蒸脾胃故飲食不化也 俱用八味

湯加鹿茸龜膠香附砂仁治之

噎食哽食 由相火衰弱不能燻蒸脾胃而化食 用腎

氣湯加沉香香附鹿茸龜膠治之

痞疼 由脾胃不能消化不化之物皆變為痞也 用香

砂六君湯大加杭芍治之或牛連貼方治之

腹寒疼 乃脾不能運糟粕故寒濕於胃而作疼也 用

桂附理中湯主之



於胃於是糟粕不化為津液而化為惡濁以傳入大腸也 用四君湯加山藥澤瀉廣皮肉菹共焙為末白糖調服或用理中湯四神丸亦可外治方以新瓦數片火烘熱醮醋上覆薄棉坐其上燻之立愈

精 由脾胃潮濕糟粕不化為津液而化為痰下滲於膀胱腎本清虛之府為痰所凌故不甯靜而滑也 用香砂六君湯主之或歸脾湯去木香加廣皮治之

右尺命脈遲主病

生目冷疼不思飲食食不消化四肢無力膀胱疼小腹疼

火便數白帶脫肛冷瀉腎瀉

遲緩

主目冷疼不思飲食食不消化四肢無力大便數脫

肝冷瀉

遲緊

主膀胱疼小腹疼

遲滑

主白帶腎瀉

右尺命脈遲病源治法

目冷疼

眼光屬火相火衰弱故冷疼用八味湯主之

還少丹亦可

不思飲食不消

消化也 用八味湯加鹿茸龜膠沉香附治之

礮亦可

四肢無力 相火不能運動也 用大補湯加鹿茸


虎骨紅花治之或十四味建中湯亦可

膀胱疼小腹疼脫肛白帶大便數 均皆命門火衰也

脫肛 補中湯加山藥苡仁茯苓升麻倍加治之

小腹疼 桂附理中湯主之不愈加吳茱

大便數 桂附理中湯主之數在早晨者四神丸主之





膀胱疼 腎氣湯主之

白帶 八珍湯加黃芪海螵蛸紅花治之或歸脾湯

上三劑亦可烏骨雞方更好

六脈俱遲細而無力為不洽之症但遲緩猶為可治久  
之人得遲細之脈為佳兆雖日久病無邪宜補而不  
過厚者慎之六脈遲疾為不洽之症

左寸心脈數主病

生目乾疼心神恍惚坐卧不寧多見鬼神夜多不寐夢  
多夢好怒顛狂症頭疼

數宏 主目乾疼頭疼好怒

數緊 主心神恍惚坐卧不甯多見鬼神夜多不寐夢掩

夢顛狂症

左寸心脉數病源治法

目乾疼頭疼好怒此三症 由心血虧而虛火妄動也

以滋陰降火為主男子六味湯女子四物湯各加知柏

治之

心神恍惚坐卧不甯多見鬼神夜多不寐夢掩多夢心血

虧而神氣不足又兼有邪熱也 治以安神定志為主



南京中醫藥大學圖書館版權所有

安神丸補心丹柏子養心湯治之

顛狂症說見浮脈 宜先吐之後以定心湯主之

經口實火可瀉黃苓之屬虛火可補參芪之屬益心為  
君火其火最弱宜補而不宜尅學者記之

此數症多由相火逼起包絡之火也故用滋陰降火湯主  
脈一平急宜補之

左關肝脈數主病

主眼疼脇疼吐血便血赤氣疼瘧疾

數宏 主眼疼脇疼瘧疾



數緊 主吐血便血疝氣

左關肝脈數病源治法

眼疼 由肝氣上冲肝火動也 用歸芍六味湯加柴胡

治之

吐血 肝氣冲而肝火動也 治男子六味湯女子四物

湯各加秦芫浙冬浙貝紅花五味治之

脇疼 肝氣鬱也 用逍遙湯加元胡治之

便血 肝不能藏血血滴於大腸也用平胃散加槐角藥

軍杭芍治之又用生四物湯加槐角地榆紅花 十全



大補湯加炒荆芥紅花阿膠秦艽地榆槐花治之

又方用草菓麵沙糖煎湯煮雞子服 又用生苡麵沙

糖開水調服或楊梅根水酒煎服或柿餅焙乾研末開

水調服

疝氣疼 肝氣下墜也 用逍遙湯加升麻鬱金治之

瘰癧疾 說見浮脉 治法未分者柴平湯如已分而面色

青黃者補中湯加首烏鱉甲常山草菓麩子姜棗治之

此部治法同翮浮但浮中多有實症而數則無實症經曰

虛陽鼓指陽洩於外剛則折之謂也治之寢宜小心切





不可用剋伐之劑

腎脈數主病

主眼疼頭疼耳疼耳鳴牙疼口乾舌燥咳嗽多疼乍寒乍熱自汗虛汗遺精白帶淋症血崩不孕血帶肌肉消疼

主眼疼頭疼耳疼耳鳴牙疼口乾舌燥虛汗乍寒乍熱血崩咳嗽多痰自汗盜汗

緩而無力 主白帶不孕飢肉消瘦

消 主滑精血帶

發疾 主淋症

足腎脉數病源治法

眼疼頭疼耳疼耳鳴牙疼口乾舌燥 皆腎家虛火上炎

也治眼疼歸芍六味湯加柴胡菊花治之又加夏枯草

益母草 頭疼六味湯加川芎白芷治之 耳疼耳鳴

开疼六味湯加元參桔梗治之 口乾舌燥六味湯加

花粉浙冬五味或少加知柏甘葛亦可

咳嗽多痰 乃水涸而金燥也 用補中湯加浙冬五味

貝母桑皮治之或十味補中湯送下味尤妥

乍寒乍熱 陰虛勞熱也 用幣帶六味湯加骨皮治之

汗 津液枯竭陰虛火動也 用歸芍六味湯主之

四君湯加黃芪杭芍麻黃根元眼浮麥凡藥著此方極妙

精 水虧不能制火故虛火妄動也 用歸脾湯去木

香加桑蛸相仁蓮鬚治之

汗盜汗 陰大虛也

帶 腎水不能養脾也 用八珍湯加黃芪紅花海螵

治之

崩血帶 腎水不能養肝木肝血虛而下帶也 治血

用黃芪補血湯加阿膠炒荊芥紅花鹿角霜治之或  
以鹿角霜開水調服或用芭蕉根煮豬蹄服或歸脾湯  
加藥治之如數而有力少壯者即用麻黃桂枝湯發汗  
即愈 如血帶用歸脾道遙二湯主之

腎水不能養肝木肝血枯而不能受孕也 用八

珍湯加黃芪阿膠紅花砂仁益母草治之或黃芪補血  
湯加阿膠亦可

肌肉消瘦 腎水不能養肝木肝血枯而不能養肌肉也  
用十全大補湯加減

淋症 腎伏邪火水虧不能制之故邪火妄動也 先用

草薺分清飲或八正散或用浙冬淮夕泡開水服或用

五葉草水酒煎服或芭蕉根搗汁點酒服後用腎氣湯

治之

右寸肺脉数主病

主鼻疼鼻血喉疼喉乾胸前骨疼火咳虛咳氣喘乳窩喘

数緊 主鼻疼鼻血氣喘喉疼喉乾胸前骨疼乳窩

数緩而無力 主虛咳

数緊而有力 主大咳



數緩 主哮喘

右寸肺脈數病源治法

鼻疼 肺氣不能上升肺火上炎也 用知柏六味湯倍

加澤瀉治之

鼻血 鼻通肺竅空而妄行也 用生四物湯加紅花貝

母側柏葉治之

喉乾喉疼 腎水不能養金虛火上炎也 用六味湯加

元參桔梗治之又有感寒暑而疼者人參敗毒散去沙

參加參元牛膀治之若服而不愈加升麻麻只壳發散之



南京中醫藥大學圖書館 版權所有

胸前骨疼 肺氣閉塞故作疼 用越蒼湯或麻黃桂枝

湯發散之

火咳 胃火盛而尅金也 用只桔二陳湯加貝母桑

治之

虔咳 水涸而金燥也 用八仙長壽湯六味湯保元湯

各加貝母桑皮治之

氣喘哮喘 肺家有痰有火也 用生脈散保元湯定喘

湯治之或酸礬研末飯糊為丸治之或金匱腎氣湯腎

氣丸亦可



乳窩 腎水虧而虛火炎也 用六味湯加元參桔梗治

之或用指甲焙研末吹之或用附子片噙之此症頭頂  
上必有紅泡須摘泡上頭髮以血出即愈如無泡用針  
刺出血又方用人參敗毒散去沙參用元參加牛蒡治

### 右關胃脈數主病

主背疼胃脘疼反胃吞酸即食即餓咳嗽瘧疾痰症顛症  
痢疾肚瀉肚疼遺精呃逆

數緩 主背疼肚疼即食即吐寒症胃脘疼呃逆

數宏 主吞酸咳嗽即食即餓瘧症火症胃脘疼反胃

數滑 主痰症顛症痢疾吐瀉遺精痰症胃脘疼

右關胃脈數病源治法

背疼 痰與食結也

用歸芍六君湯加丁香沉香治之

胃脘疼 說見前

治法同浮脈

反胃即吐者吞酸

皆胃火盛也

用腎氣湯加沉香

附治之

吞酸 用香砂六君湯加烏梅杭芍治之

咳嗽 即食即餓 胃火盛也 如氣實者用青龍石羔

湯氣虛者歸芍六君湯加炒梔治之



南京中醫藥大學圖書館藏

咳嗽 只桔二陳湯或青龍石羔湯亦可

顛症痰症 胃家有痰也 宜先吐之後以四君湯加桂

附紅花半夏兔絲治之或以石羔知母各一兩用鉄燒

水煎服

瘧疾 說見前未分者柴平湯已分者補中湯加劑如氣

虛不能分出者大補湯提之

痢疾 說在前 若數滑而有力為有食用平胃散加只

壳大黃木香治之 數滑而無力為寒痢四君湯加山

藥澤瀉苡仁黑姜木香杭芍共焙研末白糖調服又以





廣子粟壳烏梅木香共煎服重者桂附養臟湯治之

滑精 說見前 用香砂六君湯加苡仁倍加半夏治之

或歸脾湯去木香加鎖陽金櫻蓮鬚治之

肚疼 脾不能運化食故寒濕於胃而作疼也 用理中

湯加廣子治之

肚瀉 說見前 羌防建中湯如久瀉服之更妙

呃逆 四君湯加黃芪杭芍或補中湯加杭芍二方引俱

用柿蒂姜棗





南京中医药大学图书馆藏  
1964  
版权所有

醫門要下卷目錄

中暑合症論

中暑附方

感寒合症論

傷風合症論

傷風附方

頭痛

附方

外治方

大便門

秘結

秘結附方

大便血

便血附方

神效保產方

治疔瘡神效十方

脫肛附方

痢疾門

痢疾附方

泄瀉合症



小便門 溺血

溺血附方

不禁

遺溺

不禁附方

附遺溺

不通

不通附方

小便禱方

遺精門

遺精附方

瘰癧

瘰癧症內消治法

外治法

橫擔治法

脚心 腮下生瘡治法

治婦人乳花

腋下狐臭方



南京中醫藥大學 1954 版權所有

婦人產後見燈

紅白治法

治九種胃氣疼

小兒瘧疾

虱也

耳流

壯有三用法

乳癰

乍腮

木舌

中痰症

鼻癢

附子 人參 大黃用法



南京中醫藥大學圖書館藏



便門

...

...

野苜三臥起

平儀禱方

及西附方

承長英氣消治法

標似並滑原爽

標似並滑原爽

附遺瀉

謝云附入冬大

...

中藥武

承奇法

同興生瘡治法

標聽狐臭方



南京中醫藥大學圖書館藏

鄉後學管

明楊林蘭

茂號止卷

鄉後學管

中暑合症

凡中暑一症當四月初夏天道南行屬火而熱感雨發暑氣猶未生至五六月天熱地燥又兼雨水交加暑氣發焉及至夏末秋初處暑之日濕土司今則中暑者中濕者愈重蓋庚金伏地所謂三伏天也此季天之濕氣浮於地表人之陽氣浮於肌表正陽洩於外陰伏於內

氣盛而正氣虛之時是症墻垣不謹者多感名出中經也  
俗所謂中毒是也然有靜而自得之者如體虛之人  
不及衣服而中者或自恃強壯納涼取快而中者  
之者如行役勞苦而中大陽之毒者其六脉俱數  
寸尤甚或按之而有力或按之而無力其見症或  
發寒或頭痛身強脊痛類似傷寒者但傷寒舌胎  
中暑舌胎薄傷寒脉浮沉中暑脉數宏傷寒有口  
渴中暑口皆渴以此分之庶不至以中暑誤認傷  
寒矣  
法不可過表亦不可過裏宜和解之如清暑芳氣湯

羗舌湯人參敗毒散十味香薷散益元散或小柴胡湯  
劑治之 以上皆卻暑之盛藥宜因症加減未有不愈  
不明和解之法而誤下之則暑不除而反變為痢設  
則津液枯竭必至陰氣脫而反變為傷寒矣切切  
一中暑舌胎黃名挾食中暑其毒中入庚金治法以柴胡湯  
主之如不愈以大柴胡湯治之

一中暑舌胎黃紅而焦者論舌胎原當下之抑知因毒入膀胱  
動脾土庚金所以焦黃宜先瀉腎火即用五淋散  
之如不得已而下通幽湯可也



一 婦人中暑頭疼發熱者逍遙湯加炒芩治之

一 中暑壯熱體若燔炭者升陽散火湯治之

一 暑月嗜食瓜果致內傷生冷外感暑濕頭疼壯熱者

水無度六脉俱數宏而無力舌胎白雖曰中暑其實係

秋濕之症切不可中暑治之當以桂附為主如桂附

中湯大順散或羌防建中湯加黑姜治之

一 中暑而瀉者受濕所致也肚大痛一時瀉幾度皆是

治法以杭芍車前烏梅廣子煎服或縮脾飲香朴飲

或用六合定中丸

婦人中暑頭疼發熱者逍遙湯加炒芩治之



一中暑而成痢者亦受濕也肚亦痛其痢皆是紅白沫治法以烏梅廣子煎服或清暑六和湯亦可

一行役中暑一時肚痛不醒人事以路心土調開水服

一中暑大喘不止者以豔茶服之

一行役熱極脫衣一時小腹扭痛以路心土圍於小腹上令人更換溺小便沃之即愈或以棉花鋪肚子上令人哈之起泡為愈再服 開水立止

一中暑頭如斧闢其身壯熱而咽喉腫疼者是暑氣迫於喉以人參敗毒散去人參加元參牛蒡治之



一中暑頭疼不可忍者用豔茶占飛鹽治之夏秋可用春冬  
宜忌

一中暑昏悶不醒人事舌胎黑六脉俱沉疾此症最重用芭  
蕉根搗汁以人中黃炒黑淬汁內服之

一中暑肚腹扭痛六脉俱伏欲吐不能欲瀉不能名乾霍亂  
又有吐瀉兼行者名濕霍亂治法以縮脾散或理中湯加  
木瓜降香治之或鋸心土湯或檳榔籐燒灰調開水服或  
檀香降香煎湯服或膏糧煎湯服或食檳榔勿灰亦可

此症北省夏秋始有

滇省節候不真四時俱有輕為霍亂

重即絞腸沙治絞腸沙法燒刀散治之或理中湯加木瓜  
治之或用馬屎燒紅淬開水服或用棕樹葉煎湯服

一中暑發熱惡寒無汗口渴此症勞力者多得用水芹二三  
棵連根炒黑南豆辛二粒姜三片葱白三寸水煎服發汗  
即愈

一中暑吐血傾盆用犀角地黃湯治之

中暑附方

清暑益氣湯

治長夏濕熱炎蒸四肢困倦精神減少胸滿氣促身熱

心煩口渴惡食自汗身重肢體疼痛小便赤澇大便澇黃而脉濡者

沙參三錢 黃芪二錢 蒼木一錢 白木二錢 青皮一錢


廣皮一錢 神耑二錢 麥冬二錢 五味十二粒 秦歸二錢

澤瀉一錢 黃柏一錢炒 升麻一錢 甘葛一錢 知母一錢

甘草一錢 大棗生 姜引

一 九味羌活湯

治傷寒傷風憎寒壯熱頭疼身重項疼脊強嘔吐口渴  
不陽無汗及感冒四時不正之氣溫病熱病



羌活五分 防風 一不 蒼朮 一不 細辛五分 白芷 一不

生地 一不 川芎 一不 黃芩 一不 甘草五分 姜棗引

一人參敗毒散

治傷寒頭疼憎寒壯熱項強睛暗鼻聲重風痰咳嗽及  
時行瘟疫嵐瘴鬼瘧或聲如蛙鳴赤眼口瘡濕毒流注

脚腫腮腫喉痺毒痢諸瘡痘疹

人參三錢 羌活五分 獨活 一錢 柴胡 一錢 前胡 一錢 只壳

一錢 川芎 一錢 桔梗 一錢 茯苓 一錢 黃芩 一錢 甘草五分

生姜引





十味香薷飲

治伏暑身倦神昏頭重吐痢

香薷一錢 沙參二錢 陳皮一錢 白朮二錢 茯苓一錢

炙芪一錢 木瓜一錢 厚朴一錢 扁豆一錢五分 甘草五分

黃芩一錢 不用引

益元散 原名天水散

治熱而煩悶小便短澀

滑石六兩 甘草一兩

右為末冷水調下二三錢或燈草湯亦可如執甚加神



砂發汗葱白湯下

小柴胡湯

治傷寒中風少陽症往來寒熱胸脇痞滿默默不欲食  
心煩喜嘔或腹中疼或渴或咳或痢或悸小便不利口  
苦耳聾脉弦或汗後餘熱不解及春月時咳瘧發寒熱  
婦人傷寒熱入血室

沙參三錢 黃芩一錢 柴胡一錢 法夏一錢 甘葛一錢五分

陳皮一錢 甘草五分 生姜引

加味道遙湯

治血虛汗燥骨蒸勞熱咳嗽潮濕往來寒熱口乾便澀

月經不調

秦歸三錢 杭芍一錢五分 柴胡一錢 茯苓一錢 白朮二錢

薄荷五分 黃芩一錢 炒梔五分 丹皮二錢 甘草一錢

生姜引

### 柴平湯

治內傷外感

沙參三錢 白朮二錢 廬皮一錢 半夏一錢 蒼朮一錢

厚朴一錢 柴胡一錢 炒苓一錢 甘草五分 生姜引



大柴胡湯

治傷寒發熱汗出不解陽邪入裡熱結在裡心下痞鞭  
嘔而下利或往來寒熱煩渴譫妄腹滿便秘表症未出  
裏症又急脉宏或沉實弦數者

柴胡一錢 半夏一錢 黃芩一錢 芍藥一錢 枳實一錢

大黃二錢 姜棗引

五苓散

治太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲飲水  
者少少與之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消

渴者此湯主之及中風發熱六七日不解而煩有表裏  
症渴欲飲水水入即吐名曰水逆及傷寒症腹滿泄瀉  
不解渴而煩燥小便不利通治諸濕腹滿水飲水腫嘔  
逆泄瀉水寒射肺或喘或咳中暑煩渴身熱頭疼膀胱  
積熱便秘而渴霍亂吐瀉痰飲食瘧身重身痛

猪苓一錢五分 茯苓一錢五分 澤瀉一錢 白朮二錢

肉桂一錢去皮研沖 生姜引

如黃胆病加茵陳桑根皮治之 又有陰黃陽黃之分  
陰黃兩尺脉遲陽黃兩尺脉緊陰黃加附子陽黃用本



通幽湯

治幽門不通上冲吸門噎塞不開氣不得下大便艱難  
名曰下澆不通治在幽門

熟地五錢 秦歸三錢 大麻三錢 桃仁一錢 紅花三分

熟軍三不從蓉酒洗 炙草五分 杏仁二不

升陽散火湯

治骨熱表熱四肢發熱骨髓中熱熱如火燒捫之烙手  
此症多由血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾  
土并宜用此

人參三錢 柴胡一錢 防風一錢 葛根一錢 羌活一錢五分  
升麻一錢 獨活一錢 白芍一錢 炙草五分 生草五分  
生姜引

# 大順散

治胃脘伏暑飲水過多脾虛受濕水穀不分氣逆霍亂  
嘔吐

甘草一錢炒 乾姜一不 杏仁二不 肉桂一不去皮研細

# 香朴飲

治大小兒伏暑吐瀉虛煩悶亂



人參三錢烏梅二個茯苓一錢五分紫蘇七分澤瀉一錢

香薷一錢扁豆三錢木瓜一錢厚朴一錢半夏曲一錢

### 姜棗引

### 清暑六和湯

治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交  
痰喘氣嗽胃脘痞滿頭目昏疼肢體浮腫吃卧倦怠  
便澁赤并傷寒陰陽不分胃伏暑熱煩悶或成痢疾煩  
渴畏食

人參三錢茯苓一錢五分藿香一錢砂仁一錢扁豆二錢



北京中醫藥大學圖書館藏

香薷八分 厚朴一錢炙 木瓜一錢 紫蘇七分 烏梅二錢

炙草五分 姜棗引

### 縮脾飲

除暑渴止吐瀉

砂仁二錢 草菓二粒 烏梅一個 扁豆二錢 乾姜一錢

炙草五分 清水煎服

### 里中湯

治傷寒大陰病自痢不渴寒多而嘔腹痛蕪漉脉沉無力或絕冷拘急或結胸吐衄及感寒霍亂



沙參三錢 白朮二錢 黑姜一錢 煨草一錢 用土炒切不可用蜜

降香引

清暑十全散

治伏暑胃氣不和心腹滿痛

香薷一錢 烏豆二錢 厚朴一錢 紫蘇七分 茯苓一錢 五分  
白朮二錢 藿香六分 木瓜一錢 檀香一錢 煨草五分

生姜引

香薷丸

治大人小兒傷暑伏熱燥渴煩悶頭目昏眩胸膈煩滿





嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食并治霍亂吐

痢轉筋等症

香薷一兩木瓜二錢紫蘇二錢藿香二錢洗  
茯苓二錢

檀香一錢丁香五分吳草三錢

右為末煉蜜為丸雞頭子大每服一丸至二丸細嚼溫湯下或新汲水亦可

蓬原飲

檳榔三錢厚朴一錢知母一錢白芍一錢黃芩一錢

甘草五分草果仁二十一粒水煎午後溫服



舌白加黑姜舌焦黃加犀角口渴加甘葛胸膈飽悶加

蒼朮

再附便方

蒼朮三小雄黃三小花椒七分去核麝香一字

共為末吹入鼻中或點入眼角或用燒酒調服三分以

取嚏為愈

一方用如意丹吸鼻內取嚏為愈

一方用太乙紫金錠姜湯調下治中暑不醒人事

中暑昏悶不醒人事舌胎焦黑六脉俱沉疾用芭蕉根



搗汁以人中黃燒紅淬於內服之

人參養胃湯

人參

藿香

蒼朮

厚朴

茯苓

廣皮

草菓

法夏

烏梅

甘草

犀角地黄丸

生地

撫芎

杭芍

秦歸

犀角

炒苓

黃柏

知母

紅花

甘草

感寒合症

經曰春溫夏暑秋濕冬寒皆四時不正之氣但滇省地處



天未節候不真天偶陰雨即冷人冒之即為感寒症其脈  
六部俱浮沉而右尺尤沉其見症或太陽疼頭痛背疼惡  
風喜熱得暖便解發熱身重而疼胃脘寒疼臍下疼小腹  
痛舌白而無胎此症亦內傷之人多感蓋寒邪易於乘虛  
而入也較傷風則重傷寒則輕傷風鼻塞聲重感寒鼻不  
塞聲不重類似傷寒但傷寒有陰陽感寒獨傷於陰傷寒  
有汗有下感寒祇宜溫以散之而不可表輕者服胡椒湯  
圍爐即散重者羌防建中湯王之如不愈桂附理中湯治  
之胃脘寒疼理中湯加良姜香附台烏臍下疼理中湯加

枳實香附山查神糶麥芽小腹疼理中湯加桂附然有體  
實者因飲食後自恃強壯脫衣飲冷取快一時致寒邪與  
食相結其見症大熱發渴譫語而脉六部俱沉緊而右關  
沉緊而實治法不可補不可表宜下之理中湯加大黃枳  
實主之

一老人得此症用十四味建中湯倍加姜附加羌活治之

一產婦而感寒者因臨盆過早頭疼發熱切不可表祇宜補

血散然再以火光試之如見火光紅者用四物湯加黑姜

紅花蒲黃五靈脂山查益母草童便治之見火光白者用



八珍湯加黃芪紅花黑蓼益母草姜棗山查酒引治之  
經產婦百日忌柴胡學者宜知不可表之義矣

一官箭風而一點痛者用姜艾治之或用生附子研末酒麵  
調勻敷之立愈

傷寒有即食即吐類似反胃者須以舌胎分之凡胃無舌  
胎傷寒有舌胎宜用金匱湯或桂附理中湯先煎丁香沉  
香水香白蔻麝香少許用湯藥調服一酒盃二湯中各加  
降香

傷寒發汗藥



熟地 秦歸 白朮 黑姜 黑附 肉桂 炙草

生姜引開水煎臨服點姜汁三四匙

### 傷風合症

傷風為百病之源世醫均以為細小疾病輕視忽略不察  
虛實攻補妄投為害不淺夫傷風者書所謂新咳嗽鼻塞  
聲重頭痛惡風者是也其脈六部俱浮宏治者宜以人迎  
氣口兩脈分之如人迎大於氣口者為外感傷風是實症  
治法宜表之散之如氣口大於人迎者為內傷傷風是虛  
症蓋由腠理疎風邪得以乘虛而入治法宜補之提之若



以外感傷風認為虛症而誤投補益之劑則風邪不得發越誠所謂開賊破家變症百出矣 如結胸痞滿等症皆

由此出以內傷傷風認為實症而誤投發散之藥則益虛其虛必至亡陰亡陽其禍不可勝數此症宜忌房勞若不守禁則有陰陽相易之患 如虛者變為傷寒實者變為

痢症虛者陰氣愈虛則虛火愈動以致水涸金枯子反尅母男成癆瘵女成乾血實者邪入於胃則飲食不能消化大腸乾燥庚金尅辛金而成火咳卧時咳愈甚 夫表補誤投縱亡陰不過自汗盜汗亡陽不過乍寒乍熱不思飲

食猶易調理若至失守則亡陰亡陽之患必至肌肉消瘦  
卧床不起雖有神人亦莫如之何矣衛生君子可不慎哉  
一傷太陽而得者名熱傷風鼻塞涕黃鼻中息息有聲熱氣  
噴人治法宜發散中加清涼之劑

一頭如斧闢腰脊強四肢倦怠鼻塞無涕名濕傷風治法宜  
發汗中加解肌之劑

一熱傷風治法小柴胡湯加蘇葉薄荷葱白生姜如不愈九  
味羌活湯人參敗毒散升陽散火湯治之

一濕傷風治法樂平湯加黑姜藿梗防風荆芥葱白生姜加

不愈羌防建中湯加蘇葉薄荷生薑人參敗毒散加黃芩

治之

外感傷風治法參蘇飲九味羌活湯升陽散火湯六和湯

治之 或用水芹萊方亦可

一內傷傷風治法 十味補中湯姜棗煎服一劑不愈二三

劑必效 此方世多不知用惟東垣先生製補中以象入

卦丹溪先生加麥冬五味以象天地馮氏出而此方始行

為千古製傷風之神方也

一老人傷風脈雖六部浮宏皆虛陽鼓指也 治法宜補正





攻邪如十全大補湯去肉桂加桂枝羌活防風蘇葉薄荷  
治之

一 小兒傷風即用寸金丹葱薑湯下發汗即愈

一 產婦傷風夫產婦亡血過多雖實者亦虛矣何況虛人乎

故偶有不謹風邪即乘虛而入治法宜補正則邪自除切

不可表 若庸醫不明汗即血之理而妄用柴胡荆芥等

藥以發表之則汗愈出而血愈虛而熱愈甚矣故曰產婦

百日忌柴胡正謂此也 然亦有惡露不盡者須以火光

試之若見火光紅者可加童便否則補正除邪為主



一孕婦傷風治法同產婦蓋孕婦以血養子如必表之則血虧而子不能存矣

一傷風變痢疾一症由誤服補藥邪伏於裏宜急治痢疾痢疾愈而傷風自除矣

一痢疾變傷風由內虛腠理不密宜急治傷風傷風愈而痢疾亦愈矣

傷風附方

和夢飲

陳皮 錢  
蘇葉 一錢  
姜 三片  
葱白 一個  
煎服



如咳嗽加蘇子二錢法夏五分

元味羌活湯

羌活 防風 蒼朮 細辛 白芷 生地 川芎

黃芩 甘草 姜一片棗一枚

人參敗毒散

人參 羌活 獨活 前胡 柴胡 只壳 川芎

桔梗 茯苓 黃芩 生草 姜引

小柴胡湯

人參 黃芩 柴胡 法夏 陳皮 甘草 蘇葉



南京中醫藥大學

1954

版權所有

薄荷 甘草 葱姜引

升陽散火湯

沙參 葛根 柴胡 防風 羌活 獨活 升麻

白芍 炙草 生草 姜引

柴平湯加劑

沙參 法夏 柴胡 蒼朮 厚朴 炒苓 陳皮

加黨姜 加藿梗 加防風 加荆芥 甘草 姜葱引

羌防建中湯加劑

羌活 防風 炙芪 桂枝 杭芍 薄荷 蘇葉



炙草 生姜引

參蘇飲

沙參 蘇葉 陳皮 前胡 枳壳 桔梗 法夏

茯苓 甘葛 木香 甘草

十味補中湯

炙芪 當歸 沙參 白朮 柴胡 陳皮 升麻

炙草 麥冬 五味

六和湯

砂仁 法夏 杏仁 沙參 茯苓 藿香 扁豆





木瓜 甘草

# 頭痛

凡診頭痛者先審久暫次辨表裏蓋頭暫痛者風邪外襲  
於經表症也久痛者元氣虧傷於內裏症也故頭一症內  
傷之症也且其脉六部俱浮弦而兩尺更甚竒病論說曰  
腦者陰也髓者骨之充也若是則頭風者豈非少陰之病  
乎况水為萬物之母頭為人之元氣元氣一虧則水不能  
滋土而脾倦生痰不能養肝而木枯生風即氣血亦因之  
而餒矣且不能制命而相火上炎不能潤大便而邪火昌

熾此頭風之屬於氣血痰者其實皆歸於腎也此其大綱也至於治法又宜因症因脉詳加療治也或陽虛者即氣虛之屬也微感外邪則其症必畏寒喜熱羞明倦怠治宜扶陽為主如理中十全大補補中益氣之類皆可擇用之或陰虛者即血虛之屬也多因水虧虛火乘即發治宜壯水為主如六味四物三陰煎之類主之火微者八味左歸之類主之或蕪痰者痛時胸滿脇脹欲吐不休則宜蕪痰治之如先以二陳湯平胃散之類主之或先吐之亦可或挾火其痛必甚其症多內熱其痛或振振而蕪脹口

渴飲冷則宜煎火治之 如白虎湯之類先下之若夫痛在半邊者在腦後者在顛頂者連眉骨者連眼者連齒者又有雷頭風者痛而起核塊或頭中如雷鳴其症雖多搃不外察其寒熱蕪變而治之搃之令人元氣多虧切不可泥古入陳方過投以風散之藥使益虛其虛至風入於腦發為真頭疼則危矣

附方

氣虛治法

補中湯加川芎蔓荊子菊花

十全大補湯加川芎柴胡

甘葛 十四味建中湯加鹿茸龜板附子人參肉桂桂

附理中湯

血虛治法

黃芪補血湯加羌活防風柴胡紅花 四物湯加羌防柴

胡紅花倍川芎 十全大補湯加柴菊倍川芎

陰虛治法 偏頭風同法

六味加柴胡 理陰煎 還少丹 龜鹿二仙丸 腎氣

湯 婦人多因白帶而痛歸脾湯加海螵蛸或腎氣湯

逍遙湯加黃芩



大腸實火治法

通幽湯 白虎湯 小承氣湯

平胃散 加山查 萊菔子

命門實火治法

知柏六味湯 加柴菊

虛火治法

八味湯 加羌活 桂附人參湯

痰治法

萊菔子吐之 二陳湯 加甜葶藶 厚朴 貝母 桑皮 胆星 痰

竹葉或蒙石滾痰丸



南京中醫藥大學 1954 版權所有



雷頭風治法 腦後顛頂疼治同

大劑六味加羌活防風麻黃桂枝蔓子

連齒疼治法

八味湯加細辛 六味加元參桔梗蔓荆子

連眼疼治法

歸芍六味湯加柴胡菊花蔓荆有翳者加虫退

連眉骨疼治法

大劑六味湯加羌活防風白芷桂枝

耳底疼治法



六味加元參桔梗黃芩

外治方

連牙疼噙肉桂上清丸

偏頭疼以火烘之

顛頂疼以蒸活防風細辛白芷煎湯燻蒸鍋蓋更替頂之以

汗出為度以猪骨髓搽之 大抵以炙法為上灸法用

姜一片貼在痛處加艾火炙之炙至不痛為度神效

大便門

秘結

秘結一症古方有虛秘風秘氣秘熱秘寒秘濕秘等說此

真南草本

上



南京中醫藥大學圖書館

其立說大繁不知此症之當辨者惟二  
曰陰結陽結而

已蓋陽結者邪有餘宜攻宜下者也陰結者正不足宜補  
宜淋者也如此二者抑知秘結之綱領矣然秘結之由除  
陽明熱結之外則悉由乎腎經曰北方黑色入通於腎開  
竅於二陰是知腎主二便腎經津液乾枯則大便閉結矣  
但陰結有二一則陽虛二則陰虛凡下焦陽虛陽氣不行  
則不能傳送而陰凝於下此陽虛而陰結也下焦陰虛則  
精血枯燥而臟腑乾稿此陰虛而陰結也故治陽虛而結  
者但益其火而陰凝自化 治陰虛而結者則壯其水而

涇渭自通大抵陽結症必因邪火有餘或以飲食之火起於脾或以酒色之火熾於腎或以時令之火畜於臟此皆壯氣實之人方有此陰結者總由七情勞倦色慾以致陰氣內虧陰虛火燥而然若老人及產後便結大都由血燥血虛治此者無他虛者補之燥者潤之而已至若停食胃脘大腸燥結咳而不能卧卧則愈咳此庚金尅辛金也治宜潤燥而蒸以消食

秘結附方

附子理中湯

治脈緩舌白係寒秘者

平胃散  
通幽湯

治脉宏舌黃係火結者

五子方

治老人虛人便秘不可下者

桃仁

杏仁

火麻仁

郁李仁

松子仁

六味湯

加茯苓

秦歸

枸杞

醒脾丸

麻仁

枳實

大黃

厚朴

杭芍

杏仁

加劑潤腸丸

治虛結不能服大黃

麻仁

郁李仁

秦歸

陳皮

枳壳

養血潤腸丸





十胃散  
通幽湯

治脉宏舌黃係火結者

五子方

治老人虛人便秘不可下者

桃仁

杏仁

火麻仁

郁李仁

松子仁

六味湯

加茯苓

秦歸

枸杞

生脾丸

麻仁

枳實

大黃

厚朴

杭芍

杏仁

九刺潤腸丸

治虛結不能服大黃

麻仁

郁李仁

秦歸

陳皮

枳壳

廣五潤腸丸



生地 熟地 秦歸 桃仁 杏仁 郁李仁

陳皮 紅花

秘盛者加大黃枳壳 寒盛者加附子

# 大便血

腸胃本無血而有下血者大腸之病也大腸何以病下血邪血以感之也 盖心生血肝藏血脾統血心肝脾陰絡不傷腸胃不虛雖有外邪亦不能為患惟醉飽同房坐臥風濕恣啖生冷以致濕熱陰絡受傷外邪得以乘之 經曰陰絡傷則血內溢而便血此言陰氣內結不得外行滲



入腸間寒濕生灾而外邪之勝也外邪者風寒暑濕是也  
風每傷肝肝傷則不能藏血而下者醉後飲冷飲寒內傷  
血為寒凝滲入大腸而下者內外傷血血傷凝胃隨氣下  
流而致者膏粱人厚味酒色藜藿人勞役過度以致熱積  
下焦而致者然寒毒下血者腹中不痛熱毒下血者腹中  
多痛更有內傷陽氣不足下焦之陰无元陽以維之而下  
者 書所謂病人面無色脉浮弱按之絕者下血也有經  
虛陽氣下陷不能統血以致血隨氣降而下者蓋陰必從  
陽血必從氣脾為氣血生化之源故必賴補中升陽以胃

藥收功挾熱下血清而色鮮為腸風因臟腑有熱邪氣外入隨感而見者也挾冷下血濁而色黯者為臟毒因腸風日久內傷蘊積久而始發者也故腸風者風邪淫乎腸胃也臟毒者濕邪淫乎腸胃也若血射如線者虫痔也自肛門蝕孔處出也糞前出者為近血出於腸胃便後出者為遠血出於臟腑 凡下血症脉數有力唇焦口燥是為有熱宜清熱脉細無力唇淡口和喜熱畏寒或四肢厥冷是為有寒宜升提有因酒毒結而下血者實者清其毒虛者兼理其脾有脾胃氣虛而下者此血無所主因而脫隘矣

行速宜温脾補胃有病久而滑不止者氣陷不舉也宜升  
提固澁之有陰結便血者風寒之邪結於陰分不得外行  
則病歸血分宜散之有怒氣傷肝血因氣逆而下者宜平  
肝理脾丹溪曰凡下血不可純用寒涼藥必加辛味為佐  
久不愈宜用温劑必兼升提之藥仍加酒浸酒炒以寒因  
熱用故也其脉左關遲滑或數緊或右尺數緩浮

便血附方

槐花散

治脾胃有濕脹滿下血

蒼朮

厚朴

陳皮

枳殼

白朮

槐花

甘草



烏梅

芍藥黃連湯 治大便秘後下血腹中爽

芍藥 酒炒 黃連 酒炒 秦歸 淡桂

大黃

炙草 木香 檳榔

燕紅丸 治臟腑虛寒下血不止面色痿黃日久羸瘦

側柏葉 酒炒 鹿茸 醋炙 附子片 續斷 酒炒

阿膠 蒲黃 炒 黃芪 當歸 酒炒 白礬 煨

歸脾湯

沙參 炙 白朮 茯神 棗仁 遠志 黃芪



木香 秦歸 炙草 阿膠 紅花

防風秦茺湯 治腸風下血

防風 秦茺 蒼朮 香附 羌活

杭芍 秦歸 升麻

加味四物湯

生地 秦歸 杭芍 川芎 紅花 地榆

槐角 貝母 荆芥 藜蘆

補中益氣湯 治脾胃氣下陷

人參 黃芪 白朮 秦歸 陳皮 柴胡



保產方

紫厚朴 七分 姜汁 浸炒

當歸 一不五分 酒洗

川貝母 一不志淨為末將藥 煎好投入藥服

川芎 一不五分

川羌活 五分

枳壳 六分 麸炒

荊芥穗 八分

藜艾 七分 醋炒

生黃芪 八分

甘草 五分

兔絲子 一不揀淨 酒泡

白芍 一不一分 酒炒 冬用只用一不

生姜 三片

水二鐘煎

先服者空心

服如臨產及胎動不安竝勢欲小產者皆臨時熱服

如人虛極加人參五分如無人參以丹麥五錢代之

治疔瘡神效凡十方錄後

血疔 血出不止用真麻油一碗服下即止

疔瘡 初起飲菜子油一鐘即無性命之憂

疔瘡煩燥作渴惡毒攻心

青靛

二兩散者佳成團者有石灰不可用

雄黃五小麝香少許蒼耳灰三不

研末每服二錢蜜水調下可以護心

又方用土蜂房全個蛇蛻一條同研入瓦礫中黃泥封固煨

育性為末每服一錢酒調下少頃腹中大痛止其瘡已

化為黃水矣 此方治疔瘡之危篤二服輕者一服

馬六畜肉毒 生疔瘡昏狂欲死者

升麻

甘草



九製大黃丸

一方用莖麵拌勻白糖調服

一方用草菓麩沙糖煮雞子服

一方用柿餅瓦上焙乾為末白糖調服

脫肚附方

九製大黃丸

蒙石滾痰丸

平胃散 加大黃 以上治熱脫肛

十味補中湯





金匱腎氣湯 以上治寒脫肛色怒過度

歸脾湯 加升麻 治脾氣不舒

大補湯 加升麻 治大病後元氣虛損而脫者

十四味建中湯 加升麻 治同上

大小腸痛絞陰陽拂逆也大便秘先出小便後出名曰絞腸疝

苓散主之 復有老人陰陽乾枯大腸燥結便溺俱白

頻出此非絞腸乃氣血衰敗之候也 八珍湯主之

遺尿有二症一因脾胃虛弱倉廩不固腸滑而遺者一因

火盛急速逼迫而遺者脾虛理中治之火盛芍藥湯治之



湯加減治之

脫肛有二症一因氣虛下陷而脫者

補中益氣湯治之

一因腸胃有火腫脹下脫者

四物湯加升麻黃芩治之

荷之屬治之

# 痢疾門

凡痢疾一症由人當暑熱酷烈之時過食瓜果嗜寒冷魚

燻醞釀日久以致內為飲食所傷又煎外感濕熱於客氣

盛而主氣弱則溫從冷生熱從暑襲冷熱鬱遏積滯生焉

以至大傷脾胃而受寒濕矣脾土寒則不能生肝木肝氣



亦因之不舒反下陷入土中而不能藏血以滴於大腸  
膜腐臭遂至庚金不能尅甲木反為甲木所欺凌矣故  
診痢疾之脉全以兩關右尺為主而分寒熱噤口遲過四  
症熱者裏急而肚痛胃家有停積大腸口乾燥其見症小  
便短少口渴喜飲冷 治法宜平肝養胃利大腸為主即  
用平肝利臟湯加大黃下之體弱者加熟軍下之其脉或  
浮或沉俱實而有力寒症者因相火衰弱不能燠蒸脾胃  
脾胃潮濕飲食不能消化所食之物俱寒冷在胃於是糟  
粕不化為精液而化為惡濁以傳入火腸也 又况遷延

日久元氣已虛積氣獨盛攻補莫施所以用桂附理中湯  
或養臟湯加山藥澤瀉豆蔻治之 蓋助相火以扶真陰

補中氣以扶脾胃其脈或沉或遲而緩噤口痢者皆因胃  
家濕甚胃口閉塞不能受食見食反惡其脈或浮或沉而  
滑治法當開其胃竅以菹菜七醋用鐵器燒紅烙之以其  
氣燻口鼻使胃竅開則能受食而不惡食也內治方仍以  
平肝利大腸為主又有遲過一症亦由胃家濕甚不能納  
食將所食之物不變而即下其脈或沉或遲而緩用土螺  
蛸大者一枚小者二枚先將螺蛸水擠出在碗中後連壳

搗細瓦上焙乾做一麪圈圍於臍上內放麝香分餘將螺  
螯填於其中用艾火燒七次至病人覺有熱氣入腹內即  
愈。至古人以寒痢為白痢以紅痢為熱痢其說不可拘  
執摠以脉之虛實分之脉虛者不論紅白俱為寒症脉實  
不論紅白俱為熱症其脉忌宏大喜沉細外忌口渴發熱  
多汗諺云痢無補法祇有下法又云通則不痛痛則不通  
此說非也總以人之虛實分之虛者補之實者宜下學者  
記之記之

痢疾附方



用酸餃去壳不拘多少貯於瓶內用紅糖削細拌勻再加  
燒酒浸之浸至二三年者更佳不論熱痢寒痢開水調服  
神效立愈

一治暑痢六脈浮宏者 烏梅廣子湯如不愈再加水香黃  
連治之

又方陳蘿苜莖入沙糖煎服

又方用炮萐菜拌醋服

一春久患痢者由夏末秋初伏住暑濕一感四時不正之氣  
即成痢疾六脈俱宏名曰瘟痢其症最重當審脈因經以

治其實宜減毒以瘟疫之類主之

# 泄瀉合症

泄瀉有二症有虛瀉有實瀉虛瀉之脉右關尺數緩舌胎

自治法宜補宜提如理中湯羌防建中湯香砂六君湯

獨參湯或十全大補湯加劑治之如補提不住此乃元氣

大傷之症宜用燒臍方治之再用四君湯加山藥澤瀉肉

蔻焙研末調白糖服否則瀉至十日必不能復救矣實

瀉之脉右關尺數疾舌胎黃瀉時肚疼此由停食日久橫

於大腸所食之物皆順其傍而下故新食不化為津液而

作瀉已於是新舊相搏所以瀉時肚疼治法宜攻舊食切不可用溫補之劑如大承氣湯通幽湯平胃散加劑之類治之蓋舊食去而瀉自止矣

一兩尺脉數宏五更作瀉者名曰腎瀉治法用四神湯加補脾之劑治之

一一時感暑頭疼發熱水瀉不止者名曰暑瀉其脉六部俱數滑治法以大劑車前杭芍廣子量加白米苡仁姜棗治之或用烏梅廣子煎服

一兩脇湊疼肚疼而作瀉者名曰陝瀉左關脉宏右關脉緩



其瀉俱是黃沫此症多由跌打所致治法用土炒秦歸菜  
煎杭芍枳壳茯苓山藥車前炙草治之一

一暑瀉用蜂蜜拌生蘿蔔服

小便門

溺血

溺血者自出小腸其症則腎管不疼而血隨溺出或隱痛於  
臍腹或熱見於臍腑蓋心與小腸為表裏此內火化氣之  
源所由以分之故無論焦心勞力或厚味酒漿併上中二  
焦五志口腹之火凡從清道以降者必皆由小腸以達膀胱



南京中醫藥大學

南京中醫藥大學圖書館

作瀉已於是新舊相搏所以瀉時肚疼治法宜攻舊食切不可用溫補之劑如大承氣湯通幽湯平胃散加劑之類治之蓋舊食去而瀉自止矣

一兩尺脈數宏五更作瀉者名曰腎瀉治法用四神湯加補脾之劑治之

一一時感暑頭疼發熱水瀉不止者名曰暑瀉其脈六部俱數滑治法以大劑車前杭芍廣子量加白米苡仁姜棗治之或用烏梅廣子煎服

一兩脇疼肚疼而作瀉者名曰陝瀉左關脈宏右關脈緩

南京中醫藥大學圖書館



其瀉俱是黃沫此症多由跌打所致治法用土炒秦歸菜  
菴杭芍枳壳茯苓山藥車前炙草治之

一暑瀉用蜂蜜拌生蘿蔔服

小便閉

瀉血

瀉血者自小腸其症則腎管不疼而血隨溺出或隱痛於  
臍腹或熱見於臍腑蓋心與小腸為表裏此內火化氣之  
源所由以分之故無論焦心勞力或厚味酒漿併上中二  
焦五志口腹之火凡從清道以降者必皆由小腸以達膀胱



膀胱不藏也此必氣虛而然蓋氣為水母水不能蓄以氣不能固也惟老人及大病後常有此失守之兆久非所宜古方中論小便不禁有屬熱屬寒之辨不知因熱而有小便頻數其症則淋瀝點滴不能禁止而小水必不利且赤白痛澁是為淋病也大抵小水雖利於腎而腎上連肺若胞氣無權則腎水終不攝故治水者必須治氣治腎必須治肺宜以參芪歸朮桂附乾姜之屬主之加以固澁之劑為佐庶得治本之道其脈左尺疾右尺沉

遺溺者遺失也睡夢中醒而後覺惟幼稚多有之大人少  
有也蓋幼稚陽氣尚微不勝約束故夜多遺失俟氣壯自  
無不愈若大人氣脫於上則下焦不約而遺失不覺者下  
元虛寒也經曰虛則遺溺此其咎在命門宜大補元陽或  
加固澁之劑為佐其脈兩尺數滑

不禁附方

附遺血溺

葶子丸

治下元虛寒小便不禁或成白溺

葶子

鹿茸

菝葜

牛夕

熟地

秦歸

杜仲

炮姜

肉桂

兔絲

巴戟

十全大補湯 治中氣虛不能統血

加 白朮 益智仁

附子理中湯 治腎敗遺溺不禁

金匱腎氣湯 加 白朮 益智 故芷

補中湯 治兩關脈弱者

加 白朮 益智 故芷

五子丸 治小便頻數時有白濁

兔絲子 菟子 益智仁 茴香子 蛇床子 各等分

玄兔丸 治小便多 兔絲酒浸 五味酒浸 茯苓



蓮子去心

山藥

故芷炒

各等分

不通

凡小便不通其因有四宜辨其虛實有因火邪結積於小腸膀胱者此以水泉乾涸而氣血熱閉不通也有因熱居肝腎者則或以敗津積血沮塞水道而不通也然此原非無水之症不過有時壅閉其病可清可利若是氣閉之症尤為危候蓋氣閉之症有二焉有氣實而閉者有氣虛而閉者夫膀胱為藏水之府而水之人也由氣以化所以有氣斯有水而水之出也由水以運氣所以有水始有溺是





以其出其入皆由氣化令凡氣虛而閉必以真陽下竭元  
海无根水火不交陰陽否隔所以氣自氣而氣不化水水  
自水而水蓄不行氣不化水則水府枯竭者有之水蓄不  
行則浸漬腐敗者有之氣既不能化而欲強為通利果能  
行乎陰中已無陽而再用苦寒之劑不已甚乎至若氣實  
而閉者不過肝強氣逆移碍膀胱或破其氣或通其滯或  
提其隘而壅者自無不去此治實者無難而治虛者必得  
其化為不易也故凡臨此症不可不辯虛實而尤有素稟  
陽藏內熱不堪溫補而小便閉絕者此必真陰敗竭無陰

則陽無以化水虧症也治宜補陰抑陽其脈左尺疾右沉

不通附方

清肺飲 治渴而小便閉或黃色邪熱在氣分

茯苓 猪苓 澤瀉 琥珀 瞿麥 肉桂 木通

甘草 燈草 通草 車前

六味湯 加車前 木通

小便雜方

尿血用芭蕉根搗汁点水酒服

小便不通加意丹二十一丸蜜水研調服



田螺去壳搗泥封臍上即通

葱白一斤切細炒熱以帕子裹更換臍上即通

小便不尿香砂六君湯加木通澤瀉

### 遺精門

夢遺精滑白濁皆失精之病雖其症有不同而所致之本則一蓋遺精之始病無不由乎心正以心為君火腎為相火心有所受腎必應之故凡年少多慾之人或心有妄思或外妄遇以致君火搖於上相火熾於下則水不能藏而精隨已洩蓋精之藏制雖在腎而精之主宰則在心所



以精之蓄泄無非聽命於心。天一生水，地二生火，腎水不上，心火不下，故元精失守也。夫腎水不上，則氣不固而陰虛；心火不下，則妄動而相火後之。以陽旺、陽旺而陰虛，則水火不交。經曰：陰陽襍，決精氣乃決於此也。有夢而遺者，由思想所致，心虛不足而不能攝腎也。無夢而遺者，多慾所致，腎精清泄而不能禁固，相火妄動所致也。有醉飽勞倦，清氣不升，脾精不運而遺者，有腎水不足，火燻蒸，精離其位而遺者，有相火旺而脾胃有傷，水谷日生之精不得與元精俱藏而遺者，有火炎上而水下，心腎不

交而滑者有年壯氣盛久無色慾精滿而溢者有脾虛下  
陷者有痰火濕熱擾動精府者然治惟宜保心滋腎因寒  
因熱而治之 若夫白濁其原在於脾腎之虛其標在於  
膀胱之寒初濁則屬濕熱久濁則為氣脫氣脫則下焦無  
火而不溫有濕熱者當辨心腎而清之無濕熱者當求脾  
腎而固之然有赤白之分清濁之辨凡赤者多由於火然  
亦有濁去大多精化不及赤未變白此又虛之甚也白者  
寒熱皆有之由精而為濁者其在心腎由溺而為濁者其  
病在膀胱脾肝絲之夢遺由於相火之強治宜清心火瀉



相火妄神定志不夢者由於心腎之虛 治宜補益其有  
因濕熱者濕熱傷腎小水不清惟主以導濕去熱水清而  
精自固矣濁之因有一一由腎虛敗精流注治宜補腎兼  
以利水蓋腎經有二穴溺竅開則精竅閉也一由濕熱滲  
入膀胱宜導濕之中兼以理脾蓋土旺則能勝濕且土堅  
凝則水自澄清也其赤者或由心火盛治宜兼以清心火  
之劑諸症虛虛實實學者臨症細心辨脈之虛實不可泥  
黃柏知母龍骨牡蠣為聖藥而不思顧其本原之地也

遺精方

熟地 五升 淨棗皮 二升 淮藥 二升 浙冬 二升 鱉甲 二升

蓮瀝 一錢 茨實 二錢 苡仁 二升 鎖陽 二升 金櫻 二升

桑螺峭 一錢 燈心 葵引

遺精附方

人參固本丸

大造丸

入方 治夢遺白濁初起

川草薺 黃柏 浙冬 兔絲 五味

竹葉燈草引



鹿茸丸 治滑精無度

熟地 棗皮 鹿茸 山藥 五味

龜膠 蓮鬚 芡實

清心丸 清心火瀉和火安神定志止夢遺

生地 丹參 黃柏 牡礪 山藥

茯苓 茯神 浙冬 五味 車前

遠志 金櫻

北絲丸 治赤白濁

兔絲子 茯苓 遠志 牡礪 車前



白茯苓

歸脾湯

去木香

加陳皮

蓮鬚

芡實

虎潛龜鹿丸

秦歸

茯苓

鹿茸

虎骨

肉桂

大鳳髓丹

治心火太盛陽狂不已

又補腎水真陰虛

損心有所感動應之而精亦施泄此方固真元降火益

腎水大有神效

黃柏

縮砂

甘草

半夏

猪苓



茯苓

蓮鬚

益智

定志丸

治心氣不足脾弱不能攝精心腎不交小便頻

人參

茯苓

遠志

石菖蒲

山藥

打糊為丸

又方

革薺分清飲

熟地

山藥

棗皮

秦苑

蓮鬚

鱉甲

金櫻

鎖陽

浙冬

桑螵蛸

癰癥

癰癥者肝病也其症多由忿怒氣逆憂思抑鬱所致





源雖由於肝實根於腎蓋腎者肝之母忿怒傷肝則肝動而血躁憂思傷腎則水不生木而氣鬱血躁氣鬱則氣病肝主筋者故累累然結如貫珠其始必止一枚次次連生大小十數而纏繞項下多在耳之前後及胸腋間者此之部位也按之則動而微疼不甚熱久之則日以甚或頸項強疼或午後微熱或夜間口乾飲食少思四肢倦怠或堅而不潰或潰而不合皆由氣血不足故往往變為勞瘵治宜養肝滋陰舒鬱為主切勿徒事剋伐以損真元初起即宜內消之切勿用針刀及敷潰爛之藥如經久不除血

汁清稀瘡口不合聚腫不赤結核無膿血氣漸衰并宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生大抵托裏之法使瘡無變壞所以宜用也至嬰兒生不因胎毒而患瘰癧者由其母之肝胆二經火鬱氣滯而然 治宜平肝化毒為主此肝經鬱結毒氣衝於上也若衝於下則為橫擔生在兩膀之間形如瘰癧而長於瘰癧不可認作流注治之宜開鬱瀝水以消之不可使之潰潰則必死蓋此因色慾過度而然也其脉左關左尺浮緊

瘰癧症內消治法

中國醫藥大學圖書館藏

柴胡通經湯 加夏枯草

柴胡

歸尾

連翹

黃芩

牛蒡

三稜

桔梗

黃連

紅花

小生草

又方

早服上清丸

加味道遙湯

加夏枯草紫背天葵

秦歸

杭芍

茯苓

白朮

柴胡

薄荷

黃芩

炒梔

丹皮

炙草

內消丸

青皮

陳皮

牽牛各二兩

薄荷葉八兩 皂角八兩 共



南京中醫藥大學 版權所有

粗皮槌碎水煎軟揉汁熬膏將前藥研末和丸食後煎

芥湯下

丙消丸

元參蒸

牡礪醋煨研貝母去心蒸各四兩

共為末煉蜜為丸開水下

神仙活命飲

歸尾

山甲

陳皮

白芷具

花粉

乳香

沒藥

天丁

銀花

夏冰

白芷

蜈蚣敗毒散



南京中醫藥大學

1951

生地

歸尾

川芎

赤芍

連翹

知母

黃柏

花粉

大黃

全蝎

蜈蚣

虫退

元參

牛蒡

防風

夏枯

土茯苓

穀精草

玉燭散

治室女經閉頸多結核

秦歸

芍藥

大黃

芒硝

熟地

黃芩

川芎

各等分每服五錢姜為引

外治法

未破者





白膠香

海螵蛸

降香

各等分為末搽患處以濕紙掩之一夕而退

已破者

蜜蜂十二個

蛇退七分半

蜈蚣二條

以藤油四兩將前藥

入油內以文武火熬成八光粉二兩用桑枝七條忌攪  
候冷出火氣七日方可用紙攤貼

海截方

生山藥

一塊

草麻子

一枝

研勻攤貼之

又方用



夏枯草不拘多少熬膏去滓取汁貼之橫擔用此貼之亦可

又方用

夏枯草一廟煎湯當水飲或佐以行散之藥久服此之效

橫擔治法

加味道遙湯

加升麻夏枯

十全大補湯

加夏枯

金匱腎氣湯

加夏枯

橫擔小便不通

用梅花點舌丹 又方用銀戒箍一個將癰癰緊緊箍定以



大鍼二三十枚刺之數下後以醋研麝香敷之

橫擔毒感在腎囊脛起內治

先以神仙活命飲一帖解其毒後以加味道遙湯加升麻  
提之外治先以覆盆子根熬水洗之後以觀音膏如  
牛皮膠熬膏貼之

治療癰症以金谷蘭內服外敷亦可

脚心生瘡因中氣不足 補中湯治之

腮下生瘡 十全大補湯治之

二症俱為惡瘡

治重舌

用海螵蛸研末陸續吹入重舌上如不愈腮下以火礮按  
之磁瓦刮破見血即愈 湯藥神仙活命飲

治婦人乳花

用茄子自開者燒灰搽之 初起服神仙活命飲加黃花  
地丁後服十全大補湯加鹿角阿膠紅花治之

治腋下狐臭方

蜜陀僧 三錢 硫黃 三錢 黃丹 二錢 耳粉 五錢 飛水片 一分  
共研末貯磁器中勿洩氣 先以甘草湯洗之後以末



藥搽之搽後 用虵床子五錢 生草二錢 共研末 洒於  
紙上 將草紙捲成筒 燃火燻之

婦人產後見燈紅 是為血熱惡露不盡

地黃主 秦歸 川芎 杭芍 黑姜

紅花 山查 點童便水酒服 見燈自是血虛 用補血湯十全湯 亦不宜見童便

治乳癰

用燈籠草搗汁 點酒微溫服之 渣敷患處

白螺散 治九種胃氣疼

白螺一兩 煨一香 二錢 木香 白朮 藥頭





元胡 乳香各二錢 杭靈脂五錢

共為末 冷酒服

治乍腮

用大蒜切片貼上 以文火燒之

治小兒瘡疾

用麻子葉尖七尖 開水泡湯服 寸金丹 或平胃散

治木舌

用鷄血泡之 再服甘草湯

治虱包 酒色過度者多有



刮破用雷丸研末吹之

中疾症

一時不省人事用如意丹吹之鼻中再用蘇合丸服之  
或十金大補湯治之亦可

治耳流

用硃砂水泡羊弦繫其上日漸收短收至極小用金刀割  
下以麝香塗之即愈

治鼻癢

用鷲不食草同青黛研末吹入鼻中



桂有三用

胃脘痛咀嚼服

引火歸元研末服

發汗咀片煎藥服

白附去風

黑附去寒

附子無乾姜不熱

人參無黃芪不補

大黃無枳實不行



白濁去風 大腹與諸藥不同別金  
 白濁去風 白濁去風 白濁去風  
 白濁去風 白濁去風 白濁去風  
 白濁去風 白濁去風 白濁去風  
 白濁去風 白濁去風 白濁去風



南京中医药大学图书馆版权所有  
 1951

本書列板因年代已久，有些地方字跡漶漫模糊不清，現按原文校補，列表於後，以便閱讀。

卷序	頁序	原	文	卷序	頁序	原	文	卷序	頁序	原	文	卷序	頁序	原	文
一	四	白云參	下五共	一	五	葡萄	下三共	一	四	茄子	下七共	一	四	紋	肥
一	五	貼地金	六一	一	六	葉治	十三七	一	五	味甘寒	六四	一	五	血	噎
一	六	汞草	六八	一	七	紅梅	十三六	一	六	散血止	六五	一	六	往	每服
一	七	白云瓜	七六	一	八	酸餃	十四一	一	七	血不止	二十四	一	七	過	窠瘡
一	八	梗粟米	十大	一	九	桑椹子	十四四	一	八	瓠子	二五一	一	八	往	每服
一	九	气也	十一	一	十	葉	十四五	一	九	王瓜	十四四	一	九	過	窠瘡
一	十	烏鬚	十三三	一	十一	瓠匏	十五	一	十	甜瓜	十五七	一	十	過	窠瘡
一	十一	損目	十三土	一	十二	荖蘭	十五六	一	十一	灰挑良粉	十五二	一	十一	窠瘡	窠瘡



卷頁行原文卷頁行原文卷頁行原文卷頁行原文卷頁行原文

二二三 浊等症 二三三二 錢 二 夜間作燒 二 云醫暴

十二五 酒 十三八 米 齒四 白帶 九三 但土

十三七 竅不 十三九 瓜 齒六 鹽煨 九四 帶下

十三九 細黑 十三十 头 齒七 点水 九七 气治

十三十二 痛产 十三十一 胸 齒九 性能 九十 各热

十三十三 尿急 十三十二 点 齒十 漸次月 九十二 治五

十三十四 腫乍 十三十三 疾 齒十一 热退經行遂 九十三 煎点

十三十五 胎孕 十三十五 督 齒十五 絡治 九十五 目珠

十三十六 分 十三十六 損 齒十六 經安 九十八 肝風芽齒瘰

十三十八 惡 十三十七 一 齒十七 以致 廿一 枯故名

卷頁行原  
文卷頁行原  
文卷頁行原  
文卷頁行原  
文卷頁行原  
文

二廿三  
斜行二廿八  
瘡二廿二  
流入脾二廿七  
火

六  
煎  
十花椒一不  
三  
紅紫  
士  
龜

九  
遊風  
士核鼠瘡潰  
八  
二不  
士  
所

士  
草  
士  
点水  
十  
体消瘦  
士  
腎畏陽又

士  
蜜共  
廿一  
夏枯一不  
士  
吃後  
廿一  
間泡水爺

士  
点燒  
二  
水煎  
士  
胎发  
二  
焙乾

廿一  
去黃連  
四  
两共一  
士  
忍者  
五  
末搭患

二  
新病  
七  
痰胃有痰  
五  
五淋女子  
八  
白帶下瀉

四  
風釣  
九  
毒  
六  
实火实  
十  
之症

七  
虛熱虛  
士  
牛膝  
十  
煎服  
士  
紅花一不

卷頁行原 文卷頁行原 文卷頁行原 文卷頁行原 文卷頁行原

二廿一 加延胡 二廿五 疼自 二廿六 陽不足 二四二 生乾

廿五 木瓜 六 似脓 廿一 或痰中 四三十五 心定

廿一 点水酒服 八 一不 二 後見血 四三十八 煎服

廿一 腰痛 九 一不 三 热也治 四三十五 内之

二 如虫 十 白合 四 黑成 四三 酸止

九 白帶 十三 不息 十三 有准 四十六 灯盏花

廿一 打損 廿五 腑得血 廿五 热五 四十九 龙胆草

廿一 经期腹 十五 得血能 十五 色或 五十四 白帶

廿二 止一 十六 痰劳傷 十六 散經敗 六 头面

三 痰痼瘤 廿 為逸也 廿 良效 八 魚羊

卷頁行原文卷頁行原文卷頁行原文卷頁行原文

二五十二 肿大二 少吐者二 后以二 平居

五 气止 出漸加至 交十二 烏梅三 痛或

六 口臭咀 空三 白礬 服二 六 气

五 加龙 十 吹入喉 十六 者至一 五 風邪

四 消散 空一 為末等分 十七 被发汗 四 而成

九 良其 四 瘡在 穴一 送下 六 令人

五 肫 六 以醋 二 服三不 七 一陣

五 火上炖热 十 坐油盆 四 下或 八 大便

五 牛膝草根 五 勻炖 六 乘热 十三 上

五 戟草根 五 煉过 八 春冬 十六 吐酸

卷頁行原文

卷頁行原文卷頁行原文卷頁行原文卷頁行原文

三十六三喜飲三六五在二三六年老昏三六四附奇方

六甘草脹二小陰苗一桿於七射于

八把脹土二參又方三岩攻

九為末把參四蘇葉四下血

十一痛內為末煨五性温三胃气

十二煎湯酸困六按此三夙多

十三头目水一钟小便丸十五大腸下血十五滿腹

十四五種結紅腫平二白苡七防夙五小

十五令人歎冷发四六一必提珠四二酸困

十六五種結紅腫平二白苡七防夙五小

十七令人歎冷发四六一必提珠四二酸困



卷頁行原  
文  
卷頁行原  
文  
卷頁行原  
文  
卷頁行原  
文  
卷頁行原  
文

三四十  
酸痛  
三空大  
燒酒服四二五  
可也  
四五空  
時而

土  
咳血  
空一  
土狗  
土  
沉  
五空  
脾胃

大  
身不  
五  
又方  
五二  
出入  
六三  
皆虛

六二  
一宿  
空一  
枳壳  
三  
寸脉  
六五  
之分

三  
兩腋  
二  
蒼朮  
五  
弱則  
六  
而有

六  
生  
四一土  
苦其  
六  
人疏下指  
七  
然沉

七  
縱橫子  
土  
藥悔  
七  
輕下  
八  
沉細

五  
進  
五  
心者  
八  
脉常  
九  
滑者

六  
黃飢  
六  
之悔  
九  
謂能  
土  
陽將

大  
共為  
二一  
列於  
土  
腎脉  
土  
凡遇

卷頁行原  
文  
卷頁行原  
文  
卷頁行原  
文  
卷頁行原  
文

四七  
女  
四  
冷水  
四  
為痰  
四  
白湯

八  
遇虛  
治之  
美活  
能行

六  
者也  
姜棗治之  
鼻塞鼻  
六  
其血

七  
生火  
榜熱  
或蘇  
牛連貼皮

大  
金尅  
皆水火  
代抚  
三  
積也

十一  
陽盛  
邪火妄  
又用  
八  
八珍湯

八  
主之  
沉脉由  
其症  
七  
之不

九  
桃仁  
加知柏  
右関  
治之

士  
丸独  
穎頌  
大  
加皮

士  
者死  
二  
月經  
五  
尅辛  
在草

卷頁行原  
文卷頁行原  
文卷頁行原  
文卷頁行原  
文卷頁行原  
文

四卅七  
症小  
四四二  
八珍  
四五六  
滑精  
四四七  
夢掩

廿七  
樊飯糊為  
廿三  
菖蒲  
廿一  
迟緩  
廿二  
掩多

丸治之再  
腫按  
四一  
一不消化會門  
廿一  
心為

廿一  
一聞香臭神  
廿六  
此皆  
故食不  
四三  
乍

二  
不食  
廿七  
血入  
二  
制硫  
五  
數宏

廿五  
用歸  
廿八  
附沉  
四  
茸龜胶  
辛四  
遺精

廿二  
用  
四四  
不治  
士  
湯加  
五一  
一五  
然雨水未

士  
沉緩者  
五  
用六  
士  
久病  
六  
交加刺暑

廿五  
小腹  
九  
味延  
廿五  
不宜  
七  
中着多兼

十六  
相同  
四一  
冷痢  
廿五  
學者慎之  
八  
天之陽氣

卷頁行原 文卷頁行原 文卷頁行原 文卷頁行原 文

五一 九 伏於內邪 五二 一 柴胡湯加 五二 七 飲亦可 五 芫 然病

十 為中暑即 二 有不愈如 天 七 加味 罕 二 則筋

土 人稍有 三 誤表之 六 沙參 四 六 蜈蚣

土 功而得 五 柴平湯 廿 二 神糲 四 六 霍梗

土 宏而兩 七 毒入勝 苗 一 邪氣外 四 五 耳流

土 潮熱或 八 淋散主 共 七 食牛 五 刀割

土 孕有漿 九 譫語飲 共 六 為藥 草

土 渴与不 十 實條感 共 三 苓薄

土 寒矣治 十一 桂附理 世 七 口乾

土 湯九味 十二 是水沫 世 七 白濁

土 是 水沫 世 七 白濁