


懸袖便方

			一	漢
			二	書
			三	門
			八	
			七	
			九	
四	二	九	七	類
冊	架	函	號	

庫	文	閣	內
三	一	二	漢
〇	二	三	
一	三	八	
函	冊	號	
三	四	七	
架	冊	號	

內閣文庫	
番號	漢 12387
冊數	4 (2)
函號	301 37









懸

袖便方

二卷

目錄

第八脾胃門



脾胃

脹

第九

瘧疾

門

痞

積

塊


瘧瘧

門

積

塊

第十滯下門



嘔吐

積塊

痢疾 下痢 洩瀉

第十一 痰飲門

痰飲

第十二 欬嗽門

欬嗽

痰喘

第十三 積熱門

積熱

消渴

第十四 眼目門

眼目

鼻

耳

第十五 口齒門

口齒

舌

咽喉

牙疳

骨哽

懸袖便方二卷目錄終

懸袖便方卷之二

第八脾胃門

飛景堂纂

脾胃者倉廩之官也主藏水穀盛則
傳化而生血氣虛則停積而成痰飲
經曰飲食自倍腸胃乃傷善調攝者
當怒不得強食饑甚不可多食晨不

宜醉昏不宜飽如此則陰陽和而噎
膈之疾不生矣

方法

治脾胃不和飲食少進上躁下寒服
熱藥不得者

人參 白朮 各二錢
橘紅 一

湯泡七次一
枳

殼 參炒七分 甘草 炙五分

半 右以咀水一鍾半姜三片棗一

枚煎七分食遠溫服

治食積腹痛不拘男女大小并宜

白朮 炒 茯苓 半夏 姜汁炒

各一兩 萊菔子 炒三 山查肉

五錢 陳皮 五錢

共為末另以白朮熬膏丸如梧
桐子大每服四十九食遠白米
湯送下
砂朮丸 治男婦脾胃虛弱飲食
不消化

服片白朮 不油者米泔水浸切
片晒乾土炒淨一觔 山查肉 莖

晒乾一觔 砂仁 去壳炒四兩

白右為細末每服二三錢食遠米
湯調服或陳米麵打糊為丸如
菜豆大每服八十九食遠米湯
送下

土炒
啓 脾丸 治脾胃虛弱飲食少進
白朮 米泔水浸去 砂二兩 陳皮

枳實 炒一兩 麥芽 炒一

砂仁 炒七分

共為細末神麩打糊為丸如

梧桐子大每服六十九食遠白

滾湯送下

白朮散 治脾胃虛弱不思飲食

白朮 土炒一兩 茯苓 白者七分

陳皮 五分 蓮肉 去心七分 甘草

白薏仁 四分

共為細末每服三錢白米湯調

服

絡索米 治脾胃虛弱不思飲食

食入不消化病與噎塞相似

清明日取柳枝一大握熬成綠

二

湯用北方小米不拘多少煮撈
乾飯置於簋中以白麵洒上拌
均勻如法晒乾用布袋乘之懸
於通風處聽用二時先燒滾水
隨意多少候湯沸時以米投下
住火其米俱浮起看米心則無
熟可食之不可久煮久則成糊

矣每日食之甚効

治噎膈

紅花端午日搽頸次者無灰酒

拌濕瓦上焙乾魚竭瓜子搽者

為佳各等分

右為細末用無灰酒一小鍾入
藥在內調勻重湯頓熟徐二噉

下初服二分次日或三四分
三日服五分
治噎膈食不能下

黑鉛

硫黃

黑豆

三味各等分用犁頭鐵用過光
白者燒紅先將鉛黃二味一併
入紅鐵上鎔化後陸續下黑豆

煨成灰研細每服五分好釀燒

酒送下忌煎炒油膩鹽醬一

百日

治噎膈神効

猫胞衣用新瓦炭火炙枯研為

細末每服一二分好酒送下服

後噙竹筒一個睡恐傷牙及嗽

粒米不下者五六服立愈

又用辟驚骨三四付以新瓦合定

上下用火焙焦存性為末每服

三錢糯米漿酒送下

燒酒此骨在猪首腦窩中形如

雲頭小兒佩之能辟驚

治噎食不下

用乾人糞一荆萋用桑柴火同
燒煨存性取出放在缸內以井
花水浸之勤攪動待一時方用
綿紙數重濾過去渣清水約有
二桶入鐵鍋內慢火熬至二碗
又入碗內放鍋內重湯頓乾刮
下收貯每用五釐好酒化下漸

項

治膈氣
加服至三分自然進食

用黑礬四兩陳酒糟四兩拌勻
裝入酒瓶內以雄猪肉上毛并
鹽拌黃泥裹瓶外陰乾後以桑
柴火燒煨一二日通紅為度取
出將藥研為末煉蜜為丸如彈

子大每服一丸臨卧細擣好酒
送下此方京師高憲副傳仍
得藥三九而活三人

治食膈氣膈及梅核氣

甘遂 芎藭 炮煨 五 木香 一 女

右為細末每服壯者一錢弱者
五分不拘時溫酒調下

收 漸

又用鳳仙花收乾為末酒調一錢

旋飲漸愈

又用杵米的杵嘴止細糠蜜丸如

彈子大不時噲化津嚥送下

治噎膈痞塊疝積等症

五靈脂炒令烟盡研細真阿魏

研細各等分雄黃狗膽津和為

汁

丸如黍米大空心嚥津送下三

十九丸忌食羊肉醋麪

治胃寒嘔吐

陳皮三分生姜六分

右咬咀水一鍾半煎至八分不

拘時徐二熟服

又用白豆蔻七枚為末温酒調下

又日三服

噦 治胃中素熱惡心嘔吐

陳皮二分 山梔仁 炒黑三分 青

竹茹一分五分

右以咀水二鍾煎至八分入姜

汁一匙不拘時溫服

治胃熱有痰而吐

竹茹二分 半夏 茯苓 各一

甘草四分 姜三片 水一鍾

半煎至八分溫服

又治嘔吐

藿香 半夏 炮 陳皮 厚

朴 姜汁炒 蒼朮 各一分 甘草四分

姜三片 米一枚 水二鍾煎至

八分温服

治脾胃虛弱嘔吐洩瀉飲食少進

黃芪蜜炙 白扁豆炒 人參

炒 白朮各一兩去 甘草炙五分

共為細末每服二錢食遠姜枣

湯調服如氣不順紫蘇湯加些

鹽調服

治脾胃虛弱或乾嘔或洩瀉

陳皮 白朮土炒 各等分為

細末不拘時白滾水調服二錢

一方用白朮一味切片以水熬

十分至三濾去渣再熬成膏白

滾水點二匙食前服

治欬逆不止

水一鍾煎六分不拘溫服
又用枇杷葉煮汁飲之或搗梨汁
飲之亦止
治面目虛浮四肢腫滿心腹脹悶
陳皮 大腹皮 桑白皮
荅 生薑皮 茯苓皮 各等分
水煎服

柿蒂 丁香 各二分 姜三片

水一鍾煎六分不拘溫服

又用枇杷葉煮汁飲之或搗梨汁

飲之亦止
治面目虛浮四肢腫滿心腹脹悶

陳皮 大腹皮 桑白皮

荅 生薑皮 茯苓皮 各等分

水煎服

治食少腹脹黃腫

以亞腰葫蘆不去子燒存性為

末每服一箇食前溫酒調服不

飲酒者白滾水調下十餘日見

効

肉菘丸 治腹脹如鼓不食者病

可下

檳榔

肉豆蔻

輕粉

各

一丸

黑牽牛

取頭末

一兩

五分

分

右為細末糊為丸如菜豆大每

服十九至二十三丸食後煎連

翹湯下日三服

消脹丸治腹脹如鼓

木香

檳榔

黑牽牛

萊菔子

炒各等分

右為末米糊為丸如梧桐子大

每服三十丸白湯下

鷄屎醴散治心腹脹滿且食不

能暮食致令胃逆鼓症

大黃

生

桃仁

去皮尖

鷄屎醴

乾

水

者各等分

右為細末每服二錢入姜水煎

食前服

消滯丸 治積食所傷心腹痞悶

刺痛積滯不消

黑牽牛 取頭末二兩 香附米 醋

炒五靈脂 醋炒各一兩

右為細末醋打糊丸每服六十

丸食後淡姜湯送下

治傷食停飲不消

用白酒麴二兩炒白麴一兩炒

共碾為細末每服二錢白米湯

調下

保和丸 治痞悶積聚不散能消

肉積如神

山查肉不拘多少蒸一炷香取

出晒乾為末薄米糊為丸如菜

豆大每服七八十丸食後白滾

水送下小兒如常服更妙

治痔塊

硝砂 皮硝 山梳子

五

兩三味俱為細末

酒酵子 四兩即出酒之醅水菜

蕨 二個約重四五兩 穿山甲 一

兩腋下交片時搗為細末 共六

味合一處搗勻分作三塊每用

一塊以油紙或油絹攤貼患處

上用絹帛縛之一晝夜一換三

塊貼三晝夜暫歇數日其或肚
皮青色或下惡物則是疾化矣
如疾未消盡可候肚皮青色散
盡再製前藥一料貼之即愈矣
熨瘡法

朴硝一觔碾碎噴醋一酒鍾拌
勻今病人仰臥床上用溫水將

圈

患處洗淨擦乾再用麝香一分
擦皮再和白麪一塊作一圓子
圍病周匝將硝入於圈内攤平
用熨斗火灼離硝二指往來運
動硝乾再添熨二炷香去硝溫
水洗淨仍用麝香擦之再貼狗

皮膏

甲 菜

貼瘡膏 貼諸般積氣瘡塊

白花菜不拘多少 透骨草不

拍多少 即指中草二味用水熬

去渣熬成膏後用

真香油 一兩 黃丹 水飛過淘淨

炒黑色半兩 穿山甲 木燬

子 三錢 荊朮 水

紅花子 杏仁 各一兩

六味先入油內用桑柴火熬至

山甲枯黃焦色以絹濾去渣再

文火熬滴水不散再陸續下黃

用丹柳條不住攪之熬至滴

水成珠不粘手住火再入前草

膏二兩熬數沸取離火符溫方

下後葉 阿魏 乳香
沒茶 各一兩
右為細末入前膏內攪勻傾入
冷水盆內日夜換水二次泡七
日取出入磁罐內重湯化開入
麝香末二錢攪勻以蠟封罐口
勿令洩氣用時重湯化開用狗

元
皮隨病形大小攤之貼十五日
一換久積者兩貼全愈或大便
下膿血惡物而愈亦有內消者
痢疾貼臍上此藥不拘積塊血
塊痰塊百試百効
灸瘡積法
以雙線繫開元錢一個懸於頸

上適中其錢自胸直垂而下以
錢孔對為率將項上之線懸於
喉上自脊後垂下至錢而止用
黑點記之上下四邊亦用黑記
之却去銅錢寫一十字于錢之
上下兩邊上點處各用艾丸點
灸一穴灸十壯更服他藥再點

膏柔即消其効甚速 忌食生
冷炙博油膩椒蒜葱驢馬犬肉
敗脯蜆蚌蟹魚羊肉稗粳麩飭
醉飽硬物

第九瘧門

瘧乃風濕之邪隱伏而成故云夏傷於暑秋必疾瘧脾胃積食停痰亦能致此治宜解表散暑而後消食化痰清理脾胃不可驟用截藥須待病勢稍退脾胃稍開而後截之如氣壯邪輕者只須消導則自止矣

瘧疾之起由於暑濕之邪伏於脾胃積食停痰亦能致此治宜解表散暑而後消食化痰清理脾胃不可驟用截藥須待病勢稍退脾胃稍開而後截之如氣壯邪輕者只須消導則自止矣

方 紫蘇湯 治瘧疾初起 服二劑 發

散

真紫蘇 三錢 乾葛 一錢 柴胡 一

錢 五方 羌活 七分 白芷 六分 甘

草 四分

右 以 咀 薑 三 片 水 二 鍾 煎 至 一

鍾 熱 服 取 汗

治 諸 瘧 截 藥

常山 一錢 五方 枳 榔 知 母

貝 母 各 一 錢

右 以 咀 水 一 鍾 半 煎 至 八 分 露

一 宿 臨 發 日 五 更 溫 服

治 久 瘧 不 愈

常山 二錢 陳皮 二錢 枳榔

草果 砂仁 甘草 各

一錢 桃拂枝 各七寸

右 呷咀水 一鍾 酒半鍾 同煎至

八分 露一宿 發日五更 溫服

不二仙丹 截瘡如神

蒼木 去皮四兩 草烏 水泡去皮

杏 二兩 羗活 二兩 杏仁 去皮尖

兩 巴豆 四十九粒 去壳 去心 膜

去油

右 共為細末 麩為丸 如黃豆

大黃 柏麩為衣 每服一丸 臨發

日用桃仁五個 煎湯空心送下

忌熱物 一日不食 孕婦勿服

又

大蒜 三瓣 胡椒 七粒 百草霜 二

分 共搗為一丸 臨發日預先以

帛縛於曲澤穴上 男左女右 其

穴在臂膊灣三寸盡處是

連 又

治諸瘡不論速日隔日或隔三

日皆服 當歸 陳皮 各六錢 知母

柴胡 各四錢

水酒各一鍾煎至八分露一宿

臨發日五更服即止如人虛甚

先一日服十全大補湯一劑

又 草果 二個 一個用麪包火煨 一

個生用 肉豆蔻 二個用麪包煨

一個一個生用 甘草 二寸炙 一

寸生一寸厚朴二寸炙一寸生

一寸生薑一塊煨一塊生一塊

又右以咀水二鍾煎至一鍾臨發

日空心服

又五月五日取獨蒜不拘多少搗

爛再入好黃丹拌勻再搗乾濕

通白丸如龍眼核大晒乾收貯

於臨發日鷄鳴時用一九打碎

新汲井水面東送下

又以桃仁半片放在內關穴上再

用獨蒜一個搗爛掩在桃仁上

以布條縛之男左女右臨發日

先一二時行之即止此方屢驗

內關穴在手掌骨上一寸半許

尺部脉相並
又用蛇蛻塞兩耳內即止
又用真阿魏一味丸煑實大硃砂為衣癸日五更面東以無根水送下
如患瘡人熱甚癸渴以童便和蜜頓敷沸頓服之

下菜恐菜

又用陳麩為末每服一錢黃酒調服立愈
食忌生冷瓜果葷腥油膩炙烤椒蒜韭菜蕨粉麩麩助醉飽米粽

第十痢門

痢者古方謂之滯下蓋受暑濕之邪
以致脾胃不和飲食停積而成舊論
以赤為熱白為寒甚謬而氣分則白
血分則赤均一暑毒濕熱耳治法必
先通利導滯其次調胃解毒又次收
斂實腸切忌止澁之藥恐置留毒腫

凡痢疾初起時宜先通利導滯
其次調胃解毒又次收斂實腸
切忌止澁之藥恐置留毒腫
凡痢疾初起時宜先通利導滯
其次調胃解毒又次收斂實腸
切忌止澁之藥恐置留毒腫

缺

滿治洩瀉宜調理脾胃燥濕分利陰
陽為主如蒼白朮茯苓猪苓澤瀉防
風之類不可缺也
將軍湯治痢初起裏急後重膿
血稠粘日夜無度
錦紋大黃 一兩

右以咀用酒水各一鍾浸半日
香煎至一鍾去渣空心食前作二
次服之再服香連丸芍藥湯即
愈
立効散治赤白痢膿血相雜裏
急後重腹痛一服立止
黃連 四兩炒淨用吳萸三兩泡

蘇

酒半日拌黃連同吳萸炒乾揀

去吳萸不用陳枳壳熬炒三兩

右二味為細末每服三錢空心

黃酒調下 泔馮米湯下 禁

白痢陳倉米湯調服

香連丸 治痢赤白

木香 二兩 黃連 用吳萸四兩熬

水浸黃連一夜同炒乾去吳萸

不用淨黃連八兩 二味為末米

糊為丸如棗豆大每服八九十

丸薑湯食前送下

加味香連丸 治痢初覺不拘赤

白肚腹疼痛有積自行無積自

止甚効

黃連 炒十兩 木香 二兩 大黃 酒

浸透 火煨四兩 栝榔 一兩

共為細末 陳麩打糊為丸 如菜

豆大 每服七十九 食遠 禾湯送

下日三服

又 治痢赤白腹痛及休息利極効

黃連 炒六兩 阿膠 蛤粉 炒當歸

酒洗焙各三兩 乾薑 炮二兩

共為細末 醋打米糊為丸 如菜

豆大 每服五十九 加至七十九

空心 禾湯下

又 用六一散 七錢 神麩 炒紅麩

各四錢

共為細末 薑汁打糊為丸 如梧

桐子大每服六十九不拘時白
滾湯送下

又治久痢赤白不止

五倍子 飛白礬 各一兩

二味共為細末棗肉杵為丸如

菜豆大飛羅麩為衣小水湯送

下二十九丸食遠服立止

封臍膏 治久痢不止

乳香 沒藥 銀硃 各一

錢為細末 真香油 四兩 猪膽 二

個 黃丹 水飛淘去渣炒紫色 二

西 先將猪膽同香油熬至黑色

瀉去渣滴水不散再下黃丹不

在手攪滴水成珠不粘手者取

相起候温再入前三樣攪勻收貯
磁罐中去火毒用油紙攤貼臍

上

又

治久痢赤白不止

木鱉子 去壳十個 杏仁 四十九

個 桃柳枝 各四十九 節如筋粗

黃丹 水飛淘淨炒紫色三兩五

錢乳香 沒藥 各五錢為末

麝香 五分 先將前四味用真香

油七兩同熬至焦黑色濾去渣

滴水不散再陸續下黃丹用柳

條不住手攪勻再滴水成珠不

粘手取起待半時再入乳香沒

茶麝將冷入磁罐內再入麝香

麵攪勻用蠟封口以水浸七日
出火毒用時重湯頓化攤狗皮
上貼臍之効

又

治痢不拘赤白神効

大用黃連 去蘆毛為極細末聽

用木香 為細末聽用厚黃柏 去

粗皮蜜炙透為極細末聽用

每服黃柏一錢為主如紅白相

兼者黃連木香末各五分紅多

黃連六分木香四分白多黃連

四分木香六分俱用三年陳醬

一大茶匙滾水半茶鍾調服

又

治久痢

椿根白皮 去粗皮蜜炒四錢 麻

黃 五分 甘草 五分 生姜 一錢 細

茶 一錢 水二鍾 煎至八分 空心

溫服

又 生姜 三錢 細茶 五錢 水二鍾 煎

至一鍾 入蜜一小酒杯 再煎 敷

沸露一宿 空心服 白痢 溫服 赤

痢 冷服

又 治氣痢

用人乳煎 草撥服之 立愈

菜 又 用白菜 服取汁一鍾 蜜一鍾 調

白煎 敷沸 溫服

又 鷄子一箇 用清 淡燒酒一鍾 白

糖三錢 同入碗內 調勻 重湯 頓

熟服之 立止

又 用鷄一隻好醋一壺炒鷄同燒

酒食之不用鹽醬神效

又 治血痢久不止

用樗樹根皮去粗皮蜜炒陳皮

各等分為細末米糊為丸如梧

相子大每服百丸空心白滾水

送下二三服即止

又 至臘八日收槐實至端午日用

砂鍋炒黃色為末稍去渣紅痢

白米湯調服白痢黃酒調服

烏梅散治諸痢久不止

烏梅七個燒灰存性為末空

心黃酒調服

又 生薑一塊艾葉一握吳萸三錢

又 陳皮七片水二鍾煎至一鍾去渣空心熱服

又 治久痢滑腸虛弱不禁者

椿根白皮五錢烏梅三個水一鍾半煎至七分空心緩溫服

又 用葱一把切碎和末煮粥空心

食之

又 治久痢虛滑不拘赤白

石榴皮 茄蒂 燒灰等分為

末每服二錢砂糖湯調服

又 端午日取好葶藶洗淨拭乾勿

損皮入磁瓶內用好燒酒浸泥

封口勿洩須如患痢者取二枚

細嚼用原燒酒空心送下

又用生姜切如粟米大塊好細茶
相等分煎服紅痢姜不去皮白
痢姜去皮

治禁口痢

一用木驚子去壳二錢搗燭再
入麝香二分共搗如膏納臍中
以帛縛定待一時即思飲食

治禁口痢

砂仁二錢搗碎砂糖七錢細茶五
錢生姜五片搗爛水二鍾半

煎至八分露一宿次日面北

溫服

又人參 黃連 石蓮肉

三錢

右以咀水二鍾煎至八分不拘
又時溫服

又用石蓮肉砂仁等分為末每

服二錢陳米湯調服

又石蓮肉乾山藥白砂糖各等

分為末時以米湯調下

又禁黃連三錢人參一錢五分水

一調理之切不可用兜澁之藥多

致夭亡內經云無積不成痢又

曰治痢還須利即此理也又一

種人壯實者而推逐不必拘泥

日子雖多日亦可以逐之毋惑

白朮散治久瀉養脾胃實腸胃

白朮土炒白茯苓去皮各一兩

糯米 炒二兩

右為細末大棗不拘多少煮熟

拌食之或為丸為餅子俱可

砂仁 白朮 散 治水瀉及脾胃泄

砂仁 炒五錢 白朮 土炒 淮山藥

炒蓮肉 去心 各一兩

右為細末入白糖四兩調勻每

錢半煎至七分溫服藥入腹即

甦屢試屢驗

又用烏梅一斗水一桶熬滾入坐

桶內令病者坐之再將火麻葉

三錢為末紅痢白糖湯調下白

痢沙糖湯調下服完以被蓋出

汁即愈火麻葉五月五日午時

收懸簷下風吹乾
治久不愈者

烏梅 三個 碎 乾葛 三錢 細茶

三錢 生薑 三片 水一鐘 半煎至

八分 空心溫服

人 大凡久患痢疾初起 必要推蕩

症 腸胃積垢然後隨症緩急而服

服五錢白滾水調服

黃連生薑散 治水瀉脾浮

黃連 去毛淨 八兩 生薑 四兩

二味切如筋頂大塊 共一處炒

紫色為度 取出二樣 各搗為末

脾浮用黃連末水浮用生薑末

每服二錢 空心白湯調下

五味子散 治腎洩 天明澹洩

是也

五味子 二兩 吳茱萸 湯泡炒 五

錢 白朮 土炒 二兩 糯米 五合 炒

共為細末 每服二錢 陳米湯調

空心服

山藥白朮散 治脾虛洩

白朮 土炒 八兩 山藥 炒 四兩

右為細末 每日煮粥 入一合 在

內再煮 一沸 空心食之

猪肚丸 治脾虛如常水瀉

雄猪肚 一個 洗淨 去脂膜 再入

大蒜 十數頭 去皮 入肚內 自晨

煮至脫 以牡蒜 糜爛為度 取出

杵如泥再入平胃散末一料又

同搗白丸如梧桐子大每服五

十丸空心米湯送下

又治水瀉不止

用車前子炒為細末每服一錢

空心米湯調下

又治久瀉不進飲食

以黃米炒為麩每用數匙以沙

糖調吃


又治久瀉不止

用陳久臘年菜菔菜煎湯服之

立止

又用白花菜老楷熬水洗脚即

止浴呼猪屎菜則是



又用鳳眼草熬水洗脚立止洗
不可過膝止久痢亦妙
治肚腹微痛來即消亦不
多日夜舉發三四次用蕎麥麩
隨意作飯連食三四食而愈
少年患此西月瘦弱之甚諸藥
不効偶遇一僧授此方服之即

愈後傳告多人俱効
食忌生冷椒蒜葷腥油膩炙烤
麩粉糯米粽

成法飲其汁流于後於其下
恐風邪致飲食之類
疾之有或飲食之類
作成法其類

第十一 痰飲門

痰者病名也痰生於脾胃皆因脾氣
虛弱而飲食不能剋化為津液而則
作成痰矣然脾胃氣盛飲食易剋何
疾之有或飲食後因之氣惱勞碌驚
恐風邪致飲食之精華不能傳化而
成痰飲矣有流于經絡皮膚者有鬱

人... 用... 痰... 飲... 胃... 脾... 氣... 虛... 弱... 而... 飲... 食... 不... 能... 剋... 化... 為... 津... 液... 而... 則... 作... 成... 痰... 矣... 然... 脾... 胃... 氣... 盛... 飲... 食... 易... 剋... 何... 疾... 之... 有... 或... 飲... 食... 後... 因... 之... 氣... 惱... 勞... 碌... 驚... 恐... 風... 邪... 致... 飲... 食... 之... 精... 華... 不... 能... 傳... 化... 而... 成... 痰... 飲... 矣... 有... 流... 于... 經... 絡... 皮... 膚... 者... 有... 鬱...

于臟腑肢節者為病多端治當各從
所因是以虛宜補之火宜降之氣宜
順之鬱宜開之食宜導之風寒濕熱
宜發散清燥以除之故曰治病必求
其本
方法
二陳湯 一治痰涎壅盛

橘紅

半夏

姜製各三勺

茯苓

苓

二勺

甘草

一勺

炙

七十九分

右以咀用水二鍾煎至八分入

竹瀝一酒杯姜汁二匙不拘時

溫服

大半夏湯 治風痰

大半夏

十四枚

牙皂角

一條

生

姜 五片

右 呖咀水 二鍾煎至一鍾 食遠

溫服

濕鬱湯 治濕痰

蒼朮炒 黃芩酒炒 半夏 姜製香

附 醋炒各等分

右 呖咀每服七錢水二鍾煎至

八分食後溫服或神麩打糊為

丸如梧桐子大每服七十丸食

遠白湯下

半夏 喻化丸

半夏 一兩 甘草 一兩 切碎熬膏

生薑 四兩 取汁 白礬 四兩 熬

右將半夏入礬水內浸春夏三

十一日秋冬四十九日夜起陰
乾再入姜汁內浸春夏三日秋
冬七日陰乾為末以甘草膏為
丸如彈子大磁器收貯每服一
丸不拘時含口中津液化下或
加薄荷更妙
南星半夏丸消氣痰

南星 半夏 各三兩 生姜 十
兩取汁右以姜汁煮半夏南星
熟透切片曬乾為末姜汁打糊
為丸如梧桐子大每服二三十
丸食遠白湯下
導痰丸 治痰涎上壅
風化硝 五錢 枳實 炒 五錢 白

礬三錢 皂角 酥炙三錢

右為細末 白萊菔汁為丸 如梧

桐子大 每服二三十丸 食後白

湯送下

橘紅丸 治痰飲

甘草炙一兩 陳皮紅者以鹽二

兩和水泡去白淨乾十兩

右為細末 酒打米糊為丸 如菘

豆大 每服三五丸 食遠白湯

送下 米湯亦可

又 用水橙花晒乾 焙為末 每服二

匙 空心佛湯調下 白花尤妙

又 治痰火 煎水

蘿蔔子 炒皂角 燒存性 以酥

共為末姜汁加煉蜜為丸如梧
桐子大每服五七十九不拘時
白湯送下
又治痰喘
鮮山藥 搗泥爛半碗 甘蔗取
汁半碗 二味和勻重湯頓熱
飲之立止

又用梨汁藕汁各半盞和勻頓飲
之尤妙
又用梨一枚去一孔用巴豆一粒
研碎以綿紙包之為撚納入梨
孔內外以粗紙數重包之水濕
透入灰火中煨以紙乾為度取
出晚間服之去巴豆不用

治痰飲吐法

白礬一兩水一碗煎至半碗入

蜜少許再煎數沸溫服須臾即

吐如不吐再飲熱水一盞

治痰厥不省人事

用香油一盞灌入喉中須臾吐

又出痰涎即愈

治痰涎壅盛不下降者

巴豆去壳去油為霜一錢滑石

為末二兩二味研勻麵糊為丸

如菡豆大每服四十丸小兒一

歲者五六丸白滾水送下

潤下丸治痰飲

陳皮水先刮去白紅者一筋粉

甘草 去皮 四兩 切碎 鹽 四兩
右將甘草 鹽 二味 用水 五碗 熬
至 三碗 去渣 將 陳皮 入內 煮以
汁 乾 取出 焙乾 為末 每服 三錢
白湯 調下
治 虛極 痰盛
人參 一兩 竹瀝 一酒杯

右 以 咀水 二鍾 煎 八分 不拘時
入 竹瀝 溫服 常患 此症者 不免
用 消導藥 治之 痰雖 減可 反加
惡心 嘔噦 不下 飲食 乃知 胃氣
空虛 之甚 必加 以滋 補藥 治之
而食 下惡 心乃 止屢 經驗 若
信他 醫不 用滋 補專 以消 導必

誤矣凡用藥者當因人而用施
治不可執

治陰虛火動之痰不堪用燥劑者

天門冬水洗去心乾淨肉十二

兩五味子水洗去核淨乾肉三

兩右二味共搗為細末丸如梧

桐子大日進三服每服二十丸

不拘時茶清送下

治痰核

南星 烏頭 白芥子

各等分共為細末以薑汁調敷

之食忌椒蒜葷腥炙燥酒麪

糟味乳餅胡椒樾子芥菜

第十二咳嗽門

咳嗽雖諸經皆有而形症則見乎肺之一經治須分別內外可也內屬熱情所傷外因四氣所襲治內必清熱開鬱治外則疎風散寒先賢云有因痰而致嗽者只作痰治因嗽而致痰者只作嗽治其理甚當切忌澁滯之

藥恐成壅結之患

方法

治冷嗽

欵冬花 五錢 官桂 三錢 石膏 三錢

甘草 一錢 五分

右為細末每用一捻放舌上以

津液嚥下

又用生薑切片焙乾為末糯米

糊為丸如芥子大每服三十九

空心米湯下

治喘嗽有火邪久不愈者

知母 貝母 各等分共

為細末用老姜切薄片蘸藥細

嚼白湯下

又用姜汁半盞蜂蜜半盞和勻

頓熱頻服之

又以梨汁半鐘加錫糖一兩頓

化攪勻服之

又用百部不拘多少洗揀淨搗

汁以砂鍋內桑柴文火

熬如錫叔貯每服一二匙白湯

化服日服三次二三十年咳嗽

不愈者亦除根

治無痰乾咳嗽

用黃熟大瓜菓一個去皮搗爛

以布絞取汁用蜜等分如白礬

一錢熬成膏頻噙服

又用大酥梨一個控去核納白

蜂蜜四五匙於內麪包於外灰
火燒熟太麪食梨炒

治痰氣上喘咳嗽

杏仁水泡去皮尖核桃肉等分

細研如膏再加蜜少許丸如彈

每

子大無服一九食後臨睡細嚼

姜湯下

治咳嗽甚者或吐血

桑白一觔去外粗皮以米泔水

浸三日夜挫碎焙乾入糯米四

兩炒共為細末每服二錢食遠

米湯調下

治咳嗽不止胸膈氣壅滯者

用桃仁一升去皮尖麩炒令黃

色研細入瓶中以酒五升浸之
密封固三日每一盞頓熱飲之

日三次

治痰嗽面浮腫者

用真蛤粉一味新瓦上炒令紅

蓋地上太火毒加青黛少許用

淡薑水滴香油數點攪勻服之

治痰嗽并喘神効

枯白礬

五倍子

各等

分共為細末每服二錢以生猪

肝火炙熟蘸藥食後臨卧食之

治痰喘

用核桃三四枚生薑三片臨卧

細嚼温酒下

治 齁 喘

用 葶 麻 子 仁 炒 熟 揀 甜 者 食 之

須 多 服 見 効

又 用 枯 礬 末 一 匙 臨 睡 白 滾 水 調

下 三 四 服 即 愈

治 痰 嗽

用 皂 角 不 拘 多 少 燒 存 性 研 為

末 每 服 二 錢 米 湯 調 下 甚 効

治 年 高 氣 急 喘 促

用 蘿 蔔 子 炒 研 為 末 每 服 二 錢

白 湯 調 下

治 痰 喘 嗽 久 不 愈 者

香 油 一 兩 蜂 蜜 二 兩 生 姜 三 兩

搗 汁 阿 膠 五 錢 白 礬 五 錢 先 將

油姜汁阿膠白礬熬數沸再入
蜜於內熬至黑色如漆收貯每
日清晨白湯化二匙服之歌曰
一兩香油二兩蜜三兩生姜自
然汁阿膠白礬各五錢次第煎
來黑如漆每日清晨服一是多
年咳嗽自然畢

治咳嗽諸藥不効

用結過子畢老萊蕪切成片煮
熟并湯不時服之効

法製杏仁治久咳痰嗽勞嗽

乾咳皆効久服大有補益

大杏仁一觔水煮三沸去皮尖
桔梗五錢麥冬去心五味子

薄荷 五錢 甘草 各一兩
用水五碗除杏仁外將後五味
熬至二碗半去渣存留後用將
杏仁入藥水內浸一晝夜日取
晒之以藥水乾為度再晒乾又
取四五歲小兒童便一椀將杏
仁浸之晒乾復浸如此者三次

再將前藥渣水潤濕上下鋪蓋
杏仁於籠中蒸一炷香取出去
藥晒乾杏仁收貯不時食之非
但止嗽而且潤肺
食忌椒蒜葱油膩炙烤麪葷腥
糟味核桃榧子乳餅紅豆芥菜
酒

剛得荷五...
麟和蘇味...
愈云琳...
野北...
藥...
香...
西...
再...

詞第... 積熱門

積熱者乃熱毒且漸蘊積于臟腑之內令人咽喉乾舌燥唾粘痰稠服紅鼻塞頭面瘡腫久而不治或消中消渴之症生焉其治方當分虛實實者以清涼之劑瀉之虛者用滋陰之藥補之如此則水火濟而熱自退矣

方吐酸水入劑而燒自起
大金花丸之治諸積熱
之至黃柏黃連黃芩
寒與面大黃八而枝子各五錢
內令共為細末滴水為丸如梧桐子
許大每服五十丸新汲水下
治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

石羔 山梔子 甘草

各一兩
共為細末每服一錢水調下

治消中消渴虛熱

黃連 炒 知母 麥冬 去心

天花粉 各一兩

右為細末用嫩猪肚一個洗淨

入藥於內以線縫口於籠內蒸
爛研如泥加煉蜜少許為丸如
梧桐子大每服百丸食遠白滾
水送下
又治消渴每服五錢
烏梅肉 七分半 五倍子 五分
天花粉 二錢 甘草

右吹咀水一鍾煎三分併三次
午後一頓溫服
又用浮萍天花粉等分為末入
乳汁和為丸梧桐子大每服三
十丸不拘時米湯送下日三服
見効
又用繭絲湯不拘時服之妙如

確

又無以蚕繭或絲煎湯服

又用蝸牛四十九個以水一椀同

蝸牛入於磁罐內以物蓋之浸

一宿取其水頓服童者不過三

服而愈

又用大田螺五升洗淨以水浸一

宿取水飲之每宿更換田螺

六一湯 治諸虛不足胸中煩悸

時常消渴

黃芪蜜炙六兩 大甘草蜜炙一

兩

右吹咀每服四錢水一椀水

鐘半煎至七分溫服

治陰虛火動蒸熱如燎用童便斬

頭去尾取中間者每服半椀和

入好酒些須服之日服三次

治諸熱用玄明粉二錢水化下胃

弱者不宜多服

治發熱口乾用鷄子清三個白蜂

蜜一匙和勻服之

又發熱口乾不便赤者用甘蔗搗汁

服之

治積熱用厚黃栢一兩為細末煉蜜

為丸如梧桐子大每服五十九

濃煎麥冬湯下

治煩熱少睡用小麥作飯食之

治大渴症

六一散一兩五錢玄明粉一錢

六分硃砂一錢

共研為細末用新汲水調服

治大渴大便秘者

石 古膏 煨五錢 滑石 三錢

共研為細末新汲井水調服

食忌椒姜蒜葱炙燥油膩葷腥

楊梅石榴櫻桃葡萄桃子荔枝

榧子芝麻飴糖

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

第十四眼目耳鼻門
人之眼目猶天之日月無不藉其光明也平日最宜愛護若偶然紅腫增寒壯熱作痛者為風熱有餘治宜疎風降火如平日昏暗羞明迎風淚下不能視物者為血虛不足治宜清心滋陰二者俱當定慮忘憂戒酒絕色

庶幾可耳其耳鼻之症亦由內蓄
濕熱外襲風邪所致醫者宜審
斟酌療之可也

方法

冬青膏 治內有風熱積熱發於

眼目者

川黃連 二兩切碎 冬青葉 四兩

二味以水三碗浸三晝夜待黃

綠色熬去渣成膏不時點四服

角妙

梅餅子 治眼胞腫大如拳

霜梅 三個去核 白果 七個去壳

銅青 五分

右共搗為餅放碗內以井花水

浸一宿上用棉紙蓋水上以隔
其渣候水浸上紙便青錢蘸水
洗之

蘆甘石散 治眼赤腫

上好片蘆甘石 一兩 川黃連 五

錢熬汁 大冰片 一分 麝香 一分

將蘆甘石用炭火燒紅七次浸

入黃連汁內七吹再研為極細

末用棉紙羅過加入麝片再研

細收貯用燈心蘸藥點之

治火眼

用老黃瓜一條切去頭以物剜

太子穰將提過皮硝裝入於內

滿為度用綠套裝懸簷下待其

硝透出瓜外為白霜取下收貯
點眼角妙

又用用地錢草研水點之効

治赤眼

用朴硝放於豆腐上蒸之候化

下水汁以磁器盛之點眼角効

用桑樹葉臘月不落者採來煎

湯洗之

治暴赤眼腫痛

黃連 當歸尾 赤芍藥

各一錢 用百沸湯泡頓少頃以

棉紙隔相乘熱薰洗冷則易之

黃 數次而愈

又 以黃連一錢為末入鷄子清一

又個調勻濾去渣貼之

黃連膏治暴赤紅腫

川黃連 去毛 四兩 龍膽草 四兩

當歸 二兩 俱洗淨細剉搗碎用

水七碗熬至三碗濾去渣又用

水三四碗復將渣再熬至二碗

濾去粗共前汁一處再用細絹

重濾加小紅棗四個於內又熬

二碗去棗入白礬飛過五分其

熬成膏收貯磁罐內火眼涼水

化點風眼乳汁化點

又 山梔 七個 白礬 三分 同為粗末

用水一酒杯將將藥浸一時上

用棉紙蓋之洗効

治眼暴赤疼痛不可忍者

生薑連皮搗爛取汁枯白礬

錢為末用薑汁調白礬作膏眼

胞上敷之將眼緊閉勿令藥入

眼內流淚外視物如常

治火眼腫痛後柏葉過其分

南星小豆赤小豆二味等分

為末用生姜自然汁調貼太陽

穴即愈因赤熱藥武之一酒

治風熱腫痛杏出惡藥散

黃連水大黃藥朴硝重

黃丹黃各等分共為末以苦

參煎湯加蜜少許調敷眼四角

周圍妙

洗風眼効

銅綠二錢黃連二錢當歸二錢

生地黄各五錢

右咀片水半碗泡藥於碗內重

湯者一炷香取出露一宿以絹

隔住渣用手指蘸藥洗之

治眼暴赤痛

用川大黃連去毛洗淨候潤透

切片以淨絹包之用人乳一酒

鐘將黃連泡在內入鍋中蒸一

二時取起扭去渣仰臥睡以淨

手頻蘸抹眼角過宿而愈

又黃連三分洗淨切碎再以明

礬一豆許束內裹蒸以礬化為度

太來用人乳浸前藥點之
治雀目不明至晚不能視物

石決明 草決明 各一兩 夜

明砂 一錢

共為細末用猪肝一具去油膜

將刀切片不得離斷以末藥洒

在內用緣縛之水煮熟食之

又 用羊肝一味如常煮食數次

而愈

用羊肝一具不要見水以竹刀

切片不可切斷入谷精草末一

兩洒肝內以緣縛之瓦罐內以

水煮熟不時與食之立效

治鼻塞不通

菖蒲 皂角 二味等分共

為細末每用一錢以綿包裹塞

鼻中仰卧少頃即効

又 瓜蒂 細辛 各等分為末以綿

裹塞鼻中効

治鼻淵流清水

又 南薄荷 各等分共為細末

用每服二錢臨茶清調服

治腦漏鼻流膿涕

枯礬 血餘 二味等分

為末青魚膽汁拌末為餅陰乾

研細吹鼻中

又 用茄蒂燒存性為末每用一二

又

分吹入鼻

治鼻内生瘡

蜜陀僧 白芷 等分為細

末 蠟燭油調搽

治鼻中有肉下

用冰片少許點之其肉自消

治赤鼻酒齶鼻

泡

硫黃 明者 杏仁 湯花去皮尖

及雙仁 右研爛入輕粉少許

或三分再研勻臨卧時用唾調

敷赤處七日愈

膏

又用山梔子凌霄花等分為末

每服二錢食後茶調下日進二

服半月而食

又用冰銀二錢生豬油五錢一
處搗爛用細夏布包住至晚間
入擦之
治耳中忽然作痛或紅腫內脹
將經霜青箬葉露在外將朽者
燒存性為末吹入耳中其痛立
止

又用枯礬為末以甘草打細蘸入
治耳底腫痛膿水不絕
治耳底腫痛膿水不絕
輕粉一錢 麝香一分
或為細末先以綿拭乾膿水後
吹入於許或以桑螵蛸慢火炙
又一個代輕粉用七八分重者
又用陳皮燈火上燒存性為末吹

又入少許亦效

又用生土地黃搗汁滴入耳中

候其熱滾側耳傾出愈

治耳內極痛

以麝金研細末每用一字以淨

此水調傾入耳內却急傾出

治耳中出血

枯白礬研為末入麝少許吹入

即止

治耳中膿水不乾

用十層石榴花焙乾為末吹入

耳中立愈

治耳中出血不止

用龍骨研末吹入耳內即止

又用蒲黃炒黑色研細末吹入

亦妙

治耳鳴無晝夜聽如流水之聲及

痒者

烏頭燒存性石菖蒲字二味

等分為末綿裹塞耳內二次愈

治氣道壅塞兩耳聾潰

甘遂半寸綿裹塞兩耳中即以

甘州口中嚼之自然通聽神効

治耳聾

磁石如豆大一塊穿山甲燒存

性為末二分右以新棉裹塞耳

內口啣生鐵一小塊覺耳內如

風聲即愈

治凍耳瘡愈

用生姜自然汁熬成膏塗之瘡
用黃柏白斂各等分為末清香
油調搽

治耳邊生瘡

黃丹一錢松香四分
右研為末
香油調搽

又第十五口齒門

口齒咽喉乃一身之衛要稍有不利
為害非輕善養生者少食辛熱勿咬
剛硬莫當風頻剔則腫痛不生口齒
獲安若飲食有節起居有常能便身
中水升火降則關節通利咽喉亦無
患矣

方

治口舌生瘡

蘇連黃連細辛各等分右為

細末每用少許敷之

又用黃丹蜂蜜各一兩以磁罐盛

貯蒸一時鵝翎掃之

又用五倍子大者一二枚將白礬

為末入五倍子內滿入火內燒

白礬乾過取出為末敷瘡上

良久吐涎水漱之立愈

黃柏散 治口瘡

用厚黃柏去粗皮兩面以蜜塗

炙透胡黃色為末每三錢加水

片一分共研勻敷之流涎立愈

方為丸噙化更便

赴宴散治口瘡

黃連一錢炒乾姜五分共為細

末敷之

又身厚黃柏為極細末一錢真青

黛三分共研勻敷之

又用大黃連以密炙透研極細末

敷之加薄荷少許更妙

又適以白蘿蔔搗汁漱口三四遍

立愈

又乾姜一錢細辛一錢

共為細末敷之

青黛散

青黛 淘淨二錢 硼砂 五分 水片

而恐兩訛

少許共為細末時時搽上立効

又用上好黃丹三錢巴豆十粒去壳

同丹炒黑色去豆用丹敷之

治口瘡并口疳及喉痛

粉甘草 白礬 等分為末

敷之

又用吳萸為末醋調搽而脚心

治牙疼

良姜 荊芥穗

郁李根皮 大細辛 各等分

共為細末先用水漱口次將藥

擦痛處再噙水漱久則口麻痛

止

治牙痛

此方鶴虱二錢白芷一錢細辛

又玉甘松各一錢共為細末擦痛處

又蘇魚腥草各菜油及花椒各

治各等分三味共搗勻用泥少許

和成丸如豆大左牙痛塞左耳

右牙痛塞右耳兩邊輪換不可

或一齊恐閉耳氣塞一日夜取看

山有細虫効則高也去其

又或用天仙子燒烟以竹筒抵牙

引烟薰痛處虫即出肉不

又用藜蘆為末納牙孔中勿燕

又汁神効

又長風蛀牙痛用丝瓜燒存性為

末擦之

又未用茄蒂燒存性為細末擦之

治牙痛

獨蒜稍多胡椒輕粉等分

又共搗極爛用黃豆大一塊放掌

後大指下高骨前窩內左痛放

又左右痛放右以蜆殼之類蓋之

以帛擊一飯頃痛止去藥

回止如疼不可忍者先以燒酒漱

口後用此藥咬之

又白礬砂牙硝等分為末每用

三分擦之立効

又赤石脂腦朝腦雄黃等分為末擦

痛處神効

治牙根及鼻腫痛

或取朝腦鼻動雄黃等分為細末擦牙吐出痰涎即愈

治牙疼久不愈服桑不効者

石羔三錢大黃二錢生甘草一

又取半錢芒硝二錢水一鍾半煎至八

分溫服利一二次愈

固齒散能固齒黑髮烏鬚即效

七月間採旱蓮草一筋揀淨酒

洗待乾切碎用青鹽四兩盛沙

罐內盛泥封固以稻糠煨一晝

夜取出為末清晨擦牙早晚隨蒸

下極効

鼠骨散固齒如神

雄鼠骨一副煨存性石膏三兩

而恐兩訛

煨一手生一手
細辛 五錢
骨碎

補 五錢
青藍 五錢
白芷 五錢

治共研為細末每日清晨擦之

治齒動搖
以新竹截去一節留一節用飛

鹽一而川椒去目四十九粒填

入竹中火煨存性連竹灰研為

末擦牙三四日復固

治齒出血成條

人參 麥冬 茯苓 各

三錢

右咬咀水一鐘煎至五分不拘

時溫服

治牙瀉血流不止

人參 茯苓 各

六用松針搗汁一鍾入麥麩少許攪勻再澄清飲之愈

治舌腫硬或出血如泉

海螵蛸 蒲黃 各等分右

為細末每用少許塗舌上即愈

又用百草霜為末醋調搽

又用槐花炒為末塗舌上妙

治舌忽然腫出

用雄鷄冠刺血以酒鍾盛浸舌

就嚥下舌即縮

又用冬青葉煎濃汁浸之亦妙

玄參 甘桔湯 治咽喉腫痛

桔梗 三錢 甘草 薄荷

玄參 防風 荆芥 各一

錢

右吹咀水二鍾煎至一鍾食後

濕服

又用白礬朴硝二味等分為末

吹入亦効

又用雄黃硃砂白珊瑚各三錢

右用紅棗數枚忒校入前二味

咽

神 在內炭火煨炙褐黃色忒入

冰片三分共研細末吹咽喉患

處

治咽喉腫痛或齒疼口舌生瘡諸効

黃連

當歸

生地黄各

一錢升麻

二錢

牡丹皮

一錢半

石羔水錢

右吹胆水三鐘前至一鐘食後

温服

治喉痺

冰片三分燈心一錢燒存性黃

栢五分燒存性白礬七分火煨

右為細末每用二三分吹入喉

中

神効吹喉散治咽喉閉塞腫痛

單娥雙娥諸効

真山豆根為末一錢黃連為末

一錢膽礬八分礪砂五分牙硝

五分青黛六分共為極細末每

用二分以葦筒吹入喉中開口

流涎

治喉閉

用鴨嘴膽礬細研醋調灌神效

又用土牛膝根搗自然汁加醋

少許吹之

又壁錢一個入蚕蛾繭內火燒

存性加枯礬并鷄肫腔裏面黃

紙皮焙乾同為末吹之立愈

又用土牛膝一名鼓椎草搗汁灌

入吐痰即消如腫痛不能入者

令患人仰卧灌入鼻中見效再

以生韭菜搗爛敷喉頭下妙

又用滑石為末蜜丸如彈子大

噲化亦可

治纏喉風閉並單雙蛾

將

用鮮牛膝根一撮芥葉七片搗爛入人乳汁半酒鍾和之再搗取汁令病者仰取汁灌入鼻內須臾痰涎即從口鼻中出愈又用胞皂角一條去子細剉以清水一大盞浸研絞取汁半盞入生麻油一起攪勻以鵝毛蘸汁

肥肥誤

頻攪喉中吐涎為度然後用散風毒藥治之

倒塵

治乳蛾 猪牙皂角 鹽炒黃 烏龍尾 即削掛烟塵 右各等分 為細末以葦筒吹入患處 治牙疳疔亦治鼻疳

茶

人 中 白 煨 條 一 久 溺 尿 壺 中 白 垢 火

毛 褐 燒 灰 一 錢 枯 礬 一 錢

共 為 細 末 濕 者 乾 膝 乾 者 先 以

油 潤 之 搽 藥

又 舊 髮 網 巾 燒 灰 三 分 輕 粉 五 分

粉 心 煨 五 分 褐 子 燒 灰 三 分

共 為 細 末 用 甘 草 細 茶 煎 水 洗

散

之 敷 藥 靈 山 散 關 心 木 刻 三 散

又 口 鼻 生 疳 蝕 爛 欲 死 用 藍 散

敷 之 令 遍 日 十 度 夜 四 度 立 愈

神 仙 鈎 骨 丹 治 諸 骨 哽

硃 砂 一 錢 丁 香 一 錢 血 竭 五 錢

磁 石 五 錢 龍 骨 五 錢

右 為 細 末 用 黃 蠟 二 錢 為 丸 硃

砂為衣每服一九香油和好醋
調勻吞下後用濃茶任服其骨
隨棄自下或吐出
又用萆白晒萎柔用細繩縛一束
微嚼吞倒哽處引之隨吐出
又用礪砂一塊含化食頃即愈
又用威靈仙搗爛以滾水浸之頃

飯去渣徐徐嚥之妙
治魚刺哽喉
擇淨魚肉滿口嚥下立愈
又用新汲水一盞點以左目視
于水午書龍字于水內服之不
過二盞即下小兒遇哽大人如
法作與服


九

又左手搯三山訣架水一椀右手
搯劍訣指碗內咒云此碗化為
東洋大海喉嚨化作萬丈深坑
此物喉中或骨或刺隨物呼之
化為九龍入洞吾奉九天玄女
急急如律令勅右手劍訣向水
面上暗寫九天玄女川鳳龍水



字將水吃下骨刺即化如吞竹
木箸之類將竹木箸等物寸
斷浮水碗上咒飲同前
食忌椒蒜姜炙燻芥米辛辣之味
新安陳文杞校訂

懸神便方卷二終



撰
麻
度
卷
卷
二
物
法
聚
水
一
七
七
七

檢
刻
款
捕
疏
同
究
全
一
一
一
一

東
洋
大
海
樓
羅
密
刺
文
並
註
疏

身
過
琳
絲
毒
火
醫
毒
老
年
精
身
心

陶
器
外
藏
土
田
類
風
雨
天
地
一

本
卷
之
後
部
計
本
卷
再
錄
古
文

卷
註
本
卷
不
氣
陳
明
山
地
各
村

下

