

外科正宗

六

中國醫學大成第八集

外科類甲
外科叢刊之一

徐評

外科正宗

六

上海大東書局印行

徐評外科正宗

明 崇川 陳實功著

清 海寧 許辛木訂

清 吳江 徐靈胎評

鄞縣 曹炳章校

卷十一

鵝掌風

鵝掌風。由足陽明胃經火熱血燥。外受寒涼所凝。致皮枯槁。又或時瘡餘毒未盡。亦能致此。初起紫斑白點。久則皮膚枯厚。破裂不已。二攀湯熏洗即愈。

徐曰。此症必用塗藥。烘手洗方無益也。

二攀湯

二攀湯中白阜攀。兒茶柏葉在其間。先熏後洗油煙照。鵝掌風痛愈不難。

治鵝掌風皮膚枯厚。破裂作痛。宜用此湯熏洗。輕則不宜。越重越效。

白 礬

阜

礬各四兩

孩兒茶五錢

柏 葉半斤

用水十碗。同上藥四味煎數滾。先用桐油搽抹患處。再以桐油蘸紙擦點著。以烟燄熏片時。方將前湯乘滾貯淨桶內。用布蓋好。將手伸入。以湯熏之。勿令泄氣。待微熱。傾入盆內。蘸洗良久。一次可愈。七日忌下湯水。永不再發。

腎囊風

腎囊風乃肝經風溼所成。其患作癢。喜浴熱湯。甚者疔瘡頑麻。破流脂水。宜蛇牀子湯熏洗。二次即愈。

蛇牀子湯

蛇牀子湯當歸尾。苦參片加威靈仙。河水同煎。熏患處。腎囊風癢得安然。

治腎囊風溼熱為患。疔瘡作癢。搔之作疼者。

蛇牀子

當歸尾

威靈仙

苦

參各五錢

水五碗。煎數滾。入盆內先熏。待溫浸洗。二次愈。

徐曰。此專治之方。
楣案蛇牀子徐圜。

狼毒膏

狼毒膏中用檳榔。蛇牀五倍子硫黃。川椒楓肉同油沸。投入皮硝膽汁良。
治症同前。

狼毒

檳榔

硫黃

五倍子

川椒

楓子肉

蛇牀子各三錢

右爲末。用香油一大杯煎滾。入皮硝三錢再煎滾。次下公猪膽汁一個和勻。調前藥搽擦。此藥諸癢瘡用之並效。此句徐圜
楣案楓子肉。蛇牀子。徐圜。

疥瘡論

夫疥者。微芒之疾也。發之令人搔手不閒。但不知其何以生者。疥曰。吾不根而生。無母而成。乃稟陰陽氣育。溼熱化形。常列於王侯掌上。何妨士庶之身。可使文人

怕筆。繡女停針。毋分貴賤。一例施行。醫問曰。不生於身。獨攻於手者。又何也。疥曰。手掌乃太陰溼土所主。手心又少陽相火所司。土能生我。火能化我。此生皆賴溼土。陽火所化。故生者必出於手掌。醫曰。然哉。但其形知動而不知靜。能進而不能退。自非清氣所化也。又脾主消納。胃主傳化。人之飲食。未有不從厚味者。厚味之中。溼熱並化。致生此瘡。又清氣隨脈循行。濁氣留滯不散。停留肌膚。積日不解。隨後生熱。發癢。故癢熱之中。溼火混化爲蟲。形隨溼化。動隨火化。此無情而之有情也。既化之後。潛隱皮膚。展轉攻行。發癢鑽刺。化化生生。傳徧肢體。近則變爲疥癬。久則變成頑風。多致皮膚枯槁。浸溼血脈。搔癢無度。得湯方解。是宜外以繡毬丸搽擦。止癢殺蟲。內服消風散。散風涼血。兼戒口味。辛熱莫啜。忌洗熱湯。其煩自脫。此爲小恙。不當陳說。閒中之言。隨筆而白。

消風散

消風散內歸生地。蟬蛻木通蒼苦參。胡麻知母牛蒡子。石膏甘草與防荊。

治風溼浸溼血脈。致生瘡疥。搔癢不絕。及大人小兒風熱癩疹。徧身雲片斑點。乍有乍無。並效。

當歸

生地

防風

蟬蛻

知母

苦參

胡麻

荆芥

蒼朮

牛蒡子

石膏

甘草

木通各五

錢各一

水二茶鍾煎八分。食遠服。

徐曰。此浮泛之方。

當歸飲子

當歸飲子芍芍耆。生地防風白蒺藜。甘草何首烏荆芥。諸風瘡癢服之宜。

治血燥皮膚作癢。及風熱瘡疥搔癢。或作疼痛。

當歸

川芎

白芍

生地

防風

白蒺藜

荆芥

何首烏錢各一

黃耆

甘草各五

水二茶鍾煎八分。食遠服。

徐曰。亦泛方。

繡毬丸

繡毬丸內用樟冰。輕粉川椒共水銀。雄黃枯礬楓子肉。諸瘡癢疥擦之靈。治一切乾溼疥瘡及膿窠爛瘡搔癢無度者。

樟冰

川椒

枯礬

輕粉

水銀

雄黃各二錢

楓子肉另碾一百粒

以上共為細末。同大楓子肉再碾和勻。加柏油一兩化開。和藥攪勻。丸作圓眼大。於瘡上擦之。

徐曰水銀入皮膚中有毒。不宜用。

諸瘡一掃光

諸瘡一掃光。硫柏。木鼈。牀椒。枯白礬。水銀。楓子。樟冰。粉。白砒。苦參。烟膠。參。治癢瘡不論新久。及身上下。或乾或溼。異類殊形。但多癢少痛者。用之俱各有效。

苦參

黃柏各一

烟膠一升

木鼈肉

蛇牀子

點紅椒

明礬

枯礬

硫黃

楓子肉

樟冰

水銀

輕粉各三

白砒五錢

共爲細末。熟猪油二斤四兩化開入藥攪勻。丸作龍眼大。瓷瓶收貯。用時搽擦二次卽愈。

徐曰。此藥用者往往使毒入裏。變成瘡蠱。慎之。

楣案硝皮鋪刮下諸皮之膜。炒成炭研末。謂之烟膠。余見今人合瘡藥。多以淡巴菰烟筒中之油當之。問諸醫者亦多不知。

洗癢瘡方

洗癢瘡方只二般。苦參先將河水煎。公猪膽汁和勻洗。九日三洗可全安。苦參半斤。切片。用河水三四瓢煎。藥數滾。參水二瓢。住火片時。濾去渣。和公猪膽汁四五枚。攪勻淋洗。三日一洗。三次亦可痊愈矣。

徐曰。此外治良方。

廉瘡論

臙瘡者。風熱溼毒相聚而成。有新久之別。內外之殊。新者只用三香膏。乳香法紙貼之自愈。稍久紫黑者。以解毒紫金膏搽紫漸可。年久頑臙。皮肉烏黑下陷。臭穢不堪者。用蜈蚣錢法。去風毒。化瘀腐。方可得愈。外臙多服四生丸。內臙多服腎氣丸。

三香膏

三香膏內乳松香。輕粉油調紙內藏。葱湯洗淨方膏貼。何愁新久爛臙瘡。治臙瘡初起。多疼少癢。未經受風紫黑者。

乳香

松香

輕粉各等分

右爲細末。香油調稠。用夾紙一面以針密刺細孔。將藥夾搽紙內。先以葱湯洗淨。將紙有孔一面對瘡貼之。三日一換自效。忌房事煎炒等件。

徐曰。此治一切溼風瘡俱效。

乳香法紙

法紙方奇。用乳香。紙捲浸入甘草湯。攤乾再糝真輕粉。止痛生肌貼爛瘡。治臙瘡作痛不愈。先碾乳香細末一兩聽用。以呈文每紙四張。每紙一張攤平。

用乳香二錢五分。細攤平紙上。雙折捲一寸闊。將捲紙復作三條。外用以綿紮之。用甘草一兩二錢。水三碗。將捲過藥紙浸入甘草湯內。上用重物壓之。煮數滾。取起紙來。解去紮線。將紙攤開桌上。每張用輕粉三錢。糝乳香上。用椶糊刷排刷令勻。提起藥紙。帶溼以無藥一面對板壁上貼之。陰乾收用。臨時隨瘡大小。翦紙多少。先用溫湯洗淨。隨將紙有藥一面對瘡貼之。絹紮三日一換。自然止痛生肌。如貼後內無水出。不必換貼自愈。

徐曰。做法無謂。

蜈蚣錢

蜈蚣錢治人頑癩。獨活桐油白芷煎。甘草加上同熬就。傾入瘡中黑腐痊。

治癩瘡多年黑腐。臭爛作疼。諸藥不效者。用桐油二兩。獨活白芷甘草蜈蚣各一錢。入油內煎滾。先將癩瘡洗淨。用白麵水調作圈。圍在瘡之四邊。毋令泄氣。走油將脚放平。以茶匙挑油。漸漸乘熱加滿。待油溫取去。已後腐肉風毒自然脫下。用解毒紫金膏搽上。紙蓋絹紮。三日一換。

徐曰。此法甚奇。一切腐敗頑肉蟲蝕俱可用。

解毒紫金膏見結毒門

治賺瘡毋論新久。及頑瘡年久不愈者。

四生丸

四生丸療久賺瘡。骨節多疼舉動妨。地龍白附殭蠶等。草烏靈脂共丸良。治外賺血風頑瘡。骨節疼痛不能舉動。或行步不前。或渾身疼癢。或麻痺不仁。或生斑疹。

地龍去土

殭

蠶妙去

白附子

五靈脂

草烏去皮尖泡各等分

右為細末。米糊丸桐子大。每服三四十九丸。食前茶酒任下。

徐曰。此法不驗。

賺瘡應用方

腎氣丸見肺癰門

血風瘡

血風瘡乃風熱溼熱血熱三者交感而生發則搔癢無度破流脂水日漸沿開甚者內服消風散加牛膝黃柏外搽解毒雄黃散或如意金黃散如年久紫黑堅硬氣血不行者用針砭去黑血以神燈照法熏之以解鬱毒次以前藥敷之方效解毒雄黃散

治風溼流注腿脚致生血風頑瘡紫黑搔癢者。

雄黃四兩 硫黃八兩

右二味共碾細末柏油調搽紙蓋之三日一換。

徐曰治癬亦效。

如意金黃散見腫瘍門

治症同前用公猪膽汁調稠敷患上油紙蓋紮勿動待其自脫脫後色紅再敷之以色白爲度。

神燈照法見腫瘍門

治年久紫黑血風頑瘡流水作癢不絕先用葱湯洗淨以燈焰熏之每熏二擦爲度。

血風瘡應用方

涼血消風散 見疥瘡門

頑癬

頑癬乃風熱溼蟲四者爲患。其形大小圓斜不一。有乾溼新久之殊。風癬如雲朵。皮膚嬌嫩。抓之則起白屑。溼癬如蟲形。搔之則有汁出。頑癬抓之則全然不痛。牛皮癬如牛項之皮。頑硬且堅。抓之如朽木。馬皮癬微癢。白點相連。狗皮癬白斑相簇。此等總由血燥。風毒客於脾肺二經。初起用消風散加浮萍一兩。葱豉作引。取汗發散。久者服首烏丸。蠟礬丸。外擦土大黃膏。或槿皮散。選而用之。俱可漸效。徐曰。此症非服藥所能治。

土大黃膏

土大黃膏用白礬。硫黃八兩共相參。川椒三味研成末。頑癬搽之效不難。治乾溼頑癬。不論新久。但皮膚頑厚。串走不定。惟癢不痛者。

硫黃 八兩

生礬 四兩

點紅川椒 二兩

右各爲末。用土大黃根搗汁。和前藥調成膏。碗貯。新癬抓損擦之。多年頑癬。加醋和擦。如日久藥乾。以醋調搽。牛皮癬用穿山甲抓損擦之妙。

徐曰。此搽藥最效。土大黃俗名秃菜根。

榴案頸項之癬。先用刀剃。次以土大黃醋磨極濃。新筆蘸塗。微覺癢痛。乾則再塗。次日即結痂。更數日痂落。皮肉如常。余曾親試。如不用刀剃。則不癢痛而無效。

頑癬必效方

頑癬必效。川槿皮。輕粉。雄黃。巴豆。宜。斑蝥。大黃。百藥餅。陰陽水。和海桐皮。治多年頑癬。諸藥熏擦。搽洗。不效者。

川槿皮 四兩

輕粉

雄黃 各四錢

百藥煎 四餅

斑蝥 全用一錢

巴豆 去油五分

大黃 二兩

海桐皮 二兩

右爲極細末。用陰陽水調。抓損敷藥。必待自落。

徐曰。此方要爛皮。

又頑癬方

頑癬方中川槿皮。斑蝥輕粉亦相宜。再加七個楓子肉。新筆頻塗癬可醫。

川槿皮二錢

輕粉五分

斑蝥七箇

大楓子七箇

河井水共一碗。煎一半。露一宿。筆蘸塗之。

徐曰。此亦爛皮之方。

頑癬浮萍丸

浮萍丸內用鈎藤。蒼朮黃芩共苦參。殭蠶蒼耳稀莨草。丸服何憂癬更侵。

紫背浮萍

蒼朮

蒼耳草各二兩

苦參四兩

黃芩

殭蠶各一兩

鈎藤各一兩

稀莨草二兩
伊蒸

共為末。酒糊丸。白滾湯每服二錢。隨病上下服。

膿窠瘡

膿窠瘡乃肺經有熱。脾經有溼。二氣交感。先起水泡作癢。後變膿泡作疼。以清熱散風涼血除溼為治。涼血消風散是也。外以蛇牀子散或諸瘡一掃光搽之亦效。兼戒口味自愈。

蛇牀子散

蛇牀子散用黃丹。松香輕粉共枯礬。大黃楓肉同研末。油搽乾糝效非凡。治膿窠瘡生於手足偏身。根硬作脹。癢痛非常。

蛇牀子

大楓子肉

松香

枯礬各一

黃丹

大黃各五錢

輕粉三錢

右為細末。麻油調搽。溼爛者乾糝之。

徐曰。亦有效有不效。

膿窠又方

膿窠方中用黃柏。輕粉黃丹共石膏。加上枯礬能燥溼。搽之痛癢即時消。

黃柏一兩以公豬膽汁

石膏一兩

輕粉二錢

黃丹

枯礬各三錢

右為末。麻油調搽。溼者乾糝。

徐曰。此方治肥瘡大效。

膿窠瘡應用方

涼血消風散

諸瘡一掃光俱見疥瘡門

火丹

火丹者。心火妄動。三焦風熱乘之。故發於肌膚之表。有乾溼紅白之異。乾者色紅。形如雲片。上起風粟。作癢發熱。此屬心肝二經之火。治以涼心瀉肝。化斑解毒湯是也。溼者色多黃白。大小不等。流水作爛。又且多疼。此屬脾肺二經溼熱。宜清肺瀉脾。除溼胃苓湯是也。腰脇生之。肝火妄動。名曰纏腰丹。宜柴胡清肝湯。外以柏葉散。如意金黃散敷之。

化斑解毒湯

化斑解毒湯。石膏。元參。知母。共連翹。黃連。升麻。牛蒡等。甘草。人中黃。更高。

治三焦風熱上攻。致生火丹。延及遍身癢痛者。

元參

知母

石膏

人中黃

此味徐勒批不入煎藥

黃連

升麻

連翹

牛蒡子

各等分

甘草五分

水二茶鍾。淡竹葉二十片。煎八分。不拘時服。

徐曰。不外此諸味。

除溼胃苓湯

除溼胃苓湯二朮。二苓草朴滑山梔。木通澤瀉防風等。還須薄桂與陳皮。治脾肺二經溼熱壅遏。致生火丹。作爛疼痛者。

防風

蒼朮

白朮

赤茯苓

陳皮

厚朴

豬苓

山梔

澤瀉

木通

滑石

甘草

薄桂

各三分

水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。食前服。

徐曰。不合此症。

柏葉散

柏葉散中用大黃。赤豆黃柏。蚯蚓糞。加上輕粉水調敷。火丹癢痛何須問。治三焦火甚。致生火丹。作癢。或作痛。延及徧身。

側柏葉抄黃爲五錢

蚯蚓糞韭菜田內者

黃柏

大黃各五錢

赤豆

輕粉各三錢

右爲細末。新汲水調搽。

徐曰。隨舉三味。俱有小效。

纏腰火丹方

用寶鈔一張。燒化存性。研爲細末。用米醋調稀。雞翎蘸塗。一日三次。卽愈。忌食發物。

如意金黃散見腫瘡門

治火丹不論新久癢痛。用新汲水調敷。靛汁亦好。

天泡瘡

天泡者。乃心火妄動。脾溼隨之。有身體上下不同。寒熱天時微異。上體者。風熱多於溼熱。宜涼血散風。下體者。溼熱多於風熱。宜滲溼爲先。外用胡粉散。石珍散。搽之自愈。此不早治。變爲頑風紫癩。則難痊。

解毒瀉心湯

解毒瀉心湯。芩連。荆防牛蒡石膏全。山梔滑石元參草。木通知母共相煎。

治心經火旺。酷暑時臨。致生天泡。發及徧身者。

黃連 防風 荆芥 山梔

黃芩 牛蒡子 滑石 元參

知母 石膏各一 甘草 木通各五

水二茶鍾。燈心二十根。食後服。

徐曰。此症重在敷藥。如用煎方。亦不外此。

清脾甘露飲

清脾甘露飲。茵陳。朮地。翹芩。梔赤苓。麥冬。澤瀉。蒼枳殼。元明粉。草共燈心。

治脾經溼熱鬱遏。乃生天泡。下體多而疼痛者。

白朮 赤茯苓 山梔 茵陳

麥門冬 生地 黃芩 枳殼

蒼朮 澤瀉 連翹 甘草

元明粉各等分

水二鍾。竹葉燈心各二十件。煎八分。食前服。

胡粉散

胡粉散治天泡瘡。杭粉輕粉石膏夏蛤粉共研爲細末。絲瓜汁和效無雙。

杭粉一兩

輕粉

石膏

蛤粉各三錢

共研極細。將泡挑破。搯乾糝之。或用絲瓜葉搗汁調搽亦好。如冬月無此。用染布青缸汁調搽。此八字

徐曰。此方加入密陀僧、冰片尤妙。

又曰。此瘡必用剪刀剪破。方不袋膿。

楣案輕粉、蛤粉、徐圈。

石珍散

石珍散中煨石膏。還兼輕粉共相調。青黛再添黃柏末。將來一糝卽能消。治天泡日久作爛。疼痛不已。膿水淋漓者。

石膏煨

輕粉各一兩

青黛

黃

柏各三錢

右共研細。甘草湯洗淨。以此藥糝之。其疹即止。

肺風粉刺酒齧鼻

肺風粉刺酒齧鼻。三名同種。粉刺屬肺。齧鼻屬脾。總皆血熱鬱滯不散所致。宜真君妙貼散加白附子敷之。內服枇杷葉丸、黃芩清肺飲。

徐曰。此症宜外治。須塗清火拔毒藥。

枇杷葉丸

枇杷葉丸。天花粉。甘草。黃芩。酒泛丸。肺風粉刺併齧鼻。三症吞之俱可安。

治肺風粉刺鼻齧。初起紅色。久則肉炮發腫者。

枇杷葉去毛刺

黃芩酒炒

甘草一兩

天花粉四兩

共為末。新安酒泛丸。桐子大。每服一錢五分。食後併臨睡時。白滾湯茶湯俱可送下。忌火酒煎炒。

徐曰。此症宜服清肺藥。然亦非服藥所能治。

黃芩清肺飲

黃芩清肺飲歸芎。紅花地芍兼防風。薄荷翹葛天花粉。用治粉刺消無蹤。

治症同前。

川芎

當歸

赤芍

防風

生地

乾葛

天花粉

連翹

紅花

各一錢

黃芩二錢

薄荷五分

水二茶鍾煎八分。食後服用酒一杯過口。

真君妙貼散見腫瘍門

治肺風粉刺戲鼻。紅赤紫腫。早晚用涼水調敷。

雀斑

雀斑乃腎水不能榮華於上。火滯結而為斑。宜六味地黃丸。以滋化源。外以玉容丸。早晚搽洗漸愈。

徐曰。此必用塗藥。

玉容丸

玉容丸。梔羌獨松。荆礬辛柰芷麻風。芫薺椒檀蠶藁本。陀僧紅棗菊花同。治男婦雀斑酒刺。及身體皮膚粗糙。並用此洗。

甘松

山柰

細辛

白芷

白薺

白芨

防風

荆芥

僵蠶

山梔

藁本

天麻

羌活

獨活

密陀僧

枯礬

檀香

川椒

菊花

紅棗肉

以上共為細末。用去淨弦膜肥皂一斤。同槌作丸。如秋冬加生蜜五錢。如皮膚粗槁。加牛骨髓三錢。早晚洗之。肌膚自然瑩潔如玉。溫潤細膩。

徐曰。此專治去皮毛之風。義亦可取。

玉肌散

玉肌散用生綠豆。滑石白芷研成就。三味還兼白附子。雀斑酒刺治不謬。一切風溼雀斑酒刺白屑風皮膚作癢者並效。

綠豆半升

滑石

白芷

白附子各二錢

共為細末。每用三匙。早晚洗面時。湯調洗患上。

雀斑應用方

六味地黄丸見肺癰門

汗斑

密陀僧散

石黃一錢

輕粉五分

硫黃

雄黃

蛇牀子各二錢

密陀僧一錢

共為末。醋調搽之。

楣案汗斑本在末卷補遺。今移於此。

油風

油風乃血虛不能隨氣榮養肌膚。故毛髮根空。脫落成片。皮膚光亮。癢如蟲行。此

徐密點批曰此症必有蟲當用塗藥此皆風熱乘虛攻注而然當服神應養真丹外以海艾湯熏洗並效。

海艾湯

海艾湯中甘菊花。防風薄荷藿香加。甘松藁本蔓荆子。荆芥同煎效可誇。

治油風血虛風熱所致。皮膚光亮。眉髮脫落者。

海艾

菊花

薄荷

防風

藁本

藿香

甘松

蔓荆子

荆芥穗

各二錢

用水五六碗同藥煎數滾。連渣共入敞口鉢內。先將熱氣熏面。候湯溫蘸洗之。

留藥照前再洗。

梔案海艾、藁本、甘松、蔓荆子。徐圜。

神應養真丹

見鶴膝風門

治風寒暑溼襲於三陽部分。以致血脈不能榮運肌膚。致生虛癢。眉髮脫落。皮

膚光亮者。

白屑風

白屑風多生於頭面耳項髮中。初起微癢。久則漸生白屑。疊疊飛起。脫而又生。此皆起於熱體當風。風熱所化。治當用消風散。面以玉肌散擦洗。次以當歸膏潤之。髮中作癢有脂水者。宜翠雲散搽之自愈。

徐曰。此症宜驅風養血。久而見功。

又曰。此宜塗驅風潤肌之藥。久則必生蟲。更兼殺蟲之品。

祛風換肌丸

換肌丸用石菖蒲。牛膝。胡麻。參首烏。甘草。靈仙。蒼朮等。芎歸花粉亦相須。治白屑風。及紫白癩風。頑癬。淫熱瘡疥。一切諸瘡。搔癢無度。日久不絕。愈而又發。

威靈仙

石菖蒲

何首烏

苦參

牛膝

蒼朮

大胡麻

天花粉各等分

甘草

川芎

當歸減半

右爲末。新安酒泛丸。綠豆大。每服三錢。白湯送下。忌牛肉火酒雞鵝羊等發物。
徐曰。此亦非煎方丸方所能治。

白屑風應用方

消風散

見疥瘡門

翠雲散

見楊梅瘡門

玉肌散

見雀斑門

潤肌散

見白禿瘡門

耳病

耳病乃三焦肝風妄動而成。大人有虛火實火之分。小兒有胎熱胎風之別。虛火者。耳內蟬鳴。或兼重聽。出水作癢。外無掀腫。宜四物湯加牡丹皮、石菖蒲。及腎氣丸主之。實火者。耳根耳竅俱腫。甚則寒熱交作。疼痛無時。宜柴胡清肝湯治之。又有耳挺結於竅內。氣脈不通。疼痛不止。以梔子清肝湯爲治。外用黃線藥插入。挺肉縫旁。化盡乃愈。小兒胎熱。或浴洗水灌竅中。亦致耳竅作痛生膿。初起月間。不必擦藥。候毒盡自愈。如月外不瘥。以紅棉散治之。則安矣。

紅棉散

紅棉散內用枯礬。麝香胭脂在其間。小兒聾耳將棉絞。再送藥末膿自乾。治耳內流膿腫痛已消。膿尚不止。方用此糝之。

枯礬 上白三錢 麝香 一分 乾胭脂 二錢 麝香 五分

共研極細末。瓷罐收貯。先用棉裹絞盡耳內膿溼。棉裹滾藥送入耳底自愈。徐曰。另有效方。

聰耳蘆薈丸

聰耳蘆薈丸。木香。芩歸。膽草。與大黃。山梔。青黛。柴胡等。麝香。青皮。南星。良。治肝膽有火。耳內蟬鳴。漸至重聽。不聞聲息者。

蘆薈 蒼 大黃 蒸熟 青黛 柴胡 各五錢

龍膽草 當歸 山梔 青皮

黃芩 各一兩 木香 一錢 南星 三錢 麝香 五分

右為末。神麴糊為丸。綠豆大。每服二十一丸。食後薑湯送下。日服三次。漸效。

耳病應用方

柴胡清肝湯

梔子清肝湯 俱見醫門

四物湯 見續傷門

腎氣丸 見肺癰門

漆瘡

漆瘡由來自異。有感有弗感也。俗稱木生人感之。非也。漆乃辛熱有毒之物。人之皮毛腠理不密。故感其毒。先發為癢。抓之漸似隱疹。出現皮膚。傳徧肢體。皮破爛斑。流水作痛。甚者寒熱交作。宜韭菜汁調三白散塗之。服化斑解毒湯。忌浴熱水。兼戒口味。不然。變為頑風癬癩。愈而又發者多矣。

徐曰。宜用貫衆湯洗。

三白散

三白散中用石膏。輕粉。杭粉。共相調。搽時須用生韭汁。肉上漆瘡頃刻消。

杭粉一兩 石膏三錢 輕粉五錢

各為末。韭菜汁調敷。紙蓋。如無菜汁。涼水調敷。

徐曰。未必效。

又曰。石蟹磨汁塗。并飲一杯。立愈。

漆瘡應用方

化斑解毒湯見火門

瘰癧瘡

瘰癧者。密如撒粟。尖如芒刺。癢痛非常。渾身草刺。此因熱體見風。毛竅所閉。宜服消風散。洗用苦參湯。甚者皮損匝匝成瘡。以鵝黃散軟絹帛蘸藥撲之。

徐曰。此俗名風癩之疾。

苦參湯

苦參湯用大菖蒲。河水煎淋。效不虛。臨洗再加猪膽汁。瘰瘡痛癢自然除。治瘰癧瘡作癢。抓之又疼。坐如芒刺。難以安睡。用苦參四兩。大菖蒲二兩。河水五瓢。同煎數滾。添水二瓢。蓋片時。和入公猪膽汁四五枚。淋洗瘡上。不二三次。全愈。愈後避風。忌食發物。

鵝黃散

鵝黃散用黃柏末。輕粉豆粉同研入。更將滑石共和勻。止痛收乾。疾如失。

治瘰癧瘡作癢。抓之皮損。隨後又疼。用此撲之。

綠豆粉一兩

滑石五錢

黃柏三錢

輕粉二錢

右爲細末。以軟絹帛蘸藥撲之。止痛收乾。

瘰癧瘡應用方

消風散

見疥瘡門

疥腮

疥腮乃風熱溼痰所生。有冬溫後天時不正。感發傳染者。多兩腮腫痛。初發寒熱。以柴胡葛根湯散之。外敷如意金黃散。內熱口乾。二便不利者。四順清涼飲利之。表裏俱解。腫仍不消。必欲作膿。用托裏消毒散。膿成者卽針之。體虛人兼服補托藥自愈。

徐曰。此症以驅風消痰軟堅清熱爲治。赤豆爲末。雞子清調塗立效。

又曰。此症若在時氣病後。餘邪未清。仍宜照本症所感。輕劑表散。若無因驟起。則如連翹、夏枯草、土貝、甘草、大力子、白芷、元參、半夏、橘紅、黃芩、赤芍、薄荷、荊芥。

等藥俱可用。

疔腮應用方

柴胡葛根湯見傷寒發頤門

四順清涼飲見傷寒發頤門

痰包

痰包乃痰飲乘火流行。凝注舌下。四字徐四字而胞腫。綿軟不硬。四字徐四字有妨言語。作痛不安。用利剪刀當包剪破。此句徐四字流出黃痰。若蛋清稠粘難斷。捺盡以冰硼散捺之。內服二陳湯加黃芩、黃連、薄荷數服。忌煎炒火酒等件。

徐曰。此不常見之病。亦有生在頸項者。

又曰。此症人不識者多。宜留意。

加味二陳湯

加味二陳湯半夏。茯苓甘草共陳皮。芩連薄荷薑三片。痰飲生包服此宜。治痰飲流注舌下。發腫作痛。針刺已破者。

陳皮

半夏

茯苓

甘草

黃芩各八分

黃連

薄荷各五分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

徐曰。此通治方。

痰包應用方

冰硼散見咽喉門

癩風

癩風乃陽明溼熱。沸騰於肌表。或外受風寒。侵襲而成。其患初起水泡。作癢成瘡。破流脂水。癢至徹骨。久則成片。傳及徧身。好浴熱湯。形如風癩。初起上體多者。防風通聖散去硝黃。加葱頭三莖。發汗以散外毒。下體多者。去麻黃以攻內毒。通治。則初服消風清燥湯。久服祛風換肌丸。外搽諸瘡一掃光。成片流水者。真君妙貼散。皮膚頑厚有蟲者。麥錢散搽之。

徐曰。此症有似大麻風而毒氣不深。全在肌肉。故可治。

消風清燥湯

消風清燥湯生地。蟬蛻防歸芩共連。花粉川芎兼白芎。苦參甘草與靈仙。

川芎

當歸

白芎

生地

防風

黃芩

黃連

天花粉

蟬蛻

苦參

威靈仙各一錢

甘草五分

水二茶鍾煎八分。食後服。

徐曰。此通治方。

癩風應用方

防風通聖散見時毒門

祛風換肌丸見白屑風門

真君妙貼散見癩門

諸瘡一掃光見疥瘡門

麥錢散見瘡門

溼腫

溼腫者。皆脾氣受傷之病。或飲食後驟受風寒。或飢渴時誤食生冷。寒積於中。食不尅化。其患胸膈不寬。小水不利。面目浮腫。漸至偏身。此土傷不能生化之故也。宜用二蛟散疏通稼土。溫養脾元。其小水自利。浮腫自消。百發百中。

徐曰。此症不得指一病名。

楣案此症內外科書皆載之。愚意當專歸內科爲宜。

二蛟散

二蛟散內用皮硝。陳米三年要炒焦。溼腫糖湯調服下。如蛟行水自然消。治生冷惱怒傷脾。致胸膈不寬。小水不利。面目四肢浮腫。諸藥不效。用三年老黃米炒焦黃色爲末。提淨芒硝三兩。鍋內溶化。炒乾爲末。每用一平杯和勻。再碾極細。大人壯實者。每服三錢。小兒十歲上下者。一錢二分。俱用赤砂糖三茶匙。和白滾湯半茶鍾。空心調服。至午大便一次。至晚再便一次。其疾先從眼胞消起。日久元氣虛者。與加味胃苓湯間服。至重者不過五服愈。

加味胃苓湯

加味胃苓湯。朮苓。參。查。芍。半。藿。香。陳。澤。瀉。猪。苓。并。厚。樸。甘。草。香。附。效。如。神。治脾胃受傷。胸膈不寬。兩脇鼓脹。小水不利。面目四肢浮腫。

陳皮 茯苓 白朮 白芍 各一
藿香 人參 厚朴 山查

澤瀉 半 夏各五分 甘草 猪苓

香附女人加一錢

薑三片。燈心二十根。水二茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。此調和脾胃通用之方。

梔案藿香。香附。徐圈。

女人面生鰲黑斑

鰲黑斑者。水虧不能制火。血弱不能華肉。以致火燥結成黑斑。色枯不澤。宜朝服腎氣丸以滋化源。早晚以玉容丸洗之。兼戒憂思動火勞傷。日久漸退。此症不得於夫。及疑事不決者。常有之。

面斑應用方

腎氣丸見肺癰門 玉容丸見雀斑門

鈕釦風

鈕釦風皆由風溼凝聚生瘡。久則搔癢如癬。不治則沿漫項背。當以冰硫散擦之。甚者服消風散亦妙。

冰硫散

冰硫散內礬硫椒。樟腦同將蘿蔔包。灰火內煨令藥透。猪脂熬熟共相調。

硫 黃一兩

樟 冰

川 椒

生 礬各一錢

共為末。先用白蘿蔔一個。搥空。將藥填滿。復將原皮蓋之。溼紙包三四層。灰火內煨半時許。待冷取開。將藥同熟猪油調稠。搽之自愈。

徐曰。此症主方。

鈕釦風應用方

消風散見疥瘡門

枯筋箭

枯筋箭乃憂鬱傷肝。肝無榮養。以致筋氣外發。初起如赤豆大。枯點微高。日久破裂。攢出筋頭。四字徐圍蓬鬆枯槁。多生胸乳間。宜用絲藥線齊根繫緊。日此法最捷。批七

日後自落。以珍珠散糝之。其疤自收。兼戒口味不發。

徐曰。此即肱子之大者。

枯筋箭應用方

絲藥線 見嬰
癰門

珍珠散 見下
癰門

婦人脚丫作癢

婦人脚丫作癢。乃三陽風溼下流。凝結不散。故先作癢而後溼爛。又或足底彎曲之處癢溼皆然。

枯攀散

枯攀散中用石膏。黃丹。輕粉。共研調。四味將來為末糝。脚丫溼癢即時消。

枯攀 五錢

石膏 煨

輕粉

黃丹 各三錢

右為末。溫湯洗淨。搽之即愈。

楣案石膏。輕粉。徐圍。

手足破裂裂

手足破裂者。乾枯之象。氣血不能榮養故也。因熱肌驟被風寒所逼。凝滯血脈。以致皮膚漸枯。漸槁。乃生破裂。日襲於風。風熱相乘。故多作痛。以玉肌散洗擦。潤肌膏潤之。甚者兼服當歸飲子為妙。

手足破裂應用方

玉肌散

見雀斑門

潤肌膏

見白禿瘡門

當歸飲子

見疥瘡門

眼丹

眼丹脾經有風。胃經多熱。共結為腫。風多者。浮腫易消。熱甚者。堅腫難散。初起宜用金黃散敷之。有表症者。荆防敗毒散裏症者。清胃散加大黃利之。如不散。必欲作膿。宜換膏貼之。膿成者。即針之。遲則眼頭自破。此乃睛明穴。內空難斂。成漏者多。

眼丹應用方

荆防敗毒散

見時毒門

清胃散

見牙疔血門

金黃散

見腫瘍門

眼胞菌毒

菌毒者。乃脾經蘊熱凝結而成。其患眼胞內生出如菌。頭大蒂小。漸長垂出。甚者眼翻流淚。亦致昏矇。治宜用軟綿紙蘸水。蔭之眼胞上。少頃。用左手大指甲墊於患根。徐曰。右手以披針尖頭齊根切下。徐曰。尤穩。血出不妨。隨用翠雲錠磨濃塗之。其血自止。內服涼膈清脾飲二服。仍忌海腥煎炒椒薑火酒等件。不發。

涼膈清脾飲

涼膈清脾飲。地黃。石膏。芩。芍。與荆防。薄荷。甘草。山梔子。還有連翹一味涼。

防風

荆芥

黃芩

石膏

山梔

薄荷

赤芍

連翹

生地

各一錢

甘草五分

水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。食後服。

徐曰。不必服藥。

翠雲錠

治眼胞菌毒。用針割後塗之。杭粉五兩。銅綠末一兩。輕粉一錢。共研極細。用黃連一兩。同川米百粒。水一碗。煎一半。再熬折去二分。和藥作錠。陰乾。臨時用清

水少許淨硯上磨濃。雞翎蘸搽。又治爛弦風眼。或暴赤腫痛者。簪搽更效。

黑子

黑子。痣名也。此腎中濁氣混滯於陽。陽氣收束。結成黑子。堅而不散。凡人生此。終爲不吉。面部不善者去之。宜細銅管將痣套入孔內。撚六七轉。令痣入管。一拔便去。此四句徐斷。去。圈批曰。手注。有痣浮淺不能拔者。用針挑損。搽冰蠅散少許。糊紙蓋之。三日自脫。或灰米膏點之亦可。落後珍珠散乾糝生皮而愈。忌醬醋。無斑灰米膏

用成塊石灰。蘸水調稠。將白糯米插入灰內。留半米在外。片時許。候米熟。用米點上可落矣。

黑子應用方

冰蠅散 見癰瘡門

珍珠散 見下

狐氣

狐氣一名狐腋。此因父母有所傳染。又有因狐胎受生者。故不脫本來氣質。腋下多有稷紋數孔。出此氣味。常以五香散擦之。內用蒜肚時常作饌食之。可以漸退。

五香散

五香散內用沉香。更入檀香。併木香。加上零陵香。更倍。就中尤烈麝香。

沉香

檀香

木香

零陵香各三錢

麝香三分

共爲細末。每用五釐。津調搽擦兩腋下。三日一次。或用香末二錢。絹袋盛貯。挂於腋下。

徐曰。非此香藥所能愈。另有效方。

蒜肚方

用公猪肚一具。大蒜囊四十枚。去殼入肚內。以線紮口。水煮極爛。用鹽醋蘸肚。隨便食之。氣味甚者。用瀨蝦蟆一個。入內同煮。肚爛去蝦蟆。大蒜用熱酒食之。洗浴發汗。避風三日。其氣頓改。

白禿瘡

白禿瘡因剃髮腠理洞開。外風襲入。結聚不散。致氣血不潮。皮肉乾枯。發爲白禿。久則髮落。根無榮養。如禿斑光潤不癢。內血已潮。以薑蘸潤肌膏常擦。其髮漸生。禿斑乾枯作癢者。內必有蟲。宜用麥餞散搽之。蟲死風散髮生。愈後忌動風發物等件。

徐曰。此症之因。亦有數種。

麥餞散

見豈風瘡門

治禿瘡頭毛脫落。白斑如癬。瘡痂纍纍疊起。癢甚有如蟲行。葱湯洗淨瘡痂。用麻油調搽。以氈帽戴之。隨後作疼發腫。忍之。三日後其痂漸漸而脫。其髮一生。戒諸發物。

諸瘡一掃光

見疥瘡門

治禿瘡髮脫作癢。本藥一錢。加倒挂塵二分。燈窩宿油調搽自愈。

潤肌膏

潤肌膏內用麻油。紫草當歸一併投。熬透去渣黃蠟入。禿瘡搽後髮盈頭。治禿瘡乾枯白斑作癢髮脫。用麻油四兩。當歸五錢。紫草一錢。同熬。藥枯濾清。

將油再熬。加黃蠟五錢化盡。頃入碗內頓冷。搽擦自愈。

奶癬

奶癬因兒在胎中。母食五辛。父滄炙燻。遺熱與兒。頭面徧身發爲奶癬。流脂成片。睡臥不安。搔癢不絕。以文蛤散治之。或解毒雄黃散。甚則翠雲散。用青釭汁調搽。徐曰。此乃小兒食乳時之癬。又名胎癬。

文蛤散

文蛤散中輕粉末。川椒倍子炒須焦。香油調搽兒奶癬。乳母還須飲食調。

文蛤四兩

點紅川椒二兩

輕粉五錢

先將文蛤打成細塊。鍋內炒黃色。次下川椒同炒黑色。烟起爲度。入罐內封口存性。次日入輕粉碾爲細末。瓷罐收貯。香油調搽。奶母戒口爲妙。

徐曰。奶癬與諸癬微不同。此方甚平善。

奶癬應用方

解毒雄黃散

見血風
瘡門

翠雲散

見楊梅
瘡門

蟾拱頭

蟾拱頭。俗名腦猪是也。患小而稟受悠遠。皆父精母血蓄毒而成。只發一次。其患腫高。破之又腫。皆稟受時原有衣膜相裹。毒雖出而膜未除。故愈而又發。腫甚膿熟者。用針刺破。以三品一條槍插入孔內。徐曰。此却可用。然亦有用法。化盡內膜自愈。又有不腫而不收口者。此必風襲患口。宜敗銅散搽之。兼戒口味自愈。

徐曰。此症用蓖麻子打千槌膏。加提毒糝藥可愈也。

敗銅散

敗銅散用舊罐末。銅錫鉛礪總化成。性熱最能收溼水。一乾再不復同津。

治蟾拱頭已破後膿水不乾。愈而又發。久不收口。用化銅舊罐爲末。此句徐園洗淨患上香油調搽忌口。

蟾拱頭應用方

三品一條槍見痔毒門

小兒遺毒爛斑

遺毒乃未生前胞胎稟受。因父母楊梅毒瘡後餘毒未盡精血孕成。故既生之後。熱湯洗浴。烘薰衣物。外熱觸動內毒。發於肌膚之表。先出紅點。次成爛斑。甚者口角穀道眼眶鼻面皮肉俱壞。多妨乳哺。啼叫不安。初治宜早。內與土茯苓湯調。人中黃末。每日數次。共飲四五分。外用解毒紫金丹磨塗。十中可保三四。遲延毒甚。爛斑徧身不乳者。百中難活一二。此由根蒂受毒深故也。

人中黃

治小兒諸胎毒。痘疹黑陷內收。唇焦口乾。風熱斑疹。赤遊丹毒。兼治大人傷寒陽症發狂。或諸惡瘡毒氣入裏。口燥咽乾。煩渴悶亂。中諸砒草河豚等毒。諸般急病。無有不效。用毛竹一段。兩頭留節。一頭鑽一小孔。用粉草磨爲細末。從孔灌滿。以木條塞緊孔眼。用磚紮之。沈入大糞池內。半年取起。長流水浸一日。帶竹風乾。瓷罐收貯。大人每服二錢。小兒每服三四分。涼水調服。小兒胎毒爛斑。土茯苓湯調服。尋常熱病。入應病藥中調服。

徐曰。人中黃只宜治此等陽明惡毒之症。令其入於腸胃。隨糞瀉出。近日醫家不論何病。加入煎藥之內。竟是喫糞水矣。其可笑如此。

真君妙貼散見腫瘍門

治小兒胎毒皮肉腐爛。疼痛不安。用此數即效。

小兒爛斑應用方

解毒紫金丹見疔瘡門

螻蛄串

螻蛄串由於思慮傷脾。脾氣鬱結所生。是疾氣血澆薄者多。脾主四肢。其患多生於兩手。初起骨中作疼。漸漸漫腫。堅硬不熱不紅。手背及內關前後連腫數塊。不能轉側。日久出如豆腐漿汁。串通諸竅。日夜留連。腫痛仍在。患者面黃肌瘦。飲食減少。久則寒熱交作。內症並出。首尾俱宜益氣養榮湯。加味逍遙散。調和氣血。扶助脾胃。可生者十之二三。補而不應。氣血瀝盡而亡者多。

徐曰。此虛痰流注也。當兼用補藥。

又曰。此症有似流注。惟連綿通串爲異。乃純虛之症也。

螻蛄串應用方

益氣養榮湯

加味逍遙散

見癰瘰

小兒痘風瘡

痘風瘡因痧痘後毒發未盡。留熱肌膚。復被外風侵入。其患先從細瘡作癢。次漸沿開成片。脂水生痂。搔之無度。宜用麥錢散搽之。兼戒口味。避風自愈。

麥錢散

麥錢散搽痘風瘡。硫黃白信要相當。川椒生熟礬同碾。調入麻油一擦光。

治小兒痘風作癢。疊疊成片。甚則頑麻不知痛。用小麥一升。炒枯黃色。乘熱入鉢內。和硫黃四兩。白砒一兩。細末攪勻。待冷取起。加烟膠半斤。川椒三兩。生枯礬各二兩。共碾細末。臨用葱湯洗淨。以麻油調搽。油紙蓋紮。三日一換。三次愈。

徐曰。白砒卻不可輕試。須換一味為穩。然此治禿瘡為宜。痘瘡太猛。

小兒赤遊丹

赤遊丹受毒於未生前。發病於有生後。蓋身在胞胎。皆賴父精母血生養。父母不

能節慾。淫火猖熾。又不能戒諸厚味。以及炭火烘熏。重衾疊褥。種種熱毒。胎皆受之。及至生後。熱湯洗浴。烘熏衣物。觸動內毒。先發身熱。啼叫驚搐。次乃生丹。紅腫光亮。瞬息遊走。發無定處。先從頭額起者。名天奪丹。以升麻葛根湯。母子同服。餘或起於腹背。流入四肢者。輕。起於四肢。流入胸腹者。重。有此總皆先砭惡血爲要。徐曰亦不必。砭血之後。先用精豬肉縫片貼之。一時許。換如意金黃散。用水芭蕉根搗汁調敷。徐曰過之不可甚者。日換二次。內服大連翹飲。消毒犀角飲。五福化毒丹。毒氣入裏。腹脹堅硬不乳者。紫雪散下之。三日後身漸微涼。砭血之處。肉便軟活。聲清腹軟。乳哺如常者順。反此爲逆。

徐曰亦有胎毒全無因火溼交侵而生者。

升麻葛根湯

升麻葛根湯。麻葛。柴胡。木通。甘草。入。黃芩。白芍。黑山梔。丹毒遊行功可必。治丹毒身體發熱。面紅氣急。啼叫驚搐。

- 升麻
- 乾葛
- 白芍
- 柴胡
- 黃芩
- 山梔各一
- 木通
- 甘草各五

水二茶鍾煎八分不拘時母子同服。

徐曰方亦近似總以外治為主。

大連翹飲

大連翹飲。梔芎歸。車前滑石石膏隨。荆防甘麥柴芩等。蟬蛻木通牛蒡宜。治小兒丹毒發熱痰涎壅盛一切諸瘡疹。頸項生核。或傷風傷寒時行發熱等症並宜服之。

連翹

瞿麥

滑石

車前子

牛蒡子

赤芍

山梔

木通

當歸

防風

黃芩

柴胡

甘草

荆芥

蟬蛻

石膏各五分

水二茶鍾燈心二十根煎八分母子同服。

徐曰方太雜。

消毒犀角飲

消毒犀角飲防風。甘草黃連要協同。還用燈心為引使。赤遊丹腫有神功。

治小兒丹毒。身熱氣粗。啼叫驚搐不寧。

犀角鑊

防風各一錢

甘草五分

黃連三分

右水二茶鍾。燈心二十根。煎四分。徐徐服之。

紫雪散

紫雪。羚羊。麻石。共。沉香。兼參草用。寒水硝。硃金。箔。冰。赤遊丹。毒。堪。施。送。

治小兒赤遊丹毒。甚者毒氣入裏。肚腹膨脹。氣急不乳。即宜此藥救之。又治傷寒熱躁發狂。及外科一切蓄毒在內。煩躁口乾。恍惚不寧等症。

升麻

寒水石

石膏

犀角

羚羊角各一兩

元參二兩

沉香

木香各五錢

甘草八錢

水五碗。同藥煎至一碗。濾清。再煎滾。投提淨朴硝三兩六錢。微火慢煎。水氣將盡。欲凝結之時。傾入碗內。下硃砂。冰片各二錢。金箔一百張。各預研細和勻。碗頓水內。候冷凝成雪也。大人每用一錢。小兒二分。十歲者五分。徐徐嚥之。即效。病重者加一錢亦可。或用淡竹葉燈心湯化服。

徐曰。紫雪另有古方全劑。修合甚費。此乃改作小料。以便隨時製用耳。楣案紫雪非散。古方但稱紫雪。此加散字。蓋沿明刻本誤改。明刻作紫雪歌也。

針砭法

針砭之法絕世奇。丹上施針筋擊之。砭畢須將豬肉貼。赤遊掀腫用相宜。治小兒赤遊丹毒。紅赤掀腫。遊走不定。用披針鋒尖向丹上。以烏木重筋在針上擊之。密砭去血多者爲妙。血紅者輕。紫者重。黑者死。砭畢。溫湯洗淨。用乾精豬肉縫大片貼砭處。一時許。方換如意金黃散。水芭蕉根搗汁調敷。徐曰。此不得已而用之。如有良藥。皆不必也。

如意金黃散

見腫瘍門

治小兒赤遊丹毒。紅如硃。熱如火。走如雲。散及徧身不定者。用水芭蕉根搗汁調敷。加蜜亦可。

赤遊丹應用方

五福化毒丹

見胎癰門

走馬牙疳

走馬牙疳。言其患迅速。不可遲治也。乃痧痘餘毒所中。又有雜病熱甚而成者。初起牙齦作爛。隨卽黑腐作臭。甚者牙齦脫落。齦旁黑朽。不數日間。穿腮破脣。誠爲難治。初起宜用蘆薈消疳飲。外用人中白散。或冰硼散搽之。取去黑腐。內見紅肉血流者吉。如取時頑肉不脫。腐爛漸開。掀腫外散。臭味不止。更兼身熱不退者。俱爲不治。牙疳有五不治。口臭涎穢一不治。黑腐不脫二不治。牙落無血三不治。穿腮破脣四不治。用藥不效五不治。

蘆薈消疳飲

蘆薈消疳飲。薄荷。元參。甘桔。共柴胡。梔連。麻。蒡。羚羊角。竹葉石膏。不可無。治小兒走馬牙疳。身熱氣粗。牙齦腐爛。氣味作臭。內及穿腮破脣者。

蘆薈

銀柴胡

胡黃連

川黃連

牛蒡子

元參

桔梗

山梔

石膏

薄荷

羚羊角各五

甘草

升麻

各三

水二茶鍾。淡竹葉十片。煎六分。食後服。

徐曰。藥味不外乎此。但蘆薈黃連苦極傷胃。當思變通之法。又此方太寒。宜滋陰驅風解毒清火爲妙。

人中白散

人中白散最稱奇。黃柏兒茶青黛宜。冰片薄荷研細末。溫湯漱淨口疳吹。

治小兒口疳。走馬疳。及牙齦腐爛黑臭者。

人中白溺壺者佳
煨紅二兩兒

茶一兩

黃柏

薄荷

青黛

各末
六錢

冰片五分

共再研極細。先用溫湯漱淨。吹藥疳上。日用六七次。吹藥涎從外流爲吉。內收涎毒入裏爲凶。

徐曰。此治象疳之法。若走馬疳牙內有蟲。又毒火如焚。非殺蟲及清火之藥。不能奏效。當另覓良方也。

牙疳應用方

冰硼散見咽
喉門

重舌

大人小兒重舌。乃心火妄動而發。當以線針點刺。此句不宜徐勸批。令出惡血。內服解毒瀉心湯。外以冰硼散搽之。又有紫舌、木舌。亦由心火而發。用飛鹽加冰片少許。勤搽出涎自愈。又有痰氣結於舌上。成核作痛硬強者。用線針點破出血。用冰硼散搽之。服後藥。

徐曰。此症塗紫雪極效。

黃連瀉心湯

瀉心湯內用黃連。荆芥山梔黃芩兼。翹草牛蒡薄荷葉。木通加上效如仙。治大人小兒心火妄動。結成重舌、木舌、紫舌。脹腫堅硬。語言不利。

黃連

山梔

荆芥

黃芩

連翹

木通

薄荷

牛蒡子

各一錢

甘草五分

水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。食後服。

徐曰。亦通治之方。

針刺法

治重舌、木舌、紫舌等疾。腫脹疼痛。硬強不語。又兼舌根併兩齒合縫盡處作腫。瘀肉塗塞。口噤難開。俱用此法刺之。用粗線針紮在筋頭上。在患處點刺出血。紅紫毒輕。紫黑毒重。患甚者。數十點皆可。血盡。溫湯漱之。重者金鎖匙。輕者冰硼散搽之。流去熱涎。內服涼膈散。或清涼飲。可選用。
徐曰。此法或有用處。然塗藥得宜。自能漸消。不必用此也。

重舌應用方

金鎖匙

冰硼散

涼膈散

四順清涼飲俱見咽喉門

胎瘤

胎瘤者。初生小兒。頭上胸乳間腫起。大者如鰻。小似梅李。此皆胎中瘀血凝滯而成。須候兒滿月外。方可用針刺破。出如赤豆汁則安。此二句徐摠批曰。竟刺。勿疑。當用敷藥封好。內服五福化毒丹。

五福化毒丹

五福化毒丹。連桔。青黛。人參。赤茯苓。元參。膽草。牙硝片。甘草。硃砂。衣用金。治小兒蘊積胎毒。以及諸瘡癰疹。傷風斑症。口舌生瘡。痰涎壅盛。譫言煩躁。夜睡不寧者。

元參

桔梗

赤茯苓各一

人參二錢

黃連

龍膽草

青黛

牙硝各一

甘草五錢

冰片五分

硃砂三錢

金箔二十張

右為末。煉蜜丸。芡實大。每服一丸。薄荷燈心湯化服。兼治瘡症後餘毒上攻。口齒涎血臭穢。以生地黃汁化下。如無地黃。竹葉燈心湯亦可。

徐曰。此方平妥可用。治上焦火毒尤良。

又曰。瘤症非服藥所能愈。外治之時。服此以養氣亦宜。

鵝口瘡

鵝口瘡。皆心脾二經胎熱上攻。致滿口皆生白斑雪片。甚則咽間疊疊腫起。致難

乳哺多生啼叫。以青紗一條裹筋頭上。蘸新汲水揩去白胎。以淨爲度。重手出血不妨。隨以冰硼散搽之。內服涼膈之藥。

徐曰。此症宜紫雪最效。

鵝口瘡應用方

冰硼散

見咽喉門

涼膈散

見齒病門

痘癰

痘癰乃出痘溜漿不足。毒流於脾肺二經。致手脚胸背結成漫腫。大如桃李。多發在收靨之後。身涼不渴者爲吉。有此不必內消。絳圈宜貼太乙膏。候膿熟針之。元氣虛弱者兼服保元湯。助脾健胃爲要。

保元湯

保元湯用參耆朮。變理還須甘草同。大棗二枚薑一片。膿清不斂卽收功。治痘癰出膿之後。脾胃虛弱。膿清不斂者。

人參

黃耆

白朮

甘草

各一錢

三分

薑一片。棗二枚。水一鍾半。煎六分。食遠服。

徐曰。太蠻。

痘疔

痘疔乃痘毒升發不盡。留於心肝二經。初生紫點。次日變黑。毒淺者。浮高而潤。毒甚者。深陷而焦。其發多出於七朝。上下將靨之際。又生於臀腿手足。身溫疤潤。音清者吉。發在肚腹腰腎。身熱色枯。聲啞者凶。凡見此者。急用針刺疔根。插入蟾酥條。候四邊裂縫。此句徐勸疔搖動者。用刀割去。四字徐勸搽玉紅膏。生肌完口。如針無血。插藥乾枯不變膿者。終爲不治。但此症屬有餘。首尾俱宜加減鼠黏子湯爲要。

徐曰。雖是疔毒。但係痘後。又屬幼科。不得與治壯夫同。另有和平安穩之法。又曰。此與真疔微異。不得輒用重藥。內托毒氣。外用拔疔膏足矣。

加減鼠黏子湯

加減鼠黏子湯。花粉知母相當。荆芥山梔甘草。燈心竹葉煎嘗。

鼠黏子

天花粉

知母

荆芥

山梔各六分 甘草三分

水二茶鍾。淡竹葉、燈心各二十件煎服。身熱加柴胡、黃芩。有痰加麥冬、貝母。咽啞加元參、桔梗。咬牙加薄荷、石膏。便秘加蜂蜜、元明粉。昏憤加黃連、硃砂。痂枯加當歸、生地。癩疤加蟬蛻、川芎。

徐曰。此方太寒。

八珍湯

見腫瘍門

治痘疔落後。氣血虛弱。膿水出多。不能生肌收斂。

痘疔應用方

蟾酥條見疔瘡門

玉紅膏見腫瘍門

黃水瘡

黃水瘡者。頭面耳項忽生黃色破流脂水。頃刻沿開。多生痛癢。此因日曬風吹。暴感溼熱。或因內滄濕熱之物。風動火生所致。治宜蛤粉散搽之。必愈。真君妙貼散亦效。

蛤粉散

蛤粉散治黃水瘡。膿水沿開痛莫當。石膏黃柏併輕粉。水調敷上最為良。
蛤粉 石膏煨各一兩 輕粉 黃柏生碾各五錢

黃水瘡應用方

真君妙貼散見腫瘍門

外科正宗卷十一 黃水瘡

徐評外科正宗

| | |
|------|------|
| 清 | 明 |
| 鄞縣 | 崇川 |
| 曹炳章校 | 陳實功著 |
| 吳江 | 許辛木訂 |
| 徐靈胎評 | |
| 海寧 | |

卷十二

大人人口破

口破有虛火實火之分。色淡色紅之別。虛火者。色淡而有白斑細點。甚者陷露龜紋。脈虛不渴。此因思慮傷脾。多醒少睡。虛火妄動而發。宜四物湯加黃柏、知母、丹皮、肉桂。肉桂徐勒以為引導。從治法也。外以柳花散搽之。實火者。色紅而滿口爛斑。甚者腮舌俱腫。脈實口乾。此因膏粱厚味。醇酒炙燻。心火妄動而發。宜涼膈散。外搽赴筵散。吐涎則愈。如口舌生瘡。舌乾黃硬作渴者。加減八味丸以滋化源。俱禁水。

漱。

徐曰。此症不外清火養陰。亦當用紫雪、碧雪等藥塗之。

柳花散

柳花散內君黃柏。青黛肉桂並研末。冰片還須加二分。用吹口破功難述。

黃柏淨末一兩

青黛三錢

肉桂一錢

冰片二分

各為細末。共再研。瓷罐收貯。每用少許吹之。

赴筵散

赴筵散內柏苓連。梔子乾薑各自研。細辛等分和勻用。吹搽口破即安然。

黃連

黃柏

黃芩

梔子

乾薑

細辛各等分

右為末。吹患處。

口破應用方

四物湯見瘰癧門

涼膈散見咽喉門

加減八味丸見瘰癧門

唇風

脣風乃陽明胃火上攻。其患下脣發癢作腫。破裂流水。不疼難愈。宜銅粉丸泡洗。內服六味地黃丸自愈。

銅粉丸

銅粉丸中輕粉礬。銅青官粉麝香兼黃連膏子同冰片。泡洗脣風效不凡。

銅 青五錢 官粉三錢 明礬五分 麝香五分

冰片二分 黃連二兩切片輕粉五分

右共爲細末。黃連膏丸如芡實大。每用一丸放碗內。湯泡紙蓋。候烝頓熱。用上
面清水勤洗之。自愈。

楣案脣風本在人面瘡之後。今移於此。

臭田螺

臭田螺乃足陽明胃經濕火攻注而成。多生足指脚丫。白斑作爛。先癢後痛。破流
臭水。好似螺螄。甚者脚面俱腫。惡寒發熱。先宜甘草湯洗淨。貼蟾酥餅三日三枚。
後用珍珠散猪脊髓調搽膏蓋。掀腫處用真君妙貼散敷之。其腫漸消。勿卽步履。

臭田螺應用方

蟾酥餅見疔瘡門

珍珠散見疔瘡門

真君妙貼散見腫瘍門

牛程躩

牛程躩乃程途奔急。熱脚下水見風。以致氣滯血枯。結成頑硬皮肉。榮衛不滋。漸生疼痛。腫高突起。脚難行走。久則破裂。裂膿水。每日溫湯淨洗。搽牛角散。又有內膿攻注。皮頑難破者。以大線針鋒頭挑破。出膿乃寬。硬皮敲破者。翦而去之。徐曰。皮可翦。奈何肉不生者。玉紅膏長之。肉滿不生皮者。珍珠散搽上。生皮乃愈。

徐曰。此係內毒。生足跟皮內。最難療治。

牛角散

牛角散用牛角灰。松香輕粉共研之。本方加上水龍骨。牛髓調和搽上宜。

牛角尖燒灰

水龍骨

松香

輕粉

粉各等

共為末。牛骨髓調搽。虛弱者兼服十全大補湯。

徐曰。此專治之方。水龍骨或謂即船上舊油灰。

楣案牛角尖、水龍骨、牛骨髓。徐圜。

牛程躩應用方

玉紅膏見腫瘍門

珍珠散見下府門

蜣螂蛀

蜣螂蛀多生手指節中。不紅不熱。腫如蟬腹。此句徐乃手少陰痰氣凝滯而生。初起不疼。日久方痛。痛久方腐。腫仍不消。蟾酥餅膏貼。漸作稀膿。近者一載。遠者三年。此症體弱者有之。內兼補劑。免變癆瘵之病。

徐曰。治手法與諸頑瘡同。

蜣螂蛀應用方

蟾酥餅見疔瘡門

田螺泡

田螺泡多生手足。忽如火燃。隨生紫白黃泡。此脾經風溼攻注。不久漸大。腹痛不

安。宜線針挑破。泄去毒水。太乙膏蓋。挑破又生者。內服解毒瀉脾湯可愈。
解毒瀉脾湯

解毒瀉脾牛蒡子。防風蒼朮共山梔。石膏甘草黃芩等。木通燈草瀉心脾。

防風

牛蒡子

山梔

石膏

黃芩

蒼朮

甘草

木通各一錢

水二鍾。燈心二十根。煎八分。量病上下食前後服之。

田螺泡應用方

太乙膏見腫瘍門

蟾酥餅見疔瘡門

玉紅膏見腫瘍門

皴痛

楮案皴原本作臉誤字書皴手足皴裂也今通作皴

皴痛多起於手足。乃風寒鬱於皮毛。致血不榮於肌表。皮槁多痛。似無皮之狀。宜葱湯浸洗良久。隨以潤肌膏擦之。勿見風冷。就暖自愈。又每年逢冬即發者。須三伏時曬搗爛大蒜。間擦三次。不再發。

凍風

凍風者。肌肉寒極。氣血不行。初起紫斑。久則變黑。腐爛作膿者。以碧玉膏主之。生肌斂口。

碧玉膏

見結毒門

治凍風皮肉損爛。膿血淋漓。疼痛不止者。

獨勝膏

獨勝膏方最散寒。凍風凍耳莫憂煎。六月每逢三六日。搽之冬凍不相干。

治凍風凍跟凍耳。每遇冬寒則發。六月初六十六二十六日。用獨蒜搗膏。日中曬熱。四字在於遇冬所發之處擦之。忌下湯水。一日共擦三次。可以不發。又每常凍風用茄根同葱煎湯浸洗。亦不重發。

梟案此即皴痛之甚者。原本在膿窠瘡之後。今姑仍分爲二門。而移於此。

陰孔蝨

陰蝨。又名八脚蟲。乃肝腎二經濁氣所成。生此不爲清吉。銀杏散津調擦之。內服六味地黃丸。每斤加蜜炒黃柏一兩。蘆薈五錢。以清化源。愈後不發。

徐曰。髮內亦有。

銀杏無憂散

銀杏無憂散麝香。水銀輕粉與雄黃。杏仁狼毒兼蘆薈。七味研和調擦良。

水銀鉛製

杏仁去皮搗膏

輕粉

雄黃

狼毒

蘆薈各一錢

麝香一分

除水銀、杏仁膏。餘藥共碾篩細入上二味再研勻。先用土葛蒲煎湯洗之。用針挑去蝨孔。隨用津唾調擦。使藥氣入內。則不復生。切忌牛犬鼈肉。

徐曰。用百部湯洗妙。

楣案杏仁徐圈。

陰蝨應用方

六味地黄丸見肺癰門

葡萄甘疫

葡萄疫。其患多生於小兒。感受四時不正之氣。鬱於皮膚不散。結成大小青紫斑。

點。色若葡萄。發在徧體頭面。乃爲腑症邪毒傳胃。牙根出血。久則虛人。初起宜服羚羊散。清熱涼血。久則胃脾湯。滋益其內。又有牙齦腐爛者。用人中白散。羚羊角散。

羚羊角散用防芩。牛蒡知母與元參。甘草麥冬淡竹葉。止血消斑功效靈。

羚羊角

防風

麥冬

元參

知母

黃芩

牛蒡子各八分

甘草二分

水二茶鍾。淡竹葉十片。煎六分。食遠服。

徐曰。此爲主方。

楣案羚羊角、牛蒡子、徐園。

胃脾湯

胃脾湯內甘草陳。遠志沙參共茯神。白朮麥冬五味子。脈虛自汗可同春。

白朮

茯神

陳皮

遠志

麥冬

沙參各六分

五味子

甘草各五分

水二茶鍾。煎八分。食遠服。虛弱自汗者。去沙參。加入人參、黃耆各五分。

徐曰。白朮一味不切。

葡萄疫應用方

人中白散見口

咬傷

人咬爲患。良肉受傷。陽明胃經之脈。循頰車入齒縫。多火多熱。凡食經此。無不燐爛下咽。又飲食炙燔之毒。無不侵襲。故傷人發腫。其痛異常。臭膿腐爛。痛徹透心。初咬時。一日內。衆撒熱小便。浸傷處。洗盡牙黃瘀血。咬孔上蟾酥餅貼之。膏蓋。後出微膿。漸愈。如咬時未經此法。致腫痛發。疼甚者。亦與童便浸洗。浥乾。用粗紙撚蘸麻油點火。用煙燄熏咬處。良久方住。以解牙毒。仍以蟾酥條插入孔內。膏蓋。候腫消時。換玉紅膏搽之。長肉完口。如有雜症相兼者。亦隨症而治。

葱白甘草湯

葱白甘草湯二味。能治咬傷疼臭穢。每日洗之。搽玉紅。消瘀散腫。功非細。

治咬傷掀腫疼痛。膿血淋漓。臭穢腐爛者。用葱白二兩。粉草五錢。水三碗。煎至

二碗。每日洗淨傷處。瘀腐膿血。方用玉紅膏搽。黑膏蓋。漸愈。

咬傷應用方

蟾酥餅條

見疔瘡門

玉紅膏

見腫瘍門

風犬傷

風犬朝夕露臥。感非時不正之氣。故心受之。其舌外出。肝受之。其目昏矇。脾受之。其涎自流。肺受之。其音不出。腎受之。其尾下拖。五臟受毒。乃成風犬。全稟陰陽肅殺之氣。故常無故傷人。初咬卽服救生散。令小便中行出血片。宜居靜室。忌諸口味發物。并忌見諸麻赤豆等物。及聞鑼聲。百日乃安。治之遲者。毒大而小便難出。必攻臟腑。久而成形。腹脹攻急。人聲若犬。眼神露白。則不可治。有愈後犯前禁。復發者。仍死。

救生散

救生散用斑蝥七。去頭翅足。用其身。杭粉一錢。同作末。空心酒服。效如神。
治風犬咬傷。用生斑蝥七個。去頭翅足。杭粉一錢。同研。空心溫黃酒調服。一時

許。小便行出血片白脂。乃惡物也。如便疼。煎甘草湯飲之自利。如毒未盡。次早再一服。至小便清白。方為毒盡。

徐曰。另有效方。

又方

治風犬咬。其人頂中必有紅髮一根。此句急須拔去。以追風如聖散敷傷處。抽毒氣。內服救生散。

徐曰。宜更服木鼈子末如髮數。

楣案如髮數句未解。意者紅髮一根。服木鼈末一枚之數。如有二根。則服二枚。以次遞加。故曰如髮數。徐蓋語焉而未詳耳。

追風如聖散

追風如聖散吹風。川草烏芎藭薄荷同。白芷細辛蒼朮等。雄黃加上有奇功。治風犬咬傷隨用敷之。其毒即可拔出。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 草 | 細 | 防 | 川 | 薄 |
| 烏 | 辛 | 風 | 芎 | 荷 |
| | | | 藭 | |
| | | | 白 | 蒼 |
| | | | 芷 | 朮 |
| | | | | 各 |
| | | | | 一 |

雄黃四錢

共為末。溫酒調敷傷處。以紙蓋紮。早晚換二次。

惡蟲叮咬

惡蟲乃各稟陰陽毒種而生。且如蜈蚣用鉗。蠍蜂用尾。蛇以舌。見之者勿觸其惡。自不被螫。苟有所傷。各尋類而推治。

治蜈蚣咬方

用蟾酥餅磨濃塗傷處。粗紙撚蘸麻油點火。用烟燄熏之。疼腫自消。或用雄雞糞搗水塗之。或用頭垢搽傷處。以撚燄熏之。俱效。

徐曰。人馬平安散外塗內服。大妙。

人馬平安散補

西牛黃四分

冰片六分

麝香六分

蟾酥一錢

火硝三錢

滑石四錢

石膏二兩

大赤金箔四十張

共研極細末。瓷瓶收藏。切勿洩氣。此方本治夏月受暑。頭目昏暈。或不省人事。

或患痧腹痛。吹入鼻中。立時起死回生。如驟馬受熱暈倒。亦將此吹鼻即愈。

治蠍螫方

蠍有雌雄二種。雄者螫人。痛在一處。雌者痛牽徧體。用井底泥敷痛處。乾則易之。一時無泥。取新汲水以青布隨痛處搭之。溫則再易。又方。五月五日用黃蠟二兩溶化。將凝時。投雄黃、硃砂細末各三錢和勻。捏成餅窩。仍用貓兒眼草白汁。端午時滴入窩內陰乾。愈久愈佳。復捏成塊密收。臨用取一米許刺針尖上。以燈燄化開。滴正螫之處。其疼即止矣。

治蛇螫方

用雄黃末。四字蘭葉搗汁。調敷腫上。內用半枝蓮搗爛。取汁一兩。熱酒四兩。和汁服之。蓋汗爲效。仍用渣敷傷處亦妙。又方。速用端午收採蒼耳草末五錢。水煎一鍾。熱服蓋汗即安。如無端午收採者。便用常日採取陰乾者。煎服一兩發汗亦效。

又治七寸蛇螫方

七寸蛇青色扁形。尖尾短足。紅口者毒輕。青口者毒重。以舌螫人。其毒最惡。初

螫時用雄黃末一錢。生礬二錢。杓內溶化。將筋頭點藥傷處。此二句徐密點尤妙。冷則易之。連點七次即愈。毒氣入裏者。解毒紫金丹酒磨服一錢。蓋汗即愈。遲延毒走腫痛者。麻油燄熏之亦瘥。

治河豚毒方

河豚血毒中人。舌麻心悶。白茅根搗汁冷飲。子毒中人。昏悶腹脹。口噤難言。非金汁不能解也。

百蟲入耳

百蟲入耳。乃偶然誤入。如蠅蚊細蟲。以麻油數點滴入竅中。蟲即自死取出。如蜈蚣蜜蜂等大蟲。以肉炙香安耳邊。其蟲聞香自出。有蟲夜間暗入者。切勿驚慌響叫。逼蟲內攻。宜正坐點燈。光向耳竅。其蟲見光自出。對面有人見。其蟲不出。

誤吞針鐵骨哽咽喉

誤吞針刺。哽咽疼痛者。用亂麻筋一團。搓龍眼大。以線穿繫。留線頭在外。湯濕。急

吞下咽。頃刻扯出。其針頭必刺入麻中同出。如不中節。再吞再扯。以出爲度。誤吞銅物者。多食葶薺。化堅爲軟。若吞鐵骨之物。腸中不能轉動。覺墜者。多食青菜。豬脂。自然送入大腸。與糞同出。諸骨哽喉。用玉簪花根八錢。各隨所犯之肉爲引。煎湯服之。轉出乃愈。徐曰玉簪花易須用竹管放喉間又諸骨哽於咽下。不能外出者。爲龍針推之。骨下則安。其法以細鐵線燒軟。對折雙頭。用黃蠟作丸如龍眼大。裹鐵線頭上。外用絲綿裹之。推入咽內。其骨自然順下。不再推。徐曰此法無用又方。用玉簪花根切片。煎湯漱之。徐徐吐出。其骨自軟。再用乾飯嚥之。自下。

人面瘡

人面瘡古有生者。近世罕聞。其瘡全似人面。眼鼻俱全。多生膝上。亦有臂患者。方書皆云積冤所致。先須清心懺悔。改過自新。然後服十六味流氣飲。外用貝母爲末敷之。乃聚眉閉口。次用生肌斂口藥。亦可得愈矣。

人面瘡應用方

十六味流氣飲見流注門

陰毒

陰毒乃純陰無陽。被天時寒冷肅殺之氣。侵入肌膚。沈於骨髓。致氣不能升。血不能行。凝滯經絡。疼痛切骨。初起不腫不熱。朝輕暮重。久則作腫漸紅。爛斑黑靨。臭水淋漓。穢氣熏蒸。腐爛漸開。終久必死。一人年三十歲。冬月隔港與鄰婦私交。房事方畢。忽婦夫回。慌忙隔港赴水而走。熱身受寒。五日後。小腹大臀陰痛不腫。日夜響叫。至一月後。穀道旁生一爛斑。黑靨倒陷。諸藥不效。至半月。大臀連黑腐爛作臭。乾靨無膿。又十日。大臟俱壞。黑敗而死。又一人年四十歲。夏月好飲火酒。至夜赤身露臥。手膊連背陰疼難忍。一月後。肩發爛斑一塊。周圍微硬。色如紅棗。日漸延開。半月後。手膊半背共成黑靨。臭穢不堪。一月不食而死。一人中年肥胖。亦冬夏好飲火酒。飲後隨喫涼水方臥。一日。頸項作疼。微腫。堅硬如石。三月外。項大如頭。石硬不熱。真陰毒也。余辭不治。請別醫治之。項同身大。不食而死。又一人夜夢城隍拘見。責打二十。喊叫。其妻喚醒。隨後受刑處掀腫作疼。青紫急脹。視之。真棒毒也。用針刺破。流瘀血碗許。外肉腐爛作疼。調理兩月而安。此亦陰毒。故附記。

之。

失榮症

失榮者。先得後失。始富終貧。亦有雖居富貴。其心或因六欲不遂。損傷中氣。鬱火所凝。隧痰失道。停結而成。其患多生肩以上。初起微腫。皮色不變。日久漸大。堅硬如石。推之不移。按之不動。半載一年。方生陰痛。氣血漸衰。形容瘦削。破爛紫斑。滲流血水。或腫泛如蓮。穢氣熏蒸。晝夜不歇。半生疔瘡。愈久愈大。越潰越堅。犯此俱為不治。予立二方。曾治數人。雖不獲全愈。而不夭札。速死。誠緩命藥也。

和榮散堅丸

和榮散堅歸地參。茯神朮附貝南星。丹酸遠柏併龍齒。蘆薈硃砂與角沈。

治失榮症堅硬如石。不熱不紅。漸腫漸大者。

歸身

熟地

茯神

香附

人參

白朮

橘

貝母

南星

酸棗仁

遠志

柏子仁

紅各二

丹皮各一兩

蘆薈

角沈各八錢

龍齒一兩或鹿角

尖二兩煨亦可

硃砂六錢為衣

右為細末。煉蜜丸。桐子大。每服八十九丸。食後用合歡樹根皮煎湯送下。患者若
猛省自寬。澹薄甘命。亦有十中一二得愈者。否則難脫然也。

徐曰不成方。

飛龍阿魏化堅膏

治失榮症。及癭瘤乳岩。癰癰結毒。初起堅硬如石。皮色不紅。日久漸大。或疼或不疼。但未破者。俱用此貼。用蟾酥丸藥末一料。加金頭蜈蚣五條。炙黃。去頭足。研末。同入熬就乾坤一氣膏二十四兩。化開攪和。重湯內頓化。紅緞攤貼。半月一換。輕者漸消。重者亦可不大。常貼保後無虞。

中砒毒

砒乃陽精大毒之物。服之令人臟腑乾涸。皮膚紫黑。氣血乖逆而死。知覺早者。大
蘭根葉搗汁灌之。輕則可解。無蘭處。以生綠豆同水研爛。以水灌之。多則見效。如

不解者。以金汁灌之。必甦。甦後如癲不語者。每日以綠豆水飲之。毒盡則愈。
取金汁法

用大毛竹一連二節。用刀刮去外青一半。用磚紮節中。沈入大糞池內。一年後取起。以長流水浸一日。取起。鑽開節孔。內蓄糞清。瓷罐收貯。凡遇有中砒毒。河豚毒。傷寒陽毒發狂。疔瘡。痧症。毒氣入裏。煩躁口乾。渴欲飲水。脈大有力者。並宜此藥。

落下頰拏法

楣案頰當作頰頰車
下正中骨卽下把殼

落下頰者。氣虛不能收束關竅也。宜令平身正坐。醫者以兩手托住下頰。左右大指入口內。納槽牙上。端緊下頰。用力往肩下捺開關竅。向腦後送上。卽投關竅。隨用絹條兜頰。於頂上半時許去之。卽愈。

徐曰。此症兼有風痰。

救自刎斷喉法

自刎者。乃迅速之變。須救在早。遲則額冷氣絕矣。初刎時氣未絕。身未冷。急用絲線縫合刀口。糝上桃花散。多糝爲要。急以綿紙四五層蓋刀口藥上。以女人舊布裹脚。將頭擡起。周圍纏繞五六轉紮之。患者仰臥。以高枕枕在腦後。使項鬱而不直。刀口不開。冬夏避風。衣被覆暖。待其氣從口鼻通出。以薑五片。人參二錢。川米一合。煎湯或稀粥。每日隨便食之。接補元氣。三日後。急手解去前藥。用桃花散糝刀口上。仍急纏紮。紮二日。急用濃葱湯軟絹蘸洗傷處。浥乾。用抵脚挑玉紅膏放手心上。捺化。捺於傷口。再用舊棉花薄片蓋之。外用長黑膏貼裹。周圍交紮不脫。膏之兩橫頭。再用黑膏長四寸闊二寸。豎貼膏上。上下黏連好肉。庶不脫落。外再用絹條圍裹三轉。針線縫頭。冬月三日。夏月二日。每用葱湯洗浥換藥。自然不再疼痛。其肉漸從兩頭長合。內服八珍湯。調理月餘。如大便結燥。用猪膽套法。不可用利藥。雙噪俱斷者百日。單斷者四十日。必收功完口。此法曾治強盜郭忠。阜隸沙萬。家人顧興。俱雙噪齊斷將危者。又單噪傷斷者十餘人。治之俱全活。

自刎應用方

玉紅膏

見腫瘍門

桃花散

如聖金刀散

見金瘡門

八珍湯見續傷門

試知百病死生法

疾病非明醫不能決其凶吉。死生非神聖不能洞其機關。予得呂祖一枝梅方。真仙傳也。不敢私秘。刊以傳世。

呂祖一枝梅

呂祖傳授一枝梅。巴豆靈脂蓖麻子。二硃雄麝共臙脂。餅貼印堂識生死。治大人男婦小兒新久諸病。生死難定之間。用藥芡實大一餅貼印堂之中。點官香一枝。香盡去藥。已後一時許。貼藥處有紅斑暈色。腫氣飛散。謂之紅霞。捧日。病雖危篤。其人不死。如貼藥處一時後。無腫無紅。皮肉照舊不變。徐曰。血肉已死。故如此。謂白雪漫野。病雖輕淺。終歸冥路。小兒急慢驚風。一切老幼痢疾。如貼之。紅腫即愈。此方可預知生死也。

硃砂三錢 銀硃一錢五分 五靈脂三錢 麝香三分

蓖麻仁五分 雄黃 巴豆仁各五分 不去油

右各研細。於端午日淨室中。午時共研。加油臘脂爲膏。瓷盒收藏。勿經婦女人手。臨時用豆大一圓捏餅。貼印堂中。其效立見。用過餅送入河中。

造孽報病說

怪症出於無端。事必因乎有據。感應篇曰。若開如是花。必結如是果。一黃冊書手。每至甲首家。務要殺雞一隻。先食頭尾。一歲二熟。下鄉殺雞。不計其數。一朝數盡。口中生出如菌者。大小六枚。填塞滿口。湯水難下。余視之。乃孽疾也。辭不可治。別請一醫。用刀割去。次日又生如舊。延至六十日。肌膚盡削。存骨如柴而死。一竿槍戶傷殘生鳥。假如每日十命。一歲共計三千六百。盡屬死於無辜。況其雛之不得生者多矣。彼生子三人。俱至六七歲。偏身先發紅點。癢痛異常。數日後點如鑽。腐爛流血。口稱百鳥相啄。令人趕打不去。至月外。氣血瀝盡俱亡。予後勸解燒毀竿矢。合族持齋。六十二歲生一子。方得成立。一人五十餘歲。家衆養雞十餘隻。一朝衆雞齊叫。彼怒之。將衆雞兩脚齊肘。安檻上剝斷。其雞亂鳴飛跳。血盡俱死。一年後。足生脫疽。筋骨伶仃。流血不止。令妾將刀割去脚骨。瀝盡氣血而亡。一富家

置窩弓兼養鷹犬。五十後方生一子。二歲。左右頭角生孔一處。俱已露骨。視之。乃擊病也。不敢言其不治。奉上藥方。修合用之無效。請衆醫治之。強投藥餌。延至三歲而歿。其人後遭橫事。死於非命。一莊家以獵事爲樂。五十後徧身生塊。破後腐爛見骨。余知爲擊報。謂曰。先當杜養鷹犬。然後此病可治。彼從之。內服益氣養榮之藥。外用甘草當歸煎洗。仍搽玉紅膏。長肌完口。三月餘而愈。二年後復養鷹犬。又一年六月內。患陰症而歿。次子十歲。赴水死。已上數條。余所親見。皆慘戮生靈之報也。一訟師作中興訟。破衆家私。傷殘骨肉。不計其數。一日。大腿腫痛。堅硬如石。疼痛異常。常欲以繩繫足。高懸梁上。其疼乃止。如放下。疼卽如故。予知擊報。辭不可治。似此兩月。一日午時。親友四人相看。忽聞腿內大響一聲。其腫卽歸大臀。腫如巴斗。其腿卽消。臀腫痛不著席。將布兜懸挂。其疼方可。又兩月。百苦而終。又一年。其妻徧身發腫如癩。作癢非常。破流脂水。其時孟冬。天氣常欲赤身裸露。其癢稍止。如著衣被。其癢卽生。如蟲攻刺。予知擊報。亦辭之。後至隆冬。赤身流水而死。此異常之報也。所謂逆天害理。雖由己。古往今來。放過誰。決無漏網。

仙方活命飲今古不同論

古人朴實。其七情干涉者少。而從風寒暑濕外感凝滯者多。故設仙方活命飲。攻散所滯之腫。服此得效者。十常八九。由病者五臟不虛耳。今人穿鑿太過。七情煩攪過甚。內臟無有不傷。每見曾服過此藥。其瘡必不起發。脾胃再無不損。夫瘡不起發。脾胃傷敗。病者豈可得生。故今之治法。不論首尾標本。先必固脾胃。次行托藥。病無不活。愚見如此。幸同道者察焉。

徐曰。此段直是亂道。對症用藥。無有不愈。豈有古今之別。

楣案著書者。於腫瘍方。首列神授衛生湯。而此乃痛駁仙方活命飲。余取二方較之。大略相同。衛生湯僅少陳皮、貝母、沒藥。而多羌活、沉香、紅花、連翹、石決明。便秘者加大黃。是其方更猛於活命飲。乃是今而非古。此與近人言方苞之文。非望溪所及何異。

拾遺症

拾遺者。因條款分門。未及細詳。故有失載。今補註於後。以便觀覽。鼻疔。生於鼻內。痛引腦門。不能運氣。脹塞鼻竅。甚者脣腮俱腫。

牙疔。生於牙縫之中。頂高突起。痛連腮項。破則流血。黑疔。生於耳竅之內。黑硬腐爛。破流血水。疼及腮顴。

以上諸症。俱先針刺。次行發汗。仍照疔類調治。

喉癰。生於咽外正中。妨礙飲食。紅腫熱痛。必欲潰膿。軟而脹痛者。針之。內服補托之藥。玉紅膏搽貼。長肌完口。又有腐潰內通。湯水隨孔出者。曾治數人。俱亦無妨。臈疽。生在膊上。連肩通腫。長堅而硬。

兌疽。生在當手動脈之處。腫痛寒熱。痛徹手膊。舉動不便。

鳳眉疽。發在兩眉之間。形長皮赤。痛引腦戶。二目合縫。光腫發熱。

透腦疽。發在額上髮際之間。多發寒熱。頭疼如斫。不可忍耐。先用萬靈丹發汗。解散風邪。次宜清托。

附陰疽。生在內踝上三寸。初生小泡。漸至赤腫。破流血水。痛亦徹骨。不能步履。咬骨疽。發在大腿內股。不腫不紅。痛徹骨髓。初宜雷火針針入。內服萬靈丹。酒調服效。

陰疽。生於右腿夾縫之下三寸。痛連陰子。小腹亦疼。

元疽。生於左腿夾縫之下三寸。腫漫連陰。疼及大腿。淵疽。發在脇下。初起不紅堅硬。久則破潰。有聲如嬰兒啼狀。徐曰：奇症膏蓋無聲。去膏仍有異哉。難治之症也。

楣案王君士雄歸硯錄。載潘氏子肋下腫潰。竄孔甚巨。孔中作聲如嬰兒啜泣。吳江陳夢琴茂才希恕視之曰。此淵疽也。證屬大虛。固當補益。但疽孔作聲。則內膜已破。氣從旁出矣。非護其膜。補亦徒施。以人參、白朮、白芨、烏梅炭、白蠟、黃蠟、象牙屑、猪脊髓和爲丸。令日三服。以固氣。仍搗諸藥。益以生肌之品。製若糊餅。塞疽口。絲綿裹青鉛罨其外。大膏藥蓋之。闊布纏縛其體。三日一易。復用生脈六味加龍螬等品煎汁飲之。如是二十餘日。其聲漸除。三月餘而口斂。

又案外科心法。亦言聲如兒啼。爲內膜已透。可於陽陵穴灸二七壯。其聲卽止。將潰未潰。多服護膜散。白蠟、白芨各等分研末。輕者用一錢。微重用二錢。重者用三錢。或酒或米湯調下。可免透膜。

玉枕疽。生在腦後枕骨中。堅而難潰。痛引肩項。鼻塞氣粗。此太陽膀胱濕熱凝滯。

而成。

以上諸症。初起有表症者。便宜解表。有裏症者。卽與通利。潰後宜補托。久則宜收斂。此爲一定治法。不可亂投藥餌。以致危亡。

徐曰。此篇當記。

綳縛背瘡法

凡發背對口等大瘡。已潰流膿時。冬夏宜絹帛四五層。蓋在膏藥外。再用綿布見方八寸。蓋在絹外。四角用蛇皮細帶綴之。紮在前胸。綳實瘡肉。庶瘡中暖氣不泄。易於腐潰。洗瘡時預備二綳更換。務要瘡內暖氣烘烘。此法最善。故補載於此。

癰疽內肉不合法

癰疽對口大瘡。內外腐肉已盡。結痂時。內肉不黏連者。用軟綿帛七八層放瘡上。以絹紮緊。睡實數次。內外之肉自然黏連一片矣。有患口未完處。再搽玉紅膏。其肉自平。

徐曰。東洞庭劉某夫人患乳癰。醫者用刀向乳頭上寸餘出毒。瘡口向上。膿反下注。乳囊皆腐。寒熱不食。將成乳勞。延余治之。至九十日而未見功。蓋病者柔弱畏痛。既不敢於乳下別出一頭。而膿水從上注下。頗難出盡。故有傳囊之患。忽生一法。用藥袋一箇。放乳頭之下。用帛束縛之。使膿不能下注。外以熱茶壺熨之。使藥氣乘熱入內。又服生肌托膿之丸。於是膿從上泛。厚而且多。七日而膿盡生肌。又數日而全愈。後以此法治他證。無不神效。此條從泗溪醫案探入

煉元明粉法

冬至後。用潔淨朴硝十斤。水一斗五升。白蘿蔔五斤。打碎。同入鍋內。將硝煮化。候湯滾足。撈去蘿蔔。以綿紙二層鋪竹絲箕內。架在新缸上。將硝湯徐入箕內。隨瀘隨添。以湯瀘盡爲度。將缸移在天井。露三日。其硝結在缸內。傾去餘水。瀝乾爲止。將硝取下。再用砂鍋頓炭爐上。將硝一碗。化開煎滾。以銅匙鏟攪。將凝結時。鏟入小魚酢罐內。上空寸許。餘硝陸續照上法煉畢。每一罐下。用三釘品字樣插入地中。留寸半在外。將罐浮頓釘頭上。用瓦片蓋口。周圍用段磚砌百眼鑪圍繞。離罐

寸半許。著炭火入鑪內。四圍底火頂火。務要周匝。候罐硝紅爲度。次日。取出硝來。預用大綿紙攤在潔淨陰土上。將硝碾細。用絹篩篩在紙上。約一錢厚。再不許多。門窗俱關閉。不令人見。三日後。其硝自然復活。色白如粉。輕虛成片。將鉢盛貯。內用紙蓋。再放亂紙寸許。以收潮氣。庶不凝結。此品最能降火化痰。清利臟腑。怪症服之可蠲。狂躁用之卽愈。搜除百病。安斂心神。不傷元氣。惟久病瀉痢者不宜。大人每服三四錢。小兒五分至一錢皆可。俱用白滾湯。或葱湯。空心化服。候行二三次。隨飲稀粥。自然精神爽健。臟腑調和。津液頓生。百病如失。又煨過硝石六兩。加硃砂三錢。青黛一錢。冰片一錢五分。共研細末。照前篩紙上。再用紙蓋一層。四邊以界尺壓緊。勿令走氣。候三日外。取起密收。又名陽春紫雪。最治失心忘志。癩癩健忘。小兒急慢驚風。大人異症。每服五分至一錢。俱用淡竹葉燈心湯化服。屢有奇效。不可盡述。此乃神仙保命服食之品。每一斤加生熟甘草末二兩。葱湯化服。二三錢。令人容顏悅澤。輕身耐老。

榴案元明粉乃推蕩腸胃之藥。經煉稍緩耳。以爲神仙服食之品。誤人不淺。又案此下有取紅鉛法。徐用筆勾去。故不錄。

煉金頂砒法

用鉛一斤。小罐內炭火煨化。投白砒二兩。於化烱鉛上。煉至烟盡爲度。取起冷定。打開。金頂砒結在鉛面上。取下聽用。

煉硝石法

用潔淨朴硝半斤。罐內炭火鎔化煎乾。煨紅住火。冷定取出。卽成硝石。罐收聽用。利實火不利虛火也。

取蟾酥法

蟾無大小俱有酥。用闊銅鑷。鑷蟾眉稜高肉上微緊。拔出酥來。凝聚鑷裏。多則刮下。陰乾聽用。其取過之蟾。避風二日。仍送青草園中。自然不傷其生。如取之便見風下水。俱成破傷風。癩狂而死。

製附子法

大附子。要一兩以外者。不拘幾枚。以童便浸漬三寸。每日換便。夏浸三日。冬五日。再換童便。盡二香爲度。去皮臍。線穿陰乾。或日中曬硬。亦可收藏聽用。

昇白靈藥法

水銀二兩。用鉛一兩化開。投入水銀聽用。火硝二兩。綠礬二兩。明礬二兩。共研爲末。投入鍋內。化開炒乾。同水銀研細。入泥護陽城罐內。上用鐵蓋蓋之。兜以鐵梁。梁之兩端。用燒熟軟鐵線。上下紮緊。用紫土鹽泥如法固口。留出蓋面。烘令十分乾燥。架三釘上。砌百眼爐圍之。先加底火二寸。點香一枝。中火點香一枝。頂火點香一枝。預用小罐安滾湯在旁。以筆蘸湯。搽擦蓋內。常濕勿乾。候三香已畢。去火。罐待次日取起。開出藥來。如粉凝結。盞底刮下。收藏聽用。凡瘡久不收口。用此研細。搽上少許。其口易完。卽尋常收斂藥中用之。功亦甚捷。

徐曰。此藥除濕毒。不收口之瘡。餘俱有害。世人皆以昇藥爲收口之聖藥。其害無窮。

製寒食麵法

用白麵一斤。外再以麵半筋調稠。捏成薄片二塊。將前麵包合於中。周圍捏緊合口。於清明正日蒸熟。挂透風處陰乾。將麵包藏。勿經女手。越久越效。

製披針喉針法

楮案披當從靈樞經作鉞大針也

披針古多用馬銜鐵爲之。性軟不鋒利。用之多難入肉。今以鋼鐵選善火候鐵工造之。長二寸。闊二分半。圓柄扁身。劍脊尖鋒。兩邊芒利。入肉深淺。得心應手。如膿深欲其口大。直針進而斜針出。劃開外肉。則口大矣。喉針長六寸。細柄扁頭尖鋒。刺喉膿血令出。

諸藥製法

前方諸藥。未詳製法。今開列於後。不須製者不錄。

人

參潤色明亮堅實
爲上經飽不堪

天門冬

湯泡
去心

麥門冬

去心

生地黃

酒蒸

熟地黃

酒蒸

白

朮

米泔
炒

蒼

朮

米泔
炒

黃耆蜜水
拌炒

甘草

消毒生用
補托炙用

酸棗仁

炒
研

遠

志

湯泡
去心
微炒

五味子 炒研

肉蓯蓉 酒洗

牛膝 酒洗

破故紙 炒

當歸 酒洗

白芍 微炒

白蒺藜 去刺

元參 去根

香附 童便炒

柴胡 去蘆

黃芩 酒炒

黃連 解毒生用止嘔薑汁拌炒

龍膽草 酒炒

知母 鹽水炒

瓜蒞仁 去殼

貝母 去心

陳皮 去白

桔梗 微炒

防風 去蘆

乾薑 炒黑

附子 童便浸 煑 去

半夏 薑汁煮

川烏 湯泡去皮尖

草烏 湯泡去皮尖

巴戟 湯泡去 微焙

南星 煑有為末入 膽內者

澤瀉 蒸

威靈仙 去根

仙茅 米泔浸 去皮

三稜 湯泡

牡丹皮 去梗

大黃 實人多用 虛人少用

海藻 酒洗

昆布 酒洗

王不留行 炒研

牛蒡子 炒研

連翹 去梗

金銀花 去梗

牽牛子 生用 炒用

地骨皮 去梗

肉桂 去粗皮

茯苓 去粗皮

枸杞子 去蒂

琥珀 布包 搥碎 燈心 同研 研如 麪細

山梔 研炒

黃柏 鹽水 拌炒

山茱萸 去核

杜仲 鹽水 拌炒 斷絲

桑皮 蜜水 拌炒

辛夷 去蒂

乳香 去油 為末

沒藥 去油 為末

枳殼 麸炒 皮

厚朴 薑汁 製炒

巴豆去油 山查去核 石膏煨研 礪砂透白 黃丹水飛 犀角鎊末 蟬蛻去土 蜈蚣炙去 石決明煨 榴案各藥製法不一。自當檢尋本草。即如陳皮去白留白。各有攸宜。豈得概言去白。此不過為習外科者簡便起見耳。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 皂莢 <small>去皮</small> | 桃仁 <small>泡去</small> | 雄黃 <small>透紅</small> | 砒霜 <small>白生煨</small> | 龍骨 <small>生用</small> | 羚羊角 <small>鎊末</small> | 斑蝥 <small>用米炒</small> | 蚯蚓 <small>翻土</small> | 珍珠 <small>豆腐內煨</small> | 五倍子 <small>末炒</small> | 杏仁 <small>泡去</small> | 硫黃 <small>去腳</small> | 牛黃 <small>輕虛</small> | 龍齒 <small>煨存</small> | 僵蠶 <small>去絲</small> | 田螺 <small>去殼</small> | 人中白 <small>煨研</small> |
| 蓮肉 <small>泡心</small> | 芒硝 <small>提淨</small> | 硃砂 <small>淨明</small> | 自然銅 <small>醋煨</small> | 麝香 <small>去毛</small> | 蜂窠 <small>煉去</small> | 全蠍 <small>酒洗</small> | 牡蠣 <small>煨研</small> | | | | | | | | | |

逐日人神歌

初一十一二十一。大拇鼻柱手小指。初二二十二二十二。外踝髮際外踝位。初三十

三二十三股內牙齒足股肝。初四十四二十四。腰間胃腕陽明手。初五十五二十五。口舌徧身陽明足。初六十六二十六。手掌胸前又在腸。初七十七二十七。內踝氣衝及在膝。初八十八二十八。手腕股內併在陰。初九十九二十九。在尻在足膝脛後。初十二三十日。腰背內踝足趺覓。此爲太古相傳。針灸莫犯爲吉。

十二時人神歌

子蹠丑腰寅在目。卯面辰頭巳手熟。午胸未腹申在心。酉背戌頭亥股續。

十一十日針忌歌

甲不治頭乙耳喉。丙肩丁背與心求。戊己腹脾庚腰肺。辛膝脛當腎壬收。癸日不宜針手足。十干不犯則無憂。

尻神歌圖

尻神所在有根由。坤內外蹠聖人留。震宮牙端分明記。巽位還居乳口頭。中宮肩

骨連尻骨。面目還從乾上遊。手膊兌宮難砭灸。艮宮腰項也須休。離宮膝脇針難下。坎肘還連肚腳求。為醫精曉尻神訣。萬病無干禁忌憂。

尻神圖



此圖一歲起坤。二歲起

震。逐年順飛九宮。週而

復始。行年到處。則所主

症切忌針灸。俱勿犯之。

不則變生他病。

醫家五戒

一戒。無論病家大小貧富。有請便往。勿得遲延厭怠。藥金勿計較輕重。一例盡心

施治。自然生意日增。不傷方寸。

二戒。凡遇婦女及孀婦尼僧人等。必候侍者在旁。然後入房診視。倘侍者偶不在旁。更宜謹避嫌疑。真誠診視。歸對妻子。亦不可妄談閨闈。

三戒。不得出脫病家珠珀珍貴等物。送家合藥。暗中調換。如果該用。令彼自製。庶無疑謗。

四戒。凡爲醫者。勿耽嗜好。恐志慮紛馳。勿晏起。勿無事他出。致就診者守候無時。切脈必當用意。寫方務要依經。不可胡亂杜撰。受人批駁。

五戒。凡娼妓及私夥家請看。亦當視如良家子女。勿存他意兒戲。以取不正之名。視畢便回。貧窘者藥金可璧。病愈不可再往。

醫家十要

一要。先明儒理。然後習醫。或內或外。勤讀古書。手不釋卷。一一參明融化。得之於心。應之於手。臨症時自無差謬。

二要。選買藥品。必遵雷公炮製。或依方修合。或隨症加減。湯散取辦於臨時。丸丹

預製於平日。膏藥愈久愈靈。線藥越陳越好。藥不吝珍。施必獲效。

三要。凡鄉井同道之士。不可傲慢輕侮。年尊者恭敬之。有學者師事之。名重而自高者。遜讓之。技精而未顯者。薦拔之。如此。自無謗怨。

四要。治家須與治病同。人不惜元氣。斲喪太過。則百病生。醫不顧來源。靡費太過。則百用窘。能治家然後養生有資。不致視病人爲奇貨。

五要。人受命於天。醫者受人謝儀。當知天道順逆。順取者吉。逆取者凶。不論多寡。是謂順取。勒索厚資。是謂逆取。天卽因其順逆爲報應。不可不做。

六要。凡里中親友人情。如婚喪疾病慶賀。及饋送來往之禮。不可求奇好勝。每食只可一魚一菜。一則省費。二則惜祿。至病人之家。尤不可苛求飲食。

七要。貧窘之家。及遊食僧道。衙門差役人等。凡來看病。不可要他藥錢。只當奉送。

八要。貧窘至極者。當量力資助。不然有藥無食。活命亦難。

九要。浪費錢財。醫本仁術。有餘則以施藥可也。

凡店中所用醫藥器具。俱要精備齊整。不得臨時缺少。又古今前賢及近時

名公新刊醫書。必尋究參閱。以進學問。

十要。凡奉官衙所請。必當速去。毋得怠緩。要誠意恭敬。告明病源。開具方藥。病愈之後。不得圖求匾禮。亦不得請託人情。致生罪戾。

以上五戒十要。乃保身保家之法。當置座右。朝夕省覽。賢能子孫遵而行之。可以成家立業。若不聽信。必有飢寒不足之憂。悔何及矣。

楣案五戒十要。著書者蓋以垂爲家訓。故原本有與醫無涉者。余於全書俱順文刪改。不參己意。獨此稍爲增益。爲業醫者告焉。勒索厚資。尤外科包醫惡習。所望讀此而幡然改悔也。

