

衆妙仙方目錄

治痘門

小兒雜治門

補遺門



衆妙仙方卷之四

治痘門

氣毒血分者生

一二日初出之象如粟於口鼻腮耳
年壽之間先發三兩點淡紅潤色者
順之兆也於天庭司空大陽印堂方
廣之處先發者逆之兆也雖稠紅潤
澤成箇者險也順者不治自愈為氣
得其正血得其行其毒不得妄行肆
其虛也逆者不治為氣溢血滯致毒

始順

物出血點
淡紅潤色

出逆

形如香種
紫黑乾枯

妄參陽位無以當其勢也險者毒雖

犯上其氣血未離憂虞之象未可加

圖險 圖暈成形 乾紅少潤

治俟其氣血交會之後以保元湯加

桂主之謹防氣洩血散將無速矣

毒參陽位者死

陰陽得道而形圖

二三日根窠圓濕氣之冲滿也氣之

冲滿血必歸附為順根窠無暈氣離

圓順 氣溢血附 飽滿光潔

血散為逆根窠雖圖而頂陷者血亦

難聚為險順者不治自愈為氣血得

濕逆 氣失血散 枯死不榮

其道也逆者氣血交會不足致毒乘

機而犯內也險者為氣弱不能領袖

圖險 頂陷不滿 光潔真神

其血也以保元湯加川芎官桂扶陽

氣血成功而毒化

益陰豈有不痊者哉

形圓而體天象

四五日觀痘勢之形色則知氣血之

壯弱受毒之淺深此治法之大要也

形順 氣滿血榮 鮮明光澤

其形尖圓光澤大小不一等氣和血

就順也其形綿密如蚕種黑陷乾紅

色逆 綿密如泡 黑紫乾紅

紫泡者逆也其形根窠雖起色不光

潔生意猶在險也順而愈為氣拘血

附各得其道而毒自釋逆而不治為

圖險根案雖起色慘不明

氣血相離縱毒內攻險而治為氣弱血盛勢雖挾毒犯上然得交會分明用保元湯加芍藥桂米助衛制榮斯

色潤而現精萃

為調燮之妙

氣血並隆能制毒

五六日氣盛血榮於內則發揚於外

為順氣雖旺而血不歸附其色灰陷

起順氣會血附紅活鮮明

或紫陷或發為水泡痒塌為逆氣雖

旺血雖歸附不厚其色光白不榮為

發逆氣背血離乾枯綿密

險順者自念為氣血豐厚毒受制也

逆者不治氣弱血衰致毒下陷而

外剝也險者易治為氣盈血弱不及

圖險氣弱血榮色昏紅紫

歸附用保元湯加木香歸芎助血歸

附氣位非手氣不足以全中和之道

盈虧雙治見神功也

氣血勝淫邪之毒

五六日氣盈血附其毒自化化則成

漿順也氣陷血衰其毒內伏伏則不

漿順氣化漿行光潔飽滿

成漿逆也氣交不旺血雖歸附不能

成漿險也順者可不治而自愈為氣

血得中其毒自解也逆者不治為氣

血相離不能制毒而外剝也險者須

圖險。○氣血少足
光潤有神

乾坤順造化之情

急治之為氣血少寒不能振作急投
保元湯加桂米助其成漿而收濟惠
之偉功斯為治矣

血漸收而毒溢

漿順。○氣足血微
神全光潤

七八日氣旺血附其毒化漿順也氣
血乖離其毒不化漿逆也其氣血少
緩毒雖化而漿不滿險也順則不煩

足逆。○氣陷不滿
色枯乾紫

圖險。○氣弱血附
光潤不枯

治而自愈為氣旺拘血化毒之故也
逆則難治為氣血不及不能振作以
制其毒以發癰發疔者可生外剝內

傷者必死險則可治為氣血有礙不

氣已滿而神凝

能大振以保元湯加桂米發揚助漿
斯可以保全生命矣

血秋天和而保命

漿順。○氣柱血化
毒始在身

老逆。○氣陷不滿
毒成外剝

圖險。○氣平少冲
紅黃色潤

八九日漿足氣血之功成矣氣血功
成生命定矣如無他證順而已也漿
不足者氣血盡而大命臨之逆矣漿
不冲滿血附線紅氣弱而險也以保
元湯加姜米以助其氣而駕其血斯

氣刑毒化而成功

邪正明君臣道濟

血順。○氣平血收
光色始斂

漿成也于此可見施治者之妙道也
十一二日血盡毒解氣調漿足此生
生自然之理也為順或血淡而漿薄

圖險。氣少冲滿血亦有方

或血凝而滯以見氣虧而毒不解

為逆血盡漿足濕潤不斂者內虛也

為險以保元湯加芩朮以助收斂結

痂也

君道成而臣立致十三四日氣血歸本毒既殄滅漿老

結痂順也毒未脫形諸邪並作雖云

結痂此其逆也毒雖盡解漿老結痂

之際或有雜證相仍以保元湯隨證

加減不可峻用寒涼大熱之劑恐致

內損之患故也

保元湯

人參二錢黃耆三錢甘草一錢

神化全而毒勢平右用水一鍾生姜一片煎服十四五

蛇盡客感淫邪之火六日氣血功收痂落而無他證順之

還順。氣血無恙痂落痂明徵也痂未易落寒戰咬牙譫語狂煩

元逆。氣血兩虧天年盡矣疔腫作者無可生路逆之兆也痂落

潮熱唇紅口渴不食者險之證也以

四君子湯加陳皮山查黃連渴甚加

參芩白朮散不解以大連翹飲去黃

芩主之證去之後多有內損或餘毒

圖險。氣血功收神化必全

痂逆。氣血不全功虧一篑

圖險。氣血效力神化太過

補美和造化之功 未解此則尤難治也

痘之初發陰陽交會不得其一則諸惡證生矣蓋氣血不能勝毒甚至滅亡得其生者百有一焉予嘗聞其痘之惡證七日前後為陷為泡為臃為疔為痒塌為倒陷如此者有因毒勝而不治有因毒勝而自痊難於知識療理惟其陽毒內潰媒孽於表裏受傷之物又非氣血能勝其所勝而救其危也故另立治法圖式開陳于後尚冀治是者當加慎密深為我而察之

治痘如蛇皮脆破用多年蓋墻稻草為末攤上即結

加蓋

治痘毒攻眼腫不能開用象牙磨濃水洗之即効

氣弱毒滯而成形 七日前後 五陷者氣不足也氣不足

不能收血 而毒不能成漿蓋氣不能

頂 勝毒故也 七日前後見此宜治以保

陽虛陰實 元湯加芎 桂糯米溫胃助氣又以水

陷 之象故性 楊湯沃洗 之血不榮加歸至十一二

好下陷也 日漿足或 有之如血氣光澤有起勢

圖 者亦不可 過於治也深恐洒而過盛

反霄百骸 或血如死灰漿不滿足其

血附漿行而順道

血雖附不榮而兼有內證者生命不

可保安

九刃山成功虧一箕

七日前後倒陷者氣血衰也七日後

根窠發足漿行之次因瀉氣陷毒即

隨氣血而反陷也如血不走歸附鮮

倒

明衛護之力猶在治必有可拯之理

內外俱虛

其血不產亦必挾毒攻內禍復起於

陷

之象氣血勢離故滿而復陷也

蕭墻其可救乎急以保元湯加苓朮

肉豆寇渴以參苓白朮散主之又有

圖

峻用發泄毒劑致傷元氣而氣血隨

兩儀道否治賴孤陽

毒勢反陷伏者有之用子保元湯者

豈有是患誠謂一絲九鼎治者不可

輕視

毒聚媒孽之初

七日前陽毒者九瘡也或瘡未痊及

初結癥處肉分必虛毒受氣血相擊

周流百脉必趨虛處而出也蓋陽瘡

外實內虛

陰毒溷雜一黨反勝諸毒而名之也

毒

陷

陽之象也

其毒濕潤者為氣血俱盛而諸毒易

故性外旺

成漿也其毒枯燥乾紅氣血俱弱毒

與諸瘡相抗而俱不成漿也治法同

功收禪補之後

彼頂陷如枯轉潤紅變白其漿自溢
于此可見治者之功效也

毒聚於已發之未發

七日後發臃者陽毒也痘之毒併聚

手形



一處而假其名也蓋氣血不能拘收

乘載其毒使氣弱血盛陽分空虛血

臃

則載毒傳注四肢合處合者海也曲

手之三陰交會處

池委中是也毒不成漿七日前後發

毒

足形



者宜縱之發其毒并從此而出也若

治其毒必隨痘而散內攻臟腑必無

圖

足之三陰交會處

可生理如痘毒已先血氣豐盛宜解

功收於欲危之未危

散其餘毒以保元湯加解毒湯主之

為妙

氣有全道之功

九日後發疥疥者釘也毒參陽位聚

而自成窠穴已蓋氣位弱而血分不

疔

密其毒性不能自散故聚結而成其

中實外虛

形如氣固血盛則毒受制歸附豈有

毒◎陰之象也

是耶結於四肢或小或大不近臟腑

故性犯內

雖抵穿筋骨者易治結於頭面腹背

圖

逼近於內者其勢必攻穿臟腑難治

如不穿者急治治不可加峻以保元

毒無立身之地

湯加牛旁子當歸荆芥助氣逐毒待

毒液滿自釋也

治痘未出用絲瓜連蒂一截燒灰硃砂一歲一方調末蜜服

又方飛麵一升兔血丸參米大硃砂為末每服七丸三服全少

治小兒病驚痰盛夢中手脚抽掣弄舌多笑吐乳泄

牛黃五分琥珀一錢水天竺黃二錢五

雄黃七分麝香七分各一兩茯苓三錢

金銀筇各五十片

右名牛黃抱龍丸甘草四兩煎膏丸皂子大熟冰

化服

治小兒病疳五經肥熱大便不調小便下地如米

胡黃連五錢黃連五錢硃砂一錢五蘆薈麝香

各三分各另研

右名胡黃連丸為末入豬膽內線釣瓦罐漿水煮

一二沸取出入蘆薈麝香飯和丸粟米大每服二

十米飲下

又方用糞桶底夏月蛆燒灰為末雜物中食漸愈

治小兒病積殺蟲和胃止渴進食消積氣長肌肉

胡黃連 黃連去鬚梗 蘆薈另研 木香白

蒸麩去 青皮去白 鶴虱 雷丸取白色者佳

各五錢 麝香 一錢另研

右名蘆薈丸粟米飯丸末菜豆大每服二十九米

飲下

治小兒病熱焦燥睡卧不安煩渴小便少盜汗向好

覆地

黃連去鬚梗米泔浸 辰砂 二錢另研水飛通

右名辰砂瀉心湯為細末每服五分甘草湯調下

治小兒大便閉塞豆豉一撮葱白五箇搗爛過膈心

即通

已上痘法續增諸方小兒切用蓋簡易而易辦者

小兒痘瘡入眼紅腫流淚不止

雄黃 硃砂 各一錢

右用田螺二個去頂將藥入內却用流出水點之

三五次即愈

淡豆豉 用二枚研極細末入兒口以乳啖之能利

膈屎其毒自消

抱龍丸 牛膽南星八錢入蠟月生者水浸一乾百

麝香 一錢 雄黃 水飛 辰砂 細研水飛

天竺黃各四錢 牛黃二錢

右為末 煑甘草糊丸如鷄實大 遇兒中暑發熱與服三歲一丸 薄荷湯下

硃砂散 先用磁石引去鉄屑 研極細末 每服一錢

用蜜水調吃

黃栢膏 碾為細末 用香油成膏 傳於頭頂兩腮上

白芥子 碾末水調敷足心 白芥子乃子之白者壯

方多有之 今俗以菜白者用之 非也

乾臙脂 用蜜水調勻塗目上 此乃洗花輔內紅花

膏子對菜豆粉成環者 差訛

羗蘇散 痘疹初熟用此方

羗活 蘇葉 陳皮 香附 甘草

四聖散

真紫草 木通 枳殼 甘草

如聖湯 赤芍 甘草 木通 粉葛 升麻 紫葦

胡荽酒 用荽數莖搗爛入酒鍋內煎滾候溫口噴

從上至足心勿噴頭面

犀角地黄湯

生犀角 生地黄 牡丹皮 赤芍 甘草

人牙散 治痘初出光壯忽然黑陷心煩氣喘妄語

或見鬼神急治之不然毒氣入臟必死

人牙燒存性 雄雞冠血 調人牙調酒吃

豬尾膏 治痘成斑難出用此方即出如不出不治

硃砂 三錢 梅腦 五厘 真射香 五厘

用小豬尾尖上血研勻前藥用紫草煎湯送下龍

腦即片腦一名冰片其色如冰一名梅花腦以形

似梅花也曰龍腦者香如龍腦也味辛苦微寒温

平無毒龍腦本方一字誤二分五厘今已減矣

紫草散

用紫草葦水煎服葦乃春月物生之葦也色澤而

紅嫩者行陽氣之多用發痘瘡故効脾氣虛者減

用多則作泄

紫草木香散 治痘出不快大便泄利

紫草 南木香 赤茯苓 白朮 甘草

紫草木通湯 治痘出不快

紫草 木通 人參 赤茯苓 甘草

快斑散 治痘出不快

紫草 蟬退 人參 赤芍

四順清涼飲 七日前用

大黃 當歸 赤芍 甘草

涼膈散 連翹 枝子 大黃 甘草 朴硝 黃

芩 淡竹葉 薄荷葉 加些蜜煮

八珍散 人參 白朮 白茯苓 川芎 當歸

甘草 白芍 熟地黃

惺惺散 人參 白朮 白茯苓 白芍 天花粉

桔梗 細辛 薄荷葉

導赤散 治小便不通 生地黃 木通 片黃芩

甘草

加味犀角消毒飲 治毒氣壅盛壯熱心煩瘡疹未

出口生瘡不能飲乳

牛旁子 荆芥尾 防風 升麻 生犀角 甘

草 麥門冬 桔梗

小柴胡湯 半夏 人參 片黃芩 柴胡 甘草

大連翹飲 十四日後

連翹 赤芍 枝子 木通 甘草 防風 黃

芩 柴胡 當歸 荆芥 瞿麥 活石 蟬蛻

車前子 牛旁子

活血散 白芍藥炒過碾為細末每服一錢酒調下

活血湯 初起紅腫血凝不散

芎歸 赤芍 生地 紅花 蘇木

白朮散 治煩渴吐瀉除身熱清神生津液痘無顏

色首尾可服

人參 白朮 白茯苓 甘草 木香 藿香各七

乾葛 一錢四分

木香散 和表裏行津液扶陰助陽腹脹渴瀉其如

神 丁香 甘草 木香 大腹皮 赤茯苓

人參 桂心 青皮 前胡 訶黎勒 半夏

異功散

除風寒養氣血救表裏使痘疹易出易靨不致塌

附子 官桂 木香 當歸 白茯苓 人參

陳皮 丁香 肉豆蔻 半夏 白朮 厚朴

小異功散 和胃助氣

人參 白朮 白茯苓 甘草 陳皮 木香

豆蔻丸 泄瀉用

木香 砂仁 各三錢 白龍骨 訶子肉 煨去核

肉豆蔻 各五錢 赤石脂 枯白礬 各七錢

麩糊丸 黍米大每服二五十九 溫米湯送下

理中湯 乾姜 甘草 白朮 人參

治中湯 加青皮 陳皮

人參麥門冬散 靨後餘熱不除煩渴吐瀉斑疹

麥門冬 人參 甘草 陳皮 白朮 厚朴

白虎湯 即化班散 白石羔 煨過五錢 知母二錢

甘草一錢 加粳米一撮煎

清肺湯 人參 柴胡 杏仁 枳殼 桔梗 荆

芥 半夏 甘草 五味子 桑白皮 赤芍

旋復花 麻黃

二和湯 藿香尾 香附子 為末每服一字水調服

二母湯 肥知母 員貝母 水煎服

甘桔防風湯 防風 桔梗 甘草

射干鼠粘子湯 射干 甘草 升麻 鼠粘子

解肌湯 麻黃 葛根 肉桂 黃芩 芍藥 甘草

黃連解毒湯 黃連 黃柏 黃芩 枝子

八正散 車前子 瞿麥 扁蓄 活石 山枝子

一大黃 木通 甘草

托裏散 人參 當歸 黃芪 川芎 防風 積

梗 白芷 甘草 厚朴 桂

胃苓散 朱苓 澤瀉 白朮 茯苓 陳皮 厚

朴 甘草

瀉心湯 黃連一兩為末每服一字至五分一錢臨

卧溫水調服

瀉青丸 當歸 龍膽草 川芎 枝子 防風

大黃 羌活 煉蜜丸如鷄大每服半丸或一丸

竹葉湯同沙糖溫酒調下

瀉白散 桑白皮 地骨皮 甘草

生犀散 生犀角 地骨皮 赤芍 柴胡根 白粉葛 甘草

瀉黃散 藿香葉 山枝子 石羔 防風 甘草

獨聖散 治瘡疹陷入 不發色黯而氣欲絕服此漸

疎色潤紅活

用川山甲嘴上鱗三五片燒灰存性研為細末酒

調服之

無價散 舊本治痘黑陷欲死者此藥用純陽未與

陰交者可用

人猫猪犬臘晨燒 少許微將蜜水調

百者救生無一死 萬錠黃金也不消

將四味於臘月早辰日未出時貯於銷銀鍋內用

炭火煨以烟盡白色為度每用一字蜜湯調服

百祥丸 治痘瘡變壞歸腎紫色黑陷此藥太峻以

宣風散代之腎主虛不可瀉乃瀉膀胱之腑則腎

邪去矣下之後急以小異功散以溫脾土使脾土

健旺而勝腎水腎水既衰黑陷必當復起愚意此

證必先失保脾土脾衰腎旺致成黑陷百祥丸之類皆不得已而用之十救一二醫者與瀉膀胱於後不若保脾土於先

用紅茅大戟入漿水內煮極軟去骨晒乾復納汁中煮浮盡焙乾為末留元汁為丸如粟大每服三十丸先服芝麻湯送下

四聖丹

點疔陷痘用油胭脂和成膏以銀簪撥開

疔口點入少許

豌豆

四十九粒髮燒及珍珠五七無胭脂以銀代

漢藜散

痘疹入眼白蒺藜 羌活 防風 甘

草 苾末每服二錢水調下有撥雲見日之勳

吹耳丹

疹痘眼生翳膜 輕粉 黃丹 各等分

細末用竹筒吹耳左眼患吹右耳右患吹左

谷精草散

痘疹已靨翳膜遮睛 谷精草 一兩生

蛤粉 二兩

為細末用獺豬肝一葉以竹刀批片子摻藥在內用草繩縛定置甕器內貯水慢火煮熟令兒食之不拘時

洗肝散

痘後風熱攻目腫脹流淚太便堅秘

薄荷 歸 羌活 山枝仁 大黃 防風 甘

草 川芎

防風散 治痘後目中風熱赤腫流淚及痘風瘡

荆芥 當歸 川芎 防風 赤芍 防己 枝子

通神散 斑瘡入目生翳障

白菊花 菜豆粉 谷精草 為末每服一錢乾

柿一個米泔水一盞同煎候水乾吃柿七次可効

六味柴胡湯 曆後身熱不除別無他證

人參 玄參 柴胡 龍膽草 麥門冬 甘草

奇方 治痘出不透腹痛甚或忽靨者

用蟬蛻二十五個去足背洗淨為末每服一錢沸

湯調下腹痛亦止透出神効乳母亦可服

敗草散 瘡破膿水不乾 屋爛草

乃蓋屋多年爛草如無蓋墻爛草亦可其草經霜

露感天地陰陽之氣善解痘毒不拘多少晒乾或

焙乾為細末每用乾摻若因瘡痒爪破血淋漓或

瘡爛膿水不絕粘黏衣裳難以坐卧可用二三升

攤席上令兒坐卧神効

綿繭散 出蛾綿繭不拘多少炭火煨過白礬煨過

稱勻乾摻瘡上

韶粉散 痘瘡雖愈毒氣未散瘡痂雖落其癢猶黯

或凹凸內起當用此藥塗之

韶粉一兩輕粉一錢用豬油成膏塗瘡痂上

雄黃散 因痘瘡牙齦生疳蝕虫瘡

雄黃一錢銅綠二錢研極細量瘡大小乾摻其上

溫膽湯 半夏 枳實 橘紅 竹茹 甘草 茯苓

神 酸棗仁

妙應方 治小兒痰多破積追虫化食治疳熱等證

宣黃連一兩五錢去蘆胡黃連三錢洗青皮一兩泡

莪朮五錢炮牛胆南星一錢白芥子三錢布洗泡

另為青蒙石一錢將罐子用硝一兩硃砂一錢

史君子 山查子各一兩 為末米糊丸每早米

湯送七分

退火丹 冰片二厘硃砂五分 活石一錢

共研細用甘草五分煎湯不時調服除熱退赤

五日催出退熱 紫草 蟬退 枳殼 木通 山

查子 川芎 羌活 甘草 白芍 用生姜一

片糯米一撮同煎

六日催齊除熱 荆芥 牛勞子 甘草 山查紫

川芎 羌活 木通 蟬退 連翹 姜一片

七日滯色催出 紫草 蟬退 白芍 木通 山

查 甘草 連翹

八日已出血滯 牛旁 蟬退 玄參 赤芍 甘

草 木通 防風 牡丹皮 紅花

七日催出 紫草 蟬退 白芍 木通 羌活

川芎 甘草 連翹

八日起脹 牡丹皮 麥門冬 桔梗 甘草 防

風 連翹 紅花

九日 人參 白茯苓 黃芪 甘草 白芍 桔

梗 麥門冬 防風

奪命丹 麻黃 升麻 各半兩 山豆根 紅花子

大力子 連翹 各二錢 半蟬蛻 紫草 各一錢 半

人中黃 三錢

右研細末酒蜜和丸辰砂為衣薄荷葉煎湯下

調元湯 元湯即保 人參 二錢 黃耆 三錢 甘草 一錢

右剉細加生姜一片水一盞半煎至一盞去渣温

服不拘時

牛黃清心丸 黃連 生五錢 黃芩 山梔仁 各三錢 鬱

金 二錢 辰砂 半一錢 牛黃 半二分 共研細末臘雪調

麵糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯送下

膽導法 用大豬膽一枚以鷺翎筒兩頭蘸齊

一頭入胆中線牢札定吹令氣滿納入穀道中直待氣通取去

牛李膏一名必勝膏 牛李子不拘多少取汁石器中熬

成膏牛李子野生道遠至秋結實黑丸成穗每服

皂子煎杏膠湯化下

亭薤丸 甜亭薤 黑牽牛炒杏仁另漢防已錢

右為末入杏膏取蒸陳棗肉和搗為丸如麻子大

每服五丸至七丸淡生姜湯下

敗蒲散一名止汗散

用故蒲扇燒灰每服三錢溫酒調下無時服

四聖散 菘豆粒四十九 豌豆粒四十九 存性粒各 珍珠一分

油頭髮一分 燒過

右為細末臙脂水調先以簪子撥開黑瘡以此塗

水楊湯 水楊柳五斤淨洗春冬用枝秋夏用枝葉

剉斷用長流一大釜煎六七沸先將三分中一分

置浴盆內以手試不甚熱亦不可太溫先服宜用

湯藥然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯為度不

拘次數

臙脂塗法 先以升麻一味煎濃湯去渣却用臙脂

於湯內揉出紅汁就以本綿蘸湯於瘡土拭之

滅癩救苦散

蜜陀僧

滑石

各二兩

白芷

右為細末濕則乾摻之乾則好白蜜調傳

白龍散

用乾黃牛糞在風露中多炙者火

煨成灰取中心白者為末薄絹囊裹於瘡上撲之

茵陳薰法

用乾茵陳研末搗棗膏和丸如鷄

子火晒乾裂火燒煙薰之

辟穢香

蒼朮

一升 大黃

右剉細捻放火爐中燒之不可間斷

蟬蛻

密蒙花

甲乙豆殼

菘豆殼

明月妙各等分

共為細末每用一匙以豬羊肝二片批開入藥末

在內麻札定米泔煮熟頻與食肝飲湯

拔毒膏

一名必勝膏

馬齒莧 梓汁 豬膏 脂

石蜜

右以三味共熬為膏塗腫處

百花膏

石蜜不拘多少畧用湯和時時以鷄翎

刷之瘡痂亦易落無痕

龍腦膏

生梅花腦子一錢研取新殺獺豬心一

箇取心中血研和丸如菘豆大每用一丸新汲東

流水少許化下如心煩狂躁紫草燈心湯下若瘡

陷伏者溫酒化下一方加大辰砂五分尤妙或用

腦子少許辰砂一錢同研末取小豬尾尖血兩三

點研和成膏又名豬尾膏以木香湯化下立効

東坦鼠粘子湯 鼠粘子炒香當歸身 甘草

一錢 柴胡 連翹 黃耆 黃芩各半地骨皮

右剉細水一大盞煎至六分去渣温服腹空服藥

畢日休與乳食

粉紅丸一名温鷲牛胆南星四兩硃砂一錢半天竺黃

半兩 龍腦半錢 坏子臙脂一錢

右為末用牛胆汁和丸鷄頭子大每服一九小者

半丸沙糖温水化下

蟬殼明目散 蟬殼去足翅地骨皮 黃連

丹皮 白朮 蒼朮米泔浸菊二兩龍膽草錢五

甜瓜子半升

右為細末每服一錢半荆芥煎湯調下食後歸卧

各一服治時疾後餘毒上攻眼目甚効忌熱麵炒

豆醋醬等物

蕎麥粉 蕎麥一味磨取細麵痘瘡破者以此敷之

潰爛者以此遍撲之絹袋盛撲以此襯卧尤佳

白滅癩散

白芷 白附子 白薑 蜜陀僧各等分

共研極細末以水調搽面點神効

篲衣湯 炊飯篲衣煮水洗癰起疣瘡者神效如

無以炊篲煮湯亦好

蟻針法 取水蛭大者五六條放腫處吮去惡血

可以消丹瘤決癰腫

馬鳴散 人中白 即溺缸底白逆以物刮取用新瓦盛之火煨過如白鹽乃佳半兩

馬鳴退 即蚕退紙也火燒五倍子 錢同凡枯

白礬 一錢搥碎另取五倍子一錢 共為極細末

先以米泔濃汁浸洗以此傳之

一方 用乾糖毬為細末湯點服立見出透紅

活荔枝殼煎湯服亦可

治小兒痘瘡陷入不發黑色而氣欲絕服此漸蘇紅

潤用穿山甲湯洗淨炒令焦黃為末每服半錢紫

蘇煎湯入酒少許服之

又方 用胡桃一箇燒存性以乾臙脂三錢為末

用胡荽煎酒調下一錢

治小兒痘瘡入眼或病後生翳障用蟬殼洗淨去土

白菊花各等分為末每服二錢水一盞入蜜少許

煎乳食後量兒大小與之屢驗

又方 用兔子屎焙乾為末茶清調下瘡疹安後

方可多服仍治昏翳

又方

治痘瘡入眼痛楚忠傷眼睛用葶苈草陰乾為末每服三錢隨兒大小以燕羊肝半箇入盞內以杖刺碎爛投水半合攪取汁調下食後服輕者一服瘥已傷目者十服瘥

痘瘡初覺急取乾膜脂研細蜜水調兒兩眼角則痘瘡不生眼內試驗

又方

治痘瘡入目成翳用鱧魚以針刺其血磁器盛之頻點翳上自愈

治小兒痘瘡出後有餘毒塞鼻中氣閉不能睡卧用木筆花研為末加麝香少許蔥白蘸藥入鼻中數次通

治小兒痘瘡愈後瘡痂雖落其癩猶黯或凸或凹用白蜜不以多少塗於瘡上其痂易落且無疤痕亦不臭穢

新增用羊骨髓一兩入輕粉一錢研成膏子塗癩痕上妙

一小兒發熱七日痘出而倒壓色黑唇口水冷危症也有教以用狗蠅七枚搗細加醋酒少許調服即紅潤如常此秘方也其蠅夏月滿狗身易得冬月

藏狗耳中不可不知

治痘瘡用乾絲瓜煎湯飲之入口便覺疎爽當日生發神効

治小兒痘眼上星用石燕磨水濃塗眼胞上下漸自消除矣

治小兒出痘結痂向愈忽然壞爛先將葉葉瓦上焙乾研末此為諸藥之主要焙極多待用礬煨研砂煨米礪煨此三者煨即成塊待用孩兒茶不必煨如用桑葉末有二酒鍾之多即用礬二錢礪砂一錢半米礪一錢孩兒茶二錢總研極爛用菜子油調勻分作二器一以鷲毛搽塗口舌牙齒上下任

其吞咽一以鷲毛塗頭面手足鼻孔不分爛與否皆用之乾即調前藥再塗不旋踵而爛者收瘡立愈矣分二器者在口者吞餘諸處者不宜吞也

此方自驗併傳以示人一月二孫立愈

四退散 專治小兒痘疹經驗奇方

人退 即人手足指甲并取下足用瓦盛注晒乾為末

龍退 即長大蛇皮剪碎用瓦焙乾待涼方研為細末

鳳凰退 即抱子鷄屎殼每個去硬殼一半邊晒乾為末

蟬退去頭足灰沙用身潔淨者各四味多寡各

等分研為細末勻和一處不分男女每一歲服一錢以砂糖調成膏用好酒化下每日服一服連服三服如年小不能服者酒少許塗在乳頭上引下仍量小兒年之大小加減依前調化與乳母服之令其度乳亦止三服未發之先若能預服三五年未不發疹發亦不凶亦不多此乃經驗過極效之方也

小兒痘不出用井邊石下狗蚤十個放碗中用碗湯半碗投入用碗蓋少爻去以虫飲湯即時發出

用好糯米半升淘洗潔淨空乾用鹽泥為餅包裹米在內入木炭火煨通紅取出冷定揀黃色存性者可用為極細末每一兒一歲硃末一分蜜一茶匙米湯半酒鍾好酒三匙同一處調勻用茶匙徐徐喂服片時見効如脩令此藥用靜室焚香齋沐勿令鷄犬婦人聞見慎之

治痘瘡秘法

凡小兒痘瘡天行時氣名為百歲瘡毒臟腑之毒發於皮肉為水疱皮膜筋肉之毒發為血疱氣血骨髓穢液之毒發為膿疱三毒既為瘡初發之時

自然增寒壯熱頭疼嘔吐涎沫驚搐等病不同若
痘不熱則瘡不發要識虛實實則損之虛則益之
寒則溫之熱則平之是為治痘疹之權度苟妄汗
則榮衛轉開瘡爛增寒妄下則正氣內脫變黑歸
腎不收不靨十死無生眼合腹脹其毒不出肝為
水疱色青而小肺為膿疱色白而大心為血疱色
赤脾為黃疱色黃而小班初發熱者四味升麻葛
根赤芍甘草各一錢煎服四肢冷者不可服只可
服兔血丸或天婁蒂根燒灰三分飛過硃砂末三
分蜜調服四肢再寒者木香散木香人參大腹皮
茯苓半夏桂心各等分煎服其氣血旺者易脹水
易靨易落易收氣血虛者不起水不靨不收必要
服土味木香湯即發脹水或再不出者牛旁子不
拘多少入荆芥二錢煎湯服即出恐瘡稠密心脹
即用紫草三錢蟬退五七箇同煎服即解去毒再
又不出者口渴心燥咬牙用異功散能除風寒調
和陰陽溫養血氣扶其脾胃人參白朮白茯苓甘
草陳皮當歸各等分煎服易靨易收或瀉白色者
宜服木香散加肉豆蔻即止或五七八九日不大
便者用豬脊髓一條煮熟與兒吃一二塊即解其

毒其痘瘡至十三日要禁外人恐粘風寒內入恐
經水穢惡壞其痘瘡不屬素問曰飲水雪不知寒
者飲沸湯不知熱者何也岐伯曰不知寒者陰盛
陽虛不知熱者陽盛陰虛補陰木香散加丁香桂
心補陽異功散加木香當歸六七八九日看瘡紅
滿光澤者不可服藥凡痘瘡切戒食五辛煎炒雞
鶩鴨蛋等項勿食每日只燒蒼朮荔枝殼茵陳好
香為妙每日要醋罈三次以淨穢惡凡小兒出痘
瘡稠密亦無麻點何也不食醜味要禁阻生人不
許進房其瘡痊之日盡養一月其兒面如前再無
痕點如此調理萬保無虞

但小兒初發熱勿問一疔出痘不是出痘即依後方發
表若傷風發表亦可若出痘發表得汗大出
更好若痘已畧見面則決不可表故曰宜初發熱
時表之則痘發自疎也記之記之

升麻 五分 川芎 四分 防風 五分 羌活 五分 甘草 三分
麻黃 三分 紫草 五分

水一小碗煎半碗服渣再煎服要取汗發表之後
勿問見面未見面俱以後面保元湯服則痘自外
發也記之記之

小兒雜治門

小兒生疔瘡遍口喉中有用此方妙

用雄鷄肫上黃皮不要落水用火煨存性三錢白

礬火煨二錢烏倍子火煨五錢存性一川椒火煨過用一錢

治疔積方

用雞肺一個去筋百草霜一匙牛乳五厘搗爛後

和勻煎滾酒半碗許傾入攪勻服之至重者不過二三服

又方

蛤蚧大者六個去頭厚朴砂仁乾漆蘿葡

子麥芽山查各一兩每蛤蚧一個袋藥一匙肥內用醋六碗共煮乾焙為末醋煮陳米糊為丸如

至寶散

南星一兩為末生薑汁拌又晒去羗活不用晒乾

半夏一兩為末生薑汁拌又晒去獨活不用晒乾

黃芩要條者佳如蠟胡黃連二錢五分冰片

一方硃砂一錢水青礫石火硝一兩同以紫

金包硃砂飛過為射香三錢當門子散者金箔十片

鬱金一兩炒末用八錢爭瘡五分鬱金磁石十片

急驚竹青一錢薄荷慢驚東瓜仁防風煎湯

癩毒黑豆十粒大黃傷寒荆芥泄瀉米湯下

傷寒湯下

白痢 姜棗湯

赤痢 甘草湯

痰多 生薑湯 痘 丁香

木香 甘草 官桂湯下

抱龍丸

人參 三錢 白朮 三錢 白茯苓 五錢 滑石 五錢

寒水石 五錢 青黛 八錢 山查肉 七錢 白附

子 五錢 射香 一錢 赤芍藥 四錢 膽南星 五錢

天麻 五錢 右為細末 甘草汁煮 占米胡為丸

治小兒急慢驚風

五月五日取白頸蚯蚓不拘多少去泥焙乾為末加硃砂等分糊為丸金箔為衣如棗豆大每服一

丸白湯下

取蚯蚓法先以刀斷蚯蚓為兩斷看其斷跌快者

治急驚斷跌慢者治慢驚作二處合之

治小兒喉中痰壅喘甚

用巴豆一粒搗爛作一九以綿花包裹男左女左

塞鼻痰即墜下神効

痢疾方

用鷄子一箇冷水下鍋煮二三沸取出去白用黃

研碎以生薑汁半小鍾和勻與小兒服之不用茶

其効如神

秘傳五疳散

專治小兒五疳潮熱面黃肌瘦煩渴吐瀉肚大青筋手足如柴精神憔悴歷試有效無疾預服此藥則諸疾不生元氣虛弱者服半月自然肥滿身體輕健

白朮蜜水炒一兩五錢 白茯苓去皮七錢五分 甘草一錢五分

麥門冬去心一兩 史君子肉七錢切碎畧炒 山查肉五錢

麥芽炒五錢 金櫻子肉畧炒五錢 芡實二錢五分 蓮肉

心隔紙炒五錢 青皮去穢麵炒二錢 橘紅五錢 加釭龍五錢

右為極細末和勻重七兩每次用藥末一兩用煉

蜜半斤或四兩調成膏每日中晌晚間各服一

茶匙溫水嗽口身熱咳嗽加地骨百部各五分

肚腹飽脹大便稀水腸鳴作糖或虫出不和加檳

榔二錢五分木香一錢稟受氣弱加人參二錢

五分

煉蜜法用極大青竹筒一節削去外面青皮兩頭

留節將一頭錐一孔灌蜜令滿仍用竹釘固孔以

水煮蜜熟為度或加茅根一把在水中煮蜜更佳

如將蜜通煉臨時調藥旋服亦好途中無蜜滾白

水調服亦可

治走馬牙疳方

槐皮

燒灰存性

泥鹽

炒五分

右為極細末若鼻與喉嚨內有加片腦一分珍珠

一分用鷺毛筒吹入

治小兒重舌

用竹瀝或黃蘗無時點舌上或真

蒲黃塗亦可

治小兒舌腫塞口欲滿者

用紫雪一分竹瀝半

合細研和勻頻置口以盡為度

治小兒火丹方

用寒水石白堊粉等分以水調

塗紅腫之處甚効

琥珀保命丸

治小兒胎驚恐怖夜啼或生痰涎

咳嗽發熱嘔乳並宜服之

琥珀八錢

茯神去木一兩

天麻

二錢胆星

牛膽

胆汁製

龍骨火煨醋淬三

白附子

去尖皮一

兩四錢

珍珠淨末五

益智一兩

勾藤

取勾淨牛黃

二兩

右為極細末加入礪砂三錢硃砂二錢五分真射

香三分再研和蜜為丸如圓眼核大用蠟封每服

一丸薄荷姜湯研化下

琥珀抱龍丸

甘草三錢

茯苓

山藥

連肉

以上各

琥珀五錢

辰砂一錢

赤石脂

一兩

治童子被跌破面不出血

名為破驚風稍緩不

治宜急以班鳩血充白滾湯或酒飲之立愈

一小兒脾胃嬌嫩積氣難消飲食少進面色痿黃肚

大筋露手足乾瘦胃腹痞悶積滯泄瀉口又食不

化時作疼痛用

人參一錢五分

缸龍即糞蛆三錢

山藥炒一兩麥芽

白朮

米泔浸一

山查肉

炒二兩

神麩炒一

兩二錢

連肉

去皮心五錢

為細末煉蜜丸如銅錢大餅每次嚼下三枚淡一

姜湯過口不拘時服如不肯嚼姜湯調服名泰餅

治小兒泄瀉不肯服藥用梧桐葉鮮者煎湯頻頻洗

治小兒赤眼用黃連為末水調敷脚心有愈

治小兒三五歲六七歲時頭生白癬如風雪相似或

以錢大四圍有高弦者名曰風癬用穀樹汁每月

清晨點搽患上其風雪自退此患自出黃水結蓋

次日去蓋再搽如此不過五七次自愈 穀樹即

楮桃是也

一名香橘餅治小兒疳積膨脹筋露積滯腹疼黃疸

痞悶面黃脚軟吃泥嘔瀉每次二餅生姜湯磨化

服忌麥麩魚腥炊氣

陳皮 五錢 木香 五錢 茯苓 一兩 厚朴 去皮 兩

青皮 去穢 一兩 大麥芽 炒 八錢 神麩 炒 八錢

為極細末神麩糊為餅如銅錢大

小兒疳痢濃莖地榆汁飲之

治小兒泄瀉如神用糯米淘炒胡色為末沙糖調服

又用江米一百二十粒研細姜汁和為丸無根水送

見生下便死緣內風與外風相擊未產時指甲青產

門如孩搐痛是也速治免喪生命專意取八月荷

乳將白蜜調和剪取母髮三七燒灰喫去殘疴

八月池中蓮子枝燒灰入盞乳調稀入口似神拈

却痛免生虛死女兼兒

治小兒生下即死用法可救活急看兒口中懸雍前

腭上有泡以手指摘破用帛挽拭血令淨若血入

喉中即不可治也

治小兒初生氣欲絕不能啼者必是難產或胃寒所

致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣

置炭火爐中燒之仍作大紙撚蘸油點火著於臍

帶上往來燎之更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回

啼哭如常方可洗浴了却斷臍帶

五根湯 洗初生兒免生瘡疥

桃根 柳根 桑根 槐根

右每一兩洗淨切碎用水煮去滓加豬膽一枚候水溫洗浴云水內放金銀銅器則辟惡邪之氣益母草一大把剉水一斗煮十沸浴且不生瘡疥治小兒初生大小便不通腹脹欲死者急令婦人以溫水漱口淨吸啞兒前後心并臍下手足共七處每一處凡三五次漱口吸啞取紅赤為度須臾自通不爾則無生意有此證遇此法可謂再生治小兒初生遍身無皮俱是紅肉宜速以白米粉乾撲撲至生皮方止外以軟綿帛裹之

治小兒臍腫先用荊芥水洗了葱葉一片火上慢炙過取地上出火氣以指甲刮薄搭放腫處次日便消因剪斷臍傷風致臍瘡不愈白礬煨白龍骨煨右等方為末付之少用或以當歸末付之或以黃藥末塗之俱驗

治小兒面目黃赤氣息喘急啼聲不出舌強唇青聚口撮面飲乳有妨用直僵蚕二枚去絲茸略炒為末蜜調付唇口中妙

用晚蚕蛾二枚炙黃為末蜜和抹口內効治小兒口內出白沫四肢水冷最為惡候一法治之

極効其兒齒齲上有小泡子如粟米狀以温湯蘸
熟絹裹手指輕輕擦破即開口便安

治小兒臍風撮口用白僵蚕末蜜調入口唇内即瘥
又用茄子花燒灰為細末香油調搽口内効

治小兒初生不飲乳及不大小便用葱白一寸破作
四界以乳汁於砂匙内煎葱熟頻頻灌之立効

治小兒吐乳田中蚯蚓泥為末米飲調下

初生兒口噤不開者諸藥不効用天南星去皮臍研

為細末龍腦少許和均指蘸生姜汁將藥於大牙

根上搽即開

定命散

治初生小兒口噤不開

蟬蛻十四箇去脚

全蝎十四箇去毒

右為細末入輕粉少許和勻用乳汁調乳前服

治初生兒臍風撮口多啼不乳口出白沫

全蝎

二十一箇頭尾全者去毒用好酒塗炙為末

麝香一字別研

右為細末同和用半字金銀煎湯調服

辰砂僵蚕散 治小兒臍風撮口

辰砂五分

僵蚕直的去絲蛇蛻皮

錢炒一麝香別研

右為細末少許用蜜調傳唇口

水鑑方

胎風生下不能啼須使園中小葉葵搗

取汁調熊膽末繞交入口免傾危

兒生眼閉口開常呻吟因受胎熱用涼五歲藥天竺黃散及與母喫後以竹筒煎湯洗眼

洗眼方

黃連 秦皮 燈心 大棗 等分竹筒煎湯洗

治小兒重舌極證用指去甲先於舌下筋上擦去根漸深擦入如此三次又用指蘸水取項後燕窠小窠中筋自上趕下至小窠深深擦入亦三次小兒若飲乳勝前則燕去矣

治小兒重舌用針刺出舌下兩傍惡血即愈

治小兒重舌用簸箕燒灰付之舌下或以鼠婦五七枚研爛塗之或以菜葉白汁塗乳令兒吮之効鼠婦即人家濕地磚石下小灰虫也

治小兒鵝口不能乳用地鷄研水塗地鷄即扁虫人家磚下多有之新註即鼠婦也

治小兒口瘡搗吳茱萸更醋調貼兩脚心一夜即愈

治小兒口瘡用細辛黃連等分為細末塗口內神効治小兒吐不定用五倍子二箇一生一熟甘草一根

濕紙裹煨米泔調下半錢

治小兒吐用生姜連皮研汁和牛乳一盞同煎七分

隨意服効

木瓜丸 治初生兒吐不止

木瓜 木香 檳榔 麝 膩粉 各一字

研麵糊丸小黃米 大每服一二丸甘草水下無時

金朱飲 治驚壯熱 傷寒伏熱上焦虛熱重舌口鼻

生瘡致赤眼方 本名天竺黃散

川鬱金剉皂莢水 天竺黃 甘草 炙 牙

硝各半兩 硃砂一分 蟬殼十四箇 射香少

為末每服半錢至一錢蜜湯調下

治卒重舌燒蛇蛻為末唾和塗舌上差 嬰兒醋調

治重舌口中生瘡涎出 白羊屎少許

初生兒須防三病一撮口二著噤三臍風皆急病著

噤尤甚過一臘方免牙關緊急喫乳不穩啼聲漸

小口吐涎沫眼閉人見大小便通以為冷熱所得

不知病在喉舌狀亦極重善救療者十不得三四

依將護法防于事先必無此患

千金治口噤赤者心噤白者肝噤用雞糞白棗大

綿裹水一合煮二沸分再服聖惠用豆大三枚水

下

又雀糞四枚末之著乳頭飲兒大十枚

治鷄口用棗白皮汁和胡粉傳之新桑樹汁炒

保命散治鷄口 硃砂 水飛白礬燒各一分 馬牙硝半兩

各研細再同研先以手指纏乳髮指舌上垢後取白鷄糞以水攪汁調藥一字傳之

脾脉絡于舌舌者心之候若藏府壅滯心脾積熱邪

熱之氣隨脉上衝舌本則腫漸漸粗大不早療滿

塞口中當塞殺兒為木舌兒尤多此疾 水鑑木

舌要可待黃葵更入黃鈿兩相知黃丹點之七遍

立便可神方不假藥多期

陳藏器方先務兒口傍令見血卒雀甕取汁塗之產

時若開諸物口不令閉多使兒患撮口

○釣藤散 釣藤 川升麻 黃芩各半兩 蟻螂二枚

炒足微 為散每服一錢水一小盞入蘆根一方煎至

四分去滓徐徐溫餵

又當兩乳中高下平以線量灸之三壯起死仍用後

方 烏驢乳合一兩 東引槐枝三十枝 長塘火煨槐枝

入一半看不燥頭津出即取拭却于乳中浸須臾

便以槐枝點乳于口中大驗

兒物生七日封臍雄鼠散

雄鼠糞七枚 胡粉半兩 大棗三枚 綿帛細研 灰麝各一錢

研為散臍欲落不落用藥傳不令風入

治臍濕 白礬 一錢煨 龍骨 一分

為末入麝少許拭臍乾用怕風

金黃散 治臍瘡久不差傳經絡變癩

川黃連 一錢 胡粉 龍骨 燒灰各一錢

各另研復合研為細末傳臍中時時用

浴兒水入臍中或尿裊袍致臍中受濕腫爛成瘡用

封臍散

紅綿燒灰 黃牛糞 燒灰 乾臙脂 各半錢

右為細末瘡濕乾糝瘡乾用清油調傳

掩臍法治小兒大小便不取連拭葱一莖去泥生薑

一塊淡豆豉二十一粒鹽一小匙同研細爛捏作

餅烘熱掩臍中用帛扎定良久無透自通不通再

用一餅

膠蜜湯治嬰兒虛秘葱白三莖水煎去葱入阿膠炒

及生蜜溶化食前服

清液散治嬰孩小兒鵝口重舌及口瘡

青黛 一錢 龍腦 一字 朴硝 一錢 為細末用

蜜調少許鵝翎傳上

千金論曰小兒出腹之後其血氣收斂成血口內舌

上喉頰裏皆清淨也若頰裏舌上有物如蘆籜盛水者名懸癰以綿纏長針苗鋒處如粟米許大以刺之令泄去青黃赤血汁先用鹽湯洗拭次用蜜調一字散少許鴛翎蘸刷之一刺即止如未消次日再刺之三次自消 一字散 硃砂 礪砂各半錢 龍腦 一字 朴硝

右為細末用蜜少許鴛翎蘸刷之口內嚥下無妨
牙疳散

珍珠七顆 銅青 一分 白礬煨 一錢 陳石灰 一錢
右為細末米泔攪口貼

治小兒牙疳用白礬裝於五倍子內以火燒過為末付之

又用山梔子去穰以白礬裝入殼內燒過為末付之
又用白礬裝入出蚕蛾綿罽內燒過為末入麝少許
糝之効

治小兒卒驚仁有痛處而不知覺用雄雞冠血滴兒口中

又用燕窠中糞煎湯洗浴

治小兒夜啼用燈草灰付乳上與吃燈花猶妙

又用當道中土竈中心土為末新汲水調少許飲之

安神散 治嬰兒一百二十日夜啼

蟬蛻 四十九箇只用後一截嘴脚

右為細末作四服用鈞藤煎湯化不拘時服

治小兒拗哭不止以綿絹帶縛手足訖用三姓婦人
淨掃驢槽卧小兒於其中不令傍人知而看之俟
一時則拗哭自止也

治小兒寸白虫用酸石榴東引根二兩糯米三十粒
水一碗煎空心服須臾瀉下虫神効

治小兒頭上瘡及浸淫瘡并急疔瘡用芝蔴生嚼塗
治小兒甜瘡多生面部兩耳前有一法令母口中嚼
白米成膏臨卧塗之不過三五上則愈

治小兒眉爛頭瘡用小麥不以少燒令黑色存性為
末以少油調付之

又用胡桃數十箇和皮燈上燒過存性用碗蓋出火
毒研末入膩粉五錢令均以生油調塗仍先剃去
瘡上髮塗之只一二次瘡

金銀散治嬰小兒眉間生瘡名煉銀瘡 煨金銀罐
子一箇 輕粉半錢研末用麻油調傳

小兒勿令指月兩耳後生瘡名月蝕瘡欲斷用煨蟻
末傳

善藏散 善藏根 四錢 地榆皮 二錢 輕粉 半錢

右為細末先用益湯洗過便傳

封顛散治顛開崎陷咳救鼻塞 栝子仁 防風

天南星各四兩 為細末每一錢豬膽汁調勻稀

稠得所攤緋帛上隨顛大小貼一日一換時時湯

潤

秘要方 兒生一月日內或顛門腫乃胎熱用黃蘗

膏塗湧泉穴如陷半夏膏塗手心此乃嬰兒腎受

冷氣邪干于心致令生病 黃栝半夏皆為末冷水調貼

治兒藏府壅氣血不榮致顛陷主地黃散生地黄 二兩

烏雞骨 一兩 酥炙黃擣羅為末不計時粥飲調下

半錢

治顛門腫軟研以青黛末冷水調付

治顛門開不合鼻塞不通用天南星為末醋調塗顛

門時以火炙手熨之

治小兒頭骨縫開名曰解顛用蛇殼炒焦為末用豬

頰顛骨中髓調付頂上日三四度有人作頭中裹

遮護之久而自合亦良法也

又用驢蹄不以多少燒灰研細以清油調付頭縫中

治小兒疳病骨瘦如柴肚大面黃以糞坑內蛆虫用

麻布袋撈起放長流水中浸半餉新瓦上煨過存性砂糖調服愈

初生小兒大小便有血者由胎氣熱甚以生地黄取自然汁酒三匙熟蜜半匙和勻溫服又用蒲黃散主之 生蒲黃 油頭髮 燒灰各一錢

右為末用生地黄汁或米飲調乳前服

治小兒有白虎病不可不察據統天曆遊年圖云白虎在太歲後一神也假如太歲在巳則白虎在辰太歲在申則白虎在未餘倣此推其神所值之方小兒不知禁忌出入居處稍有觸冒便能為病其狀身微熱有時小冷有時啼叫足指如數物手足不瘳寢是也集香散主之

降香 沉香 乳香 檀香 安息香 人參去蘆

茯神去皮 甘草炙 酸棗仁去殼

右以咀水煎麝香一字調不拘時服存滓房內燒

治赤竈丹從頭頂腫起搗生葱汁塗

治古竈丹從頭上紅腫起赤小豆鷄子清塗

鬼火丹從面胞起竈心土鷄子清擦

天火丹赤點從背起桑根白皮末羊膏塗

天竈丹從兩背赤腫黃色柳木灰水塗

水丹後兩脅虛腫生鈇磨水豬糞塗

胡火丹後臍下起黃腫栝榔末米醋塗

野火丹後兩足赤腫乳香末羊脂塗

烟火丹自兩足起有赤白點豬槽上土塗

明漏丹自腎上起黃腫屋漏處土羊脂塗

犀角消毒飲治小兒嬰孩風毒赤紫丹瘤壯熱狂躁

身丹毒

甘草二錢半牛旁子炒一兩荆芥穗五錢防風去蘆錢半

犀角一錢五分

右剉散用水煎不拘時服

○截風散治嬰孩小兒遊丹毒寒水石白芷

右為細末用醋或生葱汁塗

治小兒火丹後背上起者用慎入草和苦酒搗塗之

赤腫遊行於體五色無常至心即死用慎大草搗

汁付之

治小兒臙脂火丹用草麻子去皮研爛以磨刀水同

調於紅處周圍圈之候乾再隨處圈塗之

又以亂髮燒灰同伏龍肝末用香油調付或用紅藍花末醋調付

又以米粉炒令黑色研細唾和付之

又以牛膝甘草等分咬咀每用一兩水一盞煎至五

分去滓調伏龍肝末付之大効

客忤強頂欲死方衣中白魚十枚為傳乳頭令兒飲

入咽愈一方二枚毋手掩睛中吐下愈亦摩兒項

及脊強處

塗頭方竈中黄土蚯蚓糞等分持和水丸塗兒頭及

五心一雞子青和聖惠先以桂神湯浴

治中客忤體熱

白蕪骨 葛根各一方牛黃半兩

為細散溫水調半錢日三四服

犀角散治客忤 犀角 麥門冬焙 鈞藤 硃砂

牛黃 半分 麝豆 三六 細末不時金銀湯調半錢服

雄黃散治客忤 雄黃 麝魚 牛黃 等分研周晬兒

服一字刺雞冠血調灌早午各一服量兒

治小兒客忤口土青黃白沫水穀解離面色變異喘

急腹痛狀似驚癇旦夕不止視其口中懸癰左右

若有小腫核即以竹針刺破之或以指甲破急

取醋炭降真香皂莢燒薰又以竈中對鍋底焦土

蚯蚓糞各等分為末水調塗兒頭上及手足心上

即効

又用新銅鏡鼻燒令赤淬酒中令兒飲之如不飲含
灌之効

又以白殭蚕七枚為末酒調服効

客忤項強欲死者用麝香如豆大細研以乳汁調末

兒口中最良

龍膽丸治驚變癇

龍膽

龍齒

各三分

牛黃

一分

搗羅入麝二錢蜜丸如黍不時荊芥湯下五丸

保生方治驚 芭蕉汁時時呷一兩口甚者五升愈

治急慢驚風搐搦日數十發搖頭弄舌

蛇蛻一分牛黃一錢水一盞煎蛇蛻五分去滓調

牛黃頓服五歲以上加

天南星煎治慢驚風 天南星剉水二盞微火煎至

天麻各一兩白附子半兩羅入南星煎丸菴豆大三

五歲薄荷湯下一九日量服

治吐瀉或誤服冷藥脾虛生風成漫驚

大天南星幾一兩地坑深三寸許炭火五斤燒通

赤入好酒半盞後入南星炭火三條蓋定候微裂

出剉微炒熟為細末服半錢或一字量兒濃煎姜

防風湯食前調服

白朮麻黃散治慢驚將發

白朮炮 乾葛各一分 麻黃去節半兩

為末荆芥湯下半錢後忌衝風湏汗如水即愈

斗門方治未滿月兒驚似中風欲死 新汲水濃煎

硃砂塗五心神効

治生下便喜驚亦治客忤 剪父母指甲燒灰并花

水調一麻子大日三夜一

慢脾侵肺歌 慢脾多睡重重取吐瀉傳脾胃轉虛

逆冷四肢多重困虛涎脾伏盛難除生氣肺藏添

邪擁任喚千般氣不舒莫使日暝兼項軟十中難

保一人姓

活脾散 羊糞焙二十箇 丁香一百 胡椒五十粒

末半錢六年東日照處壁上煎湯調服

玉訣醒脾散 南星一枚去皮臍朱砂入 白朮一分

為末半錢麝香少許冬瓜子湯調服生葱涎丸如

栗鵬砂湯下十丸後與調味散

兒身微熱雙手捉拳按胃口撮縮有體似活猢猻因

受胎六個月母見弄猢猻吸其氣生又風邪相擊

致之不速治死

經驗方猫糞燒烟薰即解

治欬發癩極熟生葛汁飲

生葛根汁 竹瀝各一合牛黃杏仁和服半合量加

治心熱風癩發欬不定

天靈蓋 酥炙黃連一分粗散一錢水一小盞煎五

分溫服量加

治風癩癢身汗而頭獨無小炷炙頂上旋毛中三

壯訖白朮湯浴之菖蒲湯亦佳

白朮五兩 白米泔二升煮三沸遠寒溫洗頭及身

劉氏治風癩驚風

芭蕉自然汁時呷一兩口甚者服五升邵平仲云

加麝更佳蔣元明云風艸牙頰頰腫痛汁一碗煎

八分乘熱嗽腫處頰頰腫牙齦痛為風牙頰頰不

腫針牙也

兒驚怖大啼精神傷動氣脈不定因驚成癩豬齒燒

灰服半錢并治蛇咬蛇黃水煮服汁

治中風目眩羸瘦驚癩五勞手足無力白羊頭一枚

蒸極熟細切五味汁食或作鱠入五辛醬醋

治中風癱緩一日內 膽礬研如麵服一字溫醋湯

下吐涎漸輕

治兒中風牙關不開 天南星一個煨熟紙裹角剪

雞豆大一窠透氣鼻孔中牙關立開

治中風狐膽丸

浮萍草

採紫背者七月半雄狐膽二十

乾月收

浮萍末膽汁九芥子大服三九不時金銀薄荷湯

寶鑑歌三陽連口頰風傷口必啞諸筋風若中禁急

不能開雞屎白如大豆三枚末水飲之

又雀屎麻子大丸之飲下

聖惠雄雀屎粉丸薄荷湯下麻子大二九

治中風口噤不省欲死

瓜蒂七枚赤小豆二七粒

全蝎炒一枚細散煎飲調一錢服吐涎効

蟬殼散治中風口喎

蟬殼端午採南枝上者寒食麵等分

細研醱醋調糊如患左斜塗右邊右斜塗左邊口

正急洗去

苦萸瓢水絞汁和犬麥麵作餅炙正即止

治中風失音不語舌根強硬陳醬汁半合和少服

又秦白皮一升煎湯澄清浴差冷洗赤眼亦効

竹瀝葛根湯治壯熱發疹竹瀝升二生葛汁五

牛黃三黑豆許入月內兒服半合四五歲作四服

兒氣急喫乳不得身溫熱鼻塞此因顛末合母抱睡

鼻氣衝著顛故鼻塞葱涎膏塗顛後磨鎖心丸氣

通愈

貼顛葱涎膏 猪牙皂角 天南星 赤小豆

等分為末葱汁塗顛次塗鼻孔

無惜散治夾驚傷寒

紫背浮萍 一錢 犀角 半錢 鈞

藤鈞 三七個

為末半錢蜜水調服連進三服汗為度常服佳

治嗽 紫苑 六分 貝母 二分 款冬花 一分

搗散服如豆大著乳頭嚥之日三四毋勿食大鹹

醋聖惠清粥飲調一守

貝母散 貝母 麩 兩 個 為末一錢百沸湯點不

時服

五松年蜜瓜膏 菰蘆皮 蜜塗臍 為末一錢蜜調

成膏時抹兒口

杏仁丸主欬逆上氣 杏仁三升熟搗如膏蜜一升

為三分先內一分杏仁內搗令強更一分搗如膏

又內一分搗熟先食含嚥日三服不得過半分

瀉白散治肺盛氣急喘嗽 桑白皮 炒 黃地骨皮 焙

一兩 甘草 炒 半兩

細末一錢水中盞糯米百粒煎六分食後溫服

治傷冷氣喘涎多 菰蘆大者一個開蓋

阿膠 一分 沙糖 半兩 二味入蘇蘇內蓋著白紙

封飯甑蒸兩遍傾出隨兒大小冷服

聖惠杏仁煎治欬嗽散不出

杏仁 淋一錢 研瀘蜜 酥各一 鑊中重湯煮杏仁

汁減半入酥蜜又煮甘沸入貝母紫苑末各一分

甘草末半份更煎攪如錫收瓷器清粥飲調半錢

日三夜一量服止為度

又用貝母煨半兩牛黃一錢甘草炙一分

細羅溫水調半錢日三四加減服

治下寒小熱 細切柳枝煮汁浴若渴絞冬瓜汁服

良方解暴熱化涎涼膈清頭目龍膽丸

龍膽草 白礬各四 天南星 半夏水浸切

三五沸焙 為末麵糊丸如桐子大騰茶清下三

十九食後臨卧糊稀如濃漿和痰壅膈熱頭目昏

重服之頓清嶺南瘴毒纔覺意思昏悶速服便解

咽喉腫痛口舌生瘡凡上壅熱涎諸證悉宜兒尤

紀用經主兒百病消風涼肌解熱止煩不生瘡癩除

寒熱痰嗽赤目咽痛血痢渴躁張肌肉利心肺涼

而有補身體有疥膿潰赤腫悉療蜀脂飲

蜀脂黃著也炙生 補西即陽者大佳色黃白甘美

腫出原寧宜州者亦佳
折之不斷若綿為上

甘草 四分之上

末方寸七水一升煎三分三服温涼適性以歲加
減保子七聖至寶之一

治心藏風熱昏憤躁悶不下食梨湯粥

梨三枚粳米一合水二升煮梨汁一盞去滓投米

煮粥淡竹葉茵陳亦可煮粥

兒風熱肌瘦五心煩熱不長肌肉面黃痿瘦夜卧不
安特發虛汗或藏府泄瀉變痢四順散銀州柴胡

地骨皮 白桔梗各三錢半

焙末一錢加減水三分煎分半温服

陶隱居去煩熱驚氣 景天葉煎湯浴

治心藏積熱煩躁恍惚牛旁粥

粳米一合水一大盞煮粥臨熟投牛旁根汁一合
攪勻空腹温食

治心熱口氣温或合面睡及上窺咬牙皆心熱也導

赤散 生地 木通 甘草炙

等分為末三錢水一盞竹葉煎五分食後温服一

無甘草用黃芩

半夏丸 治脾熱乳食不下胃膈多涎 半夏薑湯分

滑去 皂角子仁半兩 羅薑汁丸如麻子不時

溫水下三九更量

生犀散治目淡紅心虛熱 生犀二錢地骨皮 赤

芍藥 柴胡根 乾葛各一兩 甘草炙半兩

粗末一二錢水一鍾煎七分食後溫服

胡連丸治骨熱身瘦 胡黃連 乾蟾酒浸去骨炙

麝一分

羅末蜜丸如棗豈大粥飲下五九日三四更量兒

張氏治骨熱體瘦面痿黃臍腹時痛胃膈滿悶不食

常服退黃長肌進食解虛勞行滯氣利關節豬肚

九莊氏多青蒿

南木香半兩宣黃連 生地黃 青橘皮 銀柴

胡 鼈甲童便炙各二兩

細末豬肚一個盛藥緊繫慢火煮搗極爛丸如麻

子大服二三十丸溫米飲下日二三食前後皆可

治骨蒸熱黃瘦虛汗欬嗽心怯日久不已硃砂飛

柴胡二兩

細末獷豬膽汁和濕入磁合炊飯甑上蒸至飯熟

出急丸如小豆空心臨卧桃仁烏梅湯冷下十九

莊氏治肌熱盜汗不思飲食柴胡飲

柴胡 青蒿 嫩桃柳枝各陰乾 甘草炙地骨皮

等分細剉二錢入烏梅一個小麥四十九粒水一
盞煎七分食後臨卧温服

石蓮散治熱渴

石蓮心

炒黃三枚

浮萍一分

水一鍾姜少許煎六分徐徐服

胡黃連散治諸渴及疳渴解諸熱

胡黃連

麥門

冬

乾葛

玄參

甘草

炙批杷葉

炙去毛

等分末

一錢水七分

姜一片

煎五分

入蜜三五滴

煎四分温服

治痘雙連丹

川黃連

胡黃連

各一兩

羅末黃瓜一枚去瓢留蓋入藥末蓋定麵裹慢火

燒焦去麵搗熟丸菘豆大服七至十粒温水下量

加減

治黃疸變黑疸

土瓜根

搗汁

一升

頓服

病從小便

出兒減

普救散治心痛

延胡索

二兩

香附子

一兩

細末

一

錢白湯點服

嬰孺治腹痛天絳不能哺乳茯苓丸

茯苓

黃連

各一兩

未蜜丸如大豆飲下量與

肘後兒腹暴病滿欲死

半夏

篩酒和服

黍米

五丸

日三

衛生賺氣丸療腹脹氣急

蘿蔔子半兩巴豆肉破木香一分細末蒸餅心

丸如菘豆橘湯下五丸

治胃虛去風醒脾 冬瓜子粒一天南星一錢

未蒸餅心丸菘豆大五七至十九溫漿水下

治氣癖 三稜汁作羹粥以米麵為之與乳母食兒

每日服一棗大作粥十歲內及新生無問痲熱無

辜疾癖皆理

治痞滿 三白草絞汁服令吐逆除胃膈熱亦主瘡

兒痞滿按此草初不白入夏葉端半白如粉農人

候之蔣田三葉草白便秀

安神道氣消酒食益脾胃老小皆宜

青皮一斤浸三日上白益花再淋煎西雪白

甘草炙六兩新舶上茴香四兩

甜水一斗鍋熬不住攪勿著底置密器水盡慢火

炒勿焦收青皮傷生冷果菜類嚼數片常服一兩

片尤宜老人

治風疴順肝氣進飲食蘆會丸 蘆會一錢白角小

草龍膽一兩羅不艸皂角三挺二升按汁瀝滓銀

器慢火熬膏入藥丸如菘豆服三五丸薄荷湯服

一字竹葉湯亦得忌毒物

治驚風疳 麝半字 辰砂一字 真阿魏半錢

末湯丸如麻子服三五丸金銀薄荷湯下須臾吐
瀉妙

治無辜疳肚脹或瀉痢冷熱不調漏蘆散 漏蘆末

一錢豬肝一兩鹽少許煮熟空心頓服粥飲下有一
楮根白皮丸服又雞肝不服

治一切疳久服令兒肥壯無疾千金丸 川棟子肉

等方豬膽汁和杵丸如麻子大量兒飲吞日

日常服三五丸張氏用硃砂青黛白定粉光墨蜜

陀僧名五色丸非時米飲下治疳熱下虫用臘月

乾豬膽膏丸如乾湯化肉湯下疳虫如髮稍遲便

化

殺疳令肥保真丸 大蝙蝠一個罐內煨存性入麝

少許粳米飯丸如黍湯下三丸

毛世顯疳藥 牛膽釀五靈脂研再用膽汁丸米飲

下五七丸

肺疳兒喫熱食及病後傷心肺便喘嗽醫不辨冷熱

以藥攻之變成黃腫漸覺昏沉杏仁散

杏仁二七個甘草 款冬花 錢各二 麝 胡黃連 各

半復湯洗七次末一字棗湯調下日二

丁左藏治疔定命散

白礬 綠礬 等分研一錢大麥麵五錢姜葱一

寸研爛麵和餅累藥文武火燒存性地坑出火毒

一宿研入鉛霜二錢一刻耳許揩牙上一二遍

治鼻口疔蝕生瘡黃瘦不食

石膽 蘆會 等分散疹蝕處肉化膿頻搽即生

肉亦不別損

治眼疔 羯羊肝 一具 决明子 一兩 羅决明 疹肝內

未泔兩碗煮汁盡不時食前後任意食

水鑑三歲兒多睡卧合面地是腦疔

黃葵花 菊花 釜下墨 消石 栢葉 等分

散吹鼻中永不合面卧鼻有惡物似泥泄數條此

殺人之本

治疔瘦久服消食和氣長肌橘連丸 陳橘皮 一兩

黃連 半兩米泔浸

為末研入麝半錢豬膽七個分藥入漿水煮臨熟

針微割破粟米粥九菘豆大米飲下二三斗丸

胡黃連散 治疔渴黃瘦壯熱不乳

胡黃連 旱蓮子 龍膽 青黛 烏梅肉 微炒

知母各半兩牛黃一分

搗羅棗瓢丸如棗豆甘草湯下五九日三意裁

胡黃連丸治疳熱渴乾瘦 胡黃連 犀角各一分

麝半錢羊子肝一具研蜜半合末和汁蜜等傅葉

湯調藥汁一匙加減

吉氏治疳瀉不食腹脹蘆會丸 丁香 肉豆蔻

木香各半兩麵裹慢火煨熟入蘆會一兩史君子

半兩末稀糊丸如黍米飲下一二十九

揚大鄴歌

疳痢形容瘦似柴或然如乳吐虫蛔沉沉無力多

饒睡叫哭連聲目不開丁香碎與生犀末調治三

焦恐可回

宮氣解疳熱疳痢殺虫水 研青黛服

外臺療疳痢曉夜無度 樗根濃汁粟米泔各一雞

子殺許灌亦可作丸

又煮益母草食心鑑葉煮粥食治疳痢痔疾

圖經地榆煮汁如飴服

孟詵樗白皮一握倉米五十粒葱白一握炙甘草一

寸豉二合水一升煮半升頓服意快葉亦可

蕪荑丸治疳痢 羊子肝一枚切片蕪荑末半兩摻

肝肉線纏米泔煮熟糯米飯丸如麻子粥飲下五
丸早晚各一服量與

治疳痢腹痛不止胡黃連丸 胡黃連半兩 沒藥
木香 各一分

羅末糯米飯丸如菽豆粥飲下五九日三四意裁

治疳氣腫滿 陳米半兩 巴豆廿粒 木香 二錢 陳橘皮

樟柳根焙各一分 蘿蔔子輕炒分 末半錢赤小豆湯

溫調下

藿香散治霍亂吐瀉 藿香 香薷各一分 白茯苓

研半錢姜湯下如人行五里再進三服

療熱霍亂諸藥不差

藿葉二兩糯米三合水三升先煮取一升入蜜少

許和服素姜白米為米飲亦効

治脾胃虛寒吐瀉等及冷痰 齊州半夏七兩 泡七

咬咀三錢水盞半姜十片煎八分食前溫熱服

三和散治吐利津液燥少

白茯苓 一兩 烏梅肉 炒乾 木瓜 等分細末一

錢水小盞煎五分溫時時服

治嘔吐心煩熱蘆根粥 生蘆根 二兩 粟米 一合水

二大盞煎 半去滓投米作粥姜蜜少許食

睡驚丸治熱化痰鎮心神治驚悸吐逆

半夏姜製乳香 犀角 等分末姜汁糊丸如棗

豆薄荷臨卧服七至十粒

王氏消疔毒令兒吃乳無毒有毒亦解

升麻半兩大麻子破一兩酒浸辰與妳子喫一錢

臨乳捏去此

劉氏兒水瀉下注 黃連 石蓮 等分末半錢水

瀉新汲水調白瀉粟米飲下

治赤白痢不止三骨散

狗骨羊骨鹿骨等分燒末粥飲調半錢不時更量

治赤白痢骨豆

地榆一斤水三升煮升半去滓煎如錫空腹服

療下鮮血梔子灰一錢水和服量加

治血痢腹痛 益母草半兩水一鍾煎五分不時

温服

治三歲患痢初膿少血多四日膿多血少朱子丸

生地黄汁五合羊腎脂一合煖三分服

治中結腸圍斷冷滯下赤白青色如魚腦脫肛腹痛

側柏麻子末各一升水五升煮三沸百日服三合

圖經側柏葉焙川黃連等分煎汁服治男女小兒大

腹下黑血茶脚色或膿血如淀又殺五藏蠱

治吐衄血白茅花一錢水一盞煎六分温服

又新綿燒灰一錢入少麝温酒調米飲亦可

解肌丸治外搏風邪內挾痰飲寒熱往來煩渴類赤

心忪減食熱在上焦欬嗽有血

防風 地骨皮 等分末燒沙糖丸食後茶蘇湯

服一丸

水鑑兒遺血呼胎風入多不識上厠犯之三歲上解

後有鮮血並服 梨一顆去心入琥珀少許并蜜

麵裹泥棗煨一伏時去皮研水調服

治尿血 苦棟子一兩 鬱金二枚 一炮細羅葱湯調

半錢意裁

治尿血 葵子 車前葉 甘草炙赤 朴硝各一分

粗羅一錢水小盞煎五分温服

又牛蒡根搗絞汁入蜜服半合日三四量服

吉氏地黄散 菉豆粉 滑石 各一兩 甘草炙半兩

兒心脾肝積熱如大人脾受病傳腎有三陰三陽

脉兒八歲下只有三陽脉故心脾肝受病不傳腎

傳小腸小腸風熱極故尿血新汲水服二錢忌熱

食酸鹹

桃葉湯治大腸不通臍腹妨悶

桃葉一握木通二兩燈心五大川朴一硝石一葱白七

剉醋漿水二大碗煎十餘沸去滓傾盆中稍溫坐

兒盆內帕裹滓熨臍下冷即出之後喫地黄稀粥

半盞

走馬煎治大便不通連腰滿悶氣急困重 羊膽一

蜜一合鹽花半兩煎如錫撚如筋長一寸內下部

治小便不通 茯苓 通草 冬葵子 車前子

等方水四合藥半兩煎合半作二服忌油

又車前草小麥各一升水二升煮升二合去滓煮粥

服日三四

兒尿作白米泔狀未必皆泔乃膈熱

越桃一枚即山桃燈心二十莖煎湯細呷即尿清

外臺療石淋 榆皮 瞿麥各六切水一升煮半升

分溫服

又桃膠半兩湯一盞化去滓分頻服

治小便赤澀 地黄汁二合牛蒡葉汁 蜜各一

和服一合滑石細末半錢更量

蒲黃散 治膀胱熱甚血淋莖中澀痛 蒲黃 冬

葵子 生地黄各半兩 羅末一錢水大盞煎六

分温服意裁

治腸風下血或成痔烏金散

槐花銀石炒紫色

荆芥穗半兩枳殼炒二錢細羅一錢米飲調免錢

治虫咬心痛欲絕

五靈脂二錢白礬枯半研一二錢水一盞煎五分

不時温服吐虫

治兒忽不省人事叫喚身向上踊素問謂虫厥蓋胃

寒則虫聚捨心

麝木香各一錢末分兩服煖酒下一服定再服醒

麝安虫去穢木香温胃

寶鑑兒未三歲食鷄肉變虫咬心痛

治蛔渴杏仁丸 杏仁膩粉各一分末唾丸空心米

飲棗任下二丸

麝香散治蛔咬心或吐清水 麝一錢草薺苦棟

根各一兩 細羅獾豬膽三枚汁和膠研末蒸莖

湯調半錢意裁

肘後徐王方兒腹痛大汗名寒疝

治疝車前子根苗乾末紅撲兒酒下一錢

牛蒡膏治陰腫 生牛蒡汁二大錢赤小豆半桂一

和膏塗

金匱救卒死吐利不知何病 馬糞一九絞汁灌無

濕者水煮乾者取汁

又擣韭汁灌鼻中劇者灌兩耳仲景灌口

黃礬散治聾耳膿出 黃礬 羊兩烏賊魚骨 黃連

各一分羅綿果棗核大塞耳中日三易

治蚰蜒入耳 炒胡麻搗萬袋盛傾耳枕之

又牛酪灌滿耳即出當半消若入腹中空心食酪一

二升即化黃水不盡更服又牛乳和麩燒餅乘熱

治百虫入耳 蜀椒一撮以半升酢調灌耳中行二

十步出

細辛膏治鼻塞 細辛 通草各一分辛夷仁分半

杏仁二分 羊臄豬脂各三合緩火煎膏絞滓取

米粒許頻內鼻中

菊花散治鼻塞多涕 甘菊 防風 前胡 各一兩

細辛 桂心各半兩 甘草一分羅半錢乳香少許

荆芥湯調乳後服

治鼽鼻有息肉不聞香臭 瓜蒂 細辛 酪半 散紫

裹豆大塞鼻須臾通

百益餅 治小兒寒熱驚風食積吐瀉肚脹頭疼痰

救痢疾 滑石一兩水寒石麴一兩巴豆五十粒

大半夏

二子粒 姜治

右為細末醋糊為丸如菉豆大一歲二歲者二九

三四歲者三九五六歲者四九漸姜湯下

治口瘡桑白汁生地黃汁赤蜜各半合和細傳

治口瘡不得飲乳 飲羊乳佳食療含殺羊生乳

治積年口瘡薔薇膏

薔薇根一升水七升煮三升去滓含之即吐少咽

亦佳

治鶯口重舌熱瘡 柘樹根水煎濃汁去滓更煎日

三四塗

治冬月唇乾折血 搗桃仁豬脂和傳

治唇瘡久不差 八月藍葉十斤絞汁洗三日差

外臺療唇腫口白瘡素木白皮汁塗

諸病無急于咽喉死人最急治之

白礬白殭蚕等分末生薑水調一錢兩服愈如牙

關禁用去皮已豆七粒擦油在四指大方紙上紅

箸斜卷去箸男左女右簪鼻中一半點火即時烟

透喉中牙關隨開白礬少許吹喉中壓下熱涎

奪命散治喉痺

朴硝 白礬 天南星 等分末半錢水一盞煎

二分大人加至三錢

治月內兒發丹 青藍汁五合竹瀝七合和量服

嬰孺丹發卒暴者不治治丹極驗無如水中藥水藻

爛擣厚傳三分乾即易

養生土廼丹發兩手指作紅絲漸行至關節便殺人

並治惡瘡虫咬

大赤足蜈蚣二條 白礬 膽礬各一麝 細末一

刺耳許針撥破瘡口安藥醋麵糊紙貼日一換膿

血盡好肉生貼膏藥

浴棗根湯治五色丹 棗根四兩 丹參三兩 菊花兩

細剉二兩水五升煎三升避風浴

嬰孺丹發從背或走兩足赤如火

景天草十兩 真珠一分 杵為泥封

丹發腹下至卵者不治 麻黃炒升麻二各硝石四分

末并華水服方寸七日三一加大大黃半分

葉氏丹發從背起遍身如細纈名茱萸火丹一宿成

瘡 赤小豆末粉末成瘡者雞子白調傳

天雷丹從頭項起

陰乾葱末拌脂塗又竈下土雞子白調塗

丹從腹背遍身起 樺皮白末和生油調塗又赤石

脂羊脂調塗

又虎脂二兩 黃丹一兩 研膏塗

丹發如灼在脇下正赤初從額起而長上痛是螢火

丹顧也赤小豆合硝石半兩寒水石一分

細羅冷水調十錢日三量服

竈火丹由兒未滿百日犯行路竈君丹從髀間起伏

龍肝末雞子白和傳日三

丹發膝上從兩股起及臍間走入陰頭名尿竈火丹

從踝起亦用屋角茅雞子白調塗

千金水二升桑根二升煮汁浴又李根灰田中流

水和傳 三根湯 桑白皮根 李干根

等分細剉三匙水兩碗煎一碗避風淋患處

治赤遊腫或如丹煩渴渾身赤溜壯熱

菘豆粉 鉛白霜 細研芸薹汁調塗

取鈿霜法將鉛石上打薄握地坑可鉛片大以杵

搗坑實滿坑著醋鉛蓋經宿取霜如珠如煩渴服

解熱飲子

麥門冬 小蘆根 竹葉 乾葛 木漏蘆 犀

角 等分半兩水四合煎一合不時徐服

治走馬胎赤腫入心腹不救 生槐葉一握生并羹

去皮二味 赤小豆 各半 和塗患處

治瘰癧不消麝香散 麝一分 鴿糞一合 炒

細研温酒調半錢日二量服

治瘰癧結硬內消 膩粉半兩 雞子白三枚 調文武

火炒急攪著銚色赤焦入硃砂半兩研如麵粥飲

調半錢五更服腹痛便瀉下如棗核未差隔日再服

治瘰癧結塊疼痛腫穿潰膿水不絕

薄荷 陰乾 皂莢 十挺長尺二不艸者去黑皮酥

碎酒一斗浸三宿曝更浸三宿酒盡為度焙羅燒

飯丸如梧桐子食前黃耆湯下二十九兒減

蓬莪茂散消項氣磨宿滯積氣

羅豬廐一枚針穿麻油燈焰燒熟破開入藥末一

字含嚙津忌油鹽雞魚日三稍退徐服半月除根

治魚骨鯁

鷓鴣屎服方寸匕又橘皮湯沙糖魚網灰 一覆首

虎狼屎灰豬膏和鷄子可選吞

治食中吞髮繞喉 亂髮灰酒調一錢

治蛇蝎螫 小蒜汁服滓傳又葵汁服

聖惠白礬甘草等分羅如蛇咬心神煩躁眼前暗黑

新汲水調半錢如腫赤白礬鹽漿水高荳根等分

煎三五沸淋洗腫消如未及合藥用耳塞入交處
釅醋滴少許

治蝎毒 蝎雄者咬痛止一處雌者痛牽諸處雄者
井底泥塗雌者屋瓦溝下泥傅若值無兩用新汲
水屋上淋下取泥齒中殘餘豬脂射罔礪砂水和
並可傅若著手足冷水漬水微煖則易餘處冷水
浸故帛搦生烏頭末津和傅

治狂犬咬

生姜汁韭任傅

外臺治已差

千金翼葛

根末或飲其汁或葛灰小服方寸七

治吞錢

艾蒿五兩水五升煮一升頓服木炭末酒

服方寸七服蜜二升

治吞金銀釵銀指環

白糖漸食多益佳雁毛鷲毛

灰飲服

治誤吞錢物在喉

南竹根灰湯調下若齒骨灰磨

刀水調服一錢

玉錯散

治一切骨鯁或竹木簽刺喉中

蓖麻仁一兩研膏旋入寒水石末乾成散取一捻

致舌根深處冷水嚥鯁物自不見

治鯁若吞錢

半夏二分白欬一分末酒姜汁服方

寸七

治誤吞錢神應丸

硃砂 三錢 大半夏 三枚漿水煎 石腦油 和上 二味稠稀

研丸如菟豆大空心食前酒吞三九日三物隨大便下

補遺門

治喉生乳鷲 用薄綿紙卷中間約徑二分兩頭直

通長一尺其頭攢香油點火吹滅含於好人口中使火烟充入喉內如此用卷七個燒含七次其瘡成濃者即潰未成濃者即消其效如神

牙痛方 槐子黑豆等分煎六分漱口

春歸山景

川五倍 用全體透明者劈破去蛙灰敲碎粒粒

如米大小者篩出另炒

炒五倍法 用潔淨不曾用油小銅鍋一個用磚四

塊砌風爐以鍋置火上入水滾沸去水待熱量用

倍二兩入鍋炒至白烟濃暖略轉青烟則倍已黑

軟如青飯一團此便是火候足時先時用青布方

尺水洗扭乾攤地上將前藥趁熱傾布上扭成團

脚踏成餅候冷取出置地上去火氣量用其餅劈

開褐色者佳墨黑色則無用矣量髮鬚多寡用

制紅銅花法

用銅花不用銅末碾下銅末無効敲成片入猛火中燒透紅淬米醋中其花自落百燒百淬其花積多其醋漸乾却用綿紙攤熱灰上以醋傾紙上滲乾取銅花乾研細量用

硃砂透明潔白者佳不必藥制入新磁罐明礬透明潔白者佳不必枯研為末

白芨切片炒令黃色研為末此味只用以調和諸藥便粘蘸着鬚髮無益於黑

以上五味俱為細末愈細愈佳以下三末煎湯用

絕好細茶粗片無効

榴皮酸榴皮尤佳須陰乾黃色腐黑者不可用

訶子去核用皮

和藥方

每五倍末一兩銅花三錢硃五分礬末七分芩末四分方數明白和入藥研研極細倍黑則無力銅多則鬚髮黃礬多則不黑硃多則爛肉芩多則損鬚髮分毫增減不得硃冷則不傷皮肉

煎湯法

每茶一兩榴皮三錢訶皮五分泉水二大碗文武

火煎至半碗黑黃色為佳若以茶四兩榴皮一兩
二錢訶皮二錢水十甌煎至二甌去渣入鉛罐內
聽用愈久愈好又則澄徹如墨水矣

頓藥法

以鉛甌一隻調和藥物量入茶滴以不稠不稀為
度用綿紙封甌入湯鍋中頓令紙濕而將乾聞香
藥面生青水四邊水氣盡收作沙糖香即取起候
溫用

染髮法

先將鬚髮用溫湯肥皂洗極淨揩乾復用溫湯洗
去肥皂餘氣揩極乾皮肉不潤然後將藥用掠子
細細搽上務令無處不到候其盡乾夜分後略略
爬動自落落後溫湯肥皂洗淨若根下皮肉有黑
色用綿醮油擦之更淨淨則復洗乾後少用枳椇
油潤之柔且佳

接骨方

遇骨斷碎時急將鷄一隻約重一斤者去其嘴并
爪量以五加皮和之置于椿臼內連骨椿爛罇封
患處須記得今日此時封明日此時即取下不然
則骨長舊日也七日之內仍以五加皮浸酒服封

前亦尤宜此酒醉

多不

衆妙仙万卷之四終

