


聖王濟總錄

百廿

庫文閣内	
三	漢
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (126)
函號	300 212



大學東
校與箱
局之印

大德重校聖濟總錄

卷第一百二十六

瘰癧門

瘰癧結核

風毒氣毒熱毒瘰癧

瘰癧寒熱

瘰癧有膿

瘰癧久不差

日本圖書印

總錄一百二十六

瘰癧入不瘰

瘰癧寒痰

瘰癧濕熱

瘰癧門

大醫正統聖方新編卷之二十六

瘰癧統論

論曰瘰癧者其本多因恚怒氣逆憂思恐懼或飲食有
 蟲鼠餘毒或風熱邪氣客於肌肉隨虛處停結或在頸
 項或在胸腋累累相連是也詳攷方論有風毒氣毒熱
 毒之異有寒熱結核膿潰之殊然瘰癧又謂之鼠瘦者
 蓋甲乙經云寒熱瘰癧皆鼠瘦寒熱之氣所生是也瘰
 癧又通謂之九瘦者蓋孫思邈云九瘦之為病皆寒熱
 瘰癧在於頸腋是也其治法大要古人皆曰浮於脉中
 未著肌肉而外為膿血者急刺去之已潰者治如癰法
 內服五香連翹湯以蕩滌之外以火鍼攻結核中及飲

食動作悉能忌慎則鮮不差者

未瘰癧結核

論曰瘰癧結核者由風熱毒氣蘊積肝經攻注筋脉毒氣鬱而不散故項腋之間瘰癧結聚成核或如梅棗核狀累累相連其證令人乍寒乍熱頭項強痛心神煩躁蓋毒氣與血氣相搏則榮衛不和使之然也
治男女長幼瘰癧結核在項腋下項強背痛連翹湯方

連翹

玄參

木香

昆布

洗去鹹焙

枳殼

去瓤炒

犀角

鎊各壹兩半

芫胡

去苗

甘草

炙

木通

剉

芍藥

黃芩

去黑心

沉香

剉

當歸

切焙

升麻

各壹兩

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水二盞入生薑一棗大拍碎柳枝二寸長一握細剉煎至一盞去滓溫服空心日午夜臥各一服

治瘰癧腫毒結成惡核三黃丸方

大黃

剉炒

當歸

切焙各壹兩

梔子

人壹分

芫胡

去苗參分

黃連

須去

黃芩

去黑心

赤茯苓

去黑皮

桂

去麤皮

乾薑

炮

芍藥

各半兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服十九空心溫酒下日三取微利更以意增減

治初患癰瘰項邊磊磊如石皮肉寒熱赤腫烏犀湯方

犀角 鎊

惡實 炒各參兩

沉香 參分

麝香 研半錢

丁香 兩半

玄參 參分

大黃 炒

木通 剉

射干

連翹 各壹兩

右一十味麝搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心溫服至晚再服利下爲度

治惡核犀角丸方

犀角 鎊

木香 各壹分

硃砂 研水飛壹錢

白茯苓 去黑皮半兩

皂莢 去皮子酥炙

乾白薄荷

大黃 剉炒各壹兩

原蠶蛾

何首烏

天麻 各貳兩

右一十味搗羅爲細末用生羊肉精者細切研成膏和丸如黍米大每服七丸茶清下不拘時

治癰瘰毒腫沉香湯方

沉香 剉

丁香

木香

麝香 研各壹分

連翹

黃芩 去黑心各半兩

犀角 鎊壹兩半

升麻 兩壹

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服空心日午夜臥各一服

治惡核腫痛連翹散方

前無連翹 何首烏朱泚浸壹宿焙 乾白薄荷各壹兩

麝香研半錢 升麻不切 惡實炒

白茯苓去黑皮 蛇蛻皮酒浸炙各半兩

右八味搗羅為細散每服一錢匕食前溫酒調下日

三

治氣癥結核未破者四香飲方

丁香 木香 沉香剉

乳香

青橘皮湯浸去白焙各壹兩

陳橘皮湯浸去白焙半兩

枳實去瓢麩炒壹分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎三四沸去滓

食後溫服日三

治癰癥肝中有根桑白皮湯方

桑根白皮剉

消石研如粉各貳兩

紫葛

芍藥各參分

犀角鎊

虎杖各壹分

右六味將前五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓入消石半錢匕打勻空心晚後溫服利

根本似筋膜蝦蟆衣之類

治丈夫婦人瘰癧結實在項上腋下磊磊如彈丸相連
犀角散方

犀角鎊 人參 鹿角鎊

赤茯苓男用白女用赤各去黑皮 白欬各壹分

斑猫參拾枚糯米炒熟去米 糯米壹合

右七味搗羅為細散合研令勻看大小斟酌與服每
服二十以上二錢七十歲一錢匕並以蜜二匙水二
盞同煎至一盞先調滑石末二錢匕後調此散子夜
臥時服至明小便內取下惡物三五日一服取差為
度

治項上瘰癧如棗李核者先服紫威散方

紫威凌霄花是也 海藻洗去鹹焙 瞿麥穗

牡蠣煨研成粉左顧者真 甘草炙各壹兩

右五味搗羅為細散每服一錢半匕食後白湯調下
日二

治瘰癧腫痛成瘡神妙散方

牽牛子炒半生半熟 青橘皮湯浸去白焙 梔子人

地骨皮 玄參

右五味等分搗羅為細散每服二錢匕空心糯米飲
調下次日服後生犀丸

消毒化結聚生犀丸方

犀角錢半

龍腦

麝香研各半

紅娘子貳拾枚

斑貓貳拾壹枚去頭翅足同紅娘子着豆麪炒焦

右五味搗羅為細末用豆麪糊丸如菉豆大每服一

丸空心日午夜臥臘茶放溫下服至十日加至二丸

治風熱毒氣項下結核及欲作癰疽瘡癤發背等凝冰

散方

菉豆粉

乳香研各壹兩

右二味合研為散實人分作四服虛人分作八服食

後米飲調下就有核處一邊臥盡劑必差大消腫痛

治瘰癧腫痛不問大人小兒皆能療之不二散方

牡蠣煨赤壹兩

蝟皮壹枚生剉焙乾

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

治瘰癧一切結核大效丸方

斑貓壹枚

黑豆柒粒生芽者

又右二味同研為丸如菉豆大每服五丸茶清下小兒

一丸

治瘰癧滿項不破及結核腫痛者皂子丸方

不艸皂子參伍粒

右一味用酒一升半化礪砂一兩同浸七日以慢火

熬酒盡為度每服三粒臨臥含化半月必差
治瘰癧腫結內消方

海藻斤壹

右一味用酒五升浸數日食後少少飲酒

又方

蝸牛殼不拘

右一味搗為細散每服二錢匕空心米飲調下日再

至四十九日自消

又方

檲白皮切貳合

右一味以水四盞煎至一盞去滓頓服當吐惡物

治惡肉惡核瘰癧初腫丹參膏方

丹參各貳 白及各貳 升麻

蒟蒻根各壹兩半 獨活去蘆 防已

連翹 白欬 玄參

杏仁去皮尖雙

右一十味細切以生地黄汁一升淹浸一宿入鐺內

微煎十沸入豬膏四升微煎一炊飯久膏成去滓用

摩病處日二三度

治瘰癧息肉結鞭白欬膏方

白欵

莽草

玄參

木香

芍藥

大黃生用各

右六味搗羅為末旋取以醋和如膏塗帛上貼之乾

極即易

治風熱結鞭腫赤疼痛及腮頰下忽結成核消毒塗方

大黃貳

景天伍兩護火

右二味同搗爛塗於患處即再傳

治癰癧結聚不散鞭如石大蒜膏方

大蒜參枚搗爛

麝香研半錢匕

右三味和勻傳於帛上貼之一日二易旋搗最好

治癰癧發腫及結惡核皆不可鍼及癰未潰方

莽草壹兩

右一味搗末和雞子白塗貼之一日二易

治癰癧已成漏瘡歲久不愈千治千愈紫紅散方

信砒壹錢

礬石貳錢

鉛丹參錢

右三味用瓷罐子先入砒次入礬次入鉛丹勻蓋之

鹽泥固濟炭火煨烟盡至紫色取出以紙襯於地上

一時辰出火毒研細先以溫水淨洗瘡挹乾取藥少

許以生蜜調塗日夜五六次塗至五七日瘡漸斂紫

黑色即用桃紅散傳之

桃紅散方

血竭

須真好者如無以
深色炆脂代之

右一味為細末以自津唾調日夜頻塗候瘡成靨即

用浴毒湯洗之

浴毒湯方

黃蘗

去麤皮

黃連

去須

甘草

剉

黃芩

去黑心各壹兩

柏枝

壹把截如
筭子長

大豆

壹合

右六味麤擣篩每用三四匙以水二升煎至一升乘

熱淋洗日三四次候洗下靨子即用平肌散傅之

平肌散方

黃狗頭骨

燒灰

鮫鯉甲

燒灰各壹錢

亂髮

壹團指
大燒灰

右三味研勻如瘡口已乾用自津唾調濕傅之日三

四次瘡即平愈

治癰癰在項上結成顆塊及觸處但有結疑似作癰癰

急灸法

獨頭蒜

壹顆

右一味截兩頭去心作艾炷大與蒜稱貼癰子灸之

勿令破肉但取氣而已覺熱勿畏每七壯易蒜可至

七易取消

治癰癰白蠶散方

白僵蠶

兩壹

麒麟竭

沒藥

各半兩

右三味搗研為散每服一錢半匕麝香溫酒調下

治瘰癧已破未破蝸牛丸方

蝸牛

半斤

雞蘇

半斤

右二味同研極細水浸宿蒸餅丸如梧桐子大每服

十五丸瘡未破漿水下已破薄荷湯下日三

治瘰癧瘡口膿血不止罐灰散方

糞堆裏破瓦罐耳

右一物淨洗於竈心掘坑安在坑中燒三日令捻得

碎細研乾摻瘡上

治瘰癧蛇犀散方

白花蛇肉

酒浸焙肆兩

犀角

鎊壹兩

青橘皮

去白焙半兩

牽牛子

壹兩半內壹兩炒熟半兩生用

右四味搗羅為散每服二錢匕別入膩粉二錢匕糯

米飲調下五更初服至午前取下惡物如取未盡經

半月後再服未成瘡者內消成瘡者瘡自乾合

治五種瘰癧牡蠣散方

牡蠣

煨研

連翹

瓦上炒搗各壹兩

右二味為細散每服一錢匕臨臥無灰酒調下差後

更服一兩永不發

治瘰癧結核犀角丸方

犀角

屑

吳藍

黃芩

去黑心

山梔子

巴豆

去心皮炒研出油各半兩

升麻

黃耆

剉

防風

去

甘草

炙剉各參分

大黃

生剉壹兩半

連珠草

壹兩

右十一味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三丸米飲下未利加至六七丸取利為度

治瘰癧初結累累如梅李核日漸不消則破壞頸腋內

消丸方

人參

玄參

丹參

苦參

何首烏

各壹兩並細剉

右五味搗羅為末別用皂莢一十挺以麻繩接續穿

留索子頭盛在餅內掘地埋餅子留口用童子小便

浸三七日如值雨下即蓋之勿令著水候日足取出

以水淋洗掛陰處令乾用薄荷四兩酒一升童子小

便半升共前皂莢同浸一宿取出煎五七沸傾出以

手採取汁細布絞去滓入藥末一分在汁內用文武

火熬成膏將二分末入龍腦麝香各半錢同研勻丸

如梧桐子大每服二十九空心日午臨臥時薄荷茶

下

風毒氣毒熱毒瘰癧

論曰瘰癧之候大槩有三一日風毒得之於風二日氣毒得之於氣三日熱毒得之於熱蓋風熱氣蘊蓄經脉否澁皆能結於頭項胸腋成瘰癧鞭核狀如連珠腫潰生瘡不瘳則變久瘰癧之證令人寒熱羸瘦

治熱風毒氣結為瘰癧惡寒壯熱勞即更甚將成瘦木

香朮方

木香各壹兩犀角鎊

連翹各壹兩白欬壹兩

海藻洗去鹹味焙乾

昆布洗去鹹味焙乾

烏蛇酒浸壹宿去皮骨炙

射干

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服十丸空心溫酒下至夜再服

治熱毒氣毒風毒結成瘰癧連翹丸方

連翹兩壹

芍藥

玄參

大黃剉炒

犀角鎊

防已

羌活去蘆頭

木香

山梔子人兩各壹

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大食後米飲下

二十九日再服

治風熱氣毒結成瘰癧木通丸方

木通剉

車前子酒浸

大黃剉

連翹去

玄參

知母各壹兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服十九丸臘茶

下

治項下并腋下熱毒氣毒結成瘰癧斑貓散方

斑貓去頭翅足糯米炒黃色半兩

炒豆黃末

炒糯米末各壹兩甘草壹中指節大半生半炙

膩粉壹分

右五味搗羅為散一處重研勻空心米飲調下二錢匕當吐瀉下惡物即煮糯米粥補之如吐不止以炒

豆黃末煎湯止之如吐甚不止磨少許雄黃麝香止之將息後再服取吐瀉惡物盡為度

治風毒久不解搏於筋脉因成瘰癧結核生頸腋下秦

苳湯方

秦苳去苗

連翹

青橘皮去白

檳榔煨各半兩

犀角鎊參分

右五味麝搗篩每服三錢匕水一盞入木通少許同

煎至七分去滓溫服

治風毒氣毒熱毒瘰癧不破者大黃散方

大黃濕紙裏煨微焦色甘草炮

白僵蠶去土焙乾各壹兩

檳榔 煨壹分

右四味搗羅為散每服二錢匕用蜜熟水調下日可三五服取下惡物如魚腦即愈

治氣癰疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者雞鳴

散方

牽牛子末 兩壹

胡粉 錢壹

大黃 蒸末貳錢

朴消 鍊成粉參錢

右四味搗羅為散雞鳴時以井華水調服三錢匕以利為度不利再服

治風熱氣毒癩癰胡粉丸方

胡粉 錢壹

雄黃 研壹錢

雌黃 研壹錢

右三味研令勻用烏雞子三枚取白調藥入淨瓷盞內於飯上炊令鞭軟得所丸如梧桐子大每服三十丸至四十九丸溫熱水下轉下惡物為驗

治風熱毒氣結癩癰內消羌活散方

羌活

去蘆頭壹兩半

白僵蠶 炙壹兩

右二味搗羅為散每日空心以蜜酒調下四錢匕夜再服

治風毒氣毒不順結聚成癰或破或不破內消膏方

蝟皮 生剉壹枚

右一味用瓷合盛泥固濟木炭燒為灰酒調頓服之

治風毒氣毒癩癧白梅丸方直者不拘多少炒令黃色

右一味搗羅為末用陳白梅肉搗和為丸梧桐子大

每服三十丸熟水下空心午後各一

治熱毒氣毒結為癩癧蜂房膏方

露蜂房炙 蛇蛻皮炙 玄參

黃耆剉 蛇牀子各參 杏仁盪兩

亂髮雞子許大 鉛丹兩 三味東蠟兩

右九味先將前五味剉細綿裹用酒少許浸一宿勿

令酒多用油半斤內杏人亂髮煎十五沸待髮消盡

即用綿濾更下錯中然後下鉛丹蠟又煎五六沸即

瀉出於瓷器中盛取貼瘡上一日換

治熱毒風毒氣毒癩癧內消赤豆散方

赤小豆炒 黃藥子 消石研如粉

大黃生各 木鼈子參枚 豬牙皂莢伍挺

右六味搗羅為散以不語津調塗之乾即易

癩癧寒熱

論曰甲乙經論癩癧寒熱皆鼠瘦寒熱之毒氣留於脉
而不去上攻於頸腋之間風熱毒氣與氣血相搏則榮

衛不和故瘰癧而發寒熱也

治瘰癧寒熱射干連翹湯方

射干

連翹

玄參

赤芍藥

木香

升麻

山梔子人

前胡

當歸

甘草

大黃

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓入芒消少許食後溫服日再服

治寒熱瘰癧會可散方

會青

附子

礬石

荏子各半兩

當歸焙切

狸骨酥炙

甘草炙剉各貳兩

細辛去苗葉

乾薑炮

露蜂房炙各壹兩

斑猫同羌青炒

茺青各伍枚去頭翅足用糯米

炒去米不用

右一十二味搗研為散每服一錢匕空心溫酒調下

治療瘰癧初結成寒熱漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

連翹

木通剉

桂去麤皮

犀角屑

黃芩去黑心

茈胡去苗

玄參

大黃剉炒

知母焙各壹兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓下朴消半錢匕攪動空心臨臥溫服以快利為度
 治毒氣攻肌肉腫痛結脉寒熱如瘰癧急者數日殺人
 大五香湯方

木香

雞舌香

沉香剉

乳香各壹兩

藿香葉

犀角屑各參分

升麻壹兩

吳茱萸湯浸焙乾炒半兩

桂去麤皮

麻黃節去

甘草炙剉

細辛去苗葉各參分

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服空心近晚各一服若惡寒加附子二枚
 炮裂去皮臍同煎餘滓即傳腫上
 治瘰癧乍寒乍熱知母湯方

知母焙

連翹

木通剉

桂去麤皮

羌胡去苗

玄參

漏蘆去頭蘆

大黃炒剉

犀角屑

右九味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓下朴消少許攪動空心溫服以利為度
 治寒熱瘰癧土瓜根散方

土瓜根去

連翹

龍膽

黃連須去

苦參

栝樓實微焙

大黃微炒

芍藥

木香

右九味等分搗羅為散食後臨臥以溫酒調下一錢

七日三服

治瘰癧寒熱結核在頸腋之下堅痛連翹丸方

連翹

玄參

木香

升麻各壹兩半

大黃蒸半兩

昆布洗去鹹焙

大麻子微炒別搗研各貳兩

枳殼去瓢麩炒壹兩半

右八味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸食前米飲下加至二十九丸

治瘰癧連連大小寒熱煩悶木香消毒湯方

木香

大黃生各半兩

竹葉乾者壹分

連翹壹兩

獨活去蘆頭半兩

梔子人壹分

右六味蠶檮篩每服三錢匕水酒童子小便共一盞

煎至七分去滓溫服

治瘰癧寒熱先從頸腋諸處起者玄參酒方

玄參參斤細剉

磁石參斤燒令赤醋淬七遍細研水飛

右二味以生絹袋盛酒三斗浸六七日每服一盞空

心臨臥溫服

治寒熱瘰癧方

鼠頭壹枚 酥炙

右一味搗羅為散每服一錢匕空心米飲調下

又方

白僵蠶炒壹兩

右一味搗羅為散水調服一錢匕日再服

治癩癧惡寒壯熱久不差成瘦射干丸方

射干

昆布洗焙

海藻各壹兩 洗焙

木香

黃芩去黑心

犀角屑各參分

芍藥

連翹

白欬各半兩

大黃壹兩半

玄參壹兩壹分

烏蛇肉酒浸去皮 骨炙貳兩

半

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

四十九丸煎皂莢子湯下食後服日三

癩癧有膿

論曰內經謂營氣不從逆於肉理乃生癰腫蓋營氣逆則血鬱血鬱則熱聚而為膿癩癧之疾亦猶是也熱氣內結搏聚在肝肝主筋肝藏血久不差故熱聚於血血腐而為膿在於頸腋腫結相連有如梅李實者是也治癩癧結核於頸腋下外生癰膿連翹丸方

連翹

玄參剉

木香

枳殼去心炒

昆布洗去鹹焙 大黃剉微炒

大麻子人兩熱各貳兩別搗

升麻壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜和為丸如梧桐子大食前以棗湯或米飲下二十九亦可作散空心米飲調服

治瘰癧熱毒風結成腫疼及破出膿水者散腫毒紫參丸方

紫參

連翹

丹參

苦參

滑石各壹兩

輕粉

麝香

各壹分

右七味搗羅為末又用玄參半斤杵碎以好酒二升

浸三日却揉取汁去滓又以不艸皂莢子三百枚炮

熱杵末入前玄參酒內同熬成膏和藥末勻為丸如

小豆大每服一丸煎黃耆湯下每日加一丸直候加

到患人同歲便住即愈

治諸種瘰癧不限年久日近或已破或未膿及諸癰腫

瘡癰皆治惡實丸方

惡實

肆兩

麝香兩

牽牛子

壹兩半壹兩半

炒

漏蘆

去蘆頭剉貳兩

大黃

煨

薄荷葉

各貳兩

右六味搗羅為末用羊脛骨髓打破煎濃汁作大麥

麩糊為丸如梧桐子大每服十五丸日午臨臥嚼薄荷以湯下

治瘰癧成瘡有膿貼藥後服此地膽丸方

地膽去頭足翅糯米炒令米黃斑貓去頭足翅糯米炒令米黃

牛黃別研各壹分芫青拾枚糯米炒令米黃去頭翅足

生大豆黃參拾八日右五味搗羅四味為末入牛黃再研勻鍊蜜為丸如梧桐子大每服一丸空心茶下後更服尋常補益丸

治瘰癧腫核結韃不消及膿汁傍穿久不差者水紅花散木人前

水紅花不以多少壹半炒用壹半牛用右一味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至七分去滓溫服食後臨臥日三

飲方

白及 白欬 當歸

桂去麤皮各壹分附子壹枚半兩者去皮臍乳香纏兩半東南槐枝 柳枝各貳條各長柒寸到細 白及 白欬 當歸

去惡肉好肉自生神應膏方

鉛丹參兩 巴豆參分去皮研 清油陸兩

右一十一味並各剉細於石器內先下油與白及等煎令焦黑以綿濾去滓入鉛片巴豆慢火熬藥成膏先以水一碗投藥入水其藥直入水中如珠為度後刮下入瓷器內收貯每用少許量核大小塗貼

治癰癰已破膿血不止紫金膏方

柳枝參拾條各長肆寸 槐枝參拾條各長肆寸 麻黃陸兩青者

乳香別研 沒藥研 松脂各壹分

右六味擣羅四味為末先熬油令沸入槐柳枝煎令黑色去枝不用次入麻黃等熬成膏每用油紙攤塗之

治癰癰貼瘡蜂房散方

露蜂房蜜塗文火炙令青色半兩 羊屎肆拾枚燒白色

皂莢壹挺燒煙盡

右三味同研和勻洗乾瘡口用此藥貼之後可服血竭散

治癰癰已破膿水不止者血竭散方

血竭炒研壹分 大棗貳拾枚青州者燒為灰

生乾地黄焙半兩別杵為末

右三味都細研如粉以津唾調貼瘡上

治癰癰方破比合散方

檳榔不以多少

右一味端正者為細末先以溫漿洗瘡以軟帛拭乾油調塗日三上用時看多少

治瘰癧毒氣鬱結成膿發泄不止去毒散方

巴豆壹兩去殼 薄荷末貳兩 皂莢末貳兩

麝香研壹錢 鯽魚壹頭去腸肚

右五味研勻四味入在魚腹內用泥固濟以炭火五七斤燒存性候冷取出細研每服一錢匕用荆芥臘茶調下日三服

瘰癧久不差

論曰風熱毒氣蘊積府藏攻於筋膜則結為瘰癧其毒氣所感深者則衝發肌肉而久不差此疾尤忌憂思恚怒氣血勞傷飲食寒冷

治瘰癧久不差六神散方

皂莢刺 薄荷 昆布洗去鱗

海藻洗去鹹 連翹各半兩 皂莢子伍拾枚燒灰

右六味搗羅為細散每服三錢匕茶調下食後臨臥服

治風熱毒瘰癧久不差惡寒壯熱勞動轉甚漸成瘦者射干丸方

射干

昆布洗去鹹

海藻洗去鹹

木香

黃芩去黑心

犀角屑各

芍藥

連翹

白欬各半

大黃剉

烏蛇酒浸去皮骨各貳兩 玄參壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大食後溫酒下十五丸日三夜一

治療癰久不差或已破膿血甚者丁香丸方

丁香母生半兩

蒼耳苗炒壹兩

奇箱子生

皂子人各半兩

甜葶藶生半炒半壹兩 厚朴去麤皮薑汁炙壹兩

丹砂研半兩壹分

衣壹分

右七味搗研為末棗肉為丸如棗豆大丹砂為衣每服十丸至十五丸粟米飲下日三服

治療癰久不差將欲破者漏蘆湯方

漏蘆洗焙半兩

海藻洗焙半兩

連翹壹兩

沉香剉半兩

山梔子人壹分

玄參

丹參各壹兩

右七味搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治療癰久不差何首烏丸方

何首烏去黑皮壹兩

黃耆細剉半兩

皂莢去皮子

薄荷各壹兩

蛇蛻皮燒灰半兩

龍腦研壹錢

麝香研壹錢

右七味搗研為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服十丸薄荷茶下不計時候

治療癩久不差犀角散方

犀角鎊屑

燕蕒生

斑貓炒各壹兩

牽牛子炒

黑豆生各壹分

麝香研

龍腦研各壹錢

右七味除龍腦麝香外搗羅為細散再入研藥拌勻每服一錢匕熱酒調下空心服服藥後再飲酒一盞

投之下惡物為效

治療癩久不差烏雞丸方

烏雞卵壹枚

錦貝子兩半

右二味將錦貝子入在鷄卵內用濕紙裹頭七重再用塗固濟火煨過後入地坑內出火毒一宿取出研細入大黃末半兩麝香一錢同研細鍊蜜丸菜豆大空心蜜水下五丸不過五服效

治療癩必效逐邪散方

皂莢子

不限多少以絹袋盛廁中浸參柴日取出淨洗安地坑中枕蓋出毒膏宿焙乾為末

斑貓

任拾枚去頭翅麩炒令黃為末

右二味每服用皂子末二錢匕斑貓末一錢匕水銀粉二錢生鷄卵一枚取白傾盞內更入飯飲半盞并藥同攪勻四更初服至五更取下毒物或從小便中下如有些小澁痛不妨或患及五年只三服三年只二服二年只一服

治瘰癧瘦瘡久不差勝金膏方內出入毒一箇出也

黃連去須 艸栗子去殼 甘草根剉

黃蜀葵花 龍骨各半兩 白及壹分

右六味擣羅為細末取榆窠上紅蟲秤三兩半候乾同為末更入粉霜三錢同研勻每用藥三錢匕入膩

粉少許取雞清調攤帛上先以口溫漿水洗淨搵乾貼之隔日易

治頸生瘰癧已鍼瘡尚不差者貫衆湯方

貫衆壹兩半 烏蛇酒浸炙去皮壹兩 連翹

生乾地黃焙各兩 鶴蝮炒壹兩 杏仁湯浸去皮尖雙入炒

桑根白皮剉各兩 白欽壹兩 威靈仙去苗土壹兩半

白及壹兩半 大腹貳兩 延胡索壹兩半

黃耆細剉壹兩半 木占斯壹兩 甘草炙壹兩半

黃連去須壹兩

右一十六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑

五片煎至八分去滓食後溫服

治瘰癧不差敗肉生膿連翹湯方

連翹

犀角鎊各壹兩

玄參

木通剉

黃耆剉

漏蘆去蘆頭

杏仁

去皮尖雙人炒黃各壹兩半

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服日三

治瘰癧結核久不差異效散方

芫青

肆拾玖枚

麒麟竭壹兩

右二味同於藏餅中存性燒過地上出火毒研細每

服半錢匕米飲調下加至一錢匕

續金一

三

大德重校聖濟總錄卷第一百二十六



