




加藤寧蔭著

產科實驗錄


圓意立本堂藏





産科実験録自序

皇國産婆女科ノ起源更ニ講究スヘカラス神代ノ義ハ誓リ閣シ入皇ノ世ニ及テ日本武尊雙胎ニアラセラル凡産婆女科ノ説ヲ開カス欽明天皇御宇百濟ヨリ醫師渡来セリ必ラス婦人良方科ノ法方ヲ設立スルナラン以迄連綿ミ世ヲ經ルテ久シ明和年間賀川子玄ノ不世出ノ才ヲ抱キ回生術ヲ施シ世スル慶一モ治セサルハナシ迄古ニ至標額器ヲ制シ分娩ノ術ヲ行ヒ其門水



産科実験録

序一

原三折産育全書ヲ著ス其他愛ニ産科器械ヲ削
シ術ヲ施スト雖モ世ニ歟レズ是レ全ク賀川子
云子ニ超越スル徳ナキ故也近世西洋ノ学問ケ
今倍氏婦嬰新論渡来以后日ニ新ニ月ニ盛ニノ
ヒシ工ハヒホルト等ノ産科書ニ載スル受胎以
来内臓ノ位置変化一ニ明亮ナリ其術ヲ施スニ
於テハ回轉鉗子破産截腹等ノ事件懇ニ説破セ
リ今ヲ以テ後ヲ思ヘハ次芽ニ煉磨シ妙器械モ
發明セシ予此小冊子ヲ著シ世ニ公ニスルハ唯
实地経験ノ真術ヲ記載シ方今人民繁殖ノ術政

體萬分ノ一ヲ補助セント欲ス依リテ斯ニ粗ニ
産科ノ履歴ヲ記シ以テ序ニ代ス

明治十三年
芽四月

加藤寧蔭記於錦街
市隱獨樂齋南窓下

産科實驗録

加藤寧蔭著

總論

産科ニ関セス一切諸事諸藝ハ法則器械熟練ノ
 三具足ヲ有セザレハ用ヲ利セズ就中産科ハ最
 モ此三具足ヲ十分ニ全フセザレハ忽チ人ヲ害
 ス如何ニトナレハ臨産急劇ノ際医師不煉磨ニ
 ノ其措置ニキチ失ハハ母子寸刻ニ其命ヲ損ス
 大體産ハ造物者ノ所置更ニ人知ヲ加フルニ及
 ハスト雖モ亦医ノ効ヲ以テ危儉ヲ免レ艱産モ

母子安然タルハ是レ産科医ノ據テ起ル所ノ平
 産ト雖モ其所置直シキヲ失ヘハ益ノ時間ヲ
 費シ益ノ勞疲ヲ加フ且ツ豫防ノ法方斯ニ立
 テハ其期ニ臨ミ妊婦モ心情泰然其又母親属共
 ニ欣喜シテ分娩ノ時ヲ待ツ故ニ女科ハ平常專
 心專意ニシテ其術ヲ講究論弁シテ術ノ妙伎致
 々奮勵セスンハマルヘカラス故ニ斯ニ法則ト
 實驗ト相對シテ區別ヲ成ス覽者請フ之ヲ察セ
 曰

辨胎法則 附月經

夫レ医辨胎ヲ要セント欲セハ先ツ月經ノ理ヲ
 知ルヘシ月經ハ子宮所生ノ液以テ胎孕ニ供ス
 經一月一至其遲早并ニ程限ノゴトキハ諸書既
 論弁セリ依テ斯ニ贅セズ經行久暫或ハ二三日
 或ハ六七日其多少壯健ナレハ則テ多ク羸弱ナレ
 ハ則テ少ク二十八日或ハ一月ニ至リテ一至ス其
 色紫テ臭カラス其質膠結セズ速壞セズ是ヲ正
 トス若シ一月再至二十日速至シ其出ル暴注レ
 其色鮮紅腥臭凝結ス是ヲ不正トス人身病ナク
 シテ終身經不至ハ是レ子挾ナキニ医治ノ及ハ

母ル處ニ經ヲテ出テ又且身熱スルハ血多キニ
由ル身軟弱面色黃白ナルハ血黄キニ由ル月經
妄行シ肺胃ヨリ出ル者アリ大腸ヨリ出ル者ア
リ婦人吐血使血毎月期ニ依リテ作ル但經事ナ
ク發スルアリ医治ヲ必セズ經行コトニ必痛ム
者アリ是レ子宮内神經不安ニ由ル多ク胎養セ
ズ子宮頸窄ク或ハ陰戶壅塞メ經出ルヲ得ス刀
ヲ用テ微割シ經路通行ヲ度トス徑行慢延止マ
ス遂ニ白帶ノ証ニ至ルアリ又稠者膠ノ如シ清
者水ノ如シ色或ハ黃或ハ白或ハ綠或ハ淺絳其

因多ク虛弱ニ由ル其他房事過交産后調ヲ失シ
小兒久ク乳ヲ食シ貧人ノ勞役富人ノ逸居又腸
胱直腸ニ痔ヲ生シ陰道及子宮ニ波及シ遂ニ白
帶ニ至ルアリ大凡子宮ノ白帶ヲ流ス肺風邪ニ
感スルハ流滂シ大腸病アレハ白痢ヲ流ス其理
相同シ若子宮潰爛シ子宮内癰肉瘤ヲ生シテ白
帶ヲ流ストキハ危候恐ルヘシ
子宮胎ヲ受ルノ理ハ諸書既ニ明細ニ之ヲ弁ス
ルノ法ハ熟知セスンハアルヘカラス夫レ惡病
ノ婦人經期ニ及テ月水至ラス後月復至ラス其

時嘔氣ヲ蕪ス是子宮内不安上ニ胃ニ波及スレ
ハ也一月後此症ヲ見テ三月則止者アリ間マ嘔
氣臨産ノ時ニ至ル者アリ亦不嘔ノ者アリ總テ
多嘔久嘔皆不可トナス
大凡婦人或ハ乳頭尖高周圍紫黑色ヲ顯レ或ハ
眼色青白小便一種ノ質ヲ漏レ或ハ子宮口位置
轉移スル等妊ノ憑據トナスベカラス妊ヲ婦
勤モスレハ此症ヲ蕪ス唯臍下中軸脈ニ然物
アリテ其指下ニ起リ之ヲ按メ陰然氣力アリ指頭
微動ヲ覺ユル者乃妊ノ臍下ニ寸余橫脊ノ邊有

子ヲ孕溺スル形子ニメ男子四十歳前後ノ強稔
ノ如キ能ク按スルニ動カス乃妊ノ然リト雖モ
妊孕後八十五日ヲ經サレハ真假ハ變レ難レ其
故ハ形已ニ顯ルレハニ妊孕八十五日後ハ其大
小獨粟子ノ如シ其指下ニ抗抵スルニ彈カアリ
且ツ温瀆タル刺衝氣ヲ具ス宜ク熟煉スヘシ
胎ノ疑似殺種アリト雖モ大凡風塊氣塊水塊燥
屎塊等ニ猶實驗スレハ次第ニ其救増益セニ風
塊ハ臍下ヨリ臍上ニ至ルマテ膨脹シ紙袋ニ風
氣ヲ充ルカ知シ恰モ去七月ノ孕ノ如レ按腹ヲ

時嘔氣ヲ發ス是子宮内不安上ニ胃ニ波及スレ
ハ也一月後此症ヲ見テ三月則止者アリ間マ嘔
氣臨産ノ時ニ至ル者アリ亦不嘔ノ者アリ總テ
多嘔久嘔皆不可トナス

大凡婦人或ハ乳頭尖高周圍紫黑色ヲ顯シ或ハ
眼色青白小使一種ノ質ヲ漏レ或ハ子宮口位置
轉移スル等妊ノ憑據トナスベカラズ妊婦ノ婦
勤モスレハ此症ヲ發ス唯胎下中軸脈ニ然物アリ
テ其指下ニ起リ之ヲ按メ陰然氣力アリ指頭
微動ヲ覺ユル者乃妊ノ胎下ニ寸余橫脊ノ邊

子ヲ等測スル形子ニメ男子四十歳前後ノ強率
ノ如キ能ク按スルニ動カズ乃妊ノ然リト雖モ
妊孕後八十五日ヲ經サレハ真假ハ變レ難レ其
故ハ形已ニ毀ルレハニ妊孕八十五日後ハ其大
サ獨栗子ノ如シ其指下ニ抵抗スルニ彈カアリ
且ツ温潤タル刺衝氣ヲ具ス且ク熟煉スヘシ
胎ノ疑似殺種アリト雖モ大凡風塊氣塊水塊燥
屎塊等ニ猶實驗スレハ次第ニ其救増益セニ風
塊ハ胎下ヨリ胎上ニ至ルマテ膨脹シ紙袋ニ風
氣ヲ充ルカ如シ恰モ七八月ノ孕ノ如レ按腹ヲ

施セハ放屁シ縮小ス氣塊ハ臍ノ左上ニ在テ強
拳シ甚々孕ニ疑似ス血塊ハ臍下左方ニ在リ其
形ナ石ノ如ク血塊ノ孕久シキ者其下ニ孕ヲ受
ルアリ尤辨別シ難シ水塊ハ臍下二寸直下ニア
リ其形ヲ獨栗子ノ如シ水塊ヲ産スルヲ見ルニ
其形ヲ鶏卵ノ皮ナキカ如シ其因全ク廣孕ニ燥
屎塊ハ臍下右方ニ在リ其形ヲ胡化ノ如ク圓長
ニシテ按セハ痛ム左ヨリ按セハ其痛ミ止ム者
ナリ子宮外ノ妊孕アリ矣ニ奇ト稱ス可キニ異
常ノ故ヲ以テ是ヲ捨ツヘカラス医ノ注意斯ニ

存ス

実験

山城國一豪農姉兩度昏嫁ス更ニ妊セス以后
家居シテ他ニ嫁セス年齢未タ壯且美艷人奉
テ迎ヘンヲ欲ス其兄予ニ其事ヲ洩シ且身躰
疾病アルヤヲ診センヲ請フ依テ平生起居種
々症候ヲ問フニ更ニ異ナルナシ腹診スルモ
亦平ノ如シ予月經ノ否其有無ヲ問フニ經血
更ニナク交媾ノ際交感甚薄ク大愉快ト唱フ
ルトニナシ是レ所謂子候ナキニ昏嫁シテ其

系統ノ絶セシヨリ家居シテ用ヲ利スルニ若
カシト以右漸然瘡ヲ絶ス
東京府下古着商年齢三十有四毎月衄血ス其
甚シキ時ハ銅盤三箇余ニ及フ家人大ニ恐懼
ス往テ診スルニ鼻孔ヨリ凝血ヲ搯ケハ絛索
ノ了戾スルカ如ク更ニ盡クル期ナシ依テ天
窓ニ繡帶ヲ施シ鼻孔ニ収瀉菜ノ栓塞ヲ作り
含嗽菜ヲ服セシムレハ咽喉ヨリ廻出シ又大
ニ出ツ依テ栓塞ヲ撤シ鼻孔ヨリ吹菜ヲ施セ
ハ快シク寛ナルニ似タリ以后兩三日全ク癒

ニ翌月亦然リ前月ニ比スレハ半ヲ減ス其婦
一子アリ女子ニ産后月経更ニ閉ツ依テ如此
ナラン願ハ請フ薬服シテ逆行ナカランヲ
以后五六月遂ニ順ニ帰ス
浪花、一商家阿嬢頗ル姿色アリ昏嫁既ニ再
三救月ヲ出デズレテ離縁ス其父怪ムト雖モ
其因ヲ知ラス先考積善翁ニ診断ヲ請フ先考
亦其所因ヲ曉悟セス試ミニ之ヲ筮ス山雷頭
ヲ得タリ是陰門豁大ノ故ナラン然レモ實驗
セズ竊ニ其父ニ語ル父モ亦實驗スルヲ得ス

依テ一策ヲ起シ前婚ニ懇願シ其所因ヲ尋問
スルニ果シテ然リ其父所因ノ確證ヲ得テ免
考ニ享ク礼ヲ速ラレタリ
人身畸穉ハ一目シテ知ラルヘキカ陰門畸穉
ハ成長ノ後大ニ苦慮ヲ加ヘ其人其家傍セテ
以テ繁殖ノ基礎ヲ失フ幼年ノ時能ク治療ヲ
盡シハ更ニ廢物ノ憂ナカラシカ大畸穉タル
ハ治療モ及フヘカラサレ凡小畸穉ハ平體ニ
後セス凡繁殖ノ基ヲ失セサレハ尙可シ畸穉
圖式ハヒシニ、ハイホルト等産科書院ニ之ヲ

盡セリ故ニ斯ニ贅セス
東京神田一工子年齢十有ニ右胸陥没シテ小
池ノ如シ毎ニ歎ス予診シテ曰此子必ラス兄
弟アラシ祖ニ其穉々是ニ類セン果シテ然リ
是レ其母積聚アリテ妊孕ノ際其積聚ニ壓迫
セラレ遂ニ如此ノ畸穉ヲ作ス若以後妊孕ノ
際必ラス其積聚上下ニ小枕ヲ貼シ綿帶以テ
之ヲ縛シ胎子ノ害ヲ受カラシム欲ス其母月
経既ニ断ヘ妊孕ノ期ヲ過キ幸ニ免ル
奥ノ安積郡下守屋一農夫十吉妻歳二十一妊

娠十月ニメ産セス医師昌元之ヲ診ス兎頸横
骨ノ右辺ニ在リ臀左辺ノ脇下ニ至ル胎斜
ニメ産セス昌元整胎シ湯藥ヲ投ス後々救月
ヲ經テ産セス家人太怪シ医ヲ轉スルモハ或
ハ石瘕ト謂ヒ或ハ血塊ト謂ヒ一定ノ説ナシ
後二男二女ヲ生ハ前塊依然婦歳積テ三十五
其歳五月八日小腹絞痛膿血ヲ浮スル一二日
物アリ肛門ニ滯ル子婆之ヲ出不兎ノ髓蓋骨
分別メ二ト為ル者ニ後十余日腕骨胫骨及ヒ
腸ノ如キ者ニ條共ニ肛門ヨリ出ツ其腹尚物

アリ磊々痛ヲ覺フ是レ諸骨半出シ脊髓脇肋
猶遺存スルニ深遠ニメ探知スヘカラス初メ
岡内村大河原某医之ヲ診メ子宮外ノ胎ト云
フ其婦姓ヲ覺ユル時弘化四未年ニ文久元年
肛門ヨリ出ル歳マテ経歴十有五年実ニ奇ト
謂フヘキニ此記ハ予友奥ノ人世ニ産科ヲ專
門トナス其人モ亦此婦ヲ一診セリ依リテ詳
ニ其始終ヲ語ル故ニ斯ニ記載メ以テ産科医
ノ深ク注意シ子宮外ノ胎モ亦コレアルヲ曉
覺セシテ欲ス

医ハ左備ニ坐スルヲ法
トス圍ヲ設ケルニ其形ヲ
膝坐タラシテ欲レシ界ニ
テ右傳ニ坐ス必ス法トナ
ス勿レ

辨胎ノ法

婦ノ脚ヲ屈レシ之ヲ診
スレノ腹皮寬舒ニ
テ診レ易レ能ク注
意スヘシ



半産法則

六個月前半産者アリ嬰兒形體未タ完備セズ存
活ノ理ナシ七個月後嬰兒髮甲俱ニ生シ骨節粗
成テ産者アリ間マ存活ス凡ニ稀ニ半産ノ原因ハ
身體虚弱ニ由ル或ハ勞力勤苦或ハ傾跌震動或
ハ房事過度或ハ子宮擾動或ハ痔瘡及血紅白痢
麻痘内服冷毒ノ証皆能此ヲ致ス亦因ル所口魚
ニ半産スル者アリ是一種ノ性質理論スヘカラ
ス唯慮スル所ハ子宮習慣孕ゴトニ輒ク半産シ
幾ント熱路ヲ成レ既ニ嗣續ヲ妨ケ且ツ身體虛

弱ニノ遂ニ斃ル、ニ至ル凡ソ半産妊娠三ヶ月
モ多シ毎ニ月經至ルノ期ニ發ス且ク保護スヘ
キニ若シ成敗以後ハ産出漸難ニメ痛苦甚ク劇
シ満月ノ分娩ニ異ナラス胎若シ死スレハ自ラ
能ク速ニ出着シ胞衣子宮内底ニ附着スレハ必
ラス脱血アリ医且シク指ヲ入レテ探試シ子宮
ト已ニ離ル、ヲ審知スヘシ子宮口或ハ陰道内
ニ停セハ取出ヲ妨ケス毎ニ胞衣ト子宮ト未タ
離レス或ハ僅ニ離ル一半能ク子宮収束藥ヲ施
シ其収束ヲ助クヘシ胞衣離脱猶血止マサレハ

危俊恐ルヘシ


実験

慣胎常平止マス之ニ縮帶ヲ施シ其効ヲ奏ス
ル收束スヘカラス方今一切妊婦ニ施シ母子
安全ナル実ニ濟世ノ妙法ニ其法木綿ニ牧長
サ三尺五寸其婦肥胖ナレハ隨テ尺ヲ長クシ
一牧ハ腹部ヲ巻キ一牧ハ其上ヲ被ヒ最其両
端ヲ五切シ一ハ左脇ニ結ヒ一ハ右脇ニ結ヒ
上ノ部下ノ部ヲ猛クシ中ヲ廣クシ其婦ノ腹
部ニ應シ強カラス弱カラス適宜ヲ至トシ腹

部ヲ縮帶セハ其位置轉移セサルノミナラス
 能心神ヲソ爽快ナラシム寒氣ノ際ハ腰衣ノ
 如ク是亦三尺以上ノ木綿ヲ縫合シ下腰衣ノ
 上ニ被ハハ温氣常ニ斷ヘス下腰ノ冷氣ヲ豫
 防シ運動ニ便ヲ得テ其益淺クナラズ試ニ嬰
 子腹力微弱ノ者ニ施スニホク大効アリ妊婦
 五月以後腰帶ト唱ヘ木綿ヲ巻ク是レ皇國ノ
 土風ナレ氏妊婦一般五月ニ至ラザルモ早ク
 前記ノ縮帶ヲ施セハ其効淺クナラザルハ


腹巻木綿

腹ヲ巻キタルノ圖




綿木綿


兩端切紐ノ圖



蛭衣之圖



縮帯ヲ全ク施スノ圖



雙胎辨法

雙胎ハ百産中ノ一ニ三胎ハ救十ノ一四胎ハ萬
 中ノ一ニ辨法平産ニ較スレハ更ニ難シ然レ氏
 六救據アリ五六月時ニ至リ子宮ノ底ヲ摸試ス
 ルニ中平ニシテ左右並ニ大ニ一據トス左右並
 ニ動クニ據トス重累過度時アツテ大腿血管ヲ
 壓住シ血球通行平日ノ如クナラス腿脚浮腫ス
 三據トス胎盤声更ニ大ニノ聴ヤスレ四據トス
 嬰兒心跳声ニアリ或ハ一上一下或ハ一左一右
 五據トス又時アツテ婦人妊度ニ過ク雙胎ニ疑


似ス是レ胎内ノ水多クシテ致ス所能ク辨判セ
スニハアルベカラス大凡胎内ノ水其用四アリ
初時胎ヲ養フ一也母腹時アツテ偏寒偏熱此水
ヨク適宜ニ勻節シ嬰児ヲシテ安カラシムニ也
母或ハ傾跌ス此水能嬰児ヲ保護シテ震動セサ
ラシム三也満月分娩ノ時此水能子宮ノ口ヲ漲
福シテ開キ易カラシム大凡孕アレハ胎盤ノ声
顯然辨ス可シタトヘハ鶺鴒ノ如シ其声常ニ母
ノ脉至ルト相應ス一腎脉八十至ル如キ声亦
八十響ク又小児心跳其声急ニシテ胎盤ノ声舒徐

ナルニ似ス一腎脈一百二十或ハ一百四十至尋
シカラス

聴診実験

雙胎ノ判別胎児ノ死生實ニ聴診ノ徳乘テ救
フヘカラス毎時聴診ノ恩ヲ感スル一淺ニ十
ヲサレハ近時一ノ聴診器ヲ製スコムノ長サ
左右一尺五寸栓耳聴口紫檀ニ製シ其形ヲ充
小能聴キ易シ且ツ平生我身體ヲ聴スル充使
之友朋ニ告ケ各名試驗スルニ何レモ皆其可
ナルヲ報ス猶一層精製セント欲ス

自製聽診器之圖



整胎術實驗

妊婦八九ヶ月或ハ跌仆シ或ハ墜下シ見頭黃骨
 支衝ニ産婦身體屈伸スル一アタワス其際此
 術ヲ施セハ忽々舊ニ復ス且子生産婦胎兒ノ位
 置正位ニ居ラス女ヲ斜徑ニ到リ易ク其際毎
 此術ヲ施シ位置平ニ復レ心神安快ニ其法医師
 其胎ノ何レニ支衝スルヲ探知シ多クハ右肢ニ
 在リ医ノ膝産母ノ脇下ニ據リ此ヲ用力ノ地
 トナレ双手畧其胎ヲ提ケ輕ク力ヲ用テ中央ニ
 推送シ左手胎ノ足部ヲ按シ槽手ニテ整正レ編

帯以テ之ヲ収束ス

胎児ノ頭部ヲ
輕ニ中央ニ復ス
ル圖



胎児ノ足部ヲ
推送シテ中央
ニ復スルノ
圖



中道正位ニ復シテ
槽手以下整正スル
ノ圖



妊婦ハ常ニ躰トシテサランヨウ注意スル
シ然ラサレハ臨産ノ時胎衣ノ細見頭ヲ
廻纏レ容易ニ分娩セス且其兒虛弱ニシ
性命ヲ保スルノ難キモ、間コレアリ況ヤ
劇場或ハ根柢ノ地徳ヲ非常ニ際必ラス
豫防シテ遠ク避クヘシ古人胎教ノ聖
喜導奉セスハアルヘカラス

妊娠中諸病

婦人受胎ノ後多血アツテ子宮ニ入り胞胎ヲ養
育ス子宮日ニ長大身體常ナラサルヲ苦ム是レ
理ノ常ニ大凡妊娠中医治多ク効ヲ奏シ難シ然
リト雖モ其苦悩スル處アレハ必ラス治療ヲ施
行セスンハアルベカラス若シ子宮膀胱溺管小
腸等ノ處ヲ壓セハ則小便不利ス大腸ヲ壓セハ
則大使難シ血管ヲ壓セハ則心跳下身腫癢腿脚
俱ニ腫ル肺胃ヲ妨累セハ則欬嗽呼吸短促嘔吐
或ハ陰道安カラス或ハ白帶ヲ流ス或ハ頭痛眩

暈腹痛咳血泄瀉消食口中水多ク或ハ乳痛ス子
宮張テ肝膽ヲ壓セハ眼黃困倦ヲ發ス便秘スレ
ハ身熱夜寐ル下アタワス受胎後漏下月經ニ似
タルアリ或ハ毎月期ニ應レテ至ルアリ又一
ナルアリ真ノ月經ニアラス其色必ラス白色多
ク紅色薄シ子宮ニ輻湊スル一種ノ液ニシテ催
生ノ兆ニアラス誤認シテ滋飲射注方等行テ勿
レ多ク虚弱ヨリ起ル所産ノ子必ラス軟弱又時
行冬症等ニ凍受スレハ多ク墮胎ス腎藏冷症ヲ
ツテ浮腫スルモノ多クエルランヒ一七則子痲

ヲ發ス此症七月ヨリ八九ヶ月ニ至リテ發スル
モノ

子癇實驗

東京府下一商家ノ婦經産ノ後一子ヲ産スル
ニ臨テ子癇ヲ發ス象医手ヲ盡シ予亦尅テ到
リ全愈ニ及ヘリ其翌々年又一子ヲ産ス壽ニ
臨テ子癇ヲ發ス前ノ如ク鎮痙某種ニ投スト
雖モ寸効ナク象医伎盡キ予亦手ヲ束メ試ニ
一策ヲ施シ涼膈散加石ヲ投ズ一貼ニシテ勢
屈ニ貼ニシテ勢廢リ三四貼ニシテ遂ニ鎮

定ス家族ハ論ヲ候タス象人皆駭ク以迄調理
救月遂ニ全愈ヲ得タリ其後一男子瘥寧ヲ發
シ是亦種ニ手ヲ盡ス凡更ニ効ナク予ニ治ヲ
請フ予前婦子癇ノ投藥ヲ回顧シ服セシムル
ニ是亦鎮定セリ依リテ以迄急劇ノ際浸劑ト
ナサント欲シ粗細シテ貯フ

向産臨産取上法則

向産確証五アリ子宮下落シ嬰兒頭尻骨盤ニ至
ルノ故ヲ以テ肚腹必ラス鬆小一ノ子宮下落シ
テ略ホ膀胱ヲ壓スルノ故ヲ以テ時々溺セント

欲スニナリ肚腹調和セサルヲ以テ微溲ス四ノ
自然下腹内収束ヲ覺フ五ノ總テ陰道鬆寬膠涎
平日ヨリ過ク或ハ向キニ精神困倦ヲ苦ク今忽
子爽適ス向キニ飲食多カラス今忽テ三餐ヲ倍
加ス向キニ行動起立艱難ヲ苦シム今忽テ略ホ
便易ヲ覺フ此ノ証候アレハ産期遠カラサルヲ
定知スベシ
向産腹痛ニ真假アリ真痛ハ刀割ニ似タリ必ラ
ス一陣ハ一陣ヨリ緊シク一次ハ一次ヨリ速カ
ナリ一ハ子宮収縮ニ依リテ痛ハ一ハ子宮口ナ

開クノ痛ミニ依リ一ハ胎児ヲ偏送シテ出サシ
ムルノ痛ニヨル假痛ハ或ハ身體困倦或ハ飲食
消化セス或ハ便秘或ハ鬼動テ子宮安カラサル
ヨリ皆能ク痛ヲ辨ス其痛毎ニ子宮ノ上ニ在リ
致口閉セス且ツ漸ク緊ク速ナルニ非ラス
故ニ其真假ヲ分別シ易シ誤認シテ真トナシ勿
遽ニ臨壽セシムヘカラス
臨産ハ三候ニ區別ス第一候ハ胎児子宮ノ口ヲ
出シ第二候ハ胎児母腹ヨリ落テ尻骨盤ニ入ル
第三候ハ陰戸ヲ出ルナリ大凡産セントスル時

子宮斂縮シ胞衣脱離セント欲ス母腹必ラス痛ムユヘンナリ初痛ハ緩ニメ微ク一次ハ一次ヨリ緊シ是レ子宮斂縮ノ力ニヨル一次ハ一次ヨリ加ハリ大概初メ十五腎肥ヨリ漸ク速ニメ三四腎肥ニ至ル更ニ速ニメ僅カ一二腎肥ナレハ痛劇シクソ産近シ舒縮ノカラ専ラ子宮ニ属シテ其本力ハ唯斂縮逼送ノ用ニ供スルノミ畧ホ肚腹ノ力ハ十ノ一二ヲ補助スルノミ今此ニ産母頭昏メ甦セス或ハ迷蒙水ヲ嚥テ聊カ知覺スルナリ而シテ胎出ツ然ラハ力ハ子宮ニ在テ母

ニアラス大抵生育ノ事ハ人為ヲ假ラス造化ノ妙用ニアリ子宮斂縮ノ候一張一弛必ラス間断アリテ連続セス凡ソ産母臨月忽チ腰腹痛ヲ覺フ手ヲ以テ腹ニ著ク摸試スルニ子宮坚硬圓凸或ハ収縮ノ有力ヲ覺フ即チ是レ分娩ノ微其始ノ兎頭ハ骨盤ニ入り轉シテ陰道ニ出ツ故ニ子宮ノ頸先痛ム既ニメ骨盤周圍ニ累及スルトキハ則腰腹各處痛マサルハナシ然レモ各處ノ痛尤モ兎頭陰ヲ出ル時ヲ以テ最劇トス神至驟ニ漲壓セラレ、ノ故ニ因ル

婦人分娩ノ際痛劇者アリ亦劇シカラサル者アリ其人ノ性質ニヨル大概胎児過大ナレハ則痛甚シ産路煩利セサレハ痛甚シ又富貴安逸ノ人毎痛貧窮ノ人ヨリ過ク初次産孕ノ人毎痛産孕習慣ノ人ヨリ過ク生産ノ功力ハ全ク子宮ニ関係ス難易遲速ハ産母ノ能自主ル所ニアラス故ニ子宮ヲ保護スルヲ最要トス若臨産ノ時忽然意外ノ驚懼アレハ能ク子宮ヲメ驟ニ功力ヲ失ナワレメ順ヲ変シテ逆トス保護セズンハアルベカラス

婦人尻骨盤ノ大サハ男子ニ過ク前ヨリ後ニ至ル三寸ニアヨリ三寸六アニ至ル上口邪徑四寸嬰兒頭前ヨリ後ニ至ル三寸二分ヨリ三寸六アニ至ル左ヨリ右ニ至ル二寸八アヨリ三寸ニアニ至ル肩潤サ三寸六アヨリ四寸四アニ至ル嬰兒ノ頭寸前ヨリ後ニ至ル母ノ尻骨盤ノ寸ト差フ所僅ニナリト雖モ正出スルヲアタリス必ラス尻骨盤ノ邪徑ニ側合ス已ニ骨盤ニ落チ即チ後夕正ニ轉ス蓋シ骨盤上口ハ邪徑ヲ以テ最長トス下口ハ前ヨリ後ニ至ル直徑ヲ以テ最長ト

ナス平日三寸児マサニ出ントスル時三寸八分
有零尾閭骨三四枚アリ平日兜彎ノ前ニ向フ此
ノ時ニ至リテ反テ後ニ展フ平日ニ比較スレハ
展計一寸能ク児頭ヲメ出ツヘキ所以ナリ偶マ
額先出者アリ亦能産下スト雖モ較ヤ難ノミ嬰
児頭骨湊合互接各縫ハ成人ノ匠キニ似ス子宮
胎児ノ骨盤ヲ過ル時ニ偏リ母ノ骨縫聊カ展開
スルヲ能ハス児頭必ラス蹉疊略小ノ骨盤ニ恰
合シ脳體ヲ傷セス造化ノ妙知ラルヘシ若シ諸
骨湊合ノ成ルニ非スレハ骨盤ヲ經過スル時蹉

疊ナルヲアタワス其出ル必ズ難シ
胎産正アリ変アリ凡嬰児ノ頭枕骨マツ露レ難
易遲速ノ分常度ニ恰合レ産母陰道マツ損壞ス
ル所ナレ胎盤既ニ出テ血モ亦淨盡シ初期ヨリ
児出ルニ至ル皆自然ノ然ラシハル是ヲ正産ト
ナス其変ニ至テハ或ハ児胎内ニアツテ正シカ
ラス或ハ児頭大ニ常度ニ過キ或ハ児身太大チ
リ産母尻骨盤小ニメ合セズ必ラス出テ難シ或
ハ産母骨盤正レカラス或ハ所出ノ路腫窄肉瘤
等アリ或ハ嬰児肩先露ル者手先出者足先出者

臀先出者肥衣出テサル者肥衣已出テ血溢レテ
注リ力如キ者子宮陰道陰戸等ノ處迸裂者胎盤
子宮ト尚未夕脱離セズ醫士捻婆毒リニ猛力ヲ
用テ胎ヲ逼迫シテ出レ子宮翻捲ヲ致ス者産母
抽搐痠痛者皆胎産ノ変ニ合メ之ヲ計レハ正ナ
ル者多シテ変者少シ凡ソ嬰兒已ニ陰道ニ抵リ
醫師指ヲ入レ探試シ坚硬ニシテ固ナル者頭ニ固
ニシテ堅カラス或ハ縫アルヲ覺ユル者ハ臀ニ固
硬ニシテ小者ハ膝ノ一端圓凸一端五趾齊者ハ足
ノ五指齊シカラス大指短キ者ハ手ノ堅凸ニシテ

尖圓ナル者ハ肘ニ

臨産ノ時忽然トシテ腹内大痛シ刀割スル力如ク
或ハ自ラ大裂ヲ覺テ復タ緊陣ナシテ面色晦白頭
昏阻厥全身軟弱醫師ヨリ摸試スルニ或ハ兎腹
内ニ入ルカト覺テ此レ産時艱難子宮力ヲ用ユ
ル過度ナルニヨル或ハ跌仆或ハ拳打脚踢セラ
レ子宮驟裂ス是レ極テ危倫速死スル者アリ一
二日ニシテ死スル者アリ更ニ治法ナシ
臨産ノ証據已ニ確定シ審ニ真痛疑ヒナキヲ知
リ豫メ牀褥ヲ以テ褥上ニ鋪墊シ覆ニ油布或ハ

油紙ヲ以テ汚濁ヲ防キ陣痛緊速ノ時ヲ俟テ婦人ヲシテ安卧セシメ左身ヲ味ニ著ク被ヲ用テ覆蓋シ手ヲ以テ力紐ヲ握リ微シク其力ヲ助ケ膝ホヅ小起シ足牀板ヲ推シ醫傍坐シ児頭將ニ出ントスル時ヲ俟テ左手ノ四指ヲ用ヒ陰戸肛門ノ間ニ當テ斜列補助シ陰戸撐展度ニ過キ或ハ糞門ヲ裂通セシテ恐ル児頭已出テ右手ヲ用テ之ニ托シ以テ肩ノ出ルヲ俟テ肩既ニ出レハ全身皆出ツ此時宜シク静待スヘシ遽ニ力ヲ用テ催促スル勿レ大概頭既ニ出レハ痛ニ即テ劇

シカラス倘シ母已倦ミ或ハ子宮力盡キ児全身偏出スル能アハス徐寛ナレハ臍帶壓住シテ血通行セス女頃ニ児斃レンヲ恐レ医師畧補助ヲ為スヘシ其法タルカヲ輕クレ児肩ヲモツテ轉レテ脊盤直径ニ合シ出テ易カラシム児出ル後未ク声セサレハ呼吸ナシ遽ニ臍帶ヲ剪ル可カラス蓋其時臍帶中血管尚流通ス妄ニ剪ハ嬰兒性命ノ患アリ凡臍帶ヲ剪断スル法生下後發声アツテ臍動絶テ始テ切断スヘシ其機ニ臨テ胞衣ニ向テ帶中脉血ヲ輸送シ凡臍ヨリ一寸五尸

強ノ部ヲ度トシ麻ヲ以テ堅固ニ束縛シ切斷ス
 ヘシ帯ヲ断ツテ長キニ過レハ其乾涸遲延シ短
 ニ過レハ臍ニ炊衝ヲ生シ腹部ニ波及センヲ
 恐ル、故ニ切斷后木綿ニオレテ油ヲ塗リ臍
 帯ヲ包ミ兎ノ左腹ニ安定シ縛帶スヘシ右腹ハ
 肝臓アルヲ以テナリ
 胎盤出後仍ヲ縮帶ヲ用テ肚腹ヲ緊束ス一ハ肚
 腹ヲ輔助シテ意ニ適セシム一ハ子宮ヲ壓住シ
 テ鬆展ナラサラシム暖水ヲ用テ下身不潔ヲ洗
 ヒ更ニ軟布ヲ用テ前ヨリ後ニ至リ兜束シ日々

更換シ別ニ潔淨衣被ヲ易ヘ安卧兩三時起立セ
 シメス室内過暖過寒ナラレムルヲナク言語ヲ
 多クスルヲ勿レ多人室ニ入テ擾亂スルヲ禁
 シ醫師産婦身安クシテ並事ナルヲ探知シ方ニ
 歸去スヘシ

婦女性質痛ニ耐ヘサル者アリ臨産ノ時坐卧安
 カラス口噤シ嘔吐シ或ハ妄言ニ別ニ醫治ヲ勞
 セス唯産前便秘且ク潤下スヘシ産後食スル所
 ノモノハ一切ノ潤物ヲ主トス産后身安シテ病
 ナク乳アリ七日後帯ヲ照シテ内ヲ食スヘシ大

概産后病症多ク七日以前ニアリ此ヲ過ル即閑
係ナシ

分娩ノ日救度胎ノ日ヨリ計算シ二百八十日ヲ
以テ準トス毎ニ一十月経期ト暗合ス

実験

皇國産婆ノ起源更ニ確証ナシ田間ニテハ多
産ノ老婦其事ニ関係シ其地々々ノ産婦ヲ取
扱フ信州ナドハウミ親ト唱へ臨産ノ時必
ス産親来テ一切ニ従事ス故ニ生兒一生
中産親ヲ尊崇ス産親必ラス生産ニ熟練スルニテ

ラス唯其場ニ臨テ指揮スルノミ豪農ハ預メ
豪農中ノ老婆ヲ選擇シ以テ産親ト定ム一生
尊崇スルヲ以テ其等ヲ定ム又田家ニ下界ノ
老婆其事ニ従事シ不潔ノ始末ヲ取行ス都會
ノ地ハ應永ノ頃産婆ト唱テ産婆ヨリ妊婦ニ
貸シ貸賃ニ米大豆等ヲ貸シモノ一名七夜
椅子ト稱ス東京ナトハ何レノ時其椅子廢ス
ルヤ今時貸賃ノ米松葉ナトヲ請取り更ニ産
婆ヲ貸賃セズ唯其賃代ノ残ルノミ也今ヲ以
テ是ヲ見レハ此器再興可ナラシカ如何トナ

レハ産褥ニ臨ミ種々ノ流弊アツテ一定ナラ
ズ産后寢卧ノ法则亦一定ナラズ多ク斜坐ノ
體ニ役ケ嚴寒ノ際太熱ノ時大ニ産婦ヲ害ス
産前産後一定ノ器械アレハ衆人謀々ノ雜信
ヲ絶テ妊婦家族ノ安堵ナランカ

往古産臺ノ圖


西洋産褥ノ役ケヒシ工ハヒホルト等産科書
ニ記載コレアレ凡造構ノ資本容易ナラズ且
小屋等ニ於テハ却テ使テ關ク皇國産臺ノ如
キハ容易ニ設立シ且ツ構徹自在シ

欠

MISSING

産后寢床

前産臺ノ景況ニ似テ長六尺有余
幅三尺有余ノ臺ヲ米俵等ニテ編
製シ枕邊ノ高サ大凡二尺下身ノ
高サ大凡五寸其上ニ敷蒲團ヲ布
キ枕ヲ設ケ白寝外スレハ産婦心神
爽快更ニ下身麻痺寒氣侵入ノ憂
ナク且上気セズ身體自由シ



産前後血崩法則

産前出血ニアリ一ハ偶發一ハ有ラサルヲ得ス
 是レ孕婦跌仆打踢ニ或ハ遠行操作或ハ大咳大
 嘔或ハ猛力ニテ大便ヲ努力シ胎盤ト子宮ト離
 開セシム多クテ倫セス血断口ヨリ流出ス此レ
 偶發ニ平人胎孕子盤大概子宮ノ底ニ粘着ス胎
 孕ノ変ノ如キ或ハ頸口ニ粘着ス臨産子宮口開
 ク時必ラス噴血スル是レ有ラサルヲ得サルニ
 大概何時ヲ論セス但多血噴湧スレハ之ヲ治ス
 ル遲慢ナレハ性命ヲ失フノ憂ヒアリ大抵婦人

躰質同カラス産孕救次血崩ノ症ナキモノアリ
 毎孕血崩ニ慣易スル者アリ医タル者意ヲ加ヘ
 テ防備スヘシ凡偶然ノ血ハ産前後ヲ論セス俱
 ニ胎盤ト子宮ト分離スルニ因ル血断管口中ヨ
 リ流出シ分離ノ處或ハ多或ハ少ク証臍痛脈細
 ヲ見ル或ハ婦人自ラ腹内裂ルニ似タリ或ハ初
 裂時血子宮内ニ流レ子宮満テ女頃即チ流出ス
 初出多カララス後漸多キ者アリ初出即多キ者ア
 リ多キ者ハ互時ニ頭昏面白冷汗耳鳴嘔逆抽搐
 レテ死ス生産ニ因テ見出ント少血畧止者アリ

児陰戸ヲ塞クニ因ル児出後血仍噴湧ス子宮忽
チ縮レ血即時ニ止ミ若レ後漸放鬆血又出者ア
リ是皆極テ危儉産后胎盤已ニ出テ二三刻ヲ過
キ忽然血崩ス是レ子宮已縮レテ忽チ放鬆スル
ニ最モ危儉トナス

実験

産后血崩ハ突ニ産后ノ大患之ニ過キス前以
テ豫メ判交スヘカラスタトヘ其症ナリ凡必
ラス豫防セズンバアルベカラズ若レ延延ナ
レバ死須臾ニアリ其法胞衣出ル後布衾ヲ以

テ陰門ニ壓定シ産婦ヲシテ側卧セシメ上足
ヲ下足ノ膝頭ヨリサシク上部ニ越サシメ陰
カヲ牙塞スルヲ秋時次第ニ子宮歛縮メ遂ニ
血崩ノ憂ヲ免ル若レ産婆有余シテ期ヲ過サ
ハ寸刻ニシテ斃ル

胎盤不出法則

嬰兒既ニ出テ胎盤胎児ニ隨テ脊ク出ル者ニ一
ニ刻ヲ歴テ出ルモノアリ大概一時ノ内ニ在ル
ヘシ其不出ノ原因三アリ子宮無力一ニ子宮ノ
力亂用スルニ一胎盤ト子宮ト相連ル三ニ大概

生産艱産失寐困倦子宮ノ力已ニ用盡シ即時収縮スルヲ能ハサルニ因ル子宮収斂薬ヲ施シ子宮ノ力已ニ用盡シ即時収縮スルヲ能ハサルニ因ル子宮収斂縮小胎盤離脱センヲ要ス又子宮ノ力乱用シ中腰収縮シ胎盤ヲシテ阻礙シ出テサラレム又子宮ト胎盤ト相連ル大概子宮病或ハ冷ヲ生シ致ス所尤危儉トス

実験

近世胎盤癒着ノ症大ニ多レ是レ生育未タ熟セサル故ニ其家人ノ恐懼スル尤大ニ能説諭

シテ安堵セシメサレハ上逆ノ論口ニシテ止マテ予毎時試ミルニ逆キハ六七日早キハ一二日必ラス出ツ是レ胎盤更ニ用ヲ遂ク収縮スル速ナルニ由ル

乳法則 附 嬰児初生

嬰児初生長一尺五六寸ヲ率トス大概男大女小男重ク女軽シ父母壯健ナル者児重シ虚弱ナル者児軽シ初出必啼ク是レ内温外寒ノ故ニ啼声洪大ヲ宜トス皮色青紅口鼻眼耳開通頭骨堅固ニメ大潤ナラス眉髮指甲全備シ肛門黒屎ヲ泻

シ能乳ヲ吮ム此ヲ完好ノ兒ト為ス若シ啼声低
啞皮膚黒暗眼ヲ頭骨縫合鬆虚或眉髮ナク或ハ
指甲ナク或ハ黒屎ナク或ハ四支弛縦力ヲナク
或ハ乳ヲ吮テアタワス是欠瘍ノ憂ヒアリ
兒初メ産下救時一二日ニ至ルノ内所生ノ清乳
功力能消ス兒之ヲ吮テ黒屎自出ツ凡テ初時乳
少ク兒之ヲ吮ハ乳自生スル者シ乳頭縮者之ヲ
吮ハ能ク凸出セシム兒生テ兩三月内唯乳ヲ吮
ハシムヘシ別物ヲ食フテ勿レ六七月後牙ヲ生
スル時多ク血力ヲ費ス若身虚弱或ハ乳不足ナ

ル者助ケルニ滋養物ヲ與ヘシムヘシ消化レ難
キ各物皆宜シキ所ニ非ス
断乳ノ期九月ヨリ一年ニ至ルヲ度トス蓋シ兒
六七月ヨリ牙ヲ生シ九月後ニ至リテ漸ク物ヲ
食ス故ニ此ヲ以テ断乳ノ期トス此期ヲ過レハ
宜シカラス此ノ期ニ及ハサルモ亦宜シカラス
兒身虚弱九月尚牙ヲ生セサル者アリ断スル
勿レ又女遅スヘシ
断乳ノ法漸減レ漸ク断スル者乳痛マス忽然中
止者一二日内或ハ腫痛膿ナルヘシ

婦人産子後大凡一年或ハ十四ヶ月ヲ經テ月徑
通ス乳即清サ見ニ異ヘテ不可トス
産后二三日發熱ス乳ヲ生マルニ由ル者アリ蓋
シ鬼出後多血アリテ乳内ニ流ル尙レ寒冷ニ感
スレハ乳出テス必ラニ發熱身母カラス

乳母法則

産母乳頭高凸セス見呪フヤタワス或ハ虚弱ニ
シ乳清サ已ムヲ得ス乳母ヲ在覓ス其選擇ノ法
一ハ其年ヲ問フ大約二十歳ヨリ三十歳ニ至ル
者乳多シ此ヲ過クル者乳サレニハ其生見月分

ヲ問フ愈近ケレハ愈妙其隔ツ久キハ宜シカラ
ス三八其乳ヲ視ル大ナラズ小ナラズ中等一ノ
満溢白色ナルヲ佳トス已ニ月倍アル者好テ酒
ヲ飲ミ性躁シシ善怒者乳頭大小常度ニ中ヒサ
ル者不可トス乳汁ハ三百倍ノ顯微鏡ニ照シ檢
査スレハ水分ノ多サ能ク辨別セラルヘシ水分
多キハ不可シ

揉乳実験

乳ノ凝テ出テサルヲ揉テ出ス術ニ産后動毛
スレハ此症アリ其時必ラズ之ヲ施用ス

菜汁ヲ出シ火ニ安定シ適宜ノ温度
 ヲ以テ布中ニ蒸シ中搾シ婦有ヨリ乳頭
 ニ及シ右乳ハ医ノ左手ヲ布中ノ上部ニ壓
 定シ右手ヲ以テ左手ノ下ヨリ幾度モ推下
 シ布中冷レハ又温度ノ藥汁ニ浸シ前ノ
 如ク中搾リレ大凡五十遍推下レ其右
 布中ヲ角取ニ折リ又菜汁ニ浸シ布袋
 ヲ乳下腋下等ニ壓住レ不強不弱乳
 房ハ鷄卵ヲ持スルカ加ク左右ニ動搖
 シ其乳汁ノ凝固性ヲ溶解セシム是
 必接敷ヲ重テ其過不及ナカラシテ欲スル



肩ヨリ布中ヲ前ノ如ク一壓定レ
 乳頭ニ至ルマテ推下レ指頭ヲ
 以テ一ハ乳管上ニ置キ一ハ大指ヲ
 以テ乳頭下ヨリ上ニ向テ推送シ
 乳汁ヲ出サシメ其レク出ル時ハ
 吸乳管ヲ以テ乳汁ヲ出サシメ
 乳房中嫩衝ヲ起サシラレシム



産后子宮斂縮腹痛血露法則

凡ソ胎産ノ正者児及胎盤出テ後子宮即時縮小
大抵嬰兒ノ頭ノ如シ子宮ステニ縮シ脉管亦斂
ニ再シ出血アラズ能ク子宮内瘀血ヲニテ偏出
セシメ漸縮シ漸ク小ニシテ遂ニ常度ニ復シ十
日後骨盤内ヨリ探拭スルニ復見ヘス陰戸斂縮
シ心モ速ニメ一兩月後全ク平日ノ如シ是レ正
ニ産后マ、鬆展斂マラス血管齊開シ血噴滯シ
テ止マサル者アリ危候トス歎類ノ胎盤ハ母ノ
血管脚接フト雖モ産時即今離レ母ノ血管ニ

断セズ故ニ血出ルナレハ母ノ血管胎盤ニ挿
入シ脚接シ依附ス胎盤出時母ノ血管必断ス子
宮斂縮セサレハ血断口ヨリ流出スル所以ニ
産后ニハ腹必ラス痛ム是子宮内瘀血アリテ出
テント欲ス多ク兩三日ノ内ニ在リ此ヲ過レハ
別無シ痛輕ケレハ治ヲ施スニ及ハス四五日ノ
内略ホ血露ヲ見ル初メ紅色後六七日後漸ク変
シテ黄又白トナル血露ノ用ハ子宮ヲ洗滌スル
所以ニシテ平日經水ト同シカラス或ハ二十日
或ハ十餘日ナルモ妨ケナシ唯過多過久ナルハ

大概身虚弱ニ由ル胃ヲ補開スルノ薬ヲ施スヘ
シ時アツテ寒ニ感レテ忽チ止ミ發熱生タノ征
アリ又坐立太早ク或ハ行動操作勞傷ニ因リ水
色太紅ニシテ三四日ヲ過キテ止マズ出血ヲ防
グヘシ又水色黒臭ナルモノ陰戸ヲ爛ス温水ヲ
以テ洗淨スヘシ或ハ子宮口結血塊ヲ成シテ塞
住レ一二日開通シ血露結血ニ隨テ輒出レ去キ
ヲ覓ユル者アリ概シテ虚トナスベカラス大槪
産后必ラス血露アルヘシ但太急ナラス亦驟止
スヘカラス去カラス快カラス漸ク減テ以テ盡

キニ至ル斯ヲ正トナスノミ
至後症一二日大便セズ必シモ医治セズ久秘宜
ク微利薬ヲ服ス小便不利必ラス利水薬ヲ服ス
ヘシ若身發熱安カラズ乳出テズ凉薬ヲ服シ並
ニ大便ヲ利ス
子宮下墜ノ征操作貧苦ノ婦女患フル者頗多シ
其故ヲ推原スルニ産后勞動行走太早キニ因テ
致ス所ニ蓋シ子宮原ト筋帶アリ骨盤ニ繫リ胎
ヲ結ヒテ後漸ク逐テ伸長産后又漸ク短縮若シ
勞動行走太早ク子宮下墜シ筋帶弛テ力ナシ復

夕子宮ヲ收縮斂係スル一アタワス終身ノ累慎
マシハアルヘカラス

臨産ノ時陰戸撐開多ク内皮破裂スル一アリ或
ハ内外小裂若但兩腿ヲシテ合併セシメ安小七
八日後能自相連ル時アリテ陰戸尚ヲ漲開セス
児頭出ル一太速医者手ヲ用テ略攔シ裂テ肛門
ニ通スルヲ防クヘシ終身累ヲ受ク必ラス縁縫
結ムヲ施ス可シ

之時艱難産后二三日ヨリ七八日ニ至テ身體發
如腹痛スルモノアリ必ラス按スル一ヲ忌ム腹

内及子宮冷ヲ生スルヲ防クヘシ若シ舌黒脈數
口渴シ讒語シ血露忽チ止ミ或ハ乳忽チ止ム大
ニ關係アリ

産后子宮或ハ子宮胞膜冷ヲ生シ痛劇シテ腫レ
溼アリ水アリ冷症ノ法ニ依テ治ヲ施スベシ

変産法則

夫レ分娩ノ正ハ嬰兒頭先出ルヲ以テ準トス其
変ニ至テハ面臂手足先出ルモノアリ凡ソ面産
猶能産下ス面産ノ分娩セントスルニ臨テ医師
其手ヲ入レ探試スルニ口眼顔類憑ルヘシト雖

モ亦確知セラルハ鼻ニアリ探リテ鼻準ヲ得
ル即チ知ル是レ面ニノ腎ニ非ラサルヲ其陰
道ヲ出ル常産ニ較スレハ子宮ノ力ヲ出ス尤モ
多ク痛モ甚シ医師宜ク産婦ヲ安慰シ耐心靜
候セシメ速ニ確偏ヲ欲ス可カラズ嬰兒分娩ス
ルハ其面必ラス滿腫ニ跌仆ノ状ノ如シ但温水
ヲ用テ洗潤シ日々數次一二日ヲ過テ其腫自ラ
消ハ

難ク先出者ハ其死面産ヨリ多シ大約四生一死蓋
レ臂先出ル者其所置面腫ヨリ難シ多ク胎帯ヲ

擠壓シテ血通行セサルヲアリ故ニ嬰兒死スル
者多シ医師兎頭ノ將ニ出ントスル時右手ヲ用
テ兎ノ背項ヲ按シ左手下頰ヲ按シ以テ其出ル
ヲ助ケ胎帯ヲノ受壓セシメサランヲ要ス胎帯
中尿管跳躍スレハ其兎生育スル必セリ

脚先出或ハ膝先出者名ケテ逆産トス其死者臂
産ヨリ多シ大約三生一死是レ医ノ手ヲ假ラサ
ルヲ得スト雖モ且シク子宮偏送ヲ俟ツヘシ猛
ニ人力ヲ用ユヘカラス若シ匆遽拖曳スレハ子
宮頸口陰戸等ノ處尚ホ未タ豫備セス必ラス母

ヲ傷スルヲ致ス故ニ其待ヲ穩妥トス
 手先出ル者アリ名ケテ横産トス關係尤重シ大
 約ニ生一死母九生一死必ラス自然ニ産下スル
 一アタワス必ラス医師ノ幫助ヲ要ス其法タル
 婦人ヲレテ使溺ヲ出盡シ或ハ仰卧或ハ左卧両
 腿ヲ放鬆シテ子宮陰戸畧開ヲ候テ醫師オレ
 フ油ヲ用テ手ニ塗リ指甲ヲ剪去シ陰戸ヨリ圓
 椎頭手ヲ以テ漸ク産婦ノ呼吸ニ隨ヒ子宮ノ口
 ニ至リ轉シテ子宮ニ入り兎脚ノ在ル所ヲ探知
 シ捉住シ漸ク拉轉シ兎手還入ヲ以テ度トス或

ハ轉シテ脚ヲ先出サシメ逆産ノ法ヲ以テ産
 下ス胞未タ破セス嬰兎水内ニ在レハ尤モ轉シ
 易シ兎脚腹面ト同ク一邊ニ在リ或ハ母腹ニ向
 ヒ或ハ母背ニ向ヒ大概所出ノ手心前ニ向ヘハ
 脚即チ前ニ在リ所出ノ手心後ニ向ヘハ脚即チ
 後ニ在リ然レモ猶探試シテ其確定ヲ要スヘシ
 誤テ手ヲ捉ル勿レ医師手ヲ陰道ニ入レ子宮斂
 縮ヲ覺ヘハ其時停休スヘシ其放鬆スルヲ俟テ
 漸ク手ヲ入レ兎脚ヲ摸捉ス可シ大凡ソ手ヲ子
 宮ニ入ルハ務テ舒緩ナルヘシ若急遽ニ手ヲ

レハ産后冬ヲ生ス
横産致死ノ因ハ産母力ヲ用ユル過多子宮裂開
シテ死ス或ハ子宮ノ力及産母全身ノ力用ヒ盡
シテ兎出ルルニ能ハスレテ死ス若シ産母骨盤大
ニノ嬰児斃小時アツテ勉強産下スルアリテク
母子両斃ス横産ニ非スレテ嬰児ノ手其頭ヨリ
先テ出ルルアリ必ラス産下スベシ
胎児分娩後腹ヲ隔テ、子宮ヲ摸試ス仍ホ大ニ
ノ圓凸是双胎ノ産婦ヲ安慰ノ驚畏セシムル勿
レ凡双胎其身大概小兩兎俱ニ生クヘシ大概二


兎以上俱ニ生者若シ雙胎母腹ニ在リ一倒一順
産時頭先出テ脚先出ルアリ第一兎後ニ出ノ還
ニ脐帶ヲ抽曳ス可カラス蓋シ雙胎ハ兩盤ニ係
ルト雖モ然レモ多ク一脊ニ離脱ス若シ尚一兎
未タ産下セザルルアリ還ニ脐帶ヲ抽クヘカラ
ス胎盤離脱セズ子宮斂縮スルルニ能ハス血崩ノ
害ヲ致ス凡ソ雙胎第一兎出時其産頗ル難シ第
ニ兎ハ易シ産路使熟ノ故ニ然レモ必ラス二三
刻或ハ半時ヲ間シテ方ニ出ツ是レ子宮力ヲ蓄
ヘ偏送スルヲ疾ツ故ニ胎盤唯一ニノ脐帶ニナ

ルアリ又雙順雙逆アリ
 脐帯先出者兎多ク危儉是レ帯中尿管ヲ擠壓ス
 ルノミナラス血必ラス通行セス早ク挑送スベ
 シ若レ送入復出ル多ク危儉尿管全ク跳ラス或
 ハ臭氣アレハ兎已死スルヲ知ルヘシ
 怪胎常ニアラズト雖モ間又コレ有リ腦ナク手
 足ナク頭大ニメ水アリ枕骨臀骨等ニ蓄ヲ生シ
 雙胎腹相連ルアリ臀相連ルアリ一身兩頭四手
 四足ノ者アリ俱ニ存活セス


実験

畸胎ニアラスト雖モ盤狀ヲ差アリ其大ナル
 ニ至リテハ必ラス艱産ニ其致六長四扁四右
 斜四右斜四真四角四是シ
 正ナルハ上ヨリ見ルニ心蔵ノ如シ


正 真




扁 圓




長 四




左 斜




右 斜



真 四



角 四



東京府下一職ニ妻分娩ノ期ニ臨テ遲延既ニ
而三日ニ及フ往テ診スルニ全ク逆産即産褥
ヲ役ケ逆産ノ法ニテ分娩セシム唯頭部ニ至
テ出テス種ニ術ヲ施スト雖モ更ニ出ル兆ナ
シ已ムヲ得ス鉤ヲ胎児ノ口ニ入レ左手頭口
ヲ壓レ徐ニ兩膝ヲ立テ次第腰ヲ撐ケ遂ニ畧
直立ノ躰ニ及フ児頭幸ニ脱スルヲ得タリ其
頭大ニソ産母ノ骨盤ニ恰合セス頭ノ中央凹
ミ左右高ク出テ上ニテ嵌着ス其寸亦長シ始
テ知ル胎児骨縫救條アリ分娩ノ際自在ニ延

長シ徐ニ拖曳スレハ隨テ舒長トナリ骨盤ヲ
脱出スルヲ造化ノ妙感スヘキニ
山城國一農夫ノ妻破水后救時ヲ隔テ、産セ
ス依テ往テ診スレハ胎児高ク右胸下ニ着ク
即チ推送術ヲ施シ徐ニ分娩セシム其児頭長
クシテ福祿壽ノ如シ手拭ヲ以テ蒙面スレハ
不日ニソ平ニ復ス是亦造物者ノ妙ニ
推送術ノ法兩手胎児ノ頭、骨盤ニ向フヲ徐ニ
推送シ次第ニ骨盤ヲ脱出セシム
平産分娩ノ遲延ナル必ラス推送術ヲ施ス若

其術ヲ行テ摘出テサレモノハ輕便ナル短鉗
子ヲ製造レ児頭ヲ鉗レ徐々拖曳スレハ必ラ
ス母子安然ニ
横産ノ如キハ産母ヲ助クルヲ專一トシ胎児
ハ破碎シテ出スヲ捷徑トス徐々妙術ヲ施サ
ント欲セハ返テ母子兩斃ノ憂アラシ

産科実験録終

版權免許

明治十三年五月十一日
同年六月出版


定價二十五錢

著述
出版人

加藤寧蔭
東京神田區錦町
一丁目十番地

發兌

島村利助
同日本橋區馬喰町
二丁目五番地



東 京 圖 書 館

函 八 二

門

架 三

部

號

類

249
1
30

加藤寧蔭著
産科實驗録

圓意堂藏

059829-000-5

特25-734

産科實驗録

加藤 寧蔭 / 著

M13

CBI-0063

