

十九日 一般状態前日ノ如シ
子宮底ハ臍下三指横徑、收縮佳良
悪露血性、量普通、臭氣無シ

血液検査 赤血球六四〇〇〇〇

赤血球及ビ白血球ノ比五一二ニ對シ一

處置 一、水蛭一五〇條ヲ胸前壁ニ貼ス

二、處方

一、硫麻 一〇〇 稀鹽酸 一〇 單舎 五〇 水 一〇〇〇

右一日三回食後一時間内服

二、硫酸スバルテイン 〇・三

右丸薬トシテ一日三回食間内服

朝體温三十八度、脈、百〇、八、至、夕體温三十六度、脈八十四至

二十日 脈細小緊張弱キモ正調ニシテ呼吸、困、難、心、悸、亢、進、ナ、ク、心、臟、濁、音、界、ノ、變、化、無、ク、肺、動、脈、第、二、音、ハ、旺、盛、ス、浮、腫、稍、々、減、退、シ、膝、蓋、腱、反、射、ハ、消、失、シ、腓、腸、筋、壓、痛、ア、リ、長、廻、後、筋、ニ、モ、亦、壓、痛、ア、リ、悪、露、血、性、漿、液、性、ニ、シ、テ、多、少、臭、氣、ア、リ

子宮底ハ恥骨縫際上二指横徑ニアリ

尿量減少溼潤シ酸性蛋白ナク、インゲカシ著明

便通五回、朝體温三十六度、脈八十四至、夕體温三十六度、脈八十至

二十一日 脈正調可ナリ緊張シ九十至ヲ算ス頻回ノ下痢アリ一般状態益々佳良トナリ知覺ノ異常ナシ

肺臟ハ皮膚ニ高度ノ浮腫アリテ打診上ノ變化ハ不明ナリ心臟右界ハ胸骨左緣、心尖搏動ハ第五肋間ニシテ乳線ノ内方ニアリ心尖第一音ハ不純、肺動脈第二音ハ旺盛ス

子宮底ハ臍下三指横徑、收縮佳良、悪露血性漿液性臭氣無シ

朝體温三十六度、脈八十八至、夕體温三十六度四分、脈九十八至、便通八回

處方 前方

二十二日 朝體温三十六度、脈八十六至、夕三十六度二分、脈八十六至、便通十回、一般状態佳良ニシテ浮腫著シク減退ス心臟濁音界ハ一指横徑右方ニ擴張シ肺動脈第一音ハ不純ニシテ第二音ハ旺盛ス腹壁ハ弛緩シ陷凹ス子宮底ハ臍ト恥骨縫際ノ中間ニアリ收縮通常硬度稍々軟、悪露ハ漿液性少量ナク臭氣無ク下肢ハ知覺異常アリ膝蓋腱反射ハ消失シ脈細小微弱正調

二十六日 肩胛部ニ尙ホ浮腫ヲ殘シ心臟濁音界ニハ變化ナク心尖第一音ハ不純、肺動脈第一音不純ニシテ第二音ハ旺盛ス脈細小微弱、類數、患者自ラ著シク病苦ノ輕減セルヲ告グ腓腸筋壓痛甚シ

朝體温三十六度八分、脈七十八至、夕體温三十六度二分、脈八十六至、便通十回

二十七日 前、夜、來、胸、内、苦、悶、ヲ、訴、ヘ、呼、吸、困、難、アリ、脈、ハ、甚、ダ、細、小、ニ、シ、テ、頻、數、ナル、モ、正、調、ナリ
 水、經、百、五、十、條、ヲ、胸、前、壁、ニ、貼、シ、カ、ン、フ、ル、一、筒、ヲ、皮、下、ニ、注、射、ス、午、後、五、時、再、ビ、濁、血、ヲ、行、ヒ、後、〇・
 六、〇、食、鹽、水、千、瓦、ヲ、皮、下、ニ、注、入、ス、後、二、時、間、毎、ニ、カ、ン、フ、ル、一、筒、ヅ、ツ、ヲ、注、射、セ、リ
 朝、體、溫、三、十、六、度、脈、七、十、四、至、夕、體、溫、三、十、七、度、九、分、脈、百、〇、二、至、午、後、十、一、時、惡、寒、戰、慄、ヲ、以、テ、體
 溫、三、十、九、度、三、分、ニ、上、昇、ス、脈、ハ、細、小、頻、數

處 方

一、硫、麻 二〇〇 稀、鹽、酸 一〇〇 單、舍 一〇〇〇 水 一〇〇〇〇

右、一、日、三、回、食、後、一、時、間、内、服、セ、シ、ム

二、ゲ、キ、タ、リ、ス、葉、末 〇・三 「ヂ、ウ、レ、チ、ン」 一〇〇 乳、糖 一〇〇

右、一、日、三、回、食、間、内、服、セ、シ、ム

二十八日 一般狀態稍々佳良ニ趣キ脈正調可ナリ緊張ス心濁音界ニ變化ナク肺動脈第二
 音、尚、旺、盛、シ、呼、吸、困、難、ノ、狀、態、ヲ、呈、ス、下、腹、部、ニ、壓、痛、アリ、浮、腫、ハ、全、ク、消、失、シ、知、覺、異、常、無、シ、脾、腸
 筋、ニ、ハ、尚、ホ、壓、痛、アリ、膝、蓋、腱、反、射、ハ、消、失、ス、朝、體、溫、三、十、六、度、八、分、脈、百、二、十、至、夕、體、溫、三、十、六、度
 三、分、脈、百、〇、二、至、便、通、四、回
 二十九日 自覺障礙稍々輕快シ脈ハ可ナリ緊張シ正調ナリ心臟濁音界ノ擴張ナク肺動脈
 第一、音、不、純、第、二、音、旺、盛、ス
 朝、體、溫、三、十、六、度、七、分、脈、百、十、四、至、夕、體、溫、三、十、六、度、七、分、脈、八、十、六、至、便、通、一、回

三十日 患者輕快ヲ覺ユ脈正調可ナリ緊張シ七十ヲ算ス心臟濁音普通、心尖第一音不純、肺
 動、脈、第、一、音、不、純、第、二、音、旺、盛、ス

血液検査 赤血球三五〇〇〇〇、白血球四一六六、兩者ノ關係八七七、一

十月二日 一般狀態益々佳良トナリ心臟濁音界普通、肺動脈第一音不純ニシテ、第二音旺盛
 ス、腹、壁、ハ、弛、緩、シ、陷、凹、ス、下、肢、ハ、瘦、削、シ、脾、腸、筋、壓、痛、著、明、膝、蓋、腱、反、射、ハ、消、失、ス、長、廻、後、筋、ニ、壓、痛
 ア、リ、脈、可、ナ、リ、緊、張、シ、多、少、頻、數、ナ、リ

朝、體、溫、三、十、六、度、脈、七、十、四、至、夕、體、溫、三、十、六、度、六、分、脈、八、十、八、至、便、通、七、回

三日 肺臟左第二肋間以下濁音ヲ呈シ少許ノ水泡音ヲ聽キ呼吸音微弱ナリ脈細小百至、便
 通、二、回

四日 脈可ナリ緊張ス不正九十至ヲ算シ時々重複脈ヲ呈ス心臟濁音界變化ナシ肺動脈第
 一、音、不、純、第、二、音、旺、盛、ス、膝、蓋、腱、反、射、ハ、消、失、シ、脾、腸、筋、壓、痛、ア、リ、兩、肺、背、面、下、方、濁、音、ヲ、呈、シ、聲、音
 震、顫、消、失、シ、呼、吸、音、甚、ダ、幽、微、ト、ナ、ル

朝、體、溫、三、十、六、度、二、分、脈、八、十、六、至、夕、體、溫、三、十、六、度、六、分、脈、八、十、二、至、便、通、ナ、シ

五日 前、日、ト、變、化、ナ、シ

體、溫、上、昇、無、ク、便、通、ナ、シ

六日 體、溫、上、昇、無、ク、便、通、一、回

七日 體、溫、上、昇、無、ク、便、通、ナ、シ

八日 同上
 九日 心臟濁音界ニ變化無ク肺、動脈、第一音不純、第二音旺盛、下肢、瘦削、腓腸筋壓痛著明、膝蓋、反射、足趾、反射消失、
 朝體溫三十六度二分、脈八十至、夕體溫三十五度八分、脈八十二至、便通無シ
 十日 無熱、便通二回
 十一日 無熱、便通無シ
 十二日 心臟濁音界變化無シ肺動脈第二音尙少シク旺盛ス下肢、筋肉、瘦削セシモ、運動障礙無シ膝蓋、反射、全ク消失シ下肢知覺鈍麻アリ腓腸筋壓痛尙ホ存ス
 朝體溫三十六度四分、脈九十六至、夕體溫三十六度八分、脈七十至、便通一回
 十三日 便通一回
 十四日 便通三回
 十五日 便通無シ
 十六日 一般狀態頗ル佳真、脈緊張充實、正調、心臟濁音界ノ擴張ナル肺、動脈、ハ第二音旺盛ス知覺鈍麻ハ漸次輕減シ腓腸筋ノ壓痛尙ホ存シ膝蓋、反射、消失ス、退院ス
 本例ニアリテハ妊娠末期ニ水腫性脚氣ノ症狀現ハレ分娩時ニハ假死ノ状態ヲ以テ胎兒娩出セラレ爾後水腫ハ殆ンド全ク消退セシガ產後第九日ニ至リ衝心状態トナリ一時危篤ニ陥リシモ再ビ症狀輕快シテ爾來神經脚氣ノ症狀ヲ遺シ下肢、筋肉、瘦削、下肢、知覺鈍麻、膝

第七十三例 宮本某 三十五年 職人 經妊

蓋、膝、反射、消失等ノ症狀ハ長ク消退ニ至ラザリキ
 既往症 生來健全著患ヲ知ラズ十六年一ヶ月月經來潮シ爾來正調三四日間持續シ量中等臭氣無シ十七年婚嫁シ既ニ二男ヲ分娩ス昨年十二月二十二日以來月經閉止ス目下妊娠十ヶ月豫定分娩期八月二十九日
 主訴 二週間以前ヨリ高度ノ浮腫起コリ心悸亢進胸内苦悶ヲ訴フ
 入院 四十四年九月五日
 體格中等榮養稍々不真、全身高度ノ浮腫アリ顔貌蒼白浮腫狀ヲ呈ス乳房ヨク發育シ色素沈著著シク未ダ初乳ヲ分泌セズ心臟濁音界ハ浮腫並ビニ發育セル乳房ニ蔽ハレテ明チカニ診定スルコト能ハズ心悸亢進シ肺動脈第二音著シク旺盛左肺背面ノ下部呼吸音微弱腹部膨滿シ腹圍九十四仙迷ヲ算シ且腹壁ノ浮腫著シ子宮底ハ臍ト劍狀突起ノ中間ニ在リ兒頭ハ骨盤入口上ニ於テ容易ニ移動シ胎兒心音ハ右臍線ノ中央ニ於テ著明ナリ下肢ニ高度ノ浮腫アリ知覺ノ異常ナク膝蓋、反射、消失ス尿ニハ蛋白ノ痕跡ヲ認ム無熱、脈九十、疏麻一五〇チ與ヘ安息香酸曹達コヘイン〇六、ヂャレテンニ〇チ散トシテ與フ
 六日 無熱、脈頻細百、便通二回
 七日 無熱、脈九十、便一回、心臟、右界ハ胸骨左緣ヨリ約一指橫徑右方ニ擴張セルモノハ如シ浮腫多少減退ニ傾ケリ

八日 無熱、脈百八、便通二回、心悸亢進益々甚ダシク、浮腫増加ス、胎兒部分ハ腹壁高度ノ浮腫ノ爲メニ觸知スルコト困難ナリ、硫酸二〇〇ニ増量ス

九日 心臟部疼痛ヲ訴ヘ尿量減少、浮腫増加シ、一般状態佳良ナラズ時々陣痛アリ

分〇〇〇〇
九日 午後四時頃ヨリ陣痛漸次強盛トナルヲ以テ六時産室ニ移ス、同時ニ破水ス、七時四十分死、男兒ヲ分娩ス、八時胎盤娩出、子宮底ハ臍高ニ在リ、收縮稍々不充分、後出血ナシ、體温三十六度九分、脈百十

十日 朝三十六度三分、脈九十八、晝三十六度九分、脈百二、午後三時三十七度五分、脈百八、夕三十七度、脈百十四、二時間毎ニカンフル二〇〇ツツヲ注射シ、水経五十條ヲ胸部ニ貼用シ、芥子ノ脚湯ヲ行ヒ、傍ラ多角劑ニ硫酸三〇〇〇ヲ混シ、水劑トシテ與ヘ散トシテ實斐多利斯〇・五、安息香酸曹達コヘイン一〇ヲ與フ

十一日 朝三十六度八分、脈百四、晝三十七度二分、脈百四、夕三十八度二分、脈百八、便通一回、尿ニ蛋白ノ痕跡ヲ認ム、インザカン著明ニ存ス

十二日 朝三十七度六分、脈百二十、晝三十七度五分、脈百二、夕三十八度四分、脈百八、便通一回、乳房緊滿疼痛ヲ訴フ、腹部ハ膨滿シ、且壓痛アリ、食鹽水ノ腸洗滌ヲ行フ、心悸亢進甚ダシク、心音ハ一般ニ不純ニシテ全身浮腫尙ホ未ダ去ラズ、呼吸音ハ一般ニ粗裂ニシテ患者胸内苦悶ヲ訴フ、子宮底ハ臍高ニアリ、收縮不充分、壓痛アリ、惡露血性、量多量、臭氣ナシ

十三日 朝三十七度五分、脈百八、晝三十八度三分、脈百二十、夕三十八度六分、脈百二十、便通一回、脈軟、數、心悸亢進甚ダシク、肺動脈第二音旺盛、右肺背面ノ下部ハ濁音ヲ呈シ、兩肺一面大小ノ水泡音ヲ聽ク、腹部ハ高度ニ膨滿シ、鼓音ヲ呈シ、子宮底ヲ觸知スルコト難ク、且ツ下腹部ニハ壓痛アリ、惡露血性、漿液性、多量、下肢ニ高度ノ浮腫アリ、膝蓋腱反射消失、腸洗滌ヲ行ヒ、胸部ニ濕布心臟部水囊ヲ貼シ、デカール二〇ヲ注射ス

十四日 朝三十六度八分、脈百二十、晝三十七度三分、脈百二十、夕三十七度八分、脈百二十六、便通二回、脈細、小頻數ナリ、瞳孔縮少ス、兩肺ニハ尙ホ大小水泡音ヲ聽キ、心悸亢進、全身浮腫尙ホ去ラズ、胃及ビ腸ハ著シク膨滿ス、アドレナリン一〇五ヲ注射シ、千倍サリチール酸エセリン一液一筒ヲ注射ス

十五日 朝三十六度八分、脈百十四、晝三十七度三分、脈百八、夕三十八度八分、脈百三十二、便通一回、脈細、小頻數、心悸亢進益々甚ダシク、兩肺一面大小水泡音ヲ聽ク、腹部益々膨滿シ、全身ノ浮腫減退セズ

十六日 午前六時三十八度九分、脈百三十二、九時三十九度、脈百三十八、脈細、小頻數トナリ、呼吸困難、正午遂ニ死亡セリ

病理解剖記事

全身高度ノ浮腫ヲ呈ス、體格中等、榮養佳良ノ一女屍、後強直ハ既ニ消失シ、下肢ニ於テ殊ニ著明ノ浮腫アリ、死斑ハ頗ル著明ニ存ス、陰脣ニモ亦高度ノ浮腫ヲ來セリ、腹壁ヲ切開スルニ皮

下脂肪組織ハヨク發育シ其ノ厚サハ大約二、半仙迷ヲ算ス筋層ハ普通ノ状態ニアリ腸管殊ニ大腸ハ強ク膨滿シ多量ノ瓦斯ヲ有ス大網膜ノ脂肪量ハ多量ナリ腹腔中ニ甚ダ少量ノ透明ナル赤褐色ノ液體アリ横膈膜高サハ左右共ニ第五肋間ノ高サニ一致ス胸腔ヲ開クニ左右ノ肋膜腔中ニ透明赤黄色ノ液百八十五ヲ有ス肺左右共ニ遊離ス心臓ハ滑澤ニシテ中ニ透明赤黄色ノ漿液普通量ヲ有ス心臓ハ脂肪多量ニ附著シ心臓全體ニ弛緩ス、心臓中ニハ甚ダ少量ノ半バ凝固セル血液ヲ有セリ瓣膜裝置竝ビニ心内膜ハ瀰蔓性ニ血色素ノ浸潤ヲ見ルノ外他ニ變化無ク右心室左心室筋壁ノ厚サハ通常ナリ其實甚ダ軟化シ且ツ潤濁シ黄綠色ヲ呈ス

肺左右共ニ著明ナル鬱血ヲ呈セルノミ脾一五〇、八〇、二〇〇鬱血シ硬度軟、剖面暗赤色ヲ呈シ多量ノ血液ヲ有ス左腎十二〇、七〇、四〇、被膜剝離シ易シ表面滑澤剖面ニハ著明ナル變化ヲ認メズ皮髓境界明ラカナリ質軟右腎一一五、七五、四〇、被膜剝離シ易シ皮質ノ一部ニ當リテ小ナル三角形ノ病床アリ其色黄色ニシテ其周圍ハ著明ナル充血ヲ呈ス其他ハ左腎ニ同シ胃中ニ褐色ノ液體中等量ヲ含有ス粘膜炎ノ靜脈ハ著シク擴張ス肝臟大サ一九〇、一二〇、六〇、質頗ル軟、剖面比較的血液ニ富ミ黄褐色ニシテ質頗ル脆ロシ膿囊ハ稍々多量ノ膽汁ヲ有ス膀胱ハ擴張シ粘膜炎、唯尿道開口部ノ周圍ニ於テ充血ヲ呈セルノミ盲腸部ニ變化ヲ認メズ腔ハ擴張シ粘膜炎ハ一般ニ充血シ子宮ハ腫大ス長サ二〇〇、幅二〇〇ヲ算ス粘膜炎一面瀰蔓性ニ暗赤色トナリ子宮體前壁ノ粘膜炎ハ島狀ニ汚穢灰白黄色ノ偽膜ノ附著スルヲ見ル其ノ

數、十個許リニシテ其ノ粘膜炎ノ表面ニアリテ之レヲ剝離スル事困難ナリ
 病理〇解剖的〇診斷

義膜性子宮體炎 腎梗塞

本例ハ妊娠末期ニ於テ急性水腫性脚氣ノ症狀ヲ起セシモノニシテ遂ニ死胎兒ヲ分娩シ分娩後モ亦心臓機能回復セズ加フルニ產褥傳染ノ症候ヲ現ハシ次テ肺水腫ノ症狀ヲ起シ鬼籍ニ入ルニ至レリ剖見上義膜性子宮體炎ヲ證明シタレバ產褥傳染ノ合併セシヤ明カナリ新ク本例ノ如何等處置ヲ加ヘズ自然分娩ヲ遂ゲシモノニアリテハ產褥經過ハ甚ダ佳良ナルニ產褥傳染ヲ受ケタル是レ亦吾人ノ一考ヲ價スルモノト云ハザルベカラズ

第七十四例 濱口某 二十二年 理髮業 經妊

既往症 生來健全著患ヲ知ラズ十八年八ヶ月月經初潮シ爾來正調四日間持續シ量多量、輕度ノ腰痛ヲ伴フ十九年九ヶ月ニシテ結婚シ一女ヲ分娩ス今度ノ最終月經ハ四十二年八月十六日ニシテ現時妊娠十ヶ月分娩豫定期日五月廿三日)

主訴 二三日以前ヨリ下肢ニ浮腫起リ膝關節ノ疼痛ヲ訴フ

入院 四十三年六月二十三日

現症 體格大、榮養稍々不良、顔貌蒼白、舌苔アリ脈百二ヲ算ス乳房ノ發育佳良ニシテ初乳ヲ分泌ス心臓右界ハ擴張シ心尖搏動ハ第五肋間ニ於テ乳線上ニ在リ心尖第一音不純、同第二音著シク旺盛且ツ分裂ス右肺炎呼吸音微弱、腹部膨滿、腹圍九十三仙迷ヲ算ス腹形球狀ヲ呈

子宮底ハ劍狀突起下四指横徑ニ在リ兒頭下方ニ在リ骨盤入口上ニ於テ尙ホ移動シ胎兒心音ハ右臍棘線ノ中央ニ於テ明カニ聽取シ下肢ニ稍々著明ノ浮腫アリ臍腸筋握痛アリ下肢竝ビニ手指ノ知覺鈍麻シ膝蓋腱反射全ク消失ス骨盤異常無ク尿ニ蛋白ノ少量ヲ證明シ大便祕結ス硫酸二〇〇瓦ヲ内服セシム

入院後著變ナク便通日々二三回アリ第六日分娩開始

分〇ノ〇經過

二十八日 午後五時頃ヨリ陣痛開始直チニ産室ニ移ス九時三十分カテーテルニテ排尿ス同時ニ石鹼浣腸ヲ行ヒ大量ノ排便アリ後、外陰部消毒ヲ行フ之際血液ヲ混セル粘液ヲ排泄ス九時三十分内診ヲ行フ子宮口全開大シ卵胞尙ホ存ス先進兒頭骨盤入口ニ固定ス外診上胎兒心音百十左臍棘線ニ於テ明カナリ陣痛發作一分五秒間歇五分陣痛微弱ナリ十二時破水胎兒心音緩徐九十ヲ算ス直チニ腹壁ヲ壓迫セシニ同四十分稍々高度ノ假死ノ状態ヲ以テ生ル直チニ臍帶ヲ切斷シ人工呼吸法ヲ行ヒシモ三十分後遂ニ死亡セリ胎兒娩出後稍々多量ノ出血アリシヲ以テ十分後クレテ氏壓出法ヲ行ヒ胎盤ヲ壓出セリ子宮底ハ臍高ニアリ硬度硬キモ尙ホ少量ノ出血持續セリ分娩後體溫三十七度八分脈百六午後三時顔面蒼白脈頻數軟百二心悸亢進甚ダシク肺動脈第二音旺盛子宮收縮不充充分惡露血性多量

三十日 午前六時三十七度七分脈九十九時三十七度五分脈九十正午三十六度五分脈九十九午後三時三十六度二分脈八十九六時三十七度八分脈九十二九時三十七度四分脈九十四便

通無シ尿閉ヲ起セシヲ以テ導尿ス舌苔アリ心臓右界ハ一指横徑擴張シ肺動脈第二音ハ旺盛腹部甚ダシク膨滿シ子宮底ヲ明ラカニ觸知スルコト能ハズ下腹部ハ一般ニ壓痛アリ惡露血性量多カラズ麥角劑ヲ投シ更ラニ硫酸一五〇瓦ヲ伍ス

七月一日 午前六時三十六度七分脈八十六九時三十六度五分脈八十二正午三十七度脈八十八午後三時三十七度五分脈九十三時三十七度八分脈九十九時三十八度脈九十二石鹼浣腸ヲ行フ子宮底ハ臍高ニ在リ硬度軟惡露少量ナルモ多少臭氣アリ左手腕關節甚ダシク發赤腫脹シ烈シキ疼痛アリ患者ハ家事上ノ都合ニヨリ退院セリ

本例ニ於テハ妊娠末期ニ於テ輕症脚氣ノ症狀ヲ表ハシ分娩時比較的短ナルニ關ラズ胎兒心音急ニ其ノ數ヲ減シタルヲ以テ急ニ娩出術ヲ講セシモ高度ノ假死状態ヲ以テ生レ遂ニ鬼籍ニ入レリ母體產褥ハ經過ハ中途退院セシヲ以テ詳細ニ記スルヲ得ズ

第七十五例 山本某 四十一歳 商人ノ妻

既往症 生來强健著患ヲ知ラズ妊娠ノ經過異常ナク三十八年九月二十日分娩ス分娩經過亦普通十月二日全身浮腫兩下肢ハ麻痺ヲ主訴シテ當院ニ入院ス

現症 身長大體格上等榮養佳其肌肉及皮下脂肪ノ發育亦佳其顔貌蒼白貧血ヲ呈ス浮腫狀ニシテ全身ニ高度ノ浮腫アリ意識明瞭瞳孔左右同大光ニ反應ス兩下肢ハ弛緩性麻痺ヲ呈シ他動的ニ運動ヲ試ムルニ甚ダシキ疼痛ヲ訴フ下肢筋及下腹部ニ壓痛アリ且尿閉ス脈ハ正調頻數充實ス心尖搏動ハ普通ノ部位ニアリ心臓濁音界變化ナク心音第一音ハ凡テ雜音

トナリ肺、動脈、第二音旺、盛、子宮底ハ臍下三指横徑收縮不全、硬度軟、惡露少量汚穢、臭氣アリ膝蓋、腱、反射全ク消失ス、尿透明酸性比重一〇二五、蛋白ナク、インザカン」ノ反應著明、大便失禁ス、無熱

處 置

一、麥角浸(五〇) 一〇〇〇

二、硫酸スバルテイン」 〇・三

三、純牛乳療法

夜中烈シキ胸、内苦悶、及心悸亢進、アリ、顔面チアノーゼヲ呈ス、脈充實スルモ頻數ナリ直ニ水蛭五十條ヲ胸部ニ貼ス患者之ガ爲メ少シク輕快ヲ覺ユ

三日 水蛭ヲ貼シテ以來患者病症ノ輕快ヲ覺ユ然レドモ尙ホ尿閉シ大便ハ不隨意ニ排泄ス無熱、朝脈百二至、夕百四至

四日 脈正調充實、心臟濁音界變化ナシ大便ヲ排泄ス瞳孔左右同大、反應普通、無熱、脈百至

處 置

一、阿片

〇・一

二、硫酸スバルテイン」

〇・五

六日 心臟濁音界變化ナシ心尖ニ於テ縮期ノ雜音ヲ聽キ肺、動脈、第一音不純、第二音旺、盛、子宮底ハ恥骨縫際上三指横徑ニアリ肺、腸、筋、痛甚シク膝蓋、腱、反射全ク消失ス大便多少便秘ノ

傾向アリ尿量ハ著シク増加セリ無熱

七日 一般狀態佳良浮腫輕減ス

朝體溫三十七度、脈百至、夕體溫三十七度、脈百至、便通ナシ

八日 患者ハ膀胱充滿シ且疼痛ヲ訴フ大便便秘、無熱、脈百二至

九日 全身ノ知覺ハ鈍麻シ心臟濁音界ニ變化ナク心尖第一音不純、肺動脈、第二音旺、盛、子宮底臍下四指横徑、收縮佳良、膝蓋、腱、反射全ク消失、肺腸、筋、及ビ長廻後筋ニ壓痛アリ尿閉止ス、大便便秘、浣腸ス

十一日 尿閉傾秘、全身知覺ノ鈍麻、下肢ハ全ク弛緩性麻痺ヲ呈シ「アタキシ」著明ニシテ膝蓋、腱、反射消失ス浮腫ハ著シク輕減シ瞳孔左右同大反應ス無熱、朝脈九十二至、夕九十至、石鹼浣腸ス

十二日 異常ナシ一般狀態益々佳良ニ趨ク

十八日 自然ニ排尿シ時々惡寒アリシモ一般ノ狀態ハ頗ル佳良ナリ然レドモ舌ハ少シク麻痺シ言語不明瞭トナレリ味神ニハ別ニ變化ナク四肢ニ弛緩性麻痺アリ二頭腓筋、三頭腓筋、腱、反射普通、膝蓋、腱、反射及ビヒレス、腱、反射消失ス腓腸筋、及前腓筋ニ壓痛アリ心臟濁音界ニ變化無ク肺、動脈、第一音不純、第二音旺、盛、便秘セリ尿量三〇〇瓦、蛋白無ク、インザカン」少量、無熱

十九日 石鹼浣腸ヲ行フ

二十日 一般状態益々佳良、食慾良、患者大ニ輕快ヲ覺ユ脈正調、瞳孔左右同大反應アリ心臓濁音界變化ナク肺動脈第二音旺盛、右眼瞼ノ閉鎖不充分トナリ上肢ニ痙攣時々起リ拇、指、球少シク瘦削ス、アタキシシ、尙ホ著シク上肢ノ運動障礙ハ益々其度ヲ加エタルモ之レニ反シテ下肢ノ運動障礙ハ著シク輕快シ膝、蓋、趾、反射ハ尙ホ現ハレズ患者ハ自身ニ起立スルコト能ハズ、全身知覺鈍麻モ亦輕快シ其他膀胱及直腸ニ於ケル障礙ハ之レヲ認ムルヲ得ズ無熱、患者ノ希望ニヨリ退院セシム

本例ニ於テ妊娠中ニ脚氣アリシヤ否ヤ不明ナルモ患者ノ訴ニヨレバ分娩後全身浮腫、下肢ノ運動障礙主訴ヲ以テ入院セリ水腫性脚氣ノ症狀顯著タリ爾後症狀急ニ輕快シ神經性脚氣ノ症狀ヲ殘セリ

第七十六例 能登某 四十一年 大工ノ妻 經妊

既往症 月經初潮十六年十ヶ月、爾來正調三乃至四日持續障礙無シ十六年十ヶ月結婚シ四男四女ヲ安産ス最終月經ハ十二月五日ニシテ現今妊娠十ヶ月(分娩豫定九月十七日)

主訴 下肢、下腹部手指ニ於ケル知覺鈍麻及ビ下肢ニ於ケル浮腫

入院 四十三年九月十日

現症 體格中等、榮養稍々不良、苦昔無ク乳房ノ發育充分ナラズ乳嘴乳暈ノ著色モ亦著シカラズ壓搾ヲ加フルモ初乳ヲ分泌セズ脈正調充實七十五ヲ算ス手指ニ知覺鈍麻アリ上肢體反射亢進ス心臓、濁音、界、右、側、ハ、僅カニ擴張シ心尖第一音肺動脈第一音不純、同第二音旺盛、右

肺炎抵抗アリ腹部膨滿腹圍ハ十七仙迷ヲ算ス子宮底ハ臍ト劍狀突起トノ中間ニアリ兒頭ハ骨盤入口ニ固定シ胎兒心音ハ右臍線ノ中央ニ於テ聽取ス下肢ノ知覺ハ鈍麻シ且ツ輕度ノ浮腫ヲ認メ膝蓋趾反射全ク消失ス食慾佳良、便秘ス尿中蛋白無クインヂカシ著明ナリ入院後ノ經過

十一日 朝三十六度三分、脈九十四、夕三十六度五分、脈百二、便秘ス疏麻二〇〇瓦ヲ與フ

十二日 朝三十六度五分、脈百十二、夕三十六度五分、脈八十六、便秘二回

十三日 早朝ヨリ陣痛發作アリ午前九時產室ニ移ス九時二十分陣痛發作三十秒、間歇一分二十秒、胎兒心音百三十六正調、九時四十五分發作四十五秒、間歇一分、十時四十五分外陰部ヲ消毒シ石鹼浣腸ヲ行ヒシニ大量ノ排便アリ同時ニ自然排尿アリ陣痛發作五十秒、間歇一分、十一時八分胎兒心音百三十六、陣痛著シク微弱ナルヲ以テ同三十分腹部ニ熱性濕布ヲ行フ午後零時十二分破水同五十三分發作四十秒、間歇一分二十秒、午後一時導尿シ同時ニグリセリン浣腸ヲ行フ胎兒心音不良ナルヲ以テ胎兒壓出法並ビニリツトゲン、ガルス、ハワセン氏法ヲ試ミシモ其目的ヲ達セズ一時五十二分内診ヲ行フ先進兒頭ハ既ニ骨盤腔ノ廣部ニアリ子宮口ハ全開大シ卵胞既ニ破レ頭毛ヲ觸知ス大小顫門及ビ縫合ヲ觸知セズ產瘤ハ著シク増大シ胎兒心音不良トナリシヲ以テ二時十七分錯子ヲ以テ娩出ス爾後出血アリシヲ以テ同二十分クレテ氏胎盤壓出法ヲ行ヒ胎盤ヲ壓出ス子宮底ハ恥骨縫際上四指橫徑ニア

リ後出血ナク收縮佳良
産褥ノ経過

第一日 午前九時三十六度五分、脈百四、正午三十七度八分、脈百十四、午後六時三十六度三分、脈九十、便通ナシ心悸亢進、兩肺到ル所笛聲啞軌音ヲ聽ク子宮底ハ臍下二指横徑ニアリ壓痛無ク惡露多量、血性、臭氣無シ胸部濕布ヲ行ヒ麥角劑ヲ與フ

第二日 午前九時三十五度六分、脈九十八、正午三十六度三分、脈九十、午後三時三十六度四分、脈百六、便通一同、心音不純、肺動脈第二音殊ニ著シク旺盛、子宮底ハ臍下三指横徑ニアリ惡露血性臭氣ナク下、肢ニ輕度ノ浮腫アリ膝蓋腿反射消失ス

第三日 午前九時三十六度脈九十、正午三十六度二分、脈九十八、午後六時三十六度五分、脈百八、便通一同

第四日 午前九時三十五度五分、脈百一、正午三十六度四分、脈百十六、午後六時三十六度八分、脈百二、便通ナシ心悸亢進著シク肺動脈第一音不純、同第二音旺盛、子宮底ハ臍下劍狀突起ノ中央ニアリ惡露血性汚穢色ヲ呈シ量多ク臭氣アリ

第五日 午前九時體溫三十六度九分、脈百八、正午三十六度六分、脈百二十、午後六時三十七度、脈百十二、便通一同

第六日 午前九時三十七度一分、脈百四、正午三十七度一分、脈九十六、午後六時三十七度二分、脈百十四、便通一同心悸亢進シ兩肺尙ホ笛聲及啞軌音ヲ聽ク子宮底ハ臍下恥骨縫際ノ中央

ニ在リ下、肢ニ運動障礙アリ起立及ビ歩行不能トナリ輕度ノ浮腫尙ホ存シ膝蓋腿反射ハ全ク消失ス惡露汚穢色ヲ呈シ量多ク臭氣アリ尿酸ストリヒニンノ注射ヲ行フ以後隔日一回千倍液一瓦宛注射セリ

第七日 午前九時三十六度九分、脈百八、正午三十六度八分、脈百八、午後六時三十六度六分、脈百六、便通三回、子宮硬度軟、惡露臭氣アリ量多シ

第十二日 午前九時三十六度三分、脈百二、正午三十六度、脈九十、午後六時三十六度七分、脈九十六、聽診上心音次第ニ普通狀態ニ復スルモノノ如シ子宮收縮佳良、惡露少量臭氣アリ膀胱筋ノ萎縮ヲ來セリ

第十四日 略、治療退院ス
妊娠末期ヨリ脚氣ニ罹リ產褥ニ至リ症狀次第ニ輕快セシモ遂ニ下、肢ノ筋肉萎縮ヲ來シ長ク運動障礙ヲ遺セシ例ナリ

第七十九例 青木某 二十九歳 驛夫ノ妻 經妊

既往症 生來健全著患ヲ知ラズ十七年三月月經初潮シ爾來正調七日間持續、月經時障礙ナシ二十五年婚嫁シ既ニ二回分娩ス最終月經ハ十二月八日ニシテ現時妊娠十ヶ月豫定分娩期九月十五日)

主訴 高度ノ浮腫、心悸、亢進

入院 四十一年九月二十四日

現症 體格榮養中等全、身ニ浮腫アリ、脈稍々頻數、舌苔無シ、乳房發育佳、其初乳ヲ分泌ス、心臟濁音界普通、心尖第一音及ビ肺動脈第一音不純、同第二音旺盛、肺尖及ビ右肺背面ノ上部呼吸氣延長シ、同下部呼吸音微弱、腹部膨滿シ、子宮底ハ劍狀突起、下四指橫徑ニアリ、兒頭ハ骨盤入口ニ固定ス、胎兒心音ハ中央ニ於テ著明ニ聽取ス、下肢ニ高度ノ浮腫アリ、知覺鈍麻シ、腓腸筋緊滿シ、握痛アリ、膝蓋腱反射消失ス、食慾不進、尿量減少、尿中蛋白ノ少量ヲ證明ス、便通秘結

二十五日 顔貌浮腫狀ヲ呈シ、下肢ニ運動障礙、下肢及ビ手指ニ知覺鈍麻アリ、腓腸筋痛甚クシク、膝蓋腱反射消失

二十六日 朝來時々陣痛發作アリ、午後九時產室ニ移ス、同四十分石鹼浣腸ヲ行ヒ、カテーテル「排尿管」ヲ行フ、陣痛微弱ニシテ間歇長ク十一時三十分「グリセリン」浣腸ヲ行ヒ、カテーテル「排尿管」ヲ行フ

二十七日 一時三十分破水直チニ娩出ス、胎盤ハ母體面ヲ以テ生ル、子宮底ハ臍下三指橫徑ニアリ、收縮佳、體溫三十七度、脈百二

二十八日 朝三十六度、脈九十、夕三十七度、脈九十二、便通一回、尿量二百瓦、歩行ハ障礙アリ

二十九日 朝三十六度、脈九十、夕三十六度、脈百二、便通三回、尿量四百瓦、心臟濁音界普通、肺動脈第二音旺盛、心悸亢進、甚クシク、子宮底ハ臍下三指橫徑ニアリ、硬度稍々軟ニシテ、壓痛アリ、惡露血性稍々多量、臭氣無シ、下肢ニハ浮腫著シク、知覺鈍麻シ、膝蓋腱反射消失ス、硫酸(二〇〇)ヲ水劑トシテ他ニ、實芝多利斯浸ニ「ザウレナン」ヲ混シ與フ

三十日 朝三十六度一分、脈九十六、夕三十六度七分、脈八十、全身ノ浮腫多少減退シ、脈大軟、頻數、舌苔無シ、心臟濁音界普通、心尖第一音不純、肺動脈第二音旺盛、肺臟ハ一般ニ呼吸音微弱、腹部膨滿シ、子宮底ハ臍下三指橫徑ニアリ、硬度軟、壓痛アリ、惡露汚穢多少、臭氣アリ、下肢ニハ知覺鈍麻及ビ浮腫尙ホ著明ニシテ、運動障礙アリ、腓腸筋痛甚クシク、初生兒黃疸ヲ發ス

十月一日 無熱、脈頻數百十四、ヲ算ス、便通三回、尿量四百五十瓦

三日 顔貌蒼白、浮腫狀ヲ呈ス、子宮底ハ耻骨縫際上三指橫徑ニ在リ、便通二回、尿量四百瓦

四日 乳兒吐乳頻々、タリ、遂ニ人工榮養法ヲ行フ、便通四回、尿量八百、千倍硝酸ストリヒニン「液」ノ注射ヲ持續ス

八日 離乳後乳房緊滿甚クシキモ、授乳スレバ再ビ吐乳スルヲ以テ全ク廢止シ、濕布及提乳帶ヲ施ス、子宮底ハ臍下四指橫徑ニ在リ、辛ク、フジテ、獨立歩行スルヲ得ルニ至レリ

十三日 子宮底ヲ觸知スルコト困難ナリ、惡露白色少量、便通一回、尿量三百瓦

十五日 心臟濁音界普通、肺動脈第二音ハ旺盛シ、子宮底ヲ觸レズ、惡露殆ンド消失ス、下肢ニ浮腫無キモ、知覺鈍麻シ、膝蓋腱反射消失、歩行未ダ不確實ナリ、退院ス

本例ニ於テハ、妊娠末期ニ水腫性脚氣起コリ、分娩ハ容易ニ經過セシモ、初生兒ハ母乳ヲ與ヘ居リシニ、母乳ヲ與フルコト一週間ニテ吐乳起コリ、シテ人工榮養ニ代ユルノ止ムナキニ至レリ、爾來初生兒ハ健康トナリ、母體ハ產褥中發熱無キニ脈搏常ニ頻數、浮腫ハ消退シ、產褥第十七日ニシテ全ク消失スルニ至レリ、然レドモ歩行困難、知覺鈍麻、膝蓋腱反射未ダ現ハレ

ズ、所謂慢性、神經性、脚氣ノ、状態トナレリ

第八十例 露無某 二十六年 燒芋屋 初妊

既往症 月經初潮十四年一ヶ月爾來月經不順二十三年十一月ニシテ結婚シ四十二年十月十八日ヨリ月經閉止ス現今妊娠十ヶ月(豫定分娩期七月二十五日) 主訴 全身高度ノ浮腫、惡氣嘔吐、胸内苦悶等 入院 四十三年七月八日

現症 體格中等、榮養稍々不長、皮膚蒼白貧血ヲ呈ス全身高度ノ浮腫アリ心臟濁音部右界ハ左胸骨緣ヨリ約一指、橫徑、右方ニ在リ、心尖搏動第五肋間ニ於テ左乳線上ニ觸知ス、心尖第一音不純、肺動脈第一音雜音ヲ帶ビ、肺動脈第二音著シク旺盛、兩肺前面ノ上部呼吸音微弱、右肺背面ノ上部呼吸氣ノ延長著シク右肺背面ノ下部呼吸音殊ニ微弱ナリ腹部ハ一般ニ膨滿シ下腹壁ニハ高度ノ浮腫表ハレ、子宮底ハ劍狀突起下三指橫徑ニ在リ胎兒ノ部分ハ腹壁高度ノ浮腫ノ爲メ之ヲ觸知スルコトヲ得ズ胎兒心音モ亦之ヲ聽取スルコトヲ得ズ尙ホ觸診ノ際子宮壁收縮セリ其他骨盤計測上異常ヲ認メズ 同日午後ニ至リ腹痛起リ直ニ産床ニ移ス三時二十分破水シ同日四時四十五分死胎ヲ分娩(第一後頭位)シ四時五十三分胎盤娩出セリ胎兒娩出後ハ子宮收縮佳良ニシテ著シキ後出血無シ分娩後體溫三十八度五分、脈百五十、稍々不安ノ狀ヲ呈シ呼吸促進ス 産褥ノ經過

第二日 午前九時體溫三十七度四分、脈百、正午三十七度五分、脈百十、午後六時三十八度、脈百二十、便通一回、心尖第一音及肺動脈第一音ハ全ク雜音ヲ呈ス子宮收縮普通、惡露血性量稍々多量、心臟部ニ氷罷法ヲ貼シ傍ラ硫麻、ストロファンツス丁幾ゲキタリス劑等ヲ與フ 第三日 午前九時三十七度五分、脈百、正午三十七度、脈百二、午後六時三十七度、脈百二十、便通一回、尿中蛋白ノ痕跡ヲ認ム 第四日 午前九時三十七度五分、脈百、正午三十七度六分、脈九十五、午後六時三十七度五分、脈百十五、硫麻二〇〇瓦ヲ投セシニ僅カニ便通二回アリ 第五日 午前九時三十七度六分、脈百三十二、正午三十七度八分、脈百十二、午後六時三十七度六分、脈百十、細小類數、心悸亢進シ心尖第一音、肺動脈第二音、雜音ヲ帶フ子宮底ハ臍下恥骨縫際トノ中間ニアリ壓痛ヲ訴フ咳嗽時不隨意的ニ尿淋瀝ス腹部甚ダシク膨滿シ腹壁及下肢ハ浮腫著明ナリ膝蓋、腱反射消失ス 分娩後ヨリ産褥十四日ニ至ル迄ハ三十八度以下ノ發熱アリ以後平熱ニ復ス脈搏ハ時々百三十二及アコトアルモ多クハ九十前後ニシテ常ニ便秘ノ傾向アリ鼓腸ヲ起コシ患者著シク苦悶セリ内服トシテ硫麻ノ多量(二〇〇—二五〇瓦)ヲ投シ更ニ千倍エセリン水溶液一〇瓦ノ注射ヲ反復シ時々生理的食鹽水ノ腸洗滌ヲ行ヒタリ 第九日 心臟濁音界ハ僅カニ右方ニ擴張セルヲ認ム肺動脈第一音不純、同第二音旺盛、腹部膨滿著シク膝蓋、腱反射微弱ナルモ存シ浮腫未ダ去ラズ

第十一日 浮腫漸次減退シ始メタリ
 第十三日 腹部膨滿著シク減シ腹壁多少弛緩ス子宮ニ壓痛無シ
 第十八日 膝蓋腱反射現ハル
 第二十日 心臓濁音界ハ右方ノミナラズ更ニ左方ニモ一指横徑擴張スルモノノ如シ心尖部ニ於テ收縮的雜音ヲ聽キ肺動脈第二音ハ著シク旺盛ス
 第二十三日 身體多少羸瘦セルヲ認ム尙ホ筋肉ハ少シク萎縮ヲ始メタルモノノ如ク膝蓋腱反射亢進セリ
 第三十八日 心尖搏動ハ第五肋間ニ於テ乳線ノ上ニ在リ心尖第一音不純、同第二音旺盛、肺動脈第一音雜音ヲ帶フ第二音著シク旺盛ス
 第三十九日 略治療、退院ス
 本例ハ妊娠末期ニ於テ高度ノ水腫性脚氣ヲ起シタルモノニシテ分娩經過ニハ甚ダシキ障礙ヲ及ボサザリシモ胎兒ハ妊娠中ニ死亡シ、分娩期ヲ早メ、産褥ニ於テハ約二週間ニ亘ル程度ノ發熱アリ、産褥ノ經過順調ナラズ第二十九日ニ至リ辛フジテ獨立歩行シ得ルニ至リ三十九日、日ニシテ略治療、退院スルニ至レルモノナリ本例ハ母體ヨリモ寧ろ胎兒ニ障礙ヲ及ボスコト甚ダシク分娩ノ期日ハ豫定分娩期ヨリモ十日遲延セルニ係ハラズ其發育狀態ハ頗ル不長ニシテ加之死産スルニ至リシモノナリ

第八十一例 横井某 二十年 工女 初妊

既往症 生來健全著患ヲ知ラズ十三年七ヶ月月經初潮セシモ爾來不規則ニシテ四五日間持續スルモ量常ニ少量ナリ十八年十ヶ月婚嫁シ五月二十八日以來月經閉止ス目下妊娠十ヶ月(分娩豫定期二月四日)
 主訴 高度ノ浮腫
 入院 四十五年二月二十二日
 現症 體格中等榮養稍々不長全身著明ノ浮腫アリ顔貌浮腫狀ヲ呈シ脈、細、小、頻、數、舌苔アリ乳房適度ニ發育シ色素ノ沈著著シク初乳ヲ壓出シ得心臟右濁音界ハ左胸骨緣ニ在リ心尖搏動ハ第五肋間ニ於テ乳線ノ内方ニ於テ觸知ス心音ハ一般ニ不純ニシテ肺動脈第二音僅カニ旺盛、兩肺異常ヲ認メズ腹部膨滿シ腹圍九十仙迷ヲ算ス子宮底ハ臍及劍狀突起ノ中間ニ在リ兒頭ハ骨盤入口ニ固定シ心音ハ微弱ナルモ左側ニ於テ聽取スルコトヲ得、下肢ニ高度ノ浮腫アリ知覺鈍麻、腓腸筋痛等無シ膝蓋腱反射亢進ス骨盤計測上異常ヲ認メズ尿量ハ著シク減少シ尿中六%ノ蛋白ヲ有シ便秘結ス硫酸二〇〇、醋三〇〇ヲ水劑トシテ加ヘ更ラニ安息香酸曹達コヘイン一〇ヲ散トシテ與フ牛乳療法ヲ取ラシム
 診斷 妊娠腎臟炎
 十九日 無熱、脈九十、便通三回、胎兒心音不明ナリ
 二十一日 無熱、脈百二、便通三回、胎兒心音ハ右側ニ於テ僅カニ之ヲ聽取シ得タリ頭痛、視力障礙、嘔吐等無シ膝蓋腱反射消失ス入院以來浮腫減退セズ脈搏頻數、呼吸困難ヲ訴フルヲ以

テ二十二日人工早産術ヲ施セリ
分〇〇〇
分〇〇〇

二十二日 午後一時三十分産室ニ移シ直チニ排便排尿ノ後、外陰部消毒ヲ行フ三時三十分
子宮腔ニ「ブ」ヲ挿入シ同時ニ子宮頸管内ニ「メ」トロイリ「ン」ヲ挿入ス六時頃ヨリ軽度
ノ陣痛起レリ七時陣痛發作四十秒、間歇二分、胎兒心音百三十二、兒頭尙ホ移動ス九時三十分
破水ス同四十分兒頭排臨次テ五十分男兒娩出ス子宮底ハ臍下一指横徑ニ在リ會陰破裂及
後出血無シ九時五十七分胎盤胎兒面ヲ以テ生ル子宮底ハ臍下三指横徑ニ在リ收縮佳、後
出血無シ體溫三十六度四分、脈頻數百十ヲ算ス
産〇〇〇
經〇〇〇

二十三日 無熱、脈頻數百十、便通三回アリ顔貌蒼白浮腫狀ヲ呈ス心臓ノ濁音ハ普通、左方ニ
約一指横徑擴張セリ心尖搏動ハ第五肋間ニ於テ乳線ヨリ少シク外方ニ在リ心悸亢進シ肺
動脈第二音旺盛ス乳房尙ホ弛緩ス兩脚異常無ク腹部ハ著シク膨滿シ鼓音ヲ呈ス子宮底ハ
臍高ニアリ惡露血性、量多量、下肢ニハ尙ホ高度ノ浮腫アリ膝蓋腱反射全ク消失ス實多利
斯末〇・五、ヂウレチン二〇ヲ散トシ内服セシム

二十四日 無熱、脈、百八、子宮底ハ臍下一指横徑ニ在リ外陰部浮腫尙ホ著シ硬麻二〇〇瓦ヲ
與フ

二十五日 朝體溫三十六度六分、脈、百八、夕三十八度九分、脈、九十四、便通四回、乳房著シク緊滿

シ疼痛ヲ訴フ

二十六日 無熱、脈、百二十六、便通無シ顔貌尙ホ蒼白浮腫狀ヲ呈ス心臓濁音界不明、心尖第二
音及肺動脈第二音ハ旺盛シ同第一音ハ不純、子宮底ハ臍高ニアリ硬度軟、收縮不良、惡露血性
漿液性、多量、臭氣無シ下肢ニ尙ホ高度ノ浮腫アリ知覺鈍麻、膀胱筋痛等無シ膝蓋腱反射消
ス

二十七日 朝三十六度、脈、九十九、夕三十七度八分、脈、百二十、便通三回、子宮底臍下二指横徑、惡露
血性漿液性

二十八日 無熱、脈、九十、便通二回、尿中蛋白量ハ極メテ少量トナリ「イン」ヂ「カン」多量ニ存ス子
宮底ハ臍ト耻骨縫際トノ中間ニ在リ收縮通常、惡露血性漿液性、多量ニシテ臭氣無シ浮腫著
シク減退ス

二十九日 朝三十七度八分、脈、百八、夕三十六度、脈、九十、便通四回、心臓、右方濁音界ハ少シク擴
張シ、胸骨ノ左緣ヨリ一指横徑、右方ニアリ心尖第一音及肺動脈第一音不純、同第二音著シク
旺盛、子宮底上臍ヲ臍下二指横徑ニ在リ惡露多量、臭氣無シ

三月一日 朝三十七度、脈、百二十、夕三十七度七分、脈、百二十八、便通四回、全身ノ浮腫減退ス子
宮底ハ耻骨縫際上三指横徑ニ在リ惡露血性漿液性、多量、多少、臭氣アリ

二日 無熱、脈、百二十八、子宮收縮狀態、惡露性狀前日ニ同シ

三日 無熱、脈、百十四、便通四回

四日 無熱、脈九十六、便通三回、子宮底ハ耻骨縫際上三指横徑ニ在リ、惡露、漿液性、量多シ、下肢ニ、尚ホ、浮腫ヲ存ス。

七日 無熱、脈、頻數、百二十、便通二回、尿中ノ蛋白量 $\frac{3}{100}$ トナリ、各種ノ圓錐ヲ見ズ、子宮底ハ耻骨縫際上三指横徑ニ在リ、惡露ハ膿様ヲ呈シ、膝蓋、反射消失シ、浮腫、尙ホ、足背ニ存ス、沃度加里〇・五ヨリ漸次増量セリ。

十六日 無熱、脈、頻數、百二十ヲ算ス、尿中蛋白量 $\frac{3}{100}$ トナリ、膝蓋、反射、僅カニ表ハル。

十九日 下肢ノ知覺ハ鈍麻シ、筋肉ハ多少削瘦、萎縮シ、運動障礙アリ、千倍硝酸ストリヒニシ注射ヲ行フ。

二十五日 貧血蒼白、心臟右界ハ左胸骨緣ニ及ビ、心尖搏動ハ第五肋間ニ於テ乳線ヨリ少シク外方ニ在リ、心尖第一音及肺動脈第一音ハ不純、同第二音ハ旺盛ス、大動脈音ハ第一第二共ニ弱シ、下肢ニ浮腫ナク、反ツテ削瘦ス、膝蓋、反射通常。

二十六日 膝蓋、反射僅カニ亢進ス。

二十九日 尿中蛋白量 $\frac{10}{100}$ トナル。

四月八日 一般狀態漸次佳良トナル。

十七日 心臟濁音界普通、只肺動脈第二音ノ旺盛セルヲ認ム、膝蓋、反射普通、浮腫、知覺鈍麻、腓腸筋痛等消失シ、歩行確實トナリ、只尿中蛋白ノ痕跡ヲ證明スルノミ、本日退院。

本例ハ、妊娠、腎臟、炎ニシテ、高度ノ浮腫ヲ伴ヒ、一般狀態漸次不長ニ趣ク、ヲ以テ人工早産術ヲ

行ヒシガ、産褥ニ於テ、更ニ、脚氣ヲ併發シ、一時甚ダシク、増悪セシモ、蛋白量ノ減少スルト共ニ脚氣、症狀モ、漸次輕快治癒ニ趣キシモノナリ、而モ、尿中ノ蛋白量ハ未ダ全ク消退スルニ至ラズ。

第八十二例 山下某 二十六年 初妊

既往症 生來健康著患ヲ知ラズ、四年前脚氣ニ罹リシコトアリシモ、其後罹患セシコトナシ、月經初潮十六年、爾來正調五乃至六日持續ス、量通常、障礙ナシ、最近月經三十九年二月二十七日(豫定分娩期十二月四日)。

妊娠第二ヶ月ノ初メ頃ヨリ惡心嘔吐ヲ發シ、漸次増悪シ、第三ヶ月ノ始メニ至リ、全ク飲食物ヲ攝取スルコト能ハズ、常ニ粘液ヲ吐シ、榮養大ニ衰ヘタリトノ訴ヘテ、六月八日來院ス。

高度ノ妊娠嘔吐(惡阻)ト診定シ、入院セシメ、主トシテ〇・六%食鹽水ノ腸洗滌ヲ行ヘリ、一時ハ尿中蛋白ノ少量ヲ證明シ、且腦症狀ヲ發シ、豫後極メテ不長ノ徵アリシモ、約四週日ノ後一般症狀輕快シ、體重約八・五基瓦ヲ増加シ、全治退院シ、爾後全ク異常ナク、經過セシガ十月八日ニ至リ、前額痛、下肢輕度ノ浮腫ヲ訴ヘ、再ビ來院ス。

現症 體格榮養共ニ中等、顔面蒼白、稍々癱軟狀ヲ呈ス、脈ハ頻數ニシテ正、舌ハ白苔ヲ被リ、肺ハ右肺尖竝ニ右背上部ハ呼吸延長シ、右背下部ハ殆ンド濁音ニ近ク、呼吸音微弱ナルモ、水泡音ヲ聽カズ、心臟濁音界ハ少シク、右方ニ擴大シ、心尖第一音竝ニ肺動脈第一音ハ共ニ不純、肺動脈第二音亦不純ニシテ、亢進ス、腹部ハ強ク膨隆、緊滿シ、腹壁下部ハ輕度ノ浮腫ヲ呈ス、子宮底

ハ劍尖下三指横徑ノ部ニアリ胎兒頭部ハ骨盤上口上ニ於テ尙ホ移動ス胎兒心音ハ右臍棘線ノ中央ニ至テ著明ニ聽クモ殆ンド臍ノ周圍各部ニ於テモ平等ニ聽取スルコトヲ得、下肢ハ輕度ノ浮腫ヲ呈シ、膝蓋腱反射消失シ知覺異常、腓腸筋痛ナシ食慾不進、尿ハ一日七八回ニシテ稍々減量シ比重一〇一五、蛋白質陰性、インデカン僅カニ存ス、便通一日一回、體溫三十六度、脈八十至、入院ス

十月十九日 肺ノ所見前日ト異ナラズ心臓濁音界ハ僅ニ右方ニ擴張シ心尖第一音及肺動脈第一音不純、肺動脈第二音不純ニシテ亢進、腹部所見ハ第二頭蓋位ニシテ心音ハ臍ノ附近一帶ニ於テ聽キ得ルモ右臍棘線ニ於テ最モ著明ナリ下肢ハ輕度ノ浮腫ヲ呈シ膝蓋腱反射消失シ、腓腸筋壓痛及ビ知覺異常ナシ

骨盤計測上異常ナシ
朝體溫三十六度、脈八十至、夕體溫三十六度四分、脈九十至、浣腸ス

處置

一、硫酸 一五〇 稀鹽酸 一〇 水 一〇〇〇

二十二日 顔貌蒼白、舌苔依然、心臓ノ所見同前、腹壁ノ皮膚ニ浮腫表ハル胎兒ノ頤部左方ニ項部ハ右方ニ觸レ兒頭尙ホ移動ス心音ハ殊ニ右方ニ著シク聽ユ下肢ノ浮腫増加シ臍反射知覺異常、筋痛等同前、尿量ニ著變ナク蛋白、インデカン共ニ陰性、便通四回、體溫朝三十六度六分、脈七十四至、夕體溫三十六度四分、脈七十七至、二十三日ヨリ二十九日ニ至ル間著變ナシ體

溫ハ三十六—三十七度ノ間ヲ上下シ脈ハ七十—八十至トス便通四—五回

三十日 咽頭粘膜炎充血腫脹シ左背上部ニ於テ小水泡音ヲ聽ク心臓濁音界右方ニ擴大シ心音ノ性質同前、朝體溫三十六度四分、脈七十一至、夕體溫三十六度六分、脈七十一至、便通七回

三十一日ヨリ十一月四日迄著變ナク無熱、便通四—七回

十一月五日 心臓右方ニ擴大スルコト一指半横徑、心音ノ變化同上、兒頭ハ骨盤上口ニ輕ク固定シ第二頭蓋位ノ所見ヲ呈ス、檢尿スルニ蛋白陰性、インデカン陽性、便通五回、六日ヨリ九日迄著變ナシ無熱、便通四—七回

十日 腓腸筋痛表ハル

朝體溫三十六度、脈七十五至、夕體溫三十六度八分、脈七十五至、便通五回

十三日 頭痛ヲ訴フ顔面ニ輕度ノ浮腫表ハル心臓濁音界ハ一指半横徑、右方ニ擴大シ心音性質同前、胎兒ハ第二頭蓋位ノ所見ヲ呈ス、膝蓋腱反射消失、足蹠現象消失、上肢腱反射減損、下肢ニ輕度ノ知覺異常及腓腸筋痛ヲ訴フ尿量通常

朝體溫三十六度五分、脈七十六至、夕體溫三十六度一分、脈七十五至、便通七回

十五日 胎兒心音稍々緩徐ノ感アリ之レヲ算スルニ百二十、尿中蛋白及インデカンヲ證明ス

十六日ヨリ十九日迄無熱、便通四—六回

二十日 頭痛惡心ヲ訴フ、症狀前記ニ同シト雖モ浮腫ハ漸時増加ノ傾アリ

二十一日 午後一時頃陣痛開始
 午後四時破水、同四時十分産室ニ迄ル
 同四時二十分外診スルニ頭部ハ骨盤上口ニ固定シ移動セズ頤部左方、項部右方、大部分ハ右ニ心音ハ右臍棘線ノ中央ニ著ルシク百四十二ヲ算ス
 同四時二十分石鹼浣腸ス四十五分、カテーテルニヨリ排尿ス尿量少ナシ胎兒心音異常ナシ
 同五時内診スルニ小顎門前方、大顎門後方、矢狀縫合、前後徑ニ一致シ兩側坐骨棘ヲ觸知セズ
 五時五分心音百二十八正、同三十分心音百二十正、五時四十分内診スルニ矢狀縫合第一斜徑
 線一致シ前頭縫合同左前方ニアリ産痛ノ爲メ大顎門不明、後方ニ小顎門ト思ハルベキ者ヲ
 觸知ス(前頭位?)同六時心音百二十、時々不規則トナル六時三十分心音百二十、正午七時百二
 十四、規則正シ、七時二十六分、百二十四正、破水後陣痛發作ハ頻々來ルモ其持續ハ極メテ短ク
 分娩進捗著シカラザルヲ以テ午後八時四十分ヨリ腹部ニ熱性濕布ヲ行フモ陣痛ノ狀態依然
 トシテ分娩進マズ、心音不規則トナル腹壁ニ壓迫ヲ加ヘタルニ分娩稍々進捗ス
 午後八時十分排膿、同二十五分心音異常ナシ五十六分心音百二十二ニシテ微弱、八時五十七分
 前頭位ヲ以テ生レ顔面左方ニ向ク同九時三分胎盤ハ出血ノ爲メクレテ氏壓出法ニヨリ娩
 出セシム
 初生兒ハ心音極メテ微弱ニシテ四肢弛緩シ刺戟ニ對シテ何等ノ反應ナク、只分娩後極メテ
 輕キ吸氣(?)ヲナセシガ如シ依テ凡テノ蘇生術ヲ反復シタレドモ終ニ同生セシムルコト能
 ハザリキ

胎盤、娩出後子宮底ハ臍部ニシテ出血アリ收縮佳真ナラズ依テ九時二十分麥角注射ヲ行フ
 午後十時子宮底臍下四指橫徑收縮長、出血ナシ母體溫三十八度五分、脈百十至
 二十二日 心尖第一音雜音、肺動脈第一音不純、第二音旺盛ス子宮底臍高ニ一致ス收縮通常
 惡露中等量ニシテ血性、臭氣ナシ、反射消失、知覺異常及臍腸筋痛依然タリ
 朝體溫三十八度三分、脈百十六至、夕體溫三十八度二分、脈百十至、便通ナシ
 二十三日 一般症狀同前
 朝體溫三十七度五分、脈百八至、夕體溫三十九度、脈百十六至、石鹼浣腸ス
 二十四日 顔面蒼白、脈搏小ナルモ正整ナリ、一般症狀不真ナラズ心臟ノ境界不明、肺動脈第
 一音不純、第二音旺盛ス子宮底臍部、收縮中等、惡露汚穢、血色少シク臭氣アリ浮腫ナシ、反射
 消失、朝體溫三十六度五分、脈百至、夕體溫三十七度三分、脈百二至、便通ナシ
 二十五日 一般症狀前日ニ同シ心臟濁音界ハ擴張ス、惡露血性、少シク臭氣アリ、
 朝體溫三十六度、脈九十至、夕體溫三十六度八分、脈八十八至、便通ナシ
 二十六日 顔面蒼白、脈軟ニシテ九十ヲ算ス心臟ノ境界不明ニシテ肺動脈第一音不純、第二
 音亢進ス子宮底臍下二指橫徑、收縮中等、惡露汚穢、血色中等量臭氣ナシ輕度ハ浮腫足背ニア
 リ臍腸筋壓痛著シカラズ、反射消失
 朝體溫三十六度五分、脈九十二至、夕體溫三十七度六分、脈百十一至、便通ナシ

二十七日 一般症狀前日ニ同シ
 朝體溫三十七度一分、脈八十七至、夕體溫三十七度八分、脈百十二至、石鹼澀腸ス
 二十八日 一般症狀佳良、脈搏速、緊張強シ、顔面尙ホ蒼白、舌苔ナシ、子宮底ノ位置不明、壓痛アリ、惡露汚色ニシテ多量、臭氣アリ、下肢ニハ浮腫ナク、知覺ノ異常ヲ認メズ、反射消失、心臟ノ境界普通、肺動脈第二音亢進ス

血液検査 赤血球二七二四〇〇〇、白血球二〇〇〇〇、其比例一三六一、血色素五〇%

朝體溫三十七度、脈八十六至、夕體溫三十七度三分、脈九十六至、便通一回
 初生兒

剖檢記事 田中敬論執刀

死亡時間十一月二十一日午後九時、解剖時同月二十八日午後三時
 死胎ハ石炭酸水ニ浸シ氷片ヲ以テ冷却保存セリ

體格栄養中等死硬ハ既ニ融解シ死斑ノ發生胸部ハ著明ナルモ背部ハ保存器物ノ壓迫並ニ石炭酸ニ絶エズ浸サレアリシヲ以テ明カナラズ皮下脂肪筋肉ノ發育通常、腹腔ヲ開ケニ小腸ハ縮小シ大腸ハ膨滿ス、横隔膜ノ高サ右第三肋骨ノ上緣左、第四肋骨ニ一致ス、腹腔内ニハ少量ノ赤褐色透明ノ液ヲ容ル(血色素ノ浸潤ハ死後ノ變化ニヨル)心囊異常ナシ心囊液ハ赤褐色ヲ呈ス心冠靜脈ハ怒張、體血ス右房ハ擴張シ右心内ニハ流動性多量ノ血液ヲ容ル右室ノ壁ハ硬クシテ著シク肥厚シ厚徑〇五仙迷ヲ算シ乳嘴筋及肉柱ハ著シク肥大シ通常ノ

殆ンド二倍ニ達ス右心室腔ハ擴張ス左室壁ノ厚サ〇四仙迷、乳嘴筋及ビ肉柱ハ殆ンド普通、

左室前壁ノ硬度亦通常ニシテ凡テノ瓣膜裝置ニハ異常ナシ

左右肺共ニ全ク肋膜腔ヲ充タシ之レテ水中ニ投ズレバ浮游ス、質多少充實シ剖面血液ニ富ム之レヲ壓搾スルニ泡沫ヲ混ズル血液ヲ溢出ス、

脾臟大サ五・二・二・七、一・五、剖面血液ニ富ム質軟

左腎大サ四・二・二・五、一・八、剖面表面共ニ暗赤色ニシテ體血ス

右腎大サ四・二・二・〇、二・〇、左腎ニ同シ

肝臟大サ一・一・五、六・五、三・五、體血ノ他異常ナシ膽囊ハ縮小シ少量ノ膽汁ヲ容ル

胃粘膜ハ稍々多量ノ粘液ヲ以テ被ハルルノ他異常ナシ

小腸漿液膜ハ赤色ヲ呈ス廻盲部ヲ開ケニ粘膜少量且充血シ帶綠色ノ糞便ヲ容ル

膀胱ハ縮小シ殆ンド空虚ニシテ粘膜少シク充血ス咽頭食道ノ粘膜ハ暗赤色ヲ帶ブ氣道モ亦同様ナリ、胸腺亦血液ニ富ム

診斷 心臟右室肥大擴張、諸臟器ノ體血、血液ノ流動性、生産兒

本例ニ於テハ妊娠末期ニアリテ輕症、胎氣ノ症狀現ハレ、胎氣ノ症狀ハ次第ニ顯著トナリ、全身ノ浮腫表レ、妊婦ハ中絶セラレ、分娩期ノ短時ナルニ胎兒ハ高度ノ假死ニ陥リ、人工呼吸、其效ヲ奏セザリ、キ母監ハ分娩後、産褥ニ入り、脚氣症狀次第ニ減退セリ、而シテ胎兒ニハ母體脚氣ニ見ルト同様ナル剖見的所見ヲ見タリ、尙該兒ハ脚氣ノ進行極度ニ生レタルモノナ

第八十三例 中林某 三十八歳 商人ノ妻

既往症 生來強健著患ヲ知ラズ九回分娩シ産褥ノ經過佳其月經初潮十四年十ヶ月最終月經三十八年十二月二十八日(豫定分娩期十月五日)

主訴 一ヶ月以前ヨリ心悸亢進胸内苦悶アリ益々増進シ食慾不振トナリ且便秘結セリ三十九年八月二十二日入院ス

現症 體格榮養共ニ中等顔色汚穢色ヲ呈ス貧血蒼白顔貌異常ナシ浮腫並ニ發疹ナク舌ニハ白苔アリ乳腺適度ニ發育シ乳嘴乳暈ノ著色著明ニシテ初乳ヲ分泌ス脈正調充實肺臟著變ナシ心臟濁音界ハ僅カニ右方ニ擴張スルモノハ如シ心尖ニ於テハ縮期ノ雜音ヲ聽キ肺動脈第二音旺盛セズ子宮底ハ臍上ニ指横徑ノ所ニアリ胎兒部分ヲ觸知ス腎部ハ上方ニ在リ頭部下方ニアリテヨク移動ス頤部及項部不明胎兒心音ハ右臍棘線ノ中央ニ於テ之レヲ聽取シ下肢ニ浮腫並ビニ腓腸筋壓痛ナク只ダ輕度ノ知覺鈍麻アリ口圍ニモ亦存ス膝蓋腱反射存ス尿蛋白ナクインザカン「反應著明、便中蛔蟲卵多數アリ十二指腸蟲卵ナシ體溫三十七度脈七十八至

處 置

一、硫麻 一五〇 稀鹽酸 一〇 單舎一〇〇 水一〇〇〇

二十三日 咳嗽咯痰アリ大便五回、無熱、脈八十至

二十四日 前、夜、來、胸、内、苦、悶、ヲ、訴、フ、患、者、貧、血、蒼、白、舌、苔、アリ、脈、正、調、充、實、心、臟、濁、音、界、僅、カ、ニ、右、方、ニ、擴、張、シ、心、尖、部、ニ、於、テ、縮、期、ノ、雜、音、ヲ、聽、ク、肺、動、脈、第、一、音、不、純、第、二、音、少、シ、ク、亢、進、兩、肺、打、診、上、著、變、ナ、シ、右、肺、背、面、後、方、呼、吸、音、微、弱、ト、ナ、リ、水、泡、音、ヲ、聽、カ、ズ、胎、兒、頭、部、下、方、骨、盤、入、口、ニ、固、定、ス、胎、兒、心、音、ハ、右、臍、棘、線、ノ、中、央、ニ、明、カ、ニ、シ、テ、下、肢、ニ、浮、腫、ナ、ク、腓、腸、筋、壓、痛、ナ、シ、且、知、覺、異、常、ナ、ク、腱、反、射、亢、進、ス、無、熱、大、便、七、回

處 置

一、胸部濕布

二、セネガ浸(四〇)

一〇〇〇

鹽酸ヘロイン

〇〇二

二十五日 便秘六回、無熱

二十七日 咳嗽少シク止ム顔面皮膚帶黃汚穢色ヲ呈セシモ眼結膜黃染セス心尖第一音不純、肺動脈第一音不純、第二音亢進、心尖搏動時々缺滯シ且不規則トナル兩肺一般呼吸音微弱、胎兒頭部下方少シク移動ス胎兒心音右臍棘線ノ中央ニ明カニシテ下肢浮腫ナク膝蓋腱反射微弱ナルモ存在ス便秘六回腸洗滌ヲ行ヒタル後、生理的食鹽水六〇〇瓦ヲ注射ス

處 置

二〇%安息香酸曹達コヘイン二瓦ノ注射

二十八日 患者呼吸困難ヲ訴フ脈ハ大ナルモ質軟時々不規則トナル心臟濁音界變化無キ

病 歴

モノノ如シ僧帽縮期雜音、肺動脈第二音著變ナシ、兩肺一般ニ呼吸音微弱ナリ、殊ニ兩側背
面下方著ルシ下肢ニ浮腫ナク膝蓋腱反射存在ス

朝體溫三十七度五分、脈九十至、夕體溫三十七度一分、脈八十四至、便通七回、腸洗滌ヲ行ヒタル
後生理的食鹽水ヲ注射ス

二十九日 無熱、便通五回、腸洗滌ヲ行フ安息香酸曹達「コヘイン」液二瓦ヲ注射ス

三十日 顔面蒼白苦悶狀ヲ呈ス、浮腫ナク發疹ナシ、惡心起レルモ嘔吐ナシ、心臟濁音界變化
ナシ、右界ハ胸骨左緣心尖搏動第五肋間乳腺ノ内方ニ在リ、心尖第一音不純、第三肋間ノ胸骨
左側ニ於テ著明ノ雜音ヲ聽ク、肺動脈第一音不純、第二音旺盛、腓腸筋壓痛及ビ知覺ノ異常ナ
ク膝蓋腱反射弱キモ存在ス、兒頭ハ骨盤入口ニ固定ス、胎兒心音ハ右臍棘線ノ中央ニ著シ血
液檢査ヲ行ヒシモ特記スベキ變化ナシ、無熱、脈九十四、腸洗滌ヲ行フ安息香酸曹達「コヘイン」
ヲ注射ス、便通四回

九月一日 惡心ナシ、顔面蒼白舌白苔ヲ被ル、心濁音界變化ナシ、心尖第一音不純、肺動脈第一
音不純、第二音亢進、兒頭骨盤入口ニ固定ス、項部左、胎兒心音左臍棘線ノ中央ニ明カニシテ腓
腸筋壓痛竝ビニ知覺異常ナシ、腱反射存在ス、無熱、朝脈七十至、夕百至、尿酸性蛋白ナシ、インデカ
ン少量、便通三回、處置前方

二日 一般狀態少シク佳良トナレリ、舌ニ白苔アリ、心臟濁音界不明、心尖部ニ於テ縮期ノ雜
音著明、肺動脈第一音不純、第二音旺盛、左第三肋間ノ左緣ニ於テ縮期ノ雜音著明ニシテ大動

脈音亦不純、腹部膨滿臍窩存在ス、頭部下方尙ホ移動ス、項部左、項部右、浮腫ナク知覺異常ナシ
腱反射弱キモ存ス

朝體溫三十六度三分、脈八十至、夕體溫三十六度七分、脈九十至、便通六回

三日 顔面蒼白、貧血舌苔アリ、昨夜來時々惡心アリ、脈搏時々缺滯ス、心濁音界變化無シ、心尖
第一音及肺動脈第一音不純、肺動脈第二音旺盛セズ、臂部上方、頭部下方、小部分右、胎兒心音ハ
左臍棘線ノ中央ニ明カニシテ下肢浮腫竝ビニ知覺ノ異常ナク腓腸筋壓痛ナシ、膝蓋腱反射
消失ス、無熱、脈九十六至、夕八十四至、便通七回

四日 顔面蒼白、患者心悸亢進、惡心、胸内苦悶、嘔吐等ヲ訴フ、心臟濁音界變化ナシ、心尖搏動著
明ナリ、僧帽縮期雜音ヲ聽ク、肺動脈第一音不純、第二音旺盛セズ、大動脈瓣縮期雜音ヲ聽キ
右第三肋間胸骨左緣ニ於テ縮期雜音著明ナリ、下肢ニハ知覺異常浮腫ナシ、腱反射弱キモ存
ス

血液檢査 血色素量四五%、赤血球三九一二〇〇〇、白血球八〇〇〇、兩者ノ比例四八九一、乾
燥標本ニハ著明ナル變化ナシ

朝脈八十四至、夕百至

五日 貧血蒼白舌平滑ニシテ乳嘴ヲ視ズ、脈緊張適度ナルモ不規則ニシテ時々歇滯ス、心臟
濁音界變化ナシ、心尖搏動旺盛ス、肺動脈第一音不純、第二音雜音、右肺尖及第一肋間呼氣延長
シ、兒頭ハ固定ス、項部右、項部左、心音ハ中線ニ於テ著明ナリ、下肢ニ浮腫及ビ知覺異常ナク膝

蓋腱反射弱キモ存ス數同ノ下痢及嘔吐アリ

朝體溫三十六度五分、脈八十至、夕體溫三十六度九分、脈九十至、便通五回
處置前方

六日 朝體溫三十六度六分、脈百至、夕體溫三十六度五分、脈百〇二至、便通一回、尿透明、酸性蛋
白「インゲカン」ナシ安息香酸曹達「コヘイン」液二筒ヲ注射ス

七日 顔面蒼白舌苔ナシ瞳孔左右同大反應稍々鈍、脈大、緊張強ク時々不規則トナル心
臟濁音界變化ナシ心尖搏動乳線内方ニアリ心尖ニテ縮期ノ雜音ヲ聽キ第三肋間胸骨左緣
ニ於テモ亦縮期ノ雜音ヲ聽取ス肺動脈第一音雜音、第二音旺盛ス右肺前面呼吸音微弱水泡
音ヲ聽カズ左肺第四肋間以下笛聲嘖嘖音ヲ聽ク

朝體溫三十五度七分、脈八十八至、夕體溫三十六度七分、脈百二十至、便通三回、便中寄生蟲卵ナ
シ

八日 顔面多少黄色ヲ呈セシモ結膜ニハ異常ナシ舌蒼白苔ナシ脈搏頻數ニシテ時々歇滯
ス心臟濁音界變化ナク心臟基部ニ於テ縮期及縮期前ノ雜音著明ニシテ大動脈音不純、肝
臟ハ之ヲ觸知シ得ザルモ肝臟濁音部ハ多少擴大ス下肢ニ浮腫及ビ知覺異常ナク腱反射微
弱ナリ

朝體溫三十六度四分、脈百十四至、夕體溫三十六度九分、脈百二十至、便通二回
十日 惡氣嘔吐無ク食慾多ク亢進、脈正調緊張シ心臟濁音界變化ナシ心尖部ニ於テ縮期ノ

雜音ヲ聽キ一般心音旺盛シ殊ニ肺動脈第二音旺盛スルヲ認ム時々子宮收縮起コル兒頭骨
盤入口ニ固定ス心音中線ニ於テ著明ナリ下肢ニハ浮腫及ビ知覺異常ナク膝蓋腱反射存ス
朝體溫三十六度、脈八十至、夕體溫三十七度、脈百二十至、便通四回、腸洗滌ヲ行フ

十一日 朝脈搏屢々歇滯シ胸、内、苦、悶、心、悸、亢、進、午前八時三十分「コルボイリン」ヲ插入ス
午前十一時四十分陣痛起コル同時ニ「コルボイリン」ヲ娩出ス同四十五分「カンフル」ニ筒注
射ス同五十分體溫三十六度四分

零時十分内診腔部尙ホ存シ子宮口ハ二指ヲ通ズ卵胞形成セズ先進部骨盤入口ニ固定シ且
少量ノ出血アリ再ビ「コルボイリン」ヲ插入ス胎兒心音百四十六、中線ニテ明カニシテ正
調ナリ二時十五分「カンフル」ニ筒注射ス二時三十五分「コルボイリン」ヲ再ビ娩出、四時子宮
口約八仙迷ニ開大シ卵胞ヲ形成ス兒頭尙ホ移動ス小顎門ハ前、大顎門ハ後、矢狀縫合ハ前後
徑ニ一致シ尙兩側ノ坐骨棘ヲ觸知シ得

午後六時十五分子宮口全開大ス、先進部固定ス陣痛益々加ハル人工破水ヲ行フ
六時十八分兒頭排臨、同二十一分撥露、二十二分娩出ス

六時二十六分出血ス直チニ「クレ」氏法ヲ行ヒ胎盤ヲ壓出ス子宮底恥骨縫際上三指横徑、收
縮佳良、後出血ナシ初生兒(男) 體重二三六五瓦、身長四九五、前後徑一〇・八、大横徑八、小横徑七
大横徑一二、小横徑九、頭圍三三仙迷、胎盤異常ナシ

十二日 一般狀態稍々佳良、朝體溫三十七度、脈百十八至、夕體溫三十七度一分、脈百〇二至、子

宮收縮不全、便通ナシ
處 置

一、下腹部氷褌法

二、麥角浸(七〇) 一日七分分服

三、鐵 劑

十三日 一般狀態益々佳良トナリ脈小頻數ナルモ正調、心、臟、濁、音、界、多、少、右方ニ擴張シ心悸亢進ス質血性雜音著明、下肢ニハ浮腫及ビ知覺異常ナク膝蓋腱反射亢進ス臍下四指橫徑ノ部ニ子宮底ヲ觸レ收縮中等硬度稍々軟少シク壓痛アリ

朝體溫三十六度一分、脈八十至、夕體溫三十七度五分、脈百二十至、便通ナシ

十四日 一般狀況前日ニ同シ脈尙ホ時々歇滯ス(百二十二、一回位)子宮底臍下三指橫徑、收縮佳良、惡露漿液性、量普通、臭氣ナシ、浮腫及ビ知覺ノ異常ナク膝蓋腱反射亢進ス初生兒異常ナシ體重二二一〇瓦

母體朝體溫三十六度、脈八十至、晝體溫三十七度、脈百〇八至、夕體溫三十七度五分、脈九十六至、便通一回

十六日 子宮底臍下四指橫徑、收縮及硬度異常ナク少シク壓痛アリ惡露、血性漿液性、臭氣ナシ下肢ニ浮腫ナシ朝體溫三十六度一分、脈九十至、晝體溫三十七度一分、脈九十八至夕體溫三十七度一分、脈九十八至、便通一回

十七日 下、肢、ニ、浮、腫、起、ル、心悸亢進、胸内苦悶等ナシ脈頻數ナルモ充實ス心臟濁音界一指橫徑右方ニ擴張ス肺動脈第一音不純、第二音旺盛セズ下肢ノ知覺鈍麻シ、腓腸筋痛甚シク膝蓋腱反射存ス子宮底三指橫徑臍下ニアリ收縮少シク不真、惡露血性漿液性、量少臭氣ナシ朝體溫三十六度四分、脈七十至、夕體溫三十六度九分、脈八十八至、便通ナシ

十八日 脈正調歇滯セズ顔面尙ホ蒼白下肢ニ浮腫アリ心臟濁音界僅カニ右方ニ擴張ス心尖第一音不純、肺動脈第一音不純、第二音異常ナシ右肺前面一般ニ呼吸音弱ク水泡音ヲ聽カズ腓腸筋壓痛ナシ下肢及口圍ニ知覺鈍麻アリ膝蓋腱反射存ス尿透明酸性蛋白及、インザカンナシ血液検査 赤血球三九一二〇〇〇、白血球一六〇〇〇、兩者ノ比較二四四・一、血色素四〇%、退院ス

本例ニ於テハ妊娠後半期ニ於テ輕度ノ心臟性脚氣ノ症候ヲ現ハセシモ心臟ニ於ケル所見質血性雜音ノ爲メ著明ナラズ胸内若閣激シキガ爲メ人工的ニ妊娠ヲ中絶セリ産褥經過中次第ニ症狀輕快シ下肢及口圍ニ知覺鈍麻ノ症候ヲ遺シテ退院セリ

第八十四例 山田某 二十九年 工女 經妊

既往症 十六年月經初潮爾來正調四五日間持續、量中等、月經時障礙無シ二十一歲婚嫁シ既ニ三回分娩ス二月十四日以來月經閉止ス目下妊娠九ヶ月(豫定分娩期十一月廿一日)主訴 全身浮腫、尿量減少、心悸亢進、呼吸困難

入院 四十四年十月十二日
 現症 體格中等榮養稍々不其全身、浮腫アリ顔、面蒼白、浮腫、呈シ、呼吸、困難、アリ脈細小
 頻數ナルモ正調百十ヲ算ス乳房發育佳其初乳ヲ分泌ス心臟濁音界不明ナルモ擴張ナキモ
 ノノ如シ心悸亢進シ肺動脈第二音ハ著シク旺盛、兩肺呼吸音ハ一般ニ粗裂トナレリ腹部
 膨滿シ腹圍九十一仙米ヲ算ス腹壁ハ浮腫殊ニ著明ナリ子宮底ハ肋骨弓ニ達ス兒頭ハ骨盤
 入口上ニ在リテ移動ス子宮壁ハ強ク緊張シ胎兒ノ部分ハ之ヲ觸知シ難ク心音ヲ聽取セズ
 下肢ニ高度ノ浮腫アリ知覺異常ナシ腓、腸、部多少緊張シ膝、蓋、反、射、消、失、骨、盤、計、測、上、異、常
 ナ認メズ二三日来尿量減少シ尿中蛋白ノ少量ヲ證明ス浮腫漸次増加シ惡氣嘔吐加ハリ呼
 吸困難甚ダシク一般狀態不其ニ傾クテ以テ人工早産術ヲ行フ
 分娩ノ經過

十二日 午前十一時産室ニ移ル同二十分石鹼洗腸外陰部消毒導尿ス十一時四十五分二
 石炭酸水ヲ以テ腔洗滌ヲ行ヒ後硬護膜彈性「プー」約二十仙米ヲ子宮壁ト卵膜間ニ挿入
 ス外子宮口ハ容易ニ一指ノ通過ヲ許シ施術容易ナリキ五時頃ヨリ輕度ノ陣痛發作アリ外
 陰部消毒次テ導尿後更ニ腔洗滌ヲ行ヒ子宮頸管ニ「コルボイリン」ヲ挿入ス七時頃ヨリ
 陣痛稍強盛トナリシモ暫時ニシテ微弱トナレリ七時三十分發作五十秒間歇三分二十秒胎
 兒心音ヲ聽取セズ九時「コルボイリン」陣痛發作時自然ニ娩出ス内診ヲ行フニ子宮口ハ
 殆ンド全開大シ卵胞緊張シ左右坐骨棘ヲ觸知ス其他ハ不明ナリ九時十分卵胞破裂ス發作

一分十秒間歇二分十時三十九分兒頭排隨同五十五分撥露ス陣痛力微弱ニシテ分娩進行遲
 延スルヲ以テ腹壁上ヨリ數回胎兒壓出法ヲ行ヒ十一時娩出ス胎兒ハ既ニ死亡セリ子宮底
 ハ臍高ニ在リ出血無シ十一時二十分ニ至リ胎盤自然ニ娩出ス子宮底ハ臍下二指橫徑ニ在
 リ收縮通常後出血無シ無熱脈頻數百二十六
 産後ノ經過

十三日 朝三十六度四分脈百十至全身尙ホ高度ノ浮腫アリ心悸亢進シ呼吸促進惡心嘔吐
 ナ催シ患者不安ノ狀態ヲ呈ス子宮底ハ臍高ニアリ硬度軟惡露血性量多シ膝蓋腱反射消
 ス左側ノ下肢ニハ殊ニ著明ノ浮腫アリ

十四日 朝三十六度八分脈百夕三十六度五分脈百二十ヲ算ス脈ハ細小頻數不規則ニシテ
 子宮底ハ臍高ニ在リ硬度軟惡露血性多量ナルモ臭氣無シ腹部膨滿鼓腸ヲ訴フ嘔吐甚ダシ
 腸洗滌ヲ行ヒ後食鹽水六〇〇ヲ一日三回ニ注腸シ傍ラ蓆酸「セリウム」(〇・一)ヲ散トシテ與
 フ心機能微弱ナルヲ以テ三時間毎ニ「カンフル」二〇五ヲ注射ス

十五日 朝三十六度脈百十二夕三十六度五分脈百二十心悸亢進益々甚ダシク一般狀態愈
 々不其ニ傾クテ於テ水蛭三百條ヲ胸部ニ貼シ後食鹽水千瓦ニ鹽化「アドレナリン」十滴
 「チガーレン」〇・五ヲ混シ皮下ニ注射シ其他「カンフル」安息香酸曹達「ヘイン」ヲ二時間毎ニ交
 互注射セリ

十六日 朝三十六度六分脈百二十夕三十六度脈百二十微弱ニシテ不規則ナリ心悸亢進甚

ダシク呼吸困難ヲ訴ヘ浮腫益々増加シ尿量ハ著シク減少シ一般状態昨日ニ比シ不更トナ
 レリ更ラニ水蛭二百條ヲ胸部ニ貼シ後食鹽水五百瓦中アドレナリン三滴ヲ混シ皮下ニ注
 射ス其他尙ホ硫酸三〇〇瓦ヲ六〇〇ノ水ニ溶解セシメ一日三回注射ス
 十七日 午前六時三十五度八分脈百十八九時三十七度四分脈百二十二正午三十八度一分
 脈百二十四午後三十八度脈百十食鹽水注射芥子坭貼用其他百方治療ニ努メシモ一般状態
 益々不更トナリ心臓麻痺ノ爲遂ニ午後四時死亡セリ
 本例ニ於テハ妊娠後半期ニ於テ水腫性脚氣症狀ヲ表ハシ其ノ症狀急ニ増悪シ來リシヲ以
 テ人工的妊娠中絶ヲ企テタリシニ死胎兒ヲ娩出シ產褥中症狀輕快セズ遂ニ產褥第四日ニ
 至リ前記アラユル處置モ何等其效ヲ奏スルコトナク遂ニ鬼籍ニ入レリ

第八十五例 堀川某 二十年 車夫ノ妻 初妊

既往症 生來健全著患ヲ知ラズ十九年月經來潮爾來正調二乃至三日間持續少量障礙無
 シ十九年一ヶ月結婚ス最終月經ハ二月上旬ナリト目下妊娠九ヶ月
 主訴 一週間以前ヨリ歩行困難ニシテ時々嘔吐來リ食慾不進大便秘結ス
 入院 四十三年九月二十六日
 現症 體格榮養共ニ中等全身高度ノ浮腫ヲ呈ス乳房發育不更ニシテ初乳ヲ壓出シ得ズ心
 臟濁音界ハ高度ノ浮腫ノ爲メ打診上確定スルコト能ハズ脈搏頻數ナルモ充實シ且正調ナ
 リ心尖第一音及ヒ肺動脈第一音不純肺動脈第二音著シク旺盛ス兩肺ハ一般ニ呼吸音微弱

程度ノ呼吸困難アリ腹部膨滿腹圍八十三仙米ヲ算ス子宮底ハ劍狀突起下三指橫徑ニ在リ
 兒頭下方骨盤入口上ニ固定ス胎兒心音ヲ聽取スルコト能ハズ胎兒ノ部分モ亦浮腫ノ爲メ
 觸診スルコトヲ得ズ時々陣痛發作アリ下肢ニ著明ノ浮腫アリ知覺ハ著シク障礙セラレズ
 膝蓋反射全ク消失シ尿中少量ノ蛋白ヲ證明ス

二十六日 午後ニ至リ陣痛益々烈シクナリ同五時三十分產室ニ移ス同時ニ破水ス一時四
 十分後死胎兒第一體向ヲ以テ娩出シ十分後胎盤娩出ス同時ニ子宮底ハ臍下三指橫徑ニ
 在リ收縮佳其硬度硬ク後出血無シ第二度ノ會陰破裂ヲ起セシヲ以テ直チニ縫合ス體溫三
 十七度五分脈百アドレナリン一〇瓦皮下注射ヲ行フ
 産褥ノ經過

第二日 午前九時體溫三十六度九分脈百二正午三十六度八分脈百二十午後六時三十六度
 五分脈百二十細小頻數便秘シ尿中少量ノ蛋白ヲ證明ス心臟濁音界擴張ヲ認メズ心悸亢進
 著ルシ心尖第一音肺動脈第一音不純ニシテ肺動脈第二音旺盛ス兩肺到ル所笛聲及ヒ啞軋
 音ヲ聽ク子宮底ハ臍高ニアリ且壓痛アリ惡露多量臭氣無シ全身浮腫尙ホ著シク時々咳嗽
 發作アリ水蛭三十條ヲ胸部ニ貼シ腸洗滌ヲ行ヒ三時間毎ニ「カンフル」一筒ヲ注射ス

第三日 午前九時體溫三十六度七分脈百二十正午三十七度四分脈百二十八午後六時三十
 六度八分脈百三十九便秘無シ全身浮腫多少減退ニ傾ケリ脈ハ緊張適度ナルモ頻數時々不
 正トナル心臟機能著シク亢進シ心尖第一音及肺動脈第一音不純肺動脈第二音旺盛兩肺全

面ニ百リ笛聲啞軌音等ヲ聽ク子宮底ハ臍高ニアリ壓痛ヲ訴フ惡露血性汚穢臭氣ヲ放チ其量多シ腸洗滌ヲ行ヒ武酒(一〇〇)ヲ注射シ傍ラ「カンフル」安息香酸曹達コフェインヲ交互ニ注射ス

第四日 午前九時體溫三十七度六分、脈百三十、正午體溫三十六度二分、脈百三十二、午後六時三十六度四分、脈百五十、便通ナシ食慾不進惡氣嘔吐アリ脈細小頻數、心尖第一音及肺動脈第一音殆ンド雜音ヲ帶ビ肺ニハ笛聲啞軌音尙ホ著ルシ腹部膨滿シ子宮底ハ殆ンド臍高ニ在リ腸洗滌ヲ行ヒ後武酒ヲ注射シ「硫酸スバルテイン」(〇〇五)ヲ内服セシム

第五日 午前九時體溫三十六度三分、脈百四十、正午三十七度、脈百三十、午後六時體溫三十六度六分、脈百三十二、處置前方、便通無シ尿中蛋白イン「チカ」糖ヲ證明セズ

第六日 午前九時體溫三十六度三分、脈百九、正午三十六度五分、脈百二十六、午後六時三十六度三分、脈百二十、便通二回、脈細小不正、心音全ク雜音ヲ呈ス子宮收縮狀態不充、ニシテ惡露多量臭氣アリ「カンフル」安息香酸曹達コヘイン「チカ」等各一時間毎ニ注射ス

第七日 朝九時三十七度、脈百三十二、正午三十六度八分、脈百四十六、午後六時三十七度八分、脈百二十六、便通無シ

第八日 午前九時三十六度八分、脈百五十、正午三十七度三分、脈百四十八、午後六時三十八度、脈百三十八、顏貌無力狀ヲ呈シ脈軟細小時々不正トナル心悸亢進甚ダシク心臟各音ハ殆ンド雜音ヲ帶ビ肺ニハ尙ホ笛聲啞軌音ヲ聽取ス子宮收縮不真、惡露多量臭氣アリ壓痛無シ腸

洗滌ヲ行ヒ朝夕二回臍腸部ニ芥子泥ヲ貼ス

第九日 午前六時三十七度四分、脈百二十、正午三十七度八分、脈百二十、午後六時三十八度二分、脈百二十六、便通ナシ脈搏微弱時々不正トナリ、缺滯ス心肺ノ狀況前日ニ同シ下肢下腹部ニ知覺ノ異常アリ不隨意的ニ大小便失禁ス腸洗滌及ビ滋養液腸ヲ行ヒ毎二時間ニ安息香酸曹達コヘインノ注射ヲ行フ

第十日 午前九時三十七度八分、脈百二十二、正午三十八度二分、脈百二十、午後六時三十九度二分、脈百二十、顏面蒼白呼吸困難、口唇チアノーゼヲ呈ス脈軟時々缺滯ス心音凡テ不正、子宮收縮不充分ナリ腸洗滌武酒注射ヲ行フ

第十一日 午前九時三十八度七分、脈百六、正午三十六度、脈百二十、午後六時三十六度五分、脈百十二、脈四搏毎ニ一回ノ缺滯ヲ認ム呼吸困難甚ダシク子宮底臍高ニ在リ收縮不真、惡露汚穢色ヲ呈シ臭氣アリ量多シニ「カルホル」水ヲ以テ腔洗滌ヲ行ヒ一方生理的食鹽水ニテ腸洗滌ヲ行ヒ「アドレナリン」一瓦ヲ注射ス

第十二日 午前九時體溫三十八度四分、脈百二十、正午三十七度二分、脈百二十、午後六時三十七度三分、脈百十、脈多少緊張充實スルモ不正ナリ心尖搏動著明、肺臟ニ於ケル笛聲啞軌音多少減少ス腹部ハ尙ホ著シク膨滿シ子宮底尙ホ臍高ニ在リ惡氣嘔吐口渴等無シ腸洗滌ヲ行ヒ武酒ヲ注射シ傍ラ「硫酸スバルテイン」安息香酸曹達コヘイン「カンフル」等ヲ交互ニ注射シ胸部脚部ニ芥子泥ヲ貼ス患者不安ナルヲ以テ「ウエロナール」〇五瓦ヲ頓服セシム

午後八時五十分ニ至リ患者突然大量ニ吐血シ再ビ脈搏細小頻數トナリ不正跌滯シ顔面蒼白、呼吸困難、著シク不安トナリ意識潤濁ス兩肺到ル所無數ノ水泡音ヲ聽キ午後九時五十分脈搏ヲ觸レズ同、十時、五十分、遂ニ呼吸全ク絶、ユ、

剖見記事

體格中等榮養佳其ノ一女屍、皮膚蒼白、到ル所浮腫狀ヲ呈ス死斑ハ背部ニ存ス前胸壁ニ於テハ無數ノ暗赤色圓形ノ小ナル溢血症ヲ認ム是水蛭ヲ貼用セシ痕跡ナリ死硬ハ手關節ニ存ス腹部膨滿皮下脂肪織ノ發育通常、筋肉ハ貧血潤濁ス腹腔ヲ開クニ著シク膨滿ス子宮底ハ小骨盤入口ノ高サニ在リ子宮ハ前屈位ヲトリ肺臟ノ表面ハ所々厚キ纖維様膜若シクハ索狀物ニヨリテ橫膈膜ト癒著ス

橫膈膜ハ左右共ニ第四肋間ノ高サニ一致ス左肺ハ癒著無ク左肋膜腔内ニハ約百瓦ノ帶黃色ノ漿液ヲ容ル右肺ハ厚キ纖維性ノ膜若クハ索狀物ヲ以テ所々胸壁肋膜ト癒著シ右肋膜腔内ニモ同様ナル漿液約七十五ヲ容ル心囊ヲ開クニ帶黃色透明ノ漿液少量ヲ容ル内外兩面滑澤變化無シ右心室及房内ニハ少量ノ流動性血液及凝血塊ヲ容ル心内膜下ノ脂肪組織多シ一般ニ心臟ハ多少肥大スルモ右心室ノ擴張肥大ヲ認メズ壁ノ厚サハ全ク通常ナリ左室亦同シ心臟内膜及ビ瓣膜裝置ニ異常無シ心筋ハ弛緩シ軟ニシテ潤濁ス右肺上葉ノ一部氣腫狀ヲ呈ス剖面到ル處浮腫狀ニシテ壓スルニ泡沫ヲ含有スル血性漿液性ノ液ヲ出ダス右肺ハ血量ニ富ミ表面纖維様物沈著ス剖面浮腫狀ヲ呈シ上葉ニ於テ多數ノ氣管支肺炎ノ

病 歴

脾臟大サ一三〇 八〇 二〇仙米、表面滑澤剖面血液ニ乏シ質軟、脾材不明、濾胞一樣ニ不明ナリ

左腎大サ一〇〇 六〇 三・五仙米、被膜剝離シ易ク剖面血量ニ乏シ皮、髓ノ境界著シ色灰黃色潤濁ス質軟

右腎大サ一〇〇 六〇 三・五仙米、表面及剖面ノ狀況殆ンド左腎ニ同シ多少血量ニ乏シ胃ハ瓦斯ヲ以テ著シク膨滿ス十二指腸内ニハ暗赤色ノ血液大量ヲ容ル胃内ニモ凝血約三百瓦ヲ容ル胃粘膜ハ「ヘモグロビン」ヲ以テ著色シ血性粘液ヲ以テ被ハル幽門部ニ近カク小彎ニ於テ小ナル五個ノ潰瘍合シ約一錢銅貨大ノ潰瘍ヲ形成セルヲ認ム其ノ底面ハ白色清潔ナルモ他ノ一個ノ潰瘍ニ於テハ其底面不潔ニシテ凝血ヲ容ル該潰瘍ハ筋膜迄侵蝕ス肝臟大サ 二九〇 一六〇 八・五仙米表面割澤剖面血液ニ乏シク色灰白黃色、硬度通常、腸間膜ニ於ケル脂肪ノ沈著適度ナリ膀胱ヲ開クニ内ニ帶黃色潤濁セル少量ノ尿ヲ有ス粘膜蒼白異常無シ子宮ハ腔部ヨリ底迄十六仙米ヲ算ス喇叭管開口部間ノ距離十仙米、子宮内面ハ汚穢ナル分泌物ニテ被ハレ子宮前壁ニ於ケル胎盤附着部ハ尙ホ多少變性セル組織ヲ附著ス其他ノ子宮粘膜ハ出血斑ヲ呈ス腔壁消失、粘膜蒼白

診斷 一般貧血 胃圓形潰瘍 腹水 胸水 肺水腫 加答兒性肺炎 滲出性肋膜炎 心筋弛緩 腎臟脂肪變性 產褥子宮

本例ハ臨牀上明カニ脚氣ノ徵候ヲ呈セルモノニシテ死兒ヲ早産シ産褥ニ於テ諸症狀増悪シ、肺水腫ヲ起コシ遂ニ死亡シタルモノナルガ病理解剖上ニ於テハ普通脚氣ニ見ルガ如キ諸徵ヲ缺キシモノナリ、

第八十五例 川嶋某 二十八年 經妊

既往症 生來健全著患ヲ知ラズ十九年月經初潮爾來兎角不順ニシテ持續日數モ一定セズ量中等、月經時下腹痛ヲ訴フルコト多シ二十三年婚嫁シ四年前一回分娩セリ最終月經ハ一月二十八日ニシテ目下妊娠九ヶ月

主訴 下肢高度ノ浮腫並ヒニ知覺麻鈍

入院 明治四十二年九月十一日

現症 體格榮養共ニ中等、顔貌蒼白、多少浮腫狀ヲ呈ス乳房發育佳、乳嘴、乳暈著シク著色シ初乳ヲ分泌ス心臍濁音界擴張肥大ヲ認メズ心尖第一音及肺動脈第一音不純、肺動脈第二音旺盛ス右肺背面ノ下部呼吸音微弱、左肺前面ノ上部呼吸延長ス腹部ハ著シク膨滿シ子宮底ハ臍ト劍狀突起ノ中央ニ在リ兒頭ハ骨盤入口上ニアリテヨク移動ス胎兒心音ハ兩側臍棘線ニ於テ聽取シ得、腹部ハ觸診ノ際收縮ヲ起コシ疼痛ヲ訴フ下、肢、下、腹、部、ニハ、高、度、ノ、浮、腫、アリ、知覺、鈍、麻、シ、腓、腸、筋、ノ、壓、痛、ヲ、訴、フ、膝、蓋、腱、反、射、ハ、全、ク、消、失、シ、食、慾、減、退、尿、量、減、少、尿、中、多、量、ノ「インザカン」ヲ認ム蛋白ヲ證明セズ大便隔日一回

入院後ノ經過

十二日 無熱、脈頻數百十二、稀麻一五〇、稀鹽酸一〇、單舎一〇〇、水一〇〇〇一日三回食後一時間ニ内服セシム安息香酸曹達コヘイン二〇乳糖一〇爲散一日三回食間内服セシム

十三日 無熱、脈九十六、胸内苦悶、心窩部鈍痛、心悸亢進等ヲ訴フ胎兒心音ハ右臍棘線ノ中央ニ於テ最モ明カニ尿量二百瓦蛋白ノ痕跡ヲ認ム便通二回

十四日 無熱、脈百二十四、便通十回、尿量二百瓦

十六日 浮腫ハ多少減退ス無熱、脈百八、便通三回、尿量三百瓦主トシテ牛乳ヲ攝取セシム

十八日 無熱、脈百十五、便通二回、尿中蛋白量少シク増加ス實多利斯葉浸(〇・五)中ニ「ザウレチン」二〇ヲ混シ與ヘ尙ホ巴豆油一滴、乳糖一〇ヲ散劑トシ一日三回ニ分服セシム兒頭、尙ホ骨盤入口上ニ移動セリ

分娩ノ經過

十九日 午前二頃ヨリ腹部緊滿ノ感ヲ訴フルモ疼痛ヲ伴ハズ同四時産室ニ移ラシム直チニ外診ヲ行フニ兒頭ハ骨盤入口上ニ於テ尙ホ移動ス兒背ハ右側ニアリ胎兒心音ハ右臍棘線ノ中央ニ於テ著明ニ聽取ス心音百四十五ヲ算シ且正調ナリ四時二十分石鹼澀腸ヲ行ヒ多量ノ排便アリ外陰部消毒後導尿ス五時陣痛發作四十秒、間歇四分四十五秒、八時十五分再ビ石鹼澀腸及導尿ス八時二十五分子宮口全開大ス胎兒心音百四十人工破水ヲ行フ陣痛却ツテ微弱トナリシヲ以テ九時三十分ヨリ十時三十分ニ至ル間、腹部熱性濕布ヲ行フ十時五十分兒頭排臨、同五十四分兒頭撥露ス同五十五分男子第二後頭位ヲ以テ分娩ス子宮底ハ臍

下一指横徑ニ在リ輕度ノ會陰破裂ヲ起セリ十一分後、胎盤娩出ス子宮底ハ臍下四指横徑ニ下降シ收縮佳良ナリシモ稍々多量ノ後出血ヲ來タセリ直チニ子宮底ヲ摩擦シ麥角ノ注射ヲ行フ體溫三十七度七分、脈百六ヲ算ス
産褥ノ経過

二十日 朝體溫三十六度四分、脈百二、正午三十七度二分、脈百十二、夕三十七度五分、脈百二十、便通一回

二十一日 朝體溫三十六度八分、脈百八、正午三十七度三分、脈百十、夕三十八度五分、脈百二十、二便通十回、顔貌蒼白浮腫狀ヲ呈セシモ全身ニハ著明ノ浮腫ナク脈正調大ナルモ軟且ツ頻數ナリ心臟ノ擴張肥大ヲ認メズ肺動脈第二音ハ旺盛シ兩肺一面笛聲及ビ咿軋音ヲ聽ク子宮底ハ臍高二在リ壓痛アリ惡露漿液血性、多少惡臭ヲ放ツ外陰部及下肢ニハ輕度ノ浮腫及ビ運動障礙アリ殊ニ右側ニ於テ著シ、其他腓腸筋ニ壓痛アリ右下肢ニハ知覺ノ異常アリ膝蓋、腱、反射ハ全ク消失ス、胸部微溫濕布ヲ施コシ内服トシテ安息香酸曹達コヘイン、硫麻等ヲ與フ日々牛乳八合ヲ攝取セシム

二十二日 朝體溫三十六度九分、脈百、正午三十七度六分、脈九十八、夕三十七度八分、脈九十八、便通二回、尿中稍々著明ノ蛋白ヲ證明ス腹部膨滿、子宮底ハ臍下二指横徑ニ在リ收縮稍々佳良、惡露血性漿液性臭氣ナク浮腫ハ次第ニ減退シ乳房緊滿シ初乳ヲ分泌ス腓腸筋痛甚ダシ子宮腔内ヨリ惡露ヲ採取シ培養鏡檢スルニ大腸菌ヲ證明ス

二十三日 朝體溫三十六度一分、脈九十、正午三十七度四分、脈百十八、夕三十八度四分、脈百二十、便通九回左下肢ニハ疼痛アリ右側ニ比シ著シク筋肉ノ削瘦セルヲ認ム子宮底ハ再ビ上昇シ臍高二在リ收縮不良ナラス大小陰唇尙ホ浮腫ヲ認ム

二十四日 朝體溫四十度ニ達シ脈ハ百二十ヲ算ス正午三十八度七分脈百二十夕三十九度八分、脈百三十、便通四回、肺動脈第二音著シク旺盛ス兩肺尙ホ笛聲及ビ咿軋音ヲ聽ク子宮底ハ臍下三指横徑ニ在リ硬度軟、壓痛ナシ惡露漿液量多シ膝蓋腱反射消失シ浮腫ハ殆ンド全ク消失セリ

二十五日 朝體溫三十八度九分、脈百四十、正午三十八度三分、午後三時最高ニシテ四十度ニ達セシガ午後九時三十七度二分ニ下降シ、脈百二十ヲ算ス便秘セルヲ以テ石鹼浣腸ヲ行フ腹部著シク膨滿シ子宮底ヲ觸知スルヲ得ズ肺臟ノ所見前日ト異ナル所無ク心尖第一音旺盛セリ

二十六日 朝體溫三十九度五分、脈百四十ニ達ス正午三十九度六分、脈百二十八、夕四十度、脈百五十、便通三回アリ惡露白色ニシテ臭氣著ルシ量少ナカラズ

二十七日 朝三十九度二分、脈百四十、正午三十八度二分、脈八十六、夕三十八度一分、脈百六、心臟濁音界變化無ク心悸亢進シ心尖第一音不純、肺動脈第二音著シク旺盛ス兩肺前面ノ上部一般ニ呼吸音粗穢、右肺前面ノ下部呼吸音微弱、笛聲及水泡音ヲ聽ク下部ニハ滲潤無ク只多少ノ壓痛アリ子宮底ハ臍下二指横徑ニ在リ收縮不充分壓痛ヲ訴フ惡露汚穢血色ヲ呈シ

多少惡臭アリ浮腫ハ下肢ニ著シカラズシテ只顔面及上胸部ニ存スルノミ脾腸筋ノ壓痛甚
 ダシク膝蓋腱反射ハ全ク消失シ尿量減少シ咳嗽惡氣嘔吐甚ダシ武酒ノ内服及注腸安息香
 酸曹達コヘイン[]]及ビ實多利斯、ストロファンツス、丁幾等ヲ内服セシメシガ一般狀態益々
 不長トナリ同夜遂ニ死亡セリ臨[○]牀[○]的[○]診[○]斷[○] 產[○]褥[○]性[○]敗[○]血[○]症[○]、實[○]質[○]性[○]腎[○]臟[○]炎[○]、萎[○]縮[○]性[○]脚[○]氣[○]、肺[○]水[○]腫[○]
 病理解剖 (田中教諭執刀)

體格榮養共ニ其、死硬ハ膝及足關節ニ存ス死斑ハ著明ニ發生ス大陰唇ハ浮腫著シク輕度ノ
 會陰破裂ヲ認ム皮下脂肪及筋肉ノ發育佳其、大網膜ハ脂肪ニ富ミ腸管ハ瓦斯ヲ以テ膨滿ス
 腹膜ハ通常ノ光輝ヲ放ツ腹腔内ニハ少許ノ潤濁セル黃褐色ノ液ヲ容ル腸管ノ血管ハ擴張
 シ殊ニ小腸ニ於テ著明ナリ橫膈膜ノ高サ右第三肋間ノ下緣、左第四肋骨下緣ニ相當ス子宮
 ノ大サハ耻骨縫際ヨリ底迄九仙迷、底ノ橫徑一〇〇仙迷、厚徑五〇仙迷ヲ算ス
 心囊滑澤、内ニ淡黃色心囊液普通量ヲ容ル右肋膜ハ全ク變化ナシ左背面肋膜ハ肥厚シ癒著
 チ呈ス心臟右室ハ多量ノ脈脂樣凝塊及ヒ少量ノ流動性血液ヲ容ル壁ノ厚サ右室〇四、左室
 壁ノ厚サ一・二仙迷瓣膜裝置異常無ク筋肉ノ色ハ潤濁シ灰黃褐色ヲ呈ス硬度軟ナリ上行大
 動脈ノ基根部ニ少數ノ白色斑ヲ見ル右肺下葉ノ表面ノ背部ニ肺肋膜ノ肥厚、血管ノ擴張、之
 レニ對スル部ノ胸壁ニ於ケル癒著痕ヲ認ム剖面ハ一般ニ暗赤色ニシテ血液ニ富ム之レヲ
 壓スルニ泡沫ヲ混セル漿液ヲ出ダス下葉ノ上葉ニ移行スル部ニ周圍限局セル不規則四角
 形ノ病竈ヲ有シ色灰黃赤色ヲ呈ス舌ヲ壓スレハ泡沫ヲ混セル漿液ヲ出ダス此病竈ノ外側

ニ粟粒結節ノ存スルヲ見ル氣管支脈ハ一般ニ腫大シ剖面ハ黃白色ニシテ所謂乾酪變性ヲ
 呈ス右肺表面ハ滑澤、剖面血液ニ富ミ浮腫狀ヲ呈ス氣管支脈ハ一般ニ腫大セズ剖面乾酪變
 性ヲ呈セル部無シ

脾臟ハ一三〇 八〇 四〇 硬度軟、剖面暗赤褐色ヲ呈ス壓スレハ血性粥狀ヲ呈ス一般ニ
 脾材ハ増殖ス剖面粗糙ナリ

左腎 一二五 五五 三〇 被膜比較的剝離シ易シ表面黃白色、剖面血液ニ富ム皮質ハ一
 般ニ潤濁シ淡黃色ヲ呈ス血管擴張即充血ヲ呈ス髓質ハ黃色ノ線狀物ヲ呈シ直細尿管ハ脂
 肪變性ヲ呈ス右腎 一三五 七〇 六〇 甚ダ腫大シ被膜剝離シ易シ表面黃白色ニシテ無
 數ノ粟粒大乃至之レヨリ少シク大ナル黃色ノ病竈ヲ見ル剖面ハ皮質ニ殊ニ同様ノ像ヲ呈
 シ皮質一般ニ腫大シ血管充張セリ髓質ハ赤色ニシテ皮質ニ小ナル病竈ノ發生セルヲ見ル
 腎盂ハ多少擴張シ粘膜炎ハ血管擴張充血セシモ膿汁ノ存在スルヲ見ズ

胃ハ胃底ニ靜脈ノ擴張シ少數ノ紫斑ヲ發生セル外他ニ著シキ變化無シ
 肝臟ハ二三〇 一六〇 八五、表面滑澤、剖面血液ニ富ム脂肪多ク一般ニ潤濁シ所々小葉ニ
 滲潤ヲ呈シ黃色ナリ

膽囊内ニハ粘稠ナル膽汁中等量ヲ容ル粘膜炎ハ變化無シ膀胱内ニハ少量ノ粘稠性黃褐色
 ノ尿ヲ入ル膀胱基底ノ粘膜炎一般ニ蒼白ナルモ其他ノ部ハ著シク充血スルノミナラズ出
 血竈約五個アリ其大サ五錢銅貨大乃至一錢銅貨大ナリ尿道開口部ハ粘膜炎腫脹シ充血セ

ルノミナラズ白色ノ瘰ヲ見ル。過首部ノ粘膜ハ蒼色ニシテ直腸ノ下部ハ充血ス。過首瓣ハ約豌豆大圓形ノ潰瘍ヲ形成ス。基底ニ於テハ黃白色ノ小結節ヲ見、盲腸下端ノ一部ニ不規則圓形ノ潰瘍アリ。腔粘膜ハ滑澤ニシテ皺襞無シ。子宮腔部ハ暗赤褐色ニシテ著シク腫大シ。子宮體ノ粘膜ハ充血ヲ呈スルノミナラズ子宮腔内ニハ暗赤色ノ血液ヲ容ル。子宮體ノ上部ノ前面ヨリ子宮底ニ亘リ小兒手拳大ノ限局セル著明ノ變化アリ。此部ノ粘膜ハ著シク腫脹シ暗綠色ヲ呈ス。表面ハ汚穢色ニシテ淡綠色ノ偽膜ノ附著セルヲ見ル。偽膜ヲ剝離スル時ハ不規則ノ潰瘍ヲ形成シ筋層ノ露出セルヲ見ル。喇叭管ノ粘膜ハ充血スル外他ニ變化無シ。卵巢ハ兩側共ニ少シク充血ヲ呈セルノミ。骨盤腹膜ハ炎症ト見ル可キ變化無シ。

病理解剖的診斷

子宮ノ實扶的慢性炎症。出血性膀胱炎。左腎實質性腎臟炎。右腎ノ膿瘍形成。氣管支腺結核。傳染脾、實質性心筋炎。慢性肋膜炎。迴盲瓣ニ於ケル結核性潰瘍。腹水。

本例ニアリテハ妊娠末期ニ水腫性脚氣ノ症狀現ハレ症候次第ニ増悪シ分娩豫定期日ニ先ダチ自然早産ヲ來シ脚氣自己ノ症狀ハ次第ニ輕快セシモ脚ニ於ケル症狀並ニ産褥熱ノ症候ヲ起シ遂ニ再び起ツ能ハザリシニ至リタルモノトス。

第八十八例 武藤 某 三十三年 經妊 手傳業者ノ妻

既往症 生來健全著患ヲ知ラズ。十八年三月月華初潮シ。爾來正順三日間持續、量中等、月經時隙礙無シ。十九年八月月婚嫁シ。既ニ七回分娩ス。内一回ハ四月、二回ハ七月、三回ハ七月ニテ流産シ。

三回ヨリ九回マテ早産ス。微毒ノ既往症明ラカナラズ。最終月經ハ昨年十二月二十一日ニシテ目下妊娠八ヶ月、分娩豫定期日九月二十八日。

主訴 妊娠七ヶ月頃ヨリ浮腫表ハレ漸次著明トナリ心悸亢進呼吸稍促迫ヲ訴フ。

入院 大正元年八月十五日

現症 體格榮養共ニ中等顔貌浮腫狀ヲ呈シ舌苔アリ咽頭發赤稍腫脹シ頸腺二三豌豆大ニ腫脹セルヲ認ム。肘腋ヲ觸知セズ脈細小頻數八十七ヲ算ス。乳房發育佳其ニシテ乳嘴乳暈ヨク著色シ初乳ヲ壓出シ得、心臟濁音界ハ一指橫徑右方ニ擴張シ肺動脈第二音旺盛ス。肺臟ニハ著變ヲ認メズ腹部ハ高度ニ膨滿シ腹圍一米突ヲ算ス。下腹部ノ腹壁浮腫シ子宮底ハ劍狀突起下四指橫徑ニ在リ兒頭ハ骨盤入口上部ニ於テ移動シ胎兒心音ハ右臍棘線ノ中央ニ於テ明カナリ下肢ニ高度ノ浮腫アリ知覺異常ナク腸筋緊張滿シ輕度ノ壓痛アリ膝蓋髓反射亢進ス。尿少量、中等量ノ蛋白及著明ノ「インデカン」ヲ證明ス。便秘シ糞便中蠅蟲卵ヲ認ム。食慾佳其、疏麻二五〇瓦、ストロハンツス丁幾一〇、苦味丁幾二〇、水一〇〇〇瓦一日三回食間内服セシム。

十七日 心尖第一音ハ收縮期雜音ヲ呈シ肺動脈第一音不純、同第二音旺盛ス。便通九回アリシモ浮腫未ダ減退セズ呼吸促迫シ一般症狀不長トナリシヲ以テ遂ニ人工早産術ヲ行ヘリ。分。經。過。

十八日 午後八時産室ニ移ス外診ヲ行フモ高度ノ浮腫及腹壁緊滿ノ爲メ胎兒部分ヲ觸知

スル事能ハズ心音ハ左右臍棘線ニ於テ聴取スルコトヲ得百三十二、八時十分石鹼澗腸ヲ行
 ヒ多量ノ排便アリ外陰部消毒後導尿ス八時三十分子宮鏡ヲ用ヒ二%カルホルル水ヲ以テ
 腔洗滌ヲ行ヒシ後ミゾー氏鉗子ヲ以テ腔部前唇ヲ固定シ子宮腔内ニ「ブーシ」ヲ挿入ス此
 際子宮外口ハ既ニ一指ヲ通シ得可ク開大シ先進兒頭ハ骨盤入口上ニ於テ尙ホ移動セリ骨
 部及ヒ軟部産道異常ヲ認メズ「ブーシ」挿入後産牀ニ安臥セシメ二時間毎ニ檢温セシメタ
 リ

十九日 午前一時陣痛發作二十秒、間歇二分、後漸次陣痛強盛トナル、午前七時破水シ三分後
 男子第二後頭位ヲ以テ生ル羊水稍々多量、更ラニ七分後胎盤胎兒面ヲ以テ生ル直後子宮底
 ハ臍下二指横徑ニ在リ硬度稍々軟、後出血無シ分娩ハ無熱ニ經過シ直後三十六度五分、脈八
 十六ヲ算ス初生兒身長三十二仙、體重千九百十五、右側陰囊水腫ヲ起コセリ
 産褥ノ經過

十九日 午後體温三十七度四分、脈九十四、便通一回、心、臟、潤、音、界、ハ、僅、カ、ニ、右、方、ニ、擴、張、シ、心、尖
 第一音及肺動脈第一音不純、肺動脈第二音旺盛、下腹部及下肢ニハ尙ホ高度ノ浮腫存ス子
 宮底ハ臍高ニアリ硬度軟トラズ且ツ輕度ノ壓痛アリ惡露血性量多キモ臭氣無ク腓腸筋痛
 及ヒ知覺ノ異常無シ
 初生兒、肺動脈第二音ハ著シク旺盛シ下肢及ヒ足背ニ輕度ノ浮腫アリ膝蓋腱反射消失シ
 右側陰囊水腫ヲ認ム四%煉乳ヲ與フ

母體ニハ麥角浸劑及硫酸一五〇瓦ヲ處方ス便通二回アリ

二十日 體温最高三十七度五分、脈八十八、便通一回、舌苔アリ脈細小整調、心臟ノ所見前日ニ
 同シク下腹部ニハ浮腫尙ホ存シ子宮底ハ臍下四指横徑、硬度通常壓痛無シ惡露血性漿液性
 臭氣無ク下肢ニハ尙ホ著明ノ浮腫アリ知覺異常無シ膝蓋腱反射稍々亢進ス
 初生兒死亡ス

二十一日 無熱、脈九十、便通五回、子宮底ハ臍下三指横徑ニ在リ硬度通常惡露血性漿液性、量
 多キモ臭氣無シ乳房緊滿ス

二十二日 無熱、脈八十二、便通五回、尿量千百瓦

二十三日 無熱、脈八十二、便通三回、尿量千五百瓦、子宮底ノ高サ前日ニ同シ惡露血性漿液性、
 量稍々減シ浮腫亦漸次減退セリ

二十四日 無熱、脈八十四、便通三回、尿量千五百瓦、子宮底ハ臍ト耻骨縫際トノ中間ニ在リ惡
 露ハ多少其量ヲ減シ下肢ノ浮腫モ亦輕度トナレリ

二十五日 無熱、脈八十二、便通四回、尿量千五百瓦

二十六日 無熱、脈八十四、便通四回、尿量千瓦ニ減ス子宮底ハ耻骨縫際上三指横徑ニアリ惡
 露血性漿液性臭氣無シ下肢ニハ尙ホ輕度ノ浮腫ヲ留メ腱反射亢進ス

二十七日 無熱、脈九十、便通三回、尿量六百五十五瓦ニ減ス子宮底ハ耻骨縫際上辛フシテ觸知
 スルコトヲ得、惡露漿液性臭氣無シ

二十八日 尿量五百瓦、便通三回。
 二十九日 耻骨縫際上子宮底ヲ觸知スルコトヲ得、惡露少量。
 三十日 腹壁上ヨリ子宮底ヲ觸知スルコト雖ク惡露少量尙ホ存ス下肢ノ浮腫全ク消散、腸筋痛、知覺異常無シ。
 三十一日 尿量七百瓦、尿中蛋白及「インデカン」ヲ認メズ。
 九月二日 心臟濁音界擴張ヲ認メズ心尖第一音及肺動脈第一音不純、肺動脈第二音多少旺盛ス腹部膨滿鼓音ヲ呈ス惡露無シ膝蓋腱反射通常、膀胱筋壓痛及知覺異常無シ本日退院ス初生兒剖檢記事。
 體格榮養不長ノ早産兒、死硬ハ膝、肘、關節ニ存ス死斑ハ背部及臀部ニアリ腹腔ヲ開クニ皮下脂肪織及ビ筋肉ノ發育甚ク不長、腹腔内漿液ノ滲出ナク大腸ハ瓦斯ヲ以テ膨滿ス、横膈膜ノ高サ左第四肋骨ノ上縁右第四肋間ニアリ胸腔ヲ開クニ左右兩肋膜腔ハ肺臟充填シ腔内漿液ノ滲出無ク胸壁及體壁肋膜面溢血其他異常ヲ認メズ心室ヲ開クニ内ニ帶黄色透明ノ漿液少量ヲ容ル心臟表面及心室内面著變無シ冠狀靜脈多少怒張ス心臟ノ大サハ該兒ノ手掌大ヲ越ニ重量一五・五瓦、心臟ヲ開クニ心室内ニハ暗赤色流動性少許ノ血液ヲ容ル凝血ナシ心臟ノ大サ四・一、四・六、二・〇仙迷ニシテ心室壁ノ厚サ右ハ〇・七仙迷、肉柱ノ發育佳良ニシテ左室壁モ亦〇・七仙迷ノ厚徑ヲ有シ共ニ心内膜及瓣膜裝置ニ異常無ク心筋黄色質軟、肺臟ハ左右共表面滑澤剖面壓迫ニヨリ泡沫ヲ混セル血性漿液ヲ出ダシ右肺下葉多少充血シ硬

度稍硬ク脾臟大サ六・五、四・五、一・八仙迷重量一八・五瓦、表面滑澤剖面血液ニ富ミ色深赤褐色、脾濾胞著明、肝臟大サ一三・〇、六・〇、四・〇、重量一四二・〇瓦、表面滑澤剖面血量可ナリ多ク色深赤褐色ヲ呈シ硬度固々シ十二指腸輪腸管開口部ヲ開クニ粘膜ニ異常無ク膽囊ハ黄綠色粘稠ノ膽汁ヲ容ル粘膜ニ變化無シ左腎重量一一・〇瓦、大サ四・五、二・六、一・八仙迷、被膜剝離シ易ク剖面血量ニ乏シク被膜兩質ノ境界著明ナリ右腎重量一〇・二瓦、大サ五・五、二・五、二・〇、被膜剝離シ易ク剖面質血セルノ他著變ヲ認メズ盲腸部ニハ認ム可キ變化無シ膀胱内ニハ少量ノ尿ヲ容ル粘膜蒼白

病理解剖的診斷

心臟ノ肥大 諸臟器靜血 血液流動性

第八十九例 平井某 三十七年 經妊 下宿屋

既往症 十五年月經初潮爾來正調一二月間持續量少ナク月經時障礙無シ二十一年婚嫁シ既ニ七回分娩ス最終月經ハ一月中旬ニシテ目下妊娠九ヶ月。

主訴 心悸亢進、呼吸促進、胸内苦悶等、

入院 大正元年九月二日

現症 體格榮養共ニ中等顔貌浮腫狀ヲ呈ス脈微弱ナルモ正調、心臟濁音界明ラカナラズ心悸亢進著シク心音凡テ不純、肺動脈第二音旺盛ス右肺背面ノ上部呼吸延長シ腹部膨滿、子宮底ハ臍卜劍狀突起ノ中央ニ在リ兒頭ハ骨盤入口上ニ於テ容易ニ移動シ胎兒心音ハ左臍棘

線ノ中央ニ於テ聴取ス下肢ニハ浮腫無ク膝、蓋、腕、反射、全ク消失シ下肢及手指ハ知覺ハ著シク鈍麻セリ食慾不進尿量減少便通數回下痢ス

入院ノ際身體ヲ動搖セシ爲メ入院後急ニ脚氣衝心症狀ヲ起シ呼吸促進苦悶甚ダシキヲ以テ遂ニ人工早産ヲ行フニ至リ

分〇〇後ノ經過、
二日 午後四時産室ニ移シ同時ニ「カンフル」二瓦ヲ注射ス次テ石鹼洗腸ヲ行ヒ外陰部及腔内ヲ消毒シ導尿ス内診ヲ行フニ子宮口ハ漸ク一指ヲ通ズルノミ兒頭ハ骨盤入口上ニアリ尙ホ移動ス母體ハ脈搏頻數微弱呼吸困難ヲ訴ヘ口唇チアノーゼヲ呈シ不安トナリ一般狀態益々險惡ニ傾クヲ以テ急ニ分娩ヲ遂ゲシムルノ必要ヲ感シ直チニ「クナップ」氏擴張器ヲ以テ子宮口ヲ約六仙迷開大シ卵膜ヲ破ル事ナク双合廻轉術ヲ行ヒ第二骨盤端位ニ廻轉シ卵膜上ヨリ右足ヲツカミ次テ卵膜ヲ破リ不完全足位トナシ胎兒ヲ娩出ス時ニ午後六時ナリキ而シテ此手術中水蛭二百八十條ヲ胸部ニ貼用セリ胎兒分娩後三分時ヲ経テ「レテ」氏胎盤歴出法ヲ行ヒ胎盤ヲ娩出セシム子宮底ハ臍ト劍狀突起ノ中央ニアリ收縮通常後出血ナシ分娩直後體溫三十七度九分脈百二十六ヲ算ス而シテ胎兒心音ハ手術前ニハ明カニ之ヲ聴收シ得タリシモ廻轉術後娩出ニ稍々時間ヲ要セシ爲メ分娩經過中途ニ死亡スルニ至レリ

分娩直後呼吸困難稍々輕快シ一時安靜トナリシモ十數分後再ビ呼吸困難起リ口唇チアノーゼヲ呈シ鼻翼呼吸ヲ營ムニ至リ再ビ不安トナル六時三十分瀉血ヲ企テシモ僅カニ一〇〇瓦ヲ瀉血シ得シノ「ミ」ゲ「ガ」レン「二」五瓦ヲ三回ニ注射シ安息香酸曹達コヘイン、五〇瓦、カンプル六〇瓦ヲ數回ニ分チ注射ヲ試ミ其他食鹽水注入、芥子泥貼用、芥子浴等ヲ施コセシモ目的ヲ達スルコト能ハズ八時三十分頃患者漸ク安靜トナリタリシモ脈搏ヲ觸知シ難キニ至リ次テ九時四十分心臟麻痺ノ爲メ遂ニ死亡スルニ至レリ、
本例ハ妊娠九ヶ月ニシテ重症脚氣ヲ起コシ入院セシモノナルガ爲之反ツテ脚氣衝心ヲ起コシ危險ニ瀕シタルヲ以テ直チニ子宮口ヲ開大シ廻轉術ヲ行ヒ不完全足位トナシ娩出セシメタリシガ胎兒ハ分娩遲延ノ爲メ其ノ經過中ニ於テ既ニ死亡シ母體ハ分娩極メテ都合ニ經過セシニ關セズ分娩後未ダ四時間ヲ經過セザリシニ一般狀態益々不良好トナリ遂ニ不幸ノ轉歸ヲ取ルニ至レリ即チ衝心脚氣ニ對シテハ縱令分娩ヲ遂ゲシムルモ起死回生ノ目的ヲ達スルコト難キモノナルヲ知ルベシ

第九十例 龜野某 二十二年 仲仕ノ妻 初妊

既往症 生來健全著患ヲ知ラズ十八年八月月經來潮爾來正調四日間持續量中等月經時障礙ナシ二十年婚嫁ス昨年十二月五日以來月經閉止ス目下妊娠十ヶ月豫定分娩期日八月十二日

主訴 入院分娩

入院 四十二年九月十七日、

現症 體格榮養共ニ中等、乳房發育不良、乳嘴乳暈ノ著色著明ニシテ初乳ヲ壓出ス脈軟小稀々頻數、心臟濁音界擴張無キモノ、如キモ明ラカナラズ心尖第一音、及肺動脈第一音、不純、同第二音、旺盛、右肺ハ一般ニ呼吸音微弱ニシテ左肺表面ノ上部呼吸延長ス腹部膨滿シ子宮底ハ臍ト劍狀突起ノ中央ニアリ兒頭下方骨盤入口ニ固定ス心音ハ右臍棘線ノ中央ニアリ著明ニシテ觸診ノ際子宮ノ收縮ヲ認ム下肢ニハ浮腫ナク膝蓋腱反射消失ス腓腸筋痛及知覺ノ鈍麻無ク骨盤計測上異常ヲ認メズ尿量ハ減少シ少量ノ蛋白ヲ證明ス且ツ便秘セリ分〇ノ經過

十七日 入院後直チニ分娩開始ス陣痛強盛ニシテ規則的ニ反復ス午後一時二十分石鹼澆腸ヲ行ヒ外陰部消毒カテーテルヲ排尿ヲ行フ次テ外診ヲ行フニ兒頭ハ骨盤入口ニ固定シ心音ハ右側ニ於テ著明百二十八ヲ算ス同三十五分發作三十秒、間歇一分二十五秒、二十分内診ヲ行フ子宮口ハ全開大シ先進兒頭ハ骨盤入口ニ固定シ卵胞既ニ破レ頭毛ヲ觸知スルコトヲ得、小顎門ハ右前ニ在リ其他左右ノ坐骨棘ヲ觸知ス三時陣痛發作三十五秒、間歇五十五秒、カテーテルヲ排尿ヲ行フ同二十五分石鹼澆腸ヲ行フ胎兒心音百二十五ヲ算ス三時四十五分頃ヨリ陣痛微弱トナリシヲ以テ鹽酸ヒニン(〇・五)ヲ内服セシメ、グリセリン澆腸ヲ行ヒ腹部熱性濕布ヲ試ミ陣痛ヲ喚起セシム五時十分發作四十五秒、間歇一分二十秒、陣痛力尙微弱ナリ胎兒心音百四十二微弱、同時カテーテルヲ以テ導尿ス七時二十分内診ス、子宮口ハ全

開大シ卵胞既ニ破レ兒頭ハ骨盤潤部ニアリ顎門ヲ觸レズ産瘤著シク且ツ軟部産道ハ輕度ノ壓迫症狀ヲ現ハシカテーテルヲ挿入スルコト能ハズ心音ハ微弱緩徐不正、次テ又グリセリン澆腸ヲ行フ七時三十分胎兒壓出法ヲ行ヒ數回反復スルモ毫モ兒頭先進セズ陣痛亦微弱ニシテ母體疲勞甚ダシ七時四十五分既ニ胎兒心音ヲ聽カザルニ至リ軟部産道ノ壓迫症狀益々著明トナルヲ以テ穿顱術ヲ行フ、八時胎兒ヲ娩出セシ後五分ニテクレテ氏胎盤壓出法ヲ行ヒ胎盤ヲ娩出セシム、子宮底臍下二指横徑硬度ハ軟ナリシモ後出血ナシ

十一時體溫三十八度二分、脈百八、嘔吐二回アリ同二十五分、スケレイン五〇ヲ注射ス
十八日 午前一時體溫三十九度九分ニ昇騰シ、脈百二十四ヲ算ス午前六時三十九度、脈百八、九時三十八度三分、脈百二、正午三十八度八分、脈百二十、午後三時三十九度一分、脈百二十六、六時三十九度一分、脈百二十七、九時三十八度七分、脈百四、便通四回、子宮底ハ臍上二指横徑ニ在リ、收縮不真、硬度軟、壓痛アリ、惡露血性多量、臭氣無シ下肢ニハ浮腫ナク膝蓋腱反射消失ス惡露口渴ヲ訴フ武酒三十五水百瓦ヲ一日三回注射ス更ラニ、メクレイン五〇ヲ注射ス、

十九日 午前六時三十八度六分、脈百五十九、九時三十八度二分、脈百二十、正午三十七度五分、脈百十四、午後三時三十九度八分、脈百十三、六時四十分、脈百三十九、九時三十九度、脈百二十、便通二回、尿ハ1.4%ノ蛋白ヲ含有ス、心悸亢進シ時々譫語ヲ發ス下腹部膨滿シ一般ニ壓痛アリ子宮底ヲ觸知セズ惡露血性多量、臭氣アリ

二十日 午前六時三十八度三分、脈百四十四、九時三十九度三分、脈百三十八、正午四十四度二分、

脈百、四、八、細小、微弱、腹部膨滿シ下腹部ニ於テ人頭大波動ヲ呈スル囊腫様物ヲ觸レ壓痛アリ「カテーター」ヲ以テ約千瓦ノ尿ヲ排泄セシメシニ該囊腫様物ハ消失シ子宮底ハ臍ト劍狀突起ノ中央ニアリ收縮不良ナラズ惡露ハ汚穢色ニシテ多少臭アリ安息香酸曹達コヘイン「カンフル」食鹽水注射水蛭貼用芥子泥及脚湯武酒浣腸其他臨機應急ノ處置ヲ試ミシモ其效無ク遂ニ心臟麻痺ノ爲メニ斃ル

病理解剖 (甲斐助手執刀)

生前診斷

一女屍、死後強直ハ諸關節ニ尙ホ存シ死斑ハ項部背部腰部ニ存在ス腹部ヲ壓スルニ下腹部ニ當リ高サ臍部ニ達スル抵抗物アリ乳暈ハ著シク黒染ス
 腹部ヲ切開スルニ皮下脂肪ハ著シク發育シ大網膜ノ脂肪ハ發育不良ナリ腸管ハ互ニ遊離ス腹腔内ニハ液ノ滲出ヲ見ズ横膈膜高サ左第四肋骨右第四肋間ニ達ス胸部ヲ開クニ左右兩肺遊離シ肋膜腔内ニハ液ノ滲出ヲ見ズ心囊ヲ開クニ内ニ透明黄色ノ液凡ソ十五ヲ存ス心囊内面ニハ異常ナク心臟ハ該屍體ノ手拳大ヨリ稍々大ナリ左房ヲ開クニ暗赤色ノ凝血塊多量ヲ有ス左室ニハ暗赤色ノ凝血塊並ビニ血液ヲ有ス右房ヲ開クニ内ニ豚脂様塊中等量ヲ有ス硬度通常暗赤色ヲ呈ス右室ノ壁ノ厚サ〇・七仙迷、左室ノ壁ノ厚サ一・五仙迷、瓣膜裝置ニハ異常ナシ左肺ヲ切開スルニ剖面血液ニ富ミ泡沫ヲ混セル液多量ヲ壓出シ得、右肺ヲ切開スルニ上葉ハ血液ニ乏シク中葉下葉ハ血液ニ富ミ且泡沫ニ富メル液多量ヲ壓出シ得

脾大サ一〇〇 七〇 三〇、表面皺襞ニ富ム質通常ナリ剖面ハ血液ニ乏シク剖面ヲ刀尖ヲ以テ搔爬スルニ多量ノ粘稠物ヲ附着セリ

左腎大サ一〇〇 七・五 四〇、硬度稍硬ク被膜ハ稍々剝離シ易シ表面滑澤ナリ剖面血液ニ富ミ皮質ト髓質トノ境界明ラカナリ皮質ニ於テ所々ニ稍々潤濁セル所アリ、右腎大サ一〇〇 一五〇 三・五、質稍々硬ク被膜剝離シ易シ表面滑澤ニシテ剖面血液ニ富ミ皮質髓質ノ境界明ニシテ皮質ハ一般ニ潤濁シ且ツ其幅廣シ

胃ヲ切開スルニ中ニ黒色ノ液多量ニ存ス粘膜炎ニハ粘稠ノ液多量ニ附着ス廻盲部ヲ開クニ盲腸部ニ黄綠色ノ液多量ヲ有ス粘膜炎ニハ毛細管ノ怒張セル外他ニ異常無シ廻腸ニ於テハ濾胞ノ腫脹セルヲ認ム膀胱ハ著シク膨滿シ中ニ赤褐色稍々潤濁セル尿多量ヲ容ル肝臟ノ大サ二五〇 一三〇 一〇〇、硬度稍々固シ表面滑澤剖面稍々血液ニ富ム小葉ノ境界稍々明ラカナリ小葉内ニ黄色ノ斑點アリ膽囊ヲ開クニ内ニ暗綠色ノ膽汁多量ニ存ス子宮ノ大サ 一五〇 一二〇 四〇ナリ表面ハ滑澤、切割スルニ子宮壁ノ厚サ二〇、子宮ノ後壁ニ當リ黒色粘稠ナル頰敗物ヲ附着セリ子宮頸部ノ内面ニハ汚穢暗黒色且ツ惡臭アル粘稠ノ頰敗物ノ多量ヲ有セリ
 卵巢ヲ切開スルニ一ツノ豌豆大ノ黄體ヲ認ム

病理解剖的診斷

實質性腎臟炎 傳染脾 肝臟脂肪滲潤

右心室程度ノ肥大(擴張ヲ認メズ)、産褥子宮、
 本例ニアリテハ妊娠中輕症脚氣ノ症狀現ハレ分、
 延分、娩進マズ遂ニ母體産道壓迫症狀ノ爲メ胎兒ヲ穿膈セリ、
 爾後、産褥傳染ノ症狀ノ下ニ心
 臟機能急ニ衰弱シ遂ニ心臓麻痺ニ陥レリ、

第九十例 蒲原某 四十三歳 農

既往症 月經初潮ハ十六年七ヶ月結婚ハ二十年十ヶ月ニシテ既ニ分、
 月經不正、最終月經モ亦不明ニシテ現時妊娠十ヶ月

主訴 二ヶ月以來全身ニ浮腫起リ二週間以前ヨリ胸内苦悶ヲ訴フ尿量減少、
 眩暈ヲ覺ユ食慾不進ナリト

現症 明治四十五年五月二十五日

體格榮養共ニ中等顔面浮腫狀ヲ呈シ苦悶ノ狀アリ鼻翼呼吸ヲ營ミ口唇輕度ノ「チアノーゼ」
 ナ呈ス下腹部及ビ下肢ニハ高度ノ浮腫アリ著明ノ指壓痕ヲ留ム脈ハ細小頻數百至、
 十七度三分、乳房發育佳、乳嘴乳暈ノ著色著明ニシテヨク初乳ヲ壓出シ得、
 打診上心臓濁音
 界ハ僅カニ右ニ擴ガリ肺動脈第二音旺盛、且ツ不純ナリ肺ハ呼吸音一般ニ微弱ナルモ水泡
 音ヲ聽カズ腹部膨滿腹壁ノ浮腫甚ダシク胎兒部分ハ觸知シ雖ク胎兒心音モ亦不明ナリ膝
 蓋、腱、反射消失、
 反應著明、
 胎盤氣浮腫性、
 二十五日入院ス一般狀態益々不、
 傾クテ以テ同日人工

早産術ヲ行フ先ヅグナツア氏擴張器ヲ使用シ約七仙迷子宮口ヲ開大シ次ニ母體益々危險
 ニ瀕スルヲ以テ不得止穿膈術ヲ行ヒ胎兒ヲ娩出セシメタリ胎盤娩出後、
 後出血無ク子宮收
 縮狀態佳ナリキ
 産褥ニ於ケル經過

二十五日 分娩後體温三十七度三分、脈百四、心臓機能佳、
 阿列布油「二〇」二〇%安息香酸曹達コフェイン「一〇」瓦ヲ每三時間交替ニ注射

二十六日 午前九時體温三十六度五分、脈九十六、正午體温三十六度八分、
 體温三十六度八分、脈九十二、便通無ク浮腫減退ノ模様ナシ

二十七日 午前九時體温三十六度六分、脈九十三、正午體温三十六度九分、
 體温三十七度二分、脈百、一般ニ脈搏細小頻數ナルモ尙正調、
 動脈第二音ハ著シク旺盛ス左肺上葉ニ於テ水泡音ヲ聽ク其他一般呼吸音ハ幽微ナリ腹部
 膨滿、子宮底ハ臍上二指橫徑ニ在リ收縮不、
 處置「サガール」一〇CCヅ、朝夕二回ニ注射シ内服ニハ「巴豆油」一滴ヲ散薬トナシ一日三

回分服セシムル外「サキタリス」〇・五ヲ浸劑トシ一日數回分服セシメ其他水蛭二百條ヲ胸部
 ニ貼シ同時ニ腸洗滌ヲ行フ爾後便通十一回、尿量モ亦多少増量シ浮腫著シク減退セリ

二十八日 午前九時體温三十六度七分、脈九十二、正午三十六度八分、
 十七度三分、脈百二十、便通三回全身浮腫著シク減退、心臓機能ハ著シク可、
 心臓濁音

界ハ最早普通トナレリ然レドモ肺動脈第一音ハ尙ホ不純、同第二音著シク旺盛シ腹部ハ未ダ膨滿ス子宮底ハ臍高ニ在リ硬度軟、惡露血樣漿液性、其量多カラズ膝、蓋、反射ハ消、失ス

處置 水蛭五十條ヲ貼ス「ゲガーレン」一〇瓦ツツ二回注射シ内服ニハ 硫麻一〇〇 稀鹽酸一〇〇「ストロファン」丁幾一〇〇 單舎 一〇〇 水一〇〇〇 一日三回食後一時間ニ分服セシメ尙ホ他ニ「ザウレンチン」二〇瓦 「安息香酸曹達」コフエイン一〇六瓦 乳糖 一〇瓦ヲ散藥トナシ一日三回食後二時間半ニ内服セシム

二十九日 午前九時體溫三十六度八分、脈百九、正午體溫三十七度、脈百十、午後六時體溫三十七度三分、脈百十ヲ算ス便通四回、全身ノ浮腫ハ著シク減退セシモ心臟機能ハ再ビ微弱トナリ時々脈搏歇滯ス子宮底ハ臍ノ高サニアリ收縮不其、硬度軟、輕度ノ壓痛アリ惡露血液漿液性ニシテ僅ニ臭氣アリ其量多カラズ下肢ノ浮腫全ク消退セシモ膝、蓋、反射未ダ現ハレズ

處置 水蛭五十條ヲ胸部ニ臍腸部ニ「芥子泥」ヲ貼ス「ゲガーレン」及ビ「硫酸スバルテイン」ヲ毎四時間ニ交互ニ注射シ内服トシテハ前日ノ處方ヲ投ズ

三十日 午前九時體溫三十六度八分、脈百二十二、正午體溫三十七度二分、脈百二十三、午後六時體溫三十七度一分、脈百十二、便通六回アルモ腹部膨滿甚ダシキヲ以テ食鹽水ヲ以テ腸洗滌ヲ行ヒタリ心悸亢進甚ダシク患者不安ニシテ睡眠スルヲ得ズ一般狀態前日ト大差無シ

三十一日 午前九時體溫三十七度、脈百四、正午體溫三十七度三分、脈百二、午後六時三十七度四分、脈百九、心臟濁音界ノ擴張ヲ認メズ心悸亢進著シク肺動脈第二音著シク亢進シ且輕度

ノ呼吸困難ヲ起セリ、子宮底ハ前日ト同シク臍高ニ在リ收縮不其、硬度軟ニシテ壓痛アリ惡露血性漿液性ニシテ汚穢色ヲ呈シ惡臭アリ下肢ニ浮腫無ク膝、蓋、反射消、失

六月一日 午前九時體溫三十七度三分、脈百四十、正午體溫三十七度一分、脈百三十八、午後六時三十六度九分、脈百二十六、子宮底臍高ニ在リ硬度軟、惡露血性漿液性汚穢色ニシテ惡臭アリ顔貌浮腫狀ヲ呈スルモ全身ノ浮腫ハ殆ンド全ク消退セリ心臟機能著シク旺盛トナリ心音總テ不純、下肢下腹部口圍等ノ知覺ハ鈍麻シ尿中蛋白、糖ヲ證明セズ只僅カニ「インヂカン」少量ヲ證明スルノミ

處置 腸洗滌ヲ行ヒ後、臭剝五〇 武酒二〇〇 水一〇〇〇ノ注腸竝ビニ芥子ノ脚湯ヲ行フ其他ハ心臟亢奮劑ノ内服竝ビニ注射ヲ行ヘリ

二日 午前九時體溫三十六度九分、脈百十四、正午體溫三十七度三分、脈百六、午後六時體溫三十六度八分、脈九十八至、一般狀態益々不其トナリ遂ニ午後七時半心臟麻痺ヲ起シテ斃ル本患者ハ妊、娠中高度ノ水腫狀脚氣ヲ起シ呼吸困難、チアノ、一七等ヲ呈セルヲ以テ人工早産術ヲ施コシタルモノニシテ分娩後、水腫ハ減退セシモ心臟機能漸次衰弱シ産後第九日脚氣衝、心ヲ起シテ死亡セシモノナリ

第九十二例 中村某 三十一年 經妊

既往症 生來健全著患ヲ知ラズ十五年五ヶ月月經來潮シ爾來正調三四日持續、量中等、月經時障礙無シ十八年九ヶ月婚嫁シ既ニ二男一女ヲ分娩ス最終月經ハ五月八日ニシテ目下妊

娠十ヶ月(分娩豫定期日二月十五日)
主訴 昨年十二月頃ヨリ軽度ノ浮腫アリシガ近來著シク増加シ尿量減少シ毎日一回大便
亦締結シ四五日毎ニ一回聲音嘶嘎

入院 四十五年二月十三日

現症 體格良、榮養稍々不、全身浮腫ヲ呈シ呼吸困難ヲ訴フ顔貌蒼白、浮腫狀トナリ且苦悶
ノ狀アリ口唇乾燥シ汚穢黃褐色ノ舌苔アリ咽頭著シク發赤シ脈軟九十ヲ算ス乳房下垂シ
發育佳、著シク色素沈著シ初乳ヲ分泌ス心臟濁音界ハ不明心悸亢進著シク心音皆旺盛シ
就中肺動脈第二音ニ甚ダシク兩肺一般ニ呼吸音粗裂腹部膨滿シ腹圍九十二仙迷ヲ算ス子
宮底ハ臍ト劍狀突起ノ中央ニアリ觸診ノ際子宮壁ノ收縮スルヲ認ム兒頭ハ骨盤入口ニ固
定シ心音ハ左臍棘線ノ中央ニ於テ明カナリ下肢及腹壁ニ著明ハ浮腫アリ知覺ハ鈍麻シ膝
蓋、腱反射消失、便中蠅蟲卵ヲ發見ス尿ハ著シク混濁シ糖蛋白ヲ證明セズインゲンガン多量
ニ存ス入院後直チニ石鹼澆腸ヲ行ヒ醋刺三〇、硫酸二五〇、苦味丁二〇、水一〇〇〇、一日三
回食後一時間ニ内服セシメ尙ホ散薬トシテ實芝多利斯末〇・五、ザウレチン二〇、乳糖一〇、一
日三回食間ニ與フ

十四日 朝三十六度一分、脈九十、夕三十七度八分、脈八十八、便通一回甚ダ少量ニシテ脈軟、心
悸亢進、肺動脈第二音著シク旺盛シ呼吸音ハ一般ニ粗裂トナリ兒頭深ク骨盤内ニ固定ス、胎
兒心音微弱

十五日 朝三十七度、脈八十四、夕三十六度五分、脈九十、脈軟、弱、呼吸困難ヲ訴フ心臟濁音界
不明ナルモ心音ハ一般ニ旺盛シ肺動脈第二音殊ニ著ルシ胎兒ノ心音ハ左側ニ於テ明乎ニ
シテ膝蓋、腱反射消失、硫酸三〇〇瓦ニ増量シ更ニ巴豆油一滴、乳糖一〇ヲ散トシ一日三回
ニ分服セシム
分娩經過

十五日 午後三時四十分產室ニ移ス直チニ石鹼澆腸ヲ行ヒ外陰部消毒「カテーテル」排尿ヲ
行フ四時三十分内診ヲ行フニ子宮口ハ三指橫徑開大ス護膜製彈性「ブイジョー」ヲ子宮腔ヘ
挿入ス、五時二十分「ピツイトリン」一〇ヲ注射ス五時四十五分發作一分三十秒、間歇二分、六時
十分、水蛭二百條ヲ貼ス同四十分陣痛發作三十秒甚ダ微弱ニシテ七時十五分迄全ク陣痛發
作無シ七時十五分發作五十秒、七時四十五分發作二十秒、高度ノ呼吸困難ヲ訴フ七時四十五
分以後陣痛發作無シ八時三十分「カンフル」注射ヲ行フ脈搏ハ頻數ナルモ充實ス呼吸困難ハ
益々甚ダシク胎兒心音ハ遂ニ聽取シ難キニ至レリ、

十六日 零時十五分「ピツイトリン」一〇ヲ注射ス同十八分外陰部ノ消毒ヲ行ヒ「ブイジョー」ヲ
除去ス子宮口ハ六仙迷開大、兒頭ハ骨盤入口ニ固定シ卵胞既ニ破レ右前膊ノ脫出アリ整復
スルコト能ハズ既ニ胎兒心音ヲ聽カズ母體一般狀態ハ分娩ノ遷延スルヲ許サザル狀況ニ
アリシヲ以テ直チニ穿顛術ヲ施セリ十二時四十分穿顛セル胎兒ヲ娩出ス同五十分クレデ
氏壓出法ヲ行ヒ胎盤ヲ娩出ス子宮底ハ臍下三指橫徑ニ在リ收縮佳、後出血無シ、手術中、ク

ロフロルム三〇瓦ヲ使用セリ脈頻數百六ヲ算ス正調充實シ甚ダシク不長ナラズ呼吸困難
 稍々輕快ス熱發ナシ
 十七日 朝三十六度五分、脈、百八、夕三十六度九分、脈、百二十、軟、尙、ホ、呼吸困難ヲ訴フ、心臟濁音
 界擴張無ク、心、悸、亢、進、シ、肺動脈第二音、ハ、著、シ、ク、旺盛ス、腹部膨滿シ子宮底ハ臍高ニアリ硬度
 軟、惡露血性臭氣ナシ、下、肢、ニ、ハ、尙、ホ、著、明、ノ、浮腫ヲ存シ、膝蓋、反、射、全、ク、消、失、ス、食鹽水腸洗滌
 ナ行ヒ水蛭二百條ヲ胸部ニ貼ス下腹部及心臟部ニ水蛭ヲ貼ス「ピツイトリン」一〇ヲ注射シ
 「カンフル」及「安息香酸曹達コヘイン」ヲ交互ニ注射ス内服ニハ巴豆油一滴乳糖一〇ヲ散藥ト
 シ一日三回分服セシム此他「ストロファンチス」丁幾、醋剝硫麻(二〇〇)等ヲ水劑トシ與フ麥角
 劑ハ嘔氣アリシヲ以テ中止セリ

十八日 午前六時三十六度三分、脈、百二、九時三十五度五分、脈、百二、十六、正午三十五度二分、脈、
 百十、午後三時三十五度二分、脈、百十四、九時三十五度一分、脈、九十六、細、微、弱、遂、ニ、觸、知、シ、難、キ
 ニ、至、リ、體、温、ハ、益、々、下、降、シ、呼、吸、困、難、益、々、加、ハ、リ、心、機、能、著、シ、ク、微、弱、ト、ナル、湯、婆、ヲ、用、ヒ、ザ、ガ、
 レン注射、食鹽水注入、腸洗滌、芥子泥貼用其他百方治療ニ努メシト雖モ一般狀、態、漸、次、不、良、ト
 ナリ翌朝午前一時三十分肺水腫ノ症狀ノ下ニ遂ニ死亡セリ、

病理解剖 (田中教諭執刀)

體格甚、榮養佳、良ノ一女屍、死硬ハ既ニ融解シ下肢ニ高度ノ浮腫アリ腹腔ヲ開ケニ内ニ少量
 ノ透明ナル漿液ヲ容ル腸管ハ一般ニ膨滿ス橫膈膜高サ左第四肋間、右第五肋骨ニアリ右肺

表面ハ全ク遊離ス之レニ反シ左肺下葉ハ胸壁ト癒著ス心囊ヲ開ケニ滑澤ニシテ内ニ透明
 ノ漿液中等量ヲ容ル右心室ノ前面ニ於テ白色不規則強靱ナル腫症ヲ見ル心臟内ニハ大量
 脈脂樣凝血ヲ容レ左心室ハ擴張セルモ室壁ノ肥厚ヲ認メズ筋肉ハ赤褐色ヲ呈シ硬度固シ
 瓣膜裝置異常ナシ右肺ハ暗赤色浮腫狀ヲ呈ス左肺ハ右肺ニ同シ脾臟大サ一〇〇、一一〇
 八三仙迷、表面滑澤割面赤色硬度稍々軟、左腎大サ一一〇 六〇 四〇 被膜剝離シ易シ表
 面滑澤黃白色ヲ呈シ割面血量ニ富ム被質ハ黃白色潤澤セルモ腫脹セズ髓質無色ヲ呈シ皮
 髓兩質ノ境界明ラカナリ硬度稍々軟 右腎大サ一一〇 六五 四〇 被膜剝離シ易シ
 表面黃白色ヲ呈ス皮質一樣ニ潤澤シ腎盂ハ稍々擴大シ粘膜ハ所々ニヨリ血管ノ擴張ヲ認
 ム髓質乳頭ハ扁平トナル血量ニ富ミ硬度硬タシ廻盲部ヲ開ケニ盲腸ノ粘膜ニ於テ溢血點
 ナ認ム肝臟大サ二五〇 一五〇 一〇〇、表面滑澤各小葉ノ境界明ラカナリ脂肪量多ク硬
 度軟、胃ヲ開ケニ粘膜ハ粘稠ナル内容ヲ以テ掩ハル色黒ク量三千百瓦ヲ有ス子宮ハ一八〇
 一〇〇、壁ノ厚サ二〇、膀胱異常無シ

病理解剖的診斷

一、心臟ノ擴張 二、實質性腎臟炎

顯微鏡的診斷

一、心臟ニハ組織的變化無シ 一、實質性腎臟炎、
 一、肝臟變化無シ 一、脾臟靜血 二、肺靜血

本例ニ於テハ妊娠中、輕症脚氣ニ罹リ、妊娠末期ニ於テ、水腫性脚氣ノ症狀ヲ呈シ、呼吸困難ノ症狀ヲ現ハシ、來リシヲ以テ遂ニ胎兒分娩ヲ企テシモ、分娩中胎兒ノ心音次第ニ微弱トナリ、遂ニ聴取セザルニ至リ、母體ノ狀態益々危險ニ迫リシヲ以テ遂ニ穿顛ハ上分娩セシメタリ、産褥ニ入りシモ、症狀輕快セズ、心臟機能次第ニ衰弱、肺水腫ノ症狀ノ下ニ斃レタリ、尙ホ屢々檢尿ヲ試ミシモ、生前尿中諸種ノ試験ニ、蛋白ノ反應ハ凡テ陰性ニ終レリ。

第五 症候論

(一) 乾性症 die trockene Form.

妊婦若シ乾性脚氣ニ罹リタルトキハ、多クハ初メ下肢ニ倦怠ノ感、膝關節ノ無力ヲ訴ヘ、同時若クハ少ク後レテ脛骨ノ前面及ビ其前縁ニ輕度ノ浮腫表ハレ、腓腸部緊張シ、腓腸筋及ビ長廻後筋ニ壓痛ヲ感ズ、此時期ニ當リ精細ノ検査ヲナストキハ、下肢ノ知覺ハ鈍麻シ稀ニ蟻走様ノ感アリ、之ヨリ知覺ノ異常ハ漸次上行シ、指尖、口唇ノ周圍ニ及ブトアリ、脈搏ハ疾速軟トナリ、時ニ重複搏動ヲ呈スルニ至ル、上肢ノ反射ニハ著變ヲ來サザルモ、膝蓋腱反射ハ初メ亢進シ、漸次微弱トナルモノ、或ハ初メ亢進セシモノ急ニ消失スルコトアリ、尿量ハ一般ニ減少シ、大便ハ殆ド凡テノ場合ニ便秘シ、僅ノ

運動ニヨリテモ容易ニ心悸亢進、胸内苦悶ヲ起ス、他覺的ニハ心臟濁音界右方ニ擴張シ、心尖ニ於テ縮期ノ噪鳴又ハ不純音ヲ聽キ、肺動脈第一音不純トナリ、或ハ單ニ以上ノ症候ト共ニ肺動脈第一音不純、第二音強盛セリ、然レドモ心臟濁音界ニ何等異常ヲ來サザルモノアリ、以上ノ症候ハ多クハ妊娠後半期ニ表ハルルモノニシテ、脚氣自己ノ症候トシテハ非妊時ト大差ナキガ如シ。

單純ニ乾性症ト見做ス可キ者ハ、比較的少クシテ吾人ノ調査セシ脚氣妊婦ノ九十二名中七名即チ七五%ニ過ギザリシ、然レドモ水腫性脚氣ノ輕度ノ者ニアリテハ人ニヨリ乾性脚氣ニ算入スルコトアリ、然ラバ所謂乾性症ト見ルベキ者ハ此統計ヨリ遙ニ多數トナラザルベカラズ、余等ハ便利上全ク浮腫ヲ認メザル者ノミヲ乾性脚氣ト看做シテ妊娠並ビニ産褥ニ於ケル關係ヲ調査セリ。

吾人ノ遭遇セシ七名中、一名ヲ除クノ外ハ、妊娠中既ニ脚氣ノ症候ヲ呈セシ者ニシテ、一名ハ妊娠中何等脚氣トシテ認ム可キ症候ナク、産褥ニ至リ始メテ乾性脚氣ノ症狀ヲ現ハセリ、是等妊婦及ビ褥婦ハ、以上乾性脚氣トシテ記載セル症候ノ大部分ヲ具ヘ、脈ハ他ノ健康妊婦ニ比シテ稍々速脈ニシテ、下肢ノ倦怠、腓腸部ノ緊滿、心悸亢進ハ凡テノ場合ニ之ヲ認メ知覺鈍麻ノ症狀ヲ缺如セル者モ亦尠ナカラズ、膝蓋腱反射ハ縱

令一時亢進セシモノモ早晚消失セリ、胸部打診上心臓濁音界ノ擴張ヲ認メシ者二名ニシテ肺動脈第二音ノ強盛ハ凡テノ場合ニ之ヲ認メタリ、膀胱直腸ノ障礙アリシ者竝ニ尿中蛋白ヲ證明セシ者ナク著明ノ運動障礙ヲ伴ヒシ者ノ三名ハ何レモ産褥中ニ高度ノ筋萎縮ヲ來セリ。

是等妊婦ノ妊娠持續ニ就キテハ中ニ最終月經不明ノ者アリテ明カニ其關係ヲ知リ難キモ、大ナル影響ナキモノノ如ク唯内一名ハ妊娠八ヶ月ニテ死胎兒ヲ分娩セリ、他ノ一名ハ妊娠中急ニ脈搏頻數、呼吸困難、胸内苦悶ノ症狀現ハレシヲ以テ人工早産術ヲ施セリ、該死胎兒ノ剖見上所見トシテハ、右心室ノ肥大、流動性血液、諸内臓器ノ鬱血ヲ認メタリ、他ノ一名ハ産褥ニ入ノテ脚氣症狀輕快シ産褥第三十一日ニシテ略治癒ノ状態ニテ退院セシモ、其他ノ者ニアリテハ産褥ノ經過ニ著變ナク唯普通健康産婦ニ比シ其脈搏稍々急速ニシテ、平均九十以上ヲ算セリ、生兒五名中二名ハ産褥第三日ヨリ他ノ一名ハ第五日ヨリ吐乳ヲ始メシヲ以テ止ムナク母乳ヲ廢シ人工榮養ヲナスニ至レリ、即チ乾性脚氣産婦ノ七〇〇%ハ授乳シ難キ割合ヲ示セリ。

左ニ上記乾性脚氣七名ヲ一表トシテ示サン。

第一表 乾性脚氣

番	姓名	年分	浮腫	尿	膀胱	心	肺	診	發	妊	分	破	分	男	胎	後	產	轉	乳	備																		
1	服部 某	33	經	失	消	妊	中	胎	期	中	胎	胎	胎	女	2065	44	15	通	普	輕	略	第	日	十	退	院	四	院	第	十	日	第	五	日	吐	乳	養	考
2	大島 某	31	經	失	消	妊	中	胎	期	中	胎	胎	胎	女	2785	47	10	通	普	輕	略	第	日	十	退	院	四	院	第	十	日	第	五	日	吐	乳	養	考
3	本田 某	34	經	失	消	妊	中	胎	期	中	胎	胎	胎	女	1615	41	25	通	普	輕	略	第	日	十	退	院	四	院	第	十	日	第	五	日	吐	乳	養	考
4	平石 某	23	經	失	消	妊	中	胎	期	中	胎	胎	胎	女	3200	50	33	通	普	輕	略	第	日	十	退	院	四	院	第	十	日	第	五	日	吐	乳	養	考
5	名和 某	24	經	失	消	妊	中	胎	期	中	胎	胎	胎	女	2465	48	15	通	普	輕	略	第	日	十	退	院	四	院	第	十	日	第	五	日	吐	乳	養	考

症候論

二六九

番	姓名	年分	浮腫	尿	膀胱	心	肺	診	發	妊	分	破	分	男	胎	後	產	轉	乳	備
6	乳 某	27	(一產)+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	井 戸 某	36	(一產)+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

(二) 水腫性症 die ödematöse Form.

妊婦ハ步行不確、下肢ニ疲倦ヲ覺ヘ、其症狀漸次又ハ急ニ増進ス、本症ニ於テハ一般ニ知覺麻痺烈シカラズ、暫時ノ後步行ハ不能トナリ浮腫ハ先ヅ下肢ニ表ハレ比較の急ニ全身ニ蔓延シ終ニ顔面浮腫シ眼瞼モ亦腫脹シ高度ノ場合ニハ眼ヲ開クコト能ハザルニ至リ口唇、チアノーゼヲ呈シ、腹部ハ膨滿緊張シ、爲ニ胎兒ノ部分ヲ觸診シ難ク胎兒心音モ亦聴取シ難キニ至ル、大小陰唇亦著シク浮腫シ、大腿ヲ閉ヅル事能ハザル

ニ至ル、此場合ニ於テモ適當ナル療法ニヨリ次第ニ尿量増加シ一般症狀ノ佳良ニ趣クコトアリ又浮腫ハ更ニ其度ヲ加ヘ、管ニ皮下ノミナラズ、漿液膜腔例之ハ腹腔、胸腔ニ滲漏液ヲ出シ心悸亢進、胸内苦悶、胃部煩悶ヲ來タシ尿量減少或ハ全ク尿閉ヲ起シ一般症狀著シク侵サレ起座呼吸ヲナシ胎兒ノ死亡ヲ來タシ妊娠ノ中絶スルコトアリ、稀ニハ陣痛起リ生兒ヲ娩出スルコトアルモ、多クハ死胎ヲ分娩ス而シテ妊娠中絶セラレタルトキハ場合ニヨリ爾後尿量増加シ皮下ノ浮腫及ビ漿液膜腔ノ滲漏液次第ニ其量ヲ減ジ全身障礙モ亦輕快スルコトアリ、然レドモ產褥ニ入り更ニ尿量減少シ浮腫愈々加ハリ遂ニ心臟機能衰弱シテ死亡スル者アリ、佳良ノ經過ヲ取ル者ニアリテモ浮腫去リタル後多クハ筋肉ノ萎縮ヲ遺シ運動麻痺ヲ來タスコトアリ、運動障礙ノ恢復ハ徐徐ナルヲ常トス。

吾人ノ實驗セシ九十二名ノ妊婦脚氣中、水腫性ノ者ハ八十一名(八九%)ニシテ實ニ七百九十七名ノ妊婦中八十一名ノ水腫性脚氣患者ヲ見タルナリ、即チ凡テハ妊婦ノ一〇%ニ水腫性脚氣患者ヲ見ルノ割ヲ示シ、内輕症卅九名、重症四十二名ヲ算セリ。

イ 輕症水腫性脚氣

輕症脚氣患者中水腫性ノ者ハ初妊婦二十五名、經産婦十四名ニシテ、妊娠中既ニ筋ノ萎縮ヲ見シ者三名、産褥ニ至リ筋ノ萎縮ヲ來タセシ者二名、尿中ニ蛋白ノ少量若クハ其痕跡ヲ證明セシ者八名アリ、膝蓋腱反射ハ初メ亢進シ、次第ニ若クハ急ニ消失シ全ク消失セシ者十五名、他ハ微弱トナリシニ止マレリ、知覺鈍麻ヲ證明セシ者八名、二〇%心臟右側濁音界ノ擴張ヲ認メシ者二十五名、六四%肺動脈第二音ノ強盛セシ者ハ一〇〇%ニシテ發生ノ時期ハ一名ヲ除クノ外ハ凡テ妊娠末月ニ發セシ者ナリ、九ヶ月ニテ早産セシ者一名ニシテ妊娠持續ニ關シテハ多少遲速アルモ著變無キ者ノ如シ、破水後胎兒娩出マデニ要セシ時間ハ、初妊經妊平均一時四十三分ニシテ、胎兒分娩後胎盤ノ自然娩出マデハ平均九分十九秒ヲ要セリ。

胎兒ハ七名一八%假死ノ状態ニテ生レ、其内一名ハ死亡シ二名(五%)ノ死産アリテ即チ合計三十九名ノ分娩中ニ三名即チ七%ノ死兒ヲ得タルノ比ヲ示セリ、胎兒ノ發育ハ平均二千九百二瓦ニシテ後出血ノ著キ者九名(二十二%)アリ、産褥子宮ノ收縮不良、惡露ノ多量ナリシ者三十名(七十五%)ニシテ其甚シキ者ニアリテハ産褥第二十四日ニ至リ始メテ外診上子宮底ヲ觸レザルニ至リシ者アリ、脈搏ハ無熱ノ者ニアリテモ一般ニ速ニシテ多クハ九十乃至百ヲ算セリ、産褥中三十八度以上ニ發熱セシ者十五

名(三十九%)ニシテ内、細菌學竝ニ病理學上ヨリ産褥熱ト診斷セシ者三名(二〇%)内一名産褥第七日ニ死亡セリ、病理解剖上實扶的里性子宮内膜炎、化膿性腎臟炎、腸結核、腸間膜腺乾酪樣壞疽、肉豆蔻肝、脾臟肥大、心右室肥大ヲ證明セリ。

分娩後脚氣症狀ノ増惡セシ者十四名ニシテ(三五%)、二十二名(五五%)ハ産褥ニ入り症、狀直ニ輕快シ、三六名(九〇%)ハ、其内ニ在院三十一日ニ及ビシ者アリシモ、略々治癒退院ノ状態ニ至レリ、死亡三名(七%)、脚氣固有ノ死因ニヨル者二名(五%)、病理解剖上一名ハ心臟右室擴張肥大、心筋輕度ノ脂肪變性、肺水腫、鬱血肝、胃腸鬱血、輕度ノ脾臟水腫、蛔蟲、他一名ハ肺臟鬱血性水腫、脾、肝、腎ノ鬱血ヲ見タリ、而シテ殘一名ハ後ノ産褥熱ノ併發ニ因レリ。

産褥中授乳セシ者三十名、内僅ニ二名(六%)ニ於テ乳兒ニ消化不良所謂乳兒ノ脚氣症狀ヲ認メ母乳ヲ廢セリ。

ロ 重症水腫性脚氣

吾人ノ調査ニテハ、重症水腫性脚氣トナセシ者四十二名ニシテ、即チ凡テノ妊婦、褥婦ノ五%ニ重症水腫性脚氣ヲ見ルノ割合ヲ示セリ、初妊、經妊竝ニ年齢ニハ大ナル關係

ナキガ如ク浮腫ハ何レモ高度ニシテ發生ノ時期ハ三名ヲ除キ他ハ凡テ妊娠中ナリキ、七名即チ重症水腫性妊婦脚氣患者ノ一六%ハ產褥ニ入り筋ノ萎縮ヲ來セリ、二十三名ハ尿中蛋白ヲ證明セシモ、著明ノ者ハ僅ニ二名ニシテ残り二十名ハ僅ニ其反應ヲ呈セシニ過ギス膝蓋腱反射ハ初メハ亢進セシモ遂ニ消失セシ者三十三名(七八%)、知覺鈍麻ヲ認メシ者二十名約半數ニシテ、臨牀上心臟濁音界ノ右側ニ擴張セシヲ認メシ者三十名(七一%)アリ、凡テノ場合ニ肺動脈第二音強盛セリ、人工早産ヲ行ヒシ者四名他ハ自然經過ニ委セリ、其半數ハ豫定期日ニ先ダチ分娩開始シ、分娩ハ破水後ヨリ胎兒分娩マデ平均六十分、胎兒娩出後胎盤ノ娩出マデ約十分ヲ要セリ、分娩直後ニ於ケル胎兒ノ重量ハ平均二千九百〇二瓦ニシテ、死産七名(一六%)、假死ニテ生レシ者九名(二一%)、總死亡九名(二一%)アリ、即チ凡テ水腫性脚氣ニ罹レル妊婦ノ分娩ニ際シテ、其二一%ニ於テ胎兒若クハ初生兒ノ死亡ヲ見タリ、子宮ノ收縮ハ一般ニ不良ニシテ、大多數ノ場合ニ惡露ハ比較的多量ナリ、產褥中發熱セシ者ハ十六名(三八%)ニ達シ内高熱二名中一名ハ產褥第三十三日ニシテ死亡シ、解剖上急性加答兒性膀胱炎、右腎臟膿瘍、左腎ノ實質炎、第三腦室視神經牀表面ノ毛細管出血、一名ハ產褥第八日ニ斃レシ者ニシテ病理解剖上左腎臟實質炎、實質的里性子宮內膜炎、右腎臟膿瘍、氣管枝腺結

核、傳染脾、實質性心筋炎、慢性肋膜炎、廻盲部結核性潰瘍、出血性膀胱炎ヲ見タリ、脈搏ハ凡テ發熱ノ有無ニ關セズ其數多クシテ九十乃至百二十ヲ算シ、產褥ニ入り直ニ輕快セシ者二十三名(五五%)、死亡六名(一四%)、内死因ノ脚氣ニ關係アリシ者四名(九%)ニシテ、其内一名ハ產褥第二日ニ斃レ、病理解剖上、實質性腎臟炎、產褥子宮、肺鬱血、腹水、胸水、右腎臟インファクト、脂肪肝、脂肪心ヲ發見シ、他ノ一名ハ產褥第十二日ニ死亡シ、病理解剖上、一般貧血、胃圓形潰瘍、蛔蟲、胸水、肺水腫、加答兒性肺炎、滲出性肋膜炎、傳染脾、心臟弛緩、腎臟脂肪變性ヲ證明シ、他ノ二名ハ本館ノ患者ニシテ剖檢セザリシ、而シテ母體ニ重症ノ水腫性脚氣症狀アルニ關セズ、母乳ヲ試ミシ乳兒三十名中僅ニ二名(六%)ニ於テ消化不良ヲ起シ、爲ニ母乳ヲ廢シ、人工榮養ヲ行ヘリ。

以上概括記載セシ輕症水腫性脚氣及ビ重症水腫性脚氣ノ各症例ニ於ケル必要ノ事項ヲ左ニ一覽表トシテ示スベシ(裏面參照)。

第二表 水腫性脚氣患者一覽表

Table with 11 columns (numbered 11-8) containing patient data including names (e.g., 某山 楓, 某井 龜), symptoms (e.g., 消, 消, 消), and clinical notes. Includes a vertical text column on the right with anatomical terms like '尿', '膝', '腕', '心', '肺', '胎', '産'.

Table with 6 columns (numbered 17-12) containing patient data including names (e.g., 某原 田, 某上 井), symptoms (e.g., 跡, 痕), and clinical notes. Includes a vertical text column on the right with anatomical terms like '尿', '膝', '腕', '心', '肺', '胎', '産'.

症候論

28	27	26	25	24	23
某生彌	某業稻	某高日	某藤内	某木宮	某邊渡
25初輕	24初	25經	25	17	24初
-	-	-	-	-	-
失消	失消	"	"	"	弱微
-	-	-	-	-	-
=	+	=	+	+	+
+	+	+	+	+	+
氣脚娠妊 (症性腫水) 期末娠妊	"	"	"	"	"
明不	明不	遲日一十	遲日三十	遲日五十	早日五
35	108	50	45	105	28
死假ノ度輕	死假	"	"	"	"
位頭後二第	一第	一第	"	"	二第
男	"	"	女	"	"
3145	2790	2750	2810	2730	2850
48	49	49	45	47	46
10	10	6	8	10	12
胎量多稍 出屢盤	-	-	量多稍	-	盤胎量多稍 ス出屢ナ
續持間週二	"	量多	通普	"	"
日入十ヲシニ母乳不 ス知量ヲ底子宮後	ク	分充不	通普	"	"
輕	輕	-	-	-	-
90-100	90-100	80	80-90	80-90	90-100
+	-	-	-	-	-
快輕	"	"	"	快輕	シ無化變
治略	"	"	"	"	"
院退日十第	院退日十第	院退日七第	院退日八第	院退日九第	"
-	-	-	-	-	-
	第ハ兒生初 メニ日三 起ヲ「ナレ ス亡死シ 剖解理病 斷診的 窄狹管膽輸 張擴室右心 肥 炎肺性垂下 性動流血諸 血壽器臟諸		ノ留殘膜卵 ス血出メ爲 剝工人ニ直 ヒ行ヲ法離 檢強内腔後 フ行ヲ法塞	水破工人	略省表過經

症候論

22	21	20	19	18	17	16	15
某村河	某寺光三	某原河	某島中	某本松	某本松	某本松	某本松
30	22	21	21	18	18	18	18
"	經	"	"	初	初	初	初
-	-	-	-	-	-	-	-
進穴クシ著	"	"	"	進	進	進	進
-	-	-	-	-	-	-	-
"	徑橫指一	迄縁右骨胸	徑橫指一	"	"	"	"
+	+	+	+	+	+	+	+
"	"	"	"	"	"	"	"
-	-	-	-	-	-	-	-
"	"	明不	遲日八十	遲日三十	遲日三十	遲日三十	遲日三十
10	13	-	17	60	60	60	60
通普	死假	-	"	"	"	"	"
一第	向體二第 位足全不	-	二第	一第	一第	一第	一第
"	男	女	"	"	"	"	"
3085	3150	3000	2600	2700	2700	2700	2700
52	54	49	47	49	49	49	49
10	2	-	10	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-
"	量多	"	通普	"	"	"	"
"	分充不	"	通普	"	"	"	"
輕	-	-	-	-	-	-	-
80-60	70-80	80	85	90-100	90-100	90-100	90-100
-	微	-	-	-	-	-	-
"	僅	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
院退日八第	院退日八第	院退日七第	"	院退日八第	院退日八第	院退日八第	院退日八第
-	-	-	-	-	-	-	-
略省表過經	中過經娩分 不音心兒胎 シリナト眞 工人ヲ以ヲ ヒ行ヲ水破 轉廻内テ次 十ヒ行テ術 兒胎後分三 ス出媾	リ被ヲ膜卵 ス娩分儘シ 通普痛陣 略省表過經		養榮乳母 常異兒生初 シ無			

考

備

症候論

39	38	37	36	35	34
某田池	某井村	某樂相	某野森	某野淺	某川村
18	23	23	25	22	29
〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃
跡痕	跡痕	量少極	進失	〃	失消
弱微	進亢	失消	進失	〃	失消
一	一	一	一	一	一
〃	〃	一	〃	一	〃
+	+	+	+	+	+
〃	〃	〃	〃	〃	〃
一	一	一	一	一	一
運日八十	運日五十	運日一十	明不	明不	運日五十二
120	35	53	220	35	35
〃	〃	通普	產死	〃	〃
一第	二第	一第	二第	〃	〃
男	〃	〃	〃	〃	女
2550	3200	3200	2517	2955	3390
45	48	50	50	60	50
12	5	7	26	5	10
〃	出壓盤胎	〃	〃	〃	〃
〃	量多稍	通普	〃	量多	通普
〃	分充不	佳稍	分充不	分充不	通普
宮子日八	分充不	〃	〃	〃	〃
十	〃	〃	〃	〃	〃
輕	輕	〃	〃	〃	〃
100-110	100-110	90-95	90-100	100-120	90
一	〃	〃	〃	〃	〃
惡增時一	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃
院退日六廿第	院退日八第	院退日六第	治日一十三第	院退日七第	院退日七第
一	一	一	一	一	一
微=殊痛陣	裂破陰會	〃	〃	〃	〃
弱	日六第	〃	〃	〃	〃
二十九	炎枝管氣ニ	〃	〃	〃	〃
圍腹	發シシ	〃	〃	〃	〃
迷仙	チ直モシセ	〃	〃	〃	〃
省表過經	チ養榮乳母	〃	〃	〃	〃
〃	ヲ養初フ行	〃	〃	〃	〃
〃	兒生初フ行	〃	〃	〃	〃
〃	シ無常異	〃	〃	〃	〃

二八一

症候論

33	32	31	30	29	號	番
某尾松	某庭嬰	某本山	某川北	某井深	名齡	姓年
38	39	21	31	22	號	分
〃	經	初	經	〃	種	浮
〃	〃	〃	〃	〃	縮	筋
〃	〃	〃	〃	〃	白	尿
弱	進亢	失消	弱微	〃	射反	膝
一	〃	〃	〃	〃	礙障	膀
一	一	一	一	一	常異	知
〃	〃	〃	〃	〃	二第	心
〃	〃	〃	〃	〃	〃	肺
〃	〃	〃	〃	〃	〃	診
一	一	一	一	一	〃	診
運日七	運日八	〃	明不	運日八	〃	分
17	35	47	910	49	〃	分
〃	〃	通普	兒產早	通普	〃	破
〃	〃	〃	〃	一第	〃	分
〃	〃	〃	〃	〃	向體位	分
〃	〃	〃	〃	〃	別ノ	時
3349	2170	男	〃	女	重	男
52	45	〃	〃	50	長	體
3	10	8	5	10	胎	身
〃	〃	〃	〃	〃	問時	胎
〃	量多	〃	通普	〃	〃	後
〃	分充不	〃	通普	〃	血出	產
〃	〃	〃	通普	〃	露惡	〃
一	〃	〃	通普	〃	縮收	子
80	80-90	80-95	80-85	100-110	熱數	發
〃	〃	〃	〃	〃	痛壓	脈
〃	〃	〃	〃	〃	過經	子
院退日八第	院退日八第	院退日一十第	治略	治全	歸	一
一	一	一	一	一	氣脚	產
〃	〃	〃	〃	〃	〃	乳
〃	略省表過經	〃	ス水破期早	略省表過輕	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃	考	備

二八〇

44	43	42	41	40	號	番
某平大 19 經 +	某能守 25 經 +	某江松 27 初輕 +	某藤進 18 經 -	某田杉 24 經 -	名齡 白	姓年分浮筋 尿
(中娠妊)+	(褥產)+	(中娠妊)+	量少 後進	進	萎 蛋ノ中	膝膀知心肺 蓋直肌 反腸直肌
シ進亢初 弱微後	失消	弱微	後進亢著 弱微	徑橫指一	礙障異室脈ノ	診發妊分 時中娠推
ニ進微 弱	徑橫指一	ニ僅	ニ進微 弱	徑橫指一	期絶ト日 期絶ト日	胎後水破 間時ニ至
日一十	早日八十	遲日九十	遲日一	遲日八	二出兒胎後 胎ルケ於ニ	胎後水破 間時ニ至
42	24	639	35	144	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
通普	產死	死假	通普	死假	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
一第	二第	位頭前	一第	二第	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
男	女	男	男	女	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
2600	2517	3070	3235	3545	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
41	50	51	48	51	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
10	10	10	後直	壓盤胎後直	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
一	一	一	胎量稍 出壓盤	血出大	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
間日三十二 續持	子後日四十二 ズレ觸ヲ底宮	熱褥產 120-150	分充不精 輕	分充不	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
80-90	80	90-100	80-90	80-90	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
ク惡治 院退日一卅第	少增略 死(日七第)	惡增 死(日七第)	惡增 死(日七第)	惡增 死(日七第)	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
剖解理的 斷診的	剖解理的 斷診的	剖解理的 斷診的	剖解理的 斷診的	剖解理的 斷診的	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
性血腎臟肺 腫水	性血腎臟肺 腫水	性血腎臟肺 腫水	性血腎臟肺 腫水	性血腎臟肺 腫水	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
腎肝脾 血充性血	腎肝脾 血充性血	腎肝脾 血充性血	腎肝脾 血充性血	腎肝脾 血充性血	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至

重症水腫性脚氣患者一覽表

46	45	號	番
某場馬 30 經 +	某本阪 23 經 +	名齡 白	姓年分浮筋 尿
(褥產)+	(褥產)+	萎 蛋ノ中	膝膀知心肺 蓋直肌 反腸直肌
跡痕消	量微少 弱消後	礙障異室脈ノ	診發妊分 時中娠推
一十	一十	期絶ト日 期絶ト日	胎後水破 間時ニ至
早日六	早日九十	二出兒胎後 胎ルケ於ニ	胎後水破 間時ニ至
235	易輕婉分	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
二第	二第	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
男	男	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
2600	2640	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
41	46.5	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
10	10	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
一	一	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
間日三十二 續持	子後日四十二 ズレ觸ヲ底宮	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
80-90	80	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
ク惡治 院退日一卅第	少增略 死(日七第)	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
剖解理的 斷診的	剖解理的 斷診的	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
性血腎臟肺 腫水	性血腎臟肺 腫水	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至
腎肝脾 血充性血	腎肝脾 血充性血	胎後水破 間時ニ至	胎後水破 間時ニ至

59	58	57	56	55	54
某 藤伊	某 井岩	某 居鳥	某 田岩	某 田莖	某 25梶
27	19	21	24	35	25
初	初	經	初	經	經
度	度	度	度	度	度
消	消	消	微	微	微
徑	徑	徑	徑	徑	徑
早	早	週	明	週	週
35	56	55	50	132	40
二第	二第	二第	一第	一第	一第
3008	3175	2865	2500	4380	2940
50	51	48	47	61	51
8	9	12	15	10	10
量多	量多	通	量多	量多	量多
分充	分充	通	分充	分充	分充
100-110	90-100	90-100	90-100	80-90	80-90
快	快	快	快	快	快
院退日四十第	院退日八第	院退日七第	院退日一十第	中 院 入	院退日三十第
略省表過經	略省表過經	略省表過經	水破工人 略省表過經	行チ術出 間分十三 法吸呼工 モシヒ行 ズセ生蘇 仙三百圍 弱微痛陣	略省表過經

53	52	51	50	49	號	番
某 口谷	某 口野	某 野磯	某 取香	某 井藤	名齡	姓年
25	24	27	21	32	號	年分
初	初	經	初	初	號	分
度	度	經	初	初	號	筋
度	度	度	初	初	號	尿
失	失	弱	弱	弱	號	蓋
徑	徑	徑	徑	徑	號	膝
早	早	致	明	早	號	膀
23	7	10	不	日	號	心
45	28	10	早	五	號	肺
死假ノ度高	通	通	死	245	號	音
男	女	男	男	男	號	診
2400	3250	3380	3000	2860	號	發
48	49	58	50	53	號	妊
5	5	3	3	10	號	分
度出	量多	度出	胎量多	胎量多	號	分
分充	分充	分充	分充	分充	號	分
90	90	90	110-120	80-90	號	分
快	快	快	快	快	號	分
院退日十第	院退日二十第	治	院退日八十第	院退日五十第	號	分
法吸呼工人 五十七行チ ス生蘇後分	仙十九圍腹	水破工人	弱微痛陣	水破工人 死假ノ度高 ニ遂リ陷ニ ス亡死	考	備

症候論

81	80	79	78	77	76
某 井 横	某 無 露	某 木 青	某 岡 藤	某 藤 安	某 登 能
20	26	29	24	29	41
身 全	初	初	經	初	初
モシリア %6 初産	明	著	跡 痕	消 初	(中得産) +
スニ %1.0 後産	明	著	消後弱微初失	消 初	消 初
+	-	-	-	-	-
+	ニ	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
期 末 娠 妊	期 末 娠 妊	期 末 娠 妊	期 末 娠 妊	期 末 娠 妊	期 末 娠 妊
産 早 工 人	産 早 工 人	産 早 工 人	産 早 工 人	産 早 工 人	産 早 工 人
早 日 一 十	早 日 一 十	早 日 一 十	早 日 一 十	早 日 一 十	早 日 一 十
20	80	5	30	20	125
通 普	産 死	通 普	産 死	産 死	産 死
男	女	女	男	男	男
1740	1800	2935	2700	3700	3460
43.5	42	48	43	51	51
7	後 直	10	10	15	8
量 多	量 多	量 多	量 多	量 多	量 多
分 充 不	分 充 不	分 充 不	分 充 不	分 充 不	分 充 不
100-110	80-90	90-100	110-120	80-90	110-120
ニ 僅 増	後 惡 増 時 一 快 輕	惡 増	惡 増 時 一	惡 増	惡 増
中 院 入	院 退 日 九 卅 第	院 退 日 九 卅 第	院 退 日 二 廿 第	院 退 日 五 卅 第	院 退 日 五 十 第
合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊
術 産 早 工 人	術 産 早 工 人	術 産 早 工 人	術 産 早 工 人	術 産 早 工 人	術 産 早 工 人
術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ
胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分
分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒
キリナ	キリナ	キリナ	キリナ	キリナ	キリナ

二八九

症候論

75	74	73	72	71	70
某 木 山	某 口 濱	某 本 宮	某 中 田	某 村 山	某 村 山
41	22	35	27	31	31
山	濱	宮	田	山	山
脚 腫 水	脚 腫 水	脚 腫 水	脚 腫 水	脚 腫 水	脚 腫 水
脚 腫 水	脚 腫 水	脚 腫 水	脚 腫 水	脚 腫 水	脚 腫 水
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
期 末 娠 妊	期 末 娠 妊	期 末 娠 妊	期 末 娠 妊	期 末 娠 妊	期 末 娠 妊
産 早 工 人	産 早 工 人	産 早 工 人	産 早 工 人	産 早 工 人	産 早 工 人
早 日 一 十	早 日 一 十	早 日 一 十	早 日 一 十	早 日 一 十	早 日 一 十
20	80	5	30	20	125
通 普	産 死	通 普	産 死	通 普	産 死
男	女	男	女	男	男
1740	1800	2935	2700	3700	3460
43.5	42	48	43	51	51
7	後 直	10	10	15	8
量 多	量 多	量 多	量 多	量 多	量 多
分 充 不	分 充 不	分 充 不	分 充 不	分 充 不	分 充 不
100-110	80-90	90-100	110-120	80-90	110-120
ニ 僅 増	後 惡 増 時 一 快 輕	惡 増	惡 増 時 一	惡 増	惡 増
中 院 入	院 退 日 九 卅 第	院 退 日 九 卅 第	院 退 日 二 廿 第	院 退 日 五 卅 第	院 退 日 五 十 第
合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊	合 ナ 腎 娠 妊
術 産 早 工 人	術 産 早 工 人	術 産 早 工 人	術 産 早 工 人	術 産 早 工 人	術 産 早 工 人
術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ	術 施 七 行 ナ
胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分	胎 十 二 時 八 分
分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒	分 易 輕 過 經 燒
キリナ	キリナ	キリナ	キリナ	キリナ	キリナ

二八八

ヲ常トス。

今回吾人ノ調査セシ妊婦七百九十七名中、急性悪性脚氣ニ遭遇セシコト四回ニシテ凡テノ妊婦ノ〇・五%ガ衝心脚氣ニ罹リシ割合ヲ示シ、脚氣ニ罹レル九十二名ノ妊婦中四名即四%ニ於テ急性悪性症狀ヲ現ハセリ、其内一名ノ二十二歳ノ初妊婦ヲ除クノ外ハ盡ク年齢三十年以後ノ經妊婦ニシテ、何レモ妊娠末期若シクハ妊娠八ヶ月ノ頃ニ於テ其症狀ヲ起セリ、浮腫ハ全クナキ者輕度ノ者高度ノ者二名尿中ニ蛋白ヲ證明セシ者一名其量甚ダ僅微ニシテ他ハ盡ク蛋白ノ反應陰性ニ終レリ、胸内苦悶、嘔氣、嘔吐ハ本症ノ主症候ニシテ患者不安トナリ顛轉反側セリ、他覺的ニ心臟濁音界ノ擴張ハ多クハ不明ニシテ、臨牀上確カニ心臟右側ノ濁音界ノ擴張ヲ認メタル者一名アリ、凡テノ場合ニ肺動脈第二音著ク強盛シ股動脈音ヲ聽取シ且膝蓋腱反射ハ全ク消失セリ、一名ハ分娩期ニ衝心症狀ヲ起シ他ノ三名ハ何レモ妊娠末期若シクハ八ヶ月頃ニ衝心症狀現ハレシヲ以テ人工早産ヲ施セリ、胎兒ハ自然分娩若シクハ人工早産術ヲ施セシ凡テノ場合ニ、分娩開始期ニ當リテハ心音ハ明カニシテ且規則正シク其數ニモ著變ナカリシニ、分娩經過中急ニ胎兒ノ心音不明トナリ遂ニ全ク消失シ加フルニ凡テノ場合ニ陣痛微弱ニシテ分娩遅延セリ、一名ハ不全足位ナリシヲ以テ娩出

術ヲ行ヒ、他ハ母體ノ症狀益危險ナルニヨリ死胎ヲ穿顛シテ娩出セシメタリ、三名ハ分娩後一時其症狀輕快セシガ如キモ、一名ハ爾後發熱四十度ニ及ビ産褥第四日ニ斃レタリ、母體ハ病理解剖ノ所見トシテハ、實質性腎臟炎、傳染脾、肝臟ノ脂肪變性、心臟右室輕度ノ肥大、實扶的里性子宮炎症ヲ證明シ、他ノ二名中一名ハ産褥第九日、一名ハ産褥第六日ニ至リ心臟ノ機能衰弱シテ遂ニ鬼籍ニ入レリ、病理解剖上ノ所見トシテハ一名ハ心臟ノ擴張、實質性腎臟炎ヲ證明シ、他ハ自費ノ患者ニシテ剖檢スルヲ得ザリキ、残り一名ハ胎兒娩出後母體ハ三時四十分ニテ死亡セリ同ク自費ノ患者ニシテ剖檢セズ、之ヲ要スルニ心臟性脚氣ニアリテハ瀉血等凡テノ處置ニ對シ何等其反應無ク、比較的初期ニ行ヒシ早産術モ亦何等ノ效ヲ奏スルコトナク、吾人ノ場合ニ於テハ四名盡ク母兒共ニ之ヲ救フ事ヲ得ザリキ。(第三表參照)

第三表 衝心性脚氣

番	姓名	年分	浮腫	尿	膝	勝	知	心	肺	診	發	妊	分	破	分	男	胎	後	產	轉	乳	備															
號	名	齡	娠	腫	縮	白	射	礙	常	張	強	斷	期	絕	分	二	胎	向	別	重	長	盤	間	血	露	縮	熱	數	痛	過	歸	氣	考	備			
	中	蓋	胎	直	覺	右	臟	動	胎	生	娠	推	日	後	水	至	胎	分	男	胎	後	產	轉	乳	備												

第四表 胎兒心臟比較測定表

番號	死因	心臟ノ重量	心室ノ長さ		心臓基底ノ周圍		心室壁ノ厚さ		母體胎氣
			左室	右室	左室	右室	左室	右室	
1.	產後微血	14.50	3.5	3.8	3.0	3.5	0.4	0.25	1
2.	出胎時手術	16.00	4.0	4.6	3.5	3.8	0.5	0.35	1
3.	前置胎盤	18.00	4.5	4.0	4.3	5.5	0.5	0.36	1
4.	穿頸	14.30	4.0	3.8	4.0	4.2	0.5	0.40	1
5.	死産	12.75	3.8	3.7	3.4	3.0	0.5	0.35	1
6.	死産	17.70	3.7	3.5	4.8	4.8	0.5	0.35	1
7.	死産	13.30	3.0	3.4	3.6	4.0	0.3	0.30	1

以上掲ぐる所ノ九十二例ニ就テ更ラニ其概要ヲ記述スレバ

- (一)脚氣患者數 自明治三十六年九月一日至大正元年九月四日當ノ間院分娩セシ總數七百九十七名中臨牀上脚氣ト認ム可キ症候顯著ナルモノ九十二名(一一・五%)中乾性症七名(七・五%)水腫性症八十一名(八九%)ニシテ全妊婦ノ一〇・%ニ當ル、重症四十二名輕症三十九名(急性惡性症四名(四%)ニシテ全妊婦ノ〇・五%ニ當ル)ヲ表ス
- (二)發生ノ時期 妊娠中ニ發生セシモノ八十三名ニシテ其ノ大多數ノ七八ヶ月以後

ニ於テ初診セシモノニシテ此前後ヨリ發生セシモノト認ム可キ者多シ妊娠前半期ニ發生セシモノハ診査ス可キ機會少ナカリシヲ以テ實際ハ妊娠何ヶ月頃ニ最も多ク發生スルヤハ明言シ得ズト雖自覺的障礙ヲ訴フルモノハ七ヶ月頃ヨリ多カリシガ如ク、産褥ニ於テ發生セシモノハ九名ニシテ分娩二三日後ヨリ急ニ症狀著明トナル初患者ハ多ク妊娠七八ヶ月頃ヨリ起リ諸症狀顯著トナル、嘗テ脚氣ニ罹リタル者ハ普通一般脚氣ト異ナリ毎妊娠産褥ニ本症ニ罹リ易キ傾向アリ、此際ハ比較的初期ヨリ發生シ屢々重症ニ陥ルコトアリ、然レドモ現ニ罹患シ居ル者ノ妊娠スル事ハ稀レナルガ如ク又無月經 Amenorrhoe ヲ呈スル者多シ。

(三) 年齢

	20歳迄	自二十一歳 二十五歳迄	自二十六歳 三十歳迄	自三十一歳 三十五歳迄	自三十六歳 四十歳迄	自四十一歳 四十五歳迄	計
初妊	11	24	7	1	0	0	43
經妊	0	12	10	15	8	4	49
計	11	36	17	16	8	4	92

年齢ニ關シテハ、二十一歳ヨリ、二十五歳迄ニ最も多シ。

(四)脚氣ハ妊娠ニ對シ次ノ如キ影響ヲ及ボスモノナリ。

第一、妊娠持續ニ對シ如何ナル影響ヲ及ボスモノナルカヲ檢センガ爲メ分娩豫定日ト分娩日トノ差ヲ檢セシニ次ノ如キ結果ヲ得タリ。

分類	員數	平均日數	備	考
1 遲	19名	11日	内初妊 20名 經妊 19名	
2 早	28名	11日	内初妊 14名 經妊 11名	
3 一致	2名		内初妊 1名 經妊 1名	
4 不明	23名		月經不順ニシテ最終月經ノ確實ナラザルモノ及ビ早産術ヲ行ヒシモノヲ含ム	

一般ニ妊娠持續ハ自然經過ニ放任セシ場合ニハ著シキ影響ヲ受ケザルモノノ如シ。

第二、胎兒發育ノ状態ヲ檢スル爲メ人工中絶法ヲ行ヒシモノ及ビ性不明ナルモノ一名身長體重ノ不明ナルモノ六名總計十四名ヲ除キ他ノ七十八名ノ成熟胎兒ニ

就キ其ノ平均體重及身長ヲ檢セシニ次ノ成績ヲ得タリ。

性別	員數	平均體重	平均身長
男	4名	2839瓦	49.1cm
女	38名	2952瓦	49.5cm

右ニ示ス如ク女兒ノ發育反ツテ男兒ニ優レルヲ認メタルハ偶然ノ事ナルベシ第三、妊娠經過

妊娠夫レ自身ニ對シテハ全ク自然ノ經過ヲ取リシモノ八十三名ニシテ自然ニ早産ヲ來タセシモノ二名、疾病増悪ノ爲メ早産術ヲ施コセシモノ七名アリキ。

(五)分娩時母體ニ及ボス影響ニ就テハ

第一、陣痛 陣痛ノ強弱ヲ示ス爲メ假リニ分娩持續時間ヲ擧ゲン、最も確實ニ分娩開始ノ時期ヲ知り得ザリシモノモ少ナカラザルヲ以テ破水後娩出ニ至ル時間ニヨリ其強弱ヲ想像セシメントセリ、故ニ産科手術ヲ施コシタル者十一名及ビ早期破水シタル者一名記載不明瞭ナル者八名、人工破水ヲ爲シタル者六名、早産一名計二十七名ヲ除キ全ク自然經過ニ委セシモノニ就テ記載セリ。

	破水後娩出ニ至ル平均時間	胎兒娩出後胎盤娩出ニ至ル平均時間
1 浮腫高度ナル者 初妊 77分(14名)	54分(17名)	11分(35名)
2 浮腫軽度ナル者 60分(20名)	81分(11名)	9分(33名)
3 浮腫無キ者 0 (0)	22分(3名)	13分(3名)

備考、胎盤剝離ノ時間ハ胎盤壓出法ヲ行ヒシモノヲ省略シ他ノ全部ニ就テ検査セリ。

上記六十五名ニ就テ破水後娩出ニ至ル平均時間ヲ初妊經妊ニ區別シ検査セシニ前者ハ六十七分、後者ハ六十六分ヲ要セリ

第二、後出血。

1. 後出血著シカラザル者 七十三名
 2. 出血高度ニシテ胎盤壓出法ヲ要セシ者 十九名
内浮腫高度ノ者十一名、浮腫軽度ノ者八名
- 第三、一般分娩ノ輕易

1. 分娩經過輕易ニシテ母體ニ障礙ヲ及ボサザリシ者五十七名
2. 陣痛微弱ノ爲メ分娩遅延シ種々ナル續發的障礙ヲ惹起シ遂ニ産科的手術ヲ要スルニ至リシ者三十三名
3. 分娩難易不明ナル者二名

(六) 胎兒ノ運命。

1. 分娩直後呼吸ヲ營ミシ者五十八名
2. 假死ニテ分娩セシ者十七名(一八・五%)ニシテ内人工呼吸法ヲ行ヒ蘇生セル者十名(一〇・八%)ニシテ一名ハ三日後「メレナ」ヲ起シ死亡セリ、假死高度ニシテ人工呼吸法ヲ行フモ蘇生セザル者七名(七・六%)アリ。
3. 死産總數十二名ニシテ内二名ハ微毒腎臟炎等無クシテ既ニ妊娠中ニ死亡シ早産ヲ來タセシモノニシテ他ノ十名ハ分娩開口期ニハ明ラカニ心音ヲ聴取セシモ娩出期ニ於テ死亡シタルモノナリ。
4. 生兒ヲ早産セシハ二名ニシテ八ヶ月ノモノハ翌日死亡シ九ヶ月ノ者ハ生存セリ。
5. 二名ハ死胎ニテ分娩遅延セシヲ以テ穿顱術ヲ施コシタリ。

(七) 産褥ノ経過

- 6. 不明ノ者一名アリ。
- 7. 胎兒脚氣ト認ム可キ者四名アリ。
即九十二回ノ分娩中五十八回ハ胎兒ニ障礙ヲ及ボス事無カリシモ二十三回(二十五%)ハ直接間接ノ原因ノ爲メニ胎兒ハ其ノ生命ヲ損ジタル者ナリ。
- 1. 子宮收縮状態及壓痛
 - 普通ノ者 二十二名
 - 不充分ナル者 六十九名
 - 壓痛アル者 二十名
 - 壓痛無キ者 七十一名
 一名ハ産後直チニ死亡セシヲ以テ省略ス
- 2. 惡露
 - 少量ナル者 一名
 - 普通ナル者 二十五名
 - 多量ナル者 六十五名

3. 發熱

- 惡露多量ナルノミナラズ早クヨリ汚穢色ヲ呈シ且ツ臭氣ヲ放ツ。
- 無熱ニ經過セシ者 五十四名
 - 輕熱アリシ者 三十一名
 - 産褥中時々三十七度五分乃至三十八度ノ發熱アリ他ニ認ム可キ合併症無キ者ナリ
 - 高熱アリシ者 三名
 - 産褥三日頃ニ三十八度乃至三十九度ノ發熱アリシモ二三日ニシテ解熱セル者ナリ、
 - 産褥熱ヲ發セル者 三名
 - 惡露培養ニヨリ細菌ヲ證明セシ者ニシテ臨牀上産褥熱ノ症状顯著ニシテ高熱長ク持續セル者ナリ
 - 乳兒脚氣ヲ發セル者 七名

(八) 轉歸

- 1. 分娩後脚氣症状ノ輕快シタル者 五十一名

- 2. 分娩後一時増悪セシモ後輕快セシ者 二十六名
 - 3. 産褥ニ於テ死亡セル者 十三名(一四・一%)
 - 4. 産前産後諸症狀著變無キ者 二名
 - 5. 死産セル者十二名中九名ハ産褥ニ於テ増悪シ三名ハ輕快セリ
假死ヲ以テ分娩セル者十七名中九名ハ産褥ニ於テ増悪シ八名ハ輕快セリ而シテ増悪セル九名中四名ハ蘇生法效ヲ奏セズ遂ニ死亡セリ胎兒母體內ニ於テ死亡シ分娩遲延ノ爲穿顱術ヲ行ヒシモノ二名ハ共ニ産褥ニ於テ増悪セリ。
- (九)母體死亡率 本邦ノ一般脚氣ニ於テハシヨイベハ三%、ベルツハ多クトモ二・五%ヲ超過セズト云ヒ森博士ハ軍隊ニ於テ二・三%ヲ示セリ、贊氏ハ妊娠産褥脚氣ニ於テ其ノ死亡率ハ著シク増加シ一・七%ヲ示セリ、余等ノ實驗ニヨレバ實ニ一四・一%ノ多數ヲ示セリ。
- 更ニ各々ノ脚氣症狀ニ就テ検査スルニ
- 第一、心臟ノ變化**
- 1. 打診上右室ノ擴張ヲ認メシ者 五十八名
 - 2. 打診上右室ノ擴張ヲ認メザル者 三十二名

其他心臟打診上境界不明ノ者 二名

3. 肺動脈第二音ノ旺盛セル者 九十二名

第二脈數

無熱ナルニ脈搏頻數ニシテ平均九十八ヲ算ス

第三浮腫

- 1. 浮腫ヲ認メザル者 八名
- 2. 下肢ニノミ輕度ノ浮腫ヲ認ムル者 四十名
- 3. 下肢及ビ下腹部ニ高度ノ浮腫ヲ呈セル者 三十六名
- 4. 全身著明ノ浮腫 八名

第四膝蓋腱反射

- 1. 亢進セル者 十六名
- 2. 微弱ナル者 二十二名
- 3. 消失セル者 五十四名

第五知覺異常

- 1. シビレノ感アル者 三十四名

第六運動障礙

1. 下肢運動麻痺ヲ起シ歩行不自由トナリシ者十五名アリ多クハ產褥ニ起リシ者ナリ

第七筋萎縮

1. 妊娠中ヨリ筋肉ノ萎縮削瘦ヲ來タセル者 三名

2. 產褥中ニ於テ萎縮セル者 十二名

第八膀胱直腸障礙

1. 妊娠中 無シ

2. 產褥中 三名

第九尿中蛋白

1. 痕跡 十二名

2. 少量 十四名

3. 著明 二名

元來妊婦ハ屢々脚氣ニ類似シタル徵候ヲ呈スルモノニシテ其輕症ナル場合ニハ診

斷頗ル困難ナルノミナラズ妊婦產婦ニ於テハ甚ダ多ク腎臟其他貴要臟器ノ疾患ヲ伴フモノナルヲ以テ諸症狀一層複雜シ診斷不明トナル場合アリ又之レガ爲ニ其ノ豫後ヲシテ一層不良ニ陥ラシムル場合少ナシトセズ之レニ反シ生前ニ於テハ主トシテ脚氣ノミヲ認メ是等貴要ナル合併症ヲ發見シ得ル事能ハズシテ病理解剖上甫メテ意外ノ變化アルニ驚ク場合亦少ナントセズ實ニ重症脚氣ノ際ニ於テハ多クノ合併症ハ脚氣症狀ノ爲メニ被ハレテ其症狀ヲ認メ得ザル事多シ其他長與博士ノ言ノ如ク妊娠產褥脚氣ハ非妊娠時ニ於ケルガ如ク屢々病理解剖的脚氣固有ノ病變ヲ見ザルコトアリ今左ニ臨牀的及ビ病理解剖的診斷ヲ對照シ診斷上參考ノ資料ニ供セン

產褥脚氣臨牀的診斷ト病理解剖的診斷トノ比較

第一 阪本

臨牀的診斷

產褥脚氣

化膿性腎臟炎

腸間膜腺乾酪壞疽

病理解剖的診斷

實扶的里性子宮內膜炎

腸結核

肉荳蔻肝

症候論

脾肥大

第二 堀川

臨牀的診斷

產褥衝心性脚氣

心室右室肥大

病理解剖的診斷

心臟弛緩

腎臟脂肪變性

加答兒性肺炎

滲出性肋膜炎

傳染脾

肺水腫

腹水

胸水

胃圓形潰瘍

產褥子宮

一般貧血

第三 山下

臨牀的診斷

產褥脚氣

粟粒結核？

病理解剖的診斷

急性加答兒性膀胱炎

右腎ノ膿瘍

左腎實質炎

第三腦室視神經鞘表部ノ毛細管溢血

第四 木村

臨牀的診斷

產褥脚氣

妊娠腎

病理解剖的診斷

實質性腎臟炎

肺水腫

產褥子宮

胸水

腹水

右腎ノ「インフアルクト」

脂肪肝

脂肪心臟

症候論

第五 中村

臨牀的診斷

產褥脚氣

病理解剖的診斷

心臟擴張

實質性腎臟炎

第六 宮本

臨牀的診斷

產褥脚氣

病理解剖的診斷

義膜性子宮體炎

腎梗塞

第七 大平

臨牀的診斷

產褥脚氣

病理解剖的診斷

肺水腫

脾肝腎臟ノ鬱血性充血

第八 川島

臨牀的診斷

產褥熱

病理解剖的診斷

左腎臟ノ實質炎

產褥脚氣

腎臟實質炎

子宮ノ實扶的里性炎症

右腎ノ膿瘍形成

肺水腫

氣管枝腺結核

傳染脾

實質性心筋炎

慢性肋膜炎

廻盲腸部ノ結核性潰瘍

出血性膀胱炎

第九 龜野

臨牀的診斷

產褥熱

產褥脚氣

尿毒症

病理解剖的診斷

實質性腎臟炎

傳染脾

肝臟脂肪變性

心臟右室輕度ノ肥大

第十 淺野

臨牀的診斷

產褥脚氣

實扶的里性子宮ノ炎症

病理解剖的診斷

心臟右室擴張肥大

肺水腫

心筋輕度ノ脂肪變性

鬱血肝

胃腸ノ鬱血

脾臟輕度ノ水腫

蛔蟲

第六 療法

豫防法トシテハ妊婦及ビ褥婦ニ其攝生法ヲ嚴守セシムルノ外ナク、土地低クシテ濕潤セル場所及ビ床底ク光線ノ射入惡シク換氣不充分ナル家屋ハ避ケザル可カラズ、其他夏期又ハ夏期前ニ不健康地ニ移住スル事多人數狹隘ナル室ニ同居スル事身體

的及ビ精神的過勞飲酒海水浴濕地ニテ睡眠スルコト、坐業「ミシン」其他非衛生的職業等ハ之ヲ避クルヲ要ス、又胃腸ノ障礙アルモノハ早ク治療ヲ施シ尙ホ便秘アルモノハ緩下劑ヲ與ヘ便通ヲ整理シ置クヲ必要トス、食物ニ就テハ矢部岩崎二氏ノ海軍ニ於ケル兵食改良ニヨリ脚氣ヲ豫防シ得タル成績ニ徴シ米飯ヲ主食トスル人ハ特ニ副食物ノ量ヲ多クシ、又多ク副食物ヲ攝取シ得ザル場合ニハ米麥混食、半搗米食、蒸米食等ヲ取ラシムルトキハ多少脚氣豫防ノ目的ヲ達シ得ルナランカ、又嘗テ脚氣ニ罹リシ者ニアリテハ妊娠產褥中高燥清涼ナル地ニ轉地セシムルモ亦豫防法ノ一ナルベキカ、而シテ轉地ハ海濱ヨリモ五百乃至千迷ノ高サヲ有スル山地ヲ稱用セリ、佳良ナル飲料水及ビ氣温ノ下降ハ良好ナル影響ヲ及ボスモノナリ。
又妊婦及ビ褥婦脚氣ノ初期ニアリテハ轉地ニヨリテ治愈ニ越クコトアルモ妊婦ニテ高度ノ浮腫アルモノ及ビ將ニ心臟機能障礙ノ起ラントスルモノニアリテハ轉地其モノハ佳ナランモ身體動搖ノ爲メニ其症狀ノ急ニ増惡スルノ虞レアルヲ以テ不適當トス。

未ダ脚氣ニ對スル特效藥ナキ今日ニアリテハ攝生法ヲ嚴守セシムルヲ以テ第一要義トス、殊ニ水腫性ノモノニアリテハ身體安靜ハ最必要ナル條件ニシテ食物ハ最消

化シ易キ滋養品ヲ取ラシメザル可カラズ殊ニ牛乳ハ必要缺ク可カラザル榮養品ノ一ナリトス、又鶏卵麵麩等ヲ與フルコトアリ輕症者ニハ古來麥飯、小豆、甘藷、粟、稗、黑豆、白豆、綠豆、冬瓜、白瓜、昆布、鯉、蜆、大根、葱、栗、番茶等ヲ害ナキモノトシテ與ヘラル。入浴ハ入浴時又ハ浴後知覺鈍麻ノ増進スルコトアリ或ハ入浴時胸内苦悶緊縛ノ感ヲ起コスコトアリ故ニ症狀稍著明ナルモノニハ避クルヲ可トス。

藥劑的療法トシテハ水楊酸那篤倫及ビロカルビンハ一時稱用セラレシ事アリシモ妊婦梅毒ニハ概シテ不可ナリト云ハザル可カラズ。

最賞用ス可キ藥劑ハ下劑殊ニ鹽類下劑ニシテ凡テ脚氣ノ初期ニ有效ナリ、即疾患ノ初期便秘アル時殊ニ血管心臟ノ症狀著シキ時及ビ浮腫アル時ハ適應症タリ、浮腫去リ血管症狀消失後ニ於テ尙ホ下劑ヲ用ヒ下痢ヲ起コサシムル時ハ却テ榮養障礙ヲ起コシ不利ノ結果ヲ來スコトアリ、普通最モ多ク用ヒラルモノハ硫酸マグネシウムニシテ時ニ其大量ヲ投ズルコトアリ、其少量ニヨリ頻回下痢ヲ發スル場合ニハ其豫後一般ニ佳良ナルモノニ反シ便秘頑固ニシテ其大量ヲ投ズルモ下痢少ナキ場合ハ豫後多クハ佳良ナラズ、妊婦梅毒ニハ屢頑固ノ便秘ヲ來シ其大量ニ應ゼザルコトアリ、浮腫性症ニハ時ニ峻下劑巴豆油一滴、乳糖一〇瓦ヲ散藥トシ二―三回ニ分服セ

シムヲ用ヒテ佳效ヲ奏スルコトアルモ妊婦ニハ時トシテ流産ヲ起コスコトアリ注意スベシ、然レドモ妊婦ノ便秘頑固ニシテ緩下劑ノ效ナキ際余等ハ屢峻下劑ヲ投ゼシコトアリシモ未ダ妊娠中絶ヲ起コセシヲ見ズ。

「チキタリス」「チガーレン」「ストロファンツス」等ハ心臟機能障礙アル者ニハ無効ノ場合多キモ浮腫性症ニハ其效ヲ見ルコトアリ、硫酸スバルテイン「安息香酸曹達」「コヘイン」等ハ心臟ニ對シテ比較的有力ナル作用ヲ呈スルモノニシテ殊ニ浮腫性症ニ用ヒテ效アルコト多シ、浮腫著シキモノニ對シテハ此他利尿藥ヲ投シ或ハ絶鹽療法及ビ之レニ飲料水制限トヲ併用シテ良效ヲ收ムルコトアリ、時ニハ下劑利尿劑等ノ全ク奏效セザル時單ニ麵麩、鶏卵、牛乳ノミヲ與ヘ著シク利尿ノ效表ハレ浮腫減退スルコトアリ、衝心性症ニ對シテハ未ダ有效ナル處置ナク胸部ニ水蛭百乃至二百五十條ヲ貼シ或ハ瀉血ヲ行ヒ傍ラ食鹽水ノ皮下注入ヲナシ又脈搏微小ナル時ニハ時トシテ千倍鹽化「アドレナリン」ノ注射ヲ試ムルコトアリ、脈尙ホ大ニシテ胸内苦悶、呼吸困難甚ダシク「チアノーゼ」ヲ呈スル時ハ酸素瓦斯ノ吸入ヲ試ムルコトアリ、又橫膈膜神經ニ電氣ヲ通ズル事等ノ處置ニヨリ一時輕快ヲ得ルコトアルモ多クハ無効ニシテ吾人ノ行ヒシ早産術モ亦多クハ徒勞ニ屬セリ。

妊婦若シ浮腫性脚氣ニ罹リタル時ハ攝生ヲ嚴守セシメ便通ヲ調節ス可ク其他ノ處置ハ多クハ單ニ補助タルニ過ギズ而シテ其後ノ經過ニ注意シ症狀ノ増悪スルニ於テハ人爲的ニ妊娠ヲ中絶セシムルノ止ムヲ得ザルコトアリ。

妊婦若シ中等度ノ浮腫脚氣ニ罹ラバ絶對的安靜ヲ守ラシメ多量ノ牛乳ヲ與ヘ下劑ヲ投ズ可シ利尿劑ハ初メハ無效ナルコト多キモ後期ニハ有效ナリトス而シテ是レ亦其症狀ノ増悪スルヲ認メバ速ニ妊娠ヲ中絶セシメサルベカラズ。

重症ノ浮腫症脚氣合併セバ絶對的ニ安靜ヲ命ジ亦絶對的牛乳療法ヲ行フ可シ下劑及ビ利尿劑ハ奏效セズデキタリス「ストロファンツス」モ亦效ヲ見ザルコト多シ腸ノ洗滌ハ稍其效ヲ見ルコトアリ。

心臟機能障礙ノ起ラントスル際ニハ其脈尙正調ニシテ適度ノ緊張ヲ有スル間ニ子宮ノ内容ヲ除去ス可シ然ル時ハ往々佳良ノ結果ヲ得ルコトアリ若シ子宮ノ内容ヲ除クニ堪ユ可キ心機能ナシト認ムル時ハ豫メ瀉血ヲ行ヒタル後食鹽水ノ注入ヲ行ヒ横膈膜神經ニ電氣ヲ通ジ心臟部ニ氷嚢ヲ貼シ或ハ芥子脚湯ヲ行ヒ是等ノ處置ニヨリテ患者一時輕快セバ此間ニ於テ子宮ノ内容ヲ除去ス可シ。

胸内苦悶呼吸困難ヲ訴フル場合ニハ胸部ニ多數ノ水蛭ヲ貼用シ硫酸スバルテイン、

安息香酸曹達「コフェイン」ノ皮下注射ヲ行ヒ且ツ腸洗滌ヲ施ス可シ急性症ニアリテハ人爲的ニ妊娠ヲ中絶セシムルモ亦奏效少ナキが如シ。

浮腫去リシ後筋ノ萎縮起ラバ沃刺ノ内服硝酸「ストリヒニン」ノ皮下注射ヲ行ヒ瘦削セル筋肉ニ電氣ヲ通ジ或ハ入浴後按摩ヲ行フ按摩ハ比較的早期ニ行フテ效アルコトアリ唯筋ノ握痛アル部位ハ輕ク按摩セシメ同時ニ足ノ拘攣ヲ起サザル様足背屈曲ヲ充分ニナサシム可シ腓腸筋痛ニハ濕布罨法「クロロフォルム」オレフ油ノ塗布五乃至十分間ノ局所温浴法ヲ試ベク殊ニ「ストリヒニン」ヲ少量ヅツ増量シテ注射スル時ハ脊髓前角ニ於ケル反射的刺戟性ヲ昂ムルヲ以テ運動衝動ノ途ヲ作ルコトヲ容易ナラシムル利アリ量ハ〇〇〇五ヲ一日一回若シクハ各日一回注射シ漸時増量シテ〇〇〇四ニ至ラシムベシ然レドモ時ニ蓄積作用ヲ呈スルコトアルヲ以テ一定ノ注意ヲ要スル者トス余等ハ僥倖ニモ該療法ニ就キ何等不快ノ影響ヲ實驗セズ。

第七 結論

余等ノ經驗セシ所ニヨレバ、

第一 妊娠及產褥ニ合併セル脚氣ハ總テハ妊婦ノ十一・五%ニ當リ水腫症最多ク、繼

令程度ニ輕重アルモ其八十九%ハ水腫症ニシテ其一部ハ水腫ノ去リシ後ニ筋ノ萎縮ヲ遺セリ。

第二 妊娠ニ合併セル輕症ノ者 rudimentary Form ハ吾人ノ注意ヲ惹クニ至ラザルコトアリ。

第三 妊娠中ニ起リシ輕症或ハ萎縮性ノモノ atrophische Form ハ妊娠中ニハ甚シキ障礙ヲ起サザルモ分娩期ニ於テ或ハ陣痛ノ微弱ヲ來タシ分娩ノ經過ヲ長カラシメ胎兒娩出後子宮收縮不良ニシテ胎盤剝離妨ゲラレ後出血ヲ來スコトアリ。

第四 水腫性症ノ合併シタル時ニハ時ニ妊娠中絶セラレルコトアリ又時トシテ人為的ニ妊娠ヲシテ中絶セシメザル可カラザルコトアリ胎兒ハ妊娠中或ハ分娩ニ際シ死亡スルコト多シ然レモ分娩自己ノ經過ニハ著シキ關係ナキモノノ如シ且妊娠中ニ起リタル水腫性脚氣ハ產褥ニ入り約其五五%ハ治癒若シクハ其症狀著シク輕快セリ。

第五 產褥ニ入り急ニ其症狀ノ輕快セザル者ニアリテハ概シテ其豫後不良ナリトス。

第六 急性惡性症ハ何レノ時期ニモ起來スルモノニシテ其豫後極メテ不良ナルモ

ノナリ。

第七 母體ニ脚氣ヲ證明セシ者ニアリテハ分娩期ノ比較的短時ナルニ拘ラズ死産若シクハ高度ノ假死状態ヲ以テ生ルル胎兒約三十一%ニ達セリ。

第八 以上ノ關係ヲ精察スルニ縱令現在ハ其症候輕症ナルモ未ダ脚氣ノ進行期ニアルモノニアリテハ胎兒ニ及ボス影響大ナルガ如ク彼ノ輕症脚氣患者ニシテ分娩ニ際シ高度ノ假死胎若クハ死胎ヲ分娩セシ者ハ爾後產褥ニ入り其症候増惡シ豫後不良トナリシ者多シトス。

第九 前掲ノ表示セシガ如ク母體ニ脚氣症狀アルニ拘ラズ吾人ハ事情ノ許ス限リ母乳榮養ヲ試ミシニ乳兒ニ消化不良ノ症狀ヲ起セシ者比較的少ナカリシハ吾人ノ注意ヲ要ス可キ事項ナリトス乳兒脚氣症狀ト母體脚氣症狀ト一致セザルコトハ世人ノ既ニ認メシ所ニシテ例之バ母體ハ輕症脚氣ナルニ乳兒ニ驚クベキ消化不良ヲ來スコトアリ之ニ反シテ母體ノ脚氣高度ナルニ乳兒ニ何等ノ影響ナキコトアリ吾人ノ調査セシ場合ヲ見ルニ同ジク母體ノ脚氣ハ現時輕症ナルモ未ダ其症候ノ進行期ニアル者ニアリテハ總テ乳兒ニ障礙ヲ來スガ如ク現在母體脚氣ハ比較的重症ナルガ如キモ爾後漸次輕快スベキ者所謂退行期ニアル者ニアリテハ乳兒ニ影響セザ

症候論
 ル、モノ多キガ如シ。
 第十 心臟性ノモノヲ除キテハ、適當ノ時期ニ際シ、處置其宜シキヲ得バ、妊娠、產褥ニ合併セシ脚氣モ亦其豫後ヲシテ或ル程度迄ハ之レヲ佳良ナラシメ得ルモノニ近キガ如シ。

妊娠及產褥期之脚氣論終

大正二年七月十五日印刷
 大正二年七月二十日發行

正價壹圓五十錢

著者 緒方十右衛門

著者 藤村元

東京市本郷區龍岡町三十四番地

發行者 鈴木幹太

麴町區有樂町二丁目一番地

印刷者 中村政雄

右


印刷所 報文社

東京市本郷區龍岡町三十四番地

發兌元

南山堂書店

(振替貯金口座東京六三三八番)
 電話下谷四一七八番



肆 書 捌 賣

本郷區湯島切通坂町	南江堂書店	大阪市南區心齋橋筋	松村九兵衛
同 春木町三丁目	同 支店	同 東區博勢町	丸善書店
日本橋區通り三丁目	丸善書店	同 中之島玉江町	角屋書店
本郷區春木町二丁目	半田屋書店	京都市鉄屋町	丸善書店
同 龍岡町	吐鳳堂書店	同 寺町通り	南江堂出張所
同 湯島切通坂町	金原書店	同 寺町通二條南	若林茂一郎
神田區鍛冶町	朝香屋書店	同 河原町通	大黒屋書店
本郷區元富士町	文光堂書店	岡山市中之町	渡邊宗次郎
同	明文館書店	名古屋市中區榮町	丸善書店
同	豐文堂書店	金澤市片町	宇都宮書店
同 龍岡町	朝陽堂書店	長崎市引地町	集榮堂書店
同	根津書店	熊本市新町二丁目	長崎次郎
同	文榮堂書店	同 洗馬町	芹川書店
同 湯島切通坂町	宮澤書店	仙臺市南傳馬町	金英堂書店
同	富倉書店	新潟市古町通	萬松堂書店
神田表神保町	東京堂書店	同	北光社書店

56
76

終

