

醫方類聚卷之一百二十三

諸瘧門三

澹軒方

瘧丹

熟煨大蒜搗黃丹元子梔榔風浪乾湯使柳

桃枝更好五元當發服隨安

縛瘧


老鴉飮草熟按團

如小皂團大

下著壹錢安臂間

男左女右侵早縛或止或鬪自能安

取平根二



寸兩筋之中以絹片強
之次日除錢弄路上

肘後方

治寒熱諸瘧方

治瘧病方鼠婦豆豉二七枚合搗令相和未

發時壽域神方服二枚欲發時服一丸

又方青蒿一握以水二升壽域神方二鍾漬絞取汁

盡服之

又方用獨父蒜於白炭上燒之末服方寸匕

又方五月五日蒜壹片去皮中破之刀割令

容巴豆壹枚去心皮內蒜中令合以竹夾

以火炙之取可熱擣為三丸未發前服通化

玄樞面東以井水吞下壹丸不止復與一丸

又方取蜘蛛一枚蘆管中密塞管中壽域神方男左

女以縮頸過發時乃解去也

又方日始出時東向日再拜畢正長跪向日

又手當開氣以書墨注其管兩耳中各七

注又丹書舌上言子日死畢後再拜還去

又勿顧安附勿食過發時斷即差壽域神方大劫

又方多煮豉湯飲數升壽域神方數盡令得大吐便差

又方取蜘蛛壹枚著餅中合丸吞之

又方聖濟總錄臨發時搗大附子總錄生下去皮臍下

篩以苦酒和之塗背上

又方鼠婦虫子四枚各壹以糝糖裹之丸服

壽域神方水下便斷即差

又方常山搗下篩成末三兩真丹壹兩白蜜

和搗百杵丸如梧子分發服三丸中服三

丸臨臥服三丸無不斷者常用効

又方破壹大豆去皮書壹片作日字壹片作

月字左手持日右手持月壽域神方用水吞之立

愈向日服之勿令人知也備預百要方同

又方皂莢三兩去皮炙巴豆二兩去心皮搗

丸如大豆大壹服壹枚

又方巴豆壹枚去心皮射茵如巴豆大棗壹

枚去皮合搗成丸先發各服壹丸如梧子

大也

又方常山三兩甘草半兩水酒各半升合煮
取半升先發時壹服比發令三服盡

又方常山三兩秫米三百粒以水六升煮取
三升分之服至發時令盡

又方若發作無常心下煩熱取常山二兩甘
草壹兩半合以水六升煮取二升分再服
當快止仍斷勿飲食

又方牛膝莖葉一把切以酒三升服令微有
酒氣不即斷更作不過三服而止也

又方王氏集驗末龍骨方寸匕先發一服時以

酒一升半煮三沸及熱集驗方極熱盡服溫覆

取汗便即效

又方常山三兩甘草半兩知母壹兩搗蜜丸

至先發時服如梧子大十九次服減七丸

八九後五六丸即差

又方先發二時以炭火床下令赤脚極暖被

覆過時乃止此治先寒後熱者壽域神方同

又方先煮鱉甲搗末方寸匕至時令三服盡

用火炙無不斷

治溫瘧不下食知母鱉甲炙常山各二兩地
骨皮三兩切竹葉壹升切石膏四兩以水
七升煮二升五合分溫三服忌蒜熱麪猪
魚

治瘴癘常山黃連鼓熬各三兩附子二兩炮
搗篩蜜丸空腹服四九欲發三九飲下之
服藥後至過發時勿喫食

若兼諸痢者黃連犀角各三兩牡蠣香鼓各

二兩並熬龜骨四兩搗篩蜜丸服四十九
日再服飲下

無時節發者常山二兩甘草一兩半鼓五合
絲裹以水六升煮取三升再服快吐

無問年月可治三十年者常山黃連各三兩
酒一斗宿漬之曉以瓦釜煮取六升一服

八合青域神方每服壹盞比發時令得三服熱當吐

冷當利服之無不差者半料合服得

禳一切瘧未發頭向南臥五心及額舌七處

閉氣書鬼字

治一切瘡烏梅丸方甘草二兩烏梅肉熬人參桂心肉蓯蓉知母牡丹各二兩常山升麻桃人去皮尖熬烏豆皮熬膜取皮各三兩桃人研欲丸入之擣篩蜜丸蘇屠白擣一萬杵發日五更酒下三十九平旦四十九欲發四十九不發日空腹四十九晚三十九無不差徐服後十餘日喫肥肉發之也

乞見瘡白驢蹄二分熬人黃四分菜豆三分宋砒霜二分光明砒半分雄黃一分擣蜜丸如梧子發日平旦冷水服二丸七日内忌油

治瘡用桃人壹百箇去皮尖

衛生易簡方於去皮尖雋仁

乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入

黃丹三錢丸如梧子大每服三丸常發日

面北用溫酒吞下如不飲酒并花水亦得

五月五日午時合忌雞犬婦人見

壽域神方同

澹寮方

疔瘡

朴附湯治久發虛癩寒瘡

大附子

生去皮用剪作散子川厚朴去皮剪作

散子塊用劉姜自然汁

右劉散病輕者每服四錢水二大盞生姜

七片棗七枚同煎至七分重者加之當發

日早晨併三服

截癩散

常山鷄骨樣者良 茯神去皮 肉桂去麤皮 甘草

減半熱多加之

右石槌不犯鐵器也 爲麤散每服半兩用常酒

大半椀浸壹夜於當發日早晨空心去滓

冷服服後未須喫熱湯熱物滓再浸或略

煎近發時再服一方不用肉桂茯神却用

檳榔烏梅要之在人增損也凡瘡須是發

作三五次後却截之爲妙

五積交加散治感風寒作癩瘡

生料五積散 人參敗毒散 二藥等分

右和勻每服四錢水壹盞半生姜五片棗子壹枚同煎至八分去滓溫服

老瘧丹

桃仁 去皮尖略炒 鱉甲 醋炙 恒山 酒煮 豆豉 和梅蒸或發而研

右等分蒸爛烏梅肉研膏為圓每三拾圓不拘時白熟湯吞下連日拾數服忌口如常

衛生寶鑑

瘧病

一剪金治瘧疾寒熱乃瘧中聖藥

硫黃 信 各等分。玉機微義信豆

右同研末川緋紅絹子手捻藥壹捻放於絹上裹如豆大上用細絲線緊纏繫數遭繫定用剪子剪下切須緊緊如不緊恐藥有失每服壹丸星宿全時新汲水送下空心服無得人知如服藥先一日夜服至明

正發日早去淨野處避不令人知廣字亦得

溫脾散治瘧疾寒熱發歇多時不差者

甘草生半兩 萊豆壹兩 紫河車兩 砒壹錢半 別研○玉機

微義生砒壹兩半

右先杵紫河車等為末入砒和勻羅為末每服半錢新汲水少許送下如是隔日發須好日夜深服如頻日發只夜深睡服忌葷腥瓜菓酒麪魚肉三法六生冷硬物三

兩日如受邪氣深者只壹服便定十歲以上服壹字十歲以下至三五歲服半字婦人有胎不可服但請放心修合與人服切勿畏砒不敢用子用此藥三五十年救人甚多雖砒壹味有萊豆等參味性涼解得新汲水亦解此藥並不吐人有人壹種積實痰瘧每發時自吐食咸涎不會服藥亦吐非藥力也假令金液丹用硫黃紫霜丸用巴豆杏仁有大毒大熱製了服之皆有

效小兒亦可服恐不合此藥故論及此

瘧瘧治驗

燕南河北道提刑按察司書吏高士謙年踰四十至元戊寅七月間暑氣未退因官事出外勞役又因過飲午後大發熱而渴冰水不能解其病早晨稍輕減服藥不效召予治之診其脉弦數金匱要略云瘧脉自弦弦數者多執瘧論曰瘧瘧脉數素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力滕理

開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於寒故但熱而不寒者邪氣內藏於裏而小舍於分肉之間令人消爍脫肉故名曰瘧瘧月令云孟秋行夏令民多瘧瘧潔古云動而得之名曰中暍以白虎加梔子湯治之士謙遠行勞役又暑氣有傷酒熱相搏午後時助故大熱而渴如在甕中先以柴胡飲子一兩下之後以白虎加梔子湯每服一兩數服而愈 征南

副帥大忒木兒已未奉勅立息州其地卑濕
軍多病瘧痢予合辰砂丹白朮安胃散多痊
效

辰砂丹治瘧疾大有神效

朱砂

壹半入藥壹半爲衣○玉機微義信
壹兩五錢入藥中留五錢爲衣

砒

雄者

各五錢○微
義雄黃另研

右三味件爲末入白麵六錢同研勻滴水
丸如桐子大微義如朱砂爲衣每服壹丸
星宿全時用無根水送下忌濕麵熱物

聖濟總錄

寒瘧

寒瘧之狀內經所謂先寒後熱病以時作是
也蓋傷暑汗出腠理開發因遇夏氣淒滄之
水寒其氣藏於腠理皮膚之中秋傷於風則
病成矣其證先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓
頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛飲冷是
也

治寒瘧先寒後熱頭痛不可忍熱極卽汗出

煩渴吳茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙 羌活去蘆頭 甘草炙 半夏

湯洗七 乾薑炮 芎藭 細辛去苗 麻黃去根

節 高良薑 藁本去苗 桂去蘆皮

右一十一味 麤擣篩每服三錢匕 水壹盞

煎至七分 去滓 未發前溫服

治寒瘧神效檳榔湯方

檳榔剉 桂皮去蘆 常山 陳橘皮湯浸去 甘

草炙剉各

等分

右五味 麤擣篩每服三錢匕 酒半盞 水壹盞 煎至壹盞 去滓 未發前溫服

治寒瘧不差橘皮散方

陳橘皮湯浸去白 牡蠣熬三 桂皮去麤 常山

各半

右四味 爲細散 每服三錢匕 溫酒調下 未發前併三服

治瘧先寒戰寒解即壯熱鼈甲常山酒方

鼈甲去裙襴醋 淡竹葉煮 常山 甘草炙

各三分

右四味麤擣篩每服五錢匕酒半盞浸藥
蓋於地上壹宿次日添水壹盞煎至七分
去滓末發前溫服得吐為驗

治寒瘧草豆蔻飲方

草豆蔻皮去高良薑 常山 青橘皮湯浸去白

陳橘皮湯浸去白生薑半淡竹葉壹握黑

豆五十粒

右八味咬咀如麻豆都用水三盞煎至壹

盞半去滓未發時通口分溫二服

治寒瘧胃滿人參湯方

人參半兩蜀椒去目及閉口者出汗壹分乾薑炮壹兩阿魏

三分酒浸去砂石麪和作餅炙

右四味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至
七分去滓溫服不拘時

治寒瘧烏梅丸方

烏梅肉炒桃人去皮尖雙常山 豉炒各

升麻 肉蓯蓉酒浸焙桂皮去麤人參 甘草

類聚醫方

十一

炙剉各
半兩

右九味爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服
二十丸空心未發前溫酒下日二加至三
十丸

治寒瘧先寒後熱常山湯方

常山 甘草 生剉 乾薑 炮各分 附子 炮裂去 此
胡 去苗各 半兩

右五味咬咀如麻豆每以五錢匕酒壹盞
半煎至壹盞去滓分爲二服空心未發前

并食後各一服

治寒瘧無問遠近虎骨丸方

虎頭骨 炙 烏梅肉 炒 桂 去蘆皮 甘草 炙 人參
各半 桃人 去皮尖雙 常山 升麻 肉苁
蓉 酒浸切焙 附子 炮裂去皮 麝香 研香 豉
炒壹

右一十二味除桃人外搗羅爲末和勻鍊
蜜丸如梧桐子大每服三十丸未發前米
飲下

類聚

十一

類聚

十一

治寒瘧塗方

鼈甲去裙襖醋炙半兩烏賊魚骨去甲皮臍切

甘草炙常山各壹兩

右五味搗羅為末每服五錢匕酒壹盞半前十數沸留膏宿次日以酒先塗手足并背上如不發即止如發即飲此酒壹盞

溫瘧

溫瘧之狀內經所謂先傷於風後傷於寒其證先熱後寒病以時作是也蓋風為陽氣寒

為陰氣風氣先勝故先熱而後寒得之冬中風寒氣藏於腎內至骨髓至春陽氣大發邪氣不能自出至夏大暑腦髓燥肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗俱出故氣從內之外也其法宜先治其陽後治其陰也治溫瘧初發身熱頭痛不可忍臨醒時即寒慄戰動麻黃湯方

麻黃去根節煎羌活去蘆牡丹心去蘆獨活去梔子去皮芫胡去苗桔梗炒升麻炒荆芥穗

大黃剉半夏滑焙木香 知母焙黃芩大
心各半兩

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水壹盞
入生薑二片同煎取七分去滓未發時服
治溫瘧初壯熱後寒戰骨節痠痛口乾煩渴
蘆根湯方

蘆根剉壹兩麥門冬去心焙升麻 葛根剉各三分
山梔子去皮半兩石膏壹兩
右六味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入

竹葉十片煎取一盞去滓溫服未發前連
三服

治溫瘧骨節疼痛時嘔朝發暮解暮發朝解
知母湯方

知母焙乾叁分甘草炙剉兩石膏碎三兩粳米壹合桂
去麤皮半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎
取一盞去滓溫服未發前不拘時候

治溫瘧壯熱憎寒不能食地骨皮湯方

地骨皮

知母

判焙各三分

龍甲

去裙襴醋浸炙黃

常

山

判各半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入

竹葉十片煎至一盞去滓未發前溫服

治溫瘧寒少熱多冬瓜湯方

常山

細判

甘草

炙判半兩

右二味麤搗篩每服二錢匕用冬瓜汁一

盞煎七分发溫未發前服

治溫瘧常山湯方

常山

判半兩

龍甲

去裙襴醋浸炙黃

甘草

牛判各壹兩

車

前草

壹握切或用子三合

右四味麤搗篩每服三錢匕用漿水壹盞

浸藥壹宿當發前一日以急火煎取七分

去滓溫服

治溫瘧熱渴體痛松蘿湯方

松蘿

半兩

烏梅肉

炒

梔子

去皮

龍甲

去裙襴醋浸炙黃各

半兩

升麻

三分

右五味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入茶

末半錢匕煎至七分去滓未發前空腹溫服

治溫瘧常山凡方

常山剉烏梅肉炒豉炒天靈蓋酥炙黃丹各三分

砂研知母切蜀漆各半

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹以溫酒下二十九漸加至三十丸日三並未發前服

治溫瘧壯熱微寒常山飲方

常山剉淡竹葉剉小麥壹

右三味以水三盞漬藥一宿明日煎取二盞去滓未發前逐旋溫服

治溫瘧日漸羸瘦欲成骨蒸常山湯方

常山剉猴骨炙黃各三分烏梅肉炒甘草炙剉各半
兩車前葉搗天靈蓋燒作灰壹分

右六味麤搗節每服三錢匕水一盞煎至七分去滓瘧未發前溫服微吐為效
寒熱往來瘧

陰陽相勝而寒熱互作者以邪氣相非也故
氣并於陰則為寒氣并於陽則為熱寒則振
慄鼓頷以陰實陽虛故也熱則渴而飲冷以
陰衰陽勝故也

治瘧發寒熱芫胡桂枝湯方

芫胡去苗 桂去 皮去 黃芩去 心去 黑 芍藥 人參
各半 甘草炙 兩 半夏湯洗七遍焙
右七味麤搗篩切服六錢匕水二盞入生
薑一棗大拍碎棗二枚擘破煎至壹盞去

滓溫服

治瘧壯熱憎寒大便秘澀鼈甲湯方

鼈甲醋炙去 裙爛 赤芍藥 桃人去皮尖雙 當
歸切 大青 天靈蓋酥炙別 知母焙各 乾
薑炮半 牽牛子三分炒令
右九味除天靈蓋外麤搗篩每服三錢匕
水一盞煎至七分去滓調天靈蓋末壹錢
匕未發前溫服仍留其滓重煎若先自利
去牽牛子

治諸瘧疾先熱後寒頭痛四肢煩倦麻黃湯方

麻黃去根節 烏梅肉炒 秦艽去苗 苳胡去苗 甘草

草炙 麥門冬去心 犀角鎊各三分 青蒿子壹兩

常山壹兩

右九味麤擣篩每用五錢匕水壹盞半入桃柳枝心各七枚細剉豉五十粒煎至壹盞入朴消少許更煎一二沸去滓分二服早晨及卧時溫服之

治瘧先寒後熱四肢黃瘦頭痛常山飲方

常山壹兩 豉壹分 葛根剉 苳胡去苗 升麻 牡蠣

熬大黃剉 前胡去蘆頭 知母焙 山梔子人

枳殼去穢 麥門冬去心 半夏湯洗七遍 麥門冬去心

焙桃人去皮尖 甘草炙 犀角鎊各半兩

右一十六味咬咀如麻豆大每用五錢匕水一盞半入葱薤白各三寸切碎煎取壹盞去滓分二服發前及發時熱服之

治瘧寒熱作時面色黃人參湯方

人參 常山各半兩 甘草生三分 陳橘皮湯浸去白

焙各壹分

右四味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入茶末半錢匕燈心五莖煎至七分去滓入酒半盞和勻候溫未發前頓服取吐如未吐再服以痰出盡為度

治癘經吐下後寒熱頭痛煩渴犀角湯方

犀角鎊 甘草炙各半兩 麥門冬炙 升麻 知母焙 鼈甲醋炙去裙各三分 石膏碎壹兩二錢

治癘疾寒熱丹砂丸方

右七味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至壹盞去滓食前溫服未發前再服

丹砂 雄黃各壹兩 砒霜半兩 桃人去皮尖雙 麝香十壹枚 阿魏各壹錢 安息香壹分

右七味各研極細再合研勻用糯米粥和丸如雞頭大每服半丸細嚼新汲水下取吐即愈

治諸瘧發歇寒熱不定二豆丸方

菜豆

王氏集驗方去皮

黑豆

去皮

丹砂

研各壹分

砒霜

研半

兩〇集驗方半錢

右四味先研二豆如麵入砒拌勻滴水丸如梧桐子大丹砂為衣每服一丸發前取桃心七箇爛嚼冷水吞下如無桃心取桃枝煎湯放冷下

治諸瘧寒熱往來止而復發常山散方

常山

末壹兩

砒霜

研壹分

丹砂

研壹錢

右三味研勻入白麵糊和作餅子油內煮

焦黑為度再研極細每服半錢七夜半冷茶清調下

治瘧疾作寒發熱三聖丸方

凝水石

二兩

砒霜

壹兩

膩粉

壹分

右三味研細用陳粟米飯和作挺子以濕紙十重裏慢火內燒令焦黑再研為末粟米飯和丸如菜豆大每服三丸夜半桃心水下

治諸瘧寒熱不已日漸萎黃常山飲方

常山兩半烏頭炮裂去皮甘草生用壹分蒜壹顆
者糯米炒壹合豉炒壹合甌帶三寸

右七味麤擣篩以酒壹升二合浸月下露
一夜橫刀一口置藥上俟天明煎取五合
去滓空心頓服良久吐出惡痰即愈如吐
不已煮漿水粥止之

治寒熱往來瘧久不差鼈甲大黃丸方

鼈甲大黃常山 人參 蜀漆
廿草炙附子炮裂去皮白薇各三分

右八味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
每服十五丸淡竹葉湯下平且一服食後
良久再服

治諸瘧寒熱往來附子丸方

附子炮裂去皮大黃三分常山 蜀漆各
兩壹分

右四味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
每服三丸米飲下未發一服臨發再壹服

瘧瘧

瘧瘧之狀內經所謂但熱不寒陰氣先絕陽氣獨發少氣煩冤手足熱而欲嘔是也得之邪熱留於身中厥逆上衝中氣實而不外泄因用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛不及於陰故但熱不寒氣內藏於心外舍於分肉之間令人消爍脫肉名之曰瘧瘧以單陽無陰故也治瘧瘧發作有時但熱不寒頭痛不安通身俱黑大腸秘熱小便黃赤茵陳蒿湯方

茵陳蒿 山梔子 去 芫胡 去 黃芩 去 黑桔梗 炒 牡丹皮 貝母 去 荆芥穗 炒 升麻 杏仁 湯浸去皮 半夏 湯洗七遍 羌活 去 獨活 去 麻黃 去 細辛 去 生薑 二片 煎壹沸急瀉出臨發熱頭痛時去滓熱服仍須食後但此瘧止發熱并初發時先壯熱者可服 治瘧瘧上焦熱身重目黃茵陳樹皮湯方

類聚 卷之三

茵陳蒿 取葉 枳殼 去瓢 麩炒 桔梗 三分 大黃

炒 劉微 甘草各半兩

右五味麩搗篩每服三錢匕水壹盞煎至六分去滓溫服不計時候

治瘧瘧積熱痰盛寒少熱多但熱不寒煩躁引飲大青飲方

大青 青兩莖葉紫者是不紫即是遠志大不可用也如無真者以青黛代之大

黃 醋炒 赤芍藥 常山 細剉 甘草 龍膽 土

各半兩

右六味麩搗篩每服五錢匕用水壹盞半煎至八分去滓溫服氣盛熱多宜服得利或熱稍退即止人宿有冷疾年四十以上者雖有熱證不宜多服

治瘧瘧發熱不止常山散方

常山 剉一兩 升麻 三分 鼈甲 去裙襖生用 山梔子 去皮

各半兩

右四味搗羅為散每服三錢匕未發前用溫水調下取吐即差

治瘰癧鼓心飲方

鼓心壹合雄鼠糞末炒童子小便三升

草炙半兩鼈甲醋炙去裙襴芫胡去苗各壹兩一分山梔

子去皮三分烏梅七枚桃心握壹柳心握壹生地黃

汁二合生薑壹分

右一十二味除鼠糞地黃汁小便外餘並

細剉入小便中浸一宿明日煎取八合去

滓下鼠糞并地黃汁分為三服空心壹服

食後再服

治瘰癧石膏湯方

石膏碎二兩白秫米五十粒常山剉三分

右三味麤搗篩每服五錢匕以水壹盞半

入淡竹葉七片細剉煎至壹盞去滓空腹

溫飲一服欲發時壹服正發時壹服三服

訖淨室中臥勿與人語過發時後即得洗

手面及飲食七日內禁房室及酒麪久瘡

不過再劑一方加烏梅肉二七枚

治瘰癧麻黃方

藥身重

三九

麻黃去根節常山剉知母剉焙甘草炙大

黃生剉各半兩

右五味搗雜為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸溫水下未發前服日二服不差稍增之

治瘧瘧壯熱不止渴欲飲水車前草湯方

車前草剉常山剉升麻剉鼓炒甘草生各半兩

白粳米半合

右六味麤搗篩每五錢匕以水二盞宿浸

藥於星月下橫一小刀於藥上入五更煎

取一盞去滓分溫二服空腹及未發前各

一服良久即吐叶定食少漿水粥

治瘧瘧但熱不寒煩渴不止常山飲方

常山剉炒甘草剉炒烏梅七枚推碎青蒿焙一分

分

右四味麤搗篩都以小便壹盞水壹盞酒

一盞煎至一盞去滓當發日空心服

間日瘧

間口瘡者邪氣著於陰不得與陽氣俱出也
衛氣晝行於陽邪氣不得出故必再會而後
發是以間日乃作也

治間日瘡先寒戰後壯熱常山湯方

常山

甘草

炙各三兩

鼈甲

去裙襖醋炙壹兩

淡竹葉

切三升洗

右四味咬咀以酒三升漬之上覆頭安露
地明旦以水七升重湯內煮水過半為度
其酒分五服未發飲之當吐吐已不必盡

劑

治間日瘡醇醪湯方

大黃

剉炒三分

甘草

炙

常山

各壹分半

右三味咬咀以水三盞煎取壹盞去滓更
以水壹盞煎滓取七分未發先服醪藥是
後煎者相次服醇藥是前煎者差

治間日瘡常山酒方

常山

壹兩

蒜獨頭者壹顆

糯米

黑豆

各壹百粒

右四味咬咀以清酒一升病未發前一日

以酒浸藥於椀中以白紙覆之椀上橫一
刀欲發時三分飲壹分如未吐更服壹分
得吐則差

治間日瘧發寒熱常山湯方

常山 細剉各 秫米 五十粒糯 石膏

碎二兩

竹葉 三分 米亦得

右四味釐搗篩每服五錢匕以水一盞半
浸藥一宿明且煎至壹盞去滓溫服未發
前一服臨發再服當日勿洗漱勿飲食并

用餘藥汁塗五心及胷前頭面藥滓置枕
邊

治間日瘧糯米煮散方

糯米 四十粒 常山 剉 烏梅肉 炒 竹葉 剉 甘草

炙各半兩 石膏 壹兩半碎

右六味搗羅為散每服五錢匕以水壹盞
半煎至七分去滓未發前溫服

治瘧間日發大黃湯方

大黃 生半兩 甘草 炙 常山 剉 桂 去麋皮

右四味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至七分去滓未發前溫服

治間日瘧神聖丸方

黑豆

小者二十壹粒水浸去皮

砒霜

研壹錢

大棗

三枚煮去皮核

右三味須於重午七夕日修合同研丸如豌豆大以丹砂為衣合時忌婦人雞犬見於發日早晨將藥壹丸面北香上度過用冷茶清下忌熱物一復時

痰瘧

痰瘧之狀胃中不利頭痛振寒帙慄而不能食食即嘔寒去則內外皆熱寒熱更作心下支滿痰積胃中氣逆煩嘔故謂之痰瘧

治痰瘧發作有時熱多寒少頭痛額角并胃前肌肉羸動食纔入口即吐出面色帶赤半

夏散方

半夏

湯洗去滑為末生薑汁和作餅暴乾

藿香

去梗

羌活

去蘆頭

芎藭

牽牛

各半兩

右五味搗羅為細散每服三錢匕食後白

湯調下以吐為度未吐再服

治一切痰瘧石膏飲方

石膏碎 淡竹葉各三兩 常山 甘草生 烏梅

各二兩 粳米合

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至壹盞去滓溫服吐痰即差如熱盛加大

黃芩兩

治一切瘧及吐一切痰疾胡粉丸方

胡粉研 砒霜研 寒水石煨研各

右三味合研勻滴水丸如雞頭大發前新

汲水吞下壹丸即大吐至來日困睡為驗

治痰瘧吐膈細辛湯方

細辛去苗 松蘿 犀角屑 甘草生各常

山研 麻各一分 梔子人 玄參各壹

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎七

分去滓溫服以吐為度

治痰瘧吐痰犀角飲方

犀角屑鎊 升麻 玄參 常山各半 松蘿

類聚聖方
三十一

甘草生細辛去苗山梔子人各壹分

右八味麤擣篩每服五錢匕水壹蒸半煎

至八分去滓空心徐徐溫服取吐為度

治痰瘧寒熱溫疫等防葵飲方

防葵 鼈甲醋炙去松蘿 甘草生各常半

山三分

右五味麤擣篩每服五錢匕水壹蒸半煎

至八分去滓未發前徐徐溫服取吐為度

治痰瘧鼓心丸方

鼓微炒大黃生用常山三升麻半附子兩

壹合 小者炮裂去皮臍壹枚

右五味擣羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大

每服七丸發前米飲下吐後更乾嘔七丸

治痰逆多時久瘧不差及面目四肢黃腫蜀

漆丸方

蜀漆葉 牡蠣燒黃芩去黑心大黃生甘

草炙犀角屑知母焙

右七味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九空 心溫水下

治痰實瘧發歇不止常山酒方

常山三分烏梅肉生用各甘草半兩

右三味細剉以酒二盞浸一宿早晨去滓

煎溫服壹盞良久以筋入喉中引之吐痰

即差

治痰瘧發作無時升麻常山湯方

升麻一兩常山二兩蜀漆葉壹兩

右三味麤搗篩每服四錢匕井華水壹盞

半煎至一盞空心頓服良久即吐吐定食
漿水粥和之

治痰瘧吐不出烏頭湯方

烏頭炮裂去皮半夏湯洗去桂皮去蘆芫花醋炒

常山各半兩鼓炒一

右六味剉如麻豆每服三錢匕酒壹盞煎

至七分去滓發前溫服相次再服取吐為

度

治痰瘧寒熱常山甘草飲方

常山 甘草炙 大黃剉炒各 桑根白皮剉

兩烏梅五枚 杏仁湯去皮尖雙

黃連去須 羌活去蘆頭 黃芩去黑心 芎藭

枳殼去瓢 赤茯苓去黑皮 旋復花熬半 此

胡去苗青 附子炮製去皮 牽牛子炒 桂

去籬皮 虎頭骨牙齒 酥炙黃

右一十八味剉如麻豆每服五錢匕水壹

盞半煎至八分去滓温服

痰癘

痰癘者以癘發該時或日作或間日迺作也

入衛氣流行合於晝夜陰陽邪氣內舍於榮

隨衛氣以出入而應於風府其作早晏皆以

時發也寒溫痺癘動皆該時故內經統謂之

痰癘其狀伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊痛寒去

則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲

治痰癘寒癘温癘痺癘悉治之丹砂丸方

丹砂研一分 常山搗末三分

右二味研令勻鍊蜜和丸梧桐子大午時

發者平旦米飲服三辰九時七時及臨發時各服三九至夜然後得食

治痰癰麻黃九方

麻黃去根節湯掠常山剉知母焙甘草炙

大黃生用各半兩

右五味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸未發臨發各一服未差漸增丸數

治痰癰以時發鼈甲漬酒方

鼈甲鱗炙半兩烏賊魚骨炙常山各半兩附子炮裂

去皮甘草炙各一兩

右五味剉如麻豆每服五錢匕以酒壹盞半漬藥一宿明日以酒先塗五心過發時瘡斷若不斷可飲藥酒壹二盞即差

治痰癰先寒戰動寒解壯熱日發及間日發常山酒方

常山切細鼈甲炙壹分甘草炙

三分

右四味麤搗篩每服五錢匕以酒半盞浸藥覆安露地一宿明旦以水壹盞煎至七分去滓未發前溫服盡當吐既效不必盡劑過發時良久方可食

治痰癥霜黑丸方

砒霜錢一 墨 蓐草灰錢各半 菜豆粉一分

右四味豈處細研為末用糯米粥和丸如小豆大每服兩丸未發前一時辰醋湯下端午日未出時面東修合不得言語勿令

婦人雞犬見

治瘧及有孕婦人患者無不愈如聖飲方

甘草炙 芫胡去苗 常山 烏梅去核各半兩

右四味剉碎用銀器或沙石銚當發日絕早以好酒二升慢火熬至壹盞濾去滓放溫作一服飲盡良久吐瀉即愈如尚覺有寒氣未退候五七日再服

治一切瘧疾五行神驗丸方

澱花二兩 桂一兩 乾薑一兩 巴豆一兩 硫一兩

黃一兩麝香少

右六味將五般藥於盤內據五方排定取
四月二十八日夜安卓子上於中庭露以
香一鑪當虔心啓請五行神天上五星神
人間一切主藥神謂加備此蓋新法瘡尤
露後取端午日修合當啓祝去穢施功德
無所希求須夜夜志心再三啓祝至天明
早收莫令雞犬飛鳥見安於高淨處亦依
方所安著如是露七夜至午日將巴豆去

殼湯煮三五十沸擣研餘藥爲散入麝香
以薄麵糊調澱花末爲丸如櫻桃大合時
忌女子等見凡了焙乾於合內盛不得觸
汚莫令香歇唯在心法不得容易此方帶
之無不神驗修合人當月忌眼見一切魔
汚若俗人須解之宜加淨潔專志不然則
藥無神效發日淨手取以絲裏香火炙令
熱男左女右預前帶安耳中便利時除却
淨手後再安耳中不得女子捻觸女子患

男子為安日忌一切葷辛果子一丸男度
十八女度三人此方極神驗須將廣施若
有希取即無効驗也

治諸瘡知母丸方

知母焙 烏梅肉 炒各二兩半 肉蓯蓉切 常山
豉炒各二兩 甘草炙 人參 桂去蘆皮各
右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
每服二十九溫酒下

治一切瘡方

地黃汁壹斤 砒霜研半兩 蠟許
右三味先將地黃汁於瓷器中煖候沸入
砒霜不住手攪煎令稠次入蠟相和丸如
菜豆大每發時用井華水下一丸未差發
前更服一丸

治瘡常山酒方

常山 鼈甲醋炙去酒 虎頭骨炙半兩 豉炒
分桃枝壹枝 柳枝壹枝 桃人三七枚 去皮 乾棗
三枚 烏梅炙七 一丸 一丸 一丸 一丸 一丸 一丸

右九味細剉以酒一升浸一宿明日入生薑五片煎取五合去滓空心分爲二服

治瘵瘵扼虎膏方

烟脂

阿魏

各壹大豆許同研

右二味同研以大蒜肉研和爲膏用大桃核一枚劈開去人取一片以藥膏平填在核內瘵發時用藥桃核覆在手虎口上男左女右令藥著肉以絛帛繫定經宿乃去疾更不發

勞瘵

勞瘵者以久瘵不差氣血俱虛病雖間歇勞動則發故謂之勞瘵邪氣日深真氣愈耗表裏既虛故食減肌瘦色悴力劣而寒熱如故也

治勞瘵毛髮枯焦寒熱不定飲食減少肌肉消瘦面色青黑兩足無力非時足冷小便頻數大便不調夜夢泄精髓甲煮散方

髓甲

去裙襖醋炙半兩

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆頭

芎藭

去各壹分黃耆判半赤茯苓去皮生乾地黄

焙木香各壹分牛膝酒浸切焙天靈蓋酥續斷

菟絲子酒浸別搗芎藭 藿香葉 陳橘

皮湯浸去白山茱萸各壹分麝香例一錢

右一十七味搗羅為散每服三錢匕水壹

盞入搗少許同煎七分空心和滓服或鍊

蜜丸如梧桐子大空心搗湯下四十丸亦

得

治勞瘧秦艽酒方

秦艽去苗 苡胡去苗 甘草炙 鼈甲去裙爛醋炙各半兩

常山 葱白各二兩 豉壹分

右七味剉如麻豆用無灰酒三升浸一宿

於近火處頓常令微溫每服壹盞未發時

不拘時服既服又添酒壹盞於藥中再添

至三升即止

治勞瘧久作不已日致憔悴勢漸危困鼈甲

散方

鼈甲去裙爛醋浸多 常山剉 蜀漆葉 烏賊魚骨

夫附子炮裂去皮知母切焙蜀椒去目及閉
甲附子臍各半兩各壹分黃耆剉芫胡去苗各

右九味搗羅為散每服三錢匕以酒壹盞
漬一宿平旦溫服未發前再膏服

治勞瘧芫胡湯方

芫胡去苗壹兩人參 栝樓根 黃芩去黑心甘

草剉黃耆半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半生
薑半分切棗兩枚去核煎至壹盞去滓溫

服空腹欲發前各壹服

治勞瘧經年不差寒熱痿瘦祛勞湯方

芫胡去苗常山龍甲去裙襖知母切青蒿

乾日草剉枳殼桂去麤皮木香半

右九味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半入
柳枝心七枚葱白三寸煎至壹盞去滓空

腹溫服

治勞瘧寒熱萎黃渴躁煩悶甘草湯方

甘草炙三蜀漆葉半天靈蓋酥炙黑豆生

桃人湯浸去皮尖研烏梅肉炒各一分

右六味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入竹葉三片煎至七分去滓空腹未發前壹服臨發時再服

治勞瘵久不差煇煇發熱骨節痛不下食小便赤澀加瘦弱此胡枳殼湯方

芫胡去苗枳殼生剝炒升麻 麥門冬去心鼈

甲醋浸炙令黃片裙爛甘草炙桃人湯浸去皮尖雙

右七味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓未發前不拘時溫服

治勞瘵熱多寒少知母湯方

知母切焙常山細剉松蘿 桔梗去蘆頭此胡

去鼈甲醋浸炙令黃去裙爛橘葉各三分

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞柳枝心七枚童子小便半盞煎至七分去滓未發前溫服

治勞瘵鼓心飲方

鼓心九粒甘草生用鼈甲去裙爛醋此胡

去苗各 梔子 去皮 烏梅肉 七枚 桃枝心 七枚 柳

半兩 枝心 七枚 生地黃汁 合一 雄鼠糞 炒為末

右壹十味除地黃鼠糞外 籠擣篩都用童

子小便一盞半 浸藥壹宿 明旦煎取一盞

去滓下鼠糞末半錢 地黃汁壹合 生薑汁

壹合 分為兩服 空心壹服 欲發前壹服

治勞瘵并積勞寒熱常山丸方

常山 細剉三分 烏梅肉 炒 甘草 炙 鼈甲 去裙爛

萎蕤 各半兩 石膏 碎一兩 知母 焙 蜀漆葉 白

薇 升麻 地骨皮 麥門冬 去心焙 鼓

合炒壹

右壹十三味擣羅為末 鍊蜜丸如棗豆大

每服十丸 空腹米飲下 未發前再服 漸加

丸數以差為度

治遠年勞瘵雄黃丸方

雄黃 研 丹砂 研 麝香 研各半兩 木香 龜甲 去

浸醋 鼈甲 去裙爛 虎頭骨 炙 羚羊角屑

犀角屑 白薇 玄參 當歸 切 知母 焙

防風 麻黃去根節 龍膽 牡蠣熬 猪苓片

皮 芫胡去苗 茯神去木 升麻 檳榔殼煨 地骨

皮 赤芍藥 梔子人 黃連去須 烏梅肉

炒桃人湯浸去皮尖 阿魏醋研化入麵 安

息香入胡桃研 萎蕤 竜齒各三分

右三十二味除研藥外擣羅為末再同研

勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空腹

白粥飲下發前再服

治積年勞瘧不差顏色羸瘦無力烏梅丸方

烏梅肉 炒 甘草炙 升麻 人參 桂去

厚肉 菴蓉酒浸 桃人湯浸去皮 常山各

豉微炒 右九味除桃人外擣羅為末入桃人再研

勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空腹

溫米飲下發前再服漸加至三十九

治勞瘧人參丸方

人參 烏梅肉 炒 桃人湯浸去皮尖 常山

到肉 菴蓉切 升麻各三分 杏仁湯浸去

雙人別研

研桂去鹿皮鼈甲去裙襖甘草炙各三分丹砂
研阿魏研龍齒研各

右壹十三味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子
大每服二十九丸空腹米飲下末發時併兩
服

治勞瘡桂參丸方

桂去麋皮肉苁蓉酒浸切豉微炒麝香研
桃人湯浸去皮烏梅肉炒常山剉人參
各三分

右八味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每
服空腹米飲下十九丸未發時再服漸加至

治勞瘡豆桂丸方

巴豆去皮桂去麋皮澱花研阿魏醋化麩調
安息香入胡桃人

右六味除研藥外搗羅為末再研勻用麩
糊丸如梧桐子大每用絲裏煮丸香煙吐
度七遍安耳內男左女右又帶之

治勞瘧瘴瘧積年不差烏梅丹砂丸方

烏梅肉炒半兩丹砂研龍甲去裙爛醋浸知

母焙常山剉石膏碎甘草炙升麻炙蜀漆

業白薇地骨皮各壹分萎蕤各壹分牛黃研

分鼓合炒壹麥門冬去心焙青蒿乾者麝香

分研半

右壹十七味除研藥外搗羅為末研勻鍊

蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十

丸未發前再服漸加至三十九或吐出痰

即安

治勞瘧經年不差常山湯方

常山去裙爛龍甲去裙爛知母焙苾胡去苗青蒿

焙甘草枳殼去瓢桂去麋皮桃枝各一兩柳

枝各一握

右壹十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半

入葱白薤白各三寸切同煎至八分去滓

溫服不拘時

治勞瘧累服藥不差經年羸劣狀如勞疾烏

梅五補丸方

烏梅肉熬二肉苁蓉去皴皮酒黃耆桂

去麤皮生乾地黄焙茈胡法常山 桃人

去皮尖雙升麻當歸切人參 赤茯苓

人炒研 炙刺一 鼓心宣合麝香別研

去黑皮甘草兩半 各書兩 右膏十五味除研外擣羅為末入麝香桃

人合研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服空

心酒下二十九加至三十九

治勞瘧久瘧連延不差阿魏丸方

阿魏 麝香 雄黃 丹砂四味並研鼠

骨 牛骨 虎骨 兔骨 龍骨 蛇骨

馬骨 羊骨 猴骨 雞骨 犬骨 豬

骨十二味並酒炙 同為末各一分

右一十六味擣研為末和勻取人日於北

斗下以阿魏水煮糊丸如小豆大每服十

五丸溫酒下空心服

久瘧者瘧久不差發汗吐下過其真氣虛邪

久瘧者瘧久不差發汗吐下過其真氣虛邪

氣深沉以內薄衛氣不應故積歲月而難治也雖有虛否不可攻治當先其發時用湯液以發汗蓋浸漬熏蒸邪氣方出出則微汗小便利者表裏俱和久瘧自差矣

治諸瘧久不差發動無節日漸虛困羸瘦烏梅丸方

烏梅肉微炒壹兩半 鼈甲酒浸去裙爛炙令黃色壹兩 天靈蓋塗酥炙令黃色壹兩 虎頭骨酒浸炙令黃色壹兩 常山細剉 芫花去蘆 蜀漆葉三分

知母剉焙乾三分 甘草炙三分 升麻三分 人黃剉半兩

鼓炒令黃桃人皮尖雙人生別研

右壹十四味除桃人外搗羅爲細末與桃人相和鍊蜜丸如梧桐子大每日空腹未發前以枳殼桑根白皮湯下二十丸漸加至三十九丸如差後覺冷損憊卽加生乾地黄防風黃耆桂各壹兩鼓心減半日壹服治瘧久不差鼈甲丸方

鼈甲酒浸炙令黃色 虎頭骨酒浸炙令黃色 烏

梅肉炒令乾 麥門冬去心焙乾 石膏
三分 常山細剉 白薇半升 升麻三分 人
 參一分 知母三分 地骨皮兩 右膏十三味搗維爲末鍊蜜如梧桐子
 大未發前米飲服二十九明日早晨又服
 三十丸如人行十里卽食豈桃白粥至臨
 發時又服三十丸卽差不吐不利差後三
 日內將息如常法
 治久瘧不差發不以時或朝或夜肌瘦食少

地骨皮湯方

地骨皮 升麻 犀角鎊 玄參各三分 常山
一兩 細剉

右五味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞煎
 至七分去滓空腹未發前溫服欲吐須忍
 俟不能禁卽吐如此吐下卽差
 治久瘧四肢虛汗不止黃耆散方

黃耆去苗細切 牡蠣洗粉 麻黃根一兩 知母
兩 乾人參兩

右五味擣羅爲細末研令極細每服三錢
匕用河水煎小麥湯未發前調下未差再
服

治瘧久不差發歇無時漸至黃黑枯瘁成勞
松蘿飲方

松蘿三分甘草生半兩常山細判半兩鼈甲去裙襖醋浸炙

令黃色竹葉切半兩

右五味羅擣篩每服五錢匕以木壹盞半
煎至壹盞匕滓空心未發前溫服以吐爲

差

治久瘧日多增寒壯熱不止渴飲水車前草
湯方

車前草半兩常山細判半兩升麻半兩白粳米半合

炒半兩甘草生半兩

右六味羅擣篩每用三錢匕以水一盞半
宿浸藥置於星月下橫一小刀子於藥上
五更煎取七分去滓分溫二服茶腹未發
前一服相次再服良久得吐吐定即得食

漿水粥

治久瘧不差將成骨蒸勞寒熱無時莖胡飲

方 莖胡去苗兩常山三分甘草兩附子炮裂去

兩乾薑炮裂壹分

右五味剉如麻豆每用五錢匕用酒壹盞

半煎至壹盞去滓分二服空心未發前一

服發後再服

治瘧經年不差梔子湯方

梔子人壹兩常山三分車前葉炙乾粳米半兩

右四味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎

至壹盞去滓溫服未發前一服臨發壹服

以此利為差利若不止以冷飯進之

治久瘧黃酒方

黃連去須壹兩常山細剉壹兩

右二味以酒一升半浸之經宿向發前煎

取一盞分二服臨發更一服有熱當吐有

冷當下

治瘡久難差鮫鯉甲酒方

鮫鯉甲酒浸炙令黃色半兩常山三分鼈甲去裙襖醋浸炙黃半

兩烏賊魚骨三分甲烏梅肉微炒桃人二十

湯浸去雙竹葉握一豉合一葱白七莖切

右九味剉如麻豆大用生絹袋盛以酒三升浸經一宿每日空腹溫服半盞良久取此如不吐至已午時再服三兩服如不差

隔日更依前服之

治瘡久不差常山湯方

常山兩烏梅肉壹兩甘草三分並生用

右三味麤擣篩每服二錢匕水一盞入生

薑三片煎至六分去滓不計時溫服

治瘡百方不差宜服久瘡丸方

砒霜壹分研乳香半兩研半夏湯洗七遍焙乾秤壹兩

右三味重午日合同搗羅爲末正午時粽子尖和丸如皂子大發時以醋湯下壹丸更不再服如非重午日合藥須兩服差

治久瘡不差惡寒壯熱百節疼痛面色黃瘦

神功丸方

阿魏研丹砂研雄黃研各壹兩臘月狐肝焙研二兩

麝香研壹錢

右五味同研為細末用重午日日未出時
粽子九如梧桐子大病者以緋線繫壹九
男左女右中指上未差桃入湯下壹九合
藥時北面勿令雞犬婦女見

治一切瘧疾經年不差常山飲方

常山去君欄醋炙各一兩鼈甲炙知母焙白頭翁

甘草炙芫胡去苗各三分青蒿握桃枝 柳枝

各壹握桂去麤皮

右壹十味麤擣篩每服四錢匕酒一盞半
入葱白薤白各三寸切浸一宿煎取八分
去滓溫服空心服欲發時再服

治瘧久不差烏梅菴蓉丸方

烏梅肉焙肉菴蓉酒浸切焙附子炮裂去臍皮各二兩常

山三兩桃仁去皮尖雙鼓三知母焙虎頭骨

各壹兩麝香研一分桂壹兩

右壹十味擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子
大每服三十九空心米飲下

鬼瘧

鬼瘧者外邪之所乘也人真氣內虛神守不
固則鬼邪投間而入故恍惚喜怒寒熱更作
若有所持而屢發屢止也治法宜禳法之而
兼以祛邪安神之劑

治鬼瘧乾桃丸方

樹上自乾桃子

二七枚

黑豆

壹兩

巴豆

七粒去

心膜

出盡油

右三味擣羅爲細末滴冷水丸如梧桐子
大丹砂爲衣每服壹九凌晨而東井華水

吞下

治鬼瘧阿魏丸方

阿魏

研

砒霜

研

丹砂

研各

息

畫鍾馗紙燒

灰

錢二

右四味研爲細末用寒食麴丸如小豆大
每服一丸發時冷水下宜用正月十五日

五月五日合

治鬼瘧丹雄丸方

丹砂

研

膩粉

三錢

巴豆

七粒夫皮

心膜出油

乳香

研

麝香

研

雄黃

研

砒霜

研

各半錢

各半錢

各半錢

各半錢

各半錢

各半錢

各半錢

右七味研為細末水浸炊餅心為丸如梧

桐子大每服一九發前新汲水下只壹服

差

治鬼瘧獨勝丸方右以桃人壹枚和皮尖雙

人者擘作兩片壹片內書奉勅斬鬼字壹

片內書奉勅殺鬼字却合作壹枚以線繫

定五更新汲水吞下

治鬼瘧三聖丸方

雌黃

研

雄黃

研

大黃

生為

細末

各一兩

右三味再研為細末水浸炊餅為丸如梧

桐子大每服一九發日早晨面向東北新

汲水下宜五月五日午時合

治鬼瘧經久不差阿魏雄黃丸方

阿魏

研

雄黃

研

柳枝

各

桃枝

各

取

向

東

者一七莖

每莖長壹尺判丹砂研一焙擣為細末

右五味再研為細末用三家粽子角為丸如梧桐子大別研丹砂為衣發時用淨盞摩一九塗鼻尖并人中上或未退以冷水服一九仍須五月五日午時合

治鬼瘧萬安丸方

虎頭骨酒炙三兩藜蘆六兩雄黃研鬼白 天雄

炮裂去燕黃炒皂莢酢炙去皮

石七味除雄黃外擣羅為末入研者雄黃

和勻鍊蜜如彈子大令患者頭上戴壹丸立差若除伏屍於房四角燒四粒若除疫氣於床前燒壹粒或渡江海男左女右臂上帶壹粒得渡不溺

治鬼瘧丹砂丸方

丹砂研阿魏研各半錢砒霜研壹錢豉四十九粒湯浸去皮

右四味再同研為細末滴水九分作四十九丸每服一丸如脾寒取東南枝上桃兒

柳心各七枚煎湯放冷面南吞之尋常瘡發時面北新汲水下水高水共合竹四十

治鬼瘡祓除丸方

雄黑豆小者是壹百二十粒醋研雄黃研碎

雄黃研碎

本三味除黑豆外研令極細與黑豆膏同研如梧桐子大丹砂為衣用素絹袋子盛拭於神室前有患者取二九求發時服壹丸面東新汲水下臨發時更服壹丸婦

人患即男子與藥男子患即婦人與藥仍令患者閉目服須是端午日合若緩急即入節日合亦得合藥時不得見雞犬婦人合服了藥不得食熱物壹日

治瘡母此丸其華水不忌與藥時壹日

治瘡母至妙瘡丹方

砒霜研碎寒水石研碎

右二味先用研了砒在生鐵鈔內用寒水石末圍之以瓷碗合定濕紙封於碗外燒

候烟出熏紙黃色卽止取出以紙襯於地
上出火毒須臾細研爲末入研了丹砂龍
腦麝香各半錢許和勻湯浸炊餅丸如梧
桐子大以丹砂作衣每服壹丸於未發前
早晨面北用井華水下忌喫熱物壹時辰
治瘡母丹砂丸方

丹砂

研

菘豆

去皮

砒霜

研

洛

貝

殼

大

減

入

右三味於端午日靜室內面向東南用乳
鉢先將菘豆研細次入砒霜丹砂研着

徧用稀米粥化如梧桐子大陰乾每服一
丸未發前五更時并華水面北嚥下少頃
其方可食

治瘡疾結成癥瘕如聖丸方

蘇巴豆

三粒

去殼

黑豆

四

粒

砒霜

研

半

丸

意

恐

難

辨

丸

內存三味將巴豆黑豆用米醋浸一宿去皮
膜入乳鉢內順研壹百匝入砒又逆研壹
百匝如小豆大用丹砂爲衣每服壹丸
取嫩桃葉七片水一盞煎數沸頓入盞內

用醋一二滴打勻通口令病人面向東方
 吞下如無桃葉以桃枝七寸煎湯代之此
 方足厥陰肝癰四方百回入湯又並兩立
 內經謂足厥陰肝癰在經則令人腰痛少腹
 滿小便不利如癰狀非癰也數便意恐懼氣
 不足腹中怏怏在藏則令人色蒼蒼然太息
 其狀若死者俱刺足厥陰蓋足厥陰之脉循
 陰器邪氣客之則少腹滿小便不足也肝為
 將軍之官謀慮出焉故病則恐懼不足也蒼

蒼者肝之色也宜察其經絡府藏而治之

治肝癰顏色蒼蒼顛掉氣喘積年不差鼈甲

丸方治肝癰

鼈甲去殼蜀漆葉正烏梅取肉常山剉

知母一分細辛去苗苦參麥麩

各半香鼓研石青研石末研石末研

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服十丸未發前米飲下臨發再服

治肝癰木香犀角丸方治肝癰

木香 犀角一兩 羚羊角一兩 升麻各一兩 玄

參聖者 豬苓皮去 檳榔各二兩 龜甲炙 葶藶各

二鼓五兩 右一十味 搗羅為末 鍊蜜和丸 如梧桐子

大溫酒或米飲下 三十丸 日再服 體熱

去甘草 檳榔 加大黃五兩

治肝瘧 小便不利 如瘧烏梅飲方

烏梅取肉 油梔子人 各各 知母青 芍藥木

通到 生地黃各 升麻各 芍藥木

右七味 咬咀 如麻豆 每以五錢 匕水一盞

半煎至一盞 去滓 下朴消壹錢 匕食後未

發前分溫二服

心瘧者 內經謂令大煩 心甚欲得清水 反寒

多不甚熱 刺手少陰是也 蓋心為神舍 邪不

可平 邪氣干之 故煩心 其欲清水者 以心火

內熱故也 其反寒 多不甚熱者 內熱而外寒

故也 治宜通心經 利邪熱 則愈

治心瘧常山丸方

常山別搗桃人取陳者去雙八錢

可鼓一合炒令煙盡手其和皮搗膏兩鈿丹細研

右四味搗研為末鍊蜜和再搗杵丸如

梧桐子大每服十五丸在雞鳴時空心酒亦

欲發時再服十五丸其日不得梳洗發過

方可飲食

治心瘧煩心甚欲得清水反寒多不甚熱常

山湯方水

常山到一梔子人七石膏碎研烏梅去核

枚醋浸炙去甘草炙到豉微炒蜀漆

三分

右八味麤搗節每服三錢匕水一盞入竹

葉三片剉碎煎至七分去滓未發前溫服

臨發再服

治心瘧熊膽丸方

砒霜列半丹砂研麝香研雄黃研熊膽各

兩

右五味以熊膽和前四味為丸如菉豆大
發日空心冷水下兩丸臨發時再服壹丸
皆以冷飯壓或當日便止或大作乃差如
欲吐卽以煖水下之當吐出痰涎卽差

治心瘧黃連散方

黃連須去

右壹味搗羅為散發前以酒和三指搗服

足太陰脾瘧

足太陰之經脾之脉也脾經之瘧令人不樂

好太息不嗜食多熱汗出病至則嘔嘔已
乃寒寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出故
謂足太陰瘧又名脾瘧

治脾瘧寒熱時作肌瘦食減腸泄腹痛吳茱

黃湯方

吳茱萸

湯洗焙

蒼朮

米泔浸晝

鼈甲

去殼

防風

去人參

芎藭

藿香葉

此胡

去肉豆蔻

甘草

各

半兩

右二十味搗搗篩每服三錢匕水壹盞生

薑二片煎至七分去滓未發前溫服

治脾瘧不思食厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙三兩半夏為末薑汁作餅焙乾壹兩陳橘

皮湯浸去白焙二兩

黃右三味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑

三片棗壹枚擘破煎至七分去滓空心日

午臨卧各壹服

治脾瘧木香丸方

木香 附子炮裂去皮臍大黃剉炒厚朴去麤皮薑汁炙

人參各壹兩芍藥 桂皮去麤皮京三稜 獨活

去蘆乾薑炮芎藭 羌活去蘆頭甘草炙各半兩

陳橘皮湯浸去白焙檳榔剉各二兩

右壹十五味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸未發前溫水下日三服

治脾瘧寒熱檳榔湯方

檳榔剉青橘皮湯浸去白焙前胡去蘆白朮

菝葜各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

七分未發前去滓溫服

治脾瘧無問遠近阿魏丸方

阿魏研安息香入胡桃萊菔子炒三錢蕪荑

人未壹分

右四味為細末鍊蜜丸如菘豆大每服二

十丸未發前溫水下得吐則差

治脾瘧寒熱善嘔多汗青蒿湯方

青蒿炮裂去附子皮桂皮厚朴去

甘草炙陳橘皮湯浸去半夏為末薑汁和

麻黃去根節草薹薹皮白木各藿香葉

右壹十壹味剉如麻豆每服三錢七水

盪生薑三片棗一枚擘破煎七分去滓溫

服日三不拘時

治脾瘧人參飲方

人參各甘草各陳橘皮湯浸去烏梅

五枚去核豆蔻七枚

右五味搗篩每服五錢七用濕紙裹定

熱水二盞生薑一棗大拍碎棗二枚擘破

瓷器內煎至壹盞去滓末發前溫服

治脾瘧寒多熱少有汗頭目昏暗背胛拘急

或背膈痞悶嘔逆欬嗽心腹脹痛面黃肌瘦

肢節疼痛菑胡湯方

菑胡去苗葛根剉棗肉焙甘草炙

檳榔剉常山烏梅去核草豆蔻去皮厚朴

去麤皮薑汁

右九味各四兩常山烏梅草豆蔻去皮厚朴

蒸煎至壹盞去滓末發前溫服

治脾瘧無問新久鼈甲散方

鼈甲去裙襴甘草炙常山兩烏梅各

焙壹兩湯浸陳橘皮白焙松蘿去麤皮

右七味為細散每服二錢匕末發前以酒

調下日三

治脾瘧疏黃丸方

疏黃研桂皮去麤巴豆去皮心膜乾薑炮

藍澱研分一

右五味搗羅二味為末入別研三味和勻

麵糊丸菜豆大每用壹丸懸裏未發前男
 左女右塞耳中差合時取五月五日午時
 面北先吸氣七徧却於藥上呵七徧神驗
 治脾瘧橋皮散方

陳橋皮湯浸去白焙常山 乾漆炒烟出桂皮去各
 三壯蠟燒赤分右五味為細散每服三錢匕未發前温酒
 調下三服必差
 治脾瘧半夏散方

半夏為末薑汁調阿魏研各
 右二味研勻以温酒半升未發前調勻旋
 旋服之

治脾寒瘧疾七棗散方

烏頭大者壹枚炮良久移壹處再炮凡七枚炮滿去皮臍

右為細末都作壹服用大棗七枚生薑七
 片葱白七寸水壹椀同煎至壹盞疾發前
 先食棗次温服藥只壹服差一方烏頭不
 炮用沸湯壹盞泡以物盖之候温温更泡

滿四徧去皮切焙乾依上法作壹服○吳氏集驗方治疔大川烏一隻炮右爲末作一服水壹碗北棗七箇生姜十片葱白七寸煎至壹蒸臨卧先嚼棗後去滓服

手太陰肺瘧

肺瘧者內經謂令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所見刺手太陰陽明是也蓋心肺獨居膈上其氣相通故瘧邪干肺內動於心則爲寒熱善驚之候也

治肺瘧心寒甚卽發熱熱卽驚如有所見常山秫米湯方

常山言兩 秫米壹升 甘草炙

右三味籠擣篩每服三錢匕水壹蒸煎至七分去滓未發前溫服發時再服

治肺瘧心寒熱善驚如有所見人參丸方

人參 鼈甲醋炙去 桃仁去皮尖雙 常山

甘草炙 肉蓯蓉酒浸切焙 升麻各三分 杏仁去皮

人炒去 梓去 丹砂別 阿魏研 烏梅肉

炒龍齒研各壹兩

右一十三味為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸空心米飲下未發時併兩服

治肺癆及補心氣麥門冬湯方

麥門冬去心一兩半升麻別知母炙甘草炙鼈

甲醋炙此胡去苗前胡去蘆桃人去皮烏梅肉

研枳殼去穢炒各壹兩梔子去皮蘆根剉烏梅肉

炒各人參三分

右一十三味鑪燒篩每服三錢匕水一盞

半入桃柳枝各五寸剉生薑三片煎至八分去滓入石膏末半錢匕更煎沸未發前

壹二服

治肺癆心驚常山丸方

常山搗桃人去皮尖雙鈎丹研各鼓炒

右四味為細末鍊蜜和搗千杵丸如梧桐

子大每服十五丸食前溫酒下未發時服

治肺癆杏人丸方

杏人四十枚湯浸去皮尖雙人炒黃常山三分砂別研甘

草

生剉
膏分

右四味爲細末鍊蜜丸如棗豆大每服十丸未發前米飲下日再服

治肺癆心寒熱善驚丹砂丸方

丹砂

別用阿魏醋化去沙石麝香

研各分 鈎丹

研壹兩

右四味合研細末取五月五日午時粽子尖三七枚與藥同研於北斗下露一宿丸如梧桐子大未發前熱水下一丸將一丸

以緋帛裹安耳內男左女右

治肺癆心神驚悸二丹丸方

丹砂

別用鈎丹研甘草

炙剉各半兩

當歸焙切常山

各三

右五味爲細末鍊蜜丸梧桐子大每服三

丸食前溫酒下未發時再服俟飢卽以葱

豉粥與之

治肺癆烏梅丸方藥酒常山去君鱉甲炙人參肉

烏梅肉

炒常山

鱉甲

去君人參

肉

茯苓

酒浸切焙

知母

焙去皮尖雙入炒研各半兩

右七味為細末鍊蜜丸梧桐子大每服三

十丸温酒或米飲下未發前三服

治肺瘧心虛黃連湯方

黃連

去須一兩半

當歸

切焙

乾薑

炮半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水豈煮煎至

七分去滓臨發時服

足少陰腎瘧

內經謂足少陰腎瘧在經則令人嘔吐甚多

寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已在

藏則令人洒洒然腰脊痛宛轉大便難目胸

胸然手足寒刺足太陽少陰蓋腎脉入肺中

肺脉環胃口故使人嘔陰虛則陽氣偏故熱

多若夫洒洒腰脊痛大便難目胸手足寒特

以藏氣內虛機關不利故為此證也

治腎瘧令人洒洒然腰脊痛大便難目胸手

足寒烏梅丸方

烏梅

兩半

常山

三分

鼓

炒合桃人湯浸

尖雙人炒虎頭骨酥炙附子炮裂去皮肉

藜蘆酒浸切知母切焙麝香研桂皮去麩

右壹十味搗研排勻鍊蜜和老梧桐子大

每服空腹米飲下二十九未發時服

治腎瘧藜蘆丸方

肉苳蓉酒浸切烏梅肉炒桃人湯浸去

研三分常山分三鼓分三升麻半桂去麩皮

甘草炙半

右八味搗研他勻鍊蜜丸梧桐子大每未

發日空腹温酒下二十九米飲亦得至發

時更服二十九

治腎瘧天雄丸方

天雄炮裂去皮鈆丹研三人參分

右三味搗研和勻鍊蜜丸如梧桐子大每

服五丸未發日空腹米飲下日三五服

治足少陰瘧嘔吐寒熱人參湯方

人參常山甘草生燈心五十陳

瓜劉各半兩

瓜劉各半兩

瓜劉各半兩

瓜劉各半兩

橘皮

湯浸去白焙

茶末

各一分

右末味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓入酒半盞相和未發前頓服以吐為效未吐再服

治足少陰瘧嘔吐半夏散方

半夏

湯洗去滑為末生薑汁和作餅暴乾再為末

阿魏

細研各一兩

右二味同研勻每服二錢匕温酒壹盞調下末發日頓服

治足少陰瘧嘔吐半夏散方

青蘘

湯洗去滑生薑汁製焙

乾薑

炮各半兩

綠礬

研一錢

右五味搗研和勻每服半錢匕未發日以

醋湯調下

足少陽膽瘧

足少陽瘧之狀內經謂令入身體解休寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出

其刺足少陽是也蓋膽為中正之官決斷出焉今瘧邪外中其氣不守故心常惕惕然邪

盛故熱多有風故汗出

其人少

...

治足少陽瘧身體解休見人心惕惕然熱多

汗出升麻湯方

常山壹兩升麻壹兩鼈甲醋炙去淡竹葉各

兩犀角屑貝麥門冬去心知母切各甘草壹

兩炙半兩右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一

盞半煎至一盞去滓空心日午溫服

治足少陽瘧清膽黃連丸方

黃連去須甘草炙龍膽去鉛霜研定粉

黃連壹兩甘草半兩龍膽苗鉛霜研定粉

研人中白各三馬牙消研壹

右七味搗研為細末川豬膽汁和丸如梧

桐子大每服二十九丸用枇杷葉拭去毛煎

湯下日三

治足少陽瘧身體解休或寒或熱心惕惕然

汗出犀角丸方

犀角屑壹兩常山兩蜀漆葉半豉炒壹

右四味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大

每服十九丸未發前米飲下

治足少陽瘧熱多汗出蘆根湯方

生蘆根兩剉三麥門冬焙升麻葛根各

兩梔子人石膏碎研

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一

盞半入淡竹葉二七片煎至一盞去滓溫

服早晚食前

治足少陽瘧解休熱多汗出犀角湯方

犀角鎊甘草炙麥門冬焙升麻知

母鼈甲醋炙石膏碎研

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一

盞半煎至一盞去滓未發前溫服

治足少陽瘧熱多汗出此胡湯方

此胡去苗秦艽去苗麥門冬焙蘆根淡

竹葉各一

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一

盞半煎至一盞去滓入青蒿自然汁半合

再煎沸未發前五更初溫服

足陽明胃瘧

足陽明胃瘧在經則令人先寒洒淅寒甚久
 乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然當
 刺足陽明跗上在胃則令人且病善飢而不
 能食食則支滿腹大當刺足陽明太陰橫脈
 出血蓋胃圍冲氣為水穀之海邪氣客之則
 冲氣不和故善飢不能食食則支滿腹大傳
 於經者為寒熱陽不勝於陰故喜日月光及
 火氣也

治胃瘧腹滿人參蜀椒湯方
人參半斤 蜀椒去目及閉口乾薑兩 阿魏

人參半斤 蜀椒去目及閉口 乾薑兩 阿魏一分

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎
 至七分未發前去滓溫服論云未發而服

治胃瘧飢不能食蒜薑酒方
 獨窠蒜一升 生薑一斤

右二味研碎以酒半升調去滓未發時旋
 旋服之

治胃瘧阿魏酒方

阿魏初末壹錢七半夏為末生薑汁作餅暴乾再擣取半錢七

右五味以酒一盞調末發時溫服

治胃瘧脹滿不食常由橘皮散枳殼末枳殼

常山壹兩壹分陳橘皮湯浸去白牡蠣熬桂去

皮各壹分通不黃蘇枳殼

右四味擣羅為散每服一錢匕未發前溫

酒調下至日西煮溫粥壓之當日不得以

冷水洗手面

治胃瘧心腹脹滿不食枳殼湯方枳殼

枳殼法厚朴去麩皮生薑汁炙人參白朮

白茯苓去黑皮各二兩

右五味麩擣篩每服四錢匕水一盞半入

生薑切棗大切煎至壹盞去滓溫服

治胃瘧黃連湯方黃連

黃連去須臾當歸切焙乾薑炮

右三味麩擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

半盞去滓末發時併二服

治胃瘧不食艾滿腹脹時作寒熱正氣湯方

藿香葉 陳橘皮 湯浸去白焙 厚朴 去麤皮生薑汁炙

半夏 為末生薑汁作餅暴乾 甘草 炙

右五味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑

三片煎至七分去滓未發時併兩服

治足陽明胃瘧支滿腹大順氣湯方

厚朴 去麤皮生薑汁炙 陳橘皮 湯浸去白焙 白朮 半

夏 湯洗七遍 乾薑 炮 芫胡 去苗 甘草 炙

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑

五片棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不

拘時 小 治 ... 拘時 ...

治足陽明胃瘧寒熱汗再食則支滿腹大厚

朴湯方 ...

厚朴 去麤皮生薑汁炙 白朮 湯浸去

一 甘草 炙 桂枝 去皮 芍藥 去

於右五味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑

三片煎至七分去滓未發時併兩服

神效足太陽膀胱瘧 ...

是太陽瘧之狀內經謂令人腰痛頭重寒從

背起先寒後熱焯焯嗚嗚然熱止汗出難已
 刺却中出血蓋勝脫經下抵腰中上巔絡腦
 故腰痛頭重寒從背起也經虛受邪故先寒
 後熱也熱止汗出難已以真氣不勝邪故也
 治是太陽瘧寒熱芤胡湯方

芤胡去諸常山去諸龍甲去諸知母去諸枳殼去諸桂去諸甘草去諸芍藥去諸白頭翁去諸

林蒿乾者甘草炙枳殼去桂去各各膏膏兩兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入柳
 枝心七枚葱白二寸細切同煎至七分去

滓空腹溫服發前再服

治足太陽瘧腰痛頭重寒熱互作酒煎飲方

常山去諸龍甲去諸知母去諸白頭翁去諸

三桂去諸青蒿去諸甘草去諸生三生三桃李枝頭去諸

心各葱薤白各芤胡去三分三分

右一十二味細剉如麻豆大每服五錢匕

以酒一盞半浸一宿平旦煎取一盞去滓

空腹頓服當吐痰出再煎滓服

治足太陽瘧腰痛頭重寒多熱少芤胡桂薑

湯方

芫胡

去苗八兩

桂枝

去皮二兩

黃芩

去黑心三兩

桔樓

根

四兩

牡蠣

熬甘草

乾薑

各二兩

右七味

改咀

每服五錢

匕水三盞

煎至膏

盡去滓

溫服日三

初服微煩

汗出愈

治足太陽瘧牡蠣湯方

牡蠣

熬四兩

麻黃

去根節煎掠去沫焙四兩

甘草

炙二兩

蜀

漆

三兩若無常山代之

右四味

改咀

每用五錢

匕水二盞

煎至一

蒸去滓溫服若吐勿更服

瘧病發渴

內經謂諸瘧皆得之夏傷於暑以熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也

治久瘧憎寒壯熱渴欲飲水車前草湯方

車前草

常山

升麻

鼓沙

甘草

生剉

各半

兩粳米

合

右六味羅持篩每以五錢匕水壹盞半宿
浸藥於星月下橫一小刀子在藥上候五
更煎至壹盞去滓分溫二服空腹壹服未
發前再服良久吐吐定即食漿水粥

治瘧病發渴飲水不止常山湯方

常山三石膏八白稗米二

右三味咬咀每服五錢匕以水一盞半入
竹葉十片煎取八分去滓溫服平日壹服
欲發再服正發時又壹服

治瘧經數年不差發渴者梔子湯方

梔子一分常山三分車前葉焙壹兩白粳米

右四味羅持篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服未發前壹服臨發壹服

治瘧發熱骨節痛口乾煩渴蘆根湯方

生蘆根剉三麥門冬去心升麻 葛根剉

右七味蘆根每以五錢匕水一盞半煎

右七味蘆根每以五錢匕水一盞半煎

至八分去滓食前分溫二服

治瘡病苦渴烏梅飲方

烏梅 二十枚 擘破

右一味以水三盞煎取壹盞半去烏梅和

蜜壹匙分二服細細啜之

治瘡出渴生薑飲方

生薑 大棗 甘草 微炙 草豆蔻 去木通壹

右五味咬咀如麻豆水三盞煎取壹盞半

去滓分三服溫飲之

治瘡疾發渴引飲煩躁妙應丸方

菜豆 四十粒 杵末 黑豆 三十粒 杵末 砒霜 半錢 研 丹砂

黑豆大 二粒 研 鉛丹 壹錢 研

右五味同研極勻滴水和丸作二十粒每

服一丸以東南桃心七枚取井華水研向

日吞服之醋水下亦得服後病稍重者原

微寒若小可便絕有孕婦人不可服

治瘡病發渴及寒熱攻作常山湯方

常山燒烟蜀漆盡甘草炙到各二兩淡竹葉一切

升大黃生剉三兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓溫服

必用全書

諸瘧證

常山飲治諸瘧先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日併發或間日一發頭疼惡心煩渴引飲氣喘急口苦咽乾諸藥不効見方

和劑

方人謂此方合諸山瘧之大旨寒熱皆服

八味順氣散方見諸瘧疾無痰不發故也服

此愈

拔粹方藥性論熱瘧疾大者宜用不愈服益

白芷湯治瘧身熱目痛熱多寒少脉長睡卧

不安先以大柴胡湯下之微利為度如下過

餘邪未盡當服此以盡其邪

白芷兩知母壹兩石膏四兩大柴胡湯

右為末煎○玉機微議右粗末每服半兩

水一觥半煎至一盞溫服清迎發而服之

桂枝石膏湯治瘧玉機微義治瘧無他證隔日發先寒後熱

熱多寒少當知此以証其邪

桂枝五錢石膏四兩知母各壹兩黃芩壹兩炙甘草五錢

右為末分三服水煎南北經驗方

桂枝芍藥湯治瘧寒熱大作汗出不愈知為

熱也此陽盛陰虛當實內治外恐久而傳入

陰經也○玉機微義治瘧寒熱大作不論先

後此太陽陽明合病也謂之大爭寒熱作則

必戰經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰

汗出不愈知內熱也陽盛陰虛之證當內實

外虛不治恐久而傳陰經也此湯主之

桂枝三錢黃耆壹兩知母壹兩石膏四兩芍藥各壹兩

右為末水煎○微義右粗末每服五錢加

薑壹兩水煎此方在玉機微義卷二

雄黃散治久瘧不能食胃中鬱鬱欲吐而不

能吐者宜此吐之

雄黃壹兩芫花壹兩赤小豆壹兩水調下以吐為效

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

南北經驗方神珍方衛生易簡方同

麻黃黃芩湯治太陽證夜發晝差於出而不

麻黃法節黃芩心去炙甘草各半桂二錢

右咳嗽每服一兩水三匙煎服取正餘味

治瘡疾處暑前發頭痛項強脈浮惡寒有汗

桂枝羌活湯八面神醫方

桂枝羌活防風甘草各半

右為麤末服半兩外煎如吐者加半夏

麴等分南北經方同○玉機微義右為粗末每

服半兩水一錢半煎至一盞溫服清迎發

而服之如吐加半夏曲

治瘧病頭痛項強脈浮惡風無汗者麻黃羌

活湯

麻黃法節羌活防風甘草各半

右為麤末水煎玉機微義每服半兩水一盞溫服清迎

發而如吐者加半夏麴等分南北經驗方同

治發瘧如前證而夜發者麻黃桂枝湯

麻黃壹兩 去節 炙甘草三錢 黃芩五錢 桂枝二錢 桃仁十三

不去皮尖

右為末水煎桃仁散血緩肝夜發乃陰經

有邪南北經驗方同 此湯散血中風寒也

治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三

陽合病也宜桂枝黃芩湯和之

甘草二錢 黃芩五錢 人參各四錢 半夏四錢 柴胡一兩

二石膏各五錢 知母各五錢 桂枝二錢

右為麤末水煎從卯至午時發者宜大柴

胡湯下之從午至酉發者知其邪氣在內

也宜大承氣湯下之從酉至子時發者或

至寅時者知其邪氣在血也宜桃仁承氣

湯下之微利後更以小柴胡湯制其邪氣

可也

常山散吐瘧

常山二兩 水煎 甘草壹兩 水煎

水煎服空心

三和湯以四物湯涼膈散當歸各中停水煎

服法... 常山

軀瘡丹

常山 宿嘔乾不見火 檳榔 四

常石同為末酒糊丸桐子大於發日當夜五

更冷酒下五十九至早晨空心又冷酒下

五十九忌食熱物一日更思生給硬物葷

腥濕麵等數十日如夜發者却於當拜早

辰午後二次依前服之

王氏集驗方

治瘡神聖丹 砒霜 錢半 黑豆麪 錢壹 為末滴水丸

如小豆大堆黃為衣未發時空心面東新

冰下一丸

又方治瘡歌曰 冰濕藥忌食熱物 瘡發再

四兩注薑末和皮搗汁 夜露一宿

神效鬼泣 常山

又方草果一烏梅 常山 青皮 檳榔

甘草 常山 南星

右六味酒水各半煎去滓夜露一宿至五

更初温冷任意服煎生藥對露一宿至正

又方白芷 常山 南星 各半兩○經驗秘方各二錢

又右以酒一升煎至一斗去滓夜露一宿五

更初爰熱服吐下疾涎愈冷服亦得○秘

方右為細末好酒浸兩箇時辰比及將發

又之時漸漸時辰服藥忌食熱物留滓再治

壹患人此

治諸瘧青蒿散方見婦人門婦人發熱空亦而東港

醫方大成世錄黑石邊此方

瘧

和利方五苓散治寒熱未分頭疼發熱煩渴

引飲小便赤澀南北經驗方袖珍方永類鈔方同方見諸暑門

和劑方人參養胃湯治瘧疾寒多熱少者必

須先用此藥發散然後用四戰飲之類截

之因食倍加草菓醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同方

見傷寒門

和劑方小柴胡湯治瘧疾熱多寒少或單熱

頭痛胃滿咽乾南北經驗方袖珍方永類鈔方同方見傷寒門

活人方柴胡加桂湯治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡八兩 人參 甘草 半夏炮七次 黃芩

肉桂去皮各二兩

右咬咀每服五錢水盪半姜七片棗二介

煎服若渴者去半夏加人參瓜蒌根同煎

服之南北經驗方

和劑方參蘇飲治發瘧熱多寒少兼咳嗽者

南北經驗方袖珍方永類鈔方同方見傷寒門

和劑方黃連香薷散治伏暑發瘧煩渴者南北

經驗方袖珍方永類鈔方同方見諸暑門

治瘧方右用狗蠅壹隻去翅足以蠟圓之作

壹丸當發日冷酒吞下南北經驗方袖珍方永類鈔方同

和劑方對金飲子治寒熱瘧疾愈後調理脾

胃

厚朴去皮薑汁炙 蒼朮泔浸去皮 甘草炙各二兩 陳皮去白

炒赤黃色半斤○南北經驗方袖珍方永類鈔方同

右咬咀每服四錢水壹盞姜三片棗壹介

煎服一方加草菓倍用蒼朮名草菓平胃

散

南北經驗方

瘧

徐同知方正氣散退寒瘧止胃寒進飲食

藿香

四兩

草菓

四兩

半夏

四兩

縮砂

各二兩

甘草

右為劉散生姜棗干煎溫服瘧疾俟

後發日早服

袖珍方

瘧

柴胡括蕁根湯治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡

壹兩

花粉

壹兩

黃芩

三錢

錢

右咬咀每服壹兩姜五片棗二枚煎至壹

盞去渣通口服

瘧疾藥

常山

壹兩

甘草

錢

向東桃心

各七

右以水二盞酒半盞煎至七分去渣未發
前半日服

治瘧疾諸藥不効

常山 茯苓 甘草

右等分大人八錢弱人六錢用好酒一中

浸一宿露當發日早盪温服

脾寒藥右用黃丹不以多少火上炒紫色爲

度用煨蒜和勻日午爲丸彈子大每服七

八九當日發用長流水早面東服合藥時

不令陰人雞犬見

斬鬼散

人言壹兩麵四兩水和作棋子用香油二茶

末三兩白扁豆末壹兩半

右每兩分四帖明日發今晚朝北斗男

左手女右手放藥於心乾捨忌熱物

瘧丹

大南星二枚好信三錢

右先將南星開孔用信三錢研末裝入孔

內兩星相對用泥固濟炭火煨存性取出
 研為細末用菜豆粉打糊為丸如豆大每
 服二十九前半日温茶清下白麵湯亦可
 又方烏頭一百粒米醋信壹錢
 右以端午日研勻丸如紫豆大朱砂為衣
 忌雞犬婦人見未發前半日新汲水下

又方苦丁香三錢為細末細芽茶唐兩為末愈陳愈好細飛
 羅麵五錢同前二味拌勻用井花水搜和
 當三錢炒至紫黑色為度紙攤地上出火毒

右為末再用白扁豆壹兩半炒為末挂勻
 每服半錢量虛實加至壹錢臨發日五更
 病人朝東坐男左女右手掌內擊乾嘔吃
 隔夜先備冷茶送下至天明為吐頭重身
 疼覺身子難過勿慮切忌熱物如得止可
 服冷茶清午前吐盡黃水可用温粥補之
 不二散

人言一兩飛麩四兩與人言用水和白扁
 豆末二兩細茶末二兩

右同和勻每服小半錢已前半日用溫茶調下再用木盪下忌酒麪魚等

豕類鈴方

活人柴胡桂姜湯治瘧疾寒多微熱或但寒

不熱并治勞瘧

柴胡加桂湯治瘧疾先寒後熱兼治支結

白虎加桂湯治瘧疾但熱不寒者已上三方

和劑芎芷香蘇散打和黃連香薷散名

散香蘇散打和五苓散名蘇苓散

經驗秘方

瘧瘧

治瘧用青蒿薄荷桂等分為末中夜清早臨卧

各壹服熱酒下

治瘧疾端午無根水和寒食麪裹狗蠅丸壹

丸朱砂或黃丹為衣絛子包塞耳男左女

右大効

治瘧疾石龍芮此草藥隨處有之取子一個搗碎用小蚌蛤兒盛蓋在手

寸口男左女右藥調與齊之類

祛癆丹治煙瘴寒瘧等病大有神效

方米杯短山氏然永綿下寸寒且畏式文

六參 檳榔 各一 茯苓 去 半夏 湯泡 草菓

各半 常山 三兩 酒 良姜 川芎 香白芷

各七錢 節 汁 公 瓜 末 中 豉 豉 早 調 相

右為細末麴糊為丸如桐子大每服五十

粒酒送下如不飲酒者皂角子二七枚

搥碎熬湯放令溫送下勝如酒下白日發

晚夕壹服半夜壹服平明壹服夜發早一

服午時壹服晚夕壹服計壹百五十九忌

葷腥五七日切忌雞肉濕麪一月方可食

服藥之後一日不許食辛粹之物濕熱魚

肉

又一方乾薑半匙上好末茶壹匙好酒調覺

舉發時服服畢右邊卧脾睡若寒多用茶

壹半少熱多用乾姜壹半少

春用取涎大南星壹个中心剉壹梳子如小

栗子大用好醋滴於梳子滿於炭火上焙
 令醋乾如此者三切碎慢火上再焙令極
 乾藜蘆根二錢半同為細末酒糊和丸如
 梧子大每服三丸空心溫酒送下如一梳
 飯間不止再服三丸漸漸服之以叶為度
 如此涎盡乾嘔不已煎葱白湯放冷服
 一盞吐即止
 常山飲子治瘧疾神效不可具述
 常山 嵩菓子 烏梅 雞心檳榔 一

陳皮 青皮 揀甘草 各四錢
 右為粗末作二服酒水各半梳同煎三沸
 服

治寒熱一二年不愈者

青皮 去穢 陳皮 去穢 烏梅 去核 草菓 去殼 半夏 去皮
 厚朴 姜製 良姜 紙裹 甘草 鹽水 縮砂 去殼
 右咬咀每服三錢水一梳生姜五片棗一
 枚葱白三寸煎至八分去滓於將發先
 時寒熱服熱溫服滓再煎服之 簡奇方同

神效截瘡金不換湯

檀榔半二兩陳皮半一兩青皮不法法白芷去厚

朴制草菓別甘菓水烏梅帶核各常山四

右吹咀每服五錢水壹大盞酒半盞姜五

片棗七枚藥酒水姜棗自早晨煎至晚煎

出至六分露壹宿瘡發作五更初空心服瘡

繼後忌生冷

治丹熱用木耳約壹兩水壹椀半煎至壹椀

放冷候渴甚時煮餉飲之即效

又方白已小便服一三三遍即可以下式時和

治瘡撒好德捻管果治人痊右用馬鞭草根

不以多少洗淨水壹茶盞半煎至七分臨

熟著酒半盞滾數沸連滓露一宿次日未

發時溫服

經驗良方

瘡証

治瘡神惠方

青蒿用葉端午香蒿各等

右爲細末如先寒用熱酒服先熱用冷酒
服遇發日五更早服宜至誠齋戒忌鷄魚
麵生冷物

神聖丹治瘡久不愈大人小兒皆可服右大
蒜壹箇用筋頭扎一孔入去殼巴豆一粒
蒜大者入豆二粒濕紙裏煨令熟去豆不
用將蒜去外一重皮爛研再入大蒜五箇
入辰砂壹錢宿蒸餅丸如梧桐子大常發
日空心井花水下壹丸十歲以下丸如麻

子大忌三日生冷油膩仍戒熱湯物一時
合藥須用端午日忌猫犬孝子婦人見

瘡疾俗云無痰不成瘡殆不然素問論瘡以
爲夏傷於暑及遇水寒或傷暑冒風所致往
往病積于肝肝木內鬱達之而愈以經旨而
治瘡萬不失一奚必拘於鬼神與夫砭烙毒
藥而後愈也速放方法如後至誠服之無不

驗

白虎加桂湯 柴胡桂姜湯

方並見

前件二方若先寒後熱者於未發之日先

服柴胡桂姜湯二服却繼以白虎加桂湯

二服然後夜間服截藥以達肝鬱之陰

截藥方方與和劑方勝金圓同

又治久瘧水山竹葉之類或以神香而

半夏湯泡七次陳皮舊者各半兩白茯苓三錢甘草一錢

半旋覆花兩半

右為粗末每服四錢水壹盞半姜七片煎

七分去滓細細啜服不拘時一日四服樟

柱鎮曾有病者四十歲餘患瘧三年實金

傅院主只以此藥治之服六月瘧自安矣

如是虛弱泄瀉之人間服菓附湯壹二服

又方菓去皮膜七筒肥菓各五烏梅各五甘草三

大半夏湯泡青皮各四筒生薑四塊如指大

右為粗末用水壹大碗入瓦瓶中濕紙密

封煎至半碗發日天明服木白芥

參朮氣散治男子婦人虛弱及瘧安後

體虛如虛眼昏暗加淨枸杞子揀菊花藥各

半兩常服順氣快脾進美飲食

附子壹箇炮人參法蘆不木香不見藿香火

葉縮砂仁檳榔白木白茯苓

益智仁末草菓仁煨去丁香各半陳皮

白粉草炙香附子炒肉桂不見烏藥炒

根殼麩炒青皮法黃耆開水厚朴製

各量沉香不見火各川芎菜薑二

若細末羅過每二錢水壹大盞姜五片衆

一枚煎空心服四十粒煎熟二半有金

奪命丹治寒熱因發水壹盞薑半匙

常山壹兩細切前胡半兩同炒

右酒糊丸梧桐子大每服三牛丸溫酒下

日三服

鬼哭散治癩瘡但熱不寒用黃丹煨過臨發

蜜湯調下稍大能飲酒用酒調下黑豆麴

露星飲治大人小兒久瘡成勞

紫胡亦半夏亦真菝法精草大秦艸為衣

白朮出於茶三檳榔煎山薑實糖各等

右吹咀每服三錢酒醋各半盞煎露星月
壹宿次日早取再溫去滓服

瀰匪端效方入小良大熱效

瀉瘰癧下前大迫消腫服

加減柴胡湯治瘡寒熱休作有時臨睡加減

朱陸三洲方

柴胡兩黃芩七甘草如大參半夏真切

各三分

右吹咀每服四錢水壹盞半生薑六片棗

煎壹枚同煎至七分去滓溫服未發前日進
其服發即止之好日尤宜服之先寒加桂

枝三分木香半海木隔干枝打艾葉

辰砂丹治大人小兒諸種瘧病須端午日或

辰於淨室焚香戒沐靜身脩心合大名楊

明雄黃半明礞五錢同研極細菜豆粉一黑豆麵

一朱砂二錢留壹

看為細末滴水為丸如大豆大朱砂為衣

每服壹丸未發前好日夜面北斗新水下

忌熱食一時辰小兒黃米大忌葷酒菓硬
物凡治瘡病但熱不寒者勿服先河以
白虎加桂湯三服而愈

溫脾散

南昌郭

此

此

菘豆餅

一

黑豆酸

紫何車

明

信

菘豆粉

各

壹

甘草七錢

朱砂

三錢

良薑

良臘茶

各

壹

送

若為細末每服半錢新水調下好日夜服

凡治瘡疾瀉痢並作合潮者非時邪疫之氣
流運之所變致也內經云春傷於風夏生飧

泄臭傷於暑秋必病瘡須傷寒溫瘧流變法
中加減四逆湯主之

升藥

甘草

枳實

楚炒黃

小便

與瀉加茯苓劑後重加薤白十寸

右以咀角服五錢水二盞粟米壹拾同煎
至一盞去滓服協熱利不止法以方中
葛根黃芩黃連湯若同雜病治痢之方熱
藥治之反致沃洩傷人甚衆
禁瘡病久不瘥右用淨筆視水墨焚香度筆

禁書南無勇力戰鬪佛急急如律令奉勅攝
半瓦字於油餅麵餅上令信者病人喫或
用淨紙壹張書十五字上用左搓麻線結
七箇瓶胎繫紙帶男左女右臂上病愈神
佛前香火止焚之無弃於地米穀同煎

吳武集驗方附錄

伏鐵飲治瘴瘧

常山壹兩生鐵二兩

若用酒三碗煎取壹碗去鐵用常山又以

一付草二寸棗子比藥研煎取壹盞去滓放
送夜來日早晨面向北喫

神效名勇深又壹瓶火燒米入瓶內

交加飲乎治久瘧不若山嵐瘴氣壹瓶

肉厚薏七個厚朴二寸

甘草二寸半生

六藝二塊如棗紙裏

愈石為末每服分一半水一椀銀石器內煎

至一大盞去滓溫服發日空心未愈則再

服一八點去酒點則發日空亦未宜服可

愈救仙方此酒衣一半木一淋癩百器內有

治癰 數中全中

奸常 此 兵郎 錢 廿草 二十 廿半 一 廿五 小

為細末用雞子清圓如梧桐子 每服三

交十寒溫酒或醋湯吞下未發寒夜壹服發

嗽相五更初又壹服必效若久病則多服取

效 引來日早氣而向北

一方常山切康子用雞子清攪勻飯上蒸三

次去雞子清以常山晒于為末搗飯為丸

藥臨卧清早酒吞下二十九不吐不瀉即愈

又方青蒿 薄桂 衛生易簡

仲二味各為末寒多 桂少 蒿 易簡方熱多

互 七 湯 用老生姜二兩仲連皮搗汁和熱酒

正調服以衣被蓋卧即愈

不問久年近日神效

知母 其母 人常和 其 換柳 其 幾 其 不 其

等分到碎酒冰各壹盞煎至壹中安淨用

蘇蓋定露一宿五更乘冷面東方服之不
問寒熱瘧久年不瘥并服見效但不可
不令婦人煎日服效

玉機微義治瘧益神助愈

解表之劑也二劑發其熱其味酸

仲景白虎加桂枝湯方見金匱治瘧疾

又按此太陽陽明經藥也

柴胡桂姜湯方見金匱二十步不效助愈

按此少陽太陽經藥也干瀉宋醫類書

機要桂枝羌活湯方並見麻黃羌活湯按粹方

按已上三方太陽經藥也

白芷湯方見按治瘧疾

按此陽明經藥也

桂枝芍藥湯方見按治瘧疾

按此太陽陽明經藥也

桂枝黃芩湯如眼前藥轉大者知三陽合病
也宜此和之

柴胡壹兩黃芩壹兩人參各四錢甘草各半半夏各半

四石膏各五錢知母各五錢桂枝二錢
石為粗末每服五錢加至一兩水煎服之
前服此藥已如外邪已罷內邪未已再服
下藥從卯至午發者宜大柴胡下之從午
至酉發者知其邪氣在內也宜大承氣下
之從酉至子發者或至寅發者知其邪氣
在血也宜桃仁承氣下之微利後更以小
柴胡徹其邪氣可也
按此太陽陽明少陽經藥也以上諸方並

係發風寒暑熱之氣自外而入中於三陽
之經者也

桂枝石膏湯治瘧無他證隔日發先寒後熱
寒少熱多方見按

按此太陽陽明經藥也治隔日發則邪氣
所舍深者也

麻黃黃芩湯治瘧發如前證而夜發者

麻黃一兩甘草錢三桃仁二十箇黃芩錢五
桂二錢

右為細末依前服桃仁味苦甘辛肝者血
之海血驟則肝氣燥經所謂肝苦急急食
甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠
而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血
中風寒之劑
按此治風暑深入陰分而夜發乃血受病
邪氣所舍尤深者也麻黃桂枝桃仁等乃
太陽經血藥也非三陰經藥也
溫熱燥脾之劑

寶鑑交解欽子方見三局方常山飲本方見易

簡七寶飲方見簡

人參養胃湯治外感風寒內傷生冷四時溫

疫或飲食傷脾發為痰瘧方見局方平胃散

草藜藿香生 姜烏梅煎方見局方

按此平胃散加減法也出太陰厚朴例以
上諸方悉是溫脾燥烈之藥蓋認此疾為
脾寒故也然人用之亦或有效遂指為治
瘧之良方殊不知偶值病者陰陽相并脾

氣鬱結暫得溫散則氣易行濁液凝痰中
脘閉塞因得燥熱亦以暫開所以氣通而
疾止內經所謂勇者氣行則已是也此古
人爲病氣淺而厚質者設也若中氣虛弱
之人內有鬱火之證復用燥熱愈切愈虛
此將誰執
嚴氏清脾湯方見
按此小柴胡湯加減也治口苦咽乾大小
赤澀則是內熱之證用柴胡黃芩茶所以瀉

少陽之熱乃前方溫脾之一變也方名清
脾其義可知然後以草菓等藥寒熱兼用
則是未能免俗也
三因四獸飲方見
按此四君子加減也出太陰藥例
七棗湯方見三
按陳無擇謂七情感動鬱氣成癥故此二
方以治五藏氣虛結聚涎飲等證未審孰
爲補虛孰爲散結鬱孰爲導痰學者宜自

詳之

消瘧之劑

仲景鼈甲煎丸治瘧不差結為癥瘕名曰瘧

母方見金匱方

嚴氏鼈甲飲子方見本方

按瘧瘧多成癥於左脇之下名曰瘧母乃

肝之積也瘧屬少陽病少陽東方之氣故

同歸於肝又况久瘧病在血分血亦瀰附

所主也當以鼈甲君佐使之藥隨證虛實

用之不必泥此也

消食之劑

三因紅丸子方見本方

按此出厥陰南星半夏例消積滯通鬱氣

之溫藥也食瘧既因飲食而得亦常隨其

所傷而治之

吐瘧之劑

子和常山散吐瘧

常山二兩水煮晒乾

右水煎空心服

機要黎盧散

雄黃散

方並見吐劑

按瘧因外感病屬上焦又胸膈多結聚痰涎故用吐法以取效然常山砒霜之類發吐取涎縱使獲安脾胃不能不損能用無毒之藥以取效者為佳

三因截瘧諸丹

寶鑑溫脾散

一剪金

辰砂丹

方並見宜本方

明辟邪丹

方見本方

三因紅散子

方見本方

按瘧丹多用砒霜大毒之藥本草主諸瘧風痰在膈高可作吐藥蓋以其性之至燥大能燥痰也黃丹本草能主驚癇癩疾除熱下氣亦是勝痰去積之藥大抵瘧丹雖有燥痰之功大蕩胃氣脾胃虛者切宜戒之

謹按治瘧之方風暑外傷者解表之藥機要詳矣痰瘧之治宜從丹溪所論陳無擇

論濕瘡有米附湯此亦詳載又機要亦有
三陰經之論而治法用藥雖有疥瘡入血
之一方然亦失於詳悉嚴氏謂瘡生於痰
三因疫瘡食瘡瘡癰七情感動等瘡而諸
方未有可取况亦多所缺略竊觀其意蓋
以脾濕燥熱之方有以兼治諸瘡故不詳
述此缺略之所由也學者知其名識其意
苟能思之則可得而施治矣又何必待其
詳也哉

運化玄樞 治用融丸墨黃批善公醫和堂
五月初五日取百草頭細剉晒乾用紙裏之
收要用取一撮以絳帛盛藥令病人面北
繫裏賺下男左女右治一切瘡疾極驗
其日宜合瘡疾鬼哭丹先以好砒霜半兩細
研放鐵銚內以寒水石一兩為末圍定然
後用碗蓋濕紙封碗縫炭火熬烟出熏紙
黃色為度取出以紙攤放地上出火毒良
久細研為末入龍腦麝香各少許研勻後

以蒸餅水泡為泥如梧桐子大朱砂為末
每服壹丸臨發日早晨於所祀天真洞香
烟出度過面北方并花冰吞下忌食熱物
魚翅及生果廿數日方瘥此藥合時忌婦
其人猶宛難決孝服人竟如女人有疾可吟
男子粘入口內服之立效此藥合時忌婦
壽域神方凡一藥以特種藥合時人而此
治一切瘧疾用鍋底墨黃丹等分細研為末

每服三錢匕於發日空心米飲調下不過
兩服即愈此藥合時忌婦
夫瘧疾連年不愈者可用呪果法謂桃杏棗
梨栗是也此藥合時忌婦
呪曰 吾從東南來 路逢一池水 水
裏一條龍 九頭十八尾 問伊食甚
的 只喫瘧疾鬼
右念一遍吹在果上念七遍吹七次在上
令病人於五更雞犬不聞時面東而立食

訖於淨室中安卧息食瓜果葷肉熱物此
法十治八九隨處可以救人_{凡十六}治
治蠻方一切瘴瘧不問寒熱用老生薑取自
然津四兩未發前煮口露一夜臨發日五
更服若胃熱不宜服
治蠻方瘴瘧內虛發熱或寒熱往來痰逆嘔
吐頭疼身痛或汗多煩躁引飲無度或大
便自利小便黃赤兼主卒暴中風用附子
膏今去皮膚每服五錢生薑十四片煎服
生用針碎

衛生易簡方

治諸瘧

治瘧丹獨蒜十二箇煨熟桃仁壹百箇去皮
尖雙仁同搗爛入黃丹丸如雞頭大每服
三丸當發日清晨以溫酒一盞面北或面
東吞下

又方用常山二錢烏梅四箇研爛酒調服
又方用革年全日曆端午日午時燒灰糊丸
如桐子大當發日早以無根水送下一丸

又方用青蒿末常山人參等分爲末每服二錢未發前一日以好酒一大鍾調勻分作又三分黃昏半夜天明冷飲一分

治久瘧用端午日艾灸兩拳尖
梅肉各四錢甘草炙二錢共爲粗末酒水各一鍾隔夜煎去滓露一宿次早溫熱服之微吐卽効

治久瘧用驢脂和烏梅爲圓未發時服三十圓治五般瘧疾用夜明砂爲末每服時錢冷茶清調下無時大効

金匱鈎玄 蘇合香丸 瓜蒂散 辟瘟丹 辟瘟散
瘧疾有風 暑有暑 一有食 日老瘧 瘧母 瘧痰 瘧一老瘧病此係風暑入陰在藏用血藥
川芎 紅花 當歸 蒼朮 白芷 白朮 黃柏 甘草 水煎露一宿早服之

無汗要有汗散邪爲主帶補
有汗要無汗正氣爲主帶散

有瘡母者用丸藥消導帶瘡

醋煮鱉甲爲君益王稜龍蓬朮 香付

隨証加減 甘草 水煎服一劑早服之

三日一發者受病半年 間日者受病半年
一日一發者受病一月 日連三日發者一月
者氣血俱受病 暑一日間日者補藥帶表藥
後以瘡丹截之在陰分者用藥徹起陽分方
可用截藥方

常山 草果 知母 檳榔 烏梅 蘇木

山甲 炒 甘草 炙

用水豈大碗煎至半碗露一宿臨發時前
二時溫服之如欲吐則順之

大法暑風必當發汗夏月多在風涼處歇遂
閉汗而不泄因食者必從飲食上治

瘡而虛者須先用參朮一二貼托住其氣不
使下陷後用他藥治內傷挾外邪者同法
內必主痰必以汗解二陳湯加常山柴胡
黃芩

瘧而甚者發寒熱頭痛如破渴而飲水自汗
 可與五苓散以香豉二劑湯飲常由柴胡
 人參白朮黃芪白朮內黃苓黃連同梔
 子溫川芎蒼朮木半夏等治其尿不
 久病瘧二陳湯加川芎蒼朮土柴胡葛
 根白朮補一參二以風寒濕滯
 御醫撮要增補

恒山丸理溫瘧痰壅發歇寒熱不定氣血

恒山二劑香豉二合炮乾

右件為末以粟米飯和丸梧桐子大每服
 二水丸溫酒下不計時候

備預百要方劉太 醫藏傳劉太

瘧病方單煮柴胡根臨發欲差時服

又恒山苗切一升以水五升煎至三升分三

服

溫瘧方藜香子搗取汁長服

又接骨木葉汁服乃吐差大人七葉小兒三

葉

又鼓汁煎荆芥服之

又薄荷葉研和米作粥服大人小兒各服三

匙諸瘡鍼灸

千金方

肝瘡刺足厥陰見血木心瘡刺手少陰火脾

肺瘡刺足太陰肺瘡刺手太陰陽明腎

瘡刺足少陰太陽胃瘡刺足太陰陽明

橫脉出血

凡灸瘡者必先問其病之所發者先灸之

從頭項發者於未發前預灸大椎尖頭漸

灸過時止從腰脊發者灸腎輸百壯從手

臂發者灸三間以足踏地以線圍足一匝

中折從大椎向百會灸聖惠方用線圍足一匝從大椎向下

線頭三七壯炷如小豆

一切瘡無問遠近正仰臥以線量兩乳間中

屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右又

灸風池三壯

五臟一切諸瘡灸尺澤七壯

諸瘡血脈不見者刺去指間出血血去必已

先視身之赤如小豆者盡取之 瘡刺足

少陰血出愈灸與頤平其長衣之 又

一曰瘡無問數或五時或以絲量兩其間中

醫方類聚卷之卅九十五

中神益人神向百會灸

一頭灸太神百會

醫發落灸之問以玉龍眼以絲量至一

灸發落灸之問以玉龍眼以絲量至一

第取與發落灸未發前所灸六節灸其漸