

詳校官助教 李巖  
臣 紀昀 覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十八

時氣門

總論

明 周王 朱橚 撰

易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方性命之功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災虫蝗怪異四時八節種種施化不同七十二候日月運行各別終

其度方得成年是謂歲功畢矣天地尚且如此在人安可無事故人生天地之間命有通塞時有否泰吉凶悔吝若樂安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行瘟疫病者即天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之而能以道御之其次有賢人善於攝生能知撙節與時推移亦得保全天地有斯瘴

癘還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解治皆曰滿日自瘥以此致枉者天下太半凡始覺不佳即須救療迄至於病愈湯食競進折其毒勢自然而瘥必不可令病氣自然恣意攻人拱手待斃斯為誤矣夫天時氣病者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫者此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少率多相似者此則時行之氣

也從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而人有壯熱為病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也一名時行傷寒此時節候有寒傷於人非觸冒之過也若三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶小輕也五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦小微也其病與溫及暑病相似但治有殊耳 問一歲之中長幼病狀

多相似此名溫疫也四時皆有不正之氣春夏亦有寒清時秋冬或有暄暑時人感疫癘之氣故一歲之中病無長少率相似者此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火丸敗毒散冬氣溫春氣寒夏氣冷秋氣熱為時氣與傷寒同而治有異者蓋因四時不正之氣而變更不拘以月數淺深吐下隨證施行若春應暖而清氣折之則毒邪在肝三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕升麻散解肌湯主之

夏應暑而寒氣折之則毒邪在心五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微調中湯射干湯半夏桂枝甘草湯可選用也秋應涼而反大熱抑之則毒邪在肺溫熱相薄民多病瘴黃也宜白虎加蒼朮湯煎茵陳汁調五苓散冬應寒而反大溫折之則毒邪在腎其冬有非節之暖者名為冬瘟此屬春時陽氣發於冬時則伏寒變為瘟病宜葳蕤湯仲景云冬溫之毒與傷寒大異蓋傷寒者傷寒氣而

作冬溫者感溫氣而作寒疫者暴寒折人非觸冒之過其治法不同所施寒熱溫涼之劑亦異不可拘以日數發汗吐下隨證施行要之治熱涼以寒溫而行之治溫以清冷而行之治清寒以熱涼而行之治清以溫熱而行之以平為期不可以過此為大法然得時行病一日在皮毛當摩膏火灸愈不解者二日在膚可法鍼服解肌散汗出愈不解三日復發汗若大汗則愈不解者止勿復發也四日在胃服藜蘆丸微吐之愈若病固服

藜蘆丸不吐者服赤小豆瓜蒂散吐之即愈視病者尚未了了復一法鍼之當解不愈者六日熱已入胃乃與利湯下之愈百無不如意但當諦視節度與病耳若食不消病亦與時行病俱發熱頭痛食病當速下之時行病當待六七日下之時行病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五日入胃乃可下也熱在胃外而下之則熱乘虛便入胃然病要當復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此為病三死一生此輩皆多不愈

胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤出者五死一生黑斑出者十死一生但論人有強弱病有難易功效相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸水和服之當以新汲冷水令強飲一升若一升半可至二升益佳以指刺喉中吐之隨手愈不即吐者此輩病多不善勿強與水水停即結心下也更當以餘藥吐之皆

令相主當者不爾必危若此病不急以猪苓散吐解之者其死殆速亦可先以去毒物及法針之尤佳 又云此病方家呼為傷寒有二種有陰有陽陰傷寒者反於陽是也陽傷寒狀表裏相應心熱則口乾苦肝熱則放赤暈脾熱則谷道稍澁腎熱則耳熱赤肺熱則鼻乾渴胃熱則嘔逆大腸熱則大便例澁小腸熱則小便赤少皮膚熱則脉洪數身體熱反此者乃陰傷寒夫傷寒者則為寒所傷也寒主陰陰主殺凡人陰陽調則無病氣

既為寒所傷便致斯病也 又云陰陽傷寒者則毒氣傷陰陽氣也人身中有陰陽之氣陰陽者則寒熱也本以陰為毒所傷則不能流行陽熱獨至故天行多熱者也以病於諸病之中最難為療陰陽二病陰尤可憂耳時聞有此病而倉卒死者不少或由診候不能精審方藥未達指歸飲食乖宜寒溫失節故致爾自心不全甄別他醫難得精妙與其療也寧可任之但能滋味適寒溫將理中間冷暖守過七日此最為得計其中事負服

藥不可徒然者唯多日大便不通暫頁一轉洩耳又時氣病一日太陽受病太陽為三陽之首主於頭項故得病一日頭項腰痛 又時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脉絡鼻入目故病二日內熱鼻乾不得眠夫諸陽為表表始受病皮膚之間故可摩膏火灸發汗而愈 又時氣病三日少陽受病少陽脉循於脅上於頸耳故得三日胃脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於臟故可汗之而愈 又時氣四日太陰受病太陰

為三陰之首是知三日已後諸陽受病訖即傳之於陰而太陰受病焉其脉主於咽嗑故得病四日腹滿而溢乾其病在胃腸故可吐而愈也 又云夫得病四日毒在胃腸故宜取吐有得病二三日便止煩滿此為毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上焦者其人有痰實故也所以復宜取吐也 又時氣五日少陰受病少陰脉貫腎絡肺係於舌本故得病五日口熱舌乾渴而引飲其病在腹故可下而愈 又時氣病六日厥陰受病

厥陰脉循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此為三陽三陰俱受病毒氣入於腸胃故可下而愈又時氣病七日法當小愈所以然者陽陰諸經傳病竟故也今病不除者欲為再經病再經病者謂陰陽諸經重受病也又時氣病八九日以上不解者或是陰陽諸經重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未即相傳至於停滯累日病證不改者故皆當察其證而治之凡病傷寒而成瘟病者先

夏至日者為病瘟後夏至日者為病暑故曰冬三月早臥起必待日光使志若伏若慝若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪又因於寒欲如運樞故冬傷於寒春必病瘟也又有冬時傷非節之暖名為冬溫之毒與傷寒大異也有病瘟者乃天行之病耳其冬月溫暖之時人感乖候之氣未即發病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛也經曰虛邪賊風避之有時恬淡虛無真氣從之精神內



守病安從來故曰人清淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害又云四時陰陽者萬物之根本也是以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根也從陰陽則生逆之則死故曰精者身之本藏於精者春不病瘟也有病瘟汗出輒復熱而脈燥病不為汗衰狂言不能食病名為何曰病名陰陽交交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣

也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精氣竭而病留者其壽可立而傾也汗出而脈尚躁勝者死今脈不與汗相應此不勝其病也其死明也狂言者是失志也失志者死今見三死不見一生雖愈必死凡膚熱其脈盛躁者病瘟也其脈盛而滑者汗且出也凡瘟病人三二日身軀熱脈疾頭痛食飲如故脈直疾八日死四五日頭痛脈疾喜吐脈來細十二日死此病不療八九日脈不疾身不痛目不赤色不變而反利脈來牒牒按

不彈手指時時大心下硬十七日死病三四日已下不得汗脈大疾者生脈細小難得者死不療也下利腹中痛甚者死不療也凡熱病新瘥及大病之後食猪肉及腸血肥魚油膩等必大下痢不能療也必至於死若食餅餌菜黍餈脯鱠炙棗栗諸菓及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃中虛冷必大利難禁不下必死下之必危皆難救也熱病之後多坐此病不可不慎也病新瘥但得食糜弱寧可少食

令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與計日轉久可漸食羊肉糜若羹汁兔雉鹿肉慎不可食猪犬肉也新瘥後當靜臥慎勿令人梳頭洗面非但休勞亦不可多言語用心使意勞凡此皆令勞復故督邨顧子獻得病已瘥未健詣華敷視脈敷曰雖瘥尚虛未復陽氣未足勿為勞事餘勞尚可御內即死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里省之宿交接中間三日發舌出數寸而死新瘥未經百日未得氣平復而行房室大略

無不死者蓋正疾愈後六十日已能行射獵行房室則吐涎而死凡熱病房室名為陰陽易之病皆難療多死近者有士大夫小得傷寒發汗已十餘日能乘馬行來自為平復故入房室則小腹急痛手足拘拳而死深師說天行病未復強食黃花菜手足稍重一方云青花天行病瘥食雞魚必變成疰又食雞魚肉結氣不化天行病瘥飲酒合陰陽復必死天行病損未滿三月食鱔鮠肉則復下血食鹽豉令人四肢不舉天行病瘥食諸菜

有花者三年肌膚不充天行病未好食生瓜芥菜三月浮腫也天行病瘥食菜合陰陽復必死千金天行病瘥後未滿五日食一切肉麪者病更發困天行病瘥食芥鯁發病天行病瘥新起飲酒及食韭菜病更發天行病瘥食生魚酢下利必不止天行病食生菜顏色絕身不平復天行病新汗解飲冷水者損心包令人虛不復天行病未復食犬肉並葫以合食之復則死天行病瘥食生棗及羊肉者腸腹作熱蒸天行病瘥食犬肉食羊肉

作骨中蒸熱天行病瘵食魚肉並瓜生菜者令人身腫  
天行病食蒜者病發大困 問曰傷寒瘟病何以辨脈  
荅曰瘟病冬傷於寒所得也至變為瘟病傷寒汗下不  
愈而過經其證尚在而不出者亦瘟病也經曰瘟病之  
脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之如太  
陽證汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太陽瘟病也  
如身熱目疼汗下後過經不愈診得尺寸俱長者陽明  
瘟病也如胸脇痛汗下後過經不愈診得尺寸俱弦少

陽瘟病也如腹滿噎乾診得尺寸俱沈細過經不愈者  
大陰瘟病也如口燥舌乾而渴診得尺寸俱沈過經不  
愈者少陽瘟病也如煩惋囊縮診得尺寸俱微緩過經  
不愈者厥陰瘟病也是故隨其經而取之隨其證而治  
之如發斑乃瘟毒也 又云黃帝曰傷寒熱病死候有

九

太素云不可刺者九

一曰汗不出大熱發噦者死

太素云汗不出大熱發噦

者

二曰泄而腹滿甚者死

甚一作黃

三曰目不明熱不已者

死四曰老人嬰兒熱病腹滿者死五曰汗不出嘔下血

者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄汗不出出  
不至足者死八曰體熱者死九曰熱而瘕者腰反折瘵  
瘵齒噤齟也熱病七八日脈微小病者便血口中乾一  
半日而死脈代者一日死熱病七八日脈不躁不數後  
三日有汗三日不汗四日死熱病已得汗而脈尚躁盛  
此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病脈常盛躁  
而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗者生 疫  
癘傳染老幼皆相似調治一也寸虛弱盡弦緊或肝脈

濡細是雖毒邪四時然發汗吐下條例通行故曰明知  
順逆正治從治不外陰陽表裏條例通行固也然其毒  
癘之氣蘊畜於中亦隨其溫涼權其輕重而利導之庶  
毒有所泄則易為力也病源云挾毒癘之氣狀熱煩毒  
發為心腹脹滿若不治春感清邪在肝升麻葛根湯解  
肌湯夏感寒邪在心調中湯射干湯半夏桂枝甘草湯  
秋感熱邪在肺白虎加蒼朮湯發黃瘧茵陳調五苓散  
冬感溫邪在腎亦名冬溫萎蕤湯土無正形因火而名

當隨經取之此大概然耳寒證者聖散子熒火丸神明散可選用聖散子內用香附豆蔻良薑只可施之寒濕毋惑於通用之說凡瘟病可針刺五十九穴又身之穴六百五十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之為灾

時氣一日論

夫時氣一日太陽受病太陽為三陽之首而主於頭項故得病一日頭項腰脊皆痛也

方

解肌散

出聖惠方

治時氣一日頭痛壯熱四支煩疼

麻黄

一兩去根節

川升麻

一兩赤芍藥

石膏

一兩貝齒三枚

甘草

半兩炙

杏仁

一兩浸去皮尖微剉

右搗麤羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

棗三枚煎至五分去滓不計候熱服衣覆取汗便食

豉粥補虛

桂枝散

出聖惠方

治時氣一日頭痛壯熱骨節疼痛

桂枝 黃芩

麻黃

去根節 各三兩

石膏

一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候熱服衣覆取汗

解表石膏散

出聖 惠方

治時氣一日頭項腰脊痛惡寒

石膏

二兩

麻黃

一兩

去根節

葛根

二兩

白朮

二兩

桂心

一兩

白芷

芎藭

當歸

微炒 剉 各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗

葛根散

出聖 惠方

治時氣一日壯熱心神煩躁頭痛四肢不

利

葛根

剉

赤芍藥

麻黃

去根 節

黃芩

石膏

各一兩

大青

甘草

各半兩 炙 微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗

治時氣一日頭痛壯熱方

出聖 惠方

取生葛根淨洗搗取汁一大盞內豆豉一合煎至六

分去豉不計時候分為二服有汗即瘥未得汗即再服若心中熱加梔子仁十枚內葛根汁中同煎去滓服之

治時氣病一日初覺便宜發汗方

用麻黃二兩去根節以水三大盞煮麻黃去沫取汁一盞半去滓後入米一匙豉汁二合煮為稀粥不計時候頓服衣覆取汗

法

導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽兩耳拳又引鬢髮即流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱以摩面從上下二七止去脚氣令面有光又摩手令熱從體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈

時氣二日論

夫時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脈絡於鼻入於目故得病二日內熱鼻乾不得眠也夫諸陽在表表



始受病故可摩膏火灸發汗而愈也

方

水解散

出聖惠方

治時氣二日頭痛壯熱心燥

麻黃

去根節二兩

川大黃

剉碎微炒

黃芩

桂心

甘草

灸

赤芍藥各一兩

右為散每服不計時候以溫水調下二錢良久再服

未服藥前先以熱湯沐浴後便服此藥衣蓋取汗重

者不過三服強實人服二方寸寸此調風實之人三

伏中宜用之若去大黃即春夏用之

治時氣二日壯熱頭痛宜服此方

出聖惠方

甘草

一兩灸

生薑

三分

瓜蒌

一顆大者取瓢去子於碗內盛之

右先將生薑甘草用無灰酒一大盞煎取六分去滓

熱入瓜蒌碗中絞取汁不計時候分溫二服

柴胡散

出聖惠方

治時氣二日壯熱增寒頭痛腰脊強重

柴胡

去苗

麻黃

去根節各一兩

葛根

三分

桂心

二分

甘草

一分灸

赤芍

右為散每服四錢以水一中盞入豉五十粒薄荷二  
七葉煎至六分去滓不計時候先喫粥少許後以熱  
水沐浴然後服此藥衣覆取汗

梔子散

出聖  
惠方

治時氣二日頭痛背強身熱惡寒

梔子仁

黃芩

各一  
兩

石膏

二兩

葛根

剉一  
兩

杏仁

湯浸  
去皮

尖雙仁剉炒

微黃用一兩

甘草

半兩炙  
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入葱白三莖豉五十  
粒煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗

葛根散

出聖  
惠方

治時氣二日頭痛背強心煩壯熱

葛根

剉

麻黃

去根  
節

犀角屑

各一  
兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚  
煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗

三物湯

治天行病經一二日覺身體壯熱頭痛骨肉

酸楚背脊強口鼻乾手足微冷小便黃赤此是其候  
若如此宜先合煮桃柳葛湯浴之

桃枝

細切  
五斗

柳葉

細切  
五斗

酢醬水

一斗

右以水一石煮桃柳枝葉二物取七斗汁去滓內醋醬水覺滯熱以沐浴訖拭身體令乾以粉摩之勿觸風則於密處刺頭眼後兩邊及舌下血斷以鹽未厭刺處則入被臥

又後服解肌乾葛等五物飲微覆取汗如病根輕者因此或歌

葛根切五合葱白切一升生薑切二合豉一升綿裹粳米二合研碎  
右切以水五升煮取豉心以上四味取三升半汁去

滓內粳米屑煮令米爛帶熱頓啜候盡微覆取汗無所忌

又依前浴等法不覺歌宜更作雞子湯重洩之

新殼雞子五枚各破頭瀉置一盞中別加一雞子水以筋攪令極渾別用水一升煮極沸則投雞子於湯中微攪纔似熟則瀉置椀中內少醬清似變腥氣帶熱啜令盡覆使汗出

又依前雞子湯出汗汗洩當歌如不覺退合梔子等六

欽定四庫全書

卷一百四十八

味散以下之

梔子三十枚 乾葛五兩 茵陳二兩 蜀升麻三兩 大黃五兩

芒硝五兩

右切合搗為散以飲服三方寸七服之須臾當覺轉利也如經一兩食頃不利且以熱飲投又不利即須更服一方寸寸還以飲投得利為度後適寒溫將息無須服此也

又依前梔子等六味散取利復不覺退加嘔逆食不下

口鼻喉舌乾燥宜合生蘆根八味飲子細細服之

生蘆根切一升 生麥門冬二升 生薑五兩 人參二兩

知母二兩 烏梅十兩 白蜜一合 竹瀝三合

右切以水八升煮取三升去滓內蜜瀝等攪調細飲不限遍數冷暖亦不限食前後服此飲子雖不能頓除熱病然於諸症不覺有加體氣安穩心復不冷意又欲得此飲任重合但依前服之如熱勢不退心腹妨滿飲食漸少心上痞結則不可重服之

欽定四庫全書

音清方

三

又依前生蘆根等八味飲子飲之諸狀不歇漸不下食  
 心腹結破不得手近有時觸著痛不可忍既是熱病  
 體氣合熱骨肉疼痛脈合洪數口合苦乾食合嘔逆  
 體氣反涼脈反沈細飯食反下不知痛惱大小便秘  
 塞心上如石痛不可近視唇急鼻張手眼尋繹狂言  
 妄語此由熱極將思酷冷飲食寢味唯冷是求熱結  
 在心無因通洩如有此者十不枚二三更不可以常  
 途守之當須作成敗計耳此非半夏等十味湯無奈

之何其中有諸狀與此無別但加身體黃眼白睛色  
 如黃蘗此是急黃如有亦不可守常法還宜合後湯  
 救之

半夏五兩 鉅州者 乾薑三兩 吳茱萸二兩 大黃五兩 桂心

湯洗滑汁盡 白朮二兩 細辛 柴胡 牡丹皮各三兩 芒硝二兩

右切以水一斗煮取三升去滓內芒硝攪令消盡分  
 溫三服每服人行十里久若服一服利後須要伺候  
 將息勿更進湯藥但研好粟米作汁飲細細與之如

下利傷多可以酢飯止稠酢醬粥亦得忌羊肉飴生  
葱生菜桃李雀肉胡荽等

又依前成敗計服半夏等十味湯後雖得毒熱勢退利  
過不休體力漸弱宜合人參等五味散細細服之

人參

五兩

生犀角

末二兩

烏梅肉

三兩

生薑屑

三兩

黃連

二兩去毛無亦可  
以龍骨四兩代之

右為散以飲服一方寸七日三服稍加至二七忌猪

肉冷水等物

水解散

治時行頭痛壯熱一二日

桂心

甘草

大黃

各二兩

麻黃

四兩

右為散患者以生熟湯浴訖以暖水服之方寸七日

三服覆取汗或利便瘥丁強人服二寸七延年秘錄

有黃芩芍藥各二兩古今錄驗無甘草有芍藥治天

行熱病生疤瘡疼痛解肌出汗

柴胡湯

治時行疫癘一二日頭痛壯熱

柴胡

去苗

芍藥

各一兩

梔子仁

黃芩

去黑心

石膏

碎

葛根

剉各一兩

右為散每服五錢以水一盞半葱白三寸豉三十粒煎至七分去滓不計時候溫服

麻黃解肌湯

治時疫癘一二日頭痛壯熱煩燥

麻黃

去根節

升麻

炙剉

甘草

剉

芍藥

碎各一兩

石膏

碎各一兩

貝齒

燒一分

杏仁

去皮尖雙仁炒研半兩

右為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不計時候溫服即覆取汗愈便食政粥補虛

治傷寒時氣瘟疫疫疼痛壯熱脈盛始得一二日者方

用丹砂一兩右為末以水一斗煮取一升頓服之衣

覆取汗

治若得時氣冷熱不調發作者皆是寒熱所致其狀似瘧久而不瘳損人性命縱服湯藥必然難瘥宜作生熟湯浴之

用大器盛湯中坐勿動須臾百節開寒熱之氣從毛孔中出變作流汗若心中熱悶者還服少許熱湯即

定久乃出湯以衣被覆蓋睡豁然平復如患大重者  
不過三兩度即瘥

治天行一 二日

用麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓  
則著米一匙及豉為稀粥取強一升先作生熟湯沐  
浴頭百餘挽然後服前粥服後衣覆取汗於夜最佳  
八神湯 治時氣一 二日頭痛壯熱心神煩悶

當歸焙切 甘草 大黃剉炒 白朮 山梔子仁各半

麻黃去根節煎掠 芍藥 荆芥穗各一  
去沫焙一兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞入薄荷三葉葱白一  
寸生薑二片同煎至六分去滓熱服

梔子湯 治天行一 二日頭痛壯熱心中熱者

梔子 黃芩各三 豉熱綿 葱切各 石膏碎綿  
兩

葛根切各  
四兩

右切以水七升煮取二升六合去滓分溫三服如人  
行八九里再服忌麪酒生冷等物



時氣三日論

夫時氣三日少陽受病少陽脈循於脇上於頸耳故得病三日胸脇熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於臟故可汗而愈

方

柴胡散 治時氣三日頭痛壯熱心神煩壅胸膈不利

柴胡

去苗灸

人參

去蘆頭

犀角屑

黃芩

麥門冬

去心

各一兩甘草

灸微赤判

半夏

湯洗七遍去滑各半兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

葛根散

出聖惠方

治時氣三日頭痛壯熱

葛根

剉麻黃去根節各一兩半

赤芍藥

黃芩

桂心

甘草

灸微赤判

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候熱服衣覆去汗

解肌麻黃散

出聖惠方

治時氣三日表不解熱毒相傳或嘔

或嗽

麻黃

去根節

赤芍藥

各一兩

桂心

甘草

灸微赤剉

細辛

各半兩

杏仁

三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候熱服衣覆取汗

龜甲散

出聖惠方

治時氣三日未解四肢疼痛心膈煩熱

龜甲

塗醋灸微黃去裙闌

麻黃

去根節

桂心

赤芍藥

甘草

灸微赤剉

葛根

剉

枳殼

麩炒微黃去瓢

厚朴

去麁皮塗生薑汁灸令香熟各一兩

右為散每服五錢以水一中盞入豉五十粒煎至五

分去滓不計時候熱服續以葱粥投之汗出便愈若

未汗再服

大黃散

出聖惠方

治時氣三日頭痛煩熱

川大黃

剉碎微炒

秦朮

去苗

桂心

柴胡

去苗各一兩

石膏

二兩

甘草

半兩灸微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

又方

以皂莢燒作灰研羅為散每服不計時候以新汲水一中盞生薑汁蜜各少許相加調兩錢服之先用暖水沐浴後服此藥須臾汗出愈

柴胡散 治時氣一日至三日頭痛壯熱心神煩悶

柴胡去苗石膏碎麻黃去根節煎掠去沫焙各一兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞入豉三十粒葱白二寸同煎六分去滓熱服併三服汗出愈不計時候

朮豉湯 治天行時疫三二日內未經汗下

蒼朮炒五兩豉炒三兩半麻黃去根節二兩

右麤搗篩每服三錢以水一大盞前至七分去滓熱服蓋覆出汗未汗再服

人參湯出王氏博濟方 治時行病三日渾身疼痛壯熱不解

人參 赤茯苓去黑 白朮 甘草剉各一兩 麻黃去根節煎掠去

沫焙一兩半

右麤搗篩每服三錢七水一盞入葱白鹽豉各少許

同煎至六分去滓温服

解肌湯 出永類 鈴方 治天行病二三日頭痛壯熱者

乾葛 四兩 麻黃 三兩 去節 芍藥 黃芩 各二兩 甘草 灸

桂心 各一兩 一作桂枝 大棗 十二枚 擘

右切以水八升煮取二升半去滓分三服得汗愈忌

海藻菘菜生葱等三四日不汗脈浮者宜重服發汗

脈沈實者宜下之

葛根湯 治時氣二三日不解頭痛壯熱惡寒

葛根 剉一兩 麻黃 去根節煎掠 去沫焙二兩 陳皮 湯浸去白焙 甘草 灸剉

黃芩 去黑心 知母 焙 杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒各一兩

右麤搗篩每服三錢以水一盞生薑二片同煎至七

分去滓温服一名葛根橘皮湯無生薑煎法同

治疫氣傷寒二日以前不解者

方見本門頭痛類豉尿湯三味同

時氣四日論

夫時氣病四日太陰受病太陰為三陰之首三日已後

諸陽受病訖即傳之於陰太陰之脈主於咽喉故得病  
四日腹滿咽乾其病在胃膈故可吐而愈也

方

苦參湯 出聖惠方 治時氣四日身體壯熱四肢疼痛胃膈滿

心煩

苦參 一兩 剉 烏梅 七顆 搥碎 雞子 一枚 取清

右二味先以酸醋一大盞煮至五分去滓下雞子清攪令勻不計時候溫去沫服之當吐出熱氣即愈

桃柳心湯 出聖惠方 治時氣四日胃中痰壅增寒壯熱頭痛

桃心 一握 柳心 一握 甘草 三分 生 用剉 烏梅 五顆 搥碎 梔子仁 三分

右以淡醬水一大盞煎六分去滓不計時候溫服良久當吐未吐再服

治時氣四日胃膈煩滿壯熱身體熱宜吐之亦治天行

病四五日 出聖惠方

用苦參一兩剉以醋二大盞煎至五分去滓不計時候溫服良久當吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解

及溫服取汗愈

葛根散出聖惠方治時氣四日曾膈滿悶或時吐逆

葛根一两 甘草一分炙 川大黃半两碎 麥門冬一两

去心 人參一两去蘆頭

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

候溫服

犀角散出聖惠方治時氣四日曾經發汗不解寒熱無恒心

中躁悶

犀角屑 柴胡去苗各一两 麻黃去根節 木通剉 桂心

川升麻 枳殼麩炒微黃去瓢 葛根剉 黃芩 桃仁湯浸去皮

尖雙仁麩炒微黃 甘草炙微赤剉各半两

右為散每服五錢用水一盞煎至五分去滓不計時

候溫服

知母散出聖惠方治時氣四日熱渴不已往來寒熱不能飲

食

知母 枳實麩炒微黃 柴胡去苗 梔子仁 麥門冬去心

地骨皮

各一兩

甘草

半兩  
判微赤

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

八毒大黃丸 治天行病三四日身熱目赤四肢不舉

產後傷寒舌黃白狂言妄語亦療溫病已後飛尸遁屋

腹痛膈上下不通癖飲積聚癰腫苦痛腹中摩痛上諸

毒病

藜蘆

二分  
灸

大黃

三分

硃砂

五分

蜀椒

雄黃

研

巴豆

去皮

麋桂心各四分

右搗篩蜜和為丸如麻子大每服三丸當下不瘥更服合時勿令婦人鷄犬見之忌生葱野猪肉蘆笋狸肉生血物

黃連龍骨湯 治時行病數四日而早晚熱痢時作白

通諸藥多不得止吾思舊方多療傷寒後下痢耳未有

尚在數日便兼除熱止下者也四順湯熱白通若溫故

吾思作此湯以救數十人兼主傷寒

黃連

止痢除熱

黃蘗

止痢除熱各三兩

熟艾

如鷄子一枚除熱毒止痢

龍骨

二兩止痢除熱

右切以水六升煮取二升半分三服無不斷者忌猪

肉冷水

解肌升麻湯

出千金方

治時氣三四日不解

芍藥

升麻

石膏

麻黃

甘草

各一兩

杏仁

三

枚貝齒

三枚一作貝母十八銖

右吹咀以水三升煮取一升盡服溫服發汗便愈

時氣五日論

夫時氣五日少陰受病少陰脉貫腎絡肺繫於舌本故得病五日口熱乾渴而欲飲其病在腸故可下而愈也

方

大黃飲子

出聖惠方

治時氣五日大熱三部脉悉洪數者可

下之

川大黃

剉碎

川朴硝

各一兩半

黃芩

一兩

梔子

三分

枳殼

炒

微黃去瓢

甘草

炙微赤剉各半兩



右細判和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓  
不計時候溫服

柴胡散出聖惠方治時氣五日熱毒不除心神煩悶大小腸  
結秘或時頭痛

柴胡去苗枳殼麩炒微黃去瓢梔子仁 黃芩 石膏

大青 川芎硝 川大黃剉碎微黃各一兩 麥門冬一兩去心

炒甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

黃芩散出聖惠方治時氣五日心腹壅悶骨節疼痛背膊煩

熱不下飲食

黃芩 梔子仁 犀角屑 赤芍藥 柴胡去苗

枳殼麩炒微黃 檳榔各一兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計  
時候溫服

竹茹飲子出聖惠方治時氣五日頭痛壯熱食則嘔逆

竹茹 人參去蘆頭 蘆根 黃芩 梔子仁各半兩

右為細判和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分去滓不計時候溫服

承氣湯 治時氣五日胃中壅悶或時譫語為腸中有

結燥宜服

川大黃碎判 川朴硝各一兩 枳實麩炒 厚朴去粗皮

汁灸令香 熟各半兩

右為散每服四錢用水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服以利為度

消毒散 治時氣五日未解壯熱心神煩躁

大青 梔子仁 葛根判 川朴硝各一兩

右為散每服五錢用水一大盞入豉五十粒煎至五分去滓下地黃汁半合更煎三兩沸不計時候溫服  
理中丸 治時行四五日大下後或不下皆患心中結

滿兩脇痞塞胃中氣急厥逆欲絕心起高胃手不得近不過二三日輒便死歿諸乙用瀉心湯余用大小

陷胃湯病不得療重思此或是下後虛逆而氣已不理而毒復上攻毒氣相傳結於胃中縱不下者毒已入胃胃中不通毒還衝上復搏於氣氣毒相激故致此病療之當先理其氣次下諸疾思與增損

人參 白朮 甘草 茯苓 牡蠣熬 加瓜蒌根

各二兩 乾薑六分 枳實四枚

右為末以蜜和為丸服如彈子一丸熟水下不歇復服余時用此效的神速下喉即折續復與之不過服

五六丸胃中豁然矣用藥之效未嘗見此然渴者當加瓜蒌不渴除之下者當牡蠣不下勿用余因以告

領軍韓康伯右衛毛仲祖光祿王道預靈臺郎顧君

苗著作商仲堪諸人並悉用之歎其應速於時枳實

乃為之貴難者曰傷寒熱病理中溫藥今不解之以

冷而救之以溫其可論乎余應之曰夫今診時行始

於項疆赤色次於失眠發熱中於煩躁思水終於生

瘡下利大率如此耳忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等

牽馬丸 治天行病四五日下部生瘡醫所不能療者

附子一枚

藜蘆灸

桂心

巴豆

去皮心熬各一兩

右搗篩研已豆如膏和散蜜丸如梧桐子空腹服二

丸熱在膈上下飲半升熱飲投吐之後下下部瘡自

瘥神良病家嘗牽馬買藥因名牽馬丸老小半之以

意消息之忌野猪肉生葱狸肉蘆笋等物

知母湯 治欲似天行四五日熱歇後時來時往惡寒

微熱不能食者

知母

二兩

枳實

灸

梔子仁

各三兩

豉

一升熬別裹

右切以水六升煮取二升半去滓分溫三服如人行

七八里一服忌蒜麪

竹茹飲 治天行五日頭痛壯熱食則嘔者

竹茹

黃芩

梔子仁

各二兩

生薑

三兩

右切以水五升煮取一升六合去滓分溫三服忌蒜

熱麪等五日

瓜蒂散 治天行病不即瘳經四五日渴飲引心上急

強手不得近又不得眠荒亂此則是黃不必待發出黃始服藥凡是心強氣急眠卧服此湯吐即瘥

瓜蒂

按量一合熬令似黃勿令焦

小豆

一合小弱量用

右為散凡有病如前候及天行病得四五日不歇皆宜服此方以漿水飲五合和散一錢錢服之二食久必吐更與半錢錢服吐畢即瘥中男以上量以意斟酌服之

時氣六日論

夫時氣六日厥陰受病厥陰脈循陰絡於肝故得病六日煩躁而陰縮也此為三陰三陽俱受其病毒氣入於腸胃故可下而愈也

方

柴胡散 治時氣六日壯熱骨節煩疼頭痛目眩心脇氣脹急硬不能飲食恐變為黃

柴胡

去苗 枳實 麩炒 微黃

瓜蒌根

黃芩

梔子仁

茵陳

白蘚皮

川大黃

剉碎 微炒

甘草

炙微赤剉 各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分不計時候  
溫服去滓

白蘚皮散 治時氣六日熱毒不退心胃煩躁大小腸  
秘澀不得眠臥

白蘚皮 黃芩 柴胡去苗 大青 麥門冬去心 梔子

仁 甘草灸微赤剉 羚羊角屑半兩 川大黃二兩剉碎微炒

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計  
時候溫服

羚羊角散 出聖惠方 治時氣六日煩躁頭痛小便赤澀壅熱  
不退

羚羊角屑三分 川升麻 秦艽去苗 木通剉各三分 白蘚皮

黃芩各三兩 檳榔 麥門冬去心焙 川大黃剉碎微炒各一兩

甘草灸微赤剉半兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計  
時候溫服

大青散 出聖惠方 治時氣六日頭痛壯熱心神煩亂積熱不

散或狂走不定

大青 去苗各 秦艽 一兩 藍葉 川升麻 茵陳 各三

瓜蒌根 一兩 川芒硝 一兩 梔子仁 半兩 甘草 半兩 微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓入竹

瀝半合不計時候溫服

人參飲子 出聖 治時六日心胃結硬嘔不下飲食

人參 一兩去 生薑汁 蜜 各一 川芒硝 一分

右以水一大盞先煎人參取汁五分去滓下雞子清

一枚及芒硝薑汁蜜攪令勻不計時候溫服二服

黃芩湯 治天行五六日頭痛骨節疼痛腰痛兼痢

黃芩 梔子仁 芍藥 各三 豉 一升

右以水六升煮取三升半去滓分三服忌蒜熱麩等

五日

柴胡湯 治天行五六日壯熱骨節煩痛兼兩脇連心

助下脹急硬痛不能食恐變黃發者

柴胡 枳實 炙 瓜蒌 黃芩 梔子仁 茵陳

大黃切各龍膽二

右切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服忌熱

麩蒜

大黃湯出肘後方治天行若已五六日不解頭痛壯熱四肢

煩痛不得飲食

大黃 黃連去毛 黃蘗 梔子擘各半兩

右切以水八升煮取六七沸內豉一升葱白七莖煮取三升分三服此許推然方神良又療傷寒已五六

日頭痛壯熱四肢煩痛取汗不宜老小忌猪肉冷水

苦參湯出肘後方治天行熱病五六日以上宜服

苦參三兩 黃芩二兩 生地黄八兩

右切以水八升煎至二升去滓溫服半升日再忌蕪荑

黑奴丸出危氏方治時行熱病六七日未得汗脈洪大或數

面赤目張身體大熱煩躁狂言欲走渴甚又五六日以上不解熱在胃中口噤不能言心下尚暖灌藥下



咽即活兼治陽毒及發斑

麥奴

小麥未熟時叢中有不成者上有表勃刮取即麥奴也一兩

麻黃

去根節煎掠去

沫焙乾

三兩

大黃

二兩

釜底煤

研

黃芩

去黑心

芒硝

竈穴

煤

研

梁上塵

各一兩

右為細末鍊蜜丸如彈子大每服一丸新汲水研下  
渴者但與冷水盡量與飲之須臾當寒寒過汗出即  
瘥若日移五尺不汗再服一丸瘥即止須微利此藥  
須病人大渴倍常燥盛者乃可與之不爾不可與一

方無黃芩

苦參吐毒熱湯

治天行五日不歇未至七日皮肉毒

熱四肢疼痛疆

方見本門時氣四日類苦參湯同

時氣七日論

夫時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病終  
故也今病不除者欲為再經病也再經病謂經絡重受  
病也

方

羚羊角散 出聖惠方 治時氣七日心神恍惚煩躁壯熱不得

眠卧

羚羊角屑 旋復花 枳殼 麴炒微黃去瓢 前胡 去蘆頭 川

升麻 元參 赤芍藥 黃芩 地骨皮 各兩半 茯苓

神分 三 麥門冬 去心焙 甘草 半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

麥門冬散 出聖惠方 治時氣七日有熱結在內雖得汗不解

腹滿煩躁譫語宜服

麥門冬 三兩去心 川升麻 地骨皮 川大黃 剉碎微焙 黃

芩 前胡 去蘆頭 赤茯苓 各一兩 陳橘皮 湯浸去白瓢焙 枳殼

麴炒微黃去瓢各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

大黃散 出聖惠方 治時氣七日往來寒熱胃脇逆滿大腸秘

塞

川大黃剉碎 甘草炙微 川芒硝 桂心 桃仁湯浸

去皮尖雙 麻黃去根節  
仁麩微炒 各一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服以利為度

羚羊角散出聖惠方 治時氣七日心神煩熱胃腸不利目赤

不得眠卧

羚羊角屑 黃芩 梔子仁 黃連去鬚 川升麻

枳殼麩炒微黃去  
瓢各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以竹葉湯下二十九

生地黄湯 治天行七日至二七日臟腑陰陽毒氣天行病欲歇未歇或因食飲勞復心下脹滿煩熱

生地黄切一升 黃芩 芒硝 麻黃 桂心 甘草

灸各二兩 竹葉洗切 香豉綿裹 薄荷各一升 尖鼠屎三七枚 乾葛

一兩 石膏八兩碎

右切以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服忌蕪  
美海藻菘菜生葱等

菖蒲飲子 治傷寒時氣瘟疫及山蒿瘴癘不問陰陽

二證七日內外皆可服病在上則吐在表則汗在下  
則泄其病則解往年荆湖制府合此藥散施

石菖蒲去毛 川芎 甘草 藁本 乾葛 木猪苓

北柴胡 桑白皮各等半

右為散每服五錢水一大盞加連須葱頭三個煎至

七分如人行五里久再煎服

鱉甲湯 治天行病經七日以上熱勢彌固大便澁秘

心腹痞滿飲食不下精神昏亂恍惚狂言浪語脈沈  
細衆狀之証一無可救

鱉甲炙 細辛 桂心 白朮 吳茱萸 白蘚皮

枳實炙 茵陳各二兩 生薑四兩 附子一兩半 大黃

右切以水七升煮取二升六合去滓分三服如人行  
五里進一服忌生葱生菜菹菜猪肉桃李雀肉等

時氣八九日論

夫時氣病八九日已上不解者或是諸經絡重感之病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未便相傳致使停滯累日病證不改皆當察其證候而治之也

方

前胡散出聖惠方治時氣八九日不解心腹堅滿身體疼痛

內外有熱煩嘔不安

前胡一兩去蘆頭

半夏一兩湯洗七遍去滑

枳殼三分麩炒微黃去瓢

赤芍

藥三分黃芩三分麥門冬一分

去心

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分竹茹一

分煎至五分去滓不計時候溫服

治時氣八九日煩躁壅悶喘麓方出聖惠方

桔梗一兩去蘆頭

甘草三分炙微赤剉

麻黃一兩去根節

杏仁一兩湯浸

去皮尖雙仁麩炒微黃

黃芩三分麥門冬一分

去心

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

柴胡散 出聖 惠方 治時氣八九日骨熱四肢煩疼背膊勞悶

手足無力不能飲食

柴胡 一兩 去苗 黃耆 一兩 剉 赤茯苓 三分 秦艽 半兩 去苗 地骨皮

半兩 黃連 三分 去鬚 葛根 半兩 剉 枳殼 半兩 麩炒 微黃去瓢 川大黃 三分

剉碎 微炒 鱉甲 一兩半 塗醋 炙黃去裙繭 甘草

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

鱉甲散 出聖 惠方 治時氣八九日肢節疼痛熱毒不止乍寒

乍熱乍劇乍輕發動如瘧

鱉甲 二兩 塗醋 炙 微黃去裙繭 知母 黃芩 烏梅肉 微炒 柴胡

去苗 常山 地骨皮 赤芍藥 牛膝 去苗 各一兩 甘草

半兩 炙 微赤 剉

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時候溫服

黑奴丸 出聖 惠方 治時氣八九日已後口乾狂語唯飲冷水

麻黃

去根節

川大黃

剉碎

川朴硝

梁上塵

竈穴

墨 釜底墨

小麥

炒令黃色一兩

右為散煉蜜和丸如彈子大每服不計時候以新汲水研下一丸服後更與新汲水任意飲之汗出為效

### 時氣頭痛論

夫時氣三陽受病猶在於表邪毒之氣攻注於外循於風府而入於腦故令壯熱頭痛胃膈壅滯其脈浮數者可發汗及吐即愈也

### 方

葛根散

出聖惠方

治時氣頭痛壯熱

葛根

一兩

石膏

二兩

梔子仁

柴胡

去苗

赤芍藥

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入淡竹葉二七片煎

至五分去滓不計時候溫服聖濟總錄用生薑一片

棗一大枚煎無淡竹葉

沐頂湯

出聖惠方

治時氣頭痛不可忍者

石膏十兩 搗碎 梔子仁三兩 竹葉一握 甘菊花三兩 豉心三合

葱白十四莖 切

右以水六碗煮取三碗去滓內有嘴瓶中稍熟淋注頂上

治時氣頭痛壯熱絕甚者出聖惠方

石膏二兩 薺芫 木通剉 犀角屑各一兩 甘草半兩 炙 微赤 剉

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服

前胡散出聖惠方 治時氣壯熱頭痛嘔吐不能飲食

前胡去蘆 頭 知母 犀角屑 葛根剉 赤芍藥各一兩

石膏二兩

右為散每服四錢以水一半盞入竹葉二十片生薑半分葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫服

菊花散出聖惠方 治時氣頭痛至甚及百骨節疼痛

甘菊花 麻黃去根 節 葛根剉 黃芩各一兩 羚羊角屑

元參 梔子仁 赤芍藥 甘草



右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣二三日壯熱頭痛甚者出聖惠方

以不蛀皂莢一挺去皮子以濕布裏煨令焦黑搗細羅為散每服二錢以熱酒下衣覆取汗仍先以白礬湯密室中浴後服之

治時氣頭痛不止及治傷寒頭痛出聖惠方

以川朴硝三兩為散用生油調塗頂上

又方出聖惠方

以梔子仁搗羅為散每服一錢以溫水調下

又方出聖惠方

以東瓜爛搗搗於痛處神效

又方出聖惠方

以石膏五兩為散研令極細每服不計時候以臘茶調下二錢

參蘇飲出聖惠方治感冒發熱頭痛或因痰飲停積兼以胃

熱並宜服若感冒發熱亦如服養胃湯法連進數服  
取微汗即愈若尚有餘熱更徐徐服之自然平治因  
疾飲發熱但連日頻進以熱退為期不可預止兼治  
中脘痞膈嘔逆惡心開胃進食及一切發熱咳嗽聲  
重涕唾稠粘此藥解肌熱寬中快膈或欲或勞療潮  
熱往來小兒室女亦宜服之兼治發瘧

木香半兩紫蘇葉半兩乾葛洗半夏洗七次前胡去苗甘

草炙人參三分茯苓去皮各枳殼去瓢炒桔梗去蘆頭陳

皮去白各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片棗一箇煎至六  
分去滓微熱服不拘時候一方以氣盛者不用木香  
只十味

參蘇敗毒散一名敗毒散 出聖惠方治傷寒時氣頭痛項強壯熱

惡寒身體煩疼及寒壅欬鼻塞聲重風痰頭痛嘔  
噦寒熱並皆治之

柴胡去苗甘草炙桔梗 人參去蘆頭芎藭 茯苓去皮

枳殼 去瓤 麩炒

前胡 去苗 洗

羌活 去苗 獨活 去苗 各三十兩

右為麤末每服二錢水一盞生薑薄荷同煎至七分去滓不拘時候寒多則熱服熱多則溫服生薑薄荷各少許一方無獨活傷濕加白朮脚氣焮赤熱重寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒加大黃蒼朮皮膚赤疹瘙痒加蟬蛻痢純下赤胃壯能食者與數服此服方和劑方為末每服三錢七三因方為散每服四錢七今人或用四錢重非藥性涼自利及曾汗下脈虛

手足冷者勿服心脇氣觸痛或發熱背寒者勿服

七聖湯 治時氣頭痛壯熱肢體煩痛

麻黃 去根節煎掠去沫炒焙三兩 蒼朮 炒 甘草 灸剉各二兩 橘皮 湯浸

去白 木通 剉 山茵陳 各一兩 桔梗 炒一兩半

右麤搗篩每服三錢以水一盞入生薑三片同煎至七分去滓溫服

防風散 治頭痛壯熱惡風百節浸痛肩背拘急面赤

虛煩聲重咳嗽

厚朴薑製 陳皮 甘草炙 藁本各二兩 桔梗炒 獨活

防風 蒼朮拆去皮 四兩

右為細末每服三錢水一大盞薑三片棗二枚煎至七分溫服沸湯點亦可春夏宜用之

羌活散 治四時傷寒頭痛鼻塞或流清涕項背拘急

惡風自汗

柴胡四兩 白芷 川芎 藁本各一兩 桔梗 甘草

獨活 羌活各半兩

右咬咀每服三錢水一中半葱薑煎至七分熱服

治傷寒及時氣瘟病頭痛壯熱脈盛始得一日用黃丹

塗身令遍向火坐令汗出

治傷寒時氣瘟病頭痛壯熱脈盛取生蓂荷根葉合搗

絞汁服三四升

山茵陳散 治時行身熱頭痛四肢痠痛

山茵陳四兩 石膏碎研 一兩 蒼朮米泔浸一宿去皮作片炒 三兩 麻黃去根

節煎掠去沫培一兩

右為散每服二錢七熱葱茶清調下連併三服衣覆取汗

五鮮湯 治時氣頭痛五心煩熱語言狂亂

麻黃

去粗節煎去沫二兩

越桃

一半生一半炒各一兩

白朮

桔梗

炒

石膏

碎

杏仁

去皮尖雙仁炒

右麤搗篩每服三錢七水一盞生薑三片豉七粒葱

白一寸薄荷五葉同煎至七分去滓熱服如欲出汗

併煎兩服衣被蓋覆瘥

茵陳麻黃散 治時氣頭痛壯熱或暑毒伏心狀如瘧疾

疾

山茵陳

四兩

麻黃

去根節煎去沫焙五兩

石膏

碎一兩

蒼朮

水浸去粗

皮蜀椒

去目並開口者炒出汁各二兩

右為細散各每服二錢七點茶調下如狂言熱躁沙

糖冷水調下

麻黃大黃散 治時氣頭痛壯熱三日內宜服

麻黃

去根節一兩

大黃

剉桂去粗皮

黃芩

去黑心

甘草

炙剉

芍藥 乾薑 炮各半兩

右為散每服三錢七暖酒調下衣被蓋取汗

石膏湯 治時行疫癘病壯熱頭痛唇乾

石膏 碎一兩 葛根 剉三分 芍藥 貝母 百合 升麻

各半兩 梔子仁 甘草 灸各一分

右麤搗篩每服三錢七水一盞半豆豉五十粒葱白三寸同煎一盞去滓溫服

豉尿湯 治天行熱氣頭痛骨肉酸痛壯熱等疾若初

病一日在毛髮二日在皮膚三日在肌肉未必得汗

利且宜進此湯

豉 葱白 切各一升 小便 三升童子者為佳

右先熬豉及葱白令相得則投小便煮取一升澄清及熱頓服或汗或利但得則瘥如未歇依煎更進一劑頻用效

如不除進柴胡湯

麻黃 陳者去皮 甘草 灸各二兩 柴胡 黃芩 乾葛 各三兩 石

膏

五兩碎綿裹

豉

七合綿裹三沸

葱白根

切一升勿令有青夏青即熟白即冷一作

桑根皮

右切以水九升宿漬藥明但先煮麻黃令沸掠去上沫然後并諸藥煮取二升七合分三服服別先去三食頃久覆取汗汗出以粉拭之惡寒多加桂心一兩忌海藻松菜等

治傷寒時氣瘟疫病方及頭痛壯熱脈大始得一日

取蔥白根葉合搗三升許和真丹一兩水一升合煮

絞取汁頓服之得吐便瘥若重一升盡服厚覆取汗即瘥

又方

用小蒜一升搗取汗三合頓服之不過再作便瘥

又方

用烏梅二七枚鹽五合以水三升煮取一升去滓頓服之

神明白朮散

出活人書

治瘟疫病頭痛壯熱惡寒不解

白朮剉附子

炮製去皮 臍各二兩

桔梗

細辛

去苗葉 各一兩

烏頭

炮製去皮 劑四兩

右為散以絹囊成帶之居閭皆無病有病疫癘者溫

酒服方寸已覆取汗或得吐即瘥若經三四日炒三

錢以水二盞煎一盞半去滓分溫三服

治時氣頭痛壯熱

方見本門時氣一日頭痛壯熱方

時氣譫語論

夫時氣熱毒攻心則心神煩亂陽氣大盛遂譫言目赤  
心煩不得睡卧精神驚悸言語失常毒氣不除陽中結  
燥其脈洪數者是其候也

方

秦艽散

出聖惠方

治時氣熱毒躁悶譫言口舌乾渴不止

秦艽

去苗

黃芩

木通

剉

犀角屑

麥門冬

去心

元參

藍葉

梔子仁

桔梗

去苗頭 各一分

甘草

炙微赤剉 各三分

赤

芍藥



白蘚皮散

出聖惠方

治時氣大熱悶亂譫言

白蘚皮

犀角屑

川升麻

大青

甘草

灸赤劉各

一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治時氣譫語欲走

出聖惠方

生雞子白

一枚

川芒硝

一兩細研

生甘草末

一錢

右以井華水一中盞攪令勻吹去沫不計時候服之

生地黄飲子

出聖惠方

治時氣心膈大熱煩悶言語失度

生地黄

三兩

元參

赤茯苓

各一兩

麥門冬

二兩去心

犀角

屑甘草

半兩灸微赤劉

右細劉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

治時氣煩熱如火譫語欲走

出聖惠方

人參

去蘆頭

甘草

煨令微黃各一兩

右為散每服一錢以新汲水調服須臾更令病人多

飲冷水得吐之為效

猪苓散

出聖惠方

治時氣但謔言煩躁不安

猪苓

去黑心

白蘚皮

澤瀉

赤茯苓

大青

各三分

麥門冬

一兩去心焙

川大黃

三分

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服不計時候以新汲水調下三錢

犀角丸

出聖惠方

治時氣熱毒在臟謔語口乾煩躁

犀角屑

梔子仁

川大黃

剉碎微炒

鐵粉

細研

馬牙硝

各一兩

甘草

三分炙微赤剉

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫

竹葉湯下三十丸

大黃丸

出聖惠方

治時氣大熱不退謔語大便難

川大黃

二兩剉碎微炒

黃芩

犀角屑

猪苓

去黑皮

枳殼

麴炒微黃去瓢

川朴硝

各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以麥門湯溫溫下三十丸

水導散

出千金方

治天行病煩熱如火狂言妄語欲走

白芷一兩 甘遂二兩

右二味搗篩以水服方寸須臾令病人飲冷水腹滿則吐之小便當赤色也一名濯腹湯此方療大急者

治天行壯熱狂言謬語言五六日者

雞子三枚 芒硝方寸匕 井華水一杯

右三味合攪盡服之心煩下則愈


水導散 治時氣病煩熱如火狂言妄語欲走

甘遂兩半 白芷兩二 大黃兩四 厚朴兩八 枳實五枚 芒硝三合

右四味以水一斗先煮厚朴枳實五升去滓內

大黃取二升去滓芒硝更煎一兩沸分再服得快利

止



普濟方卷一百四十八

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官助教臣李巖

謄錄監生臣謝家楨