

醫方類聚卷之一百六

膈噎門二

聖惠方二

治膈氣嘔逆不下食諸方

夫膈氣嘔逆不下食者由胃中有寒寒從胃



從胃

上結搏於胃中經絡否澁氣不宣和後有恙
怒氣逆寒熱不調脾胃氣虛痰飲留滯故令
嘔逆不能下食也

治膈氣心胃不利食即嘔逆草薤豈散方

草荳蔻一兩人參三分去去陳橘皮壹兩湯湯

白木兩桂心兩木通兩檳榔兩雞舌

香兩赤茯苓兩半夏兩湯湯

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣胃中壅滯痰毒上攻嘔逆不能下食

半夏散方

半夏壹兩湯湯洗洗人參壹兩去去赤茯苓壹兩陳

橘皮壹兩湯湯浸浸射干兩桂心兩草荳蔻兩

去去旋復花兩枳實兩湯湯洗洗

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣胃虛嘔逆從朝至夜不能飲食胃中

痛氣漸羸困白木散方

白木兩人參壹兩去去乾薑兩炮炮甘草兩

赤茯苓兩湯湯洗洗五昧子兩麴末兩

赤茯苓兩湯湯洗洗五昧子兩麴末兩

壹合炒 大麥蘖 壹合炒 桂心 兩

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治膈氣不多下食心腹氣滿時或嘔逆訶梨

勒散方

訶梨勒皮 兩 赤茯苓 壹兩 木香 兩 白朮 壹兩 桂

心 兩 大腹皮 兩 木通 壹兩 草薹菹 壹兩

陳橘皮 壹兩湯浸去白瓤焙

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣不能食腹內冷氣或吐逆宜服厚朴

散方

厚朴 壹兩半去麤皮塗人參 壹兩 去白朮

壹兩吳茱萸 半兩湯浸七 水通 三分 桂心 三分

赤茯苓 三分 陳橘皮 二兩湯浸 甘草 半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

治膈氣嘔逆不下食腹脇脹四肢不和宜服此方

訶梨勒皮壹兩人參三分去青橘皮壹兩湯

厚朴壹兩薑汁炙令香熟白朮三分枳殼三分

黃去毒

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中
蒸入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治膈氣嘔逆不能下食脾胃氣弱四肢乏力

丁香散方

丁香兩半青橘皮一兩湯浸白茯苓壹兩人參

薑兩半枇杷葉半兩拭去桂心壹兩半夏壹兩

湯洗七徧去滑

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中蒸
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治膈氣噎塞不能下食食即嘔逆人參散方

人參牛兩去蘆頭厚朴牛兩去蘆皮塗生陳橘

皮壹兩湯浸去白白木牛兩沉香牛兩紫蘇壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中煮

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治膈氣不能飲食食即嘔逆吳茱萸散方

吳茱萸半兩湯浸七當歸壹兩剉人參壹兩

去蘆頭青橘皮三分湯浸去白華芩三分高良薑三分

剉檳榔三分胡椒兩半

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱

酒調下壹錢

治膈氣嘔逆不能下食脾氣弱陳橘皮散方

陳橘皮壹兩湯浸去白粟米半合炒甘草半兩

剉梨勒皮二兩丁香壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以生

薑湯調下壹錢

治膈氣食飲不下嘔逆不定日漸羸瘦木香

九方

木香兩半 人參半兩 去去 蘆頭 赤茯苓兩半 甘草兩半 炙炙
 剉剉 漢椒半兩 去去 日及及 閉閉 桂心兩 細辛兩半 赤
 芍藥兩半 陳橘皮壹兩 湯湯 浸浸 川大黃壹兩 碎碎 微微 炒炒
 附子半兩 去去 皮皮 裂裂 乾薑半兩 炮炮 郁李人湯一兩 浸浸
 去去 皮皮 厚朴壹兩 去去 麤皮麤皮 塗塗 生生 訶梨勒皮兩 一
 半半 微微 炒炒 厚朴壹兩 薑汁炙 令令 香香 熟熟

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
 如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下

二十九

治膈氣脾胃久冷氣滯嘔逆不能下食枳殼
 九方

枳殼三分 微微 黃黃 去去 瓤瓤 木香兩半 草薢壹 去去 皮皮 赤茯苓三分 當歸三分 剉剉 桂心二分 蔣蘿壹兩 葶芩兩 葶芩兩 人參三分 去去 蘆頭 胡椒 白朮三分 訶梨勒皮壹兩 桔梗 乾薑半兩 炮炮 檳榔三分 甘草壹分 炙炙 右件藥搗羅為末以酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候以薑棗湯下二十七

丸

治膈氣嘔逆不能下丸方

桑葉末二兩半夏壹兩湯洗七徧去滑

右件藥搗細羅為散每服一錢以醋漿水

一中盞煎至六分入生薑汁少許不計時

候稍熱并滓服

治膈氣痰結諸方

夫膈氣痰結者由氣脉閉塞津液不通因飲水積聚在於胃膈之間不能消散故結成痰

也

治膈氣痰結氣滯不思食飲肩背壅悶四肢

煩疼赤茯苓散方

赤茯苓壹兩半夏半兩湯洗七徧去滑桂心三分大腹皮

剉壹兩枳殼壹兩微黃去瓢陳橘皮壹兩湯浸白

木半兩木通三分旋復花半兩前胡壹兩去蘆頭檳

榔壹兩訶梨勒皮二兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣胃中痰結食不消化腹中脹滿雷鳴
大腹皮散方

大腹皮壹兩 吳茱萸壹兩湯浸七 白朮壹兩

旋復花壹兩 枇杷葉壹兩去毛 桔梗二兩去

甘草三分炙 木香三分 桂心壹兩 厚朴壹兩半

塗生薑汁 半夏一兩 滑石七 獨活七

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治膈氣胃中痰結舌塞不通不能飲食旋復
花散方

旋復花半兩 木香半兩 赤茯苓壹兩 白朮壹兩 人參

壹兩去 龍胡壹兩去 半夏壹兩湯洗 桂心

壹兩 青橘皮三分湯浸 芎藭壹兩 附子壹兩炮

壹兩 大腹皮半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣痰結脾冷食飲不下胃中刺痛檳榔
九方

檳榔壹兩白木一兩陳橘皮一兩湯浸厚朴二

去麤皮塗生薑壹兩前胡壹兩高良薑一兩

汁炙令香熟桃人壹兩湯浸去皮尖半夏壹兩湯洗

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵九

如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下

二十九

治膈氣痰結心胃積滯氣不宜散飲食不下

前胡九方

前胡一兩去川大黃三分判白朮三分旋復

花半兩肉荳蔻三分去殼人參三分去麥門冬兩

去心枳殼三分製炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵九

如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二

十九

治膈氣痰結否塞心胃壅悶芫花九方

芫花壹兩醋拌巴豆半兩去皮心研桂心

杏人壹兩湯浸去皮尖桔梗壹兩去

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如小豆大食前以溫酒下二丸

治膈氣痰結氣逆不能下食半夏丸方

半夏壹兩湯洗陳橘皮三分湯浸薯蕷壹兩

乾薑壹兩炮甘草壹分炙黃丹一兩炒

右件藥搗羅為末入黃丹同研令勻煮棗

肉和丸如梧桐子大每於食前煎人參牛

薑湯下二十九

治膈氣胃中痰結氣逆不下飲食方

木香壹兩青橘皮二兩湯浸白荳蔻三分郁

李人二兩湯浸去皮

右件藥搗羅為散研入郁李人令勻每

於食前以川椒七粒煎湯調下壹錢神巧

同方

治五膈氣嘔吐酸水諸方

夫五膈氣嘔吐酸水者由胃中氣滯胃有宿

冷飲水停積乘於脾胃脾得水濕則不能消於水穀故令氣逆脹滿嘔吐酸水也

治五膈氣嘔吐酸水寒氣上攻胃中刺痛腹

脇脹滿飲食不下白朮散方

白朮一兩木香半兩吳茱萸半兩湯浸七桂心半兩湯浸七

陳橘皮一兩湯浸半葶芫半兩檳榔兩人參兩

香熟令川大黃壹兩碎微炒厚朴壹兩皮生塗薑汁

香熟

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水壹中

蓋入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治五膈氣脾胃寒不能下食嘔吐酸水時復

胃膈刺痛檳榔散方

檳榔二兩人參壹兩肉荳蔻壹兩白朮壹兩

陳橘皮壹兩湯浸半葶芫半兩洗華芫壹兩

高良薑壹兩厚朴二兩去麤皮塗生薑汁令香熟

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候

類聚百方 十一

稍熱服

治五膈氣心胃久冷結滯時多嘔吐酸水不思飲食厚朴散方

厚朴

壹兩半去麤皮塗生薑汁炙令香熟 吳茱萸 半兩湯浸七遍焙乾

微炒 人參

壹兩去蘆頭 陳橘皮 壹兩湯浸去白醜焙 白朮 壹兩

甘草

半兩炙 高良薑 半兩剉 桂心 半兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治五膈氣脾胃冷滯每欲食則多嘔吐酸水

宜服人參散方

人參

壹兩去蘆頭 檳榔 壹兩 高良薑 半兩剉 陳橘皮

壹兩湯浸 華芩

壹兩 白朮 壹兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治五膈氣脾胃虛冷嘔吐酸水不能下食四肢乏力丁香散方

類聚百方

十一

丁香半兩白木三分桂心壹兩陳橘皮壹兩湯浸

半夏半兩湯洗枳殼半兩麩炒藿香半兩

參三分去赤茯苓三分乾薑半兩炮訶梨勒

皮壹兩甘草壹分炙厚朴一分生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中煮

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治五膈氣胃中宿冷食不消化嘔吐酸水陳

橘皮散方

陳橘皮壹兩湯浸白木二分人參壹兩胡

椒半兩肉荳蔻壹兩甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中煮

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治五膈氣嘔吐酸水脾胃虛寒不能下食半

夏散方

半夏半兩湯洗檳榔半兩紅荳蔻半兩桂心

三木半兩白木三分陳橘皮壹兩湯浸赤茯

苓三半兩當歸半兩高良薑半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治五膈氣脾胃虛冷食不消化嘔吐酸水叫

肢不和面色青黃漸加羸弱木香散方

木香半兩陳橘皮一兩湯浸草芩半兩乾薑半兩

剉裂訶梨勒皮壹大腹皮三分桂心半附子

壹兩炮裂甘草壹分炙赤對夫古赤對

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱

酒下壹錢

治五膈氣胃中噎塞嘔吐酸水不能下食訶

梨勒散方

訶梨勒皮壹兩雞舌香半兩陳橘皮一兩湯浸

白荳蔻半兩去皮人參壹兩去赤茯苓半白木

三分胡蘆三分去桂心壹兩甘草壹分厚朴

壹兩去薑壹兩香生高良薑壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以陳

海藥圖考 卷六 七

米粥飲調下二錢

治五膈氣及胃口不和多吐酸水不思飲食

木香散方

木香半兩附子三分炮裂去皮臍人參三分去丁香

半兩乾薑半兩炮裂陳楠皮一兩湯浸去白訶梨勒

皮壹兩草薹壹兩殼壹兩射干兩半

右件藥搗細羅為散每服不計時候煎生

薑棗湯調下二錢

治五膈氣脾胃久冷嘔吐酸水臍腹疝痛不

思飲食草薹薹丸方

草薹壹兩薹壹兩附子壹兩炮裂去皮臍縮沙一兩陳

橘皮一兩湯浸焙乾薑半兩炮裂枳實半兩

吳茱萸半兩湯浸七桂心三分雞舌香兩檳

榔半兩木香半兩當歸半兩炒

右件藥搗羅為末以水浸蒸餅和搗三二

百杵丸如梧桐子大每服不計時候以熱

酒下三十丸

治五膈氣滯宿食不消嘔吐酸水腹脹不能

下食赤茯苓丸方

赤茯苓壹兩陳橘皮三兩湯浸去白瓤焙大麥蘖一兩炒

黃桂心二兩乾薑一兩炮人參壹兩去蘆頭神麩

二兩炒木杏壹兩訶梨勒皮二兩甘草半兩炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下

二十九

治五膈氣脾胃久冷聖濟總錄嘔吐酸水不

能下食木香丸方

木香壹兩青橘皮壹兩湯浸去白瓤焙桂心一兩白朮壹兩

益智子壹兩肉荳蔻壹兩細辛半兩去苗葉

吳茱萸半兩湯浸七乾薑半兩炮

右件藥搗羅為末酒煮餅爛研和丸如梧

桐子大不計時候以生薑湯嚼下十丸○

總錄右九味搗羅為末以酒煮麩糊丸如

菜豆大每服十五丸食後生薑湯下

治氣膈心腹痞滿諸方

夫氣膈心腹痞滿者由寒氣在於胃膈逆滿

咽塞不通噫聞食鼻心腹脹滿此皆榮衛不和陰陽隔絕藏腑否塞而不宣通故令心腹痞滿也

治氣膈心腹痞滿不下飲食肩背壅悶四肢煩疼柴胡散方

柴胡二兩枳殼壹兩白朮壹兩甘草半兩
赤芍二兩茯苓二兩檳榔二兩陳橘皮壹兩白甄壹兩
赤芍藥壹兩訓黎勒皮壹兩
右件藥搗羅為散每服四錢以水壹中

蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

治氣膈吐涎痰食不消化心腹痞滿雷鳴枳和葉散方

枇杷葉一兩枳殼壹兩人參壹兩檳榔壹兩
夏壹兩湯洗壹兩桔梗壹兩蘆頭壹兩陳橘皮壹兩
七壹兩湯洗壹兩滑壹兩去壹兩白壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治氣膈心腹痞滿脾胃氣虛弱不能飲食訶
梨勒散方

訶梨勒皮一人參三分去京三稜三分

草荳蔻壹兩白木三分赤茯苓三分甘草半兩

陳橘皮壹兩湯浸乾薑三分

桂心三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候煎生

薑橘皮湯調下一錢

治氣膈心腹痞滿四肢拘急體重白朮散方

白朮三分木香半兩訶梨勒皮二分桂心三分甘草

壹分炙丁香半兩人參半兩厚朴壹兩

陳橘皮壹兩湯浸草荳蔻壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候煎生薑木

瓜湯調下二錢

治久患氣膈心腹痞滿咽喉噎塞不下食飲

宜服此方

枳殼壹兩訶梨勒皮壹兩

類聚百六

右件藥搗細羅為散每服不計時候煎生薑橘皮湯調下壹錢

治氣膈咽喉噎塞心腹痞滿不下飲食胃背俱悶赤茯苓丸方

赤茯苓壹兩桂心壹兩乾薑三分炮甘草半兩

赤枳殼壹兩麩炒微黃羚羊角屑壹兩訶梨勒皮

二兩陳橘皮壹兩湯浸去白檳榔壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如彈子大不計時候常含壹丸嚙津如患

甚即將壹丸以煎湯研破服亦得

治氣膈心腹痞滿不下飲食或時嘔吐四肢

不和人參丸方

人參二兩去頭桂心壹兩赤茯苓壹兩訶梨勒皮

壹甘草一分炙乾薑半兩炮檳榔壹兩陳橘

皮壹兩湯浸去白甄焙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下

三十九

類聚百六

十九

藥材目錄

卷之六

治氣膈脾胃久冷心腹痞滿喫食無味面色萎黃沉香丸方

沉香兩半丁香兩半木香兩半檳榔兩半桂心壹兩訶

梨勒皮兩一川大黃兩半碎微炒肉荳蔻兩半去殼麝

香一分細研

右件藥搗羅為末入麝香研勻鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以薑棗湯嚼下十九

治膈氣宿食不消諸方

夫膈氣宿食不消者由寒氣在於脾胃之間使穀不化也此皆脾藏虛弱不能磨之則經宿而食不消也

治膈氣脾胃久冷宿食不消心腹虛脹四肢瘦弱宜服厚朴散方

厚朴壹兩去麩皮塗生沉香三分青橘皮半

湯浸去檳榔兩半丁香兩半訶梨勒皮壹兩桂

心兩半白朮三分高良薑三分荳蔻壹兩去皮木

香三分人參三分去頭甘草壹分炙微赤到

類聚百六

二

本草綱目卷之六

二十七

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候時時服

治膈氣胃中不利宿食不化木香散方

木香壹斤 橘人半斤 湯浸去皮尖 草薹壹斤

去訶梨勒皮二斤 枳心壹斤 檳榔壹斤 麥蘖三分

書白朮三分 甘草壹分 微赤到

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候時

熱服

治膈氣壅滯不下飲食或宿食不消草薹

散方

草薹三分 青橘皮三分 湯浸去白 訶梨勒皮

兩益智子半斤 人參三分 去頭 細辛半斤 赤茯苓

苓半斤 厚朴壹斤 薑汁炙令香熟 半夏半斤 洗七遍

去丁香壹分 甘草壹分 微赤到 檳榔三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣壅滯脾胃虛弱宿食不消四肢虛乏

葷澄茄散方

葷澄茄壹兩人參半兩去盧頭草薹薹半兩細辛

膏木香兩白木三分大腹皮三分京三稜兩

微煨五味子兩半夏半兩湯洗七遍高良薑兩

判去白甘草半兩訶梨勒皮兩青橘皮湯浸

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中煮

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服神巧萬全方同

治膈氣壅滯不下飲食或宿食不消人參散

方

人參壹兩去盧頭木香兩檳榔半兩乾薑三分炮

白朮兩枳殼半兩麩炒黃去桂心兩青橘皮二分

湯去京三稜兩甘草半兩赤茯苓

芩壹兩訶梨勒皮兩厚朴兩薑汁炙香熟

右件藥搗篩為散每服二錢以水壹中盞

類聚百六

二三

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治膈氣脾胃積冷宿食不消心胃不利訶梨

勒散方

訶梨勒皮壹兩人參三分去去白朮三分黃耆三分

到神麴一兩炒微黃木香三分桂心三分麥蘖三分炒微

黃高良薑二分草荳蔻三分陳橘皮半兩湯浸去白

瓢焙

右件藥搗細羅為散不計時候以生薑湯

調下壹錢

治胃膈氣滯脾胃虛冷飲食不消面無顏色

人參散方

人參一兩去去赤茯苓壹兩木香半兩白朮一兩麥

蘖三分炒微黃附子壹兩炮裂去皮訶梨勒皮壹兩縮

沙半兩吳茱萸壹分湯浸去皮編焙乾微炒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下壹錢

治膈氣心胃妨悶不能下食食不消化訶梨

勒丸方

類聚百六

二三

類聚方
三十一

訶梨勒皮壹兩 檳榔二兩 桂心一兩 甘草半兩

赤木香壹兩 陳橘皮二兩 湯浸 白木一兩 前胡

壹兩半 五味子壹兩 去蘆頭

右件藥搗羅為末以棗瓠和搗三二百杵

丸如梧桐子大每服不計時候以薑棗湯

下三十丸

治膈氣不下食縱食不能消化神麴丸方

神麴四兩 炒 麥蘖四兩 炒 厚朴二兩 去蘆

香炙令 陳橘皮壹兩 湯浸 桂心一兩 訶梨

勒皮半兩 乾薑壹兩 炮 檳榔一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵

如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下

二十丸

治膈氣心胃中痛諸方

夫膈氣心胃中痛者由宿有寒氣在於臧腑

之間因其經絡否澁不得宣通臧虛邪感上

攻於胃中邪氣與正氣相擊故令心胃中痛

也

類聚百六
三四

治膈氣壅滯攻心胃中連肩背痛日夜不止
赤茯苓散方

赤茯苓一兩桂心一兩人參一兩去蘆頭去陳橘皮二兩

湯浸去白朮一兩蓬莪茂一兩大黃壹兩剉吳

茱萸半兩湯浸七厚朴二兩去蘆皮塗生

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治膈氣心胃冷硬結痛下氣檳榔散方

檳榔壹兩木香兩陳橘皮壹兩半湯浸枳實

壹兩麩前胡壹兩去蘆頭去川大黃二兩剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治膈氣心胃冷氣疼痛不食少力丁香散方

丁香半兩厚朴壹兩半去蘆皮塗桂心三分白

朮壹兩甘草壹兩剉人參壹兩去蘆頭去赤芍藥兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

類聚百六
三五

類聚方

三五

蓋煎至五分去滓入酒半小盞更煎三兩
沸不計時候稍熱服

治膈氣心胃中伏滯冷氣痰痛飲食不下桂
心散方

桂心壹兩去前胡壹兩去人參壹兩去牛李根

壹兩訶梨勒皮二兩青橘皮壹兩湯浸

右件藥搗羅為散每服四錢以水一中盞
煎至六分去滓不計時候稍熱服

治膈氣心胃中煩滿疼痛及走疰氣欲絕柴

胡散方

柴胡一兩甘草半兩炙當歸三分剉木香

壹兩檳榔壹兩犀角屑壹兩麝香三錢

右件藥搗篩為散入麝香研勻每服三錢
以水一中盞煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治膈氣心胃中積冷氣痛心中滿悶不能下
食或時嘔吐半夏散方

半夏壹兩湯洗吳茱萸半兩湯浸桂心

壹人參壹兩去 甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治膈氣心胃中氣痛不可忍方

木香半兩 吳茱萸半兩湯浸七 桂心三分

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中盞煎至六分不計時候稍熱服

治膈氣心胃中虛寒疼痛厚朴散方

厚朴二兩去麤皮塗生 吳茱萸半兩湯浸

微桂心 白朮壹兩 陳橘皮去白 蘇焙

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下一錢

治膈氣食後嘔逆心胃中疝痛方

乾薑半兩炮 吳茱萸半兩湯浸七 白朮二兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下壹錢

治膈氣心胃中氣逆時復疼痛枳實散方

枳實壹兩 麩黃兩 桂心壹兩

右件藥搗細羅不散每服不計時候以熱

酒調下一錢

治膈氣心胃間痛宜服此方

白朮壹兩 枳實壹兩 麩黃兩 神麴壹兩 炒壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱

酒調下壹錢

治膈氣心胃氣滯疼痛連於腹脇飲食不下

木香丸方

木香壹兩 青橘皮壹兩 去白兩 檳榔壹兩 桂心兩

乾薑半兩 炮人參三分 去兩 細辛三分 吳茱萸三分

半兩湯浸七 川烏頭半兩 去皮兩 貝母三分 煨微

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二

十九丸常含三五丸嚥津甚佳

治膈氣心胃間痛氣逆飲食不下小草丸方

小草三分 桂心三分 川椒三分 去目及閉兩 乾薑兩

三分炮裂對細辛三分附子半兩炮裂去皮膚

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十丸

治五噎諸方

夫五噎者一曰氣噎二曰憂恚噎三曰食噎四曰勞噎五曰思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦隔絕津液不行憂恚噎怒所以謂之五噎噎者噎塞不通故也

治五噎胃管氣滯心胃滿悶咽中噎塞不能下食人參散方

人參半兩去蘆頭半夏半兩易洗七遍去滑桂心半兩乾薑半兩炮白朮半兩草薹薹去皮甘草半兩炙陳橘皮一兩易浸去白枇杷葉半兩拭去毛炙華髮半兩大腹皮壹兩丁香半兩訶梨勒皮兩厚朴兩薑汁炙令香熟

右件藥擣羅羅為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治五噎心胃不利痰壅食少半夏散方

半夏壹兩湯洗檳榔二兩前胡壹兩大枳殼

一兩麥炒吳茱萸半兩湯浸七人參壹兩

微黃去瓢甘草半兩炙桔梗壹兩去桂心一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分小麥小豆各五十粒煎至六

分去滓不計時候稍熱服

治噎不下食心胃煩悶不得眠卧盧根散方

盧根一兩木通半兩射干三分半夏三分湯

去赤茯苓半兩人參壹兩去甘草半兩炙枳

殼二分炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治噎心胃煩滿食飲不下腹脇妨悶訶梨勒

散方

訶梨勒皮壹兩桂心三分枳殼三分炒陳

橘皮壹兩湯浸去白 甘草半兩炙 蘆根壹兩木

瓜三分 木香半兩 羚羊角屑三分

右件藥搗細羅為散不計時候煎木瓜湯調下壹錢

治噎心胃短氣煩悶不能下食半夏九方

半夏二兩湯洗七遍去滑 木香一兩 枳殼二兩麩炒微黃去瓢 羚羊

羊角屑壹兩 桂心一兩

右件藥搗羅為末以生薑自然汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服不計時候煎木瓜

湯下壹十九

治噎不能下食咽喉壅塞心胃煩悶生薑汁煎方

生薑汁五合 白蜜五兩 人參二兩去蘆頭 百合

二兩搗羅為末 牛酥五合

右件藥內銅鍋中以慢火煎如膏不計時候含一丸如半棗大嚥津或煎人參湯調

下壹茶匙亦得神巧萬全方同

又方右取春杵頭糠細羅以老牛涎和丸如

彈子大不計時候含一丸嚥津

治氣噎諸方

夫氣噎者由陰陽不和藏氣不理寒氣填於
胃膈故噎塞不通而謂之氣噎令人喘悸胃
背痛也

治氣噎食飲不下腹中雷鳴大便不通利氣

檳榔散方

檳榔壹兩木香半兩芎藭半兩訶梨勒皮兩昆布
壹兩桂心半兩甘草一分炙兩川大黃壹兩
去鹹味

微炒半夏半兩湯洗七遍去滑

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中
盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治氣噎不通心悸喘急胃背疼悶咽喉壅塞

半夏壹兩湯洗七遍去滑柴胡壹兩羚羊角屑壹兩射

干三分赤茯苓兩桔梗三分蘆頭去昆布壹兩湯洗

甘草半兩炙兩木香半兩湯洗三遍以水一

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中
盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
稍熱服

治氣噎心膈壅塞不能下食宜服此方

赤茯苓壹兩桂心半兩桑根白皮壹兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入粟米壹茶匙煎至六分去滓不計時

候溫服

治咽喉不利胃膈氣噎不能下食方

半夏壹兩半湯洗七遍去滑桂心三分木香半兩

右件藥搗麤羅為散每服二錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治胃中氣噎不下食喉中如有肉塊方

昆布二兩洗去鹹味小麥二合

右件藥以小三大盞煎候小麥爛熟去滓

每服不計時候喫壹小盞仍揀取昆布不

住含三兩片子嚙津極妙分次

治氣噎胃膈不利煩滿不下食方

蜜半升酥半升生薑汁半升

右件藥相和以慢火煎成膏收於瓷合中每取半棗大含化嚥津或內熱酒中調服之亦得

治胃膈氣噎寒煩悶不下飲食腹脇妨脹秘

澁不通大腹皮丸方

大腹皮壹兩木香壹兩訶梨勒皮壹兩桂心半兩
川大黃壹兩半半夏一兩胡一兩
碎微炒 微炒 一兩 湯洗 前 胡 一兩

去蘆頭枳殼壹兩青橘皮一兩湯浸
鬱三乾木瓜郁李人壹兩湯浸
右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候煎生薑木通湯下三十丸

治食噎諸方

夫食噎者此由藏冷而不理津液澁少而不能傳行飲食故食入則噎塞不通故謂之食噎胃內痛不得喘息食不下是也

治飲食喜噎宜服半夏散方

半夏壹兩湯洗乾薑壹兩炮石膏二人參

二兩去蘇蘇根壹兩桂心一兩甘草半兩炙吳

茱萸半兩湯浸七

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中

蓋人生薑半分棗二枚小麥小豆各五十

粒同煎至六分去滓不計時候稍熱服

治食噎飲食不下妨悶極甚羚羊角散方

羚羊角屑一兩前胡壹兩去甘草壹兩炙人

參二兩去陳橘皮二兩湯浸赤茯苓一兩馬

蘭子二兩微炒

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中

蓋人生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治氣膈食噎方

川大黃壹兩訶梨勒皮壹兩

右件藥搗羅羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以粥飲下十九

治胃膈氣滯食噎不下方 聖濟總錄名 昆布丸方

春杵頭細糠一合昆布末一兩○總錄洗去鹹焙

右件藥用老牛涎一合生百合汁壹合二

味以慢火煎入少蜜攪成膏溲前二味九

如雞頭實大不計時候舍一九細細燕津

神巧萬全方同

治酸咽吐水及白沫食飲不消腹脇脹滿檳

榔散方

檳榔一兩厚朴一兩去蘆皮塗生薑汁炙令香熟 甘草半兩炙微

赤川壹兩到大黃壹兩碎微炒 白朮壹兩訶梨勒皮壹兩陳

橘皮壹兩半湯浸 吳茱萸半兩湯浸七桂

心一兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治食訖醋咽多噎食飲不下脾胃虛冷白朮

散方

白朮二兩吳茱萸半兩湯浸七高良薑壹兩

桂心壹兩去 人參壹兩去

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋人生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治噤咽胃中氣塞食飲不下半夏散方

半夏半兩湯洗 人參壹兩去 赤茯苓壹兩 甘

草半兩炙 吳茱萸半兩湯浸 訶梨勒皮微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

計時候稍熱服

治脾胃冷氣上攻胃膈切痛醋咽不能下食

木香散方

木香壹兩 厚朴壹兩去 薑汁炙令香熟 檳榔壹兩 陳

橘皮二兩湯浸 白朮二兩 甘草半兩炙 高良

薑壹兩 前胡二兩去

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋人生薑半分煎至六分去滓不計時候

蓋入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治脾胃冷氣上攻胃膈切痛醋咽不能下食

木香散方

稍熱服

治胃脇支滿背上時寒腹脹多噫醋咽氣逆

前胡丸方

前胡一兩半枳殼壹兩麩炒壹兩桂心一兩草薺

薤白壹兩高良薑壹兩乾薑半兩炮赤茯苓

吳茱萸壹兩湯浸七赤芍藥壹兩厚朴二兩

去蘆皮塗生薑壹兩川大黃二兩碎微炒杏仁壹兩

去皮尖雙人壹兩炒微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下
三十九

治脾肺氣冷上攻胃膈嘔吐酸水不思飲食

腹脇虛脹檳榔丸方

檳榔兩高良薑三分陳橘皮半兩湯浸桂

心壹分厚朴半兩薑汁炙令香熟訶梨勒皮半兩

半夏半兩湯洗七遍去滑草荳蔻半兩白朮半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以生薑湯下三十

丸

又方檳榔二兩陳橘皮壹兩半湯浸去白瓢焙

右件藥搗細羅為散每服不計時候以生

薑蜜湯調下壹錢

大全本草

余匱下函方治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不

下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞

去滓不計時溫服

孫尚藥方治諸吃噎橘皮二兩湯浸去瓢剉

以水壹升煎之五合通熱頓服更加枳殼

一兩去瓢炒同煎之服效

三四方

五噎證治

夫五噎者即氣噎憂噎勞噎思噎食噎雖五種不同皆以氣為主所謂氣噎者心悸上下不通噎噦不徹胃背痛憂噎者遇天陰寒手足厥冷不能自溫勞噎者氣上膈脇下支滿胸中填塞攻背疼痛思噎者心怔悸喜忘目

視眩暈食噎者食無多少胃中苦寒疼痛不得喘息皆由喜怒不常憂思過度恐慮無時鬱而生涎涎與氣搏升而不降逆害飲食與五膈同但此在咽嗑故名五噎
 五噎散治五種噎食飲不下胃背痛嘔噦不徹攻刺疼痛淚與涎俱出

- 人參 茯苓 厚朴 去蠹皮剉 姜汁製炒 枳殼 去穢 炒
- 桂心 甘草 訶子 炮去核 白朮 橘皮
- 白薑 炮 三稜 炮 神麩 炒 麥蘗 炒各二兩 木香 炮

檳榔 蓬朮 炮各半兩

右為末每服二錢水一盞生姜三片棗子

壹枚煎七分 得效方煎至十分 空心溫服棗湯點

亦得

沉香散治五噎五膈胃中久寒諸氣結聚嘔逆噎寒食飲不化結氣不消常服寬氣通噎寬中進食

- 白朮 茯苓 各半兩 木通 南北經驗方 三兩 當歸 補珍方
- 橘皮 青皮 大腹子 大腹皮 經驗方 補珍方

三兩得效
 方檳榔
 方各甘草
 一兩
 白芷
 方一兩
 方一兩
 右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空腹溫服○得效方右劉散每服水壹盃薑三片棗二枚煎至六分空腹溫服

木香
 芍藥
 方經方
 方大
 方壹兩
 方去
 方經
 方去
 方經

嘉禾散治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胃

膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛可思飲食如中
 焦虛痞不任攻擊臟腑虛寒不受峻補或因
 病氣衰不復常稟受怯弱不能多食尤宜服
 之

枇杷葉去毛姜汁塗炙 薏苡仁微炒 縮砂仁 人參
 茯苓各壹兩 石斛細判用酒炒 大腹子微炒 沉香
 木香 藿香 杜仲去皮姜酒炙 隨風子無
 揀緊小詞子 穀蘖微炒 白荳蔻 五味子炒
 代各三分 桑白皮 丁香 檳榔 青皮各半 半夏

餅炙神麴各膏甘萼炙兩陳皮三分白朮炒

右為末每服二錢水壹盞生姜三片棗三

枚煎至七分溫服不計時五噎入乾柿一

枚同煎拾服見效膈氣叶逆羸困入薤白

三寸棗五枚同煎

搥津圓治五噎八痞

獨頭蒜不拘多少每介開七竅入去皮江

也丁香澹寮方橘紅木香澹寮方草擦不火

胡椒

右等分為末用蒜膏為丸如梧子大先嚼

搥少許令生津液乾嚙貳粒漸加至三五

圓臨臥服

廣五行記永徽中有僧維則病噎不能食語

弟子曰吾死之後便可開吾胃喉視有何物

言絕而卒弟子果開視胃中得一物形似魚

而有兩頭遍體皆肉鱗弟子置器中跳躍不

止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作澱有

一僧以澱置器中此虫遂遶器中走須臾化
爲水此乃生痕非五噎比後人因以藍治噎
誤矣澹寮方用
後方同

五膈證治

病有五膈者胃中氣結津液不通飲食不下
羸瘦短氣名憂膈中脘實滿噎則噤心飲食
不消大便不利名曰思膈胃脇逆滿噎塞不
通嘔則筋急惡聞食臭名曰怒膈五心煩熱
口舌生瘡四肢倦重身常發熱胃痺引背不

能多食名曰喜膈心腹脹滿欬嗽氣逆腹下
若冷雷鳴遶臍痛不能食名曰恐膈此皆五
情失度動氣傷神致陰陽不和結于胃膈之
間病在膈中之下故名五膈若在咽喉卽名
五噎治之五病同法

五膈圓治憂恚思慮膈塞不通及食冷物卽
發其病苦心病不得氣息引背痛如刺心下
堅大如粉絮澹寮方心
下堅硬緊痛欲吐吐卽差食
飲不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔逆

悉主之

麥門冬去心 甘草炙各五兩 人參四川 以各出干澹紫

方去目及遠志 炒去心 細辛去苗 桂心炒三兩 〇澹紫

閉口者方去麤皮 乾薑炮二兩 附子炮壹兩

右為末蜜圓彈子大含化日三夜二胃中

當熱七日愈亦可丸如梧子大米湯下二

三十圓延年方夏加麥門冬甘草人參各

壹兩經心錄以吳茱萸代杜治遇寒冷則

心痛咽中有物吐不出嚙不入食飲減少

並可服之不拘時候得効方同

寬扁圓治氣不升降胃膈結痞

木香澹紫方 京三稜炮 青皮各半兩〇澹紫方去白

半夏三洗七次 大腹子壹分〇澹紫方壹兩

右為細末姜汁糊為丸梧子大食後米湯

下二三十圓得効方同

嘉禾散 沉香散並治五隔方見前

神巧萬全方

治五膈氣噎悶或吐逆不下食礪砂丸方

大附子壹分剝去中心肉別和後藥杵礶砂水飛過丁香上

各半 青橘皮去穢木香 肉豆蔻各壹分

椰三分生用

右以淨礶砂內入剝了附子中和不盡都

將熟麪如饅頭裹入灰中煨令焦却和丁

香等都杵為末滴水和再杵丸如梧桐子

大每服二十丸生薑湯下

五膈丸治寒冷則心痛咽中有物吐之不出

咽之不下方

乾薑炮桂心各二兩麥門冬去細辛人參

去蘆茱萸各二兩附子炮遠志去心椒炒令汗出甘草

各壹兩

右件搗羅為末煉蜜丸梧桐子大空心酒

下二十九

治五氣胃中煩滿吞塞不通心腹虛脹心下

結實飲食不得宜服訶梨勒散方

白芷 沉香 丁香 訶梨勒皮 前胡

各一兩 木香剝人參去蘆厚朴去皮薑汁塗沉

香研青橘皮去益智子去桂心去枇杷葉

拭去華澄茄炒赤茯苓去高良薑剉白豆

薤去皮炙白朮切甘草炙已上名半兩

右搗羅為末每服四錢以水壹中蒸生薑

半分煎至六分去滓熱服

治五種膈氣壅滯氣逆心腹脹痛宿食不消

宜服丁沉凡

丁香 沉香 木香 訶梨勒皮 附子

炮水硃砂過乾薑炮青橘皮去神麴別已上

各壹兩 檳榔壹兩 桃人壹百二十個湯

右件搗為末以硃砂神麴別以酒煮為膏

和溲丸如梧桐子大每服二十九生薑湯

下

治食物過飽不消遂成痞膈將死方

馬牙消無一大兩碎之如吳茱萸半斤陳者

右煎茱萸取濃汁投滓承熱吸之久未轉

更進一服立愈 唐竇群曾話在常州時

食膾不消痞結悶甚諸藥悉不轉腹堅氣

絕醫徐彥莊處得此方服乃瘥竇云微此
殆絕

噎病方

夫噎病亦有五種謂氣噎憂噎食噎勞噎思
噎噎者噎塞不通心胃不利飲食不下也治
法各隨其證候而治之

治五噎立効方

枇杷葉拭去毛陳橘皮去白各生薑半兩
右為麤散都以水二大盞半煎至一盞半

去滓不計時温分三服

治五噎胃膈咽喉不利痰逆食少宜服此方

右用半夏七枚小者湯浸洗去滑擣羅為
末作一服以濃生薑湯調服之患年多者
不過三服瘥

治卒食噎方

陳橘皮壹兩湯浸去白

右以水壹大盞煎取半盞稍熱頓服肘後方備

預百要方同

又方左右傍人可與輕解衣帶勿令噎者知則愈

是齋醫方

治噎溪口王省幹擇中傳以蘿蔔濃煎湯如熟水飲之

治男子婦人氣噎病立僧正方

雞素子

兩個和宿食用濕紙裹黃泥固濟炭火內燒將烟斷時取出去黃泥

素子內物不可去分毫

木香壹錢丁香壹錢沉香壹錢

右四味同為細末用煮棗去皮核元如梧

桐子大每服三十元食前下煎至六分食

瑣碎錄

治膈氣

一切氣痛延胡索不拘多少每服二錢熱酒

調下甚者不過再服

胃中噎塞用寔婦梳壹枚燒灰煎鑰匙湯調

下即寬

冷痰飲惡心川華芩一兩搗羅為末每於食

前用清粥飲調下半錢

嚴氏濟生方

五噎散治五噎食不下嘔呃痰多咽喉噎塞

胃背滿痛

人參 半夏湯泡七次 桔梗去蘆炒 白芷 薤仁

木香不見火 枳頭糠 白朮瀉寒方炒 華澄茄瀉寒方

方去沉香不見火 枇杷葉拭去毛 澹姜澹寒方 汁浸炒

乾牛薷各壹兩 甘草炙半兩

右為細末每服二錢醫方大成集成南北經驗方袖珍方亦效

咀方錢水一中盞生薑七片煎至六分食

後溫服王機微義同

五膈散治五膈胃膈痞悶諸氣結聚脇肋脹

滿痰逆惡心不進飲食

枳殼去瓢炒 木香不見火 青皮去白 大腹子 白

朮瀉寒方炒 半夏炒 麩炒 丁香不見火 天南星湯泡去皮

乾薑炮 麥蘖炒 草果仁各壹兩 甘草炙半兩

右為細末每服二錢醫方大成集成南北經驗方袖珍方亦效

咀方錢水壹中盞生薑五片煎至六分大成

袖珍方七分溫服不拘時候待效方玉機微義同

瓜萋實圓治胃痞胃中痛徹背喘急妨悶

瓜萋實研別枳殼去瓢半夏湯泡七次桔梗去瓢

各壹兩

右為細末薑汁打糊為圓如梧桐子大每

服五十圓食後用淡薑湯送下得效方澹

大成集成南北經驗方
袖珍方永類鈴方同

修月魯般經後錄

壯元丸治膈氣酒膈酒積涎漱腹疼吐逆痞

滿

巴豆五十個取霜神麩半斤半夏一兩洗雄黃

白麩炒十錢

右研勻水為丸小豆大細米糠炒變赤色

食後溫水下童子二丸三四歲膏丸歲半

半丸止嗽溫瀼汁下止嘔吐生薑湯下

得効方

五噎

沉香散治五噎五膈胃中久寒諸氣結聚嘔

逆噎塞食飲不化結氣不消常服寬氣通噎

寬中進食方見三因方

嘉禾散治同上

大七氣湯治喜怒不節憂思兼并多生悲恐
或時振驚致臟氣不平增寒發熱心腹脹滿
傍衝兩脇上塞咽喉有如炙轡吐嚔不下皆
七氣所生

半夏湯泡七次五兩 白茯苓四兩 厚朴姜製炒三兩 紫蘇

右剉散每服四錢水壹盃薑三片棗壹枚

煎空腹溫服

五膈

寬中散治因憂恚寒熱動氣成五種膈氣不

進飲食

白豆蔻去皮二兩 縮砂四兩 香附子炒去毛十六兩 丁香

木香三兩 青皮去白四兩 甘草炙五兩 厚朴去皮

陳皮去白四兩 薑汁壹斤

右為末每服二錢入生姜二片塩少許沸湯點服不以時候諸冷氣用之亦効

澹軒方

醫治膈氣 欠審問休使

用白花牛或白牛氣喉頰骨舌下者約四五

圈以酸米醋蘸火上炙乾再蘸再炙之候

半椀醋蘸炙乾盡碾為細末米湯調服之

大有神效

肘後方

金匱玉函方治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不

下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞

衛生易簡方 去滓不計時溫服

外臺祕要治噎矜羊角屑一物多少自在末

之飲服方寸匕亦可以角摩噎上良

澹察方

膈噎

五膈寬中散治因憂恚寒熱動氣傷神致陰

陽不和腑臟生病結於胃膈之間遂成五膈

之病一曰憂膈胃中氣結津液不通飲食不

下羸瘦短氣二曰恚膈心下實滿噎噉醋心

飲食不消大小便不利三日氣膈胃脇痞逆
 噎塞不通噫聞食臭四日寒膈心腹脹滿咳
 嗽氣逆腹上苦冷雷鳴遶臍痛不能食肥五
 日熱膈五心中熱口中爛生瘡四肢煩重唇
 口乾燥身體或熱腰項疼痛胃痺引背不能
 多食及一切氣疾並皆治之○醫方大成治
 七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胃膈痞
 滿停痰氣逆遂成五膈之病一切冷氣並皆
 治之

白豆蔻去殼木香二兩丁香不縮砂仁

南北經驗方玉青皮去陳皮湯浸洗去甘

草炙五兩厚朴去皮生香附子去毛淨各

三兩

右為細末每服壹錢大成經驗方姜汁搥

末少許沸湯點服醫方集成袖珍方承

衛生寶鑑

膈氣噎

桂香散治膈氣反胃諸藥難差朝食暮吐暮

食朝吐甚者食已輒出其效如神

水銀 黑錫 各三錢 硫黃 五錢

右叁味鈔內用柳木槌研煞微火上細研為灰取出後入丁香末貳錢桂末貳錢生薑末三錢一處研勻每服三錢黃米粥飲調下壹服取效病甚者再服

丁香附子散治膈氣吐食

丁香 半兩 檳榔 壹箇重三錢 黑附子 一箇重半兩 炮去皮 上硫黃 硃石 胡椒 各二錢

右先將四味為末入研藥和勻每服二錢用飛硫黃一箇去毛翅足腸肚填藥在內濕紙五七重裹定慢火燒熟取出嚼食後用溫酒送下日三服如不食葷酒粟米飲下不計時

漢防已散治五噎

官桂皮 陳皮 各壹兩 漢防已 五錢 杏仁 湯浸去尖 紫蘇 羚羊角 鎊細辛 各七兩 右七味粗末每三錢水壹錢半薑三片煎

七分去粗溫服忌酸味生冷滑物壹日兩

服拔粹方同南北經驗方袖珍方日進三服

紅豆丸治諸嘔逆膈氣反胃吐食

胡椒 縮砂 棟丁香 紅豆各貳十

右為末薑汁丸如皂角子大每服壹丸棗

壹箇去核填藥麩裏煨熟細嚼白湯下空

心日三服

聖濟總錄

五種膈氣

人之胃膈升降出入無所滯礙命曰平人若

寒溫失節憂恚不時飲食乖宜思慮不已則

陰陽拒隔胃腕否塞故名膈氣曰憂曰恚曰

氣曰寒曰熱五種雖殊其為膈病則一

治陰陽氣不升降否氣膈氣心痛腹痛咽喉

噎悶氣道不勻嘔吐痰沫飲食不下大便祕

利不定或裏急後重腹痛不可忍此藥養氣

消痰溫中散滯緩氣丸方

木香半兩 桂去麤皮 人參貳兩 白朮貳兩 吳茱萸

二兩厚朴去麤皮薑汁炙阿魏半兩和麵煨熟訶梨勒皮貳兩附子地裂

右九味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十九溫熟水下不計時候

治男子婦人五種膈氣及賣切氣不思飲食建中丸方

白豆蔻去皮胡椒壹分藿香斤炒高良薑各三
分甘草炙陳橘皮易浸去白焙芍藥兩茵醬兩人參
紅豆蔻去麤皮藟炮芎藭兩藿香葉各半兩

右壹十二味搗羅為末鍊蜜和丸如雞頭大每服二丸溫酒或生薑湯嚼下不計時候

治五種膈氣豆蔻散方

肉豆蔻去皮木香厚朴薑汁炙人參去麤皮
赤茯苓去黑皮桂去麤皮甘草炙青橘皮湯浸
去白焙訶梨勒三枚炮檳榔二枚

右壹十味搗羅為散每服二錢匕如茶點服若入薑棗同煎亦佳能治氣補勞通血

脉益脾胃

治五種膈氣通膈散方

枳殼去瓢炒桂皮去麤甘草炙陳麴炒訶黎勒炒

皮白木陳橘皮湯浸去赤茯苓去黑皮

人參炮乾薑炮京三稜煨草豆蔻皮去檳榔

半生五味子炒厚朴去麤皮生半夏湯洗

半熟生薑同擣如泥却攤在新木香郁李人

尾上用文武火煨令黃色木香

湯浸退皮麩炒黃各壹兩

右壹十八味擣羅為散每服二錢匕入鹽

少許如茶點服不計時候○醫方大成有

咬咀每服三錢水壹盞薑棗煎服搯湯點

亦可醫方集成南比經驗方

治霍亂吐瀉氣逆結胃膈氣刺痛不思飲食

備急沉香散方

沉香錯丁香半生炒乾薑炮京三稜煨蓬莪

茂煨到各藿香用木香肉豆蔻皮去桂去

皮人參赤茯苓去黑皮高良薑 胡椒

甘草炮各

右壹十四味搗羅為散瓷合盛每服二錢匕入塩少許如茶點服不計時候

治五膈氣痞心胃噎塞漸致羸瘦五膈散方

人參 赤茯苓去黑皮 厚朴薑汁炙 枳殼去

麩桂皮去麩 甘草炙 陳皮炒 訶梨勒皮 白

木 陳橘皮湯浸去白焙 乾薑炮 京三稜煨 各壹

兩 檳榔剉 木香各壹分

右一十四味搗羅為散每服二錢匕入塩點服如脾氣腹脹心胃滿悶每服三錢用

水壹盞入生薑壹塊切棗二枚擘破鹽少許同煎至八分不計時候和滓熱服

治五膈氣痞悶腹脅脹滿豆蔻丸方

肉豆蔻人 京三稜炮 蓬莪茂炮 青橘皮

湯浸去白焙 陳橘皮湯浸去白焙 桂去麩皮 檳榔剉

木香各半兩 牽牛子四兩半生半熟取末貳兩

右九味搗羅為末以棗肉和丸如梧桐子大每服二十九食後生薑湯下

治五膈氣喘促腹脇脹滿胃膈不快痰逆惡

心不思飲食萊菔木香散方

萊菔子

貳兩

粟米

壹兩半

陳橘皮

湯浸去白焙壹兩

巴

豆

肥大者三十枚去皮於瓦石器內與上三味同炒候藥焦黑色揀去巴豆不用

木香

壹分

右五味搗羅為散用煮萊菔湯調下二錢

匕或以生薑汁煮麵糊和丸如梧桐子大

萊菔湯下十五丸亦得

治五種膈氣利膈散積滯消腹脹進飲食

京三稜丸方

京三稜

濕紙裏煨碎

沉香

各半

青橘皮

湯浸去白焙

鼈甲

去裙襴醋炙

檳榔

剉各壹分

巴豆

五枚去油為霜

右六味搗羅為末水煮白麵糊和丸如菉

豆大每服五丸食後溫熟水下

治五種膈氣胃腹脹悶不能飲食礪砂枳殼

煎丸方

礪砂

無石者別研三分

枳殼

湯浸去麩切作片子焙乾取末四兩

頭

炮裂去皮尖為末

大黃

生為末各壹兩同三味末壹處拌勻用醋四升

銀器內慢火熬末桂皮

五靈脂

乾漆炒

出蓬莪茂煨當歸切焙芍藥各壹兩牽牛子取

朱參

右壹十壹味除前膏外搗羅為末入硃砂等膏中於臼內搗壹千下和丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下婦人血氣醋湯下不嚼不計時服

治一切膈氣妨悶不下食木香訶梨湯方

木香訶梨鞞核陳橘皮湯浸去白五味子半夏湯洗七人參湯去滑桂皮去麩赤茯苓

去黑蘆根枳殼去麩炒各三分

右壹十味剉如麻豆每服五錢匕水壹盞半入生薑壹兩大切煎取八分去滓溫服

治膈氣心腹痞滿全不思食華撥飲方

華撥沉香剉草豆蔻去青橘皮去白丁香香桃人炒去尖大腹剉生薑切炒各訶梨勒皮貳兩甘草炙枳殼去麩炒右壹十壹味麤搗篩每服三錢匕水壹盞

煎至七分去滓溫服不拘時

治五膈氣噎滿悶不下食五膈丸方

白木炒木香炮訶梨勒炮去核陳橘皮去白焙

昆布洗去鹹水桃人去皮尖雙入大黃剉桂去

皮半夏湯洗去滑七檳榔剉枳實去瓢五味子

各半琥珀研壹

右壹十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服三十九空心生薑棗湯下

治膈氣紫金丹丸

桂去皮訶梨勒煨去核昆布洗去鹹桃人湯

木香去皮尖雙入琥珀研陳橘皮去白焙

炒各一兩半沉香雞舌香各半丹砂別研

三白木木瓜根剉壹

右一十二味搗研為末再同研勻鍊蜜和

丸如櫻桃大每服壹丸含化嚙津或欲作

小丸如梧桐子大每服二十九温酒下

膈氣咽喉噎塞

膈氣噎塞者由憂思過甚氣結不通肺胃虛

弱氣留育膜則結滯於胃膈故升降否塞蓋

弱氣留育膜則結滯於胃膈故升降否塞蓋

喉嚨者氣之所以上下若氣塞不通則咽喉
噎悶狀若梅核嚥納有妨故謂之膈氣咽喉
噎塞也况肺氣上通於喉嚨胃脉外連於咽
嗑若使上下升降肺胃和平則陰陽調順膈
氣自散矣

治諸膈氣心胃煩結噎塞不通飲食日減檳
榔湯方

檳榔 剉 訶梨勒皮 炒 葦澄茄 赤茯苓 去
皮人參 陳橘皮 湯浸去 甘草 炙 沉香 剉

麥蘖 炒 厚朴 去麤皮生 京三稜 炮 白朮 等
右膏十二味麤搗篩每服三錢匕水膏蓋
生薑二片大棗二枚擘煎取七分去滓溫
服日三夜一

治膈氣咽喉噎塞欬嗽上氣痰盛喘滿氣道
否滯不得升降乾嘔妙功丸方

鵬砂 研炒末 丹砂 研炒末 硃砂 飛研炒 巴
豆霜 炒末 三桂末 益智人末 各半
右六味拌和令勻用糯米粥和丸如麻子

喉嚨者氣之所以上下若氣塞不通則咽喉
噎悶狀若梅核嚥納有妨故謂之膈氣咽喉
噎塞也况肺氣上通於喉嚨胃脉外連於咽
嗑若使上下升降肺胃和平則陰陽調順膈
氣自散矣

治諸膈氣心胃煩結噎塞不通飲食日減檳
榔湯方

檳榔 剉 訶梨勒皮 炒 葶澄茄 赤茯苓 去
皮人參 陳橘皮 湯浸去 甘草 炙 沉香 剉

麥蘖 炒厚朴 去麤皮生薑汁炙 京三稜 炮 白朮 等

右膏十二味麤搗篩每服三錢匕水膏蓋
生薑二片大棗二枚擘煎取七分去滓溫

服日三夜一

治膈氣咽喉噎塞欬嗽上氣痰盛喘滿氣道
否滯不得升降乾嚥妙功丸方

鵬砂 研炒末 丹砂 研炒末 硃砂 飛研炒 巴
豆霜 炒末 三桂末 益智人末 各半

右六味拌和令勻用糯米粥和丸如麻子

大每服壹丸或兩粒食後臨寢乾嚥

治膈氣咽塞憂結不散人參湯方

人參 赤茯苓去黑皮 白朮 桂皮去麤皮 訶梨

勒皮炒 京三棱炮 陳橘皮湯浸去白焙 枳殼去

麩甘草炒 檳榔各 木香半 草豆蔻去皮

右壹十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞

煎至七分去滓溫服日二夜一

治諸膈氣冷熱不調喜怒無度胃中咽塞不思飲食或憂思過甚不足之氣蘊積心臆日

漸消瘦大腹湯方

大腹皮切 檳榔剉 木通剉 防已 青橘皮

湯浸去白焙 紫蘇莖葉 桑根白皮剉 甘草炙

枳殼去瓢麩炒 草豆蔻去皮 丁香皮剉 大黃

剉炒各半兩 木香壹分

右一十三味麤搗篩每服三錢匕水壹盞

生薑二片大棗一枚擘同煎七分去滓溫

服日三夜一

治膈氣咽喉噎塞萬靈木香丸方

木香壹分附子炮裂去皮臍檳榔剉一兩縮沙皮

乾薑炮桂皮去麩陳橘皮湯浸去白肉豆蔻去殼

藜香子炒各半兩

右九味搗羅為末醋煮麪糊丸如梧桐子

大丹砂為衣每服二十九生薑湯下茶酒

亦得不計時候

治膈氣咽喉噎塞不下飲食丁香丸方

丁香各壹錢木香各壹錢榔檳剉青橘皮去白醋

控乾炒令黃京三稜炮芫花醋浸壹宿色各壹分

各半五靈脂壹兩香墨燒令烟盡候通赤放冷秤壹錢

右八味同搗羅為末再羅過肥巴豆七粒

去皮心膜細研如膏塗於新瓦上出油令

盡細研與前來藥末同研拌令極勻川水

煮白麪糊和劑鞭軟得所丸如人麻子大

令乾每服五丸至七丸生薑湯下不計時

候

治膈氣咽喉噎塞心煩嘔逆不進飲食人參

丸方

人參 厚朴去蘆皮生 枇杷葉去毛 檳榔

剉各半 半夏淡漿水煮熟 壹兩拾沸切碎半兩

右五味搗羅為末麩糊為丸如梧桐子大

每服二十九生薑湯下不拘時服

治膈氣咽喉噎塞煩悶嘔吐心胃痞滿腹脇

膨脹可思飲食安息香煎丸方

安息香別研半兩 木香 沉香各壹兩 訶梨勒皮

炮貳桂去麤皮 白茯苓去黑皮 肉豆蔻人 縮

沙人 芍藥 萆澄茄 懷香子微炒 益智

去皮五味子微炒 白豆蔻人 芎藭 當歸

切丁香皮剉 蓬莪茂地 京三稜剉 莎草根

去檳榔剉各壹兩半 硃砂別研半兩 阿魏壹分細研

許和作餅子炙令香熟

右二十三味除別研外搗羅為末再同研

勻用蜜三十兩鍊熟和為丸如雞頭大每

服壹丸細嚼溫酒或生薑鹽湯下不拘時

治膈氣噎塞不入飲食導氣散方

虎頭王字骨酥炙 萆撥微焙 人參 厚朴去蘆皮生

薑汁 羚羊角屑

右五味等分搗羅為散每服二錢匕溫水

調臨臥食後服

治膈氣噎塞脾胃虛冷瘦劣不下食京三稜

丸方

京三稜炮訶梨勒 煨去核 木瓜焙 鱉甲醋炙去

礪瑋鎊各分 桃人湯浸去皮炒 枳實去瓢炒乾

薑炮 白朮 昆布湯洗去鹹焙 赤茯苓去黑皮 木

香各半兩

右壹十二味搗羅為末陳麴糊和丸如梧
桐子大每服二十九煨生薑木瓜鹽湯下

治膈氣咽喉噎塞胃膈填滿不思飲食通氣

湯方

半夏湯洗七遍 生薑細研和半 夏作餅陳

橘皮湯浸去 桂去麩皮

右四味麤搗篩每服五錢匕冰水盪半升

生薑五片煎至八分去滓溫服

治膈氣噎塞不下飲食撞氣丸方

雌黃研附子炮裂去皮丹砂研木香 寒水

石研人中白研各麝香研一

右七味先以雌黃入銚子却將寒水石蒸

雌黃用油紙燭十二箇燒盡為度次將衆

藥為末和令勻以粟米飯和丸如雞頭大

每服一丸用生葱一二寸同嚼溫酒下婦

人以當歸葉煎酒下

治膈氣噎塞不思飲食附子丸方附子

大者生去皮臍切破丁香半兩

右二味搗羅為末細研硃砂少許糝棗內

蒸熟去皮核和藥丸如梧桐子大每服十

五丸溫米飲下食前服

膈氣嘔逆不下食

膈氣嘔逆不下飲食者由胃氣不足風冷乘

之或憂恚氣結不得宣通故令膈腕不滿氣

寒胃中縱能食而卒不下或入胃中多致不

消與留飲相擊則變為嘔逆也

治膈氣嘔逆不下食惡心心腹疼痛及脾積

氣飲食進退面黃腹脹怠惰藏府不調水穀不化磨癥瘕積聚沉香煎丸方

沉香 剉 丁香 各壹兩 阿魏 醋化開入麵和作餅子慢火炙半兩

木香 胡椒 沒藥 研 丹砂 水飛研 高良薑 剉 縮沙人 去皮各半兩 檳榔 麵裹慢火煨 硃砂 飛

研斃器中火上 吳茱萸 湯浸洗焙 巴豆 去

熬乾各壹兩 心膜 研新瓦上攤出油壹分 青橘皮 湯浸去白焙 硫黃 研各

右壹十五味搗研為末鍊蜜丸如棗豆大每服三丸至五丸食前臨臥溫生薑橘皮

湯下如暴傷生冷嘔逆惡心心腹疼痛量加丸數

治膈氣嘔逆不下食塞悶惡心丁香羌防

丁香 貳 木瓜 切 木香 各壹分 肉豆蔻 去殼

檳榔 剉 半覆 壹分 青橘皮 云白炒

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸生薑湯下

治膈氣嘔逆不下食無比羌防

乾薑 炮 附子 炮裂去皮臍 澤瀉 剉 桂 去麋皮 巴

豆二七粒去皮醋煮研

右五味搗羅為末和勻鍊蜜九如梧桐子

大每服三九至五九温酒下早晚各壹服

治膈氣吐逆不下食檳榔散方

檳榔生剉京三稜煨蓬莪茂煨甘草炙藁香

子炒益智子炒青橘皮炒柏乾薑炮各

右八味搗羅為散每服二錢匕沸湯調下

日二

治膈氣痞悶痰飲惡心嘔逆不下飲食水香

九方

木香炮半兩莎草根炒京三稜煨白朮各壹

沉香剉礪砂剉研好茶末去皮炒益智子各半兩

桂去麤皮丁香炒各烏梅肉炒壹巴豆二七

皮研肉豆蔻去殼右一十三味除巴豆外搗羅為末醋煮麵

糊丸如菉豆大每服三九至五九食後生

薑湯下

治膈氣痞悶嘔逆惡心不下飲食臘茶丸方

臘茶末 丁香炒 檳榔剉 青橘皮去白木切炒

香炮縮沙去皮炒 巴豆去皮心膜研 烏梅

肉炒 二蒸 三洗 八分 餘下

右八味除巴豆外搗羅為末再同研勻醋

煮麵糊丸如菜豆大每服三丸至五丸溫

生薑湯下早晚食後服

治膈氣嘔逆不下食心胃痞悶噎塞不通化

氣丸方

木香炮 檳榔生剉 各二兩 礪砂別研 大黃炮 三分

丹砂別研

右五味搗研為末酒煮麵糊和丸如梧桐

子大每服十九至二十九不拘時候生薑

湯下

治膈氣嘔逆不下食分氣丸方

白木剉 麩炒 木香炮 蓬莪茂煨 乾薑炮 橘橘

皮湯浸去桂皮 甘草炙 縮沙人 去皮 蘘

香子炒 乾木瓜切 益智子炒 各二兩 胡椒半 阿

魏醋化 餅白 麵和 二分

右一十三味搗羅為末浸蒸餅丸如雞頭
實大每服一九塩湯嚼下不計時候

治膈氣嘔逆不下食噎塞腹肚膨脹安息香
丸方

安息香酒化研赤茯苓去黑皮桂皮去麤皮檳榔生

白朮炒甘草炙訶梨勒皮厚朴皮生

薑汁陳橘皮湯浸去白乾薑包半

右壹十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大
每服二十九生薑湯下不計時候

治膈氣嘔逆飲食不下心胃痞滿沉香煮散

方

沉香剉藿香子炒青橘皮湯浸去白焙炒胡椒

葶澄茄剉棟實剉陳橘皮湯浸去白焙炒各壹兩

右七味搗羅為散患者但心頭氣未斷皆
可服之每服二錢匕葱白五寸拍破酒并

童子小便各半盞同煎至六分放溫和滓

服重者不過三服

治胃膈氣痛不思食食即嘔逆木香散方

木香 可香 檳榔 剉 訶梨勒皮 剉 桂 去

皮 茆香 剉各 枳殼 去 大黃 剉 乾木

瓜 切 三分 碎 右九味搗羅為散再同研勻每服二錢匕

炒生薑搗湯調下 治 治隔氣嘔逆不下飲食或憂恚氣結不得宣

通參 芩 朮 干 黃 芩 炮 薑 汁 草

人參 赤茯苓 去 黑 乾 薑 炮 薑 汁 草

細辛 去 蒲 葦 葉 下 枳 殼 去 訶 梨 各 壹 附

勒皮 炒 檳榔 剉各一

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子

大空心温酒下二十九丸如覺有物在喉中

即丸三五丸如彈子大每一丸含化嚥津

治膈氣嘔逆心胷痞滿食飲不下氣寶丸方

藜 杏 子 揀淨 銀 石 器 內 陳 橘 皮 湯 檳

榔 剉各 木 香 壹 分 四 味 同 黑 牽 牛 揀淨 秤

吳 茱 萸 二 兩 慢 火 同 炒 菜 黃 焦 只 取 牽 牛 子 壹 向 杵 取 末 貳 兩

右五味同拌勻鍊蜜和劑為丸如梧桐子

大每服十丸至十五丸米飲或木香湯下有痰卽用檳榔末半錢水半盞煎數沸放溫下欲微踈利加至三十九丸至四十九丸看虛實腹稍空服之

治胃氣素弱因於憂志膈氣嘔逆不思飲食五膈丸方

人參一附子炮裂去遠志去心蜀椒乾薑炮細辛去苗葉桂去皮甘草炙麥門冬去心焙各三分

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大食後含化胃中熱卽三服

膈氣痰結

膈氣痰結者謂結痰在胃膈之上喉間噎塞欬唾稠濁氣滿胃中妨害飲食蓋緣脾肺久虛氣道否澁不能升降水飲停結聚而爲痰久不差則變虛勞上喘之病治膈氣痰結不思飲食訶梨勒湯方

訶梨勒煨去核半夏二兩湯浸七遍甘草

炙各壹 草豆蔻去皮 檳榔剉 青橘皮湯浸去

兩半 丁香壹分

右七味麤擣篩每服三錢匕水壹盞入生

薑三片煎至七分去滓熱服不拘時候

治膈氣痰結不入飲食肉豆蔻丸方

肉豆蔻去殼 木香 桂去麤皮 沉香 益智子

去華澄茄 胡椒 青橘皮湯浸去 附子

炮裂去皮 勝各等分

右九味擣雜為末用木瓜壹枚切蓋去子

內礪砂壹兩飛過者飯上蒸熟研如膏後

拌諸藥如乾更入鍊蜜和丸如梧桐子大

空心臨臥溫酒下十五丸

治膈氣痰結和胃氣進飲食半夏五香丸方

半夏湯浸七遍去滑擣羅為末 丁香 沉

香剉各 麝香研 龍腦研 丹砂研各 藿香葉

兩 檳榔尖者二 木香 甘草炙各

右壹十味擣研為末鍊蜜和丸如彈子大

每服壹丸空心食前生薑盞酒嚼下

治膈氣痰結嘔逆減食丁香勻氣丸方

丁香 木香 沉香 剉 肉豆蔻 去殼 桂皮 去麤

京三稜 煨先搗取末 當歸 洗切 陳橘皮 湯浸去白焙

檳榔 剉 藟澄茄 附子 炮裂去皮臍 安息香 酒化

去乳香 過絹包湯內攪 硃砂 飛 丹砂 研各分

豆 一十粒去皮熱 灰內炮令紫色研

右壹十六味搗雜為末與安息香等壹處

拌和研勻酒煮麪糊和再搗三二百下丸

如麻子大每服五七丸溫生薑湯下

治膈氣痰結不止藿香湯方

藿香 去梗 草豆蔻 去皮 阿魏 壹錢用木

香 壹分 人參 陳橘皮 湯浸去白 桔梗 炒壹

乾薑 壹錢 甘草 炙 訶梨勒 炮去核

右壹十味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入

生薑三片同煎至八分去滓空心服

治膈氣痰結上焦冷氣吞酸吐沫嘔逆不食

乾薑丸方

乾薑 壹分 半夏 湯浸去滑 丁香 半

右三味搗羅為末以生薑自然汁煮麩糊為丸如梧桐子大每服十五丸煎木瓜益湯下不計時服

治膈氣痰結嘔逆吐食妙紅散方

紅麴炒丁香藿香葉人參白茯苓去黑皮各半兩

右五味搗羅為散每服二錢匕米飲調下

食前服

治膈氣痰結通中消飲去積冷止腹痛茯苓

湯方

赤茯苓去黑皮人參麥藥炒陳橘皮湯浸去白

陳麴炒半夏薑汁浸二宿切草薢薢皮

三青陳皮湯浸去白

右八味搗篩每服三錢匕水壹盞人生薑三片同煎至六分去滓食前溫服

治膈氣痰逆胃中痛不思食前胡湯方

前胡去蘆芍藥炒半夏湯洗去人參切

合各三赤茯苓去黑皮枳殼去麩炒枇杷葉刷

去木香 檳榔煨 白茅根各半

右壹十壹味 麤搗篩 每服五錢匕 水壹盞

半煎八分 去滓不拘時溫服

治膈氣痰結 胃中不利 五膈丸方

桑根白皮剉 紫蘇葉微 赤茯苓去黑陳

皮湯浸去白 檳榔剉 生薑切 厚朴去

皮生薑汁炙 旋復花壹兩

右八味 搗羅為末 鍊蜜和丸 如梧桐子大

空心米飲下 二十九 漸加至三十丸

膈氣宿食不消

飲食入於胃而化於脾胃 和調則水穀易

腐若脾胃虛寒 卽傳化不時 新陳蘊積 况膈

氣之人 氣道久澀 是致噫氣酸臭 否滿噎塞

而苦宿食不消也

治膈氣宿食不消 痰毒虛氣 飲食無味 壯熱

憎寒 霍亂吐逆 人參 茯苓湯方

人參二兩 赤茯苓去黑皮 附子炮裂去 黃耆

白朮 乾薑炮 前胡去蘆 甘草炙 訶黎勒

皮 枇杷葉 拭去毛 陳橘皮 湯浸去白焙 麻黃 去根
節 桂皮 去麤皮 益智子 去皮各壹兩

右壹十四味 麤擣篩每服三錢匕 水壹盞 生薑三片 棗壹枚 擘破同煎至七分去滓 溫服如脾泄氣痢及傷寒三日外要出汗 併三服衣被蓋出汗不計陰陽二毒食毒 傷寒並能療之

治膈氣宿食不消 胃膈痞滿 心腹脹痛 建中湯方

草豆蔻 皮去 陳麩 炒 麥蘖 炒 厚朴 去麤皮生薑汁炙熟
陳橘皮 湯浸去白焙 白朮 乾薑 炮各壹兩 藁香 干
炒木香 各半兩

右九味 麤擣篩每服三錢匕 入生薑三片 棗二枚 擘破水壹盞 同煎至七分去滓 溫服不拘時

治膈氣宿食不消 溫脾胃除積冷 磨脾散方

木香 人參 附子 炮裂去皮臍 甘草 炙 赤茯苓 去黑皮 草豆蔻 皮去 乾薑 炮各壹分 陳麩 炒 麥

藜炒各壹兩

右九味搗羅為散每服二錢匕入鹽點服不拘時

治膈氣宿食不消草豆蔻散方

草豆蔻去皮高良薑炮陳麴炒麥蘖炒木香

各壹兩訶梨勒炮去核陳橘皮湯浸去白焙桂皮去麤

烏梅肉炒甘草炙各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕入鹽點服空心食前

治膈氣宿食不消氣攻兩脇痛口內唾痰心胃不快參麴散方

人參 白茯苓去黑皮厚朴去麤皮塗生枳

殼去麤炒桂皮去麤甘草炙陳麴炒黃訶梨勒皮

白朮 乾薑炮京三稜煨熟白檳榔剉木香

各叁分

右壹十三味搗羅為散每服二錢匕入塩點服空心食前

治膈氣宿食不消散寒邪温脾胃附子丸方

附子炮裂去皮臍丹砂各一兩研細如粉留壹半為衣檳榔剉

半丁香錢一杏人二十八枚去皮尖雙人別研成膏

右五味搗研極細和勻鍊蜜為丸梧桐子

大丹砂為衣每服三九至五九先嚼棗壹

枚裏藥丸乾嚙後以少生薑湯下不拘時候

治膈氣宿食不消養胃丸方

厚朴去麤皮剉作小塊壹斤丁香半斤生薑五斤取自然汁於銀

石器內同厚朴文火煮盡薑汁炒令乾白朮兩一十人參兩壹

右五味搗羅為末以煮棗肉和丸如梧桐

子大每服三十九米飲下空心食前

治膈氣宿食不消消積滯進飲食礪砂丸方

礪砂壹兩研碎以漿水一大盞化去沙石入銚子內熬盡漿水却入好酒半升

重熬山芋兩四木香肉豆蔻去皮榔檳半兩

右五味搗羅為細末以礪砂膏接和令勻

却以好酒半盞煮麵糊丸如梧桐子大每

服十九至十五丸食後良久溫酒下

治膈氣宿食不消麥蘖散方

麥蘖四兩炒芎藭 白芷 藁香子炒烏藥

各壹兩半莎草根炒去毛桔梗炒縮沙去皮陳橘皮
 湯浸去紅豆蓬莪茂炮桂去皮厚朴去
 白焙薑人參各壹兩白木香三兩訶梨勒
 皮炙熟蒼術米泔浸壹宿右壹十八味擣羅為散每服二錢匕陳米
 飲或塩湯調下不計時候

治膈氣宿食不消厚朴湯方

厚朴去麤皮剉壹兩半生草豆蔻去
 皮高良薑一宿炒令紫青橘皮湯浸去
 五味子各半白焙

陳橘皮湯浸去甘草炙麥蘖炒茈胡去
 參去根節煮陳麴炒訶梨勒炮去

一益智炒去烏頭炮裂去皮乾薑炮壹
 右壹十七味麴擣篩每服三錢匕水壹盞

薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓稍
 熱服不拘時候

拔粹方

胃膈痞之疾

人參利膈丸治胃中不利痰嗽喘滿利脾胃

壅滯調秘推陳致新治膈氣聖藥也

木香 檳榔七錢 人參 當歸 藿香各

兩甘草 枳實各壹 大黃酒 厚朴姜製各

右為細末滴水為丸桐子大溫水下南此

方袖珍方玉 如難齊少加宿飪餅和丸機從義同

十膈氣散專治十般膈氣冷膈風膈氣膈痰

膈熱膈憂膈悲膈水膈食膈喜膈皆病源也

並因憂驚冷熱不調又乖將攝更於喜怒無

時貪嗜飲食因而不化滯積在胃上喘痰嗽

歲月漸深心胃噎塞漸致瘦羸久若不除必

成惡疾

人參諸方 白茯苓諸方 官桂諸方 枳殼去

炒炙甘草 神麴炒 麥蘖炒 廣茂炮 吳白

朮 訶梨勒皮煨去 陳皮去 乾生姜炮 京

三稜煨已上 厚朴姜製 檳榔煨 木香已上各

右為極細末每服一錢醫方大成集 成南

永類鈔 入搯壹字白湯點服如覺脾胃不

和腹脹心胃滿悶用水壹盞生薑七片棗

二枚乙介 煎少許同煎至八分和 泮熱服
空心食前

玄明粉朴硝不以多少煎過澄濾了五七遍
晚於星月下露地至明自然結作青白硝
也用定瓷罐兒按實於炭火內從慢至緊
自然成汁煎至不響再加頂火壹煨取去
於淨地上倒合盆盍去火毒至晚取出為
細末每二斤入甘草生熟二兩每用壹錢
二錢桃花湯或葱白湯調下治膈上氣滯

滯五藏秘澁邪熱忌魚及藕

豆蔻散治五積膈氣

肉豆蔻去皮 木香 人參 厚朴姜製 赤茯苓

芩去皮 桂各半 炙甘草半 檳榔五錢 訶梨勒皮

半青皮去白 陳皮去白 郁里仁湯浸去皮

兩半夏湯洗了同生薑搗如泥堆

右為極細末每服三錢匕入鹽少許如茶

點服 若入生薑棗同煎亦佳不拘時候

能治氣補勞通血脈益脾胃去痰實

醫方大成

五噎五膈

和劑方膈氣散治五種膈氣三焦痞塞嘔吐痰逆飲食不下

肉豆蔻 乾姜炮 青皮去白 甘草炙 厚朴去

姜木香各五兩 陳皮去白 枳殼去 蓬莪朮炮

京三棱炮 肉桂去 益智仁 檳榔各十

右為末每服二錢水壹盞姜棗煎服煎湯

亦可點服醫方集成南北經驗方

和劑方撞氣阿魏圓治五種噎疾九般心痛

疝癖氣塊腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣

婦人血氣並皆治之醫方集成南北經驗方

見諸氣門

經驗方奪命四生散永類鈔方經驗良治方

治男子五膈五噎翻胃嘔吐不進飲食服此

藥多有神效不可輕視良方全不能進食者

有起死回生之功

丁香 淨棟川芎醫方集成 白姜洗淨 南木香

不見肉桂去皮不見火新羅參神麩各半大

草菓二介炮取仁訶子七枚取肉縮砂仁二十

莪朮炮粉草錢半各七巴豆十四粒去殼心

浸壹宿別研為膏留就鉢中

右十二味日乾為末入乳鉢內和勻巴豆

膏再篩過入瓦合內以油紙蓋合口却用

黃蠟和松脂溶如法封固合良方封固合

氣及水縫每以十二月上辰日或初八黃

道生氣天月二德日至誠修合於地高爽

處理上中三尺深良方二三尺至次年六

月中伏節擇吉日晴明時取出向當風處

攤去濕氣良方攤眼以不漏瓦瓶收貯密

封壯實人每服用半錢臨睡百沸湯調半

盞頓服仰卧片時徐以溫白粥良方溫白

壓下若羸弱只服壹字二三服即能進食

止嘔吐續以寬中散丁沈透膈湯橋皮煎

元厚朴煎元等兼進佐助胃氣忌生冷魚

腥粘膩并硬物壹兩月則全愈矣良方此

夏右丞府遇至人孕婦不可服南北經驗方
傳授常修合施人孕婦不可服方補珍方
同

南北經驗方

五噎五膈

拔粹方百杯九治酒停腹中膈氣痞滿面色

黃黑將癖疾飲食不進日漸肌瘦如飲酒先

收此藥百杯不醉亦無諸痰

紅皮三兩去木香炮三乾姜三兩

香五斤甘草二錢茴香京三稜縮

砂仁三十個白豆蔻三十個生姜一兩去皮切

兩淹一宿焙乾

右為細末煉蜜為丸朱砂為衣每壹兩作

五丸生薑湯下細嚼無時

永類鈴方

五噎五膈

膈氣變翻胃用煎紅元吐瘀血及虫而愈其

方并附

雄黃半兩木香半兩賓郎三稜莪朮煨陳

皮貫衆去毛各 乙兩 大黃春二兩 秋 乙兩 乾漆乙

炒烟起

已上九味作末糊元壯土可五十元

又芫花乙兩 巴豆二十壹粒去由 甘遂乙兩

右為末糊元梧桐子大候乾用紅羅包之

絹線札繫剪斷壹服前藥內加川壹粒萬

病轉湯使五更初服瘵疾醋灸肉噉婦人

醋湯名秦川煎紅元 有氣膈服好蘇合

香元噉姜汁少許喉中爆聲而愈

勞瘵門以五膈下氣元噉化治五膈膏育之

疾針藥無可施者有鬲噎繫黃犬令其乾

餓數日後用生米乾飼之或用粟米候其

糞以陶洗淨極以作粥用薤白一握入湯

內泡至熟去薤取其通氣粥熟再入沉香

末二錢粥帶稀薄者

翻胃始因膈噎所成有痰母虫痕非好手不

能治用

附子片乙兩 南星片乙兩 巴豆二十壹粒去皮

色變去巴豆入干
姜丁香末各半兩

右同煎作末五更早掌中舌蘸乾喫半錢
津化仍以陳皮湯一呷送下

又蘇合香元青州白元打和用生薑合元服
有翻胃噎塞煩悶諸藥不効蘆根煎湯下

枳殼湯

又真阿魏末少郊外野人拋下乾人糞多作

末五更初姜片蘸食能起死人 趙玉困

傳

又翻胃吐黑汁治不愈用鞣澄茄末米粉糊

元姜湯下而愈再令服平胃散三百貼

又姜汁調白虎丹治翻胃如神白虎風化擣

大蒜元

三十膈五噎浪分支派疏 與儒門事親論同

三乙承氣湯

北黃粗芒硝厚朴姜枳實生用

兩甘草去皮炙當歸酒洗焙二

右咬咀每服半兩水盞半生姜五片棗二

箇孽開同煎七分去滓熱服不拘時候病
 重者每服乙兩加姜二片棗乙箇若不納
 藥須時時呷服之以通為度雖為下藥有
 泄有補卓有奇功劉河間又加甘草以為
 三乙承氣以甘和其中最得仲景之秘試
 論只論四味當歸不在試論之列不可即
 用然等分不多縱用亦無妨

四生丸治壹切結熱常服肢體潤澤耐老

北大黃

去粗皮酒洗紙包煎黑牽牛 三兩取頭

末乙皂角

去皮生用芒硝乙兩

右四味為末滴水為元梧桐子大每服二
 三十元白湯送下

對金飲子

淨陳皮

八兩制蒼朮 四兩人參 乙兩制厚朴

四兩甘草

炙三兩黃芩 二兩半去黃芪 乙兩

右咬咀每服半兩水蒸半生薑五片棗二

箇同煎七分去滓熱服先服承氣湯夜服

四生丸如已効進食不格拒方用對金飲

子然初病作且於嘔吐胃熱類內選用清利之藥審其虛實重輕方用前藥更佳
經驗良方

治卒噎方

青皮炒土烏藥

淨茴香

炒木瓜

各等分

右咬咀同煎至七分去滓溫服

又方用楓子炒烟微起卽爲末乾柿蒂煎湯下

治隔氣食噎久成翻胃隱士裴如心傳右川

壯老姜一斤帶皮淨洗切如大錢厚以踈竹蘿子盛入寺觀內廁抗中浸七日取出長流水中漂七日取出曬乾爲末再秤過每壹斤入甘草末一兩每服二三錢米飲調徐徐服次用高良薑去毛切片清油炒變色爲末陳米飯爲丸如梧桐子人每服至二三十丸或五十丸漸漸米飲調良姜末送下忌生冷難化物

治膈氣經驗方右大鯽魚壹尾

用市中自死者活魚不效

剖腹去盡腸物留鱗用大蒜去淨皮薄切片填入魚腹內仍合魚為壹尾用濕紙包定次用麻皮纏之又用熟黃泥厚厚外固日數乾用碎碎灰火慢慢煨熟取出鱗刺骨入局方平背散擣細丸如梧桐子大日乾瓶收勿泄氣味每用米飲空心或空腹下參拾丸

玉機微義

嚴氏五噎散

方見嚴氏濟生方

五膈散

方見嚴氏濟生方

局方五膈寬中散

方見永類鈔方

按已上三方前太陰陽明經藥也

謹按反胃諸方古方悉是香燥大熱之藥皆不足為法今姑其壹二至於丹溪所言補血益陰潤燥和胃調中等藥雖無其方自宜隨證用之觀其立論則思過半矣

壽域神方

治噎食用葷澄茄白豆蔻等分為末每服乾

啖喫

一方用白麩二斤半蒸作大饅頭壹箇頂上開口取空將皂礬裝滿用新瓦揅泥封固掘土窰以文武火燒壹晝夜候紅色取出研爲細末棗肉爲丸如梧桐子大每服二十丸空心酒水任下忌酒色葷腥

一方取古塚內罐瓮中水但得壹飲卽愈極有神効

一方用蛇吞蝦蟇入腹者令人所蛇口中擠

出蝦蟇黃泥固濟燒灰爲末米飲調服同蛇川之可治勞嗽

一方鵬鳥雛壹對未生毛者以瓦二片置雛於內黃泥固濟燒爲末研細每用壹匙好酒調服 鵬鳥卽狔鶩

衛生易簡方

五噎

治噎塞不通用羚羊角燒灰爲末水調方寸匕服

又方用狼喉結乾為末入牛錢於湯飲內服

又方用鷓鴣背啣之遂下

又方用頭垢壹豆大漿水煎服立愈

治膈氣噎食服藥無效者用巧婦窠燒灰為

末每服三錢酒溫調下壹窠可治壹人甚

驗

治噎食用香附子炒去毛為末酒煎陳皮湯

調壹二錢服日三亦治心痛

備預百要方

食噎方因食喉塞

使兩人各提耳吹兩耳即下

又嚼下榛子

又削大蒜內鼻

又以海藻周於頸下又食之

又鵝毛燒灰酒服

又通草煎湯服之

又蘆根汁服之

又藍汁服之

喉中如有物不出入腹脹羸瘦方藁荷根汁服之蟲自出如有物者蟲之所作也

膈噎食治

食醫心鑑

論五種噎病食治諸方

五噎者一日氣噎二日憂噎三日食噎四日勞噎五日思噎此皆陰陽不和三焦隔絕津液不利故令氣隔不調是以成噎也

治五噎胃膈妨塞飲食不下瘦弱無力宜食羊肉索餅方

羊肉

四兩炒

麵

半斤

橘皮

壹分

右和麵以生薑汁溲作索餅空心食之○

聖惠方右以橘皮末及生薑汁和麪作索餅於豉汁中煮熟入臠食之神方萬壽親全方同

養老書食治老人胃膈妨塞食飲不下漸

黃瘦行履無氣軟弱羊肉索餅方羊肉白

者

四兩切

白麵

六兩

橘皮末

壹分

右搗薑汁搜

麵作之如常肉下五味葱椒橘皮末等炒
熟煮空心食之日壹服極肥健温藏府
用必
之書
同

治五噎飲食不下喉中妨塞瘦弱無力宜喫

黃雌雞索餅方隨多少麵半桂末壹分茯苓末兩一右

黃雌雞隨多少炒作臠斤半桂末壹分茯苓末兩一右

以桂末茯苓末和麩溲作索餅熟煮兼臠

食之○聖惠方黃雌雞壹隻去毛麵斤半桂

心一分赤茯苓壹分右以桂心等末和麩

溲作索餅於豉汁中煮入臠食之神巧萬

壽親養老書食治老人噎病食不通胃脇

滿悶黃雌雞四兩切餽方黃雌雞作臠頭白麵

六兩茯苓末貳兩右和茯苓末搜麩作豉汁中

煮空心食之常作三五服極除冷氣噎用

之書

治五噎飲食不下胃中結塞瘦弱無力方

烏雌雞肉半夏治如常麩四兩桑白皮聖惠方

茯苓各八分○聖惠方赤茯苓三分末桂心四分並剉○

末
右以水壹升煎桑白皮等三味汁三合漉
麵和肉煮熟食之○聖惠方右件二味末
入麵中先以水煮桑根白皮湯浸麵切入
豉汁中煮候熟與雞肉調和一如常法食
之

治五噎不下食方右取崖蜜含微微嚥之即

差備預百要方同○聖惠方右取崖蜜每於粥中

化半匙食之神巧萬全方同

治氣噎方

密壹升○聖惠方半升酥三兩薑汁三合○聖惠方壹合

右相和微火煎如稀飴入酒中飲之○聖

惠方每於酒中調壹匙服之空食之亦佳

治噎病胃膈積冷飲食不下黃瘦無力方

蜀椒壹百粒開口者

右以醋淹浸令濕漉出麵拌令勻熟煮和

汁吞之差備預百要方同

治胃隔氣擁結飲食不下桂心粥方

桂心四分茯苓六分桑白皮十二分

右細剉以水二升煎取壹升半去滓量事

著米煮粥食之備預百要方同○聖惠方治胃膈

疾氣壅結食飲不下如似鯁噎方桂心二分

赤茯苓兩桑根白皮兩右件藥細剉以水

三大盞煎至二盞半去滓下粳米二合煮

作粥食之

治噎病不下食方

春杵頭糠半麩四兩

右相和溲作餈餈空心食之○聖惠方右

相和溲作餈餈於豉汁中煮食之神巧萬全方同

聖惠方

書食治五噎諸方

夫五噎者一日氣噎二日憂噎三日食噎四

日勞噎五日思噎由陰陽不和三膈隔絕津

液不利氣不調理之所致也此皆憂恚嗔怒

氣結在於心胃不得宣通是以成噎宜以食

治之也

治噎病胃間積冷飲食不下黃瘦無力川椒
 麵拌粥方川椒去目百粒白麩二兩右以醋淹椒令濕漉出於麵中拌令勻便
 於豉汁中煮空心和汁吞之○壽親養老
 書食治老人噎藏府虛弱胃脇逆滿飲食
 不下椒麩粥方蜀椒一兩杵碎白麩五兩右以
 苦酒浸椒壹宿明日取出以拌麵中令勻
 煮熟空心食之日二服常驗

治噎病不下食方老牛唾沫如棗許大置稀

粥中飲之終身不噎矣勿令患人知

壽親養老書

食治噎塞諸方

食治老人噎病心痛悶膈氣結飲食不下桂
 心粥方

桂心末壹兩粳米四合

右以煮作粥半熟次下桂末調和空心日
 壹服亦破冷氣殊効

食治老人噎病食飲不下氣塞不通蜜漿方

白蜜壹升熟湯壹升

右湯令熱卽下蜜調之分二服皆愈

食治老人噎病氣塞食不通吐逆蘇蜜煎方

土蘇二兩白蜜五合生薑汁五合

右相和微火煎之令沸空心服半匙細細

下汁尤効必用之

食治老人噎病胃滿塞悶飲食不下薑橘湯

方

生薑二兩切陳橘皮兩壹

右以水二升煎取壹升去滓空心漸服之

常益效

食治老人噎冷氣擁塞虛弱食不下蘇煎餅

子壹斤蘇壹斤白麩六兩以生薑汁五合調之

右如常法作之空心常食潤藏府和中

食治老人咽食入口卽塞澁不下氣壅白米

飲方

煨白米四合春頭糠末兩

或右煮飲熟下糠米調之空心服食尤益

食治老人噎塞水食不通黃瘦羸弱餽飽方

雌雞肉五兩白麩六兩葱白半握

左右如常法下五味椒薑向雞汁中煮熟空

食心食之甘壹服極補益

施園端效方

食治

內經曰五行之大唯土五藏所主唯脾脾為

中藏以養四旁衆病篤疾脾全命在調其食

飲湯藥與粥食相應適其寒溫水穀乃人之

生命煎湯造粥務要勤誠憑義以親雖勞勿

倦

酒飭食治方治膈氣噎食胃翻吐逆羸瘦焦

枯飲食不下頃於大定歷見斯疾用局方膈

氣寬中輩湯散日品三服每以服藥之後人

行五里令喫白飭三塊再行五里令飲正酒

壹盃如此日以三時味於飭酒代食助藥和

氣理虛由此痊安者十餘人矣

戀粥食治方醫之治病妙育多門從所好之
庶唯弗倦至若酒調散藥斟酌溫稀壹飲而
終別停酒下藥或酸若水漱而緩以錫糖熱
渴或寒冷飲與熱服隨意尤子數多而難嚥
粥餅和吞辛鹹之湯散難服救從所欲醫者
意也智用臨時又有食前食後間隔移時勿
令食藥同食混其藥力譬如飲酒飢飽有殊
空心壹盞力超食後之三不代飯前之一病

之深久減日損虛治者戒之

單食白粥法粥之雖米製造由人食作民天
利害非細米麤水苦灰銚浮糠水米不停沸
烹大猛米餘則火短水廣則過熬作之者不
明服之者生惱

粥食埋治方米雖一味造粥多般色味罕新
服之环厭大記遠取淨甜之水細滑粟米量
升

山藥 粟黃 蜀黍 紅粳 白糯 牟

仁葱白生薑拌麩菜薹少許

粟米百中川豈旦令色味新更改換翻騰

做粥軟溫熱調停香異味奇神清意樂喜

則氣緩粥為身命之源飲饕根當可代藥

之半

膈噎針灸

神巧萬全方

膈噎

扁鵲云厥俞主胃中膈氣灸隨年壯

氣噎灸直中憂噎灸心俞良食噎灸乳根勞

噎灸膈俞思噎灸天府

修月魯般經後錄

膈氣

中魁二穴竇大師秘傳不入經絡

承類鈴方

膈噎灸膏肓隨年數作壯妙候火瘡灸直中

膈噎導引

巢氏病源

策引諸否候

養生方導引法云正坐努腰胷仰舉頭將兩
手指相對向前捺席使急身如共頭餘面下
欲至席還起上下來去二七去胷肋否藏冷
膈疼悶腰脊悶也

醫方類聚卷之一百六

醫方類聚卷之一百六
此方類聚卷之一百六
醫方類聚卷之一百六