

外科正宗

色建公

与以昌



重訂外科正宗自錄

卷之一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽平陰平陽症第五

癰疽五善歌第六

卷之二

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因受病王治不同論第十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷之三

癰疽圖形十五 附癰疽諸症  
瘡各十辨

卷之四

腦疽論十六

疔瘡論十七

脫疽論十八

卷之五

瘰癧論十九

鬢疽論二十

咽喉論二十一

卷之六

時毒論二十二

癰瘡論二十三

肺癰論二十四

流注論二十五

卷之七

乳癰論二十六 附乳  
岩

附骨疽論二十七 附鶴  
膝風

腸癰論二十八

臟毒論二十九

卷之八

痔瘡論三十

下疳論三十一

魚口便毒論三十二

囊癰論三十三

懸癰論三十四

腎癰論三十五

卷之九

楊梅瘡論三十六

結毒論三十七

多骨疽論三十八

陰疔論三十九

傷寒發頤四十

疔發四十一

癰疽四十二

小腹癰四十三

鵝口疽四十四

龍泉疽虎鬚毒四十五

石榴疽四十六

穿骨疽四十七

大麻風四十八

翻花瘡四十

腋癰五十

脇癰五十一

鼻痔五十二

骨槽風五十三

紫白癩風五十四

卷之十

齒病五十五

腦漏五十六

破傷風五十七

跌撲五十八

金瘡五十九

杖瘡六十

湯潑火燒六十一

甲疽六十二

繭唇六十三

痞癬六十四

天蛇毒六十五

頭痛六十六

合公毒六十七

鼻出血六十八

牙縫出血六十九

血箭血疔七十二

鵝掌風七十一

腎囊風七十二

疥瘡七十三

廉瘡七十四

血風瘡七十五

頑癬七十六

膿窠瘡七十七

凍風七十八

火丹七十九

天泡八十

肺風粉刺酒皰鼻八十一

雀斑八十二

油風八十三

白屑風八十四

耳病八十五

漆瘡八十六

竹木刺八十七

瘰癧瘡八十八

卷之十一

疔癰八十九

痰包九十

癩風九十一

溼腫九十二

咬傷九十三

風犬瘡九十四

女人面生鰍黑斑九十五

鈕叩風九十六

枯筋箭九十七

婦人腳了作癢九十八

手足破裂九十九

眼丹一百

墨子一百一

眼胞黃毒一百二

體氣一百三

白赤癢一百四

奶癬一百五

蟻拱頭一百六

小兒遺毒爛斑一百七

蜈蚣串一百八

小兒痘風瘡一百九

小兒赤遊丹一百十

走馬疔一百十一

重舌一百十二

胎瘤一百十三

鴨口瘡一百十四

痘癰一百十五

瘰癧一百十六

黃水瘡一百十七

卷之十二

大人口破一百十八

臭田螺一百十九

牛程躑一百二十

僵螂蛭一百二十一

田螺泡一百二十二

臉痛一百二十三

陰虱一百二十四

葡萄疫一百二十五

百蟲入耳一百二十六

惡蟲可咬一百二十七

人面瘡一百二十八

誤吞針鐵骨哽咽喉一百二十九

中疔毒一百三十

落頭須拿法一百三十一

救自刎斷喉法一百三十二

陰毒一百三十三

失榮症一百三十四

試知百病死生法一百三十五



造孽報病說一百三十六

仙方活命飲今古不同論一百三十七

拾遺症一百三十八

唇鳳一百三十九

綳縛皆瘡一百四十

癰疽肉不合一百四十一

煉元明粉一百四十二

取紅鉛法一百四十三

煉金頂砒法一百四十四

煉硝石法一百四十五

取蟾酥法一百四十六

製附子法一百四十七

昇白靈藥法一百四十八

製寒食麵法一百四十九

逐日人神歌一百五十

十二時人神歌一百五十一

尻神歌訣一百五十二

製炒諸藥一百五十三

醫家五戒一百五十四

醫家十要一百五十五

開割披鍼候針形一百五十六汗斑方一百五十七

重訂外科正宗卷之十一

疔瘰第八十九

疔瘰乃風執溼痰所生有冬溫後天時不正感發傳染者多兩腮腫痛初發寒熱以柴胡葛根湯散之外敷如意金黃散在裏內熱口乾二便不利者四順清涼飲利之表裏俱解腫仍不消必欲作膿托裏消毒散膿成者即針之體虛人兼服補托自愈

柴胡葛根湯 見傷寒發頤門

四順清涼飲 見湯瀉門

痰包第九十

痰包乃痰飲乘火流行凝注舌下結而飽腫綿軟不硬有妨言語作痛不安用利剪刀當包剪破流出黃痰若蛋清稠粘難斷捺盡以冰硼散搽之內服二陳湯加黃芩黃連薄荷數服忌煎炒火酒等件

加味二陳湯

加味二陳湯半夏  
芩連薄荷薑三片

茯苓甘草其陳皮  
痰飲生來服此宜

治痰飲流注舌下發腫作痛針刺已破者服之

陳皮

半夏

茯苓

甘草

黃芩

黃連

薄荷各五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

小礪散

見咽  
喉門

癩風第九十一

癩風乃陽明滯熱沸騰於肌表或外受風寒侵襲而成其患初起水泡作癢成瘡破流脂水養至徹骨久則成片傳及遍身好浴熱湯形如風癩初起上體多者防風通聖散去硝黃加葱頭三莖發汗以散外毒下體多者去麻黃以攻內毒久服祛風換肌丸初服消風清燥湯外搽諸瘡一掃光成片流水者真君妙貼散皮膚頑厚

有腫者麥散搽之

消風清燥湯消風清燥湯生地花粉川芎兼白芍

川芎 當歸 白芍

黃連 天花粉 蟬蛻

水二鍾煎八分食後服

應用方

防風通聖散見時毒門

真君妙貼散見腫瘍門

溼腫第九十二

溼腫者皆脾氣受傷之病或飲食後驟受風寒所侵或飢渴時悞食生冷所滯寒積於中食不尅化其患胸膈不寬小水不利面目溼腫漸至徧身此土傷不能生化之故也宜用二蛟散疏通稼土

蟬蛻防歸苓共連 苦參甘草與靈仙

生地 防風 黃芩

麥 靈仙各一 甘草五

祛風換肌丸見白眉風門

諸瘡一掃光見疥瘡門

養脾元其小水自利浮腫自消此方百發百中之妙

### 二蛟散

二蛟散內用皮硝  
涇腫糖湯調服下

陳米三年要炒焦  
如蛟行水自然消

治生冷惱怒傷脾致胸膈不寬小水不利面目四肢浮腫諸藥不  
效用三年老黃米炒焦黃色為末提淨芒硝三兩鍋內溶化炒乾  
為末每用一平杯和勻再碾極細大人壯實者每服三錢小兒十  
歲上下者一錢二分俱用赤砂糖三茶匙和白滾湯半茶鍾空心  
調服至午大便一次至晚再便一次其疾先從眼胞消起日久元  
氣虛者與加味胃茶湯間服至重者不過五服愈

### 加味胃茶湯

加味胃茶湯水茶  
澤瀉瀉猪苓併厚朴

參查芍牛藿香陳  
甘草香附效如神

治脾胃受傷胸膈不寬兩脇臃脹小水不利面目四肢浮腫者服  
之

陳皮

茯苓

白朮

各一錢

白芍

各一錢

藿香

人參

厚朴

山查

澤瀉

半夏

各五

甘草

猪苓

各二

香附

女人加一錢

薑三片燈心二十根水二鍾煎八分食前服

咬傷第九十三

人咬為患良肉受傷但齒乃陽明胃經有餘臟腑多火多熱生穴於此凡食經此無不燔爛下咽又飲食炙燔之毒無不侵襲故傷人發腫其痛異常臭膿腐爛痛徹連心是感牙之毒也初咬時一口內眾撤熱小便浸傷處洗淨牙黃瘀血咬孔上蟾酥餅貼之膏藥後出微膿漸愈如咬時未經此法致腫痛發疼甚者亦與童疔浸洗搥乾用麤紙搥蘸麻油點火用烟焰薰腫痛土良久方佳以解牙毒仍以蟾酥條挿入孔內膏蓋候腫消時換玉紅膏擦之其肉完口如有雜症相兼者亦隨症而治

碧酥餅條見疔瘡門

玉紅膏見腫瘍門

葱白甘草湯葱白甘草湯容易每日常將頻洗之

咬傷疼痛兼臭穢消瘀散腫功全備

治咬傷焮腫疼痛膿血淋漓臭穢腐爛者用葱白二兩粉草五錢水三碗煎至二碗每日洗淨傷處瘀腐膿血方用玉紅膏擦之黑膏蓋漸愈

### 風犬傷第九十四

犬乃朝夕露臥非時不正之氣所感故心受之其舌外出肝受之其目昏朦脾受之其涎自流肺受之其音不出腎受之其尾下拖此五臟受毒成爲風犬乃稟陰陽肅殺之氣故經此必致傷人隨咬卽服救生散小便中行出血片忌諸口味發物赤豆等俱不可見百日乃安治之遲者毒大而小便難出必攻臟腑久則成形腹脹攻急入聲若犬眼神露白者俱爲不治有愈後復犯前禁觸之

仍死

救生散

救生散用七斑蠶  
杭粉一錢同作末

惟用全身翅足藥  
空心酒服效偏高

治風犬咬傷用生玳瑁七個去頭翅足杭粉一錢同研空心溫酒

酒調服一時許小便行出血片白脂乃惡物也如便疼煎甘草湯

飲之自利如毒未盡次早再一服以小便清白方為毒盡

又方治風犬咬有效其人項中必有紅髮一根急須拔去以追風

聖散敷傷處抽毒氣服救生散

追風如聖散追風如聖散防風  
白芷細辛蒼朮等

川草烏芎藭薄荷同  
雄黃加上效無窮

治風犬咬傷隨用敷之其毒即可拔出

細辛 防風 川烏 薄荷 草烏 川芎

白芷 蒼朮各一錢  
雄黃四錢

共為末溫酒調敷傷處以紙蓋托早晚換二次



風犬傷之要辭居

諸麻赤豆大葷祛

百日之中都忌見

致教患者樂年餘

女人面生鰐黑斑第九十五

鰐黑斑者水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結成斑黑色枯  
不澤朝服腎氣丸以滋化源早晚以玉容丸洗面斑上日久漸退  
兼戒憂思動火勞傷等件但此生於夫主不利疑事不決者常有  
之

腎氣丸

見肺  
癰門

玉容丸

見雀  
斑門

鈕叩風第九十六

鈕叩風皆原風溼凝聚生瘡久則搔癢如癩不治則沿漫項背當以

冰硫散擦之甚者服消風散亦妙

冰硫散

冰  
散內用川椒

朝腦生髮豈可饒  
還將猪脂共相調

硫黃兩

楮冰

川椒

生藥錢

六為未先用白羅蔔一個掘空其內將藥填滿腹將原皮蓋之  
紙包三四層灰火內煨半時許待冷取開用藥同熟油調  
忠上自愈

風散見疥瘡門

### 枯筋箭第九十七

筋箭乃憂鬱傷肝肝無榮養以致筋氣外發初起如赤豆大枯  
微高日久破裂趨出筋頭縫鬆枯槁多生胸乳間宜用絲藥線  
祇繫繫七日後其患自落以珍珠散搽之其疤自收兼戒口味

發

梁線見癭瘰癧門

珍珠散見下瘡門

婦人腳了作癩第九十八

腳了作癢乃從三陽風溼下流凝結不散故先作癢而後生溼  
又或足底彎曲之處癢溼皆然

散

枯礬散中用石膏  
四味將來為末

黃丹輕粉不相使  
脚了溼毒即消

枯礬錢

石膏

煨

輕粉

黃丹

各錢

為末溫湯洗淨搽藥即愈

手足破裂第九十九

破裂破裂老乾枯之象氣血不能榮養故也因熱肌腠被風寒  
逼凝滯血脉以致皮膚漸枯漸槁乃生破裂日襲於風風熱相  
感多作痛以玉肌散洗擦潤肌膏潤之甚者兼服當歸飲子為

散

見小雅  
斑門

潤肌膏

見白禿  
斑門

當歸飲子

見易方  
斑門

眼丹第一百

乃脾經有風胃經多熱其結為腫風多者則浮腫易消甚者則  
望腫難散初起宜用金黃散敷之有表症者荆防敗毒散裏症出  
胃散加大黃利之如後不散必欲作膿宜換膏貼之膿成者即  
刺之遲則眼頭自破此乃疔明穴內空難斂者成漏者多

敗毒散見時毒門

清胃散見牙繼出血門

金黃散見腫毒門

### 黑子第一百一

疔名也此腎中濁氣滯滯於陽陽氣收束結成黑子堅而不  
入人生此終為不吉面部不善者去之宜細銅管將疔套入孔  
六七八轉令疔入管一拔便去有疔浮淺不能拔者用針挑  
上搽冰蠶散少許糊紙蓋之三日自脫或灰米膏點之亦可  
珍珠散乾摻生皮而愈忌醬醋無斑

小膏用成塊石灰蘸水調稠將白川米插入灰內留半米在外止

計候米熟用米點痣上可落矣

又見瘰  
疔門

珍珠散見下  
疔門

取胞菌毒第一百二

者乃脾經蘊熱凝結而成其患眼胞內生出如菌頭大帶小漸  
出甚者眼翻流淚亦致昏矇治宜用軟綿紙蘸水屢之眼胞  
之頭用左手大指甲佃於患根右手以披針尖頭齊根切丁而  
不妨隨用翠雲錠磨濃塗之其血自止內服涼膈清脾飲二服

心海腥煎炒椒薑火酒等件不發

河脾飲涼膈清脾飲薄荷  
黃芩赤芍連翹等

荆防生地石膏圖  
甘草山梔豈可無

吹風 荆芥

黃芩

石膏

山梔

薄荷

芍芍

連翹

生地各一錢

甘草五錢

二連登心三十張煎八分食後服

翠雲銳治眼胞菌毒用針割後塗之杭粉五兩銅綠末一兩輕粉一錢共研極細用黃連一兩同川木百粒水一碗煎一半再熬折去二分和藥作錠陰乾臨用清水少許淨硯上磨濃雞翎蘸搽患處又治爛弦風眼或暴赤腫痛者隨搽更效

### 體氣第一百三

體氣一名胡氣此因父母有所傳染者又有胡胎而受生者故不吐本來氣質凡此腋下多有棕紋數孔出此氣味常以五香散擦之  
內用蒜肚時常作饌食之亦可解其氣味可漸而退此法常敢試也

### 五香散

五香散內用沉檀  
加上麝香功更捷

還有零香併木香  
敢教體氣不相妨

### 沉香

### 檀香

### 木香

### 零香

各三錢

### 麝香

分三

共為細末每用五釐津調搽擦兩腋下三日一次或用香末二錢

絹袋盛貯挂於腋下亦效

肚方用公猪肚一具入大蒜囊四十九枚去殼入肚內以線扎口  
水煮極爛用鹽醋蘸肚隨便食之氣味甚者用癩蝦蟆一個入內  
同煮肚爛去蝦蟆大蒜用熱酒食之洗浴發汗避風三日其氣頓  
改

### 白禿瘡第一百四

禿瘡因剃髮腠理司開外風襲入結聚不散致氣血不潮皮肉乾  
枯發為白禿久則髮落根無滋養如禿斑光潤不癢內血已潮以  
薑蕪潤肌膏常擦其髮漸生禿斑乾枯作癢者內必有蟲宜用麥  
饒散搽之蟲死風散髮生可愈後忌動風發物等件

錢散見痘風  
會昔瘡門

治禿瘡頭毛脫落白班如癬瘡加壘壘蚤起癢甚猶若蟲行葱湯

洗淨瘡痂潔淨用麻油調搽以輕帽蓋之隨後作疥發腫忍之三日後其痂漸漸而脫愈之後不復作其髮一生戒諸發物

諸瘡一掃光見疥瘡門

治禿瘡髮脫作癢本藥一錢加倒挂塵二分加燈窩宿油調搽治

愈

潤肌膏

潤肌膏內用麻油能搽禿瘡枯編色

紫草當歸一處投加之黃蠟效應收

治禿瘡乾枯白斑作癢髮脫用麻油四兩當歸五錢紫草一錢同

熬藥枯燒清將油再熬加黃蠟五錢化盡傾入碗內頓冷搽擦由

上漸愈矣

奶癬第一百五

奶癬見在胎中母食五辛父食燥遺熱與見生後頭面遍身發

奶癬流脂成片睡臥不安搯癢不絕以蚊蛤散治之或解毒雄黃



散甚則聚雲散妙

蛤散

蚊蛤散中輕粉未香油調搽嬰兒癩

蚊蛤兩

點紅川椒二兩

輕粉五錢

川椒倍子炒須焦乳母宜將飲食調

先將蚊蛤打成細塊鍋內炒黃色次下川椒同炒黑色烟起為度入罐內封口存性次日入輕粉碾為細末確收貯香油調搽奶母

戒口為妙

雄黃散見血風瘡門

聚雲散青紅汁調搽見楊梅瘡門

膳拱頭第一百六

膳拱頭俗名腦猪是也患小而稟受悠遠皆父精母血蓄毒而成生後受毒者只發一次其患腫高破之又腫皆稟受時原有衣膜相裹毒雖出而膜未除故愈又發腫甚膿熟者用針刺破以三品一條鎗插入孔內化盡內膜自愈又不腫而不收口者此必溼襲

患口宜敗銅散搽之兼戒口味自愈

敗銅散

敗銅散效為何因  
性熱亦能收溼水

銅錫鉛礱總化成  
一乾再不復回津

治蟬拱頭已破後膿水不乾愈之又發久不收口用化銅舊確在  
未洗淨患上香油調搽忌口

三品一條鎗見痔  
毒門

小兒遺毒爛斑第一百七

遺毒乃未生前在於胞胎稟受因父母楊梅瘡後餘毒未盡精血乃  
成故既生之後熱湯洗浴烘薰衣物外熱觸動內毒必發於肌膚  
之表先出紅點次成爛斑甚者口角穀道眼眦鼻面皮肉俱壞多  
妨乳哺啼叫不安初治宜早內與土茯苓湯調入中黃末每日數  
次共飲四五分外用解毒紫金丹磨塗患上效者可保十中三四  
遲延毒甚爛斑遍身不乳者百中難活一二此由根蒂受毒之深

故也

人中黃治小兒諸胎毒痘疹黑陷內收唇焦口乾風熱斑疹赤遊丹  
毒兼治大人傷寒陽症發狂或諸惡瘡毒氣入裏口燥咽乾煩渴  
悶亂中諸砒草河朮等毒諸般急病無有不效用毛竹一段兩頭  
留節一頭鑽一小孔用粉草磨爲細末從孔灌滿以木條塞緊孔  
眼用磚扎之沉入大糞池內一年取起長流水浸一日帶竹風乾  
磁確收貯大人每服二錢小兒每服三四分涼水調服小兒胎毒  
爛斑土茯苓湯調服尋常熱病入應病藥中調服卽效

真君妙貼散

見腫瘍門

治小兒胎毒皮肉腐爛疼痛不安用此敷卽效

解毒紫金丹

見疥瘡門

蠟蚶串者乃得於思慮傷脾脾氣鬱結所生是痰氣血澆薄者多  
四肢屬脾土其患多生於兩手初起骨中作疼漸生漫腫堅硬  
執不紅手背及內關前後連腫數塊不能轉側日久出如豆腐  
汗串通諸竅日夜相留腫痛仍在患者面黃肌瘦飲食減少久  
寒熱交作內症並出首尾俱宜益氣養榮湯加味道遙散調和  
血扶助脾胃其中可生者十有三矣補而不應氣血澆盡而  
者多

### 益氣養榮湯

加味道遙散

見癩  
癩門

### 小兒痘風瘡第一百九

痘風瘡因痧痘後毒發未盡留熱肌膚復被外風侵入其患先從  
瘡作癢次漸沿開成片脂水生痂搔之無度因用麥餞散搽之  
戒口味避風自愈

麥餞散

麥餞散採痘風毒  
川椒生熟枯礬末

硫黃白信要相當  
調用麻油一擦光

治小兒痘風作癢叠叠成片甚則頑麻不知痛用小麥一升炒枯  
黃色乘熱入鉢內和硫黃四兩白砒一兩細末攪勻待冷取起加  
烟膠半觔川椒三兩生枯礬各二兩共碾細末臨用葱湯洗淨用  
麻油調搽油紙蓋扎三日一換三次愈

小兒赤遊丹第一百十

赤遊丹受毒於未生前發病於有生後蓋身在胞胎皆賴父精母血  
藉以生養父母不能節其慾多致淫火猖熾胎必侵受又不能戒  
諸厚味以及炭火烘薰重裘疊褥往往受熱子無弗有及致生後  
熱湯洗浴烘薰衣物觸動內毒而欲發之時先發身熱啼叫驚搐  
次生紅腫光亮發熱瞬息遊走發無定處先從頭額起者名天奪  
丹以升麻葛根湯母子同服餘皆起於腹皆流入四肢者輕起於

四肢流入胸腹者重有此總背先破惡血為要破血之後先用  
猪肉縫片貼之一時許換如意金黃散用水芭蕉根搗汁調敷其  
者日換二次內以大連翹飲消毒犀角飲五福化毒丹毒氣入  
腹脹堅硬不乳者紫雪散下之三日後身漸徹涼破血之處肉  
軟活聲清腹軟乳哺如常者順反此為逆

升麻葛根湯

升麻葛根湯芍藥  
木通甘草連翹等

柴胡黑山梔莫逃  
丹毒遊行効最高

治丹毒身體發熱面紅氣急啼叫驚搐等症服

升麻

乾葛

白芍

柴胡

黃芩

山梔各二

木通

甘草

各五分

水二鍾煎八分不拘時母子同服

大連翹飲

大連翹飲梔芍歸  
荆防甘麥柴芩等

車前飛滑石膏隨  
蟬蛻木通牛蒡宜

治小兒丹毒發熱痰涎壅盛一切諸瘡痧疹項生核或傷風

寒時行發熱等症並宜服之

連翹 瞿麥 滑石 車前子 牛蒡子 赤芍

山梔 木通 當歸 防風 黃芩 柴胡

甘草 荆芥 蠟蛻 石膏各五分

水二鍾燈心二十根煎八分母子同服

消毒犀角飲消毒犀角飲防風 赤遊丹腫効神功

治小兒丹毒身熱氣麓啼叫驚搖不寧等症服

犀角鎊 防風各一分 甘草五分 黃連三分

右水二鍾燈心二十根煎四分徐徐服之

紫雪散紫雪粉羊犀角共 元參沉水香甘草 升麻寒水石膏逢 硝片硃砂金箔從

治小兒赤遊丹毒甚者毒氣入裏肚腹脹氣急不乳即宜此藥

救之又治傷寒熱燥發狂及外科一切蓄毒在內煩躁口乾恍惚

不寧等症

升麻

寒水石

石膏

犀角

羚羊角各一

元參兩

沉香

木香

各五錢甘草八錢

水五碗同藥煎至一碗濾清再煎滾投提淨朴硝三兩六錢微火漫煎水氣將盡欲凝結之時傾入碗內下硃砂水片各二錢金絲一百張各預研細和勻碗頓水內候冷凝成雪也大人每用一錢小兒二分十歲者五分徐徐嚥之即効病重者加一錢亦可或用

淡竹葉燈心湯化服

針砭法

針砭之法絕世奇筋頭復向針上敲

赤遊丹頂用相宜出血還須精肉醫

治小兒赤遊丹毒紅赤癩腫遊走不定須砭之用披針銜尖向患上以烏木重筋在針上面擊之密砭去血多者為妙血紅者輕砭者重黑者死砭畢溫湯洗淨用乾精猪肉縫大片貼砭處一時許



方換如意金黃散水芭蕉根搗汁調敷

聖意金黃散 見腫瘍門

治小兒赤遊丹毒紅如硃熱如火走如雲散及遍身不定者用水

芭蕉根搗汁調敷加蜜亦可

五福化毒丹 見胎痛門

### 走馬疔第一百十一

疔馬牙疔其患迅速不可遲延故也其患多在疔痘餘毒所中又有雜病熱甚而成者其患牙根作爛隨便黑腐作臭甚者牙齦脫落齦傍黑朽不數日間以致穿腮破唇誠為不治初起宜用蘆薈消疔飲外用人中白散或冰硼散二藥擦之取去黑腐內見紅肉血流者為吉如取時頑肉不脫腐爛漸開嫩腫外散臭味不止更兼身熱不退者俱為不治

盧耆治疳飲升麻牛膝各拾羊角

元參甘草共此木胡

治小兒走馬牙疳身熱氣龔牙齦腐爛氣味作臭以及穿腮破者並服之

蘆耆 銀柴胡 胡黃連 川黃連 牛蒡子 元參

桔梗 山梔 石膏 薄荷 羚羊角各伍分

甘草 升麻各三分

水二鍾淡竹葉十片煎六分食後服

人中白散人中白散擅功奇 水片薄荷研細未 黃栢兒茶青黛烏宜口疳參上病輕離

治小兒口疳走馬疳及牙齦腐爛黑臭者極効

人中白弱壺者佳 煨紅二兩 孩兒茶 兩黃栢 薄荷 青黛各五分

冰片五分

共再研極細先用溫湯漱淨吹藥疳上日用六七次吹藥涎從外

流為吉內收涎毒入裏為凶

疔五不治

臭涎穢者一不治

惡腐不脫者二不治

牙落無血者三不治

腮破唇者四不治

用藥不効者五不治

糊散見咽喉門

### 重舌第一百十二

人小兒重舌乃心火妄動發之當以線針點刺患上合出惡血內服解毒瀉心湯外以冰硼散擦之又有紫舌木舌亦由心火而發用飛鹽加冰片少許勤搽出涎自愈又有痰氣結於舌上成核作痛硬强者用線針點破出血用冰硼散搽之服後藥

連瀉心湯

瀉心湯用山與芩連甘草連翹薄荷葉

荆芥山梔牛蒡先木通加上効如仙

治大人小兒心火妄動結成重舌木舌紫舌脹腫堅硬語言不利

者並宜服之

黃連

山梔

荆芥

黃芩

連翹

木通

薄荷

牛蒡子各錢

甘草五分

水二鍾燈心二十根煎八分食後服

針刺法治重舌本舌此苦脹等疾腫脹疼痛硬強不語又兼舌根併  
兩齒合縫盡處作腫爛肉塗塞口禁難開俱用此法刺之用鴛鴦  
針扎在筋頭上在患處點刺出血紅紫毒輕紫黑毒重患甚者點  
十點皆可血盡溫湯漱之甚者金鎖匙輕者冰硼散搽患上流注  
熱涎內服涼膈散清涼飲俱可選用

金鎖匙

冰硼散

涼膈散

四順清涼飲俱見咽疾門

### 胎瘤第一百十三

胎瘤者初生小兒頭上胸乳間腫起大者如餛飩小似梅李此皆胎中

瘀血凝滯而成雖候見滿月外方可用針刺破內如赤豆汁則安

內服五福化毒丹

福化毒丹

五福化毒丹連桔元參胆草牙硝片

青黛人參赤茯苓甘草珠砂金箔呈

治小兒蘊積胎毒以及諸瘡癰疹傷風痲症口舌生瘡痰涎壅盛

謔言煩燥夜睡不寧者並効

元參

桔梗

赤茯苓

人參

黃連

龍膽草

青黛

牙硝

甘草

冰片

硃砂

金箔

右為末煉蜜丸芡實大每服一九薄荷燈心湯化服及治瘡症後

餘毒上攻口齒涎血臭穢以生地黄汁化下如無地黃竹葉燈心

湯亦可用

鵝口瘡第一百十四

口瘡皆心脾二經胎熱上攻致滿口皆生白斑雪片甚則咽間唇

叠腫起致難乳哺多生啼時以青紗一條裹筋頭上蘸新汲水  
去白胎以淨爲度重手出血不妨隨以冰硼散擦之內服涼膈  
藥

冰硼散見咽  
喉門

涼膈散見齒  
病門

### 痘癰第一百十五

痘癰乃源痘瀰藥不足毒流於脾肺二經致手脚胸背結成漫腫  
如桃李此多發在收靨之後身涼不渴者爲吉有此不必內消  
太乙膏貼上候膿熟針之元氣虛弱者兼服保元湯助脾健胃  
要

### 保元湯

保元湯力効無窮  
甘草參芪兼白朮

救困扶危立大功  
棗薑加上起痲癢

治痘癰出膿之後脾胃虛弱膿清不斂者服之

人參

黃芪

白朮各一錢

甘草三分

薑一片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

痘疔第一百十六

疔乃痘毒升發不盡留痘心肝二經者發之初生紫點次日變黑  
毒淺者浮高而潤毒甚者深陷而焦其發多出於七朝上下將磨  
之際又生於臀腿手足身溫疤潤音清者吉發在肚腹腰腎身熱  
色枯聲啞者凶凡見此者急用針刺疔根插入蟾酥條候四邊裂  
縫疔搖動者用刀割去搽玉紅膏生肌完口如針無血插藥乾枯  
不變膿者終為不治但此症屬有餘首尾俱宜加減鼠粘子湯為  
要也

減鼠粘子湯

加減鼠粘子湯  
荆芥山梔甘草

花粉知母共藏  
燈心竹葉難忘

鼠粘子

天花粉

知母

荆芥

山梔各六分

甘草三分

水二鍾淡竹葉燈心各二十牛煎服

身熱加柴胡黃芩

有痰加麥冬貝母

咽啞加元參枳殼

咬牙加薄荷石膏

便秘加蜂蜜元明粉

昏憤加黃連硃砂

痲枯加當歸生地

癩疔加蟬蛻川芎

八珍湯

見潰瘍門

治痘疔落後氣血虛弱膿水出多不能生肌收斂宜服之

蟾酥條

見疔瘡門

玉紅膏

見疔瘡門

### 黃水瘡第一百十七

黃水瘡於頭面耳項忽生黃色破流脂水頃刻沿開多生痛癢此因日晒風吹暴感溼熱或因內食溼熱之物風動火生者有之治法

蛤粉散搽之必愈

蛤粉散

蛤粉散治黃水瘡石膏黃栢併輕粉

膿水沿開痒痛當水調敷上即時良

蛤粉

石膏

煨各一兩輕粉

黃栢

生張各五錢



共為細末涼水調搽冬月麻油調亦好

吳君妙貼散

見睡  
瘍門

治黃水瘡癢痛脂水亦効

黃水瘡藥方

此藥方係治黃水瘡之良方，其法係將藥材研末，用涼水或麻油調搽。冬月則用麻油調搽亦好。此藥方係吳君之妙貼散，見睡瘍門。治黃水瘡癢痛脂水亦効。

大人口破第一百十八

口破者有虛火實火之分色淡色紅之別虛火者色淡而白斑細吐甚者陷露龜紋脉虛不渴此因思慮傷脾多醒少睡虛火動而之四物湯加黃栢知母丹皮肉桂以為引導從治法也外以柳葉散搽之實火者色紅而滿口爛糜甚者腮舌俱腫脉實口乾此膏梁厚味醇酒炙燻心火妄動發之宜涼膈散外搽赴筵散吐瀉則愈如口舌生瘡舌乾黃硬作渴者加減八味丸以滋化源俱林水漱

柳花散

柳花散內君黃栢冰片加之為未吹

青黛肉桂相兼續虛陽口破功奇速

黃栢

淨末

一兩

青黛

錢三

肉桂

錢一

冰片

分二

各為細末共再研磁罐收貯每用少許吹之

筵散

甚筵散內栢苓連  
細辛加之各等分

黃連

黃栢

黃芩

梔子

乾薑

細辛各等分

爲末吹患上

物湯

見癩  
瘰門

涼膈散

見咽  
喉門

加減八味丸

癰疽  
瘻門

臭田螺第一百十九

田螺乃足陽明胃經溼火攻注而成此患多生足指腳根隨起白

斑作爛先癢後痛破流臭水形似螺醫甚者脚面俱腫惡寒發熱

先宜甘草湯洗淨貼蟾酥餅三日三枚後用珍珠散猪脊髓調搽

膏蓋焮腫上真君妙貼散敷之其腫漸消戒便步履

蘇餅

見疥  
瘡門

珍珠散

見下  
疔門

真君妙貼散

見癰疽  
腫瘍門

牛程躩第一百二十

程躩程途奔急熱腳下水見風以致氣滯血枯結成頑硬皮肉榮

衛不滋漸生腫痛腫高突尖起腳難行走久則破裂膿水相流  
日溫湯淨洗搽牛角散又有內膿攻注皮頑難破者以大線針  
頭挑破出膿乃覓硬皮敲破者剪而去之內不生者用五  
肉滿不生皮者珍珠散搽上生皮乃愈

牛角散

牛角散中牛角燒  
本方加上水龍骨

松香輕粉不相饒  
相兼牛躑鳩同調

牛角尖

燒灰

水龍骨

松香

輕粉

各等

共為末牛角髓調搽虛弱者兼服十全大補湯

五紅膏

見腫  
場門

珍珠散

見下  
疔門

僵蟬蛙第二百二十一

僵蟬蛙多生手指節中不紅不熱腫如蠅腹乃于少陰痰氣凝滯  
生初起不疼日久方痛痛久方腐腫仍不消蟾酥餅膏貼漸作  
膿近者一載遠者三年此屬體弱者有之內兼補劑免變癆瘵

酥餅見疔瘡門

田螺泡第二百二十二

螺泡多生手足忽如火燃隨生紫白黃泡此脾經風濕攻注不久漸大脹痛不安線針挑破泄去毒水太乙膏蓋挑破又生者內服

解毒瀉脾湯可愈

毒瀉脾湯

解毒瀉脾湯牛子石膏甘草黃芩等

防風

牛子

山桅

石膏

黃芩

蒼朮

甘草

木通

各一錢

水二鍾燈心二十根煎八分量病食前後服之

土膏見腫瘍門

蟾酥條見疔瘡門

玉紅膏見腫瘍門

者皆起於手足乃風寒氣鬱於皮毛致血不榮於肌表謂及棉則多痛似無皮之狀是腠苦生焉將患上葱湯浸洗良久隨以潤肌膏擦之就暖勿見風冷自愈又每久逢冬即發者須三伏時晒地爛大蒜間擦三次不再發謂寒因熱治其理甚明矣

陰風第一百二十四

虱又名八腳蟲也乃肝腎二經濁氣而成生此不為清吉銀杏此津調擦之內服六味地黃丸每斤加蜜炒黃栢一兩蘆薈五錢清化源愈後不發

杏無憂散

銀杏無憂散麝香雄黃狼毒兼蘆薈

水銀輕粉杏仁強調擦何愁藥不艱

水銀

製

杏仁去皮輕粉

雄黃

狼毒

蘆薈各一錢

麝香一分

除水銀杏仁膏餘藥共碾篩細入上二味再研勻先用土苳蒲

洗之用針挑去風孔隨用津唾調擦使藥氣入內愈不復生切

心牛犬鬣肉

不地黃丸見肺瘡門

### 葡萄瘰第一百二十五

有瘰其患多生小兒感受四時不正之氣鬱於皮膚不散結成大  
小青紫斑點色若葡萄發在遍體頭面乃為疔症自無表裏邪毒  
疔胃牙根出血久則虛人斑漸方退初起宜服羚羊散清熱涼血  
八則胃脾湯滋益其肉又有牙根腐爛者人中白散

于角散

羚羊角散用知母甘草麥冬淡竹葉

黃芩牛蒡與元參止血清斑功效靈

羚羊角

防風

麥冬

元參

知母

黃芩

牛蒡

各八分甘草二分

小二鍾淡竹葉十片煎六分食遠服

脚湯

扶神白木併遠志

麥冬五以服康寧

白木

茯神

陳皮

遠志

麥冬

沙仁各五

五味子

甘草各五分

水二鍾煎八分食遠服虛弱自汗者去沙參加入參黃芪各五

甲白散見口疳門

百蟲入耳第一百二十六

蟲入耳乃偶然誤入之如蠅蚊細蟲入耳以麻油數點滴入竅中  
蟲亦自死取出如蜈蚣蜜蜂等大蟲入者以肉炙香安耳邊其蟲  
聞香自出有蟲夜間暗入者切勿驚慌响叫逼蟲內攻宜正坐點  
燈光向耳竅其蟲見光自出對面有人見其蟲不出

惡蟲叮咬第一百二十七

蟲乃各稟陰陽毒種而生見之者勿觸其惡且如蜈蚣用鉗蝎

正宗

卷之七

四



尾惡蛇以舌螫人自出有意附毒害人必自知其惡也凡有所  
名尋類而推治

咬傷疼腫驟發用蟾酥餅磨濃塗傷處用簾紙撚蘸麻油點火  
烟焰薰之疼腫自消又方用雄雞糞搗水塗之又方用頭垢搽  
處以撚燻薰之

雌雄二種雄者螫人痛在一處雌者痛窄徧體用井底泥敷痛  
處乾則易之一時無泥取新汲水以青布隨痛處搭之溫則再易  
方五月五日用黃蠟二兩溶化將凝時投雄黃硃砂細末各三  
錢和勻捍成餅窩仍用貓兒眼草白汁端午時滴入窩內陰乾愈  
愈佳復搗成塊密收臨用一米許刺針尖上以燈焰化開滴正  
患處其毒即止矣

傷人用雄黃末蘭葉搗汁調敷腫上內用半枝連搗爛取汁一

兩熟酒四兩和汁服之蓋汗爲效仍用渣敷傷處亦妙又方隨酒  
卽用端午收採蒼耳草末五錢水煎一鍾熱服蓋汗卽安如無酒  
午收採者便用常日採取陰乾煎服一兩發汗亦效

七寸蛇青色扁形尖尾短足紅口者毒輕青口者毒重以舌蟻人甘  
青最惡初螫時用雄黃末一錢生薑二錢杵內溶化將筋頭點熨  
傷處冷則易之連點七次遂愈毒氣入裏者解毒紫金丹酒磨服  
一錢蓋汗卽愈遲延毒走腫痛者麻油焰薰之亦瘥

河魴毒血毒中人舌麻心悶白茅根搗汁冷飲子毒中人昏悶腹脹  
口禁難言金汁解之非此不能也

### 人面瘡第一百二十八

人面瘡古言有生者近世之罕聞矣其生病異而受之必異然瘡象人  
似人面眼鼻俱全多生膝上亦有臂患者據方書皆云積勞所致

先須清心懺悔改過自新然後方服十六味流氣飲外用貝母爲  
末敷之乃聚肩閉口次用生肌斂口藥亦可得愈矣

十六味流氣飲

見流注門

### 誤吞針鐵骨哽咽喉第一百二十九

吞針刺哽咽喉疼痛者用亂麻筋一團搥龍眼大以線穿繫留線頭  
在外湯溼急吞下咽頃刻扯出其針頭必刺入麻中同出如不中  
節再吞再扯以出爲度誤吞銅物者多食葶薺化堅爲軟若吞鐵  
骨之物腸中不能轉動覺墜者多食青菜猪脂自然送入大腸從  
糞同出諸骨哽喉用玉簪花根八錢各隨所犯之肉爲引煎湯服  
之轉出乃愈又諸骨哽於咽下不能外出者烏龍針推之骨亦則  
安矣

龍針治骨哽於咽下難出者用細鐵線燒軟雙頭處用黃蠟作丸

龍眼大裏鐵線頭上外用絲綿裹之推入咽內噴骨處其骨口外  
順下矣不下再推

又方治諸骨哽喉玉簪花根切片煎湯漱之徐徐吐出其骨自脫而  
用乾飯嚥之自下

### 中砒毒第一百三十

砒毒者陽精大毒之物服之令人臟腑乾涸皮膚紫黑氣血乖逆則  
絕則死初服知覺早者大蘭根葉搗汁灌之輕則可解無蘭處以  
生菜豆同水研爛以水灌之多則爲效如不解者以金汁灌之必  
甦甦後如顛不語者每日以漿豆水飲之毒盡則愈

取金汁法用大毛竹一連二節用刀劈去外青一半用磚扎節中  
入大糞池內二年後取起以長流水浸一日取起鑽開節孔內甚  
糞清磁罐收貯凡遇有中砒毒河鮑傷寒陽毒發狂疔瘡痧症毒

氣入裏煩躁口乾渴欲飲水脉大有力者並宜此藥

落下頰拿法第一百三十一

平頰者氣虛之故不能收束關竅也患者平身正坐以兩手托住  
下頰左右大指入口內納槽牙上端緊下頰用力往肩下捺開關  
竅向腦後送上卽投關竅隨用絹條兜頰於頂上半時許去之卽  
愈

救自刎斷喉法第一百三十二

口刎者乃迅速之變須救在早遲則額冷氣絕必難救矣初刎時氣  
未絕身未冷急用絲線縫合刀口摻上桃花散多摻爲要忌以綿  
紙四五層蓋刀口藥上以女人舊布裹腳將頭擡起周圍纏繞五  
六轉扎之患者仰臥以高枕枕在腦後使項彎而不直刀口不開  
冬夏避風衣被覆暖待患者氣從口鼻通出以薑五片人參二錢

用米一合煎湯或稀粥每日隨便食之接補元氣三日後急手  
去前藥用桃花散摻刀口上仍急纏扎扎二日急用濃葱湯軟結  
蘸洗傷處搥乾用抵脚挑玉紅膏放手心上捺化擦於傷口處用  
用舊棉花薄片蓋之外用長黑膏貼裹周圍交扎不脫近喉刀口  
兩傍再用黑膏長四寸濶二寸豎貼膏上兩頭粘貼好肉庶不  
落外再用絹條圍裹三轉針線縫頭冬月三日夏月二日每用葱  
湯洗搥換藥自然再不疼痛其肉漸從兩頭長合內服八珍湯  
理月餘如大便結燥用渚膽套法不可利藥利之雙額俱斷者  
日單斷者四十日必收功完口此法曾治強盜郭忠阜隸沙萬宗  
人顧興俱雙額齊斷將危者用之全活單額傷斷者十餘人治之  
俱保無虞矣

玉紅膏

見腫瘍門

桃花散

如聖金刀散

見金瘡門

八珍湯

見潰瘍門

陰毒第一百二十三

毒乃純陰無陽被天時寒冷肅殺之氣侵入肌膚沉於骨髓致氣不能升或能行凝滯經絡疼痛切骨初起不腫不熱朝輕暮重久則作腫漸紅爛斑黑靨臭水淋漓穢氣薰蒸腐爛漸開終久必死一人年三十歲冬月隔港與鄰婦私交房事方畢忽婦夫回慌忙隔港赴水而走執身受寒五日後小腹大臀陰痛不腫日夜响叫至一月後谷道傍生一爛斑黑靨倒陷諸藥不效至半月大臀連黑腐爛作臭乾靨無膿十日大臑俱壞黑敗而死也又一人年四十歲夏月好飲火酒至夜赤身露臥手膊連背陰疼難忍一月後肩發爛斑一塊周圍微硬色如紅棗日漸延開半月後手膊半背其成黑靨臭穢不堪一月不食而死一人中年肥胖亦冬夏好飲火酒飲後癩裂京水方決一日頓首在旁改重更甲石三月

外頂天如頭石硬不熱此陰毒也辭不可治後請別醫治之項間  
身大乃異症不食而死又一人夜夢城隍拘見責打二十喊叫其  
妻喚醒隨後受刑處炊<sub>非</sub>作疼青紫急脹視之真棒毒也用針刺  
破流瘀血碗許外肉腐爛作疼調理兩月而安此亦陰毒或附記  
之後人可閱

### 失榮症第一百三十四

榮者先得後失始富終貧亦有雖居富貴其心或因六欲不遂損  
傷中氣鬱火相凝遂成失道停結而成其患多生肩之已上初起  
微腫皮色不變日久漸大堅硬如石推之不移按之不動半載一  
年方生陰痛氣血漸衰形容瘦削破爛紫斑滲流血水或腫泛如  
蓮穢氣薰蒸晝夜不歇半生疔瘡愈久愈大越潰越堅犯此俱爲  
不治予立二方曾治數人雖不獲全愈而不夭札速死者誠緩命



藥也

榮散堅丸

和榮散堅歸地參丹酸遠栢并龍齒

扶陳水附貝南星蘆薈硃砂與角沉

治失榮症堅硬如石不熱不紅漸腫漸大者服

歸身

熟地

茯神

香附

人參

白朮

橘紅

各二兩

貝母

南星

酸棗仁

遠志

栢子仁

丹皮

各一兩

龍齒

二兩殼無或鹿角角共三兩煨亦可

蘆薈

角沉

硃砂

六錢不為衣

右為細末煉蜜丸桐子大每服八十九食後用合歡樹根皮煎湯送下患者若改往從新澹薄甘命其中有得愈者十中一二否則難脫然也

難脫然也

龍阿魏化堅膏

石皮色不紅日久

漸大或疼不疼但未破者俱用此貼用蟾酥丸藥末一匙加金  
蜈蚣五條炙黃去頭足研末同人熬就乾坤一氣膏二十四兩  
開攪和重湯內頓化紅緞攤貼半月一換輕者漸消重者亦可信  
止常貼保後無虞矣

### 試知百病死生法第一百三十五

死生非神聖不能洞其機關疾病無明醫亦不能決其凶吉否則估  
人疑或決斷不當予異授呂祖一枝梅真仙方也不敢私秘一  
刊註以傳權世云

呂祖一枝梅

堪誇呂祖一枝梅  
雄麝銀珠砂麝脂

世豈真麻靈脂隨  
識死知生不改移

治大人男婦小兒新久諸病生死難定之間用藥其實大一餅貼

印堂之中點官香一枝香盡去藥已後一時許藥處有紅斑暈係

腫氣飛散謂紅霞捧日病雖危篤其人不死如貼藥處一時後無

腫無紅皮肉照舊不變謂白雪漫野病雖輕淺終歸冥路小兒急慢驚風一切老幼痢疾俱貼之紅腫卽愈此方用之可預知生死也

硃砂三錢

銀硃一錢

五分

五靈脂三錢

麝香分三

萸麻仁五錢

雄黃

芭荳仁各五錢

不去油

右各研細於端午日淨室中午時共研加油臙脂爲膏磁盒收藏勿經婦女人手臨用荳大一圓捏餅貼印堂中其功立見用過餅送入河中

### 造孽報病說第一百三十六

怪症出於非端事必因乎有據感應篇曰若開如是花必結如是果一黃冊書手每至甲首家務要殺雞一隻先食頭尾一歲二熟下卽殺雞不計其數一朝數盡口中生出如菌大小六枚填塞滿口

湯水難下視之乃孽疾也辭不可治又請一醫用刀割去其目  
生如舊延至六十日肌膚盡削存骨如柴而死○一竿鎗戶傷殘  
生鳥假如每日十命一歲共計三千六百盡屬死於無辜況其雞  
子不得生者多矣彼生子三人俱至六七歲遍身先發紅點癢痛  
異常數日後點如鑽趨腐爛流血口稱百鳥相啄令人趕打不  
至月外氣血瀝盡俱亡子後勸解燒毀竿矢合族持齋六十二歲  
生一子方得長成而立○一人五十餘歲家聚養雞十餘隻一朝  
衆雞齊叫彼怒之將衆雞兩腳齊肘安檻上剝斷其雞亂命飛跳  
血盡而俱死一年後足生脫疽筋骨伶仃流血不止令妾將刀割  
去腳骨瀝盡氣血而亡○一富家置窩以兼養鷹犬五十後方生  
一子二歲左右頭角生孔一處俱已露骨視之乃孽病也不敢言  
其不治奉上藥方修合用之無效請眾醫治之強投藥欲延至三

歲而殺其人後遭橫事死於非命○一莊家穢事為樂五十後遍

身生塊破後腐爛見骨素知彼養鷹之報予曰欲病先當杜

養鷹犬然後施治則可彼從之內服益氣養榮之藥外用甘草當

歸煎洗仍搽玉紅膏長肌完口三月餘而愈二年後復養鷹犬又

一年六月內得患陰症而歿次子十歲赴水而死已上數條係乎

的實皆出於不仁慘戮生靈之報也一訟師作中興訟破眾家私

傷殘骨肉不計其數一日大腿腫痛堅硬如石疼苦異常常欲以

繩繫足高懸梁上其疼乃止如放下疼即如故予知孽報辭不可

治似此兩月日至午時親友四人相看忽聞腿內大嚮一聲其腫

即歸大臀腫如巴斗其腿即消臀腫痛不著席將布兜懸挂其疼

方可又兩月百苦而終又一年其妻遍身發腫如癩作癢非常破

流脂水其時孟冬天氣常欲赤身相露其癢稍止如著衣被其癢

卽生如蟲攻刺予知孽報亦辭之後至隆冬赤身流水而死此  
常之報也所謂逆天害理雖由已古往今來放過誰無漏矣

### 仙方活命飲今古不同論第一百三十七

古人朴實其七情干涉者少而從風寒暑溼外感凝滯者多故設仙  
方活命飲攻散所滯之腫服此得效者十常八九乃患者五臟之  
虛耳今人穿鑿太過七情煩攪過甚而內臟無有不傷每見此症  
曾服過此藥其瘡必不起發脾胃再無不損若瘡不起發脾胃復  
敗患者豈有得生至此自干天命今之治法不論首尾標本先以  
固脾胃次行托藥謂本立而道生無不活予見如此幸同道者  
察焉

### 拾遺症第一百三十八

拾遺者因條款分門遺失未及細詳但本病立門以正病爲主而從

病故有失焉。今查補註，以便觀治之。鼻疔生於鼻內，痛引腦門，不能運氣，脹塞鼻竅甚者，唇腮俱腫。○牙疔生於牙縫之中，頂高突起，痛連腮頰，破則流血。○黑疔生於耳竅之內，黑硬腐爛，破流血水，痔及腮破以上之症，俱先針刺，次行發汗，仍照疔類調治。○喉癰生於陽外正中，腫痛妨礙飲食，紅腫發熱，必欲潰膿，軟而脹痛者，針之內服補托之藥。玉紅膏搽貼，長肌完口。又有腐潰內通，涎水隨孔出者，曾治數人，俱亦無妨。○臈疽生在膊上，連肩通腫，長堅而硬。○兔疽生在當手動脈之處，腫痛寒熱，徹手脾舉動不便。○鳳眉疽發在兩目之間，形長皮赤，痛引腦戶。二日合縫，光腫發熱。○透腦疽發在額上髮際之間，多發寒熱，頭疼如斫，不可忍耐。先用萬靈丹發汗，解散風邪，次宜清托。○附陰疽生在內踝上三寸，初起水泡，漸生赤腫，破流血水，痛亦徹骨，不能步履。○咬骨

疽發在大腿內股不腫不紅痛徹骨髓初宜雷火金金之內服  
靈丹酒調服效○陰疽生於右腿夾縫之下三寸痛連陰子小指  
亦疼○元疽生於左腿夾縫之下三寸漫腫連陰疼及大腿○淵  
疽發在脇下初起不紅堅硬久則破潰有聲如嬰兒啼狀膏蓋無  
聲去膏仍有異哉難治之症也○玉枕疽生在腦後枕骨中堅石  
難潰痛引肩項鼻塞氣齷此太陽膀胱溼熱凝滯而成大抵以上  
之症有名而生者鮮矣初起有表症者便宜解表有裏症者卽由  
通利潰後宜補托久則宜收斂此爲一定治法不可混亂妄投藥  
餌致其危亡也

唇風第一百三十九

唇風陽明胃火上攻其患下唇發癢作腫破裂流水不疼難愈宜  
粉丸泡洗內服六味地黃丸自愈



銅粉丸

編粉丸中輕粉礬  
黃連膏子同水片

銅青官粉與麝香  
爛服唇風頃刻良

銅青錢

官粉錢

明礬一錢五分

輕粉一錢五分

麝香一分

冰片二厘

黃連

二兩切片  
煎聖膏

右共為細末與連膏丸如芡實大每用一九湯泡紙蓋每洗頗熱

上面清水抄洗之其患自愈

綳縛背袋第一百四十

至於發背對口大瘡等疾已潰流膿時冬夏宜絹帛四五層放貼憂藥外再用綿布見方八寸四角用蛇皮細帶紮之安蓋絹上以酒扎在前胸綿貫瘡上庶使瘡中暖氣不泄易於腐潰洗瘡時預備二繡更換務要患內暖氣烘烘此法最善故亦補之

癰疽內肉不合法第一百四十一

癰疽對口大瘡內外腐肉已盡惟結痂膿時內肉不粘連者用軟棉

帛七八層放患上以絹扎緊將患處睡實數次內外之肉自然  
連一片如長生成之肉矣有患口未完處再搽玉紅膏其肉自不  
矣

### 煉元明粉法第一百四十二

冬至後用潔淨朴硝十斤用水一斗五升白蘿蔔五斤打碎同硝入  
鍋內煮化候湯滾定撈去蘿蔔將竹絲箕以綿紙二層攤鋪箕內  
架在新缸上以硝湯徐入箕內候折再添以湯瀘盡爲度將缸披  
在天井露三日其硝結在缸邊傾去餘水瀝乾爲止將硝取下面  
用砂鍋頓炭爐上將硝一碗化開煎滾以銅匙鏟攪將成凝結時  
鏟入小魚酢罐內上空寸許再下硝煉如此已畢每一罐下用三  
丁品字樣釘入地上留寸半在外將罐浮頓釘頭上用瓦片蓋口  
周圍用段磚砌百眼鑪圍繞離罐寸半許將著炭火入鑪內四圍

底火頂火一概相護候確硝紅爲度次日取出硝來預用大綿紙攤在牆頭陰土上將硝碾細用絹篩篩在紙上一錢厚再不許多將門窗俱已關閉不許與人見之三日後其硝自然復活色白如粉輕虛成片將鉢盛收紙蓋之上再用亂紙寸許以收潮氣庶不凝結此品最能降火化痰清利臟腑怪症服之可蠲狂躁用之卽愈搜除百病安斂心神况此服之不傷元氣惟久病瀉痢者不宜大人每服三四錢小兒五分至一錢皆可俱用白滾湯或葱湯空心化服候行二三次隨飲稀粥自然爽健精神調和臟腑津液頓生百病如失又煨過硝石六兩加硃砂三錢青黛二錢水片一錢五分共碾細末照前篩紙上再用紙蓋一層四邊以戒尺壓緊勿令走氣候三日外取起密收又名陽春紫雪最治失心忘志顛癩健忘小兒急慢大人異症每服五分至一錢俱用淡竹葉燈心湯

化服屢有奇效不可盡述元明粉乃神仙保命藥食每一片如  
熟甘草末二兩葱湯化服二三錢令人悅澤容顏輕身耐老矣  
取紅鉛法第一百四十三

女子十四歲而天癸至此陰中之真陽氣血之元稟過此將行時  
顯先若桃花之狀陽虧陰藏其經只在半月之裏必來預用白  
紬一尺五寸洗淨時常用綿帶一條束臍下綿紬兩尖頭前後  
帶上中間常堦陰器小便解一頭便罷即繫之經至盡染紬上  
初至紅鉛一顆大如魚眼紅色明亮如珠此為接命至寶隨與  
酒一杯和服一時後如醉不醒口以人乳飲之一日後自甦已  
能絕房事者延壽一紀餘經換紬堦取陰乾浸上白重便內片吐  
其經自然脫下取置磁盤內陰乾聽用如不昇煉者謂之空紅  
亦可補益虛勞接續命脉如次服已後但未破身者俱可取聚

乾磁蓋鼻煉色如紫霜一般合人三元丹內人乳服之接命長年  
卻除百病此方神秘不宜輕泄故不可傳但取紅鉛之女生平愛  
惜飽暖適時無拘束為上

### 煉金頂砒法第一百四十四

用鉛一斤小罐內炭火煨化投白砒二兩於化洋鉛上煉烟盡為度  
取起冷定打開金頂砒結在鉛面上取下聽用

### 煉硝石法第一百四十五

用潔淨朴硝半觔礬內炭火鎔化煎乾煨紅住火冷之取出即成硝  
石礬收聽用利實火不利虛火也

### 取蟾酥法第一百四十六

用蟾不拘大小其酥俱有用潤銅鑷蟾眉稜高肉上微緊拔出酥  
來凝聚鑷裏多則括下陰乾聽用其取過之蟾避風二日仍送青

草園中自然不傷其生如取之便見風下水俱成破傷風狂而  
死

製附子法第二百四十七

大附子二兩之外方用隨數幾枚以童便浸塗三寸每日換便浸至  
夏三冬五再換童便煮盡二香為度去皮臍線穿陰乾或日中曬  
硬亦可收藏聽用

昇白靈藥法第二百四十八

水銀二兩用鉛一兩化開投入水銀聽用火硝二兩綠礬二兩明礬  
二兩共碾為末投入鍋內化開炒乾同水銀碾細入泥護陽成磚  
內上用鐵蓋罩之以鐵梁鐵塊左右用燒熟軟鐵線上下扎緊由  
紫土藍泥如法固口要烘十分乾燥為要架三釘上砌百眼爐由  
先加底火二寸點香一枝中火點香一枝頂火點香一枝隨用小

罐安滾湯在傍以筆蘸湯擦擦器內常溼勿乾候三香已畢去火  
罐待次日取起開出藥來如粉或結或底上刮下靈藥收藏聽用  
凡瘡久不收口用此研細摻上少許其口易愈若入於一概收斂  
藥中用之其功奇甚捷

製寒食麵法 一百四十九

用白麵一筋外再以麵半筋調稠厚捏成薄片二塊將前麵包合於  
中周圍捏緊合口於清明正日蒸熟掛透風處陰乾用麵包煎勿  
經女手越久越效

逐日人神歌第一百五十

初一十二十二大拇鼻柱手小指初二二十三十二外踝髮際  
外踝位初三三十三股內牙齒足股肝初四十四二十四腰  
間胃院陽明手初五十五二十五口舌遍身陽明足初六十六二

十六手掌胸前又在腸初七十七二十七內跳氣沖及在膝初  
十八二十八手腕股內併在陰初九十九二十九在尻在足膝  
後初十二二十三下日腰背內踝足跌筭此為太古相傳針灸莫  
為吉

十二時八神歌第二百五十一

子踝丑腰寅在目

卯面辰頭巳手熟

午胸未腹申在心

酉背戌頭亥股續

屍神歌訣第二百五十二



九 神 圖



此神農所置一歲起坤  
 二歲震逐年順飛九宮  
 週而復始行年到處則  
 所主症切忌針灸切勿  
 犯之否則變生他病慎

右九宮尻神歌

尻神所在有根由

坤內外踝聖人留

震宮牙端分明記

巽位還居乳口頭

中宮肩骨連尻骨

面目還從乾上遊

手腫兌宮難砭灸

艮宮腰項也須休

離宮膝脇針難下

坎肘還連肚脚求

為醫精曉尻神訣

萬病無半禁忌憂

十干日不宜用針犯之病多反覆

甲不治頭乙耳喉

丙肩丁背與心求

戊己腹脾庚腰肺

辛膝壬當腎脬收

癸日不宜針手足

十干不犯則無憂

製炒諸藥第一百五十三

前方諸藥未註炮炙今開於後凡藥必遵雷公炮炙入藥乃效如

製生藥入煎不為治病反為無益譬如人食餚饌不用烹炮生食

豈不害人當熟思之

人參 潤色 明亮 堅實 為王 輕脆 不堪

熟地黃 蒸酒

補托 灸熟

酒洗

白茯苓 去刺

黃連 解毒 生用 止 嘔 姜汁 拌炒

油去

乾薑 炒

尖

仙茅 米泔 浸 蒸去 皮

海藻 洗酒

連翹 去梗 心 碾

天門冬 湯泡 去心

蒼朮 米泔 浸炒

遠志 湯泡 去心 微炒

破故紙 炒

香附 童便 浸炒

龍膽草 炒酒

陳皮 白去

半夏 姜汁 水煮

南星 煨有 馬牙 牛胆 內者

澤瀉 蒸

牡丹皮 去

牽牛 炒 生用

麥門冬 去心

黃芪 蜜水 拌炒

五味子 炒

當歸 洗酒

柴胡 蘆去

知母 鹽水 拌炒

桔梗 微炒

川烏 湯泡 去尖

威靈仙 去根

大黃 實人 生用 虛人 灸用

生不 留行 炒 碾 牛蒡子 炒

地骨皮 去梗 肉桂 麩 籠

生地黃 酒浸

甘草 消毒 生用

肉蓯蓉 去鱗

白芍 微炒 黃色

黃芩 炒酒

瓜蒌仁 殼去

防風 蘆去

草烏 湯泡 去皮

茯苓 去麩皮

枸杞子 去蒂

琥珀 布包同碾研如麵細

山梔 焦

黃柏 鹽水拌炒

山菜萸 去核

杜仲 鹽水拌炒斷絲

桑皮 蜜水拌炒

辛夷 去蒂

乳香 去油為末

沒藥 去油為末

枳殼 炒皮

厚朴 姜汁製炒

呂黃 去油為末

皂莢 去皮弦子煨

五倍子 去炒

蓮肉 泡皮去心

山查 去核

桃仁 泡皮上

杏仁 泡去皮尖

苦硝 湯煮提淨

石膏 煨礮

雄黃 透紅明亮

硫黃 去脚

礪砂 淨明潔白

礪砂 白色透明

砒霜 白色明亮者有生煨兩用

自然銅 去脚

次七

黃丹 水飛炒紫

龍骨 生用煨用

牛黃 色輕

麝香 去皮

犀角 未鎊

羚羊角 未鎊

龍齒 性煨存

蜂蜜 煉去末

蟬蛻 去土

斑蝥 用米炒去翅足

姜蠶 去絲微炒

全蝎 酒洗去毒

蜈蚣 炙去頭足

珍珠 豆腐內煮數滾在包搥碎同燈心

田螺 去殼曬乾

牡蠣 煨研

石決明 煨

紅鉛 法註未卷

人中白 煨研

以上藥品凡本書內應用製炒炮炙者錄之不炮炙者未錄

醫家五戒第一百五十四

一戒凡病家大小貧富人等請視者便可往之勿得遲延厭棄欲往而不往不爲平易藥金毋論輕重有無當盡力一例施與自然生意日增毋傷方寸

一戒凡視婦女及孀婦尼僧人等必候侍者在傍然後入房診視倘傍無伴不可自看假有不便之患更宜直誠窺視雖對內人不可談此因閨閣故也

二戒不得出脫病家珠珀珍貴等送家合藥以虛存假換如果該用合彼自製入之倘服不效自無疑謗亦不得稱讚彼家物色之好凡此等非君子也

四戒凡爲醫者不可行樂登山攜酒遊玩又不可片時離去店中凡有抱病王者必當親視用意發藥又要依經寫出藥帖必不可杜

撰藥方受人駁問

五戒凡娼妓及私夥家請看亦當是已視如良家子女不可無意自  
戲以取不正視畢便回貧窘者藥金可璧病愈返則藥不可再  
去以圖邪淫之報

醫家七要第一百五十五

一要先知儒理然後方知醫業或內或外勤讀先古明醫確論之書  
須巨文手不釋卷一一衆明融化機變印之在心慧之於目凡治  
症時自無差謬矣

二要選買藥品必遵雷公炮炙藥有依方修合者又有因病隨時  
減者湯散宜近備丸丹須預製膏藥愈久愈靈線藥越陳越異  
不吝珍珍久必濟

三要凡鄉井同道之士不可輕侮傲慢與人切要謙和謹慎年尊

恭敬之有學者師事之驕傲者遜讓之不及者薦拔之如此自無  
謗怨信和爲貴也

四要治家與治病同人之不惜元氣斷喪太過百病生焉輕則支離  
身體重則喪命治家若不固根本而奢華費用太過流蕩日生輕  
則無積重則貧窘

五要人之受命於天不可負天之命凡欲進取當知彼心願否體認  
天道順逆凡順取人緣相慶逆取子孫不吉爲人何不輕利遠害  
以防還報之業也

六要凡里中親友人情除婚喪疾病慶賀外其餘家務至於饋送來  
往之禮不可求奇好勝凡食只可一魚一菜一則省費二則惜祿  
謂廣求不如儉用

七要貧窘之家及遊食僧道衙門差役人等凡來看病不可要他藥

錢足毋奉藥再過貧難者高量力微贈方爲仁術不然有藥而無火公良者其命亦難

八要凡有所蓄隨其大小便當置買產業以爲根本不可收買玩器及不緊物件浪費錢財又不可做人銀會酒賈有妨生意必當例禁之自絕誘惑

九要凡店中所用各樣物具俱要精備齊整不得臨時缺少又古今前賢書籍及近時名公新刊醫理詞說必當尋參閱以進學問此爲醫之本務也

十要凡奉官衙所請必當速去毋得意緩要誠意恭敬告明病源具方藥病愈之後不得圖求匾禮亦不得言說民情致生罪戾不近公自當守法

戒士要乃保身保家守成之法故直言而不吝當置於座右



必有一覽若有覺能守孫前遵而行之則可以成家立業若不聽信  
及矣

開書披針喉針形第一百五十一

披針古之多用馬啣鐵爲之此性軟不鋒利用之多難入肉今以  
鋼鐵造善火候鐵工造之長二寸濶二分半圓梗扁身劍脊鋒尖  
兩邊平利用之藏手不覺入肉深淺目不難也如膿深欲其口大  
直針進而斜針出割開外肉口則大矣喉針長六寸細結扁頭鋒  
尖刺喉膿血者皆善

汗斑方 蜜陀僧散 石黃錢 輕粉 碗黃 雄黃 蛇床子

各三錢 蜜陀僧一錢 爲末醋調搽患上

重訂外科正宗卷之十二終