

陰虛牙痛方

赤芍 元參 各一錢二分 銀花 一錢 生甘草 四分

引加燈心一分。桂圓肉五枚。

牙痛散 三

月石 火硝

各等分。取淨末。每藥一兩。外加冰片三分。擦之。

虫牙散 三

雄黃 五錢 草撥 八錢 上冰片 八分

各取淨末。和勻。磁瓶收貯。牙齒虫蛀作痛。用擦之。

口舌糜腐方

三四

大紅薔薇花葉晒乾。或隔水焙燥。忌火炒

研末和冰片

少許。搽擦。如冬月無葉用根亦效。

牙疳方 三五

舊紅褐子燒灰 甘蔗皮燒灰

紅棗肉

壁螭窩

土墻上者佳炙

狗屎內骨頭燒灰 各七分

俱用陰陽瓦焙為末。先將瘡用米泔水煎洗。後用甘

草湯候溫洗淨。然後吹藥。

耳膿方 一

用胭脂

產濟寧州如銀硃樣紫色者可
用棉胭脂油胭脂俱不可用

枯礬

飛過者

釘

綉粉等分爲末吹

耳後出血方 二

凡人耳後髮際搔痒小竅出血用止血藥不效者此
名髮泉取多年糞桶籬燒灰敷之立愈如指縫出血
亦然或用炒甲片細末罨之亦止

治耳內乾痛時或有膿耳外紅腫結癰方 三

內治服歸芍地黃丸

即內症八號六味地黃丸加歸芍

銀花五分炒梔

五分

生甘草三分

勾籐勾二分

煎湯加青鹽少許送

下。早二錢。晚一錢五分。

外治用乾胭脂。

燒存性

枯礬

各五分

海蝶蛸

一錢

射香

分

共為末。用鶯管吹入耳內。結茄。用茶子清油調雞

翎醮搽之。結瘰。用解凝散

見前外敷之。症十二

眼患效方

四

赤芍

銀花

白蒺藜

去刺

丹皮

當歸

石決明

取九孔

蒙

花各一

生地三錢 川芎六分 甘菊花 木賊一分

川羌活二分 桑葉四片 生羊肝五錢如無羊肝用黑芝蔴三錢代之

亦可

如翳障久患不能常服煎劑者照方以分作錢以錢

作兩外加生地二兩 丹參二兩 蟬蛻去頭足水飛一兩五錢 洋

參三兩 生羊肝全黑者尤佳總用六兩 各取淨末用桑葉四兩

煎汁和蜜水跌丸每早三錢鹽開水下服之無間翳

障漸退。

清肺散五 治肺金氣盛尅肝黑珠連生白星昏花澀痛

桑白皮 元參 薄荷 黃芩

白蒺藜 去刺 紫蘇 各一錢 白豆蔻仁 五分

甘草 三分 廣橘紅 七分 鹽水拌炒

水煎食後服。

滋腎飲 六 治腎肝虛損精血枯竭瞳人散大目視無光。

熟地 三錢 天冬 二錢 五味子 五分 枸杞子

川黃柏 青鹽水拌炒 黑大豆 二十粒 牡丹皮 川石斛

甘菊花 真阿膠 蛤粉炒 車前子 各一錢

水煎五更時服。

推雲散

漸生外障翳膜

防風

木賊草

秦皮

荆芥

羌活

白蒺藜

去刺炒

蟬

殼

去土炒

殭

蚕

去絲炒

元參

牡丹皮

枳

殼

各一錢炒

草決明

二錢炒

水煎食遠服。

偏風散

八

治偏風不拘左右頭目疼痛赤澁怕亮惡風眼眵漸小甚至害目俗名半月頭痛治之極效

蘇葉

羌活

防風

荆芥

蟬殼

川芎

細辛

各一錢

柴胡

七分

疆蚕炒

松蘿茶

各二錢

甘草三分

加葱頭三枚。水煎半飢時熱服。護暖取汗。避風一二日。

眼中翳肉方九

蛇退一條。以麻油炒黃色。勿使焦黑。加菘豆三合炒。

真沙糖一兩。用水一碗。

煎成。食遠服立退。二三年者。

兩服即愈。

眼瞳成漏方十

凡眼下空處。主翳出。農流。

應者以柿餅去皮取肉搗爛塗之十日全愈

洗眼方_{十二}

杏葉 十片

無根水一碗煎八分澄清洗之洗至一年目如童子

洗目日期

正月 初八
二月初十三
三月初五
四月初一

五月 初五
六月初七
七月初七
八月初九

九月 初七
十月初十
十一月初九
十二月初二

如遇閏月照前月日期若用桑葉不若杏葉之妙

眼中堆起肉翳方 三

向屠戶取猪鼻頭上尖沿邊一道皮煨研為末用好酒每早下三錢兩日後退淨。

眼內白珠夾起紅翳方 三

用羚羊角磨四分杭菊花六分煎湯調下三五服自退。

昏花眼方 古

用童便浸菊花洗之。

跌打傷損類

跌傷接骨方

用大活鱉一隻。脚爪全。搗爛。沖熨酒。盡量飲醉。再以渣罨患處。半日。骨內有聲。卽接。傷在上者。食後服。在下者。食前服。骨碎垂危。用乳香沒藥各三錢。加骨髓補一錢五分。沖蟹酒飲之。並效。

一方治跌打閃碰傷。損不出血。但外有青腫紫色者。先用葱白搗爛。炒熨敷痛處。隨用生大黃研末。姜汁調敷。並盡量飲前鱉酒。卽愈。

跌打接骨敷藥方

二

此方百試百驗。不可輕視。勿以藥料甚賤。而忽之也。

支子

炒黑

麩

各三錢

生

軍

不可見火

沒

藥

各二錢

劉寄奴

薄荷骨

川

烏

草

烏

各四錢

姜十片

葱一把

各藥搥爛。加醋一小杯。和勻。炒熱。敷患處。外骨斷處。

用夾板夾緊。對時一換。若傷骨重者。加桂枝一錢。骨

髓補二錢。松香一錢。方內生軍用五錢。不腫不用醋。

皮破不用醋。

糟同搗。四圍敷上。中留一孔。其骨即出。

止血定痛散。三。治跌打損傷。皮破血流。

真檀香

陳礦灰

雲

苓

各一兩

蟬

蛻

去頭足水飛

蛇

蛻

去頭足水飛

生半夏

各三錢

象

皮

一兩無象皮用真象牙五錢代之

珍珠

一錢

研細末。無聲為度。磁瓶收貯。遇跌傷。取末糝患處。立可止血定痛。結茄後。用真麻油調。雞翎蘸搽。茄落後。并無癍點。方內有生半夏。切忌入口。

生肌定痛散

四

治全前

真紫檀香 丹 參 雲 苓 降 香

遠 志

錢各五

琥 珀

血 竭

錢各三

取末和勻糝患處止血定痛如傷手傷風延蔓橫害

每藥末一錢加蟬蛻蛇蛻各三厘糝患處糝後結痂

不落用麻油稀調雞翎醮潤之口瘡舌裂並可用吹

一方治跌打損傷皮破血出倉猝不及用藥取真白蠟

淨白糖霜各等分研細糝破處立可止血

金刀散

五

治一切跌破血流不止及刀斧所傷用之止血定痛生肌

松 香 夏 菓 劉 寄 奴

各等分爲細末和勻糝傷處

刀斧傷出血不止方 六

用陳石灰同韭菜搗爛。陰乾研細。每末一兩。加紫黑降香節。剉三錢。和勻糝患處。立刻生肌止血。雖切斷亦接。忌下生水。金瘡並治。端午日合更妙。

金瘡血出不止方 七

用紫黑降香節。剉末微炒出汗。五倍子打碎炒黃色。各等分爲細末糝之。

破傷手足方 八

用自已小便淋傷處。雖痛甚立止。

外科膏子 九 治一切跌打損傷。湯火傷爛。將翎毛塗上。即愈。

麻油 八兩 雞蛋黃 一個 頭髮 三錢 硃砂 水飛

銀硃 各一錢 水飛 黃蠟 六錢

先將油入無硝硫砂鍋內。文火煎。後入蛋黃。熬化盡。再入頭髮剪寸長。以箸順攪化盡。始終文火順攪。方入硃砂銀硃。再入黃蠟。掇鍋安地上。一宿後收用。從高墜下。跌悶不醒方 十

接骨入骱方^{十一}

骨碎補

川續斷

威靈仙

各一兩

用陳酒二斤煎數沸濾清隨量熱飲之以盡醉為度。並將藥渣搗爛熨揉傷處紫三日愈。

一綠散^{十二}

治打撲傷損眼泡赤腫疼痛。

芙蓉葉

生地

各等分共搗爛敷眼泡上或為末以雞蛋清調勻敷亦可。

七厘散 三

治一切跌打傷損，樹木山石傷折。

歸尾 二兩
兒茶 六分
硃砂
乳香

沒藥 各二錢
紅花
雄黃 各八錢
冰片

射香 各二分
血竭 二錢

各為極細末，和勻，以磁瓶收貯。每服七厘，燒酒調百
花酒送下，並用酒調敷傷處。

參芪紫金丹 十四

此丹提補元氣，健壯脾胃，止渴生津，增
長精神，和通筋血，傷重而氣虛者，最宜
服之。

上黃芪 炙
黨參 各四
丁香
香
當歸
歸酒洗

血竭

骨髓補

北五味各一兩

五加皮

沒藥

去油各二兩

甘草

八錢

茯苓

一兩五錢

煉蜜爲丸。每服三錢。早晚淡黃酒化服。童便亦可。

三黃寶蠟丸

五

專治跌打損傷。刀箭鎗傷。一切棒瘡。破損。風傷。刑傷。急血。奔心。及瘋犬毒虫。蛇咬。墜馬。瘀血凝滯。痰迷心竅。危在頃刻。諸險症。

天竺黃

天竺黃乃竹之精液結成。如黃土着竹成片者是。

紅芽大戟

劉寄奴

血竭

各三兩

明雄黃

兒茶

各二兩

當歸尾

一兩三錢

琥

珀

水粉

麝

香

各三錢

籐黃

四兩。用秋露水隔水滾十數次。去浮沉。取中。將山羊血拌入晒乾。

山羊血

一兩研細
入藤黃內

朴硝 一兩

右藥各爲細末。分兩要足。如無真天竺黃。卽以九轉
胆星三兩。并醋炙瓦楞子一兩代之。用提淨黃蠟二
十四兩。煉溶離火。入滾湯內。坐定將各藥末摻入。不
住手攪勻。取起。用磁器盛貯。聽用。極危篤者。一錢。次
者五分。無灰黃酒化下。外敷。用香油隔湯燉化。勿見
火。如受傷日久。病勢深重。速服數次。能令週身瘀血
盡變爲新。活絡舒筋。真起死回生之聖藥也。服後忌

琥珀丸

大便秘者。

大黃

酒炒

桃仁

去皮尖

蘇木

木

搗末

姜

黃

各二兩

朴硝

枳

榔

黑

丑

半生半熟

三

稜

酒煮

香附

赤

芍

各一兩

巴豆

肉

炒紫色六錢

紅

花

七錢

肉桂

烏

藥

各五錢

木

香

三錢

共為極細末。將朴硝化水。去渣。麩糊為丸。菜豆大。硃砂為衣。每服三錢。大便行三次後。吃冷粥即止。

內傷酒藥方

七

治跌打及勞傷太過。腹脇腰膝筋骨肢體疼痛無力。不拘遠年近日。男女老少皆效。

紅花 桃仁炒 秦芫 續斷

廣木香 砂仁炒 牡丹皮 威靈仙各一兩

當歸 五加皮 懷牛膝各三兩 骨髓補搗碎忌鐵晒乾

胡桃肉炒 杜仲炒 丹參各二兩

擇道地藥製過晒乾用陳酒二十斤將一半同藥隔

湯煮大線香三炷待冷定取開將所存之酒沖入封

固每日早晚隨意溫服一二杯

熨方 凡跌打損傷不論新久先用此方熨傷處輕者不必再用藥重者先用此方再擦藥服藥更妙

麵皮一斤做麵筋洗

乾炒熨用細包噴酒在細上熨再噴再熨俟血用行
動再擦藥服藥則更效傷重者先服藥然後熨

治打綿臀方十九

以錫箔用無根井水濕過鋪杖處以手掌着力拍打
卽消

一方用木耳四兩炒黃爲末蜜調敷患上

捧瘡膏二十

用麻油四兩煎滾入雞子黃三個熬枯撈去再入洗
淨血餘五錢又熬枯撈去下白蠟五錢冰片三分和

勻冷透薄敷患處。

杖瘡 三

杖畢。卽用童便。陳酒各一鐘。和勻。溫服。免血沖心。甚妙。卽用葱切爛炒熱。搭杖處。冷則再易。止痛消腫。散瘀神效。跌打損傷。此法亦妙。如無葱。用熱豆腐敷在杖處。其氣如蒸。其腐卽紫。復易去。以淡爲度。

杖後敷藥方 三

樟

冰

七錢五分

生大黃

末七錢

生半夏

末三錢

急用熱童便一桶。將足浸之。如冷用燒紅磚二塊。淬之。即熱直浸至童便面上。浮起白油。其傷盡出。再用肥皂搗如泥。雞子清和敷傷處。以草紙包裹脚。縛緊。一夜不可動。內服人中白一兩煨。乳香沒藥各二錢。
 箬包炙。牛膝三錢。木耳五錢燒灰。自然銅五錢煨。共為末。用牛膝一錢五分。煎酒調下。三錢。

內傷久發方 二四

凡跌仆碎傷。胸脇腰肋等處。并肩挑負重。失足蹬筋。

初時不覺。延至經年累月。忽後疼痛。浮面按之不痛。擎重方覺。或咳。噎。吸氣。牽掣。吊疼。此乃內傷。氣逆。血滯。久恐患壅毒。宜用生大黃細末一兩。止可烘。慎勿火炒。以老姜二兩。舂爛。串滾水一杯。絞汁。隔湯頓溫。調大黃末。如膏藥。藕式。塗于痛處。不必留頭。蓋以粗紙。外用帛紮之。一日一換。三次卽愈。如傷三五年者。亦效。

門

益母丸 一

歸神湯 二

八珍養血丸 三

歸脾丸 四

一味生新飲 五

一味厭紅散 六

種玉酒 七

養脂丸 八

一味利關散 九

一味歸經飲 十

探胎飲 十一

泰山磐石散 十二

千金保孕丸 十三

護胎飲 十四

安胎飲 十五

銀苧酒 十六

益母地黃湯 十七

束胎丸 十八

芎歸補中湯 十九

保安煎 二十

固元飲 二十一

一味通瘀飲 二十二

疎解散 二十三

正氣飲 二十四

祛邪化滯煎 二十五

疎風利陰煎 二十六

萬應無憂散 二十七

紫炁丹 二十八

佛手散 二十九

當歸芍藥湯 三十

芎歸湯 三十一

仙傳通津救命至靈丹 三十二

散 附方一

紫霞丹

三五 附方三

華陀愈風散

三七 附方一

快脾飲

三九

通脉湯

四一 附方二

開鬱流氣散

四三

托裏散

四五

附 治產後陰翻方

附 治子腸不收方

陽和生血湯

養營惜紅煎

三六 附方一

邪滯雙解散

三八

當歸補血湯

四十

吹乳飲

四二

益血和中散

四四

附 治妊娠小便不通方

附 治產後陰腫方

附 治產後肉線下垂方

附 治乳脹不回方

附 治乳懸怪症方

附錄達生論

婦科門

婦人之症。與男子同。而有不同者。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。婦人之不同於男子者。陰柔其性也。人之一身。氣運乎血。血麗乎氣。而婦人尤以血爲先天之本。血於婦人。由水之行地中。自二七而天癸至。榮華貫乎百脉。而疾病亦莫不由之。自行經而孕育。而胎前。而產後。症有主有客。而總以調和氣血爲主。氣血調。經脉和。腠理固。病何從生。體此以製

方百不失一矣。彼悞任攻伐者。在柔脆之質。為禍尤烈。往往有陰罹其慘。而不悟者。良可哀也。輯婦科

益母丸 一

治婦人赤白帶下。惡露淋漓不止。及胎前產後諸症。

益母草

方梗對節生葉。葉類大麻。四五月間開紫花。是白花非。

於五月間。採取晒乾。連根莖葉。勿犯鐵器。磨為細末。煉蜜丸。如彈子大。每服一丸。用熱酒和童便化下。若臨產時。倉卒未合。只用生益母草。搗汁。入蜜少許。服之。其效甚大。或用砂鍋文武火熬成膏。如黑沙糖色。

此罐收貯。每服二三匙。或酒或童便調下。亦妙。

少進諸症。

黨參 二錢

白朮 半錢

白茯苓

歸身 各一錢

炒棗仁

陳皮 各八分

甘草 五分

圓眼肉 七枚

羚羊角

琥珀 各研末五分

右羚羊角、琥珀二味不煎。餘藥煎熟去渣。入二末和

勻。食前服。

八珍養血丸

三

治月候不調。赤白帶下。皮寒骨熱。肢體倦怠。並一切崩淋乾血等症。

上炙芪

大生地

白朮

丹參 各三兩

當歸

陳阿膠

茯苓

雲茯苓

白芍 各二兩 五錢 遠志 八錢 川芎 一兩 炙草 五錢

各取末。杜仲十兩燉膏。和煉蜜為丸。每服四錢。淡酒

下。如症勢重者。早三錢。薑湯下。晚二錢。淡酒下。

加味歸脾丸

四 治脾不統血。以致妄行。並心悸怔忡。胃

口不調。飲食不香。陰虛寒熱以及產後失調。經行乖舛諸症。

黨參 黃芪 炙 白朮 炒 雲苓

炒棗仁 各二兩 遠志 當歸 各兩 廣木香 煨

炙草 各五錢 柴胡 八錢 麥冬 一兩五錢 去心 糯米拌炒

取末。用桂圓肉四兩煎汁。小紅棗六兩去皮核。煮

和丸。每服二錢。早服。鍋焦粉湯下。晚服。淡酒下。

一 呀生新飲 五 治乾血癆症

全當歸

五錢 酒洗

水酒各半。濃煎。分早晚服。半月取效。前症由於先天

不足。兼之七情所傷。照方服。加服養血丸。見前兼進

八珍湯。見內症加陳阿膠。二錢製杜仲。一錢湯丸並進。

可以漸愈。慎勿輕用通經逐瘀如桃仁代赭之類恐

致崩下暈脫。不可救藥也。

厭紅散 六 治血崩不止

陳

棕

三錢燒
灰存性

陳酒調下。前症由氣不攝血。照方服。加用補中湯。

見內

症十

八珍湯。

見內症
十三

相間投之。俱用陳棕灰。

五為引。

兼服歸脾丸。

見前
四號

可以漸愈。

種玉酒

七

治婦女經水不調。氣血乖和。不能受孕。或生過一胎。停隔多年。服此藥酒百日。即能懷孕。如氣血不足。經滯痰凝者。服至半年。無不見效。受胎後。加服泰山磐石散。見後十號保護胎元。

全當歸

五兩切片此
能行血養血

遠志肉

五兩用甘草湯洗此能
散血中之滯。行氣消痰

二味。用稀夏布袋盛之。以甜三白酒十助浸之。七

口為度每晚隨量溫飲之。慎勿間斷。服完照方再製。再於每月經期。加用青殼鴨蛋。以針刺孔七個。用蘄艾五分。水一碗。將蛋安於艾水碗內。飯鍋上蒸熟食之多則五六個。少則二三個。尤妙。

蕎麥 八

凡閨女在室行經。並無疼痛。及出嫁後。忽患痛經。漸至滋蔓。服藥罔效。此乃少年新婚。男女不知禁忌。或經將來時。或行經未淨。遂爾交媾。震動血海之絡。損及衝任。以致瘀滯凝結。每致行經。斷難流暢。是以作疼。名曰逆經。痛患此難。以受孕。醫不明此。猜寒猜熱。論虛論寔。混治無效。惟投以此方。多神應。痛止經調。俱得產育。

蕎麥

五升淘去灰。曬燥磨篩去粗皮。取淨麵聽用。蕎麥補衝任脈絡。且兼化瘀滯。

畫邊臙脂

二兩此係蘇木茜草紅花佐以烏梅煎染綿蠶而成取其溫潤之氣威而不猛

右將畫邊臙脂煎濃汁搗和蕎麥淨麵爲丸如桐子大。每早服五錢。開水下。忌食豬肝羊血糟醋。

一味利關散

九

治赤白沙淋諸症。

真赤茯苓五錢爲末。空心豆腐漿調下。

一味歸經飲

十

治月經逆上。出於口鼻。

韭汁一小杯。和童便溫服。吐血咯血昏暈等症。服

此方亦能取效。

飲十一 婦人經水不來三月疑似用此驗之。

川芎不俱多少為末不見火

空心煎艾湯調下五分。覺腹中動。則有胎也。臍之下血動者。乃血痕也。不動者。血凝也。病也。

泰山磐石散 十二

治婦人氣血兩虛。或肥而不實。或瘦而血熱。或肝脾素虧。倦怠少食。屢有墮胎之患。此方和平。兼養脾胃氣血。覺有熱者。倍黃芩。少用砂仁。覺胃弱者。多用砂仁。少加黃芩。更宜戒惱怒。慾事。屏酒醋辛熱之物。可保無墮。

黨參 焙

糯米 各三錢

黃芪 蜜炙

川斷

黃芩 各一錢

川芎

甘草 蜜炙

砂仁 研各五分

白芍 酒炒

熟地 各八分

白朮 土炒

二錢

白水煎服。但覺有孕。隔三五日。常用一服。過四個月。方保無虞。其藥渣可傾入河池內。與魚食之。以有糯米故也。

千金保孕丸 十三 治妊婦腰背痛。慣墮胎。服此可免半產之患。

川續斷 一二兩 酒拌炒 厚杜仲 四兩 切片用白糯米炒斷絲

右共為末。以山藥四兩糊丸。如桐子大。每服八九十丸。用米湯空心送下。戒惱怒。忌食酒醋。猪肝發火等物。

保東舉曰。婦女凡懷胎兩三月。慣會墮落。名曰小產。

安胎。又多用艾附砂仁熱補之劑。是速其墮矣。殊不知血氣清和。無火煎爍。則胎自安。大抵氣虛則提攝不住。血熱則濫溢妄行。欲其不墮。得乎香附雖云快氣開鬱。多用則損正氣。砂仁快脾。多用亦耗真氣。况香燥之性。氣血兩傷。求以安胎。適以損胎也。惟泰山磐石散。千金保孕丸。能奪化工之妙。百發百中。萬無一失。

飲 十四 治經虛漏胎。

川芎 六分 歸身 炒白芍 雲苓 各一錢

上黨參 蜜炙 大生地 炙各三錢 焦白木 製杜仲

川續斷 各一錢五分 炙草 五分 丹皮 八分 淮岳 二錢

薑皮 一分 南棗 二枚

懷孕二三月。忽然腹痛下血。如欲小產。照服一二劑。可以固氣安胎。縱然小產。亦能平善。勿易視之。

安胎飲 十五 妊娠五七個月。用數服可保全產。

黨參 白朮 當歸 熟地

川芎 白芍 陳皮 炙甘草

紫蘇 炙黃芩 錢

引加薑五分。白水煎服。

銀苧酒 十六 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍及胎漏下血。

苧根 二兩 紋 銀 五兩 酒 一碗

如無苧之處。用茅草根五兩。加水煎之。如不善飲者。水煎。加酒飲之亦可。

母地黃湯 十七 治妊娠跌墜腹痛下血。

黃芪 炒 生地 益母草 當歸 各二錢

引加薑二分。白水煎服。

加丸 十八

懷胎七八個月。恐胎氣展大難產。用此扶母氣。求兒胎。自然易產。然必胎氣強盛者乃可服。

條黃芩

酒炒勿太熟。冬月一兩。夏月半兩。

白

朮

三兩

陳

皮

二兩

白茯苓

七錢五分

右爲末。粳米粥糊丸。桐子大。每服五十丸。白湯下。

芎歸補中湯

十九

治氣血俱虛半產。

川芎

炙黃芪

當歸

白

朮

炒

黨參

白

芍炒

炒杜仲

炒阿膠

各一錢

艾葉

三分

五味子

四分

炙甘草

五分

保安煎 二十

治婦人難產。橫生逆產。以致六七日不下者。或嬰兒已死腹中。命在垂危。照方服之。立刻卽下。保全母子兩命。服之無不效驗。此方異人所授。願以救世活人。每見收生穩婆。用手取割。立傷產婦。深可憫憫。切忌。如臨月二三日。前覺行走動履不安。預服一劑。可保萬全。此方屢試屢驗。活人無數矣。

當歸

酒洗

川芎

芍藥

各一錢五分

厚朴

朴薑汁

蘄艾

各七分

兔絲子

一錢四分

川貝母

一錢去心

枳殼

六分

川羌活

甘草

各五分

荊芥穗

炙黃芪

各八分

炒白芍

各一錢二分

水一鍾。薑三片。煎八分。預服者空心服。臨產者隨時

服。

元飲 二一

治妊娠三月後胎動下血。或因傾跌欲墮服此俱可保安。

大生地 四錢

川芎 六分

歸身

川續斷

雲苓

各二錢

炒白芍

製杜仲

丹

參

各五錢

焦白朮

一錢三分

炙

草

四分

煎成加淡酒半小杯冲服。胎生者安。如已死腹中。方

去川續斷。加敗龜板。

三錢

血餘灰。

五分

芒

硝。

六分

投一劑。自然收縮而下。

通瘀飲

二二

治小產後惡露不行。小腹脹痛等症。

每取二錢煎成一小盞。和入童便淡酒各半小杯。更
加薑汁一滴。每早服一次。三次為度。凡小產重於大
產。尤宜加慎調養。小產後照取陽和生化湯。見後三十四號
煎服一二劑。兼進是方。可免小產變生諸症。

疎解散 二三

治妊娠傷寒初起。項強惡寒。肢冷骨節酸痛。身體倦怠。默默不語。投是藥一劑。肢體
稍和。得汗未透。再一劑。自然汗解。解後無
庸他藥。服芎歸。見前十一號八珍。見內症十三號等湯
數劑。可以保安。如他症悉除。惟餘煩渴。投
加味逍遙散。見內症二十六號二劑自愈。

川芎 一錢
全歸 二錢
建麩
夏麩

生黃芪

各三錢五分

砂

仁

四分

枳

殼

炒

防

風

各八分

桂枝

五分

引煨薑一片。葱白三錢。

正氣飲

二四

治妊娠瘧。

荆芥

炒

川芎

各八分

當

歸

建

麴

夏麴

赤芍

各三錢五分

蒼

朮

炒

白

朮

各二錢

橘紅

一錢

赤首烏

三錢

枳

殼

六分炒

藿香葉

五分

桂枝木

四分尖

加薑皮

二分

葱白

三寸

二劑後。

瘧發漸早。

漸輕。

去

半夏各三錢 柴胡六分 炙甘草八分 引去薑皮換薑

一錢五分 瘧先時服。二劑應止。如未止。日進芎歸湯。見前十九

一劑瘧先時投五福飲。見內症十七 一劑自然漸止。止後

投入珍湯。見內症十三 數劑可以保安。

祛邪化滯煎 二五 治妊娠痢。

川芎 黃芩 各八分 當歸 炒白朮 各二錢五分

建麴 夏麴 各二錢 藿梗 雲苓 各一錢

赤芍 一錢二分 煨木香 四分 炙草 三分

引加薑皮 半分 砂仁殼 二分 冬瓜皮 五分 按二劑化

滯祛邪和調榮衛。痢應可止。如未止。用歸芍六君湯。

即前內症二二香砂六君湯去藿香砂仁換當歸白芍各一錢 和入香連丸 見內症五九

一錢服三五劑自愈。愈後加服八珍湯。 見內症十三 數劑

疎風利陰煎 二六 治產婦中風不省人事。口吐涎沫。手足瘳癱。

歸身 四錢 荆芥穗 一錢五分

右藥為末。每服二錢。水一盞。酒童便各一小杯。煎成

灌之下咽即解。

內應無憂散 二七

胎前臨產之月。間一日服一劑。臨產時。有力之家。照方加好人參七分。無

當歸身 三錢

焦木

炒黃芩

各錢五分

廣皮

五分

益母草

大熟地

各二錢

大川芎

茯苓塊

各一錢

炙草

四分

大腹皮

八分黑豆汁洗淨

紫炁丹

二八

治橫生逆

產難產者。

全當歸

一兩

川芎

柞樹皮

各五錢

紅花

二錢

炙黃芪

三錢

敗龜板

一個

照分兩每料蜜成三丸每服一丸丹參

二錢

煎湯服。

產房中潔淨婦女口念

慈悲無上至聖化生佛一

百零八遍。若膏梁體弱甚。加人參二錢。藜藿體不

加。即產也。

佛手散 二九

治懷孕六七個月。因跌踣傷胎。腹中疼痛。口禁昏悶。或心腹飽滿。血上衝心。及產後

腹痛發熱。頭疼諸症。

當歸 五錢
川芎 三錢

水一盞。酒一小杯。同煎。照服一二劑。胎生者安。胎死者下。如橫生倒產。子死腹中者。加黑馬料荳五錢炒焦。乘熱淬入酒水中。加童便一杯煎服。

歸芍藥湯 三十

治妊娠心腹急痛。或去血過多。眩暈等症。

澤瀉 各一錢
川芎 二錢

白水煎服

加味芎歸湯 三一 治分娩交骨不開。或五七日不下垂死者

生過男女婦人髮三錢燒存性 自死龜板 一個炙酥用

川芎 七錢 當歸 一兩

水煎服。不問生死胎俱下。

仙傳通津救命至靈丹 三二 治裂胞生及難產數日。血水已乾。產戶枯澁。命在垂危者服之神效

桂圓肉 六兩 去核 生牛膝梢 一兩 用酒一杯 浸搗爛

將桂圓肉煎濃汁。冲入牛膝酒內服之。停半日即產。

平胃散 三三 治胎死腹中。其舌多見青黑。口中甚穢而嘔。腹中不動。祇覺陰冷重墜者是。

厚朴 薑汁炒 陳皮 各三錢 朴硝 五錢 炒甘草 一錢二分

蒼朮 三錢 米泔水浸去皮炒

照方用河水一盞。酒一盞。煎十數沸。入朴硝。再煎數沸。溫服。其死胎即化水而出。萬不失一。

一方用朴硝末三錢。以熱酒和童便調服。立下。或用佛

手散 見前 調服亦妙。

血暈諸症是方一產下。即服之留渣

再煎再服。時不論冬夏。人不論強弱。俱宜照服。切勿加減。小產亦宜照服。

當歸 五錢
炙草 五分
炮薑 四分
川芎 二錢

丹參 一錢五分
桃仁 九粒
去皮尖

煎好。加花酒童便各半小杯。冲服。以杜產後諸患。

紫霞丹 三五 治產後血暈驚風一切危症。

熟地 川芎 各四錢
當歸 八錢
黑荆芥 一錢
炒

炮薑 五分
丹參 一錢五分
桃仁 五粒
益母草 一錢
去皮研

煎成。加童便一杯和服。

一。方。治。產。後。血。崩。大。下。不。止。用。蒲。黃。炒。黑。為。末。二。錢。以。

川。芎。當。歸。各。二。錢。煎。湯。調。服。

一。方。治。產。後。血。不。止。用。百。草。霜。

取。燒。野。草。者。

一。錢。酒。調。和。入。

八。珍。湯。

見。內。症。十。三。

內。溫。服。

一。方。治。產。後。昏。暈。急。將。亂。髮。浸。陳。醋。燒。於。床。前。立。甦。即。

取。童。便。一。碗。溫。服。可。保。無。虞。

養。營。惜。紅。煎。

三。六。

治。產。後。鼻。中。流。血。不。止。

歸。尾 三。錢。

川

芎

一。錢。五。分。

荆。芥。穗

一。錢。炒。黑。

血。餘。灰

五。分。

煎。成。加。陳。京。墨。酒。磨。汁。半。小。杯。童。便。一。小。杯。和。溫。服。

一方用本人頂心髮莖紅絨線莖合扎右手手中指

節上令極緊即止此乃瘀血逆行產後危症倉猝無

醫速宜用此

華陀愈風散 三七

治產後中風口噤手足抽掣角弓反張或血暈不省人事四肢強直或心頭倒築吐瀉欲死

荊芥穗

除根不用
焙乾為末

每服三錢童便調服口噤則挑牙灌之齧噤則不必

研末只將荊芥用童便煎俟微溫灌入鼻中其效如

神同黑豆酒并用更妙

古方彙粹 卷之三 十四
一方用黑豆五錢炒至烟起。再入連根葱頭五個同炒。

隨入好酒一杯。水一盞煎成温服。出汗即愈。

邪滯雙解散 三八 治產後瘡。

川芎 六分 當歸 建麴 夏麴

炒蒼朮

各一錢五分

枯穀芽

炒白芍

藿香葉

各一錢

雲苓

丹參

各二錢

大生地

三錢

引葱八分。煨黑薑一錢。肢冷加桂枝尖木三分。二劑

後瘡來已正。方內加升麻炙柴胡各四分。生熟首烏

各一錢五分。投二劑可止。如未止再投二劑。接服休

脾飲 三九 治產後痢。

當歸 建 麩 夏 麩 各一錢 老蘇梗 四分

赤苓塊 二錢 丹皮 八分 藿梗 六分 淡干薑 二分

炙草 三分

照服二劑。加大生地 一錢五分 薑汁炒炭 淮岳 二錢 廣皮 七分

丹參 二錢 砂仁殼 四分 冬瓜皮 八分 白蔻肉 四分 大

南棗 二枚 再四劑。取和解而愈。

當歸補血湯 四十 產後大補陰血。退血虛發熱如神。

黃芪一兩當歸三錢

水二碗煎一碗一服立愈分兩不可加減

通脉湯四一治乳少或無乳

生黃芪一兩當歸白芷各五錢

七孔猪蹄一對煮湯吹去浮油煎藥一大碗服之覆面睡卽有乳或未效再一服無不通矣其新產無乳者不用猪蹄只用水酒各一盞煎服體壯者加好紅花五分以消惡露

一方用雄猪白胰一個切碎炒半熟冲入黃酒一碗頓

熱空心連膜服之。兩三次效。是方體壯者宜之。

一方用赤小豆四錢煎湯頻飲。即通。是方體弱者宜之。

吹乳飲四二 治乳癰初起

蒲公英一兩 金銀花二兩

搗汁和熱酒服。留渣敷患處。

開鬱流氣散四三 治乳硬如石

槐花三錢 遠志三錢

右為末。每日陳酒調服。半月取效。外用遠志葱蜜餅

敷之。遠志葱蜜餅敷法見外症六號 益氣養營煎後引

益血和中散

四四 治乳岩乳癰初起。

用敗龜板。煨存性。每服三錢。糖拌。好酒送下。盡醉即

消。

托裏散

四五

治乳癰潰爛。至見臟腑。

雄鼠糞

兩頭尖者。是炒。

露蜂房

煨

土練樹子

經霜者妙。川練不用。

右等分爲末。每服三錢。酒下。間三日一服。數日膿盡。

瘡口漸收。

治妊娠小便不通。腹脹如鼓。數日垂死。用猪脬吹脹。以

鷺毛管子安上。插入陰孔。捻脬氣吹入。即通。通後加

治產後陰翻。用澤蘭葉五錢。煎濃湯薰洗。卽收。

治產後陰腫。此症皆因下體受風。形似生毒。紅赤腫疼。

用葱白 一兩 研膏。入乳香 一錢 研勻。敷貼患處。卽消。

一方用羌活防風各一兩。煎湯薰下體。亦消。

治子腸不收。用蓖麻仁 十四粒 研膏。敷頭頂心。腸收上。卽

速去之。去之不速。恐生變異之症。慎之慎之。

治產後肉線下垂。此症因產婦用力太過。垂出肉線。痛

徹心脾。急搗連皮老薑三觔。入麻油二觔。炒乾。先以

熟絹盛起肉線。納入產戶。乃以絹袋盛薑。就近薰之。冷則更換。漸次縮入。重者須一二日可愈。斷則不治。

治乳脹不回。用大麥芽炒黃煎服。神效。

治乳懸怪症。產後兩乳忽長。細小如腸。垂過小腹。痛

不可忍。用川芎當歸各二錢。濃煎頻服。仍用二味燒薰。令病者吸之。又以草麻子一粒。研爛。貼其頭頂。當漸收上。既收。復舊。速卽洗去。草麻子。

臨產六字真言。一曰睡。二曰忍痛。三曰慢臨盆。

初覺腹痛。先自家拿穩主意。要曉得此是人生必然之理。極容易之事。不必驚慌。但看痛一陣。不了。又疼。連連五七陣。漸疼漸緊。此是要生。方可與人說知。以便伺候。若痛得慢。則是試痛。只管安眠穩食。不可亂動。此處極要着意留心。乃是第一關頭。不可忽畧。若認作正產。胡亂臨盆。則錯到底矣。

此時第一忍疼爲主。不問是試痛。是生產。忍住疼。照常吃

飯睡覺痛得極熟。自然易生。且試痛與正產。亦要疼久。看其緊慢。方辨得清。千萬不可輕易臨盆坐草。揉腰擦肚。至囑至囑。再跣時宜穩跣。坐時宜正坐。不可將身左右擺扭。須知此處。要自家作主。他人替不得。與自家性命相關。與別人毫無干涉。

到此時。必要養神惜力爲主。能上床安睡。閉目養神最好。若不能睡。暫時起來。或扶人緩行。或扶桌站立片時。疼若稍緩。又上床睡。總以睡爲第一妙法。但宜仰睡。使腹中寬舒。小兒易於轉動。且大人睡下。小兒亦是睡下。轉身便不

費力蓋大人宜惜力小兒亦惜力以待臨時用之切記切記。

無論遲早切不可輕易臨盆用力。切不可聽二樵婆說孩兒頭已在此。以致臨盆早了。悞盡大事。蓋母子一氣。子在母腹中時。母之氣力。卽子之氣力。母若無力。則子亦無力矣。故母不輕用力。兒便有氣勢。自會鑽出。何須着急。因恐小兒力薄。其轉身時用力已盡。及到產門不能得出。或亦有之。宜稍用力一陣助之。則脫然而下矣。或曰大便時亦須用力。如何生產不用力。不知大便呆物。

必須人力。小兒自會轉動。必要待其自轉。不但不必用力。正切忌用力。蓋小兒端坐腹中。及至生時。垂頭轉身向下。腹中窄狹。他人有力難助。要聽其自家慢慢轉身到產門。頭向下。腳向上。倒懸而出。若小兒未曾轉身。用力一逼。則腳先出。以爲詫異。且贈之美名曰腳踏蓮花生。或轉身未定時。用力一逼。則橫卧腹中。一手先出。又名之曰討鹽生。卽或轉身向下。畧不條直。用力畧早。亦或左或右。偏頂腿骨而不得出。不知此等弊病。皆是時候未到。妄自用力之故。奉勸世人。萬萬不可用力。然亦非全不用力。但當用力。

只一盞茶時耳。其餘皆不可亂動者也。卽如大便未到其時。縱用力亦不能出。而况於人乎。

或問何以知此一盞茶時而用力乎。曰。此時自是不同。若小兒果然逼到產門。則渾身骨節疎解。胸前陷下。腰腹重墜異常。大小便一時俱急。目中金花爆濺。真其時矣。當於此時臨盆。用力一陣。母子分張。何難之有。更有第一妙法。凡女子臨產。其兩手中指傍。脉必跳動。異於往時。直至中指第二節。脉亦亂動。方是的真時候。于此時臨盆。則用一口氣送下便生矣。

或曰。早一時斷乎不可矣。不知遲了一時。可不妨否。曰。不妨。若果當其時。必無不出之理。然或偶有不出者。則小兒力盡不能得出。宜令上床安睡。使小兒在腹中。亦安睡歇力。少刻自然生矣。

或曰。倘或兒到產門。而大人睡下。豈不有礙。曰。更好。蓋小兒向下時。而大人坐立。則小兒倒懸矣。豈能久待。今大人睡下。兒亦睡下。有何妨礙。又曰。倘或悶壞。奈何。曰。他十個月。不會悶。今乃悶乎。

或曰。不宜用力。已聞教矣。不知先悞用力。以致橫生倒產。

有法治之否。曰：急令安睡，用大劑加味芎歸湯服之。將手足緩緩托入，再睡一夜，自然生矣。又曰：托之不入，奈何？曰：若肯睡，再無托不入之理。若到此時，仍不許他睡，又或動手動脚，亂吃方藥，吾未如之何矣。若兒身已順，產戶已開，兒已露頂，猶不下者，此因兒身回轉，臍帶絆肩故也。名曰礙產。卽令產母仰臥，徐推兒上，以中指按摩兒肩，去其臍帶，方可用力。

或曰：盤腸生，是何緣故？曰：用力之過。蓋因產母平日氣虛，及到臨時，用力努掙，渾身氣血下注，以致腸隨兒下。一次

如是下次路熟。又復如此。若能等待瓜熟蒂落之時。何得有此怪異。

或曰。穩婆不必用乎。曰。既有此輩。亦不能不用。但要我用他。不可他用我。全憑自家作主。不可聽命于彼耳。大約此等人。多愚蠢。不明道理。一進門來。不問遲早。不問生熟。便令坐草用力。一定說兒頭已在此。或令揉腸擦肚。或手入產門探摸。多致損傷。更有一等狡惡之婦。借此居奇射利。禍不忍言矣。每見富貴之家。預將穩婆留在家中。及到臨時。稍不快利。前後門戶。接到無數。紛紛攘攘。吵成一片。所

謂天下本無事。庸人自擾之。但房中只要會生育。過老嫗二人。有氣力抱腰。女人二名。或一人靜以守之。米粥時進。以飽爲度。

或問服藥有益無損否。曰。安得無損。鼠兔二丸。大耗氣而兼損血。回生丹大破血而兼損氣。蓋鼠兔例用香竄之藥。產時百脉解散。氣血虧虛。服此散氣藥。兒已出而香未消。其損多矣。且令毛竅開張。招風入內。禍不可言。回生丹以大黃紅花爲君。其餘亦多消導之品。血已耗。而又大破之。多致產後發熱等病。遺患無窮。按此方藥。古今稱爲神靈。

奇寶尙然如此。其他可知。今所輯胎產前後諸方。皆家常之品。屢經試驗者。非世上之方。故公之人世。以廣大生之德。

或曰。依此言。世間總無難產者耶。曰。偶亦有之。或因母太虛。胎養不足。血氣不完。或母病傷寒之後。熱毒傷胎。又或夫婦同房太多。以致慾火傷胎。平日過食椒薑煎炒之物。火毒傷胎。以及跌撲損傷。皆致難產。多令胎死腹中。除此之外。無難產者矣。又有嚴寒天氣。滴水成冰之時。貧家房中。火氣微薄。以致血寒而凍。亦令不出。然此亦因臨盆早。

去衣久坐之故耳。若令擁被安臥待時而產，豈有此患？或問臨產時飲食如何。曰：此時心內憂疑，腹中疼痛，甚至精神疲困，口中失味。全要好飲食調理，但不宜過於肥膩耳。倘不能食，只將鷄鴨湯、肉湯之類，吹去油，澄清頻頻飲之。若在貧家，豈能辦此？白米粥最佳，餛飩亦可，俱能壯助精神，和調氣血。人以食爲命，豈可一日缺乎？

冬月天冷，產母經血得冷則凝，致兒不能下，此害最深。故冬月生產，下部不可脫去棉衣，并不可坐臥寒處，務使滿房圍爐，常有煖氣，令產母背身向火，臍下腿膝間常煖，血

得煖則行。兒易產也。

盛夏產婦宜溫涼得宜。不可過涼。致增疾病。不可人多。熱氣逼襲。令產母心煩。熱血沸騰。有鬱冒冲暈之患。

將產最戒曲身眠臥。雖甚腹痛。宜強爲跼立。散步房中。或凭几立。切戒曲腰。以阻兒轉舒尋路也。蓋兒子尋到產門。被母腰曲遮蔽。再轉又再蔽。則子必無力而不能動。決至難產。人見其不動。則謂胎死。其實因無力而非死也。此時縱有妙藥良方。不能令子有力而動。只要補接產母元氣。更要心安氣和。調理精神。胎元漸復。可保無虞。又有胞水

已下。子忽不動。停一二日。三五日者。調補氣血之外。切戒憂懼驚恐暴躁。蓋驚則神散。憂則氣結。暴則氣不順。血必妄行。多致昏悶。知此善調。自然無恙。

凡手先出。名曰橫生。足先出。名曰倒生。救法。急令產母仰臥。畧以鹽塗兒手心足心。仍以香油抹之。輕輕送入。即便自轉順生。不可任其久出。久則手足青而子傷。難以送入。亦不可妄用催生方藥。蓋手足之出。非藥可治。又切勿悞聽。克婦用刀斷手。一斷。子必腹中亂攪而傷母矣。

或問試痛何故。曰。兒到七八個月。手足五官全備。已能動

彈。或母腹中有火。或起居不時。令兒不安。以此大動而痛。此等十胎而五。不足爲奇。只宜照常穩食安眠。一二日自然安靜。或痛之不止。用安胎藥一二服。自止。此後近有數日。遠則月餘。甚至再過三四箇月纔產。人多不知。輕易臨盆。終日坐立。不令睡倒。或抱腰擦肚。或用手拖。或用藥打。生生將兒取出。母則九死一生。兒則十胎九夭。慘不可言。世間難產。皆此故也。蓋胎養不足。氣血不全。如剖卵出雛。裂繭出蛹。寧可活乎。只說小兒難養。誰復根究到此。又有受寒及傷食腹痛不可不知。

或問何以知其試痛。曰：只看痛法。一陣緊，一陣者，正生也。一陣慢，一陣，或乍緊乍慢者，皆試痛也。

或問傷食受寒，何以辨之。曰：傷食者，當臍而痛，手按之更痛。或臍旁有一梗，寒痛多在臍下，綿綿而痛，不增不減，得熱物而稍緩是也。

或問將試痛，認作正生，其害如此。倘將正生，認作試痛，以致過時，不亦有害乎。曰：無害。果當其時，小兒自會鑽出。縱或過時，不過落在襁中，生在床上而已，有何大害。而如此諄諄乎。

古方彙考 卷之三
三
大全方曰。婦人懷孕有七八個月生者。有一年二年乃至四年而後生者。不可不知。

朱丹溪先生云。產後以大補氣血爲主。雖有他症。以末治之。

陳無擇曰。兒下時。切不可遽然平臥。必須靠坐良久。俟惡露下行。方可安臥。不然。恐血隨火上行。奔心入肺。以成危症。又若分娩艱難。勞傷元氣。產母垂危。產子已死。急以黃芩川芎當歸數觔。水煎。乘熱熏蒸滿室。俾產婦口鼻俱受其氣。臍帶以油紙燃燒斷。藉其煖氣。以接補子母陽氣。

枕流子曰。交骨不開。多因用力太早。逼兒頭在戶口也。但數日不下者。服藥後。閉目靜養片時。則藥入陰分。藥始奏功。不然無效。蓋開目則氣行陽道。閉目則氣行陰道。夜雖屬陰。不閉目則尚在陽。晝雖屬陽。一閉目則氣亦入陰矣。保胎以絕慾爲第一義。其次亦宜節慾。蓋寡慾則心清。胎氣寧謐。不特安胎。且易生易育。少病而多壽。

孕已知覺。卽宜用布一幅。六七寸濶。長視人肥瘦。約纏兩道。橫束腰間。直至臨盆之時。纔解去。若是試疼。仍不宜解。蓋胎未長成。得此則腰脊有力。些須閃挫。不致動胎。且常

百方彙編 卷之三
令腹中狹窄。及到解開。則腹中乍寬。轉身容易。

凡覺受胎。一切行動。俱宜小心。不可任意舉步。及用力移。撥重物。恐防蹉跌。五月以前。根蒂未固。若一遭跌。多有墮落之虞。五月後。至臨產。小兒神識初生。魂魄怯弱。母若一跌。兒在腹中。如山崩地陷。神魂飛越。無論胎墮。子母不保。幸而生育。必有胎驚。臍風之病。多致夭折。萬一成人。恒遭顛癩惡疾。藥不能療。與其生後疼愛。不若胎中保護。慎之。慎之。

一受胎後。不可登高上梯。恐傾跌有損。不可伸手高處取。

物恐胎傷而子啼腹中。如子腹中啼。但令妊婦鞠躬片時。或俯拾地上錢荳之類。自安。

生男生女。夫命所招。與婦何干。倘或連胎生女。不可在旁。咨嗟嘆息。令其氣苦。致病傷生。凡此只宜寬慰爲主。又有將女溺死者。忍心害理。後嗣不昌。

產後莫妙於熱酒對童便。或腹痛甚。用陽和生化湯。無不愈者。再用馬料豆。炒至烟出。用無灰酒淬之。如此三次。去豆飲酒。能治產後七十二症。傷風受寒者尤宜。

或問產後胞衣不下。乃極惡之症。可以損命。有諸。曰不妨。

不必服藥。亦不必驚恐。若胞衣不下。急用粗麻線將臍帶繫住。又將臍帶雙折。再繫一道。以微物墜住。再將臍帶剪斷。過三五日。自痿縮乾小而下。累用有驗。或以二指隨臍帶而上。帶盡處。以指連胞向下一捺。惡血覆盡。其衣隨手下矣。或覺胎衣不下。產婦用自已頭髮塞口中。打一惡心。則下矣。只要與產母說知。放心不必驚恐。不可聽穩婆妄用手取。多有因此而傷生者。慎之慎之。

小產重於大產。一切調理並如產後法。

薛立齋先生云。小產重於大產。大產如粟熟自脫。小產如

生採破其皮殼斷其根蒂也。但人往往輕視死者多矣。小產數日後忽然渾身大熱面紅眼赤口大渴欲飲凉水。晝夜不息。此血虛之症。宜用當歸補血湯以補其血。若認作傷寒而用石膏芩連等寒涼之藥則必死矣。