

寅

臨證指南醫案

倪
韞
如



南京中医药大学图书馆版权所有

臨證指南醫案醫目

卷三

遺精

淋濁

陽痿

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

易動無制故精不能固。由煩動而泄。當填補下焦俾精

充陽潛可以圖愈。

熟地八兩

麥冬二兩

夜神二兩

五味子兩

線膠四兩

川角膏四兩

沙苑二兩

遠志兩

芡實三兩

湖蓮三兩

金櫻膏九

馬陰虛體質常有夢泄之疾。養陰佐以瀉劑。仍參入通藥可效。六味去丹澤加湖蓮芡實五味遠志秋石

金櫻膏丸

張陰精走泄陽失依附。上冒爲熱。坎水中陽不藏。古人必以厚味填之。介類潛之。乃從陰以引陽。與今人見熱

按源不同

熟地

龜肉

粢菜

青鹽

柏子仁

女貞子

山藥

旱蓮草

某

脈左弦右濡夢遺咳嗽氣急

熟地

麥冬

萸肉

五味

茯神

女貞子

山藥

湖蓮

川角膏

楊

脈垂入尺有夢遺精議填陰攝固其下

熟地

萸肉

五味

山藥

茯神

覆盆子

遠志

線膠

湖蓮

冬實



牡蠣

1951

中醫藥大學

圖書館

所有

中醫藥大學

全櫻膏丸鹽湯下

剉

先患目疾流淚，嘈雜不欲食，內鬱勃陽氣過動，膀胱不主攝納，有半連次遺泄，腰脊酸楚，皆肝腎病矣。
此皆有陰虛之症

熟地

丹皮

湖蓮

芡實

遠志

苔中醫藥大學圖書館藏所有

某

勞損漏陽，大便時溏，陰火上升，下則遺滑。

熟地

龜板

芡實

遠志

女貞

建連

冬草

山藥

某

少年頻頻遺精，不寐，心嘈，乃屬腎中有火，精得熱而妄行，日後恐有腎消之虞。

熟地

丹皮

芡實

遠志

苔中醫藥大學圖書館藏所有

焦黃柏

生地

大冬

茯苓

煅牡蠣

炒山藥

某瓶虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動精。

搖下泄。加以夜坐不靜。養暴寒。再折其陽。身不發熱。時

時驚惕煩躁。從仲景亡陽而潤。例用救逆湯。法必得神。

氣凝靜。不致昏瘡癰癧之變。救逆湯去芍。

陰虛
濕熱
費。色蒼脈敷煩。心明遺陽火。下降陰虛。不攝有濕熱。下

注此固儻無功。

薯解

黃柏

川蓮

遠志

茯苓

澤寫

桔梗

芍藥

吳一病形在腎肝但得濕頭中痛微緩少腹陰囊亦脹想
陰分固虛而濕熱卽着致腑經之氣無以承流宣化理
固有諸先泄厥陰鬱熱兼通腑氣再議

龍胆草

胡黃連

萸薢

丹皮

茯苓

澤瀉

葛根

丹皮

又閱病原是臟陰精之衛致陽浮頭痛兼有遺精月
數發下虛上實純以補滻決不應病性不耐丸劑與通
攝兩用

既有頭痛必須兼症治否則亦當分治

龜板

秋石

熟地

女貞

遠志

芡實

湖蓮

茯苓

熬膏



北京中医药大学图书馆版权所有

錢十二脈右弦左垂陰虛濕熱遺精瘡蝕

黃柏

知母

熟地

萆薢

茯苓

遠志

密丸

某一夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱二氣乘虛下陷墮

腰中至囊環跳脈蓋諸處可見久遺八脈皆傷

藥兼理陰氣 猪苓湯

又 熟地

五味

外實

茯苓

湖蓮

山藥

下損及中
兼治
脾胃

宋三無夢頻頻遺精乃精竅已滑古人謂有夢治心無夢
治腎腎陰久損陽升無制喉中貯痰不清皆五液所化



胃納少而運遲固下必佐健中

人參 桑螵蛸

生龍骨

鎖陽

芡實

熟地

茱萸

遠志

金櫻膏丸

華_{加元}傷於上精敗於下心腎不交久傷精氣不復謂之

損丙經治五臟之損治各不同越人有上損後陽下損墳丙經治五臟之損治各不同越人有上損後陽下損從陰之議然必納穀資生脾胃後天得振始望精氣生於穀食自上秋至今日甚乃裏真無藏當春令泄越生氣不至漸欲離散從來精血有形藥餌焉能驟然充長攻病方法都主客邪以偏治偏閭古東垣丹溪輩於損皆不知其理之

不背復者首宜大進參术多至數觔調有形精血難生

無形元氣須急固耳。况上下交損，當治其中。若得中甦加穀，繼參入攝，納填精氣，神之屬方。今春木大泄，萬物盡放，人身應之。此一月中急挽勿懈矣。

參朮膏米飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去，當歸

此寧神固精，收攝散亡，乃濟以治脫之法。

又半月來服桑螵蛸散以固下，參朮膏以益中，遺滑得止。其下關頗有收攝之機。獨是晝夜將寢，心中諸事紛紛來擾，神傷散越，最難斂聚。且思慮積勞，心脾營血暗損，血不內涵，神乃孤獨。議用嚴氏濟生歸脾方，使他臟



真氣咸歸於脾。今夏前土旺司令，把握後天於理最合。

歸脾湯

又立夏四日，診左脈百至餘，頗有斂聚之意。右關及尺，芤動若革。按脅下過寸，動氣似若穿梭。此關在內，空衝脈失養，而震躍不息。此女子胞胎。男子聚精之會也。凡內損精血形氣，其胃旺納食者，務在滋填。今食減不納，假寐片晌，必煩驚惕。醒而汙自述，五心熱熾，四肢骨節熱痿如墮。明是陰精內枯，致陽不交陰，轉枯轉涸。自下及中，至上前投桑螵蛸散，固滯精竅，遺滑經月不來。奈廕食不加，後天生氣不醒，膿厚填補於理難進。卽參

於轉情若能刻刻如此自考其學必更進矣

木甘溫益氣又恐益其枯燥宜參生脈以茲三焦晨用人乳一杯使氣血陰陽引之導之迎夏至一陰來復宜用人乳一盞隔湯燉熟服午後畧饑用生薦四君子湯

無用

又一月來雖經反覆參脈症形色生陽頗有相帶近食蚕豆滯氣腹中微膨食復日味酸澀見久卧重着脾陽運動之機尙少而火升心煩動氣汗出遺精雖藏於音未得平復總是內損已深若調治合宜只要懦氣復得一分便減二分病象長夏脾胃主令培土助納爲要而精氣散越仍兼攝固之法刻下味酸微膨補脾少佐疏胃宣肺進耳早上另製補蠶丸劑益臟真以招納散失

之氣

方晚服

人參

菟芻

白朮

炙草

早七
九方人參

麥冬

五味

神翹

麥芽

葵實

桑螵蛸

白龍骨

淡竹葉

金櫻膏丸

茯苓

棗仁

金箔

石茲胃氣
所以難復

華氏五次
醫案功過
細細分別
能於此處
相半學者
學必大進

又形色有漸復之象較之更至病去三四但乾舌脈弦
大尚少中和左脈細促未靜穀道運遲有吞酸脣脹寐
中仍欲遺精此中焦之陽宜動則運下焦之陰固則能
守乃一定成法午後服異功散加炒穀芽

晨服

遺症固濬下焦乃通壅治法想精門已滑濬

能取效必用滑藥引導同氣相求古法有諸

牛骨髓 羊骨髓 猪脊髓 麝角膠

生牡蠣 熟地 黃肉 茯神

山藥 茄實 湖蓮 遼志

膠體代密丸晨服四錢秋石一分化水下

毛六長夏暑濕熱都令脾胃受傷色黃神倦氣分自餒
因有遺泄一症在盛年陰虛多及詢納食未爲強旺
遺發必勞煩而來脈象非數博議以養脾立法

歸脾去黃芪桂圓加益智龍骨

必有妙義
當補然有一味
精思之患

心昏兼治

項 脈左弱右弦色黃食少腹脹便溏常有夢遺此升
陰柔滑膩可服用煦陽以涵陰

生地絲子

覆盆子 蛇床子 五味子

韭子

大

益智仁 煙

補骨脂 龍骨 建蓮粉丸

中醫

丁

陰精走泄陽不內依欲寐即醒心動震悸所謂病因
精奪當養精以固氣從前緩藥不錯但不分剛柔爲偏
陽是以見血莫見血投涼

龜版

去脂削光一兩桑螵蛸蟬殼

人參一錢

當歸一錢

青花龍骨

三錢飛

抱木茯神三錢

丸既始於念萌不遂其欲陽下墜而精洩先夢者心陽注

此亦心怯

腎久則精血日損不充養筋骨爲痛下損及中食不化此非萸地賦膈以及濫精可效妙香散

謂之陰氣走泄遺精移官溢墳塞固令納穀少而不甘增氣既弱滋膩先妨胃口議用桑螵蛸散密丸服之四年遺精數年不但腎關不固陽明脈絡亦已瘳其後病愈宜戒慾寧心一年寒暑更遷陰陽漸交用桑螵蛸散治之

顧九滑精用陰藥頓然食減藥先傷胃據述夢寐驚狂精走無以護神當固無形矣

人參

生龍骨

桑螵蛸

益智仁

茯苓

遠志

木香

呂七有夢乃遺是心有所觸而致經營操持皆擾神動說齋賈客於外非關酒色矣 妙香散

俞三壯年形質偉然脈來芤虛述心悸怔多畏

甚竝靜此陽不易委於陰過用勞心使然用

張四形壯脈小自述心力勞瘦食減遺精夜半

而奪當養氣以充精理其無形以固有形 妙香散

支二疼多鼻塞能食有夢遺精醫投疏泄肺氣消痰六十

劑不効問讀書夜坐陽氣必升充塞上竅上盛下衰寐

則陽道降而精下生爲遺用補心丹

貴。真陰損傷而五志中陽上燔喉痛下墜爲遺精。日耗骨髓無力必延枯槁而後已藥餌何足久恃。

早服補心丹 晚服桑螵蛸散

胡遺精四年精關久滑不固陰久傷陽氣不入陽躡夜寐不寐前以鎮攝小效獨心中怔悸不已以桑螵蛸散從心腎治

畢六有夢遺精是心腎病清心固腎是爲成法得以水火交合病當漸減內傷病從內起豈得與外來六氣混治

熟地

龍骨

遠志

五味

茯神

芡實

建蓮

金櫻膏丸

程

左脈剛堅火升神氣欲昏。片刻平復。宛若無病。此皆。

勞心五志之陽動。龍相無制。常有遺泄之狀。先用滋腎。

丸三錢。後鹽湯送。

又早服補陰丸。晚服三才加炒黃柏砂仁。

又交霜降絡中。陡然熱蒸。肢節皆麻。火風震動。多因脾腎液枯。議用二至百補丸。意班龍一至百補丸加黃柏。林八診脈細濤。疑則遺精。心熱口渴。不時寒熱。此腎陰內損。心陽暗熾。補心丹三錢四。

某冬令煩倦。噦加。是屬不藏陽少潛伏。兩足心常冷。平時先夢而遺。由神馳致精散。必鎮心以安神。猶喜胃弱。

納穀若能保養可望漸愈

桑螵蛸

金櫻子

覆盆子

芡實

遠志

茯神

茯苓

龍骨

湖蓮

煎膏練密收饑時服七八錢

楊八十沖年遺精。知識太早。難成易虧。真陰不得充長。及壯盛未有生育。而久遺滑漏。褚氏謂難狀之疾者。蓋病傷可復精損難復也。診脈上動尺芤。心動神馳。神馳精散。草木性偏焉。得見長務。宜斷慾百日。以妙香散桑螵蛸散方。理心脾以交腎。回腎氣以寧心。早晚並進。百日以驗之。

腎氣
不攝

呂

二成婚太早精血未滿久洩必關鍵不攝初則精虧

濁久則元精渭溢精濁之病巢氏分晰彰著經言腎虛

氣漫爲賬鹹爲腎味上溢口舌皆下失攝納之權

生兎絲子粉

蛇床子

覆盆子

陝沙苑子

家華子

五味子

鯉魚膠丸

許十九脈虛芤應乎失血遺精先天既薄更易泄少藏正褚氏所云難狀之疾。中年須潛心靜處冀水火自交可以精固莫但圖藥餌須堅守瞬刻無制之功。

鮮河車膏 九蒸熟地 五味

黃肉

山藥

湖蓮

竹仁

芡實

金櫻膏丸



李五脈小色白失血遺精屢發猶喜納穀胃安封藏固補使其藏聚若再苦寒瀉火胃傷廢食坐以待困矣

熟地

萸肉

工味

穀益子

河車膏

生黃粉

山藥

芡苓

芡實

金櫻膏丸

某脈左部數有鋒芒初夏見紅久遺滑入夜疾升腹痛肝陽上冒腎弱不搃固攝助納必佐涼肝

熟地

湖蓮

芡實

生白朮骨

芡神

川石斛

失章一脈數虛氣衝心熱咳嗽失血屬因嘔怒肝陽升則血



湧墜則精遺春末上旺入夏正當發泄主令暮熱晨汗

陰陽樞組失固議進攝真其清寒肺藥須忌

魚鱠膠

生龍骨

桑螵蛸

盜

茯苓

五味

秋石調人

陸一肌肉鬆柔脈小如數常有夢遺陰精不固上年冬發過溫溫則腠理反疏陽動不藏諸氣皆升絡血隨氣土溢見症如頭面熱目下內闇心悸怔忡四肢汗出兩足跗腫常冷不溫走動數步即吸短欲喘何一非少陰腎氣失納陽浮不昔潛伏之徵况多夢紛擾山精傷及神氣當喫厚填精質重鎮神佐酸以收之甘以緩之勿



重復之方
十居六七

令人心煩

因血以投涼莫見下寒藥過燥熱恪守禁忌以安之經
年冀有成功所慮年志慮未純貽變反覆

水製熟地

人參秋石

白龍骨

五味

炒山藥

茯神

遺精之法

曰不外乎

與精鎮心

太無碍妙

方法俗醫

往往用溫

熱及粘膿

等物必至

傷人此老

全不犯此
但此症總
有伏邪爲

遺精一症前賢醫有明辨其義各載本門殊不復尋
夫抵此症變幻雖多不越乎有夢無夢濕然二著之
範圍而已古人以有夢爲心病無夢爲腎病濕熱爲
小腸膀胱病夫精之藏制雖在腎而精之主宰則在
心其精血下注濕熱濕淫而遺滑者責在小腸膀胱

故先生於遺精一症亦不外乎平定心益腎填精固攝

思如火加
痰如風不
能搜剔餘
邪兼以調
和臟氣季
曲惟治方
無變病一
味安神填
腎猶多未
盡之理也

清熱利濕清法如腎精虧乏相火易動陰虛陽胃而爲遺精者用厚味填精升類潛陽養陰固濡諸法如無夢遺精腎開不固精竅滑脫而成者毋繁勞神填陰固攝及滑濤五施方法如有夢而遺精勞過及脾腎受傷心腎不交上下交損而成者用歸脾湯及脾胃散參木膏補心丹等方心脾腎兼治之法如陰妙香散參木膏補心丹等方心脾腎兼治之法如陰虛不攝濕熱下注而遺滑者用黃柏草薢黃連芩澤等苦泄厥陰鬱熱兼通腑氣爲主如下虛上實火風震動腎腎液橫而爲遺滑者用二至百補丸及通泻下焦之法如龍柏交熾陰精走泄而成者用三才封

體丹滋腎丸大補陰，丸峻補真陰。承制相火以，歸陰
中伏熱爲主。又有房勞過度，精竭陽虛，寐則陽陷而
精道不禁，隨觸隨泄。不夢而遺者，當用固精丸。固
八脈之氣，又有膏梁酒肉，飲醉厚味之人，久之脾胃
釀成濕熱，留伏陰中，而爲夢泄者，當用劉松石猪胰
丸。清脾胃蘊蓄之濕熱，立法雖爲大備，然臨症之生
心化裁，存乎其人耳。鄒滋丸



南京中医药大学图书馆版权所有

淋濁

濕熱

某二濕熱下注淋濬當分利。

草薢

淡竹葉

瞿麥

細木通

扁蓄

某八濕熱下注濁痛淋濬先用分利法。

草薢

淡竹葉

木通

赤苓

茵陳

海金沙

魏脈數垂淋濬愈後再發肛脹便不爽餘濁更盛。

萆薢

猪苓

澤瀉

白通草



南京中医药大学图书馆版权所有

海金沙

晚蠶沙

丹皮

黃柏

又滯濁下行痛緩議養陰通腑。

阿膠

生地

猪苓

澤鴟

山梔

丹皮

大黃

毛三壯盛體豐當夏令濕熱蒸迫水穀氣墜而有淋濁腹
寒涼腹脹得固瀉無效皆非腑病治法。子和杜苓飲
又前用甘露飲淋濁已止而頭暈左肢麻木胃脘腹中
餓則欲痛咽喉中似有物粘著咳咯咽飲不解診脈左
勁左濡據症是水弱木矢滋涵肝陽化風過膈達咽達
巔木乘胃土陽明脈衰不司東筋骨以利機關脉陽中



中醫藥大學

約翰霍普金斯大學圖書館版權所有

痛得食則緩者胃虛求助也今壯年有此已屬瘳乎
萌養肝腎之液以熄虛風補胃土以充絡脈務在安常
勿圖速效可望全好

製首烏

蕤蓉

天冬

杞子

柏子霖

茯神

菊花炭

青鹽

紅棗肉丸服四錢

晚用猪肚丸方

某膏淋濁、膩濕、熱居多，然亦有勞傷腎傷、下虛不攝者。
今以酒客腹中氣墜、便積、苦辛寒分消治。

川棟子

枳荅

草薢

海金沙

黃柏

青皮

防己

蟬沙

陰虛
濕熱

汪 氣左堅入尺，濕熱下墜，淋濁痛。滋腎丸。

周二便濁革痛。滋腎丸三錢。

吳王久瘡不愈。已有濕熱知識太早。陰未生成。早泄致陽光易升易降。牙宣齦血爲濁爲遺。欲固其陰。先和其陽。奶奶丹溪大補陰丸合水陸二仙丹加牡蠣金梗膏丸。黃舌白氣短。胸中痛。目暗微淋。乃陰虛於下。氣阻於上。暫停參劑。早上服都氣丸三錢。晚服威喜丸一錢。葉脈數形瘦素。有失血。自覺氣從左升。痰嗽隨之。此皆積勞。陽氣鼓動。陰弱少制。六味壯水和陽極是。近日便濁雖宜清熱。亦必顧其陰體爲要。

生地

丹皮

甘草稍

澤瀉

某

陰虛濕熱在腑爲濁。

六味去萸加車前牛膝黃柏

草薢

某

遺由精竅淋在溺竅異出同門最宜分別人遺不攝

是精關不攝爲虛但點滴草中痛痒久腹堅滿此屬淋

閉乃隧道不通未可便認爲虛况夏令足趾濕腐其下

焦先蘊濕熱熱阻氣不流行將膀胱撐滿故令脹堅議

理足太陽經

五苓散

某
五淋濁溺短澑痛先通陽氣

下焦
不

臨證指南醫案

卷三 淵濁

十六

流行

草薢

三錢

烏藥

一錢

益智

五分

赤斧

三錢

心火
下咽

蘆一
四脈沉淋濁

分清飲加山梔丹皮茯苓猪苓

某三淋濁小便不利當清利火腑道赤散生地用細者

加赤苓瞿麥

黃心熱下遺於小腸則爲淋濁用藥以苦先入心而小腸火腑非苦不通也既已得效宗前議定法

人參

黃柏

川連

生地

茯苓

茯神

丹參

桔梗

石菖蒲

王

淋屬肝膽濁屬心腎心火下咽陰失上承故瀝濁不

禁

人參

川連

生地

茯神

氣閉

某氏氣閉成淋

柏子仁

遠志

紫苑

枇杷葉

杏仁

降香末

瓜蔓皮

鬱金

黑山梔

苦京中醫藥大學

力案重確
可周

林明脉
熱血

某三小溲短赤帶血

導赤散加琥珀末五分赤茯苓

胡三小溲短赤帶血

導赤散加琥珀末五分赤茯苓

氏導赤散加知柏以清龍雷

許十八血淋尿管溺出而痛脈沉實形色蒼黑治從腑熱

蘆薈

山梔

郁李仁

紅花

當歸

酒大黃

龍膽草

丹皮

又

血淋未已用堅陰精熱

小生地

粉丹皮

黃柏

知母

淡竹葉

山梔

非血淋也

精闢
陰虛

祝五中年已後瘦人陰虧有熱飲酒濕熱下墮精屬瘀血

皆熱走入陰則陰不固攝前方宗丹溪補陰丸取其介屬潛陽苦味堅陰若用固涩必致病加

水製熟地

龜服膠

磁石

天冬



茯苓

黃柏

知母

猪脊筋搗丸

不歸氣

范此精走濶淋、脊骨生熱屬陰虛。胃弱勿用膩滯。

鹿角膠

覆盆子

五味

歸身

鹿角膠

秋石

芡實

金橘膏丸

戈脈左細勁腰痠、渴溺右遺瀝。近日減穀難化。時下焦臟陰虛，餒漸及中焦。肺陽收納肝腎勿損胃氣。

熟地

杞子

柏子仁

當歸身

紫衣胡桃

補骨脂

杜仲

茯苓

青鹽

密丸

某五六旬有五，下焦空虛，二便不爽，渴管瘦痛，姑與腎氣

湯主治。 腎氣湯細組，慮清服。

朱六血淋管漏脄熱爲多經月來每渴或大便其墜下更甚想陰精既損醫氣不收故也

鹹蓴蓉

柏子仁

杞子

大茴

牛膝

茯苓

非血淋方也

某

淋、燭、經、年、陽、煩、腰、痛、畏、冷、

熟地

杞子

鹿角膠

巴戟

杜仲

柏子仁

湖蓮

芡實

敗精
漏脈
腫脹

葉七淋屬肝膽、漏屬心腎。據述病溺出渾濁如膿，病甚則

多或因遺泄後漏痛皆平，或遺後漏轉甚。想精關之
間必有有形敗精凝阻其竅，故藥中清濕熱通腑及固

瀉補陰久餌不效先議通瘀腐一法考古方通淋通瘀用虎杖湯今世無識此藥每以杜牛膝代之

用鮮杜牛膝根水洗淨搗爛绞汁大半茶杯調人蜜麝香一分同隔湯緩溫空心服只可服三四服淋通即止倘日後病發再服

又淋病主治而用八正分清導赤等方因熱與濕俱屬無形腑氣爲壅取淡滲苦寒濕去熱解膀通病解若房勞弱忍精血之傷乃有形致濁阻於隧遂故每尿而痛徒進清濕熱利小便無用者以溺與精同門異路耳故虎杖散小效以麝香入絡通血杜牛膝亦開通血中敗

濁也

此治療血爲淋之方

韭白汁九製大黃兩

生白牽牛子兩

歸蘿五錢

桂枝木

生三錢。炒桃仁二兩。

小茴三錢

韭白汁法丸

李

敗精凝隧通瘀癰宣竅已效。

生桃仁

杜牛膝人中白

生黃柏

麝香調水

徐玉五旬又四勞心陽重陰液日損壯年已有痔瘍腸中久有濕熱酒性辛溫亦助濕熱熱下注爲癰爲淋故初病投八正五苓疎氣之壅也半年不痊氣病漸入於血絡考古方惟虎杖散最宜虎杖散

張丹溪謂五淋症濕熱阻塞居多三年前會看是癥月

前舉發竟有血塊窒塞尿管大痛不能出想房勞強忍敗精離位變成污濁腐且少腹堅滿大便祕滯氣無蘊腑氣不用考湏湖發明篇中有外甥癆齋之病與此適符今成其義叅入朱南陽法。治瘀血爲淋

兩頭尖

川椒子

韭白

小茴

桂枝

歸尾

沖入杜牛膝銀汁

又 痛脹皆減滴瘀成淋前投通濁已效只要凝塊全無一便不反覆陰藥呆鈍桂附劫液通陽柔劑爲宜

蓴蓉

歸尾

柏子仁

炒遠志

柏子

葵蒂

小茴

當加入養血藥

馬 淋渴屬用膽居多桂附劫陰與剛臟不合診脈沉濇無力非五苓八正可投議用朱南陽法仍是厥陰本方耳

老韭根白一兩頭尖一兩
歸鬚二錢 穿山甲末一粒
小茴香五分 川棟子肉一錢

徐 由淋痛漸變赤白獨少年患此多有慾心暗動精離本宮腐敗凝阻燭竅而成乃有形精血之傷三年久病形消肉減其損傷已非一臟一腑然補精元髓必佐宣通爲是自能潛心安養尚堪帶病延年

熟地

生蠶角

蕤英

炒遠志

案鴻此
案鑒

赤斧

牛膝

某每溺尿管空精弱後渾濁敗精阻礙濕熱內蒸古方虎杖散宣發通腐甚妙若去麝香必不靈效敷諸湯藥更上一籌矣

酒煨大黃 炒龍膽草 炒焦黃柏 牽牛子

川棟子 黑山梔 小茴

沉香汁

某陰精上蒸者。毒陽火下。啞者危。血淋久而成形。窒痛煩心。心火直升。老人陰精已憊。五夜化成敗濁。阻塞不通。欲溺必痛。得泄瀉減。卽痛則不通。痛隨利緩之謂故知柏六味及歸脾逍遙之屬。愈治愈劇其守補升補滋



滯濇藥決不中病用琥珀痛減乃通血利竅之意然非久進之方以不傷陰陽之通潤立方

生地

益母草

女貞子

阿膠

琥珀

稻豆皮

司脈
病

顧二敗精宿於精關宿腐因溺強出新者又瘀在裏經年累月精與血並皆枯槁勢必竭絕成勞不治醫藥當以任督衝帶調理亦如女人之崩漏帶下醫者但知八正分清以潔熱治亦有地黃湯益陰瀉陽總不能走入奇經

鹿茸

龜甲

當歸

杞子

此方
不能
通鑑

茯苓

小茴

鮑魚

夏三案續神耗過動天君陽燧直升由降水火不交陰精變爲腐濁精溼與便濁異路故宣利清解無功數月久延其病傷已在任督凡八脈奇經醫每棄置不論考孫真人九法專究其事欲涵陰精不漏意在升固八脈之氣錄法象末 方不甚清楚

鹿茸

人參

生兔絲粉

補骨脂

韭子

舶茴香

覆盆子

茯苓

胡桃肉

柏子霜

蒸餅爲丸

剉九脈緩濁後有血或間成塊晨傾溺器必有膠濁粘

膩之物四肢寒癥納食如昔病傷奇脈

生鹿茸

當歸

杞子

柏子仁

沙苑子

小茴

此非治血淋之方

王五。悲憂驚恐。內傷情志。沐浴薰蒸。外泄陽氣。絡甲不歸。血從漏出。蓋衝脈動而諸脈皆動。任脈遂失擔任之司。下元真氣。何以固納。述小便欲出。有瘻瘍如淋之狀。診脈微小。滯最宜理陽通補。用青囊班龍丸。

淋有五淋之名。濁有精濁便濁之別。數者當察氣分與血分精道及水道。確從何來。大凡祇結宣通滑脫。當補。若因心陽亢而下注者。利其火腑。濕熱甚而不

法淋之法
有通有塞
要當分別
有瘀血積
塞住溺管
者宜先通
無瘀積而
致滑者宜
燥補不但
前丸各別
法亦復各
端宜博識
而詳放之
法中並未
見及也

宣者衛其泉源氣陷用升陽之法血瘀進化結之方此數端人所易曉也獨不知厥陰內患其症最急少腹達前陰如刺小水點滴難通環陰之脈絡皆瘦弱化機關已息先生引朱南陽方法兼參李頤川意用滑利通陽辛鹹泄急佐以循經入絡之品豈非發前人之未發耶若大便濁之恙只在氣虛與濕熱椎求實者宣通水道虛者調養中州若虛實兩兼又有益臟通腑之法精濁者蓋因損傷肝腎而致有精瘀精滑之分精瘀當先理其離宮腐濁繼與補腎之治精滑者用固補斂攝倘如不應當從真炁調之景岳謂

亦屬影

理其無形以固有形也。然此症但知治肝治腎，而不
知有治八脈之妙。亦屬影先生引孫真人九法升奇陽固精
絡使督任有權漏卮自己可見平日若不多讀古書
而臨症焉知此理。若不經先生講明予今日亦不知
此方妙處。又尿血一症虛者居多若有火亦能作癟
當與血淋同治。倘清之不愈則專究乎虛上則主於
心脾下則從乎肝腎久則亦主於八脈大約與前症
相同要在認定陰陽耳。邵新甫

陽痿

徐三脈小數清上熱火升喜食辛酸爽口上年因精滑陽
痿用二至百補通填未效此乃焦勞思慮鬱傷當從少
陽以條暢氣血

柴胡 薄荷 丹皮 鬱金 山梔

神翹

廣皮

茯苓

生薑

心腎
不交

仲二八旬以內而陽事不舉此先天真弱心氣不主下交
於腎非如老年陽衰例進溫熱之比填元髓海交合心

腎宜之

過度
勞心

熟地 雄羊腎

杞子

補骨脂

黃節

茯苓

胡桃

青鹽

鹿筋膠

王玉述未育子向衰莖縮凡男子下焦先虧客館辦事曲
運神思心陽久吸腎陰用斑龍聚精茸珠合方

男子以八爲數年逾六旬而陽事痿者理所當然也
若過此猶能生育者此先天真厚所謂陽常有餘也
若夫少壯及中年思此則有色慾傷及肝腎而致者
先生立法非峻補真元不可蓋因陽氣既傷真陰必
損若純乎剛熱燥濇之補必有偏勝之害每兼血肉
溫潤之品緩調之亦有因恐懼而得者蓋恐則傷腎

恐則氣不治宜固腎稍佐升湯有因思慮煩勞而成者則心脾寧。指治有微捷生陽者必從膽治。蓋凡十一臟皆取穴於膽。又云少陽爲樞。若得膽和。則何鬱之有。更有濕熱爲患者。當前必加利而下除。舉治用苦味。墮陰淡滲去濕。渴去熱清而病退矣。又有陽明虛則冥筋縱。蓋胃爲水穀之海納食不眠。精氣必虛。况男子外腎其名爲勢。若穀氣不充欲求其勢之雄壯堅舉。不亦難乎。治惟有通補陽明而已。華岫雲

陽痿之妨
其症多端
非專論數言
不明
當另詳
茲不復贅



南京中医药大学图书馆版权所有

衛陽
瀝

汗

某二脈細自汗下體怯冷衛陽式微使然

黃芪三錢

熟附子

七分熟於元半錢

炙甘草五分

煨薑一錢

南棗三錢

宋三脈徵汗淋右脣高突而更色痿足冷不食易飢食人
卽飽此陽氣大傷衛不擁護法當封固

人參

黃芪

製角附子

熟於朮

既現汗症
必兼汗治
芪附能
治陽虛之
汗若陽盛
之汗則
有害

真武湯

孫五肉瞞筋陽心悸汗出頭痛愈畏風怕冷陽虛失護用



南京中医学院
中医药大学图书馆版权所有

臣言中西醫學卷三

勞傷陽虛汗油

黃芪

三錢

白朮

二錢

防風

六分

炙草

五分

顧氏勞方

憤怒心皆熱汗出往時每以和陽治厥陰肝

月懶得效今年春夏經行病發且食納頓減諸氏謂獨陰

無陽須推異治通補既銳小察不必見熱投涼用鍊其

陽以理虛

人參

半夏

茯苓

參草

牡蠣

小麥

南棗

虛宮衛

者溫之

張五脈弦大身熱時作汗出良由勞傷營衛所致經互勞

嫩黃芪

當歸一錢

桂枝木錢

白芍半錢

炙草五分

細辛半錢

南棗三錢

末一脈細弱自汗體冷形神疲憊知機少納肢節酸楚在營衛當以甘溫

生黃芪

桂枝木錢

白芍

炙草

煖薑宜生者

南棗

某

汗出寒凍真氣發泄痰動風生用辛甘化風法

生黃芪

桂枝

炙草

茯苓

防風根

煖薑當歸附子

南棗

神
鬼

梅案膚積勞神困食減五心汗出非因實熱乃火與元

四

呂陽

方

氣熱不雨立氣泄爲熱爲汗當治在無形以實火宜清
虛熱宜補耳議用生脈四君子湯當加牡蛎
少寐多夢

人參

龍骨

茯神

棗仁

炒白芍

炙草

煎藥吞道家之品

蒸熟五味

子三十粒

爲治

又 鎮攝汗止火升咳嗽仍屬陰虛難得充復奇陰微怯

熟地炭 人參

呂陽

五味

炒萸肉

川斛

茯神

久占子

接服瓊玉膏方

汗出絶由

干心火不

五屬執者

多屬寒者

少今諸方

皆用補陽

治法乃一

偏之見皆

由不知汗

出之液在

何經也悞

人多矣●

亡陽之汗

乃陽氣飛

越下焦空

虛此乃危

經云陽之汗以天地之同名之又云陽加於陰謂之汗由是推之是陽熱加於陰津散於外而爲汗也土心爲主陽之臟凡五臟六腑表裏之陽皆心主之陽行其變化故隨其陽氣所在之處而氣化爲津而隨其火損所在之處而津道爲任然有自汗盜汗之別焉夫汗本平陰乃人身之津液所化也經云鍼者心之液又云腎主五液故凡汗症未有不由心腎虛而得之者心之陽虛不能衛外而爲固則外傷而自汗不分寤寐不因勞動不因發散療瘞然自出由陰蒸於陽分也賢之陰虛不能內營而退藏則內傷而盜

非陽○虛乃陽惡也



之症非
參附不能

四陽自

急大不

當者

土相

胎

汗出

而

汗

汗盜汗者。助內經所云寢汗也。睡熟則出醒則漸收。
由陽蒸於陰分也。故陽虛自汗治宜補氣以備外。腫
虛盜汗治當補陰以營內加氣虛表弱。自汗者止。
第五次保心靈全宣如之。
仲景有黃芪建中湯。先賢有玉屏風散。如陰虛有火。
盜汗發熱者。先賢有當歸六黃湯。柏子仁九如柴葛
心神氣熱汗泄者。先生用生脈四君子湯。加薑衛虛
而汗出者。宗仲景黃芪建中湯。及辛甘化風法。如衛
此湯劑不以正汗
此是上陽之方
陽虛而汗出者。用玉屏風散。芪附湯。真武湯。及甘麥
大棗湯。鎮陽理陰方法。按症施治。一絲不亂。謂之明
醫也。夫復奚愧。鄒滋九。

陽脫

陳

胎

遺尿目瞑口開面亮汗油陽飛欲脫無藥力挽擬

附湯法加人參便固元真接續耳

又 子丑爲陰陽交界之時更逢霜降正不相續後現胎

象進兩攝陰陽方 參附湯加五昧子

又 陽回汗止神甦剪方收於火症之說如陰液欲涸心熱渴飲姑救冒汗

人參

麥冬

五味

茯神

建蓮

陰氣欲盡難進溫熱之補大意收攝真陰爲治

又 腎真未全收納使溺自遺無如咽燥喉痛陽雖初向

亦復之未去養生脈散之說而不知理故耳

南京中

中醫

大學圖書

版權所有

此案共五

方皆似是

而非故病

情反覆歷

懲不爽今

特指明之

後之學者

宜審焉蓋

陽脫者非

無陽也乃

陽氣上越

而不肯附

乎陰也故

欲止其汗

必用陰藥

以維繫之

加真武湯

爲亡陽之

祖方必重

虛陽

徐

人參 麥冬 五味 熟地炭
茯神 遠志炭 菖蒲根
熟地 熟地炭
人參 熟地 茯神 青鉛
周脈革無根。左尺如無。大汗後。寒症頭顱痛。躁渴不寐。
此屬亡陽。平昔飲酒少穀。回陽辛甘。未得必達。有乾嘔
格拒之狀。眞危如朝露矣。勉議仲景救逆湯。收攝潰散
之陽冀有小安。再議治病。救逆湯加參附。

怡交第七日。鼾聲呵欠。目瞑煩躁。診脈微細而促。此

伏是良中症

卷二



純用陽藥

已屬二偏

又不知卽

用納陰之

藥以致心

熟渴飲又

用麥冬五

味以收火

氣入于肺

中尤爲大

犯咽喉燥

喘有由來

矣又不知

急清肺胃

仍用生脈

熟地補土

血腥邪火

不降陰氣

皆一氣不相接續衰微之徵最速是精神熄風方法難
以進商急固根時倣河間地黃飲

尚有鳳樓堂言峻補

熟地

附子

蕤蓉

黃芩

大黃

杞子

遠志

菖蒲

川芎

黃 腎脈不得上榮肝風突起掀旋呵欠鼾聲口噤牙關

陰陽不續危期至速地黃飲子極是

熟地炭 黃肉炭 川斛 天冬 没薑蓉

天冬

牛膝炭

五味

遠志

茯神

飲子煎法

此方節中虛

脾大不斂神迷墮語墮陽不相交合爲欲脫之象救

陰無速功急急鎮固陰陽莫其甦息

南京中醫大學圖書館版權所有

難

不承遂成
敗症非鑿

鑿可證者

平齋此一

子亡陽一
症亦皆耳
食之學耳

脫之名惟
陽氣驟越
陰陽相離
汗出如油
六脈垂絕
一時急迫
之症方名
爲脫至千
病久病深
元氣已億

人參

茯神

阿膠

淮小麥

龍骨

牡蠣

淮小麥

又

陰液枯槁，陽氣獨升，心熱驚惕，倏熱汗泄，議用復脈

湯甘以緩熱，充養五液，復脈去薑桂加牡蠣

又

胃弱微嘔，暫與養陽明胃津方

此非脫症

人參

炒麥冬

炒白粳米

茯神

鮮蓮子肉

川斛

人參

秋石水
拌烘

熟地炭

天冬

麥冬

夜神

鮮生地

又

秋燥上薄，嘔甚微嘔，宜調本兼以清燥

大中醫書局

南京中醫藥大學圖書館版權所有

班宜峻補危至有轉机

此則凡病

將死之時無不盡然

不得名脫所列諸藥皆係將死

之候不得天干脫門

人參秋石水麥冬

丹桂非脫症玉竹

金草

南棗白梗米

非脫症

玄参九一錢桃石拌人參湯送

某氏脈如雀啄色枯氣促身重如山不思納穀乃氣血大虛慮其暴脫不治之症

人參生地阿膠

炙草左牡蠣

又補攝足三陰

入參熟地炭

棗仁

茯神

五味鮮蓮子肉



朱氏久損不復。真氣失藏。交大寒節初之氣。厥陰風木主
候。肝風乘虛上擾。氣升則嘔吐。氣降則大便。寒則脅肉
更甚。熱則神煩不寧。是中下之真氣杳然。恐寒春前後
有厥脫變幻擬進錘邊法。此防脫之方。

人參

生牡蠣

龍骨

附子

桂枝木

生白芍

炙草

艾自半月前。寒熱兩日。色脈愈弱。食減寢少。神不自持。

皆虛脫之象。議固之濇。之不及理病。

因虛即以治病。病不虛。固虛何以分途。

人參

生龍骨

牡蠣

桂枝

炙草

南棗肉

宜加補血藥

文 脘神稍安議足三陰補方

人參

砂仁末炒熟地

炒黑杞子

茯神

五味

牛膝炭

脫即死也諸病之死皆謂之脫蓋人病則陰陽偏勝至極即死矣人之生也負陰抱陽又曰陰在內陽之守也陽在外陰之使也是故陰中有陽陽中有陰其陰陽樞紐自有生以至老死頃刻不離離則死矣故古聖先賢劄著醫籍百病千方無非爲補偏救弊和協陰陽使人得盡其天年而已夫脫有陰脫陽脫之殊內經論之最詳難經又言脫陽者見鬼脫陰

脫是病象
沉是總名
附下文之
陽脫陰脫
可稱爲陽
死陰死耶

者目盲此不過言其脫時之情狀也明理者須預爲
挽救則可若至見鬼目盲而治之已無及矣今觀死
生之信法回陽之中必佐陰藥攝陰之內必兼顧陽
氣務使陽潛陰固庶不致有偏勝之患至於所脫之
症不一如中風眩暉嘔吐喘衄汗多亡陽之類是陽
脫也瀉痢崩漏胎產下多亡陰之類是陰脫也炒脹
乾霍亂痞脹症厥臟腑窒塞之類是內閉外脫也陽
脫於上陰脫於下卽人死而魂升魄降之謂也總之
陰陽樞紐不脫病雖重不死然則陰陽樞紐何在其
在於命門歟華岫雲

脾胃

此篇治法獨得真傳

胃陰虛
不納飢

錢

胃虛少納。土不生金。音低氣餒。當與清補。

麥冬

生扁豆

玉竹

生甘草

桑葉

大沙參

王數年病傷不復。不飢不納。九竅不和。都屬胃病。陽土喜惡偏剛燥。若四君異功等。竟是治脾之藥。腑宜通。即是補。甘濡潤。胃氣下行。則有效驗。

麥冬一錢

火麻仁一錢半炒

水炙黑小甘草五分

生白芍二錢。臨服入青甘蔗漿一杯。



某四病後胃氣不甦不飢少納姑與清養。

鮮省頭草錢白大麥仁五錢新魯皮一錢

川斛三錢烏梅五分

某三脈濇體質陰虧偏熱近日不飢口苦此胃陰有傷邪熱內熾古稱邪火不殺穀是也。

金石斛 陳半夏炒 生穀芽

廣皮白

陳香枝 堆茯苓

肺胃
陰虛

某

理肺養胃進以甘寒。

甜杏仁

王竹

花粉

枇杷葉

川貝

甜水梨汁

某 脾數口渴有痰。胃陰未旺。

炒麥冬 生白扁豆 生甘草

北沙參 川斛

陳十一知飢少納。胃陰傷也。

麥冬

川斛

桑葉

茯神

胃陽虛

某

胃陽受傷。腑病以通爲補。與守中心必致雍逆。

人參

粳米

益智仁

茯苓

廣皮

炒荷葉

某 食穀不化。胃無火也。

生白芍

厚朴

新會皮

益智仁

曰梗米



茯苓

砂仁

計三陽微痰，黑食入不化。

人參

生益智

桂心

茯神

廣皮

煨薑

高六脈更小帶弦，知飢不欲食，晨起吐痰，是胃陽不足，宜用外臺茯苓飲。

又人參

白朮

茯苓

廣皮

半夏

枳實皮

曰蒺藜

地粟粉

席三脈右濡，臍上過寸有聚氣橫，東幾年來食難用飽，每三四日一更衣，夫九竅失和，都屬胃病，上脘部位爲氣



药大学图书馆版权所有

分清陽失司。倣加景微通陽氣爲法。

薤白

瓜薑汁

半夏

薑汁

川桂枝

鮮菖蒲

某二服濡自汗。口淡無味。胃陽傷矣。

人參

淡附子

淡乾薑

茯苓

南棗

王脈小右弦。病屬勞倦。飲食不和。醫投柴葛雜八消導。
升表攻裏。致汗泄三日。院中不饑。全是冒陽大傷。防有
嘔呃厥逆之變。此方可用參丸。

丁香

炒萸米

生益智仁

薑汁

半夏

茯苓



孫

長夏熱傷爲瘧爲痢都是脾胃受傷老年氣衰不肯
自復清陽不肯轉旋院中不得容納口味痰吐不精脈
弦右濡濶下焦便不通調九竅不和都胃病也此剛補
不安陽土不耐辛熱矣議宣通補方如大半夏湯之類

大半夏湯加川連薑汁

又 小溫中丸

錢一壯年肌柔色黯脈小濡濶每食過不肯運化食冷物
膀上卽痛色脈參合病象是胃陽不旺濁陰易聚醫知
腑陽宜通白有效

良薑

草果

紅豆蔻

厚朴

脾陽虛

汪機舌灰黃脫癥不饑形寒法冷脾陽式微不能運石氣非溫通焉能宣達。

半夏

茯苓

廣皮

乾薑

周十四脈象窒塞能食少運便溏當溫通脾陽

生白朮

一錢半
茯苓
三錢

益智仁
一錢

淡附子
一錢

乾薑

一錢
草撥
一錢

又丸方當以脾腎同治著想。

溫通脾陽頗適脈象仍然窒塞照前方再服一劑如



脾胃
陽虛

吳酒多穀少濕勝中虛腹痛便溏太陰脾陽少健

平胃合四苓加穀芽

王十五素有痰飲陽氣已微再加恬鬱傷脾脾胃運納之陽愈憊致食下不化食已欲瀉夫脾胃爲病最詳東垣當

升降法中求之

人參

白朮

羌活

防風

生益智

廣皮

炙草

木瓜

張子食加便溏胃醒脾不運也方藥當以太陰陽明是謂

異功散加甘松益智

周十四脈緩弱脘中痛脹嘔瀉清涎是脾胃陽微得之積勞

午後病甚。陽不用事也。大凡脾陽宜動則運。溫補極是而守中及贊滯皆非其道。腑陽間佐用之。

人參

半夏

茯苓

生薑

朱砂
五味子
陽微食後吞酸

淡薑

大便不爽間用半碗水

大黃

茯苓

四兩

炒半夏二兩

生於北二兩

厚朴一兩

淡乾薑一兩

草蔻一兩

兩

淡乾薑

一兩

草蔻

一兩

淡吳萸

一兩

公丁香

五錢

水法丸

脾胃
濕傷

某

八脈弦

食下脹

大便不爽

水穀之濕

內著

脾陽不主

默運

胃腑不能宣達

疎脾降胃

令其升降爲要

金石斛

三錢

厚朴

一錢

枳實皮

一錢

廣皮白

一錢



苦參一錢

神麴半錢

茯苓皮三錢

麥芽一錢

陳八厥陰三瘡半年夏至節交春木退舍大寒然而疫解病傷未旺雨濕蒸逼外臨內受水穀不運洞泄之後而神倦食減湯傷脾胃清氣用東垣清暑益氣王之

清暑益氣法

脾腎
陽虛

洪 姵

脈虛濶弱面赤潮溼鼻冷肢冷肌腠麻木時如寒寢

微熱欲溺大便有不化之形穀食不納此陽氣大衰理

進溫補用附子理中湯

虛 中 氣
趙七氣分本虛衛少外護風怯冷冬天大氣主藏夏季氣泄外越此天熱煩倦一因也是氣分屬陽故桂附理

陽歸於八味古稱腎氣有通攝下焦之功能使水液
不致泛溢其中陰藥味厚爲君乃陰中之陽藥施於
虛未爲中窪。歷舉益氣法無出東垣範圍。仲濬陽府解
脾胃自強偏寒偏熱總有太過不及之弊補中益氣加
不適麥冬北味又間服四君子湯

饑傷

宜三痛而納食稍安病在脾絡因饑餓而得當養中焦之
營胃以緩之是其治法歸建中湯

食傷

戈小便短澀渾濁大便頻溏不欲納穀此傷食惡食也

當分消土

生益智

廣皮

茯苓

澤瀉

炒豆芽 炒山楂

脾胃之論莫詳於東垣。其所著補中益氣調中益氣升陽益胃等湯誠補前人之未備。察其立意。因以內傷勞倦爲主。又因脾乃太陰濕土。且世人胃陽衰者居多。故用參芪以補中。二朮以溫燥升柴丹下陷之清陽。陳皮木香理中宮之氣滯。脾胃合治。蓋用之得宜。誠效如桴鼓。蓋東垣之法。不過詳於治脾。而畧於治胃耳。乃後人宗其意者。凡著書立說。竟將脾胃總論。卽以治脾之藥籠統治胃。舉世皆然。今觀葉氏之書。始知脾胃當分析而論。蓋胃屬戊土。脾屬己

陽

陰

名言至論
深得內經之旨此老必有傳授其學不諱深造也

土戊陽己陰。陽之性有別也。臟宜藏腑宜宣。臟腑之體用各殊也。若脾陽不足。胃有寒濕。一臟一腑。皆宜於溫煥升運者。自當恪遵東垣之法。若脾陽不虧。胃有燥火。則當遵葉氏著。胃陰之法。觀其立論云。納食主胃。運化主脾。脾宜升。則健胃。宜降。則和。又云。太陰濕土。得陽始運。陽明陽土。得陰自安。以脾喜潤。胃喜柔潤也。仲景急下存津。其治在胃。東垣大升陽氣。其治在脾。此種議論。實超出千古。故凡遇真質木火之體。患燥熱之症。或病後熱傷肺胃。津液以致窟瘡。不食舌燥。咽乾煩渴。不寐。肌燥熇熱。便不通利。此

九竅不和都屬胃病也。豈可以芪朮升柴治之乎？故先生必用降胃之法。所謂胃宜降則和者，非用辛開苦降亦非。苦寒下奪以損胃氣，不過甘平或甘涼濡潤以養胃陰，則津液來復使之通降而已矣。此義良宗內經所謂六腑者，轉化物而不藏，以通爲用之理也。今案中所分胃陰虛、胃陽虛、脾陽虛、中虛餓傷食傷，其種種治法最易明悉。余不叅贅，總之脾胃之病，虛實寒熱宜燥宜潤，固當詳辨。其於升降二字，尤爲緊要。蓋脾氣下陷固病，即使不陷而但不健運，已病矣。胃氣上逆固病，即不上逆但不通降亦病矣。故

脾胃之治法與名門相兼者甚多。如嘔吐、腫脹、泄瀉、便閉、不食、胃痛、腹痛，木乘土諸門尤宜並參。論以明其理可也。幸岫雲發明亦切當。



南京中医药大学图书馆



南京中医药大学图书馆版权所有

木乘土

此是症不是病從古無此名也假如火刑金燥傷腎亦可立一病名稱

用四

某

肝厥犯胃入膈

半夏

薑汁

杏仁

金鈴子

延胡

香豆豉

白蔻

鮑三情濃不適陽氣鬱勃於中變化內風掀旋轉動心悸流涎麻木悉歸左肢蓋肝爲起病之源胃爲傳病之所飲酒中虛便易溏滑議兩和肝胃。

桑葉

炒丹皮

天麻

金斛

川貝

地膚皮



中国医药大学图书馆版本

吳 脈左數右濡氣塞心痛養胃平肝

半夏

茯苓

炒麥冬

柏子仁

川棟子

青橘葉

顧五脈弦胃脘癰痛子後清水泛溢由少腹濁起顯是肝

一脈弦胃脘癰痛子後清水泛溢由少腹濁起顯是肝

一脈弦胃脘癰痛子後清水泛溢由少腹濁起顯是肝

厥胃痛之症

此是炎胃痛之病

吳萸

五分

川棟子

錢

延胡

一錢

茯苓

二三錢

桂枝木

五分

高良薑

錢

某九脈左弦右濤中脘痛及少腹病在肝胃

川棟子

青皮

生香附

小茴

茯苓

南棗

某三舌白疕心液沫泛溢病在肝胃當通陽泄濁

吳萸七分乾薑一錢 薑汁三分茯苓三錢 南棗一枚

任入此情志不遂肝木之氣逆行犯胃嘔吐脹脹開導
笑可解疑滯血藥乃病之對頭也

延胡

川棟子

蘇梗

香附

紅薑慧

王四胃胱痛高突而堅嘔清涎血沫滴水不能下咽四肢
冷肌膚麻木。搘背脊病勢畧緩此屬肝厥犯胃。

開口吳萸

金鈴子

炒延胡

生香附

高良薑

南山楂

此症多以治必有薑飲爲患爲氣必見效



版權所有

某 脈左弦少寐氣從左升泄肝和胃

生左牡蠣五錢 川棟子肉一錢 化州橘紅半錢

茯苓三錢

澤瀉一錢

某

脈緩左弦晨倦食減在土旺之候急調脾胃
戊巳湯去甘草加穀芽

程王曲運神機心多擾動必形之夢寐診脈時手指微震
食納痰多蓋君相動主消爍安穀不充形骸首宜理陽
明以制厥陰勿多岐也

某 通補陽明和厥陰

人參

枳實

半夏

茯苓

石菖蒲



人參

茯苓

半夏

高良薑

吳萸

生白芍

某一肝逆犯胃脘痛腹鳴氣擗至咽

四

川棟子

桂枝木

淡乾薑

川椒

生白芍

吳萸

烏梅

茯苓

程五操家煩動嗔怒都令肝氣易逆乾嘔味酸木犯胃土
二風木動乃晨泄食少形瘦脈虛先議安胃和肝

人參

半夏

茯苓

木瓜

生益智

煨薑

華二據說氣攻脇脹春起秋愈此內應肝木飽食不和肝



傳胃矣

焦白朮

半夏

柴胡

枳實

生香附

廣皮

乾荷葉湯泛丸

毛

目微黃

舌黃

煩渴

脇肋板

實

呼吸周身

寒

吐食物

痰飲卽胸院痛

脹此肝木犯胃

頭氣短阻雖平

昔宜於溫補

今治病宜通氣分

半夏

一錢

廣皮白

一錢

大杏仁

十粒

白蔻仁

八分

川棟子

一錢

炒延胡

一錢

生薑

五分

土瓜根皮

一錢

又

心中懊惱噎痛

氣分熱痰未平

用溫膽法

竹茹

一錢

炒半夏

一錢

茯苓

一錢

枳實

一錢

桔梗八分

橘紅一錢

生薑三分

王十、癥積是重著有質。今痛升有形。痛解無跡。發於暮夜。衝逆欲嘔不吐。明是厥氣攻胃。由惱怒強。其氣帶索。而成病。發時用河間金鈴子散。兼以宣通陽明凝逆可愈。

金鈴子

延胡

半夏

瓜蔞皮

山梔

橘紅

半夏

瓜蔞皮

秦七面長身瘦。稟乎木火之形。氣阻院中。食少礙。痛胃口。爲逆。乃氣火獨熾之象。忌用燥熱劫津。治以平肝和胃。

降香

鬱金

山梔

橘紅

枇杷葉

蘇子

川貝母

薑皮

朱_五半百已衰。多因神傷思慮。夏四月太氣發泄。遂加便
溏長夏暑熱。無有不大耗氣分寒熱之來。乃本氣先_擇
而六氣得以乘虛。今不思納穀之因。皆寒熱二氣擾_逆
胃脘清氣受戕。所以致困莫甦。不煩不渴。胃陽處也。_凡
醒胃必先制肝。而治胃與脾迥別。古稱胃氣以不行爲
順區區未甘之守升柴之升。竟是脾藥。所以鮮克奏效。

人參

茯苓

炒麥冬

大麥仁

木瓜

烏梅

董

病久正氣已衰。喜熱惡寒爲虛。診得左脈尚弦。病在

肝但高年非伐肝平肝爲事議通補胃陽

人參

茯苓

煨薑

新胃皮

炒粳米

炒荷葉蒂

陸三咽屬胃胃陰不升但有陽氣壅蒸致膈燥不成寐衝逆心悸震動如驚厥陰內風乘胃虛以上僭胃脈日虛肢肌麻木當用十味溫膽合株水湯通攝兼進俾肝胃陽和可以痊安

大參

茯苓

棗仁

知母

竹茹

半夏

黃色林米

又用泄少陽補太陰法六君去甘草加丹皮桑葉全

解湯法左

郭 脹弦心中熱欲嘔不思食大便不爽乃厥陰肝陽順乘胃口陽明脈絡不宣身體掣痛當兩和其陽酸苦泄少佐徵辛 此方用苦辛酸法最合經旨

川連

桂枝木

生牡蠣

烏梅

生白芍

川棟子

生牡蠣

芮 前議肝病入胃上二格拒考內經諸痛皆主寒客但寒必化熱昔淺學之人不能知也 經年累月久痛寒必化熱故六氣郁從火化河間特補病機一十九條亦然。思初病在氣久必不血以經脈主氣絡脈主血也此臟腑經絡氣血須分晰辨明投劑自

可入穀更調初病驚驚夫驚則氣逆初病肝氣之逆久

則諸氣均逆而三焦皆受不特胃當其衝矣謹陳後

先後進藥方法厥陰篇云氣上竚心飢不能食欲吐涎沫夫木既犯胃胃受克爲虛仲景謂制木必先安土恐防久寇難復議用安胃一法

川連

川棟子

川椒當歸

生白芍

烏梅

淡薑渣

歸鬚

橘紅

刀論皆斥
草識

內經以攻病就制曰勝方補虛益體須氣味相生曰
生方今胃被肝乘法當補胃但胃屬腑陽凡六腑以
通爲補黃連味苦能降戴元禮云諸寒藥皆疑濶惟

有黃連不凝清有薑彬歸鬚氣味之辛得黃連川棟
之苦。微內經苦與辛合能降能通芍藥。酸寒能泄十

中木乘又能和陰止痛當歸血中氣藥。辛溫上升撫

鬚方薄其氣不升梅古先春化發最早得少陽生氣
非酸斂之收藥。得連棟苦寒內經所謂酸苦泄熱。
以氣與熱須無形無質。其通透之法迥異故無及之。
又春分前七日診右脈虛弦帶濶左脈小弦勁而數胃
痛已緩但當有畏寒鼓慄俄頃發熱而解此肝病先厥
後熱也今歲陰厥司天春季風不生氣肝病既久脾胃
必虛風木鬱於土宮營衛二氣未能流暢於經脈爲營

養護衛此偏熱偏寒所由來矣夫木鬱土位古人制肝
補脾升陽散鬱皆理偏就和爲治勿徒攻補寒熱之病
周

今春半天令漸溫擬兩和氣血佐以宣暢之陰分
小滿氣緩泄越必大培脾胃後天方合歲氣體質調

定春季煎丸二方

人參

茯苓

廣皮

炙草

當歸

白芍

丹皮

桑葉

薑棗湯法丸

人參

廣皮

穀芽

炙草

白芍

開用
煎方

黃芩

丹皮

柴胡

下

有年冬藏不固

春木萌動人身內應乎肝水弱木失

此二方俱
不中病有
畏寒熱等
營衛
症當先和

滋榮陽氣變化內風乘胃爲嘔攻脇爲痛仲景以消渴
心熱屬厥陰內經以吐涎沫爲肝病肝居左而病熾偏
右木犯上位之徵經旨謂肝爲剛臟非柔不和問醫藥
沉桂黃連雜以破泄氣分皆辛辣苦燥有剛以治剛之
弊倘忽厥逆瘛瘲奈何議鎮陽熄風法

生牡蠣

阿膠

細生地

丹參

淮小麥

南棗

又、內風陽氣鼓動變幻皆有形無質爲用太過前議鹹
苦久陰和陽佐麥棗以和胃制肝獲效蓋肝木肆橫胃
土必傷醫治既僻津血必枯唇赤舌絳咽乾穀味即鬱

此症屬痰
飲此方不
功

有火之症
此痰欲而

酸膩是胃汁受劫胃陰不復夫胃爲陽明之土非陰柔不肯協和與脾土有別故也

力石切

生牡蠣

阿膠

細生地

炒麻仁

炒麥冬

炙草

張五脈此當變萬小弦納穀腕中哽噎白述因乎挹鬱強飲則知本

火犯土胃氣不得下行所致議苦辛泄降法

黃連

鬱金

香淡豆豉

知茹

半夏

丹皮

山梔

生薑

又 前方泄厥陰通陽明爲衝氣吐涎腕痛不納穀而設。且便難艱阻胸脹悶土下交阻有年最慮關格與進退。



黃連湯

江 晨起腹痛。食穀微滿。是清濁之阻。按脈右虛左盛。
思飲食。脾胃困頓。都屬虛象。古人培土必先制木。降火
爲法。此症有痰飲不可疎。

人參 淡吳萸 淡乾薑 炒白芍

周九酒熱濕痰。當有年正虛清氣少。旋遂致結祕不能容
納。食少。自述多鬱易嗔。議從肝胃主治。

半夏 川連 人參 枳實

茯苓 薑汁 常用潤劑

王五噦逆舉發。湯食皆吐。病在胃之上脘。但不知起病之

因田據云左脇內結痕聚用木侮胃明係情懷夏勞以致氣鬱結聚久病至頗能安穀非純補可知泄厥陰以舒其用和陽明以利其腑藥取苦味之降逆氣管通至

川棟子皮 半夏

川連

薑汁

左牡蠣 淡吳萸

唐 痘逆惡心是肝氣犯胃食入臥著痛而且脹夜寐不安亦是胃中不和貴乎平肝養胃致其復若見有形衝逆之狀攻伐競進有痞滿成脹之患

川連

神麪

吳萸

川棟子

查肉

鬱金



姚

寒熱嘔吐。脇脹腹痺。大便乾滯。不暢。古云九竅不和。

無此論。

都屬胃病。法當平肝木。安胃土。更常進人乳。薑汁以益。

血潤燥宣通。午後議用大半夏湯。

人參

半夏

茯苓

廣皮

菖蒲

金石斛

中醫

藥

大

胡氏經後寒熱氣衝。欲嘔。忽又奴饑。仍不能食。視其算淮。
方不甚明。病亮。欬汗氣短。多藥冒傷。肝木升逆。并上焦表病。

炙甘草

小生地

芝麻仁

阿膠

麥冬

白芍

牡蠣

又照前方去牡蠣加人參

又 衡陽上逆則煩不得安。仍是陰弱。夫胃是陽土以陰爲用。太火無制。都係胃汁之枯。故腸中之垢不行。既口陰虧。不必強動大便。

人參

鮮生地

火麻仁

天冬

麥冬

炙草

天冬

徐氏經候適來。肢骸若撤。環口肉膾蠕動。兩踝臂肘常冷。夫衝脈血下。躋維脈怯。不用衝隸。陽明厥陰對峙。因鬱肝病。木乘土位。以致胃衰。初則氣升至咽。久則憊食。脘痞。昔人有治肝不應。當取陽明。陽明不鬪。空洞若谷。厥氣上加。勢必嘔脹吞酸。然陽明胃腑通補爲宜。剛藥畏



其劫陰少濟以柔藥法當如是

人參一錢 半夏量汁炒
二錢 茯苓三錢 淡附子

白粳米錢 木瓜一錢

經來之時而病狀如此總
是血虛而肝風乘之宜用

胃虛益氣而用人參。非半夏之辛茯苓之淡。非通劑矣。少用附子以理胃陽。粳米以理胃陰。得通補兩和陰陽之義。木瓜以酸收胃汁以制肝。兼和半夏附子之剛復。此大半夏與附子粳米湯合方。

張氏。肝病犯胃。心痛乾嘔。不能納食。肢冷泄瀉。腑經陽失流。展非虛寒也。金鈴子散加川連烏梅桂枝生薑

徐氏。屢屢嘔吐。下元氣怯。而寒熱久嗽。氣塞壅胸。湧吐涎

沫乃嘔。嘔怒肝膽內寄之相火風木內震不息犯胃
則嘔逆吞酸乘胸侵咽必脹悶喉痙漸漸昏迷欲寐久
延不已爲鬱勞之病此治嗽清肺裏錢消痰止胃越上
考內經肝病主治三法無非治用治體又曰治肝不虛
當取陽明蓋陽明者土獨有木火之長侮所以制其衝
逆之威也是病原治法大略安胃丸淑梅湯逆

鮑姬風泄已止胃逆不納食。

人參

川連

烏梅

木瓜

川斛

掃紅

朱氏嘔怒動肝氣逆惡心胸脇閉動氣下嚥欲便腹是中下

二集損傷不復約束之司失職擬進培土泄木法亦曾
時之計

烏梅

乾薑

川連

川椒

人參

茯苓

川棟

生白芍

王氏寡居多鬱宿病在肝。通日暑邪深入。肝病必來犯。嘔
吐衄下利。無止不思。穀食心中疫熱。仍是肝言。本症况
暑濕多傷氣。分人參輔胃。開痞扶胃有益。幸無忽致瘦
可也。

枳實

人參

用連

半夏

薑汁

牡蠣

又 胃開恩食仍以制肝和胃

人參 金石斛 半夏

桔

紅

枳實

呂氏季脇之傍是虛里穴今跳躍如梭乃陽明絡空也。足太陰肺脈通丘胸亦屬陽明所管經行後而病變。前案中說已著。茲不復贅。大凡絡虛通補最宜。身前衝氣微張。衝脈所主病內經所謂男子內結七疝。女子帶下瘕聚。今也瘡無形象。諒無結聚。祇以冷汗頭寒食入惡心鼻准明環口色青。肝胃相對一勝必一負。今日議理陽明之陽。佐以宣通奇脈。仲景於動氣一籥。都從陽徵起見。

未見

醫言指掌錄卷之三
做以爲法

人參

茯苓

炒熟附子

生薑文

桂枝木

炒黑大茴

碎石英

生杜仲

朱氏

上冬用溫通奇經帶止經轉兩月間納穀神安且

月初二日偶涉喚忿卽麻痺乾嘔耳聾隨卽昏迷如廢

診脈寸強尺弱食減少口味淡微汗此厥陰之陽化風

乘陽明上犯蒙昧清空法當和陽益胃治之

人參一錢

茯苓三錢

炒半夏一錢

生白芍一錢

烏梅十分

小川連二分

淡生薑二分

廣皮白一錢

此厥陰陽明藥也胃腑以通爲補故主之以大半夏

陽熱擁於上故少佐薑連以瀉心肝爲剛臟家入白芍烏梅以柔之也

亥

三月初五日經水不至腹中微痛右脇蟠蟠而動

合之

陽明脈絡空虛衝任無時當與通補入藥

人參一錢

當歸二錢

茺蔚子錢

香附

醋炒一錢

茯苓三錢

小茴一錢

生杜仲二錢

又

照方去荒蔚杜仲白芍官桂

某氏久有痛經氣血不甚流暢疎加景怒傷肝少腹衝氣
上犯逆行於肺爲欬寒熱聲嘎脇中拘急不飢不納乃
左升右降不可轉旋致失胃氣下行爲順之旨故肝用

宣泄胃腑宜通爲定例矣

鈎藤

丹皮

桑葉

半夏

茯苓

廣皮白

又威喜丸

唐 積勞內傷。晚悶脇脹。嘔吐格拒。眩暈不得臥。陽秋內風。暴張。恐其忽然癥厥。議通胃平肝法。

小川連

薑汁

半夏

牡蠣

川棟子

生白芍

江 巨按爲實患。目病來屬肝痛。必多嘔。大便秘。濁肝病及胃。當苦辛泄降。少佐酸味。

小川連

生淡乾薑

半夏

枳實

黃芩 生白芍

顧十五陽明脈衰形寒、痞飢不食、心痛、洞泄兼嘔。

人參

吳萸

茯苓

生薑

炒黃稭米

此嘔吐之主方

果勞怒傷陽氣逆血鬱致痛、痞脹便溏、風太侮土，則

既故與通補陽明厥陰，大半夏湯去密加桃仁柏子

仁當歸薑棗湯法丸

某脈微小弱是陽氣已衰今年太陰司天長夏熱泄氣分不食不運味變酸苦脾胃先受因也稍涉嗔怒不乘土中益加不安從東垣培土制木法

人參

廣皮

茯苓

益智

木瓜

淡薑渣

夏

通補陽明開泄厥陰

人參

半夏

茯苓

吳萸

白芍

肝脾

汪氏氣滯脾弱

逍遙散加礬金砂仁末

肝脾
胃

大便未結腹中猶痛食入有欲便之意胃陽未復用

木因時令尙橫用泄木安土法。

人參

木瓜

厚朴

茯苓

益智仁

青皮



南京中医药大学图书馆版权所有

江

鎮衝任溫養下焦頗效所議治嗽肺藥寒涼清火背

謬顯然

炒黑杞子 滋蕤蓉 小茴香并炒當歸

沙苑 石殼建蓮 茯神

又 動忍腕下痛不飲食是肝厥犯脾胃。病外生枝最難

善調之理理氣皆破泄難用。議進制肝木益胃土一法

人參一錢

炒焦白芍一錢

真柳南香

計沖五
小匙

炒焦烏梅

三分酸

泄肝陽

茯苓

五錢切小塊

化橘紅

五分宣通緩痛

又 人參

嫩鈎藤

明天麻

化橘紅

炒烏梅肉

茯苓

伽南香

大
煎藥

肝膽

朱

胃弱痰多補虛宜通肝陽易升左頬赤佐泄少陽

人參

炒半夏

茯苓

鈎藤

膽脾

范

五脾竅開舌舌出流涎爲脾病克脾者少陽膽木以養

經靈桑葉

煨薑

南棗

脾泄膽治

人參

於术

天麻

薑黃

桑葉

丹皮

某

補太陰泄少陽

人參

茯苓

焦朮

炙草

廣皮

白芍

炒丹皮

桑葉



南京中医药大学图书馆版权所有

又 照方去甘草桑葉加木瓜

李子少陽木火犯太陰之土持齋淡薄中虛熱灼以補脾
和肝爲久長調理 四君子加芩芍桑葉丹皮

金能食遲舌紋裂左順內腫不喜飲水太陰脾陽鬱
法當補土泄木 比症有火有痰有風不得用燥藥

於朮

茯苓

新會皮

炙草

煨益智

柴胡

丹皮

白芍

張九脈小弱是陽虛體質田鬱勃內動少陽木火木犯太
陰脾土遂致寢食不適法當補土泄木

人參二錢

白朮一錢

半夏一錢

茯苓二錢

甘草五分

廣皮一錢 丹皮二錢 桑葉一錢 薑一錢

東一錢

肝爲風木之臟。又爲將軍之官。其性急而動。故肝臟之病較之他臟爲多。而於婦女尤甚。肝病必犯土。是侮其所勝也。本臟現症。仲景云。厥陰之爲病。消渴氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐。或下之利不止。又內經所載肝病難以盡述。大凡其脈必弦。脇或脹或疼。偏寒偏熱。先厥後熱。若一犯胃。則惡心乾嘔。脘痞不食。吐酸水涎沫。或脹。便或溏或不爽。肢冷肌麻。案中治法有陰陽虛實之殊。略舉而敘述之。若肝陰胃陰未虧。肝陽亢逆犯胃。先生立法用藥。

則違。柔用剛泄肝。如吳萸桂通胃。如半夏薑汁。附加益智枳朴等。則兼運脾陽。中虛必用人參。或大半夏湯。附子粳米湯。進退黃連湯。瀉心法。苦中法。溫膽導湯是也。若肝陰胃汁已虛。木火熾盛。風陽擾胃。用藥忌剛。用桑葉肝。則阿膠生地白芍麻仁。瓜蒂。胃則人參麥冬知母。粳米秫米等是也。至於平病之法。則剛柔寒熱兼用。烏梅丸安胃丸。逍遙散。若四君六君異功。戊己則必加泄肝之品。用桑葉丹皮者。先生云。桑葉輕清。清泄少陽之氣。熱丹皮苦辛。清泄肝膽之血熱。用全鉛子散者。川棟苦寒。直泄肝腸。延胡

專理氣滯血滯之痛此皆案甲之綱領也余另分此
一門者因嘔吐不食脇脹脘痞等恙恐醫者但認為
脾胃之病不知實由肝邪所致故特爲揭出以醒後
人之目耳且世人但知風勞臟膈爲四大重症不知
土敗木賊肝氣日橫脾胃日敗延至不救者多矣則
不究心於此哉華岫雲

諸案大抵皆胸痺痞滿及痰飲內革之症治痞痺之方最
忌人參而此欲其壯士以制木用者甚多必有遺病至於
蓄瘀痛全不齒及尤屬辨症不清其中精思巧意中病處
頗多亦得矢忝牛也

腫脹

胃陽虛

果五食穀不運。腹脹嘔惡大便不爽。脈弦色黃此胃陽虛。微升降失司使然。法當溫通陽氣。

吳萸八分

半夏三錢

草朮一錢

淡乾薑一錢

生薑汁五分

廣皮白一錢

方太燥

陳三証脈石大而緩。至如小數促。冬季寒熱。身痛。汗出。即解。自勞役飢飽。嘔惡之後。病劇。面白浮腫。腹脹呼吸。喘。目淚鼻衄。動則益甚。衝欲起食。納留中不運。時序交夏。暉胃主候。覩色脈情形中滿脹。病日來矣。蓋此症屬勞。



南京中國醫藥大學圖書館

所有權歸

論極明而
方不中病
本屬難治
面浮足腫
無用人參
消瘀養營
利水庶幾
近之

倦致損初病卽在脾胃東垣云胃爲衛之本脾乃營之
源臟爾受病營循二氣晝夜循環失度爲寒爲熱非
瘧邪半表半裏之症斯時若有明眼必較辨用而前
言勞者溫之損者益之建申日溫令脾胃清陽自生
原祇定無事更遷仲景亦謂男子脈大爲勞則知內
仲景東垣乘訓真規矩惺繩至法且汗泄積勞審是陽
傷醫舉辛走却陽苦寒敗胃病人白述飲膳卽中脘不
舒頃之少腹急痛便稀其胃陽爲苦辛大傷明甚又述
咳頻衝氣必自下上逆夫衝脈隸於陽明胃陽傷極中
乏坐鎮之真氣衝脈動則諸脈交動濁陰散漫上布此

臥著欲起矣愚非遙指其、脹正合內經濁氣在上則生
脹脹太陰所至爲脹脹相符也。昔有見淡休治痰見血
休治血當以病因傳變推求故辨論若此。

厚朴

杏仁

人參

茯苓

蜜煨薑

南棗

厚朴杏仁取其能降氣參姜取其建立中之
清陽而和營衛也。

吳四單脹弱少溫通頤適當用大鍼沙丸一錢二分八服

某 食下脹脹舌黃當治脾陽。

生白朮一錢 廣皮一錢 茯苓三錢 厚朴一錢

重
脾陽

木瓜五分

淡附子七分

徐九攻痞變成單脹脾陽傷拉難治之症

生白朮 熟附子 茯苓 厚朴

主乾薑

錢

食入腹脹已五十日且痛必有形致動頭中微痛去

病滿屬氣痛不言口氣因氣滞二便既通其泄未必在乎陽冒然太陰脾陽傷以至溫開泄主之

桂枝

生白朮

淡乾薑

厚朴

又照方去白朮加生益智仁茯苓

楊十五飲酒聚濕太陰脾陽受傷單單腹脹是濁陰之氣綑結不宣通二便不爽治以健陽運濕

生茅朮

草菓

附子

廣皮

厚朴

茯苓

草撥

諸荅

吳四食下脹脹便滑不爽肢木不仁此脾陽用頭不能運便然溫通中陽爲主

白朮三錢

附子一錢

炮薑半錢

桂枝木

茯苓二錢

草撥一錢

中醫

丹脹必有
實邪一未
盈補是益
其病也四
皆云謂脹
腹大皆膚
于熱不可
者也

僧七俗語云膏梁無厭發癰疽瘍泊不堪生腫脹今素有
腕痛氣逆嘔吐漸起腫脹乃太陰脾臟之陽受傷不司
鼓動運行陰土宜溫佐以制木治

生於朮

茯苓

廣皮

椒目

厚朴

益智仁

良薑

某時左脈弦、脹滿不運便泄不爽。當溫通脾陽。

此通氣利濕之方

草果仁

茯苓皮

大腹皮

廣皮

青皮一錢

厚朴一錢

木猪苓一錢

枳壳半錢

寒熱俱中，頗微滿舌白。用治中法。

人參

益智

廣皮

茯苓

澤寫

金剛

木瓜

人來失血
陰氣大傷
豈可燥熱

周五八歲四年後失血。乃久積勞傷酒肉不忌。溫鬱脾陽爲脹。問小溲僅通。大便仍溏。渴陰乘陽。午後夜分並劇。

生於丸

熟附子

大黃利尿

陳十五積勞脾陽傷食下張足腫

生白朮

茯苓

熟附子

草葉仁

厚朴

廣皮

某躬耕南畝曝於烈日漬於水土暑濕內蒸爲漏病邪去正傷。高晚踰腫腹滿乃脾陽已困諸氣不司運行留陰慚爾竊據內經病機諸濕腫滿皆屬於脾。

生白朮

草蔻

茯苓

厚朴

附子

澤瀉

鄒三深秋霍亂轉筋必有暴冷傷及脾胃病機一十九條河間皆謂熱亦屬偏見愈瀉愈服。是實症。夫酒客之

濕皆脾胃陽微不運致濕邪凝聚氣壅成脹見脹滿微投攻下不究致病之因故曰難調之症

生白朮

草菓

熟附子

厚朴

廣皮

茯苓

脾胃
陽虛

陳四苦寒多用。胃陽久傷。右脇痛。嘔酸濁。皆屬陰辛。用辛甘溫中。補虛。減病人述。早上腹寬。暮夜氣緊。微便大便不爽。有單腹脹之憂。

人參

生白朮

茯苓

肉桂

歸身

益智

廣皮

煨薑

趙王胸腹脹滿。久病痰多。

生白朮二兩
茯苓二兩
厚朴一兩
肉桂五錢
薑十九

兩

方不起于雜古

所存

本草云厚朴興白朮能治虛脹倣漢古枳朮之意也
佐茯苓通胃陽肉桂入血絡則病邪可卻矣

楊

脈沉小弦中年已後陽氣不足痰飲水寒皆令逆

脾胃耳

人參一錢
茯苓三錢
白朮一錢
淡附子錢
薑汁三分

生

附子調

倪仁腹更膨便不爽腑陽不行

砂仁殼

厚朴

生益智

茯苓

生穀芽

廣皮

又 六腑不通壅。凡濁味食物宜忌

雞肫皮 麥芽 山楂 砂仁 陳香綠

脈沉小緩早食難化晚食夜張大便不爽此腑陽之傷不可流行必以溫藥疎通忌食閉氣粘葷

生白朮

附子

厚朴

草藥

茯苓

廣皮白

梔榔汁

腎胃

浦

九

腎氣

九

五苓散

一攝

少陰

一通

太陽

濁泄溺逼腹滿

陽虛

此是治一。

○

○

○

○

○

○

日減不爲錯悞但虛寒脹病而用溫補閑古人調劑必是通法蓋通陽則濁陰不聚守補恐中焦易鈍喻氏謂能變胃而不受胃變苟非純剛之藥易勝其任議於舉

夜服玉壺丹五分晨進

人參

半夏

薑汁

茯苓

松實

乾薑

陳六老人脾腎陽衰。午後暮夜陰氣用事。食納不適。陽明脹脹時泄。治法初宜剛劑。俾陰濁不僭。陽乃復辟。

人參

一錢半

淡附子

一錢

淡乾薑

八分

茯苓

二錢

炒免絲

三錢

胡蘆巴

一錢

此治陽明之陽也。若參入白朮甘草。則兼走太陰矣。

某七脹脹由足入腹。診脈細軟。不能運穀。當治少陰太陰。

陽虛
脾腎

生白朮

厚朴

茯苓

淡附子

醫言指掌圖卷三
淡乾薑

草機

馬三暮食不化。黎明瘕泄乃內傷單脹之症。脾腎之陽積弱。據理當用腎氣丸。

顧脈微而遲。色衰萎黃。鱗爲介屬。鹹寒沉降。凡陽氣不足者。食之損陽。其致病之由。自試一次矣。久利久泄。云無不傷腎。今浮腫漸起。自下是水失火而敗。若非緩下。徒見泄瀉有紅。爲脾胃濕熱必致中滿敗壞。

原註非宜
生茅朮

熟地炭

熟附子

淡乾薑

茯苓

車前

果 脾腎虛寒多瀉。由秋冬不煎。春木已動。勢必尅土。腹

滿小便不利乃腫病之根若不益火生土日吃疲藥焉

能卻病

人參

白朮

附子

生益智

腎陽
虛

免絲子

茯苓

姚四據說情懷不適因嘔怒痰嗽有血視中年形瘦肉消
入八十八漸漸腹脹跗腫下牛漸甚陽氣日奪早服腎氣丸一錢
漸漸用服藥不宣過藥五分散

某陽微陰結腫脹

殷氏行動氣墜於下臥著氣擁於上此跗腫晝甚頭脹夜甚總
是中年陽微最有腹大喘急之事濟生九十服

附子

茲仁

白朮

木防己

澤瀉

細辛

肝胃
不和

朱

陽明胃逆，厥陰來犯。丹溪謂上升之氣自肝而出。清

金開氣亦有制木之功能而痛脹稍緩。議以溫膽加黃

連方。

半夏

茯苓

橘紅

枳實

竹茹

川連

生白芍

某二舌微黃，痕逆，脘胸悉脹，當和肝胃。

桂枝木

乾薑

青皮

吳黃

川棟子

炒半夏

秦

兩年初秋發瘍脈絡氣血不爲流行而腹滿重

則頗安。臍左動氣臥則尤甚。吐冷沫常覺冷氣身麻語塞。肝風曰熾。疎泄失職經以肝病吐涎沫。本侮土位。自多腹脹。丹溪云。自覺者非真冷也。兩次潰瘍之後。剛燥熱藥似難進。商議以宣通肝胃爲治。有年久忌貴乎平淡矣。

雲茯苓去不切病當用和營之藥一錢

三角胡麻搗碎滾水洗十次三錢

厚橘紅一錢

嫩鈎藤錢一錢

熟半夏炒黃一錢半

白旋覆花一錢

瀘清服一杯 四帖

又 接眼大半夏湯

肝鬱犯胃兼濕

熟半夏

炒二錢半
小塊五錢

薑汁

調服四分

人參同前一錢

方。五診脈百至右緩濶左弦勁始而腸鳴泄氣由漸腹滿脹脹納食幾廢便難溺少此皆情懷少曠清氣不轉肝木侵侮胃土腑陽塞塞脹滿日甚據云先因胃脘心下痛症氣鬱顯然非旦晚圖功之象議河間分消法。

杏仁

厚朴

海金沙

陳香櫟

鬱金

藜菔子

木通

雞肫皮

王七食入不運脘中脹脹病由悒鬱經年不愈視色黃形瘦按脈小而濇喜涼飲欲惡熱大便未經通調九竅不和皆胃病矣。

川連

雞肫皮

枳實

廣皮

桔梗

瓜薑鬚

半夏

藜蘆子

鬱金

杏仁

薑汁竹沥丸

楊回肝鬱乘胃爲脹。經年內有形用緩消一法。

生茅朮

雞肫皮

川連

生厚朴

沙薑消

鉗砂裏

椒目湯法丸

畢 濕熱由腑滯及腸中，大便不爽，食入不適。平昔肝木

易動，厥陰不主疏泄，少腹形脹，無非滯氣之壅。久則凝

瘀日踞，小溫中丸三錢十服。

有瘀欲

程子脈右弦，面黃，腹滿，按之濡，應有聲。每大便先腹痛，便

不能乾爽。此胃氣不降陽氣自滯也乎。嗔怒不息肝木橫逆。味泄失司。膄脹之來。皆由于此。議泄肝通腑。置言脅減之義。

杏仁

紫厚朴

猪苓

椒朮

梔榔汁

按服小溫中丸

某七不飢不運。少腹胃脘悉滿。診脈左弦。乃肝木犯胃。二
腑不主流行。濁陰漸久。瀦漫他日。單脹之作。竟有難以
杜患者。速速戒惱怒。安閒自在。誠治斯疾之良圖。

小溫中丸一錢五分。開水送下。

夏 夏四月。脾胃主氣。嗔怒怫鬱。無不動肝。肝木侮土。而

故是乃當
自犯此戒
利也

脾胃受傷鬱久氣不轉舒聚而爲熱乃壯火害氣宜平
減食膩脹矣當作木土之鬱調治桂附助翬導血以
鬱熱益深是速增其病矣

鈎藤 丹皮 黑山梔 川連

紫草朴

萊菔子

廣皮白

荷梗

又

脂勢已緩脈來弦實此濕熱猶未盡去必淡泊食物

清肅胃口以清慘利水之劑服五六日再議

猪苓

澤鴟

通草

海金沙

金銀花

葵蒂皮

黑楂豆皮

又 診脈掌中沉來去不爲流利氣阻濕鬱膠痰內著議



用控涎丹六分緩攻

又服控涎丹。大便通而不爽。診右脈弦實。目窠舌燥。中焦濕熱不行。因久病神倦。不敢過攻。議用丹溪小溫丸。每服三錢。乃泄肝通胃。以緩治其脹。

謝形神勞煩。陽傷肺氣不通。痴瘕陰獨。從厥陰乘犯陽明。胃爲陰濁。家閉腸中。氣窒日甚。年前邪勢頗緩。宣絡可效。今閉銅全見濁陰。若用辛雄剛劑。何以直突重圍。脹滿日增。人力難施矣。

此非大熱
之藥可
當消其滯

川棟子 小回香

猪膽汁

生炮川烏頭 生淡川附子 淡乾薑 淡吳萸

唐氏紫苑

杏仁

通草

鬱金

黑山梔

又三焦不通。脘痺腹脹。二便皆祕。前方用開手太陰丸。
苦辛潤降。小濃得利。兼進小溫中丸。泄肝平胃。賁勢什
減有五。但間日寒藥復來。必是內鬱之氣。陽不條達。
寒戰慄。議用四逆散和解。其小溫中丸仍用。

生白芍

枳實

柴胡

黃芩

半夏

杏仁

竹茹

生薑

張姬腹脹。大便不爽。得煖氣稍快。乃陽氣不主流行。
蓋六腑屬陽。以通爲補。春水地氣來升。土中最畏水乘。
勢猖熾。治當泄木安土。用丹溪小溫中丸。每服二錢。

肝犯胃陽虛

張氏用鎮肝逆理胃虛方法。脈形小弱，吐涎沫甚多，仍不納穀，周身寒凜，四肢微冷，皆胃中無陽，濁上膈，而血爲膜脹。所謂食不得入，是無火也。

人參

吳萸

乾薑

川連

茯苓

附子

木鬱
氣滯
血濁

丁三，眩怒，氣血逆亂，右脇不和，夜食噉，噫，脹，乃肝胃不能治以解鬱，宣通氣血。

鈎藤

丹皮

桑葉

生香附

菝葜

神曲

降香木

炒黑查肉

徐平素肝氣不和，脇朋少腹脹，氣血不調，痰飲漸聚。

火



厥陰陽明同治

桃仁 延胡 踝尾 小茴

半夏 茯苓 橘紅 神曲

馬三脈實火病癥熱在血胸不爽小腹墜能食不渴二便
滌少兩淮苦辛宣肺病未能卻此屬血病用通幽法
桃仁 郁李仁 歸尾 小茴 紅花

。製大黃 杜枝 川棟子

又 曲日氣墜少腹夜臥不覺甚則頭昏胸悶今年五月
初用礞滯經通三焦續進通幽其墜脹仍若議至香流
氣法

香附

南京图书馆版权所有

川棟子

延胡

小茴

黑山梔

青木香

橘核

生香附磨汁法

董

初因下血轉痢繼而大便祕艱自左脇至右腹漸致

瘀積於右腹

腹大堅滿小便自利病在血分久病兩年形瘦氣短不

敢食攻其五積成例議用古禹餘糧丸每日一錢

鄭氏得食腹痛上及心胸下攻少腹甚至筋脈擾於周身

并有瘀積

經絡之間大便欲解不通揚此乃腸胃氣阻故痛隨利

減神保丸一錢

張脈左弦右浮濶始因腹痛胃脹繼則腹大高凸納食

犯脾肝鬱

減少難運二便艱滯不爽此乃有年操持勞慮太甚肝

木拂鬱肺土自困清濁混淆脹勢乃成蓋臟真曰病肺
陽不運考古治脹名家必以通陽爲務若滋陰柔襲激
加桂附疑陰沴濁豈是良法議用局方禹糧丸其水
臟攻其穢濁俟有小效兼進通陽剛補是爲虛症內傷
脹滿治法至於攻瀉劫奪都爲有形而設與無形氣傷
之症不同也局方禹鈞糧丸

脾胃犯

陳姬久鬱傷及脾胃之陽面無華色納粥欲嘔大便滯泄
氣陷則跗腫氣呆則腕閼有中滿之憂用治中法

人參 生益智 煙薑 茯苓

木瓜 炒廣皮

肝脾
不和

邪夾暑

程女脈數惡心脘脹

炒半夏 廣皮

扶荅 麝金

藿香 黃連一分
煎水拌

又 暑傷脾胃則肝木犯土左腹膨泄瀉。

人參 厚朴

廣皮

炒澤瀉

扶荅 木瓜

炙草

炒杏肉

又 人參 炒柴胡

炒白芍

炒黃芩

扶荅 炙草

生薑

大棗

木火
犯土

宋 食入脘脹此屬胃病視色脹形瘦自述飲酒嘔吐而得又述耳鳴內瞶是木火犯中鬱勃病甚議用逍遙減



南京中医药大学图书馆版权所有

白芍合左金方

朱四瘧癰馬刀都是肝膽爲病病入延及脾胃腹滿便瀉
舌黃微渴非溫補可服泄不少以疎之和脾胃以調之
冀其脹勢稍減

吳萸拌川連 生於芍 川桔子 炒山楂
黑山梔 厚朴 南皮 椒目

唐女氣腋三年近日跌仆嘔吐因驚氣火更逆胸臆填塞
脹滿二便皆通自非質滯喜涼飲而起煙癲從病能篇

驟脹屬熱

川連

淡黃芩

半夏

枳實

高醫著百病養

卷三 脣脹

王



用犯
脾胃
陽虛
有濕

乾薑

生白芍

鐵鑄針

願六今年風木加臨太陰陽明不及遂爲膜脹小便不利
兩跗皆腫大便滯滯治在腑陽用分消湯方

生於水

茯苓

澤鴻

猪苓

厚朴

椒目

海金沙湯煎

吳金歲厥陰司天加臨。竇蠶節病腹滿喘促肢腫面浮
寒熱汗出皆木乘土位清陽不得舒展濁氣痞塞僭踞
故泄氣少寬姑擬通腑以泄濁。

生於水

茯苓

椒目

紫厚朴

澤瀉

淡薑渣

中醫藥大學圖書館藏
大英中醫書局

朱九齡勢久坐巾焦不運寒熱小溲不通腹脹滿脹小
而濶全。是肺陽失司與泄木通腑分消法。

四苓加枳目厚朴大腹皮青皮

肝脾
不和
清陽
病結

陳

壯盛年歲形消色奪診脈右小促左小弦動病起上

年秋季腕中卒痛有形梗突病後時遇驚觸衝次食減

不適食入不運停蓄上腕腹形脹滿甚則脇肋脛腹四

肢不緩晝夜漸溫大便旬日始通便後必帶血出清早

未食自接脰上氣海有瘕形甚小按之微痛身動飲水

寂然無躁天氣稍冷爪甲色紫細推病屬用脾氣血不

通則爲鬱遏久則陽微痺結上下不行有若否卦之義

閱醫案或消或補總不見效者未知通陽之用

薤白

桂枝

瓜萸仁

生薑

半夏

茯苓

又
薤白汁

桂枝木

瓜萸實

川棟子皮

半夏

茯苓

歸鬚

桃仁

延胡

薑汁

二汁法丸

梔

脹滿胸腫小溲短濇不利便泄不爽當開太陽爲主。

五苓散加枳目

陽開太行當不瀉小瀉溫潤

所致前法專治脾陽宜乎不應當開太陽爲要

某少腹單脹二便通利稍舒顯是腑陽壅滯濁陰凝結

五苓散加椒目

鄭雨投通裏竅法。痛脹頗減。無如陰陽不分。舌絳頰燥。不欲納穀。想太陽膀胱不開。陽明胃不司閑。法當仍與通陽腑爲要。但五苓桂朮斷不適用。議用甘露飲意。

此方不取五苓散

猪苓

茯苓

澤瀉

寒水石

椒目

炒橘核

程

今年長夏久熱。熱勝陽氣外泄。水穀遲滯。自內起漸漸浮腫。從下及上。至於喘咳。不能臥息。都是濁水凝痰。阻遏肺氣下降之司。但小溲不利。太陽氣亦不通調。此雖陽虛症。若腎氣湯中萸地之酸膩力難下行矣。

五味與乾
薑同用止

喉之聖藥
但于熱症
有礙

茯苓

桂枝木

杏仁

生白芍

乾薑

五味

生牡蠣

澤瀉

馬

五初起胸痺嘔吐入夏跗瞼少腹悉腫食穀不運溲短

不利此陽氣式微水穀之濕內蘊致升降之機失司

開太陽姑走濕邪

猪苓三錢

桂枝木八分

茯苓皮三錢

澤瀉

防已一錢

厚朴一錢

四帖

小兒另有
治法

邱歲六齡碑年夏至濕熱外薄所食水穀之氣蒸爲濕熱

阻遏氣機脾不轉運水道不通腹笥滿脹幼科但知消

導不曉通腑泄濕致脾氣大困泄瀉不分陰陽參苓之

褚僅救消滌之害不能卻除濕滯故雖受無益於滿活
根都在中宮泄肝以安胃分利以通腑必得小溲頻利
冀有中竅之機當用未藥以漸消之

猪苓 澤瀉 海金沙 通草

椒目

普濟

濕壅
上焦
肺氣
不降

吳平昔濕痰阻氣爲喘茲因過食停滯陰臟之陽不通。
陽腑之氣不通二便不爽跗腫腹滿診脈沉弦猶是水
寒痰滯阻遏氣分上下皆不通謂當從三焦分治頃見
案頭一方用免絲子升少陰吳茱萸泄厥陰不知作何
解釋不敢附和仍用河間分消定議

大杏仁 萊菔子 猪苓

澤瀉

葛麻子

厚朴 桑白皮 廣皮 細木通

又三焦分消泄，肝通腑，一便不爽。如昔診脈浮小帶，從聞聲呼息不利，是氣分在上結阻，以致中下不通，喘張，要旨開鬼門以取汗，潔淨腑以利水，無非宣通表裏務在治病源頭。據脈症參詳，急急開上爲法，合金匱風水反登義矣。

麻黃 杏仁 石膏 茯草 芎仁

朱初因面腫邪干陽，位氣壅不通，二便皆少，桂附不應，卽與導滯，滯屬有質，濕動無形，人肺爲喘，乘脾爲脹，六腑開合皆廢，使不通，痰溺短渾濁時或點滴，視其舌絳

喘張此方
甚合足見
心思靈巧
如是驚治
法真可編
入醫案其
重複套大
牛可刪

口渴腑病。背脹。臟病。腹滿。更兼倚劄。左右睡眼。隨著爲甚。其濕熱布散。三焦明眼難以決勝矣。經云從上者治其上。又云從上之下。而甚於下者。必先治其下。而後治其上。此症逆亂紛更。全無頭緒。皆不辨有形無形之誤姑以清肅上焦爲先。

飛滑石一錢半

大杏仁去皮尖十粒

生苡仁二錢

白通草一錢

鮮枇杷葉刷淨毛去筋手內揉爛二錢

漢芩皮一錢

淡豆豉一錢半

黑山梔殼錢

急火煎五分服

此手太陰肺經藥也。肺氣窒塞。當降不降。杏仁微若。則能降。滑石甘涼。滲濕解熱。以仁通草。淡而透氣。分

枇杷葉辛涼能開肺氣疾。荅用皮謂諸皮皆涼，施以宣其陳腐鬱結。凡此氣味俱薄爲上焦藥，微齊之才輕可去實之義。

某暑暉氣急，小溲濶少。此外邪壅肺氣，分不通治。當從風水皮水宣其經隧，以能食能寢爲佳。勿得誅伐，無過之地。

前胡

密炙麻黃

半夏子

薑皮

紫苑

杏仁

茯苓皮

廣皮

王

髀尻微腫，小腿下臙腫甚。乃腑陽不行，病甚於暮。宜

辛香通其經腑之鬱。

下焦
濕經

生於水

炮川烏

止細辛

茯苓

漢防已

川濁活

又中滿用餘糧丸獲效得緩下泄濁之力。腹脹已去而體冗足跗肌肉腫浮。夫臟寒生滿病。燉水腑之陽。培火生上是法究竟。陽未全復。四末流行未布。前議幽香通其下焦經脈。果得腫減。議用加味活絡丹。

炮川烏

乾地龍 乳香

沒藥

北細辛

桂枝木

用油松節三兩。酒水各半煎汁。法丸

汗 腫自下起。脹及心胸。遍身肌膚赤癩。溺無便滑。濕熱蓄水。橫清經隧。氣機閉塞。呻吟喘急。濕本陰邪。下焦先

壅塞
濕熱
經隧

受醫用桂附芪朮邪蘊化熱充斥三焦以致日加凶危也此危病也無治法

川通草一錢海金沙五錢黃柏皮半錢木猪苓二錢

生赤豆皮半錢真北細辛一分

又煎法腫消三四仍以分消

川白通草 猪苓 海金沙 生赤豆皮

葛蔥子 袋苔皮 晚蠶沙

又間日寒戰發熱渴飲此爲瘧乃病上加病飲水結聚

以下痛脹不敢用涌吐之法暫與開肺氣壅遏一法

大杏仁 密炒麻黃 石膏 此方無謂



南京中医药大学图书馆版权所有

又 湿邪畱飲發紅癰胸聚濁痰消渴未已用木防已

木防已一錢

石膏三錢

杏仁三錢

苡仁二錢

飛滑石半錢

寒水石半錢

通草前湯代水

陳

進神芎導水丸二日所下皆粘膩黃濁形色全前議

腑氣窒塞水濕粘滯濁攻犯肺爲痰嗽水清脈隧爲浮

贍大凡經脈六腑之病總以宣通爲是內經云六腑以

通爲補今醫不分臟腑經絡必曰參芪是補豈爲明理

然肢節足腑之傷出路無由必鍼刺以決其流此內外

冀可皆安戌已尤三錢用二日後再進前藥一服

醉七、腹滿下至少腹三陽都已受傷而周身疥瘡數年不

此老有時與此相昔不知何故腹瀉等病必須有出路古人兼以針刺爲治但其道甚獨不知其理而卻針之反有大害

斷脈絡中必有濕熱就腹痛泄鴻腑陽不通不獨偏熱

偏寒之治常用西苓散

此方在何奇義人不能寫之

當用瘡

治法

猪苓三錢 荚蒾三錢 澤瀉一錢 生於朮

錢

椒目五分

濕熱
胎氣

倪姪

濕熱脚氣上攻心胸脘中滿脹脰逆乃濕上甚為熱

化與苦辛先平在上之滿脹用瀉心法

川連

黃芩

枳實

半夏

薑汁

杏仁

再加桔梗皆尤妙

濕熱
胎鹽

陽

囊腫腹脹此屬瘡蠶

茯苓皮 海金沙

此非治腹藥治法當兼通外朴加入連翹赤芍銀花等藥則得之矣

白通草 大腹皮

厚朴

廣皮

猪芩

澤瀉

木火人絡

某症性喚氣有餘便是火。肝膽中木火入絡成形爲脹便

溺皆赤喉痛聲嘶痰血肝病過膈犯肺久延爲單腹脹

難治小溫中九三錢

氣逆八絲

吳五氣逆脾脹汨汨有聲已屬絡病難除病根

老蘇梗

生香附

厚朴

白蔻仁

土瓜梗

桔梗

枳殼

黑山梔

陽虛獨陰
冤澗

汪脈右濶左弱而黃瘦露筋乃積勞憂思傷陽獨陰起於少腹漸至盤踞中宮甚則妨食嘔吐皆單鼓脹之象大著調治最難欲驅陰獨急通陽。

乾薑

附子

猪苓

澤瀉

椒目



又通太陽之裏驅其濁陰已得脹減囁緩知身中真陽向爲羣藥大傷議以護陽兼以泄濁法

人參 塊扶苓 生乾薑 淡附子 澤

又陰濁盤踞中土清陽蒙閉腹滿腫脹氣逆腹痛皆陽氣不得宣通濁陰不能下走擬進白通法

此急長之方緩劑不用此症不屬不治無用善也

生乾薑

生炮附子

仲猪膽汁

黃三停帶單脹並不渴飲置則便利不爽夜則小溲略通此由氣分鬱痺致中焦不運先用大針砂丸每服一錢五分。煖其水臟以濁

某向有宿痞夏至節一陰來復連欠夢遺遂腹形堅大

二便或通或閉是時右膝癰腫潰瘍未必非濕熱門
經絡所致診脈左小弱右緩大面色青減冒煩明
食必腹脹愈加四肢惡冷熱自裏升甚則動血牙宣
是身中氣血交絡固非積聚停水之脹者古人於脈定
以分清氣血爲主止痛務在宣通要知攻下皆爲通腑
溫補乃護陽以宣通今者雖腹脹當以脾胃爲病數
太陰不運陽明愈鈍議以緩攻一法此亦敗症不治

川桂枝一

錢

熟大黃一

錢

生白芍一

錢

厚朴一

錢

枳實一

錢

淡生乾薑一

錢

三帖

又 診脈細小右微促畏寒甚右脇中氣觸人小腹著臥

卽有形塞者識用局方禹餘糧丸煖水臟以通陽氣
早晚各服一錢流水送入服

又 脈入尺弦勝於數元海陽虛是病之本肝失疏泄以致膜脹是病之標當朝用玉靈丹午用疎肝散脾利水分消太陽太陰之邪

紫草朴炒一錢半 細沙仁炒研生於朮一錢

猪苓

一錢

茯苓

塊三錢

瀉瀉

一錢

又 脈弦數手足畏冷心中兀兀中氣已虛且服小鍼砂丸每服八十粒開水送二服以後藥壓之

生薑朮

雲茯苓

廣皮

煎湯一小杯後服

又 脈如濶，凡陽氣動則遺。右脇汨汨有聲，墜入小腹可知。腫脹非陽道不利，是陰道實水穀之濕熱不化也。

用牡蠣澤瀉散

左牡蠣四錢澤瀉一錢

花粉一錢半

川桂枝木通陽五分

茯苓二錢

紫厚朴錢

午服

又 脈數實惡水，午後手足畏冷，陽明中虛水氣聚而爲飲也。以杏桂朮甘湯劫飲，牡蠣澤瀉散止遺逐水。

照前方去花粉加生於朮二錢

又 手足畏冷，不喜飲水。右脇汨汨有聲，下嗌不腹脈雖

數，而右太空弦信是陽明中虛。當用人參熟附生薑溫

經補虛之法但因欲回府調理數目方中未便加減且用前方調治太陽太陰

生於丸

左牡蠣

生四澤瀉

炒一錢

苓

桑葉

生益智

桂枝木

分四錢

炒厚朴

苓

桑葉

朝服小溫中丸五十粒

開水送仍用三味煎湯

壓之

一日後食遠服

楊柳子味過辛酸脾冒氣傷

結聚食入則脹滿

曾服礞石大

黃丸滯濁既下不愈病不在平腸中

前賢治脹治滿必

日分消攻有形不效自屬氣聚爲痕疎胃宜清調脾當暖此宗前賢立法

外三焦膈
膿俱任陽
膜之間

胃氣虛
不和

生芻朮 廣皮

丁香皮 黃柏

草豆蔻

川黃連

厚朴

茯苓

澤瀉

水法丸

帳滿之爲
漏漏卽使正虛經屬邪

實古人慎用補法又

脹必有濕
濕則有壅

內經所以

指爲熱症

今多用溫德之藥內

雖有通利

之品而臣

不勝主貽

悞必多細

開諸索犯

愈者少而

不治者多

腫脹證大約腫木乎水脹由乎氣腫分陽水陰水其
有因風。因濕。因氣。因熱外來者爲有餘。爲陽水。因
於大病後因脾肺虛弱不能通調水道。因心火耗金。
肺不能生腎水以致小便不利。因腎經陰虛火燥
肺金而溺少。悞用行氣分利之劑漸至膀胱瘀盛。小
水短赤。釀成腫證。因發者爲不足。卽爲陰水。若脹病
之因更多所脹之位各異。或因濕。因鬱。因寒。因熱。因
氣。因血。因痰。因積。因蟲皆可爲脹。或在臟。在腑。在脈。
絡。在皮膚。在身之上下表裏皆能作脹。更或始因於

也
張滿必有
有形之物
宜緩緩下
之

臨證指掌醫案 卷三
寒久變爲熱哉。或始爲熱，中未傳寒，中且也。脹而兼
腫，而腫則必兼脹，亦有腫脹同時並至者。其病如
幻，不一其病機之參伍錯綜，更難敘述。設案中諸症，無
有濕在下者，用分利；有濕在土中下者，用分消；有濕
而著裏者，用五苓散；通達膀胱，有濕鬱熱，兼者，用半
夏瀉心法；苦辛通降，有濕熱氣鬱積者，用雞金散；加
減消利並行，有氣血鬱積，夾濕熱之邪，久畱而不散
者，用小溫中丸；清理相火，健運中州，有濕熱與水寒
之氣交橫，氣喘溺少，通身腫脹者，用禹餘糧丸；崇土
制水，緩下泄濁，有寒濕在乎氣分，則用萬附有寒濕

入於血分則用桂附有濕上甚爲熱則用麻杏石膏等味清肅上焦之氣有濕下著爲涼則用加味厚瀉等劑。宣通下焦之鬱有藉乎薤白瓜蔞者滑潤氣機之痺結於腹脇也有藉乎藜黃歸尾者搜逐血肉之疑滯於經隧也有藉乎玉壺桂延神保神者視其或輕或重之痰飲水積而驅之也此皆未損夫臟氣而第在腑之上下膜之表裏者也若有胃陽虛者參苓必進脾陽衰者尤附必投更有傷及乎腎者則又需加減八味濟生等丸矣其他如養陽明之大半夏湯疎厥陰之逍遙散蓋由證之牽連而及是又案中