


66
c
10

5

R

DE BONONIENSI
SCIENTIARUM
ET
ARTIUM
INSTITUTO ATQUE ACADEMIA
COMMENTARII.

TOMI SECUNDI PARS TERTIA.



BONONIAE

Ex Typographia Laelii a Vulpe. MDCCXLVII.
SUPERIORUM PERMISSU.

LONDON MEDICAL SOCIETY

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

BENEDICTO XIII

PONTIFICI MAXIMO

BONONIENSIS SCIENTIARUM INSTITUTI

PATRI

AMANTISSIMO.

v

ACADEMICORUM QUORUMDAM OPUSCULA

V A R I A.

P R A E F A T I O.

HAnc enimvero partem tertiam, quæ eadem tomi secundi commentariorum bononiensis Instituti atque Academiæ ultima est, cum publice typis mandarem, plane intellexi, in magnis præclarisque rebus audendum semper esse aliquid. Nam profecto nunquam partis huius editionem suscepissem, neque in hanc quasi novam provinciam ingredi ausus essem, nisi paullo plus sperassem, quam ratio ipsa postularet. Dicam, quod verum est, & morem scribendi sequar meum: in quo si ab aliquibus reprehendor, quod clarissimæ Academiæ, mihi que coniunctissimæ, res scribens, eius non modo laudes, sed etiam incommoda interdum exponam, & quasdam quasi maculas, quas alii obtegendas esse putant, aperiam; non tam horum obiurgationes pertimesco, quam illis probari cupio, qui veritatem appetentes in omnibus, huiusmodi præsertim narrationes sincere scribi volunt. Igitur cum tertii huius voluminis editionem primum aggressus sum, vix credi potest, quanta opusculorum, quibus illud componere possem, inopia laborarem; vix ut tantum suppeteret, quantum satis esset ad paucas paginas conficiendas; non quod Academia non rebus abundaret ex omni genere quamplurimis (quod illi facile intelligent, qui huius libri
vel

vel titulos tantum legerint); sed aliæ erant ab aliis inter multas dispersasque colligendæ; latine vertendæ nonnullæ; scribendæ pleræque; ornandæ, expoliendæ, perficiendæ prope omnes: quæ si ut fierent, exspectare voluissem, verendum valde erat, ne exspectandi finis esset nullus. Cum eo igitur adducta res esset, ut spem haberet iam prope nullam; fortunæ dare aliquid volui; & editionem maiori cum audacia, quam res ipsa ferret, suscepi. Quod cum fecissem, & paucula, quæ erant in manibus, prælo commissem, tantum repente Academicorum studium in colligendis, comparandisque rebus suis exstitit, tanta diligentia, tanta alacritas, ut quem antea opusculorum paucitas pæne ab editionis consilio abduxerat, eundem me postea prope copia deteruerit. Etenim cum animadverterent omnes in eo communem gloriam agi, minimeque decere rem tanta cum exspectatione susceptam subito abrumpi, ad suas quisque lucubrationes statim rediit, & quæ vix antea obscure & cursim in adversariis notaverat, perficere confestim cœpit, & nitidiori oratione distinguere. Quod studium in mathematicis præcipue rebus eluxit. Itaque & geometria, & eius quasi comites atque alumna, trigonometria, astronomia, mechanica, algebra commentationes statim quamplurimas, cum ex aliis præclarissimis italiæ civitatibus, tum ex hac ipsa, quæ litterarum parens semper est habita, depromptas, festinanter coegerunt, & quasi certatim ad me contulerunt. Quid plura? Me ipsum quoque, quod eas scilicet adolescens amaveram, ad dimissa iam dudum studia revocarunt. Quapropter si quid adhuc possem in eo genere, conatus sum. Quod cum mihi pro ingenii mei mediocritate successisset, sermonesque in academia nostros nonnulli gravissimi viri, mihi que amicissimi, probavissent, non dubitavi, mathematicas cogitationes meas, qualescumque essent, in hanc tertiam tomi partem conferre, ut qui alios hortationibus excitassem, exemplo etiam, si possem, commoverem. Ea re factum est, ut mathematicæ disciplinæ, quibus in prioribus duabus partibus locus vix ullus relictus fuerat, in hanc tertiam involaverint, & pæne totam compleverint.

Quod mecum ipse considerans interdum vereor, ne qui falsum fuisse me putent, quod in prima huius tomi parte dixerim, mathematicas disciplinas a nostris minus excoli;
quam.

quamquam si multos, hoc ipsum dicendo, incitavimus, non me sane falsum visum esse pœnitebit. Ceterum quod dixi, (non enim diffiteor,) geometriæ studium ab omnibus in hac urbe avidissime arripi, retineri a paucissimis, in quo magis fortunæ culpa est, quam voluntatis; ex eo intelligi volo, hos quidem, qui mathematicas res tam multas tam subito in unum volumen contulerint, occupationibus plerisque studiisque aliis distineri, nec ea, de quibus agunt, profiteri. Quod si credatur, non modo non moleste feram, sed etiam gaudebo, me hoc bononiensis academix incommodum, ut alia permulta, patefecisse. Idque mehercle si omnes facerent, quicumque academiarum suarum studia, rationesque describunt, commodiores profecto historias ederent, & communi bono magis consulere; nam vitia & laudes simul referentes, ea proponerent, quorum exemplo academix aliæ condidi, & regi, conservarique facile possent. Sed cum illi suum maxime esse putent, nullum academiarum illarum, de quibus scribunt, vitium prodere; omnes autem, qui illas vel instituerint, vel auxerint, vel ornaverint, tamquam perfectissimos quosdam, & quasi de cælo lapsos proponant; exempla afferunt, quæ excellentissimi nescio qui & perfectissimi imitari se posse sperent; nobis, qui divini non sumus, spem nullam relinquunt. Ego autem sic semper existimavi, optimas quasque res ex unoquoque genere nobis ante oculos a poetis poni; historicorum autem esse ostendere, quo modo ad perfectissimas illas formas homines accedant non perfectissimi. Hæc dixi, ut si qui forte mirantur, me paullo liberius de ea academia, quacum mihi coniunctio tanta sit, scripsisse; intelligant tandem, nos non illam extollere, atque ornare, sed describere, atque exponere voluisse; neque de academicis tantum bene mereri, sed veritati etiam dare aliquid, & aliis litteratorum hominum cœtibus, posteritati que consulere; quarum rerum si modo aliquid affecuti sumus, nunquam profecto putabimus, nostram non fuisse commendandam audaciam. Sed iam de nostra scribendi ratione satis multa.

Quamvis vero in rebus, quas ederem, colligendis nullum mihi certum tempus, quod alibi dixi, præfiniverim; sed lucubrationes omnes, quæ quidem editione dignæ existimarentur, cuiusvis anni essent, admiserim; fecit tamen **BENEDICTI XIII. P.O.M.** summa, ac prope divina libe-

liberalitas, ut e dignitate Academix sit dispertiri tempora, & academiam unam in duas quasi distinguere. Etenim cum Pontifex sapientissimus, nobis adhuc hunc tomum edentibus, novum academicorum ordinem condiderit, quos Benedictinos appellari voluit, quibusque annua præmia constituit, dici non potest, in quam spem Academia se erexerit, & quanto litterarum amore, & cupiditate laudis subito exarferit. Nefas sit autem, conventus illos veteres, privatos plerumque & obscuros, cum his splendidissimis, & ut ita dicam, pontificiis confundere. Nos ergo hunc tomum contextentes non nisi illa recepimus, quæ ante Benedictinorum ordinem conditum, si non scripta, ac recitata, excogitata certe fuerant, & domesticis tractata sermonibus; nisi si qua infra prodierint, quæ essent rebus iam editis, propter ipsum argumentorum nexum, statim iungenda. Reliqua in tomum alium reservavimus. Quem tomum si nos quidem confecturi sumus (nihil enim in hac tam tenui valetudine sperare audemus), curabimus quidem certe, ut Benedictinorum dignitati diligentia nostra respondeat; sin autem alii (quod optabilius est) in hanc provinciam successerint, præclare cum Academia actum esse existimabimus, si quo tempore ad tanti nominis gloriam emerferit, eodem res eius scribi & elegantius cœperint, & ornatius.

Nunc, quando hunc, postremum fortasse, laboris nostri fructum, monumentumque carissimæ Academix relinquimus, his, qui nobis succedent, auctores sumus, ut si quando Academicos minime ad editiones paratos habeant, ne desperent. Instent, urgeant, laborent; opus aggrediantur. Nam si nobis idpsum facientibus, quamvis auctoritate essemus nulla, Academici, nullis adhuc honoribus aucti, nullis præmiis incitati, non defuerunt; quanto minus aliis deerunt, cum & res suas maiori cum dignitate scribi ab his posse sentient, & ipsi Benedictinos se esse meminerint?

I

ACADEMICORUM QUORUMDAM
OPUSCULA

V A R I A.

EUSTACHII MANFREDII

De Mercurii ac Solis congressu in astronomica Specula bononiensis scientiarum Instituti observato die IX novembris MDCCXXIII.

INitium nobis cœlestium observationum, quas e Specula astronomica, in ædibus bononiensis scientiarum Instituti publico munere excitata, nec dum absoluta, peragendas suscepimus, insigne erit, rarumque spectaculum, quod nuper mortalibus præbuit mercurii stella, quum inter solem, terramque decurrens, solis orbem peragrasset visa est. Habet quidem semper hoc phænomeni genus magnam in eius planetæ motibus investigandis utilitatem: nunc vero habuit & iucunditatem quandam, quod antehac a viris celeberrimis haud semel ætate nostra prænunciatum, ac frustra expectatum, annorum denique sex, & viginti intervallo reversum conspexerimus. Postremus namque mercurii cum sole congressus, quem quidem europæis animadversum accepimus, in diem tertiam novembris anni 1697 incidit. Ex ea die plerique cœlestium motuum canones congressus alios duos, intra annos tresdecim, Europæ, ex parte saltem, visibiles pollicebantur: alterum anno 1707 die 5 maii, alterum die 6 novembris 1710; nonnulli tamen erant, qui utrumque in nocturnas horas coniicerent, atque his eventus respondit, utroque enim hoc tempore mercurium ab obser-

T. II. P. III.

A

vato.

vatoribus peritissimis, e diversis Europæ regionibus in sole quæsitum, nec inventum fuisse constat. Denique decennio post, die videlicet 8 maii 1720, qua die, omnium pœnerationibus consentientibus, denuo futurum erat, ut solis marginem, saltem excurrendo perstringeret, computos omnes tertio fefellit, quippe in austrum (ut coniecere licet) tantisper deflexus, solis occursum declinavit.

Ergo cum iterum spes esset, ut die 9 novembris labentis anni 1723 sub vesperam aliquo temporis spatio intra solem cerneretur, ad observationem, quantum liceret, exacte instituendam nos comparavimus; studium mihi atque operam adiungentibus suam, una cum Gabriele fratre, doctissimis, atque ornatissimis huiusce scientiarum academix sodalibus, Iacobo Parma philosophix, Io: Baptista Banderio utriusque Iuris, doctoribus, Iosepho Bolsio Marchesio Parmensi, Dominico Weber Helveto, quibuscum altero ab hinc anno iucundissima mihi horum studiorum intercedit consuetudo.

Primum horologia duo oscillatoria diebus aliquot ad meridiem exegimus, meridiei tempora accuratissime indagantes ex æqualibus, ante, ac post meridiem captatis solis altitudinibus, non neglecta correctione, quam solaris motus a circulis parallelis deviatio postulat. Eadem horologia ad stellarum quoque conversiones expendimus. Totis sex diebus haud maiorem in eorum motu inæqualitatem, quam unius, vel alterius secundi scrupuli, invenimus.

Ad hæc deliberandum nobis fuit de methodo, qua mercurii observatio tutissime peragi posset. Duo præsertim erant, quæ curam nostram exposcerent. Primum ut ingressum planetæ in solem, si fieri posset, distincte cerneremus; deinde ut positiones eiusdem aliquot accurate notarem, e quibus positionibus apparens semita, quam ipse in sole percurreret, iusta ad eclipticam inclinatione describi posset. De planetæ ingressu, satius duximus, si directe solem ipsum per telescopia, oculis vitro opacato munitis, quam si solis speciem, charta exceptam, intueremur. In eum usum telescopia duo, alterum Campani, optimæ notæ, pedes undecim, alterum pedes octo bononienses longum, selegimus. Longiores tubos experiri loci conditio prohibebat, namque observatio intra unius, vel alterius conclavis angustias perficienda erat,
quod

quod superior, eaque spatiosior, Observatorii area lignorum struibus, atque impedimentis aliis (ut inter ædificandum) obsepta esset.

Posterius illud quod spectat, ea observandi ratio potissima videbatur, qua solis, & planetæ appulsibus ad verticale, atque ad horizontale quadrantis filum ex horologio notatis, res omnis perficitur, ut ab astronomis parisiensibus factum in ea observatione, quam anno 1697 habitam memoravimus; hoc pacto omnis illa aberratio præcaveri poterat, quæ a refractionibus existit, quum sol non multum ab horizonte attollitur. Atqui suspicio erat, si quadrantis telescopio, pedes 3, haud amplius, longo id tentarem, an exiguum planetæ corpusculum visu consequi valeremus, præsertim ubi nubecula, aut crassior nebula intercederet. Proximum huic erat, si solis speciem, per longius telescopium trajectam, circulo in tabella descripto exciperemus; simulque verticalem eius circuli diametrum perpendiculo, simul planetæ in eo circulo imaginem stylo designarem, quod a Gassendo, Hevelio, aliisque, in hisce ipsis mercurii conjunctionibus observandis, factum accepimus. Verum illud cogitavimus, futurum ut sole in occasum vergente, speciei figura, refractionum interventu, minime rotunda appareret, nec deinceps circulo in tabella exarato congrueret.

Quod unum supererat, ad observationem per horarios, ac parallelos circulos instituendam animum adiecimus, ea ratione, quæ multis ætate nostra observatoribus celeberrimis usu est recepta; non quod arbitraremur rationem hanc ab refractionum erroribus immunem esse, sed quod eorum errorum quantitates postmodum æstimari, ac corrigi posse reputarem. Igitur telescopio alteri, quod ad manus erat, pedum 8, simplex reticulum aptavimus, cuius reticuli dum unum e filamentis illis, quæ paribus intervallis distita sunt, solis limbus pertraderet, filum aliud, priora normaliter interfecans, horarii circuli, ipsa vero æquidistantia fila parallelorum circulorum loco essent. Reticuli genus aliud, ab summo astronomo Cassino excogitatum, quo filis quatuor, semirectos angulos continentibus negotium hocce facillime expeditur, idcirco non prætulimus, quod longiusculo tubo, quo uti decreveramus, aspectus tantum non pateat, quantum ad solem totum, aut ad maximam eius partem visu

comprehendendam requiritur, quum alter eius limbus in filo parallelo statuitur.

Die ipsa 9 novembris, qua mercurii transitus imminabat, summo mane cælum post diuturnam serenitatem nebula involvi, mox crassis nubibus obduci, vix ut inter harum hiatus unam vel alteram solis altitudinem, ad explorandum horologii statum, notare licuerit. Paulo a meridie, cum de visendo mercurio actum putaremus, nubibus paulatim rarefcentibus, altitudines, antemeridianis respondentes, captavimus. Brevi quod supererat nubium, leni perflante vento ita difiectum, dissipatumque est, ut deinceps ad solis occasum purissimo cælo usi fuerimus. Ex hora pomeridiana 1. 50 intentis telescopiis, alter alteri succedentes, solem prosequi non cessavimus, quousque ad orientalem eius orbis marginem apparuit mercurius. Aderant nobis observantibus complures, qui spectandi gratia ex universa civitate convenerant, Viri docti, ac prænobiles; in quibus duo ex amplissimo Senatorio Magistratu, qui scientiarum Instituti præfecturam gerit, Franciscus Maria Comes Signius, Alexander Marchio Duliolus Marsilius; aderat, & ipse Instituti huiusce scientiarum suavor, ac promotor beneficentissimus Aloysius Ferdinandus Comes Marsilius; cui ante annos 26, Viennæ cum esset, consimilem inibi observationem habere contigerat.

Sed jam phases singulas a nobis observatas ordine subiiciemus; quarum quæ ad definiendas planetæ in sole positiones pertinent, romanis adscriptis numeris notavimus compendii gratia, ut cum easdem deinceps memorari usus fuerit, iisdem numeris singulas distinguamus.

Observationum series.

Tempora & Meridie
diei 9 Novembris.

h. ' ' "

3 26 22 Nunc primum ortivus solis margo quasi foveola quadam incisus mercurium ingredientem prodidit, telescopio pedum undecim, atque ex eius foveolæ figura apparuit necdum dimidiam planetæ diametrum solem ingressam. Eodem pœne tempore detectus est mercurius telescopio pedum octo.

3 27 45 Totum mercurii corpusculum foli immersum erat, eiusque limbum interius tangebatur, telescopio pedum undecim. Hæc phasis paullo serius accidisse visa est, quam expectabatur, quasi planeta inter ingrediendum oblongus fieri, aut appendiculam post se trahere videretur; nescio an ex optica aliqua causa, nam postmodum plane rotundus apparebat.

I) 3 33 26 Limbus præced. solis ad filum horar. reticuli.
3 35 38 Mercurius ad idem filum.
3 35 41 Limbus sequens solis ad idem filum.

Solis diameter, quæ iuxta horarium protendebatur, intervalla $21\frac{1}{3}$ reticuli occupabat; eorundem intervallorum $11\frac{1}{3}$ intererant inter parallelos mercurii, & limbi borealis, qui limbus in hac, & sequentibus observationibus, unum e filis reticuli æquidistantibus percurrerebat.

Quoniam hoc tempore refractiones nondum rotundam solis figuram ad sensum immutare poterant, solis vero diameter, quæ ex tabulis astronomicis probatissimis erat min. 32. 34, intervallis $21\frac{1}{3}$ reticuli respondebat, scire licet inter borealem limbum solis, ac mercurium intercapedinem (quæ observata est intervallorum $11\frac{1}{3}$) fuisse min. 17. 25.

Pari ratione cum a transitu præcedentis ad transitum sequentis limbi solis per horarium

Cir-

h. ' ''

circulum min. 2. 15 temporis effluxerint, a mercurio autem ad limbum sequentem sec. 3, palam est, ex ea, quam diximus, solaris diametri mensura, mercurium a sequenti, sive orientali solis limbo secundis circuli maximi 43 distitisse. Eadem ratione in sequentibus observationibus declinationes mercurii a boreali, atque elongationes ab orientali margine supputatas, & ad scrupula maximi circuli redactas consignavimus.

II	}	3	43	57	Limbus præcedens solis ad horarium.
			46	5	Mercurius ad horarium.
			46	12	Limbus sequens solis ad horarium.
					Declinatio mercurii a boreali solis limbo, ex intervallorum observatione elicita, min. 16 52. Elongatio eius a limbo orientali, ex temporibus adnotatis min. 1. 41. Accurata observatio.
III	}	3	48	7	Mercurius ad horarium.
			48	15½	Limbus sequens solis ad horarium.
					Declinatio mercurii a limbo boreali min. 16 48. Eiusdem elongatio a limbo orientali min. 2. 9.
					Per idem tempus mercurii magnitudinem iterum, ac sæpius æstimantes intervalli unius partem nonam in diametro exæquare iudicavimus. Erat ergo planetæ diameter sec. 9 maximi circuli.
	}	3	49	50	Mercurius ad horarium.
			50	0	Limbus sequens solis ad horarium.
					Elongatio igitur mercurii a limbo orientali min. 2. 25. Declinationem non notavimus.
IV	}	3	52	47	Mercurius ad horarium.
			52	57½	Limbus sequens solis.
					Declinatio a limbo boreali min. 16. 39. Elongatio a limbo orientali min. 2. 32.
	}	3	58	21	Mercurius.
			58	34	Limbus sequens solis.
					Elongatio a limbo orientali min. 3. 8.

Inter

h. . "

Inter hæc mercurii figura tam eo telescopio, cui reticulum inerat, quam alio pedum octo, curiosius inspecta nonnullis minime rotunda, at ovalis æstimabatur, longiori eius diametro ita posita, ut cum horario circulo angulum semirectum paullo amplius, a borea in ortum efficeret. Ad hæc planetam quadam veluti nubecula, quemadmodum solares maculæ solent, circumseptum se vidisse quidam arbitrati sunt.

V	}	4	0 56	Mercurius ad horarium.
			1 9	Limbus sequens solis ad horarium.
				Declinatio a limbo boreali min. 15. 49. Elongatio a limbo orientali min. 3. 8.
VI	}	4	5 3	Mercurius.
			5 17	Limbus sequens solis.
				Declinatio a limbo boreali min. 15. 45. Elongatio ab orientali min. 3. 23.
VII	}	4	10 55 $\frac{1}{2}$	Mercurius.
			11 13	Limbus sequens solis.
				A limbo boreali min. 15. 40 ab orientali min. 4. 13.
	}	4	13 21	Mercurius.
			13 39	Limbus sequens.
				Elongatio igitur a limbo orientali m. 4. 21.
VIII	}	4	14 56 $\frac{1}{2}$	Mercurius.
			15 16	Limbus sequens solis.
				Declinatio a limbo boreali min. 14. 51. Elongatio ab orientali min. 4. 42.
	}	4	17 33	Mercurius ad horarium.
			17 53	Limbus sequens solis.
				Elongatio a limbo orientali min. 4. 49.
IX	}	4	29 12	Mercurius ad horarium.
			29 36	Limbus sequens solis.
				Declinatio a limbo boreali min. 14. 35. Elongatio ab orientali min. 5. 48.
Post hæc iterum telescopio pedum undecim solem inspicientes ad occasum persecuti sumus. In eo mercurium perpetuo rotundum,				
etsi				

etsi inter horizontales vapores fluctuantem, neque ulla involutum nubecula vidimus.

Haecenus observationes nostræ; quas qui inter se se contulerit haud difficulter agnoscat declinationum mutationes temporum incrementis minime accurate respondere. Aliqua etiam, licet minora, dissidia in elongationibus a limbo ortivo reperiet. Discrimina hæc partim vagis, ac minime constantibus refractionum variationibus (atque hoc præsertim in postremis phasibus) partim tamen observationum ipsarum exiguis erroribus tribuenda ultro agnoscimus. Perdifficile enim erat singulis vicibus reticulum ita componere, ut fila positum acciperent solis itineri exquisitè parallelum, quemadmodum hæc methodus postulat; ac multa impediebant, quo minus machina parallactica uteremur, cuius subsidio necessitas illa effugi solet. Itaque nil mirum in aliquam e mensuris nostris quiddam vitii irrepsisse. Quamquam in illis tanta denique non apparet inæqualitas, ut ad dimidium minuti unius excrescat, neque difficile erat id qualecumque erroris corrigere, nisi candoris nostri esse arbitraremur observationum numeros ita tradere, quemadmodum inter observandum descripti extant.

Quæ ratio sit huiusmodi observationum a refractionibus corrigendarum.

Nunc ergo dispiciendum est quibus erroribus, propter refractionum interventum, obnoxia sit hæc observandi methodus, quærendumque quatenus phasés singulas a nobis observatas ab eiusmodi erroribus purgare, ac corrigere liceat. Hoc ni fiat, in describenda planetæ semita, atque in iis omnibus, quæ inde consequi possunt, investigandis, frustra erimus. Cum autem de huiusmodi aberrationibus loquor, non eas accipi volo, quas paullo ante memoravi, ex inæquali aeris densitate, sive ex densitatis inconstantia inter observandum fortasse subortas; harum enim corrigendarum ratio nulla esse potest; sed eam deviationem specto, qua fieri necesse est, ut si vel maxime uniformis, & constans sit aeris status, tamen quilibet planetæ positus per horarios, ac parallelos circulos observando definitus, nisi correctio

rectio quædam adhibeatur, ab vero planetæ in sole positu non nihil discrepet, quem scilicet positum habere visus esset, si eum nulla intercedente refractione intueri licuisset. Hanc vero deviationem aliquam esse, neque prorsus contemnendam, modo sol observationis tempore (ut in hoc cum mercurio congressu) non longe ab horizonte absit, ita planum faciemus.

Notum est solis speciem ita ex refractionibus deformari, ut e rotunda ovalis fiat; & diameter quidem horizontalis iustam ad sensum magnitudinem fervet, verticalis autem contrahatur. Esto in figura I peripheria solis refracte visa observationis tempore $fbnl$, horizontalis diametri species fn , verticalis bl , centri autem s . Iam hoc ipso eius, quam diximus, aberrationis necessitas, ex parte saltem, intelligitur. Cum enim mercurii positum ad solares margines, sive in horario circulo ex borea in austrum, sive in parallelis ex ortu in occasum, observando dimetimur, margines illi, quibus cum planetæ fit comparatio, minime ad unumquemdam circulum, sed ad curvam $fbnl$ pertinent. Itaque errabimus, si circulum, ut fieri solet, describentes, ac duas in eo circulo rectum angulum comprehendentes diametros, alteram pro horario, alteram pro parallelo ducentes, ex earum diametrorum extremitatibus, veluti e solaribus limbis, illas declinationum, atque elongationum mensuras intra circulum accipiamus, quas observatione comperimus; atque eo magis errabimus, quo solis species, eius phasis tempore, magis a circulari figura abludet (quod equidem infra septem, vel octo gradus altitudinis sensu assequi incipimus, cum vero ad quintum, aut sextum gradum ventum est, in tantum excrescit, ut dissimulari non possit); neque, posita eadem solis altitudine, error perpetuo idem erit, sed alius, pro alia horarii ad verticalem inclinatione, & planetæ ab iis, quos diximus, limbis distantia.

Sed alia præterea est causa, cur planetæ positus, eiusmodi observationibus definitus, correctione egeat. Ducatur in eodem schemate horarius circulus sb , ac parallelus, rectum cum eo angulum efficiens sp . Et si hæc recta æquatori, ac veris stellarum itineribus æquidistans est, tamen centri solaris species, dum diurno motu occasum versus fertur, minime hanc viam sp insistere videbitur. Cogitemus enim

solem exiguo temporis spatio e verticali circulo ky in alium verticalem bp translatum. Id dum contingit, simul centri s altitudo augetur, aut minuitur, eaque mutata, refractionem eius minui, vel augeri necesse est. Minuatur altitudo (ut in observationibus nostris, ubi sol in occasum vergebat) & refractionis incrementum huic diminutioni congruens esto pa . Facile apparet solis centrum, quum ad verticalem bp pervenerit, in puncto a appariturum, & semitam, quæ ab eo describi videbitur, fore sa , utique aliam ab sp . Quod autem de centro s dictum est, de singulis eius circumferentia punctis, atque adeo de utroque limbo, australi scilicet, & boreali, e quibus planetæ declinationes captabantur, dictum puta; singula enim hæc puncta lineas descripsisse videbuntur lineæ sa parallelas. Igitur cum inter observandum reticuli filamenta iuxta limbi borealis motum componebantur, minime vero parallelo sp , sed apparenti sa æquidistantia statuebantur, neque reticuli filum horarium, horario vero sb , sed apparenti, ad rectam sa normali, æquidistabat. Propterea nisi huiusce discriminis ratio habeatur, cum denique observatio in typum refertur, iterum errabitur, neque planetæ ad eclipticam positus, hoc pacto reperiatur, cum veritate consentiet.

Omitto, ne illam quidem, quam dixi, lineam sa rectam esse, sed curvam, neque, ut recta foret, australis, & borealis limbi semitas huic lineæ adamussim æquidistare posse; non enim refractionis incrementum limbo congruens, quo tempore solis species ad verticalem bp transfertur, æquatur incremento pa refractionis eius, quæ ad centrum pertinet; nec propterea figura $fbnl$ inter movendum servari potest, sed ut plurimum descendente sole compressior fit. Hæc, inquam, omitto, subductis enim calculis reperi quicquid erroris inde existere potest perexiguum esse, & quod sperni queat, præsertim in hisce nostris observationibus, ubi quam minimum temporis inter mercurii, & solaris limbi transitum intererat.

His ergo ita expositis, dicendum superest, quæ harum aberrationum geometricè corrigendarum sit methodus; nimirum qua ratione, cuiuslibet phasis tempore, planeta in circulari solis disco ita collocari possit, quemadmodum nullis turbantibus refractionibus spectandus fuisset. Methodum hanc

hanc ita proponam, ut expositionem eius accommodem observationi nostræ, in qua sol occiduum cæli partem occupabat; mercurii vero positiones a boreali, atque ab orientali speciei limbo defumebantur; ex quo non difficulter intelligitur, quid aliis casibus præstandum sit.

Primum semidiametro sf tot scrupulorum, quot ea die habuerit solis semidiameter, circulus describatur $fkny$, cuius centrum s , ducaturque fn pro horizontali, atque illi perpendicularis ky pro verticali diametro. Deinde, supputata ad tempus eius phasis, quam corrigere volumus, solis altitudine vera, eaque ope tabulæ refractionum in visam conversa (habet hoc difficultatem nonnullam quod refractiones in tabulis, quæ ab astronomis traduntur, visis altitudinibus, non veris adscribi, aptarique soleant, sed altero, vel tertio in tabulam ingressu res denique expediri potest) describenda est curva fnl , quæ solis speciem in ea altitudine exhibeat, ita quidem, ut centri species cum puncto s , & diametri horizontalis apparentia cum recta fn congruat. Huius quidem curvæ etsi perdifficilis est contemplatio, nec dum de eius natura quicquam a geometris per scriptum extat, non tamen difficile est eam per plura puncta ex refractionum tabulis delineare. Accepta enim kb æquali differentiæ refractionum centri, & limbi superioris solis in verticali circulo, erit punctum b huiusce limbi species. Similiter si Tt , ipsi ky parallela, æqualis fiat differentiæ refractionum centri, atque eius puncti superioris semicirculi solis, quod punctum in verticali Tt reperitur, erit huiusce puncti species t ; atque eodem pacto inferioris semicirculi species fln describetur.

Quinimo, invento, ut antea, puncto b , si axe primario fn , & semiaxe secundario bs semiellipsi fnb describatur, vix hæc ab apparenti solis figura aberrabit, quod sensu percipi possit. Sunt enim refractionum differentiæ kb , Tt altitudinum differentiis, atque adeo lineis sk , cT sat accurate proportionales, ut ex refractionum tabulis apparet, saltem ubi solis centrum ultra gradus tres attollitur, atque altitudines ipsæ non ultra 15, vel 16 minuta (quanta est solis semidiameter) inter se discrepant; unde facile consequitur rectas sk , cT , rectis bs , ct proportionales esse, quæ ellipsis est proprietas. Eademque ratione si pun-

Et infimi solis species l inveniatur, atque eodem axe primario fn , femiaxe autem secundario sl semiellipsis alia describatur fln , curva e duabus semiellipsibus conflata $fbnl$, satis in hoc negotio accurate, solis figuram in ea altitudine imitabitur. Propterea figuram hanc, uti vere ellipticam, deinceps spectabimus.

Iam ergo, supputato ex astronomicis datis angulo, quem horarius circulus eo tempore cum verticali comprehendit, statuatur illi æqualis angulus Ksb , fiatque sp normalis ad sb , ut hoc pacto sb , circulum horarium verum, atque sp verum parallelum referat.

Ad hæc, uno vel altero temporis minuto post observationis tempus quærenda est iterum centri solis altitudo vera, & ex hac, visa, nec non huic conveniens refractionis. Tum vero tempusculum illud in partes circuli, primum paralleli, deinde maximi, redigatur, sitque eius mensura sp , ex eodem modulo defumpta, ex qua solis semidiameter, ceteræque in figura lineæ acceptæ sunt. Per punctum p agatur pa , ipsi ky parallela, atque in ea ex puncto p verticem versus sumatur pa æqualis differentiæ refractionum centri solis utroque eo tempore, ductaque recta as , quæ speciem solarem secet in dd , erit as apparens eius centri parallelus.

Post hæc ducatur in ellipsi fbn semidiameter sr semidiametro ds coniugata, & acta per r recta linea ru eidem ds parallela, quæ in r ellipsim tanget, positionem eam ostendet, quam reticuli filum inter observandum obtinebat, quod filum a boreali solis limbo percurrebatur, eritque punctum r limbus ipse borealis apparens, ad quem planeta observando relatus est. Quod si sg ad perpendicularum erigatur ipsi ds , & semidiametro sg coniugata fiat so , ac per o agatur ou æquidistans sg , ac propterea ellipsim tangens in o , ostendet ou positionem illam, quam observationis tempore habuit filum reticuli, quod cum parallelis filis angulum rectum efficit, eritque punctum o limbus ipse orientalis, ex cuius appulso ad filum ou , cum mercurii appulso collato, eius elongatio colligebatur.

Ex puncto igitur u , in quo ru , ou se interfecant, sumpta in ur recta uq æquali elongationi planetæ ab limbo ortivo, & in uo recta ui æquali declinationi a limbo boreali,

reali, si per q, i rectæ agantur qm, im , rectis ou, ur parallelæ, earum sectio m apparentem mercurii locum in ovali solis specie designabit; nimirum punctum m ad puncta r, o ita comparatum erit, quemadmodum planeta ipse ad borealem, atque ad orientalem speciei limbum comparatur.

Denique ductis per m rectis tmc , ad fn perpendiculari, & mx eidem parallela, quæ posterior ellipsim secet in x , & acta xe ipsi ky parallela, quæ semicirculo fn occurrat in e , si per e recta describatur ez , ipsi fn parallela, ac rectæ tm occurrens in z , erit z mercurii locus, ita ad circulum $fnky$, & ad verum horarium sb , verumque parallelum sp , relatus, quemadmodum spectandus fuisset, si refractiones nullæ intercessissent; quapropter adiecta in schemate ecliptica, diametro scilicet, quæ eum angulum cum recta sb efficiat, quem observationis tempore ecliptica cum horario comprehendebat, vera planetæ longitudo, ac latitudo, eius phasis tempore, circino inveniri poterit, quantum quidem per refractionum anomalias, earumque hypoteses, nondum fortasse exactissime constitutas, licet.

Methodi huiusce demonstrationem omitto, quod eam ex hætenus dictis haud difficulter percipi, & rem hanc totam ex iis, quæ sequuntur, satis illustrari existimem.

Quæ fuerit semita a Mercurio intra solem in hocce congressu descripta.

UT ergo observationum nostrarum phases, quatenus opus foret, hac methodo corrigerem, atque ex earum serie viam a mercurio intra solem descriptam investigarem, modulum minorum circuli maximi eius magnitudinis construxi, ut minuta ex eo modulo sexdecim, unciis circiter 5 bononiensibus exæquarentur, quo facile esset singula quævis, aut bina saltem, scrupula secunda visu distinguere. Ex eo modulo sumptis min. 16. 17, quæ fuit solis semidiameter observationis tempore, ea semidiametro circulum in charta descripsi. Hunc circulum, minori tamen forma exaratum figura II ostendit. In eo transversam diametrum duxi, quæ eclipticam referret, atque diametrum aliam gradibus 106. 35, occasum versus in superiori semicirculo, ad illam prior-

rem

rem inclinatam, pro horario circulo statui, quod nempe is sit angulus, quem ecliptica in gradu 16. 45 scorpium (quo proxime loco tunc sol versabatur) cum meridiano, sive cum horariis circulis efficit. Neque tamen horarium, neque alias, quæ deinceps sequuntur, lineas hic notavi, ne tot linearum ductibus confusio oriretur.

Ducta deinde ad horarium normali diametro, quæ parallelum centri solis exhiberet, mercurii positus ad singulas observatas phases in schemate designare aggressus, primum subductis rationibus reperi in ea phasi, quæ numero I notata est, nulla correctione opus esse, quod in tanta altitudine, quantam eo tempore sol ab horizonte habuit, nondum refractionis quicquam erroris efficeret, quod sensu distinguere posset. Itaque ex mercurii declinatione, quæ a boreali limbo observata est min. 17. 25, atque ex elongatione ab margine orientali sec. 43, planetæ positum intra solem talem deprehendi, qualem in figura numerus I ostendit.

Post hæc ad phasim num. IX notatam, quæ omnium postrema est, perpendendam transivi. Ex declinatione solis, quæ fuit grad. 16. 52 mer. nec non distantia poli a vertice Bononiæ grad. 45. 31, ac demum ex hora pomeridiana 4. 29, angulum ab horario a verticali circulo in solis centro comprehensum grad. 41. 14 comperi; itaque in figura diametrum aliam duxi, quæ cum horario hunc angulum efficiens, verticalem referret, eique diametro orthogonalem aliam statui, quæ pro horizontali diametro foret.

Ex iisdem datis prodiit mihi vera centri solis altitudo ad huiusce phasis tempus grad. 3. 29, atque distantia a vertice grad. 86. 31. Huic distantie in Cassiniana refractionum tabula respondebat refractionis min. 14. 23, ex qua vera distantia a vertice confieret grad. 86. 16. 37, si modo tabulæ eius refractiones veris, non visis a vertice distantibus responderent. Rursum igitur refractionem ex ea tabula quærebam, quæ visæ distantie grad. 86. 16. 37 congrueret, reperiebamque min. 13. 37, quæ ablata ex distantia vera grad. 86. 31 efficit distantiam visam non nihil magis accuratam grad. 87. 17. 23. Ad hanc ergo distantiam rursum refractionem quærens, inveniebam min. 13. 40, qua dempta ex vera distantia a vertice grad. 86. 31, prodibat visa grad. 86. 17. 20, eaque accuratissima; cum enim iterum distantie grad.

grad. 86. 17. 20 refractionem debitam quærerem, eandem atque antea comperiebam, min. 13. 40, quæ propterea verissima erat ex hac tabula centri refractione.

Quoniam autem vera distantia a vertice centri solis erat grad. 86. 31, semidiameter autem eius min. 16. 17, colligebatur inde distantia a vertice vera limbi superioris in verticali circulo grad. 86. 14. 43. Iterum ergo refractionem huic limbo congruentem eadem methodo investigabam, ac reperiebam min. 12. 53. Itaque refractionum centri, ac limbi superioris differentia erat sec. 47, atque hæc quantitas ea est, quæ lineæ *kb* prioris figuræ respondet.

Semiellipsim igitur, quæ superiorem solis semicirculum referret, in eo, quem dixi, ampliori circulo iuxta methodum supra traditam ex hisce datis delineavi, nempe cuius axis primarius erat horizontalis solis diameter, secundarius vero femiaxis iuxta verticalem protensus a primario secundis 47, ex modulo acceptis, deficiebat.

Post hæc centri solis distantiam a vertice ad horam 4. 30 (nempe uno temporis minuto ab observatione elapso) iterum supputabam, eamque comperiebam grad. 86. 41, refractionem vero illi debitam min. 14. 9, quæ propterea refractionem centri hora observationis repertam, min. 13. 40, excedebat secundis 29. Deinde cum arcus paralleli, quem uno temporis minuto sol percurrit, sit min. 15, sive sec. 900, ut vero radius 100000 ad sinum complementi declinationis solis grad. 16. 52, nempe ad 95698, ita 900 ad 861, colligebatur exinde rectæ *sp* (fig. I) longitudo partium circuli maximi 861, seu minutorum 14. 21, quare acceptis ex circuli centro *s* in linea *sp*, quæ parallelum referebat, partibus moduli 14. 21, occasum versus, punctum *p* nanciscebar, per quod ducta *pa*, verticali *yk* parallela, longitudinis sec. 29, per punctum *a* apparentem centri solis parallelum *asd* ducebam; neque modicam eius a vero parallelo deflexionem inveniebam, quippe quæ gradus duos excederet. Postremo reliquis omnibus, ut exposita antehac methodus præcipit, absolutis, talis mercurii in sole positus prodibat, qualis fig. II numero IX cernitur.

Eadem prorsus ratione reliquas phases in observationum serie, romanis numeris supra notatas, in schema retuli, quarum quidem phasium, quæ ante horam quartam obser-

observatæ sunt, correctione nulla, refractionum causa, indigere comperi, eas scilicet quæ numeris II. III. IV notantur, præter phasim I, de qua supra dixi. Ex hora vero 4. 1, cui phasis V respondet, corrigendæ omnes fuerunt, quod aberrationem a refractionibus ortam notabilem iam esse calculi ostenderent; atque hoc pacto eos positus mercurii reperi, quos figura demonstrat. Reliquæ phases, quæ nullo distinctæ sunt numero, in schema referri non poterant, quod in iis mercurii a limbo solis declinatio observata non fuerit, elongationes tamen a limbo orientali, quæ in iis consignantur, inter se se, & cum temporibus collatæ, ut plurimum cum reliquis consentiunt, earumque veritatem confirmant.

Cum vero puncta illa singula in typo notata, minime omnia in eandem rectam lineam incidere viderem, non melius semitam a mercurio descriptam definire me posse existimavi, quam si phases duas maxime inter se distitas, nempe I, & IX, recta linea iungens, rectam hanc pro mercurii semita acciperem. Id ubi feceram, positionum reliquarum puncta ita ad hanc lineam comparata erant, ut aliqua citra, alia ultra eam iacerent, ac plurima eorum perexiguam quiddam ab ipsa distarent, quemadmodum figura ostendit, id quod semitæ positionem illam confirmare videtur. Una est phasis VII, quæ longius ab hac linea evagatur, quam ut tolerari possit, atque hoc, ni fallor, eius observationis vitium aliquod prodit.

Descripta hoc pacto ea portione semitæ, quam mercurius a phasi I ad phasim IX peragravit, eaque hinc inde producta, quousque circulo utrimque occurreret, puncta duo nactus sum, quorum alterum, ad orientem positum, mercurii ingredientis, alterum ad occasum, egredientis locum demonstrat. Horum punctorum perpendicularem ab ecliptica distantiam circino dimensus, reperi in puncto ingressus min. 3. 13, in puncto egressus min. 7. 31, utrobique ad boream, atque hæ sunt mercurii latitudines septentrionales ad initium, finemque huiusce sub sole transitus, quantum ex observationis nostræ conditione definire eas licet; cum enim vix hora una, paullo amplius, planetam, propter ingruentem solis occasum, profecuti simus (quæ est eius itineris in sole pars circiter quinta) non tantam in
hac

hac semitæ positione subtilitatem præstare possumus, quantum quibus plus diei ad hanc profequendam observationem superfuit, uti parisiensibus, ac londinensibus astronomis contigisse accepimus.

Ex datis autem duabus hisce latitudinibus, & solis semidiametro min. 16. 17, eas, quas subiungam, mensuras calculo trigonometrico adeptus sum, quantæ etiam circino in schemate deprehendebantur.

Latitudo mercurii in puncto ingressus	min. 3	13 Bor.
Latitudo eiusdem in puncto egressus	min. 7	31 Bor.
Differentia longitudinum mercurii, & centri solis in ingressu	min. 15	58
Differentia longitudinum mercurii ac centri solis in egressu	min. 14	27
Longitudo semitæ a mercurio intra solem ab ingressu ad egressum peragrata	min. 30	41
Perpendicularis distantia semitæ a centro solis	min. 5	25
Angulus quem ipsa semita cum ecliptica comprehendebat	grad. 8	2

Ex quibus ad reliqua omnia, quæ hanc coniunctionem spectant, investiganda iam progrediar.

*Determinatio coniunctionis mercurii cum sole
ex hisce observationibus.*

ANtea tamen perspiciendum est quæ ex observationibus in typum relatis eliciatur quantitas motus planetæ in sole. Quum mercurii positiones in singulis phasibus notatas inter se conferebam, inveniebam earum intervalla temporum intervallis minime exacte proportionalia, id quod ab iis, quos dixi, errorculis, inter observandum admissis, procul dubio oriebatur, atque ambiguum efficiebat horarii planetæ motus investigationem. In hac dubietate nihil mihi tutius occurrebat, quam si e duobus longissime inter se distantis punctis huiusce motus mensuram elicerem. Itaque cum portionem semitæ, quæ inter punctum ingressus planetæ, & postremam omnium phasium, numero IX notatam, intercipitur, circino dimensus reperirem min. 6. 20, ingressus
Tom. II. P. III. C autem

autem in horam 3. 27, ac postremæ phasis tempus in horam 4. 29 congruat, quorum temporum intervallum est hor. 1. 2, subductis rationibus prodibat horarius motus in semita intra solem apparens min. 6. 8.

Sed ut motum hunc nonnihil adhuc accuratius obtinerem; animadvertēbam mercurii diametrum in observatione fuisse nobis æstimatam secundorum 9, ut ad phasim III notatum est, quapropter ex horario motu illo, utcumque cognito, colligebam, portionem semitæ, mercurii diametro æqualem, ab eo peragrata tempore secundorum horariorum 89, atque hoc quam proxime fuisse oportet tempus, quod planeta impendit postquam solis limbum exterius tetigit, quoad eundem interius contingens totus in sole appareret. Quapropter cum interior contactus notatus fuerit hora 3. 27. 45, consequitur primum eius ad oram solis appulsum accidisse hor. 3. 26. 16, tametsi nobis non ante hor. 3. 26. 22 est visus; centrum vero ad limbum eundem pervenisse hor. 3. 27. 0. Postremæ vero phasis tempus, cum scilicet mercurius in ea phasi circulum horarium transibat, erat hor. 4. 29. 12; intervallum igitur temporis ab ingressu centri mercurii ad hanc phasim est hor. 1. 2. 12; atque hoc tempore minuta illa, quæ diximus, 6. 20 in sua semita peragravit, ex quo horarius eius motus fit min. 6. 7 unico secundo minor atque antea repertus fuerat.

Hic quidem planetæ est motus in ea, quam descripsit, aut descripsisse visus est, recta intra solem linea, quæ cum ad eclipticam angulo grad. 8. 2 inclinaretur (sicut antea posuimus) sequitur horarium motum mercurii a sole in longitudinem, sive ad eclipticam reductum, fuisse min. 6. 3.

Nunc igitur cum mercurius, horæ unius spatium minuta 6. 7 propriæ semitæ in sole percurrat, sequitur totam eius viæ longitudinem (quam min. 30. 41 supputavimus) peragrata horis 5. 1. 9, & semitæ dimidium horis 2. 30. 34, quibus adiectis ad tempus ingressus centri hor. 3. 27. 0, conflatur medium transitus hor. 5. 57. 34, atque eodem pacto colligitur tempus, quo centrum mercurii a sole excessit hor. 8. 28. 9.

Præterea cum, ex iis, quæ diximus, differentia longitudinis, qua mercurius centrum solis sequebatur, ipso ingressu

gressus tempore fuerit min. 15. 58; horarius autem motus in longitudinem a sole min. 6. 3, consequens est mercurium ad eandem cum centro solis longitudinem pervenisse post horas ab ingressu 2. 38. 21, nempe post meridiem hor. 6. 5. 21, atque hoc tempus est verum coniunctionis planetæ cum sole. Cassinianæ tabulæ exhibent eo tempore (quod iuxta medios motus est h. 5. 49. 23) solis longitudinem in scorpionis grad. 16. 47. 10, quibus ad unguem consentiunt observationes per hosce dies a nobis habitæ ad maximum gnomonem, qui Bononiæ in Divi Petronii æde ab ipso Cassino constructus extat. Atque hæc eadem est mercurii e tellure visa hoc tempore longitudo, cui e diametro opponitur telluris longitudo a sole, & mercurio visa, in Tauri grad. 16. 47. 10.

Latitudinem vero quod attinet, quam mercurius in ipso coniunctionis articulo habere visus est, cum ab ingressu ad egressum tempus intercesserit horarum 5. 1. 9, atque eo intervallo augmentum latitudinis ex numeris supra positis colligatur min. 4. 18; ab ingressu vero ad coniunctionem lapsæ fuerint hor. 2. 38. 21, consequitur incrementum latitudinis ab ingressu ad coniunctionem min. 2. 16. Quare cum latitudo in ingressu inventa fuerit min. 3. 13, erit latitudo tempore coniunctionis min. 5. 29 septentrionalis.

Ex iis ephemeridibus, quas anno 1715 e Cassinianis tabulis supputatas edidi, elicitur coniunctionis huiusce tempus verum h. 6. 41 nempe 36 minutis ferius atque ex observatione, id quod min. 3 circiter in mercurii longitudine excessum ostendit; latitudo autem ex Ephemeridibus min. 5. 0, secundis tantummodo 29 ab observatione deficiens. Earum ephemeridum continuationem in annum 1750, brevi evulgandam, adornamus ex iisdem tabulis, quibus tamen correctiones nonnullas ab insigni astronomo Maraldo, Cassini nepote, e propriis observationibus deductas, ac nobiscum communicatas, in iove præsertim, ac saturno, adhibuimus, ac partim etiam in mercurio. Sed ex hac ipsa observatione mercurii motus fortasse ulterius adhuc corrigi poterunt.

*Determinatio nodi ascendentis mercurialis
orbitæ.*

Nunc cum eo, quod posuimus, latitudinis incremento haud difficulter indagabimus quo tempore mercurius in ipsa orbitæ suæ, atque eclipticæ sectione, absque latitudine ulla, versatus fuerit, quas sectiones astronomi nodos appellant. Quoniam enim ex dictis latitudinis augmentum min. 4. 18 horas 5. 1. 9 sibi deposcit, manifestum est tempus, cui respondeat augmentum minorum 3. 13 latitudinis, (quanta scilicet in ingressu deprehensa est) horarum fuisse 3. 45. 9, quibus deductis e tempore ingressus centri mercurii in solem hor. 3. 27. 0, confiet tempus, quo mercurius in ipso nodo, eoque septentrionali, sive ascendenti, versabatur hor. 23. 41. 51 post meridiem diei 8 novembris. Atque adeo cum coniunctio hora 6. 5. 21 a meridie diei 9 commissa fuerit, intervallum temporis, quo planetæ adventus ad nodum coniunctionem antecessit, fuisse liquet horarum 6. 23. 30.

Ut autem inveniamus nodi longitudinem e tellure visam, quo tempore mercurius, nodum ipsum attingens, eclipticæ planum traiecit, quoniam horarium mercurii a sole motum in ecliptica supra elicuimus min. 6. 3; inter coniunctionem vero, ac tempus, quo mercurius nodum tetigit, horas intercessisse comperimus 6. 23. 30, cui tempori competunt eius motus min. 38. 37, erit hæc differentia longitudinum solis, & mercurii e tellure visa ad horam 23. 41. 51, quo scilicet tempore planeta in nodo versabatur. Atqui solis longitudo colligitur eo tempore in scorpii grad. 16. 31. 5; mercurius igitur, atque adeo nodus ipse telluri spectabatur in scorpii grad. 17. 9. 42.

Denique ut appareat ad quodnam longitudinis punctum nodus hic, e sistematis planetarii centro, hoc est e sole, visus, referatur, aliquid præcogniti ex astronomicis hypothsesibus assumemus, quod tamen tale erit, ut in eo vel nihil, vel parum admodum errari possit, nempe illud: qui fuerit planetæ motus e sole visus, eo, quod diximus, temporis intervallo, horarum 6. 23. 30. Hunc ego motum e Cassinianis tabulis collegi, in orbita quidem mercurii grad.

1. 38. 16, sed ad eclipticam reductum grad. 1. 37. 34, ac tantus est angulus elongationis mercurii in coniunctione existentis a nodo, in plano eclipticæ sumptus, quem scilicet angulum recta linea, a sole ad nodum ducta, cum ea recta comprehendit, quæ ipso coniunctionis tempore ex sole ad tellurem pertinebat; quo tempore cum telluris longitudo (quam recta hæc designat) e sole visa supra posita fuerit in tauri grad. 16. 47. 10, relinquitur longitudo nodi ex sole in tauri grad. 15. 9. 36.

*Determinatio inclinationis orbitæ mercurii
ad eclipticam.*

ET si perdifficile est ex observationibus planetæ prope nodum habitis orbitæ eius inclinationem ad eclipticam dimetiri, tentabimus tamen, quæ nobis prodeat in hoc mercurii transitu inclinationis huiusce quantitas. Inclinationem vero orbitæ cum dicimus, non eum angulum spectamus, quo semita a mercurio in sole peragrata, eclipticam secare visa est, quæ mere apparens est inclinatio, e duorum motuum, mercurii, & solis, compositione, nec non ex utriusque planetæ a tellure distantis pendens, quam equidem supra graduum 8. 2 invenimus; sed angulum illum, quem planum orbitæ cum eclipticæ plano constanter (quantum equidem Astronomi arbitrantur) comprehendit.

Hunc ergo angulum ut investigemus, iterum astronomicas hypotheses in subsidium advocabimus, quod sine illis res hæc expediri nequeat. Quoniam igitur ipso coniunctionis tempore, hora scilicet 6. 5. 21 a meridie diei 8 novembris, apparenti tempore, sed æquali hor. 5. 49. 23 e cassinianis tabulis distantia telluris a sole ea erat, cuius logarithmus 499527; distantia vero mercurii a sole ea, cuius logarithmus 449436; in triangulo autem ad mercurium, tellurem, & solem constituto, ut hæc, quas dixi, distantia, ita sinus angulorum iis oppositorum, quorum angulorum is, qui ad tellurem existit, notus est, nempe latitudo mercurii apparens coniunctionis tempore, min. 5. 29; ex ea, quam dixi, analogia prodit angulus ad mercurium grad. 179. 42. 37, quocirca tertius angulus, qui scilicet ad solem pertinet, erit grad. 0. 11. 54, atque hanc coniunctionis tempore fuisse

fuisse constat mercurii visam e sole latitudinem, qua re-
 ta, angulus orbitæ mercurii cum eclipticâ latere non potest;
 erat enim ex antea dictis mercurii, in coniunctione existen-
 tis, atque e sole visi, distantia a nodo, sive latitudinis ar-
 gumentum in orbita acceptum grad. 1. 38. 16, atque ut si-
 nus huiusce argumenti ad radium, ita esse oportet sinum
 latitudinis e sole visæ min. 11. 54 ad sinum quæsitæ inclina-
 tionis, quæ propterea elicietur grad. 6. 57. 15 minutis tribus
 maior atque a Keplero, ac plerisque omnibus, post eum ta-
 bularum authoribus, statuitur.

*Comparatio motuum mercurii in hac, aliisque cum sole
 coniunctionibus observatorum.*

Post inventum telescopium congressus mercurii cum sole
 omnino sex ab Astronomis, ante hunc, de quo scribi-
 mus, congressum observatos accepimus.

Primus a Gassendo Parisiis anno 1631 novembris die 7
 mane, in quo tamen nihil præter planetæ e sole egressum
 accurate sibi notatum testatur auctor, propterea quæ fuerit
 mercurii, solem peragrantis, celeritas minime ex ea obser-
 vatione inferre licet.

Secundum transitum a Scakerleo anglo anno 1651 die
 3 novembris in insula Surata perspectum ferunt, sed eius
 observationis numeros non vidi.

Tertius & Londini Hugenio, ac Mercatori, & Gedani
 Hevelio, anno 1661 die 3 maii observatus, cum prope no-
 dum mercurii descendentem inciderit, in quo longe alia est
 planetæ celeritas, cum nostra hac observatione, ad nodum
 ascendentem habita, conferri nequit.

Quartus ab Halleyo in insula S. Helenæ anno 1677 diè
 7 novembris, idemque Avenione a Galleto, & fociis ani-
 madversus. Halleyus quidem tempora ingressus, atque
 egressus planetæ diligentissime definivit, in reliquis sibi ipsi
 non satisfecit, nam neque, propter maximam solis altitudi-
 nem, micrometrum usui esse poterat, & positus illos duos
 ad verticalem circulum, in quibus utramque hanc phasim
 contigisse memorat, æstimatione potius ab se designatos,
 quam mensuris perspectos testatur; propterea in dissertatio-
 ne, quam hac de re edidit, planetæ latitudinem e Galleti
 men-

menfuris, quam e propriis, defumere maluit. Verum in hanc ipsam Galleti observationem, esto accurate habitam, vitii aliquid irrepsisse, & du Hamel in Historia regix Academiæ parisiensis anni 1697. agnoscit, & res ipsa loquitur, plures enim eius observationis numeri (in Ephemeride eruditorum gallica anni 1677 editi) cum Halley numeris, ac sibi invicem aperte pugnant, ut difficile sit quicquam inde exculpere, quo de planetæ motu satis constitutum videatur.

Ne tamen hoc ipsum intentatum relinquam, utar mercurii latitudine, quam Galletus in egressu notavit min. 6. 12. Ex hac, & solis semidiametro min. 16. 17, fit longitudinis differentia inter solem, & mercurium min. 15. 3. Deinde cum ex totali egressu, tam in insula Sanctæ Helenæ, quam Avenione animadverso, colligatur Avenionem minutis temporariis 45. 2 ea insula orientaliorem esse, medium autem eclipsis in S. Helenæ fuerit hor. 0. 3. 50, fuisse oportet medium Avenione hor. 0. 48. 53. Ex quo patet perperam ab Galileo conjunctionem statui hor. 0. 39, cum conjunctio medium illud subsequi, non præcedere debuerit.

Iam ex perpendiculari distantia mercurialis semitæ a centro solis, quam min. 4 circiter fuisse ex observatione liquet, atque ex eius inclinatione ad eclipticam, quæ a gradibus 8 non valde abesse potest, conficitur semitæ portio inter medium eius punctum, & conjunctionis articulum intercepta secundorum 34.

Ad hæc cum ea, quam dixi, inclinatione grad. 8, & differentia longitudinis a sole, quam mercurius egrediens obtinuit, min. 15. 3, efficitur pars semitæ inter conjunctionem, & egressum min. 15. 12, quibus si secunda illa 34 adiiciantur, fiet dimidia semitæ longitudo, quæ scilicet a medio transitus ad egressus locum protenditur, min. 15. 46, atque eam mercurius horis 2. 37. 10, iuxta Halley observationem, peragravit. Apparens igitur motus planetæ in propria semita unius horæ spatio min. 6. 2, & ad eclipticam reductus min. 5. 58, quinque secundis minor eo, quem in postrema hacce conjunctione supra invenimus.

Quintum congressum anno 1690 die 10 novembris Erfordix Kirkius, Norimbergix Wurtzelbau, & Eimmart, Cantone PP. Fontenay, & le Compte, atque alii alibi ob-

fer.

fervarunt. Erfordix, & Norimbergæ vix quicquam notatum præter planetæ exitum. Cantone diu quidem mercurius in sole visus, eiusque iter descriptum, sed descriptionis exemplum, primum parum accuratum, deinde emendatius ad regiam academiam parisiensem delatum, nusquam tamen (quod sciam) vulgatum est; quæ vero ex eo autographo in Historia academix ipsius sparsim relata extant, ad motum mercurii definiendum non sufficiunt.

Sexta denique extat huiusce generis observatio Lutetix a Cassino, Hiræo, Maraldo, Roterodami a Iacobo Cassino, Viennæ a Co: Marsilio, Norimbergæ a Wurtzelbau habita die 3 novembris anni 1697.

In hac observatione motum mercurii a sole tempore minutorum horariorum 44. 33 reperit Cassinus (referente Du Hamel in Historia academix anni 1697) minutorum circuli 4. 33. Subductis rationibus fit horarius planetæ a sole motus min. 6. 8, quem nos in transitu huiusce anni secundis, haud amplius, 5 minorem invenimus. Itaque motus hic noster horarius min. 6. 3 medius est inter eum, quem in coniunctione anni 1697 a Cassino accepimus, atque eum quem ex Galleti observatione anni 1677 supputavimus.

Ac nescio an ex his, quæ diximus, non nihil corrigendum sit in durationibus solarium a mercurio eclipsium, quarum tempora egregius astronomus Halleyus in præclara illa de hoc argumento edita dissertatione (quæ e regix Societatis londinensis Transactionibus in Acta eruditorum Lipsiæ anni 1693, nec non in astronomicas Whistoni prælectiones translata extat) consignavit, ut maxima quidem duratio, quam ille dimidiam horarum 2. 44 statuit, fiat horarum 2. 40; ac reliquæ omnes proportionem eadem minuantur. Sed hæc summi illius viri iudicio relinquemus.

Hæc quidem de longitudinis motu. Mutationem vero quod attinet, quam planeta iuxta latitudinem in hisce coniunctionibus subit, ex qua præsertim apparentis eius semitæ ad eclipticam inclinatio pendet; quoniam in congressu anni 1677 longitudinem dimidiæ semitæ, a mercurio in sole descriptæ, invenimus min. 15. 46, ex ea, & solis semidiametro min. 16. 17, fit angulus a semita, atque ab ipsa semidiametro in egressus puncto comprehensus grad. 14. 28. Ex latitudine vero, egressus tempore adnotata, min. 6. 12,
con.

conflatur angulus femidiametri cum perpendicularo, in eclipticam e puncto egressus demisso, grad. 67. 37. Horum angulorum summa grad. 82. 5 ex grad. 90 ablata, angulum semitæ apparentis mercurii cum ecliptica graduum 7. 55 efficit; cum quo, & semitæ totius longitudine min. 31. 32, elicitur differentia latitudinum in ingressu, atque egressu min. 4. 21, atque hoc est latitudinis incrementum, quod planeta spatio horarum 5. 14. 20 (quæ est eclipsis duratio ab Halleyo observata) suscepit. Iuxta hanc rationem debuit in hac postrema eclipsi intervallo horarum 5. 1. 9 (nempe ab ingressu ad egressum) mercurii latitudo augeri min. 4. 10 id quod octo secundis deficit ab eo latitudinis incremento min. 4. 18, quod ex observatione hac postrema deduximus.

Non diffiteor motum hunc latitudinis in congressu anni 1677 paullo alium repertum iri, si ex aliis latitudinum mensuris in ea observatione captatis perquiratur. Verum cum harum numeri sibimet ipsis non omnino consentiant, & tamen ab eorum progressu liqueat mercurii egredientis latitudinem ab ea denique min. 6. 12 quantitate haud multum distare posse, nullam huiusce rei indagandæ potiore rationem existimavimus ea, quam secuti sumus.

Porro in congressu anni 1697 nonnihil minor invenietur latitudinis mutatio, si ea, quæ habet du Hamel in Historia academix parisiensis anni 1697, cum iis conferantur, quæ in commentariis eiusdem academix anni 1707 a Cassino peculiari dissertatione scripta extant. Ait enim du Hamel inter coniunctionem, & egressum intercessisse horas 2. 11. 26, & mercurii egredientis latitudinem observatam perhibet min. 8. 58. Cassinus vero latitudinem fuisse memorat australem min. 10. 42, scilicet in coniunctione ipsa. Quapropter latitudinem spatio horarum 2. 11. 26 decrevisse patet min. 1. 44, nimirum cum ipsa australis esset; atque, ea ratione servata, latitudinem borealem intervallo horarum 5. 1. 9 augeri oportet min. 3. 59; a quo observatio anni 1677 sec. 10, nostra autem sec. 19, utraque in excessum discrepat. Sed videlicet perdifficile est hosce motus ex observationibus brevi temporis spatio habitis (quo scilicet tempore mercurius quartam, aut quintam ad summum itineris sui in sole partem peragrabat) exacte definire, ac il-

lud potius mirandum tam modica inveniri inter hæc observationes dissidia, præsertim cum in nostra, mercurii positiones per tot refractionum ambages nobis exquirendæ fuerint.

Investigatio mediorum motuum mercurii.

Observationum huiusce generis usus est non contemnendus in mediis motibus definiendis. Ea propter qui denique motus ex hac observatione nostra cum antiquioribus collata eliciatur, nunc dispiciemus methodo eadem, quam celeberrimus Cassinus in ea, quam diximus, egregia dissertatione, hanc indaginem est aggressus.

Ac primum illud notandum ab antiquissima observatione, quam a Gassendo habitam retulimus anno 1631, ad Halley observationem anni 1677, parem annorum numerum effluxisse, atque ab hac ad nostram, quæ anno 1723 est habitata, annos scilicet utrobique 46. Ante omnia igitur dierum quoque, & horarum intervalla comparabimus, & quatenus sibi consentiant perpendemus.

Gassendus observatum sibi ait egressum mercurii e sole die novembris 6 anni 1631 hora, ex altitudine solis, 22. 28; punctum vero limbi, in quo egressus contigit, ita describit, ut de eo dubitationem omnem non tollat. En eius verba: *quantum præcise ea limbi pars distiterit a diametro, verticalem representante, iurare omnino non ausim, quippe sol tempore tam brevi ante hunc excessum illuxit ut non satis notarim punctum, e quo factus est exitus. Aut fallor tamen, aut is fuit inter 32, & 33 gradus; memini enim non longe abfuisse a gradu 35, an citra tamen, an ultra fuerit, hoc est quod doleo non adnotatum. Utcumque se res habet, suspicio ad illud propendet.* Ex inde supputationes suas ita instituit, quasi planeta e gradu 32 min. 30 excessisset, quo posito provenit illi latitudo eo tempore min. 6. 20, atque assumpto e rudolphinis tabulis mercurii motu, ac solis semidiametro, coniunctionem elicit hor. 19. 58. Verum ob eas causas, quas afferam, ubi ad motum nodorum ventum erit, probabile mihi est planetæ exitum tantundem saltem ultra gradum 35 contigisse, quantum ipse citra eum gradum statuit, nempe in gradu 37 min. 30, quo posito erit mercurii
egre-

egredientis latitudo min. 5. 25, ex qua, & solis semidiametro min. 16. 17 confit differentia longitudinum solis, & mercurii min. 15. 21, quam differentiam, horario motu observationibus nostris definito, explet mercurius horis 2. 32, atque his ab egressus hora deductis, fit coniunctionis tempus hor. 19. 56 parisiis, quæ bononiæ est hora 20. 32.

Iam vero in observatione 1677, posita ea, quam supra dixi, longitudinum differentia in egressu min. 15. 3, ac horario motu longitudinis mercurii a sole min. 5. 58, prodit intervallum inter coniunctionem, & egressum hor. 2. 31. Egressus vero in insula Sanctæ Helenæ observatus est hor. 2. 41; ergo coniunctio ibi hora 0. 10, quæ bononiæ est hora 1. 20 post meridiem diei 7 novembris, atque idem fere tempus elicitur, si medio huiusce transitus, supra invento in ea insula hor. 0. 4, addantur minuta horaria 6, quæ secundis illis 34 mercurialis semitæ, inter medium eclipsis, & coniunctionem interceptis, debentur.

Ex quo obiter notare licet tempora harum mercurii coniunctionum, cum hætenus observatarum, tum quæ deinceps observandæ erunt, a clarissimo Halleyo in ea, quam memoravimus, dissertatione tradita, ita accipienda esse, ut minime ipsum coniunctionis articulum (quanquam hoc tituli præferant) sed potius medium transitus planetæ ostendant. Coniunctionem enim mercurii anni 1677 consignat hora londini 0. 28, quæ in insula S. Helenæ est hor. 0. 4, id quod minime in tempus coniunctionis, sed in medium eclipsis, ibi observatum optime quadrat.

Porro quoniam ex anno 1631 die 6 novembris hor. 20. 32 ad annum 1677 die 7 novembris hor. 1. 20 anni effluerunt 46, quorum bissextiles 12, ac præterea hor. 4. 48; fit intervallum inter hæc coniunctiones dierum omnino 16802 hor. 4. 48. Pariter cum ex anno 1677 die 7 novembris hor. 1. 20 ad annum 1723 die 9 novembris hor. 6. 5 intercesserint anni 46, quorum 10 bissextiles (annus enim 1700 ex gregoriana correctione communis est habitus) ac insuper dies 2 hor. 4. 45, conflatur harum coniunctionum intervallum dierum iterum 16802 horarum 4. 45, quod a priori illo dierum 16802 hor. 4. 48 tribus, haud amplius, horariis minutis discrepat, miro plane in tam difficili indagine observationum, ac calculorum consensu. Eo igitur se-

curius ad medium planetæ motum investigandum progrediamur.

Ad hoc autem observationes duas inter se se remotissimas comparabimus, Gassendi scilicet, & nostram, quarum intervallum ex dictis colligitur dierum 33604 hor. 9. 33, seu minorum 48390333 temporis veri, ac tantumdem medii; æquatio enim dierum nihil turbat, quippe quæ ad sensum eadem utroque hoc tempore ex astronomicis hypothesebus deducitur; atque hoc tempore mercurius periodos 382, puta gradus 137520 vero motu, sive e sole viso absolvit, ac tantum præterea zodiaci arcum, quanta est inter telluris longitudinem, utroque hoc tempore sole visam differentia; quam ego quidem e cassinianis tabulis colligo grad. 2. 5, longitudinem enim telluris in priori illa conjunctione invenio in grad. 14. 42, in hac vero postrema in grad. 16. 47 tauri, ut propterea fiant gradus omnino 137522 min. 5, sive minuta 8251325. Hinc inquam verus est mercurii motus, qui equidem a medio non nihil discrepat, quod fieri possit utroque hoc tempore minime eandem esse planetæ ab aphelio distantiam. Verum cum inter conjunctionis utriusque loca gradus 2. 5, haud amplius, intersint, quo arcu promotior est posterioris huiusce, quam prioris locus, aphelium vero, annorum 92, qui intercesserunt, spatio, haud multum citra, vel ultra hanc eandem graduum 2 mensuram promoveri constet, exiguum denique quiddam errari potest, si diurnum planetæ motum, hac comparatione elicitum, tamquam medium spectemus. Ductis igitur minutis circuli 8251325 in 1440 horaria minuta, quæ dies unus continet, & producto per 48390333 horaria, e quibus intervallum coalescit, diviso, prodit diurnus motus mercurii grad. 4. 5'. 32''. 34'''. 50''''.

Eum motum ex anno 1631 ad 1697 invenerat Cassinus grad. 4. 5'. 32''. 21''', ex anno autem 1631 ad 1690 graduum 4. 5'. 32''. 42''', propterea medium quoddam sumens, statuerat grad. 4. 5'. 32''. 32''', vel si observationum quoque aliarum, a Bullialdo expensarum, ratio haberetur, grad. 4. 5'. 32''. 35'''. 37''', id quod 47, haud amplius, quartis scrupulis inventam a nobis excedit mensuram.

Quod si tamen hunc motum, ex constitutis utcumque planetæ inæqualitatibus, nonnihil subtilius decernere lubeat; quo-

quoniam mercurii aphelium annorum 92 spatio gradibus 2. 41 promoveri pleræque astronomicæ tabulæ statuunt, si ab hocce arcu auferantur gradus 2. 5, qui inter prioris, ac posterioris coniunctionis loca intercesserunt, residuum grad. 0. 36 erit arcus interceptus inter huius postremæ locum, & punctum illud zodiaci, quod ubi mercurius in hac novissima revolutione attigit, æqualem ab aphelio distantiam obtinuit, atque in priori coniunctione obtinebat; hunc vero arcum mercurius motu ex sole viso, in hac, ubi versabatur, ab aphelio distantia media signorum nempe 5, grad. circiter 13, peragrat horis 2. 21 (ubi scilicet horis 6. 23. 30 motus eius e sole apparens est grad. 1. 38, ut supra positum est). Ergo hora post coniunctionem 2. 21 mercurius eandem ab aphelio distantiam est assecutus, quæ fuit tempore coniunctionis anni 1631; atque hoc temporis intervallo, supra revolutionis 382, ac gradus 2. 5, antea inventos, minuta quoque circuli 36 in zodiaco est emensus. Quare, si iterum ratio ineatur, fient scrupula circuli 8251361 in 1440 horaria ducenda, ac per scrupula temporis 48390474 dividenda; unde prodit diurnus motus medius grad. 4. 5'. 32". 36"". 7"". Ex postrema hac indagine (quam propter longius, quod nobis obtigit, intervallum tutiorem arbitror) fit motus medius in anno communi sign. 1. 23. 43'. 19". 42"". 35"" quatuor, aut quinque secundis maior atque in rudolphinis, ricciolianis, & hiræanis tabulis.

Investigatio motus nodorum mercurii.

SI quid in hac re, quam agimus, difficultatem habet, habet sane nodorum mercurialis orbitæ motus indago, quæ cum e duarum observationum collatione pendeat, in quibus observationibus singulis arduum est nodi positum accurate decernere, multo maioris operæ est ex utroque hoc posito eius puncti progressum æstimare.

De hoc argumento agens summus astronomus Ioannes Dominicus Cassinus in ea, cuius sæpe meminimus, dissertatione, cum nodi ascendentis longitudinem ad omnium coniunctionum, eatenus observatarum, tempora, qua pollebat solertia, indagasset, has, quæ sequuntur, e tellure visas longitudes reperit, quibus longitudinibus locus nodi e
sole

sole spectatus ex diametro opponitur; nimirum: 1631 novembris 6 scorpis 13. 8, 1677 novembris 7 scorpis 14. 12; 1690 novembris 10 scorpis 14. 32. 25; ac denique medio tempore inter observationes 1690, & 1697 (quod tempus incidit in mensem maium anni 1694) scorpis 14. 42. 10, e quibus prodit annuus nodi motus, modo min. 1. 21, modo 1. 26, modo 1. 31, ex observatione tamen Hevelii, anno 1661, 3 maii ad nodum descendentem habita, quæ puncti huius longitudinem exhibet in tauri grad. 14. 24, si ea cum Gassendi observatione conferatur, celeriores nodi motum colligi observat, quippe qui in annis 30 nondum expletis foret 1. 16, nempe in annos singulos min. 2. 32.

Annui motus nodi quantitas min. 1. 20, vel 1. 21 parum ab ea discrepat, quam plerique astronomi, qui elapso seculo floruerunt, in eorum tabulis consignarunt. Alii tamen sunt, qui eum motum non maiorem 50, vel 51 secundis ponant, qui fixarum stellarum motus est annuus, quod in copernicana sententia eo redit, ut nodi sint plane immobiles, ac ea tantum celeritate progredi appareant, qua æquinoctiorum puncta regrediuntur, atque hanc sententiam celeberrimus Halleyus in ea, quam sæpe memoravi, dissertatione, de solis, atque inferiorum planetarum coniunctionibus, est amplexatus.

Cum tentarem, quænam motus quantitas e singulis nodi longitudinibus a Cassino inventis, & cum nostra collatis, eliceretur, quæ locum nodi e sole visum anno 1723 novembris 9 exhibet in tauri grad. 15. 9. 36, videbam ex ea determinatione, quæ ad annum 1694 pertinet, fieri motum annum sec. 57, quæ ad 1690 min. 1. 9, quæ ad 1677 min. 1. 16, quæ denique ad 1631 min. 1. 20, ac si ad hevelianam quoque anni 1661 respicerem, secunda haud amplius 45 annua reperiebam. Motus nodi fere semper minor erat minutis illis 1. 20, propius tamen ad hanc mensuram accedebat, si observatio nostra cum antiquioribus, quam si cum recentioribus compararetur.

Et si dubium non erat, quin hæc discrimina ab ipsarum observationum errorculis, ex parte saltem, orientur (ut propterea minime necesse sit inæqualitates ullas in nodorum motu comminisci) atque ea demum motus mensura præferenda videbatur, quæ ex Gassendi, ac nostris observa-
tio.

tionibus, quippe omnium inter se remotissimis, colligitur min. 1. 20, cum tamen inter annos 1631, 1677 tantumdem temporis interesset, atque inter 1677, ac 1723, anni videlicet utrobique 46, lubuit experiri, an res hæc subtilius adhuc enucleari posset.

Cum ergo mercurii latitudines in coniunctionibus hisce tribus observatas expenderem, ac viderem anno 1631 a Gassendo statui min. 6. 20, in ipso planetæ egressu, a Galileo autem anno 1677 min. 6. 12, ac denique hoc anno 1723 ex figura colligi min. 7. 31, ac propterea ab anno 1631 ad 1677 secundorum 8 diminutionem, ab anno autem 1677 ad 1723 minutorum 1. 19 incrementum perspicerem, facile agnovi in aliqua ex observationibus hisce tribus vitium latere.

Postquam autem observationis suæ enarrationem a Gassendo scriptam in manus sumpsi, atque ea, quæ supra retuli, verba legi; quibus verbis ambiguum relinquit puncti eius, e quo mercurius excessit, determinationem, agnovi latitudinem illam, non invito authore, non nihil minui posse, si nempe planetæ egressum contigisse ponamus tantumdem ultra gradum trigessimum quintum a vertice numeratum, quantum citra eum gradum dubitanter ipse statuerat, nempe grad. 2. min. 30. Itaque descripto typo, notatoque in illo verticali circulo ad eclipticam debite inclinato (inclinationem hanc grad. 56. 48 calculo inveni) ac designato puncto solaris limbi, quod ab huius vertice grad. 37 min. 30 distaret, eius puncti, atque adeo egredientis mercurii latitudinem circino inveni min. 5. 25. Hoc ipsum (quo fidentius crederem) existimasse videtur clarissimus Halleyus, qui cum in illa coniunctione distantiam semitæ mercurii a centro quasi observatam consignaverit min. 3. 18, hoc ipso latitudinem in egressu min. circiter 5 min. 30 ab se suppositam indicat.

Quapropter cum hæc anno 1677 deprehensa fuerit min. 6. 12, ac anno 1723 min. 7. 31, nullum in hisce dissidium maius apparet, quam quod observationum ipsorum exiguis, neque evitabilibus erroribus, tribui queat. Neque temere crediderim latitudinem illam anni 1631 paullulum adhuc fortasse minuendam, sed nihil ultra mutare volui, ne clarissimi observatoris verbis vim inferre viderer.

His

His ita constitutis, quoniam in observatione cassiniana anni 1697 invenimus motum latitudinis spatio horarum 2. 11. 26 fuisse min. 1. 44, quod in singulas horas efficit sec. 48, in observatione autem Galleti anni 1677 eum motum spatio horarum 5. 14. 20 comperimus min. 4. 21, nempe unius horæ spatio sec. 50, ac denique in nostra horis 5. 1. 9, min. 4. 18, sive hora una sec. 51; medium inter hosce latitudinis motum horarium eligentes sec. 50, inveniemus latitudinem illam egredientis mercurii in observatione Gassendi horas sibi 6. 30 deponere; quibus ab hora egressus 22. 28 lutetiæ subductis, fit tempus, quo planeta nodum attingit in meridiano parisiensi hor. 15. 58. Fuit autem coniunctio parisiis, ut supra dictum, hor. 19. 56; transitus igitur per nodum coniunctionem antecessit hor. 3. 58. Porro cum mercurii motum e sole visum prope hunc nodum, ad eclipticam reductum, supra statuerimus grad. 1. 37. 34 intervallo horarum 6. 22. 30, qui in horis 3. 58 fit grad. 1. 0. 33, si hic e longitudine telluris, coniunctionis tempore e sole visa, subducatur, quæ longitudo fuit tauri grad. 14. 41. 47, prodit longitudo nodi e sole in observatione anni 1631 in tauri grad. 13. 41.

Haud secus in congressu anni 1677 inveniemus latitudinem illam, qua cum mercurius e sole excessit, nempe min. 6. 12, horas requirere 7. 26, ab exitus tempore, quod in insula S. Helenæ fuit hor. 2. 41, subducendas, ut habeatur hora transitus mercurii per nodum hora 19. 15. Quare cum coniunctio ibidem fuerit hor. 0. 10, fit intervallum inter transitum mercurii per nodum, ac coniunctionem hor. 4. 55. Huic tempori debetur mercurii motus a sole visus grad. 1. 15. 3, demendus loco telluris e sole viso tempore coniunctionis, nempe tauri 15. 44. 31, fietque locus nodi in observatione anni 1677, tauri 14. 29.

Ab anno igitur 1631 ad 1677 motus nodi hinc elicitur min. 48, hoc est in annos singulos sec. 62. Ab anno autem 1677 ad 1723 minutorum 41, nempe in annos singulos sec. 53, ac denique a 1631 ad 1723 motus extitit grad. 1. min. 29, nempe pro quolibet anno sec. 58, atque hæc postrema securior videtur huiusce motus definitio.

Verum cum certum sit paucorum secundorum errorem in latitudine, minutis aliquot longitudinem nodi mutare posse,

se, id quod modico hoc temporis spatio, a prima Gassendi observatione elapso, non contemnenda efficiat in annuo nodorum motu discrimina, is unus ætate nostra superesse videtur harum observationum usus, non tam ut ex his huiusce motus quantitatem inquiramus, quam ut comparando experiamur, cuinam motus hypothesei observationes ipsæ propius respondeant. Duas ergo illas, quas dixi, hypotheses, alteram, quæ motum sec. 51, alteram, quæ circiter min. 1. 20 nodo in annos singulos tribuit, ad coniunctiones hætenus observatas expendemus. Coniunctionum ipsarum tempora, & loca, nec non mercurii latitudines, quibus ad hæc comparationes utemur, hic præmittimus.

1631. Coniunctio mercurii cum sole novembris 6 hora bononiæ 20. 32 tempore vero, sed æquali hor. 20. 16, ut supra invenimus. Locus coniunctionis in scorpii grad. 14. 41. 47. Latitudo mercurii min. 3. 18 bor. quanta elicitur ex latitudine tempore egressus (quam fuisse ostendimus min. 5. 25) ex motu horario latitudinis sec. 50, & ex intervallo inter coniunctionem, atque egressum supra tradito hor. 2. 32.

1677. Coniunctio novembris 7 hora bononiæ 1. 20 temp. ver., seu hor. 1. 4 temp. med. locus coniunctionis scorpii grad. 15. 44. 31, ut paullo antea supputavimus. Latitudo in ipsa coniunctione min. 4. 6 bor. Elicitur ex latitudine egressus min. 6. 12, ex motu horario latitudinis sec. 50, & ex intervallo quo coniunctio egressum præcessit hor. 2. 31.

1690. Coniunctio novembris 9 hora bononiæ 18. 57 temp. ver., seu hor. 18. 41 temp. med. locus coniunctionis scorpii 18. 19. 57. Elicitur ex medio transitu Cantone observato hor. 1. 26 (ut Cassinus referente du Hamel in Historia academiæ 1698) ex angulo semitæ apparentis cum ecliptica grad. circiter 8, ex latitudine tempore coniunctionis, mox subiicienda, ex motu horario mercurii in semita sua min. 6. 7, & ex differentia meridianorum Cantonis ac bononiæ hor. 6. 46. Latitudo in ipsa coniunctione min. 12. 22 bor. Cassin. in comment. acad. 1707.

1697. Coniunctio novembris 2 hora bononiæ 18. 34 temp. ver. sive hor. 18. 18 temp. med. locus coniunctionis scorpii grad. 11. 34. 45. Elicitur ex hora parisiis a Cassino
T. II. P. III. E obser.

observata 17. 58, & ex differentia meridianorum bononiæ ac lutetiæ min. 36. Latitudo tempore coniunctionis min. 10. 42. au. Cassin. in comment. acad. 1707.

1723. Coniunctio novembris 9 hora bononiæ 6. 5 temp. ver. nempe hor. 5. 49 temp. med. locus coniunctionis scorpii grad. 16. 47. 10. Latitudo tempore coniunctionis min. 5. 29. bor. quemadmodum supra invenimus.

Locus coniunctionis, sive solis longitudo in hisce observationibus, e cassinianis tabulis deprompta est. Inclinatio plani orbitæ ad eclipticam in subsequentijs calculis assumitur grad. 6. 54, quanta ab astronomis passim statuitur, observatione hac nostra parum discrepante. Denique logarithmi distantiarum mercurii, necnon telluris, a sole iidem usurpantur, quos supra tradidi; neque enim hæc elementa exactissime nota esse in hoc negotio requiritur.

*In coniunctionibus annorum 1631, 1677,
intervallo annorum 46.*

Locus terræ ex sole in coniunctione 1631	8 14° 41' 47"
Locus terræ in coniunctione 1677	8 15 44 31
Ergo terræ locus promotior in secunda observatione	1 2 44
In hypothesi motus annui nodorum sec. 51 motus annis 46 competens	39 25
Ergo incrementum distantiae mercurii a nodo	23 19
Huic incremento respondet incrementum latitudinis a sole visæ, calculis subductis,	2 55
Sed incrementum latitudinis ex tellure visæ	1 21
In hypothesi vero motus annui nodorum min. 1. 20, annis 46 debentur	1 1 20
Ergo incrementum distantiae a nodo	0 1 24
Cui competit incrementum latitudinis ex sole	0 7
Sed ex tellure	0 3
Latitudo mercurii in coniunctione anni 1631	bor. 3 18
Latitudo in coniunctione anni 1677	bor. 4 6
Ergo incrementum latitudinis ex tellure observatum ab anno 1631 ad 1677	0 48
	Et.

Eodem pacto in reliquis coniunctionum comparationibus incrementa, aut decremента latitudinis in utraque hypothese supputavimus, atque eadem, sicut observata fuerunt adiecimus. Sed compendii gratia, calculis omiffis, rem totam in synopsim hanc, quæ sequitur, contulimus.

Coniunctionum compara- tiones	Inter- vallū ann.	Incrementum, vel decrementum latitudinis e tellure visa a prima ad secundam coniunctionem.		
		Ex hypothese motus annui nodi sec. 51.	Ex hypothese mo- tus annui nodi min. 1. 20.	Ex obser- vatione ipfa
1631 1677	46	incrementum 1 21	increm. 0 3	0 48
1631 1690	59	incrementum 9 25	increm. 7 52	9 4
1631 1697	66	decrementum 13 28	decrem. 15 21	14 0
1631 1723	92	incrementum 2 42	increm. 0 6	2 11
1677 1690	13	incrementum 8 4	increm. 7 49	8 16
1677 1697	20	decrementum 14 49	decrem. 15 29	14 48
1677 1723	46	incrementum 1 21	increm. 0 3	1 23
1690 1697	7	decrementum 22 53	decrem. 23 13	23 4
1690 1723	33	decrementum 6 43	decrem. 7 46	6 53
1697 1723	26	incrementum 16 10	increm. 15 27	16 11

Ex his iudicare licebit, utri ex iis, quas diximus, hypothefibus melius observationes respondeant. Mihi Gassendi præfertim observatio motum quidem nodorum, æquinoctio-
rum præcessione nonnihil celeriozem postulare videtur; multo tamen eum lentiozem esse, quam pro annuis min. 1. 20 manifesto liquet. Ac nescio an in illa Gassendi obser-
vatione latitudo adhuc sec. circiter 30 minuenda fuerit, ut reliquis propius respondeat, quod si fiat, comparationes

omnes cum hypothesi motus annui sec. 51 fere ad unguem consentient.

Ceterum hunc motum longe deficere ab annuis min. 1. 20, ni fallor, confirmatur ex mercurio ad nodum alterum in sole non viso die 8 maii 1720, id quod planetæ latitudinem (tunc australem) maiorem ostendit, quam ex plerisque astronomorum tabulis, posteriori huic hypothesi innixis, efficitur, atque hoc ipso nodos nonnihil retrahendos significat.

In tychonico mundi systemate nihil refert quantus sit nodorum mercurii, vel planetæ alterius primarii motus. In pythagorica autem hypothesi non æque integrum arbitror. Si enim planetarum nodos, plusquam æquinoctia retrocedunt, progredi, hoc est vere moveri, observationes evincant, plana ipsa orbitarum necessario movebuntur. Atqui terrestris orbitæ, nempe eclipticæ, planum non moveri ex immutatis inerrantium siderum latitudinibus constat; mirum igitur, si tellus planeta est.

*Meridianorum differentia quædam ex observationibus
huiusce mercurii cum sole congressus.*

DUM hæc scriberem, observationes nonnullas de hoc mercurii sub sole transitu, aliis in locis habitas, accepi. Earum observationum cum nostris collatione differentiam temporariam meridiani bononiensis ab eorum locorum meridianis deduxi.

Patavii vir clarissimus Ioannes Marchio Polenus, eius gymnasii mathematicus præstantissimus, in epistola, quam ea de re Gabrieli fratri meo inscriptam vulgavit, mercurium ad solis marginem observatum sibi memorat hor. 3. 29. 54, atque hoc est tempus ingressus centri, quemadmodum ex ipsius verbis facile colligitur. Fuit autem ingressus centri, ex iis, quæ supra posuimus, bononiæ h. 3. 27. 0, ergo differentia temporis, qua Patavium bononia in ortum vergit min. 2. 53, intra sec. 30 consentiens cum ea differentia, quam ex aliis observationibus antehac collegimus min. 2. 24.

Romæ Illustrissimus Præsul Franciscus Blanchinus ingres-
sum

sum quidem mercurii in orbem solis non notavit, verum in iis, quas ad me dedit, literis deprehensam sibi narrat differentiam temporariam ascensionis rectæ mercurii, ac limbi orientalis solis secundorum temporis sex hora 3. 44, atque iterum secundorum 26 hora 4. 38. Ex pluribus autem cum lunæ, tum satellitum iovis eclipsibus ab eodem viro celeberrimo romæ, atque abs me bononiæ observatis constat romam bononia orientaliorem esse min. 4. 25 sat proxime; quæ differentia, si ex horis 3. 44, & 4. 38 subducatur, fient tempora duarum, quas dixi, mercurii observationum in meridiano bononiæ hor. 3. 40, & hor. 4. 34, quibus temporibus differentias ascensionis rectæ mercurii, & limbi orientalis fere ad unguem easdem nobis, atque ipsi observatas, ex observationum nostrarum serie apparet.

Genux vir doctrina, iuxta ac nobilitate, summus, Paris Marchio Salvagus, amplissimæ eius reipublicæ Senator, mercurii ac solis contactum observavit hora 3. 20. 33, cui tempori consensisse refert a clarissimo Abbate Barabino habitam eiusdem phasis determinationem, etsi utramque, nonnullis, quas memorat, de causis, nonnihil dubiam existimat. Si ergo id de interiori mercurii, & solis contactu interpretemur, quoniam hic bononiæ accidit hora 3. 27. 44, erit genua occidentalis bononia minutis temporariis 7. 12. Hanc tamen differentiam minorum saltem 9 ex lunæ eclipsibus utrobique observatis alias, ac certius, ni fallor, deduximus.

Parisiis in observatorio regio celeberrimus astronomus Iacobus Philippus Maraldus (ut suis ad me literis significavit) mercurium in limbo solis primum deprehendit hora 2. 50. 13. Nos bononiæ hora 3. 26. 22; observatorium ergo parisiense nostro occidentalius est minutis 36. 9. Contactus interior solis, & mercurii parisiis accidit hora 2. 51. 48; bononiæ vero hora 3. 27. 45. Iterum ergo parisiense observatorium occidentalius bononiensi min. 35. 57. Posterior hæc determinatio certior videtur, quod in priori illa observatione constare nequeat, an utrobique, cum primum planeta videri cœpit, eadem diametri suæ parte soli immerfus esset. Utraque autem optime consentit observationibus aliis permultis, lutetiæ, ac bononiæ habitis, quarum plurimæ in commentarios regis illius academix relata extant.

Bibur.

Biburgi ad danubium, quod oppidum min. 1. 40 ingolstadio orientalius perhibetur, mercurius ortivum solis limbum ingressus erat hor. 3. 30. 0, ut ex literis doctissimi, atque ornatissimi P. Nicasii Grammatici Soc. Iesu, qui ingolstadii degens (ubi mathesim summa cum laude profectur) transitum hunc, ob interpositas nubes, observare nequivit, quod idem sibi norimbergæ accidisse significavit vir nobilissimus, ac doctissimus Ioannes Philippus Wurtzelbau. Quoniam ergo totalis ingressus notatus est nobis hor. 3. 27. 45, erit biburgum orientalius bononia min. 2. 15 temporis.

Ingolstadium vero (quippe biburgo occidentalius min. 1. 40) erit orientalius bononia min. 0. 35. Harum urbium duarum meridianos ex lunari quoque eclipsi die 28 iunii 1722, utrobique observata, parum aut nihil differre compertum habemus.

Oeniponte mercurius totus solem ingressus erat hor. 3. 29. 13, ut ex eiusdem P. Grammatici literis cognovi. Bononiæ hora 3. 27. 45. Ergo œnipons orientalius bononia min. 1. 28.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Septentrio 20 30 31 32 33
Minuta circuli maximi






Fig. II.

Fig. I.





EUSTACHII MANFREDII

*De iovis & martis coniunctione heliocentrica,
observata anno MDCCXXVII.*

Superiori anno MDCCXXVII mensibus maio, iunio, & iulio determinata sunt in hoc observatorio permulta temporis puncta, quibus vel mars vel iuppiter meridianum circulum traiecerunt, necnon & meridianæ eorundem planetarum altitudines; constabat enim fore, ut hi planetæ die 29 mensis iunii in una linea recta, seu potius in uno plano, eoque ad planum eclipticæ perpendiculari, simul cum centro solis existerent; per quod tempus planetarum alterius ab altero distantia minima fuit illarum omnium, quas vel in illa conversione synodica obtinere potuimus, vel in sequenti exspectamus, quæ anno MDCCXXVIII, septembri mense exeunte, finietur. Atque ego quidem observationes illas, & calculos, qui ad has spectarent, necnon & alia, quæ ipse in martis motibus per id tempus animadvertissem, proximo superiori augusto mense ad Iacobum Riccatum Comitem, sodalem nostrum, misi, cum omnia in epistolam contulissem. Idque feci, ut satisfacerem viro doctissimo, ac me dudum hortanti, ut observatione quapiam perquirerem, an marte ad iovem quamproxime accedente, appareret aliqua in illius cursu irregularitas aut perturbatio, qua illa Newtoni hypothesis confirmaretur, planetas, atque adeo corpora omnia se mutuo trahere. Nunc illius epistolæ summam exponam.

Planetæ, quos diximus, ad meridianum circulum perveniebant provento iam die. Iuppiter, cum meridianum ipsum attingeret, iam inde a die 17 mensis maii ante meridiem observari potuit, quo tempore, quamvis non longius a sole abesset, quam gradus circiter 13, tamen & eius tempora, & altitudines satis commode notabantur per semicirculum muralem illum, quem dudum Aloysius Ferdinan-

nandus Marfilius in observatorium contulerat. Et tempora quidem illarum iovis traiectionum, eiusdemque altitudines, tum ascensiones rectas, declinationes, longitudes, latitu-

Observationes ζ	Tem. ver. post meri:			Altitudo merid. corr:			Ascensio recta.		
	H	'	"	G	'	"	G	'	"
Maii 16	23	7	6	60	13	35	40	19	37
25	22	39	$20\frac{1}{2}$	60	51	5	42	21	52
27	22	33	5	60	59	25	42	48	59
Iunii 4	22	7	$42\frac{1}{2}$	61	30	35	44	37	17
9	21	51	$35\frac{1}{2}$	61	49	25	45	44	1
11	21	45	$2\frac{1}{2}$	61	56	35	46	9	21
23	21	5	$32\frac{1}{2}$	62	37	37	48	42	47
25	20	58	$55\frac{1}{2}$	62	43	48	49	7	58
26	20	55	36	62	46	50	49	20	19
27	20	52	$15\frac{1}{2}$	62	49	55	49	32	12
29	20	45	$35\frac{1}{2}$	62	55	50	49	56	17
30	20	42	$14\frac{3}{4}$	62	58	45	50	8	4
Iulii 4	20	28	$56\frac{1}{4}$	63	10	18	50	55	34
5	20	25	36	63	13	10	51	7	8
23	19	25	$44\frac{1}{4}$	63	57	55	54	19	41

dinesque, quas initis calculis ex observationibus selectio-
ribus, eisque ipsis quindecim, deduximus, sequens tabula
ostendit.

<i>Declinatio Septen:</i>			<i>Longitudo ♄</i>			<i>Latitudo Merid:</i>		
G	'	"	G	'	"	G	'	"
14	42	41	12	29	1	0	56	41
15	20	13	14	32	57	0	56	13
15	28	32	15	0	23	0	56	3
15	59	43	16	49	11	0	56	5
16	18	34	17	55	59	0	56	2
16	25	44	18	21	20	0	55	53
17	6	47	20	53	55	0	56	4
17	12	58	21	18	44	0	56	18
17	16	0	21	30	55	0	56	24
17	19	5	21	42	40	0	56	22
17	25	0	22	6	25	0	56	36
17	27	55	22	18	2	0	56	39
17	39	28	23	4	47	0	56	56
17	42	20	23	16	10	0	56	55
18	27	7	26	34	38	0	57	39

Quo loco animadvertere licet, iovis positus observatos nobis, consignatosque in hac tabula iis calculis, quos ex tabulis Cassini inivimus habita ratione postremarum correctionum motuum iovis, quas correctiones Maraldus edidit, tantum respondere, quantum postulare æquum est. Contra vero decem ipsa minuta aberrant ab iis calculis, quos ego & Iosephus Marchesius, sodalis noster, ex tabulis tum Hiri, tum Vistoni subduximus.

Observationes martis non æque faciles fuerunt, ut iovis. Die 26 mensis maii observari primum Mars in meridiano cœptus est, ante meridiem, cum distaret a sole gra-

Observationes ♂	Temp: ver: post merid.			Altitudo merid. corr.		
	H	'	"	G	'	"
Maii 25	22	23	10 dub.	60	6	28 dub.
Iunii 4	22	11	13 $\frac{1}{2}$	62	21	34 dub.
5	22	10	2 $\frac{1}{2}$ dub.	62	33	29 dub.
25	21	45	36	66	9	59 dub.
28	21	41	59	66	36	15 dub.
30	21	39	32 $\frac{1}{2}$	66	51	0 dub.
Iulii 4	21	34	51 $\frac{3}{4}$	67	20	57
5	21	33	41 $\frac{1}{4}$	67	28	1
6	21	32	21 $\frac{1}{4}$	67	35	6 dub.
7	21	31	24 $\frac{1}{2}$	67	40	36 dub.
Augusti 1	21	4	45 $\frac{1}{2}$	69	18	38 dub.

dus 24, unde spes erat, ut insequentibus diebus recedens a sole magis magisque, quotidie melius cerni posset. Spem illam fefellit sæpe tenuis nebula, quæ quasi ad constitutum tempus inter meridiem, & occidentem excitata, ultra altitudinem illam efferebatur, quam planeta per meridianum transiens obtinere debuisset; ipsumque idcirco non nisi ægre admodum cerni, patiebatur. Quod dico, ut intelligatis, observationes illas omnes, quas fecimus, altitudinum in primis, non nisi tamquam dubias a nobis poni. Eas sequens tabula ostendet.

<i>Ascensio recta.</i>	<i>Declinatio septen.</i>	<i>Longitudo ♄</i>	<i>Latitudo merid.</i>
G ' "	G ' "	G ' "	G ' "
38 18 30	14 36 8	10 35 37	0 26 51
45 30 10	16 51 14	17 52 22	0 20 57
46 14 1	17 3 9	18 35 57	0 21 7
		II	
60 50 8	20 39 39	2 52 19	0 6 46
63 2 25	21 5 55	4 58 40	0 4 8
64 29 58	21 20 40	6 21 36	0 3 57
67 27 13	21 50 37	9 9 5	0 1 8
68 11 21	21 57 41	9 50 37	0 0 20
68 55 26	22 4 46	10 32 6	0 0 43
69 40 12	22 10 16	11 13 56	0 0 21
87 59 10	23 48 18	28 9 27	0 20 3

Ut cognosceretur, an aliqua ex hisce observationibus incurfu martis ostenderetur perturbatio, subductæ sunt longitudes, quas in singularum observationum temporibus habere mars debuisset ex illis astronomorum tabulis, quæ accuratissimæ adhuc habentur, idest Cassini, Hirei, & Viltoni. Hæ sic se habent.

Longitudi- nes ♂	ex Cassini ♂	Hirei II	Wiltoni ♂	Observatio- nibus ♂
	G ' ''	G ' ''	G ' ''	G ' ''
Maii 25	10 32 49	10 34 52	10 34 49	10 35 28
Iunii 4	17 50 3	17 51 51	17 51 49	17 52 22
5	18 33 28 II	18 35 16 II	18 35 12 II	18 35 57 II
25	2 49 12	2 51 57	2 50 38	2 52 19
28	4 55 27	4 58 19	4 56 53	4 58 40
30	6 19 26	6 22 24	6 20 45	6 21 34
Iulii 4	9 6 44	9 9 40	9 7 43	9 9 5
5	9 48 21	9 51 20	9 49 22	9 50 37
6	10 29 56	10 32 58	10 30 54	10 32 6
7	11 11 29	11 14 33	11 12 22	11 13 56
Augusti 1	28 8 33	28 11 46	28 8 52	28 9 27

Quod

Quod ad latitudines spectat, difficile est eas sic comparare, ut certi aliquid concludere possimus; idque propter irregularitatem illarum, quæ ex observationibus ducuntur, quæ irregularitas oritur ex illa, quam modo diximus, altitudinum determinandarum incertitudine. Tamen observatarum latitudinum hic ordo esse videtur, ut quamdiu meridionales sunt, nempe ad diem usque quintum iulii, plerumque minores sint, quam illæ, quæ ex una qualibet astronomorum, quos supra memoravimus, hypothese eliciuntur; e contrario fere semper maiores sint, cum septentrionales evaserint, nempe ex die quinto iulii. Harum series hæc est.

Latitudines ♂	ex Cassini M		Hiræi M		Wistoni M		Observationibus M	
	G	' "	G	' "	G	' "	G	' "
Maii 25	0	27 57	0	27 53	0	29 0	0	26 51
Iunii 4	0	21 23	0	21 35	0	22 42	0	20 57
5	0	20 45	0	20 55	0	22 2	0	21 7
25	0	7 21	0	7 31	0	8 36	0	6 46
28	0	5 12	0	5 24	0	6 27	0	4 8
30	0	3 49	0	3 58	0	5 1	0	3 57
Iulii 4	0	1 0	0	1 8	0	2 11	0	1 8
5	0	0 14	0	0 25	0	1 27	0	0 20
6	0	0 27	0	0 18	0	0 43	0	0 43
7	0	1 9	0	1 2	0	0 0	0	0 21
Augusti 1	0	19 25	0	19 33	0	18 39	0	20 3

Cum

Cum hæc adhuc observarentur, animadverti, martem diebus illis, quibus propius aberat a coniunctione heliocentrica cum iove, haud multum abesse a parallelo arcturi, quæ stella insignis est, cuiusque traiectiones per meridianum tum ad horologia examinanda, tum alias ob causas quotidie notabantur. Constitui ergo, martem ad hanc stellam referens, eius motus perquirere, notando scilicet differentiam temporum, quibus tum hæc, tum ille per meridianum ipsum transibant, quæ methodus multo simplicior est, minusque erroribus obnoxia, quam prima illa, in qua tempora traiectionum planetæ ad meridiei horam referuntur, &

♂		<i>Tempus medi: inter ♂ & ♂ Arcturum.</i>			<i>Ascensio recta. ♂</i>		
-----		H ' "			G . "		
Iunii	25	9	58	82	60	49	41
	28	9	49	35 $\frac{3}{4}$	63	1	37
	30	9	43	43 $\frac{3}{4}$	64	29	51
Iulii	4	9	31	59 $\frac{1}{4}$	67	26	16
	5	9	29	3 $\frac{1}{2}$	68	10	31
	6	9	26	7 $\frac{1}{4}$	68	54	42
	7	9	33	10 $\frac{1}{2}$	69	39	0

supputationes e loco solis dependent in ecliptica sane variabili. Atque hac quidem methodo observationes fieri poterunt non plus septem, ex quibus supputationes sequentes peractæ sunt, sic quidem ut ascensio arcturi sumeretur grad. 210. 49'. 46'', quanta scilicet ex aliis observationibus, eodem hoc anno vertente factis, elicitur. Quamquam minime necessarium erat ascensionem hanc accuratissime definire; hic siquidem non tam de veris planetæ locis solliciti eramus, quam de eius velocitatibus, quæ differentiæ sunt longitudinum inter unum locum & alterum.

<i>Declinatio superius inventa.</i>	<i>Longitudo II</i>	<i>Latitudo Merid.</i>
G ' ''	G ' ''	G ' ''
20 39 40	2 51 55	0 6 39
21 5 55	4 57 56	0 4 0
21 20 40	6 21 30	0 3 57
21 50 37	9 8 12	0 1 0
21 57 40	9 49 50	0 0 14
22 4 46	10 31 25	0 0 49
22 10 16	11 12 50	0 0 29

Ut autem cognoscatur, utrum hisce observationibus perturbatio ulla motus martis, ab iovis attractione orta, ostendatur, absque eo quod vires directionesque subtilius perquiramus, quibus sol, iuppiter, & mars agere in se mutuo, in hac attractionum hypothesi, debuissent; diversosque angulos metiamur, sub quibus aliæ, atque aliæ partes orbitæ, quas mars deinceps propter eas vires describeret, e terra conspici debuissent; mihi quidem satis videtur, duo tantum considerare; quorum unum ad id spectat, quod efficere appropinquatio iovis debuisset in martis latitudine, trahendo ipsum paullatim extra eius orbitam ad eam partem, ubi ipse iuppiter versabatur; alterum ad id spectat, quod velocitas motus martis in longitudine manifestare sane debuisset; quam velocitatem, adveniente vi iovis attractiva, mutari non nihil oportebat, ab eoque ordine discedere, quo planeta ante vel accelerabatur ipse per se, vel retardabatur.

Quod autem ad primum spectat, cum sit his temporibus, iuxta astronomorum hypotheses, nodus ascendens martis circa grad. 17. 30' tauri, eiusque orbita inclinationem ad eclipticam habeat grad. 1. 52'. Nodus vero iovis circa grad. 7. 30' cancri; eiusque orbita inclinationem ad eclipticam habeat grad. 1. 20'; ex his sane trigonometrica ratione comperio, communem sectionem, qua se interfecant duæ orbitæ, quas planetæ hi tenent, cadere circa grad. 2 hinc arietis, hinc libræ; cum iovis orbita, qua parte ab ariete ad libram procedit, meridionalior sit, quam martis.

Ex his porro sequitur, ut cum planeta uterque in illo fux orbitæ semicirculo versatur, qui a 2°. grad. arietis iuxta signorum ordinem usque ad 2 libræ protenditur (in hoc autem semicirculo versati ambo sunt per totum observationum nostrarum tempus) iuppiter semper ex ea parte sit, quæ marti est australis; quo sane fit, ut si iuppiter attractiva vi sua deducere martem potest extra planum illius orbitæ, quam tenet, debeat utique ipsum trahere versus partem meridionalem; eaque re fieri necesse est, ut latitudo martis (sive e terra spectetur, sive e sole), si meridionalis quidem sit, maior videri debeat, sin autem septemtrionalis, minor, quam videretur, si iovis attractio esset nulla.

Nunc vero ex observationibus, quas supra retulimus, manifestum fit, illo quidem tempore, quo observabamus,
rem

rem plane fecus cecidisse; quemadmodum paullo ante animadvertimus. Nam utique latitudo martis, cum esset meridionalis, (fuit autem usque ad diem 5 iulii) plerumque minor comperta est; & contra ex illo die, cum iam esset septentrionalis, maior, quam ferant tabulæ astronomorum, quas supra dixi, quæque accuratissimæ sunt inter omnes, quas nos quidem novimus. Si quid ergo ex his latitudinum observationibus ad rem nostram potest colligi, id sane non attractionem iovis confirmat, sed potius tollit. Quod si observationes fieri potuissent accuratissime, facile crediderim futurum fore, ut nihil, ad sensum utique, discreparent a calculis, quos ex Cassini, aut Hirei tabulis subduximus; quæ tabulæ, quod ad latitudines spectat, nihil fere ab observationibus dissentiunt, ut videantur, in hoc quidem, vistonianis anteponendæ. Et sane observationes martis, quæ diebus 4 & 5 iulii habitæ fuerunt, quæque inter ceteras certissimæ sunt, nihil quidquam ab iis calculis discreparunt.

Quod vero ad illud spectat, quod secundo loco proposueram; sit S centrum solis, qui in illa attractionum hypothesis ponendus est tamquam immobilis, cum terra e contrario tamquam mobilis ponenda sit, quasi orbem quemdam annum TEL percurreret circa solem. Sit præterea IVP pars illa orbitæ iovis, quam iuppiter observationum nostrarum tempore perlustrabat; MAR illa, quam perlustrabat mars. Sit autem punctum M illud ipsum, in quo primum attractio iovis, ante eius cum marte coniunctionem sensibilis fieri cœpta est. Oportet ergo, martem, propter hanc attractionem, ex ipso puncto M discedere sensibilibus cœpisse ab orbita sua MAR, aliamque ingredi curvam lineam MON, quæ orbitam MAR in M exterius tangeret. Sit demum SOV illa recta linea, in qua planetarum coniunctio heliocentrica secuta est, cum existeret iuppiter in puncto V suæ orbitæ, mars vero in puncto O curvæ MON.

Iam vero si illa attractionum hypothesis valet, non est dubium, quin toto illo tempore, quo mars ex M ad O processit, vis illa, qua trahebatur ab iove, eo tenderet, ut ipsum, oblique licet, versus lineam immobilem SOV, pariter traheret; qua in linea planetæ ambo tandem coniuncti sunt; quæ vis propterea conspirabat cum vi illa, qua mars ceteroqui secundum ordinem signorum ex M versus lineam

SOV fertur. Contra vero post coniunctionem, quo tempore mars ex O processit, verbi gratia, usque ad N, attractiva vis iovis ipsum retrahebat versus lineam SOV; & nitebatur quodammodo contra directionem vis illius, quæ ceteroqui martem, per eius orbitam, ex A versus R, detulisset; quæque ipsum deferebat in illa curva, quam dixi, ex O versus N.

Ut ergo ignoretur, & quantum mars ex harum virium compositione deinceps progredi debuisset, & præterea, idque multo magis, quanto maiores, minoresve in dies videri progressionem regressionesve martis debuissent, e terra, pro vario ipsius positu, spectatæ, quam visæ essent, si mars suum cursum sine perturbatione ulla tenuisset; manifestum certe videtur, debuisse vim iovis accelerare motum martis in longitudine ante coniunctionem, post coniunctionem retardare. Quo mihi videtur motus quoque apparens martis e terra spectatus eandem fere legem debuisse sequi, diverso curvarum MAR, MON positu nihil id aut certe parum impediens; facit enim attractivæ vis exiguitas, ut hæc curvæ parum admodum inter se dissent.

Atque hoc posito animadvertendum est, velocitatem apparentem martis, e terra spectatam, vel sine ulla attractione iovis, per totum illud tempus, quo observationes peregrimus, debuisse perpetuo minui, idque duabus de causis, quæ simul iunctæ eodem spectabant. Una est, quod planeta in ea parte orbitæ versabatur, qua secundum ordinem signorum progrediens a perihelio versus aphelium fertur, qua in parte realis eius motus semper retardatur. Altera est, quod mars respectu terræ a coniunctione versus oppositionem solis procedebat, quo tempore, etiamsi realis eius motus esset æquabilis, tamen apparens, saltem quoad planeta directus est, (fuit autem per observationum tempus) debebat perpetuo minui. Componendo igitur perpetuam hanc motus retardationem cum vi iovis attractiva, martem, ut supra diximus, accelerante modo, modo retardante, affirmare posse mihi videor, velocitatem martis apparentem, post eius heliocentricam cum iove coniunctionem, propter iovis ipsius attractivam vim, debuisse plus minui (nempe si ad velocitatem, quæ erat ante coniunctionem, comparetur) plus, inquam, minui, quam calculi postulabant; plus scilicet,

cet, quam si nulla omnino esset attractio. Idque fane indicio esse potest ad cognoscendum, utrum ulla sensibilis attractio intercesserit, etiamsi satis non sit ad quantitatem eius declarandam.

Ut autem hoc argumento utamur, scire convenit tempus ipsum, quo planetarum coniunctio facta fuit, quod tempus etsi accuratissime definiri non potest, si mars quidem e sua orbita elapsus curvam lineam MON peragraverit, tamen ex illo consensu, qui inter loca iovis observata & cassinianas tabulas compertus est; illoque trium admodum minorum excessu, qui pariter in iisdem tabulis compertus est, cum ad loca martis observata conferrentur, statui utique citra errorem potest, coniunctionem ipsam paucis horis calculos antecessisse, quos ex his tabulis subduximus. Ac cum hi calculi coniunctionem ipsam ostenderint die 29 iunii hor. 8 post meridiem, putare facile possumus, ipsam die 29 circa meridiem secutam esse, quippe de horis aliquot incertos nos esse, ad id quidem, quod volumus, nihil interest.

Ponemus igitur observationem martis, quam notavimus die 28 iun. hor. 21. 41'. 59'', ut certum quemdam quasi terminum, quo distinguantur motus martis, qui coniunctionem antecesserunt, ab iis, qui post coniunctionem eandem secuti sunt, ut videamus tandem, an hi motus ea lege, eaque ratione retardati sint, quam modo diximus.

Vistoni tabulæ, quæ in longitudinibus martis videntur inter alias accuratissimæ (quippe quæ ad minutum unum cum observationibus consentiunt diebus vel illis, a quibus omnis aberat perturbationis suspicio; uti dies sunt 25 maii, & 4 & 5 iunii) die 25 iunii tempore observationis martem statuunt in grad. 2. 50'. 38'' gemin.; die porro 28 in grad. 4. 56'. 53'' signi eiusdem. Quapropter planetæ motus in his tribus diebus, seu potius in tribus hisce martis reversionibus, erat e Vistoni tabulis grad. 2. 6'. 15''; nempe in diebus duobus, proportione servata, grad. 1. 24'. 10''. Iam ex iisdem tabulis eodem modo colligitur, motus martis a die 28 ad 30 iunii grad. 1. 23'. 52''. Velocitas ergo, quæ marti convenit ex his tabulis in diebus duobus, qui coniunctionem secuntur, ab illa deficit, quam mars habet per duos illos dies, qui coniunctionem antecedunt secundis non am-

plius 18''. Ex observationibus autem, quas peregrinus (illis quidem, quæ ad solem relatæ sunt), compertum est, motum martis a die 25 ad 28 fuisse grad. 2. 6'. 21'', nempe grad. 1. 24'. 14'' in dies duos; motum autem duorum sequentium dierum a 28 ad 30, fuisse grad. 1. 22'. 54''. Velocitas ergo observata per dies duos post coniunctionem ab illa deficit, quæ diebus duobus ante coniunctionem observata est, minutis ipsis 1'. 20''. Ex observationibus ergo plus deficit, quam ex calculis, minutis 1'. 2''. Atque id quidem attractionum hypothese esset satis consentaneum.

Verum si pro illis longitudinibus, quas ex observationibus martis ad solem relati notavimus, illis utamur, quas deductas habemus planetam ad arcturum referentes, inveniemus motum trium dierum, qui coniunctionem præcesserunt, idest a die 25 usque ad 28 fuisse grad. 2. 6'. 1'', ut diebus duobus grad. 1. 24'. 0'' convenient; dierum vero duorum, qui coniunctionem sunt secuti, motum, idest a die 28 ad 30, fuisse 1. 23'. 34''. Atqui secunda hæc velocitas a prima illa deficit secundis ipsis 26''; cum calculis compertum sit debere eam deficere secundis 18''. Nihil ergo ad confirmandam attractionum hypothese reliquum est, nisi secundorum 8'' differentia; quæ sane, ad concludendum quidpiam, nihil est; potest enim eadem hæc differentia ex eo oriri, quod quarta tantum parte unius secundi minuti temporis erratum sit in determinando vel martis, vel arcturi transitu, sive etiam in corrigendo horologio, aut murali instrumento die 28; neque ad subtilitatem tantam aspirare observando quisquam potest.

Atque ego quidem nullus dubito, quin differentiarum longitudinum, sive motuum martis, quas ex arcturo, multo certiores sint tutioresque, quam illæ, quas ex sole deduximus; idque ut credam tum methodi simplicitas facit, tum ipsa datorum, quæ ad rem adhibentur, paucitas. Huc accedit ipsa velocitatum observatarum progressio; namque in illis, quæ a sole pendent, diversi quidam quasi irregulares saltus animadvertuntur, qui in aliis nulli sunt, neque cum ipsa perturbationum hypothese ullo modo consentiunt. Optandum ergo erat maxime, ut observationes martis cum arcturo plures haberentur, nec non & eius declinationes certissimæ, diebus præsertim 26. 27. 29 iunii; ut & comparari
simul,

simul, & componi multis modis possent; conclusionesque, quæ inde ductæ essent, aliæ aliis confirmari, & corrigi. At cum dierum non amplius trium motum ante coniunctionem, nempe a die 25 ad 28, habeamus cognitum, in eoque oporteat, quæstionem hanc subtilissimam totam verti, necessarium utique esset, hunc ipsum motum accuratissime cognovisse, ac sine illa dubietate, quæ in determinationem præsertim altitudinum irrepsit.

Tamen ad rem totam, quoad eius fieri potest, illustrandam, comparavi velocitatem, quæ in dierum, quos modo dixi, intervallo colligitur, cum illis velocitatibus, quæ intervallis aliis, inter vicesimum octavum diem, alioque, qui coniunctionem secuti sunt, conveniunt. Ac cum id similiter fecerim in iisdem velocitatibus, ut sunt e vistonianis numeris deductæ; inveni plerumque secunda minuta paucula, quæ perturbationem ostendere quamdam visa sunt, cum interdum tamen perturbationem hanc, quam quærimus, adeo non ostenderent, ut essent potius contraria. Omninoque affirmare posse mihi videor, in hac quidem coniunctione nihil ad sensum perspicue satis ex observationibus nostris in marte apparuisse, quod iovis attractioni esset tribuendum.

Ac primum quidem hæc ratio nihil pugnare videbitur cum systemate illo universo, in quo corpora omnia creduntur trahere sese mutuo. Etenim vel illi, qui hanc hypothesein tuentur maxime, facile concedunt attractionem iovis non esse utique in marte sensibilem. Gravesandus supputationem quamdam suam profert, qua ostendat in coniunctione horum planetarum cum sole, vim iovis non posse imminuere vim illam, qua mars versus solem trahitur, quaque in peripheria suæ orbitæ continetur, nisi quantum sit 1 ad 11577. Nihilominus videntur hic mihi distinguenda esse duo: effectus instantaneus attractionis, quem unice Gravesandus considerat in suis calculis; & effectus totalis, qui ex ea fit, cum iam corpori, quod trahitur, applicata fuit ad tempus aliquod. Et sane si iuppiter martem ad se trahere non potuisset, nisi puncto illo temporis, quo mars in puncto C suæ orbitæ existit, quod punctum C in lineam coniunctionis SV cadit; ac tum statim attractio omnis cessavisset, procul dubio nulla sensibilis mutatio in cursu martis secuta


secuta esset. Verum cum distantia horum planetarum IM, PN, tum ante coniunctionem, tum post, per tempus aliquod æquales distantia VO ad sensum conserventur; au-geantur etiam aliquantum; non statim transgredi illos terminos possunt, intra quos valet proportio per calculos determinata, unde sequitur, ut quærendum adhuc sit, an talis vis, quamlibet parva, tamen applicata marti per dies aliquot, ipsumque perpetuo agitando, eum effectum edere debeat, qui in martis cursu tandem aliquando manifestetur.

Aliud est autem, quod consideremus in attractionibus, quibus generatim planetae primarii dicuntur se mutuo trahere. In omni coniunctione heliocentrica planeta inferior aberrare aliquantulum debet, quantumcumque id sit, ab orbita sua elliptica propter vim attrahentem superioris; in eaque aberratione curvam quamdam lineam sequi debet, uti MON, quæ semper extra, numquam intra orbitam excurret, ut planeta eam tenens a sole semper recedat, ad solem accedat numquam. Quapropter ubi planeta inferior ad id punctum N pervenerit, ubi vis attractiva superioris insensibilis plane fit, non sane video, quid causæ sit, cur ad primam desertamque orbitam redeat. Videtur potius, meo quidem iudicio, ellipsin quamdam novam debere ingredi, quæ alterum quidem focus in sole habeat, uti prima, sed eius species, & positus, & longitudo absoluta maioris axis omnino pendere debent a longitudine lineæ SN, & velocitate illa ac directione, quam forte habet planeta in N eo temporis puncto, quo vis attractiva superioris iam cessat. Videtur mihi ergo in planetae orbita, non modo positus maioris axis (de quo illi etiam concedunt, qui attractivas vires tuentur), sed etiam ipsius orbitæ species, & maioris axis longitudo absoluta debere paullatim mutari; ac verisimile omnino est, debere hunc axem paullatim longiorem fieri, nisi illud modo ostendatur, velocitatem planetae ac distantiam a puncto S ita compensari, ut axis, quem dixi, eandem teneat longitudinem, quam habebat. Et horum quidem contraria videntur mihi debere evenire planetae superiori, si is utique trahitur ab inferiori.

Hic vero, ut illud mittam, quod dixi, debere ellipseos speciem, ac formam mutari, quam mutationem mutatio excen.

centricitatis manifestaret, dubitandum minime est, quin si hæc omnia ita fiant, uti attractionum ratio postulat, elongatio maioris axis, quæ in martis orbita attractione iovis fieri debet, seculorum cursu manifestanda ad sensum sit, martis motu medio imminuto, sive, quod eodem recidit, periodico aucto tempore. Utrum autem in hoc planeta id vere accidat, non ausim iudicare; ad id enim requiritur observationum multarum tum antiquarum, tum recentium comparatio; antiquæ autem plerumque sunt non admodum accuratæ. Utique tamen scio, Maraldum, virum doctissimum, in Commentariis academix regix scientiarum anni 1718, non sine gravi causa adductum esse, ut valde suspicetur motus medios tum saturni, tum iovis mutatos fuisse, sic tamen, ut cum ista attractionum hypothese minime consentiant. Etenim iuppiter, qui planeta inferior est, si ad saturnum comparetur, & in quo vis huius attractiva sensibilis admodum esse putatur, deberet profecto ex iis, quæ modo diximus, dilatata orbita aliquid de motu suo medio remisisse; sic ferret illa attractionum hypothesis. Atqui Maraldus comperit, ipsum contra motu medio auctum esse. E contrario saturnus, qui est superior, si comparetur ad iovem, & in quem iuppiter vim attractivam exercet, si calculis fides est, satis magnam, deberet, contracta orbita motum suum accelerasse; cum tamen ex Maraldi sententia videatur retardavisse.

Ac de his omnibus, ut iam ab illo academico, ad quem hæc scripsi, iudicium fieri volui; sic nunc idem ab universa academia requiro; non enim id egi, ut aliquid in hac re affirmarem, observationibus præsertim nixus, quas imperfectas esse vel ipse sentio; multoque minus ut hypothesein oppugnarem, quam maximorum hominum confirmat auctoritas, quæque etiam dicitur observationibus niti non nullis; quamquam, nisi erro, in publicam lucem nondum prodierunt. Quod si operæ pretium esse videbitur, perquisitionem hanc persequi, in planeta martis institutam; id sane fieri poterit in coniunctione eius heliocentrica cum iove, quæ proxime sequetur, quemadmodum supra dixi, circa finem mensis septembris anni sequentis 1729. Astronomis curæ erit coniunctiones alias persequi.



EUSTACHII MANFREDII

*De congressu mercurii cum sole in astronomica
specula bononiensis scientiarum Instituti
observato die XI novembris*

MDCCXXXVI mane.

Tab. observ. astronom. fig. I.

CUM mihi ob adversam valetudinem transitum hunc mercurii cum sole nonnisi per intervalla spectare, neque in eo mihi ipsi satisfacere licuerit, referam paucis quæ in hac specula non tam a me, quam a viris doctissimis, qui frequentes huc adventare consueverunt, observata fuerint, præsertim vero ab egregio iuvene *Eustachio Zanotto Phil. Doc.*, qui meas in astronomica professione vices gerit; deinde ea subiungam, quæ postmodum ex observationibus in typum relatis, atque ad calculos expressis una cum illo definiti.

In supremo speculæ conclavi, unde maiores tubi optici promi, aptarique possunt, intenderat *Zanottus* in solem optimæ notæ telescopium, a campano elaboratum, pedes 22 bononienses longum, quo ipsum, si fieri posset, mercurii in marginem solis incursum notaret; ac quando incursum illum quorundam astronomorum calculi maturius, aliorum ferius, complurium scrupulorum diffidio, pollicebantur, cum *Iosepho Roverfio* condixerat, si quando ipse cessasset, ut is confestim eidem telescopio succederet. Alii interea aliunde brevioribus tubis in idem intendebamus. Cælum erat nitidissimum, aer nullo ventorum flatu perturbatus. Obtigit *Roverfio*, ut omnium primus planetam ad solis marginem deprehenderet hora post meridiem 22. 8. 37, ac mox interiorum eius cum sole contactum definiret hora 22. 11. 12. Horologiis utebatur ad meridianam lineam per
T. II. P. III. H eos.

eosdem dies expensis, quam ipsam lineam *Zanottus* per æquales altitudines matutinas, ac vespertinas pluries ad solem exegit.

Observatoribus aliis paullo ferius planeta in solis limbo est animadvertus. Mihi, ex inferiori conclavi collimanti telescopio campani pedum 11 non ante horam 22. 9. 5 est conspectus, cum iam sat notabili sui parte solem delibaret, contactus autem interior eodem tubo æstimatus hor. 22. 10. 53. Sed longe certior prior illa observatio, quippe quæ præstantiori instrumento est habita. Quoniam tamen ex temporibus egressus planetæ mox afferendis constitit eius corpusculum in excessu impendisse min. 3. 16, si tantumdem ex tempore contactus interioris a *Roversio* notati, subduxerimus, fiet contactus exterior, sive primus mercurii ad solem appulsus adhuc certior hor. 22. 7. 56.

Deinceps observationes eo spectarunt, ut puncta aliquot invenirentur eius semitæ, quam planeta in sole describere visebantur. Ea puncta singula ad circulum horarium, nec non ad parallelum per centrum solis ductum retulimus, cassiniana methodo, notatis ex horologio temporibus, quibus & limbi solis, & mercurius filum horarium micrometri, hic vero præterea etiam obliqua pertransiret, interea dum sol boreo sui margine filum ipsum parallelum pertraderet. Multa eiusmodi puncta nactus est *Zanottus* telescopio pedum 8; unum ego vel alterum tubo pedum 6, cui tubo micrometrum aptatum erat exquisiti operis a v. cl. *Io: Iacobo Marinonio mathematico casareo* excogitatum, atque huic observatorio dono missum. Eodem & *Roversius*, & *Thomas Perellus M. D.* nonnulla puncta alia determinarunt. Huc etiam pertinet observatio a *Perello* in ipso meridiano habita, murali semicirculo, qua observatione inventa est planetæ ascensio recta secundis $11\frac{1}{2}$ temporariis maior, declinatio autem secundis $58\frac{1}{2}$ temporariis minor, quam centri solis. Illud præterea *Zanottus* sibi sumpsit, ut insigniorum macularum, quæ plures eo die in sole cernebantur, positus describeret. Ab iis maculis facile erat planetam internoscere, & quod exacte rotundus, & quod nigerrimus, & quod nulla areola esset obseptus.

Ad mercurii egressum quod attinet, *Franciscus Algarottus*, qui nuper ex gallia, & britannia in italiam redux huiusce

ſce phænomeni ſpectandi gratia bononiam ſe contulerat, tubo pedum 8 uſus initium notavit hora a meridie o. 50. 1, finem hor. o. 53. 6; ego vero telescopio illo 11 pedum initium hor. o. 51. 7, finem hor. o. 53. 44; *Roverſius* telescopio pedum 14 finem tantum advertit hor. o. 54. 1; verum hæ obſervationes minus certæ cum ob mediocrem tuborum præſtantiam, tum quod ventus id temporis coortus tubos ipſos nonnihil agitaret. Præferenda ergo hiſce omnibus obſervatio telescopio illo pedum 22 habita, quo *Franciſcus Vandellius*, in hoc ſcientiarum Instituto *militaris architecturæ professor*, interiorem contactum definivit hor. o. 50. 50, exteriorem hor. o. 54. 6, unde mora planetæ in limbo min. 3. 16, & tempus egreſſus centri hor. o. 52. 28, quod ex mea obſervatione foret hor. o. 52. 25.

Haëtenus obſervationes ipſæ; nunc quæ ex earum inter ſe ſe collatione una cum *Zanotto* deduxerim, perſequar. Aſſumpta ſolis diametro min. 32. 34, ac tempore eius tranſitus per circulos horarios min. 2. 17 (quos numeros & recentiorum aſtronomorum tabulæ exhibent, & obſervationes ipſæ comprobarunt) puncta illa planetariæ ſemitæ obſervando definita in typum retulimus; ac cum ob exiguas obſervationum fallacias minime omnia examuſſim in eamdem rectam lineam inciderent, nullam eorum conciliandorum rationem aptiorem invenimus, quam ſi ſtatueremus perpendiculararem lineam ex centro ſolis ad planetæ ſemitam ductam angulum cum horario circulo comprehendere grad. 23. 40 ad ortum: eius vero perpendicularis longitudinem a centro ad ipſam ſemitam poneremus min. 13. 58 ad boream. Ex hiſ reliqua omnia calculo deduximus in hunc modum.

Initium ingreſſus mercurii in ſolis diſcum	hor. 22. 7. 56
Ingreſſus centri	hor. 22. 9. 34
Totalis ingreſſus	hor. 22. 11. 12
Initium egreſſus	hor. o. 50. 50
Egreſſus centri	hor. o. 52. 28
Totalis egreſſus	hor. o. 54. 6

Mora centri mercurii in disco solis	hor.	2.	42.	54
Semimora	hor.	1.	21.	27
Tempus medii transitus	hor.	23.	31.	1
Angulus lineæ perpendicularis ad femitam planetæ cum circ. horario ab observationibus definitus ad ortum	gr.	23.	40	
Angulus eclipticæ cum horario ex tabulis astronomicis ad ortum	gr.	105.	48	
Inde angulus eclipticæ cum perpendiculari ad mercurii femitam apparentem	gr.	82.	8	
Et angulus femitæ app. cum ecliptica	gr.	7.	52	
Distancia femitæ a centro solis ab observationibus inventa ad bor.	gr.	0.	13.	58
Semidiameter solis	gr.	0.	16.	17
Longitudo femitæ intra solis discum	gr.	0.	16.	45
Eius longitudinis dimidium	gr.	0.	8.	22
Ex his motus horarius mercurii in femita apparenti	gr.	0.	6.	10
Motus horarius apparens in ecliptica	gr.	0.	6.	6
Inde portio femitæ inter medium transitus, & coniunctionem	gr.	0.	1.	58
Portio femitæ ab ingressu ad coniunctionem	gr.	0.	10.	20
Portio eiusdem a coniunctione ad egressum	gr.	0.	6.	24
Differentia longitudinis mercurii & solis in ingressu	gr.	0.	10.	15
Differentia longitudinis in egressu	gr.	0.	6.	21
Tempus a medio transitus ad coniunctionem	hor.	0.	19.	2
Tempus ipsum coniunctionis bononiæ t. ver.	hor.	23.	50.	3
t. med.	hor.	23.	34.	25
Longitudo solis, & mercurii in ipsa coniunctione e cassinianis tabulis <i>scorpii</i>	gr.	19.	23.	30
Huic longitudini respondet intra sec. 4 observatio a <i>Petro Lilio I. U. D.</i> eodem die habita gnomone meridiano ad Divi Petronii.				
Latitudo mercurii in ingressu bor.	gr.	0.	12.	37
Latitudo in egressu bor.	gr.	0.	14.	54
				Inde

Inde motus horarius in latitudinem	gr.	0.	0.	50 $\frac{1}{2}$
Et latitudo in ipsa coniunctione bor.	gr.	0.	14.	1
<hr/>				
Ex his intervallum temporis a transitu mercurii per nodum ascendentem ad coniunctionem	hor.	16.	39	
Et tempus ipsum transitus per nodum t. ver.	hor.	7.	11	
t. med.	hor.	6.	55	
<hr/>				
Ex tabulis cassinianis motus mercurii in orbita e sole visus intervallo horarum 16. 39 circa hoc tempus, seu argumentum latitudinis in coniunctione	gr.	4.	15.	47
Idem motus ad eclipticam reductus	gr.	4.	13.	56
<hr/>				
Inde locus nodi ascendentis mercurii e sole visus	<i>tauri</i>	gr.	15.	9. 34
<hr/>				
Distancia mercurii a sole ad tempus coniunctionis e tabulis cassinianis	log.	4493	01	
Distancia telluris a sole ex iisdem tabulis	log.	4995	03	
<hr/>				
Inde latitudo mercurii in coniunctione, e sole visa bor.	gr.	0.	30.	31
Unde inclinatio orbitæ mercurii ad eclipticam	gr.	6.	51	
<hr/>				
Tempus a contactu interiori mercurii ad exteriorem in egressu ex obs.	bor.	0.	3.	16
Portio semitæ hoc tempore a mercurio peragrata	gr.	0.	0.	20
Angulus semitæ ipsius cum semidiametro solis in egressu	gr.	58.	50	
Inde diameter apparens mercurii quamproxime	gr.	0.	0.	10
<hr/>				

EUSTACHII MANFREDII

De cometa anni M DCC XXXVII.

Cometa labentis huius anni millesimi septingentesimi trigesimi septimi Matteuccio & Boldrino rem astronomicam exercentibus die vicesima secunda februarii in conspectum venit cum cælum nitidissimum esset, quod superioribus diebus & nebula obductum, & prætermodum lucido crepusculo coruscare visum fuerat. In occidentali plaga infra venerem tanquam stella nebulosa apparebat, magnitudine veneri æqualis, sed debiliori lumine, & colore subalbido, cauda soli opposita & duos gradus longitudine circiter æquante, in extrema parte latiore, minusque vivida. Ope telescopii in cometæ capite observatus est nucleus haud rotundus, nubecula quadam obductus, cuius extremitas dubia; latitudo caudæ prope caput potius diametro nubeculæ, quam nuclei respondere visa est. Dum hæc curiosius conspiciuntur, cometa vaporibus immergi cœpit, paullo post occidit, atque adeo observationi locus sublatus est. Hoc tantum constitit, quod inter ceti, & piscium asterismum versabatur; sequentes vero observationes eum trans æquatorem in meridionali hemisphærio respectu polorum mundi clare ponunt, quod quidem confirmant transitus australioris trium stellarum in collo ceti, & cometæ per idem immobile telescopium.

Die 23 horis 7. 24 cometæ locum determinavimus ope stellæ fixæ asterismi piscium, adnotando scilicet tempus transitus utriusque per obliqua & horarium micrometri ad telescopium sex pedum aptati. Fixa minutis 2. 59 prius ad horarium, quam cometa apellebat, eratque borealior secundis $30\frac{1}{2}$. Nos eam censuimus, quam in asterismo piscium Bajerus f vocat, sed posteriores observationes neque illam esse neque aliam quampiam adhuc adnotatam ostenderunt, atque adeo hæc observatio ad locum stellæ inveniendum,
statim

statim ac solaribus radiis se abduxerit, apta erit, ut inde cometæ ascensio recta, & declinatio eruatur. Cometam secundum ordinem signorum progredi, atque etiam borealiorum fieri hoc vespere iudicavimus.

Die 24 horis 7. 14 cometæ positum ex configuratione stellarum definivimus. Recta linea ab α piscium ad venerem ducta basis erat trianguli ferme isoscelis, quod versus meridionalem plagam extendebatur, & verticali angulo cometa inhærebat; hic obtusus erat, latusque cometam & venerem coniungens aliquanto longius erat latere a cometa ad fixam ducto. Huiusmodi determinatio observationibus, quæ posteris diebus habitæ sunt, bene congruit. Iam vero ut exactius locum determinaremus, stellam fixam observavimus, quæ minutis 21. 17 post cometam per micrometri horarium transibat, & australior erat secundis temporariis 41; verum hæc quoque ab auctoribus omissa est. Cæli portio observationibus nostris exposita ita insignioribus stellis vacua erat, ut nequaquam datum fuerit quampiam reperire ab auctoribus descriptam, quæ & parallelo cometæ sat proxima, & in ascensione recta haud valde distita esset.

Die 25 nobis tandem contigit, ut cometæ locum stabiliremus ex α piscium, quæ non procul aberat ab eius parallelo. Hac ratione horis 7. 30 ascensio cometæ prodit grad. 22. 1, & declinatio borealis grad. 1. 6; atque adeo eius longitudo \vee grad. 20. 46, & latitudo australis grad. 7. 35. Hic notandum est, nos fixarum numeros a catalogo britanico Flamstædii deprompsisse.

Die 26 horis 7. 13 relato ad eandem, & ad alias fixas cometa, eius ascensio recta reperta est gr. 23. 55. 30, & declinatio borealis gr. 1. 31; hinc longitudo \vee grad. 22. 43, & latitudo australis gr. 7. 53.

Die 27 cælum nubibus obductum fuit.

Postrema die februarii ope stellæ 108 piscium ex catalogo britannico ascensio recta cometæ horis 7. 33 fuit grad. 27. 37, declinatio borealis grad. 2. 21, longitudo \vee grad. 26. 29½, & latitudo australis grad. 8. 27.

Die prima martii horis 8. 2 telescopium micrometro instructum in cometam intendimus, eiusque transitum per filorum centrum adnotavimus, visuri scilicet, an per immotum telescopium aliqua ceti stella transiret, cum nulla amplius

plius ex constellatione piscium inservire posset. Minutis primis circiter 51 elapsis apparuit lucida mandibulæ *Menkar* dicta, notatoque tempore transitus per obliqua & horarium, cometæ ascensionem eruimus grad. 29. 25, declinationem borealem grad. 2. 47, longitudinem \vee grad. 28. 21, & latitudinem australem grad. 8. 41.

Die 2 horis 7. 35 ope eiusdem stellæ ascensio recta cometæ inventa est grad. 31. 11, declinatio borealis grad. 3. 5, longitudo \vee grad. 0. 8, latitudo australis grad. 9. 1. Cauda admodum imminuta erat, & dimidium ferme gradum longitudine æquabat.

Die 3 horis 7. 2 ope eiusdem stellæ cometæ ascensionem rectam deprehendimus grad. 32. 44, declinationem 3. 27, longitudinem \vee grad. 1. 44, latitudinem australem grad. 9. 12.

Die 4 cælum nubilum.

Die 5 horis 7. 35 cometa cum stella ceti, quæ a Bajoro litera ν distinguitur, & ab ipso nuncupatur *trium in collo borealior*, sed a Flamstedio *ad supercilium sive oculum*, comparatus ascensionem rectam habuit grad. 36. 0, declinationem grad. 4. 7, longitudinem \vee grad. 5. 4, & latitudinem australem grad. 9. 39.

Die 6 horis 7. 9 adhibita eadem stella ascensionem cometæ invenimus grad. 37. 30, declinationem borealem grad. 4. 28, longitudinem \vee grad. 6. 37, latitudinem australem grad. 9. 48. Adhuc cometa a vividioribus oculis nullo instrumento instructis visebatur, etiamsi ad quintam diem fulgeret luna, & ab eo vix 7, aut 8 gradibus abesset.

Die 7 horis 7. 30 iterum cum superiori stella cometam contulimus, atque inde eius ascensionem rectam definivimus grad. 38. 58, declinationem borealem 4. 50, longitudinem \vee grad. 8. 9, latitudinem australem grad. 9. 56. Absque telescopio cometa non distinguebatur nebula, & lunæ fulgore impediante. Caudam tamen omnem nondum amiserat.

Cælum nubibus opertum fuit usque ad diem 17 martii, atque adeo spes nobis cometam iterum videndi sublata erat.

In mensuris hætenus relatis exactitudinem minuit difficultas observandi cometæ transitum per fila micrometri,
exi.

exiguum enim lumen micrometro illustrando aptum facile cometæ lumen superabat, sic ut vel cometa, vel micrometri fila spectatori auferrentur. In schemate tamen rite adnotatis cometæ locis superius inventis, non modo singula ad rectam lineam pertinere deprehendimus, quæ semitam in firmamento a cometa descriptam repræsentat, verum etiam sic inter se disposita esse, ut facile cometam tardius in dies moveri ostendant. Si quæ tamen errata occurrunt, quæ diurnum eius motum, aut directionem perturbent, hæc non amplius, quam ad duo, vel tria minuta assurgunt.

Cometæ semita æquatorem secat ad gradus 17 versus orientem a vernali æquinoctio numeratos, & cum eo in boreali hemisphærio versus orientem angulum comprehendit 12, aut 13 graduum; sic ut ea semitæ portio, quam hoc tempore cometa emensus est, tota intra æquatorem iaceat, & eclipticam. Circulus maximus, quem hæc recta repræsentat, si producatum versus occidentem, inter piscium, & ceti asterismum transit prope quatuor informes stellas a Bairo supra caudam ceti descriptas, & eclipticam, ut ex calculo eruitur, secat in grad. 11. 30 X, angulum efficiens grad. 11. 53. circiter; si vero orientem versus, taurum ingreditur, tenditque versus orionis clypeum.

Cum nobis allatæ fuerint a P. Abbate Revillas nostræ academix socio observationes, quas habuit a die 16 februarii, qua die primum ab eo observatus est, usque ad diem 25, optime eas novimus sibi invicem respondere, supponentes cometam initio suæ apparitionis motum habuisse per rectam eandem, quam nostris observationibus determinavimus, apparentemque eius motum primis diebus velociorem, æquabilioremque fuisse, quod indicat cometam die 16, qua detectus fuit, non procul abfuisse a perigæo; ea propter a terra imposterum recessisse: quod quidem confirmat apparentis magnitudinis perpetua imminutio.

Semita, quam cometa inter asterismos sequutus est, non multum differt ab illa, quam habuit primus duorum, qui mense februario anni millesimi septingentesimi secundi apparuerunt, quantum videlicet deducere licet ex observationibus supra caudam habitis a Blanchino, & a Maraldo romæ, & a nobis bononiæ, caput enim tunc videri haud poterat. Hoc tantum interest, quod postremus hic cometa

in iisdem longitudinibus borealior sit, perinde ac si descendens nodus in consequentia aliquot gradus processisset, aut angulus orbitæ cum ecliptica fuisset imminutus.

Dominicus Cassinus relatis ad invicem observationibus cometæ 1668. ab ipso bononiæ visi, & eius, qui apparuit anno millesimo septingentesimo secundo, eundem esse suspicatus est, qui periodum suam annis 34 absolverit; neque defuerunt antiquiores cometæ, qui hanc revolutionem confirmarent. Hinc Ghislerius academicus noster in suis ephemeridibus astronomos monuit post æquale temporis spatium facile eundem recurrere posse. Verum integro ferme anno tardius apparuit, quod fortasse explicari posset supponendo perihelium in antecedentia adeo motum fuisse, ut ad obtinendum in iisdem longitudinibus eundem ad solem aspectum, tantumdem temporis impenderet, quod etiam conducirer ad explicandum, cur cometa hac vice minori cauda apparuerit. Fieri ergo facile potest, ut cometa omnino idem redierit; nostrisque temporibus illud Senecæ, (quamvis, cum antiquum sit, irrideatur,) tamen verum esse appareat. *Veniet tempus, quo ista, quæ nunc latent, in lucem dies extrahet, & longioris ævi diligentia. Ad inquisitionem tantorum atas una non sufficit, ut tota celo vacet. Erit qui demonstret aliquando in quibus cometa partibus errent, cur tam seducti a ceteris eant, quot qualesque sint.*

*Sequuntur observationes Cometa mensibus
martii & aprilis habitæ.*

Die 18 martii cælum tandem serenum patuit post undecim dies nivibus imbribusque horridos, ac cum luna non nisi duabus post horis oritura esset, telescopium in eam cæli partem intendimus, ubi præcedentes observationes cometam debere esse ostendebant. In asterismo tauri eum invenimus ferme in recta linea inter stellam a Baiero adnotatam litera ξ , & aliam valde lucidam ab ipso intra talem asterismum omissam, in confinia vero arietis recensitam, quam quidem supponimus adnotatam litera ν in flamstediano catalogo. Cometa tamen borealior erat hac recta, propiorque primæ duarum stellarum. Cauda, quæ illi su-
per-

pererat, barbam potius referebat. Magnitudine & lumine adeo imminutus apparuit, ut difficulter eius positio adnotari potuerit. Horis autem 8. 37 ope stellæ 43 tauri, quæ tardius, quam cometa, 26 minutis ad telescopium appellebat, ascensio recta cometæ inventa est grad. 53. 8, declinatio borealis 7. 21½, longitudo 8 grad. 22. 37, latitudo meridionalis grad. 11. 27.

Die 19 cælum nubilum fuit, at die 20 ferenum: itaque hac nocte directo in cometam telescopio, & rite disposito micrometro cometæ transitum per centrum filorum adnotavimus. Immoto telescopio stellæ a nemine adnotatæ appulsum ad obliqua, & ad horarium 31 minutis segnius observavimus. Hanc sequenti nocte cum stella tauri a Baiero litera μ adnotata contulimus, ex qua ascensio recta cometæ horis 8. 42 diei 20 deducta est grad. 55. 14, declinatio grad. 7. 49, longitudo 8 grad. 24. 47, & latitudo australis grad. 11. 30.

Die 21 ex stella μ tauri ascensionem rectam cometæ horis 8. 54 invenimus grad. 56. 15½, declinationem borealem grad. 7. 55, longitudinem 8 grad. 25. 49, latitudinem australem grad. 11. 38.

Die 22 cometa prope duas stellas ignotæ positionis versabatur, quarum alteram ferme atmosphæra sua operiebat. Horis 7. 53 cometam ab hac stella tribus tantum minutis circuli versus occasum distare æstimavimus; cometam vero unico minuto stella australiorem. Stellam cum μ tauri contulimus, atque hinc deduximus cometæ ascensionem grad. 57, 12, declinationem grad. 8. 6, longitudinem 8 grad. 26. 48, latitudinem australem grad. 11. 40.

Die 23. Adeo difficile erat cometam internoscere, ut, nisi oculus in tenebris aliquantisper versatus omnem luminis sensum amisisset, eum videre nequaquam posset, attamen horis 9. 12, ut licuit, ope stellæ μ tauri, & 44 eiusdem constellationis ex Flamstedio ascensionem invenimus grad. 58. 8, declinationem grad. 8. 27, longitudinem 8 grad. 27. 47, latitudinem australem grad. 11. 31. Hæc observatio dubia est.

Die 24 cælum nubilum fuit.

Die 25. Usque adhuc cometam ad stellas retulimus ope micrometri, quod tenui lumine illustrabamus, ut fila

discernerentur; imposterum id fieri non potuit, siquidem cometa penitus evanescebat ex quocumque lumine, quod micrometro affunderemus. Itaque ad ocularem æstimationem confugimus tum distantiae, tum aspectus cum iis stellis, quæ intra telescopium eodem tempore apparebant, quarum positus, si ipsæ ab auctoribus omissæ fuissent, ex aliis stellis cognitis determinari potuisset. Horis 7. 50 cometa cum stellis μ , & 44 tauri, a qua parum distabat, & cum tertia quadam ignotæ positionis eodem tempore intra telescopium apparebat. Trapetii, quod cometa cum dictis tribus stellis comprehendebat, figura & laterum proportionem oculorum indicio definitiva ascensionem eruimus grad. 60. 2, declinationem grad. 8. 34, longitudinem γ grad. 29. 42, latitudinem australem gr. 11. 48.

Diebus 26, 27 martii cælum nubilum.

Die 28 locum cometæ inquisivimus ex quatuor stellis, quæ intra telescopium simul aderant cum cometa, æstimatione videlicet aliquorum laterum triangulorum ab ipso cum stellis comprehensorum. Inter has unica tantum erat notæ positionis, nempe ν tauri; alias ad hanc observatione retulimus, sed difficulter, lumini enim sustinendo non erant pares, quapropter huic observationi parum deferendum est. Horis 8. 23 ascensio recta cometæ inventa fuit grad. 62. 38, declinatio grad. 8. 59, longitudo Π grad. 2. 21½, latitudo grad. 11. 53.

Die 29 non absimili ratione cometæ locum ope trium stellarum ignotæ positionis collegimus, tum has ad d tauri retulimus, quæ paullo post in telescopium incurrebat. Horis itaque 8. 23 cometam ascensionem rectam habereprehendimus grad. 63. 40, declinationem grad. 9. 11, longitudinem Π grad. 3. 25, latitudinem australem 11. 53.

Die 30 cometa simul cum stella d tauri in telescopio apparebat, & alia fixa in eadem recta linea interiacebat, quæ ad tertiam partem totius distantiae respectu d versabatur. Hæc simplex stellarum & cometæ configuratio, fixæ incognitæ loco prius adinvento, ascensionem cometæ exhibuit horis 8. 13 grad. 64. 27, declinationem grad. 9. 8 longitudinem Π grad. 4. 11, latitudinem australem grad. 12. 4.

Die 31 duæ superiores stellæ parvum triangulum cum cometa constituebant, cuius quidem æstimatio a ratione laterum

terum ducta facilis fuit. Hinc positio cometæ deducta est; nempe ascensio recta horis 7. 30 grad. 65. 15, declinatio grad. 9. 18, longitudo Π grad. 5. 1, latitudo australis 12. 3.

Die prima, & secunda aprilis cælum nubilum fuit.

Die 3 stellam δ tauri per centrum micrometri traduximus, ac parallelum filum percurrere curavimus; deinceps ablato quocunque lumine per immotum telescopium transitum cometæ expectavimus, de quo certiores nos fecerant præteritæ observationes. Post aliquod tempus cometa, vel potius incertum luminis vestigium prædictum parallelum ferme strinxit. Temporis differentia inter appulsum stellæ, & cometæ ad centrum micrometri, quantum æstimare licuit, fuit minutorum 9. 30, ex quo deduximus ascensionem rectam cometæ horis 8. 12 grad. 67. 42, declinationem borealem grad. 9. 35 $\frac{1}{2}$. Post minuta 12 circiter cometæ positum cum duabus proximis stellis adnotavimus, eiusque locum invenimus, facta scilicet comparatione duarum stellularum ad secundam ex duabus stellis π orionis. Nova hæc observatio ascensionem rectam exhibuit grad. 67. 51, declinationem grad. 9. 37 $\frac{1}{2}$. Si de ascensione recta fermo sit, ea, quæ ex prima observatione colligitur, melius cum prioribus, ac posterioribus ascensionibus congruit; contra vero declinatio, quæ ex postrema observatione colligitur, melius cum aliis præcedentium, ac subsequendum dierum declinationibus convenire videtur, quapropter statuimus cometæ longitudinem Π grad. 7. 36, & latitudinem australem grad. 12. 8.

Die 4 aprilis etiamsi luceret luna, & septem tantum gradibus a cometa distaret, is nihilominus affulsit nobis, observatoque eius situ respectu duarum præcedentium stellarum, ascensionem rectam eruimus horis 8. 23 grad. 68. 27 $\frac{1}{2}$, declinationem grad. 9. 46, longitudinem Π grad. 8. 17, latitudinem grad. 12. 5 $\frac{1}{2}$.

Die 5 cælum sudum erat, & tamen cometa nobis inquireribus latuit. Luna ad sextum diem fulgebat, & a loco cometæ præfinito 12 gradus circiter distabat.

Die 6 aprilis Franciscus Vandellus, qui antea noctibus primus omnium, utpote peracutis intructus oculis, cometam invenerat, & pleraque observationes huc usque re-

latas

latas fecerat, nescio quid luminis vidit, quod cometam esse æstimavit. Luna micrometrum illustrabat. Itaque debite hoc composito indicavit horis 8. 9 differentiam ascensionis inter cometam, qui præcedebat, & secundam duarum stellarum π orionis maiorem esse intervallo, quo inter se distant duo micrometri fila horarios circulos repræsentantia, quæ distantia alias emensa fuit minorum 15. 34 circuli maximi; similiter differentiam declinationis maiorem esse intervallo inter duo fila parallelos indicantia, quæ & ipsa ad minuta 15. 34 assurgit. Ex his cometæ ascensionem rectam eruimus grad. 69. 51, declinationem borealem 9. 58, longitudinem Π grad. 9. 42, latitudinem australem grad. 12. 5 $\frac{1}{2}$. Sequentibus noctibus frustra laboravimus ut cometam inveniremus.

Observationum seriem tum quoad ascensiones, tum quoad declinationes superius deductas examinantes, habita ad tempus, quo peractæ sunt, debita ratione, nonnullas irrepisse irregularitates novimus, quæ observationem fortasse aliquam errore haud vacare facile evincunt, orto præsertim ex difficili æstimatione transitus aut fixæ, aut cometæ per fila micrometri. Immutanda igitur fuit aliqua ex parte observationum nostrarum series, quæ quidem mutatio, si ascensiones respicias, in plerisque nulla, in aliquibus exigua, maior autem fuit minorum 6 addenda die 28 martii, & minorum 4 subducenda die 29, quas mehercule observationes suspectas esse, & errori obnoxias, alias indicavimus. At ubi declinationes inspicias, maior aliqua fuit mutatio in iis adhibenda; maxima fuit minorum 10, aut 11 subtrahenda die 23 martii, & minorum 8 pariter subducenda die 29. Nos hic missas facimus ascensiones, & declinationes sic correctas exhibaturi longitudes, & latitudes inde deductas, quas verosimiliores, quantum fas est in huiusmodi observationibus, reputamus.

Temporis mora supra horizontem admodum brevis parallaxis observandæ locum sustulit, atque inde eruendæ distantia a tellure. Quare ad methodum nos convertimus, quam in arithmetica universalis Newtonus tradidit, supponendo videlicet toto tempore, quod intercedit inter observationes dierum 25 februarii, & 6 martii, cometæ motum rectilineum fuisse, & æquabilem. In hunc finem quatuor
sele-

selegimus observationes, duas videlicet nuper enunciatas, reliquas vero duas diebus respondententes 28 februarii, & 3 martii. Tali innixus methodo distantiam cometæ a terra diei 25 februarii respondentem definivit Eustachius Zanotus $\frac{m}{55}$ illarum partium, quarum media distantia terræ a sole $\frac{m}{100}$ continet; angulum quoque subduxit ab apparenti cometæ via ad eclipticæ planum reducta comprehensum cum recta tunc temporis in eodem eclipticæ plano ad cometam e terra visum directâ grad. 70. 38; sumendo nempe hunc angulum respectu posterioris rectæ ad ortum, & ad partes terræ respectu prioris. Idem omnino invenit Bolsius Marchesius calculum seorsim aggressus. Positionem quoque nodorum, inclinationemque plani orbitæ ad eclipticam calculi prædicti vestigiis inhærendo definivimus. Elementa hæc parum abludunt ab iis, quæ Halleius in cometarum tabula subduxit pro cometa anni millesimi sexcentissimi septuagesimi secundi. Quamquam cum nonnullæ immutandæ fuerint longitudines, eaque præsertim minuto integro, quæ die 3 martii peracta est, opus sane esset calculum iterum aggredi correctis observationibus instituendum ad distantiam, & cetera elementa melius stabilienda.

*Cometae longitudes, ac latitudines
ex observationibus correctis.*

		H		G		G	
				V		M	
Februarii	25	7	30	20	46	7	35
	26	7	13	22	43	7	53
	28	7	33	26	29 $\frac{1}{2}$	8	27
Martii	1	8	2	28	20	8	43
	2	7	35	0	4	8	58 $\frac{1}{2}$
	3	7	2	1	45	9	12 $\frac{1}{2}$
	5	7	35	5	4	9	38
	6	7	9	6	37	9	48
	7	7	30	8	8	9	57
	18	8	37	22	37	11	26
	20	8	42	24	47	11	34
	21	8	54	25	49	11	37
	22	7	53	26	48	11	40
	23	9	12	27	46	11	43
	25	7	50	29	42	11	49
	28	8	23	2	27	11	57 $\frac{1}{2}$
	29	8	23	3	19	12	0
	30	8	13	4	11 $\frac{1}{2}$	12	3
31	7	30	5	1	12	4	
Aprilis	3	8	12	7	33	12	6
	4	8	23	8	17	12	5 $\frac{1}{2}$
	6	8	9	9	42	12	5 $\frac{1}{2}$

EUSTACHII ZANOTTI

De cometa anni MDCCXXXIX.

Nocte insequente diem vigesimam septimam maii cælo sereno cometa se prodiit, qui nitens inter constellationes ursæ maioris, & aurigæ in medio trianguli insidebat, quod stellæ tres α geminorum, capella, & σ ursæ maioris paribus fere intervallis constituunt. Nudo oculo conspicientibus tanquam stella tertix magnitudinis apparebat, quamquam nebula, qua circumseptus erat, novum quidpiam in cælo exortum ostendebat. Adhibito tubo optico pedum viginti trium cometæ forma clarius enituit, nam & nucleus distinguebatur eius magnitudinis, quæ magnitudinem iovis æmulabatur, & densa nebula cometæ caput, seu nucleum involvens, quæ in partem soli averfam se se longius protendens caudam referebat duos gradus longam, quæ quo magis a nucleo protrahebatur, eo latius explicabatur, & sensim evanescebat.

Cum is esset cometæ positus, manifestum est attendita huius loci latitudine ipsum tunc inocciduum fuisse; at post aliquot dies, cum ad meridiem motu proprio inclinaretur, sub horizontem occultari cœpit. Eius motus retrogradus fuit, & in fine paullo velocior: semita inter stellas fixas descripta aurigam, & taurum traiciens eclipticam secat in gr. 14. 54 geminorum, ac deinceps orionem ingrediens ibi tandem definit. Itaque cometa disparuit in constellatione orionis, cum cæli tractum quinquaginta circiter graduum absolvisset.

Semita, quam diximus, a circulo maximo valde aberrat; quod quamvis manifestum fiat ex ipso semitæ ductu in globo artificiali, in quo cometæ loca iuxta ascensiones rectas, & declinationes observatas notata fuerint, maluimus tamen id ex ipsis observationum numeris trigonometrica ratione inquirere, quo res luculentius definiretur. Itaque

positionem eius circuli maximi investigavimus, qui per duo semitæ puncta transiret, eaque puncta in hoc negotio adhibita fuerunt, quæ duabus observationibus responderent dierum scilicet 28 maii, & 9 iunii. Hic circulus eclipticam fecat in gr. 11. 18 geminorum angulum faciens gr. 48. 41 ad occidentem. Equidem si cometa motu suo per hunc circulum maximum excurrisset, latitudo quælibet observata ad circuli peripheriam usque pertingeret, quod si ab eo declinaverit latitudo observata, vel ultra circulum porrigetur, vel infra continebitur. Die 17 iunii latitudo cometæ fuit gr. 20. 51, & latitudo ad circulum pertingens, & cometæ longitudini respondens calculo conficitur gr. 18. 0, quapropter hæc minor est illa gr. 2. 51. Eundem calculum inivimus pro cometæ loco diei 25 iunii, & invenimus latitudinem intra circulum contentam a latitudine observata deficere gr. 2. 45. Aliud huiusmodi aberrationis indicium habemus a nodo cometæ, qui eclipticam traiecit in gr. 14. 54 geminorum, & circulus maximus, uti diximus, eclipticam fecat in gr. 11. 18. Quæ omnia eo tantum spectant, ut demonstraretur quænam fuerit cometæ via in sphaera universi, & quantum a circulo maximo deflexerit. Quamquam si quid coniiicere licet, argumentum ab his desumere possumus, quo probemus cometam non moveri in plano circa tellurem, ut planetæ faciunt circa solem, sed aliud centrum motus assignandum esse, nisi forte volumus brevi eo tempore nodorum lineam in consequentia processisse gradus plus quam viginti.

Nunc de observandi modo nonnulla differemus. Telescopio utebamur octo pedes longo haud amplius, cui micrometrum aptatum erat ex quatuor filis ita constructum, ut duo quælibet proxima, & se invicem interfecantia, angulum semirectum in centro micrometri constituerent. Ope huius micrometri cometam ad stellam referebamus, si qua stella cognita prope cometæ parallelum versabatur. Si enim micrometrum sic stabiliatur, ut unum ex filis parallelum existat semitæ, quam stella motu diurno describit, notatis temporibus, quibus cometa, & stella fixa reliqua micrometri fila prætergrediuntur, nihil facilius est, & astronomis usitatius, quam differentiam ascensionis rectæ, & declinationis inter duo sidera ex observationum numeris colligere. Verum

rum accidere aliquando potest, ut perfecta observatione non eum deprehendamus fuisse micrometri positum, quem diximus, quod quidem a duobus temporum intervallis inter bina fila dignoscetur, quæ intervalla si fuerint inæqualia, indicio erit nullum ex quatuor filis stellarum semitæ parallelum extitisse. Id quotiescumque contigerit, vel observatio iterum peragenda erit, si fieri poterit, vel ratio excogitanda, qua observationum numeri emendentur. Quod si aliqua emendandi ratio suppetat, ea non mediocrem astronomis utilitatem afferre potest, etenim differentiam ascensionis rectæ, & declinationis eruere licebit, quicumque fuerit micrometri positus, neque opus erit ad observationem faciendam accedentes in statuendo micrometro quidquam immorari, dummodo in conciliandis observationum numeris idonea correctio adhibeatur; & quamvis calculus paullo operosior futurus sit, iuvabit tamen, si observatio ipsa expeditior reddatur: tempus enim observationibus aliquando deficere potest, numquam tamen deficient supputationibus.

Sit micrometrum BDI, & semita apparens stellæ BD, quæ tria micrometri fila traiciens reliquo non sit parallela. (*Tab. observ. astron. fig. 2*) Notata fuerint momenta temporis, quibus stella unumquodlibet filum prætergressa est in punctis B, A, D, ex quo data erunt intervalla BA, AD. Intelligatur a centro micrometri ducta recta IO perpendicularis ad semitam stellæ BD, quæ propterea vicem geret circuli horarii transeuntis per centrum micrometri. Denominetur primum intervallum AB = m , & secundum intervallum AD = n , & quæratür AO, & IO. Confec̄to calculo reperitur $AO = \frac{mn : m - n}{mm + nn}$, & $IO = \frac{mn : m + n}{mm + nn}$. Inventa AO addatur tempori quo stella fuit in A, vel ab eo subducatur, prout intervallum primum AB maius, vel minus fuerit altero AD, & conficietur transitus stellæ per horarium; & præterea a valore quantitatis IO dabitur distantia semitæ a centro micrometri. Quæ duo si eodem pacto determinantur in pluribus stellis, prodibit earum differentia ascensionis rectæ, & declinationis. Hoc micrometro plerasque observationes exegimus, & quotiescumque intervalla inter bina fila inæqualia reperta sunt, methodo iam explicata

ascensiones rectas, & declinationes cometæ ex observationum numeris deduximus.

Aliud micrometrum excogitavimus, quo uteremur cum cometa paullo debilior factus esset, neque amplius lucernæ lumen pati posset, quod ad collustranda fila in telescopium immittebatur. Constructionem eius paucis explicabimus; hæc enim in circello quodam solido, atque intus aperto consistit. Duo fila adiunximus, quæ cum loco diametrorum posita essent, ab eorum intersectione circuli centrum designabatur: quod commode nobis obtigit propterea, ut circuli diametrum definiremus; stellam enim, quæ prope æquatorum versabatur in telescopio, sic moveri curavimus, ut per centrum micrometri transfiret, atque ex eius mora circuli diametrum constituimus minutorum 31. 50. Ad observationem faciendam quod attinet, ea sic conficiebatur. Traiiciente stella per aperturam circuli duo momenta temporis notabantur, quibus ingrediendo & egrediendo circuli peripheriam adibat. Quoniam vero circulus horarius per centrum micrometri ductus chordas omnes a stellis descriptas bifariam dividit, ab observationum numeris transitus per horarium facile colligebatur; cumque longitudo chordæ ab ipsa observatione innotesceret, & data esset circuli diameter, chordæ distantiam a centro brevi calculo assequeremur.

Hanc observandi rationem sequuti sumus a die 4 augusti usque ad ultimam diem, quo tempore cometa lumine adeo diminutus erat, ut nubecula potius videretur quam stella, & accedente quovis externo lumine dispareret. His diebus si quid erraverimus in determinandis cometæ locis, id non modo observandi difficultati tribuendum existimamus, verum etiam aliquam in micrometrum culpam transferendam concedimus; etenim si chordæ vel a stella, vel a cometa descriptæ parum a centro absint, perexiguus error observationis distantiam fideris a centro micrometri non parum detrahet. Id autem quantum sit, ad calculum redigere non prætermisimus, & invenimus neglectis duobus secundis scrupulis temporariis minutum primum cum dimidio in dicta distantia peccari posse. Sed hoc micrometri vitium ferendum erat, quod tunc nulla aptior observandi ratio suppetebat.

In observationibus faciendis adiutores habui præstantifimos iuvenes Petronium Matteuccium, & Iosephum Roverfium, quibus primum contigit cometam videre, quem deinceps aliis indicaverunt. His se focium adiunxit Franciscus Vandellus in hoc Instituto architecturæ militaris professor, & in mathematicis versatissimus; ac demum Iosephus Garatonus, qui & medicinam cum laude profitetur, & in cælo, & sideribus totus est. Hi non modo se focios præbuerunt in observationibus, sed etiam supputationum laborem ultro susceperunt. Non prætermittam nos in eruendis cometæ locis ascensiones rectas, & declinationes stellarum a catalogo britannico Flamtedii deprompsisse, & eclipticæ obliquitatem posuisse gr. 23. 28. 25, quantam scilicet ex duobus solstitiis proxime elapsis collegimus. Quæ vero fuerint stellæ, quæ quotidianis observationibus inservierunt, sigillatim trademus.

Diarium observationum.

Die 27 maii nulla existente stella notæ positionis prope cometæ parallelum, ad ignotas quasdam stellas confugimus, quarum ea, quæ insignior erat, in ascensione recta distabat ad ortum gr. 10. 28. 50, & ad septentrionem declinabat gr. 0. 23. 14. Huius stellæ locum deinceps definivimus mense ianuarii subsequenti anni, cum noctu meridianum circulum pertransiret, & statuimus eius ascensionem rectam pro die 27 maii 1739 gr. III. 7. 48, & declinationem septentrionalem gr. 51. 0. 51. Numeros, qui ad cometam pertinent, in hoc diario non rescribimus, quod eos in tabula suo quosque ordine dispositos exhibebimus.

Die 28 maii etsi cometa aliquantulum demigravisset, nondum tamen parallelum circulum cognitæ alicuius stellæ assequutus erat, ideoque oportuit stellam adhibere, cuius locum deinceps definiremus comparatione facta cum, uræ maioris; & quoniam hæ duæ stellæ nimio plus in declinatione distabant, quam ut per micrometrum conferri possent, ad stellam quamdam intermediam confugimus, quæ duas illas invicem colligaret. Ascensio recta stellæ prodit
gr.

grad. 104. 44. 9, & declinatio septentrionalis gr. 49. 53. 31.

Die 29 maii cometam cum stella ignotæ positionis comparavimus, ac deinceps per ι ursæ maioris deprehendimus stellæ ascensionem rectam gr. 106. 46. 59, & declinationem septentrionalem gr. 49. 41. 36, hor. 14. 11 traicientem cometam per inferiorem meridiani partem murali semicirculo observavimus, eodemque instrumento transitum α persei notavimus, ut inde colligeremus cometæ locum. Fuit autem ascensio recta cometæ gr. 99. 0. 10, & declinatio septentrionalis gr. 50. 6. 29.

Die 30 maii cometa adhuc septentrionalior erat ι ursæ maioris; cum tamen uterque in telescopium ingrederetur, ea tantum habita observatione cometæ locum decernere potuimus. Hor. 14. 4 ope semicirculi cometæ locum iterum definivimus facta comparatione cum α persei, cuius transitum ex numeris observationum præcedentis, & subsequæ diei tuto definire licuit. Ascensio recta prodiit gr. 98. 14. 37, & declinatio septentrionalis gr. 49. 49. 35.

Die 31 maii observationi interfuit eadem ι ursæ maioris. Hor. 13. 57 per semicirculi planum transivit cometa, qui propter nebulam vix discernebatur. Notavimus quoque transitum α persei, & ex harum observationum numeris supputavimus ascensionem rectam cometæ gr. 97. 31. 50, & declinationem septentrionalem gr. 49. 31. 40.

Die 2 iunii observationem instituimus cum eadem stella ι , atque comperimus cometam, & stellam in eodem parallelo versari, & in ascensione recta tantummodo differre. Eadem nocte cometam vidimus per meridianum transeuntem, dum cælum ex ea parte boreali quodam lumine coruscabat. Observatio dubia est, cometa enim ea luce circumfusum vix internoscebatur. Id porro contigit hor. 13. 43, cum esset eius ascensio recta 96. 9. 14, & declinatio septentrionalis 49. 1. 8. Nulla imposterum haberi potuit observatio meridiana; nam cum cometa a polo in dies magis elongaretur meridianum petens, horizonti propius accedebat, atque adeo in densiores vapores immerfus delitescere cœpit. Meridianas hæc observationes pro investiganda parallaxi aggressi sumus, in quibus propterea fatis est, si ascensio recta probe constituta fuerit, sed quia propter obser-

servandi difficultatem in declinationibus præsertim erroris suspicio est, ideo in eam, quam trademus seriem, nequaquam distribuendas esse existimavimus.

Die 3 iunii observatio cum eadem stella, peracta est.

Die 4 iunii cum eadem stella.

Die 5 iunii ad stellam α urfæ maioris nos convertimus, cum stella ϵ eiusdem constellationis observationi non amplius inservire posset. Quamquam ascensionis rectæ, & declinationis numeros stellæ α a catalogo britannico non deprompsimus, sed facta comparatione cum priore stella ope micrometri locum eius definivimus; sic enim visum est nobis cometæ loca in ordinem distributa melius convenire.

Die 7 iunii cometam retulimus ad eandem stellam α .

Die 8 iunii cum stella α ad cometam non amplius referri posset, aliam minorem stellam adhibuimus, cuius locum didicimus ex ipsa α . Itaque posita ascensione recta huius stellæ gr. 104. 7. 46, & declinatione septentrionali gr. 47. 40. 32 cometæ locum determinavimus.

Die 14 iunii capella cometam præcedens eius locum indicavit.

Die 15 iunii cometam contulimus cum β aurigæ.

Die 16 iunii cum eadem β .

Die 17 iunii cum eadem β .

Die 25 iunii cometa solem prætergressus summo mane in hemispherio orientali inquirendus erat, & quia suspicabamur fore, ut a matutino crepusculo obrueretur, insignem stellam elegimus, quam ad cometam referremus, quæque in eodem parallelo ipsum præcederet. Directo itaque telescopio ad γ andromedæ, quam dicunt *Alamak*, & in ea positione per immobile fulcrum retento post debitum tempus cometa se se nobis obtulit observandum.

Die 28 iunii ad τ , & ν aurigæ.

Die 2 iulii observationem exegimus cum duabus stellis ν , & θ aurigæ.

Die 3 iulii peracta observatione cum duabus stellis, quas nocte superiore adhibuimus, cometæ caudam diligenter metiti sumus, atque eius longitudinem constituimus unius gradus; directio autem non videbatur soli opposita, sed aliquantulum declinare ad septentrionem.

Die 6 iulii quamvis stella ξ persei cometam longe

præ-

præcederet, eam tamen elegimus, quod nulla insignis stella habebatur in constellatione aurigæ, quæ ad cometam referri posset.

Die 7 iulii eadem ξ persei observationi inservivit.

Die 9 iulii cometa parallelum ϕ aurigæ assequutus, neque admodum a parallelo ξ persei distans ad utramque stellam referri potuit. Loca, quæ ex utraque observatione deduximus, mirifice inter se convenire deprehendimus.

Die 12 iulii cometa parum aberat a parallelo ϵ aurigæ.

Die 14 iulii ad stellam α eiusdem constellationis.

Die 15 iulii cælum caliginosum erat, & cometa vix discernebatur, attamen referre potuimus ad stellam (26) aurigæ ex catalogo Flamstedii.

Die 16 iulii ad eandem stellam.

Die 20 iulii postquam cometam cum γ aurigæ de more comparaverimus novum micrometrum experiri voluimus, cometam referentes ad eandem stellam; neque dissidia inter observationum numeros invenimus, quæ minutum excederent.

Die 21 iulii cum eadem γ aurigæ.

Die 22 iulii cum stella (127) tauri.

Die 26 iulii cometæ locum definivimus facta comparatione cum stella (123) tauri. Cælum nebulosum erat.

Die 27 iulii cum ea stella, quæ inter pleiades *taygeta* nuncupatur.

Die 2 augusti cometa iovem sequebatur, & parum ab eius parallelo aberat, ac ne quid observationi deesset cometam retulimus ad stellam fixam nempe ad ω tauri.

Die 4 augusti cum cometa vix internosceretur novum micrometrum adhibere oportuit, quo ipsum retulimus ad ϵ tauri.

Die 10 augusti ad σ orionis *in exuviiis secundam*.

Die 17 augusti cometam telescopio inquirentes, quem nudo oculo videre non amplius licebat, tandem comperimus prope stellam π orionis *in exuviiis sextam*, atque eius locum ex hac proxima stella determinavimus. Post hanc diem nulla observatio habita est, neque, cum luna ad oppositionem accederet, & maiorem in dies lucem effunderet, ulla spes erat, ut cometam adeo lumine diminutum per-

perciperemus; & revera sequentibus diebus id nunquam nobis obtigit, quamvis omnem diligentiam in eo perquirendo adhibuerimus.

De Theoria Cometæ.

PERACTIS observationibus in id primum animum intendimus, ut videremus, an ulla existeret parallaxis, quæ nos moneret de cometæ distantia a tellure, cuius distantia cognitio plurimum faceret pro stabilienda aliqua huius planetæ theoria. Observationes, quæ detegendæ parallaxi infervirent, iam in promptu erant, iis enim diebus, quibus cometa circulum perpetuæ apparitionis describebat, eius ascensionem rectam semel, atque iterum eadem nocte determinavimus, videlicet cum ipse adhuc a meridiano distabat 90 gradus, & cum in meridiano versabatur. Harum observationum altera in hemisphærio occidentali habita est, ubi cometam retulimus ope micrometri ad γ urse majoris, alteram vero observationem exegimus in meridiano interea, dum cometa per planum semicirculi muralis pertransibat. Quamquam cometæ locum non deduximus ex eius transitu per meridianum, sed ex comparatione cum stella α persei, cuius transitus per eundem semicirculum observatus fuerat, quæque parum in declinatione differebat. Hac scilicet ratione erroribus occurrere voluimus, qui forte in observationum numeros ex instrumenti vitio illapsi fuissent, cuius instrumenti limbus neque in omnibus suis punctis cum plano meridiani perfecte congruebat, neque aberrationis quantitas altitudinibus captis respondens explorata erat. Præterea, cum ex duabus prædictis observationibus deducendus esset cometæ motus, oportebat scire, quantum duæ stellæ γ urse majoris, & α persei in ascensione recta differrent, quod quamvis ex catalogis fixarum depromi potuisset, attamen cum in iis diffidia sæpius reperiantur, propriis observationibus deffinire constituimus, idque commode per nos fieri potuit, cum utraque stella in eodem fere parallelo versetur. Huiusmodi cautiones in re, quæ maximam subtilitatem requirit, adhibendæ erant, easdemque hic recensere voluimus, ut quisque intelligat, quo fundamento de parallaxi iudicium proferamus.

Si qua parallaxis extitisset, quæ percipi potuisset, ea profecto ex observationibus dierum 29, 30, 31 maii, & 2 iunii prodiisset, quibus diebus cometæ locum bis definivimus, & in hemisphærio occidentali prope semicirculum horæ sextæ, ubi parallaxis horaria maxima est, & in meridiano, ubi eadem parallaxis evanescit. Quare cum cometæ retrogradus fuerit, motus horarius, qui apparet inter duas huiusmodi observationes, propter parallaxim minor fuisset eo, qui elicitur ex motu diurno. Verum subductis diligentissime calculis illud ascensionis rectæ decrementum inter observationes deprehendimus, quod motui diurno respondebat, si tamen dissidia quædam exigua excipiantur, quæ ex observationum defectu facile oriuntur. Immo si tres priores observationes attendimus, inventis dissidiis nihil quidquam deferendum esse statuemus; hæc enim parallaxi refragantur, utpote quæ ascensionis rectæ decrementum maius efficiant, quam quod ex motu diurno colligitur: & quamvis observatio diei 2 iunii parallaxi favere videatur, huic tamen assentiri minime debemus tot aliis obstantibus observationibus.

Quamquam & aliæ sunt præter eas, quas memoravimus, observationes, quæ nullum de parallaxi indicium afferunt; nam quibus noctibus cometæ prope insignem aliquam stellam versabatur, semel atque iterum eius locum definivimus; sed cum huiusmodi observationes non satis longo temporis intervallo inter se distent, detegendæ parallaxi minus idoneæ habitæ sunt, easque propterea prætermittendas esse censuimus. Quod si ex his etiam argumentum desumere vellemus, concludendum esset nullam, quæ sane percipi potuerit, parallaxim extitisse.

Quoniam parallaxim nullam invenimus, quæ distantiam cometæ patefaceret, ad methodos ab astronomis traditas nos convertimus, in quibus, etsi aliquid supponere oporteat, id tamen concedendum videbatur, cum nulla melior ratio suppeteret, qua distantie calculus perficeretur. Supposuimus, inquam, brevem orbitæ arcum a recta linea nihil ad sensum differre, atque eius partes a cometæ sic absolvi, ut temporum proportionem sequerentur. Itaque cum ipsa calculi ratio postulet, ut quatuor cometæ loca adhibeantur, ea ex observationibus excerpimus, quæ novem dierum inter-

tervallum complectebantur, quibus positis iuxta celeberrimi Newtoni præcepta in arithmetica universalis tradita calculum aggressi sumus. Verum in eam contradictionem incidimus, per quam distantia calculo inventa penitus corruerat; linea enim, quæ dictam distantiam repræsentabat, in hemisphærium soli oppositum, ubi cometa non erat, porrigebatur. Quod cum non ex ullo supputationis errore prodiisse cognoverimus, a principiis assumptis repetendum esse existimavimus. Quis scit, an orbitæ arcum, quem cometa spatio illo novem dierum prætergressus erat, liceat supponere rectilineum? Quod si a linea recta valde deflexerit, nil mirum si calculus in illud absurdum nos adduxerit. His animadversis novam supputationem aggredi constituimus, & quo minus suppositio trajectoriæ rectilinéæ nos abluderet, alias quatuor observationes elegimus, quæ minori temporis intervallo seiunctæ erant, eas nempe dierum 28, 29, 30, 31 maii; & quoniam calculus ab initio exordiendus erat, novitatis studio permoti aliam supputationem inivimus, atque adeo cassinianam methodum sequentes, quæ in actis parisiensibus anni 1727 conscripta legitur, elicuimus tandem distantiam cometæ a tellure die 28 maii 669 earum partium, qualium mediocris distantia solis a tellure continet 100; atque inde prodiit distantia cometæ a sole earundem partium 596.

Verum ipsa calculi ratio nos docuit distantiam tali pacto inventam non ita certo constitutam fuisse, ut in dubium revocari minime posset, idque præsertim propter nimiam observationum viciniam. Nam cum cometæ loca, quæ adhibita fuerunt, valde proxima sint, quatuor linæ positione data, quæ in plano eclipticæ longitudinem cometæ referunt, parvulos angulos comprehendunt, & in ea angulorum exiguitate quivis error, ex iis quidem, qui inter observandum evitari nequeunt, magnum discrimen in distantiam adducere potest, per quod cometæ semita vel telluri propius admoveatur, vel ab ea longius removeatur; quod quidem facile concedetur ab iis, qui trigonometricis supputationibus dant operam. Cum hæc animadverteremus, quamvis ægre ferremus post tot experimenta nihil adhuc certum de cometa constitutum esse, attamen præteritus labor ad nova tentamina magis, magisque excitabat; cum-

que nihil illustrius fit, nihilque magis ab astronomis comprobatum, quam theoria Newtoni, prætermisissis aliis, ad hanc studium omne nostrum convertimus. Newtoniana theoria, ut cuique notum est, longissimis calculis implicita est, sed fecit Petronii Matteucci diligentia, & in mathematicis rebus solertia, ut ea nobis minus operosa videretur, is enim, ut est etiam ad calculos paratissimus, maximam sibi laboris partem suscepit. Itaque nos ex tribus delectis observationibus, quæ ab invicem longo temporis intervallo seiunctæ erant, singula theoriæ elementa deduximus, & parabolam determinavimus, quam cometa circa solem perlustravisse videretur. Totius calculi rationem non expono, quæ paucis explicari nequit; præterquamquod me astronomis satisfacturum puto, si elementa tantum hic adiungam, quibus theoria continetur: nam si quis proprias observationes cum hac theoria conferre voluerit, ex sequentibus numeris longitudes, & latitudes cometæ pro quovis dato tempore supputabit. Non est prætermittendum hunc cometam, cuius motus apparens retrogradus fuit, etiam in orbita motu retrogrado processisse.

Longitudo perihelii \ominus gr. 12. 34 .

Longitudo nodi ascendentiis \ominus gr. 27. 18

Inclinatio orbitæ gr. 55. 53

*Distantia perihelia, posita mediocri
distantia solis a tellure partium
10.000*

6716

*Tempus, quo cometa fuit in perihelio
die 17 iunii*

hor. 11. 43.

Ex his longitudes, ac latitudes observationum temporibus respondentes supputavimus, in quibus tantam cum observatis cometæ locis consensionem deprehendimus, quanta

ta expectari potest in rebus huiusmodi. Sed quid plura? tabulas hic sub oculos ponam, quarum altera observationes ipsas complectetur, altera vero longitudinum, ac latitudinum numeros ex elementis iam constitutis exhibebit, quibus manifestum fiet, quam præclare newtonianis legibus cometarum motus obsequantur.

Cometa loca ex observationibus.

1739	Temp. ap.		Ascen. recta			Declina.			Longitu.			Latitu.			
	H	'	G	'	"	G	'	"	G	'	"	G	'	"	
Maii	27	10 50	100	38	58	S 50	37	37	♄	7	35	25	S 27	26	2
	28	9 28	99	55	52	50	22	36		7	6	2	27	8	51
	29	9 50	99	10	30	50	7	24		6	34	53	26	51	34
	30	9 46	98	24	53	49	50	32		6	3	18	26	32	46
	31	9 9	97	41	23	49	36	25		5	33	0	26	16	29
Iunii	2	9 16	96	16	2	49	2	44		4	33	12	25	40	14
	3	9 40	95	34	55	48	46	8		4	4	8	25	22	18
	4	8 58	94	55	48	48	30	21		3	36	23	25	5	38
	5	8 56	94	16	23	48	11	28		3	8	6	24	45	49
	7	8 58	92	59	56	47	37	51		2	12	54	24	10	30
	8	10 17	92	21	28	47	18	34		1	44	52	23	50	58
	14	9 37	88	49	43	45	21	58	♃	29	6	47	21	53	43
	15	9 37	88	17	39	45	1	3		28	42	13	21	33	0
	16	9 9	87	45	27	44	39	47		28	17	24	21	12	37
	17	8 57	87	14	21	44	18	15		27	53	11	20	51	0
	25	14 45	83	22	38	40	54	33		24	45	17	17	33	26
	28	14 2	82	8	38	39	35	39		23	42	0	16	17	11
Iulii	2	14 46	80	40	42	37	44	1		22	23	45	14	30	22
	3	13 57	80	20	9	37	16	59		22	5	5	14	4	30
	4	14 0	79	59	43	36	47	12		21	46	12	13	35	59

Comete.

Cometæ loca ex theoria Newtoniana.

1739	Logarit. dift. Com. a Sole.	Longitu.			Latitu.			Diffe. Longi.		Diffe. Lati.			
		G	'	"	G	'	"	'	"	'	"		
Maii 27	390285	♄	7	37	3	S	27	26	4	+ 1	38	+ 0	2
28	389724		7	6	0		27	9	21	— 0	2	+ 0	30
29	389143		6	34	28		26	51	34	— 0	25	0	0
30	388579		6	4	0		26	34	20	+ 0	42	+ 1	34
31	388047		5	34	27		26	16	56	+ 1	27	+ 0	27
Iunii 2	386993		4	35	5		25	41	25	+ 1	53	+ 1	11
3	386490		4	5	42		25	23	25	+ 1	34	+ 1	7
4	386028		3	38	1		25	6	15	+ 1	38	+ 0	37
5	385580		3	10	22		24	48	5	+ 2	16	+ 2	16
7	384754		2	14	19		24	11	11	+ 1	25	+ 0	41
8	384363		1	45	5		23	51	10	+ 0	13	+ 0	12
14	382911	♁	29	8	24		21	53	18	+ 1	37	— 0	25
15	382802		28	42	50		21	32	2	+ 0	37	— 0	58
16	382737		28	18	27		21	10	44	+ 1	3	— 1	53
17	382711		27	53	59		20	48	53	+ 0	48	— 2	7
25	384055		24	43	53		17	34	43	— 1	24	+ 1	17
28	385144		23	41	51		16	17	53	— 0	9	+ 0	42
Iulii 2	387005		22	22	37		14	30	2	— 1	8	— 0	20
3	387506		22	4	17		14	3	14	— 0	48	— 1	16
4	388041		21	46	0		13	34	53	— 0	12	— 1	6

Come-

Cometa loca ex observationibus.

1739	Temp. ap.		Ascen. recta			Declina.			Longitu.			Latitu.						
	H	'	G	'	"	G	'	"	G	'	"	G	'	"				
Iulii	6	15	11	79	22	36	S	35	45	49	Π	21	10	56	S	12	36	55
	7	15	11	79	2	18		35	16	17		20	51	46		12	8	43
	9	15	22	78	26	42		34	13	30		20	16	55		11	8	30
	12	15	1	77	40	3		32	40	12		19	29	32		9	38	45
	14	14	26	77	9	3		31	35	38		18	57	9		8	36	14
	15	14	19	76	55	0		31	2	27		18	42	56		8	4	45
	16	14	52	76	39	39		30	28	51		18	25	48		7	33	57
	20	15	14	75	39	1		28	9	45		17	19	26		5	17	47
	21	15	11	75	24	11		27	34	33		17	2	20		4	45	28
	22	14	39	75	10	27		26	57	45		16	46	53		4	10	4
	26	14	26	74	17	7		24	28	6		15	43	17		1	46	22
	27	14	39	74	3	46		23	47	28		15	26	45		1	7	13
Aug.	2	13	36	72	31	56		19	40	32		13	33	42	M	2	48	19
	4	13	43	72	0	55		18	11	24		12	53	41		4	13	15
	10	13	21	70	14	55		13	15	48		10	33	14		8	53	7
	17	14	54	67	41	0		6	44	22		7	1	26		14	58	10

Come.

Cometae loca ex theoria Newtoniana.

1739	Logarit. dist. Com. a Sole.	Longitu. G ' "	Latitu. G ' "	Diffe. Longi. ' "	Diffe. Lati. ' "
	Iulii 6	389178	II 21 9 21	S 12 36 34	— 1 35
7	389754	20 51 51	12 7 42	+ 0 5	— 1 1
9	390939	20 17 59	11 8 22	+ 1 4	— 0 8
12	392739	19 30 1	9 38 37	+ 0 29	— 0 8
14	393977	18 56 46	8 36 3	— 0 23	— 0 11
15	394596	18 40 45	8 4 24	— 2 11	— 0 21
16	395231	18 24 44	7 31 31	— 1 4	— 2 26
20	397722	17 20 49	5 17 21	+ 1 23	— 0 26
21	398336	17 4 57	4 43 51	+ 2 37	— 1 37
22	398934	16 49 6	4 9 48	+ 2 13	— 0 16
26	401343	15 42 57	1 45 37	— 0 20	— 0 45
27	401937	15 25 24	1 7 58	— 1 21	+ 0 45
Aug. 2	405357	13 34 58	M 2 49 2	+ 1 16	+ 0 43
4	406469	12 54 27	4 14 31	+ 0 46	+ 1 16
10	409642	10 34 26	8 49 39	+ 1 12	— 3 28
17	413133	7 2 50	14 57 28	+ 1 24	— 0 32

*Observatio eclipsis solis habita in astronomica
specula bononiensis scientiarum Instituti
die 22 maii MDCCXXIV.*

*Ex observatione Eustachii Manfredii, Ioannis Baptiste
Bandieri, & Dominici Weber, ut est ab ipsis
descripta.*

Ingruente eclipsis tempore, nubes dissipari cœperunt, quibus antea cælum obductum erat, quare nos telescopia, quæ in promptu erant, in solem direximus, & paulo post lunæ marginem in discum solis ingressum telescopio pedum 11 notavimus h. 6. 35'. 55" tem. ver. p. m. Luminarium contactus in eo quadrante occurrit, qui a puncto infimo disci solis, & ab extremo septentrionali puncto diametri horizontalis comprehenditur. Prope marginem, in quo luna apparere cœpit, visa fuerat facula, ubi præcedentibus diebus macula infederat, sed ea post incœptam eclipsim ob nebulam, & aeris densitatem distingui amplius non potuit.

Observato eclipsis initio sequentes phases definivimus telescopio pedum octo, cui tabella adiuncta erat concentricis filis distincta, & in duodecim digitos dispertita. Tabellæ distantia a vitro oculari æquabat uncias $16\frac{3}{4}$, & diameter speciei solaris uncias $3\frac{1}{2}$.

H " T. v. p. m.

6	40	10	Deficiebat plus quam digitus.
6	44	0	Duo digiti } determinaciones aliquantulum
6	48	50	Tres digiti } dubiæ.
6	53	16	Digitus quatuor.
6	57	29	Digitus quinque.
7	1	59	Digitus sex)
7	5	24	Digitus septem) inter nubes.
7	9	39	Digitus octo)

In præcedentibus phasibus cum sol manifesto ellipticus propter refractiones appareret; imago eius in tabellam proiecta cum circulo exteriori ad solis diametrum dimenso congruere nequaquam poterat; quare diligenter curabamus in determinandis digitis, ut diameter horizontalis speciei solaris cum diametro circuli exterioris conveniret.

Dum eclipsis erat octo digitorum sol inter nubes absconditus est, & nulla imposterum haberi potuit digitorum determinatio.

7 26 8 Sol iterum apparet, sed ita nubibus involutus, ut nullo adhibito vitro fuligine tincto in eum commode inspiceremus. Eclipsis longe aucta erat, eamque oculari æstimatione definivimus excedere digitos $11\frac{1}{2}$.

7 28 48 Maxima obscuratio iam prætergressa erat, & revera illuminationis cornua, & longiora fiebant, & latiora; eodemque tempore pars inferior solis detegebatur, quæ adhuc latuerat; locus enim maximæ obscurationis in eum peripheriæ quadrantem incidit, qui inter punctum inferius, & extremum punctum meridionale diametri horizontalis constituitur. Tempore maximæ eclipsis magna obtenebratio facta est, & plures stellæ apparuerunt, & venus, & mercurius. Ex iis, quæ notata fuerunt, coniecimus maximam obscurationem fuisse digitorum $11\frac{13}{14}$, quia scilicet arcus solis emicans duplam latitudinem æquabat eius filii, quod in foco telescopii extensum erat, quæ latitudo, seu crassities bis sumpta secunda decem, aut duodecim comprehendebat.

7 29 0 Cornua eclipsis horizonti parallela existebant.

7 29 20 Limbus præcedens solis horizontem visibilem tangit, qui cum nullus esset terrestrium corporum interpositus, tamquam linea recta apparebat.

7 29 22 Limbus præcedens lunæ horizontem tangit; &
tunc

tunc cornu septentrionale altius attollebatur
cornu meridionali.

- 7 30 27 Cornu septentrionale occidit; & quamvis sol
totus infra horizontem lateret, vespertinum
lumen adhuc augebatur. Peractis hisce obser-
vationibus quadrante astronomico horizontis
depressionem definivimus, ubi sol occiderat,
eaque inventa est minutorum 9. 30''.

*Observationes aliæ habitæ a Iacobo Parma, & a
Iosepho Bolsio Marchesio.*

- 6 36 6 **I**nitium eclipsis visum telescopio pedum 8.
Sequentes observationes institutæ sunt ope tabel-
læ, quæ digitos referebat, & telescopio pe-
dum 3 aptata erat. Tabella ab oculari vitro
distabat uncias 18, & imaginis exceptæ dia-
meter æquabat uncias $2\frac{1}{2}$.
- 6 43 52 Digiti duo deficiebant.
6 47 55 Digiti tres.
6 52 28 Digiti quatuor.
6 56 13 Digiti quinque.
7 0 34 Digiti sex. Determinatio dubia.

*Defectus solis observatus e specula bononiensis
Scientiarum Institutii*

ab

Eustachio Manfredio, & a Iacobo Parma

die 25 septembris MDCCXXVI

ut est ab ipsis descriptus.

Tab. observ. astronom. fig. 3.

Plures maculæ in sole visebantur, quæ cum a luna obtegi deberent, ante eclipsis initium ope micrometri earum positum in sole definivimus, easdemque in typum retulimus, & literis consignavimus, quo facilius singularum immerisiones a nobis indicerentur. Macularum positum in disco solis exhibet subiectum schema.

H	'	"	Tem. ver. p. m.
5	23	19	Initium eclipsis tubo pedum 11; iamque luna tangit marginem maculæ f.
5	25	15	Centrum maculæ e obtegitur.
5	29	7	Centrum maculæ b.
5	30	34	Centrum maculæ a.
5	32	45	Centrum maculæ c.
5	32	49	Centrum maculæ d.
5	41	49	Intervalla 15 diametri solis ab eclipsi immunis, quorum diameter solis erat $21\frac{1}{2}$.
5	44	46	Intervalla 14.
5	47	55	Intervalla 13.

5 51 12

H	'	"	Temp. ver. p. m.
5	51	12	Intervalla 12 .
5	55	11	Intervalla 11 .
5	56		Sol post montes absconditur .

Ex intervallis superius descriptis non satis constat de quantitate eclipsis; nam cum sol prope horizontem versaretur, eius figura a refractionibus nimium deformata conspiciebatur:

*Defectus solis observatus in astronomica specula
bononiensis scientiarum Instituti
die 15 Septembris MDCCXXVII mane
ab
Eustachio Manfredio, & sociis,
ut est ab ipsis descriptus.*

Tab. observ. astronom. fig. 4.

PRO determinandis eclipsis phasibus machinam paralla-
cticam telescopio instructam adhibuimus. Tabella cir-
culis concentricis distincta e regione vitri ocularis
transverso brachiolo telescopium deferenti infixam
erat, cuius distantia ab oculari vitro æquabat uncias 9.
Iacobus Parma, & Franciscus Vandellus hoc instrumento
definiendis digitis operam dabant.

Maculæ in sole conspiciebantur, quarum positus is
erat, quem subiecta figura exhibet. Plerasque earum im-
mersiones, & emersiones, quas hic referemus, notatæ fue-
runt a Comite Francisco Algarotto, & ab Eustachio Za-
notto.

H ' " temp. ver. post meri.

18 55 48 Eclipsis iam cœperat. Propter nubes verum ini-
tium determinari non potuit.

18 57 14	Deficiebat dimidium digiti	} observationes] dubiæ pro- } pter nubes.
18 59 37	Digitus unus, atque aliquid amplius	
19 3 12	Digitus unus cum semisse	
19 6 50	Digitus duo	

19 10 11 Digiti duo cum semisse
Interim ab observando cessavimus propter den-
siores nubes.

19 35 46 Nondum deficiebant digiti quinque.

H	'	"	temp. ver. post mer.
19	40	47	Digiti quinque præterpropter.
19	44	31	Maior macula ex tribus notatis i centro suo ad lunæ marginem apellit.
19	47	27	Limbus lunæ transit inter duas maculas s.
19	47	46	Altera ex duabus maculis s tota latet.
19	51	37	Obscuratio solis minor erat quinque digitorum.
19	54	12	Centrum maculæ p immergitur.
19	55	37	Centrum maculæ q.
19	59	2	Eclipsis manifesto minuebatur, tunc enim non excedebat digitos quatuor cum semisse. Ob- servatio dubia propter nubes.
20	1	22	Macula n penitus absconditur.
20	10	10	Obscuratio aliquantum minor est trium digito- rum cum semisse.
20	11	47	Macula i detecta est.
20	15	0	Deficiebant digiti tres.
20	18	48	Digiti duo cum semisse.
20	18	49	Macula s detegi incipit.
20	22	26	Digiti duo.
20	26	14	Digitus cum semisse.
20	36	6	Finis eclipsis.

*Defectus totalis lune observatus in specula
bononiensis scientiarum Instituti
die 13 februarii MDCCXXIX.*

*Ex observationibus Eustachii Manfredii, Iacobi Parmæ,
& Francisci Vandelli.*

H " tem. ver. post mer.

7 39 22	I Nitium eclipseos dubium.
7 40 22	Ricciolius in umbra.
7 41 2	Grimaldus mergi incipit.
7 42 7	Grimaldus totus latet.
7 43 37	Umbra per medium galilei.
7 49 37	Per medium aristarchi.
7 50 12	Totus aristarchus. Umbra ad mare humorum.
7 51 23	Per medium gassendi.
7 53 25	Per medium mare humorum.
7 58 33	Ad copernicum.
7 58 48	Ad bullialdum.
7 59 8	Ad heraclidem.
8 0 23	Centrum copernici, & totus bullialdus.
8 1 23	Totus copernicus latet.
8 4 13	Incipit pitatus & erathostenes.
8 5 18	Per medium pitati.
8 6 4	Totus erathostenes.
8 7 31	Tycho ad umbram.
8 8 39	Medium tychonis.
8 8 59	Plato ad umbram.
8 10 24	Tycho totus latet.
8 10 39	Totus plato.
8 13 54	Umbra ad manilium, & ad mare ferenitatis.
8 15 19	Totus manilius.
8 16 57	Eudoxus & aristoteles ad umbram.
8 17 59	Medium eudoxi, aristotelis & menelai.
8 19 4	Medium dionisii.

H	'	"	tem. ver. post mer.
8	21	35	Ad plinium.
8	24	40	Ad mare nectaris.
8	24	50	Ad fracastorium.
8	26	5	Medium fracastorii.
8	27	3	Fracastorius totus latet.
8	28	55	Totum mare nectaris.
8	31	55	Snellius ad umbram.
8	32	10	Ad mare crisium.
8	34	5	Per medium mare crisium.
8	35	51	Totum mare crisium in umbra.
8	39	16	Totalis immersio.
10	16	46	Initium emersionis.
10	19	52	Ricciolius extra umbram.
10	20	26	Grimaldus detegi incipit.
10	20	57	Medium grimaldi.
10	21	43	Grimaldus totus emerferat.
10	25	1	Medium galilei.
10	25	51	Mare humorum incipit emergere.
10	28	31	Per medium mare humorum. Gassendus ad umbram.
10	31	26	Per medium aristarchi.
10	31	49	Totus aristarchus emerferat.
10	33	12	Keplerus.
10	35	40	Tycho ad umbram.
10	36	52	Medium tychonis.
10	38	17	Totus tycho extra umbram.
10	40	22	Copernicus ad umbram.
10	41	12	Medium copernici.
10	42	14	Totus copernicus extra umbram.
10	47	47	Totus erathostenes.
10	48	18	Plato incipit.
10	49	1	Medium platonis.
10	49	53	Totus plato extra umbram.
10	57	14	Totus manilius.
10	58	14	Umbra per medium eudoxi, & aristotelis.
10	59	19	Menelai, & dionisii.
11	2	59	Maris nectaris.

H	'	"	tem. ver. post mer.
11	3	12	Plinius emergit.
11	5	19	Mare nectaris extra umbram.
11	10	27	Taruntius emergit, nubeculis lunam involven- tibus.
11	12	20	Incipit mare crisium. Observatio dubia.
11	14	20	Medium mare crisium.
11	16	29	Totum mare crisium.
11	17	27	Finis eclipsis dubius propter nubes.

*Observationes aliae Francisci Mariae Zanotti, Iosephi Bolssi
Marchesii, Comitum Francisci Algarotti,
Eustachii Zanotti.*

7	38	50	Initium eclipsios.
7	44	9	Galileus totus latet.
7	49	37	Aristarchus ad umbram.
7	50	42	Totus aristarchus in umbra.
7	50	47	Mare humorum ad umbram.
7	51	28	Totus keplerus latet.
7	55	18	Totum mare humorum.
7	58	48	Incipit copernicus.
8	0	24	Bullialdus totus latet.
8	1	22	Totus copernicus.
8	7	34	Tycho incipit.
8	9	8	Plato.
8	9	11	Totus plato.
8	13	49	Mare serenitatis ad umbram.
8	13	53	Manilius.
8	15	9	Totus manilius immergitur.
8	18	44	Totus menelaus.
8	19	10	Dionisius.
8	26	13	Promontorium acutum.
8	28	12	Promontorium fomni.
8	31	50	Initium maris crisium.
8	35	27	Finis maris crisium.
8	39	0	Totalis immersio.

H	'	"	tem. ver. post mer.
10	18	33	Initium emerfionis.
10	22	56	Grimaldus extra umbram.
10	26	49	Incipit mare humorum.
10	26	52	Galileus extra umbram.
10	31	58	Aristarchus.
10	36	42	Tycho detegi incipit.
10	37	18	Bullialdus extra umbram.
10	38	23	Totus tycho.
10	43	5	Totus copernicus.
10	51	44	Totus plato.
10	56	39	Centrum manilii.
10	57	28	Totus manilius.
10	59	40	Centrum menelai.
11	4	13	Centrum plinii.
11	11	0	Promontorium fomni.
11	14	3	Incipit mare crisium nubeculis lunam involven- tibus.
			Finis eclipseos non est observatus propter nubes.

*Totalis lunæ defectus observatus in astronomica
specula bononiensis scientiarum Instituti
die 8 augusti MDCCLXXIX.*

*Observatio habita a Ioanne Iacobo Marinonio casareo
mathematico, & consiliario, & a Iosepho
Bolsio Marchesio.*

H ' " temp. ver. post mer.

11	56	52	I nitium eclipseos.
11	58	32	Galileus totus latet.
12	3	47	Aristarchus.
12	4	42	Keplerus.
12	6	49	Gassendus.
12	7	12	Schikardus.
12	10	41	Bullialdus.
12	11	33	Copernicus ad umbram.
12	12	56	Medium copernici.
12	19	46	Tycho ad umbram.
12	20	54	Medium tychonis.
12	21	43	Tycho totus latet.
12	23	43	Plato mergi incipit.
12	24	42	Medium platonis.
12	25	23	Totus plato.
12	25	55	Infula sinus medii.
12	27	35	Manilius totus tegitur.
12	29	35	Aristoteles.
12	32	7	Menelaus.
12	35	0	Plinius.
12	38	49	Promontorium fomni.
12	39	26	Promontorium acutum.
12	44	16	Fracastorius.
12	45	42	Proclus.

H	'	"	temp. ver. post mer.
12	46	59	Initium maris crisium.
12	49	47	Medium maris crisium.
12	52	19	Totum mare crisium obumbratur.
12	53	6	Petavius totus immergitur.
12	55	54	Totalis immerfio lunæ.
<hr/>			
14	34	25	Initium emerfionis dubium.
14	35	25	Procul dubio emerfio cœperat.
14	37	30	Incipit grimaldus.
14	38	20	Galileus totus emerferat.
14	38	28	Grimaldus.
14	39	45	Aristarchus.
14	44	47	Keplerus.
14	48	33	Incipit plato.
14	49	31	Medium platonis.
14	50	42	Totus plato extra umbram.
14	52	47	Copernicus totus emerferat.
14	55	32	Bullialdus.
15	1	56	Initium tychonis.
15	2	36	Medium tychonis.
15	3	50	Totus tycho.
15	4	50	Manilius.
15	7	47	Menelaus.
15	11	2	Dionifius.
15	11	37	Plinius.
15	18	53	Promontorium acutum.
15	20	30	Initium maris crisium.
15	20	59	Totus proclus.
15	23	34	Medium maris crisium.
15	26	19	Totum mare crisium extra umbram.
15	35	0	Finis eclipseos.

*Observationes alie habite ab Eustachio Zanotto,
& a Francisco Vandello.*

H	'	"	temp. ver. post mer.
11	59	12	G Rimaldus totus tegitur.
12	4	9	G Galileus.
	6	30	Keplerus ad umbram.
	9	29	Schikardus.
	11	3	Copernicus.
	12	48	Medium copernici.
	13	3	Totus copernicus latet.
	14	35	Totus timocharis.
	19	16	Tycho ad umbram.
	19	59	Medium tychonis.
	20	42	Totus tycho.
	23	21	Plato ad umbram.
	24	13	Medium platonis.
	24	53	Totus plato.
	26	0	Manilius umbram tangit.
	26	50	Manilius tegitur.
	30	37	Menelaus ad umbram.
	30	52	Totus menelaus.
	33	44	Dionisius.
	34	4	Plinius.
	37	36	Initium maris nectaris.
	40	51	Totum mare nectaris.
	42	36	Messala ad umbram.
	45	44	Proclus.
	46	30	Mare crisium ad umbram.
	49	9	Medium maris crisium.
	51	44	Totum mare crisium.
	55	43	Totalis immerfio lunæ.
14	34	5	Initium emerfionis.
	38	2	Grimaldus emergit.
	38	10	Grimaldus totus emerferat.
	39	45	Aristarchus.
	44	53	Keplerus.
	46	50	Helicon.

H	'	"	temp. ver. post mer.
14	49	33	Plato ad umbram.
14	50	40	Totus plato.
15	2	3	Tycho incipit.
	2	51	Medium tychonis.
	3	51	Totus tycho.
	4	37	Manilius emergere incipit.
	7	47	Menelaus.
11	7		Totus Dionisius exit.
11	27		Plinius.
16	37		Cleomedes.
18	53		Promontorium acutum.
20	33		Initium maris crisium.
24	11		Medium maris crisium.
26	33		Totum mare crisium.
15	35	0	Finis eclipseos.

*Defectus solis observatus in astronomica specula
bononiensis scientiarum Instituti*

ab

*Eustachio Manfredio, Eustachio Zanotto,
Iosepho Roverfio*

*die 15 iulii MDCCXXX mane,
ut est ab ipsis descriptus.*

Nubes horizontem occupabant ex ea parte, qua sol oriturus erat. Hor. 16. 39 sol apparuit deficiens digitos $4\frac{1}{2}$ præterpropter. Nulla interiecta mora ad machinam parallacticam confugimus, ut imaginem solis tabella, quæ illi adiuncta erat, exciperemus, & quantitatem eclipseos pro more definiremus. Longitudo telescopii erat pedum 4, & diameter imaginis solaris super tabellam projectæ æquabat uncias $2\frac{1}{2}$.

H ' " temp. ver. post mer.

16 44 12 Obscuratio solis digitorum 4.

16 45 42 Totalis emersio maculæ, quæ visebatur in eadem recta linea cum duabus propius centrum solaris disci constitutis.

16 47 40 Deficiebat dig. $3\frac{1}{2}$.

16 48 53 dig. 3.

16 49 15 Alia macula emerferat, quæ in eadem recta linea cum tribus supradictis versabatur, & solis margini propior erat.

16 51 13 dig. $2\frac{1}{2}$.

Nubes solem occludunt.

H ' " temp. ver. p. m.

16 59 40 Sol iterum apparet deficiens dig. 2.

17 1 46 Deficiebat dig. $0\frac{1}{2}$.

17 3 4 Emerfio alterius maculæ, quæ parum aberat a limbo folis.

17 4 10 Finis eclipseos telescopio pedum 11.

17 4 11 Finis eclipseos observatus in tabella machinæ parallacticæ.

*Observatio eclipseos lunaris Romæ habita
die I decembris MDCCXXXII
in adibus Eminentiss. De - Via*

a

*D. Didaco Revillas Abbate Hieronymiano,
Abbate Ioanne Bottario, &
Eustachio Manfredio.*

Observationes habitæ telescipio palmorum 10.

H	'	"	temp. ver. post mer.
8	45	28	P Enumbra iam sensibilis.
	49	14	Penumbra densior.
	51	19	Initium eclipseos.
	51	44	Grimaldus mergi incipit.
	52	47	Totus latet.
	52	54	Galileus.
	53	48	Umbra ad gassendum.
	56	2	Totus latet gassendus.
	57	23	Schikardus.
9	2	43	Keplerus.
	4	53	Aristarcus totus latet.
	5	0	Lansbergius, & M. humorum fere totum latet.
	6	13	Bullialdus.
	6	53	Capuanus.
	7	8	Umbra ad mare nubium.
	8	2	Copernicus mergi incipit.
	8	29	Per medium copernici.
10	27		Umbra ad erasthenem; & copernicus totus latet.
	14	12	Tycho mergi incipit.
	14	45	Infula sinus medii.

H	'	"	temp. ver. post mer.
9	15	37	Heraclides .
	16	22	Tycho iam latet .
	18	12	Tymocharis .
	20	4	Archimedes .
	21	4	Harpalus .
	23	10	Manilius .
	23	16	Helicon .
	23	40	Plato .
	26	21	Menelaus .
	28	55	Catharina, & cyrillus .
	30	11	Plinius .
	30	56	Dionisius .
	32	31	Aristoteles .
	33	11	Promontorium acutum .
	34	27	Fernellius .
	35	51	Snellius .
	36	11	Possidonius .
	36	41	Petavius .
	37	45	Promontorium somnii .
	38	25	Langrenus .
	40	24	Hermes ,
	41	0	Proclus .
	41	30	Incipit mare crisium .
	42	32	Cleomedes .
	45	10	Umbra per medium maris crisium .
	46	20	Messala .
9	48	24	Totalis immerfio .
0	57	5	<i>Totalis immerfionis duratio .</i>
11	31	13	Procul dubio emerfio iam cœperat .
	33	13	Grimaldus emerferat .
	46	3	Medium copernici .
	51	17	Tycho .
	51	52	Plato .
	53	13	Archimedes .
	56	36	Infula finus medii .
	59	57	Eudoxus .

H	'	"	temp. ver. post mer.
12	2	10	Manilius.
	3	26	Aristoteles.
	4	25	Menelaus.
	8	11	Possidonius.
13	6		Plinius.
17	14		Promontorium acutum.
20	38		Langrenus.
23	21		Totum mare crisium.
26	55		Finis.

Duratio totius eclipseos H. 3. 35. 36.

*Phases nonnullæ immersionis ex alia observatione habita
telescopio Newtoniano.*

H	'	"	temp. ver. post mer.
8	50	13	P Enumbra densa.
	51	28	Initium certum obscurationis.
	54	8	Grimaldus latet totus.
	54	32	Umbra per medium galilæum.
9	0	58	Totus keplerus latet.
	2	18	Umbra ad aristarchum.
	3	37	Totus aristarchus latet.
	8	3	Umbra ad initium copernici.
	9	20	Per medium copernici.
	10	32	Totus copernicus tegitur.
	14	47	Umbra ad initium tychonis.
	23	11	Ad initium manilii.
	23	26	Ad initium platonis.
	23	55	Umbra per medium platonis, & manilii.
	24	40	Totus plato tegitur.
	39	35	Umbra ad initium procli.
	40	18	Umbra ad hermetem.
	41	0	Totus proclus tegitur.
	41	31	Ad initium maris crisium.
	44	20	Per medium maris crisium.
	46	15	Totum mare crisium obumbratur.
	49	3	Totalis lunæ immersio in umbra.

*Observatio eclipsis lunæ habita in astronomica
specula bononiensis scientiarum Instituti*

a

*Petro Martino in neapolitano Licæo matheſeos
professore,*

Eustachio Zanotto, Francisco Vandello,

Josepho Roverſio

die 28 maii MDCCXXXIII

ut est ab ipsis descripta.

INitium eclipsis contigit existente luna infra horizon-
tem. Primæ phasæ, quæ a nobis observatæ fuerunt
sunt admodum dubiæ propter nebulam, quæ lunam
involvebat. Quantitatem eclipsis definivimus ope mi-
crometri telescopio pedum 8 accommodati, cuius microme-
tri intervalla $19\frac{1}{2}$ lunæ diametrum metiebantur.

H ' " temp. ver. post mer.

8	4	49	Intervalla 5 diametri lunæ ab eclipsi immunis.
	5	1	Keplerus ad umbram.
	6	49	Intervalla adhuc 5.
	10	49	Intervalla $5\frac{1}{2}$.
	16	34	Intervalla 6.
	21	53	Timocharis extra umbram.
	22	35	Intervalla 7.
	24	9	Grimaldus incipit emergere.
	26	14	Grimaldus extra umbram.
	29	9	Copernicus emerſerat.
	30	42	Intervalla $7\frac{1}{2}$.
	33	41	Intervalla 8.
	33	53	Menelaus emerſerat.

H	'	"	temp. ver. post mer.
			Disiectis nebulis cælum ferenum patuit.
8	37	49	Intervalla $8\frac{1}{2}$.
	37	59	Plinius extra umbram.
	40	19	Intervalla 9.
	42	4	Umbra per medium mare crisium.
	42	19	Mare humorum incipit emergere.
	43	49	Intervalla 10.
	45	26	Medium maris humorum.
	45	41	Schikardus extra umbram.
	50	53	Intervalla 11.
	52	57	Dionisius.
	53	20	Mare crisium extra umbram.
	56	2	Intervalla 12.
8	58	26	Promontorium acutum, & taruntius.
9	0	49	Intervalla 13.
	5	49	Intervalla 14.
	6	0	Tycho emergere incipit.
	7	50	Totus tycho emerferat.
	10	20	Intervalla 15.
	12	20	Medium maris nectaris.
	15	19	Intervalla 16.
	16	39	Mare nectaris extra umbram.
	22	15	Intervalla $17\frac{1}{2}$.
9	29	10	Finis eclipsis.

*Eclipsis solis observata in astronomica specula
bononiensis scientiarum Instituti*

ab

*Eustachio Manfredio, & sociis
die 3 maii MDCCXXXIV mane,
ut ab ipsis descripta est.*

H ' " Tem. ver. p. m.

22 27 5 **I** Nitium eclipseos.

Deinceps telescopio pedum 8 micrometrum aptavimus, quo obscurationis quantitatem æstimaremus. Diameter solis æquabat intervalla micrometri $21\frac{1}{4}$.

22 43 15 Intervalla 19 diametri solis ab eclipsi immunis, unde elicitur quantitatem obscurationis fuisse dig. 1. 15.

22 51 30 Intervalla $18\frac{1}{2}$ ————— dig. 1. 33.

22 54 45 Intervalla $18\frac{2}{3}$ ————— dig. 1. 38.

22 58 45 Intervalla $18\frac{3}{4}$ ————— dig. 1. 41.

23 4 46 Intervalla $18\frac{3}{4}$ ————— dig. 1. 38.

23 10 46 Intervalla $18\frac{1}{2}$ ————— dig. 1. 33.

23 15 26 Intervalla $18\frac{2}{3}$ ————— dig. 1. 27.

23 17 16 Intervalla $18\frac{3}{4}$ ————— dig. 1. 25.

23 21 1 Intervalla 19 ————— dig. 1. 15.

23 23 46 Intervalla $19\frac{1}{3}$ ————— dig. 1. 9.

23 25 31 Intervalla $19\frac{1}{4}$ ————— dig. 1. 7.

H	'	"	temp. ver. post mer.
23	26	31	Intervalla $19\frac{1}{3}$ ————— dig. 1. 4.
23	28	17	Intervalla $19\frac{1}{2}$ ————— dig. 0. 59.
23	31	47	Intervalla 20 ————— dig. 0. 42.
23	39	48	Finis eclipseos.

Maxima obscuratio fuit dig. 1. 41.

*Defectus lune observatus in astronomica specula
bononiensis scientiarum Instituti*

ab

*Eustachio Manfredio, & sociis
die I octobris MDCCXXXV.*

H	'	"	temp. ver. post mer.
12	51	52	I Nitium eclipseos.
12	58	30	Schikardus ad umbram.
13	0	20	Schikardus totus latet.
	8	13	Incipit mare humorum.
	9	44	Capuanus in umbra.
	11	18	Tycho ad umbram.
	13	13	Totus tycho tegitur.
	18	26	Gassendus in umbra.
	19	30	Totum mare humorum.
	21	55	Bullialdus.
	30	50	Grimaldus incipit.
	36	22	Medium grimaldi.
	46	48	Mare nectaris ad umbram.
	47	44	Totum mare nubium.
	49	50	Umbra per medium grimaldi.
	54	15	Totum mare nectaris latet.
14	2	5	Grimaldus iam emerferat.
	5	20	Reinoldus tegitur.
	30	14	Insula sinus medii extra umbram.
	31	59	Mare humorum incipit emergere.
	35	30	Gassendus extra umbram.
	38	45	Dionisius.
	48	53	Schikardus.
	50	53	Capuanus.
	53	15	Promontorium acutum.
	59	22	Mare tranquillitatis.
15	4	6	Tycho incipit emergere.

H	'	''	tem. ver. post mer.
15	5	24	Medium tychonis.
	6	41	Totus tycho.
	7	10	Incipit mare nectaris.
	15	59	Fracastorius.
	19	29	Totus Fracastorius emergit.
	20	26	Totum mare humorum.
	34	50	Finis eclipseos.

Diameter apparens lunæ æquabat intervalla $20\frac{2}{3}$ micrometri, quo identidem quantitatem obscurationis definivimus, ac deinceps in digitos convertimus.

13	4	50	Intervalla diametri lunæ ab eclipsi immunis $17\frac{1}{2}$, quibus respondent digiti ecliptici 1. 40.
13	7	50	Inter. 17 dig. 1. 57.
	14	50	Inter. 16 dig. 2. 33.
	19	30	Inter. 15 dig. 3. 9.
	24	50	Inter. 14 dig. 3. 44.
	31	35	Inter. 13 dig. 4. 19.
	37	50	Inter. 12 dig. 4. 55.
	41	50	Inter. $11\frac{1}{2}$ dig. 5. 13.
	46	50	Inter. 11 dig. 5. 30.
	55	50	Inter. $10\frac{2}{3}$ dig. 5. 54.
14	6	50	Inter. 10 dig. 6. 6.
	18	50	Inter. 10 dig. 6. 6.
	31	20	Inter. $10\frac{2}{3}$ dig. 5. 54.
	34	20	Inter. $10\frac{1}{2}$ dig. 5. 48.
	38	40	Inter. 11 dig. 5. 30.
	47	50	Inter. 12 dig. 4. 55.
	54	26	Inter. 13 dig. 4. 19.
	59	20	Inter. 14 dig. 3. 44.
15	6	50	Inter. 15 dig. 3. 9.
15	12	30	Inter. 16 dig. 2. 33.
15	18	20	Inter. 17 dig. 1. 57.

*Defectus totalis luna observatus e specula
bononiensis scientiarum Instituti
26 martii MDCCXXXVI.*

*Ex observatione Eustachii Manfredii
telescopio pedum 10.*

H	'	"	tem. ver. post mer.
10	58	45	I Nitium eclipseos dubium.
11	0	46	Umbra ad medium grimaldi.
	1	51	Ad medium galilæi.
	6	0	Ad medium aristarchi.
	7	56	Ad medium kepleri.
10	16		Gassendi.
11	40		Capuani (dub.)
15	27		Copernici.
16	57		Bullialdi.
19	27		Eratosthenis.
22	22		Pitati.
24	15		Platonis.
26	2		Tychonis.

*Ex observatione Iosephi Bolsii Marchesii
eodem telescopio.*

11	28	55	Umbra ad medium manilii.
	33	56	Dionysii.
	39	53	Catharinæ, theophili, cyrilli.
	41	23	Promontorii acuti.
	45	47	Taruntii & procli.
	46	41	Mare crisium obumbrari incipit.
	51	55	Totum mare crisium latet.
11	55	41	Totalis immersio lunæ in umbram.

Ite.

Iterum ex observatione Manfredii eodem tubo.

H	'	"	tem. ver. post mer.
13	33	30	Initium emersionis dubium.
	34	10	Certius.
	36	30	Emergit ricciolius.
	37	10	Medium grimaldi.
	38	27	Medium galilæi.
	41	31	Medium aristarchi.
	45	27	Kepleri.
	46	49	Schikardi (dub.)
	47	26	Maris humorum.
	48	41	Capuani (dub.)
	52	6	Copernici.
	53	28	Platonis.
	53	38	Bullialdi.
13	59	10	Tychonis.
14	0	14	Totus tycho emergit.
	5	20	Medium manilii.
	8	12	Menelai.
	10	47	Dionysii.
	12	12	Plinii.
	15	22	Messhallæ.
	18	3	Promontorii acuti.
	20	48	Procli.
	23	17	Petavii.
	23	53	Maris crisium.
	26	33	Langrenii (dub.)
	26	46	Totum mare crisium emergit.
	31	43	Totalis emersio dubia.
	32	23	Certior.

*Ex observatione Eustachii Zanotti
telescopio pedum 11.*

H	'	"	tem. ver. post mer.
10	59	20	Luna deficere iam cœperat.
11	2	10	Galilæus in umbra.
	6	3	Medium aristarchi in umbra.
	8	8	Keplerus.
	10	23	Gassendus.
	13	11	Heraclides.
	14	59	Copernicus umbram attingit.
	16	10	Totus latet.
	17	14	Umbra ad medium bullialdi.
	17	33	Umbra ad tymocharim.
	23	27	Attingit platonem.
	24	22	Ad medium platonis.
	25	12	Totus plato latet.
	25	35	Umbra attingit tychonem.
	26	15	Ad medium tychonis.
	26	55	Totus tycho immergitur.
	29	15	Ad medium manilii.
	32	48	Ad medium menelai.
	33	44	Dionysii.
	36	15	Plinii.
	39	54	Catharinæ, theophili, cyrilli.
	41	6	Promontorii acuti.
	41	53	Umbra attingit hermetem.
	42	28	Ad medium hermetis.
	43	17	Totus hermes in umbra.
	44	27	Umbra ad mare fœcunditatis.
	45	52	Ad proclum.
	46	41	Ad cleomedem.
	46	52	Ad mare crisium.
	49	34	Ad medium maris crisium.
	51	12	Totum mare crisium in umbra.
11	56	32	Totalis immersio lunæ in umbram.
13	32	5	Initium emersionis dubium.

H	'	"	temp. ver. post mer.
13	33	34	Emerfio cœperat.
	36	23	Emergit ricciolius.
	36	49	Grimaldus emergere incipit.
	37	40	Medium grimaldi exit.
	38	0	Totus grimaldus.
	39	3	Galilæus totus detegitur.
	41	41	Aristarchus totus.
	45	22	Keplerus emergit.
	46	22	Heraclides.
	47	42	Medium mare humorum.
	51	48	Copernici initium.
	52	23	Medium.
	53	17	Finis.
	53	43	Medium platonis.
	54	12	Plato totus.
13	59	45	Medium tychonis.
14	0	12	Tycho totus.
	3	24	Medium eudoxi.
	5	34	Manilii.
	8	21	Menelai.
	9	26	Hermetis.
	10	52	Dionysii.
	12	2	Plinii.
	15	38	Mefshallæ.
	18	0	Promontorii acuti.
	20	53	Proclus emergit.
	23	54	Medium mare crisium.
	26	34	Totum mare crisium.
14	31	14	Finis eclipseos.

Francifcus Vandellius telescopio pedum 8, Ioseph Roverfius telescopio pedum 6, quibus telescopiis micrometra erant aptata, ea determinarunt, quæ ad eclipseos quantitatem identidem definiendam attinebant; ex iis autem phasibus, quæ inter se se respondent, invicem collatis elicitur medium deliqui contigisse hora 12. 44. 50 post meridiem tempore vero.

*Defectus lunæ observatus e specula astronomica
bononiensis scientiarum Instituti
Noct. seq. diem 19 septembris MDCCXXXVI.*

*Ex observatione Eustachii Zanotti
telescopio pedum 11.*

H " " temp. ver. post mer.

13	42	10	I Nitium eclipseos.
	45	51	Umbra ad medium ricciolii.
	46	39	Umbra ad medium grimaldi.
	50	5	Umbra ad medium galilæi dub.
	54	33	Ad initium maris humorum.
	56	23	Ad medium gassendi.
	56	47	Ad medium schikardi.
	57	36	Ad medium kepleri.
	57	53	Ad medium aristarchi.
	58	30	Ad medium capuani.
14	3	45	Ad medium bullialdi.
	6	11	Ad initium copernici.
	6	53	Ad medium copernici.
	7	26	Ad finem copernici.
	8	1	Ad medium erathostenis.
	8	39	Ad medium heraclidis.
	9	20	Ad medium pitati.
	11	35	Ad initium tychonis.
	12	23	Ad medium tychonis.
	12	56	Ad finem tychonis.
	13	27	Ad medium heliconis.
	20	11	Ad medium platonis.
	22	38	Ad medium manilii.
	26	16	Ad medium menelai, & dionysii.
	28	22	Ad medium eudoxi.
14	29	7	Ad medium aristotelis.

Q 2.

14 30

H ' " temp. ver. p. m.

14	30	15	Ad medium plinii .
	34	5	Ad medium promontorii acuti .
	38	18	Ad medium promontorii somni .
	39	25	Ad medium messhallæ .
	39	58	Ad medium procli .
	42	9	Ad initium maris crisium .
	43	15	Ad medium cleomedis .
	44	37	Ad medium maris crisium .
	46	27	Ad finem maris crisium .
14	49	10	Totalis immerfio .
16	37	45	Emerfio iam cœperat, ricciolius extra umbram .
	38	20	Umbra ad medium grimaldi .
	42	1	Ad medium galilæi .
	44	25	Ad medium fchikardi .
	47	18	Ad medium aristarchi .
	48	15	Gaffendus totus emerferat .
	50	8	Umbra ad medium kepleri .
	55	19	Ad medium heraclidis .
	55	54	Ad medium bullialdi .
	58	33	Ad medium tychonis .
	59	19	Ad medium heliconis .
	59	33	Copernicus totus emerferat .
17	5	26	Umbra ad medium platonis .
	13	59	Ad medium manilii .
	18	41	Ad medium menelai .
	19	38	Dionysius emerferat totus .
	22	56	Umbra ad medium plinii .
	24	51	Ad medium hermetis .
	27	40	Ad medium promontorii acuti: obfervatio de- inceps dubia ob crepusculum matutinum .
	35	0	Mare crisium magnam partem emerferat .
	40	0	Nondum defierat eclipsis .
17	46	0	Prorfus defuiffe videbatur .

*Ex observatione Thomæ Perelli tubo pedum 8, &
Iosephi Garatoni tubo ped. 9.*

H	'	"	temp. ver. post mer.
13	46	38	Umbra ad grimaldum.
	47	28	Grimaldus totus in umbra.
	48	56	Umbra ad galilæum.
	50	28	Totus galilæus.
	53	32	Umbra ad mare humorum.
	56	25	Ad medium mare humorum.
	58	22	Keplerus in umbra.
14	3	27	Umbra ad bulialdum.
	5	7	Ad copernicum.
	6	16	Ad medium copernici.
	7	2	Ad finem copernici.
	11	21	Ad initium tychonis.
	12	2	Ad medium tychonis.
	12	51	Ad finem tychonis.
	13	15	Ad heliconem.
	13	55	Ad finem heliconis.
	19	52	Ad initium platonis.
	20	32	Ad finem platonis.
	25	42	Ad initium menelai.
	26	5	Ad initium dionysii.
	26	40	Ad finem menelai.
	26	44	Ad finem dionysii.
	28	19	Ad medium mare serenitatis.
	33	31	Ad initium possidonii.
	35	34	Ad finem maris nectaris.
	37	34	Ad promontorium somni.
	41	38	Ad initium maris crisium.
	44	19	Ad medium mare crisium.
	45	29	Umbra ad finem maris crisium.
14	49	10	Totalis immersio lunæ in umbram.
16	58	17	Tycho ab umbra se subducere incipit.
	58	23	Medium tychonis emergit.
	59	35	Totus tycho emergit.
17	5	2	Plato emergere incipit.

H	'	"	temp. ver. post mer.
17	5	52	Totus plato emergit.
	13	32	Emergit initium maris serenitatis.
	25	0	Emergit medium mare nectaris.
	27	20	Emergit totum mare nectaris.
	35	40	Initium maris crisium dub.
	38	20	Emergit medium maris crisium.
	40	20	Emergit totum mare crisium.
17	43	0	Finis eclipseos.

Diametrum lunæ hora 12. 53 dimensus est Ioseph Roverfius micrometro, quod telescopio pedum 8 aptatum erat, & invenit minutorum 29 sec. 35.

Eadem nocte Eustachius Zanottus observaverat totalem immersionem primi satellitis iovis in umbram hora 8. 5. 6 post meridiem ver., usus telescopio campani pedum bononiensium 22.

*Defectus solis observatus e specula bononiensis
Scientiarum Instituti*

ab

*Eustachio Manfredio, & sociis
die prima martii MDCCXXXVII.*

Tab. observ. astronom. fig. 5.

INitium huiusce deliquii calculos nostros minutis horariis plus septem antevertit. Hora enim 3 min. 33 sec. 36 iam aliquid solaris marginis a luna delibari apparuit directo intuitu per vitrum fuligine infectum, ac telescopio pedum undecim aptatum (cum paullo ante, hoc est, in ipso scrupulo 33, eodem telescopio sol plane rotundus visus esset) calculi autem initium in horam 3. 41 coniciebant.

Deinceps digitos eclipticos notavimus traiecto solis radio per tubum opticum pedum sex, eoque excepto in tabella candida, cui tabellæ circulus inscriptus erat ad imaginem solis commensus, atque in digitos, ac semidigitos dispersitus. Verum observationi haud parum obstitit ventus machinam exagitans. Certiores phases hæ fuisse videntur

H	'	
3	40	Deficiebat digitus præterpropter.
3	48	Duo digiti.
3	57	Digiti tres.
4	6	Digiti quatuor.
4	15 $\frac{1}{2}$	Quinque digiti.
—	—	—
4	35	Digiti septem.
4	45	Septem cum semisse, quæ nobis obscuratio maxima visa est.
4	55	Iterum digiti ipsi septem, eclipsi iam decrecente.
		Post.

Postmodum cum species solis in occasum vergentis nimis fluctuans, ac trepida videretur, necnon ex rotunda in ovalem sat manifesto deformata, a digitorum dimensione, quippe haud satis certa, cessavimus.

Nonnullæ apparebant in sole maculæ, tres præsertim, quarum positiones ipso meridie eius diei ab observationibus descriptas exhibet subiectum schema. Duarum ex his occultationes ita definivimus eodem tubo pedum undecim.

H ' ''

4	23	18	Limbus lunæ coronam maculæ A contingit.
	23	49	Nucleum ipsum maculæ A tegere incipit.
	24	25	Totum nucleum abscondit.
	26	14	Maculam B dstringit.
	26	31	Totam involvit.

*Defectus luna observatus in specula bononiensis
Scientiarum Institutum
die 8 septembris MDCCXXXVII.*

Ex observatione Iosephi Roverfii tubo optico pedum 10.

H	'	"	temp. ver. post mer.
14	50		I nitium eclipses dubium.
14	52		Procul dubio cœperat eclipsis.
15	3	21	Totus heraclides in umbra.
	4	8	Aristarchus totus.
11	34		Umbra per medium platonem.
12	2		Galilæus in umbra.
12	24		Plato totus.
14	29		Umbra per medium mare imbrium.
18	19		Totus eratosthenes in umbra.
19	29		Umbra ad medium kepleri.
30	0		Initium grimaldi inter nebulas.
35	0		Medium grimaldi inter nebulas.
42	31		Totus possidonius.
44	26		Manilius.
49	41		Totum mare serenitatis.
15	54	36	Grimaldus extra umbram.
16	0	21	Mare crisium obtegi incipit.
	4	23	Umbra ad proclum.
	9	31	Ad medium maris crisium.
15	17		Medius keplerus emerfit.
18	37		Emerfit galilæus.
23	24		Totum mare crisium in umbra.
30	12		Medius copernicus emerfit.
38	13		Aristarchus emerfit.
44	43		Emerfit eratosthenes.
48	18		Manilius.
51	53		Mare crisium detegi incipit.
53	13		Emerfit menelaus.

H	'	"	temp. ver. post mer.
16	57	19	Emersit heraclides.
17	4	23	Emersit helicon.
	8	48	Umbra ad medium mare crisium.
	13	19	Totum mare serenitatis emerfit.
	15	0	Totum mare crisium emerfit.
			Finem deliquii definire non licuit nubeculis lunam involventibus.

*Ex observatione Petronii Matteucci telescopio
ped. 8, ac reticulo.*

14	22		Diam. lunæ pluries definita exæquabat intervalla ipsa reticuli 20.
15	10	19	Pars diam. lunæ ab eclipsi immunis intervalla 16.
	14	59	Inter. 15.
	26	24	Inter. 13.
	35	0	Inter. 12.
	42	50	Inter. $11\frac{1}{2}$.
	47	54	Inter. 11.
	52	20	Inter. $10\frac{1}{2}$.
16	0	10	Inter. 10.
	10	11	Inter. adhuc 10.
	18	41	Inter. adhuc 10.
	32	17	Inter. 11.
	42	37	Inter. 12.
	49	7	Inter. 13. dub.
16	58	43	Inter. 14.
17	4	13	Inter. 15.
	10	0	Inter. 16.
	14	25	Inter. 17.
17	20	20	Inter. 18.

*Eclipsis solis observata in astronomica specula
bononiensis scientiarum Instituti
ab
Eustachio Manfredio, & sociis
die 15 augusti MDCCXXXVIII mane.*

Tab. observ. astronom. fig. 6.

H ' " Tem. ver. p. m.

22 52 25 **E** Clipsis iam cœperat.
Sequentes phases observatæ fuerunt ope
tabellæ telescopio sex pedum affixæ,
in qua digiti & semidigiti descripti
erant.

23	0	10	Obscurationis dig. 1.
	4	20	dig. $1\frac{1}{2}$.
	11	20	dig. 2.
	18	25	dig. $2\frac{1}{2}$.
	23	56	dig. 3.
	31	49	dig. $3\frac{1}{2}$.
	35	14	dig. 4.
	43	30	dig. $4\frac{1}{4}$.
	45	14	dig. $4\frac{2}{3}$.
	46	59	dig. $4\frac{1}{2}$.
	51	14	dig. $4\frac{3}{5}$.
	55	14	dig. $4\frac{2}{3}$.
	58	14	dig. $4\frac{3}{4}$.
0	1	46	dig. $4\frac{4}{5}$.
	4	14	dig. $4\frac{4}{5}$.
	13	25	dig. $4\frac{2}{3}$.
	18	5	dig. $4\frac{1}{2}$.
	22	43	dig. $4\frac{1}{3}$.
	28	25	dig. $4\frac{1}{5}$.







R 2

31 50

H	'	"	temp. ver. post mer.
o	31	50	Obscurationis dig. 4.
	39	13	dig. $3\frac{1}{2}$.
	42	0	dig. $3\frac{1}{3}$.
	46	50	dig. 3.
	51	11	dig. $2\frac{2}{3}$.
	52	55	dig. $2\frac{1}{2}$.
	54	58	dig. $2\frac{1}{3}$.
o	57	31	dig. 2.
I	0	30	dig. $1\frac{3}{4}$.
	2	0	dig. $1\frac{2}{3}$.
	3	26	dig. $1\frac{1}{2}$.
	5	24	dig. $1\frac{1}{3}$.
	7	52	dig. 1.
	10	6	dig. $0\frac{3}{4}$.
	13	4	dig. $0\frac{1}{2}$.
I	18	2	Finis eclipseos.

Tempora quibus maculæ solares, vel sub disco
lunæ sunt absconditæ, vel ab eo detectæ.

23	3	50	Macula c tegitur.
	21	3	Macula A tangit lunæ marginem.
	21	49	Centrum eiusdem maculæ.
	22	41	Macula A iam delitescit.
	23	54	Prima ex duabus maculis B incipit occultari.
	25	0	Centrum eiusdem maculæ.
	25	45	Eadem macula tota latet.
	26	24	Centrum alterius maculæ B immergitur.
	27	2	Macula D tangit lunam.
	31	2	Eadem macula tota latet.
o	31	45	Macula A incipit emergere.
	32	30	Eadem macula A emerferat.
	33	25	Centrum primæ maculæ ex duabus B emergit.
	34	59	Totalis emersio eiusdem maculæ.
o	35	51	Alteram ex duabus maculis B emerferat.



*Defectus luna observatus e specula bononiensis
Scientiarum Instituti*

die 24 ianuarii MDCCXXXVIII

ab

Eustachio Zanotto, & sociis.

H	'	"	tem. ver. post mer.
10	18	7	I Nitium eclipseos dubium.
	19	37	Procul dubio cœperat eclipsis.
	24	52	Totus harpalus immergitur.
	29	49	Totus heraclides.
	31	34	Totus helicon.
	33	35	Umbra per medium aristarchum.
	34	40	Totus aristarchus sub umbra.
	35	24	Plato ad umbram.
	36	19	Totus plato sub umbra.
	44	51	Umbra per medium erathostenem.
	47	47	Totus keplerus.
	51	1	Copernicus ad umbram.
	55	7	Totus hermes.
10	58	32	Copernicus totus latet.
11	4	27	Ricciolius.
	8	19	Grimaldus ad umbram.
	9	47	Plinius totus in umbra.
	14	11	Incipit mare crisium.
	19	37	Medium mare crisium in umbra.
	24	49	Totum mare crisium.
	27	57	Taruntius totus in umbra.
	28	42	Ricciolius extra umbram.
	31	42	Dionisius immergitur.
	46	7	Umbra ad mare nectaris.
11	53	11	Galileus extra umbram.
12	14	22	Aristarchus totus emerfit.
12	18	55	Totus copernicus extra umbram.

H	'	''	tem. ver. post mer.
12	30	37	Heraclides .
	35	19	Timocharis .
	36	27	Dionifius .
	38	58	Helicon .
	40	22	Manilius .
	45	41	Menelaus .
	46	17	Plato detegi incipit .
	47	33	Totus plato extra umbram .
	50	1	Plinius .
12	53	37	Aristoteles .
13	1	44	Mare crisium emergere incipit .
	2	47	Proclus emerfit .
	5	37	Medium mare crisium extra umbram .
	8	57	Totum mare crisium se subduxit .
	12	1	Finis eclipseos .
	12	35	Finis eclipseos iuxta aliam observationem .

Tempore maximæ obscurationis determinata fuit eclipseos quantitas ope micrometri, quod telescopio pedum octo aptatum erat, & inventa fuit ex pluribus sæpius repetitis observationibus dig. 7. 12.

*Defectus solis observatus in astronomica specula
bononiensis scientiarum Instituti*

ab

*Eustachio Zanotto, Petronio Matteuccio,
Iosepho Garatono, & Iosepho Roverfio
die 4 augusti MDCCXXXIX.*

Telescopio sex pedum tabellam sic aptavimus, ut axi eiusdem perpendiculariter existeret. In tabella sex circuli concentrici paribus intervallis inter se diffiti descripti erant ad quantitatem eclipseos per digitos deffiniendam; verum digitorum partes oculari iudicio æstimabantur.

H	'	"	tem. ver. post mer.	H	'	"	tem. ver. post mer.
4	26	1	Initium eclipseos.	5	33	8	dig. $7\frac{2}{3}$.
	31	30	dig. 1.		36	37	dig. $7\frac{1}{3}$.
	35	46	dig. $1\frac{1}{2}$.		42	26	dig. 7.
	38	30	dig. 2.		48	24	dig. $6\frac{1}{2}$.
	41	40	dig. $2\frac{1}{2}$.		52	49	dig. 6.
	45	30	dig. 3.	5	57	8	dig. $5\frac{1}{2}$.
	49	0	dig. $3\frac{1}{2}$.	6	0	57	dig. 5.
	52	46	dig. 4.		4	31	dig. $4\frac{1}{2}$.
4	57	8	dig. $4\frac{1}{2}$.		8	25	dig. 4.
5	0	25	dig. 5.		11	36	dig. $3\frac{1}{2}$.
	5	21	dig. $5\frac{1}{2}$.		15	25	dig. 3.
	9	14	dig. 6.		18	0	dig. $2\frac{1}{2}$.
	14	48	dig. $6\frac{1}{2}$.		21	9	dig. 2.
	20	25	dig. 7.		24	9	dig. $1\frac{1}{2}$.
	25	31	dig. $7\frac{1}{3}$.		27	3	dig. 1.
	29	0	dig. $7\frac{2}{3}$.	6	31	47	Finis eclipseos.

Dum

Dum obscurationis quantitatem ope tabellæ metiebamur, tempora notavimus, quibus maculæ quædam, quæ in sole apparebant, vel a luna obtegebantur, vel ab ea emergebant. Maculæ insigniores erant quatuor, quarum duæ tantum sub luna delituerunt, eæ scilicet, quæ magis ad septentrionem declinabant.

4	44	18	Occidentalior ex duabus maculis immergi incipit.
	44	38	Eadem macula penitus latet.
5	12	53	Initium immersionis alterius maculæ.
	13	15	Totalis immersio.
6	8	30	Postrema, quæ orientalis erat ex duabus maculis emergere incipit.
	8	47	Eadem macula emerferat.

*Eclipsis solis observata in astronomica specula
bononiensis scientiarum Instituti*

ab

*Eustachio Zanotto, & a Petronio Matteuccio
die 30 decembris MDCCXXXIX mane.*

Initium eclipsis hora 20. 48. 14 post meridiem tem. ver. notatum fuit; & sane luminarium contactum paucis admodum secundis horariis maturius contigisse existimamus, etenim quo tempore eclipsim persensimus, obscurus lunæ discus solis marginem vix delibaverat.

Plures eclipsis phases telescopio pedum octo una cum reticulo definivimus, cuius reticuli intervalla $21\frac{4}{9}$ ex sæpius repetitis observationibus solis diametrum metiri comperimus: quare cum pars diametri solis ab eclipsi immunis tempore maximæ obscurationis intervalla $19\frac{1}{4}$ æquaverit, elicitur maximam eclipsis quantitatem fuisse dig. 1. 14.

H ' " temp. ver. post mer.

20 53 40 Intervalla 21 diametri solis ab eclipsi immunis.

20 55 55 Intervalla $20\frac{1}{2}$.

21 2 38 Intervalla 20.

9 25 Intervalla $19\frac{1}{2}$.

14 53 Intervalla $19\frac{2}{3}$.

19 23 Intervalla $19\frac{1}{4}$.

22 54 Intervalla adhuc $19\frac{3}{4}$.

H ' " temp. ver. post mer.

21 26 32 Intervalla $19\frac{1}{3}$.

29 11 Intervalla $19\frac{1}{2}$.

35 38 Intervalla 20.

45 1 Intervalla $20\frac{1}{2}$.

47 8 Intervalla 21.

21 51 54 Finis eclipsis.

*Eclipsis lunæ observata in astronomica specula
bononiensis scientiarum Instituti*

ab

*Eustachio Zanotto, & a Petronio Matteuccio
die 13 ianuarii MDCCXXX.*

H	'	"	temp. ver. post mer.
9	11	0	I Nitium eclipsis.
	12	21	Ricciolius ad umbram.
	13	59	Grimaldus.
	15	1	Grimaldus totus latet.
	15	52	Totus galileus.
	20	6	Aristarchus ad umbram.
	21	7	Aristarchus totus in umbra.
	23	46	Totus keplerus.
	25	35	Gassendus ad umbram.
	26	20	Totus gassendus sub umbra.
	29	16	Umbra schikardum attingit.
	30	24	Schikardus totus in umbra.
	30	36	Copernicus ad umbram.
	31	18	Erathostenes totus in umbra.
	32	35	Totus copernicus.
	33	35	Totus capuanus.
	33	37	Bullialdus ad umbram.
	34	33	Bullialdus totus latet.
	36	2	Timocharis.
	39	57	Umbra per medium pitati.
	40	23	Plato immergi incipit.
	40	32	Insula finis medii.
	41	24	Totus plato immergitur.
	43	40	Tycho ad umbram.
	45	5	Tycho in umbra.
	47	11	Manilius ad umbram.
	48	10	Manilius in umbra.

S 2

49 54

H	'	"	temp. ver. post mer.
9	49	54	Eudoxus ad umbram.
	51	4	Eudoxus in umbra.
	51	40	Umbra ad medium menelai.
	52	46	Dionysius totus latet.
	54	45	Plinius ad umbram.
	55	23	Plinius totus latet.
10	0	14	Catharina, cyrillus in umbra.
	0	58	Fracastorius ad umbram.
	0	59	Promontorium acutum.
	1	53	Fracastorius totus in umbra.
	3	16	Promontorium somnii.
	5	54	Proclus.
	6	32	Messalla.
	7	31	Mare crisium obumbrari incipit.
	9	44	Umbra ad medium maris crisium.
	11	31	Totum mare crisium latet.
10	16	37	Totalis immerfio lunæ in umbram.

In hac eclipsi luna penitus deficiens obscurior nobis visa est, quam alias apparuerit. Emerfionis phafes sunt admodum dubiæ, officiebant enim observationibus & densa nebula, quæ lunam involvebat, & humidus aer, a quo identidem telescopii vitra inficiebantur.

12	1	28	Luna emergere incipit.
	4	14	Umbra ad medium ricciolii.
	4	49	Incipit grimaldus.
	5	42	Grimaldus extra umbram.
	7	18	Galileus.
	9	22	Incipit aristarchus.
	10	4	Aristarchus emerferat.
	19	29	Helicon.
	22	37	Medium copernici exit.
	23	24	Copernicus extra umbram.
	25	1	Medium platonis.
	25	25	Timocharis extra umbram.
	30	17	Medium tychonis.

H	'	"	tem. ver. post mer.
12	31	20	Tycho emerferat.
	34	0	Aristoteles.
	34	59	Eudoxus.
	38	29	Manilius.
	41	12	Menelaus.
	45	6	Dionysius.
	45	23	Possidonius.
	47	8	Plinius.
	52	30	Promontorium acutum.
	56	23	Mare crisium detegi incipit.
	58	30	Umbra ad medium mare crisium.
13	0	42	Mare crisium emergit.
13	7	16	Finis eclipsis.

IACOBI RICCATI

*De motuum communicationibus
ex attractione.*

QUum ex iis, quæ alias a nobis demonstrata sunt, illud videatur multo certissimum, vires vivas velocitatum quadratis esse æstimandas, atque omnia stare a Leibnitio, si aliqua, tametsi exigua, vis primitivæ portio in ictu inertium corporum impendatur: nullus dubito, quin viri illi clarissimi, doctissimique, qui veterem, vulgaremque Cartesii sententiam tuentur, in id nervos omnes ingenii, animique vires intendant, ut huiusmodi principium, quo tamquam basi nostræ demonstrationes nituntur, funditus evertant, atque convellant. Æquiore fortasse usus fuisset adversario, aut potius iudice, si cum Newtono fuisset mihi habenda disceptatio: qui auctor in suis monumentis, quæ sane deleri non possunt, hanc veritatem scriptam reliquit. Tametsi autem in mentem illi non venerint ea, quæ ex hoc principio consequuntur (sæpe enim fit, ut viros etiam acerrimo ingenio præditos nonnulla fugiant) tamen cum semel veritatem noverit, facile mihi persuadeo, hominem non minus doctum, quam ingenuum, si adhuc viveret, etiam confectaria probaturum.

Interea quando cum eius discipulis res mihi habenda est, dabo operam, ut alio analyseos circuitu meam propositionem demonstrem. Quoniam autem alia motus communicandi ratio mihi consideranda occurrit, cum scilicet motus ab altero ad alterum corpus non ex ictu, sed attractione transfertur; patefaciam quibusnam legibus fiat huiusmodi transitus, & quantum sui similis natura sit, & simul ostendam leges omnes, quibus vires vivas possumus æstimare, si leibnitianam excipias, omnes sibimetipsis adversari.

Primum omnium peto, utrum ad distendendam cordam elasticam, aut elastrum vis impendenda sit? Mirabuntur
for.

fortasse nonnulli, cur ita interrogem. Verum ubi sciant, quo res deducenda sit, desinent mirari. Nam si vim requiri dicant, iam habeo quidquid ad perficiendam demonstrationem est necessarium: si vim requiri negent, quod ne suspicor quidem, hæc mecum quæso attente animadvertant.

Suspendatur ex clavo immobili A (*Fig. 1*) elastrum AB, in cuius termino B collocetur pondus C, quod descendet motu accelerato usque ad punctum C; tum ex impetu impresso perget descendere motu retardato distendendo cordam usque ad certum punctum exempli causa D, in quo amisso motu quiescet. Iam vero cum ibi vis elastica præpolleat, descensus in ascensum convertetur, & grave C sursum feretur motu accelerato usque ad C, tum motu retardato usque ad B. Ita reciproca quadam agitatione instar penduli nunc sursum, nunc deorsum feretur in infinitum; si virga AB sit absoluta elasticitate prædita, & motus fiat in spatio resistentiæ experte. Sed cum huiusmodi circumstantiæ in terræ viciniis locum non habeant, post plerasque oscillationes mobile in loco C conquiescet, patiente elastro distensionem BC.

Porro nisi elastri resistentia gravitatis impediret actionem, descenderet globus C motu ea lege accelerato, perinde ac si ab elastro disunctus liber descenderet. Quare igitur percurrens spatium BC minus acceleratur? quare per intervallum CD motu retardato iter facit? quare conquiescit, ubi ad punctum D pervenit? quare tandem mutata directione regreditur per lineam DB, neque ad centrum gravium tendere pergit? Nonne certum est, id effici partim ab actione, partim ab elastri retro-actione?

Ut ratio intelligatur, sciendum est, elastrum AB in naturali positione collocatum habere minimam repugnantiam ad infinitesimam distensionem: sed quanto magis distenditur, tanto magis ulteriori distensionem resistit: donec virga, quæ infinitam acquirere nequit longitudinem, ubi certam passa est distensionem disrumpitur. Itaque curva, cuius ordinatæ expriment crescentes elastri tenacitates, originem habens in puncto B ab axe BE magis, magisque remota fiet, sitque exempli causa curva BHK, cuius naturam in præsentia supervacaneum est investigare. Hoc enim dumtaxat scire oportet, minimam resistentiam esse in puncto

cto B, maximam in puncto E, si virga dirumpitur, dum longitudinem AE acquisivit.

Recta GB cordæ AB normalis corporis C reprehesentet gravitatem. Ex puncto G ducatur verticalis GI, quæ resistantiarum scalam secet in puncto F. Perस्पicum est in puncto B grave C integram exercere actionem, quia in eo loco infinitesima est elastri resistentia; sed dum mobile pervenit in m, gravitas integram vim suam Lm minime exercet; vis enim contraria elastri per mn expressa subtrahenda est: qua de re impulsus sollicitans mobile ad descensum reprehesentatur ab intercepta Ln, & summa omnium impulsuum successivorum non exprimitur a rectangulo GBCF, quod accideret, si globus C libere descenderet, sed a trilineo GBF. Hinc si fiat area HFI inferior superiori areæ GFB æqualis, ordinata HD secabit axem in puncto D, in quo puncto globus C post descensum per verticalem BD conquiescet.

Describatur deinde parabola apolloniana Bcd; cuius ordinatæ Cc, Dd significabunt velocitates, quas adeptum esset corpus C percurrens spatia BC, BD non impeditum a cordæ tenacitate: sed quoniam idem grave ab elastro suspensum, ubi ad punctum C venit, habet non celeritatem Cc, sed minorem celeritatem CO, neque hoc actioni gravitatis tribuendum est, cuius virtus omnis in quolibet puncto grave sollicitat: dicendum est igitur, aliquam gravitatis partem, quæ velocitatem Oc velocitati CO addidisset, erogatam esse adversus elastrum, cuius & auxit longitudinem, & tenacitatem superavit. Similiter in puncto D idem mobile omni privatur motu: atqui, si libere centrum petiisset, præditum esset velocitate Dd: igitur vis omnis, quæ necessaria est, ut mobili velocitas Dd communicetur, consumpta est in elastri distensionem per integrum spatium BD.

Præterea fac perpendas elastrum, dum se se restituit, vim facere gravitati corporis C, illudque fursum trahere a D usque ad B: sed ut corpus C per hoc spatium fursum feratur, tanta vis requiritur, quantam libere descendens a B in D adeptum esset: igitur omnes successive impressiones corpori C communicatæ a gravitate constante reactionis causa translatae sunt in elastrum, quod naturalem longitudinem recuperans fursum trahit pondus æquali virium ag-

gregato, tametsi illud gravitas iteratis impulsibus ad centrum sollicitet.

Multa hac de re dici possent, sed hæc satis, superque ostendunt, elastrum, cuius fibræ per se quiescant, non posse distendi, neque comprimi, nisi vis extrinseca adhibeatur. Quæ cum ita sint mihi ob oculos propono huiusmodi

Hypothesein.

Sphæræ A (*Fig. 2*) coniunctum sit elastrum rigidum C, atque utrumque in spatio infinite raro procedat communi velocitate V. Interim dum movetur, lineamque horizontalem percurrit, in altero elastri termino collocetur sphæra B motus expers. Concipio autem, ut res pertractatu facilior sit, cum utramque sphæram, tum elastrum gravitate carere, elastrique massam ad massas corporum habere proportionem minorem quacumque data: nihil enim impedit, quominus elastrum massæ inassignabilis finita præditum sit tenacitate. Quæritur quibusnam legibus motus communicatio peragetur.

Propositio prima. Theorema.

DUm motus corpori B communicatur, aio, elastrum distensionem passurum: nam si secus res se se haberet, necesse esset, ut quum primum sphæra B coniuncta est elastro, e vestigio integram corporis A acquireret velocitatem: qua de re existeret effectum, quod virtutem causæ, vel maxime superaret: nam cum pares sint velocitates, vis producta ad vim primitivam eam habet proportionem, quam habent massæ $A + B : A$. Si quis vero diceret, per gradus corpori B medio elastro motum communicari, tunc haberetur actio, cui nulla retro-actio responderet: atqui hæc omnia certissimis principiis repugnant: necesse est igitur, ut, in iis, quas supponimus circumstantiis, maiorem elastrum acquirat longitudinem. Q. E. D.

Corollarium.

QUandoquidem integra manere non potest proportio, quæ inter effectum causamque intercedit, nisi, acquirente corpore B certum velocitatis gradum, in corpore A aliqua velocitatis portio pereat; fiet, ut sicuti per gradus sphaera B velocitatem adipiscitur, ita per gradus sphaera A velocitatem amittat. Sed cum motus communicatio medio elastro peragatur, hoc paullatim in maiorem longitudinem extenditur, donec utrumque corpus A, B, ipsumque elastrum pari velocitate procedat.

Propositio altera. Theorema.

UT ultra naturalis dimensionis limites extendatur elastrum, aliqua vis primitivæ portio in nostra hypothesi impendenda est.

Concipe animo, corpus A, cuius vis sine dubio aliqua ex parte consumitur, ut alterum corpus post se trahat, tantam velocitatis fecisse iacturam, ut utrumque corpus pari velocitate gradiatur. Quia vero communis motus nihilum quidem in peculiarem actionem influit, perinde est quod elastrum medium sit inter duo corpora, quæ simul cum ipso pari passu moveantur communi velocitate = u , ac si medium esset inter duo corpora omnino quiescentia. Hoc ex theoria translati motus consequitur: nam si duas sphaeras in lintre ponas, quæ eadem velocitate = u ad oppositam plagam moveatur, qui in ripa consistit, inspiciet elastrum, dum se se restituet, agere adversus duas sphaeras quiescentes, quarum altera motu contrario accedet ad alteram. Quapropter elastrum, dum ad pristinam redit longitudinem, inertiam duorum corporum vincit, quæ tanquam quiescentia considerantur, ipsisque eiusmodi indit velocitates, quæ ad finitarum ordinem pertinent: atqui quo pacto fieri hoc possit sine vi, quam vim, nisi elastrum accipiat a corpore A, unde habeat non video. Aliqua igitur portio vis primitivæ in elastrum translata est, quod profecto tanta vi sese restituit, quanta fuit in eo distendendo consumpta.

Corollarium.

QUUM utrumque corpus simul cum elastro cietur, vis primitiva in tres partes distribuitur, quarum prima in corpore A conservatur, altera communicatur corpori B, tertiam acquirit elastrum. Quum vero eadem est tribus corporibus velocitas, elastrum superioribus manentibus circumstantiis maximam patitur distensionem: & quo maior vis in elastro residebit, tanto minor in corporibus inexistet.

Scholion.

DUM corpus A cum corpore B motum communicat, elastrum maiorem distensionem patietur, donec æquali velocitate utraque sphæra gradiatur. Iam vero primum omnium aio, motuum communicationem in his circumstantiis peragi iis legibus, quibus in ictu corporum inertium natura utitur.

Quum vero elastrum C maximam adeptum est longitudinem, tum, ut paullo ante detexi, incipit compressionem pati, & alterius corporis B augendo, alterius A minuendo celeritatem ita contrahitur, ut naturalem dimensionem adipiscatur: aio deinde in his circumstantiis fieri communicationem saltem per punctum temporis secundum eas leges, quas adhibet natura in collisione corporum, quæ absoluta, atque exquisita pollent elasticitate.

Tum ubi elastrum huiusmodi dimensionem acquisivit, necesse est, ut sphæra B, quæ maiori prædita est velocitate, sphæram A de loco extrudat, donec utrumque pari velocitate cietur. In huiusmodi circumstantiis corpus B corporis A auget velocitatem, periude ac si nullo medio existente elastro modo corporum inertium fieret motus communicatio. Hoc evenire non potest, nisi elastrum quodammodo corrugetur, & contrahatur, usque dum æquata duorum corporum velocitate actio, retroque actio deficiat. Nunc quoque vis primitiva inter duas sphæras, & elastrum dividitur: constat enim non posse elastrum compressionem subire, nisi vis aliqua in hunc effectum impendatur.

Deni-

Denique cum perinde sit, elastrum constitutum esse inter duo corpora, quæ eadem velocitate ad eandem plagam moventur, ac si inter duo corpora quiescentia collocarentur, & cum a vi extrinseca compressionem subierit, oportet sine dubio sese restituat, atque relaxet. Hinc fiet, ut vis elastica ex utraque parte agens tantum detrahat de motu corporis B, quantum alterius corporis A motum auget: ita ut elastrum recuperata veteri longitudine AB per minimum saltem temporis spatium conquiescat, & sphaera A pristina celeritate V gradiatur.

Hac porro ratione post varias motuum communicationes ad primas circumstantias res redibit, & duo corpora A, B una cum elastro in medio inani, neque resistente in infinitum iter facient: dummodo tamen extremi limites considerentur, in quibus elastrum maximam patitur aut distensionem, aut compressionem, & ad naturalem dimensionem regreditur. In aliquibus tamen, quæ intermediae sunt hypotheses; motus communicatio fieret perinde, ac si duo corpora imperfecte elastica ad occursum venirent. Sed hac de re nihil refert verba facere, cum uberius a nobis alio in loco fuerit explicata.

Quæ in hoc scholio dumtaxat proposuimus, ea firmissimis demonstrationibus confirmanda sunt, ut & dubitatio omnis de medio tollatur, & multa ad rem nostram considerentur.

Propositio tertia. Theorema.

Globus A secundum nostram hypothesin trahat post se globum B, & fiat motus communicatio in cymba, quæ secundo flumine feratur ea velocitate V, quam a principio habet corpus A, sed ad oppositam plagam moveatur. Qui in cymba vehuntur, inspiciunt motum corporis A retardari, accelerari motum corporis B, donec utrumque pari velocitate moveatur, quam voco = u. Verum qui in littore sedent, vident primum sphaeram A quiescentem, cui motus communicatur a sphaera B prædita navigii velocitate = - V, donec utrumque æqualem habeat celeritatem, quam indicabit species v. Atqui nautæ actione peracta inspiciunt duorum corporum velocitatem u, & sedentes in
ripa-

ripa velocitatem $V - u$, idest differentiam inter celeritatem cymbæ, & celeritatem communem corporum in cymba inspectorum: igitur $V - u = v$, seu $V = u + v$.

Hinc consequitur (uti enim licet eadem demonstratione, cum spheram A quiescentem trahit corpus B præditum eadem celeritate V) aut corpus A trahat corpus B, aut a corpore B trahatur, modo ut æquales sint primitivæ velocitates, consequitur inquam, si in primo casu perfecta communicatione motus oriatur communis velocitas u , in altero celeritas v , aggregatum huiusmodi duarum celeritatum primitivæ, & constanti celeritati exæquari idest $u + v = V$. Quod demonstrandum mihi proposueram.

Corollarium primum.

Superiores velocitates u , v habent profecto aliquam proportionem, quæ consequitur a proportione inter massas A, B intercedente. Nam si constans perseverat corpus A, & corpus B evadat inassignabile, velocitas u primitivam adæquat, altera velocitate v evanescente. Etenim nemo non videt, spheram A, quæ post se trahit minimam massam B, nihil amittere, nisi inassignabilem sui motus portionem: quemadmodum, si spheram B trahere debeat corpus, ad quod infinitesimam habet proportionem, nihil ei, nisi inassignabilem celeritatem, communicat. Similiter si globus B fiat infinitus, velocitas u evadit infinitesima, & celeritas v æqualis primitivæ V . Denique si corpora A, B æqualia forent, & celeritates æquales essent inter se, idest $u = v$, & singulæ æquales dimidiæ primitivæ celeritatis.

Corollarium alterum.

Item vis, quæ in elastro dilatando impenditur, respondet alicui relationi inter massas A, B, præsertim quum æqualis facta est utriusque corporis velocitas. Nam si corpus A finitum, corpus B infinitesimum sit, perspicuum est elastrum minimam pati distensionem: contra si B infinitum sit, vis integra globi A in distendendo elastro consumitur. Quare in iis, quæ mediæ sunt hypotheses, idest cum spheræ finita se se respiciunt proportione, virtus spheræ A in
duas

duas partes dividitur, quarum altera motus communicatio-
nem, altera elastri distensionem producit: & quo maior,
aut minor erit massa corporis B comparata cum massa cor-
poris A, eo maior, aut minor erit vis in elastrum agens.

Scholion.

Quando duæ sunt rationes, quibus motus communica-
tur, videlicet ex attractione, & ex percussione, iuva-
bit in præsentia alteram alteri comparare. Sume alia
corpora duo (*Fig. 3*) nimirum $a = A$, $b = B$, atque effice,
ut sphaera a velocitate $= V$ impingat in sphaeram b quie-
scentem, & si sphaeræ inertes sint, post ictum communi ce-
leritate x cieantur: deinde fac, ut sphaera b sphaeram a
immotam iciat eadem velocitate V , & post percussionem
coniunctim gradientur velocitate y .

Aio summam duarum velocitatum $x + y$ æqualem esse
velocitati primitivæ V : nam canones communicationis mo-
tus, quos ipse post alios demonstravi, & communis mathe-
maticorum sententia comprobavit, ostendunt esse $x =$
 $\frac{av}{a+b}$, & $y = \frac{bv}{a+b}$: igitur $x + y = \frac{a+b \cdot V}{a+b} = V$. Hinc cum
demonstratum sit supra $u + v = V$, colligitur $x + y =$
 $u + v$.

Deinde si morem Cartesianis gerentes vires vivas motus
quantitatibus æstimemus, ipsisque concedamus, eandem
quantitatem motus cum ante, tum post ictum conservari,
ita ut nulla vis vivæ pars in mortuam transeat, atque in
contusionem erogetur, aio, falsam esse, atque absurdam
prædictam æquationem $x + y = u + v$.

Etenim si postquam sphaera A cum corpore B, quem
potest, motum communicavit, vis omnis primitiva in ipsis
omnino conservaretur, nulla portio in distendendo elastro
consumi posset: secus enim effecti virtus virtutem causæ
quam maxime superaret: atqui, ut probatum est supra, ali-
qua vis vivæ portio ab elastri reactione extinguatur: igitur
ea, quæ residua est, expressa more cartesiano per $\frac{A+B}{a+b} \times$
 u , est minor primitiva AV, cui cum æqualis sit $\frac{a+b}{a+b} \times x$
residens ab ictu in corporibus a, b, sequitur velocitatem x
ma-

maiolem esse velocitate u , quando æqualia sunt A, a , & B, b .

Eadem methodo probari potest celeritatem y maiolem esse celeritate v : igitur binomium $x + y$ maius est altero binomio $x + v$: quod perspicuis nostris demonstrationibus aduersatur.

Nemo unus facile sibi persuadebit, minorem vis primitivæ portionem in elastri distensione, quam in contusione requiri: namque ab ictu minor vis vivæ quantitas in corporibus a, b , maior in sphaeris A, B post elastri distensionem maneret integra. Quare esset $u > x$, & $v > y$, atque adeo binomium $x + y$ deficeret a binomio $u + v$: quod cum allatis demonstrationibus non cohæret.

Quæ cum ita sint necesse est fateri, æqualem vis vivæ portionem consumi cum in elastro distrahendo, tum in contusione efficienda: & quocumque tandem modo ab altera sphaera in alteram actio transferatur aut per ictum, aut per attractionem, cum motus quantitas non varietur, ab ipsa nequaquam desumendam esse vis vivæ æstimationem, quæ vis non solum motum superstitem producit, sed etiam contusionem, aut distensionem elastri.

Ex iis, quæ dicta sunt hætenus, satis constat, quæ leges huic communicationi moderentur, quæ attractione peragitur: nam cum ex una parte habeatur $x = u$, $y = v$, ex altera $x = \frac{av}{a+b}$, $y = \frac{bv}{a+b}$, habebis celeritates u, v expressas per massas, & per velocitatem primitivam, & poteris ea omnia consecutaria deducere, quæ ad absolutam rei huiusce theoriam necessaria videbuntur: tametsi velles duo corpora diversis prædita esse velocitatibus aut conspirantibus, aut contrariis. Nobis autem magis arridet alia via incedere.

Propositio quarta. Problema.

Oportet determinare quanta vis in elastri distensione consumatur, & quo pacto corporis A vis primitiva æstimanda sit.

Ut res, quam fieri potest maxime, universe pertractetur: fit vis viva corporis A ante omnem actionem in ratione
com.

composita eiusdem corporis A, & cuiuscumque dignitatis V^n velocitatis: item quia vis, quæ peracta motus communicatione in duobus corporibus A, B conservatur ad eam, quæ in elastrum transfertur, ut dictum est supra, habet proportionem, quæ consequitur ex proportione inter massas A, B intercedente, concipe animo distributionem fieri secundum proportionem duarum potestatum indeterminatarum $A^t : B^t$.

Vis viva, quæ post actionem in duobus corporibus residua est, ut petit nostra hypothesis, exprimenda est per massas $A + B$ multiplicatas in velocitatis u dignitatem u^n , idest $\overline{A + B} \cdot u^n$: atqui $A^t : B^t :: \overline{A + B} \cdot u^n : \frac{A + B \cdot B^t \cdot u^n}{A^t}$:

igitur analogiæ novissimus terminus exprimit vim erogatam in distensionem elastri. Deinde duarum virium accepta summa, quam vis primitiva adæquat, nam inter effecta producta, & causam producentem intercedit æqualitas, æquatio occurret $\overline{A + B} \cdot u^n + \frac{A + B \cdot B^t \cdot u^n}{A^t} = AV^n$, aut

$$\overline{A^t + B^t} \cdot u^n = \frac{A^{t+1} \cdot v^n}{A + B}, \text{ \& extracta radice } n, u =$$

$$\frac{\overline{A^{t+1} \cdot v^n}}{A + B \cdot \overline{A^t + B^t}^{\frac{1}{n}}}$$

Similiter post actionem corporis B, quod præditum celeritate V pertrahit corpus A, vis in duabus sphaeris inexistens est $= \overline{A + B} \cdot v^n$: atqui $B^t : A^t :: \overline{A + B} \cdot v^n : \frac{A + B \cdot A^t \cdot v^n}{B^t}$:

igitur extremus terminus significat vim adversus elastrum consumptam. Quare facta æquatione inter aggregatum duarum virium, & vim primitivam BV^n , & calculo ut supra

$$\text{adhibito nanciscemur } v = \frac{\overline{B^{t+1} \cdot v^n}}{A + B \cdot \overline{A^t + B^t}^{\frac{1}{n}}}: \text{ sed ex nostro}$$

theoremate $u + v = V$: igitur $\frac{A^{\frac{t+1}{n}} v + B^{\frac{t+1}{n}} v}{A + B \cdot A^{\frac{t}{n}} + B^{\frac{t}{n}}} = V$; denique

$$A^{\frac{t+1}{n}} + B^{\frac{t+1}{n}} = A + B \cdot A^{\frac{t}{n}} + B^{\frac{t}{n}}.$$

Ut rem quaesitam inveniamus, opus est duorum exponentium valores ita determinare, ut quaecumque tandem sit proportio inter massas A , B , quae pro lubitu immutari potest, extrema aequatio ne transversum quidem unguem ab erret a veritate. Quod hercle numquam obtinebis, nisi statuas exponentem $t = 1$, & exponentem $n = 2$: igitur vis primitiva est, ut massa A ducta in quadratum velocitatis V^2 , atque ita distribuitur, ut vis, quae post motus communicationem in sphaeris A , B reliqua est, ad eam, quae elastrum distrahit, sit ut massa A ad B . Quod oportebat determinare.

Corollarium primum.

Vires vivae eandem proportionem habeant, quam motus quantitates, ut placet Cartesianis, ut sit exponens $n = 1$, & formula oecumenica in peculiarem resolvatur $A^{t+1} + B^{t+1} = A + B \cdot A^t + B^t$, aut $A^{t+1} + B^{t+1} = A^{t+1} + AB^t + BA^t + B^{t+1}$. Tametsi tribuas quemlibet valorem ipsi t ; tamen numquam absurdum evitabis, & semper totum parti aequale invenies, aut opus erit sumere alterum ex corporibus A , B negativum, cum ultima aequatio in hanc mutetur $A^{t-1} = -B^{t-1}$. Quamobrem etiamsi vis in contusionem erogata sit perquam exigua, tamen ex ea discimus vulgarem de viribus vivis opinionem vehementer a naturae legibus abhorrere.

Corollarium alterum.

Immutata hypothesis, aut eadem prorsus absurda occurrunt, aut valor massae B comparatae cum massa A determinandus erit: quibus in circumstantiis dumtaxat poterit agere

agere natura; in reliquis vero necesse erit, ut aut ad novas leges confugiat, aut eiusmodi communicationem motus permittat, quæ sibi metipsum adversetur.

Corollarium tertium.

Certe quidem non ita usu venit cum fit $t = 1$, $n = 2$, quia in qualibet massæ determinatione æqualitas inter duo æquationis membra manet integra: est enim $A + B = \sqrt{AA + 2AB + BB}^{\frac{1}{2}}$.

Corollarium quartum.

SI massæ accipiantur æquales, magis simplex fit æquatio; nimirum $2 \cdot A^{\frac{t+1}{n}} = 4^{\frac{1}{n}} \cdot A^{\frac{t+1}{n}}$, aut $2 = 4^{\frac{1}{n}}$, aut $2^n = 4$: ex qua cognoscitur exponents n necessario exæquare binarium: igitur si facta $A = B$, vis corporis A exprimitur per productum AV^2 , nullam in quibuslibet circumstantiis patitur mutationem: vis enim viva corporis motu præditi nullo modo a corpore B pendet, cui aliquando portio aliqua communicanda est,

Corollarium quintum.

OB oculos tibi iterum propone formulam œcumenicam $A^{\frac{t+1}{n}} + B^{\frac{t+1}{n}} = \frac{A + B \cdot A^t + B^t}{n}$, & face $n = 2$ secundum corollarii superioris determinationem, ut eam magis simplicem reddas. Hinc invenies. $A^{\frac{t+1}{2}} + 2 \cdot A^{\frac{t+1}{2}} \cdot B^{\frac{t+1}{2}} + B^{\frac{t+1}{2}} = A^{t+1} + AB^t + BA^t + B^{t+1}$, aut deletis delendis $2 \cdot A^{\frac{t+1}{2}} \cdot B^{\frac{t+1}{2}} = AB^t + BA^t$. Divide per AB omnes terminos $2 \cdot A^{\frac{t-1}{2}} \cdot B^{\frac{t-1}{2}} = B^{t-1} + A^{t-1}$, aut A^{t-1}

$-2 \cdot A^{\frac{t-1}{2}} \cdot B^{\frac{t-1}{2}} + B^{t-1} = 0$. Extrahe radicem secundam

$A^{\frac{t-1}{2}} - B^{\frac{t-1}{2}} = 0$. Ex qua æquatione ad casum peculiarem devenis $A = B$. Quare cum liceat utrumque corpus per unitatem exprimere, supervacaneum erit exponenti t valorem tribuere determinatum. Verum alia via in formulis superioribus salvatur æqualitas, quin proportio inter massas A , B limitetur, nimirum si indicem t æqualem unitati constituas.

Scholion.

EX iis, quæ hætenus dicta, & declarata sunt, perspicuum cum cuique esse potest, leges omnes, si leibnitianam excipias, quibus vires vivas corporum metiri luberet, & rerum naturæ, & sibi ipsis vehementissime adversari. Etenim duo solum principia sunt, quibus tamquam basi, ac fundamento argumenta nostra nituntur: primum videlicet, translati motus theoriam admittendam esse; alterum, aliquam vis primitivæ portionem in distensione elastri consumi: ex quibus principiis, postquam mathematicorum methodo pleraque consecutaria derivavi, mihi videor sole clarius videre, quemlibet canonem, qui ad vires vivas æstimandas assumatur, aut alterutri, aut utrique ex illis principiis repugnare: quæ principia apprime conveniunt cum lege, quam omnium primus mathematicorum rep. reclamante sanxit Leibnitius. Nulla igitur præter hanc hypothesis est eiusmodi, qua natura uti possit, quin aut aliquod occurrat absurdum, aut physicum existat effectum, cuius nulla sit causa, aut peculiare corporum motus a communi motu omnino turbentur.

Propositio quinta. Theorema.

QUotiescumque eadem velocitas in duabus sphaeris A , B inexistit, maximam omnium distensionem, quam in nostris circumstantiis pati possit, habet elastrum. Quando vero medium est inter duo corpora, quæ cum ipso pari gradiuntur celeritate, omni peracta corporis A actione,

ne, & retro-actiōne corporis B, iam incipit agere elastrum se se paullatim restituens, donec ad naturalem longitudinem redeat. Quare & corporis B motum accelerat, & motum moratur corporis A. Aio in huiusmodi circumstantiis motus communicationem fieri iuxta leges corporum absolute elasticorum.

Sphæra a = A impingat in sphæram b = B; utraque autem sphæra a, b exquisita prædita sit elasticitate, ut post ictum se se omnino restituat, relaxetque. Probatum est unam, eandemque vim cum in contusione, tum in elastri distensione consumi, & non minus par sphærarum a, b, quam par A, B coniunctim iter facere communi celeritate $\frac{AV}{A+B}$ saltem per punctum temporis, quum aut elastrum maximam habet distensionem, aut prorsus est completa contusio. Itaque prædictæ vires dux æquales, dum reviviscunt, eandem virtutem exercent adversum massas æquales ad easdem plagas progredientes eadem celeritate. Cum igitur omnia paria sint, æqualia sint effecta necesse est, & duarum sphærarum A, a, item B, b æquales sint celeritates: atqui peracta motuum communicatione corpora a, b iis gradientur velocitatibus, quas canones motus communicationis inter corpora prorsus elastica determinant: igitur iisdem legibus moventur corpora A, B, postquam elastrum pristinam longitudinem recuperavit.

Corollarium primum.

Quo tempore ita gradiuntur, vis omnis primitiva AV^2 in duobus corporibus inexistit: nulla enim vis agit in elastrum, quod neque distentum sit, neque compressum.

Corollarium alterum.

Liquet esse velocitatem corporis $B = \frac{2AV}{A+B}$, & corporis $B = \frac{A-B \cdot V}{A+B}$, quarum velocitatum sume quadrata, & multiplica per massam quodque suam, ut habeas vim vivam corporis $B = \frac{4BA^2 V^2}{(A+B)^2}$, & corporis $A = \frac{A^3 - 2A^2 B + AB^2 \cdot V^2}{(A+B)^2}$:
quæ

quæ vires in summam collectæ restituent vim primitivam AV^2 .

Scholion primum.

PRætermittam ea, quæ ex superioribus propositionibus consequuntur; neque perpendam, quo pacto motus ex altero corpore in alterum transeat, aut vires vivæ distribuantur, aut ex principe lege oriatur altera, vi cuius eadem motus quantitas relativa ubique perseverat, & utriusque sphaeræ centrum gravitatis eadem velocitate, & directione procedit. Nihil dicam de hypothefibus magis implicitis, nimirum cum sphaera B, dum se se elastro coniungit, prædita esset aliqua velocitate conspirante, aut contraria velocitati corporis A. Etenim de huiuscemodi rebus cum alias verba fecerim, legentium humanitate abuti non debeo.

Scholion alterum.

Illud dicam unice, eam velocitatem quam habent corpora modo elasticorum corporum gradientia, per minimum temporis spatium dumtaxat conservari: nam aut sphaera B velocius movetur, quam sphaera A, si utraque eandem habeat directionem; aut sphaera B accedit ad corpus A, quod, si sphaera A minor sit corpore B, plerumque contingit. Ut ut res accidat, necesse est, ut elastrum comprimatur, qua compressione completa æqualem celeritatem acquirant corpora. Quare aliud erit genus motus communicationis, quod impulsu quodam peragitur, & inertium corporum leges observat.

Verum cum a vi externa elastrum compressum sit, iterum restituatur oportet, & nativam acquirat longitudinem: igitur detrahet de velocitate corporis B, & corporis A celeritatem augebit: qua actione completa primum corpus quiescet, alterum progredietur pristina celeritate V.

Hoc pacto iterum res ad initium redibit, postquam fuerit omne communicationum genus completum. Horum omnium demonstrationes pleno alveo fluunt ex allatis propositionibus.

IACOBI RICCATI

PROBLEMA

Dato quacumque ratione radio osculi per curvam describendam curvam describere.

QUum iamdiu in tomo undecimo diarii lit. italiæ pag. 204 meam solutionem problematis inversi radiorum osculantium edendam curavi; nihil mihi aliud proposueram, nisi viam illis iterare, qui in calculi infinitesimorum doctrina non multum versati erant, ut deinceps solvendis difficillimis quæstionibus vel ad puram, vel ad mixtam mathesim pertinentibus pares essent. Quare constitui mecum ipse eo tempore, nullum aliud problema attingere præter illud, quod maxime & simplex esset, & usui accommodatum, in quo scilicet valor semidiametri osculatoriæ datus supponitur quacumque ratione per alterutram ex coordinatis. Sed quoniam sæpe uluvenit, ut radii osculantis functio detur per tangentes, normales, rectasque alias analogas; interdum etiam per curvam ipsam, quæ describenda est; placet in præsens veteri opusculo novum addere, ut nihil rei, qua de agimus, deesse videatur.

Problema primum.

Intelligatur descripta (*Fig. 1*) curva ACE, quæ referatur ad axem AB, & cuius radius osculans datus sit quocumque modo per arcum AC. Voco de more abscissam $AB = x$, applicatam $BC = y$, & curvam $AC = s$; atque adeo tria elementa CF, FE, CE erunt dx , dy , ds . Præterea fit radius $EG = r$ datus per AC, idest per s , tangens $HC = t$, subtangens $HB = p$.

Notum est formulam exprimentem valorem radii osculatoris, si ds ponatur constans, fore $\frac{dx ds}{dy} = r$. Hæc ut ea
me-

methodo tractetur, qua in altero opusculo usus sum, pono mihi ob oculos æquationem $\frac{yds}{dy} = t$, cuius differentias accipio supponens ds constans, & invenio $dt = \frac{dy^2 ds - ydsddy}{dy^2}$, five $\frac{dy^2 ds - dy^2 dt}{yds} = ddy$, five $dy^2 ds - dy^2 dt = \frac{ydxds^2}{r}$.

Quoniam vero curvæ subtangens $= p = \frac{ydx}{dy}$, erit $\frac{pdy}{y} = dx$. Si hunc valorem dx substituas in formula superiori, quæ princeps est, nancisceris $dyds - dydt = \frac{pds^2}{r}$: in qua si pro ds , ut opus est, ponas eius valorem $\frac{tdy}{y}$, obtinebis $\frac{tdy - ydt}{tp} = \frac{ds}{r}$. Alterum æquationis membrum, nimirum $\frac{ds}{r}$ semper potest saltem transcendenter obtineri, quia ex nostra hypothese r nihil est aliud, quam curvæ s functio quæcumque.

In primo autem membro $\frac{tdy - ydt}{tp}$, si pro p eius valorem substituas, nempe $\sqrt{tt - yy}$, orietur $\frac{tdy - ydt}{t\sqrt{tt - yy}}$, ex quo nullo negotio commixtionem variabilium de medio tolles, si facias $q = \frac{y}{t}$; peractis enim necessariis operationibus utraque variabilis y , t evanescet, & maxime simplex orietur æquatio $\frac{dq}{\sqrt{1 - qq}} = \frac{ds}{r}$.

Præterea si ex formula $\frac{tdy - ydt}{tp} = \frac{ds}{r}$, adhibita æquatione $pp + yy = tt$, eiiciam speciem t retenta p , inveniam $\frac{pdy - ydp}{pp + yy} = \frac{ds}{r}$. Pono $\frac{y}{p} = z$, & invenio formulam a variabilium immixtione liberatam, nempe $\frac{dz}{1 + zz} = \frac{ds}{r}$.

Ex his facile colligere licet, valorem non minus curvæ s , quam radii r , & summatoriæ $S \frac{ds}{r}$ dari aut analytice, aut transcendenter per z , atque adeo æquationem ita dispositam $\frac{rdz}{1 + zz} = ds$ habere variables separatas. Quod dicendum est etiam de altera æquatione $\frac{rdq}{\sqrt{1 + qq}} = ds$.

Iam

Iam vero quum fit $ds = \frac{tdy}{y}$, & $\frac{y}{t} = q$, fiet $\frac{dy}{q} = \frac{rdq}{\sqrt{1-qq}}$,
 five $dy = \frac{rqdq}{\sqrt{1-qq}}$. Si quis autem uti malit formula $z = \frac{y}{p}$,
 facto aliquo analyseos circuitu, deteget $ds = \frac{\sqrt{pp+yy} \cdot dy}{y} =$
 $\frac{\sqrt{1+zz} \cdot dy}{z} = \frac{rdz}{1+zz}$. Demum $dy = \frac{rzdz}{1+zz \cdot \sqrt{1+zz}}$.

Pervenimus ad novas æquationes duas liberas a per-
 mixtione indeterminatarum, in quibus ordinatæ elementum
 dy datum cognoscitur per functiones arcus s; tres enim
 species q, z, r relatæ ad curvam s totidem æquationes ef-
 ficiunt, quæ ad locos cognitos pertinent. Itaque terminos
 contrahentes, æquationes, quas invenimus, in hanc maxime
 simplicem formam exponamus $dy = \omega ds$, five in æquivalen-
 tem $udy = ds$: namque si ordinata y data est per functio-
 nem $Suds$, consequitur etiam curvam s dari per applicatæ
 functionem, videlicet $Sudy$, quum u per y inventa fue-
 rit.

Quando est $udy = ds$, erit $u^2 dy^2 = ds^2 = dx^2 + ds^2$:
 igitur $dy\sqrt{uu-1} = dx$. Aequatio hæc œcumènica omnes
 curvas amplectitur, quæ problemati proposito satisfaciunt.

Animadvertere oportet duas quantitates differentiales
 $\frac{dq}{\sqrt{1-qq}}$, $\frac{dz}{1+zz}$ exhibere elementum arcus circularis, aut per
 finum, aut per tangentem. Quare si elementum ds fuerit
 algebraice integrabile, rectificatio quæsitæ curvarum,
 atque adeo valor semidiametri osculantis a tetragonismo
 circuli dependebit: qui tetragonismus quoque locum habe-
 bit, quoties integralis $S \frac{ds}{r}$ ad logarithmos pertinebit, aut
 ad altioris ordinis quadraturam. Verum si $S \frac{ds}{r}$ convenit
 cum formula propria arcus circularis, tum non minus cur-
 væ mensura, quam radii valor esse poterit algebraicus.
 Qua in hypothesi, perspicuum est, quantitates omnes s, r,
 q, z se se per algebraicam proportionem respicere: quantitati
 autem u idem convenire, non est difficile demonstratu.

Quoniam s, & r in nostra hypothesi dantur algebrai-
 Tom. II. P. III. X ce

ce ex. ca. per z , & z per $\frac{y}{p}$, per ordinatam scilicet, & subtangentem, & $p = \frac{y dx}{dy}$, facile colligitur fore $dx = \frac{p dy}{y}$. Qui valor si substituatur in curvæ æquatione œcumenica $dx = dy \sqrt{uu - 1}$, fiet $\frac{p}{y} = \frac{1}{z} = \sqrt{uu - 1}$: ex qua formula eruitur, dari u algebraice per z , atque adeo per s . Hoc idem valere semper de applicata y nequaquam dixerim; nam curvarum nostrarum rectificatio per coordinatas nequaquam obtinetur, nisi quum in æquatione $dy = \omega ds$ omnia algebraicam integrationem recipiunt.

Ad exemplum sit s quacumque ratione algebraice data per z ; & quoniam $ds = \frac{tdy}{y}$, & $\frac{t}{y} = \frac{\sqrt{1+zz}}{z}$, erit $dy = \frac{z ds}{\sqrt{1+zz}}$. Ponatur $s = z$, qua in hypothefi osculator radius $r = 1 + ss$, & æquatio œcumenica hanc formam accipiet $dy = \frac{z dz}{\sqrt{1+zz}}$. Fiat integratio, omiffa constantis additione, & orietur $y = \sqrt{1+zz}$, five $\sqrt{yy - 1} = z = s$, & $r = yy$. Æquatio itaque curvæ ad coordinatas relata erit $\frac{dy}{\sqrt{yy - 1}} = dx$, cuius constructio peragitur per hyperbolæ quadraturam.

Sit præterea $ds = z^{n-1} dz$, aut $s = \frac{z^n}{n}$, & $dy = \frac{z^n dz}{\sqrt{1+zz}}$.

Quæ æquatio algebraicam integrationem recipiet, si exponent n sit numerus integer, & impar; si vero par esset, integratio nulla alia ratione haberetur, quam per logarithmos, aut hyperbolicam quadraturam. In ceteris casibus, ubi index n aut negativus est, aut fractus, scriptores illi legantur, qui dedita opera de huiusmodi formulis verba fecerunt.

Nihilo tamen minus huiusmodi animadversiones supervacaneas non existimo; patefaciunt enim, radii osculatoris expressionem a curvæ functione sæpenumero ad functionem ordinatæ transferri.

Constructio.

Indeterminata AB (*Fig. 2*), quæ vocetur = s, repræ-
senter arcus variabiles curvæ quæsitæ. Quando autem ex
principibus æquationibus una erat $dy = \omega ds$, in qua ω dari
per s demonstratum est, constituatur ordinata BC = ω , &
intelligatur descripta curva AC. Palam est spatium curvili-
neum CAB = $S\omega ds = y$, nimirum æquale coordinatæ curvæ
construendæ.

Ab æquatione $dy = \omega ds$ transitus fiat ad analogiam $\omega :$
 $1 :: dy : ds$; sed statuimus $ds = udy$: igitur, $\omega, 1, u$ erunt
in continua proportione geometrica; qua de re si fiat, ut
BC ad unitatem, ita unitas ad u, quantitas u invenietur.
Hinc nova describatur curva AF, cuius abscissa AE æquet
spatium curvilineum ACB = y, & applicata EF = $\sqrt{uu - 1}$;
atque adeo area AFE = $Sdy \cdot \sqrt{uu - 1} = x$. Quapropter
coordinatæ curvæ, quam quærimus, exprimuntur altera per
x, seu per spatium FAE, altera per y, seu per spatium
ACB.

Nihil reliquum est, nisi ut curva AC geometricè de-
terminetur, quod faciendum est ope æquationis $\frac{ds}{r} = \frac{dz}{1 + zz}$.
Verum ne negligam elegantiam, hac utor præparatione.

Radio IH (*Fig. 3*) describo circulum HRK, & ex diametri
extremo puncto H, erigo normalem HVX, quæ cum sit tan-
gens, erit secundum species assumptas = z. Hinc ad integra-
tionem transiens invenio $S \frac{ds}{r} = S \frac{dz}{1 + zz} =$ arcui circulari
HR. Verum hic arcus variis modis exprimi potest: nam
posita abscissa HP = q, & applicata PR = $\sqrt{2q - qq}$, in-
venitur curvæ elementum $TR = \frac{dq}{\sqrt{2q - qq}}$: igitur $S \frac{ds}{r} =$
 $S \frac{dq}{\sqrt{2q - qq}} = HR$. Quare per fluxionem eiusdem arcus, sive

abscissæ HP = q, generatim data erit curva s, quæ expri-
mi poterit per applicatam PM curvæ cognitæ HMN. Iam
vero in memoriam revocemus alteram æquationem, nimi-

rum $dy = \omega ds = \frac{r dz}{1 + zz \cdot \sqrt{1 + zz}}$, & quum fit $\frac{rdz}{1 + zz} = ds$,

oriatur $\omega ds = \frac{z ds}{\sqrt{1 + zz}}$, five $\omega = \frac{z}{\sqrt{1 + zz}}$. Quando autem $IR =$

$1 : RP = \sqrt{2q - qq} :: IV = \sqrt{1 + zz} : VH = z$, est $\frac{z}{\sqrt{1 + zz}}$

$= \sqrt{2q - qq}$. Igitur $\omega = \sqrt{2q - qq} = RP$. Hisce statutis tertiam figuram cum altera comparantes facile colligemus, rectas PM , PR fore coordinatas respondentes curvæ AC , idest $PM =$ abscissæ $AB = s$, & $PR =$ ordinatæ $BC = u$. Quod unice erat investigandum.

Omifimus in generali constructione constantium additionem: hoc enim in singulis casibus geometricis determinandum relinquimus.

Solutio altera.

Formula radii osculantis per secundas differentias expressa erat $\frac{ds}{r} = \frac{ddy}{dx}$, in qua tamquam constans assumptum fuerat curvæ construendæ elementum ds . Quod si formula uti velimus, in qua constantes locum nullum habeant, ea erit huiusmodi $\frac{ds}{r} = \frac{dsddy - dydds}{dsdx}$. Ut secundis fluxionibus liberemur, disponatur altera æquationis pars in

hunc modum $\frac{dy}{dx} \cdot \frac{ddy}{dy} - \frac{dds}{ds}$. Quantitates $\frac{ddy}{dy}$, $\frac{dds}{ds}$ integrari per logarithmos possunt, earumque summatoria erit $l dy - l ds$, quæ fiat $= lp$, ut oriantur æquationes duæ, $\frac{ddy}{dy} - \frac{dds}{ds} = \frac{dp}{p}$, & $\frac{dy}{ds} = p$. Itaque habebimus $\frac{ds}{r} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dp}{p}$.

Atqui $p = \frac{dy}{ds}$, & $\frac{dy^2}{p^2} = ds^2 = dx^2 + dy^2$: igitur $dx = \frac{dy \cdot \sqrt{1 - pp}}{p}$. Quo valore rite substituto nascetur $\frac{ds}{r} = \frac{dp}{\sqrt{1 - pp}}$,

in qua æquatione quum sint variables separatæ, methodus superioris solutionis in usum vocetur.

In formula $\frac{ds}{r} = \frac{dsddy - dydds}{dsdx}$ assumatur tamquam constans ds , & ponatur $dy = p ds$; peractis necessariis opera-

tionibus, se se iterum nobis offeret æquatio $\frac{ds}{r} = \frac{dp}{\sqrt{1-pp}}$.

Accipe deinde tamquam constantem dy , & utere formula $\frac{ds}{r} = \frac{-dydds}{dsdx}$. Pone $ds = qdy$, sive $ddy = dydq$, & invenies $\frac{ds}{r} = \frac{-dy^2dq}{dxds}$, & peractis necessariis substitutionibus ad expellendum productum $dxds$, deteges $\frac{ds}{r} = \frac{-dq}{q\sqrt{qq-1}}$.

Postremo accipiatur alia formula radiorum osculantium, nimirum $r = \frac{ds^3}{-dxddy}$, sive $\frac{ds}{r} = \frac{-dxddy}{ds^2}$, in qua tamquam constans consideratur abscissæ elementum dx . Sit $z = \frac{dx}{dy}$, & $dz = \frac{-dxddy}{dy^2}$; quare erit $\frac{ds}{r} = \frac{dy^2dz}{ds^2}$: atqui ex hypothefi $dx = zdy$: igitur $ds^2 = dx^2 + dy^2 = dy^2 \cdot \overline{1+zz}$: quo valore pro ds^2 substituto nanciscemur $\frac{ds}{r} = \frac{dz}{1+zz}$.

Quocumque utamur analyseos circuitu, semper accidet, neque secus accidere potest, ut integralis $S \frac{ds}{r}$ semper referatur ad mensuram arcuum circularium, quorum differentia aut per sinus, aut per secantes, aut per tangentes exprimitur.

Solutio tertia.

AB analyticis solutionibus ad geometricam gradum facio, quæ statim quæstionem solvit, quin egeamus illis formulis, quæ ingeniosissime a geometris detectæ sunt. In quæsitâ curva (*Fig. 4*), quam descriptam suppono, accipio partes duas infinitesimas, & æquales AC , CI , & duco secantes duas infinite proximas LAC , KCI . CG , IG normales cordis AC , CI se se fecant in puncto G , & per hanc sectionem determinant radium osculatorem CG datum, ut supponitur, per curvæ functionem. Ductis ex punctis C , I ordinatis CB ; ID , ductaque infinitesima CF axi HD parallela, factoque centro in C minimo intervallo CI describo arcum infinitesimum IE , & semidiametro CN , quæ æquet quam.

quamlibet constantem describo arcum circuli NLK, cuius elementum LK inter duas secantes CAL, ICK iacebit.

Collige ex facta præparatione, similes esse sectores duos CGI, KCL; uterque enim similis est sectori infinitesimo ICE: igitur si semidiameter CN constituatur æqualis unitati, fiet $\frac{CI}{CG} = LK$: atqui CG datus supponitur per curvam cCI: igitur tam curva ipsa, quam radius osculans datus erit per arcum NL, sive, supposita circumferentiæ, eiusque partium rectificatione, per sinum LM, aut per CM. Similiter CI curvæ fluxio data erit per quantitatem differentialem arcus LN, aut respondentium sinuum LM, CM. Quum autem similia sint triangula LMC, CFE, aut CFI, quemadmodum primi trianguli latera notam proportionem habent; ita tres lineæ infinitesimæ alterum triangulum constituentes in eadem proportione erunt: qua de re inventum est, quidquid ad describendam inventam curvam erat necessarium.

Hic advertendum esse videtur, quod tamen circuli CNL positio mutatur, eiusque centrum C omnibus curvæ cAI punctis successive applicatur; solutio tamen omni caret paralogismi suspicione. Nam præterquamquod radius CN semper est constans, in quacumque positione punctum N semper est unum, atque idem, in eoque originem habent omnes arcus NL crescentes, aut decrecentes constanti arcu, si ita videtur, addito, vel subducto, ut nova origo in aliud peripheriæ punctum transferatur, sed semper æquidistans a puncto N.

Concipio, ordinatam CB motu sibi ipsi parallelo cieri, eiusque extremum punctum C radere curvam CAc, & simul cum ipsa transferri circulum CNL. Postquam ordinata positionem ex.ca.cb acquisiverit, accedet quidem ut secantes cl, ck secent arcum nl in punctis l, k diversis omnino a punctis L, K; ut arcus nl, NL minime sint inter se æquales: verum punctum c erit semper centrum circuli descripti semidiametro cn = CN, & punctum n idem omnino, ac punctum N. Quare arcus crescentes nl, NL ex eadem origine progredientur.

Constructio.

Ratiocinii series nos ad constructionem perducit, quæ longe multumque a primæ solutionis differt constructione. Nam curva quæsitæ, radius osculator, arcus NL, sinus duo LM, MC eiusmodi sunt quantitates, ut altera detur per alteram: primæ duæ ex suppositione, aliæ ex præparatione præmissa, factoque ratiocinio. Iam vero producat, si opus est ordinata CB, & in eam ex puncto G demittatur perpendicularis GP: orientur huiusmodi analogiæ $CL : LM :: GC : CP :: IC : CF$: atqui quum elementum curvæ CI exprimat per productum semidiametri osculantis GC in fluxionem circularem LK, erit $CI = CG \cdot LK$: igitur $CL : LM :: GC : CP :: GC \cdot LK : CF$. Prima ex hisce analogiis manifestat co-radius CP dari per arcus NL. functionem, altera æqualitatem demonstrat inter $CP \cdot LK = CF$.

Simili ratione progredientes inveniemus analogias $CL : CM :: CG : GP :: CI : IF$, sive $GC \cdot LK : IF$: ex quibus perspicuum est, co-radius GP notum esse per functionem arcus NL, & hanc æquationem valere $GP \cdot LK = FI$. Patefacti igitur sunt valores duarum differentiarum CF, FI, quarum summa exhibet coordinatas curvæ quæsitæ relatæ ad axem HB.

In rectam lineam extendatur arcus NLK, in qua (*Fig. 4, 5*) assumatur punctum n analogum puncto N: accipiantur abscissæ nl, nk æquales arcubus crescentibus NL, NK, ductisque in ordinatarum formam normalibus lp, lq, fiat prima æqualis co-radio CP, altera æqualis co-radio GP. Per puncta p, q, & alia infinita simili ratione determinata describantur curvæ rp, sq: cuique patens est, spatii elementum plk, cuius summatoria est area mixtilinea lnrp, æquale esse rectangulo $CP \cdot KL$, atque adeo, ex demonstratis, CF, quæ est differentia abscissæ pertinentis ad curvam quæsitam cAI. Quare factò ad integrationem transitu per aream lnrp curvæ quæsitæ abscissa determinabitur.

Similiter area differentialis $qlk = GP \cdot LK = FI$: quare facta integratione spatium curvilineum lnsq æquabit ordinatam BC curvæ quæsitæ, quæ est integralis fluxionis FI.

Qua-

Quapropter si per unitatem dividantur spatia $lnrp$, $lnsq$, expriment primum abscissam, alterum ordinatam curvæ, quam quærebamus. Q. E. I.

Problema alterum.

SI datus concipiatur per curvam quacumque ratione (*Fig. 4*) co. radius CP , quem vocabo $= u$, nullo negotio quæstioni satisfiet, si quæ dicta sunt opportune in auxilium vocentur. Eligo quamlibet ex tribus formulis solutionis secundæ, causa exempli $\frac{ds}{r} = \frac{-dq}{q\sqrt{qq-1}}$: fed est $GC = r : CP = u :: CI = ds : CF = dx$: ergo $\frac{uds}{dx} = r$, atque adeo $\frac{ds}{u} = \frac{-dq ds}{q dx \cdot \sqrt{qq-1}}$: fed ex hypothesi $ds = qdy$, & $dx = dy\sqrt{qq-1}$: igitur completis substitutionibus $\frac{ds}{u} = \frac{-dq}{qq-1}$.

Eadem methodo dato per curvam altero co. radio GP , quem voco $= z$ æquationem nanciscemur $\frac{ds}{z} = \frac{-dq}{\sqrt{qq-1}}$. Hinc quemadmodum integralis $S \frac{ds}{r}$ æqualis est expressioni arcus circularis; ita colligas velim, summatorias $S \frac{ds}{u}$, $S \frac{ds}{z}$ inveniri per quantitates, quæ pertinent ad hyperbolæ quadraturam, sive ad logarithmos.

In præpositis quæstionibus quandoquidem radius osculi, & utraque subosculatrix datur solum per curvam, nullo modo per coordinatas, æquali iure licet curvam describendam vel ad axem, vel ad focum referre. Primam rationem sequutus sum, quippe quæ maiori simplicitate ornata videtur.

Appendix.

QUoniam de formulis differentialibus secundi ordinis fermo incidit: placet addere methodum, quæ iamdiu mihi occurrit, & qua nullam puto latius patere. Nam omnia fluxionum genera amplectitur, in eisque infinitos casus absolvit, qui tamen certis limitibus continentur, & quas.

quasdam conditiones postulant, quas paucis dabo operam ut exponam. Nulla iam ingeniis hominum spes reliqua est ita perficiendi, atque absolvendi calculum integralem, ut sub uno dumtaxat canone quotquot excogitari possunt formulæ contineantur.

Aio itaque, omnes æquationes differentiales secundi gradus, in quibus vel primum elementum tamquam constans assumptum sit, vel fecus, si altera ex variabilibus finitis, eiusque functiones absint, semper in æquationem differentialem primi gradus converti posse. Quæ soluta sunt problemata multa huiusce canonis exempla præbuerunt. Generatim ita faciendum est, ut sequens exemplum ostendet.

Si dy constans sit, formula radii osculantis est huiusmodi $\frac{-dxds^2}{dydds} = r$. Si radium r dari velis per quancumque

potestatem tangentis $t = \frac{yds}{dy}$: erit itaque $t^m = \frac{y^m ds^m}{dy^m} = r$;

atque adeo $\frac{-dxds^2}{dydds} = \frac{y^m ds^m}{dy^m}$. Primo omnium apparet, ex-

positam formulam in nostro canone contineri: nam licet locum habeat ordinata y elevata ad potestatem indeterminatam m ; tamen neque x , neque ulla eius functio in æquationem ingreditur. Quoniam assumpta est tamquam constans dy , ut secunda differentia dds evanescat, fiat $qdy = ds$, sumptisque differentiis $dqdy = dds$, & peracta substitutio-

tione erit $\frac{-dxds^2}{dqdy^2} = \frac{y^m ds^m}{dy^m}$, aut $\frac{-dx}{dq} = \frac{y^m ds^{m-2}}{dy^{m-2}}$. Pro ds^{m-2}

collocetur eius valor $q^{m-2} dy^{m-2}$, & pro dx eius valor

$dy \cdot \sqrt{qq - r}$, & orietur æquatio $\frac{-dy\sqrt{qq - r}}{dq} = \frac{y^m \cdot q^{m-2} \cdot dy^{m-2}}{dy^{m-2}}$,

quæ, si fiat simplicior, hanc formam accipiet $\frac{-dy}{y^m} = \frac{q^{m-2} dq}{\sqrt{qq - r}}$.

Itaque tam applicata y curvæ construendæ data est per q , quam q per y ; sed $dx = dy\sqrt{qq - r}$: igitur integrando abscissa x fit nota per ordinatam y . Q. E. I.

In peculiari quodam casu sit $m = 3$, & radius oscu-

lans proportionalis cubo tangentis; formula œcumenica $\frac{-dy}{ym}$
 $= \frac{q^{m-2}dq}{\sqrt{qq-1}}$ in hanc mutatur $\frac{-dy}{y^3} = \frac{qdq}{\sqrt{qq-1}}$, & facta integra-
 tione $\frac{x}{2y^2} = \sqrt{qq-1}$. Nullam addo constantem, quia per
 hanc additionem natura curvæ nihil mutatur. Quum vero
 fit $dx = dy\sqrt{qq-1}$, substituto pro $\sqrt{qq-1}$ eius valore
 $\frac{x}{2y^2}$ fiet $dx = \frac{dy}{2y^2}$, & integratione facta $x = c - \frac{1}{2y}$, sive
 $2xy = 2cy - 1$: qui locus est ad hyperbolam intra assym-
 ptotos, cuius propterea elegans proprietas nobis proponi-
 tur.

Satis constare puto, in æquationibus differentialibus se-
 cundi gradus, in quibus non adest alterutra ex indetermi-
 natis x, y , existere tutam methodum, qua ad primas dif-
 ferentias perducimur. Idem evenire aio æquationibus diffe-
 rentialibus tertii gradus, si utraque ex variabilibus finitis
 ab æquatione absit.

Ecce tibi propositum exemplum. Sit $dxddd + dx^2ddy = dx^4 + dy^4$, in qua assumptum est tamquam constans ele-
 mentum dx . Pono $pdx = dy$: igitur $dpdx = ddy$, &
 $dxddp = dddy$. Factis necessariis substitutionibus nanciscemur
 $dx^2ddp + dx^3dp = dx^4 + dy^4$: sed $dy^4 = p^4dx^4$: ergo
 $dx^2ddp + dx^3dp = dx^4 + p^4dx^4$, & facta divisione per dx^2 ,
 $ddp + dxdp = dx^2 + p^4dx^2$. Pervenimus iam ad æquatio-
 nem differentialem secundi gradus, quam sancitus canon
 amplectitur. Itaque progrediens statuo $qdx = dp$, & diffe-
 rentiis acceptis in hypothesi dx constantis $dqdx = ddp$, &
 facta substitutione erit

$$dqdx + qdx^2 = dx^2 \cdot \overline{1 + p^4}, \text{ sive}$$

$dq + qdx = dx \cdot \overline{1 + p^4}$: sed $dx = \frac{dp}{q}$: ergo $dp + dq = \frac{dp}{q} \cdot \overline{1 + p^4}$. Sæpe accidit, ut variables æquationem con-
 stituentes adeo sint permixtæ, atque confusæ, ut nulla ra-
 tione possint separari. Verum hoc nihil detrahit methodo,
 quam exponimus, sed vitio tribuendum est theoriæ prima-
 rum differentiarum, quæ præsertim quoad incognitarum se-
 parationem multum abest a perfectione.

Pro-

Progrediens aio, a formulis differentialibus gradus quarti, ut ad primum redigantur oportere, non solum abesse utramque ex indeterminatis x, y , sed etiam alterutra ex primis fluxionibus dx, dy , earumque functionibus. Ab æquationibus quinti gradus abesse debent præter finitas ambæ fluxiones primæ; in æquationibus sexti gradus præter has etiam alterutra ex fluxionibus secundis ddx, ddy , & utraque in æquationibus sexti gradus: atque ita deinceps in infinitum.

Quarti gradus exemplum propono. Sit $d^4y + dx d^3y - dx^2 ddy = 0$, constans autem accepta sit dx . Fiat de more $pdx = dy$, atque adeo $dpdx = ddy$, $dx ddp = d^3y$, $dx d^3p = d^4y$. Itaque factis substitutionibus $dx d^3p + dx^2 ddp - dx^3 dp = 0$, sive $d^3p + dx ddp - dx^2 dp = 0$. Aequatio hæc tertii gradus omni finita variabili caret. Utamur igitur explicata methodo, & post plures operationes positis $qdx = dp$, $zdx = dq$, obtinebimus formulam $zdz + zdq = qdq$, in qua ex notis methodis variables separantur.

Facile est intellectu, cur conditiones illæ requirantur, sine quibus diximus canonem non valere. Nam postquam eiectionis differentiis secundis, tertiis ec. ad primas differentias nos methodus nostra perduxerit, nisi adsint conditiones expositæ, æquatio, quæ nascetur, non solum primas incognitas x, y , sed etiam assumptas p, q &c. continebit. Quod ubi acciderit, nulla nos methodus docere generatim potest, quomodo aut separentur, aut ad integrationem perducantur. Multa quidem in hisce casibus adsunt adiumenta, quibus solent analystæ uti, aliquando cum fructu; sæpe autem eorum industriam rei difficultas frustratur.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.





Fig. 5.



VINCENTII RICCATI

*Animadversiones in fractionem, cuius numerator,
& denominator per certam determinationem
nihilò æquales fiunt.*

IOannes Huddenius geometra in primis acutus in epistola de reductione æquationum ratus est, valorem fractionis, cuius numerator, & denominator per certam determinationem nihilò æquales fiunt, inveniri nulla ratione posse. Sed post editam epistolam, dum eam iterum revocaret ad trutinam, correxit se se aliquantum emissa scheda, & id verum esse dixit, ubi utraque quantitas denominator scilicet, & numerator per eandem quantitatem non sit divisibilis. Verum frustra fit huiusmodi limitatio, quemadmodum in notis in geom. Cartesii advertit Iacobus Bernoullius deinceps sæpe laudandus. Nam si fractio rationalis est, numeratorem, ac denominatorem habet per eandem quantitatem semper divisibiles; si irrationalis valorem habet certum, ac definitum, neque multo labore determinabilem. Quæ hac de re scripta hæcenus sunt in præsens examinare decrevi: quod non fecissem sane, nisi me dubitationes doctissimi geometræ compulissent.

Si fractio data rationalis sit, quæ efformetur ex x , & constantibus, & fiat $= \frac{0}{0}$ per determinationem $x = a$, quæ quamlibet constantem designat: dividatur cum numerator, tum denominator per $x - a$; quod toties fiat, donec posita pro x constanti a aut uterque, aut alteruter valorem habeat definitum, quem ubi inveneris iam nulla de vero fractionis valore esse potest dubitatio.

Nam si tum numeratoris, tum denominatoris valor finitus est, fractionis valor finitus erit: si denominatore valorem finitum habente numerator $= 0$, fractio quoque $= 0$: si vero numeratoris valor finitus sit, denominatoris $= 0$, fractio valorem obtinebit infinitum.

Ad

Ad exemplum assumo huiusmodi fractionem.

$$\frac{y}{a} = \frac{x^4 + ax^3 - 9a^2x^2 + 11a^3x - 4a^4}{x^4 - ax^3 - 3a^2x^2 + 5a^3x - 2a^4}. \text{ Numerator, \&}$$

denominator dividatur per $x - a$, & proveniet

$$\frac{y}{a} = \frac{x^3 + 2ax^2 - 7a^2x + 4a^3}{x^3 - 3a^2x + 2a^3}; \text{ in qua item si ponatur}$$

$x = a$, numerator, & denominator fiunt $= 0$, qua de re dividantur iterum per $x - a$, & orietur

$$\frac{y}{a} = \frac{x^2 + 3ax - 4a^2}{x^2 + ax - 2a^2}; \text{ in qua pariter omnia evanescunt}$$

si $x = a$; iteranda itaque est divisio, & invenietur formula

$$\frac{y}{a} = \frac{x + 4a}{x + 2a}; \text{ in qua si fiat } x = a, \text{ habebimus}$$

$$\frac{y}{a} = \frac{5a}{3a} = \frac{5}{3}. \text{ Q. E. I. Longo circuitu analysim profegu-}$$

tus sum, ut methodus patefieret: ceterum fatius fuisset in hoc exemplo divisionem instituere per $x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3$; unica enim operatione valorem fractionis invenissemus.

Quamquam hæc methodus plerumque deficit, si fractio abundet irrationalibus; tamen sæpenumero non mediocri cum fructu in usum traducitur. Ita in exemplo proposito a Ioanne Bernoullio in actis Lips. 1704 sit

$$y = \frac{-xx + a\sqrt{ax}}{a - \sqrt{ax}} = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{-x^{\frac{3}{2}} + a^{\frac{3}{2}}}{-x^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{2}}}. \text{ Numerator huius}$$

fractionis per denominatorem dividatur, & erit

$$y = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}}, x + a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} + a. \text{ Itaque si fiat } x = a, \text{ erit}$$

$y = 3a$, prorsus ut invenit Bernoullius, qui ut possit dividere per $x - a$ longo calculo tollit assimetriam: nimirum multiplicat denominatorem per y ; tum opportunis calculi auxiliis radicalia eliminat; deinde ad unam partem omnibus

bus terminis translatis instituit divisionem per $x - a$; postremo invenit omnes valores y , inter quos, qui quæritur, nullo negotio cognoscitur.

Verum, fatendum est enim, exposita methodus vel prorsus inutilis est, vel maxime difficilis, ubi signorum radicalium magna est complicatio. Quare ad aliam methodum confugiendum est, quam suppeditabit infinite parvorum theoria. Ut eius methodi, quam expositurus sum, fundamentum aperiatur, pone numeratorem fractionis $= z$, denominatorem $= u$. Tum super communi axe, in quo accipiantur abscissæ $= x$, constructæ intelligantur duæ curvæ, quarum ordinatæ sint z , & u . Constat tam z , quam u fieri $= 0$, quum x fit $= a$: ergo pro hoc casu quid aliud quærendum est, nisi ratio ultima, quæ intercedit inter ordinatas z , u iam evanescentes propter æqualitatem $x = a$.

Ad hanc rationem inveniendam augenda est, vel minuenda communis abscissa quantitate infinitesima dx , ita ut fiat $= a \pm dx$, qui valor substituatur pro x in æquatione $z =$ numeratori fractionis, & si adsunt extrahantur radices more newtoniano. Atque illis extractis disponatur formula ea ratione, ut primus terminus ille sit, qui nulla ratione affectus est quantitate dx , secundus in quo dx minimam obtinet dimensionem, atque ita deinceps per seriem. Primus terminus propter signa contraria semper destruitur; secundo omissis reliquis, qui respectu eius sunt infinitesimi, erit $= z$; quod si secundus destruat, fiet $z =$ tertio; si etiam tertius ob signa contraria sit $= 0$, erit $z =$ quarto; atque ita deinceps omissis semper subsequenter, qui respectu eius, qui assumitur, sunt infinitesimi. Eadem prorsus fiant in denominatore, & invenietur quantitas $= u$. Altera per alteram dividatur, & valor fractionis invenietur.

Primum iubeo te animadvertere, in extrahendis radicibus modo newtoniano non esse necesse, ut series per multos terminos producat; sed satis esse, ut ille terminus inveniatur, qui primo ex contrarietate signorum non eliditur. Deinde adverte me dixisse augendam, vel minuendam abscissam elemento dx . Namque sæpe, si augeatur, ordinata provenit imaginaria, quo in casu ad hæc vitanda erit minuenda abscissa; aut vice versa. Verum hoc tene: si auges in numeratore debes etiam augere in deno-
mina-

minatore, aut contra, ut ordinatæ ad eandem abscissam pertinentes comparentur. Rem exemplis reddam clariorem.

Sumo primum exemplum ex formula nullo signo radicali affecta. Sit ea ipsa fractio, cuius valorem per methodum primam invenimus: nimirum

$$\frac{y}{a} = \frac{x^4 + ax^3 - 9a^2x^2 + 11a^3x - 4a^4}{x^4 - ax^3 - 3a^2x^2 + 5a^3x - 2a^4}. \text{ Pono } x = a + dx,$$

substitutoque valore in numeratore, quem vocavi = z , fiet

$$\begin{aligned} z &= a^4 + 4a^3dx + 6a^2dx^2 + 4adx^3 + dx^4 \\ &\quad a^4 + 3a^3dx + 3a^2dx^2 + adx^3 \\ &\quad - 9a^4 - 18a^3dx - 9a^2dx^2 \\ &\quad 11a^4 + 11a^3dx \\ &\quad - 4a^4. \end{aligned}$$

In hac formula prima columna ex finitis quantitibus constans evanescit, quod semper in nostris formulis eveniet: altera, in qua dx adest, pariter = 0: tertia pariter ex contrarietate signorum destruitur. Prima, quæ non eliditur quarta est: quare omissa quinta, quæ infinitesima est respectu quartæ, erit $z = 5adx^3$. Si idem fiat in denominatore, quem vocavi = u , completa analysi invenietur $u = 3adx^3$. Quare si dividatur z , per u fiet.

$$\frac{y}{a} = \frac{5adx^3}{3adx^3} = \frac{5}{3}: \text{ quemadmodum supra nacti sumus.}$$

A formula nullo prædita signo radicali progredior ad formulam signo radicali affectam multiplici: atque eam potissimum seligo, quam proponit vir summus Ioannes Bernoullius: nimirum

$$y = \frac{\sqrt{2a^3x - x^4} - a\sqrt[3]{a^2x}}{a - \sqrt[4]{ax^3}}. \text{ In numeratore substituo pro}$$

$x, a + dx$, ut fiat

$$z = \sqrt{a^4 - 2a^3dx - 6a^2dx^2 - 4a^3dx - dx^4} - a\sqrt[3]{a^3 + a^2dx}.$$

Extraho duas radices more newtoniano, sed subsisto in ter-

terminis, ubi adest dx ; propterea quod hi non destruentur, & ceteri præ his infinitesimi fiunt. Prima radix erit $= a^2 - adx$; secunda $= a + \frac{1}{3}dx$. Quare

$$z = \frac{a^2 - adx}{-a^2 - \frac{1}{3}adx} = \frac{-4}{3} adx.$$

Quod factum est in numeratore fiat in denominatore, & orietur formula

$u = a - \sqrt[4]{a^4 + 3a^3 dx + 3a^2 dx^2 + adx^3}$. Extraho radicem omittendo terminos, in quibus habetur dx^2 , & superiores potestates: radix extracta est $= a + \frac{3}{4}dx$: ergo

$$u = a - \frac{3}{4}dx = -\frac{3}{4}dx: \text{ ergo valor fractionis}$$

$$y = \frac{-\frac{3}{4} adx}{-\frac{3}{4} dx} = \frac{16}{9} a: \text{ prorsus ut invenit Bernoullius.}$$

Ad tertium exemplum propono fractionem

$$y = \frac{x^2 + ax \cdot \sqrt{a} - \sqrt{x} \cdot x^2 + a^2}{2a\sqrt{x} - \sqrt{a} \cdot a + x}, \text{ in qua si } x = a \text{ cum}$$

numerator, tum denominator evanescit. Pono in numeratore pro x , $a + dx$, & proveniet

$$z = \frac{2a^2 + 3adx + dx^2 \cdot \sqrt{a} - \sqrt{a + dx} \cdot 2aa + 2adx + dx^2}{\sqrt{a + dx}}$$

modo newtoniano invenio; & quoniam perspexi terminos, in quibus adest dx se se destruere, ita invenio,

ut non contemnam dx^2 . Invenio autem esse $= \sqrt{a} + \frac{dx}{2\sqrt{a}}$

$-\frac{dx^2}{8a\sqrt{a}}$. Hac itaque substituta nanciscor

$$\begin{aligned} z &= \frac{2a^2\sqrt{a} + 3adx\sqrt{a} + dx^2\sqrt{a}}{-2a^2\sqrt{a} - adx\sqrt{a} + \frac{dx^2\sqrt{a}}{4}} = -\frac{3}{4} dx^2\sqrt{a}. \\ &\quad - 2adx\sqrt{a} \\ &\quad - dx^2\sqrt{a} \\ &\quad - dx^2\sqrt{a}. \end{aligned}$$

Utor eadem substitutione in denominatore, & erit
 $u = 2a\sqrt{a+dx} - \sqrt{a} \cdot \overline{2a+dx}$. Extracta radice, in qua
 non debet omitti dx^2 , quia termini continentes dx se se
 destruunt, inveniatur

$$u = \frac{2a\sqrt{a+dx} - dx\sqrt{a} - dx^2}{-2a\sqrt{a} - dx\sqrt{a} - 4\sqrt{a}} = \frac{-dx^2}{4\sqrt{a}} : \text{ergo valor fractionis est}$$

$$y = \frac{-\frac{3}{4}dx^2\sqrt{a} \cdot 4\sqrt{a}}{-dx^2} = 3a. \text{ Q. E. I.}$$

Exemplum quartum, & ultimum desumatur a Iacobo
 Bernoullio, & est huiusmodi

$$y = \frac{a-x \cdot \sqrt{2aa-3ax+xx}}{a-\sqrt{2ax-xx}}. \text{ In huius fractionis numera-}$$

tore si pro x ponerem $a+dx$, quantitas proveniret imagi-
 naria; quod ideo accidit, quia curva expressa per $z =$
 $\frac{a-x \cdot \sqrt{2a^2-3ax+xx}}{a-\sqrt{2ax-xx}}$ nullum ramum habet, ubi x su-
 perat a . Hoc etiam pro aliis casibus animadvertisse iuva-
 bit. Quare pro x substituo $a-dx$, & erit

$$z = \frac{a+dx}{-a} \cdot \sqrt{\frac{2a^2+3adx+dx^2}{-3a^2-2adx+a^2}} = dx^{\frac{3}{2}} \sqrt{a+dx}.$$

Omisso itaque dx , quæ respectu a est infinitesima, fiet

$$z = a^{\frac{1}{2}} dx^{\frac{3}{2}}.$$

Eadem fiat substitutio in denominatore, & erit

$$u = a - \sqrt{\frac{2a^2-2adx-dx^2}{-a^2+2adx}} = a - \sqrt{a^2-dx^2}. \text{ Extra-}$$

hatur radix, quæ erit $= a - \frac{dx^2}{2a}$. Ergo

$$u = \frac{a+\frac{dx^2}{2a}}{-a} = \frac{dx^2}{2a}. \text{ Dividatur } z \text{ per } u, \text{ & fiet}$$

= y

$$y = \frac{2a^{\frac{3}{2}} dx^{\frac{3}{2}}}{dx^2} = \frac{2a^{\frac{3}{2}}}{dx^{\frac{1}{2}}}: \text{quæ est quantitas infinita.}$$

Methodus tradita eadem est cum illa, quam exposuit Iacobus Bernoullius in notis in geom. Cart. nota xxix. Hoc tamen habet discriminis, quod facta substitutione non utitur vir doctissimus extractione radicum, quemadmodum nos fecimus; sed ponit numeratorem = tdx , ortamque hinc æquationem a surditate liberat. Deinde quum termini, a quibus dx abest, necessario se se elidant, eos, in quibus dx invenitur, ponit = 0; atque per ortam æquationem determinat valorem t , & numeratorem fractionis tdx . Idem facit in denominatore. Quod si adhuc & numerator, & denominator = 0; repetit operationem ponendo loco tdx , tdx^2 , vel si evanescant iterum tdx^3 ; atque ita deinceps, donec valor quæsitus reperiatur.

Quod si valor post operationem prodiret infinitus, ordiretur novam operationem, sed poneret successive numeratorem (idem dic de denominatore) = $t\sqrt{dx}$, $t\sqrt[3]{dx}$, $t\sqrt[4]{dx}$, &c. In quibus operationibus illud cum primis observandum est, non opus esse tota æquationum reductione uti, sed tantum, quantum conducit inveniundo termino, quo indigemus, qui plerumque levi negotio ab attento Analysta eruitur.

Hæc methodus, quam Iacobus Bernoullius sequitur, genuina est. Verum huic aliam, quæ per radicum extractiones peragitur, anteponendam esse duximus, quia ad liberandam æquationem a surditate longiores operationes requiruntur, quam ad extractionem radicum.

Exemplum alterum hac ratione tentatum hoc palam faciet. Facta substitutione $a + dx$ pro x , ponatur numerator fractionis = tdx , & erit

$$tdx = \sqrt{a^4 - 2a^3 dx - 6a^2 dx^2 - 3adx^3 - dx^4} - a\sqrt[3]{a^3 + a^2 dx}.$$

Ut facilius operationes peragantur pono primum terminum = p , secundum = q , ut sit $tdx = p - q$; ergo $q = p - tdx$. Elevo ad tertiam potestatem, & fiet

$$q^3 = p^3 - 3p^2 tdx + 3pt^2 dx^2 - t^3 dx^3; \text{ sive opportune trans-}$$

latis terminis $q^3 + 3p^2 t dx + t^3 dx^3 = p \cdot \overline{p^2 + 3t^2 dx^2}$. Elevo

ad quadratum $\overline{q^3 + 3p^2 t dx + t^3 dx^3}^2 = p^2 \cdot \overline{p^2 + 3t^2 dx^2}^2$.

Pro p, q valores substituantur; sed ita eleventur potestates, ut negligatur dx^2 , & superiores potestates, & fiet

$$a^{12} + 2a^{11} dx + 6a^{10} t dx = a^4 - 2a^3 dx \cdot a^8 - 4a^7 dx = a^{12} - 6a^{11} dx.$$

Quare $t dx = \frac{-4}{3} a dx$, ut supra inventum est. Si quis methodum hanc cum nostra comparaverit, quænam elegantia præstet facile iudicabit.

Præterea si post primam operationem in fractione uterque terminus aut nullus fiat, aut infinitus, iteranda est analysis ponendo in primo casu $t dx^2, t dx^3$, atque ita deinceps; in secundo casu $t dx^{\frac{5}{2}}, t dx^{\frac{7}{3}}$, atque ita deinceps, donec fiamus voti compotes. Quot operationes iterandæ erunt sæpenumero, verus ut valor inveniatur! præsertim si valor numeratoris, & denominatoris inveniendus proportionalis esse debeat dx elevatæ ad potestatem fractam numeris altio-

ribus expressam, ut esset $dx^{\frac{7}{11}}$. Accedit, quod eam eligere potestatem, quæ proposito serviat, fortunæ potius, quam certæ regulæ tribuendum videtur.

Consideravi, utrum tot operationes hac ratione vitarentur: id enim fieri nullo negotio posse videbatur: nimirum facta substitutione pono numeratorem = z , libero æquationem a radicalibus signis; tum deletis terminis se se destruentibus aiebam, si termini item deleantur, qui infinitesimi sunt aliorum respectu, tandem valor ipsius t unica operatione prodire debet, ad quemcumque tandem ordinem infinitesimorum pertineat. Verum vidi statim, incertum esse, quinam termini sint respectu aliorum infinitesimi, qui proinde sine parallogismo negligi possint. Exemplo rem aperiam.

Sit inveniendus valor quantitatis

$\sqrt[3]{a^3 - x^3} + A \cdot \overline{x - a^m}$, quum fit $x = a + dx$. Facta substitutione invenio

✓ —

$\sqrt[3]{-3a^2 dx - 3adx^2 - dx^3 + Adx^m}$. Si hæc mea methodo tractanda sit, extrahatur radix tertia duobus tantum terminis consideratis; hos enim sufficere deprehendi: & erit

$$-3^{\frac{2}{3}} a^{\frac{2}{3}} dx^{\frac{2}{3}} - \frac{dx^{\frac{4}{3}}}{3^{\frac{2}{3}} a^{\frac{1}{3}}} + Adx^m. \text{ Iam vero sit primo } m = \frac{2}{3}$$

si $A = 3^{\frac{2}{3}} a^{\frac{2}{3}}$, valor quæsitus erit $= \frac{-dx^{\frac{4}{3}}}{3^{\frac{2}{3}} a^{\frac{1}{3}}}$; si vero

A non sit $= 3^{\frac{2}{3}} a^{\frac{2}{3}}$ valor quæsitus fiet $= A - 3^{\frac{2}{3}} a^{\frac{2}{3}} \cdot dx^{\frac{2}{3}}$. Sit deinde $m > \frac{2}{3}$, omittuntur duo ultimi termini, & valor invenietur $= -3^{\frac{2}{3}} a^{\frac{2}{3}} dx^{\frac{2}{3}}$. Sit demum $m < \frac{2}{3}$, omittuntur duo primi termini, & valor $= Adx^m$.

Quod si Bernoulliana methodo tentare rem velis, fiat

$$\sqrt[3]{-3a^2 dx - 3adx^2 - dx^3 + Adx^m} = z: \text{ five}$$

$\sqrt[3]{-3a^2 dx - 3adx^2 - dx^3} = z - Adx^m$. Eliminenter radicalia $-3a^2 dx - 3adx^2 - dx^3 = z^3 - 3Az^2 dx^m + 3A^2 z dx^{2m} - A^3 dx^{3m}$. In hac formula, vel sit $m > \frac{2}{3}$, vel $m < \frac{2}{3}$, omitti poterunt termini $3adx^2$, dx^3 , qui respectu $3a^2 dx$ infinitesimi sunt: ergo fiet

$$-3a^2 dx = z^3 - 3Az^2 dx^m + 3A^2 z dx^{2m} - A^3 dx^{3m}.$$

Si mihi constaret ad quem ordinem infinitesimorum pertineat z , constaret itidem utrum z^3 , & $-3Az^2 dx^m$ sint infinitesimi respectu $3A^2 z dx^{2m}$, an respectu z^3 sint infinitesimi $-3Az^2 dx^m + 3A^2 z dx^{2m}$. Sed quoniam hoc nondum est cognitum, incertum est quinam termini sine parallogismo omitti possint.

Ad determinandum autem ad quem ordinem infinitesimorum pertineat z , nullam aliam viam iniri posse existimo, quam animadvertere, cui potestati dx debeat esse proportionalis radix z . Quamobrem non curatis coefficientibus satis erit in formula inventa radices extrahere: quod
fi fiat

fi fiat invenietur $-dx^{\frac{1}{3}}$ proportionalis $z - dx^m$: ergo z debet esse æqualis alicui functioni vel $dx^{\frac{1}{3}}$, vel dx^m . Si itaque $m > \frac{1}{3}$, z pertinebit ad eum infinitesimorum ordinem, ad quem pertinet $dx^{\frac{1}{3}}$. Quare z^3 erit omnium maximus, respectu cuius ceteri poterunt præteriri. Itaque erit $-3a^2 dx = z^3$, seu $-3^{\frac{1}{3}} a^{\frac{2}{3}} dx^{\frac{1}{3}} = z$, sicut supra invenimus. Si vero $m < \frac{1}{3}$, $dx^{\frac{1}{3}}$ erit infinite parva respectu dx^m : ergo z in eo erit infinitesimorum ordine, in quo est dx^m . Quo in casu omnes termini nostræ æquationis ad eundem quantitatum ordinem pertinent; nullus itaque omitti poterit. Quare omisso $-3a^2 dx$, qui respectu $A^3 dx^{3m}$ est infinite parvus, necessarium erit radicem extrahere, & erit $z - A dx^m = 0$, sive $z = A dx^m$, quemadmodum supra invenimus.

Si vero $m = \frac{1}{3}$, & A^3 minime æqualis sit $3a^2$, tunc termini $-3adx^2 - dx^3$ omitti possunt: erit itaque $-3a^2 dx = z^3 - 3az^2 dx^{\frac{1}{3}} + 3A^2 z dx^{\frac{2}{3}} - A^3 dx$. Non curatis coefficientibus extrahatur radix tertia, & fiet $dx^{\frac{1}{3}}$ proportionalis $z - A dx^{\frac{1}{3}}$: ergo z ad eum ordinem pertinet infinitesimorum ad quem $dx^{\frac{1}{3}}$. Nullus itaque terminus omitti poterit in æquatione. Extrahenda est igitur necessario radix ad inveniendum valorem z , atque regrediendum, unde discessimus.

Demum in eadem hypothefi sit $A^3 = 3a^2$: quo in casu fiet æquatio $-3adx^2 = z^3 - 3Az^2 dx^{\frac{1}{3}} + 3A^2 z dx^{\frac{2}{3}}$. Ut autem cognoscatur ad quem ordinem infinite parvorum pertineat z , nullam aliam video rationem, quam demere utrique parti terminum $A^3 dx$, sive $3a^2 dx$: quo dempto si intelligatur extracta radix fiet

$\sqrt[3]{-3a^2 dx - 3adx^2} = z - A dx^{\frac{1}{3}}$: in qua quando notum est adesse terminos, qui se destruunt, constabit z esse infinite parvam respectu $dx^{\frac{1}{3}}$: ergo omissis terminis, qui sine parallogismo omitti possunt, fiet

— $3ad$

$$= 3adx^2 = 3A^2 zdx^{\frac{2}{3}}, \text{ sive } \frac{-adx^{\frac{4}{3}}}{A^2} = \frac{-dx^{\frac{4}{3}}}{3^{\frac{2}{3}}a^{\frac{1}{3}}} = z; \text{ quem}$$

admodum supra inventum est. Ab hoc exemplo ceteroquin non difficili, nemo unus non discet, quam longa, ac salebrosa via tenenda sit, ut certa regula, atque lege methodus Bernoulliana ducatur. Sed de hac satis.

Si quis arbitraretur, posse per methodum differentiationis verum numeratoris, verum denominatoris valorem inveniri, non levi fortasse in errore versaretur. Quod ut palam faciam, fac tibi iterum proponas numeratorem eius fractionis, quam loco primo tractavimus

$z = x^4 + ax^3 - 9a^2x^2 + 11a^3x - 4a^4$: in qua si pro x substituatur $a + dx$ provenit, ut dictum est

$$\begin{aligned} z = & a^4 + 4a^3 dx + 6a^2 dx^2 + 4adx^3 + dx^4 \\ & a^4 + 3a^3 dx + 3a^2 dx^2 + adx^3 \\ & - 9a^4 - 18a^3 dx - 9a^2 dx^2 \\ & + 11a^4 + 11a^3 dx \\ & - 4a^4 \end{aligned}$$

Hiscæ ad memoriam revocatis utamur methodo differentiationis, & numeratoris expositi differentia sumatur, & erit $z = 4x^3 dx + 3ax^2 dx - 18a^2 x dx + 11a^3 dx$. Hæc, si ponatur pro x quantitas constans a , coincidit prorsus cum secunda columna nostræ formulæ. Qua de re si hic esset subsistendum, verus valor quæsitæ numeratoris etiam differentiando inveniretur. Sed quoniam termini omnes a contrariis signis eliduntur, sumenda est iterum differentia. Supposita itaque dx constante fiat differentiatio, & erit

$z = 12x^2 dx^2 + 6ax dx^2 - 18a^2 dx^2$, quæ, si fiat $x = a$, est dupla columnæ tertix: ergo si ad secundam differentiationem progrediendum est, valor per differentiationem inventus est duplus vero. Sed quando hic etiam signa contraria omnes elidunt terminos, fiat progressus ad tertiam differentiationem, & erit

$z = 24x dx^3 + 6adx^3$, quæ erit sextupla, quam tertia nostra columna: igitur si tertia differentiatione opus sit, valor inven-

ventus est ad verum, ut 6 : 1. Quod si quarta fumeretur differentia, quod exemplum hoc non postulat, fieret $z = 24dx^4$, quæ se habet ad terminum in ultima columna comprehensum ut 24 : 1.

Quod in formula omnis radicalis signi experte vidimus, id valet in formulis quibuscumque. Quod unico exemplo iuvabit confirmare: numerator formulæ in tertio exemplo propositæ erat

$$z = \sqrt{x^2 + ax} \cdot \sqrt{a} - \sqrt{x} \cdot \sqrt{x^2 + a^2} \text{ . five}$$

$$z = a^{\frac{1}{2}} x^2 + a^{\frac{3}{2}} x - x^{\frac{5}{2}} - a^2 x^{\frac{1}{2}} \text{ . Differentiæ sumantur}$$

$$z = 2a^{\frac{1}{2}} x dx + a^{\frac{3}{2}} dx - \frac{5}{2} x^{\frac{3}{2}} dx - \frac{1}{2} a^2 x^{-\frac{1}{2}} dx : \text{ in qua quoniam, si fiat } x = a, \text{ omnia eliduntur, ad secundam differentiationem progredior: } z = 2a^{\frac{1}{2}} dx^2 - \frac{15}{4} x^{\frac{1}{2}} dx^2 + \frac{1}{4} a^2 x^{-\frac{3}{4}} dx^2.$$

Fiat $x = a$, & invenietur $z = 2 - \frac{14}{4} \cdot dx^2 \sqrt{a} = -\frac{3}{2} dx^2 \sqrt{a}$, qui valor duplo maior illo est, quem per nostram methodum invenimus.

Quærenti vero, cur, si unica differentiatione opus sit, verus valor prodeat, non autem si pluribus, facile est respondere, quia quando posita $x = a$, $z = 0$, constat, aucta abscissa elemento dx , ordinatam z fore æqualem suæ primæ differentiæ. Fieri quidem potest, ut hæc prima differentia ordinatæ z sit infinites major, aut minor elemento dx . Verum ad eam inveniendam ad secundas differentias minime est confugiendum, sed in eius expressione, quum res poscit, minime sunt negligendæ quantitates illæ, quæ respectu dx sunt infinitesimæ. Quare nihil ad rem facit animadversio Petri Varignonii hominis doctissimi in notis ad In. par. Hospit. docentis, idcirco inter differentiandum omitti ddx , d^3x &c., quia eorum coefficientes ex signorum contrarietate se eliderent. Nam quamquam hoc verum est, non agitur hic de invenienda secunda, aut tertia differentiali, sed de invenienda prima ad quemcumque ordinem infinitesimorum pertineat.

Expono hic per seriem proportionem, quam habet valor

lor verus ordinatæ ad valorem differentiando inventum, quotcumque differentiationibus utaris.

Si differentiandum sit semel, bis, ter, quater, quinquies ec.

Valor verus est ad $1, 1, 1, 1, 1$ ec.

valorem differentiando $1, 1.2, 1.2.3, 1.2.3.4, 1.2.3.4.5$ ec.
inventum

Neque vero hoc novum est: cognitum enim est iamdiu, terminos, qui eruuntur ex newtonianis feriebus ad eos, qui prodeunt differentiando, huiusmodi proportionem tenere.

Nolim tamen suspicetur aliquis, me per hæc, quæ dixi hætenus, accusare paralogismi methodum, qua ad inveniendum fractionum, de quibus agimus, valorem utitur in actis lipsiensibus 1704 Ioannes Bernoullius vir summus, & cum paucis comparandus. Etenim tantum abest, ut Bernoullii methodum evertam; quin potius verum, quo innititur fundamentum, aperio. Iubet vir summus, differentias sumi cum numeratoris, tum denominatoris, hisque sumptis novam fractionem constituit. Si hæc valorem obtineat definitum, nihil faciendum est aliud: si adhuc sit & numerator, & denominator = 0, sumit denuo differentias, atque ita iterum, atque iterum, donec valorem, quem quærit, inveniat. Si hic ageretur de inveniendo vero numeratoris valore, tum vero denominatoris valore, ubi necessaria esset secunda, aut tertia differentiatio verum valorem nequaquam obtineremus, sed eiusmodi, qui ad verum constantem haberet proportionem. Sed quando nihil quæritur aliud, quam verus fractionis valor, verus obtinetur. Etenim quum toties numeratoris, quoties denominatoris differentia sumatur, erit semper valor verus numeratoris ad valorem verum denominatoris, ut valor numeratoris differentiando inventus ad valorem denominatoris inventum eadem ratione. Igitur numerator verus divisus per verum denominatorem eundem quotientem exhibebit, quem exhibet numerator differentiando inventus divisus per denominatorem similiter inventum. Quapropter satis abunde constat per methodum bernoullianam semper verum fractionis valorem prodire.

Etsi autem methodus Ioannis Bernoullii optima sit, tamen non ita late patet, ut omnium fractionum valores ex-

hibeat, quemadmodum auctori doctissimo visum est. Quod, ut appareat, fac periculum in formula, quam propono. Sit itaque

$$\frac{y}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{2a^2 - 3ax + xx}}{\sqrt{a-x}} : \text{quæ formula ita facilis est, ut}$$

tractari possit per primam methodum, dividendo scilicet

$$2a^2 - 3ax + xx \text{ per } a - x. \text{ Prodibit autem } \frac{y}{\sqrt{a}} = \sqrt{2a - x}$$

$= \sqrt{a}$, si fiat $x = a$. Verum ut methodum Ioannis Bernoullii in usum traducas, differentia numeratorem, atque

divisorem, & alterum per alterum divide, ut sit $\frac{y}{\sqrt{a}} =$

$$\frac{-3adx + 2xdx}{2\sqrt{2aa - 3ax + x^2} \cdot \frac{dx}{2\sqrt{a-x}}} = \frac{3a - 2x \cdot \sqrt{a-x}}{\sqrt{2aa - 3ax + xx}}, \text{ in qua}$$

omnia evanescunt, si fiat $x = a$. Sumatur iterum differentia, & erit

$$\frac{y}{\sqrt{a}} = \frac{-2dx\sqrt{a-x} - dx \cdot \frac{3a-2x}{2\sqrt{a-x}}}{-3adx + 2xdx} = \frac{7a-6x \cdot \sqrt{2aa-3ax+xx}}{3a-2x \cdot \sqrt{a-x}},$$

in qua pariter, si fiat $x = a$, & numerator, & denominator $= 0$. Atque polliceor, factis in æternum differentiis numquam verum valorem inventum iri, sed semper numeratorem, & denominatorem futuros $= 0$, quia nunquam duæ radices a fractione abibunt.

Causa autem, cur hoc accidat, est, quia verus numeratoris valor (idem dic de denominatore) facta $x = a - dx$, non pertinet ad eos ordines quantitatum infinitesimarum, ad quos pertinet aliquis ex hac serie terminus

$$dx^0, \quad dx, \quad dx^2, \quad dx^3, \quad dx^4 \text{ ec.}$$

sed est inter ipsos medius. Per differentiationem autem primam

mam

mam obtinetur dx , per secundam dx^2 , per tertiam dx^3 : atque ita deinceps. Quare si qua est quantitas media, numquam per repetitam differentiationem elici poterit. In adducto exemplo quoniam valor numeratoris, & denominatoris est ordinis $dx^{\frac{1}{2}}$, ut meam methodum adhibenti palam fiet, numquam per methodum Ioannis Bernoullii inveniri poterit.

Venio nunc ad casum, in quo valor proportionis $\frac{dx}{dy}$, aut $\frac{dy}{dx}$ per fractionem exprimitur, quæ in certa hypothefi

habet tam numeratorem, quam denominatorem æqualem nihilo. Si hæc fractio vel solis x constet, vel solis y , iisdem methodis tractatur, quibus supra usi sumus. Verum, quia non semper expedit alterutram ex indeterminatis ab æquatione arcere, fac advertas dum formula differentiat ad inveniendam proportionem $dx : dy$, necesse esse, ut in peculiari casu, quo de agimus, evanescant quantitates tum quæ multiplicant dx , tum quæ multiplicant dy : aliter neque numerator, neque denominator fractionis $= 0$. Dum differentia modo vulgari accipiuntur, omittuntur omnes illi termini, in quibus summa exponentium quantitatum dx , dy superant unitatem, quia respectu eorum, qui retinentur sunt infinite parvi. Sed in præfenti casu quoniam tam dx , quam dy multiplicatur per 0 , termini illi nulla ratione omitti possunt, quia non amplius sunt infinitesimi respectu eorum, qui æquationem constituunt. Si illos in computum deducas, verum valorem proportionis $dx : dy$ obtinebis terminis finitis.

Hanc ob rem nihil aliud requiritur, quam pro x , & y substituere in æquatione $x \pm dx$, & $y \pm dy$: tum terminis finitis deletis, qui propter æqualitatem se destruant, instituire æquationem inter eos terminos, in quibus dx , dy unicum dimensionem obtinent, reliquis omissis horum respectu infinitesimis. Si vero per certam determinationem ex contrarietate signorum hi destruantur, constituatur æquatio inter eos terminos, qui primo non se se elidunt: ex qua æquatione veram proportionem $dx : dy$ elicies.

In exemplum primo adduco æquationem propositam a

Saurino homine clarissimo in Ac. reg. 1716, quæ est huiusmodi

$y^4 - 8y^3 - 12xy^2 + 16y^2 + 48xy + 4xx - 64x = 0$.
In hac substituo pro y , $y + dy$, pro x , $x + dx$, & provenit

$$\begin{aligned}
 & y^4 + 4y^3 dy + 6y^2 dy^2 + 4y dy^3 + dy^4 \\
 & - 8y^3 - 24y^2 dy - 24y dy^2 - 8dy^3 \\
 & - 12xy^2 - 24xy dy - 12x dy^2 - 12dx dy^2 \\
 & \quad - 12y^2 dx - 24y dy dx \qquad \qquad \qquad = 0 \\
 & + 16y^2 + 32y dy + 16dy^2 \\
 & + 48xy + 48x dy + 48dx dy \\
 & \quad + 48y dx \\
 & + 4xx + 8x dx + 4dx^2 \\
 & - 64x - 64dx.
 \end{aligned}$$

Ad inveniendam proportionem inter dx , dy , sufficit secunda columna: nam reliquæ sunt respectu eius infinitesimæ. Verum si $y=2$, $x=2$ (hi enim, ut demonstravit Saurinus, sunt valores respondentes) invenietur tam dx , quam dy multiplicari per 0: ergo ad tertiam columnam confugiendum erit, quæ relictis ceteris respectu eiusdem infinitesimis, quæsitum valorem dabit. Substituto autem 2 tum pro x , tum pro y , invenies factò calculo $dx^2 = 8dy^2$, five

$$\frac{+1}{2\sqrt{2}} = \frac{dy}{dx}. \text{ Q. E. I.}$$

Exemplum alterum desumam ab æquatione pariter a Saurino proposita: nimirum

$x^4 - ayx^2 + by^3 = 0$. Substituo $x + dx$, & $y + dy$ pro x , & y , & erit

$$\begin{aligned}
 & x^4 + 4x^3 dx + 6x^2 dx^2 + 4x dx^3 + dx^4 \\
 & - ayx^2 - 2ayx dx - ay dx^2 - adx^2 dy \\
 & \quad - ax^2 dy - 2ax dx dy \qquad \qquad \qquad = 0 \\
 & + by^3 + 3by^2 dy + 3by dy^2 + bdy^3.
 \end{aligned}$$

Si fiat $x=0$, $y=0$, hi enim valores sibi invicem respondent, non minus columna secunda, quam tertia ex contrarietate signorum destruitur; quare assumenda erit quarta, & instituenda æqualitas $4x dx^3 - adx^2 dy + bdy^3 = 0$, in qua dele-

deleto primo termino, qui multiplicatur per $x = 0$, fit $adx^2 dy = bdy^3$; ex qua hi valores eruuntur $dy = 0$, & $\frac{dy}{dx} = \frac{\pm \sqrt{a}}{\sqrt{b}}$: qui valores conveniunt proportioni $dy : dx$.

Sapienter animadvertit Saurinus tum proportionem $dx : dy$ exprimi per fractionem $= \frac{0}{0}$, quum quæritur pro illis punctis, in quibus plures eiusdem curvæ rami se intersecant. Quare quum proportio quæsitæ tot habeat valores, quot sunt rami se intersecantes, non potest sane exprimi ab æquatione, in qua dx , & dy ad unicam tantum dimensionem ascendant; sed necessaria est æquatio, in qua summa exponentium dx , dy sit æqualis numero ramorum se intersecantium. Quid autem præstat analysis in hac hypothesis? Ad nihilum redigit omnes illos terminos, in quibus summa exponentium dx , dy est minor, quam par est; ut æquatio constituta inter illos terminos, in quibus dx , dy congruam obtinent dimensionem, si resolvatur, tot exhibeat valores, quot sunt rami eiusdem curvæ se intersecantes.

Nunc vero perpendendum esse iudico, in utraque æquatione, quam facta substitutione nacti sumus, si differentietur prima columna obtineri secundam; si, non minus dx , quam dy ut constante considerata, secundæ differentia accipiatur, & dividatur per 2, obtineri tertiam; si tertia differentietur, & dividatur per 3, haberi quartam; si hæc differentietur, & dividatur per 4, haberi quintam: atque ita deinceps, si plures essent. Quapropter proportio, quam quærimus, inveniri potest per methodum differentiationis. Data itaque curvæ æquatio modo vulgari differentietur; hæc dabit, ut notissimum est, proportionem $dx : dy$. Quod si per certam determinationem omnes termini evanescant, differentietur iterum sumptis dx , dy ut constantibus: quæ oriatur æquatio determinabit requisitam proportionem: in eo enim unice a nostra differt, quod habet omnes terminos multiplicatos per 2. Si adhuc evanescat iteretur differentiatio, donec non evanescentem invenias. Multiplicator enim communis omnes terminos æquationis afficiens æqualitatem non turbat.

Nihil reliquum est, nisi ut de peculiari methodo, qua
Sau.

Saurinus utitur, pauca dicam. Iubet scriptor doctissimus ex curvæ æquatione duobus modis disposita primo secundum exponentes y , deinde secundum exponentes x efformari formulas duas. Tum utriusque terminos multiplicat per series arithmeticas duas; primam efformatam ab exponentibus y , alteram ab exponentibus x confectam, & singulos primæ terminos per y dividit, secundæ per x . Atque huiusmodi multiplicationem, ac divisionem toties iterat, donec substitutis pro x , y eorum valoribus, non amplius termini evanescant. Postea, si n numerum exprimat operationum, quæ institutæ sunt, primam multiplicat per dy^n , secundam per dx^n : quod quamquam Saurinus non significat palam, tamen est vel maxime necessarium. Demum omnes terminos utriusque per additionem collectos facit $= 0$: ex qua æquatione proportionem determinat $dx : dy$.

Ad methodum explicandam utor primum ea ipsa æquatione, qua primum antea usus sum, quæ disposita

$$\begin{array}{l} \text{secundum exponentes } y \text{ est} \\ y^4 - 8y^3 - 12xy^2 + 48xy + 4xx \\ + 16y^2 \quad - 64x = 0 \end{array} \left| \begin{array}{l} \text{secundum exponentes } x \text{ est} \\ 4x^2 - 64x + y^4 \\ + 48yx - 8y^3 = 0 \\ - 12y^2x + 16y^2 \end{array} \right.$$

Multiplicentur respective termini per has series arithmeticas

$$\begin{array}{cccccc} \frac{4}{y} & \frac{3}{y} & \frac{2}{y} & \frac{1}{y} & \frac{0}{y} & | & \frac{2}{x} & \frac{1}{x} & \frac{0}{x} \\ & & & & & & & & & & \& \text{erit} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4y^3 - 24y^2 - 24xy + 48x \\ + 3^2y \end{array} \left| \begin{array}{l} 8x - 64 \\ + 48y \\ - 12y^2 \end{array} \right.$$

Quoniam vero, si $y = x = 2$ omnia abeunt in nihilum, iteretur analysis, & fiat ut supra multiplicatio per hasce series

$$\begin{array}{cccc} \frac{3}{y} & \frac{2}{y} & \frac{1}{y} & \frac{0}{y} \\ & & & & | & \frac{1}{x} & \frac{0}{x} \\ & & & & & & & & \& \text{fiet} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 12y^2 - 48y - 24x \\ + 3^2 \end{array} \left| \begin{array}{l} 8 \end{array} \right.$$

Sub.

Substituto valore x , y iam non amplius evanescent quanti-
tates: igitur multiplicata formula prima per dy^2 , altera per
 dx^2 (accipitur exponens 2, quia duæ factæ sunt operatio-
nes) obtinebimus æquationem

$$\frac{12y^2 - 48y - 24x}{+ 3^2} \cdot dy^2 + 8dx^2 = 0.$$

Antequam progredior, confero hanc æquationem cum
illa, quæ ex tertia columna meæ seriei elicitur. Si hæc di-
videretur per 2 differret a nostra per hoc dumtaxat,
quod in hac defunt termini $ydx dy$, $dx dy$. Sed hi in nostra,
substituto valore y , destruuntur; qua de re ex horum termi-
norum defectu nullus error potest suboriri. Verum dubitari
non iniuria potest, utrum similium terminorum defectus in
aliis æquationibus ad parallogismum perduceret. Periculum
faciamus in æquatione secundi exempli

Ea disposita duobus modis est huiusmodi.

$$by^3 - ax^2y + x^4 = 0 \quad | \quad x^4 - ayx^2 + by^3 = 0.$$

Multiplicentur singuli termini per singulos terminos harum
serierum

$$\frac{3}{y} \quad \frac{1}{y} \quad \frac{0}{y} \quad | \quad \frac{4}{x} \quad \frac{2}{x} \quad \frac{0}{x}$$

& fiet

$$3by^2 - ax^2 \quad | \quad 4x^3 - 2ayx.$$

Si harum prima duceretur in dy , altera in dx , & facta
utriusque additione æquaretur 0, nihil differret a secunda
columna meæ formulæ. Sed quoniam si $x = 0$, $y = 0$,
omnes termini æquales fiunt nihilo, fiat denuo multiplica-
tio per series arithmeticas.

$$\frac{2}{y} \quad \frac{0}{y} \quad | \quad \frac{3}{x} \quad \frac{1}{x}$$

& erit

$$6by \quad | \quad 12x^2 - 2ay.$$

Si facta respectiva multiplicatione per dy^2 , dx^2 omnia in
unam

unam summam colligantur, formula proveniens differret a tertia columna meæ seriei, quod habet omnes terminos bis sumptos, & caret termino $axdx dy$. Sed quia in eadem suppositione omnia destruuntur, fiat ut supra multiplicatio per series

$$\frac{1}{y} \quad \left| \quad \frac{2}{x} \quad \frac{0}{x}$$

& oriatur

$$6b \quad \left| \quad 24x$$

Quæ provenit formula, si prima ducatur in dy^3 , altera in dx^3 , & colligantur in summam, habebit terminos sextuplo maiores, quam termini quartæ columnæ nostræ formulæ; præterea abest terminus $adx^2 dy$.

Quoniam tres institutæ sunt operationes, fiat multiplicatio respectiva per dy^3 , dx^3 , & termini collecti in summam = 0. Erit $6bdy^3 + 24x dx^3 = 0$. Quare si fuerit $x = 0$ nihil obtinetur aliud, quam $dy = 0$. Itaque defectus terminorum, quos Saurini methodus negligit, in parallogismum definit.

Non inficior equidem, huiusmodi Saurini methodum facile corrigi posse in hunc modum. Facta prima operatione multiplicentur respectivè formulæ per dy , dx , atque colligantur in summam hac ratione

$3by^2 dy - ax^2 dy + 4x^3 dx - 2ayx dx = 0$. Quæ denuo disponatur primum secundum exponentes y , tum secundum exponentes x

$$3by^2 dy - 2axy dx - ax^2 dy = 0 \quad \left| \quad 4x^3 dx - ax^2 dy - 2ayx dx + 3by^2 dy = 0 \right.$$

Multiplicentur per series

$$\frac{2}{y} \quad \frac{1}{y} \quad \frac{0}{y} \quad \left| \quad \frac{3}{x} \quad \frac{2}{x} \quad \frac{1}{x} \quad \frac{0}{x}$$

& oriatur

$$6bydy - 2axdx \quad \left| \quad 12x^2 dx - 2axdy - 2aydx$$

Prima multiplicetur per dy , & secunda per dx , & omnes termini in unam summam colligantur

$$6bydy^2 - 2axdx dy + 12x^2 dx^2 - 2axdx dy - 2aydx^2 = 0, \text{ in qua}$$

qua nullus deest terminus; sed quoniam si $x = 0$, $y = 0$ omnia evanescunt, disponatur duobus modis, ut antea factum est

$$\begin{array}{l|l} 6bydy^2 - 4axdx dy = 0 & 12x^2 dx^2 - 4axdx dy - 2aydx^2 = 0 \\ -2aydx^2 + 12x^2 dx^2 & + 6bydy^2 \end{array}$$

Multiplicentur termini per series

$$\begin{array}{l|l} \frac{dy}{y} & \frac{0 \cdot dy}{y} & \left| & \frac{2dx}{x} & \frac{dx}{x} & \frac{0dx}{x} \end{array}$$

& fiet

$$\begin{array}{l|l} 6bdy^3 & & \left| & 24xdx^3 - 4adx^2 dy \\ -2adx^2 dy & & & \end{array}$$

Omnes termini collecti dant

$6bdy^3 - 2adydx^2 + 24xdx^3 - 4adydx^2 = 0$. Deleto autem termino, qui multiplicatur per x , est enim $x = 0$, erit

$$6bdy^3 - 6adydx^2 = 0, \text{ quæ dat } dy = 0, \text{ \& } \frac{dx}{dy} = \frac{\pm \sqrt{b}}{\sqrt{a}} : \text{ quem-}$$

admodum a me inventum est. Verum methodus huiusmodi ita correcta, nihil differt a methodo differentiationis.

Quæ autem ad discutiendas geometræ doctissimi dubitationes meditatus sum, eo consilio academiæ communicare constitui, ut eius iudicio, quod facio plurimi, comprobarentur; aut si forte lapsus fuerim, ab erroribus ipsa momente liberarer.

VINCENTII RICCATI

*Animadversiones in formulam differentialem, in qua
indeterminata ad unicam tantum
dimensionem ascendunt.*

I. **E**Xistunt plerique homines sane docti, & in rebus analyticis multum versati, qui arbitrantur in formula differentiali, in qua indeterminata ad unicam solummodo dimensionem ascendunt, quæ-

que ita œcumenice exprimi potest $\overline{ax + b + cy} \cdot dy = \overline{fx + g + by} \cdot dx$, semper indeterminatas posse a se invicem separari, ut illis separatis ad geometricam constructionem deveniatur. Verum si illis dumtaxat utamur methodis, quæ hætenus traditæ sunt ab analystis, puto casum adesse, in quo indeterminatarum separatio nequaquam obtinetur. Ex hisce methodis illas, quæ elegantiores nobis videntur, breviter exponemus, & primum eam formulam œcumenicam eliciemus, in qua non solum incognitæ separatæ inveniuntur, sed etiam integralis differentialis formulæ exhibetur, & res omnis ad exponentialium calculum traducitur.

II. Huiusmodi formula integralis longo quidem, sed non difficili calculo inveniri potest per methodum integrandi sine prævia separatione, qua usus est Ioannes Bernoullius vir toto orbe terrarum clarus in Ac. petrop. t. I. Differentialis formulæ supponatur esse integralis

$\overline{Ax + B + Cy}^{p+q} = M \cdot \overline{Fx + G + Hy}^{p-q}$. A, B, C, F, G, H, p, q sunt quantitates constantes indeterminatæ deinceps per analytica subsidia determinandæ. Quantitas M est constans quæpiam. A numeris transitus fiat ad logarithmos,

& oriatur $\overline{p+q} \cdot \overline{Ax + B + Cy} = \overline{p-q} \cdot \overline{Fx + G + Hy}$.

In

In hac differentia accipiantur, ut fiat

$$\frac{\overline{p+q} \cdot A dx + \overline{p+q} \cdot c dy}{Ax + B + Cy} = \frac{\overline{p-q} \cdot F dx + \overline{p-q} \cdot H dy}{Fx + G + Hy}.$$

Aequatio a divisoribus liberata hanc formam accipit.

$$\begin{aligned} \overline{p+q} \cdot AF x dx + \overline{p+q} \cdot CF x dy & \quad \overline{p-q} \cdot AF x dx + \overline{p-q} \cdot AH x dy \\ \overline{p+q} \cdot AG dx + \overline{p+q} \cdot CG dy & = \overline{p-q} \cdot BF dx + \overline{p-q} \cdot BH dy \\ \overline{p+q} \cdot AH y dx + \overline{p+q} \cdot CH y dy & \quad \overline{p-q} \cdot CF y dx + \overline{p-q} \cdot CH y dy. \end{aligned}$$

Quæ, ut collatio commode institui possit, in hunc modum disponenda est.

$$\begin{aligned} & \overline{p+q} \cdot CF x + \overline{p+q} \cdot CG + \overline{p+q} \cdot CH y \\ & - \overline{p+q} \cdot AH x - \overline{p+q} \cdot BH - \overline{p+q} \cdot CH y \cdot dy = \\ = & \overline{p-q} \cdot AF x + \overline{p-q} \cdot BF + \overline{p-q} \cdot CF y \\ & - \overline{p-q} \cdot AF x - \overline{p-q} \cdot AG - \overline{p-q} \cdot AH y \cdot dx. \end{aligned}$$

III. Iam vero hæc ultima æquatio comparetur cum æquatione data, quæ legitur N. I, & orientur æquationes sex, ex quibus constantium indeterminatarum valores licet determinare.

$$\begin{array}{l|l} 1^a) \overline{p+q} \cdot CF - \overline{p+q} \cdot AH = a & 4^a) -2q \cdot AF = f \\ 2^a) \overline{p+q} \cdot CG - \overline{p+q} \cdot BH = b & 5^a) \overline{p-q} \cdot BF - \overline{p-q} \cdot AG = g \\ 3^a) 2q \cdot CH = c & 6^a) \overline{p-q} \cdot CF - \overline{p-q} \cdot AH = h. \end{array}$$

Quando sex sunt coefficientes determinandi, & duo exponentes, constat, cum de coefficientibus, tum de exponentibus unum posse pro arbitrato determinari.

IV. Ut exponentes p , & q definiantur, huiusmodi ineatur calculus. Multiplica æquationem tertiam per quartam, & habebis

$$7^a) CAFH = \frac{-fc}{4qq}. \text{ Adde primam \& sextam}$$

$$8^a) 2p \cdot CF - 2p \cdot AH = a + b, \text{ five } CF - AH = \frac{a + b}{2p}.$$

Detrahe sextam a prima, & erit

$$9^a) 2q \cdot CF + 2q \cdot AH = a - b, \text{ five } CF + AH = \frac{a - b}{2q}.$$

Addita octava, & nona proveniet

$$10^a) 2CF = \frac{a + b}{2p} + \frac{a - b}{2q}. \text{ Deducta autem octava ex}$$

nona orietur

$$11^a) 2AH = \frac{a - b}{2q} - \frac{a + b}{2p}. \text{ Multiplicetur iam decima per}$$

undecimam, & fiet

$$4ACFH = \frac{a^2 - b^2}{4pq} + \frac{\overline{a - b^2}}{4qq} - \frac{a^2 - b^2}{4pq} - \frac{\overline{a + b^2}}{4pp}; \text{ five}$$

$$4ACFH = \frac{\overline{a - b^2}}{4qq} - \frac{\overline{a + b^2}}{4pp}; \text{ fed ex septima}$$

$$4ACFH = \frac{-fc}{qq}: \text{ ergo}$$

$$\frac{-4fc}{qq} = \frac{\overline{a - b^2}}{qq} - \frac{\overline{a + b^2}}{pp}; \text{ five } \frac{\overline{a + b^2}}{pp} = \frac{\overline{a - b^2}}{qq} + \frac{4fc}{qq}.$$

Igitur $p : q :: \overline{a + b} : \sqrt{\overline{a - b^2} + 4fc}$; quare si ponatur $p = \overline{a + b}$, erit $q = \sqrt{\overline{a - b^2} + 4fc}$; quæ duæ æquationes valores exponentium determinant.

V. Antequam progrediar, opportunum iudico definire valores G, B ex aliis constantibus indeterminatis. Ex æquatione secunda erit

$$B = \frac{\overline{p + q} \cdot CG - b}{\overline{p - q} \cdot H}; \text{ ex quinta } B = \frac{\overline{p + q} \cdot AG + g}{\overline{p - q} \cdot F}. \text{ Igi-}$$

$$\text{tur } \frac{\overline{p + q} \cdot CG - b}{H} = \frac{\overline{p + q} \cdot AG + g}{F}. \text{ Quare } \frac{\overline{p + q}}{\overline{CFG}}.$$

$$\overline{CFG - AHG} = bF + gH. \text{ Igitur } G = \frac{bF + gH}{p + q \cdot CF - AH} : \text{ atque}$$

$$\text{ex decima, \& undecima constat } CF - AH = \frac{a + b}{2p} = \frac{1}{2}$$

$$\text{substituto valore } p : \text{ ergo } G = \frac{2bF + 2gH}{p + q} =$$

$$\frac{2bF + 2gH}{a + b + \sqrt{a - b^2} + 4fc} \text{ si pro } p, q \text{ valores inventos N. IV}$$

substituas. Simili ratione, & calculo invenies valorem B,

$$\text{scilicet } B = \frac{-2bA - 2gC}{a + b - \sqrt{a - b^2} + 4fc}.$$

VI. Hisce inventis ex quarta nancisceris $F = \frac{-f}{2Aq} =$

$$\frac{-f}{2A\sqrt{a - b^2} + 4fc}. \text{ Item ex decima } F = \frac{a + b}{4Cp} + \frac{a - b}{4Cq} =$$

$$\frac{a - b + \sqrt{a - b^2} + 4fc}{4C\sqrt{a - b^2} + 4fc} : \text{ ergo } \frac{-f}{A} = \frac{a - b + \sqrt{a - b^2} + 4fc}{2C} ;$$

$$\text{ergo } A : C :: \frac{-f}{a - b + \sqrt{a - b^2} + 4fc} : \frac{1}{2}. \text{ Igitur si fiat}$$

$$A = \frac{-f}{a - b + \sqrt{a - b^2} + 4fc} \text{ erit } C = \frac{1}{2}. \text{ Tum ex quar-}$$

$$\text{ta } F = \frac{a - b + \sqrt{a - b^2} + 4fc}{2\sqrt{a - b^2} + 4fc}. \text{ Demum ex secunda } H =$$

$$\frac{c}{\sqrt{a - b^2} + 4fc}. \text{ Hisce valores introduc in formulas ex-}$$

pri-

primentes valores B, G, quæ habentur N. V, & erit

$$G = \frac{b \cdot a - b + \sqrt{a - b^2 + 4fc} + 2gc}{a + b + \sqrt{a - b^2 + 4fc} \cdot \sqrt{a - b^2 + 4fc}}, \text{ \&}$$

$$B = \frac{2bf - g \cdot a - b + \sqrt{a - b^2 + 4fc}}{a + b - \sqrt{a - b^2 + 4fc} \cdot a - b + \sqrt{a - b^2 + 4fc}}$$

Itaque hisce valoribus substitutis habebitur integralis formulæ datæ

$$\frac{-fx}{a - b + \sqrt{a - b^2 + 4fc}} + \frac{2bf - g \cdot a - b + \sqrt{a - b^2 + 4fc}}{a + b - \sqrt{a - b^2 + 4fc} \cdot a - b + \sqrt{a - b^2 + 4fc}} + \frac{\frac{3}{2}y}{a + b + \sqrt{a - b^2 + 4fc}} =$$

$$= M \cdot \frac{x \cdot a - b + \sqrt{a - b^2 + 4fc}}{2\sqrt{a - b^2 + 4fc}} + \frac{b \cdot a - b + \sqrt{a - b^2 + 4fc} + 2gc}{a + b + \sqrt{a - b^2 + 4fc} \cdot \sqrt{a - b^2 + 4fc}} + \frac{cy}{\sqrt{a - b^2 + 4fc}}$$

VII. Huiusmodi integram formulam non attente consideranti videri facile poterit, proposita differentialis formula integrationem semper admittere, aut ad formulam reduci præditam exponentibus constantibus. Verum si recte advertes, invenies plures esse casus, ad quos integralis formula nequaquam pertinet.

VIII. Primo omnium pone $\overline{a - b^2} = -4fc$ ita, ut $\sqrt{a - b^2 + 4fc} = 0$, quæ suppositio applicata inventæ integrali dabit $\frac{x \cdot a - b}{2} + \frac{b \cdot a - b + 2gc}{a + b} + cy = 0$. Hanc æqua-

tionem satisfacere propositæ æquationi differentiali experienti palam fiet. Verum, ut paullo infra, nempe N. XV, constabit, aliam methodum in usum traducens plane cognovi, præter lineam rectam, quæ ab ultima æquatione ex-
pri-

primitur, alias quoque curvas ad nostram differentialem pro hac hypothese pertinere.

IX. Deinceps si $\sqrt{a-b^2+4fc}$ sit quantitas imaginaria, quod eveniet, ubi alterutra ex speciebus f, c sit negativa, & rectangulum fc sit maius quarta parte quadrati $a-b$; formula omnis cum in exponentibus, tum in coefficientibus abundat quantitatibus imaginariis, quas quomodo expellas non video, neque fortasse expellere poteris, nisi ad formulam differentialem regrediaris. Quapropter pro hac hypothese integralis inventa est prorsus inutilis, neque ad ullam nos constructionem perducit.

X. Hæc autem ab aliis animadversa fuisse non ignoramus; & vulgo notum, in suppositione N. VIII integrationem formulæ ad hyperbolæ quadraturam pertinere; in N. IX suppositione etiam ad circuli quadraturam: quam rem alia adhibita methodo patefaciam. Verum alia adest suppositio, in qua res nondum perfecta est, neque constat quo pacto ex formula differentiali curvam construamus. Ea autem est, quum $fc = ab$; qua in hypothese liquet

$\sqrt{a-b^2+4fc} = a+b$. Quid autem in hac hypothese eveniet nostræ integrali? Nimirum illa, rite operatione instituta,

ta, in hanc mutabitur. $\frac{2fb-2ga}{o.a} + y = \frac{M^{\frac{1}{2a+2b}} + fx}{a}$, quæ

ad nullam deducere constructionem potest, propterea quod in illa addenda est y quantitati constanti infinitæ. Quæ hypothesis casum complectitur absolute integrabilem, quum scilicet $a = -b$, seu $a+b=0$.

XI. Quæ quum ita sint, tametsi integralis inventa sæpenuero utilitati esse possit, tamen in casibus, quos illa nequaquam attingit, alia methodo uti, necessarium est. Quapropter singulatim omnia contemplanſ aio primo, æquationem ubique fore integrabilem, quotiescumque $a = -b$. Nam transpositis terminis erit $a \cdot xdy + ydx + bdy + cydy = fxdx + gdx$: quæ integrata dat $A + axy + by + cy^2$

$\frac{cy^2}{2} = \frac{fx^2}{2} + gx$. Hanc autem æquationem ad conicas sectiones pertinere, nemo unus est, qui ignoret. Imo si $fc = ab$, de quo casu mentionem fecimus N. X, sive in hac hypothesisi si $fc = -aa$, erit ad parabolam. Quantitas A est constans addita in integratione.

XII. Deinceps aio, si $fb = ag$, obtineri indeterminatarum separationem ope substitutionis $fx + g + by = zy$.

Namque transpositis terminis erit $x = \frac{-g - by + zy}{f}$: igitur

differentiando $dx = \frac{-bdy + zdy + ydz}{f}$; factisque opportu-

nis substitutionibus nostra formula mutabitur in hanc

$$-\frac{ga}{f} dy - \frac{ab}{f} ydy + \frac{azydy}{f} = \frac{-bzydy}{f} + \frac{z^2ydy}{f} + \frac{y^2zdz}{f} + bdy + cydy$$

Deletis autem primis terminis, qui ex suppositione $fb = ag$ destruuntur, factisque necessariis operationibus formula in hanc mutabitur

$$\overline{ab - cf} \cdot -ydy - \overline{a - b} \cdot -zydy + z^2 \cdot -ydy = y^2 z dz,$$

sive $\frac{-dy}{y} = \frac{zdz}{zz - z \cdot \overline{a + b} + ab - cf}$, in qua inveniuntur

incognitæ separatæ. Si sit $a = -b$ utrumque æquationis membrum ad logarithmos pertinebit, ex quibus si ad numeros fiat transitus, inveniatur æquatio N. XI nostræ hypothesisi accommodata.

XIII. Ut inventa formula ad magis notas redigatur,

$$\text{fiat } zz - z \cdot \overline{a + b} + \frac{\overline{a + b}^2}{4} = tt: \text{ igitur } z + \frac{a + b}{2} = t,$$

& $dz = dt$, factisque necessariis substitutionibus obtinebimus

$$\frac{-dy}{y} = \frac{tdt + dt \cdot \frac{a+b}{2}}{tt - \frac{\overline{a+b}^2}{4} + ab - cf} = \frac{tdt + dt \cdot \frac{a+b}{2}}{tt - \frac{\overline{a-b}^2}{4} - cf}.$$

XIV.

XIV. Tres iam casus oportet distinguere. Aut enim

$\frac{\overline{a-b^2}}{4} + cf$ est quantitas positiva, aut $= 0$, aut negativa.

Sit primo quantitas affirmativa, eaque fiat $= mn$. Item fiat

$\frac{a+b}{2} = m$. Quare formula in hanc mutabitur $\frac{-dy}{y} =$

$\frac{tdt + mdt}{tt - nn} = \frac{m+n}{2n} \cdot \frac{dt}{t-n} + \frac{n-m}{2n} \cdot \frac{dt}{t+n}$. Quæ omnia

integrata per logarithmos dant $lA - ly = \frac{m+n}{2n} l\overline{t-n} +$

$\frac{n-m}{2n} l\overline{t+n}$, & facto transitu a logarithmis ad numeros

$\frac{A}{y} = \overline{t-n}^{\frac{m+n}{2n}} \cdot \overline{t+n}^{\frac{n-m}{2n}}$. Huic autem formulæ si recte

substitutiones adhibeantur, orietur

$A^{2n} = \overline{fx + g + \frac{b-a}{2}y - ny}^{m+n} \cdot \overline{fx + g + \frac{b-a}{2}y + ny}^{n-m}$

non dissimilis illi, quam per primam methodum universalius invenimus N. VI. In hac itaque hypothesi curva aut algebraica est, aut exponentialis.

XV. Ad alterum casum accedo, in quo $\frac{\overline{a-b^2}}{4} + cf = 0$.

In hoc formula ita se se habet $\frac{-dy}{y} = \frac{tdt + mdt}{t^2}$, sive

$\frac{dy}{y} + \frac{dt}{t} = \frac{-mdt}{t^2}$. Huic formulæ, ut ab aliis demonstratum

est, duplex æquatio satisfacit, altera quæ sine integratione, altera quæ per integrationem obtinetur. Prima est $yt =$

0 , sive per substitutiones regrediendo $yz - y \cdot \frac{a+b}{2} = 0$,

sive $fx + g + by - y \cdot \frac{a+b}{2} = fx + g + y \cdot \frac{b-a}{2} = 0$, quæ

prorsus eadem est cum illa, quam per primam methodum invenimus N. VIII, dummodo præsentī accommodetur hypothesi. Quæ autem per integrationem obtinetur, est huiusmodi

$$-lA + ly + lt = \frac{m}{t}, \text{ quæ dependet a sola hyperbolæ quadratura.}$$

XVI. Demum si $\frac{a-b^2}{4} + cf$ est quantitas negativa, hoc est $= -nn$, hoc pacto disponatur æquatio $\frac{-dy}{y} = \frac{tdt}{tt + nn} + \frac{m}{n} \cdot \frac{ndt}{tt + nn}$: quæ integrata exhibet $lA - ly = l\sqrt{tt + nn} + \frac{m}{n}$. in arcum circulare, cuius radius $= n$,

tangens $= t$. Quapropter in hoc casu æquatio dependet cum a circuli, tum ab hyperbolæ quadratura.

XVII. Præterea aio, in suppositione $cg = hb$ obtineri indeterminatarum separationem, si utaris substitutione $ax + b + cy = zx$, & indeterminatam x ab æquatione expellas. Quoniam idem est calculus, eademque confectaria ac in hypothesi superiore, libenter omnia omitto, atque analystis relinquo.

XVIII. Postea aio, ubi nulla ex prædictis æqualitatibus locum habeat, faciendam esse prius huiusmodi substitutionem

$$y = z + \frac{fb - ag}{ab - fc}, \text{ atque adeo } dy = dz. \text{ Hac autem}$$

substitutione facta orietur æquatio

$$axdz + bdz + zdz = fxdx + gdx + bzd, \\ + \frac{c \cdot fb - ag}{ab - fc} \cdot dz + \frac{b \cdot fb - ag}{ab - fc} \cdot dx$$

in qua adsunt conditiones secundæ hypothesi, quæ N. XII habetur, ut patebit consideranti æquales esse huiusmodi

$$\text{quantitates } fb + \frac{fc \cdot fb - ag}{ab - fc}, \text{ } ag + \frac{ab \cdot fb - ag}{ab - fc}. \text{ Proinde}$$

per

per methodum secundæ hypothesis constructur, & eadem elicientur confectaria.

XIX. Denique aio per substitutionem $x = z + \frac{cg - hb}{ab - fc}$

oriri æquationem præditam conditione hypothesis tertiæ, nempe N. XVII, atque adeo in suis indeterminatis separabilem.

XX. Obtinuimus itaque indeterminatarum separationem casu illo dumtaxat excepto, ubi $ab = fc$: quo in casu nisi adsit altera ex conditionibus, quæ continentur N. XII, XVII, substitutio, qua utimur, implicat quantitates infinitas, atque adeo analyseos subsidia inutilia reddit.

XXI. Ad separandas indeterminatas in proposita formula possem quoque alia methodo uti, quam paucis exponam. Fiat $x = z + A$, & $y = u + B$. A, B sunt quantitates constantes determinandæ in operationis progressu. Factis substitutionibus oritur æquatio

$$\begin{aligned} azdu + aAdu + cudu &= fzdz + fAdz + budz \\ + b du &+ g dz \\ + cB du &+ bBdz. \end{aligned}$$

Per determinationem duarum constantium A, B eiicio ab æquatione utriusque partis secundos terminos ponens $aA + b + cB = 0$, $fA + g + bB = 0$, ex quibus oritur $A = \frac{cg - hb}{ab - fc}$, $B = \frac{fb - ag}{ab - fc}$. Hinc æquatio erit $azdu + cudu =$

$fzdz + budz$: quæ, quum in omnibus terminis habeat indeterminatas ad eandem potestatem elevatas, pertinet ad canonem Gabrielis Manfredii hominis doctissimi. Quare fiet

$$\begin{aligned} u = sz, \text{ \& post non ita multas operationes inveniemus } & \frac{-dz}{z} \\ = \frac{ads + csds}{cs^2 + as - bs - f}. \end{aligned}$$

Ex qua formula prorsus eadem confectaria elicies, quæ supra commemoravimus.

XXII. Verum neque hæc methodus quidquam prodest, dum $ab = fc$. Si in hac hypothesis foret etiam $ag = fb$, ex quibus duabus hypothesis tertia elicitur, nempe $hb = cg$,

res esset per se patens. Nam nostra æquatio rite disposita hanc formam indueret

$axdy + bdy + cydy = \frac{f}{a} \cdot \overline{axdx + bdx + cydx}$, quæ dividi potest per $ax + b + cy$, eaque divisa oriatur $dy = \frac{fdx}{a}$, quæ integrata dat $A + y = \frac{fx}{a}$. Duæ itaque æquationes propositæ faciunt satis, nempe $ax + b + cy = 0$, & $A + y = \frac{fx}{a}$.

XXIII. Verum quando in hypothesi $ab = fc$, quantum quidem scio, res nondum confecta est; ad separandas incognitas methodo usus sum non ita usitata, quæ me voti compotem effecit. Traditam æquationem hac ratione dispono

$x = \frac{y \cdot \overline{bdx - cdy}}{ady - fdx} + \frac{gdx - bdy}{ady - fdx}$. Utor substitutione

$x = Sdy$, & $dx = tdy$, & erit $Sdy = y \cdot \frac{htdy - cdy}{ady - ftdy} + \frac{gtdy - bdy}{ady - ftdy}$, sive $Sdy = y \cdot \frac{ht - c}{a - ft} + \frac{gt - b}{a - ft}$. Accommode-

mus formulam nostræ hypothesi, & cum sit $b = \frac{fc}{a}$, facta

substitutione, habebimus $Sdy = y \cdot \frac{fct - ac}{a \cdot a - ft} + \frac{gt - b}{a - ft} = \frac{-cy}{a} + \frac{gt - b}{a - ft}$. & differentiando ita, ut D designet diffe-

rentialem quantitatis subsequentiæ $tdy + \frac{cdy}{a} = D \frac{gt - b}{a - ft}$,

sive $dy = \frac{1}{t + \frac{c}{x}} D \frac{gt - b}{a - ft}$, in qua inveniuntur incognitæ separatæ.

XXIV. Quantitas, quæ sita est sub signo D differentietur,

tur, & erit $dy = \frac{ga - fb}{f} \cdot \frac{dt}{t + \frac{c}{a} \cdot \frac{a}{f} - t^2}$. Antequam pro-

gredior adverto, quid eveniat in suppositione $\frac{-c}{a} = \frac{a}{f}$;

tunc enim formula mutabitur in hanc $dy = \frac{ga - fb}{f} \cdot \frac{-dt}{\frac{a}{f} - t^2}$;

igitur integrando $y = A + \frac{ga - fb}{f} \cdot \frac{-1}{2 \cdot \frac{a}{f} - t^2}$, & $t dy =$

$dx = \frac{ga - fb}{f} \cdot \frac{-t dt}{\frac{a}{f} - t^2}$, & integrando

$x = B + \frac{ga - fb}{f} \cdot \frac{-a}{2f \cdot \frac{a}{f} - t^2} + \frac{1}{\frac{a}{f} - t}$.

XXV. Inveni valores indeterminatarum x , y , qui algebraice dantur per t , ostendunt curvam esse algebraicam; imo facto calculo inveniemus esse sectionem conicam. Et quamquam in casu $ga - fb = 0$ formulæ videantur deficere, tamen facto calculo reperies æquationem ad lineam rectam, quæ altera est ex supra traditis, ubi pro hoc casu

æquationem examinavimus. Verum hypotheses duæ $b = \frac{fc}{a}$, & $\frac{-c}{a} = \frac{a}{f}$ evidenter inferunt tertiam $a = -b$: qua in hypothesi propositam formulam semper integrabilem esse monstravimus N. XI.

XXVI. Quare hac hypothesi omiſſa universaliter formulam tractemus: quod ut facilius fiat, ponatur $\frac{ga - fb}{f}$

$= m$, $\frac{c}{a} = p$, $\frac{a}{f} = q$, ita ut sit $dy = \frac{m dt}{t + p \cdot q - t^2}$, quæ

iuxta

iuxta notas methodos tractata, exhibet $dy = \frac{mdt}{p+q^2 \cdot p+t}$
 $+ \frac{mdt}{p+q^2 \cdot q-t} + \frac{mdt}{p+q \cdot q-t}$. Integretur $y = lA +$
 $l\sqrt{p+t} - l\sqrt{q-t} + \frac{m}{p+q \cdot q-t}$ sumptis logarithmis in logisti-
 ca, cuius subtangens $= \frac{m}{p+q}$.

XXVII. Itaque si ope logarithmicæ describamus cur-
 vam respondentem ultimæ æquationi, in qua t sint ordina-
 tæ, y abscissæ, spatium inter curvam, & coordinatas com-
 prehensum divisum per unitatem $= x = Stdy$. Verum hoc
 spatium, atque adeo valor x per logarithmos invenietur.

Est enim $t dy = dx = \frac{mtdt}{p+q^2 \cdot t+p} + \frac{mtdt}{p+q^2 \cdot q-t} +$
 $\frac{mtdt}{p+q \cdot q-t^2}$, five $dx = \frac{mdt}{p+q^2} - \frac{mpdt}{p+q^2 \cdot t+p} - \frac{mdt}{p+q^2} +$
 $\frac{mqdt}{p+q^2 \cdot q-t} - \frac{mdt}{p+q \cdot q-t} + \frac{mqdt}{p+q \cdot q-t^2}$. Nam si sum-
 mentur singula terminorum paria, redibit superior æqua-
 tio. Ultima æquatione expurgata erit $dx = -\frac{mpdt}{p+q^2 \cdot t+p}$
 $- \frac{mpdt}{p+q^2 \cdot q-t} + \frac{mqdt}{p+q \cdot q-t^2}$, quæ integrata sumptis lo-
 garithmis in eadem, qua supra logistica, fiet $x = -p\sqrt{t+p}$
 $+ p\sqrt{q-t} + lB + \frac{mq}{p+q \cdot q-t}$.

XXVIII. Hæc methodus ubique constructionem suppe-
 ditabit. Verum elegantius fortasse fiet, si vulgari methodo
 præ-

prætermiffa aliam fequamur rei noſtræ accommodatiſſimam.

Inventa iam eſt æquatio N. XXIII $dy = \frac{1}{t + \frac{c}{a}} D \frac{gt - b}{a - ft}$, ex

qua oritur $t dy = dx = \frac{t}{t + \frac{c}{a}} D \frac{gt - b}{a - ft}$. Fiat $\frac{gt - b}{a - ft} = z$

$\frac{1}{t + \frac{c}{a}} = u$, & $\frac{t}{t + \frac{c}{a}} = w$. Igitur erit $dy = u dz$, & $dx = w dz$.

XXIX. Nihil iam reliquum eſt, niſi ut videamus ad quas quadraturas pertineant formulæ udz , $w dz$. Aio utramque ad hyperbolam inter aſſymptotos pertinere. Etenim, ſi

utaris formulis ſuppoſitis N. ſuperiore, invenies $t = \frac{az + b}{g + fz}$,

$t = \frac{a - cu}{au}$, demum $t = \frac{cw}{a - aw}$: ergo $\frac{az + b}{g + fz} = \frac{a - cu}{au}$,

$\frac{az + b}{g + fz} = \frac{cw}{a - aw}$. Porro utraque æquatio pertinet ad hy-

perbolam inter aſſymptotos. Hac autem ratione conſtruitur.

XXX. Rectæ Aa, Qq ſe ſe ad angulum rectum interfecent in puncto C. Sumatur $CA = Ca = \frac{ag - bf}{aa + fc}$, cui normales excitentur $AB = ab = \frac{aa}{aa + fc}$, & inter aſſymptotos

Qq, Aa deſcribantur hyperbolæ oppoſitæ tranſeuntes per puncta B, b. Sumatur $CD = \frac{ab + cg}{aa + fc}$, & $CE = \frac{af}{aa + fc}$, &

per E agatur EGT, per D ducatur FDG paralleleæ aſſymptotis: erunt $GT = z$, $TS = u$. Ergo ſpatium FGTS = $Sudz = y$ addita ſi lubet, vel detracta aliqua conſtante.

XXXI.

XXXI. Tum fumatur $EK = AB = \frac{ad}{aa + fc}$, & per K agatur hKH parallela aA, quæ concurrat cum AB, ab in punctis H, h. Normales eidem excitentur $HI = hi = \frac{ac}{a^2 + fc}$,

& per puncta I, i describantur inter assymptotos Hh, Qq hyperbolæ oppositæ, quarum altera concurrat cum FG in L: erunt $GT = z$, & $TY = w$, & spatium $LGTY = Sw dz = dx$: quibus iam inventis nihil difficile est supposita hyperbolæ quadratura requisitam curvam describere, cuius progressus pro varia coefficientium proportione varius evadet.

XXXII. Hoc genus constructionis videtur locum non habere ubi $aa + fc = 0$; nam omnes hyperbolarum parametri infiniti evadunt. Verum in hoc casu hyperbolæ transeunt in lineas rectas, uti apparet ex formulis harum curvarum descriptis N. XXIX, quæ in ea hypothese transeunt in formulas linearum rectarum. Sed hunc casum iam pertractavimus N. XXIV. Si autem $a = 0$ nostra constructio deficeret quidem, sed advertendum est tunc b fieri infinitam propter æquationem, quam supponimus, $b = \frac{fc}{a}$. Quod

si non minus a , quam $c = 0$, formula eadem methodo pertractata ad absolutam separationem perduceretur. Quod si cum a , tum $f = 0$, cui etiam si vis adde $c = 0$, res nihil haberet difficultatis.

XXXIII. Dixi, existentibus non minus a , quam $c = 0$, formulam eadem ratione pertractatam ad separationem perducere, & ad idem genus constructionis: quod quamquam facile est, tamen breviter calculum indicabo. Aequatio enim huic casui accommodata est huiusmodi $Stdy = \frac{-by}{f}$

$\frac{gt + b}{ft}$. Ergo differentiando $tdy + \frac{bdy}{f} = D. - \frac{gt + b}{ft}$, five

$dy = \frac{f}{ft + b} D. - \frac{gt + b}{ft}$, & $tdy = dx = \frac{ft}{ft + b} D. - \frac{gt + b}{ft}$:
ad

ad quas formulas quum sit æquatio perducta, nihil iam difficile erit ope duarum hyperbolarum ex nostra ratione constructionem absolvere.

XXXIV. Unicus casus reliquus est, ad quem huiusmodi constructio nequaquam se extendit, quum scilicet $ag - bf = 0$: sed hic casus coniunctus cum casu nostræ hypothesis $ab = fc$, qui trahunt tertium $bb = cg$, pertractatus est N. XXII.

XXXV. Si æquationem nostram hac ratione disposuissem $y = x \cdot \frac{ady - fdx}{bdx - cdy} + \frac{bdy - gdx}{bdx - cdy}$, & posuissem $y = Stdx$,

eodem prorsus calculo ad separationem deveniretur. Casus autem, quo frustraretur methodus, est, quum $bb - gc = 0$, qui prorsus coincidit cum casu methodi superioris, qui descriptus est N. XXXIV.

XXXVI. Quamquam nostra hæc methodus maxima simplicitate, & elegantia ornata est in hypothesis $ba = fc$, cui illam accommodavimus; quæ hypothesis frustra alia ratione tentatur: tamen etiam extra hanc hypothesis separationem indeterminatarum obtinet; quod breviter indicare sufficiet. Repeto itaque æquationem $x = y \cdot \frac{bdx - cdy}{ady - fdx}$

$$+ \frac{gdx - bdy}{ady - fdx}. \text{ Fiat } x = Stdy, \text{ \& erit } Stdy = \frac{y \cdot \overline{bt - c}}{a - ft} + \frac{gt - b}{a - ft},$$

quæ differentiata dat $tdy = \frac{dy \cdot \overline{bt - c}}{a - ft} + yD \frac{bt - c}{a - ft}$

$$+ D \frac{gt - b}{a - ft}, \text{ sive } \frac{dy}{y} = \frac{a - ft}{at - ft^2 - bt + c} D \frac{bt - c}{a - ft} + \frac{a - ft}{y \cdot at - ft^2 - bt + c} D \frac{gt - b}{a - ft}.$$

Fiat $\frac{a - ft}{at - ft^2 - bt + c} D \frac{bt - c}{a - ft} = \frac{-ds}{s}$, & s dabitur saltem trascendenter per t , & erit

$$\frac{dy}{y} + \frac{ds}{s} = \frac{a - ft}{y \cdot at - ft^2 - bt + c} D \frac{gt - b}{a - ft}. \text{ Ponatur}$$

$$\frac{dy}{y} + \frac{ds}{s} = \frac{du}{u}, \text{ \& } ys = u, \text{ \& } y = \frac{u}{s}, \text{ quibus substitutis erit}$$

$$\frac{du}{u} = \frac{a - ft \cdot s}{u \cdot at - ft^2 - bt + c} D \frac{gt - b}{a - ft}, \text{ five}$$

$$du = \frac{a - ft \cdot s}{at - ft^2 - bt + c} D \frac{gt - b}{a - ft} \text{ cum incognitis separatis.}$$

XXXVII. Eadem methodus ad separationem duxisset, si positum fuisset $dy = S dx$. Sed hæc satis est indicasse. Quibus omnibus rite perpenſis apparebit, nullum esse casum, in quo in proposita differentiali æquatione indeterminatæ separari non possint; imo non paucos esse casus, qui pluribus rationibus absolvuntur.

ADDITAMENTUM.

XXXVIII. Methodus, qua usus sum ad obtinendam indeterminatarum separationem in ultimo casu propositæ formulæ, omnibus formulis accommodari potest, quæ in hac æquatione œcumenica continentur $x = yM + aN$, in qua M, N dari supponuntur per dx, dy , & constantes. Primo quidem si $M = 0$, res ita liquido constat, ut nullus sit dubitationi locus. Quare hoc omisso id demonstrandum aggredior de formula omnibus terminis constante. Quam ob rem hoc mihi præmittendum est.

XXXIX. Si in formula $Mdx + yNdx = dy$ dentur M, N quocumque modo per x , & constantes, indeterminatæ semper poterunt separari. Nam dividatur æquatio per y ,

$$\text{\& fiet } \frac{Mdx}{y} = \frac{dy}{y} - Ndx. \text{ Ponatur } Ndx = \frac{dz}{z}, \text{ atque adeo}$$

$SNdx = lz$; quare z data erit saltem transcendenter per x .

$$\text{Peracta substitutione erit } \frac{Mdx}{y} = \frac{dy}{y} - \frac{dz}{z}. \text{ Ponatur } \frac{dy}{y} - \frac{dz}{z} = dt$$

$= \frac{dt}{t}$, five $\frac{y}{z} = t$, & factis substitutionibus orietur $\frac{Mdx}{zt} =$

$\frac{dt}{t}$, five $\frac{Mdx}{z} = dt$, in qua, quum z detur per x , inco-

gnitæ separatæ inveniuntur.

XL. Separata hac formula quemadmodum plures Geometræ docuerunt, venio ad formulam $x = yM + aN$, in qua M, N datæ supponuntur per dx, dy , & constantes. Adverte oportere ut in quantitatibus M, N differentialia nullius sint dimensionis; si enim secus esset, lex omogeneorum non conservaretur: ergo si pro dx substituam $t dy$, differentialia ex quantitatibus M, N omnino abibunt. Quapropter pono $x = St dy$, & $dx = t dy$, & factis substitutionibus dx, dy evanescunt in quantitatibus M, N , & solum in eisdem inerit t . Quare æquatio hanc formam accipiet $St dy = yP + aQ$, in qua P, Q dantur tantum per t , & constantes. Sumantur differentia $t dy = P dy + y dP + a dQ$,

aut $dy - \frac{y dP}{t - P} = \frac{a dQ}{t - P}$, in qua æquatione, quum adsint

conditiones N. XXXIX, poterunt indeterminatæ separari. Quare licebit semper construere curvam, in qua y sunt abscissæ, t ordinatæ. Atqui $x = St dy$; idest æqualis spatio curvilineo curvæ modo descriptæ diviso per unitatem: igitur per huiusce quadraturam describetur etiam curva quæsitæ. Quæ quum ita sint liquido constat, æquationes, in quibus x, y unicam dumtaxat obtinent dimensionem, tametsi dx, dy quibuscumque afficiuntur exponentibus integris, aut fractis, separationem indeterminatarum ubique recipere.

XLI. Unum aut alterum exemplum methodum declarabit, & aliquot non spernendis animadversionibus locum

dabit. Data sit æquatio $x = \frac{y dx}{dy} + \frac{a dx^2}{dy^2}$. Fiat $x = St dy$,

& $dx = t dy$, atque peractis necessariis substitutionibus orietur $St dy = yt + at^2$, sumptisque differentiis $t dy = t dy + y dt + 2at dt$, quæ deletis terminis se se destruentibus exhibet $-y dt = 2at dt$. Quum hæc sit divisibilis per dt dat æquationes duas, nimirum $dt = 0$, $-y = 2at$.

XLII. Si primam integremus, habebimus $t = A$: ergo $x = SA dy$, & integrando $x = Ay + B$, quæ pertinet ad lineam rectam. In hac formula duæ constantes inveniuntur, quæ additæ sunt in duabus integrationibus. Verum quum in æquatione construenda non adsint nisi differentialia primi ordinis, videtur unica dumtaxat constans locum habere posse; qua de re altera ex constantibus per alteram determinanda erit. Ut hoc fiat, accipiatur ultima formula $x = Ay + B$, differentietur $dx = A dy$. Hi valores collocentur in formula data $x = \frac{y dx}{dy} + \frac{a dx^2}{dy^2}$, & erit $Ay + B = Ay + aA^2$. Hæc quum debeat esse idemtica, fiet $B = aA^2$. Quare vera integralis erit $x = Ay + aA^2$.

XLIII. Ad alteram æquationem venio, nempe $-y = 2at$, five $t = \frac{-y}{2a}$: ergo $x = S \frac{-y dy}{2a}$: igitur integrando $x = A - \frac{y^2}{4a}$, quæ pertinet ad parabolam apollonianam. Ut determinetur valor constantis A , valores x , & dx substituantur in formula data, & inveniatur $A - \frac{y^2}{4a} = \frac{-y^2}{2a} + \frac{ay^2}{4a^2} = \frac{-y^2}{4a}$, ex qua colligitur $A = 0$: ergo vera formula erit $x = \frac{-y^2}{4a}$.

XLIV. Si data æquatio methodo vulgari tractetur, hoc enim facere possumus, eadem æquationes integrales prodibunt. Namque adhibito opportuno calculo inueniemus $dy = \frac{2ax + y dy}{\sqrt{4ax + yy}}$. Fiat $\sqrt{4ax + yy} = z$, & erit $dy = dz$, & integrando $y + A = z = \sqrt{4ax + yy}$, & $yy + 2Ay + AA = 4ax + yy$: ergo $x = \frac{2Ay + AA}{4a}$, quæ coincidit cum superiore.

riore. Altera æquatio nascitur, si fiat $z = \sqrt{4ax + yy} = 0$:
ergo $4ax = -yy$.

XLV. Hæc proprietas duarum curvarum responden-
tium nostræ æquationi differentiâli, ubique habetur, quum
 y non multiplicatur nisi per $\frac{dx}{dy}$; quia, factò calculo secun-
dum nostram methodum, evanescet dy ex æquatione, quæ
propterea erit divisibilis per dt , quemadmodum quisque
experiendo comperiet.

XLVI. Exemplum alterum desumetur ab æquatione x
 $= \frac{ydx^3 - adx^2 - ady^2}{dy^3}$. Pono $x = Sdy$, & $dx = tdy$, fa-
ctisque necessariis substitutionibus $Sdy = yt^3 - at^2 - a$, &
sumptis differentiis $tdy = t^3 dy + 3yt^2 dt - 2atdt$, sive
 $t - t^3 \cdot dy = 3yt^2 dt - 2atdt$, sive $\frac{dy}{y} - \frac{3tdt}{1-tt} = \frac{-2adt}{y \cdot 1-tt}$.

Ponatur $\frac{dy}{y} - \frac{3tdt}{1-tt} = \frac{dz}{z}$, & integrando $ly + \frac{3}{2} l \sqrt{1-tt}$
 $= lz$, sive $y = \frac{z}{\sqrt{1-tt}^{\frac{3}{2}}}$, & peractis substitutionibus

$$\frac{dz}{z} = \frac{-2adt \cdot \frac{3}{2} \sqrt{1-tt}}{z \cdot 1-tt} = \frac{-2adt \cdot \sqrt{1-tt}}{z} : \text{ergo}$$

$\frac{dz}{2a} = -dt\sqrt{1-tt}$, cuius constructio, ut notum est, de-
pendet a circuli quadratura.

XLVII. Methodus hæc etiam in casibus aliis multis
utilitati esse potest, ubi x solum linearem obtinet dimen-
sionem. Nam si fuerit $x = M$, in qua M detur quomodo-
cumque per y , dx , dy , & constantes, posito $x = Sdy$, &
 $dx = tdy$, factisque substitutionibus, fiet $Sdy = N$, in qua
 N dabitur per x , t , & constantes, neque in ea differen-
tialia locum habebunt. Sumantur differentiæ, & orietur
 tdy

$t dy = dN$, in qua dN dabitur per y , t , dy , dt , & constantes, sed ita, ut differentialia linearem obtineant dimensionem. Si in formula hac inventa methodus existit separandi indeterminatas, ut aliquando accidet, res erit perfecta; sin minus, nostra methodus quoque deficiet. Verumtamen per illam æquatio, in qua differentialia affecta sunt exponentibus quibuscumque integris, vel fractis, reducitur ad æquationem, in qua differentialia linearem tantum obtinent dimensionem.

XLVIII. Exemplum unicum propono. Sit æquatio

$$x = \frac{y dx}{dy} + \frac{ay^2 dx^2}{dy^2} + \frac{by^3 dx^3}{dy^3} + \frac{cy^4 dx^4}{dy^4} \text{ ec.}$$

Fiat $x = S t dy$, & $dx = t dy$, factaque substitutione erit $S t dy = yt + ay^2 t^2 + by^3 t^3 + cy^4 t^4$ ec., & differentiando $t dy = t dy + y dt + 2at^2 y dy + 2ay^2 t dt + 3bt^3 y^2 dy + 3by^3 t^2 dt$ ec. five


$$-y dt = 2at^2 y dy + 2ay^2 t dt + 3bt^3 y^2 dy + 3by^3 t^2 dt \text{ ec.}$$

in qua, quoniam licet separare indeterminatas, utilis est

methodus. Fiat igitur $yt = z$, & $-y = \frac{-z}{t}$, & erit $\frac{-z dt}{t} = 2az dz + 3bz^2 dz + 4cz^3 dz$ ec., five

$$\frac{-dt}{t} = 2adz + 3bz dz + 4cz^2 dz \text{ ec. \& integrando } lA -$$

$lt = 2az + \frac{3}{2}bz^2 + \frac{4}{3}cz^3$ ec., in qua, quando habentur incognitæ separatæ, constructio est in potestate. Hæc dicta volo, ut appareat, non omni methodum utilitate carere.



VINCENTII RICCATI

De centro æquilibrii.

EX multis, ac prope innumeris scriptoribus, qui de re mechanica egerunt, nullus fortasse est, qui de puncto illo verba non fecerit, ex quo si grave suspendas omnia quiescunt in æquilibrio. Atque huiusmodi punctum ita constans esse compertum est, ut non mutetur, quacumque ratione circumvoluto corpore, dummodo eius partes eundem respectivo situm retineant.

Verum quidquid tradiderunt, illi dumtaxat hypothese aptavere, in qua concipiuntur partium gravitates directiones habere parallelas: quæ hypothesis quamquam in iis, quæ usui hominum, & commodis serviunt, unice adhibenda est; tamen pleræque aliæ hypotheses a philosophis iamdiu consideratæ sunt, & difficillimis phænomenis explicandis accommodatæ. Quamobrem operæ pretium duximus pulcherrimam de æquilibrii centro theoriam promovere, & ad illas etiam hypotheses transferre, in quibus directiones potentiarum centrum petunt, quamcumque cum distantis a centro potentie teneant proportionem. Quæ meditando nacti sumus, ea in hunc modum disponemus, ut primum de potentiis parallelis, deinde de illis, quæ ad centrum tendunt, verba faciamus. Quod spectat ad parallelas, eas habere centrum æquilibrii constans, firmiore fortasse, quam antea factum est, demonstratione probabimus; tum methodos exponemus, quibus usi sunt scriptores ad huiusmodi centrum determinandum. De potentiis autem centrum petentibus quæremus, quænam hypotheses careant, quænam præditæ sint centro æquilibrii constante; post, qua ratione methodi illæ, quibus inventum est centrum æquilibrii in potentiis parallelis, ad rem nostram traduci possint, breviter exponemus.

Itaque ad rem propositam propius accedentes, præmittimus huiusmodi notissimum.

LEM-

LEMMA.

INvenire potentiam æquivalentem duabus, quæ virgæ rigidæ applicantur.

Virgæ rigidæ AB (*Fig. 1*) applicentur duæ potentiæ AM, BN, quibus æquivalens invenienda sit. Directiones AM, BN producantur, donec concurrant in C, & transferantur potentiæ in punctum C, sumtis in earum directionibus $CS = BN$, $CR = AM$: nihil enim interest, utrum potentiæ positæ sint in locis AM, BN, aut in locis CR, CS. Hæ autem componantur facto parallelogrammo CSTR, cuius diagonalis CT æquivalentem repræsentabit. Hæc producatur, donec concurrat in K cum virga rigida AB. Perspicuum est, potentiam CT translata in KL, & applicatam virgæ rigidæ in K æquipollere duabus potentiis AM, BN.

Ubi advertendum est, determinandam esse non solum quantitatem potentiæ æquivalentis, sed etiam punctum, ubi applicanda est: non enim æquivalet, nisi puncto K applicata.

Corollarium primum. Tres potentiæ KL, AM, BN sunt inter se ut sinus angulorum ACB, KCB, KCA. Quare divisio angulo ACB ita, ut sinus angulorum ACK, BCK sint reciproce, ut ipsæ potentiæ AM, BN, invenietur punctum K, cui potentia æquivalens est applicanda.

Corollarium alterum. Ex puncto K demissis in potentiarum directiones normalibus KP, KQ, sumtoque tamquam sinu toto KC, constat KP, KQ esse sinus angulorum ACK, BCK: sed potentiæ ex cor. 1 debent esse reciproce proportionales sinibus angulorum ACK, BCK: ergo reciproce ut perpendiculares KP, KQ.

Corollarium tertium. Si potentiæ AM, BN ad eandem partem dirigantur, punctum K cadit inter puncta A, B. Verum si potentia AM ad unam partem sollicitaret, BN ad oppositam, punctum K caderet extra puncta B, A modo ad unam, modo ad alteram partem, ut circumstantiæ requirunt.

Corollarium quartum. Ad æquilibrium habendum satis est efficere, ut potentia æquivalens ad oppositam plagam dirigatur. Quapropter si virga rigida ex puncto K sustentetur,

tur, potentia e AM, BN in aequilibrio quiescent; & constabit quam potentiam exercent fulcrum K, nimirum aequalem, & oppositam potentia e aequivalenti KL.

Corollarium quintum. Si potentiarum directiones AM, BN concurrant in puncto C, etiam potentia ipsis aequivalens in eodem puncto concurrat necesse est. Quare si duae potentia e AM, BN fuerint parallelae, etiam aequivalens eisdem erit parallela.

De potentiis parallelis.

EX praemisso lemmate possem omnia invenire, quae ad potentias parallelas pertinent: satis enim esset supponere, eas esse potentias parallelas, quae ad angulum infinite acutum in puncto infinite distante conveniunt. Ex qua suppositione liceret e vestigio colligere, distantias punctorum A, B a puncto K esse in ratione reciproca potentiarum, & potentiam aequivalentem KL esse aequalem summam potentiarum AM, BN, si haec ad eandem partem dirigantur; si vero ad oppositas, earumdem differentiam. Quae res statim cuique patebit, qui infinitorum, & infinite parvorum theoriam non ignoret. Tamen aliam placet moliri demonstrationem longiorem quidem, sed non inelegantem, & quae in infinitorum theoriam nequaquam ingreditur.

Ad demonstrationem adornandam praeter praemissum lemma indigeo dumtaxat axioma, quod maxime simplex est, atque perspicuum. Illud autem est huiusmodi. Si duabus, aut pluribus potentiis addantur duae, quae aequales sint, & contrariae, eadem prorsus erit potentia aequivalens.

Virgae rigidae AB (*Fig. 2*) applicentur potentia e parallelae AM, BN, quibus aequivalens invenienda est. Dividatur linea AB bifariam in D: & quoniam duae potentia e aequales, & contrariae non immutant aequipollentem, addantur duae potentia e AD, BD ita, ut invenienda iam sit aequipollens quatuor potentiis AM, AD, BN, BD. Primae duae componantur facto parallelogrammo AMFD, & inveniatur aequivalens AF. Eodem modo facto parallelogrammo BNGD inveniatur aequivalens duabus BD, BN nempe BG. Hisce aequivalentibus substitutis invenienda iam erit potentia aequi-

valens duabus AF, BG. Producat BG, donec concurrat cum AF in C, factisque $RC = AF$, $SC = BG$, completoque parallelogrammo CRTS, ducatur diagonalis TC, quæ erit potentia æquivalens potentiis AM, BN applicata in puncto K.

Iam vero aio primo, potentiam æquipollentem TC esse parallelam potentiis AM, BN. Ex C ducatur CO parallela AB. Propter triangula similia ADF, COF erit $AF : CF :: AD : CO$. Item propter similitudinem triangulorum BDG, GOC erit $BG : GC :: BD : CO$; atqui, quum sit $AD = BD$, est $AD : CO :: BD : CO$; igitur per æqualitatem rationum $AF : CF :: BG : CG$; sive permutando $AF : BG$, aut $RC : RT :: CF : CG$: ergo duo triangula TRC, GCF, quæ habent angulos TRC, GCF æquales, & circa hosce angulos latera proportionalia, sunt similia: igitur angulus RCT = CFG: ergo TC est parallela DF, sive potentiis AM, BN. Q. E. D.

Aio deinde, potentiam æquivalentem TC fore æqualem potentiis AM, BN. Ex punctis R, S ducantur RP, SQ parallelæ AB. Duo triangula AFD, RCP non solum sunt similia, sed etiam æqualia propter æqualitatem laterum AF, RC: ergo $CP = FD = AM$. Eodem modo triangula GBD, CSQ propter æqualitatem laterum BG, SC non solum similia sunt, sed etiam æqualia: ergo $CQ = GD = BN$, sed $CQ = TP$: ergo $TP = BN$: ergo dux simul $CP + TP = TC = AM + BN$. Q. E. D.

Si potentiæ AM, BN ad oppositas plagas traherent, tunc potentia æquivalens TC differentię potentiarum AM, BN æqualis inveniretur.

Aio postremo, potentias AM, BN esse in ratione reciproca distantiarum AK, BK. Namque DF, seu $AM : KC :: AD : AK$. Item $KC : DG$, seu $BN :: BK : BD$, seu AD. Ergo per rationem ex æquo perturbatam $AM : BN :: BK : AK$. Q. E. D.

Si AM, BN ad plagas contrarias sollicitarent, eadem proportio omnino valeret, sed punctum K caderet post puncta B, A ad partem maioris potentiæ AM.

Post hanc demonstrationem nemini obscurum esse potest, & circa punctum K dividens lineam AB in ratione potentiarum reciproca parallelas potentias in æquilibrio manere,

nere, & easdem iure optimo collectas intelligi posse in eodem puncto K; quod nihil aliud est, quam pro duabus potentiis æquivalentem substituere ipsis æqualem. Quæ duæ proprietates latissime patent, & conveniunt potentiis, quemcumque ipsæ angulum cum linea AB efficiant, dummodo maneant parallelæ, & eisdem lineæ AB punctis applicatæ.

Quod de duabus potentiis, idem de tribus, de quatuor ec., immo de infinitis cuicumque corpori, superficiæ, aut lineæ applicatis hac progressionem demonstratur. Namque sint plures potentia (Fig. 3) A, B, D ec. parallelæ applicatæ cuicumque massæ in punctis A, B, D. Iungatur AB, quæ dividatur in K in ratione reciproca potentiarum A, B: demonstratum est potentias circa punctum K æquilibrium ubique facere, & in eodem puncto collectas intelligi posse. Intelligantur itaque in puncto K collectæ, & iungatur KD, quæ dividatur in H in ratione reciproca $A + B : D$: patet circa punctum H potentias esse semper in æquilibrio, & in eodem collectas intelligi posse. Quæ ratiocinatio quum ad quotquot volueris potentias etiam infinitas extendi possit, palam est potentias parallelas eiusmodi centrum habere, circa quod non solum in æquilibrio maneant, sed etiam in eodem colligi possint, aut pro ipsis substitui una dumtaxat potentia ipsarum aggregato æqualis. Atque hoc punctum semper idem est, quacumque ratione massa convertatur, modo potentia maneant parallelæ, & applicatæ eisdem massæ punctis in eisdem semper respective distantis: ut, si mota, & circumvoluta quocumque pacto massa, cuius partes eundem respective situm retineant, ipsæ semper lineæ finienti perpendiculares exsisterent.

Hæc ipsa est hypothesis gravitatis corporum, quum eorum directiones parallelæ esse supponuntur; in qua hypothesis singulis particulis corporis æqualibus potentia æquales, parallelæ, & perpendiculares horizonti applicantur. Igitur intra quæcumque corpora cuiuscumque figuræ punctum invariable existit, circa quod corpora quomodocumque suspensa æquilibrata quiescunt, & in quo omnium partium gravitas iure optimo intelligitur collecta: quod centrum gravitatis appellatur.

Postquam demonstratum est, potentias parallelas etiam

numero infinitas præditas esse centro æquilibrii constante, reliquum est, ut promissis satisfaciens methodos indicemus, quibus a doctissimis viris centrum idem est determinatum. Nemo unus non videt, rem expertem esse omnis difficultatis, si potentia sint numero finita, & solummodo negotium facessere, si sint numero infinita; ut si cuilibet puncto lineæ, aut superficiæ, aut corporis sua potentia applicata fuerit. Duas methodos a scriptoribus usurpatas video; prima usi sunt Varignonius in Ac. reg. 1714, Hermannus in Phoronomia, alique bene multi. Alteram excogitavit, & in Ac. reg. 1731 exposuit doctissimus Clairaut vir in rebus geometricis eximius.

Quod pertinet ad primam. Sint qualibet potentia A, B, D ec. applicata cuicumque corpori, quæ potentia sibi ipsis semper parallelæ remaneant ex. ca. perpendiculares horizonti: aio fore, ut ducto quolibet plano, & ex punctis A, B, D ad illud demissis perpendicularibus AM, BN, DQ, item ex H communi gravitatis centro HO, valeat æqualitas $A \cdot AM + B \cdot BN + D \cdot DQ = \overline{A + B + D} \cdot HO$.

Accommodetur, & circumvolvatur corpus simul cum plano ita, ut potentiarum directiones sint eidem normales. Tum iungatur AB, inventoque duarum potentiarum A, B æquilibrii centro K, normalis plano ducatur KP, & per punctum K ducatur RKS parallela MN ductæ in plano. Propter similitudinem triangulorum RKA, SKB erit KB:KA::BS:AR; sed A:B::KB:KA: ergo A:B::BS:AR: igitur $A \cdot AR = B \cdot BS$: sed $A \cdot AR$ est excessus rectanguli A.KP supra A.AM; & $B \cdot BS$ est excessus rectanguli B.BN supra B.KP: ergo $A \cdot AM : A \cdot KP$ est arithmetice sicut $B \cdot KP : B \cdot BN$: ergo $A \cdot AM + B \cdot BN = \overline{A + B} \cdot KP$.

Iungatur iam KD, quæ dividatur in H in ratione reciproca $A + B : D$: demittatur HO normalis plano, & ducatur per punctum H recta THV parallela PQ ductæ in plano. Propter similitudinem triangulorum KHT, DHV erit HD:HK::DV:KT; sed $A + B : D$:::HD:HK: igitur $A + B : D$:::DV:KT: ergo $\overline{A + B} \cdot KT = D \cdot DV$; sed $\overline{A + B} \cdot KT$ est excessus rectanguli $\overline{A + B} \cdot KP$ supra $A +$

$\overline{A+B} \cdot HO$, & $D \cdot DV$ est excessus rectanguli $D \cdot HO$ supra $D \cdot DQ$: ergo $\overline{A+B} \cdot KP : \overline{A+B} \cdot HO$ est arithmetice ut $D \cdot HO : D \cdot DQ$: ergo $\overline{A+B} \cdot KP + D \cdot DQ = \overline{A+B+D} \cdot HO$; sed ex prima parte $\overline{A+B} \cdot KP = A \cdot AM + B \cdot BN$: igitur $A \cdot AM + B \cdot BN + D \cdot DQ = \overline{A+B+D} \cdot HO$. Qui progressus quum ad infinitas etiam potentias extendi possit, consequitur pro illis quoque propositionem æque valere.

Supervacaneum iudico advertere cum potentias ad plagam oppositam sollicitantes, tum distantias cadentes ad alteram plani partem fore negativas, propterea signo — esse afficiendas. Iam vero vocentur singularæ potentia = p , earum summa = Sp , distantia singularum a plano dato = x , summa rectangulorum ex distantis, & potentiis = Spx , distantia centri gravitatis a plano dato = u , erit semper $Spx =$

$$u \cdot Sp: \text{ ergo } u = \frac{Spx}{Sp}. \text{ Q. E. I.}$$

Methodum doctissimi Clairaut (*Fig. 4*) exponens, ut brevior sim, paullo alia ratione utar ab ea, quam auctor sequutus est. Sint potentia quælibet parallela applicata linea, vel superficiei, vel corpori, quas per AEB designo, quarum æquilibrii centrum sit K ; item alia similes designata per $EBbe$, quarum centrum æquilibrii constans sit H ; omnium autem centrum sit k . Ab hisce autem punctis ad quamlibet lineam datam demittantur normales, KP , kp , HO : perspicuum est $Kk : Hk :: EBbe : AEB$: sed $Pp : Op :: Kk : Hk$: ergo $Pp : Op :: EBbe : AEB$.

Iam vero sint, ut supra, potentia parallela AEB , quarum quaeritur centrum æquilibrii constans, applicatae cuiuscumque linea, superficiei, aut corpori, cuius axis aliquis sit AB . Augeatur hic infinitesimo elemento Bb , cui respondeant potentia $EBbe$. Illarum centrum æquilibrii constans sit K , istarum H ; omnium autem sit k : quæ tria puncta in eadem linea recta constituta sunt. Ab hisce punctis demittantur in axem perpendiculares KP , kp , HO . Potentia AEB vocentur = Sp ; potentia $EBbe$, quæ nihil aliud sunt, quam illarum differentia = p , $AB = x$, $AP = u$, $Pp = du$. Ex paullo antedictis constat fore $AEB : EBbe :: Op = Bp =$
 $BP :$

BP : Pp, five in signis analyticis $Sp : p :: x - u : du$: ergo $du \cdot Sp = px - up$, five $du \cdot Sp + up = px$, & integrando u .

$Sp = Spx$, five $u = \frac{Sp x}{Sp}$: quemadmodum etiam per metho-

dum primam inventum est,

Dum invenitur $AP = u$, nihil aliud invenitur, quam distantia centri æquilibrii K, quod quæritur, a plano transeunte per punctum A, cui sit rectus axis AB: sed si hoc modo inveniatur distantia eiusdem centri a tribus planis non parallelis, illud hac ratione determinabitur. Omitto casus, in quibus methodus fieri brevior potest, neque formulas cuilibet hypothese applico: hæc enim obvia sunt, & ubique a scriptoribus indicata.

De potentiis centrum petentibus.

ANtequam potentias ad centrum tendentes considerandas suscipio, necesse est, ut solutum exhibeam huiusmodi geometricum

PROBLEMA.

IN basi AB (*Fig. 5*) dati trianguli ABC dato puncto K, ducere rectam RKS ad latera terminatam ita, ut $RK = SK$.

Accipiatur $KM = AK$, & a puncto M agatur MS parallela lateri CA, quæ alterum latus CB secabit in S. Ducatur SKR; aio hanc a puncto K divisam esse bifariam.

Demonstratio. Quoniam AR, MS parallelæ sunt per constructionem, triangula RKA, SKM erunt similia; sed latera homologa AK, MK ex constructione æqualia sunt: igitur triangula RKA, SKM non solum similia sunt, sed etiam æqualia: ergo $KR = KS$. Q. E. D.

Potentias tendentes ad centrum, quas modo cepi considerare, pono crescere, vel decrescere, ut quæcumque functio distantiarum a centro, quam, ut generaliter exprimam, designabo littera f ita, ut fAC significet functionem ex distantia AC, & constantibus utcumque compositam. Verum advertete, hanc non esse unicam rationem, ex qua
coa-

coalescunt potentia, sed aliam constantem esse, quam eadem potentia tenerent posita in eisdem a centro virium distantis. Energiam, qua praedita sunt potentia posita in determinata quadam a centro distantia, quae ad libitum accipi potest, indicabo nomine potentiarum absolutarum. Itaque potentia erunt inter se in ratione composita potentiarum absolutarum, & functionum quarumlibet distantiarum a centro. Hac definitione praemissa.

Virga rigida applicentur potentia absoluta A, B (*Fig. 1*) quas eisdem litteris designo; distantia autem a centro C sint AC, BC: ergo potentia erunt ut $A \cdot fAC : B \cdot fBC$. Supponatur K esse punctum aequilibrum, ex quo in AC, BC demittantur normales KP, KQ, & ex centro virium C in AB pariter normalis demittatur CO. Ut aequilibrium intercedat, necesse est se se habere $A \cdot fAC : B \cdot fBC :: KQ : KP$: sed quum sint similia triangula KBQ, CBO erit $KQ : CO :: KB : CB$, & propter similia triangula AOC, APK, $CO : KP :: CA : AK$: ergo $KQ : KP$ in ratione composita $\frac{KB : CB}{CA : AK} :: KB \cdot CA : KA \cdot CB$. Igitur $A \cdot fAC : B \cdot fBC ::$

$KB \cdot AC : KA \cdot BC$, sive $\frac{A \cdot fAC}{AC} : \frac{B \cdot fBC}{BC} :: KB : KA$. Ut

igitur habeatur punctum aequilibrum K, necesse est ut linea AB coniungens puncta, in quibus applicantur potentia, di-

vidatur in ratione reciproca $\frac{A \cdot fAC}{AC} : \frac{B \cdot fBC}{BC}$.

Itaque punctum aequilibrum K respectu potentiarum constans erit, atque invariatum, si invariata, & constans sit praedicta ratio: quod contingere nequaquam potest nisi

$\frac{fAC}{AC} = \frac{fBC}{BC}$. Hoc autem in duplici dumtaxat hypothesi

locum habet: prima quum ubique $AC = BC$, seu quum partes finitae additae, vel detractae lineis AC, BC illarum aequalitatem non destruunt; quod supponit eas esse infinitas, seu centrum C infinite distare; quae hypothesis cum ea coincidit, quae potentiarum directiones ponit parallelas.

Altera hypothesis postulat, ut $AC : BC :: fAC : fBC$, quod
idem

idem est, ac dicere, quum potentia crescunt in ratione distantiarum a centro. In ceteris autem hypothefibus punctum K mutat positionem in linea AB, prout eiusdem lineae positio respectu centri mutatur.

Advertendum est, in hypothefi potentiarum crescentium ut distantia a centro, punctum K dividere lineam AB in ratione reciproca potentiarum absolutarum. Quapropter si haec eadem potentia absolutae concipiantur mutare directionem suam versus centrum, & parallelas directiones accipere, idem centrum aequilibrum habebunt, atque hoc constans. Quare methodi illae, quibus in hypothefi virium parallelarum centrum aequilibrum invenimus, & huic nostrae hypothefi possunt esse adiumento. Quod consuetarium etiam ex dicendis lucem accipiet.

Nunc perpendendum est (*Fig. 5*), utrum potentia absolutae intelligi possint collectae in puncto aequilibrum K, vel hoc constans sit, vel secus; sive, quod idem est, utrum potentia aequivalens duabus potentiis absolutis A, B positae in A, B sit aequalis eisdem potentiis positae in puncto K. Per punctum K ducatur ex praemisso problemate linea SKR, ut pars SK sit = RK. Producat CK donec KT = CK, ducanturque RT, TS, & efformetur quadrilaterum RTSC, quod sine dubio erit parallelogrammum: nam, quum duo triangula RKT, SKC sint similia, & aequalia, RT, CS erunt parallelae, & aequales.

Iam vero energiae, quibus praeditae sunt potentiae absolutae A, B positae in punctis A, B, erunt inter se se ut CR : CS. Nam si parallelae AB ducantur RG, SF, quas esse aequales constat, erit

$$CR : CA :: RG : AK$$

$$CA : CB :: CA : CB$$

$$CB : CS :: BK : FS = RG : \text{ergo } CR : CS \text{ in ratione}$$

$$\text{composita } \frac{CA : CB}{BK : AK} :: BK . CA : AK . CB : \text{ sed ex supra de-}$$

monstratis BK . CA : AK . CB :: A . fAC : B . fBC : igitur CR : CS :: A . fAC : B . fBC : sive ut potentiae, quibus in punctis A, B praeditae sunt potentiae absolutae A, B. Q. E. D.

Itaque diagonalis CT exprimet potentiam aequipollentem duabus potentiis absolutis A, B positae in punctis A, B. Iam

B. Iam vero producta RG, donec concurrat cum CB in H, erit $CG : CF = TG :: GH : FS = RG$: ergo componendo $CG : CT :: GH : RH :: KB : AB$: sed quum sit ex dictis

$$KB : KA :: \frac{A \cdot fAC}{AC} : \frac{B \cdot fBC}{BC}, \text{ erit componendo } KB : AB ::$$

$$\frac{A \cdot fAC}{AC} : \frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC} : \text{ ergo } CG : CT :: \frac{A \cdot fAC}{AC} :$$

$$\frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC} : \text{ sed } RC : CG :: AC : KC : \text{ igitur } RC :$$

$$CT \text{ in ratione composita } \frac{A \cdot fAC}{AC} : \frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC}; \text{ five}$$

$$AC : KC$$

$$RC : CT :: A \cdot fAC : \frac{A \cdot KC \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot KC \cdot fBC}{BC}.$$

His inventis voco P energiam potentiaram absolutarum A, B positaram in K. Perspicuum est fore $RC : P :: A \cdot$

$$fAC : \overline{A + B} \cdot fKC. \text{ Igitur } CT : P :: \frac{A \cdot KC \cdot fAC}{AC} +$$

$$\frac{B \cdot KC \cdot fBC}{BC} : \overline{A + B} \cdot fKC : \text{ ergo potentia } \alpha\text{quivalens dua-}$$

bus absolutis A, B positis in A, B ad potentiam earumdem

$$\text{positarum in K est, ut } \frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC} : \frac{\overline{A + B} \cdot fKC}{KC}.$$

Porro hæc non potest esse ratio æqualitatis, nisi aut $AC = BC = KC$, quod verum est in hypothesi centri infinite distantis; aut $fAC = AC$, quod dat hypothesim potentiaram crescentium, ut distantia a centro. In ceteris hypothesibus est semper ratio inæqualitatis. Quare ad gravitatem quod spectat, si duas hæc excipias, in nulla hypothesi fieri potest, ut iure bono concipiatur collecta omnium partium gravitas in puncto æquilibrii; potentia enim æquivalens gravitatibus corporum A, B positorum in A, B non est æqualis gravitati eorundem corporum positorum in K.

Hypothesis autem potentiaram crescentium, ut distantia a centro, quando duabus illis ornata est proprietatibus,

bus, quas demonstravimus convenire potentiis parallelis, scilicet ut duæ potentiæ habeant centrum æquilibrii constans, & ut collectæ intelligi possint in eodem centro æquilibrii, in dubitationem cadere nullo pacto potest, quin adhibita eadem serie, qua usi sumus in potentiis parallelis demonstrari idem possit de tribus, quatuor &c. immo de infinitis potentiis. Qua de re omnia corpora gravia in hac hypothese centrum gravitatis obtinebunt, ex quo, si suspendatur quacumque ratione corpus, æquilibrium servabit, & in quo omnium partium gravitatem licet collectam intelligere.

Reliquum est, ut methodos exhibeamus, quibus in hypothese virium tendentium ad centrum, inveniri centrum æquilibrii potest. Duabus methodis in hypothese virium parallelarum usi sumus. Utraque tentanda est, & rei, qua de agimus, accommodanda. Demonstravimus nuper, duabus potentiis absolutis A, B (*Fig. 6*) positæ in A, B, five $A \cdot fAC + B \cdot fBC$ æquivalere potentiam KC.

$\frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC}$. Quare si queratur potentia absoluta

K collocanda in puncto K efficiens idipsum, quod efficiunt potentiæ absolutæ A, B positæ in punctis A, B debet K. fKC æquare potentiam æquivalentem potentiis A, B positæ

in A, B: ergo $K \cdot fKC = KC \cdot \frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC}$: igitur

$$K = \frac{KC}{fKC} \cdot \frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC}$$

Addatur iam tertia potentia D, & H sit centrum æquilibrii duarum potentialiarum K, D, erunt ex prima parte potentiæ $K \cdot fKC + D \cdot fDC$ æquipollentes HC.

$\frac{K \cdot fKC}{KC} + \frac{D \cdot fDC}{DC}$. Pro $K \cdot fKC$, & $\frac{K \cdot fKC}{KC}$ eorum valo-

res substituantur, & fiet $KC \cdot \frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC} + D \cdot fDC$

fDC æquipollentes $HC . \frac{A . fAC + B . fBC + D . fDC}{AC \quad BC \quad C}$: at-

qui ex prima parte $KC . \frac{A . fAC + B . fBC}{AC \quad BC}$ æquipollent

$A . fAC + B . fBC$: igitur $A . fAC + B . fBC + D . fDC$

æquivalent $HC . \frac{A . fAC + B . fBC + D . fDC}{AC \quad BC \quad DC}$.

Hic autem progressus quum produci possit in infinitum, consequitur etiam de infinitis potentiis propositionem valere. Quare si vocentur potentiæ absolute = p , earum distantia a centro virium = z , distantia centri æquilibrii a centro virium = t , & per signum S denotetur summa; potentiis omnibus manentibus in loco quæque suo, quas designo

per $Sp . fz$ æquivalet potentia $tS \frac{p . fz}{z}$, quæ debet intelligi

applicata in centro æquilibrii .

Si formulam aptemus hypothese, in qua potentiæ sunt, ut distantia a centro, tunc $Sp . fz$ positæ potentiis in suis respective locis æquivalet potentia tSp . Quæ formula satis indicat illud, quod alia ratione deduximus: nimirum omnes potentias absolutas sitas in centro æquilibrii idem efficere, ac facerent positæ in suo quæque loco .

Ceterum neque in hac hypothese, neque in aliis per hanc methodum inveniri potest quantitas t , quæ est distantia centri æquilibrii a centro virium; non enim inter po-

tentias $Sp . fz$, & $tS \frac{p . fz}{z}$ datur æqualitas, sed tantum

æquipollentia. Quare nisi res ad æqualitatem redigatur fieri non potest, ut æquilibrii centrum reperiatur. Redigi autem posse ad æqualitatem hac ratione existimo .

Ducatur per centrum C quælibet linea CM , ad quam ex punctis A, B , ubi duæ potentiæ applicatæ sunt, demittantur normales AM, BN , item KP ex centro æquilibrii K .

Quoniam est ex demonstratis $BK : AK :: \frac{A . fAC}{AC} : \frac{B . fBK}{BC}$.

F f 2

Item

Item $BK : AK :: NP : MP$ erit $NP : MP :: \frac{A \cdot fAC}{AC} : \frac{B \cdot fBC}{BC} :$

ergo $\frac{A \cdot fAC}{AC} \cdot MP = \frac{B \cdot fBC}{BC} \cdot NP$: atqui $\frac{A \cdot fAC}{AC} \cdot MP$

est differentia rectangulorum $\frac{A \cdot fAC}{AC} \cdot MC$, & $\frac{A \cdot fAC}{AC} \cdot PC$;

& $\frac{B \cdot fBC}{BC} \cdot NP$ est differentia rectangulorum $\frac{B \cdot fBC}{BC} \cdot PC$, &

$\frac{B \cdot fBC}{BC} \cdot NC$: igitur $\frac{A \cdot fAC}{AC} \cdot MC : \frac{A \cdot fAC}{AC} \cdot PC$ est ari-

thmetice, ut $\frac{B \cdot fBC}{BC} \cdot PC : \frac{B \cdot fBC}{BC} \cdot NC$: ergo $\frac{A \cdot fAC}{AC} \cdot MC$

+ $\frac{B \cdot fBC}{BC} \cdot NC = PC \cdot \frac{\frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC}}$.

Addatur tertia potentia D , & comparetur potentia

absoluta $K = \frac{KC}{fKC} \cdot \frac{\frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC}}$ cum potentia D ,

quarum centrum æquilibrii fit H . Ducantur HO , DQ normales rectæ CM : erit ex prima parte $\frac{K \cdot fKC}{KC} \cdot PC +$

$\frac{D \cdot fDC}{DC} \cdot QC = OC \cdot \frac{\frac{K \cdot fKC}{KC} + \frac{D \cdot fDC}{DC}}$, & pro

$\frac{K \cdot fKC}{KC}$ eius valore substituto, erit $\frac{\frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC}}$.

$PC + \frac{D \cdot fDC}{DC} \cdot QC = OC \cdot \frac{\frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC} + \frac{D \cdot fDC}{DC}}$,

sive ex prima parte $\frac{A \cdot fAC}{AC} \cdot MC + \frac{B \cdot fBC}{BC} \cdot NC +$

$D \cdot f$

$$\frac{D \cdot fDC}{DC} \cdot QC = OC \cdot \frac{A \cdot fAC}{AC} + \frac{B \cdot fBC}{BC} + \frac{D \cdot fDC}{DC}.$$

Qui progressus, quum in infinitum produci possit, consequitur de omnibus potentiis veram esse propositionem. Quare retentis superioribus denominationibus vocentur $MC = x$, intercepta inter normalem cadentem a centro æquili-

brii, & centrum virium $= u$, erit $S \frac{px \cdot fz}{z} = u S \frac{p \cdot fz}{z}$, si-

$$S \frac{px \cdot fz}{z}$$

ve $u = \frac{S \frac{px \cdot fz}{z}}{S \frac{p \cdot fz}{z}}$. Quæ formula prorsus valeret, etiamsi li-

nea assumpta non transfret per centrum C. In qualibet enim parallela rectæ CM æquales partes abscinderentur a perpendicularibus, ac in CM; immo initium x , & u , modo sit unum idemque, in quolibet puncto assumi potest: quod breviter adnotasse sufficiet.

Ad methodum doctissimi Clairaut quod spectat, ita nostræ hypothesei accommodari posse videtur. Si fuerint, quot volueris potentia, (*Fig. 4*) quæ tendant ad centrum C, quarum centrum æquilibrii sit K; item alia quarum centrum æquilibrii H; centrum autem omnium sit k: quæ tria puncta in eadem linea recta sita sint, necesse est. Ex hisce punctis in lineam positione datam AB demittantur normales KP, kp, HO. Quoniam ex demonstratis potentia æquivalens omnibus potentiis, quarum centrum K, divisa per distantiam KC est ad potentiam æquivalentem omnibus, quarum centrum H, divisam per HC, ut Hk:Kk, erit etiam ut Op:Pp.

Iam vero sint infinitæ potentia tendentes ad centrum C, quarum centrum æquilibrii K quæritur. Earum aliquis axis sit AB. Repræsentetur ab AEB summa rectorum

$\frac{p \cdot fz}{z}$ ita, ut $AEB = S \frac{p \cdot fz}{z}$. Augeatur AB quantitate infi-

nitesima Bb, cui respondeat BbeE, quod proinde $= \frac{p \cdot fz}{z}$.

Hac additione facta, novæ etiam potentia adduntur, qua-

rum

rum centrum fit H. Centrum autem omnium ex K transit in k. Vocetur $KC = t$, $HC = r$. Constat potentiam æquivalentem omnibus, quarum centrum $K = t \int \frac{p \cdot fz}{z}$, & omnibus quarum centrum $H = r \cdot \frac{p \cdot fz}{z}$: ergo prima divisa per t ad secundam divisam per r se se habebit, ut $Op : Pp$. Vocetur $AB = x$, $AP = u$, & $Pp = du$. Itaque erit

$$\int \frac{p \cdot fz}{z} : \frac{p \cdot fz}{z} :: x - u : du, \text{ sive } du \int \frac{p \cdot fz}{z} + u \cdot \frac{p \cdot fz}{z} = \frac{px \cdot fz}{z} :$$

igitur integrando $u \int \frac{p \cdot fz}{z} = \int \frac{px \cdot fz}{z}$; atque adeo $u = \frac{\int \frac{px \cdot fz}{z}}{\int \frac{p \cdot fz}{z}}$: quæ formula prorsus coincidit cum ea, quam per primam methodum supra invenimus.

Si utramque methodum sedulo consideres, non duas esse perspicias, sed unam eandemque oppositis rationibus progredientem. Utraque enim refert potentias, earumque centra ad lineam positione datam: sed prima syntheticam rationem iniens a duabus potentiis progreditur ad tres, deinde ad quatuor, atque ita ad infinitas: secunda analytica ratione utens supponit centrum, quod quæritur; illudque per methodum infinite parvorum, additis potentiis respectu reliquarum infinitesimis, promovet: tum ad potentias duas æquipollentes tam potentiis datis, quam additis proprietatem aptat, qua respectu centri æquilibrii duæ potentia præditæ sunt. Verum hæc methodus inutilis fuisset, nisi antea per distantiam centri æquilibrii a centro virium synthetica ratione potentiarum etiam infinitarum inventa fuisset potentia æquipollens centro æquilibrii applicanda.

Punctum illud, in quo normalis ducta a centro æquilibrii secat lineam positione datam appellabo vestigium centri æquilibrii in linea positione data. Si per vestigium centri æquilibrii ducatur planum, cui linea positione data sit perpendicularis, in hoc plano centrum æquilibrii inexistit

fit quidem certe. Quoniam autem formula satis indicat in qualibet linea positione data inveniri posse vestigium centri æquilibrii, assumantur tres lineæ non parallele, quarum omnium positio data sit, in quibus omnibus vestigia centri æquilibrii determinantur. Per hæc tria plana ducantur, quibus rectæ assumptæ normales sint, punctum tribus planis commune, idipsum est centrum æquilibrii, quod quaeritur.

Si formula contrahatur ad hypothesim potentiæ proportionalium distantiarum a centro, multo fit simplicior,

atque elegantior. Mutatur enim in hanc $u = \frac{Sp_x}{Sp}$: a qua

notandum est, distantias potentiæ a centro omnino abesse, quod indicio est, centrum æquilibrii esse constans, quamcumque positionem habeant potentiæ absolutæ respectu centri virium, dummodo eandem servant positionem inter se se. Nam singe animo, aut virgas rigidas, aut corpus, cui applicatæ sunt potentiæ, simul cum linea positione data, in qua est vestigium centri æquilibrii, quacumque ratione moveri, aut accedere, aut recedere a centro virium, aut circa aliquod punctum revolvi; profecto idem respectu potentiæ manebit centri æquilibrii vestigium: ergo etiam centrum æquilibrii: quam proprietatem alia ratione antea demonstravimus.

Advertendum est etiam, formulas pertinentes ad hypothesim virium parallelarum, & virium crescentium, ut distantia a centro esse unam, eandemque; ex quo colligitur, unum esse, idemque centrum æquilibrii in utraque hypothesi; quam proprietatem supra item demonstratam vidisti.

Hæc quidem de centro æquilibrii investiganda, atque demonstranda mihi proposui: ex quibus perspicuum est duas solummodo existere hypotheses, in quibus non mutata potentiæ inter se positione centrum æquilibrii constans est, in eoque omnes potentiæ absolutæ collectæ intelligi iure optimo possunt. In reliquis & centrum æquilibrii mutatur, & potentia omnibus æquivalens non est æqualis energiæ omnium potentiæ in centro æquilibrii positæ.

Ve.

Verum rationes indicatæ sunt, & formulæ exhibitæ, per quas & potentia æquivalens, & centrum æquilibræ in hypothesi quacumque determinatur.




Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 2.





Fig. 5.



PETRI TABARRANI

*De thermometrorum peculiari correctione
nunc primum excogitata.**Accedit**Epistola de fonticulo quodam.*

Non dubito fore plerosque, Sodales ornatissimi, qui hanc meam de thermometris dissertatiunculam superfluum hisce temporibus iudicent, quum viros de Philosophia optime meritos varia, & multiplicia commenta hac super re scripsisse legent: sed hi sciant velim me pauca iccirco commemorare, quæ eorumdem correctioni, atque illustrationi tantum inservire valent. Oblata autem mihi ea primo occasione, pro meo studio meritam gratiam debitamque, Optimi Viri, eius honoris causa referre expedit, quem proximis diebus mihi habuistis, ut in vestrum præclarissimum cœtum congregarer.

II. Optima, vel saltem optimis proximiora esse thermometra mercurio constructa apud nostrates philosophos in confesso est, (a) siquidem alia, ne Florentinis quidem ex-
T. II. P. III. G g ceptis,

(a) Halley Phil. Trans. & n. 197. Boerb. elem. Chem. tom. 1. exper. XIV coroll. 3 sch. p. m. 41. Musschenb. tentam. exper. nat. cap. in Acad. del Cim. p. 8. Elem. phys. n. 557. „ Etenim mercurius, cum fuerit ab omni fœditate purgatus, eiusdem est naturæ ubicumque terrarum, ac tubis inclusus nullam patitur commutationem: præterea est simillimum veri, vel eidem expansioni, & condensationi per eundem caloris, vel frigoris gradum, postquam Physicis eum bene purificasse placuerit, ubi vis gentium obnoxium esse ec. „ De l' Isle Mémoire pour servir à l'histoire Petersb. 1738.

ceptis, atque a clarissimo Reaumurio correctis (a), pluribus scitent vitiis, (b) quorum aliquo nec eadem ex mercurio constructa, ac in præsens vulgo adhibita deficiunt; quod vitium in eodem consistit vitro, cuius capacitatem aliquantum calore dilatari, itidemque frigore comprimi luculenter cernitur (c), quo fit, ut vera, & iusta rarefactio, & condensatio mercurii, vel alterius liquoris, quo thermoscopia sint confecta, nullatenus haberi possit (d).

III. Qua de re quamvis nullus amplius ambigeret, nihilo tamen secius in celeb. Academia, quæ Petersbourgi est, proximis annis non defuit, qui animi penderet; quamobrem Bulffingero, qui tum ibidem tamquam academicus morabatur, quædam vitri peculiaris forma, concava nimirum, atque convexa, scutellæ instar conflata in mentem venit (Fig. 1), qua eam vitri affectionem a philosophis iamdiu cognitam, indicatamque plane fancire non dubitavit. Eiusmodi ergo vitrum hic tum adhibuit, eventusque adammiffim accidit, ut vir clarissimus arbitratur; etenim inflexo tubo illi annexo, thermometerum construxit, cuius convexa superficie coram academicos madefacta, liquor in tubo contentus, *salutulum* sic dictum inferius agebat, contra vero eveniebat in eius concavam vitri superficiem eadem calida infusa: itidem utrumque contra accidebat, si clarissimus auctor pro calida frigida utebatur: (e) quapropter memoratam vitri affectionem sine ulla contentione, atque dubitatione tali sic eius forma excogitata manifesto confirmavit; quo fit, ut vel de thermometerorum vitio modo descripto, quod est ex eis quintum, quæ clariss. Musschenbroeckius memorat, (f) nullus in præsens dubitet.

IV.

(a) *Histoire de l'Académie Royale des Sciences an. 1730.*

(b) *Musschenbr. loc. cit.*

(c) *Sag. di natur. exper. pag. m. 178 Hist. de l'Académie des Sciences année 1700, 1710.*

(d) *Vitrum ipsum* [inquit Musschenbr. loc. cit.] *capacius fit calore, angustius frigore; quare rarefactiones liquoris ascendentes minores cernuntur, descensus enim minores, quam si vas, uti par erat, pro experimentis, semper aque capax maneret.*

(e) *Comment. Acad. Scient. Imper. Petrop. tom. III. p. 242.*

(f) *Quintum, inquit, vitium tolli hucusque non potuit loc. cit. 537.*

IV. Cum igitur, Sodales amplissimi, Romæ duobus ante annis ad construenda thermometra secundum Farhenei-
tii, & Musschenbroeckii methodum me applicuissem, mente, & cogitatione versare cœpi, quomodo ei thermoscopiorum vitio mederi possem; quamobrem cum experimentis faciendis variis thermoscopiis eodem clarissimo Bulffingeri vitro, aliisque ei simillimis constructis una cum clarissimo Leprotto (occasionem nacti Petri Casati præstantis Vitrarii, qui tum forte Romæ aderat) intentus essem, cœpi egomet mecum sic cogitare, utrum videlicet thermometra eo Bulffingeriano vitro confecta memorato vitio immunia forent: cui rei magnopere sum assensus, intelligendo in thermometris eo vitro constructis, si utraque scilicet eiusdem superficies, concava nimirum, atque convexa cum agilitate eodem instanti madefieret, nullum *salutulum* fieri, verum quamdam tantummodo commotionem, seu tremorem *salutuli* vice observari, ab actione caloris, vel frigoris in utraque superficie, concava videlicet, atque convexa, per idem tempus productum: indicium certum, ut liquet, quod in alternis caloris, & frigoris vicissitudinibus id omne, in quo convexa deficit superficies, concava omnino suppleat: ceterum hæc ambas superficies æquidistantes, quam maxime potest, vitrarius ducat oportet; tum enim altera alteram superficiem melius supplebit.

V. Id omne, Sodales, cum præstantissimo Leprotto iam tum contuli, idemque, ut per litteras clarissimum Musschenbroeckium consularem, quid ipse sentiret, mihi metipsi auctor fuit, quod mox hic tum feci, mihi que quamvis eidem nec nomine forsitan noto, tamen benevole vir experientissimus non modo respondit, curam meam approbans, & laudans, sed etiam de rebus quibusdam ad proba paranda thermometra non parum utilibus, & necessariis, sincere loquens monuit, quemadmodum ex suapte epistola sub huius finem dissertatiunculæ apposita intelligetur.

VI. Mea igitur emendatio, ut quisque vestrum, Sodales, percipit, ab eo Bulffingeriano vitro orta est; ita ut, si hæc mea correctio non nihili sit æstimanda, maior sane laus eidem clarissimo Bulffingero habenda sit, qui ob rationem, quam suprascripsi N. III, eiusmodi vitrum concavum excogitavit, quam mihi metipsi, qui id vitrum ad construenda

thermometra, eo ut commemorato vitio immunia forent, tantummodo adhibui.

VII. Præterea hæc mea thermometra interim dum ego una cum iis, quæ consueto cylindro prædita sunt, construebam, calorem frigusque semel apprehensum citius amittere quam ea, plane intellexi: & cur ita accidat, unumquemque non latet, siquidem eadem præterquamquod vitris constent bene crassis, superest cylindrica massa mercurii, quam arripitum calorem vel frigus non tam cito dimittere constat: contra vero illa duabus exilioribus vitreis superficiebus, atque uno tantum, ut ita dicam, mercurii plano scatent; tum etiam maiori donantur superficie, quam eadem cylindris prædita; quibus ex rebus fit, ut liquorem contentum caloris, frigorisque externi actio celerrime afficiat; ad summam ea thermometra promptiora quibuscumque aliis, atque expeditiora fore ad ostendendas caloris, vel frigoris perennes mutationes neququam est dubitandum.

VIII. Super hæc animadvertendum, Sodales, quod clarissimus Farheneitius ob maiorem, qua pollent, superficiem, sphaerarum vice, ut calor vel frigus celerrime penetrare, ac afficere posset liquorem thermometri, cylindros adhibuit (a): præterea summus philosophus Boerhaavius thermometrum, vulgo dictum Drebbellii, emendavit, sensibiliusque reddidit peculiari ampulla ex binis segmentis sphaericis, nec minime distantibus loco sphaeræ substituta, eo ut vas compressum evaderet (b): eadem hac ideo ratione quo magis postrema hæc omnia illis, alterum tantum nostra Bulfingeriano vitro, ut dictum est, constructa, his singulis antecellere iure, ac merito dicendum est.

IX. Has igitur ob causas hanc meam emendationem illi eidem, quam præclara Musschenbroeckius tradit (c), nisi me animus fallit, plane antepono, siquidem vir doctissimus
 cylin.

(a) *Ut autem, inquit, thermometra ab omnibus caloris mutationibus afficiantur, loco globulorum cylindris vitreis sunt prædita; eo enim modo ob maiorem superficiei quantitatem citius a variatione caloris penetrantur ec. The. Philosoph. Transact. Abridgd. vol. v. par. II. III. IV. p. 52.*

(b) *Elem. Chem. tom. I exper. III. pag. m. 76. Tab. 2 Icon. III.*

(c) *Elem. de Physiq. tom. I. cap. xxvi. n. 953.*

cylindris vitreis utitur, queis exquisite, ut dictum est, observare non accidit, velut in meis concavis impressivæ sphaeris animadvertitur, perennes mutationes frigoris, calorisve, in atmosphæra, ut satis unicuique notum est, obvenientes. Attamen præcipuam causam, ob quam cylindrus fuit sphaeræ substitutus, gravissimus auctor in annexa, quam supra dixi, epistola, eo fuisse scribit, ut proportio inter utramque superficiem, cylindri scilicet & tubi, facilius determinaretur; etenim, hoc modo, inquit, ad unam eandemque scalam probe accommodata, & concordia habentur thermometra; id autem, ultro ait, his meis concavis sphaeris obtinere difficile est: porro id omne, Sodales, haud inficior, sed vel in iis, quæ cylindro constructa sunt, satis superque laboriosum evadit opus; ita ut memoratam peræquam proportionem nisi per libellam melius accommodari posse intellexi, ponderando scilicet mercurium in cylindro, seu concavo Bulffingeriano vitro non semel enunciato contentum, ut habeatur tantummodo quantitas, quæ pro tubo annexo sumenda est, qua item methodo idem vir clarissimus de l'Isle usus est (a): verumtamen singulis his rebus unum, aut alterum thermometrum constructum esse tantum fat est, nam cetera quotlibet secundum ea accommodari posse hic idem vir clarissimus nos monet; dummodo tamen liquor thermometri quocumque, vel maximo frigore glaciali, seu artificiali in phialam nequaquam descendat, sed nonnihil in tubo tunc temporis remaneat; siquidem unus ex terminis scalæ faciundæ, ut ostendam paulo post, ibidem sumendus est.

X. Altero præterea vitio subiiciuntur thermometra, de quo nulla a philosophis, quod sciam, fit mentio; etenim thermometris in recipiente vitreo, sic dicto, machinæ pneumaticæ positis, interim dum aer, ut adsolet, eo extrahitur, liquorem thermometri (in meis præsertim scutellæ instar, ut dictum est, confectis) N. IV in tubum aliquantum descendere animadvertitur: contra vero ibidem aere introeunte, eundem liquorem in tubum adscendendo inibi redire protinus observatur; quod indicia plana affert, quantum ego perspicio, memoratum liquorem ab aeris pondere su-

per

(a) *Mémoire pour servir à l'Histoire ec.*

per vitri parietes premente plus æquo suspensum teneri: quod vitium tamen facillime tolli potest, disponendo videlicet terminos scalæ conflandæ, eo ut vera thermometri altitudo, vel eius vitri respectu, semper habeatur, ubi dictum liquorem descendere cernitur, thermometro in vacuo Boyleano locato: attamen eum thermometri in memorato vacuo descensum clarissimo nostro sodali Galeatio contigit, ut videret, varia experimenta in hoc vestro scientiarum Instituto suis auditoribus faciendo.

XI. Philosophi etiam nunc constructis thermometris, atque omni aere per ignem vindicatis, obstruxerunt, ac *hermetice*, ut dicunt, *sigillarunt*: unus, quod sciam, non semel commemoratus vir clarissimus de l'Isle thermometra aperta relinquit, quod cuidam ex meis amicis, Romæ cum essem, minus arridebat; siquidem aiebat ab aeris columnula ita premendum, urgendumque liquorem thermometri, ut veræ eius altitudini hæc eadem pressio impedimenta inferre valeat; quamobrem tum mihi experiri placuit, si ita vel aliter accideret, ac amicus opinabatur; idque tamen feci duobus thermometris supra altitudinem per ignem elevatis, ibidemque *hermetice sigillatis*, ad quam in aquam ferventem immersa ascendere solent: sic igitur ea parata thermometra, tam in aquam ferventem, quam in idem Reaumurii constans artificiosum frigus mox describendum immersi, atque eius ascensum, descensumque in tubo notavi; tum demum iisdem thermometris de integro patefactis, eademque, ut supra, repetita operatione, ad eadem adamussim signa, quæ in tubo ante notaveram, ascenderunt, descenderuntque thermometra. Ex eo igitur, Sodales, unusquisque vestrum colligere potest, caloris frigorisque vicissitudines, quæ in atmosphæra assidue contingunt, thermometra ad eandem apta scalam, vel clausa, vel sint aperta, peræque ostendere.

XII. Notandum etiam, Sodales, quod si quis (a) thermome-

(a) Vide implendi thermometra, purgandi liberandique ab omni aere mercurii, methodum apud clarissimum Musschenbroeckium *Commentar. ad tentam. exper. nat. cap. in Acad. del Cim. pag. 12. Essai de physiq. chap. xxvi. n. 948*: quod facillime obtinetur nostra præsertim vitra adhibendo, quæ tertia figura donata sunt.

mometra obstructa velit, [quæ nihilominus plus mihi arri-
dent, quamvis sit opus laboriosius, quam ea, quæ aperta
relinquuntur, siquidem pulvis, humidumque, quod est in
aere, obducere tubos poterit, opacosque reddere] interim
dum parat, nimium igne, vel alia quacumque re vitrum
minime torquere studeat; etenim ex his quædam, quæ iam
optima evaserant, *hermetice sigillata* non semel patefeci,
quæ posterius quacumque diligentia adhibita, perfecta non
plane ut antea, cum fuerint de integro obstructa, nequa-
quam redierunt; præclare enim conflata thermometra, no-
tante clarissimo viro Petro Van Musschenbroeckio [a], ad
idem adamuffini signum in glaciem immersa cum aperta,
tum clausa descendant oportet. Ceterum ut unusquisque
præstantiora, quammaxime potest, thermoscopia construat,
vel omnia ea, quæ mihi memoratus vir clarissimus per lit-
teras notum fecit, animadvertat (b).

XIII. Venio nunc, Sodales, ad thermometrorum sca-
lam, quam inter binos terminos thermometrorum tubulo
(c) appositos cum solertissimo Reaumurio conflandam esse
opinor, quorum alter fervens aqua est, alter vero frigus
interim dum aqua congelatur frigoribus; siquidem utrum-
que satis commodum fore, vel ego existimo: cum hunc
eundem philosophi constantem, & firmum ubivis gentium
experti sint: de illo certiores facti iam fuimus, ut notum
est, a clarissimo Amontonsio in monumentis regię scientia-
rum Academiæ; (d) de eo vero possum egomet vobis expo-
nere

(a) *Comment. ad tentam. exper. natur. cap. in Acad. del Cim. loc. cit.*

(b) *Epist. ad fin.*

(c) *Hos tubulos magni refert per totum spatium scale fa-
ciunde æquales, quoad fieri potest, fore necesse est, ut thermosco-
pia habeantur æqualiter deambulantia, quam rem, quomodo obti-
nere valeamus, neminem melius ostendisse video præter non se-
mel memoratum de l' Isle [loc. cit.], curando videlicet, ut mer-
curii portio per universam tubi cavitatem excurrat, ac per
idem tempus spatia, quæ mercurius excurrendo transit, circino
metiendo, ii tantum seligantur ad spherulas nostras adnectendi,
qui relata æqualitate donati sunt.*

(d) *Attamen, ut hoc præclarum inventum verum, & absolu-*

nere, clarissimi viri, quod vel Romæ, quemadmodum Lutetia Parisiorum accidit, atque Amstelodami, eundem frigoris gradum eius effectus ergo ex non semel laudato Leprotto intellexerim; qua de re eundem clarissimum Musschenbroeckium proximis diebus monui; id scire, ut infra videbitis, aventem. (a)

XIV.

tum omni tempore evadat, atmosphaera pondus in barometro animadvertendum est, idemque in thermoscopiorum praesertim constructione unusquisque diligenter attendat oportet, siquidem quo maius est pondus atmosphaera, animadvertente clarissimo Farberneitio, eo maior item calor est aqua ebullientis; contra vero calor aqua imminuitur, quoties incumbentis atmosphaera pondus imminui videtur; hinc ait doctissimus Boerhaavius: igitur in gradu caloris aqua ferventis designando apprime necessarium esse, ut annotetur simul pondus aeris in barometro, cum aliter nihil certi scribatur. Dum interea verum omnino est, quod illa aqua, quae ebullit, dum atmosphaera pondus manet idem, nunquam plus caloris concipere augmento ignis. Unde hoc modo emendata regula amontonsiana semper vera habetur. Elem. Chem. par. alt. de art. theor. exper. vi. p. m. 84.

(a) Sub finem anni proximi 1746 in manus pervenit meas opusculum quoddam gallice editum, quod continet descriptionem methodi thermometri universalis Lutetia Parisiorum an. 1741 impressum, in quo auctor suum non inscripsit nomen; hoc tamen idem manufactum seorsum videre contigit M. Micheli; eius ergo opusculi auctor libenti animo primo termino, caloris videlicet, nequaquam altero assentitur, qui ad frigus pertinet; idque duabus causis, quarum prima est ne valde singularis, atque, ut opinor, inaudita; siquidem hac in re cum quibusdam sentit, qui contra, atque ipse in omne tempus animadvertit, se observasse dicunt; altera vero est mera suppositio, quam vir bonus facit; videlicet in ea est opinione, ut in regionibus frigidioribus glaciei centrum maiori nitri quantitate, aliisque salibus a nostris discrepantibus refertum sit; quamobrem thermometri liquor, inquit, eis in regionibus plus descendere valet, quam quantum in aliis accidat: utilius tamen foret, ut ego opinor, hunc eundem auctorem curasse ad exemplum clarissimi Musschenbroeckii, ut citius ab aliis experimentum [siquidem experimentis aliorum nequaquam suismetipsis moris est ut fidem praestet] eis in regioni-

XIV. Præterea loco eiusmodi frigoris vel eo uti possumus constanti, & firmo, quod præstantissimus Reaumurius suo Marte, quantum sciam, nactus est, inventum sane nobile, atque perinde æstimandum, ut ego arbitror, ac sit, quod modo commemoravimus clarissimi Amontonii præ calore; quod constans & perpetuum frigus, ut legitur in monumentis Academiæ regiæ scientiarum, pars una salis marini, binæque nivis, tres omnino, vel eius tres partes binæque illius, quinque omnino gignunt, simul ac una ambo permixtæ in aquam solvuntur; etenim transacto eius solutionis puncto temporis, quod fere dicam in instanti, frigus modo enunciatus, quo maius eadem illa occasione nequaquam sentitur, parum se imminuit.

XV. Quemadmodum igitur thermometra a clarissimo de l'Isle excogitata, vel corrigendis barometris [ut una gravitas aeris separetur ab alteratione eiusdem a calore orta] inservire valent (a), iccirco metheorologicas ephemerides legendo aliis singulis possunt fortasse anteponi; qua barometrorum correctione penitus neglecta, eam clarissimo viro in dubium venit fuisse causam, cur multiplices varietates ad montium cacumina, atque ad eorum radices Physici observaverint, quibus in locis aeris temperiem maxime variam esse unumquemque non fugit: verumtamen, Sodales, singula alia thermometra physicorum ædibus minus animo exulare intendo; siquidem ea aeris temperationi observandæ bene hercule inservire valent, atque ultro ostendere, ut animadvertit idem prælaudatus de l'Isle (b), quomodo caloris frigorisque vicissitudines liquores varios, quibus thermoscopia conflantur, diversimode afficiant: porro autem singulorum series thermometrorum merito, Sodales,

Tom. II. P. III.

H h

fer.

bus fieret, quam mera hac uti suppositione; siquidem nos in experimentis, nequaquam in suppositionibus acquiescimus; suppositiones enim, animadvertente clar. viro Musschenbroeckio [elem. de Phys. S. 9] haud posse fore non fucatas ex eo patet, quod easdem fieri a Philosophis non oporteret.

(a) Loc. cit. qua de re vel clarissimum Bulffingerium cogitasse legitur in commentariis Acad. scient. Imper. petrop. tom. II. III.

(b) Loc. cit.

servanda, itemve physicorum bibliothecæ ratione honoris iisdem sunt decorandæ, qui physicæ non sine causa habendus est; etenim in eam illustrandam Philosophi rerum, nequaquam fabularum, auctores magnum sumptum & laborem, ut notum est, insumperunt.

His omnibus habitis tum denique non putavi, Sodales optimi, esse alienum instituto meo ob maiorem totius rei intelligentiam vobiscum communicare, quod ad clarissimum Musschenbroeckium scripseram, ut dictum est, [N. V.] & quod mihi vel ea de re humaniter ipse respondit.

CLAR. VIRO PETRO VAN MUSSCHENBROECKIO
PROFESS. CELEBER.

PETRUS TABARRANUS MED. DOCT. S. D.

NON erit tibi permolestum, opinor, Vir Doctissime, me hominem tibimet prorsus ignotum tecum pauca quadam communicare ad thermoscopia spectantia, pro quibus licet in variis europæ regionibus multi, & præclari viri tecum laboraverint, studioseque cogitaverint, res tamen eo non devenit, ut omnibus careat vitiis, inter quæ illud non parvum, quod tu ipse hucusque tolli non potuisse candide, & sincere [ut eruditorum omnium mos est] confiteris, (a) videlicet vitri ipsius capacitatem calore augeri, eandemque frigore comprimi; iccirco bene ac sapienter inferis; *ex gradibus adscensus non possumus de vera quantitate rarefactionis aliquid certum stabilire* (b). Quod quidem licet abunde pateat ex eo, quod mercurius, seu vini spiritus statim descendat, mox ascendat in tubum, dum sphaera, vel cylindrus alicuius thermometri aquæ calidiori immergitur. (c) Oppositum vero eveniat, si frigidiori aqua immergatur (d); placuit tamen mihi una cum doctissimo viro Antonio Leprotto, Clem. Papæ XII. Archiatro, cui ob singularem erga me benevolentiam plurimum debeo, adhibita machinula clarissimi Bulffingeri (e) rem ad examen revocare. Propterea ab artifice eiusmodi machinarum non imperito fieri curavimus prælaudatam machinulam tubulo recurvo cum phiala vitrea constantem [Fig. 1], cuius inferioris hemisphaerii pars introrsus retracta curvaretur ita, ut exteriori superficiei parallela fieret. Eam spiritu vini in modum thermometri florentini re-

H h 2

ple.

(a) *Elem. Phys.* p. 245.

(b) *loc. cit.*

(c) *Sag. di nat. esper. fat. nell' Accad. del Cim. part. 2. esper.*

1. *Amont. Mémoire de l' Acad. Royale des sciences* 1700. 1705.

(d) *Sag. di nat. esper. loc. cit. Homberg. Mémoire de l' Acad. Royale des sciences* 1710.

(e) *Comment. Acad. scient. imper. petrop. tom. III. p. 243.*

plevimus, eademque ita composita experimenta coram amicis pluries repetita sunt, semperque cum iisdem clarissimi auctoris adamussim convenerunt; videlicet infusa aqua calida in phyalæ huius machinulæ cavitatem subitaneus ascensus, quem vocant *saltulum*, statim visus est, qui a reliquo subsequente ascensu evidentissime distingui poterat. Affusa postea in eandem cavitatem aqua frigida, non ascensus, sed celerimus descensus apparuit. Merfa tandem machinula modo in hanc, modo in illam aquam, ita tamen, ut phyalæ exterior superficies, absque eo quod in concavam nullo modo aqua illaberetur, madefieret, nil aliud, quam quod solet in thermoscopiis vulgaribus, visum est: postrema tamen hæc non tam clare cernebantur, ac superius dicta, ex eo fortasse, quod ad hæc præstantia satis apta non esset machinula; quamobrem alias ab artifice fieri curavi, ut in figuris 2. 3. 4, tubis gracilioribus instructas, ut *saltuli* illi magis conspicui redderentur. Quibus omnibus sæpe ad examen revocatis, matureque perpensis, observatum est, si cum dexteritate mergerentur ita, ut per idem, ut ita dicam, temporis momentum utraque superficies madefieret, nullum fieri *saltulum*, sed aliquem dumtaxat tremorem. Quo viso illud mihi in suspicionem venit, an aliqua ex dictis machinulis ad rem esset pro thermoscopiis quinto antedicto vitio liberandis, si non ex toto ob binas superficies, haud omnino æquales, saltem maiori ex parte ita, ut obtineri valeat absque sensibili errore, si quidem vitra probe constructa sint, vera rarefactionis quantitas. His igitur machinulis quædam fabricavi thermoscopia 3. 4 adhibitis machinulis, tam ex methodo a te, vir præstantissime, tradita, (a) quam ex regulis clarissimi de l'Isle, (b) quæ, si nil aliud, saltem a caloris mutationibus afficiuntur, & quidem multo magis, ut videre contigit, quam quæ cylindris instructa sunt [quod inventum solertissimo Farheneitio, quantum scio, debetur]; eo enim modo, ut idem Farheneitius inquit, *ob maioris superficiei quantitatem, citius a variatione caloris penetrantur* (c). Et certe thermoscopia hæc nostra citissime,

(a) *Elem. Physic. p. 244.*

(b) *Miscell. Berol. tom. iv. p. 343.*

(c) *Philos. transact. Abridg. vol. vi. part. 11. p. 52.*

fime, postquam calefacta sunt, frigescunt, & mercurius citius in tubos ascendit, si phiala, postquam in glacie salis communi immixta manserit, aeri exponatur: contra vero citius idem mercurius descendit, phiala in eandem glaciem immissa: quæ quidem non ita expedite contingere videmus in iis, quæ coniunctum habent cylindrum. Hæc sunt, vir doctissime, quæ pro thermoscopiis corrigendis, & accuratiori ratione construendis excogitavi, quæ an recto, ut dicitur, stent talo, tute ipse iudicabis; ego enim sapientiæ, & singulari tuæ doctrinæ tantum tribuo, ut, si eadem tibi arrideant, de eorum veritate amplius non dubitavero, tanti a me fit tui ipsius iudicium. Vale.

Romæ v. nonas Octobr. 1738.

VIRO

VIRO EXPERIENTISSIMO PETRO TABARRANO

MED. DOCT.

P. VAN MUSSCHENBROECK.

Quo tempore physicæ elementa conscribendam, nondum remedium tollendis omnibus thermometrorum vitiis inveneram, deinde tentando, meditandoque omnia fere sustuli, atque ante annum memoriæ tradidi in opere physico, quod belgico edidi sermone, atque nuper in gallicam linguam versum esse video. Remedium, quod attuli, idem est cum tuo: rem acu tetigisti, gratulorque tuæ sagacitati, & dexteritati: adnotas mercurium in tuis thermometris citius a calore, & frigore affici quam in cylindris, quod a duabus causis pendeat, vel a crassitie vitri, ex quo bulbi cylindrive sunt conflati, vel a magnitudine superficierum eorundem; quo enim superficies maiores, eo maior in intrinsecum contentum mercurium erit caloris externi actio. Præcipua ratio cylindrorum tubis adnexorum fuit, ut facillime determinaretur proportio inter capacitatem cylindri, & tubi, ut construi possent plurima thermoscopia pari passu ambulancia, atque ad eandem accommodata scalam (a): hoc difficilius tuis concavis impressivæ spheris obtinebis (b). Sed aliqua manet & vix superanda difficultas; nempe omne vitrum non est æque durum, alterum citius ab igne emollitur, alterum difficilius: hoc fortius trahit mercurium, hoc imbecillius: hoc porosius est altero: & inspicere tuborum internas externasve superficies, vitrum, invenies asperiori, alterum læviori superficie donatum; quo evenit ut mercurius in tubum hunc facilius adscendat, quam in alterum (c). Quamobrem si bona thermoscopia parare volueris, uno & eodem vitro pro omnibus utare; elige quod limpidissimam, & politissimam superficiem acquirit: men-
fura

(a) Vid. num. ix.

(b) vid. loc. cit.

(c) Hac de re consule clariss. viri Comment. ad tentam. exper. nat. cap. in Acad. del Cim. pag. 10.

fura accurate per pares quaslibet portiones tuborum, ut capacitatem partium noscas (a), atque ita accommodes scalam; in hoc solo maximum situm est arcanum.

Si possideas thermoscopium ad scalam Farheneitii, vel Reaumurii fabrefactum, tum oro, ut experimentum capias, an Romæ idem frigus desideretur, ut aqua in glaciem abeat, quam Amstelodami (b): si autem quædam alia nova physicam spectantia Romæ sint detecta, eaque mecum communicare volueris, nostra hollandica etiam remittam; nunc autem officiosissime salutatus, Vale.

x. Novembr. 1738. Ultrajecti.

Epi-

(a) N. XIII.

(b) Idibus Februarii 1739 cum essem Lucæ accepi hanc viri clarissimi litteram, moxque clarissimum Leprotum oravi, ut Romæ eius rei periculum faceret, siquidem eiusmodi thermometra eundem possidere me non latebat: quamobrem factò Romæ periculo, observationem frigoris, quo aqua Romæ conglaciatur, adamussim congruere cum ea, quæ hac super re facta est Amstelodami, mihi statim rescripsit; cuius rei, ut supra dictum est N. XIII, certiozem feci clarissimum virum; verum postea nullum ab eodem responsum tuli: ita ut, an litteræ inde redditæ sint, animi pendeam.

*Epistola, in qua fons describitur ab avulso nemore
luculenter auctus.*

Q UOD nuper tibi pollicitus sum, me fontem quam primum tibi descripturum, quem Carolus Dominicus Orsuccijs Patritius Lucensis non parum auctum fore nobiscum loquens forte meminit, postquam nemus ad conferendas oleas in quodam suo prædio eradica-verit, libenter facio, quum vel diligens, & prudens agricola, qui ei prædio, aliisque rebus faciundis præest, id omne verum esse candide testatus est; tum etiam egomet eius rei veritatem plane agnovi. Id igitur prædium in plano sic dicto Mommi quarto a Camaiore circiter lapide meridiem versus, atque occasum solis in conspectu Vieregii situm esse scito; quod prædium modo a nobili Lucensi familia Busdraghiorum ære non paucò emit; partim enim in planitie est, partim in colle non valde excelso collocatur, ubi super cetera sylvæ, pulcherrimumve olivetum extant; excelsiori vero loco eidem sylvæ, atque oliveto finitimo nemus, quod dixi, aderat quamplurimis ingentibusque ilicibus consitum; quod nemus non modica impensa cultum reddidit ilicum loco oleis infertis.

Ad extremitatem igitur eius nemoris in vicinia videlicet oliveti fonticulus prorumpibat, cuius aqua, postquam nemus fuit, ut dictum est, eradicatum, ita adaucta cernitur, ut memoratus Orsuccijs trapetum ad terendas oleas ibidem ædificare cogitaverit; etenim in præsens fontis aquam sic auctam ei quodammodo sufficere trapeto non temere opinatur. Fons iste, nisi multum ego fallor, firmum ratumque facit eum ipsum, quem Plinius ab exciso nemore in hemo exortum esse tradit (a), de quo ab eodem Seneca fit mentio, atque de Theophrasto didicisse ait [b], tametsi
ratio-

(a) *Nascuntur fontes decisis plerumque sylvis, quos arborum alimenta consumebant. Sicuti in hemo, obsidente Gallos Cassandro, cum valli gratia sylvas cecidissent ec. Nat. hist. lib. 31 cap. 4.*

(b) *Natur. quæst. lib. 3 cap. 11.*

quod sic elaboratum aquam pluviam arcet atque continet, quod antea nequaquam accidebat, quum durum, desertum, incultumque foret solum, extra quod aqua pluvia facilius diffluere valebat.

Porro hac in re ei forte esset sermoni locus, si solum modo descriptum evolutum, nudatumque fuisset arboribus, verum ingentibus densisque ilicibus, ut dictum est, refer- tum erat; iccirco aqua pluvia non tam facile, ut inquiunt, diffluere poterat; præterquamquod si solum excultum, atque ideo singulis nudatum ilicibus, arcendo retinendoque aquas pluvias ex eorum sententia eius augmenti aquæ fonticuli impræsentiarum causa est; his ergo argumentis infero, quod aqua pluvia retenta, ut aiunt, hoc auxit fonticuli aquam, quod a plantis haud amplius sit attracta & consumpta, quum idem solum vel sit, quemadmodum non semel scriptum est, singulis nudatum arboribus. Hæc sunt, quæ mente versabam, ut tibi nota essent. Plura scripsissem, verum ea tibi fat esse intelligo. Vale.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.



IOANNIS ANTONII GALLI

*De nonimestri fœtu extra uterum aucto, & mortuo
per abdomen vivæ matris extracto.*

Quod fœtus extra uterum nutriri possit, & augeri res notissima est, neque unica observatione confirmata. Negari quidem non potest, quod res simul rarissima sit. At tempus fecit, ne saltem nostris hisce temporibus iterum observari desideraretur. Vobis etenim, Sodales ornatissimi, adhuc memoria non excidit, me duobus ab hinc annis e viva matre per abdomen mortuum extraxisse fœtum nonimestrem extra uterum nutritum, & auctum. Quo evulgato id porro evenit, quod de rebus rarissimis solet, ut nempe, excitatis hinc illinc sermonibus variis, statim quæ rei circumstantiæ maioris momenti essent, a quampluribus infirmarentur, imo a nonnullis etiam omnino negarentur. Ex quo sane mecum ipse reputavi, cum primum in hoc ornatissimo, lectissimoque conventu vestro meditatam aliquid de scripto recitare debuissem, mihi de re ipsa, veritatis causa, differendum esse, quod ne videar minus clarè, & inutiliter fecisse, dissertationem dividam in duas partes, quarum prima complectar prægnationis historiam; fœtus, & secundinarum per abdomen extractionem; quæque post matris obitum de sacco, de utero, de tubis, & ovariis observaverim; altera autem nonnullas adiungam animadversiones ad physicam alias, alias ad praxim spectaturas. Ut vestras demum vos ipsi adiungatis oro, obtestorque. Sic quod pro vestrum, pro rei, pro loci dignitate certe ex me defuturum erit, per vos ipsos addetur cumulatissime.

Mulier duos circiter supra triginta annos nata, habitus plenioris, & succulenti, quamquam per decennium iuveni viro iuncta, unicam tamen, & quidem molestissimam graviditatem felici iam partu compleverat. Anno millesimo

septingentesimo quadagesimo tertio ante kalendas decembris alterius prægnationis minus dubia habere cœpit argumenta. Præter illa multa, ob quæ pluribus molesta, ipsi autem hæc etiam molestissima fuit graviditas, hoc unum addebatur, quod frequentes, & fere diuturnos pateretur dolores ad hypogastrium, eoque maiores præsertim cum supra latus sinistrum decumberet. Ad quintum circiter mensem tanta illi accessit molestia a graviditate, ut ad opem aliquam postulandam impelleretur, quamquam patientis esset, fortisque animi mulier. Primum vocata fuit in auxilium obstetricula, quæ statim os uteri explorans, imminentem abortum pronunciavit. Quænam inde habuerit certa signa, mihi prorsus non constat; constant quidem multa, & validissima, quæ urgente obstetrice fuerunt a muliere non omissa tentamina ad abortiendum, de quibus tandem frustrata una cum obstetrice graviditatem ipsam in dubium revocavit. Ad definiendam ideo vocatus ego potui ex multis argumentis satis validam habere de graviditate suspicionem; ex oris vero uteri exploratione, quamquam ad sextum mensem properasset graviditas, ne minimam quidem habere potui. Supererat persentire motus fœtus, de quibus iam certa dicebatur mater; at ego non nisi circa septimum mensem per manum ventri admotam tam certos, & distinctos percepi, ut quam antea solummodo suspicatus eram, modo pro certo haberem graviditatem, etsi status oris uteri tunc temporis per me iterum explorati constanter excluderet quamcumque graviditatis opinionem. Quod sane unum cum sæpe numero mente revolverem, numquam potui cum altero conciliare certissimo graviditatis signo, nempe motibus fœtus, nisi hunc extra uterum versari excogitarem. Mulier interim & a molestissima prægnatione, & a doloribus universo abdômini additis eo fortius sollicitabatur. Novissimis mensibus accedebant vomitus fere continuus, inappetentia, sitis multa, urinæ paucæ, alvus strictissima, languidus oculorum aspectus, facies subflavo colore fœdata, vigiliæ, febres, universi corporis macies. In hoc rerum statu impatiens expectaverat partum prope kalendas septembris, quando pariendi doloribus, ut ipsa aiebat, per tres, quatuorve dies, & fœtus insolitis, violentissimisque motibus vexata, de repente in gravem incidit syncopem, a qua
resti-

restituta nullis amplius pariendi doloribus, nullisve fœtus motibus sollicitari facta est; sed gravi potius, & insolito premi pondere ad fundum abdominis, cum federet, aut ad latus, supra quod decumberet. Urgentibus descriptis doloribus mucositates sanguineæ, quales imminentem partum præcedere solent, e pudendis identidem fluxerunt, quibus impulsus ad os uteri denuo explorandum, illud tetigi non ut alias occlusum semper, resistens, & prominens, glandis extremo non dissimile, sed complanatum, molliusculum, imo apertum ita, ut medii digiti extremo ingredi facile permetteret in uteri cavum, quod inveniens omnino vacuum, ut in non prægnantibus est, de fœtu extra uterum concepto, & adhuc existente aperte, & tuto commonere, constanterque sustinere non amplius dubitavi.

Aeque potuissim & facilem, & tutam, & minus laboriosam per abdomen extractionem prægnanti mulieri polliceri: unicum certe, & extremum præsidium. At ipsa rei novitate, raritate, incertitudine, periculo percussa animo maluit exitum naturæ providentiæ, quam artis industriæ committere.

Per mensem, & ultra inter metum, & spem, inter plurimum obstetricum, & muliercularum opiniones, suasionesve, quas fingere vobis potestis & quantas, & quam inanes, & inauditas, inter varios animi affectus, & anxietates; per mensem [inquam] & ultra fœtum mortuum abdomine gessit non sine aliorum symptomatum accessione. Inter graviora notavi ventris onerosam molem, & proci dentiam, quo se verteret; cadaverosum, & male olentem spiritum; febriles motus irregulares cum intenso frigore, & fere continua inhorrescentia; frequentes repentinos lapsus in animi defectiones; abdominis ac si magno hydrope, vel enormi abscessu tumeret, tantam distensionem, & pulsationem, ut quomodocumque sita deficere, & suffocari videretur. Per quæ sane multa, & omnia gravissima, & periculosissima cum mulier in certo, & proximo vitæ discrimine versari se tandem cognovisset, extractionem fœtus per abdomen etiam, atque etiam a me postulavit.

Quamquam spes boni exitus mihi esset desperatissima, ut tamen animadverti mulierem viribus constare adhuc factis, & forti animo esse; operationem vero ad vitam saltem pro-

protrahendam tutam fatis, utilem, & consonam fore, illam suscipere non renui, dummodo ad probandam auctoritate, ad confirmandam præsentia, ad iuvandam consilio vocaretur Petrus Paullus Molinellius, quem in rebus chirurgicis habui Magistrum ingenio, doctrina, integritate præstantissimum.

Octavo idus octobris ad patientem convenimus ambo; quæ inter nos prius excitatæ fuerunt animadversiones non de fœtus extra uterum existentia, non de extrahendi per abdomen necessitate versabantur. Erant hæc tam certa, & evidentiâ, quam quæ maxime; multo minus in controversiam venit, an simul, & semel, an per intervalla aperiendum abdomen, & fœtus extrahendus. Circumstantiis in operando visa est res committenda. Fuerunt quidem de loco abdominis aperiendo, de operandi methodo, de patientis situatione.

Quoad primum = ex maiori dolorum constantia, decubitus difficultate, contentique fluidi repercussione in sinistro, quam in dextero latere, sinistra statuimus aperire media quasi via inter ossis ilei angulum superiorem, & umbilicum.

Quoad secundum = duximus aliis præferre instrumentis scalpellum (Gallis bistouri) eoque recta per abdomen ad tres transversos digitos dividere primum integumenta, postea ope sulcati specilli musculos, peritoneum inde, tandem faccum, in quo fœtus containeretur.

Quoad postremum = illam collocare sedentem ad lecti marginem constituimus, ne inter operandum, si iacuisset, præ suffocatione, qua sæpissime opprimebatur, sursum elevare cogere mur.

Post hæc ad incisionem. Simul ut faccum penetravi, statim fluxit pleno gurgite serum putridum, faniosum, atro sanguine tinctum, fœtentissimum. Præter capillos fœtus non aliud quidpiam sibi mixtum habebat. Hic tum ad decem circiter libras fluere sinimus non parvo cum respirationis levamine. Ut longe copiosius flueret, sineremus; adhuc enim ex tumente abdomine, & repercussionis sensu non tenuem copiam contineri deprehendebatur. Verum fatius existimavimus occludere vulnus, & mulierem in lecto iacentem collocare, priusquam syncope non admodum remota

mota corripere, viresque frangerentur.

Ad vulneris ideo deligationem statim conversi prius linteam, & mollem turundam butyro illitam intrusimus, deinde siccis cylindricis glomeribus cum adnexo filo totam plagam implevimus; demum superimpositis spleniis spiritu vini imbutis cum satis lato mantili firmavimus. Ne supra vulnus decumberet ægram commonuimus; ut cibo tenui, & cardiacis reficeretur, commendavimus.

Neque hoc primum male cecidit. Somnum, quem tamdiu vix tenere potuerat, cœpit per aliquot horas: cibum, quem vomere solebat, retinuit: vix correpta syncope: vix spiritus angustia: de vulnere parum dolens lecto per totam noctem iacuit, ut sitam reliquimus.

Summo mane detecto vulnere, glomeribusque omnibus eductis simul cum turunda, ferum eiusdem prorsus, ut antea, conditionis ad duas libras, & ultra effluxit. Sistebatur identidem inter fluendum ob fœtum os vulneris occludentem. Quod ne iterum esset, firmiori mulieris statu animatus vulnus dilatavi. Tunc, ægra nonnihil supra vulnus inclinata, multum fluxit humoris, & promptius. Digitis intromissis brachium fœtus facile tetigi, saccum autem peritoneo intime adhærere cognovi.

Quid ergo tum deerat præter fœtus extractionem? ad eam persolvendam nonnulla urgebant, ad ferendam vero satis virium ægræ adhuc non esse ex eo constabat, quod propter evacuationem vix copiosiore quasi in syncopem laboretur. Cardiacis itaque, iusculis, cibo, somno ultro refecta ipsa voluit fœtum extrahi septima a vulnere die. Quamquam ille per septem fere hebdomadas mortuus, adhuc tamen carnosus erat, & bene completus. Ergo ne integer extrahendus? Postulasset vulnus nimis amplum. At placuit periculo potius, quam commodo, & brevitati in operando consulere, ideoque frustatim educere, quod tamen nedum fieri potuisset sine prævia vulneris ulteriori dilatatione.

Vulnus itaque prius ad pollicem transversum hinc inde dilatari, in quo faciendo, ut primum, sic modo res feliciter cecidit; vix etenim paucæ fluxerunt sanguinis guttæ. Statim ad exitum se se obtulit brachium fœtus sinistrum, quod digitorum auxilio ad scapulam usque extractum cultro

ab

ab ipsa separavi. Ea deinde forcipe, qua Cheseldenus utitur in calculo sua methodo e vesica extrahendo, & crura, & femora, & dexterum brachium, & quamlibet aliam fœtus partem pro libituprehendere, & comprimere, & frangere, ad os autem vulneris trahere, & tenere, & dividere commodissime potui ægra semper æque bene ferente.

Inter extrahendum observavi, quod tantum putrescere cœperant vertex capitis, abdomen, & funiculus umbilicalis, cuius ideo viribus niti non potui ad placentam extrahendam. Oportuit ergo ut manum usque ad pollicem intromitterem, qua ad ileum reflexa statim illam inveni solito quidem crassiore, compactioreque, nec non suppositis partibus admodum adhærentem, non adeo vero ut non potuerim illam ab ipsis sensim, sensimque divellere, & integram extrahere. Insignibus hæc donata erat sanguiferis vasis, &, quod insolitum, tota subnigro colore fœdata, quo ipso fœdatam vidi eam, quæ in conspectum venire potuerat, sacci portionem. Extracta placenta de membranis nihil observavi. Utrum consumptæ fuissent, utrum sacco communes, dicere non auderem; de sacco quidem dicam, quod propter nimiam cum circumpositis partibus adhæSIONEM, ne levem quidem portiunculam potui separare.

Ad vulneris ideo deligationem conversus iuxta primam methodum absolvi citissime, non quin ab ægrotantis intolerantia sollicitarer, sed quia ego ipse præ nimis gravi fœtore non semel quasi deficere autumaverim.

Propter multam humoris fluentis copiam bis hætenus in die vulnus curaveram, & bis imposterum debui eandem omnino ob causam. Hoc solum interfuit, quod humor ante fœtus extractionem fluebat fœtens maxime, serosus magis, & sanguinolentus; post illam vix male olebat, saniemque potius subnigram fere semper æmulabatur. Sequenti die vulneris ora inveni pari nigredine colorata, ceterum mollia, & humida. Nullus interim in abdomine dolor, distensio nulla, nulla maior virium iactura, somnus quietus, ciborum tolerantia; ad summum eo res redibat, ut nihil præterea id temporis expetendum videretur.

At quantum spei ex his colligeretur, tantum adimebant constans, & in dies copiosa saniosi humoris in fac-

cum

cum collectio ; & inde aucta universi corporis macies .

Reipsa ægra undecima a prima operatione die febricula cum multo frigore correpta fuit . Accesserunt illico summa spirandi difficultas , deglutitio impedita , ciborum intolerantia , extrema virium deperditio , animi frequentes defectiones , demum lethales convulsiones , inter quas circa vespeream occubuit nono kalendas novembris .

Habita in cadavere abdominis sectione coram prælaudato Molinello invenimus saccum , in quo fœtus fuerat contentus , adhuc ita extensum , ut fere totam occuparet cavitatem ; partibus autem singulis illi undequaque circumpositis ita intime adhærebat , vix ut portiuncula disjungi cultro potuisset ; intimam præterea habebat superficiem plane subnigram , crassitiem vero , qualis est tenuis intestini , præter portionem , cui adhæserat placenta , & qua sinistrum ileum respiciebat ; ibi etenim magis compactum erat , resistens , & crassum . Quoad tubas , & ovaria , erant dextrorsum aliqua satis manifesta vestigia utriusque ; at sinistrorsum non ita ; patebat enim quidem sinistræ tubæ osculum in uterum ; verum immissum in illud specillum vix unam , aut alteram lineam poterat introduci ; eoque non solum , sed etiam diligenti inspectione postea constitit , tubæ in suo per uteri substantiam cursu fuisse magnam partem obstructam .

Ceterum ne minimum quidem extra uterum sinistræ tubæ , aut ovarii vestigium apparebat , sed harum partium locum crassi , & anfractibus interrupti sacci parietes obtinebant . Demum uterus conspiciebatur is prorsus , qui in non gravidis solet . Notandum hoc tantummodo fuerat , quod eius substantiæ supra sinistram tubam adnatus erat tumor , qui magnitudine , colore , contentisque sorbum æmulabatur . Tubam ipsam visus est comprimere , & occludere . Cetera , quæ sunt abdominis , viscera tantum vidimus exsucca , & contracta , quantum in tabe extrema confectis solent reperiri . Plura observare neque res postulaverat ; neque aliud quidquam peculiari dignum observatione .

Haftenus ergo abdominis sectionem , atque etiam totius rei si minus ornatam , attamen sinceram , & integram commemorationem sum executus . Nunc alteram ingredior dissertationis partem , qua mihi proposui animadversiones nonnullas .

las complecti ad praxim alteras, alteras ad physicam spectaturas; atque de his nunc primum.

Non semel reperti sunt fœtus extra uterum enutriti, & aucti, ex quo dubium omne de conceptu ex ovo evelli prorsus debuisset. Nihilominus dum opinio hæc tam evidentibus comprobata observationibus communiter accipiebatur, Moebius alter observationes ipsas Paracelsi fabulis comparavit, quin imo adversus historiam præ ceteris singularem a celebri chirurgo Abrahamo Cypriano conscriptam non paucas edidit animadversiones. De his quidem non hic mihi sumo iudicium ferre.

Hoc potius mihi sumerem, ut per hanc meam novissimam observationem ceteris antea habitis adiunctam opinioni conceptus ex ovo ceteroquin probatissimæ tantum addi posset firmitatis, & roboris, quantum controversiis, & animadversionibus aliis vel nullum, vel levissimum saltem locum relinqueret.

Reverà non agitur de fœtu tam parvulo, & vix concepto, ut hæsitandum sit, an fingi potuerint rudimenta in membranulis ovarii, aut tubæ aliqua alia ex causa alteratis. Fœtus hic omne iam ceperat incrementum extra uterum, totamque ætatem in tenebris expleverat. Longe minus naturæ tribuendum, quod ad exitum fœtui promovendum adeo omnia evertere, & commutare potuerit, ut inde habitæ observationi nullatenus fidendum sit. Natura licet fœtum hunc tamdiu mortuum abdomine servasset, nedum viam ad expellendum aperire tentaverat aut ulcere, aut alia quadam morbosa partium alteratione. Uterus ipse quocumque graviditatis tempore exploratus, atque etiam post obitum matris diligentissime dissectus, cum integritate, & magnitudine idem semper fuerit, ac qui in non prægnantibus solet, suspicionem omnem tollit, quod fœtus utero disrupto, & lacerato sibi viam fecerit in abdominis cavitate, quod etiam ex hoc longius abest, quod ipse una cum placenta intacto utero ex peculiari sacco fuerit extractus. Demum in defuncta muliere commoda investigatio utriusque tubæ, & ovarii, uteri etiam, & integri sacci, in quo fœtus includebatur, præsentem Viro in anatomicis æque ac chirurgicis versatissimo, & probatissimo, videtur alteri anteponenda habitæ inter fœtum extrahendum viva superstite matre.

matre. Dum sanguis effunditur, dum partes dolore contrahuntur, dum patiens agitur, & conqueritur, & tubas, & ovaria, & parvulum uterum vix supra pelvim eminentem per vulnus prope umbilicum commode perlustrare, libere evolvere, & quanta oporteat diligentia contemplari (quæ omnia nobis persuadere voluit Cyprianus se optime facere potuisse) quam difficile sit, quisque iudicabit in chirurgicis operationibus vel mediocriter versatus.

Verum ne plus meis tribuere, quam quæ aliorum sunt, videar æstimare, mittamus hæc, conversi libentius ad tumorem considerandum uteri substantiæ adnatum. Quoties iam quoties naturæ industria, consilio, providentia, factum est, ut præternaturalibus ad veram rerum naturalium, & quidem magis absconditarum cognitionem perduceremur! Ita porro tumore isto. Is ex illis mihi visus fuit, qui lentissime fiunt, crescunt, & ad suppurationem perveniunt. Propter situm vere tubam comprimebat, & occludebat. Cur stylus per tubæ osculum in uterum hians facile intromissus tubam ad tumorem usque, non ultro penetrabat? Cur tuba ipsa ab uteri osculo usque ad tumorem conspicua, ultra vero una cum ovario in saccum oblitterata? Sed quantum de tumore hæc clara, & vera, tantum a controversia non abest, an ipse fuerit impedimento, quin fœcundatum ovum transiret per tubam in uterum, an potius tumorem ipsum fecerit transitus fœcundato ovo alia ex causa denegatus. Utrum ex his probabilius sit, primum ne, an secundum, Physici videant, & definiant. Si forte primum, ad id saltem hæc mea fecisset observatio, ut non magis de conceptu ex ovo opinio confirmaretur, quam alia de ovi fœcundatione a feminali aura per vias sanguinis ad ovarium translata vel maxime probaretur.

De tumore satis. Tria adhuc restant, quæ mihi videntur non esse absque aliqua animadversione prætereunda. Occurrit primo placenta duplo maior solito, nec non insignioribus sanguiferis vasis locupletata; circa quam animadvertant, qui fœtum per sanguinem nutriri auctumant, num magis eorum opinioni favere possit admirabilis hæc naturæ sollicitudo, dum quem non potuerat copiosum, & elaboratum per uterum fœtui suppeditare, fecerit per placentam duplo maiorem, sicque voluerit, ut suppeterent uteri defe-

Etui illius magnitudo, & vasorum copia, per quæ necessaria foetui non defuisset ad nutritionem sanguinis redundantia.

Alterum, quod animadversione dignum est, consistit in intima adhæssione totius facci cum partibus circumpositis, quod licet primo intuitu a morbofo statu repeti posse suadeant tot observationes in cadaveribus phtysi, inflammatione, vel alio simili morbo confectis, in quibus viscera aut cavitatibus, aut sibi invicem adhærere reperta sunt; attamen non ab aliqua etiam alienum esset probabilitate utili cuidam naturæ artificio tribuere, quæ si de vegetabilibus sollicita ad arbores quandoque, imo ad parietes annectit conflulendi causa nonnullorum expansioni, incremento, & adminiculo, quo plus de foetu erit extra uterum, pro quo ideo desideretur, ubi tuto contineatur, unde foveatur, & uberius nutriatur.

Postremum respicit uterum ipsum, qui licet nullius usus in hac graviditate fuisset, ideoque semper ore clausus, tamen apertus est urgentibus deprimentibus, & expulsivis doloribus consueto pariendi tempore. Ergo ne exitimandum pro partu a foetu excitari, ut contrahatur fundo, & aperiat ore ad illum expellendum, si tum fecerit, cum nullum contineret; an potius a divina quadam supremi artificis moveri lege, & mechanismo, quemadmodum naturalis historix cultoribus mirari non raro contingit, dum certis temporibus aliqua vident id, quod continebant, expromere, & veluti in lucem edere? Utcumque tamen id sit, observatio hæc nostra, si non veram, cur uterus in partu aperiat, causam ostendit, quæ tamen ad hanc rem explicandam, ut modo hæctenus excogitata sunt, ad unam omnes, nisi admodum fallor, ostendit pugnare cum veritate. Sed iam ad practica me convertam.

Certa non haberi incipientis graviditatis signa abunde satis comprobatur quotidiana experientia. Quot enim mulieres tunc vere gravidæ non sunt, cum esse magis censebantur? & quot aliæ vere gravidæ deteguntur, quibus nec minimum erat indicium, unde esse suspicarentur? Incunti saltem graviditati nedum signa certa deessent, si quæ pro minus incertis habenda, virginibus etiam singula sæpenumero non acciderent a solo menstruorum defectu. Quot gravi-
dis

dis recurrerunt menstrua, quibus non gravidis defuerunt? Lac ipsum (ut probabiliora sequar) e mammis excerni quamplurimis gravidis non continget. Virginibus autem non semel contigisse accipitur. Quocumque ergo graviditatis tempore solus erit de illa suspitioni locus, certitudini autem nullus? nequaquam. Motus tandem foetus, & oris uteri status tam certa apud me sunt graviditatis signa, quam quæ esse, quin simul, & semper veram fuisse graviditatem observaverim. Hinc est, quod si utrumque deerit omnino, nec vera sit, nec falsa tam intra, quam extra uterum graviditas; si deerit primum, indicium erit, aut falsam esse graviditatem, aut si vera, proximum morti futurum foetum. At si tantummodo deerit secundum, scilicet oris uteri status nunquam mutetur, motus autem foetus in abdomine crescant, & distincte persentiantur, vere constabit de foetus existentia extra uterum. Id sane in causa fuit, cur duos ante novissimum graviditatis mensem de foetu extra uterum non falso suspicarer. Monet equidem gravissimus chirurgiæ Scriptor, dum indicia quærit foetus extra uterum existentis, monet (inquam) præter alia graviditati communia, duo ista accedere, quod urgentibus partus doloribus os uteri non aperiatur, & aquæ ad ipsum non colligantur.

Observatione hac mea constaret, & dignosci id posse longe prius, quam partus dolores urgeant, & urgentibus ipsis adhuc os uteri aperi.

Addam me vidisse mulierem, cui post diuturnos dolores, neque uterus apertus fuit, neque aquæ collectæ, quamquam nonimestrem foetum utero gereret, ut post matris obitum constitit ex abdominis, & uteri sectione.

Ne tamen dum hæc addo, existimetis, me facere animo tanto Viro adversandi, cui fateor me tam tribuere, quam literatissimi omnes. Imo hæc, & alia quæque a me hætenus dicta ita velim accipiatis, ac si vestris subiicerem disquisitionibus. Neque alio certe in illis proponendis spectavi, nisi ut vestrum magis ingenium excitarem, quam de meo periclitarer.

ROGERII IOSEPHI BOSCOVICHII

*De motu corporis attracti in centrum immobile
viribus decrescentibus in ratione distantiarum
reciproca duplicata in spatiis
non resistantibus.*

Neminem iam latet Matheos cultorem virium centralium theoria, quam Hugenius primus attigit, & horologiis oscillatorii applicavit, Newtonus ita perfecit, & ad astronomiam transtulit tam felici successu, ut vix quidquam in eo genere desiderari posse videatur. Multa ille quidem, Viri doctissimi, & elegantissima theoremata demonstravit, & difficillima problemata solvit summo tum Mechanicæ, tum Geometriæ fructu, quas methodis nulli ante ipsum usitatis mirum in modum auxit, ditavitque; ex quibus illa, quæ pertinent ad definiendos motus in sectionibus conicis corporis agitati versus centrum immobile viribus decrescentibus in eadem ratione, in qua crescunt distantiarum quadrata, non quidem maxime omnium ardua, atque inaccessa, sed vel eo nomine maximi usus, quod tam feliciter keplerianas Planetarum leges cum simplicissimis mechanicæ principiis concilient, ita iam ubique prostant, ut prorsus supervacaneus videatur labor, in re adeo pertractata versari. At præterquamquod in iis etiam, quæ maxime pervulgata sunt, atque trita, fieri sæpe solet, ut quædam, licet non penitus contemnenda, ab aliis tamen vel neglecta, vel etiam nequaquam animadversa exciderint, quæ novo cuidam veluti spicilegio locum relinquunt; arbitrati sumus futurum profecto operæ pretium, si ex iis alia dilucidius exponeremus, alia nova methodo adhibita vel simplicius, vel accuratius demonstraremus. Accedit quod cum nonnulla, quæ ad infinitorum indolem, atque usum pertinent, Geometris nec iniucunda, ut speramus, nec inutilia pro-

proferre meditaremur; ea quidem non nisi tam nobili, & aliunde iam satis cognito, atque perspecto illustranda exemplo esse duximus; ubi etiam occasione arrepta, celebre velut mysterium quoddam, quod Eulerus, summus ceteroquin vir, & de universa Mathesi optime meritus, at cæco formularum ductui, nostro quidem iudicio, plus æquo tribuens, inseruit haud ita pridem primo tomo mechanicæ, exponeamus, atque enodabimus, & vitium fallacis argumentationis, qua sententiam omnino incredibilem confirmare maxime nititur, aperiemus. De consilio satis: aggrediamur rem ipsam.

I. Admittimus in corporibus, ut rationi, & phænomenis conformem, vim inertix, sive determinationem quandam retinendi eum statum quietis, vel motus uniformis in directum, in quo semel sunt posita, nisi vires impressæ cogant statum mutare. Eam tamen inertix vim nec ex phænomenis, nec a priori demonstrari posse censemus. Vires alias metimur mutatione status, quam inducunt tempore quam minimo; & agnoscimus compositionem motus, qua fit, ut corpus binis viribus sollicitatum in fine cuiusque temporis sit in angulo opposito eius parallelogrammi, cuius latera singula percurrisset singulis viribus seorsim agentibus; unde illud etiam consequitur, si vis utraque agat initio temporis tantummodo, describi ipsam parallelogrammi diametrum motu æquabili.

II. Si vis quæpiam constans æqualiter, & secundum eandem directionem agat in corpus sola vi inertix prædictum initio tempusculorum æqualium; celeritates in fine temporum, continentium quascumque summas eorum tempusculorum, erunt, ut ipsa tempora, & spatia computata a primo illo tempusculo crescent secundum seriem numerorum naturalium 1. 2. 3 &c.: unde facile deducuntur hæc duo: 1. Si a spatiis, quæ percurruntur usque ad finem temporum, continentium quascunque summas tempusculorum æqualium, dematur dimidium spatioli postremo tempusculo descripti; erunt residua accurate ut quadrata temporum, vel ut quadrata celeritatum. 2. Si toto eo tempore habuisset corpus velocitatem, quam habet in fine, percurrisset accurate duplum eius residui.

III. Nam in *Fig. 1*, cuius constructio ex ipsa inspectione

ne

ne patet; si tempuscula æqualia exponantur rectis æqualibus AB, BC, CD &c., spatia descripta rectangulis BK, CM, DO &c. Spatia, quæ percurreuntur binis temporibus quibuscumque AD, AE, erunt ut summæ eorum rectangulorum, five ut areæ ADPOMK, AEGTOMK. Si ab iis areis auferantur triangula omnia AKL, LMN, NOP &c.; remanebunt triangula ADP, AEG, quæ erunt, ut quadrata laterum homologorum AD, AE exprimentium tempora. Sed illa triangula exprimunt dimidium spatii postremo tempusculo descripti, cum sint dimidia rectangulorum BK, VM &c., adeoque & DV, ZN &c. vel EH, FI &c. Patet igitur primum. Velocitate vero, quæ habetur postremo tempusculo, confecta fuissent singulis tempusculis spatia æqualia expressa per BQ, CR, DS &c., adeoque toto tempore AE spatium expressum per AEGQ duplum trianguli EGA, quod triangulum est excessus spatii AEGTOK supra dimidium postremi ET. Patet igitur & alterum.

IV. Hinc si ea tempuscula concipiantur infinite parva; erit æquipollenter dimidium spatioli percurfi primo tempusculo, ad spatium percursum tempore finito, ut quadratum primi tempusculi ad quadratum temporis eiusdem, & celeritate acquisita in fine ipsius temporis manente per totum tempus, absolveretur æquipollenter duplum spatii descripti motu ita uniformiter accelerato: spatium enim postremo tempusculo descriptum respectu totius spatii descripti tempore finito evadit infinite parvum, & tuto contemnitur.

V. Si aucto numero eorum tempusculorum in infinitum, ipsa demum ita evanescant, ut actio evadat continua; erunt spatia quibuscumque temporibus descripta, ut quadrata temporum accurate, adeoque totum spatium tempusculo utcumque parvo descriptum ad spatium descriptum tempore finito, erit ut quadratum ipsius tempusculi ad quadratum temporis finiti. Quamobrem si pro mensura virium perpetuo agentium assumitur spatium percursum tempusculo indefinite parvo; assumi debet pro mensura virium, quæ concipiantur agere per intervalla tempusculorum æqualium, dimidium spatii primo tempusculo percurfi.

VI. Corpus præditum sola vi inertie proiectum ex A (Fig. 2) secundum directionem AC tempusculo indefinite parvo percurrat AB. Secundo tempusculo æquali percurreret

ret per n. 1 BI æqualem BA, & positam in directum. Sed si in B agatur versus datum punctum F vi, qua seorsim agente percurreret BH; percurreret per n. 1 diametrum BD parallelogrammi HBID. Sequenti tempusculo vi inertix percurreret pariter DP æqualem DB, sed si in D urgeatur versus F vi, qua seorsim agente describeret DL, abibit per diametrum DE parallelogrammi DPEL; & ita porro si initio sequentium tempusculorum æqualium urgeatur versus idem punctum F viribus quibuscumque; deferetur semper per diametros parallelogrammorum, & describet latera poligoni ABDEKabd &c. positi in plano immobili rectorum FA, AC.

VII. Omnium triangulorum AFB, BFD, DFE &c. æquales erunt areæ inter se. Ducta enim FI, triangula AFB, BFI ob bases AB, BI æquales, & altitudinem in F communem, æqualia sunt: pariter æqualia sunt BFI, BFD constituta super eadem basi FB, & inter easdem parallelas FB, DI: ac proinde etiam FBA, FBD æquantur inter se; eodemque argumento æquantur FBD, FDE &c. Inde sequitur areas, quas percurrit, & quasi verrit recta coniungens corpus cum centro virium F, sive areas clausas perimetro descripta a corpore, & rectis coniungentibus extrema puncta perimetri ipsius cum puncto F, fore ut tempora, quibus percurruntur, quia continebunt eundem numerum æqualium triangulorum, quem numerum æqualium tempusculorum continent ea tempora.

VIII. Vires, quas corpus habet in punctis B, D, E &c. versus punctum F, dicuntur centripetæ: conatus ille, quem corpus vi inertix exerit, deveniendi potius per rectam lineam ad I, quam ad D, & qui vincitur a vi centripeta, dicitur vis centrifuga: quare vis centripetæ in B erit mensura per num. 2 dimidia BH, vis centrifugæ dimidia DI; eritque semper in motibus liberis necessario æqualis vis centripeta vi centrifugæ, cum hæc nihil aliud sit, nisi corporis nifus recedendi ab eo puncto, ad quod a vi centripeta deflectitur, ortus a determinatione abeundi per lineam rectam.

IX. Si ducatur AH, erit ABDH parallelogrammum, quia latus HD parallelogrammi HI erit æquale lateri opposito BI; adeoque & rectorum AB, cui cum etiam parallelum
Tom. II. P. III. L1 fit;

fit, erunt & AH, BD parallelæ. Quare ducta AD, se mutuo bifariam secabunt in O diametri AD, BH, eritque BO mensura vis centripetæ.

X. Si altitudo illa, ex qua vi eadem perpetuo agente acquireretur celeritas, cum qua corpus proiicitur, dicatur Q; erit $Q = ABq : 4BO$; quia est per num. 4 BO ad Q ut quadratum tempusculi, quo vi centripeta describeretur BH, ad quadratum temporis, quo motu uniformiter accelerato describeretur Q. Sed quoniam eodem illo tempusculo celeritate projectionis describeretur BI, vel BA, & tempore, quo motu accelerato describitur Q, describerentur per num. $4^2 Q$ celeritate, quæ acquiritur in fine eius temporis, & quæ ponitur æqualis celeritati projectionis; erit quadratum illius tempusculi ad quadratum huius temporis, ut ABq ad $4QQ$. Erit igitur $ABq \cdot 4QQ : BO \cdot Q$; unde fit $ABq \times Q = 4QQ \times BO$, & $ABq : 4BO = Q$.

XI. Altitudines Q, ex quibus cadendo corpora agitata diversis viribus uniformiter agentibus acquirerent datam aliquam velocitatem, sunt in ratione inversa virium ipsarum. Cum enim fit $ABq : 4BO = Q$, & data velocitate maneat $ABq : 4$; erit Q reciproce, ut BO, sive reciproce, ut vis centralis. Rursus si BO exponat spatium finitum, quod gravia percurrunt dato tempore motu uniformiter accelerato, & AB spatium, quod eodem tempore percurritur data quadam velocitate, erit eodem prorsus argumento altitudo, in fine cuius acquirerent eandem velocitatem, $ABq : 4BO$. Data igitur velocitate projectionis, & vis centralis quantitate absoluta, invenietur Q, si fiat tertia continue proportionalis post spatium, quod gravia libere cadendo motu uniformiter accelerato percurrunt dato tempore, & dimidium spatii, quod data velocitate percurritur motu æquabili eodem tempore, ad quæsitam altitudinem Q, ut est vis centralis data ad gravitatem.

XII. Celeritas, qua corpus movebitur in perimetro poligoni, erit reciproce, ut perpendicularum demissum ex centro virium in latus, quod percurritur, productum, si opus est, & celeritas optica, sive quæ apparet spectanti ex F, erit in ratione reciproca duplicata distantiarum ab ipso centro. Est enim prima, ut latus ipsum, quod percurritur ex: gr: AB, BD &c., secunda, ut angulus AFB, BFD &c.

sub

sub quo spectatur motus ex F. Sed ob areas omnium triangulorum æquales, æqualia sunt producta ex basibus AB, BD singulorum, & altitudinibus, nempe perpendicularis demissis e communi vertice F in ipsas, quæ producta sunt earum arearum dupla. Igitur bases ipsæ erunt reciproce, ut altitudines. Anguli vero AFB, BFD &c. sunt reciproce, ut quadrata laterum FA, FB &c.; est enim propositio elementaris. *In triangulis, in quibus unus tantum angulus infinitesimus est, esse æquipollenter angulum ipsum directe, ut aream, & reciproce, ut quadratum lateris alterutrius adjacentis.*

XIII. Si concipiatur augeri numerum tempusculorum, & minui magnitudinem in infinitum, ut evadat demum actio vis centripetæ continua, evanescent latera poligoni, quod abibit in *Fig. 3* in curvam AEB cavam versus centrum virium F, & directio projectionis ABC figuræ 2 in tangentem AC, ac pariter directiones laterum omnium in rectas tangentes. Manebunt autem areæ AFE clausæ rectis AF, FE, & arcu descripto AE proportionales temporibus. Quare viribus perpetuo sollicitantibus corpus versus punctum F immobile describitur curva cava versus idem punctum posita in plano immobili transeunte per directionem projectionis, & centrum virium, ita ut areæ, quas describit recta coniungens corpus ipsum cum centro virium, sint temporibus proportionales, celeritas in orbita sit in ratione reciproca perpendiculari demissi e centro virium in tangentem, & celeritas optica apparens ex centro virium sit in ratione reciproca duplicata distantiarum.

XIV. Facile inversa demonstratione numeri 6 demonstratur inversum theorema, nimirum corpus, quod orbitam ita describat circa punctum immobile, ut areæ ad ipsum punctum terminatæ, sint temporibus proportionales, præter vim inertiam, qua motum conservet, urgeri viribus ad idem punctum directis.

XV. Si sumatur arcus AD infinitesimus, ducanturque DO, DI parallelæ, tangenti CA, & rectæ FA, exprimet AO æquipollenter vim centripetam, & DI ipsi æqualis vim centrifugam, sive vim, qua corpus, dum nititur abire per tangentem, conatur recedere a puncto D curvæ ad punctum I tangentis; conatus autem percurrendi AI, dicitur

vis tangentialis. Arcus AD assumendus omnino est infinitesimus, & adhuc AO, DI expriment vim centripetam, & centrifugam æquipollenter, non accurate, quia pro mensura vis perpetuo agentis assumptum est in num. 5 spatium, quod percurritur illa vi uniformiter agente in directum eodem aliquo tempusculo indefinite parvo. Iam vero illa vis, quæ perpetuo agit in omnibus punctis arcus AD, non semper uniformiter agit, nisi ea puncta concipiantur ita indefinite inter se proxima, ut inæqualitas actionis respectu actionis totius sit infinite parva. Præterea directio virium perpetuo mutatur, unde fit, ut amittatur pars actionis, quæ semper minuitur in compositione virium, adeoque spatium AO sit aliquanto minus eo, quod percurreretur, si virium directio esset semper eadem, quæ differentia non est infinitesima respectu ipsius spatioli AO, nisi, existente arcu AD infinite parvo, directiones omnes sint æquipollenter parallelæ, & pars amissa in compositione virium infinite parva respectu eius, respectu cuius amittitur.

XVI. Hinc si vis centralis concipiatur agens per intervalla tempusculorum æqualium, quo casu describitur polygonum; effectus vis centrifugæ primo tempusculo est in *Fig. 2* DI intercepta inter arcum BD, & chordam AB, productam; si vero concipiatur perpetuo agens, quo casu describitur curva, est DI in *Fig. 3* intercepta inter arcum & tangentem. Sed in utraque consideratione mensura vis ipsius erit eadem: nam per num. 5 in prima sumi debet dimidius, in secunda totus effectus vis agentis primo aliquo tempusculo, & DI in *Fig. 2* æqualis BH dupla est BO, cui æquari debet intercepta inter arcum BD, & tangentem parallelam æquipollenter chordæ AD. Si rite discernantur poligona a curvis, & consideratio virium agentium per intervalla æqualium tempusculorum a viribus perpetuo agentibus, vitabuntur facile plures paralogismi, in quos facile inciditur, & qui nonnumquam in errorem inducunt, licet sæpe ad veram deducant conclusionem binis erroribus se mutuo corrigentibus.

XVII. Quælibet curva vel in se rediens, vel abiens in infinitum, vel infinitis spiris circumvoluta, describi potest a corpore cum quavis velocitate egresso ex dato eius puncto secundum directionem tangentis, & sollicitato viribus qui.

quibusdam ipsum perpetuo urgentibus versus punctum assumptum ex parte cava eiusdem curvæ. Sit (*Fig. 2*) eiusmodi curva ABDE &c. & centrum virium F. Ducatur chorda AB quæcumque, producatque, ut sit BI ipsi æqualis: ducatur FB, & ipsi parallela ID occurrens curvæ in D, tum DH parallela IB, & chorda BD, quæ eodem modo producat in P, ducaturque PE parallela DF, compleatur parallelogrammum DPEL, & ducta, productaque DE, continuetur constructio, si opus sit in infinitum. Iam vero si corpus proiciatur per AB, & ubi devenerit ad B, impellatur versus F vi, qua seorsim agente percurreret BH, abibit per diagonalem BD: & pariter si in punctis D, E &c. urgeatur versus punctum F viribus, quibus seorsim agentibus percurreret DL, EM &c., feretur per diametros DE, EK &c. parallelogrammorum LP, MK &c., & describet polygonum inscriptum datæ curvæ. Si iam concipiatur primam chordam minui in infinitum, ac proinde ita augeri numerum æqualium tempusculorum, & minui tempuscula, ut actio vis centripetæ evadat continua, & polygonum desinat in curvam, ac directio projectionis in tangentem; describetur curva ipsa a corpore iis viribus centripetis prædito, & ea cum velocitate egresso secundum curvæ tangentem.

XVIII. Si curva in se ipsam redeat; poterit ita assumi prima chorda AB, ut postrema XA desinat accurate in A, & tunc eæ, quæ proxime sequentur, sint iterum AB, BD &c. Nam si assumpta AB utcumque, desinat in punctum aliquod Z ea, quæ proxime antecedit A; concipiatur, punctum B recedere ab A motu continuo: movebuntur reliqua omnia puncta D, E &c. motu continuo, & ubi Z in A desinet, desinet locum puncti B, & chordam primam AB. Quoniam autem areæ omnium triangulorum debent esse æquales inter se, erunt areæ AFB, AFX æquales inter se, ac proinde si continuetur XA in Q, ut sit $AQ = AX$, ducanturque BQ, FQ; triangulum FAQ, quod æquatur FAX, ob bases XA, AQ æquales, æquabitur triangulo AFB; & quoniam sunt super eadem basi FA, erunt etiam inter easdem parallelas, ductaque BG parallela AQ, erit GQ parallelogrammum, cuius diametrum AB iterum percurreret corpus, & manentibus omnibus, ut prius, perget
per

per BD, DE &c. Quare viribus centralibus eodem semper modo agentibus in iisdem curvæ punctis per intervalla æqualium temporum, describetur indefinenter polygonum curvæ ipsi inscriptum, & actione continua ipsa curva describetur.

XIX. Quæcumque dicta sunt de vi centripeta urgente corpus versus datum punctum, eodem prorsus modo applicentur vi repellenti a dato puncto, quo casu describuntur vel poligona inscripta datis curvis obvertentibus convexitatem centro virium, vel ipsæ curvæ.

XX. Vis in B ad vim in b est, ut BH ad bh, vel BO ad bo, quas vires inter se conferre, & determinare relationem virium ipsarum ad celeritatem projectionis, tum ut ex datis orbibus determinentur vires, quibus describi possint, tum ut ex datis viribus eruantur orbitæ, quæ percurri debent, ad Geometriam, & Analysim pertinet, in qua disquisitione satis patet, quam necessarius sit usus infinite, seu potius indefinite parvorum, quorum natura explicata a nobis est in dissertatione duobus adhinc annis edita.

XXI. Quædam pauca inde huc revocanda. Nos nomine quantitatis infinite parvæ intelligimus non quantitatem in se determinatam, sed quæ concipiatur decretere ultra quoslibet limites. Nominamus infinitam eam, quæ concipitur augeri ultra quoscumque limites; finitam, quæ vel in se determinata est, vel nec concipitur augeri, nec minui ultra certos limites in se determinatos. Unam aliquam infinitesimam ad libitum assumptam dicimus primi ordinis, eam, quæ ad hanc sit, ut ipsa ad aliquam finitam, dicimus ordinis secundi, atque ita porro. Aequipollentes autem appellamus quantitates, quarum differentia est alicuius ordinis inferioris ipsarum ordine. Patebit autem paulo inferius non inelegans usus eorundem ordinum in problemate inverso virium centralium decrecentium in ratione reciproca duplicata distantiarum.

XXII. Hanc virium legem sectiones conicæ sibi vindicant. Sive enim directo problemate quærantur vires corporis percurrentis sectionem conicam tendentes ad ipsius focus, & occurrit ratio reciproca duplicata distantiarum; sive problemate inverso data lege virium decrecentium in ratione reciproca duplicata distantiarum quærantur orbitæ,
quæ

quæ describuntur, & occurrunt sectiones conicæ. Quamobrem assumenda est aliqua ipsarum sectionum affectio, ex qua petatur determinatio utriusque problematis. Nos unam ceteris præferemus satis notam, quæ omnium commodissime assumi potest pro definitione ipsa, si conicæ sectiones ita primum in plano positæ extra conum considerandæ sint, ac definiendæ, ut deductis demum præcipuis ipsarum affectio-
 ctionibus, demonstretur, cono utcumque secto, eius naturæ curvam obvenire, quod & Hospitalius præstitit, & alii plerique.

XXIII. *Defin.* Ex quovis puncto A lineæ LABS (*Fig. 4*) ducta recta AF ad datum punctum F, & recta AC normali ad datam rectam EC, quæ per punctum F non transeat, sit semper FA ad AC in ratione data: lineam LABS omnia eiusmodi puncta continentem dicimus sectionem conicam, si ratio fuerit minoris inæqualitatis, ellipsim, si æqualitatis, parabolam, si maioris inæqualitatis, hyperbolam: punctum F dicimus focum, rectam EC directricem. Ea definitio & simplicissima est, & omnibus conicis sectionibus eodem prorsus modo convenit, & ipsas non modo a rectis lineis, verum etiam a circulo ipso fecernit, cui non applicatur, nisi concipiatur, directricem EC abire in infinitum, & nusquam iam esse; quo casu, si sint duo puncta A, B, ratio AC ad BR, ac proinde etiam FA, ad FB accedit ad rationem æqualitatis ultra quoscumque limites, & curva in circulum desinit centro F. Sed quod caput est, ex ea præcipue, omnes conicarum sectionum affectio-
 nes facillime, ac pene immediate deducuntur.

XXIV. *Coroll. 1.* Si chorda BA sectionis conicæ occurrat directrici in E, ducaturque EF, & ipsi parallela AH; erunt FH, FA æquales: nam per defin. est FB ad BR, ut FA ad AC, & alternando FB ad FA, ut BR ad AC, ut BE ad AE, ut FB ad FH.

XXV. *Coroll. 2.* Contra vero si capiatur FH æqualis FA, patet fore AH parallelam FE, vel si sit & FH æqualis FA, & AH parallela EF; occurret ipsa FE chordæ BA productæ si opus sit, & directrici in eodem puncto E: ac proinde dato foco & duobus punctis A, B, determinatur unum directricis punctum, & datis tribus punctis & foco, determinantur bina puncta directricis, & directrix ipsa.

XXVI.

XXVI. *Coroll. 3.* Dato foco F, directrice ER, & puncto A, facile inveniuntur omnia alia puncta sectionis, si ducta quacumque FB indefinita, & facta $FH = FA$, ductaque AH, & illi parallela FE, ducatur recta EAB, quæ, ubi occurrat rectæ FH in B, determinabit punctum quæsitum. Facile autem inde deducitur ellipsim, & parabolam iacere totas citra directricem, hyperbolam habere ramum etiam ultra ipsam, qui vocatur hyperbola opposita: ellipsim in se redire, parabolam, & utramque hyperbolam in infinitum protendi: omnes curvas esse, quibus recta non nisi in duobus punctis possit occurrere, omnesque foco F obvertere cavitatem præter hyperbolam oppositam, quæ ipsi convexitatem obvertit.

XXVII. *Coroll. 4.* Ope *Coroll. 1.* facile determinatur positio tangentis. Nam producta EF in I, erunt anguli EFA, IFH æquales alternis FAH, FHA æqualibus inter se ob latera FH, FA æqualia. Concipiatur recta FB ita accedere ad FA, ut demum coeant, & evanescet chorda AB, una cum angulo AFB: abibit secans EAB in tangentem, & anguli AFI, AFE fient æquales, ac proinde recti. Quamobrem si data conicæ sectione, & directrice detur punctum A, vel E, dabitur tangens EA, ducta FA, vel FE, & facto angulo recto ad F.

XXVIII. *Prop. 1. Probl.* Describat corpus sectionem conicam viribus ipsum perpetuo urgentibus versus focum: quæritur ratio ipsarum virium in diversis punctis. Concipiatur vires agere initio æqualium tempusculorum indefinite parvorum ita, ut describatur iuxta num. 17 polygonum sectioni conicæ inscriptum, cuius bina latera quæcumque indefinite parva (*Fig. 5*) sint AB, BD, focus F, directrix CEL.

XXIX. Areæ AFB, BFD erunt constanter æquales triangulo, quod primo tempusculo describitur, per num. 7, chorda AD erit bifariam secta in O, & vires centrales exprimentur per rectam BO, per num. 9, cuius rectæ valor investigandus est.

XXX. Rectæ BA, DA productæ occurrant directrici in C, & E, ducanturque centro F arcus OT, AIH, BG, EMN, rectæ AI, AH, & rectæ FP, BR, perpendiculares directrici, cui FB occurrat in L.

XXXI.

XXXI. Erunt per num. 25 rectæ FE, FC parallelæ rectis HA, IA, ac proinde anguli CFE, IAH æquales inter se. Cum igitur angulus IFH ad centrum sit duplus anguli IAH ad circumferentiam; erit pariter duplus & anguli CFE, adeoque $FB \cdot \frac{1}{2}BG :: FE \cdot EN = BG \times FE : 2FB$.

XXXII. Quoniam ob arcum EN æquipollentem tangenti normali ad EF, & rectam FIL æquipollenter perpendiculararem chordæ AH parallelæ ipsi EF, sunt EN, FL æquipollenter parallelæ; erunt $NE \cdot FL :: CE \cdot CL :: ME \cdot BL$, ac proinde $NE \cdot ME :: FL \cdot BL :: FP \cdot BR$, adeoque $FP \cdot BR :: NE = BG \times FE : 2FB \cdot EM = BG \times FE \times BR : 2FB \times FP$.

XXXIII. Quoniam arcus OT æquipollet tangenti perpendiculari ad FO, & parallelæ rectæ FE; similia erunt triangula FAE, TAO, quorum anguli ad A æquales ad verticem. Pariter similia sunt AME, AOB, ob EM, OB parallelas. Quare $FE \cdot AE :: OT \cdot OA$, & $EA \cdot EM :: OA \cdot BO$, ac ex æqualitate ordinata $FE \cdot EM = BG \times FE \times BR : 2FB \times FP :: OT \cdot OB = BG \times BR \times OT : 2FB \times FP$.

XXXIV. Iam vero $BR : FB$ est ratio constans, $2FP$ est pariter quantitas constans. Erit igitur OB ut $BG \times OT$. Sed arcus BG, OT æquipollent sinibus, sive altitudinibus triangulorum BFD, FAO, quorum primi area est constans, secundi area æquipollet areæ constanti FAB, ac proinde sunt reciproce, ut bases FD, FA. Erit igitur OB reciproce ut $FD \times FA$, sive æquipollenter reciproce ut FBq . Si igitur augeatur numerus tempusculorum in infinitum, ut evadente actione vis centralis continua, poligonum abeat in curvam; erunt vires corporis girantis circa focus sectionis conicæ accurate in ratione reciproca duplicata distantiarum.
Q. E. I.

XXXV. *Coroll. 1.* Quoniam valor BO obtinetur per quantitates finitas ductas in OT, & BG, quæ posito arcu curvæ infinitesimo primi ordinis, sunt infinitesimæ ordinis primi, oportebit ipsam OB esse infinitesimam ordinis secundi.

XXXVI. *Coroll. 2.* Si duplum areæ AFB, vel BFD dicatur A; erit $BG \times OT = AA : AF \times DF = AA : FBq$. Si vero per focus F agatur in Fig. 4 recta LFS parallela directrici, occurrens ipsi sectioni in L, & S, & SV normalis
T. II. P. III. M m malis

malis ad directricem, patet fore $LF = FS$, & $SV = FP$. Erit autem ex defin. $BR . BF :: VS = PF . FS$. Erit igitur $BF \times PF : BR = FS$, & $2BF \times PF : BR = LS$, ac proinde in formula inventa habebitur $BO = AA : LS \times FBq.$, vel si LS , quam ex conicis constat esse latus rectum principale sectionis, dicatur L ; erit $BO = AA : L \times FBq.$

XXXVII. *Coroll. 3.* Hic valor BO a vero valore differt per infinitesimam ordinis ad summum quarti, quod per elementa infinitesimorum facile demonstratur. Nam in primis in inveniendo arcu EN nihil neglectum est. In eruendis valoribus EM , & OB assumptus est arcus EN in num. 32. pro recta parallela ipsi FL . Differt autem ab ea recta per quantitatem non maiorem ordine tertio. Nam FL differt a perpendiculari ad chordam AH , & rectam FE ipsi parallelam, per angulum infinitesimum ordinis ad summum primi, cum vera perpendicularis cadat intra angulum AH infinitesimum ordinis primi. Vera perpendicularis est parallela tangenti arcus EN . Quare recta FL est parallela rectæ, quæ cum eadem tangente continet angulum infinitesimum ordinis ad summum primi. Est autem propositio elementaris, *posito arcu circuli infinitesimo ordinis primi, rectam quamlibet ductam per contactum, & terminatam ad radium, quæ cum tangente contineat angulum infinitesimum ordinis primi vel inferioris, differre ab arcu, tangente, sinu, chorda, per quantitatem ordinis ad summum tertii.* Quare substituta arcui EMN , recta Emn vere parallela rectæ FL , in eruendo valore $Em = BG \times FE \times BR : 2FB \times FP$ committetur error binis ordinibus ipsa inferior.

XXXVIII. Ad inveniendum valorem OB , assumptus est arcus OT pro recta parallela ipsi FE , a qua differt per infinitesimam ordinis ad summum tertii, quod deducitur eodem discursu, quo inventa est differentia arcus EN a recta parallela rectæ FL in numero superiore.

XXXIX. Hinc ubi primum inventus est in num. 33 valor $OB = BG \times BR \times OT : 2FB \times FP$, is aberrabit a vero valore quantitate saltem binis ordinibus inferiore ipsa OB . Est enim propositio elementaris: *In quantitate eruta per finitam multiplicationem, divisionem, elevationem ad finitam potentiam, & extractionem finitæ radicis, tot saltem ordinibus distare ab ipsa errorem ortum ex infinitesimis neglectis, quot ordi.*

ordinibus distabat illa ex infinitesimis, quæ minime omnium distabat ab ea, respectu cuius neglecta est.

XL. In reductione autem valoris $BG \times BR \times OT : 2FB \times FP$ ad $AA : L \times FBq$, in num. 34, negliguntur semper ea, quæ binis ordinibus distant ab iis, respectu quorum negliguntur. Nam ubi pro $2FB \times FP : BR$ substituitur L , nihil contemnitur: ubi $AA : AF \times FD$ pro $BG \times OT$, sumuntur pro arcibus BG, OT eorum sinus, qui ab ipsis differunt per infinitesimam ordinis tertii, & pro area FAO area FAB , quæ ab ea differt per areolam OAB tot ordinibus ab ipsa distantem, quot ordinibus distat BO a BF , nempe binis.

XLI. Demum ubi pro $AF \times FD$ ponitur FBq , contemnitur infinitesima binis ordinibus inferior; est enim propositio elementaris. In triangulo AFD , cuius solus angulus F infinitesimus sit, secta bifariam basi AD per rectam FO ; hanc ipsam differre a media proportionali tam Arithmetica, quam Geometrica inter FA, FD per infinitesimam ordinis secundi. Quare & FB , quæ differt ab FO per infinitesimam ordinis secundi, differet a media proportionali Geometrica inter FA, FD , per infinitesimam ordinis secundi, adeoque, per num. 39, & eius quadratum ab $FA \times FD$.

XLII. Prop. 2. Probl. Invenire trajectoriam, quam describit corpus utcumque proiectum, & perpetuo sollicitatum versus punctum datum extra directionem projectionis viribus decrescentibus in ratione reciproca duplicata distantiarum ab ipso puncto.

XLIII. Concipiatur, vires agere initio tempusculorum æqualium, & describetur (*Fig. 6*) iuxta num. 6 poligonum $GABD \dots X$, cuius perimetri pars finita sit GX . Erunt eius areæ GAF, AFB, BFD &c. æquales per num. 8, & recta AO ad rectam BI per num. 9, & 17 ut vis in A ad vim in B , sive ex hypothese ut FBq ad FAq .

XLIV. Sit F focus sectionis conicæ transeuntis per puncta GAB , per quæ, iuxta num. 25, definitur directrix, & iuxta num. 26, omnia sectionis puncta. Si sectio non transit per punctum D , occurrat rectæ Dd parallelæ BF in d , ubi triangulum FBd , quod æquatur FBD ob basim FB communem, & FB, Dd parallelas, æquabitur triangulo FAB , ducaturque diA .

XLV. Quoniam per num. 37 ita est $OA = AA : L \times FAq$, & $Bi = AA : L \times FBq$, ut ab eo valore differant quantitate ordinis ad summum quarti; erit OA ad quantitatem differentem ab ipsa Bi per infinitesimam ordinis ad summum quarti, ut FBq ad FAq, sive per num. 43, ut OA ad BI. Erit igitur Ii ordinis ad summum quarti, & Dd, quæ ob AD bifariam sectam in I est eius dupla, erit pariter ordinis ad summum quarti.

XLVI. Quoniam per num. 25 datis punctis A, B ad conicam sectionem, & foco F invenitur punctum C eius directricis, in quo eam secat chorda BA producta; erit ipsum C commune tam directrici sectionis transeuntis per puncta GAB, quam per puncta ABD. Sit prior directrix CeN, posterior CEn, & occurrant illi perpendiculara GH, AM, BN in H, M, N, ac recta dA producta in e, huic perpendiculara Am, Bn, DL in m, n, L, & recta DA in E, rectis DE, Fe sibi invicem occurrentibus in R. Sit deum PQ, directrix sectionis transeuntis per postrema tria puncta VZX, ipsisque PQ, CN sint perpendicularares XQ, XS.

XLVII. In primis angulus EFe erit infinitesimus ordinis ad summum quinti: nam iuxta num. 31 tam angulus CFE est dimidius anguli BFD, quam CFe dimidius BFd, ac proinde & EFe dimidius DFd. Est autem DFd infinitesimus ordinis ad summum quinti, cum sit FD finita ad Dd infinitesimam ordinis ad summum quarti, ut sinus anguli dDF, qui, cum æquetur alterno DFB, est infinitesimus ordinis primi, ad sinum DFd, qui evadit ordinis ad summum quinti.

XLVIII. Angulus vero EAe erit infinitesimus ordinis ad summum tertii: nam est AD infinitesima ordinis primi, ad Dd infinitesimam ordinis quarti, ut sinus AdD, qui cum radium non possit excedere, non potest esse infinitus, ad sinum DAd, vel EAe ad verticem oppositi, qui sinus evadit ordinis ad summum tertii.

XLIX. Quamobrem est ER ordinis ad summum quinti, eR ad summum tertii: nam in triangulis FEA, FeA, quorum latera omnia finita sunt, anguli ad E, & e finiti sunt, & ob angulos ad F, & A infinitesimos, in triangulis EFR, eAR, finiti pariter sunt anguli ad R, eorumque sinus. Est autem

autem in triangulo ERF ut sinus finitus anguli R ad sinum anguli F infinitesimum ordinis ad summum quinti, ita latus finitum FE ad latus ER , quod evadit infinitesimum ordinis ad summum quinti: & in triangulo ARe ut sinus finitus anguli R ad sinum anguli A infinitesimum ordinis ad summum tertii, ita latus Ae finitum ad latus Re , quod evadit infinitesimum ordinis ad summum tertii.

L. Quoniam igitur latus Ee maius non est lateribus ER , Re simul sumptis: erit pariter ordinis ad summum tertii: cumque sint ob angulos CFE , CFe infinitesimos ordinis primi, rectæ CE , Ce ordinis saltem primi, erit angulus ECE ordinis ad summum secundi. Quare directrix sectionis conicæ transeuntis per puncta ABD inclinatur ad directricem transeuntis per puncta GAB angulo ordinis ad summum secundi.

LI. Eadem vero demonstratione directrix sectionis transeuntis per puncta BDK , inclinatur ad præcedentem angulo infinitesimo ordinis ad summum secundi, & ita porro usque ad directricem PQ , cuius inclinatio ad primam CN continet omnes intermedias inclinationes. Continebit igitur angulus SPQ tot angulos ordinis ad summum secundi, quot latera poligoni continentur a B ad X , nempe numerum infinitum ordinis primi; ac proinde erit infinitesimus ordinis ad summum primi.

LII. Ratio quoque FX ad XS differet a ratione FG ad GH , vel FB ad BN per infinitesimam ordinis primi, vel inferioris. Nam ob angulos CNB , CnB rectos puncta Nn sunt ad circulum, cuius diameter recta BC finita. Igitur ob angulum NCn infinitesimum ordinis ad summum secundi, erit arcus & chorda Nn ordinis ad summum secundi, adeoque erit ordinis ad summum secundi differentia laterum BN , Bn , quæ minor est latere Nn , & differentia rationis FB ad BN a ratione FB ad Bn . Ratio FD ad DL est per definitionem eadem, ac ratio FB ad Bn , & eodem argumento ratio pertinens ad directricem sequentem ab ea ratione differt per quantitatem infinitesimam ordinis ad summum secundi, atque ita porro usque ad rationem FX ad XQ , cuius differentia a ratione FB ad BN erit infinitesima ordinis primi, vel inferioris, cum sit summa omnium differentiarum intermediarum, quarum singulæ sunt ordinis ad summum.

summum secundi, & quarum numerus est infinitus ordinis primi. Ob angulos autem PSX, PQX rectos puncta PSQX sunt ad circulum, cuius arcus & chorda SQ sunt ordinis primi, vel inferioris, & angulus SPQ, adeoque differentia laterum SX, QX, quæ est minor, quam SQ, & differentia rationis FX ad SX a ratione FX ad XQ erit infinitesima ordinis primi, vel inferioris, ac proinde eodem modo differet etiam ratio FX ad XS a ratione FB ad BN.

LIII. Concipiatur iam, tempuscula minui, & augeri numerum ipsorum ita, ut, viribus perpetuo agentibus, evanescant latera, & poligonum abeat in curvam perpetuam, evanescet angulus infinitesimus SPQ, directrices omnes in unam definent, & ratio FX ad XS erit eadem, ac ratio FB ad BN, ac proinde etiam punctum X ad sectionem conicam, cuius F focus, CS directrix. Igitur trajectoria quæsitæ erit conici sectio. Q. E. I.

LIV. *Coroll. 1.* Celeritas in perimetro diversarum sectionum conicarum, quæ describantur in quacumque distantia viribus semper habentibus rationem reciprocam duplicatam distantiarum, erit in ratione composita ex subduplicata directæ lateris recti principalis, & ex inversa perpendiculari demissi e foco in tangentem. Erit enim (*Fig. 5*) in ratione lineolæ AB, quæ dato tempusculo describitur. At quoniam per numerum 36 est vis $OB = AA : L \times FBq$, & A est duplum areæ AFB, ac proinde demissa FV perpendiculari in BA productam, est $A = AB \times FV$; erit $OB = ABq \times FVq : L \times FBq$, & $ABq = OB \times L \times FBq : FVq$. Sed quoniam ponitur vis OB esse in ratione reciproca duplicata distantiarum BF, erit $OB \times FBq$ quantitas constans. Igitur erit ABq, ut $L : FVq$, sive AB, ut $\sqrt{L} : FV$. Evanescente autem latere poligoni, secans BAC vertitur in tangentem, & FV evadit perpendicularum in tangentem.

LV. *Coroll. 2.* Celeritas autem optica, sive apparens spectanti motum e foco F erit in ratione composita ex directæ subduplicata lateris recti, & reciproca duplicata distantia a foco. Est enim celeritas optica, ut angulus AFB, sub quo motus spectatur ex F. Est autem ut in num. 11 angulus AFB, qui dicatur F, ut $A : FBq$, ac proinde AA ut $F^2 \times FB^4$. Sed per num. 36 $OB = AA : L \times FBq$, Quare erit BO, ut $F^2 \times FB^2 : L$, & $BO \times L : FB^2$, ut F^2 .

Cum-

Cumque sit vis BO reciproce ut FB^2 ; erit $L : FB^4$, ut F^2 , & F ut $\sqrt{L} : FBq$.

LVI. *Coroll. 3.* Areæ, quæ dato tempore describuntur in diversis sectionibus, erunt in ratione subduplicata lateris recti principalis: quadrata vero temporum periodicorum, quibus integræ revolutiones absolvuntur in ellipsis, ut cubi distantiarum mediarum a foco, sive semiaxium transversorum. Nam ob $BO = AA : L \times FBq$, erit $L \times BO \times FBq = AA$, & ob $BO \times FBq$ quantitatem constantem, erit AA, ut L, & A, ut \sqrt{L} . Rursus quoniam tempus periodicum eo maius est, quo maior est area totius ellipseos, & quo minor est areola dato tempusculo descripta; erit quadratum temporis periodici directe, ut quadratum areæ totalis, & reciproce, ut quadratum areolæ primo tempusculo descriptæ: at ex conicis posito semiaxe transverso D, coniugato C, est dimidium lateris recti $CC : D$, adeoque L, ut $CC : D$, & $L \times D$, ut CC; areæ autem ellipsium sunt, ut $D \times C$, & ipsarum arearum quadrata, ut $DD \times CC$, sive ut $L \times D^3$. Cum igitur sint quadrata primæ areolæ AA, ut L, erit quadratum temporis periodici, ut $L \times D^3 : L$, sive ut D^3 .

LVII. *Scholium.* Quæ hætenus demonstrata sunt de viribus centripetis in ellipsi, parabola, & ceteriore hyperbolæ ramo obvertentibus foco F cavitatem iuxta num. 26, eadem omnia eodem prorsus pacto demonstrantur de viribus centrifugis in hyperbola opposita, quæ obvertit foco convexitatem, & describitur viribus repellentibus corpus in ratione reciproca duplicata distantiarum: & pariter eodem pacto applicari ipsis poterit sequens problema.

LVIII. *Prop. 3. Probl.* Data directione, & celeritate projectionis, & data quantitate absoluta vis centralis decrescentis in eadem lege propositionis 2, determinare sectionem conicam describendam. In primis directio projectionis est ipsa tangens curvæ describendæ, per num. 13; deinde data velocitate projectionis, & data vi centrali, dabitur per num. 11 altitudo illa Q, ex qua corpus libere demissum ea vi uniformiter agente, acquireret velocitatem, cum qua proicitur, quæ est $ABq : 4BO$.

LIX. Iam vero per num. 36 est $OB = AA : L \times FBq$, & $L = 2FB \times FP : BR$, ac per num. 54 $A = AB \times FV$. Erit igitur

igitur $OB = FV^2 \times AB^2 \times BR : 2FB^3 \times FP$, & $ABq : 4BO = FB^3 \times FP : 2FV^2 \times BR = Q$, adeoque $BR.FP :: FB^3 : FV^2 . 2Q$.

LX. Hinc eruitur elegantissima constructio problematis. Coniungatur centrum virium F cum puncto projectionis B . Ducatur FC (*Fig. 7*) ipsi normalis occurrens alicubi in C directioni projectionis CB , & BN parallela ipsi FC , quæ sit ad FC , ut est quarta continue proportionalis post FV , & FB , nimirum, ut est $FB^3 : FV^2$ ad duplam datam altitudinem Q , (sumenda est autem BN ad partes puncti C respectu FB , si corpus attrahatur in F , sed ad partes oppositas, si iuxta num. 57 repellatur) agaturque recta CN , & ipsi perpendicularis BR ; eritque F focus, CR directrix, FB ad BR ratio determinans quæsitam sectionem, cuius omnia puncta inveniri possunt per num. 26. Patet: quia erit $BR.FP :: BN.FC :: FB^3 : FV^2 . 2Q$, & ob angulum CFB rectum, recta CB tangens per num. 27.

LXI. *Coroll. 1.* Sectio erit parabola, si fuerit altitudo Q æqualis distantia FB . Nam in parabola est $FB = BR$, & ob angulos CFB , CRB rectos triangula quoque CFB , CRB æqualia, adeoque perpendicularum demissum ex R in CB cadet in idem punctum V ; eritque $FV = VR$, ac puncta FVR in directum iacebunt. Quoniam autem ob angulos ad V , & P rectos puncta $FVPC$ sunt ad eundem circumulum, ac proinde angulus $VFP = VCP = VCF$; similia erunt triangula rectangula PFR , VCF , adeoque $CF.CV :: FR = 2FV.FP = 2FV \times CV : CF$; ac proinde in formula num. 59 $Q = FB^3 \times FP : 2FV$, $\times BR$ substituto valore FP , & posita BF pro BR , fiet $Q = FB^2 \times CV : CF \times FV$. Est autem $CV.FV :: CF.FB$, adeoque $CV \times FB = FV \times FC$. Igitur erit $Q = FB$.

LXII. *Coroll. 2.* Si altitudo Q fuerit maior, adeoque vel maior velocitas, vel minor vis centripeta, trajectoria erit hyperbola, si minor, ellipsis. Cum enim sit BN ad FC , ut quarta continue proportionalis post FV , FB ad duplam altitudinem Q , patet, aucta Q imminui BN , imminuta augeri, & in primo casu evadere minorem, in secundo maiorem tam angulum BCR angulo BCF , quam sinum BR sinu BF .

LXIII. *Coroll. 3.* Si fuerit directio CB perpendicularis ad

ad FB , rectæ FC , BC evadent parallelæ, & puncto C in infinitum recedente, evadet directrix RP parallela directioni BC , rectæ vero FB , BR congruent cum recta FP , & recta FV cum recta FB , quare proportio num. 60 $BR.FP :: FB^3 : FV^2$. $2Q$ abibit in fig. 8 in hanc $BP.FP :: FB.2Q$. Inde vero per conversionem rationis BP ad FB , ut FB ad differentiam duplæ altitudinis Q ab ipsa FB : ac proinde in eo casu multo simplicior evadit curvæ determinatio, & pariter ut in *Coroll. 2*. Si fuerit Q maior quam FB , habebitur hyperbola; si æqualis, parabola; si minor, ellipsis. Donec autem fuerit Q maior dimidia FB , directrix PL iacebit ad partes B respectu F , quæ imminuta Q ita recedet, ut facta $Q = \frac{1}{2}FB$ abeat in infinitum, nec usquam iam sit: adhuc imminuta Q infra $\frac{1}{2}FB$, cadet directrix in pl ad partes oppositas, ut sit Fp minor quam pB : evanescente prorsus Q abibit p in F .

LXIV. Coroll. 4. Quando facta $Q = \frac{1}{2}FB$, directrix abit in infinitum, ellipsis mutatur in circulum iuxta num. 23. Quamobrem si directio projectionis sit perpendicularis ad rectam, quæ coniungit punctum projectionis cum centro virium, & velocitas sit ea, quam corpus vi illa constanter agente acquireret cadendo per dimidiam eiusmodi distantiam, describetur circulus circa centrum virium, quod congruit cum Hugeniano theoremate 5.

LXV. Coroll. 5. Erui etiam potest celebre Galilei theorema, quo demonstravit, viribus constantibus, & parallelis, quacumque celeritate, & directione, quæ cum directione, virium non congruat, describi parabolam. Si enim (*Fig. 6*) concipiatur centrum virium F abire in infinitum; fient directiones virium BF inter se parallelæ, & ratio distantiarum BF ratio æqualitatis, ac proinde vires constantes. Quæcumque autem fuerit finita velocitas, erit altitudo Q infinities minor quam FB , adeoque casus pertinebit ad ellipsum, quæ foco in infinitum recedente oblongata ultra quoscumque limites in parabolam desinet.

LXVI. Scholium. Per easdem formulas definiri potest etiam ascensus & descensus corporis, utcumque proiecti versus centrum virium, vel in partes centro oppositas; si sectiones quæ describerentur celeritate quam minima, vel nonnihil inclinata directione projectionis, concipiantur defini.

nere in rectam lineam, ubi demum evanescit projectionis celeritas, vel congruit cum directione virium. Sed cavendum a paralogismis, in quos hic per quam facile inciditur.

LXVII. Corpus proiectum ex B (*Fig. 9*) directione CBD , describat arcum Bd sectionis conicæ $bOBd$, cuius directrix PCN determinetur ut in problemate, sitque axis $POFS$. Si manente puncto B , & celeritate projectionis, concipiatur directio CBD ita accedere ad rectam FB , ut demum cum ipsa congruat; aucta BN in infinitum, puncta $POFVC$ sibi invicem congruent, & rectæ CBD , FB cum axe $POFS$, & cum tota curva.

LXVIII. Hinc eruitur, corpus B proiectum per BD in partes oppositas centro virium F abiturum in infinitum, si altitudo illa Q , per quam motu uniformiter accelerato acquireret velocitatem, cum qua proiicitur, non fuerit minor, quam distantia FB , quia eiusmodi velocitate debuisset percurrere hyperbolam, vel parabolam; si vero ea altitudo fuerit minor, corpus idem post ascensum usque ad punctum S , in quod abit alter vertex ellipseos eo casu describendæ, mutata directione regressurum ad F .

LXIX. Ipsum punctum S vel s , in quod abit alter vertex ellipseos, vel hyperbolæ oppositæ, & celeritas in quovis puncto D facile determinantur per ultimas rationes (*Fig. 9*). Sit in *Fig. 10* FQ æqualis datæ altitudini Q , & fiat QB ad BF , ut BF ad FS sumendam ex eadem parte puncti F , ex qua iacebit B respectu Q . Quadratum autem celeritatis in D tam in ascensu, quam in descensu, si Q cadat in B , erit in ratione inversa distantiarum FD , si cadat infra vel supra, erit ut $DS : FD$, vel $Ds : FD$.

LXX. Nam in *Fig. 9* circulus centro B intervallo FB , occurrat rectæ RB productæ in A , & I , ducanturque FE , BH , normales ad RB , FS , & alter vertex ellipseos (quem solum casum figura exprimit) abeat in S . Erit per defin. $PS . SF :: RB . BF = BA$, & dividendo, ac alternando $FP . RA :: SF . BF$. Decrescente FP ultra quoscumque limites decrescet pariter & AR , quæ ad illam habet rationem finitam, & FB , RB erunt æquipollentes. Pariter æquipollent tam FB , FH , BE ob angulum BFH imminutum ultra quoscumque limites, quam FV , FC sinus & tangens anguli infinitesimi FBC . Quare substitutis hisce æquipollentibus in
num.

num. 59 erit $FB^3 \times FP : FC^2 \times FB = 2FQ$, five $FB^2 \times FP : 2FQ = FC^2$.

LXXI. Ob angulum BFC rectum angulus PFC est complementum anguli HFB, adeoque æqualis angulo FBH, & triangula rectangula FHB, CPF similia; ac proinde ut $FC^2 = FB^2 \times FB : 2FQ \cdot FP :: FB^2 \cdot BH^2 = FE^2$. Erit igitur $FE^2 = 2FQ \times FP$. Sed ex natura circuli est $FE^2 = AE \times EI$, five, ob BI æqualem, & BE æquipollentem FB, est = $AE \times 2FB$. Erit igitur $2FQ \times FP = AE \times 2FB$, & proinde $FP = ER \cdot AE :: FB \cdot FQ$, vel per conversionem rationis $FP \cdot AR :: FB \cdot BQ$. Numero 70 inventum est $FP \cdot RA :: SF \cdot BF$. Erit igitur $SF \cdot FB :: FB \cdot BQ$, quod erat primum.

LXXII. Velocitas est reciproce, ut FV per num. 12, & 54, five æquipollenter reciproce, ut FC. Inventus est autem valor $FC = FB^2 \times FP : 2FQ$ in fine num. 70, & num. 71 $SF \cdot FB = FH :: FB \cdot BQ$; unde per conversionem rationis fit $SF \cdot SH :: FB \cdot FQ = SH \times FB : SF$. Erit igitur $FC^2 = BF \times FP \times SF : 2SH$. Ac proinde quadratum celeritatis in diversis punctis B ellipseos, ut $2SH : FB \times FP \times SF$, five ob FP, SF constantes ut $SH : FB$, & abeunte puncto H in B, in Fig. 10 erit quadratum celeritatis in B, ut $SB : FB$, & in D ut $SD : FD$.

LXXIII. In hyperbola cadit Q supra B, & A, S abeunt ultra directricem, reliquis eodem modo se habentibus: at in parabola, congruentibus punctis A, R, & Q, B, abit S in infinitum, & ratio $SD : FD$, evadit reciproca folius FD; quod etiam sic demonstratur facilius. Est in Fig. 7 $FV = VR$ in parabola iuxta num. 61; pariter triangula rectangula PFR, VRB, FVB similia sunt, quia priora duo habent angulos ad F, & R alternos æquales, & posteriora æqualia sunt ob $FB = BR$. Erit igitur $FP \cdot FR = 2FV :: FV \cdot FB$. Quare $2FV^2 = FP \times FB$, & ob FP constantem erit FV^2 , ut FB, & quadratum celeritatis reciproce, ut FB.

LXXIV. Si in Fig. 11 puncta FBDSs sint eadem, ac in 10, & concipiantur FS, Fs æquales, ac per punctum C assumptum ad arbitrium in recta FC perpendiculari ad FS agatur CN ipsi FS parallela, atque inter asymptotos CN, CF indefinite productas per puncta S, & s transeant rami
Nn 2
SHR,

SHR, ris, el, ELE hyperbolarum coniugarum, tum per puncta D, B agantur ordinatæ ENDI, LKBH, positis punctis I, H ad partes puncti F respectu rectæ CN; exprimitur autem quadratum celeritatis, cum qua corpus proiicitur, quando Q est minor quam FB, per rectam BH, quando æqualis, per KH, quando maior per BL: & in quacumque alia distantia FD exprimetur quadratum celeritatis in primo casu per DI, in secundo per NI, in tertio per DE.

LXXV. Nam ex notissima asymptotorum natura est $CN \times NI = CF \times FS$, adeoque $NI = CF \times FS : CN = CF \times FS : FD$. Hinc $DI = NI - ND = CF \times FS : FD - CF = (CF \times FS - CF \times FD) : FD$, $= CF \times SD : FD$, & pariter $CN \times NE = CF \times Fs$, adeoque $NE = CF \times Fs : CN = CF \times Fs : FD$; hinc $DE = NE + DN = CF \times FS : FD + CF = (CF \times Fs + CF \times FD) : FD = CF \times sD : FD$. Adeoque ob CF, SF, sF constantes erunt DI, ut DS : FD, NI ut 1 : FD, DE ut Ds : FD.

LXXVI. In primo casu velocitas omnis extinguatur in S, tum eadem ordinatæ DI exprimunt quadrata celeritatum in descensu: ordinatæ autem superiores Di exprimerent quadrata celeritatum, quæ haberentur in ascensu vi centripeta supra S in centrifugam versa. In secundo casu velocitas decrefcit ultra quoscumque limites, sed nunquam extinguatur. In tertio casu decrefcit quidem, sed ita, ut decrefcente NE ultra quoscumque limites, semper remaneat velocitas maior, quam ea, cuius quadratum exprimitur per rectam BK vel DN, dimidiam eius, quæ exprimit quadratum velocitatis in distantia FS æquali Fs.

LXXVII. In omnibus casibus si corpus demittatur deorsum ex B versus F; ordinatæ DI, NI, DE indicabunt pariter quadrata celeritatum pro punctis D assumptis infra B, & celeritas in accessu ad F augebitur in infinitum.

LXXVIII. Quid vero post appulsum ad F? Eulerus tomo 1 Mechanicæ §. 655 censuit corpus post appulsum ad F debere sursum regredi, licet ad F appellat cum infinita celeritate deorsum, nec ullum inveniatur obicem. Idque sic omnino demonstrari arbitratur. Si corpus (Fig. 10) ex S proiiciatur velocitate ita exigua, ut describat ellypsin SNOM; girabit perpetuo circa punctum F descendendo, & ascendendo

dendo per vices ab S ad O, & ab O ad S. Imminuta celeritate projectionis, donec evanescat, abibit demum perimeter ellipseos in rectam SF, & punctum O in F. Quare corpus ad F delatum retro cursum flectet ad S, nec ultra F progredi poterit.

LXXIX. Idem repetit §. 762, ubi generalius affirmat, si vires sint in ratione distantiarum reciproca triplicata, vel maiore; delatum ad centrum cum infinita velocitate debere *nusquam amplius reperiri, sed quasi subito annihilari*, valore nimirum formulæ, quæ distantiam exprimit, post appulsum ad centrum abeunte in imaginarium, sive impossibilem: si vires sint in ratione minore, quam triplicata, sed non minore, quam simplici, corpus pariter delatum, cum infinita celeritate debere cursum retro flectere: & solum ubi vires sint in ratione minus quam simplici, debere appellere cum velocitate finita, & ultra progredi. Sensit quidem, quam veritati minus consentanea prima illa duo appareant ipsa prima fronte, ut satis luculenter expressit §. 272; censuit tamen ita evidenter deduci ex formulis algebraicis, & ex hac transformatione curvarum in rectas, ut *calculus potius, quam nostro iudicio fidendum sit*.

LXXX. Nos quidem infinite parva, & infinita, quæ in se determinata sint, omnino respuimus iuxta ea, quæ demonstrata sunt in dissertatione de natura, & usu infinitorum, & infinite parvorum, de qua num. 20. Cumque celeritatis mensura requirat spatium aliquod aliquo tempore percursum, nullam agnoscimus celeritatem absolute infinitam, aut infinite parvam. Illud certe patet, nullam omnino debere esse in natura aut vim, aut celeritatem infinitam, ne in hisce quidem hypothesebus; si quod par est credere, non puncta pure imaginaria agant in alia puncta, sed corpora in corpora, quo casu ob corporum impenetrabilitatem ad centrum virium deveniri non potest. Sed si libeat considerare punctorum vires in puncta; affirmamus hæc duo. 1 Ex transformatione ellipseos, vel alterius sectionis conicæ, in rectam lineam non deduci reflexionem motus a centro virium in eandem plagam. 2 Posse oppositum demonstrari, quod nimirum motus continuari debeat ultra centrum, celeritate per eosdem gradus imminuta, per quos creverat.

LXXXI.

LXXXI. Primum sic facile intelligetur. Recta MFN normalis ad axem SFO occurrat in M, & N ellipsi, quam describit corpus proiectum ex S secundum rectam normalem ad SF. Actio vis centralis resolvatur in duas partes alteram parallelam axi SF, alteram eidem normalem. Omissa hac posteriore, quæ extinguit velocitatem projectionis, tum generat accessum ad axem, ac recessum, illa prior generat accessum ad rectam MN, & recessum ab eadem. Ab S ad N hic accessus perpetuo acceleratur: ob celeritatem acquisitam recedit corpus usque ad O, nimirum donec ob directionem eiusdem vis versam in oppositum extinguitur tota ipsa celeritas: tum iterum nova amissæ æqualis acquiritur ad partes contrarias per arcum OM, quæ pariter per arcum MS amittitur.

LXXXII. Oportet igitur actionem virium omnium per arcum NOM æqualem esse actioni per MSN, & duplam actionis, quæ habetur in descensu per arcum SN, brevitate nimirum temporis compensata per intensionem actionis ipsius ex maiore vicinia ortam. Attenuetur iam ellipsis ultra quoscumque limites: decrescet quidem arcus MON, sed actio illa semper dupla actionis per SN augebitur cum ipsa. Si ellipsis demum abeat in rectam, evanescet prorsus hæc actio cum arcu NOM, & actio per SN excrescet in infinitum puncto N abeunte in F. Contempto arcu NOM, videtur contemni quantitas infinite parva, & contemnitur, vis dupla eius, quæ genuit totam velocitatem acquisitam in descensu, nimirum vis, quæ debuisset hanc ipsam velocitatem extinguere, & contraria æquali producta, repellere corpus usque ad altitudinem S. Plurima eiusmodi exempla proferri possent, & ex Geometria, & ex Mechanica, & iccirco monuimus diligenter cavendum a paralogismis.

LXXXIII. Partem alteram sic evincemus. Trahatur (Fig. 11) punctum positum in S ab omnibus punctis superficiei sphericæ Mm in ratione reciproca duplicata distantiarum. Demonstravit Newtonus attractionem ex omnibus compositam fore in ratione reciproca duplicata distantiarum a centro F, donec punctum fuerit extra superficiem; at intra superficiem ubicumque, ut in O, fore prorsus nullam. Igitur id punctum accelerabit motum perpetuo usque ad M, tum per Mm feretur æquabili celeritate, quam acquisivit usque

usque ad M, ac deinde per mds feretur motu retardato usque ad distantiam Fs æqualem FS. Concipiatur iam, radium sphæræ minui donec abeat in punctum F. Oportebit punctum attractum in F in ratione reciproca duplicata distantiarum progredi ultra F: nec in hac demonstratione quidquam contemnitur præter spatium Mm prorsus iners, ubi id ultimo concipitur evanescere.

LXXXIV. Si constructis iisdem illis hyperbolis, ducantur præterea ordinatæ MR, mr, OT, cum recta RVr; exprimentur quadrata velocitatum in D ante appulsum ad F per DI, & in d post appulsum per di priori æqualem paribus distantis. Nec obest quod arcus SI constituat eandem curvam, & exprimat eadem formula, non cum arcu si, sed cum el; quia sæpe accidit, ut eiusdem curvæ aut formulæ partes aliæ aliis problematis solvendis inserviant, & eidem problemati partes diversæ diversarum curvarum. Utriusque exemplum hic adest. Ordinatæ DI usque ad S inserviunt ascensui corporis attracti in F, ordinatæ Di, quæ ad eandem curvam pertinent, nihil expriment in hac hypothese, sed determinant quadrata velocitatum, quas corpus haberet in ascensu supra S, si vires centripetæ ibi mutantur in centrifugas; quæ mutatio cum fiat per saltum, viribus nimirum centripetis in S nec evanescentibus, nec in infinitum excrescentibus; utraque hypothesis eadem formula non exprimitur, sed ad duplex problema pertinet.

LXXXV. Contra vero in casu, quo puncta omnia superficie sphæricæ vires exerant eodem semper modo circumquaque in sphæram in ratione reciproca duplicata distantiarum, exprimentur quadrata celeritatum puncti in S sibi relictæ usque ad M per ordinatas DI ad arcum SIR, ab M usque ad m, non per ordinatam OT ad eundem arcum, sed per ordinatam OV ad rectam Rr, ab m usque ad s per ordinatas di ad arcum ris alterius hyperbolæ, qui nec cum arcu ISR, nec cum recta Rr exprimitur eadem æquatione.

LXXXVI. Eodem prorsus pacto, ubi superficies sphæræ Mm abiit in punctum F, quod concipitur præditum tota illa vi absoluta, quam habuerat superficies, arcus SRT, srt licet pertinentes ad diversas hyperbolas expriment per ordinatas suas quadrata celeritatum semper positiva, & in paribus

bus a centro distantis æqualia: & pariter in omnibus tribus casibus hyperbolæ, parabolæ, ellipseos abeuntium in rectam lineam, corpus delatum in centrum celeritate aucta ultra quoscumque limites perget ad partes oppositas, & paribus a centro distantis pares habebit celeritates.

LXXXVII. Possent facile definiri & tempora descensuum, atque ascensuum. Illud sit satis, quod eruitur ex num. 54 quadrata temporum descensuum ex diversis altitudinibus FS, corporis ex S libere decidentis, & oscillationum ab S ad s fore ut cubos distantiarum ipsarum. Hæc sunt, quæ vobis, Sodales optimi, proponere habebamus. Vestrum erit de omnibus iudicium ferre.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.






Fig. 11.





ROGERII IOSEPHI BOSCOVICHII

De viribus vivis.

Celeberrimam de virium vivarum mensura controversiam aggredimur, Sodales doctissimi, vel dirimendam, vel componendam, vel potius summovendam: opus sane arduum, & audax consilium: nulla enim fortasse alia Mathematicos primæ notæ, nulla certe Mechanicos gravius, diutiusque in factiones distraxit. At quid nocebit tentasse? Si res minus prospere cesserit; licebit saltem usurpare vulgatissimum illud: *Vel contendisse decorum est.*

I. Duo virium genera in corporibus universa distinxit antiquitas, quorum utrumque a potentiis quibusdam motus omnes vel generantibus, vel immutantibus ortum duceret: alterum, quod in nisu quodam ad motum consisteret, qui sine ullo etiam motu haberi posset, ut ubi per subiectum planum impeditur gravitatis effectus; alterum, quod semper cum motu ipso coniunctum esset, quod Peripatetici impetum appellarunt, & ita per nisum illum summoto obstaculo censuerunt gigni, ac corporibus communicari, ut eius ope & motum continuarent, & obstacula, si quæ se offerrent, pervincere conarentur, ac summovere. Utriusque autem generis vires a sola celeritate æstimari consueverant, ubi de singulis æqualibus materiæ particulis ageretur; ut nimirum nisus ille duplus esset, vel triplus, qui summoto obstaculo duplam in eadem materiæ particula, vel triplam velocitatem generaret eodem tempore; impetus autem duplus censeretur, vel triplus, qui cum dupla, vel tripla celeritate eiusdem particulæ coniunctus esset: ac proinde, ubi de inæqualibus materiæ quantitatibus, sive, quod idem sonat, de inæqualibus massis sermo esset; æstimabantur vires utriusque generis a summis celeritatibus particularum omnium æqualium, nimirum a massis ipsis in simplicem celeritatem ductis.

II. Et quidem, quod ad primi generis vires pertinet, earum mensura facile experimentis confirmabatur, cum & virium æqualitas, si æquales forent, ex æquilibrio innotesceret, ac per æqualitatem ratio quoque, si forent inæquales, deduceretur, & celeritates dato tempore genitæ facile observando detegerentur. In vertice B (*Fig. 1*) plani inclinati AB accuratissime levigati sit trochlea, filo DBC advoluto, e cuius altero extremo globus C libere pendeat, ex altero bini æquales ex eadem materia globi E, & D partim ab ipso filo, partim ab eodem plano inclinato sustineantur. Quoniam nisum ad descensum per planum inclinatum minorem experimur, quam ad descensum liberum; invenietur facile inclinatio illa, quæ globum C cum globis E, & D in æquilibrio sistat. Eo casu nisus ad descensum globi D, æqualis nisui globi E æquabitur dimidio nisui globi C, cum ob æquilibrio primi illi duo simul hunc tertium solum adæquent. Iam vero si filo disrupto diligenter notentur celeritates, quas in descensu acquirunt eodem tempore globi C, & D; invenietur prioris celeritas posterioris celeritatis dupla; in eadem nimirum ratione nisuum; quod idem generalius deprehenditur, si in D quicumque æqualium globorum numerus appendatur, vel globus cuiuscumque massæ; celeritates enim singularum particularum in descensu acquisitæ eodem tempore erunt, ut nisus ex æquilibrio deducti, quod idem aliis quoque methodis, & in aliis virium generibus experiri liceret.

III. Quod vero ad secundi generis vires pertinet, tentatum quidem a Galileo, Merfeno, Ricciolio, aliisque, sed experimentis plures non ita notas circumstantias involventibus, ut nihil inde erui potuerit, quod controversiæ occasionem præriperet. Adhuc tamen usque ad annum 1686 secundi quoque generis virium mensura eadem satis communiter est adhibita. Eo autem anno in Actis lipsiensibus Leibnitiusschediasma edidit, cui titulus: *Brevis demonstratio erroris memorabilis Cartesii, & aliorum circa legem naturæ &c.*, in quo primi generis vires *Mortuas* appellavit, secundi generis *Vivas*, & illas quidem a massis in velocitates ductis, has vero a massis ductis in quadrata velocitatum æstimandas censuit; ut nimirum idem corpus cum dupla velocitate delatum non duplam, sed quadruplam habere debeat

beat vim vivam, cum tripla, vel decupla non triplam, vel decuplam, sed noncuplam, vel centuplam: cuius novæ sententiæ illud in primis protulit fundamentum vir celeberrimus, quod videret gravia sursum proiecta ascendere ad altitudines proportionales non celeritatibus ipsis, sed celeritatum quadratis.

IV. Et initio quidem non ita multos nova opinio sectatores habuit, plerisque adhuc veteri sententiæ addictis, Papino in primis recentem illam impugnante, cum quo aliquamdiu certavit Leibnitius. Verum Ioanne Bernoullio, redintegrate bellum, qui novis elastorum experimentis Leibnitianam sententiam restituit, plurimi statim per Germaniam potissimum, atque Italiam summi viri easdem partes amplexi sunt, quas Hermannus elasticorum globorum occurribus, Polenus fovearum in molli corpore excavationibus factis impressione diversorum globorum decidentium ex diversis altitudinibus, alii aliis confirmare conati sunt, ac stabilire; maximo auctoritatis pondere leibnitianæ sententiæ accedente a reliquorum Bernoulliorum, & Volffii suffragiis in Germania, Gravesandii, & Musschenbroeckii in Hollandia, Comitis Iacobi Riccati iam olim, & nuper Patris Vincentii Riccati eius filii summi e nostra Societate Mathematici in Italia, ac demum in Gallia ipsa veteri potius sententiæ addicta matronæ lectissimæ du Chatellet, quæ in suis physicis institutionibus leibnitianas partes acerrime propugnavit.

V. Nec tamen vetus sententia tanto auctoritatis pondere obruta corruit, aut de suo dignitatis gradu devoluta est, plurimis per galliam potissimum, & angliam contra obnitentibus, & in hac quidem Stirlingio, ac Mac-laurino, in ea Mairanio summis viris, pro eadem tamquam pro aris, & focus acerrime pugnantibus, quorum postremus ita nostro quidem iudicio veterem explicavit sententiam, & ab omnibus adversariorum telis protexit; ut nihil iam ab experimentis afferri possit, quod Mairanii methodo cum ea optime conciliari nequeat, analogia præterea, & simplicitate naturæ ipsi abunde faventibus: quem tantum virum & iniuria carpit, & quidem acrius, quam par esset, Petrus Martinus in opusculo de viribus vivis edito quatuor ab hinc annis, licet eandem ibidem, quam Mairanius sententiam

propugnet. Ubi illud sane Martino contigit, quod sæpe quosdam primæ notæ auctores carpentibus usuvenire solet, ut in eo maxime, in quo eos corrigendos putant, labantur ipsi. Rem totam aperiemus quam brevissime, non quod hac nostra defensione indigere arbitremur celeberrimum virum in re satis patente per se ipsam; sed ut erga doctissimum hominem, nobisque amicissimum, qualecumque hoc obsequii nostri argumentum exhibeamus; atque ut in hoc ipso cœtu, apud quem olim tam graviter accusatus fuit Mairanius, non desit, qui tanti viri, licet illam quidem sponte etiam incurrentem in oculos, defensionem suscipiat.

VI. Inter cetera experimenta, quæ pro leibnitiana sententia afferri solent, illud est non vulgare, quo globus A, (*Fig. 2*) si demittatur successive ex diversis altitudinibus AB in massam MN argillæ mollis, vel sebi, vel alterius eiusmodi materiæ cuiuscumque, deprehenditur excavare foveas DCE proportionales ipsis altitudinibus, ex quibus globus demittitur; cumque ex legibus Galilei quadrata celeritatum, quas gravia cadendo acquirunt, sint ut altitudines, ex quibus cadunt; patet foveas ipsas esse proportionales non velocitatibus, sed velocitatum quadratis, ex quo leibnitiani deducunt vires quoque vivas corporum, quarum nimirum effectus sit eiusmodi fovearum excavatio, non ipsis celeritatibus respondere, sed celeritatum quadratis. Id ipsum experimentum passim a leibnitianis adductum recensuerat una cum aliis nonnullis in sua dissertatione Mairanius, quam anno 1728 commentariis Academiæ parisiensis inseruit, illud adiungens, ea in dubium revocari non posse, cum tradantur a viris æque doctis, ac in experimentorum diligentissima institutione exercitatis. Admisso autem experimento demonstraverat ex veteri ipsa de viribus vivis sententia idem prorsus phænomenum consequi debere, si ratio temporis, quo velocitates singulæ amittuntur, habeatur: illud enim ostenderat, si earum virium, quæ in fovea excavanda amittuntur, ineatur ratio, duplam vim amitti non posse, nisi post quadruplum mollis illius materiæ loco motum, atque compressum.

VII. Mairanii locum in notis in suam illam dissertationem Martinus producit, ubi etiam idem experimentum addit

dit & a Fontenello traditum, ut exacte institutum, ac sæpius repetitum, & a Cribellio fuisse propositum, & a Poleno admissum, quod idem demum in fine ipsius dissertationis apud Musschenbroeckium quoque se legisse affirmat. Nihilominus tamen ego, inquit, *si opus esset iurarem a nemine hoc experimentum fuisse institutum. Sed ignoscamus Mairano experimenti ignorationem, se enim in eo libenter credulum præbuisse apparet. Quis ei ignoscet id, quod fidenter tradit, experimentum ipsum cum vulgari virium æstimatione mire consentire?* Sub finem autem de Musschenbroeckio agens. *Opponit, inquit, varia experimenta, inter quæ non reticet illud globi cadentis ab inequalibus altitudinibus, imprimisque foveas proportionales altitudinibus ipsis; qui quidem error est ei communis cum Cartesianis, Leibnitianisque omnibus sic experimentum se habere tradentibus.* Mirum sane videbitur contra tantam tantorum hominum, immo omnium Cartesianorum, ac Leibnitianorum licet contrarias inter se partes defendentium auctoritatem in quæstione de facto, hac nostra ætate, qua ubique diligentissimis, & crebro repetitis experimentis in naturam inquiritur, affirmasse, paratum se iurare a nemine hoc experimentum institutum, & Mairanii credulitatem incufasse. Nec minus admiratione dignus tantæ fiducia fons. Instituerat nimirum idem experimentum Martinus, cuius successum cum Mairanii, ceterorumque omnium testimoniis apprime consentientem, ut ex ipsa eius narratione constat, ipse maxime iisdem contrarium censuerat. Dimensus enim fovearum profunditates BC, sive arcuum DCE sinus versos, invenerat profunditatem foveæ impressæ a globo ex quadrupla altitudine decedente esse proxime duplam non quadruplam. At ii cum foveam nominant, non eius profunditatem intelligunt, sed spatium omne DCE longum, latum, & profundum, quod indicat quantitatem materiæ mollis loco motæ, atque compressæ, nimirum segmentum solidum spheræ, cuius segmenti axis est ipsa illa profunditas CB. Constat autem, si axes CB plurium segmentorum ad diametrum spheræ rationem exiguam habeant, fore segmenta ipsa proxime, ut profunditatum quadrata; posita enim ratione diametri ad circumferentiam ut 1 ad c, diametro spheræ = a, axe CB = x, est segmentum sphericum $\frac{1}{2}acxx - \frac{1}{3}cx^3$, in qua formula si x respectu a sit satis

exigua, secundum membrum contemni poterit sine notabili mutatione primi; ac proinde segmenta ipsa erunt proxime ut $\frac{1}{2}acxx$, sive ob $\frac{1}{2}ac$ constantem, ut xx , in duplicata ratione profunditatum. Quamobrem ex eo ipso, quod Martino obvenerit fovearum profunditas proxime dupla in casu altitudinis quadruplæ, colligitur foveam ipsam proxime quadruplam extitisse; quod Mairanius, quod Fontenellus, quod Musschenbroeckius, quod Cartesiani, & Leibnitiani omnes, ipso Martino teste, haud illi quidem plus æquo creduli, ita se habere affirmaverant.

VIII. Nec primum hoc eo in genere Martini infortunium. Accusaverat gravius ipse in epistola illa de luminis refractione (de qua epistola & nos mentionem fecimus in dissertatione: De natura & usu infinitorum, & infinite parvorum: edita anno 1741, & meminit Martinus in hoc opusculo eodem anno edito) PP. Clavium, & Tacquetum, quod affirmarent e falso directe ratiocinando verum demonstrari posse, & integram dissertationem de eodem argumento promiserat. Nos ibidem, & quæ Martinus inter se confunderet, & in quo maxime falleretur, paucis exposuimus; illud polliciti, si eiusmodi dissertationem edidisset, defensionem suscepturos, & quæ nobis tam in ea epistola, quam in edenda dissertatione displicerent, evulgaturos. Edebat autem ipse eodem ferme tempore opusculum suum de virium vivarum mensura, cuius notis immiscuit nonnulla, quæ ad eiusmodi quæstionem pertinerent. Cum vero ibidem nihil prorsus invenerimus, quod ad ea spectet, quæ nos obiecimus; censemus opusculi impressionem absolutam esse, ante quam nostræ dissertationis exemplum ad ipsum perveniret. Nec vero inter ea, quæ adiecta sunt ibi, quidquam adest, quod nos magnopere moveat, sive rationem illam spectemus, qua Martinus utitur ad probandum, non posse e falso deduci verum, sive responsionem, qua Tacquetianam demonstrationem conatur eludere. In ipsa enim ratione æquivocationem quamdam latere, haud difficulter ostendi potest, quod tamen manifestius patet ex ipsa tacquetiana demonstratione, in qua illud sane omnino inficiari Martinus non potest; ex falsa hypothesis, quod recta linea, quam ibi Tacquetus nominat, perpendicularis sit dato plano, deveniri ad veram propositionem, quod perpendicularis non sit,

fit, absque eo, quod ullum in toto illo discursu ratiocinationis vitium deprehendi possit. Deducit quidem Tacquetus demonstrationem eo, ut evincat, falsa illa hypothesi admiffa, angulum quemdam, qui vere rectus esse debet, obliquum esse; sed male iccirco Martinus infert, a Tacqueto nihil nisi falsum ex falso erui; nam in ea Tacquetus propositione non sistit, sed recta utique ratiocinatione ex illa anguli obliquitate iam deducta ad veram tandem propositionem progreditur, quod nimirum recta illa ipsa dato plano perpendicularis non sit, quæ propositio & deducitur ex falso, & cum ex ipsa sua contradictoria deducatur, evidenter vera deprehenditur. Verum hic in eo fufius immorari nec licet, nec libet: immorabimur fortasse alibi potissimum, si quid ad ea, quæ in nostra illa dissertatione proposuimus, reponat uspiam. Interea vero proposita de viribus vivis controversia ad se nos vocat.

IX. Nos quidem posteaquam, & phænomena omnia, & phænomenorum explicationes ab utriusque partis propugnatoribus propositas diu diligentissime consideravimus, in eam tandem sententiam devenimus, quam hic vobis, Sodales doctissimi, proponemus: *Vires vivas in corporibus nullas esse*: illud enim contendimus, phænomena omnia ita pendere a vi inertix, & momentaneis, ac perpetuo pereuntibus potentiarum actionibus, sive viribus mortuis, ut vires vivæ sint prorsus superfluxæ, ac ex illo Newtoni principio satis communiter admissio, causas non plures admittendas esse, quam quæ veræ sint, & effectibus explicandis sufficiant, omnino e physica reiiciendæ. Si eam sententiam satis comprobaverimus, summovebitur ipsa de virium vivarum æstimatione controversia. Si autem adhuc virium vivarum nomine uti libuerit, & id nomen adnectere idæ alicui objecta alia aliunde nota complectenti; tum vero poterit ita adhiberi, ut vires vivæ vel massis respondeant in simplices celeritates ductis, vel massis ductis in quadrata celeritatum, quo quidem pacto controversia ipsa componeretur redacta ad litem de nomine. Si demum secluso principio illo, vires vivas licet superfluas illas quidem, & inutiles, quispiam omnino velit admittere; affirmamus, salvis phænomenis, admitti posse vel ita, ut respondeant massis in celeritates simplices ductis, vel massis ductis in celeritatum quadrata,
ita

ita tamen, ut simplicitati & analogiæ naturæ melius confu-
latur in priore, quam in posteriore sententia, quo demum
pacto controversia dirimeretur. Hæc autem omnia cum ex-
posuerimus; addemus ex ea occasione nonnulla, quæ ad
corporum compositionem, & partium, ex quibus coale-
scunt, naturam, viresque pertinent, nobis saltem nova, &
ut speramus nec iniucunda, geometris potissimum, nec in-
fecunda, & quæ nostram hanc ipsam de viribus vivis sen-
tentiam simpliciore reddant, atque elegantiore.

X. Agnoscunt omnes utriusque sententiæ mechanici
vim eam in corporibus, quam Keplerus omnium primus
vim *Inertia* appellavit, Newtonius vim insitam, & passi-
vam. Ea est determinatio quædam materiæ ad perseveran-
dum in eo statu quietis, vel motus uniformis in directum,
in quo semel est posita, nisi aliqua potentia cogat statum
mutare. Ea vel est quædam naturæ lex conditori libera,
vel est quædam, ut scholasticorum voce utamur, exigentia
conditionata ipsius essentiæ corporis, quam & Peripatetici
possunt admittere, & si velint, in qualitate etiam aliqua
collocare, quæ habeat eiusmodi conditionatam exigentiam.
In quo ea sita sit physice, hic nimirum non quærimus. Sa-
tis est nobis, quod eam in corporibus admittant Mecha-
nici, tam ii, qui vires vivas admittunt solis velocitatibus
proportionales, quam ii, qui velocitatum quadratis, cum
quibus agimus. Ea vi inertix corpora, si nullam habent ve-
locitatem, quiescunt; si habent aliquam, eandem retinent,
donec nova ab aliqua potentia generetur.

XI. Porro velocitas, vel celeritas, potest considerari
(ut hic etiam scholasticorum utamur vocibus, hic maxime
idoneis) in actu primo, & in actu secundo. Velocitas in
actu secundo est ratio quædam spatii, quod percurritur,
& temporis, quo percurritur: nec eius idea quidquam
aliud involvit præter tempus, spatium, & eorum relatio-
nem quamdam, qua hæc celeritas eo maior dicitur, quo
plus spatii eodem tempore percurritur motu uniformi, &
quo minus tempus in eodem spatio percurrando impendi-
tur; ac proinde est, ut spatium divisum per tempus. Huic
celeritati in singulis particulis materiæ respondet quantitas
motus dato tempore perfecti ab eadem particula, qui mo-
tus, cum sit translatio de loco in locum, est ut spatium
per-

percursum. Ac proinde in toto corpore est quantitas motus, ut summa celeritatum particularum omnium, sive ut celeritas in massam ducta. Hæc ipsis mechanicæ tyronibus notissima sunt.

XII. Velocitas in actu primo est ipsa determinatio, quam habet corpus ad hanc celeritatem in actu secundo; sive est determinatio percurrendi dato tempore determinatum spatium. Hanc velocitatem retinet corpus in motu uniformi vi inertix; immo ea nihil est aliud, nisi ipsa vis inertix determinata a præcedentibus dispositionibus, nimirum vel a primo statu, in quo eam materiam conditor posuit, dum conderet, vel ab actionibus potentiæ, quæ in illam egerunt prius.

XIII. Potentiæ nomine intelligimus, eas causas, quæ per actiones suas statum corporis mutant, quæ cum illud determinant ad habendam aliam celeritatem in actu secundo, dicuntur producere in ipso novam celeritatem in actu primo. Actio momentanea, qua hæc velocitas generari concipitur, dicitur vis activa, quæ nobis quidem est unica vis, a Leibnitio autem vis mortua dicta est. Eiusmodi potentiæ sunt impenetrabilitas in collisione corporum, si per contactum fiat: gravitas in accessu ad centrum, vel ad aliud corpus: ea causa, quæ, si partes quorundam corporum ad se plus æquo accedant, eas repellit, si recedant plus æquo, ad se invicem adducit, & dicitur vis elastica; causa pariter adhæisionis particularum corporum, qua unius motum altera sequitur: causa obsistens compressioni quorundam aliorum corporum, quæ figuram amissam non recuperant, & mollia dicuntur; & aliæ eiusmodi, si quæ sunt.

XIV. Eæ pariter potentiæ possunt reponi vel in libera Dei lege, vel in alia conditionata exigentia quadam essentix ipsius corporis, vel etiam a peripateticis, si velint, in qualitate quadam, salvis prorsus phænomenis. In quocumque enim physice sitæ sint eiusmodi potentiæ, modo eandem velocitatem in actu primo generent in corpore, sive ipsum ad eandem celeritatem in actu secundo determinant, eadem semper motuum phænomena habebuntur. Quamquam autem hic & actionis, & generationis nomine utimur; tamen nulla vera, & physica actione, aut productione est opus, in ea generatione velocitatis in actu primo; ut ipsa celeritas

iuxta ideam, quam de ea tradidimus, non est aliquid, quod physice producat, & de novo adveniat. Habetur abunde per præsentem combinationem illius vel legis, vel exigentiæ conditionatæ, in qua vis inertix sita est, & illius alterius, in qua sita est potentia ipsa, ac per circumstantiam loci, vel aliam eiusmodi, quæ conditionem in potentia ipsa imbibitam determinet. Sic gravitas per newtonianos est quædam vel determinatio ipsorum corporum naturæ, vel potius libera Dei lex, qua si bina corpora posita sint in quacumque distantia etiam in vacuo, statim acquirant determinationem accedendi ad se invicem, & acquirendi novam celeritatem in actu secundo eo maiorem, quo minus est quadratum distantix. Intelligentur ea corpora exiltere: intelligatur vis inertix, qua priorem celeritatem retineant, si nulla potentia agat: intelligatur tanta determinata distantia; intelligitur genita nova celeritas in actu primo, determinatis conditionibus omnibus: & intelligatur nova celeritas perpetuo advenire, si intelligentur perpetuo determinari conditiones eadem. Nulla in hac idea involvitur vera productio cuiusdam, quod sit velocitas in actu primo, nulla actio physica; quod quidem hic semel ita præmittimus, ut intelligatur semper, quo sensu actionem velocitatis generativam accipiamus, eamque usurpare nobis liceat imposterum, quin ullius vivæ vis productio ad velocitatis generationem requiratur.

XV. Potentias plerumque concipimus tamquam perpetuo agentes, ut gravitatem, & elasticitatem. Ex singulis momentis temporis solam producant pressionem, quæ in velocitatem non transit ulla multiplicatione, sed solo ductu per tempus continuum; prorsus ut linea nulla sui multiplicatione evadit superficies, sed continuo ductu per aliam lineam. Verum impenetrabilitas, ut in congressu eorum corporum, quæ figuram nulla vi mutant, & dicuntur dura (quæ corpora an existant in natura hic non quarimus, ea autem inferius excludemus) ipso momento temporis, quo contactus fit, velocitatem generat; & tamquam per saltum mutat; atque iccirco vis, quæ in percussione exeritur, dicitur esse altioris ordinis, nec pura pressio utcumque multiplicata ipsam adæquat, sed solum, ut diximus, ducta per tempus continuum.

XVI.

XVI. Pressio tamen ita cum velocitate connectitur, ut linea recta cum plano. Ut enim recta linea per aliam datam rectam ducta in eodem angulo planum describit sibi proportionale, sic pressio per datum tempus continuata abit in velocitatem sibi proportionalem. Ut variata etiam linea, in quam altera ducitur, est planum genitum in ratione composita lineæ, quæ ducitur, & per quam ducitur; ita etiam variato tempore, quo eadem pressio durat, velocitas genita est in ratione composita pressionis, & temporis, per quod ea continuatur. Ut si in *Fig. 3* recta *EF* perpetuo maneat eiusdem longitudinis, dum per rectam *AC* ducitur ad angulos rectos, describit rectangulum, in quo singulis particulis *Ee* respondeant spatiola *FEef* æqualia; at si ipsa perpetuo vel crescat, vel minuatur, & fortasse etiam evanescat, ac ad partes oppositas abeat; aliam figuram planam describit, vel ad easdem partes iacentem, vel partim ad easdem, partim ad contrarias; sic & pressio, si semper eiusdem magnitudinis perseveret, motum generat uniformiter acceleratum, in quo singulis tempusculis æqualibus accedunt æqualia velocitatis incrementa; at si perpetuo varietur, producit motum difformiter acceleratum, in quo incrementa ipsa celeritatis tempusculis æqualibus facta, vel maiora sint, vel minora perpetuo, aut etiam pressione directionem mutante, abeant in decrementa. Ut demum si spatiolum *Ee* concipiatur indefinite parvum, ob differentiam rectarum *ef*, *EF* indefinite parvam concipitur areola *FEef* tamquam rectangulum; ita ob binarum pressionum differentiam tempusculo indefinite parvo indefinite parvam, motus etiam difformiter acceleratus tempusculo illo ipso concipitur tamquam uniformiter acceleratus. Quamobrem si segmenta *AE* rectæ *AC* expriment tempora: recta autem *EF* exprimat pressionem ipsam; optime per planum *BAEF* exprimetur ipsa celeritas, in quam abit pressio *EF* continuata per tempus *AE*. Quamquam ut omne aliud quantatum genus, velocitates quoque per lineas exprimi poterunt, assumpta ad arbitrium una aliqua linea, quæ unam aliquam velocitatem exponat.

XVII. Ut autem hæc theoria generalior sit, in ipso æquilibrio, in quo oppositis pressionibus binæ potentix inter se pugnant, & nullus consequitur motus, nulla celeri-

tas in actu secundo; concipimus tempore quovis continuo velocitates in actu primo produci, sed contrarias, & æquales, quarum proinde summa perpetuo maneat $= 0$; actione autem potentia exercita momento temporis, quod temporis continui non est pars, sed terminus, eodem prorsus pacto, quo punctum in geometria non est linea pars, sed terminus, generari concipimus pressionem illam tantum, quæ ad celeritatem est, ut linea ad superficiem.

XVIII. Celeritas nova, quæ generatur, si generatur in eadem directione cum priore, additur ipsi, & exurgit utriusque summa, ut in analysi accidit quantitibus eodem signo affectis: si generetur in directione contraria, ipsi negative additur, nimirum subtrahitur, & exurgit utriusque differentia, ut quantitas negativa addita positivæ eam minuit, non auget; quo casu si velocitas contraria est æqualis priori; remanet velocitas $= 0$, sive determinatio ad quietem, ut diximus in pressionibus contrariis; si maior, remanet velocitas negativa, sive cum directione opposita priori. Si demum nova celeritas generetur in directione aliqua obliqua; ei oblique applicatur iuxta legem notissimam compositionis, & resolutionis motuum. Exponat (*Fig. 4. 5*) priorem velocitatem AB, posteriorem AC; completo parallelogrammo ACDB, diameter AD exponet & magnitudinem, & directionem velocitatis, quæ ex utriusque compositione exurgit. Idem & in pressionibus, & in velocitatibus contingere ab experimentis manifeste discimus; & cum ex binis velocitatibus, vel pressionibus AB, AC, tertia AD exurgit; ea dicitur compositio motuum: cum una AD concipitur tamquam orta a binis AB, AC definitis per latera parallelogrammi cuiuscumque, cuius AD sit diameter; ea dicitur resolutio. Nec illud hic quærimus, an ex aliis anterioribus naturæ legibus necessario fluat, & demonstrari possit; an sit potius primaria quædam lex, cui aliam quampiam naturæ auctor pro arbitrio suo substituere potuerit, & illud fancire, ut ex motuum compositione alia quæpiam directio, alia mensura novæ pressionis, ac celeritatis exurgeret.

XIX. In compositione velocitas, quæ exurgit semper est minor componentibus simul sumptis, quia latera AB, BD, ideoque & AB, AC simul maiora sunt latere AD. In resolutione augetur ob oppositam rationem, seu, ut verius dica-

dicamus, augeri concipitur; facile enim ex theoria, quam tradituri sumus, deducitur, resolutionem numquam habere locum, sed solum mente concipi; revera autem solum haberi compositionem. At si velocitates componentes intelligantur resolvi in duas, alteram secundum directionem novæ exurgentis, alteram secundum directionem ipsi perpendiculararem; perpendiculares ipsæ semper sibi æquales se elident mutuo, reliquarum summa, vel differentia semper eadem erit in ea, quæ exurgit, ac in componentibus. Nam ductis CF , BE perpendicularibus ad AD , & completis reſtangularibus Ff , Ee , ac resoluta AC in Af , AF , & AB in Ae , AE , satis patet ex æqualitate triangulorum AFC , BDE , quæ facile demonstratur, æquales fore AF , DE , & CF , BE ; ac proinde etiam Af , Ae ; adeoque ipsas Af , Ae oppositas se mutuo elidere, reliquarum summam in *Fig. 4*, differentiam in *Fig. 5* esse AD .

XX. Hisce omnibus præmissis; en demum, in quo cum leibnitianis, & antileibnitianis convenimus, & in quo discrepamus. Actionem illam potentiarum, qua generatur pressio, vel celeritas, & quam appellavimus vim ipsarum, metimur per aggregatum celeritatum illarum, quæ generantur in singulis particulis, nimirum per massam in simplicem celeritatem ductam; in quo & Leibnitius convenit, qui vires mortuas ita æstimat. Ea æstimatio est satis conformis rationi. Cum enim concipimus ea actione generari vel celeritatem, vel pressionem, quæ per tempus datum continuata, velocitatem producit sibi proportionalem; ea actio, quam nos ad eum unicum finem concipimus, ab ipso effectu æstimanda erit. Eam autem actionem, nos nihil aliud producere concipimus, & affirmamus, præter hanc pressionem, & velocitatem. Leibnitiani, & Antileibnitiani admittunt præterea vim vivam, ab his potentiarum actionibus in corpore relictam, & permanentem; quocumque demum modo eam explicent physice; sive eam velint consistere in peripatetica quadam qualitate, quæ sit impetus, quod nolunt; sive in alio quocumque. Nos hanc vis vivæ sive qualitatem, sive tantum ideam reiicimus, ut prorsus superfluum, & affirmamus phænomena omnia abunde explicari per ideas tantum a nobis hæctenus traditas, quibus concipiamus, a potentiis per actiones suas immediate produci solum velocitatem,

tatem, & cum priori per vim inertix conservata componi vel directe, vel oblique: illi inter se pugnant, quæ debeat esse mensura vis eius vivæ, quam vel concipiunt, vel admittunt. Quamobrem si illud ostendimus, phænomena omnia motuum optime explicari sine hac nova vel re, vel idea; evicimus sane, vires vivas nullas esse, & obiecto quæstionis summoto, quæstionem ipsam summovemus.

XXI. Verum ut a motu uniformi ducamus exordium; evidentissime patet ad conservationem velocitatis, quæ per præcedentes potentiarum actiones est acquisita, satis esse solam vim inertix, nec ullam vim vivam requiri. Ea conservatio in ipsa idea vis inertix manifeste includitur. Quare si, ubi potentix agunt ad velocitatem generandam, nulla pariter vis viva necessaria sit; omnia omnino phænomena sine viribus vivis explicabuntur.

XXII. Iam vero si velocitas producat per vires earum potentiarum, quæ concipiuntur agere sine ullo etiam contactu, & impulsu alterius corporis, quemadmodum & a Newtonianis, & a Peripateticis concipitur agere gravitas etiam in corpus in vacuo collocatum; pariter manifesto apparet, nullum opus esse viribus vivis. Ex eo, quod vires gravitatis singulis momentis temporis E in *Fig. 3* producant pressiones EF sibi proportionales, & tempusculis Ee velocitates $FEef$; producent totis temporibus AE , AC velocitates $BAEF$, $BACD$ iuxta num. 16. Si autem eiusmodi velocitates, exprimantur per ordinatas EH ad lineam quamdam AHG , spatiola tempusculo Ee producta a velocitate EH erunt, ut areolæ $EHhe$, & tota spatia respondentia temporibus AE , AC , ut areæ AEH , ACG . Licet autem & celeritates singulis tempusculis productæ sint, ut vires, & spatia percursa, ut celeritates; in aggregatis varia deprehendetur summarum ipsarum relatio, pro varia mutatione virium EF . Si vires sint constantes; evadit BFD recta linea parallela AC , velocitas $BAEF$, ut vires, & tempora coniunctim: quare manentibus viribus, fit EH , ut AE , fit AHG recta definens in G , evadunt spatia AEH , ut quadrata laterum EH , vel AE , nimirum ut quadrata velocitatum, vel temporum, vel etiam ut productum ex AE , & EH , nimirum ex tempore, & velocitate. Patet igitur cur in hac hypothesis gravitatis corpus ex quadrupla altitudine descendens
duplam

duplam celeritatem acquirat, & duplum tempus impendat. Eadem prorsus de causa si sursum impellatur cum dupla celeritate; ascendet ad altitudinem quadruplam sine ulla necessitate quadruplæ vis vivæ, quæ sursum trumat ipsum corpus. Ascendit enim donec dupla velocitas contraria impressæ generetur, quæ impressam elidat, & mutet directionem motus in contrariam. Quod ascensus ille habet de positivo motu sursum, pendet a sola vi inertix conservante priorem celeritatem: quod habet de negatione ulterioris motus, provenit a gravitate, quæ post quadruplam demum altitudinem duplam genuit velocitatem.

XXIII. Quod si iam AE exprimat non tempora, sed spatia, & EF vires, quæ singulis æqualibus tempusculis generent velocitates sibi proportionales; iam areola FEef non exprimet velocitatem genitam spatiolo Ee, quia quo celerius id spatiolum percurritur, eo minorem velocitatem generabit vis eadem. Erit autem celeritas producta in ratione composita ex directæ vis FE & tempusculi, quod tempusculum cum sit ut spatiolum Ee directæ, & velocitas tota inverse; erit velocitatis incrementum directæ ut FE, & Ee, & reciproce ut tota velocitas, ac proinde productum ex velocitate in suum incrementum, erit ut areola FEef. Inde autem ex infinitesimorum lege colligitur, fore quadratum celeritatis corporis ex A descendens ex quiete, ut est areola BAEF: & cum de decremento in velocitatem contrariam ducto idem discursus sit; si motus incipiat in A versus C cum velocitate, quam exprimat BACD, & vires contraria directione agant; erunt residuarum velocitatum quadrata ut CEFD, & motus in C extinguetur totus. Si autem sit EI ordinata ad lineam quamdam continuam NIm reciproca velocitatis EH; quæ nimirum sit ad datam quamdam rectam L, ut hæc ad EH; erit areola EHe directæ ut spatiolum Ee, & reciproce ut velocitas EH, nimirum ut tempusculum; ac proinde totum tempus, quo percurritur AE, erit, ut tota area MAEIm. Ex eiusmodi autem linearum natura, omnia quæ ad hosce motus acceleratos, aut retardatos pertinent in elementis mechanicæ facile deducuntur: ut e: g: si vires EF fuerint ut distantix EC a fine motus C; linea BD fit recta desinens in C, linea AHG vertitur in quadrantem vel ellipseos, vel circuli, area

MAEIm

MAEI^m datur per quadraturam circuli, velocitates in fine spatiorum acquisitæ sunt ut ipsa spatia, & tempora sunt æqualia. Hinc in hac lege gravitatis, quæ decreſcat in ratione diſtantiarum a centro, velocitas, quæ acquiritur in caſu per duplam diſtantiam, eſt dupla; ideoque e contrario ſi corpus exeat e centro cum dupla velocitate; elevatur ad duplam altitudinem. Atque ut elevatio ad altitudinem quadruplam in hypotheſi gravitatis conſtantis non evincit vim vivam quadruplam; ſic in hoc caſu elevatio ad altitudinem duplam non evincit vim vivam duplam. Pendet utrumque phænomenum a ſolis ſummis velocitatibus, quas ſingulis tempuſculis æqualibus producant vires ipsis proportionales, & a ſolis ſummis ſpatiorum, quæ ſingulis tempuſculis æqualibus percurruntur cum velocitatibus ſibi proportionalibus.

XXIV. Quod autem attinet ad corporum collisionem præmittimus prius principium ſatis celebre *actioni ſemper æqualem, & contrariam eſſe reactionem*, quo tam feliciter uſus eſt Wrennus, Valliſius, Hugenius ad elæſticorum corporum congreſſus definiendos, & Newtonus ad ſuam mutuam gravitatem, per quam cœleſtium corporum motus implicatiſſimos explicavit. Nos id principium ita intelligimus, ut quotieſcumque vis alicuius potentiæ agat ſecundum unam directionem in unum corpus, ita æque agat in aliud ſecundum oppoſitam; ut æquales ſummas velocitatum producat utrimque in particulis, a quibus æquales motuum quantitates pendeant; ac proinde velocitates ſingularum particularum generet maſſis reciprocas. Nullum ſane phænomenum huic adverſatur principio, plurima illi favent, immo quantum experiundo licet animadvertere, favent omnia. Sic in magnete, & ferro, vis magnetica velocitates producit maſſis reciprocas: ſic in navicula, & navi maiore funis diſtentus: ſic ſi ceram digito premas, & digitus premitur ſimul, & illa materia. Quare hoc principium ex analogia naturæ ſatis aperte deducitur. At nos ex eo, & durorum, & elæſticorum, & mollium corporum congreſſus eadem generali methodo facillime deducemus.

XXV. Sint iam in *Fig. 6* bini globi duri AB, & CD, quorum maſſæ M, & m, velocitates, cum quibus ſibi invicem occurrunt V, & u; quæ quidem dicantur poſitivæ ſecun-

cundum directionem BC, negativæ secundum oppositam. Momento temporis, quo puncta B, & C se contingunt, debent immutari velocitates vi impenetrabilitatis ita, ut ad quietem respectivam reducantur, sive ad æqualem velocitatem, cui nimirum impenetrabilitas non opponitur. Considerabimus igitur impenetrabilitatem, tamquam potentiam quamdam, quæ ita in utroque globo producat velocitates oppositas, ut ex ex una parte relinquat velocitatem utrobique eandem, ex altera sint ob actionem utrinque æqualem reciproçæ massis. Dicatur communis velocitas x ; erit velocitas a priore amissa $V - x$ ad velocitatem acquisitam a posteriore $x - u$, ut m ad M ; ac proinde $VM -$

$$Mx = mx - mu, \text{ sive } VM + mu = Mx + mx, \text{ sive } \frac{VM + mu}{M + m}$$

$= x$; formula communis pro collisione corporum durorum, in qua velocitas communis post collisionem habetur, si singulæ massæ per suas velocitates multiplicentur, & productum dividatur per massarum summam. Si autem quæratur $V - x$ velocitas in priore globo producta ad partes opposi-

$$\text{tas; invenitur ipsa } \frac{VM + Vm - VM - um}{M + m} = \frac{Vm - um}{M + m};$$

nimirum ut $M + m$ summa massarum est ad m massarum alteram; ita $V - u$ differentia velocitatum ad easdem partes, vel summa ad oppositas, quæ est velocitas respectiva, ad velocitatem illam, quæ in altero globo producitur secundum directionem oppositam rectæ iungenti centra.

XXVI. Nulla hic pariter necessitas virium vivarum. Si bini globi celeritatibus, quæ sint reciproce proportionales massis, sibi invicem occurrant; sistitur ex eadem formula momento temporis utriusque motus. Inde colligunt anti-leibnitiani, vires vivas eorum fuisse ante concursum, ut massas, & celeritates; ac proinde in conflictu ob earum æqualitatem sisti motum. Si impenetrabilitatem respicimus ut potentiam quamdam, quæ secundum communes leges agat, licet per saltum, ex natura scilicet duritiei, nulla virium vivarum necessitas est in eo casu.

XXVII. Concipiamus iam eosdem globos, ubi venerint ad distantiam BC, repelli vi quadam, quæ ulteriori accessu

sui resistat, & imminutis distantis augeatur. Mutabitur, non quidem momento temporis, sed successive velocitas utriusque ita, ut ex principio actionis, & reactionis æqualis post quodcumque tempus continuum producantur velocitates massis reciprocæ ad partes contrarias. Interea vero minuetur perpetuo distantia, donec, si vis illa repulsiva fuerit satis magna, distantia maneat quidem aliqua, sed sit minima: quo casu reducentur ad eandem velocitatem, quod nimirum requiritur, ut distantia ulterius non minuat. Tum vero, vel incipiet iterum crescere distantia, si nimirum perseveret repulsiva illa vis: vel perseverabit, si ibi ea omnis cesset. Primus casus exhibet nobis binos globos impingentes in elastrum BHC, quod dum clauditur angulus H, globi ipsi repelluntur, donec ad priorem positionem ventum sit, post quam elastrum retrahi incipit plus æquo apertum a celeritate iam acquisita, & globi cum acquisita celeritate pergunt recedere a se invicem: ac potest idem primus casus referre etiam binorum elasticorum globorum concursum, quorum partes, dum post contactum in B, & C introrsum cedunt, velocitatis inæqualitate in iis punctis inhibita per vim impenetrabilitatis; elasticitas, quæ earum accessui ad reliquas resistit, agit utrinque æqualiter. Secundus casus exhibet corporum mollium naturam, qui haberetur, si elastrum in illa minima distantia disrumpere in H; quæ proinde concipi possunt tamquam composita fibrillis elasticis illis quidem, sed breviusculis, & quæ citissime vel disrumpantur, vel dissolvant quosdam veluti nodos, quibus continebantur. Sic enim partes, dum introcedunt, resisterent, sed figuram nequaquam recuperarent.

XXVIII. Quoniam autem in illa minima distantia habemus globorum velocitates redactas ad æqualitatem, & velocitates utrinque productas massis reciprocas; habemus elementa eadem, ex quibus in congressu corporum durorum eruta est velocitas, quæ ab altero globo acquiritur secundum directionem oppositam rectæ iungenti centra. Eadem igitur erit formula pro corporum mollium congressu; & pro elasticorum corporum collisione duplicanda erit eadem acquisita velocitas; eritque ut summa massarum, in iis quidem ad massam simplicem alterius, in his vero ad duplam;

duplam; ita velocitas respectiva ad velocitatem ab altero acquisitam.

XXIX. Si fuerint quotcumque globi intermedii in EFG; (Fig. 7) sub initium quidem punctum B cum tota velocitate globi AB celerrime accedet ad E; interea E incipiet acquirere velocitates versus F, & B cum globo AB ad partes oppositas, ac proinde incipiet globus AB retardari. Ad accessum puncti E, vis, quæ repellit E, & F, statim utrumque punctum ad partes oppositas urgebit, sed minus, quam vis, quæ repellebat B, & E, ob minorem sub initium velocitatem puncti E, quam B, adeoque minorem accessum. Quantumvis exiguo tempore post primum occursum in B sublato æquilibrium propagabitur mutatio status per omnia puncta EFGC, sed multo maior erit velocitas acquisita secundum directionem BC in proximis globis, quam in remotioribus. Progressu temporis deveniri debet ad distantias omnium minimas, post quas globi incipiant a se invicem recedere. Id non continget, nisi ubi velocitas respectiva evaserit nulla; & proinde omnium globorum velocitates æquales. In eo casu ob actionem & reactionem æquales summa celeritatum, quas ob vim repulsivam exercitam per BE acquisiverunt particulæ globi AB, erit æqualis celeritati acquisitæ ad partes oppositas a particulis globi E; ac ad partes pariter oppositas velocitatem acquirent æqualem globi E, & F, & ita porro usque ad globum CD. Summæ velocitatum particularum omnium productæ a vi repulsiva in intervallis BE, EF, FG, GC, sint x, y, z, u : erit summa omnium velocitatum, quas acquirent particulæ globi AB secundum directionem CB usque ad illam minimam distantiam, $= x$; summa autem omnium, quæ remanent secundum directionem oppositam ex iis, quæ productæ sunt in particulis reliquorum globorum, erit $= x - y, + y - z, + z - u, + u$ sive erit $= x$. Nimirum prior summa posteriori æqualis. Quamobrem si in plures globos quotcumque delatos eadem velocitate cum globo CD incurrat globus AB; eodem prorsus modo res cedit, ac si ii globi omnes in unicum massam coalescerent, & sola vis per BE ageret; ac proinde recurrent, quæ dicta sunt num. 28. Idem autem esset discursus, si globi quotcumque pergerent etiam cum globo A, & alii quotcumque cum globo D cum iis-

dem velocitatibus eorundem globorum. Semper in minima distantia reducerentur omnes ad velocitatem æqualem, & reducerentur productis utrinque æqualibus velocitatum oppositarum summis ita, ut velocitas singularum particularum primi aggregati acquisita per vires repulsivas ad velocitatem particularum singularum secundi aggregati esset in ratione reciproca massæ secundi ad massam primi. Et idem pariter discursus esset, si vires aliquæ non solum agerent in globos proximos, sed & immediate removerent E a G, vel a CD.

XXX. Potest hic casus accommodari globis vel elasticis, vel mollibus, dum concurrunt: in quorum primas partes, quæ se contingunt, agat vis impenetrabilitatis, in reliquas vero, & in eas ipsas, dum introcedunt, & ad se accedunt magis, quam pro data distantia, vires repulsivæ. Potest pariter accommodari corporibus duris, concipiendo ea divisa in plures particulas, quarum alias ab aliis removeat vis impenetrabilitatis, qui casus a casu elasticorum solum differet in eo, quod in corporibus duris impenetrabilitas agat momento temporis, & in reliquis elasticitas successive, nec dura post æqualem celeritatem resilient. Potest demum accommodari globis impingentibus in elaietra pluribus angulis constantia, quem casum figura exprimit, considerando solum effectum elasticitatis, & abstrahendo ab illa translatione virgarum elastri, quæ pendet ab aliqua rigiditate, & parum effectum turbat. Ubi datis singulorum intervallorum viribus absolutis determinari posset, globis AB, CD ad se invicem accedentibus, quod punctum debeat quiescere, qui debeat esse singulorum punctorum motus, quando singula puncta, quorum propiora potissimum initio plurimum accelerantur, tum retardantur, ad maximam celeritatem deveniant, & alia eiusmodi. Nobis satis est ostendisse, quomodo per solam generationem velocitatis ortam a potentiis agentibus utrinque æqualiter pendeant hi omnes effectus, sine ulla necessitate virium vivarum.

XXXI. Et quidem illud etiam simul patet, quoniam pacto in elasticis, & in mollibus corporibus fiat illa introcessio partium, & fovearum excavatio. Cum primum se molles globi contingunt, mutatur initio magis celeritas particularum contactui proximarum; donec paulatim partes
omnes

omnes ad æqualem celeritatem reducantur. Ob illam velocitatis inæqualitatem accedunt partes aliæ ad alias magis, quam prius; ea est mutatio figuræ, introcessio partium, excavatio foveæ. Si materia sit elastica; figura recuperatur, immo etiam ultra priores limites iam conceptos excurritur, & oscillationes quædam fiunt, ex quibus in fluidis elasticis undæ quædam exurgunt: si materia sit mollis; ubi ad illam celeritatem communem ventum est, manet distantia particularum eadem, & manet fovea. Sic in *Fig. 2* dum globus *A* impingit in primas materiæ mollis particulas in *B*, statim ex vi impenetrabilitatis, & repellentium potentiarum acquirunt velocitates, per quas æquilibrio summo, velocitas aliqua generatur in omnibus, ita tamen; ut in propioribus sub initium multo maior generetur, quam in remotioribus, donec demum, & globus, & particule, & tota massa *MN*, cum toto sustentaculo ad eandem velocitatem reducantur, quæ minima erit, & fere nulla ob immensam totius telluris massam, cui fulcrum innititur.

XXXI. Hisce autem omnibus præmissis sponte prope modum fuit explicatio phænomenorum, quæ a Leibnitianis adducuntur ad probandum, vires vivas adesse, quæ sint, ut massæ in quadrata celeritatis ductæ. Concipiatur globus *CD* maximus, (*Fig. 6*) versus quem globus *AB* delatus cum una velocitate elastrum claudat ad datum intervallum. Si globus idem cum dupla velocitate impingat in quatuor eiusmodi elastra, illa eodem intervallo claudet, & ab aliis quatuor duplam pariter in regressu non quadruplam velocitatem acquireret. Quia si recta *AC* in *Fig. 3* sit eadem, ac *BC* in *Fig. 6*; vires *EF* in singulis spatiis *E* erunt, ut numerus elastrorum, sive quadruplæ in secundo casu; quare & areolæ *FEef*, & totæ areæ *ACDB*, quæ per num. 23 expriment quadrata velocitatum tam acquisitarum, quam amissarum spatio eodem *AC*, erunt in secundo casu quadruplæ, ac proinde velocitates duplæ; quamobrem rectæ *EI* semper subduplæ, & subdupla aggregata omnium tempusculorum *EeiI*. Ex eo nimirum, quod singulis tempusculis velocitates generantur viribus proportionales; cum per idem spatiolum *Ee* corpus cum maiore velocitate delatum, minus diuturnam sentiat quatuor elastrorum actionem velocitatis generativam, quam corpus delatum cum unica

vim

vim sui elastri; minus quam quadrupla velocitas generatur, vel destruitur per id spatiolum, & aggregatum simul omnium est ex exposita demonstratione non quadruplum, sed duplum. Nulla igitur virium vivarum necessitas: quas tamen si quis velit admittere, licet inutiles, & ponat singulis tempusculis æqualibus generari proportionales viribus eodem passu, quo celeritates; hic profecto æque bene, ac nos, hæc phænomena explicabit, quod & de sequentibus intelligi debet. Et eo reducitur luculentissima Mairanii explicatio, requirentis, ut amissarum virium summa colligatur.

XXXII. Eodem modo explicatur, Polenianum experimentum, quo demissis globis A (*Fig. 2*) eiusdem molis, diversarum massarum ab altitudinibus, quæ massis ipsis sint reciproce proportionales, excavantur in argilla foveæ æquales DCE. Deveniet globus subquadruplus cum dupla tantum velocitate: & si globum quadruplum in quatuor æquales partes mente dividimus; singulis viribus in hæc partes æquales distributis, agent in globum minorem in singulis punctis spatii vires quadruplæ earum, quæ agent in partes singulas globi maioris; ac iccirco prorsus, ut numero superiore, duplam tantum iisdem illis spatiis percursis usque ad quietem destruent velocitatem, tempore subduplo duplam tantum contrariam producendo.

XXXIII. At in eo experimento, de quo num. 6, & 7 diximus, cum globus idem ex diversis altitudinibus demissus semper foveas excavarit altitudinibus, adeoque, quadratis velocitatum proportionales; causa pariter ex eodem fonte petenda est. Superficies DCE segmenti spherici est, ut sinus versus CB, quod ex Archimede constat. Quare dum globus immergitur, incurrit in singulis punctis spatii BC in numerum particularum proportionalem distantiam BC. Hinc fit, ut vires, quæ in eo producunt velocitates contrarias, sint ut distantiam ab initio B motus retardati. Quare, ut in num. 23 notavimus, in hac virium hypothese velocitas dupla extinguetur duplo emenso spatio BC, & eodem tempore. Quadrupla est materiæ quantitas, ea fovea contenta, quæ comprimitur; sed non iccirco quadrupla velocitas contraria generatur. Globus duplo velocior singulis tempusculis æqualibus successive incurrit ille quidem in quadruplum numerum

merum particularum, sed ea potissimum de causa singularum virium actiones excipit dimidio tantum tempore, ac proinde dimidias, & omnium simul duplas. Nusquam autem virium vivarum vestigium ullum, & multo minus necessitas.

XXXIV. Demum, & in globorum elasticorum collisione, quo pacto se res habeat, facile est expedire. Impingat globus in globum triplum, cum binis gradibus velocitatis, inquit Hermannus; unum illi communicabit, cum uno ipse resiliet, cum quo si incurrat in alium sibi æqualem, quiescet, illo abeunte cum eodem gradu. Quare quadruplam habebat vim vivam, quam in quadruplam massam divisit. Phænomenum quidem ita se habere debet, ut evincitur etiam ex nostris formulis, quas exposuimus num. 25, & 28. Sed causa in promptu est. Elasticitas in globo triplo unum gradum velocitatis produxit, in globo impingente tres oppositos, quorum duo priorem velocitatem elidunt; tertius relinquitur, qui pariter in secunda collisione amittitur æquali velocitate per elasticam vim in utroque globo producta. Nulla igitur hic quoque necessitas vis vivæ e globo in globos translata. Sic si globus A (*Fig. 8*) delatus ad C ita oblique impingat in globum B, ut facta $AC = 2$, & ducto perpendicularo in rectam iungentem centra BC, sit $CD = 1$, perget globus per CF parallelam AD cum velocitate $AD = \sqrt{3}$, & globus B abibit cum velocitate $= 1$. Si autem rursus cum data lege impingat in globum G, tum in I; iidem globi abibunt cum velocitate $= 1$, & globo A relinquetur primum velocitas $= \sqrt{2}$, tum $= 1$. Sed inde colligi non poterit habuisse vires vivas 4, quas divisit in 3 globos, una sibi reservata. Vis elastica in globo B generavit illam eius velocitatem $= 1$, & in globo C contrariam CD, quæ composita cum $Cd = CA$ oblique, ipsam potius minuit, & reduxit ad $\sqrt{3}$. Et idem in reliquis collisionibus contigit, vi elastica semper binas æquales contrarias velocitates producente.

XXXV. Ceterum quod in experimentis potissimum, in quibus globus in argillam decidit, excavatio fovearum a nulla vi viva pendeat, sed a potentiarum actionibus explicatis; sic manifeste colligitur. Si massa MN (*Fig. 2*) impingat in globum A; eadem prorsus fovea excavatur, ac si
globus

globus cum eadem velocitate impingat in massam. Excavatio autem eiusmodi nec tribui potest vi vivæ globi A, qui nimirum quiescebat, neque viribus vivis particularum materiæ mollis MN, quæ vires vivæ tendunt ad conservandum omnium motum, non ad minuendum. In eo casu provenit ex eo, quod impenetrabilitas, & aliæ potentiæ, dum agunt in globum A, ad generandam velocitatem in eo, agunt & in partes materiæ mollis generando celeritates oppositas, maiores quidem initio in proximis, in remotioribus minores; donec paulatim omnes evadant æquales; & accessus particularum ad se invicem, pendens ab illa inæquali velocitate initio motus, tandem sistatur, & maneat fovea.

XXXVI. Hoc pacto per omnia phænomenorum genera excurrendo, ostendimus, nusquam viribus vivis opus esse: sed ex simplicissimis principiis omnia omnium generum phænomena motuum explicari posse per immediatam celeritatis productionem factam actionibus potentiæ nihil post se relinquentibus in ipsis corporibus, præter diversam determinationem vis inertix, cum ipsa vi inertix perseverantem. Iam vero si quis, non obstante inutilitate vis vivæ, illam adhuc velit admittere; poterit, ut libuerit, salvis prorsus phænomenis. Si enim statuat, potentias illas quotiescumque in singulis particulis singulis temporibus producant celeritatis gradus sibi proportionales, producere etiam vires proportionales; erunt vires ipsæ, ut massæ in simplicibus celeritates ductæ. Si autem velit, singulis æqualibus spatiis confectis, produci singulos vis vivæ gradus viribus producentibus proportionales; tum vero erunt virium aggregata, ut massæ in quadrata velocitatum ductæ. Nam singulis spatiolis *Ee* (*Fig. 3*) producentur vires proportionales areolæ *FEef*; ac proinde vires productæ toto spatio *AE* exprimentur per aream *BAEF* exprimentem etiam quadrata velocitatum. In utraque sententia phænomena eodem modo contingent, quæ, ut vidimus, pendent a sola celeritatum productione.

XXXVII. Prior sententia est antileibnitianorum, posterior leibnitianorum. Neutram amplectimur ob inutilitatem vis vivæ. Neutrius falsitatem ex phænomenis demonstrari posse affirmamus. Prima tamen magis conformis esset simplicitati, & analogiæ naturæ, & illam quidem libentius ample-

amplecteremur, si alterutram omnino amplecti oporteret. Cum potentia singulis temporibus, non singulis spatiis producant celeritates sibi proportionales; analogia melius servabitur, si & vires eadem lege producat. In opposita sententia minima quaecumque vis per magnam velocitatem elevari posset ad maximam vim brevissimo tempore producendam, & multo maiorem quam maxima vis longissimo. Id sane simplicitati naturae minus consonum videtur esse. Demum cum mortuae vires sint in ratione massarum & celeritatum; etiam vivae, si aequae bene possunt, debent potius eodem modo aestimari. At possunt: nam quaecumque diximus de potentiis generantibus celeritates, si dicantur de generantibus vires, & colligantur summæ sive eorum, quæ acquiruntur, sive eorum, quæ amittuntur, constabunt sibi simul omnia, & phaenomenum nullum repugnabit, ut in num. 31 indicavimus.

XXXVIII. Nec nos magnopere movet Leibnitiana, & Bernoulliana conservatio virium vivarum, quæ habetur in Leibnitiana sententia in corporibus elasticis. Demonstravit iam olim Hugenius in congressu corporum elasticorum semper conservari post congressum summam productorum, quæ sunt singulorum massas ducendo in quadrata suarum celeritatum. Id Leibnitius, & Bernoullius attribuunt legi naturæ vires vivas conservanti semper easdem. At nostro quidem iudicio melius vires in opposita sententia conservarentur, si ullæ essent. Nam quadrata velocitatum, licet in Leibnitiana sententia satis exprimant quantitatem virium, earum directionem exprimere non possunt; cum quadrata semper positiva sint, & vires habere possint directiones contrarias, ac proinde ex positivis in negativas transire. Sic in Newtoni sententia gravitatis decrepantis in ratione reciproca duplicata distantiarum a centro, si distantia dicantur x , vires

exprimi quidem possunt per $\frac{1}{xx}$; donec directionem non

mutant; ea mutata formulæ motuum, quæ ex tali expressione eruuntur, fallaces sunt. Ex: gr: notum est, in ea virium lege, si punctum tendat ad singula puncta superficiei sphaericæ, mensuram attractionis ex omnibus resultantis, donec est extra superficiem, posita distantia a centro = x

fore $\frac{1}{xx}$; at simul ac infra superficiem descendit, evadit =

o. Iam vero quoniam vires vivæ deberent esse & positivæ, & negativæ; si summa maneret, maneret utique, ut in omni & geometria, & analysi, ita, ut negativa addita positivis ea minuerent, & additioni subtractio substitueretur. At eo pacto in Leibnitiana sententia summa non manet: in Antileibnitiana vero sententia, cum summa motuum ad easdem partes, & differentia ad oppositas conservetur, motibus nimirum, qui producuntur ab actionibus potentiæ æque semper in partes oppositas agentium, neutram turbantibus; vis autem viva in ea sententia sit ut massa in celeritatem ducta, adeoque ut motus: conservatur utique etiam vis viva ita, ut positiva pro positivis in ea summa, & negativa habeantur pro negativis. Quin immo si hoc sensu reformetur Cartesii principium de conservatione quantitatis motus, rite servatis directionum signis; ita erit verum, & de iis viribus, & de motibus; ut animæ quoque liberæ vires nihil turbent eiusmodi conservationem; nam ea tantum lege ipsa etiam in corpora agit, ut semper oppositas debeat binis particulis celeritates imprimere, quod facile demonstratur.

XXXIX. Si demum, quis vires vivas nullas admittat, at in corpore consideret dispositionem illam, quam habet, ad foveam excavandam in molli massa, ad tendendum numerum elastrorum, ad ascendendum contra gravitatem uniformem ad aliquam altitudinem, considerando hos effectus tamquam ab ipso præstitos, sine ullo respectu ad potentias, a quibus pendent, ad seriem actionum, & tempora, quibus exercentur; poterit is eam dispositionem ita consideratam appellare vim vivam, eritque eius mensura massa ducta in quadratum velocitatis. At æque alter poterit considerare dispositionem ad quoddam spatium dato tempore motu uniformi percurrendum, vel in vincendis obstaculis, seriem, & tempora actionum considerare, & huic erunt vires vivæ in ea consideratione usurpatæ, ut massæ ductæ in simplices celeritates. Qui ita voces usurpari non permittat, quæstionem de nomine instituet. Verum in quæstione de nomine vetustiori potius loquendi modo est adhærendum, quam recentiori,

tiori. Nec est cur Leibnitius, si de nomine tantum immutando contendit, se tantopere iactet, tamquam si magnum aliquem omnium mechanicorum errorem deprehenderit; quod bene notat Mairanius.

XL. Explicatis hoc pacto phaenomenorum generibus omnibus per actiones potentiarum, quæ communiter considerari solent, & reductis ad simpliciora, & generalissima principia productionis immediatæ velocitatis; remanet, Sodales lectissimi, ut nostram sententiam quamdam aperiamus, quæ maiorem etiam simplicitatem inducit, & analogiam circa potentias ipsas, & earum agendi modum: in quam nos quidem maxime propendemus, tum ob hanc ipsam simplicitatem, & analogiam; tum quod plurimis etiam primariis corporum affectionibus explicandis sit apta; licet videamus, eam quidem ab iis omnibus, qui rem altius non perpenderit, cum risu quoque excipiendam. Nihilo tamen minus diutissime meditati eam hic proferre non dubitamus, paratissimi tamen si gravius quidpiam contra ipsam proferatur nobis, eandem deserere, & communem sequi. Lis ea est acerrima Newtonianos inter & Cartesianos circa motuum generationem, quod Cartesiani solo corporum impulsu eorum motum mutari, contendunt, Newtoniani vires admittunt etiam in corporum distantia agentes. Sic gravitatem hi etiam in vacuo agnoscunt, illi contra vociferantur, unum esse in mechanica impulsum admittendum, cetera omnia a mechanica plurimum abhorrere.

XLI. Nobis autem rem diutius, & diligentissime considerantibus illud in mentem venit; si analogiæ, & simplicitati naturæ consulatur; nullam mutationem motus fieri per impulsione[m], sed semper per vires agentes in aliqua distantia, sive ex in natura ipsa corporum sitæ sint, sive potius ex libera quadam pendeant opificis supremi lege, qui pro arbitrio suo potuisset non solum hanc materiam condere potius, quam non condere, sed etiam, cum his potius, quam cum illis condere affectionibus, & legibus, nulla vi illata naturæ corporum nihil aliud requirenti, nisi summam subiectionem Conditoris sui divinis nutibus. Quamobrem censemus, ab illis principiis derivari, corpora, & eorum particulas nullo umquam casu se ita contingere; ut vere nihil intermedii spatii intersit; sed viribus quibusdam præ-

ditas esse singulas materiæ particulas, quæ in aliis distantibus attractivæ sint, in aliis repulsivæ ita, ut demum imminutis in infinitum distantibus, augeatur vis repulsiva in infinitum, non vincenda nisi infinita vi, quam solus Deus ipse O. M. possit exerere, qui proinde solus possit, compenetrare corpora, & iis adimere extensionem.

XLII. Nec illud nos movet, quod videamus continuas, & non interruptas superficies corporum, videamus, admotis globis nullum apparere intervallum, admota manu contactum experiamur; nec illud veremur, ne quis baculo utendum dicat, ut innotescat nobis, an vere contactus corporum habeatur. Minima intervalla sub sensum non cadere, satis patet. Trans pellucidam crySTALLUM libere radii permeant quaquaversus: immo, ut norunt, quicumque microscopiis tractandis assueverunt, trans omnium corporum tenues laminae, licet ad sensum continuas, transeunt. Adfunt iccirco meatus, qui non apparent, & adfunt in imensa copia. Idem globorum intervallis potest contingere. Si maxima vis repulsiva in minimis distantibus sese exerat; ubi globum globo admoveris, vis illa, ut in *Fig. 6*, aget in utrumque globum; donec utrumque ad eandem celeritatem reduxerit. Promovebitur globus, qui ante quiescebat, altero, si ipsum semper promoveas, semper intervallum illud minimum retinente, quod tu sensu percipere cum non possis; non poteris sane inde arguere, ipsum intervallum vere nullum esse. Idem in manu continget, idem in baculo. Ubi ad minimas eas distantias ventum fuerit, vis repulsiva aget illa quidem & in id corpus, & in fibras, ut in vero immediato contactu vis impenetrabilitatis: fiet introcessio partium, ut in pressione ex contactu derivata: tendentur fibræ ea vi, & inde motu ad cerebrum propagato, eodem prorsus modo perceptio fiet, quo fieret per contactum. Ea omnia adduximus, ut ante quam fundamenta ipsa nostræ sententiæ aperimus; ostendamus manifesto, neque eius veritatem, neque eius falsitatem huiusmodi experimentis, & sensuum testimonio evinci, ac in ipsis sensibus nullum prorsus fundamentum haberi posse pro utralibet. Sed ut magis communi loquendi modo consulamus, quo & nos utimur, contactum dicemus physicum, & cui, ut unice per sensus noto, nomen contactus ex hominum
 inti.

institutione est impositum, eum, in quo bina corpora devenierint ad distantiam, quæ nullo hominum sensu possit percipi, & in qua vis repulsiva ita sit magna, ut nulla humana vi vinci possit. Contactum mathematicum, & immediatum eum, in quo intervallum in se sit nullum. Illum priorem in baculo formidaremus, hunc secundum, si nostra sententia vera sit, timere non possumus.

XLIII. Sed ut ad fundamentum nostræ huius sententiæ deveniamus; in primis difficultatem omnem amovebimus, qua huiusmodi vires in distantia quadam agentes reiici solent, tamquam hic agendi modus, nec mechanicus sit, nec naturæ congruens. Quæ nobis communis est difficultas cum Newtonianis, & quidem etiam Peripateticis gravitatem suam vel in libera Dei lege, vel in ipsa natura, & essentia corporis, vel in qualitate quadam reponentibus, quæ, licet in vacuo positum, corpus ad aliud corpus, vel ad centrum distans adduceret. Illud a Cartesianis petimus. Cur tandem per impulsum communicatur motus? Cur ubi globus globum impellit, motus quieto globo communicatur? Dicent sane, impenetrabilitatem esse in causa; si enim bina corpora idem spatium occupare possent; non esset, cur alterum ab altero retineretur. Urgebimus: quid autem est impenetrabilitas ista? unde fit, ut idem spatium bina corpora occupare non possint? Dicent sane, eam esse vel naturam corporum, ut alterum alterius locum non occupet, vel liberam Dei legem, vel ignotum aliquid; & si quidquam aliud reponant; semper urgebimus, donec eodem recidant. Sinant igitur, nos quoque eadem responsione uti: nimirum eam esse vel corporum naturam, vel liberam Dei legem, ut alterum ad alterum in quibusdam distantiis accedere, in aliis recedere debeat, & quidem in minimis semper recedere secundum certas quasdam leges, quas paulo infra explicabimus.

XLIV. Et sane ut alia innumera attractionum & repulsionum genera omittamus, quæ in minoribus distantiis se abunde produnt; luculentissima eiusmodi virium exempla in gravitate habemus, & in viribus illis, quibus corpora in lumen agunt, & lumen in corpora. Multa a doctissimis viris ingeniosissime reperta sunt ad gravitatem explicandam per corporum impulsionem ope materiæ gyran-

tis.

tis. Censemus nec per Cartesianos vortices, licet reformatos, nec per Hugenianum, gravitatem explicari posse. Et Cartesianorum potissimum vorticum reformatio, quam infeliciter a summis etiam viris tentata sit, exemplis aliquot illustravimus in disquisitione in universam Astronomiam, quam anno 1742 exhibuimus. Hic ipse infelix exitus tantorum tentaminum nobis abunde suadet, gravitatem ab impulsione nequaquam pendere, & planetarum, cometarumque motus tam diuturnos procedere a vi inertix, & a viribus gravitatis agentibus in immenso pene vacuo, vix ullam resistentiam exhibente. Radios autem luminis in transitu prope corporum opacorum acies intorqueri vi quadam sine ullo contactu, deprehendit olim Grimaldus noster, & Newtonus inde illam activam vim deduxit, qua tam feliciter usus est, ad reflexionem, inflexionem, & refractionem potissimum explicandam. Et quidem ita putamus, luminis repulsum in reflexione non fieri ab impactione in eam superficiem, a qua id reflectitur, ut eam propositionem censeamus a Newtono demonstrari, quantum in physicis licet, optices l. 2 parte 3 prop. 8. Binis hisce luculentissimis exemplis instructi, adversariorum clamores nullis rationibus, sed solis præiudiciis ab infantia secum deductis innixos non formidamus; & vires aliquas adesse in natura, per quas sine immediato contactu mutetur corporum status, & velocitas generetur, ita admittimus; ut eum agendi modum satis naturæ ipsi familiarem esse, immo etiam in hac nostra sententia unicum arbitremur. Accedit mira illa vis magnetica diu, & pariter frustra tentata per vortices materiæ magneticæ, cuius præcipua phenomena, qua ratione a nobis explicari possint, innuemus inferius.

XLV. Cur autem huius tantum generis vires admittamus in natura, & impulsione excludamus; causa in promptu est. Communis iam est multorum sententia, nihil in natura per saltum fieri, sed ut in locis etiam geometricis, & in algebraicis formulis accidit, quidquid augetur, aut minuitur, ita continuo augeri, aut minui, ut ab una quantitate ad aliam motu semper continuo per omnes intermedias quantitates transeat. Huius principii nulla experimenta falsitatem evincunt: plurima, quantum per sensus
licet

licet deprehendere, eo nos manifeste deducunt. Et quidem in ipso locali motu nulla sane alia de causa per saltum ex uno loco transire non licet in alium; nisi continuo motu per intermedia transeat. Sic & per tempus continuum ab uno momento ad aliud distans devenimus, sine interruptione, & saltu. Id ipsum autem, & in motuum generatione ita a Leibnitianis potissimum admitti solet; ut nulla velocitas momento temporis intereat tota, aut oriatur, nec ab uno velocitatis gradu transeat ad alium, nisi per intermedios omnes transitus fiat. Hinc dura corpora excludunt a natura, in quorum congressu momento temporis generaretur velocitas, vel extingueretur; & omnia corpora vel elastica esse volunt plerique, vel mollia, vel potius mixta, ita nimirum, ut in congressu binorum corporum, dum partes introrsus cedunt, paulatim extingatur velocitas per decrementum continuum, quæ vel iterum restituatur paulatim ad partes contrarias per continuum incrementum, ut in elasticis, vel prorsus intereat, ut in mollibus.

XLVI. Iam vero si id principium verum est; verum erit etiam mutationem motuum numquam fieri per impulsionem; quod ex ipso nobis quidem videtur evidenter consequi. Fac enim (*Fig. 9*), duo globi elastici AB, CD æquales & cum æqualibus celeritatibus delati, quas exprimant rectæ AF, DO ipsi AD perpendiculares, in se invicem impingant in E: ipso momento temporis, quo impingunt in se invicem puncta diametrorum C & B, motum omnem necessario sistent diametris BA, CD abeuntibus in Ea, Ed æquales: at omnes reliquæ particule præter illas primas, ut postremæ a & d, adhuc moveri pergent motu retardato semper; donec omnis earum celeritas alicubi extingatur in M, & N mutata iam figura, & diametris contractis: & si globi quidem sint molles; perseverabunt in eo statu: si elastici; singulæ particule per eosdem gradus retro reflectentur. Si autem erigantur semper BG, aH, EI, dK, CL usque ad rectam FO; velocitates punctorum A, & D, exprimentur illæ quidem per ordinatas semper æquales ad rectam FO usque ad H, & K; tum per ordinatas perpetuo decrescentes ad lineas quasdam HM, KN. At velocitates particularum B, & C, si quæ primæ particule solidæ sunt, vel saltem punctorum, B, & C, vel superficialium circa B, & C, si

C, si globis substituantur cylindri, momento temporis extinguuntur totæ, & quiescent ea puncta, vel superficies toto eo continuo tempore, quo *a*, & *d* abeunt in M & N; exponentur igitur primum punctorum B, C velocitates ipsæ per ordinatas ad rectam FO usque ad I, tum in I abrumperetur omnis expressio per ordinatas, & ordinatæ EI succedet punctum. Si igitur nulla velocitas momento temporis extinguitur; non pergunt globi cum uniformi velocitate usque ad contactum; sed ubi particule B, & C accesserint ad quamdam exiguam distantiam; vis aliqua repulsiva eas perpetuo repellit ita, ut velocitas paulatim extinguatur ante contactum. Substituendo corpora mollia, & elastica duris, evitatur quidem saltus in velocitatibus particularum A, & D; saltus autem in velocitatibus particularum B, & C evitari non potest, nisi in minimis distantiiis eiusmodi vis repulsiva admittatur.

XLVII. Et vero, quod in motu globorum æqualium, cum velocitatibus contrariis, & æqualibus ostensum est, idem continget in congressu quorumcumque corporum cum inæqualibus velocitatibus. Velocitates primarum superficierum momento temporis reduci debent ad æqualitatem, cum impenetrabilitas non sinat alterum corpus alterius locum subire, & toto eo tempore, quo mutantur figuræ, & ceterarum partium velocitates ad æqualitatem pariter reducuntur, quies illa respectiva partium contingentium perseverabit. Hanc autem vim repulsivam distantiiis perpetuo immunitis crescere ultra quoscumque limites, inde eruitur; quod si finita esset, globis cum aliqua velocitate delatis, quæ definiri posset, punctorum B, & C velocitas in ipso contactu elidi desineret; at ea velocitate aucta contactus haberetur, ante destructam velocitatem illam totam, & proinde saltus. Et multa quidem saltuum huiusmodi afferri possent exempla alia, tum pressionum simplicium, tum mutationis momentaneæ loci geometrici, celeritates exprimentis; sed casum evidentissimum, & facillimum delegimus. Ex analogia, & simplicitate naturæ deducitur principium illud expositum num. 45; illo principio admissio, contactus mathematicus necessario excluditur, & vires repulsivæ in minimis distantiiis crescentes ultra quoscumque limites recta ratiocinatione colliguntur.

XLVIII.

XLVIII. Ut autem alius impediatur saltus; oportet vires easdem, quibus particulæ in minimis distantiiis se invicem repellunt, ad omnes etiam distantias in infinitum extendi; licet possint in maioribus distantiiis ita decrescere, ut sensum omnem effugiant, & in attractivas etiam mutantur, ut iam explicabimus. Si enim eiusmodi vires aliquo intervallo nullæ prorsus essent, tum alicubi agere inciperent; novo ibi elemento adveniente, abrumperetur prior geometricus locus exprimens celeritates, & novus substitui deberet. Sic si particulæ A & D motu uniformi delatæ usque ad a & d , ibi tantum vires repulsivas sentire inciperent; velocitates usque ad a , & d exprimerentur per ordinatas ad rectas FH, OK, quæ ibi abrumperentur, & iis succederent vel rectæ, vel curvæ quædam HM, KN. Id ne fiat, oportet actionem aliquam fuisse in omnibus distantiiis, & quidem expressam per ordinatas ad curvas quasdam continuas, de quibus mox agemus, ac nullam, si ullibi nulla est, solum in punctis quibusdam, in quibus ex curvæ axem fecant, & repulsio mutatur in attractionem, vel viceversa; eo enim pacto, velocitates exprimentur per curvam quamdam, quæ ad datam quidem rectam accedere poterit, sed nusquam in eam ipsam mutabitur.

XLIX. Directa igitur ratiocinatione ex illo principio deducto per analogiam naturæ devenimus ad vires particularum corporum in minimis distantiiis repulsivas, & iis imminutis auctas ultra quoscumque limites, iis auctis variatas ita, ut exprimantur per ordinatas ad curvas quasdam continuas. Mirum autem, quam ea particularum idea explicandis plurimis corporum phænomenis perquam idonea sit; mirum quanta inde pulcherrimorum, & difficillimorum problematum seges erumpat, quibus & geometria sublimior, & analysis exerceatur. Rerum multitudine, & magnitudine obruimur, quæ cum per universam late naturam excurrant, intra tam angustos unius dissertatiunculæ fines contineri non possunt. Quamobrem delibabimus tantum nonnulla, omissis quamplurimis.

L. In corporibus omnibus gravitatem mutuam detexit Newtonus, quam ipse in particulis omnibus agnovit decrescentem in ratione reciproca duplicata distantiarum: agnoscimus nos repulsiones has in minimis distantiiis, quæ di-

stantiis imminutis in infinitum excrescant. Si ad eas solas vires in corporum particulis attendendum esset; sic exponi possent. Exponant (*Fig. 10*) segmenta rectæ AG distantias binarum particularum a se invicem; sitque curva quædam MCKIH eius naturæ, ut habeat pro asymptoto rectam NL perpendicularem axi AG, a qua perpetuo recedat; secet axem alicubi in C, a quo recedat usque ad K, tum reflectatur versus ipsum, & ab aliquo puncto I habeat pro asymptoto hyperbolam secundi ordinis, cuius factum sub abscissis, & quadrato ordinarum constans sit, ad quam nimirum hyperbolam arcus in I accedat ultra limitem sensibilem, tum perpetuo magis, & distantia pariter puncti I a recta NL sit perquam exigua. Eius curvæ ordinatæ BM, quæ versus alteram plagam spectant, expriment vim repulsivam; quæ spectant oppositam plagam, ut DK, EI, FH, mutatæ in negativas, expriment vires attractivas. Utimur autem virium attractivarum, & repulsivarum nomine, non quod aliquam physicam actionem ponamus particulæ distantis in distantem, sed ut hisce vocabulis exprimamus determinationem illam, quæ vel sita est in libera Dei lege, vel in natura, & essentia particularum corporum, vel in qualitate aliqua, qua particulæ ad se invicem conentur accedere, vel a se invicem conentur recedere; quæcumque ex iis sit causa physica eius conatus. Hæc quidem curva, & gravitati Newtonianæ, & nostræ vi repulsivæ satisfaciet.

LI. In omnibus enim distantis maioribus, quam sit AE, ut AF, posita ipsa $AF = x$, & $FH = y$, erit ad sensum xy constans, & y ut $\frac{1}{xx}$; sive attractio in ratione

reciproca duplicata distantiarum. Crescet ea attractio imminutis distantis usque ad AD, tum decreset, & in C erit nulla. In minoribus autem distantis, ut AB, mutabitur in repulsivam, quæ, in infinitum imminuta distantia, in infinitum augetur.

LII. At ecce tibi simul, ex eadem lege per eiusmodi curvam expressa, & impenetrabilitatis ratio patet, & extensionis, quæ semper habitæ sunt tamquam primariæ quædam corporum affectiones, a simplici quodam principio
non

non pendentes. Profecto si imminuta distantia AB, vires eiusmodi repulsivæ in infinitum crescunt: sine infinita vi particulæ ad se invicem ita admoveri non poterunt; ut eundem occupent locum. Quamobrem solus naturæ auctor infinita potentia pollens eam poterit resistantiam vincere, & corpora compenetrare. Pariter si se in minimis distantiiis particulæ ita repellunt; disponentur profecto ita, ut per locum aliquem distribuantur in longum, latum, atque profundum.

LIII. Verum & illud statim sese obiicit oculis, quo nimirum pacto fluidorum particulæ inter se adhæreant ita, ut aliæ magis compressioni, & dilatationi resistent, aliæ minus. Si enim eorum particulæ sint in illa distantia AC, & ea utcumque parum imminuta, vel aucta statim ordinatæ utrinque plurimum crescant; vi ad comprimendum adhibita etiam maxima, minimum accedent: quia cito vi comprimenti æqualis invenietur repulsiva: & idem dilatationi accidet. Sic aqua nulla vi adhibita comprimetur ad spatium ita minus, ut sub sensus cadat; nec tamen inde erui poterit, eam constare globulis solidis, se contingentibus, quo casu nullum aliud fluidum continere posset duplo plus materiæ, adeoque & ponderis, quam aqua: sed nec illud, elasticitate carere aquæ particulas; verum potius summam esse elasticitatem, concludetur. Sic etiam separationi resistet, magis, vel minus pro natura rami CK. Contrarium accidet, ubi ex ordinatæ non statim multum augentur.

LIV. At quoniam aqua maiore vi, ut per ignis actionem, in vapores convertitur, quorum particulæ maxima vi a se invicem recedunt, & in exiguis distantiiis sibi invicem adhærent vi maiore, quam quæ ex gravitate oritur; iis viribus, ut & aliis chymicis aliorum corpusculorum effectibus explicandis, arcus curvæ CKI (*Fig. 10*) ita flectendus est, ut axem in aliis binis, vel etiam quotcumque punctis fecet. Mutabitur curva in aliam (*Fig. 11*), in qua in maximis distantiiis AF sit vis attractiva proxime in ratione reciproca duplicata distantiarum usque ad AE: usque ad AD adhuc crescat, sed ab ea ratione magis recedat, ut possit deinde decrescere usque ad AT: tum fiat repulsiva crescens usque ad AS, decrescens usque ad AQ: ibi iterum vertatur in attractivam crescentem usque ad AO, decrescentem

usque ad AC, & demum in repulsivam abeat. Si particulæ aquæ habeant distantiam AC eam tuebuntur, donec vis aliqua, superata maxima vi attractiva OP, eas ultra AQ removeat: tum enim sponte a se recedent plurimum; & si punctum R plurimum recedat ab axe; maximas vires repulsivas acquirat. Vires autem attractivæ versus O possunt esse multo maiores, quam quæ a gravitatis expressione requirantur.

LV. Harum attractionum usque ad certos limites, & repulsionum post eisdem exemplum habemus in elastis, quæ in certis angulis aperta quiescunt, magis distracta ad se invicem conantur accedere, magis compressa vim exerunt repulsivam. Et quidem ex eadem theoria, & mollium corporum discrimen habebitur ab elasticis. Si enim intervalla QT, CQ, per quæ vires repulsivæ, vel attractivæ exeruntur, maiora sint; corpus erit elasticum: si post modicissima intervalla, repulsivæ vires in attractivas transeant; erit molle. In primo casu post multam compressionem a T versus Q, adhuc semper vires repulsivæ agent, & ad veteres distantias redibitur. In secundo casu statim pervenietur ad Q, post quem limitem vi repulsiva in attractivam versa nullus erit conatus ad regressum. Sic & in filis, ac funibus videmus, earum massas plus æquo compressas, compressioni resistere: fiet id per intervallum AC; si autem distendi incipiant, quo plus distenduntur, plus distensionem resistunt; id vero continget per CO. Si superetur maxima vis attractiva OP, multo magis, & citissime minores quoque vincuntur usque ad OQ, & vi attractiva in repulsivam versa funis disrumpitur.

LVI. Multo autem plures itus curvæ, & reditus, ad alia complicatiora phænomena explicanda requiruntur, quæ singula persequi, infinitum foret, nec est huius loci. Illud notandum, omnes huiusmodi curvas esse de genere earum, quas parabolicas vocant; & quæ exprimuntur per $a + bx^m + cx^n + dx^r \text{ \&c.} = y$; in quibus nimirum data distantia x , unica habetur vis y , vel attractiva, vel repulsiva; potest autem eadem vis y respondere pluribus distantibus x . Et quoniam solutum iam est a Newtono problema: invenire curvam parabolici generis, quæ per data quotcumque puncta transeat, poterit semper inveniri curva continua, & regu.

regularis, quæ exprimat vires cuiuscumque particulæ respectu cuiuscumque alterius, quæ vires ex phænomenis deductæ sint; & eadem curva poterit ad arcus datos quarumcumque aliarum accedere quantum libuerit, & eos in quotlibuerit, & quam libuerit proximis punctis interfecare; dummodo ii arcus diversis axis segmentis respondeant, harum vero curvarum natura, & ea puncta, per quæ transeunt, ex phænomenis investiganda sunt.

LVII. Illud tamen nequaquam omittendum, quo pacto & solidorum corporum adhæsiō ex iisdem fontibus repetatur. Si enim (*Fig. 12*) vires particulæ A versus particulam C per omnem directionem in gyrum circa eas distantias, in quibus sunt positæ, sint ferme æquales; constituent corpus fluidum, cuius partes resistent quidem separationi, qua cogantur maiores distantias acquirere, sed, servatis distantis iisdem, libere altera circa alteram movebitur, & excurrat, quo excursu fiet, ut fluidum cedat vi cuiuscumque illatæ, & cedendo facile moveatur, ac corpus utcumque parum excedens fluidum in gravitate, si totum demergatur, descendat lente quidem, sed tamen semper descendat, eodem particularum numero ad se invicem accedente, qui recedit, & motu circa se, servatis distantis, nullam habente difficultatem. Unde etiam fiet, ut si massa fluidi separanda sit; non magna aliqua superficies simul abrumpatur; sed attenuato fluido in loco separationis per excursum particularum circa se revolutarum, successive aliæ post alias separentur; quod & in decidentibus aquæ guttis aspiciamus. Et id quidem separationem fluidorum perfectorum facillimam redderet. At si alia curva exponat vires particulæ A, secundum directionem Gg, alia secundum aliam quamcumque ita, ut sit axis quidam virium qQ , & vires quaquaversus non exprimentur per curvam aliquam, sed per ordinatas ad superficiem quandam, & in eadem distantia AC per gyrum superficies illa ordinatas habeat iam positivas, iam negativas; in eadem pariter distantia particulæ se mutuo fugabunt, si in una aliqua directione sint, se attrahent in alia, & in limitibus attractionis, ac repulsionis constitutæ eam positionem servare poterunt, & ab ea depulsæ verticitatem quamdam acquirere, qua se restituant, in quo ipsa corporum solidorum connexio sita esse poterit, qua non solum sepa-

separationi resistant, sed etiam inflexioni. Id autem potissimum necessario accidet, si maior pars ex minoribus constet, quæ inter se sint in distantibus multo minoribus habentibus validissimos connexionis limites; sed in illis maioribus distantibus aliæ attrahant magis, aliæ minus, aut etiam repellant; tum enim necessario consequetur verticitas.

LVIII. In plurimis autem problematis, quæ circa hæc expressiones virium, ut ita dicamus, superficiales proponi possunt, & circa motus, qui inde consequuntur, patet quantæ in mechanica utilitatis sint præclarissima inventa D. Cleraut circa curvas duplicis curvaturæ, & loca ad superficies. Sed fieri posset, ut nec axis ullus haberetur in his viribus, & nullæ binæ rectæ lineæ a particula exeuntes eandem haberent curvam; quo casu per ordinatas ad eandem superficiem ex vires generaliter exprimi non possent; analytice possent; sed ea non sunt huius loci, & tam multa persequi non vacat.

LIX. Hæc autem idea nos perducit ad compositionem particularum maiorum ex minoribus omnino homogeneis, dissimillimam tamen. Ponatur, vires minorum particularum tam secundum axes quosdam, quam secundum quamcumque aliam directionem habentem respectu eius axis positionem datam, exprimi iisdem curvis in omnibus iis particulis, & diversis curvis secundam diversam positionem in singulis; ubi autem binæ combinantur in quavis distantia secundum quamvis directionem, vim mutuam exprimi per summam ordinarum, quæ pertinet ad particulam utramque in iis distantibus, & directionibus: & poterunt maiores particulæ componi ex minoribus ita; ut dissimillimas habeant virium leges, & ex his aliæ maiores gradatim pariter, ut libuerit, dissimiles. Nam si distantia assumantur aliæ aliis ita minores, ut ratio minorum ad proxime maiores sit insensibilis; & circa terminos singularum ex iis distantibus fiat in recessu transitus a magna vi repulsiva ad magnam attractivam, quæ tamen, antequam ad sequentem distantiam ventum sit, iterum in magnam repulsivam convertatur, ac deinde varietur utcumque; plures particulæ minores, positæ circa eos terminos, coalescent validissime in unam maiorem particulam, ac in maioribus distantibus unitim agent: nec maiores particulæ eiusdem ordinis se mutuo dissolvent; aut ultra quosdam

dam limites ad se accedent. Quid autem, si eodem modo fixæ quoque sint in limitibus quibusdam attractionum, & repulsionum omnium, curva nimirum KIH (*Fig. II*) ut in minimis, ita quoque in maximis ultra omnes planetas distantis plurimum abluente ab ea hyperbola, quæ exprimit gravitatem decrescentem in ratione reciproca duplicata distantiarum, & secante axem iterum, ac fortasse in aliis punctis quamplurimis? An non distantiam servarent a se invicem proxime eandem, nec in se mutuo irruerent, & mundus totus ita constaret sibi, ut una ex maioribus illis particulis? Quid ni ea potissimum de causa in tam immensa distantia a nobis, & a se invicem collocatæ sunt? Quid ni cometæ, qui longe ulterius procurrunt, dum in nostra quidem vicinia sunt, planetarium systema subeuntes, viribus, quæ sunt quamproxime in ratione reciproca duplicata distantiarum, describant curvas quamproxime accedentes ad parabolæ, vel ellipses; at mutata in maioribus distantis virium lege, ab iis orbibus plurimum recedant, & redeant illi quidem, at longe alios, longe aliarum orbitalium arcus describant in reditu? An non saltem in iis, qui procul recedunt, nullum haberi poterit indicium reditus, licet iidem redeant, mutata fortasse etiam atmospheræ illius vastissimæ magnitudine, & forma, ex qua eorum apparens magnitudo æstimatur, nucleo ipso ingenti semper caligine quadam involuto?

LX. Porro maiorum particularum vires, quæ ex minorum combinatione prodeunt, poterunt esse, ut diximus, inter se dissimillimæ: nam ex diversa axium combinatione, & minorum particularum numero diversissimæ virium leges exurgerent. Qui autem inde elegantissimis tam directis, quam inversis problematis aditus aperitur! ut nimirum, si data minorum particularum communi lege, dato numero, & earum positione ad se invicem, quæratur lex, quæ in maioribus ab iis compositis consequi debeat: vel numerus, & positio axium quæratur eiusmodi, ut in particula maiore ex iis composita data aliqua exurgat lex, vel saltem datæ aliquæ vires in datis datarum directionum punctis: quæ quidem problemata solus ille semper omnia unico intuitu penetrat, qui mundum dum conderet, si hoc, quo diximus modo se res habent, iis est usus.

LXI.

LXI. Quin immo quoniam per illos attractionum, & repulsionum limites tam feliciter explicatur adhæſio partium; quid ni nullæ ſint minimæ particulæ ſolidæ; ſed, ut omnes adhæſiones eiufdem generis ſint, ultimo reſolvantur corpora in puncta quædam, quæ partes non habeant, ac proinde continuam extensionem nec habeant, nec componant. Ut puncta mathematica in geometria nec lineam, nec ſuperficiem, nec ſolidum continuum componunt; ſed vel congruunt, vel aliqua linea a ſe invicem diſtant; ſic eiufmodi puncta phyſica, & realia, iis viribus prædita continuam extensionem non poſſent componere, ſed vel compenetrari deberent, ad quod ipſum divina infinita vis requireretur, vel a ſe invicem aliquo intervallo diſtare, quod in utriſque ex ipſa indiviſibilitate, & extensionis carentia conſequitur. Continuum phyſicum eo pacto ſummoveretur e natura. At quoniam in hac hypothefi phænomena omnia ex earum virium actionibus pendentia eodem modo ſe haberent; continui exiſtentia probari non poteſt. Qui autem de continuo ipſo diu cogitaverit, agnoſcet ſane, in lucro potius ponendum eſſe, ſi id e natura expelli poſſit, atque exturbari. Quid quod ex una parte omne quantatum genus, quod augeri poteſt in infinitum, poteſt etiam minui, natura utraque ex parte limites omnes reſpuente; ac proinde moles corporis, quæ particulis a ſe invicem diſtractis poteſt augeri in infinitum, videtur illa quidem ex naturæ analogia debere poſſe in infinitum & minui: ex altera vero parte, ſi nullæ ſunt infiniteſimæ partes in ſe determinatæ, ſed infinite parva ſunt indefinite parva, in quibus nos tantum a determinata magnitudine abſtrahimus, ut in ſingulis caſibus demonſtrationem liceat deducere ad abſurdum, & ſi eadem materiæ particula non poteſt iam maiorem, iam minorem locum occupare totum; in nulla alia ſententia moles ultra quoſcumque limites minui poteſt, particulis ſolidis, ubi ad contactum devenerint, omnem ulteriorem compreſſionem omnino reſpuentibus: dum punctorum intervalla utcumque parva, in quacumque data ratione poſſint ſemper dividi, & moles corporis cuiuſcumque, ſi punctis conſtet huiuſmodi, reduci ad aliam in quacumque data ratione minorem? Quid quod ibi ſane multo expeditius illud intelligitur, qui fieri poſſit; ut radii luminis

nis secundum omnes directiones liberrime excurrant, nec quidquam se invicem turbent. Nimirum numerus punctorum utcumque maximus, ex quo constarent, ad spatium totum haberet rationem quavis data minorem, sive nullam; & eadem esset ratio numeri casuum, in quibus sibi invicem deberent occurrere, ad numerum casuum, in quibus se vitarent. Quid autem, si ea potissimum de causa tanta luminis celeritas, tanta raritas data est; ut cum occurfus evitari necessario debeant, virium quoque omnium, quas in exiguis distantis in se invicem exercerent diversorum radiorum particulae, actiones minimae evadant, & inceptum iter ad sensum non mutant? Non hæc ita se habere, dicimus: sed campi huiusce incredibilem quamdam, & ingeniis exercendis aptissimam innuimus ubertatem.

LXII. Demum quod ad magneticos effectus pertinet; potiores sane sponte inde fluunt. Nam tres in primis sunt præcipuæ magnetis affectiones: attractio, ac repulsio iuxta diversos polos, communicatio virtutis, & directio. Attractio inde pendere potest, quod lex virium inter particulas ferri potissimum, & magnetis, ad multo maiorem distantiam, quam reliquæ, a gravitatis lege plurimum adhuc dissideat, & secundum diversas directiones vires exercentur in iis particulis qua repulsivæ, qua attractivæ. Ubi multæ eiusmodi particulae coaluerunt simul cum axibus attractionum vel congruentibus, vel parallelis, ii enimvero erunt magnetes optimi, qui quidem vires etiam aut acquirere poterunt, aut amittere; prout plures particulae, quocumque demum artificio, eandem positionem acquirant, vel amittant, vel cum aliis coniungantur, ex quarum conjunctione immutetur lex. Patet autem eos habere etiam posse polos attractionis, & repulsionis, & iis contractis, singula frustra suos pariter polos habitura. At si ferri particulae quocumque demum pacto eam axium positionem acquirant, ferrum ipsum poterit in magnetem abire, & eandem attractivam, ac repulsivam vim exercere.

LXIII. Hinc communicatio virtutis in eo sita esse potest, quod ferri particulae casu & sine ullo ordine dispositæ, ob magnetis vicini actionem obvertant axes suos ita, ut in pluribus particulis ii congruant; tum enim se prodet magnetica vis in ferro quoque. Et eadem de causa filum

ferreum, quod super magnetem ductum virtutem contraxit, poterit virtutem amittere, si motu contrario priori ducatur ita, ut axium positiones iterum perturbentur. Ferrum autem, quod diu in eodem iacuit situ, in magnetem abire poterit, particularum axibus paulatim convergentibus ex actione continua subpolarium magnetum, quos ibi in magna esse copia infra superficiem telluris patebit ex ipsa directionis explicatione.

LXIV. Directio acus in singulos magnetes pendere potest ab ipsa attractione, & repulsione iuxta diversos particularum polos, & axium positionem, ex quibus, licet in maiore distantia, verticitas pendeat prorsus, ut in num. 57. Directio autem versus certas terræ plagas polo proximas, & altero tantum polo magnetis eo se sponte obvertente, provenire potest ex eo, quod per universam quidem tellurem ingentes adsint sub ipsa superficie massæ ferri, & magnetum, sed multo plures, quam alibi, versus polos. Quod enim eiusmodi fodinæ adsint non tantum sub ipso polo, id efficiet, ut non versus polum accurate dirigantur acus, sed hinc inde aberrent. Quod eiusmodi fodinæ minores nullo certo ordine dispersæ sint per omnem tellurem, id efficiet, ut in declinatione magnetis nullus sit certus quidam ordo, sed & linea, in qua nulla est declinatio, & reliquæ, in quibus ea est certi graduum numeri, sint admodum irregulares ad sensum, & compositæ: quæ quidem ex historia magnetica habemus omnia. Atque eius rei imaginem quamdam expressam habere possumus; si maiorem aliquem magnæ virtutis magnetem ad mensæ caput collocemus; tum alios minores dispergamus irregulariter. Acus se ad magnum illum magnetem potissimum diriget; sed minorum actionibus deflectetur nonnihil. Erit autem linea quædam irregularis, in qua laterales actiones se mutuo elidant, & directio fiat versus magnetem illum maximum: hinc inde ab ea linea declinationes habebuntur contrariæ, & curvæ, in quibus eæ sint certi graduum numeri, erunt pariter satis compositæ.

LXV. Hinc autem elegantissimis, & difficillimis problematis aperitur iterum aditus: ut si datis in plano binis, vel ternis, vel quotcumque massis utcumque inæqualibus materiæ attrahentis in quacumque distantiarum ratione,













opor.


oporteat invenire curvam, in qua corpusculi attracti directio fiat versus datum punctum, vel ab eo deflectat per datum angulum. Id autem difficilius, & generalius evadit; si ex massæ dentur extra planum utcumque: multo autem magis crescit difficultas: si attractiones exprimantur per curvas quascumque datas, vel etiam per ordinatas ad superficiem, vel ita, ut in diversis quibusvis directionibus diversæ curvæ adhibendæ sint. Quid autem, si problemata proponantur inversa, ut si datis attractionis legibus, & datis curvis directiones easdem exprimentibus, quærat numerus, & dispositio eiusmodi massarum? An non eo pacto iniretur via ad determinandam ex observationibus fodinarum magneticarum positionem, & magnitudinem?

LXVI. Ac si ea est declinationis, & inclinationis causa; quid ni inde fiat, ut quotidie parum admodum mutetur directio; at procedente tempore mutatio fiat multo maior, & alicubi post ingentes terræmotus statim haud ita parva depræhensa sit? Nimirum fodinæ illæ perpetuas mutationes subeunt, novæ alibi generantur, augenturque, alibi minuuntur, & intereunt; quæ mutatio & perpetua est, & exiguo quidem tempore exigua, si summam spectes mutationum omnium contrariarum, longiore vero multo maior. At si ita res habet; an non inanis est cura, variationem declinationis ad certas leges, quas omnino respuit, revocandi? Fodinas autem magneticas & ferreas in pluribus locis esse maximas, ignorat nemo. Ad hosce effectus explicandos ex sufficiunt; ex igitur sunt causæ. A phænomenis earum positio determinanda, ex quibus, maximam esse sub polo copiam, deducitur. Si quis vero & difficiliora velit problemata; is motum quærat puncti attracti a massis dispersis, quarum attractiones, vel exprimantur per curvas, vel per ordinatas ad superficiem, vel in quavis recta ex ipsis massis exeunte, diversæ sint; vel ab eiusmodi motibus quærat vel massas datis legibus, vel leges datis massis. Quam vastus hic geometriæ, & sublimiori analysi campus, in quo vires suas experiantur, & promoveant analysim ipsam summi etiam geometriæ, & analysi!

LXVII. Nos autem nimium sane evagatos eo regredi necesse est, unde digressi sumus; ut manum tandem de tabula removeamus. Omnia virium genera per hæc curvas ad

unicum, & sibi femper constantem agendi modum reducuntur. Corpora dura eliminantur e natura, eliminatur saltus omnis, qui etiam in aliis quibusdam virium legibus haberetur; ut supra vidimus num. 38 in puncto a punctis superficiei sphericæ attracto in ratione reciproca duplicata distantiarum; ubi attractio in infinitum potest excrefcere in accessu; quod in nostris curvis numquam accidit. Phænomena autem motuum eodem, quo supra, modo hic explicantur per actiones utrinque æquales virium per curvas explicatas expositarum, quæ novas celeritates immediate producant in corporibus tam elatticis, quam mollibus, sine ulla uspiam necessitate virium vivarum, sine ulla necessitate impenetrabilitatis agentis per saltum in impulsu corporum, & contactu.





IOANNIS CHRYSOSTOMI TROMBELLI

A D

FRANCISCUM MARIAM ZANOTTUM.

De acus nauticæ inventore.

I. **B**asilicas editiones atque imperiosas habes (a), Zanotte litteratissime, dum me nauticæ acus originem, auctoremque edisserere iubes. Quod si non statim exsequor, ingratum pronuncias, pessimeque merentem non modo de inclyta scientiarum Academia, quæ me nihil plane ea de re cogitantem, in præclarissimum suum cœtum retulit, sed & de te quoque, qui huius præclarissimi beneficii, & auctor fortasse fuisti, & certe nuncius. Laboriosam utique provinciam imponis, dum rem ab aliis pertractatam (b), & (tua quidem sententia) nondum plane evolutam explicare me vis: in qua etiam vereor, ut ea in sit novitatis laus, quam philosophicæ nostrorum temporum academix fere perquirunt. Obsequor tamen, & dubium omne, ac scrupulos, quibus angebar, amovet iussio tua: neque enim tibi vehementer lucubratiunculam hanc efflagitanti denegari a me posse existimo. Dicam ergo quæ ex variis scriptoribus didici. Tu porro quisnam rectius sentiat, iudicare poteris.

II. Ex inventa acu nautica (sic enim, uti nosti, tenuem chalybeam lamellam, quæ virtutem, quam habet magnes, ut se se veluti sponte convertat ad polum, ex eiusdem magnetis affricu, contrahit, appellamus) ex inventa, inquam,
acu

(a) *Plaut. captiv. 4. 2. 31.*

(b) *Ut de reliquis fileam, argumentum hoc plurima cum eruditionis, tum ingenii laude pertractavit Gregorius Grimaldus, cuius doctissimam dissertationem continent Acta (si ita appellare ea volumus) Academiae betruscæ tomo III pag. 195.*

acu nautica gloriam non paucæ nationes sibi comparare student, id inventum popularibus suis tribuentes.

III. Non defuere (*a*), qui vetustos ægyptios egregiam hanc magnetis facultatem novisse dicerent; quam quidem variis hieroglyphicis, atque ænigmatum formis occultaverint; ne vulgata scilicet lapidis huius præstantia vilesceret. Favet opinioni huic non levis coniectura. Putant siquidem viri doctissimi ab ægyptiis manasse finas. Sinæ porro iam pridem in maritimis itineribus magnete duce utebantur.

IV. Phœnices, tyriosque maritimis itineribus exercitissimos in iisdem itineribus cursum suum direxisse magnetis ope, testantur nonnulli (*b*), qui illis traditam fuisse aiunt virtutem hanc ab sapientissimo viro aliquo, atque illo quidem contribule suo, vel, si vis, ægyptio: aut fortasse etiam a Salomone, dum, Hiram imperante, sociati hebræis phœnices, classes ingentes construxere, earumque ope itinera suscepere longissima, periculisque refertissima. Neque vero [si his credimus] aliter ad tam distitas regiones cursum dirigere, neque toto fere terrarum orbe emporia construere, & colonias stabilire iisdem phœnices potuissent, uti re vera & construxerunt, & stabilierunt.

Postrema hæc opinio, quæ scilicet phœnicibus a Salomone traditum vult magnetem, seu acum ipsam magneticam se se convertentem ad polum, viris eximiis plurimum placuit (*c*). Etenim, si hos audimus, rex iste sapientia & philosophicarum rerum peritia reliquos homines longe superans, dum classem in remotissimas regiones sapius misit, acu nautica nauulo tradita, eoque de eius virtute edocto, tutiorem reddidit, atque adeo breviorum illius cursum effecit.

V. Nonnulli, quibus persuasum est, præstantiam lapidum nullam fuisse Aristoteli abditam, in eximii huius philosophi libris verba quædam reperisse se monent, in quibus describitur magnes, virtutem suam, qua se vertat ad polum,
ferro

(*a*) *Ioannes Federicus Hervartus in libro inscripto: Admiranda ethnicæ theologiæ mysteria.*

(*b*) *Fullerus lib. 4 miscel. sac. cap. 19.*

(*c*) *Vide quæ tradit Ioannes Albertus Fabricius biblio. art. 2 n. 12 pag. 634, ubi allegantur Fullerus, Pineda &c.*

ferro tribuens, ideoque apertissime traditur egregium illud instrumentum, quod *pyxidem nauticam* appellamus; quippe in ea conclusa, obfirmataque tenuis ferri lamella magnetica virtute imbuta se veluti sponte ad polum vertit. En porro, quæ dixi, Aristotelis verba desumpta ex libro, qui *De lapidibus* inscribi solet. *Angulus magnetis cuiusdam est, cuius virtus convertendi ferrum ad zorum* [hoc est septentrionem]: & hoc utuntur nauta. *Angulus vero alius magnetis illi oppositus trahit ad Aphron* [idest polum meridionalem], & si approximes ferrum ad zorum, & si ad oppositum angulum approximes, convertit se directe ad Aphron.

VI. Latinis haud ignotam nauticam acum propterea putant alii, quod versiculos hos in Plauto (a) legerint.

Huc secundus ventus nunc est; cape modo vorsoriam

Hic favonius serenu' est, isti, auster imbricus.

Hic facit tranquillitatem, iste omnes fluctus conciet.

Et rursus alibi (b) cape vorsoriam.

Recipe te ad Herum &c.

vorsoria nimirum, seu *versoria* nomine magneticam acum indicatam contendunt: hac quippe voce a Philosophis, quorum linguam sequi Plautus commode potuit, magnetica acus appellatur (c).

VII. Vult Goropius Becanus (d) a cimbris, ideoque a germanis accepisse reliquos europæos tam præclarum inventum, illisque propterea debere nos eas, quibus nunc afflui.

(a) In mercatore actu 5 sce. 2 v. 34.

(b) In trinum: actu 4 sce. 3 v. 19, & 20.

(c) Vide Musschenbroeck, & reliquos fere omnes Philosophos.

(d) In Hispanicis lib. 3 pag. 29 edit. Plantini 1580.

= Qui nauticam anemographiam delineant in pendula pyxidis tabula, magnetis vi perpetuo ad omnes mundi plagas directa, triginta duos ventos distinguunt, singulis quadrantibus octo ventos applicantes; quorum nomina omnia cimbrica sunt, sive linguæ teutonicæ, nobis inter scallim & mosam vernacula, propria: qua de re liquet cuius fuerit primus pyxidis, ad cuius normam clavus ferretur, inventor. Quotquot enim sunt, qui triginta duo ventorum discrimina distinguunt, nostratibus vocibus utuntur, sive hispani sint, sive galli, sive alterius nationis naucleri.

fluimus, americanæ, atque africanæ, asiæque opes, & pharmaca. Innititur vero [quod discimus (a) ex Pineda] iis ventorum, qui in pyxide describuntur, nominibus: quippe cimbrica lingua ea est, qua notantur. Ii quoque germanis laudem hanc tribuunt, qui ab Alberto Magno omnium primo detectam hanc magnetis virtutem, & Aristotelis auctoritate firmatam, litteris etiam traditam fuisse aiunt.

VIII. Galli laudem hanc sibi adsciscunt. Ac primum quidem verba illa Ditmari proferunt (b): *Magdeburgi horologium fecit* [Gilbertus monachus, natione gallus, qui deinde Silvester II Pontifex fuit] *illud recte constituens, considerata per fistulam quamdam stella nautarum duce*. Etenim sic verba illa accipiunt, (c) ut horologium solare Gilbertus construxerit, lineam meridionalem perquirens magnetico instrumento polum spectante.

Tum versiculos hos adducunt, quos edidit Guiotus Provinciaus [quem alii XII, alii XIII seculo vixisse aiunt] Poeta, ut ea ferebant tempora, præclarus.

Icelle etoile ne se muet,
Un art font qui mentir ne puet,
Par vertu de la Marinette,
Une pierre laide, & noirette,
Où li fer volontiers se joint &c.

In his nimirum versiculis plane explicatur acus nauticæ vis, & nisus, conatusque in polum. Quid? quod Ricciolus (d) nobilis astronomus, idemque italus, veritate ipsa compellente, docet, imperante Ludovico nono, gallos nautas ita acu nautica fuisse usos, ut eam exiguo vase aqua semipleno veluti innatantem continerent: duabus vero fistulis, quibus innitebatur, cavisse ne mergi posset. Atque hanc nauticæ

(a) *De rebus Salom. lib. 4 cap. 15 §. 4 pag. 203.*

(b) *Lib. VI Chron.*

(c) *Maiol. coll. 18 de lapidibus pag. 312 editionis Moguntinae anni 1615. = Sed & annos ab hinc sexcentos Gilbertus vir gallus, qui postea in pontificatu romano Silvestri secundi nomen consequutus est, comperto, magnetis virtute, septentrione, atque axe, apud Mersuxpuz, horologium egregium instituerat.*

(d) *Geograph. & hydrograph. lib. 10 cap. 18.*

ticæ acus formam, valde quidem [uti res ipsa declarat] ab hodierna nobilitate, ac præstantia deficientem, a gallis ait transiisse ad italos. An non etiam eam laudem gallis tribuit Cabeus, dum Petrum Peregrinum gallum ante trecentos, & amplius annos de acu nautica primum omnium scripsisse docet? (a)

Ad hæc: nauticæ acus auctores, inventoresque gallos indicat ipsa eiusdem acus vetusta structura; quippe prisca consuetudo ita eam efformari iubebat, ut cuspidem, qua septentrionem polumque monstrat, lilium referret; ideoque gallici auctoris certam notam. Præterea vox ipsa *calamita*, quæ non modo ad magnetem ipsum, verum etiam ad ferrum, quod virtutem, qua se convertat ad polum, ex magnetis affricu contraxit, denotandum sæpe adhibetur, vox, inquam, *calamita* illam ipsam, quam nuper diximus, huiusce instrumenti ostendit originem. Etenim vox hæc *calamita* gallica lingua, ex qua procul dubio derivata est, *ranam* significat *natantem*, ideoque & formam illam indicat, quam habebat nautica acus, antequam stylo in medio confixo siteretur, & etymologia ipsa auctores innuit gallos. Miraris, Zanotte mi, tam subtilem, &, si superis placet, ingeniosissimam probationem? At scito non modo gallos eam proposuisse; (b) verum, quod magis miraberis, dudum ab italo scriptore fuisse traditam. Ille ipse nempe Ricciolus, quem nuper allegavi, recitatis Guyoti Provinei [ut ipse putat] notissimis versiculis = *Icelle*
T. II. P. III. Vu estoile

(a) Primus, quod sciam, Petrus quidam Peregrinus Gallus id posteritati tradidit in quodam libello, seu potius epistola: sic enim maluit eam auctor appellare &c. lib. I cap. VI pag. 23 *Philosophia magnetica*.

(b) *Clariff. Menag. in orig. ital. ad vocem calamita*. Più verisimile è quella [derivazione] del P. Forniero Gesuita, il quale nell' undecimo della sua *Idrografia* al capo primo scrisse, che questo vocabolo fu così detto dal francese *calamite*, significante propriamente una specie di ranocchio verde; perciocchè avanti che fosse trovato il modo di sospendere, e bilanciare nella bussola l' ago toccato dalla *calamita*, ponevasi con due picciole festuche in un' ampolla piena d' acqua, dove galleggiava, ovvero nuotava a guisa d' un ranocchio.

estoile ne se muet &c. scriptis hæc prodidit. Quibus indicat, ad polum, & meridiani situm discernendum adhibitum fuisse vel ipsum magnetem, vel versorium magneticum, cum rosa ventorum versicolore, Marinette dicta, quæ cum aqua innataret, videbatur rana quadam, [gallice Grenouille verte] quæ antiquitus gallis dicebatur calamite, unde nomen hoc ad italos manavit pro ipso lapide magnete significando. (a) Denique ipsa ventorum nomina, quæ denotata habet pyxis in ora, ex gallica lingua originem habent. Quis enim gallicas neget voces: *hard, sud, est, ouest*?

IX. Ne hac ipsa laude fraudarentur lusitani, effecit gallici scriptoris diligens cura, Regnaultii scilicet, (b) philosophi valde laudabilis; quippe nauticam pyxidem aut inventam, aut certe ita a lusitanis excultam, auctamque fuisse ait, ut hos merito auctores illius facias.

X. Italos eximiam hanc magnetis virtutem europæos reliquos edocuisse, ii tradunt, qui Marcum Polum venetum diu apud asiæ populos incolam, eam, quam prædicamus magnetis facultatem, a finis edidicisse, eiusque usum in europam induxisse aiunt; ii quoque, qui a venetis mercatoribus, qui per ea tempora ad indos usque, atque adeo per erithræum ad sinas ipsos pervenire consueverant, in italiam delatam putant nauticam pyxidem; quamobrem inventionis laudem Sinis quidem hi facile tribuunt, at virtutis huius, ut ita appellem, manifestationem, & apud nostrates usum, venetis adsciscunt.

Italis pariter gloriam hanc tribuunt ii, qui acum nauticam aut primo observatam, aut certe elaboratam perfectamque fuisse aiunt a Gira, seu Gioia patria amalphantano, quem Flavium plerique, Ioannem alii appellant: hinc notissimus ille versiculus,

*Prima dedit nautis usum magnetis amalphis,
cui affinis est alius æque notus.*

Inven.

(a) Ricciol. Geogr. lib. x cap. 18 pag. 455.

(b) Tratten. xvi pag. 209 tom. I. Questo fenomeno, Eudosso, richiama al mio spirito l'obbligazione, che ha tutto il mondo a' Portughesi, i quai l'Indie scoprir volendo, trovarono, o perfezionarono almeno una cosa più stimabile delle stesse ricchezze dell'Indie, voglio dire la bussola.

Inventrix præclara fuit magnetis amalphis.

XI. Angli tamen præripere nationibus reliquis laudem hanc student, fatentes scilicet primordia huiusce præclarissimi instrumenti, quod italice *bussola* appellant, apud populos alios fortasse exstitisse [est quippe, si Anglos audis, eorum sententia valde probabilis, qui Rugerio Baconio anglo inventum hoc tribuunt] (a): at se provexisse, atque adeo perfecisse asseverant, quod rude, impolitumque ab aliis acceperant: quod nisi peregissent, levissimum fuisset ex detecta hac magnetis virtute, & ex inventa acu nautica emolumentum. Propterea itaque se illius auctores vocant, quod polierint, promoverint, auxerint, perfecerint denique id, quod ante eorum laborem, & studium, aut neglectum fortasse erat, aut certe non multum habens utilitatis. Illud ergo instrumentum, quod *bussola* vulgo dicimus, aut *nautarum circulum* [*cerchio, o compasso de' marinari, o sia cerchio fatto a compasso*] a contribulibus suis profectum angli volunt: quod palam indicatum aiunt nominibus iis ipsis, quibus huiusmodi instrumentum appellamus: *Boxel* quippe, & *mariner s' compass* anglicæ linguæ voces sunt, quas reliqui populi retinentes, sancteque servantes [licet, ut linguarum genio aliquatenus indulgerent, non nihil immutarint] manifesto declarant, a quibus rem ipsam acceperint.

XII. At adhuc quidam sunt, qui a tanta opinionum diversitate, ac multitudine territi vel ancipites hærent, nullumque se invenisse aiunt, quem tam nobilis inventi auctorem pronuncient, vel, ut in aliis inventis sane non paucis, ita & in detegenda hac magnetis facultate, elaborandaque magnetica acu, sensim profecisse aiunt homines, adeo ut dividi in plurimos ea laus debeat.

XIII. Habes, præclarissime Zanotte, nobiliores hoc de argumento sententias; sed quoniam a me, quod sentio, proferri vis, statim profero, ea tamen conditione [quod ab initio dixi] ut tu, si quid minus probabis, candide

V u 2

reii.

(a) *De verham in demonstr. essentia & attributorum Dei lib. V cap. I pag. 278 edit. Florent. Fabricius quoque cap. XXI Bibliogr. n. 12 pag. 635 hac scriptis mandavit: Gilbertus Peregrinum e Rogeri Baconi scriptum suffuratum testatur &c.*

reiicias, & apertissime; neque enim audacter, & animose hac in controversia quicquam certi statuere audeo, sed ea tantum tibi veluti amico, atque adeo iudici propono, quæ verisimiliora arbitror, & veritati propiora.

XIV. Pauci porro, ut puto, erunt, qui ægyptiis affirmant, eam, de qua agimus, magnetis, ac usve nauticæ præstantiam fuisse notam. An non ea fuisset deinceps nota phœnicibus, & græcis, qui plerasque artes, & scientias ab ægyptiis didicerunt, easque deinceps edocuerunt latinis, & nationes romanis subditas? Phœnicibus tamen, ac græcis quoque, & latinis, atque occidentalibus nationibus omnibus fuisse eam abditam, ex eo maxime assequimur, quod nemo veterum huiusce magnetis virtutis meminit, tametsi non pauci varias magnetis vires, facultatesque descripserint, & ea retulerint, quorum ope nautæ suos dirigerent cursus: quod deinceps apertius ostendam.

XV. At, a quibus, inquis, hanc magnetis præstantiam edidicere sinæ, si ab ægyptiis, a quibus derivantur, non didicere?

Multa ad solvendum valde difficilia brevis hæc interrogatio proponit, quæ si velim singula fufe, accurateque persequi, vereor ne epistolæ modum ac rationem excedam. Complectar tamen, ut potero, paucis ea, quæ ad præsens institutum necessaria esse arbitrabor.

XVI. Sinas ab ægyptiis derivatos fuisse censent nonnulli, inter quos doctissimus Huetius (a) eminet, hisce rationum momentis permoti. Iidem fere sunt utriusque nationis mores, & ritus. Si duplici litterarum genere utebantur ægyptii, sacro uno, itemque abdito, profano altero, & vulgato; id & præstant sinæ. Lingua, qua nunc utuntur sinæ, affinis valde illi est, qua utebantur ægyptii. Quin si vacca ab ægyptiis colebatur, a sinis pariter colitur. Metempicosis errore utraque natio ducitur. Exteros quoque utraque natio averfatur maxime (b).

At

(a) *Commerc. antiqu. cap. 10.*

(b) *Olim ægyptios exteris maxime fuisse infensos, tradit Strabo lib. 17. En illius verba latine expressa. Enimvero primi ægyptiorum reges suis contenti opibus, nec importata aliunde magnopere desiderantes, omnibus exteris navigantibus eo*

At non propterea tanti hæc facio, ut finas ægyptiorum progeniem censeam. Simillimum veri est, orientales multos, atque eos præsertim, qui cultiores, & litteratiores reliquis erant, duplici litterarum genere fuisse usos, sacro uno, profano altero. Hoc de argumento copiose disputat Bochartus (a), quem, opto, consulas. Bocharto Tavernerium iunge de sacra Braminum lingua scribentem (b). Quis tamen nationes istas inter ægyptiorum nepotes, & sobolem recenseat? Ceterum valde distat forma characterum illorum, quibus sinæ utuntur, ab forma illorum, quos ab ægyptiis adhibitos novimus (c). Hinc si ex characterum formis originem coniecere vis, plane diversos utriusque nationis parentes, atavosque fateberis. Animosa porro persuasio ea fuit, qua se duci permisit vir eruditissimus, dum affinem tradidit utriusque nationis linguam. Plane noscat, oportet, & funditus utramque linguam, qui de huiusmodi affinitate iudicare sapienter velit. An vero plane callebat Huetius sinensem, & vetustissimam ægyptiorum linguam; iis nempe temporibus usitatam, quibus ab ægypto evulsa est portio civium aliqua, ut finas incoleret?

In vaccarum cultum finas [si generatim loqui volumus] esse propensos, nemo, quem legerim, tradit, tametsi varios evolverim, qui de eorum moribus, ac ritibus agunt. Metempicosi quoque addictos esse (si generatim hic quoque loqui volumus) minime ii docent, quos nuper allegavi scriptores,

infensi erant, maxime græcis, qui ob soli penuriam populari, atque appetere aliena solebant: pag. 792 edit. Paris. 1620. Id de sinis quoque testantur historici omnes, veluti Torfellinus in Vita S. Francisci Xaverii lib. V &c.

(a) In geographia sacra lib. 2 Chanaam cap. 17.

(b) Parte 2 itinerar. pag. 171.

(c) Sinenses vero neque literis utuntur, neque facile concipiunt, quomodo fieri possit, ut tam exiguo numero characterum, quorum singuli nihil significant, exprimere, atque scripto consignare possimus tot, tamque diversas animi nostri conceptiones, & quacumque ore eloqui valemus Quomodo sinensium characteres differant ab hieroglyphicis ægyptiorum, disquirat Kircherus tomo 3 Oedipi. Hætenus Fabricius cap. 21 bibliogr. pag. 630.

ptores, quos tamen diligentes ac peritos agnovimus. Ceterum si ex hoc argumento, ac nota feros ægyptiorum nepotes dignoscere vis, plerosque asiæ populos ab ægyptiis derivatos fuisse docebis: vaccas enim colunt, & animas ex una animante, dum moritur, in alterius corpus pertransire contendunt (a).

Sinas olim a portibus suis, ac regionibus omnibus externos expulisse, ultro fateor; sed neque hæc ægyptiis per ætates omnes indita barbaries fuit, ac fera consuetudo: (b) neque hic ægyptiorum tantummodo, finarumque mos fuit, adeo ut eo indicio utriusque populi originem dignoscere certo possis. Quin plane novimus ad nostra usque tempora moschos adeo infensos fuisse exteris, ut neminem paterentur sine capitis periculo ditionis suæ fines ingredi. Ex scilicet nationes, quæ aut penu sua se vivere posse putant, aut insidias ab exteris metuunt, aut etiam verentur, ne opibus patrii regni ditentur advenæ, principumque favore, dignitatibus augeantur, eosdem externos, si possunt, arcent, & a finibus suis eiiciunt. Atque id sane experimento suo comprobavit Huetius ipse, cuius verba hic describerem, nisi & multa essent, & a præsentis instituto alienissima (c). Coniecturam porro multo graviolem attulisset clarissimus Huetius, si circumcissionis ritum a finis observatum ostendisset: illi enim tenacissime adhæsere ægyptii, atque adeo orientales populi sane non pauci (d), a quibus proinde, si manassent sinæ, avitum hunc morem retinuisent. Si itaque eum minime servant, ille, ut puto, minime errabit, qui priscos finarum parentes ab ægyptiis valde diversos affirmabit,

Sed

(a) Vide quæ tradit le Gendre de l'opinion tom. 1 lib. 3 cap. 1 n. 4 pag. 219, & rursus cap. 4 n. 18 pag. 300. Les Brachmanes des Indes &c. Vide etiam quæ tradit Iovet to. 2 pag. 152, & 194 editionis italica.

(b) Consule quæ Strabo lib. 1 de Menelao ab ægyptiis, & æthiopicis regali hospitio excepto, & muneribus donato docet pag. 38, 39, & 40 editionis parisiensis 1620.

(c) Eius verba in commentario De rebus ad se pertinentibus, legat obsecro lector lib. 2 pag. 46.

(d) Calmet in peculiari dissertatione.

Sed demus, quod libet, sinasque ab ægyptiis profluxisse fateamur. Demus quoque sinas iam dudum magnete, acque magnetica cursus suos mari provectos direxisse. An non eam potuerunt subsequenter seculis aut invenire ipsi, aut ab aliis addiscere? Id utique, si sapias, fateberis. Quot enim aut invenimus parentibus nostris, avisque abdita, aut ab aliis assequimur, quæ deinceps excolimus & perficimus?

XVII. At tu, Zanotte doctissime, a me exposcis, quid tandem de sinis iudicem, quos quidem nautici instrumenti inventores fuisse plerique asserunt, obsistentibus tamen aliis, quorum auctoritas summa est. Me oratio deficiet, si eos omnes recensere studebo, qui acum nauticam apud sinas iam dudum in usu fuisse aiunt. Nonnullos indicabo (a), quos tu, si vis, consule. Horum porro, ac præsertim Patris Societatis, & Huetii auctoritas, (prior enim diligenter consuluit scripta, ac vetera monumenta sinarum, alter vero ea narrat, quæ constans fama falsa esse non sinit) horum, inquam, auctoritas obiicienda est auctoritati Kircheri, aliorumque paucorum, qui sinas laudem hanc demunt, propterea quia fabulosa videntur esse, quæ de adhibita sinis multis ab hinc seculis magnetica pyxide narrantur; & nullus scriptorum sinarum, quos hi consuluerunt, eorum inventæ acus magneticæ meminit; nullus quoque qui ex sinico imperio ad nostras regiones devecti sunt, quos pariter hi consuluerunt, noverit magnetica acu in maritimis uti nunc sinas.

Nostra sane non interest hic sedulo perquirere, num
anti-

(a) Fournier hydrogr. lib. xi cap. i.

Menagius orig. ling. ital. ad vocem calamita.

Societ. observ. mathem. astronom. &c. deducta ex libris sinensibus.

Le Gendre de l'opinion tom. 2 lib. 4 cap. ix n. 56 pag. 83.

Huetius de commerc. cap. 10 pag. 24 editionis italicæ.

Auctor. librorum illorum, qui spectaculum naturæ inscribuntur, tom. 8 edit. italicæ.

Isaacus Vossius variar. observ. cap. 14. Quibus, si vis, adde quæ ex probatis auctoribus didicit, scriptisque prodidit Fabricius: (Biblioth. cap. 21 n. 12 pag. 635) videlicet Vascum Gammam, qui primus detexit promontorium bonæ spei, incidisse in naves barbarorum, quibus acus magneticæ usus foret.

antiquissimus, plurimaque numerans secula sit apud finas magneticæ pyxidis usus. Probabilis sane eorum opinio est, qui ante Christum natum adhibitam magneticam pyxidem a finis aiunt, sed fac multo recentiore fuisse apud illos. Mihi satis est si dederis (quod tamen multorum, eorumque valde diligentium scriptorum testimonio compertissimum videtur fieri) diu ante europæos magnetica acu usos fuisse finas. Tunc porro statim diluis cetera. Ignoraverint, ut libet, ii, quos consuluit Kircherus, [de cuius auctoritate vide, obsecro, quæ tradit Huetius (a)] aliique, si qui sunt, qui laudem hanc finis invident, ignoraverint, inquam, finas scriptores, qui hæc litterarum monumentis consignaverint. An propterea deneganda fides iis est, qui hæc enarrarunt? Minime vero: multa enim, ut quisque novit, a probatis etiam scriptoribus omittuntur, quæ alii tamen tradidere. Illud certo constat, uti nunc etiam finas, utpote veterum morum retinentissimos, acu nautica non fixa obfirmataque, sed natante & fluxa, ad eum modum, quo traditum est, usos fuisse eos, qui ex asia præstans hoc instrumentum deduxere in europam (b).

XVIII. Dicant porro quod libet, qui phœniciis & tyriis notam fuisse contendunt eam, de qua agimus, magnetis vim. Ego sane multo aliter sentio, sentiamque iugiter, donec scilicet non levibus coniecturis, sed validis, firmisque argumentis ostendant phœniciorum, tyriorumque fautores, ea itinera ab iisdem phœniciis & tyriis fuisse suscepta, quæ sine tam egregio instrumento suscipi non potuissent, & in his itineribus eo re ipsa fuisse usos. At qui eorum itinera describunt, ita describunt, ut facile assequaris, potuisse ea peragi sine magnetis, & nauticæ acus commodo; & eos consuetam veteribus reliquis navigandi rationem fuisse secutos: ita scilicet, ut diu se alto non fiderent, sed littori plerumque adhærerent, portumque sæpissime tenerent. Certo quoque novimus stellas tantum consuluisse, dum navigarent,
& præ

(a) *De rebus ad eum pertinentibus pag. 65.*

(b) *Furnerius, & Menagius locis nuper allegatis. Rursus auctor Spectaculi naturæ loco nuper allegato. Altri vogliono dar quest' onore ai Cinesi &c. Vide quæ numero XXV. afferentur.*

& præ ceteris minorem urfam. Aratus, & ex eo Cicero (a)

Hac fidunt duce nocturna phœnices in alto.

Ovidius quoque (b)

*Magna minorque fera, quarum regis altera graias,
Altera sidonias, utraque sicca, rates.*

Non me latet Levinum Lemnium, aliosque præclaros viros, quos sequitur doctissimus Pineda (c), veterum testimonia allegare, quibus significetur & ultra fretum gaditanum phœnices navigasse, insulas quoque magnas invenisse, atque incoluisse; & horum quidem exemplo non littoribus tantum adhæsisse deinceps nautas, sed alto se commisisse. An id [inquiunt] ausi fuissent, si nautica pyxide caruissent?

Sed non propterea a sententia recedo. Quæcumque de phœnicum remotissimis navigationibus tradidere Strabo (d), Arrianus, aliique vetusti scriptores, veluti verissima excipio: quamvis noverim in dubio ea poni a recentioribus non paucis. Quid tum denique? nisi ut fatear potuisse phœnices, aliosque phœnicum exempla secutos populos, audere aliquid, quod nostri fortasse, nisi acu magnetica iuvarentur, non auderent. Insulas, quas extra fretum gaditanum navigantes repererunt, si quis dicat eas fuisse, quas nunc *azorides*, aut *canarias* vocamus, rem valde verisimilem dicet. Fac tamen remotiorem aliquam, immo, si vis, americæ portionem aliquam minus ab hispaniis remotam eos invenisse; quid aliud obtines, nisi, quod facile dabo, veteres aliquando, seu casu, seu procellarum, ventorumque vi, seu, temeritate etiam aliqua, eo fuisse deductos, quo alii ferri non potuere?

Ii porro, qui alto se commiserunt, non acum nauticam itineris, audaciæque suæ ducem habuere, sed ventos definito aliquo anni tempore constanter spirantes. Arrianus sane (e) hæc de Hippalo tradit. *Primus Hippalus gubernator animadverso emporiorum situ, ac maris figura, invenit navigationem per altum mare eo tempore, quo spirant ex oceano apud nos etesia, in indico vero mari libonotus.*

Tom. II. P. III.

XX

Quam-

(a) Parte x operum pag. 617.

(b) *Tristium lib. 4 initio elegiæ 3.*

(c) *De rebus Salom. lib. 4 cap. 15 S. 5 pag. 202, & seq.*

(d) *Lib. 1.* (e) *In Peripl. mar. eryth.*

Quamquam ii ipsi, qui alto se committebant, non ita videntur se alto commisisse, uti nunc se committunt, qui gaditano freto egressi, in occidentales, aut orientales indias navigant, sed ita, ut paulo audaciores essent iis, qui littoribus iugiter adhærebant, & portus sæpissime capiebant. Ceterum hi quoque portus crebro petebant, nec multorum mensium in alto sustinebant navigationem. Hoc modo Æneas, qui paulo ante hæc dixerat (a),

feror exsul in altum

Cum sociis, natoque, penatibus, & magnis dis.

& deinceps (b)

Dant maria, & lenis crepitans vocat auster in altum.

Deducunt socii naves, & littora complent:

proxime post hæc subdit (c).

Huc feror, hæc fessos tuto placidissima portu

Excipit: egressi veneramur Apollinis urbem.

nec aliter accipiendi sunt eiusdem Virgilii notissimi versus (d)

Vix e conspectu sicula telluris in altum

Vela dabant lati

..... medium Æneas iam classe tenebat

Certus iter (e).

Quid? quod minime latere potuisset reliquos populos tam præstans magnetis virtus, si eam novissent phœnicii gubernatores, & nautæ. Tamen nullus plane veterum de ea meminit, sed vel avium volatum (f), vel stellas tantummodo commin-

fcun-

(a) Æneid. 3 v. 11.

(b) ibid. v. 70.

(c) v. 78.

(d) Æneid. 1 v. 34.

(e) Æneid. 5 v. 1.

(f) Martian. Capell. lib. VI sub titulo de India.

Pineda de rebus Salomon. lib. 4 cap. 15 S. 5, ubi allegat

Plinium libro VI cap. 22, & Solinum cap. 56, quos consule.

Alia hic non affero, quippe, si cuncta referre vellem hanc in rem apta testimonia, infinitus propemodum essem. Si quis tamen alia adhuc optat, ecce tibi Virgilium 5 Æneid. vers. 832.

..... clavumque affixus, & hærens

Nusquam amittebat, oculosque sub astra tenebat.

Rurfus lib. 3 v. 204.

Erramus Pelago: rotidem sine sidere noctes.

& in Georg. lib. 1 v. 137

scuntur, quæ iidem nautæ consulerent. Hinc Virgilius de Palinuro. (a)

*Qui lybico nuper cursu, dum sidera servat,
Exciderat puppi mediis effusus in undis.*

An omisissent commodum illud, quod in maritimis itineribus ex magnete, acque magnetica percipitur, si illud novissent, quando quidem toties inculcant stellas huiusmodi cursuum duces?

At saltem non omisissent præclaram hanc magnetis præstantiam, quum diligenter de eodem magnete differerent, illiusque facultates adducerent. Omiserunt tamen, dum præsertim vim illius ferri attractricem describerent. Hanc profecto veteribus græcis fuisse notam, ea declarant, quæ magnus vir Gassendus illorum testimoniis aut adductis, aut certe indicatis, scripsit (b). An vero latinis notam dicere quis audebit, postquam Lucretium copiosissime de magnete differentem audierit, (c) eximiam hanc tamen magnetis facultatem silentio prementem?

Ne tamen videar unius Lucretii silentio fidere. En tibi Plinium (d): *Quid lapidis rigore pigrius? ecce sensus, manusque tribuit illi. Quid ferri duritia pugnacius? sed cedit, & patitur moras: trahitur namque a magnete lapide, domitrixque illa rerum omnium materia ad inane nescio quid currit: atque ut propius venit, assistit, teneturque, & complexu hæret.*

Nec minus eleganter ac festive, ornateque de magnete Claudianus (e)

*Ex ferro meruit vitam, ferrique rigore
Vescitur, has dulces epulas; hæc pabula novit.*

— — — — —
X x 2

Pro-

Navita tum stellis numeros, & nomina fecit.

Tibullus porro lib. 1 eleg. 9 v. 10.

Ducunt instabiles sidera certa rates.

Etiam Petronius Arbiter Satyric. pag. 361 edit. Amste. 1669.

*Gubernator, qui pervigil nocte siderum quoque motus
custodit &c.*

(a) Lib. 6 Æneid. v. 358.

(b) Philosoph. Epicur. tom. I pag. 192, & 193, & tom. II oper. pag. 122 &c.

(c) Libro VI v. 979.

(d) Lib. 36 cap. 16.

(e) In epigramm.

*Pronuba fit natura deis : ferrumque maritat
 Aura tenax : subitis sociantur numina furtis .
 Quis calor infundit geminis alterna metallis
 Fœdera? quæ duras iungit concordia mentes?
 Flagrat anhela filex : & amicam saucia sentit
 Materiem : placidosque chalybs cognoscit amores .*

At quis veterum, amores eos comminiscitur, quibus ardeat magnes polum iugiter spectans, & ad eum veluti anhelans?

XIX. Quod de Salomone comminiscuntur, vocat nos ad celebrem illam disquisitionem, quæ viros doctissimos diu exercuit, exercebitque fortasse etiam impofterum: quænam scilicet sint ex regiones, quas *tharsis* & *ophir* sacra Scriptura appellat. In hoc argumento libentissime versarer, si præsens institutum, atque epistolæ modus ferret. Confule, ne cuncta indicem, quæ hac super re scripsit laudatissimus Huetius (a): atque ex iis [nisi multum fallor] assequeris, errare eos, qui remotissimas insulas, ad quas Salomonis & Hiram classes tenderent, fuisse censent. Quod si paucis perstringere me vis, quod eo de argumento sentiam; statim habe. *Ophir* & *tharsis* ea procul dubio sunt loca, ad quæ Salomonis classes ferebantur. De *ophir* quidem hæc tradit sacer auctor (b) *classem quoque fecit rex Salomon in asiongaber, quæ est iuxta ailath in litore maris rubri in terra idumææ. Misitque Hiram in classe illa servos suos, viros nauticos gnaros maris cum servis Salomonis. Qui cum venissent in ophir, sumtum inde aurum quadringentorum viginti talentorum detulerunt ad regem Salomonem.* Hoc idem narrans scriptor Paralipomenon (c) Salomonem, ait, *Asiongaberem & Ailathum adiisse, classis huius visendæ causa; tum hæc subiicit; misit autem ei Hiram per manus servorum suorum naves & nartas gnaros maris, & abierunt cum servis Salomonis in ophir.* Et hæc quidem ad iter in regionem *ophir* susceptum pertinent. Aliud iter in *tharsis* institutum, reditumque navium Salomonis ex ea regione declarant subsequencia (d), *classis regis per mare cum classe Hiram semel per*
tres

(a) In peculiari libello, quem De navigationibus Salomonis inscripsit.

(b) 3 Reg. 9, 26, & seq.

(c) 2 Paralip. 8, 16, & seq. (d) 3 Reg. 10, 22.

tres annos ibat in tharsis. = (a) Naves regis ibant in tharsis cum servis Hiram semel in annis tribus: & deferebant inde aurum &c. Atque ex his quidem verbis assequeris, tribus annis completum tandem fuisse iter classis illius, quæ dirigebatur in tharsis, longe vero breviori spatio [unius scilicet anni] iter classis illius, quæ pergebat in ophir.

Porro si Danieli Huetio, quem omnes ingeniosissimum, eundemque doctissimum norunt, fidem habes, multo propiores regiones hæ Iudææ erant, quam vulgus ferat, ideoque minime indigebant novi illius inventi, quod Salomoni scriptores nonnulli tribuunt. Et sane pyxide nautica non eguit ea classis, quæ singulis annis eo restituebatur, unde discesserat: romanæ enim & græcæ classes itinera hæc, & multo longiora conficiebant sine magnetica pyxide. At neque ea eguit, quæ post tres tantum annos se iterum pelago committebat: erat quippe per id tempus ea navigandi ratio, ut nec multum a littore abessent naves, nec alto fiderent, sed sapissime portus appellerent, in quibus menses integros, atque adeo tota hyeme permanerent. Porro maritima itinera hoc instituto suscepta, peractaque, etiam si viginti annis complerentur, nautica pyxide minime indigent. Quamquam nisi nos Huetii auctoritas, & probabilis coniectura decipit, duobus annis revera perficiebatur iter susceptum in tharsis: tertius vero annus tribuebatur reficiendis, onerandisque navibus, tyriis ad patrios lares remittendis, atque inde revocandis, & ad novum iter præparandis, aliisque huius generis, quæ integrum sane annum exposcunt (b).

Quod si Scripturæ verba penitus inspiciamus, ac diligenter.

(a) 2 Paralip. 9, 21.

(b) Huetii verba utpote valde apta omittere nolui: quia tamen multa, in paginæ calce collocanda ea duxi. Iter autem illud sic puto temporibus dividendum, ut annus unus poneretur in abitu, alter in reditu, tertius reficiendis post reditum navibus, instruendis, onerandis; institorum & nautarum quieti, mercibus distrahendis, phœnicibus tyrum remittendis, atque inde revocandis, & ad novum iter comparandis. Valde autem fallatur, si quis veterum navigationes, & nautica artis notitiam ex nostra ætate æstimet. Magnetica pyxidus usus homines nostros &

gentius, manifesto perspicies classem Hiram, & iam pridem hisce itineribus fuisse assuetam (a), & magistros veluti fuisse classarios Hiramii classiariorum Salomonis (b): & hinc fortasse aliquando *simpliciter classis Hiramii* vocatur ea ipsa classis, quæ iunctos habebat, & socios hebræos subditos Salomonis (c). Iusserat scilicet Salomon subditos suos, utpote imperitos, parere subditis Hiramii, viris iam pridem mari assuetis, & in nautica facultate dudum exercitatis; item fere ut propterea, quia in cædendis lignis sidonios Hiramii subditos peritissimos noverat, (d) iusserat hebræos suæ ditioni sub-

audentiores, & peritiores effecit. Navigare audent noctu, in tenebris, nubilo calo; olim adventante nocte ancoras iaciebant. Obliquos excipiunt ventos, ac fere adversantibus auris iter peragunt; olim rectis tantum, ac puppim ferentibus. Navigiorum mole, & nautarum industria tempestates domant, quibus olim fere deprimebantur. Vasta transmittunt æquora, ignotas scrutantur terras; nullus locus, nulla gens audaciæ ipsorum inaccessa est; vix e conspectu telluris abscedebant olim, ac vix ullam iis aditam regionem reperias, quam quæ terris iam inventis coniuncta erat. Unde omnes litorum recessus, sinus omnes necesse erat emetiri. Aperte enim tradit auctor periplus erythræi, non aliter olim in indiam navigasse ægyptios, quam sinus & litora exiguis navigiis circumeundo. Quod & ad reliquas itidem navigationes pertinere censendum est. De navigation. Salom. cap. 8 n. 3.

(a) *Sed & classis Hiramii, quæ portabat aurum de ophir, attulit ex ophir ligna thyina multa nimis. 3 Reg. 10, 11, 14 — Quia classis Tharsis regi erat in mari cum classe Hiram. 1 Reg. 10, 22. Classis regis per mare cum classe Hiram semel per tres annos ibat in Tharsis. 3 Reg. 10, 22.*

(b) *Misitque Hiram in classe illa servos suos viros nauticos gnaros maris cum servis Salomonis, qui cum venissent in ophir, sumptum inde aurum quadringentorum viginti talentorum detulerunt ad regem Salomonem. 3 Reg. 9, 25 &c.*

(c) *Sed & classis Hiram, quæ portabat aurum de ophir &c. 3 Reg. 10, 11, 22.*

(d) *Præcipe igitur, ut præcident mihi servi tui cedros de libano, & servi mei sint cum servis tuis scis enim, quomodo non est in populo meo vir, qui noverit ligna cadere sicut sidonii. 3 Reg. 5, 6.*

subiectos sidoniorum regimini, & directioni subesse, & obsequi.

Quamvis itaque, si vis, sciverit Salomon, & plane noverit eam, de qua agimus, magnetis virtutem [quo de argumento hic si disputavero, rem agam ab instituto meo alienissimam: & iam pridem monuere scripturarum interpretes dubitari merito posse, num plane omnes noverit Salomon, penitioresque lapidum, herbarumque virtutes, cum Scriptura non raro hyperbole utatur, quæ fortasse etiam latet in verbis his: *neque erat verbum, quod latere posset regem*] quamvis, inquam, si vis, eam de qua agimus, magnetis virtutem sciverit Salomon, indubitata tamen res est, ea minime in his navigationibus fuisse usum, neque eam edocuisse sive hebræos, sive sidonios. An si eam docuisset hebræos, neglexissent ii navigationem, quam Salomone rege experti fuerant sibi utilissimam, & quam commodissimam comprobassent, si magnetis, acusque nauticæ facultatem plane novissent? Tamen Salomone defuncto neglexerunt plane navigationem, neque ea de re diu cogitarunt; donec scilicet rex Iosaphatus eorum emolumentorum memor, quæ hebræi, Salomone imperante, ex classe constructa perceperant, classem alteram apparavit, eamque in ophir dirigere in animo habuit, aurumque ex ea regione deducere; quod tamen perficere minime potuisse accepimus ex sacro scriptore (a).

XX. Venio ad Aristotelis locum. Num liber ille, qui *de lapidibus* inscribitur, & a quibusdam non contemnendis viris Aristoteli tribuitur, reipsa Aristotelem auctorem habeat, an non, diffidium non leve est. Plerique Aristoteli abiudicant. Neque illos obiecta Alberti Magni auctoritas movet: temere enim, inquiunt, Alberto Magno tribuitur liber ille, qui *de mineralibus* inscribitur, ex quo verba iam allegata desumpta sunt; cum putidissima contineat, atque arabum, immo astrologorum, & necromantum studiis mirum in modum faventia (b). Hinc ab ea operum Aristotelis editio-

(a) *Iosaphatus fecit naves tharsis, ut irent in ophir auri gratia: & non ivit, quia confractæ sunt in asiongaber.*
3 Reg. 22, 49.

(b) Videantur præ ceteris, quæ traduntur tractatu 3 cap.

tione, quam Iugduni apparavit Ioannes Frellonius, abest liber ille, de quo disputamus. At le Gendre, alique viri clarissimi minime curantes, num iure, an iniuria Alberto Magno tribuatur liber ille, qui *de mineralibus* inscribitur, quod ad Aristotelis librum attinet, Laertii auctoritate innixi, minime dubitant ita rem componere, ut inscriptum *de lapidibus* librum, pronuncient re vera fuisse ab Aristotele compositum, & ab arabibus inventum, nonnullis accessionibus fuisse auctum, seu potius deformatum. In harum porro numero id collocant, quod de magnete polum respiciente narratur. Solutio hæc, cui plurimum favet Cabeus [a], valde probabilis ab iis reputabitur, qui probe norunt, quam multa adiuncta veterum libris sint ab iis præsertim, qui operæ pretium se facere existimabant, si nova evulgantes, vetustis scriptoribus ea adscriberent, ut ab iis auctoritas nuper inventis conciliaretur.

Num vero ad demendum Aristoteli librum hunc, aut eam certe partem, quæ ab Alberto Magno [si Albertus Magnus is est] allegatur, vim habeant argumenta, quæ hanc in rem allata vidi, alienum iudicium esto. Tu tamen, Zanotte mi, eadem argumenta paucis comprehensa habe. Postquam iam allata de magnetis polum respicientis virtute retulit Albertus, quædam de magnetum generibus, & viribus enarrat, quæ uti deridicula, ita plane adversantia sunt veritati: veluti quoddam magnetum genus esse, quod aurum, alterum quod argentum, alterum denique quod carnes ipsas attrahat, & alia his affinia. An putamus Aristotelem acutum sane, & valde solertem philosophum nugis his aurem, fidemque præstitisse, easque litteris consignasse? Albertus tamen nugarum istarum vadem facit Aristotelem (b). Alterum porro argumentum hoc est. Vincentius Bel.

3, 4, & 5 in cuius fine hæc leguntur: *Non possunt hæc ex principiis physicis probari, sed oportet ad hoc scire astronomiam, & magiam, & necromanticas scientias, de quibus in aliis considerandum est.* An Albertus Magnus vir magnopere doctus, & pius hæc protulisset?

(a) *Philosophia magnetica cap. 6.*

(b) *De miner. lib. 2 tract. 3 cap. 6 pag. 423. Item dicit Aristoteles, quod species magnetis sunt valde diversa: quadam*

Bellovacensis Alberti Magni propemodum æqualis (a), eadem fere de magnete ad polum se vertente, atque adeo ferro eandem virtutem communicante, referens, quæ tradiderat Albertus Magnus (b), nullam Aristotelis mentionem facit. An contempisset tam eximii scriptoris testimonio, atque auctoritate dicta sua comprobare Vincentius, si ab Aristotele prodiisse putasset, quæ Aristoteli adscripserat Albertus Magnus, ipse vero Vincentius veluti vera crederat, scriptisque consignarat?

XXI. Iam vero nos expectant duo illa Plauti loca, quibus se ostendisse arbitrantur vetustis romanis notam fuisse eam, de qua agimus, magnetis, acufque nauticæ utilitatem. Atque hæc quidem loca variè accipiunt interpretes. Mihi sane plurimum placet ea explicatio, pro qua citatum vidi Salmasium (c), & Turnebum (d), quibus addas opto Cabeum (e): ut scilicet vox hæc *vorforia*, seu *versoria* significet pedem veli, seu funem, quo velum dirigitur, eoque regitur, & flectitur, quo gubernatori libuerit, navis. Scilicet in eo, qui ex Mercatore adducitur loco, Eutyclus Carinum alio temere properantem, in patria detinere volens, allegorico sermone illi pollicetur, si in patriis ædibus consistat, & sanius consilium capiat, affecuturum illum quæcumque optat. Hic igitur verborum illorum est sensus.

T. II. P. III. Y y Favent

enim trahit aurum: & alia diversa ab ea trahit argentum, & quædam stannum, quædam ferrum, quædam plumbum..... & quædam trahit carnes humanas, & dicitur ridere homo, cum a tali trahitur magnete, & manere apud ipsum, donec moritur, si valde magnus est lapis: & quædam pilos, & alia aquas, & alia pisces. Quod porro hic de carnibus a magnete tractis edocet, antea etiam tradiderat. Scilicet tractat. 2 cap. XI pag. 233 hæc scripserat: *Aristoteles dicit, quod est quoddam genus aliud magnetis, quod trahit carnes hominis.*

(a) Vide quæ tradit Oudin tom. 3 pag. 451.

(b) Speculi maioris lib. 8 cap. 19.

(c) In Plauto edito lugduni batavorum, & roterodami cum notis [uti appellant] variorum anno 1669.

(d) Ibi pag. 1135 tomi II. Eundem Turnebum allegavit Pineda de rebus Salomonis lib. 4 cap. 15 §. 4.

(e) *Magnetica Philosophiæ* cap. 6.

Favent hic cuncta, si consilio meo obsequens regas, & contineas te: item ut navem versoria [idest fune velum moderante] regit, ac continet gubernator. En ipsos Plauti versiculos, quibus quidem lectis, in meam, ut puto, Zanotte disertissime, sententiam venies.

Eut. *Si huc item properes, ut istuc properas, facias rectius.*

Huc secundus ventus nunc est; cape modo versoriam:

Hic favonius serenu' est, istuc auster imbricus:

Hic facit tranquillitatem, iste omnes fluctus conciet.

Recipe te ad terram, Charine, huc. Nonne ex adverso vides?

Nubis ater, imberque instat. Aspice nunc ad sinistram,

Calum ut est splendore plenum, ex adverso vides &c.

Ch. *Religionem illic obiecit: recipiam me illuc.* Eut. *Sapis,*
O Charine, contra pariter fer gradum, & confer pedem,
Porrige brachium, prebende. iam tenes? Ch. teneo.

Eut. *Tene.*

Alter quoque Plauti locus eandem plane retinet vocis huius versoria significationem. Audi num vera eloquar. Charmides multis antea hortatus fuerat Stasimum, ut ad herum iret.

Stasime, fac te propere celerem, recipe te ad dominum domum:

Ne subito metus exoriatur scapulis stultitia tua.

Adde gradum: appropera. iamdudum factum est, cum abis domo.

Tum vero cunctantem adhuc his compellat verbis.

— — — — — *cape versoriam.*

Recipe te ad herum &c.

Confule, obsecro, locum ipsum Plauti, videbisque me hic quoque vera tradere. Alienissimus vero erit a Plauti meta, & plane inficetus sensus, si versoriam pro nautica pyxide accipias. Quid est enim nauticæ pyxidi cum consilio, quod Stasimo præbet Charmides? An pyxis navem retrahit?

Imprudenter autem ad coniecturam, quam refutavimus, confirmandam, affertur recentiorum philosophorum versorii nomine magneticam pyxidem appellantium auctoritas. Hi sicut poterant ad novum inventum denotandum novum fingere vocabulum, maluerunt prisca uti voce, aliam tamen illi significationem adiungentes; quod non raro videmus factum,

atum, & procul dubio in vocibus *femoralia*, *pileus*, *calceus*, *petasus*, *mitra*, & affinibus aliis: quippe vocabulis his nos utentes, multo diversam a vetusta significationem illis imponimus.

Quod attinet ad Germanos, mirum utique non est, si tam excellentis inventi auctores Germanos faciat Goropius, cum plurimam operam impenderit ille, ut cuncta fere commoda, ac bona a germania deducat. Si coniecturas alias adiunxisset illi, quam ex ventorum, qui in nautica pyxide describuntur, vocabulis deducit, valde verisimilem opinionem suam fecisset; at cum potissimum hisce nominibus innitatur, responderi facile potest, hoc tantum erui [quod non inviti concedimus] eos, qui huius modi instrumentum hac ex parte perfecerunt, ventorumque nomina pyxidi addiderunt, germanos fuisse, patriamque suam ea ratione indicasse. At non eorum, quæ deinceps addita sunt instrumento, sed instrumenti ipsius inventorem quærimus: neque vero hunc germanum, aut cimbricum fuisse prodit ea vox, qua nauticam pyxidem appellamus. Quis enim theutonica, aut cimbrica dicat vocabula *bossola*, *bussola*, *boxel*, & affinia alia, quibus instrumentum hoc vocare consuevimus?

Quod vero adducitur ex Alberto Magno, valde commodam explicationem fortasse iam habuit. Vide numerum XX. Sed tamen, si vis, Alberto Magno librum eum tribuo. Tum vero Alberto Magno innotuisse eam, quam celebramus, magnetis præstantiam, candide fatebor: at non continuo probas eandem præstantiam Alberto omnium primo innotuisse: quin potius assequor Alberti tempore [hoc est anno fere 1240] notissimam fuisse, & omnium ore vulgatam eam, quam extollimus, magnetis vim: neque enim adscribi Aristoteli potuissent ea, quæ adduximus verba, nisi perspectum fuisset doctis, sponte sua se ad polum magnetem vertere. Illud porro commodi ex eo testimonio eruimus, ut discamus apud orientales, & nisi fallimur, expresse apud arabas, celebrem fuisse eam, quam prædicamus, magnetis virtutem. Ex orientali quippe lingua proveniunt voces *zorou*, & *caphou*, quibus utitur Albertus Magnus, cui proinde hanc tribuimus laudem, quod rem miram, tametsi vulgatam, & celebrem, latinorum philosophorum primus scriptis prodiderit suis. Dixi *latinorum philosopho-*

phorum: etenim Furnerius (a), quem sequi videtur Ricciolus (b), multum ante Alberti Magni tempora *obscuram mentionem huius instrumenti reperiri*, ait, *in geographia nubiana scripta tempore Rogerii Sicilia regis, seu circa annum 1151*. Cabeus quoque (c), aliique viri clarissimi ea de nautica pyxide docent, quibus indicant usum illius apud europæos ad vetustiora etiam tempora esse referendum. Qua de re alienum iudicium esto.

XXIII. Iam vero convertendus est sermo ad Gallos, quorum industria effecit, ut putaretur a multis, illorum studio, & labore detectam fuisse eam, de qua disputamus, magnetis excellentiam. Examinemus nunc singula. Quod ex Ditmaro proferunt hanc habere fortasse potest commodam explicationem. Horologii nomine nisi vis intelligere machinam aliquam nobis ignotam, qualis ea esse videtur, quæ *horologium nocturnum* aliquando appellata est (d), & ea ipsa fortasse est, quam *horoscopum* Papias nuncupat: tu dic vocem *horologium* valde usitatam substituisse librariorum, aut potius eos, qui primo Ditmarum typis evulgaverunt, voci *horoscopum*, qua quidem [quod ex Ducange Papiam allegante discimus] denotatur *instrumentum quoddam rotundum, vel quadrum habens circumquaque multas divisiones, & mediclinium in medio, in quo sunt foramina, per quæ omnes horæ & stellæ cognoscuntur; unde Astrolabius dicitur*. Sed nolo de voce, atque adeo de opificio voce illa significato litigemus. Fac solare fuisse horologium illud quod magdeburgi confecit Gilbertus. Quid tandem consequeris? Nihil omnino, quod causæ tuæ faveat. An negabis meridianam perquiri potuisse a Gilberto, dum per fistulam stellam polarem noctu intuebatur: atque ea tandem perspecta horologium ab eo fuisse confectum? Potuit etiam ea diligentia Gilbertus poli altitudinem perquirere, quam nisi notam habeas, perperam solare horologium perficere te posse speras.

Cete.

(a) *Lib. II hydrograph. cap. I.*

(b) *Geogr., & hydrogr. lib. x cap. 18.*

(c) *Lib. I cap. 6 pag. 23.*

(d) *Vide Ughelli tomum V pag. 609. Ibi quippe hæc de Pacifico veronensi archidiacono traduntur: horologium nocturnum nullus ante viderat, en invenit argumentum &c.*

Ceterum si velint galli illud magnetis institutum, quod polum sponte respicit, minime delituisse Gilbertum monachum, & nihil amplius, facile connivebo: dummodo fateantur id, quod me docuit auctor præstantium illorum librorum, qui *Spektaculi naturæ* nomen præferunt: nimirum ea notitia, si qua tum erat, ad maritima itinera minime fuisse usos per ea secula homines (a). At multo maior vis
in

(a) In ogni tempo si è conosciuta la proprietà della calamità di tirar il ferro. Talete, a cui un effetto sì costante aveva fatto gagliarda impressione, è venuto a pensare, che questa pietra avesse un anima. Platone, Aristotile, e Plinio hanno fatto parola della medesima attrazione: ma ne essi, ne altri fino all'undecimo, o anche fino al principio del duodecimo secolo, conosciuto hanno, che la calamita sospesa, o nuotante sull'acqua per mezzo d'un sovero, volti sempre uno de' suoi lati, e sempre il lato stesso verso il nord. Quegli eziandio, che fece tale osservazione non andò più innanzi, e non comprese l'importanza, nè l'uso dell'ammirabile scoperta. Conosciute queste due proprietà di tirare il ferro, e di guardare il nord, alcuni curiosi reiterarono l'esperienza, e facendo nuotare in un vaso pieno d'acqua un pezzo di ferro, ed una calamita sostenuti dal soghero per lasciarli operare senza ostacolo l'un verso l'altro, osservarono, che quando il pezzo di ferro era stato fregato dalla calamita, questo ferro medesimo aveva pure la virtù di voltarsi verso il nord, e di tirare, come la calamita, agghi, e ramenti di ferro. Di esperienza in esperienza vennero sino a mettere un ago calamitato sopra due briciole di paglia poste sull'acqua, e ad osservare, che questo ago voltava invariabilmente la sua punta verso il nord. S'incamminavano così alla grande scoperta; ma fin qui ciò, che chiamasi la bussola, non era trovato ancora. Il primo uso, che i curiosi fecero di questa scoperta fu d'ingannare i semplici con delle apparenze di magia. Per esempio, un piccolo cigno di smalto incavato, nuotando per questo mezzo sopra l'acqua d'un vaso, e portando col suo rostro una lucertola, o un serpentello di ferro, non mancava di correr dietro a un pezzo di pane, che se gli presentava su la cima d'un coltello; egli seguiva fedelmente i moti del coltello, e levava in ammirazione tutti gli spettatori, i quali ignoravano, che il coltello avesse acquistata la proprietà di tirare il ferro, mercè

in iis versiculis, quos iam citavi, inesse putatur. Scilicet si Guyotus Provineus, qui illorum auctor dicitur, XII, aut certe XIII Ecclesie seculo floruit, plane fatendum est, gallis innotuisse eam, de qua dicimus, magnetis facultatem, multo ante quam itali ab asiaticis eam se didicisse narrent. At audi, Zanotte doctissime, quid ex duobus gallis scriptoribus didicerim. Menagius prior est, Stephanum Pasquierum allegans (a), Gilbertus Carolus le Gendre alter (b). Utrumque porro accuratissimum, atque eruditissimum fatebitur quisquis libros ab iis editos pervolverit. Versiculi hi Hugoni Bertio (c) Cluniacensi monacho tribuendi sunt, quem S. Ludovico imperante vixisse aiunt. Optavit scilicet Poeta ille sane non malus, optavit, inquam, [si clarissimo le Gendre credimus] ut Romani Pontificis vita, ac consuetudo ea esset, ut in eam veluti fulgidam polarem stellam respicere, illiusque lumine duci universi christiani possent. En integrum, si loqui ita volumus, ex laudatis scriptoribus Hugonis epigramma.

Un art font qui mentir ne puet.
 Par vertu de la Marinette
 Une pierre laide, & noirette
 Où le fer volontiers se joint;
 Et si regarde le droit point,
 Puis que l'eguille l'a touchée;
 Et à un festu l'ont fichée.
 En l'iau le mettent sans plus;
 Et li festus li tient dessus.
 Puis se tourne la pointe toute
 Contre l'étoile; si sans doute

Que

del tocco della calamita. Il preteso mago finiva di convincere l'assemblea della sua possanza, comandando a un ago corcato a fior d'acqua, che svolgesse la sua punta dall'oriente, o dal mezzodì, e la dirizzasse verso il tal punto del cielo, verso la stella polare: lo che veniva immantinenti eseguito. Finalmente trovaronsi degl'ingegni più serj, che applicarono questa esperienza ai bisogni della navigazione nel duodecimo secolo.

(a) Origin. ling. ital. ad vocem calamita.

(b) De l'opinion lib. 4 tom. 1 pag. 83.

(c) Hugues de Berci.

Que japer rien ne faussera,
 Ne mariniers n' en doutera.
 Contre l' étoille vâ la pointe,
 Par ce font le mariniers cointe
 De la droite voye tenir:
 C' est un art qui ne puet mentir,
 La prennent la forme, & le molle
 Que cette étoille belle & claire;
 Tal deveroit être le saint Père;
 Clere deveroit être & estable.

Quibus positis, plane intelligis adductos versiculos labente iam fere seculo XIII fuisse compositos, ideoque ea ipsa ætate, qua alii innotuisse italis hanc ipsam magnetis virtutem aiunt: sic ut lis adhuc perstet, num gallis, an potius italis ea tribuenda laus sit, quæ percipitur ex acu nautica.

Neque te moveat, quod de Peregrino gallo narrat Cabeus, quem sequuntur Fabricius, aliique viri doctissimi. Eandem quippe explicationem fere excipit, atque excipiunt Alberti Magni, quæ iam exposuimus N. XX verba. Nimirum dubitatur primum a viris doctis, num a Peregrino illo gallo, cui Garzonii testimonio innixus favet Cabeus, an vero a Ioanne Taisnero prodierit opusculum illud, in quo ea, quam dicimus, magnetis virtus celebratur. Quod si revera auctorem habet Peregrinum, non aliud tamen ex ea re obtines, nisi quod facile dabimus: scilicet diu antequam Gioia amalphanus nauticam pyxidem perficeret, illius rudimenta [si loqui ita licet] apud orientales usitata, fuisse nota gallis scriptoribus.

Quod deinde commemorant: ita scilicet fuisse olim magneticam acum conformatam, ut lilium cuspide exprimeret, ideoque gallici auctoris certam præferret notam, solutionem hanc habet. Id apud nautas omnes in usu fuisse pernegant angli, batavi quoque, & fortasse etiam negabunt itali. At demus quod optant galli. Quid tandem ex ea re consequuntur? Gallicos nautas potissimum usos fuisse in maritimis itineribus nautica acu; quam quidem ita efformare consueverint, ut cuspide lilium referret. Potuere porro nautæ alii, vel ut obsequerentur gallis, vel quia quamdam ornatus, venustatisque speciem habere videbatur nauticæ acus cuspis lilii formam habens, eam retinere, usur-

usurpareque. Ostendant [obsecro] primum quidem, atque ab ipsis, ut ita appellem, acus nauticæ primordiis formam eam, non aliam quamlibet, fuisse servatam. Ostendant quoque eos errare, qui aiunt, propterea lilii formam in magneticæ acus cuspide fuisse expressam, quod illius inventor, aut certe promotor, & artifex eximius Gioia, eo argumento indicare voluerit sibi, suisque contribulibus imperare regem, qui ex galliis duxisset originem (a). An ignoramus neapolitano regno per ea tempora præfuisse principes endegavenses?

Difficultatem porro, quam postremo loco commemorant, eam nempe, quam [si gallorum patronis credimus] nobis facit etymologia vocis huius *calamita*, ii evitant, qui negant a gallis hoc nomine fuisse appellatum magnetem, acumque magneticam (b). At hi, monente Menagio (c), multum errant; etenim revera *calamite* dicitur a gallis, item ut ab italis *calamita*. Aliud itaque consilium capiamus oportet, ut difficultatem hanc dissolvamus. Petrus Franciscus Iambullarius (d) ex remotissima regione vocem hanc derivat: putat quippe origine aramæam esse, seu potius hebræam: quippe שֶׁמֶט challamisch, seu *calamis* lapidem hebræorum lingua significat. Potuit autem magnes *antonomastice* lapis dici: est quippe lapidum præstantissimus: & græci sane λίθον magnetem vocant, quamquam vox hæc lapidem generatim significat. Etymologiam hanc minime approbat Menagius (e); quippe vox hæc communis est italis, hispanis, gallis, atque adeo græco-romanis, quorum linguæ ab hebræa minime derivantur. Perperam itaque ab hebraica lingua, Menagio iudice, eam deducimus. Hoc tamen incommodum, si quod est, facile evitas, si dixeris non hebraicam tantum esse vocem hanc *calamita*, sed apud
alios

(a) *Recens lexici Morerii editio.* (b) *Ferrarius.*

(c) *S' inganna di certo il Sig. Ferrari nel dire, che i francesi aimant la chiamino, e non calamite.... Che la voce calamite sia voce francese, senza pigliare altra briga, lo rimettiamo ai Vocabolari francesi.*

(d) *In dialogo, quem appellavit il Gello, in quo de Florentina linguæ origine disputat.*

(e) *In origin. linguæ italicæ, ad vocem calamita.*

alios orientis incolas usitatam, ideoque a persis, mesopotamis, arabibus etiam. Tum porro quis vetat, ne ab oriente, atque ab hebraica ipsa lingua orientalium multarum linguarum matre vocem hanc deducamus, quando quidem [nisi plane fallimur] ab oriente pyxidem ipsam magneticam europæi, atque adeo ipsi græco-romani acceperunt? An non, dum nova inventa ab exteris nationibus accipimus, ea ipsa vocabula retinemus, quibus eadem inventa apud eos appellantur, a quibus accipimus? Hanc sane etymologiam non modo Iambullarius, quem parvi videtur Menagius facere, sed & Marcus Marinus vir præclarissimus iam dudum proposuit, & approbavit (a). Atque huius sane egregii scriptoris cum summa fuerit orientalium linguarum peritia, eum minime deceptum puto.

At age. Neque ab hebræis, neque ab arabibus, neque ab aliis remotissimis orientis regionibus vocem hanc deriva: eam etiam etymologiam sperne, quam proposuit (b) Covarruvias

Z z

ruvias

(a) חֶלְמִישׁ Nomen forma masculina, & in regimine חֶלְמִישׁ sine plurali; quod quinque vicibus tantum legitur in Bibliis, & dubitatur, quid proprie significet. Ego non levi coniectura adducor, ut arbitrer magnetem esse, consentiente nomine, quo vulgo utimur, sed ratio dictionis ignoratur. [Calamita]. Alii duritiem, fortitudinem interpretati sunt. Est autem magnes inter lapides siccitate quadam refertus, ut aquam ex eo elicere non minimam sit res mira. Expende locos omnes accuratius.

: חֶלְמִישׁ לְמַעַיְנוּמִים Vertere magnetem fonti [in fontem] aquarum. Pl. 114, 8.

: חֶלְמִישׁ חֶלְמִישׁ חֶלְמִישׁ Educere aquam de petra magnetis [duritiei]. Deut. 8, 15.

: חֶלְמִישׁ וְשִׁמֹן מִחֶלְמִישׁ צֹר Sugere facere oleum de magnete [duritie] lapidis. Deut. 32, 13.

: חֶלְמִישׁ עַל כֵּן שִׁמְתִי פָנָיו כִּי Ponere vultum sicut magnetem. Isa. 50, 7.

: חֶלְמִישׁ מִיְדוֹ מִיְדוֹ Mittere manum in magnetem. Iob. 28, 9.

(b) Il Covarruvias è d'opinione, che venga dalla voce greca

ruvias [quamvis me quidem iudice verisimilitudinem aliquam habeat : putabatur enim XIV seculo, uti alia multa, item etiam calamos, seu stipulas trahere magnes]; alias quoque huic affines eiusdem vocis origines contemne. Commode eam a græcis desumere, si vis, potes. Non ne apud græcos *καλαμίς acuminatam arundinis festucam* significat (a)? En porro etymologia vocis huius *calamita*. Potuit scilicet ita appellari, propterea quia tenuissimi instar frustuli, seu festucæ arundinæ acuminatæ instar, acus nautica est. Et hanc quidem originem, quam Ferrarius indicat, valde probabilem agnovit clarissimus Menagius, qui, ut puto, iis minime obsisteret, qui vocem hanc ex eo derivarent, quod primum acus nautica tenuibus ligni frustulis, seu paleis (quas calamos interdum dicimus) innixa, natanque servaretur in pyxide. Potuit etiam, si vis, (vide, quæso, quam comis sim) potuit, inquam, calamita dici, ex eo quia veluti rana nataret in aquis.

Sed cur me cogis vocis huius originem ex gallica lingua trahere, quando quidem ex latina, aut potius ex græca eam deducere aptissime possum? Audi quid tradat Plinius opinionis meæ locupletissimus testis (b). *Ea rana; quam græci calamitem vocant, quoniam inter arundines, fruticesque vivat, minima omnium, & viridissima*. Tum porro perstat adhuc quæstio: potuere enim a latinis tam itali, quam galli vocabulum hoc accipere: potuere item accipere a græcis, iis præsertim, quos *græco-romanos* per ea tempora appellabant, quibus cum scilicet sæpissime debebant tum galli, tum itali.

Levissimum porro id est, quod ex ventorum nominibus eruunt. Pauci profecto erunt (si qui tamen nostris temporibus erunt), qui voces has *nord, sud, est, ouest* a gallica lingua deducant, cum compertissimum sit, theutonicas potius, seu cimbricas, aut celticas has esse voces, non gallicas. At fac esse gallicas. Quid tandem ex eo obtines, nisi
quod

καλάμη significante streppola Quod stipulas trahat: essendo falso, che la calamita tiri le streppole a se, e falsa parimente quella derivazione. Menagio.

(a) *Lexicon Græco-latinum Iacobi Tufani*.

(b) *lib. 32 cap. 20*.

quod facile daturus sum? nempe a multis iam seculis ventos gallicis vocabulis esse a nautis appellatos. An non ultro laudem hanc gallis tribuo, ut fatear eos iam dudum maritimis itineribus se exercuisse, ideoque ventis ea indidisse nomina, quibus nunc utimur, quæque diu postquam se in iisdem itineribus se exercere consueverant galli, in nauticæ pyxidis ora designaverunt nautæ? Ceterum pauci, ut arbitror, erunt, qui pyxidem nauticam inventam a gallis putent, postquam noverint Cardinalem de Vitriaco scriptorem gallum, eundemque & vetustissimum, & contribulium suorum laudatorem eximium, eiusdem quidem pyxidis mentionem fecisse, sed non propterea eam gallis inventoribus tribuisse. Verba huiusce scriptoris mox afferemus. Et de gallis hætenus.

XXIV. Atque ii porro multo meliorem causam habuisse videntur præ lusitanis, quibus [si Regnaultium excipias] nullus eorum, quos consului, hanc laudem tribuit. Perquisivi sane in Maffæi libris, quem Regnaultius in rem suam allegat, perquisivi, inquam, quænam tandem Maffæius pro lusitanis adduceret, nihilque plane inveni, quo Regnaultii sententia firmari possit. Etenim minime ad id evincendum apta reor verba hæc, quæ in ipso fere historiarum indicarum limine occurrunt: *Navigandi vero ante centesimum annum vel apud hesperios populos tanta fuit inscitia, maritimo videlicet usu astrolabii nondum excogitato, ut ab ora discedere, & alto oceano se committere nequaquam auderent: sed littora caute legentes, ubi ad æstus maris, aut brevia periculosa pervenerant, quasi repagulis quibusdam a natura, seu numine obiectis, reciperent illico se se, & longius tendere quodam modo nefas arbitrarentur.* Cum hæc sane doceant, lusitanos ne astrolabio quidem ullo in navigationibus ante annos centum [quo quidem tempore iam diu nautica pyxis in usu apud nos erat] fuisse usos; ac multo minus ostendant eos, aut pyxidis nauticæ inventores fuisse, aut ita excultum, provectumque per lusitanos inventum hoc, ut maiorem, quam reliquæ nationes, laudem propterea fuerint assecuti.

XXV. Iam devenimus ad italos, ideoque ad eos, quibus plerique, aut inventæ, aut certe in europam deductæ, expolitæque, multoque melius, quam antea, elaboratæ nauti-

cæ pyxidid laudem tribuunt. Quidquid secus nonnulli sentiant, valde probabilis eorum sententia est, qui italum aliquem, [quem plerique venetum civem in oriente mercaturam facientem fuisse aiunt] qui italum, inquam, censent deduxisse ab asia in europam celeberrimum hoc inventum. Quid enim verisimilius censeripotero, quam italum aliquem [itali enim orientis maria, ac provincias decimo ipso: quid quod etiam octavo, & septimo seculo frequentare consueverant], atque illum fortasse venetum civem ex eorum numero, qui mercaturam amplissimam per ea tempora in omnibus orientis partibus faciebant, instrumentum illud, quod valde commodum in maritimis itineribus agnoverat, deduxisse in europam, quo popularibus suis expeditius, certiusque pararet iter? An asiatici populi magnetica acu per ea tempora caruerint? Tu certe non putas, Zannotte doctissime, quem non latet, quid ea de re scripserint & Cardinalis de Vitriaco (a), & hi-

(a) *Adamas in India reperitur ferrum occulta quadam natura ad se trahit. Acus ferrea postquam adamantem contigerit, ad stellam septentrionalem, quæ velut axis firmamenti, aliis ærgentibus, non movetur, semper convertitur: unde valde necessarius est navigantibus in mari.* Iacobus de Vitriac. histor. Hierosol. cap. 89. Quamvis porro, si vis, in eo erret hic scriptor, quod putet virtutem, qua se ferrum convertit ad polum, ab illo acquiri per contactum adamantis, cum re vera per contactum, affricumque magnetis acquiratur: atque id quidem ostendat occidentalibus non admodum fuisse notam hanc, de qua agimus, magnetis præstantiam, eam, nisi probabilis coniectura nos fallit, occultantibus orientalibus, & indico adamanti per ea tempora in nostris regionibus admodum raro, tribuentibus: haud obscure tamen significat iis, quæ allegavimus, verbis, non ignotam fuisse eo, quo is vixit sæculo, ideoque XIII, acus nauticæ vim, & summam utilitatem. [Unde valde necessarius est navigantibus in mari &c.] Vide Oudin pag. 46 tomi III: in quo quidem loco eum floruisse ait anno 1220, & seqq. Dixi si vis: etenim affinitatem aliquam magnetem inter, & adamantem se invenisse putant philosophi. Vide, quæ tradunt eruditi Lipsienses in Actis 1693 pag. 187, & eximius Beccarius noster tom. 2 Actor. Acad. Bonon. pag. 295.

& historici alii nobilissimi. An non etiam simillimum veri est, quoniam per ea tempora novimus deductam in europam magneticam pyxidem (a), per eos fuisse deductam, qui præ ceteris cum asiaticis mercaturam exercebant, & in eorum regionibus diu versabantur? Porro nemo vertere in dubium potest, num præ ceteris nationibus omnibus per eam ætatem se in mercatura cum asiaticis exercerent itali, ac præ ceteris veneti, quos etiam novimus eiusdem mercaturæ exercendæ causa, sæpe, diuque in ægypto, in perside, atque adeo ultra gangem duxisse moram, firmamque posuisse sedem. Et sane acceptam ab orientalibus, & nisi fallimur, proxime a saracenis, quibus [ut probabilis fert coniectura] tradiderant nauticam pyxidem, aut sinæ ipsi, aut alii, qui a sinis acceperant, indicat nauticæ constituendæ pyxidis consuetudo apud sinas: ita enim hi [si viris probatissimis credimus] eam etiamnum efformant, uti veteres europæi efformabant, scilicet ut natantem, & subere innixam in pyxide magneticam acum teneant (b). Quod scilicet palam indicat, a quonam tam præstans, atque utile instrumentum acceperint europæi, qui illud perficientes, multo amplius emolumentum ex eo assequuntur, quam habeant sinæ, qui ne videantur per europæos profecisse, in veteri instituto, & [si ita loqui liceat] in ipsa navigationis infantia

(a) Per ea tempora in usu fuisse apud europæos magneticam pyxidem, ea facile ostendunt, quæ antea retuli, quibus addere ea etiam potes, quæ clarissimus van Musschenbroeck docet Physic. experim. pag. 150: idest prodere Thevenottum in itinerrario epistolam se vidisse anno 1269 a Petro Adfigerio conscriptam, in qua declinare acus a vero septentrione quinque gradibus commemoratur. Id porro sine explorata, usitataque acu nautica fieri omnino non poterat.

(b) Audi quid præ ceteris doceat Cabeus de epistola Petri Peregrini galli, quem idem Cabeus ante alios de egregia hac magnetis virtute scripsisse putat; quid, inquam, Cabeus de Petri Peregrini epistola doceat. In hac ergo epistola de motu magnetis in polos fit mentio: cuius est illa ratio hoc experiendi, dum in ligneo vase, quasi in cymbula, aquis imponitur. Affinia tradunt Ricciolus Geogr. & hydrograph. lib. 10 cap. 18, Menagius, aliique viri clarissimi.

tia adhuc permanent (a). Hæc sane est præclarissimi scriptoris galli sententia, probabilis profecto, nisi nos a partium studio finamus decipi.

Idque si tenebimus, illa argumenta omnia effugiemus, quibus illorum opinio improbatur, qui Marcum Polum ex finis nauticam pyxidem adduxisse aiunt; propterea quia tum ex aliis quidem haud contemnendis testibus; tum vero maxime ex Iacobo de Vitriaco constat, antequam Marcus Polus se se italiæ restitueret [id autem anno 1260 contigisse aiunt] occidentalibus cognitam fuisse nauticam pyxidem. Fac enim id ita esse. Potuit sane is, quem diximus, venetus mercator nauticam pyxidem deferre, antequam Marcus Polus patrias sedes remearet, novoque nobilissimo invento europam ornaret. An non novimus [quod sæpe dixi] diu, antequam Polus se arduo itineri committeret, italos alios, ac præsertim venetos mercaturæ causa orientis regiones penetrasse, ibique diu moratos esse? Quod si fateris, fatearis etiam oportet orientalium mores, opificia, inventa, ideoque etiam nauticam pyxidem addiscere eos potuisse, deducereque in italiam.

XXVI. At cur, inquires, homo tam præclare de italia, vel potius de universo humano genere meritis, nomen suum reticere voluit, dum tam præclarum opus italiæ dedit?

Ignoras sane quisquis hæc obiicis, mercatorum mores, atque instituta? hi quippe laudes, gloriamque minime perquirunt, sed divitias, & opes, quas unice diligunt. Ceterum in hanc, quæcumque ea tandem sit, difficultatem incidet, etiamsi gallos, aut alterius cuiuspiam nationis homines inventores nauticæ pyxidis facias: latet enim procul dubio tam benefici adversus europam, atque uti dixi, universum huma-

(a) Altri vogliono darle l'onore ai Cinesi; ma come che ancora in oggi l'ago calamitato non s'adopra nella Cina, se non facendolo galleggiare sopra un sostegno di sovero, come facevasi un tempo in europa; è credibile, che Marco Polo, od altri veneziani, che andavano all'Indie, ed alla China per lo mar rosso, abbiano fatto conoscere fin dal decimo terzo secolo nel più interno dell'asia cotesta importante esperienza, della quale diversi Piloti hanno poscia perfezionato l'uso fra noi. Spettacolo della natura.

humanum genus viri nomen. Eam porro difficultatem evitas, si dixeris, non ab uno advectam ex oriente nauticam pyxidem, sed a pluribus eodem fortasse navigio vectis, qui cum laudem partiri in multos deberent, de ea minime fore solliciti.

XXVII. Ceterum dum hæc trado, non eorum reiicio opinionem, qui ab amalphantano cive, anno fere 1300, primum elaboratam nauticam pyxidem volunt: quibus quidem favet innumera historicorum phalanx (a). Scilicet utramque sententiam pulchre concilias, si dixeris, devectam quidem a veneto mercatore in europam nauticam pyxidem, at tam ruditer elaboratam, ut ad nauticos usus haud multum haberet utilitatis. Perfecit itaque illam civis amalphantanus, quisquis is est, aut certe in ea elaboranda profecit adeo, sive itylo in media acu infixio, sive aliis in eam collatis commodis, ut multo utiliorem in longissimis itineribus ducem nautæ haberent.

XXVIII. Dixi *quisquis is est*: neque enim eorum sententiam reprobō, qui inter duos amalphantanos cives laudem hanc partiuntur, quorum primus [Ioannes Gioia fortasse is est: potuit autem Marci Poli esse æqualis, aut eo etiam antiquior] inceperit, quod alter [Flavius Gira, nisi fallimur, appellatus] multo plus auxit, & pene dixerim, perfecit. Etenim id indicat ipsa, quæ circa horum & nomen, & cognomen vertitur lis; cum pyxidis nauticæ inventorem alii Ioannem, Flavium alii appellent: cognomine vero Giram nonnulli, Gioiam alii: quod valde commode expli.

(a) Apud Morery (ad verbum Gioia Flavio) allegantur Parthenius Giannetasius, Hortellius, Blondus, Ferrarius, Philander, Guillelmus Laurus, Baudran, Brietius, Rey, Alphonsus Lasor a Varea, Thomas Bozius, Gyraldus, Gerardus, & Ioannes Vossius, Leander Albertus, alique etiam, quibus iungas volo clariss. viros Hyacinthum Gimma, & Gregorium Grimaldum, quorum postremus, (nam laudatissimam Gimmae elucubrationem nondum videre potui) quorum, inquam, postremus hoc super argumento doctissimam, uti iam dixi, edidit Dissertationem, eamque (quod pariter dixi) Hetruscæ academix Actis inseruit (tom. 3 pag. 195, & sequentibus) in qua quidem alios adhuc allegat.

explicas, si duos agnoscas, cives ambos amalphitanos, & de pyxide nautica præclare meritos: quorum Ioannes unus, Flavius fuerit alter, unus Giræ, Gioiæ alter cognomine. Favet quoque suspitioni huic nostræ virorum præclarissimorum auctoritas, e quibus Ricciolium & Brietium seligo, eruditos perinde atque accuratos scriptores. Etenim hæc tradit Brietius (a). *Hoc anno inventa est pyxis nautica a Flavio quodam amalphitano. Non desunt tamen, qui antea excogitatum tradant a Ioanne Gioia item amalphitano, cuius beneficio novum orbem detectum habemus, & veterem accuratius &c.* Ricciolus vero scripta hæc reliquit (b). *Fieri potest, ut Ioannes Gioias inchoarit, & Flavius perfecit pyxidem, distribuens ventos in 16, & postea in 36, eorumque rosam charta rotunda inscriptam superadaptavit chalybi magnetico.*

XXIX. Neque vero te eorum auctoritas terreat, qui italiam laudem hanc eripiunt, ut anglis tribuant. Dum italiam, & litterati, & vulgus ipsum laudem hanc adscribunt, quis anglorum rationibus adduci possit, ut eos italiam hac in re præferat? Vocem hanc *bussola* italicam esse contendo. Hinc capsulam, quam cæci deferunt, ut in eam christianorum pietas obulos, quibus alantur, coniiciat, plane italica, itemque vetustissima, & usitatissima voce *bussolo* appellamus. Potuit itaque acus, & pyxis nautica *bussola*, seu *buxula* appellari; propterea quia ad eum ferme modum conficeretur capsula magnetem, seu acum nauticam continens, quo *buxulos*, seu pyxides suas itali efformabant: seu, si vis, propterea quia vetustis temporibus ex *buxo* ea capsula conficeretur (c).

Neque vero hæc temere dico: id enim fatebitur quisquis linguam nostram, eiusque origines, atque etymologias callet. Audi ab extero quidem, sed linguæ nostræ peritissimo scriptore, num vera eloquar. Menagius is est, qui de italicæ linguæ originibus differens in rem præsentem hæc tra-

(a) *Ad annum 1302.*

(b) *Geogr. & hydrogr. lib. 10. cap. 8.*

(c) *Ex ligno capsulam, qua magnetem maritimi itineris ducem contineret, fuisse confectam, declarant ea, quæ ex epistola Petri Peregrini galli eruit Cabens antea allegatus: dum in ligneo vase, quasi in cymbula, aquis imponitur.*

tradit. „ Boffolo . Vafetto, comunemente di legno: da boffo; co-
 „ me πυξίς da πύξος; perchè per lo più di boffo fi facevano i
 „ boffoli . Quintilian. VIII, 6. Eo magis necessaria κατ'ἄχρησις,
 „ quam recte dicimus abufionem, quæ de non habentibus no-
 „ men fuum accommodant, quod in proximo eft . Sic: equum
 „ divina Palladis arte ædificant Seneca de beneficiis (a).
 „ Quædam etiam fi vera non fint, propter fimilitudinem eo-
 „ dem vocabulo comprehenfa funt. Sic pyxidem & argen-
 „ team, & auream dicimus . Boffolo pure fi dice quel vafò de'
 „ ciechi fatto ad ufo di ricever le limofine, ancorchè per lo più
 „ fia di stagno . Boffoli chiamano anche i tofcani certi vafì d'ot-
 „ tone, co' quali ne' magistrati, e nelle adunanze fi raccolgono i
 „ partiti . E perchè le boffole de' naviganti furono da principio
 „ fatte a maniera di boffoli, ebbero altresì tal nome; e da' mo-
 „ derni furono in latino chiamate pyxides; ne cangiano il nome,
 „ perchè adelfo fi faccian anche di altre materie . „ Reliquæ vero
 voces; idelt mariner s' compass tam anglicæ funt, quam ita-
 licæ: nos enim noſtra ipla lingua commode dicimus com-
 paffo, o fia circolo de' marinari, o pure marinareſco . Hinc fi
 his tantum fidas, anceps hærebis, num ab italia provene-
 rint, an ab anglia voces iſtæ, ideoque pyxis hiſce vocibus
 ſignificata .

XXX. Hæc tamen dum profero, non eam demo anglis
 laudem, quam plerique illis iure, meritoque tribuunt, mo-
 nentes ſcilicet nonnulla valde utilia antiquo invento fuiſſe
 ab illis addita: neque enim in ea ſum ſententia, ut putem
 extremam manum nauticæ pyxidi impoſitam fuiſſe ab amal-
 phitano Gioia: quin immo aio, contendoque præſtantiffimum
 hoc, atque utiliffimum instrumentum, ſicut melius profecit,
 cum ab aſia in italiam deductum fuit, ſic deinceps augmen-
 ta alia, & ſi loqui ita volumus, quofdam perfectionis gra-
 dus obtinuiſſe a nationibus illis, quæ ſe plurimum in navi-
 gationibus exercent; in quarum quidem numero anglica
 pleraſque antecellit . Quamquam quis hæc præſtiterit, etiam
 num in abdito eſt (b) .

XXXI. Prioribus inventis noſtra hac ipſa ætate addita
 Tom. II. P. III. A a a non-

(a) Lib. V, 13.

(b) Spectac. natur. tom. VIII pag. 114 edition. italica . Ma-
 lo ſteſſo è di queſta invenzione &c.

nonnulla sunt , profecto non contemnenda . Sic clariff. Reaumur novam rationem edocuit, qua ferrum, & chalybs magneticam virtutem imbiberent, ideoque polum respicerent, tametsi magnetem ipsum minime tangerent (a). Novam construendæ nauticæ pyxidis rationem tradidit egregius Burché (b). Alia eodem de argumento repererunt tum Parisiensi, tum aliis etiam Academiis adscripti viri docti. Neque omiffum, ut puto, id fuisset a nostris, nisi illos mercaturæ exercendæ in remotissimis oris difficultas a maritimis itineribus prope iam alienasset; huc adde nostros minus esse avidos.

XXXII. Habes, Zanotte doctissime, quid ego hoc super argumento ex variis, eisque probatis auctoribus didicerim. Enitere tu, ut academici alii, qui me longe ingenio, atque exercitatione præstant, id exequantur, quod hoc super argumento adhuc discendum superest; neque solum de inventore quærant, sed etiam rei naturam, si fieri potest, explicent: cur scilicet magnes, seu acus nautica polum respiciat, & ad eum veluti feratur. Cur etiam in hoc respectu, seu (si appellare ita volumus) in hac *tendentia*, non æque constans sit, sed quasdam veluti patiatur vicissitudines, & inconstantiam præferat. Plurima hac in disputatione ingeniose inventa sunt, & litterarum monumentis tradita. Nondum tamen, ut pulchre nosti, litteratorum aviditas expleta est. Conqueruntur nimirum quod adhuc multa delitescant, quæ in lucem, philosophorum diligentia, & diuturnum studium proferre tandem possit.

XXXIII. Cum hæc ad te scriberem, Zanotte mi, vicem aliquam beneficii mihi conlati tibi referre studui, & rependere nonnullam pro optimo nuntio gratiam. Sed quas tandem academix ipsi aut referam, aut rependam? Viginti ab hinc & amplius annis, philosophicis studiis postremum vale dixi; neque iis nunc dare operam vel levem possum, qui curis, ab optimis studiis prorsus remotis, ut nosti, distineor, & pene opprimor. Ne tamen ingratus appaream, id academix dono dare in animo habeo, quod illi, nisi fallor, acceptum erit, & gratum. Inter multa ve-

tusta

(a) Vide *Acta academiae parisiensis scientiarum studiis addictæ* anno 1723 pag. 1.

(b) Vide *Acta 1733 eiusdem academiae*.

tuſta inventa, quæ noſtris temporibus funditus periſſe viſa ſunt, illud etiam iure recenſetur, quo nobili, & vividiffimo auro tenui lamella ducto, & coloribus præſtantiffimis veteres ornare codices a ſe conſcriptos confueverant. Aut prorfus periere artes hæ, aut ita labefactatæ ſunt, ut fere deſperant, qui libros nunc affabre excribunt, eos huiusmodi decorare ornamentis. Ego vero in vetuſto codice inveni, quomodo deperdita inventa iterum in lucem edam. In eo quippe multa, & varia artificia proponuntur, quæ ſi ſequamur, ſperandum eſt, ut egregiis lamellis aureis ornemus codices, & colores efformemus vividiffimos, & conſtantiffimos, quibus quidem aqua gummi dilutis, quas volumus formas, figuræſque in iis exprimamus. Auctoramentum, & veluti pignus eventus promiſſioni plane respondentis in experimento iam ſumpto habeo. Petronius quippe a Vulpe optimi Lælii, egregii typographi, filius, idemque optimus adoleſcens a me exoratus, partem aliquam executus eorum eſt, quæ præſcribuntur in meo codice, iamque lamellam auream hædinæ pelli ad ſcribendum præparatæ affabre appinxit, & cæruleum colorem ex æris rubigine haud difficili conatu expreſſit. Hæc duo tantum pertentavit. Alia plurima codex, quem dixi, continet, commoda illa quidem, & non minus venuſtatis, quam utilitatis habentia. Codicem ipſum, ſi iubes, ad te mittam. Tu inter academicos, quibus ea, quæ deſcribuntur, placuerint, laborem partire, laudemque (niſi me fallit animus) non modicam conſequentur. Utinam ego quoque huiusmodi laborum particeps eſſe poſſem. Eniterer ſane, ut noſtra ætas, ac civitas antiquioribus ſeculis, & Germanis civitatibus (a quibus fortaffe maior horum inventorum pars derivata eſt) minime invideret; ſed vetat, quod iam dixi, & tu probe noſti, impoſita nobis dura, graviſque provincia, qua iubeor alieno commodo, ſtudiisſque haud ſuavibus inſervire. Tu qui litterario otio fruëris, eo utere, novisſque lucubrationibus, ac conatibus nomen tuum iam illuſtre ſatis & celebre, atque adeo academiæ, ac civitatis noſtræ, ornare, atque amplificare adhuc perge. Vale.

A B U N D I I C O L L I N Æ

De acus nauticæ inventore.

IN penetrabilitatem lucis, de qua superiore anno, plura congefferam, quæ vestro iudicio, Sodales lectissimi, atque ornatissimi, ex condicto subiicerem, cum Ioannis Chrysolitomi Abbatis Trombelli, viri doctissimi, atque humanissimi dissertatio de nauticæ pyxidis inventione, multiplici, iustoque omnium plausu perfecta est. Neque profecto aliter ab hoc cœtu vestro, omnium, quæ literis continentur, æquissimo æstimatore, excipi debuit oratio, quam & dicentis auctoritas, & doctrinæ, atque eruditionis præstantia, & argumenti gravitas, atque iucunditas maximopere collaudabant. Utinam vero tum temporis invidentia, tum incuria scriptorum, tum etiam hominum ambitione, argumentum hoc idem non illa caligine offunderetur, quam hætenus vincere, ac penetrare cuilibet, perspicacissimo licet, oculo non conceditur; ingenti enim lite composita, dissertationem Trombellus certe dedisset numeris omnibus absolutam. At quoniam quæcumque hac de re dici possunt in opinione sunt posita, licet probabilissima a quopiam in partem alterutram afferantur, videbitur semper alteri in sententiam contrariam adduci posse probabiliora. Hinc factum est, ut licet levissimum quid solummodo obiecerim de Salomonis ophiræ loco (ne scilicet academicorum expectationi omnino deessem) intimo tamen sensu, tum circa inventionis tempus, tum circa modum, quo nauticæ pyxidis usus in europam inductus a viro clarissimo dicebatur, utique dissentirem. Cum vero me officii causa Trombellus, ad urbanitatem videlicet natus homo, invisisset; cumque de ista opinionum discordia sermo inter nos amicissimus haberetur, ipse rem sibi gratam facturum me dixit, si quod de hac ipsa quæstione sentiebam, scripto committerem. Parui quam libenter, meamque lucubrationem, qualiscumque ea demum sit,

fit, vobiscum communicare decrevi, pro vestra benignitate futurum sperans, ut argumentum a vobis alias cumulatissima laude receptum, ab indiferto nunc homine, longe minori doctrinæ apparatu tractari rursus patiamini; nam quamvis physicam scientiam non illustret, tamen ad physicæ hitoriam maxime pertinet. Perinde autem dicam, ac si Trombelli differtationem minime audierim, ut eius nutibus obsequi potius videar, quam opinionibus adversari.

Eratostheni succenset acriter Strabo, (a) quod *vetustissimos, aut piraticam, aut mercaturam exercentes, non egressos in pelagus, sed Iasonis modo præter littora permeasse putaverit, affirmatque veteres ipsos maritima itinera longius emensos, quam posteriores.* Bacchum, Herculem, Theseum, Ulysem, aliosque, quos ipse memorat, omittamus, quorum navigationes tum nimia caligine temporum circumfusæ, tum poetarum figmentis oblectæ sunt. Phœnices certe *extra columnas herculeas egressi*, ut idem Strabo (b) auctor est, *condidere urbes ad maritimam oram aphricæ, & in mediterraneis, paullo post troiana tempora.* In britanniam præterea, in galiam, quin & in thulem ipsam colonias deduxisse probabilissimum est; sed hanc in quæstionem Cambdenum legas, & Samuelem Bochartum; nec enim quidquam, quod non usquequaque exploratum sit, consectari volo. Profecto dubitatione illud caret, quod habet laudatus Strabo, a cassiteridum nempe insularum incolis stannum phœnices mercari solitos (c), *eosque solos a Gadibus missos hanc negotiandi viam aggressos; cum interim cursum istum cunctos mortales ipsi celarent.* Sive autem post artabrum promontorium fuerint cassiterides, ubi eas collocant idem Strabo, Solinus, & Plinius; sive inter hyberniam, atque britanniam, ut ex Cambdeno mavult Cellarius, (d) insignem semper navigationis cursum designant. Quid demum quod Nicaonis primi ægyptiorum tegis imperio, e mari rubro solventes, aphrica tota circumlustrata, phœnices ipsi per fretum herculeum traductis navibus, in ægyptum regressi sunt; quod Herodotus lib. quarto diferte docet (e), aphricam ipsam animadvertens tunc primum innotuisse?

Con-

(a) Lib. 1 edit. Basil. p. m. 38. (b) *ibid.* (c) *Ad calc. lib. 3 p. m. 122.* (d) *lib. 2 cap. 4 n. 83.* (e) *Herod. lib. 4 cap. 42.*

Contigit ista totius aethiopicæ circuitio trecentesimo sexto decimo circiter anno ante Christum humani generis servatorem; verumtamen multo ante transvecto erythraeo longe, lateque per orientalem oceanum vagabantur. Nam Salomonis ævo phœnicum peritia nautica in tantum celebrabatur, ut ipse tyriis naucleris in ophiritica expeditione usus fuerit, eidem navigationi iam ante assuetis (a). Ophiram videlicet in aurea chersoneso sola, & in circumstantibus insulis inveniendam existimo, tum quod merces omnes ad Salomonem allatæ hac una in regione inveniuntur; tum quod ophir, aliique Iectani filii loca orientalia occuparint (b) [ex Ophir enim Ophira, sicuti ex Edom Edumæa, ex Chanaan Cananæa, atque Illiricum ex Illirico Cadmi filio] tum demum quod phison, seu ganges, omnem terram evilath, *ubi nascitur aurum*, circuire dicatur in sacris literis (c), Evila vero fuerit frater Ophir. Hæc autem obiter; cum evincere id tantum nitar antiquos ad valde longinqua loca navigia impulisse, quod luculentius imo appareret, si cum plerisque vel in america, vel in hispania ophiram requirerem (d). Ceterum ophiritica hæc navigatio per Salomonis posteros culta fuit; nam ita legimus tertio Regum (e): *Iosaphat fecerat classes in mari, quæ navigarent in ophir propter aurum, & ire non potuerunt, quia confracta sunt in asiongaber*. Hinc interceptæ eiusmodi navigationes; nec propter bella, tum domestica, tum externa, subsecutasque hebræorum captivitates imposterum revocatæ.

Sed de navalibus phœnicum, atque hebræorum expeditionibus satis multa. Complures alias subiicerem ab aliis gentibus factas; verum ne multis vos morer, omitto; legi enim possunt apud (f) Ramusium, (g) Furnerium, (h) atque Ricciolium. Attingam tamen nonnulla, quæ magis probent antiquos impellere in medium oceanum naves consuevisse. Cum Hanno cartaginensium dux, cuius celebratissimam naviga-

(a) V. Ricciol. Geog. Ref. lib. 3 cap. 20 n. 3.

(b) Gen. 10, 30. (c) *ibid.* 2, 11.

(d) V. Mart. Lipen. de ophirit. Salom. navig. cap. 6.

(e) cap. 22 n. 49. (f) Ramus. t. 1.

(g) Fournier. hydrogr. lib. 5.

(h) Ricciol. geogr. ref. lib. 3 cap. 20.

vigationem italicam fecit Ramusius (a), occidentalia aphyricæ littora classe lustraret, calore nimio perterritus vela dedit, atque navigia in profundum mare per integros dies quatuor invexit. Cartaginenses iterum aphyricas easdem oras cum legerent, tradit Diodorus (b) tempestate actos ad athlantici oceani insulam devenisse, multorum dierum itinere a lybia distantem, ex qua cum in patriam, consulto utique, ac data opera redissent, ne propter amœnitatem loci cartaginenses, patria relicta, eo convolarent, rem occultarunt. Insulam istam ex facili americanam dixeris; & ad eam respexisse etiam Senecam in Medea (c), ubi oceano vincula rerum laxante, tellurem ingentem dixit post multa secula apparituram, detegendosque orbes novos. Terras videlicet ævo illo paucorum navigationibus notas, vulgari aliquando, atque contrito cursu adeundas prudenter existimavit, & poetarum more coniecturam hanc suam tamquam oraculum venditavit. Sed innotuerint ne romanis occidentales indiæ, vel non innotuerint, parum refert; cum eisdem romanos & cassiterides adiisse, & britanniam classe circumnavigasse exploratissimum sit; orientales vero indias in tantum illis innotuisse, ut ad easdem iter nostra hæc ætate vix sit lusitanis, ac batavis usitatus. Testatur Strabo (d) naves centum viginti Aelio gallo ægypti præfecto *ex muris portu ad indiæ tractus enavigasse*; hanc vero totam romanæ classis navigationem, incredibili reipublicæ quæstu quotannis factam, ita describit Plinius (e), ut naves ipsas compendii causa longius a maris ora, atque in profundum actas ostendat. Quid plura? Cum de navigationibus verba faciunt historici veteres, & poetæ, iam tum altum pelagus homines tenuisse aperte declarant. Ita Troiani, ut cetera omittam, cum exciso ilio in italicam venirent, (f)

.... *E conspectu siculae telluris in altum
Vela dabant lati.*

Atque

(a) T. 1 pag. m. 114. V. etiam Plin. lib. 11 cap. 67.

(b) Diod. lib. 5.

(c) *Act.* 2 *extrem.*

(d) Strabo lib. 3 p. m. 122. Tacit. Agric. cap. 10. V. Ramus.

T. 1 pag. m. 371. Strabo lib. 2 p. m. 83.

(e) Plin. lib. 6 cap. 23.

(f) Virgil. *Æneid.* lib. 1.

Atque Didonem fugiens (a)

..... medium Æneas iam classe tenebat

Certus iter, fluctusque atros aquilone secabat.

Fuerunt igitur & longissimæ, & minime litorales antiquorum navigationes, quæ, si quid iudico, neque volatu emisfarum avium ad terras cognitæ remeantium, nec simplici solis, & reliquarum stellarum observatione, nec denique scientia sola ventorum, statis temporibus ad certas aliquas plagas spirantium perficerentur. Validiore subsidio opus erat; quod unde repeti posset, si vim directivam magnetis excipias, plane non video. Neque profecto veteres nautas subsidio huiuscemodi destitutos recte quis dixerit, eo quod antiquorum scripta, cum attractivam mirifici istius lapidis facultatem commemorarent, directivam prorsus omittant. Cum enim posterior hæc vis potissimum ad rem nauticam referatur, græcorum, quod sciam, nemo, inter latinos vero unus Plinius nonnihil de nautica facultate tractavit. Hinc cum vel ipsam græcarum, ac romanarum navium structuram penitus ignoremus (non enim possumus quid biremes, triremes, quadriremes &c. hepteres, hocteres fuerint intelligere) nihil profecto mirum, si quam tenerent in ipsis navibus gubernandis, ac dirigendis ratio nos latet. Sed neque compertum est mentionem magnetis ad usus nauticos in veterum scriptis omnino desiderari; nam [Plauti versoria relicta, quam, ut antiquis notitiam omnem, atque usum pyxidis nauticæ abripiant, complures nimium fortasse detorquent] Vincentius bellovacensis, & Albertus magnus in quodam opusculo de lapidibus, quod Aristoteli tribuunt, hæc se legisse testantur (b): *Angulus magnetis cuiusdam est, cuius virtus convertendi ferrum est ad zoron, hoc est septentrionem, & hoc utuntur nautæ; angulus vero alius magnetis illi oppositus trahit ad aphron, idest polum meridionalem &c.* Ast Aristoteli opusculum hoc de lapidibus falso tribuitur: esto. Ast verba illa zoron, & aphron sunt penitus inaudita; hoc quoque dabo; dummodo librum hunc ipsum quocumque auctore, ac qualibet lingua conscriptum antiquitatis fuisse tantæ non neges, quanta requirebatur, ut Aristoteli a scri-

pto.

(a) *Ibid. lib. 5 init.* (b) *Vinc. Bellov. spec. t. 1 lib. 8 cap. 19 Alb. M. de mineralibus tract. 2 cap. 6.*

ptoribus minime contemnendis, qui ad tertii decimi seculi medietatem florebant, prudenter tribueretur, & simul (quod primum est) fatearis non tamquam novi alicuius inventi, sed tamquam iam tum vulgatæ cuiusdam rei magnetis mentionem ad usus nauticos illic haberi. Si libet, in peius etiam ruamus; & quod mentis integer nemo dixerit, concedamus hunc de lapidibus librum aut recens conscriptum, aut funditus ementitum. Vigebat igitur apud navium gubernatores magneticæ acus usus tempore saltem Vincentii bellovacensis, quod accuratius animadvertere debuissent, qui circa annum millesimum trecentesium secundum nauticæ pyxidis inventorem faciunt Ioannem Gioiam amalphantum.

Re tamen vera magnetis vim directivam multo ante Vincentium bellovacensem fuisse cognitam tum ex eo patet, quod Sidonius Apollinaris seculi quinti scriptor (a) illam commemoraverit, tum vero maxime ex eo, quod valde antiquiora fuerint horologia sciotherica horizontalia, quæ, ut recte horas indicent, per acum magneticam disponuntur. Refert (b) Ditmarus Gerebertum, qui postea Silvester secundus fuit, Othonem imperatorem adiisse, & cum eo diu conversatum, in Magdeburgo horologium fecisse, *illud recte constituens, considerata per fistulam quadam stella nautarum duce*, quo loco prorsus ab re fuisse Furnerius (c) animadvertit polarem stellam conspiceret, nisi illius ad meridianum appulsus cognosceretur, ad quod simplex tubus minime conducebat, optime vero pyxidula acu magnetica instructa. Præterea Kircherus (d) apud Salomonem cretensem in horis monstrandis ferream usurpatam lanceolam se reperisse testatur. In geographia item nubienfi, Rogerii primi siciliæ regis ætate conscripta, hoc est circa annum centesimum quinquagesimum supra mille, nauticæ pyxidis veluti quædam vestigia exhibentur; post annos vero circiter quinquaginta, Satyricus ille *Guyot de Provins* (e) in poemate suo lapidis huius vim directivam clarissime designavit, atque Hu-

T. II. P. III. B b b go

(a) ex Fournier. lib. II cap. 9.

(b) Chronic. cap. 6 ex Ciaconio in Silv. II.

(c) Hydrog. lib. II cap. 9.

(d) Ars Magn. lib. I cap. 6.

(e) ex Furn. & Ricciol. loc. cit.

go Bertius, ad ea ferme tempora, refert naucleros magnetem vitreo vase aquæ innatantem continuisse, ut noctu polum cognoscerent. Nonnullorum quidem ex recensitis auctoribus obscura videri loca minime inficior; sed quoniam nemo ætate illa nauticæ artis præcepta ex professo conscripsit, id ipsum, quod nunc in scriptoribus, obiter id attingentibus, videantur obscura, rem, de qua agimus, vulgatissimam tunc fuisse fortassis probat; est enim in omnium more ea, quæ notissima sunt, verbo unico, & quam potest leviter designare.

Ceterum nauticæ pyxididis recordatio si nulla propemodum in scriptoribus ævi mediæ, vel infimæ inveniretur, nihil mirarer. Nam, romanorum imperio ad perniciem vergente, ex septentrione in europam reliquam pæne universam egressæ immanissimæ gentes, & clarissimas urbes plurimas devastarunt; & divina, ac humana omnia in discrimen deterrimum adduxerunt. Obrutæ tunc squalore, luctuque artes omnes, literæ profligatæ, sublata commercia, navigationes omissæ; cumque per annos integros quadringentos detestabilis pestis hæc perdurasset, subsequencia totidem secula prostratas res, atque perditas ad statum pristinum revocare non potuerunt. Evanescentibus tandem paullatim tenebris, novamque in faciem composita europa, dimissas cum orientalibus indiis navigationes italia repetiit, & exoticas merces per sinas, atque arabes ad mare rubrum delatas, venetis maxime, ac ianuensibus navigiis excipiens, in omnes alias europæ partes distribuebat.

Tam longo tamen temporis intervallo nauticam pyxidem non omnino delituisse confirmant præter allata nuperime testimonia, longissimæ nonnullorum navigationes, quas vel in illa calamitate temporum factas ex planispherio Camaldulensi coniicio. Planispherium autem camaldulense tabulam voco universam veteris orbis faciem representantem, tertio decimo seculo factam, atque venetiis in monasterio nostro Sancti Michaelis maxima cura adservatam. De celeberrimi istius planispherii aut auctore, aut origine cum apud plures (a) varia legissem, eaque pugnancia inter se, a

D. An.

(a) *V. Ramus. T. 2 in præf. ad itin. M. P. V. ; Fortunium. Hist. Camald. part. 2 lib. 4 cap. 23 ; Vital. Terrarossa Rifles. Geog. cap. 2.*

D. Angelo Calogerà ordinis mei monacho valde erudito, & opusculorum collectione notissimo, venetiis degente, quid tandem hac de re esset, per literas sciscitatus sum. Rescripsit hic falsa omnia quæcumque de planispherio hoc tradebantur. Auctorem tabulæ camaldulensis familiæ hominem nomine Maurum fuisse. In tabula ipsa totius aphyricæ littora designari, quodque post annos saltem ducentos a Vasco Gama detectum, & *bonæ spei promontorium* vocatum fuit, illic *Capo de Diab* nominari. Hausisse Maurum quæcumque pinxerat ab extraneis hominibus venetias tunc temporis undique convolantibus, cusumque in honorem eius numisma, cum hac epigraphe: *F. Maurus S. Michaelis Morianensis de venetiis, ordinis Camaldulensis Cosmographus incomparabilis*. Hæc quidem ille. Quod si tunc temporis erant, qui toti aphyricæ circumfusa littora aut verbis, aut graphide exponerent, ut non incondite omnino, imo etiam hercle, ratione temporum habita, & eleganter, & satis apposite ab alio in geographicas mappas traducerentur, navigationibus temporibus proxime superioribus institutis, erit id utique tribuendum; quæ cum eiusmodi sint, ut pyxidis usum omnino requirere videantur, cur, quæso, instrumenti huiusce pulcherrimi inventum ad posteriora tempora referemus? Sane qui Marci Pauli veneti itinera attente perlegerit, a quo vel confectum, vel ex sinarum imperio venetias allatum communiter putant planispherium hoc ipsum, aut eius autographum, quique primus europæorum iaponias infulas adiit (a), atque in oceano indico est quam latissime pervagatus, ultro fatebitur eius navigationes vix absque pyxide, ac ne vix quidem perfici potuisse.

Hinc porro affirmandi ansam complures arripuerunt nauticam pyxidem a sinis acceptam per Marcum hunc venetum in europam primo delatam. Pro certo namque illis erat magnetis usum in nautica re apud sinas a multis iam seculis viguisse. Refert Martinius sinicæ historiæ auctor (b) Cheveunghum sinarum imperatorem cochinchinensi legato machinam dono dedisse, quæ sua sponte respiciens austrum monstrabat iter, sive terra illud, sive mari facientibus.

Bbb 2

Eam

(a) *Itin. lib. 3 apud Ramus. t. 2.*

(b) *Hist. Sivic. lib. 4.*

Eam *chinan* appellari, qua voce nunc etiam *sinæ* magneti-
cam acum designant, *argumento haud dubio eius usum illo
iam tempore* (seculis scilicet amplius, quam undecim ante
Domini adventum) *apud sinas inventum, ad alias inde na-
tiones transivisse. Hanc machinam duces sequuti cochinchinen-
ses, unius anni spatio domum rediere.* Martinio Isaac Vossius,
ut alios taceam, consentit, qui præter modum ingenium,
atque doctrinam *sinarum* extollens, acutus alias, ac sollers
vir, ita scribere non est veritus (a): *Si quis omnium,
quæ sunt, aut olim fuere gentium præclara simul conferat in-
venta, tanta tamen, & talia non erunt, quin longe invenian-
tur plura, & meliora, quæ a solis reperta fuere scribis.* De
scientiis, inventisque *sinarum* reliquis consulatur Anonymi
dissertatio (b) ultima in duorum arabum ad *sinas* itinera,
seculo octavo instituta, quo loco gentis istius scientiæ, ac
inventa longe iustiori trutina perpenduntur. De re vero
nautica, & pyxidis usu cum antiquissimæ *sinarum* expedi-
tiones ad orientalem *aphricæ* oram, & ad S. Laurentii in-
sulam infirmo admodum fundamento, consuetudinum nem-
pe quarumdam, morumque apparenti conformitate, nitantur;
illorum vero ad *persicum* usque *sinum* navigationes
[quod aperte deducitur ex modo laudatis arabum itineri-
bus] (c) littorales fuerint, idcirco, ut antiquitus illos nau-
tica pyxide instructos credam, minime adducor. Maritimum
certe *sinarum* iter ad *indias*, ut nimis longum ab europæis
reiectum est; licet autem in Marco Paulo veneto (d) inve-
niam *sinenses* nautas *moluccas* adire, monet is tamen pro-
pter itineris magnitudinem, atque difficultatem admodum
raro expeditionem hanc fieri, annoque toto solum comple-
ri. Præterea si penes *sinas* pyxidem nauticam ipse primo
invenisset, rem tantam diligens, atque sincerus homo ne-
quaquam reticisset. Cuiusmodi vero machina illa fuit a
Cheveungho cochinchinensi legato donata, qua fretus, ut in
finitimam cochinchinam rediret, integrum annum insump-
sit? Sed rem conficiat Kirckerus (e): *Non desunt, inquit,*
qui

(a) *De magnit. Sin. Urb. cap. 14.*

(b) *Paris. apud Coignard. 1718.*

(c) *Apud Anon. cit. pag. 142.*

(d) *Lib. 3 pag. 4.*

(e) *Ars magn. lib. 1 cap. 6.*

qui velint ex china per Paulum Marcum venetum verticitatem magnetis anno millesimo ducentesimo sexagesimo europa primum innotuisse. At quamvis ego singulari diligentia rem exquisierim, ex iis tamen, qui in china fuerunt, quique annales chinensium optime norunt, nihil de rei veritate certi cognoscere potui.

Cur vero instrumentum tam utile, imo tam necessarium a finis arabes non accepissent, cum quibus a seculis iam ferè decem arabes ipsi negotiationis nexum iniere? Profecto autem non acceperunt; quandoquidem nullas ab ipsis detectas terras, provincias nullas maritima expeditione devictas, nullam navigationem ex iis, quas vulgo vocant *di lungo corso* susceptam ostendes, quo iure aliquo ante institutam cum europæis consuetudinem quicumque illis usus magneticæ pyxidis vindicetur. Hisce potissimum argumentis Bergeronium antiquam directivæ magnetis vis cognitionem arabibus tribuentem, strenue, copioseque confutat Anonymus, de quo supra (a), subiiciens turcas, arabes, perfas pyxidem nauticam originali nullo vocabulo, sed italico *busola* diu nuncupasse; argumento minime dubio nationes has omnes, italis utique, venetis autem signanter, ac ianuensibus, commercii causa ægyptum, ac syriam navigatione multa adeuntibus, pyxidem ipsam acceptam referre, ut ab ipsis etiam & hydrographicas tabulas, & longioris navigationis præcepta acceperunt. Nec enimvero pyxidis usus in nautarum indici oceani vulgus illico exivit; nam Nicolaus de Comitibus (b), qui ante seculi quintidecimi medietatem in eodem oceano versabatur, hæc habet: *I naviganti dell' India si governano con le stelle del polo antartico . . . perchè rare volte veggono la nostra tramontana, e non navigano col bossolo, ma si reggono secondo che trovano le dette stelle o alte, o basse.* Eodem labente seculo Vascus Gama bonæ spei promontorium prætergressus, dicitur quidem in orientali aphricæ littore naucleros vidisse europæorum more pyxide utentes; at florentinus quidam patricius, qui ab eadem expeditione redeuntem Gamam comitabatur, suæ navigationis historiam conscribens, testatur (c) mauros septentrionem
non

(a) *Dissert. de l'entrée des Mahom. dans la Chine.*

(b) *Apud Ramus. t. 1 pag. m. 343 versa.*

(c) *Ex eod. t. 1 pag. m. 120 versa.*

non observare, sed ligneorum quorundam quadrantum ope, naves dirigere; post pauca vero veluti rem clarius explicans (a) Nauclerum quemdam hebræum alexandrinum inducit ipsissima hæc verba dicentem: *Navigano in quelli mari senza buffolo, ma con certi quadrantì di legno, che pare difficil cosa, e massime quando fa nùvolo, che non possono veder le stelle.* Porro Nauclerum hunc a rege Melindæ acceperat Vascus Gama (b) itineris ducem in indico oceano; italicam autem linguam dicitur calluisse, ut ipsum cum italis diu conversatum, pyxidis cognitionem, atque usum, inter asiaticos, aphyricanosque nautas nondum vulgatum, ab iisdem italis accepisse cognoscas. Denique Ludovicus Barthema concivis noster, qui decimo sexto ineunte seculo ægyptum, syriam, arabiam, persidem, indiamque universam diligentissime perlustravit, ac reliquis omnibus, teste Ramusio (c), accuratius descripsit, veluti peculiare quiddam animadvertit, quod dum ad insulam iavam contenderet [d], *il padrone della nave portava la buffola ad usanza nostra, & aveva una charta, la quale era tutta rigata per lungo, e per traverso.* Quo bononiensis scriptoris testimonio dissertationem hanc meam libens concludo, quòd intelligitis urbem hanc nostram, quæ viris in optimo quolibet rerum genere spectatissimis abundavit, prænobilis etiam viatoris laude minime caruisse.

HERA.

(a) pag. 121.

(b) *ibid.* pag. 119.(c) *Prefat. in Lud. Barth. t. 1 p. m. 47.*(d) *Itin. Lud. Bart. lib. 7 cap. 27 ap. Ram. t. 1.*

HERACLITI MANFREDII

*De viribus ex elastrorum
pulsu ortis.*

Non ignoratis profecto, Sodales clarissimi, quæ mihi persona in illo dialogo imposita fuerit, qui in prima parte secundi tomi commentariorum vestrorum de vi corporum viva est editus; non enim dubito, quin vestrum quisque eum sæpius legerit, vel propter rei, de qua agitur, gravitatem, vel propter summam, qua scriptus est, urbanitatem, atque elegantiam. Inductus ego in eo sum, quasi cartesianæ opinionis circa vim vivam defensor; & ea sane mihi tribuuntur, quæ vel si numquam dixissem, tamen dixisse vellem, cum tam suaviter, urbaneque dicantur.

Sunt autem, qui me, quasi ille ipse Heraclitus sim, qui in dialogo illo disputat, interdum rogent, quærantque, cur, cum ibi tamquam certissimum aliquid posuerim: *elastrum idem, sive eandem elastrorum seriem, si duo corpora inæqualium massarum pellat, velocitates iis tribuere, massis ipsis reciproce proportionales*: cur, inquam, cum id posuerim, non idem etiam demonstraverim. Quid enim, inquiunt illi, si id negetur? Et sane negatur a nonnullis.

Quoniam ergo pro illo Heraclito accipior, conabor pro illo respondere; easque rationes adducere, quas ipse, quantum coniecere possum, adduceret, si tueri se vellet. Contenderet autem, ut credo, illud ipsum theorema, cuius demonstratio quæritur, ex Bernulliana ratione statim & necessario consequi; neque propterea demonstrandum in eo sermone fuisse, qui totus esset Bernullianorum causa susceptus. Id paucis exponam, rem totam ab initio repetens.

Sed ante illud dabitur, ut de vi corporum viva breviter differam, demonstrationem proferens, quæ ad probandam Cartesianorum sententiam, mutatis paucissimis ex Bernullio ipso

ipso sumi potest. Id cum fecero, ad rem ipsam propius accedam, ostendamque primum, seriei cuiuslibet velocitatem ex Bernullianorum opinione eandem esse debere; deinde propositum theorema expediam paucissimis. Hæc executus finem faciam.

Exordiar ab eo, quod primo loco proposui, Sodales præclarissimi, de vi corporum viva. Sint duæ elastrorum series inæquales, altera verbigratia ex tribus, altera ex duodecim elastris constans. Utraque ex una parte in fulcrum immobile nitatur, ex altera libera sit. Utraque, sive ob adiectum retinaculum immota maneat, sive retinaculo sublato accipiat motum & resiliat, perpetuo æqualiter aperta consideretur, itaut tum in prima tum in singulis successivis apertiunculis elastra cuncta, tum huius, tum illius seriei, æqualem in utraque angulum cruribus suis faciant. Demum ambæ, dum se se aperiunt, protrudant una unum mobile, altera alterum, sed æqualia. Pressiones illas, quas ambæ hæ series faciunt, cum elastra unius ad eundem angulum dilatata sunt, ad quem dilatata sunt elastra alterius, voco pressiones homologas.

Dico itaque, pressionem, qua series una explicando sese urget suum mobile, esse ad pressionem homologam, qua series altera urget suum, uti est directe numerus elastrorum ad numerum elastrorum, nempe ut tria ad duodecim; siquidem seriem unam elastrorum trium posuimus, alteram elastrorum duodecim.

Quod si cui minus arridet, videbimus infra, an res ita se habeat. Nunc, quando rem ita se habere supponimus, dico vires, quas mobile accipit a ternis elastris, ubique esse ad vires, quas mobile aliud æquale accipit a duodenis, in ratione simplicium velocitatum homologis pressionibus respondentium, non in ratione quadratorum earundem velocitatum.

Placet hoc theorema demonstrare ea supputatione, quam Cartesiani a Bernullio ipso mutuuntur, quamque Bernullius proposuit in præclaro opere de legibus communicationis motus capite septimo. Nam quamvis Bernullius ibi contrarium probet, Cartesiani tamen unam litterulam uno in loco de suo addentes, id quod iure se facere posse putant, demonstrationem illam, supputationemque totam fecerunt suam. Disputant ergo ad hunc modum.

Re-

Repræsentet linea AC (*Fig. 1*) cuiuslibet seriei longitudinem, linea vero BD alterius cuiuslibet seriei longitudinem a priore diversam. Protrudat porro series AC extremo uno C, iuxta directionem CF, mobile quodpiam cuiusvis figuræ, verbi gratia globum. Altera item series BD extremo D protrudat, iuxta directionem DI, globum alium priori æqualem. Duæ curvæ CML, DNK ordinatis suis GM, HN repræsentent velocitates ab æqualibus globis acceptas in punctis G, & H. Sit $BD = a$; abscissa $DH = x$; huius differentiale HP, sive $NT = dx$; ordinata $HN = u$; huius differentiale $TO = du$.

Sumamus nunc abscissas, quæ pertinent ad curvam CML, idest abscissas CG, CE eius magnitudinis, ut habeant ad abscissas DH, DP, quæ pertinent ad curvam DNK, eam rationem, quæ est inter serierum AC, BD longitudines; id enim est omnino consentaneum assumptæ hypothese de elastris, sive quiescentibus, sive resilientibus, æquali in utraque serie angulo dilatatis: & faciamus $AC = na$, seu, quod perinde est, faciamus, esse unitatem (1) ad numerum quemvis (n), uti est longitudo $BD = a$ ad longitudinem $AC = na$. Quo casu factum erit etiam, ut sint in eadem ratione 1 ad n , tum numeri elastrorum utriusque seriei, tum harum serierum vis absoluta, tum vis, quam transmittunt in suum mobile modo hæc, modo illa series; sunt enim hæc tria, omnium consensu, semper proportionalia. His sic positis, erit etiam abscissa $CG = nx$; huius differentiale $GE = ndx$. Sit quoque $GM = z$.

Igitur cum sit $AC : CG :: BD : DH$, quandocumque serierum resilientium extrema, & globi ab iisdem extremis pulsati pervenerint ad puncta G & H, omnia elastra seriei utriusque erunt æque dilatata: ergo in horum unoquoque erit absumpta pars æqua elasticitatis, itemque supererit in unoquoque alia pars æqua. Pressio igitur uniuscuiusque elastri in globum erit adhuc æqualis. Si ergo summa pressio- num, quæ fiunt a serie BD in globum delatum ad punctum quodvis H, idest si pressio illa, qua urgetur globus transiens per punctum H, sit $= p$; pressio homologa, idest illa, qua globus transiens per punctum G, urgetur a serie AC, erit $= np$.

Modo incrementum velocitatis globi existentis in H,
 T. II. P. III. Ccc idest

ideſt differentiale TO $[du]$, docentibus ipſis leibnitianis, habet rationem compoſitam viſ motricis, ideſt preſſionis p , & tempuſculi, quo durante conficitur a globo ſpatiolum HP $[dx]$. Porro huiuſmodi tempuſculum eſt in ratione directa eiuſdem ſpatioſi HP $[dx]$, itemque inverſa velocitatis HN $[u]$, ideſt eiſ velocitatis, qua idem ſpatiolum $[dx]$ a globo percurritur. Exprimitur ergo analytice dictum tem-

puſculum per $\frac{dx}{u}$. Quare ducto hoc valore in p , habebitur incrementum velocitatis globi exiſtentis in H, ideſt differentiale TO $= du = \frac{pdx}{u}$. Quod, cum det, $udu = pdx$, in-

tegrando dabit etiam $\frac{uu}{2} = \int pdx$.

Ob eamdem ratiocinationem, cum incrementum velocitatis globi exiſtentis in G, ideſt differentiale VD $[dz]$ habeat rationem compoſitam viſ motricis, ſeu preſſionis $[np]$ agentis in puncto G, & tempuſculi, quo conficitur a globo ſpatiolum GE, quod tempuſculum ſimiliter analytice

exprimitur per $\frac{ndx}{z}$, patet dictum incrementum velocitatis

globi exiſtentis in G, ideſt differentiale VD $[dz]$ fore pari-

ter exprimendum ſic, $dz = \frac{npdx}{z}$. Quod cum det, $zdz =$

$npdx$, integrando dabit, $\frac{zz}{2} = \int npdx$.

Ex harum æquationum integralium comparatione colligitur ſequens analogia, $uu : zz :: \int pdx : \int npdx$. Quæ analogia, diviſo utroque termino ultimæ rationis per $\int pdx$, tum facta radicum extractione, vertitur in eam, quæ ſequitur, videlicet, $u : z :: 1 : n$, quæ ſane oſtendit, velocitatem $[u]$ globi protruſi a ſerie BD, eſſe ad velocitatem $[z]$ æqualis globi protruſi a ſerie AC, uti 1 ad n ; nempe uti viſ, quam globus unus accipit a ſerie BD, ad vim, quam globus alter accipit a ſerie AC, quæ ipſa eſt cartefianorum ſententia.

Ana-

Analysis hæcenus proposita, qua cartesiani suam de viribus motricibus sententiam probant, eadem ipsissima est, qua summus geometra Ioannes Bernoullius probat aliam cartesianis prorsus contrariam sententiam, idest leibnitianam. Idque statim apparebit, si hæc ipsa analysis cum illa conferatur, quam vir celeberrimus eo loco, quem supra indicavimus, proposuit. Unum tantum interest inter leibnitianos, cartesianosque in hac analysi usurpanda; quod leibnitiani utriusque seriei BD, & AC pressiones homologas, quibus duo æquales globi in punctis H, & G sollicitantur, utrobique exprimunt eodem symbolo p , quippe quia censent, has pressiones in singulis similibus serierum dilatationibus esse inter se æquales; cartesiani vero pressiones hæc homologas non utrobique exprimunt eodem symbolo p ; sed in altera serie, puta in serie BD, pressionem exprimunt symbolo quidem p , in altera vero serie AC pressionem exprimunt symbolo np ; quippe cum existiment, dictas pressiones esse, uti sunt numeri elastrorum, scilicet uti 1 ad n . Ceterum calculus utrisque auctoribus favet pariter, quippe cum, si is instituat assumpta leibnitiana pressionum expressione, tandem colligatur, esse $uu : zz :: 1 : n$., videlicet, vires corporum æqualium esse, uti quadrata velocitatum; assumpta vero expressione cartesiana, colligatur esse, $u : z :: 1 : n$; nempe uti supra a cartesianis ipsis demonstratum est, easdem vires esse in ratione simplicium velocitatum.

Igitur quandocumque conveniat inter utrosque auctores de huiusce analytice demonstrationis firmitudine, iam res tota eo tandem deducta videtur, ut ad componendam inter leibnitianos, cartesianosque de viribus motricibus controversiam, id dumtaxat decernendum sit, utra de duabus analyticis expressionibus ad veritatem propius accedat, an ea, quæ pressionum, de quibus agitur, æqualitate a leibnitianis admissa, fundatur, an contra quæ earundem pressionum inæqualitate iuxta cartesianorum sententiam innixa est. Omnino decernendum est, utrum pressio unius seriei sit ad pressionem homologam alterius, uti numerus elastrorum ad numerum elastrorum, sive ut 1 ad n . Ego vero neque is sane sum, qui tantorum virorum rationes expendere, deque earum vi iudicium ferre me posse existimem; neque si

is essem, qui possem, vellem tamen id in præsens suscipere. Eas tantum rationes proponere nunc est animus; porro de iisdem iudicium aliorum esto.

Notum est, leibnitianos dictarum pressio-
rum æqualitatem sumere ex eo theoremate, quod eiusdem bernulliani operis capite sexto proponitur, quodque ita se habet. Si fuerint duæ elastrorum series inæquales, altera exempli gratia trium, altera duodecim, eodem in utraque angulo apertorum; tum si ambæ immotæ maneant, appposito hinc fulcro, illinc obice quopiam, verbi gratia manu impediente, quo minus ultra aperiantur, idem erit nisus, quo manus altera a tribus, ac quo altera a duodecim elastris premetur. De hoc theoremate, quod, ut est perspicuum, circa elastra quiescentia totum versatur, nullus cartesianorum hætenus dubitavit. Ex eo igitur, quod pressiones ab elastris adhuc immotis exercitæ in utraque serie æquales sint, colligunt leibnitiani, eas fore itidem æquales in singulis earundem serierum infinite parvis dilatationibus, quas toto explosionis curriculo series ipsæ acquirunt. Nam cum quælibet infinite parva dilatatio coniunctum habeat motum adeo exiguum, ut huius differentia a quiete assignari nequeat, & proinde nulla censeatur, series ambæ in illis singulis apertionibus spectari poterunt, tamquam quiescentes, atque adeo earum pressiones in obiectos globos sumi poterunt utrobique æquales.

Quod vero ad cartesianos spectat, hi ut probent dictarum pressio-
rum inæqualitatem, primum ratiocinantur sic. Ex vires, quæ motum adiunctum habent, etiamsi infinite parvum, sunt generis omnino diversi ab iis, quæ sine motu agunt. Igitur æqualitas pressio-
rum, quas duæ series sine ullo motu, & omnino quiescentes, exercent, non valet ad probandam æqualitatem pressio-
rum, quæ ab iisdem seriebus exercentur, etiam ubi eadem motum acceperint. Moveri & non moveri, seu motus & quies sunt duo corporum status ex eorum genere, inter quæ nihil tertium inveniri potest. Igitur velocitas, quantulacumque ea tandem sit, debet ad alterutrum ex his corporis statibus revocari, minime vero ad neutrum. Et sane cum infinitæ exiguæ velocitates coniunctim sumptæ efficiant tandem velocitatem aliquam finitam, & assignabilem, quietem contra nunquam efficiant,

efficiant, manifestum esse videtur, velocitatem infinite parvam esse quid toto genere diversum a quiete, atque adeo a pressione, quæ sine motu fit. Et hac quidem ratione cartesiani primum in dubium revocant pressio-
num, de quibus nunc quæstio est, æqualitatem. Ad adstruendam vero earumdem inæqualitatem, ita ut sint in ea ratione, quam supra indicavimus, vim faciunt in altero argumento, quod sequitur.

Immota manente elastrorum serie quantumvis longa, non alia exercetur pressio, quam quæ ab uno elastro seorsim a ceteris exerceretur; propterea quia pressiones ceterorum omnium æquali actione, atque reactione se se mutuo elidunt. Porro autem sublato æquilibrio, & resiliente iam serie, elastra singula, ex quibus ipsa constat, debent omnia simul uno tempusculo æqualiter aperiri, usquedum peractis infinitis huiusmodi apertiunculis, in unoquoque elastro æqualibus & contemporaneis, omnia simul postremam dilatationem adeptæ fuerint. Erunt ergo elastra singula semper æqualiter aperta, imo quoniam nulla sufficiens ratio est, ne illo tempusculo, quo fit prima infinitesima apertio ternorum elastrorum seriei verbi gratia BD, (*vide Fig. 1*), ne, inquam, eodem tempusculo fiat pariter prima apertio duodenorum in serie AC, imo millenorum, pluriumve, si quæ insint in alia quavis excogitabili serie; hinc propositarum serierum BD, & AC dilatatio tum in singulis apertiunculis, tum in omnibus coniunctim erit contemporanea. Quod cum accidere nequeat, nisi uterque globus, idest tum qui a ternis elastris seriei BD, tum qui a duodenis seriei AC truditur, eodem tempore totidem æqualia spatiola percurrat, quot insunt elastra in serie illum sollicitante, sequitur globum unum singulis instantibus accepturum a serie BD tres pressiones infinite parvas æquales tum inter se, tum singulis illis duodecim, quas globus alter accipit a serie AC. Ex quo proclive est colligere, etiam pressiones earumdem serierum fore inter se, uti sunt numeri elastrorum, idest uti 1 ad n , proindeque esse exprimendas duobus diversis symbolis, videlicet p , & np , uti volunt cartesiani, qui expansionum velocitates in utraque serie merito inæquales ponunt, cum pressiones ponant inæquales.

At non video, cur qui pressiones æquales ponunt, ut
ber-

bernulliani faciunt, non etiam velocitates ponant æquales. Quæ res declaranda mihi est paulo fusius, nam omnis oratio mea huc fere spectat. Sunt autem qui velint, velocitates, quibus series expanduntur, minime æquales esse, quamvis pressiones sint æquales; iique hac potissimum ratione inniti videntur; quod scilicet breviorē seriem breviori tempore expandi putant, longiorē vero longiori. Ex hac enim temporum inæqualitate censent evenire debere, ut quamquam inæqualium serierum pressiones æquales sint, tamen ob maiorem earundem pressio-num numerum, quarum plures, ut hi philosophi putant, longiori tempore a longiore serie in mobile imprimuntur, necessario in hoc idem mobile maior velocitas inducatur.

Atque hi philosophi non solum tempora inæqualia esse constituunt, sed certam quoque illorum proportionem statuunt, docendo, series elasticas ita aperiri, ut tempora harum apertionum habeant inter se rationem subduplicatam longitudinis earundem serierum; nempe illam, quam habent radices numerorum, qui exprimunt multitudines elastorum series componentium, idest in proposito exemplo rationem, quam habet \sqrt{BD} ad \sqrt{AC} , sive $\sqrt{1}$ ad \sqrt{n} .

Atqui id totum difficultatibus premi potest quamplurimis. Ac primum: quis non videat, non posse ob solam temporis durationem augeri sive in seriebus, sive in globis pulsis velocitatem, quousque velocitatis causa non augeatur? Fac duas æquales pilas horizontali mensæ impositas, a duobus æqualibus agentibus, verbi gratia a duobus æqualibus malleis lusoriis, alteram seorsim ab altera æqualiter premi. Fac unamquamque pilam ita temperate a malleo in motum adigi, ut quamquam malleus nusquam illam deferat, tamen uniformiter & eadem semper pressione pergat agere. Iam si alter malleorum diutius altero pilam insectetur, sane non idcirco quisquam putaverit maiorem velocitatem in hac, quæ diutius pressa est, fore excitandam. Igitur posita duarum pressio-num æqualitate, sola maior minorve earundem duratio non parit maiorem, aut minorem velocitatem.

Deinde si pressio, quam facit series AC in puncto G, propter maiorem diuturnitatem, velocitatem maiorem parit, quam pariat pressio illa, quam facit series altera BD in pun-

puncto homologo H; iam globus, quem urget series AC, erit velocior, cum perveniet in punctum E, quam globus, quem urget series BD, cum perveniet in punctum homologum P. Non ergo ambo hi globi æqualiter premi poterunt, atque urgeri in punctis homologis E & P; nam quamvis in his punctis ambæ series, quantum in se est, faciant pressiones, ut bernulliani volunt, æquales; tamen globi has pressiones non æqualiter accipient; quippe quia alter altero velocior erit, seseque celerius pressioni subtrahet. Et tamen, iuxta bernullianorum sententiam, sicut globi in punctis homologis G, & H premuntur æqualiter, æqualiter quoque premi debent in punctis homologis E, & P. Quid est enim, quod pressiones in binis quibusque homologis punctis eodem symbolo p exprimunt?

Præterea cum dictæ temporum inæqualitatis in serierum elasticarum apertionibus, hætenus a leibnitii sectatoribus nulla prodierit sufficiens probatio, cartesiani primum illud petunt, quid causæ sit cur elastra, quorum etsi dispar esse possit numerus, par est tamen nisus in singulis ad resilendum, ubi singula seorsim a reliquis posita sunt, resiliant statim, & singula æquali tempore aperiantur; ubi vero simul iunguntur in seriem, sive longam, sive brevem, non illo eodem tempore aperiantur simul omnia, sed in una serie resiliant citius, in alia segnius & cunctentur. Etenim, cum omni inertia carere illa velimus, cumque ex uno extremo nullo obice fulciantur, impedire se mutuo non possunt, ideoque, si in seriem coniecta retardentur, retardabuntur sine causa, eludentque principium illud, quod nunc in scholis adeo premitur, rationis sufficientis.

Mitto expendere proportionem illam, quam leibnitiani ponunt inter tempora, quibus duæ series BD, AC homologas dilatationes absolvunt; quam proportionem volunt esse subduplicatam illorum spatiorum, quæ a seriebus ipsis in similibus dilatationibus conficiuntur. Quo loco cartesiani postulare a leibnitianis solent, ut hanc proportionem argumento aliquo probent.

Neque sane hanc probationem postulant cartesiani a leibnitianis disputandi genio, aut obstinatione quadam, qua veterem sententiam de vi viva in animo sibi infixerint; sed quia ad controversiam tantam, qua nulla maior
in

in physica est, id in primis pertinet. Nam cum motus, qui in utraque serie habetur, durante qualibet dilatatiuncula, spectetur tamquam uniformis, cumque generatim in quocumque motu uniformi spatia a mobili percurfa sint in ratione composita temporum, atque velocitatum, id profecto consequens erit, ut si ratio temporum, quibus durant singulæ dilatatiunculæ, ponatur esse ipsa ratio spatiorum subduplicata, ratio quoque velocitatum sit subduplicata spatiorum, seu, quod idem est, vires globorum vivæ sint, uti quadrata velocitatum. Ut proinde ad sententiam leibnitianorum nihil opportunius poni possit, quam ea hypothesis, quam ipsi proponunt, idest tempora habere rationem spatiorum subduplicatam, quæ hypothesis quanto leibnitianis commodior est, tanto magis cartesiani id iure ab iis postulant, ut eiusdem hypothesis probationem afferant aliquam.

At aliquam fortasse afferunt a gravitatis exemplo petitam. Etenim si gravia duo corpora per duas lineas perpendiculares cadant, constat profecto, casuum tempora inæqualia esse, si lineæ quidem sint inæquales, & habere rationem linearum subduplicatam; id quod est a magno Galileo demonstratum. Quare cum pressiones, quas gravitas in cadentia hæc corpora exercet, sint æquales (possumus enim horum cadentium massas æquales ponere) sintque etiam æquales pressiones, quas duæ elastrorum series exercent in duo mobilia; videbitur fortasse aliquibus, eandem esse debere in utroque motus genere temporum proportionem.

Verum non est huic paritati nimis fidendum. Etenim in duobus cadentibus demonstratur, tempora esse in ratione subduplicata linearum, quia experimentis Galilei, & rationibus quamplurimis constat, æqualia velocitatis incrementa utrique cadenti advenire in æqualibus temporibus singulis. Num ergo tale aliquid demonstratum est in mobilibus globis, qui a duabus elastrorum seriebus urgeantur?

Sed quæcumque iam sit vel inæqualitas temporum, vel proportio, certum est, vel in cadentibus ipsis, velocitates semper debere esse æquales, quotiescumque pressiones, quæ fiunt in cadente uno, æquales sunt & numero, & magnitudine, pressioibus, quæ fiunt in altero. Etenim pressiones magnitudine æquales faciunt incrementa velocitatum
æqua-

æqualia; quare si tot numero pressiones fiunt in uno cadente, quot in altero; erunt in utroque incrementa velocitatum & numero æqualia, & magnitudine; igitur & æquales incrementorum summæ; & omnino velocitates totales in utroque cadente æquales erunt. Quod si velocitates cadentium in temporibus inæqualibus inæquales sunt; id fit ex eo, quod cum tempora inæqualia sunt, pressiones quoque sunt numero inæquales; atque ex hac pressio-num inæqualitate inæqualitas oritur velocitatum.

Quod si ad series elasticas transferamus, dicendum sane est, velocitates totales, quibus urgentur globi a duabus elastrorum seriebus, ex leibnitianorum sententia, æquales semper esse debere. Hi enim, si sibi constare volunt, non possunt, quin pressiones in ambabus seriebus admittant & magnitudine, & numero æquales. Magnitudine quidem; quoniam volunt, series ambas in apertiunculis singulis homologis æqualiter premere: quod nisi admittant, cur, quæso, utriusque seriei pressionem in binis quibusque apertiunculis homologis eodem symbolo p exprimunt? Numero autem; cum nulla sit apertiuncula in una serie, cui non respondeat apertiuncula similis, & homologa in altera. Quod cum ita sit, debent profecto leibnitiani velocitates totales ambarum serierum æquales ponere; quamcumque temporum inæqualitatem, proportionemve prætendant.

Et sane quidni ponant? Cum nequeant alia ratione dictarum serierum, ut ita dicam, phænomena simul conciliare. Nam ut alia mittamus argumenta, quibus ista leibnitianorum de seriebus elasticis theoria obnoxia est, unum hoc proferemus.

Supponamus (*Fig. 1*) seriem AC longiori tempore expandi quam seriem BD, atque adeo imprimere in globum a se pulsum velocitatem maiorem illa, quam series BD, expandens se se breviori tempore, in globum a se pulsum potest imprimere. Iam per leibnitianos velocitas illa maior genita fuit a serie AC ob pressionis incrementa, æqualia quidem illis, quæ impressa sunt a serie BD, sed numero plura propter maiorem pressionis durationem. Igitur si utriusque seriei velocitas foret æqualis, foret quoque æqualis cumulus dictorum incrementorum pressionis, & proinde foret etiam æqualis totalis pressio ab utraque serie exerci-

ta ; nam , si inæqualitas velocitatis provenit a cumulo pressio-
 tionum , quæ in una serie plures sunt numero , æqualitas
 velocitatis provenire debet a cumulo pressio-
 tionum , quæ numero æquales in utraque serie sint .

Porro sit punctum I illud , in quo series BD habet
 eam maximam velocitatem , quam potest expandendo se se
 acquirere : sit pariter punctum F illud , in quo altera series
 AC maximam habet velocitatem . Profecto ea maxima ve-
 locitas seriei BD erit æqualis cuiquam ex minoribus illis
 velocitatibus , quas series AC aliquo in puncto suæ expan-
 sionis habuit . Nam cum hæc series acquirat successive
 omnes velocitatis gradus , qui medii sunt inter minimam
 & maximam , acquirit etiam illum eundem , qui adæquat
 maximam seriei BD velocitatem . Ponatur itaque punctum
 R esse illud , in quo ipsa series AC habet velocitatem
 æqualem illi maximæ , quam habet series BD in puncto I .
 Igitur , si velocitates in R , & I sunt æquales , est quoque
 æqualis tum iste , tum ille incrementorum pressio-
 nis cumu-
 lus , a quo eadem genitæ sunt , uti paullo ante collegimus .
 Igitur utraque pressio totalis , idest tum quæ in puncto R ,
 tum quæ in puncto I exercetur , est eodem symbolo p ex-
 primenda . Igitur puncta eadem R , & I homologa sunt ,
 & utriusque seriei elastra cuncta in hisce punctis eundem
 apertionis angulum obtinent . Atqui id impossibile est , cum
 punctum F , non vero punctum R , sit homologum puncto
 I . Ergo est etiam impossibile velocitates serierum in punctis
 R , & I esse æquales , inæquales vero in maximarum dila-
 tationum punctis homologis F , & I . Ergo ex ipsis leibni-
 tianorum principiis colligitur , velocitates , quas utraque
 series habet in quibuscumque homologis dilatationibus , esse
 æquales .

Videntur iam ergo bernulliani , suis ipsi rationibus du-
 cti , debere concedere , duas elastrorum series inæquales , si
 duos æquales globos urgeant , non solum pressiones , sed
 etiam velocitates habere æquales . Ex hoc autem facillime
 colligetur id , quod initio propositum fuit , idest duas ela-
 strorum series æquales , si globos inæquales urgeant veloci-
 tates iis tribuere massis ipsis reciproce proportionales . En
 quo modo id ostendatur .

Sit in *Fig. 2* series quælibet , verbi gratia ex tribus
 ela-

elastris constans. Resiliat eadem ex utraque parte, & protrudat duo mobilia, B unius libræ, A duarum. Resiliente serie, punctum C sit centrum gravitatis. Sit porro alia series priori æqualis, idest trium elastrorum, utrinque ipsa quoque resiliens, protrudensque duo mobilia E, & D, priorum dupla, videlicet mobile E sit mobilis A duplum, & proinde quadrilibre; mobile D sit duplum mobilis B, & proinde bilibre; quo factò duo mobilia A, & D erunt æqualia. Huius autem novæ seriei centrum gravitatis sit punctum K.

Docet idem doctissimus Bernullius in ea lipsiensi dissertatione, de qua supra, seriebus evolventibus se se, velocitates a mobilibus acceptas, fore in ratione reciproca massarum eorundem mobilium, & centra gravitatis toto dilatationis curriculo fore omnino quiescentia. Igitur si velocitas mobilis B sit 1, velocitas mobilis A erit $\frac{1}{2}$, & hanc eandem rationem, idest, 1 ad $\frac{1}{2}$, habebit velocitas mobilis D ad velocitatem mobilis E. Iam cum puncta C, & K in toto dilatationis tempore immota maneant, ea sic habentur a bernullianis, quasi duobus adactis clavis inibi infixæ detinerentur; essentque propterea unius seriei partes CA, CB tamquam duæ series innixæ in fulcro quodam immobili C, & similiter alterius seriei partes KE, KD tamquam series duæ in fulcro quodam immobili K innixæ.

Hic ergo erunt ex bernullianorum opinione duæ series inæquales CA, KD, illa unius elastri, hæc duorum, quæ duos globos æquales A, & D pellent. Igitur ex ipsorum quoque opinione, ut supra ostendimus, harum serierum CA, KD velocitates æquales erunt; ac cum velocitas globi A, si comparetur cum velocitate globi B, sit $\frac{1}{2}$, etiam velocitas globi D erit $\frac{1}{2}$, si comparetur cum eadem velocitate globi B. His ita se habentibus, si iam comparentur bina quæque mobilia, quæ ab æquali elastrorum numero pelluntur, exempli gratia duo B, & D, quæ singula a duobus elastris pelluntur, itemque duo A, & E, quæ singula pelluntur ab uno elastro, eorum velocitates invenientur habere rationem massarum reciprocam. Scilicet mobile A, quod subduplum est mobilis E, habet velocitatem huius duplam; est enim illius velocitas $\frac{1}{2}$; huius vero, idest mobilis E, velocitas est $\frac{1}{4}$. Similiter mobile B, quod subduplum est mobi-

lis D , habet velocitatem huius duplam; illud enim habet velocitatem 1 ; hoc vero, idest D , habet velocitatem $\frac{1}{2}$. Videntur ergo, series duæ æquales, si globos inæquales pelant, velocitates iis tribuere, non massarum radicibus, sed massis ipsis reciproce proportionales.

Idque cum ex ipsis bernullianorum principiis statim, nec obscure, ducatur, nihil fane erat, cur eo in loco demonstraretur, ubi sermo esset maxime cum bernullianis. Intelligitis profecto, Sodales ornatissimi, quo hæc spectent; eo nempe, ut argumenta cognoscatis, quibus Heraclitus ille tueri se possit, qui olim cum Francisco Maria Zanotto (sic enim fert dialogus) in academia vestra de viribus vivis disputavit. Quæ ego argumenta colligere volui, ne viderer me ipse deseruisse; utinam vero ut Heracliti illius sententiam tueri, sic etiam elegantiam, & venustatem imitari possem.

Fig. 1.






Fig. 2.



THOMAE LAGHII

De rubentibus lignorum cineribus.

QUamquam de rubentibus quorundam lignorum cineribus vobiscum dicturus, plane intelligam rem me afferre, natura fortasse sua parvi faciendam, eamque quibusdam vix experimentis tentatam, non absolutam propterea, atque perfectam, quemadmodum pro loci huius dignitate cupiebam ipse vehementer; facile tamen, ut spero, ignoscent mihi humaniores Physici, qui nihil despiciendum ducunt, ac conatus omnes libenter amplectuntur, & probant.

Huiusmodi itaque cineres, quos mihi primum observare contigit, ac simul lignum, e quo, dum comburitur, capiuntur, Franciscus Vandellus spectatissimus Sodalis noster autumnus proxime elapso sumpserat ab amico ruri per id tempus degenti prope oppidum apud vulgus *vergato* dictum, ubi casu repertum fuerat inter frusta illa lignea, quæ rhenus ab altioribus montibus in magnis alluvionibus secum vehit, ac post aquarum detumescientiam hic, illic ad ripas demittit, quæque a pauperibus eius regionis incolis ad hyemis iniurias arcendas colligi solent, & maturius etiam, si opus fuerit, igniri. Cum autem de insolita hac cinerum specie admonitus essem, rei novitatem magnopere admiranti mihi lignum, suosque cineres præ sua comitate dono dedit laudatus Vandellus, ut si quid in illud, ac cineres experiri vellem, esset integrum. Antequam vero quidquam molirer, cogitare cœpi num ad alnum, aut fagum, vel abietem, vel populum, vel aliam quamvis earum arborum, quas rhenus in iis montibus tangit, explorandum lignum referri posset, sed neque mihi, quod nihil duco, neque aliis vel peritissimis botanicis datum fuit quidquam de eo decernere, præter id unum: lignum illud diu sub aquis, ac terra delituisse, ab iis aquis ita ablutum, plurimum substantiæ suæ amisisse,
alie.

alienaque imbuisse principia, ut hinc calore solis exsiccatum, fuscum, squammosum, rarum suam omnem veterem formam exuerit.

Interea dum mecum animo pervolverem, utrum rubros cineres largiendi facultas tantum esset huiusce peculiaris ligni, an & aliorum (modo ab aquis similiter vexarentur) accepi a clarissimo Galeatio idem cuidam quoque ligno e paludosis locis educto evenisse, itemque multis ab hinc annis ad egregiam mulierem Lauram Bassiam tantillum alterius ligni, sive potius radicis eadem virtute præditæ delatum fuisse; cuius radicis ut ipsa periculum fecit, sic aliis experimentis nostris tantæ mulieris auctoritas maiorem fidem adiungit.

Iam ergo ut rem totam vobis aperiam, utrumque lignum, montanum videlicet & palustre, ad examen revocavi, quoniam huius participem me esse voluit humanissimus Galeatius. Videbatur hoc fibrarum suarum textura a montano differre; erat tamen æque ac alterum subnigrum, at aliquanto ponderosius, quod mire consentit cum colorum discrimine, quem ipsi cineres invicem collati præferebant, iique ex simplici lignorum combustionibus elicitis; nam quos montanum lignum reliquerat, vividiori rubedine nitebant, quos palustre, saturatiori; verum hoc discrimen tanti non est faciendum, ut quæ causa cineres illos, non hos etiam rubore inficiat; in quam quidem causam inquirenti industriæ, & laboris aliquid subeundum; neque enim in solo cinerum aspectu erat conquiescendum. Rogavimus propterea Iacobum Zanonum chemicum, ut scitis, præstantem, ut suam nobis operam suppeditaret in iis experimentorum generibus, quæ inire diligenter volebamus; ac primum, ut coniecimus & ligna diutissime in aquis detenta partem eorum principiorum, quibus ditantur, amisisse, & nova inde arripuisse, ligna ipsa destillationi commisimus, ut quidquid intus in illis abscondebatur, analysis admoneret.

Quinque drachmæ montani ligni retortæ inditæ liquorem primo aqueum largitæ sunt; postmodum ascenderunt fumi totum vas obnubilantes; tandem igne multum aucto secutum est oleum crassum, densum, & nigricans: refrigeratis vasis, apertoque recipiente erupit odor omnino similis illi, quem omnia ligna destillata emittunt; liquor si
degu-

de gustaretur, acidulus, ac fere acetosus persentiebatur; oleum maximam partem fundum tenebat, præter tantillum, quod in liquore innatabat; liquoris pondus erat drachmarum circiter duarum; olei vix dimidiæ; residua massa, quæ in retortæ fundo continebatur instar carbonis, scrupuli pondus non excedebat.

Nunc ad lignum palustre: in huius destillatione servata est eadem quantitas, quæ supra; post destillationem id unum tantum discriminis repertum est, nempe plus olei ex hoc elicatum esse, quam ex montano, multoque copiosiores fumos exhalasse, sed albicantes, qui undequaque recipiens vas lacteo liquore obduxerant, ramificationes æmulante salis volatilæ animalis, quique liquor in oleum resolutus est.

Ex memorata destillatione illud colligitur, Zanono ipso monente, minus olei, & salini phlegmatis in hisce lignis deprehendi, quam ab aliis naturaliter se habentibus æqua portione destillatis obtineri soleat, etsi alterum ex his lignis plus altero eiusdem olei ostenderit; sciendum enim, e reliquis lignis per destillationem oleum educi non modo copiosius, sed tenuius, & quasi subcæruleum, quod longe abest ab oleo prædicto.

Hactenus de activioribus principiis; reliquum erat, ut caput mortuum perlustrarem, in quo ruboris causam latere opinio fuit: quod igitur e montano ligno supererat, aperto igne calcinatum, abiit in calcem tenuissimam, & eleganter rubram, vel igne reverberato constantem, nec immutatam. Orta hinc suspicione colorem illum, ferreæ cuidam substantiæ, croci naturam adeptæ, ac calci admixtæ tribuendum esse, calcem illam magneti admovimus, at nullum ad magnetem ipsum motum edere conspeximus; ea vero sebi, vel alterius adipis additione denuo uita magnetis actioni paruit plurimas ferri micæ patefaciens, quod haud mirum videri debet, cum omnibus innotescat crocum martis nequaquam ad magnetem accurrere, nisi in genuinum ferrum reviviscat.

Non his contenti curavimus, ut prædictis cineribus lixivium pararetur, atque ad siccitatem redigeretur, eo videlicet consilio, ut cuius indolis foret quidquid in eo ab evaporatione resideret, tandem cognosceremus; reperta est terra quædam eiusdem coloris, & saporis, quem habet ea,
quæ

quæ inter solvendum, & cryſtallizandum vitriolum ſeparatur, idque pluries repetitum eſt eodem exitu; verumtamen, quod omnem dubitationem tollit: ſolutio gallæ eidem concretioni ſalino terreæ affuſa atramentum confecit.

Eadem porro methodo in paluſtris ligni caput mortuum inquiſivimus, nihil tamen in eo rubedinis detectum eſt, & quamvis igne multoties vexaremus, colorem atrum perpetuo retinuit. Ceſſit mihi res hæc præter expectationem, eaque ſollicitum me habuit; ægre quippe ferebam lignum, quod ſtatim concrematum cineres parit rubedine tinctos, non item eos parere poſt deſtillationem, quemadmodum in priori illo experti fuimus; unde nam quaſo peti debet tanta hæc varietas non ferenda? Proclive eſt coniecere lignum hocce, ſi primum comburatur, applicito immediate igne oleum omne dimittere; deſtillationis autem ope non omni proſus ſpoliari; præſertim cum oleoſa materie, & quidem craſſiori, ditius altero ligno apparuerit; quin imò opinari licet, portionem eiufdem olei, quæ fert fortassis ligni huius conditio, portionem, inquam, eiufdem olei caloris vehementia agitati, commoti, atque repercuffi, tenacius capiti mortuo adhæſiſſe, illudque intimius pervafiſſe, adeout propterea ferruginea ipſius calcis ſubſtantia in crocum redigi nequiverit: revera admoto magnete protinus viſæ ſunt non paucæ calcis particulæ celeritate ſumma ſe ſe attollere, ſecus atque in rubefcentibus eiufdem ligni cineribus ſimplici uſtione paratis contingat, in quibus ſi minus nullæ, ut in priori cinere alterius ligni, multo ſaltem pauciores glebæ magnetis nutui obſequuntur. Coniectura hæc, quæcumque fuerit, videtur quoque ad illud intelligendum accommodata, cur ſalinum concrementum e lixivio ſimiliter confecto elicatum, mediæ potius naturæ, quam vitriolicæ perciperetur, quod a ſolutione gallæ nullatenus attingebatur.

Utcumque vero ſe res habeat, tuto affirmare poſſumus rubedinem eam, qua huiusmodi cineres ſive obſcuriori, ſive nitidiori donantur, ad calcem quamdam ferream referendam eſſe, cum in ſingulis & ferreum, & vitriolicum principium latere investigationes noſtræ declaraverint. Vitriolum, quod in terræ venis abunde reperitur, cuiusque naturalis basis eſt ferrum, quis inficiabitur, modo in aqua ſolvatur,

vatur, sibi viam sternere in ligni fibras posse, ac ideo martem sub ea forma lignum undique pervadere? maxime quia innumeris observationibus constat, non parum vitrioli martis in plerisque corporibus, ac potissimum vegetabilibus adesse, ad ipsos plantarum ramos, imo ad subtilissima florum stamina distributum. Quod si lignum, longissimo tempore sub terris degens, continenter aquis ablutum, magna fuorum principiorum parte privetur, aptius forsitan evadet ad vitriolicum salem uberius arripiendum, atque ad illam proprietatem induendam, quam in expositis lignis admiramur.

Quoniam vero crocus martis nullam ab acidis alterationem patitur, in hoc etiam hi cineres sequi videntur rationem croci; nam iis instillato nitri spiritu nulla effervescencia suborta est; nulla etiam oleo tartari, quemadmodum nulla coloris mutatio per sirupum violarum, inditio fati manifesto neque quidquam acidi, aut alkalici saltem evoluti memoratos cineres complecti; solutio quoque alumini (ne hanc reticeamus) nativum suum ruborem haud reddidit elegantiozem. Nimius essem, si quæcumque super hac re institui experimenta vobis enarrarem; recitabo tantum aliqua, quæ in ea me opinione firmiorem reddunt, non esse ad phænomeni huius intelligentiam a calce ferrea descendendum.

Lithantracem concremare feci, ex quo cineres dumtaxat nigricantes obtinuimus; quamquam ex hoc quoque rubentes cineres elicitos interdum fuisse accepimus; nempe cum esset eisdem illis imbutus principiis, quibus memorata ligna imbuuntur. E radice rubiæ, & ligno campestrano, atque indico, corporibus iam de se rubentibus, cineres subalbidi prodierunt. Ne autem observationibus nostris quidquam deesset, quod propius ad naturæ imitationem accederet, communibus cineribus sæpius elotis, ac de integro calcinatis adhuc albidis, nec ferruginea materia auctis, modicam vitrioli portionem adiecimus, nempe suboctuplam, ac peracta denuo calcinatione vidimus eos cineres coloris fusci ad rubrum tamen vergentis, multisque ferreis particulis præditos; eosdem sulphuri admixtos albidiores conspeximus, tandem alumini nulla coloris extenuatione.

A cineribus ad ligna ventum est: periclitari placuit in
T. II. P. III. E e e alno,

alno, in populo, in iunipero, in opio, aliisque. Ebullita hæc ligna pluries in aqua simplici, tum in aqua, quæ tartarum dissolverat, in suis cineribus nihil præbuerunt memoratu dignum; ne alnus quidem, quamvis id lignum natura sua rubescat. Horum lignorum omnium fructa, quæ ebullire fecimus in aqua solutione vitrioli imbuta, haud videbantur negligenda; colorem enim prope nigrum adeptæ fuerant, quo lignum casu inventum æmulabantur; cuius coloris causam ex vitriolo, & facultate in lignis adstringente instar gallæ proficisci nemo negaverit. Fecit id, ut spe aliqua duceremur esse nos horum ligneorum frustulorum cineres aliquanto similes iis, de quibus hætenus locuti sumus, reperiendos; neque spem eventus fefellit, nam hi cineres a rubiginis colore parum recesserunt; cur non autem accessissent magis ad illos, si diutius ligna in eadem aqua ebullissent, si per repetitas calidæ ablutiones partem suorum principiorum amisissent, si demum rariora, & spongiosiora evasissent?

Quæ cum ita sint, Viri doctissimi, procul ne a vero aberit, qui philosophetur ligna quævis sic disposita, & præparata posse ad cineres rubros edendos aptissima fieri? Equidem, si meum in hac controversia iudicium interpone-re liceat, non improbabile censeo; hæc tamen aptitudinem si minus æque in omnibus agnoverimus, discriminis quod erit, culpanda potius aut ligni structura, aut terræ, vel aquarum alluentium conditio, aut denique aliud in aliis temporis spatium, quo ibi detenta fuerint, quam opinio hæc reiicienda; enimvero ex lignis, quorum exemplum vestris oculis subiicimus, palustre suarum partium textura alienum esse videtur a montano: cineres habet non eodem rubedinis gradu nitentes, ponderosiores, ferreis particulis tum ante, tum post admixtam pinguedinem, flammisque subinde absumptam ditiores; illud præterea, quod a lectissima muliere Laura Bassi accepimus, compactius est, ac subluteum, cineresque suos, quos primum ad rubedinem tendentes impertiebatur, cœpit modo flavescentes manifestare, quod nullam movet admirationem, cum calx ferrea modo rubra esse soleat, modo flava, cuiusmodi apparet ochra vulgaris, atque eo magis, quod qui color ruber in nostris hisce cineribus manifesto se prodit, ad colorem intense flavum videtur prorsus pertinere.

Num

Num autem futurum sit, ut aliqua coloris mutatio & prædictis lignis a nobis exploratis veterascendo contingat, id temporis diuturnitas docebit. Nunc certe firmum illud, ratumque est, huiusmodi cineres colore suo non multum a vitrioli colcotare, aut croco martis, ut cuilibet eos inspicienti patebit, discrepare.

Antequam finem dicendi faciam, postremo monendi estis, periclitari nos voluisse, an iisdem cineribus pigmentum confici posset colorandis corporibus idoneum. Videbam enim rem me allaturum, quæ & iucunditate præstaret aliqua, nec utilitate prorsus careret, in quam præcipue studiis nostris contendimus. Cum ergo obduxissem eo pigmento tantillum ligni, obtentus est rubor non inelegans; excitatus porro sum ad id præstandum ex eo, quod rubrica, qua utuntur mechanici ad id coloris genus rebus plurimis inferendum, nihil aliud sit, quam concretum quoddam terreo martiale, non secus ac cineres nostri, ad quos ut idem munus commode transferatur, nonnisi sufficiens eorum copia nobis suppeditanda.

Habetis observationes eas, quas super his cineribus præstiti, quasque eo libentius suscepi vobiscum communicandas, quo mihi omnino novum acciderat ligna diutissime sub aquis, & terris degentia vitriolicos sales copiosius imbibere, itaut tandem rubedo eorum cineribus infideat; quod ut semper admiratione dignum est, multo tamen est magis, id in agro bononiensi repertum esse, ubi vitriolum ipsum non effoditur.

CAIETANI MONTII

*De Aldrovandia novo herba palustris
genere.*

QUum experimenta quædam de rebus chymicis, quæ
 haud ita pridem tentare exorsus sum, nondum eo
 sint perducta, ut commode ad academiam deferri
 possint; id mihi a vobis facile concessum iri existi-
 mo, ut eorum loco ex botanicis aliquid proponam; de-
 scriptionem videlicet, ac imaginem plantæ cuiusdam, in pa-
 ludibus agri bononiensis sponte nascentis, in iisque cum
 flore, ac fructu primum repertæ. Hæc fere pro nova haberi
 potest, licet eam videatur Leonardus Plukenetius britan-
 nus; in sua Phytographia, sub finem præteriti seculi com-
 memorasse: sed indicam ille stirpem esse non italicam di-
 xit; folia etiam sic parum accurate expressit in imagine,
 ut locum reliquerit dubitandi, utrum ea, quam ipse lenti-
 culam palustrem indicam appellat, cum planta, quam de-
 scribere ingredimur, eadem sit: præterea floris, aut fructus
 nulla vel ab ipso, vel ab alio quovis mentio illata est; ita
 ad quod genus proprie referenda sit, quove nomine appel-
 landa; quum & nominis, & generis determinatio a flore, ac
 fructu peti debeant, constare adhuc non potuit. Nos &
 florem primi, & fructum vidimus; quorum ex attenta inspe-
 ctione perspeximus sui generis plantam esse, novo propte-
 rea designandam nomine: quippe manifestum est lenticulis
 palustribus, quæ flores vel nullos, vel admodum imperfe-
 ctos gignunt, adnumerandam non esse; a quibus si merito
 exclusæ sunt a botanicis & quadrifolia dicta, & patavina;
 multo hæc magis eximi debet, quæ flores petaloidos gerit,
 ac perfectissimos. Fecimus igitur pro iure quodam nostro,
 ut novum plantæ minus cognitæ, & a nobis ad certum ge-
 nus relatæ imponeremus nomen: præsertim quod non modo
 floris, fructusque conformatio, sed & habitus, & figura to-
 tius

tius plantæ, ad nullam ex vulgo cognitis accedens, idipsum a nobis postulare videbatur. Et quoniam hæc semper inter botanicos consuetudo fuerat, ut clarorum virorum nomina, qui in hac facultate excelluissent ad plantas ipsas traducerentur, quemadmodum priscis temporibus in Pæonia, in Euphorbio, in Gentiana, in Eupatorio, ut recentiori memoria in Cortusa, ac in aliis vero permultis hac nostra ætate factum est, quum horti publici bononiensis conditori Ulyssi Aldrovando, egregio non philosopho solum, sed etiam botanico nondum hic honos habitus esset, meas partes esse putavi, occasione novi huius plantæ generis, memoriam civis nostri doctissimi, atque eruditissimi, cui & herbarum cognitio, & historia naturalis universa plurimum debet, hac etiam ratione ad posteros mandare.

Aldrovandiam itaque appellare volui hanc plantulam, id nomen commune faciens cum reliquis, si quæ forte flore, ac fructu convenientes, habitu vero externo ab ea non multum discrepantes alibi reperientur. Interea speciem illam, quam solam novi, paludum nostrarum incolam ad characterem huius generis definiendum adhibebo.

Primus qui hanc plantam apud nos, imo forte in europa universa invenit, Ioannes Carolus Amadeus fuit, medicus bononiensis, quem plerique ex nobis meminisse possumus, vir antiqua morum simplicitate, doctrinæ cultor non indiligens, in herbarum vero cognitione, quam a Iacobo Zanonio celebri botanico adolescentulus acceperat, & qua usque ad senectutem mirifice semper delectatus est, longe excellens. Inter ceteras illius laudes hanc prope singularem, ac vere illius propriam, commemorare possum, quod in seminibus contemplandis, ac microscopio subiiciendis ita exercitatus fuit, ut vel minimo quovis granulo oblato, pro certo affirmare posset huius esse, sive illius plantæ semen, in eoque iudicio ferendo vix umquam falleretur, quod sane in varietate propemodum infinita, exilitate vero plerumque summa permagnum est; adeo ut iure id mihi affirmare posse videar, in huiusmodi cognitione parem illi fuisse neminem. Is igitur, quem dixi, Amadeus, quum Butrii, agri bononiensis oppido, medicinæ faciendæ causa habitaret, inde sæpe ad vicinas Dulioli paludes proficiscebatur, ad aquaticas herbas, quibus ea loca abundant,
& qua-

& quarum, ut dixi, studiosissimus erat, perquirendas. Ibi tum primum hæc illi occurrit, de qua nunc agimus, aquis ut plurimum submersa, singulari foliorum structura, ac situ a reliquis omnibus, quas ipse noverat, vel quarum imagines in libris conspexerat, longe discrepans.

Nec vero dubitasset eam statim pro nova in vulgus edere, sed morabatur ipsum, quod flores, ac fructus, quos videlicet rarissime profert, nondum viderat. Specimina interim exsiccata ad Lælium Triumphettum rem herbariam tunc apud nos publice profitentem, & ad parentem nostrum, & ad alios etiam extra hanc urbem botanicos mittebat, eorumque opinionem sciscitabatur. Respondebant illi novam re ipsa videri plantam, nisi forte lenticula illa esset a Plukenetio in phytographia, & almagesto botanico, qui libri tum primum Bononiam advecti fuerant, commemorata. Non cessabat Amadeus omnem operam ponere ad flores, fructusque investigandos, sed incassum. Relicto postea domicilio, quod per aliquot annos Butrii habuerat, Bononiam se recepit, ubi quum esset, non amplius ea loca tam frequenter adeundi, quam res postulabat, facultatem habuit.

Post Amadei mortem, quum & palustrem agri nostri tractum plus semel peragrando opportunitas nobis data fuerit, cumque ex iis locis in horti publici usum herbæ variæ palustres sæpe ad nos afferri consueverint, in his plantulam istam cum fructibus, imo & floribus quibusdam subclausis, insperantibus nobis fortuna obiecit; quos ut etiam expansos intueremur, in testa florali limosa terra & aqua repleta per aliquot dies soli expositam aluimus, pluries quotidie observantes, ne forte occasio nos fugeret, si ex iis flores essent, qui brevissimo tempore permanent aperti. Hac diligentia adhibita integri, perfectique floris veram formam tandem aspeximus, ex eaque & genus constituimus, & plantæ totius descriptionem, quæ adhuc nulla erat, concinnavimus: neque eo contenti, cum essent multa, quæ difficillime verbis exprimi possent, imaginem quoque a perito artifice effingi curavimus, quam imaginem in exposita tabula habetis.

Aldrovandia, ut aliæ multæ, inter palustres herbas aquis perpetuo mergitur, quarum tamen a superficie aliquando

quando sic parum abest, ut omnino supernatare videatur. Nec vero radicum capillamenta subiecto fundo infixæ facile invenias, sed plane fluitantia, quamquam re vera non in profundis stagnorum æquoribus, sed in limosis herbosisque marginibus herba hæc plurimum reperiri solet. Caule plerumque constat simplici, dodrantali, interdum etiam duplici, unicum videlicet ramulum proferente, qui semper brevissimus est, ac singularis, neque usquam scapi, ex quo emergit, longitudinem exæquat. Articuli & in cauli, & in ramo, si adsit, crebri sunt, & conferti, quibus septem, octo, vel novem inhærent folia in orbem radiorum instar disposita, ut in rubiis, sed crassiuscula, intus veluti spongiosa, ad eam partem, qua geniculo annectuntur, angustiora; ad alteram vero in latitudinem sensim se expandentia, in extremo veluti retusa, in sex tamen virides barbularum desinentia. In barbularum medio folliculus oblique appenditur, singularis omnino structuræ, ex orbiculari constans membrana, in semicirculi formam sic complicata, ut ventricosus ille quidem, ac subtumidus, sed margine tamen presso, & connivente, quasi crista quadam ad alteram partem circumdatus appareat. Huic similis nihil cogitare potui, quam ossas illas frixas, quæ ieiunii quadragesimalis tempore, ex complanatæ pastæ orbiculo duplicato, dulcem intus massam recondentes confici solent; quæ si vacuæ simul ac tumentes concipiantur, verissimam istius folliculi ideam repræsentabunt. Folliculi, ut dixi, oblique insident foliis, inter medias barbularum, omnes eodem obliquitatis angulo, & crista in omnibus ad eandem partem versa, ita ut quilibet articulus cum adhærentibus foliis a scapo avulsus molendini rotam præferat, foliis nimirum rotæ singulos radios, utriculis vero situlas aquam ex alto cadentem excipientes perbelle repræsentantibus. Augusto mense flores istius herbæ apparent, sed rarissime, quæ causa fuit, cur diligentissimum quoque latuerint Amadeum. Producit autem quilibet scapus non amplius quam binos, vel ternos ad summum, longis insidentes pedunculis; qui pedunculi radiatim, ut modo dictum est, folia circumstant, ea lege, ut qui articuli hos pedunculos proferunt, numquam inter se proximi sint, sæpius valde remoti, haud raro alter in medio scapo, alter in laterali ramulo: ubicumque tamen sint pedunculi isti fo-

lia,

lia, inter quæ nascuntur, longitudine superant, ita ut flores, quos sustinent, non facile sub iisdem foliis delitescant. Flores ipsi calyce constant quinquepartito, profunde secto, viridi, crasso, non deciduo: petala pariter quinque sunt, longiuscula, acuminata, ex albo viridia, eiusdem fere longitudinis, ac laciniæ calycis, vel non multo minora, quæ si vi diducantur (raro enim is flos sua sponte omnino expanditur) orbem constituunt, cuius diameter fere lineæ duæ. Medium florem occupat embryo, sive pistillus a Tournefortio sic appellatus, sphaericæ figuræ, pro floris ratione grandiusculus, cuius vertici quinque tubæ incurvæ, breves, candidæ affiguntur; totidem vero stamina æqualis longitudinis flavos apices, sive antheras sustinentia circumposita sunt. His marcescentibus una cum petalis, embryo succrescit, calyce superstite, fitque globosus fructus piperis granum fere adæquans, in quo tamen subobscura quinque angulorum notari possunt vestigia. Interior unica est cavitas, semina continens vix umquam plura quam decem, nigra, minuta, longiuscula, internoque fructus parieti, quod in paucis contingit, affixa.

Quoniam vero hæc planta, uti diximus, raro florescit, fructusque fert, alia ratione propagationi illius consuluit natura: nempe ad extremos caules, & ramulos, sub autumnii finem, germina enascuntur, ut in aliis quibusdam herbis palustribus; quæ ex foliis convolutis, arctèque complicatis constant. Germina hæc hiemis initio, corruptis ceteris plantæ partibus, fundum petunt, ac sub glacie servantur, usque ad novum veris adventum; quo tempore folis calore aquis tepescentibus sensim relaxata, in plantas eiusdem speciei brevi adolefcunt; exque, utriculis foliorum contento intus aere paulatim se expandentibus, ad superficiem aquæ feruntur. Hæc propagationis ratio simillima est illi, quæ in multis herbis per bulbos fit; in arboribus vero per gemmas aliquando & furculos. Quando huius plantæ virentis mihi copia erat, saporem, odoremque explorare volui, & sapor quidem initio mihi subdulcis, amarus postea, & austerus visus est, odor nullus, nisi quem palustres herbæ prope omnes ab originis loco mutuuntur. Hoc re vera singulare est in hac planta, quod etsi tam recens, quam sicca tota viridis est, si tamen comprimatur inter duo chartacea

tacea folia, ut botanicorum mos est, exsiccanda, notam utrique rubentem imprimit, formam totius plantæ, singularumque illius partium haud obscure repræsentantem; neque in primis dumtaxat chartis, quas herba contingit rubere ille consistit color, sed ad multas etiam penetrat ex inferioribus, imo quod est mirabilius, id evenit, etiam si non recens herba, sed multis ante mensibus exsiccata chartis interponatur; quod cum etiam præstet rocella tinctoria, qua infectores utuntur ad lanas colore subpurpureo tingendas, & est lichenis orientalis species quædam; locus relinqui videtur coniecturæ in hac nostra palustri herbula utilitatem latere pro arte tinctoria. Sed hoc alias viderim, ubi examen, quod adhuc non licuit, instituere datum erit.

Unum est, quod ex me postulari video, ut aperiam sententiam meam, an putem eandem esse aldrovandiam nostram cum lenticula illa plukenetiana, quod olim Lælium Triumphettum, ac parentem nostrum, Amadeo adhuc vivo, suspicatos esse dixi: certe si id, quod sentio, libere fateri debeo, rem ita se habere prorsus existimo: fidem enim faciunt & habitus externus, qui in utraque idem est, in alia vero ex cognitis plantis prorsus nulla; & ramulus unicus lateralis, & folia circa scapos conferta, & barbula foliis permixta. Obstet sane, quis neget, quod Plukenetius lenticulam suam indicam nominat, & quod in imagine non folia angusta in sex barbulas desinentia cum appenso folliculo ostendit, sed folia prope subrotunda, gemina tantum barbula ad basim instructa. Ceterum cum plane inter omnes constet auctorem istum plerasque ex plantis, quarum imagines dedit, non virides, aut recentes vidisse usquam, sed ex variis regionibus exsiccatas studiosissime congeffisse, ac in tabulis delineasse, nihil facilius evenire potuit, quam ut hanc plantam cum aliis palustribus ex italia fortasse acceperit, eamque, amissa scheda originis locum denotante, ut indicas habebat alias prope innumerabiles, indicam pariter reputaverit: nisi forte existimare malimus, sponte nasci hanc plantam non in italia solum, sed etiam in india: quod vero ad errorem in foliis attinet, hunc etiam video ex hoc, quod siccatum ramulum depinxerit, existere potuisse.

Nihil autem in hac re maioris momenti est, quam auctoritas viri clarissimi Ioannis Iacobi Dilleni, quem inter principes nostræ ætatis botanicos vere mihi videor commemorare posse; is cum in perficiendo universali plantarum nomenclatore, sive ut aiunt pinace, quem clarissimus vir Guilielmus Sherardus exorsus fuerat, atque eius rei causa immensam ab eodem Sherardo oxoniensi academix relictam supellectilem excusserit, autographos videlicet botanicorum codices, exemplaria plantarum sicca fere innumera, tum ab aliis, tum ab iis, qui ante ipsum in anglia vixerant, botanicis, quorum ex numero Plukenetius fuit, ingenti studio collecta; tamen de hac ipsa planta per literas a parente meo, qui etiam exemplar illius ad eum miserat, rogatus quid sentiret, non dubitavit pro certo asserere eandem esse cum lenticula plukenetiana. Neque ob id tamen Amadeus noster sua laude fraudandus est; primus enim ubi sua sponte hæc planta nasceretur, invenit, primus vegetandi modum, & ordinem perspexit, primus veram illius partium structuram, ut botanicum decet, accurate cognovit: is denique fuit, qui cum & locum, & tempus, & alia, quæ ad ipsam pertinent, diligenter notasset, facilem nobis expeditamque reliquit viam, ut floribus etiam, ac fructibus, qui ipsum fugerant, compertis plenam, absolutamque illius cognitionem botanicis traderemus: in quo illud percommode cecidit, ut decus illud, quod celeberrimi Aldrovandi memoriæ iampridem debebatur, a nobis redderetur. Enim vero sæpe miratus fueram, quod cum in americanis stirpibus designandis omnia ferme illustrium botanicorum nomina collegisset Plumerius, ex iisque & Bauhinam fecisset, & Matthiolam, & Clusiam, & alias longe multas; si quæ autem ab eo forte præterita essent, Michelius, Houstonus, Gronovius, Linnæus ad novorum, quæ ipsi instituerant, generum denominationem usurpassent; de Aldrovando nostro in mentem venisset nemini, sed nimirum illi ex operibus editis tantum botanicum fuisse, quantus re vera fuit, iudicare non potuerunt. Nos autem qui & bibliothecam illius amplissimam vidimus, huic instituto nuper adiunctam, & libros permultos, quos de plantis editurus erat, & tabulas incisas, quas pro iis libris comparaverat: & volumina stirpium exsiccatarum sexdecim, in quibus nulla ferme, quæ

iis temporibus cognita esset, desideratur, facile intelligere potuimus ad ceteras summi viri laudes hanc etiam accessisse, ut in clarissimis illius ætatis botanicis posset numerari; & sane ut talem agnoverunt, & in suis operibus deprædicant Matthiolus, Gesnerus, Bauhinus uterque, Clusius, Lobelius, Marantha, aliique non pauci, quibuscum ille studiorum communione iunctus fuit, quique omnes amicum & fautorem, plerique etiam præceptorem appellant suum. Igitur si vel maxime Carolo Linnæo assentiamur, qui vetas plantis imponi a viris nomina, etiam eruditione præstantibus, nisi in re potissimum herbaria excelluerint; hunc tamen honorem Aldrovando non denegabimus, qui non solum omni doctrinæ genere expolitus fuit, sed & singularem quoque sibi inter botanicos laudem promeruit.

FIGURARUM EXPLICATIO.

- Fig. a.* **P**lanta cum floribus, fructibusque delineata.
b. Folia radiatim circa geniculum disposita.
c. Folium cum appenso folliculo microscopio conspectum.
d. Idem detracto folliculo.
e. Folliculus a folio separatus.
f. Idem vi apertus, ac diductus.
g. Flores quales per microscopium nonnihil maiores apparent.
h. Fructus, ex quo aperto prodeunt semina.



g. TILP. III.

FRANCISCI MARIAE ZANOTTI

De elastris.

SERMO PRIMUS.

MInime vereor, Sodales optimi, ne cum elastrorum naturam explicare ingrediar, si me dixero timide admodum ad disputandum accedere, id magis exordii causa videar dicere, quam ex animo. Scitis enim, rem esse perdifficilem, quam etiam, audacia nescio qua mea, feci ipse difficiliorem. Etenim cum sæpe ex vobis audivissem, & quid Bernullius in lipsiensibus actis anni millesimi septingentesimi trigesimi quinti; & quid in actis academix parisiensis anni millesimi septingentesimi octavi & vicesimi super eadem re Camusius tradidisset; eosque intellexissem non directis rationibus, sed, ut magno ingenio sunt homines, longe petitis, maximeque contortis, uti; mihi autem nec otii ad subtilitates tantas perquirendas, nec valetudinis fatis esset, consilium cepi æque commodum, atque audax. Volui quippe quaestionem eandem nullo auctore, magistro nullo, nullo duce, ingredi, & in rem ipsam directe intuens, sola ratione ductus, quid in ea possem, experiri; sperabam enim fore, ut si omnia quam diligentissime circumspexissem, in eas tandem sententias mea sponte laberer, ad quas illorum me invitabat auctoritas. Qua in re, ut in aliis sæpe multis, fefellit me ratio, & quo nolebam, adduxit. Nam cum mihi diu fatis indulgissem, meque ad auctores, a quibus discesseram, revocasssem, plane sensi, me, quamvis eadem, quæ illi, supposuissem, ac de multis inter nos conveniret, in eos tamen incidisse locos, in quibus permagna esset dissensio. Atque ego quidem ab opinionibus meis destitisssem, si auctoritate vinci maluissem, quam ratione; sed credo, ne illos quidem

dem voluisse auctoritate vincere. Eas ergo vobis exponam, ac cum ad locos venero, qui maxime in quaestione sunt, monebo, remque totam iudicio vestro committam; modo illud memineritis, rem hic tantum inspiciendam esse, auctoritate nihil agendum; hac enim si agatur, quis ego sum, quem quisquam cum Camusio, aut Bernullio comparet; hominibus auctoritate tanta, ut vel hac una persuadere possint quidlibet? Hinc autem totius sermonis nascetur exordium.

Definitiones & assumta.

Elastrum cum dico, intelligi volo angulum æqualia crura habentem, qui si claudatur, constringaturve, sibi que postea relinquatur, sua se sponte aperiat. Dilatationem illam, in qua elastrum quiescit sua sponte, voco dilatationem naturalem.

Quod si de multis elastris sermo fuerit, similia inter se omnia esse putabo, & omnino æqualia, ut neque crurum longitudine, neque vi sese aperiendi quidquam differant.

Neque vero in his materiæ, aut massæ pondus considerabo; & omnino sic differam, quasi elastrorum massa ad id, quod quaeritur, nihil faceret; quod quidem & illi fecerunt, qui adhuc de elastris differuerunt. Quapropter cum elastrum constrictum, sibi que relictum, ad dilatationem suam naturalem non nisi certo tempore perveniat, non id quidem propter massam fieri putandum est, quæ ipsum retardet, sed propter elasticitatis ipsius naturam, quæ id postulet.

Elastrorum seriem cum dicam, intelligam elastra plura, deinceps posita, & in eadem recta linea insistentia, ut extremis cruribus se mutuo contingant.

Elastrum quodlibet, sive quamlibet elastrorum seriem sic dilatari putabo, ut extrema crura per eandem lineam rectam toto relaxationis tempore ferantur.

Quod si elastrum, sive elastrorum series, ex neutra parte impediatur, quo minus relaxet sese, id elastrum, sive hanc seriem vocabo liberam, sin autem ex altera parte in obicem immobilem infigatur, ultra quem relaxare se

se

se nullo modo possit, elastrum infixum dicam, sive seriem infixam.

Quod si elastrum, aut elastrorum series, aperiendo se se, corpus aliquod pellat, ipsumque secum deferat, hoc elastrum, sive hanc seriem deferentem appellabo. Quæ nullum corpus deferunt, elastra sive series dicam sine adiuncto.

Harum ego vires explicans dicam breviter, & dilucide, quantum potero; an vere, vos videritis; sed nitar hoc etiam. Quod si cunctari interdum videbor, & in rebus singulis paullo diutius hære, quam isti solent, qui hæc profitentur; ex hoc ipso intelligetis, quanto studio ad veritatem contenderim; simulque dabitis hanc veniam homini non mathematico, rem difficillimam, & prope novam tractanti. Ut autem a simplicissimis exordiamur, dicam primum de elastro uno, eoque tum libero, tum infixo. Veniam postea ad series multorum.

De uno elastro vel libero, vel infixo.

Sit unum elastrum, idque liberum, ABC (*Fig. 1*), quod primum clausum sit, ut ambo eius crura BA, BC in unam lineam coeant BM; postea sibi relinquatur. Non est dubium, quin statim se aperiat, & iactans se se in utramque partem æquali vi ad naturalem dilatationem feratur. Dilatationem eius naturalem linea AC definio, quam linea BM mediam secat in M.

Ac tempus utique, quo elastrum ABC ad naturalem dilatationem pervenit, est illud ipsum tempus, quo punctum A percurrit lineam MA; nam eodem tempore etiam punctum C percurrit lineam MC; hisque duobus motibus naturalis dilatatio efficitur.

Sit iam unum elastrum, idque infixum, DEF (*Fig. 2*), quod scilicet extremum alterum D in obicem quemdam immobilem XZ infixum habeat. Sitque primum clausum, constrictumque totum in linea recta XZ; postea sibi relinquatur. Non est dubium, quin statim se aperiat, seseque totum iactans in partem alteram, ad naturalem dilatationem feratur. Dilatationem eius naturalem definio linea DF.

Porro

Porro tempus, quo elastrum DEF ad naturalem dilatationem pervenit, est illud ipsum tempus, quo punctum F percurrit totam lineam DF.

Iam vero si elastra duo, unum liberum ABC, alterum infixum DEF inter se comparentur, & dilatationum tempora quærantur, mihi verisimile valde est, utrumque illorum ad naturalem dilatationem pervenire æquali tempore. Cur enim non perveniant, cum & ipsa æqualia sint, & eadem elasticitatis vi polleant, ut idem plane effectus, nisi si quid obstet, in utroque pariter sequi debeat?

At, inquires, hoc ipsum obstat, quod elastrum ABC tantummodo dilatatur; elastrum vero DEF, præter quam quod dilatatur, progressivum etiam motum habet, deferturque totum ab linea XZ versus F; quapropter vis, qua agitur elastrum ABC, dilatationem tantum, vis vero, qua agitur elastrum DEF, non dilatationem tantum, sed etiam totius elastri progressionem debet parere, quarum alteram dum facit, retardatur in altera. Dilatationem ergo elastri DEF retardat elastrum ipsum DEF, quod ab elasticitate sua, qua dilatatur, deferri etiam totum debet in partem alteram.

Verum id totum nihil est. Quæ enim nullius massæ sunt, si ultro deferantur, vim deferentem nihil retardant; elastra autem nullius massæ esse ponuntur; ergo nihil retardant, etiamsi ultro deferantur. Nisi forte volumus, hominem aut ingeniosum, aut prudentem, aut temperantem in suo cursu retardari debere, propterea quod suum secum ingenium, aut prudentiam, aut temperantiam ferre debeat; quod si qui dixerit, rideatur; & ob id ipsum rideatur, quia neque ingenii, neque prudentiæ massa est ulla, neque temperantiæ. Ac ne a qualitatibus corporum discedam, quis putet, vim eam, qua corpus quodpiam aut rotundum, aut molle defertur, aut durum, ex eo retardari, quod simul cum corpore rotunditatem quoque eius, aut duritiem, aut mollitudinem ferre debeat? Hæc enim non ex iis rebus sunt, quæ massam habent; sed aliis categoriis subiiciuntur. Sed pressius agamus, ac rem totam concludamus paucis ad hunc modum. Res, quæ deferuntur, vi deferenti retardationem tanto minorem afferunt, quanto ipsæ minoris sunt massæ, ergo si elastra nullius massæ esse putantur, illud
etiam

etiam putandum est, nullam ab iis fieri, si quopiam deferrantur, retardationem.

His positis iam facile ostendam, in dilatationibus elastrorum ABC, DEF, velocitatem puncti F duplam esse velocitatis puncti C. Etenim cum ambo elastra ad naturalem dilatationem perveniant eodem tempore, sequitur, ut punctum F lineam DF, & punctum C lineam MC percurrant eodem tempore, ideoque velocitates habeant proportionales lineis DF, MC. Est autem DF æqualis lineæ AC, idest dupla lineæ MC; sequitur ergo, ut velocitas puncti F sit dupla velocitatis puncti C.

Haftenus de uno elastro dixi vel libero, vel infixo; nunc de multorum serie dicam. Exordiar autem a serie infixa, quippe quia motum absolutum in unam tantum partem habet, ideoque videtur esse simplicior.

De elastrorum serie infixa.

SIt series infixa AG (*Fig. 3*) elastrorum quotlibet ABC, CDE, EFG, quæ alterum extremum A infixum habeat in obicem immobilem XZ. Primum clausa & constricta sit tota in linea recta XZ. Postea sibi relinquatur. Dubium non est, quin ea statim se aperiat, seseque totam proiciat ab linea XZ versus G, usque eo dum ad naturalem dilatationem perveniat. Hanc dilatationem linea AG definie-
mus.

Quo modo dilatatio hæc fiat, & series tota se se explicet, paucis aperiam, & in omnibus veri similitudine quadam contentus ero. Evidentiam quærant, qui sibi plus confidunt.

Initio cum series tota clausa est, premunt se se mutuo elastra omnia æqualiter; quippe quia æquali elasticitate pollent omnia.

Postea cum libertas seriei datur ad partem alteram G, non est dubium, quin punctum G foras emicet, interim dum punctum E elastri EFG adhuc premit, & vim facit contra obicem XZ; dilatatur ergo statim elastrum EFG.

Porro dilatari elastrum EFG non potest, quin eodem tempore pressio eius contra elastrum CDE minuatur; est enim cuiusque elastri in maiori dilatatione pressio minor.

Non potest autem pressio elastri EFG minor fieri, quin eodem tempore elastro proximo CDE cedat; quod elastrum CDE, cedente illo, sequi debet, usque eo dilatans se se, ut pressiones utriusque elastri æquales semper inter se maneant.

Æquales autem manere pressiones non possunt, nisi si dilatationes quoque elastrorum æquales semper inter se sint; oportet igitur, ut aperiente, ac dilatante se se elastro EFG, aperiat se se eodem tempore, ac dilatet æqualiter elastrum proximum CDE.

Idemque transferri potest cum ad elastra alia, quibus series componitur, tum vero etiam ad dilatationes alias, quæ primam consecuntur. Quo apparet, & elastra omnia eodem tempore aperiri, & æqualibus temporibus æquales dilatationes obtinere, & eodem tempore ad naturalem dilatationem pervenire.

Quæ cum ita sint, manifestum est, puncta G, E, C, eodem tempore omnia, ab linea XZ discedere, ac sic progredi, ut intervalla GE, EC, CA inter se semper æqualia sint; quo fit, ut punctorum G, E, C velocitates non æquales sint inter se, sed proportionales lineis AG, AE, AC; quas puncta ipsa G, E, C percurrunt eodem tempore.

His omnibus illud etiam addo: Elastrum quodvis in serie positum ad naturalem dilatationem suam eodem tempore pervenit, quo ad eandem perveniret, si solum esset, & extra omnem seriem. Quod si in uno GFE manifestum fiat, erit idem manifestum & in aliis. Et vero elastrum GFE quid aliud habet ex aliorum, quæ ipsum infecuntur, coniunctione, & vicinia, nisi hoc unum, quod, dum dilatatur ipsum se se, deferatur ab illis ultro, & promovetur? Quis autem non videt, dilatationis tempus in elastro nihil mutari, ex eo, quod totum, dum dilatatur, deferatur alio? Nisi forte putamus, elastrum in navi positum alio tempore dilatari, si immobilis navis sedeat, alio, si aquarum cursu rapiatur.

Quod si ita est, oportet iam seriem quamvis infixam, cuiuscumque sit longitudinis, sive quocumque elastrorum numero constet, eodem semper tempore ad naturalem dilatationem pervenire; quippe cum elastra eius omnia, quot-

quotcumque sunt, ad naturalem dilatationem perveniant eodem tempore, quo unumquodque illorum ad eam perveniret, si solum esset, & in nullam seriem implicitum.

Atque his denique rebus fit, ut velocitas extremi puncti G tanto sit maior, quanto longior est series, sive quanto plura sunt elastra. Etenim cum quævis series ad naturalem suam dilatationem perveniat eodem tempore, sequitur in quavis serie, ut punctum extremum G totam lineam AG percurrat eodem tempore; ideoque eius velocitas tanto sit maior, quanto hæc linea longior est, idest quanto longior est series, sive quanto plura sunt elastra.

Idque sane rationi consentaneum videtur; nam cum omnia elastra in unum punctum G nitantur, facile apparet, tanto id punctum velocius esse debere, quanto elastra ipsa sunt plura.

Infixas series adhuc consideravi, quas explicans mihi videor quodammodo etiam liberas explicasse; quod facile intelligetis, si modo prius cognoscatis, seriem quamque liberam, dum aperitur, in duas infixas dispertiri. Id, quod statim planum faciam.

De elastrorum serie libera.

Sit series libera AB (*Fig. 4*), quæ primum clausa, atque constricta in unam lineam EM ita, ut puncta extrema A, & B in M coeant, postea sibi relinquatur. Non est dubium, quin ea statim se aperiat, & iactans se se in utramque partem æquali vi, ad naturalem dilatationem feratur, puncto eius medio M manente immoto in linea EM. Dilatationem naturalem seriei definitio linea AB, quam mediam fecat linea EM.

Dividitur ergo series tota in duas æquales partes MA, MB; has ego dico pro duabus seriebus infixis haberi posse; idque satis erit in altera, puta MB, demonstrasse.

Et primum quidem habet pars MB extremum unum immobile in M, seseque totam in eandem partem proiicit versus B; quo sane infixam seriem imitatur. Præterea cum vis tota totius seriei, quæ ex viribus elastrorum omnium conflatur, in duas partes MA, MB æqualiter distribuatur, sequitur, ut pars MB ex hac distributione eam vim obti-

neat, quæ conflatur ex dimidio elastrorum numero, idest ex illo ipso elastrorum numero, quibus ipsa composita est; atqui eandem hanc vim prorsus haberet, si series infixæ esset; imitatur ergo seriem infixam in hoc etiam; & omnino pro serie infixæ haberi potest. Quod si conceditur in parte MB, nihil est, cur non etiam in parte MA concedatur.

Iam ergo si ea, quæ de seriebus infixis diximus, ad partes MA, MB transferantur, facile colligentur omnia, quæ ad seriem liberam pertinent. Hæc recensabo paucis.

Primum elastra omnia seriei liberæ AB æqualibus temporibus æquales habent dilatationes, ideoque ad naturalem dilatationem perveniunt omnia eodem tempore. Idque etiam ex eo colligi potest, quod cum series tota AB continua sit, & elastra eius omnia inter se communicent, fieri nequit, ut elastrum alterum, ne tantillo quidem tempore, constrictius maneat, aut explicatius, quam alterum.

Præterea elastrum quodlibet seriei liberæ AB eodem tempore ad naturalem dilatationem pervenit, quo ad eandem perveniret, si solum esset, & extra omnem seriem positum.

Præterea series tota AB, quicumque elastrorum sit numerus, sive quæcumque sit seriei longitudo, ad naturalem suam dilatationem eodem tempore pervenit; quippe quia partes ambæ MA, MB, quicumque elastrorum sit numerus, sive quæcumque ipsarum sit longitudo, eodem semper tempore ad naturalem dilatationem perveniunt; sunt enim ambæ tamquam dux series infixæ.

Deinde extremorum A, & B tanto maior est velocitas, quanto longior est series AB, sive quanto maior est elastrorum numerus. Etenim, quæcumque sit seriei longitudo, eodem semper tempore ad naturalem dilatationem series pervenit, ideoque eodem semper tempore punctum B percurrit lineam MB; & similiter eodem semper tempore punctum A percurrit lineam MA. Igitur velocitas puncti B tanto est maior, quanto est longior linea MB; & similiter velocitas puncti A tanto est maior, quanto longior est linea MA. Manifestum est autem lineam utramque MA, MB tanto longiorem esse, quanto est longior tota series AB, sive quanto est maior elastrorum numerus.

Iam vero si seriem liberam AB cum infixæ quavis conferre

ferre velimus, nihil negotii erit ostendere, velocitatem utriusvis puncti A, vel B ita esse ad velocitatem extremi mobilis seriei cuiusvis infixæ, uti est longitudo MA, vel MB, idest dimidiata longitudo seriei liberæ, ad longitudinem seriei infixæ.

Hæc quasi cursim proposui. Qui enim superiora concesserit, spero fore, ut hæc etiam per se intelligat. Si qui autem illa concedenda esse non existimet; in illis hærendum est, non in his. Sed iam ad series deferentes transeamus, quæ, ut supra dixi, ex sunt, quæ se se aperientes in corpora quæpiam incurrunt, & ea secum auferunt.

De seriebus deferentibus.

Definitiones, & assumta.

Hic vero qui elastra, elastrorumque series ab omni massa præscindi volunt, hypothesein suam, meo quidem iudicio, vel minuant oportet, vel explicent. Ni faciant; motum corporis, quod serie defertur, & velocitatem frustra quærent. Nam si velocitas seriei in massa nulla inhæreat, nulla erit, a serie quidem, motus quantitas: unde ergo quantitatem motus accipient corpora, quæ a serie pelluntur? Ac corporum quidem, quæ pelluntur, velocitates ex ea proportione solemus quærere, quam habent massæ ambæ pellentis simul & pulsi ad massam unam pellentis; qua regula quo modo uti poterimus, si pellentis seriei massam nullam omnino esse velimus? Ac si regulam hanc ipsam sequi volumus, oportebit utique, cum seriei massa ponatur nulla, velocitatem eius a pulsu quovis in infinitum minui. Quis autem erit infinitæ huius retardationis modus? Vel qua ratione definietur?

Quando igitur deferentes series explicare ingredimur, quæ pellunt corpora, eisque certam motus quantitatem tribuunt; nemo, ut credo, ægre feret, si massam aliquam supponamus, in qua serierum ipsarum celeritates inhæreant; non ut celeritates, quas seriebus convenire diximus, propter hanc massam mutantur, sed ut eadem maneant, & inhæreant in hac massa.

Ut

Ut vero indulgeamus auctoribus, & hanc ipsam, quam supposuimus, massam, quantum possumus, contemnamus; eam primum perexiguam esse putabimus, ut, si cum massa eius corporis, quod a serie pellitur, comparetur, haberi possit pro nulla. Deinde putabimus, eam æqualem esse in seriebus omnibus, ut possit etiam in duarum serierum comparatione, propter æqualitatem scilicet, contemni. Sic massam supponemus aliquam, (quod erat ad quantitatem motus, pulsionemque faciendam necessarium) & eam ponemus, quæ in comparationibus omnibus (quod maxime auctores videntur velle) haberi possit pro non posita. Hanc massam appellabo posthac massam seriei.

Porro celeritatem seriei cum dixero, celeritatem intelligam puncti extremi, in quod series tota nititur. Quod si qui velit non celeritatem ultimam, sed mediam quamdam intelligere; nihil repugnabo. Est enim ultimarum, & mediarum proportio eadem. His prævisis series infixas, & deferentes explicare ordiar ad hunc modum.

De seriebus infixis deferentibus.

SIt series AB (*Fig. 5*), quæ altero extremo A incumbat obstaculo immobili XZ, extremo altero B urgeat globum Q, quem se se explicans secum auferat.

Hic vero dubium esse non potest, quin totius seriei dilatatio obiecto globo retardetur. Quo modo id fiat, & quas vires, velocitatesque accipiat globus, per conclusunculas pauca exsequar.

Prima. Quantitas motus, qua series AB per se ipsa, nullo opposito globo, fertur, proportionalis est seriei longitudini. Quod ita probo. Cuiusvis seriei celeritatem in eadem semper massa inhærere volumus: ergo quantitas motus in quavis serie proportionalis celeritati est; atqui celeritas est proportionalis longitudini seriei, ut supra ostendimus; ergo etiam quantitas motus proportionalis est longitudini seriei.

Secunda. Elastra omnia, quibus series AB componitur, æqualiter a globo in suis dilatationibus retardantur. Id ita probo. Urgente serie globum Q, elastra omnia, quibus ipsa componitur, æquali tempore æqualiter dilatantur;

tur; nihil enim causæ est, cur alterius pressio a pressione alterius vincatur; atque huc redeunt argumenta, quæ supra induximus; atqui etiam dilatarentur æqualiter æquali tempore, si globus nullus seriem retardaret, ergo elastra omnia, quibus series componitur, in dilatationibus suis retardantur a globo Q æqualiter.

Tertia. Series AB globum Q usque premit, donec ad naturalem dilatationem pervenit. Simul ut series ad hanc pervenit, globus ab ea disiungitur, conceptoque impetu longius abit. Id ita ostendo. Series AB elasticitate sua perpetuo urgetur, ideoque alios, atque alios motus perpetuo accipit; ideoque perpetuo acceleratur; donec ad naturalem dilatationem perveniat. Atqui quamdiu acceleratur, tamdiu globum debet premere; ergo globum usque eo premit, donec ad naturalem dilatationem perveniat. Ad hanc vero cum pervenerit, retardari statim incipit; globus ergo acceptum impetum conservans, & abiens longius ab ea disiungitur.

Quarta. Series AB premens globum Q suam omnem motus quantitatem in ipsum transfert. Quod sic colligo. Premente serie globum Q , omnis motus quantitas in massam seriei, & massam globi proportionaliter distribuitur. Est autem seriei massa, si ad massam globi comparetur, ut supra monui, contemnenda; ergo series suam omnem motus quantitatem in globum transfert.

Quinta. Velocitas globi Q proportionalis est longitudini seriei divisæ per globum. Id ita probo. Longitudo seriei proportionalis est quantitati motus, quæ in globum Q transfertur; potest ergo pro ipsa motus quantitate sumi; atqui quantitas motus per globum divisa proportionalis est globi velocitati; ergo longitudo seriei per globum divisa proportionalis est ipsius globi velocitati. Ita si longitudo seriei sit $= S$, erit globi velocitas $= \frac{S}{Q}$.

Sexta. Tempus, quo series AB globum Q deferens dilatatur, sive quo globus lineam AB percurrit, proportionale est globo ipsi. Id statim ex eo patet, quod velocitas globi, ut modo ostendimus, est $= \frac{S}{Q}$. Quippe dubium non

est, quin velocitas sit spatium divisum per tempus; cum sit
ergo

ergo S spatium illud, quod globus percurrit, dum series dilatatur, fitque velocitas $= \frac{S}{Q}$, necesse est, ut Q exprimat

tempus, ideoque fit tempus proportionale globo Q .

*An velocitas globi Q exprimenda sit
per $\sqrt{\frac{S}{Q}}$.*

Hic enimvero aperte fateor, Sodales lectissimi, me valde vereri, ne quid offendam; vix enim satis recte dici posse mihi videtur, quod contra Camusium, Bernulliumque dicatur. Bernullius, nec uno in loco, ea tradidit, quæ si sequamur, dicendum sit, velocitatem globi Q non esse, ut ego volo, $\frac{S}{Q}$, sed $\sqrt{\frac{S}{Q}}$. Camusius eandem rem tractans sic

disputat, ut videatur Bernullio velle obsequi. Quid illos adduxerit, ut hanc metiendæ velocitatis in globo Q rationem sequantur; quibusque argumentis suam sententiam defendant, non quæro; propterea quod non aliorum sensa examinare constitui; sed mea proponere. Tamen ne videar, si nulla proposita causa ab horum opinione discesserim, homines, quos maxime vereor, contempsisse; paucula adnotabo, quæ cum ex illorum sententia necessario sequantur, mihi tamen videntur dici minus commode.

Et primum quidem cum velocitas globi Q , ex illorum sententia, sit $\sqrt{\frac{S}{Q}}$, erit motus quantitas $= \sqrt{SQ}$. Atqui id

ipsum dicitur minus commode. Etenim si motus quantitas est \sqrt{SQ} ; eadem manente serie S , si modo globus Q augeatur, motus etiam quantitas augebitur. Quis autem intelligat, quo modo motus quantitas augeri debeat, cum series, unde omnis motus oritur, maneat eadem, solumque globus augeatur, qui a serie moveri debet?

Ne illud quidem satis belle dicitur, seriem, si brevior sit, ideoque paucioribus elastris constet, eandem motus quantitatem facere, quam faceret, si longior esset, & constaret elastris pluribus. Quod tamen ex illorum sententia necessario consequitur. Etenim cum motus quantitas sit \sqrt{SQ} ,
mane.

manebit hæc eadem, quantumcumque series S minuatur; modo globus Q tanto augeatur, quanto illa minuitur.

Quid quod etiam series brevior maiorem motus quantitatem interdum faciet, quam longior. Velut si imminuta serie S globum Q usque eo auxeris, ut productum totum SQ fiat maius.

Hæc illi confiteantur, oportet, qui velocitatem seriei, five globi, radice ipsius seriei per globum divisæ metiuntur. Quæ incommoda, ut vere dicam, me deterrent; atque haud scio, an qui illam metiendi rationem secuntur, cum ad hæc venerint, sibi ipsi satis placeant. Hactenus deferentes series exposui, easque infixas; nunc illas exponamus, quas liberas dicimus.

De seriebus liberis deferentibus.

SIt series libera AB (*Fig. 6*), quæ clausa primum in linea EM sibi postea relinquatur; eaque, aperiens se se, duos globos P, & R pellat in contraria. Hic verò multa per se occurrunt usque adeo manifesta, ut demonstrationem prope recusent; itaque, quantum scio, negantur ab nemine. Hæc paucis proponam, & quasi cursim.

Primum. Non est dubium, quin series AB, aperiens se se, in prima sui dilatatione utrumque globum pellat æqualiter; ipsa enim per se se in utramque partem æqualiter nititur. Quod si facit in prima dilatatione, nihil est cur idem non faciat & in aliis.

Secundo. In prima seriei dilatatione elastra omnia æqualiter dilatantur. Nihil est enim, cur in illa communi lucta alterum elastrum cedat alteri. Quod idem accidit in aliis dilatationibus, quæ secuntur; quo fit, ut elastra eiusdem seriei omnia ad naturalem dilatationem perveniant eodem tempore.

Tertio. Pelluntur globi ambo usque eo, dum series ad naturalem dilatationem pervenit. Elasticitate enim in utramque partem perpetuo urgente, oportet, seriem perpetuo in utramque partem accelerari, ideoque utrumque globum perpetuo urgere. Simul ut series ad naturalem dilatationem pervenit, acceleratio cessat; globi vero abeuntes longius a serie disiunguntur.

Quarto. Globus uterque æqualem motus quantitatem a serie accipit; quippe quia in dilatationibus singulis uterque æqualiter pellitur.

Quinto. Quantacumque fuerint spatia MA, MB a globis P, & R eodem tempore percurfa, erit MA ad MB, uti velocitas globi P ad velocitatem globi R. Quippe quia velocitates spatiis æstimantur, cum tempus est idem.

Sexto. Iisdem positis erit MA ad MB, uti reciproce globus R ad globum P; nam cum motus quantitates æquales sint, oportet velocitates globorum globis ipsis esse reciprocas; sunt autem velocitates globorum (quod modo ostendi) uti spatia MA, MB.

Septimo. Globi P, & R sic procedunt, ut commune centrum gravitatis immotum maneat in M. Quippe quia quocumque globi P, & R eodem tempore pervenerint, erit P ad R, uti reciproce MB ad MA.

Octavo. Numerus elastorum, quæ insistant in linea MA, est semper ad numerum elastorum, quæ insistant in linea MB, uti linea MA ad lineam MB. Quippe, cum omnia seriei elastra æquales semper inter se habeant dilatationes, necessario sequitur, ut elastra tanto plura, sive tanto pauciora in linea MA insistant, quam in linea MB, quanto longior, aut brevior est linea MA, quam linea MB.

Atque hæc quidem vel sine demonstratione conceduntur fere ab omnibus. Nunc ea proponam, quæ quo facilius concedantur, si non ad veritatem, at certe ad magnam veri similitudinem conabor ostendere.

Dico primum. Vis tota seriei AB, quæ motum efficit, proportionalis est longitudini ipsius seriei. Quod sic colligo. Quanto longior est series, tanto plura sunt elastra, ideoque tanto maior in serie est elasticitatis vis. Atqui hæc illa est, quæ motum efficit; ergo quanto longior est series, tanto est maior seriei vis, quæ motum efficit.

Dico secundo. Motus quantitas utriusvis globi, sive P, sive R, proportionalis est longitudini seriei. Id probo. Quoniam globi P, & R quantitates motus habent æquales, par est credere, vim totam seriei, quæ motum efficit, ita distribui, ut dimidia una agat in P, dimidia altera in R; eritque propterea motus quantitas, sive in P, sive in R,
pro.

proportionalis huic dimidiæ; ergo etiam proportionalis toti; ergo etiam proportionalis longitudini seriei.

Dico tertio. Velocitas globi P proportionalis est longitudini seriei AB diviſæ per P; itemque velocitas globi R proportionalis est longitudini seriei AB diviſæ per R. Quod ita oſtendo. Longitudo seriei AB proportionalis est motus quantitati, ideoque pro ipſa motus quantitate ſumi poteſt; atqui motus quantitas diviſa per P proportionalis est velocitati globi P; itemque motus quantitas diviſa per R proportionalis est velocitati globi R; ergo longitudo seriei AB diviſa per P erit proportionalis velocitati globi P; itemque longitudo seriei AB diviſa per R erit proportionalis velocitati globi R. Si ergo fuerit seriei longitudo = S, erit globi P velocitas = $\frac{S}{P}$; velocitas vero globi R erit = $\frac{S}{R}$.

Dico quarto. Tempus, quo globus P percurrit ſpatium MA, est = $\frac{MA}{S}$, & tempus, quo globus R percurrit

ſpatium MB, est = $\frac{MB}{S}$. Id ita probo. In omni motu

tempus æquale est ſpatio diviſo per velocitatem; cum ergo ſpatium decurſum a globo P ſit = MA; velocitas vero ſit = S, ſequitur, ut tempus, quo globus P conficit ſpatium

MA, ſit = $\frac{MA}{S}$. Eodem modo invenietur tempus, quo

globus R conficit ſpatium MB, eſſe = $\frac{MB}{S}$. Quamquam

cum tempora hæc duo æqualia eſſe debeant, invento uno quærendum non erit alterum.

Dico quinto. Tempus, quo ſive globus P ſpatium MA, ſive globus R ſpatium MB conficit, est = $\frac{PR}{P+R}$, quam men-

ſuram noto, quia videtur commodiſſima; ceterum ex his, quæ modo dixi, facillime ducitur. Etenim cum ſit MA, MB :: R, P, ſequitur, ut ſit $\frac{MA}{MA+MB}$, ideſt $MA = \frac{R}{S} \frac{P+R}{P+R}$;

H h h 2

& ſimi.

& similiter $MB = \frac{P}{S} \frac{P+R}{P+R}$; cum sit ergo tempus globi P,
 ut supra docui, $= \frac{MA : P}{S}$, & tempus globi R $= \frac{MB : R}{S}$; si
 loco $\frac{MA}{S}$ substituatur $\frac{R}{P+R}$, & loco $\frac{MB}{S}$ substituatur $\frac{P}{P+R}$,
 fiet utrumque tempus $= \frac{PR}{P+R}$.

Dico sexto. Utervis globus, five P, five R, ea vi pel-
 litur, qua pelleretur a serie infixæ, quæ æqualis esset seriei
 liberæ AB dimidiatæ. Probare id nitar ad hunc modum.
 Vis motum efficiens in serie quavis tanta est, quanta est
 series ipsa; si sit igitur series infixæ dimidia seriei AB, di-
 midiam quoque habebit vim seriei ipsius AB; atqui globus
 utervis, five P, five R, urgetur vi dimidia seriei AB; ergo
 ea vi urgetur, qua urgeretur a serie infixæ, quæ esset æqua-
 lis seriei AB dimidiatæ.

Hinc ad omnes infixarum, liberarumque serierum com-
 parationes patet aditus.

Dico septimo. Si partes seriei MA, MB sint inæquales
 (esse autem inæquales oportet, si inæquales sint globi P,
 & R) minime haberi possunt, tamquam duæ series infixæ,
 quæ inter se se nihil communicent, & quasi pariete quo-
 dam interposito disiunctæ sint. Id ita probo. Cum series
 una & continua AB primum aperitur, vis eius omnis in
 duas æquales vires distribuitur, quarum altera se immittit
 per MA contra P, altera per MB contra R; quare pars
 seriei MA agit non vi sua, sed ea vi, quæ illi ex hac di-
 stributione contingit, quæque facile dimidia vis est totius
 seriei. Idem dico de parte MB. Atqui si hæ partes MA,
 MB duæ series infixæ essent, nihilque inter se propter pa-
 rietem interpositum communicarent, distributio illa, quam
 dixi, nulla fieret; & pars utraque seriei ageret vi tantum
 sua; ergo hæ partes MA, MB minime haberi possunt,
 tamquam duæ series infixæ, quæ propter parietem inter-
 positum inter se se nihil communicent.

*An sint audiendi, qui putant seriei partes MA, MB
pro duabus seriebus infixis habendas esse.*

Non sum nescius fore permultos, qui hanc æqualem totius vis in partes MA, MB distributionem minus probent. Iique contendunt, partes has, quoniam puncto quodam fixo, atque immobili inter se dividuntur, perinde haberi posse, ut si firmissimo quodam pariete divisæ essent, quo pariete & seriei totius continuitas, & partium inter se communicatio, & illa, quam dixi, totius vis distributio tolleretur. Quorum ratio quoniam in immobilitate puncti nititur; hanc prius immobilitatem paucis demonstrabo, quo res tota melius cognoscatur. Ostendam postea quid intersit, utrum seriei partes puncto hocce, an pariete interposito dividantur.

Sit series quævis libera AB (*Fig. 7*) constans elastris quotlibet AGH, HKL, LOB, quæ coacta primum in unam lineam EM, relaxetur postea, globos duos P, & R pelens in contraria. Hic dico, idem seriei punctum I per totum relaxationis tempus manere semper in linea EM. Quod sic demonstro.

Cum per totum relaxationis tempus elastra omnia æqualiter inter se semper dilatata esse debeant, erit semper basis una AH ad summam basium omnium, idest ad AB, ut elastrum unum AGH ad summam elastrorum omnium, idest ad seriem. Erit etiam (quod facile demonstrari potest) AH ad HM, ut AGH ad HI; & omnino pars AM ad totam AB, uti pars AGHI ad seriem totam. Quod si ita est, erit quoque AM ad partem reliquam MB, uti AGHI ad partem reliquam seriei IKLOB. Atqui proportio AM ad MB est semper eadem; est enim semper AM ad MB, uti R ad P; ergo series tota in eadem semper proportione dividetur ab linea EM; ergo in eodem semper seriei ipsius puncto I; ergo idem seriei punctum I manebit semper in linea EM.

Atque hoc ipsum punctum I, quoniam ab linea EM numquam dimovetur, illud est, quod multi habent pro immobili; eoque duas seriei partes ita disiungi volunt, uti disungerentur a pariete. Quid enim interest, inquiunt illi,
cum

cum sit punctum immobile æque ut paries? Quod si interpositus paries & seriei continuitatem, & illam totius vis in utramque partem distributionem tollit; cur non eam pariter tollat punctum I? Quibus ego adduci non possum, ut assentiar.

Hoc enim interest inter punctum I, & parietem; quod immobilitas puncti I ab ipsa seriei continuitate, & totius vis distributione oritur; non ergo tollere has potest, quæ si non essent, ne ipsa quidem esset. At immobilitas parietis non ab his oritur, sed est ipsa per se se; itaque & seriei continuitatem, & illam totius vis distributionem potest tollere, & tollit.

Idem declaro aliter. Cum series tota continua sit, oportet, ut globum utrumque æque premat, ideoque vim suam in utramque partem distribuatur æqualiter; quod si facit, oportet etiam, ut ex altera parte velocior fiat, ex altera tardior; sintque ipsæ seriei partes velocitatibus proportionales. Atque hoc ipso fit, ut punctum I in linea EM detineatur. Ergo non recte colligitur: punctum I in linea EM detinetur; igitur neque series tota continua est, neque vim suam omnem æqualiter in ambas partes distribuit; detinetur enim punctum I in linea EM ob id ipsum. Nihil tale de pariete dici potest, qui in eodem loco manet, quia ipse per se est immobilis.

Atque hæc differentia eo etiam manifestior est, quod quamvis punctum I in linea EM quasi sedeat, non impedit tamen, quo minus pars altera MB ad partem alteram MA se se accommodare debeat; idque eo valet, ut elastra partis alterius MB toto relaxationis tempore æque semper dilatata esse debeant, ut elastra partis alterius MA, ipsa seriei continuitate id postulante: quod minime eveniret, si ambæ hæ partes pariete interposito disiungerentur. Præterea si in ipso relaxationis tempore elastrum unum parti MB improvise addatur, aut dematur, illico punctum I moveri, & simul alterius partis MA velocitas, & vis mutari debebit. At si paries lineæ EM substituatur, nullo modo ex alterius partis mutatione mutari debebit altera.

Dicet fortasse aliquis: cur quæso, dum aperitur series, vis eius omnis se se tam apte distribuit? Quis eam mentem huic vi indidit, ut cum series in duas inæquales partes dividat-

vidatur, se se ipsa tamen distribuat æqualiter in ambas?

Quod si qui dicat, is mihi videbitur naturam virium nondum fatis cognovisse. Quod enim est corpus, quod si moveatur, non artificiosissima in eo fiat, & aptissima, & commodissima ad omnia, totius vis distributio? Exemplum afferam simplicissimum. Rotetur pulsu quovis linea quævis ST (*Fig. 8*) circa unum sui punctum C. An non statim ut ea pellitur, vis omnis pulsu orta se se per totam ea ratione distribuit, ut in puncto C sit nulla, in aliis vero punctis, vel partis CS, vel partis CT, tanto sit maior, quanto unumquodque a puncto C longius distat? Quis quæso hanc mentem ei dedit, ut, abstinens se se a puncto C, ad puncta alia se applicet proportionem tam commodam? Quid si linea ST non recta sit, sed inflexa, & contorta multis modis? Quam convenienter, quam apte, quam pulchre diffundet se se vis tota per flexus, & curvaturas omnes, ut sit ubique tanto maior, quanto longius abest a puncto C! Quid? In istis ipsis elastrorum seriebus, quas adhuc consideravimus, quantum est elasticitatis, in se se explicanda, ut ita dicam, ingenium, quanta industria! Desinant ergo mirari, si series liberas explicantes, ingenii aliquid earum vi dedisse videmur.

Parent enim divinæ cuidam necessitati motus, viresque omnes, quam necessitatem si consilio, & sapientia carere vulgus putat, fallitur. Hæc enim, quæ longe a ratione nostra absunt, & quasi sua sponte fiunt, non sine ratione fiunt, sed fiunt ratione meliori. Hæc habui dicere de elastris.

De vi corporum viva.

Valde autem vereor, ne hæc differens visus sim vobis illorum sententiam labefactare velle, qui vim vivam quadrato velocitatis metiuntur; nam utique non nulla fustuli, quæ ab his teneri & defendi solent. Qui quid dicant breviter recensebo, monens in locis singulis, quid illis ex hoc nostro sermone concedi possit, quid negari debeat.

Et primum quod aiunt, vim vivam velocitatis quadrato æstimandam esse, si modo hoc uno contenti sint; ea quidem, quæ adhuc proposui, nihil repugnant. Etenim in
id

id unice incubuimus, ut velocitatem constitueremus, quam globus quivis a serie quavis accipit. Quamcumque autem accipiat, quid impedit, quo minus vim eius vivam metientes, velocitatis quadratum, si res ferat, in massam ducamus?

Quod vero aiunt in serie libera AB (*Fig. 6*), (quæ, in duas partes MA, MB divisa, globos duos pellit P, & R) vires vivas globorum P, & R proportionales esse partibus MA, MB; id etiam ex iis, quæ diximus, concedi potest. Etenim cum velocitates globorum P, & R lineis MA, MB exprimantur, erit vis viva globi P, si velocitatis quadrato æstimetur, æqualis producto P : MA : MA; & vis viva globi R æqualis producto R : MB : MB; cum sint autem P : MA & R : MB æqualia; productum illud erit ad hoc, idest vis viva globi P ad vim vivam globi R, uti MA ad MB.

Quod autem ad series infixas omnes idem transferunt; & quemadmodum vires vivæ globorum P, & R proportionales sunt partibus MA, MB, sic pariter contendunt, vim vivam cuiusque globi, qui a serie quavis infixa pellatur, proportionalem esse seriei, a qua pellitur, id enimvero concedi non potest. Nam præter quam quod partes MA, MB pro seriebus infixis haberi non debent; quod supra ostendi; rem etiam secus se habere, sic demonstro. Sit series quavis infixa = S. Globus = Q. Erit velocitas = $\frac{S}{Q}$









cuius quadratum si in massam ducatur, ut hi volunt, fiet vis viva = $\frac{SS}{Q}$, quæ minime proportionalis est seriei.


Ac scio ego quidem non hanc illos metiendæ velocitatis rationem tenere, sed sequi aliam; quippe radicem seriei per radicem globi dividunt, & ponunt velocitatem $\sqrt{\frac{S}{Q}}$. Idque ipsum scite faciunt, ut vim vivam proportionalem seriei possint invenire. Nam utique si $\sqrt{\frac{S}{Q}}$ quadretur,

tum ducatur in massam Q, fiet vis viva æqualis ipsi S. Et quoniam miram hanc metiendæ velocitatis rationem ob id ipsum invexisse videntur, ut vim vivam proportionalem semper seriei esse, possent defendere; nihil ego quidem repugnarem, si causas haberent graves, cur id defenderent.

Quas

Quas vero causas habent? aut cur tam acriter defendunt, vim vivam proportionalem semper seriei esse? Nempe quia vis viva prius in serie est, deinde a serie in globum transfertur; est autem in serie quavis, vel potius in elastro quovis, eadem semper, & constans, & perpetua. Verum id ipsum quo modo probant? Videndum est enim, ne, cum cetera huius causa ponantur, hoc ipsum ponatur sine causa. At, inquiunt, vis viva substantialis est, per seque subsistens, nec ab alio dependens; nam quamvis generetur a motu, statim tamen ut est genita, evadit substantialis, quapropter nec augeri in eadem re, nec minui potest. An suam illam meriendæ velocitatis rationem in elastrorum series invexerint, ut hæc defendant? Quæ ego quidem si intelligerem, fortasse concederem. Ut nunc sum, libentius de substantiali forma Aristoteli assentiar, quam cuivis de substantiali ista vi. Quæ vis substantialis, quamvis patronos habeat magnos, & graves, non mihi tamen tanti esse videtur, ut, eius defendendæ causa, velocitatis mensuram, quam supra in elastrorum seriebus explicandis proposui, mutandam esse censeam.





FRANCISCI MARIAE ZANOTTI

De elastris.

SERMO ALTER.

CUm paucis ante mensibus de elastrorum natura, & vi apud vos, Viri clarissimi, differuissem; non ignoratis profecto, quam multos sermo ille meus, non academicos modo, sed prope cuiusvis generis homines ad eiusdem rei studium accenderit. Quem enim paullo doctiorem offendere per illos dies potui, qui mecum non de elastris vellet verba facere, & de vi corporum viva disputare? Ad quas disputationes vel inter ludos interdum, & in conviviiis revocabar, ut locus iam nullus in urbe esset, in quo non aliquam academiam invenirem. Cum autem multi multa ex me quærerent, & alii obiicerent alia; plane intellexi, theoremata esse quædam, quæ totius controversiæ initia contineant, quæque nisi quis teneat, vix possit ad absolutam rei cognitionem pervenire. Hæc ego notavi, hortante maxime Carolo Grassio Senatore amplissimo, sodale nostro, apud quem est etiam a litteratissimis viris, qui ad ipsum constitutis diebus conveniunt, non semel hac de re disputatum. Hæc ipsa vobis legere constitui, sperans fore, ut qua me alias humanitate, & patientia audistis, eadem nunc quoque audiatis. Sed ante moneo, me illa eadem in hoc sermone assumere, quæ assumsi in altero, definitionesque easdem sequi; quod ipsi per vos facile intelligetis. His ergo insistens pauca quædam statim notabo, quæ ad elastrorum relaxationem generatim pertinent.

Elastrorum relaxatio explicatur.

Elastrum quodvis, dum relaxatur, continenter premit, & vim facit, ut dilatet se se magis, magisque, donec ad naturalem dilatationem perveniat. Quare & continuam habet pressionem, & continuam dilatationem, & continuam accelerationem.

Has continuitates per particulas infinitas infinite parvas sic explico. Elastrum a constrictionis statu ad naturalem dilatationem fertur per dilatatiunculas infinitas, infinite parvas, alias aliis deinceps succedentes. In initio autem cuiusque dilatatiunculæ elasticitas pressionem novam affert, quæ celeritatem auget. Quamquam pressiones hæ novæ, quoniam elastro adveniunt magis, magisque dilatato, aliæ aliis debiliores sunt, donec elastrum ad naturalem dilatationem perveniat. Sic & pressio in elastro est continua; & continua quoque est acceleratio; nam illa continua dicuntur, quæ intervallis disiunguntur infinite parvis.

Elastrum quodvis, eodem semper dilatatiuncularum numero, ad naturalem dilatationem fertur, si ab eodem constrictionis statu discedat. Et quoniam elastra omnia, de quibus infra agemus, ab eodem semper constrictionis statu discedere putabimus, idcirco etiam putabimus, dilatatiuncularum numerum eundem esse in omnibus, ideoque etiam eundem in omnibus numerum pressionum.

Quia vero, constricta elastrorum multorum serie, elastra singula in eodem constrictionis statu sunt, idcirco, si libertas seriei detur, elastra eius omnia eodem dilatatiuncularum numero ad naturalem dilatationem feruntur. Quæ sane dilatatiunculæ iisdem tempusculis in elastris omnibus fiunt; omnia enim eodem tempore dilatari incipiunt, & eodem tempore ad naturalem dilatationem perveniunt. Quod & in alio sermone declaravi; & mihi facile concedent omnes, quicumque hanc rem totam diligentius scrutati sunt.

His prævisis theoremata nonnulla paucis exsequar, quibus tota relaxationis ratio, quod ex multorum sermonibus intellexi, melius cognosci poterit.

*De vi, quam elastrum infixum in utramque
partem facit, dum se se
explicat.*

SIt elastrum IKL (*Fig. 1*), quod ex parte I incumbat obici immobili XZ; constrictumque cum sit, relaxetur. Punctum L ex hac relaxatione vim vivam concipiet; punctum I vim semper habebit mortuam; atque illa per totum relaxationis tempus perpetuo augebitur; hæc perpetuo minuetur. Vires dico, si modo intelligamus, celeritates punctorum L, & I in massa quapiam, quantulacumque ea sit, inhærere; sublata enim omni massa, vis nulla in celeritate esse potest.

Propositum autem sic probo. In singulis dilatatiunculis elasticitas pressionem novam affert tum puncto I, tum puncto L; pressionem autem singulæ, quibus afficitur punctum I, statim in obice XZ eliduntur; itaque punctum I semper fertur contra obicem XZ una tantum pressione: ea scilicet, qua in præsentis tempusculo afficitur; quo fit vis mortua. Pressiones vero, quibus afficitur punctum L, quoniam nullo obice eliduntur, in motu abeunt, & velocitates alias, atque alias, quæ conservatæ, & in infinitum auctæ faciunt vim vivam. Quoniam vero pressionem, ab elasticitate ortæ, aliæ aliis deinceps debiliores sunt, sequitur, ut vis mortua puncti I perpetuo minuatur; vis viva puncti L, quamquam per incrementa alia aliis minora, perpetuo tamen augeatur.

His facile intelligitur, pressionem omnem, ac vim cessare in puncto I simul, ut elastrum ad naturalem dilatationem pervenit; punctum vero L, concepto impetu, ferri longius.

Quod si series elastrorum quotlibet ABC, CDE, EFG (*Fig. 2*) incumbens ex parte A obici immobili XZ, relaxetur; facile intelligitur, unumquodque elastrum, verbi gratia CDE, ex parte C, quæ spectat obicem, vim mortuam perpetuo exercere; ex parte altera E vi viva in contrarium rapi; esseque in eodem puncto C, ubi elastra duo se mutuo contingunt, & premunt, vim vivam, & vim mortuam; vim mortuam, quæ fit ab elastro CDE contra obi-

obicem XZ; & vim vivam, quæ fit ab elastro ABC, quæque punctum C rapit versus G.

Neque vero vis hæc mortua, quam facit elastrum CDE, vim vivam retardat, qua elastrum ABC urget punctum C; nam quamvis illa contra hanc nitatur, & premat perpetuo; tamen elastrum ABC illam simul, & elastrum CDE, a quo illa fit, secum rapit. Velut is, qui in navi sedet, quamvis ipsam contra eius cursum manu premat, nihil tamen eam retardat; navis enim & pressionem, & prementem secum rapit.

An punctum extremum seriei, quæ quidem constricta detineatur, æqualiter premat, quicumque elastrorum sit numerus.

Neminem esse puto, qui neget, punctum extremum seriei, quæ quidem constricta detineatur, æqualiter premere, quicumque elastrorum sit numerus. Sunt tamen, qui id sibi explicari velint. Id ergo sic explico.

Sit elastrum IKL (*Fig. 1*) ex parte I incumbens obici immobili XZ. Siqui, manu apposita ad punctum L, ipsum constrictum teneat; sentiet is quidem, ac sustinebit vim illam, quam facit elastrum in puncto L contra manum; vim illam, quam facit in puncto I contra obicem, non sentiet.

Igitur ad pressionem, quam punctum L facit contra manum, nihil refert, utrum pressio, quæ fit in I, obice quodam XZ detineatur (*Fig. 1*), an pugnet cum elastro altero DEI (*Fig. 3*) vi pari, ipsumque sustineat. Quod si elastrum LKI ea pressione, quam facit in I, quamque manus non sentit, sustinet elastrum IED; illud profecto sequitur, ut huius elastri IED pressio non possit ad punctum L, neque ad manum puncto L appositam, pervenire.

Qua re fit, ut si series quæpiam DL constricta detineatur, quocumque elastrorum numero constet, punctum L æqualiter semper premat; elastra enim omnia, alia ab aliis, quemadmodum supra dixi, sustinentur, ut illorum pressio ad punctum L pervenire non possit.

In physicos quosdam incidi, qui hoc theorema mirarentur; ego contra illos mirabar, qui in vulgatissimo experimen-

rimento id nondum animadvertissent. Namque in experimento Torricellii, cum aer inferior, qui hydrargyrum proxime tangit, dicatur utique ipsum premere elasticitate sua; quis tamen umquam dixit, si ad elasticitatem inferioris aeris addatur gravitas aeris superioris, pressionem contra hydrargyrum augeri debere, & barometricam altitudinem maiorem fieri? Cur id, quæso, nemini umquam in mentem venit?

Nempe quia inferior aer superioris aeris gravitatem elasticitate sua sustinet, neque finit, gravitatis huius pressionem ad hydrargyrum pervenire. Et omnino errant, qui putant, hydrargyrum, in experimento Torricellii, superioris aeris gravitatem sentire; quemadmodum is etiam erret, qui pondus quodpiam manu tenens, elastro inter pondus, & manum interposito, putet se sentire pondus; non enim pondus, sed elasticitatem sentit elastri, cui, pondus tenens, resistit; quamvis, cum elasticitas hæc æqualis semper sit ponderi, facit æqualitas, ut putet ille se pondus sentire ipsum. Sed iam in viam redeamus.

*An velocitas prima, quam statim accipit punctum
extremum seriei, dum hæc se aperit,
proportionalis sit ipsius seriei
longitudini.*

Sit series elastrorum quotlibet AG (*Fig. 2*) incumbens ex parte A obici immobili XZ; cumque constricta sit, subito relaxetur ex parte G. Dico, velocitatem, quam primum concipit punctum extremum G, esse proportionalem longitudini seriei, sive, quod eodem redit, numero elastrorum.

Ut id clarius ostendam, sit series altera IL (*Fig. 1*) elastri unius IKL; ut sit longitudo seriei AG ad longitudinem seriei IL, uti numerus elastrorum, quibus illa componitur, ad unum. Incumbatque series IL ex parte I obici immobili XZ; sitque elastrum IKL æque constrictum, ut elastrum quodlibet seriei AG; tum subito relaxetur.

Unumquodque elastrum seriei AG eodem tempore æque dilatatur, atque elastrum IKL; quippe quia elastra, quibus series AG componitur, cum massa omni careant, nihil
se

se se mutuo impediunt; idque satis in alio sermone planum fecimus. Iam ergo propositum sic probo.

In prima dilatatiuncula elastri IKL punctum L certo tempusculo certum spatiolum conficit. Eodem tempusculo unumquodque elastrum seriei AG dilatatiunculam absolvit parem dilatatiunculæ elastri IKL; oportet ergo, ut punctum G eodem tempusculo spatiola totidem conficiat, quot sunt elastra, quibus series AG componitur; ergo velocitatem concipit elastrorum numero, sive, quod idem est, longitudini seriei proportionalem.

Difficultas quadam tollitur.

INveni quosdam ad hanc demonstrationem tardiores; eosque in primis tenebat hæc ratio. Corpus quodque a quiete discedens velocitatem statim concipit proportionalem pressioni, quam habebat, dum quiesceret. Atqui cum series AG, IL ad pares angulos constrictæ detinerentur, & quiescerent, puncta G, & L pressiones habebant æquales; ergo, si, relaxantibus se seriebus, puncta hæc a quiete discedant, velocitates statim concipient æquales.

Id totum quale sit, diligenter examinemus; non enim paucos sum nactus, quos hæc ratio caperet. Camusius vero, vir doctissimus, suam illam elastrorum theoriam, quam in parisiensis academix actis edidit, ex ea, quam modo dixi, velocitatum æqualitate totam duxisse videtur.

Igitur quod primo loco aiunt, corpus quodque a quiete discedens velocitatem statim concipere proportionalem pressioni, quam ante habebat, dum quiesceret; id sane aliquo modo distinguant, oportet. Si enim nullo modo distinguant, qua ratione, quæso, illud explicabunt, quod hydrostatici vulgo docent; aquam, si perforato vasis latere subito exsiliat, ea statim velocitate exsilire, quam haberet, si ex altitudine tanta decidisset, quanta est aquæ in vase? Qui enim potest velocitas hæc proportionalis esse pressioni, quam aqua ante habebat, dum in vase quiescebat? An non pressio illa proportionalis est altitudini; velocitas vero radici altitudinis? Ut illud mittam, quod pressio illa vis est mortua, e qua velocitas assignabilis oriri statim posse non videtur.

Verum

Verum ut ad rem ipsam propius accedamus; concedo ego quidem, velocitatem, quam corpus a quiete discedens primum accipit, proportionalem esse ei pressioni, quam habebat, antequam a quiete discederet; sed ita concedo, si, dum a quiete discedit, nulla causa superveniat, quæ pressionem eius augeat, aut minuat; sin minus, non concedo. At, inquires, quid ergo supervenit in serie AG, dum hæc se aperit, & punctum G a quiete discedit, quod ipsius puncti G pressionem subito augeat, aut omnino mutet?

Nempe supervenit pressio elastrorum omnium insequentium. Etenim, relaxante se se elastro EFG, pressio eius in E minuitur, neque amplius sustinere potest elastrum CDE; hoc ergo, statim se promovens, elastrum quoque EFG promovet, & simul cum eo punctum G ulterius urget. Eodemque modo, quoniam elastrum ABC non amplius sustinetur, ab elastro CDE, se se ipsum quoque antrorsum promovet, & ulterius urget elastra ambo CDE, EFG, & simul cum his punctum G. Apparet ergo, puncto G, dum a quiete discedit, supervenire pressionem elastrorum omnium insequentium, quæ non amplius sustinentur alia ab aliis, quemadmodum sustinebantur, dum series adhuc constricta quiescebat.

Quapropter minime mirandum est, velocitatem, quam primam punctum G accipit, nequaquam proportionalem esse ei pressioni, quam ante habebat.

Obiectum aliud diluitur.

CUM hæc perambulans cum amicis quibusdam disputarem, & omnes iam fere persuasissimè, adolescentulus quidam nobilis, qui una nobiscum erat: me nondum, inquit, persuades; & argumentum hoc protulit. Non potest corpus, quod antecedit, premi ab eo, quod insequitur, si quod antecedit, sit velocius, quam quod insequitur. Id scilicet omnes docent; & est tamen usque adeo perspicuum, ut nihil sit opus doceri. Quid ergo? Relaxante se serie AG, an non punctum G velocius est, quam aliud quodvis seriei punctum, sive E, sive C? An non velocius est, quam alia elastra omnia, quæ ipsum insecuntur? Qui igitur potest ab his premi?

Hanc ego ingeniosi adolescentuli dubitationem sic sustuli. Non potest utique corpus insequens premere corpus aliud, quod maiori velocitate antecedit; si procedentia hoc modo corpora disiungantur inter se se, communicationemque omnem amittant. Quid vero, si communicationem inter se, connexionemque semper retineant aliquam?

Fac, verbi gratia, corpora duo P, & R per vim quamdam repulsivam, & mutuam inter se se communicare; atque interim dum R velocissime se se removet a P, manum quampiam vim facere in P, ipsumque corpus P urgere versus R velocitate vel minima. Oportebit profecto, corpus R, accedente ad ipsum corpore P, tanto velocius ferri. Premetur ergo corpus R a corpore P, & a manu; etiamsi corpus R antecedit, & velocius sit; corpus vero P, & manus tardius insequantur.

Id ipsum apparet in punctis G, & E; quacumque enim velocitate feratur G, semper tamen connexionem quamdam habet cum E propter continuitatem elastri GFE, cuius elastri elasticitate fit, ut per totum relaxationis tempus inter puncta G, & E vis repulsiva quædam existat. Quare quantulumcumque velocitate promoveatur punctum E ab insequente elastro CDE, tanto velocius punctum ipsum G ferri debet. Sentit ergo punctum G pressionem, quam elastrum insequens CDE facit in E, etiamsi feratur velocius, quam ipsum elastrum CDE; immo ob id ipsum velocius fertur, quia pressionem illam sentit.

An summa omnium velocitatum, quas per totum relaxationis tempus deinceps accipit punctum extremum seriei, longitudini ipsius seriei proportionalis sit.

CUM supra docuerim, velocitates, quas primum accipiunt puncta G, & L, dum series se se aperiunt, serierum ipsarum longitudinibus proportionales esse, facile erit idem transferre ad velocitates quoque alias, quas per totum relaxationis tempus puncta eadem deinceps accipiunt.

Etenim dum puncta G, & L prima illa velocitate feruntur, elastra singula utriusque seriei dilatatiunculam suam
pri.

primam absolvunt, qua absoluta in eodem constrictio-
 tu sunt omnia. Nihilque est, cur velocitas altera, quam
 nova elastrorum pressio affert punctis G, & L, non eandem
 proportionem sequatur, quam prima. Idemque de tertia
 dici potest, de quarta, & de aliis. Erit ergo & prima ve-
 locitas, & alia quævis longitudini seriei proportionalis; er-
 go etiam summa omnium.

Hinc porro sequitur, ut velocitas ultima, quam habet
 punctum G eo puncto temporis, quo series ad naturalem
 dilatationem pervenit, sit ipsa quoque longitudini seriei
 proportionalis. Quid est enim velocitas illa ultima, nisi
 summa velocitatum omnium, quas punctum G per totum
 relaxationis tempus deinceps acquisivit?

*An velocitates ultima punctorum G, & L inæquales
 inter se esse possint, si primæ quidem
 æquales sint.*

HActenus demonstravi, velocitates vel primas, vel ulti-
 mas punctorum G, & L longitudinibus serierum pro-
 portionales esse. Quosdam autem inveni, nec ita paucos,
 qui primas velocitates punctorum G, & L æquales semper
 inter se esse vellent; iidemque contendebant, velocitates
 ultimas, in seriebus quidem inæqualibus, debere esse inæ-
 quales. Quorum opinionem etsi satis reiecimus, primarum
 velocitatum æqualitate sublata; idque ad nostram elastrorum
 theoriam firmandam satis est; nihil tamen impedit, quo
 minus ultro progrediamur, illudque etiam ostendamus, ve-
 locitates ultimas punctorum G, & L inæquales esse non
 posse, si primæ quidem sint æquales.

Id, quod satis constabit, si modo explicemus, quali-
 ter, posita illa, quam in præsens ponimus, primarum ve-
 locitatum æqualitate, elastrorum dilatatiunculæ aliæ ex aliis
 fieri debeant, & quo ordine pressiones, velocitatesque novæ
 punctis G, & L advenire.

Illud ergo in primis tenendum est, pressiones, quibus
 elastra velocitatem suam continenter augent, advenire alias,
 atque alias, non ex æqualibus tempusculis, sed ex æquali-
 bus dilatatiunculis; quod & suppositionibus, quas adhuc
 secuti sumus, & rei ipsius naturæ maxime consentaneum

est. Elasticitas quippe non ipsa per se se pressiones validiores, aut debiliores facit; sed elastri contractione maiori, minorive ad id determinatur; itaque pressiones singulæ, quibus velocitas paullatim augetur, singulis dilatatiunculis respondent, neque æqualibus tempusculorum intervallis fieri postulant, nisi si ipsa dilatatiuncularum ratio id requirat.

His visis propositam rem explico. Dum series IL aperitur, punctum L ex ea pressione, quam tunc habet, velocitatem quamdam concipit, qua certum spatiolum percurrit certo tempusculo. Interim prima dilatatiuncula elastri IKL absolvitur. Hac absoluta tunc demum pressio nova advenit, & augetur velocitas puncti L .

Quod si, serie AG se se aperiente, punctum G velocitatem statim concipit æqualem velocitati puncti L , sane sequitur, ut æquali tempusculo spatiolum æquale conficiat. Quo tamen confecto, dilatatiunculæ primæ singulorum elastrorum B, D, F nondum erunt absolutæ; nam adhuc singula constrictiora erunt, quam elastrum IKL . Quare nova pressio nondum iis adveniet, sed oportebit, punctum G eadem velocitate ulterius progredi, donec dilatatiuncula prima in singulis elastris absolvatur. Hac absoluta tunc demum pressio adveniet nova, & velocitatem puncti G augetur.

Sic in prima elastrorum dilatatiuncula velocitates punctorum G , & L æquales erunt, quamvis velocitas puncti G diutius perseverabit, quam velocitas puncti L ; nam punctum G feretur per spatiolum longius.

Iam vero, dilatatiuncula prima absoluta, cum elastra omnia in eodem sint constrictiois statu, nihil sane est, cur dilatatiuncula secunda non eodem plane modo instituat, quo instituta fuit prima. Idemque ad alias, quotquot consecuntur, dilatatiunculas transferri poterit.

Igitur si velocitates punctorum G , & L in prima dilatatiuncula æquales sint, æquales quoque erunt in dilatatiuncula alia quavis; ac si omnes duorum punctorum velocitates dilatatiunculis omnibus respondentibus in duas summas conferantur, æquales quoque erunt hæ summæ; sunt autem hæ summæ æquales velocitatibus ultimis punctorum G , & L ; ergo etiam velocitates hæ ultimæ æquales inter se erunt.

Hoc

Hoc loco diligenter animadverti velim id, quod quasi obiter monui: tempuscula, in quibus singulæ elastrorum dilatatiunculæ fiunt in serie AG, minime æqualia esse tempusculis, in quibus singulæ dilatatiunculæ fiunt in serie IL: quod sic dico; si primæ quidem velocitates punctorum G, & L, ut in præsentia putamus, æquales sint. Id infra iuvabit animadvertisse.

*Argumentum contrariorum
proponitur.*

Non est autem argumentum contrariorum prætermittendum. Omnis enim oratio manca sit, nisi &, quod proposuit, demonstrat, &, quæ contra afferuntur, diluat: quod utinam recentiores philosophi diligentius facerent. Scholastici illi veteres, quos iam contemnimus, studium ad id maius adhibuerunt; quod fortasse a græcis, romanisque propius aberant, a quibus omnis bene dicendi ratio orta est. Qui ergo velocitates ultimas punctorum G, & L inæquales esse contendunt, etiamsi primæ æquales sint, hanc fere rationem adhibent.

Sint (quando id nunc datur) velocitates primæ punctorum G, & L æquales; quod scilicet a pressionibus oriatur æqualibus. Iam punctum G, quod longius spatium conficere debet (quippe quod seriem AG longiorem ponimus, quam seriem IL) longius quoque tempus in suo cursu infumet. Punctum L, cui brevius spatium conficiendum est, breviori tempore contentum erit. Pressio igitur, quæ utriusque puncto æqualiter instat, instabit longiori tempore puncto G, quam puncto L; igitur velocitatem pariet maiorem in G, quam in L; est enim illud quasi iam tritum, velocitatem proportionalem esse pressionem in tempus ductæ.

Quod argumentum quoniam in eo nititur, quod vulgo aiunt, velocitatem cuiusque corporis proportionalem esse pressionem in tempus ductæ, id ipsum, nisi molestum est, diligentius explicemus.

*Explicatur illud, quod aiunt, velocitatem
proportionalem esse pressioni ductæ
in tempus.*

Non est dubium, quin, si pressio eadem in eodem corpore per alia tempuscula, atque alia iteretur, velocitas inde fiat tanto maior, quanto sæpius pressio iterata est; ideoque sit velocitas proportionalis pressioni in tempusculorum numerum ductæ.

Quod si tempuscula ponantur semper æqualia, erit etiam velocitas, quam corpus finito quovis tempore acquiram habebit, proportionalis pressioni in totum hoc tempus ductæ. Nam si tempuscula ponantur semper æqualia, erit semper numerus tempusculorum ad numerum tempusculorum, uti totum tempus ad totum tempus.

Id apparet in motibus a gravitate ortis. Nam cum gravitas agat ipsa per se se, neque rem aliam expectet, a qua determinetur; idcirco pressionem eandem iterat in corpore, æquali quoque tempusculo. Velocitas ergo, quam corpus finito quovis tempore a gravitate acquirat, cum sit proportionalis pressioni in tempusculorum numerum ductæ, sint autem tempuscula hæc æqualia; est etiam proportionalis pressioni ductæ in totum tempus; ideoque etiam proportionalis toti tempori, cum pressio sit semper eadem.

Verum si tempuscula non ubique ponantur æqualia, fieri poterit, ut velocitas, quam corpus finito quovis tempore acquirat, cum sit proportionalis pressioni in tempusculorum numerum ductæ; non sit tamen proportionalis pressioni ductæ in totum tempus. Rem hanc exemplo illustremus.

Sit totum aliquod tempus quadruplum alterius temporis totius; illudque resolvatur in tempuscula, quæ singula sint ipsa quoque quadrupla singulorum tempusculorum, in quæ resolvitur hoc. Erit sane æqualis tempusculorum numerus in utroque tempore, quamvis tempora ipsa tota non sint æqualia.

Iam ergo in utroque tempore pressio eadem per singula tempuscula iteretur. Toties sane iterabitur in uno tempore, quoties in altero; ideoque velocitates faciet in utroque

que

que tempore æquales; & hoc tantum intererit; quod velocitas, quam unaquæque pressio in quadruplo tempore gignet, quadruplo tempusculo perseverabit; quam vero gignet in tempore subquadruplo, tempusculo perseverabit subquadruplo. Quod si velocitates in utroque tempore acquisitæ omnino æquales sunt, iam satis patet, eas utique proportionales esse pressioni in tempusculorum numeros ductæ, non vero pressioni ductæ in tota tempora.

Atque hæc quidem valent in motibus acceleratis, in quibus pressio perseverat, idest per infinita tempuscula iteratur. Ceterum in motu æquabili quis est, qui velit pressionem in tempus ducere? Nam si pressionem in tempus ducas, quo corpus moveri pergit; cum id tempus perpetuo augeatur, augebitur quoque pressio, & velocitas; quod intelligi in motu æquabili non potest; non enim sit æquabilis, si velocitas perpetuo augeatur.

Præterea quis ignorat, pressionem in motu æquabili nequaquam perseverare, sed simul ac certam velocitatem corpori indidit, evanescere, nec amplius iterari? ut propterea nullo modo in tempus ducenda sit. At, inquires, cur ergo pergit moveri corpus, cum pressio evanuerit, nec amplius iteretur? Respondeo: moveri pergit propter inertiam suam; nam primum velocitatem accipit a pressione; eandemque postea retinet, cum pressio evanuerit, propter inertiam. Quod ergo aiunt velocitatem proportionalem esse pressioni in tempus ductæ; id totum a motu æquabili reii-ciamus.

Argumentum contrariorum dissolvitur.

HIS expositis facile contrariorum ratio dissolvetur, quæ huc redit. Pressio illa, qua primum aguntur puncta duo G, & L, æqualis est in utroque; idcirco velocitatem statim æqualem in utroque creat. Tamen quia punctum G longiori tempore moveri pergit; pressione in tempus ducta, velocitas eius fit maior; quippe velocitas proportionalis est producto pressionis, & temporis.

Quod argumentum qui proferunt, videant, quæso, velocitatem cum dicunt, quam intelligant; nam si eam velocitatem intelligunt, quam habent punctum G, sive punctum

Etum L in unaquaque dilatatiuncula seorsim sumta, frustra hanc asserunt, proportionalem esse ei producto, quod fit pressione in tempus ducta. Etenim, quamvis motus, quo punctum G, sive L in tota seriei dilatatione fertur, acceleratus utique sit; motus tamen, quo fertur in unaquaque dilatatiuncula, habetur pro æquabili; in motu autem æquabili, velocitas, quod supra monui, male æstimetur, si æstimetur pressione in tempus ducta.

Sin autem velocitatem cum dicunt, eam intelligunt, quam habet vel punctum G, vel punctum L in tota seriei dilatatione, vel quam ex tota seriei dilatatione acquirit; ideoque pressionem in totum dilatationis tempus duci volunt, videant hic quoque, ne fallantur. Nam pressio iteratur in singulis elastrorum dilatatiunculis, idest in tempusculis singulis dilatatiuncularum singularum; quare in tempusculorum numerum utique duci potest ad velocitatem æstimandam; ac si tempuscula hæc omnia æqualia essent, recte etiam duceretur in tota dilatationum tempora; sed quoniam tempuscula, in quibus fiunt elastrorum dilatatiunculæ singulæ in serie AG, minime æqualia sunt tempusculis, quibus fiunt dilatatiunculæ singulæ in serie IL; quod supra animadvertimus; idcirco quamvis pressio in tempusculorum numeros duci possit ad velocitatem æstimandam; in tota dilatationum tempora, quemadmodum paullo ante monui, non potest.

Quam quidem rationem si sequimur; quoniam dilatatiuncularum, ideoque etiam tempusculorum numerus in utraque serie æqualis est; pressio autem, (ut contrarii volunt) quæ in unaquaque elastrorum dilatatiuncula fit, ipsa quoque in utraque serie æqualis est; oportet sane productum in utraque serie æquale fieri, si pressio in tempusculorum numerum ducatur; ideoque etiam velocitates, si his quidem productis proportionales sint, in utraque serie gigni æquales.

Adhuc ostendimus, velocitates ultimas punctorum G, & L inæquales esse non posse, si primæ quidem ponantur æquales. In quo tamen si quid forte erravi, minus moleste feram; quippe quod, ut ante monui, theoriam elastrorum nostram satis firmavimus, primarum velocitatum æqualitate sublata. Hanc enim æqualitatem cum sustulerimus;
quid:

quidquid ea posita sequi debet, contemnere nos quidem possumus commodissime.

De elastris, eodem numero, sed per varios ordines in seriem dispositis.

FAcit patientia vestra, Sodales ornatissimi, & singularis, qua me adhuc audistis, humanitas, ut peccare aliquid mihi videar, nisi illa, quoad possum, utar; sermonemque ita, ut est apud Carolum Grassium cum litteratissimis viris a me habitus, vobis exponam. Nam & multi ex academia in eam disputationem fuerunt impliciti, &, quod caput est, quæstiones de elastris continet non contemnendas.

Veneram ego ad Grassium quodam die, cum litteratos permultos homines expectaret, qui ad ipsum octavo quoque die, ut scitis, convenire solent, & venustioribus studiis otium fallere. Cumque ille, dum alii advenirent, simul cum Iosepho Putio, & Thoma Laghio ad ignem federet, ut me vidit, in tempore, inquit, advenis; narrabat enim mihi Putius, quæ tu paucis ante diebus in academia differuisti. Quæ istæ sunt, quæso, quas de elastris turbas excitas? Ego vero, inquam, turbas nullas excito; sed hi plurimas, & graves excitant, qui contra me dicunt. Non illi, inquit Grassius, contra te dicerent, nisi tu contra illos. Sed iocos mittamus. Ac cum me sedere iussisset, aveo, inquit, scire, quo modo illa explices, quæ sunt olim a summo viro, Ioanne Bernullio, in lipsiensibus actis tradita, de elastris eodem numero, sed per varios ordines in seriem dispositis; quæ ut melius in memoriam revoces, figuras tibi statim delineabo.

Hic chartam sumens schemata tria fecit: primum elastra quatuor B, C, D, E finxit (*Fig. 4*) in unam seriem OP disposita, quam seriem, inquit, incumbere volo obici immobili XZ ex parte O, ex parte vero P urgere corpus A. Tum elastra eadem B, C, D, E in binos ordines distribuens (*Fig. 5*) seriem alteram RS fecit, quam pariter voluit ex parte R incumbere obici immobili XZ, ex parte S urgere corpus A. Tum demum elastra eadem B, C, D, E (*Fig. 6*) in quatuor ordines distribuit, ac seriem tertiam

fecit TV, ipsam quoque incumbentem ex parte T obici immobili XZ, ex parte vero V urgentem corpus A. Ac sit tibi, inquit, corpus A ubique eiusdem massæ. Contendit in primis Bernullius, nisi fallor, corpus A ab unaquaque harum serierum OP, RS, TV eandem accipere velocitatem. Tu quo modo id explicas?

De velocitate, quam accipit corpus A ab unaquaque trium serierum OP, RS, TV.

Facillime, inquam, & multis modis. Et primum quidem fac, seriem RS uno tantum ordine elastrorum B, C constare; & seriem TV uno tantum elastro B. Hoc posito, cum mihi quidem velocitas sit ipsa series divisa per corpus A; qua de re satis in academia disputavi; erit sane velocitas, quam accipiet corpus A a serie OP, $= \frac{4}{A}$;

velocitas, quam accipiet a serie RS, $= \frac{2}{A}$; & velocitas, quam

accipiet a serie TV, $= \frac{1}{A}$, idest erunt velocitates, uti 4, 2,

1. Si ergo in serie RS elastrorum ordo duplicetur, velocitas, quæ erat 2, duplicabitur, & fiet 4. Similiterque in serie TV, si elastrum quadruplicetur, velocitas, quæ erat 1, quadruplicabitur, & fiet 4 ipsa quoque. Erit ergo velocitas ubique eadem, nempe 4.

Idem aliter declaro. Quoniam in serie RS duo elastrorum ordines, iique inter se pares, BC, DE idem corpus A simul deferunt, perinde est, ut si unus ordo BC dimidium A deferat, alter ordo DE dimidium alterum; quare utriusque ordinis velocitas erit 2 divisum per $\frac{A}{2}$, idest $\frac{4}{A}$. Eo-

demque modo ostendetur, in serie TV velocitas esse 1 divisum per $\frac{A}{4}$, idest $\frac{4}{A}$. Quo apparet, velocitatem a serie-

bus hisce omnibus æqualem fieri.

Et est id sane consentaneum, cum idem corpus A, in unaquaque serie, OP, RS, TV, æquali elastrorum numero prematur.

Tamen

Tamen Bernullius, inquit Laghius, rem non sic explicat; & pressiones, quantum memini, permiscet varias & tempora. Ita prorsus, respondi; tamen eandem esse, in unaquaque harum serierum, corporis A velocitatem, non ex hac pressio-num, aut temporum varietate colligit, sed aliud argumentum affert. Quodnam? inquit Putius. Hoc, inquam, si recte sum affecutus. Unaquæque harum serierum eandem vim vivam tribuit corpori A, ergo eandem quoque velocitatem; non potest enim vis viva in eadem massa esse eadem, nisi eadem quoque sit velocitas.

At, inquit Putius, quo modo probat, unamquamque harum serierum eandem vim vivam tribuere corpori A? Nam si dicat, id ex eo fieri, quia vis viva proportionalis semper esse debeat numero elastrorum, a quibus gignitur; id ipsum, quæram, quo modo probet. Cur enim non idem de quantitate motus dici possit, ut ipsa quoque elastrorum, a quibus gignitur, numero proportionalis esse debeat?

Quid? inquit Grassius; an non liceat id dicere? Per Bernullium utique, inquit Putius, non liceat. Nam si idem elastrorum numerus eandem motus quantitatem in quovis corpore gignat, non eandem profecto gignet in quovis corpore vim vivam, si vis quidem viva, ut nunc volumus, & Bernullius contendit, velocitatis quadrato æstimetur. Cum ergo ambæ simul, vis viva, & motus quantitas, proportionales esse elastrorum numero non possint, cur esse potius vis viva dicatur, quam motus quantitas?

Hic, ego inquam, non satis, mi Puti, intelligis, quid intersit inter substantiale, & accidentale; nam quantitas motus, & velocitas accidentalia sunt, ideoque, eodem etiam manente elastrorum numero, variare fortasse possunt. Vis viva substantialis est, ideoque, si elastrorum numerus idem maneat, ut alia varientur omnia, variari ipsa non potest.

Non exspectabam, inquit Grassius, ut nos huc deduces; substantialitas enim illa, de qua te audio in academia paullo liberius disputavisse, me fugerat. Sed quando Bernullii ratio huc redit, fateor sane, me illam non satis assequi, ut etiam tibi ignoscam, qui in ista substantialitate non acquiescas. Sed quorsum, quæso, pressiones illas varias, quas modo Laghius commemorabat, & varia tempora

vir ille summus permiscet? Non enim sine causa hæc etiam considerat.

Nempe, inquam, ut illam ipsam substantialitatem melius tueatur; nam si temporibus, pressionibusque variatis vis tamen viva maneat eadem, videtur iam ille sibi substantialitatem quamdam in vi viva cognoscere. Mihi, inquit Grafsius, (credo & his duobus) nihil sit satis ad hanc cognoscendam. Sed dic, obsecro, quo modo pressionibus illas varias distribuat, & tempora; nam aveo ex te audire; & Ghedinus noster, & Tiolius, qui nunc adveniunt, in his etiam rebus, ut tu scis, delectantur. Ego vero, inquam, & tibi obsequi, & his placere, si possim, cupio. Sed Ghedinus, credo, Bonamicum de rebus ad Velitras gettis legi mavult; scio enim, vos ad hunc legendum hoc vesperæ convenire: præclarum commentarium; quem ego quoque audire malim, quam de elastris dicere. Hic Ghedinus, non committam, inquit, ut neapolitanorum, hispanorumque gloriam quamquam summopere admiror, sermonibus tamen vestris anteponam. Ac cum ipse, & Tiolius confidissent; eosque, qua de re sermo inter nos esset, quoque deducti essemus, Laghius docuisset, sic ipse sum exorsus.

*Quas pressionibus exerceant proposita series OP, RS, TV;
quibusque temporibus dilatentur.*

BErnullius, ut mihi quidem videtur, pressionibus distribuit ad hunc modum. Quoniam in serie OP corpus A ab uno tantum elastro tangitur, vult ille in hac serie pressionem esse = 1. Quia vero in serie RS tangitur ab elastris duobus, pressionem in hac serie vult esse = 2. Quia demum in serie TV tangitur ab elastris quatuor, vult pressionem hic esse = 4.

Hic Putius inquit: miror id sane. Quo modo enim series hæc omnes æqualem vim vivam in corpus A transferant, cum premant non æqualiter? An non per pressionibus vis viva transfertur? Tunc ego, idem, inquam, mirari poteris de velocitate. Quis enim intelligat, ex pressionibus inæqualibus eandem in eodem corpore velocitatem fieri?

At ego quidem incommodum hoc fugio. Quare? inquit Putius. Quippe quod ego, inquam, cum velocitates æquales

æquales ponam, pressiones quoque pono æquales. Id explica: inquit Ghedinus. Quia, inquam, corpus A (quæ mea sententia est) non uno elastro tantum in serie OP premitur, etiamsi ab uno tantum tangatur; neque in serie RS premitur duobus tantum, etiamsi tangatur tantum a duobus. Non enim corpus A premunt ea tantum elastra, quæ ipsum tangunt; sed etiam illa, quæ infecuntur, & urgent, & premunt illa, quæ tangunt. Quod si sequimur, dicendum profecto est, pressionem in unaquaque harum serierum elastris quatuor fieri; ut propterea nihil mirandum sit, & æqualem eam esse, & velocitatem æqualem parere in omnibus. Prorsus assentior, Ghedinus inquit; sed dic iam de temporibus.

Tempora, inquam, Bernullius sic distribuit, ut pressionum rationem quasi invertat. Vult quippe dilatationis totius tempus in serie OP esse = 4; in serie RS esse = 2 in serie TV esse = 1. Quæ ego tempora non muto. Et sane si concedimus, velocitates, quas corpus A a tribus hîc seriebibus accipit, æquales esse; illud etiam concedamus, oportet, spatia esse, uti tempora; quare cum spatia OP, RS, TV sint, uti numeri 4, 2, 1, necesse est etiam tempora horum numerorum proportionem sequi.

*An temporis consideratio a mensura vis vivæ
excludatur.*

Hic Putius, quamvis, inquit, de pressionibus cum Bernullio non consentias; tamen si illud das, dilatationum tempora in his seriebibus inæqualia esse; videtur ille profecto id assequi, ut in vi viva metienda temporis ratio habenda non sit. Hic enim corpus A eandem ubique velocitatem, eandemque propterea vim vivam acquirit, quamvis tempora, quibus hanc acquirit, sint varia. An putas, Bernullium huc spectasse? Est enim cartesianis mirum in modum infensus, qui, ut suam illam de vi viva metienda opinionem tueantur, numquam ad tempus non confugiunt.

Quod, inquam, faciunt, o Puti, plus quam vellem. Bernullius autem huc etiam spectasse videtur; quamquam non hoc illi erat primo loco propositum. An autem sit
assecu.

affecutus, quod voluit, ut tempus iam in vi viva metienda contemni debeat, valde dubito. Etenim si Bernullii rationem sequimur, illud tempus contemni debet, quo series dilatantur, & corpus A vim vivam acquirit; atqui huius temporis ne cartesiani quidem rationem habent; quippe qui non id tempus considerari volunt, quo vis viva acquiritur, sed id, quo vis viva, postquam acquisita est, in effectu edendo amittitur. Itaque si quod corpus vi quadam viva sursum excurrat, non illi quidem quærunt, quanto tempore hanc vim acquisiverit, sed quantum sit illud tempus, quo sursum excurrendo, vim acquisitam amittit. Ac si corpus vi quapiam viva in materiam mollem se immitat, & foveam faciat; quærunt cartesiani quidem, quo tempore foveam faciat, & in ea facienda vim omnem amittat; quo autem tempore vim illam sibi comparaverit, non quærunt.

Quod ergo tempus Bernullius contemni vult, id & cartesiani contemnunt; quod autem cartesiani considerant, de eo Bernullius verbum non facit. Quamquam, ut supra dixi, non hoc erat illi primo loco propositum; illud potius sibi proposuerat, ut ostenderet exemplo aliquo vim vivam corporis A proportionalem esse numero elastrorum.

*An exemplo trium serierum OP, RS, TV satis
probetur vim vivam proportionalem esse
numero elastrorum.*

IDque præclare assequitur, inquit Gotardus Bonzius, qui in tempore adveniens postrema verba audiverat; itaque stans adhuc: an non vobis, inquit, de Bernullio sermo est? Is ergo plane ostendit, in tribus illis seriebus, quarum schemata vobis video esse in manibus, vim vivam proportionalem esse numero elastrorum. An non idem est elastrorum numerus in seriebus hisce omnibus? An non eandem vim vivam unaquæque series parit in corpore A? Est ergo utique vis viva elastrorum numero proportionalis.

Cum hæc Bonzius dicens confedisset; ego vero, respondi, nullus dubito, quin proportio ista constet in tribus illis seriebus, quas Bernullius suo modo sibi composuit. Vereor aliquantulum, ne proportio eadem non maneat in serie.

feriebus aliis. Hæc dicens, chartam sumsi, & seriem MN (*Fig. 7*) inscripsi, elastris sex compositam B, C, D, E, F, G in tres ordines distributis, ut singuli ordines elastris binis componerentur. Et facite, inquam, seriem hanc ex parte M obici immobili XZ incumbere, ex parte N urgere corpus A, idque æquale esse ei corpori A, quod urgetur a serie OP.

Quid hic vos? Putatisne, vim vivam, quam corpus A accipit a serie OP, esse ad vim vivam, quam accipit a serie MN, uti 4 ad 6? Ego quidem, inquit Grassius, non negem; sed id tamen probari velim. Videatur enim revolvi eodem, & quasi principium petere, siqui dicat, vim illam esse ad hanc, uti 4 ad 6, propterea quod vires vivæ proportionales esse debeant numeris elastrorum; nam quæstio est de hoc ipso.

Oporteret, inquit Bonzius, velocitates primum metiri, quas habet corpus A a seriebus OP, & MN; nam his cognitis statim vires vivæ cognoscerentur; ac tum demum appareret, an numeris elastrorum proportionales sint.

Ratio, inquam, optima: modo velocitates, quas metiri volumus, non ex illa ipsa virium vivarum proportione, quæ in quæstione est, ducamus. Velut heri bernullianus quidam, mecum in hanc quæstionem ingressus, faciebat. Argumentabatur enim sic: vis viva est ad vim vivam, uti 4 ad 6. Ergo velocitatis quadratum erit ad velocitatis quadratum, uti 4 ad 6. Ergo velocitas ad velocitatem, uti $\sqrt{4}$ ad $\sqrt{6}$. Velocitates profecto, si isto modo inveniantur, ex invenientur, ut vires vivæ existant elastrorum numero proportionales; sunt enim ductæ ex hoc ipso.

An non tu aliam, inquit Putius, velocitatum invenendarum methodum in academia proposuisti? Proposui ego quidem, inquam, sed illam bernulliani isti repudiabunt. Quid enim non repudient, ut illud teneant, vim vivam semper proportionalem esse elastrorum numero? Tamen, inquit Grassius, methodum istam tuam periclitemur. Quando id vultis, inquam, statim facio. Putemus in præsens, seriem triplicatam MN ad simplicem redigi, quæ uno tantum elastrorum ordine BC constet. Velocitas profecto, quam accipit corpus A a serie OP, ex his, quæ ego in academia docui, erit = 4. Quam vero accipiet a serie illa
simpli-

simplici, quam modo dixi, quæque binis elastris constat, erit $= 2$. Cum ergo series MN triplicata sit, ideoque velocitatem triplam afferat, accipiet corpus a serie MN velocitatem non amplius $= 2$, sed $= 6$. Velocitas ergo, quam accipit corpus A a serie OP, est ad velocitatem, quam accipit a serie MN, uti 4 ad 6. Erunt ergo vires vivæ, uti 16, & 36; non ergo uti elastrorum numeri.

Pulchre tibi procedunt omnia, inquit Tiolius; siquidem velocitates tuo modo invenisti. Sed quid ei tandem male vertat, qui, Bernullium sequens, velocitatem, quam corpus A accipit a serie OP, faciat esse, ut bernullianus ille tuus faciebat, $\sqrt{4}$; quam vero accipit a serie MN, faciat esse $\sqrt{6}$? Equidem video, hanc velocitatum mensuram ex eo duci, quod vis viva proportionalis elastrorum numero ponatur; idque ipsum duci ex eo, quod substantialis sit; qua quidem re confiteor, nihil esse obscurius. Tamen si quis obscuritatem rerum minus, quam tu, oderit, eaque Bernullii ratione implicari se sinat, quid ei tandem accidet minus commode?

Video, inquam, quid agas. Vis nempe, ut bernullianos ad absurdum deducam, vel certe ad id incommodum, quo perterriti opinionem deponant. Difficile id quidem est; nam modo obtineant, vim vivam, quam velocitatis quadrato metiuntur, proportionalem esse elastrorum numero, omnia ferre possunt. Ego certe non feram, si qui dicat, velocitatem, quam terni elastrorum binorum ordines BC, DE, FG in serie MN corpori A tribuunt, non esse triplam eius velocitatis, quam eidem corpori tribueret unus tantum horum ordinum. Cur enim non sit tripla, cum singuli ordines in idem corpus A æque agant? Et tamen tripla esse bernullianis non potest.

Quid ita? inquit Laghius; quia, inquam, si corpus A tribus ordinibus pellatur, quorum summa constet elastris sex, oportet sane, ex bernullianorum opinione, vim eius vivam esse $= 6$, ideoque velocitatem $= \sqrt{6}$. Similiterque si uno tantum ordine BC pellatur, qui elastris duobus constet, oportebit, vim eius vivam esse $= 2$, velocitatem $= \sqrt{2}$. Quis autem non videt, velocitatem eam, quæ sit $= \sqrt{6}$, minime triplam esse eius velocitatis, quæ sit $= \sqrt{2}$?

Ut

Ut ut est, mihi certe non satis probatur, vim vivam (si vis modo ulla viva est in natura) proportionalem semper esse elastrorum numero, a quibus manat. Vereor enim, ne variet, & ab hac proportionalitate aberret, quemadmodum aberrat, & variat velocitas. Libentius dixerim, quantitatem motus numero elastrorum respondere, quam vim vivam.

*An vis ulla viva sit
in natura.*

Libentius ego quoque, inquit Grassius, id dixerim. Sed quid est, quod ais: *si vis modo ulla viva est in natura?* An hoc etiam dubitas, utrum vis viva sit ulla? Scio enim in philosophia quam facile nihil teneas. Sed si vim vivam nullam esse ponis; quis quæso tibi credat, tam multos homines, tam litteratos, tam graves usque adhuc inter se contendisse de vi nulla? Ne ego quidem, inquam, id crederem; si illi graves, quid ipsa sit vis viva, de qua contendunt, omnes mihi eodem modo explicarent. Sed scis, vel in ipsa definitione quantum discrepent.

Quapropter ut perspicuitati serviam, quantum possum, quod me interrogas, dialecticorum more statim distinguo. Si enim vim vivam cum dicis, quantitatem ipsam motus, a potentia aliqua, & pressione ortam, intelligis; sanus non videar, si dubitem, an sit ulla in natura. Et vero quis umquam de ea dubitavit? Sin autem vim eam intelligis, quæ ad quantitatem motus addatur, quæque sit ipsa tamen quantitati motus proportionalis; quamquam quid ea opus sit in natura, non video; tamen si vis esse aliquam, non admodum repugnabo. Quod si vim eam intelligis, quæ ad quantitatem motus addatur, quæque non velocitati, quemadmodum motus quantitas, sed velocitatis quadrato æstimetur; hæc enimvero an sit ulla in natura, valde dubito.

Quid? inquit tum Laghius; cum corpora mota effectus in natura edant velocitatis quadrato proportionales; an non opus est, vim quamdam in corporibus motis inesse, quæ velocitatis quadrato proportionalis sit? Etiamne, inquam, substantialis? Non hoc dico, inquit Laghius; nam

ut sit vis viva in natura, & proportionalis quadrato velocitatis sit; non continuo tamen & immutabilis sit, oportet, & per se subsistens. Substantialitatis ergo opinionem, inquam, quæ quasi fundamentum a bernullianis ponitur, reiicis.

Credo, inquit Laghius, & hi reiiciunt; (ostendebatque mihi Ioannem Petrum fratrem meum, & Lælium Amadesium, quos dudum introiisse, non fenseram) hi enim, inquit, rident, cum substantialitatis nomen audiunt. Quod enim nomen, si paullo asperius sit, inquam, non hi rideant? Homines poetarum lectione perpoliti, quibus nihil venustum est, præter Adonidem. Non autem animadvertunt, quantum in his nominibus interdum sit ponderis. Sed hi profecto Bonamicum de rebus a Carolo Borbonio præclare gestis audire malunt; nostra hæc abhorrent. Bonamicum ergo, quem iam Ghedinus habet in manibus, audiamus.

Non; inquit Amadesius, nisi prius ad id respondeas, quod modo Laghius proponebat. Si enim corpora, quæ moventur, effectus edunt velocitatis quadrato proportionales, oportet sane, vim quamdam in illis esse velocitatis quadrato proportionalem; quæ, quoniam quantitas ipsa motus esse non potest, oportet, ut sit vis alia, quæ ad ipsam addatur. Vides, nos non in fabulis tantum delectari. Quod si voces interdum ridemus; insolentia nominum risum movet, non res ipsa.

Vos vero, inquam, cum omnia ad elegantiam referatis, ridetis iure quodam vestro. Nos his nominibus assueti sumus, ut iam credam poetas vestros nobis ignoscere. Sed quando tibi res placet; morem geram, & pauca de re dicam; modo illud mihi concedatis, ut cum ad id, quod Laghius modo proposuit, respondero, ad Borbonium transeamus. Quæro igitur, qui effectus hi sint velocitatis quadrato proportionales. Spatia, inquit Amadesius, quæ corpora sursum iacta excurrunt. Et foveæ, inquit Laghius, quas globi exempli gratia in sebum cadentes faciunt. Experimentum summi viri, Ioannis Poleni, non ignoras.

Nec ignoro, inquam, & summopere admiror. Sed prius dicam de spatiis. An ergo putas, Amadesi, spatium, quod adscendens corpus excurrit, ipsius corporis effectum esse?

esse? Non quidem, inquit Amadesius, spatium ipsum; sed quia corpus, adscendendo, se se omnibus spatii punctis applicat; hæc scilicet applicatio effectus est; quæ quoniam proportionalis est spatio ipsi, idcirco etiam velocitatis quadrato proportionalis est. Sic enim audio a leibnitianis disputari.

Ita sane, inquam. Sed quid, si, dum corpus adscendit, ex improvise omnis ei gravitas adimatur? Quid fiet corpori? Abibit sursum, inquit Amadesius, in infinitum motu æquabili. Et se se, inquam, applicabit spatio infinito. Hic se colligens Amadesius, cum aliquantisper substitisset, video, inquit, quam fallaciam nectas. Nempe, quia corpus, gravitate omni sublata, per infinita spatia abiturum est, vis inde colligi, vim eius vivam infinitam esse. In quo falleris. Etenim gravitate omni sublata, corpus in infinitum abit motu æquabili, neque in eo vim vivam ullam exercet; sola motus quantitate fertur, quæ, sublatis resistentiis omnibus, numquam in illo minuitur, sed manet eadem.

Hoc scilicet volebam, inquam. Nam si corpus per infinitum spatium excurrere potest sine vi viva, cur per finitum non possit? Ac si motus quantitas, quæ numquam minuitur, ei satis est ad infinita spatia percurrenda; cur eadem motus quantitas, si resistentiis aliis, atque aliis paullatim minuitur, non sit satis ad finita? Ut appareat, quantitatem motus, ab naturalibus potentiis ortam, satis valere ad omnia; vim aliam nullam ad hanc addi oportere.

Quo loco mirari satis non possum, quid sit, quod in corpore, si ad spatium aliquod sursum feratur, vim vivam quamdam omnes requirant; in eodem corpore, si per idem spatium deorsum cadat, vim vivam requirat nemo. Quid enim? An non idem cadendo describit spatium, quod adscendendo? An non iisdem punctis se applicat? Quod si quantitas motus satis cadenti est, ut spatii punctis se applicet, cur non sit satis etiam adscendenti? Ut hoc unum intersit, quod quantitatem motus in cadente gravitatis pressiones paullatim pariunt; in adscendente quantitatem motus iam partam paullatim minuunt, ac tandem extinguunt. Sed nihil impedit, quo minus quantitas motus satis sit vel cadenti, vel adscendenti ad spatia eadem emetienda.

Cum hæc dixissem; scite, inquit Ioannes Petrus subridens, ex istis spatiis evasisti; sed nondum tamen explicas, quid id sit, quod in corpore adscendente pro effectu haberi debeat. Nam spatium quidem ipsum effectus non est; applicatio autem corporis ad spatium est motus ipse, non effectus moti corporis. Quid ergo? An corpus hoc motu percitum nihil efficit? Nihil, inquam, efficeret, nisi contra nitentis gravitatis resistentias vinceret. In his ergo vincendis effectus omnis est positus. Quod si ita est, vide, quemadmodum rem expediam. Resistentiarum omnium summa, quas corpus adscendendo vincit, proportionalis est velocitati: quod omnes facile concedent; sunt enim resistentiæ nihil aliud, nisi pressiones, quas corpus a gravitate accipit, dum adscendit. Atqui hæc summa effectus est. Effectus igitur in adscendente corpore proportionalis velocitati est, non quadrato velocitatis. Viden', quam breviter rem totam expediverim, ut ne mullæ quidem tuæ brevius possint?

Te autem miror, Tiolius inquit, qui non ad tempus confugis, ad quod audio cartesianos solere semper perfugere. Nempe illos, inquam, cum semel erraverint spatium pro effectu ponentes, iuvat errare iterum, & tempus effectui admiscere; nam, spatium cum dividunt per tempus, resistentiarum summam, aliud agentes, metiuntur; & errant feliciter, sed tamen errant.

Exspecto iam, inquit Laghius, de foveis quid respondeas. Non admodum, inquam, longe abeo. Quid enim? Dum globus ex certa altitudine decidens in sebum se infligit, putasne, effectum esse foveam illam, quam facit, sive spatium illud, quod sebo vacuum relinquitur? Nequaquam, inquit Laghius; quis enim dicat, spatium illud a decidente globo effici? Sed quoniam globus per sebum descendens, multas eius partes removet, & resistentias earum vincit, has resistentias, quas vincit, in effectus loco pono.

Præclare, inquam. Qui ergo spatium, sive foveam, metiuntur, nihilque præterea requirunt, effectum non metiuntur; atque ut foveas velocitatis quadrato proportionales invenisse se, prædicent; non continuo tamen credendum est, effectus quoque fuisse velocitatis quadrato proportionales; videndum est enim, non quam foveæ, quæ fiunt, pro-

portionem habeant, sed quam proportionem habeant resistentiæ, quæ vincuntur; in his enim vincendis vis omnis absumitur. Resistentiis sublatis, dimotisque partibus, foveæ ipsæ per se existunt.








Atque in his experimentis, ut fatear, illud interdum mirari soleo, quod qui ea faciunt, eam semper velocitatem considerari volunt, quam globus, ex altitudine quapiam cadendo, acquisiverit; cui velocitati vim vivam quamdam adiungunt, eaque foveam fieri, dicunt. Quid enim velocitate ista opus sit, non video; vel omnino quid opus sit, globum ex altitudine quapiam decidisse.

Quid? inquit Amadesius: annon opus est, globum vim vivam quamdam habere, ut perrumpat sebum, & in ipsum se immittat? Hanc ille vim vivam, ex altitudine quapiam cadendo, acquirit. Nisi cadat, vim tantum habebit mortuam. Quid ergo, inquam, si prægravis globus, non ille quidem ex altitudine quapiam in sebum cadat, sed filo, aut manu sustentetur, usque dum sebi superficiem attingat, ac tum sibi relinquatur? An non sebum perrumpet suo pondere, & foveam quamdam faciet? Hanc vero qua vi faciet? Nam cum primum descendere per sebum incipit, vim vivam nullam habet. At, inquires, vim vivam acquirit per sebum descendendo. Igitur vim vivam acquirit, faciendo foveam, idest effectum edendo. Quid ergo aiunt, effectum id esse, in quo edendo vis viva amittitur; cum hic quidem in effectum edendo acquiratur?

Sed faciamus etiam, si volumus, globum, dum descendit per sebum, & foveam facit, præter quantitatem motus, quam a gravitate accipit, accipere etiam vim vivam. Non hanc tamen accipiet, nisi cum per quoddam spatium descenderit, idest cum foveam quamdam fecerit. Hanc ergo foveam, quam facit, antequam vim vivam accipiat, qua vi facit? Quod si, nullam adhibens vim vivam, partem tamen aliquam foveæ potest facere, cur partes quoque alias, & foveam totam non possit? Ut hoc foveæ negotium per solam motus quantitatem expediatur; vim vivam nullam adiungere opus sit.

Sed iam, obsecro, ista mittamus; ad molliora studia veniamus. Ut lubet, inquit Grassius. Tu hæc tamen cum academia profecto communicabis. Vereor, inquam, ne, si
de

de his rebus iterum in academia differam, molestus sim; præsertim cum ex res sint, quæ dici ex tempore dilucide satis vix possint. Tu vero, inquit Grassius, ne obscurus in dicendo sis, timeas? Tamen res easdem mandare litteris potes. Faciam, inquam, si otium erit.



FRANCISCI MARIAE ZANOTTI

De elastris.

SERMO TERTIUS.

Cum superiore anno pauca quædam de elastrorum vi, & natura contra Camusium, excellentissimum longe mathematicum, & in parisiensibus academicis clarissimum, proposuerim; non satis ea de re dixisse videbor, nisi hominis doctissimi cum sententiam reiecerim, argumentum etiam, demonstrationemque dissolvam. Est enim omnis perfecta oratio, ut Rhetores omnes tradunt, in argumentatione & confutatione posita, quarum alteram si tollas, nihil aut parum momenti sit in altera. Patiemini ergo, Sodales optimi, me rursus ad rem eandem reverti, & Camusii argumentum paullo diligentius expendere, ut quam disputationem non sine vestra approbatione suscepi, eandem perficiam hoc vespere.

*Theorema Camusii proponitur,
& declaratur.*

Camusius theorema hoc statuit. Sit AB (*Fig. 1*) longitudo cuiusvis elastrorum seriei: quæ series cum sit immobilis in A, relaxans se se ad partem B globum urgeat. Sintque elastra seriei omnia & forma, & magnitudine, & vi inter se æqualia. Velocitas globi proportionalis erit non lineæ AB, sed eius radici. Sic Camusius. Ego, lineæ, dixeram.

Quoniam vero in seriebus tantum similibus theorema hoc suum Camusius proponit; videamus iam (ne quid ambiguum relinquamus) quas ille series vocet similes. Duas ergo series similes vocat, si in pari elastrorum omnium dilata-

lata-

latatione pressio seriei unius eandem semper habeat proportionem ad pressionem alterius.

Qua definitione posita, si elastra omnia utriusque seriei cum vi, tum forma, & magnitudine æqualia inter se sint, (esse autem in præsens putantur) nulla erit series non cuius similis. In pari enim elastrorum omnium dilatatione, pressio unius seriei semper æqualis erit pressioni alterius, si Camusium audimus; si me auditis, pressio semper æqualis erit pressioni, si ambæ series immotæ teneantur; sin autem relaxent se se, pressio semper erit ad pressionem, uti numerus elastrorum ad numerum.

Iam vero si sint AB, CD (*Fig. 1*) serierum duarum similiarum longitudines; ac series ipsæ immobiles in A, & C, relaxando se se ad partes B, & D, duos globos æquales pellant; sintque præterea AE, AF, & CG, CH partes similes longitudinum AB, CD; non est dubium, quin, cum series relaxando se se pervenerint primum ad puncta E, & G, tum ad puncta F, & H, pressio in E sit ad pressionem in G, ut pressio in F ad pressionem in H.

Quippe quia cum sint AE, CG, & AF, CH partes similes longitudinum AB, CD, facile intelligitur, elastra utriusque seriei omnia æqualiter dilatata esse debere, simul ut series pervenerint in E, & G, vel in F, & H. Porro autem ut pressiones in punctis E, F, G, H proportionales sunt, proportionales quoque erunt velocitates, quas globi in iisdem punctis acquirunt. Id per se satis clarum est.

*Constructio, & demonstratio propositi
theorematum.*

HÆtenus series similes explicavi, in quibus theorema suum Camusius proposuit. Ad id autem demonstrandum constructionem hanc adhibet.

Convertantur lineæ AB, CD (*Fig. 1*) in duas curvas IK, LM ita inflexas, ut si globi ex I, & L per eas decendant, eandem a gravitate velocitatem in quibusque punctis accipiant, quam in iisdem punctis accipiunt ab elastris, dum lineas AB, CD percurrunt.

Antequam constructionem reliquam persequor, operæ præ-

pretium est explicare, quæ sint in construendis his curvis supponenda, qualesque hæ curvæ sint.

Et primum quidem putandum est, velocitates illas, quas primum globi a gravitate accipiunt in punctis I, & L, æquales esse illis, quas primum accipiunt ab elastrorum seriebus in punctis A, & C. Quod si præsens gravitas, quam natura corporibus indidit, id non ferat; possumus utique id gravitatis genus fingere, quod id ferat.

Secundo quoniam globi, percurrentes lineas AB, CD, velocitatis incrementa alia aliis semper minora ab elastrorum seriebus accipiunt; ac tandem in punctis B, & D incrementum velocitatis accipiunt nullum; sic etiam putandum est, latercula omnia curvarum IK, LM alia aliis inclinatiores semper esse, donec ad ultima perveniatur in K, & M; quæ horizontalia sint, oportet; ut ibi scilicet incrementum velocitatis a gravitate sit nullum.

Et curvis quidem his ita constructis, dubitari non potest, quin, si arcus bini IN, IO, & bini LP, LQ, sint partes similes curvarum IK, LM; velocitates, quas cadentes globi habebunt in punctis N, O, P, Q, proportionales esse debeant. Etenim si in lineis AB, CD sumantur segmenta AE, AF, CG, CH æqualia arcibus IN, IO, LP, LQ, erunt AE, AF, CG, CH partes similes linearum AB, CD; & velocitates in punctis E, F, G, H, uti supra diximus, proportionales.

Ex hoc porro, quod globorum velocitates in N, & O; & in P, & Q, proportionales sint; (qualescumque sint arcus IN, IO, LP, LQ, modo partes sint similes curvarum IK, LM) sibi dari Camusius vult, ut curvæ ipsæ IK, LM pro similibus, & similiter positæ haberi possint, & omnia eis tribui, quæ curvis similibus, & similiter positæ tribuuntur.

Atque hinc sane theorematis sui demonstrationem habet expeditissimam. Ductis enim horizontalibus lineis KR, MS, quæ perpendiculares duas IR, LS fecerint in R, & S, facile intelligitur, poligona IRK, LSM similia esse; esseque $IR, LS :: IK, LM, \& \sqrt{IR}, \sqrt{LS} :: \sqrt{IK}, \sqrt{LM}$.

Quare cum velocitates, quas globi a gravitate acquirunt, cadendo ex I in K, & ex L in M, sint utique inter

se, uti \sqrt{IR} , & \sqrt{LS} , erunt quoque uti \sqrt{IK} , & \sqrt{LM} ; ideoque etiam velocitates, quas iidem ab elatrorum pulsu acquirunt percurrendo lineas AB, CD, erunt, uti radices linearum ipsarum AB, CD.

Neque vero Camusius hanc demonstrandi viam aperte tenet; etenim longius spectans, & multa simul colligere volens, postquam curvas IK, LM eo, quem supra dixi, modo construxit, ex illarum similitudine, & notissimis gravium proprietatibus, formulas quasdam sibi condit, e quibus, tamquam e communibus locis, argumenta petit omnia ad suas sententias stabiliendas. Mihi quidem non videtur res tanti fuisse; ac potuerunt fortasse multa, vel sine formulis, brevius, atque adeo clarius, expediri; velut hoc ipsum theorema, de quo loquimur, cuius demonstrationem e formularum latebris quasi eductam, & omni prope artificio spoliatam, in medio posui. Nunc eandem consideremus, si placet.

*An velocitates cadentium globorum per IK, & LM
sint inter se, uti radices altitudinum
IR, LS.*

ET primum quidem illud in hac demonstratione ponitur: velocitates globorum cadentium ex I in K, & ex L in M, ita inter se esse, uti radices altitudinum IR, & LS. Id nisi concedas, demonstratio tota corruat, necesse est.

Videamus ergo quatenus concedendum id sit. Ego vero, si globi ambo eodem agantur gravitatis genere, idest impulsus accipiant ambo a gravitate æquales; concedo utique, cadentium corporum velocitates proportionales esse radicibus altitudinum; non autem concedo, si gravitatis genus sit dispar; idest si globus alter impulsus maiorem a gravitate accipiat, alter minorem.

Etenim qui demonstrant, velocitates cadentium corporum ita inter se esse, uti radices altitudinum; id scilicet demonstrant, quia terrestria tantum corpora inter se comparant, quæ omnia eodem gravitatis aguntur genere. Non idem demonstrarent, si corpora duo inter se compararent, quorum alterum in terram caderet, alterum, exempli cau-
sa,

fa, in lunam; siquidem dicuntur omnia in luna multo minores impulsus accipere a gravitate. Atque hæc sane comparatio si fiat, cadentium velocitates radicibus altitudinum minime proportionales invenientur.

Sinite hoc loco, Sodales præstantissimi, me a proposito paullisper digredi, ut illos moneam, qui vim vivam velocitatis quadrato ex eo maxime metiuntur, quod cadentia corpora vim vivam acquirunt altitudini, unde decidunt, proportionalem; censetur autem altitudo proportionalis esse velocitatis quadrato. Quod illis recte procedet, quamdiu terrestria cum terrestribus comparabunt. Videant autem, si a terra discesserint, in luna ne quid offendant. Si enim terrestre aliquod corpus, quod in terram cadat, cum lunari quopiam comparent, quod cadat in lunam, non erunt, quod supra dixi, velocitatum quadrata altitudinibus proportionalia. Quid, si in venerem transeant, si in mercurium, si in alia cœlestia corpora, quorum singula proprium habent gravitatis genus? Quæ erit a planetis, cometisque omnibus, & quanta dissensio? Hæc dixi, non ut homines arguerem, sed ut monerem.

Ad propositum iam redeo. Ut demonstratio Camusii ne corruat, sintque velocitates globorum decidentium ex I in K, & ex L in M radicibus altitudinum proportionales; putandum sane est globos ambos eodem agi gravitatis genere, idest æqualiter a gravitatibus suis pelli in punctis I, & L, ideoque etiam æqualiter ab elastrorum seriebus pelli, in punctis A, & C. Idque ipsum sane Camusius supponit; nam quamvis in condendis suis formulis nullam certam his impulsibus proportionem assignet; ut formulas tamen ipsas theoremati accommodet, idque efficiat, quod vult; impulsus, qui fiunt in I, & L, æquales esse supponit; idque ex eo, quod illos etiam æquales supponit, qui fiunt in A, & C. Quod facit ille quasi iure quodam suo. Commodius autem fecisset, si quod supposuit, ratione aliqua demonstrasset.

Ego certe cum dixi (recordari enim omnes potestis) impulsus illos, quos globi ab elastrorum seriebus primum accipiunt in A, & C, minime æquales esse, sed elastrorum numero proportionales, id etiam demonstrare conatus sum; & præterea argumenta collegi, quæ contra videbantur dici

posse, ut ea, si possem, etiam solverem. Quo apparet, me nihil assumisse arbitrato meo; certe noluisse.

*An curvæ lineæ IK, LM similes sint,
& similiter positæ.*

Alterum est, sine quo stare Camusii demonstratio non potest: curvas scilicet IK, LM & similes, & similiter esse positas. Id nempe Camusius ex eo colligit, quod, si arcus quivis sumantur IN, IO, LP, LQ partes similes curvarum IK, LM, velocitates, quas cadentes globi habent in punctis N, O, P, Q, proportionales sunt. Mihi non videtur id satis esse ad similitudinem, similemque curvarum positionem colligendam. Quod plane manifestum fiet, si duas ipse curvas lineas IK, LM (Fig. 2) construxero, in quibus illa utique velocitatum proportionalitas conservetur; ipsæ autem curvæ nequaquam similes, & similiter positæ sint. Has statim construo.

Accipiantur in duabus lineis verticalibus IR, LS partes infinitæ, infiniteque parvæ Ip, pq, qr &c. Ls, st, tu &c., totidem in utraque linea. Sintque lineolæ Ip, pq, qr &c. aliæ aliis semper minores, differentia infinitesima secundi ordinis; sitque præterea prima Ip ad primam Ls, uti secunda pq ad secundam st, & sic deinceps; ut sint lineolæ Ls, st, tu &c. ipsæ quoque aliæ aliis semper minores eodem modo.

Hoc factò ducantur horizontales totidem lineæ ph, qz, rk &c. sm, tn, uo &c., ductisque lineolis duabus quibusvis Ih, Lm, quæ fecent horizontales in h, & m; factò centro in h, intervallo hI, describatur circulus secans qz in z, ducaturque lineola hz. Et similiter factò centro in m, intervallo mL, describatur circulus secans tn in n, ducaturque lineola mn; eodemque modo ducantur zk, no, aliæque deinceps.

Non est dubium, quin series lineolarum Ih, hz, zk &c., & series lineolarum Lm, mn, no &c. duas curvas lineas IK, LM constituent; etenim cum sit Ip maior quam pq; sit vero Ih æqualis hz, fieri nequit, ut sit hz in directum lineæ hI; sed oportet, ut ab eius directione tantillum deflectat. Idemque accidet lineolis aliis omnibus, ut de-

flectant

flectant semper alia ab aliis, & quidem in eandem partem.

Curvas construxi IK, LM. Nunc duo ostendam: primum has curvas eiusmodi esse, ut si arcus bini IN, IO, & bini LP, LQ partes similes ipsarum sint; globi autem duo ex I, & L per eas decidant; velocitates, quas globus alter habebit in N, & O, proportionales futuræ sint velocitatibus, quas habebit alter in P, & Q; secundo fieri posse, ut hæ curvæ nequaquam sint similes, & similiter positæ.

Primum ostendam, ductis horizontalibus NE, OH, PC, QT, quæ fecent perpendiculares IR, LS in punctis E, H, C, T. Cum sint arcus IN, LP partes similes curvarum IK, LM, tot erunt latercula Ih, hz &c. in arcu IN, quot erunt latercula Lm, mn &c. in arcu LP; & pariter tot lineolæ Ip, pq &c. in linea IE, quot erunt lineolæ Ls, st &c. in linea LC. Quare cum sit prima Ip ad primam Ls, uti secunda pq ad secundam st, & sic deinceps; erit etiam tota IE ad totam LC, uti Ip ad Ls. Eodemque modo ostendetur, esse etiam IH ad LT, ut est Ip ad Ls. Erit ergo IE, LC :: IH, LT, sive IE, IH :: LC, LT, & \sqrt{IE} , $\sqrt{IH} :: \sqrt{LC}$, \sqrt{LT} . Atqui velocitates, quas habet globus alter in N, & O, sunt inter se, uti \sqrt{IE} , & \sqrt{IH} ; velocitates vero, quas habet alter in P, & Q, sunt inter se, uti \sqrt{LC} , & \sqrt{LT} ; ergo velocitates illæ his erunt proportionales.

Fieri autem potest (quod secundo loco proposui), ut hæ curvæ IK, LM nequaquam similes & similiter positæ sint. Quod sic ostendo. In construendis his curvis latercula prima Ih, Lm, ut cuique luberet, sumi sivismus; ac poterunt utique ea sumi, ut anguli Ihp, Lms inæquales fierent; putemus ergo hos angulos factos fuisse inæquales; iam igitur prima illa latercula Ih, Lm nequaquam erunt similiter posita. Iam vero latercula, quæ secuntur, hz, mn vel angulos zHI, nmL æquales faciunt, vel inæquales; si æquales, ergo ne ipsa quidem erunt similiter posita, quoniam æquales angulos faciunt cum laterculis Ih, Lm positis non similiter; si inæquales, iam ergo curvæ IK, LM non sunt similes.

Appa-

Apparet igitur, illam, quam diximus, velocitatum proportionalitatem non satis esse ad ostendendum, curvas hæc & similes, & similiter esse positas.

Quid requiratur ad harum curvarum similitudinem; similemque positum inducendum.

Requiritur præterea, ut anguli Ihp , Lms sint æquales. Et sane, si æquales hi sint, curvæ lineæ IK , LM & similes, & similiter positæ esse debebunt. Quod statim ostendam, ductis lineis hy , mx , quæ parallelæ sint lineolis pq , st , fecentque lineas qz , tn in punctis y , & x .

His enim ductis facile intelligetur, lineolas, zh , hI , Ip , pq , hy , omnes ex ordine proportionales esse lineolis nm , mL , Ls , st , mx ; esseque propterea zh , $hy :: nm$, mx ; quare cum sint anguli hyz , mxn æquales, ut qui recti sunt; facile constat, æquales quoque esse angulos zhy , nmx ; ideoque cum sint æquales etiam anguli yhp , xms ; quippe recti; & æquales etiam sint anguli phI , smL ex supposito; consequens est, ut etiam reliqui anguli zhI , nmL æquales esse debeant. Quod cum ad angulos alios omnes transferri possit, quotcumque a laterculis deinceps sequentibus fiunt, satis constat, curvas IK , LM esse similes.

Neque minus manifestum est, similiter esse positas; quippe quia latercula Ih , Lm , propter æqualitatem angulorum Ihp , Lms , sunt utique similiter posita; sequentia vero latercula ipsa quoque similiter posita esse oportet, cum alia ab aliis deflectant paribus semper angulis.

Videtur ergo curvarum, quas construximus, IK , LM similitudo omnis ex eo pendere, ut anguli Ihp , Lms æquales sint. Horum angulorum æqualitatem si tollas, proportionalitas velocitatum in punctis N , O , P , Q manebit; similitudo curvarum, & similis positus non manebit.

*An liceat Camusio æqualitatem angulorum
Ihp, Lms supponere.*

Quamquam id quidem non in his tantum curvis valet, quas finximus, sed in omnibus, quocumque tandem modo constructæ sint; ut nullæ similes, similiterque positæ esse possint, nisi illa, quam diximus, angulorum Ihp, Lms æqualitas supponatur. Quare Camusii argumentum solutum satis habebimus, si ostendamus, hanc illi angulorum æqualitatem supponere non licere. Rem repetam ab initio.

Cum sint curvæ IK, LM, ut Camusius vult, non solum similes, & similiter positæ, sed æquales etiam longitudinibus AB, CD (*Fig. 2*); sane sequitur, ut quemadmodum latercula prima Ih, Lm sunt partes similes curvarum; sic etiam lineolæ primæ Af, Ce, æquales laterculis Ih, Lm, sint partes similes longitudinum AB, CD.

Oportet præterea, ut Camusii ratio fert, velocitatem, qua globus decidit ex I in h, æqualem esse velocitati, qua globus idem, elastris pulsus, percurrit lineolam Af; eodemque modo velocitatem, qua globus decidit ex L in m, æqualem esse velocitati, qua globus idem propter elastrorum pulsum percurrit lineolam Ce.

His prævisis duo hæc pono. Primum: si velocitates, quibus globi, elastris pulsus, percurrunt lineolas Af, Ce, sunt inter se, uti \sqrt{Af} , & \sqrt{Ce} ; erunt utique, in curvis lineis IK, LM, anguli Ihp, Lms æquales. Secundo: si velocitates, quas dixi, non sunt inter se, uti \sqrt{Af} , & \sqrt{Ce} ; anguli Ihp, Lms æquales esse non poterunt.

Demonstro primum. Si velocitas, qua percurritur Af, est ad velocitatem, qua percurritur Ce, uti \sqrt{Af} ad \sqrt{Ce} ; erit iam ex his, quæ diximus, etiam velocitas, qua globus labitur per Ih, ad velocitatem, qua labitur per Lm, uti \sqrt{Ih} ad \sqrt{Lm} ; atqui illa velocitas est ad hanc, etiam ut \sqrt{Ip} ad \sqrt{Ls} ; erit ergo \sqrt{Ih} , $\sqrt{Lm} :: \sqrt{Ip}$, \sqrt{Ls} , & Ih, Lm :: Ip, Ls; ideoque propter æqualitatem angulorum Iph, Lsm, qui recti sunt, similia erunt triangula Iph, Lsm, & anguli Ihp, Lms æquales.

De.

Demonstro secundum. Si velocitas, qua percurritur Af, non est ad velocitatem, qua percurritur Ce, uti \sqrt{Af} ad \sqrt{Ce} ; ne velocitas quidem, qua globus labitur per Ih, erit ad velocitatem, qua labitur per Lm, uti \sqrt{Ih} ad \sqrt{Lm} ; atqui tamen velocitas illa est utique ad hanc, uti \sqrt{Ip} ad \sqrt{Ls} ; non erit ergo $\sqrt{Ih}, \sqrt{Lm} :: \sqrt{Ip}, \sqrt{Ls}$, neque Ih, Lm :: Ip, Ls; neque triangula Iph, Lsm similia erunt, neque anguli Ihp, Lms æquales.

Aequalitatem igitur angulorum Ihp, Lms supponere nullo modo licet, nisi si prius supponatur, velocitates, quibus globi ex elastorum pulsu percurrunt lineolas Af, Ce, esse inter se, uti \sqrt{Af} , & \sqrt{Ce} , idest uti radices longitudinum AB, CD. Atqui id supponere Camusio non licet; si id enim supponat, id supponat, quod maxime in quaestione est; non igitur Camusio licet, angulorum Ihp, Lms æqualitatem supponere. Ac si hanc non supponit, ne curvas quidem lineas IK, LM (quocumque tandem modo constructæ sint) pro similibus, & similiter positis habere potest.

*De ipsa Camusiani argumenti
forma.*

HAec sunt, Sodales optimi, quæ me primum, cum in illum Camusii sermonem incidissem, quamvis nondum satis perspecta animo haberem & cognita, fecerunt tamen, propter obscuritatem nescio quam, ut elegantissimæ, ingeniosissimæque demonstrationi minus assentirer; postea studio adhibito rem totam evolvere conatus sum, quæ tamen & apertior fuisset, & se se citius prodidisset, si Camusius quidem argumentum suum ad dialecticorum leges conformasset, & minus timide conclusisset.

Non enim ille, tamquam dialecticus aliquis strenuus, atque audax, sic ponit: *Si curvæ duæ id habent, ut velocitates cadentium in similibus quibusque partibus proportionales sint; sunt similes: hæ curvæ id habent: ergo sunt similes: sed cum primum posuerit: hæ curvæ id habent: ad earum similitudinem colligendam statim addit: si similes sunt, id habent:*

in

in quo videtur dialecticos audire noluisse, quorum vetus præceptum est, iam inde ab Aristotele profectum, & græcis, romanisque oratoribus probatissimum, ut conditione posita id colligatur, quod sequitur; non ex eo, quod sequitur, colligatur conditio ipsa.

Idque videtur Camusius contempsisse magis, quam non vidisse; itaque rationem concludit timidius; non enim sic colligit: *ergo curvæ sunt similes: sed: ergo pro similibus haberi possunt*; perinde ut si possint esse, & possint etiam non esse similes; liberum autem cuique sit eas sumere, ut lubet. Quam libertatem si ille cuivis concedit, miror. Etenim si curvæ similes plane sint, theorema illud colligitur, quod ipse vult; sin autem non sint, colligi potest contrarium; ut certe videatur non fuisse hic locus cuiusquam libertati committendus.

Hæc dixi, Sodales optimi, ne cum doctissimi, ingeniosissimique mathematici sententiam non amplecterer, demonstrationem viderer aspernari; quam ego quidem summo opere admiror; sed curare tamen debui, ut, si possem, refellerem; est enim superbum, atque arrogans magnorum hominum opiniones reiicere, rationibus non respondere.

Fig. 1.







Fig. 2.



VINCENTII MENGhini

*De ferrearum particularum progressu
in sanguinem.*

ANte plures annos constitueram in martialium medicamentorum effectus, & agendi modum, inquirere, præsertim cum singularis eorum efficacia ad quamplurimos morbos curandos, tum priscis, tum recentioribus medicis semper fuerit admirationi. Ad quam inquisitionem rite instituendam, illud mihi præstandum videbatur, ut prius multis, & accuratis experimentis certior fierem, an vere metallica hæc substantia in stomacho, & intestinis subacta ad vias sanguinis progredere. Id cum anno proximo superiore fuisset aggressus, accidit, ut nonnulla phænomena inter experiendum a me visa, ab hoc ferri transitu in sanguinem explorando me avocarent, & ad aliam prorsus diversam indaginem allicerent, nimirum, ut cognoscerem quodnam esset proprium ferri domicilium in viventium corporibus, quod meminere, puto, me tandem fuisse aliqua ex parte assequutum. Iam ergo, Sodales optimi, ad intermissam investigationem rediens, meorum laborum eventum maiori, qua potero, perspicuitate, vobiscum communicabo. Itaque & ferri progressum in sanguinem, de quo disputatio est inter medicos, & eiusdem metalli præcipuos, & magis constantes effectus, quos, occasione huius investigationis, mihi contigit observare, paucis dicam.

Iam vero cum ferrum pro varia suarum partium habitudine, modo magis, modo minus aptum videretur ad lacteos ductus subeundos, hinc operæ pretium duxi, metalli huius multiplices formas, omnino sex, quas statim enumerabo, mihi in ipso experimentorum aditu comparare: scilicet, primum vulgaris ferri scobem nullo artificio tractatam, sed tantum setaceo traiectam in promptu habui: de-

inde scobem diuturno lapidis porphyrites attritu præparatam: mox hanc ipsam scobem musto ad mellis consistentiam excoctam (quod compositum magni est usus apud plerosque florentinos, qui illud ferri spumam appellant): præterea mineram crudam in pollinem redactam; denique duas medicis notissimas ferri præparaciones, crocum nempe, & tincturam; crocum quidem, quem vocant aperitivum subtilius contritum; tincturam vero, forma liquaminis cuiusdam ad guttas aliquot exhibendi. Porro unamquamque ex istis sex substantiis in diversis animantium generibus adhibui, videlicet in canibus, in suibus, in pullis, in hominibus, & quidem singulas in plerisque; tempus administrationis fuit in omnibus idem, nimirum dierum saltem quadraginta: quod attinet dosim, hæc varia fuit pro varia animantium corporis magnitudine, sed eadem in genere eodem: erat quippe rationi maxime consentaneum pullis minimum pondus, canibus paulo maius, suibus adhuc maius, hominibus denique illud, quod praxis probabat, exhibere: atque ut sanguinis statum in cunctis hisce animantium generibus, post assumptum metallum, intimius cognoscerem, curavi, ut antequam hoc sumerent, singulorum sanguinem exploratum haberem, aut si quando id, vel propter viventium exiguitatem, ut in pullis, vel propter eorum feritatem, ut in suibus, instituire non licuisset, saltem id mihi solemne fuit, ut eiusdem generis sanguis præsto esset, qui cum homogeneo sanguine ex ferro nutrito, ubi occasio daretur, posset pro lubitu comparari.

Ut autem accuratiora, magisque accepta mea forent experimenta, duorum solertissimorum virorum adiumento in singulis usus sum: nempe medici, & in anatomicis sectionibus exercitatissimi Fabii Vignafferri, qui dicta animalia modo adhuc viventia, modo mortua summa dexteritate dissecuit; itemque præstantissimi viri Herculis Lelli, qui in experimentis conficiendis non solum consilium, atque incitamentum, sed & opem, & diligentiam præstitit incredibilem; ut nihil dicam de Iacobo Conti, cuius in hac re tantum diligentia, & opera usus sum, quantum amicitia utor in omnibus, idest commodissime; nam cum ad propositum mihi finem duplici potissimum examine opus esse intelligerem, altero chymico, quo sanguinem, altero ana-
tomico,

tomico, quo vasa, & partes animalium solidas explorarem, nempe eo consilio, primum, ut martialis substantia in viventium sanguinem, si qua esset ingressa, perspicue appareret, tum eiusdem martis transitus a lacteis in ductus sanguiferos manifesto cognosceretur: hinc veluti duplex experimentorum classis exorta est, in quarum utraque dictorum peritissimorum virorum industria erat mihi opportunissima.

Exordiar igitur a sanguine: quod antequam facio, finite, ut distinctionem illam ferrearum particularum in duo summa genera, quam anno elapso institui, quam brevissime commemorem. Vocavi particulas primi generis illas, quæ ab invicem sunt solutæ, & quamquam paulo remotius a magnete, ad illum tamen confestim accurrunt: secundi generis, quæ confestim, & quasi glebularum forma cultro magnetico adhærent, modo propius ad illas admoveatur. Iam ergo sanguinis examen chymicum eo ferme modo, quo superiore anno audivistis, sic peractum est. Extractis separatim ex animantibus pluribus ferro minime nutritis, scilicet ex homine, cane, sue, quinque unciis sanguinis, iisque ad ignem exsiccatis, & ad scrupuli unius pondus redactis, diligenter exploravimus, quot ferreæ moleculæ, sive primi, sive secundi generis, in eo continerentur: similiter in totidem unciis sanguinis eiusdem speciei, sed aliqua ex supra recensitis ferreis præparationibus quadraginta dies nutriti, & ad scrupuli pariter pondus redacti, latentis ferri copiam investigavimus; & quoniam in avibus ob sanguinis inopiam, tantundem colligi non potuit, eandem tamen proportionem, scilicet ut quo minus erat extracti sanguinis pondus, eo minor quoque foret exsiccati pulveris quantitas, ubique servavimus. Quod cum respectu prædictarum sex martialium præparationum singillatim in memoratis animalium speciebus iterum, ac sæpius præstitum fuerit, vix audeo dicere, quanta experimentorum seges mihi se se obtulerit, quantusque labor fuerit subeundus. Mitto dicere ea omnia, quæ in animalium delectu, & nutritione fuerunt observata: nam primum quantum ad homines, in quibus, solius morbi occasione, martialia medicamenta præbere datum erat, illos elegimus, qui morbo non admodum dissimili laborarent: quantum ad bruta;

hæc

hæc, quoad fieri poterat, ætate, viribus, statura, paria deligebantur. Horum pondera, antequam ferreum alimentum præberetur, accurate notabantur: notabatur omnium aspectus, oculorum nitor, alacritas, in cibo, ac potu capiundo fastidium, aut promptitudo, excrementorum status; denique symptomata, aut qualitatum quarumcumque mutationes, quæ de individui salute, aut morbo nos possent admonere; præcipue vero pulsus ratio habita est, adeo ut de singulis prædictis viventibus, demptis avibus, & suibus, innotesceret, quot ictus in unoquoque horæ minuto, tam ante, quam post peractam ferream diætam numerarentur. Ut igitur primum, quæ in hominibus observare contigit, vobiscum communicem, scire oportet, ex sex illis ferreis substantiis tres tantummodo in quatuor ægrotantibus fuisse adhibitas; nempe tum in muliere chlorosi affecta, tum in viro hypocondriaco ferream scobem porphyrite subactam: in altera muliere mæsenterii obstructionibus detenta, spumam ferri; denique in homine altero hypocondriaco, crocum martis aperitivum. Iam, quæ observando didicimus, huc redeunt. Urinæ, quas prædicti quatuor ægroti egresserunt, aut eundem ferrearum particularum exiguum numerum, tam ante, quam post ferri usum habuerunt, aut vix tantillo maiorem habuit eius mulieris lotium, cui spuma data est. Contra vero pulsationum arteriæ numerus in omnibus aliquantisper est auctus; & in muliere quidem chlorosi affecta, itemque in viro hypocondriaco, qui ambo scobe utebantur, magis insigniter; in illa, ex quinquaginta duabus, ad sexaginta quatuor minuti intervallo; in hoc a septuaginta, fere ad octoginta: neque est prætereundum, eidem mulieri & vultus colorem, & cathameniorum fluxum per id curationis tempus rediisse. Reliquos duos ægros quod attinet, in his quoque factum est aliquod in pulsationum arteriæ numero incrementum, sed minus, quam in prioribus. Manifestum quoque discrimen indicavit sanguinis analysis. Nam is ad ignem de more excoctus, & in viro, & in muliere, post sumptam scobem ferream, profecto plures ferreas primi generis atomos, quam ante, nobis obtulit: alter vero ægrotus croco curatus, licet sanguinis calcem habuerit ferro refertiolem, quam antea, habuit tamen copia paulo minore: adhuc longe minore habuit eius mulie.

mulieris sanguis, cui ferri spuma medebamur. Est etiam animadversio dignum, quod tam in humano, quam in aliorum animantium sanguine solet deprehendi, videlicet quo plures insunt in eo metalli particulæ, eiusque usus fuit diuturnior, plerumque colorem præferre intensius rubicundum, ac ferme coccineum, & serum in ipso ad reliquas partes maiorem habere proportionem.

Ab hominibus ad bruta transeuntes, in horum historia erimus paulo proluxiores: nam quod in hominibus non licuit, datum est pluribus, ac diversis modis periclitari in canibus, quorum circiter decem, & octo ferreo hoc regimine, ea, quam supra innui, diligentia, & diuturnitate tractavimus. Omnium sanguis post illud regimen, quamquam non semper æque dives ferro apparuerit, semper tamen aliquantisper ditior fuit, quam ante.

Ex his vero sex præsertim memoria digni visi sunt. Horum bini, ambo venatici, vesci coacti sunt cibo plurima scobe ferri imbuto per setaceum traiecta: bini non venatici minera cruda; quintus croco; sextus demum scobe eadem porphyrite lævigata. Primis diebus alii alimentum huiusmodi fastidiebant: vomebant alii, alii latratibus, anxietate, gemitibus, interiorem corporis perturbationem manifestabant, minus tamen ii, qui minera vescebantur. Desierunt autem abhorre ab huiusmodi alimentis circa quintam diem, scilicet oborta fame, & nigris apparentibus alvinis fœcibus: progrediente vero curatione, sensim cibum, a quo abhorruerant, cœperunt avide ingurgitare, tum fieri alacriores, ad motum promptiores, robusti magis, ac carceris impatientes: quin tractu temporis omnium pulsus frequentior, quam ante, observatus est, & quidem priores duo venatici, qui scobe rudi utebantur, quive & oculis sanguineis, & truci aspectu, & siti, & voracitate, & inquietudine ceteris præcallebant, pulsus habuerunt minuti intervallo sexdecim fere ictibus celeriores. In quatuor reliquis canibus pulsus frequentia ad tale incrementum non pervenit. Porro cum absoluta iam ferrea diæta omnium, quotquot alebamus, canum pondus ad stateram metiri consueverimus, repertum est in singulis librarum aliquot incrementum, præcipueque in iis, qui mineram accipiebant, dempto ex prædictis sex illo, cui crocus datus est;

huic

huic enim contra, pondus una, vel altera libra imminutum est: fortasse quia circa diætæ medium fœdis pustulis in dorso cœpit ægrotare. Similiter omnium octodecim sanguis, uti initio indicavi, peracta iam diætæ, paulo plus, quam ea nondum incepta, ferro scatens observatus est: omnium autem minime eorum sanguis, in quibus scobs rudis, & crocus adhibitus est; paulo magis, in quibus scobs lævigata; adhuc magis, in quibus minera.

Iam experimenta in gallinaceo genere suscepta per summa capita recitabo. Ex his avibus sex aluimus scobe simplicissima, sex eadem scobe, sed lævigata, sex minera, duas spuma, itemque duas tinctura. Commiscebantur martialia hæc medicamenta cum pulticula ex tritici flore, & iusculo confecta, quam etsi primis diebus respuissent, tamen compellente fame, eidem sensim & ipsæ assueverunt. Post aliquot dies nigerrimas fœces egerere, avidius cibum rostro arripere, argutule vociferare, inter cavearum angustias, quibus includebantur, impatientes moveri, appropinquante vero ferreæ diætæ fine, rubicundiores in illis fieri crystulas, oculosque deprehendimus; præsertim in illis, quæ scobem simplicem comedebant, quarum tres sitiebant magis, magis loci angustiam fastidiebant, escam demum porrigentibus, erectis præter modum, & vivacibus crystulis irascebantur: ex reliquis tribus una quædam, incepta vix diætæ, ægrotare visa est. Nam & alvinæ deiectiones defecerunt, & intumuit insigniter ingluvies: hinc sitis ingens, hinc crystarum pallor, in motu segnities, in cibo fastidium. Huic tamen auxilio fuit rhabarbarum pulticulæ martiali additum, quo medicamento cum recreari paululum avem, subducta alvo, & detumescente ingluvie, cognoscerem, eodem per universum curationis tempus usus sum. Quibus sic procedentibus, earum corpora ad stateram exacta sunt; constititque in aliquibus duarum, in aliis trium unciarum, quin etiam quatuor in una, vel altera mineram assumente, factum fuisse ponderis augmentum. Quid tandem harum avium sanguis post talem escam ostenderit, res tota ita ferme cessit, ut in canino sanguine supra indicatum est. Ferreæ particulæ copiosiores ad cultrum magneticum accurrebant in his, quæ scobem porphyrite tritam voraverant, in his vero adhuc multo plures, quæ mineram; porro in his,
quæ

quæ crocum, aut scobem rudem acceperant, pauciores; paucissimæ in his, quæ spumam, & tincturam; vix aliquas vero in ea ave deprehendimus, cuius ægritudini rhabarbaro occursum erat.

Cum hæcenus recensita experimenta in triplici animantium genere, videlicet in hominibus, in canibus, in pullis habita, multiplici consensione declarent, ex sex iam dictis ferreis præparationibus, duas præ reliquis, scobem nempe lævigatam, & multo etiam magis minera, huius metalli copiam sanguini impertiri, operæ pretium visum est in hanc rem penitus inquirere, eamque tum in aliis etiam canibus, tum in suis iterum periclitari. Itaque quatuor adhuc canes eidem experimento subiecimus; duos nimirum scobe lævigata, duos contra minera nutritivimus: nutritivimus præterea duos porcos, alterum minera, alterum eadem scobe. In omnibus ferri dosis fuit uncia unius; tempus dierum quadraginta: qui minera pascebantur, sive sues, sive canes, nullam ægritudinis notam præbuerunt, quin in dies fiebant promptiores ad cibum, & obæsiore. At qui scobem edebant, tum sues, tum canes, quamquam non secus ac quibus minera dabatur, admodum essent voraces, vegeti, & obæsi, tamen & diætæ initio, & versus finem modo vomendi conatibus, modo vomitu ipso tenebantur: habuerunt etiam id peculiare, ut oculis valde ruberent. Ceterum neque in his, neque in illis unquam fuit alvus adstricta: fæces quippe copiosissimæ egerebantur quotidie, & nigerrimæ. Videbatur autem e re nostra maxime futurum, si ex comparatione sanguinis naturalis cum eo, in quem scobs, aut minera esset ingressa, perspectum haberemus, quanta facta esset additio ferri. Quam observationem sic sumus aggressi.

Tam ex uno cane, quam ex sue, in quorum utroque minera statuto tempore adhibita fuerat, sectis in iugulo sanguiferis vasis extraximus pares cruoris portiones, & ex harum portionum unaquaque, detracto omni sero, libram unam seposuimus. Idem penitus peractum est in alio sue, & in alio cane, quorum uterque tenuissimam scobem sumpserat: denique idem iterum fecimus in tertio sue, itemque in tertio cane, quorum neuter ulla ferrea substantia usus fuerat. Sex hæc sanguinis libras, seorsim in totidem

fistilibus iam sepositas, ad eundem ignis gradum, & per idem tempus admovimus, ut exsiccarentur. Libra porcini, itemque libra canini sanguinis minera imbuti, ad idem ferme pondus, idest ad drackmas octo utraque exsiccando decrevit: altera libra porcini, & canini sanguinis scobem continentis, utraque licet eodem igne, eodemque tempore exsiccationem passa, tamen nonnisi drackmas circiter quatuor cum dimidio reliquit. Tertia demum libra porcini, & canini sanguinis nullo ferro pasti, utraque ad drackmas tres est imminuta.

Iam pulveres hosce tres, primum, secundum, & tertium, quorum unusquisque duo sanguinis genera separatim habebat, idest porcinum, & caninum, vehementiori igni commisimus, usque dum pariter incandescerent, & in calcem converterentur: ad nos quippe maxime pertinebat de ferro latente intimius cognoscere.

Igitur calces hasce omnes prius multa aqua perfusas, ut ab extraneis partibus expurgarentur, iterum siccavimus. Ex novo hoc processu facta est singularum proportionata ponderis iactura. Nam primus pulvis, cuius pars una porcini, altera canini sanguinis unciam separatim continebat, repertus est in utraque parte scrupulorum decem cum dimidio: secundus in utraque paulo plus quam scrupulorum quatuor: tertius denique in utraque scrupulorum duorum cum dimidio.

Promota iam analysi ad hunc terminum, non potui me continere, quin confestim experirer cum Lellio, quæ esset in dictis tribus calcis generibus ferri proportio. Primi generis calx, quæ mineræ ferreæ substantiam secum gerebat, tam in suilla, quam in canina portione, uberiolem ferri copiam suppeditavit; non adeo uberem calx secundi generis, in qua inerat scobs lævigata; minus adhuc uberem calx tertii generis, quam nulla ferrea præparatio infecerat; adeo ut hoc ipsum examen nobis adhuc plenius suaserit, ferri mineram præ ceteris martialibus substantiis abundantius in sanguinem transferri.

Verum ut proximius optatum finem assequeremur, & quidquid ferreas particulas in calcibus absconditas adhuc obvolvebat, penitus removeretur, iterum calces vehementissimo fusionis igni obiecinus. Dum igne torquebantur
prio-

priores duæ mineram abscondentes, ebullire vehementius, quam reliquæ omnes, & flammam præ omnibus reliquis intense cæruleam emittere visæ sunt. Ex quo iam apparet id esse peculiare martiali mineræ, ut secum in sanguinem vehat non modicam vim sulphurearum particularum. Absoluta iam fusione, calces singulas in marmoream tabulam effudimus. Priores duas, singulas grana octoginta sex circiter invenimus pependisse: secundas, grana quadraginta duo: tertias demum, paulo plus, quam triginta.

Fuit autem nobis prorsus iucundum invenire in prioribus metallicos globulos magnitudine milii feminibus aliquantulum maiores; ubi autem magnetem adhibuimus, tum hi, tum reliqua materies omnino, uti particulæ primi generis, demptis paucioribus secundi generis, ipsum promptissime secuti sunt. Inerant ergo tum in suillo, tum in canino sanguine minera nutrito, metalli huius grana octoginta sex: quantum ad suillum, & caninum scobe tenuissima nutritum, in hoc pariter quidquid ex fusione residuum fuit, totum ferreum partim primi, partim secundi generis comparuit, sed ferreos illos globulos nullos confecerat, & iam, ut audivistis, erat granorum tantummodo quadraginta duorum, nempe dimidium præcedentis. Denique suillus, & caninus, quos ambos a ferri esu prohibueramus, utriusque generis moleculas continebat, sed, uti iam dictum est, vix paulo plus, quam trientem eius ponderis æquabat, quod in primo illo sanguine repertum est.

Ad analysis nostræ complementum, libuit præterea experiri, an acidorum liquorum miscela, repertarum martialium particularum convenientiam aliquam cum ferreis substantiis a nobis exhibitis, luculentius manifestaret.

Igitur in æquas portiones calcium sex, postremo loco dictarum, quas vitreis vasis exceperamus, infudimus guttulas numero pares aquæ fortis. Eventus autem fuit omnino diversus in omnibus.

Primæ duæ calces, in quibus latebat minera, ab affuso acido odorem emiserunt nonnihil molestum, & mediocri ebullitione commotæ sunt. Qui odor, & ebullitio paulo sensibiliores sunt, quam ubi fit eadem aquæ fortis instillatio in mineram nativam.

Calces duæ secundæ limato ferro, subtiliterque trito

scatentes, longe graviolem odorem cum sibilo, & diuturniori effervescentia emiserunt; qui effectus, illos ferme æmulatur, qui acidorum spirituum affusionem in ferrum limatum consequuntur.

Ex ultimis duabus, cum nullum adventitium ferrum absconderent, vix aliquis odor excitatus est, & nulla vera ebullitio; utique vero vapor quidam tenuissimus ad instar fumi, illum prorsus æmulantis, qui ab acidorum congressu cum minera ignem nondum passa, solet emanare: quod ideo monendum duxi, quia id confirmare videtur, ferrum illud, quod ex naturæ instituto inest in sanguineis globulis, simillimum esse ipsi mineræ.

Sed iam ab observationibus expediti, quæ ad chymicum examen spectant, sermonem nostrum ad alias, quæ anatomici iuris sunt, convertamus. Contraham vero in unam veluti summam quidquid in canibus, in fuis, in pullis anatomica inspectio ostendit, ne scilicet prolixa tot anatomicarum sectionum historia, vestra, viri doctissimi, abutar humanitate. Scire autem in primis convenit, id a nobis semper fuisse servatum, ut qua die alicuius animantis sectio erat instituenda, ferrum affatim, & per intervalla eidem exhiberetur, eo nempe consilio, ut quacumque hora libuisset in lacteorum vasorum statum inquirere, posset promptius, si qua existeret ferrea materies, se se manifestare. Id etiam servatum est semper, ut singula animantia eodem mortis genere necarentur, nimirum dissectis omnium iugularibus venis, & carotidibus; hoc enim pacto præsto erat nobis ea sanguinis copia, qua ad chymicum examen instituendum indigebamus: id demum cautum est, ne animalia hæc diu post mortem, quin immo viventia, & effluente adhuc ex recisis venis sanguine, cultro anatomico subiicerentur.

Aptatis ergo, ut mos est, supra tabulam iis animantibus, quorum chyli ductus lustrare volebamus, protinus aperto imo ventre, quotquot aderant observatorum oculi, ad mesenterium, & circumposita viscera intendebantur.

Chyliferorum facies in unoquoque subiecto fuit prorsus eadem: nam in canibus, porcisque fuit semper conspicuus, atque pulcherrimus eorum ductuum reptatus: erant quippe omnes candidissimo liquore adeo turgidi, ut is,
pre-

premente digito, in suo itinere manifeste posset promoveri.

Quantum ad aves, quarum lactea anatomicis nondum sunt perspecta, in his nulla chyli vestigia, sed sola vasa sanguifera paulo patentiora, & turgidula comparuerunt.

Ex quarum observationum consensione, cum nullibi, neque in quadrupedibus, neque in avibus, latentis ferri colorem deprehenderemus, prope fuit, ut animum desponderemus de videndo ferri traiectu ab intestinis in sanguinem. Verum spem nostram mirifice erexit eorum animalium observatio, præcipue vero avium, quas minera nutrivimus. Harum sex quæsitum a nobis ferri iter in sanguinem constanter indicaverunt.

Erat enim in his meseraicarum venarum reptatus omnino notabilis propter ferrugineum colorem, quo earum furculi ab invicem distinguebantur, præsertim in eo loco, ubi vasa hæc, a tubo intestinali ad mesenterium distribuuntur.

Materia, quæ dictum colorem hisce vasis impertiebatur, uberior erat in maioribus truncis, & adhibito tum a me, tum a laudatis supra viris microscopio, opportune a solertissimo Lellio parato, conspeximus ferruginosam illam materiem pluribus in locis hærentem, & minutissimis micantem atomis, non secus ac eveniat mineræ ipsi. Non præteribo rem, quæ mihi haud prorsus contemnenda visa est: scilicet vasa hæc, hoc modo a ferrea substantia colorata, eo semper in loco apparuisse, in quo eadem oriri videbantur ab iis intestinis, quæ adhuc contento intus chyllo distenta erant: in iis vero, quæ iam fuerant eodem depleta, nullus erat huiusmodi color in dicto confinio; utique vero paulo remotius ab ipso: idest versus mesenterii centrum, ubi corpuscula ferruginea secundum vasorum directionem disposita intuebamur. Quæ res facit, ut parisiensium observationibus, Bruneri etiam, & Peyeri libentius assentiamur: nam hi duo posteriores in anserem, & gallinam, primi vero, idest parisienses, in ciconia ex iniectis in vasa meseraica liquoribus, certiores facti sunt, chylum ab intestinis, non in vasa chylifera, quæ nulla sunt, sed in meseraicas venas immediate transferri: itaque quod his auctoribus iniectionum suarum præsidio, nobis nullo artificio, sed

sed sola consuetudinis naturæ inspectione, contigit invenire.

Est aliud quoque discrimen inter eorum animantium viscera, quæ minera, ac quæ reliquis quinque ferreis præparationibus alebantur.

Ab usu siquidem scobis rudioris plerumque, tum in canibus, tum in pullis, mirum in modum turgent vasa sanguinea, tenuium præsertim intestinorum, quin etiam substantia ipsa eiusdem tubi subinde coccineo colore infecta, atque inflammationi proxima deprehenditur: turgent etiam vasa minima, quæ per cerebri membranas vagantur. Quod magis declarat vim stimuli, & contractionis ab hoc medicamento in minimis vasculis excitatæ, præsertim cum debuissent post mortem vasa eadem detumescere, exhausto nimirum sanguine ob præviam iugularium vasorum dissectionem. Ceterum in aliis dictorum animantium visceribus, aut liquoribus nullum offendi solet vitium; hoc uno dempto, quod bilis colorem præfert nonnihil dilutiorem, itemque fluidiorem consistentiam: fatendum tamen est hanc bilis mutationem non iis solum viventibus accidere, quibus scobs simplex, sed aliis etiam, quibus sive minera, sive scobs lævigata, aut alia quævis ex recensitis martialibus præparationibus data est. Videntur enim omnia huiusce generis medicamenta bilem fere semper reddere dilutiorem.

Quantum ad alium effectum, idest ad vasorum capitalium, & meseraicorum turgentiam, hæc longe minor est ab aliarum præparationum, quam a rudioris scobis usu: a minera autem nullam prorsus effici perpetuo observavimus: tamen non reticebo historiam suis, cui non ad diem tantum quadragesimum, uti in ceteris præstitum est, sed usque ad centesimum, unciam mineræ alimentis mixtam obtulimus; eo nempe consilio, ut nobis innotesceret, an ultra illud tempus liceret mineram sine assumentis noxa usurpare. Hic fuit toto hoc temporis intervallo, de more reliquorum sui generis animantium edacissimus; auctus est mole ultra ceteros: erat vegetus, & in motu expeditissimus, ut omnium sanissimus nobis videretur. In hoc, dissecto tum medio, tum infimo ventre, non levis se se obtulit in musculorum fere omnium interstitiis, aquarum colluvies; scilicet cum paritoneum, & muscoli circa hanc membranam circumpo-
fiti,

fiti, essent fere omnes œdematosi, inter disseccandum aqua undequaque stillabant: dixisses, hoc animal, dum viveret, anasarca laborasse: sanguis erat dilutus, & in vas receptus post aliquot horas copiosum, & flavum serum a se dimisit: vasa meseraica, & intestinorum erant turgida, sed non inflammata. Observatio hæc, si cum iis præsertim iungatur, quæ de bile in animalibus ferro partis præ solito dilutiore, seroque sanguineo maiorem cum aliis partibus proportionem habente, supra indicavimus, haud multum consentit cum quorundam virorum experimentis, ex quibus colligunt martialia, nulla vi fundente, aut colliquante, utique vero adstringente, prædita esse.

Hæc igitur ea sunt, quæ nostrarum observationum series nos docuit de ingressu in sanguinem, sive mineræ, sive aliarum ferri præparationum, deque effectibus ceteris earumdem.

Videtur enim in aperto positum esse, ferrum sicuti a medicis solet usurpari, ab officina chyli (secus ac plures antea existimaverint) in sanguinem migrare: forte enim huius sententiæ auctores ducuntur a communissima illa observatione, qua constat, ab assumpto ferro, fœces atro colore infectas prodire, & eo colore non apparente, plura gigni ægritudinum genera.

Videntur præterea hæc nostra experimenta probare, mineram melius, & uberius præ ceteris ferri præparationibus se se in sanguinem immittere, eiusque immissionem, neque vasorum plenitudinem, neque symptomata ulla noxia inducere; nam etsi quis fortasse suspicetur, porcum illum per centum dies minera nutritum, de quo postremo loco dictum est, ab hac mineræ administratione læsum fuisse, tamen, ut opinor, hinc colligere nequaquam poterit, hanc martialis medicamenti speciem, esse, natura sua, viventibus infensam, sed utique existimabit, nimietati potius, ac prædiuturno eius usui, morbum, si modo erat, in eo animali observatum, fore tribuendum.

Id quoque docemur, scobem lævigatam non ita copiose admitti in sanguinem; parum refert, vasa sanguifera post eius usum, plenitudinem aliquam accusare: reliquas etiam præparationes parcius ad sanguinem pervenire, quamquam hunc paulo magis turgere faciant. Inter has crocus mini-

mum

num præ ceteris commercium cum sanguine habere videtur; quamobrem iure doctissimus Lemeryus in commentariis scientiarum regiae academiae, improbat cuiusvis croci ferrei in medicina faciendae usum, his fere verbis: *Qualibet croci præparatio omnem sulphuream materiam a ferro abigit, & disperdit, adeo ut a nullo liquore acido subigatur; hinc in stomachum admissus cum nequeat ab existentibus in eo succis dissolvi, ad sanguinem non transmittitur.* Quod Lemeryanum monitum aliqua ratione observationibus hisce nostris tum in canibus, tum in pullis, tum in hominibus habitis confirmatur.

Quod si ergo tutissimam ferri substantiam seligere ad usum medicum debeamus, profecto nulla videtur mineræ nativæ anteferenda: ego quidem in hisce experimentis semper illam usurpavi, quæ ab ilva insula ad nos fertur, & quæ ferro dives, ac ceterarum omnium, quæ in italia sunt, purissima existimatur: quam nullus dubito, quin adhuc præstantiorem, ac arti medicæ opportuniorem sit redditurus, qui eam simplicis aquæ affusione, & solerti, & longa lævigatione præparaverit: hæc enim & innocua est, & liberius in sanguinem vehitur, & est maxime homogœnea nativo illi ferro, quod in huius globulis a natura insitum fuit.

Hinc veritati consentaneum esse deprehenditur, quod, in ea dissertatione, quam conscripsit Sydenhamius ad Guilielmum Cole, de anonymo quodam auctore ita legitur: *Mineram ipsam, prout a terræ visceribus effoditur, crudam, efficacius in subiugandis morbis operari, quam ferrum ignem passum, & fusione depuratum.*

Verum de his interim haud plura.

EUSTACHII ZANOTTI

*De quibusdam luminibus septentrionalibus
anno MDCCXXX mense martii
observatis.*

Die 11 martii hora 9 defecto penitus vespertino lumine borealem auroramprehendimus in septentrionali cardine, quæ ad quinque, aut sex gradus altitudinis extendebatur, & ad tres, aut quatuor gradus iuxta circulum horizonti parallelum. Circumquaque spissa nebula horizontem occupabat, quæ fortasse in causa erat, cur phænomenon tenuissimum lumen transmitteret: elapsis minutis decem nullum amplius phænomeni vestigium apparebat, vel quod revera extinctum esset, vel quod in vaporibus delitesceret. Post aliqua minuta ad pristinam lucem reversum est, in eoque statu sex minuta perduravit. Tandem hora 9. 36 cum vapores densiores fierent, prorsus evanuit. Cælum undique nubibus obtenebratum est, & fulgura ad meridiem sub stellis navis argu observata sunt.

Die 13 martii hora 7 inter orientem, & septentrionem in azimuthali circulo quadraginta gradus a cardine septentrionali distito lumen se se nobis obtulit. Altitudo erat octo ferme graduum, latitudo vero multo minor. Decem & septem minutis vertentibus, etsi phænomeni extensio eadem manserit, lumen adeo crevit, ut eas flammæ æmularetur, quas ab agricolis ad consumendas stipulas & stramenta excitatas e longinquo spectare solemus, in eoque statu quadraginta quinque minuta perduravit. Postea vero cum phænomenon se se dilataverit, tractus quidam niger horizontalis se prodidit, qui totum lumen in duas partes discriminebat; maculæ præterea apparuerunt nigræ, & obscuræ, quarum nonnullæ ita illi tractui adhærebant, ut eius figuram omnino irregularem redderent. Hora 7. 45 lumen coarctari

T. II. P. III. Qqq cœpit,

cœpit, & maculæ, & tractus niger disparuerunt, ac demum brevi temporis spatio ita coarctatum est, ut similitudinem lunæ haberet, cum in horizonte existit. Hora decima prorsus evanuit, cum plures antea vicissitudines habuerit; etenim modo tamquam cometæ cauda horizonti adiacens visebatur, modo tamquam globus igneus; quandoque autem nihil aliud dignoscebatur præter lumen tenuissimum.

Die 18 hora 7 prope cardinem septentrionalem boreale lumen effulsit, quod ab ipso cardine declinabat ad orientem gradus fere sex; altitudo erat quatuor graduum, latitudo sex. Interea dum lumen magis, magisque exardescere videbatur, tractus quidam niger latitudine æquans dimidium gradum in medio se se protulit, qui phænomenon in duas æquales partes horizontaliter dividebat; deinceps lumine paulatim deficiente prope horam 8 vix ullum eius vestigium apparebat. Interea nihil notatum est animadversione dignum. Hora 8. 18 lumen reviviscere visum est, & tunc horizonti tractus lucidus inhærebat, qui ab alio tractu nigro in duas partes dividebatur. Cum hæc apparuissent, statim auroræ finis fuit.

Dies 21 martii auroram habuit omnium, quas hætenus retulimus, splendidissimam. Hora 6 ea cæli plaga, quæ a septentrione ad orientem vergit octo gradus, tenui quadam albicante luce distincta erat, quæ ingruente nocte magis, magisque vigeat. Elapsis minutis circiter 20 rubeum, & flagrantem ignem æmulabatur, tantumque lumen undequaque diffundebat, quantum satis esset, ut obiecta circumposita lucescerent, quæ per eam noctis caliginem cerni non potuissent. Id visum est & Francisco Vandellio, & Iosepho Roverfcio, quos observationis socios habuimus. Dum tantæ lucis erat phænomenon, globus igneus horizonti adhærens in medio enituit adeo splendidus, ut solus spectantium oculos ad se converteret; atque ut ea referam, quæ ad oculi iudicium pertinent, nihil enim de re ipsa affirmare ausim, videbatur reliquum phænomeni lumen ab eo globo dumtaxat profluere, & in capillicii formam circa illum accommodari. Quod quidem diversis modis accidere potuisset, vel si globus inter crassiores vapores constitisset; hos enim irradians eam sibi lucis coronam comparasset, non secus ac videmus flammam spissa nebula circumfusam lucida qua.

quadam atmosphaera, & eo sane vividiori, quo nebula densior est, ambiri; vel si globus longius abfuisset, & radios luminis per vapores transmittens lucem eis attulisset, quemadmodum evenire putamus, si coronæ, & halones circa lunam efformantur, dum cælum tenui quadam nebula obducitur. Hæc, cum ita apparuerint, opinioni illorum favere videntur, qui putant in hisce phænomenis principium quoddam insidere, a quo tota lux propagatur, atque diffunditur; cui opinioni hac suadente aurora assentirer, si quod uni phænomeno explicando accommodatur, idem liceret transferre ad omnia. Permanente adhuc globo, & luce circumambiente, cuius diameter erat quatuor graduum, nubecula supereminens se protulit, quæ inferius colore rubeo, & vivido sic clarebat, ut videretur & ipsa a globo lumen mutuari. In hoc statu aurora borealis horam integram perduravit, qua elapsa formam omnino mutavit, & nubem, & globum amisimus. Hora 7. 39 ad altitudinem duodecim graduum extendebatur, & a duobus tractibus nigris horizontalibus disungebatur, quorum alter, qui horizonti propior erat, latitudinem unius gradus habebat, superior vero quadruplo maior erat. Hora 7. 43 lumen cogi, & evanescere cœpit. Hora 8 ne ullum quidem luminis vestigium apparebat. Hæc aurora ultima fuit ex iis, quæ mense martio apparuerunt: quis scit an aliæ multæ extiterint, quæ propter temporum inconstantiam, & frequentes nubes observari nequiverint?

Haftenus auroras descripsimus; nunc ea breviter commonebimus, quæ singulis communia deprehendimus; non ut quidquam statuamus, quod auroris omnibus conveniat, sed potius ut ostendamus maximam inter eas, quæ hac tempestate apparuerunt, similitudinem fuisse, quæ sane tanta fuit, ut videatur una, eademque aurora per totum illud tempus permanisse, & per vices tantum prodiisse. Quod ad colorem attinet, is ad rubrum vergebat in omnibus, quamquam modo intensior erat, modo dilutior. Singulæ auroræ tractibus nigris fuerunt distinctæ, qui tunc solum exoriri videbantur, cum aliqua phænomeno occurreret vicissitudo, per quam vel extensio mutaretur, vel lumen. Columnæ, seu trabes, quos huiusmodi phænomenis sæpe adiunctos observamus, nulli umquam apparuerunt. Præte-

rea notari volo, nos in describendis auroris tunc solum de nebulis, & nubibus admonuisse, cum illæ boreali lumini adhærebant, & ad illud quodammodo pertinebant; verum enim vero nubes cunctis noctibus extiterunt, atque ex præfertim, quæ ad instar virgarum horizontalium permanentes, ac immobiles conspiciuntur. Demum singulæ horizonte terminabantur, neque unquam situ dimovebantur, eundemque cæli quadrantem obtinuerunt, qui inter septentrionalem cardinem, & orientalem extenditur.

IOSEPHI VERATTI

De aurora boreali anni MDCCXXXII.

Proximo anno millesimo septingentesimo trigesimo secundo septembri mense phenomenon quoddam in cælo mihi observare contigit, quod ad lucas boreales referendum esse cognovi, quodve iam tum vobiscum, si per vos tamen liceret, communicare decrevi.

Dies erat eius mensis decima octava, hora vero ferme secunda vespertina, cum in ea parte horizontis, quæ inter septentrionem, & occidentem solem est, lux quædam apparuit, initio quidem ad parvam altitudinem trium, vel quatuor graduum elevata. Atque hæc minima inter altitudines, quas porro sæpe mutavit, æstimata est. Arcus in modum curvata erat, cuius arcus crura septem graduum spatium in horizonte comprehendebant, propterea quod a septentrione gradus quadraginta quinque, ab occidente triginta & octo distare compertum est. Color huius lucis crepusculi colorem æmulabatur, candidus vero, & mirum in modum nitens. Nullus præcesserat in horizonte vapor, qui huius esset similis.

Inconstans erat eiusmodi splendor, modo enim evanescebat, modo apparebat iterum, assurgens videlicet alterne, quo tempore extendebatur etiam in latum, alterne se contrahens secundum omnes dimensiones. Si quid visui tribui poterat, apparebat in modum rei, quæ modo supra horizontem emergeret, modo infra ipsum subsideret. Octo immersiones, totidemque emersiones intra viginti minutorum tempus observare potui. Quemadmodum & hoc notare licuit neque in omnibus emersionibus æqualem fuisse phenomenon altitudinem, & latitudinem, neque æqualem durationem; coloris tamen, & claritatis æqualem fuisse modum.

Post octavam immersionem, quam modo memoravimus, nova emersio successit, in qua claritas illa multo maiorem

iorem altitudinem, amplitudinemque obtinuit, quam antea esset affecuta. Altitudo enim sex gradus æquabat, basis vero patebat quindecim, atque hic animadversum est latitudinis huius partem magis ad septentrionem, quam ad occidentem procurrisse, ut propterea a boreali polo quadraginta quinque, ab occasu solum triginta distaverit; minusque curvata, & magis a circulari forma deflectens effecta fuerit phænomeni figura. Post nonam istam emersionem, eique succedentem depressionem, quæ deinceps secutæ sunt, minores usque, & usque dimensiones lumini attulerunt, quod ita paulatim diminutum est, ut quasi extinctum videretur.

Cum igitur leve tantum superstes esset eius vestigium, ecce ad distantiam quatuordecim graduum a septentrione novus fulgor exoritur, cuius basis decem graduum erat, altera proinde sui extremitate ab occidente gradus sexaginta sex distans. Altitudo autem ipsius varia fuit, alterne enim & ipse assurgens, ac subsidens non eosdem semper limites attingebat. Summa inter hæc altitudines triginta graduum fuit, minima non infra octo. Figura eius semper fuit acuminata, & quasi ad perpendicularum erecta. Quamquam apex modo obtusior, modo acutior erat, neque enim aliter fieri necesse erat, quod eadem semper manebat basis. Scire autem licet paulo post exortum novæ huius lucis primam illam, quam fere extingui visam fuisse diximus, micasse denuo, atque cum hac nova coruscationes suas alternasse, huic tamen posteriori fulgore imparem, magnitudine, & diurnitate; non enim multo post evanescere visa est. Sic quoque secunda hæc lux, postquam quindecim fere minuta fulgorem suum integrum servasset, languescere sensim cœpit, & quinque aliorum minorum spatio extincta est.

Et iam rediisse cælum ad consuetam suam faciem videbatur, cum a secundæ illius lucis extinctione, exactis fere minutis quindecim, repente non procul ab occidentali cardine nova lux effulsit, irregularis omnino figuræ, quam tamen ad quadrilateram propius accedere dixissem, si angulos exactius formatos, & latera minus intorta habuisset. Hanc neque splendore, neque colore ab iis, quæ descriptæ sunt, differre vidimus, siquidem ad horizontem cælum albesce-

bescebat magno cum nitore. Basis eius septemdecim graduum erat, altitudo novem, distantia ab occidente graduum octo; alterius autem extremi a septemtrione sexaginta quinque.

Extemplo autem nitidissimus ille albor in flammeum ruborem conversus est. Ac fere statim ab extremo septemtrionali phænomeni columna ascendit, & ipsa flammea. Huic ad verticem quasi adnasci visæ sunt duæ aliæ flammæ, altera ad septemtrionem, altera ad occidentem deflectens. Ambæ fumum quemdam exhalare videbantur rarum, subalbidum, atque versus septemtrionem se diffundentem, fortasse quod ventus, qui per id tempus flabat, ex austro ipsum in oppositam plagam ferret. Illud vero admirationem faciebat, quod magna scintillarum copia ab huiusmodi flammis eructabatur, quæ in altum evedæ, & versus septemtrionem dispersæ tandem evanescebant. Fulgor tantus erat, ut facile ædificia etiam procul distita discernerentur, sed tribus vix elapsis minutis columna paulatim decrescens fere momento extincta est, nihilque aliud remansit quam nitor ille flammeus, quem antea constitisse diximus.

Verum dum oculos in illum nitorem defixos habeo, altera columna colore igneo ad occidentale eius extremum similiter prorupit, copiam fumi, nubium instar, & ipsa eructans; qui similiter interrupto itinere in septemtrionem contendebat; reliquorum vaporum more attenuabatur sic, ut sydera nescio quæ ad occasum properantia conspici poterint. Dum hæc mirabar, ex insperato novum spectaculum se mihi exhibuit.

E media enim basi phænomeni igneum quoddam corpus ovalis figuræ apparuit solis ad occasum vergentis diametrum æquans. Fulgore erat, quem pulvis pyrius accensus exhibet; nullus tamen vapor, nullus fumus attollebatur; scintillæ tantum earum instar, quas pyrius pulvis solet emittere, magno impetu prosiliebant; sed brevissimum fuit durationis tempus, vix enim integrum minutum æquavit. Tum vero meteori color igneus in flavo album, sed coruscantem conversus est, qui & ipse sensim pallescens sub horizontem deprimi, & contrahi visus est, donec eo extincto nullum amplius fulgoris signum remanserit. Erat tunc hora noctis tertia cum quadrante.

PETRONII MATTEUCCII

De aurora boreali anni MDCCXXXVIII.

NOcte insequente diem secundam mensis iunii, anni millesimi septingentesimi trigesimali noni aurora borealis apparuit. Initium ad horam nonam post meridiem observatum est, antequam crepusculi dubium lumen evanesceret. Borealem cardinem auroræ centrum fere occupabat, huncque positum ad tempus habuit, nulla interim singulari facta mutatione.

Hora II. 40 boreale lumen repente vividius factum, quasi ignis, exarsit: nonnulli lucentes, rubeique materiæ iactus apparuerunt; arcus tamen, qui horum extrema, qua parte horizontem respiciunt, occupare solet, non apparuit.

Hora II. 55 ita se habebant. Ad 40 gradus assurgebat iactus quidam verticalis septem prope gradus latitudinis complectens, varie, variis subalbidi luminis tractibus distinctus, huius medium fere cometæ tunc apparentis splendor traiciebat; ad septemtrionem alii duo ascendebant iactus, duos gradus lati, eodemque intervallo inter se distantes; horum altitudinem prioris altitudo superabat: ad occidentem alius assurgebat stellam σ maioris ursæ prætergrediens, rubrum cæli lumen partem illam occupans fulgore suo longe superans; huic ad eandem plagam intervallo quatuor, aut quinque graduum succedebat iactus alius stellas κ , & ι maioris ursæ prætervadens; post alius occidentalior duas eiusdem asterismi stellas μ , & λ perstringebat.

Prope horizontem caligo obscura apparebat, cuius supremam partem clarum quoddam lumen, velut splendentis nebulæ, collustrabat.

Emissorum iactuum alius alio erat altior, neque eandem omnes ab horizonte mensuram observabant. Altior fuit ille, qui cometam offendebat, minusque aberat ab hori-

horizonte, alii ex utraque parte huic succedentes præterquamquod longius ab horizonte, longius quoque a vertice abesse visi sunt, hac tamen ratione, ut horum altitudo eo minor fieret, quo maius ab altiori intervallum.

Post hæc ferme extemplo boreale lumen evanuit, superstitite dumtaxat usque ad horam decimam quartam prope horizontem debiliori aliquo, & incerto.

IACOBI BARTHOLOMAEI BECCARII

*De quamplurimis phosphoris
nunc primum detectis*

COMMENTARIUS ALTER.

CONSPECTUS HUIUS SECUNDI
COMMENTARII.

I. **A**ccuratioꝝ Phosphoros observandi ratio post editum primum Commentarium inventa. II. Per eam certo illud cognitum est, quod ante solum dubitanter propositum fuerat, omnia naturalia corpora ab externa lucis aspectu lumen concipere, atque in tenebris aliquandiu conservare. III. Incommoda, quibus obnoxia erat prima observandi ratio. IV. Quomodo his per novam hanc provisum fuerit. V. Alia quaedam in his observationibus animadvertenda: & primum de luce, in qua observanda corpora statui debent. VI. 2. De apta eorundem adversus ipsam lucem. VII. 3. Et observatorem in tenebris latentem positione. VIII. 4. Quid faciendum, si pulveris forma sint, vel liquoris. IX. 5. Maiores corporum moles ad observandum minoribus esse preferendas. X. 6. Minuscula corpora quomodo commode observentur. XI. Utilitas harum cautionum iterum explicata. XII. Incipit novorum phosphororum recensio a fossilibus, & primum a terris, quæ lucent omnes etiamsi obscuri sint coloris. XIII. Idem quoque in arenis observatum est. XIV. Itemque in marmoribus etiam durissimis, quæ ante obscuris corporibus annumerata fuerant. XV. Ex lapidibus mole minoribus, qui marmore duriores non sunt, lucem concipiunt universi, etiam ii qui nominatim e phosphororum censu exclusi alias fuerunt, uti amiantus, & talcum. XVI. Similiter qui mar-

more

more duriores sunt, sive opaci sint, ut malachites, & iaspides; XVII. Sive medio inter opacos, & pellucidos loco, ut achates, opali, onyces, & alii; XVIII. Sive demum pellucidi, ut crystallus, & gemma, solare lumen si minus simplex, at certe vitrea lente collectum admittunt. XIX. Metalla vero etiam his novis observationibus obscura esse pergunt. XX. Cinnabaris item, zincum, & marchasita. Contra lapis calaminaris, magnes & alia nonnulla, etiamsi metallica sint mixtura, & atro colore. XXI. Terrestres succi denuo examinantur. Salsi omnes phosphori sunt, ne ipso quidem excepto vitriolo. XXII. Similiter pingues, & speciatim succinum, & sulphur, quæ alias obscura visa sunt. XXIII. Coniectura olim proposita de phosphorum non parvo numero in vegetantium genere, his novis observationibus confirmatur; & causa probabilis affertur, cur eo in genere pauci esse videantur. XXIV. Enumerantur stirpium partes, notata luminis mensura, quod singula concipiunt. XXV. Nuclei, farina, amyllum ipsum etsi non torrefacta splendescunt. Omnino quæ olim inter phosphoros tantummodo artificiosos numerata fuerunt, naturalibus sunt accensenda. XXVI. Ex vegetantium succis post saccharum, manna, & mel, itemque gummi omne lucem assumit. XXVII. Resina quoque. XXVIII. Imo & olea sive pressu, sive distillando elicita. XXIX. In animalium genere nihil e phosphorum numero excipiendum est. Hinc quæ olim excepta sunt, haberi debent tantummodo pro minus lucentibus, non pro vere obscuris. Eiusmodi sunt inter alia ungula, cornua, & pili. XXX. Quidquid membraneum est, & nervosum: in genere quidquid ad glutinis naturam accedit, etiam sine ulla preparatione splendet. XXXI. Carnes quoque lucent, saltem lentis foco percussa, aut convenienter siccata. Quæ duo etiam reliquas partes ad lucendum plurimum iuvant. XXXII. Animalium succos phosphoros esse, lactis, & adipis exemplo suadetur. XXXIII. Suspicio de luce animalium adhuc viventium. XXXIV. Lux aliqua in manu observatoris primum visa = XXXV. De qua dubitatum est diu, an in extraneo aliquo, an in manu ipsa resideret. XXXVI. Hoc postremum nonnullis observationibus probabile redditum fuit. XXXVII. Alia quadam pene certum. XXXVIII. Recensionis huius conclusio. Sequentur deinde generales quadam propositiones, ad phosphorum præsertim doctrinam spectantes, & alia non pauca res hætenus propositas consequentia, vel facile ab iis deducenda.

I. **Q**uod plerisque eorum accidere solet, qui novum aliquid investigare aggrediuntur, ut inter initia laboris sui multa non videant, quæ postquam aliquanto longius in eo progressi fuerint, se multo prius non vidisse mirentur; id mihi quoque accidit admirabilem illam, & ante inauditam lucis facultatem primum observanti, qua obiectis corporibus se se adiungit, & aliquandiu, post eorum quoque recessum in tenebras, inhærescit. Quanquam enim ad eiusmodi studium tantam diligentiam attuli, quantam afferri posse ad subtilissimam quamvis investigationem existimabam; non pauca tamen relinquere coactus sum, quæ aut attingere observando non valui, aut expoliendo perficere. Neque vero ad hæc præstanda exquisitius aliquod artificium, aut singularis quædam observatoris industria, sed paucarum tantummodo rerum, atque in speciem levissimarum animadversio requirebatur. Mihi porro eiusmodi res nisi post editum a me de hisce phosphoris commentarium in mentem non venerunt. Venerunt autem sua quasi sponte, aut certe nulla ingenii contentione quæsitæ; ut propterea miratus sim, atque adeo ægre tulerim, ac pene ipse mihi succensuerim, quod animum ceteroquin experiundi cupidissimum ad præsidia, quæ ita in promptu essent, fatis cito non advertissem.

II. Accuratiore igitur observandi ratione instructus iterum ad priora studia me contuli, quæ superioribus mensibus instaurata usque ad hodiernum diem non intermisi. Semper enim de physicis studiis ita sensi, ea raro quidem sine magno studentis incommodo, nunquam vero sine aliquo naturalis scientiæ detrimento intermitteri. Namque ex una parte multo facilius est opus semel incœptum urgere, quam intermissum redintegrare; ex altera vero nisi qui studium aliquod suscepit conetur etiam perficere, is vel nullum in eodem labore, vel serum habebit successorem. Quo magis mihi condonari posse existimo, quod iterum ad meos phosphoros biennium, & eo amplius relictos sim reversus. Eo autem facilius hanc veniam me impetraturum esse confido, quod studii huius intermissio incredibili novorum phosphorum ad veteres illos, & iam in priore commentario descriptos accessione sit compensata. Siquidem affirmare
 sine

sine arrogancia possum, me qualicumque hac industria mea lucis dominatum ita amplificasse, ut nullum corpus in hac rerum universitate iam reperire liceat, si pauca quædam tantummodo excipiamus, quod luci obiectum eandem in finem suum admittere non cogatur, & quandiu ipsius agilitas patitur, retinere. Hanc equidem sive lucis, sive universæ corporeæ naturæ proprietatem novam sane, ac singularem in scripto illo denuntiavi, sed timide, ac dubitanter, ut eum scilicet decebat, qui ad eam proponendam opinione tantum, aut coniectura duceretur. Cui sane coniecturæ uti plurimum favere poterat incredibilis illa corporum multitudo, quæ alienam lucem sibi arripere deprehendi, ita non parum obstare videbantur alia non pauca, quæ ab externa claritate visa sunt obscura discedere. Nunc vero nullus dubitationi, aut timori locus relictus est, postquam hæc ipsa corpora lucis vi tandem cessisse per iteratas, certissimasque observationes cognovi. Modo hæc observationes, omnemque earum ordinem explicatius tradere operæ pretium existimo, quo & maior dictis fides habeatur, & aliis ad easdem observationes tutum, & expeditum iter præmonstretur.

III. Quoniam igitur de iis tantummodo phosphoris nunc agitur, qui ab aliena luce splendorem suum mutuuntur, eadem præceptiones hic quoque locum habebunt, quæ in priore meo commentario propositæ sunt. Namque & universus ille sermo circa hoc idem phosphorum genus versatus est, & omnis in eo tradita observandi ratio ad hoc unum fuit comparata. Cum ergo plura ex his corporibus a luce, cui exposita sunt, pertenuè lumen sibi assumant, assumptum autem citissime deponant, his duobus incommodis, quæ observationem omnem turbare potuissent, remedio fore diximus, alteri quidem, si observator eousque in tenebroso loco moraretur, dum omnis a prægressa luce commotio in eius oculis sedata esset; alteri vero, si corpus, de quo periculum facere instituisset, ab exteriori luce ad obscuritatem, in qua ille se contineret, quam citissime, ac sine ulla externæ ipsius lucis admissione transferretur. De longa illa in tenebris mora nihil est, quod addam ad ea, quæ & ipse alias, & ante me Fayus monuit, qui hanc unam rem tanti fecit, ut in ea totam propemodum ad
suis-

eiusmodi observationes præparationem contineri existimaverit. Potius dicendum erit de corporum ab exteriori luce ad interiorem obscuritatem translatione. Quam etsi percelerem in primis illis observationibus mihi reddere conatus sum, artificio quodam ad id satis commode, ut mihi videbatur, excogitato, minore tamen opere in subsequens tentaminibus multo celeriore, aut certe observanti commodiore effeci. Memineritis proculdubio, me tunc gestatoriam cellulam mihi comparasse, in qua phosphoros meos ab omni externo lumine tutissimus contemplerer; cellulæ autem huius fenestræ aptatum fuisse versatile tympanum, cui res observandæ imponerentur; has demum, cum essent iam exteriori lumine saturatæ, unico tympani circumactu observatori intra cellulam latitanti, sine ullo externæ lucis illapsu, obverti potuisse. Hæc sane videbantur ad requisitam celeritatem opportunissime excogitata. Verum persæpe accidebat, ut neque is, qui exploranda corpora tympano imponere debuisset, satis promptus esset ad officium suum; neque ipse observator res sibi obversas arriperet satis cito. Interea vero dum alteruter, vel ambo morabantur, quantumvis parva fuisset ea mora, conceptus splendor e corpore decedebat, quod idcirco intuentis oculos non percellens, ipsius iudicio, e phosphorum classe detrudendum videbatur.

IV. Cum ergo in huius erroris cognitionem venissem, rem aliter expedire opus fuit. Itaque superiori margini fenestræ nunc memoratæ duo siparia ex nigro, densoque panno appendi, alterum quidem ad exteriorem eius faciem, alterum ad interiorem; ambo autem tam lata, ut circumquaque totos sex digitos fenestræ ambitum excederent. Cum ergo deorsum libere propenderent, atque ad fenestræ margines satis per se applicarentur, omne externum lumen a cellula excludebant. Licebat autem observatori nonnihil elevatis inferioribus sipariorum oris, corpus quodvis manu prehensum in exteriorem claritatem proferre, brachio, quantum opus esset, extento, eodemque vicissim retracto fuismet oculis admovere. Interea dum hæc faceret, oportebat eum clausis oculis esse, ne irrepente lumine perstringeretur. Retracta manu, & sipariis sponte collapsis, quæ duo minimo temporis momento fiebant, cum sic obducta fene-

fenestra iam nihil ipsi esset ab irrepente luce metuendum, continuo poterat oculos in obiectum corpus intendere, ac de ipsius splendore, aut obscuritate iudicare.

V. Atque ita præcipuis incommodis, quæ in prioribus meis observationibus mihi obvenerant, provisum est. Sed experientia edoctus sum alia quædam animadverti oportere, quæ si negligantur, persæpe fallax, nedum difficile futurum sit de his phosphoris iudicium. Ac primum quidem sciendum est, eos in clarissima luce omnino esse statuendos. Inutile cuiquam videri poterit id monere. Quis enim in eam sententiam facile non veniat, corpora, quibus nitidius lumen haurire datum fuerit, nitidius itidem fore, ut refulgeant? Sed aliter fortasse alii sentient, in primis ii, quibus visum est, nonnullos phosphoros melius nubiloso cælo, quam sereno, imo sub ipso solis radio inclarere. Cuius etiam rei non improbables rationes afferunt. Idcirco aperte monendum erat, mihi aliter in hisce phosphoris, quam illis in lapide bononiensi, de quo præcipue loquuntur, eam rem observare contigisse. Ac si aliquid in admittenda luce differrent hæc corpora, facile id posset dispari eorum ingenio attribui. Nostri quippe phosphori ab ipsa natura; ab arte vero per summam ignis vehementiam bononiensis lapis, & alii eius similes, hanc splendendi facultatem acceperunt. Omnino autem naturalibus illis phosphoris nunquam vidi solare lumen nocuisse. Quin etiam in eo genere quidam sunt usque adeo morosi, ut vel minimas tantæ lucis differentias sentire videantur; neque ab ea, nisi ab omni vaporum labe purissima sit, ad fulgendum excitentur. Sunt quoque alii non pauci, quibus neque sufficit clarissimum solem aspectasse. Hi usque obscuri erunt, dum collectis per vitream lentem syderis eius radiis ad lucis amplexum adigantur.

VI. Non solum autem considerandum est, quo in lumine, sed quo etiam modo phosphori nostri collocentur. Sunt enim nonnulli, qui ad idem lumen sub uno positu, quam sub alio quovis, melius illustrentur. Difficile est autem ea de re certum aliquod, & generale consilium dare; proptereaquod & superficies, & figura corporis, & diversa componentium partium natura, & alia fortasse plura externi luminis admissionem variare solent. Quæ singula vix prævideri, sed universa ne vix quidem possunt. In genere
autem

autem ea positio censenda est aptissima, sub qua plurimum luminis e radiante corpore in corpus eidem obiectum incidat. Plus vero incidet in superficiem, quæ scabra sit, quam in politam: hæc enim ex opticæ legibus magnam partem appellentis lucis ante reflectet, quam ab ea se tangi sinat. Item si foveis, & eminentiis interrupta sit corporis superficies, curandum est, ut omnia, quantum fieri potest, æque illustrentur. Nam sæpe quæ partes supra ceteras extant, sui umbram in has ita proiiciunt, ut magna pars corporis vel sub ipsa clarissima luce obscura maneat. Idcirco totum itidem corpus obscurum apparebit, præsertim si viribus imbecillum sit ad lumen attrahendum. Tenuis enim lux, si etiam fuerit interrupta, nec oculos spectatoris satis percellit, & obscuritatis potius speciem exhibet, quam fulgoris. Sæpe etiam continget experimentum sumi de corporibus, quorum partes sint natura, & qualitatibus discrepantes. Tunc ipsa res testatur, eas partes luci obvertendas esse, quæ magis eidem sint amicæ. Igitur albæ præ fuscis, præ humidis sicciore, & opacæ potius, quam pellucidæ. Sed quoniam id non semper licet ante experimentum cognoscere, iuvabit corpus subinde versando aliter, atque aliter constituere, si forte locus inveniatur, in quo lucem haud in gratiis excipiat. Quod præceptum non raro etiam valere poterit in iis corporibus, quæ sibi ubique similia videntur. Id equidem in vitreo scypho expertus sum, figuræ conicæ, qui luci sic obversus, ut axe horizonti parallelo esset, fulgenti quodam tractu, & horizonti similiter parallelo ornabatur; in alio quovis positu lumen omne respuebat.

VII. Ad rectam quoque collocationem pertinere videtur, ut eas partes, quæ illustratæ sunt, spectator sibi exacte obvertat, non alias. In quo errare difficile videri potest, sed multo sæpius re ipsa erratur, quam quis putaret. Manus enim, quæ ad quotidianos motus a visu dirigi consueverunt, hoc subsidio in tanta obscuritate destitutæ non raro falluntur.

VIII. Sed alia quædam accidere potest situs mutatio, qua partes corporis, illustratæ cum fuerint, spectatori tamen non obiiciantur. Accidit ea corporibus in parvas glebular, aut in pollinem comminutis. Eorum quippe a luce in tenebras retractio sine quassatione aliqua, in tanta præsertim cele.

celeritate, fieri non potest. Contingit ergo tum plurimas solutæ illius massæ particulas faciebus suis revolvi, tum alias super alias prolabi. Sic earum, quæ illustratæ fuerunt, splendor omnis, obscurarum superiectu obumbratur. Eamdem ob causam liquorum perdifficilis est observatio. Quapropter continendi sunt, quantum fieri potest, ne fluant. Id fiet ampullis ex nitidissimo vitro eos coercendo, quæ si plenissimæ sint, humorem contentum nec succuti, nec agitari sinunt. Traiecta vero lux per vitrum, quod nitidum, ut diximus, & præterea tenue sit, liquoris partes satis excitat ad lucendum; & semel ab iis recepta, cum earum nulla fiat perturbatio, quantum ad observationem satis est, retinetur. At vero pulveres vasis quantumvis patulis excipiendi sunt; deinde apprimendi sunt ita, ut eorum granula cohæreant. Sic positum, sub quo lumen receperunt, singula eundem servabunt, atque hoc ipsum lumen suum observatori adhuc integrum exhibebunt.

IX. Postremo animadverti debet, melius esse in magnis corporibus experiri, quam in parvis. Ac si experimentum de tenui luce habendum sit, non modo id melius censendum est, sed etiam omnino necessarium. Manifestum est enim languida etiam luce, modo sit in magnam superficiem diffusa, oculos posse commoveri, non ita vero si parva contineatur. Quocirca si nobis facultas sit in eiusdem generis corporibus delectum habere, præstabit omnino ad experiendum, quæ mole maiora sunt, adhibere. Mihi certe quorundam corporum exigua frustra observanti lucem nullam videre contigit, non ita vero parvam, ubi maiora pertentavi.

X. Verum non semper copia nobis datur in magnis experiendi, vel quod in eo genere nihil sit magnum, ut in gemmis, vel quod nobis in promptu non sit. Tunc magnitudo, quam natura, vel opportunitas non dedit, artificio est procuranda. Vel ergo multa eiusmodi minuta corpuscula sunt compingenda, & super atratæ ceræ tabellam in spatium tam amplum, quam fieri potest, sunt ordinanda; vel si eorum numerus deficiat, subtiliter contundenda sunt, & pollen super similem tabellam inducendus. Hac ratione minutulas gemmas, quæ singulæ obscuræ videbantur ad lucem complectendam adduxi. Nec dubito, quin ii quoque ada-

mantes, in quibus nullum adhuc lumen a physicis deprehensum est, si eodem modo in experimentum venirent, se minime a luce alienos esse declararent.

XI. Atque hæc potissima sunt, quæ phosphororum nostrorum lucem videre cupientes observare decet. In quibus explicandis si aliquanto longior, nimius certe non fui: nisi forte nimietate peccare dicamus eum, qui res ad physicam aliquam investigationem pernecessarias paullo accuratius tradat. Nempe harum, quas hucusque exposuimus, ignorantio pulcherrimam hanc lucis facultatem usque ad hæc nostra tempora non solum observatoribus perspicacissimis, sed propemodum mihi ipsi, eadem non suspicanti modo, sed enixe quærenti occultavit. Et sane innumerabilia fere corpora, ut initio dictum est, ex hoc phosphororum genere per me ante detrusa fuerunt, quæ deinceps subtiliore ista observandi ratione convictus ad illud ipsum genus, quasi in familiam suam revocare sum coactus. Hic vero si eiusmodi corpora enumerare ingredior, nolim iterum redundantæ accusari, proptereaquod ea enumeratio nihil adicere novi ad illud videatur, quod generatim vel in ipso initio sermonis huius pronuntiavi, nullum videlicet reperiri corpus, exceptis paucissimis, quod luci obiectum particulam eius aliquam secum in obscurum locum non asportet. Quanquam enim hæc lucis admissio universis corporibus communis est, habent tamen singula peculiare aliquid ea in re, quod notatione sit dignum; & hæc ipsa rerum singularium notatio credibiliorem facit de universo genere narrationem.

XII. Novæ igitur huius recensitionis idem erit ordo, quem in primo commentario sequuti sumus: & novos itidem phosphoros in tres classes partiemur, fossilium, vegetantium, & animalium. Inter fossilia primum locum in eo commentario dedimus terris, ex quibus lucere quidem per multas diximus, sed obscuras etiam esse non paucas. Et quanquam nullam certam splendoris, aut obscuritatis notam ex earum qualitatibus, colore præsertim, sumi posse affirmavi, addidi tamen inter colores album, & qui ad ipsum propius accedunt, lucis esse amicissimos. Nunc vero post recentes observationes aio, nullam terram non lucere, ne ipsis quidem nigris, & rubris exceptis. Enimvero atras
illas,

illas, quæ nostris pictoribus usitatæ sunt, tenui quidem luce, sed minime dubia perfusas vidi, ad margines præsertim, & angulos, ut fere in aliis permultis corporibus observari consuevit. Aliquanto magis inclaruit vicetina illa fullonia, quam in scripto illo commemoravi, sed luce tamen inclaruit candori suo minime respondente, ut mirum non sit, eam cum aliis quibusdam pro exemplo albarum, quæ lumen non admitterent, a me in eodem scripto fuisse propositam. Parum autem abfuit, quin etiam nunc flavam quandam terram ex romano agro ad nos in usus pictorum allatam e phosphorum censu expungerem, adeo pertinax fuit in respuendo vel ipso solari lumine. Sed eius durissimum ingenium collectis per vitream lentem solis radiis, atque in ipsam coniectis tandem edomui.

XIII. De arenis vero, quas terris subiunxi, vix habeo quod addam ad priores observationes. Plerisque enim, modo color non obesset, etiamtum splendendi virtutem attribui. Lutea illa, e qua vicini colles exsurgunt, etiam non absterfa ochra, qua eius nitorem retundi asserui, non nihil tamen splendentem se mihi præbuit eam denuo observanti. Splendentes quoque se præbuerunt talcosæ illæ miculæ aurei coloris, quibus illa interspersa est, quantumvis lucem omnem iisdem olim denegaverim.

XIII. Inter lapides mole spectabiliores marmoribus princeps locus profecto debetur, quod neque aliis magnitudine cedant, & præterea levitate, & nitore omnibus præstent. Sed præstant etiam lucendi facultate. Mollioribus fere, & candidioribus maxima videtur obtigisse. At non omnino deest aliqua præduris, & fuscis, de quibus tamen a me olim dubitatum est. Porphyrites certe, ophites, & granitum, quæ tunc in exemplum adduxi, claritatem aliquam sub sole induerunt; maiorem vero sub lentis foco. Sed & basaltes æthiopicum marmoris genus duritie, & colore ferrum imitans non se a luce omnino aversum ostendit, quandoquidem se vinci eodem foco passum est. His addi possunt & ægyptiacum quoddam viride, & viride item antiquum, & orientale aliud viride *della stella* dictum, quæ alias vel nihil, vel tantum ad margines dubio lumine refulserunt.

XV. Lapidés vero exiguos mole in sua genera pariter

dispercentes alios quidem marmoribus duritie cedere, alios quovis marmore duriores esse proposuimus. Et illos iterum pro formæ diversitate in novas classes, tres videlicet, distinximus. Primæ classi, quæ lapidibus omnino informibus tributa est, nihil modo est addendum. In altera lapides eos complexa, qui extrinsecus informes concinnitatem aliquam intus recondunt, & amiantum, & talci diversas species, & narniensem quendam ætitem obscuris corporibus annumeravimus. Sed immerito id factum esse posteriores observationes docuerunt; per quas manifestum lumen in his non modo, sed & in aliis ad eandem classem pertinentibus; præsertim vero in orientali quodam præduro ætite, imo & in ipsa ex amianto confecta charta licuit conspiciari. Postremam exiguorum, molliorumque lapidum classem corporibus intus non minus, quam extus regulari aliqua figura spectabilibus tributari phosphorum ditissimam feci. De variolato tamen, & cruciformi dubitanter loquutus sum: modo clarere hos quoque assero, nec dubitanter.

XVI. Post hæc sequuti sunt lapides marmore duriores. Ex his perpauca primis tentaminibus inveni, qui splenderent in tenebris, pauciores certe quam nitor, quem ostentant sub dio, polliceri videatur. At subsequenter studiis nullum reperi, qui lucendi potestate non esset, & non lucret re ipsa, modo convenientibus auxiliis iuvaretur. Omnibus efficacissimum, certissimumque auxilium fuit solaris luminis per causticum vitrum intentio; non paucis vero, præsertim si minuta essent eorum corpuscula, plurium eiusdem generis fragmentorum conglutinatio, aut tritus, & comminuti pulveris, ut ante dictum est, in maiusculum spatium super atram ceram explanatio. Cum ergo genus hoc lapidum in opacos, pellucidos, & inter utrumque medios dispartitus essem, percurrens deinde singula genera, ex opacis solum cyaneum lapidem in phosphorum censum admisi, ceteros autem excludendos esse putavi, & nominatim quidem malachitem, & iaspides universos. At vero decus hoc, quod per eius temporis studia his lapidibus detractum est, posteriora cumulatissime reddiderunt. Namque, & malachites, postquam lentis focum sustinuit, eodemque modo nephriticus lapis non dubie nobis refulsit; & iaspides, sive rubri, sive obscure virides, sive ex multis, di-

ver.

versisque coloribus misti ad lentis focum, multi etiam ad simplex solis lumen splenduerunt, præsertim vero ii, quibus erant albicantes venæ intermixtæ.

XVII. In altero autem pretiosorum lapidum genere, quod inter opacos, & perspicuos medium est, centenos achates cum examinaverim, unum tantummodo videre obtigit, qui ad solare iubar etiam per lentem collectum non sit commotus. Erat is ex multis, & obscuris coloribus mistus, ut suspicari liceat pervicaciam tantam colori potius, quam lapidis ingenio esse tribuendam. Examinavi præterea in eodem genere opalos, onyces, carneolos, quos in priore scripto præterieram, atque hos quoque ad solis vel simplex lumen splendere vidi.

XVIII. Postremum tandem genus, quod crystallos, & omnes pellucas gemmas complectitur, fuit conatibus nostris multo obsequentius, quam expectaveram. Retiterant enim & Fayo eas multis modis olim tentanti, & mihi ipsi, cui ceteroquin non infelicem in eiusmodi periculis esse contigerat. Verum quod primis experimentis assequi non licuit, id erat postremis reservatum. Namque ut de crystallo primo loquar, multæ simplex solis lumen quasi sponte complexæ sunt; difficiliore alia vim lentis sustinere voluerunt. Omnes vero artificio non magno ad lucendum etiam sub diurna tantum claritate adductæ sunt. Collisu mutuo subtilissimus pollen, albissimusque ex ipsis deterritur. Hunc sibi etiam invicem affricant, ubi præsertim magis scabræ sunt, & impolitæ. Pollen hic facit, ut iis in locis satis nitide, atque ad lumen etiam non summum crystallo explendescant. Eadem res in vitro tentata, perinde mihi cessit, atque in crystallo. Quo factum est, ut etiam hoc nobilissimum artis opus ab obscuritate, in qua huc usque iacuerat, ad phosphori dignitatem sit evectum. Quod vero ad gemmas attinet, sub lentis foco paucis exceptis nituerunt omnes. Facillime omnium smaragdi, quorum etiam non paucos simplex lumen solis commovit. Post smaragdos sapphiri, præsertim candidiores; fere his pares chrysoliti. Sequuti sunt amethysti, & topazii; dein rubini, præsertim colore pallidiores; tandem granati, & hyacinthi. Hos postremos illustrare vix potui solitarios; aggregatos non ita difficile; multo difficilius tamen, quam aliud quodvis gemmarum

marum genus. Imo aliquot granatos colore, & politura nitidissimos, & mole conspicuos, gemmam itidem quamdam duritie, & colore pro rubino habitam, duosque insignes hyacinthos illustrare non potui segregatos. Coloris naturam causatus sum, nec iniuria, ut opinor. Aliis quippe observationibus, & quidem non paucis, compertum iamdudum est rubrum colorem inter ceteros luci esse infensissimum.

XIX. Post gemmas in meo illo scripto metalla consideravi, divisionem scilicet fossilium a Wodwardo traditam sequutus. Multa in metallis olim molitus est Fayus; ego quoque deinceps non pauca. Nunquam certe destiti, post susceptum hoc studium ea urgere, ut votis meis obtemperarent. Sed nulla vi, artificio nullo adduci hucusque potuerunt, ut in lucis amicitiam venirent. Durum sane, & pervicax corporum genus, quod & lucem, & vim electricam, & ipsum quoque rorem aversetur. Hæc sunt paucissima illa corpora, quæ in tota rerum harum terrestrium universitate e phosphorum numero excipienda esse, initio huius sermonis pronuntiavi. Nam si quæ alia visa sunt post externæ lucis aspectum adhuc obscura remanere, non difficile fuit obscuritatis huius aliquam causam, non in eorum natura, sed in alia re quapiam iisdem omnino extranea positam cogitare. At vero in metallis nondum quidquam inventum est ab eorum natura disunctum, cui tantam in lucem contumaciam probabiliter tribuamus.

XX. Eadem obscuritate qua metalla, etiam quidquid aliquam habet cum ipsis cognationem prioribus meis observationibus involvi. Porro hæ nullam cinnabari, zinco, marchasitis iniuriam fecerunt: hæc enim re ipsa lucem non admittunt. Fecerunt utique calaminari lapidi, qui splendorem nec ita modicum arripiens, obscuris corporibus nunc memoratis a me accenseri non debuisset. At notam hanc posteriores observationes tum lapidi huic, tum aliis huius generis fossilibus ademerunt, quæ facile in eandem notam incidere potuissent. Aliquot certe magnetes, quos solis radio exposui tenuissima quadam luce nitere visi sunt. Erat vero lux illa per totum eorum corpus diffusa. Nituit quoque, sed interrupte, ferrea quædam minera. Nituit & magnesia. Nituit smiris, & lapis hæmatites, itemque armenus
præ-

præsertim lentis foco provocatus: ad simplex vero solis lumen nituit alius lapis colore, & pondere ferrugineus, nitoremque hunc suum ad latera, quæ abrupta erant, ostendit. His ergo, & aliis non paucis, quæ non commemoro, nec metalli admittio, nec color, qui plerisque ater est, aut obscurus, sic obfuerunt, ut aliquem clarorem non conceperint levissimum quidem, ut ante monui, sed observatori, qui aliquanto diligentior fuisset, non elapsurum.

XXI. Pottremum locum in fossilium classe, terrestribus succis, Woodwardo auctore, assignavi. Quos etiam in falsos, & pingues distinxî susceptam ab eo divisionem perpetuo sequutus. Sales in phosphororum classem admisi pene univertos. Eos quippe tantummodo exclusi, qui ab omni admittione metallica non essent purissimi, experimento præsertim de vitriolo sumpto permotus. Vitriolum enim, cuiuscumque generis esset, & quantumvis pellucidum, mihi visum fuit nihil externæ lucis sibi adiunxisse. At postea iterato accuratius experimento, in crystallina huius salis gleba levia quædam languidæ lucis vestigia deprehendi; pertenuè item lumen, sed latius diffusum in vitriolo contrito, & pressu in planam superficiem expanso; non tenuè demum in alba illa calce, in quam vitriolum sub æstivis solibus dilabi consuevit. Id lumen, quod in contrito vitriolo pertenuè, ac pene incertum fuisse dixi, lens vitrea non dubium fecit; in vitrioli autem calce sic etiam intendit, ut triplavi auctum esse videretur.

XXII. Multo autem gravius ex commentario meo detrimentum acceperat pinguium succorum genus. Ex his ne unum quidem in phosphororum censum recepi. At suum cuique decus, & quoad licuit, per subsequentes observationes restitutum est. Restitutum est certe succino, & sulphuratum nativo, tum fuso. Non ita gagati, & lithanthraci. Sed his nigredo est tanta, ut cuivis vel lucidissimo corpori obscuritatem possit offundere; ac propterea mirandum non sit, ea in summa etiam luce non lucida permansisse.

XXIII. Hactenus de fossilibus. Sequitur ut de vegetantibus dicamus. Cum primum in his observationibus versaremur, inter corpora, quæ tunc examinavimus, visæ sunt plantæ minime omnium lucem appetere. Non idcirco tamen earum generi lucendi facultatem, sed potius facultati huic
robur,

robur, & alacritatem deesse ad se se quantum opus esset exferendum existimavi. Impeditam nempe esse, ac veluti obrutam principii alicuius lumini adversi implicatione. Facile autem mihi fuisset de hoc principio coniecturam facere ex iis experimentis, quæ tum de lignis, & fibris, ex quibus plantæ omnes contexuntur, tum de artificiosis phosphoris ceperam, quos potissimum ex vegetantibus confici animadverteram. Ligna enim, & fibræ cum inter ceteras stirpium partes siccioris sint compositionis, etiam lucem in se manifestius trahunt; eorum vero phosphorum præparatio omnis in eo duntaxat posita est, ut convenienter siccantur. Ex quibus cogitare in promptu fuisset, insitam quidem esse in plantis lucendi vim aliquam, sed humoris, quo illæ turgent, redundantia hebetari, a quo, si expediretur, continuo e suis latebris exsiliret. Verum ut ingenio sum minus pronus ad opinandum, nec ipse mihi paucis experimentis in novo præsertim studio satisfacio, ab omni coniectura temperavi. Nunc vero ab ea, quæ modo indicata est, temperare vix possum. Eo quippe inclinant me, ac prope modum impellunt recentes aliæ, bene multæ, atque inter se consentientes observationes. His certior factus sum nihil in plantis inveniri, quod idoneum fieri non possit ad lumen combibendum, si arecendo humorem omnem exhalarit. Plurimis satis est solius aeris perflatu siccari; alia non lucent, nisi prius fuerint exsuffata. In hoc numero vidi arundinaceas plantas nonnullas; inter ceteras tipham. Omnibus vero præsidio est ignis calor ad alacrius, nitidiusque lucendum, sed moderatissimus sit oportet, & sui ne levem quidem notam relinquens. Unam mihi ex omnibus stirpibus videre contigit sanguineam betam, quæ lucis amplexum, vel ignis calore illecta recusavit.

XXIV. Verum non ita humoris vinculis innexa est facultas ista lucendi, ut exsolvi etiam non possit, dum plantæ virent, & succo turgent. Satis est plerisque ad lucem aliquam concipiendam clarissimum solem aspexisse; observatori autem ad eam percipiendam ita se, ut initio sermonis huius dictum est, præparasse. His rite servatis radices splendere videbimus pene omnes, modo color non officiat. Splendescet autem præcipue cortex; medullium enim, si pulpa sit molliore, obscurum apparebit. At obscuritatem,
exuet,

exuet, si expressione fiat exsuccum. Caules, & cortices partim lignorum, partim frondium ingenium sequuntur, ut scilicet ad alterutram partem eorum textura magis accedit. Folia vero splendorem aliquem a sole pleraque accipiunt. Omnium facillime incana, & hirsuta, & siccioris naturæ; in eodem vero folio ea pars, quæ humo est obversa. Quod si nudo sole non percellantur, traiectis per lentem radiis vix resistent. Id quoque floribus excitamento erit ad lucendum. Non pauci enim in lucem difficiliore sunt, quam ipsa folia, etiamsi colore non admodum sint obscuro. Non ita difficiles se præstant fructus etiam molles, & succosi: multo autem facilius illustrantur exsiccati.

XXV. Eorum vero nuclei lumen arripiunt, nec ficcari eos, multo minus torreri opus est. Perutile id quidem ipsis est ad vegetum lumen ostentandum; ad aliquod, nec tamen adeo tenue concipiendum, minime necessarium. In quo equidem a me ipse dissentio, qui olim non tantum fructus, & nucleos, sed & farinas, & ipsum candidissimum amyllum, & omnia propemodum semina e naturalium phosphorum familia summovere non dubitavi; locum ipsis tantummodo inter artificiosos concedens, modo tamen, ut paulo ante dictum est, moderato calore torrerentur. Sed æquum omnino est condonari hunc errorem homini, qui nondum accuratissimam illam observandi rationem calleret, nec esset adhuc experientia edoctus, quantopere in his corporibus lucendi vim humidi aeris attractus infringat. Nempe longe alia mihi visa sunt, cum denuo redii ad eorum observationem per æstivos calores, fudo cælo, & sicco aere, omnino tempestate ab ea diversissima, in quam incidit prima illa investigatio. Lucent ergo satis vivide, nec arte ulla præparatæ omnis generis nuces, cerealia semina, & legumina, phaseoli in primis, & ciceres, qui paucis phosphoris nitore cedunt.

XXVI. Luce non minus vegeta plurimos vegetabilium succos, omnes certe aliqua perfusos vidi. Inter sales principem locum olim saccharo dedi. Huic manna, & mel tantum splendore cedunt, quantum siccitate. Ac mel quidem vix lucem aliquam ostendit, nisi frigore duriusculum, & quasi granosum evaserit. Gummi omne alterum vegetabilium succorum genus splendore insignis est. Arabici guttæ

quædam, nonnullæ item ex pruno collectæ mihi obtigerunt ita splendentes, ut nihil supra. Etiam tragacanthæ lux est non modica, nisi humiditas eius compagem laxarit. Id si acciderit, ficcatio remedio est.

XXVII. Postremum genus, quod pinguium succorum est, minus quam reliqua duo lucem admittit, omnino tamen non respuit. Omnes resinarum lacrimæ plus minus splendunt; nitidius quidem, quo puriores sunt, albicantes magis, & ficcioris naturæ; secus vero quæ contrarias habent notas. Resina benzoe cuiuscunque luminis vires elusit; ac parum abfuit, quin etiam solare contempserit: minimum certe nudo sole; collectis etiam eius radiis non multum commota est. Non minorem lucis ignaviam in terebinthinaprehendimus. Cum liquida esset, nihil fulsit; aliquantum, postquam frigore induruisset.

XXVIII. Ad pingues istos succos referenda quoque sunt olea. Hæc sive e fructibus, e nucleis, e feminibus expressa fuerint, sive chemicorum igne destillaverint, lucendi vi non carere existimaverim, si duorum tantummodo exemplum aliquid valet ad coniecturam de ceteris faciendam. Alterum ex his oleis est, quod ex olivis per expressionem, alterum, quod distillando ex anisi feminibus elicitor. Sub sole utrumque splenduit manifesto, non prius tamen, quam vi hyberni frigoris congelassent. Quo facile suspicemur, si cetera olea similiter concreverent, non dissimilem fulgorem esse susceptura.

XXIX. Iam vero ad animalium genus tandem veniamus. Id genus facultate ista extranei luminis attrahendi non minus quam fossilia, & vegetantia nobilitatum a natura fuisse in commentario meo pronunciaui. At appetitum eiusmodi ad eas animantium partes fere contractum esse, quæ singulariter ex terrestri principio in solidam firmitatem indurato concretæ sunt; in reliquis enim pinguitudinis admistione si minus extingui, at certe non modicum hebetari. Novis autem observationibus edoctus sum, eiusmodi vim oleoso utique principio hebetari, sed non penitus extingui. Quocirca non omnino obscura, sed tantum minus splendentia dicenda iam erunt ea corpora, quæ inter obscura olim recensui. Ita si qua discrepantia inter veteres observationes, & recentes intercedere videatur, minimo negotio com.

componetur. Nulla igitur pars est in animali genere, in quam aditus non sit externo lumini, facilior utique in alias, in alias minus facilis. Atque ex iis, quæ animantium corporibus extrinsecus veluti adnata sunt, quadrupedum unguæ, cornua, & pili; volucrum pennæ, rostra, & ungues; aquatilium squammæ remisse collucent; conchyliorum vero testæ vividius, ut alibi a nobis dictum est. Solenes, pinnas, & unguem odoratum olim e lucidorum corporum numero excepi; sed nulla exceptione uti opus erit, si res quemadmodum nunc explicata est, intelligatur. Similiter nec alcis unguam e phosphorum censu eximemus, quamvis solari lumini obsistat; cedit enim eidem per lentem in parvum spatium contracto, & in eas partes compulso, quæ minus obscuri sunt coloris; ut culpa omnis in hoc uno esse videatur.

XXX. Detractis pilis, & plumis terrestrium belluarum, & volatilium extima cutis lucet. Quadrupedum coria tum recentia, tum variis modis, uti ad vitæ commoda fieri solet, concinnata, imo etiam saturis coloribus infecta lucere vidi. Lucet quoque avium pellis iis maxime in locis, quæ minus adipe suffusa sunt, aut subiectorum ossium eminentiis aliquanto magis attolluntur. Ibi enim macrior est ea membrana. Omnino autem quidquid membraneum est, aut nervosum, dicam etiam generalius, quidquid ad eius glutinis, quo hæc viventia maxime scatent, naturam accedit, id omne alienam lucem sibi libentissime adiungit. Sic ossium, dentium, cornuumve decocta in gelu formam adstricta; iura carnum inspissata, & in tabellas ad viatorum commodum redacta; serum item sanguinis superflui humoris exhalatione concretum; & demum tenax illa, & subflava crusta, quæ sanguini per magnas inflammationes fere supercrefcit, non modico splendore perfunduntur, etiamsi non fuerint ustulata. Ignis utique auxilio insita in his rebus lucendi facultas intenditur, omnino autem non procreatur. Quod ego, si eo tempore cognovissem, quo primum ex ipsis artificiosos phosphoros eas torrefaciendo confeci, diligenter notare procul dubio non omissem, ne forte quis existimaret, splendendi vi a natura non fuisse instructa ea corpora, quibus ad splendendum artis subsidia comparassem.

XXXI. Iam vero carnes ex omnibus animantium parti-

bus minimam habere videntur propensionem in lucem. Atque hinc factum est, ut in eo sermone, quem de his rebus iam habui, non ausus fuerim locum inter phosphoros concedere, nisi albis carnibus, & quidem assis. Ceteris propter colorem, quem luci contrarium fore existimavi, ita diffusus sum, ut omnem earum observationem prætermiserim. Sed etiamsi non prætermissem, in ea tamen observandi ratione, quam tunc sectabar, nescio an aliquid de ipsarum luce decernere licuisset; adeo languidum est, & fugax vel illud ipsum lumen, quod solis radiis vehementer percussæ concipiunt. In ossibus aliter res habet. Verum de his nihil mihi addendum est ad ea, quæ in altero commentario scripsi. Hactenus ergo demonstratum est solidas animantium partes alienam lucem ad se trahere universas. At si quæpiam ex his, quas recensuimus, aliquanto difficilius id fecerit, faciet minus difficile, si quemadmodum de vegetantibus dictum est, congruenter exsiccescat.

XXXII. Quod attinet ad animantium succos, nullum pariter eorum a luce alienum esse iudicaverim, postquam lac, & adipem lucere tandem deprehendi, quorum alterum in se, quandiu saltem fluidum est, lumen non admittere, alterum etiam arcere a corporibus, aut certe debilitare pronuntiaveram. Lac porro illustrari qui volet, eas cautiones adhibeat, quas supra tradidimus, cum de liquorum observatione generatim dictum est. Pro quacunque autem animali pinguitudine valebunt ea, quæ de oleis vegetabilium proposuimus. Easdem scilicet frigore durari oportet; nam si vel leviter mollescant, omnis recepti luminis vigor obtunditur.

XXXIII. Hucusque recensitis observationibus, aliisque non paucis, quas, ne longior essem, prætermisi, cum hanc splendendi facultatem in animale genus tam late diffusam esse animadverterem, cogitare subinde cœpi, anne illa eadem vi, quam in emortuis animantium partibus miratus fueram, animantia ipsa, dum etiam vivunt, essent insignita. Nullam equidem causam videbam, cur natura vivis corporibus id negasset, quod sensu, & vita carentibus largita esset. At meum istud cogitatum quadam verisimilitudine, aut naturæ ipsius convenientia, non illustri, & certa observatione aliqua nitebatur. Porro ad eiusmodi observa-

tio.

tionem pervenire non licuisset, nisi, mutata prima illa observandi ratione, me ipsum observatorem simul præstitissem, & scopum, in quem observatio dirigeretur. In locum tympani, quo res a me in mea cellula spectandæ modo externæ luci, modo ipsi mihi obverterentur, duplicatum illud sphericum substitui, quod initio huius sermonis descriptum est. Eius subsidio in mea potestate iam fuit rem quamcumque manu arreptam, vel etiam nudam manum, imo & brachium, quantum vellem in externam claritatem proferre, atque inde in tenebras illas servata interiore obscuritate reducere. Modo unusquisque intelligit alternatione ista non modo liberum mihi, sed plane fuisse necessarium, splendorem, si qui forte manus adhæsisset, observare.

XXXIV. Et revera cum primum novo isto artificio uti cœpi, visus sum levia quædam lucis vestigia in meis digitis animadvertere, præsertim ad costas, & apices. Rei novitate delectatus, nec tamen omnino captus nolui confestim meorum sensuum testimonio fidere. Itaque observationem sedulo iterare, externæ luci modo hanc, modo illam manus partem obiicere, visus aciem in ipsam mox retractam acriter intendere, loca diligenter notare, quæ maxime splendescere viderentur, non minus accurate lucem eam intuendo persequi, visurus an digitorum varium flexum, & manus universæ agitationem sequeretur, constanti videlicet ad easdem partes adhæsione, demum quæcumque observando assecutus fuisset, magno studio inter se comparare. Fructu non caruit hæc diligentia. Omnia tandem me prima observatione minime fuisse deceptum egregie declararunt.

XXXV. De luce cum essem iam certior factus, nova continuo suborta est dubitatio, an ea in ipsa cute, an potius in quapiam re alia, qua cutis infecta esset, insideret. Sciebam quippe vel tenuissimi pulvisculi affricu corpora de se obscura non raro splendorem aliquem sibi adsciscere, quem statim exuerent, ac pulvis abstersus esset. Parum certe abfuit, quin eam ob causam lucendi facultatem metallicis quibusdam massis attribuerem. Facile autem corporum attrectatu manus inquinantur. Verum etiamsi alienis immunditiis non squaleat cutis, habet de se unde hominibus etiam munditiei, & cultus studiosissimis sordescat. Perungitur quippe naturaliter lenti cuiusdam unguinis perpetua effusio.

fusionem, quod alicubi exarescens in furfures abit. Hos non semel expertus fueram diurnam lucem arripere, ac retinere. Id porro locum dedit suspitioni, etiam tum pinguitudinem istam simili claritate suffundi, cum sebacea forma, & visum plane fugiens pellem oblinat; idcirco humanam cutem, si forte luceat, non proprio, sed alieno splendore ornari. Suspicioni pondus addidit lucis omnis extinctio, quoties digiti, aut tota manus calida perfunderentur. Minuebat ex adverso eam adscitæ lucis suspitionem istarum partium etiam ante lotionem exquisita munditia, & nitor earundem interdum ita vividus, atque tam late diffusus, ut fordibus, quæ cerni præ tenuitate non possent, vix adscribendus videretur.

XXXVI. Cum ita distraheretur animus, & quæ modo attuli ancipitem afferrent cogitationem, accidit tandem XII kal. decembris superioris anni, ut manus mea, quæ alterius observatoris iudicio mundissima undequaque visa est, inusitato splendore præfulserit. Semel atque iterum lota est; extersa; iterum soli exposita; nihil, aut omnino parum de concepta luce remisit; quinimo eam retinuit etiam madens. Sæpius & sicca, & madida lentis foco percussa est in dorso, in vola, quæ pars obscura ut plurimum apparuerat, in ea eminentia quæ infra pollicem est, ac demum in apicibus digitorum. Omnia hæc loca egregie nituerunt, maxime vero digitorum apices, & pollicis quidem inter ceteros. Splendebant autem acrius tum apices, tum aliæ quædam manus partes, cum arctius compressæ durescebant. Ex quo intelligere datum est, luminis varietates, quas ante notaveram, diversos cutis status, non adventitiæ alicuius rei accretionem sequi. Et sane interdum lux omnis e manu deleta est, sola in calentem aquam immersione, qua illa molliri tantummodo poterat, non sordes certe, si quæ fuissent, abstergi. Omnino enim in quamplurimis rebus observatum est, mollitudinem luci adversari, favere siccitatem.

XXXVII. Verum universæ huic dubitationi, quæ industria mea non modo tolli hucusque non potuit, sed potius augeri, & confirmari visa est, finem tandem attulit temporis opportunitas. Nam circa idus ianuaras huius anni cum ad easdem observationes rediissem, in universa tum manus,
tum

tum brachii superficie tantum splendorem conspexi, quantum nunquam ante conspexeram. Namque & loca, quæ alias nitere consueverant, nitere acrius visa sunt, & quæ ante obscura fuerant, non mediocriter fulgere. Causa in nulla extranea re inveniri potuit. Manus, & brachium erant mundissima. Itaque in ipsa cute quærenda fuit. Omnia vero diligenter consideranti nihil in ea insueti apparuit, præter id, quod insignis tempestatibus mutatio afferre potuit. Sæviebat per eos dies acerrimum frigus. Nemini vero ignotum est, cutem frigore asperam fieri, strigosam, duriusculam, pallentem. Neque minus certum est, lucem corporibus, in quibus hæc insunt, libenter adhærere. Ita & omnis de ista luce dubitatio sublata est, & splendoris dignitas humanæ cuti non improbabili ratione vindicata.

XXXVIII. Et iam terrestris huius naturæ præcipua regna perlustravimus. Cuius laboris cum is tandem fructus existat, ut amplissimam in omnia corpora lucis potestatem minime dubiis observationibus demonstraverimus, iam id omne, quod nobis initio propositum fuit, videmur esse consecuti. Nempe omnis hæc nostra investigatio id unum semper spectavit, ut admiranda naturæ opera, quoad nobis liceret, scrutaremur; eorum vero absconditas rationes aliorum perspicacitati detegendas relinqueremus. Hoc ingenii est, quo quam parum valeamus, nimis intelligimus; illud industriæ, ac diligentia, qua præstare laudabile aliquid potest etiam non ingeniosus. Veruntamen ut physicorum utilitati, & commodo, quantum fieri potest, serviamus, ad summa quædam capita observationes hæcenus recensitas contrahemus; quæ inter se nexa, quæ consequi ex aliis videbuntur, ea opportune indicabimus; audebimus etiam aliquid coniectari, si probabili coniecturæ sit locus; quæstiones movebimus, si quæ forte aliorum ingeniis ad philosophandum excitamento fore videantur; his omnibus recentes observationes interferentur, quæ aut veteribus momentum addant, aut viam sternant ad nova cogitata. Quæ cum ea, qua nobis concessum erit, diligentia præstiterimus, universo huic commentario finem imponemus.

GABRIELIS MANFREDII

*De eliminandis ab aequatione arcubus
circularibus, & alia.*

I. **N**otissimum est theorema: si sint duo arcus circuli habentis radium R , quorum tangentes sint, maioris quidem A , minoris vero B , tangentem arcus eiusdem radii R , qui sit summa duorum illorum arcuum, fore $RR \times \frac{A+B}{RR-AB}$. At vero tangentem arcus eiusdem radii R , qui sit differentia duorum illorum arcuum, fore $RR \times \frac{A-B}{RR+AB}$. Ex uberrimo hoc fonte quam-

plurima profluunt theoremata ad significandas tangentes arcuum multiplicium, & submultiplicium. Nam tangentes summæ trium, quatuor, uno verbo, quotvis arcuum eiusdem circuli radio r descripti, quorum singulorum tangentes sint a, b, c &c. hoc uno theoremate licet componere. Arcus quippe, qui complectitur tres arcus, quorum tangentes sunt a, b , & c , est summa duorum arcuum, quorum unus tangentem habet c , alter ipse est summa duorum arcuum, quorum tangentes sunt a , & b , adeoque huius posterioris tangens est $rr \times \frac{a+b}{rr-ab}$. Itaque opus est tantummodo

in formula $RR \times \frac{A+B}{RR-AB}$ scribere r loco R , & loco A

ponere $rr \times \frac{a+b}{rr-ab}$, & loco B scribere c , confurget ex-

pressio tangentis arcus, cuius radius r , complectentis tres arcus, quorum tangentes sunt a, b , & c . Expressio autem erit

erit $\frac{rr \times a + b + c - abc}{rr - ab - ac - cb}$. Et si quatuor sint arcus, quo-

rum tangentes sint a, b, c, f . Sufficiet in canone

$\frac{RR \times A + B}{RR - AB}$ loco A ponere $\frac{rr \times a + b + c - abc}{rr - ab - ac - bc}$ (tan-

gentem arcus, qui adæquat tres arcus simul sumptos, quorum tangentes sunt $a, b, \& c$) & loco B ponere f , & obtinebimus canonem pro exprimenda tangente arcus, qui complectitur quatuor arcus habentes pro tangentibus a, b, c, f ; canon autem erit

$$\frac{r^4 \times a + b + c + f - rr \times abc + abf + acf + bcf}{rr \times rr - ab - ac - cb - bf - cf - af + abcf}$$

II. Pro quovis autem numero arcuum, quorum omnium radius sit r , singulorum tangentes sint $a, b, c, f, g, h \&c.$ numero quotvis, tangens arcus, qui omnes illos arcus complectitur, exprimetur per fractionem, cuius numeratoris primus terminus est summa omnium tangentium affecta signo $+$, terminus alter est summa omnium productorum ex singulis ternis tangentibus affecta signo $-$, tertius terminus est summa omnium productorum ex singulis quinis tangentibus affecta signo $+$, quartus est summa omnium productorum ex singulis septenis tangentibus affecta signo $-$, atque ita progrediendum est quousque ex dato tangentium numero conflari poterunt producta capientia numerum impari ipsarum tangentium; qui sane termini singuli in eam radii potestatem ducendi sunt, quæ illos omnes ad unam, eandemque dimensionem redigat, denominatoris dimensiones unitate superantem; signa autem terminorum $+$ & $-$ alternim se se excipiunt. Fractionis autem denominatorem sequenti ratione comparabis. Primus itaque denominatoris terminus erit id quod relinquitur dempta ex quadrato radii summa omnium productorum ex singulis binis tangentibus, signo $+$ affectum. Alter terminus erit summa omnium productorum ex singulis quaternis tangentibus affecta signo $-$. Tertius erit summa omnium productorum ex singulis sexenis tangentibus affecta signo $-$, atque ita progrediendum est, quousque in censum venerint omnia producta capientia numerum parem datarum tangentium, signa vero $+$, & $-$ hic

T. II. P. III.

V u u

quo.

quoque alternatim se excipiant, & dimensiones terminorum per congruam radii potestatem sunt adæquandæ.

III. Quod si arcus omnes, quorum tangentes dantur, inter se æquales esse accidat, quicumque tandem sit eorum numerus, tangens summæ eorumdem, seu tangens arcus multipli iuxta numerum datorum arcuum eodem plane artificio emerget; omnia quippe producta ex quotvis datarum tangentium numero, in potestates datæ tangentis transeunt, quarum quidem numerus per vulgatas combinationum leges semper innotescit. Ut si quærat tangens arcus quintupli eius, cuius tangens est a , radius vero r , siye eius arcus, qui quinquies complectitur arcum tangentis a , quandoquidem tangens arcus, qui sit summa quinque arcuum habentium tangentes a, b, c, f, g ex allato theoremate est

$$\frac{r^4 \times a + b + c + f + g - rr \times abc + abf + acf + cbf + abg + acg + bcg + bfg + cfg + afg + abcfg}{rr \times rr - ab - ac - cb - bf - cf - af - ag - bg - cg - fg + abcf + abcg + abfg + acfg + bcfg}$$

opus est tantum loco omnium datarum tangentium scribere eandem tangentem a , eritque tangens arcus quintupli = $5r^4 a - 10rra^3 + a^5$; numeri autem, qui sunt in coefficienten-

$$r^4 - 10aarr + 5a^4$$

tibus terminorum tam in numeratore, quam in denominatore sunt numeri complexuum, qui in dato tangentium numero fieri possunt capientium tot tangentes quota est dimensio tangentis in uno quovis termino. Sic termino numeratoris secundo $10rra^3$, præfigitur numerale coefficientens 10, quia decem sunt producta ex singulis ternis, quæ fieri possunt in datis quinque tangentibus; termino autem $5a^4$ in denominatore appositum est coefficientens numerale 5, eo quod quinque sunt producta ex singulis quaternis, quæ ex datis quinque tangentibus conflantur.

IV. Tandem si data arcus cuiusvis tangente quæstio sit de inveniendâ tangente arcus submultiplicis iuxta quemvis datum numerum integrum, vocando b tangentem arcus dati, x vero tangentem quæsitam arcus submultiplicis, ex assumpta x erues tangentem arcus, qui sit iuxta datum numerum multiplex arcus habentis tangentem x . Atque hæc adæquanda est datæ tangenti b , ut comparetur æquatio, in qua quæsitâ x est ipsa tangens arcus iuxta datum numerum submultiplicis eius, cuius tangens est data b . Ut si data tan-

gente

gente arcus, quam vocamus b , quærat tangens arcus, qui sit quintans dati arcus, quam vocamus x , inveniemus tangentem arcus, qui sit quintuplus arcus habentis tangentem x , quæ erit $\frac{5r^4x - 10rrx^3 + x^5}{r^4 - 10rrxx + 5x^4}$. Cum hæc sit tangens ar-

cus quintupli eius, qui tangentem habet x , erit ipsa b . Itaque habebimus æquationem $x^5 - 5bx^4 - 10rrx^3 + 10rrbxx + 5r^4x - r^4b = 0$, in qua x est tangens quæsitæ arcus subquintupli eius, cuius datur tangens b . Aequationum autem hac ratione constitutarum omnes radices reales sunt, usumque obtinent in sectionibus arcuum omnium habentium datam tangentem in tot partes, quotus est datus numerus.

V. Pari ratione si quærat tangens x arcus, qui sit ad arcum, cuius data sit tangens b , in ratione quavis numeri dati ad numerum datum, veluti ut 3 ad 5, æquatio obtinebitur pro inveniendâ tangente x . Nam cum arcus tangente x iubetur esse ad arcum, cuius tangens b , in ratione 3 ad 5, hinc consequitur tres arcus, quorum singulorum tangens est b , æquales fore quinque arcibus, quorum singulorum tangens est x . Itaque tangens arcus tripli eius, qui habet tangentem b , quæ est $\frac{3rrb - b^3}{rr - 3bb}$, adæquanda est tangenti arcus

quintupli eius, qui tangentem habet x , quæ est

$\frac{x^5 - 10rrx^3 + 5r^4x}{r^4 - 10rrxx + 5x^4}$, quapropter æquatio erit

$$\begin{array}{r} x^5 + 5b^3 \\ - 15rrb \quad x^4 \\ \hline rr - 3bb \end{array} \quad \begin{array}{r} - 10r^4 \\ + 30rrb \quad x^3 \\ \hline rr - 3bb \end{array} \quad \begin{array}{r} + 30r^4b \\ - 10rrb^3 \quad xx \\ \hline rr - 3bb \end{array} \quad \begin{array}{r} + 5r^6 \\ - 15r^4bb \quad x \\ \hline rr - 3bb \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 3r^6b \\ + r^4b^3 \\ \hline rr - 3bb \end{array} = 0.$$

VI. Hæc quidem omnia ex communi analysi excerpta sunt, nec quidquam novi præferunt. Iam ad eorum usum in æquationibus differentialibus progrediendum est.

VII. Aequatio differentialis, cuius omnes termini integrantur per logarithmos, in æquationem algebraicam tandem faceffit. Ut si æquatio fuerit $\frac{adx}{x} = \frac{2ady}{y} - \frac{ady}{y-a}$, quæ in-

tegrata est $lx = 2ly - l\sqrt{y-a}$, poterit hæc ad duos tantummodo terminos redigi, scribendo $lx = l\frac{yy}{y-a}$, &

ab æqualitate logarithmorum progrediendo ad æqualitatem quantorum, quorum sunt logarithmi, abiicientur ab æquatione logarithmi, & scribi poterit $x = \frac{yy}{y-a}$. Qua autem

ratione in integranda per logarithmos æquatione illa primaria $\frac{adx}{x} = \frac{2ady}{y} - \frac{ady}{y-a}$ constantes arbitrariæ in æqua-

tionem possint induci, satis notum est, neque opus est in his diutius immorari.

VIII. Quid simile in æquationibus advenit, in quibus singuli termini per arcus circuli integrantur; ab his enim, non secus ac in æquationibus logarithmicis accidit, ad algebraicas æquationes datur regressus, modo legitima arguendi ratio in huiusmodi regressu ubique servetur. De huius itaque modi æquationibus, deque earum in algebraicas conversione nonnulla notatu digna hic sunt referenda.

IX. Quoties datæ æquationis differentialis indeterminatæ cum earum differentialibus ab invicem seiunctæ duas æquationis partes constituunt, quarum utraque est fractio rationalis, cuius denominator nullam radicem habet realem, sed omnes imaginarias, tunc sæpenumero accidit, ut totum integrationis negotium per solos arcus circuli notæ tangentis, ac radii conficiatur, quapropter non raro æquatio in algebraicam abit; secus si denominator aliquas, aut omnes radices reales habeat; intervenientibus quippe in integratione logarithmis, simulque arcubus circularibus æquatio in algebraicam converti nequit; sunt enim sibi invicem arcus circuli, & logarithmi impedimento, ne æquatio ab illis expurgetur, & algebraica evadat. Exemplis rem illustrabimus.

X. Linea queratur, cuius subtangens sumpta in axe abscissarum x sit ad ordinatam, ut $xx + aa$, ad $yy + aa$. Erit æquatio $\frac{dx}{xx + aa} = \frac{dy}{yy + aa}$. Hæc ducta in aa evadit

$$\frac{aadx}{xx + aa} = \frac{aady}{yy + aa}. \text{ Integrando utramque æquationis par-}$$

tem

tem patet fore, ut in quaesita linea arcus tangentem habens x , perpetuo adaequet arcum, cuius tangens sit y , sumptis his arcibus in eodem circulo radium habente a . Quoniam autem duorum arcuum aequalium in eodem circulo sumptorum tangentes quoque inter se se aequales esse oportet, erunt in quaesita linea ipsae x , & y inter se ubique aequales, eritque aequatio $x = y$, quae est ad rectam angulum semirectum cum axe complectentem.

XI. Cum autem integrale formae $\frac{aadx}{xx + aa}$ non sit so-

lummodo arcus radio a , & tangente x , sed etiam arcus ille, addito quovis arcu constante, idemque accidat etiam in alia forma $\frac{aady}{yy + aa}$, liberum est nobis pro integrali

prioris partis aequationis scribere summam arcus, cuius tangens x cum arcu quocumque, cuius tangens sit constans arbitraria b . Et pro integrali alterius partis aequationis scribere arcum, cuius tangens y , addito (vel dempto) arcu tangentem habente constantem quamcumque ad arbitrium assumptam c . Porro complexus duorum arcuum, quorum unius tangens sit x , alterius b , arcus est cuius tangens est $\frac{aa \times x + b}{aa - bx}$, & arcus alter, qui componitur ex arcu habente tangentem y , & ex alio habente tangentem c , arcus est tangentem habens $\frac{aa \times y + c}{aa - cy}$. In optata igitur linea arcus tangentem habens $\frac{aax + aab}{aa - bx}$ aequalis est ubique arcui tan-

gentem habenti $\frac{aay + aac}{aa - cy}$. Et quoniam loco additionis arcuum constantium subductio adhiberi potest, quin &, si libeat, hic subductio, ibi additio, hinc tangentes b , & c , ut libet positivas, vel negativas assumi posse consequitur, modo termini aab , & bx signa inter se opposita habeant, idemque de terminis aac , & cy est dicendum. Nunc vero, postquam arcus duos inter se aequales praebet aequatio, quorum videlicet tangentes sunt $\frac{aax \pm aab}{aa \mp bx}$, & $\frac{aay \pm aac}{aa \mp cy}$, ab

arcubus ad tangentes procedendo, recte concludemus æquationem pro quæsita linea algebraicam esse $\frac{aax \pm aab}{aa \mp bx} =$

$\frac{aay \pm aac}{aa \mp cy}$, in qua signorum vicissitudines quatuor præbent

æquationes ad hyperbolam inter asymptotos, quæ sunt

$$\frac{xy - bc}{b - c} y \quad \frac{+ bc}{b - c} x \quad + aa = 0$$

$$\frac{xy - bc}{b + c} y \quad \frac{+ bc}{b + c} x \quad + aa = 0$$

$$\frac{xy + bc}{b - c} y \quad \frac{- bc}{b - c} x \quad + aa = 0$$

$$\frac{xy + bc}{b + c} y \quad \frac{- bc}{b + c} x \quad + aa = 0$$

XII. Si postulatum fuisset, ut subtangens quæsitæ lineæ esset ad duplam ordinatam, ut $xx + aa$ ad $yy + aa$, æquatio ad curvam quæsitam esset $\frac{dx}{aa + xx} = \frac{2dy}{aa + yy}$, quam æqua-

tionem, in aa prius ductam, si ad integralia pura redigamus, emerget lineæ quæsitæ conditio, ut nimirum arcus tangentem habens x sumptus in circulo radio a , perpetuo æqualis sit duplo arcui in eodem circulo sumpto, cuius tangens est y . Horum autem arcuum tangentes sunt x , & $\frac{2aay}{aa - yy}$. Hinc transeundo ab arcubus ad tangentes (quan-

doquidem arcus in eodem circulo sumuntur), erit æquatio algebraica pro linea quæsita $x = \frac{2aay}{aa - yy}$, sive $aax - xyy -$

$2aay$

$2aay = 0$. At si dum æquationem integramus arcus constantes addere, vel demere velimus, exurget quæsitæ lineæ alia conditio, ut videlicet arcus circuli tangentem habens x , addito vel dempto arcu tangentem constantem b habente, ubique sit æqualis arcui circuli, cuius tangens sit $\frac{2aay}{aa - yy}$,

addito vel dempto arcu circuli tangentem constantem habente c . Quorum arcuum utramque æquationis partem constituentium tangentes cum sint $\frac{aax + aab}{aa - bx}$, & $\frac{aac + 2aay - cyy}{aa - 2cy - yy}$,

æquatio inter has tangentes algebraica erit pro curva quæsitæ $\frac{aax + aab}{aa - bx} = \frac{aac + 2aay - cyy}{aa - 2cy - yy}$, in qua b , & c esse pos-

sunt quanta positiva, & negativa, eo quod arcus tangentium b , & c possunt addi arcubus, quibus applicantur, & ab iis demi, si libuerit, incolumi æquatione.

XIII. At vero si plures sint in æquatione differentiali termini, quam duo, quorum unusquisque per arcum notæ tangentis sit integrabilis, oportebit, post integratam æquationem illos, qui ad easdem æquationis partes sunt, in unum colligere, ut tota æquatio inter duos ad summum arcus constituta sit.

XIV. Ut si proposita fuisset æquatio $\frac{aadx}{aa + xx} = \frac{2aady}{aa + yy}$
 $+ \frac{aady}{a + y^2 + aa}$. In qua unusquisque terminus per arcum

circuli notæ tangentis integratur, adeoque curvæ quæsitæ ea est conditio, ut arcus tangente x adæquet ubique duplum arcus tangente y una cum arcu tangente $a + y$ sumptis omnibus his arcubus in circulo, cuius radius est a ; ut hæc æquatio præparetur ad eliminationem arcuum, & deinde in algebraicam vertatur, curandum est, ut unus sit arcus ad unam æquationis partem, alter ad alteram. Quemadmodum enim ab æquatione logarithmica $la + lc = lx + ly$ non recte transitus fit ad algebraicam $a + c = x + y$, sed tamen ab æquatione unius logarithmi cum uno logarithmo $lx = ly$ recte arguitur $x = y$, modo omnes logarithmi ab una, eademque logistica decerpti sint, ita in arcubus circularibus, si com-

si complexus plurium arcuum, quorum tangentes notæ sunt, æqualis sit complexui aliorum arcuum, quorum etiam tangentes sint notæ, non recte procedimus ab æqualitate summæ arcuum ad æqualitatem summæ tangentium, sed omnes arcus ad unam, eandemque æquationis partem constituti in unum arcum notæ tangentis sunt colligendi. In proposita æquatione arcus, cuius differentiale est $\frac{2aady}{aa + yy}$, tangen-

tem habet $\frac{2aady}{aa + yy}$, & radium a ; arcus autem, cuius diffe-

rentiale est $\frac{aa - yy}{a + y^2 + aa} aady$, tangentem habet $a + y$, & ra-

dium eundem a ; horum itaque duorum arcuum summa tangentem habet $\frac{a^3 + 3aay - ayy - y^3}{aa - 2ay - 3yy}$. Arcus igitur hanc

tangentem habens æqualis est arcui tangentem x habenti; nam quando æquatio inter duos arcus eiusdem circuli, & notæ tangentis versatur, arcus abiicere licet, & ad æquationem algebraicam delabi, quæ erit $x = \frac{a^3 + 3aay - ayy - y^3}{aa - 2ay - 3yy}$.

Hic nil obstat, quin fiat arcuum constantium additio, aut subductio ad unam, vel ad utramque æquationis partem. Si utrique æquationis parti addere velimus arcum constantem, priori quidem arcum, cuius tangens sit b , posteriori vero arcum, cuius tangens sit c , æquatio algebraica evadet $\frac{aax + aab}{aa - bx} =$

$$\frac{a^5 + 3a^4y - a^3yy - aay^3 + a^4c - 2a^3cy - 3aacyy}{a^4 - 2a^3y - 3aayy - a^3c - 3aac y + acyy + cy^3}$$

XV. Nemini negotium faciet ratio integrandæ fractionis $\frac{bbdx}{aa + xx}$, statim quippe advertet unusquisque, hanc

non aliam esse a fractione $\frac{bb}{aa} \times \frac{aadx}{aa + xx}$, atque adeo inte-

grale propositæ fractionis esse arcum quemdam circuli radio a descripti, qui sit ad arcum circuli eodem radio descripti habentem x pro tangente in ratione bb ad aa .

XVI.

XVI. Quid si in æquatione fractiones numerales inter-
veniant? Tota prius æquatio fractionibus est liberanda, tum
nil obstat, quo minus ad æquationem algebraicam per tra-
ditas regulas properemus. Veluti si fuerit

$$\frac{\frac{2}{3}aadx}{aa+xx} = \frac{\frac{2}{3}aady}{a-y^2+aa}, \text{ eliminatis fractionibus numeralibus}$$

$$\text{erit } \frac{4aadx}{aa+xx} = \frac{3aady}{a-y^2+aa}. \text{ In figura igitur quaesita quatuor}$$

arcus, quorum singulorum tangens sit x , æquales erunt tribus
arcubus, quorum uniuscuiusque tangens sit $a-y$; arcus autem
hi omnes in uno, eodemque circulo, cuius radius sit a , sunt
capiendi. Sane quadruplicis arcus habentis tangentem x
tangens est $\frac{4a^4x - 4aax^3}{a^4 - 6aaxx + x^4}$, & tripli arcus habentis tan-

$$\text{gentem } a-y \text{ tangens est } \frac{6aay - 9aayy + 3y^3}{6ay - 2aa - 3yy}. \text{ Igitur arcus,}$$

quorum hæ sunt tangentes inter se æquales erunt in figura
quaesita, & tangentes ipsæ inter se etiam æquales erunt;
quare erit æquatio algebraica $\frac{4a^4x - 4aax^3}{a^4 - 6aaxx + x^4} =$

$$\frac{6aay - 9aayy + 3y^3}{6ay - 2aa - 3yy}; \text{ non memoro hic quoque adhiberi posse}$$

arcuum constantium, quorum tangentes sint b , & c , addi-
tionem, vel subtractionem, & algebraicas inde profluere
æquationes inventis tangentibus arcuum, qui complectantur
& arcus constantes, & illos, quorum tangentes per modo al-
latas fractiones significantur.

XVII. At si sint inter se diversi radii circulorum, in
quibus sumendi sunt arcus, quibus æquatio integratur, tunc
ad communem circulum illi sunt referendi. Si fuerit

$$\frac{aadx}{aa+xx} = \frac{bbdy}{bb+yy}, \text{ conditio figuræ, quam hæc æquatio de-}$$

notat, erit quod arcus circuli radio a descripti tangentem
habens x , sit ubique æqualis arcui circuli radio b descripti
tangentem y habenti. Ut hosce duos arcus ad eundem cir-
culum radio a redigamus, oportet tantum meminisse, arcum
T. II. P. III. X x x cir-

circuli radio a similem arcui circuli radio b , tangentem y habenti, habere tangentem $\frac{ay}{b}$, & esse ad hunc arcum, ut

a ad b , quapropter loco arcus circuli radio b descripti tangentem y habentis, scribi potest arcus circuli radio a descripti, cuius tangens sit $\frac{ay}{b}$, sitque in b ductus, & per a

divisus. Ut si b sit $3a$, quo casu æquatio fit $\frac{aadx}{aa+xx} =$

$\frac{9aady}{9aa+yy}$, conditio quæsitæ lineæ erit, ut arcus circuli ra-

dio a , tangente x , ubique æqualis sit triplo arcui circuli eodem radio a descripti, cuius tangens sit $\frac{1}{3}y$, & in univ-
ersum, ut arcus circuli, cuius elementum est $\frac{bbdy}{bb+yy}$, re-

digatur in arcum circuli, cuius radius sit a , loco elementi $\frac{bbdy}{bb+yy}$ scribemus $\frac{b}{a} \times aa \times \frac{ady}{b}$, nam hæc scribendi forma
 $\frac{aa + \frac{aayy}{bb}}$

a priore illa nihil differt, & consistit in quadrato radii a ducto in differentiale tangentis $\frac{ay}{b}$, diviso per summam qua-

drati radii a cum quadrato tangentis $\frac{ay}{b}$, quod totum du-

ctum est in constantem b , itaque eius integrale erit arcus

circuli radio a , tangente $\frac{ay}{b}$, sed ductus in b , & divisus

per a .

XVIII. Verum non poterimus explicare in terminis algebraicis tangentem arcus, qui sit ad arcum datæ tan-
gentis in ratione a ad b , nisi a , & b sint inter se, ut
numerus datus ad numerum datum. Hinc consequitur æqua-
tionem, qualis est modo proposita $\frac{aadx}{aa+xx} = \frac{bbdy}{bb+yy}$, non

pos.

posse in algebraicam converti, nisi cum datur in numeris ratio a ad b . In allato exemplo, ubi b ponitur $= 3a$, erit æquatio $\frac{aadx}{aa+xx} = \frac{3 \times aa \times \frac{2}{3}dy}{aa+\frac{yy}{9}}$, & conditio curvæ est,

ut arcus tangentem habens x , sit ubique æqualis triplo arcui tangentem habenti $\frac{2}{3}y$, sumptis arcubus in circulo, cuius radius a . Triplicis arcus tangentem habentis $\frac{2}{3}y$, tangens est $\frac{27aay - y^3}{27aa - 9yy}$, quare sunt inter se æquales arcus circuli radio a , quorum unius tangens x , alterius $\frac{27aay - y^3}{27aa - 9yy}$;

& (quod inde consequitur) tangentes ipsæ x , & $\frac{27aay - y^3}{27aa - 9yy}$ inter se æquales sunt. Si arcuum constantium, quorum tangentes b , & c , additionem nolimus negligere, habebimus æquationem pro quaesita linea

$$\frac{aax + aab}{aa - bx} = \frac{27a^4y - aay^3 + 27a^4c - 9aacyy}{27a^4 - 9aayy - 27aacy - cy^3}, \text{ in qua } b, \text{ \& }$$

c possunt esse cuiusvis signi.

XIX. Hactenus in æquationibus differentialibus versati sumus, in quibus indeterminatarum nulla secundam dimensionem excedit. Verum si in denominatoribus fractionum, quibus æquatio constituitur, indeterminatarum altera, aut utraque ad quartam dimensionem ascendat, sintque omnes denominatorum radices, sive divisores simplices imaginarii, qua ratione arcus circulares eruantur, quibus fractiones integrari possunt, quæ sit illorum tangens, qui radius circuli, operæ pretium est paullo luculentius explicare.

XX. Fractionis rationalis integrandæ denominator, si plures habeat, quam duas radices imaginarias, in factores reales dividendus est, ex quorum ductu ille componatur, & in quorum factorum nullo fluens secundam dimensionem excedat. Hoc ubi fecerimus, dividenda deinde est fractio ipsa in totidem fractiones, quot sunt factores illi, singulas habentes pro denominatore singulos factores illos, quarum deinde fractionum unamquamvis seorsim facili negotio integrabimus.

XXI. Ut si fuerit proposita fractio integranda

$$\frac{6axxdx + aaxdx}{11}$$

$x^4 + \frac{9aaxx}{2} + 3a^3x + \frac{85a^4}{16}$, cuius denominator quatuor est

radicum, earumque nulla est realis. Diviso denominatore in duos factores reales $xx - ax + \frac{17aa}{4}$, & $xx + ax + \frac{5aa}{4}$,

ex quorum ductu ipse coalescit, fractionem deinde in duas fractiones partiemur, quarum una unum ex his divisoribus, altera alterum habeat pro denominatore. Sane si contet, (ut in alato exemplo) qui sint duo illi divisores reales, ex quibus conflatur fractionis denominator, quando hic quatuor est tantummodo dimensionum, vel tres divisores, quando denominator est sex dimensionum, & ita porro, quod reliquum est, divisionem nimirum fractionis in fractiones habentes singulos illos factores pro denominatoribus, facile absolvemus; quippe sunt theoremata quaedam pro divisione fractionis propositæ in alias fractiones simplices, quarum una quævis unum habeat pro denominatore ex divisoribus denominatoris fractionis propositæ. Dabimus nunc theoremata pro divisione fractionis, cuius denominator quatuor sit dimensionum, factores habens duos, quorum uterque duarum sit dimensionum. Canon fractionis differentialis huiusmodi esto $Ax^3 dx + Bxxdx + Cxdx + Kdx$.

$$\frac{Ax^3 dx + Bxxdx + Cxdx + Kdx}{xx + Mx + N \times xx + Px + Q}$$

Dividitur illa in duas, quæ sunt

$$\frac{fxdx + gdx}{xx + Mx + N}, \quad \& \quad \frac{bxdx + ldx}{xx + Px + Q},$$

in quibus coefficientia f, g, b, l sunt fractiones constantes, quarum communis denominator est $\overline{N - Q^2 + NP - MQ} \times \overline{P - M}$; numeratores vero sunt

$$K \times \overline{M - P} + \overline{B - AM} \times \overline{NP - MQ} + \overline{C - AN} \times \overline{Q - N},$$

pro quanto f

$$K \times \overline{P - M} + \overline{B - AP} \times \overline{MQ - NP} + \overline{C - AQ} \times \overline{N - Q},$$

pro

pro quanto vero g

$$K \times \overline{Q-N+MM-MP} + CN \times \overline{P-M} + BN \times \overline{N-Q} + AN \times \overline{MQ-NP},$$

tandem pro quanto l

$$K \times \overline{N-Q+PP-MP} + CQ \times \overline{M-P} + BQ \times \overline{Q-N} + AQ \times \overline{NP-MQ}.$$

XXII. Iam in proposita fractione $\frac{6 axxdx + aaxdx}{11}$

$$\frac{x^4 + \frac{9}{2} aaxx + 3a^3x + \frac{85}{16} a^4}{2}$$

cuius denominator productum est duorum factorum realium $xx - ax + \frac{17}{4} aa$, & $xx + ax + \frac{5}{4} aa$, valores coefficientium

constantium f, b, g, l erunt $f = 0, b = 0, g = \frac{17}{22} aa$, &

$l = -\frac{5}{22} aa$, & fractio proposita dividitur in duas, quae

sunt $\frac{17aadx}{22 \times xx - ax + \frac{17}{4} aa}$, & $\frac{-5aadx}{22 \times xx + ax + \frac{5}{4} aa}$. Ita;

que si æquatio sit $\frac{aady}{22 \times aa + yy} = \frac{6 axxdx + a^3xdx}{11}$

post divisionem fractionis habentis x , & dx in duas

$\frac{17aadx}{22 \times xx - ax + \frac{17}{4} aa}$, & $\frac{-5aadx}{22 \times xx + ax + \frac{5}{4} aa}$, habebimus

$\frac{aady}{22 \times aa + yy} = \frac{17aadx}{22 \times xx - ax + \frac{17}{4} aa} - \frac{5aadx}{22 \times xx + ax + \frac{5}{4} aa}$

omisso vero communi denominatorum divisore numerico 22 (in quem finem assumpsi primam æquationis partem, & ipsam habentem hunc divisorem in denominatore, qua assumptione mirum in modum universa hæc supputatio contrahi-

trahitur) iam ad integrationem parata est æquatio. Est quippe arcus circuli radio a , tangentem habens y , ubique æqualis excessui, quo quadrans decies & septies sumptus arcus cuiusdam habentis tangentem $x - \frac{1}{2}a$ sumpti in circulo, cuius radius est $2a$, superat quintuplum arcum, cuius tangens est $x + \frac{1}{2}a$ sumptum in circulo, cuius radius est a ; hi enim arcus sunt integralia fractionum, quæ æquationem constituunt. Nunc ut revocemus arcum, cuius tangens est $x - \frac{1}{2}a$, sumptum in circulo, cuius radius est $2a$, ad arcum circuli, cuius radius sit a , loco fractionis

$$\frac{17aadx}{xx - ax + \frac{17aa}{4}}$$

feu alterius eiusdem cum illa valoris $\frac{17}{4} \times \frac{4aadx}{x - \frac{1}{2}a^2 + 4aa}$,

scribemus $\frac{17}{2} \times aa \times \frac{1}{2}dx$

$$\frac{\frac{17}{2} \times aa \times \frac{1}{2}dx}{x - \frac{1}{2}a^2 + aa}$$
; hæc enim posterior scribendi

forma statim ostendit fractionis integrale esse medietatem decies & septies sumptam arcus cuiusdam habentis radium a , & tangentem $x - \frac{1}{2}a$. Sunt itaque omnes arcus ad com-

munem circulum radio a descriptum revocati; & quaesitæ figuræ ea est conditio, ut arcus, tangente y , ubique adæquet excessum, quo medietas decies & septies sumpta arcus cuiusdam habentis $x - \frac{1}{2}a$ pro tangente superat quin-

tuplum arcus habentis tangentem $x + \frac{1}{2}a$; & duplicatis omnibus huius æquationis terminis, erit conditio lineæ quaesitæ, quod duplum arcus habentis y pro tangente, ubique æquale sit excessui, quo arcus decies & septies sumptus, cuius tangens sit $x - \frac{1}{2}a$, superat decuplum arcus, cuius

tangens sit $x + \frac{1}{2}a$; omnes vero arcus capiendi sunt in circulo, cuius radius sit a . Ad compendium nonnihil faciet, si arcus, cuius tangens est $x + \frac{1}{2}a$ ad alteram æquationis partem transferatur, scribaturque summam dupli arcus, cuius

cuius tangens est y cum arcu, cuius tangens est $x + \frac{1}{2}a$ decies sumpto, semper æqualem esse arcui, cuius tangens est $x - \frac{1}{2}a$ decies & septies sumpto. Iam ut æquationem ab

2

arcubus ad tangentes traducamus, sicque in algebraicam convertamus, opus est invenire tangentem arcus decupli eius, cuius tangens est $x + \frac{1}{2}a$, deinde tangentem summæ arcus habentis y pro tangente cum arcu illo decuplo, & hanc sic inventam tangentem adæquare tangenti arcus, qui decies & septies complectitur arcum, cuius tangens est $x - \frac{1}{2}a$. Omnes autem hi arcus ex illo circulo sumendi

2

sunt, cuius radius est a . Ad has tangentes in terminis algebraicis significandas, earumque rationes algebraica æquatione referendas inter se, dimensiones literæ x , & y simul sumptæ ad vigesimam octavam dimensionem assurgunt, ut mirum videri possit, quod complexam adeo atque elevatam formularum compositionem postulet æquatio differentialis tam simplex, & plana, ut est proposita

$$\frac{aady}{aa + yy} = \frac{6 aaxxdx + a^3 xdx}{11} \cdot \frac{x^4 + \frac{9}{2} aaxx + 3a^3 x + \frac{85}{16} a^4}{16}$$

XXIII. Poterunt hic quoque arcubus, qui utramque æquationis partem componunt, admoveri arcus constantes, vel additione, vel subductione, quo ipso æquatio, de qua superiore numero actum est, adhuc nonnihilo magis implicita evadet.

XXIV. Verumtamen in allato exemplo, ideo ad algebraicam æquationem data est via ab æquatione inter arcus circulares, quia denominator fractionis habentis x , & dx in duos factores reales est divisibilis, in quorum utroque fluens x duas habet dimensiones. Potest itaque quæri num omnis formula omnes radices imaginarias habens in trinomia realia sit semper divisibilis, in quorum nullo fluens excedat secundam dimensionem. De hoc adeo inter geometras semel dubitatum est, ut neminem lateat ipsos in analyfi

lysi principes viros diu hæsisse ancipites, an forma omnium, quæ quatuor habent radices imaginarias, simplicissima $x^4 + a^4$ in duos factores reales possit dividi. Postquam vero clarissimorum analyistarum munere compertum est, illam esse productum duorum componentium realium $xx + ax\sqrt{2} + aa$, & $xx - ax\sqrt{2} + aa$, longe ulterius promotæ est dividendarum formularum facultas in divisores reales trinomios, duas dimensiones habentes, iamque in primo commentariorum huius academix volumine ratio tradita est dividendæ formulæ $x^{2m} + b^{2m}$, in divisores numero m reales, quicumque sit numerus m , quorum unusquisque duas habeat fluentis x dimensiones, quæ etiam methodus ad formulas $x^{2m} + ax^m + b^{2m}$ extenditur, quin ad omnes formulas $x^n \pm b^n$, quicumque sit numerus n modo integer, eodemque loco post formulæ divisionem in factores reales, totum fractionis, cuius formæ illæ sint denominatores, negotium perficitur usque ad integrationem.

XXV. Nondum tamen res hæc est undique absoluta; nisi enim certiores simus omnem formulam denominatoris, rationalem illam quidem, quo ad fluentem x , posse dividi in factores reales duarum dimensionum, & si omnes eius radices sint imaginariæ, nunquam tuto poterimus asserere, omnem fractionem rationalem unius fluentis per solas quadraturas sectionum conicarum posse integrari.

XXVI. Agemus nunc de fractionibus, quarum denominatores ad quatuor tantum dimensiones evectam continent fluentem, de denominatoribus altiorum potestatum tractationem in aliud tempus reiicientes.

XXVII. Dico itaque omnem formam realem, & rationalem unius fluentis z , in qua ipsa fluens quatuor tantummodo habeat dimensiones, etsi omnes in illa fluentis valores sint imaginarii, in duos factores semper dividi posse, ex quorum ductu illa componitur, quorum uterque duas ex illis radicibus continet, eosque ambos reales. Formulam rationalem voco, in qua fluens z nullo signo radicali affecta est; formulam vero realem illam, in qua omnium terminorum coefficientia sunt quanta realia.

XXVIII. Quæcumque sit formula denominatoris fractionis integrandæ, certum est secundum terminum ex illa
tolli

tolli posse. Statuamus itaque denominatorem fractionis integrandæ iam secundo termino imminutum esse, quod quidem ideo assumimus, ut brevitati, & eorum, quæ dicenda sunt, perspicuitati, quantum in potestate est, sit consultum.

XXIX. Esto itaque $y^4 + bbyy + c^3y + d^4$ denominator fractionis integrandæ, postquam ab eo secundus terminus ablatu est. Volo nunc denominatorem istum in alium transmutare, in quo coefficientis secundi termini idem sit, ac coefficientis termini penultimi, suppletis in coefficiente termini secundi dimensionibus, quæ desunt, per radicem quadratam ultimi termini. Hoc ut assequar, scribo pro fluente y novam fluentem x , addita illi quadam constante incognita, & per supputationem determinanda, quæ sit n . Itaque pono $x + n$ in locum y , in data fractione integranda. Denominator illius, qui erat $y^4 + bbyy + c^3y + d^4$ vertetur in $x^4 + 4nx^3 + 6nn$
 $\quad \quad \quad + bb \quad xx \quad + 4n^3 \quad + bbnx$
 $\quad \quad \quad \quad \quad \quad + 2nbb \quad x \quad + n^4$
 $\quad \quad \quad \quad \quad \quad + c^3 \quad \quad \quad + c^3n$
 $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad + d^4$

cum autem id, quod postulatur, sit, ut $4n^3 + 2nbb + c^3$ coefficientis penultimi termini idem sit, ac $4n$ coefficientis termini secundi, suppletis per radicem quadratam ultimi termini dimensionibus deficientibus, erit æquatio

$$4n\sqrt{n^4 + bbnx + c^3n + d^4} = 4n^3 + 2bbn + c^3. \text{ Et æquatio ad inveniendam } n, \text{ erit } n^3 + \frac{2d^4}{c^3}nn - \frac{\frac{1}{2}bbn}{c^3} - \frac{\frac{1}{3}c^3}{c^3} = 0$$

Assumenda est igitur pro n , quævis ex radicibus realibus huius æquationis (oportet autem quantum n , in æquatione cubica unum saltem valorem realem habere), & pro y in fractione proposita scribenda est nova fluens x , addito quanto reali n ; denominator vertetur in formulam realem, quatuor dimensionum, quo ad literam fluentem x , in qua coefficientis termini secundi ductum in radicem quadratam ultimi termini, coefficienti penultimi termini erit æquale. Potest itaque omnis denominator datæ fractionis quatuor dimensionum secundo termino carens, in alium realem de-

nominatorem transmutari, in quo adsit inter coefficientia secundi, & penultimi termini ea relatio, quam postulamus.

XXX. Quantum n , quod æquatione modo inventa obtinetur, interdum id præstare potest, ut peracta substitutione $x + n$ in locum y , coefficientis termini secundi ductum in radicem quadratam ultimi termini, sit profecto idem, ac coefficientis penultimi termini, verum signa sint mutata.

Nam æquatio $4n^3 + 2bbn + c^3 = 4n\sqrt{n^2 + bbn + c^3n + d^4}$, qua prior illa conditio continetur, evasisset $4n^3 + 2bbn + c^3 = -4n\sqrt{n^2 + bbn + c^3n + d^4}$, si posterior hæc conditio fuisset in quæstione; utriusque autem æquationis idem est tractandæ modus, eademque finalis æquatio $n^3 + 2d^4$

$$\frac{c^3 nn}{c^3} \\ - \frac{\frac{1}{2}b^4}{c^3}$$

$-\frac{1}{2}bbn - \frac{1}{8}c^3 = 0$; quapropter valorum ex hac æquatione profectorum aliqui interdum hoc, non illud efficere poterunt.

XXXI. A primo ad ultimum; fractionis integrandæ denominator fluentem habens z ad quartam potestatem evectam, termino secundo mulctetur, si iam terminus hic ab illo non absit. Novus fractionis denominator, qui iam termino secundo imminutus erit, cuius fluens erit y , convertatur in formulam, in qua fluens erit x , & inter coefficientia secundi, & penultimi termini servetur conditio sæpe memorata, ubique substituendo $x + n$ loco y , n vero unus sit ex valoribus realibus, quos habet in æquatione $n^3 + 2d^4 nn - \frac{1}{2}bbn - \frac{1}{8}c^3 = 0$. Itaque reliquum est, ut osten-

$$\frac{c^3}{c^3} \\ - \frac{\frac{1}{2}b^4}{c^3}$$

damus, qua ratione dividendus sit in duos factores reales denominator, cuius fluens sit x , tali modo constitutus, ut coefficientis termini secundi ductum in radicem quadratam ultimi termini æquale sit coefficienti ultimi termini, idque quamvis denominatoris omnes radices sint imaginariæ.

XXXII. Denominator itaque post substitutionem $x + n$ in locum y ; hanc formam acquirat $x^4 + ax^3 + bbyx + ammx$

$ammx + m^4$. Statuantur duo trinomia $xx + gx + mm$, & $xx + fx + mm$, ex quorum ductu denominator ipse intelligatur confurgere. Ducantur hæc trinomia in se invicem, & productum comparetur cum propositæ fractionis denominatore, singulos producti huius terminos cum homogeneis expositi denominatoris terminis conferendo. Productum erit

$$x^4 + gx^3 + 2mmxx + mmfx + m^4 + fx^3 + fgxx + mmgx,$$

quod si ea, quam diximus, ratione conferatur cum denominatore $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$, orientur quinque æquationes, quarum prior, & postrema sunt identicæ, secunda, & quarta sunt eadem æquatio, itaque pro una tantum habendæ sunt. In duabus itaque ad summum æquationibus tota hæc comparatio consistit, quæ sunt $g + f = a$, & $2mm + gf = bb$. Ex priorè provenit $g = a - f$, quo valore in altera æquatione substituto, habemus $2mm + af - ff = bb$. Hinc duo valores f ,

nempe $f = \frac{1}{2}a \pm \sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb}$, quare g , quæ est $= a - f$, erit $= \frac{1}{2}a \mp \sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb}$.

XXXIII. Si denominator in factores dividendus sit $x^4 + ax^3 + bbxx - ammx + m^4$ (qualem præbet interdum substitutio $x + n$ in locum y , ex iis, quæ Num. XXX. adnotavimus) comparandus est cum producto ex duobus trinomiis $xx + gx - mm$, & $xx + fx - mm$, & reliqua omnia sunt peragenda, ut in denominatore $xx + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$, & valores f , & g prodibunt

$$f = \frac{1}{2}a \pm \sqrt{\frac{1}{4}aa - 2mm - bb}$$

$$g = \frac{1}{2}a \mp \sqrt{\frac{1}{4}aa - 2mm - bb}.$$

XXXIV. Formula igitur $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$ est productum duorum trinomiorum

$$xx + \frac{1}{2}ax - x\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} + mm, \text{ \&}$$

$$xx + \frac{1}{2}ax + x\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} + mm. \text{ Formula autem } x^4 + ax^3 + bbxx - ammx + m^4 \text{ est productum duorum trinomiorum}$$

$$xx + \frac{1}{2}ax - x\sqrt{\frac{1}{4}aa - 2mm - bb} - mm, \text{ \&}$$

$$xx + \frac{1}{2}ax + x\sqrt{\frac{1}{4}aa - 2mm - bb} - mm.$$

Id unusquisque, multiplicando duo illa trinomia in se invicem, & duo hæc posteriora in se invicem, poterit experiri. In his trinomiis, si pro x ponas $y - n$, sitque n valor ille, quo usi sumus in transitu a formula $y^4 + bbyy + c^3y + d^4$ ad formulam $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$, orientur factores, per quos divisibilis erat primus ille denominator. Tandem si loco y ponas z auctam quanto, cuius ope terminus secundus ablatuſ fuit a denominatore habente fluentem z , emergent factores duarum dimensionum, per quos dividitur primus ille denominator fractionis, quæ Num. XXVII. fuerat proposita.

XXXV. Ex ipsa factorum, per quæ dividitur formula $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$, inspectione statim in conspectum venit conditio, quam postulant ipsi factores, ut sint reales; oportet enim, ut quantum $2mm + \frac{1}{4}aa$ minus non sit, quam bb . Quod nisi accidat, non poterit formula dividi in trinomia realia, quæ sint eius formæ, quam habent assumpti factores $xx + gx + mm$, & $xx + fx + mm$. Hoc itaque casu pro negotio integrationis frustra divisus est denominator in duos factores, quando illi non sunt reales; quid enim ad integrandam fractionem conferunt denominatoris divisores, quando hi reales non sunt?

XXXVI. Verum, quod formula non sit divisibilis per duo trinomia ad typum eorum, quæ assumpsimus, conficta, non ex eo consequitur formulam non posse dividi per alia alius formæ trinomia realia, ex quorum multiplicatione ipsa confurgat.

XXXVII. Separantur enim valores literæ x in duabus æquationibus quadraticis

$$xx + \frac{1}{2}ax - x\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} + mm = 0, \text{ \&}$$

$$xx + \frac{1}{2}ax + x\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} + mm = 0,$$

quarum priorem voco P, alteram Q.

Habebimus ex æquatione P.

$$x = -\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} + \sqrt{\frac{2}{16}aa - \frac{1}{2}mm - \frac{1}{4}bb - \frac{1}{4}a\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb}} \quad \text{A}$$

$$x = -\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} - \sqrt{\frac{2}{16}aa - \frac{1}{2}mm - \frac{1}{4}bb - \frac{1}{4}a\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb}} \quad \text{B}$$

ex

Ex æquatione vero Q

$$x = -\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} + \sqrt{\frac{2}{16}aa - \frac{1}{2}mm - \frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}a\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb}} \quad C$$

$$x = -\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} - \sqrt{\frac{2}{16}aa - \frac{1}{2}mm - \frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}a\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb}} \quad D$$

hos valores eodem ordine, quo scripti sunt, voco A, B, C, D.

XXXVIII. Iam ubi quantum $2mm + \frac{1}{4}aa - bb$ positivum sit, trinomium ex ductu $x - A$ in $x - B$ reale erit; restituet enim trinomium P; eademque ratione $x - C$ ductum in $x - D$ dabit trinomium Q, quæ ambo eo casu sunt realia. Reliquum est, ut rationem ostendamus, dividendæ propositæ formulæ in trinomia realia, quando bb non est minus, quam $2mm + \frac{1}{4}aa$, sive quando bb maius est, quam $2mm + \frac{1}{4}aa$. In hac igitur hypothesi

XXXIX. Vocetur quantum $\frac{2}{16}aa - \frac{1}{2}mm - \frac{1}{4}bb = p$. Erit

itaque p quantum reale; non interest an positivum, vel negativum. Et pp erit quantum positivum, & reale, quippe omne quadratum quanti realis, vel positivi, vel negativi positivum est, & reale. Vocetur etiam $\sqrt{bb - 2mm - \frac{1}{4}aa} = q$, erit itaque q quantum reale, quippe radix quadrata quanti positivi $bb - 2mm - \frac{1}{4}aa$; & qq erit quantum & reale, & positivum. Fiant subrogationes quantum p , & q in quatuor valoribus A, B, C, D. Valores illi vertentur in hos

$$x = -\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}q\sqrt{-1} + \sqrt{p - \frac{1}{4}aq\sqrt{-1}} \quad A$$

$$x = -\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}q\sqrt{-1} - \sqrt{p - \frac{1}{4}aq\sqrt{-1}} \quad B$$

$$x = -\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}q\sqrt{-1} + \sqrt{p + \frac{1}{4}aq\sqrt{-1}} \quad C$$

$$x = -\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}q\sqrt{-1} - \sqrt{p + \frac{1}{4}aq\sqrt{-1}} \quad D$$

XL. Radix quadrata binomii imaginarii $p + \frac{1}{4}aq\sqrt{-1}$

$$\text{est } \sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} + \sqrt{\frac{p - \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}}$$

& apo.

& apotomæ $p - \frac{1}{4}aq\sqrt{-1}$ est

$$\sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} - \sqrt{\frac{p - \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}}$$

has ergo radices pono loco radicum binomii, & apotomæ in valoribus A, B, C, D mox descriptis, & prodeunt quatuor valores x

$$x = -\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}q\sqrt{-1} + \sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} - \sqrt{\frac{p - \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} \quad \text{A}$$

$$x = -\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}q\sqrt{-1} - \sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} + \sqrt{\frac{p - \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} \quad \text{B}$$

$$x = -\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}q\sqrt{-1} + \sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} + \sqrt{\frac{p - \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} \quad \text{C}$$

$$x = -\frac{1}{4}a - \frac{1}{2}q\sqrt{-1} - \sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} - \sqrt{\frac{p - \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} \quad \text{D}$$

in his valoribus pars $\sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}}$ est quantum

reale, sed $\sqrt{\frac{p - \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}}$ est quantum imaginarium;

est enim pars negata $\sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}$ semper maior parte affirmata p propter quantum positivum $\frac{1}{16}aaqq$ super additum quadrato pp .

XLI. Trinomia realia, in quæ dividi potest forma $x^4 + ax^3 + bxx + ammx + m^4$, erunt, quæ confurgunt ex ductu $x - A$ in $x - C$, & $x - B$ in $x - D$. suntque $xx - Ax - Cx + AC$, & $xx - Bx - Dx + BD$.

Quod illa sint realia, quando realia non sunt trinomia P, & Q, inde patet, quod coefficientia terminorum intermedio.

diorum $-A - C$, & $-B - D$, eorumque contraria $A + C$, & $B + D$ sunt quanta realia, & realia etiam sunt utraque producta AC , & BD . Trinomia igitur ipsa realia esse manifestum est; de summis $A + C$, & $B + D$ quod sint reales, non est ambigendum, nam $A + C$ est $-\frac{1}{2}a +$

$$2 \sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}}$$
 quantum reale, & $B + D$ est $-\frac{1}{2}a$

$$- 2 \sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}},$$
 quantum & ipsum reale, de-

struunt quippe in his summis se invicem quanta imaginaria, quæ in valoribus A , & C , ut & in valoribus B , & D enunciantur. Quo vero ad producta AC , & BD , sunt illa,

AC quidem =

$$\frac{1}{16}aa + \frac{1}{4}qq + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq} - \frac{1}{2}a \sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} - q \sqrt{\frac{-p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}}$$

BD vero =

$$\frac{1}{16}aa + \frac{1}{4}qq + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq} + \frac{1}{2}a \sqrt{\frac{p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}} + q \sqrt{\frac{-p + \sqrt{pp + \frac{1}{16}aaqq}}{2}}$$

quorum utrumque reale est, quandoquidem singula quanta, quibus producta hæc componuntur, sunt realia.

XLII. Omnis itaque fractio differentialis unius tantum fluentis, quam dicemus z , in cuius denominatore ipsa fluens quartam attingit dimensionem, integrabitur per conicarum sectionum quadraturas; quem in finem hac ratione tractanda est. Primum eliminandus est a denominatore fractionis terminus secundus, si adsit. Expulso hoc termino, denominator induet formam hanc $y^4 + bbyy + c^3y + d^4$. Sumatur n una radicum realium æquationis

$$n^3 + \frac{2d^4}{c^3}nn - \frac{1}{2}bbn - \frac{1}{8}c^3 = 0$$

$$- \frac{1}{2}b^4$$

$$c^3$$

ponaturque in formula denominatoris $x + n$ loco y . Per hanc

hanc substitutionem denominator novæ fractionis conformatus erit ad hoc exemplar $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$, nempe coefficientis secundi termini ductum in radicem quadratam ultimi termini adæquabit coefficientis termini penultimi. Advertendum bb non significare hoc loco quantum, quod eodem caractere expressum erat in præcedenti formula denominatoris $y^4 + bbyy + c^3y + d^4$, sed positam esse hanc speciem bb ad indicandum coefficientis termini medii novæ formæ $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$, quod in ipsa substitutione emerget. Postquam denominator integrandæ fractionis ad hunc typum est conformatus, si quidem quantum $\frac{1}{4}aa + 2mm - bb$ positivum sit, dividetur denominator ipse in duo trinomia realia

$$xx + \frac{1}{2}ax - x\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} + mm, \&$$

$$xx + \frac{1}{2}ax + x\sqrt{2mm + \frac{1}{4}aa - bb} + mm,$$

quæ vocamus iam P, & Q. At ubi sit $2mm + \frac{1}{4}aa - bb$ quantum negativum, denominator $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$, dividetur in duo trinomia realia, quorum unius coefficientis termini intermedii erit

$$\frac{1}{2}a - 2 \sqrt{\frac{\frac{1}{16}aa - \frac{1}{2}mm - \frac{1}{4}bb + \sqrt{\frac{1}{4}m^4 + \frac{1}{16}b^4 - \frac{1}{4}aamm + \frac{1}{4}bbmm}}{2}}$$

& ultimus terminus erit

$$\frac{1}{4}bb - \frac{1}{2}mm + \sqrt{\frac{1}{4}m^4 + \frac{1}{16}b^4 - \frac{1}{4}aamm + \frac{1}{4}bbmm} - \frac{1}{2}a \sqrt{\frac{\frac{1}{16}aa - \frac{1}{2}mm - \frac{1}{4}bb + \sqrt{\frac{1}{4}m^4 + \frac{1}{16}b^4 - \frac{1}{4}aamm - \frac{1}{4}bbmm}}{2}}$$

$$\sqrt{bb - 2mm - \frac{1}{4}aa} \sqrt{\frac{-\frac{1}{16}aa + \frac{1}{2}mm + \frac{1}{4}bb + \sqrt{\frac{1}{4}m^4 + \frac{1}{16}b^4 - \frac{1}{4}aamm + \frac{1}{4}bbmm}}{2}}$$

alterius autem trinomiali coefficientis termini intermedii erit

$$\frac{1}{2}a + 2 \sqrt{\frac{\frac{1}{16}aa - \frac{1}{2}mm - \frac{1}{4}bb + \sqrt{\frac{1}{4}m^4 + \frac{1}{16}b^4 - \frac{1}{4}aamm + \frac{1}{4}bbmm}}{2}}$$

& ul.

& ultimus terminus erit

$$\frac{1}{4}bb - \frac{1}{2}mm + \sqrt{\frac{1}{4}m^4 + \frac{1}{16}b^4 - \frac{1}{4}aamm + \frac{1}{4}bbmm} +$$

$$\frac{1}{2}a \sqrt{\frac{\frac{2}{16}aa - \frac{1}{2}mm - \frac{1}{4}bb + \sqrt{\frac{1}{4}m^4 + \frac{1}{16}b^4 - \frac{1}{4}aamm + \frac{1}{4}bbmm}}{2}}$$

$$+ \sqrt{bb - 2mm - \frac{1}{4}aa} \sqrt{\frac{-\frac{2}{16}aa + \frac{1}{2}mm + \frac{1}{4}bb + \sqrt{\frac{1}{4}m^4 + \frac{1}{16}b^4 - \frac{1}{4}aamm + \frac{1}{4}bbmm}}{2}};$$

ex horum trinomiorum ductu componitur denominator $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$, & hæc realia erunt, si imaginaria sint trinomia P, & Q. Hæc autem trinomia vocabimus R, & S.

XLIII. His peractis fractionem integrandam distribuamus in duas fractiones, quarum unius denominator sit P, alterius Q, siquidem P, & Q sint trinomia realia; secus fractionum denominatores sunt trinomia R, & S, in quem finem theorematibus utemur numero XXI. traditis. Harum fractionum unamquamvis nullo deinde negotio integrabimus per congruentem circuli, aut hyperbolæ, quadraturam, aut per utramque.

XLIV. Ubi omnes quatuor valores x , qui ex æquatione $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4 = 0$ eliciuntur, quosque vocavimus A, B, C, D, sint reales, reales erunt etiam omnes singulorum binorum summæ, & realia singulorum binorum producta. Realia igitur erunt omnia sex binomia $xx - Ax - Bx + AB$, $xx - Cx - Dx + CD$, $xx - Ax - Cx + AC$, $xx - Bx - Dx + BD$, $xx - Ax - Dx + AD$, $xx - Bx - Cx + BC$. At vero si horum valorum A, B, C, D duo sint reales, & duo reliqui imaginarii, sint A, & B duo reales, erit itaque reale trinomium $xx - Ax - Bx + AB$. Eo ipso reale etiam esse oportet trinomium $xx - Cx - Dx + CD$; qui enim potest non esse reale trinomium $xx - Cx - Dx + CD$, quod ductum in trinomium reale $xx - Ax - Bx + AB$ facit productum reale $x^4 + ax^3 + bbxx + ammx + m^4$? reliqua quatuor trinomia $xx - Ax - Cx + AC$, $xx - Bx - Dx + BD$, $xx - Ax - Dx + AD$, $xx - Bx - Cx + BC$ erunt imaginaria, quandoquidem ter.

T. II. P. III. Zzz mi.

minorum intermediorum coefficientia summæ sunt quanti realis A, vel B, cum imaginario C, vel D. Et ultimi termini AC, vel AD, vel BD, vel BC, sunt ductus realis A, vel B in imaginarium C, vel D. Tandem ubi omnes quatuor valores A, B, C, D sunt imaginarii, erunt, vel trinomialium par $xx - Ax - Bx + AB$, & $xx - Cx - Dx + CD$, vel alterum par $xx - Ax - Cx + AC$, & $xx - Bx - Dx + BD$ realia.

XLV. Exempli loco unum addimus specimen progressus, quo fractio $\frac{a^4 dz}{z^4 + 4az^3 + 7aaz^2 + 15a^4}$ ad integratio-

$$\frac{a^4 dz}{z^4 + 4az^3 + 7aaz^2 + 15a^4}$$

nem paranda est. Ut secundum terminum a denominatore auferamus, assumimus $z = y - a$. Fractio itaque transit in aliam $\frac{a^4 dy}{y^4 + aayy - 6a^3y + 31a^4}$. Hæc forma denominatoris

$$\frac{a^4 dy}{y^4 + aayy - 6a^3y + 31a^4}$$

in aliam vertenda est, in qua coefficientis termini secundi ductum in radicem quadratam ultimi termini æquale sit coefficienti penultimi termini. Comparando igitur denominatorem $y^4 + aayy - 6a^3y + 31a^4$ cum canone denominatoris

secundo termino deficientis, quem dedimus numero XXIX, inueniemus, quæ ibi est bb hic esse aa , quæ ibi c^3 hic esse $-6a^3$, & quæ ibi d^4 , hic esse $31a^4$, adeoque æquationem,

pro invenienda litera n , esse $n^3 - \frac{5}{2}ann - \frac{5}{2}aan + \frac{3}{4}a^3 = 0$,

in qua n tres habet valores reales $n = \frac{5}{2}a$, $n = a + \sqrt{\frac{5}{2}aa}$, & $n = a - \sqrt{\frac{5}{2}aa}$; quocumque ex his valoribus utaris, po-

nasque $y = x + \frac{5}{2}a$, vel $y = x + a + \sqrt{\frac{5}{2}aa}$, & $y = x + a - \sqrt{\frac{5}{2}aa}$, rem conficies, nempe formam denominatoris in aliam convertes, in qua coefficientis secundi termini ductum in radicem quadratam ultimi termini erit æquale coefficienti termini penultimi.

XLVI. Assumamus primum $n = \frac{5}{2}a$, ponamusque $y = x +$

$x + \frac{1}{2}a$. Subrogemus hunc valorem in locum y in fractione $\frac{a^4 dy}{y^4 + a^2 y^2 - 6a^3 y + \frac{31}{4}a^4}$, fractio evadet

$$\frac{a^4 dx}{x^4 + 2ax^3 + \frac{5}{2}a^2 x^2 - \frac{9}{2}a^3 x + \frac{81}{16}a^4}.$$

In huius fractionis

denominatore coefficiens penultimi termini, quod est $-\frac{9}{2}a^3$

æquale est coefficienti $2a$ secundi termini, suppletis in hoc dimensionibus per $\frac{9}{4}aa$, radicem quadratam ultimi termini,

sed signa sunt diversa; denominator itaque dividetur in duos factores $xx + ax + x\sqrt{-6aa} - \frac{9}{4}aa$, & $xx + ax -$

$x\sqrt{-6aa} - \frac{9}{4}aa$, per regulas numero XXXIII. traditas; suntque hi imaginarii.

XLVII. Separemus igitur ex duobus trinomiis

$$xx + ax + x\sqrt{-6aa} - \frac{9}{4}aa, \text{ \&}$$

$$xx + ax - x\sqrt{-6aa} - \frac{9}{4}aa \text{ valores } x, \text{ qui erunt,}$$

ex priore quidem trinomio

$$A. \ x = \frac{-a - \sqrt{-6aa} + \sqrt{4aa + 2a\sqrt{-6aa}}}{2}, \text{ \&}$$

$$B. \ x = \frac{-a - \sqrt{-6aa} - \sqrt{4aa + 2a\sqrt{-6aa}}}{2};$$

ex posteriore autem

$$C. \ x = \frac{-a + \sqrt{-6aa} + \sqrt{4aa - 2a\sqrt{-6aa}}}{2}, \text{ \&}$$

$$D. \ x = \frac{-a + \sqrt{-6aa} - \sqrt{4aa - 2a\sqrt{-6aa}}}{2}, \text{ quos eodem}$$

ordine retento vocabimus A, B, C, D. Radices binomii $4aa + 2a\sqrt{-6aa}$, & apotomæ $4aa - 2a\sqrt{-6aa}$ sunt, binomii quidem $\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} + \sqrt{2aa - a\sqrt{10aa}}$, apotomæ autem $\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} - \sqrt{2aa - a\sqrt{10aa}}$; quas radices pono in valoribus A, B, C, D, & fiunt novi valores.

$$x = -\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}\sqrt{-6aa} + \frac{1}{2}\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} + \frac{1}{2}\sqrt{2aa - a\sqrt{10aa}}. \quad A$$

$$x = -\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}\sqrt{-6aa} - \frac{1}{2}\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} - \frac{1}{2}\sqrt{2aa - a\sqrt{10aa}}. \quad B$$

$$x = -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}\sqrt{-6aa} + \frac{1}{2}\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} - \frac{1}{2}\sqrt{2aa - a\sqrt{10aa}}. \quad C$$

$$x = -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}\sqrt{-6aa} - \frac{1}{2}\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} + \frac{1}{2}\sqrt{2aa - a\sqrt{10aa}}. \quad D$$

XLVIII. Si x mulctetur valore, quem vocamus A, & altero, quem vocamus C, & duo residua in se ducantur, prodibit trinomium

$$xx + ax - x - \frac{1}{2}a \sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} + \frac{7}{4}aa + \frac{5}{2}a\sqrt{10aa} - \frac{1}{2}\sqrt{6a^3\sqrt{10aa} - 12a^4},$$

& si x mulctetur valore B, & deinde valore D, & residua in se invicem multiplicentur, emergit aliud trinomium

$$xx + ax + x + \frac{1}{2}a \sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} + \frac{7}{4}aa + \frac{5}{2}a\sqrt{10aa} + \frac{1}{2}\sqrt{6a^3\sqrt{10aa} - 12a^4},$$

quæ sunt realia, & ex eorum ductu conflatur denominator

$$x^4 + 2ax^3 + \frac{5}{2}aaxx - \frac{9}{2}a^3x + \frac{81}{16}a^4.$$

XLIX. Non puto oportere, ut analytam moneamus in multiplicandis inter se formulis $x - A$, & $x - C$, ut etiam $x - B$ in $x - D$, quoties occurrunt in se ducenda duo quanta imaginaria (siquidem illa non sint unum idemque quantum, sed duo inter se se diversa) oportere producti signum invertere. Quippe $+\sqrt{-m}$ ductum in $+\sqrt{-n}$ facit $-\sqrt{mn}$, & $-\sqrt{-m}$ in $+\sqrt{-n}$ facit $+\sqrt{mn}$. Est enim $+\sqrt{-m} = +\sqrt{m}\sqrt{-1}$, & $+\sqrt{-n}$ est $+\sqrt{n}\sqrt{-1}$, quare productum erit $+\sqrt{mn}$ ductum in -1 , sive $-\sqrt{mn}$. Huius anomalix nisi ratio habeatur, quoties ducendum est $\sqrt{-6aa}$ in

in $\sqrt{2aa - a\sqrt{10aa}}$ (quæ sunt quanta imaginaria inter se diversa) producta, quæ oriuntur duo quidem trinomia erunt realia, sed non ea, ex quorum ductu in se invicem confurgat expositus denominator

$$x^4 + 2ax^3 + \frac{5}{2} aaxx - \frac{9}{2} a^3 x + \frac{81}{16} a^4.$$

L. Sumpsimus, num. XLVI., $y = x + \frac{1}{2}a$. Si itaque in mox repertis trinomiis realibus, per quæ dividitur denominator datæ fractionis, pro x restituamus $y - \frac{1}{2}a$, fient trinomia realia duo, ex quorum ductu efficitur denominator $y^4 + aayy - 6a^3 y + \frac{31}{4} a^4$ fractionis, in qua fluens erat y .

Sunt autem trinomia illa

$$yy - y\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} + \frac{1}{2}a\sqrt{10aa} + \frac{3}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{6a\sqrt{10aa} - 12a^2}$$

$$yy - y\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} + \frac{1}{2}a\sqrt{10aa} + \frac{3}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{6a\sqrt{10aa} - 12a^2}$$

Et quoniam in transitu a fractione, cuius fluens erat z , ad fractionem, cuius fluens est y , assumpsimus, num. XLV, $z = y - a$, hinc si in his trinomiis pro y scribas $z + a$, habebis duo trinomia realia, quæ in se ducta referent denominatorem fractionis, quæ nobis integranda primum oblata fuit, qui erat $z^4 + 4az^3 + 7aaz^2 + \frac{15}{4} a^4$, suntque hæc trinomia

$$zz + 2az - z - a\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} + \frac{1}{2}a\sqrt{10aa} + \frac{5}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{6a\sqrt{10aa} - 12aa}$$

$$zz + 2az + z + a\sqrt{2aa + a\sqrt{10aa}} + \frac{1}{2}a\sqrt{10aa} + \frac{5}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{6a\sqrt{10aa} - 12aa}$$

LI. In æquatione $n^3 - \frac{5}{2}ann - \frac{1}{2}aan + \frac{3}{4}a^3$, quam num. XLV. tractavimus, præter valorem $n = \frac{1}{2}a$ duo alii valores reperti sunt $n = a + \sqrt{\frac{5}{2}aa}$, & $n = a - \sqrt{\frac{5}{2}aa}$. Si priore utamur ad immutandum denominatorem $y^4 + aayy - 6a^3 y + \frac{31}{4} a^4$, subrogando $x + a + \sqrt{\frac{5}{2}aa}$ in locum y ,

fractio $\frac{a^4 dy}{y^4 + aayy - 6a^3 y + \frac{31}{4} a^4}$

eva-

evadet

 $a^4 dx$

$$x^4 + 4ax^3 + 2x^3 \sqrt{10aa} + 22aaxx + 6axx \sqrt{10aa} + 30a^3 x + 12aax \sqrt{10aa} + \frac{55}{2} a^4 + 5a^3 \sqrt{10aa}$$

cuius denominator est formula, in qua $4a + 2\sqrt{10aa}$ coef-
ficiens secundi termini ductum in $5aa + \frac{1}{2}a\sqrt{10aa}$ radicem
quadratam ultimi termini $\frac{55}{2} a^4 + 5a^3 \sqrt{10aa}$ æquale est co-

efficienti penultimi termini, quod est $30a^3 + 12aa\sqrt{10aa}$.
Verfabimus itaque denominatorem hunc ea ratione, qua
in denominatore $x^4 + 2ax^3 + \frac{5}{2} aaxx - \frac{9}{2} a^3 x + \frac{81}{16} a^4$ re-

solvendo usi sumus, & duo trinomia realia eruemus, per
quæ denominator hic est divisibilis, in quibus deinde, si
pro x scribamus $y - a - \sqrt{\frac{5}{2}aa}$, eadem trinomia emergent,
per quæ divisibilem esse formulam $y^4 + aayy - 6a^3 y + \frac{31}{4} a^4$

observavimus numero præcedenti. Si autem in fractione

$$\frac{a^4 dy}{y^4 + aayy - 6a^3 y + \frac{31}{4} a^4}$$

in locum y ponas $x + a - \sqrt{\frac{5}{2}aa}$,

utendo tertio valore literæ n , quem numero XLV. eruimus,
fractio evadet

 $a^4 dx$

$$x^4 + 4ax^3 - 2x^3 \sqrt{10aa} + 22aaxx - 6axx \sqrt{10aa} + 30a^3 x - 12aax \sqrt{10aa} + \frac{55}{2} a^4 - 5a^3 \sqrt{10aa}$$

in qua, non secus ac in præmissis fractionibus, quarum fluens
est x , quantum $4a - 2\sqrt{10aa}$, quod afficit terminum se-
cundum, ductum in $5aa - \frac{1}{2}a\sqrt{10aa}$ radicem quadratam
ultimi termini, constituit $30a^3 - 12aa\sqrt{10aa}$ coefficiens ter-
mini penultimi. Hunc denominatorem possumus itaque ad
instar eorum, quos modo resolvimus, dividere in trinomia
realia, in quibus, si deinde loco x scribatur $y - a + \sqrt{\frac{5}{2}aa}$,
emergent denuo illa eadem trinomia num. XLIX. memo-
rata, per quæ dividitur denominator $y^4 + aayy - 6a^3 y + \frac{31}{4} a^4$. Hucusque egimus de denominatoribus fractionum
diffe.

4

differentialium, quartam dimensionem non excedentibus; quos ostendimus nunquam non esse divisibiles in duos factores reales duarum dimensionum. Deinceps agemus de iis denominatoribus, in quibus fluens ad maiores dignitates evecta est, & quando iam in actis huius academix vol. primo res tota confecta est in formulis, quarum omnes termini intermedii deficiunt, vel solus adest terminus medius, reliquum est, ut de iis agamus, in quibus nullius termini sedes vacua est. Quod sequentibus dissertatiunculis præstabitur.

I N D E X

OPUSCULORUM.

- B**eccarii Iacobi Bartholomæi. *De quamplurimis phosphoris nunc primum detectis. Commentarius alter.* 498.
- Boscovich Rogerii Iosephi. *De motu corporis attracti in centrum immobile viribus decrescentibus in ratione distantiarum reciproca duplicata in spatiis non resistentibus.* 262.
- De viribus vivis.* 289.
- Collinæ Abundii. *De acus nauticæ inventore.* 372.
- Galli Io. Antonii. *De nonimestri fœtu extra uterum aucto, & mortuo per abdomen vivæ matris extracto.* 251.
- Laghii Thomæ. *De rubentibus lignorum cineribus.* 397.
- Manfredii Eustachii. *De mercurii ac solis congressu observato die ix. nov. MDCCXXIII. I.*
- De iovis ac martis coniunctione heliocentrica.* 39.
- De congressu mercurii cum sole observato die xi. novemb. MDCCXXXVI.* 57.
- De cometa anni MDCCXXXVII.* 62.
- Manfredii Gabrielis. *De eliminandis ab æquatione arcibus circularibus; & alia.* 520.
- Manfredii Heracliti. *De viribus ex elastrorum pulsu ortis.* 383.
- Matteucci Petronii. *De aurora boreali anni MDCCXXXVIII.* 496.
- Menghini Vincentii. *De ferrearum particularum progressu in sanguinem.* 475.
- Montii Caietani. *De aldrovandia, novo herba palustris genere.* 404.
- Riccati Iacobi. *De motuum communicationibus ex attractione.* 143.
- Problema: dato quacumque ratione radio osculi per curvam describendam curvam describere.* 159.
- Riccati Vincentii. *Animadversiones in fractionem, cuius numerator & denominator per certam determinationem nihilo aequales fiunt.* 173.
- T. II. P. III. Aaaa Ani-

Animadversiones in formulam differentialem, in qua indeterminata ad unicam tantum dimensionem adscendunt.

194.

De centro aequilibræ. 215.

Tabarrani Petri. *De thermometrorum peculiari correctione nunc primum excogitata. Accedit epistola de fonticulo quodam. 233.*

Trombelli Io: Chrysofomi. *De acus nauticæ inventore. 333.*

Veratti Iosephi. *De aurora boreali anni MDCCXXXII. 493.*

Zanotti Eustachii. *De cometa anni MDCCXXXIX. 73.*

De quibusdam luminibus septentrionalibus anno MDCCXXX, observatis. 489.

Zanotti Francisci Mariæ. *De elastris. Sermo primus. 413.*

De elastris. Sermo alter. 435.

De elastris. Sermo tertius. 463.

His accedunt

Eclipses variæ observatæ ab Eustachio Manfredio. 91.

Io: Baptista Banderio.

Dominico Veber.

Iacobo Parma.

Iosepho Bolsio Marchesio.

Francisco Vandello.

Francisco Algarotto.

Eustachio Zanotto.

Francisco Maria Zanotto.

Io: Iacobo Marinonio.

Iosepho Roverfio.

Didaco Revillas.

Io: Bottario.

Petro Martino.

Thoma Perello.

Iosepho Garatono.

Petronio Maiteuccio.

INDEX

Eorum, quorum fit mentio
in opusculis.

- A**
 Adfigerius Petrus. 365.
 Aldrovandus Ulysses. 405. 410. 411.
 Albertus Leander. 367.
 Albertus Magnus. 336. 351. & seq. 376.
 Algarottus Franciscus. 58. 97. 101.
 Amadesius Lælius. 458. 459. 461.
 Amadeus Ioannes Carolus. 405. & seq. 409. 410.
 Amontonius. 239. 241. 243.
 Aratus. 345.
 Archimedes. 310.
 Aristoteles. 334. & seq. 351. & seq. 357. 376. 433. 473.
 Arrianus. 345.
- Baconius Rugerius. 339.
 Baierus. 64. & seq.
 Banderius Ioannes Baptista. 2. 91.
 Barabinus. 37.
 Barthema Ludovicus. 382.
 Bassia Laura. 398. 402.
 Baudrand. 367.
 Bauhinus. 411.
 Becanus Goropius. 335.
 Beccarius Iacobus Bartholomæus. 249. 364. 498.
 Bellovacensis. 376. 377.
 Bergeronius. 381.
 Bernullius Iacobus. 173. 178. & seq.
 Bernullius Ioannes. 174. 176. & seq. 185. 187. 194. 291.
 313. 383. 384. 387. 395. 413. 414. 424. 449. & seq. 456.
 Bertius Hugo. 358. 378.
 Blanchinus Franciscus. 36. 65.

- Blondus . 367.
 Bochartus Samuel . 341. 373.
 Boerhaavius . 233. 236. 240.
 Boldrinus . 62.
 Bonamicus Castrucci . 452. 458.
 Bonzius Gotardus . 454. 455.
 Borbonius Carolus utriusque Siciliae Rex . 458.
 Boschovichus Rogerius Iosephus . 262. 289.
 Bottarius Ioannes . 109.
 Bozius Thomas . 367.
 Brietius . 367. 368.
 Brunerus . 485.
 Bulffingerus . 234. & seq. 241. 243.
 Bullialdus . 28.
 Burchius . 370.

 Cabeus . 337. 352. 353. 356. 359. 365. 368.
 Calmet . 342.
 Calogerà Angelus . 379.
 Cambdenus . 373.
 Camufius . 413. 414. 424. 440. 463. & seq.
 Cartesius . 143. 173. 290.
 Casatus Petrus . 235.
 Cassinus Dominicus . 3. 19. 24. 25. & seq. 28. & seq. 33.
 42. 44. 49. 66.
 Cassinus Iacobus . 24.
 Cellarius . 373.
 du Chatellet . 291.
 Chefeldenus . 256.
 Ciaconius . 377.
 Cicero . 345.
 Clairaus . 220. & seq. 229. 326.
 Claudianus . 347.
 Clavius . 294.
 Clusius . 411.
 Cole Guilielmus . 488.
 Collina Abundius . 372.
 de Comitibus Nicolaus . 381.
 Conti Iacobus . 476.
 Covaruvias . 361.

Cribellius. 293.
Cyprianus Abrahamus. 258. & seq.

Derhamus. 339.
Dillenius Ioannes Iacobus. 410.
Diodorus. 375.
Diogenes Laertius. 352.
Ditmarus. 336. 356. 377.
Drebellius. 236.
Ducangius. 356.
Duhamelius. 23. & seq. 33.

Eimmartus. 23.
Epicurus. 347.
Eratosthenes. 373.
Eulerus. 263. 284.

Fabricius Ioannes Albertus. 334. 339. 341. 343. 359.
Farheneitius. 235. & seq. 240. 244. 247.
Fayus. 501. 509. 510.
Ferrarius. 360. 362. 367.
Flamstedius. 64. 67. 77.
Fontæneus. 23.
Fontenellus. 293. 294.
Fortunius. 378.
Frellonius Ioannes. 352.
Fullerus. 334.
Furnerius. 337. 343. 344. 356. 374. 377.

Galeatius Gusmanus. 238. 398.
Galileus. 290. 292. 392.
Galletus. 22. & seq. 31. & seq.
Gallus Ioannes Antonius. 251.
Gama Vascus. 379. 381.
Garatonus Iosephus. 77. 125. 135.
Garzonius. 359.
Gassendus. 3. 22. 26. 28. 30. & seq. 35. 347.
le Gendre. 342. 343. 352. 358.
Gesnerus. 411.
Ghedinus Fernandus Antonius. 452. 453. 458.

Ghi-

Ghislerius Antonius. 66.
 Giannetafius Parthenius. 367.
 Gilbertus. 336. 339. 356. 357.
 Gimma Hiacynthus. 367.
 Gioia. *V.* Gira.
 Gira, feu Gioia. 338. 359. 360. 367. 368. 369. 377.
 Goropius. 355.
 Grammaticus Nicasius. 38.
 Grassius Carolus. 435. 449. 451. 452. 455. 457. 461. 462.
 Gravesandus. 53. 291.
 Grimaldus. 318.
 Grimaldus Gregorius. 333. 367.
 Gronovius. 410.
 Guiotus Provineus. 336. 337. 358. 377.
 Gyraldus. 367.

Halleius. 22. & seq. 25. & seq. 30. & seq. 71. 233.
 Hanno Carthaginiensis. 374.
 Hermannus. 220. 291. 311.
 Herodotus. 373.
 Hervartus Io: Federicus. 334.
 Hevelius. 3. 22. 30.
 Hippalus. 345.
 Hiramus. 334. 348. & seq.
 Hireus. 24. 42. 44. 49.
 Hombergus. 243.
 Hortellius. 367.
 Hospitalius. 271.
 Houstonus. 410.
 Huddenus Ioannes. 173.
 Huetius. 340. & seq. 348. 349.
 Hugenius. 22. 262. 304. 313.
 Iambullarius Petrus Franciscus. 360. 361.
 Iosaphatus. 351.
 Iovat. 342.
 Isleus. 233. 237. & seq. 241. 244.
 Keplerus. 22. 296.
 Kircherus. 249. 341. 343. 344. 377. 380.
 Kirckius. 23.

Laghius

- Laghius Thomas . 397. 449. 451. 452. 456. & seq. 460.
 Lancifius . 249.
 Lafor Alphonfus . 367.
 Laurus Guillelmus . 367.
 Lecontius . 23.
 Leibnitius . 143. 156. 290. 291. 297. 313. 315. 391.
 Lellius Hercules . 476. 482. 485.
 Lemnius Levinus . 345.
 Leprottus Antonius . 235. 240. 243. 247.
 Linnæus Carolus . 410. 411.
 Lipenius Martinus . 374.
 Lobelius . 411.
 Lucretius . 347.

 Maclaurinus . 291.
 Maffeiſus Ioannes Petrus . 363.
 Mairanius . 291. & seq. 315.
 Manfredius Eutachius . 1. 39. 57. 62. 91. 95. 97. 99. 107.
 109. 115. 117. 119. 120. 127. 131.
 Manfredius Gabriel . 2. 36. 203. 520.
 Manfredius Heraclitus . 383.
 Maraldus Iacobus Philippus . 19. 24. 37. 42. 55. 65.
 Marantha . 411.
 Marchefius Bolſius Ioseph . 2. 42. 71. 93. 101. 103. 119.
 Marimonius Ioannes Iacobus . 58. 103.
 Marinus Marcus . 361.
 Marſilius Alexander . 4.
 Marſilius Aloyſius Ferdinandus . 4. 24. 39.
 Martianus Capella . 346.
 Martinius . 379.
 Martinus Petrus . 113. 291. & seq.
 Matteuccius Petronius . 62. 77. 84. 130. 135. 137. 139. 496.
 Matthiolus . 411.
 Maurus Camalduleniſis . 379.
 Menagius . 337. 343. 344. 358. 360. & seq. 365. 368.
 Menghinus Vincentius . 475.
 Mercator . 22. 353.
 Merſennus . 290.
 Micheliſus . 410.
 Molinelliſus Petrus Paullus . 254. 257.

- Montius Caietanus. 404.
 Montius Iosephus. 406. 409.
 Morerius. 360. 367.
 Musschenbroekius Petrus. 233. & seq. 240. & seq. 246. 291.
 293. 294. 335. 365.

 Nevtonus. 39. 70. 83. 84. 143. 262. 296. 304. 313. 318. 321. 324.
 Nicaon ægypti rex. 373.

 Orfuccius Carolus Dominicus. 248.
 Oudinus. 353. 364.
 Ovidius. 345.

 Papias. 356.
 Paracelsus. 258.
 Parma Iacobus. 2. 93. 95. 97. 99.
 Pasquierius Stephanus. 358.
 Peregrinus Petrus. 337. 339. 359. 365. 368.
 Perellus Thomas. 58. 125.
 Petronius Arbiter. 347.
 Peyerus. 485.
 Philander. 367.
 Pineda. 334. 336. 345. 346. 353.
 Plato. 357.
 Plautus. 333. 335. 353. 354.
 Plinius. 248. & seq. 346. 347. 357. 362. 373. 375. 376.
 Plukenetius Leonardus. 404. 406. 409. 410.
 Plumerius. 410.
 Polenus Ioannes. 36. 291. 293. 458.
 Polus Marcus. 338. 366. 367. 379. 380.
 Putius Iosephus. 449. 451. & seq. 455.

 Quintilianus. 369.

 Ramusius. 374. 375. 378. 379. 381. 382.
 Reaumurius. 234. 238. 241. 247. 370.
 Regnaultius. 338. 363.
 Revillas Didacus. 65. 109.
 Rey. 367.
 Riccatus Iacobus. 39. 143. 159. 291.

- Riccatus Vincentius. 173. 194. 215. 291.
 Ricciolius. 290. 336. & seq. 356. 365. 368. 374. 377.
 Rogerius Siciliae Rex. 356. 377.
 Roverfius Iosephus. 57. & seq. 77. 107. 113. 122. 126. 129.
 135. 490.

 Salmasius. 353.
 Salomon. 334. 348. & seq. 374.
 Salvagus Paris. 37.
 Saurinus. 188. & seq. 192.
 Scakerleus. 22.
 Seneca. 66. 248. & seq. 369. 375.
 Sherardus Guilielmus. 410.
 Sidonius. 377.
 Signius Franciscus Maria. 4.
 Societus. 343.
 Solinus. 346. 373.
 Stirlingius. 291.
 Strabo. 340. 342. 345. 373. 375.
 Sydenhamius. 488.

 Tabarranus Petrus. 233. 243. 246.
 Tacitus. 375.
 Tacquetus. 294. 295.
 Taifnerus Ioannes. 359.
 Tavernerius. 341.
 Terrarossa. 378.
 Thales. 357.
 Theophrastus. 248. & seq.
 Thevenottus. 365.
 Tiolius Petrus Antonius. 452. 456. 460.
 Torricellius. 439.
 Torfellinus. 341.
 Triumphettus Laelius. 406. 409.
 Trombellius Ioannes Chrysoftomus. 333. 372. 373.
 Turnebus. 353.
 Turnefortius. 408.
 Tufanus Iacobus. 362.

 Valkisius. 304.
 T. II. P. III.

- Vandellius Franciscus . 59. 69. 77. 97. 99. 105. 113. 122.
 397. 490.
 Varignonius Petrus . 184. 220.
 Veber Dominicus . 2. 91.
 Verattus Iosephus . 493.
 Ughellius . 356.
 Whistonus . 24. 42. 44. 49. 51.
 De Via Ioannes Antonius . 109.
 Vignaferus Fabius . 476.
 Virgilius . 346. 347. 375.
 De Vitriaco Iacobus . 363. 364. 366.
 Vodvardus . 510. 511.
 Volfius . 291.
 Voffius Gerardus . 367.
 Voffius Ioannes . 367.
 Voffius Isaacus . 343. 380.
 Vrennus . 304.
 a Vulpe Lælius . 371.
 a Vulpe Petronius . 371.
 Vurtzelbaus Ioannes Philippus . 23. 24. 38.

 Zanonus Iacobus . 398.
 Zanonus Iacobus antiquior . 405.
 Zanottus Eustachius . 57. & seq. 71. 73. 97. 101. 105. 107.
 113. 121. 123. 126. 133. 135. 137. 139. 489.
 Zanottus Franciscus Maria . 101. 333. 337. 339. 343. 354.
 358. 364. 370. 396. 413. 435. 463.
 Zanottus Ioannes Petrus . 458. 460.

I N D E X

Rerum, de quibus in opusculis
agitur.

Actio quo modo æqualis reactioni. 304. Actio in distans
an esse possit in natura. 317.

Acus nautica, an ægyptiis inventa, an sinensibus, an phœ-
nicibus, aut tyriis. 334. An Aristoteli cognita. 334. 335.
An Latinis. 335. An eam Germani invenerint. 335. 336. An
Galli. 336. 337. An Lusitani. 338. An Itali. 338. An Angli.
339. Non videtur inventa ab ægyptiis. 340. Ne phœ-
niciis quidem veteribus fuisse nota. 344. & seq. Ne
hebræis quidem, neque sidoniis. 351. Aristoteles vim
directricem magnetis non novit. 351. & seq. Ne Ro-
mani quidem veteres. 353. & seq. Germani illam non
invenerunt. 355. Ne Galli quidem. 357. & seq. Ne
nomen quidem e gallica lingua derivandum. 360. &
seq. Ne Lusitani quidem pyxidem nauticam invenisse
dicendi sunt. 363. Acum nauticam primi in europam
invexerunt Itali. 363. & seq. Quæstio de acus nauticæ
inventore iterum proponitur. 372. Acum nauticam an-
tiquissimis in usu fuisse ostenditur. 373. & seq. ævo
certe medio. 377. & seq.

Æquationem differentialem secundi gradus in differentia-
lem primi convertere. 169. & seq. De eliminandis ab
æquatione arcubus circularibus. 520.

Æquilibrii centrum secundum varias hypotheses quæritur.
215. & seq. æquilibrium quid sit, & quo modo fiat,
explicatur. 299. 300.

Aer an gravitate sua hydrargyrum premat in Torricellii
experimento. 438. 439.

Aldrovandia novum herbæ genus. 404. cur aldrovandia
dicta. 405. 410. quando & a quo inventa. 405. 406.
Flores eius comperti. 406. Herba palustris est. 406.

407. describitur. 407. 408. Quo modo propagetur, & adolescat. 408. Chartas, inter quas interponitur, rubore inficit. 408. 409. Eadem est ac lenticula Plukenetii. 409. 410.
- Aqua summe elastica. 323.
- Attractio in centrum immobile quos motus corporibus det. 262. & seq. In iove & marte examinatur. 39. & seq. in planetis quibuslibet. 54.
- Auroræ boreales varix describuntur. 489. & seq.
- Cinis cuiusdam ligni inventus ruber. 397. Genus ligni quæritur. 397. 398. Id ligni quidquid est, chymice dissolvitur. 398. & seq. Caput mortuum coloris rubri sedes. 399. Ipse color ruber ad calcem quamdam ferream referendus. 400. & seq. Ligna omnia ad hunc colorem in cineribus suis expromendum apta. 402.
- Cometa observatus anno MDCCXXXVII. 62. & seq. describitur. 62. procedit iuxta signorum ordinem. 63. motus eius describitur. 63. & seq. eiusdem cometæ reditus. 66. Parallaxis inquiritur. 70. 71. Cometa alius observatus anno MDCCXXXVIII. describitur. 73. Retrogradus est. Motus eius describitur. 74. non videtur moveri in plano circa tellurem. 74. Diarium observationum. 77. & seq. Cometæ theoria exponitur. 81. & seq.
- Coniunctio mercurii cum sole. *Vide* Mercurii. Iovis cum marte. *Vide* Iovis.
- Contactus corporum nullus in natura. 315. 316. Si contactus detur in occurso corporum, natura interdum ager per saltum. 319. 320.
- Corpora resolvuntur in puncta nullam habentia extensionem. 328.
- Differentiales formulæ considerantur, in quibus indeterminatæ ad unicam tantum dimensionem adscendunt. 194. & seq.
- Eclipses varix describuntur. 91. & seq.
- Elastorum series quam velocitatem tribuant corporibus, quæ pellunt. 383. & seq. Argumentum ab his petatum ad metiendam vim vivam proponitur, & expenditur. 385.

385. & seq. An similiter dilatata æqualiter premant?
 387. & seq. An, si premant æqualiter, inæquales velocitates possint gignere. 389. & seq. An eadem elastrorum series corporibus massa diversis velocitates tribuat massis ipsis reciproce proportionales. 394. & seq. Elastrorum natura iterum inquirenda proponitur, & explicatur. 413. & seq. Quam velocitatem habeant series elastrorum vel infixæ, vel liberæ. 417. & seq. Series deferentes quam velocitatem tribuant corpori, quod pellunt. 422. & seq. An series liberæ deferentes pro duabus seriebus infixis habendæ sint. 429. & seq. Quid de vi viva ex elastrorum seriebus constet. 431. & seq. An sit proportionalis seriei elastrorum, si ab elastrorum serie gignatur. 432. 433. Elastrorum relaxatio explicatur. 436. De vi, quam elastrum infixum in utramque partem facit, dum sese explicat. 437. Series infixæ omnes an premant æqualiter, si similiter dilatatae sint, & immotæ detineantur. 438. 439. Qua celeritate profiliat punctum extremum seriei infixæ, si series infixæ relaxetur. 439. & seq. Quæ eius celeritas sit in fine relaxationis. 442. 443. An celeritates in fine relaxationis possint esse inæquales, si æquales sint in initio. 443. & seq. Elastra eodem numero, sed per varios ordines in seriem disposita, considerata proponuntur. 449. Quam velocitatem tribuant corpori, quod pellunt. 450. & seq. Quas pressiones exerceant. 452. 453. Quibus temporibus dilatentur. 453. Camusii theoremata proponitur. 463. Eius constructio & demonstratio. 464. 465. demonstratio examinatur. 466. & seq.

Ferri particulæ utrum in sanguinem viventium animalium invehantur. 475. & seq. Ferri præparaciones varix ad varia animalia alenda. 475. 476. In quibus animalibus experimenta facta sint. 476. Dixta ferrea quid in variis animalibus præstiterit. 476. & seq. E qua præparatione plus ferrearum particularum in sanguinem invehatur. 481. & seq. Ferrearum particularum natura acidorum liquorum miscela manifestatur. 483. 484. Ferrearum particularum transitus per venas meseraicas. 485.

Fœtus

- Fœtus extra uterum nutritus, auctus, mortuus, ac tum de-
 mum per vivæ matris abdomen extractus. 251. & seq.
 Matris mortuæ sectio. 257. Conceptus ex ovo confir-
 matur. 258. & seq. Graviditatis signa; & unde cogno-
 sci possit, fœtum extra uterum versari. 261.
- Fonticulus ab avulso vicino nemore mirum in modum au-
 ctus. 248. & seq.
- Fractiones considerantur, quarum tum numerator tum de-
 nominatur ex determinatione aliqua fit nihil. 173. &
 seq.
- Inaurandorum, depingendorumque antiquo more codicum
 ars instauratur. 371.
- Iovis & martis conjunctio heliocentrica observata ad utrius-
 que planetæ vim attractivam examinandam. 39. & seq.
- Magnetis vires explicantur. 329. 330.
- Martis conjunctio cum iove. 39. & seq.
- Mercurii cum sole congressus. 1. & seq. quo modo obser-
 vatus. 2. 3. phasæ notatæ. 5. & seq. quo modo erro-
 res corrigendi, a refractionibus inter observandum or-
 ti. 8. & seq. Quam viam tenuerit mercurius in sole. 13.
 & seq. Conjunctio mercurii cum sole ex observationi-
 bus determinata. 17. & seq. Determinatur nodus ascen-
 dens orbitæ mercurialis. 20. 21. Determinatur inclina-
 tio orbitæ mercurii ad eclipticam. 21. 22. Observatio-
 nes varix inter se conferuntur ad mercurii motus co-
 gnoscendos. 22. & seq. Nodorum motus perquiritur.
 29. & seq. Meridianorum quorundam differentix ex
 variis observationibus mercurii & solis congregientium
 colliguntur. 36. & seq. Alter mercurii cum sole con-
 gressus. 57. & seq.
- Micrometrum nova ratione adhibitum ad cælestes observa-
 tiones. 75. 76.
- Motus quo modo ex attractione communicetur. 143. & seq.
 motuum compositio & resolutio exponuntur. 300. 301.
- Ophir & tharsis ubi locorum essent. 348. & seq.
- Phosphori quamplurimi inventi. 500. & seq. Quo modo per-

perquirendi. 501. & seq. Phosphororum divisio in fossiles, vegetantes, animales. 506. Fossiles multi, qui haecenus incogniti fuerant, enumerantur. 506. & seq. Vegetantes phosphori recens detecti. 511. & seq. Item animales multi. 514. & seq.

Potentia in agitandis corporibus quid sit, quidve agat. 297. 298. Potentiæ variæ definiuntur & explicantur. 298. 299.

Pressio per tempus continuata in velocitatem abit; & quo modo id fiat. 299. 300. quo modo in tempus ducta proportionalis sit velocitati. 446. 447. non est pressio ducenda in tempus, si motus sit æquabilis. 447.

Radio osculi quomodocumque dato per curvam describendam, curvam ipsam describere. 159. & seq.

Sinenses populi an ab ægyptiis manaverint. 340. & seq.
Solis & mercurii congressio. 1. & seq.

Thermometrorum novissima correctio proponitur. 233. Scutella, qua instrui possint, primum a Bulffingero inventa. 234. 235. Instructa hoc modo perfectiora videntur, & commodiora. 236. & seq. Thermometrorum vitium novissime detectum. 237. & seq. An præstet thermometra habere undique & perfecte occlusa. 238. 239. Frigus, quo primum congelatur aqua, an ubique gentium sit idem. 239. 240. De novissima thermometrorum correctione iudicium a Musschenbroekio quaesitum. 243. & seq. Musschenbroekii iudicium. 246. & seq.

Velocitas quid sit & quotuplex. 296. 297. quo modo a pressione oriatur. 299.

Vis inertiae quid sit. 296. vis attractiva quare in infinitum propagetur. 321.

Vis viva velocitatis quadrato æstimanda est. 154. & seq. Vis dividitur in vivam & mortuam. 289. 290. Quo modo utraque metienda sit. 290. 291. Historia quaestionis de vi viva. 290. 291. Quam proportionem habeant foveæ in molli massa a cadentibus globis excavatæ. 292. 293. Vires vivæ in corporibus nullæ sunt. 295. Quo modo intelligi vis viva possit, ut vel quadrato velocitatis,
vel

vel velocitate ipsa æstimanda sit. 295. Ad motum æquabilem habendum nulla vi viva opus est. 302. ne ad motus quidem illos, qui a gravitate oriuntur. 302. 303. ne ad illos quidem, qui ex collisione oriuntur. 304. & seq. neque ad illos, qui generantur ab elastris. 309. 311. Poleni experimentum explicatur. 310. 311. 312. Cartesianorum sententia propter analogiam & simplicitatem anteponitur sententiæ Leibnitianorum. 312. 313. Eadem virium quantitas melius conservatur, posita Cartesii sententia. 313. 314. Motus liberi hanc virium conservationem non turbant. 314. Pro varia significatione, quam quis tribuit nomini vis vivæ, potest vis viva & velocitatis quadrato, & velocitate ipsa æstimari. 314. 315. Argumentum Bernullii de vi viva expenditur. 385. & seq. Quid de vi viva ex elastrorum seriebus constet. 431. & seq. an sit proportionalis seriei, a qua gignitur. 432. 433. 454. & seq. an temporis ratio in vi viva metienda haberi debeat. 453. 454. An vis viva ulla sit in natura. Quæstio iterum proponitur. 457. An constet de vi viva ex spatiis, quæ corpora sursum iacta excurrunt. 458. & seq. an ex foveis, quas cadentes globi faciunt. 460. 461. Difficultas contra Leibnitianos proponitur. 467.

Vis repulsiva communis particularum omnium. 321. Hinc impenetrabilitas & extensio corporum. 322. 323. Hinc fluidorum resistentia contra comprimentes causas. 323. Hinc elasticitas corporum & mollitudo. 324. Multa alia per hanc vim modo repulsivam, modo attractivam explicantur. 326. 327. Vi repulsiva continuitas corporis tollitur. 328.

M O N I T U M .

Planisphærium Camaldulense, de quo agitur pag. 378. 379, minus certæ antiquitatis esse, Opusculi Auctori modo intellexit. Id ergo Lectorem moneri vult, ne argumento, quod ex illius antiquitate ductum est, plus tribuatur, quam oportet. Ceterum rem ipse totam in peculiari opere fusius tractabit.

Vidit

Vidit D. Paulus Philippus Premoli Cler. Regul. S. Pauli, & in Ecclesia Metropolitana Bononiæ Pœnit. pro SS. D. N. Benedicto XIV Archiepiscopo Bononiæ.

Ad A. R. Dominum Ioannem Antonium Castelvetri Curatum S. Margaritæ, & Vicarium perpetuum eiusdem Monasterii, ut nomine S. Officii videat, & referat.

Fr. Thomas Maria de Angelis S. Officii Bononiæ Generalis Inq.

Die 15 Iulii 1747

Tertiam partem secundi Tomi Commentariorum Academiae Scientiarum, & Artium bononiensis Instituti plurima academicorum opuscula proferentem, attente legi, & quod in lucem prodeat utilissimum reputo. Etenim, præterquamquod in ea observetur quicquid bonis moribus, ac religioni consonum est, res omnis disciplinas illustrat, & mirum quantum illas auget, ac promovet. Accedit rem totam summi Sacerdotis rem esse, ac ipsi fore gratissimum, ut evulgetur; cum enim ipse Academiam iam prope extinctam suscitaverit, ac amore summo complectatur, & foveat, quicquid ab academicis profertur, ab ipso profectum esse putandum est. Censeo itaque, si Paternitati Vestræ Revmæ placuerit, esse evulgandam.

D. Iob. Antonius Andreas Castelvetri Parochus, & Vicarius perpetuus Parœcia, & Monasterii S. Margaritæ.

16 Augusti 1747.

Attenta præmissa attestazione

IMPRIMATUR.

F. Seraphinus Maria Maccarinelli Vicarius Gen. S. Off. Bononiæ.

*Errata**Corrige.*

<i>Pag.</i>	<i>lin.</i>		
viii	29	idpsum	idipsum
3	37	facilime	facillime
31	36	ipforum	ipfarum
58	18	visebantur	videbatur
63	27	britanico	britannico
68	12	indicio definitiva	iudicio definita
73	2	prodiit	prodidit
	23	costellatione	constellatione
83	1	celeberimi	celeberrimi
145	37	successive	successivæ
146	31	supponimus	supponimus,
147	30	vi,	vi?
150	8	consequitur	consequitur,
152	14	sint	sint,
157	30	B =	A =
165	13	potet	potest
166	30	accedet	accidet
167	8	est	est,
171	2	redigantur	redigantur,
178	17	omisso	omissa
179	13	iterum	iterum,
222	29	cepi	cœpi
231	26	centro	centro,
291	40	Mairanius	Mairanius,
293	5	effet	effet,
204	40	occurrunt	occurrunt,
310	12	explicatur,	explicatur
313	4	producat	producant
315	18	tamen	tamen,
316	17	icciro	iccirco
324	2	AC	AC,
384	21	fese	fese,
394	37	urgeant	urgeant,
400	18	quæ	quod
405	4	excelluissent	excelluissent,

