



42





HARVARD-YENCHING LIBRARY  
HARVARD UNIVERSITY  
2 DIVINITY AVENUE

Loan from Courtney Lib.

OCT 31 1999

赤水玄珠幼科二十六卷目錄

脫肛門

哮喘門

咳嗽門

吐瀉門

癰門

淋門

遺尿門

外腎光腫門



痢門

瘡門

吃坭 吃生米門

耳門

龜胸龜背門

虫門

痒門

癩門

赤水玄珠幼科二十六卷

新安生生子孫一奎著



脫肛門

脫肛乃腸胃有積滯以致濕熱之氣下流蘊於肛門而然也法當推逐其積又或貪坐冷地熱為寒凝結為內痔致每登廁肛即脫下此當從痔而治痔消而肛自收也有泄利日久中氣虛而下陷者宜大補中氣兼為升提從推從補從升皆當看症又有肛上生虫者予友黃桂峯文治

一人肛出百方不應乃以生猪肚子一具刮下  
垢物用紗囊盛之罨於肛上一夜次早細虫不  
計其數盡叢於囊垢上肛即收入此亦濕熱之  
所生也

致新湯 治食積腸胃脫肛不時用此消而推之

木香分二 檳榔分五 京三稜醋煨 山查 枳壳

飛仁分各七 滑石分一錢五分 黃連吳茱萸製三分 右水

煎食前服 積甚者遇仙丹下之方見

丹石散 治外痔脫肛如神 黃丹 滑石分等

為細末新汲水調塗日三五次愈

滋腸散 久痢大腸脫出不收 訶子肉煨

赤石脂 龍骨分各等 右末用茶調肛上綃帛

揉入 治痢久不止米飲調服

勝雪膏 翻花等痔熱痛不可忍或已成瘡

冰片 鉛霜 右末好酒研成膏塗上即愈

僧礬散 蜜陀僧錢二 枯礬錢一 冰片許少

為末敷上先用苦參湯或防風荆芥湯洗

苦參湯 脫肛并痔 枳壳 黃連 大黃

甘草 荆芥 苦參 芍藥 黃芩 各等分

右每五七錢加車前子茅草同煎薰洗

凡腸頭作癢多是有虫一用生艾 川棟根煎湯

薰洗

赤石脂散 瀉痢後肛門不收 赤石脂

伏龍肝 等分 為細末敷肛上

蒲黃散 蒲黃 五錢 熬猪脂一兩全拌成膏塗肛

五倍子湯 五倍子 一兩 煎湯入皮硝薰洗

補中益氣湯加防風桔梗水煎食前服

蜘蛛散 大蜘蛛 鹽裹包裹煨存性為末一錢

鉄銹末 三錢

猪胆汁調敷肛妙

又方 鱉頭燒灰敷 **上**

哮喘門

哮喘辯

孫仲子泰來曰哮喘之與喘極須分別疑似之間虛實攸繫非細務也夫哮喘以聲响名喉中痰盛膠塞肺竅氣道蹇滯呼吸不暢喉中如水雞之聲故氣高而喘心熱而煩擡其肩擷其項不能屈

體而拾物貼席而伏枕也原其痰火內鬱外被  
風寒束其皮腠肺氣為之不利皆上壅胸喉斯  
乃有餘之疾雖多日不食亦不死治惟調氣豁  
痰解表蓋痰出而聲自寢也顧喘以氣息言喉  
中無痰氣促不相接續有虛有實仲景云汗出  
如油喘而不休者死故前人治法有補有瀉是  
故不可與哮同日而語也

明治哮

哮發之原有三有因驚風之後而得者由治驚不

調氣故痰不盡徹去有感風寒而得者有食鹹  
酸搶喉而得者然皆不外乎利肺調氣豁痰六  
字也

麻黃杏子草膏湯 治傷寒發汗後不可更行桂  
枝湯汗出而喘無大熱者及下後而喘

麻黃

二兩  
去節

杏仁

去皮尖  
二十五粒

石膏

四兩

甘草

二兩

右每三四錢水煎服

蘇合香丸 治哮調氣豁痰極効治驚風後而得  
者尤佳



大効雄硃化痰丸 治因驚後哮喘逆觸心肺氣  
急口張虛煩神困

雄黃 硃砂 蟬退 全蝎焙 姜蚕炒 南星

白附子炒各錢 輕粉五分 右末麵糊為丸麻子

大每服二十九薄荷茶清任下

九寶湯 大人小兒素有喘急遇寒暄不常發則

連綿不已哮喘咳嗽夜不得卧

素白皮 橘紅 大腹皮 紫蘇 杏仁

薄荷 甘草 麻黃 官桂各五分 姜三片為

梅一枚水煎服

明治喘

喘之原有六有風寒傷肺而得者有厚味傷脾積

痰上迫於肺之氣為之不利而得者有大病後

被剋伐太過傷其脾胃而中氣虛弱者有火逼

肺金之為火侮而氣不得下降者有水腫之疾

水溢迫肺而喘者有破熱太早腎未完固而洩

其真陰以致腎虛不能納氣歸原者故治法有

疎風解表有清火保肺有清中化痰有利水滲

温有峻補腎元有單補中氣較之於哮大不相  
侔茲特揭而明之俾認証循方不啻駕輕車就  
熟徑即夜行亦無顛躓之慮也矣

九寶湯 風寒哮喘咳嗽不能伏枕 方見哮

黃芩半夏湯 寒包熱哮喘咳嗽

半夏 枳壳 酒苓 桔梗 紫蘇 麻黃

杏仁 甘草 右姜枣水煎服 天寒加桂枝

桑白皮湯 肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑白皮 半夏 蘇子 杏仁 貝母 山梔

黃芩 黃連 右姜水煎服

定喘湯 諸喘久不愈

白菓廿一枚去壳切炒 款冬花 桑白皮蜜炒 麻黃

法製半夏各三錢 蘇子二錢 杏仁 酒苓各一錢半

水煎作二次服

生脉湯 肺氣大虛氣促上喘汗出而息不續命

在須臾 麥明冬去心五錢 人參三錢 五味子三十粒

水煎服

星半瓜蒌丸 清中化痰

南星 半夏 瓜蒌仁 香附子 橘紅

蘿蔔子炒 杏仁 皂角灰 右末神麴糊丸

梧子大每服二三十丸姜湯下

又方 治食積痰喘壅滯不利

半夏製姜 瓜蒌仁 山查 神麴 海石

蘿蔔子 青黛 右末用瓜蒌穰搗為丸竹瀝

生姜湯下每服三十九

參朮調中湯 補中清熱定喘除嗽

人參 白朮各五分 紫白皮蜜炒 炙甘草各三分

麥門冬 陳皮 茯苓各一錢 青皮三分 五味子

二十粒 水煎服

雙玉丸 治胃火刑肺氣高而喘每至夏月必一

發者 軟石膏 寒水石各煨姜汁 右等分為

細末用甘草煎濃膏為丸荒荳大每夜白湯或

淡姜湯送下一錢

神秘湯 水氣作喘

橘紅 桔梗 紫蘇各五分 人參三分 五味子

七粒 紫白皮一錢 半夏七分 枳櫛五分 炙甘草二分

姜三片水煎服

椒目散 水泛於肺心得水而浮故喘不得卧

川椒目 沉水者略炒為末每一錢姜湯調下

葶藶大棗瀉肺湯 上氣喘急身與面目俱浮鼻

塞聲重不聞香臭胸滿將成肺癰

葶藶炒研末彈子大一丸 大棗十枚去核 水二盞先煎大

棗至一盞去棗入葶藶煎八分食後服 先服

仲景小青龍湯二帖再服此

八味丸 治下元真氣不足腎虛不能納氣歸原

而喘 懷熟地四錢 山藥 山茱萸肉各二錢

茯苓 澤瀉各一分 錢 大附子童便制 桂心各五分

右蜜丸赤豈大每服二三十九丸白湯下

加減八味丸 治全上 即前方去大附子加五

味子

人參胡菹湯 治下元不足喘不得卧

人參一錢五分 胡菹肉三枚 姜一片水煎服

杏仁煎 治喘嗽 杏仁去皮尖炒 胡菹肉去皮

等分研為膏加煉蜜丸彈子大臨卧嚼下

一方 胡荽肉三枚 姜三片 臨卧嚼吃 飲湯三四

口再嚼再飲 止嗽化痰

千縉湯 治痰飲喘急不能卧 人扶而坐 一服即安

半夏泡七筒 炙甘草 皂角炙各一寸 生姜一片 水

煎服

治哮喘欲成 龜胸龜背者

甜葶藶四兩 五味子一兩 紫蘇子二兩 杏仁一兩五錢

桑白皮蜜炒二兩 右蜜丸黍米大 每三五十九丸 淡

豆豉湯下 銅壁山人加靈三分 神効

咳嗽門

有傷風嗽 有傷乳食嗽 有痰嗽 有火嗽 有虛嗽

風者鼻塞或流清涕 乳食者胸腹飽悶發熱

日輕夜重 痰者一咳便有痰 喉中常有痰聲

火者發熱面赤 小水短澀 虛者呼吸力微

大小便利 躰倦而面色青白

三拗湯 治感冒風邪 鼻塞聲重 語音不出 頭痛

目眩四肢拘倦 咳嗽多痰 胸滿氣短 麻黃

杏仁皮不去 甘草 姜葱白煎温服 取汁 有

熱加前胡 有痰加半夏

華蓋散 肺感寒邪咳嗽上氣胸滿煩悶項背拘

急聲重鼻塞頭目昏眩痰氣不利

麻黃去節 蘇子炒 桑白皮蜜炒 杏仁 茯苓

陳皮各五錢 甘草二錢 右每三五錢水煎服

金佛草散 治傷風頭目昏痛往來寒熱肢疼煩

悶痰涎不利咳嗽喘滿唾稠粘壯熱惡風

金佛草 荆芥各一兩半 前胡 麻黃去節各

甘草五錢 赤芍藥 半及 各七錢 每三錢姜東

煎服 嗽甚加杏仁五味子

茯苓厚朴湯 治傷乳食停痰咳嗽或吐白沫氣

喘 茯苓 半夏各一錢半 厚朴制五分 甘草二分

姜三片煎服

白餅子 傷乳食停痰咳嗽氣粗喘急及冷痰腹

痛 滑石 輕粉 半夏 南星各一錢 巴豆

十四粒去壳水煮熟 右研勻巴豆後入糯米飯搗為丸

荒荳大捏作餅子三歲已上三五餅已下一二

餅煎葱湯下 傷食麥芽湯下

新傷乳食咳嗽用二陳湯加蘿蔔子杏仁枳壳麥

芽山查厚朴之類服之食消而嗽自止

瀉白散 化痰止咳下氣進食瀉肺火  
素白皮炒蜜 地骨皮各一兩 甘草二錢 每三錢

加粳米煎服

雙玉丸 胃火食積痰火面赤氣粗喘嗽 方見喘門

清化丸 火刑肺金咳嗽喘急 貝母 知母各一兩

巴豆二十粒 全炒去巴豆只用二母為末煉蜜

為丸荒豈大每服一二十九白湯下

又嗽脾肺之氣不足用前諸劑不効者以六君子

湯加改仁素白皮五味子服之即安

夏月咳嗽多汗喘咳無力生脉湯佳

雄黃丸 治癖積痰嗽嘔吐 雄黃五錢 半夏

神麴 白麴各一兩 巴霜四十九粒另研 右末滴水

為丸荒豈大用米糠拌炒赤色每服七丸加至

十丸嘔吐姜湯下痰嗽壅菜汁下

咳久連聲不已口鼻出血者茅根湯主之

陳皮去白 半夏麴 茯苓 甘草 天門冬

片苓 梔仁 貝母 知母 石膏 生地  
杏仁 桔梗 瓜蒌根 水煎臨服加茅根汁  
一小酒盞全服

吐瀉門

小兒吐瀉不異大人當於大人門擇治故不再論  
茲採數方以備不時之急但審諦寒熱躰認傷  
積証明則百投百効矣

凡吐乳直出而不停留者古謂之覘乳但以炒麥  
芽三錢橘紅一錢丁香三分水煎服之立止

凡霍亂吐不止者用蘆稷米炒黃煎湯飲之立止  
又方 白扁荳嫩苗煎湯飲之立止如無嫩苗時  
月即用白扁荳炒過煎湯與之亦安

二香散 止吐如神 真藿香 一錢二分 丁香 一錢

白滑石 五錢 右為末每服五七分米飲下

凡冷吐者乳不消化多吐而少出面白眼慢神昏  
額上汗出急宜溫中理中湯參香散若將傳慢  
脾者可用全蠲觀音散

參香散 治寒吐胃虛投諸劑不効者



人參 沉香 丁香 藿香 木香 各等分

為末每三五分米飲調下

全蠲觀音散 治吐瀉截風定志度免傳變慢驚

黃耆 炙 人參 各二錢半 木香 炙甘草 蓮肉

扁豆 炒 茯苓 白芷 全蠲 羌活 防風

天麻 各二錢 右每服三五錢姜枣煎服

六神湯 脾胃虛吐瀉不進飲食

黃耆 扁豆 人參 白朮 茯苓 炙甘草

藿香 各等分 每三四錢姜枣煎服

藿香散 治冷吐瀉臟腑不調瀉下青黃黑白色

或如雞子清或腹疼微熱

橘紅 藿香 枳壳 厚朴 炙甘草

右為末每服一錢米飲下 治瀉寒湯下

凡熱吐者面赤氣粗唇紅吐出之勢射而遠乳已

化色黃小水短少二陳湯加姜汁炒黃連黃芩

枇杷葉

濟生竹茹湯 治熱吐口渴煩躁

橘紅 乾葛 甘草 麥門冬 竹茹 生姜

右水煎服 热甚者加姜連

益元散 治热吐面赤氣粗小水短少 傷暑作

吐尤佳 滑石錢六 甘草錢一 為末姜汁調灯

心湯下吐甚者并花水下

凡食傷而吐者吐出之物有餽餒氣眼胞浮面色

黃足冷壯热日輕夜重麦芽枳實青皮枳榔厚

朴陳皮之類消而降之

治瀉之劑

凡冷瀉者面色青白小水清腸鳴漉漉腹中作疼

口不渴益黃散理中湯挾風邪者藿香正氣散

挾暑氣者六和湯

胃苓湯 治冷瀉小水不利

蒼朮 厚朴姜汁 陳皮 炙甘草 白朮

茯苓 猪苓 澤瀉 桂皮 姜三片水煎服

凡热瀉者面赤唇紅小水短少口乾六一散燈心

湯調下立止

清六益元湯 治热瀉小水短少口乾

白朮炒 滑石 炙甘草 黃連酒炒 麦芽炒

水煎服

四苓湯

治熱瀉小水短少腹中作疼

白朮

炒

赤茯苓

澤瀉

猪苓白芍藥

酒炒

酒苓

酒連

水煎服

凡食傷而瀉者腹中或疼或脹暖氣如敗卵詳其所傷以對証之劑消而磨之如傷乳食以麦芽糯米食以酒麩肉以山查豆腐以蘿蔔子豉粉以杏仁諸菓子以射香肉桂傷魚以橄欖每於理脾中倍加所以之藥為君則効也凡諸肉傷

初未下藎之時只宜吐之如瓜蒂散或蘿蔔子搗滾水取汁多飲之即吐若食已下藎入胃則不可吐以香橘餅之類消之若腹中飽硬日數已久而痛在臍腹則宜備急丸等下之然後調補瀉始止也若補之太早恐食積不消久而變為痢疾或為脾洩或為痞滿皆由執衡者失先後次第之宜盲對証之劑之所致也又投已上諸劑不止者乃重瀉也當從麻治

瓜蒂散

治食傷胸藎脹疼元

欲吐煩悶不安

瓜蒂三枚 赤小豆錢一 為末白湯調下五七分

少刻用鵝翎於喉中探之即吐

香橘餅 食積瀉冷瀉腹中脹疼

丁香 青皮 陳皮錢各二 厚朴 神麴炒

麥芽炒各五錢 右為末煉蜜為餅紫蘇湯下米

飲亦可

消積丸 吐瀉大便酸臭

丁香九粒 砂仁十二粒 巴豆二粒 烏梅肉二粒

右為末麵糊為丸荒豈大溫水送下一二丸

保安丸 傷食瀉

香附子炒 砂仁炒各一兩 白姜煨 青皮炒

陳皮 京三稜 蓬朮俱醋煨 炙甘草各五錢

右為末麥芽麵糊為丸荒豈大每一二九姜

湯下

夏月作瀉或傷暑吐瀉以六和湯治之名六和者

以其能和六腑也

六和湯 治吐瀉霍亂

砂仁 半夏 杏仁 人參 炙甘草各一兩

赤茯苓 藿香 扁豆炒 木瓜各二兩 每三  
五錢姜枣煎服

香橘膏 治吐瀉

砂仁二錢 白苳仁一錢 蓮肉 山藥 木香

青皮炒各五錢 陳皮 厚朴制各一兩 麦芽炒

神麴炒各二兩 右為末蜜丸雞豆大每服一九吐

用紫蘇湯下瀉荆芥湯下

保安四聖餅 治吐瀉驚痺吐瀉日久恐傳慢驚

人參 白朮 茯苓各一兩 炙甘草 南星炮

白附子各五錢 代赭石煨醋淬一兩 蛇含石煨二錢

右為末端陽日棕搗為餅計重一錢每服一餅

吐姜湯 瀉米飲 驚薄荷 痺米泔水下

苳蔻散 腹痛腸胃虛冷滑洩不禁

肉苳蔻一枚剉一小孔入乳香一塊濕麵包裹

煨熟為末每服三五分米飲下

睡驚太乙丹 治瀉後蠶青鎮驚安神止夜啼

白朮 茯苓 桔梗炒一兩 藿香五錢 川芎

白芷各錢 扁豆炒五錢 白芍藥酒炒五錢 右為

末煉蜜為丸櫻桃大辰砂射香為衣每服半丸  
薄荷湯或東湯化下 夜啼燈心釣藤湯化下

癖門

癖者血膜包水癖於脇傍時時作痛也惟癖能發  
潮熱能生寒熱故瘧家中腕多蓄黃水日久而  
後成癖此蓋小兒臟腑不和營衛不暢津液不  
得流通冷氣搏之則結聚而成癖矣進食丸消  
食丸可選而用之甚者白餅子下之治之不早  
恐成疰積羸瘦肚脹則難治也

取癖丸 治腹脇痞結氣滿不得宣通

甘遂微炒 芫花炒 黑丑半炒半生 辣桂

蓬朮 青皮 木香 枏仁去皮 五靈脂各錢

巴霜 右為末飛麵糊為丸麻子大每服一二

丸姜蜜煎湯灌下泄後用冷粥補之

燒丹丸 乳癖食癖午後寒熱咳嗽脇下結硬

玄精石煨赤 輕粉各一分 粉霜 礬砂各五分

右為末入寒食麴一錢水和成餅外再用濕麵  
包裹慢火煨黃色取出去麴將藥再研為細末

滴水為丸米粒大一歲五丸二歲十丸夜卧白  
湯送下至天明取下惡物如不下漸加丸數如  
妳癖未消尽隔三兩日再一服以癖消尽為度  
紫丸子 嬰兒乳食失節宿食不化胸腹痞滿嘔  
吐惡心便利不調乳食減少不消內挾冷痰大  
便酸臭或變蒸發熱多日不解因食成癩先寒  
後熱

代赭石

醋收

赤石脂

煨各一兩

杏仁

去皮尖麩皮炒五十個

巴霜

炒一錢

右為末餽餅丸

如黍米大月外兒

只服一丸米飲下微利即瘥

千金方云此方之妙無所不治雖為下藥並不

虛人

七聖丸 能令黃瘦子頓作化生兒

三稜

莪朮

芫花

各醋浸同炒

青皮

橘紅

川練子

去皮揅

杏仁

去皮尖

右為末醋糊為丸

黍米大食遠

白湯服日間所食之食物盡行消

化永無積滯

消積丸 消積聚寬腹脹退面腫進飲食化滯物

木香

人參

各一錢半

黃連

炒

莪朮

醋煨各三錢

橘紅

青皮

炒

枳榔

二枚

右為末麵糊為丸

黍米大食後米飲下

萬金丸

磨積塊去黃胖神效

平胃散

加夜明沙

炒

針砂

醋淬

皂礬

醋煮乾

紅各等分

為末紅棗肉為丸荒荳大空心米飲下

忌一切血及蕎麥麵

靈仙丸

消一切癰

歲靈仙為末煉蜜丸彈子大紅絹袋盛藥一丸

用精猪肉四兩煮極爛去藥聽喫其積化從大便而下以知為度

搗癖散

治癖立効

海蛤粉

黃丹

硫黃

各等分

初伏日修合為

細末用好米醋調成膏於新烏盆中晒乾為細末一歲兒服一分空心米飲調下取下癖積如藍汁為驗

鱉甲猪肚丸

小兒痞積發熱

柴胡

一兩

黃連

鱉甲

醋炙各三錢

枳實

炒木香



青皮 各五錢

青蒿 七錢

右為末入猪肚內蒸極

爛同搗為丸梧子大每服二十九人參湯送下

赤茯苓 六錢

赤芍藥

山梔子 各三錢

當歸

甘草 各五錢

每五錢燈心煎服

導赤散 血淋

生乾地黄

木通 各二錢

黃芩

甘草 生各一錢

右為末每服一錢井水入燈心煎湯服仍以米

飲調油髮灰空心灌下

車前子散 小便不利

茯苓

猪苓

香薷

車前子

人參

各等分

右為末每服五錢燈心湯下

金砂益元散

小便淋瀝不通

麝香

海金砂

滑石

甘草

各等分

右為末

每服三錢木通燈心煎湯下或冬瓜仁湯亦可

茯苓散 治白尿

京三稜

蓬朮

各

砂仁

赤茯苓

各半兩

青皮

陳皮 滑石

炙甘草

右為末每服一錢燈

心煎湯調下

三稜散 小兒尿白久而成疝此藥實脾土消食

化積

三稜 蓬朮 益智仁 甘草 神麴 麦芽

陳皮 錢各五 右水煎服痰嗽加製半夏口腥氣

加鹽調理諸痰加枣子

淋門

淋淋瀝也尿竅澁滯小便點滴而出艰澁而疼頻而數起也由熱結膀胱不能滲洩下焦之氣壅滯而然其血淋者熱自小腸而來小腸與心為

表裏心主血熱則妄行滲於膀胱而致之也

小兒尿出少頃如米泔狀者由乳哺失節傷於脾胃以致清白不分久則成疝而濁也尿初出時微赤良久變白乃熱疝之邪初出黃白良久變米泔者乃冷疝之候也冷者益黃散主之熱者牛黃丸冷而復挾熱者大蘆薈丸純白濁者厚朴丸諸失津液欲成疝而小便白濁者茯苓

散

葵子散 小兒諸淋

葵子 車前子 木通 桑白皮蜜炒 藿麥

赤茯苓 山梔子 炙甘草各等分 水煎服

八正散 心經蘊熱口燥咽乾五淋小便澀眼目

赤脉赤瘡

滑石 瞿麥 木通 大黃 扁蓄 車前子

梔子各五錢 甘草稍半二錢 每二三錢加燈心

煎服

木通散 上焦熱小便閉煩躁生嗔及淋瀝諸瘡

丹毒

八正散 加赤茯苓 黃芩

五淋散 膀胱有熱水道不通或尿如豈汁或如

沙石或膏或血

血餘散 治血淋

髮灰二錢 生蒲黃 生地黄 赤茯苓 甘草

各一錢 煎調髮灰空心服

分清飲 通心氣補漏精小便餘瀝赤白濁

益智仁 川草薢 石菖蒲 烏藥 灯心水

煎服 一方加白芍藥茯苓

君朴丸 治諸瘕小便白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子肉煨 厚朴制 黃連各一 木香二錢

右為末麵糊丸赤豈大米飲下三十丸

胃苓丸 治小便如米泔甚効分陰陽退潮熱消

浮腫退黃疸調脾胃 此銅壁山人改湯為丸

即胃苓湯加草菓米糊丸米飲下 嘔吐姜湯

下 泄瀉車前子湯下 浮腫長流水五加皮

燈心湯下 黃疝本方一料加茵陳五錢燈心

湯下 白濁鹽濕下 疝氣茴香湯下

遺尿門 尿床附

遺尿者謂小便日夜時出多而不禁尿床者謂夜

入床睡去乃小便出而不知也良由下元不足

腎與膀胱虛冷所致故古方多用溫補下元之

劑腎氣實則氣固而溺有統攝則不致遺失也

劉守真又謂有熱客於腎部干於足厥陰之經乃

廷孔鬱結極甚而氣血不得宣通則痿痺而神

無所用故夜滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁

也此又不可不知

孫仲子泰來曰夫謂不禁者乃小便出多不計其  
遍數為下元大虛之症由陽氣虛憊不能收持  
此急症也不急治則死矣非大溫大升大補則  
莫能濟其虛而固其原彼尿床者嬰孩童稚常  
有之蓋男子十六而精通腎氣固即不為治至  
其時亦自止若治之早者則早止也亦有至老  
而不止者余目擊十數人矣余族且三人皆乏  
嗣總由下元虛冷良可徵矣劉守真謂有熱客  
腎部干於厥陰廷孔鬱結極甚不能宣通故遺

失不能收禁愚謂既澀結極甚不能宣通則小  
便所出者僅點滴而已所出必短澀疼痛色必  
黃赤安能直遂長清不收不禁哉內經謂膀胱  
約而為瘻不約為遺溺不禁由是參之守真之  
論只可言淋乃暫去之疾非遺失日久者可擬  
余不佞僭為辯

鷄腸散 小兒尿床遺溺不自知竟

鷄腸燒 牡蛎煨 白茯苓 真桑螵蛸炒各五錢

桂心 龍骨各二錢半 每服三錢姜枣煎服

鷄胫脛散 治遺尿

鷄胫脛具一 鷄腸燒 猪胞炙

右為末男用雌女用雄每服一二錢酒調下

破故紙散 下元虛冷遺尿

破故紙炒 為末一二錢白湯調服

益智仁散 治全上亦治白濁

益智仁 白茯苓分 為末每服一錢空心米

飲下

又方 五倍子一半生用一半燒存性 為末雪糕為丸白湯

補原丸 治下元虛憊小水不禁或如脂膏

桑螵蛸 益智仁 人參 仙茅 山茱萸肉

兔絲子 乾山藥 巴戟 右為末各照常製

芡實粉為丸蓮肉湯送下七八十丸

遺尿方 破故紙 益智仁 烏藥各三錢 白茯苓

茯神各一錢 右為末空心米飲下一錢

外腎光腫門

小兒陰腫多由甘肥不節濕熱下流或啼哭怒氣

不順或失坐冷地皆能致之

丹溪謂脫囊腫大墜下不收以紫蘇莖葉為末水調荷葉包之又謂一人傳此方用野白紫蘇為末濕則乾搽乾則香油調敷雖皮潰而核欲墜悉有神功

菝仁丸 治怒氣不順啼哭鬱氣結於肝經發為陰腫或為偏墜或水竇不通亦能發腫此方主

之 菝仁去皮微炒 桂心 黑莖微炒 白蒺藜炒研去刺

牡丹皮 大黃各等分 右為末煉蜜丸麻子大

每服五丸或七丸青皮木香葱白煎湯入鹽

少許送下 或煎大流氣飲研青木香送下亦可

丹溪 用木通甘草黃連當歸黃芩煎服

牡蠣散 小兒外腎腫大莖物光明

牡蠣煨 為細末以津唾調塗腫處即消

又方 加地龍末一分 如外腎熱者以鷄子清調敷

又方 治小兒外腫 菝仁研如坭津唾調敷

青木香丸 寬中快蕩腹脇疼痛心下堅痞腸中

水聲陰腫偏墜

黑莖炒一兩五錢 青木香 補骨脂炒 萹澄茄

栝柳各四兩

先將栝柳用粟米包外再以濕紙

裹煨令焦去飯取栝柳合前藥為末滴水丸荒

豈大每服二十九白湯下

又方 治偏墜 防風 牡丹皮

為末酒調服一二錢立効 或白湯入鹽下

又方 治偏墜 五苓散內加防風牡丹皮極効

有熱者服三黃丸

二白散 膀胱蘊熱風濕相承發為陰腫小便利不

白豈炒二兩 素白皮 白朮 木通 陳皮各五錢

右為末每二錢姜湯調服

蟬退散 陰囊忽腫或坐地多時感受風濕或為

虫蟻所吹

用蟬退五錢水一碗煎湯薰洗腫處腫消痛止

須洗二三次後服五苓散以燈心湯調服

又方 葱地上蛭蚓糞為末煎甘草汁調敷腫上

或薄荷汁調亦妙

痢門

小兒痢疾外感少而內傷多故曰無積不成痢也



但當審諦新久虛實若新起而腹痛手不可近  
後重裏急日夜頻送小水短少稠粘之物若膿  
若血不計遍數者急宜下之下後看輕重再為  
調補噤口者審其從時令之氣而來躰必發熱  
用人參敗毒散加陳倉米有熱毒薰蒸胃口虛  
而不納穀或乾噦嘔惡者以辰砂益元散用生  
姜汁調燈心湯送下若痢久而腸胃虛弱者但  
當補養氣血蓋虛回而痢自止也脾胃健飲食  
進痢自旋止日數雖多而無誤於事也小便不

利者當利之清六九佳

人參敗毒散 治四時不正之氣發為寒熱瘧痢  
或遍身作痛嘔噦惡心噤口 方見丹毒赤遊  
加陳皮姜枣

香脯 小兒刮腸下痢噤口不食閉口合眼至重

危困 精猪肉一兩批 膩粉 將猪肉於炭

火上慢炙旋鋪膩粉令勻成脯每以少許與吃  
如未知吃且放鼻邊自然要吃此方治胃口有  
毒食之神効

百一選方 治噤口痢

蓮肉去壳留心碾為末每服半錢陳米飲調下  
此是毒氣上衝心肺借此以通心氣便覺思食

山藥散 噤口痢

乾山藥一兩半炒熟 為末白湯調二錢服之

嘔噦立止

茅花湯 吐血下血鼻衄血痢黑痢

茅花一大把水煎服 無花用根代之

枳殼寬腸散 順氣治痢

甘草炙六錢 枳殼炒二兩 為末每服一錢空

心白湯調下

烏梅湯 治下痢津液必臟腑虛燥煩渴引飲及

諸病後煩渴引飲無度

烏梅肉微炒五錢 白茯苓 木瓜各一兩 右每三

錢姜一片水煎服

清六丸 治血痢小水短少及洩瀉 此方專清

六府濕熱故名清六內用紅麴者以其能消食

積而化淤血也

桂府白滑石

飛過六兩

炙甘草

一兩

紅麴

炒五錢

右滴水為丸灯心湯下二三十丸

芍藥湯 治赤白膿血裏急後重腹中疼痛刘守

真云行血則便膿自愈調氣而後重自除此方

是也 白芍藥

二錢

當歸

一錢

酒連

酒苓

各分

木香

檳榔

各五分

肉桂

四分

甘草

二分

水煎服

小水短少日夜後重者加只壳升麻桃仁各一

錢滑石三錢 若積滯重而熱盛者加大黃二

錢

保和丸 食積痢腹疼不知餓用此消之

山查

神麴

各二兩

厚皮

半夏

各一兩

蘿蔔子

連翹

炒各五錢

右末仍以神麴糊為丸荒豇大每

服一錢白湯下

小香連丸 裏急後重腹疼赤白痢

黃連

吳茱萸各一兩全炒只用連

木香

二錢

訶子

煨去核五錢

右為丸麴糊為丸荒豇大每三十九米飲下

地榆散 治赤痢無糞鮮紅點滴而下

地榆

炒蜜

訶肉

煨

香草

各一分

為末每服一錢米飲調下

地榆飲 熱痢腹痛赤白頻併

地榆錢二 甘草 白芍藥 當歸各一錢 枳殼炒一錢

錢半 黃連吳茱萸炒一錢 水煎服

茯苓白朮散 治寒痢而下清白如魚凍者脾弱

不思飲食

茯苓錢三 白朮 人參 木通 只壳 甘草

炒各一錢 肉果煨 桂心各一錢半 訶肉二錢 陳皮

每三五錢燈心煎服

朴附丸 治寒痢滑洩不

厚朴制 大附子炮 乾姜炮 陳皮各等分

為末粟米糊為丸每服五七分或一錢米飲下

木香一錢 黃連吳茱萸炒三錢 粟壳去蒂萆蜜炒二錢

薑蚕炒一錢 甘草二錢 右剉以生姜三錢全炒

爆乾為末米飲調下 赤生地黃湯下 白烏

梅湯下 如有熱小柴胡湯解之

養臟湯 治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦

裏急後重腹臍疔痛脫肛 如臟腑滑洩夜起

及日久虛寒加大附子三片

粟壳蜜炒三錢 人參 當歸 肉桂 肉果煨

白朮 訶肉煨 炙甘草各一錢 木香 芍藥各一錢半

每三五錢水煎服忌酒麵生冷

胃風湯 風冷乘虛干於腸胃水穀不化泄瀉腹

脇虛滿腸鳴痾痛下如莖汁或純瘀血

白朮 芍藥 川芎 人參 當歸 肉桂

茯苓各等分 每服三錢入粟米一錢水煎服

芍藥栢皮丸 一切膿血惡痢窘痛

白芍藥 黃栢各一兩 當歸 黃連 枳壳各五錢

為末滴水丸荒豈大白湯下

二黃熟艾湯 積熱下痢赤色及治傷寒四五日

大下熱利諸藥不効者

黃連 黃芩 黃栢各出錢 熟艾半雞子大

每服三錢水煎服

噤口痢 人參 黃連各一錢 石蓮子三分

為末擦牙關二二次即能食 右丹溪用人參

黃連二味煎濃服之但得一呷入腹即愈此加

石蓮子亦有理

芫蕤散 嬰孩腸胃脆弱糟粕不聚瀉痢不止或

赤或白冷熱不調日夜頻併愈而又發神効

但忌葷腥生冷

肉苳菟 煨一個 胡粉 炒二錢 龍骨 生一錢 枯礬 一錢

為末每服一錢米飲調下或以薄糊丸麻子大

每服五六上丸 議曰胡粉即真鉛粉也出韶

州者名韶粉出定州者名定粉搵名光粉其性

滯故用以滯其腸令不虛滑芫蕤溫臟之藥安

和腸胃龍骨白礬澀腸止痢凡虛滑日夜無度者服之隨時痊愈

神効雞青丸 嬰孩一切痢疾不拘冷熱皆効

木香 二錢 生黃連 五錢 肉苳菟 生一個

右為粗末取雞子青搜和作餅慢火炙黃色變

紅者稍乾擘破碾為末白麵糊為丸麻子大每

三五十九丸米飲下 此方功在雞子青

失効至聖千金飲子 治先吐後瀉後又變痢臍

腹痠痛脇肋脹滿受濕虛鳴膿血五色相雜或

如豈汁或如瘀血日夜無度食少肌羸

黃芪蜜炙 甘草 陳皮 粟壳蜜炙 木香

白芍藥 地榆蜜炙 黑荳炒 當歸 枳壳炒

烏梅 淮東 白朮 訶肉煨 黃連各等分

每三五錢水煎服

大艾煎丸 小兒虛痢大渴不止

艾葉燒存性 乾葛粉 胡粉炒 海螵蛸

龍齒各等分 為末煉蜜為丸雞頭子大每服一

丸至二丸米飲下

木菴麵 噤口痢一粒飯不食且此効

白朮五錢 肉果炮二枚 木香二錢 右為末白麵

一兩水搜作餅切作條子水煮熟用葱白生姜  
鹽各少許和汁與吃看所入多少仍用雞青丸

調理

炒鷄子 治休息痢及疴瀉日久不愈

鷄子一枚先用黃膈如指大一塊銚內熔化入

鷄子拌炒熟空心食之大効

剪紅丸 治痢鮮血

側柏葉 槐花 枳壳炒 荆芥穗各等分

醋糊丸糯米湯下

癰門

小兒癰痢治同大人惟劑輕小耳當於大人科參治茲但收集數方以備緩急不重論也緣其症不外於外感內傷二者而已外感有六經之形症用和解六經之劑治之內傷有胸腹胞滿晝輕夜重之標準只以二陳湯加健脾胃消導之劑治之蓋無痰不作癰也歎發之後乃為截之虛

弱者補之然初發二三日之間必須導痰運脾和解為主切不可遽投補截設汗不週頭疼未徹則表邪未盡解也苟痰不清胸腹不暢則內傷未盡鎔也補之截之是閉其邪而塞其去路其變也曷勝言哉和解六經之劑詳於天人科第八卷中

清脾飲 治痺癰熱而不寒或熱多寒少膈滿不能食口苦舌乾煩渴小便黃赤大便不利

青皮 厚朴制 白朮 草果煨 柴胡  
茯苓 半夏 黃芩 甘草各等分 生姜三片



水煎服

養胃湯 外感風寒內傷生冷溫中快高  
山嵐瘴氣寒癘嘔逆

人參

蒼朮

厚朴

半夏

藿香

草果

煨去壳

茯苓

各五分

陳皮

七分

甘草

二分

姜三

片芩一枚烏梅一枚煎服

香葛飲 嬰狹夾食夾驚傷寒四時瘟疫癘疾

香附子

炒

紫蘇葉

各一兩

橘紅

青皮

葛根

各五錢

炙甘草

二錢五分

薑三五錢姜葱白煎服

露星飲 治久癘成癆以此截之

秦艽

柴胡

白朮

茯苓

檳榔

常山

酒炒

一次

黃芩

甘草

半夏

麩

官桂

各等分

右用酒醋水各半碗煎七

分露一宿臨發五更服之

鬼哭飲 截癘

常山

制

大腹皮

白茯苓

鱉甲

醋炙

甘草

桃柳枝各七條水煎臨發空心五更

服

南斗散 痰癯

常山 制

白芷

南星

生各等分

酒煎臨

發五更服

白朮截癯飲

虛弱久癯脾虛嘔吐不思飲食不

拘寒熱極効

白朮

一半生用一半炒用四錢

橘紅

麦芽

各二錢

烏梅

一枚

姜五片

水煎臨發日五更服

何首烏丸

治久癯陰虛熱多寒少以此補而截

之

