

NEIMI
MIT DEM



yer-Kr

DAS
ZEICHEN
DES
VERTRAUENS

4)
7760

[Handwritten scribble]

~~1258~~

MG
R47-61

Indikationsverzeichnis
分類用藥表
Table of Indications

Pharm. Präparate
分類藥名錄
Pharm. Preparations

Sera und Impfstoffe
血清及漿苗
Serums and Vaccines



3 1774 1512 6

ÄRZTEJAHRBUCH

醫師日記

MEDICAL DIARY



I. AUSGABE

第一輯

I. EDITION



»Bayer«

LEVERKUSEN

德國拜耳大藥廠

姓名.....

住址.....

.....

電話號數.....

銀行摺子號數.....


汽車執照號數.....

汽車號數.....

{拾得者請速交還本人為荷}


醫師日記目次

分類用藥表	第 7—69 頁
分類藥名錄	第 71—157 頁
血清及漿苗	第 159—171 頁
上海德國醫藥院(附圖)	
Deutsche Medizinische Akademie	第 174 頁
北京輔仁大學(附圖)	
Fu Jen University Peking	第 175 頁
最新研究	第 176—178 頁
各期梅毒之治療	第 179—182 頁
白濁治療用「烏利龍」「新烏利龍」	第 183—184 頁
最新瘧疾治療	第 185—186 頁
阿米巴痢治療	第 187—188 頁
黑熱病之治療	第 189—190 頁
各重要藥物之最高用量表(成人及小兒)	第 191—196 頁
醫藥用衡量表及通常用各種單位	第 197—198 頁
各種常見之中毒症象與治療	第 199—208 頁
尿液分析	第 209—213 頁
藥物禁伍表	第 214—221 頁
計算孕婦生產時日表	第 222—223 頁
華氏攝氏羅氏三種溫度比較表	第 224 頁
「拜耳」維他命製劑 Vitamin Preparations	第 225—228 頁
「拜耳」荷爾蒙製劑 Hormone Preparations	第 228—233 頁
血液之形態與成份 Morphological Components of the Blood	第 234—235 頁
常用處方略語表	第 236—237 頁
插頁:	
德國拜耳大藥廠總管理處之外景	第 2—3 頁之間
拜耳分公司散佈全球圖	第 2—3 頁之間
上海拜耳藥品公司之各經理處	第 2—3 頁之間
「貝靈」氏像 拜耳自備飛機	第 166—167 頁之間
瘧疾原蟲發育圖 正常經週圖	第 198—199 頁之間




»Bayer« - Stammhaus, Leverkusen 德國拜耳大藥廠總管理處之外景

拜耳公司分售



拜耳十字商標保

上海拜耳藥品無畏公司之經理處分佈地點




親 友 錄

姓 名										
通 訊 處										
電 話										



親 友 錄

姓 名											
通 訊 處											
電 話											



INDIKATIONSVERZEICHNIS

分類用藥表


TABLE OF INDICATIONS

Important!

In the Table of Indications no claim is made as to the completeness of the therapeutic data in each case, as only »Bayer« products have been considered. The designations given in parentheses behind the preparations point only briefly and in a general way to the type of product and its administration. The exact information will be found in the "List of Preparations"

注意!

分類用藥表所列各症用藥。僅以「拜耳」出品為限。當然難稱完備。至於該等藥之性質及用法詳細情形。請參閱分類藥名錄。



分類用藥表

Abortion, habitual, tendency to

流產，習慣性流產，有流產

傾向者。

'Lutren' 路脫命 第108頁

'Cantan' 康泰 第84頁

'Ereton' 愛利唐 第94頁

Abortion, septic

流產敗血症

化學治療

'Prontosil' 百浪多息 第128頁

'Rivanol' 雷佛奴耳 第132頁

'Trypaflavine' 脫呂帕弗拉文 第146頁

提高身體抵抗力

'Omnadin' 握姆納丁 第165頁

'Yatren'-Casein 乳酪藥特靈 第154頁

血清治療

Anti-Peritonitis Serum 'Behring'

(貝靈)腹膜炎血清 第165頁

'Streptoserin' (貝靈)鍊球菌血清精 第168頁

Abscess 瘡癤膿瘍

化學治療

'Uleron' 烏利龍 第148頁

'Rivanol' 雷佛奴耳 第132頁

'Trypaflavine' 脫呂帕弗拉文 第146頁

'Surfen' 蘇芬 第144頁
油膏治療

'Uleron' Ointment 烏利龍油膏 第148頁

'Prontosil' 百浪多息 第128頁

提高身體抵抗力

'Omnadin' 握姆納丁 第165頁

'Yatren'-Casein 乳酪藥特靈 第154頁

血清漿苗治療

'Streptoserin' (貝靈)鍊球菌血清精 第168頁

'Staphar' 斯太法 第168頁

Staphylo-'Yatren' (貝靈)「藥特靈」葡萄狀球菌漿苗 第168頁

Antipyrogenous 'Yatren' Vaccine 'Behring'

(貝靈)「藥特靈」化膿菌混合漿苗 第160頁

Achylia 胃酸欠缺

'Acidol'-Pepsin 阿即多耳配符新 第72頁

'Bioferol' 百福祿 第80頁

Acne 面部瘡癤，粉刺

治療變態反應

'Torantil' 多能體 第146頁

分類用藥表

<p style="text-align: center;">提高身體抵抗力</p> <p>'Omnadin' 握姆納丁 第165頁</p> <p style="text-align: center;">漿苗治療</p> <p>Antipyrogenous 'Yatren' Vaccine 'Behring' 〔貝靈〕「藥特靈」化膿菌混 合漿苗 第160頁</p> <p>Staphylo-'Yatren' 〔貝靈〕「藥特靈」葡萄狀球 菌漿苗 第168頁</p> <p>'Staphar' 斯太法 第168頁</p> <p>'Staphygen' 斯太法精 第168頁</p> <p style="text-align: center;">普通治療</p> <p>'Mitigal' 滅疥 第110頁</p> <p>'Tumenol'-Ammonium 土門奴耳一鉅 第148頁</p> <p style="text-align: center;">砒劑治療</p> <p>'Optarson' 奧拍泰純 第116頁</p> <p>'Solarson' 所拉純 第138頁</p> <p>'Spiroid' 斯砒螺刺脫 第140頁</p> <p style="text-align: center;">荷爾蒙治療</p> <p>'Prolan' 補奴郎 第124頁</p> <p>'Uden' 溫敦 第148頁</p> <p>'Cyren' B 西冷B 第88頁 (西冷油膏) 第89頁</p> <p><u>Acrocyanosis</u> 尖端青紫症</p> <p>'Padutin' 保妥耐 第118頁</p>	<p><u>Actinomycosis</u></p> <p>'Yatren'-Casein 乳酪藥特靈 第154頁</p> <p>'Yatren' Solution 藥特靈液 第152頁</p> <p>'Entodon' 恩託同 第92頁</p> <p>'Jothion' 乍鐵紅液 第104頁</p> <p>'Salvarsan' 洒爾佛散 第134頁</p> <p><u>Adnexitis</u> 子宮附屬器官炎</p> <p>參. Metritis 第46頁</p> <p><u>Adynamia</u> 無力, 懶倦</p> <p>'Cortenil' 可得寧 第86頁</p> <p>'Iliren' 意利命 第100頁</p> <p><u>After-pains</u> 痛楚</p> <p>'Dolantin' 度冷丁 第90頁</p> <p>'Compral' 康普樂 第86頁</p> <p>'Gardan' 加當 第98頁</p> <p>'Novalgin' 羅瓦而精 第114頁</p> <p>'Pyramidon' 齊藍米藤 第130頁</p> <p><u>Aggranulocytosis</u></p> <p><u>白血球缺乏</u></p> <p>'Campolon' 康巴隆 第82頁</p> <p>'Campoferron' 康巴飛樂 第82頁</p> <p>'Omnadin' 握姆納丁 第165頁</p>
--	---

分類用藥表

Air-sickness 航空病

'Coffeminal'
咖啡蜜拿 第 86 頁

Alimentation, forced

強制營養法

Insulin "Bayer"
因蘇林 第 102 頁
'Campoferron'
康巴飛樂 第 82 頁
'Vogan' 復康 第 152 頁
'Bioferol' 百福祿 第 80 頁
'Cortenil' 可得寧 第 86 頁
'Iliren' 惹利命 第 100 頁
'Optarson'
奧拍泰純 第 116 頁
'Tonophosphan'
託拿福賜芬 第 146 頁

Alopecia 禿髮

'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第 146 頁
'Prolan' 補奴郎 第 124 頁
'Unden' 溫敦 第 148 頁
'Cyren' B 西冷 B 第 88 頁
'Solarson' 所拉純 第 138 頁

Amenorrhoea 無月經, 經閉

'Prolan' 補奴郎 第 124 頁
'Unden' 溫敦 第 148 頁
'Cyren' B 西冷 B 第 88 頁
'Lutren' 路脫命 第 108 頁
'Elityran'
茲利特靈 第 92 頁

Amoebic dysentery

阿米巴痢疾
(參看 Dysentery 痢疾)
第 28 頁

Anacidity 無胃酸

(參看 Gastritis)
第 34 頁

Anæmia, pernicious

惡性貧血

'Campolon'
康巴隆 第 82 頁
'Campoferron'
康巴飛樂 第 82 頁
'Acidol'-Pepsin
阿即多耳配符新 第 72 頁

Anæmia, secondary

續發性貧血

'Bioferol' 百福祿 第 80 頁
'Solarson' 所拉純 第 138 頁
'Optarson'
奧拍泰純 第 116 頁
'Tonophosphan'
託拿福賜芬 第 146 頁
'Campolon'
康巴隆 第 82 頁
'Campoferron'
康巴飛樂 第 82 頁
'Cantan' 康泰 第 84 頁
'Vogan' 復康 第 152 頁

分類用藥表

Anæsthesia 麻醉

麻 醉 種 類	奴佛峇因成份 (+蘇潑拉來寧)'	本妥卡因成份 (+蘇潑拉來寧)'
浸潤麻醉	0.5	0.05—0.1
傳導麻醉	1—2	0.2
脊髓麻醉	5	0.5
		不用蘇潑拉來寧
脊側麻醉	1—2	0.1—0.2
薦骨麻醉	1—2	0.1
內臟神經麻醉	1—2	0.1—0.2
	粘 膜 麻 醉	
喉科麻醉	5—20	1—2
泌尿系麻醉	3	0.1—0.2
眼科麻醉	5—10	加或不加蘇潑拉來寧 0.25—1

「可白息」'Corbasil' 可用以替代蘇潑拉來寧。

Anaphylaxis 過敏症

'Suprarenin'
蘇潑拉來寧 第142頁
'Racedrin'
拉西特靈 第130頁
'Torantil' 多能體 第146頁

梅毒為因者

'Casbis' 嘉色鈹 第84頁
'Salyrgan' 洒利采 第136頁

Angina pectoris 狹心症

'Lacarnol' 來克諾 第104頁
'Padutin' 保妥西 第118頁
'Dolantin' 度冷丁 第90頁
'Jocapral'
局卡潑拉 第102頁
'Theominal'
梯烏密拿 第144頁
'Entodon' 恩託同 第92頁
'Sajodin' 洒乍錠 第134頁

Aneurysm, Aortic

大動脈弓瘤

'Entodon' 恩託同 第92頁
'Sajodin' 洒乍錠 第134頁

分類用藥表

Angina, Vincent's

文生氏咽喉炎

- 'Spirocid'
斯磯螺刺脫 第140頁
'Neosalvarsan'
新六〇六(新洒爾佛散)
第134頁

'Gardan' 加當 第98頁

'Aspirin'
阿司匹靈 第76頁

'Novalgin'
羅氏而精 第114頁

'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁

Angina, tonsillar

扁桃腺炎

'Panflavin' Tablets
旁弗拉文錠 第118頁

'Revasa' Tablets
利法撒丸 第130頁

'Prontosil'
百浪多息 第128頁

'Casbis' 嘉色鈹 第84頁
提高抵抗力

'Omnadin'
握姆納丁 第165頁

'Yatren'-Casein
乳酪藥特靈 第154頁

血清治療

'Streptoserin'
鍊球菌血清精 第168頁

局部洗漱

'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁

'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁

'Surfen' 蘇芬 第144頁

止痛消炎

'Dolantin' 度冷丁 第90頁

'Pyramidon'
霹藍米藤 第130頁

Angiospasms 血管痙攣

解痙劑

'Padutin' 保妥耐 第118頁

'Lacarnol' 來克諾 第104頁

解痙及鎮靜劑

'Dolantin' 度冷丁 第90頁

'Jocapral'
局卡潑拉 第102頁

'Theominal'
梯烏密拿 第144頁

'Luminalettes'
盧蜜拿粒吞 第108頁

'Prominalettes'
普蜜拿粒吞 第126頁

Anguilluliasis 醋鯁蟲症

'Yatren' 藥特靈 第152頁

'Salvarsan'
六〇六劑 第134頁

Ankylostomiasis

十二指腸蟲

'Seretin' 賽雷丁 第138頁

'Bedermin'
貝代明 第80頁

分類用藥表

Anorexia 食慾缺乏

'Acidol'-Pepsin 阿即多耳配符新	第 72 頁
Insulin "Bayer" 因蘇林	第 102 頁
'Campolon' 康巴隆	第 82 頁
'Campoferron' 康巴飛樂	第 82 頁
培補劑	
'Bioferol' 百福祿	第 80 頁
'Tonophosphan' 託拿福賜芬	第 146 頁

Aortitis 大動脈弓炎

參看 Aneurysm, aortic
第 12 頁

Appendicitis, perforated

盲腸炎潰穿

Anti-Peritonitis Serum 'Behring'	
(貝靈)腹膜炎血清	第 165 頁
'Rivanol' 雷佛奴耳	第 132 頁

Arhythmia, nervous

脈搏不規正

'Abasin' 亞保心	第 72 頁
'Adalin' 阿特靈	第 72 頁

Arteriosclerosis 動脈硬化

荷爾蒙治療解痙劑	
'Padutin'保妥耐	第 118 頁
'Lacarnol'來克諾	第 164 頁
普通解痙劑	
'Jocapral' 局卡澄拉	第 102 頁
'Theominal' 梯烏密拿	第 144 頁
'Luminalettes' 盧蜜拿粒吞	第 108 頁
碘劑治劑	
'Sajodin' 洒乍錠	第 134 頁
'Entodon'恩託同	第 92 頁

Arthritis deformans

變狀性關節炎

刺激治療

'Yatren'-Casein 乳酪藥特靈	第 154 頁
--------------------------	---------

止痛

'Dolantin'度冷丁	第 90 頁
---------------	--------

止痛消炎

'Novalgin' 羅瓦而精	第 114 頁
'Pyramidon' 霹藍米藤	第 130 頁
'Aspirin' 阿司匹靈	第 76 頁
'Gardan'加當	第 98 頁
'Compral'康普樂	第 86 頁

分類用藥表

Arthritis, endocrine

內分泌失職性關節炎

- 'Prolan' 補奴郎 第124頁
 'Preloban' 百樂朋 第124頁
 'Cyren' B 西冷B 第88頁
 'Cyren' Ointment
 西冷油膏 第88頁
 'Unden' 溫敦 第148頁
 'Erugon' 安樂根 第94頁
 荷爾蒙治療
 'Elityran'
 益利特靈 第92頁
 'Padutin' 保妥耐 第118頁

Arthritis, gonorrhoeal

白濁性關節炎

化學治療

- 'Uleron' and 'Neo-Uleron'
 烏利龍, 新烏利龍 第148頁
 'Trypaflavine'
 脫呂帕弗拉文 第146頁

漿苗治療

- 'Gonargin' 果乃金 第164頁
 Mixed Gonorrhoeal
 Vaccine 'Behring'
 「貝靈」白濁混合漿苗
 第164頁

- Gono-'Yatren'
 白濁藥特靈 第164頁
 'Toxogon'
 托克素剛 第170頁

局部治療

- 'Protargol'
 普泰哥 第128頁

- 'Albargin'
 亞爾敗近 第74頁

- 'Trypaflavine'
 脫呂帕弗拉文 第146頁
 治療白濁膿漏眼

- 'Neo-Uleron,' 'Uleron'
 新烏利龍, 烏利龍 第112頁
 'Protargol', 'Albargin'
 普泰哥, 亞爾敗近 第128頁
 泌尿系消毒劑

- 'Helmitol'
 海而密妥 第98頁

Arthritis, rheumatic

婁麻質斯性關節炎

- 'Dolantin' 度冷丁 第90頁

- 'Novalgin'
 羅瓦而精 第114頁

- 'Aspirin'
 阿司匹靈 第76頁

- 'Pyramidon'
 霹藍米藤 第130頁

- 'Prontosil'
 百浪多息 第128頁

- 'Gardan' 加當 第98頁
 'Compral' 康普樂 第86頁

提高一般抵抗力

- 'Omnadin'
 握姆納丁 第165頁

- 'Yatren'-Casein
 乳酪藥特靈 第154頁

局部治療

- 'Jothion'
 乍鐵紅液, 或油 第104頁

- 'Spirosal'
 斯必路色溶液 第142頁

分類用藥表

Arthritis, septic

敗血性關節炎

'Prontosil'	
百浪多息	第128頁
'Trypaflavine'	
脫呂怕弗拉文	第146頁
'Rivanol'	
雷佛奴耳	第132頁
'Surfen' 蘇芬	第144頁

Arthrography

關節 X 光攝影

Per-'Abrodil'	
辦阿保羅的	第120頁

Ascariasis 蛔蟲

'Bedermin'	
貝代明	第80頁

Ascites 腹水

'Salyrgan' 洒利永	第136頁
'Elityran'	
益利特靈	第92頁

Asphyxia 窒息

'Icoral' 伊可賴	第100頁
'Racedrin'	
拉西特靈	第130頁

Asthenia 衰弱, 無力

'Cortenil' 可得寧	第86頁
'Iliren' 意利倫	第100頁
'Preloban' 百樂朋	第124頁

Asthma, bronchial

氣管枝性氣喘

碘劑治療

'Entodon' 恩託同	第92頁
'Sajodin' 洒乍錠	第134頁
'Jocapral'	
局卡潑拉	第102頁

減除發作

'Racedrin'	
拉西特靈	第130頁
'Hypophysin'	
赫破弗辛	第100頁
'Suprarenin'	
蘇潑拉來寧	第142頁

減除發作之原因

'Selvoral'	
色而伐納	第138頁
'Pyramidon'	
霹藍米蘇	第130頁
'Adalin' 阿特靈	第72頁

改正變態反應

'Torantil' 多能體	第146頁
'Campolon'	
康巴隆	第82頁

Asthma, cardiac

心臟性氣喘

參看 Angina pectoris	
狹心症	第12頁

Atony, intestinal

腸壁弛緩

'Hypophysin'	
赫破弗辛	第100頁

分類用藥表

<p><u>Atony, uterine</u> 子宮弛緩</p> <p>‘Orasthin’ 卧禱定 第116頁</p> <p>‘Hypophysin’ 赫破弗早 第100頁</p> <p>‘Gravitol’ 格樂維妥 第98頁</p> <p><u>Balanitis</u> 龜頭炎</p> <p style="padding-left: 40px;">消毒用</p> <p>‘Rivanol’ 雷佛奴耳 第132頁</p> <p>‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文 第146頁</p> <p>‘Surfen’ 蘇芬 第144頁</p> <p style="padding-left: 40px;">麻醉止痛用</p> <p>‘Anaesthesin’ 阿那難信 第74頁</p> <p><u>Bang's infection</u> 彭氏症</p> <p>‘Prontosil’ 百浪多息 第128頁</p> <p>‘Omnadin’ 握姆納丁 第165頁</p> <p>‘Pyramidon’ 霹藍米藤 第130頁</p> <p><u>Beri-beri</u> 腳氣病</p> <p>‘Betaxin’ 倍他生 第80頁</p> <p><u>Bilharziasis</u> 住血蟲病</p> <p>‘Fouadin’ 福錦 第96頁</p> <p><u>Biliary Colic</u> 膽囊膽道病</p> <p>參看 Chololithiasis (膽石症) 第21頁</p>	<p><u>Blackwater fever</u> 黑水熱</p> <p>‘Atebrin’ 阿的平 內服或注射 第76頁</p> <p><u>Blepharospasms</u> 眼瞼痙攣</p> <p style="padding-left: 40px;">局部麻醉</p> <p>‘Pantocain’ 本妥卡因 第118頁</p> <p><u>Blood pressure, decrease</u> in 血壓過低</p> <p>參看 Hypotonia 第39頁</p> <p><u>Bronchiectasis</u> 枝氣管擴張</p> <p style="padding-left: 40px;">化痰劑</p> <p>‘Cresival’ 克利西佛 第88頁</p> <p>‘Guaiacose’ 庫阿可斯 第98頁</p> <p style="padding-left: 40px;">使氣管中分泌物稀薄</p> <p>‘Entodon’ 恩託同 第92頁</p> <p>‘Sajodin’ 洒乍錠 第134頁</p> <p>‘Selvorol’ 色而伐納 第138頁</p> <p>‘Prontosil’ soluble 百浪多息液 第128頁</p> <p><u>Bronchitis</u> 氣管枝炎</p> <p style="padding-left: 40px;">提高抵抗力</p> <p>‘Omnadin’ 握姆納丁 第165頁</p>
---	---

分類用藥表

化 痰

‘Cresival’ 克利西佛	第 88 頁
‘Guaiacose’ 庫阿可斯	第 98 頁
使氣管中分泌物稀薄	
‘Selvoral’ 色而伐納	第 138 頁
解除氣管痙攣	
‘Racedrin’ 拉西特靈	第 130 頁
使氣管中分泌物稀薄	
‘Entodon’ 恩託同	第 92 頁
‘Sajodin’ 乍錠錠	第 134 頁
‘Jothion’ 乍錠錠	第 104 頁
‘Prontosil’ soluble 百浪多息液	第 128 頁

Bronchopneumonia

氣管枝性肺炎

‘Suprifen’ 蘇潑立芬	第 142 頁
‘Icoral’ 伊可賴	第 100 頁
提高抵抗力	
Pneumococcus Vaccine	
‘Behring’ 「貝靈」氣管枝性肺炎菌漿 苗	第 167 頁
‘Omnadin’ 握姆納丁	第 165 頁
血清治療	
Anti-Pneumococcus- Serum ‘Behring’ 「貝靈」肺炎球菌血清	第 167 頁

化 痰 劑

‘Cresival’ 克利西佛	第 88 頁
消炎退熱劑	
‘Novalgin’-Quinine 雞納羅瓦而精	第 114 頁
‘Pyramidon’ 霹靂米藤	第 130 頁
‘Novalgin’ 羅瓦而精	第 114 頁
‘Gardan’ 加當	第 98 頁

Buerger’s disease

栓塞性血管炎

參看 Endarteritis 第 30 頁

Burns 燙傷

‘Cortenil’ 可得寧	第 86 頁
‘Iliren’ 意利命	第 100 頁
‘Vogan’ 復康	第 152 頁
止 痛 劑	
‘Compral’ 康普樂	第 86 頁
‘Gardan’ 加當	第 98 頁
‘Novalgin’ 羅瓦而精	第 114 頁
局部應用防治化膿	
‘Rivanol’ 雷佛奴耳	第 132 頁
‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文	第 146 頁
‘Surfen’ 蘇芬	第 144 頁
促進傷處速癒	
‘Padutin’ 保安酞	第 118 頁

分類用藥表

<p style="text-align: center;">生皮劑</p> <p>'Pellidol' Ointment 北里多油膏 第120頁</p> <p>Bursitis 粘液囊炎</p> <p style="padding-left: 2em;">提高一般抵抗力</p> <p>'Omnadin' 握姆納丁 第165頁</p> <p style="padding-left: 2em;">塗搽於患處</p> <p>'Jothion', 'Jothion' Oil, 'Jothion' Solution 乍鉄紅製劑 第104頁</p> <p>Cachexia 參看 Asthenia</p> <p style="padding-left: 2em;">衰弱無力 第16頁</p> <p>Cachexia, Simmond's</p> <p style="padding-left: 2em;">西門氏惡液質</p> <p>'Preloban' 百樂朋 第124頁 'Cortenil' 可得寧 第86頁 'Iliren' 意利命 第100頁 'Prolan' 補奴郎 第124頁</p> <p>Calculus, urinary and vesical</p> <p style="padding-left: 2em;">腎結石, 膀胱結石</p> <p style="padding-left: 4em;">X 光攝影用</p> <p>Per-'Abrodil' 辦阿保羅的 第120頁</p> <p style="padding-left: 2em;">泌尿系消毒尤宜於鹼性小便者</p> <p>'Prontosil' 百浪多息 第128頁</p>	<p>'Helmitol' 海而密妥 第98頁</p> <p>'Amphotropin' Tablets 安夫脫羅米片 第74頁</p> <p>'Amphotropin' Solution 安夫脫羅米注射液 第74頁</p> <p style="text-align: center;">止痛藥石用</p> <p>'Novalgin' 羅瓦而精 第114頁</p> <p>'Dolantin' 度冷丁 第90頁</p> <p>'Hypophysin' 赫破弗罕 第100頁</p> <p style="padding-left: 2em;">如需要脊髓麻醉可用</p> <p>'Novocain' or 'Pantocain' 奴佛客因或本妥卡因 第116頁</p> <p style="text-align: center;">預防用</p> <p>'Vogan' 復康 第152頁</p> <p>Carbuncle 癰疽</p> <p style="padding-left: 2em;">參看 Furunculosis 第33頁</p> <p>Carcinoma 癌症</p> <p style="text-align: center;">止痛劑</p> <p>'Dolantin' 度冷丁 第90頁</p> <p>'Novalgin' 羅瓦而精 第114頁</p> <p>'Luminal' Solution 盧蜜拿 第108頁</p> <p>'Compral' 康普樂 第86頁</p> <p>'Gardan' 加當 第98頁</p> <p>'Pyramidon' 霹藍米藤 第130頁</p>
---	--

分類用藥表

Cardiac insufficiency

心臟機能不全

- 'Suprifen'
蘇潑立芬 第142頁
- 'Salyrgan' 洒利永 第136頁
- 'Optarson'
奧柏泰純 第116頁
- 'Tonophosphan'
託拿福賜芬 第146頁
- 'Lacamol' 來克諾 第104頁

Cardiac neurosis

心臟神經失職

鎮靜劑

- 'Adalin' 阿特靈 第72頁
- 'Luminalettes'
盧蜜拿粒吞 第108頁
- 'Prominalettes'
普蜜拿粒吞 第126頁
- 解痙調整血管痙攣劑
- 'Lacamol' 來克諾 第104頁
- 'Theominal'
梯烏密拿 第144頁
- 'Coffeminal'
咖啡蜜拿 第86頁

Catarrh, intestinal

腸消化失職

收斂殺菌

- 'Eldoform'
愛兒杜方 第92頁
- 'Rivanolettes'
雷佛奴耳粒吞 第132頁

'Yatren' Pills

藥特靈丸 第154頁

消化不良

- 'Acidol'-Pepsin
阿即多耳配符新 第72頁
- 'Festal' 凡食泰 第96頁

Chancre 下疳 參看

下疳及 Syphilis 第62頁

Chancroid 軟性下疳

化學治療

'Uleron', Neo-'Uleron'
烏利龍及新烏利龍 第148頁

注射於患處週圍

- 'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁
- 'Yatren' Sol.
藥特靈液 第152頁

局部治療

- 'Albargin'
亞耳敢近 第74頁
- 'Protargol'
普泰哥 第128頁
- 'Trypaflavine'
脫呂帕弗粒文 第146頁
- 'Surfen' 蘇芬 第144頁

Chilblains 凍瘡

參看 Pernio 凍傷 第52頁

Chlorosis 萎黃症

參看 Anaemia 第11頁

分類用藥表

Cholangitis, Cholecystitis

Cholelithiasis

膽道炎, 膽囊炎, 膽石症

診斷及驅石用

'Hypophysin'
赫破弗辛 第100頁

利膽及殺菌消毒用

'Prontosil'
百浪多息 第128頁

'Choleflavin'
利膽弗拉文 第84頁

'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁

'Amphotropin' Solution
安夫脫羅米液 第74頁

此外

'Torantil'
多能體 第146頁

止痛而避免嗎啡

'Dolantin'
度冷丁 第90頁

'Novalgin'
羅瓦而精 第114頁

'Compral' 康普樂 第86頁

'Gardan' 加當 第98頁

'Pyramidon'
霹藍米藤 第130頁

預防結石

'Vogan' 復康 第152頁

Cholera 霍亂

Cholera Vaccine 'Behring'
「貝靈」霍亂漿苗 第160頁

Cholera nostras 歐洲霍亂

參看 Catarrh, intestinal
腸炎 第20頁

Chorea minor

麻痺性舞蹈病

鎮靜劑

'Luminalettes'
盧蜜拿粒吞 第108頁

'Luminal' 盧蜜拿 第106頁

'Pyramidon'
霹藍米藤 第130頁

'Adalin' 阿特靈 第72頁

砒劑治療

'Solarson' 所拉純 第138頁

'Spirocid'
斯砒螺刺脫 第140頁

'Neosalvarsan'
新六〇六(新洒爾佛散) 第134頁

Choroiditis 脈絡膜炎

普遍刺激治療

'Omnadin'
握姆納丁 第165頁

增進攝收

'Entodon' 恩託同 第92頁

'Sajodin' 洒乍錠 第134頁

消炎劑

'Selvoral'
色而伐納 第138頁

利尿

'Salyrgan' 洒利承 第136頁

分類用藥表

<p>Circulatory weakness <u>循環系衰弱</u> 參看 Cardiac insufficiency 第20頁</p>	<p>'Gardan' 加當 第98頁 'Novalgin' 羅瓦而精 第114頁</p>
<p>Claudication, inter- <u>mittent</u> 間歇性跛行症</p>	<p>Colic 痲痛 參看 Spasms, intestinal 第60頁</p>
<p>'Padutin' 保妥而 第118頁 'Lacarnol' 來克諾 第104頁 'Theominal' 梯烏密拿 第144頁 'Luminalettes' 盧蜜拿粒吞 第108頁 'Entodon' 恩託同 第92頁 'Sajodin' 洒乍錠 第134頁 'Jocapral' 局卡潑拉 第102頁</p>	<p>Colitis, ulcero - mem- <u>branous</u> 潰瘍性粘膜性 <u>大腸炎</u> 'Torantil' 多能體 第146頁 'Yatren' 藥特靈 第152頁 'Rivanol' 雷佛奴耳 第132頁 酵素治療 'Festal' 凡食泰 第96頁</p>
<p>Climatic bubo 氣候性橫痃 參看 Lymphogranuloma inguinale 第44頁</p>	<p>Collapse 虛脫, 猝中</p>
<p>Climacteric distur- <u>bances</u> 絕經期症候</p>	<p>'Suprifen' 蘇潑立芬 第142頁 'Icoral' 伊可賴 第100頁 'Racedrin' 拉西特靈 第130頁 'Suprarenin' 蘇潑拉來寧 第142頁</p>
<p>'Uden' 溫敦 第148頁 'Cyren' B 西冷 B 第88頁 'Preloban' 百樂朋 第124頁 'Theominal' 梯烏密拿 第144頁 'Jocapral' 局卡潑拉 第102頁 'Luminalettes' 盧蜜拿粒吞 第108頁 'Prominalettes' 普蜜拿粒吞 第126頁 'Compral' 康普樂 第86頁</p>	<p>Colon, idiopathic dilata- <u>tion</u> 原發性結腸肥大症 'Hypophysin' 赫破弗辛 第100頁 'Istizin' 一試滌淨 第102頁</p>
	<p>Colpitis 陰道炎 參看 Leucorrhoea 第42頁</p>

分類用藥表

Condyloma acuminatum

尖頭疣贅

- 'Pellidol' Ointment 北里
多油膏(現成) 第120頁
'Tumenol'-Ammonium
土門奴耳-銨 第148頁

Conjunctivitis 結膜炎

- 'Prontosil' soluble
百浪多息液 第128頁
'Protargol'
普泰哥 第128頁
'Albargin'
亞爾跋近 第74頁

滴眼時可略佐以奴佛客因

- 'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁
'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁

麻醉及止癢

- 'Pantocain'
本妥卡因 第118頁

普遍刺激治療劑

- 'Yatren'-Casein
乳酪藥特靈 第154頁

Constipation 便秘

通便瀉劑

- 'Istizin'
一試蔴淨 第102頁

腸壁麻痺

- 'Hypophysin'
赫破弗辛 第100頁

腸壁痙攣

- 'Dolantin'度冷丁 第90頁
'Pyramidon'
霹藍米藤 第130頁
'Rivanolettes'
雷佛奴耳粒吞 第132頁

Constitutional distur- bances 體質障礙

- 'Elityran'
益利特靈 第92頁
'Preloban'百樂朋 第124頁

Coronary sclerosis

心冠動脈硬化 參看

Arteriosclerosis 第14頁

Coxitis 股關節炎

參看 Arthritis 第14頁

由發育障礙引起之股關節炎

- 'Vigantol'維剛妥 第152頁
'Detavit'特太肥 第88頁

Cretinism 克汀病 參看

Myxoedema 第47頁

Cystitis 膀胱炎

- 'Prontosil'
百浪多息 第128頁

Antipyogen 'Behring'
[貝靈]化膿菌抗素
第160頁

- 'Amphotropin' Solution
安夫脫羅冰溶液 第74頁

分類用藥表

<p>泌尿系內部消毒劑。</p> <p> 驗性尿者亦有效</p> <p>‘Helmitol’ 海而密妥 第 98 頁</p> <p> 葡萄球菌性膀胱炎</p> <p>‘Spirocid’ 斯砥傑刺脫 第 140 頁</p> <p> 大腸菌性膀胱炎</p> <p>‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文 第 146 頁</p> <p> 沖洗膀胱用</p> <p>‘Zephiran’ 賜福露 第 156 頁</p> <p>‘Rivanol’ 雷佛奴耳 第 132 頁</p> <p>‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文 第 146 頁</p> <p>‘Yatren’ 藥特壺 第 152 頁</p> <p>‘Protargol’ 普泰哥 第 128 頁</p> <p>‘Albargin’ 亞爾敗近 第 74 頁</p> <p> 出 血 時</p> <p>‘Suprarenin’ 注入膀胱 蘇澄拉來寧 第 142 頁</p> <p> 膀胱麻醉</p> <p>‘Pantocain’ 本妥卡因 第 118 頁</p> <p> 解除痙攣用</p> <p>‘Rivanol’ 雷佛奴耳 第 132 頁</p>	<p> 止 痛</p> <p>‘Dolantin’ 度冷丁 第 90 頁</p> <p>‘Pyramidon’ 霹藍米慈 第 130 頁</p> <p>‘Novalgin’ 羅瓦而精 第 114 頁</p> <p>‘Gardan’ 加當 第 98 頁</p> <p><u>Cystography 膀胱 X 攝影</u></p> <p>Per-‘Abrodil’ 辨阿保羅的 第 120 頁</p> <p><u>Dacryocystitis 淚囊炎</u></p> <p> 沖洗及點眼用</p> <p>‘Rivanol’ 雷佛奴耳 第 132 頁</p> <p>‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文 第 146 頁</p> <p>‘Albargin’ 亞爾敗近 第 74 頁</p> <p>‘Protargol’ 普泰哥 第 128 頁</p> <p><u>Decubitus 褥瘡</u></p> <p>‘Padutin’ 保妥而 第 118 頁</p> <p> 洗滌瘡口用消毒劑</p> <p>‘Rivanol’ 雷佛奴耳 第 132 頁</p> <p>‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文 第 146 頁</p> <p>‘Surfen’ 蘇芬 第 144 頁</p> <p>‘Zephiran’ 賜福露 第 156 頁</p>
--	---

分類用藥表

<p style="text-align: center;">油膏治療</p> <p>'Pellidol' Ointment 北里多油膏 第120頁</p> <p>'Rivanol' Ointment 雷佛奴耳油膏 第132頁</p> <p>'Trypaflavine' Ointment 晚呂帕弗拉文油膏 第146頁</p> <p style="text-align: center;">急處止痛用</p> <p>'Anaesthesin' 阿那雖信 第74頁</p> <p><u>Degeneration, subacute</u> <u>combined 亞急性合併脊</u> <u>髓變質(由於惡性貧血者)</u></p> <p>'Betaxin' 培他生 第80頁</p> <p><u>Dementia praecox</u> <u>早發性癡呆</u></p> <p style="text-align: center;">人工發熱治療</p> <p>Typhoid Vaccine 'Behring' 「貝靈」傷寒漿苗 第171頁</p> <p style="text-align: center;">治療休克</p> <p>Insulin »Bayer« 拜耳因蘇林 第102頁</p> <p>鎮靜及長時麻醉用</p> <p>'Avertin' 安穩酞 第78頁</p>	<p>'Evipan'-Sodium 鈉伊惟本 第96頁</p> <p>'Luminal' 盧蜜拿 第106頁</p> <p>'Luminal' Solution 盧蜜拿溶液 第108頁</p> <p>'Phanodorm', 'Phano- dorm'-Calcium 福眠錠, 福眠錠鈣 第120頁</p> <p>'Veronal', 'Veronal'- Sodium 維婁那耳, 鈉維婁那耳 第150頁</p> <p><u>Dengue 登革熱</u></p> <p style="text-align: center;">提高一般抵抗力</p> <p>'Omnadin' 握姆納丁 第165頁</p> <p>'Yatren'-Casein 乳酪藥特靈 第154頁</p> <p style="text-align: center;">退熱止痛</p> <p>'Novalgin' 羅瓦而精 第114頁</p> <p>'Novalgin'-Quinine 鷄納羅瓦而精 第114頁</p> <p>'Pyramidon' 齊藍米藤 第130頁</p> <p>'Aspirin' 阿司匹靈 第76頁</p>
--	---

分類用藥表

Depression, states of

憂鬱沉悶

'Adalin', 'Abasin'	
阿特靈, 亞保心	第 72 頁
'Evipan'	
伊惟本	第 94 頁
'Luminal'	
盧蜜拿	第 106 頁
'Luminalettes'	
盧蜜拿粒香	第 108 頁
'Prominalettes'	
普蜜拿粒香	第 126 頁
'Phanodorm'	
福眠錠	第 120 頁
'Veronal', 'Veronal'-	
Sodium	
維婁那耳, 鈉維婁那耳	第 150 頁

培 補 用

'Bioferol'	
百福祿	第 80 頁
'Optarson'	
奧拍泰純	第 116 頁
'Solarson'	
所拉純	第 138 頁
'Tonophosphan'	
託拿福賜芬	第 146 頁
'Campolon'	
康巴隆	第 82 頁
'Campoferron'	
康巴飛樂	第 82 頁
荷爾蒙劑 (須各按病原 分別應用)	
'Prolan' 補奴郎	第 124 頁

'Preloban'

百樂朋	第 124 頁
'Unden' 溫敦	第 148 頁
'Cyren' B 西冷 B	第 88 頁
'Erugon'	
安樂根	第 94 頁
'Padutin'	
保妥耐	第 118 頁

Dermatitis herpetiformis

皰性皮膚炎 (Duhring 氏症)

"Bayer" 205	
拜耳二〇五	第 78 頁
'Solarson'	
所拉純	第 138 頁
'Spirocid'	
斯砒螺刺脫	第 140 頁

Diabetes insipidus 尿崩症

'Hypophysin'	
赫破非亭	第 100 頁
'Pyramidon'	
霹藍米藤 (藉以增加 荷爾蒙之作用)	第 130 頁

Diabetes mellitus 糖尿病

調整碳水化合物之新陳代謝

Insulin "Bayer"	
拜耳因蘇林	第 102 頁

血糖不足。用因蘇林葡萄
糖液靜脈注射用

'Suprarenin', for inj.	
蘇潑拉來寧	第 142 頁

分類用藥表

Diarrhoea 下瀉 參看
Catarrh, intestinal
 第 20 頁

Diathesis, exudative
 滲出性因素

‘Selvorol’
 色而伐納 第 138 頁

‘Vigantol’
 維剛妥 第 152 頁

‘Detavit’
 持太肥 第 88 頁

‘Vogan’ 復康 第 152 頁

‘Tonophosphan’
 托拿福賜芬 第 146 頁

Diphtheria 白喉

血清治療

Diphtheria Antitoxin
 ‘Behring’
 「貝靈」白喉抗毒素 第 161 頁

‘Streptoserin’
 「貝靈」鍊球菌血清精 第 168 頁

Diphtheria Prophylactic
 Al. F. T. ‘Behring’
 「貝靈」白喉預防素 (蟻醛解毒之白喉毒素) 第 162 頁

預 防

‘Panflavin’ Tablets
 旁弗拉文片 第 118 頁

‘Revasa’ Tablets
 利法撒錠 第 130 頁

洗 漱

‘Rivanol’
 雷佛奴耳 第 132 頁

‘Trypaflavine’
 脫呂帕弗拉文 第 146 頁
 培補調養

‘Betaxin’
 培他生 第 80 頁

‘Optarson’
 奧拍泰純 第 116 頁

‘Spirocid’
 斯砥螺刺脫 第 140 頁

Disinfection of the hands,
instruments and for
gynaecological pur-
poses 洗手, 器械消毒及婦
 科上之用

‘Zephirin’
 賜福露 第 156 頁

Dislocations 脫臼

藉使患處鬆弛

‘Novocain’
 奴佛容因 第 116 頁

‘Pantocain’
 本妥卡因 第 118 頁

‘Avertin’ 安穩爾 第 78 頁

‘Evipan’-Sodium
 鈉伊惟本 第 96 頁

Dropsy, cardiac and
renal 心臟腎臟性水腫

‘Salyrgan’
 洒利汞 第 136 頁

‘Elityran’
 益利特靈 第 92 頁

‘Campolon’
 康巴隆 第 82 頁

分類用藥表

Dysentery 痢疾

'Yatren' Pills 藥特靈丸	第154頁
'Spirocid' 斯砒禦刺脫	第140頁
'Rivanolettes' 雷佛奴耳粒吞	第132頁

Dysentery, amœbic

阿米巴 蟲 痢

'Rivanolettes' 雷佛奴耳粒吞	第132頁
'Rivanol' 雷佛奴耳	第132頁
'Yatren' Pills 藥特靈丸	第154頁
'Spirocid' 斯砒禦刺脫	第140頁

預 防 用

'Yatren' Pills 藥特靈丸	第154頁
------------------------	-------

Dysentery, bacillary 菌痢

血 清 治 療

Anti-Dysentery Serum 'Behring'	
「貝靈」痢疾血清	第162頁

化 學 治 療

'Yatren' 藥特靈	第152頁
'Rivanol' 雷佛奴耳	第132頁
'Eldoform' 愛兒杜方	第92頁

Dysidrosis 出汗困難

'Mitigal' 滅疥	第110頁
--------------	-------

Dysmenorrhœa 經痛, 經困

荷 爾 蒙 治 療

'Unden' 溫敦	第148頁
'Cyren' B 西冷B	第88頁
'Prolan' 補奴郎	第124頁
'Preloban' 百樂朋	第124頁

止 痛 解 痙

'Dolantin' 度冷丁	第90頁
'Compral' 康普樂	第86頁
'Gardan' 加管	第98頁
'Imp!etol' 應必妥	第102頁
'Novalgin' 羅瓦而精	第114頁
'Pyramidon' 辟藍米藤	第130頁

Dyspepsia 消化不良

'Acidol'-Pepsin 阿即多耳配符新	第72頁
'Hydronal' 益多納	第100頁
'Festal' 凡食泰	第96頁

Dyspnoea 呼吸困難

'Suprifin' 蘇澄立芬	第142頁
'Icoral' 伊可賴	第100頁
'Jocapral' 局卡潑拉	第102頁
'Racedrin' 拉西特靈	第130頁

分類用藥表

Dystrophia adiposo-

genitalis 尖端肥大症

'Preloban'
百樂朋 第124頁

亦可用下列合治

'Elityran'
益利特靈 第92頁

'Prolan' 補奴郎 第124頁

對於少女

'Unden' 溫敦 第148頁

'Cyren' B 西冷 B 第88頁

對於男童

'Erugon'
安樂根 第94頁

Eclampsia 子癇

'Cortenil'
可得寧 第86頁

'Luminal'
盧蜜拿 第106頁

'Avertin'
安穩面 第78頁

利尿

'Salyrgan'
洒利承 第136頁

Insulin »Bayer«
「拜耳」因蘇林 第102頁

Eczema 各種濕疹

'Omnadin'
握姆納丁 第165頁

局部治療

'Pellidol' Ointment
北里多油膏 第120頁

'Rivanol'

雷佛奴耳 第132頁

'Surfen' 蘇芬 第144頁

'Mitigal' 滅疥 第110頁

'Tumenol'-Ammonium

土門奴耳-銜 第148頁

'Anaesthesin'

阿那雖信 第74頁

'Albargin'

亞爾敢近 第74頁

'Protargol'

普泰哥 第128頁

'Afridol' Soap

阿非脫藥皂 第74頁

'Cyren' Ointment

西冷油膏 第88頁

內服治療

'Selvoral'
色而伐納 第138頁

'Vogan' 復康 第152頁

'Vigantol'

維剛妥 第152頁

Insulin »Bayer«

拜耳因蘇林 第102頁

'Optarson'

奧拍泰純 第116頁

'Solarson'

所拉純 第138頁

'Unden' 溫敦 第148頁

'Cyren' B 西 B 第88頁

治療變態反應

'Torantil'
多能體 第146頁

Emaciation 消瘦

參看 Alimentation 第11頁

分類用藥表

<p>Emphysema, pulmonary <u>肺氣腫</u></p> <p>‘Racedrin’ 拉西特靈 第130頁</p> <p>‘Entodon’ 恩託同 第92頁</p> <p>‘Sajodin’ 洒乍錠 第134頁</p> <p>‘Pyramidon’ 霹藍米藤 第130頁</p> <p>Empyema 蓄膿</p> <p style="padding-left: 2em;">提高一般抵抗力</p> <p>‘Omnadin’ 握姆納丁 第165頁</p> <p style="padding-left: 2em;">化學治療劑沖洗用</p> <p>‘Rivanol’ 雷佛奴耳 第132頁</p> <p>‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文 第146頁</p> <p>‘Surfen’ 蘇芬 第144頁</p> <p>Empyema of accessory <u>cavity 副腔蓄膿</u></p> <p>參看 Empyema 本 頁</p> <p>Encephalitis 大腦炎</p> <p style="padding-left: 2em;">化學治療</p> <p>‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文 第146頁</p> <p>‘Luminal’ 盧蜜拿 第106頁</p>	<p>Endarteritis 動脈內膜炎</p> <p>‘Padutin’ 保妥耐 第118頁</p> <p>‘Theominal’ 梯烏密拿 第144頁</p> <p>‘Luminalettes’ 盧蜜拿粒吞 第108頁</p> <p>‘Sajodin’ 洒乍錠 第134頁</p> <p>‘Entodon’ 恩託同 第92頁</p> <p>Endocarditis 心臟內膜炎</p> <p style="padding-left: 2em;">化學治療</p> <p>‘Prontosil’ 百浪多息 第128頁</p> <p>‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文 第146頁</p> <p style="padding-left: 2em;">此 外</p> <p>‘Aspirin’ 阿司匹靈 第76頁</p> <p>‘Novalgin’ 羅瓦而精 第114頁</p> <p>‘Pyramidon’ 霹藍米藤 第130頁</p> <p>‘Streptoserin’ 「貝靈」鏈球菌血清精 第168頁</p> <p>Endometritis 子宮內膜炎</p> <p>參看 Metritis 第46頁</p> <p style="padding-left: 2em;">止血及鑑別診斷用</p> <p>‘Uden’ 溫敦 第148頁</p> <p>‘Cyren’ B 西冷B 第88頁</p>
--	---

分類用藥表

Enuresis, nocturnal

夜尿症

- 'Hypophysin'
赫破弗辛 第100頁
- 'Optarson'
奧拍泰純 第116頁
- 'Prominalettes'
普蜜拿粒吞 第126頁
- 'Luminal', 'Luminalettes'
盧蜜拿, 盧蜜拿粒吞
第106頁

Epididymitis 副睪丸炎

- 參看 Gonorrhoea 第 35 頁
及
Tuberculosis 第 64 頁

Epilepsy 羊癇風

- 'Prominal'
普蜜拿 第126頁
- 'Coffeminal'
咖啡蜜拿 第 86 頁
- 'Luminal', 'Luminalettes'
盧蜜拿, 盧蜜拿粒吞
第106頁

小兒羊癇風

- 'Lacarnol'
來克諾 第104頁
- 'Padutin'
保妥耐 第118頁

在發作時

- 'Luminal' Sol.
盧蜜拿溶液 第108頁

Epistaxis 鼻衄

- 'Racedrin'
拉西特靈 第130頁
- 'Suprarenin'
蘇潑拉來寧 第142頁
- 'Cantan' 康泰 第 84 頁

Erysipeloid 類丹毒

提高一般抵抗力

- 'Omnadin'
握姆納丁 第165頁

血清治療

- 'Streptoserin'
「貝靈」鏈球菌血清精
第168頁

局部治療

- 'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁
- 'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁
- 'Tumenol'-Ammonium
土門奴耳-銨 第148頁

Erysipelas 丹毒

化學治療

- 'Prontosil'
百浪多息 第128頁

提高一般抵抗力

- 'Omnadin'
握姆納丁 第165頁
- 'Yatren'-Casein
乳酪藥特靈 第154頁

分類用藥表

血清漿苗治療

'Streptoserin'	
「貝靈」鍊球菌血清精	第168頁
Strepto-'Yatren'	
「貝靈」藥特靈鍊球菌漿苗	第169頁
Antipyrogenous 'Yatren'	
Vaccine 'Behring'	
藥特靈化膿菌混合漿苗	第160頁
'Rivanol' + 'Suprarenin'	
雷佛奴耳十蘇潑拉來寧	第132頁
'Jothion'	
乍鉄紅	第104頁

Erythema nodosum

結節性紅斑	
'Aspirin'	
阿司匹靈	第76頁
'Gardan'	
加當	第98頁

Exanthema (血清, 藥物中

毒之發疹)	
砒, 汞, 鉍劑中毒	
'Campolon'	
康巴隆	第82頁
'Cantan'	
康泰	第84頁
預防用	
'Torantil'	
多能體	第146頁

Excitement, conditions of

興奮, 怔忡, 不寧等	
'Adalin'	
阿特靈	第72頁
'Luminalettes'	
盧蜜拿粒吞	第108頁
'Prominalettes'	
普蜜拿粒吞	第126頁
'Luminal'	
盧蜜拿	第106頁
'Veronal'-Sodium	
鈉維莫那耳	第150頁
酞酞劑	
'Avertin'	
安穩酞	第78頁

Exsiccosis 急性水份缺乏

'Pyramidon'	
霹藍米藤	第130頁
Insulin «Bayer»	
拜耳因蘇林	第102頁

Favus 鬍鬚

'Afridol' Soap	
阿非脫藥皂	第74頁
'Tumenol'-Ammonium	
土門奴耳-鉍	第148頁
'Mitigal'	
滅疥	第110頁

Fever, relapsing 迴歸熱

'Neosalvarsan'	
新六〇六(新洒爾佛散)	第134頁
'Spirocid'	
斯砒螺刺脫	第134頁

分類用藥表

Fissure, anal 肛門破裂

局部治療

- 'Anæsthesin'
阿那維信 第74頁
- 'Tumenol'-Ammonium
土門奴耳-銜 第148頁

通便劑

- 'Istizin'
一試蔴淨 第102頁

Fistulæ, for the demon- stration of- X光漏管攝影

- Per-'Abrodil'
辨阿保羅的 第120頁

Flatulence 腸胃充氣

- 'Festal' 凡食泰 第96頁

Fractures 骨折

促進骨質遠長

- 'Cantan' 康泰 第84頁
- 'Vigantol'
維剛妥 第152頁
- 'Detavit'
特太肥 第88頁
- 'Selvorol'
色而伐納 第138頁
- 'Elityran'
益利特靈 第92頁

止痛

- 'Dolantin'
度冷丁 第90頁

'Compral'

康普樂 第86頁

'Novalgin'

羅瓦而精 第114頁

'Gardan' 加當 第98頁

Framboesia 熱帶莓狀腫

'Neosalvarsan'

新六〇六(新洒爾佛散)
第134頁

'Solu-Salvarsan'

聖露洒爾佛散 第136頁

'Spirocid'

斯砒螺刺脫 第140頁

鈹劑治療

'Casbis' 嘉色鈹 第84頁

Frigidity 陽萎性慾薄弱

'Prolan' 補奴郎 第124頁

有時需合併用

'Unden' 溫敦 第148頁

或

'Cyren' B 西冷B 第88頁

及

'Preloban'

百樂朋 第124頁

Furunculosis 瘡癤

化學治療

'Uleron' 烏利龍 第148頁

提高抵抗力

'Omnadin'

握姆納丁 第165頁

分類用藥表

漿 苗 治 療	
Antipyrogenous 'Yatren' Vaccine 'Behring'	
藥特靈化膿菌漿苗	第160頁
Staphylo-'Yatren'	
藥特靈葡萄狀球菌漿苗	第168頁
'Staphar'	
斯太法	第168頁
以 及	
'Uleron' Ointment	
烏利龍油膏	第148頁
'Prontosil'	
百浪多息	第128頁
'Rivanol'	
雷佛奴耳	第132頁
'Jothion'	
乍鉄紅	第104頁
'Tumenol'-Ammonium	
土門奴耳-銨	第148頁
'Zephiran'	
賜福露	第156頁
'Surfen' 蘇芬	第144頁
'Rivanol'	
雷佛奴耳	第132頁
'Novocain'	
奴佛客因	第116頁
'Trypaflavine'	
脫呂帕弗拉文	第146頁
'Campolon'	
康巴隆	第 82 頁
Insulin »Bayer«	
「拜耳」因蘇林	第102頁
'Vogan' 復康	第152頁

Gangrene, pulmonary	
<u>肺壞疽</u>	
'Neosalvarsan'	
新六〇六(新洒爾佛散)	第134頁
'Trypaflavine'	
脫呂帕弗拉文	第146頁
Gas gangrene 氣疽	
<u>血清治療</u>	
Anti-Gas Gangrene Serum 'Behring'	
「貝靈」氣性壞疽血清	第163頁
<u>化學治療</u>	
'Rivanol'	
雷佛奴耳	第132頁
'Trypaflavine'	
脫呂帕弗拉文	第146頁
'Yatren' 藥特靈	第152頁
Gastric crises of tabetic	
<u>脊髓癱之胃症狀</u>	
參看 Tabes dorsalis	第 62 頁
Gastric hæmorrhage	
<u>胃出血</u>	
參看 Hæmorrhage	第 36 頁
Gastritis, anacid	
<u>胃炎, 胃酸缺乏</u>	
'Acidol'-Pepsin	
阿即多耳配符新	第 72 頁
'Torantil'	
多能體	第146頁
'Vogan' 復康	第152頁

分類用藥表

Gastritis, hyperacid

胃炎，胃酸過多
 'Hydronal'
 益多納 第100頁
 'Torantil'
 多能體 第146頁
 'Vogan' 復康 第152頁

Gastroenteritis 腸胃炎

'Festal' 凡食泰 第96頁

Gingivitis 齒齦炎

參看 Stomatitis 第61頁

Goitre 地方性甲狀腺腫

參看 Myxoedema
 第47頁

Gonorrhoea 白濁

化學治療

'Uleron', 'Neo-Uleron'
 烏利龍，新烏利龍
 第148頁

漿苗治療

Gono-'Yatren'
 白濁藥特靈 第164頁
 'Gonargin'
 果乃金 第164頁
 Mixed Gonorrhoeal
 Vaccine 'Behring'
 「貝靈」白濁球菌混合漿苗
 第164頁
 'Toxogon'
 托克素剛 第170頁

局部治療

'Protargol' 普泰哥 第128頁
 'Albargin'
 亞爾敗近 第74頁

靜脈注射

'Trypaflavine'
 脫呂帕弗拉文 第146頁

眼白濁治療

'Uleron', 'Neo-Uleron'
 烏利龍，新烏利龍
 第148頁

'Uleron' Ointment
 烏利龍油膏 第148頁
 'Albargin'
 亞爾敗近 第74頁
 'Protargol' 普泰哥 第128頁

泌尿系消毒

'Helmitol'
 海而密妥 第98頁
 'Amphotropin'
 安夫脫羅冰 第74頁

Graves' disease 格拉夫氏

症，突眼性甲狀腺腫

調整新陳代謝

'Vogan' 復康 第152頁
 'Solarson' 所拉純 第138頁
 'Tonophosphan'
 託拿福賜芬 第146頁
 'Spirocid'
 斯砒擊刺脫 第140頁
 'Luminalettes'
 盧蜜拿粒吞 第108頁
 'Prominalettes'
 普蜜拿粒吞 第126頁

分類用藥表

<p style="text-align: center;">鎮 靜 用</p> <p>'Luminal' 盧蜜拿 第106頁</p> <p>Haemophilia 血友病 參看 Haemorrhagic diathesis 第37頁</p> <p>Haemorrhages, general <u>measures</u> 各種出血</p> <p>'Manetol' 孟納妥爾 第110頁</p> <p>'Selvoral' 色而伐納 第138頁</p> <p>'Campolon' 康巴隆 第82頁</p> <p>'Cantan' 康泰 第84頁</p> <p>Haemoptysis 咯血 參看本頁肺癆咯血</p> <p>Haemorrhage from the <u>bladder</u> 膀胱出血</p> <p>'Suprarenin' 蘇潑拉來寧 第142頁</p> <p>Haemorrhages, gynaeco- <u>logical</u> 參看 Menorrhagia 第46頁</p>	<p>Haemorrhages, in- <u>testinal</u> 腸出血</p> <p>'Eldoform' 愛兒杜方(收斂) 第92頁 大腸最下部出血用以灌腸</p> <p>'Suprarenin' 蘇潑拉來寧 第142頁</p> <p>'Racedrin' 拉西特靈 第130頁</p> <p>'Suprarenin' or 'Racedrin' 蘇潑拉來寧(痔瘡坐劑)或 拉西特靈 第142頁</p> <p>Haemorrhage, post- <u>partum</u> 產後出血過多</p> <p>'Gravitol' 格樂維妥 第98頁</p> <p>Haemorrhages, puberal 參看 Menorrhagia 第46頁</p> <p>Haemorrhage, pulmo- <u>nary</u> 肺癆, 咯血 參看 Tuberculosis 第64頁 平息症狀用</p> <p>'Luminal' Solution 盧蜜拿溶液 第108頁</p> <p>Haemorrhages, vitreous 玻璃體出血</p> <p>'Entodon' 恩託同 第92頁</p> <p>'Sajodin' 洒乍錠 第134頁</p>
--	--

分類用藥表

Haemorrhagic diathesis

出血性因素

'Manetol'	第110頁
孟納妥爾	
'Cantan' 康泰	第84頁
病後調補劑	
'Campolon'	第82頁
康巴隆	
'Campoferron'	第82頁
康巴飛樂	
'Selvoral'	第138頁
色而伐納	
'Vigantol'	第152頁
維剛妥	

Haemorrhoids 痔瘡

'Istizin'	第102頁
一試滌淨	
施於患處	
'Suprarenin'	第142頁
蘇潑拉來寧	
'Racedrin'	第130頁
拉西特靈	
'Anaesthesin'	第74頁
阿那維信	

Hands, disinfection of the

手部消毒

參看	第27頁
----	------

Hay fever 枯草熱

'Torantil'	第146頁
多能體	
'Campolon'	第82頁
康巴隆	

'Vogan' 復康	第152頁
------------	-------

'Racedrin'	第130頁
拉西特靈	

'Selvoral'	第138頁
色而伐納	

'Omnadin'	第165頁
握姆納丁	

'Novocain'-'Suprarenin'	第116頁
奴佛客因—蘇潑拉來寧	

'Pantocain'-'Suprarenin'	第118頁
本妥卡因—蘇潑拉來寧	

Headache 頭痛

'Aspirin'	第76頁
阿司匹靈	

'Cafaspin'	第82頁
康復之餅	

'Pyramidon'	第130頁
霹藍米藤	

'Coffeminal'	第86頁
咖啡蜜拿	

'Gardan' 加當	第98頁
-------------	------

'Compral'	第86頁
康普樂	

'Dolantin'	第90頁
度冷丁	

'Impletol'	第102頁
應必妥	

Herpes progentalis

· 包皮疱疹

'Afridol' Soap	第74頁
阿非脫藥皂	

'Mitigal' 滅疥	第110頁
--------------	-------

分類用藥表

Herpes tonsurans

斷髮癩疹	
'Afridol' Soap	
阿非脫藥皂	第 74 頁
'Mitigal' 滅疥	第 110 頁
'Rivanol'	
雷佛奴耳	第 132 頁
'Trypaflavine'	
脫呂帕弗拉文	第 146 頁

Herpes zoster 帶狀皰行症

'Betaxin'	
培地生	第 80 頁
'Anaesthesin' (製為油膏)	
阿那雖信	第 74 頁
止痛	
'Dolantin'	
度冷丁	第 90 頁
'Aspirin'	
阿司匹靈	第 76 頁
'Compral'	
康普樂	第 86 頁
'Gardan' 加當	第 98 頁
'Novalgin'	
羅瓦而精	第 114 頁
'Pyramidon'	
霹藍米藤	第 130 頁

Hiccough 呃逆

解痙鎮靜劑	
'Pantocain' Sol.	
本妥卡因溶液	第 118 頁

'Luminal'	
盧蜜拿	第 106 頁
'Luminalettes'	
盧蜜拿粒吞	第 108 頁
'Pyramidon'	
霹藍米藤	第 130 頁
'Adalin' 阿特靈	第 72 頁
'Compral'	
康普樂	第 86 頁

Hyperacidity of the

stomach 胃酸過多	
參看 Gastritis	第 34 頁

Hyperemesis gravi-

darum 妊娠嘔吐	
參看 妊娠期疾患	第 54 頁

Hyperhidrosis 出汗過多

'Afridol' Soap	
阿非脫藥皂	第 74 頁

Hypertonia 血壓過高

'Padutin'	
保妥耐	第 118 頁
'Theominal'	
梯烏密拿	第 144 頁
'Luminalettes'	
盧蜜拿粒吞	第 108 頁
'Prominalettes'	
普蜜拿粒吞	第 126 頁
'Adalin' 阿特靈	第 72 頁
'Pyramidon'	
霹藍米藤	第 130 頁

分類用藥表

碘劑治療

'Entodon'	恩託同	第 92 頁
'Jocapral'	局卡潑拉	第 102 頁
'Sajodin'	油乍錠	第 134 頁

Hypotonia 血壓低降

強心劑

'Suprifen'	蘇潑立芬	第 142 頁
'Racedrin'	拉西特靈	第 130 頁
'Suprarenin'	蘇潑拉來寧	第 142 頁

此外

'Preloban'	百樂朋	第 124 頁
'Tonophosphan'	託拿福賜芬	第 146 頁
'Iliren'	意大利命	第 100 頁
'Cortenil'	可得寧	第 86 頁

Hysteria

希司的里, 神經衰弱

'Adalin'	阿特靈	第 72 頁
----------	-----	--------

Icterus 黃膽

'Choleflavin'	(利膽)	第 84 頁
利膽弗拉文		
'Campolon'	康巴隆	第 82 頁

Insulin »Bayer«

拜耳因蘇林	第 102 頁
'Cortenil'	可得寧 第 86 頁
'Iliren'	意大利命 第 100 頁
止癢	
'Mitigal'	滅疥 第 110 頁

Ileus, post-operative

手術後絞腸症

參看腸壁弛緩	第 16 頁
--------	--------

Impetigo contagiosa

膿疱瘡

化學治療

'Prontosil'	百浪多息	第 128 頁
提高一般抵抗力		
'Omnadin'	提姆納丁	第 165 頁

外用

'Zephiran'	賜福靈	第 156 頁
'Surfen'	蘇芬	第 144 頁
'Uleron'	烏利龍油膏	第 148 頁
'Rivanol'	雷佛奴耳	第 132 頁
'Tumenol'-Ammonium	土門奴耳-銨	第 148 頁
'Mitigal'	滅疥	第 110 頁
'Pellidol'	北里多油膏	第 120 頁
'Afridol'	阿非脫藥皂	第 74 頁

分類用藥表

碘劑治療

‘Entodon’ 恩託同	第 92 頁
‘Jocapral’ 局卡潑拉	第 102 頁
‘Sajodin’ 洒乍錠	第 134 頁

Insulin «Bayer»

拜耳因蘇林	第 102 頁
‘Cortenil’ 可得寧	第 86 頁
‘Iliren’ 意利命	第 100 頁
止 癢	
‘Mitigal’ 滅疥	第 110 頁

Hypotonia 血壓低降

強 心 劑

‘Suprifin’ 蘇潑立芬	第 142 頁
‘Racedrin’ 拉西特靈	第 130 頁
‘Suprarenin’ 蘇潑拉來寧	第 142 頁

此 外

‘Preloban’ 百樂朋	第 124 頁
‘Tonophosphan’ 託拿福賜芬	第 146 頁
‘Iliren’ 意利命	第 100 頁
‘Cortenil’ 可得寧	第 86 頁

Hysteria

希司的里, 神經衰弱

‘Adalin’ 阿特靈	第 72 頁
--------------	--------

Icterus 黃膽

‘Choleflavin’ (利膽) 利膽弗拉文	第 84 頁
‘Campolon’ 康巴隆	第 82 頁

Ileus, post-operative

手術後絞腸症

參看腸壁弛緩	第 16 頁
--------	--------

Impetigo contagiosa

膿疱瘡

化 學 治 療

‘Prontosil’ 百浪多息	第 128 頁
提高一般抵抗力	

‘Omnadin’ 握姆納丁	第 165 頁
-------------------	---------

外 用

‘Zephiran’ 賜福露	第 156 頁
‘Surfen’ 蘇芬	第 144 頁
‘Uleron’ Ointment 烏利龍油膏	第 148 頁
‘Rivanol’ 雷佛奴耳	第 132 頁
‘Tumenol’-Ammonium 土門奴耳-銨	第 148 頁
‘Mitigal’ 滅疥	第 110 頁
‘Pellidol’ Ointment 非里多油膏	第 120 頁
‘Afridol’ Soap 阿非脫藥皂	第 74 頁

分類用藥表

Iridocyclitis rheumatica

婁麻質斯虹膜睫狀體炎

提高抵抗力

'Omnadin'
握姆納丁 第165頁

'Yatren'-Casein
乳酪藥特靈 第154頁

治療婁麻質斯

'Novalgin'
羅瓦而精 第114頁

'Aspirin'
阿司匹靈 第76頁

'Pyramidon'
辟藍米藤 第130頁

Kala-azar 黑熱病

參看'Leishmaniasis' 第41頁

Keratitis, parenchymat-

ous 角膜炎(主質性)

'Spirocid'
斯吡蝶刺脫 第140頁

'Salvarsan'
六〇六劑 第134頁

'Entodon' 恩託同 第92頁

'Salyrgan' 洒利永 第136頁

局部麻醉

'Pantocain'
本妥卡因 第118頁

Keratitis, pneumococcal

肺炎菌性角膜炎

Anti-Pneumococcus
Serum 'Behring'
「貝靈」肺炎球菌血清
第167頁

Keratomalacia 角膜軟化

'Vogan' 復康 第152頁

Kraurosis vulvæ

外陰乾枯

'Mitigal' 滅疥 第110頁

'Novocain' Sol. (滴劑)
奴佛容因液 第116頁

'Uden' 溫敦 第148頁

'Cyren' B 西冷B 第88頁

'Cyren' Ointment
西冷油膏 第89頁

Laryngitis 咽喉炎

'Cresival'
克利西佛 第88頁

麻醉用

'Anaesthesin'
阿那雅信 第74頁

'Novocain' + 'Suprarenin'
奴佛容因 + 蘇潑拉來寧
第116頁

'Pantocain'
本妥卡因 第118頁

(+蘇潑拉來寧)

Leishmaniasis

利什曼氏蟲病

1) Kala-azar 黑熱病

'Neostibosan'
新斯錫波霜 第112頁

'Solustibosan'
聖露斯錫波霜 第140頁

'Atebrin'
阿的平(注射) 第78頁

2) 皮膚利什曼氏蟲病

'Fouadin' 福錫 第96頁

'Neostibosan'
新斯錫波霜 第112頁

分類用藥表

Leprosy 麻風

- 'Antileprol'
安癩露 第 74 頁
'Fouadin' 福錄 第 96 頁

Leucorrhœa 白帶

局部治療

- 'Devegan' 代末剛 第 88 頁
'Zephiran' 賜福露 第 156 頁
'Surfen' 蘇芬 第 144 頁

一般治療

- 'Optarson'
奧拍泰純 第 116 頁
'Solarson' 所拉純 第 138 頁
'Tonophosphan'
託拿福賜芬 第 146 頁
'Vogan' 復康 第 152 頁
'Detavit' 特太肥 第 88 頁

Leukæmia 白血病

- 'Campolon'
康巴隆 第 82 頁
'Campoferron'
康巴飛樂 第 82 頁
'Cantan' 康泰 第 84 頁
'Solarson' 所拉純 第 138 頁
'Optarson'
奧拍泰純 第 116 頁
'Spiroid'
斯吡螺刺脫 第 140 頁
'Neosalvarsan'
新六〇六(新洒爾佛散)
第 134 頁

Libido, increased (nymphomania, priapism)

性慾過甚

- 'Adalin' 阿特靈 第 72 頁
'Luminalettes'
盧蜜拿粒吞 第 108 頁

Lichen ruber planus

紅平性苔癬

- 'Solarson' 所拉純 第 138 頁
'Spiroid'
斯吡螺刺脫 第 140 頁
'Tumenol'-Ammonium
土門奴耳-銜 第 148 頁
'Mitigal' 滅疥 第 110 頁

Lichen tropicus (prickly

heat) 癩子

- 'Afridol' Soap (永劑肥皂)
阿非脫藥皂 第 74 頁
'Mitigal' 滅疥 第 110 頁

Liver abscess, tropical

肝膿瘍, 阿米巴性

- 'Yatren' Pills
藥特靈丸 第 154 頁
'Rivanol'
雷佛奴耳 第 132 頁
'Rivanolettes'
雷佛奴耳粒吞 第 132 頁

Liver atrophy, acute

yellow 急性肝萎縮

- Insulin «Bayer»
「拜耳」因蘇林 第 102 頁
'Campolon'
康巴隆 第 82 頁

分類用藥表

Liver, cirrhosis of the

肝硬化症

解毒劑

- 'Torantil' 多能體 第146頁
 'Campolon'
 康巴隆 第82頁
 'Campoferron'
 康巴飛樂 第82頁
 'Vogan' 復康 第152頁

利尿劑

- 'Salyrgan' 洒利永 第136頁

Lumbago 腰部肌肉痛

- 'Aspirin'
 阿司匹靈 第76頁
 'Pyramidon'
 霹藍米藤 第130頁
 'Gardan'
 加當 第98頁
 'Novalgin'
 羅瓦而精 第114頁
 'Dolantin'
 度冷丁 第90頁
 'Impletol' 應必妥 第102頁

荷爾蒙治療

- 'Lacarnol' 來克諾 第104頁

Lumbar anaesthesia

脊髓麻醉

- 參看 Anæsthesia 第12頁

Lupus erythematosus

紅斑性狼瘡

- 'Trypaflavine'
 脫呂帕弗拉文 第146頁
 'Prontosil'
 百浪多息 第128頁
 'Antileprol'
 安癩露 第74頁

Lymphangitis 淋巴管炎

Lymphadenitis 淋巴腺炎

提高一般抵抗力

- 'Omnadin',
 捩姆納丁 第165頁

漿苗治療

- 'Yatren'-Casein
 乳酪藥特靈 第154頁
 Antipyrogenous 'Yatren'
 Vaccine 'Behring'
 藥特靈化膿菌混合漿苗 第160頁

化學治療

- 'Prontosil'
 百浪多息 第128頁
 'Trypaflavine'
 脫呂帕弗拉文 第146頁
 'Rivanol'
 雷佛奴耳 第132頁

外用

- 'Jothion' Sol.
 乍鐵紅溶液 第104頁
 'Tumenol'-Ammonium
 土門奴耳-銜 第184頁

分類用藥表

Lymphogranuloma

淋巴腺腫 (Hodgkin氏病)

化學治療

'Prontosil'
百浪多息 第128頁

砒劑治療

'Solarson'所拉純 第138頁

Lymphogranuloma, in-

guinal 熱帶淋巴腺腫 (又

稱第四種性病)

'Fouadin' 福錫 第96頁

'Neostibosan'
新斯錫波霜 第112頁

'Plasmoquine' Compound

百司母因複劑 第124頁

Quino-'Plasmoquine'

奎諾百司母因 第122頁

病後調理用

'Campolon'

康巴隆 第82頁

'Campoferron'

康巴飛樂 第82頁

'Solarson'所拉純 第138頁

'Optarson'

真拍泰純 第116頁

'Spirocid'

斯砒嚙刺脫 第140頁

'Tonophosphan'

託拿福賜芬 第146頁

'Bioferol' 百福祿 第80頁

Malaria 瘧疾

各型瘧疾之普通療法

'Atebrin' 阿的平 第76頁

'Atebrin' for injection

阿的平注射劑 第78頁

'Plasmoquine' Simplex

百司母因 第122頁

Quino-'Plasmoquine'

奎諾百司母因 第122頁

'Plasmoquine' Compound

百司母因複劑 第124頁

預防用

'Atebrin' 阿的平 第76頁

'Plasmoquine' Simplex

百司母因(純) 第122頁

Mastitis 乳房炎

化學治療

'Prontosil'

百浪多息 第128頁

'Uleron' 烏利龍 第148頁

止乳用

'Cyren'B 西冷B 第88頁

提高抵抗力

'Omnadin'

握姆納丁 第165頁

漿菌治療

Staphylo-'Yatren'

「藥特靈」葡萄狀球菌漿菌

第168頁

分類用藥表

局部治療

- 'Jothion' Oil, 'Jothion'
Sol. 卞鉄紅溶液,
卞鉄紅油 第104頁
- 'Uleron' Ointment
烏利龍油膏 第148頁
- 'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁
- 'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁
- 'Surfen' 蘇芬 第144頁

Measles 麻疹 (俗稱出痧子)

提高抵抗力

- 'Omnadin'
握姆納丁 第165頁

預防

- 'Panflavin' Tablets
旁弗拉文 第118頁
- 'Revasa' Tablets
利法撒 第130頁

退熱止痛

- 'Gardan' 加當 第98頁
- 'Pyramidon'
齊藍米藤 第130頁
- 'Novalgin'
羅瓦而精 第114頁
- 'Compral' 康普樂 第86頁

Melaena neonatorum

小兒黑糞

- 'Campolon'
康巴隆 第82頁
- 'Cantan' 康泰 第84頁
- 'Manetol'
孟納妥爾 第110頁

Melancholia 憂鬱症

參看 Depressions 第26頁

Ménière's disease

耳病性眩暈

- 'Padutin' 保妥耐 第118頁
- 'Luminal', 'Luminalettes',
盧蜜拿, 盧蜜拿粒吞
第108頁
- 'Luminal' Sod.
鈉盧蜜拿 第108頁
- 'Prominal', 'Prominal-
ettes' 普蜜拿,
普蜜拿粒吞 第126頁
- 'Coffeminal'
咖啡蜜拿 第86頁

Meningitis, epidemic

流行性腦膜炎

- 'Prontosil'
百浪多息 第128頁
- 'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁
- 'Amphotropin' Sol.
安夫脫羅冰溶液 第74頁
- 'Helmitol'
海而密妥 第98頁
- 提高一般抵抗力

- 'Omnadin'
握姆納丁 第165頁
- 止痛退熱

- 'Gardan' 加當 第98頁
- 'Pyramidon'
齊藍米藤 第130頁
- 'Novalgin'
羅瓦而精 第114頁
- 'Compral' 康普樂 第86頁

分類用藥表

預 防 用

'Panflavin' Tablets	
旁弗拉文	第118頁
'Revasa' Tablets	
利法撒片	第130頁
'Trypaflavine' Sol.	
脫呂怕弗拉文溶液	第146頁

Menorrhagia, Metrorrhagia 月經不調, 月經痛

荷 爾 蒙 治 療	
'Lutren' 路脫命	第108頁
'Prolan' 補奴郎	第124頁

止 血	
'Gravitol'	
格樂維妥	第98頁
'Tenosin' 胎孛星	第144頁
'Manetol'	
孟納妥爾	第110頁

補 血	
'Cantan' 康泰	第84頁
'Campolon'	
康巴隆	第82頁
'Campoferron'	
康巴飛樂	第82頁

Meteorism 鼓腸

'Festal' 凡食泰	第96頁
--------------	------

Metritis and Parametritis 子宮炎, 子宮旁炎

'Omnadin'	
握姆納丁	第165頁
'Yatren'-Casein	
乳酪藥特靈	第154頁
'Eufiamin'	
優弗拉明	第163頁
'Prontosil'	
百浪多息	第128頁

'Protargol'	
普泰哥	第128頁
'Albargin'	
亞爾敗近	第74頁
'Rivanol'	
雷佛奴耳	第132頁
'Surfen' 蘇芬	第144頁
'Jothion' 乍鉄紅	第104頁
'Gravitol'	
格樂維妥	第98頁
'Prolan' 補奴郎	第124頁

Metropathia hæmorrhagica 子宮出血病

'Lutren' 路脫命	第108頁
'Prolan' 補奴郎	第124頁

Metrorrhagia 子宮血崩

參看本頁 Menorrhagia

Migraine 偏頭痛

'Cafaspin'	
康復之餅	第82頁
'Aspirin'	
阿司匹靈	第76頁
'Pyramidon'	
齊藍米藤	第130頁
'Gardan' 加當	第98頁
'Dolantin' 度冷丁	第90頁
'Impletol' 應必妥	第102頁
'Compral' 康普樂	第86頁
'Novalgin'	
羅瓦而精	第114頁
'Coffeminal'	
咖啡蜜拿	第86頁
'Luminalettes'	
盧蜜拿粒吞	第108頁
'Prominalettes'	
普蜜拿粒吞	第126頁

分類用藥表

Möller-Barlow 氏症

參看 Scurvy 第 59 頁

Morphinism 嗎啡成癮

參看戒除鴉片 第 68 頁

Motor car-sickness 暈車

'Coffeminal'
咖啡蜜拿複劑 第 86 頁

Multiple sclerosis

多發性硬化症

'Campolon'
康巴隆 第 82 頁

'Neostibosan'
新斯錫波霜 第 112 頁

'Betaxin' 培他生 第 80 頁

'Dolantin' 度冷丁 第 90 頁

發熱療法

Typhoid Vaccine

'Behring'
「貝靈」傷寒漿苗 第 171 頁

Muscular tension

肌肉緊張

'Lacarnol' 來克諾 第 104 頁

Myalgia, rheumatic

肌肉婁麻質斯痛

'Lacarnol' 來克諾 第 104 頁

Mycosis 黴菌病

'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第 146 頁

'Rivanol'
雷佛奴耳 第 132 頁

'Surfen' 蘇芬 第 144 頁

'Entodon' 恩託同 第 92 頁

Myxoedema 粘液性水腫

'Elityran'
益利特靈 第 92 頁

'Sajodin' 洒乍錠 第 134 頁

'Entodon' 恩託同 第 92 頁

Naevus, juvenile 幼年斑痣

'Solarson' 所拉純 第 138 頁

Narcosis 麻醉

'Evipan'-Sodium
鈉伊惟本 第 96 頁

'Avertin' 安穩可 第 96 頁

Nephrolithiasis 腎石

參看 Calculus, urinary
第 19 頁

Nephrosis 腎病

'Salvrgan' 洒利永 第 136 頁

Neuralgia 神經痛

'Betaxin' 培他生 第 80 頁

'Dolantin' 度冷丁 第 90 頁

'Compral' 康普樂 第 86 頁

'Gardan' 加當 第 98 頁

'Novalgin'
羅瓦而精 第 114 頁

'Novalgin'-Quinine
雜納羅瓦而精 第 114 頁

'Pyramidon'
霹藍米藤 第 130 頁

'Aspirin'
阿司匹靈 第 76 頁

分類用藥表

Neurasthenia 神經衰弱

鎮 靜 用

- 'Adalin' 阿特靈 第 72 頁
'Pyramidon'
齊藍米簾 第 130 頁

安 眠 用

- 'Evipan' 伊准本 第 94 頁
'Phanodorm'
福眠錠 第 120 頁
'Adalin' 阿特靈 第 72 頁
'Luminal'
盧蜜拿 第 106 頁

荷 爾 蒙 治 療

- 'Erugon' 安樂根 第 94 頁
'Preloban' 百樂朋 第 124 頁
'Juvenin' 育維寧 第 104 頁

Neuritis 神經炎

- 'Betaxin'
培他生 第 80 頁
'Dolantin' 度冷丁 第 90 頁
'Compral'
康普樂 第 86 頁
'Gardan' 加當 第 98 頁
'Novalgin'
羅瓦而精 第 114 頁
'Aspirin'
阿司匹靈 第 76 頁
'Pyramidon'
齊藍米簾 第 130 頁

Noma 走馬疔

- 'Salvarsan'
洒爾佛散 第 134 頁
'Spirocid'
斯砒螺刺脫 第 140 頁
'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第 146 頁
Insulin »Bayer«
「拜耳」因蘇林 第 102 頁

Obesity 肥胖症

甲 狀 腺 機 能 不 足

- 'Elityran'
益利特靈 第 92 頁

腦 下 腺 機 能 不 足

- 'Preloban' 百樂朋 第 124 頁

合 併 治 療 用

- 'Unden' 溫敦 第 148 頁
'Cyren' B 西冷 B 第 88 頁
'Erugon' 安樂根 第 94 頁
'Elityran'
益利特靈 第 92 頁

驅 除 組 織 內 水 份

- 'Salyrgan' 洒利永 第 136 頁

Edema, pulmonary

肺 水 腫

- 'Salyrgan' 洒利永 第 136 頁
'Luminal' 盧蜜拿 第 106 頁
'Racedrin'
拉西特靈 第 130 頁
'Selvorol'
色而伐納 第 138 頁

分類用藥表

Oriental sore 東方癬

參看 Leishmaniasis
利什曼氏蟲病 第41頁

Osteomalacia 骨軟化症

維生素治療

'Vigantol' 維剛妥 第152頁
'Detavit'
持太肥 第88頁

鈣磷治療

'Selvorol'
色而伐納 第138頁
'Tonophosphan'
託拿福賜芬 第146頁

Osteomyelitis and

Osteitis 骨髓炎, 骨炎

化學治療

'Uleron'
烏利龍 第148頁
'Prontosil'
百浪多息 第128頁
'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁
'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁

漿苗血清治療

'Staphar' 斯太法 第168頁

增進抵抗功用

'Omnadin'
握姆納丁 第165頁

增進吸收用

'Jothion' 乍鐵紅 第104頁

調補用

'Tonophosphan'
託拿福賜芬 第146頁
'Vigantol' 維剛妥 第152頁
'Detavit' 持太肥 第88頁

Otitis media 中耳炎

化學治療

'Prontosil'
百浪多息 第128頁
'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁
'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁
'Surfen' 蘇芬 第144頁

增高抵抗力用

'Omnadin'
握姆納丁 第165頁
'Yatren'-Casein
乳酪藥特靈 第154頁
'Zephiran' 賜福露 第156頁
'Jothion' 乍鐵紅 第104頁
'Yatren' Sol.
藥特靈溶液 第152頁

表面麻醉用

'Pantocain'
本妥卡因 第118頁
'Anaesthesin'
阿那維信 第74頁
'Novocain'
奴佛客因 第116頁

Ovarian insufficiency

卵巢失職

參看經閉 Amenorrhoea
第11頁

分類用藥表

Oxyuriasis 蛻蟲病

'Lubisan' 露冰山 第106頁

Ozaena 臭鼻

'Vigantol' 維剛妥 第152頁

'Detavit' 特太肥 第88頁

'Vogan' 復康 第152頁

'Entodon' 恩託同 第92頁

沖洗鼻部用

'Rivanol'

雷佛奴耳 第132頁

'Trypaflavine'

脫呂帕弗拉文 第146頁

'Yatren' 藥特靈 第152頁

Pains, lightning 閃痛

參看 Tabes 第62頁

Pancreatic insufficiency

Pancreatitis 胰腺炎及失職

'Festal' 凡食泰 第96頁

Pappataci fever 白蛉子熱

參看 Dengue fever
第25頁

Paralysis agitans

震顫癱瘓

鎮靜或催眠用

'Luminalettes'

盧蜜拿粒吞 第108頁

'Luminal' 盧蜜拿 第106頁

'Veronal', 'Veronal'-Sod.

維婁那耳 鈉維婁那耳

第150頁

砒劑治療

'Solarson' 所拉純 第138頁

'Spirocid'

斯砒螺劇脫 第140頁

Paranoia 偏執狂

發熱療法

Typhoid Vaccine

'Behring'

「貝靈」傷寒漿苗 第171頁

'Luminal' 盧蜜拿 第106頁

'Veronal', 'Veronal'-Sod.

維婁那耳 鈉維婁那耳

第150頁

'Phanodorm', 'Phano-

dorm'-Calcium

福眠錠

福眠錠鈣 第120頁

'Avertin' 安穩酞 第78頁

Paratyphoid 副傷寒

Typhoid-Paratyphoid

Vaccine 'T.A.B.' 'Behring'

「貝靈」傷寒副傷寒混合漿

苗 第171頁

'Trypaflavine'

脫呂帕弗拉文 第146頁

'Pyramidon'

霹藍米藤 第130頁

Parotitis, epidemic

流行性腮腺炎

預防用

'Panflavin' Tabl.

旁弗拉文 第118頁

'Revasa' Tabl.

利法撒片 第130頁

分類用藥表

提高抵抗力用

‘Omnadin’ 握姆納丁	第165頁
‘Yatren’-Casein 乳酪藥特靈	第154頁
砒劑治療	
‘Spirocid’ 斯砒螺刺脫	第140頁
‘Salvarsan’ 洒爾佛散	第134頁
增進攝收	
‘Jothion’, ‘Jothion’ Oil, ‘Jothion’ Sol. 乍鐵紅, 乍鐵紅油, 乍鐵紅 溶液	第104頁

Parturient weakness

分娩無力

參看 Atony, uterine
第17頁

Pediculosis pubis 陰毛蝨

‘Mitigal’ 滅疥	第110頁
‘Afridol’ Soap 阿非脫藥皂	第74頁

Pemphigus 天施瘡

‘Bayer’ 205 ‘Germanin’ 拜耳二〇五	第78頁
‘Neosalvarsan’ 新洒爾佛散	第134頁
‘Spirocid’ 斯砒螺刺脫	第140頁
‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文	第146頁
‘Prontosil’ 百浪多息	第128頁

‘Pellidol’ Ointment
北里多油膏 第120頁

Pericarditis 心包膜炎

婁麻質斯性者

‘Aspirin’ 阿司匹靈	第76頁
‘Novalgin’ 羅瓦而精	第114頁
‘Gardan’ 加當	第98頁
‘Pyramidon’ 霹藍米露	第130頁
增進攝收用	
‘Entodon’ 恩託同	第92頁
‘Jothion’, ‘Jothion’ Oil, ‘Jothion’ Sol.	第104頁

乍鐵紅劑	第104頁
‘Sajodin’ 洒乍錠	第134頁
‘Suprifin’ 蘇潑立芬	第142頁

Perimetritis 子宮週圍炎

參看 Metritis 第46頁

Periodontitis alveolaris,

Periostitis alveolaris

齒齦炎, 齒齦骨膜炎

局部消毒用

‘Yatren’ 藥特靈	第152頁
‘Rivanol’ 雷佛奴耳	第132頁
‘Surfen’ 蘇芬	第144頁
‘Trypaflavine’ 脫呂帕弗拉文	第146頁
‘Jothion’ Sol. 乍鐵紅溶液	第104頁

分類用藥表

止痛用

- 'Combral' 康普樂 第86頁
 'Pyramidon'
 拜藍米藤 第130頁
 'Gardan' 加當 第98頁

砒劑治療

- 'Salvarsan'
 六〇六劑 第134頁
 'Spirocid'
 斯砒螺劑 第140頁

提高抵抗力用

- 'Omnadin'
 握姆納丁 第165頁

Peritonitis 腹膜炎

血清預防及治療

- Anti-Peritonitis Serum
 'Behring'
 「貝靈」腹膜炎血清 第165頁

化學治療

- 'Prontosil'
 百浪多息 第128頁
 'Rivanol'
 雷佛奴耳 第132頁
 'Trypaflavine'
 脫呂帕弗拉文 第146頁
 'Surfen' 蘇芬 第144頁
 'Icoral' 伊可賴 第100頁
 'Suprarenin'
 蘇潑拉來寧 第142頁
 'Salyrgan' 洒利永 第136頁
 Tuberculin 'Behring'
 結核菌素 第170頁
 'Jothion' 乍鐵紅 第104頁

Pernicious anaemia

惡性貧血

- 參看 Anaemia 第11頁

Pernio 凍瘡

局部治療

- 'Tumenol'-Ammonium
 土門奴耳-銜 第148頁
 'Anæsthesin'
 阿那維信 第74頁
 'Jothion' Sol.
 乍鐵紅溶液 第104頁
 'Pellidol' Ointment
 北里多油膏 第120頁

改進組織營養

- 'Padutin' 保妥而 第118頁

止痛

- 'Combral'
 康普樂 第86頁
 'Gardan'
 加當 第98頁
 'Novalgin'
 羅瓦而精 第114頁

Pertussis 百日咳

預防及初期治療用

- Pertussis Mixed Vaccine
 'Behring' 「貝靈」百日
 咳混合漿苗 第166頁
 'Phyantrin'
 飛散特靈 第166頁
 'Omnadin'
 握姆納丁 第165頁
 'Cresival'
 克利西佛 第88頁

分類用藥表

<p style="text-align: center;">解 瘰 用</p> <p>'Dolantin' 度冷丁 第 90 頁</p> <p>'Luminalettes'</p> <p>盧蜜拿粒吞 第 108 頁</p> <p>'Racedrin'</p> <p>拉西特靈 第 130 頁</p> <p style="text-align: center;">需 要 時 可 佐 以</p> <p>'Adalin' 阿特靈 第 72 頁</p> <p>Pharyngitis 咽喉炎</p> <p style="text-align: center;">預 防 及 治 療 用</p> <p>'Panflavin' Tabl.</p> <p>旁弗拉文 第 118 頁</p> <p>'Revasa' Tabl.</p> <p>利法撒片 第 130 頁</p> <p>'Pantocain'</p> <p>本妥卡因 第 118 頁</p> <p>'Anaesthesin'</p> <p>阿那維信 第 74 頁</p> <p>'Novocain'</p> <p>奴佛容因 第 116 頁</p> <p>'Jothion' Sol.</p> <p>乍鐵紅溶液 第 104 頁</p> <p style="text-align: center;">吸 入 用</p> <p>'Prontosil'</p> <p>百浪多息 第 128 頁</p> <p style="text-align: center;">漱 口 用</p> <p>'Rivanol'</p> <p>雷佛奴耳 第 132 頁</p> <p>'Trypaflavine'</p> <p>脫呂帕弗拉文 第 146 頁</p> <p>'Surfen' 蘇芬 第 144 頁</p> <p>Phlebitis 靜脈炎</p> <p>'Jothion' Oil, Sol.</p> <p>乍鐵紅油, 溶液 第 104 頁</p> <p>Phlegmon 蜂窩織炎</p>	<p style="text-align: center;">化 學 治 療</p> <p>'Uleron' 烏利龍 第 148 頁</p> <p>'Prontosil'</p> <p>百浪多息 第 128 頁</p> <p style="text-align: center;">提 高 抵 抗 力</p> <p>'Omnadin'</p> <p>握姆納丁 第 165 頁</p> <p>'Yatren'-Casein</p> <p>乳酪藥特靈 第 154 頁</p> <p style="text-align: center;">血 清 與 漿 苗 治 療</p> <p>'Streptoserin'</p> <p>「貝靈」鍊球菌血清精 第 168 頁</p> <p>Antipyrogenous 'Yatren'</p> <p>Vaccine 'Behring'</p> <p>「貝靈」藥特靈化膿菌混合漿苗 第 160 頁</p> <p>Staphylo-'Yatren'</p> <p>「貝靈」藥特靈葡萄狀球菌漿苗 第 168 頁</p> <p>Strepto-'Yatren'</p> <p>「貝靈」藥特靈鍊球菌漿苗 第 169 頁</p> <p>'Uleron' Ointment</p> <p>烏利龍油膏 第 148 頁</p> <p>'Prontosil'</p> <p>百浪多息 第 128 頁</p> <p>'Rivanol'</p> <p>雷佛奴耳 第 132 頁</p> <p>'Trypaflavine'</p> <p>脫呂帕弗拉文 第 146 頁</p> <p>'Surfen' 蘇芬 第 144 頁</p> <p>'Jothion' 乍鐵紅 第 104 頁</p> <p>'Tumenol'-Ammonium</p> <p>土門奴耳-銜 第 148 頁</p> <p>'Pellidol' Ointment</p> <p>北里多油膏 第 120 頁</p>
--	---

分類用藥表

Phlyctæna 眼疱疹

Tuberculin 'Behring'	
結核菌素	第170頁
'Rivanol'	
雷佛奴耳	第132頁
'Selvoral'	
色而伐納	第138頁

Plague 鼠疫

Plague Vaccine 'Behring'	
「貝靈」鼠疫漿苗	第166頁
Anti-Plague Serum	
'Behring'	
「貝靈」鼠疫血清	第166頁

Pneumonia 肺炎

提高抵抗力

'Omnadin'	
握姆納丁	第165頁
'Yatren'-Casein	
乳酪藥特靈	第154頁

血清治療

Anti-Pneumococcus	
Serum 'Behring'	
「貝靈」肺炎血清	第167頁

消炎

'Selvoral'	
色而伐納	第138頁

強心

'Suprifin'	
蘇潑立芬	第142頁
'Iccoral' 伊可賴	第100頁
'Racedrin'	
拉西特靈	第130頁
'Suprarenin'	
蘇潑拉來寧	第142頁

止痛退熱

'Gardan' 加當	第98頁
'Novalgin'	
羅瓦而精	第114頁

Poliomyelitis

脊髓灰白質炎

'Panflavin' Tablets	
旁弗拉文	第118頁
'Revasa' Tablets	
利法撒片	第130頁
'Trypafflavine'	
脫呂帕弗拉文	第146頁

Pollutions 遺精

'Adalin' 阿特靈	第72頁
'Luminalettes'	
盧蜜拿粒吞	第108頁

Potency, disturbances of

性慾障礙

參看 Impotence 第108頁

Pregnancy disturbances

妊娠期疾患

'Adalin' 阿特靈	第72頁
'Luminal' 盧蜜拿	第106頁
'Luminalettes'	
盧蜜拿粒吞	第108頁
'Prominal' 普蜜拿	第126頁
'Prominalettes'	
普蜜拿粒吞	第126頁
'Novalgin'	
羅瓦而精	第114頁
'Compral' 康普樂	第86頁

分類用藥表

止 噁 心

'Anaesthesin'
阿那維信 第74頁

止 嘔 吐

'Cortenil' 可得寧 第86頁

'Cantan' 康泰 第84頁

'Luminal' Sol.
盧蜜拿溶液 第108頁

Insulin «Bayer»
「拜耳」因蘇林 第102頁

出 血

'Lutren' 路脫倫 第108頁

通 便 培 補

'Istizin' 一試滌淨 第102頁

'Selvoral'
色而伐納 第138頁

Premature born, rearing

of the 早產兒哺養

'Prolan' 補奴郎 第124頁

'Vogan' 復康 第152頁

'Vigantol' 維剛妥 第152頁

'Detavit' 特太肥 第88頁

Prickly heat 痲子

參看 Lichen trop. 第42頁

Proctitis, Periproctitis

直腸炎, 直腸週圍炎

'Omnadin'
握姆納丁 第165頁

'Yatren'-Casein
乳酪藥特靈 第154頁

'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁

Prostate, hypertrophy of

攝護腺增殖

'Erugon' 安樂根 第94頁

Prurigo 癢疹

'Anaesthesin'
阿那維信 第74頁

'Tumenol'-Ammonium
土門奴耳-鉦 第148頁

Pruritus 癢癢

'Cyren' Ointment
西冷油膏 第89頁

'Mitigal' 滅疥 第110頁

局 部 治 療 用

'Anaesthesin'
阿那維信 第74頁

'Novocain'
奴佛客因 第116頁

'Tumenol'-Ammonium
土門奴耳-鉦 第148頁

'Afridol' Soap
阿非脫藥皂 第74頁

荷 爾 蒙 治 療

'Uden' 溫敦 第148頁

'Cyren' B 西冷B 第88頁

'Lacarnol' 來克諾 第104頁

'Padutin' 保妥西 第118頁

Psittacosis 鸚鵡病

'Trypaflavime'
脫呂帕弗拉文 第146頁

分類用藥表

Psoriasis

牛皮癬

'Afridol' Soap 阿非脫藥皂	第 74 頁
'Tumenol'-Ammonium 土門奴耳-銜	第 148 頁
'Trypaflavine' 脫呂帕弗拉文	第 146 頁
'Solarson' 所拉純	第 138 頁
'Spirocid' 斯砒螺刺脫	第 140 頁
'Optarson' 奧柏泰純	第 116 頁
'Prolan' 補奴郎	第 124 頁
'Campolon' 康巴隆	第 82 頁
'Campoferron' 康巴飛樂	第 82 頁
'Selvorol' 色而伐納	第 138 頁
'Vogan' 復康	第 152 頁

Puerperal fever 產褥熱

化學治療

'Prontosil' 百浪多息	第 128 頁
'Rivanol' 雷佛奴耳	第 132 頁
'Trypaflavine' 脫呂帕弗拉文	第 146 頁

提高抵抗力

'Omnadin' 握姆納丁	第 165 頁
'Yatren'-Casein 乳酪藥特靈	第 154 頁

血清治療

'Streptoserin' 鍊球菌血清精	第 168 頁
--------------------------	---------

Purpura hæmorrhagica

出血性紫癍

參看出血性因素	第 37 頁
---------	--------

Pyelitis, Pyelonephritis

腎盂炎及腎盂腎臟炎

'Prontosil' 百浪多息	第 128 頁
'Trypaflavine' 脫呂帕弗拉文	第 146 頁
'Helmitol' 海而密妥	第 98 頁
'Amphotropin' 安夫脫羅冰	第 74 頁
'Uleron' 烏利龍	第 148 頁
'Spirocid' 斯砒螺刺脫	第 140 頁
'Salvarsan' 洒爾佛散	第 134 頁
'Omnadin' 握姆納丁	第 165 頁

Pyelography 腎盂 X 攝影

Per-'Abrodil' 辨阿保羅的	第 120 頁
------------------------	---------

分類用藥表

<u>Pylospasm</u>		<u>Rheumatism, articular</u>	
幽門痙攣痛		關節婁麻質斯	
‘Dolantin’度冷丁	第90頁	參看 Arthritis	第14頁
‘Luminalettes’		<u>Rheumatism, muscular</u>	
盧蜜拿粒吞	第108頁	肌肉婁麻質斯	
‘Prominalettes’		‘Aspirin’	
普盧蜜拿粒吞	第126頁	阿司匹靈	第76頁
‘Pyramidon’		‘Pyramidon’	
霹藍米藤	第130頁	霹藍米藤	第130頁
‘Anæsthesin’		‘Dolantin’	
阿那雖信	第74頁	度冷丁	第90頁
‘Adalin’阿特靈	第72頁	‘Novalgin’	
		羅瓦而精	第114頁
<u>Quincke's œdema 氏水腫</u>		‘Gardan’加當	第98頁
‘Torantil’多能體	第146頁	‘Compral’	
		康普樂	第86頁
<u>Rashes 疹,血清,藥物惹起者</u>		‘Yatren’-Casein	
‘Campolon’		乳酪藥特靈	第154頁
康巴隆	第82頁	<u>Rhinitis, acute 急性鼻炎</u>	
‘Campoferron’		‘Omnadin’	
康巴飛樂	第82頁	握姆納丁	第165頁
<u>Rat-bite disease 鼠咬病</u>		‘Yatren’-Casein	
‘Neosalvarsan’		乳酪藥特靈	第154頁
新六〇六(新洒爾佛散)	第134頁		外用
<u>Raynaud's disease</u>		‘Racedrin’	
雷腦氏壞疽		拉西特靈	第130頁
‘Padutin’		‘Suprarenin’	
保安甞	第118頁	蘇潑拉來寧	第142頁
<u>Rhagades 破裂</u>		‘Anæsthesin’	
‘Anæsthesin’		阿那雖信	第74頁
阿那雖信	第74頁		內服
‘Pantocain’		‘Aspirin’	
本妥卡因	第118頁	阿司匹靈	第76頁
‘Tumenol’-Ammonium		‘Gardan’加當	第98頁
土門奴耳-銜	第148頁	‘Novalgin’-Quinine	
		羅瓦而精	第114頁

分類用藥表

Rhinopharyngitis

鼻腔咽喉炎

'Panflavin' Tablets 旁弗拉文錠	第118頁
'Revasa' Tablets 利法撒片	第130頁
'Omnadin' 握姆納丁	第165頁
'Yatren'-Casein 乳酪藥特靈	第154頁
滴 鼻 用	
'Rivanol' 雷佛奴耳	第132頁
'Trypaflavine' 殿呂帕弗拉文	第146頁
'Surfen' 蘇芬	第144頁
'Albargin' 亞爾敗近	第74頁
'Protargol' 普泰哥	第128頁

Rickets 佝僂病

'Vigantol' 維剛妥	第152頁
'Detavit' 特太肥	第88頁
'Tonophosphan' 託拿福賜芬	第146頁
'Selvoral' 色而伐納	第138頁

Ringworm and other parasitic affections

金錢癬及寄生蟲性皮膚病	
'Afridol' Soap 阿非脫藥皂	第74頁

'Anæsthesin' 阿那雞信	第74頁
'Mitigal' 滅疥	第110頁
'Compral' 康普樂	第86頁
'Gardan' 加當	第98頁

Roentgenography

X光攝影

Per-'Abrodil' 辨阿保羅的	第120頁
'Festal' 凡食泰	第96頁

Roentgen-sickness

X光射爻病

'Cortenil' 可得寧	第86頁
'Cantan' 康泰	第84頁
'Campolon' 康巴隆	第82頁
'Selvoral' 色而伐納	第138頁
'Suprifin' 蘇瀝立芬	第142頁

Scabies 疥瘡

'Mitigal' 滅疥	第110頁
'Turnenol'-Ammonium 土門奴耳-鉅	第148頁

Scarlatina 猩紅熱

Anti-Scarlatina Serum	
'Behring' 「貝靈」猩紅熱血清	第168頁
'Streptoserin' 鏈球菌血清精	第168頁

分類用藥表

<p>提高抵抗力</p> <p>'Omnadin' 握姆納丁 第165頁</p> <p>漱口, 含錠</p> <p>'Rivanol' 雷佛奴耳 第132頁</p> <p>'Trypaflavine' 脫呂帕弗拉文 第146頁</p> <p>'Surfen' 蘇芬 第144頁</p> <p>'Revasa' 利法撒 第130頁</p> <p>化學治療, 利尿等。</p> <p>'Prontosil' 百浪多息 第128頁</p> <p>'Helmitol' 海而密妥 第98頁</p> <p>'Cantan' 康泰 第84頁</p>	<p>'Combral' 康普樂 第86頁</p> <p>'Yatren'-Casein 乳酪藥特靈 第154頁</p> <p>Scierodermia <u>皮膚變硬症</u></p> <p>'Padutin' 保妥耐 第118頁</p> <p>'Elityran' 益利特靈 第92頁</p> <p>'Campolon' 康巴隆 第82頁</p> <p>Insulin »Bayer« 「拜耳」因蘇林 第102頁</p> <p>'Vogan' 復康 第152頁</p> <p>Scrofulosis 結核性腺病 <u>參看 Tuberculosis</u> 第64頁</p> <p>Scurvy 壞血病 <u>'Cantan' 康泰</u> 第84頁</p> <p>Schistosomiasis 吸血蟲病 <u>參看 Bilharziasis</u> 第17頁</p> <p>Schizophrenia 精神病 <u>Insulin »Bayer«</u> 「拜耳」因蘇林 第102頁</p> <p>Sea-sickness 暈船 <u>'Coffeminal'</u> 咖啡靈拿獲劑 第86頁</p>
<p>Sciatica 坐骨神經痛</p> <p>'Dolantin' 度冷丁 第90頁</p> <p>'Betaxin' 培他生 第80頁</p> <p>'Aspirin' 阿司匹靈 第76頁</p> <p>'Novalgin' 羅瓦而精 第114頁</p> <p>'Pyramidon' 齊藍未藤 第130頁</p> <p>'Gardan' 加當 第98頁</p> <p>'Impletol' 應必妥 第102頁</p>	

分類用藥表

Seborrhoea capitis

髮際皮脂漏

'Prontosil'	第128頁
百浪多息	
'Mitigal'	第110頁
滅疥	
'Afridol' Soap	第74頁
阿非脫藥皂	
'Prolan' 補奴郎	第124頁

Sepsis 敗血症

化學治療

'Prontosil'	第128頁
百浪多息	
'Trypaflavine'	第146頁
脫呂帕弗拉文	
'Rivanol'	第132頁
雷佛奴耳	
'Amphotropin' Sol.	第74頁
安夫脫羅冰溶液	

提高抵抗力

'Omnadin'	第165頁
握姆納丁	
'Yatren'-Casein	第154頁
乳酪藥特靈	

漿苗及血清治療

Antipyrogenous 'Yatren'	
Vaccine 'Behring' 藥特靈	
化膿菌漿苗	第160頁
Strepto-'Yatren'	
「貝靈」藥特靈鍊球菌漿苗	第169頁

Staphylo-'Yatren'

「貝靈」藥特靈葡萄狀球菌漿苗 第168頁

'Streptoserin'
鏈球菌血清精 第168頁

Serum Sickness 血清病

'Cantan'	第84頁
康泰	
'Racedrin'	第130頁
拉西特靈	
'Hypophysin'	第100頁
赫破希平	
'Omnadin'	第165頁
握姆納丁	

Sleeping Sickness

非洲睡瘧

'Bayer' 205	第78頁
拜耳二〇五	

Sodoku 鼠咬病

參看 Rat-bite disease 第57頁

Spasms, intestinal 腸痙攣

'Rivanolettes'	第132頁
雷佛奴耳粒吞	
'Rivanol'	第132頁
雷佛奴耳	
'Dolantin'	第90頁
度冷丁	
'Pyramidon'	第130頁
霹藍米藤	
'Novalgin'	第114頁
羅瓦而精	

分類用藥表

Spasmophilia 痙攣素質

'Vigantol'	維剛妥	第152頁
'Detavit'	特太肥	第88頁
'Luminal'	盧蜜拿	第106頁
'Luminalettes'	盧蜜拿粒吞	第108頁
'Selvoral'	色而伐納	第138頁

Spring fatigue 春季易倦

'Cantan' 康泰	第84頁
-------------	------

Sprue 斯潑盧

'Campolon'	康巴隆	第82頁
'Campoferron'	康巴飛樂	第82頁
'Cantan' 康泰	第84頁	

Strophulus infantum

嬰兒苔癬

'Vigantol'	維剛妥	第152頁
'Detavit'	特太肥	第88頁
'Selvoral'	色而伐納	第138頁

局部應用

'Rivanol'	雷佛奴耳	第132頁
'Trypaflavine'	脫呂帕弗拉文	第146頁

Stomatitis 口腔炎

'Cantan' 康泰	第84頁	
'Rivanol'	雷佛奴耳	第132頁
'Trypaflavine'	脫呂帕弗拉文	第146頁
'Surién' 蘇芬	第144頁	
'Yatren' 藥特靈	第152頁	
'Jothion' Sol.	乍鐵紅溶液	第104頁
'Panflavin' Tablets	旁弗拉文錠	第118頁
'Revasa' Tablets	利法撒片	第130頁
'Pantocain'	本妥卡因	第118頁
'Novocain' Tablets	奴佛容因片	第116頁
'Anaesthesin'	阿那雖信	第74頁

Stye 眼瞼腺炎

'Omnadin'	握姆納丁	第165頁
'Yatren'-Casein	乳酪藥特靈	第154頁
Staphylo-'Yatren'	「藥特靈」葡萄狀球菌漿苗	第168頁
'Staphar'	斯太法	第168頁
'Rivanol'	雷佛奴耳	第132頁

分類用藥表

Sycosis 贅瘡

'Staphar'	
斯太法	第168頁
Staphylo-'Yatren'	
「藥特靈」葡萄狀球菌漿苗	第168頁
'Uleron' Ointment	
烏利龍油膏	第148頁
'Prontosil'	
百浪多息	第128頁
'Afridol' Soap	
阿非脫藥皂	第74頁
'Mitigal' 滅疥	第110頁
'Rivanol'	
雷佛奴耳	第132頁
'Trypaflavine'	
脫呂帕弗拉文	第146頁
'Tumenol'-Ammonium	
土門奴耳-銻	第148頁
'Jothion'	
乍鐵紅	第104頁

Syphilis 毒梅

'Salvarsan' preparations	
六〇六劑	第134頁
'Spirocid'	
新砒螺劑脫	第140頁
'Casbis' 嘉色鈹	第84頁
'Salyrgan'	
洒利永	第136頁
'Entodon'	
恩託同	第92頁
'Sajodin'	
洒乍錠	第134頁
'Jocapral'	
局卡潑拉	第102頁

Tabes dorsalis 脊髓癆

'Dolantin'	
度冷丁	第90頁
'Impletol'	
應必妥	第102頁
'Luminal'	
盧蜜拿	第106頁
'Novalgin'	
羅瓦而精	第114頁
'Compral'	
康普樂	第86頁
'Gardan' 加當	第98頁
'Pyramidon'	
霹藍米騰	第130頁

Tendon sheaths, inflammation of 腱鞘炎

'Omnadin'	
握姆納丁	第165頁
Antipyogenicus 'Yatren'-	
Vaccine 'Behring' 藥特靈	
化膿菌漿苗	第160頁
'Streptoserin'	
鍊球菌血清精	第168頁
'Rivanol'	
雷佛奴耳	第132頁
'Trypaflavine'	
脫呂帕弗拉文	第146頁
'Jothion' Oil,	
'Jothion' Sol.	
乍鐵紅油,	
乍鐵紅溶液	第104頁

分類用藥表

Tenesmus 裏急後重, 痙攣

參看 Spasms, intestinal	第 60 頁
'Dolantin'	第 90 頁
度冷丁	第 90 頁
'Pyramidon'	第 130 頁
霹藍米蘇	第 130 頁
'Rivanol'	第 132 頁
雷佛奴耳	第 132 頁
'Compral'	第 86 頁
康普樂	第 86 頁
'Gardan' 加當	第 98 頁
'Novalgin'	第 114 頁
羅瓦而精	第 114 頁

Tetanus 破傷風

預 防 用

Tetanus Antitoxin	
'Behring' 「貝靈」	
破傷風抗毒素	第 169 頁

治 療 用

Tetanus Antitoxin	
'Behring' 「貝靈」	
破傷風抗毒素	第 169 頁
'Avertin'	第 78 頁
安穩酏	第 78 頁
'Luminal'	第 106 頁
盧蜜拿	第 106 頁
'Luminal'-Sodium	第 108 頁
鈉盧蜜拿	第 108 頁

Tetany 痙攣搐搦

參看 Spasmophilia	第 61 頁
-----------------	--------

Thrombosis 血栓成形

'Elityran'	
益利特靈(預防)	第 92 頁

Thrush 鵝口瘡

'Panflavin' Tablets	第 118 頁
旁弗拉文錠	第 118 頁
'Revasa' Tablets	第 130 頁
利法撒片	第 130 頁
'Rivanol'	第 132 頁
雷佛奴耳	第 132 頁
'Trypaflavine'	第 146 頁
脫呂帕弗拉文	第 146 頁

Tinnitus aurium 耳鳴

'Theominal'	第 144 頁
梯烏密拿	第 144 頁
'Pyramidon'	第 130 頁
霹藍米蘇	第 130 頁
'Luminalettes'	第 108 頁
盧蜜拿粒吞	第 108 頁
'Prominalettes'	第 126 頁
普蜜拿粒吞	第 126 頁
'Padutin'	第 118 頁
保妥酏	第 118 頁
'Sajodin'	第 134 頁
洒乍錠	第 134 頁
'Entodon'	第 92 頁
恩託同	第 92 頁
'Racedrin'	第 130 頁
拉西特靈	第 130 頁
'Suprarenin'	第 142 頁
蘇潑拉來甯	第 142 頁
'Tonophosphan'	第 146 頁
託拿福賜芬	第 146 頁

分類用藥表

<p><u>Toothache</u> 牙痛</p> <p>‘Compral’ 康普樂 第 86 頁</p> <p>‘Pyramidon’ 霹藍米藤 第 130 頁</p> <p>‘Gardan’ 加當 第 98 頁</p> <p><u>Trachoma</u> 沙眼</p> <p>‘Prontosil’ 百浪多息 第 128 頁</p> <p>‘Albargin’ 亞爾敗近 第 74 頁</p> <p>‘Protargol’ 普泰哥 第 128 頁</p> <p>‘Yatren’ 藥特靈 第 152 頁</p> <p>‘Rivanol’ 雷佛奴耳 第 132 頁</p> <p>‘Surfen’ 蘇芬 第 144 頁</p> <p>‘Antileprol’ 安癩露 第 74 頁</p> <p><u>Train-sickness</u> 暈船暈車</p> <p>‘Coffeminal’ 咖啡蜜拿合劑 第 86 頁</p> <p><u>Trichomonas leucor-</u> <u>rhoea</u> 滴蟲性白帶</p> <p>參看 Leucorrhoea 第 42 頁</p> <p><u>Trichophytosis</u> 毛髮癬菌病</p> <p>參看 Sycosis 第 62 頁</p> <p><u>Trigeminal neuralgia</u> 三叉神經痛</p>	<p>參看 Neuralgia 神經痛 第 47 頁</p> <p><u>Tuberculosis</u> 結核病症</p> <p>‘Tuberculin ‘Behring’ 結核菌素 第 170 頁</p> <p>化痰劑</p> <p>‘Cresival’ 克利西佛 第 88 頁</p> <p>止痛退熱劑</p> <p>‘Pyramidon’ 霹藍米藤 第 130 頁</p> <p>‘Dolantin’ 度冷丁 第 90 頁</p> <p>‘Compral’ 康普樂 第 86 頁</p> <p>維他命培補治療</p> <p>‘Vigantol’ 維剛妥 第 152 頁</p> <p>‘Detavit’ 特太肥 第 88 頁</p> <p>‘Vogan’ 復康 第 152 頁</p> <p>‘Cantan’ 康泰 第 84 頁</p> <p>‘Selvoral’ 色而伐納 第 138 頁</p> <p>‘Tonophosphan’ 託拿福賜芬 第 146 頁</p> <p>Insulin “Bayer” 拜耳因蘇林 第 102 頁</p> <p>‘Vogan’ 復康 第 152 頁</p> <p>沖洗結核患處用</p> <p>‘Rivanol’ 雷佛奴耳 第 132 頁</p> <p>肺癆咯血。參看 Hæmorrhages 第 36 頁</p>
---	--

分類用藥表

Typhoid fever 傷寒

- Typhoid Vaccine
 'Behring' 「貝靈」
 傷寒預防漿苗 第171頁
 Typhoid-Paratyphoid
 Vaccine 'T.A.B.' 'Behring'
 「貝靈」傷寒副傷寒 T.A.B.
 預防漿苗 第171頁
 Anti-Typhoid Serum
 'Behring'
 「貝靈」傷寒血清 第171頁
 'Omnadin'
 握姆納丁 第165頁
 'Yatren'-Casein
 乳酪藥特靈 第154頁
 'Rivano!'
 雷佛奴耳 第132頁

退熱止痛

- 'Pyramidon'
 霹藍米藤 第130頁
 'Gardan' 加當 第98頁
 'Novalgin'
 羅瓦而精 第114頁
 鎮靜, 催眠, 止血, 強心等。
 'Adalin'
 阿特靈 第72頁
 'Phanodorm'
 'Phanodorm'-Calcium
 福眠錠福眠錠鈣 第120頁
 'Manetol' (止血)
 孟納妥爾 第110頁
 'Cantan' 康泰 第84頁
 'Eldoform'
 愛兒杜方 第92頁
 'Suprarenin'
 蘇潑拉來寧 第142頁

- 'Racedrin'
 拉西特靈 第130頁
 調補劑
 'Bioferol'
 百福祿 第80頁
 'Optarson'
 奧柏泰純 第116頁
 'Tonophosphan'
 託拿福賜芬 第146頁

Twilight sleep 銘酞劑

- 'Avertin'
 安穩酞 第78頁
 'Evipan'-Sodium
 鈉伊惟本 第96頁
 'Luminal' Solution
 盧蜜拿溶液 第108頁

Ulcer, corneal 角膜潰瘍

- Anti-Pneumococcus
 Serum 'Behring' 「貝靈」
 肺炎菌血清 第167頁
 'Trypaflavine'
 勝呂帕弗拉文 第146頁
 'Yatren'-Casein
 乳酪藥特靈 第154頁
 滴眼用
 'Rivano!'
 雷佛奴耳 第132頁
 'Suprarenin'
 蘇潑拉來寧 第142頁
 製為油膏
 'Racedrin'
 拉西特靈 第130頁
 麻醉
 'Pantocain'
 本妥卡因 第118頁

分類用藥表

Ulcus cruris 下腿潰瘍

'Omnadin'	第165頁
握姆納丁	
調整血脈	
'Padutin'	第118頁
保妥耐	
消毒殺菌	
'Uleron' Ointment	第148頁
烏利龍油膏	
'Rivanol'	第132頁
雷佛奴耳	
'Trypaflavine'	第146頁
脫呂帕弗拉文	
'Surfen' 蘇芬	第144頁
促進生肌	
'Vogan' Ointment	第152頁
復康油膏	
油膏	
'Pellidol' Ointment	第120頁
北里多油膏	
'Albargin'	第74頁
亞爾敗近	
'Tumenol'-Ammonium	第148頁
土門奴耳-銜	
'Elityran'	第92頁
益利特靈	

Ulcer, gastric 胃潰瘍

解痙止痛	
'Anæsthesin'	第74頁
阿那雅信	
'Dolantin'	第90頁
度冷丁	
除酸護胃膜	
'Hydronal'	第100頁
益多納	

調整循環系

'Padutin'	第118頁
保妥耐	
'Torantil'	第146頁
多能體	
'Vogan' 復康	第152頁
'Betaxin'	第80頁
培他生	
'Cantan' 康泰	第84頁

Ulcer, tropical 熱帶潰瘍

'Neosalvarsan'	第134頁
新六〇六(新洒爾佛散)	
'Pellidol' Ointment	第120頁
北里多油膏	

Undulant fever 未利他熱

'Trypaflavine'	第146頁
脫呂帕弗拉文	
'Neosalvarsan'	第134頁
新六〇六(新洒爾佛散)	
'Pyramidon'	第130頁
霹藍米隆	

Uræmia 尿毒症

利尿	
'Salyrgan'	第136頁
洒利承	
強心	
'Racedrin'	第130頁
拉西特靈	
'Suprarenin'	第142頁
蘇潑拉來寧	
減除痙攣	
'Luminal'	第106頁
盧蜜拿	

分類用藥表

Urticaria 蕁麻疹

'Selvoral'
色而伐納 第138頁

'Torantil'
多能體 第146頁

'Racedrin'
拉西特靈 第130頁

'Suprarenin'
蘇澄拉來寧 第142頁

止 癢

'Mitigal'
滅疥 第110頁

'Tumenol'-Ammonium
土門奴耳-銻 第148頁

此外之藥劑

'Campolon'
康巴隆 第82頁

'Uden' 溫敦 第148頁

'Cyren' B 西冷B 第88頁

'Cyren' Ointment
西冷油膏 第88頁

Varices 靜脈瘤

'Betaxin'
培他生 第80頁

'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁

發炎性靜脈瘤用

'Tumenol'-Ammonium
土門奴耳-銻 第148頁

X光攝影用

Per-'Abrodil'
辨阿保羅的 第120頁

Vasography 血管X光攝影

Per-'Abrodil'
辨阿保羅的 第120頁

Venereal granuloma

第四種性病

'Fouadin' 福錄 第96頁

Vitiligo 白癜瘋

'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁

Vomiting 嘔吐

'Luminal'
盧蜜拿 第106頁

'Luminalettes'
盧蜜拿粒吞 第108頁

'Prominalettes'
普蜜拿粒吞 第126頁

'Impletol'
應必妥 第102頁

'Cantan' 康泰 第84頁

'Luminal'
盧蜜拿 第106頁

Insulin "Bayer"
「拜耳」因蘇林 第102頁

'Anæsthesin'
阿那雖信 第74頁

'Adalin' 阿特靈 第72頁

'Veronal'
維婁那耳 第150頁

分類用藥表

Vulvitis, Vulvovaginitis

陰門炎, 陰門膿道炎

- 參看白濁 第35頁
 沖洗, 栓塞用
 'Rivanol'
 雷佛奴耳 第132頁
 'Trypaflavine'
 脫呂帕弗拉文 第146頁
 'Surfen' 蘇芬 第144頁
 'Protargol'
 普泰哥 第128頁
 'Albargin'
 亞爾敗近 第74頁
 'Devegan'
 代末剛 第88頁
 'Yatren' Pills
 藥特靈丸 第153頁

荷爾蒙治療

- 'Cyren' Ointment
 西冷油膏 第88頁

止癢

- 'Tumenol'-Ammonium
 土門奴耳-銻 第148頁
 'Anæsthesin'
 阿那維信 第74頁

Weakness 衰弱

- 參看 Asthenia 第16頁

Whitlow 膿性指頭炎(瘰癧)

瘡口消毒

- 'Rivanol'
 雷佛奴耳 第132頁
 'Trypaflavine'
 脫呂帕弗拉文 第146頁
 'Jothion' Sol.
 乍鈇紅液 第104頁

增高抵抗力

- 'Omnadin'
 握姆納丁 第165頁
 'Yatren'-Casein
 乳酪藥特靈 第154頁
 血清漿苗治療
 Antipyrogenous 'Yatren'-
 Vaccine 'Behring'
 「貝靈」藥特靈化膿菌混合
 漿苗 第160頁
 'Staphar'
 斯太法 第168頁
 Staphylo-'Yatren'
 藥特靈葡萄狀球菌漿苗
 第168頁
 'Streptoserin'
 「貝靈」鏈球菌血清精
 第168頁

Withdrawal cures

戒鴉片嗎啡等毒

- 'Luminal'
 盧蜜拿 第106頁
 'Impletol'
 應必妥 第102頁
 'Novalgin'
 羅瓦而精 第114頁
 'Avertin'
 安穩酞 第78頁
 'Icoral' 伊可賴 第100頁
 'Veronal'
 維婁那耳 第150頁
 'Veronal'-Sodium
 鈉維婁那耳 第150頁
 'Phanodorm'-Calcium
 福眠錠鈣 第122頁
 Insulin *Bayer*
 「拜耳」因蘇林 第102頁

分類用藥表

Wound treatment

瘡口創傷治療

內服

'Prontosil'
百浪多息 第128頁

'Prontalbin'
百浪太平 第126頁

沖洗敷搽

'Zephiran'
賜福露 第156頁

'Uleron' Ointment
烏利龍油膏 第148頁

'Vogan' Ointment
復康油膏 第152頁

'Surfen' 蘇芬 第144頁

'Rivanol'
雷佛奴耳 第132頁

'Trypaflavine'
脫呂帕弗拉文 第146頁

'Albargin'
亞爾敢近 第74頁

'Protargol'
普泰哥 第128頁

'Yatren' 藥特靈 第152頁
促進生肌

'Pellidol' Ointment
北里多油膏 第120頁

'Albargin'
亞爾敢近 第74頁

血清治療

Anti-Gas-Gangrene
Serum 'Behring'

「貝靈」氣疽血清 第163頁
Tetanus Antitoxin

'Behring' 「貝靈」
破傷風抗毒素 第169頁

局部麻醉止痛

'Pantocain'
本妥卡因 第118頁

'Anaesthesin'
阿那難信 第74頁

Xerophthalmia 角膜軟化

'Vogan' 復康 第152頁



PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE

分類藥名錄

PHARMACEUTICAL PREPARATIONS



拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>亞保心 'Abasin'</p> <p><i>Acetyl-bromodiethyl-acetyl-carbamide</i></p>	<p>神經衰弱。用腦過度。精神抑鬱。怔忡。煩躁善怒。以及血管硬化者之各種困苦。</p>	
<p>阿即多耳配符新 'Acidol'-Pepsin</p> <p><i>Betaine hydrochloride c. Pepsin</i></p>	<p>胃分泌不足。無胃酸。無食慾。消化不良。胃炎。胃癌。小兒夏日吐瀉。黃膽，尿酸關節治療期中，惡性貧血等症之極有價值輔佐劑。在注射六〇六劑時。用以提高血中酸量。</p>	
<p>阿克來年 'Acranil'</p> <p><i>Dihydrochloride-chlormethoxy-acridyl-aminodiethylaminopropanol</i></p>	<p>由於腸梨形鞭毛蟲所致之腸病。</p>	
<p>阿特靈 'Adalin'</p> <p><i>Bromodiethylacetyl-carbamide</i></p>	<p>各種失眠症候專劑。又為馳名鎮靜安神妙藥。舉凡神經衰弱心悸怔忡，心跳，心神緊張，煩悶，抑鬱，均宜用之。</p>	

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
<p>毫無弊害之日間可用鎮靜劑。日間用之并不影響精神及體力之工作效能。</p>		<p>成人：每日三次。每次一至二片。溶於水內服之。 兒童：按年齡酌量減少。 包裝：每管 10 及 20 片。每片 0.25 公分。</p>
<p>固體鹽酸配符新合劑。服用極便。隨身可帶。劑量準確。效力靈速持久。久貯不變。最有影響胃液分泌之長久效力。并且味佳可口。無不樂服。</p>		<p>成人：每服 1-2-3-4 片。先溶於水。在餐時或餐後服下。 小兒：每服 1/2-1-2 片。一片內含之鹽酸量。等於八滴淡鹽酸。 包裝：每管 10 片。每片 0.5 公分。 注意：本品不能受潮。在貯藏時或緩慢服用時。均須防濕妥藏。</p>
<p>腸梨形鞭毛蟲病特效化學治療劑。</p>		<p>四歲以下小兒。每日服 1 片。 五至八歲兒童。每日服 2 片。 成人及八歲以上兒童。每日服 3 片。一次服下或分作 3 次服下均可。在餐後用水圓吞下。 包裝：每瓶 15 片。每片 0.1 公分。</p>
<p>和平可靠安眠，鎮靜劑，毫無任何副作用。入體後外排甚速。醒後毫無疲倦之感。</p>		<p>安眠用：1 次可服 1-2 片最好用熱水化服。就寢前半小時服下。 鎮靜用：每日 3-4 次。每次 1/2-1 片。用涼水服下。 包裝：每管 10 片，每片 0.5 公分。每管 30 片，每片 0.1 公分。 粉劑 每瓶 25 公分。</p>

拜耳大藥廠

品 名		通 應 症
<p>阿非舵藥皂 'Afridol' Soap 內含 4% sodium oxymercuri-o- toluylate</p>		<p>統治各種寄生蟲性細菌性皮膚病。 瘡癤。癩風。鬍鬚。斷髮癢疹。皮 脂瀉。汗分泌過甚。手部消毒。預 防瘡癤外症。</p>
<p>亞爾敗近 'Albargin'</p>		<p>白濁。白濁膿漏眼。結膜炎。膀胱 炎。尿道炎。</p>
<p>硝酸銀膠質合劑</p>		<p>性 質 殺菌消毒毫無刺激性之銀劑。最有 效力白濁良藥。具有深部殺菌之功。</p>
<p>安夫脫羅冰 'Amphotropin'</p>		<p>尿道消毒。細菌尿。膀胱炎。腎盂 炎。白濁性尿道炎。腎臟手術膀胱 手術及膀胱鏡檢等之前以及患猩 熱者統宜先用。以資預防枝節。</p>
<p>Hexamethylene- tetramine camphorate</p>		<p>注射劑。急性高寒熱病症。慢性尿 道發炎。以及頑痼腎盂膀胱疾患。 他法久治不愈者。尿閉。膽道，膽 囊疾患。腦膜炎等。</p>
<p>阿那雖信 'Anaesthesin'</p>		<p>創口。皮裂。糜爛潰瘍。咽喉發炎。 口腔發炎。臥瘡。燙傷等之作痛。 胃部感覺過敏。胃潰瘍。胃癌。幽 門痙攣。暈船。瘙癢以及各種作癢 濕疹。</p>
<p>安癩露 'Antileprol'</p>		<p>麻瘋。沙眼。</p>
<p>Esters of Tarak- togenos kurzii</p>		<p>性 質 本品係最有效力之大風子油治療特 效劑。內服與注射均可。性質純和。 無不能受。</p>

拜耳大藥廠

性 質	劑 量 及 用 法
<p>殺菌消毒功力極大之水銀劑。無侵蝕刺激之副作用。</p>	<p>用以洗滌患處。待泡沫乾後再徹底洗淨。 包裝：每包一塊。</p>
<p>治療用：沖洗注射用 0.1-0.2% 溶液。點滴用可至 3% 溶液。沖洗子宮用 3% 溶液。膀胱炎沖洗膀胱用 0.25-0.5% 溶液。淚囊炎用 1-2.5% 溶液。濕疹等用 1-3% 油膏。</p> <p>預防：用 5% 溶液佐以 10% 甘油點滴。 包裝：每瓶 5 公分粉末。</p>	
<p>泌尿系內服消毒殺菌及消炎特效劑。因其中含有樟腦質。故效力所以特大也。</p>	<p>每日三次。每次一二片。 包裝：每管 20 片。每片 0.5 公分。</p>
<p>尿道注射用消毒劑。性質和平。雖用大量亦無流弊。故用本品。可使身體即刻增加大量烏羅力屏而無弊害。因之立見強大優良殺菌功效。</p>	<p>靜脈注射：隔二三日注射一次。從 10 公撮漸增至 40 公撮。感應靈敏或有高熱之人。量宜小。由 5-10-20 公撮。 包裝：每盒 5 管。每管 20 公撮。每瓶 50 公撮。</p>
<p>內服外搽均可止痛。功效持久。而無弊害。本品溶解緩慢。故功力能和緩持久。</p>	<p>外用：5-20% 配為各式應用。 內服：每日數次。每次 0.25 至 0.5 公分。裝於膠囊內吞服。餐前服。 包裝：每瓶 25 公分。</p>
<p>麻瘋：內服，每日 $\frac{1}{2}$-5 公分。餐後服。 肌肉注射。初用一管。等於 1.5 公撮。隨後視病人之受耐性與情形漸漸增至 5 公撮。或再高亦可。 皮內注射：注射於患處。 沙眼。用本品塗摩於結膜上。製為 20-30% 油膏。 每瓶 50 粒膠囊。每粒 0.5 公分。每盒 24 管。每管 1.5 公撮。 溶液一百公撮裝</p>	

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
阿斯卡立脫 'Ascaridol'		各種寄生蟲病。最宜於蛔蟲及十二指腸蟲。
土荆芥油 (<i>Ol.chenopodii</i>)有效成份製劑		
阿司匹芬寧 'Aspiphenin' 「阿司匹靈」與芬那采丁合劑		各種傳染病。受涼感冒症候。神經痛。婁麻質斯。頭痛。牙痛以及女子經痛等。
阿司匹靈 'Aspirin' <i>Acetic ester of salicylic acid</i>		頭痛。牙痛。神經痛。一切有寒熱症候。受涼感冒婁麻質斯等。
阿的平 'Atebrin' <i>Dichlorhydrate of 2-methoxy-6-chlor-9-a-diethyl-amino-δ-pentylamino-acridine</i>		瘧疾。預防瘧疾。規寧感應過敏。黑水病及孕婦均能服用無忌。 性 質 人工合成治瘧特效藥。功力迅速可靠。撲殺無性生殖幼蟲之效力尤大。只須連服五至七日。即使瘧疾全愈。又為最可靠之瘧疾預防劑。

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
<p>驅蟲名藥。內含成份永遠如一。標準可靠。故效力亦準。</p> <p>‘阿斯卡立脫’內含美國產土荊芥油之有效成份。其中雜質剔除淨盡。故無流弊。</p> <p>服用油劑時。每每尚感瀉力不足。故最好尚另外予以蓖麻油少許。藉資補充。</p>	<p>成人：每日早晨空腹吞服三粒。隨即服有力瀉藥一劑。</p> <p>十二歲以下小兒。按年齡。每一歲服一公撮。油劑(=1/4茶匙)。</p> <p>膠囊劑：每管3及6粒。每粒0.3公分。</p> <p>油劑：每瓶15公撮。內含0.375公分阿斯卡立脫混於蓖麻油之內。</p>	
<p>退熱，止痛，除風濕藥。服之即刻見效。</p>	<p>每日1-3片。或略多亦可。分作數次服下。</p> <p>止痛用：一次即服二片。</p> <p>包裝：每管20片。每片0.5公分。</p>	
<p>止痛退熱除風濕名藥。「阿司匹靈」有大部不經分解即為身體攝收。毫不傷損心臟。亦無刺激腸胃之弊。</p>	<p>每日服2-6片。分作數次服下。特別需要情形。尚可以多服。</p> <p>包裝：每瓶25片及100片。每片0.3公分。每瓶10片及20片。每片0.5公分。又有2片紙袋裝。每片0.5公分。</p>	

治療：內服。須在餐後。并用多量水份。每一全劑約五至七日。成人及八歲以上強壯兒童。每日可用0.3公分。分作三次服。

四至八歲小兒。每日0.2公分。四歲以下小兒每日0.1公分。為特別週到起見。尤其對於熱帶瘧。最好在服完「阿的平」後。再服「百司母因」一劑。〔詳請參看百司母因〕。

預防：成人與四歲以上兒童。每星期服0.4公分。二至四歲小兒。每星期0.3公分。二歲以下小兒每星期0.1公分。〔可於一星期內擇二日分服。或一日服。〕

包裝：每瓶15片及每瓶300片。每片0.1公分。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>阿的平注射劑 Atebrin' for injection</p> <p>(<i>Atebrin'-Musonol</i>) <i>Atebrin'-di-methane</i> <i>sulphonate</i></p>	<p>昏迷性瘧疾。瘧蟲太多之瘧疾。</p>	<p>性 質</p> <p>本品係一極易溶解於水之「阿的平」鹽類。用之功力較內服更速。藉收即刻剷除瘧蟲與立即見效之功。</p>
<p>安穩酞 'Avertin'</p> <p><i>Tribromo-ethanol</i></p>	<p>外科，產婦科手術用基本麻醉劑。酞酞無痛生產亦可用之。顛狂興奮，破傷風，子癇均宜用以鎮靜。</p> <p>禁忌：嚴重肝臟腎臟直腸病患損傷者以及肺癆病者。</p>	
<p>拜耳二〇五 'Bayer' 205 (<i>Germanin'</i>)</p> <p><i>Symmetric</i> <i>carbamide of m-</i> <i>amino-benzoyl-m-</i> <i>amino-p-toluy-</i> <i>l-naphthyl-amine-</i> <i>4:6:8-trisulphonic</i> <i>sodium</i></p>	<p>非洲睡疫。(錐蟲病)兼有預防與治療之特效。</p>	

拜耳大藥廠

性 質



劑量及用法

肌肉注射。用 0.1 公分者。則以 1.5 公撮蒸溜水溶解。用 0.3 公分裝者。則以蒸溜水 5 公撮溶解。成人與八歲以上強壯兒童。每日用 0.3 公分。五至八歲兒童用 0.2 公分。一至四歲小兒用 0.1 公分。身體較衰弱之人。此等一日量。宜分作二至三次注射為妥。一歲以下小兒每日 0.05 公分。

靜脈注射：肌肉注射。攝收速度已夠。故此法係為多餘。必欲行此法者。則每次量不得超過 0.1 公分。溶於三公撮蒸溜水內。此量一日之內。可以用至二三次。

包裝：每盒 6 管。乾裝粉末。每管 0.1 公分。

重量：每盒 2 管及每盒 25 管乾裝粉末。每管 0.3 公分。

灌腸用麻醉劑。無興奮期。病者逐漸入眠。最不傷損精神。手術後尚酣眠若干時。可使最痛苦時期在不知不覺中渡過。

基本麻醉：用 2.5% 液灌腸。每一公斤體重。可用 0.08-0.1 公撮。十分衰弱病人酌減。〔宜按病人狀態略予更變〕

酞酞酣眠：子癇，用 0.05-0.07 公撮比一公斤體重之量。〔製為 2.5% 溶液灌腸。〕

包裝：液劑每瓶 100 公撮。

剛果紅液 Congo-red (1:1000)

十公撮裝：專供測驗安穩酞液是否純淨之用。

為各種錐蟲病症唯一特效專藥。既可預防。又有持久治療效力。

用法與劑量另詳仿單。函索即寄。

每盒 10 管 0.5 公分。每盒 5 管。每管一公分。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>貝代明 'Bedermin'</p> <p style="text-align: center;">「阿斯卡立脫」與 「賽雷丁」合劑</p>		<p>十二指腸蟲，蛔蟲，及蟯蟲病。</p> <p style="text-align: center;">性 質</p> <p>功效極靈準之驅蟲良藥。由拜耳出品驅蟲劑「阿斯卡立脫」與「賽雷丁」兩名劑合成。故有相得益彰之特效。</p>
<p>培他生 'Betaxin'</p> <p style="text-align: center;">拜耳乙-維生素劑</p>		<p>1) 各型脚氣病。 2) 各種神經炎，神經疾患。各型脚氣病。各種神經痛，神經病症。孕娠中以及產後神經痛。傳染病中及過後之多發性神經炎。視神經炎。坐骨神經痛。帶狀疱疹。肋間神經痛。白喉後之麻痺。三叉神經痛以及一切由食物缺乏此種維生素而成之疾病。 3) 多發性脊髓變質症 (嚴重血病及惡液質時常見之病狀)。 4) 尿酸關節炎。靜脈痛。脊髓多發性硬化症。</p> <p style="text-align: center;">性 質</p> <p>標準人工合成乙-維生素劑。神經炎特效專藥。一公絲「培他生」等於三百卅國際單位。</p>
<p>百福祿 'Bioferol'</p> <p style="text-align: center;">('Bioferrin')</p> <p>合乎生理學原則之 鐵質肝精合劑</p>		<p>貧血，身體虛弱衰憊。精神萎靡。神經衰弱等諸虛百損。肺癆等。</p>

拜耳大藥廠

性 質	劑 量 及 用 法
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> 性 質 </div>	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> 劑 量 及 用 法 </div>
小兒：1歲 1-2 公撮 3歲 3-6 公撮 四歲以上十二歲以下。則每大一歲加量一公撮。 每瓶卅公撮。恰為成人一全劑之用。 膠囊劑服法：12歲以上青年 4 粒 15歲以上青年 5 粒 18歲以上 6 粒。 凡在服本品後。概須按年齡服瀉藥(蓖麻油或瀉鹽)一劑。 包裝：每管九裝六粒。每粒0.6公分。 每瓶 30 公撮液劑。14%液。	

關於一項脚氣病之用法。詳載仿單。請參閱之。

第二第四項：行注射法。普通用。每日一管(五公絲)皮下注射。或肌肉注射。本品作靜脈注射。亦毫無反應。但此法多只用於嚴重脚氣病者。

嚴重症候：或未便每日注射者。可用強號「培他生」(1公撮=25公絲)。

內服：每日三次。每次一片(等於三公絲)。營養治療上用。只須每日二三次。每次半片。即已足夠。

包裝：每管 20 片。每瓶 100 片。每片均為三公絲 (Vit. B₁ hydrochloride)。

每盒 3 管及 15 管。每管均為 1 公撮。等於 5 公絲。

強號：每盒 3 管及 15 管。每管均為 1 公撮。等於 25 公絲。

內含足量蛋白質及煉淨血色素之液劑。所有血中各種重要滋養料。以及血清中之有效成份。無不俱全。另佐以肝精。促進造血器官之機能。因之功效相得益彰。尤為偉大。

成人：餐時或餐後。每服 1-2 湯匙。

兒童：按年齡酌減。每日服 1-2 茶匙。

包裝：每瓶 200 公分。

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>布妥倫 'Butolan'</p> <p><i>Carbamine acid ester of p-oxidyphenylmethane</i></p>	<p>蚊蟲症</p>	<p>性質</p>
<p>康復之餅 'Cafaspin'</p> <p>(<i>Cafiaspirin</i>)</p> <p>每片內含 0.5 公分「阿司匹靈」與 0.05 公分咖啡英</p>	<p>精神萎靡不振。體倦，身心不舒。頭痛。偏頭痛。煙酒過度之難過。受涼感冒及各種有熱傳染病。</p>	
<p>康巴飛樂 'Campoferron'</p> <p>內含補血專藥肝精及鉄銅質</p>	<p>一切續發性貧血。惡性貧血已用「康巴隆」之後。用以竟其全功。治惡性貧血時在注射「康巴隆」之停劑期內用之以補不足。作為諸虛百損。病後元虧之大補劑。</p>	
<p>康巴隆 'Campolon'</p> <p>根據 <i>Gaensslen</i> 大學教授方法提出之肝精製劑</p>	<p>惡性貧血。各種續發性貧血。(瘧疾後，患寄生蟲病者，孕婦貧血，等) 病後元虧。復元緩慢。變態感應 (蕁麻疹，斯不婁症，枯草熱，氣喘，) 砒質，鉛質，鈹質中毒症候。愛克司光射灸病。用以調整神經機能。促進血液狀態。多發性硬化症。用以保護肝臟。乳嬰之自身中毒症候。</p>	

拜耳大藥廠

性 質



劑 量 及 用 法

成人及十歲以上兒童：每日三次。每次一片。連服一星期。
較幼小兒：照成人量用半片。

乳嬰：照成人量用半片。

在服藥期中。肛門宜搽 Hydrargyr. praec. alb. 油膏。在服完1瓶後。宜用瀉藥1劑（「一試滌淨」。）

包裝：每瓶20片。每片0.5公分。

本品係聯「阿司匹靈」之特效與咖啡英興奮作用於一體之合劑。

對於循環系呼吸中樞。中樞神經以及新陳代謝腎臟機能等均有優良影響。

成人：1片。每日二至四服。

小兒：半片。每日一至二次。
亦可每日服至2片。

包裝：每管15片。每片0.55公分。

功力極高內服肝精劑。內含0.1% 鐵質及0.003% 銅質。利用其中銅質對鐵質之觸媒作用。增進鐵質對於製血系器官之專門補血作用。

如未經醫處方。普通則成人日服二三次。每次1-2茶匙。（1茶匙=5公撮）。

小兒服半量。可與飲食混服。
包裝：每瓶100公撮。

功力最高注射用肝精。性質純和。用後即刻可見紅血球加增。血色素提高。一般狀態亦見優良。偶見功效未能顯著時。則內服新鮮肝質。

肌肉（膺肌）注射。每日二公撮。或多亦可。如已見效。則可每隔八日注射一次。每次用5-10公撮注射。輕症。此等方法開始即可採用。俾省時常注射之忙繁。在既已全愈後。則此間隔八日方法。

仍宜續行二至四星期之久。血友病。每日可用至三管。每管2公撮。

包裝：5管裝。每管2公撮。3管裝。每管5公撮。

醫院用：每盒25管。每管2公撮。瓶裝10公撮。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>康 泰 'Cantan' 拜耳兩種維生素</p>	<p>兩種維生素缺乏之症候。血友症。出血性因素。</p> <p>兩種維生素不足症狀： 壞血症初期現象。貧血。萎黃。營養不良(早產兒)。易倦。各種出血。肺癆咯血。子宮，腸胃出血。</p> <p>傳染病。及自身中毒症；例如氣管枝疾患，白喉後心臟損傷。腸胃自身中毒症候。腎盂炎。各種藥物感應過敏現象。鑛質新陳代謝失整。骨折皮破。不易全愈。齧齒。孕娠期中毒現象。</p> <p>照射愛克司光前。用以預防。</p>	
<p><i>l-ascorbic acid</i></p>		
<p>嘉 色 鈹 'Casbis' <i>10% hydrate of bismuth</i> 油劑</p>	<p>梅毒。熱帶蕁腫。扁桃腺咽峽炎。</p> <p>性 質</p> <p>毫無毒性。毫無刺激之鈹劑。腎部肌肉注射用。其中之鈹質分散極均勻。易為組織攝收。注射處保無痛楚之虞。成份準確。劑量易準。</p>	
<p>利 膽 弗 拉 文 'Choleflavin' 「脫呂怕弗拉文」，拍 拍維靈，怕它非靈 及薄荷油等合成</p>	<p>胆道炎。胆囊炎。膽石症。傳染性黃膽病。以及腸上部之傳染性症候。對於膽石有預防病痛之功。</p>	

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
<p>功力最足純粹兩種維生素劑。此種維生素在人體內起一種特別觸媒作用。對於組織內新陳代謝產物有解毒作用。靜脈注射肌肉注射。并無痛楚。亦無任何副作用。</p>		<p>預防用：小兒每日半片。成人每日一片。照射愛克司光之前一夜。可服三片。以資預防射災病。</p> <p>治療用：成人。每日三次。每次1片。小兒每日二至三次。每次半片。</p>
<p>肌肉注射用：成人平均每日一管。靜脈或皮下注射。小兒半量。強號「康泰」只供靜脈或肌肉注射之用。最宜於血友病及嚴重缺乏此種維生素之病症。</p>		
<p>包裝：每片 = 0.05 公分。l-ascorbic acid 每瓶 20 片。100 片及 250 片。</p>		
<p>安瓶：每管 = 0.1 公分。l-ascorbic acid 每盒 5 管。每管二公撮。</p>		
<p>醫院用大盒。每盒 25 管。每管 2 公撮。</p>		
<p>強號：每管 = 0.5 公分。l-ascorbic acid 每盒 3 管。每管 5 公撮。</p>		
<p>醫院用大盒。每盒 15 管。每管 5 公撮。</p>		
<p>成人：臀肌注射。初用 0.5 公撮。隨後 1 公撮。每隔三日注射一次。總量為 12-15 公撮。</p>		
<p>兒童按年齡酌量減少。小兒初用 0.05 公撮。隨後漸由 0.1 加至 0.2 公撮。每隔三日注射一次。待總量用至 1.5-2 公撮為止。扁桃腺咽喉炎。注射 1-1.5 公撮。小兒減少。</p>		
<p>包裝：每瓶 15 公撮。 每盒 10 管。每管 1.5 公撮。 醫院用大瓶。100 公撮。</p>		
<p>利膽劑 對於膽道等有顯著殺菌及消炎功效。又有解痙作用。使結石易於外排。</p>		<p>每日三次。每次 2 粒。餐前服下。或增加劑量亦可。</p> <p>包裝：每瓶 30 及 60 粒。</p>

拜耳大藥廠

品 名		適應症
<p>細脫林 'Citrin' "Bayer"</p> <p>滲透性 維生素 P 劑</p>		<p>此種維生素在治療上極有價值。功能使毛細管機能保持正常狀態。提高其抵抗力。增進其滲透力。又有使血液凝結力增加之功。</p>
<p>咖啡蜜拿 'Coffeminal'</p> <p>「盧蜜拿」與咖啡英 合劑</p>		<p>偏頭痛。痙攣性頭痛。羊癇瘋。血管神經失常。女子經痛以及絕經期之各種痛苦。</p>
<p>康普樂 'Compral'</p> <p>Urethane trichlor- ethyl alcohol and 'Pyramidon' 之化 學的合成劑</p>		<p>各種痛楚。頭痛，牙痛，耳痛，尤靈。婦科：經痛，產後陣痛，行搔括手術前後均宜用以防痛治痛。外科：在手術之前後。均宜用之。牙科：齒根膜，齒髓以及各種發炎腫痛。齒科種種痛楚均宜用以防治。</p>
<p>可白息-奴佛客因 'Corbasil'-'Novocain'</p>		<p>請參看第 114 頁</p>
<p>可得寧 'Cortenil'</p> <p>人工合成腎上腺皮質 荷爾蒙劑</p>		<p>腎上腺皮質缺陷：即所謂愛狄森氏症。潛伏性腎上腺皮質機能之不足。其症象為虛弱易倦，不論精神或體力方面均不振作。血壓不足。血糖量降低等。（愛狄森氏症象，無力，衰萎，消瘦）暫時性腎上腺皮質損傷。由於急性傳染病及自身中毒釀成者。</p>

拜耳大藥廠

性

質



劑量及用法

出血性紫斑，血小板減少之紫斑，急性出血性腎臟炎，各種泌尿系之發炎性出血。以及胃肺出血等。持發性內硬腦脊膜炎。此外齒齦出血，潰瘍性大腸炎，某種血友病（他藥不見效者）。按病情輕重在一日之內可用一至數次。

可行靜脈注射。或內服與注射合併。

片劑：每管 20 片。每片含 25 公絲。

液劑：每盒 5 管。每管 3 公撮。=75 公絲。

本品係集「盧蜜拿」之解癱特效與具有興奮中樞神經，促進腦脊髓液滲透力之咖啡英。合配而成。故有特別對於中樞血管系之解癱作用。奏效極靈。並無使人軟倦之弊。

普通。每日 1-3 片。但可無疑的加至每日 6 片之量。

包裝：每管 10 片每片 0.075 公分。

功力可靠。定痛極靈。服後即見痛楚漸減之止痛功效但毫不影響心神與體力之工作效能。亦無軟倦之感。

每服 1-2 片。每日可服數次。

包裝：每管 10 片。每片 0.5 公分。

嚴重燙傷及凍傷以及由慢性化膿膿致之敗血症象身體水份與鹽類之恒態失均。（腎臟病，子癩）；

經 X 光或紫外光線治療後引起之射灸病。

妊娠嘔吐。病後復元遲緩。

本品功能完全替補腎上腺皮質荷爾蒙之不足。

按病情。每日注射 1-2 次。每次 1 管。肌肉注射。

包裝：每盒 3 管。每管 1 公撮。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>克利西佛 'Cresival'</p> <p>Calcium cresol-sulphonate 劑</p>		<p>各種急性慢性呼吸器官病。肺炎，肺癆，百日咳等等咳症。</p>
<p>西 冷 B 'Gyren' B</p> <p>Diethyldioxystilbene-di-propionate</p>		<p>原發性續發性無月經。生殖器發育不全。經痛。女子不孕。絕經期各種病痛（關節疾患。關節痛。精神抑鬱。精神失常。瘙癢以及其他各種皮膚疾患。總之凡由卵巢濾泡荷爾蒙失職者）。本品係一人工合成品。功效與濾泡荷爾蒙相似。本品內服與注射之效力。其比較約為1比1至2比1之間。即原行注射者改行內服時。則內服量可照注射量加倍。</p>
<p>特 太 肥 'Detavit'</p> <p>含 A D 維生素乳劑</p> <p>製造者 »Bayer« E. Merck Darmstadt</p>		<p>身體發育障礙。骨質生長不良。身體虛弱易罹疾病。胃納不佳。以及諸虛百損等。又可預防軟骨病。</p>
<p>代 未 剛 'Devegan'</p> <p>每片含○•二五公分 p-hydroxy-3-acetyl- amino-phenyl-arsonic acid 及○•○三公分 硼酸。外加特別方法 製成之炭化水素○• 六七公分混合製成</p>		<p>女子各種白帶。特別是鞭毛滴蟲性陰道炎。以及由於陰道粘膜機能萎退之各種白帶。</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
<p>化痰，消炎，蘇肺名藥 功能使肺內濃痰稀釋。毫無 刺激劇烈作用之化痰妙品。 同時兼有開胃之功。味佳可 口。性質最純。小兒科尤宜 多用。</p>		<p>成人：日服 3-4 次。每次 1 湯 匙。 小兒：日服 3-4 次。每次 1 茶 匙。可用雙倍量之茶 水沖淡服用。 包裝：每瓶 125 及 500 公分。</p>

劑量及詳細用途。可參看包裝內所附之仿單。

包裝：

「西冷」B片：每瓶 20 片。每片 0.1 公絲西冷 B。

強號：每瓶 20 片。每片 0.5 公絲西冷 B。

「西冷」注射液：每盒 5 管。每管 1 公撮（油溶液）含 0.5 $\frac{1}{2}$
公絲「西冷」B。

強號：每盒 5 管。每管 1 公撮。（油液）含 2.5 公絲「西
冷」B。

油膏：每管 20 公分。5 生的長一條約 1 公分含 1 公絲。

不含魚肝油乳劑。但有足量
魚肝油之 A D 兩種維生素。
味甘易服毫無魚肝油之惡味
。特太肥所含之維生素量較
普通魚肝油所含超過一倍。

乳嬰：每日 $\frac{1}{2}$ -1 茶匙

小兒：每日 1-2 茶匙

成人：每日 1 湯匙

包裝：每瓶 125 公撮。

白帶根治專劑。內含除各種
消毒殺菌成份之專門效驗外
。尚含有特製澱粉質。此物專
具補充陰道粘膜炎澱粉質不足
之功。有驅除各種雜菌。而
調整陰道之固有酸性。

初用每日塞入一片。隨後每
星期內約用 4-6 次。每次一
片。用藥之次晨宜行坐浴。
亦有主張高量。每日 1-3 次。
每次 1-2 片。如陰道分泌失
常。藥片分解太慢。可將藥
片在水中稍浸再塞入。
包裝：每罐 15 及 30 片。

拜耳大藥廠

品 名		適應症
<p>度冷丁 'Dolantin'</p> <p><i>1-methyl-4-phenyl-piperidine-4-carbonic-acid-ethyl-ester-hydrochloride</i></p>		<p>手術後及癌症者之痛楚。各種神經痛。神經症候。關節疾患。關節痛等。</p> <p>平滑肌痙攣。腸胃，胆道，以及泌尿系等部之痙攣痛。</p> <p>產科。子宮口強直痙攣，痙攣性陣痛(痛楚太甚)以及產出時痛楚。</p> <p>血管痙攣。狹心痙。偏頭痛。各種頭痛。脊髓癆之痛楚。</p>
<p>愛培撒 'Ebesal'</p> <p><i>Cupro-allyl-thio-urea-benzoic acid</i> 之鈉鹽。約含銅十九%</p>		<p>新發明銅製劑。功效極佳病人最易耐受之強壯劑。</p> <p>普通用金製劑治療之處。均可採用本品。例如產生性肺結核，喉癆，肺外他部結核，多發性關節炎，以及其他關節炎。</p>
<p>鐵伊拉純 'Elarson' iron <i>Strontium salt of Chloroarsinoso-behenic acid</i> + Ferr. red.</p>		<p>續發性貧血萎黃等</p>

拜耳大藥廠

性

質



劑量及用法

止痛解痙特效新藥。內服，注射或肛門栓塞均可。本品性質平和。易於受耐。雖極嚴重痛楚用之亦能制止。功能遠在阿刀屏嗎啡兩劑之上。完全可以取而代也。

內服：每日一至三次。每次一片。最好在餐後服下。需要情形。亦可加至每日三次。每次二片之量。

服時最好先將藥片溶於少許茶水內。

注射：每日1-3次。每次1-2公撮。皮下或肌肉內注射。嚴重痛楚欲急止時。可用1-2公撮。緩緩靜脈注射（此量約於1-2分鐘內注完）。有時可用10公撮葡萄糖溶液或生理食鹽水合併注射。

包裝：每管20片。每片含25公絲。每盒5管。每管二公撮。

供靜脈注射用。開始量為○。○一公分（六分之一格林）。以後劑量之增加。或須緩慢或須迅速。均宜視病人之反應若何為斷。每間二日注射一次。劑量可增至○。○二五公分，或○。○五公分或○。○七五公分或○。○九公分。總量為○。六公分—二。○公分（九—三○格林）。普通症注射二全劑即可。惟多數症候須注射三全劑或四全劑。每一全劑注射畢。宜停劑兩三個月。

每盒5個乾安瓶。計0.01公分（六分之一格林），0.025公分（三分之一格林），0.05公分（四分之三格林），0.075公分（一又四分之一格林），及0.1公分（1.5格林）各1管。

內服鐵砒合劑。最有和緩功效。

每片內含0.5公絲砒質及30公絲鐵質。

成人：每日服2-6片。

兒童：按年齡加減每日由1-3片餐後服用。

包裝：每瓶60片。

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>愛兒杜方 'Eldoform'</p> <p>蘇酸與酵母合劑</p>		<p>各種腸炎加答。夏日水瀉，吐瀉等。結核症與流行性感冒之消化失常以及各種急性慢性消化失職。</p>
<p>益利特靈 'Elityran'</p> <p><i>A preparation of natural thyroid</i></p>		<p>甲狀腺機能不足例如： 粘液性水腫。 肥胖症。 對於水腫功能增進水份之排泌。調整循環系。有利尿之功。 又有督促骨質生長之作用。不易痊癒之骨折最宜用之。局部用於下腿潰瘍，防制血栓成形。</p>
<p>恩託同 'Entodon'</p> <p><i>Hexamethyl-di-amino-iso-propanol-diiodide</i></p>		<p>血壓過高，血管硬化，血管瘤，狹心症，大動脈弓痛，氣管枝性氣喘，慢性氣管枝炎，淋巴腺腫，半身不遂，中風，梅毒，鉛中毒等。</p>
<p>Ephedrin</p>		<p>參看「拉西特靈」'Racedrin'</p>

拜耳大藥廠

性質		劑量及用法
<p>止瀉收斂消炎劑 功能收斂腸壁。在胃中不起作用。入腸遇鹼性反應。即刻分解生效。其中醱素功能培植腸中有益菌類之繁殖。本品味佳無弊。尤宜於小兒科之用。</p>	<p>成人：每日3-4次。每次1-2片。 兒童：每日3-4次。每次半片。傳染性腹瀉宜在服用本品之前。先服瀉劑(例如甘汞與「一試滌淨」等)清腸。 包裝：每管10及20片。</p>	
<p>甲狀腺劑。統具甲狀腺之各種功效。有完全替代甲狀腺之功。舉凡一切甲狀腺失職症。均宜用之。又有增進新陳代謝與利尿之功。</p>	<p>內服：每日三次1-2片。重症正式粘液性水腫或肥胖過甚可增加劑量至每日3次。每次3片之量。此等情形須在醫師指導之下用之。 肌肉注射：每日或隔日注射一次。由0.5公撮漸增至2公撮。 小兒：按年齡酌減。 每瓶：30片。每片0.025公分亦即10個家兔單位。</p>	
<p>本品見效極速，功力持久不衰。性質純和。易於受耐。雖對於碘質感應過敏之人。亦能耐受。誠理想的注射用碘劑也。</p>	<p>皮下，肌肉或靜脈注射均可。每日注射半至1管。或隔1-2日注射1次。 每盒10管。每管2公撮。</p>	

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>愛利唐 'Ereton' (Vitamin E)</p> <p>「拜耳」戊種維生素劑</p>		<p>女子不孕 (凡生殖腺并無可證明之缺陷亦無生殖器之解剖上的及病理上的不全者)。</p> <p>習慣性小產。有小產危險時 (可與「路脫命」'Lutren'同用)。早產及死胎傾向者。早產兒之人工培養，以及乳汁不足時均宜用之。</p> <p>兒性體格。生殖器發育不全。月經障礙。子宮出血等。均可試用之。男子無生殖機能 (由於精蟲缺乏，精蟲壞死，精液太少等因者)。陽萎。本品可作輔佐荷爾蒙治療用。</p>
<p>安樂根 'Erugon'</p> <p>標準舉九荷爾蒙劑</p>		<p>男子一切由於生殖腺機能不全之症候。由內分泌失職以及精神衰萎之性慾薄弱。</p> <p>舉凡一切精神不振。精神抑鬱。體倦無力。早老先衰等。</p> <p>各種神經衰弱。第一期攝護腺腫大或手術之後。無不咸宜。</p>
<p>伊惟本 'Evipan'</p> <p><i>N-methyl-cyclohexenyl-methyl-malonyl-ureide</i></p>		<p>由於不易成眠之睡眠不足。或早醒等等睡眠失常。</p>

拜耳大藥廠

性 質



劑量及用法

內含充足天然戊種維生素。由動物試驗鑑定效力。兼含各種有關係之磷鹽以及植物萌芽內之整個乙種維生素組合物。

普通 每日三次。每次一片。
重症：有小產危險時。有嚴重精蟲成形障礙者。宜增量服用。於一至二星期內。每日服3次。每次可服至3片之多。

包裝：每盒20片。

另性生殖腺荷爾蒙劑。
用鷄冠試驗。測定其效力。
以鷄單位為標準。兩個鷄單位等於六十個鷄冠單位。

宜肌肉注射（不可靜脈注射）。每日或隔一二日注射一次。每次一管。共注射十次。嚴重症候可用廿次。

內服：每日3次，每次1-2片。

安瓿：每盒2管，每管1公撮。每公撮等於兩個鷄單位。

大盒：10管。每管份量同上。

片劑：每瓶30片。每片0.25鷄單位。

特效促成睡眠劑。
服後經廿分鐘即能成眠。并不使睡眠過度延長。服後須經少時即已完全分解外。醒後不起絲毫後作用。故不刻清爽。絕無軟倦睡之感也。

上床前用以催眠時。可服一至二片。半夜醒後。不能重眠者。只須服一片已足。

用時宜將藥片溶於半玻璃杯熱茶湯之內服下。

每管10片。每片0.25公分。

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>納伊惟本 'Evipan'-Sodium</p>	<p><i>Sodium salt of N-methyl-cyclo- hexenyl-methyl- malonyl-ureide</i></p>	<p>靜脈麻醉劑 外科上以及產科上醜酞生產用。</p>
<p>凡食泰 'Festal'</p>	<p>性質固定胰腺酵素 製劑</p>	<p>腸腺分泌不全之消化失職腺機能 不調。腸臟多屍。胆囊胆道之附帶 症象。慢性胰腺症候。各種慢性腸 胃症候。 腸部行 X 光攝影之前。用以驅腸氣。 十二指腸，大腸以及胆道等經手術 後之善後治療。 進行性肌肉萎縮症可試以本品與 glycocoll. med. 合併治療頗見功 效。</p>
<p>福錄 'Fouadin'</p>	<p><i>(Neo-Antimosan) 6.3 per cent. solu- tion of antimony III-pyrocatechine disulphomate of sodium</i></p>	<p>各種住血蟲病。皮膚與粘膜之利什 曼氏小體症。 鼠蹊淋巴腺腫。熱帶花柳病性肉芽 腫。麻瘋亦可試用之。 三價錫劑。肌肉注射。毫無痛楚。 為日本住血蟲專藥。最有縮短治療 時間之特效。</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
-----	---	-----------

最優良靜脈注射麻醉劑。性質純和。各種病人。均能受耐。一經注射。即刻麻醉。深沉之麻醉時間。約有十至廿分鐘之持久。

每包內均附有詳細用法說明書。
 包裝：
 每盒：5 管。每管 0.5 公分。
 附蒸溜水 5 管。每管 5 公撮。

醫院用：每盒 25 管每管 0.5 公分。不附蒸溜水
 每盒 5 管。每管 1 公分。附蒸溜水 5 管。每管 10.5 公撮。

醫院用：每盒 25 管。每管 1 公分。
 附蒸溜水 25 管。每管 10.5 公撮。

醫院用：每盒 25 管。每管 1 公分。
 [不附蒸溜水]

性質固定之胰腺酵素製劑。內含胰腺之脂肪分解酵素，澱粉分解酵素蛋白質分解酵素，以及纖維質分解酵素等。本品係片劑外用之糖衣具有防酸性。故入胃不化。達腸遇鹼性反應後始起分解發揮作用。其功力毫不受破壞之影響。

每日 3 次。每次 1 片。餐後囓圖吞下。不可咬碎。
 嚴重或頑固症例。可酌量增加劑量。在腸部行 X 攝影之前 2-3 日即宜服用本品以清腸中積氣。使攝影清晰。
 每瓶 20 及 50 片。

肌肉注射：
 成人：〔體重約六十公斤者〕第一日用 3.5 公撮。第二，三，五，七，九，十一，十三，十五，十七日每日各用 5 公撮。
 小兒：十公斤體重用 1 公撮。初量宜減少。一次之量。按該童體重幾多公斤即以此比例用幾多公撮「福錄」。

一全劑包裝：
 成人用：每盒 10 管。3.5 公撮裝 1 管。5 公撮裝 9 管。
 每盒 15 管。3.5 公撮裝 1 管。5 公撮裝 14 管。
 兒童用包裝：每盒 10 管。0.5 公撮裝 1 管。1.5 公撮裝 1 管。3.5 公撮裝 8 管。

拜耳大藥廠

品 名	適 應 症
<p>芬固爾 'Fungol'</p> <p>有機碘質麝香草腦及石碳酸屬化合物合劑</p>	<p>香港脚。錢癬。趾間濕癢。以及一切黴菌性皮膚症。</p>
<p>加 當 'Gardan'</p> <p>「霹藍米藤」與「羅瓦而精」之分子的結合物</p>	<p>各種痛楚。例如頭痛牙痛，四肢痛，偏頭痛神經痛等。</p> <p>一切感冒受涼傳染病。特別對於流行性感冒，關節肌肉萎麻質斯。坐骨神經痛腰痛等。</p>
<p>拜耳二〇五 'Germanin'</p>	<p>非洲睡疫</p>
<p>格樂維妥 'Gravitol'</p> <p><i>Diethyl-amino-ethyl-ether of 2-methoxy-6-allyl-phenol</i></p>	<p>產後出血，小產出血，產後子宮鬆弛出血不止。以及子宮發炎子宮弛張之出血(月經過多等)發育期以及絕經期之出血。</p>
<p>庫阿可斯 'Guaiacose'</p> <p>「所買妥司」佐以7% <i>guaiacol-calcium-sulphonate</i></p>	<p>呼吸器官病(肺癆，肺炎，氣管枝炎，氣管枝擴張，氣管炎等)。病後尤以傳染病後以本品作為調理之用。最為適宜。功能促進全愈。</p>
<p>海而密妥 'Heimitol'</p> <p><i>Anhydro-methylene-citrate of hexa-methylene-tetramine</i></p>	<p>細菌尿，腎盂炎，膀胱炎，腎石症，白濁性尿道炎，尿管膿瘍。</p> <p>預防用：膀胱內開刀，行泌尿系插入導管手術均宜先用。以免枝節。猩紅熱用之。有預防腎臟炎之功。</p>

拜耳大藥廠

性 質	劑 量 及 用 法
<p>強力殺菌劑。功能深入肌膚。立使患區恢復健全之狀態。應用本品毫不着色。且有藥到癢止之神效。</p>	<p>每晨浴後用本品塗搽患處。較重症候每日須塗搽二次。用藥後最好以繃帶包紮。</p> <p>包裝 每瓶廿公撮</p>
<p>「加當」功能止痛消炎。退熱解風濕。性質和平。雖久服或大量。均能受耐。毫無流弊。</p>	<p>片劑：每日 3-4 服。每服 1 片。嚴重痛症。可服至每次 2 片。(0.5 公分)</p> <p>包裝：每管 20 片裝。每片 0.125 公分。10 片裝。每片 0.5 公分。</p>
<p>(參看第 78 頁)</p>	<p>—</p>
<p>子宮止血劑。</p> <p>功效與麥角劑相同。平均持久。但無其弊。毫不影響血壓。內服與注射均可。</p>	<p>皮下或肌肉注射。每次 1 公撮。每日可注射數次。</p> <p>內服：每次一片。每日服 3-4 片。亦可增至 6 片。餐時或餐後用水送下。</p> <p>包裝：每管 20 片。每片 0.02 公分。</p> <p>每盒 3 管每管 1 公撮。</p>
<p>應用便利。功力迅速之癒創木製劑。其中之癒創木有治療之功。而「所買妥司」則特具開胃補養之益。用之有相得益彰之效。</p>	<p>成人：每日服 2-3 次。每次 1 湯匙。</p> <p>小兒：每服 1-2 茶匙。最好與牛奶或可可混服。</p> <p>包裝：每瓶 150 公分。</p>
<p>味佳性純。定痛殺菌之膀胱消毒劑。驗性尿症用之亦有特效。本品性質平和。久用最宜。</p>	<p>每日服 3-4 次。每次 1-2 片。溶於水內或糖水內服。</p> <p>包裝：每管 20 片。每片 0.5 公分。粉劑每瓶 25 公分。</p>

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>益多納 'Hydronal' <i>Aluminium hydroxide with marked gelforming property</i></p>		<p>胃酸過甚，刺痛，噁心，痙攣等以及胃炎，胃潰瘍。十二指腸潰瘍。幽門狹窄。</p>
<p>赫破弗辛 'Hypophysin'</p> <p>內含腦下腺後葉有效成份</p>		<p>產出期。子宮陣痛微弱。平產用之。可使產出加速。產後子宮弛緩出血。剖腹手術後之腸麻痺。氣管枝性氣喘。胆石腎石用之有助進結石外排之功。</p>
<p>伊可賴 'Icoral' <i>M-hydroxy-N-ethyl-diethyl-amino-ethyl-aminobenzol + m-hydroxy-phenyl-propanol-amine in the proportion of 4:1</i></p>		<p>各種虛脫。例如手術後，傳染病中，(肺炎，流行性感冒，白喉，猩紅熱等。)各種中毒之心臟衰弱(煤氣，吞服生鴉片，安眠藥)以及初生兒窒息等皆宜用以急救。</p>
<p>意利倫 'Iliren'</p> <p>腎上腺皮質荷爾蒙劑</p>		<p>愛迪森氏症。傳染症後(白喉等)不易復元(與「康泰」合用)。無力。衰萎。太瘦。青年時期之腦下腺失職性惡病質。兼有身體發育障礙者。(與「百樂朋」'Preloban'合用)。</p>

拜耳大藥廠

品 名	適 應 症
<p>應必妥 'Impletol'</p> <p>「奴佛客因」與咖啡 英合劑</p>	<p>各種機能性與器質性頭痛。偏頭痛。失眠。慢性中耳炎。狹心症。膽囊，胃部之慢性疾患。頭腦受傷之各種機能障礙。以及外傷性癱瘓。末梢神經痛及坐骨神經痛。</p>
<p>因 蘇 林 Insulin »Bayer«</p> <p>胰島腺荷爾蒙劑</p>	<p>糖尿病。糖尿病之昏厥。由於糖尿病之癱疽，壞死。手術後之酸中毒。嚴重孕娠嘔吐。急性黃膽肝萎縮症。非糖尿病者用作肥胖劑。精神病。</p>
<p>一試滌淨 'Istizin'</p> <p>1:8-dihydroxy-anthraquinone</p>	<p>便秘，大便不暢。</p>
<p>局卡潑拉 'Jocapral'</p> <p>Theobromine 0.5 g 'Prominal' 0.06 g 及 0.075 g iodo-calcium-triethanol-amine 之合劑</p>	<p>狹心症。慢性急性血管痙攣症候。血管硬化。血壓過高之病痛。手足麻痺感覺。心臟性之呼吸短促。氣管枝性氣喘。潛伏性水腫因素。血管痙攣性之痛楚。失眠。月經失整以及絕經期之痛苦。用六〇六劑及鈹劑後。用之為善後調理。</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
<p>統治各種痛楚。用後即有止痛之功。並且效力持久不衰。性質純和。毫無弊害。</p>		<p>每盒之內均附有詳細用法。 包裝：每盒 10 管。每管 2 公撮。</p>
<p>本品係用結晶體因蘇林配成。劑量準確。功效可靠。保證純淨。久貯不變。劑量採取國際單位為標準。製成之後。概經臨床試驗鑑定。</p>		<p>皮下注射。按病情輕重每日用 5-40 單位。重症尚可再加劑量。至 60-80 單位之量。每次量為 2-4 單位。遇糖尿病昏厥。須即用 50 單位至 100 單位靜脈注射及 50 單位皮下注射。靜脈注射葡萄糖液。隔 2-4 小時之距離。陸續再用因蘇林皮下注射。孕婦嘔吐。用 5-30 單位。 包裝：5 公撮管裝。有 50-100-200 及 300 國際單位四種。</p>
<p>性質平和。功力充足之瀉藥。調整腸部秘結。無不極宜。最適於常服久用。久臥病榻者以及產婦等。多感便秘。用本品疏通。尤稱最宜。注意：本品內有色素。故服後小便呈紅色。此等現象。毫無弊害。切莫慮忌。</p>		<p>每次用 1-2-3 片。晚餐後服。兒童酌量減少。 包裝：每瓶 30 及 60 片。每片 0.15 公分。</p>
<p>性質純和。最易耐受之血管調整劑。 用後即有自覺的病症減輕現象。各種血管硬化現象亦有他覺的優良效果。</p>		<p>輕症。每日 3 次。每次半片。 重症。每日 3 次。每次 1 至 2 片。 包裝：每管 20 片。</p>

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>乍 鐵 紅 'Jothion'</p> <p><i>Di-iodo-hydroxy-propane (80% 碘質)</i></p>		<p>凡向用碘酒或碘油膏之處概宜改用本品。關節炎。漿液膜發炎。各種婁麻質斯。尿酸關節炎。神經痛(坐骨神經痛)。腺病腺結核。淋巴腺炎。氣管枝炎。子宮附屬器官炎。皮膚病中，例如鬚瘡。白癬。齒齦炎。齒根骨膜炎。齒槽膿漏。手術時亦可用以消毒切開處替代碘酒之用。</p>
<p>育 維 寧 'Juvenin'</p> <p><i>Yohimbine methyl-arsinate 及 strychnine methyl-arsinate 合劑</i></p>		<p>性神經衰弱。陽萎等。精神衰弱以及神經精神不振。</p>
<p>來 克 諾 'Lacarnol'</p> <p>從組織中提出之核素製劑</p>		<p>狹心症，煙草過度之狹心症。心冠動脈硬化。心臟與血管病症(由血管痙攣而起者)。用本品係有專門根治作用。老人或心臟衰弱者用「來克諾」提高心臟機能之功。此外老人癢癢症。神經痛。僵直硬感。婁麻質斯之肌肉痛。</p>
<p>「拜耳」乳黃素 Lactoflavine »Bayer« <i>6:7 dimethyl-9-(1'-d-ribityl-)-iso-allo-azine</i></p>		<p>此藥尚在開始應用之期。性質項下所述各症用之均頗有效：</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
<p>無臭無色碘劑。一切均在碘酒之上。易為身體攝收。有深部作用。并不污染肌膚。亦少刺激。又不侵蝕器械。</p>		<p>普通用 10-25% 油劑或油膏劑。皮膚感應過敏之人。只用 1-2%。</p> <p>牙科用 10% 製劑。</p> <p>婦科用 2-5% 作銹紅甘油合劑浸溼紗布栓塞。</p> <p>包裝：油劑 10% 每瓶 25 公分</p>
<p>性神經衰弱以及一切身心衰憊現象之大補劑。其作用極速極短暫。但依以士的年。則可襄其大成矣。</p>		<p>每日 3 次。每次 1 片。最好與注射劑交互應用（每隔一日注射一次。每次一管。皮下注射）。</p> <p>包裝：每瓶 50 片。 每盒 10 管。每管 1 公撮。</p>
<p>本品具有專門擴張心冠動脈力之功用。只須服用數日。即可見效。其作用極速。且無副作用。及呼吸困難等現象。雖經月久。亦無發生。</p>		<p>每日內服 1-3 次。每次 10-25 滴。或每日注射 1-2 次。每次 1 管。肌肉或皮下注射。緊急症例。靜脈注射 1/2-1 公撮。肌肉僵直。可每日用 1-2 管注射於作痛僵直之肌肉內。</p> <p>包裝：每瓶 20 公撮。 每盒 5 管。每管 1 公撮。</p>
<p>功力最大。人工合成。標準乙2。維生發育。見停止。治兼之。</p>		<p>本品每日可以皮下或肌肉注射至 5 管。每盒 5 管。每管 2 公撮。每管含 1 公絲「拜耳」鼠單位。</p>

拜耳大藥廠

品 名



適應症

癆必用
'Lopion'

*Sodium salt of
auro-alkyl-thio-
urea-benzoic acid*

各型各期結核症。尤以復發之肺結核。

此外紅斑性狼瘡。敗血症。遷延性心臟內膜炎。傳染性關節炎。梅毒等。

露 冰 山
'Lubisan'

*Resorcinmono-
butylether-di-
ethylcarbamate*

蟻 蟲 病

無刺激無弊害驅蟲劑。尤以對於蟻蟲最有特效。

盧 蜜 拿
'Luminal'

*Phenylethyl-
malonylurea*

羊癲瘋。子癲。妊娠嘔吐。偏頭痛。舞蹈病。嚴重不眠。各種痙攣。興奮煩躁。悵悶。狹心症。血壓過高。拔塞多氏症。

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
特別解除毒性之金劑。可用高量。功力深大。		靜脈注射。第一次 0.01 公分。隨即加至 0.1 公分。病人能受耐者即漸加至每次 0.5 公分。每隔 6-8-10-14 日注射 1 次。肌肉注射量。用至 0.25 公分。 包裝：管裝分 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 及 0.75 公分等。

劑 量 按 照 年 齡 及 體 重 約 數 規 定

年 齡	大 約 體 重	每 日 量
10 歲 及 以 上 者	30 公 斤, 及 以 上 者	6 膠 囊 或 12 公 分 粉 粒 劑
7-9 歲	23-27 公 斤	5 膠 囊 或 10 公 分 粉 粒 劑
5-6 歲	18-20 公 斤	4 膠 囊 或 8 公 分 粉 粒 劑
3-4 歲	14-16 公 斤	3 膠 囊 或 6 公 分 粉 粒 劑
1-2 歲	10-12 公 斤	2 膠 囊 或 4 公 分 粉 粒 劑

上述之量均每日清晨空腹時一次服之量。
 第二第三日在服完「露冰山」後。隔 3 小時即服足量蓖麻油一劑。
 不論膠囊或粉粒劑均不宜嚼碎。可用水吞下。
 粉粒劑係為小兒而備。因小兒不會吞嚥也。
 包裝：每瓶 20 粒膠囊。每粒 0.15 公分。
 聽裝粉粒劑。每罐 40 公分。

世界馳名羊癇瘋專藥。功效最可靠。預防兼治療肌肉及平滑肌各種痙攣性病症。又為強有力之鎮靜劑，安眠劑。	羊癇瘋：用增加又復遞減服法。每日之劑量自 0.05-0.2 公分。失眠用 0.1-0.2 公分一日量。失眠兼有輕度興奮狀態者。每日量 0.2-0.4 公分。子癇有強力動作不安者。每日量 0.4-0.6 公分。用 20% 盧蜜拿溶液亦佳。 本品之最大每日量為 0.8 公分。最大每次量為 0.4 公分。 包裝：每瓶 10 及 50 片。每片 0.1 公分。 每瓶 10 及 50 片。每片 0.3 公分。 粉劑 10 公分及 25 公分二種。
---	--

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>盧蜜拿粒吞 'Luminalettes'</p> <p>即極小量「盧蜜拿」劑</p>	<p>久用「盧蜜拿」治羊癇瘋時。用本品最宜。血管與平滑肌痙攣狀態。血壓過高。血管神經失職。狹心症。偏頭痛等。</p> <p>血管硬化之血管痙攣。氣管枝性氣喘。百日咳。巴塞多氏症。絕經期之各種痛苦。</p>	
<p>盧蜜拿溶液 20 % 'Luminal' Solution 20 % <i>Phenylethyl-malonyl-urea dissolved in an inert bland medium</i></p>	<p>嚴重不眠症。興奮不甯。精神困悶煩躁。羊癇瘋質。嚴重孕娠嘔吐。小兒痙攣質。破傷風。戒絕嗎啡。</p>	
<p>鈉 盧 蜜 拿 'Luminal' Sodium</p> <p><i>Sodium salt of phenyl-ethyl-malonylurea</i></p>	<p>適應症與用途全「盧蜜拿」。</p>	
<p>路 脫 命 'Lutren'</p>	<p>習慣性流產或有小產之危險現象時。女子不孕。非經期之子宮出血。無月經。月經痛。月經艱難。</p>	

黃體荷爾蒙劑

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
解痲。無催眠作用。		按年齡與身體狀態酌用。每日量自 2-6-8 片。 包裝：每管 30 片。每片內含 0.015 公分「盧蜜拿」。
久貯不變，肌肉注射「盧蜜拿」液劑。例如內服不及或不能內服時。用本品注射最為相宜。（與水溶液劑不能混合）。		肌肉注射，成人每次 1 公撮。乳嬰 0.3 公撮。小兒 0.5 公撮。較大兒童 0.75 公撮。每日可以用至 2-3 次。（不可靜脈注射！）。 包裝：每盒 10 管。每管 1 公撮。
易溶於水之「盧蜜拿」劑。供製「盧蜜拿」液之用。例如灌腸用或作坐錠。		本品為消毒溶液可作肌肉注射之用。 每次最大量 0.4 公分。 每日最大量 0.8 公分。 包裝：每盒 5 管乾裝。每管 0.22 公分。另有瓶裝粉劑每瓶廿五公分。
黃體荷爾蒙劑。		劑量及用途。詳情請看仿單。 包裝：每盒 1 管 3 管及 5 管。每管 1 公撮（2 個國際單位）。另有 5 管裝。每管亦 1 公撮（但為 5 個國際單位）。

拜耳大藥廠

品 名	適 應 症
<p>孟納妥爾 'Manetol'</p> <p>由脊髓中提煉出之有效成份</p>	<p>各種出血不止。肺癆咯血。鼻腔，咽喉，腸胃，泌尿系道等處之出血不止。尤宜於膀胱攝護腺以及產婦科上之出血不止。</p> <p>預防；手術之前用之。可使出血減至最低限度。呈胆黃現象者均有出血傾向。在施手術時咸宜先用預防出血不止。</p>
<p>米格來靈 'Migraine'</p> <p><i>Antipyrin caffeine-citrate</i></p>	<p>各種原因之頭痛。偏頭痛，神經痛，烟酒過度之痛苦。神經衰弱者之頭部脹感。</p>
<p>滅 疥 'Mitigal'</p> <p>有油液與油膏兩種製品</p> <p><i>Dimethyl-diphenylene-disulphide</i></p>	<p>一切寄生蟲癢性皮膚病。疥瘡。蝨病。糠秕疹。鬍鬚。寄生性匍行疹〔斷髮泡疹〕。各種癢疹。膿泡疹。面部痤瘡。酒糟鼻。</p>
<p>「新六〇六」 「新洒爾佛散」 'Neosalvarsan'</p>	<p>詳載第 134 頁</p>

拜耳大藥廠

性 質	劑 量 及 用 法
<p>生物鑑定起生理作用之特效止血劑。 有縮短出血時間之功。</p>	<p>注射次數視出血時間與輕重而定。普通情形在廿四小時用 1-3 次。行肌肉注射即已足夠。重症無疑的可於一日之內注射 5-6 管。 局部止血。可用 1 比 5 倍沖淡「孟納妥爾」浸濕紗布栓塞患處。 包裝：每盒 1 管及 5 管。每管 1 公撮。</p>
<p>止痛專藥。統止各種神經痛。</p>	<p>每日服 2-3 片。每片 0.37 公分。每日可服數次。 包裝：每管 21 片。每片 0.37 公分。另有粉劑。</p>
<p>毫無刺激性。有機性硫磺劑。功力可靠。殺蟲消炎。止癢如神。應用便利。不污衣被。</p>	<p>癢癢性皮膚病。早晚各搽一次。疥瘡。須各處塗到。大約 150 公分瓶裝者約分於三日內用完。 小兒身上有多處搔破時。宜起始數日只用較小量搽於搔破之處。 包裝：每瓶 30, 75 及 150 公分油劑 錫管裝油膏。</p>

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>新斯錫波霜 'Neostibosan'</p> <p>[可參看「聖露斯錫波霜」] <i>p-amino-phenyl-stibinate of diethyl-amine in strongly detoxicated and stabilised form</i></p>		<p>黑熱病，及皮膚利什曼氏蟲病。</p> <p>性 質 「新斯錫波霜」為五價錫劑。性質特別純和。易於受耐。而功力則特大。較之舊劑可以縮短甚多治療時間。</p>
<p>新烏利龍 Neo-'Uleron'</p> <p><i>4(4'-aminobenzol-sulphonamide)-benzol-sulphon-mono-methylamide</i></p>		<p>各期各種白濁。</p> <p>軟性下疳及葡萄球菌疾患。據動物試驗上本品對於肺炎菌疾病效果極佳。故由此菌釀成之病症概可試用之。</p>
<p>Nicotinic acid amide »Bayer«</p> <p>「拜耳」 尼古丁酸銜</p> <p><i>The antipellagra factor for human beings. Pyridine-3-carboxylic acid amide</i></p>		<p>玉蜀黍病。</p> <p>續發性玉蜀黍病 (例如腸胃大手術之後。腸部傳染病中，酒徒)。</p> <p>症象：(暈眩) 頭痛，肌肉痛，關節痛，軟倦無力，皮膚起灸覺，便秘或下瀉，無欲以及精神困頓等。</p> <p>皮膚病症，由於肝臟疾患以及嗜酒過度釀致者。夏季水泡症。</p> <p>以及各種對於光亮感覺過敏症象。變態反應，(眼臉水腫) 等均可試用之。</p>

拜耳大藥廠

性 質



劑 量 及 用 法

靜脈或肌肉注射。

乳嬰，二歲以下小兒。初用 0.05 公分。漸增至 0.1 公分。
二至四歲小兒初量 0.05-0.1 公分。漸增至 0.2 公分。五至
九歲小兒。初量 0.1 至 0.2 公分。漸增至 0.25 公分。十歲
至十五歲兒童。初量 0.2 公分。漸增至 0.3 公分。

成人。初量 0.2 公分。第二次 0.3 公分。漸增至 0.45 公分。
此亦為最高每次量。總共須注射 8-10 針。

包裝：每盒乾裝 1 管 0.05 公分。1 管 0.1 公分。1 管 0.2 公
分。1 管 0.3 公分。10 管 0.3 公分。

醫院用包裝：每乾裝管。1, 2 公分及 3 公分。

內服化學治療劑。主治白濁
及一切葡萄球菌釀成之病症
。「新烏利龍」治療白濁成績
驚人。只須服完一短劑（共
十二公分）。竟達百分之八十
以上全愈。

詳細用法。最好請參看包內
所附之仿單。

包裝：每管 24 片。每片 0.5
公分。
每瓶 250 片。每片 0.5
公分。

尼古丁酸鈣。係動物儲於體
內抗玉蜀黍病之原質。
此物與尼古丁完全不同。毫
無毒性。故雖用大量。亦無
弊害。

普通每日皮下或肌肉注射 1
至 2 管。每管含 0.1 公分有效
成份。或內服 1-3 片。每片
0.25 公分。

包裝：每盒 10 管。每管 2 公
撮。每管 10 片。每片
0.25 公分。

拜耳大藥廠

品 名



適 應 症

羅瓦而精
'Novalgin'

*Sodium phenyl-
dimethyl-pyrazolon-
methyl-amino-
methane sul-
phonate*

各種痛楚。雖最嚴重之痛楚用之亦有止痛之功。例如膽石腎石疝痛。關節肌肉婁麻質斯。腰痛。坐骨神經痛。產婦陣痛。用之亦可輕止。各種神經痛以及感冒受涼傳染病。例如傷寒。肺癆等。

「羅納羅瓦而精」
'Novalgin'-Quinine

最有挫治一切受涼症候。尤以流行性感冒，各種痛楚，關節肌肉婁麻質斯，神經痛，月經痛楚，以及產後陣痛等用之最佳。

拿佛阿色羅
'Novasurof'

*Double compound of
sodium oxymercuri-
o-chlor-phenyloxy-
acetate and diethyl-
malonyl-urea*

不論由於心臟或腎臟失職之水腫。肥胖過度者用以減除體內水份。梅毒。
禁忌：腎臟絲球炎。嚴重腎臟硬化與嚴重惡液質病。

奴佛容因—可白息液
'Novocain-Corbasil'
Solution

「奴佛容因」與
「可白息」合劑
「可白息」之化學名稱
為 *O-dioxy-phenyl-
propanolamine*

局部麻醉用。

拜耳大藥廠

性 質



劑 量 及 用 法

內服或注射之最新特效止痛藥。消炎，退熱，除風濕。用之即見痛止之功。注射尤靈。遜可取嗎啡等劑以代之。性質純和。雖在饑餓，衰弱不堪之人均能受耐無礙。

內服：每日3-4次。每次1-2片。或每日3-4次。每次服滴劑20-40滴。0.5-1公分嚴重痛楚。每次可服5公撮每日2-3次。肌肉注射每次1-2公撮。每日可注射2-3次。靜脈注射0.5-1.2公撮。每日1-2次。

嚴重痙攣性疝痛。(結石痛) 則每日可用注射1-2次。每次5公撮。

包裝：每管10片。每片0.5公分。50%液劑
每盒5管每管1公撮。每盒5管每管2公撮。
每盒5管每管5公撮。尚有滴劑與粉劑。

特效退熱止痛靈藥。「蘇納羅瓦而精」係由止痛與鎮靜等劑組合而成之良藥。因之在治療方面有協同作用。使功力尤偉。

每日1-3次。每次1-2片。按病情增減。不宜在空腹服下。最好在餐後用之。
包裝：每管10及20片。每片0.25公分。

水溶性承劑。供肌肉與靜脈注射用。性質純和。利尿功用特大。且持久不衰。又為治療梅毒之承劑。

每次注射1-2公撮，每1星期內注射1-2次。臀肌或靜脈注射。
包裝：每盒10管每管1公撮。每盒10管每管2公撮。

雖對於腎上腺素感應特別過敏之人或循環系患病者。概可採用本品。作為局部麻醉用。亦毫無任何危險與副作用(例如，掙扎不安，顫抖，盜汗心跳以及甚而至於虛脫等。)

溶液：E 2%
包裝：每盒20管每管2公撮。每盒100管每管2公撮。每瓶25公撮。

拜耳大藥廠

性

質



劑量及用法

浸潤麻醉：「奴佛客因」溶液 0.5% 加「蘇潑拉來甯」
'Suprarenin'。

傳導麻醉：1-2% 「奴佛客因」溶液加「蘇潑拉來甯」。

脊椎麻醉：5% 「奴佛客因」溶液加「蘇潑拉來甯」。

鼻喉科：5-10-20% 「奴佛客因」溶液加「蘇潑拉來甯」作點
滴或塗搽之用。

眼科：2-5-10% 「奴佛客因」溶液加「蘇潑拉來甯」。

泌尿科：3% 「奴佛客因」與銀液劑合併應用。

牙科：1-2-4% 「奴佛客因」溶液加「蘇潑拉來甯」。

內用：「奴佛客因」之一次劑量為 0.5 公分 (七·五格林) 或
較小量。「可白息」'Corbasil' 1% 溶液之用量 (滴數) 宜與
1 比 1000 之「阿得列那林」或「蘇潑拉來甯」相同。至多用
30 滴。不得再增加。表面麻醉須加 1-10 滴「可白息」於麻
醉劑中。

「奴佛客因」粉：每瓶 5 公分及 25 公分。

「奴佛客因」「蘇潑拉來甯」溶液：「A」0.5% 溶液每瓶 25
公撮。「B」2% 溶液每盒 10 管每管 2 公撮。「C」5% 溶液
每盒 10 管每管 3 公撮。「E」2% 溶液每盒 20 管每管 2 公
撮，每盒 100 管每管 2 公撮及瓶裝 25 公撮。

功力迅速持久之補腦養神強
身體體良藥。其中之砒質與
士的年均均有調整新陳代謝促
進心身之特效。用後無不即
有神爽體健心身愉快之功。

每隔 1 日皮下注射 1 公撮。
感應靈敏之人則每星期內注
射 2 次。每次 1 公撮。
包裝：每盒 12 管。每管 1 公
撮。

專門影響子宮收縮之腦下後
葉荷爾蒙劑。專對子宮起作
用。決不影響血壓，腸壁蠕
動，以及利尿作用。故雖患腎
病，血壓增高以及子癩之產
婦，亦能應用無礙。劑量以
「飛靈」單位 V.U. 為標準。

肌肉或皮下注射。助產用 1 1/2
-3 V.U. 產後用。可用至 4-6
V.U. 或 1 1/2-3 V.U. 用生理
食鹽水沖淡。緩慢靜脈注射。
「臥褥定」每公撮 3 飛靈單位。
包裝：每盒 3 管每管 1 公撮。
每盒 10 管每管 1 公撮。

拜耳大藥廠

品 名		適應症
<p>保妥耐 'Padutin'</p> <p>調整血管荷爾蒙劑</p>		<p>老年人循環系障礙。頭脹，頭暈，腦血管硬化。輕度精神不振。血壓過高。步行維艱。絕經期痛苦。手足麻木。癢癢。因血行不暢之組織營養不良。血管痙攣。指端青紫。指端麻木。尖端雷腦氏壞疽。血管栓塞。間歇性跛行症。此外： 下腿潰瘍。皮膚硬化。胃潰瘍。十二指腸潰瘍。Ménière 氏病（耳病性昏眩）。</p>
<p>旁弗拉文錠 'Panflavin' Tablets</p> <p><i>Active principle is 'Trypaflavine' (acriflavine)</i></p>		<p>預防各種傳染病；受涼流行性感冒，白喉，猩紅熱，多發性脊髓炎。腦膜炎。以及口腔各種病症。潰爛。喉蛾。口腔炎。齒齦炎。鵝口瘡。口腔，咽喉加答。</p>
<p>本妥卡因 'Pantocain'</p> <p><i>p-butyl-amino-benzoyl-dimethyl-amino-ethanol hydrochloride</i></p>		<p>各種局部麻醉。尤最適於表面麻醉。</p> <p style="text-align: center;">——</p> <p style="text-align: center;">性 質</p> <p>局部麻醉劑。遠較古加英無毒。又無其易於成癮之弊。特別能在表面麻醉上取古加英而代之。只須極淡溶液即已有極速極久之麻醉作用。性質純和。毫無刺激。人身易於受耐。在中性溶媒中極易溶解。可經消毒而不變質。與腎上腺素混合亦宜。</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
-----	---	-----------

血管擴張特效劑。特別對於末梢血管。調整循環系。	肌肉注射。起初每日2次。每次半管。三日後則可每日2次。每次1管。如尚感劑量不足。則可增至每日2次。每次2管。再增量亦可。
-------------------------	--

內服：每日3次每次10滴或1片(=3個單位)。
 靜脈注射40-80單位。用1-2公升生理食鹽水沖淡。約於八至十小時內灌畢。
 包裝：每盒5管。每管1公撮。(每公撮等於4個生物單位)。
 每瓶10公撮(每公撮=7個生物單位)。
 每管20片。(每片等於3個生物單位)。

含劑：化學治療消毒良藥。口腔，咽喉等部用以消毒預防傳染最佳。功能制止白喉菌，鏈球菌肺炎菌以及其他病原菌之繁殖發育。完全無弊害。味亦甘美。	每1-2小時含1片於口內。任其緩緩溶解。 包裝：每瓶40片。
--	-----------------------------------

「本妥卡因」用為各種局部麻醉。無不咸宜。浸潤麻醉用1‰溶液(佐以0.0005%蘇澄拉來寧)。(耳鼻喉科用1‰溶液。佐以0.0025%蘇澄拉來寧)傳導麻醉用1-2‰溶液(佐以0.005%蘇澄拉來寧)。表面麻醉用0.5-2%溶液。(大約用1-2公撮)。脊髓麻醉用特製「本妥卡因」安甌。“dry ampoules”係10公絲乾裝。用時抽出脊髓液2公撮將其溶解。成為1/2%溶液。

眼科用1/4-1%溶液。油膏劑為0.2%
 呃逆：(打噎)用1-2%液一兩滴。滴於鼻粘膜上。膀胱麻醉。用0.1-0.2%液。
 包裝：片劑：每片0.1公分。每瓶10片。
 粉劑：每瓶1及5公分。
 液劑：每瓶25公撮。
 乾安甌：每盒5管。每管10公絲。
 (脊髓麻醉用)

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>北里多 'Pellidol' <i>Diacetylamino-azotoluol</i></p>		<p>各種破皮，創口，濕疹，下腿潰瘍等。</p>
<p>辨阿保羅的 Per-'Abrodil' <i>3:5-di-iodo-4-pyridon-N-di-ethanolamine acetate</i></p>		<p>腎盂，導尿管，膀胱與血管之區分，關節，漏管等處行 X 光攝影用之遮光劑。 禁忌：病人感應過敏。(鑑別方法詳載仿單)。 重篤之分泌機能薄弱，一般身體狀態極弱之腎臟病人。淋巴腺質者。肺癆與孕婦無忌，</p>
<p>辨阿保羅的 強號 Per-'Abrodil' »forte« <i>3:5-di-iodo-4-pyridon-N-di-ethanolamine acetate + 3:5 di-iodo-4-pyridon-N-di-ethylamine acetate</i></p>		<p>靜脈注射泌尿系 X 光攝影遮光劑。 禁忌與「辨阿保羅的」同。</p>
<p>福 眠 錠 'Phanodorm' <i>Cyclo-hexenyl-ethyl-malonyl-urea</i></p>		<p>各種原因之失眠。各種興奮不寧。精神悵悶以及腦部病患之後。心悸怔忡。顫抖等。</p>

拜耳大藥廠

性 質	劑 量 及 用 法
	
<p>生皮名藥。功力最速最可靠。</p>	<p>製有現成2%油膏。 每錫管25公分。</p>
<p>靜脈注射 X光攝影用遮光劑。只須靜脈注射 20公撮 35% 溶液。即可攝得上述各器官之極清晰照片。可以隨便注射。不似其他老劑。在注射時必須十分緩慢也。本品性質純和。毫無刺激與痛苦。以本品用導尿管輸入亦可攝得明顯照片。用本品注入漏管，或關節內亦無痛楚。</p>	<p>乳嬰：靜脈注射 2-3公撮。一至三歲小兒用 8公撮。三至十二歲用 10公撮。十二至十五歲用 15公撮。十六歲以上者與成人同量。用一管等於 20公撮。注射時間約 3-5分鐘。 以導管輸入用 20% 液劑。小兒有時亦可行皮下注射。約 20-50公撮 7.5% 液。</p>
<p>關節攝影用 3 公撮現成溶液。 包裝：現成溶液 35%。每管 20 公撮。</p>	
<p>靜脈注射 X光遮光劑。為 50% 現成液劑。用之所攝影片。更較清晰明顯。因其外排緩慢。故攝影亦可從容進行。性質平和。毫無副作用之虞。</p>	<p>成人：每用一管 20 公撮。靜脈注射。注射時間。約 3 至 5 分鐘。 包裝：每管 20 公撮。50% 溶液。</p>
<p>安眠劑。本品在體內破壞極速。故外排甚易。服者清醒亦快。因之次晨醒後清爽。決無不快之軟倦感覺。</p>	<p>成人每服 $\frac{1}{2}$-1 片。 小兒每服 $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ 片。 較大兒童 $\frac{1}{2}$-$\frac{3}{4}$ 片。 服時將本品溶於少許熱茶水中服下。 包裝：每管 10 片。每片 0.2 公分。</p>

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>福眠錠鈣 'Phanodorm'-Calcium 「福眠錠」之鈣鹽。</p>		<p>各種原因之失眠。各種興奮不甯。精神振悶以及腦部病患之後。心悸怔忡。顫抖等。</p>
<p>百司母因 'Plasmoquine' simplex</p> <p><i>N-diethylamino-isopentyl-8-amino-6-methoxy-quinoline</i></p>		<p>瘧疾</p>
<p>奎諾百司母因 Quino- 'Plasmoquine' 「百司母因」規寧合劑 內服片劑</p> <p>注射液劑</p>		<p>治療預防各型瘧疾。</p> <p>性質</p> <p>其規甯與「百司母因」之混合比例極為適宜。</p> <p>最具撲滅瘧蟲作用。特別對於有性生殖幼蟲更具特效。</p> <p>本品多用於極嚴重症例。例如昏迷狀態。以及不能內服或攝收者(腸胃失職。嘔吐等)。</p>

拜耳大藥廠

性 質	劑 量 及 用 法
<p>攝收較為迅速。故效力較快。在體內破壞亦較速。因之最無不良影響。</p>	<p>服法劑量與「福眠錠」同。 包裝：每管10片。每片0.2公分。</p>
<p>對於有性生殖幼蟲特具功效。人工合成治瘡劑。惡性瘡之有性生殖幼蟲頑固難滅。規寧等對之毫無作用。本品則獨具特效。若與「阿的平」合併治療。不論何種瘡疾概可於最短期全愈。并使復發率降至最低。(參看第76頁「阿的平」章內)。</p>	<p>與「阿的平」合併應用。須在服完「阿的平」後始單用本品。三至五日。每日2-3次。每次1片。(0.01公分)五至八歲小兒。每日一至二次。每次1片。四歲以下小兒。每日只服1片(0.01公分)(參看第76頁「阿的平」)。</p> <p>包裝：每管15片。每片0.01公分。 每管25片。每片0.02公分。</p> <p>注射液劑：1%溶液。 每盒10管。每管1公撮。</p>

內服時必須在餐後。不可空腹服下。并須多飲茶水。

治療：成人。每日三四次。每次1片。一至五歲兒童。每日一二次。每次半片。六至十歲每日三四次。每次半片。十歲以上者可與成人同量。

預防：成人每日1片。一至五歲小兒。每日1/4片。六至十歲每日半片。十歲以上者可與成人同量。

包裝：每瓶12, 50, 250片。每片內含0.01公分「百司母因」0.3公分硫酸規甯。

成人：每日肌肉注射1-2管。每管2公撮。一至五歲小兒用0.5公撮。五至十歲用1公撮。增減劑量。仍與用內服劑時條件相仿。如覺見效。毋須再行注射。隨時可以改用片劑內服。

包裝：每盒5管。每管2公撮含0.02公分「百司母因」及0.6公分規甯。

拜耳大藥廠

品 名		適應症
<p>百司母因複劑 'Plasmoquine' compound 其「百司母因」與規 寧量之比為 1:12.5</p>		<p>瘧疾</p>
<p>百樂朋 'Preloban' 腦下腺前葉荷爾蒙</p>		<p>一切腦下腺前葉失職之疾病。身體發育障礙。新陳代謝失職。總之凡此等與該腺失職有關者。統可用之。</p> <p>性 質 內含腦下腺前葉各種有效成份。可以久貯不變。其劑量係以鷄鰾丸成熟法以測定之。故稱成熟單位。</p>
<p>貝荷肥脫 'Priovit' 內含按生理比例成份之水溶性乙丙維生素屬之組合體</p>		<p>凡兼有新陳代謝提高之各種病症。補充維生素不足之營養。 因身體機能提高 (運動, 巨艱工作等) 所惹起維生素消耗過度時。宜用以補充。</p>
<p>補奴郎 'Prolan' Standardised placental gonadotrophin</p>		<p>出血性子宮病 (由於腺體與濾泡生殖過盛者)。 (絕經期與少女之出血) 續發性無月經。辜丸隱匿症。 此外消瘦過度, 癢癩, 鱗屑癬, 各種小盤骨間之發炎症候。絕經期之初期症象。</p> <p>性 質 第一級生殖荷爾蒙。 採用國際單位 (I.U.)。</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
-----	---	-----------

每片含0.01「百司母因」0.125 硫酸規甯。	成人與十歲以上兒童每日3 次。每次1片。一至五歲小 兒。每日1次。每次1片。六 至十歲每日2次每次1片。 必須在餐後飽腹時服下。 包裝：每瓶30片。
-----------------------------	---

內服：每日3次。每次1片。漸增至每日3次。每次3片。
 1片等於5個成熟單位。

包裝：每瓶30片。

注射：肌肉注射。每星期2-3次。每次1管。(等於25個成
 熟單位)。
 每盒乾裝「百樂朋」3管。附生理食鹽水3管每管1
 公撮。

每片內含。 「培他生」(乙 ₁ 維生素)0.5公 絲。 拜耳乳黃素(乙 ₂ 維生素) 0.25公絲。 「康泰」兩種維生素25公絲。 拜耳 Citrin (P種維生素) 5公絲等。係一標準，久貯不 變之混合維生素製品。	普通成人兒童。每日2次。 每次1片。 乳嬰每日總量1片。壓碎混 於食物中。孕娠中，高熱病 症。因消耗維生素太多。當 然無疑的可以加量。蓋因用 本品而致維生素過量。實莫 須有之事也。 包裝：每管20片。
--	--

肌肉注射：每日用100-300單位。在出血症候每日用500-
 1000-2000單位。須算準。在排卵期用之。

至於「補奴郎」與「百樂朋」(天然腦下腺前葉荷爾蒙劑)之合
 併用法。請參看仿單。

包裝：每盒乾裝5管。每管100國際單位。
 附2公撮裝蒸溜水5管。
 每盒乾裝1管。500國際單位。
 附2公撮裝蒸溜水1管。

醫院包裝：每盒乾裝5管。每管500國際單位。附2公撮
 裝蒸溜水5管。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>普 蜜 拿 'Prominal'</p> <p><i>N-methyl-ethyl-phenyl-malonyl-urea</i></p>		<p>最宜作久治羊癲瘋之用。 雖多年老症亦宜。</p>
<p>普 蜜 拿 粒 吞 'Prominalettes'</p> <p>每片內含 0.03 分 「普蜜拿」</p>		<p>血壓過高，偏頭痛。拔塞多氏症。輕性甲狀腺中毒。精神不甯，神經質。百日咳。神經衰弱。心臟血管神經失常以及困悶感覺等。</p>
<p>百 浪 太 平 'Prontalbin'</p> <p>(前稱無色百浪多息) <i>p-aminophenylsulphonamide</i></p>		<p>同「百浪多息」。請看該章第128頁</p>
<p>「百浪太平」 創口撒劑 'Prontalbin' Wound Powder</p> <p>內含40%「百浪太平」</p>		<p>好氣性菌 (鏈球菌，葡萄球菌，腸鏈球菌，變形桿菌，青膿桿菌等) 傳染之污穢創口。</p> <p>性 質</p> <p>磺胺屬藥品。內服或局部應用治療氣疽等患。用以佐助外科手術之不及。最為相宜。</p>

拜耳大藥廠

性 質	 劑 量 及 用 法
標準羊癩瘋專藥。無催眠副作用。 雖久用不輟。亦無流弊。	按病情輕重酌用，每日用 5-8片。大多數症例。只須2 片，即已足夠。 包裝：每管 10 片。每片 0.2 公分。
解癰特效新劑。 并無絲毫催眠作用。	按年齡與身體狀態每日約服 2-8片。平均分服。 包裝：每管 30 片。每片 0.03 公分。
同「百浪多息」。	包裝：每管 20 片。每片 0.5 公分。每大包裝 1000 片。每片 0.5 公分。

用法：a. 已經傳染或有傳染危險之創口。宜即刻採用 5-20 公分本品撒入創口內。在換紗布時可再用之。

b. 有全身傳染之危險時。除照上法採用撒粉局部應用外。尚須令病人另服「百浪多息」或「百浪太平」。每日 2-5 公分。按病情輕重。酌量增減。但不得連服過八日。如仍須再服。必須在上一劑服完後隔七日方可續服。

c. 氣疽或已有嫌疑時。除局部照上法應用外。應佐以每日 2-5 公分之「百浪多息」或「百浪太平」內服。即先予 2 公分。隨後每隔 4-6 小時服 1 次。每次 1 公分。尚須注射氣疽血清。靜脈注射。

包裝：每罐 50 公分。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>百浪多息注射液 'Prontosil' soluble</p>	<p><i>Di-sodium salt of 4'-sulphonamide- phenyl-azo-7- acetyl-amino-1- oxynaphthaline- 3:6-disulpho-acid</i></p>	<p>丹毒。敗血性喉蛾。多發性關節炎。傳染性關節病。關節婁麻質斯。中耳炎。腦膜炎。產褥敗血病，小產後寒熱。膀胱炎。腎盂炎，膿尿症，胸膜腔蓄膿。鼠蹊淋巴腫。天花。產後及已有傳染之手術，預防發生枝節。膽囊膽道炎，肺炎等均可試用之。每有奇驗。猩紅熱亦可用以預防合併症。本品係一特效化學治療劑。主治一切鏈球菌症候。對於葡萄球菌大腸菌疾患亦有功效。</p>
<p>百浪多息片劑 'Prontosil' rubrum (tablets)</p>	<p><i>4-sulphonamide-2', 4'-diamino-azo- benzol</i></p>	<p>白濁及其後果。瘡口。濕疹。瘡癤。癰疽。眼瞼炎。結膜炎。淚囊化膿等。</p>
<p>普泰哥 'Protargol'</p>	<p>蛋白銀劑。內含 8.3 % 有機銀質</p>	<p>白濁及其後果。瘡口。濕疹。瘡癤。癰疽。眼瞼炎。結膜炎。淚囊化膿等。</p>

拜耳大藥廠

性 質



劑量及用法

應用本品。最要者即係立刻採用足量。並且內服與肌肉注射法同時兼進。

每日用 1.5-3 公分內服。及 0.25-0.5 (或至 0.75) 公分。肌肉注射。皆分三次於一日用。

0.25 「百浪多息」液 = 5 公撮 (1 管) 5% 溶液。

小兒用成人量 $\frac{1}{2}$ 。乳嬰用成人量 $\frac{1}{4}$ 。二歲以下小兒服用本品。宜於服後予以淡鹽酸 (12.5%) 二滴。(每 0.1 公分「百浪多息」用二滴如此類推)。

一經見效之後。即單用內服法至病症全愈亦可。

為防止復發起見。停劑不宜太早。

丹毒單用內服法 (即已甚妥)。因「百浪多息」有極大走皮之傾向。(每日服 1-2 公分。分作三次服用)。

泌尿系病急。單用內服法即已足夠。(每日 1-1.5 公分。分作三次服)。

預防用。每日 1-1.5 公分內服。或肌肉注射 0.25 公分「百浪多息」液劑。不論急性或慢性氣管枝炎。氣管擴張以及扁桃腺炎。咽喉炎。可用「百浪多息」5 公撮 (2.5%) 液劑。

行吸入法。每一星期行 2 至 4 次。

關於直腸灌注用法之詳情。請參看仿單。(例如小兒科上之敗血症等)。

外用：「百浪多息」油膏。可用 5%。

「百浪多息」酒精阿西通混合液。「百浪多息」為 2%。

「百浪多息」與乳糖混合劑。「百浪多息」為 10%。

詳細用途與處方等。請參看仿單。

如果本品須久用 (數星期之久者) 時。則必須請醫師指示。隨時注意血像變化。以及服至相當時期停劑若干日。以免發生流弊。

包裝：片劑：每管 20 片。每片 0.5 公分。

注射液劑：5% 每盒 5 管。每管 5 公撮。

醫院用包裝：每盒 25 管。每管 5 公撮。

久已馳名白濁劑。兼為各等創口消毒妙藥。

本品並不與普通蛋白銀劑相似。「普泰哥」功效極大。又無刺激性。作用可抵達深部。本品調製各種濃度溶液極便。

白濁用 0.25-10% 溶液。

眼科 2-5% 溶液。

沖洗膀胱用 (膀胱炎) $1\frac{0}{100}$ -

$2\frac{0}{100}$ 溶液。

子宮炎用本品沖時。用 10%

溶液。

溶液須用冷水新鮮現製現用

包裝：每瓶 25 公分。

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>霹藍米藤 'Pyramidon'</p>	<p><i>Dimethylamino-phenyl-dimethyl-pyrazolon</i></p>	<p>各種痛楚。偏頭痛。胃痛。噁噎吃逆。月經困苦。關節肌肉萎麻質斯。尿酸關節炎。坐骨神經痛。各種神經痛。感冒受涼與各種傳染病。肺癆潮熱。傷寒。麻疹。腸胃痙攣。氣管枝性氣喘。血壓過高之痛苦。帶狀疹。</p>
<p>拉西特靈 'Racedrin'</p>	<p>Raceme-Ephedrine "Bayer"</p>	<p>虛脫現象。特別因傳染而起之心臟衰弱。以及循環衰弱。 哮喘。哮喘之呼吸困難及重壓感。枯草熱以及其他過敏感應症。變態反應症。坤克氏浮腫。濕疹。皮膚炎。嗎啡莨菪精中毒。瞳孔放大劑。</p>
<p>利法撒 'Revasa' Tablets</p>	<p>Contain as active principle 3 mg. bis-2-methyl-4-amino-quinolyl-6-carbamide hydrochloride</p>	<p>預防流行性感冒，白喉，猩紅熱，脊髓灰白質炎，腦膜炎，口腔喉鼻腔一切病痛，扁桃腺炎，口腔炎，齒齦炎，鵝口瘡，喉口卡答。 患白喉及猩紅熱後之帶菌者之最佳喉口殺菌劑。</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
<p>效驗神速。消炎，止痛，退熱，止神經痛。名藥。對於心腎，血液并無不良影響。對於平滑肌有解痙作用。用少量即有功效。但用大量亦能受耐。</p>		<p>每日 2-3 次。每次 1 片 (0.3 公分) 或 3 片。每片 0.1 公分。多發性關節炎須用大量，可以每日用至 3 公分之多，傷寒肺癆每 1 小時 1 片。每片 0.1 公分。</p>
<p>包裝：每瓶 20 及 100 片。每瓶 10 片。每片 0.3</p>		<p>每片 0.1 公分。另有粉劑。</p>

化學合成交感神經劑。有阿得列那林之完全功效。可以內服。

功效持久。遠勝於阿得列那林。

內服：每日 1/2 片至 1 片。耐受性佳者。每日服 1/2 片或 1/4 片多次。亦可至每日每服 1 片。小兒百日咳每日 1-3 服。每服 0.008 至 0.016。皮下注射。每日數次。每次 1/2 公撮至 1 公撮。

外用油膏及溶液

3-5% 溶液。滴眼用 3% 溶液。每 10 公撮中加「奴佛客因」0.1。每日滴 3-4 次。照上劑亦可用為坐藥。

包裝：每管 20 片每片 0.05 公分。溶液 5% 每盒 5 安瓿。每安瓿 1 公撮。

不染色之化學治療喉口消毒劑。

藥性平和。無害於人。而殺菌之力極大。雖在極稀釋時仍有殺滅鍊球菌，葡萄球菌，肺炎菌，白喉桿菌，傷寒菌及廣腸桿菌等之功。

預防用：每日數次每次 1-2 片。口中含化。

治療用：每小時 1-2 片。小兒按年歲酌減。

包裝：每盒 20 片。

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>雷佛奴耳 'Rivanol'</p>	<p>一切創口化膿，關節傷口，傳染局部或化開之膿瘍，口腔炎，乳腺炎，產褥熱，腹膜炎，體腔蓄膿，扁桃腺炎，泌尿系發炎，膿疱瘡，丹毒，結膜炎，及其他眼炎症。</p> <p>用於腸結核與膀胱結核尤佳。</p> <p>此外用小量之適應症尤多。可參觀下面「雷佛奴耳粒吞」。</p>	
<p><i>2-ethoxy-6:9 diamino-acridine lactate</i></p>	<p style="text-align: center;">性質</p> <p>創面消毒及深處消毒之化學治療劑。殺菌之力極強而對人身細胞則毫無刺激。所以亦可以注入體腔及皮肉之內。</p> <p>對於一切化膿球菌尤有特效（殺滅各種球菌雙球菌）。</p>	
<p>「雷佛奴耳」眼藥膏 'Rivanol' Eye ointment</p>	<p>治一切眼疾 特別是睫邊炎及眼結膜炎</p>	
<p>雷佛奴耳粒吞 'Rivanolettes'</p>	<p>阿苗巴痢及其他傳染性腸病。急性慢性腸炎。大小腸炎。以及乳嬰與幼兒之各種腹瀉。</p>	
<p><i>Pellets containing 'Rivanol' 0.025 g. (gr. $\frac{1}{4}$) and 0.01 g. (gr. $\frac{1}{8}$) for infants</i></p>		

拜耳大藥廠

性 質



劑量及用法

組織深部消毒用液；1:2000 至 1:500 濃度之「雷佛奴耳」溶液（內加 $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ % 成「奴佛容因」）。

又於溶液內加入 5% 右旋糖即成等壓性溶液。

外用為 0.5-1% 之油膏或泥膏。1-10% 乾塗劑。2.5% 撒粉劑。灌腸用溶液 1:10000 至 1:3000。白喉時用 1% 溶液塗喉部。結核病時膀胱沖洗用 1:10000 至 1:5000 溶液。膀胱炎及膀胱痙攣時，有尿急或尿難用 1:5000 至 1:3000。洗鼻用 1:2000 至 1:1000。

1:1000 溶液可用大量灌入腹腔。在盲腸炎手術後可用 300 至 500 公撮灌入腹腔。火燙瘡口包裏用 1:5000 液。靜脈注射 1:1000 溶液。每次可用 50-60 公撮。烙去靜脈瘤在肢體繫緊後注射 1:300 溶液（加 0.1 g 奴佛容因）2-3 公撮。丹毒；於流火交界處距紅腫約 6 公分四圍注射 1:1000「雷佛奴耳」液及同量之 0.5-1%「奴佛容因」液有時仍加入蘇潑拉來甯。

包裝：「雷佛奴耳」粉 10 及 25 公分。

「雷佛奴耳」片：每管 20 片每片 0.1 公分。

安甞：每盒 5 管每管 5 公撮。

毫無刺激易塗於睫緣易搽於眼皮內。一切紅眼用之神效眼藥。

每日一次或數次塗眼內。

包裝：每管 10 公分。

可以內服之阿苗巴痢特效劑。統治一切腸胃傳染及腹瀉。殺蟲消毒。同時有解痙攣之神效。故能止瀉止痛並對腸涎膜有解痙止痛作用。

成人：每日 3-4 服。每服 2 粒。每粒 0.025 公分。

小兒過六歲：每日 3 服至 6 服。每服 1 粒。

乳嬰及幼兒：每日 2 至 4 服。每服 $\frac{1}{2}$ -1 片。各按體質年齡。斟酌用之。

包裝：每管 30 片。每片 0.025 公分。

醫院包裝：每瓶 150 片。

小兒科用：每片 0.01 公分。每管 30 片。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>洒乍錠 'Sajodin' <i>Calcium salt of mono-iodo-behenic acid, containing about 25 per cent. iodine and 4 per cent. calcium</i></p>	<p>脉管灰硬症，腦充血(中風)血壓過高，心病哮喘，氣管枝炎，肺氣腫，脉絡膜炎，虹彩炎，第二期及第三期梅毒，脊髓癆，梅毒性眼病。</p>	
<p>「洒爾佛散」及其製劑 'Salvarsan' and its derivatives</p>	<p>各期梅毒 楊梅癬，回歸熱鼠咬病 gangosa 等。 熱帶病，腸梨形蟲病，化膿性喉蛾。文生氏扁桃腺炎。流行性耳下腺炎(腺腮)。肺壞疽。水痘。 牙根膿瘍。</p>	
<p>新 六 〇 六 新洒爾佛散 'Neo-Salvarsan'</p> <p><i>Sodium salt of dioxydiamino-arsenobenzene-methylene-sulphoxylic acid</i></p>	<p>與「洒爾佛散」同</p>	

拜耳大藥廠

性 質	劑 量 及 用 法
<p>易與脂肪結合之有機性碘劑。性質平和。完全無味。無碘質之副作用。故最宜於久服。</p>	<p style="text-align: center;">  </p> <p>每日 2-3 服。每服 1-2 片。 每餐後服之。服時須將藥片嚼碎。 包裝：每管 20 片。每片 0.5 公分。</p>
<p>「洒爾佛散」及其製劑均經德國政府特設機關嚴格檢查。生物試驗毒性試驗完全證明完善。無絲毫錯誤。方准發行。治愈指數極大。功率極高而耐受性極佳。每管「洒爾佛散」均曾經嚴格的化學實驗。生物實驗。毒性實驗。及臨床實驗。由德國政府負責檢查。故全世界中只有此種治療劑。唯一可靠。</p>	<p>見以下各項製劑章內。</p>
<p>「新洒爾佛散」反應中性。溶液易製。宜於靜脈注射。但必須現製現用。</p>	<p> 每一次量 男子：0.3-0.6 公分。 女子：0.15-0.45 公分。 孩童：0.15-0.3 公分。 乳嬰：每 1 公斤體重用 0.01-0.03 公分。 全劑量 男子：4.5-6.0 公分。 女子：4.0-5.0 公分。 </p>

局部用 0.6 化於 20 公撮甘油內。塗搽文生氏扁桃腺炎。治疥癬。用靜脈注射其劑量按年齡而異。
 包裝：每管 0.15, 0.3, 0.45, 0.6, 0.75 及 0.9 公分。
 每盒 1 管，10 管及 50 管三種。

拜耳大藥廠

品 名



適 應 症

聖露洒爾佛散
'Solu-Salvarsan'

與「洒爾佛散」同

性 質

已製成之溶液。既可靜脈注射又可肌肉注射。完全無痛。

包 裝

- 每管 0.05 公分, (0.5 公撮)。
- 每管 0.1 公分, (1 公撮)。
- 每管 0.2 公分, (2 公撮)。
- 每管 0.3 公分, (3 公撮)。
- 每管 0.4 公分, (4 公撮)。
- 每管 0.5 公分, (5 公撮)。
- 每管 0.6 公分, (6 公撮)。

*3:4'-Diacetyl-
amino-4-oxyarseno-
benzol-2'-
sodium glycolate*

照上各種分量有 1 管盒裝及 10 管盒裝兩種。

洒利汞
'Salyrgan'

強有力之利尿劑，在心病浮腫，心肌退化，因肝壅塞而起之腹水，非炎性之腎病，胸腔水腫，心包膜水腫，減輕循環負擔以助強心劑之功，肥人減瘦，脂肪浮腫症(虛胖)，梅毒。禁忌：腎絲球腎炎，腎臟嚴重灰硬症，以及嚴重惡液質症。

性 質

最進步無毒利尿劑。水銀祛梅毒劑。注射處不痛不腫又全無水銀中毒之患。此其大不相同於一切溶解性水銀劑之處。雖連續注射亦毫無弊患。即施於無望之病人以及長期久用。其功力均不少減。

*Complex mercury
compound of so-
dium salicyl-allyl-
amide-0-acetate in
5 per cent. theophyl-
line solution*

拜耳大藥廠

性 質 BAYER 劑量及用法

注射須用長針頭 深入大臀肌肉內
每星期注射兩三次。約十針為一完全劑

略如下表。

年齡：	每隔三四日注射一次 (以公撮計)	一全劑 (以公撮及公分計)
成人 男	1x4; 4x5; 5x6 c.c.	54 c.c.=5.4 g
女	1x3; 4x4; 5x5 c.c.	44 c.c.=4.4 g
小孩		
三 月	1x0.25; 2x0.5; 2x1; 2x1.5 c.c.	6.25 c.c.=0.625 g
六 月	1x0.25; 2x0.5; 3x1; 2x1.5 c.c.	7.25 c.c.=0.725 g
九 月	1x0.25; 2x0.5; 2x1; 3x1.5 c.c.	7.75 c.c.=0.775 g
十二月	2x0.5; 2x0.75; 2x1; 3x1.5 c.c.	9 c.c.=0.9 g
一歲半	2x0.5; 2x1; 2x1.5; 2x2 c.c.	10 c.c.=1 g
二 歲	2x0.5; 2x1; 2x1.5; 3x2 c.c.	12 c.c.=1.2 g
三 歲	2x0.75; 2x1; 2x1.5; 3x2.5 c.c.	14 c.c.=1.4 g
五 歲	2x0.75; 2x1; 2x2; 3x2.5 c.c.	15 c.c.=1.5 g
七 歲	2x1; 2x1.5; 2x2; 3x3 c.c.	18 c.c.=1.8 g
十 歲	1x2; 2x2.5; 5x3 c.c.	22 c.c.=2.2 g
十二歲	1x2.5; 2x3; 4x4 c.c.	24.5 c.c.=2.45 g
十五歲	2x3; 3x4; 3x5 c.c.	33 c.c.=3.3 g
廿 歲		成人劑量

0.5-2 公撮肌肉或靜脈注射。每隔兩日一次。

亦可與強心劑同用。

又可注射於腹腔及肺膜腔。每次2公撮或更多亦可。灌腸用每次5公撮。

治梅毒用可與「新洒爾佛散」同針注射。不起變化。亦不混濁。浮腫之肉內不可注射。必不得已須將注射部分之浮腫擠于他處。然後用細長針頭深入肌肉深處注射。

坐藥：於停劑期間用之。每兩日一錠。重症每日一錠。

內服：亦於休劑時用之。每日二三服。每服一丸。遇痼疾可加至每日五服。輕症亦可以內服代注射。

包裝：每安瓿1公撮每盒五安瓿。每安瓿2公撮每盒5安瓿。「洒利汞」藥丸每瓶20丸。

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>色而伐納 'Selvoral'</p> <p><i>Calcium salt of glucohexite-citric acid</i></p>		<p>植物性神經病 哮喘 枯草熱 血清病之斑疹，因服藥而起之疹塊，風疹，(蕁麻疹) 愛克斯光病 (因照射而起之嘔吐消瘦等) 小腹部及眼部一切發炎症。一切漿液滲出性病。肺炎，氣管枝炎 滲出性傾向，痙攣質 骨折久治不愈 假關節 斯潑婁症 孕娠期及授乳期之鈣質營養失常用之有預防及治療之功。血友病。</p>
<p>賽雷丁 'Seretin'</p> <p><i>Carbon tetrachlor. puriss.</i></p>		<p>鉤蟲病。</p>
<p>雪亞能 'Sionon'</p> <p><i>Glucohexite</i></p>		<p>糖尿病</p>
<p>所拉純 'Solarson'</p> <p><i>Ammonium heptin-chloroursinate</i></p>		<p>諸虛百損，營養不足，貧血，萎黃病，白血病，巴塞多氏病。瘡癩等傳染病後調理用。</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
<p>高價鈣質製劑。 毫無異味。 所輸入之鈣質可完全消化得用。 耐受性極佳。</p>		<p>成人：每日 2-3 服。每服 1 堆尖咖啡匙。約 2 公分。 小兒：每日 2-3 服。每服一平咖啡匙。必要時可加劑。 包裝：每盒 50 公分。及 100 公分。</p>
<p>專治鉤蟲病。 性質絕對精純。曾經嚴格化學檢定。及生物檢定。</p>		<p>成人：各按體質。於空腹時連服三四丸。每丸 1.2 公分。用茶湯送下。 小兒：十歲內小兒每服 1-4 丸。每丸 0.6 公分。視年齡大小而異。 包裝：每丸 0.6 公分。每瓶 5 丸。每丸 1.2 公分。每瓶 5 丸。</p>
<p>糖尿病人之甜味營養品。 極易消化。完全攝收。但毫不增加尿糖。蒸煮烘烤均不變質。</p>		<p>每日量為 30-80 公分。 分數次加入規定食物內用。 每包均附烘煮說明書。 包裝：100 公分。500 公分。1 公斤。</p>
<p>最佳砒製劑。 供皮下注射，有完全砒劑功能。毫不刺激。無一切副作用。耐受極佳。極與人身相宜。呼氣中毫無惡臭。</p>		<p>皮下注射 每隔 1-2 日注射一次。每次一公撮。注射十次或十二次後。停劑十日。再從新繼續注射。有時可增劑至加倍。 包裝：每盒 12 安瓿每安瓿 1 及 2 公撮。</p>

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>聖露斯錫波霜 'Solustibosan'</p> <p><i>Sterile solution of antimony V. hexonate</i></p>		<p>黑熱病(卡拉阿差江北呼瘧塊)。多發性硬化症。</p> <p>性 質</p> <p>五價錫製劑。製成溶液等滲溶液。毒性極小。排泄極速。可用大量。每日注射。奏功極速。治療期極短。</p>
<p>所買妥司 'Somatose'</p> <p><i>Water-soluble meat albumose</i></p>		<p>胃口不佳，食慾不振，貧血萎黃病，虛弱病，病後不調，腸胃病。</p> <p>增進食慾之補劑。科學配合補力偉大。不需消化。不費腸胃之力。吸收極速。完全發生功力。毫無殘餘。</p>
<p>斯吡螺刺脫 'Spirocid'</p> <p><i>4-hydroxy-3-acetylamino-phenyl-arsonic acid</i></p>		<p>梅毒，熱帶楊梅腫，回歸熱，阿當巴痢，文生氏扁桃腺炎。</p> <p>鍊狀球菌葡萄狀球菌腎孟炎 梨形蟲腸病 舞蹈病 續發性貧血。</p> <p>性 質</p> <p>可以內服之有力祛毒劑，殺梅毒螺旋菌功力極大。耐受性極佳之強壯劑。</p>

拜耳大藥廠

性 質 E
BAYER
R 劑 量 及 用 法

靜脈或肌肉注射治黑熱病。
 開始劑量：乳嬰及四歲以下幼兒 2公撮 五至九歲 2-4公撮
 十至十五歲 4-6公撮 成人 6公撮
 以後劑量可用至照量加倍。
 一全劑量：成人 100-120公撮。小兒每一公斤體重用 2公撮。
 於必要時。可增加劑量。並無危險。
 治多發性硬化症。開始劑量全上。一全劑量可加三四倍。
 包裝：每盒 1安瓿 每安瓿 4公撮。每盒 1安瓿。每安瓿 6公撮。
 每盒 10安瓿 每安瓿 6公撮。每瓶 60公撮。

液體「所買妥司」
 成人每日二至四服。每服一滿食匙。共有淡甜二種 甜者不
 和水吃 淡者可加兩三倍水沖淡或加入菜羹內湯內同服。
 小兒一茶匙至半食匙。每日服 2至4次。
 包裝：每瓶 175公撮。

治梅毒：成人連服三日。第一日 2片。第二三日每日 3片。
 均清早空心時服。然後停劑三日。三日後再照樣連服三日。
 然後再休息再續服。如此服至總劑量 56片(等於 14公分)
 為止。或每隔一日服藥一日。一日三四次。每次 1片。每
 服一星期。休息三四日。總量亦服至 14公分為止。
 小兒二歲至五歲。每服半片至 1片。六歲至十歲每日服 1
 片。較大的兒童可按其體重及發育程度。每日服 1片或 1
 片半至 2片。
 乳嬰產後十日即需服用。就醫較遲。需用大劑。起頭即每日
 三服。每服 0.02公分或 0.06公分。每需用第二個全劑。

Mommsen 氏法：

- 10 天每日三次每次 0.01 公分四天休息
- 10 天每日三次每次 0.02 公分四天休息
- 10 天每日三次每次 0.06 公分四天休息
- 10 天每日三次每次 0.125 公分四天休息
- 10 天每日三次每次 0.125 公分四天休息
- 10 天每日三次每次 0.25 公分四天休息
- 10 天每日三次每次 0.25 公分

治文生氏扁桃腺炎。每日 1至3片。連服 2至4日。同時用
 水糊外搽喉部。
 葡萄球菌膀胱炎。疝氣，疔贅，肥人減瘦，巴塞多病。每
 日 2片。阿巴痢每日 2片。連服 10日。慢性病每日 1片
 以後每週 2片。
 包裝：0.25公分。每管 30片。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>斯必路色溶液 'Spirosal' Solution <i>Mono-ethylene-glycolester of salicylic acid. 'Spirosal' solution contains 1 part 'Spirosal' and 2 parts alcohol</i></p>		<p>肌肉及關節痛,神經痛,腰痛,坐骨神經痛,尿酸關節炎,乾性肋膜炎。</p>
<p>蘇潑拉來寧 'Suprarenin' (Adrenalin) <i>O-dihydroxyphenylethanol-methylamine (sinistra-'Suprarenin')</i></p>		<p>使局部缺血。幫助局部麻藥用。 心臟衰弱及血管衰弱之虛脫 (可直接注入心臟 1 公絲 = 1 公撮)。現成液劑 (一比一千倍)。 開刀後強心。過敏感應震盪症。救急。哮喘吐血。腸胃出血。</p>
<p>蘇潑立芬 'Suprifen' <i>Rac.-p.-oxyphenyl-methyl-amino-propanol-chlorhydrate</i></p>		<p>一切血壓降低病症。 虛脫內陷。 傳染病後或病中之血壓降低心臟衰弱。輕症心臟失職。 X光病。一切大手術後預防虛脫與康毗箭毒素或毛地黃合用治嚴重心臟代償機能不整。 血脈循環易虛脫之病人在注射「洒爾佛散」前宜用以預防虛脫。</p>

拜耳大藥廠

性

質



劑量及用法

專治痲質斯特效藥。局部治療。止痛如神。毫無刺激。吸收極速。

用時稀釋外用擦患處。每日擦 2-3 次。或用棉花浸藥水貼擦患處。冬日宜於用後在患處用棉花或絨布包妥。

包裝：每瓶 30 公分。

腎上腺髓質荷爾蒙所含收縮血管之成分。用人工合成。絕對純淨。可以久藏。功效確實而持久。

膀胱出血：用一比一千倍溶液十滴加水一百公撮灌入止血。腸出血用二十滴（或四十或六十或八十滴）加鹽水 1-2 公升灌腸。

皮下注射：每次 0.2 至 1 公撮。內服十至二十滴或半片至一片。靜脈注射半至一公撮。加入生理食鹽水五百公撮。於二三小時之內。緩緩注入靜脈。

包裝：瓶裝 25 公撮一比一千。安瓿每盒十管每管一公撮。藥片每瓶 20 片每片 0.001 公分。

最佳強心劑及血脈循環興奮劑。耐受性質優良。既可注射又可內服。

內服：

成人每日 2-3 服每服 5 至 10 滴茶湯牛奶送下。

乳嬰及五歲以下幼兒每日 2-

3 服。每服二至四，至六滴。茶，水，牛奶送下。

五歲至十歲幼兒。每日 2-3 服。每服五至八滴。

注射：皮下注射肌肉注射（亦可靜脈注射）。

成人每次 1-2 公撮。視其體質而異。

必要時（傳染病中可一日注射數次或每小時注射 1 公撮）。

靜脈注射：加入鹽水點滴注射。每日可用五至十安瓿。

乳嬰及五歲以下幼兒。每次注射 0.1-0.4 公撮。每日 2-3 次。

五歲至十歲小兒。每日 2-3 次。每次 1 公撮。肌肉注射。

包裝：滴瓶 10 公撮 10% 溶液。針藥每盒 5 安瓿。每安瓿 2 公撮。（1%）。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>蘇 芬 'Surfen'</p> <p><i>Bis-2-methyl-4-amino-quinolyl-6-carbamide hydrochloride</i></p>		<p>防腐。表面創口消毒。組織深處防腐消毒。一切傳染性瘡口盡可用之。體腔化膿性病症之沖洗。傳染性皮膚病。黴菌性疾病。</p>
<p>胎 孛 星 'Tenosin'</p> <p><i>p-oxy-phenyl-ethyl-amine- + β-imidazoethyl-amine</i></p>		<p>產後及婦科手術後子宮弛緩出血。</p>
<p>梯 烏 密 拿 'Theominal'</p> <p><i>Combination of theobromine 0.3 g. (gr. 4½) and 'Luminal' 0.03 g. (gr. ½)</i></p>		<p>急慢性血管病，血管痙攣，心痙攣症，狹心痛，血壓高，血管灰硬化症之疼痛及失眠，耳鳴，甲狀腺機能亢進之心跳，更年期及老人之神經性心跳及血管過敏。</p>
<p>拜耳健身素 Tonicum Bayer</p> <p><i>contains: liver extract, a compound of phosphorus and arsenic, nux vomica, mineral salts of the blood as well as the vitamin B complex and vitamin C</i></p>		<p>諸虛百損。羸弱勞怯。憂勞過度。失神脫力。神經弱衰。萎靡不振。病後虛弱。產後失調。又為振作生活重要中樞之用。兼有增強體力活潑之功。</p>

拜耳大藥廠

性 質



劑量及用法

表面消毒及深處消毒之化學治療劑。無染色之患。

包裏沖洗，注入組織用千分之一或千分之二水溶液。再淡亦可。油膏撒粉用一比十。膀胱沖洗以及膀胱鏡檢時。用一比一萬倍溶液100公撮。加稀醋酸8滴。可防止因遇尿液而混濁之弊。

包裝：每管 10 公分。

人工合成子宮收縮及止血劑。內含麥角之有效銨基成分。性質固定。功效確實。無味，可久藏。注射處無刺激。

內服：每日 3 服每服 15-20 滴。或每日服一片。皮下或肌肉內注射一安瓿。以後或兩安瓿。

包裝：溶液每瓶 20 公分。藥片每片 0.1 公分。每瓶 20 片。注射液每盒 3 安瓿。每安瓿 1 公撮。

血管解痙及調整血管之良劑。使柯柯精之調節血管作用與「盧蜜拿」之解痙作用具於一體。故能改善各器官之血流。調整血壓而使精神愉快爽適。

每日 2-3 服。每服 1 片。和水服。

包裝：每管 20 片每片 0.33 公分。

健補劑。最能改善新陳代謝機構。調補心臟血脈循環。促進各器官之血流。使其暢旺。振作精神。活潑體力。

成人：每日 2-3 服。每服 1 食匙最好餐前服。

小兒：每日 3 服每服 1-2 滿茶匙。視年歲大小而異。

包裝：每瓶 320 公分。

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>託拿福賜芬 'Tonophosphan'</p>	<p>有機磷劑 <i>Sodium salt of dialkyl-amino-aryl-phosphinic acid (11 per cent. phosphorus)</i></p>	<p>精神及心理之虛弱症象。貧血。性慾不振。性慾神經衰弱。血壓過低。心肌病。巴塞多病。骨骼病〔佝僂病軟骨病等〕。過敏性病如血管神經病，蕁麻疹可與砒劑合用。梅毒可與「洒爾佛散」同針注射。</p>
<p>多能體 'Torantil'</p>	<p>動物腸粘膜提出劑 <i>Composed of physiological albuminoid substances obtained from the intestinal mucous membrane</i></p>	<p>一切因腸自身化毒力不濟而起之疾病。〔自身中毒〕。腸胃涎膜發炎症及潰瘍症〔例如大腸潰瘍，十二指腸潰瘍，胃潰瘍等〕。肝腫〔因腸中腐敗毒質所害〕肝結節硬化，膽道炎以及一切肝病。乳嬰營養中毒。血管神經性之鼻炎。哮喘，枯草熱，過敏性濕疹，瘡癩，蕁麻疹〔風疹〕坤克氏皮膚浮腫。以及血管失職性鼻炎等。</p>
<p>脫呂帕弗拉文 'Trypaflavine'</p>	<p>消毒殺菌化學治療劑 <i>3:6-diamino-10-methyl-acridine chloride</i></p>	<p>創口消毒，皮膚寄生蟲病，白濁病，靜脈注射治一切敗血症如腦炎，腦膜炎，產褥熱，心內膜炎，感冒肺炎，關節炎，腎盂炎，小產，邦氏傳染病，寒熱往來，略如馬爾太熱，鱗屑癬在人工太陽燈照射前用之以增其感應力。</p>
		<p>性質 創口防腐之化學治療劑。深處消毒絲毫不傷人身組織之內用化學治療劑。抵抗一切傳染病。專治白濁最有效最無害。係靜脈注射治淋濁之特效藥。</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑 量 及 用 法
-----	---	-----------

高價極品無毒磷製劑。有促進及調整新陳代謝機能之特效。興奮疲弱之心肌。注射後毫無刺激性。毫無不快副作用。藥片內服。統治諸虛百損。精神疲倦。收功靈速。

內服：每日3服。每服1片。飯後吞服。皮下注射每日1公撮。注射液1%或2%均可
 包裝：1%溶液每安甌1公撮每匣10及20安甌。
 強效：2%溶液。每安甌1公撮每匣10安甌。
 藥片：每片0.1公分。每管30片。

專治過敏性病及腸內中毒症之標準製劑。曾用鹽酸組織毒實驗證明其充分祛毒力。即若干量「多能體」在十七度溫度下，二十四小時之內。能將1mg.鹽酸組織毒解毒者。此量謂之一單位。

每一安甌含一單位。
 臀肌內注射。每二日一次。或每星期二次。有時在注射本品時。可先試用少量注射。每一全劑約共注射十針。
 內服：每日3服。餐前服1-3片。囓圖吞下。

包裝：「多能體」液。每匣乾安甌5管。外加2公撮消毒生理鹽水5管。臨時化用。
 醫院包裝 每匣內藥劑與生理鹽水各25管。
 「多能體」片 每管20片。

靜脈注射用0.5或2%溶液。每次注射5-20公撮。
 脊髓注射1比5000溶液2-5公撮。皮膚病(白癬, 狼瘡等)與高山太陽燈同用, 外搽天泡瘡1比100 [水酒各50分]不可靜脈及肌肉注射。
 外用撒粉5%。油膏2%。
 尿道沖洗0.5-1比1000火燙傷包圍亦然。直腸沖洗1比10000至1比5000倍。
 包裝：藥片每瓶15片每片0.1公分。
 溶液：1/2%每盒5管每管5及10公撮。
 2% 每盒5管每管5及10公撮。

拜耳大藥廠

品 名



適 應 症

土門奴耳-銜
'Tumenol'-
Ammonium

*A tarry product,
obtained from
bituminous slate*

乾癬, 痔瘡, 癬瘡, 傳染性膿疱瘡,
天泡瘡, 癢瘡, 頑癬, 膿瘡等。

烏利龍
'Uleron'

*4(4'-aminobenzol-
sulphonamide)-
benzol-sulphon-di-
methyamide*

白濁。葡萄狀球菌病。一切外症因
葡萄狀球菌傳染化膿者。疔瘡。蜂
窩織炎。汗腺膿瘍。骨髓炎。癰疽。
熱癬。腦膜炎。軟疔。膀胱炎。及
腎盂炎。近又試用「烏利龍」治一切
肺炎雙球菌傳染病。

烏利龍油膏
'Uleron' Ointment

5% 'Uleron'

外科：一切創傷及汗穢創口。膿瘍
蜂窩織炎。乳房炎。疔瘡。手術後創
口治療。皮膚科。小腿潰瘍。癰瘡。暑
豆膿疱瘡。天泡瘡。綠菌髮癬。
眼科。白濁膿漏眼。普通紅眼沙眼。

新烏利龍
Neo-'Uleron'

參看第 112 頁

溫 敦
'Uden'

Follicular hormone
»Bayer«

標準卵巢濾液荷爾
蒙劑

卵巢功能退化：
原發及續發性無月經。痛經。宮冷。
更年期病。因卵巢病而起之新陳代
謝病。更年期關節炎。因卵巢病而起
之陰癢及皮膚病。

拜耳大藥廠

性 質	劑 量 及 用 法
<p>消炎止癢。易溶於水。毫無惡臭。</p>	<p>製為 2-20 % 油膏。 因搔癢破爛者。以酒精，醚，水，三者等分各 30 公撮。加本品 10-20 公分。製成外搽藥。 包裝：每瓶 25 公分。</p>
<p>專治白濁及葡萄狀球菌之內服化學治療劑。 動物實驗證明。功力確切。又專能治嫌氣菌及肺炎球菌病。</p>	<p>一切服用規則。詳載仿單及白濁論專冊。請參考之。 包裝：每管 24 片。每片 0.5 公分。 醫院包裝 250 片。</p>
<p>創口油膏。化膿消炎。殺菌之力極大。而性極和平。 凡鏈狀及葡萄狀球菌傳染之創面用之。統有藥到病除之妙。</p>	<p>刮取油膏至洋刀背厚一層塗于紗布上。覆蓋患處。 包裝：每管 30 公分。</p>
<p>純淨標準卵葉滬沱荷爾蒙。 不含絲毫雜質。 久用功力不變。</p> <p>一切按國際聯盟衛生委員會世界標準單位製成之標準天然女性荷爾蒙劑。</p>	<p>各種用法參觀仿單。 包裝：藥片每瓶 15 片。每片 1000 單位 注射液 每匣 5 管。每管 1 公撮 1000 單位。又每匣 2 管。每管 1 公撮 10000 benzoate 單位。每匣 1 管。每管 2 公撮 50000 benzoate 單位。10 公撮 瓶裝 100000 單位。</p>

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>佛杜里 ‘Vaduril’</p> <p style="text-align: center;">從幼小動物顎骨中 提出之臟器治療劑</p>		<p>牙頸外露及感應過敏。內分泌性齒齦疾患。(特別是青年人)。 進行性齲齒。 出齒太遲。</p>
<p>佛里耳珠 ‘Valyl’ Perles</p> <p style="text-align: center;"><i>Valerianic acid diethyl-amide</i></p>		<p>神經衰弱，歌司的利之最佳鎮靜劑。 疑心病 偏頭痛 失眠 神經性心病。 心悸怔忡。狹心症。小手術及牙科施麻藥前之安心去怯劑。月經病。經淨期病。妊娠病。烟酒中毒。</p>
<p>維婁那耳 ‘Veronal’</p> <p style="text-align: center;"><i>Diethylmalonyl- urea</i></p> <p>鈉維婁那耳 ‘Veronal’-Sodium</p> <p style="text-align: center;"><i>Mono-sodium salt of diethylmalonyl- urea</i></p>		<p>各種失眠症 煩躁，憂勞，驚悸，抖顫，舞蹈病，搐搦，百日咳，妊娠嘔吐。</p>

拜耳大藥廠

性 質		劑量及用法
<p>最新牙科特效臟器製劑。專治牙根及牙槽周圍之機能衰弱症。</p>		<p>內服：每日3服。每服2片。每一全劑約300片。</p> <p>注射：涎膜下皮下肌肉內。每一兩日注射2公撮。全劑20公撮。</p> <p>最好內服與注射輪用不輟。(注射8-10次)。</p> <p>包裝：藥片 每盒2管。每管30片。每片0.4公分。 每盒10管。每管30片。每片0.4公分。注射液 每盒10管。每管2公撮。</p>
<p>完全無害之人工合成之纈草酸製劑。功效準確含量平均。</p>		<p>每日2-3服。每服2-3丸。興奮過度煩躁不寧須長期治療。可每日1-3服。每服1粒。每日加1粒漸加至每日3服。每服3-5粒。</p> <p>包裝：每瓶25粒。每粒0.125公分。</p>
<p>極有力之催眠劑。用在治療劑量範圍中。並無有害副作用。 「鈉維婁那耳」易於溶解。可加入生理食鹽水內灌腸。並可注射。</p>		<p>「維婁那耳」0.25-0.5公分臨就寢前一小時用熱湯服下。 「鈉維婁那耳」內服0.3-0.4-0.6公分。(婦女半片)糖湯和服。 肌肉或皮下注射。(肌肉注射較佳) 10% 溶液 5-10公撮。</p> <p>灌腸0.5「鈉維婁那耳」0.2食鹽加至20公分水。</p> <p>包裝：鈉維婁那耳藥片。每片0.5 每管十片。 維婁那耳片0.3公分。每管25片。 0.5公分。每管10片。「維婁那耳」及「鈉維婁那耳」都有粉子。每瓶25公分。</p>

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>維剛妥 'Vigantol' 丁種維生素劑</p>	<p>製造者 » Bayer «Leverkusen E. Merck Darmstadt</p>	<p>佝僂病以及一切骨質病(軟骨症,骨質鬆脆,各種骨質關節病症,瘦骨質)癩癧病。 助長出牙及保護牙齒。</p>
<p>復康 'Vogan' 甲種維生素劑</p>	<p>製造者 » Bayer «Leverkusen E. Merck Darmstadt</p>	<p>1. 增加皮膚及涎膜之抵抗力。 夜盲, 眼角膜軟化, 眼乾燥症。 創口不易收口, 皮膚斑疹, 傷風咳嗽(呼吸道病)易生膽石尿石腎石等結石症, 陰道厚膜(白帶)。 2. 作用於新陳代謝。 開胃, 幫助發育, 早產嬰之飼育, 輕巴塞多病, 無胃酸及胃酸過少。</p>
<p>藥特靈 'Yatren' <i>7-iodo-8-hydroxy-quinoline-5-sulphonic acid (iodine content 26.5 per cent.) + sod. bicarb. (25 per cent.) to render it water-soluble</i></p>	<p>藥特靈溶液 'Yatren'-Solution</p>	<p>創傷治療, 扁桃腺炎, 口腔炎及其他涎膜破傷。陰道及子宮之發炎。各種腸胃病。 阿苗巴痢(參看藥特靈丸)。</p>
<p>現成消毒管裝注射液。注射於發炎化膿處週圍組織內或關節內最宜。</p>		

拜耳大藥廠

性

質



劑量及用法

預防用：

乳嬰及幼兒：每日服5-6滴油溶液劑。

小孩 每日服6滴或藥片1片。

治療用：

乳嬰及幼兒：每日15滴至愈為止。

小孩 每日18滴或3片。

成人 每日12滴等於2片。服4-6星期為止。

治小兒痙攣質：每日3服。每服10滴。

維剛妥油 1公撮等於30滴結晶維生素丁0.3公絲。

包裝：每滴瓶內10及50公撮。

每瓶50片。每片含結晶維生素丁0.06公絲。

高價極品標準

維生素甲製劑

比之最佳之魚肝油多含百倍

維生素甲。

可達專門用維生素甲治療之目的。而避免服大量魚肝油之惡味。

「復康」液：

每日5-10滴1次服。或分幾次服。牛奶或湯汁和服。

巴塞多病及肥胖療法。每日3服。每服30滴。胃酸缺少。每日3服。每服10滴。

藥片2-4片。茶湯吞服。

胃酸缺少每日3服。每服4片。外用油膏用法另詳仿單。

包裝：油劑（1公分等於12000國際單位）。每滴瓶5公撮。片劑（每片等於12000國際單位）。每瓶50片。

至善至上之表面消毒及深處消毒劑。毫無刺激。故可以直接注射入患處之內。

預防及治療阿苗巴痢及其他腸傳染症（參看藥特靈丸）。

創口包藥用3%溶液。耳喉鼻科用1%液沖洗外并可直接用粉劑噴入。

泌尿系科用1-3%液50公撮。沖洗膀胱炎洗膀胱0.5-2%阿苗巴痢及一切腸傳染病。

內服藥特靈丸。

灌湯可用藥特靈1公分。和水200公撮。

漸加至3公分：600-800公撮水。

包裝：粉劑10, 25, 50, 及100公分。

包裝：每盒6管。每管1公撮。每瓶25公撮。

拜耳大藥廠

品 名		適 應 症
<p>藥 特 靈 丸 'Yatren' Pills</p>	<p><i>Effective substance: 7-iodo-8-hydroxy- quinoline-5-sul- phonic acid (iodine content 26.5 per cent.)</i></p>	<p>專門治療及預防阿苗巴痢疾之特效藥。急性慢性以及痢後遺患均可治療斷根。兼治療及預防一切腸傳染病。便秘尤其是熱帶便秘。脫膜性及潰瘍性大腸炎。</p>
<p>乳 酪 藥 特 靈 'Yatren'-Casein</p>	<p>性 質 專作用於阿苗巴蟲尤能殺其孢子同時能振作腸蠕動。</p>	<p>急性及慢性關節痿麻質斯，畸形關節炎，產褥熱，急慢性子宮附屬器官炎。子宮後屈轉位。後道格拉氏高滲液症。小產發熱及敗血之預防。淋巴腺結核。 虹彩炎，急慢性結膜炎。</p>
<p>弱號： 3% 藥特靈 2.5% 乳 酪 強號： 3% 藥特靈 5% 乳 酪</p>	<p>性 質 普遍性之刺激劑。</p>	

拜耳大藥廠

性

質



劑量及用法

急慢性痢疾：

第一日每日三服。每服一粒。

第二至第五日。每日三服。每服二粒。如能受耐則：

第六七日每日三服。每服三粒。

以後續服。每日三服。每服三粒。連服三日。停劑四日。

再服再停共歷三星期之久。

大腸病除內服外。同時用「藥特靈」溶液 (0.5-0.75%) 灌腸。

菌痢每日服三次。每次 2-4 丸。

一般胃腸病。每日 1 服。每服 2-4 丸。

預防阿苗巴痢。每星期服藥 2 日。每日一次。每次 2-4 丸。

包裝：每瓶 10, 25, 50 及 100 丸。每丸 0.25 公分。

肌肉痿麻質斯。肌肉內注射弱性 0.5-2 公撮。

關節痿麻質斯。 ,, 2-5 公撮。

白濁關節病。 ,, 3-5 公撮。

畸形關節炎。 ,, 0.1-0.5 公撮。

汗腺腺瘍。靜脈內注射弱性 1 公撮。

預防產褥熱。肌肉內注射強性 5 公撮。

子宮附屬器官病 ,, 弱性 1-2 公撮。

急性眼病。靜脈注射強性 0.5-3 公撮。

慢性眼病。靜脈注射弱性 0.5-2 公撮。

氣管枝炎。肌肉注射弱性 3-5 公撮。

氣管枝肺炎。靜脈注射弱性 1-2 公撮。

癱瘓。靜脈注射弱性 0.5 公撮。

漸加至強性 2 公撮。

包裝：乳酪藥特靈

強性：每盒 6 管。每管 1 公撮。

每盒 6 管。每管 5 公撮。 瓶裝每瓶 25 公撮。

弱性：每盒 6 管。每管 1 公撮。

每盒 6 管。每管 5 公撮。

瓶裝每瓶 25 公撮。

拜耳大藥廠

品名		適應症
<p>賜福露 'Zephiran'</p>	<p><i>Solution of highly molecular alkyl- dimethylbenzyl- ammonium chlorides</i></p>	<p>外科 產婦科 消毒用 膀胱沖洗，皮膚病殺菌，手消毒， 器械消毒，以及一切糞坑廁所消毒， 殺入腳蟲（陰毛蟲）。</p> <p>性質 極有力之消毒劑，對於人體完全無 害。雖久用亦毫不傷皮膚及黏膜。 與水和融，不問濃淡，毫無惡臭， 而有香氣。且可久藏。</p>

拜耳大藥廠

性 質



劑量及用法

手消毒：1% 液。約等於 2 茶匙和水 1 公升。

器械消毒：

最頑強之菌胞芽均可完全殺滅。凡器械先用二比一百之蘇打溶液浸洗。然後用「賜福露」一比一百之溶液煮一刻鐘取出。弄乾在消毒手續之下保存。凡一切器械之無毒貯藏。均可浸於一比一百之「賜福露」溶液。每日更換。但須完全浸入液內。即可保險矣。其中並須佐以 1% Sodium nitrite 藉防銹腐。

陰道沖洗：

0.5% 液。等於一茶匙和水一公升。

皮膚病：

用 1/100 液蘸搽。任其自乾。每日 3 次。

膀胱沖洗：

1/4-1/2 0/100 (即半比千) 如須停蓄膀胱內。須更淡至 1/4 0/100 倍。


坑廁消毒另有仿單。

殺陰蟲，處方：「賜福露」10，酒精 50，阿西通 10，加水成 100。用此藥水徹底浸搽有蟲處并停留五分鐘。然後用熱水肥皂洗去。連搽數日。

包裝：每瓶 50 公分。150 公分。

血清與漿苗

拜耳大藥廠—貝靈研究院



各種血清自經煉淨減除其中蛋白質之法創始後。血清治療上乃獲一偉大進步。血清內蛋白質原極多。茲將其中各種雜質與抗毒素無關之蛋白質剔除。使其蛋白質總量大減。此項煉淨血清中所含之蛋白質最多僅 5%。優點：

- (一) 身體攝收迅速。故功力亦快。
- (二) 反應低微。血清病減少。

煉濃煉淨血清：煉濃血清即係將血清體積縮小。使在小量血清中有大量抗毒素之謂。本廠各種煉濃煉淨血清中所含之蛋白質量。最高不過 12%。製成後概經德國國家化驗機關鑑定。



拜耳大藥廠 - 貝靈研究院

名稱	性質 用法 包裝
<p>「貝靈」化膿菌抗素 'Antipyogen' Behring</p>	<p>本品係多價抗體原合劑。為專對或 普遍性治療各種化膿症候之用。例 如瘡癤。皮膚生膿。蜂窩織炎。中 耳外耳炎。膀胱炎。口腔炎等。難 愈瘡口用之。最有速愈之功。 肌肉注射。逐漸增量。每隔1日注 射1管。 每盒6管。份量逐增。 每盒6管。每管1公撮(單位劑量)。 每瓶6公撮。</p>
<p>「貝靈」 「藥特靈」化膿 菌混合漿苗 Antipyogenous 'Yatren' Vaccine Behring</p>	<p>混合漿苗。內含葡萄球菌鏈球菌。 肺炎菌。大腸菌以及青膿桿菌等菌 苗。另依3%「藥特靈」液。主治各 種混合傳染性症候。 肌肉與靜脈注射用。每隔1日注射 1公撮。 每盒6管。每管1公撮。劑量逐漸 增加。</p>
<p>「貝靈」卡他兒漿苗 [合併] Anti-Catarrh Mixed Vaccine Behring</p>	<p>預防及治療各種受涼症候。 預防用：每盒3管。每管1公撮。 治療用：每盒3管。每管1公撮。</p>
<p>「貝靈」霍亂漿苗 Cholera Vaccine Behring</p>	<p>霍亂漿苗。每公撮內含5000兆菌 苗。及0.5%石炭酸防腐劑。 專作預防霍亂之用。皮下注射2-3 次。每次0.5至1公撮。隔5至10 日注射1次。 每盒3管。每管1公撮。瓶裝10及 20公撮。</p>

拜耳大藥廠 - 貝靈研究院

名 稱	性 質 用 法 包 裝
<p>「貝靈」白喉抗毒素 Diphtheria Anti-toxin 'Behring'</p>	<p>白喉血清。 抗毒性馬血清。德國國家監製。內含0.5%石炭酸防腐劑。 預防用：1000國際單位。 治療用：4000-50000國際單位。</p> <p>包裝：</p> <p>安瓶 2500 國際單位 [10 c.c.] 1000 國際單位 [2.5 c.c.] 1500 國際單位 [3.75 c.c.] 2000 國際單位 [5 c.c.] 3000 國際單位 [7.5 c.c.] 5000 國際單位 [10 c.c.]</p> <p>煉淨</p> <p>安瓶 1000 國際單位 [2.5 c.c.] 1500 國際單位 [3 c.c.] 2000 國際單位 [4 c.c.] 3000 國際單位 [5 c.c.] 5000 國際單位 [6 c.c.] 10000 國際單位 [10 c.c.]</p> <p>煉淨煉濃(球蛋白)</p> <p>安瓶 2500 國際單位 [2.5 c.c.] 5000 國際單位 [2.5 c.c.] 10000 國際單位 [5 c.c.] 20000 國際單位 [10 c.c.]</p>
<p>「貝靈」白喉預防漿苗 'T.A.F.' Diphtheria Prophylactic 'T.A.F.' 'Behring'</p>	<p>自動白喉預防專藥。根據 H. Schmidt 氏法製成之白喉菌抗體元與抗毒素劑。皮下注射。每次1公撮。共注射 2-3 次。每次隔開 3-4 星期。</p> <p>包裝：每盒 3 管。每管 1 公撮。每瓶 25 公撮。</p>

拜耳大藥廠 - 貝靈研究院

名稱	性質 用法 包裝
<p>「貝靈」白喉預防素 (經蟻醱解毒之白喉菌毒素) Diphtheria Prophylactic A.L.F.T. 'Behring'</p>	<p>本品係吸收氮氧化鋁後之蟻醱變性白喉菌毒素。專供自動免疫預防白喉之用。</p> <p>1公撮含150預防單位。</p> <p>德國國家公佈用量為： 六歲以下小兒 注射2次。 每次0.5公撮。 六歲以上小兒 注射2次。 每次0.3公撮。</p> <p>在兩次注射之間。至少須隔開4星期。</p> <p>包裝：每盒1管。1公撮。 大盒5管。每管1公撮。 瓶裝25公撮。</p>
<p>「貝靈」痢疾血清 Anti - Dysentery Serum 'Behring'</p>	<p>多價抗毒，抗菌性用馬製成之血清。 含○●五%石炭酸防腐劑。 德國國家監督製成。 統治各種細菌性痢疾。</p> <p>預防：每次10公撮。肌肉注射。 治療：肌肉與靜脈各注射25公撮。 在需要情形之下。仍可續用若干次。</p> <p>包裝：多價痢疾血清</p> <p>多價 (Shiga-Kruse, Flexner 及 Y)</p> <p>安瓶 5 c.c. 10 c.c. 20 c.c. 凍淨凍液</p> <p>安瓶 2000 國際單位 [10 c.c.] 4000 國際單位 [10 c.c.] 8000 國際單位 [20 c.c.]</p> <p>單價 (Shiga-Kruse)</p> <p>凍淨凍液</p> <p>安瓶 10000 國際單位 [10 c.c.]</p>

拜耳大藥廠 - 貝靈研究院

名稱	性質 用法 包裝
<p>優弗拉明 'Eufiamin' Adnexitis Vaccine Behring</p>	<p>多價抗體元劑。專供子宮附屬器官炎之專對性及普遍性治療之用。每隔二三日注射一次。由弱漸強。自一號管開始至十二號管止。肌肉或皮下注射。</p> <p>弱性：每盒 6 管。每管 1 公撮。 (由 1 單位至 6 單位)</p> <p>強性：每盒 6 管。每管 1 公撮。 (由 7 單位至 12 單位)</p>
<p>「貝靈」 氣性壞疽血清 Anti-Gas Gangrene Serum Behring 德國國家監製</p>	<p>本品分多價及單價兩種。</p> <p>a. 多價。氣疽血清為一抗毒性馬血清。含 0.5% 石炭酸防腐劑。含菌量詳下。</p> <p>b. 單價。氣疽血清。專對單由氣疽菌釀成之症候。</p>

此項血清專能預防兼治療各種單獨性氣疽及其合併症。剖腹時尤宜先用。

用法：預防用：注射於患處週圍或靜脈注射。每次用廿公撮。治療用大量。可至每次一百公撮。或多或重複注射均可。

包裝：多價氣疽血清。

10 公撮管裝內含抗毒素量。最少有：

1500 國際單位氣疽菌(perfringens)抗毒素。

1000 國際單位氣疽腐敗弧菌(vibriion septique)抗毒素。

800 國際單位惡性水腫菌(bac. oedematiens)抗毒素。

170 國際單位化組織菌(bac. histolyticus)抗毒素。

20 公撮裝者。其抗毒素含量。則較此加倍。

單價氣疽血清(單含氣疽菌抗毒素)

每管 10 公撮。內含 4000 國際抗毒素單位。

拜耳大藥廠-貝靈研究院


名 稱	性 質 用 法 包 裝
<p>果 乃 金 白濁漿苗 'Gonargin'</p>	<p>每公撮本品。內含 25-5000 兆白濁菌苗。及○●五成石炭酸防腐劑。統治各種白濁症候。特別宜於老白濁防止合併症之發生。又供誘發白濁之用。肌肉或靜脈注射。</p> <p>包裝：每盒 6 管。每管 1 公撮。含菌苗量漸增。每管由 25 兆，50 兆，100 兆，200 兆，500 兆至 1000 兆各 1 管。每瓶 6 公撮。每公撮含 100 兆菌苗。每瓶 6 公撮。每公撮含 5000 兆菌苗。</p>
<p>「貝靈」 白濁球菌混合 漿苗 Mixed Gonorrhoeal Vaccine 'Behring'</p>	<p>本品內含除白濁菌苗為主體外。尚有葡萄球菌鏈球菌大腸球菌及類白喉桿菌等之菌苗。含量由 50-400 兆不等。</p> <p>主治各種白濁合併傳染疾患。</p> <p>皮下注射。亦可靜脈注射。每隔 2-4 日注射 1 次。每次 1 管。按號注射。</p> <p>每盒 10 管。每管 1 公撮。菌苗逐漸增加。</p>
<p>「貝靈」白濁「藥特靈」 Gono-'Yatren'</p>	<p>含「藥特靈」之白濁漿苗。每公撮含 50-400 兆菌苗。主治慢性白濁及其合併症。肌肉或靜脈注射。每隔 2-4 日注射 1 次。每次 1 管。按號注射。</p> <p>包裝：每盒 6 管。每管 2.5 公撮。由 50-400 兆菌苗。</p> <p>瓶裝：每瓶 25 公撮。每公撮 50 兆菌苗。</p>

拜耳大藥廠·貝靈研究院

名 稱	性 質 用 法 包 裝
<p>「貝靈」流行性感 冒菌混合漿苗 Influenza Mixed Vaccine 'Behring'</p>	<p>由於流行性感冒菌，鏈球菌，肺炎菌等菌製成之混合漿苗。每1公撮內含680兆菌苗。持其預防流行性感冒及其合併症之用。 皮下注射：共注射3次。每用0.5至1公撮。每隔5-7日注射1次。 包裝：每盒3管。每管1公撮。</p>
<p>「貝靈」腦膜炎血清 Anti-Meningo- coccus Serum 'Behring'</p>	<p>腦膜炎馬血清。德國國家監督製成。主治腦脊髓膜炎及其敗血性症候。 預防用：10-20公撮肌肉注射。 治療用：20公撮；行肌肉，脊溝或腦室內注射。連續不斷注射若干日。注射時須先放出等量之脊髓液。呈敗血症現象時。宜行肌肉及靜脈注射。 包裝：每管10及20公撮。</p>
<p>握姆納丁 'Omnadin'</p>	<p>「握姆納丁」係一刺激治療劑。由蛋白質類脂肪體及動物性脂肪體等普遍刺激性原質合成。專具提高身體一般的抵抗力之功。一切急性有寒熱傳染性症候統宜即刻肌肉或皮下注射2公撮。有時亦宜重復注射。 安瓶2公撮：每盒3, 12, 及50管。</p>
<p>「貝靈」腹膜炎血清 Anti-Peritonitis Serum 'Behring' 德國國家監督製成</p>	<p>本品係抗毒性馬血清。每公撮內含氣疽菌100國際單位(bac. perfringens)及1000 B.U. 大腸菌抗毒素。及0.5% 6 炭酸防腐劑。 主治腹膜炎。按病情輕重用20-40公撮或更多亦可。行腹膜內，靜脈及肌肉注射。 包裝：每管20公撮。(含2萬 B.U. 大腸菌抗毒素)及2000國際單位氣疽菌抗毒素)。</p>

拜耳大藥廠-貝靈研究院


名 稱	性 質 用 法 包 裝
<p>「貝靈」 百日咳混合漿苗 Pertussis Mixed Vaccine 'Behring'</p>	<p>多價百日咳漿苗。內含5000兆百日咳菌苗 (Bordet-Gengou bac.) 400兆流行性感菌苗。及黃葡萄球菌，白葡萄球菌，鏈球菌，肺炎菌以及卡塔球菌等各200兆菌苗。</p> <p>專治混合傳染之百日咳。共注射3次。初次0.5公撮，第2次0.75公撮。末次1公撮。每次注射之間。隔開2日。行肌肉注射。</p> <p>包裝：每瓶5公撮。</p>
<p>飛散特靈 'Phyosantrin'</p>	<p>單價百日咳漿苗。專作預防及治療百日咳之用。最宜於起病初期。共用3-4管。每隔1-2日肌肉注射1次。</p> <p>盒裝：4管。每管1公撮。含4000兆6000兆菌苗各1管。8000兆菌苗2管。</p> <p>瓶裝：4公撮。初用$\frac{1}{2}$公撮。第2次$\frac{3}{4}$公撮。第3次第4次各1公撮。</p>
<p>「貝靈」鼠疫血清 Anti-Plague Serum 'Behring'</p>	<p>單價抗菌性血清。具預防與治療功效。</p> <p>預防用：10-20公撮。</p> <p>治療用：60-100公撮肌肉或靜脈注射。每管10公撮。</p>
<p>「貝靈」鼠疫漿苗 Plague Vaccine 'Behring'</p>	<p>預防鼠疫之用。內含已制死之鼠疫菌苗。共注射3次。每次用0.5至1公撮。</p> <p>包裝：每盒3管。每管1公撮。瓶裝10及40公撮。</p>



E. v. Behring

E. v. Behring

貝靈氏像



拜耳自備飛機—可於最短期內將拜耳藥品運至遠方以應急需

拜耳大藥廠 - 貝靈研究院

名 稱	性 質 用 法 包 裝
<p>「貝靈」肺炎球菌血清 Anti - Pneumococcus Serum 'Behring' 標準監製肺炎血清。</p>	<p>a. 多價抗毒抗菌性馬血清。含第一第二簇肺炎菌抗毒素。 b. 單價抗毒抗菌性馬血清。含第一簇肺炎菌抗毒素。 c. 單價抗毒抗菌性馬血清。含第二簇肺炎菌抗毒素。</p>
<p>三種血清概含〇・五%石炭酸防腐劑。 主治各種由於肺炎菌釀成之症候。特別用於格魯布性 (或全瓣性) 肺炎。肌肉或靜脈注射廿五公撮。按病情輕重。酌用多寡。每日可照此量注射數次之多。 多價：10 公撮 1 管。內含第一簇菌 3000 Felton 抗毒單位。第二簇菌 1000 Felton 抗毒單位。25 公撮 1 管。內含 7500 第一簇菌 Felton 抗毒單位及 2500 第二簇菌 Felton 抗毒單位。 多價：25 公撮 1 管。內含第一簇菌 15000 Felton 抗毒單位。第二簇菌 5000 Felton 抗毒單位。 單價：25 公撮 1 管。內含二萬第一簇菌 Felton 抗毒單位。 25 公撮 1 管。內含二萬第二簇菌 Felton 抗毒單位。</p>	
<p>「貝靈」肺炎漿苗 Pneumococcus Vaccine 'Behring'</p>	<p>含各簇肺炎菌苗之漿苗劑。用治各種慢性由於肺炎菌釀成之症候。共有濃淡兩種製劑。皮下或肌肉注射。每隔二至三日注射一次。 包裝：每盒 10 管。每管 1 公撮。內含 10 兆菌苗。 濃號每盒 10 管。每管 1 公撮。內含 50 兆菌苗。</p>
<p>「貝靈」氣管枝性肺炎菌漿苗 Bronchopneumonia Vaccine 'Behring'</p>	<p>內含專對性及普遍性抗體元。供治療氣管枝性肺炎之用。共注射三四次。肌肉注射每隔二日注射一次。 包裝：兒童用。每盒 4 管每管 1 公撮。1-4 號。分量漸增。 成人用。每盒 3 管。每管 2 公撮。1-3 號分量漸增。</p>

拜耳大藥廠-貝靈研究院

名 稱	性 質 用 法 包 裝
<p>「貝靈」 猩血熱血清 Anti-Scarlatina Serum 'Behring'</p>	<p>混合性鏈球菌血清。 治療：10-30公撮煉濃血清。或25-75公撮普通性者。肌肉或靜脈注射。 預防：5-10公撮肌肉注射。 包裝：安瓶 10公撮，25公撮 凍淨凍液 10公撮</p>
<p>斯太法 'Staphar'</p>	<p>用特法及解除毒性製成之葡萄狀球菌漿苗。主治各種葡萄狀球菌病症。皮下或肌肉注射。初次用0.5公撮。漸增至1公撮。隔日注射1次。 包裝：每盒3管10管。每管1公撮。</p>
<p>斯太法精 'Staphygen'</p>	<p>葡萄球菌之蟻醛類毒素。主治一切由葡萄球菌症候。例如瘡癤膿瘍，癩瘡，骨髓炎等。每隔2-3日注射1次。初用0.1公撮第一號液。逐漸增加至1公撮第二號液。 每盒2瓶各2公撮。分第1號(1:10濃度)及第2號。(未經沖淡)</p>
<p>「貝靈」「藥特靈」 葡萄狀球菌漿苗 Staphylo-'Yatren'</p>	<p>每管含30-600兆葡萄球菌苗。統治一切急慢性葡萄球菌疾患。肌肉注射。亦可行靜脈注射。每2-3日注射1次。 每盒6管。每管2.5公撮，菌苗量漸增。每瓶25公撮。每公撮含菌苗50兆。</p>
<p>鍊球菌血清精 Anti-Streptococcus Serum 'Behring' 'Streptoserin'</p>	<p>多價抗毒性抗傳染性馬血清。統治各種鏈球菌病症。例如敗血症。蜂窩織炎等。肌肉或靜脈注射。 預防用。10至25公撮。 治療用。25至50公撮。 包裝：每管10，25及50公撮。</p>

拜耳大藥廠 - 貝靈研究院

名 稱	性 質 用 法 包 裝
<p>「貝靈」「藥特靈」 鏈球菌漿苗 Strepto-‘Yatren’ ‘Behring’</p>	<p>本品為漿苗中佐以「藥特靈」之製劑。每公撮內含 25-300 兆菌苗。統治各種急性慢性鏈球菌症候。肌肉或靜脈注射。每隔 2-4 日注射 1 次。 包裝：每盒 6 管。每管 2.5 公撮。含菌量逐漸增加。每瓶 25 公撮。每公撮內含 50 兆菌苗。</p>
<p>「貝靈」破傷風抗毒素 Tetanus Antitoxin ‘Behring’</p>	<p>破傷風馬血清。德國國家監製。含 〇・五%石炭酸防腐劑。預防用。肌肉注射。三千單位。治療用。最少須肌肉，靜脈或脊髓（抽去等量髓液）注射五萬單位。有時須重複使用大量。 包裝： 安瓶 3000 國際單位 [10 c.c.] 每公撮至少 600 單位者 3000 國際單位 [5 c.c.] 6000 國際單位 [10 c.c.] 凍淨 3000 國際單位 [5 c.c.] 凍淨凍濃 安瓶 每公撮 2000 以上單位者 3000 國際單位 [1.5 c.c.] 20000 國際單位 [10 c.c.]</p>
<p>四 合 漿 苗 霍亂傷寒混合漿苗 ‘Tetravaccine’</p>	<p>本漿苗內含傷寒，副傷寒 A 與 B 以及霍亂等四種菌苗。用 0.5% 石炭酸為防腐劑。 皮下注射。最好注射於左側胸前鎖骨下皮下。每隔 8 日注射 1 次。第 1 次 0.5 公撮。第 2-3 次各 1 公撮。 包裝：每瓶 10 公撮。</p>

拜耳大藥廠 - 貝靈研究院

名稱	性質 用法 包裝
<p>托克素剛 'Toxogon'</p>	<p>煉濃白濁漿苗劑。內含除專對性抗體元外。尚有一般普遍性抗體元。每一公撮內含 500-2000 兆菌苗。其特別優點。在於性質平和。易於受耐。而效力特大。</p> <p>供肌肉注射用 安瓶 A amps. 6x1 c.c. 單位劑量 B amps. 6x1 c.c. 含菌量逐管增高</p> <p>供靜脈注射用 安瓶 C amps. 6x1 c.c. 含菌量逐管增高</p> <p>肌肉靜脈合併注射用 安瓶 D amps. 6x1 c.c. 含菌量逐管增高</p>
<p>「貝靈」癬瘡清毒漿 'Trichophytin'</p>	<p>從各種毛髮黴菌中提出之可溶性物質液劑。為一多價藥品。</p> <p>主治各種毛髮癬菌病症。兼作診斷之用。皮內注射。逐次漸增劑量。</p> <p>包裝：每瓶 1 公撮。</p>
<p>結核菌素劑 (鐵勃固靈) 德國國家監製。 Tuberculin</p>	<p>由結核菌培養基中營養液提出者。稱為老「鐵勃固靈」。由結核菌及其殘物中提出者。稱為新「鐵勃固靈」。此等製品。專供治療及診斷結核症之用。</p>
<p>a) 診斷用：老鐵勃固靈 (即郭后氏鐵勃固靈)。</p> <p>b) 治療用：</p> <p>1) 郭后氏結核菌素。Tuberculin Koch 每瓶 1 及 5 公撮。</p> <p>2) 結核菌素 'A.F.' Tuberculin 'A.F.' (郭后氏無蛋白質結核菌素) 每瓶 1 公撮。</p> <p>3) 羅生博結核菌素 Tuberculin Rosenbach 每瓶 1 公撮。</p> <p>4) 結核菌血清漿苗。Tuberculosis Sero-Vaccine 'S.B.E.' 每瓶 1 公撮。</p>	

拜耳大藥廠 - 貝靈研究院

名 稱	性 質 用 法 包 裝
<p>「貝靈」 傷寒接種漿苗 Typhoid Vaccine 'Behring'</p>	<p>專供傷寒預防之用。每公撮內含 1000 兆傷寒菌苗。及 0.5% 石炭酸 防腐劑。 皮下注射。共須 2-3 次。每次用 0.5 公撮至 1 公撮。每隔 7-8 日注射 1 次。 包裝：每瓶 10 公撮。</p>
<p>「貝靈」傷寒副 傷寒混合漿苗 Typhoid-Paraty- phoid Vaccine T.A.B. 'Behring'</p>	<p>本品係一多價預防漿苗。預防正副 傷寒。每公撮內含傷寒菌苗 500 兆 及副傷寒 A 與 B 菌苗各 250 兆。 用 0.5% 石炭酸為防腐劑。 皮下注射。每次用 0.5-1 公撮。每 隔 7-8 日注射 1 次。共注射 2-3 次。 包裝：每盒 3 管。每管 1 公撮。 瓶裝 10 公撮。</p>
<p>「貝靈」傷寒血清 Anti-Typhoid- Serum 'Behring'</p>	<p>本品係一抗毒抗傳染性傷寒馬血 清。內含 0.5% 石炭酸防腐劑。專 作治療傷寒之用。 肌肉或靜脈注射。每次 25 公撮。有 時可連續注射數次。 包裝：每管 10, 20, 25 公撮。</p>
<p>烏而卡登 軟性下疳漿苗 'Ulcatren' Soft Chancre Vaccine 'Behring'</p>	<p>本品係一軟性下疳之混合漿苗劑。 主治軟性下疳及其各種合併症。 初用第 1 號管。逐漸用至第 6 號管。 每隔 3-5 日注射 1 次。靜脈注射。 包裝：每盒 6 管。每管 2 公撮。劑 量逐漸增加。</p>

醫師日記附錄目次

上海德國醫藥院(附圖)

Deutsche Medizinische Akademie . . . 第 174 頁

北京輔仁大學(附圖)

Fu Jen University Peking 第 175 頁

最新研究 第176—178頁

各期梅毒之治療 第179—182頁

白濁治療用「烏利龍」「新烏利龍」. 第183—184頁

最新瘧疾治療 第185—186頁

阿米巴痢治療 第187—188頁

黑熱病之治療 第189—190頁

各重要藥物之最高用量表(成人及小兒) . . . 第191—196頁

醫藥用衡量表及通常用各種單位 第197—198頁

各種常見之中毒症象與治療 第199—208頁

尿液分析 第209—213頁

藥物禁伍表 第214—221頁

計算孕婦生產時日表 第222—223頁

華氏攝氏羅氏三種溫度比較表 第 224 頁

「拜耳」維他命製劑 Vitamin Preparations 第225—228頁

「拜耳」荷爾蒙製劑 Hormone Preparations 第228—233頁

血液之形態與成份 Morphological

Components of the Blood 第234—235頁

常用處方略語表 第236—237頁

插頁:

德國拜耳大藥廠總管理處之外景 . 第 2 — 3 頁之間

拜耳分公司散佈全球圖 第 2 — 3 頁之間

上海拜耳藥品公司之各經理處 . . . 第 2 — 3 頁之間

「貝靈」氏像 拜耳自備飛機 . . . 第166—167頁之間

瘧疾原蟲發育圖 正常經週圖 . . . 第198—199頁之間

DEUTSCHE MEDIZINISCHE AKADEMIE SCHANGHAI



In Fortsetzung des seit 35 Jahren in Schanghai erteilten deutschen Hochschulunterrichts, der im Jahre 1907 mit der "Deutschen Medizinschule für Chinesen" begann, wird auch der Unterricht in der D.M.A.S. in deutscher Sprache von deutschen Hochschullehrern erteilt. Massgebend für den Unterricht ist der deutsche Studienplan, der das medizinische Studium in Vorklinikum (4 Semester) und Klinikum (6 Semester) trennt. Die während oder nach Abschluss des Studiums abgelegten Examina können also den in einer Universität in Deutschland abgelegten Prüfungen gleichgestellt werden.

Zum Studium werden Abiturienten von staatlichen oder staatlich anerkannten Mittelschulen zugelassen, die gute Begabung, ausreichende naturwissenschaftliche Vorbildung und genügende Sprachkenntnisse besitzen, um deutschsprachigen Vorlesungen folgen zu können.

Für Schüler mit unzureichenden naturwissenschaftlichen Kenntnissen ist eine NATURWISSENSCHAFTLICHE VORBEREITUNGSKLASSE (Klasse B), für Schüler und Studenten mit ungenügenden oder fehlenden Sprachkenntnissen eine SONDERSPRACHKLASSE (Klasse C) eingerichtet. Die Aufnahme in die verschiedenen Klassen erfolgt auf Grund einer schriftlichen und mündlichen Prüfung. — Die Höchstzahl in einer Klasse beträgt 25 Studenten.

Auswärtigen Studenten kann Internat mit Verpflegung, besonders begabten Studenten können Stipendien gewährt werden ("Bayer-Stipendium" usw.). Studenten anderer Universitäten mit genügenden Deutsch-Kenntnissen werden auf besonderen Antrag zu einigen Spezial-Vorlesungen als Gasthörer zugelassen.

Vorlesungs-Verzeichnis, Prospekt und nähere Auskunft können vom Sekretariat der D.M.A.S., 82 Yates Road, Schanghai, erhalten werden.



DEUTSCHE MEDIZINISCHE AKADEMIE SICHANGHAI 上海德國醫學院



FU-JEN UNIVERSITÄT IN PEKING

北 京 輔 仁 大 學

DIE FU-JEN UNIVERSITÄT IN PEKING

wurde 1925 gegründet und 1931 von der chinesischen Regierung als Universität anerkannt. Sie umfasst die drei Fakultäten: Literatur, Pädagogik und Naturwissenschaften, die zusammen aus elf Abteilungen bestehen.

Im Schuljahr 1941/42 betrug die Zahl der Studierenden 2245, davon waren 895 Studentinnen. Mit dieser Schülerzahl ist die Fu-Jen die am stärksten besuchte Universität Nord-Chinas.

Der Universität ist ein mikrobiologisches Institut angegliedert, das sich unter der Leitung von DR. J. CHANG vorzüglich der Bekämpfung des Flecktyphus widmet und einen Impfstoff nach der Weigl-Methode herstellt.

Im Herbst 1942 eröffnet die Fu-Jen Universität eine Sektion für deutsche Sprache und Literatur. Ziel und Studiengang weichen aber in wesentlichen Punkten von dem traditionellen Programm für westliche Sprachen insofern ab, als die Studenten der Sektion vornehmlich mit der Sprache der Wissenschaft, besonders der Naturwissenschaften, bekannt gemacht werden.

An laufenden Veröffentlichungen gibt die Universität auf sinologischem Gebiet die "Monumenta Serica," "Folklore Studies" und "Fu-Jen HSÜEH CHIH" (letztere in Chinesisch) heraus, ferner eine Zeitschrift für chinesische Literatur.

Mit der Universität verbunden sind auch drei Mittelschulen, eine für Knaben und zwei für Mädchen. Insgesamt zählen sie 1224 Schüler.

最新研究

學問之道無窮。研究從無止境。新智識之發明也。始於小範圍。專家之專門研究。繼而發為實用。造福人羣。其意義乃日趨重要。所謂作始也簡。成功也鉅是也。此嚴格科學必然之歸宿也。本廠集合專家。各以專長悉心研究。又與實地臨診。醫療專家密切合作。故其成就。篤實光輝。超越時代。最近所成功者無一非劃時代之新發明。無一非空前之特效劑。由此而許多病症。有新治法。由此而許多絕症。忽得救治之方。此誠醫藥界之大成功。不可不略述也。

(一) 「度冷丁」 'Dolantin'

「度冷丁」為完全化學品。具有絕大功力。而用法簡便。既能解癮。又能止痛。既可內服。又可注射。向來對一切疼痛病症。尤其是因癮變而起之症。均無特效劑。普通唯恃嗎啡。阿刀平及其他植物鹼以取快一時。而其副作用之多及流弊之大。每遭人以得不償失之憾。故百年以來。醫家日日在求有大功力。而無副作用之安全止痛劑。「度冷丁」即應此期望之成功品也。「度冷丁」為化學品質地純淨。具絕大解癮作用。既有阿刀平之神經作用。又有帕帕維寧之肌肉作用。而其特殊之止痛功能。則又與嗎啡無異。數種特效。集於一體而無絲毫副作用。宜乎醫家認為破天荒之靈藥。「度冷丁」既兼有諸長。故其主治之範圍極廣。解癮止痛無不應手奏效。自此藥發明而鴉片製劑及莨菪製劑。一切毒品殆幾乎全廢矣。

(二) 「西冷」 'Cyren'

自人工動春性物質發明。本廠最先着手製出。各種「西冷」製劑。其中以「西冷」B為最有價值。治療之成績獨優。最近又製成內服之「西冷」片。其攝收極速。見效極準。異於天

拜耳大藥廠

然女性濾泡素之不宜內服。天然荷爾蒙內服者。必須較同劑注射者分量加十倍。始有同樣功效。而「西冷」之內服者。與注射此分量完全相同。功力完全相等。加之性質和善。耐受性極佳。尤為其優點。又有「西冷」油膏。便於外用。

(三)「烏利龍」及「新烏利龍」'Uleron' and 'Neo-Uleron'

自「烏利龍」及「新烏利龍」出世。而淋濁始有化學治療之方。病者始有完全斷根之望。此近代醫家之公論也。「烏利龍」不但專治慢性老白濁。即對急性新白濁亦能以十二公分之總劑量。於四天之短期內治愈斷根。治愈率之高約為百分之八十至百分之九十。如再續服一次。用同樣劑量。同樣連服四天。其治愈率可增至百分之九十六。蓋幾於百治百愈矣。此不獨治效之高可驚。即其時間經濟之優點。亦大可驚矣。此真近代醫藥之一極大進步也。此高貴重要之記錄。實創造於拜耳大藥廠之研究所中。其貢獻於人羣者。可謂大矣。「烏利龍」及「新烏利龍」。所以優於眾品者。以其攝收極速。據實驗報告。在服「新烏利龍」之第一日。其血清中「新烏利龍」量。即為11 mg%。「烏利龍」及「新烏利龍」。吸收既速。見功又捷。故在治療中。絕無蓄積作用及一切副作用之虞。

最近發見「烏利龍」。可以外用。故又製為「烏利龍」油膏。此種油膏專治一切污穢創口及久久不愈之傷口。尤其是金屬之裂傷。如由鋸器所傷之傷口。用「烏利龍」油膏。外治靈效非凡。

(四)「百浪多息」'Prontosil'

「百浪多息」之發明。近數年醫學界驚天動地之一大事也。向來膿菌病無化學劑內治法。自「百浪多息」出。一切險症。咸有醫法。故醫史家選稱今日之時代為「百浪多息」時代。良以其為劃時代之大發明也。發明「百浪多息」之偉人。即為拜耳大藥廠研究所之化學治療專家都莫克氏 Domagk。

拜耳大藥廠

此藥發明才不過數年。而世界上受其福賜。得起死回生者。已不知其幾千萬人矣。此皆拜耳廠之嘉惠。不可忘也。最近因治療界之需要。又製為「百浪多息」油膏。以為外治一切創傷之用。其功效至偉大。尤其戰地外科。用途極廣。

(五)「阿克雷年」‘Acranil’

係最近代最新發明之靈藥。「阿克雷年」‘Acranil’乃專治腸梨形蟲之化學治療劑。腸梨形蟲傳染病。其為患不亞於阿苗巴菌痢。向來無藥可醫。即幸獲暫愈。亦終必復發。最近拜耳研究所同人在各種阿克雷定誘導體中。尋出「阿克雷年」‘Acranil’。始得一專治腸梨形蟲病之特效藥。功效確實。用法簡單。永保斷根。從無復發。

(六)「托克素剛」‘Toxogon’

漿苗治療。在最近新研究中。亦有嶄新之進步。「貝靈」研究院所發明之濃厚白濁菌漿苗。其中除專對性之白濁菌漿苗外尚有非專對性之普遍抗體原。專能喚起身體一般抵抗力。用於白濁治療。有一舉兩得之功。以之與「烏利龍」及「新高利龍」同用。可使一切白濁之治療功效十全。

(七)「海母德」‘Hemodal’

(八)「退巴丁」‘Tibatin’

(九)「儲蓄因蘇林」 Depot-Insulin

拜耳廠研究所之研究精神。永無倦日。在此許多新發明之成績。光輝燦爛之際。最新之特效劑。又接踵而至。有為專門止血之「海母德」。是為維他命 K 之製劑。乃從納夫妥希奴林製成。又有專治鏈球菌傳染病之化學治療劑。「退巴丁」。功效在一切磺醯胺劑之上。本廠發明之儲蓄因蘇林現已製為透明溶液。此亦技術上之一大進步也。

由此可見拜耳出品不斷改善。不斷增加。其名滿寰宇。豈偶然哉。

各期梅毒之治療

梅毒係一變化無窮慢性漸趨於死亡路途之傳染病。因之在治療時必須審慎。并須顧到患者年齡體質以及病情等等問題然後着手治療。則收功方見顯著。梅毒治療上自從砒銻二劑發明後。方有特效專藥。其功效不僅使臨床症候消退而已。即血液及髓液中之菌踪亦獲全除。蓋其效力在於殺滅病原菌。故有根治之效也。

梅毒一經感染應即刻趁早用六〇六劑治療。愈早治療。收效愈佳。切勿錯過早治時機。螺旋菌在體內停留既久。即愈難消滅。因之頑惡老痰治療極費週折。總而言之既染此疾。即應從速用足砒銻二劑治療。

最易應用之法為：

Bonner 氏砒銻劑合用法。每一星期內兩劑均用足劑量。於同日內注射「六〇六」劑(靜脈注射)。及銻劑(肌肉注射)。

「新六〇六」'Neosalvarsan' 每次之男子成人量為〇・四五至〇・六公分。其總足量為五・五公分至七公分。普通情形每星期注射二次。即每隔三四日注射一次。女子成人之一次足量為〇・四五公分。每星期則為〇・九公分。男子每星期二次。每次〇・六公分。此項男女成人之每週量。均已足夠。且易於受耐。并無流弊。頑固難愈症例。女子可增用至每星期二次。每次〇・六公分之量。男子無疑的可用〇・七公分。或更加增亦可。但此量終竟少用也。

其最佳之合併用銻劑為「嘉色銻」'Casbis'。用者最易受耐。每星期注射二次。每次一公撮。一個相當足量之全劑。約為十至十二次。(每星期二次。例如星期一及星期

拜耳大藥廠

四各一次。)兩藥於同日注射。總量約於五至六星期內用畢。第一次注射。如防反應過高。可略減劑量。(新六〇六)用〇・三公分。「嘉色鈹」用〇・七五公分。遇腦梅毒時除用磷劑外佐以一二次「嘉色鈹」。畧遲後始用「新六〇六」。此後以「新六〇六」與「嘉色鈹」二藥合併治療。一全劑用完後。如果只停劑五星期。即用第二劑。則效果必然更佳。在行此等足量治療之期間。必須注意病人之一般狀態，體重，小便，皮膚，心臟，腸胃，口腔以及咽喉等處。如果發生枝節。應即刻停劑。如略呈反應。則減低劑量。

星 期	男 子 新六〇六	嘉 色 鈹	女 子 新六〇六	嘉 色 鈹
1.	0.45公分	0.75公撮	0.3 公分	0.75公撮
	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
2.	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
3.	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
4.	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
5.	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
總 量	5.85公分	9.75公撮	4.35公分	9.75公撮
6.亦可加用 一星期之量	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
	0.6 公分	1.0 公撮	0.45公分	1.0 公撮
總 量	7.05公分	11.75公撮	5.25公分	11.75公撮

「新六〇六」之每星期量為 0.9-1.2 公分。(二次 0.45-0.6)

在用完第一全劑後。停劑時間為五星期。

靜脈注射應注意之點：首推注射緩慢。針頭刺入靜脈後。宜倒抽少許血液至注射器。藉以證明確在靜脈內否。注射時如略感痛楚或稍微墳起。即係針頭不在血脈之徵兆。應即刻停止。重新刺尋靜脈。注於靜脈外之禍患甚大。不

拜耳大藥廠

可不慎。如遇難行靜脈注射之人。例如肥胖者或小兒等。可改用可行肌肉注射之「六〇六」劑「聖露酒爾佛散」‘Solu-Salvarsan’。此藥亦宜作靜脈注射之用。肌肉注射時。宜注於臀肌深部。每星期行二三次。共用十針為一全劑。

既已開拆之不論「新六〇六」。或「聖露酒爾佛散」。均須即刻用完。切不可停置再用。以免中毒。

(一)第一期呈負號梅毒。即新染之梅毒只經用三次「新六〇六」後。血清反應呈負號者。只須用完一全劑「砒鈹兩劑合併療法」(約共各十至十二針)。即已足夠。但為慎重一勞永逸計。必須隔五星期後照樣續用一全劑。

此等兩全劑療法。係第一期「血清反應仍呈正號」之梅毒。最低限度所必須之量。並且必須力求第二全劑所用之量必須與第一劑同。

(二)新鮮已至第二期梅毒。最少必須注射三個足量全劑。第一二全劑之間停劑五星期。(每全劑約為砒鈹劑各十至十二針。第二次停劑時間。亦可改為六星期)。

(三)較老之第二期梅毒。在用完三個足量全劑後。隔二月仍須再用第四全劑。並且宜停用他種「六〇六」劑。例如「聖露酒爾佛散」。頑固第二期梅毒。照上項之劑量。多已足夠。除非特別頑惡症例。當須隔二三月後更用第五全劑者。

如果已屬儘早施行此等足量全劑治療之後。尚未獲十分滿意結果時。必須即刻檢驗脊髓液。俾及早判定。是否梅毒已經延及中樞神經。對於此等頑惡不應砒鈹合併治療之病人。只有增加六〇六劑量或另行人工瘧疾(發高熱療法)治療。藉增效果。

(四)第三期梅毒。呈皮膚或內臟症象者。療法照第三項同。每全劑之間宜隔一個半至三個月停劑時期。須知在用

拜耳大藥廠

此等足量藥劑療法之時。必須體內各部器官之共同健強合作。因之病人在用藥時必須遵照。起居規正。減除煙酒。不過勞力。不太用心神等條件。切保攝生之道。方有特效也。

〔五〕中樞神經梅毒。其脊髓液已呈顯著之變化時。則先行人工瘧疾法。隨即仍用砒鉍合併法。每見已有明顯麻痺或脊髓癆症象者。經此治療後仍可獲得優良效果也。凡此等五六兩項之遲期梅毒。磺劑亦至有效。尤以注射用磺劑「恩托同」‘Entodon’為最佳。

〔六〕胎傳〔先天梅毒〕梅毒只須早用砒鉍合併先治療孕婦。原屬可以避免。孕婦一般而論均能受耐砒鉍二劑。僅不過較普通人感應器為靈敏。原來之每星期量為〇・九公分。如今不可再多。對於孕婦患第二期梅毒之劑量。至少為三個砒鉍混合全劑。如果在第五孕娠月或尚較遲方發現孕婦患梅毒時。則大多數只須注射二個砒鉍混合全劑。〔每全劑之間停劑四星期。一全劑砒鉍各十至十二針。每星期二次〕將來即可獲得健康無毒之胎兒。

新生胎兒一經診斷。宜即刻施行早治法。有許多症例經用足量砒〔「聖露洒爾佛散」〕鉍合併療法〔兩劑之間停劑五星期〕或大量「斯砒螺刺脫」‘Spirocid’。此劑之小兒乳嬰用量。迄今各家尚未一致。但介紹 Mommsen 氏用法。〔詳請參看分類藥名表「斯砒螺刺脫」章內。此法係於出世後之第十日開始。過較大小兒。則行大量砒鉍合併治療法。劑量按年齡與體重酌定。〕

欲求撲滅梅毒之有力方法。須以新染症例早予診斷及使早愈為最要。用六〇六劑可獲早愈之機會。不僅對於第一期梅毒而已。即不論新老之第二期梅毒用之亦然。其最要者。厥為觀察病者是否已經用足劑量。如未用足。則病症不免繼續蔓延也。

白濁治療用「烏利龍」「新烏利龍」 'Uleron' and 'Neo-Uleron'

自從本廠發明鏈球菌專藥「百浪多息」，'Prontosil' 屬藥物後。經繼續研究之結果。又發明白濁特效藥「烏利龍」'Uleron' 及「新烏利龍」'Neo-Uleron' 其性質純和。只須內服即收治療白濁之特效。並不論症在何期。以及一切由白濁菌釀成之各種合併症。一概見功。

普通一種化學治療劑。其效既特強。則對於所治部份之組織亦不免有相當毒性為患。但「烏利龍」及「新烏利龍」概無此弊。本品早經大量臨床經驗公認。功效優良。且凡違法採用所謂短劑療法者。一概未見有任何不良反應及副作用。

「烏利龍」及「新烏利龍」現已經過大量臨床經驗承認。雖對新染白濁(即未過十日之症例)。亦宜即刻採用。毋須等待。

短劑用法：一短劑。即連服本品四日。每日三次。每次二片。每片○●五公分。總量十二公分。據統計數千用「新烏利龍」治療之白濁症例。結果只用一短劑即獲全愈。不再復發者。佔百分之八十至八十五。如果服一短劑後尚未全愈者。可隔一星期。再照法服用一短劑。經服二短劑後。其未能全愈者。僅百分之五(全愈者達百分之九十五)。至於尚須再服第三短劑。極屬少數。服法亦須在服完第二短劑後停劑一星期。始可服用。

拜耳大藥廠

此二劑劑可隨便採用。普通在服完第二短劑後。未見十足功效時。第三短劑宜換一種。如先前係服「烏利龍」者。則改用「新烏利龍」。如係服「新烏利龍」者。則改「烏利龍」。凡非解剖上有特別情形者。多能收全愈之功。如果用完三短劑後仍不能愈者。係屬極少之數。蓋係此病人不應化學治療之故。因之本品只以三短劑為限。能愈者固已早愈。其極少不應藥者。再用亦無裨益。宜另求他法也。

如果本品欲在傳染後隔十日以上之久始再應用時。則於等待期間可用過錳酸鉀 (1:10000) 溶液沖洗。在二短劑間之停劑期內亦宜施行。

有時不用此等局部治療法者。亦有採用漿苗療法以替代之。最好採用「托克素剛」'Toxogon' 或「果乃金」'Gonargin'。功效特優。用法仍宜採用肌肉與靜脈合併注射法。

參看下表：

第一日	五百兆	菌苗	肌肉注射
第二日	五十兆	菌苗	靜脈注射
第三日	一千兆	菌苗	肌肉注射
第四日	一百兆	菌苗	靜脈注射
第五日	二千兆	菌苗	肌肉注射
第六日	二百兆	菌苗	靜脈注射

在用完漿苗劑後。即可繼續服用「烏利龍」或「新烏利龍」。

至於鑑定是否全愈時。每先行誘發法。以資判斷是否尚有白濁菌發現。但此法必須在藥服完後至少隔六日施行方準。

最新瘧疾治療

本廠愛培弗究研究院公佈瘧疾療法。確能消滅瘧蟲。兼又防止復發。其最大之成就應歸功於 Schulemann 氏 Schoenhofer 氏及 Wiegler 氏等。因諸氏發明「百司母因」後。從此方有一種真正可以消滅惡性瘧疾有性生殖幼蟲之專藥。雖然在此之前早已遍用規寧。但規寧尚非完善無缺之瘧疾劑。規寧僅能殺惡性瘧之無性生殖幼蟲。規寧不能撲滅惡性瘧疾之有性生殖幼蟲。而此蟲恰為釀致復發。散佈蔓延之禍根。其所以用規寧不能撲滅瘧疾。無絕對功效者。良以此故耳。

「百司母因」專能殺滅此項惡性瘧之有性幼蟲。顧學術無止境。瘧疾治療決不能以「百司母因」之發明而自滿。更經繼續研究。遂又有專門撲殺惡性瘧（及其他隔日與隔二日瘧疾）無性生殖幼蟲專藥之發明。完全可以取規寧而代之。此藥名「阿的平」‘Atebrin’。其發明完全歸功於 Mauss 氏及 Mietzsch 氏。「阿的平」係一阿克雷定（色素）屬藥物。專能殺滅三種瘧疾之無性生殖幼蟲及隔日與隔二日瘧之有性生殖幼蟲。其優點在於效力偉大迅速。超過舊有之劑。又因性質純和。易於受耐。故係瘧疾的理想製劑。使其治療時間縮至最短。又無規寧之各弊。「阿的平」對於子宮毫無影響。雖孕婦亦能安心服用。蓋規寧則在禁用之列也。「阿的平」無起黑水病之虞。凡已呈黑水病者。規寧既不敢用。故其惟一瘧疾根治劑係「阿的平」矣。

隔日瘧隔二日瘧只須單獨服用「阿的平」。即收根治之效。連服五至七日。每日三次。每次一片（○●一公分）。餐後并用多量茶水送下。空腹不宜。因每有惹起胃部不適之感。

*見 198 頁瘧疾原蟲發育圖

拜耳大藥廠

照此服法。無不全愈。復發者極屬少見之事。四至八歲兒童。只須連服五日。每日二片之量。每片〇・一公分。四歲以下小兒。亦連服五日。但每日只須一片(〇・一公分)即够。如欲使其復發率降至等於零時。則在服完「阿的平」一全劑後。更服「百司母因」一全劑。與治惡性瘧時同。則收效益佳。

惡性瘧疾治法：成人及八歲以上兒童。概先服「阿的平」五至七日。每日三次。每次一片(〇・一公分)。在服完「阿的平」後。另服「百司母因」三至五日。每日二次。每次一片(〇・〇一公分)。亦須在餐後用多量茶水送下。否則胃部每有不快感覺。

如遇嚴重症例。瘧蟲繁殖太甚時。或欲熱度速退時。則可用注射法替代普通治療之內服法。在起初第一第二日將「阿的平」之每日量〇・三公分行一次肌肉注射。真過十分嚴重症例。亦可將第二針之劑量在第一次注射之當日。隔數小時後即行注射亦可。普通用二日注射法。隨後仍繼續行內服法。至用完一全劑為止。

惡性瘧在用完一全劑「阿的平」後。須用每日二片(〇・〇一公分)「百司母因」。連服三至五日。此項劑量對於七歲以上兒童亦宜。七歲以下小兒。則只須每日服一片(〇・〇一公分)即够。

如遵上述以一全劑為標準之用法。結果復發者僅佔百分之五至七。如果但求臨床上症象消退而已。則只須四至六片「阿的平」分於二日內服下。亦即見功。

「阿的平」亦適於預防之用。成人於一星期內任擇二日服用本品(例如每星期一二)。每日二片(〇・一公分)。平均每星期四片。二至四歲小兒一星期量平均三片。二歲以下小兒。每星期一片。無不均有十足預防功效。

阿米巴蟲痢治療

痢疾為僅略少於瘧疾之熱帶病。在中國流行尤廣。以前其治療未趨劃一。近則已有繩準。簡括言之。不論急性或慢性阿米巴蟲痢其最有效劑厥為「藥特靈」'Yatren'。伊米汀(吐根劑)對於急性確有相當效果。然對於慢性者。則極難如望。且此劑毒性匪輕。常見嚴重中毒現象。茲姑棄不論。又阿米巴對於此藥每見發生固性。竟至毫無功效可言。惟「藥特靈」則絕無此弊。

最先用者以為此藥對於阿米巴發生直接撲殺作用。故僅行使藥液貯於腸中略久之灌腸法。惜灌腸法之效力僅在腸之下部。其功不遠。因之改行內服丸劑。或合併使用。藉收上下交攻之益。

不論急性或慢性阿米巴蟲痢之最適宜療法

「藥特靈」丸用量

第一日： 每日三次。每次一粒「藥特靈」。餐後服下。
第二至第五日： 每日三次。每次二粒「藥特靈」。餐後服下。
第六至第七日： 每日三次。每次三粒「藥特靈」。餐後服下。

內服與灌腸合併療法。急性固宜。但對於慢性尤佳。灌腸液逐漸加濃。先用清水灌入洗淨。劑量：

第一日	1公分「藥特靈」粉	比水 200公撮
第二日	2公分「藥特靈」粉	比水 300公撮
第三日	3公分「藥特靈」粉	比水 400公撮
第四日	3公分「藥特靈」粉	比水 500公撮
第五至七日	3公分「藥特靈」粉	比水 600-800公撮

灌腸之液須深深灌入。并使之久貯於內。最好能達 6-8

拜耳大藥廠

小時之久。如不能忍耐如許之久。則可將藥液內佐入 25-30 滴鴉片酊。並將水份減少至 300-500 公撮。

為防復發計。宜在愈後仍再服用。以絕後患。連服三日。每日三次。每次三粒。停劑四日。再照樣服用。如此斷續服用三星期。即可保險一勞永逸矣。遇特別頑固老疾。并須同時行灌腸法。每日用 2-3 公分「藥特靈」粉溶於 300-500 公撮水內灌入。連行 3 日即停 3-4 日不用。如是亦斷續用三星期之久。特別急性症候。在用「藥特靈」之起初五日內。佐以伊米汀數針。頗有價值。在用藥期間病者可以毋須特別忌口。但只能少進易於消化之食物。

「雷佛奴耳」‘Rivanol’亦有強大撲殺阿米巴功效。且尚具有解除腸壁痙攣之作用。可以消除病人裏急後重之感。採用本品內服與灌腸均可。灌腸：每日可行 2-3 次。每次用 1:1000-1:5000 倍溫熱溶液。內服則連服七日。最好用「雷佛奴耳粒吞」‘Rivanolettes’。成人：每日服三次。每次兩片（每片 0.025 公分）。十歲以上兒童。每日三次。每次一片（0.025）。較幼小兒及乳嬰：按年齡酌減。約每日服二至四次。每次半至二片。（每片 0.01 公分）如與「藥特靈」合用。則功效益佳。

此外尚有若干專家採用「斯砒螺刺脫」‘Spirocid’治療阿米巴蟲痢。此藥對於蟲痢。亦極有優點。用法：最好每日服 2 片。連服十日之久。慢性症候。每日 1 片。隨後則每一星期內共服 2 片。每片 0.25 公分。

總之後二者不過為蟲痢輔佐劑。其主要者當推「藥特靈」。「藥特靈」係蟲痢特效專藥。其殺蟲力既大。非他藥可及。對於腸壁已破潰之瘡口亦特具消毒作用。係有兩重功效也。

黑熱病(卡拉阿差)之治療

黑熱病在發明銻劑之前。前途黑暗無比。染者死亡率幾達百分之百。自從發明銻劑吐酒石 Tartar. emetic. 後。方始稍露一線曙光。然而此藥毒性太重。令人幾乎不能受耐。迨人工合成銻劑後。此病之治療方始昌明。其中尤以五價銻為最完美。公認為黑熱病特效專劑。

「新斯銻波霜」'Neostibosan'「聖靈斯銻波霜」'Solustibosan'

係五價銻劑。概為黑熱病之標準專藥。其殺病原「利什曼氏」小體之效力既最強。而性質又極和平。從此使吐酒石絕跡於黑熱病治療上矣。

「新斯銻波霜」最宜於製為5%溶液行靜脈注射之用。如製為25%溶液行肌肉注射亦宜。其濃度恰與血液為等滲也。注射處最好為臀肌深部。本品劑量大體方面已有標準。但仍須參酌病情與病人體質規定則更為妥適。注射時必須小心。尤其行靜脈注射時。必須緩慢。既不宜在過飽時亦不可在空腹時施行。在注射之後應令病人略為休息數小時。不可即刻勞力動作。在用藥之期內。病人須擇易於消化之食物。

劑量之規定。普通為四十五公斤之成人用三公分之總量。但參酌病情與體質予以增減更宜。四十五公斤體重以上之人則可略增用三·五一三·六公分「新斯銻波霜」。(參看下表)。

小兒需量一般而論較成人為高。成人用量係照體重為比。此項比例對於小兒不適。小兒之總量最低要照成人所用之比增加百分之十至廿也(按體重為比)。

拜耳大藥廠

「新斯錫波霜」總量表

體 磅	重 公斤	「新斯錫波霜」總量 公 分	體 磅	重 公斤	「新斯錫波霜」總量 公 分
10	4.5	0.3	90	40.5	2.7
20	9.0	0.6	100	45.0	3.0
30	13.5	0.9	110	49.5	3.3
40	18.0	1.2	120	54.0	3.6
50	22.5	1.5	130	58.5	3.9
60	27.0	1.8	140	63.0	4.2
70	31.5	2.1	150	67.5	4.5
80	36.0	2.4			

「聖露斯錫波霜」‘Solustibosan’ 據最近之應用經驗。其對於四十五公斤重成人之總量為八十公撮。四十五公斤以上者。其總量為一百公撮。小兒之用量亦較成人所用之比例為高。例如廿七公斤體重之小兒其總量為五十至六十公撮。第一次注射。當然須顧到身體對於錫劑恐起過敏作用。故宜以較小量開始。下示每次之用量。藉供參閱。

乳嬰至二歲小兒	1—2 公撮 = 0.02—0.04 公分	錫質
二至四歲小兒	2 公撮 = 0.04 公分	錫質
五至九歲小兒	2—4 公撮 = 0.04—0.08 公分	錫質
十至十五歲兒童	4—6 公撮 = 0.08—0.12 公分	錫質
成人	6 公撮 = 0.12 公分	錫質

「斯錫波霜」可每日注射。或隔一日注射。用 0.1-0.15 公分。視病人受耐如何而增至每次 0.3 公分之量。迨注射到一全劑總量為止。如照法施用均能獲全愈。只有極少數症例。例如在第一劑用完之二至四星期後脾腫未退脾穿刺物或胸骨穿刺物內仍有「利什曼氏」小體發現者。則須續用。普通成人須續用五針。每針 0.3 公分。毋須再用一全劑也。在注射「新斯錫波霜」「聖露斯錫波霜」一全劑後。決不可性急。在隔一星期後即為續行注射。務須至少隔二星期後檢驗。是否已獲斷根。太早檢驗。因藥力尚未發揮完畢。雖病蟲似未全滅。實不足為憑也。

然而例外不免。亦曾有人發現雖經二次療治後。仍未能完全斷根者。此係例外極罕見之事。苟遇此等病人時須隔二至四月後。再為注射一全劑。則定獲全愈矣。

拜耳大藥廠

各種重要藥物之最高用量表

及各若干重要藥物之中等*限量表

按照德國藥典

第六冊

藥 名	最大一次量 (公分為單位)	最高一日量 (公分為單位)
*Aba in.....	0.5	1.5
*Abrodil.....	20.0	—
*Acid. acetylo-salicyl.....	1.5	5.0
Acidum arsenicosum.....	0.005	0.015
Acid. diethylbarbituric.....	0.75	1.5
Acid. phenylethylbarbit.....	0.4	0.8
*Acranil.....	0.3	0.3
*Adalin.....	1.5	2.0
Amylene hydrate.....	4.0	8.0
Amyl nitrate.....	0.2	0.5
*Anaesthesin.....	1.0	2.0
Antifebrin.....	0.5	1.5
*Antipyrin.....	1.5	4.0
Apomorphine hydrochloride.....	0.02	0.06
Aqua Amygdalar. amar.....	2.0	6.0
Argentum nitricum.....	0.03	0.1
Arsacetine.....	0.2	—
*Aspiphenin.....	1.5	5.0
*Aspirin.....	1.5	5.0
*Atebrin.....	0.3	0.3
Atropine sulphate.....	0.001	0.003
*Betaxin.....	3-25 mg.	50 mg.
*Boroverlin.....	1.5	4.0
Bromoform.....	0.5	1.5
*Butolan.....	1.0	3.0
*Cafaspin.....	1.0	2.0
*Campolon.....	2-5 c.c.	10 c.c.
*Canadrast.....	0.03	0.1
*Cantan.....	100-500 mg.	500 mg.-1 g.
Cantharides.....	0.05	0.15
*Cassbis.....	0.5-1 c.c.	1 c.c.
*Certuna.....	0.02	0.06

凡前置*者。表明所示之量在許多情形之下。
只宜短時應用。

拜耳大藥廠

藥 名	最大一次量 (公分為單位)	最高一日量 (公分為單位)
Chloral hydrate	3.0	6.0
Chloroform, orally	0.5	1.5
Cocaine hydrochloride	0.05	0.15
Codeine phosph.	0.1	0.3
*Caffeine sod. salic.	1.0	3.0
*Coffeminal	0.075	0.45
*Compral	1.0	3.0
*Cortenil	5 mg.	15 mg.
Creosotum	0.5	1.5
*Cyren B	2.5 mg.	5 mg.
Diacetylmorphine hydrochloride	0.005	0.015
Dihydroxycodeinone hydrochlor.	0.03	0.1
Dionin	0.1	0.3
*Dolantin	50-100 mg.	200 mg.
*Elarson-Iron	3 tabl.	3-9 tabl.
*Eldoform	1.0	4.0
*Elityran	0.05	0.15
Emetine hydrochloride	0.05	0.1
*Entodon	1-2 c.c.	2 c.c.
Ethylmorph. hydrochlor.	0.1	0.3
Eukodal	0.03	0.1
*Eumydrin	0.0025	0.0075
*Evipan	0.5	—
*Evipan Sodium	1.0	—
Extract. Belladonnae	0.05	0.15
Extract. Opii	0.075	0.25
Extract. Strychni	0.05	0.1
Folia Belladonnae	0.2	0.6
Folia Digitalis	0.2	1.0
*Gardan	1.0	3.0
*Germanin	1.0	1.0
Glandulae Thyreoideae siccatae	0.5	1.0
*Glycocol	10.0	20.0
*Gravitol	0.02	0.12
*Helmitol	1.0	4.0
Heroin hydrochloride	0.005	0.015
*Hexeton i.v.	0.01	—
*Hexophan	1.0	4.0
Hydrarg. bichloratum	0.02	0.06
Hydrarg. bijodatum	0.02	0.06
Hydrarg. chloratum	0.1	—
Hydrarg. cyanatum	0.01	0.03
Hydrarg. oxyeyanatum	0.01	0.03
Hydrarg. oxydatum	0.02	0.06
Hydrarg. salicylicum	0.02	—
Hydrastinin hydrochloride	0.05	0.15
*Hydronal	$\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$	5.0

拜耳大藥廠

藥 名	最大一次量 (公分為單位)	最高一日量 (公分為單位)
*Hypophysin	1-3 V.U.	10 V.U.
*Icoral intramuscularly	0.1	—
*Immetal	10-15 c.c.	10-15 c.c.
*Istizin	0.75	1.0
*Lactoflavine	1 mg.	2.5 mg.
*Lactophenin	0.5	3.0
Liquor pot. arsenicosi	0.5	1.5
Lobeline hydrochloride	0.02	0.1
*Lopion	0.01-0.1	0.01-0.1-0.5
Luminal	0.4	0.8
Luminal Sodium	0.4	0.8
*Lutren	5 mg.	15 mg.
*Melubrin	2.0	4.0
*Migraine	1.1	3.3
Morphine hydrochloride	0.03	0.1
Narcophin	0.03	0.1
Sod. acetylarsanilic	0.2	—
Sod. diethylbarbitur	0.75	1.5
Sod. nitrate	0.3	1.0
Sod. phenylethylbarbitur	0.4	0.8
*Neosalvarsan	0.6	—
*Neo-Uleron	1.0	3.0
Nitroglycerine sol.	0.1	0.4
*Novalgin	1.5	4.5
*Novocain	0.5	—
Oleum Chenopodii anthelmintici	0.5	1.0
Opium, concentrated, and all decoctions containing about 50% morphine and the integral part of the remaining opium constituents	0.03	0.1
Opium powder	0.15	0.5
*Orasthin	1-3 V.U.	10 V.U.
*Padutin	3 U.	9 (-45) U.
*Pantocain	see table on page 12	
Papaverine hydrochloride	0.2	0.6
Paraldehyde	5.0	10.0
*Pardimon	1 mg.	1 mg.
*Per-Abrodil	20 c.c.	—
*Phanodorm	0.4	—
*Phenacetin	1.0	3.0
Phosphorus	0.001	0.003
Phosphorus solutus	0.2	0.6
Physostigmine salicylate	0.001	0.003
Physostigmine sulphate	0.001	0.003
Pilocarpine hydrochloride	0.02	0.04
*Piperazine	1.0	3.0

拜耳大藥廠

藥 名	最大一次量 (公分為單位)	最高一日量 (公分為單位)
*Plasmoquine	0.02	0.04
Podophylline	0.1	0.3
*Preloban	5-25 M.U.	25 M.U.
*Prolan	300-500 I.U.	2000 I.U.
*Prominal	0.4	0.8
*Prontosil	1.0	3.0
Pulvis Ipecacuanhae opiat.	1.5	5.0
*Pyramidon	0.5	1.5
*Racedrin	0.15	0.3
*Rivanol	0.1	0.3
Sajodin	0.5-1.5	1.0-5.0
Salol	2.0	5.0
Santonine	0.1	0.3
*Scopolamine hydrobromide.	0.001	0.003
*Solustibosan	6 c.c.	6 c.c.
*Spirocid	0.75	1.0
*Strophantine	0.001	0.005
Strychnine nitrate	0.005	0.01
*Suprifen	0.01	0.1
*Sulfonal	1.0	2.0
*Suprarenin (adrenalin, etc.)	0.001	—
*Tannigen	1.0	3.0
Tartar. emetic.	0.1	0.3
*Theobromine sod. sal.	1.0	6.0
*Theocin sod. acet.	0.5	1.5
*Theominal	0.5	1.5
Theophylline	0.5	1.5
Tinctura Colchici.	2.0	6.0
Tinctura Digitalis.	1.5	5.0
Tinctura Iodii	0.2	0.6
Tinctura Lobeliae.	1.0	3.0
Tinctura Opii crocata	1.5	5.0
Tinctura Opii simplex	1.5	5.0
Tinctura Strophanti	0.5	1.5
Tinctura Strychni.	1.0	2.0
*Tonaphin.	3 U.	20-25 U.
*Tonophosphan	0.1	0.3
*Torantil	1 U.	1 U.
*Trigemin	0.75	2.25
Trional	1.0	2.0
*Trypaflavine.	0.6	—
*Tutocain	0.2	0.2
*Uleron	0.5-1.0	3.0
Veratrine	0.002	0.005
Veronal	0.75	1.5
Veronal-Sodium.	0.75	1.5
*Vigantol	0.00018	—
*Vogan	24 000 I.U.	120 000 I.U.
*Yatren	1.0	3.0
Yohimbine hydrochloride	0.03	0.1

拜耳大藥廠

小兒之限量

每次量 (公分為單位)				每日量 (公分為單位)		
乳嬰	小兒	兒童		乳嬰	小兒	兒童
0.1	0.2	0.3	Abasin	0.2	0.4	0.75
4.0	8.0	10.0	Abrodil	—	—	—
0.025	0.05	0.1	Acetanilide	0.06	0.15	0.3
0.1	0.3	0.5	Acid. acetyl-salicyl.	0.3	0.9	1.5
0.0002	0.0005	0.001	Acid. arsenicosum ..	0.0006	0.0015	0.003
0.1	0.2	0.5	Adalin	0.3	0.6	1.0
0.05	0.1	0.3	Anaesthesin	0.15	0.3	1.0
0.15	0.3	0.5	Antipyrin	0.45	1.0	1.5
—	0.0025	0.005	Apomorph. hydrochl.	—	0.005	0.01
0.0015	0.003	0.01	Argentum nitr.	0.0045	0.009	0.03
0.1	0.3	0.5	Aspiphemin	0.3	0.9	1.5
0.1	0.3	0.5	Aspirin	0.3	0.9	1.5
0.1	0.1	0.2	Atebrin	0.1	0.1	0.2
0.00025	0.0005	0.00075	Atropine sulphate ..	0.00075	0.001	0.002
—	0.08 per kg	—	Avertin	—	—	—
0.005	0.01	0.02	Betaxin	0.005	0.01	0.02
0.1	0.3	0.5	Borovertin	0.3	0.9	1.5
0.15	0.25	0.5	Butolan	0.5	0.5	1.5
0.1	0.25	0.3	Cafaspin	0.3	0.75	1.0
0.5 c.c.	1 c.c.	1 c.c.	Campolon	1 c.c.	2 c.c.	3 c.c.
0.0015	0.003	0.005	Canadrast	0.0045	0.01	0.02
0.02	0.03	0.05	Cantan	0.02	0.05	0.1
0.05	0.1	0.2	Quinoplasmoquine ..	0.15	0.3	0.6
0.5	1.0	1.5	Chloral hydrate.	1.0	2.0	3.0
0.0025	0.005	0.0075	Cocain. hydrochl.	0.0075	0.015	0.03
0.005	0.01	0.02	Codein. phosph.	0.015	0.03	0.075
0.005	0.01	0.025	Coffeminal	0.015	0.03	0.06
0.05	0.1	0.2	Coff. sod. salic.	0.15	0.3	0.6
0.1	0.2	0.3	Compral	0.3	0.75	1.0
—	½ tabl.	½ tabl.	Elarson-Iron	—	1 tabl.	3 tabl.
0.25	0.5	0.5	Eldoform	0.25	1.0	1.0
0.005	0.01	0.02	Elityran	0.01	0.02	0.05
0.00025	0.0004	0.00075	Eumydrin	0.00075	0.001	0.0025
0.03	0.06	0.12	Evipan	—	—	—
0.075	0.25	0.5	Evipan-Sodium	—	—	—
0.005	0.0075	0.01	Extr. Bellad.	0.015	0.02	0.03
—	0.0075	0.015	Extr. Opii	—	0.015	0.045
0.1	0.25	0.3	Gardan	0.3	0.75	1.0
0.1	0.3	0.6	Germanin	0.1	0.3	0.6
0.2	0.3	0.5	Helmitol	0.6	1.0	1.5
—	0.0005	0.001	Heroin hydrochl.	—	0.0015	0.003
—	—	0.005	Hexeton i.v.	—	—	—

拜耳大藥廠

每次量 (公分為單位)				每日量 (公分為單位)		
乳嬰	小兒	兒童		乳嬰	小兒	兒童
0.1	0.2	0.3	Hexophan	0.3	0.5	1.0
0.05	0.1	0.2	Hydrargyr. chlor. . .	0.15	0.2	0.5
0.005	—	—	Icoral	—	—	—
0.15	0.15	0.3	Istizin	0.3	0.45	0.75
0.02	0.03	0.06	Luminal	0.06	0.1	0.2
0.02	0.03	0.06	Luminal-Sod.	0.06	0.1	0.2
0.05	0.1	0.5	Melubrin	0.15	0.5	2.0
0.1	0.2	0.3	Migraine.	0.3	0.5	1.0
—	0.002	0.005	Morph. hydrochl. . .	—	0.006	0.01
0.15	0.3	0.5	Sod. salicyl.	0.3	1.0	2.0
0.075	0.15	0.3	Neosalvarsan	0.075	0.15	0.3
0.05	0.1	0.3	Novalgim	0.15	0.5	1.5
—	0.01	0.025	Opium powder	—	0.03	0.075
0.7	1.5	3.0	Per-Abrodil	—	—	—
0.02	0.06	0.1	Phanodorm	—	—	—
0.05	0.1	0.3	Phenacetine.	0.15	0.5	1.0
0.1	0.25	0.3	Piperazine	0.3	0.5	1.0
0.005	0.005	0.02	Plasmoquine	0.01	0.01	0.03
0.06	0.1	0.2	Prominal	0.15	0.3	0.4
0.1	0.2	0.3	Prontosil	0.3	0.6	0.9
0.1	0.15	0.3	Pyramidon.	0.3	0.45	1.0
0.008	0.016	0.02	Racedrin	0.025	0.05	0.05
0.004	0.008	0.01	Rivanol	0.015	0.025	0.05
0.1	0.3	0.6	Salol	0.3	1.0	2.0
0.0025	0.025	0.05	Santonine	0.0075	0.05	0.1
0.06	0.12	0.5	Spirocid	0.06	0.12	0.5
0.05	0.125	0.15	Sulfonal	0.15	0.4	0.75
0.0002	0.0005	0.00075	Suprareninehydrochl.	—	—	—
0.0001	0.0005	0.001	Strychnine nitr.	0.0003	0.00075	0.003
0.1	0.25	0.25	Tannigen	0.5	1.0	1.5
0.05	0.3	0.5	Theobromine sod.sal.	0.15	1.0	1.5
0.025	0.03	0.05	Theocin sod. acct. . .	0.05	0.05	0.1
0.05	0.15	0.25	Trigemin	0.15	0.3	0.75
0.05	0.125	0.15	Trional	0.15	0.4	0.75
—	—	0.05	Trypaflavine	—	—	—
0.1	0.25	0.5	Uleron	0.25	1.5	2.3
0.5	1.05	2.0	Urethane	1.0	2.0	2.0
0.05	0.15	0.3	Veronal	0.05	0.3	0.5
0.05	0.15	0.3	Veronal-Sodium	0.05	0.3	0.5
0.00015	0.00015	0.00018	Vigantol	—	—	—
2 4000*	48000*	48000*	Vogan	24000*	48000*	48000*
0.05	0.1	0.25	Yatren	0.15	0.2	0.5

*IU

拜耳大藥廠

醫藥用衡量表

服藥用單位

1 杯水	100—150 公撮
1 食匙	15 „
1 小兒匙	10 „
1 茶匙	5 „
1 刀尖	$\frac{1}{2}$ —1 公分

酏劑較水約輕 10%，糖漿及濃食鹽溶液的較水重 25%

滴劑比較表

1 公分蒸溜水在攝氏 15 度時等於 20 滴

	一公撮 滴數
糖漿	17—19
水樣流體(淡酸)	20
淡芳, 木焦油	37—38
流膏	40
油(揮發性油及脂肪)	40—50
酒精, 酒精劑, 酏劑	50—60
醚(以太)	80

通常用各種單位

長 度

1 公尺等於地球 1 週 10,000,000 分之 1。

1 公尺 = 100 公分 = 1000 公絲, 1 公里 = 1000 公尺

$\frac{1}{1000}$ 公絲 = 1 Mikron (μ) 約等於一個小球菌之對徑。

英國用長度單位

1 英里 = 1760 碼 = 1,609 公里

1 碼 = 3 英尺 = 0,9144 公尺 (米)

1 英尺 = 12 英寸 = 0,3048 公尺 (米)


1 英寸 = 0,0254 公尺 (米)

面 積

100 平方公尺 = 1 畝 Ar (a)

100 Ar = 1 Hektar (ha)


100 Hektar = 1 平方公里



瘧疾原蟲發育圖解

- | | | |
|---------------|----------|------------|
| 1. 鐮狀胞芽 | 2. 環形幼蟲 | 3. 半月形幼蟲 |
| 4. 分殖情形 | 5. 裂體胞芽 | 6. 雌雄性幼蟲 |
| 7. 帶尾雄蟲及圓形雌蟲 | 8. 雌蟲受孕 | 9. 成卵之初期現象 |
| 10. 動卵 | 11. 初期卵胞 | 12. 卵胞成形 |
| 13. 鐮狀胞芽由卵胞遊離 | | |

正常經週



之解互型
時在之圖
器官上化
情器蒙變
經系爾其
月殖荷及
常生及係
在女上關
在女剖相

各種常見之中毒症象與治療

毒物名稱	症 象	治 療
<p>苛性鹼屬 Alkalies, caustic</p> <p>阿摩尼亞 苛性鈉 苛性鉀 致死量約 10-20 公分。</p>	<p>唇舌口腔有腐蝕之痕跡。下流涎，嘔吐帶血，下瀉帶血，脈搏增速，尿呈鹼性。</p>	<p>醋酸水，酸葡萄酒，酒醋酸，檸檬與橙橘汁，膠性飲料，牛乳等。體時亦用淡酸性液。但須極慎重，如傷在眼部：用清水洗，如為石灰所傷則亦用淡碳酸水沖洗。</p>
<p>酒 精 Alcohol</p> <p>成人致死量 約 300 公分 小兒致死量 約 40 公分</p>	<p>精神興奮，煩躁不寧，發狂，身體不能均衡，搖擺不定。謔語昏迷。瞳孔縮小，脈搏微弱緩慢。體溫降低，一般的麻痺等。</p>	<p>洗胃，頭部用冷熱水沖激，皮膚刺激劑。伊可賴 'Icoral'，咖啡英等。謔妄：則行沖浴。士的年，抱水氫醛亦宜。用時須慎。以盧蜜拿較佳。此外：培他生 'Betaxin'，康泰 'Cantan' 等。</p>
<p>木酒精 Methylalcohol</p> <p>致死量 10-100 公分</p>	<p>嘔吐，腹痛，眩暈，視障礙，昏迷，心臟衰弱。</p>	<p>洗胃，敷炭，放血，溫暖，呼入氫氣，興奮劑伊可賴 'Icoral'，咖啡英，士的年等。</p>
<p>亞摩尼亞 Ammonia</p> <p>Liq. amm. caustici 之致死 量約為 30 公分。</p>	<p>由吸入而腐蝕氣管者其症狀與苛性鈉中一毒相似。小便呈鹼性。因亞摩尼亞已變成尿酸。</p>	<p>食道與胃部受傷者。治法與苛性鈉鉀中毒相同。呼吸道中毒者。用淡醋酸或檸檬酸液噴霧吸入，吸入水蒸氣。</p>

拜耳大藥廠

毒物名稱	症 象	治 療
<p>銀 劑 Argentum (硝酸銀等。致死量約 25 公分)</p>	<p>口腔內先起白色 隨即黑色疤痕， 胃痛，嘔吐，下 瀉，慢性中毒者， 齒齦著銀。</p>	<p>用食鹽水 (10-20: 1000) 洗胃，碘化鉀， 或碘化鈉(5-10:1000) 膠狀飲料，蓖麻油。</p>
<p>砒 Arsenic 砒酸之致死量約 0.1-0.2 公分</p>	<p>胃痛(腹痛)，嘔 吐，腸胃痙攣下 瀉，瀉出物似米 湯，隨後則呈便 秘，頭痛，皮膚 蒼白，皮膚炎， 心臟衰弱，脈搏 微弱增速，呼吸 急促，昏迷。 有機性砒劑中毒 時。常見視力障 礙，視神經病變。</p>	<p>洗胃，吐劑(硫酸鋅)， Ferr. oxyd. sac- charat. 液陸續用湯 匙量服下，Mag. usta Antidotum ar- senici (Mag. usta+ Ferr. oxyhydrat.)， 硫酸鐵，炭末，蛋白 質，牛奶，膠質。適 宜脂肪量。靜脈注射 Sod. thiosulphate伊 可賴 'Icoral' 蘇潑拉 來寧 'Suprarenin'。 此外，培他生 'Beta- xin' 康泰 'Cantan' 等。</p>
<p>阿刀屏 Atropine 致死量 0.1 公分 顛茄致死量約 3-10 枚。 Scopolamin, Hyoscyamin 致死量極少公絲 即够。</p>	<p>嘔吐，口腔乾燥， 渴，吞嚥困難， 眩暈，瞳孔高度 散大，視障礙， 幻想，痙攣，脈搏 增速，心跳，麻 痺。</p>	<p>吐劑，洗胃，獸炭末， 濃咖啡，嗎啡雖有益 但大多數均感危險。 Pilocarpin, 丹寧劑， 抱水氫醛，淋浴，鴉 片。</p>
<p>本 淨 Benzine 致死量約 10-30 公分 Petroleum 火油致死量約 半公升。</p>	<p>頭痛，眩暈，半 麻痺狀態，皮膚 青白，心跳痙攣， 白血球數降低， 腎臟失常。</p>	<p>洗胃，獸炭，丹寧劑， 牛奶，強心劑伊可賴 'Icoral'，蘇潑立芬 'Suprifin'，等。</p>

拜耳大藥廠

毒物名稱	症 象	治 療
<p>石 炭 酸 Carbolic acid</p> <p>來沙而 Lysol 及其類似物等 內服致死量 約 10-15 公分。 輸入體中空腔 之致死量為 1-2 公分。</p>	<p>呼出之氣有石炭酸 酸臭味，嘴唇口 腔有腐蝕現象， 嘔吐，下瀉，疝 痛，脈搏快速， 呼吸有軒聲，瞳 孔縮小，小便棕 色帶綠，眩暈， 痙攣，昏迷，腎 臟炎。表面中毒現象。患處呈乾性壞死 (常用 2% 石炭酸液包妥後見之)。</p>	<p>洗胃，吐劑，鈣劑， 處方：Calc. oxyd. hydr. 5.0 Sacch. 15.0 Aq. 50 製成液 劑。每五分鐘服一食 匙，Mag. usta, 硫化 鈉，Cystin, 粘漿劑， 牛奶，強心興奮劑等，</p>
<p>古 加 因 Cocaine</p> <p>致死量一公分</p>	<p>神志不安，眩暈， 痙攣，呼吸脈搏 增速，瞳孔散大， 虛脫。</p>	<p>洗胃，獸炭，丹寧劑， 阿刀屏，Amyl nitr- ate, 溴劑，抱水氯醛， 人工呼吸，興奮劑， (‘Icoral’，伊可賴 ‘Suprifin’，樟腦劑，咖啡等)。維晏那耳， ‘Veronal’，盧蜜拿，‘Luminal’，安穩酞， 心臟部位用芥末包妥。</p>
<p>腈 酸 劑 Cyanate</p> <p>Aq. Amygd. Am. 苦 杏 仁 水 致死量 0.06 公分 Pot. cyanide 腈酸鉀 致死量 0.2-0.3 公分</p>	<p>中毒者發出杏仁 氣味，呼吸麻痺， 皮膚漸呈青白。 眩暈嘔吐，瞳孔 特別散大，昏迷， 結果呼吸與心臟 停止。</p>	<p>A. 如係服下者。注射 Apomorphine 0.01 公分。如已呈痙 攣此藥即不能用， 只有行洗胃手續，再 待病人吐出後，再 澈底洗胃，(20/100 過錳酸鉀液或 2% 雙氫水)。重症或已呈痙攣或麻痺者。 用 50 公撮 2% Sod. thiosulphate 液。 緩慢行靜脈注射。因蘇林，膠質硫磺 劑，一烷藍，人工呼吸，(輸入氯氣)， 強心劑，興奮劑，皮膚刺激，伊可賴 ‘Icoral’，Lobelin, 呼吸極劣時，隔半小 時再注射。蘇潑立芬 ‘Suprifin’，必要 情形之下。每 2-3 小時注射一次。 B. 如係吸入者。則洗胃等不必施行。其 餘方法照上。</p>

拜耳大藥廠

毒物名稱	症 象	治 療
<p style="text-align: center;">洋地黃 Digitalis 致死量： 葉 2.5 公分 酹 30 公撮</p>	<p>嘔吐，噁心，腹痛，下瀉，脈緩慢，不規則，呼吸短急，精神興奮，手足冷厥，肌肉抽搐，昏迷。</p>	<p>洗胃，吐劑，歌炭，丹寧劑，靜卧，伊可賴 'Icoral'，樟腦等興奮劑。阿刀屏，酒精。</p>
<p style="text-align: center;">麥 角 Ergotamine 致死量約 1-4 公分</p>	<p>噁心，嘔吐，腸疝痛，下瀉，壞疽，流產，昏迷，思眠，麻痺，瞳孔散大，痙攣，瞎(內障)，盛脫。</p>	<p>洗胃，吐劑，丹寧劑，Salol, amyl nitrite, nitroglycerine, 保妥酹 'Padutin', 伊可賴 'Icoral', 等，鴉片劑。</p>
<p style="text-align: center;">蟻醛屬 Formaldehyde Formalin Lysoform 致死量 30 公撮 4-40% 液</p>	<p>結膜炎紅，咽喉胃部作痛，眩暈，昏迷，皮色青白，心臟衰弱，蛋白尿，血色素尿，尿閉。</p>	<p>內服 6-12 個生雞蛋，大量尿素，Liq. ammon. acet. 若干滴入水內服下 (Lysoform 中毒者忌用)。瀉劑，灌腸，傷在皮膚者。用阿摩尼亞水或炭酸阿摩尼亞水洗滌，傷在眼部者用淡阿摩尼亞蒸氣燻蒸。</p>
<p style="text-align: center;">菌類中毒 Fungi (誤作菜羹用)</p>	<p>口渴，嘔吐，腹痛，下瀉，精神興奮，昏迷，冷厥，脈搏緩慢，呼吸急促，瞳孔散大。</p>	<p>洗胃，吐劑，瀉劑 (蓖麻油)，強心興奮劑，咖啡，酒類，全身保持溫暖，阿刀屏。</p>

拜耳大藥廠

毒物名稱	症 象	治 療
<p>煤氣, 沼氣等 Gases Carbon monoxide</p>	<p>頭痛, 嘔吐, 眩 暈, 昏迷, 耳鳴, 知覺消失, 麻痺, 呼吸遲緩, 脈搏 增速, 皮色青白 (一氧化炭血色 素), 痙攣, 言語 不清。</p>	<p>新鮮空氣, 輸入氧氣, 放血 300-500 公撮, 隨即注入 600-1000 公撮生理食鹽水, 刺 激皮膚(冷淋浴), 吸 入刺激劑(醋酸, 以 太, 阿摩尼亞), 不可 用鎮靜麻醉劑, 興奮 劑(伊可賴 'Icoral', Lobelin 等)。</p>
<p>蟲 咬 Insect bites 蜂刺, 以及各種 節蟲噬刺。</p>	<p>患處紅腫, 蕁麻 疹, 甚而至於喉 頭水腫窒息。</p>	<p>伊可賴 'Icoral', 咖啡 英 Caffeine, 拉西特 靈 'Racedrin', 握姆 納丁 'Omnadin'. 局部治療亞摩尼亞水 Liq.ammonii caust. 及薄荷等有涼感之油 膏塗搽。患在粘膜上 則用蘇打塊。</p>
<p>因 蘇 林 Insulin</p>	<p>局部症象: 感應 特別靈敏。脂肪 增殖。 一般症象: 疲倦 無力, 餓感, 盜 汗, 一切血糖不 足症象, 眩暈, 昏 迷, 痙攣。</p>	<p>局部: 奴佛客因混合 劑塗搽。 在症象初起時內服; 葡萄汁, 葡萄糖, 甘蔗 糖。 靜脈注射: 各種症象 畢呈時, 用 5-20 公分 葡萄糖製為 5-20% 液 注射。 皮下注射: $\frac{1}{2}$ 公撮 1:1000 蘇潑拉來寧, 培他生 'Betaxin'.</p>

拜耳大藥廠

毒物名稱	症 象	治 療
<p style="text-align: center;">碘 Iodine</p> <p>致死量 3-4 公分 碘酊 20-30 公分 碘仿 8 公分</p>	<p>口腔, 食道, 胃等處痛楚, 喉頭癢痒, 流涎, 嘔吐, 煩悶, 頭痛, 脈搏細弱, 心跳, 腎臟刺激現象, 蛋白尿, 血色素尿, 呼吸短促, 衰弱, 發疹, 粘膜加答, 碘酒中毒者, 吐出物有碘色碘臭。</p>	<p>洗胃, 澱粉質, 麵粉, 蛋白質, 吐劑, 瀉劑, Sod. thiosulphate 20/500 小蘇打, 鈣劑。</p>
<p style="text-align: center;">鉛 鹽 Lead</p> <p>致死量 20-50 公分。</p>	<p>急性中毒: 嚴重腸胃炎現象 慢性中毒: 齒齦鉛質儲積, 貧血, 痛痛, 便秘, 嘔吐, 麻痺, 中鉛毒性腦疾患, 譫妄昏迷。</p> <p>'Padutin', 康巴隆 'Campolon', 保護肝臟之食療法, Sod. thiosulphate, 培他生 'Betaxin', 鎮靜劑, 盧蜜拿 'Luminal', 刺激劑, 士的年, 如係職業性者則改變職業。</p>	<p>急性中毒: 洗胃, 吐劑, 瀉鹽, 磷鹽, 鈣劑, 蛋白質, 牛奶, 粘漿劑, 獸炭, 保妥而 'Padutin', Sod. thiosulphate 靜脈注射。痛痛: 鴉片, 阿刀屏。類茄劑. 灌腸。</p> <p>慢性中毒: 保妥而 'Campolon', 保護肝臟之食療法, Sod. thiosulphate, 培他生 'Betaxin', 鎮靜劑, 盧蜜拿 'Luminal', 刺激劑, 士的年, 如係職業性者則改變職業。</p>
<p style="text-align: center;">麻醉劑 Narcotics</p> <p>醚 Ether 哥羅方 Chloroform 抱水氯醛 Chloral hydrate 致死量 5-16 公分 四氯化炭 Carbon tetrachloride 致死量 (10-20 公分)</p>	<p>血壓下降, 脈搏微弱, 瞳孔散大, 昏迷, 窒息, 心臟呼吸麻痺, 有時肝臟呈損傷現象。</p>	<p>人工呼吸, 吸入炭酸氣, Lobelin, 士的年伊可賴, 'Icoral' 蘇潑拉來寧 'Suprarenin', 蘇潑立芬 'Suprifin', 有時亦可靜脈注射與體溫相等之生理食鹽水, 醚中毒之癱瘓用納伊惟本 'Evipan'-Sodium 1-2 公撮, 靜脈注射。</p>

拜耳大藥廠

毒物名稱	症 象	治 療
<p>鴉片，嗎啡 可殿英等 Opium Morphia Codeine 內服致死量約 0.4 公分 皮下注射致死量約 0.1-0.3 公分 小兒 0.004 公分</p>	<p>頭痛，嘔吐，瞳孔縮小，思眠，痛覺降低，一般的不全麻痺，呼吸麻痺，尿閉，痙攣，昏迷。</p>	<p>吐劑，洗胃，(0.1% 過錳酸鉀)及丹寧劑，獸炭，濃茶或咖啡，阿刀屏，士的年，伊可賴 'Icoral', Lobelin 等強心興奮劑。人工呼吸。</p>
<p style="text-align: center;">磷 Phosphorus 致死量約 0.01-0.09 公分</p>	<p>感覺過敏，頭痛，腹痛，嘔吐(吐出物有磷臭，置於暗處則發閃光)。隨後則黃膽，嚴重腹痛，肝腫，脈搏遲緩細微，腸胃出血，皮膚出血，鼻出血，子宮出血，時有窒息之感，衰弱，心臟衰弱，昏迷，心臟麻痺，下顎骨壞疽。</p>	<p>徹底沖洗胃部 (0.1% 過錳酸鉀) 或用吐劑硫酸銅 1 公分一次服下)，各種含硫瀉鹽，碳酸鈉，氯水，蘇澄拉來寧 'Suprarenin'，尚可試用因蘇林十康巴隆 'Campolon'，十葡萄糖三物混合注射，用未經精製陳老松節油 30-40 滴製為乳劑，起初每隔半小時隨後隔二小時服一次，每次一湯匙。</p> <p>禁用：牛奶，蛋白質，蓖麻油。</p> <p>磷質燒傷：患處可搽 10% 硝酸銀液。</p>

拜耳大藥廠

毒物名稱	症 象	治 療
<p>氯 酸 鉀 Potassium chlorate 致死量約 5-15 公分</p>	<p>變性血色蛋白， 血色素尿，喉部 乾燥，嘔吐，渴， 下瀉，黃膽，皮色 青白，心臟衰弱， 尿毒症。</p>	<p>洗胃，瀉藥，利尿劑， 輸入氧氣，放血，各 種強心興奮劑，例如： 伊可賴 'Icoral'，匹羅 卡屏 Pilocarpin。 注意：勿進酸性食物， 勿飲檸檬氣水。</p>
<p>敗 肉 (Ptomaine等) 臘腸，陳腐鞏腥</p>	<p>急性腸胃炎，^體 吐，下瀉，高熱，身 體一般狀態衰 不堪，眩暈，腫 孔散大，上眼 下垂，虛脫。</p>	<p>吐劑，洗胃灌腸，萘 麻油，獸炭，肉中毒 血清，</p>
<p>規 寧 Quinine 內服致死量 15 公分。</p>	<p>耳鳴，興奮，粘 膜出血，聽視障 礙，暗，知識錯 亂，虛脫，脈搏 緩慢，〔用治瘧 疾時，常見惡起 黑尿病，可用 'Atebrin'阿的平 治之〕。</p>	<p>洗胃，吐劑，獸炭， 興奮劑例如：蘇潑立 芬 'Suprifen'，'Ico- ral'，伊可賴等。 治視覺障礙。可用保 妥面 'Padutin'。</p>
<p>山 道 年 Santonin 致死量 0.12-0.36 公分</p>	<p>嘔吐，昏迷，痙 攣，瞳孔散大，虛 脫，流涎，輕度腹 痛，麻痺，視障 礙，小便紅色，性 慾增高，多尿，尿 滴不止。</p>	<p>伊可賴，'Icoral'，洗 胃，人工呼吸，獸炭， 吸入醚，抱水氫醌。</p>
<p>血 清 病 Serum sickness</p>	<p>蕁麻疹，紅點疹， 約在注射血清之 後 7-12 日發現， 寒熱，關節痛，心 神煩悶。</p>	<p>赫破弗辛 'Hypophy- sin'，拉西特靈 'Race- drin'，鈣劑，握姆納 丁 'Omnadin'。</p>

拜耳大藥廠

毒物名稱	症 象	治 療
<p>蛇 咬 [蝮蛇] Snake bite</p>	<p>咬處蜂窩織炎，紅潤出血性發炎，淋巴管炎，嘔吐，寒熱，呼吸短促，心臟與呼吸麻痺。</p>	<p>即刻用嘴吸出咬處之毒汁，用燒紅鐵燒灸，或腐蝕劑，在咬處之，上用繩緊繫，咬處之週圍可搽3-5%碘酒，或注入咬處週圍組織</p> <p>內5%過錳酸鉀，石灰水，氫水，氯化鐵，阿摩尼亞水，1%酒精，醚，樟腦劑，Pilocarpin, 放血，伊可賴，'Icoral'，蛇咬血清。</p>
<p>士 的 年 Strychnine 致死量 0.02-0.1 公分。</p>	<p>牙關緊閉，強直，癱瘓，四肢僵直，驚悸，呼吸短促，窒息。</p>	<p>嗎啡，酒精，伊可賴，人工呼吸，有時或行注射，盧蜜拿 'Luminal'。</p> <p>'Icoral'，丹寧劑，放血及生理食鹽水。</p>
<p>汞 劑 Sublimite 致死量約 0.1-0.2 公分 [鉍中毒之現象與療法與此處相似)。</p>	<p>潰瘍性口腔炎，齒齦有水銀蓄積，粘膜炎與皮膚經升汞之腐蝕。急性腸胃炎，症狀頗似痢疾，裏急後重，便中帶血。咳嗽，氣管枝性肺炎，皮膚發疹，麻痺般懶倦，一般的衰弱，腎臟炎(尿間蛋白尿)，心臟衰弱。</p>	<p>洗口(用 'Ortizon')，洗胃，吐劑，獸炭，牛奶，蛋白，Sod. thiosulphate 35:500 作為一次或二次服下。Aq. hydrosulphur. dil. 1:4 或 Sod. sulphurate 1% 內服或灌腸。</p> <p>處方：Ferr. pulv. 20, Sulf. pulv. 15, Sirup. simp. Aq. font. aa 50 合劑，內服，每次一湯匙，日服多次。碘化鉀，碘化鈉，Theobromine 3-4 公分，每日量。靜脈注射：Sod. thiosulph. 或 Strontium thioacetate, 肌肉注射：康巴隆，'Campolon'，康泰，'Cantan'，內服葡萄糖及小蘇打，靜脈灌注高滲透性右旋糖液。</p>

拜耳大藥廠

毒物名稱	症 象	治 療
<p>安眠藥 索弗拿 Sulphonal 致死量 10-30 公分 巴比土酸屬劑致死量 5-20 公分</p>	<p>感覺遲鈍，搖擺， 沉眠，呼吸與心 臟麻痺， (Sulphonal 中毒者尿中帶 Haematopor- phyrin)</p>	<p>洗胃，瀉劑，利尿劑， 人工呼吸，興奮劑； 伊可賴，'Icoral'， Lobelin 等。</p>
<p>硫化氫 及 硫之鹼性化合物 Sulphurated hydrogen</p>	<p>知覺消失，呼吸 困難，皮色青白， 蜷曲痙攣，麻痺， 硫色素色。</p>	<p>人工呼吸，輸入氯氣， 放血，生理食鹽水注 射，伊可賴 'Icoral'， Ferr. saccharatum 靜脈注射，Ferr. oxyd. 或 carb. sacch. 或 hydroxyd. dial. 一公分一次，每日數 次內服。</p>

尿液分析

飲食正常。每廿四小時小便之總量。約一千五百至一千七百公撮。此在糖尿病及尿崩病。則數量大增。恰在體溫上升時亦然。此外萎縮腎及煩渴症。亦相當增加。反之在身體過勞及發熱中。腎病浮腫之萎縮腎及急性腎絲球炎等。其數量均大減。

尿液比重為 1.020-1.017。平時搖曳於 1.025-1.015 之間。此在糖尿病熱病及飲水特少。則比重增高。其在尿崩症。萎縮腎及飲水特多。則比重減低。

平常人在混合食料營養下。每二十四小時內。尿液中溶有固體成分如下：

蒸發殘渣	約	60 公分
尿素	約	25-30 公分
食鹽	約	8-15 公分
鉀與鈣	約	4 公分
硫酸	約	2-3.5 公分
磷酸	約	1-4 公分
尿酸	約	0.55-1.5 公分
阿母尼亞	約	0.5-0.9 公分
Kreatinin	約	0.5-1 公分

試醋醋酸法 (Lange 氏環狀試法)

尿液五公撮。加新鮮 20% 之 Sodium nitro-prusside 溶液十滴及醋十五滴混和之。然後沿試管壁徐徐加入阿母尼亞水一公撮。俾其全浮於原來液體之上。如尿液中有大量醋醋酸存在。則立刻在兩種液接觸處。生一紫色環。如所含分量較小。至遲兩分鐘生環。環色漸暗終乃近黑。

試阿西通法

(一) 沃度方試法

尿液三公撮。加入苛性鈉一·五公撮。濾去所生之磷酸鹽沉澱。於濾出液中加入等量之 n/10- 碘溶液。觀察四

拜耳大藥廠

十五秒鐘。不含阿西通之正常尿液。此時現寶石光。如略含阿西通。只須每公升中含○●○三公分阿西通。則起明顯之混濁。并有沃度方之劇臭。含阿西通愈多。則尿液愈混濁。

(二) Salicylaldehyde 試法

五公撮尿液加入 10% Salicylaldehyde 酒精溶液一公撮。然後緊沿試管壁放入苛性鉀一小片。(Pot. hydric. purum in rotulis 'Merck') 而靜置之。含阿西通者。於苛性鉀溶化時。上下接連層。現濃紅環。其不含阿西通者。現褐黃色環。如此一公升尿液中。只須含○●○五公分阿西通。即可試出。

尿液中有時偶含 aldehyde。在上法中。亦現陽性但含阿西通之尿液。在醋醋酸之試法中。亦現陽性。

(三) p-Nitrophenylhydrazine 試法

小玻璃坩杯(二●五公分高一●五公分寬光邊率平滑)加入尿液二公撮。蓋以載物片。載物片向下一面塗一凡士林圈。其中點試藥一滴。此試藥係新鮮現製之飽和 p-Nitrophenylhydrazine 溶於 15% 之醋酸中。濾過用之。試藥應滴於尿液上。而不沾及玻璃杯邊緣。然後浮置此杯於攝氏四十度之溫水內。管上端約浮出水面半公分。凡陽性反應。均生 acetone-p-Nitrophenylhydrazone 結晶。形如長針。其色金黃排列如 T 狀或 V 狀。肉眼可見。用放大鏡或顯微鏡觀之。則更為顯明。在一百公撮尿液中。僅須含有○●○五公分阿西通。至遲三十分鐘。即現此種針狀結晶。

試脛基法 (Diazo 反應)

三公撮磺醯酸溶液(0.5 公分 sulphanil 酸溶於七十公撮冷水震搖多次。5 公撮 25% 鹽酸湊水至 700 公撮)入試管中。加 0.5% nitrite 溶液一滴。傾入尿液中。如脛基陽性。則因多量阿母尼亞之加入。現櫻紅色。其震搖所生之沫。亦現紅色。

試膽色素法 (Gmelin 氏法)

尿液濾過趁濾紙微濕時。滴入硝酸過硝酸合劑一滴。陽性反應起黃紅色紫色或綠色環。綠環尤為確證。

拜耳大藥廠

試血液法 (Deen 氏法)

含過氧化水素之松節油及瘡瘡木酞 (1:49) 各等分加入酸性尿中或先用醋酸變酸之尿液。其中兩液接觸處發生混濁樹脂環。如有血色素存在。則現藍色。

「靛藍米藤」試驗法

用本品試大小便及其身體分泌物內之血時須備下列各物：

(一) 飽和「靛藍米藤」酒精溶液。「靛藍米藤」二·五。九十成酒精五十公撮。

(二) 百分之五十成醋酸。

(三) 百分之三成雙氫水。

豌豆大小尿一塊先用三四公撮蒸溜水調和。稍待傾出其溶體。加入〔八滴〕淡醋酸。驗小便時所加之醋酸量亦同。最後加入與醋酸同量之「靛藍米藤」液。及六至八滴雙氫水。如果正確。則試經搖動後即呈青蓮色。每有須待數分鐘後始呈此現象者。

蛋白質檢查

定性試驗

一，煮沸法 尿液含蛋白質者。煮沸時。產生絮狀白衣而成混濁。在混濁時。滴入五滴濃硝酸。則磷酸鹽溶清。而蛋白質不溶。仍舊混濁。如懷疑此種混濁或由所服藥中之樹脂酸所致。可多加酒精即可分明。

二，硫柳酸 (sulpho-salicylic 酸) 法

尿液微量入試管中。加入 20% 之硫柳酸液數滴。如蛋白質陽性立刻尿液混濁。煮之則消失。此法極敏銳極簡便。

三，鐵精酸鉀法

尿液中加相當醋酸使變酸性。然後加入 10% 鐵精酸

拜耳大藥廠

鉀溶液三五滴。其所生之鐵疇氫。能使蛋白質沉澱。加熱則蛋白質因醋酸過剩而復溶。

四，海來爾氏法 (Heller)

謹慎將尿液注於濃硝酸上。分成兩層勿使混合。如蛋白質陽性。則液層接觸處。輒生混濁環。界限分明。

定量試驗

愛司博法 (Esbach)

用愛司博蛋白質計。裝酸性之尿液於該管內至 U 度。然後注入愛司博試藥至 R 度處。數數震搖之。十二小時至二十小時後。就管上劃度讀之。即知蛋白質之含量。如尿液含蛋白質過多。須先加稀釋。較精細之法：尿液與愛司博試藥。各二十公撮。混和置水浴中。加熱過濾之。沉澱物洗至穩定乾度。然後秤之。蛋白質約等於該沉澱之百分八十。此法中等敏銳。

試膽酸法

派登考夫法 (Pettenkofer)

尿液內入微量蔗糖及一滴濃硫酸。而蒸發之陽性反應呈紫紅色。

試尿酸法

尿酸定性法。Murexide 瓷杯內少許尿。其中加數滴硝酸而蒸發之。即現橙黃色斑。加阿母尼銻則成紫紅色。

尿酸定量法。{ Salkowski-Ludwig } 尿液二百公撮。加二·六%含阿母尼銻之硝酸銀溶液二十公撮及二十公撮鎂複劑混和之。收集其沉澱。用含阿母尼亞之水洗之。於此沉澱中。加入二十公撮次硫酸銅溶液而煮之。其中次硫酸銀之沉澱析出。濾過之液。則加鹽酸而濃縮之。尿酸即成結晶。次日可秤而定之。

試印地康 Indican 法

尿液十公撮。加二五%醋酸鉛溶液二·五公撮。沉澱

拜耳大藥廠

濾過。濾液內加等容積 Obermeyer 試藥 (0.2 份氯化鐵比出烟鹽酸 25 份) 而震搖之。陽性起錠青色。加哥羅仿而搖之。則錠青色均入哥羅仿內。

試 Kreatinin 法

定性：用 Sodium nitro-prusside 溶液數滴。並加少許苛性鈉。陽性則起深紅色。

試尿色素法

等量尿液及 Schlesinger 試藥 (1 份醋酸鋅；9 份純酒精) 混和。即起混濁。濾之。如陽性其濾液現綠色螢光。

試還元胆色素法 (尿色素前級物 Urobilinogen)

尿液五公撮。加艾利氏試藥十滴。如含過量之還元膽色素。則尿液立現紅色。否則非加熱不紅。

糖之鑑定

定性試驗

(一) 特羅美氏 Trommer 法

在尿液內加 10% 之苛性鈉液。約當尿液容積五分之一。然後用稀硫酸銅液。徐徐滴入。至氧化銅不復溶解為止。煮沸。陽性現黃色或紅褐色。

(二) 女郎德一波且兒氏 Nylander-Böttcher 法

尿液 10 公撮。加女郎德試藥 1 公撮。煮一分鐘。現黑色沉澱者為陽性。

定量試驗

(一) 用鉛糖液。待其透明以旋光鏡檢之。

(二) 斐令氏 Fehling 法。20 公撮斐令試藥用 80 公撮水沖淡加熱。以滴管徐徐滴入稀淡五十倍尿液於內。至斐令氏液之藍色全失為止。20 公撮斐令液合葡萄糖 0.1 公分。

(三) 發酵法。用酵母菌。有特製劃度之曲頭管裝入尿後。置於攝氏三十度數小時。然後就其劃度讀之。即得其量。

拜耳大藥廠

藥物禁伍表

藥名	禁忌與下列藥物配伍
硝酸基銻基固 Acetanilide	安替比林，水化氯醛(液化)。溴鹽與碘鹽(沉澱)。雷瑣亭，薄荷，麝香草腦。
酸 Acids	弱酸之鹽類，如鈉鹽十水楊酸〔有水楊酸之沉澱產生，此沉澱原不易溶解，故現避離矣〕。當化合二鹽類時，如此中一鹽不易溶者，則將無新鹽類產生，如鹽酸鹽與硝酸銀，硫酸鋅與醋酸鉛。
亞爾敗近 'Albargin'	氯化物，鞣酸物質。
酒精 Alcohol	明膠，阿拉伯樹膠，蛋白質(起沉澱) 氯酸鉀，過錳酸鉀，苦味酸，鉻酸〔起爆炸〕。
鹼類 Alkalies	質鹼類，(起沉澱)，易氯化各物〔在鹼性液中因氯化而分解，如右旋糖，雷瑣亭，甘油，焦性兒茶酸，焦性沒食子酸，克利沙洛平，蘇潑拉來寧〕，酸性鹽〔等於中和〕，銻鹽，〔產生銻氣〕，脂肪(起皂化作用)糖漿(例如在大黃糖漿中，因有植物性色素包含在內，故有染色現象)，鈣鹽，鎂鹽，鋇鹽，與金屬鹽〔起沉澱〕。
植物鹼 Alkaloids	鹼性物，碳酸鹽，硼酸鹽，金屬鹽，碘及碘鹽，鞣質，植物性藥物之浸膏及酊劑因含鞣酸者，(起沉澱)，如嗎啡與茴香氫溶液，亞硝酸，例如亞硝酸二烷醇，亞硝酸五烷，亞硝酸鈉，過錳酸鉀，(等於硝化或氯化而分解)。
鋁 Aluminium	醋酸鉛，鹼性物，鹼性碳酸鹽，明膠，石灰水〔起沉澱〕。

拜耳大藥廠

藥名	禁忌與下列藥物配伍
亞硝酸五烷 Amyl nitrite	安替比林，胍鹼，碘鹽，溴鹽，(含亞硝酸，故僅限其純粹者用於處方，或和酒精混合處方，因其不溶於水也)。
阿那維信 'Anæsthesin'	酸，強鹼。
安替比林 'Antipyrin'	鞣酸質，含鞣質之植物性藥物浸膏，碘，規寧，昇汞(起沉澱)，亞硝酸，亞硝酸二烷醇，亞硝酸鈉，亞硝酸五烷，硝酸，鐵鹽，氫(變色反應及分解作用)，醋酸基亞基因，蟻醛及含蟻醛之製劑，烏羅刀屏，鈉鹽，薩羅耳，水化氯醛，石炭酸，駢因醇，薄荷腦，(液化)，汞鹽，例如亞汞，例如甘汞(成可溶性汞化物，易被吸收而中毒)。
阿坡嗎啡 Apomorphine	鹼類，(青色反應，及生沉澱) 鐵鹽，碘，鞣酸(起沉澱)。
苦杏仁水 Aqua Amygdalæ Amaræ	阿坡嗎啡，阿托品，可卡因，咖啡因，規寧，士的年，安替比林，斯可朴拉明(起分解) 炭酸溶液，砒酸鉀溶液，茴香氣溶液，氧化鎂(生飽和生青酸溶液) 氯酸鉀。
阿司匹靈 'Aspirin'	鹼類，酸類，鐵鹽。
阿托品 Atropine	參照胍鹼類項下。
硼砂 Borax	胍鹼類，樹類，(起沉澱) 水化氯醛，(分解)。
咖啡安息酸鈉 Caffeine-sod. benzoate	酸及酸性葉質，如檸檬糖漿等。
樟腦 Camphor	石碳酸，水化氯醛，駢因醇，麝香草腦，薩羅耳，雷瑣辛，(起液化)。

拜耳大藥廠

藥名	禁忌與下列藥物配伍
石碳酸 Carbolic acid (Phenol)	安替比林，水化氯醛，樟腦，鞣因醇，非那西汀，雷項辛，麝香草腦(起液化)，溴，碘(起沉澱)，火棉膠(起沉澱)，鐵鹽(起變色反應)，鹼類(起分解)，過錳酸鉀，氯酸鉀，鉻酸(起爆炸)，硝酸。
水化氯醛 Chloral hydrate	鹼類，氨，溴化物，碘化物，硼砂，苦杏仁水，(起分解) 安替比林，樟腦，鈉鹽，非那西汀，薊藍米藤(起液化)。
枸橼酸 Citric acid	鈉之複鹽，柯柯豆素，甘草之浸膏及流浸膏(起沉澱)。
可卡因 Cocaine	參照植物鹼類項下。
可第因 Codeine	參照植物鹼類項下及茴香經溶液。
膠樣銀 Colloidal silver	和過氧化氫同置時，產生氧而起爆炸狀。
洋地黃 Digitalis	鞣酸，金屬鹽，(醋酸鉛) 碘，鹼類，鐵鹽，(因生理上之原因而不宜) 安替比林，顛茄，鴉片，奎寧，硝酸甘油，碘化合物。
甘油 Glycerine	水化氯醛，(分解) 氯酸鉀，鉻酸，過錳酸鉀，氯化石灰(爆炸)。
海羅英 Heroin	鹼類。
六個一烯四銜 Hexamethylene tetramine	鹼類，安替比林，明膠。
雙氧水 Hydrogen peroxide	和膠樣銀同置時，遊離氧氣而起爆炸狀。
浸劑與煎劑 Infusions and decoctions	金屬鹽，鹼類。

拜耳大藥廠

藥名	禁忌與下列藥物配伍
<p>碘 Iodine</p>	植物鹼，膠漿，金屬鹽，鞣酸(沉澱)，澱粉，含澱粉之植物性粉劑(作藍色)，揮發油，水化氯醛(分解)，鉍及鉍鹽及各種鉍化合物，例如白色沉澱汞(有爆裂性，因其產生碘化氯也)。
<p>碘鹽 Iodine salts</p>	氯酸鉀，過錳酸鉀，氯化高鐵溶液(因氧化作用，碘遊離)，鹼類，汞鹽，硝酸銀(沉澱)，茴香鉍溶液，鉍(因產生碘化氯起爆炸)，有機碘製劑，硝酸鹽，亞硝酸鹽，酒精及硝酸銀(分解)。
<p>鐵鹽 Iron salts</p>	鹼類(沉澱)，各種易被氧化之物質，如碘(生遊離碘)，鞣酸；植物性藥之浸劑，及酞劑，含有鞣酸者(起藍色)，沙利先酸，石碳酸，安替比林，霹藍米藤，蘇潑拉來寧，雷項亭，植物鹼類(變色反應)。
<p>一試滌淨 'Istizin'</p>	和鹼類合置，有紅色或紫色反應(如重碳酸鈉或氯化鎂)，但其功用不變。
<p>乍鐵紅 'Jothion'</p>	鹼類·水(分解)。
<p>搽劑 Liniments</p>	酸，酸性鹽，鉍鹽，鈣類及鎂類，鉍搽劑切不可和遊離碘合配。
<p>茴香鉍溶液 Liq. ammon. anisat.</p>	植物鹼之鹽類，嗎啡，可第因(在止咳劑中用者)，金屬鹽(產生沉澱)，碘鹽(爆炸，產生碘化氯)，含氯石灰(爆裂)。
<p>亞砷酸鉀液 Liq. arsenicalis</p>	鐵鹽，苦杏仁水，碘鹽(沉澱)。
<p>氯化高鐵液 Liq. ferri. chloridi.</p>	亞刺伯膠漿(沉澱，但如充分稀薄之，無復沈澱產生)，參照鐵鹽項下。

拜耳大藥廠

藥名	禁忌與下列藥物配伍
亞醋酸鉛溶液 Liq. plumbi subacetici 盧蜜拿 'Luminal' 鈉盧蜜拿 'Luminal'- Sodium 薄荷腦 Menthol	鹽酸鹽，硫酸鹽，磷酸鹽，碘鹽，溴鹽，鴉片，鞣酸，碘，膠漿明膠類（沉澱）。 各種鹼性物。 其溶液須現製現用，不宜久置，不宜用煮沸法消毒，禁和銻，溴，酸等配合或同用。 石碳酸，水化氯醛，乙駢固醇（那夫妥耳），麝香草腦（雷瑣辛），薩羅（與上列等物混合，則液化）。
昇汞 Mercuric chloride Sublimate	胍鹼類，鹼類，鞣質及植物藥浸膏含有鞣酸者及多種有機物（沉澱）；因此昇汞丸是與陶土製成，金屬及金屬鹽（分解或成為汞合金），石灰水，肥皂，碳酸鹽，銻（沉澱），氣酸鉀（爆發）。
甘汞 Mercurous chloride Calomel	蛋白質，精氨酸，乳酸，鹽酸，碳酸鹽，酒精，鹼類，例如：氯化鎂（成為昇汞），特別重要者：有機物，光，蔗糖（二成為昇汞，故甘汞粉應和乳糖同時處方因後者非吸水結果無水份存在不致含藥物分解），安替比林（毒物）。
汞鹽 Mercury salts	蛋白質及胍鹼類能使汞銀鹽沈澱，許多鹽類能使汞銀鹽沈澱，氯化物，溴化物，碘化物及鹼類能使可溶解之低汞鹽沉澱，可溶解之高汞鹽能與氯化物及溴化物沉澱，複鹽能與碘化物，鹼類及銻沉澱。
米格來靈 'Migrainin'	鞣酸，碘，規寧，銹鹽，及甘汞。

拜耳大藥廠

藥名	禁忌與下列藥物配伍
嗎啡鹽 Morphia salts	鐵鹽，銀鹽，汞鹽，過錳酸鉀，鹼類，亞硝酸鹽，苦杏仁水，鞣酸。
羅瓦而精 'Novalgin'	參考安替批林。
奴佛客因 'Novocain'	鹼性碳酸物，甘汞，鞣質，銀鹽。
鴉片 Opium	參考質鹼類。
本妥卡因 'Pantocain'	因本妥卡因一遇鹼質時其鹽基即分離於本妥卡因之溶液中。故應用之器皿及注射器應絕不含微量之鹼性為佳。因本妥卡因能與溴化鉀，碘化鉀，鋅，昇汞及氫萘沉澱故應避之，如遇銀鹽溶液藥物時宜用硝酸—本妥卡因。
疊 醛 Paraldehyde	溴化物及碘化物 (分解)。
北里多 'Pellidol'	酸，苛性鉀 (因該藥物只限用於油膏中故不必考慮其不可合併之醫藥混合物)。
胃液素 Pepsin	酒精，而劑，鹼類，及金屬鹽 (沉澱)。
二烷噁經因啤二烷 'Phenacetin'	水化氯醛，水楊酸 (潮解)。
過錳酸鉀 Pot. permanganate	質鹼類 (於溶液中氯化)。碘，硫磺，甘油，酒精，醚，石炭酸，炭，石松屬，糖，鞣質 (爆發)。
普泰哥 'Protargol'	古加因 (沉澱)，硫酸鋅 (沉澱)，重金屬之鹽。

拜耳大藥廠

藥名	禁忌與下列藥物配伍
霹藍米蕨 'Pyramidon'	參考安替批林。
規寧 Quinine	參考質鹼類。
拉西特靈 'Racedrin'	碘化鉀。
雷頊卓 Resorcín	安替批林, 水楊酸, 樟腦, 薄荷, 霹藍米蕨(起液狀物), 金屬鹽, 碘鹽(變色)。
雷佛奴耳 'Rivanol'	酸(特別鹽酸), 生理食鹽水, n/10 碘溶液, 在奴佛客因之溶液中是不固定。故此項混合溶液應新製, 應避光。
水楊酸 Salicylic acid	銹鹽(變色), 質鹼類(沉澱), 嗎啡及科典英例外。
薩羅 Salol	安替批林, 樟腦, 水化氯醛, 薄荷, 麝香草腦(起液狀物)。
硝酸銀 Silver nitrate	氯化物, 溴化物, 碘化物, 靖化物, 醋酸鹽, 鹼類, 鞣質(沉澱), 質鹼類, 配糖體, 炭水化物, 糖, 石炭酸, 蛋白質, 以及其他有機物(搗碎時即爆發例如製成塊狀以製藥丸), 故應用時只限於溶液, 製丸時應與陶土合併。
銀鹽 Silver salts	氯化物, 溴化物, 碘化物, 靖化物, 醋酸鹽, 鹼類, 硫化物, 鞣酸及一般有機物(蛋白質, 膠, 糖等)。
斯必路色 'Spirosal'	加水, 鹼類(氫化銻), 或鹼鹽類(肥皂)。
硫磺 Sulphur	氯酸鉀, 過錳酸鉀, 漂白粉, 金屬鹽(變黑色)。

拜耳大藥廠

藥名	禁忌與下列藥物配伍
硫 酸 Sulphuric acid	與水，酒精，松節油等混合之時，常有高熱度發生(爆炸)。硫酸鹽不能與鉛，鋇及石灰混合(沉澱)。
腎 上 腺 'Suprarenin'	鹼類，金屬鹽，如鐵，昇汞(變色)。
糖 漿 Syrups	鹼類或酸類反應，常使糖漿變色。
鞣 酸 Tannic acid	鹼類(變成深色)，鐵鹽(呈水色)，植物鹼鹽及金屬鹽(沉澱)，煎劑中之膠質；動物膠質及蛋白質(沉澱)，銻酸，氯酸鉀，過錳酸鉀。
炭 匿 勒 'Tannigen'	溫液(積聚)。
麝 香 草 腦 Thymol	樟腦，水化氯醛，薄荷，撒羅耳，安替批林，靛藍米藤(起液體物)。
酞 劑 Tinctures	含樹脂之酞只可稀薄於酒精後再混合(否則起沉澱)，含有質鹼類者不能與含有鞣酸之酞混合(沉澱)。
碘 酒 Tinctura iodi	銻及銻鹽(爆炸後產生碘化氫)。
番 木 鱉 酞 Tinctura nucis vom.	大黃酞及大黃酒(沉澱)，並參照質鹼類。
阿 片 酞 Tinctura opii simplex	鞣酸，碘酒，金屬鹽，例如鉛鹽類(沉澱)，並參照質鹼類，尤其不能與大黃酞混合。
維 婁 那 耳 'Veronal'	不宜與鹼性物及鹵性碳酸物相緩(產生銻)，甘汞。
硫 酸 鋅 Zinc sulphate	醋酸鉛(沈澱)。

拜耳大藥廠

計算孕婦
本表計算係從月經

一 月	十 月	二 月	十一 月	三 月	十二 月	四 月	一 月	五 月	二 月	六 月	三 月
1	8	1	8	1	6	1	6	1	5	1	8
2	9	2	9	2	7	2	7	2	6	2	9
3	10	3	10	3	8	3	8	3	7	3	10
4	11	4	11	4	9	4	9	4	8	4	11
5	12	5	12	5	10	5	10	5	9	5	12
6	13	6	13	6	11	6	11	6	10	6	13
7	14	7	14	7	12	7	12	7	11	7	14
8	15	8	15	8	13	8	13	8	12	8	15
9	16	9	16	9	14	9	14	9	13	9	16
10	17	10	17	10	15	10	15	10	14	10	17
11	18	11	18	11	16	11	16	11	15	11	18
12	19	12	19	12	17	12	17	12	16	12	19
13	20	13	20	13	18	13	18	13	17	13	20
14	21	14	21	14	19	14	19	14	18	14	21
15	22	15	22	15	20	15	20	15	19	15	22
16	23	16	23	16	21	16	21	16	20	16	23
17	24	17	24	17	22	17	22	17	21	17	24
18	25	18	25	18	23	18	23	18	22	18	25
19	26	19	26	19	24	19	24	19	23	19	26
20	27	20	27	20	25	20	25	20	24	20	27
21	28	21	28	21	26	21	26	21	25	21	28
22	29	22	29	22	27	22	27	22	26	22	29
23	30	23	30	23	28	23	28	23	27	23	30
24	31	24	1 三月	24	29	24	29	24	28	24	31
25	1 十月	25	2	25	30	25	30	25	1 三月	25	1 四月
26	2	26	3	26	31	26	31	26	2	26	2
27	3	27	4	27	1 一月	27	1 二月	27	3	27	3
28	4	28	5	28	2	28	2	28	4	28	4
29	5			29	3	29	3	29	5	29	5
30	6			30	4	30	4	30	6	30	6
31	7			31	5			31	7		

見第一九九頁正常經週圖

拜耳大藥廠

生產時日表
期之最後一日為始

	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	一 月
1	7	1	8	1	8	1	7
2	8	2	9	2	9	2	8
3	9	3	10	3	10	3	9
4	10	4	11	4	11	4	10
5	11	5	12	5	12	5	11
6	12	6	13	6	13	6	12
7	13	7	14	7	14	7	13
8	14	8	15	8	15	8	14
9	15	9	16	9	16	9	15
10	16	10	17	10	17	10	16
11	17	11	18	11	18	11	17
12	18	12	19	12	19	12	18
13	19	13	20	13	20	13	19
14	20	14	21	14	21	14	20
15	21	15	22	15	22	15	21
16	22	16	23	16	23	16	22
17	23	17	24	17	24	17	23
18	24	18	25	18	25	18	24
19	25	19	26	19	26	19	25
20	26	20	27	20	27	20	26
21	27	21	28	21	28	21	27
22	28	22	29	22	29	22	28
23	29	23	30	23	30	23	29
24	30	24	31	24	31	24	30
25	1 五月	25	1 六月	25	1 七月	25	1 八月
26	2	26	2	26	2	26	1 九月
27	3	27	3	27	3	27	2
28	4	28	4	28	4	28	3
29	5	29	5	29	5	29	4
30	6	30	6	30	6	30	5
31	7	31	7	31	7	31	6

華氏攝氏羅氏三種
溫度比較表

華氏	攝氏	羅氏	華氏	攝氏	羅氏
212	100	80	95	35	28
200	93.3	74.7	94	34.4	27.6
150	65.6	52.4	92	33.3	26.7
112	44.4	35.5	90	32.2	25.8
110	43.3	34.7	88	31.1	24.9
108	42.2	33.8	86	30	24
106	41.1	32.9	84	28.9	23.1
105	40.6	32.4	82	27.8	22.2
104	40	32	80	26.7	21.3
103	39.4	31.6	78	25.6	20.4
102	38.9	31.1	76	24.4	19.6
101.5	38.6	30.9	74	23.3	18.7
101	38.3	30.7	72	22.2	17.8
100.5	38.1	30.4	70	21.1	16.9
100	37.8	30.2	68	20	16
99.5	37.5	30	66	18.9	15.1
99	37.2	29.8	64	17.8	14.2
98.4	36.9	29.5	62	16.7	13.3
98	36.7	29.3	60	15.6	12.4
97.5	36.4	29.1	58	14.4	11.6
97	36.1	28.9	56	13.3	10.7
96.5	35.8	28.7	54	12.2	9.8
96	35.6	28.4	52	11.1	8.9
95.5	35.3	28.2	32	0	0

拜耳大藥廠

»Bayer« VITAMIN PREPARATIONS

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>A</p> <p>‘VOGAN’</p> <p><i>Vitamin A</i></p> <p>Manufacturers:</p> <p>»Bayer« <i>Leverkusen</i></p> <p>E. Merck <i>Darmstadt</i></p>	<p>Equal in potency to 100 times the quantity of cod-liver oil. Biologically standardised in international units so that 1 g.= 120,000 I. U.</p> <p>(1) Increase in the resistance of the skin and mucous membrane: nightblindness, keratomalacia, xerophthalmia, delayed healing of wounds, skin exanthema, catarrh of the respiratory passages (hay fever), tendency to the formation of renal, vesical and biliary calculi, colpokeratosis (leucorrhoea).</p> <p>(2) Metabolic actions: to stimulate the appetite, to promote growth, to rear the newly-born and for slight cases of thyroid hypofunction (exophthalmic goitre). To regulate achlorhydria and hypochlorhydria.</p>	<p>Pellets: Bottles of 50.</p> <p>Drop-bottles of 5 c.c.</p>
<p>B₁</p> <p>‘BETAXIN’</p> <p><i>Vitamin B₁</i> <i>Antineuritic vitamin.</i></p>	<p>Standardised vitamin B₁-preparation. Specific antineuritic. 1 mg. synthetic crystalline vitamin B₁ hydrochloride=333 international units.</p> <p>(1) Beri-beri in all its manifestations.</p> <p>(2) Neuritis and neuralgia of various origin and localisation: pregnancy and puerperal neuritis; polyneuritis during and after infectious diseases; alcoholic and optic neuritis; sciatica, herpes zoster, intercostal neuralgia, post-diphtheritic paralysis, trigeminal neuralgia and B₁-hypovitaminosis due to a faulty diet.</p> <p>(3) Subacute combined degeneration of the cord.</p> <p>(4) ‘Betaxin’ may be given a trial in gout, phlebalgia and multiple sclerosis.</p>	<p>Tablets:</p> <p>Tubes of 20 (3 mg. synth. cryst. vit. B₁ hydrochloride per tablet).</p> <p>Ampoules:</p> <p>Boxes of 3 and 15 of 1 c.c.=5 mg. synth. cryst. vit. B₁ hydrochloride per c.c.</p> <p>»Forte« Ampoules:</p> <p>Boxes of 3 and 15 of 1 c.c.=25 mg. synth. cryst. vit. B₁ hydrochloride per c.c.</p>

拜耳大藥廠

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>B₂</p> <p>'LACTOFLAVINE'</p> <p style="text-align: center;">»Bayer«</p> <p style="text-align: center;"><i>Vitamin B₂</i></p> <p>6:7 dimethyl-9-(1'-<i>d</i>-ribityl-)-iso-allozine.</p>	<p>Highly potent standardised vitamin B₂ preparation. In young rats suffering from 'Lactoflavine' deficiency retardation or arrest of growth occurs sooner or later causing death. Skin affections of a non-specific nature and disturbances of carbohydrate metabolism are occasionally observed.</p>	<p>Ampoules, 2 c.c.:</p> <p>Boxes of 5.</p>
<p>C</p> <p>'CANTAN'</p> <p style="text-align: center;"><i>Vitamin C</i></p> <p><i>l</i>-ascorbic acid.</p>	<p>Besides possessing anti-scorbutic properties, vitamin C also influences fermentative processes and assists in detoxicating intermediate products of metabolism.</p> <p>Scurvy. Haemorrhagic diathesis. Anaemia in children. Catarrhal infections. Intestinal toxæmia. Disturbances in mineral metabolism. Cardiac failure. X-ray sickness.</p>	<p>Tablets, 0.05 g. ascorbic acid per tablet:</p> <p>Tubes of 20.</p> <p>Ampoules, 0.1 g. ascorbic acid per amp.:</p> <p>Boxes of 5 × 2 c.c.</p> <p style="text-align: center;">" " 25 × 2 c.c.</p> <p>»Forte« Ampoules, 0.5 g. ascorbic acid per amp.:</p> <p>Boxes of 3 × 5 c.c.</p> <p style="text-align: center;">" " 15 × 5 c.c.</p>
<p>D</p> <p>'VIGANTOL'*</p> <p style="text-align: center;"><i>Vitamin D₂</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Obtained by ultraviolet irradiation.</i></p>	<p>Rickets; osteomalacia; infantile tetany; chronic anaemia; general calcium deficiency.</p>	<p>Prepared from pure crystallised vitamin D₂. 1 mg. pure crystalline substance = 40,000 International Units.</p> <p>'Vigantol' Oil:</p> <p>Drop-bottles containing 10 and 50 c.c.; 1 c.c. (=about 30 drops) contains 0.3 mg. crystalline vitamin D.</p> <p>'Vigantol' pellets (with a coating of chocolate):</p> <p>In bottles containing 50 pellets. 1 pellet contains 0.06 mg. crystalline vitamin D.</p> <p>'Detavit': Bottles of 125 c.c.</p> <p>Tasteless, odourless emulsion, free from cod-liver oil and containing five times the amount of vitamins A and D as cod-liver oil emulsion.</p>
<p>A + D</p> <p>'DETAVID'*</p> <p style="text-align: center;"><i>Emulsion containing vitamins A and D.</i></p>		

* Manufacturers: **»Bayer«** *Leverkusen*
E. Merck *Darmstadt*

拜耳大藥廠

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>E</p> <p>'ERETON'</p> <p><i>Vitamin E</i></p>	<p>Sterility in women which is neither due to directly demonstrable disturbances of the generative glands, nor to anatomical or pathological changes preventing conception. Habitual abortion. Threatened abortion (if necessary, in combination with 'Lutren'). Tendency to still-births and premature births.</p> <p>Hypogalactia. In infantilism with genital hypoplasia, menstrual disturbances and uterine haemorrhages a trial is indicated. Sterility of the male, as far as it is due to azoo-, necro- or oligospermia. Impotence (for supporting specific hormone therapy).</p>	<p>'Ereton' contains the natural vitamin E in abundant and biologically standardised form, as well as all the phosphatides and the vitamin B complex of the plant-seedling.</p> <p>Tablets: Boxes containing 20 double tablets of 1 R.U. Vitamin E.</p>
<p>K</p> <p><i>Vitamin K</i></p> <p><i>Antihaemorrhagic Preparations</i></p> <p>'HEMODAL'</p> <p><i>Tablets:</i></p> <p><i>Dimethylamino-acetyl-methyl-naphthohydro-quinone-chlormethylate.</i></p> <p>'HEMODAL'</p> <p><i>For injection:</i></p> <p><i>Methyl-naphthoquinone-sodium-bisulphite.</i></p>	<p>All cases in which the prothrombin content is reduced and blood coagulation thereby delayed, such as:</p> <p>(1) Cases in which—owing to morbid alterations or surgical measures—no bile reaches the intestinal tract, especially in icterus and intestinal occlusion, in order to restore the capability of operation and to remove the danger of serious haemorrhages.</p> <p>(2) Prophylactically in patients with a normal prothrombin content, in whom a biliary fistula is intended to be set.</p> <p>(3) Prophylactically (administration to pregnant women shortly before their confinement) as well as therapeutically in physiologically and pathologically increased hypoprothrombinaemia of the newly-born and their secondary phenomena (melaena, haematemesis, umbilical and intracranial haemorrhages).</p> <p>'Hemodal' is effective in oral and parenteral administration. It is soluble in water and therefore also absorbed without the presence of bile in the intestine</p>	<p>'Hemodal' tablets: Tubes containing 10 tablets of 10 mg. (gr. 1/6). Bottles containing 50 tablets of 10 mg. (gr. 1/6).</p> <p>'Hemodal' for injection: Boxes containing 5 ampoules of 1 c.c. (= 10 mg. or gr. 1/6). Boxes containing 25 ampoules of 1 c.c. (= 10 mg. or gr. 1/6).</p>

拜耳大藥廠

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>P</p> <p>'CITRIN'</p> <p>»Bayer«</p> <p>Vitamin P</p> <p><i>The permeability vitamin.</i></p>	<p>Vascular purpura, thrombopenic purpura, acute haemorrhages following inflammations and injuries of the mucous membrane; also gastric and pulmonary haemorrhages.</p> <p>Idiopathic haemorrhagic internal pachymeningitis.</p>	<p>Pellets (1 pellet=25 mg. 'Citrin'):</p> <p>Tubes containing 20 pellets.</p> <p>Solution:</p> <p>Boxes containing 5 ampoules of 3 c.c. (1 amp.=75 mg. 'Citrin').</p>

»Bayer« HORMONE PREPARATIONS

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>'CORTENIL'</p> <p><i>Synthetic suprarenal hormone preparation.</i></p>	<p>Restitution of the lacking or insufficient suprarenal cortex hormone.</p> <p>Hidden insufficiency of the suprarenal cortex which displays itself in weakness, mental and physical fatigue, hypotonia, reduced blood sugar levels etc. (Addisonism, adynæmia, asthenia and emaciation).</p> <p>Total insufficiency, in Addison's disease, partly. Temporary lesion to the suprarenal gland resulting from infectious diseases and poisoning.</p> <p>Serious lesion resulting from burning or cold, and also septic conditions following chronic suppurations.</p> <p>Disturbance of the water and salt equilibrium (renal diseases, eclampsia).</p> <p>After-effects of exposure to X-ray and ultraviolet ray treatment.</p> <p>Hyperemesis gravidarum.</p> <p>Delayed convalescence.</p> <p>A prophylactic in serious surgical operations on gastro-intestinal tract.</p> <p>Acne rosacea of the eye.</p>	<p>One ampoule corresponds to the effectiveness of 5 mg. desoxy-cortico-sterone acetate.</p> <p>Ampoules:</p> <p>Boxes containing 3 ampoules of 1 c.c.</p>

拜耳大藥廠

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>'ELITYRAN'</p> <p><i>A preparation of natural thyroid.</i></p>	<p>Standardised on weight-reducing properties in guinea-pigs. Well tolerated, obviating usual by-effects of thyroid preparations. Action on metabolism 10 times that of thyroxin.</p> <p>Obesity. Myxœdema and other conditions of thyroid deficiency.</p>	<p>Tablets (10 guinea-pig units each): Tubes of 30.</p>
<p>'ERUGON'</p> <p><i>Standardised testicle hormone and the potent principles of the testicle.</i></p>	<p>Male sex hormone preparation, standardised in comb growth units according to Pezard's method.</p> <p>Impotence, eunuchoidism. Neurasthenia, anxiety neurosis, psychic depression. Prostatic hypertrophy. Aftertreatment of prostatectomy.</p>	<p>Ampoules, 1 c.c. : Boxes of 2. 'Pellets', 10. Bottles of 30.</p>
<p>'HYPOPHYSIN'</p> <p><i>Contains the active principles of the pituitary gland (posterior lobe).</i></p>	<p>Uterine tonic. 1 c.c. 'Hypophysin' = 3 Int. Units. 1 c.c. 'Hypophysin' strong = 10 Int. Units.</p> <p>Gynaecology: primary or secondary weakness of the uterine contractions during birth; uterine atony. Internal medicine: defective intestinal peristalsis, cholelithiasis, nephrolithiasis. Serum sickness, bronchial asthma.</p>	<p>Ampoules, 1 c.c.: Boxes of 3. 'strong': ampoules of 0.5 and 1 c.c.: Boxes of 3.</p>
<p>'ILIREN'</p> <p><i>An adrenalin-free preparation of suprarenal cortex for oral use.</i></p>	<p>Contains the therapeutically important active principles of the suprarenal capsule free from adrenalin. The pills are coated with a varnish which only dissolves on reaching the small intestine. The stable contents of each pill correspond to 3 g. fresh suprarenal cortex.</p> <p>Indications: Addison's disease. Delayed convalescence after infectious diseases, for example diphtheria (in combination with 'Cantan'), debility, asthenia, emaciation, pituitary cachexia, in adolescence accompanied by disturbances of growth (in combination with 'Preloban'), hypotonia. If necessary combined with 'Cortentil'.</p>	<p>Pills: Bottles of 30.</p>

拜耳大藥廠

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>INSULIN <i>»Bayer«</i> <i>The hormone of the islets of Langerhans in the pancreas, in isotonic solution.</i></p>	<p>Pure crystalline substance in isotonic solution. Standardised in International Units. Diabetes mellitus. Schizophrenia (insulin shock therapy). "Weight-building."</p>	<p>Phials of 5 c.c. with 10, 20, 40 or 60 International Units per c.c.</p>
<p>'LUTREN' <i>Corpus luteum hormone.</i></p>	<p>Exactly standardised corpus luteum hormone. The clear oily solution contains 2 or 5 international units per c.c. Habitual and threatened abortion. Female sterility. Amenorrhœa and dysmenorrhœa.</p>	<p>Ampoules, 1 c.c. = 2 I. U. (2 mg. progesterone): 1 × 2 mg. 3 × 2 mg. 5 × 2 mg. 5 × 5 mg.</p>
<p>'ORASTHIN' <i>The fraction of the extract of the posterior pituitary lobe which has a specific tonic action on the uterus.</i></p>	<p>That fraction of posterior pituitary extract which exerts a specific tonic action on the uterus and no action on blood pressure, intestines or diuresis. The oxytocic principle. Secondary uterine inertia, post-partum hæmorrhage, uterine atony on nephropathia gravidarum or eclampsia.</p>	<p>Ampoules, 1 c.c. (3 I. U.): Boxes of 3 or 10.</p>
<p>'PRELOBAN' <i>A preparation obtained from the anterior pituitary lobe.</i></p>	<p>Contains the active principles of the whole anterior pituitary lobe, standardised by its action on the testicles of the cock (maturation unit). For the treatment of functional disturbances of the posterior pituitary lobe followed by developmental disturbances, as well as in metabolic alterations due to hormone deficiency.</p>	<p>Pellets: Bottles of 30. 1 pellet contains 5 maturation units (M. U.). Ampoules: 1 ampoule contains 25 M. U. Boxes of 3 amps. and 3 amps. of dist. water. Boxes with 15 dry amps.</p>

拜耳大藥廠

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>'PROLAN'</p> <p><i>Standardised placental gonadotrophin.</i></p>	<p>Gonadotropic hormone. Biologically standardised (International Units).</p> <p>Undescended testes. In cases in which hypofunction of ovarian tissues is presumed, e.g., puberty bleeding, maturity bleeding, habitual abortion, female sterility.</p>	<p>Ampoules (each 100 I. U.): Boxes of 5 and 5 amps. of 2 c.c. distilled water each.</p> <p>Ampoules (each 500 I. U.): Boxes of 1 and 1 amp. of 2 c.c. dist. water.</p> <p>Boxes of 5 and 5 amps. of 2 c.c. dist. water.</p>
<p>'SUPRARENIN'</p> <p>(Adrenalin)</p> <p><i>O-dihydroxyphenyl ethanol-methylamine (sinistra- 'Suprarenin').</i></p>	<p>Active principle of the adrenals (ævorotatory). Substance is either synthetically prepared or made from suprarenal capsules. Astringent, analeptic and hæmostatic.</p> <p><i>Incompat. with alkalis and metallic salts.</i></p> <p>Surgery and dentistry, combined with a local anæsthetic. Internally in gastric and intestinal hæmorrhage. Subcutaneously in bronchial asthma and acute allergic conditions. Intravenously in collapse and post-operative shock.</p>	<p>1:1000 'Suprarenin' solution: Bottles 25 c.c.</p> <p>Ampoules, 1 c.c.: Boxes of 10.</p> <p>Tablets: 20 x 0.001 g.</p>
<p>'UNDEN'</p> <p>Follicular hormone</p> <p><i>»Bayer«</i></p> <p><i>A standardised follicular hormone.</i></p>	<p>Follicular hormone. Standardised in International Units (œstrone units or oestradiolbenzoate units).</p> <p>Female sterility, uterine inertia, primary and secondary amenorrhœa, oligo- and hypomenorrhœa, menopausal sequelæ.</p> <p>muscular injections). Each ampoule contains the equivalent of 0.1 mg. œstrone=1000 International Units.</p> <p>Boxes of 2 ampoules of 1 c.c.: (solution for intramuscular injections). Each ampoule contains the equivalent of 1 mg. oestradiolbenzoate=10,000 International Benzoate Units.</p> <p>Boxes containing 1 ampoule of 2 c.c. (solution for intramuscular injections). Each ampoule contains the equivalent of 5 mg. oestradiolbenzoate=50,000 International Benzoate Units.</p> <p>Bottles with 10 c.c., containing the equivalent of 10 mg. oestradiolbenzoate=100,000 International Benzoate Units.</p>	<p>Pellets: Bottles containing 15 pellets of 'Unden': 1 pellet is the equivalent of 0.1 mg. œstrone=1000 International Units.</p> <p>Solution: Boxes of 5 ampoules of 1 c.c.: (Sterile solution for intramuscular injections).</p>

拜耳大藥廠

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>'CAMPOLON'</p> <p><i>A liver extract suitable for injection according to Prof. Gäusslen.</i></p>	<p>2 c.c. are equal in therapeutic effect to 500 g. of fresh liver given by mouth. Each batch of 'Campolon' is tested <i>clinically</i> before issue.</p> <hr style="width: 10%; margin: 10px auto;"/> <p>Pernicious anæmia, and secondary anæmias. Subacute combined degeneration. Sprue. Lead and bismuth poisoning. 'Salvarsan' dermatitis. Convalescence and debility. Disseminated sclerosis. Toxicosis (gastroenteritis) in infants.</p>	<p>Ampoules, 2 c.c.: Boxes of 5. " " 25.</p> <p>Ampoules, 5 c.c.: Boxes of 3.</p> <p>Bottles of 10 c.c.</p>
<p>'CYREN' B</p> <p><i>Diethyldioxystilbene-dipropionate</i></p>	<p>Synthetic derivative of stilbene with full biological effects of the follicle hormone.</p> <hr style="width: 10%; margin: 10px auto;"/> <p>The proportion of effectiveness between 'Cyren' B given parenterally and 'Cyren' B administered by mouth fluctuates between 2:1 and 1:1, i.e. to obtain the same effect the same up to double the injection dose is required for oral administration.</p> <hr style="width: 10%; margin: 10px auto;"/> <p>Primary and secondary amenorrhœa, genital hypoplasia, dysmenorrhœa, female sterility, menstrual irregularities, climacteric disturbances (arthropathy, arthrosis, arthritis), conditions of depression and psychoses, pruritus and other skin diseases of ovarian origin.</p>	<p>'Cyren' B tablets: Tubes containing 20 tablets of 0.1 mg. diethyldioxystilbene-dipropionate.</p> <p>'Cyren' B 'forte' tablets: Tubes containing 20 tablets of 0.5 mg. dimethyldioxystilbene-dipropionate.</p> <p>'Cyren' B ampoules: Boxes containing 5 ampoules of 1 c.c. oily solution of 0.5 mg. diethyl-dioxy-stilbene - dipropionate.</p> <p>'Cyren' B 'forte' ampoules: Boxes containing 5 ampoules of 1 c.c. oily solution of 2.5 mg. diethyldioxy-stilbene-dipropionate.</p>

拜耳大藥廠

Name and Composition	Properties and Indications	Packings
<p>'LACARNOL'</p> <p><i>A nucleosidic fraction from organic tissue extracts.</i></p>	<p>Vasodilator with a selective action on the coronary arteries.</p> <p>—</p> <p>Angina pectoris and vascular diseases, when due to arteriospasm. Intermittent claudication. Endarteritis obliterans.</p>	<p>Solution: Drop bottles of 20 c.c.</p> <p>Ampoules for injection, 1 c.c.: Boxes of 5.</p>
<p>'PADUTIN'</p> <p><i>A vasomotor hormone.</i></p>	<p>An internal secretion of the pancreas. Complicated molecular constitution, very unstable to heat, acids, bases, and alcohol. Dilator of arterioles.</p> <p>—</p> <p>Angiospasm, intermittent claudication, endarteritis obliterans, Raynaud's disease, and climacteric disorders. Gangrene. Chilblains. Visual disturbances.</p>	<p>Ampoules, 1 c.c. (4 biolog. units): Boxes of 5.</p> <p>Pellets (3 biolog. units): Tubes of 20.</p> <p>Solution (7 biolog. units per c.c.): Bottles of 10 c.c.</p>

MORPHOLOGICAL COMPONENTS OF THE BLOOD

I. Erythrocytes. Diameter of 7.5μ ($6-9 \mu$), about 5 million in 1 c.mm. Hæmoglobin content 100 per cent. (16 g. hæmoglobin in 100 c. c. blood).

Abnormalities in number: 1) **Decrease:** Secondary anæmia (hypochromic), pernicious anæmia (hyperchromic), pregnancy anæmia (hyperchromic). Goat's milk anæmia. 2) **Increase:** Polycythæmia, polyglobuly (10 millions).

Abnormalities in size: Anisocytosis (microcytosis, megal- or macrocytosis), erythrocytes differing from the normal size (normocyte). Secondary anæmia, pernicious anæmia, hæmolytic jaundice.

Abnormalities in form: Polkilocytosis: malformed, pear-shaped erythrocytes. Secondary anæmia, pernicious anæmia, hæmolytic jaundice.

Abnormalities in colour or staining property:

1. Polychromatic erythrocytes: blood cells that in contrast to normal erythrocytes, which can be stained only with acid dyes (eosin), also take up basic dyes (methylene blue). Observed in pernicious anæmia.
2. Reticulocytes (vital granulated erythrocytes): erythrocytes with staining residues of the original blood-cell protoplasm, which normally disappear in the maturation of erythroblasts and normoblasts. Secondary anæmia, pernicious anæmia.
3. Punctate basophilic erythrocytes with granules that are demonstrable with basic dyes. Occurrence in lead poisoning, pernicious anæmia, various anæmic conditions.
4. Pigment increase in hyperchromic anæmia (F.I. > 1)
5. Pigment decrease in hypochromic anæmia (F. I. < 1) and secondary anæmia.

Resistance of erythrocytes to anisotonic NaCl solution diminished in hæmolytic jaundice, pernicious anæmia and diabetes.

Erythrocyte sedimentation rate is the speed at which erythrocytes sink to the bottom in a test tube. A faster rate is observed in conditions of increased protein breakdown (tumours, infections, pregnancy).

II. Leucocytes.

1. Myeloid leucocytes (granulocytes).

- a) Neutrophils, polymorphonuclear leucocytes (6000-8000 in c. mm.), 65-70 per cent.

Decrease: leucopenia, granulocytopenia in hæmolytic jaundice, pernicious anæmia, typhoid, intoxications.

Absence: agranulocytosis.

Increase: leucocytosis; pathologically: myeloid leukæmia: 200,000-500,000.

- b) Neutrophil myelocytes (15-20 μ in diameter). Primary stage: myeloblasts normal in bone-marrow, pathological in blood.

- c) Transitional leucocytes (transition forms of a and b). Occurrence in infectious conditions as a so-called shift to the left in the white blood picture.

	Leucocytes	Basophils	Eosinophils	Neutrophils				Lymphocytes	Large mononuclears
				Myelocytes	Juveniles	Transitional nuclears	Poly-nuclears		
Normal	6000	1	3	—	—	4	63	23	6
Shift to the left	7000	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	—	—	19	20	36	9

- d) Eosinophil leucocytes 2-4 per cent. Increased occurrence in: trichinosis, bronchial asthma, pemphigus, psoriasis, anaphylactic shock.

- e) Basophil leucocytes or mast-cells, occurrence 0.5 per cent., increased in myeloid leukæmia.

- f) Monocytes: large mononuclear cells and transition forms; it is doubtful whether they belong to the myeloid system. Occurrence: normally 4-8 per cent.

2. Lymphatic leucocytes (lymphocytes). 20-25 per cent.

- a) Lymphocytes: increased in lymphatic leukæmia (200,000), decreased in Hodgkin's disease (besides leucocytosis).

- b) Plasma cells = lymphocytes with large basophil vacuolised protoplasm. Occurrence normally rare, but often in leukæmia, German measles, whooping-cough and chronic inflammatory processes.

III. Blood platelets (thrombocytes). 2-3 μ in diameter, 250,000-500,000. Decreased in thrombopenic purpura. Serum colour: caused by bilirubin content, increased in hæmolytic jaundice, liver disorders, pernicious anæmia, and blackwater fever.

常用處方畧語表

aa.	ana	各
√ a.c.	ante cibum (cibos)	食前
ad	ad	至
add.	adde	加增
√ ad decub.	ad decubitum	就床前
ad 2 nd vic.	ad secundam vicem	二回服
ad 2 vic.	ad duas vices	二回服
ad lib.	ad libitum	隨意
ad part. dolent.	ad partes dolentes	痛部
ad prand.	ad prandium	晝飯時
ad ter. vic.	ad tertiam vicem	三回服
ad us. ext.	ad usum externum	外用
agit.	agita	振盪
alt. dieb.	alternis diebus	隔日
alt. hor.	alternis horis	每二時間
1 a. m.	ante meridiem	午前
aq.	aqua	水
a. u.	ante usum	用時
b. i. d.	bis in die	一日二回
cib.	cibus	食
c. m.	cras mane	明朝
c. n.	cras nocte	明晚
coct.	cola	煮沸
d.	da	與
d.	dosis	用量
d. d. i. d.	de die in diem	每日
d. d. t.	dentur doses tales	每日量與
det. in plo.	detur in duplo	與其二倍
d. i. d.	dies in dies	日日
dieb. alt.	diebus alternis	隔日
dieb. sing.	diebus singulis	每日
dieb. tert.	diebus tertiis	每三日
dim.	dimidius	半分
d. in p. aeq.	divide in partes aequales	等分
div. in pulv. vi.	divide in pulveres sex	分或六包
√ dol. dur.	dolore durante	疼痛時
dos.	dosis	用量
d. t. d.	da tales doses	同量與
ext.	externus	外用
hebd.	hebdomas	一週

拜耳大藥廠

h. s.	hora somni	寢時
in d.	in dies	每日
m.	misce	調合
m. f.	misce fiat	混和
noct.	nocte	夜
noct. mane q.	nocte maneque	朝晚
o. h. c.	omni hora cochleare	每時一食匙
o. m.	omni mane	每朝
omn. bih.	omni bihora	每二時間
omn. hor.	omni hora	每時
omn. man. vel. noct.	omni mane vel nocte	每朝或每夕
omn. 4 hr.	omni quarta hora	每四時間
omn. quadr. hor.	omni quadrante horae	每十五分時
o. n.	omni nocte	每夜
p. c.	post cibum	食後
p. e.	partes aequales	等分
p. edent.	post edente	食後
p. m.	post meridiem	午後
p. q. h. p. $\frac{1}{2}$ h.	per quadrantum horae	十五分時
pr. man.	primo mane	早朝
p. r. n.	pro re nata	時時
pro d.	pro die	一日
pro dos.	pro dose	一回
q. h.	quaque hora	每時
q. l.	quantum libet	任意量
q. d. alt.	quaque die alterno	隔日
q. pl.	quantum placet	適當量
qq.	quaque	每
qq. hor.	quaque hora	每時
q. s.	quantum sufficiat	適宜量
quotid.	quotidie	每日
semih.	semihora	半時間
sesqh.	sesquihora	一時半
s. i. d.	semel in die	一日一回
sig.	signa	服用法
s. q.	sufficiens quantitas	適宜量
ss.	semis	半分
t. d.	tales doses	同量
t. i. d.	ter in die	一日三回
u.	usu	應用
us. ext.	usus externus	外用
vesp.	vesper	晚



»Bayer«

Leverkusen, Germany

德國拜耳大藥廠

總經理

»Bayer«

PHARMA CO.

138 Kiangse Road Shanghai

拜耳藥品有限公司

上海江西路一三八號

分行：漢口 天津 奉天 大連

分銷處：南京 蘇州 揚州 興化 泰縣 鎮江 徐州
 濟南 青島 烟台 威海衛 北京 唐山
 石家莊 順德 彰德 新鄉 太原 大同
 張家口 包頭 張家口 杭州 寧波 溫州
 廈門 廣州 澳門 汕頭 蚌埠 安慶 蕪湖
 哈爾濱 新京 牛莊 吉林 齊齊哈爾 安東
 錦州 西貢 河內

備忘錄

備忘錄

1943

一 月		二 月		三 月	
星期	3 10 17 24 31	星期	7 14 21 28	星期	7 14 21 28
一	4 11 18 25	一	1 8 15 22	一	1 8 15 22 29
二	5 12 19 26	二	2 9 16 23	二	2 9 16 23 30
三	6 13 20 27	三	3 10 17 24	三	3 10 17 24 31
四	7 14 21 28	四	4 11 18 25	四	4 11 18 25
五	1 8 15 22 29	五	5 12 19 26	五	5 12 19 26
六	2 9 16 23 30	六	6 13 20 27	六	6 13 20 27
四 月		五 月		六 月	
星期	4 11 18 25	星期	2 9 16 23 30	星期	6 13 20 27
一	5 12 19 26	一	3 10 17 24 31	一	7 14 21 28
二	6 13 20 27	二	4 11 18 25	二	1 8 15 22 29
三	7 14 21 28	三	5 12 19 26	三	2 9 16 23 30
四	1 8 15 22 29	四	6 13 20 27	四	3 10 17 24
五	2 9 16 23 30	五	7 14 21 28	五	4 11 18 25
六	3 10 17 24	六	1 8 15 22 29	六	5 12 19 26
七 月		八 月		九 月	
星期	4 11 18 25	星期	1 8 15 22 29	星期	5 12 19 26
一	5 12 19 26	一	2 9 16 23 30	一	6 13 20 27
二	6 13 20 27	二	3 10 17 24 31	二	7 14 21 28
三	7 14 21 28	三	4 11 18 25	三	1 8 15 22 29
四	1 8 15 22 29	四	5 12 19 26	四	2 9 16 23 30
五	2 9 16 23 30	五	6 13 20 27	五	3 10 17 24
六	3 10 17 24 31	六	7 14 21 28	六	4 11 18 25
十 月		十一 月		十二 月	
星期	3 10 17 24 31	星期	7 14 21 28	星期	5 12 19 26
一	4 11 18 25	一	1 8 15 22 29	一	6 13 20 27
二	5 12 19 26	二	2 9 16 23 30	二	7 14 21 28
三	6 13 20 27	三	3 10 17 24	三	1 8 15 22 29
四	7 14 21 28	四	4 11 18 25	四	2 9 16 23 30
五	1 8 15 22 29	五	5 12 19 26	五	3 10 17 24 31
六	2 9 16 23 30	六	6 13 20 27	六	4 11 18 25

1944

一 月							二 月							三 月						
星期	2	9	16	23	30	星期	6	13	20	27	星期	5	12	19	26					
一	3	10	17	24	31	一	7	14	21	28	一	6	13	20	27					
二	4	11	18	25	二	1	8	15	22	29	二	7	14	21	28					
三	5	12	19	26	三	2	9	16	23	三	1	8	15	22	29					
四	6	13	20	27	四	3	10	17	24	四	2	9	16	23	30					
五	7	14	21	28	五	4	11	18	25	五	3	10	17	24	31					
六	1	8	15	22	29	六	5	12	19	26	六	4	11	18	25					
四 月							五 月							六 月						
星期	2	9	16	23	30	星期	7	14	21	28	星期	4	11	18	25					
一	3	10	17	24	一	1	8	15	22	29	一	5	12	19	26					
二	4	11	18	25	二	2	9	16	23	30	二	6	13	20	27					
三	5	12	19	26	三	3	10	17	24	31	三	7	14	21	28					
四	6	13	20	27	四	4	11	18	25	四	1	8	15	22	29					
五	7	14	21	28	五	5	12	19	26	五	2	9	16	23	30					
六	1	8	15	22	29	六	6	13	20	27	六	3	10	17	24					
七 月							八 月							九 月						
星期	2	9	16	23	30	星期	6	13	20	27	星期	3	10	17	24					
一	3	10	17	24	31	一	7	14	21	28	一	4	11	18	25					
二	4	11	18	25	二	1	8	15	22	29	二	5	12	19	26					
三	5	12	19	26	三	2	9	16	23	30	三	6	13	20	27					
四	6	13	20	27	四	3	10	17	24	31	四	7	14	21	28					
五	7	14	21	28	五	4	11	18	25	五	1	8	15	22	29					
六	1	8	15	22	29	六	5	12	19	26	六	2	9	16	23	30				
十 月							十 一 月							十 二 月						
星期	1	8	15	22	29	星期	5	12	19	26	星期	3	10	17	24	31				
一	2	9	16	23	30	一	6	13	20	27	一	4	11	18	25					
二	3	10	17	24	31	二	7	14	21	28	二	5	12	19	26					
三	4	11	18	25	三	1	8	15	22	29	三	6	13	20	27					
四	5	12	19	26	四	2	9	16	23	30	四	7	14	21	28					
五	6	13	20	27	五	3	10	17	24	五	1	8	15	22	29					
六	7	14	21	28	六	4	11	18	25	六	2	9	16	23	30					

北 182.6 京

