

古方集解 上函全

種子要方 同上

中風大法 同上

徐靈胎醫書三十二種

古方集解

吳江徐大椿靈胎著

古吳潘蔚增輯

天王補心丹道藏 治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證

人參 白茯苓 元參 桔梗 遠志各五錢 當歸 五味子 麥冬 天冬 丹參 酸棗仁 各

生地四兩 柏子仁兩一

右為末煉蜜丸如椒目大白湯下此養心一方有石菖蒲四錢無五味子一方有甘草川連

柯韻伯曰心者主火而所以主者神也神衰則火為患故補心者必清其火而神始安補心丹用生地黃為君者取其下足少陰以滋水主水盛可以伏火此非補心之陽補心之神耳凡果核之

有仁猶心有神也清氣無如柏子仁補血無如酸棗仁其神存身參苓之甘以補心氣五味之酸以收心氣二冬之寒以清氣分之火心氣和而神自歸矣當歸之甘以生心血玄參之鹹以補心血丹參之寒以清血中之火心血足而神自藏矣更假桔梗為舟楫遠志為向導和諸藥入心

而安神明以此養生則壽何有健忘怔忡津液乾涸舌上生瘡大便不利之虞哉

導赤散氏錢 治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱淋不利

生地 木通 甘草梢各等分

右三味水煎服此瀉心火散

季楚重曰經云兩精相搏謂之神是神也者待心中之真液腎中之真氣以養者也故心液下交而本也錢氏制此方意左承而水自生前賢以生脉救真液是治本不洽標也導赤散清腎火是治標以固本則心火自降尤慮肝木妄行能生火必先合乙癸之滋生地黃佐以甘草梢下焦培腎火之不實且治莖中痛更用木通導小腸之滯即以通心火之鬱是一治兩得者也瀉心湯用黃連所以瀉心火之實邪毒木之有餘瀉子以清母也導赤用地黃所以治虛邪虛邪責水不足壯水以制火也此方涼而能補較之用苦寒伐胃傷其生氣者遠矣

王孟英曰本方去甘草加黃芩蜜丸名火府丹亦治心熱渴溢淋濁等證本方加生蘇黃連丹皮各升麻清胃湯輕清涼血乃秦皇透化斑疹之良劑

古方集解

當歸補血湯 治男婦血虛似白虎證熱面赤煩渴引飲脈來洪大而虛重按則微

當歸錢二 黃耆兩一

右二味水煎服此補表

吳鶴臯曰

血實則身涼血虛則身熱或以飢困勞虛其陰血則陽獨治故諸症生焉此證純象白虎黃芪則味甘補氣者也今黃芪多致倍而云補血者是以有謂之虛是也當歸味厚為陰中之陰故能養血

四物湯方局 治一切血熱血虛血燥諸證

當歸 熟地 川芎 白芍

右四味水煎服此血病 川芎五分 白芍二錢 酒炒

張路玉曰

恨者莫如坎離失血等證血受病之專劑非調補真陰之的方書或謂四物補陰遂以治陰虛發熱火炎行却耶先輩治上之迅掃虛陽四物又專事女科者咸以此湯隨症漫加却病之能成藥用之何其最可生無形之氣所當急固也昔人有言見血無治血必先調其氣又云四物湯不得補氣藥不能成陽生陰靡不應手輒效是言也然余嘗謂此湯傷寒火邪解後餘熱留於血分至夜微熱不除或合柴胡或加桂枝不可沒其功也

玉屏風散 治風邪久留而不散者自汗不止者亦宜

防風 黃耆 白朮 各等分 或加炒糯米

右為細末酒調服此能固表使風邪不易

柯韻伯曰

者自來邪氣留連則發散太過必虛故治風者不逆無以驅之而患無以藥之不畏風之不去而畏風之復惟急為風邪氣中之潤劑治風獨取此味任重功專矣然氣者所以清頭面七竅內除骨節痠疼而外解四肢之類疾腸風下血婦人子嗽風是補劑中之風藥也所以防風得黃芪其功愈大耳白朮健脾胃溫分肉培

土。即以盜風也。夫以防風之善驅風。得黃芪以固表。則外有所衛。得白朮以固裏。則內有所據。風邪去而不復來。此欲散風邪者。當倚如屏。珍如玉也。其自汗不止者。亦以微邪在表。皮毛肌肉之不通耳。其與防風通聖等方懸殊矣。

道遙散方。治肝家血虛火旺。頭痛目眩。頰赤口苦。倦怠煩渴。抑鬱不樂。兩肋作痛。寒熱。小腹重墜。婦人經水不調。脈弦大而虛。

芍藥酒

當歸

白朮

茯苓

甘草

柴胡各二錢

本方加丹皮。梔子。即加味道遙散。加煨薑三片。薄荷少許。煎服。此疎達肝

趙羽皇曰

五臟若欲補。云肝苦急。急食以甘緩之。蓋肝惟急善怒。其氣上行則順。下行則鬱。鬱則火動。而諸病生矣。故發於上則頭眩耳鳴。而或為目赤。發於中則胸滿脇痛。而或作吞酸。發於下則小腹疼痛。而或泄瀉。或發於外則寒熱往來。以瘧非瘧。凡此諸症。何莫非肝鬱之象乎。而肝不之

唐容川曰

此治肝經血虛火旺。鬱鬱不樂。方用白朮。茯苓。助土德以升木。當歸。白芍。益榮血以養肝。薄荷。解熱。甘草。緩中。柴。姜。升。發。木。鬱。則。達。之。遂。其。曲。直。之。性。故。名。之。曰。道。遙。如。火。甚。血。不。和。者。加。丹。皮。山。梔。清。理。心。色。甘。草。緩。中。柴。姜。升。發。木。鬱。則。達。之。遂。其。曲。直。之。性。故。名。之。曰。道。遙。如。火。甚。血。不。和。者。之。血。而。是。治。肝。之。血。瀉。心。色。之。火。即。是。瀉。肝。之。火。以。子。母。同。氣。故。也。

平胃散

治濕淫於內。脾胃不能剋制。有積飲痞膈中滿者。

陳皮

厚朴

甘草

各三錢

右為末。每服二錢。薑湯下。日三服。或水煎。每服五錢。如小便赤澀。加茯苓澤瀉。米穀不化。飲食傷

多。加枳殼。胃中氣不快。心下痞氣。加枳殼木香。心下痞悶。腹脹者。加厚朴。甘草減半。過夏加炒黃芩

過雨水濕潤時。加茯苓澤瀉。如有痰涎。加半夏陳皮。咳嗽。飲食減少。脈細。加當歸黃耆。脈洪大。緩加

黃芩黃連。大便硬。加大黃三錢。芒硝三錢。先嚼麩炒桃仁爛。以藥送下。本方加皂礬。即皂礬平胃丸。

燥經曰乎以濕之是也行水則去自燥非半夏之辛燥也或曰有痰而渴宜去半夏代以貝母吳鶴鼻曰
湯而喜飲者易之不能飲水脾渴宜半夏也此濕為熱為標所謂濕極而蒙勝已之化非真象也又東
南之人濕熱生痰故丹溪恒主之加枳實砂仁即名枳砂二陳湯其性較急也先哲曰二陳為治
痰之妙劑其於上下左右無所不宜然止能治痰之標不能治痰之本痰本在脾在腎治者詳之

枳朮丸 治痞積消食強胃 心中堅大如盤

枳實 兩一 白朮 兩二

右用荷葉裹燒飯為丸桐子大每服五十丸加木香砂仁即香砂枳朮丸古本全係張潔

東垣曰

白朮主甘溫其苦味除胃中之濕熱其甘溫補脾散之元氣多於枳實一倍枳實味苦溫泄心
不峻利矣下痞悶消胃中於此為震正少腸肝膽之氣即須入胃營氣上行消他先補虛而後生胃氣更
以煨飯和藥與木協力滋養穀氣而補脾胃其利大矣若用食藥下之傳變諸症不可勝數按東垣此
一方源出金匱然一急一緩

附錄金匱枳朮湯 治心下鞭大如盤邊如旋杯水飲所作

枳實 枝七 白朮 兩二

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中脹即如故

以德曰

心下胃上腕也胃氣弱則所飲之水不消痞結而堅必強其
胃消其疾白朮健脾強胃枳實善消心下痞逆停水散滯血
張景岳曰 濕古枳朮丸以白朮為君脾得燥而能健佐以枳實其味苦峻實有推牆倒壁之功此寓攻
傷其氣助其瘦耳 於守之劑唯脾氣不清而滯勝者宜之若脾氣已虛非所宜也令以為補脾之藥及小兒瘦

藿香正氣 治外受四時不正之氣內停飲食頭痛寒熱或霍亂吐泄或作瘧疾

厚朴 陳皮 桔梗 半夏 甘草 大腹皮 白芷 茯苓 蘇葉 藿香

右十味加薑棗水煎熱服此方可 治時疫

吳鶴臯曰

四時不正之氣由鼻而入不在表而在裏故不用大汗以解表但用芬香利氣之品生之蘇病在太陽與此湯全無相干傷寒脈沉發熱與元氣本虛之人并火陰發熱者宜戒又金培營中氣者若平胃散加半夏藿香丸凡受山嵐瘴氣及出遠方不服水土吐瀉下利者主之蓋平胃散可以平濕土而消痞半夏之燥以醒脾藿香之分以開胃各曰正氣謂能正不正之氣耳

大順散

治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草三十斤

乾薑 杏仁 肉桂 各四斤

右先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作聲為度節

淨後入肉桂一處搗為散每服二錢水煎溫服如煩燥并花水調下不拘時沸湯調亦得此治暑天

王安道曰

若以之治靜而得之脾胃受濕乾薑杏仁肉桂次之除肉桂外立蓋溫中藥也原其初意本為胃暑伏熱引飲藥子陰果為寒何非寒氣也蓋夏月陽氣發散於外而陰氣則在內耳豈可視陰氣為寒氣而用溫熱之

殊砂安神丸

治心神昏亂驚悸怔忡寤寐不安

殊砂 研另

黃連 兩各半

生地黃 錢三

當歸 錢二

甘草 各二

右為細末酒泡蒸餅丸如麻子大殊砂為衣每服三十九卧時津液下

葉仲堅曰

之體赤色通心能鎮魂散熱安胎生血用當歸之甘溫歸心血也更佐甘草之甘以苦熱配黃連之苦寒瀉心熱也受依地黃之寒以瀉之心主血用當歸之甘溫歸心血也更佐甘草之甘以苦熱解則肺得其職而形自正也

人參瀉肺湯

治肺經積熱上喘胸膈脹滿痰多大便溢

人參 黃芩 梔子 枳壳 薄荷 甘草 連翹 杏仁 桑皮 大黃 桔梗 右水煎服

王又原曰 肺經云邪之所湊其氣必虛又肺為嬌藏其不堪破耗也明矣自肺熱傷肺之說行曰保肺補

三黃湯 治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食

麻黃 獨活 細辛 黃耆 黃芩 石膏 杏仁 甘草 芍藥 附子 大黃 枳實 桔梗 右水煎服

陳元犀曰 此治風中太少通發陰陽驅邪之方也足太陽屬脾主四肢手足拘急惡寒經日不欲飲食

控涎丹 甘遂 大戟 白芥子 等 右為末煮糊丸桐子大曬乾臥時淡薑湯或熱湯下五七丸至十九丸此乃下痰之方

王晉三曰 控涎也涎讀作羨酒涎也水流貌引三焦之水而流涎出於水道也芥子皮裏膜外之水飲

茯苓甘草湯 傷寒厥而心下悸者宜先治水當服此湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

茯苓西二 桂枝西二 生草炎一西 生薑西二

右四味水四升。煮取二升。分溫三服。

柯韻伯曰

此厥陰傷寒發散內邪之汗。取此傷寒厥而心下悸者。宜先治水。以裏急後緩為治法。此方專治痰血成勞之病。即所以補虛也。凡血虛者。其脈必微。此方以桂枝湯加芍藥。芍藥能收斂。桂枝能溫通。芍藥能養血。桂枝能助陽。芍藥能助陰。此方之妙。在於芍藥與桂枝之配合。芍藥能收斂。桂枝能溫通。芍藥能養血。桂枝能助陽。芍藥能助陰。此方之妙。在於芍藥與桂枝之配合。

乾血肌膚甲錯。兩目黯黑。此丸主之。
大黃蒸十分 黃芩西二 甘草西三 桃仁升一 杏仁升一 芍藥西四 乾地黄西十 蟬螬升一 乾漆西一 蟲

右十二味為末。煉蜜為丸。小豆大。酒飲服五丸。日三服。食血乾則納而不散。非草木之品。所能下。必用

李士材曰

此方專治痰血成勞之病。即所以補虛也。凡血虛者。其脈必微。此方以桂枝湯加芍藥。芍藥能收斂。桂枝能溫通。芍藥能養血。桂枝能助陽。芍藥能助陰。此方之妙。在於芍藥與桂枝之配合。芍藥能收斂。桂枝能溫通。芍藥能養血。桂枝能助陽。芍藥能助陰。此方之妙。在於芍藥與桂枝之配合。

古方集解

尤在涇曰

大黃廣九君以黃從胃中宣發潤燥佐以黃芩清肺衛杏仁潤心燥桃仁補肝虛生

大黃廣九君以黃從胃中宣發潤燥佐以黃芩清肺衛杏仁潤心燥桃仁補肝虛生
地菽腎燥乾漆性急飛廉破堅通給行陽却有神功故方名標而用瓊玉膏補之勿扶性下入陰補毒失
癸蟠燔去兩腸下之堅也。指方中寬舒潤實之品而言也。故喻嘉言曰：可用瓊玉膏補之勿扶性下入陰補毒失
補虛者緩舒也。綿也。指方中寬舒潤實之品而言也。故喻嘉言曰：可用瓊玉膏補之勿扶性下入陰補毒失
却寬舒胃氣之義。

桂枝麻黃各半湯

治傷寒向愈脈微緩惡寒身癢

桂枝一兩十六株

芍藥酒

生薑切

甘草炙

麻黃各一兩

大棗四枚

杏仁二十

皮共十四個湯浸去

柯韻伯曰

大陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少面有赤色者三陽氣併營在表不得汗越因
蓋八九日來正氣已虛表未解此身必瘧狀發熱惡寒熱多寒少面有赤色者三陽氣併營在表不得汗越因
入麻黃一分不再作經故立此法再耳。此與前證因未經發汗而病日已法雖陽明二微而汗之各取三合併取法兩方各
煎而合服。猶水陸相合。淫滑分明。見仲景用偶方輕劑其中更有緩急大小反佐之不同矣。取法為六合。頓
攻之義也。後人算其分兩合為一方。與葛根青龍輩何異。

葛根黃芩黃連湯

治太陽證誤下利遂不止喘而汗出者此主之

葛根半斤

甘草炙

黃芩各二兩

黃連三兩

右四味以水八升。先煮葛根減二升。入諸藥。煮取二升。去滓。分溫再服。

柯韻伯曰

太陽病。外症未解。而反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫

柯韻伯曰

太陽病。外症未解。而反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫

柯韻伯曰

太陽病。外症未解。而反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫

柯韻伯曰

太陽病。外症未解。而反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫

柯韻伯曰

太陽病。外症未解。而反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫
反下之。逆協熱而利。心下痞。黃連微弱者。用桂枝人參湯。本桂枝下症。醫

大黃

四兩 酒洗 厚朴 半斤 去

枳實 五枚

芒硝 三合

右四味以水一斗。先煮二物。取五升。去滓。納大黃。煮取二升。去滓。納芒硝。更上火微火一兩沸。分溫再

服。得下餘勿服。胃中非存燥屎之所。此言胃中者。指足陽。明言。即所謂胃中實是也。乃腸胃之總名。

小承氣湯 治汗多微發熱。不惡寒。或小便數而大便鞭。讞語者。與此湯微和胃氣。

大黃

四兩 厚朴 二兩 去

枳實 三枚

右三味以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯當更衣。不爾者盡飲之。若更衣者勿服之。

柯韻伯曰

諸病皆因於氣。穢物之不去。由於氣之不順也。故攻積之劑。必用氣分之藥。因以承氣名湯。氣味多性。猛制方大。其服欲令大泄下也。因名曰大承氣。性緩制小。其服欲微和胃氣也。因名曰小承氣。更有妙義。大承氣用分水。欲使芒硝先化。燥屎去。內大黃。再煮。後積。內芒硝。何哉。蓋生者氣銳而先行。熟者氣純而和緩。仲景欲使芒硝先化。燥屎去。內大黃。再煮。後積。內芒硝。何哉。蓋生者氣銳而先行。小承氣以三味同煎。

喻嘉言曰

全匱治痙。痙為病。胸滿口噤。臥不着席。脚攣急。必斷。蓋可與大承氣湯。乃死。裏求法也。靈樞。斷齒加以胸滿。謂其邪尚在中。下三焦。熱邪充斥。死。不旋踵矣。在傷寒。症腰折。胸滿。不可下。胸滿。不可下。然投者。易。且。須知所謂胸滿。謂其邪尚在中。下三焦。熱邪充斥。死。不旋踵矣。在傷寒。症腰折。胸滿。不可下。胸滿。不可下。然投者。易。且。亡。即小小下之。尚不足。以勝其陽。救其陰。故取此湯。以承領其一綫之陰氣。陰氣不盡。為陽熱所劫。因而。得生者多矣。可與二字。甚活。臨症酌而用之。初非定法也。既有下之。重傷其陰。之大戒。復有下之。急救。其。為深造。端在此矣。

調胃承氣湯

治胃氣不和。不惡寒。但熱。腹微滿而煩。與此湯。

大黃

四兩 去 清酒浸

甘草 二兩

芒硝 半斤

右三味。以水三升。先煮大黃甘草。取一升。去滓。納芒硝。更上火微煮。令沸。少少溫服。外邪已盡。乃

柯韻伯曰

此治太陽陽明併病之和劑也。因其人平素胃氣有餘。故太陽病三日。其經未盡。即欲再作太陽。經發汗而外熱未解。此外之不解。由於裏之不通。故太陽之頭項強痛。雖未除。而陽明之發。景之要法。此仲

熱不惡寒。已外見此不得執太陽禁下之一說。坐視津液之枯燥也。少與此劑以調之。但得胃氣一和。必自汗而解。是與針足陽明同義。而用法則有在經在府之別矣。不用氣藥而亦名承氣者。調胃即所以承氣也。經曰。平人胃滿則腸虛。腸滿則胃虛。胃虛則氣津液。而上下。今氣之不承。由胃家之實熱。必用硝黃以瀉胃家之積。而胃氣得以下順。故亦得承氣之名。津液之前輩見條中。無燥屎之便。寓致堅硬者。可用一補。調胃之法。備矣。胃氣則得以下順。故亦得承氣之名。津液之前輩見條中。無燥屎之便。寓致堅硬者。可用一知此方。為燥屎而設。故芒硝分兩多。於大承氣。因病不在氣分。故不用氣藥。耳。右云。未堅硬者。可用一煎。脈有法。度粗工不審。其立意。故有三承氣之說。豈知此方全在服法。之妙。少服之。是宜調胃承氣。是於觀大。中益氣調胃。用甘草。是於政實中慮虛。

大陷胸丸 治病發於陽而反下之。熱入因作結胸。病發於陰而反下之。因作痞。所以成結胸者。以下之太早故也。

大黃 斤半 **葶藶子** 熟 **芒硝** **杏仁** 去皮夫熬 黑各半升

右四味搗篩二味。納杏仁芒硝。合研如脂。和散取如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢匕。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下。更服。取下為效。

柯韻伯曰 胸中者宗氣之所出。故名氣海。氣為陽。故為一陽之部。氣為水。母。氣清則水。精。四布。氣熱則水。濁。而壅結矣。水結於胸。則津液不下。無以潤腸胃。故大便必燥。不下。輸。其水。道。不通。大黃

芒硝善滌腸胃之熱。實先病在胸中。而亦用以為君者。熱淫於內。當治以苦寒。且以潤腸。其水。道。不通。大黃瀉子。開其胸中之水。氣而行。水自利。矣。小結。又因於氣熱。必佐葶藶。以直攻之。寒以清其熱。於胸中。過熱。源。清。而。解。胸中。之。結。滯。而。保。胃。之。無。傷。是。又。以。攻。劑。而。復。和。劑。矣。白。蜜。之。甘。以。緩。之。使。留。連。於。胸。中。過。熱。源。清。而。解。初起者甚捷。然必視其人壯實。可以一戰成功。如平素虛弱者。病久而任攻伐者。當念虛虛之戒矣。

小陷胸湯 治病在心上。按之則痛。脈浮滑者

黃連 兩一 **半夏** 半升 **栝蘆實** 大者一個

程扶生曰 此熱結未深者在心下。不若大結胸之高在心上。按之痛。比手不可近。為輕。脈之浮滑。又緩於沈緊。但痰飲素盛。按熱邪而內結。所以脈見浮滑也。以半夏之辛通之。黃連之苦瀉之。栝蘆之

石三味以水六升。先煮栝蘆。取三升。去滓。納諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。

若潤滌之蓋所以除熱散結於胸中也
先煮括蕞分溫三服皆以緩治上之法也
程郊情曰胸者攻雖不峻而一皆直瀉其胸裏之實邪亦從此奪矣
柯韻伯曰胸者攻雖不峻而一皆直瀉其胸裏之實邪亦從此奪矣

上故脈亦應其象而沈緊止在寸下大小胸腹按之知痛小腹硬者為大結胸此土燥水堅故脈亦應其
痲結寒溫並用溫熱之結自平瓜薑實色赤形圓中含津液法象於心用君助黃連之若且以滋半
夏之燥洵為除煩滌疾開結寬胸之劑雖同名陷胸而與攻利水穀之方懸殊矣○大小
青龍攻太陽之表有水火之忿大小陷胸攻太陽之裏有痰飲之別不獨以輕重論也

豬膚湯 少陰病下痢咽痛胸滿心煩者此主之
右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得溫分六服引少陰之

柯韻伯曰少陰病多下利以下焦之虛也陰虛則陽無所附故下焦虛寒者反見上焦之實熱少陰脈循
心煩者因陰併於下而陽併於上水不上承於心火不下交於腎此未濟之象猪為水畜而津液在膚取
其膚以治上焦虛浮之火和白蜜花粉之甘瀉心潤肺而和脾滋化源培母氣水升火降上熱不行虛陽
得歸其部不治利而利自止矣三味皆食
物不藉於草所謂隨手拈來盡是道泄不能上蒸於肺致絡燥而為咽痛者又非甘草所能治矣當以猪

王晉三曰腎應虛而肺主膚虛煩之熱白粉白蜜緩中俾猪膚比類而致津液從腎上入肺中循喉嚨復
從肺出絡心注胸中
而上下燥和解矣
治溼温多汗

白虎加蒼朮湯 治溼温多汗
知母 兩 甘草 二兩 石膏 一斤 蒼朮 兩 粳米 各三

石為末每服四錢水一盞半煎至七分去滓取汁温服
葉香巖曰知母氣味苦寒入足陽明甘草氣味甘平入手足太陰此治溼相搏而為溼温病者以苦寒辛寒

之藥清其暑以辛温入足太陰梗米氣味甘平入手足太陰此治溼相搏而為溼温病者以苦寒辛寒
甘平之藥緩其中則賦和皆却病自安矣

甘平之藥緩其中則賦和皆却病自安矣

甘平之藥緩其中則賦和皆却病自安矣

甘平之藥緩其中則賦和皆却病自安矣

百合知母湯金匱 百合病發汗後者主之

百合七枚 知母三兩

石先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎知母。

取一升。去滓。後合和煎取。

陳元犀曰

百脈俱朝於肺。百脈俱病。病形錯雜不能悉治。只於肺治之。肺主氣。氣之為病。非實而不順。即虛而不足。百合能治邪氣之實。而補正氣之虛。知母入肺金。益其水源。下通膀胱。使天水之氣。合而所傷之陰轉。則其邪從小便出矣。誤汗傷陰者。汗為陰液。陰液傷。故以此湯澀其陽。維陽即所以救陰也。

唐容川曰

百合花下覆如鐘。有肺之象。其根多瓣。合而為一。百脈合宗之象。故以為主分煎。合服二藥。合致其功也。

滑石代赭湯金匱

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石代赭。

赭取一升。去滓。後合和重煎。取一升。五合。分溫服。

陳元犀曰

誤下者其熱必陷。熱陷必傷下焦之陰。故以百合清補肺金。引動水源。以代赭石鎮離火。而不使其上騰。以滑石導熱氣。而能通水府。則所陷之邪從小便而出。自無灼陰灼陰之患矣。此即見陽救陰法也。

參蘇飲易簡

治感冒風寒。頭痛發熱。憎寒效嗽。涕唾稠黏。胸膈滿悶。脈弱無汗。

人參 蘇葉 乾葛 前胡 陳皮 枳殼 茯苓 半夏 桔梗 木香

甘草各五分 生薑片五 大棗一枚

石十三味水煎。熟服。取汗。以上三方。乃感冒風寒之總法。其病止在皮毛肌肉之中。未入經絡。故不也。此等症四時皆有。南方最多。

葉仲堅曰

此少陽中風而寒溼內着之證也。仲景於啖劑不用人參。惟少陽寒熱往來。雖有口苦咽乾。目眩。此相火亦用人參。以固中氣。此咳聲重。痰稠。粘涕。唾交。流。五夜無主。寒溼。稽留。於胸。臆。凡正氣虛者。和氣必感。故胸膈滿悶。輔以陳皮。枳殼。少佐。胡木。香熱不發。而痰壅。盛於心下。非辛燥不除。故用茯苓。半夏。少佐。桔梗。以開之。病高者。宜下。故不取柴胡之升。而任前胡之降。欲解表者。必調和榮衛。故用胡芎。蘇散。則治頭痛發熱。惡寒無汗之表劑矣。

括婁桂枝湯

全 太陽病。其症備身體強。八然脈反沈遲。此湯主之。

括婁根

兩 桂枝 芍藥 各三 甘草 兩二 生薑 兩三 大棗 十二

右六味以水九升。煮取三升。分溫三服。取微汗。汗不出。食頃啜熱粥法。

喻嘉言曰

傷寒方中治項背凡用桂枝加葛根湯矣。彼之汗出惡風。其邪在表。而此之太陽症。因不具和交合之當。從風寒之表法起見。故不用葛根之發汗解肌。既用括婁之味。苦入陰。擅生津。撤熱之長。為君合之。桂枝和管衛。養筋脈。而治其痠。乃變表法為和法也。然既君以括婁根。當增之。桂枝為臣。當

陳元犀曰

方中用姜桂合甘草為辛甘化陽。芍藥為甘化陰。陰陽和則得微汗而邪解矣。設未傷。故加葛根以宣外。脈沈遲者。為風淫於外。而內津液已傷。故加括婁根以滋內。以括婁苦寒潤燥之功大也。

豬苓湯

全 脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。主之。

豬苓

反去 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉 各一

右五味以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內膠。烱消。溫服七合。日三服。此蓄飲

趙羽皇曰

仲景製豬苓一湯。以行陽明少陰二經水熱。然其旨全在益陰。不專利水。蓋傷寒在表。最忌亡陽。而壞虛又患亡陰。亡陰者。亡腎中之陰。與胃家之津液也。故陰虛之人。不但大便不可輕動。即小便亦忌下通。倘陰虛過於溼利。津液不致耗竭。方中阿膠養陰。生新去瘀。於腎中不利水。即於腎中

即小水亦忌下通。倘陰虛過於溼利。津液不致耗竭。方中阿膠養陰。生新去瘀。於腎中不利水。即於腎中

潤真陰。滑石甘滑而寒。於胃中養陰。佐以二苓之淡。滲者行之。既疏濁熱。而不留其瘀。壅亦之。是陰腎不苦其格。燥源清而流有不清者。手顧太陽利水。用五苓者。以太陽職司寒水。故急加桂以行。形也。利水雖同。寒溫迥別。惟明者知之。

柯韻伯曰少陰病得之二三日。心煩不得臥。是上焦實熱。宜黃連阿膠湯清之。少陰病欲吐不吐。心煩但六七日。反見咳而嘔。渴。心煩不得臥者。是下焦虛寒。宜白通湯以溫之。此少陰初病。而下利似為虛寒。至二苓之虛。陽擾。而致變。症見也。用下焦陰虛。非實熱。所宜。下焦虛而非實熱。非化氣。真陽不藏。致上補之。以味也。澤瀉氣味輕清。能引水氣上升。滑石體質重墜。能引火氣下降。味厚。乃氣血之質。是精不足者。諸苓阿膠。黑色通賢。理少陰之本。茯苓滑石。白色通肺。滋小陰源澤也。瀉阿膠。鹹先入降。得既濟之任。故製此。亦且滋陰。益氣之品。是君大之下。陰精承之。以此滋陰利水。而生津。諸症自平矣。

防已黃耆湯風濕脈浮身重。汗出惡風者。此湯主之。

防已一兩 甘草半兩 白朮七錢 黃耆一兩一分去蘆

石剉麻豆大。每炒五錢。七生薑四片。大棗一枚。水盞半。煎八分。去滓。溫服。良久再服。喘者加麻黃半兩。胃中不和者。加芍藥三分。氣上衝者。加桂枝三分。下有陳寒者。加細辛三分。服後當如蟲行皮中。

從腰下如冰。後坐被上。又以一被繞腰下。溫令微汗差。

陳修園曰

陳元犀曰

麻黃杏仁薏苡甘草湯

所致也

麻黃半兩去節湯泡 甘草一兩炙 薏苡仁兩半 杏仁十個去皮尖炒

右剉麻豆大。每服四錢。水一盞半。煮八分。去滓。溫服。有微汗。避風。

陳修園曰

香薷飲

治暑熱乘涼飲冷。陽氣為陰邪所遏。頭痛發熱。惡寒煩燥。口渴腹滿吐瀉者。

香需斤一 厚朴薑汁 白扁豆炒各半斤

石水煎浸冷服此治時行暑病之主方其分兩則五錢至一兩止

十味香需飲 即前方加入參甘草黃耆木瓜陳皮白朮茯苓

黃連香需飲 即香需飲加黃連同炒黃色

葉仲堅曰 飲與湯稍有別。服有定數者名湯。時時不拘者名飲。飲因渴而設。用之於溫暑則最宜者也。然與其有水患而治之。暑先選其能汗能利者用之。乎香需芳辛溫能發越。陽氣有微上微下之。功便然。治暑者君心以解表利小便。佐厚朴以除溼。扁豆和中。合而為飲。人於胃熱去而溼不留。內外之暑證。悉除矣。若心煩口渴者。無勞豆加黃連。名黃連香需飲。加茯苓甘草。人於胃熱去而溼不留。內外之暑證。尤不可服。今人不知暑傷元氣。概用以代茶。是開門揖盜也。

柴胡去半夏加栝蔞湯全 治瘧病發渴者亦治勞瘧

柴胡兩八 人參 黃芩 甘草各三兩 栝蔞根兩四 生薑兩二 大棗十枚

右七味用水一斗二升。煮取六升。去滓。煎取三升。溫服一升。日二服。

徐忠可曰 小柴胡為少陽主方。湯易半夏加栝蔞根。亦治少陽成法也。攻補兼施。故亦主勞瘧。

王晉三曰 夏性滑利。發渴者。由風火內淫。劫奪津液而然。奚堪半。

柴胡桂薑湯全 治瘧寒多微有熱或但寒不熱

柴胡斤半 桂枝三兩 乾薑兩二 栝蔞根兩四 黃芩兩三 牡蠣二兩 甘草二兩

右七味以水十二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。

王晉三曰 即用柴胡和少陽之陽。即用黃芩和裏。用桂枝和太陽之陽。即用牡蠣和裏。用乾薑和陽明之陽。重於花粉者。陰病之。痰以救液為急務也。

重於花粉者。陰病之。痰以救液為急務也。

痰以救液為急務也。

痰以救液為急務也。

痰以救液為急務也。

趙氏曰用柴胡為君發其鬱伏之陽黃芩為佐清其半裏之熱桂枝甘草所以通肌表之痲括
清脾湯治熱多陽瘧

青皮 厚朴 柴胡 黃芩 半夏 甘草 茯苓 白朮 草果

石九味加薑三片水煎服

柯韻伯曰瘧為少陽病治分六經邪留於募原有遠近之殊其發有虛實先後之異而此湯之治瘧實以積之不磨者亦因脾之不運也胃主脾之輸而胃為脾之表凡欲清脾必先平胃青皮厚朴草果皆氣味兼厚之品取以倒陽明之倉正利脾陰之輸而為痞積之積必先平胃青皮厚朴草果皆氣味兼厚之品取以倒陽明之倉正利脾陰之輸而為痞積之積必先平胃

為瘧積之本矣必用芩柴以清之更合於少陽之治然此為土中瀉大不是直攻少陽乃清脾之義也

免因虛而刺甘朮之必須又防微杜漸法耳

白頭翁湯熱痢下重者此湯主之

白頭翁 黃連 黃芩 秦皮 兩各三

石四味以水七升煮取二升去滓温服一升不愈再服

柯韻伯曰三陰俱有下利證自利不渴者屬太陰是藏有寒也自利渴者屬少陰以下焦虛寒津液不升

也重濕熱穢氣引水自救也惟厥陰下利屬於熱以厥陰主肝而司相火肝王則氣上撞心火鬱則熱利下

也也平瀉飲水厥陰病則清濁之風秦皮木小岑高得清陽上升之象為臣是以厥陰風木風動則木搖而火王

也也黃連瀉君火可除上焦之渴是謂下者舉之寒因熱用法久利則用烏梅丸之酸

也也二利用此方以升散大是謂下者舉之寒因熱用法久利則用烏梅丸之酸

黃芩湯傷寒 太陽與少陽合病自下痢者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯若傷寒本自寒下醫

復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃芩黃連人參湯主之

黃芩 二兩 甘草 芍藥 各二 大棗 十二枚

方方集解

右四味以水一斗。煮取三升。去滓。温服一升。日再。夜一服。此熱利之主方。

黃芩加半夏生薑湯傷寒論 即前方加半夏生薑三煎服法同。

程郊倩曰此之合病者頭痛胸滿口苦噤乾目眩或往來寒熱脈或大而弦半表之邪不待太陽傳過而用黃芩湯清熱益陰半裏清而半表自解矣

柯韻伯曰太陽少陽合病是熱邪已入少陽之裏膽火上升移熱於脾故自下利與黃芩湯酸苦相濟以參以補中兼生薑飲則嘔故仍加半夏生薑

乾薑黃連黃芩人參湯寒論 乾薑黃連黃芩人參各三

右四味以水六升。煮取二升。分温再服。瀉心湯。下四方皆以黃芩為主。

柯韻伯曰治傷寒吐下後食入口即吐此寒邪格於上焦也雖不痞鞭而病本於心故用瀉心之半乾薑以散上焦之寒芩連以清下食入口即吐此寒邪格於上焦也雖不痞鞭而病本於心故用瀉心之半

胃虛不堪半散不用甘草大棗者嘔不宜入口即吐是為食格此肺氣胃氣受傷之別也入口即吐不使留乃火炎上之象故若寒倍於辛熱不名瀉心者以瀉心湯專為痞鞭之法耳

要知寒熱相結於心下而成痞鞭寒熱相阻於心下而成心湯源同而流異也

苓桂甘朮湯金匱 心下有痰飲胸脇支滿目眩此方主之短氣有微飲當從小便去之此主之腎氣丸亦主之

茯苓四兩 桂枝 白朮各三兩 甘草一兩

右四味以水六升。煮取三升。分温三服。小便則利。

趙以德曰靈樞謂心胞絡之脈動則病胸脇支滿者謂痰飲積於心胞其病則必若是目眩者痰飲阻其開經絡痰水得温則行故以布水精於上也茯苓治痰飲積於心胞其病則必若是目眩者痰飲阻其何也蓋桂枝之辛得甘則佐其發散復益土以制水且得茯苓則不瀆滿而反泄滿本單曰甘草能下氣

開經絡痰水得温則行故以布水精於上也茯苓治痰飲積於心胞其病則必若是目眩者痰飲阻其何也蓋桂枝之辛得甘則佐其發散復益土以制水且得茯苓則不瀆滿而反泄滿本單曰甘草能下氣

何也蓋桂枝之辛得甘則佐其發散復益土以制水且得茯苓則不瀆滿而反泄滿本單曰甘草能下氣

何也蓋桂枝之辛得甘則佐其發散復益土以制水且得茯苓則不瀆滿而反泄滿本單曰甘草能下氣

何也蓋桂枝之辛得甘則佐其發散復益土以制水且得茯苓則不瀆滿而反泄滿本單曰甘草能下氣

何也蓋桂枝之辛得甘則佐其發散復益土以制水且得茯苓則不瀆滿而反泄滿本單曰甘草能下氣

利矣。關門自。岑桂末甘湯之輕清以通其陽。陽化氣則水飲停畜呼吸不利而然也。全匱並出二本妙義益彰呼氣之短用。木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防已湯。全。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑其脈沈緊得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主。之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

喻嘉言曰。治肺氣所傳之府。蓋支飲上入於膈。逼近心肺。與援腎邪。本文云。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑。其脈沉緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防已湯。主之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

右五味以水六升。先煮四味。取二升。去滓。納芒硝。再微煎。分溫再服。微利則愈。

右四味以水六升。煮取二升。分溫再服。

木防已去石膏加茯苓芒硝湯。全。即前方去石膏加茯苓。兩。芒硝。三。合。

補肺阿膠散。乙。止咳生津。

阿膠。一兩。馬兜鈴。煨。惡實。炒。甘草。炙。各。一兩。杏仁。七。錢。

右加糯米一合。水煎服。按此方治小兒哮喘。最效。

程郊倩曰。痰帶紅線。嗽有血點。日漸成癆。緣肺處臟之最高。葉間布有細竅。氣從此出入。呼吸成液。灌既

道也。用馬兜鈴者。清竅熱也。糯米以補脾。母氣到則肺自輕。清無礙矣。

痰帶紅線。嗽有血點。日漸成癆。緣肺處臟之最高。葉間布有細竅。氣從此出入。呼吸成液。灌既

蘇子降氣湯方 治虛陽上攻氣不升降上感下虛痰涎壅盛胸膈噎塞并久年肺氣至效

蘇子 半夏各二錢 前胡 甘草各二錢 厚朴 陳皮各八錢 當歸二錢 沉香七錢 薑片三片

右水煎不拘時服若虛冷人加肉桂五分黃耆一錢

唐容川曰氣即水也水凝則為痰水泛則為飲痰飲留滯則氣阻而為喘效蘇子生薑半夏前胡陳皮宣

草以緩其急出氣者肺也納氣者腎也故用沉香之納氣入腎或肉桂之引火歸元為引導

清燥救肺湯 治臆鬱喘嘔

桑葉三錢 石膏二錢 甘草一錢 胡麻仁炒研 阿膠分 人參分 杏仁七分 去皮

枇杷葉一片 麥冬二錢

右九味以水一椀煎六分頻頻二三滾熱服

喻嘉言曰按諸氣喘鬱之屬於肺者於肺之燥也而古今治鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之燥者

屬之中下而惟喘屬之上所以亦無此方及於肺之燥也而古今治鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之燥者

有能清金滋水以苦寒而不用至如苦寒降火之藥尤在肺大約以胃為主胃土為肺之母

錢耳倘更以苦寒下其氣傷其胃其尚生火之藥尤在肺大約以胃為主胃土為肺之母

柯韻伯曰清方用香燥之法品氏宗其旨集源潤劑可製燥救肺湯用醇知故無遺滋涼有石潤品冬

東西方之清方用香燥之法品氏宗其旨集源潤劑可製燥救肺湯用醇知故無遺滋涼有石潤品冬

之源源而金有所不燥則無以食氣而相生之母令子虛矣取阿膠子病則母虛用甘草滋陰補毛上通主氣

生之肺藥而經霜之桑葉非肺家之肝藥乎其平之二葉煎東方色入通於肝者外應毫毛固通水氣

佐之謂也若謂實大可瀉而久服必鬱不開而大愈熾皮聚毛落喘而不休此名之救肺而可法

防已茯苓湯金 皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者主之

防已 黃耆 桂枝 甘草 茯苓

右五味以水六升。煮取二升。分溫三服。

徐忠可曰：藥亦同防已黃耆湯。但去朮加桂。芍藥者。風水之濕。在經絡近內。皮水之濕。在皮膚近外。故但以

麻黃附子湯。水之為病。其脈沉。小屬少陰。浮者為風。無水虛脹者為氣。水發其汗即已。脈沉者宜麻

黃附子湯。浮者宜香子湯。金匱注云。杏子湯未見。恐是麻黃杏仁甘草石膏湯。

麻黃 兩三 甘草 兩二 附子 一枚

右三味以水七升。先煮麻黃。去上沫。納諸藥。煮取二升半。溫服八分。日三服。發汗為治水要訣。此乃發腎水之汗也。

陳元犀曰：師言脈沈。少陰。用附子。溫經散寒。主石水之病。即可知。脈浮。屬太陽。用杏子。散大陰之氣。

即麻黃杏仁甘草三味。為變其脈。症言之也。恐石膏之凝寒。大有關於脾胃。故不可用焉。余以為杏子湯。知是。否且俟後之學者。

牡蠣澤瀉散 傷寒論 大病瘥後。從腰以下有水氣者。主之。

牡蠣 兩 澤瀉 兩 括蔞根 兩 蜀漆 兩 葶藶 兩 高陸根 兩 海藻 兩

右七味。異搗。下篩。為散。更入白中。治之。白飲和服。方寸匕。小便利。止後服。日三。

鄒潤安曰：牡蠣澤瀉散。證水蓄於下。上焦之氣。不能為之化。故類萃商陸葶藶。以從上下。下

散治腰以下。水氣上行。括蔞牡蠣。則一以上。濟其清。一以下。召其濁。而使之化耳。又曰：牡蠣澤瀉

開泄。方能得力。用括蔞根者。恐行水之氣。遇融。有傷上焦之陰。仍使之從脾胃及陰。還歸於上。如常山之蛟

擊其首。則尾應。擊其尾。則首應。不殊也。

十水丸 千金翼 第一之水。先從面目腫遍一身。名曰青水。其根在肝。大戟主之。第二之水。先從心腫。名曰赤水。其根

在心。葶藶主之。第三之水。先從腹腫。名曰黃水。其根在脾。甘遂主之。第四之水。先從脚腫。上氣而

欬名曰白水其根在肺。藁本主之。第五之水先從足跌腫名曰黑水其根在腎。連翹主之。第六之水先從面至足腫名曰元水其在膽根芫花主之。第七之水先從四肢起腹滿大身盡腫名曰風水其根在胃。澤漆主之。第八之水先四肢小腫其腹獨大各曰石水其根在膀胱桑根白皮主之。第九之水先從小腸滿名曰暴水其根在小腸巴豆主之。第十之水乍盛乍虛乍來乍去各曰氣水其根在大腸赤小豆主之。

石十病藥皆等分與病狀同者則倍之白蜜和先食服一丸如小豆日三欲下病者服三丸弱者當以意節之。十水之名病源亦詳載其狀今立此十方想當時本有此分別也姑存之。

犀角地黄湯千金治傷寒及溫病應發汗而不汗之內蓄血者及鼻衄血不盡內餘瘀血大便黑面黃

消瘀血

犀角兩一 生地黃兩八 芍藥兩三 丹皮兩二

右四味咀以水九升煮取三升分三服喜妄如狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脈大來遲腹不

滿自言滿者為無熱但依方二味不必加

柯韻伯曰氣為陽血為陰陽密乃固陽盛則傷陰陰平陽秘陰虛者陽必湊之矣故氣有餘即是大入血室血不營經即隨逆氣而妄行上升者出於口鼻下陷者出於二便雖有在經在府之分

要皆心肝受熱所致也心為營血之主心火旺則血不寧故用生犀生地酸鹹甘寒之味以清君火肝為

蔽血之室肝火旺則無氣故陰不足者當補之以味勿得反傷其氣也若用芩連膽

失則陰虛陰虛則無氣故陰不足者當補之以味勿得反傷其氣也若用芩連膽

草梔相以瀉其氣則陽之刺者若從火化陽已衰者氣從苦發燎原而飛越矣

四生丸方類 治吐血衄血血熱妄行
生荷葉 生艾葉 側柏葉 生地分等
右搗爛丸如雞子大每服一丸水煎去滓服以凡煎湯亦一法

柯韻伯曰 心腎不交。則五臟齊損。陰虛而陽無所附。則火炎上。其陽盛則陽絡傷。故血上溢於口鼻也。凡所以全其水氣。不經火煮。更以速於火。令葉法震入肺家。而和藏血之室。五藏安堵。則水清。肺經而獨爛為丸。衛之氣。艾葉芳香。入脾胃。而生血之司。荷葉法震入肺家。而和藏血之室。五藏安堵。則水清。肺經而獨爛為丸。陽秘而血歸經矣。是方也可暫用以過安行之。熱血如多用。則傷營。蓋血得寒則凝。血不凝則散。而新血不生也。設但知清大涼血。而不用歸皮。養榮等劑。以善其後。鮮有不綿連。歲月而斃者。非立方之不善。妄用者耳。過

黃土湯 全

治下血。先便後血。此遠血也。

甘草

乾地黃

白朮

附子

阿膠

黃芩

各三

兩

灶中黃土

斤半

右七味。以水八升。煮取三升。分溫三服。

唐宗海曰

補血者。脾之所統也。先便後血。乃脾氣不攝。故便行氣下泄。而血因隨之。以下方用竈土。草朮。建而膠熟地。又滋其既虛之血。合計此方。乃滋補氣血。而兼用溫清之品。以和之。為下血崩中之總方。古皆目為聖方。不敢加減。吾謂聖師立法。指示法門。實則變化隨宜。故此方熱症可去。附子再加清。蔞寒症可加溫藥。

赤小豆當歸散 金匱

治下血。先血後便。此近血也。

赤小豆

三升。浸令芽出。晒乾。

當歸

右二味。杵散。漿水服。方寸匕。日三服。

唐宗海曰

此治先血後便。即今所謂臟毒。與痔瘡相似。故用當歸以活血。用赤豆色赤入血分。發芽則能疏利血中之絡。使血解散。則不聚結。肛門赤豆芽又能化血成膿。皆取其疏利之功。癰膿故多用之。俱用漿水服。

黃連湯 傷寒論

傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。主之。

黃連

甘草

乾薑

桂枝

去皮各

人參

兩

半夏

大棗

十二

右七味。以水一斗。煮取六升。去渣。溫服一升。日三夜一服。邪氣寒氣並用。

傷寒表不發熱而胸中有熱是其人未傷寒時素有蓄熱也熱在胸中必上形頭面故寒邪不得上干吐
 焦實必中氣虛故寒邪從胸而入胃中於膈則入少陽此類是也凡邪在少陽法當柴胡主治
 此不往來寒熱病不在半表則柴胡不中與之胸中為君瀉心之熱姜桂去胃中之寒甘棗緩胸中之
 降故炎上而欲嘔人參補虛雖無寒熱往來於外而有寒熱相搏於中所以寒熱並用攻
 痛兼施仍不離少陽和解之法耳此症在太陰少陽之間此方兼瀉心理中之劑
 溫脾湯本方 主治錮冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先取去然後調治不可謂虛以養病也

厚朴 乾薑 甘草 桂心 附子 各二 大黃錢四

右六味以咀取一兩水二鍾煎六分頓服不可謂虛以養病此千

喻嘉言曰許叔微製此方深合仲景以溫藥重下之法其大黃止用四錢更為有見夫錮冷在腸胃而泄

病人舊微瀉者梔子湯中寧敢用上黃以溫藥重下之法其大黃止用四錢更為有見夫錮冷在腸胃而泄
 故也即是觀之腸胃網冷之泄瀉而可恣用大黃耶便利設當行大黃芍藥者宜減之以其胃氣弱易動
 或至轉增裁酌用之真足法矣

備急丸金匱 治寒氣冷食稽留胃中心腹滿痛大便不通

大黃 乾薑 各二 巴豆 一兩去皮 研如脂

右先搗大黃乾薑為末納巴豆合搗千杵和蜜丸如豆大藏密器中勿洩氣候用每服三四丸煖水

或酒下又主中惡心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤如卒死者捧頭起灌令下須臾當差不差更與

三丸當腹中鳴吐利便差若口噤者須化從鼻孔用葶管吹入自下於咽此溫下之法口噤而不

柯韻伯曰大便不通當分陽結陰結陽結有承氣更承之結陰結又製備急之方金匱用此治中惡當知

腸胃冷積大黃通地道又能解巴豆毒是有師也乃微仲景方散而加峻者歟白散治寒結在胸故用溫
 梗佐巴豆為吐下兩解法此寒結腸胃故用大黃佐薑巴以直攻其寒世徒知有溫補法而不知有溫下
 之治所以但講虛寒實也

麥冬湯金匱 火逆上氣咽喉不利止逆下氣此主之

麥冬 升一

半夏 升七

人參

甘草 各二

粳米 合三

大棗 十二

右六味以水一斗二升煮取六升濕服一升日三夜一服

喻嘉言曰

此方治胃中津液乾枯虛火上炎治本之良法也夫用清肺胃之火若大逆其仍用竹葉石膏加味也考無胃氣則死胃氣者肺之母也本草有正氣不致津液不生不維無益而反害之矣凡肺病有胃氣則生者謂肺藉其豁痰豁疾為肺之母也然有試於大上氣謂肺藉其清涼而反害之矣凡肺病有胃氣則生法於麥冬人參甘草大棗統米大補中氣以生津液津液既中又增入半夏辛溫之味以開胃行津而助潤肺宜特用其利咽下氣哉顧其利咽下氣非半夏之功實善用半夏之功矣

桂枝加厚朴杏仁湯

喘家主之

於桂枝湯內加厚朴杏仁

治太陽下後微喘而表未解者夫喘為麻黃症方中治喘者功在杏仁桂枝本不治喘此因芍藥之欬下後表雖不解微喘已疎則不當用麻黃而宜桂枝所以宜桂枝者以其中有芍藥也既有杏仁以降氣故凡喘家則當用麻黃湯而作桂枝湯者如厚朴杏仁為佳法矣

麻黃杏仁甘草石膏湯

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者此湯主之

麻黃四兩 杏仁五十個 甘草二兩 石膏半斤

石四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升去滓溫服一升

柯韻伯曰

此溫病發汗遂邪之主劑也凡冬不藏精之人熱邪內伏於藏府至春風解冰伏去薑棗熱而未滿三日桂枝下咽陽盛則汗之於外者此法也於此時發於熱風陰浮入名風溫其脈表陰俱熱伏邪自出云云

身重滿三日桂枝下咽陽盛則汗之於外者此法也於此時發於熱風陰浮入名風溫其脈表陰俱熱伏邪自出

熱而未滿三日桂枝下咽陽盛則汗之於外者此法也於此時發於熱風陰浮入名風溫其脈表陰俱熱伏邪自出

柯韻伯曰此溫病發汗遂邪之主劑也凡冬不藏精之人熱邪內伏於藏府至春風解冰伏去薑棗熱而未滿三日桂枝下咽陽盛則汗之於外者此法也於此時發於熱風陰浮入名風溫其脈表陰俱熱伏邪自出

法溫病分溼渭處合觀濕病提綱而大旨顯矣此大青龍之變局也

青龍白虎皆賴以建功然用之謹甚故青龍以惡寒脈緊兼用姜桂以扶衛外之陽白虎以汗後煩渴兼用參朮以保胃腕以建功也此但熱無寒佐姜桂則脈流薄疾斑黃狂亂作矣此但熱不虛加參朮則食入於陰氣長於陽語語陽脹矣凡外感之汗下後之證治矣此為實溫病在存陰裡者不必慮其亡陽也然此為解表之劑若無喘語難出等證則有白虎湯之證治利而不治喘要知溫病下後無利不止證葛根黃連表裡之虛相須相濟者也若葛根黃連黃芩湯則治利而喘要知溫病下後無利不止證葛根黃連表裡非治溫藥且麻黃專於外達與葛根之和發表不同石膏甘瀉與黃連之苦燥懸殊同是涼解表裡有毫釐千里之辨矣

茵陳蒿湯 穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃為穀疸此湯主之

茵陳蒿 兩六 梔子 十四 大黃 兩二

右三味以水一斗先煮茵陳減六升納二味煮取三升去渣分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

柯韻伯曰 太陽陽明俱有發黃證俱頭汗而身無汗則熱不外越小便不利則熱不下泄故痰熱在裏然裏有不用梔子相皮湯乃清大法陽明之裏當汗而發之故用麻黃連翹赤豆湯為涼散法心胸是太陽陽明

之裏當寒以勝之用梔子相皮湯乃清大法陽明之裏當汗而發之故用麻黃連翹赤豆湯為涼散法心胸是太陽陽明北方之色經冬不凋傲霜凌雪偏受火寒之氣故能除熱邪留滯之於內故立本方是逐散法茵陳身內外痰熱悉從小便而出腹滿自減腸胃無傷仍合引而竭之此陽明利水之聖劑也仲景治津液渴飲有四法本太陽轉屬者五苓散散微發汗以散水氣大煩渴小便不利者白虎加參清火而兼用猪苓因二苓為氣化之品而小便復利也此陽明利水之聖劑也仲景治法胸有成竹矣竊思仲景利小便必用氣化之品小便復利也此陽明利水之聖劑也仲景治法兼用猪苓因二苓為氣化之品而小便復利也此陽明利水之聖劑也仲景治法不出而渴者津液先虛更不可用明燥此推陳利小便之妙法也此陽明利水之聖劑也仲景治法與芒硝之峻利則大黃但可以用潤胃燥而大便之不遠行可知故必一宿而腹始減黃從小便去而不由大腸中景立法神

麻黃連軹赤小豆湯 治傷寒痰熱在裏身必發黃此主之

麻黃 二兩 連軹 兩二 赤小豆 升一 杏仁 粒四十 甘草 兩二 生梓白皮 升一 生薑 兩二 大棗 枚十二

右以潦一斗先煮麻黃去沫納諸藥煮取三升分溫三服此方治傷寒餘邪未盡

柯韻伯曰 治太陽傷寒妄下熱入但頭汗出小便不利身發黃此亦小豆梓皮為君而冠以麻黃者見

傷營衛不和故耳夫皮膚之濕熱不散仍當發汗而小豆赤色心家數也酸甘味之

于理熱邪上炎故頭汗無汗之處濕熱蒸身必發黃水氣上溢皮膚故小便不利此心為熱所

中而散通經絡行津液而為君佐連翹杏仁白皮所製也小豆赤色心家數也酸甘味之

能降火而除濕取而清之半日服盡者急方通劑不必緩也夫麻黃一劑發於中清火而定喘君以減曲盡麻

黃連阿膠湯論 治少陰病心中煩不得卧

黃連 兩四 黃芩 兩一 芍藥 兩二 阿膠 兩三 雞子黃 枚二

右五味以水六升先煮三物取二升去渣納阿膠烺盡少冷納雞子黃攪和溫服七合此治腎氣冲

故清心火以納腎氣

柯韻伯曰 此少陰之瀉心湯也凡瀉心必藉連芩而導引有陰陽之別病在三陽胃中不和而心下痞鞭

亦不得用大黃以傷胃矣用連芩以直折心火佐芍藥以收斂神所以扶陰而抑陽也然以甘助痞鞭

使病清而不至不得臥以微細之病脈而反見其煩手非得氣血之熱不除難於腎可以補坎宮之火色入通於心可以

補心中之血用生者攪和取潤下之義也鹽皮煎少方之熱入通於腎可以補坎宮之火色入通於心可以

日火位之下陰精承之陰手陽秘精神乃治斯方之謂歟

酸棗仁湯 治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁 兩五 甘草 兩一 知母 兩二 茯苓 兩二 川芎 兩二

右五味以水八升先煮棗仁取六升納諸藥煮取三升分溫三服者之多不審也此方外臺有加

乾姜者亦

可採取

羅東逸曰 經曰肺藏魄人卧則血歸於肝又曰肝者罷極之本又曰陽氣皆煩則張精絕故罷極必傷宜補用粟仁至二升以生心血養肝則血不虛勞虛煩不得卧明矣粟仁酸平應少陽木化以川芎之辛散補勞極則火發於腎上行至肺則肝不悶而仍不得眠故以甘緩芩芎之流肝泄氣所謂以土條之然終恐將水壯全清而魂自甯斯神凝魂藏而魄且靜矣此治虛勞肝極之神方也

溫膽湯 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服

半夏 竹茹 枳實 橘皮 生姜 甘草

右六味 以水八升煮取二升分三服 又不一不濕之症 方中一味生姜已足散胆中之寒庸醫

羅東逸曰 膽為中正之官清靜之府喜溫惡寒煩擾喜和 不喜變驚蓋東方木德少陽溫和之氣也若

官以煖蒸而不宣也熱嘔吐苦焦方靜以竹茹清胃氣且以蘆根且以甘草生三焦調胃而少陽平三焦正而

下以枳實除三焦之疾壅利茯苓平漆致中焦之清氣且以蘆根且以甘草生三焦調胃而少陽平三焦正而

少陽正胆家有不清宣而和者乎和即溫也濕之者實涼之也 若胆家真畏寒而怯屬命門之火衰當與

乙癸同源 而治矣

磁珠丸 治神水寬大漸散昏如霧露中行漸觀空中有黑花觀物成二體及內障 神水淡綠色

磁石 辰砂 神麴

右三味 更以一兩水和作餅煮浮入前藥煉蜜丸每服十九丸加至三十九丸空心米飲下

王又原曰 經曰五藏六府之精皆上注於目則目之能視者氣也目之所以能視者精也腎惟藏精故神

結有陽氣以發於腎則洞悉而離照故神光發於心先發陽而外映有短少昏既內障諸證所由作也磁石直疑

入腎經收散失之性引鐵吸肺全之義歸藏腎水氣神光短少昏既內障諸證所由作也磁石直疑

鑿火能燭水相濟而光華不四射與然目受藏府之精其治耳聾耳鳴等症亦以鎮壓之功

制虛陽之 則不收賴鎮壓之品疾收而吸引之故為急救之劑也

柯韻伯曰此丸治癩癘之聖劑。蓋狂癲是心腎脾三藏之病。心藏神。脾藏意。與智腎藏精。與智。心者神明。而屬火。真水藏其中。若天不明。則十二官危。使道閉塞。而不通。形乃大傷。即此謂也。然主何。以不明也。心者神明。而空竅。故目多妄見。而作此奇疾也。非金石之重劑。以鎮之。狂必不止。朱砂靈南方之赤色。入通於心。能降無根之火。而安神。明磁石。稟北方之黑色。入通於腎。吸肺金之氣。以生精。墜炎上之火。以入志。且食入重而主降。性寒而滋陰。志同道合。奏功可立。俟。神馳。推陳致新。上交心神。下達腎志。以生意智。且食入於陰。長氣於陽。是用神馳之旨。手煉蜜和丸。又甘以緩之矣。

石斛夜光丸 治神水寬大漸散。昏如霧露。空中有黑花。覩物成二。神水淡綠。淡白色者。
天門冬二兩 兔絲子七錢 人參 茯苓 各二 甘菊 山藥 枸杞 石斛 杏仁 各錢
麥冬 熟地 生地 各一 肉從蓉 青箱子 羚羊角 錢
防風 枳殼 烏犀 錢 牛漆 七錢

羅東逸曰此方為陽衰陰弱。不能升精於目。而設。故自科與千金磁珠丸並重。治證亦同。然磁珠為鎮壓。精明者也。若腎肝虛。則陰弱。不能攝陰。而浮散。神先於外。以為致神水寬大。觀物成二。此其治法。其養精氣。皆上於目。而為之精。故夫目之精明者。陰陽合傳。而為於兩眸。而繼明。如晝夜矣。是方先補腎肝。以二冬二地。免絲。枸杞。五味。牛漆。從蓉。群隊。滋陰之品。以歸精。陰懷精。飲氣。安神。養血。此壯水之主。亦所以生木也。復以人參。炙草。茯苓。山藥。培中。官。使調合。陰陽也。佐之以羨。藜。甘。菊。川。芎。枳。殼。防。風。行。肝。達。氣。青。箱。決。明。子。解。經。散。帶。黃。連。烏。犀。為。角。清。火。泄。熱。合。利。以。速。也。

礞石漆痰丸 治實熱老痰之峻劑。虛寒者不可用。
黃芩 大黃 酒蒸各八兩 礞石 一兩 煅消版過 沉香 五錢 忌火

右四味為細末。水丸。川椒。大。量。人。大。小。用。之。用。溫。水。一。口。送。過。咽。即。仰。臥。令。藥。徐。徐。而。下。半。日。不。可。飲。食。勿。起。身。行。動。言。語。待。藥。氣。自。胃。口。漸。下。二。腸。然。後。動。作。飲。食。服。後。喉。間。黏。壅。滯。不。快。此。藥。力。

右為末每服三錢加竹葉生蜜煎此瀉中上二焦之火即調胃

余師愚曰熱淫於內治以鹹寒佐以甘故以連翹黃芩竹葉薄荷

天水散河間一名益元散治夏時中暑熱傷元氣內外俱熱無氣以動煩渴欲飲腸胃枯涸者又能催生

下乳精聚水蓄裏急後重暑注下迫者宜之

桂府滑石六兩甘草一兩辰砂三錢

右為細末新汲水一碗調服三錢滑利清涼通連水道而不傷陰所以為佳

柯韻伯曰元氣虛而不支者死和氣盛而無制者亦死今熱傷元氣無氣以動斯時用參芪以補氣

味純粹之品以主之滑石稟土沖和之氣行西方清肅之令使傷元氣善補虛者不使助入和氣必得

乙草之精而具流走之性異於石膏之凝滯能上清水之源下通水道蕩除六府之邪熱能使勝熱甘而不傷脾含天

擾中神明不妄必得砂以鎮之則神氣可以為佐復涼水以滋之則和熱自除矣此補心之陽寒亦通

行也至於熱利初起裏急後重者宜之滑氣可以去暑也催生下乳精聚水蓄裏急後重暑注下迫者宜之

越鞠湯丸丹治一切濕痰食火氣血諸鬱

香附 蒼朮 撫芎 神麴 山梔 仁 白滾湯下

右以水煎服或作丸菜豆大每服百丸

季楚重曰內經論木鬱達之五句前聖治鬱之法最詳所謂鬱者清氣不升濁氣不降也然清濁升降皆

收肺氣焦滿出肺氣使陰失治節之令不惟生氣不升收氣亦不降上下不交而鬱成矣故經云大陰不

為嘔為脹滿又云諸氣膈鬱皆屬於肺然肺氣之布必由胃氣之運必入肝膽以助發強胃而

資生神氣佐化莫非胃氣不宣三焦失職所致方中君以香附快氣調肺之運必入肝膽以助發強胃而

木尤甚前朝而警衛和太陰之鬱清氣下肅而精氣化此丹溪因五鬱之法而變通者也然五鬱之中全

四磨飲生治七情傷感上氣喘急胸膈不快妨悶不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸空心温服濃汁使藥存留胸中不即下達亦古製方之法也皆能為病然愈於壯者之行

王又原曰

經云聖人普氣如持至寶庸人役物而反傷太不和此情隨所感皆能為病然愈於壯者之行不暫快初投而於弱者之久而不應矣夫呼出為陽吸入為陰肺氣旺則清肅下行歸於腎陰是氣有所攝不復而上逆若正氣既衰邪氣必盛縱欲剖堅破滯即氣必不伏方用人參補其正氣沉香則取其氣而後以柳馬藥從而導之所謂實必顧虛瀉必先補也本方補肺氣養正温腎氣鎮攝歸根喘急逸其氣之遠氣味齊到效如桴鼓矣其下養正丹者煅腎藥也本方補肺氣養正温腎氣鎮攝歸根喘急逸已

指迷茯苓丸 治中脫留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移

茯苓二兩 半夏一兩 枳殼炒半兩 風化硝半兩

右為末薑汁和丸桐子大每服三十丸薑湯下按方極和平而義精效速方內半夏宜生研澄粉貼

柯韻伯曰

痰飲之本皆水也水入於胃游溢精氣上輸於脾此自陽入陰也脾氣散精上歸於肺此也若陰陽不和清濁相干胃氣亂於中脾氣難於升肺氣滯於降而痰飲隨作矣痰與飲同源而有陰陽之別陽盛陰虛則水氣凝而為痰陰虛則水氣溢而為飲除痰者降氣清火是治其標補陰利水是治其本也滲飲者降氣燥濕是治其標温腎利水是治其本也除痰者降氣清火是治其標補陰利水是治其燥溼茯苓滲溼風確軟堅枳殼利氣別於二陳之甘緩遠於礞石之峻悍亦平胃之劑也

養心湯 治心神不足夢寐不寧驚悸健忘等症
白芍 當歸 人參 遠志 麥門冬 黃芩 山藥 艾實 蓮鬚 酸棗仁 茯神 石蓮子

右十二味水煎服

吳子宣曰

難經云心不足者調其榮衛榮衛者血脈之所出而心主之故養心者莫善於調榮衛也然榮於離以成衛並出中州榮注精於肝而濁氣歸心衛氣通於肺而為心相腎受心營肺衛之歸而又升精於人參從神以神養心兼仁歸芍以母養肝山藥門冬黃芩以清養肺蓮鬚艾實石蓮遠志以滋養精而升之於是神明之主泰然於天鈞之上矣此養心之旨也

防風通腎散 風熱壅盛表裏三焦皆實者此方主之

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷 麻黃 連翹 芒硝 石膏 黃芩 桔梗

滑石 甘草 荆芥 白朮 枳實 生薑

右為細末每服三錢

吳鶴臯曰

防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荆芥薄荷清上藥也風熱之在顛頂者得之由鼻而泄大黃芒硝通利藥也風熱之在腸胃者得之由後而泄滑石枳實清胃氣也連翹黃芩長於治火此方得之在決瀆者得之由溺而泄風淫於高肺胃受風熱之由甘草白朮石朮和胃氣也健脾胃而連翹黃芩長於治火此方之旨詳於悲哉亦治失下發熱三焦火實全方除硝黃各曰雙解散表有風麻黃芍藥連翹復有當歸芍藥以和血桔梗白朮甘草以調氣營衛皆和表裏俱暢故曰雙解本方名曰通聖極言其用之妙耳

侯氏黑散 治大風四肢煩重心中惡寒不足者

菊花 白朮 細辛 茯苓 牡蠣 桔梗 防風 人參 礬石

黃芩 當歸 乾薑 芍藥 桂枝

右十四味杵為散酒服方寸匕日一服初服二十日溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷服六十日

止藥積在腹中不下也熱食即下矣冷食自能助藥力

喻嘉言曰

方中取用礬石以固濕者藥使之積留不散以漸填空竅使邪氣不能流此填積腹中不下而熱即行故壅塞不用溫酒調下以開其痺者受矣蓋禁諸熱食惟宜冷食如此再四十日則藥

徐忠可曰

侯氏黑散用參苓歸芍驅內伏之寒兼桔梗黃芩以開提肺熱為臣而加防風桂枝以行脾氣酒力運行周身為使煎薑風盡除新風不受耳必為散酒飲至六十日止又當冷食使藥積腹中不滯下蓋邪漸侵心不惡熱其由陰寒所謂塞其空竅為是良工之理若專治其表裏風邪非不外出而重門洞開出而復入勢將莫禦耳

理若專治其表裏風邪非不外出而重門洞開出而復入勢將莫禦耳

風引湯金匱 除熱癰瘤 巢氏云脚氣宜風引湯

大黃 乾薑 龍骨各四兩 桂枝三兩 甘草 牡蠣各二兩 寒水石 滑石 赤石脂 白石脂

紫石英 石膏各六兩

右十二味杵粗篩以韋囊盛之取三指撮并花水三升煮三沸温服一升此乃臟腑之熱非草木之品所能散故以金石重藥

清其裏

陳元犀曰

大人中風牽引小兒驚癇痰癎正火熱生風五藏元盛及其歸入心其治同也此方用大黃之瀉以堵其路而石藥之中以取乾姜之止而不行者以補之用桂枝甘草以緩其勢又用石藥精神魂魄之紛馳用寒水石以助腎之真陰不為陽光所燦更用紫石英以補心神之虛恐心不明而十矣後人以藥石過多而棄之味孰甚焉

防己地黃湯金匱 治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈浮

防己一分 桂枝一分 防風各二分 甘草一分

右四味以酒一杯浸之一宿絞取汁生地黃二斤咬咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃

汁和分再服此方他藥輕而生地獨重乃治血中之風也此等法最宜細玩

越婢湯金匱 風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大汗者主之

麻黃兩六 石膏半斤 生薑三兩 甘草二兩 大棗十五枚

石五味以水六升先煮麻黃去上沫納諸藥者取三升分温三服惡風加附子一枚本方加白朮四

兩即越婢加朮湯越婢寒散在表之方也

喻嘉言曰

越婢湯者示微發表於不發之方也大率取其通調榮衛麻黃石膏二物一甘熱一甘寒合而用之脾偏於陰則和以甘熱胃偏於陽則和以甘寒乃至風熱之陽水寒之陰凡皆得壅塞其者悉得用之何者中土不和則水穀不化其精悍之氣以實營衛營衛虛則或寒或熱之氣非欲壅塞其壅道而不通於表裏所以任表之風水用之而在裏之水兼渴而小便自利者咸必用之無非欲壅塞其

種子要方

吳江徐大椿著

男女媾精萬物化生胎雖孕於精血實賴先天一氣結成所謂二五之精妙合而凝也惟精凝其血是精勝為男血聚其精是血勝為女駢胎品胎乃精氣之分岐四射而血凝之亦非一路焉男有不可為父者得陽氣之虧女有不可為母者得陰氣之塞故種子之法男以補腎填精為要女以養血調經為先使精血充足經候無愆則男無不父女無不母矣

脈法 督脈生病女子不孕少陰脈微弱濇年少得之為無子中年得之為絕產肥人脈細胞有寒飲故令少子瘦人脈濇衝無餘血故不能孕

治法 男貴養精女宜調血經前腹痛須調氣兼以活血經後腹痛宜補血或兼益氣陰虛者滋陰壯水以調元氣陽虛者補腎扶陽以生精血

用藥 主以四物湯加砂仁香附杜仲續斷血瘀加桃仁原紅花血虛加阿膠黃明膠血熱加山梔丹皮血寒炮姜肉桂氣滯加木香香附氣虛加人參黃耆虛寒秦艽桂虛熱先期湯各隨脈證調治庶克有子

選方 加味種子四物湯 治衝任兩虛不孕脈虛濇者
熟地五錢 當歸三錢 白朮錢半 川芎一錢 白芍錢半 茯苓錢半 阿膠三錢 香附二錢 續斷三錢 艾草五分

水煎去渣冲炒黃砂仁末五分温服
衝任兩虛不能交媾水火是胞中血少氣濇故無以孕精而娠焉熟地補陰滋血當歸養血榮經川芎活衝脈之血白芍斂任脈之陰白朮健脾生血阿膠補血益陰香附調氣解鬱艾草緩中益胃茯苓滲

濕以消子宮積斷續筋以雄經脈也水煎温服稍佐砂仁調胃醒脾使脾胃調和則血室充足而氣無帶濇之患何有衝任不調媾精不孕哉

種子加味四物湯 治血氣兩虛不孕脉虛軟者

熟地 五錢 人參 錢半 白芍 酒炒 白朮 錢半 當歸 二錢 川芎 一錢 茯苓 錢半 菴蓉 酒洗 三錢 紫石英 三錢 醋炒

水煎去渣温服

血氣兩虛少火不振無以薰育胞門故不能媾精而成孕焉熟地補陰滋血人參補氣扶元當歸養血

榮經白朮健脾生血川芎行血海以調經白芍斂陰血以資脉茯苓滲濕清子宮菴蓉扶陽温腎藏紫

石英煖子宮以治年久不孕也水煎温服使腎煖陽回則血氣充盈而經脉榮和天葵如度無不媾精

而成孕矣

調經種玉湯 治血虛挾滯不孕脉澁者

熟地 五錢 吳茱 一錢 醋炒 白芍 錢半 川芎 一錢 當歸 三錢 香附 二錢 酒炒 茯苓 錢半 丹皮 錢半 陳皮 錢半

延胡 錢半 酒炒

水煎去渣温服

血虧挾滯冷熱不調致天葵愆期故不能成孕焉熟地補陰滋血當歸養血榮經川芎活衝脈之血以

調經白芍斂任脉之陰以和絡延胡活血滯香附調氣滯吳茱温肝逐冷陳皮利氣和胃丹皮凉血退

熱茯苓滲濕和中也水煎温服使血活滯行則寒清熱化而天葵如其常度無不媾精而成孕矣如過

期色淡加炮姜肉桂以温經煖血先期色鮮加條苓梔子以清熱凉血此隨症加減之法無不絜絜入扣

經驗育胎丸 治年久無孕脉澁者

熟地 五兩 當歸 酒炒 三兩 白芍 酒炒 兩半 川芎 酒炒 兩 白朮 兩半 香附 酒炒 兩 黃芩 兩半 陳皮 兩半 續斷 酒炒 三兩 砂仁 兩 為末醋丸温酒下三淡錢

血虧挾熱經氣乖和故天癸不調不獲媾精而年久無子焉熱地補陰滋血當歸養血榮經川芎行血中之氣白芍斂經血之陰黃芩清熱涼膈陳皮利氣和胃白朮健脾生血砂仁開胃醒脾香附調氣化解鬱續斷續筋脉壯經也淡醋以丸之溫酒以行之使熱化滯行則經血充而天癸如其常度無不媾精而成孕矣何年久無子之足患哉

婦人歸附丸 治年久無子脉細澆者

香附三兩酒炒當歸三兩酒炒鹿角三兩酒炒黑

為末醋丸溫酒下三錢

衝任虧損血氣不調致生陽不振不能媾精而年久無子焉香附和血調氣當歸養血榮經鹿角黑炒力能扶衝任之陽以燥子宮之寒濕也醋丸酒下使子宮溫暖則生陽振發而經脉滋榮血氣無不調之患年久無不孕之虞矣

附益類仙丹 治無孕脉澆滯者

香附一斤童便製益母一斤焙

為末艾湯丸溫酒下三錢

血凝於絡氣滯於經故天癸不調不能媾精而孕子焉香附理血中之氣力能解鬱調經益母調衝任之血性善生新去宿艾湯以丸之溫酒以行之使子宮溫暖則血活氣行而經脉融和天癸如度豈有不孕之婦乎

金蓮種子方 治年久無孕脉緩數者

熟地五兩當歸三兩白芍兩半川芎一兩黃芩兩半香附兩丹參兩蒼朮兩益母兩砂仁兩

為末入烏骨白毛雞腹內刮淨腸垢酒洗酒煮爛出骨酥爇將藥并全雞焙脆再為末醋煮米糊丸温酒下三五錢

血虧濕熱經氣不調子宮不能清淨故年久難以孕子焉熟地補陰滋血當歸養血榮經白芍斂陰血以資血室川芎行血海以調經脉黃芩清熱涼膈蒼朮燥濕強脾益母草去宿血紫丹參生新血香附調氣解鬱砂仁開胃醒脾也入雞腹酒煮炙脆煮米糊丸復以温酒下蓋雞屬巽佐諸藥入肝補血醋以收之酒以行之使濕熱頓化則血氣調和而衝任蓄泄有權天癸無不如度豈有不能孕子之憂哉

相子建宮丸 治血虛宮冷不孕脉數濡弦微瀆者

熟地三兩 當歸三兩 白芍兩半 川芎錢 阿膠錢 艾葉兩半

為末煉蜜丸温酒下三錢

血海虛子宮冷無以生長化育乎其間故不能媾精而孕子焉當歸養血以榮血海熟地補血以滋衝任川芎行血中之氣白芍斂經中之陰阿膠補任脉之血艾葉煖子宮以調血氣也蜜以丸之酒以行之使血海充足則子宮温煖而衝任化育有權天下無不孕之婦矣

加味養營丸 治無孕脉數虛瀆者

熟地四兩 當歸三兩 白芍兩半 川芎一兩 黃芩兩半 白朮兩半 阿膠錢 香附兩半 麥冬三兩 心酒蒸

陳皮兩半 黑豆三兩 甘草錢

為末煉蜜丸温酒下三錢

血虧氣滯拔熱而心火不生衝任不足故無以媾精而孕子焉熟地補陰滋血當歸養血榮經白芍斂陰血川芎榮血海黃芩清熱涼膈白朮健脾生血阿膠補衝任之陰香附調衝任之氣麥冬清心潤

肺以滋經脈之燥黑豆補腎益陰以填經脈之虛甘草緩中益胃陳皮利氣和中也蜜以丸之酒以下之使心腎交滋則衝任調和而血行熱化氣滯無不調經脈無不清何媾精之不能成孕哉

加味香附丸 治經愆不孕脈濡弦滑者

香附一斤分四分酒浸一宿炒一分 梔子一分 槐汁浸一宿炒一分

熟地八兩 當歸四兩 白芍四兩 川芎二兩 澤蘭四兩 海螵蛸四兩

為末醋酒和丸温酒下三錢

氣滯於經血虧於脈故天葵愆期不能媾精而孕子焉香附尚調氣滯四製足以調經熟地峻補血虛重用可以滋脈當歸榮養血脉白芍收斂經陰川芎行血海以調經脈澤蘭通血脉以益海海螵蛸滋子宮以媾精也醋以丸之酒以下之使滯氣頓化則經血充盈而衝任融和天葵無不如度何患不克媾精而孕子哉

大五補丸 治瘦人無孕脈軟數弦滑者

熟地五兩 人參兩半 天冬二兩 麥冬三兩 蒸去 枸杞三兩 遠志兩半 茯神兩半 地骨皮兩半

益智兩半 鹽炒 葛蒲兩半

為末煉蜜丸温酒下三錢

瘦人火多血少血室常虧不能滋榮經脈故無以媾精而生子焉熟地補陰血以壯水天冬清心肺以益陰人參扶元補氣麥冬潤肺清心遠志交通心腎枸杞補髓填精益智補火通心氣葛蒲開竅豁痰涎茯苓滲濕以清子宮地骨清肌以退虛熱也煉蜜以丸之温酒以下之使陰血日旺則火自潛藏而經脈融和無不媾精而有子矣

種子要方

增損三才丸 治血少無孕脉軟者

天冬三兩去心炒 熟地五兩 人參兩半 遠志兩半 茯苓兩半 鹿角兩半 北味一兩

為末煉蜜丸温酒下三錢 年老加混元衣酒洗炙末 一方加白馬莖酒洗炙末 一方加熟附子鹽

水炒黑 一方加麥冬酒浸蒸 一方加續斷酒炒 一方加沉香磅末蒸

血少經枯不能滋榮百脉故子宮乾澁無以媾精而孕子焉天冬清心潤肺兼能益陰壯水熟地滋補

陰血更能榮養經脉人參扶元補氣遠志通腎交心茯苓滲濕以清子宮北味收斂以滋津液鹿角壯

督脉以煖胞門也蜜丸酒下使血榮經潤則子宮無枯澁之患而天葵如其常度無不媾精而孕育矣

年老加混元衣大補血氣白馬莖之扶陽熟附子之補火麥門冬之潤燥川續斷之接續經脉沉香末

之温融下焦因形定診無不頭頭是道

神效墨附丸 治經愆無子脉軟者

香附四兩 新徽墨四兩 醋四兩 人參四兩 熟地八兩 當歸四兩 川芎二兩 茯苓三兩 木香三兩 艾葉四兩

為末醋丸温酒下三錢

氣血兩虧寒滯不化而子宮枯澁故天葵愆期無以媾精生子焉香附四製以調經氣徽墨醋煨以固

血室人參扶元補氣熟地滋血補陰當歸養血脉以榮經川芎行血海以調經木香調氣化茯苓滲濕

氣艾葉理氣血以祛寒濕也醋以丸之酒以温下使子宮温煖則寒滯自散而血氣完復何致天葵愆

期不能媾精而生子哉

青蒿烏雞丸 治潮熱食少經愆無子脉軟者

青蒿一斤 人參四兩 黃耆四兩 當歸四兩 香附四兩 茯苓二兩 川芎二兩 白朮四兩 丹皮二兩

白芍二兩 鱉甲醋炙四兩 地骨皮三兩 艾葉二兩

製為末取白熟毛烏骨雄雞一隻去腸垢留腹入熟地八兩好酒煮爛去骨全前藥焙脆為末仍用煮雞酒糊熟糯粉乾濕可丸餘酒收入仍用溫酒下三五錢

氣虛不能鼓運其血致熱過經中而潮熱食少天癸愆期故不能生子焉人參扶元補氣黃耆實衛補中白朮健脾土以鼓運乎血當歸養血脉以營運乎經川芎行血中之氣白芍斂經脈之陰香附調氣

解鬱鱉甲散結滋陰牡丹皮涼血以平相火地骨皮清肌以退潮熱茯苓滲濕兼清子室艾葉理血尚煖子宮青蒿解鬱熱而直清肝膽也熟地煮雞得水不同氣引領諸藥扶陰益血鼓運營氣即以煮雞

酒丸仍用好酒送下使氣壯血行則衝任融和而營衛調適其潮熱無不退飲食無不增何患天癸不調不能生子耶

大烏雞丸 治血虛挾熱羸瘦無子脉軟弦數者

生地五兩 人參兩半 黃耆三兩 鱉甲醋炙三兩 熟地五兩 白朮兩半 白芍兩半 柴胡五錢 當歸三兩

智母兩半 鹽炒

製為末用白熟毛烏骨雄雞一隻緝死去毛及腸垢留腸雜同前藥入腹綿線窠縫童便入壺煮爛焙乾骨酥炙共為細末煉蜜為丸百沸湯下三五錢

氣血兩虛挾虛熱而潮熱經愆子宮枯澆故無以媾精而生子焉生地滋陰壯水以涼血黃耆益氣實衛以補中人參扶元補氣熟地滋血壯陰白朮健脾生血當歸散結滋陰當歸養血以潤子宮白芍斂

陰以資血室柴胡升陽散熱并舒肝膽知母清熱潤燥善退寒蒸入雞腹煮焙烘蜜丸之沸湯之使氣血內充則水木同源而血室滋榮子宮無枯澆之愆何患潮熱不退天癸不調豈有不能媾精生子之婦乎

小烏雞丸 治虛冷無子脉細澆者

熟地八兩 吳茱二兩 醋炒 白芍二兩 酒炒 乾姜二兩 當歸四兩 良姜兩半 醋炒 川芎一兩 川椒兩半 補骨脂三兩 鹽炒

荷葉一張

製為末烏骨白絲毛雄雞一隻如前法全入酒煮爛收乾焙骨酥炙共末煉蜜丸温酒下三五錢
衝任虛寒子宮冷乏天癸不能依時而下故無以媾精而孕子焉熟地補血以滋血室當歸養血以榮衝脉吳茱煖子宮以逐冷白芍斂任脉以益陰焦姜温中鼓血良姜温胃逐冷川芎通行血海以調經
川椒補火散寒以煖腎補骨脂補火燥濕炒荷葉和血升陽入雞腹煮爛焙脆共末煉蜜以丸之温酒
以下之使子宮温煖則血室滋榮而寒頓釋衝任融和自然天癸如常無不媾精而孕子矣

紫河車丸 治虛寒不孕脉軟弱者

紫河車一具 白酒洗銀 大熟地八兩 當歸身四兩 白芍藥二兩 酒 冬白朮四兩 製 淮山藥四兩

金香附兩 炒 揀人參四兩 紫石英四兩 醋煨 甘枸杞四兩 蕪艾葉二兩 醋炒 小川芎二兩

各藥同河車陳酒煮爛收乾晒脆為細末蜜丸温酒下三五錢

氣血兩虧子宮不煖致天癸愆期無以孕育而生子焉熟地補陰滋血人參補氣扶元當歸養血榮經
白朮健脾生血川芎行血海以調經白芍斂陰血以和絡香附調氣解鬱山藥補脾益陰蕪艾葉理血
氣以温血室紫石英溢血氣以煖子宮甘枸杞滋培腎藏紫河車大補血氣入酒煮爛收焙煉蜜以丸
之温酒以下之俾血氣內充則子宮温煖而衝任融和天癸無不調自能孕子育而生子矣

調生丸 治年久不孕脉數緊澆者

熟地五兩 當歸三兩 白芍兩 酒炒 川芎一兩 澤蘭二兩 白朮兩半 石斛二兩 乾姜一兩 丹皮一兩 酒炒

肉桂去皮延胡酒炒

製為末淡醋丸温酒下三錢

血虧挾滯冷熱不調致經愆腹痛不能孕生焉熟地補陰滋血當歸養血紫經川芎行血海以調經白芍飲陰血以和脉丹皮涼血熱白朮健脾元石斛補虛退熱乾姜温胃散寒澤蘭通利經脉肉桂温煖營血延胡索化血氣以調和經脉也醋丸以收之酒下以行之便冷熱並化則經氣調和而腹痛無不退天癸無不調何有不能生子之患哉

父附煖宮丸 治虛寒無子脉細澹者

熟地八兩黃耆三兩芡菜一兩當歸四兩官桂二兩白芍二兩川芎一兩香附二兩艾葉二兩續斷三兩

製為末淡醋丸温酒下三錢

氣血兩虧寒滯不化而衝任乖和故天癸愆期腹痛不孕焉熟地補陰滋血黃耆補氣固中當歸養血榮經脉白芍斂陰和血脉芡菜温中逐冷官桂温經散寒川芎行血海以調衝任香附調經氣以理經愆艾葉理血氣芡菜温子宮續斷續筋脉兼調經脉也醋丸以收之酒下以行之使血氣內充則寒滯外散而子宮温煖衝任調和可無不孕之憂何痛經之足患哉

勝金丸 治經遲不孕脉虛弱者

熟地五兩人參兩半白朮兩半茯苓兩半當歸三兩白芍兩半川芎一兩桂心兩半香附二兩

白薇酒炒延胡酒炒艾草五錢

製為末煉蜜丸温酒下三五錢

血氣兩虧挾寒滯而腹中疼痛經水來遲故不能孕子焉熟地補血以滋衝任當歸養血以榮經脉川

芎行血海白芍斂陰血人參扶元補氣兼通血脉白朮健脾統血鼓運脾元茯苓滲濕以清血室炙草緩中以益胃氣延胡化血滯力擅通經香附解氣鬱當歸主調經桂心補久煖血白薇降泄益陰也蜜以丸之酒以行之使血氣內充則寒滯解散而經氣溫煖腹痛無不自退豈有經遲不孕之患乎

白薇丸 治寒熱氣逆經遲無子脉沉緊者

白薇一兩 人參兩半 附子一兩 熟地三兩 桂心一兩 白芍兩半 吳茱萸一兩 當歸二兩

紫石英 醋炒 樗榔 一兩

製為末煉蜜丸温酒下三錢

火虛陽微寒邪氣逆傷營氣而腹痛經遲寒熱無子焉附子補火以禦寒邪人參扶元以通血脉熟地補陰尚滋血室慧煖血力行寒滯當歸養衝脉之血白芍斂任脉之陰樗榔破滯降逆吳茱萸温中逐冷紫石英温澁子宮能令有子嫩白薇降泄虛陽可除寒熱也蜜丸酒下俾火煖陽回則寒散滯消而血氣內充自然腹痛退而寒熱降豈不經調而有子乎

秦桂丸 治血海久冷不孕脉細澹者

肉桂去皮一兩 秦艽一兩 附子一兩 當歸二兩 厚朴一兩 人參一兩 乾姜一兩 白薇一兩 半夏一兩

製為末煉蜜丸温酒下二三錢

血海久冷衝任少薰育之權故腹痛經遲時發寒熱而不能孕子焉桂附煖血海以逐冷姜朴温中氣以散寒當歸養血脉人參扶元氣秦艽活血通經半夏化痰燥濕白薇降泄以除寒濕熱也煉蜜以丸之温酒以下之俾血海温煖則久冷頓消而腹痛無不退寒熱無不除何患天癸不調不能孕子乎

艾附丸 治血虛宮冷不孕脉弦緩澹者

熟地 五兩 當歸 三兩 白芍 兩半 艾葉 兩半 丁香 一兩 香附 兩 木香 一兩 藿香 兩半
製為末 醋丸 溫酒下 三錢

血虧氣亂 子宮寒冷 故天癸來遲 不能孕者 為熟地補血 以滋血室 當歸養血 以榮經脈 白芍收斂 營血 艾葉溫煖 子宮 香附溫中 散滯 氣藿香開胃 醒脾 丁香溫中 散滯 醋丸 以收之 酒下 以行之 使子宮溫煖 則經血充盈 而經氣調和 天癸無來遲之患 豈猶有不能孕之子憂哉

濟陰丹 治久不孕 脈軟弦澹者

熟地 五兩 人參 兩半 當歸 三兩 川芎 一兩 肉桂 兩 乾姜 兩 秦朮 二兩 木香 一兩 糯米 一合

製為末 煉蜜丸 溫酒下 三錢

血氣兩虧 寒滯脈經 不能輸泄 而天癸來遲 久不孕者 為熟地補血 以滋血海 人參扶元 以通血脈 當歸養血 榮經 川芎活血 行氣 肉桂溫經 煖血 乾姜煖胃 散寒 秦朮活血 脈以通經 木香調胃 氣以化氣 糯米實土 膏以滋榮 經脈也 煉蜜丸 之溫酒下 之使寒滯消散 則血氣充盈 而經脈調和 天癸無來遲之患 即久不孕者 尚可圖效耳

紫石英丸 治子宮久冷 不孕 脈軟澹者

紫石英 三兩 人參 兩半 熟地黃 五兩 當歸身 三兩 川芎 一兩 川烏頭 兩 紫厚朴 一兩 桂心 兩半

吳茱萸 兩 白乾姜 兩

製為末 煉蜜丸 溫酒下 三錢

血氣兩虛 風冷滯腸 營氣不能灌注 而子宮久冷 故不能孕育 為熟地補血 以滋血室 人參補氣 以通血脈 當歸養血 榮經 脈 川芎活血 行血 海川烏扶陽 逐肉 桂溫經 祛冷 厚朴溫中 散滯 乾姜煖胃 祛寒

吳萊萸溫肝以降逆氣紫石英澁血以煖子宮也煉蜜丸之溫酒下之俾風冷消散則氣血內充而子宮溫煖天癸如常無不孕之婦矣

盪胞煎 治久年斷產脉實者

大黃一兩 附子一兩 炮 厚朴一兩 製 桂心一兩 朴硝一兩 當歸二兩 赤芍一兩 人參一兩 桃仁二兩

製為末每服六錢水酒各半煎去渣溫服

瘀熱內結天癸不通故年久斷產不能孕子焉硝黃蕩滌熱結桃赤破瘀通經附子厚朴補火散結力能煖子宮以調氣化當歸肉桂鼓運營血兼能養經脉以開血閉復用人參扶助元氣且以防諸藥之也水酒合煎務使瘀化結開則天癸自通而血室清和即年久之斷產尚可冀其懷孕耳

丹溪植芝湯 治肥盛無子脉濡弦滑者

當歸二錢 川芎一兩 白芍錢半 酒炒 香附二錢 白朮錢半 炒 茯苓錢半 半夏錢半 製 陳皮錢半 甘草五分 生姜三片

水煎去渣溫服

痰結胞門子宮閉塞故天癸不調不能有子焉半夏燥濕以治痰之標白朮健脾以治痰之本當歸養血脉以榮經川芎行血氣以調經白芍斂陰和血香附解鬱調經茯苓滲濕和脾陳皮化痰利氣甘草緩中和胃氣生姜散痰開結氣也水煎溫服俾痰化結開則經脉清和而天癸如度自可媾精而得孕已何患胞門疾結乎

消脂膜導痰湯 治痰閉不孕脉浮滑者

南星三錢 製 枳殼一錢 炒 半夏錢半 製 防風錢半 滑石三錢 羌活錢半 橘紅錢半 川芎一錢 茯苓錢半 車前子錢半 炒 生姜三片

水煎去渣溫服

痰納胞門閉邊子室故今天癸不調不能孕育焉南星散痰燥濕牛夏燥濕化痰防風祛閉以勝濕積
穀瀉滯以化氣滑石通肌利竅羌活燥濕通經橘紅利氣除痰川芎活血行氣茯苓滲濕氣以清經脉
車前利濕氣以淨子宮生薑開豁痰涎以清廓胞門也水煎溫服使痰化結開則胞門清肅而經脉融
和天癸無不如度何患不能生子乎

先期湯 治經候先期不孕脉數洪瀆者

生地 五錢 川連 炒一錢 白芍 二錢 當歸 三錢 川芎 一錢 黃芩 炒半錢 黃柏 炒半錢 阿膠 三錢 蛤 知母 幾半 鹽 甘

草 幾半 水煎去渣溫服

血虛熱迫天癸先期致令子宮嬌柔不能媾精而有子焉生地滋陰壯水以涼血白芍斂血攝陰以和
血苓運清上焦之熱知柏清下焦之熱川芎馨下奔之血當歸歸失位之血生草瀉火緩中阿膠補陰
益血以固衝任也水煎溫服使熱化血盈則衝任完固而天癸如其常度何有先期不孕之愆哉

過期飲 治經候過期不孕脉遲瀆者

熟地 五錢 當歸 三錢 白芍 錢半 川芎 一錢 肉桂 一錢 炮姜 一錢 附子 一錢 香附 二錢 艾葉 一錢

水煎去渣溫服

血虛寒伏衝任輸泄無權故天癸瀆少來遲不能媾精而有子焉熟地補血以滋血室當歸養血以榮
經脉川芎行衝脉之血白芍斂任脉之陰附子補火禦寒肉桂溫經通閉香附解鬱調經炮姜濕中逐
冷艾葉理血氣以煖子宮也水煎溫服使伏寒解散則血室滋榮而子宮溫煖何有經行瀆少來遲不
孕之患哉

痛經方 治經前痛甚不孕脉澹滯者

熟地五錢 當歸三錢 鬱金一錢 香附二錢 五靈脂二錢 白朮二錢 白蔻一錢 木香一錢 延胡二錢

水煎去渣温服

血凝氣滯肝脾不能操蓄泄之權故經欲行時先疼甚二三日而不孕焉熟地補血滋榮當歸養血益營鬱金破血氣香附調經氣五靈脂除疼痛以降濁延胡索活血脉以通經白述健脾運血白蔻理氣寬胸木香調胃氣以醒脾也水煎温服使氣行血化則脾胃健運而衝任融和肝脾得操蓄泄之權安有經前疼甚不可冀其懷孕者乎

調營定痛丸 治經後疼痛不孕脉虛澹者

熟地五兩 人參兩半 白朮兩半 川芎一兩 當歸三兩 木香一兩 白芍兩半 香附二兩 茯苓兩半

紫石英三兩 醋兩 煨

製為末煉蜜丸温酒下五錢

血脉空虛氣滯而血去脉絡愈虛故經後臍腹疼痛不能懷孕焉熟地補血滋血人參補氣通脉白朮健脾氣以生血當歸養營血以榮經川芎行血中之氣白芍斂血室之陰木香化滯氣調中香附調經氣以定痛茯苓滲濕以清血室石莖溢血以煖子宮也蜜丸酒下便經血內充則滯氣自化而衝任調和何有經後疼痛之患尚可冀其懷孕矣

升陽利濕湯 治肥人濕閉不孕脉弦緩者

南星二錢 蒼朮錢半 羌活錢半 白芍八分 滑石三錢 姜半 半夏錢半 防風錢半

水煎去渣温服

軀脂滿溢閉塞子宮故天癸不調不能懷孕焉蒼朮燥熱強脾南星散痰燥濕羌活疎太陽之府防風燥衝任之經台芎行血海之氣滑石開子宮之閉半夏豁軀內之痰涎也水煎溫服使濕痰消散則子宮肅清而衝任融和何有閉塞經愆不孕之患哉

附斷產法 服油煎水銀棗核大永不懷孕

故蠶紙方圓一尺燒灰酒服終身不復懷孕產後服之更驗四物湯料五錢加薑薑子三錢煎湯於經後空心服

按夷堅志載東京女子曰牡丹慣售墮胎藥生獲惡報以天地之大德好生也姑兩存之以備攷

此藥專治... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 誠濟世之良藥也

此藥專治... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 誠濟世之良藥也

此藥專治... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 誠濟世之良藥也

此藥專治... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 誠濟世之良藥也

此藥專治... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 誠濟世之良藥也

此藥專治... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 誠濟世之良藥也

中風大法

吳江徐大椿靈胎著

中風 風者百病之始也又曰百病之長善行而數變中風大法有四半身不遂曰偏枯即令半肢風症四肢不舉曰風痲即令癱風症遍身疼痛曰風痺即令痛風症卒倒不語曰風癡即令中風症也然邪有微甚中有淺深中經外有六經形證中絡口眼歪斜中府九竅閉塞或肢節偏廢中藏口噤神昏二便不禁中藏最危有關性命

內因 人之元氣強壯營衛和平腠理緻密外邪焉能為害惟七情乘戾飲食失節色慾勞傷真元耗散則營衛空疎邪乘虛入也所以氣虛之人衛外不密則外風易入血虛之人肝木不平則內風易作

外症 卒中昏倒窺視喁斜搖擗反張骨痛筋急入經則癱瘓入絡則膚頑至暴瘡暴麻語言蹇澀痰涎壅盛皆中風之候也

辨證 凡中寒中暑中濕痰厥食厥氣厥熱厥虛暈皆卒倒不語當分閉脫極與中風相似但風必有歪斜搖擗或偏估之證為異就諸類證中中氣身冷脈沉無痰涎中風身溫脈浮有痰涎也心脾受風則舌強難言腎虛脈痿則失音不語陽明經脈受風則筋脈掣急而口噤不開陽明血燥受風拘攣筋脈牽引太陽為歪斜口眼風入肝脾筋脈失養手足搖擗而為癱瘓血氣衰微痰涎凝滯四肢不得稟氣而作麻木

類中 中風之有真假不過以標本而分治也南北之風氣既殊而人之稟質亦異肥人氣居於表瘦人陰虧於內肥人多痰瘦人多火火即痰之本痰乃火之標痰火煎熬壅閉氣道痰熱生風神明失指亦令僵仆故曰類中河間以將息失宜水不製火丹溪以東南卑下濕熱生痰東垣以中氣太虛卒然倒仆究竟真中者亦由氣血虛弱營衛失調然後感於外邪其因火因氣因濕因痰者亦未必絕無外邪侵侮而作也雖有外邪侵侮則因火因氣因濕因痰各自為病又何暇為歪斜癱瘓暴仆暴瘡之候乎可知邪氣

盛則為實為標正氣奪則為虛為本也

非風 非風一症每多卒倒卒倒必至昏潰本皆以內傷積損血氣頹敗而然故竟以非風名之庶乎使人易曉知其實非風症也

有邪無邪 非風之症古皆以氣血虛弱營衛失調腠理不密而邪乘虛入所謂虛之所在邪必湊之也但有邪無邪何可不辨有邪者是中風邪實之類無邪者即非風衰敗之屬有邪者必或為寒熱走注或為腫痛偏枯而神志或可無恙無邪者本無痛楚寒熱而肢節忽癱精神言語忽爾變常也有邪者病由乎經即風邪之外受無邪者病闕乎藏即精虛則氣去為眩暈卒倒氣去則魂離為昏潰無知也有邪者邪固乘虛而入故當先扶正氣而通經逐邪之品不得不用以為佐無邪者救本猶恐不暇尚可妄行耗散以傷正氣乎

肝邪 五藏皆能治病而風厥之病何以獨重肝邪且又急暴之若此也蓋人所賴以生者惟在胃氣以胃為水穀生人之本故經曰人無胃氣則死脉無胃氣亦死肝邪即胃氣之賊一勝則一負不相並立故非風強直掉眩皆肝邪風木之化也其四肢不用痰涎壅盛皆胃敗脾虛之候雖東方之實豈果肝氣之有餘耶正以五陽俱敗肝失所養則肝從邪化故曰肝邪陰陽類論以肝藏為最下者謂其木能乘土肝能尅胃也然肝邪之發必由脾胃之虧使脾胃不虛則肝木雖強決無乘脾之患亦無尅胃之虞腎水不虛則木得滋榮自無肝邪之發何有強直之虞所謂胃氣者即五藏六府陽和之氣非獨指陽明胃氣為言也所謂胃水者即五藏六府之精津血液非獨指小陰腎水為言也真陽敗者真藏見真陰敗者亦真藏見凡見真藏者是胃氣不致乎於手太陰而真藏之氣獨見即肝邪也即無胃氣也見則必死此非風類風症之大本歟

氣脫 肝風卒倒每多氣脫人之生死由於氣氣聚則生氣散則死多以酒色過度七情內傷先損藏府真陰此受病之本或年力衰殘勞傷耗散以損一時之元氣忽爾仆倒卒然昏愊此非元氣暴脫之候乎汗出如淋營衛氣脫也遺溺遺屎腎命氣脫也口開鼻斡陽明經氣之脫也口角流涎太陰藏氣之脫也四肢癱軟肝脾之氣脫也昏愊無言心腎之氣脫也似此形神俱敗元氣已脫若無痰氣壅塞必當參附急救元陽隨以甘杞歸地補接真陰使精化為氣即向生之氣也舍此他求從無實濟矣

痰本 非風症多痰由脾虧腎敗而然也夫痰即水化其本在腎其標在脾在脾以水不歸原水泛為痰也在脾以食飲不化土不制水也其末在肺不能通調水道水精無以四布而成痰也必當溫脾強腎肅清肺金則元氣清和不治痰而痰自化矣此即治痰之本

經絡痰飲 痰在周身為病莫測如癱瘓癩癧半身不遂皆伏痰留飲為邪不去其痰病何由愈然經絡之痰無非津液使營衛調和則津液自化何痰飲之有惟元氣虧損神機化衰而水中無氣津凝液敗皆化為痰也可見氣化則痰涎可為津液氣不化則津液盡為痰涎豈津液之外別有可化為痰涎者耶若痰在經絡非攻不去則必并元津而盡去之安有獨攻其痰而元津可無損者津液既傷元氣並竭則隨去隨化而痰必愈甚此治痰者痰終不盡所盡者惟元氣耳矧有本無痰氣而妄攻之其害可勝言哉治痰之藥如滾痰丸清氣化痰丸搜風順氣丸必元氣無傷果有實痰留滯乃可暫用分消若病及元虛而但知治標未有不日敗者飲亦如之

治痰 治痰之法若果痰涎壅盛填塞胸膈湯液俱不能入不得不先開其痰如獨聖散茶調稀涎散探吐元氣大虛痰涎又盛當以參蘆一味探吐能進湯藥則止眼直咬牙肢體拘急面赤勁強脈滑有力亦為可治死證已具痰聲漉漉於咽喉間強吐亦為無益且有隨吐隨斃者如無死證痰氣盛極用藥探

吐吐不出者危若形證已定氣不甚虛挾寒挾濕生痰者二陳湯六安煎選用因人生痰宜清隔飲加竹茹童便火甚者抽薪飲為宜胃虛嘔惡多痰者六君子湯或異功散陰虛肺燥兼效多痰金水六君煎陰虛水泛為痰六味丸作湯飲陰中火虛八味丸作湯妙脾腎虛寒不能生化為痰者金匱腎氣丸中氣虛寒不能運化生痰者理中湯加半夏陰分虛寒生痰者理陰煎若脾氣虧損痰滯中焦閉塞清道四肢骸體發為諸病者宜壯脾理痰流行其氣則脾氣健而痰可化病可解非補中益氣二陳參朮不可禁用破氣瀉痰及倒倉之法形盛脈實邪實者或可暫攻亦百中之一二也

治血氣 非風口眼歪斜半身不遂手足拘攣肢體掉搖總皆病由乎筋骨也夫肝主筋而藏血腎主骨而藏精精血虧損不能滋養百骸則筋緩骨弱痿癱風癱如樹木枝枯必津液不能到人之偏廢亦猶是也經曰足得血而能步掌得血而能握故治風先治血血行風自滅潤燥必須養精精充則燥自能除而肝邪類中血虛非風實由燥氣乘之木從金化燥必生風當養血氣以除擊急益精神以強痿廢則真陰復而血氣充不必治風而假風自息虛燥自除若反風燥則風能勝濕燥必愈甚也

偏枯痿弱本由陰虛然血氣本不相離陰中有氣陰中復有血血非氣化不行氣非血澤不化故血中無氣則病為緩縱廢弛氣中無血則病抽搐偏枯且氣主動無氣則不能動不能動則不能舉矣血主靜無血則不能靜不能靜則不能潤矣筋緩當責無氣筋急當責無血無血宜四物湯大營煎無氣宜四君湯十全大補湯

治水火 非風證陰中水虛必多熱多燥而病在乎精血陰中火虛必多寒多滯而病在乎神氣若水火俱傷則形神俱弊而難為力矣火虛宜八味丸右歸飲可以益火之原水虛宜六味丸左歸飲可以壯水之主若陰陽俱虛形神困劇宜大補元煎十全大補湯盡力調治庶可挽回多熱多火忌辛溫如參朮姜

桂之類多寒多濕忌清涼如地芍冬斛之類火盛即陽證宜專治火於羊角散之類火微宜兼滋陰六味地黃湯之類寒盛即陰證宜專益火八味地黃湯之類寒微宜溫經七味地黃湯之類然治火之法但使火去六七即當滋養其陰治寒之法但使寒去六七即當溫培其陽蓋陽勝陰則寒病愈陰勝陽則熱病除故治熱必從陰分陰得滋而火易降治寒必從陽分陽得溫而寒易散也

辨寒熱 非風口眼歪斜有寒熱之辨手足陽明之筋挾口環唇手足太陽之筋抵目內眥寒則筋脈掣急目不開熱則筋脈弛縱目不合牽引口眼歪斜或左或右此以病之寒熱言筋之緩急也然血氣無虧雖熱未必緩雖寒未必急總由血氣衰而不勝其寒熱也嘗謬以偏左為左寒右熱偏右為右寒左熱不知偏左者其急在左右本無急偏右亦然故無論左右凡拘急之處即血氣所虧邪着之經治宜從緩又灸亦捷氣血流行則邪可解而正可回筋可舒而歪可正矣唇緩流涎聲重語遲皆縱緩之類熱則緩縱而間亦有寒者氣虛故也歪斜牽引搐搦強直皆拘急之類寒則拘急而間亦有熱者血虛故也當辨血氣之寒熱則病之虛實可判矣

非風癱瘓證亦有寒熱之辨寒則反折筋急熱則筋緩弛縱固其常也然寒熱皆能拘皆急能弛縱乃其變也寒而拘急寒傷其筋血凝不流也熱而拘急熱傷其筋血燥不榮也寒而弛縱氣虛不能自收持熱而弛癱瘓軟不能自管束脈證之間使無寒熱可據但當專治血氣無疑矣

辨經藏諸證 非風等證當辨在經在藏者輕而淺在藏者重而深經病連肢體藏病病在元神在經之病無不由中而發在藏之病全關根本而表理微甚各有所主經藏雖各不同陰陽無不本乎血氣但知陰陽之偏勝氣血之緩急而別其有邪無邪則盡善矣顏色憔悴血脈不榮是心之經病浮腫不仁四肢不用是脾之經病拘急掉眩癱瘓抽搐是肝之經病口眼歪斜牽引左右是陽明及肝膽經病

骨弱無力不能久立是腎之經病此皆經病之輕者滑汗如油畏寒極甚是肺之經病神昏舌強口不能言是心之經病唇緩流涎口開手撒是脾之經病眼昏黑筋痛極甚是肝之經病聾絕無聞骨痛極甚是腎之經病反張戴眼腰脊如折是膀胱經病此皆經病之危證

喘效短氣悲憂不已病在肺藏多言多笑神昏不寐病在心藏腹痛噎逆吐涎嘔惡病在脾藏胸脇氣結多怒如狂病在肝藏陰痿多恐小腹痛急病在腎藏此皆藏病之稍輕證氣大喘大急色灰白紫赤肺藏已絕神離色脫昏沉不醒心藏已絕痰涎壅極呢逆腹脹脾藏已絕眼閉躁亂舌卷囊縮肝藏已絕聲痞寒厥便溺不禁腎藏已絕此皆藏病之危證

辨脉 中風之脉浮緩小弱者生急疾堅大者死浮緩為中風本脉兼緊則多表寒兼大必屬氣虛兼遲必夾虛寒兼數定見虛熱兼滑定多痰濕咸為可治之脈苦兼濇象乃為血枯不能波瀾脉不應變者亡

總治 風證必兼痰為患宜化痰為先初得之即當順氣日久必兼活血蓋治風須治血血行風自滅也然風之中人當辨淺深虛實有中藏中府中經中血脉之殊中經邪在三陽之表中血脉邪着血脉之中

乃屬表之裏其病猶淺中藏邪入三陰之裏中府邪據三陽府分其病已甚若在淺不治必入於深在經不治必入藏府矣邪氣盛而正不甚虛者可直攻其邪攻邪即所以安正也正氣大虛而邪不受制者必當顧本以兼逐其邪顧本即所以却邪也至非風內敗之證必當培脾滋腎養心榮肝蓋脾土旺而血自生脾氣運而痰自化腎水足而燥自除腎氣固而痰歸經肝血榮而風自熄心火降而神自清也風之為病不一治要在乎陰陽虛實表裡寒熱之機而已

辨治 風之為病最多治誤在不明其表裏蓋外風是八方之所中內風是五藏之本病也八風自外而入必先發熱惡寒頭疼身疼外證顯可見五風由內而發絕無外感而忽病如風其由內傷可知也然既

非外感而曰諸暴強直皆屬於風諸風掉眩皆屬於肝蓋肝主風而藏血血病則無以養筋筋病則強直掉眩諸變百出皆肝木之化故云皆屬於風也後世不明不惟類風認為真中而以內奪厥逆之候俱認為風誤人莫甚夫外風是邪襲經絡故多陽實內傷由於七情故多陰虛凡藏氣受傷脾病在肢體必兼痰飲腎病在骨髓或在二陰心病病在血脉或在神志肺病在營衛或在聲音肝病病在筋爪或在血液此五藏之類風未有不由陰虛致然東垣獨得其旨謂中風卒倒昏不知人並非外來風邪乃本氣自病人年四十而陰氣自半起居衰也每多犯之豈非陰虛木旺生風乎夫人生於陽根於陰根基厚人必強根基薄人必弱根基衰人必病根基敗人必危人知陰虛惟一不知陰虛有二陰中水虛則病在精血陰中火虛則病在神氣蓋陽衰則氣去而神志為之昏亂陰虛則形壞而肢體為之廢弛竟以形壞神離之證而不求水火之原猶以風治鮮不傾危矣試言天道早則多燥燥則生風是風木之化從乎燥燥則陰虛宜專補培以救真陰則虛燥自除而類風自熄然真風非曰絕無虛證但風乘虛入而宜從風治類風非曰必無扶邪治宜扶本而邪始可却故治虛當察在陰在陽而直以扶本治實當察挾痰挾氣而暫泄其邪至元氣大虛卒仆不醒上無痰下失禁頭目沉困厥脫之候尤與邪風無涉非大劑參附豈能挽回倘不細察而妄投燥散熟知燥必傷陰散必傷氣此為醫殺之耳

用藥佐使

非風而有兼證者通經報使之法不可偏廢蓋脈絡不通皆由血氣血氣兼證各有所因因於

風者必閉遏因於寒者必凝滯因於熱者必乾涸因於濕者必壅滯因於虛者必不運行及一切血凝氣滯挾痰挾飲並皆阻塞經絡而佐使之法各各不同風閉者散而通之如麻桂羌獨辛芷之類寒凝者熱而通之如蔥椒桂附姜撥之類熱燥者涼而通之如苓連知柏梔枳之屬濕滯者燥而通之如蒼朴滑解苓茵之屬血滯者活而通之如芎歸桃膠丹紅之屬氣滯者化而通之如附香烏寇殼實之屬痰滯者豁

而通之如星黃芩薑貝之屬飲停者導而通之如遂戟苓芩二且之屬氣血虛而不運者補而通之如參
耆歸地朮杞之屬凡此通經之法參耆補元氣而氣虛甚者非佐薑附不能追散失之元陽歸地補精血而
陰虛極者非桂附不能復無根之生氣寒邪在經客強主弱者非桂附之勇則血脈不行而寒邪終不能
去痰濕在中土寒水泛者非姜附之煖則脾腎不健而痰濕終不能除大抵實者可用寒涼虛者必宜溫
煖但附子剛勇而熱陰虛水虧者固非所宜多熱多燥者尤為切禁若無燥熱但涉陽虛非附子不能
奏捷古人云附子與火酒同性其義可知

死證 直視心絕眼閉肝絕手撒脾絕鼾睡肺絕遺尿管絕沉昏不醒肉脫筋痛髮直頭搖吐涎面赤汗
出如珠痰聲漉漉皆在不治

用藥 古法中血脈大秦芩湯中府小續命湯中藏三化湯閉證三生飲脫證參附湯大概順氣化痰為
先二陳湯加烏藥枳殼竹瀝薑汁隨六經證再為加減無汗拘急加羌活防風有汗體痛加白芍桂枝惡
寒身熱加柴胡黃芩頭痛目瞤加川芎蔓荊口眼歪斜加全蝎天麻頭眩烘熱加甘菊細茶風痰壅盛加
南星貝母恍惚識語加菖蒲遠志茯神棗仁手足搐搦加僵蠶天麻姜汁竹瀝筋急加木瓜筋攣加鈎藤
在臂加桂枝在足加牛膝如風邪初退痰飲漸消但半身不遂審是血虛二陳合四物湯氣虛二陳合四
君湯俱加秦芩續斷竹瀝姜汁四肢不舉屬濕痰者滾痰丸姜桂煎湯化下屬虛弱者十全大補湯補之
大便不通屬痰實者滾痰丸利之屬津涸者四物麻仁湯潤之若中之輕者自醒能言能食惟身體不遂
或手足攣躄者前諸法常服自愈以上疎風化痰為君補養氣血為佐以報使舒筋為使乃治真中
風邪之劑也如脾腎二經虛而中者當滋化源以培根本脾虛食少痰多者六君子湯中氣倦怠而痰多
者補中益氣湯加茯苓半夏心氣虛而難言者歸脾湯腎陰不朝而難言者六味地黃湯腎經瘡痍者地黃

飲子肝經血燥而拳蹇者加味消遙散病勢減而未能復元者當審肝脾腎三家是何經氣虛血虛陰虛陽虛以六味七味八味丸虎潛丸還少丹服之再以四君六君八珍歸脾十全大補補中益氣等湯日服無間總有虛風無不潛消默奪矣