

天竺經論眼序一首

叙眼生起一首

出眼疾候一首

眼疾品類不同候一首

眼將節謹慎法一首

眼暴腫痛方一十首

目赤痛方二十一首

胎赤久赤方七首

目暴卒赤方六首

目痒方四首

目中風腫方五首

眼熱礮痛赤腫方三首

眼闇令明方一十四首

失明方六首

青盲及盲方六首

雀目方四首

目膚瞤方一十四首

暈瞤方四首

生膚息肉方八首

目風源出方六首

眯目方八首

肝氣不足方二首

肝實目痛方二首

眼雜療方二十首

總按
厚有方
十九

小
卷
二十一
卷
目
錄

王憲先生外臺秘要方第二十一卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等 上進

新安後學程行道敬通甫訂梓

天竺經論眼序一首

體上道人撰俗姓謝住齊州於西國胡僧處授

蓋闢乾坤之道唯人爲貴在身所重唯眼爲寶以其所繫
妙絕通神語其六根眼最稱上是以療眼之方無輕易爾

叙眼生起一首

謝道人曰夫眼者六神之主也身者四大所成也地水火
風陰陽氣候以成人身八尺之體骨肉肌膚塊然而處是

道按
一
作聽

地大也血淚膏涕津潤之處是水大也生氣溫暖是火大

也舉動行來屈伸俛仰喘息視聽是風大也四種假合以

成人身父母精血寔斯增長而精成者也其眼根尋無他

物直是水耳輕膜裹水圓滿精微皎潔明淨狀如寶珠稱

曰眼珠實無別珠也黑白分明肝管無滯外託三光內因

神識故有所見凡人不解謂眼有珠喻若魚之被煮此事

不然夫魚畜水陸之有目者悉皆是水無有別珠直以湯

火煎煮水凝結變自成珠但看生魚未被煮炙豈有珠義

直置死魚水已凝厚論其活者水亦輕薄

出眼疾候一首

上

宋本
作火

宋本
作證

譚道人曰夫人眼白睛重數有三設小小犯癰無過作
 但黑睛水膜止有一重不可輕觸致敗俄頃深可慎之凡
 人不究謬據多重或七或五此皆是其妄說一家成言耳
 然眼之精微水映輕薄無所堪耐易致諸疾故學療之者
 事須安審不可麤疎恐致毀傷患眼之家自須謹慎諸所
 禁忌悉不應犯若覺有疾即宜早療當及其初根脚未立
 則易驅遣若其久後根盤四布既成痼疾雖復行療極難
 成効且身稟四大性各不同是以治者證候非一冷熱風
 損疾生不同傷勞虛實其方各異宜應察其元起尋究本
 根按法依源以行療救不得謬濫措方以乾薑療熱毒之

眼以冷水療風寒之目非直冷熱無効蓋亦致患俄頃常

見愚人不識病源直尋古方輕欲立療或經有疾遇藥得

愈便以此法遞相傳授都不知病有冷熱之殊虛實之異

或有道姑慶姬為人求食輕得有損寧慮幽冥良為病家

不別真偽聞語便從遂使應愈之病增為痼疾驪珠之眸

永成盲瞽一何可哀故目有條貫以示後人皆苦眼無所

宋本無文字

因起忽然膜膜不痛不痒漸漸不明久歷年歲遂致失明

令觀容狀眼形不異唯正當眼中央小珠子裏乃有其障

作青白色雖不辨物猶知明暗三光知晝知夜如此之者

名作腦流青盲眼未患時忽覺眼前時見飛蠅黑子逐眼

通按

慶音摩

慶姬即

老尼類

也

通按

慶膜一

本作遺

慶下同

高糖按

慶疑當

作慶下

法字
作矢
五

上下來去此宜用金篦決一針之後豁若開雲而見白日
針訖宜服大黃丸不宜大泄此疾皆由虛熱兼風所作也
眼疾品類不同候一首

誦道人曰若有人苦患眼漸膜膜狀與前青盲相似而眼
中一無所有此名黑盲宜針刺服藥如瞳子大者名曰烏
風如瞳子腎綠色者名為綠腎青盲皆是虛風所作當覺
急須即療湯丸散煎針灸禁慎以驅疾勢若眼自闇多時
不復可療此疾之源皆從內肝管缺眼孔不通所致也亦
宜須初欲覺時即須速療之若已成病更不復可療亦無
勞措意也若因時病後得眼生白障者此名為翳也為熱

毒所作宜應速服湯丸依法鑱之傳食醫散若因病後生

肉者此為膚障也

後卷并無食醫散通按後方傳醫皆令醫除食即除字意

此是風熱所作宜服湯丸鈎割除之若眼赤痒淚出者為

熱虛風服散煎除之若見黑煙赤光瞳子黑大者為烏風

勞水動故宜服車前空青丸以消息之若眼忽爾赤痛者

此是天行眼痛風熱所作應宜早急療之不者當生於醫

後難療若人眼痛當黑珠生白翳并黑子等大如米如此

之者名為痛損眼此不易可療勿輕犯觸但眼因破損有

物撞作醫障癢痕者悉不可療亦無勞措意

通按勞水動三字疑有闕文

宋本
作看

眼將節謹慎法一首

嘗作
其實

謝道人曰五行云肝者眼家之根本此乃一家之同類

言無實五藏六腑悉皆相連故欲療眼而審其虛實察其

由起既識病源宜先作內療湯丸散煎事事分明既服諸

藥便須依方謹慎凡欲療眼不問輕重悉不得以風霜雨

水寒熱虛損大勞并及房室飲食禁忌悉不得犯若虛勞

冷者宜服補肝丸出千金翼第十卷十五味在此卷下也

若人患眼不值明師遇道姑廢姬欺詐妄語云犯神鬼或

以環鈎或復蒜熏或火燒針熨此皆不識病源而逆療包

陰陽為益實微動致傷余見此途內懷矜愍學療之者勿

習是方非直疾勢不除亦自奇成蠱道

此法中文句疑珠
金別季校

尚德按

出子以

下十五

字疑當

細書

味金宋
本作未

眼暴腫痛方一十首

謝道人療眼暴腫毒痛不可忍欲生瞖方

決明子升一

石膏研四兩

升麻切四兩

梔子人升一

地膚子

茺蔚子各一分

苦竹葉切二分

乾藍葉切一分

芒硝二兩

車前草汁一升二合

冬瓜子三升為末

右十一味以水二斗煮竹葉取七升二合去滓內諸藥

煮取四升分為四服每服相去可兩食間再服為度小

兒減藥以意裁之

又療眼暴腫痛方

苦竹葉升一

柴胡二兩

蛇銜二兩

黃連

白芒硝

細辛 各一兩

右六味切以水三升煮取一升去滓温服之忌豬肉

又方

秦皮

黃連 各一兩

苦竹葉 一升

右三味切以水五升本作三升煮取八合洗眼與前方相類眼忽

腫痛盲須煮秦皮作湯洗是主療也忌豬肉

又方

細辛

麩核人

盧鹽 各一兩

決明子 二兩

右四味切以地骨汁煮取一升半去滓更以蜜一升半

合煎取一升半與前方同

又療眼天行暴腫痒痛方

地骨皮 三斤切

右一味以水三斗煮取三升絞去滓更內鹽二兩煎取

一升傳目或加乾薑一兩

又方

前胡 三兩

芍藥

青箱子

決明子

細辛 各二兩

車前子 五合

梔子

淡竹葉 切

右九味切以水九升煮取三升溫分為三服忌生菜

又方

半夏 一升洗

生薑 八兩

前胡 四兩

枳實 二兩炙

細辛 一兩

烏梅 十二枚

右六味切以水七升煮取二升半温分爲三服忌羊肉

錫生菜

又方

甘草 一兩

粟米 三合

甘草 雞子大

蘆根 五兩

右四味切以水八升煮取二升七合分爲三服忌海藻

菘菜

又療兩眼痛大黃湯方

大黃 四兩

芍藥 五兩

細辛

甘草 炙各四兩

黃芩 二兩

右五味切以水七升煮取二升半温分爲三服甚妙

又方

大黃

八兩切

右一味以水五升漬之一宿明且絞取汁分三服之病甚多由脾實以上忌油膩生冷房室蒜菜酒麪等物

目赤痛方二十一首

病源凡人肝氣通於目若肝氣有熱熱衝於目故令赤痛
出第二十八卷中

廣濟療目赤病及胎赤方

以蟬蛤裏置蜜二分鹽礫一分夜臥以火炙煖著目借

三四日差止

又方

豬膽和鹽祿五分點背効

深師療眼赤痛除熱黃連煎方

黃連 半兩

大棗 一枚

右二味以水五合煎取一合去滓展綿取如麻子注目

日十夜再忌豬肉

案驗療目赤痛方

茸竹葉 二七片

烏梅 四兩碎

大錢 三文

右三味以水二升洗漬藥半日早向東竈煮之三沸三

上三下取二合卧以注目眚

又療目赤痛洗眼方

蕤核人

二十枚碎

苦竹葉

一把

細辛

半兩

右三味以水三升煮取半升以洗眼日三五度甚妙

刪繁療眼赤洗眼竹葉湯方

淡竹葉

五合

黃連

四枚

青錢

二十文

大棗

二十枚去皮核

梔子人

七枚

車前草

五合

右六味以水四升煮取二升以洗眼日六七遍此方甚

良忌豬肉

千金療眼赤闇方

字上有
青字泄
字下有
薰字三
字下有
避風冷
三字末
木三字
下有不
避風冷
良五字

杏未熟時杏人汁

合一

鹽 五兩

青錢

右三味合內瓷器中封頭勿令泄百日後出著四背頭

日二三

千金翼療赤眼方

杏人四十九枚去皮尖絹袋裏飯底蒸之承熱絞取

脂以銅青胡粉各如大豆乾薑石鹽各如半大豆許

熟研之以雞毛沾取掠眼中背頭日三夜再

又方

杏人脂

合一

鹽祿

如棗核大

印成鹽

三顆

右三味取杏人脂法先擣杏人如脂布袋盛蒸絞取脂

置密器中內諸藥直坐著其中密蓋二七日夜臥注目

四眥不過七度差止

又療赤眼不問久近方

礪砂三兩以酢漿埒器中浸日中暴之三日藥著器

四畔乾者取如粟大夜著兩眥不過三四度永差并

石鹽石膽等分尤佳

竝出第十一卷中通按埒乃堅土或係粗瓦罐如甕類也

張文仲療兩眼熱赤方

東壁上土帛細羅內如豆大兩眥中令淚出三五度

卽差常用大効

肝藥同

又傳効療眼赤無新久皆差神驗方

尚德按
礪千金
異作礪

石鹽棗核大人乳一棗許置故銅椀中以古錢十文
研之使青稠著椀底取熟艾急搏一雞子許掘地作
小坑子坐艾於坑中燒使煙出以銅椀覆上以土擁
四邊勿令煙出量艾燃盡卽止刮取著椀青藥每以
半豆許於蛤蟬中和棗核大人乳汁研細以綿纏杖
頭注入兩背夜卽仰臥著之至五六度必差無石鹽
以白鹽無古錢以青錢替之亦得

肘後同

延年療眼赤熱不能得好差此由肝中客熱不絕方

黃連

三兩

秦皮

三兩

右二味切以水三升煮取一升五合去滓食後溫服分

二服如人行七八里服必効同

又療眼赤飲方

前胡

黃連

秦皮

黃芩

梔子人

各三兩

決明子

二兩半

藜人

一兩碎

竹葉

切一升

右八味切以水六升煮取二升五合去滓分三服食後

服之忌豬肉

又療眼赤方

藜人

黃芩

梔子人

黃連

秦皮

各二兩

竹葉

一升

右六味切以水五升煮取一升六合分三服

六味白赤熱方

前胡 二兩

防風

決明子

黃連

蕪人 各二兩

竹葉 一升

右六味切以水六升煮取二升分爲五服

又竹葉飲主痰熱眼赤頭痛方

竹葉 一握

犀角屑

升麻

乾葛 各二兩

黃芩

麥門冬 各三兩
去心

右六味切以水六升煮取二升分爲三服

又方

竹葉 一握

麥 一升淘

地骨白皮 二分

右三味以水五升煮取二升以麥熟爲度食後分二服
蔣孝璋處此方

近効療眼赤痛眼漠漠方

消石研末於眼四角各點一粟許須臾熱淚出便睡
睡覺以漿水洗又明目

又療赤眼及眼睛上瘡方

秦皮一大兩以清水一大升於白瓷椀中浸春夏一
食久以上看碧色出卽以飭頭纏綿點下碧汁仰臥
點所患眼中仍先從大眥中滿眼著微痛不畏量久

三五度飯間卽側臥瀝却熱汁每日十度以上著不

過兩日差忌酢蘿蔔

李諫議近効方

艾勃賜源乾曜療赤眼方

生石蜜

朱砂

光明者

石鹽

芒消

鹽碌

石決明

去麤皮細研各六分

蕤人

三百顆

黃連

宜州者

細辛

各一兩

烏賊魚骨

長二寸去甲

右十味擣篩細研欲著時少少取白蜜和置眼兩大角

中如菘豆許大仍不避風日唯破及枯除此並差萬金

不傳忌猪肉生菜

胎赤久赤方七首

病源胎赤者是人初生洗目不淨令穢汁浸漬於眼使驗

赤爛至大不差故云胎赤

出第二十八卷中

千金療胎赤眼方

取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭麻油一匙置銅鉢

中且使童子以水研之至瞋止取夜卧時以塗目眦

日三度差止

崔氏療三五十眼赤并胎赤方

西域法太常丞呂才道

生烏麻油

半雞子許著銅器中以細麪石磨之使迷迷不能研乃止

熟艾 三升

杏仁

一升去尖皮

黃連

一兩

雞糞

一升

鹽

一合

亂頭髮

如半枕許大

右七味穿一坑其形如瓶口小裏大燒使乾別開一小

高樓按
藥經會
小瓶

得梅按
水千金
作木

凡乳以前藥并艾等一重重布著坑內狀如灸炷以火燒之將前所磨銅器以蓋坑口煙盡收取銅器上脂煙傳眼肯瘡上欲卧時著胎赤三十五年者不過三兩日差忌猪肉

又方

胡粉 六分

麩人 四分

右二味先研麩人使碎內胡粉中更熟研又搗生麻子爲燭燃使著別取猪肋脂於燭燄上燒使脂流下滴入麩人胡粉中更研攪使均如錫以綿纏細杖子內藥內承軟點眼兩眦藥須更冷還於麻燭上燒而用之

去德榜
內疑當
雜句

又療積年赤眼方

取古字錢四十九文重著又取石鹽末填心孔中令
 滿以五月五日中於石上用烈炭火燒令極赤然後
 內一升醎酢中以傾甕內用四十九重紙封一日去
 一重去盡然後用一黍米大點眼背中極効

並出第
四卷中

必効主眼風赤久胎赤方

銅鑿鑼一尺以下面者一枚著石鹽末如杏人許油

脂半雞子許相和合鹽取柳枝如箸一握急束齊一

頭用研油脂三日狀如墨取熟艾如雞卵大剗地作

小坑置儿於下安艾著火令銅鑿鑼於上其下仍令

本草
卷第

通氣火盡卽成常蓋頭欲用時以綿纏杖子頭點取藥著兩背頭每夜著卽臥蘇六方云頓用甚効

又療積年風赤眼方

取生油生豬脂胡粉各等分和研傅眼中二日內赤

搨除

救急療久患風赤眼方

黃連 一兩

大棗 兩顆去皮核細切

印成鹽 兩大豆許

右三味以井花水半升內前件藥攪緩火煮三分去一

以綿瀘使盡其餘汁更緩火煎之候藥上有紫液起卽

是更煎以物盡刮取於合內貯之勿使塵污取用一度

取二大豆許以人乳和之置兩眼背頭從淚出每著苦
人咽喉卽停積年患赤眼者不過五度卽差及風胎赤
皆差亦不勞避風每欲出時口含鹽水以洗之甚良忌
猪肉

目暴卒赤方六首

肘後葛氏療目卒赤痛方

以鹽湯洗之

又方

燒荆木出黃汁傅之

又方

竹葉

黃連

錢

右三味以水三升煎取二合綿染傅眥日五六度忌猪

肉 並出第二卷中

漆師療眼忽赤痛方

鯉魚膽 一枚

黃連 二十一枚

右二味和淹於飯下蒸之熟去滓塗目眥五六度愈忌

猪肉

必効療眼暴赤方

雞舌香 二十枚

乾棗 二十擘

黃連 二十枚碎

右三味以水半升煎五六沸澄取清點目中差多著令

獨德按
字上
脫枚

人目明忌猪肉 常永傳

又目暴赤熱毒方

糝人

一分搗成膏

吳黃連

一分

雞子白

一枚

右三味以綿裹二味內雞子白中漬一宿塗眼四五度

厚則洗之

目痒方四首

肘後療目卒痒且痛方

削乾薑令圓滑內管中有汁拭薑復內之未盡易之

又風日常痒淚出方

又風日常痒淚出方

以鹽注管中差止

文仲療眼暗及風赤痒方

煎成白鹽 三匙 烏賊魚骨 四枚去甲

右二味以清酢漿水四升煎取二升澄清每旦及晚洗

眼赤去膚肉單鹽漿水煎之洗亦佳

又療風痒赤方

黃連 半兩 丁香 二七枚碎 藥皮 半兩 蕤人 二七枚

錢 七文古者

右五味以水二升煎取一升去滓綿纏杖點取著眼角

差止 附後同

宋本

目中風腫方五首

病源目為肝之外候肝虛不足為冷熱所干故氣上衝於
目外復遇風冷所擊冷熱相搏而令睛內結腫或如杏核
大或如酸棗之狀腫而因風所發故謂之風腫出第二十
八卷中
肘後療目中風腫弄眼方

礬石 二錢熬末

右一味以棗膏和如彈丸以磨目上下食頃止日三磨

一作揉姚同

又方

取頭垢著眥中亦得

又方

枸杞根白皮

伏雞子殼

右二味等分搗為末著目上

范汪療目中風腫痛方

取薤白刀截仍以膚上令遍漠皆差薤頭辛痛者止之

集驗療目中腫痛方

壽枸杞汁洗之日六七度

深師療眼有熱生翳肘後同

眼熱礮痛赤腫方三首

刪繁療眼熱皆赤生赤脉息肉急痛閉不得開如芒在眼

有誤

礮痛大棗煎方

大棗 十顆去
皮核

黃連 二兩

淡竹葉 五合

右三味以水二升煎取一升澄取八合下棗黃連煎取

四合去滓綿濾細細點傅眼中忌猪肉

又車前草湯洗方

車前草 切半
升

乾藍 五合

淡竹葉 三
兩

右三味切以水三升煮取二升綿濾去滓用上好鹽半

刀圭內湯中攪令調取冷細細用洗眼一刀圭者準丸

如兩大豆大 必効同

張文仲療眼暴赤腫礮痛不得開淚出方

見按
礮音參
沙也破
痛眼疼
知有沙
在眼也
尚德按
礮初朕
切參上
礮物雜
也

黃連

黃蘗

麩人

鹽碌

芒硝

各等分

右五味搗篩和如黍米大內背中忌猪肉

眼闇令明方一十四首

千金論曰凡人年四十五十以後漸覺眼闇至六十以後還漸目明療之法五十以前可服瀉肝湯五十以後不可瀉肝目中病可傳石膽散等藥無病不可輒傳散但補肝而已目病肝中有風熱令人眼闇者當灸肝俞五百壯穴在明堂部中及服除風湯丸散數十劑當愈也
凡生食五辛接熱食飲刺頭出血過多極目遠視夜讀細

高德按
千金無

口沒後
讀書

山巨晴
視日極

百瞻視
山川草

木三件
十九件

件十六

書不避煙火博弈不伏日沒後讀書飲酒不已熱食麪食

抄寫多年雕鏤細作泣淚過度房室無節數向日月輪看

夜遠視星火月中讀書雪山巨晴視日極日瞻視山川草

木
又按月午
金作月下

右十九件並是喪明之由養性之士宜熟慎之又有馳騁

田獵冒涉霜雪迎風追獸日夜不息者亦是傷目之媒也

恣一時之浮意為百年之痼疾可不慎歟可不慎歟凡人

從少時不自將慎年至四十即漸漸眼闇若能依此將慎

可得白首無他所以人年四十已去當須瞑目非有要事

不可輒開此之一術護慎之極也其讀書博弈等過度患

自者名曰肝勞若欲療之非三年閉目不視不可得差
自瀉肝及作諸療終是無効也人有風邪多必眼闇先攻
其風而闇自差

出第六卷中

廣濟主令明目方

三月中取新杏人研脂絞取汁一升石鹽兩大豆大
銅器盛之取銅古錢二七文浸之二七日綿注目中

夜洗眼用

出第五卷中

小品療眼漠漠黃連洗湯方

黃連

三兩

秦皮

二兩

蕤人

半兩

右三味咬咀水三升煮取一升半絞去滓適寒温以洗

日日四五度又加升麻二兩加水煎之忌豬肉

集驗明日令髮不落方

十月上巳日取槐子內新髧中封口三十日洗去皮

初服一枚再服二枚至十日服十枚滿十日却從一

起千金云從月一日一枚二日二枚每日加一枚計

服一千九百八十枚小月減六十枚此療主明目令

髮不白好顏色長生養病冷人勿服肘後云扁鵲方

高德按
療千金
作藥
七按
無視當
作視觀

防風

細辛

芎藭

白鮮皮

獨活

甘草

槲皮

大棗

其竹葉

其蜜

其皮

其棗

各三兩

各二兩

去脉各二兩

二七枚去核

通按
餘字一
作夜字

通按
絛字當
是攪字

右十味切以水一斗二升煮取四升去滓丁蜜更煎

沸分爲四服日三餘一服若是五六月燥器貯冷水藏

之忌海藻菘菜生菜千金崔氏同出第
十一卷中

千金補肝散療男子五勞七傷明目方

地膚子一斤
陰乾 生地黃七斤
取汁

右二味搗地膚末和汁暴之令乾更搗爲散酒服方寸

匕日三

又方

白瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍訖以酢五升漬

一宿暴乾搗下篩酒服方寸匕日三久服佳

又神麴丸主明目百歲可讀細書方

神麴 四兩

磁石 二兩 燒研

光明朱砂 一兩 研

右三味末之蜜和丸如梧子飲服三九日三常服益眼力衆方不及學者須知此方神驗當寶秘之忌生血物益出第六卷中

千金翼湯肝湯主藏中痰實熱衝眼漠漠闇方

苦竹根 八兩

半夏 四兩 洗

乾藍

茯苓

枳實 炙

白朮 各三兩

杏仁 二兩 熬

乾地黄 二兩

細辛 二兩

甘草 二兩 炙

右十味切以水一斗二升煮取二升七合分三服

地膚子

監子

蒺藜子

車前子

瓜子

菟絲子

菟蔚子

青葙子

決明子

合三

細辛

桂心

螢火蟲

各三分

大黃

八分

黃連

六分

右十四味擣篩蜜和爲丸如梧子飲服子五丸日三加

至三九

前方有白朮各湯肝此方有大黃各補肝通按前將節謹慎中云虛勞冷者宜服補用丸豈有虛冷而可服大黃乎

又主眼闇方

蔓菁子

一斗
淨洗

右一味以水四升煮自旦至午去汁易水又煮至晚去

外臺秘製
汁易水又煮至旦暴乾以布袋貯之一度擣三升以粥
飲服三方寸匕日三服美酒等任性所便

竝出第十
卷中

延年令目明方

濾療香取黍米一粒內目眥中當有水出并目中習
習然引風出狀卽明之候也常以日申時傅之若似
痛以冷水洗之卽定以申時傅藥者爲其日至日下
便漠漠暗如有物卽以藥內中淚出以熟帛拭之以
水洗訖便豁然明也此香以單主百病服之益人勝
石乳也本云是外國用之明目甚驗天竺沉香中出
此

洗眼湯去熱氣漠漠視物不見并醫方

秦皮

黃蘗皮

蕤人各三分

細辛二分

羌蔚子

三分

黃連

四分

古銅錢

七文

右七味切以水二升煮取八合平旦洗目忌生菜

又青菡子丸主眼風闊有花方

青菡子

槐子

覆盤子

地膚子

薪藁子

車前子

各五分

右六味搗篩蜜和丸如梧子日服十五丸忌五辛豬雞

牛羊肉魚蒜麩酢

近効療眼中一切諸疾盲瞽天行風冷熱胎赤淚出常漠

備德抄
疑卷
作全

漠不多見物唯不療睛破餘悉主之方

石膽

一兩光
明者

波斯塩綠

一兩色青陰雨
中乾不濕者是

真石鹽

二兩

硃砂

二分以上四
味各別研

秦皮

三兩

藜人

三兩
三日研

烏賊魚骨

一兩去上
甲別研

細辛

一兩

防風

三兩

馬蹄決明

二兩七孔者仍以煖水
洗去上細皮數過用

鈆丹

一兩

黃連

三兩

右十二味草石藥合擣篩唯似粉仍以重絹羅重篩訖以白蜜於火上微煖去上沫取下清者和之作塊更擣

千杵以油臙紙裏之亦取瓷瓶子盛貯勿使見風可得

多年不敗每欲著以兩米許硬和少許蜜稀擣如熟麩

尚德按

以童子頭分置兩眼眚至夜仰臥枕之合眼至明不
口含清漿和一豆許鹽鹽消吐洗眼不避風日未差之
前忌食麪羊肉醬果子生菜薑汁苜蓿蒿苣惟羊頭蹄
肝冷塩下餘竝不得食至著後復更七日慎之過此一
任與食每日一度著藥甚妙

失明方六首

肘後療積年失明不識人方

七月七日取蒺藜子陰乾搗篩食後服方寸匕

深師療失明主一歲二歲三歲四歲拭目中無他病無所
見如縮中視決明散方

馬蹄決明 二升

右一味搗篩以粥飲服方寸七忌魚蒜猪肉辛菜

千金補肝散療目失明漠漠無所見方

青羊肝一具去上膜薄切之以新瓦盆子未用者淨

拭之內肝於中炭火上炙令極燥脂汁盡取之別搗

決明子半升蓼子一合熬令香下篩三味合和更篩

以飲汁食後服方寸七漸加至三七不過兩劑能

歲復可夜讀書

又補肝散療三十年失明方

尚德
五十金
作服

細辛
鍾乳 研

茯苓

雲母粉

遠志
五味子

右六味各等分搗作散飲服五分七日三加至一錢七
忌生菜大酢

又方

胡麻一石蒸三十遍末之日服一升良

又方

三月採蔓菁花陰乾末之空腹以井花水服方寸匕
久服長生日明可夜讀細書

並出第六卷中

青盲及盲方六首

病源青盲者謂眼本無異瞳子黑白分明直不見物耳但

五藏六腑之精氣皆上注於目若藏虛有風邪痰飲乘之
有熱則赤痛無熱但內生障是睛藏血氣不榮於睛故外
狀不異只不見物而已是謂之青盲養生方云勿塞故井
水瀆令人耳聾目盲又云正月八日沐浴除目盲
深師療青盲方

出第二十八卷中

猪膽一枚一味微火煎之可丸如黍米內眼中食頃
良

又黃牛肝散療青盲積年方

黃牛肝

具一

土瓜根

三兩

羚羊角

屑三

麩人

三兩

細辛

六兩

車前子

升一

右六味藥合肝於瓶中春夏之月封之十五日冬月封之二十日出暴乾擣下篩酒服方寸匕忌肉魚五辛生菜等

又療肝藏病眼青盲內或生障惡風赤痛補肝散方

乾薑 六分 甘遂 三分 桂心 俛苓

附子 炮 黃連 甘草 炙 當歸

乾漆 熬 貝齒 燒 猪苓 白朮 各五分

乾地黄 八分 丹參 六分 防風 七分 黃耆 六分

右十六味爲散酒服方寸匕日三服忌海藻菘菜生菜猪肉冷水桃李雀肉等

白德按
二疑當
小五

外臺秘要

又療肝氣之少眼視眈眈面目青眼中眵淚不見光明調

肝散方

細辛

栝實

各二兩

蕤人

甘草

各一兩

羊肝

一具去脂膜炙乾

右五味搗為散以酒服方寸匕甚良忌同前

又療眼盲腦痛方

鯉魚腦并膽等分調以注目皆日三良

肝後療雀目

必効蔓菁子散主青盲瞳子不壞者治十得九方

蔓菁子六蒸之看氣遍合甑下以釜中熱湯淋之即

暴乾如是三度訖搗篩清酒服二方寸匕漸至加三

七陰雨日勿合散壞百日剋愈神効甚良

雀目方四首

病源人有晝而睛明至暝則不見物世謂之雀目言其如

鳥雀暝便無所見也 出第二十八卷中

廣濟療雀目地膚子丸方

地膚子 五兩 決明子 一升

右二味擣篩米飲和丸每食後以飲服二十九至三十

丸

又雀目至暮無所見者栢皮散方

老栢白皮 四兩 烏梅肉 二兩 細辛 各四兩 地膚子 各四兩

右四味搗篩為散每食後清酒服二方寸七日三四服

差

崔氏療雀目方

七月七日九月九日取地衣草草淨洗陰乾末之酒和

服方寸七日三服一月即愈

出第四卷中

千金翼療眼暮無所見方

猪肝具一細切以水一斗煮熟置小口器中及熱以目

臨上大開勿閉也冷復溫之取差為度

出第十一卷中

目膚醫方一十四首

病源陰陽之氣皆上注於目若風邪痰氣乘於腑藏腑藏

之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚瞖膚瞖者
瞖睛上有物如蠅翅者卽是又此言肝藏不足爲風熱之
氣干之故令目睛上生瞖瞖久不散漸漸長侵覆瞳子出
第二十八卷止

深師療眼瞖方

胡粉注瞖上以療三年瞖

又療眼黑瞖覆瞳子膚起方

貝子

四枚
燒

空青

一兩

礬石

一兩
熬
汁
盡

右三味末取如黍米注瞖上日二

又主眼瞖方

書中白魚末注少許於腎上

千金療目赤及腎方

烏賊魚骨

去甲

鉛丹等分合研細和白蜜如泥蒸之半

食久著少許四背中差

又去腎方

貝齒

十枚燒

細篩末取胡豆著腎上日再正仰卧令人

傳之炊一石米久乃拭之息肉者加真珠如貝子分

等研如粉

又療目腎障白膜落方

雄雀屎人乳和研以傳上當漸漸消爛良妙

肘後并翼同

洗眼湯療熱出攻眼生障翳方

秦皮

黃蘗

決明子

黃芩

黃連

各三分

麩人

五分

梔子人

七枚

大棗

五枚

右八味切以水一升煮取六合洗日日二差忌猪肉

千金翼真珠散主白翳覆瞳睛不見物方

光明朱砂

二分

貝子

五枚炭燒末之

白魚

七枚

乾薑

末半分

右四味擣為末相和研之如粉以熟帛三篩之仰臥

人以小指爪挑取少許將傳眼中亦主白膚翳風淚

生血物

又七寶散主日翳經年不愈方

丹 仁三分 湯水二

而德按 漢字下 千金翼 看火字

通按

朱砂一作礬砂

白真珠一分

珊瑚一分

紫貝一分

馬珂一分

朱砂二分

琥珀一分

麝人二分

決明子一分

石膽一分

右九味擣下篩極細傳目中如小豆日三大良忌生血

物並出第十一卷中

崔氏療醫五十年不差方

貝齒一枚

豆豉三十八枚

三年苦酒三升

右三味先漬貝齒三宿消盡乃內豉微火煎如膠取三

合藥置筒中夜卧時著如小麥大於背頭明日以湯洗

之十日愈

通按

筒中一

管

中

又癢眼中醫少輕者方

取枸杞及車前子葉分等手中熟按使汁欲出又別
取桑葉兩三重裹之懸於陰地經宿乃摘破桑葉取
汁細細點目中不過三五度腎自當爛

又腎如重者方

取楮白皮暴乾合作小繩子如麤釵脚許火燒作灰
待冷隨便以灰點腎上不過三五度腎自當爛張右

司送 並出第四卷中

延年療眼熱暈白腎覆瞳子方

車前子

九分

決明子

黃連

各九分

黃芩

秦皮

玄參

沙參

瞿麥

地骨皮

蕤核人

各七分

藍實

九分

右十一味搗篩蜜和丸如梧子食後飲服二十九漸加至三十九差止為度忌猪肉

謝道人療眼醫欲盡微微猶有者傳此散方

珊瑚

虎珀

玉屑

曾青

紫貝

朱砂

伏雞子殼

去白皮

右七味各等分研重篩為散仰臥以米許置瞿上四五

度忌血物

暈醫方四首

病源五藏六腑之精華皆上注於目目為肝之外候肝藏
血血氣不足則肝虛致受風邪風邪搏於精氣故精氣聚
生於白睛之上繞於黑睛之際精彩昏濁黑白不明審謂
之日暈

延年主眼熱暈瞽覆瞳子方

柴胡 三兩

茯苓

枳實 炙

決明子

瞿麥

各三兩

黃連

別漬

甘草

炙

麩人

各二兩

右八味切以水一斗煮取二升七合去滓分再服忌海

藻菘菜猪肉酢物

又方

黃連

決明子

車前子各九分 黃芩

沙參

人參

地骨皮 麩人

瞿麥

茯苓各七分

秦皮 甘草

澤瀉各五分

右十三味搗篩蜜和為丸如桐子飲服二十九日再服

為度

又療眼因赤差後瞽暈方

決明子六兩 黃連

麩人各六兩 黃蘗四分

鹽碌三分

右五味搗末更研極細取少許內目中日三四度忌者

肉

又方

秦皮 一兩

右一味以水一升五合煮取七合澄清决明用漬散肉

目中一如前法 並出第四卷中

生膚息肉方八首

病源息肉淫膚此由邪熱在藏氣衝於目熱氣攻於血脉
蘊積不散結而生息肉在於白睛膚驗之間即謂之息肉
淫膚也

肘後療目中生肉稍長欲滿目及生珠管方

宋 吟 無 病 源 有 完 本 關 病 源 五 字 尚 德 按 此 條 亦 後 人 所 下 甚 清 字 聖 藥 當 張 詞 二 可 德 按

貝齒

真珠 分等

右二味並研如粉拌令和以注肉上日三四度良

小品療眼膚肉生覆瞳子者方

取針燒令赤爍著膚上不過三爍縮也有令人割之

三復生不如爍之良

刪繁療肝熱不止衝眼為昔赤脉息肉閉痛不開但熱勢

彭彭不歇及目睛黃洗肝乾藍飲方

乾藍 切

車前子

苦竹葉

切各 秦皮 三兩

細辛

決明子

麩人

山梔子

升麻

芍藥 各三兩

石十味切以水二斗煮乾藍取一斗去滓取清八升煮藥取一升下芒硝三兩沸去滓分再服忌生菜

千金療眼中息肉方

驢脂石鹽末和以注眥卽差

千金翼礬石散主目瞤及努肉方

礬石上上白者內如黍米大於瞤上及努肉上卽令淚出以綿拭之令得惡汁盡日一其疾逐惡汁盡日漸自薄便差好上上礬石無過絳礬石色明淨者復如療眼常法

崔氏療人眼熱冷膚肉瞤方

時字下
宋本有
以草
三字
高德按
疑當
本廷

光明朱砂

一兩

研 礪砂

一兩

漿水

一大升

右三味以五月五日合置銅器中日暴使乾用刀子刮

取以新帛裹之每夜眠時著一米許安眼四眥各一米

畫一月間內外暗者皆愈忌生血物

出第四卷中

必効療眼熱努肉及赤痒方

黃連

一兩

竹葉

一兩

右二味以水一升半煎取半升置銅器中湯上煎似稀

錫止卧時點眼中熱淚出即差止

謝道人療眼風熱生赤肉方

大黃

二兩

黃芩

一兩

甘草

炙

人參

地骨白皮

決明子

各三兩防風

石膽

地膚子

黃連

兔肝

各一兩

車前子

一升

螢火蟲

一兩 救

右十三味搗篩為散以鯉魚膽一合和丸飲下十五至

三十九忌猪肉海藻菘菜

目風淚出方六首

病源目為肝之外候若被風邪傷肝肝氣不足故令目淚
出其湯熨針石別有正方補養宜導今附於後養生方
引法云以鼻內氣左手持鼻除目睛泣出又云端坐伸腰
徐以鼻內氣以手持鼻除目睛淚出又夫五藏六腑皆有

兩德按
病源仲
作生手
字上有

津液通於目者為淚若藏氣不足則不能收制其液故目

自然淚出亦不因風而出不止本無赤痛

並出第二十八卷中

深師療眼淚出雞舌香丸方

雞舌香 二銖

黃連 六銖

乾薑 一銖

藜人 一百枚

礬石 二銖
熬

右五味搗為末以棗膏和丸如雞距以注眼背忌猪肉

又療眼白腎淚出雞距丸方

乾薑 三分

藜人 三十枚

雞舌香 十枚

黃連 二銖

胡粉 四銖

礬石 五銖
熬

右六味搗末以棗膏丸如雞距注眼大眦日再忌猪肉

風淚出眼痒痛散方

貝齒 十枚

決明子

黃連

細辛

乾薑 各一分

右五味擣下篩以指爪取如麻子注眥中日再三夏月

加乾薑一分眼痛以三指撮二合水煮三沸去滓以汁

洗之良 何漢壽用甚有效驗

集驗療目中風寒淚出眥赤痒乳汁煎方

黃連 三分

麩人 二分

乾薑 四分

右三味擣散以乳汁一升漬藥一宿明且於微火上煎

得三合綿絞去滓取如米內眥中

崔氏療目淚出方

苦酒

古錢

一百五
十文

右二味以苦酒漬錢微火煎取三升去錢濾取汁更煎取七合漸漸點著背中甚良

又療目中煙淚出不得開即刺痛方

取石鹽如大豆許用內口中習習去鹽以冷水洗數

日差

並出第四卷中

眦目方八首

廣濟療眦目籠帶灰方

取少許籠帶燒作灰水服方寸匕立出

別後同

又療眯目不出淫膚瞿麥散方

瞿麥

乾薑

各二
分

右二味為散以井花水服方寸七日三不過三眯出

又療眯目猪膏塞鼻方

以猪膏如半雞子裏鼻孔中隨眯左右著鼻中以驗
之即復仰卧須臾不知眯處

又麥芒入目不出方

煮大麥汁注眼中即出良

肘後療目萃芒草沙石聾眯不出方

磨好書墨以新筆點注目中瞳子上

高德按
裏疑當
作塞

高德按
裏疑當
作塞

又方

鹽豉各少許著水中臨目視之即出

並出第一卷中

深師療目痛及眦忽中傷因有熱暝者方

取地膚白注目中

千金翼主眦目不明方

惟羊鹿筋擘之內口中熟嚼著臉上以手輕授之若有眦者二七遍授便出之視眦當著筋出即止未出者復為之如此法常以平旦日未出時為之以差為度出乾以好蜜注四眦頭鱧魚膽亦佳若數授目痛

可間日授之

出第十一卷中

商德按
子金
子乾
子金

肝氣不足方二首

千金翼補肝湯主肝氣不足兩脅拘急痛寒熱目不明并

婦人心痛乳癰膝脛熱消渴爪甲枯口面青方

甘草 炙

防風 各三兩

烏頭 二兩 炮

大棗 二十枚

細辛

栝子人

茯苓 各二兩

梨人

桂心 各一兩

右九味切以水八升煮取三升分爲三服忌海藻菘菜

猪肉生葱菜酢物

又補肝湯主肝氣不足方

甘草 炙

黃芩

人參

桂心 各二兩

尚德按
丸字疑
新

右四味切以水六升煮取二升分三服忌生葱餘同

肝實目痛方二首

刪繁療肝實熱目痛胃滿急寒瀉肝前胡湯丸方

前胡

秦皮

細辛

梔子人

黃芩

升麻

蕤人

決明子

各三兩

芒硝

三兩

苦竹葉

切一升

車前草

切一升

右十一味切以水九升煮取三升去滓內芒硝分為三

服 千金同

又療肝實熱或眼痛熱不止生地黄煎方

生地黄汁

一升 玄參汁 五合

蜜

五合

車前汁

五合

外堂

三五

升麻

細辛

各二兩

芍藥

梔子

各三兩切

右八味切以水五升煮升麻等四物取一升五合去滓

下生地黃等汁蜜沸成煎分五六服

眼雜療方二十首

內缺二方

廣濟療客熱衝眼赤痛淚出決明湯方

決明子

升麻

枳實

炙

柴胡

黃芩

芍藥

各二兩

梔子

十四枚

竹葉

一升

車前草

四升

甘草

一兩炙

右十味切以水九升煮取二升五合去滓內芒硝濕服

分爲三服忌海藻菘菜

方
九
一

又療先服石熱衝上眼赤方

黃連

苦參

槐子

各八兩

麩人

決明子

黃芩

各二分

麥門冬

六分去心

萎蕤

大黃

各六分

右九味擣篩蜜和丸如梧子食後以蜜水下二十至三

十九忌猪肉

肘後療日卒痛珠子脫出及有青翳方

越鷲矢

真丹

乾薑

各等分

右三味末如粉以少許著目中翳上良妙

小品療眼風結腫合或眼生翳人口吹之睛中牽引疼痛

白芨赤起或黑變黃從下上覆半睛者秦皮湯方

秦皮 洗

黃連 各二分

黃蘗 三分

大棗 五枚

麩人 二分

右五味切以水二升煮取一升以洗眼忌猪肉

集驗療眼闇熱病後失明方

以羊膽傅旦暮各一

又療風眼爛眦者方

竹葉 四分

栝白皮 六分

黃連 四分

右三味切以水二升煎取五合稍稍滴兩眦日三度忌

猪肉

令水清接取以別釜煮之水盡即添益時嘗看味

瀝出暴乾

右一味搗末酒飲等任意和服三方寸七日惟服七合
飽食任性酒服即服無限時慎生冷百日身熱瘡出不
久自差

又療目赤口乾唇裂方

石膏 一斤

生地黃汁 一升

赤蜜 一升

淡竹葉 五升

右四味以水一斗二升煮竹葉取七升去滓入石膏取

一升半下地黃汁蜜取三升細細服之忌蕪荑

並出第
十一卷中

文仲陶氏療數十歲聾眼爛皆方

德按
字下
千金翼
有兩沸

摘葫葉中心一把著鑊中水五升煮用小板覆上穿

作孔以目臨上瘡當痛食頃出淚一升便即差

必効朱砂散主人眼中有黑白花逐眼上下方

光明砂

六分

地骨白皮

五分

車前子

三分

龍腦香

六分

決明子

五分

右五味搗篩細研如粉少少傅之

近効療熱風暴赤驗爛生瘡或礮或疼或痒或痛久患虛

熱遠視不明喻若隔綿看花或服石乳發動冷熱淚出白

睛赤紅腫脹淚暴眼珠皆是肝二膈實熱腎藏已虛宜先服

竹葉飲子治之然後可點藥凡患眼有連睛疼痛者皆不

得以辛辣藥點之幸請細意詳思不得措手此見投
藥未曾試以各說異能競施衆療微有疼障似瞽者或
庸人不審眼珠厚薄乃將針穿豆爪甲摩之傷敗非一
輒附數方百無一失且服之不令吐利點藥不痛不疼
攝既有所憑疾苦豈能不愈如前病狀宜服此竹葉飲子
除風客熱暴礮澁疼痛睛赤目黃冷淚熱淚兼理石乳天
行眼疾方

竹葉 一握

乾葛 三兩

地骨白皮

薺萐 各五兩

甘草 三兩

右五味切以水二大升煎取半升去滓內車前子三

分三服一日令盡皆食後服之良不過三劑眼中疼痛
歇次得點藥一無疼痛神効前方亦須傳藥抽熱毒風
不然恐尋經脉入眼熱深入亦難差也又取羊肝一具
或猪肝亦得猪肉精處亦堪取三斤皆須破作手許大
片厚薄亦如手掌候其疼處或從眼後連耳上頭或有
從眉向上入頭掣痛者火急新汲水中漬令極冷貼其
疼痛脉上及所患部分候肝或肉稍暖微則易之須更
間其肝肉等並熟如煮來者豈不是熱毒之候出也此
卽損眼之禍又恐三辰齋忌之月無肉以大豆還作四
五替如漬肝肉法更互熨之其疼痛忽連鼻中酸辛者

豆按

大豆還

豆

今

人

以是難差之候亦宜急覓其藍莖葉擣如泥傅痛處

有差者十得三四凡是此患不宜久忍痛若深入於眼

中漸成痼疾尚德拾遺者旋轉互用之意非謂豆腐也

又療眼睛不疼亦不痛上下驗赤風痒生瘡淚多者宜點

此藥方

糝人四十九枚去赤皮研

胡粉如碁子許大上火燒看赤變如金色

右二味各別研取好真酥如杏核許大都一處和研令

勻入龍腦香如大豆許大三粒研令消宜油帛裹或細

合子盛之勿泄氣傷風則不堪用或有小兒胎赤並宜

用此方且不疼痛亦不損眼大人久患赤痛爛瘡者宜

先取鹽花或好白鹽一方寸匕醋漿水不用純酢中中者一大升煎鹽三五沸綿濾取汁欲夜臥先以清水洗眼次以鹽湯洗之拭令眼乾次以爪甲挑取麻子許多藥塗眼大小皆任眼開合須叟少淚出眼中涼冷狀若人吹不經三日內其赤便差視物漸明恐眼中忽有到睛毛刺眼者速令一人以鑷子摘去之否則令眼淚多礮痛若不除之塗藥終無益耳

又凡目疾不問少長男女等所忌有五一房室二麪酒三日衝風冷霜雪向日遠視四哭泣嗔怒五終身不用喫生五辛蕎麥葵菜若因疾犯者則疾深難療幸細意將慎百

無一失故具五忌也

又療眼赤腫熱疼淚出燒人皮肉不可堪忍或石乳發動
起睛疼悶乍歇乍發頭痛增寒驗赤瘡爛無所見物白膜
覆黑珠或因天行斑毒入眼無所見者一切藥並不可著
唯宜用此法甚驗萬無失一方

千歲藥汁一名夔夔藤汁也不問春夏秋冬夏比採其
莖削去上蒼皮麤細如大母指大者即得截斷可長
六七寸取一銅器或瓷器中盛水三五升漬之一食
頃其頭白乳汁出可長半寸許取此汁將

通按

此處文

仍舊

關之

又療眼中一切諸疾青盲瞽者天行風赤無端忽不見物

悉主之此方兵部侍郎盧英所傳價重千金

石膽 研

波斯鹽綠 研

石決明

烏賊魚骨 去甲

鈇丹

細辛

濃沙 各三分

蕤人 碎

防風 三兩

秦皮 二兩

馬蹄決明 二兩

是辰砒 是辰或 是疑當

右十一味搗散及研避風煮以白蜜鍊濾使淨和訖於
白中更搗五七千杵以油臘紙重裹之重合盛勿令見
風可致百年不敗合之不欲見蟲犬與鳥雀婦女及孝
子穢惡之類仍取臘月合之有患取米粒更和上蜜如
和餈夜卧點之衝風行亦不畏每日點以差卽止

夏候

極處傳

又凡自天行病後皆不得食葵熱麩生五辛蕎麥魚膾毒
物傷目就中更犯房室加之疼痛連眉乍疼乍痒鬢邊脉
筆微似憎寒愚醫不曉遂妄針灸兼服補藥因茲失明或
有先服英乳之人亦同斯疾宜卽將理不得妄服湯丸甘

苦酸辛須知冷熱只如腎風虛損瞳人脹大無瞖而便失
明假如肝藏熱風筋膜連睛生薄浮瞖宜服甘平苦味之
藥辛酸溫熱入口發其風毒唯宜傅薄膏散熱氣自除少
飲湯方攝埋不盈三劑日漸痊愈吐利湯鍼灸不得妄施
宜服後方療天行從因犯食毒失明兩鬢脉掣熱疼兼頭
痛憎寒天陰即發及先食英乳者方

前胡 三兩

生麥門冬

五兩 去心

竹葉

一握

甘草

二兩 炙

梔子

二七 枚

乾葛

葵藜

三兩

漏蘆

各三兩

右八味切以水三大升煮取一大升分作三服神驗良

忌海藻生菜

尚德按
二兩二
身疑折

又鼯鼠上膏療眼疼脉掣連耳熱疼不可堪者方

取口中鼯鼠上

二升

青木香

一兩

大黃

五兩

白欬

二兩

寒水石

六兩

右五味搗篩爲散用熟新白酒和如稠餈當痛掣處摩之如手掌許傅之乾卽易至乎旦午卽止神効無比

又眼有倒睫毛或折在臉中聚生刺人白睛唯覺痒悶漸赤膜起連上下臉多赤生瘡若掣刺黑睛則淚出似白翳出若刺著瞳人令眼疼痛礮澁不欲見明連鼻駿痛兼腦掣夾此多損傷宜速救療其法如左

若欲療之者皆取乎晨日未出之際令一眼明人把

鑷子拔之去倒睫毛勿使毛斷連根去之下手十減
八九疼痛立止至夜點前千歲藥汁三五日將息方
得平復點首生男乳汁良若點辛辣之藥從此傷敗
實可痛哉慎風寒日月光及煙火房室五辛一月內
即差

又凡是黑睛及瞳人瑩薄有瘡醫皆不可用辛辣及溫藥
洗之並是害眼之兆宜用秦皮湯洗之方

秦皮 一兩

梔子 人二七枚

淡竹葉 一握

右三味切綿裹以水一升半著銅器中煎三五沸以綿

濾取洗眼切須淨器物盛之 夏伏極錄用

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔
較勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十一卷終