

# 溫疫條辨摘要



溫疫條辨摘要

附 風溫簡便方  
金瘡鐵扇散方

光緒己丑年

浙江書局刊

原序

漢長沙太守張仲景傷寒論爲方書之祖其治傷寒諸方於今  
爲烈惟於溫病溫从江後人省江加汗爲瘧卽溫字僅有刺穴之法而世失其傳  
後人不明其義凡遇春溫夏熱外感內傷以及陰虛內熱等症  
執守成方概以傷寒施治張冠李戴其貽誤豈淺鮮哉是以河  
間東垣丹溪繼起詳爲發明有功天下後世良多此薛立齋所  
以有外感遵仲景內傷法東垣熱病用河間雜症用丹溪之通  
論也惜於溫病治法猶未發其奧妙吳又可溫疫論出世人咸  
奉爲金科玉律矣然尙泥於膜原之說若逢初得卽中陰陽毒

脉伏體厥及一切暴症急症乃疾雷不及掩耳必待離於膜原然後議下恐亦不可救藥也且如三消飲中用草菓羌葛等味溫中發表與亢陽之症頗不相宜博採溫病良方莫如山陰陳三錫所著二分晰義一書之簡當詳明自夏邑楊栗山著傷寒溫疫條辨妙會張仲景溫病可刺五十九穴之義而又以後賢諸書神明而化裁之爲之條分縷晰使寒溫之辨朗若列眉實發前人未發之覆啟千古不傳之秘醫者倘卽此而精研之凡治溫疫當無復有含冤者矣但其書尙未廣傳卽豫省坊間亦無市本雖於溫疫盛行時舉其說以告行醫諸君子又恐其少

見多怪也嗚呼斯人何幸遭此疫癘而又爲庸醫所誤致有合  
家殞滅而莫之或悟者竊心傷之因以硯田餘力出其三折一  
得之見爰卽陳楊二家言特爲摘要一卷略明大義備載症脈  
條列治法雖不盡詳言其所以然之故而大要已具使第依樣  
葫蘆按症施治固未有不愈者也若夫因應隨機神明變化則  
又存乎其人耳錄成特書微意以弁諸首嘉慶辛未新安呂田  
書於橫山澹成軒

原序

憶自嘉慶甲戌河南新安呂子浴軒館余家昕夕談論每言其

從兄硯平先生學問人品爲洛西冠而兼邃於醫病多奇方方  
多奇中惜乎余未之見焉丙子春兒子驄忽遘疾遠近醫者數  
十輩咸以爲傷寒投以汗和之劑而勢益增延數日幾瀕於危  
正在倉皇無措適先生之胞姪子模世兄緣事過沃迂道問其  
從叔浴軒於館當卽延入診視一見決爲瘟病所開之方迥異  
尋常治法入口下咽症隨藥減漸次獲痊因詳與語乃知其令  
叔著有瘟疫條辨摘要一書屢爲友人謀刻未果凡所據以審  
症用藥者實本諸此余欲取而讀之倉猝弗可得迄今數年浴  
軒乃攜以至展誦數過始知有陳楊二家書而先生之博覽精

探廻非膚見淺學可比獨念先生品學足以醫國醫俗上下均無所施而僅寄託於方書小道致足惜耳適沈吟問兒子驄忽從旁請曰聞先生之於是道蓋不啻三折肱矣此書尤發前人未發之覆簡明精當闢千年之藜蕪張暗室之明燈有益於世不淺未宜久秘篋中願捐貲付剞劂廣傳當時俾業是科者知瘟病另爲一門與傷寒治法迥然不侔庶臨症不至乖方而其大有造於斯人也正匪獨先生之志也夫余欣然從之而爲之序 詔封中議大夫候選郎中前戶部江南司主事古沃愚弟裴念謨頓首拜書時道光癸未九月二日也

寄勸重印廣傳原序

余於咸豐丁巳筮仕中州謬膺筦鑰十有餘載惟素不知醫而極愛良方刊刻廣傳終日孜孜不憚煩勞且於公餘之暇修製丹丸購買靈藥施送多厯年所本省及各省醫療病症無算已身四十餘年無疾纏繆益信功不枉用中州厯年來旱時居多頻生瘟疫醫家總以傷寒方治之無效正在無法可施適已未春洪大令自山西攜來瘟疫條辨摘要一書據云曾在安徽經驗多年奈兵燹之後板片無存只有一本恐日久遺失勢必失傳豈不可惜於是依方施治無不應手而療一時傳抄洛陽紙

貴計算此書字數不下四萬每字工價一文謀諸同善好施十人每人各出青蚨四貫付之梓人兩月告成中州全省傳遍活人甚廣恐他省未必周知茲再刷印寄至京都另刷一分求各省提塘寄各省首縣卽求釀金刻印廣傳外府屬之州縣則各省共傳此方人人同登壽寓不分此疆彼界依然痛養相關非特予小子之幸抑且是書之幸云爾是爲序同治十年歲次辛未識於豫省官舍燕山忻如宋光祚

引言

歲丁丑都門疫甚有友云疫無死證皆誤治耳服其藥者果立起活人無算余亦其一也叩其術厯數群書余不知醫頗苦其多乃云溫疫條辨摘要一本言簡且賅即不曉脈息按證施治靡不應手嗣徧覓坊間越二年始獲此本

卷之三

四

四

閱之了々累試悉驗今甌人適苦疫用亟利布冀裨安黎光緒十有一年八月

郡守李士林識  
安樂雜錄要一本

瘟疫條辨摘要目錄

瘟病根源症治與傷寒不同辨

雜氣說

瘟病與傷寒六經症治不同辨

瘟病症狀五十條

大頭六症

瘟病諸下症

續增分別瘟病症治八十五條

四損不可正治辨

痘病與傷寒不同診脉義

痘病正治諸方

痘病雜症諸方

補遺諸方

附治捻頸血痢瓜瓢楊梅跖蹠錦霞諸痘六方

又附葡萄疫症治

又附風溫簡便方

又附金瘡鐵扇散方

瘟疫條辨摘要

原本

山陰陳良佐錫三先生二分晰義

夏邑楊 璞栗山先生寒溫條辨

河南新安呂 田心齋集錄

瘟病根源症治與傷寒不同辨

傷寒得天地之常氣、冬寒之月、風寒外感、邪氣從肌膚入、自氣分傳於血分、治法以發表爲第一義、故不見裏症、一發汗而外邪卽解、溫病得天地之雜氣、卽天地之癟氣、四時皆有、春夏較多、而於兵荒之後爲尤甚、延門合

只每相傳染謂之瘟疫。邪氣從口鼻入中於三焦。自血分發出  
非若傷寒之不染人也。邪氣從口鼻入中於三焦。自血分發出

氣分治法以逐穢爲第一義。

吳又可曰大凡客邪貴乎早治須乘人氣血未亂肌肉未消津液未

耗病人不至危殆投劑不至掣肘愈後亦易平復欲爲萬全之策者不過知邪之所在早拔去病根爲要耳此其所以注意逐邪不拘故雖有表症。瘟病凡見表症皆裏結糞也。故雖有表症。症鬱滯浮越於外也。一發汗而內邪愈熾。吳氏曰醫見有表復有裏乃引經論先解其表乃攻其裏此大謬也。○以上分別寒溫了如指掌最宜着意認識庶不入於歧路近時治瘟病者每以治傷寒方治之卽不用辛溫發散之品亦多用九味羌活湯或達源三消之劑溫覆汗之不然則小柴胡湯和之非發汗過多卽和解擔延往往變爲亡陽越經等症遺誤不淺不得不辨或用鮮薄荷連根搗取自然汁服能散一切風毒然亦非爲發始設也臨症慎之。或曰內經云冬傷於寒春必病溫何也楊栗山曰冬傷於寒謂人當冬時受寒氣也春必病溫謂人到來

春必病溫也。亦猶曰人之傷於寒也。則爲病熱云爾。東垣云其所以不病於冬而病於春者。以寒水居卯之分。方得其權。大寒之令復行於春。開發腠理。少陰不藏。辛苦之人。陽氣外泄。誰爲鼓舞。陰精內枯。誰爲滋養。生化之源已絕。身之所存者熱也。故內經又云。冬不藏精。春必病溫。此水衰火旺來春。其病未有不發熱者。與溫病何涉。溫病者。疵癥之雜氣。非冬來之常氣也。腎虛人易爲雜氣所侵。則有之。非謂傷於寒則爲溫病也。經何以不曰溫病。而必曰病溫乎。蓋溫者。熱之始。熱者。溫之終也。豈諸家所謂溫病者哉。特辨以正前人註釋之謬。按晉王叔和序。

例云冬時嚴寒殺厲之氣中而卽病者爲傷寒中而不卽病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病溫暑之病本於傷寒而得之此論一出印定後人耳目未有不以治傷寒方治溫病者仍訛踵謬牢不可破不思寒毒殺厲之氣如何藏於肌膚淺浮之處猶能曠日持久安然無恙至春夏而始發作耶此亦可不煩言而知其說之誤矣

雜氣說 節錄

雜氣者。天地一切不正之氣。楊栗山曰。毒霧之來也。無端烟瘴之出也。無時。濕熱薰蒸之惡穢。無窮無數。兼以餓殍在野。骸骼之掩埋不厚。甚有死尸連牀。魄汗之淋漓自充。遂使一切不正之氣升降流行於上下之間。凡在氣交中。無可逃避。雖童男室女。以無漏之體。富貴豐亨。以幽閒之思。且不能不共相殘染。而辛苦之人可知矣。而貧乏困頓之人。又豈顧問哉。語云。大兵之後必有大荒。大荒之後必有大疫。疵癘旱潦之災。禽獸草木。往往不免。而況於人乎。觀此益知瘟病根源。絕非冬來之常氣矣。

接吳又可曰。雜氣之所全無時所着無方。故有發於一鄉一邑而他處安然無有者。亦非年歲四時五運六氣之所可拘也。其所著雜氣論亦可互參。

溫病與傷寒六經症治不同辨

此辨六經形症甚悉臨症詳之自知何症爲何經矣

凡傷寒

冬月爲正傷寒

足太陽膀胱經從頭項貫腰脊故頭痛項強身痛發熱惡寒然風寒常相因寒則傷榮頭痛惡寒脈浮緊無汗麻黃湯主之開發腠理以散寒得汗而愈風則傷衛頭痛惡風脈浮緩有汗桂枝湯主之充塞腠理以散風汗止而愈若風寒並受榮衛俱傷頭痛發熱無汗煩燥大青龍湯主之此三方者冬月天寒腠密非辛溫不能發散故宜用也

此言治冬月正傷寒表症若用以治

溫病未有不死者

若夫春夏之溫病

冬月患溫病者有之

斷寒表症而爲傷寒者其雜氣從

口鼻而入伏鬱中焦流佈上下一發則炎熱熾盛表裏枯涸其

陰氣不榮。斷不能汗。亦不可汗。邪不在表也。宜以辛涼苦寒清瀉爲

妙。輕則清之。神解清化芳香之類。重則下之。增損雙解加味涼

膈升降之類。消息治之。△△傷寒汗後熱不退。此陰陽交而魂魄離

也。症亦危矣。熱稍緩者。宜更汗之。若反劇煩燥者。必有夾食夾

痰。或兼有宿病。當尋其源而治之。若發熱煩燥。小便不利。爲熱

入膀胱之本。五苓散主之。△△溫病清後熱不退。脈洪滑數。或沉伏。

表裏皆實。譫語狂越。此熱在三焦也。加味六一湯解毒承氣湯

大下之。傷寒傳至陽明。則身熱目痛鼻乾。不得卧。葛根湯表裏俱盛。口渴引飲。脈洪大。此在經之熱也。宜白虎湯傳。至少陽爲

半表半裏之經往來寒熱脇滿口苦耳聾乾嘔默默不欲食小柴胡湯加減和之若溫病見此症宜增損大柴胡湯治之過此不解則入陽明之府表症悉罷名爲傳裏若溫病則邪熱本在裏潮熱譫語脣焦舌燥大便

秘脈沉實長洪如痞滿燥實四症皆具大承氣湯主之但見滿燥實三症邪在中焦調胃承氣湯不用枳朴恐傷上焦之氣若只見痞滿二症邪在上焦小承氣湯不用芒硝恐傷下焦之血也小腹急大便黑小便自利喜忘如狂畜血也桃仁承氣湯代抵當湯丸濕熱發黃但頭汗茵陳湯傷寒下後熱不退胸中堅滿不消脉尚數實者此爲下未盡或下後一二日復發喘滿者

並可用大柴胡湯或六一順氣湯復下之若下後仍不解宜詳虛實論治如脈虛人虛發熱口乾舌燥不可更下小柴胡湯參胡三白湯和之溫病下後厥不回熱仍盛不退者危症也如脈虛人弱不可更下黃連解毒湯玉女煎清之不能不下黃龍湯主之若停積已盡邪熱愈熾脉微氣微法無可生至此下之死不下亦死用大復甦飲清補兼施宣散虛熱脈氣漸復或有得生者醫貫以六味地黃丸料大劑煎服以滋真陰此亦有理若傷寒腹滿而嗌乾則知病在太陰也口燥咽乾而渴則知病在少陰也煩滿囊縮而厥則知病在厥陰也邪到三陰脉多見沉

、倘沉而有力、此從三陽傳於三陰、熱症也、外雖有厥逆自利、欲  
寢舌捲囊縮等症、正所云陽極發厥、止該清之下之、自是桂枝  
加大黃承氣六一一派、若溫病見此等症、自是涼膈六一解毒承氣之類、若本是陽症、  
因汗下太過、陽氣已脫、遂轉爲陰症、夫邪在三陽、其虛未甚、胃  
氣尙能與邪搏、而爲實熱之症、邪到三陰、久而生變、其虛之甚  
也、氣血津液俱亡、不能勝其邪之傷、因之下陷、而裏寒之症作  
矣、此熱變爲寒之至理、脉必沉而無力、症見四肢厥逆、心悸惕  
瞶、腹痛吐利、畏寒戰慄、引衣踳臥急、宜溫之補之、陽虛者附子  
四逆、陰虛者理陰、補陰傷寒多有此症、此言由三陽傳入三陰也、又有直中陰經者○

按溫病後半治法間或有同傷寒用桂附者亦不可不知溫病無陰症竭者老風燭已入四損不可正治之條亦難爲力矣熱變爲寒百不一出此辨溫病與傷寒六經症治之要訣也蓋傷寒之邪風寒外感始中太陽者十八九溫病之邪直行中道初起陽明者十八九信乎治療之宜早而發表清裏之宜諦當也倘審之不諦而誤治之卽成壞病是醫者之咎也可不慎與此書本爲溫病而設故論辨  
內凡治傷寒方茲不具載

按傷寒論曰。凡治溫病可刺五十九穴。成註瀉諸經之濕熱。  
謂瀉諸陽之熱。逆瀉胸中之熱。瀉胃中之熱。瀉四肢之熱。瀉  
五藏之熱也。觀此可知溫病治法與傷寒溫覆發散之法。劃

然兩途。又平脉篇曰、寸口脈陰陽俱緊此明與傷寒脈浮緊。  
浮緩不同復繼之曰清邪中於上焦濁邪中於下焦陰中於  
邪則又與傷寒症行身背行身前行身側之迥別矣自叔和  
伏寒之論出而世人無不以溫病爲傷寒無不以傷寒方治  
瘟病致使仲景良法精義千古長晦無惑乎喻氏謂一肓引  
衆肓相將入火坑也此言雖近於慢罵實則救世之婆心耳  
余故特揭經言於此以告當時醫溫病者且爲進一言曰曾  
是傷寒論而猶不足信與

自知人能相不取言與

余始特辟道自外挾以告當知醫則諒者且僕故士吉田有  
界直師移入水乳也非吉神致使彼也。或問之曰之謂也。  
其誠姓姓姓聚丸也。諒辨于古死轉無爲乎。卽此一旨起  
而矣。又篇出而世人體不以臨臘識更無不以寒寒式。前  
後之傳也。故其後之傳也。故其後之傳也。故其後之傳也。  
名號。故其後之傳也。故其後之傳也。故其後之傳也。  
然則金父平和謹曰。廿口相効則效。則相效。則相

溫病以辨症爲要。其狀多端，特爲揭出，以便認識。

有頭暈渾身壯熱，內燒作渴，嘔吐食者○有頭眩，胸膈膨悶，不利，不思飲食，遍身壯熱者○有渾身壯熱，飲水無度者○有內燒作渴，而身不發熱者○有渾身壯熱而無汗者○有渾身壯熱而自汗無度者○有頭疼，腦悶，壯熱，發渴，渾身骨節酸痛者○有壯熱發斑者○有壯熱溫疹發露者○有頭面猝腫者○有腮臉偏腫者○有咽喉腫痛，痰涎壅塞，滴水不能下者用齒覓二斤，不見水，搗入白麵半斤，陳醋一兩，和勻敷腫處，便覺冰涼爽快。口含升降散，卽能下咽喉。半日間，其腫消盡如失。○有喉項俱腫，上連腮頷而疼痛，痰涎上壅者○有渾身壯熱

聲音不亮者○有猝然跌倒喉中痰响如水雞聲者、切莫認作  
莫認作眞中風更類中風○有渾身壯熱頭昏耳聾者○有頭項猝腫大如斗者○  
○有遍身斑疹雜出者○有似野火丹毒者○有似癰疹風瘡者○  
○有血從口出者○有血從鼻孔出者○有血從牙宣出者○  
○有血從大小便出者○有小便熱淋如血者○有小便濇痛不通者○有大便閉結者○有大便火瀉無度者○有舌強口苦咽乾聲音不亮者○有肚腹作痛腸鳴如雷者○有渾身壯熱內燒口舌生瘡者○有發斑譫語昏迷不省人事者○有見神見鬼手舞足蹈似風癲狂祟者○有患瘟疫而誤服發汗之

劑變爲亡陽之症發狂叫跳昏不知人者○有昏不知人如醉如癡者○有渾身壯熱頭痛咳嗽不甯者○有內燒作渴上吐下瀉身不發熱者○有憎寒壯熱一身骨節酸痛者○有四肢厥冷身涼如冰而噴氣如火煩燥不甯者○有遍身紅腫發塊如瘤者○有胸高脇起脹痛嘔如血汁者○有血從目出牙縫出毛孔出者○有血從大便出甚如爛瓜肉屋漏水者○有便清瀉白足重難移者○有肉瞞筋惕者○有舌捲囊縮者○有舌出寸許絞擾不住聲音不出者○有頭痛如破腰痛如折滿面紅腫目不能開者○有熱盛神昏形如醉人哭笑無常目不

能閉者○有渾身火泡瘡帶白漿者以上諸症有單見者有兼見者不可枚舉統以升降散治之

大頭六症乃瘟病中之最重且凶者傷寒無此症故復申

而明之

大頭者天行疵癘之雜氣人感受之壅遏上焦直犯清道發之爲大頭溫也世皆謂風邪閉塞而成是不知病之來厯者也○若頭顱腦後項下及耳後赤腫者此邪毒內蘊發越於太陽也○鼻額兩目並額上面部掀赤而腫者此邪毒內蘊發越於陽明也○耳上下前後並頭角赤腫者此邪毒內蘊發越於少陽

也○至於喉痺項腫勁筋脹大俗名蝦蟆瘧正經所云清邪中上焦也○如絞腸瘧吐瀉揪痛軟腳瘧骨痿足痛正經所云濁邪中下焦也○如瓜瓢瘧胸高嘔血疙瘩瘧紅腫發塊正經所云陰中於邪也六症統以升降散主之甚者增損雙解散加味涼膈散外敷方見前症狀條下後並有敷腳方

瘟病無正發汗之理惟下症最多並爲指明

面黃○身黃

此濕熱鬱於脾土之症宜茵陳湯合升降散治之

○目暗不明○目赤○

目黃○目瞑○目直視○目反折

此腎水枯涸邪熱居內之症宜加味涼膈散加龍胆草

○舌白胎○舌黃胎○舌黑胎

白黃者宜升降散加味涼膈散黑者宜解毒承氣湯○按黑而乾澀者屬實若黑而滑潤者屬虛更宜詳審脈症形神四者參

看的確分別治之虛者似宜用理陰之類不得謂黑色皆實也

○舌白砂胎○舌紫赤色○舌芒刺○舌裂○舌短○舌捲○  
舌硬○脣燥裂○脣焦色○口臭○鼻孔如烟煤○口燥咽乾  
○氣噴如火○揚手擲足○小便極臭○小便赤黑○小便涓  
滴作痛○朝熱○善太息○心下滿○心下痛○心下滿痛○  
心下高起如塊○腹脹滿痛○腹痛按之愈痛○小腹滿痛○  
頭脹○頭脹痛○頭汗○頭痛如破○譖語○發狂○畜血如  
狂○小便閉○大便燥結○轉屎極臭此皆下症虛者慎之便  
汗大麻仁汁生芝麻汁入蜜服自通○大便膠閉○挾熱不利宜大柴胡熱結傍流六一  
順氣虛者慎之○體厥○體厥○宜解毒○以上症治大畧已具、

瘟病諸症業已條列於前猶恐臨症含糊茲復詳錄寒溫條辨各條並摘取吳氏瘟疫論以明瘟病症治之所以異於傷寒者若干條令閱者了然於心不以瘟病爲傷寒不以傷寒方治瘟病則患瘟者自不冤矣其中有輕者有重者有最重者到底總無陰症諸條開列於左

陽症發熱惡寒頭痛身痛目痛鼻乾不眠脇痛寒熱而嘔潮熱、  
譖語詈罵不認親疎面紅光彩脣燥舌黃胸腹滿痛能飲冷  
水身輕易動常欲開目見人喜言語聲音亮口鼻之氣往來  
自如小便或黃或赤或溷濁或短數大便或燥秘或膠閉或

挾熱下利或熱結旁流手足自溫緩爪甲紅活此陽症之大畧也在瘟病無論爲表爲裏一於清熱導滯而已不宜發表以有表症而非表邪也

陰症在傷寒末傳塞中與陰寒直中三陰則有之其症或惡寒戰慄面時青黑或虛陽泛上面雖赤而不紅活光彩身重難以轉側或喜向壁臥或蹉臥欲寐或閉目不欲見人懶言語或氣微難以佈息或口鼻之氣自冷聲不響亮或時燥擾煩渴不能飲冷或脣青或舌胎黑而滑手足厥逆爪甲青紫血不紅活小便清白或淡黃大便下利或寒結或熱在肌肉之

分以手按之殊無大熱若陰勝則冰透手此陰症之大畧也  
瘟病無陰症○所以並列者○以別○陽症便於認識也○或四損之人亦有虛弱者○但其根源是瘟病卽溫補藥中亦宜用滋陰之味○若峻用辛熱恐真陰立涸矣○

所以前列腺者以別陽症便於認識也。或四損之人亦有虛弱者，但病即溫補藥中亦宜用滋陰之味。若峻用辛熱

陽症似陰乃火極似水真陽症也宜以雙解涼膈加味六一解  
毒承氣之類斟酌輕重消息治之。以下諸條皆言瘟病各  
症非兼傷寒雜症也閱者詳之

陰症似陽瘟病無此。雖房事後適病，病適至行房，總是陽症。  
陽毒陰毒雜氣中人之陽分爲陽毒。中人之陰分爲陰毒。凡中

此者不止面赤、吐膿血、咽喉痛、身痛、甚至心腹絞痛、大滿大  
脹、通身脉絡青紫、手足指甲色如靛葉、口噤牙緊、心中忙亂。  
一二日卽死者、但刺尺澤穴在骯髒上、下兩青筋、委中穴在腿灣上、下兩青筋、十指出血、  
並刺金津玉液二穴穴在口內舌上青筋。出血或有發泡者亦刺破、  
兼治七十二番、卽令服玉樞丹最妙、撥正散尤爲奇方、男左女右、吹  
入鼻中、雖危必甦、以增損雙解散主之。按辛巳之疫、亦間有  
用溫熱愈者、須臨症詳審。

表症發熱、惡寒、惡風、頭痛、身痛、項背強痛、目痛、鼻乾、不眠、胸脇  
痛、耳聾、目眩、往來寒熱、嘔而口苦、脈浮而洪、或緊而緩、或長

而弦此皆表症在瘟病乃裏症鬱結浮越於外也宜升降雙解裏熱一清表氣自透不待發散自能汗解

裏症不惡寒反惡熱掌心並腋下濶濶汗出腹中硬滿脹痛大便燥結或膠閉或熱結旁流或挾熱下利譫語發狂口渴咽喉乾舌黃或黑舌捲或裂煩滿囊縮而厥脉洪滑或沉實或伏數此皆裏症宜下並詳參前下症條

表裏兼症輕則增損大柴胡重則加味六一順氣主之

下後脉反浮裏症下後當脉靜身涼今脉浮身微熱口渴神思或不爽此邪熱溢於肌表裏無大留滯也雖無汗宜白虎湯

若大下後或數下後脉空浮而虛按之豁然如無以其人或自利經久或他病先虧或本病日久不痊或反覆數下以致周身血液枯涸宜用玉女煎加人參除邪滋陰其病自愈下後脈復沉餘邪復瘀於胃也宜更下之更下後脈再浮者宜白虎湯得汗而解如脈空浮而數按之如無宜白虎加人參下後脈反數身復熱舌上生津不甚飲水此裏邪漸去鬱陽暴伸也宜柴胡清燥湯和解之下後身反熱與上條義同下後反痞此虛而誤下也宜參歸養榮湯中病即止

下後邪氣復聚乃餘邪尙有隱伏因而復發再酌前方下之慎

勿過劑

下後奪氣不語乃氣血俱虛神思不清惟向裏睡似寐非寐似寤非寤呼之不應此正氣奪也靜守虛回而神思自清言語漸朗如用藥人參養榮湯可酌與之亦勿過劑

急症急攻蓋以雜氣流毒怫鬱三焦其病不可測識一發舌上白胎如積粉譬如早服涼膈承氣等方下之至午舌變黃色煩滿更甚再急下之至晚舌變黑刺或鼻如烟煤仍加硝黃大下之所謂邪微病微邪甚病甚非藥之過也此一日之間

而有三變、幾日之法。一日行之、稍緩則不及救矣。若下後、熱渴除、胎不生、方愈。更有熱除胎脫、日後熱復發、胎復生者、再酌前方下之、不必疑貳也。嘗見瘟病一二日卽死者、乃其類也。原本醫案云、丁亥五月、李廉臣女年十八、患瘟體厥脈厥、內熱外寒、痞滿燥實、譫語狂亂、罵詈不避親疎、煩燥渴飲不食、不寐惡人與火、晝夜無寢。刻予自端陽日診其病、至七月初三日始識人、熱退七八而思食、自始至終以解毒承氣湯一方、雪水熬石膏湯煎服、約下三百餘行、黑白稠粘等物、愈下愈多、不可測識。此眞奇症、恠症也。廉臣曰、若非世兄見眞

守定通權達變、小女何以再生。戊子秋舉人李煦南長公約年十五患瘧脈沉伏妄見妄言如醉如癡渴飲無度以加味涼膈散連下一月而甦。又予甥年二十一患瘧初病便煩滿囊縮登高棄衣渴飲不食日吐血數十口用犀角地黃湯加柴芩連梔元參荆芥穗灰十劑間服瀉心承氣湯七劑諸症退而飲食進越五日小便不通脹痛欲死予細診問脈仍沉臍間按之勁痛予思此土實氣閉不舒因而小水不利也以大承氣湯下黑血塊數枚而病始痊此皆症之罕見者也可見凡下不以數計有是症卽投是藥但恐見理不明認症不

卷之三

一

透。反致擔擗而輕重緩急之際。有應連日。有應間日下者。如何應多。如何應少。其間不能如法。亦足誤事。此非可以言傳。臨時酌斷可也。此等症治亦少存此以備參考。傷寒無此症治。予猶子慎樞治孟津杜名金鼎者。曾用增損雙解散生石膏八錢芒硝五錢大黃八錢。日進二付。連服八日而始愈。是亦大症之一驗也。故附誌之以便參酌。因證數攻瘍病下後二三日或一二日舌上復生胎刺邪未盡也。再下之胎刺雖未去已無鋒芒而軟然熱渴未除更下之熱渴減胎刺脫日後更復熱又生胎刺更宜下之吳又可曰余里周因之患疫月餘胎刺凡三換計服大黃二十兩始愈。又朱海疇年四十五歲患疫得下症四肢不舉身臥如塑目

閉口張舌上胎刺問其所苦不能答因問其子兩三日所服何藥云進承氣湯三劑每劑投大黃兩許不效更無他策惟待日而已但不忍坐視更祈一診余診得脈尚有神下症悉具藥淺病深也先投大黃一兩五錢日有時而少動再投舌刺無芒口漸開而能言三劑舌胎少去神思少爽四日服柴胡清燥湯五日復生芒刺煩熱又加再下之七日又投承氣養榮湯熱少退八日仍用大承氣肢體自能少動計半月共服大黃十二兩而愈又數日始進糜粥調理兩月平復凡治千人所遇此等症不過三四人而已姑存案以備參酌耳

發熱頭痛身痛而渴爲熱之輕者神解小清涼之類如發熱氣噴如火目赤舌黃譫語喘息爲熱之重者加味涼膈增損三黃石膏之類如發熱厥逆舌見黑胎則熱之極矣加味六一順氣解毒承氣大清大下之

惡寒口燥咽乾舌黃脣焦甚至戰振者乃陽盛格陰內熱則外寒也輕則神解甚則升降增損雙解治之

惡風等於惡寒神解芳香升降涼膈等方斟酌治之  
頭痛乃邪熱上攻頭面輕宜神解清化重則增損雙解升降合

內外治之

身痛乃熱鬱三焦表裏阻隔陰陽不通也宜神解芳香升降加味涼膈增損雙解之類隨其輕重酌用自愈

不眠由熱鬱三焦陰不敵陽故煩燥不能眠也輕則增損大柴胡湯重則增損雙解兩解表裏之熱毒以治之

多眠三陽合病目合則汗小清涼合白虎譴語有熱增損三黃石膏加大黃益胃中有熱亦欲多眠但神昏氣粗而大熱絕不似少陰之踰臥足冷也

自汗邪熱內結誤服表藥大汗亡陽煩渴不解大復甦飲不因誤表而自汗者增損三黃石膏裏實加大黃若愈後每飲食

及驚動卽汗出此表裏虛怯也。人參固本湯加黃芪、牡蠣、麻黃根以固之。吳氏用人參養榮湯至發熱而利，自汗不止者死。大汗出，熱反盛，狂言不止者死。汗出髮潤，喘不休者死。汗出如珠不流者死。

盜汗由邪熱內鬱外侵於表升降或增損大柴胡加牡蠣、胆草、或龍胆草末二錢、豬胆汁同溫酒調服。按此症用當歸六黃湯亦效。

頭汗熱不得越陽氣上騰也。兼譫語者增損大柴胡加味涼膈身發黃者涼膈加茵陳心下滿頭汗出水結胸也宜柴胡陷胸湯卽小柴胡加瓜蔞實四錢黃連二錢陽明病頭汗出下

血譖語此爲熱入血室兼男子言不僅婦人也柴胡清燥湯加山甲桃仁黃連大黃芒硝若下後頭汗出小便利者死又下後頰上汗出而喘小便反秘者亦死元氣下脫額上汗如貫珠者死頭汗有生死之分須詳辨之

手足心腋下汗爲陽明胃實兼少陽胆實也增損大柴胡大便秘硬者加味六一順氣兼譖語者爲有燥糞熱聚於胃宜加味涼膈散

戰汗疫邪留於氣分解以戰汗氣屬陽而輕清邪在氣分則易疎透所以時得戰汗當卽脈靜身涼煩渴頓除三五日後陽

氣漸積、不待飲食勞碌、或有反復者、乃裏邪未去、纔經發熱、  
下之卽解、下之未盡、日後復熱、當復下、復汗、下後煩渴減、腹  
滿去、或思食而知味、裏氣和也、身熱未除、脉近浮、此邪氣拂  
鬱於經也、當得汗解、如未得汗、以柴胡清燥湯和之、復不得  
汗者、從漸解也、不可苛求其汗、應不失下、氣消血耗既下、欲  
作戰汗、但戰而不汗者危、以中氣虧微、但能降陷、不能升發、  
也、次日當期復戰厥回、汗出者生、厥不回、汗不出者死、以正  
氣脫、不勝其邪也、戰而厥回無汗者、真陽尚在、表氣枯涸也、  
可使漸愈、若戰而忽瘡者必死、瘡者身如尸、牙關緊、目上視

也。凡戰不可擾動。但可溫覆。擾動則戰而中止。次日當期復戰。戰汗後復下。後越二三日反腹痛不止者。欲作滯下也。無論已見積未見積。宜當歸導滯湯治之。

狂汗此乃因伏邪中潰。欲作汗解。因其稟賦充盛。陽氣衝擊。不能頓開。故忽然坐臥不安。且狂且燥。少頃大汗淋漓。狂燥頓止而愈。○吳又可曰。傷寒汗解在前。瘟疫汗解在後。

結胸痞氣是鬱熱內攻。宜陷胸承氣加味涼膈之類。早下之外。

用熨法最妙。

腹滿熱鬱失下。邪火久羈也。脹滿而痛。或咽乾便秘譫語者。升

降涼膈加枳實厚朴、

小腹滿爲尿與血、小便不利者、尿滯也。宜神解、升降、小便自利。  
者畜血也。解毒承氣、加夜明砂、桃仁、丹皮、山甲、

腹痛亦邪火鬱滯陽明也。宜升降、涼膈消息治之。

煩熱此雜氣伏鬱三焦也。宜雙解、三黃石膏之屬消息治之。

潮熱陽明內實也。增損大柴胡或加味涼膈加胆草、升降散、太極丸酌用亦好。甚則六一順氣更須切脉之滑大沉實審其

臍腹脹痛與否務要酌度適中病情不可太過不及。

往來寒熱伏邪內鬱多屬熱結在裏陰陽不和增損大柴胡主

之升降散亦此症妙藥也

譖語大便難者熱鬱三焦時其輕重以升降涼膈六一解毒承氣之類消息治之若誤服表藥者增損三黃石膏加大黃畜血者大便黑小便利解毒承氣加夜明砂桃仁山甲丹皮下利脉滑而數者有宿食也加味六一必須詳辨症脉斟酌適中甚有體厥脉厥者更須下之若下後下症悉除三五日後譖語不止者宜柴胡養榮湯加辰砂一錢大抵譖語脉短則死脉和則愈或氣上逆而喘滿或氣下奪而自利皆爲逆也此又不可不知猶子慎思瘟病大下後譖語仍不止無可再下余以三黃石膏加辰砂一錢遂愈附此亦

見醫者意也神明存乎其人耳

鄭聲乃鄭重頻頻謬語諄諄不已而氣微也若神昏氣促不知人事者死如氣不促手足頗溫其脉沉細而微者人參三白湯五福飲七福飲之類隨症加減治之所謂四損不可正治者此類是也

熱搏血分。畜血陽明輕則如狂。重則發狂。黃連解毒湯送下。  
代抵當湯丸去桂加牛膝丹皮又有如狂一症。或由失志而  
病在心。或由悲憂而病在肺。或由失精而病在腎。或由鬱怒  
思慮。飢飽勞碌而病在肝脾。此其本病已傷於內。而邪氣復  
侵於外。則本病必隨邪而起矣。外無黃赤之色。剛暴之氣。內  
無胸腹之結。滑實之脉。或不時燥擾而禁之則止。或口多妄  
誕而聲息不壯。或眼見虛空。或驚惶不定。察其上口無燥渴。  
察其下便無硬結。是皆精氣受傷。神魂不守。所謂虛狂是也。  
與陽極發狂者迥不相同。須辨氣血陰陽四損。何在隨症消

息治之。又有應下失下、真氣虧微、及投承氣、下咽少頃、額上汗出、髮根搔痒、邪火上炎、手足厥冷、甚則振戰心煩、坐臥不安、如狂之狀、此爲藥煩、急投薑湯卽已。若藥中多加生薑煎服、則無此狀矣。

△△△  
發斑疹總緣雜氣熱毒鬱於胃中而發洩也。

吳又可曰、傷寒發斑則病篤時疫發

斑則斑出紅赤者爲胃熱、紫紅者爲熱甚、黑色者爲胃爛、最忌稠密成片、如熱甚、脈洪數、煩渴者、白虎合犀角地黃加蚕  
蟬青黛、如熱毒內蘊、心煩不得眠、錯語呻吟者、犀角大青湯  
加蚕蟬、或增損三黃石膏加青黛犀角、熱煩便結者、俱加酒

大黃如斑發已盡、外熱稍退、內實便秘譫語者、加味涼膈微  
下之。若夫疹與斑等、增損雙解主之。加紫背浮萍五七錢、或  
重加石膏、大黃、芒硝清散得宜、未有不出者。如身出而頭面  
不出、此毒氣內歸危候也。急以大蟾蜍一個、搗和新汲水去  
渣痛飲之、自出屢驗。○又有虛火發斑、其斑淡紅、按之卽無  
或四肢逆冷、脈見虛弱。古方治以大建中湯、僭擬用人參養  
榮湯、以補氣血。臨症酌之、然此症在瘟病百中無一。雖甲戌  
之疫病者甚衆、此症僅見其一、以氣血雙補而愈。

△△  
發黃多由陽明濕熱加味涼膈加茵陳、外用黑豆一升、黃蒿四

兩煮滾湯一鍋、傾銅盆內、攬稍冷、入雞蛋清七八個、以手指攬起白沫、敷身黃處、黃散溫覆汗出而愈、瘟病至此爲疾已甚、多有不治之症、按齒陳湯亦好、余曾治此病以升降散重加齒陳、卽愈

畜血謂瘀血畜結於內也、身黃如狂、屎黑善忘、皆畜血之症、緣陽明熱鬱失下、邪火久羈、故腸胃畜血多、膀胱畜血少、亦有血爲熱搏下注膀胱者、必察其人胸臍傍小腹但有硬滿處、以手按則痛者、便爲畜血、若在胸脇、手不可近、犀角地黃合黃連解毒、中腕臍間、手不可近、桃仁承氣去桂加丹皮枳殼、再合黃連解毒、臍下小腹、手不可近、黃連解毒送增損代抵

當湯丸、然病至此已難爲矣、實者可救、虛者多危、

衄血緣血熱在裏浮越於表也犀角地黃加芩連柴梔元參桑  
蟬甚加大黃入蜜酒童便冷服大抵衄血吐血下血脈微小  
者生實大者死或衄吐下後脈微小易治若熱反盛脈反洪  
數者死若衄而頭汗出或身上有汗不至足者皆難治也

吐血此與衄血皆屬熱毒內鬱經絡火盛火載血液而妄行也。

大清涼或犀角地黃合瀉心湯有瘀血紫黑成塊者加桃仁

**大黃以利之**

折俱係雜氣伏鬱中焦邪熱亢閉上攻頭目乃胃家實也通宜升降涼膈清利之頭眩痛量加大黃目眩赤等症量加酒炒胆草

△△  
咳嗽緣伏熱內鬱也白虎湯合升降小清涼加竹葉若煩悶則  
加味涼膈增損三黃石膏並加桔梗又咳而脉數者爲心火  
刑肺金不治

口燥咽乾。佛熱內鬱也。小清涼增損三黃石膏。再看兼症消息。治之。

咽痛怫鬱中焦。流佈上下。卽見少陰經口燥舌乾。咽喉腫痛。不

利之症以其脉貫腎絡肺繫舌本故也增損雙解加元參牛蒡子或增損普濟消毒飲倍桔梗加荆芥穗升降散尤爲對症之藥余每以清化湯去白附重加元參及牛蒡子並用吳萸末敷足心卽愈

△△發渴此病一發卽煩渴引飲者以鬱熱自內達外也輕

加蚕蟬花粉重則增損三黃石膏加大黃凡病忽欲飲水者爲欲愈宜少與之得水則胃和汗出而愈

漱水不欲嚥必其人胃中濕飲過甚或伏火未散或畜血停留俱未可知但口舌乾而不欲咽也輕則小清涼升降清降之重則解毒承氣大瀉之

嘔吐嘔者聲物俱出乾嘔者無物之吐亦謂乾嘔吐者無聲出物總由胃中伏火鬱而攻發也增損三黃石膏加味涼膈加石膏清利之自止若有宿糞燥結時時嘔吐者宜涼膈升降通之如病愈後脈症俱平腹中有塊常作蛙聲所云病愈結存也俟胃氣漸復津液流通結塊自下斷不可再攻凡胃熱甚服藥嘔吐不納者愈吐愈服三服後火性漸消徐徐用藥卽不吐須嚼生薑爲妙忌甜物若瘧病愈後大便二三旬不行時時作嘔飲食不進調胃承氣湯下之卽愈

者加味涼膈、腹脇滿痛而喘者解毒承氣若自臍下氣海動氣而喘者不治

△短氣

△鬱熱

△內迫

△氣多急促

△須看兼症

△舌上白胎如屑

△清化湯增

△損三黃石膏

△若胎黃及黑色

△而短氣加味涼膈

△或解毒承氣

△之類急下之

△若病者屬四損之輩

△又當詳辨

△蓋短氣有類於

△喘但短氣則氣急而短促

△不似喘之搖肩而氣促也

△大抵氣

△急而不相續

△多屬實氣少不足以息

△多屬虛以此辨之百不

△一失

△呃逆

△俗謂打攔

△忒是也

△怫熱攻發

△火性上炎氣逆而呃逆連聲

△呃逆

△俗謂打攔

△忒是也

△怫熱攻發

△火性上炎

△氣逆而呃逆連聲

治法各從其本症而消息之、大概不外清化升降、涼膈以清熱導滯爲主。如見白虎症、則投白虎。見承氣症、則投承氣。膈間痰閉、則用滾痰丸。但治本病、呃自止。又方用白毛烏雞從雞胸間活劈開放病

△  
人心胸間  
塲之愈

△  
△  
蛻厥乃表裏三焦熱鬱亢極。胃中如沸、蛻動不安、下氣不通、必反於上、因而嘔出、酌用三黃石膏加味、涼膈俱加川棟子、使君子、烏梅、自愈。大抵胃腕忽痛忽止、身上乍寒乍熱、面上時赤時白、脉息倏亂倏靜、皆吐蛻之候也、須早辨之。

△  
△  
厥逆雜氣伏鬱、陽熱內迫、格陰於外、氣閉不能達於四肢、甚有

通身冰涼其脈多沉滑或沉伏或沉細欲絕或六脈俱閉所云體厥脈厥是也症多怪異不測之狀輕則升降雙解涼膈重則六一順氣解毒承氣斟酌下之若數下後厥不回熱不退者死亦有下數十次利下數十行厥方回熱方退而得生者卽所謂急症急攻也下之或可活不下必死無疑矣余治脈伏而有熱狀者於下劑內重加酒浸大生地一兩歸身七八錢甚效

大便自利怫鬱內盛發熱煩渴小便色赤大便自利升降主之內熱甚而利不止燥悶狂亂者三黃石膏加酒大黃腹滿痛更加之挾熱下利者宜升降小承氣撤其餘邪而利自止熱

形而後存  
卷之三  
結旁流者、胃家實熱、以六一順氣下之、得結糞而利立止、若不得結糞、仍下臭水、及所進湯藥、因大腸邪深、再以前湯重下之、虛甚則宜黃龍湯、此內經通因通用之法也。

大便膿血、因怫熱結滯火勢下注、陽實陰虛也、甚則如豚肝、如爛瓜肉、屋漏水者、大清涼、三黃石膏、或當歸導滯、加減治之、升降散亦最效。

小便不利不通、因陽明熱鬱氣結不舒、故小水濇滯而短少也、升降散通之、自愈、亦有心熱小便不利者、宜小復甦飲、又方、治熱鬱者、用元明粉三錢、芒硝亦可、雞子清一枚、蜂蜜三匙、

和一處或新汲水或燈心湯或車前草汁調服甚則解毒承氣下之利水無益也。

小便自利乃邪熱干於血分畜血尿血邪留欲出小便數急膀胱不約而自遺也升降或桃仁承氣去桂加丹皮牛膝枳殼合黃連解毒去其邪熱自愈。

小便數膀胱積熱頻來而短少也神解升降之屬治之

心悸謂築築然動怔忡不安也此鬱熱內盛火性上衝加味涼膈增損三黃石膏看兼症消息治之。

瘡症卽角弓反張也緣濕熱生風木勝克土筋不能榮輕則瞞

惕癥癰重則鼻扇目直頭折臂反以加味六一順氣下之蓋瀉土所以瀉木也

肉瞞筋惕瞞者肌肉蠕動惕者筋脈動跳也此陽明火毒陷入厥陰陽明主潤宗筋燔灼津液弗榮而動加味六一解毒承氣消息治之設有虛而瞞惕者必入四損不可正治之條臨症詳之

舌捲囊縮因邪鬱中焦流佈上下以致肺肝受傷水不勝火陰不敵陽筋脉弗榮故有此症宜加味六一解毒承氣治之

循衣抹牀由陽明邪熱亢閉上乘心肺致令神志昏憤多有撮

空之症宜解毒承氣下之如火盛精枯用熟地一兩歸身七  
錢山藥五錢煮湯入前藥煎服每收奇功若久病神昏氣血  
陰陽四損者宜按四損內消息治之

△△煩燥由表裏三焦大熱渴欲引飲煩燥不安多現奇怪不測之

狀三黃石膏雙解升降三方並爲對症之劑大抵不經汗下  
而煩燥爲實汗下後煩燥爲虛內熱曰煩謂心中鬱煩爲有  
根之火故有煩不燥爲可治外熱曰燥謂氣外熱燥爲無根  
之火故但燥不煩爲不可治按但燥不煩擬以玉女煎清陽明之火補少陰之水或可取效

△△懊惱懊惱卽惱字鬱鬱憒憒比之煩燥而更甚也由熱毒蘊於胸

中加味涼膈或熱毒鬱於胃中解毒承氣下之無不愈者。

△△佛鬱陽氣佛鬱面赤而光盛也目紅如硃煩燥飲水者增損三

黃石膏內實潮熱不大便增損大柴胡或加味涼膈治之

△△△鬱冒俗謂昏迷是也由火邪逼肺神昏不醒大復甦飲主之若

蓄熱內逼脈道不利反致脈沉細或閉而昏迷欲死者加味

涼膈加味六一之類治之又方蟾蜍心搗和水飲最妙

△△△動氣由藏氣不調肌膚間築築跳動於臍傍上下左右及左乳

之下曰虛里者皆其所聯絡者也故動之微者止於臍旁若動之甚則連及虛里並心胸真若春春然連續而渾身振動

者。乃天一無根也。治法直救真陰以培根本使氣有所歸無不獲效。須分左右水火消息治之。所云四損不可正治者觀此可例其餘矣。

肢體浮腫時疫潮熱而渴舌黃身痛心下滿悶腹時痛脈數此應下之症也。外有通身及面目浮腫喘急不已小便不利此疫兼水腫因三焦壅閉水道不行也。但治在疫水腫自已宜小承氣湯。向有單腹脹而後疫者治在疫若先年曾患水腫因疫而發者治在疫水腫自愈病人通身浮腫不體益甚臍凸陰囊及陰莖腫大色白小便不利此水腫也繼又身大熱

午後益甚。煩渴心下滿悶、喘急、大便不調。此又加疫也。因之下後脹不除，反加腹滿。宜承氣加甘遂二分。弱人量減。蓋先腫脹續得時疫。此水腫兼疫。大水在表。微疫在裏也。故併治之。時疫愈後數日，先自足浮腫。小便不利。腫漸至心腹而喘。此水氣也。宜治在水。時疫愈後數日，先自足浮腫。小便如常。雖至通身浮腫而不喘。別無所苦。此氣復也。蓋血乃氣之依歸。氣先血而生。無所依歸。故暫浮腫。但靜養節飲食。不藥自愈。若病愈後。三焦受傷。不能通調水道。下輸膀胱。肢體浮腫。亦是水氣。自與氣復懸殊。宜金櫃腎氣丸治之。蓋水氣足。

冷肢體常重氣復足不冷肢體常輕爲異耳時疫身體羸弱、言不足以聽氣不足以息得下症少與承氣下症稍減更與之眩暈欲絕蓋不勝其久也絕穀期月稍補則心復滿悶攻不可補不可守之則元氣不鼓餘邪沉匿膜原日惟水飲而已以後心腹忽加腫滿煩冤者向來沉匿之邪方悉分傳於表裏也宜承氣養榮湯一服病已設表腫未除宜微汗之自愈時疫得裏症失下以致面目浮腫小便自利此表裏氣滯非兼水腫也宜承氣下之裏氣一疎表氣亦順浮腫頓除或見絕穀期月指爲脾虛發腫誤補必劇妊娠更多此症治法

同前，則子母俱安，但當少與慎無過劑。

藏結如結胸狀、飲食如故、時時下利、寸脈浮、關脈細小沉緊、名藏結。一有舌胎便知熱邪內結、酌用神解大復甦之類、清解之亦可、與太極丸緩下之。

狐惑症由失下不解所致。食少胃虛，蟲噉五藏，故脣口生瘡爲狐惑。謂之狐惑者，如狐之猶豫不定也。其候齒燥聲啞，惡食，面目乍赤乍白乍黑，舌上胎白脣黑，四肢沉重，喜眠，胃虛蟲食，殺人甚速。黃連犀角湯主之。外用雄黃銳丸，納穀道中。百合病百脉一宗，舉身皆病，無復經絡傳次，故曰百合。其症似

寒不寒似熱不熱欲食不食欲臥不臥默默不知所苦服藥卽吐如見鬼狀大抵由病後虛勞藏府不調所致緒論謂卽

痿症之暴者以肺熱葉焦氣化不行以致小便不利又肺爲

百脉之總司故通身經絡廢弛宜百合地黃湯治之

余曾治一女子

年十二三歲忽得痿症下身不能行動卽以百合地黃湯與之漸能動移復得肩臂以上至項相連筋痛而熱又以生地四物湯加知母黃柏生地重用兩許二付而愈

主客交病謂人向有他病而羸或久瘧痢瀉或內傷瘀血或吐血便血男子遺精白濁真陰枯涸女子崩漏帶下血枯經閉之類以致肌肉消爍邪火獨存故脈近滑數一着溫病穀食

暴絕更加身痛發熱痞悶不眠若誤以原病更重醫藥頻試  
或補或瀉或滋養或疏散不得治法病終不解如脈數身熱  
不去者邪火與正氣並鬱也肢體時痛者邪火與榮血相搏  
也胸脇刺痛者邪火上結於膈膜也主客交渾最難得解治  
法當乘其大肉未消真元未敗急用三甲散多有得生者更  
附加減於後方中隨其素而調之余長子婦妊娠患疫又適產後身熱胸脇刺痛按法

治之

即愈

感冒兼疫疫邪伏而未發因感冒風寒觸動疫邪相繼而發既  
有感冒之因復有風寒之脉症先投發散一汗而解一二日

續得頭疼身痛、潮熱煩渴不惡寒此風寒去疫邪發也以疫

治之。

瘧疾兼症瘧疾二三發或七八發後忽然晝夜發熱煩渴不惡寒舌生胎刺心腹痞滿飲食不進下症漸具此瘟疫著瘧疾隱也以疫法治之○瘧疫晝夜純熱心腹痞滿飲食不進下後脈靜身涼或間日或每日時惡寒而後發熱如期者此瘟疫解瘧邪未盡也以瘧法治之凡瘧者寒熱如期而發餘時脈靜身涼此常瘧也若傳胃者必現裏症名爲溫瘧宜以疫法治之余每治瘧瘧以增損大柴胡湯加減投之隨手取效

婦女瘧病與男子無異、但多兼經候、用神解、小清涼、升降、雙解之類隨症治之、否則邪傷衝任、而爲熱入血室矣。  
熱入血室、衝爲室海、卽血室也、衝脈得熱、心血必妄行、在男子則下血譫語、在婦人則月水適來、惟陽明病下血譫語、兼男子言、不僅爲婦人也、但以婦人經氣所虛、邪得乘虛而入、故病熱入血室爲多、如經適來、卽斷胸脇滿、或結胸譫語、及經行未盡而適斷、或熱盛神昏、但頭汗出、並宜增損大柴胡湯加歸尾、桃仁、山甲、若發熱經水適來而不斷、晝則明了、夜則譫語、宜小柴胡去參、加陳皮、丹皮、梔子、黃連、益母草、以清其熱。

亦有用小柴胡去參加生地愈者、又有經盡熱隨血散而自

愈者、

按衝陽屬陽明胃是經多血太衝屬厥陰肝是經藏血爲血海故二經皆爲血室也

妊娠癟病內蘊邪熱急用護胎之法井底泥塗臍至關元

臍下二寸

乾再易之或以青黛伏龍肝爲末水調塗之若大熱乾嘔錯

語呻吟增損三黃石膏湯治之如熱甚燥急胎動不安必須

早下之奪其裏熱庶免胎墜

若治之不早以致腹疼如椎腰痛如拆服藥已無及矣

酌

用升降雙解涼膈芒硝逐去邪熱而胎自固全不妨礙內經

曰有故無損亦無損也如係四損之入又當從其損而調之

條辨云結糞瘀邪腸胃中事胎附於脊在腸胃外子宮內事也大黃直入腸胃滌邪故不礙胎氣芒硝化胎不可輕投若

遇燥實用  
亦無妨

產後瘧病怫熱內熾用三合湯治之最妙如萬不能不下升降散無妨增損雙解散去芒硝黃連加生地川芎尤爲對症之

藥

小兒瘧病加味太極丸主之升降散亦妙分量多少酌用  
復病謂瘥後而病復作發熱也蓋瘧病邪熱內熾血分大爲虧損最善反覆故有伏邪未盡而自復者稍與前藥去其餘邪自愈○有因梳洗沐浴多言妄動而勞復者惟脉不沉實爲辨輕則靜養可愈或但飲童便無不愈者重則補陰益氣煎

六味地黃丸料、或安神養血湯隨症加減治之使血脉融和  
自然熱退病痊然亦不可過劑。○有因飽食及食腥葷或吞  
酸飽悶而發熱者爲食復輕則梔子厚朴湯加神麴或合小  
柴胡湯重則神昏譫語腹滿堅痛欲吐不得欲下不能此危  
候也以升降大柴胡黃龍涼膈之類酌量與服可也。○有因  
憤怒與不戒房事而復發者乃不自貴重之故觀症審脉隨  
宜救之。又有小心過慎之人裏症方退原不甚虛輒用參  
附溫補是因補而復以致不救者不知凡幾切宜慎之。○凡  
諸復症升降散或太極丸斟酌輕重仍可用也。○如瘡後脉

遲細而弱、或五更泄瀉、乃命門真陽不足、自是腎氣右歸、四神之屬、或補陰益氣、六味之類、隨時審症、分別水火酌用可也。瘧病愈後、繼而有一身盡痛、甚有不可轉側者、又有一目昏花、或兩目昏花、並有兩目了了、直看不見者、余視此症、火消爍枯涸而然、用六味地黃湯加當歸枸杞子、以補其血、一付遂愈。乃真陰被

火消爍枯涸而然、用六味地黃湯加當歸枸杞子、以補其血、一付遂愈。

有耳聾不聽者、有神情癡呆者、有退爪脫皮落髮者、諸如此類、奇奇怪怪、不一而足、自可不藥漸愈、若妄治之、不惟多事、反致不美、慎之大抵瘧病愈後、太平酒調理最妙、如不可得、莫若靜養爲善、尤要在節飲食爲第一關緊。卷之三

總之瘟病與傷寒實出兩門。自晉迄今溫病失傳無人不以  
瘟病爲傷寒。無人不以傷寒方治瘟病。動云先解其表乃攻  
其裏。此仲景傷寒論也。所以瘟病一二日內遇陽明腹脹滿  
痛之症。少陰口燥咽乾之症。厥陰舌捲囊縮之症。再不敢議  
下。明知厥深熱深之陽症。下之已遲。萬一徼倖不過爲焦頭  
爛額之客。千餘年來孰任殺人之辜耶。

按瘟病中天地之癟氣四時皆有。而於春夏凶荒之際爲尤  
甚。若一鄉一家同病。則瘟疫是也。所謂疫者。役也。猶今之門  
頭差也。若傷寒只是冬月至春夏斷不得謂之傷寒。且冬月

傷寒風寒由肌膚入初起多見太陽經症漸次循經而傳形症俱詳於其於合病兩經三經齊病併病一經先病未盡前須先認清不傳者是也又過一經之傳者是也或始則二陽合病後則一陽病兩感日傳二經陰陽衰一陽邪盛歸併於一經亦爲併病俱病也在傷寒仲景以麻黃附子細辛湯主之在瘟病河間以雙解散主之補仲景瘟病兩感治法之症則甚少若瘟病由內達外乃邪氣充斥奔迫此六字爲瘟病症狀傳神最易認識不循經傳是以諸症合見並奇奇怪怪難以名狀者甚多再細細參之脉理驗之神情寒瘈之辨了然無復疑義矣

又按冬月正傷寒必用表藥發散者緣寒氣固蔽在表不能發越所以用溫散藥以汗解之是肌一鬆而邪從汗解也若

瘟病火鬱於內用風藥散之是猶火得風而愈熾所以其病  
益甚故必養陰禦陽之藥如水之能制火也或疑不用表散  
何以能發汗是只知汗出於陽而不知汗生於陰養陰則汗  
自出譬如五六月亢陽之時一得陰雨露自潮出且汗者心  
之液瘟病諸方大抵總以瀉心經客熱爲主心熱一去汗液  
之能流通矧炎夏之時動則流汗又豈待發散而始出耶  
自能流通知炎夏之時動則流汗又豈待發散而始出耶。  
又按三分晰義及寒瘧條辨俱云凡瘧病一切解肌發汗溫  
中散寒之藥切戒勿用今但摘其尤甚者表而出之如麻黃、  
羌活、獨活、葛根、蒼朮、細辛、香附、艾葉、蒼耳、烏頭、桂枝、牙皂巴

豆川椒、烏梅、胡椒、故紙、茴香、肉桂、附子、乾薑、豆蔻、益智等味、若誤服之。則亢陽之火愈熾。而病愈危矣。

再者、余自三折後、凡臨症閱歷以來、恪守前賢成規、無不取效、亦間有瘟病末後、用參附等熱藥而愈者、非屬四損、即或誤治、擔延久虧、是又在隨時詳審脉症形神、互相參証、診視、諦當、辨別明確、認眞虛實寒熱、然後施治、行方而出以智圓、心小而濟以胆大、始可萬全、不至乖方、所謂神而明之存乎其人、此又不可不知也。

歲甲戌、瘟疫盛行、醫藥每多乖方、觸事生心、不憚煩瑣、續增

八十五條詳悉辨明庶臨症無復疑義云

四損不可正治辨

凡人大勞大慾及大病久病或老人枯槁氣血兩虛陰陽並竭名曰四損真氣不足者氣不足以息言不足以聽或欲言而不能感邪雖重反無脹滿痞塞之症真血不足者通身瘦黃兩脣刮白素或吐血衄血便血或婦人崩漏產後失血過多感邪雖重面目反沒赤色真陽不足者或厥逆或下利肢體畏寒口鼻氣冷感邪雖重反無燥渴譖妄之狀真陰不足者肌膚甲錯五液乾枯感邪雖重應汗不汗應厥不厥辨之不明傷寒誤汗瘧

病誤下以致津液愈爲枯涸邪氣滯濇不能轉輸也。凡遇此等不可以常法正治當從其損而調之。調之不愈者稍以常法正治之。治之不愈者損之至也。一損二損尚可救援三損四損神工亦無施矣。後附錄一案

楊栗山曰病有純虛純實非清則補有何乘除設有既虛且實者清補間用當詳孰先孰後從少從多可緩可急纔見醫家本領余丙子在亳生員張琴斯正年過六旬素多鬱結有吐血症歲三五犯不以爲事也四月間忽而發熱頭痛身痛不惡寒而作渴乃溫病也至第二日吐血倍常更覺眩暈大

熱神昏、手足戰掉、咽喉不利、飲食不進、病家醫家、但見吐血、便以發熱眩暈、神昏爲陰虛、頭痛身痛、戰掉爲血虛、非大補不可救、不察未吐血前已有發熱作渴、頭痛身痛之症也。余曰、舊病因溫病發、血脫爲虛邪熱爲實、是虛中有實症也、不可純補、余用炙甘草湯、原方炙甘草二錢、阿膠二錢、麻仁去枝二錢、人參一錢、生薑二錢、大棗二枚、桂皮四錢、麥冬去心四錢、生地八錢、桂氏加當歸、棗仁炒各三錢、五味子一錢、炒去桂枝、加歸芍、熟地黃、五味、犀角殼、蟬脫、二服血已不吐、諸症減去七分、舉家歸功於參、均欲速進、余禁之、竟不能止、又進一服、遂覺煩熱頓作、胸腹否悶、徧體不舒、終夜不寐、時作譫語、余曰、諸症

皆減初補之功也此乃本氣空虛以實填虛不與邪搏所餘三分之熱乃邪熱也再補則以實填實邪氣轉熾故變症蜂起遂與太極丸微利之而愈後因勞復以參柴三白湯治之而愈後又食復以梔子厚朴湯加神麩六錢而愈引而伸之觸類而長之可以應無窮之變矣

甲子年正月廿二日。寒流未退。血凝目津。透擦卦。便缺良久。余與道人同。用大承气。通脉。逐瘀。利水。大汗。燥渴。召天家。舞阳神。不寐。分食。又。服脉。察。脉。大脉。

瘟病與傷寒不同診脈義

諸書未載，獨見傷寒、溫疫條辨，按此只從陶氏浮中沉三法。

凡瘟病脉不浮不沉中。按洪長滑數。右手反盛於左手。總由怫  
熱鬱滯。脉結於中故也。若左手脉盛。或浮而緊。自是感冒風寒  
之病。非瘟病也。

凡瘟病脉怫熱在中。多見於肌肉之分。而不甚浮。若熱鬱少陰。  
則脉沉伏欲絕。非陰脉也。陽邪閉脉也。

凡傷寒自外之內。從氣分入。始病發熱惡寒。一二日不作煩渴。  
脉多浮緊。不傳三陰。脉不見沉。瘟病由內達外。從血分出。始病  
不惡寒。亦間有惡寒者。但熱多而寒少耳。而發熱一熱。卽口燥咽乾而渴。脉多

洪滑甚則沉伏此發表清裏之所以異也。

凡浮診中診浮大有力浮長有力傷寒得此脉自當發汗此麻黃桂枝症也溫病始發雖有此脉切不可發汗乃白虎瀉心症也死生關頭全於此分按瀉心當是大黃黃連黃芩非附子瀉心等方也

凡溫病內外有熱其脈沉伏不洪不數但指下沉濶而小急斷

不可誤爲虛寒若以辛溫之藥治之是益其熱也所以傷寒多從脈。瘟病多從症蓋傷寒風自外入循經傳也溫病拂熱內熾溢於經也。

凡傷寒始太陽發熱頭痛而脉反沉者雖曰太陽實見少陰之

脉故用四逆湯溫之。若癟病始發未嘗不發熱頭痛而見脈沉濶小急此伏熱之毒滯於少陰不能發出陽分所以身大熱而肢不熱者此名厥症雜氣怫鬱火邪閉脈而伏也急以鹹寒大苦之味大清大瀉之斷不可誤爲傷寒太陽始病反見少陰脈沉而用四逆湯溫之溫之則壞事矣又不可誤爲傷寒陽厥慎不可下而用四逆散和之和之則病甚矣蓋熱鬱亢閉陽氣不能交接於四肢故脈沉而濶甚至六脉俱絕此脉厥也手足逆冷甚至通身冰涼此體厥也卽仲景所謂陽厥厥淺熱亦淺厥深熱亦深是也下之斷不可遲非見真守定通權達變者不足

以語此

凡瘟病脉中診洪長滑數者輕重則脉沉甚則閉絕此辨瘟病與傷寒脉浮脉沉異治之要訣也

凡瘟病脉洪長滑數兼緩者易治兼弦者難治

凡瘟病脉沉濇小急四肢厥逆通身如水者危

凡瘟病脉兩手閉絕或一手閉絕者危

凡瘟病脉沉濇而微狀若屋漏者死

楊栗山曰傷寒瘟病必須診脈施治有脉與症相應者則易於

識別脈與症不相應、郤宜審察緩急、或該從脈、或該從症、務要  
脉症兩得、卽如表症、脉不浮者可汗而解、裏症、脉不沉者可下  
而解、以邪氣微、不能牽引抑鬱正氣、故脉不應、下利脉實有病  
愈者、但得症減、復有實脉、乃天年脉也、又脉法之辨、以洪滑者  
爲陽、爲實、以微弱者爲陰、爲虛、不待問也、然仲景曰、若脉浮大  
者、氣實血虛也、內經曰、脉大四倍以上爲關格、皆爲真虛、陶氏  
曰、不論浮沉大小、但指下無力重按全無便是陰脉、此洪滑之  
未必盡爲陽也、實也、景岳曰、其脉如有如無、附骨乃見沉微細  
脫、乃陰陽潛伏閉塞之候、陶氏曰、凡內外有熱、其脉沉伏不洪

不數指下沉濁而小急。是爲伏熱。此微弱之未必盡爲陰也。虛也。夫脉原不可一塗而取。須以神氣形色聲音症候彼此相參。以決死生安危。方爲盡善。所以古人望聞問切四者缺一不可。

錢學森著《物理學》

痘病正治諸方

升降散

一名二分散  
一名陪賑散

白僵蠶

酒炒二錢

全蟬脫

去上一錢

廣蠶黃

去皮三分不用片蠶黃

川大黃

生四錢

右爲細末

合研勻

病輕者

分四次服

每服重一錢八分二釐

右爲細末合研勻

病輕者分四次服

每服重一錢八分二釐

五毫用冷黃酒一杯

蜂蜜五錢調勻冷服

中病卽止病重者

分三次服每服重二錢四分三釐三毫

黃酒一杯半蜜七錢

分三次服每服重二錢四分三釐三毫

黃酒一杯半蜜七錢

五分調勻冷服最重者

分二次服每服重三錢六分五釐黃

酒二杯蜜一兩調勻冷服如一二付未愈可再服之

熱退卽止胎產亦不忌

蜜丸名太極丸性稍緩服必空心服後須

止胎產亦不忌

蜜丸名太極丸性稍緩服必空心服後須

忌半日不可吃茶水。吃烟。吃飲食。若不能忌。並不效。能遵禁。忌下咽。卽甦半日而愈。若飽食後服此。亦不效。愈後最忌飽食。只宜吃稀粥四五分飽。永不再發。至於腥葷。更須着實牢忌。萬不可吃。凡患瘧疫。未曾服他藥。或一二日。或七八日。或至月餘。未愈。但服此藥。卽愈。若先用他藥不效。後用此藥。亦闇有不驗者。服藥雜故也。

瘧病正治諸方。條列如左。以便按症施治。輕則清之。神解散。大清化湯。芳香飲。大小清涼散。大小復甦飲。增損三黃石膏湯。之類。重則瀉之。增損大柴胡湯。增損雙解散。加味涼膈散。加

味六一順氣湯、增損普濟消毒飲、解毒承氣湯之類而升降散其總司也。輕重皆可酌用。察症切脉斟酌得宜。病之變化治病之隨機應變。神明則存乎其人耳。寒溫條辨云：處方必有君臣佐使而又兼引導。此良工之大法也。是方以殭蠶爲君、蟬蛻爲臣、薑黃爲佐、大黃爲使。米酒爲引、蜂蜜爲導。六法俱備而方乃成。竊嘗考諸本草而知殭蠶味辛苦氣薄喜燥惡濕得天地清化之氣輕浮而升陽中之陽故能勝風除濕清熱解鬱從治膀胱相火引輕清氣上潮於口散逆濁結滯之痰也。其性屬火兼土與木老得金水之化殭而不腐溫病

火炎土燥、焚木爍金、得秋分之金氣而自衰、故能辟一切佛  
鬱之邪氣。夫蠶必三眠三起、眠者病也、合簿皆病而皆不食  
也、起者愈也、合簿皆愈而皆能食也、用此而治合家之痘病、  
所謂因其氣相感、而以意使之者也、故爲君。夫蟬氣寒無毒、  
味鹹且甘、爲清虛之品、出糞土之中、處極高之上、自甘風露、  
而已、吸風得清陽之真氣、所以能祛風而勝濕、飲露得太陰  
之精華、所以能滌熱而解毒也、蛻者退也、蓋欲使人退去其  
病、亦如蟬之脫然無恙也、亦所謂因其氣相感、而以意使之  
者也、故爲臣。薑黃味辛苦大寒無毒、蠻人生啖喜其祛邪伐

惡行氣散鬱能入心脾二經建功闢疫故爲佐大黃味苦大  
寒無毒上下通行蓋亢甚之陽非此莫抑苦能瀉火苦能補  
虛一舉而兩得之人但知其建良將之大勳而不知有良相  
之碩德也故爲使米酒性大熱味辛苦而甘令飲冷酒欲其  
行遲傳化以漸上行頭面下達足膝外週毛孔內通藏府經  
絡驅逐邪氣無處不到如物在高巔必奮飛冲舉以取之物  
在遠方及深奧之處更必迅奔探索以取之且喜其和血養  
氣伐邪辟惡仍是華陀舊法亦屠蘇之義也故爲引蜂蜜甘  
平無毒其性大涼主治丹毒斑疹腹內留熱嘔吐便秘欲其

清熱潤燥而自散瘟毒也。故爲導益蠶食而不飲。有大便無小便。蟬飲而不食。有小便無大便。以清虛而散火。君明臣良。治化出焉。薑黃辟邪而靖疫。大黃定亂以致治。佐使同心。功績建焉。酒引之使上行。蜜潤之使下導。引導協力。遠近通焉。補瀉兼行。無偏勝之弊。寒熱並用。得時中之宜。所謂天有覆物之功。人有代覆之能。其洵然哉。用治溫病。百發百中。屢試屢驗。萬無一失。按此方不知起於何時。自陳三錫畧爲變通。治溫熱之病。楊栗山又從表章之活人無數。

輕清之劑

大黃枳普大

神解散

瘟病初覺憎寒體遍身酸痛口苦咽乾胸腹滿悶此方主之

重壯熱頭痛四肢無力

白殭蠶

酒炒一錢或二三錢

蟬蛻

五個或一錢

神麴

三錢

金銀花

二錢

生地

二錢木

通錢

車前子炒研一錢

黃芩

酒洗一錢

黃柏

鹽水炒一錢

桔梗

一錢

黃連

一錢水

煎入冷黃酒一杯蜜三匙服

○按此方內無表藥而汗液流

通內無裏藥而熱毒自下

有斑疹者卽見斑疹而內症悉除

此其所以神也

清化湯

瘟病壯熱憎寒體重舌燥口乾上氣喘吸喉不利頭面猝腫目不能開者此方主之

殭蠶

酒炒

三錢全蟬蛻

十個

金銀花

二錢

澤蘭葉

一錢

橘紅

八分

胆草

酒炒

一錢

黃芩

二錢

黃連

一錢

梔子

炒研

一錢

連翹

去心一錢

元參

一錢

桔梗

一錢白附子

炮五

甘草

五分

大便實加酒大黃四錢咽喉痛加牛蒡子炒研

一錢頭面不腫去白附子水煎入蜜酒冷服

清化者以清邪中於上焦而能化之以散其毒也芩連梔翹  
清心肺之火元參橘甘清氣分之火胆草清肝膽之火而且  
沉陰下行以瀉下焦之濕熱蠶蟬散毒消腫定喘止音能使  
清陽上升銀花清熱解毒澤蘭行氣消毒白附散頭面風毒  
桔梗清咽利膈爲藥之舟楫蜜潤藏腑酒熱而散能引諸涼  
藥至熱處以行內外上下亦火就燥之意也其中君明臣良  
而佐使同心引導協力自使諸症悉平矣

小清涼散

瘟病壯熱煩躁頭沉面赤咽喉不利或脣口煩腮腫者此方主之

殭蠶

酒炒二錢

蟬蛻

十個

銀花

二錢澤蘭

當歸

二錢生地

石膏

五錢黃

連一

黃芩

一錢梔子

炒一錢

丹皮

一錢紫草

一錢

水煎入蜜酒

童便

冷服

○黃連

清心火

亦清脾火

黃芩清肺火

亦清肝火

石膏

清胃火

亦清肺火

梔子清三焦之火

紫草通竅

和血解毒

消脹

銀花清熱解毒

澤蘭行氣消毒

當歸和血

生地丹皮涼血

以養陰而退陽也

蠶蟬爲清化之品

散腫消鬱清音定喘使

清升濁降則熱解而症自平矣

芳香飲

元參一  
兩白茯苓

石膏五  
錢

蟬退個

十二  
三  
殭蠶酒炒

荆芥三  
錢

黃芩

二  
天花粉三  
錢神麴炒三  
苦參三  
錢陳皮一  
錢甘草一  
錢水煎入蜜酒、

錢

水煎

入蜜酒、

錢

冷服。瘧病多頭痛身痛心痛脇痛嘔吐黃痰口流濁水涎如紅汁腹如圓箕手足搖搦身發斑疹頭腫舌爛咽喉痺塞此雖奇奇怪怪不可名狀皆因肺胃火毒不宣鬱而成之耳治法急宜大清大瀉之但有氣血損傷之人遽用大苦大寒之劑恐火轉閉塞而不達是害之也當以此方治之。

小復甦飲

癲病大熱或誤服發汗解肌藥以致譫語發狂昏迷不醒燥熱便秘或飮食而復者並此方主之

殭蠶酒炒

蟬蛻十  
個

神麴三  
錢

生地三  
錢

木通二  
錢

車前子二  
錢

黃芩

黃柏

梔子

炒

黃連

知母

桔梗

丹皮

各一錢

水煎引前

同

表裏三焦大熱清劑

增損三黃石膏湯

主治表裏三焦大熱，兩目如火，鼻乾面赤，舌黃昏焦，身如塗硃，燥渴引飲，神昏譁語。

石膏

八錢

僵蠶

酒炒

蟬退

十個

薄荷

二錢

淡豆豉

三錢

黃連

二錢

黃柏

水鹽

炒二錢

黃芩

二錢

梔子

二錢

知母

二錢

水煎入蜜酒冷服

若腹脹痛或

燥結，加大黃

錢

寒能制熱，故用白虎苦能下熱，故用解毒

佐以荷豉蠶蟬之

辛散升浮者

以溫病熱毒至深

表裏俱實

揚之則越

降之則

鬱鬱則邪火猶存

兼之以發揚

則炎炎之勢皆燼矣

此內外

分消其勢，猶兵之分擊者也

熱鬱腠理先見表症爲大宜

大清涼散

主治表裏三焦大熱胸滿脇痛耳聾目赤口鼻出血昏乾舌燥口苦自汗咽喉腫痛譫語狂亂者

殭蠶

酒炒三錢

全蟬蛻

十個去毒三個

當歸

酒洗

生地

金銀花澤蘭

蘭

各二錢

澤瀉

木通

車前子

炒黃連

薑炒黃芩

梔子

炒黑梔子

五

分

味子

麥冬

去心天冬

胆草

酒炒

知母

丹皮

各一錢

一生甘草

五分

分

水煎

入黃酒半小杯童便半小杯冷服

胆草瀉肝熱

黃芩瀉肺熱

梔子清三焦

澤瀉瀉腎濕

木通車

前瀉火於下

歸地丹皮

養血涼血

甘草緩中

二冬五味

清金平木潤燥

養筋黃連瀉

心火知母瀉腎火

澤蘭行氣消毒

銀花清熱解毒

全蝎去風定搐

仍用蠶蟬治疫

如無搐症全蝎可去臨時酌裁

地龍湯

治瘧病大熱諸症、

地龍卽蚯蚓搗爛、入新汲水攬淨浮油、飲清汁、

有飲金汁愈者卽人糞水

清後不解下劑

此方並有初病卽用者詳症施治不必執一

加味六一順氣湯

少陰厥陰病、口燥咽乾怕熱、消渴譫語神昏、大便燥實、胸腹滿硬或熱結旁流、達臍疼痛

厥逆脈沉伏

者此方主之

殭蠶

酒炒

蟬退

十個

大黃

酒浸二錢

芒硝

二錢

柴胡

三錢

黃連

和蜜酒服

白芍

甘草

生各一錢

厚樸

半錢

枳實

麸炒一錢

水煎

沖芒硝入蜜酒

和蜜酒服

解毒承氣湯

瘧病三焦大熱、痞滿燥實譫語、狂亂不識人、熱結

旁流循衣抹床舌捲囊縮及瓜瓢疮瘡上爲癰

膿下血如豚肝等症、厥逆脈沉伏者、此方主之、加桔梗

蔓

一個半夏二錢名陷胸承氣湯治胸滿兼有上症者

殭蠶酒炒

五錢退個

黃連十

黃芩

黃柏

梔子各一

錢

枳實炒

二錢厚朴

姜炒五錢大黃

酒浸三錢朴硝

另入五錢芒硝

常大黃加至兩餘、芒硝加至五七錢餘

水煎入蜜酒和服

按此乃痘病要藥也。然非厥逆脉伏、大熱大實、熱結旁流、舌捲囊縮、循衣抹床等症見之眞而守之定不可輕投。予用此方救壞症危症大症而愈者甚衆。虛極加人參二錢五分，如無參用熟地一兩歸身七錢、山藥五錢煎湯入前藥煎服亦累有奇效。內經曰：熱淫於內治以鹹寒佐之以苦。此方是也。

加人參取陽生陰長所謂無陽則陰無以生加熟地等取血  
旺氣亦不陷所謂無陰則陽無以化其理一也

### 重瀉之劑

增損雙解散

瘟病主方按兼表症多者宜此

殼蠶

酒炒

退個

十二三錢

廣

舊黃

分七錢

防風

一錢

薄荷葉

一錢

芥穗

一錢

歸錢

酒炒

白芍

一錢

黃連

一錢

連翹

去心一錢

梔子

一錢

桔梗

二錢

滑石

六錢

甘草

一錢

大黃

酒浸二錢

芒硝

二錢

水煎

沖芒硝入蜜

酒冷服

按硝黃隨症酌

加余用

此方每以大黃七八錢芒硝

三五錢治重症

愈者甚多須隨宜酌量不得執泥

溫毒流注無所不至上干則頭痛目眩耳聾下流則腰痛足

腫注於皮膚則斑疹瘡瘍壅於腸胃則毒利膿血傷於陽明則腮臉痛腫結於太陰則腹滿嘔吐結於少陰則喉痺咽痛結於厥陰則舌捲囊縮此方解散陰陽內外之毒無所不至矣

加味涼膈散

瘟病主方余治瘟病

雙解涼膈

愈者不計其數若

大頭瓜瓠等症危在旦夕數年來以二方救活者

百有餘人真神方也

○按裏症多者宜此

殭蠶酒炒

三錢

蟬蛻十二個

廣薑黃七分

黃連二錢

黃芩二錢

梔子二錢

連翹二錢

芒硝另各

三錢

甘草一錢

竹葉三十片

水煎沖芒

硝入蜜酒冷服若欲下之量加硝黃胸中熱加麥冬心下痞去心薄荷大黃芒硝

枳實、渴加石膏、小便赤數加滑石、胸腹滿加枳實厚朴連翹荷竹、味薄而升浮、瀉火於上、芩連梔薑、味苦而無氣、瀉火於中、大黃芒硝、味厚而鹹寒、瀉火於下、蠶蟬清化滌疵癟之氣以解毒、用甘草者取其性緩而和中也、加蜜酒者取其引上而導下也、

增損普濟消毒散

太和年民多疫癟初覺憎寒壯熱體重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利口燥舌

乾俗名大頭瘟東垣曰半身以上天之陽也邪氣客於心肺上攻頭面而爲腫耳此經所謂邪中於上焦者也

元參

三錢

黃連

二錢

連翹

去

梔子

酒炒

牛蒡子

研

藍根

如無以清

桔梗

各二錢

陳皮

一錢

甘草

生一錢

全蟬退個

十二

殭蠶

酒炒

大黃

酒浸各三錢

金匱要略

增損普濟消毒散

太和年民多疫癟初覺憎寒壯熱體重次傳頭面腫盛目不能開上喘咽喉不利口燥舌

乾俗名大頭瘟東垣曰半身以上天之陽也邪氣客於心肺上攻頭面而爲腫耳此經所謂邪中於上焦者也

元參

三錢

黃連

二錢

連翹

去

梔子

酒炒

牛蒡子

研

藍根

如無以清

桔梗

各二錢

陳皮

一錢

甘草

生一錢

全蟬退個

十二

殭蠶

酒炒

大黃

酒浸各三錢

黃芩三錢水煎入蜜酒童便冷服

芩連瀉心肺之熱爲君元參陳皮甘草瀉火補氣爲臣翹梔夢藍蠶蟬散腫消毒定喘爲佐大黃蕩熱斬關推陳致新爲使桔梗爲舟楫載藥上浮以開下行之路也

半表半裏之劑

並治癰瘡屢驗大黃有  
用三四錢者隨宜酌之

增損大柴胡湯

瘟病熱鬱腠理以辛涼解散不至還裏而成可攻之症此方主之乃內外雙解之劑也

柴胡四錢薄荷二錢陳皮一錢黃芩一錢黃連一錢黃柏一錢枳實

錢大黃一錢廣薑黃七分殼蠶蟬酒炒三錢全蟬退十個白芍一錢梔加生薑

二錢水煎入冷黃酒一兩蜜五錢冷服

清下壯水諸劑

黃連解毒湯

大熱乾嘔煩渴譫語神吟不眠者此方主之

黃連

黃芩

黃柏

梔子

各一錢

水煎治服

崔尚書曰

胃有燥糞令人錯語邪熱盛極亦令人錯語大便

秘而錯語者承氣湯

大便通而錯語者解毒湯

玉女煎

治少陰不足陽明有餘水虧火旺六脉浮洪滑大乾燥煩渴頭痛牙疼吐血衄血者

熟地

五錢

牛膝

半錢

石膏

五錢

知母

錢半

麥冬

去心二錢

水煎服

熟地牛膝補腎水之不足石膏知母瀉脾土之有餘而金則  
土之子水之母也麥冬甘以保肺寒以清肺所謂虛則補其

母實則瀉其子也。

黃龍湯

治胃實失下虛極熱極循衣撮空不下必死者

人參

錢半

熟地三錢

當歸二錢

大黃酒浸三錢

芒硝二枳

實一錢

厚朴一分

錢五分

水煎服

虛人熱結於內攻之不行乃腸胃枯涸之故故陶氏加參歸地於大承氣中以助氣血建背城之功與小柴胡湯桂枝新加湯用人參佐表藥輔正匡邪之義同

六味地黃湯

此所謂壯水之主以制陽光也

熟地

四錢

山藥二錢

山萸肉二錢

白茯苓半錢

丹皮半錢

澤瀉半錢

水煎服

下後虛極之劑

人參固本湯

瘟病虛極熱極循衣撮空不下必死者下後神思  
稍甦續得肢體振寒怔忡驚悸如人將捕之狀四

肢厥逆眩暈昏迷項背強直此大虛之兆將危之候也此方  
救之。按此等症竟有至十日外昏迷不醒四體冰涼形如死人而心口微動者以附子理中回陽漸甦靜養而愈但不可多用久用耳誌此以見神化之一端

人參

二錢熟地

三錢生地

二錢杭芍

錢半

天冬去麥冬去

知母

炙草

陳皮

各一錢

水煎微溫服服後虛回卽止服葢溫病乃邪火燥症人參固爲補元氣之神丹但恐偏於益陽恣意投之有助火固邪之弊不可不知世之庸工溫病用參受害者不可枚舉病家只

痘瘡傳新  
誤一人醫家終身不悟不知殺人無算特書之以爲濫用人參之戒必如前症虛危之極方可暫用

下後不解之劑

大復甦飲

瘟病表裏大熱或誤服溫補和解藥以致神昏不語形如醉人或哭笑無常或手舞足蹈或譖語罵人不

省人事目不能閉名越經症及誤服表藥而大汗不止者名亡陽症此方主之按越經者傷寒傳變只足三陽三陰六經而不及手三陽三陰六經此則越足六經之外而熱入於手少陰心經也

殼蠶

酒炒

蟬蛻

十個

當歸

三錢

生地

二錢

人參

茯神

犀角

磨麥

冬至天麻

丹皮

梔子

炒黑

黃連

酒炒

知母

黃芩

酒炒甘草各

錢滑石

二錢

水煎入蜜酒犀汁服

按犀角甚難磨可剉細紙

包納懷中候熱取搗立碎

羅細和服此歸田錄所謂人氣粉犀也。

陳來章曰熱入於心經涼之以連梔犀

角心熱移於小腸瀉之以滑石甘草心熱上逼於肺清之以

芩知麥冬然邪之越經而傳於心與夫汗多亡陽者皆心神不足也故又入人參茯神以補之此卽導赤瀉心各半湯也

加天麻

濕紙包煨切片酒炒

使之開竅以定其搐

按如無其症再加歸天麻可不用

地丹皮和血涼血以養其陰仍用蠶蟬以清化之品滌疵癘

之氣耳

瘧病雜症諸方

瘡滿脹痛熨方

瘡滿脹痛

瘡

生薑

葱白

等分

生白蘿蔔

加倍如無用子

約共須一二斤搗碎炒熱

白布包作餅熨胸前結胸處並治一切痞滿脹痛皆愈且速

犀角大青湯

治斑吟不眠或咽喉不利者

或心煩大熱錯語呻吟

或以青錢

各三升

麻黃連

各一錢

甘草

五分

芩黃柏

梔子

各一分

水煎入犀角童便冷服或加

殭蠶三錢蟬退十個便秘加大黃

犀角地黃湯

瘧病胃火熱盛衄血吐血咳嗽咯血者蓋衄行清道

而不守隨氣而行火氣急迫故隨經直犯清道上腦而出於

鼻爲衄其從肺而出於咽者則爲咳咯其存胃中者爲守榮之血守而不走胃虛不能攝或爲火逼故嘔吐從咽而出也

衄血之熱在經吐血之熱在府傷寒衄血爲表熱瘧病衄血

爲裏熱，內經曰：心移熱於肺，則咳嗽出血，便血、畜血，如狂，漱水不欲咽。傷寒便血爲傳經熱邪，瘟病便血爲裏熱畜血，在上則喜忘，在下則如狂，漱水而不欲咽。熱在經裏無熱也。蓄血發燥而內不渴，故雖漱水而不欲咽。海藏經曰：凡血症多不飲水，惟氣症則飲水。經云：陽明病口燥，漱水不欲咽者必衄。傷寒當發汗而不發汗，邪熱妄行逼血外出，故見此症。及陽毒發斑，熱甚傷血，發於皮膚，見紅點者爲疹，如錦紋者爲斑，傷寒不當下而下，熱毒乘虛入胃，則發斑疹。瘟病當下而不下，熱留胃中，亦發斑疹。或誤服熱藥太過，亦發斑疹。

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

懷生地

六錢

白芍

四錢

牡丹皮

三錢

犀角

二錢

磨

水煎入犀角

汁服，瘀血甚者，加大黃二錢以行之。或因怒致血，或熱極如狂，加柴胡平少陰厥陰之火，加黃芩瀉上中二焦之火，加梔子瀉三焦之火也。

瀉三焦之火也

生地甘寒涼血以滋腎水丹皮苦寒瀉血中之伏火犀角大  
寒解胃熱而清心火白芍酸寒和陰血而散肝火以共平諸  
經之僭逆也

地榆散治瘍病熱毒不解日晡壯熱腹痛便利膿血甚如爛瓜肉屋漏水者

地榆二錢當歸四錢白芍四錢黃芩二錢黃連二錢梔子二錢

炒黑犀角粉磨

錢薙白四錢無薙白韭白亦可

水煎入犀角汁冷服又有熱毒痢下血用鬱金炒槐花各五錢炙草減半爲末每服三錢豆豉湯下

治日久病甚煩燥昏沉

蟾蜍心三二個搗和水飲二三次定心安神而病去矣勿以

爲微而忽之、或並加硃砂少許、

白虎湯

溫病表裏俱盛、口渴引飲、脈洪大、此方主之。

石膏

生八錢、入錢半

知母

三錢、甘草生

錢半

粳米二錢、竹葉三十片

水煎冷服、

玉樞丹

一名紫金錠、主治暴中雜氣、昏暈欲倒、如霍亂吐瀉、攬

腸沙青筋脹心腹痛脹、諸般危症、並一切山嵐瘴氣、水

土不服解諸毒療諸瘡利關竅、

通百病奇效有不可殫述者

山茨姑

洪山出者洗去毛皮焙一兩

川文蛤

淨槌破焙二兩、紅芽大戟去淨

骨焙

一兩  
千金子

一名續隨子、用鮮者去殼去油一兩

朱砂

有神氣者研末三錢明雄黃

鮮紅

大塊

五錢  
者研末  
麝

揀淨皮毛乾

右七味秤準合研勻於細石臼內漸

加糯米濃飲調和燥濕得宜杵千餘以光潤爲度每錠一錢

每服一錠，病重者連服二錠，取通利後，以溫粥補之。  
一治一切飲食藥毒、蠱毒及喫自死牛馬豬羊等肉、菌中毒、  
並山嵐瘴氣、烟霧惡毒等症，昏亂猝倒，或生異形之狀，悉用  
涼水磨服。一凡遇天行疫症，延街偏巷相傳染者，用桃根  
湯磨濃，抹入鼻孔，次服少許，任入病家，再不沾染。一治陰  
陽二毒，瘟疫癰脹，或狂言亂語，或胸腹腫痛，並喉痺咽腫，俱  
用薄荷湯待冷磨服。一治癰疽發背，對口天泡，無名腫毒，  
白蛇節紅絲等疔，諸惡等瘡，諸風癰瘍，久痔紅腫，及陽梅結毒，  
俱用無灰酒磨服，外用涼水磨塗，日夜數次，覺癢即消，潰爛

者亦可少減。一治牙疼、酒磨塗痛處仍含少許、良久嚥下。  
一治男婦急病癰邪奔走叫號、失心狂亂羊羔猪癲等風俱  
用石菖蒲煎湯磨服。一治心胃痛及諸般氣痛諸般血痛  
並赤白痢瀉泄急痛霍亂絞腸之類俱用薑湯磨服。一治  
中氣中風中痰口眼歪斜牙關緊急語言蹇濶筋股攣縮骨  
節風腫遍身疼痛行步艱難等症用酒磨頓熱服之。一治  
風犬毒蛇澗溪諸蟲傷人及注徧身毒氣入裏命在旦夕俱  
用酒磨服外以水磨塗之再服葱湯汗出愈。一治年深日  
久頭脹頭疼偏正頭風及溫病後毒氣攻注腦門作脹者俱

用葱酒磨服仍磨塗太陽穴上。一治小兒急驚風、五疳、五  
痢、黃疸俱用薄荷湯磨加蜜調服。一治小兒遺毒生下百  
日內皮塌肉爛、穀道眼眶損者涼水磨服並塗抹。一治婦  
人經水不通紅花湯下。一治傳尸勞瘵諸藥不效一方土  
指教服此每早磨服一錠至三次後逐下惡物尸蟲異形怪  
類而愈。一治一女子久患勞瘵爲尸蟲所噬磨服一錠片  
時吐下小虫十餘條後服蘇合香丸其病頓失調理月餘而  
愈真濟世衛生之寶藥也

撥正散

主治雜氣爲病陰陽毒瘡脹及一切無名惡症並食厥痰厥氣厥皆驗

草撥

雄黃

精爲火硝各二錢

冰片

麝釐

各五

右爲細末男左女右以筒吹入鼻中卽甦

柴胡養榮湯

治瘟病後陰枯血燥邪熱不退

柴胡三錢

黃芩一錢

陳皮一錢

甘草一錢

當歸二錢

白芍半錢

生地三錢

知母半錢

二花粉二錢

蟬退個

殭蠶十錢

酒炒

大棗二枚

水煎溫服

去當歸白芍生地名柴胡清燥湯數下後餘熱未盡邪與衛搏故熱不能頓除宜此方和解之

安神養血湯

治愈後勞復發熱

茯神

棗仁

當歸

遠志

桔梗

白芍

生地

陳皮

甘草 元肉

當歸導滯湯

治病後痢疾。○按尊生書歸芍三倍、萊菔子加倍半餘俱三錢、炙草用生者臨症酌之。

當歸

一兩

白芍

一兩

萊菔子

四錢

車前子

研枳殼炒

枳榔

炒

炙草

二錢

錢水煎入蜜服

紅痢加桃仁

此方之奇全在當歸白芍益泄瀉最忌當歸之滑而痢疾最喜其滑也白芍味酸入肝以和木使木不侵脾土枳殼枳榔消逐濕熱之邪車前分利其水濕而又不耗真陰之氣萊菔辛辣除熱去濕又能上下通達消食利氣使行於血分之中助當芍以生新血而蕩滌其瘀血也加甘草蜂蜜以和中則

又無過烈之患奏功之神奇實有妙理耳。熱加黃連二錢、黃芩二錢日夜無度或裏急後重之甚者加大黃木香溫病後痢疾加白僵蠶蟬脫余嘗治溫疹後痢甚危者加金銀花一兩至四兩屢效。又有疫痢傳染此方不應者改投疫痢方用蒼朮一兩防風白朮白芍羌活豆豉一錢效。

### 愈後調治方

太平酒

溫病愈後元神未復腰腳無力渾身酸軟者此方主之。

糯米酒糟

晒乾炒黃色爲末二兩四錢。

主消食除冷氣殺腥去草藥毒潤

皮膚調藏府和血行氣止痛。紅曲

陳久者佳炒黃黑爲末二兩四錢。

主健

脾消食養陰滋血。六神麵

陳久者佳炒黃黑爲末四兩入錢。

主健脾養胃。

卷之三

化穀消食。

陳麥麸佳去淨面筋晒乾炒黑色爲末四兩入錢

主天行溫毒

熱極發狂發斑疹大渴者又主調中養氣健人生力助五藏

除煩悶利小腸麥乃養心之穀屬火而麸則能退心熱與胸

膈之熱蓋取同氣相求亦從治之意也。白殭蠶白而直者

酒炒黃色爲末

全蟬退去土爲末四錢加枳殼水通治食滯飽悶服散

亦妙右六味研勻水丸每服一兩以冷黃酒三兩調蜜一

兩送下隔五日如法再服如是三次開胃進食健人生力只

十餘日仍如無病一般因名其方爲太平酒

產後瘧病方

治產後大熱神昏四肢厥逆譫語或不語等症若發狂燥結量加大黃芒硝內經曰熱淫

於內治以鹹、寒佐之、以苦。

又曰：有病則病受之，是也。

三合湯

此本生化小柴胡、小清涼、三方加減令而爲一也。

當歸

八錢酒洗川芎

不去皮尖紅花一錢黃芩三錢粉丹皮

炒研一錢酒洗黃芩一錢

金銀花

三錢澤蘭葉三錢生甘草一錢

白僵蠶

二錢酒炒全蟬退

十二個金銀花一錢澤蘭葉三錢生甘草一錢

全蟬退

金銀花一錢澤蘭葉三錢生甘草一錢

金銀花

一錢

益母草

五錢去老梗

軟柴胡

四錢梔子三錢水煎入蜜酒童便和服

小兒瘡病

可隨症酌用。凡治瘡病方皆

加味太極丸

溫疫論原方無蟬退天竺黃五錢、胆星五錢、大黃三錢、冰片三分、有麝三分、端陽收合砂爲衣、姜

湯化下與此少異。

白姜蚕

二錢酒炒全蟬退

一錢土廣姜黃三分

川大黃

四錢天竺黃一錢

胆

星錢冰片共爲細末，糯米濃湯和丸如芡實大，冷黃酒和蜜泡化一丸，冷服。愚按天竺黃真者不多得，擬以竹懸代之，蜜丸亦可。

滌疫滋生湯主治瘟疫時氣最良，可時常飲之

卽自己尿也

避禳瘟疫方

用貫眾長浸水缸中

此方甚效，並治咽喉腫痛

吳茱萸搗爛，醋糊和敷腳心，卽消。

簡便治瘧方

漢陽進士黃亮夢神傳  
此方治瘧疫果救多人

用小便一碗薑汁一鍾同煎一滾服

療時疫者服大黃良

陳宜中嘗從夢中得此方，夢神人語曰：天災流行，人多死於疫癘，惟服大黃者生事

見宋

治呃逆胸痞等症方

用白毛烏骨雞一隻，從雞胸活割開，安病人胸前罨之，自愈。  
又方，將雞乾擣去毛，破開去腸屎，刀切爛鋪心頭上，治濕熱發黃，昏沉不省人事，死在須臾者，少頃即活。

辟邪丸

雄黃一兩 鬼箭羽 赤小豆 丹參各二錢

共爲細末、煉蜜爲丸、如桐子大、每服五丸、溫水下服、此雖與  
病人同牀合被、亦不傳染。又用雄黃抹鼻、或飲雄黃酒、亦  
可。又方、取初病人衣服蒸之、令散氣、亦不傳染。

備用諸方

大承氣湯

陽明病、痞滿燥實譖語煩渴腹痛便秘此方主之

大黃

四錢酒浸芒硝二錢厚朴薑炒四錢枳實麸炒二錢水煎溫服硝俟藥煎成另沖入

小承氣湯

陽明病、心腹脹滿潮熱狂言而喘此方主之

大黃

酒浸厚朴薑炒枳實麸炒一錢水煎溫服



紅花

酒洗七錢

生桃仁

另研兩

丹皮

一兩

牛膝

一兩

共爲末

煉蜜丸

曾薑湯送下三錢。

百合地黃湯

治百合病

百合七個劈破、以泉水浸洗去沫、另用泉水五盃、煎取一盃半、生地黃二兩、洗淨、用泉水五盞、煎取一盞半、二汁合一處、分二服、大便下惡物如漆中病即止、不中再作服。

三甲散

治主客交渾病

鼈甲

酥炙一錢

龜甲

酥炙一錢

山甲

土炒五分

殭蠶

生用切五分

全蟬蛻

斷一錢

牡蠣粉

五分

當歸

五分

白芍

酒炒五分

麝蟲

俗名土鼈蟲三個

搗入酒取汁

聽用



黃連

酒炒二錢

犀角

二錢

烏梅

三分

木香

磨汁

水煎另入二汁服

和

雄黃銳丸

治狐惑蟲食藏

半夏人參

甘草

大黃

水煎

大黃

水煎

雄黃 黃連

苦參 桃仁 青箱子

各等分

共爲末以艾

汁丸如棗核樣棉裹入穀道中

補陰益氣煎

此補中益氣之變方也景岳云有騰雲致雨之妙

熟地

三五錢

當歸

二三錢

山藥

炒二錢

陳皮

一錢

人參

一錢升麻

五分火上浮者

不

柴胡一錢

生薑

二錢炙甘草一錢

水煎服

去升柴山藥陳皮參薑加炮薑名理陰煎治天一無根真陰不足

梔子厚朴湯

重加神曲治食復

梔子 厚朴 枳實 神麴

人參三白湯

加柴胡三錢名參胡三白湯

人參

二錢土炒白朮

白茯苓

三錢

生薑

三錢

大棗

三枚

水

煎

此方純乎調內，若參胡三白湯，以人參爲君，佐白朮以培太陰之母，白芍以滋厥陰之血，茯苓以清少陰之水，生薑助柴胡散表邪，大棗助人參補元氣，信爲大病後調理之聖劑矣。若榮衛不和，去柴胡，加桂枝；口渴心煩，加麥冬、五味；輔人參生津止渴，心下痞，加黃連；枳實瀉心，不得臥，加竹茹泄太陰。

熱如無表熱，並去柴胡，卽人參三白湯矣。

按瘟病桂枝慎用

五福飲

凡五藏氣血虧損者，此方能兼治之，足稱王道之最。

人參

補心隨宜用

熟地

補腎三錢至一兩

當歸

補肝二錢至七錢

白朮

補肺滑浸土炒二錢

甘草

補脾蜜炙一錢

水煎溫服，或加生薑

凡氣血兩虛症，以此爲主，或宜散者，加升柴荆防，宜溫者，加薑桂附子，宜清者，加梔子、青蒿、地骨皮之類，左右逢源，無不可也。原方加熟棗仁二錢，製遠志肉一錢，名七福飲，治氣血兩虛，而心脾爲甚者。按此泛論，非爲溫病言也。

茵陳蒿湯

治發黃症

茵陳蒿二錢梔子三錢大黃酒浸五錢

水煎溫服

又補遺諸方

代天靖疫飲子第二方

二分晰義中，本三方條辨僅錄其第一，即清化湯是也。

陳皮六分

丹皮一錢

川連一錢

黃芩一錢

黃柏一錢

骨皮一錢

車前一錢

木通一錢

殭蠶炒三錢

蟬蛻炒十枚

神麴一錢

當歸二錢

桔梗二錢

水煎入蜜

酒服。

一人於四月間因着惱患瘧疾，憎寒壯熱，頭沉遍體

疼痛，誤服發汗藥更重，服此一付而瘧瘳現，連進四服全愈

第三方

川連一錢

當歸三錢

丹皮二錢

生地二錢

殭蠶炒三錢

蟬蛻個

木通二錢

川連一錢

當歸三錢

丹皮二錢

生地二錢

殭蠶炒三錢

蟬蛻個

前一錢神麴炒三錢紅花一錢桔梗一錢黃芩一錢引同前加自己尿一杯服。一人患瘧因誤服防風通聖散葛根湯小柴胡湯發汗和解等藥延挨半月病勢危甚渾身壯熱目赤譫語手足抽掣服此方兩付全愈。

清心驅疫飲子第二方

原本此亦三方條辨錄其第一卽神解散是也

川連一錢殭蠶炒一錢蟬蛻個白附一錢陳皮六錢分丹皮一錢當歸二錢生

升地二車前一錢木通一錢神麴炒三錢桔梗一錢甘草五錢分引同前第三

方。一人患瘧憎寒壯熱心疼嘔吐發狂譫語昏不知人因誤服解肌發汗藥病勢甚危與此一服而安再服全愈。

第三方

川連一錢當歸二錢生地炒二錢丹皮二錢生黃芪二錢紅花一錢澤蘭二錢  
蟬蛻五個殭蠶炒三錢桔梗二錢神麴炒三錢黃芩炒二錢甘草三分

引同前。一婦人年近五旬，患瘧憎寒，壯熱頭暈，四肢無力，乾嘔，用此方一服全愈。又一婦人年五十一，腹中有孕五月矣，患瘧內熱，身涼頭痛，作嘔，病勢甚危，亦用此方卽愈，不得謂蟬蛻爲孕婦禁用之藥，所以有病則病受之，並不動胎氣。

又滌熱三方

大梨削薄片，於新汲水中去渣飲汁，卽梨漿也。生藕搗爛，

取汁一盞，入蜜一合，和勻分爲二服。○用靛青一茶匙，以新  
汲井水調服效。

清燥養榮湯

治數下後，陰虧津液不生，目澀舌乾，口燥者，以下三方，本吳氏溫疫論。

知母 花粉

歸身

白芍

陳皮

地黃汁

甘草

燈心引

承氣養榮湯

治下後熱渴未除，裏症仍在者。

知母 當歸

白芍

生地

大黃

枳實

厚朴

貝母養榮湯

治下後痰涎湧甚，胸膈不清者，忌用參芪。

知母 花粉 瓜蔞仁

貝母

橘紅

白芍

當歸

蘇子

人參養榮湯

此乃吳氏增減者，原方無麥冬，知母，有茯苓，遠志，桂心，白朮，臨症酌之。

人參 麥冬 五味 地黃 彌身 白芍 知母 陳皮

黃芪 倍加 甘草

倍加

參歸養榮湯

治下後反痞

人參一錢半夏二錢 生地二錢熟地三錢大棗枚生薑炮三錢草白

芍酒炒錢半當歸二錢水煎溫服

果係虛症一服其痞如失若下後仍潮熱口渴脉洪大而痞者投之禍不旋踵須詳辨之

二聖救苦丸 本古今醫鑑及良朋彙集按此亦治瘟疫表裏雙解之藥屢效

酒大黃 兩 牙皂 一兩炙去皮弦

共爲細末打熟麵糊爲丸如菉豆大每服四十九菉豆湯放冷送下得汗而愈一云每服二錢亦視症酌之

五瘟丹行並諸瘧熱病

黃連

黃柏

黃芩

甘草

紫蘇

香附

各一兩

右六味皆生用於冬至日製爲末用錦紋大黃三兩濃煎湯去渣熬成膏和前藥爲丸如彈子大硃砂雄黃末爲衣再貼金箔每服一丸冷水磨服神效

鱉甲散

治傷寒八九日不瘥諸藥不效名壞傷寒按瘧病十數日後邪熱不解表裏未清諸藥不效而爲壞症者亦擬

用此方救之故復錄以備參酌

鼈甲

炙研升麻

前胡

烏梅

黃芩

犀角

枳實

各七分

地錢

甘草五分

水鍾半煎八分服

一方用黃丹

胡椒

白礬

各一兩

馬蜂窩

五錢一方無此味

共爲細

末每用時約二三錢以老葱共搗成膏男左女右手捏住對小便處卽時汗出效

又方用大黃

三錢芒硝

按病人每歲一錢

○

共搗如泥男左女右

手捏住或夾腋下夾片時汗出卽愈○按吳氏曰痘病汗解在後若戰汗不得及一應汗解而不得者故復錄二方於上以備酌用

附治諸瘍六方

加味敗毒散

治捻頸瘍、其症咽喉腫痺、失音、湯水不下、危在旦夕。

羌活一錢

前胡一錢

芥穗半錢

牛子半錢

枳殼一錢

元參三錢

馬勃一錢

桔梗

黃芩三錢

射干二錢

薄荷一錢

殭蠶五分

人中黃三錢

如藥不能下、急用穀心刺鼻孔出血、更用針刺少商穴、穴在大指指甲盡處、肉際向外一分、左右皆可刺、更用白礬銀硃冰片等分研末吹喉中、令吐出痰涎後服藥。

梔芍散

治血痢瘍、其症腹痛下墜、便膿血如痢、日夜無度。

生大黃一錢

芍藥三錢

枳實二錢

半梔榔二錢

厚朴一錢

金銀花五錢

人

中黃三錢引加東壁土一塊

生犀飲治高腸起氣喘嘔血

犀角汁一盞黃連二錢瓜蒂三錢蒼朮一錢人中黃三錢

○引同前大便閉加大黃三五錢虛加參

三黃湯

治楊梅瘻其症遍體紫塊如瘡癰

黃連二錢

大黃三五錢

人中黃三錢

赤芍三錢

丹皮二錢

滑石二錢

元參三錢

生地黃三錢

甘草一錢

大渴飲冷者加石膏五八錢

葛根二三錢

人中黃散治瘡瘍偏身走痛危在旦夕

一錢硃砂半雄黃半薄荷

錢桔梗錢

三甘草一錢

一大便閉加

人中黃一錢硃砂半雄黃半薄荷

錢桔梗錢

三甘草一錢

一大便閉加

大黃

犀牛飲治錦霞瘡其症渾身  
斑疹成片痛痒異常

犀角汁一錢牛子二錢荆芥二錢防風錢半赤芍三錢生地三錢大渴飲冷  
者加石膏五錢葛根二錢

又附治小兒葡萄疫此症多因感受癟疫之氣鬱於皮膚、  
發於偏身惟腮脰居多甚則邪毒攻胃以致牙齦腐爛臭  
味出血形類牙疳而青紫斑點狀若葡萄凝結而成大小青紫斑點初起宜服羚角散久虛者宜服胃脾湯米泔水漱口以非  
疳散日擦四五次卽效近見中年之人下虛者亦患此症

治法

同前

羚羊角散

羚羊角 麥冬 黃芩 知母 牛子 防風 元參各八分

甘草二分

竹葉十片食遠服

胃脾湯

白朮

遠志 麥冬

沙參

茯神

陳皮

各六分

味

五分

甘草

炙五分

分

分

非疳散

羚羊角

人中白

煅文蛤各一錢

爲細末、用米泔水

漱口後擦此藥

按瘧病一門、創立於仲景、遺失於漢魏、晦

亂於叔和、至吳氏始辨正發明、陳氏提綱握要、楊氏復爲條  
辯而詳論之、其義乃重明於今日、愚之此書、蓋信述而竊取  
之、其中間有去取運用不同者、特欲明白簡易、昭人心目、非

敢妄作聰明師心自用也

同春野鶯白頭人

年老面相輸太其寢氏更顯微今日遇之

益奇而而齋祖

騎火足時至吳刀散將石鑿開刻丑時

刻要跡五哥

炳日炎烈出葵

刻藏藏一門隙立外中景影尖竹難

難

非演辨

錢羊食人中口

辨

文健

微時未相米

米

知正甘草

卷

目輶

白演

志

交冬

交參

參

刺賦

刺

各六

正

甘草

生

朴葉十六

金毒

金

石筍羊食

麥參

黃芩

味母

牛子

牛

胡風

胡

元參

元

各六

正