

婦科指歸上

自序

証子百家之書誤人
 每矣其誤

人在心術望書亦且誤人其則

誤及性命所最傷也伏羲氏畫

八卦於是言陰陽之道其行之

數而疾病豈理未且明文至禱

蒼氏嘗百草，亦其味以達之。其
游六腑，貫通經絡，又曰黃帝氏
與岐伯嘗天地之氣，行三氣
之理。六淫八風之氣，由人稟之
行。三氣以生，三生不息之源。其
為素問，其樞密，其經流傳，其世然。

讀此罕能解之相沿既久不
先實迨仲景東垣丹溪諸先生
祖述神明以八法十二科辨症
定方變動權衡至用以參近世
不知誰實作俑何景岳以立說
編為景岳全書今法專以補病

為治病夫人家陰陽氣血為無
偏害何有於病既病矣則當有
以除之素何以補為治乎喻子
嘉言棄舉子業悉心攻策嘗究
內經通會脈理因見忌於鄉邦
僻洪都而走浙幸遇知者其道

遂行吾終門法律意則顯激南
幽福則分徑嫩綿甚可依歸而
卒未也且咀髓吸液此良用嘆
可具先君子以望旨若世具難
不敏竊思繼志初讀由徑茫然
昔解泰改詒若家書復不甚悟

又与道法业焉因彙象玉南昌
獸居新域門之太室偕室女八
身靈極通漸悅矣鬼神來告漸
覺先珎汝獲由內徑素向天地
六淫之端以參四時正變中り
順送陰陽和遠四方風土剗彙

燥溼少明病去之性藥又寬充
脈學何以言之九虛人身何
以爲三傳九部練習指期務求
脈學與病攻心泰恒憶先君子
與人福望謂望之要在脈而望
之理亦在脈減哉是言也

身望八矣自愧衰頽身臥閉門
謝客而求方同瘧疾日蹙而至
悠悠此心終焉過拒且承知愛
此公責予立說向世爰先纂歸
多兩科以待編定焉羞婦多兩
科由經所稱二玉予見近時

家每視為甚易誤人實每不得
不先為編定現如幸諒其心也
八十卷人亦因曾鼎氏撰

凡例

一醫家必先講求脈息審証既真乃能認症即如感冒輕病淺深當別表裏宜清脈理不真今日一表明日一裡邪衰傷肉輕者受枷鎖之苦重者見死亡之憂是以先舉斷湖雖學刊出行世

一醫家必讀內經方知陰陽至理時行遂順

一醫家方立最忌朝發夕改古來名手治年遠久病每一切脈即知病由源得淺深之道每立一方便數十劑更改不過二三果爾收效鑿案疊之三人豈無見聞嘉言云有方之書奉為至寶無方之書絕不寓目斯言也確中三人之弊予受益

在此潛未能盡窮其術

一醫家用藥必查道地必辨質性方知五味輕重之宜

一醫家用藥必求炮製之法所行徑絡自然利達是以驗應無

差

一醫家九散必遵仲景八法君臣佐使孰輕孰重切不可拘泥

成方以妨時令百得標本

婦科指歸目錄

卷一

辨男女稟氣論

辨男女脈論

辨男女形色論

女子通經論

調經辨症諸方

女子經閉

調經湯

通經丸

法製香附丸

月經前期辨

加減黃芩散

調經丸

月經後期辨

理經加減四物湯

內補當歸丸

月經或前或後

紫雪丸

血虛發熱

逍遙散

紫苑湯

行經氣痛

紅花當歸散

經來不止

金狗散

經來黃泥水色

加減四物湯

經來銅綠色

烏雞丸

經來全白無紅

經來成塊死猪血色

經來臭如夏腐之物

龍骨丸

經來如魚髓

疎風止痛散

經來如牛膜片

硃雄丸

經來下肉脍

十全大補湯

經來小便痛如刀割

牛膝湯

經來吊陰不可忍

川棟湯

經來未盡潮熱氣痛

義術散

經行盡作痛

四物湯

經來脇氣痛

四物元胡湯

經來小腹痛有塊

元胡散

經來遍身疼痛

烏蘘順氣散

觸經傷寒

五積散

經逆上逆

犀角地黃湯

經來兼咳嗽氣逆者

紅花散

冬花散

經來每月二三次

膠艾湯

經來狂言如見鬼者

麝香散

茯神丸

經來常嘔吐不思飲食

丁香散

經來飲食後即嘔吐

烏梅丸

九仙奪命丹

經來通身浮腫

木香調胃散

經來泄瀉

理中丸

經來前後痢症

香連酒積湯

經來大小便俱出

分利五苓散

經來常咳嗽

潤肺清燥飲

經阻腹大如鼓

經來小便出白虫

推虫丸

建中湯

經來潮熱日久不退不思

飲食

血山崩

八灰丸

烏經散

經來吐衄虫

卷二

婦人受胎逐月胎形各經按治論

安胎保產論

初孕十月胎豆尤宜慎之

補母壽子論

受胎半產論

臨時宜真產脈訣

初有孕未知果否感冒風

寒

言歸湯加減解散法

至二三個月果是真胎惡阻嘔逆

加味參橘飲

至三四個月胎乾不旺用勝胎散

至五六月胎氣漸旺用調氣湯

至八九個月胎乾尤盛大補胎元湯

至十個月胎已完足用加味佛手散

凡有孕元氣不足者用加味安胎散

二孕成後惡阻嘔逆者用參橘飲

三孕婦常有怒氣胸腹滿悶宜用理脾子肝散

四孕婦腹中不時作痛下墜者宜服加味安胎飲

五孕婦面目浮宜用人參漂朮散

六孕婦胎乾上攻宜用順氣安胎飲

七孕婦按月漏胎宜補中安胎飲

八孕婦頓仆動胎宜用膠艾安胎飲

九孕婦心驚胆怯宜用竹葉安胎飲

十孕婦腿膝發腫用天仙藤散不效再用補中健脾湯

十一孕婦口噤項強等症宜用羚羊角散

十二孕婦小便短澁或淋宜用加味安榮散

十三孕婦形容勞苦性燥小便帶血宜用加味道遙散

十四孕婦臍腹作痛小便淋閉宜用安胎飲加二陳升解

十五孕婦元稜壯盛常見澀紅數點血感之故無腰腿該痛不任用藥

十六孕婦氣逼腹脹等症宜用鯉魚湯

十七孕婦常咳嗽至甚者宜服寧肺止咳飲

十八孕婦咳嗽帶紅者用地黃紫苑湯

十九孕婦霍亂吐瀉用六和湯

二十孕婦癰疾用安胎飲加減治之

二十一孕婦痢症用安胎飲加香連治之

補母壽子方 并加減法 大造丸

半產益母丸

凡初有孕偶感風寒者用理血散解湯

凡有孕至三四個月受寒者用養血散解湯

胎前怔忡養心平肝飲

紅棗硃砂方

胎前至八九個月手足浮腫用五皮湯加當歸治之

胎前七八個月陰腫用安胎順氣飲

胎前遍身發癩用回春湯加減

胎前下血胎動即投安胎飲

胎前脚腫用順氣養血湯

胎前中風先用黃臘丸次用加減排風湯

胎前癱瘓用疎痰順氣飲

胎前腰痛用猪腎丸再服安胎飲

胎前頭痛用屏風散
胎前泄瀉用藿香散加減

胎前胃氣痛用烏梅湯摩佛手散

胎前大便閉結用養血通潤散

胎前遍身癢甚者用擦法
胎前陰癢用洗法

胎前乳腫用皂角散加柚子葉擦法

胎前消渴用四物湯加生麥相炭

胎前咽喉痛用升麻桔梗湯

子煩症

犀角飲

二冬飲

順氣利膈飲

子癰症

羚羊角散

子懸症

紫蘇寬中飲

子淋症

安營散

胎前惡阻

和氣散

胎前八九個月孩兒攻心

涼膈和中散

胎前六七月氣緊發熱不能臥

紫蘇安胎飲

胎前衄血

衄血丸

胎前漏紅

扁柏飲

胎前赤帶

扁柏飲去百草霜

胎前白帶

青苔散

閉白湯

胎前氣緊咳嗽臉紅

逍遙散

紫苑湯

胎前紅水流水

膠艾湯

安胎飲

胎前小便不通

八味湯

胎前八九個月大小便不通

加味大黃丸

臨產須知

治橫生逆產久不能下方

又霹靂奪命方

產時防血暈法

治兒已生胞衣不下用例

勾註神驗方

治產難方

臨產破水務服佛手散開骨神驗方

產後用加減生化湯

產後宜忌

胎死上喘

黑神散

斬爛散

粒遂逐胎令胎橫速用滋者益母草對量便服再進必聖

散

產後較胎前病實更多尤宜慎重

產後七日所忌

產後三日所宜

一論血塊

二論血暈

三論厥症

四論血崩

五論氣短似喘

六論妄言妄見

七論傷食

八論忿怒

九論產後類瘧

十論傷寒二陽并三陰

十二論發汗

十一論類中風

十三論盜汗

十四論口渴小便不利

十五論類瘧

十六論泄瀉

十七論冷泄

十八論痢症

十九論霍亂

二十論嘔逆不食

二十一論水腫

二十二論怔忡驚悸

二十三論骨蒸發熱

二十四論胃痛

二十五論遍身痛

二十六論淋

二十七論流注

二十八論陰蝕五疳

二十九論大便閉誤下成脹

三十論乳癖

試驗產後生化湯

詳論生化湯之妙

產後定撥諸方

滋榮益乾復神湯

滋榮益乾湯

加參生化湯

寧神生化湯

涿榮益乾復神湯

加味生化傷食湯

長生活命丹

舒肝扶脾飲

加味生化湯

又養正通幽湯

又一方治大便久不通

生津止渴益水飲

生化湯加減治類症方

又方

涿榮活絡湯

治盜汗益陰湯

加減生化止泄湯

參苓朮附湯

參芪益朮散

加減生化湯治痢方

加味香連丸

溫中健運飲

又温中加附散

加減補中益氣湯

清骨散

加減生化湯治遍身痛方

又治淋方

又一方治久淋不愈

葱熨方

又一方

參朮通幽湯

防風散解湯

加減生化嘔逆湯

加減蒼朮湯

加減生化湯治胃痛方

茅根湯

又一方

參歸生化湯

薑洗方治陰蝕五疳症

又方治下部瘡虫

治乳癰初起法

又方瓜蒌乳投散

迴膿散

附產後乳漏方

薰被方

升舉大補湯

加減生化湯

加味參苓生化湯

四君生化湯

七珍散

參蘇霹靂方

神衛參芪溢權湯

又散癰方

產後各症治法

共三十條

養營大補湯

參苓蓮子湯

加減生化湯

加減香連丸

加減生化湯

加減抵聖湯

丹皮散

卷四

推原婦女調理不善受害成癆論

辨癆症治法

室女經閉誤治成癆方

初宜散消積風方

次宜通經涼膈湯

三宜疎肝解肌湯

四宜開鬱清肺湯

五宜加減逍遙湯

六宜調經養血湯

產後失調月癆辨治

產後月癆固陰回元湯

大轉回元膏

婦科通治諸方

熱入血室

亂經痛

治瘀血成塊年久不散作痛者

外治法

調經女金丹

調經金匱丸

調經益母丸

調經八珍益母丸

開胃順氣調經丸製香附

丸

調經烏雞丸

甘露回生飲

通經丸

又通經方

又通經方

又通經方

痛經方

血痺方

產後異症方

胎產空丹

四物湯

芎歸湯

抑氣養血莪朮散

濟陰丹

加味五積散

琥珀澤蘭湯

勝金丸

逍遙散

加味七君湯

加味平胃散

加味樛蒺四物湯

加味芎歸湯

五苓散

皴血丸

卷柏丸

內灸散

沉香丸

保生湯

加味溫胆湯

延齡四物湯

蜜硝煎

導赤散

茯苓導水湯

知母飲

羴羊角散

枳桔二陳湯

舉胎四物湯

五淋散

黃芪湯

益母丸

甘麥大棗湯

當歸飲

治行經過度

蘇蘇飲

鈎藤湯

桔梗湯

加味地黃丸

阿膠湯

銀芎酒

六味地黃丸

四物加黃芩黃連湯

七沸湯

又方

四物加葵花湯

先期湯

金匱土瓜根湯

十聖散

過期飲

滋血湯

簡易方當歸散

人參養血丸

沉香降氣散

心氣天香散

益胃升陽湯

大溫經湯

溫經湯

滋血湯

蟹甲散

交加地黃丸

桂枝杏仁湯

丹溪治癥方

婦幼兩科合用藥性砂製總論

掃幼兩科合用藥性

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

蘇合香丸

婦科指歸卷一

南城曾鼎香田氏輯訂

辨男女稟乾論

易曰乾道成男坤道成女乾為天坤為地以男女而究乾坤之
理則天地之乾分屬乎陰陽者無物不然陰陽既有定位稟氣
自爾不同况人為萬物之靈豈家豈有不分陰陽漫成混施男
屬陽主乾火為用是以經云陽生陽主動發見於外易曰各正
性命保合太和即陰陽會合沖和之乾也稍有微恙賴氣血流
通五行運化古所謂男病易治也女屬陰主血水為用是以經
云陰生陰主靜順承乎內易曰含宏光大品物咸亨即柔順承

天施地之道也。偶有激戾，反自憂鬱，交加五行，不轉古所謂女
病難治也。男以八數，二、八、十、六，身體發動之時，人多不至。教
皆由富貴之家，厚味過重，習氣不正，相火易動，速宜滋養，令真
火歸藏，免成內傷。女以七數，二、七、十、四，癸水漸旺，行之按期，倘
不能抑養，經門之中，非乾燥即汎漫，至出嫁之後，尤難調理。甚
則帶病受孕，而徑止使餘血注于胞中，以護胎，耗及分娩時，其
症百出，救之維難。女病難醫，於此可見。予為之，以婦科畧為辨

明

辨男女氣論

倉公云：病名多相類，不可知。故聖人為之，氣法以起度量，則脈

法宜審也男以左尺之脈為命門之根女以右尺之脈為命門
之本男脈陽中有陰肝脈貴洪大氣宜輕清則氣舒火則上
升則不伏將官有主左尺宜細而長腎水則充足矣右尺細
微而深火則歸藏矣水足精固斷無他患內經云男宜左旺女
脈陰中有陽肝脈宜浮而細平木舒血氣流通胞胎氣盛左
尺宜沉而堅腎水不亂矣右尺宜旺而滑則血歸海矣血旺胎
溫生育無恙內經云女人右尺宜旺也此以水性論指胞胎
子宮言之唯此二脈不同其餘無異此男女不同脈之證云

辨男女形色論

形色者臟腑之精華流露而外見也蕭敵魯曰人有形疾觀其形

色即知病所在俞附之術故以此之形色相聚一望可知又必
得明其內外虛實之方而識其浮沉澀滑之候則得矣夫氣輕
清上浮男主乾之宜清形宜豐潤不宜枯削色宜微赤帶黃光
彩發外乾火皆清血亦相應五行相通無尅無犯再加保養何
患不永年耶否則形瘦色青水不養肝之色先現必因酒色過
度飲食不節兼之怒氣傷肝病由此起速宜調治得法形色自
轉地乾重濁下凝女主血之宜濁形宜滋潤不宜過肥色宜微
白帶黃澤潤內著血無積瘀氣亦閑會何患不生育耶否則形
敗色紅火來尅金白色先現必因憂鬱傷情貪食燥熱厚味兼
之房事傷期病亦由此而起速宜調經信期一正可無大害此

男女形色之辨昭然可見在昔神於鑒者視疾若隔紗觀物深得病形兼知色候者如此

女子通經論

女為地道至陰應數七二七之年地道通而天癸至三旬一見盈三則虧行之有恆曰月經對日及時為正血色又貴清紅不宜澀淡或召數之先者氣血旺或召數之後者氣血虧又當初行之時必須食戒燥熱生冷性宜恬靜不宜燥烈手不宜時沾冷水身不宜冒犯寒暑如此為行也期來和血足宜然一生無恙否則初行不能謹慎第一性燥第二亂食第三風寒第四冷水犯此四者種之為害犯乾者行皆痛犯食熱者行必色紫犯

冷者血必成塊犯寒者血必凝久則經期愈不調或症無常因
加夏令暑熱七情為害經則閉血必敗或成內傷外勞而治者
又不尋根喪無日矣出稼以液加之房事陽氣沖動陰道不載
禍患旋至豈皆命乎女病所以難治不同男病者以此
調經辨症諸方

女子經閉

室女天癸當至初出血海一二次忽然閉止此因不識調養多
洗冷水兼食煎炒辛熱之故血冷則凝血熱則閉因此血不調
經變而為患面色青黃遍身浮腫候作腫治如害不淺務宜先
用調經之劑經行腫浮即服通經丸或服法製南無附丸

調經湯

蘇葉根同用一錢五分 陳皮一錢 赤芍分 香附一錢五分 烏藥一錢 神曲二錢

壳分 青香分 甘草分 五 引陳薑皮分 或受風寒加防風前

胡

第二劑加當歸一錢五分 川芎分 鬱金一錢 元胡一錢 桑葉一錢 春即

再加紫胡分 沫時可去再服三四劑腫自消

通經丸

生地二兩 三稜錢 莪朮錢 當歸兩 赤芍錢 川芎錢 芫花錢 香附錢

劉寄奴錢 烏藥錢 獨活錢 茯苓錢 陳皮錢 右研

細末早米糊為丸每服空心酒送下三四錢

法製南香附丸方

真南香附去盡毛二十八兩先用童便浸七日河水洗淨再加米泔漂三日一換漂後洗淨切片曬乾分為七分每分四兩

一分用酒柴胡三稜各二兩酒煮汁浸

一分用酒蒸薔金蘇木各二兩水煮汁浸

一分用蘄艾丹皮各二兩米泔水煮汁浸

一分用烏藥紅花各二兩酒煮汁浸

一分用川芎酒蒸元胡各二兩水煮汁浸

一分用當歸身四兩酒煮汁浸

一分用醋蒸過莪朮二兩水煮汁同童便浸

夏浸三日冬浸五日春煉均浸四日浸滿將香附汁晒乾其餘
者過之藥俱不用將七分香附和勻加陳皮二兩縮砂仁一兩
入肉為末細篩用前所浸至附之汁加當歸四兩川芎二兩杭
為一兩懷生地四兩入肉熬成稀膏去渣瀉過再入上神麩四
兩打成糊為丸婦人經水不調乾血旺者只服此丸用開水送
下若有寒用薑皮紫蘇煎湯送下每日四錢服至數日自必經
調有期柔弱者不宜服

月經前期辨

行經每月對期血正人必無患倘不對期病疴多矣或經來水
猪肝色五作心熱腰痛小腹疼面色黃瘦不思飲食乃血虧敗

生肉煎先用黃芩散治五心煩熱後用調經丸至次月血勝熱清而人自安經期正而自調

加減黃芩散

當歸二錢 川芎八分 赤芍八分 鬱金一錢 桑葉一錢 烏藥八分 梔炭八分 元胡八分

一錢 蘇八分 陳皮一錢 香附一錢 神麴二錢 炙草六分 次服加生地

二錢 經來紫黑色有塊者加法砂豐連五分

調經丸

當歸三錢 川芎一兩 杭芍一兩 生地二兩 元胡一兩 砂仁六錢 漂木一兩

茯苓八錢 大茴三錢 陳皮一兩 右為細末米糊成丸如梧子大

不拘時送下百丸

月經後期辨

其經來水屋漏水頭昏目暗小腹作痛更魚白帶咽中臭水魚腥作惡吐逆先用理經四物湯次用內補當歸丸俟次月觀其

對期否

理經加減四物湯

當歸 錢三 川芎 一錢 杭芍 二分 生地 錢三 漂朮 錢一 柴胡 錢一 桑葉 錢一 香

附 一錢 元胡 一錢 三稜 分四 莪朮 分四 炙草 分六 陳皮 一錢 蘇 錢一

半空服 血寒者加姜炭六分 肉桂 分三 或續斷不接作痛

者加紅花蘇木 杏仁 激痛作嘔不思飲食者加砂仁 半夏

有以加防風有寒加附子 前胡 餘照此

內補當歸丸

當歸 兩四
川芎 兩一
薑炭 八分
杭芍 兩一
熟地 兩四
川樸 錢八
白芷 錢八
續斷

錢八
萊菔 錢五
茯苓 兩一
阿膠 兩二
蓮蓉 兩二
炙草 錢八
漂木 兩一
右為末

煉蜜為丸 空心送下 四錢

月經或前或後

其症因脾不勝食無以助其氣血經故不調月經退後次月食
或多進又往前矣用藥只宜理脾行氣脾勝血旺自然血調氣
順經必依期否則再看前後何如當服紫金丸

紫金丸

青皮 錢六
陳皮 兩一
蒼朮 錢六
漂朮 兩二
檳榔 錢六
枳實 兩四
良薑 錢四
砂仁

錢六
 紅豆 錢五
 香附 五錢
 烏藥 兩一
 三稜 錢五
 莪術 錢五
 川朴 兩一
 石研

末米糊為丸食後米飲湯送下百丸

血虛發熱

其症因婦人性急或經行時房事觸傷腹中結塊如鷄子大左
 右旋動月經不行變成五心煩躁頭暈目暗咳嗽多痰皆由傷
 血之故先用逍遙散止其五心之熱次用蒼朮湯止其咳嗽若
 傳一年失治體瘦泄瀉百死無生

逍遙散

當歸 錢二
 白芍 錢八
 漂朮 錢一
 柴胡 錢一
 芍藥 錢一
 地骨皮 錢二
 花粉 錢一
 厚荷 分四
 胆草 分五
 石蓮肉 打一個
 梔炭 錢一
 藕梗 分五
 服二三劑

海加小生地三錢

紫苑湯

阿膠錢一杏仁錢一素皮錢一川貝錢一知母錢一紫苑錢一款冬花錢一

桔梗錢半枳實錢五蘆子錢四白菊錢一桑子錢一

臨臥服

行徑氣痛

經來一半未得盡行積于腹內久之全欠全乾不清積血不化變成
乾痛或口熱或無熱宜用紅花當歸散行其餘止其痛

紅花當歸散

當歸錢二紅花錢一三稜錢四莪朮錢四蘇木錢一赤芍錢一蘆梗錢一枳殼錢一

上芫花錢一臨臥服

經來不止

經來十日或半不止者多因行經時過食薑椒一切大炙等物
是為熱症可吃金毛狗脊散

金毛狗脊散

金毛狗脊二錢 真阿膠一錢五分 地榆一錢 川續斷一錢 當歸三錢 川芎八分

白芍八分 熟地三錢 桑寄生一錢五分 空心服

經來黃泥水色

此症大寒不宜清涼宜用加味四物湯以煖其經以活其血次

月色轉血勝

加味四物湯

當歸 三錢 川芎 一錢五分 砂為 一錢 熟地 四錢 小茴 五錢 烏藥 八分 元胡索 一錢

砂壳 一錢 引煨皂薑二片 薑二枚 空心服

徑來銅綠色

此症全無血色乃大寒大冷切不可用涼劑宜服烏鷄丸半月

烏鷄丸

熟附錢八 上肉桂六錢 麻茸四錢 漂木二兩 當歸三兩 川芎一兩 蒲黃一兩

葶蓉二兩 用白翻毛烏骨鷄煮爛焙乾同前藥末和勻為丸

空心送百餘丸 此方氣虛血寒脾虧不勝食者方可

服不宜亂用

徑來主白無紅

此症經來全白小便作痛面色青黃氣血兩虧亦宜服烏雞丸
加炙芪人參陳皮

經來成塊死猪血色

此症血黑頭昏目暗口唇白色四肢發麻者虛冷極也宜服內
補當歸丸

經來具水夏腐之物

此乃血虛更傷煎炒熱食等物譬如天氣久旱溝渠不清穢惡
停積婦女舊血不清新血不接則亦如夏腐之物宜用龍骨丸
龍骨丸

花蕊骨

一兩
海螵蛸 一兩
當歸 三兩
杭芍 一兩
川芎 一兩
懷生地 四兩
牡蛎 四兩

一兩
一錢
一兩
一兩
一兩

右為末煉蜜為丸空心溫酒送下

百丸

經來如魚髓

每月經來雙脚疼痛不能行下元氣虛冷更重風邪所致宜行

氣血疎風止痛散

疎風止痛散

天麻 一兩
僵虫 十個
烏藥 八分
牛膝 一錢
獨活 六分
骨碎 補
紫金皮 一錢

當歸 三錢
川芎 一錢
南藤 一錢
防風 六分
蘇梗 一錢
附 一錢
引薑

葱酒煎 半空服

經來如牛膜片

徑來不止並下牛膜片昏迷倒地此乃血乾結聚變成此症雖
驚人却可治宜用硃雄丸

硃雄丸

硃砂一錢要入猪心久煮再加水飛去黃油水雄黃二錢亦
要飛去黃油水雲母一兩亦附五錢共研細末和勻久煨老
薑煮膠棗肉為丸每茶匙大用煨薑湯送下四五十九

徑來下肉脍

徑來不止忽下肉脍三五斤或鷄子用刀割開肉似石榴子者
症雖驚人亦可醫治宜用十全大補湯四五劑

十全大補湯

人參一錢 當歸三錢 川芎一錢二分 杭芍八分 熟地四錢 漂朮一錢五分 茯苓二錢

炙芪一錢五分 肉桂八分 炙草六分 引薑棗 空心服

經來小便痛水刀割

此乃血門不閉急用牛膝湯

牛膝湯

川牛膝三兩 水二鐘煎成一鐘臨服再研碎上乳至二錢瓦上

焙乾去淨油上寸五分再煎半時空心服湯渣不宜服

經來吊陰不可忍

此症有兩條筋從陰吊至二乳疼痛發熱宜服川棟湯二三劑

川棟湯

川棟一個 猪苓錢一 澤瀉錢一 漂木錢一 大苗分八 小苗分四 木玄分五 麻黃

烏藥錢一 檳榔錢一 元胡錢一 乳香錢一 引薑一片 葱一根 熟

服出汗可愈

徑來未愈 淤熱氣痛

徑行一半 忽口乾 小腹痛 頭痛 遍身淤熱 此因傷食 生冷兼受

寒故血滯 不行阻 不能下 切不可補 宜用義木散 徑行痛止 淤

退

義木散

紅花錢一 蘘朮錢一 義木分五 元胡錢一 牛膝錢一 附錢一 紫蘘

錢一 五分

經行后作痛

此症手足麻木腹中覺冷氣血兩虛宜用四物湯

四物湯

當歸 三錢 川芎 一錢 芍藥 二錢 熟地 三錢 黃芪 一錢 茯苓 五分

引煨薑二片

棗三枚 不愈再加人參陳皮吳萸

經來脇氣痛

經來時脇氣一塊水杯其血帶黑宜治塊為先用元胡四物湯

四物元胡湯

四物湯加元胡 四錢 沉香 五分 生薑艾 四錢 延胡散

經來小腹痛有塊

經來小腹有塊如皂角樣橫過痛不可忍不思飲食面色青黃
宜服元胡散

元胡散

元胡索四兩製二兩附二兩百藥霜一兩共為細末用益母膏和勻

砂糖為丸每服五錢送下塊消為度重者再加少半

男髮錢

經來遍身疼痛

經來二三日忽遍身疼痛乃外邪入骨或熱或不熱宜解表用

烏葉順氣散

烏葉順氣散

川羌 一錢
 五分 藜蘆 一錢
 五分 元胡索 一錢
 五分 藟金 一錢
 五分 附 一錢
 五分 烏藥 八分

枳壳 六分
 前胡 一錢
 甘草 六分
 引薑葱

觸經傷寒

經來忽然作渴由外傷風寒冷水內過食生冷所致遍身疼痛漸重
 痰乘緊懣惡心作熱四肢發冷乃觸經傷寒急投五積散

五積散

川羌 一錢
 防風 一錢
 陳^皮 一錢
 蒼朮 一錢
 神麴 二錢
 白芷 一錢
 枳壳 八分
 芍附 一錢
 半夏 一錢
 當歸 一錢
 川芎 八分
 乾薑 六分
 肉桂 五分
 白芍 八分
 青 八分
 皮 五分
 炙草 八分
 引薑葱

經逆上逆

經來時忽泛口鼻出者因多食椒薑熱極火升血逆而上宜用

犀角地黄湯

犀角地黄湯

小生地 三錢 丹皮 一錢 赤芍 一錢 黃芩 一錢 鬱金 一錢 梔仁 一錢 甘草 八分

百草霜 一錢 陳皮 五分 扁柏炭 一錢 引麝 麝羊角尖 佛手 辰

經逆並咳嗽柔逆者

經逆上不往下五心煩躁柔陰咳嗽喘急者速用紅花散次用

冬花散六又劑

紅花散

紅花 一錢 蘊木 一錢 辰粉 三錢 梔仁 一錢 百草霜 一錢 黃芩 一錢 引

童便

冬花散

冬花 一錢
 苑花 一錢
 杏仁 二錢
 桑皮 一錢
 粟壳 五錢
 白菊 二錢
 石膏 一錢
 知母 八分
 化紅 八分
 甘草 二錢
 蘊葉 八分

每月經來二三次

徑來幾點而止過五日十日又來幾點而止面色青黃先服膠

艾湯次服茶壹九 茶壹九方見前

膠艾湯

川芎 八分
 杭芍 八分
 熟地 三錢
 阿膠 一錢
 艾炭 一錢
 桑苓 一錢
 引棗

三個

徑來狂言亦見神鬼

此因心火亂動怒氣觸阻逆血攻心不知人事狂言亂語先用
麝香散寧定心志復用茯神丸

麝香散

紫胡錢一赤芍錢一壽星錢一茯苓錢一小生地錢三梔仁錢一桑苓錢一

化紅分八元胡錢一轉胆星分三首好去渣再加製熟研一

分元寸二厘摩佛手五分入內再蒸一乙刻去渣不拘皆服

俟人事清楚氣平血下不食加百草霜一錢服一副再服

神丸

茯神丸

茯神二兩 遠志一錢 茯苓一兩 附子一兩 藜蘆一兩 砂礞石五分 桑葉一兩 藟一兩

元胡一兩 九轉胆星一錢 右為末用心生心薑汁為丸吞服

二錢佛手湯送下

經來常嘔吐不思飲食宜服丁香散

丁香散

母丁香一錢 乾薑一錢 藿梗二錢 雲苓一錢 陳皮二錢 半夏一兩 厚

木一兩 共為末早米飲服二錢

經來飲食後即嘔吐

經來或因積痰入胞腕阻米食不下胃急服烏梅丸次用九仙

奪命丹

烏梅丸

木香錢三 雄黃錢五 葶藶錢一 桂蕊子錢三 上法夏錢二 貝母錢五 藿香

五分 良薑錢一 五分 右為末用烏梅搗爛和勻為丸如梅核大小

服一九入口頻嚙化

九仙奪命丹

淡豆豉錢一 川樸錢一 陳只壳錢二 法夏錢一 煨木魚錢一 茯苓錢三 山

查肉二十個 砂壳八分 製蒼朮錢二 右為細末薑湯服錢一

徑乘遍身疼痛

此因脾土不能克水宜木香神味散

木香神味散

煨木香 五分 陳皮 錢一 人參 分八 三稜 分五 義木 分五 香附 分五 單薺 錢一

製蒼朮 錢一 木通 錢一 大腹皮 錢一 枳壳 分八 車前子 錢一 紅豆 錢一

薑皮 錢一 查肉 二十個 空心服

經來泄瀉

經來時五更泄瀉水乳兒尿乃腎虛也宜理中丸

理中丸

人參 錢一 漂木 錢一 乾薑 錢一 五味 粒十 炙草 分八 空心服

經來前後病症

此症多因傷食肥膩過多兼受暑氣相交為害變作病症切勿不

可理氣又不可清涼理氣則穢乘上升逆行無救清涼則穢乘

不行久延必變痢者利也只宜通利須用香連消積湯

香連消積湯

川連五分木香五分陳皮一分神麩二分吳茱萸四分川樸八分烏藥六分

山查二十茶一分服之利再不通利後重閉結不下加百

草同原丹一兩即久晒久露黃牛尿水牛不可用先将牛

屎一兩焚湯去渣再煎臨時服加白蠟三錢去足黑脚開

水化化用爛飯少許同搗為丸將藥湯送下穢尽為度務

要忌葷男婦俱可用有受暑者加香益藜蘆

徑來大小便俱出

此症名曰噎理症因食熱物過多久積而成宜用分利五苓散

解其積熱順動陰陽

分利五苓散

阿膠錢一猪苓錢一澤瀉錢一漂木錢一赤芍錢一附子錢一川芎分八當歸分八

一錢五分 空心服

徑來常咳嗽

此症乃肺燥金枯重則咽中必帶血急服潤肺清燥飲

潤肺清燥飲

蘼葉分八桔梗錢一白菊錢一桑皮錢一杏仁錢一小生地錢三

化紅分八浙貝錢一桑葉錢一甘草分八引梨汁服至咳嗽少輕加

北沙參當歸阿膠

經阻腹大如鼓

經閉二三月腹大如鼓人皆為孕一日不覺經來血湧有色有物如蝦蟆子者昏迷不醒人事體氣盛者急服十全大補湯無應不效 方見前

經來小便出白虫

經來血內白虫壘、如鷄腸者滿腹疼痛此症只宜推虫逐大便出了則可保宜用推虫丸出尽痛止服建中湯

推虫丸

續隨子 錢一 楨榔 錢一 黑白丑 各五 甘遂 分六 羌活 分六 大黃 錢一 大戟

元寸 重 共為細末麵糊成丸如桂圓子大每服用酒化

燕服

建中湯

炙芪一分 肉桂五分 杭芍五分 木香四分 炙草五分 河水煎

經來澀極日久不退不思飲食

此症因病久胃氣不開當以開胃為先只用白鴨一隻取血熱
注沖服

血山崩

此症宜用八厘丸來重者用烏金散血止再辨明氣血盛衰用

藥神治

八厘丸

阿膠里 側柏葉里 蒲黃宗 百草霜不可過多 白

茅根 桑葉成 苧麻根大 孫綿炭 引白芎

蕉塊 右共為末水泛各半調服

烏徑散

撫芎川言內選頂小極堅硬方是 不拘多少打碎成 里炭研為細末

每服三錢泛調下產過年老服五錢

徑來吐虺虫

此症徑來特寒熱四肢厥冷大汗嘔吐蛔虫柔喘緊繃此症為

無一救

掃科指歸卷一終

卷之六

一

其法... 凡... 者... 必... 也...

其法...

其法... 凡... 者... 必... 也...

其法...

其法...

其法... 凡... 者... 必... 也...

其法... 凡... 者... 必... 也...

其法... 凡... 者... 必... 也...

婦科指歸卷二

婦人受胎逐月胎形各症按治論

一月形如露珠乃太極動而生陽天一生水謂之胚足厥陰肝

脈主之經水即開飲食少異

二月五樞花辦乃太極靜而生陰地二生火謂之暉足少陽胆

脈所主若有吐逆等証名曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物乃一

臟之虛水愛酸乃肝經虛

三月水清鼻涕先成鼻與雌雄二器乃分男女手厥陰心胞相

火所主胎最易動務宜慎重

四月始受水精以成血脈具手足形像順成手少陽三焦所主

五月始受火精四脈已成毛毫始生足太陰脾脈所主

六月始受土精以成筋口目皆具足陽明胃脈所主

七月始受木精以成骨遊其氣能動左手；太陰肺脈所主

八月始受土精以成皮膚九竅皆成遊其氣乃動右手；陽明

大腸經所主

九月始受石精百節畢備三轉其身足少陰腎經所主

十月神氣備足；力乃旺太陽膀胱經所主

唯手少陰心太陽小腸無所主者君主之官無為而已墮胎多

在三四五月最宜慎重亦有七個月墮胎者皆因亂動過勞為

望者務按逐月生形之道與生母氣血衰旺少壯年老重時令

五行細察六脈治之最不可偏補氣分以至胎愈不安近時輒以鷄為安胎之物不知鷄之為物填塞肝火煽動肝風多損少益羊老者偶一食之尚不至釀成大害若少年火旺肝氣不調初受胎者吃之必致臨產艱難之命俱險偶有生者產母必多後患兒子必多驚風疳風等症并天花決難透發種之害人不可勝數至足胎之時產母每日不時走動令氣血調和臨產必順小兒在腹亦令舒展安寧是母與子皆受益靡窮也

安胎保產論

凡孕婦脾胃旺而氣血充則胎安而產正且生下男女亦神足不夭只常用藥調和氣血若稟氣不足禁術不知自然脾胃弱

而飲食少精神愈虧虛症百出孕成輒墮即產下必多天定需
藥味預扶母之氣血令後來有胎母安子壽若俟胎成之後臨
時扶補已無及矣其預先調養生血之功當審何種不足不調
必按脈切理為之調治切忌燥火補氣之藥蓋火燥則血愈虧
氣愈盛則血不調害人甚矣務遵朱丹溪安胎良方細認虛實
調養後列二十餘方有受病之處按方加減易曰天地絪縕氣
物化醇男女構精萬物化生人以精血合濟而成孕或精氣蒸
胃多嘔血少氣虛愛食酸物使胃氣受傷噁咀飲食若人素弱
本方量加橘半若嘔吐稟氣厚再加竹瀝薑汁少許為引再有
時下血名胎漏或小腹墜痛名胎痛胎漏宜涼血加生地黃

胎痛宜溫和少加帶殼砂仁至若傾跌動胎下血膠艾宜加葱
葉衝胎上逆煨木香為使小便短澀或淋乃子淋之症服此方
不應水小便帶血是膀胱積熱宜逍遙加梔炭或有面目虛浮
肢體無力多屬濕氣重用漂朮砂殼或有子煩症則心驚胆怯
不時煩悶安胎竹葉無疑天仙藤散治足指縫出水病名子柔
虛弱者多加參朮羚羊散療項強筋搐拳攣病名子癩痰多
竹瀝參苓少用脾胃氣虛胎壓尿胞臍腹脹而小便淋閉先宜
探吐升提再服安胎加人參平胃調和有胸悶腹脹便閉遍身
浮腫者名胎水不利用鯉魚湯若脾胃氣弱佐以四君五皮飲
有胎柔上攻腹脹作痛者名曰子懸必加香薷蘓治之若食少

哺熱兼加味逍遙柴胡梅連爲丸治骨蒸勞熱當歸六黃湯治
之有盜汗哺熱孕成數墮因母血虧不能分養務預先服安胎
生化湯可保到期分挽子無耗賴母氣血以養之藥力少僅可
涿榮胎母故安胎之方必須重劑月服老女得其女妻必寡慈
以候經期若遇枯陰必頻棄以全胎力其人愛精重施少服燥
大之藥生子必精神易於長養狂陽益施育子清寡無神此造
化必然之正理凡求嗣者當察之大抵孕婦素弱又於分養胎
元則虛產百出務遵丹溪補母壽子之方以補血爲主佐以順
氣清涼參朮桑芩乃安胎之聖藥言婦懷熱實補血之良方佐
以紫蘊陳皮可爲常服之藥也夫孕成六月之前其胎尚未轉

運痰養性降乃利水之藥產前忌用黃芪雖補氣而初胎之時
用之氣盛血散更害於胎砂仁可止嘔宜痛多則動血行胎歷
致丹溪安胎之論不過數語安胎之方不過三四在後人加減
用之十中可全八九誠醫學之準則也

初孕十月胎足當生尤宜慎之

臨產之時防係戰胎勿即真作真產戰胎多屬女胎何也男胎
面向裡女胎面向外向裡易轉向外難轉是以有戰胎之說俟
轉宜破水：旺血旺一轉便生由水大行舟順流直下戰胎
未定即令產母坐桶必早破水而產母憑空着力其水直流血
亦下行誤傷原氣胎久不下力亦竭矣至真產時水乾血敗豈

能生下穩婆故作矜張攘臂揣摩婦女胡言惶感惑擾亂產母神
志速死之道相因而來速宜連進佛手散生水生血令產母高
睡端正養息切勿側臥坐亦宜正痛時能忍兩人端扶候兒轉
身到門順流而生及胞衣同下方保全吉若胞停腹中則先斷
臍帶胞衣用草鞋墜住下部週圍之好防感風寒并加熱衣煖
腹為冬寒之月尤宜扶至床前蓋被坐臥速煎生化湯服一二
劑防胞衣下後血暈產時產後務安慰產母之心切不可慌張
致令神散氣亂血不寧靜生死關頭可不慎乎

補母壽子論

凡屬生產生下孩兒無氣及養不成人者皆父母元氣不足之

故男人愛精重施則髓滿骨堅又得氣血兩盛者為記易所謂
坤厚載物德合無疆故種子神足而壽若純陽枯陰成孕則母
無餘血蔭胎全藉藥力補救養其胎元固其胎氣若係老女
妻必須另床節慾兼藥培補算候經期固本方施斯乾元資始
之本實坤元資生之源厚經云因和之之是為聖度若不遠惟
慎則相火易動雖不交會亦暗流損泄多矣經云陰平陽秘精
神乃治陰陽離決精神乃絕此二乘相因五行交接上古聖人
表激闡幽義物皆備之至理尤厚寄于人身望者豈可口業改
黃愚者或視為異物難以狂者且識其荒遠莫稽任意施方以
性命為草菅耶

受胎半產論

受胎之後多至三四兩月之間忽然胎動不能安者半產此症不一最重者因撞徑所受之胎因板高所致者因氣盛血虧者因肝旺怒盛者因房事過傷者因墮跌傷者因因飲食不慎者因服藥所誤者因夏令暑氣中傷者俱當問明治之惟因撞徑受胎者最為難治其中氣血旺者施以安胎飲畧加調經一二味令其濁氣既清緩以神理或可保全而氣血虛弱者藥亦難投胎即難安板高不安者古人治法按用豆一把撒地下令其徐左右手^順捻起檢至百十粒其胎自安蓋板高之時小兒失其血管左右挪移檢豆令小兒過而含

之再服一之調氣養血之劑胎便安矣有氣盛血虧者氣盛血
不能隨以破胎不能安宜安胎養血之劑猶如平氣之藥百房
事過傷者宜專養陰生水理脾胃失足傷氣宜調氣分按其
傷左右治之百飲食不慎者問明或熱食或生冷所誤分別用
安胎飲加減治之百因服藥所誤者看明前方治之有夏令暑
盛之時受暑傷胎宜於安胎之內稍加一二清解暑氣之藥按
症問明用藥審察輕重治之以上動胎各症若待血來過多胎
必難保唯救胎母切不可強固其胎

臨時定真產訣

產時脰產母兩手寸關尺俱不現再脰兩手中指尖第一節上

脈動過節即是真產斷不有差

初覺下孕未知果否或受風寒發熱等症宜用芎歸湯加減解
散法

芎歸湯加解散法

當歸一錢 川芎八分 紫蘇一錢 陳皮一錢 防風八分 前胡一錢 泉麩五分

首烏二錢 山查五分 烏藥八分 甘草六分 赤芍六分 引陳老薑皮六分

寒熱重不能出汗者加乾葛一錢 寒深遍身痛者加苧浸川芎

錢一

至二三個月果是真胎惡阻嘔逆不思飲食頭暈倦怠宜服加

味參橘飲固胎為要恐防幸產

加味參橘飲

陳皮 一錢五分 人參 一錢 種梗 一錢 霍香 五分 當歸 二錢 川芎 八分 炙甘草 四分

炒子苓 八分 製首烏 二錢 漂朮 一錢 砂仁 五分 半夏 八分 引荷葉蒂 五錢

有蒂紅棗三個

至三四個月胎柔不旺飲食減少脾氣弱不能勝胎宜服勝胎散

散

勝胎散

製首烏 四錢 漂朮 一錢 當歸 四錢 川芎 二錢 阿膠 一錢 淮山藥 一錢

後党 四錢 陳皮 八分 大梗 一錢 子苓 一錢 砂殼 二分 引荷葉蒂 五個

有蒂紅棗三個 年老者(多生)加炙棉芪 一錢 陳墨竺豆 二錢

間日服一劑服過四月後再加慎寒暑節飲食勿登高慎

房事斷無隨胎之患

至五六個月胎氣漸旺尤宜固母宜服生血調氣湯

生血調氣湯

懷生地三錢秦當歸四錢川芎二錢漂木一錢淫心一錢阿膠一錢

枚黨四錢陳皮一錢子苓一錢煨木四分火梗五分炙草六分引荷

葉蒂五錢紅棗七枚至七八個月生地改用熟地或加蘄

艾炭一錢

至八九個月胎氣尤盛母子兩固宜重養胎元大補胎元湯

大補胎元湯

熟地錢四分 當歸錢五分 川芎錢五分 淮山錢五分 菴錢五分 收黨錢四分 陳皮錢一分 杭芍錢一分

小錢一分 子錢一分 浮木錢一分 續斷錢一分 煨木錢一分 炙草錢一分 引桂圓肉錢一分

或百心煩不安者加麥冬天冬白菊百痰者加浙貝南查

百腹脹者加腹毛腰脹者加蘊兜水虧生育多者加兔絲餅

川杜仲鹽酒炒去肉白芷倘百他症詳註於後審明定治

至十個月胎已完足用加味佛手散

加味佛手散

秦歸身錢四分 川芎錢二分 初生棄火盛者減用錢二分 九製熟

地錢三分 實桑苓錢二分 上收黨錢二分 廣陳皮錢一分 每日煮上熟米

滋早晚隨量可飲集不順者加大橘餅血虧心虛者加桂圓

肉分五 此方多服臨產必順無疑難之症

凡百孕者或百元氣不足倦怠胎動飲食減少宜服加味安胎

散

人參錢一 陳皮分六 當歸錢二 漂木錢一 子芩分六 紫葇分八 熟地錢二 砂仁

分四 炙草分五 引百蒂老子三個荷葉蒂五元 渴加青冬分六

二孕成後至二三個月惡阻嘔逆不思飲食頭暈倦怠宜服加

味參橘飲

加味參橘飲

人參錢一 陳皮錢一 漂木錢一 半夏分八 當歸錢二 霍香錢一 縮砂仁分四

竹茹錢一 炙草分四 引同上

三子常日怒氣胸腹滿悶服順氣等藥反加脹悶者宜用理

脾平肝散

理脾平肝散

人參錢一 陳皮分八 漂木錢一 當歸錢二 川芎分八 藜蘆錢一 子芩錢一 炙草

分三 煨木分八 杭馬分六

四孕婦百腹中不時作痛或小腹下墜者血虛氣隘宜服加味

安胎飲

加味安胎飲

人參錢一 陳皮分八 當歸錢二 川芎分八 漂木錢一 藜蘆分八 熟地錢二 炙草

五分 引陳薑皮分五 或薑中寒者加吳芋分三 乾薑分三 砂仁

五孕婦面目虛浮四肢必重水菜多因脾弱不能勝濕或因久
溼所致宜健脾利水即服全參漂木散

全參漂木散

人參錢一陳皮分八漂木錢一當歸錢二川芎分八紫葳分八腹皮分八冬皮分八

錢一引陳薑皮

六胎柔上攻心腹脹懣作痛宜服順柔安胎飲

順柔安胎飲

人參錢一漂木錢一川芎分八當歸錢二紫葳分八陳皮分八砂仁分四子芩分四

八烏藥分八煨木分四

七孕掃或按月下血數滿痛名漏胎多因房事兼勞喜食煎炙宜

補中安胎飲

補中安胎飲

人參一錢熟地二錢漂木一錢當歸六分紫蘊八分桑苓八分有藥草五

引扁葉蒂五元連蒂紅杏五枚

八孕掃頓休動胎下血宜服安胎飲一日二劑不止加膠艾安

胎飲

安胎飲

人參一錢當歸二錢川芎八分熟地一錢漂木一錢陳皮六分子苓一錢炙草一錢

八分紫蘊八分水五活五煎五不止加阿膠五艾葉八分

九孕掃心驚胆怯煩悶不安名曰子煩宜服竹葉安胎飲

竹葉安胎飲

人參錢一 漂木錢一 當歸錢二 川芎五分 陳皮五分 子苓錢一 生地錢二 炙草

上竹葉十餘 引荷葉蒂五分 百蒂紅棗枚

十孕掃百腿膝發腫乘但懣悶上下不舒甚之足指腫出水者

由脾虛不能制水四肢屬脾宜服天仙藤散不效再服補中健

脾陽

天仙藤散

天仙藤錢一 五附錢一 陳皮五分 烏葉八分 木瓜錢一 薏蘆六分 薑皮五分

兼血皆虧年老者加當歸漂木人參

補中健脾胃湯

人參 錢一木 漂一 炙芪 錢一 陳皮 錢六 茯苓 錢一 當歸 錢二 枳實 錢八 砂殼 錢五

分五

十一 孕婦口噤項強手足宿孽言語不清痰涎上壅不省人事
兼作中風治之宜用羚羊角散而無前症常見稍覺中風多因
血燥類風切不可作中風論誤人甚矣

羚羊角散

羚羊角 分八 防風 錢六 川芎 錢六 當歸 錢一 茯神 錢一 白菊 錢一 五加 錢一

杏仁 粒十 苡仁 錢二 木香 錢三 蘆汁 痰多加竹瀝乘虛脾弱

者加人參漂木

十二孕婦小便短澁或淋瀝者曰子淋宜服加味安榮散

加味安榮散

人參八分 漂木一錢 當歸一錢 麥冬八分 苓皮一錢 通草一錢 甘草五分 引

燈心二分 若石一錢 痰加一錢 浙貝一錢 山查一錢 砂苓一錢

十三孕婦形容勞苦性燥過食煎炒小便常帶血宜清膀胱

之火間服加味道遙散

加味道遙散

當歸一錢五分 芍藥一錢五分 漂木一錢 茯苓一錢 柴胡五分 枳實一錢 丹皮一錢 生地一錢

梔炭一錢 甘草二分 引燈心二十寸 此方不宜多服

十四孕婦臍腹作痛小便淋閉由脾胃氣虛胎壓尿胞宜服安

胎飲加之陳升解

安胎飲

漂木 一錢 陳皮 一分 參 一分 當歸 一錢 生地 一錢 銀柴胡 五分

升麻 五分 炙草 六分 空心服 先用鹽湯探吐令氣升水行

十五孕婦元氣壯盛受孕常見微血數點乃血盛故也若無腰

腿痠痛不須服藥

十六孕婦氣逼腹脹便閉浮腫名胎水宜服鯉魚湯

鯉魚湯

漂木 二錢 茯苓 二錢 當歸 二錢 芍藥 一錢 用鯉魚一尾一斤多者

去腸雜鱗加陳皮生薑泮水四碗煮至一碗半加前四味

藥再煎至七分溫服而水未盡照前再服

十七孕婦常百咳嗽至甚者宜服寧肺止咳飲

寧肺止咳飲

藟葉

五分

桔梗

錢一

杏仁

錢一

紫苑

錢一

桑皮

分八

天冬

錢一

白菊

五分

甘草

錢一

橘紅

分六

甘草

分六

知母

分八

冬花

分八

痰多

加

浙貝

竹

瀝薑

汁

風

寒重加防風六分氣喘日恒不寧加蜜炙麻黃四分

十八孕婦咳嗽吐血用生地紫苑湯

生地紫苑湯

懷生地

錢二

紫苑

錢一

天冬

錢一

桑冬

錢一

麥冬

分六

知母

分八

甘草

分六

引生瓜子仁五分臨服訖摩犀角

十九孕婦霍亂吐瀉心煩宜用六和湯

六和湯

陳皮八分 藿香八分 半夏一錢 杏仁十粒 竹茹一錢 木瓜一錢 扁豆一錢 甘草

五分 茯苓一錢 砂仁五分 引薑棗 服藥弱加人參次服安胎飲

二十孕婦倘患瘧疾不論寒多熱少宜安胎飲加減治之

加減安胎飲

人參一錢 陳皮一錢 當歸四錢 漂木一錢 紫蘘一錢 何首烏四分 柴胡八分

子苓一錢 梟鞠一錢 半夏一錢 烏梅二個 炙草六分 赤芍六分 逢冬春寒

盛之時病者百寒戰之甚加桂枝三四分夏令之時宜加細

花參一錢 四分內熱重加青蒿二錢熱極小便帶紅加芫

連酒炒一次人乳炒二次四分木通一錢

二十一孕婦百患痢症者加減安胎飲加香連治之

加減安胎飲加香連

當歸四分陳皮一錢生地三錢子苓一錢荳蔻一分泉麩一錢腹毛一分藿香一分

六雲連五分煨木香四分炙草四分百草回原丹五錢煎湯去渣

再煎藥臨服時再加頂上淨白蠟三錢為丸送下

補母壽子方 百論上篇

人參一錢陳皮八分當歸四錢川芎一錢漂木一錢熟地四錢炙草六分

麩一錢引荷葉蒂五元連蒂紅棗三枚 肝氣不和者

去熟地改用製首烏脾虧常泄者加建蓮子十粒砂仁五分慈杞

液者去熱地改製首烏錢煨木香錢杭白芍錢口渴心煩者

加表冬錢五錢怔忡驚悸者加鹽水炒益智仁錢五錢桂圓肉錢此方

胎過六月可常服餘做此加減至九月當歸用錢六錢川芎用錢一

八年老生多者加兔絲餅錢以猴棗錢五錢芍藥弱者再加炙

棉芪錢五分時下妄用香附為主以芪附桂朮葶歸等藥全用

大損柔燥血偏陽傷陰必成痼疾抱胎反為種子誤人大矣

或石服交加散者偶石得孕因少壯婦必多恚怒服此折粟

諧榮幸而得中耳豈可視為良方圖嗣乎且無子多因血虧

不能攝元即受胎者多墮全血愈虧傷陰予考究古論唯河

車大造丸最妥當之極久服必驗

大造丸

紫河車一具取少壯頭產男胎者為佳切不可見灰土者生

下水來用河水漂去惡血再入河內漂半日至白色為度再

用銀鍼挑去血子再漂至水無紅色用槓之乾入錫壺內加

磁一罐生薑二片將壺蓋之好外用麵糊封固勿令泄氣入

鍋內久者半日候冷開口取出用淮山藥二兩為末杓勻洒

于河車之上務要週到火上烘乾為末忌鉄再加液藥

人參一兩當歸三兩川芎一兩漂木二兩麥冬八分天冬八分子苓一兩

懷生地三兩五味四錢雞腰子十對川黃柏用童便浸一日夜洗淨切片晒乾加蜜拌透晒

砂黑八分肥知八分煨石八分化水右藥十二味為法炮製同河車末

拌勻加陳米粉攪糊成丸如棗豆大晒乾益過一次陰乾收貯
貯与早空心開水送下四錢服藥後忌食菜蔬葱蒜雞
魚椒薑等物并一切水菓或言行疼痛者加法益川牛膝一
兩元胡一兩此丸種子助胎服之新無墮胎之症

半產

百論在前

有孕至三四個月或五月忽覺腹痛腰疼紅來不止服藥難
安多因血虧肝脾不飽和之故調理尤宜加重恐後亦猶小
滿月已過即宜記服益母丸預防後患

益母丸

白花益母草

五月五日採法
洗益陰乾一斤

女貞實

冬至日取向東者佳法
拌益晒須九次一斤

上攷黨四兩 漂於朮四兩 秦當歸四兩 真阿膠四兩 川芎片二兩 杭白芍

一兩 九製首烏四兩 製香附一兩 共為細末用真懷地六兩

六錢 泌蒸一次廣陳皮去白三兩二味煎湯去渣再熬成稀膏加

煉蜜同煎末並為丸每服五錢開水送下或再加服大造丸

永無後患

凡初有孕偶感風寒者宜用理血散解湯

理血散解湯

當歸一錢 川芎八分 防風八分 蘆薑八分 陳皮八分 神麴一錢 桔梗一錢

甘草五分 引陳薑皮六分 次服加酒炒桑椹一錢 傷寒骨節痛

者加酒浸川芎一錢

凡有孕至三月偶感風寒者尔宜養血散解湯

養血散解湯

當歸 錢三 川芎 一錢 製首烏 錢四 紫蘊 分八 神曲 錢一 防風 分五 桔梗 錢一

甘草 分六 引陳老薑皮 分五 或石脾虧氣弱者加牧党陳皮

漂朮

胎前怔忡

此症有二百至五六月陡然怔忡因胎乘旺肝火又感柔火上

乘者宜用養心平肝飲

養心平肝飲

當歸 錢三 川芎 分八 懷地 錢三 杭芍 分六 栢子仁 霜 分六 茯神 心木 寸三

桑椹一錢炙草六分 引蓮子二錢 百蒂紅棗三枚 荷葉蒂五片

又百精神恍惚怔忡者乃血虛君官無主所致用紅棗酥砂方

紅棗酥砂方夜眠神不安亦可服

小紅棗五個去核三個肉貫製熟箭鏃辰砂一厘外加麻乳
好束人乳半碗將棗入內隔水久煮次早空心溫熱將棗取

去乳細嚼紅棗開水送下

胎前至八九個月手足浮腫

此乃氣血兩虧兼受濕氣所致切忌通利之藥宜用五皮湯加
當歸治之若單脚腫者不必服藥

五皮湯

五加皮錢一 陳皮分八 桑皮錢一 大腹皮分八 陳薑皮分八 當歸錢一 空

心服

胎前七八個月陰腫

此乃胎柔不能遊動宜服安胎順氣飲

安胎順氣飲

當歸錢三 川芎錢一 懷生地錢三 杭芍分八 陳皮分八 紋黨錢三 桑苓錢一

煨木香分四 腹毛分八 訶子肉個一 烏藥分八 炙草分六 引荷葉蒂個五

百蒂紅棗個三

胎前遍身該懶

此症面色青黃不思飲食困倦無力形容憔悴乃因血少不能

養胎宜用四物湯加減

四物湯

當歸 錢三
川芎 一錢
熟地 錢二
枳實 一錢
漂木 錢一
桂圓肉 錢五
白

並 百寒加蘇梗

胎前下血動胎

胎前下血胎柔亂動觀其體盛色不寢者即投加減安胎飲若
體弱色衰冷汗自出四肢無力此乃君官不正精神已散用藥
不效難安聽其自然安之反受其害

加減安胎飲

人參 錢一
阿膠 錢二
當歸 錢四
川芎 一錢
茯神 心木
建蓮子 二十粒

五味子十粒 浮小麦三錢 百草霜四分 不可多用切

引荷葉蒂五枚 蓮蒂

紅棗三枚 柔虛甚者加炙芪一錢 漂木一錢

胎前脚腫

此症因柔血兩虧下元不足兼小風邪激腫不痛者胎柔盛又服藥亦可重者須用順柔養血湯

順柔養血湯

收黨三錢 陳皮一錢 當歸四錢 製首烏三錢 川芎一錢 炒芍三錢 桑皮三錢

烏藥六分 阿膠一錢 煨木香四分 炙草六分 引法一鐘兌空心服

胎前中風

此症忽控牙關緊閉痰柔上壅不知人事因坐多食生冷風中坐

卧先用黄蠟丸搽上下牙關再進加減排風湯

黃蠟丸

黃蠟錢_二 枯礬錢_二 牙皂錢_一
先將蠟鎔化加礬皂末入內和勻

候温擦牙切不可啞下擦後開水漱淨再服梳風湯

加減排風湯

麻黃_五 防風_六 白蘚皮_八 白菊_一 半衣_一 獨活_四 當歸_四

四 漂木_一 杏仁泥_一 甘草_六 引煨老薑

胎前癰瘕

此症一時手足不能運動乃胃中多痰閉塞氣血所致宜用疎

疾用桑飲

疎痰調氣飲

半夏錢一浙貝錢一 五錢 攷薑錢二 陳皮錢一 南星分六 查肉個十五 雷陽錢四

香附錢一 烏藥分八 甚者加竹瀝二匙 薑汁一匙

胎前腰痛

此乃血氣固胎不能養腎之經虧以致腰痛難忍宜服猪腎

丸再服安胎飲

猪腎丸

猪腰子一對用小茴香分四 青鹽分五 拌炒和勻久蒸熟焙

乾為末熟地汁為丸空心送下五十九

加減安胎飲

當歸 四錢 川芎 一分 熟地 四分 漂朮 一錢 鬼臼餅 一分 淫山藥 一分

杜仲 一錢 續斷 一錢 阿膠 一分 煨木香 四分 引桂圓肉 五分

胎前頭痛

此因風寒入腦陽衰不能發出宜用屏風散倘已故疾一時不

能見效問明加減

屏風湯

生黃芪 一錢 防風 六分 白芷 六分 黃菊 一錢 藁本 六分 杭芍 五分 甘草 六分

當歸 三錢 會後服

胎前泄瀉

胎前泄瀉不可一宜論之宜察四時之氣分而治之或忌飲食

不調多食水菓所改總宜以藿香散加減治之

藿香散

藿香 一錢
五分 陳皮 八分 紫蘇 五分 薄荷 六分 腹毛 六分 漂木 一錢 半夏 一錢

砂壳 六分 引煨薑或烏梅砂壳或改砂仁

胎前胃氣痛

胎前胃痛不能忍者多因肝氣不調胎氣不順只可輕之為之

止痛用烏梅一個煎湯摩乾佛手五六分服之三次

胎前大便閉急

此因脾土燥大腸滯以理脾潤腸為主宜用養血通潤散

養血通潤散

當歸錢四 女貞錢六 陳皮錢一 枳壳錢二 炙草錢八 茯苓錢一 咀杏錢四

胎前遍身癢甚者

此因皮毛中風濕不必服藥先用炒荊芥穗擦之不愈再用樟

冰水燒酒擦之即愈

胎前陰癢

百孕不節房事陽精留蓄因而作癢用川椒白芷葱白煎水洗

胎前乳腫

胎前乳腫發寒作熱名為吹用皂角一條燒過存性酒泔飯後服之三次外用柚子葉烘熱不時擦之至散為度

胎前消渴

此症血少三焦火勝宜四物湯加生地三錢砂黃柏炭八分去
心麥冬一錢可服二三劑 四物湯見前

胎前咽喉痛

此乃風火內閉胃下痰涎宜散解風火用升麻桔梗湯

升麻桔梗湯

升麻五 防風六 桔梗一 甘草六 小生地五
引竅透建烏梅

一個 飯後服

子煩

此症胎至七八個月因肺臟陰火上乘於心則心煩停痰積飲

左胸氣懣冲心尔煩若熱煩宜清解若停飲必嘔宜順氣利膈

煩退務服安胎飲仍摩乾羊角尖為引 安胎飲見前

犀角飲

麥冬 錢八
地骨皮 錢一
生地 錢二
白菊 錢一
桑葉 錢八
茯苓 錢八
甘草 錢六

天冬 錢一
竹葉 錢五
引摩犀角尖或乾羊角尖

二冬飲

麥冬 錢八
天冬 錢一
生地 錢三
人參 錢六
知母 錢八

順氣利膈飲

蒼朮 錢一
枳殼 錢五
香附 錢一
神麩 錢一
山查 錢十
白菊 錢一
瓜蒌霜 錢六

葛根 錢一
陳皮 錢八
桑葉 錢一
甘草 錢六
引煨木香

子癰

孕婦忽然不省人事角弓反張須臾即甦狀似中風名曰子癇
必重風邪所致宜用羚羊角散

羚羊角散

防風分六羌活分六五加皮錢一生苧仁錢四白菊錢一當歸錢三川芎錢一

杏仁分八煨木香分四桑葉錢一甘草分六引摩羚羊角尖分三

病退仍服安胎飲加摩羚羊角尖安胎飲方見前

子懸

胎柔不和懷孕過熱以致脹滿或痛或不痛謂之子懸恐後難

產宜服紫蘊寬中飲

紫蘊寬中飲

紫蘊 錢一
人參 分八
陳皮 一錢
香附 五分
蔚金 分八
杭芍 分五
歸身 錢四

川芎 分八
腹毛 錢一
神麩 錢一
炙草 分八

子麻

此症由肉熱所致熱結便閉胸臑不通宜用安營散

安營散

麥冬 分八
通草 一錢
木通 分八
滑石 分六
秦當歸 錢三
人參 分五
細辛 分一

甘草 分六
引燈心

胎前惡阻

胎至八月忽吐逆不思飲食腹作脹此乃胎氣不和因而惡

阻宜用和氣散

和氣散

陳皮錢一 桔梗錢一 川朴分六 砂仁分五 蒼朮錢一 小茴香分三 益智仁分五

當歸錢三 藿香錢一 腹毛分八 炙草分六 煨木香分五 車空服 此

方本百母丁香恐其性燥愈不得和去之改腹毛木香餘倣

此

胎前八九個月孩兒攻心

胎前孩兒攻心此乃過食椒薑煎炒等物兼之俗人勸食鷄為

補胎之要藥致令胎存上焦令孩兒不安勝如夏冬加重紫畏

益受熱難安以至於此手足亂動上攻止心母不能安速用涼

膈和中飲

涼膈和中飲

生地 錢三 連翹 分六 白菊 錢一 花粉 錢一 天冬 錢一 桑葉 錢一 雲連 分四

石蓮 個一 當歸 錢三 甘草 分六 引摩乾羊角尖 錢三 兒服雪水 分六 中

胎前至六、七個月柔緊發熱不得臥

此症多因受風寒再加亂食生冷煎炒等物寒熱相并致令肺柔不清胃柔不降胎柔不調緊閉上焦宜服紫蘊安胎散

紫蘊安胎散

紫蘊 錢一 桔梗 錢一 化紅 分六 泉麩 錢一 山查 個十五 當歸 錢三 腹皮 分八

桑皮 錢一 竹葉 分六 甘草 分六 白菊 錢一 桑葉 錢一 寒重者加前

胡內熱重脾柔旺者少加熟石膏知母

胎前衄血

胎前鼻中常流鮮血名衄血因喜食煎炒熱物致令血熱亂行
上冲胞絡只用涼胎之法不可用四物湯宜服衄血丸

衄血丸

生地錢二 蒲黃錢一 扁柏炭錢一 子苓錢一 桑皮錢一 白菊錢一 甘草錢五

分六
雪水煎

胎前漏紅

身已有孕紅宜歸藏胎(養潤臟)豈可見漏每月一至如狂行應
期此是漏也皆因房事不節重過食煎炒熱物以致血不歸藏
宜用扁柏飲

扁柏飲

扁柏炭 一錢五分 當歸 二錢 川芎 八分 子芩 一錢 炙草 一分 阿膠 二錢 熟地

二錢 引百草霜 二分 荷葉蒂 五分

胎前赤帶

胎前赤帶如猪肝木精神短少亦宜扁柏飲去百草霜 方見前

胎前白帶

此乃血虛火盛性柔不和宜先服青苔散次服閉白湯

青苔散

青苔 即天井男人洗臉水所倒之地積久生苔女人搽粉

者不可用洗淨晒乾炒至黑色法湯服四分

閉白湯

金毛狗脊二錢 真阿膠二錢

煎服四 五劑

胎前氣緊咳嗽臉紅

胎前氣緊臉紅咳嗽不止其徑每月無期忽來數莫日午心煩

氣逼咳嗽此乃鬱火所致先用逍遙散退其煩次用紫苑湯止

其咳嗽二方俱見前

胎前動紅水流者

此症多因跌傷血湧水流水急用膠艾湯以止其血次用安胎

散以護其胎膠艾湯方見上

安胎散

阿膠一錢 人參八分 當歸四錢 川芎八分 熟地四錢 小茴二分 大茴二分

用多 引百草霜三分 荷葉蒂五元

胎前小便不通

此症別無他恙忽下小便不通因胎不能轉運宜服八味湯

八味湯 去附片加車前

熟地四錢 丹皮二分 降瀉八分 山藥二錢 萸肉一錢 肉桂二分 甘草六分 車前

分五

胎前八九個月大便不通

此乃大腸經熱極重胎氣所閉只用加味大黃湯

加味大黃湯

熟黃一錢五分 大腹毛八分 當歸錢四分 子芩一錢五分 女貞錢五分 炙草八分 茯苓八分

一錢五分 會遠服 兼弱者加人參一錢五分

臨產須知

凡臨產之難者皆因坐草太早非真產之時腹痛之初兒身纔轉即以為產催其用力破水是以百橫生倒產之厄若身未順而偏生者或左腿或右腿雖兒已投門而不能下但云露頂非頂也或左右額角也速令產母仰臥端正穩婆輕推兒近上以手正其額用力一送即下又兒頭之後骨偏左穀道露頂未正令穩婆急於穀道外輕推頭正用力一送便下或兒先露手足先以鹽塗足掌急輕搔之并以鹽塗母腹又用小針於兒手足

心柱之針一二分三四處畧向上送兒痛驚轉一縮回頭可保
生下但產掃初腹痛不可驚動即將保胎佛手散並一副服再
加米飲粥熬服靜坐端正令兒身一轉自然順下可免西傷

治橫生逆產久不能下方

用全身蛇退一條注浸洗淨蠶退故紙一張

係養蚕原日之舊紙

二味入

新瓦罐內罐外加鹽泥封固不可泄乘入火內煨審其煨過時
即行取出不可令其燒過存性過則無力共為細末用乳香一
錢並湯調服

又霹靂奪命丹

治難產已久其母目翻口噤面黑唇青口中沃沫者凶子母命

互須史若觀其臉色微紅子死母死急用前方加少壯人頭髮
皂角洗淨煨炭存性合乳香一錢黑鉛一錢五分水銀七分五
厘為末用積猪心血和丸梧子大金箔為衣每服二錢要倒流
水送下北方急救其母子能下母能活否則俱亡若能子下母
活尤宜慎重調治總以生化湯連進二三劑為主

產時防血暈法

產時必先預備杵錘硬石子入火內燒紅及兒下地取小盤一
個注好醋斤餘將燒紅錘石入醋內令產母鼻聞醋氣神氣清
和斷無暈之症在候作虛暈錯用參耆一服即死產後胞久
不下者速照前法安慰產母即服生化湯一劑恐血上乘不治

并用紅棗茶葉蕎麥殼和入爐內安放產母房中用火燒燻
以辟穢氣

治兒已生下胞衣不下用倒勾龍神驗方

倒勾龍 一條 即年久屋塵垂下復勾上者此塵空閒經久屋

內方有茅茨上更多其效更速用瓦焙乾忌鉄煨研存性研
末水送各半調服產母端坐一晌即下仍要靜養高臥切不
宜矮睡停一二時再服生化湯一劑晚服童便一碗開水沖
服可吃陳蚕米稀粥一二碗高臥次早仍先吃開水沖童便
後服生化湯令瘀血自行新血漸轉多劑尤妙可保無恙

治難產方

用牆上裁高處蛇退一茶要臥頭向下者焙乾為末加上元
寸香五厘和勻用乳調成膏貼臍上務要產下即去斷不可
久貼之受害非小慎之

臨產破水時可服佛手開骨神驗方

秦當歸 八錢 川芎 三錢 海螵蛸 二兩 整龜板 三四兩 天葵子 五分

芫蔚子 五分 懷生地 五分 陳皮 一錢 蘊兜 三錢 續斷 一錢 炙草 五分 子芩

一錢 引柞木枝五寸如無亦可 此方藥料務要先預備

二劑初生者恐一劑不得產加一劑必要服藥後久不產方

可加年老體弱者加人參去葵子芫蔚子減螵蛸 一兩

產下產母務要高睡即服開水一碗停車時用童便和開水一

碗頻服約二時候再服生化湯一劑方可吃粥飯否則惡露不
清脾胃受傷變症亦多由是而來

加減生化湯

秦當歸 錢三
川芎 一錢
桃仁 十粒
益母草 二錢
乾薑 五分
炙草 六分
薑炭

引稀沙糖 五錢
童便 半碗
百受風寒者加蘇梗 一錢
陳皮

炒荆芥 八分
南查肉 二個
逢冬大寒時乾薑重用夏殊宜

於斟酌用服至瘀尽痛止

產下最忌食鷄魚宜久齋久脾氣健血色清信期正無後患
兼血清和且保一生少病素菜中芫耳蕪不可食之則後產艱

難受害多端夏天當暑不宜用扇冬天值寒切不宜近火

胎死上喘

因母患熱症治者未能得法久延傷胎令子不能降生作喘速
看母舌黑青色者子已死矣或因難產亦至于此速用黑神散

黑神散

熟地 五錢 蒲黃 五錢 乾薑 八分 當歸 五錢 赤芍 一錢 桂心 六分 水煎

服

斬爛散

肉桂 五錢 白芷 一錢 滑石 一錢 斑猫 三個 煎服 若面色不清舌不

黑指甲帶紅其子犹生不可輕用此方

集逐逐胎令胎橫速用汪浸益母草加童便對服再進五聖散

水聖散

葵花子半合為末熱服(調湯)二錢若順產門不下用熱(調湯)
加童便進服血見黑即止此藥固血又剋子血

婦科指歸卷二終