


聖王濟總錄

百集

庫文閣内	
三	漢
冊	函
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (174)
函號	300 212



大正抄書院藏書目録第一七七十六

小兒門

小兒痘疹上卷

小兒痘疹



小兒驚風

小兒疳積

小兒疳積

小兒驚風辨疑

大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百七十六

小兒門

小兒欬逆上氣 小兒嘔吐

小兒噦 小兒吐乳

小兒乳癖 小兒癥瘕癖結



黃至六升去滓下杏仁更煎至三升乃內諸藥及飴糖四兩蜜八兩於慢火上攪不停手熬令可丸卽丸如大豆大五六歲兒每服三丸食後溫熟水化下日

三

治小兒欬逆吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗伍遍

桂去麤皮

款冬花炒

射干

紫苑去苗土

右五味麤搗篩每用一錢七水一盞生薑一棗大拍

碎煎至五分去滓分溫三服更量兒大小加減

治小兒欬逆喘息如水雞聲麻黃湯方

麻黃去根節煎射干

紫苑去苗土

甘草炙剉各

桂去麤皮

半夏伍枚生薑湯洗拾遍炒

右六味麤搗篩五六歲兒每服一錢七水一盞棗一

枚生薑少許煎至五分去滓內蜜半錢七更煎一二

沸食後溫服日三量兒大小加減

治小兒上氣欬逆不止七味半夏湯方

半夏湯洗拾遍

紫苑去苗土

桂去麤皮

小阿膠炙令燥

甘草炙剉各

細辛去苗葉

款冬花各半

右七味麤搗篩每服一錢七水一盞生薑少許煎至

五分去滓投蜜一匙攪化食後服日三更量兒大小

加減

治小兒欬逆上氣五味半夏湯方

半夏

生薑湯洗拾遍炒

紫苑

去苗土

細辛

去苗葉

阿膠

炙令燥

桂

去麤皮各貳兩

右五味麤擣篩每用一錢匕水一盞煎至六分去滓

分溫三服空心午間日晚各一更量兒大小加減二

治小兒欬逆上氣喉中有聲不通利紫苑散方

紫苑

去苗土壹兩

杏仁

去皮尖雙入炒

細辛

去苗葉

款冬花

各壹分

右四味搗羅為散二三歲兒每服半錢匕米飲調下

日三更量大小加減

治小兒上氣喘息如水雞聲射干湯方

射干

量大小半

半夏

湯浸洗柒遍焙各壹兩

右三味麤擣篩五六歲兒每服一錢匕水一盞生薑

少許煎至四分去滓熱服日三更量兒大小加減

治小兒欬逆上氣杏蜜煎方

杏仁

去尖皮雙人生研如膏

蜜

各貳兩

右二味和勻於銀石鍋內慢火熬成煎旋丸一二歲

兒每服如菉豆大一丸溫水化下更量兒大小加減

治小兒上氣欬嗽不得安臥桔梗飲方

小桔梗

剉炒

桑根白皮

剉

貝母

去心

白茯苓

去黑皮

大青

五味子

小瓜剉

吳藍

人參

各參分

甘草

炙剉壹兩半

右九味麤搗篩每服一錢匕水八分煎至四分去滓

食後溫服量大小加減

治小兒欬逆上氣喘滿氣促調順胃氣進益飲食前胡

丸方

前胡

去苗

人參

半夏

湯浸去滑瀝切焙

白朮

各壹兩

丁香

壹分

大小以意取

右五味搗羅為細末生薑自然汁煮麩糊丸如菉豆

大每服五丸至七丸食後臨臥生薑湯下

治小兒欬嗽氣急紫苑湯方

紫苑

去苗土

貝母

去心

欬冬花

各壹兩

右三味細剉每服一錢匕以水七分煎取四分去滓

溫服食後

治小兒嘔吐

論曰小兒嘔吐者脾胃不和也或因啼呼未定而遽飲

乳或因乳中傷冷令兒飲之皆致嘔吐蓋兒啼未定氣

息未調遽令飲乳其氣尚逆乳不得下停滯胸膈胸滿
氣急故令嘔吐乳母乘涼冷氣入乳乳汁變壞不捨除
之因以飲兒壞乳入胃則令腹脹氣逆故亦變嘔吐又
右小兒沐浴不避風冷風冷與血氣相搏胃生蘊熱亦
為嘔吐當審其形證冷熱依法治之

治小兒嘔吐膈上有冷橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白焙

細辛

去苗

乾薑

炮裂各壹分

大黃

剉

甘草

炙各參分

右五味麤搗篩每一錢匕水七分煎至四分去滓分
溫三服一日令盡更量兒大小以意加減

治小兒嘔吐不止厚朴湯方

厚朴

去麤皮生薑汁炙

人參

各壹分

粟米

炒壹合

右三味麤搗篩每一錢匕水七分入生薑二片同煎
至四分去滓分溫二服早晨日晚各一服更看兒大

小以意加減

治小兒吐逆丁香湯方

丁香

半

桂

去麤皮壹分

人參

半兩

甘草

炙半兩

藿香葉

壹分

乾薑

炮裂半兩

白茯苓

去黑皮壹分

右七味麤搗篩每服半錢匕水五分同煎至三分去

滓溫服入棗煎更妙

治小兒吐逆不定丁香湯方

丁香 如無批杷葉代人參

白茅根 剉 藿香 用葉各壹分

右五味麤擣篩每服一錢匕水七分入生薑一片煎

至四分去滓量兒大小加減服之

治小兒脾胃不和吐逆不止訶梨勒丸方

訶梨勒皮 煨去核 丁香 壹錢

陳橘皮 湯浸去白 半夏 湯洗去滑

人參 壹分

右五味擣羅為末用生薑汁煮麩糊丸如棗豆大每服七丸生薑湯下乳食前

治小兒吐逆不止石亭脂散方

石亭脂 壹分 白滑石 貳錢

右二味細研為散煎竹葉糯米湯調下一字匕立止

治小兒胃氣虛弱多痰吐逆乳食難停丁香溫胃丸方

丁香 貳錢 天南星 壹分漿水煮透軟

半夏 壹分漿水煮令乾 水銀 壹分

黑鉛 半分與水銀 白豆蔻 去皮壹分

右六味擣羅為末用黃蠟一兩鎔和成煎丸如棗豆

大每服二丸或三丸丁香湯下

治小兒胃虛可思乳食噦逆膈悶肉豆蔻丸方

肉豆蔻壹錢 生薑壹錢 木香壹錢

人參壹分 青橘皮湯浸去白

白朮壹分

右六味搗羅為末白麩糊丸如菉豆大每服五丸米

飲下不拘時服

治小兒吐逆不定木瓜湯方

木瓜生 生薑不去

右二味各半兩切作片子水一盞煎至五分去滓量

兒大小分減溫服

治小兒一切吐逆不止水銀丸方

水銀結沙半錢 丁香壹分 葛根各壹兩

半夏湯浸半錢

右四味搗研為末用生薑汁和麩煮糊為丸如黃米

大每服三丸煎金銀湯下更量兒大小加減

治小兒吐逆麥門冬散方

麥門冬去心焙壹兩 石膏生用壹兩 甘草壹分

右三味搗羅為散每服半錢匕量兒大小加減煎茅

香根生薑湯調下

定小兒吐逆木香丸方

木香

末

黑犬膽

各壹分

右二味以膽汁和木香末丸如大豆大每服二歲已

下粥飲化一九

定小兒吐逆滑石散方

白滑石

錢貳

鯉魚膽

乾者伍枚

右二味搗研為散每服半字匕倒流水調下

治小兒胃熱吐逆妙聖丸方

龍腦

粉霜

膩粉

滑石

右四味各等分研為細末麩糊丸如菉豆大每服一

丸煎乾柿湯下不拘時服

治小兒心膈伏熱生涎霍亂躁悶身體多熱乳食難停

吐逆不定大戟丸方

大戟

漿水煮過切焙乾搗羅取末參錢

膩粉

粉霜

各壹錢半

水銀

各壹錢

鉛

各壹分貳味結沙

乳香

研

丁香

各壹錢

龍腦

半錢

右八味研令勻鎔黃蠟一分和為膏旋丸如麻子大

每服三丸至五丸量兒大小加減如煩躁研生脂麻

馬齒水下吐逆煎馬齒丁香湯下

治小兒冷氣吐逆不止心胸痞滿金鍼丸方

蘇陽起石研壹

杏人

拾伍枚湯浸去皮尖雙入炒

木不灰木

生研半兩

阿魏

半錢

巴豆

去皮膜拾貳枚

右五味除巴豆杏人別研外搗為細末後入二味再研令勻用糯米飯丸如雞頭人大焙乾每服一九用鍼穿燈焰上燎透為度入鹽少許同研細冷生薑湯加調下量兒大小分減與之

治小兒風熱吐不止甜消散方

甜消壹錢

滑石

白膩者半兩

右二味同研為散每服半錢匕用漿水半盞已下入

生油一點打勻調下立止

治小兒脾胃不和腹脹氣逆變成嘔吐人參散方

人參

白茯苓

去黑皮各壹兩 葛根

木香

藿香

取葉

甘草

炙剉各壹分

右六味搗羅為散每服一錢匕水一盞煎至六分溫

服

治小兒吐逆不定乳香丸方

乳香研

丹砂研

麝香

研各壹錢

半夏

半兩湯洗柒次生薑汁炒黃

右四味搗研為末麩糊和丸如菉豆大每服五丸米

飲下量兒大小加減服

治小兒胃氣虛寒嘔吐不止不下乳食丁香湯方

丁香貳錢

胡椒壹錢

檳榔壹枚

右三味麤搗篩每服半錢匕水半盞入白茅根少許

同煎至三分去滓溫服不計時候量兒大小加減服

治小兒吐逆不止麝香湯方

麝香壹錢

五靈脂壹兩

右二味拌勻每一錢匕水酒各半盞煎至半盞去滓

溫分二服量兒大小加減

小兒噦

論曰小兒氣弱不能勝乳致乳滿胃中氣既不得傳導復遇呼吸風冷則使胃氣上逆故令噦能節其乳仍溫胃氣則噦自愈

治小兒噦逆麝沉散方

麝香研

沉香剉各壹分

右二味搗研為散拌勻每服半錢或一錢匕沸湯點

服量兒大小加減

治小兒噦逆不止訶梨勒散方

訶梨勒皮壹分

人參

檳榔剉

甘草炙

陳橘皮

白湯浸去切炒沉香剉各半兩

右六味擣羅為散每服一字或半錢至一錢匕量兒
大小煎麥蘗湯調下

治小兒噦牛乳飲方

牛乳 生薑自然汁

右二味於銀器中慢火煎沸一歲兒飲二分蓋更量

大小加減

治小兒噦不止羊乳飲方

羊乳升

右一味慢火於銀器中煎令減半分作五服更量兒

大小加減

治小兒胃氣虛噦逆丁香補胃丸方

丁香壹錢 藿香葉壹分 附子炮裂去皮 貳錢

定粉研 檳榔壹分

右五味擣研為末滴水丸如梧桐子大每服一九至

二丸米飲下不計時量大小加減

治小兒胃氣虛冷噦逆不止枇杷葉散方

枇杷葉炙去毛 丁香各壹錢 白茅根

人參各壹分

右四味擣羅為細散每服半錢或一錢匕煎馬齒莧

湯調下不計時量兒大小加減

治小兒噦逆不止乳食不進遂愈散方

滑石末壹丁香貳藿香末錢

右三味同研勻細每服一字或半錢匕生油調下量

兒大小加減

治小兒噦逆腹脹消乳進食丸方

陳橘皮湯浸去白焙乾生薑去皮切貳味同炒黃色各壹兩

右二味同搗羅為末水浸炊餅心和丸如麻子大每

服一二歲兒橘皮湯下七丸量兒大小加減服

治小兒脾胃虛寒噦逆不止木香丸方

木香去粗皮草豆蔻去粗皮檳榔剉

青橘皮去白焙陳橘皮去白焙肉豆蔻去殼

京三稜炮剉

右七味搗羅為末麩糊和丸如菉豆大每服五丸溫

生薑湯下量兒大小加減服

治小兒脾胃虛寒噦逆不入乳食人參丸方

人參去黑皮白朮各壹分

木香去粗皮山芋各壹分丁香各壹分

右六味搗羅為細末白麵糊和丸如菉豆大每服七

丸生薑湯下妳食前服量兒大小加減服

治小兒胃寒多噦人參丸方

小兒人參

兩半

白茯苓

去黑皮

陳橘皮

去白焙

白朮

半夏

湯洗去滑各半分

甘草

炙

乾薑

炮各壹分

右七味搗羅為末，麩糊和丸，如黃米大，每服十九或

十五丸，煎薑香湯下，量兒大小加減服。

小兒吐乳

論曰：小兒飲乳後忽吐逆，乳汁者名曰吐乳，蓋由乳哺

冷熱不調，停在胸膈，復因飲乳舊乳未消，新乳又入，氣

不通，宜新陳相壓，所以吐乳，當節乳則愈。

治小兒吐乳，胸中否滿，乳飲停積，麝香湯方。

小兒麝香

研

木香

下香 人參

沉香

剉

赤茯苓

去黑皮各壹分

丁香

半

右六味，麝搗篩，每半錢，匕水半盞，煎數沸，去滓，分溫

二服。

治小兒吐乳，胸中冷氣，停結黃耆湯方。

黃耆

人參

各參分

當歸

切焙

芍藥

甘草

剉

芎藭

各半兩

細辛

去苗葉壹分

右七味，麝搗篩，每一錢，匕水七分，煎至四分，去滓，分

溫二服，早晚各一更，量兒大小加減。

治小兒初生吐不止鹽黃散方

鹽兩黃米大

牛黃兩粟米大研

人參

白茯苓各壹大 甘草兩小豆大炙

右五味先搗研四味為末以乳汁半合煎三五沸入

牛黃末攪勻分減服之

治小兒吐乳麝香丸方

麝香壹錢研

丁香搗末

杏仁去皮尖雙人炒研各壹分

右三味研搗為細末以粟米飯丸如麻子大每服五

丸人參湯研下更量兒大小加減

治小兒飲乳後吐哕不止丁香丸方

丁香壹分

藿香葉兩半

人參分

右三味搗為細末鍊蜜丸如菉豆大每服三丸粥飲

下煎至四公去渣分二服服與良藥

治小兒吐哕不定枇杷葉散方

枇杷葉去毛炙

丁香各壹分

右二味搗羅為散兒小者於乳頭上塗一字令兒哕

之兒大者煎棗湯調下不拘時更量大小加減

治小兒吐奶不止妙功散方

藜蘆洗焙

右一味搗為細散以少許吹入鼻中嚏三兩次立止

治小兒吐乳莎草根散方

莎草根炒去毛香附子是也

甘草炙剉各半兩

右二味搗羅為散每一錢匕水七分煎至四分去滓

溫分二服早晚各一細細呷之更量大小加減

治小兒吐乳母服人參湯方

人參陳橘皮去白焙各貳兩

右二味搗羅為散每一錢匕水七分生薑半棗大拍

破煎至四分去滓分溫二服服後與兒乳喫

治小兒嘔吐不止人參散方

人參壹兩為末 丹砂半兩研

右二味同研令勻每服半錢匕熟米飲調下更量大小加減

治小兒吐不止雙石散方

石亭脂錢壹 白滑石錢參

右二味研為細散每服一字匕煎竹葉糯米湯調下

更量大小加減

治小兒吐逆不止丁香散方

丁香半分 桂去麤皮 藿香葉各壹分

人參 甘草炙剉 乾薑炮各半兩

白茯苓去黑皮壹錢

右七味搗羅為細散每服半錢匕水七分煎至四分
溫服更量大小加減

治小兒吐逆不止二生湯方

生木瓜不去皮 生薑不去皮

右二味等分切作薄片量兒大小以水煎熟去滓與
服

小兒乳癖

論曰小兒脾胃氣弱保養不慎則令三焦不調乳飲不
化聚而成痰流於脇下寒氣乘之遂成癖聚久不消橫
連少腹上至心下按之苦痛肌膚漸瘦面色青黃多睡

目澁寒熱往來嘔吐欬嗽故謂之乳癖世呼為爛脾是
也

治小兒乳癖積氣散方

粉霜研壹錢半

訶梨勒皮為末肆錢 硫黃研壹錢半

京三稜為末柒錢

蜜陀僧研伍錢 白丁香研貳錢

右六味搗研為散再同研勻每服一錢匕用生薑漿

水調下後於五更服青靈丸

治小兒乳癖青靈丸方

粉霜

丹砂研

膩粉各壹錢

水銀貳錢用鉛少許結沙

麝香研半錢

青黛貳錢

巴豆

參拾粒去皮心膜出油盡研

右七味各細研再同和勻用麩糊為丸如黃米大薄荷湯下五丸至七丸新水亦得

治小兒乳癖二香散方

白丁香

直者肆拾玖粒

丁香

貳拾壹枚為末

石燕子

壹枚搗研

硫黃

研參錢

膩粉

抄壹錢七研

蜜陀僧

研

礞砂

研各參錢

右七味同研勻為細散每服一歲半錢七二歲一錢七十歲以上二錢七用麩湯調下如左肋下病臥左邊如右肋下病臥右邊至曉取下癖積是驗

治小兒乳癖食癖每至午後時作寒熱微有欬嗽脇肋癖鞭燒青丸方

輕粉貳錢

太陰玄精石

研壹分

粉霜

礞砂

研各壹兩

白麩

參錢

右五味再同研細滴水為餅子以文武火燒熟為度再研滴水為丸如黃米大三歲以上每服五丸漿水下三歲以下以意增減

治乳癖礞砂丸方

礞砂

礞石

粉霜

鷹屎

無食子

京三稜

各用末壹錢七

膩粉字參

龍腦研壹字

石八味再同研勻以麩裹大棗燒熟取棗肉和藥丸如棗豆大每服三丸或五丸煎古老錢湯下量兒大小加減兼治久積麩燒棗不燒藥次用外貼藥

治乳癖外貼散方

芸薹子錢末參

寒食麩壹錢半

右二味再同研勻用新水調如糊紙上攤貼乳癖上頻以水潤之

治小兒乳癖脇下結塊不消膩粉丸方

膩粉

白丁香微炒各壹分

右三味再同研勻以棗肉和丸如黍米大每服一丸新汲水下取下粘滯惡物効量兒大小加減不計時候

治小兒乳癖神効金花散方

白丁香直者微炒柒拾粒

丁香貳拾伍粒貳味為末

蜜陀僧研

硫黃研

黃鷹屎白研各半錢

右五味再合研勻每服三歲以下一字七三歲以上半錢至一錢匕並用爛汁調下臨臥服至來日取下青黑稠黏物即愈未盡不過再服

治小兒乳癖方

獨窠蒜一頭

右一味將蒜擣爛看兒乳癖大小候兒睡着隨病大小貼聽兒腹內作聲便急取去不用

治虛中挾積并乳癖聖餅子方

石燕子末貳錢

粉霜參錢

膩粉

礶砂研各貳錢

延胡索壹分爲末

鷹屎白研壹錢

治小兒白麩肆錢

丹砂研壹錢

右八味用雞子清和丸如雞頭大作餅子焙灰火內微燒過每服米飲化下半餅子

治小兒乳癖積塊消癖丸方

治小兒牽牛子壹兩半生半炒皂莢肥者參挺燒令烟盡爲度

三巴豆去皮心研出油夏秋半兩春冬壹兩

右三味除巴豆外擣羅爲末後入巴豆再同研勻用粟米飯丸如棗豆大每服三丸橘皮湯下如常服丸如粟米大茶下三丸量兒大小加減

治小兒乳癖攻脇肋緊痛如神散方

獨頭蒜壹顆研

樓葱壹寸研

膩粉半錢

凌霄花末壹錢

右四味再同研勻調塗脇肋上鞭處用醋麩餅子貼蓋之候口內聞蒜氣急用溫湯洗去

治小兒爛癬腹脇緊硬時作寒熱牽牛丸方

白牽牛錢末貳

粉霜錢壹

膩粉錢參

礪砂研壹錢半

黃鷹屎末壹錢

白丁香為末壹錢

延胡索大者柒枚擣末

石鷲子搗研壹枚

白滑石末壹錢

小沒藥研壹錢

白麩錢伍

右一十一味研為細末拌和勻滴水作餅子先於

火上炙乾次入灰火煨熟為度放冷細研更入硫黃

一錢同研勻滴水為丸如棗豆大看兒大小每服

三丸至五丸煎柳枝乾柿湯下臨睡服

治小兒乳癬肌瘦寒熱脇下鞭痛化癬丸方

生薑切片子暴乾為末

丹砂研各貳錢

巴豆霜壹錢

礪砂研

白滑石搗研各貳錢

右五味再同研勻粟米飯和為丸如黃米大每服二

丸薄荷湯下爛食後臨臥服

治小兒乳癬脇肋堅鞭喘癰時作疼痛水銀丸方

水銀壹錢

硫黃同研貳錢

蜜陀僧搗研貳錢

膩粉錢參

巴豆貳粒去皮膜心研出油盡

礪砂研半錢

石燕子搗研貳錢

右七味再同研勻白麩糊為丸如黃米大每服三丸

煎槐葉湯下爛食後臨臥服更量兒大小加減

治小兒乳癖滴水丸方

本黃蘗去麩皮剉 輕粉研

天南星炮 半夏生薑汁浸壹宿湯洗去滑焙各壹錢

巴豆拾粒去皮出油盡 水銀結沙子半

右七味搗羅研為末再同研勻滴水和丸如菉豆大

每服二丸或三丸煎生薑葱白湯下量兒大小加減

治小兒虛積乳癖軟金丸方

膩粉錢貳 蓬砂研皂子大 礞砂研半皂子大

黃連去須半錢 太陰玄精石研半錢

黃鷹屎半錢 巴豆壹枚半生半燒 粉霜半錢

右八味搗研為末再同研勻棗肉和用麩劑裹文武

火中煨以麩熟為度去麩取藥旋丸如黃米大每服

一二九甘草薄荷湯下量兒大小加減

治小兒乳癖硫黃散方

硫黃研 蜜陀僧別搗研 膩粉研

訶梨勒皮為末各壹錢

右四味和令勻每服一錢匕妳汁調下更量兒大小

加減

治小兒乳癖大黃丸方

大黃剉炒 桔梗剉炒 木香剉

陳橘皮去白焙馬牙消研

訶梨勒皮壹枚烏梅肉炒半

郁李人去皮各參分

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如黃米大一歲兒每服七丸米飲下更量大小加減

治小兒初生至百日周晬腹內有氣衝心喉及壯熱頭疼嘔逆腹痛寒熱乳癖宜下胎中宿物大黃丸方

大黃剉炒壹兩丹砂研人參

枳殼去瓢炒白茯苓去黑皮各壹分半

芫胡去苗桂去麤皮各半木香壹分

右八味搗研為末鍊蜜丸如棗豆大每服五丸乳汁

煎下日三次者加至二十九丸若令其和

治小兒乳癖積聚按之苦痛肌膚漸瘦面色青黃妙應

丸方

檳榔剉貳枚陳橘皮湯浸去白焙青橘皮湯浸去白焙各半兩

木香壹分黃連去須炒蓬莪茂剉

桂去麤皮各壹分

右七味搗羅為末每抄一錢匕入巴豆一粒去皮心

膜醋煮令黑色并杏仁一粒去皮尖燈上燒作黑灰

同研令細與藥末再合研令勻用白麵糊和丸如粟

米大每服二丸食後生薑湯下量兒大小加減

治小兒脾胃氣弱乳食不化乳飲留於腸下因寒成癖
蓬莪散方

蓬莪莪

炮切

阿魏

壹錢水化開漫蓬莪
茂壹宿慢火炒乾

右二味搗羅為細散每服半錢匕紫蘇米飲調下量

兒大小加減

小兒癥瘕癖結

論曰小兒腹中腸下結聚之病有形可驗按之不動者
癥也假結有形推之浮移者瘕也僻在左右者癖也諸
癥本於食諸癖本於飲諸瘕本於氣皆由府藏不和三
焦不調又為寒濕之氣所乘故令乳哺不化食飲結聚

而為癥瘕癖結之病

治小兒陰陽氣不順虛痞脹滿嘔逆腹痛成癥瘕癖結

等病萬應丸方

檳榔貳枚

陳橘皮去白

青橘皮去白焙
各半兩

木香

黃連去須

蓬莪莪煨

桂去麤皮
各壹分

右七味搗羅為末每用一錢匕入巴豆一粒去皮心
膜醋煮

紫色杏仁一枚去皮尖燈
研將前藥末同二味合研勻

細用白麩糊和丸如粟米大每服二丸食後生薑湯

下更量大小加減

治小兒癰氣手脚心熱面色黃不下食日漸羸瘦往往覆臥久不治變成惡病入夏即瀉痢木香丸方

木香八分 茯苓去木 人參

白朮 枳殼去瓢炒 當歸炒切

京三稜剉 知母焙各半兩 鼈甲醋炙去裙

大黃炒剉 生薑焙切 檳榔剉

桂去麤皮各壹分

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大一二百粒日兒每服一九二三歲兒二丸至三丸並空腹日晚米飲下微利下惡物為度更隨兒大小增減

治小兒癰癰大鼈甲丸方

鼈甲醋炙去裙 犀角鎊 丹砂研

桂去麤皮各半兩 大黃炒剉 當歸焙切

小葶藶炒 代赭煨 巴豆去皮心膜研如膏各壹兩

心枳殼去瓢炒 牛黃研 麝香研各壹分

右一十二味搗研為末鍊蜜和丸如麻子大三四歲兒每服二丸至三丸空心新汲水下差即止更隨兒大小加減

治小兒食癰本於腸胃氣弱喫食不化結聚不散腹中隱隱成塊按之即痛芍藥丸方

芍藥炒 大黃炒

龍甲醋炙去

麻人研各 防葵炒

大白木各壹分

右七味搗研為末鍊蜜和丸如菉豆大一歲兒每服

三丸三歲至五歲五丸並溫熱水下日再更量兒大

小加減

治小兒脾積氣三稜丸方

京三稜剉

石三稜剉

雞爪三稜剉

蓬莪茂剉各半兩

木香壹分

右五味並生杵羅為末酒煮麩糊和丸如麻子大膩

粉為衣每服五丸烏梅生薑湯下量兒大小加減

治小兒癥瘕食癖京三稜散方

京三稜煨

龍甲醋炙去

枳殼去瓢

陳麴炒

大腹子剉

訶梨勒皮半生

厚朴去麩皮生薑汁炙

麥蘖炒

蓬莪茂煨

青橘皮去白焙

右一十味搗羅為散六七歲兒每服半錢匕空腹米

飲調下日三更量兒大小加減

治小兒食疳長肌膚益顏色化宿食治腹脹破積聚和

氣調中檳榔丸方

檀榔剉

丹砂研

阿魏麩裏煨熟

代赫研

乳香研

木香

五靈脂炒

肉豆蔻去殼各壹兩

巴豆去皮心膜出油盡半兩

蟾頭壹枚炙焦

右一十味杵研勻細麩糊和丸如黍米大每服一二丸溫生薑湯下更量兒大小加減

治小兒脾積氣肌瘦膽礬丸方

石膽礬研

盧會研各半兩

龍腦研

麝香研各壹錢

丹砂研

胡黃連末各壹分

黃連末壹兩用豬膽壹枚入末在內以好醋煮拾餘沸取出掛候乾研為末

右七味同研勻細醋煮麵糊和丸如菉豆大每服十丸早晨臨臥溫米飲下更量兒大小加減
治小兒疳癖食癖每至午後時作寒熱微有欬嗽脇肋癰鞭鍊青丸方

太陰玄精石壹分粉霜

硃砂各壹錢

輕粉錢貳

白麩錢參

右五味同研極細滴水成餅子文武火燒熟再研滴水丸如黃米大每服七丸漿水下三歲以下五丸更量兒加減

治小兒癖氣發即腹脇疔痛減食黃瘦鼈甲丸方

小兒驚風

去濕爛醋

防葵

入參

各伍分

訶梨勒皮

太黃

蒸壹兩

桑菌

郁李人

壹兩半

右七味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服三丸至五

丸空腹米飲下更量大小加減

治小兒癥瘕腹痛脹滿或作塊或皮膚浮腫不能食雄

鼠粥方

雄鼠肉

伍兩

陳橘皮

去白焙

鼈甲

醋炙去

京三稜

煨

郁李人

去皮研

生薑

切焙

右六味麤搗篩作三貼每貼以水一升煎去滓取半

大升入粳米一合五味煮作粥空腹食之

治小兒氣癖上下左右移動不常木香丸方

木香

壹分

白檳榔

剉參

大黃

蒸焙

枳實

麩炒各

附子

炮裂去

乾薑

炮各

朴消

壹兩

右七味搗研為末鍊蜜和丸如菉豆子大每服三丸至五丸空腹溫湯下更量大小加減

治小兒水癖按之作聲牽牛子丸方

牽牛子

炒

枳殼

去瓢麩炒

藥皮

去麩

甘遂

炒

桂

去麩

牡丹皮

各壹分

