

一癰疽將安宜用加味十全湯補其氣血庶肌肉易生

一背疽多先渴而後發或先疽而後渴不救者多矣若服加減八味丸非特杜絕渴疾抑亦大滋氣血生長肌肉

一癰疽嘔逆有二一因初發不服內托散伏熱在心一因脾氣不正伏熱在心者則心煩身熱焮腫作痛宜用內托散三兩服之脾氣不正者則不煩熱或聞穢氣作嘔宜用嘉禾散如有寒熱

用不換金正氣散五更初兼服山藥丸以補腎
癰疽用香藥調治論

伍氏曰氣血聞香則行聞臭則逆大抵瘡癆多因營氣不從逆於肉理鬱結為膿得香則氣血流行故服五香連翹湯萬金散金粉散凡瘡本腥穢又聞臭觸則愈甚若毒入胃則咳逆古人用之可謂有理且如飲食調令香美以益脾土養其真元可保無虞矣

五發癰疽通治方

漏芦湯

治一切惡瘡毒腫丹癰瘰疬疔腫魚臍

五發癰疽初覺一二日便如傷寒頭疼煩渴拘

急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不

寧皮膚壯熱大便閉瀉小便赤黃並皆服之

姪婦勿服

漏芦

白斂

黃芩

麻黃

去節

枳實

炒去白

升麻

芍藥

炙甘草

朴硝

各二兩

大黃

二兩

右每服三五錢看虛實用水煎空心

熟服

五香連翹湯

治諸瘡腫初覺一二日便厥喉咽

塞發寒熱

乳香

木香

木通

大黃

各半錢

連翹

沉香

獨活

桑寄生

丁香

射干

升麻

射香

另研各一錢

甘草

五分

姜三片

水煎

不拘時服

托裏護心散

治諸疔腫發背曾經汗下毒氣攻

心迷悶嘔吐而痛可服二三服

乳香

一兩

菉豆粉

四兩

和勻每服三錢甘草湯調服

神仙礮磬丸

此藥不問老幼皆可服之服至一

兩已上無不取効最止疼痛不動臟府委是神

効活人不可勝數

白礬

明亮者
一兩研

黃蠟

七錢化

蠟冷不能丸以滾湯頓之便軟每服二十丸漸

加至三四十丸白湯或酒吞下如未破即內

消已破即便合如服金石發動致疾更用白礬

末一兩匙頭溫酒調下亦三五服見効有人遍

身生瘡狀如蛇頭服此亦効諸書皆稱神奇但

一日之中服近百粒則方有功此藥能防毒氣

內攻蓋能護膜也切不可欺其淺近而忽之始

終服過半斤必能萬全瘡愈後服之尤佳

一方治蛇咬只熔化白礬乘熱滴傷處痛即止毒
氣即趕出立見効驗要知白礬大能解毒也

千金托裏散 治一切瘡腫發背疔毒若氣血虛

而不能作膿或潰後膿清痛仍不減最宜服此

便能排膿止痛 黃蓍半兩厚朴 防風

桔梗

各二兩

連翹

二兩

川芎

白芷

沒藥

各三錢

乳香

錢二

當歸

五錢

甘草

各二兩

官桂

人參

各一

右為細末每服三

提起待少
未佳手
入攀匀

右衆手丸如梧桐子大倘

研

化

錢

錢酒一大盞煎三二沸溫服

十六味流氣飲 治無名惡瘡瘍疽疔 川芎

當歸 芳藥 防風 人參 木香 黃芪

官桂 桔梗 白芷 檀郎 厚朴 烏藥

紫蘇 只壳 甘草各一錢 右作一帖水煎食服

內托羌活湯 治尻臀生瘡堅硬腫痛大作

羌活 黃柏酒製各二錢 防風 翩尾 藥本

連翹 蒼朮 陳皮 炙甘草一錢 肉桂三分

黃芪一錢半 水一鍾酒半鍾煎八分食前服

清心內固金粉散 一名金花散 專治惡瘡熱

盛欬痛煩躁作渴此藥解毒 辰砂另研

人參 甘草各三錢 蒼朮粉四兩

白荳仁 朴硝各五錢 射香或水片各一錢另研 右以參

苓荳蔻為末入研藥和勻每服一錢半蜜湯調

麥飯石膏方又名鹿角膏 白麥飯石其石顏色黃白像麥

飯團者研細末 听用 鹿角要生者自解者不用截作二三寸長炭火內煅令烟盡為度研

白歛末細 右將麥飯石用炭火煅紅以好

米醋淬之如此煅淬十次研為極細末每用二

兩白歛末二兩鹿角灰末四兩同入乳鉢乳令無声方有効驗若研不細敷上作痛若研得極細如眼藥一般極能止痛排膿收口量藥末多寡用經年好米醋入銀石器內煎令魚眼沸却旋旋入前三味藥末在內用竹籃子不住手攪熬一二時久令稀稠得所傾出磁盆候冷以帛蓋密勿惹塵灰每用時先用猪蹄湯洗去瘡瘍上膿血至淨以故帛挹乾以鷄翎拂藥膏塗敷四圍凡有赤處尽塗之但畱中心一竅如錢大

以出毒氣膿血如瘡未潰能令內消如已潰則排膿如湍水逐日見瘡口收歛如患瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥以貼瘡上但肉膜終穿亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍忌口氣及有腋氣之人并月婦皆令忌之此方但得好帶盖鹿角好麦飯石精虔修合勝用他藥多矣仍可熬取好米醋一大碗候逐日用藥於瘡上俟乾便以鷄毛蘸醋拂潤勿令緊也初用湏一日一洗換十日後兩日一換

排膿內補十宣散一名十奇散
一名內補散治瘡疽瘍瘍未成者速散已成速潰敗膿自出無用手擦惡肉自去不用刀針服藥後其痛頓減効驗如神

人參 當帰 菖蓍各二兩 厚朴姜汁炒 苦梗 白芷 薄桂各一兩 右為末每服三錢酒調下日夜各數服以多為妙服至瘻口潰更服為嘉不飲酒人濃煎木香湯調下然終不若酒力之勝或飲酒不多能勉強以木香湯薰酒調下亦可

乳香黃蓍散 治一切惡瘡瘍疽發背疔瘡痛癥不可忍者或未成者速散已成者速潰不假刀砭其惡自下 又打撲傷損筋骨疼痛並皆治之

黃蓍 當帰 川芎 麻黃去根節 甘草 人參

芍藥各一兩

粟壳

蜜

陳皮各一兩

乳香

沒藥

錢各五

每服五六錢水煎服

黃蓍湯 治一切瘡腫瘧疽並宜服之

黃蓍

川歸

酒洗各一兩

各

大黃

芍藥

陳皮

錢各五

右加生姜三片水煎服

灸甘草

錢各五

各

大黃

芍藥

陳皮

各

水煎服

托裏內補散 專治一切惡瘡潰爛出膿之

後宜服之

人參

川歸

川芎

白芍

甘草

白芷

防風

白术

茯苓

官桂

黃蓍

金銀花

各等分水煎服

護心散

治瘧氣冲心嘔吐

又名不二散

灸甘草

硃砂

飛各一錢

菜荳粉

炒二錢

為細末作一帖白湯

調下

當歸連翹散

清熱解毒通潤大小便

當歸

連翹

梔子仁 芍藥

金銀花

各一兩

黃芩

五錢

右每服五錢水二鍾煎七分空心溫服如欲通

大便加大黃二錢待藥煎將熟入之再煎一二沸服之

托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脉洪

絃實數腫甚欲作膿者

當歸

括萎根

一錢半

大黃

錢三

皂角刺 牡蠣

朴硝

連翹

各一錢半

金銀花

赤芍藥 黃芩

各一錢

水酒

各一鍾煎

乳香止痛散

治一切瘡腫疼痛不止

乳香

沒藥

各一錢

丁香

五分

粟壳 白芷

陳皮

炙甘草

水煎服

加味當歸飲子 古云諸瘡皆屬心火之鬱則發

之 當歸 生地 升麻 各五錢 防風 二錢

荆芥穗 何首烏 各一錢 柴胡 白芍藥 川芎

羌活 黃蓍 各三錢 紅花 蘇木 甘草 各一錢

每服五錢生姜三片煎或沐浴取微汗効速使

血氣通暢服藥應効

托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短促吃逆不絕不得安卧時有昏憤

丁香 沉香 苗香 陳皮 益智仁 各一錢

木香 一錢

羌活

良姜

炮三錢

黑附子

炮去皮四錢

炙甘草

二錢

姜三片水煎服

忌生冷

猪蹄湯 治一切瘡疽并諸腫毒消毒氣去惡肉凡瘡有口便須用此湯洗 黃芩 白芷

赤芍藥

川歸 羌活

生甘草

露蜂房

有蜂

兒者各等分 先將獐猪前蹄兩隻重一斤只用白水三升煮軟將汁分作二次澄去面上油并下肉渣每次用藥一兩投入汁中再用文武火煎

十數沸去渣以故帛蘸湯溫徐揩瘡上死肉
惡血隨湯而下洗淨訖以帛拭乾仍避風忌人
口氣吹之有狐臭人及月婦貓犬並不宜入病
人房中洗瘡切忌手觸洗瘡之方甚多惟此方
極効其用露峰此甚有理蓋以毒攻毒也

麥門冬湯 瘰疽潰後膿水不絕 麥門冬

黃蓍 五味子 人參 官桂 當歸 遠志
白芩 芎窮各一錢 生甘草三錢
姜一片 東二枚 水煎

四虎散 治癰疽腫硬厚如牛皮按之痛

天南星 草烏頭 半夏生用

半夏生用

狼毒

各等分為細末醋蜜調敷番頭蟲氣

內托散

諸腫毒惡瘡一服立愈

便盡力

大黃

牡蠣

各五錢

甘草

三錢

括萎仁

二兩如無用山梔子亦可

右分三帖水煎服

鐵井欄

治無名腫毒背疽以此圍之番口出氣

芙蓉葉

重陽前收

蒼耳

端午前燒存性

為末以蜜水

調上

五香湯

諸瘡入腹托裏

丁香

木香

沉香

乳香

各兩

人參

一兩另加

射香

三錢去之勿霍

者

右為細末每服三錢水一盞煎六分空心熱服
總錄聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方
大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣不通者
其餘熱結昏昧口燥咽乾大便硬小便澀者未
可與服

止痛當歸湯 治腦疽發背穿潰疼痛

當歸 黃耆 人參 官桂 茯苓 炙甘草
生地各一兩 每服五錢水煎服

金銀花散

發背惡瘡托裏止痛排膿 金銀花

無花藤葉代之四兩

甘草

八錢

分為三帖酒水各半煎服

拔毒散

治熱毒丹腫遊走不定 寒水石

生用

石膏

生用各四兩

黃柏

甘草

各一兩

為細末新汲

水調掃之或油調塗之或帛花上攤貼以涼水

潤之

寸金丹

二名返魂丹三名再生丸四名追命丹

六名來甦丹七名知命丹八名得道丸非人勿
示若有人患瘧身未爛者與三丸服之嚥下便

活如口噤幹開研化灌之下喉立生治發背腦疽瘡腫遍身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重身躰壯熱射香一分乳香

輕粉烏金石雄黃狗寶沒藥各一錢鯉魚胆

蟾酥二錢

粉霜

黃蠟三錢

金頭蜈蚣

金頭蜈蚣

金頭蜈蚣

金頭蜈蚣

金頭蜈蚣

乾用

狗膽各一枚

頭男胎乳

一盞金頭蜈蚣

金頭蜈蚣

金頭蜈蚣

金頭蜈蚣

金頭蜈蚣

金頭蜈蚣

丸荳荳大小兒丸如芥子大每服一丸病重者加三丸白丁香七枚研爛新汲水調送下被蓋

出汗勿令透風凡服藥後喫白粥瓜礬就睡大妙頭瘡腫痛不過三服

定痛托裏散一切瘡腫疼不可忍如年少氣

實先用疎利後服此藥

川芎

川歸

乳香

白芍藥

沒藥

與乳香各一錢半

官桂

一錢御米壳

去筋膜炒

二錢

水煎服

柞木飲子發背瘡疽已成未成並宜服之

乾柞木葉

四兩

乾荷葉心蒂

萱草根

甘草節

地榆

各一兩

右為末每服五錢水煎服

早晚各進一服

內托千金散 瘰疽發背腦疽乳瘡諸瘡癧未成者自散已成者即潰 人參 川歸 黃芪

川芎 防風 白芍 官桂 桔梗 白芷

甘草 括萎 金銀花 各等分 痛甚者加當歸乳香沒藥芍藥 每服七八錢水煎臨服加好酒半盞溫服日進二三服若瘡口有黑血出及有汗出者此藥之功也

牛膠飲 截瘡疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻

於內不傳惡証

牛皮膠

通明好者淨洗
乾秤四兩為則

右用酒一碗入膠納重湯頓令膠撓勻傾出更浸酒隨意飲尽若善飲者以醉為度亦用酒煎却浸以白湯飲尽為佳此法活人甚多

國老膏 一切瘡疽俱發預期服之能消腫逐毒使毒氣不內攻功效不具述 大甘草

有粉者二斤

槌令碎河水浸一宿擣令漿汁濃去渣再用綿瀝過銀石器內慢火熬成膏以磁罐收之每服一二匙無灰酒侵入或白湯亦可不拘時服曾

服丹劑燥藥亦解之或微利無妨

遠志酒 一切瘧疾發背惡毒有死血阴毒在中
則不痛敷之則痛有憂怒并氣積而內攻則痛
不可忍敷之則不痛或熱蘊在內熱逼人手不
可近敷之即清涼或氣虛血冷潰而不歟敷之
即歟 此乃韓大夫宅用以救人極驗若七情
內鬱不問虛實治之必愈 遠志米泔浸洗去心苗

右為細末酒一盞調藥末三錢遲頃澄清飲之
以渣敷病處

忍冬酒 瘰疽發背初起時便當服此不拘疽發
何處及婦人乳癰服之皆有奇効外以麥飯石
膏及神異膏塗之其効若神 忍冬藤生取一

大握以葉入砂盆內爛研入好酒或生酒尤佳
調和稀稠得所塗敷四圍中心畱一大竅出氣
仍用忍冬藤五兩用木槌微搗不可碎甘草節一兩

右入砂瓶內水二碗文武火慢煎至一碗入
無灰好酒一大碗再煎十數沸去渣分為三次
服一日服盡如病勢重一日夜再進一劑服至

大小腸通利藥力乃到。若無生者用乾者終不及生者力大而効速其功勝於紅內消。

神仙截法。瘧疽發背一切惡毒預服此藥毒氣不內攻可保無虞。真麻油一斤銀石器煎十數沸傾出冷用

右以無灰酒兩碗侵入油重湯溫稍熱通口急服一日尽之為妙或疾發數日者亦宜急服之佳此法乃吳侍御家云三代用之無不驗又聞獵者云凡悞中藥箭急飲麻油則藥毒不行後於西山親見一人被虎箭穿股四號不忍急以

此灌之良久遂定又聞鄭學諭曾用之効。

黃蓍丸 治因用針砭傷其經絡白濃赤汁逗流

不止

生黃蓍

八錢

川歸

三錢

木香

沉香

肉桂

乳香

各一錢

右諸香並不見火為細末用

荳粉生姜汁煮糊為丸梧桐子大溫水吞四

五十九

忍冬丸 療渴疾既愈之後須預防發瘧疽大宜服此 忍冬藤根莖花葉皆可以用以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許研為

細末以所浸酒打麵糊為丸梧桐子大每服五十丸至百丸不拘時酒飲任下此藥不特治

癰疽大能止渴并治五痔諸瘻等疾

援生膏 治諸般惡瘡及瘰疬鼠瘻繩起者點破

即愈

血竭

乳香

沒藥

各一錢

蟾酥

輕粉

各三錢

雄黃

五錢

射香

五分

右用喬麥稈灰或真炭灰一斗

二升淋灰湯八九碗

用栗柴或桑柴文武火煎

作三碗取一碗收畱二碗盛於好磁器內候溫
將前七味藥研為極細末入灰湯內用鐵瓢或

葉柳枝搗再以好風化石灰一升入藥灰湯內
搗勻取出候冷過宿成于小白磁罐內凡遇諸
惡瘡點在當頭一日二次次日又一次瘡頭食
破約五分血水出為妙恐日久藥乾將前收畱
灰湯入之

烏龍膏

一名烏金散去

一切腫毒癰疽收赤暈

木別子

壳

半夏

各二兩

小粉

四兩

草烏

五錢

右於鉄鍋內慢火炒令轉焦為細末出火毒再
研以水調稀稠得所敷毒四圍畱頂出氣或以

醋調亦得

透膿散 諸瘡疽瘍及貼骨瘡不破者不必刀針
以針點之不移時其膿自透累驗

蛾角子出蛾角子口者右燒存性以酒調服切記只
用一枚不可多用如用二三枚即有二三口也

慎此方絕驗勿忽

通門散 一切瘡疽無頭腫痛 山梔子錢三
大黃錢二 牡蠣炒五錢 地龍去土三錢 紫甘草錢五
每服六七錢水煎服以利為度

乳香拔毒散 一切瘡腫瘡疽消毒 黃芩各二兩

黃柏 地骨皮 乳香 滌藥各二錢

為末涼水調攤貼腫處効

立効散 發背諸瘡癧瘰疬乳瘡與前方間服神
效 皂角刺不用枯者剉而久炒 生粉草二兩

乳香五錢 沒藥一兩 括萎五枚肉炒取

右為末每服二錢無灰酒調下

灸法 瘰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫

一切如錢貼其中心以小艾炷灸之五壯而止若

形狀稍大以黃稈紙蘸酒全貼看先乾處為筋
脚於脚處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯而
止 又法屈指從四圍尋按遇痛處是根就此
處重按深入自竄輕快即此灸之更於別處灸
若腫大即搗蒜餅焙乾蘸法醋灸熱更換頻罨
或以熨斗火於蒜上熨之逐次更換熱餅頻熨
如竄患處走散以綿帛覆蓋勿令氣泄俟少間
敷藥凡瘡疽腫大如鱉之形湏看頭向上下先
灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊而長從盡

處灸之湏番頭并後兩脚勿灸設盡灸之不惟
火氣壅聚彼毒無所走散反攻入裏也倘辯認
不明以白芷三分 漢椒 一 亲白皮各一錢
連根葱白十根 新水煎入酸醋半盞淋洗少
頃其筋自見可以辯認頭尾

萬病解毒丸 瘡疽發背魚臍毒瘡藥毒草毒挑
生蛇毒獸毒諸惡瘡病 五倍子五錢 山荳根
山慈姑一兩 全蝎五錢 紅牙大戟七錢 射香一錢
續隨子取仁去油取霜各半兩 砥砂 雄黃各二錢

右件先以前五味入木臼搗羅為細末次研後
四味夾和糯米糊丸分作三十五丸端午午七夕
重陽臘日淨室修合每服一丸生姜蜜水磨下
井水浸研敷患處解毒收瘡救病神妙硃砂雄
黃乃癆醫五毒攻乃癆中物也

加味八味丸

降心火生腎水治諸渴疾癰疽未

發前已瘡後渴症通用

熟地黃

焙二兩

山茱萸

微炒

山茱萸

蒸取肉焙各一兩

辣桂

去粗皮五錢

澤瀉

截作塊酒

蕪荑

盛

牡丹皮

焙

白茯苓

各八錢

五味子

慢火焙乾

神仙太乙膏 治瘧疽及一切惡瘧軟癆不問年
服三十丸空心鹽湯下

研兩半

右為細末煉蜜候冷和丸如梧桐子大每
月深淺已未成膿並宜治之蛇虎傷蜈蚣犬咬
傷湯火刀斧所傷皆可內服外貼如發背先以
溫水洗瘡淨軟綿拭乾却用緋帛攤膏藥貼瘡
即用冷水下咳漱及喉閉纏喉風並用新綿裹膏藥
置口中含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太

陽穴後服以山梔子湯送下打撲傷損外貼內服橘皮湯腰膝痛者患處貼之內服鹽湯送下唾血者桑白皮湯下諸痛先以鹽湯洗净諸血量大小以紙攤貼每服一丸如櫻桃大蛤粉為衣其膏可收十年不壞愈久愈烈一方久遠瘰癧同上瘻瘍塗湯洗淨貼酒下一丸婦人血脉不通甘草湯下一切瘻瘍并腫痛及疥癩別煉油少許和膏塗之 玄參 白芷 當帰

赤芍藥 肉桂去粗皮 大黃 生地黃

各一兩

右剉碎用麻油二斤浸春五夏三秋七冬十火熬黑色濾去渣入黃丹一斤青柳枝不住手搘候滴水中成珠不粘手為度傾入磁器中以磚蓋口掘子窖埋阴樹下以土覆三日出火毒欲服丸如鷄頭子大

神異膏 治癰背瘡疽諸般惡瘻癧其効如神治疽疾先以麥飯石膏塗敷俟其瘻根脚漸收放徑寸大脚用神異膏貼之收口此藥隨其人病深淺取効合時不可與婦人鷄犬猫獸穢物見

之 玄参

半兩

杏仁

去皮尖切一兩

露蜂房

淨炒一兩用有蜂兒

者為妙

男子亂髮

洗淨焙乾五錢

綿黃芪

三分全蛇退洗焙

鹽水

錢五

黃丹

飛細五兩

右用真麻油一斤用髮入銀

鑊中文武火熬候髮焦鎔尽以杏仁投入候變黑色用好綿瀘去渣再將所熬清油入鑊內然後入玄參黃芪慢火熬一二時取出鑊子安冷爐上半時久火力稍息旋入露蜂房蛇退二味將柳枝急攪却移鑊放火上不住手攪慢火熬至紫黃色用綿瀘過浸入清油在鑊內乘冷投

黃丹急攪片時又移鑊于火上以文武火慢火熬不住手柳枝攪千餘轉候藥油变黑色滴水中凝結成珠則是膏成就若珠子稀再熬少時必候其得所然後磁器內收封待用或恐偶然火熬太過稍硬難用却少將臍熬麻油在內以磁器盛封蓋於甌上蒸乘熱攪調收用膏藥熬成了湏連兩盛磁器置淨水中出火毒一昼夜歇三日方可用日換二次夜換一次熬此膏藥極難於火候湏耐看火緊慢火猛則藥中火發

不特失藥性又傷人面目救助不及千萬謹戒
膏藥方甚多不下數十治痘之神無出此方千
金不換杖瘡尤妙

萬金膏 治痘瘡發背諸般瘡癧從高墜墮打撲
傷損脚膝生瘡遠年癰瘡痔漏一切惡瘡又云
專治發背神妙不可具言或初瘡若做瘡用牛
皮膠令稀稠得所如藥化攤在毛頭上於初瘡
處或有做瘡處貼次用軟布帕子二條於醃米
醋內煮令熟漉出互相於熬紙上乘熱蒸熨不

可令布帕冷布帕二條不可都齊漉出常畱一
條于醋內煮候蒸熨得一條冷時却取醋內煮
者熨之俟冷却又於醋內取熱布蒸熨度幾常
得熱布替換即易見効若瘡痒乃是藥攻其病
須忍痒不止直候膿出將尽即濃煎貫衆湯候
溫洗去膠紙次日依前更洗若上有膿又如前
法蒸熨雖連數日蒸熨不妨但要瘡中膿盡瘡
乾為度然後用生肌紅玉散掺在瘡上即以萬
金膏貼每日一上或兩上每用再蒸熨並如前

先鋪膠帶于瘡上了亦如前用貫衆湯洗入膠

紙 龍骨 鱉甲 玄參 黃柏 草烏

黃連 烏賊魚骨 黃芩 白芨 白斂

豬牙皂角 木別子 當歸 白芷 川芎

厚朴去粗皮 槐枝 柳枝各四寸長二十一條 乳香另研

沒藥另研半兩 黃丹水飛淨炒過

赤色去粗皮三斤

右除乳沒丹外餘藥入油內慢火

煎候白帝焦色去粗入黃丹一半不住手撓令
微黑色更入黃丹仍撓待滴入水中成珠不粘

手為度撓溫下乳沒末撓勻磁器盛用時量瘡
大小攤紙貼之治諸惡瘡加自然銅肉桂各一
分一方無當帰

磨風膏 治頭面五發瘡腫疥癬等疾及湯泡傷

磨風止痛減瘢痕 自附子 白芍藥 白茯

苓零令香 白芨 白飲 白芷 白檀

藿香 升麻 細辛 黃芪 甘草 杏仁去皮

尖各一兩 脑子 括萎根一大括萎二兩去皮

芝麻油 右前十四味剉油內浸一日於臘日

木火炭上銀石器內煎至白芷微黃色離火入
括萎二味着內煮百沸重綿濾去粗再慢火上
煉油香下削淨黃膚熔開為度傾在磁器內收
貯上摻脑子密封旋用磨風塗之

金絲萬應膏

治擗撲傷損手足肩背并寒濕脚

氣疼痛不可忍小兒脾疳癰瘍咳嗽不肯服藥

者

瀝清二斤半

威靈仙二兩

草麻子一百枝

黃膚去皮壳

黃膚二兩

木別子二十粒

牛黃一錢

沒藥切片

乳香各一錢

麻油

夏二兩
秋各四兩

右先將瀝清同威靈仙下鍋熬化以槐柳枝攪
候焦黃色重綿濾過以瀝清入水盆候冷成塊
取出秤二斤凈再下鍋熔開下麻油黃膚草麻
子泥不住手槐柳枝攪勻湧慢火滴入水中不
粘手扯拔如金絲狀方可如硬旋再加油少許
如軟加瀝清試得如法却下乳香沒藥末起鍋
在炭火上再用槐柳枝攏數百次又以粗布漉
下水盆內扯拔如金絲頻換水却用小鍊盛頓
如落馬墜車被傷疼痛處穴上炙熱貼透骨肉

為驗連換熱水數次浴之則熱血聚處自消小兒脾疳鴻痢貼肚上咳嗽貼背心上

洗藥神硝散

專治瘡疽潰爛臭稔

朴硝一兩

蛇床子

研破二兩

右二味和勻每用三錢水一碗煎

三五沸通手洗瘡上用後藥摻之

聖効散

收斂瘡口

黃柏皮一兩去粗

炒赤色穿山甲一

兩

炒黃色

梔榔木香各半兩

右為末每用少許

候大膿出尽洗净方可乾摻瘡上

阿膠飲

一切瘧疽癰毒牛膠到蛤粉

炒成珠粉草各一

橘紅錢五分三帖水煎服

家藏神驗血竭膏

當歸酒洗白芷

大黃

黃連

黃柏

木別子去

火角

杏仁

露蜂房各一

乳香

沒藥

血竭各三

血余

一

飛丹

一

麻油

二斤

右除乳沒血竭餘藥入油熬焦去渣熬

至滴水成珠下丹將柳樹棍不住手攪軟硬適中入乳香等攪勻即成膏矣薛立齋云血竭取其以毒攻毒也若惡瘀已去毒氣既消宜用

神效當帰膏以其生肌續筋也

李氏云瘧疽不服內托散及失宣通內毒以致咽喉口舌生瘡甚則生紅黑菌管人甚速當用琥珀犀角膏治之向有患此症者諸法不効與此藥一日而安

琥珀犀角膏

真琥珀

犀角

辰砂

飛

茯苓

各三錢

冰片二分半

人參

三錢

酸棗

炒二錢

右為末煉蜜丸

彈子大每服一丸

麥門冬湯化下

李氏云瘧疽不服托裏之藥熱毒內攻喉舌生瘡甚至黑爛當服犀角散以解其毒

犀角屑

玄參

升麻

黃芪

赤芍

麥門冬

去心生粉草

當帰

各一兩

大黃

微炒三兩

右為粗末

每服三錢

水煎

薛氏云前方破血降火內疎之劑也若其脉沉寒大便秘結發熱作渴喜飲冷者屬熱蓄於內方可用之若其脉虛浮大便不結發熱作渴畏飲冷者乃屬血虛於外可用當帰補血湯若尺脉洪數而無力發熱作渴小便頻數者屬腎水不足虛火上炎宜用加減八味丸蓋此症多因腎

水虧虛火上炎故也

內托黃蓍丸

治針砭所傷惡寒發熱膿水不止

肌肉不生瘡口不斂

黃蓍

兩

川歸

酒洗
三兩

肉桂心

木香

沉香

乳香

各一

荳蔻末

四兩

右為末以姜汁打荳蔻末糊為丸白湯吞

薛氏云若肌肉傷而瘡口不斂用六君子湯以補

脾胃

若氣虛惡寒而瘡口不斂用補中益氣

湯以補脾肺若血虛發熱而瘡口不斂用四物

參木以滋肝脾

若膿多而瘡口不斂用八珍

湯或十全大補湯以養血氣經云脾主肌肉如前藥未應但用四君歸蓍以補脾胃更不應乃下元陽虛急用八味丸以壯火生土若脉數發渴者難治此真氣虛而邪氣實也

李氏云近有數人病背疽或先寒後熱先熱後寒或連日或間日必嘔痰大汗而止皆用紫胡恒山不應乃脾氣不正復感寒邪痰盛而作遂先用不換金正氣散次用排膿內補散木香湯三日而愈若外邪既去而仍嘔不止宜用六君

子湯以補脾胃○大亢胃氣虛而作嘔者必喜溫熱毒內攻而作嘔者必喜冷治當辨之

家傳不換金正氣散 治感冒風寒或傷生冷或

瘧癰或疫癘

蒼术

米泔浸炒四兩

厚朴

姜汁炒四兩

炙粉草

二兩

橘紅

三兩

藿香葉

半夏

姜制二兩

木香

溫酒一兩

人參

白茯苓

各二兩

右每服五錢加姜枣水

煎服二兩

亢疽愈後忽發渴而不救者十有八九或先渴而患疽者尤為難治急用加減八味丸可免前患如能久服永不作渴亦無疽症且氣血皆壯有

神劑也

薛氏云前症屬腎水枯涸虛火上炎口乾作渴飲水無度或舌黃作裂小便頻數或痰氣上壅煩躁不寧或二三年先作渴飲水或口舌生瘡兩足發熱多痰或瘡愈三年而口乾作渴小便頻數急用前藥多有復生者能逆知其因預服前丸可免此患若兼手足厥冷真陽虛也宜服八味丸大亢瘡後審其腎水不足用加減八味丸中氣虛弱用補中益氣湯氣血虛弱用十全大

補湯陽氣虛寒加姜桂如不應用八味丸

加減八味丸

熟地黃八兩乾山藥

山茱萸去核各三兩

五味子

炒各四兩

肉桂一兩

牡丹皮

白茯苓

右煉蜜為丸梧子大每服八十

九五更未言語前白湯下

黃蓍六一散

黃蓍六兩

粉草

半生半炙一兩

右為末每服二錢空心日午白湯調下不應作
大劑水煎服

薛氏云忍冬丸解熱毒消渴之藥也六一湯補氣

虛作渴之藥用之無有不驗

五味子湯

腎水枯涸口燥舌乾

五味子

麥門冬

各一兩

黃蓍

炒三兩

人參

二兩

炙甘草

五錢

右每服五錢水煎服

此方乃滋其化元之劑設腎水既涸虛火上炎
燥渴湏佐以加減八味丸

李氏云疽疾將安每日當服十全大補湯以補氣
血宜與排膿內補十宣散相間服

薛氏云潰瘍屬氣血俱虛補之固當若患腫瘍而

氣血虛弱者尤宜預補否則潰而不斂凡大病之後氣血未復多致再發若不調補必變為他症而危或誤以為瘡毒復發反行攻伐速其斃也深可戒諸

神効托裏散 治一切瘧疽發背腸瘧

黃芪炙水 忍冬葉 當歸各五錢 粉草二錢

右酒煎服渣敷患處 此乃托裏消毒之良劑

神効爪萎散 治乳瘡瘰疬與立効散相間服

黃瓜萎一株碎當歸尾 甘草節五錢 沒藥另研一錢

右用酒三碗煎一碗分三次服未成即消已成即潰

立効散 治瘧疽瘰疬

皂角刺半斤炒赤

粉草二兩

乳香

沒藥另末各二兩

黃瓜萎五個連皮研碎

右每服一兩好酒煎服

薛氏云二方治瘧疽瘰疬解毒止痛通用之良劑也若瘰疬寒熱煩痛腫赤乃肝經氣病當清肝火以養肝血若寒熱既止而核不消乃肝經之血亦病也當養肝血以清肝火若初如豆粒着

於筋肉色不变內熱口乾精神倦怠久不消潰
乃脾肝虧損當健脾土培肝木外臺秘要云肝
腎虛熱則生瘻矣病机云瘻癰不係膏梁丹毒
因虛勞氣鬱所致補形氣調經脉其瘻自消若
悞下之必先犯病禁經禁矣

綠雲散

治五發毒瘻於背腦或手足

此方治金石發疽果

有神効

鳳尾草

形如鳳尾葉背有金星久乾一兩

粉草

一錢

用酒一碗煎三五沸入冷酒一碗飲之以醉為
度立効

清涼膏

治一切瘡瘍膿去後用之

當歸

二兩

白芷

白芨

木別子

去壳

黃柏

乳香

白歛

白膠

各五錢

黃丹

淨五兩

麻油

十二兩

右入油煎黑去粗入黃丹以槐柳枝不住手順
攬再煎成膏乃下乳香等藥

碧油膏

止痛排膿炙後用此

蒼枝

柳枝

紫枝

槐枝

乳香

血竭各五錢

黃丹

淨四兩

右用麻油十兩照常法煎成膏入乳香等任貼
神効酒煎散 治一切瘡瘍其効如神

人參

沒藥 當歸尾 各一

甘草 括萎

一
生半
錢半
錢

右以酒三碗煎二碗分四服粗焙乾加當歸
一兩酒糊丸桐子大每服五十丸以酒下

三

消毒活血

經驗方 治金石發瘡

黑鉛一斤

甘草

三
兩

右用酒一斗置磁器內先以甘草置在一邊另
將鉛熔投酒一盞取鉛再熔仍投九度取酒飲
醉寢即愈

治瘡疽用生甘草為末酒調二錢服連進數服

消 前方乃清熱消毒之劑若曰膏梁積食者不宜
石蓄毒血氣壅滯者最宜如脾胃虛血氣滯
者不宜槩用恐胃寒故也

升麻湯 肺瘡胸乳間作痛嘔吐膿血腥穢

升麻 苦梗 以仁 地榆 黃芩 赤芍

丹皮 甘草 各等分水煎服

穀道前後生瘡謂之懸瘡 粉草一兩截斷以潤
水浸潤久令透內細剉無灰酒煎服有人患此
已破服兩劑瘡即愈

崔氏云治手足甲疽或因修甲傷肉或因損足成瘡潰爛上脚用瓦甌置鐵板上燬色赤如金者為真沸定取出研末以鹽湯洗搽之

薛氏云前症即脫疽也此方固有良驗尤當調元氣為善大抵此症先醇酒灸燻膏梁厚味傷脾或房勞虧損腎水故有先渴而後患有先患而後渴者若色赤作痛自潰可治色黑不潰不治色赤作痛者先用隔蒜灸活命飲托裏散再用十全大補湯加減八味丸色黯不痛者隔蒜灸

葉枝灸亦用十全大補湯加減八味丸則毒氣不致上侵元氣不致虧損庶可保生亦有因修手足口咬等傷者若元氣怯弱或犯勞事外塗寒涼內服耗伐損傷脾胃患處不潰色黯上延亦多致死重者湏解去當以腳力轉解周髀輕拽使筋隨骨出而毒得洩否則毒筋內斷仍上潰雖云無益且偏僻之處氣血罕到藥難導達況攻毒之劑先傷脾胃反損元氣不若灸法為良重者湏解毒為善故孫真人云在肉則剜在

指則截雖親之遺軀不忍毀傷然不如是則勢必至于天歿非休親之心也况患處已壞雖解不痛又何憚而不為乎女子亦有此患多因鬱怒虧損肝脾所致治法與前同

疔瘡

多生四肢發黃庖中或紫黑必先痒后痛先寒后熱也

疔瘡者皆臟腑積受熱毒邪氣相搏於經絡之間以致血凝滯注于毛孔手足頭面各隨五臟部分而發也其形如粟米或疼或痒以致遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚

眼花蓋疔腫初發時突起如疔蓋故謂之疔含蓄毒氣突出寸許痛痒異常一二日間害人甚速是尤在瘡疽之上也內經以白疔發于右鼻赤疔發於舌根黃疔發于口唇黑疔發于耳前青疔發於目下蓋取五色之應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處如在手足頭面及骨節間者最急其餘猶可緩也凡疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘刺令惡血出乃敷藥力方得入于針孔中則佳若

不刺破藥力不能入又看口中頰邊舌上有赤
黑如珠子者是也諸疔名目雖多其治法畧同
初起宜以針刺出毒血將蟾酥丸或廻疔錠子
之類從針孔縫入之上用膏藥貼之仍服飛龍
奪命丹發汗及五香連翹漏芦湯之類并清心
之劑蓋諸瘡皆屬心火心清則毒氣消散而易
愈矣

追毒丹 取黃去疔頭追膿毒立効

蟾酥

用酒化

蜈蚣

酒

硇砂

白丁香

各一錢無此朱加巴豆

雄黃

二錢

輕粉

一錢

硃砂

二錢

巴豆

七粒

不去油

右為末用酒打糊為丸麥子大兩頭尖入於針
破口內用水沉膏貼之後用膏藥及生肌藥追
出膿血毒物又有如黑陷漏瘡者四圍死敗肉
不去不生肌者不可治也亦用此藥追毒去死
肌敗肉生新肉愈矣小者用一粒大者功用之
病輕者不必用針只以手指甲爬動於瘡頂上
安此藥水沉膏貼之其瘡即時紅腫為度去其
敗肉為妙用之神驗

水沉膏 將白芨末放在盞內用水沉下去用帶貼之如用膏不可用生肌藥 凡用拈点之藥用此膏圍貼則不傷好肉

追疔奪命丹 能立取効驗使腫內消

羌活 獨活 青皮

君

防風

君

黃連

赤芍

細辛

甘草節

蟬退

姜桑

金線重樓

澤蘭

金銀花

各一兩

有膿加

何首烏

白芷

要通利加

青木香

大黃

梔子

牽牛

毒在下加

木瓜

各二錢

右每服五錢先將一貼加澤蘭金銀花各一兩
生姜十片同藥擂爛好酒旋之熱服不善酒者
水煎仍以酒水各一盞半生姜十片煎至熟服
之汗出為度病退再加大黃二錢煎熱取利一
兩次去餘毒為妙

此方以藥味觀之甚若不切然効速如神方不
失一百發百中如有別証再出宜隨加減治之
若心煩嘔吐加 甘草節一錢 荘豆粉一錢

水下 嘔逆惡心加乳香荳粉甘草湯下

飛龍奪命丹 治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便

痛已成者服之立愈此乃惡症藥中至宝病危者服之立安萬無失一係神人之秘方不可輕

忽

血竭一錢

蟾酥

乾者二錢酒化

乳香

沒藥

銅汞

硃砂二錢為衣各

雄黃三錢

輕粉五分

膽礆

寒水石

各一錢

射香

冰片各五分

海羊

二十一條即蝸牛

蜈蚣

一條酒炙去頭足

右為末先將海羊連壳研如泥

和前藥為丸葷大或加酒打麵糊每服二丸
先用葱白三寸爛嚼吐于手心男左女右將藥
包在葱內無灰酒三四盞送下避風處被蓋出
汗約人行五里許再以熱酒數盞催之以汗出
為度

服前藥二丸即消如汗不出重者再服二丸汗出
即効三五日重者再進二丸即愈 如疔走黃
過心者難治汗出冷者亦死 如病人不能嚼
葱搗碎裹藥以熱酒吞下 服此藥後忌服冷
水冷物黃瓜茄子猪魚鷄鵝羊溫麵一切發毒

動風之物不可食之及月婦狐臭人見之此藥活人萬全誠外科匙鑰

拔黃藥 用真取蟾酥飛羅麵為丸梧子大可將一丸放在面前舌下即時黃出

百二散又名護心散 治發疔煩躁手足不住發狂者

急宜服之

方在瘡門

蟾酥膏 治疔 新蟾酥以白麵黃丹搜作劑圓如麥顆大用指甲爬動瘡上挿入重者針破瘡頭用一粒內之仍以水沉膏貼

回瘡錠子

治疗瘡大妙

草烏頭一兩

蟾酥

巴豆

七箇去皮管射香字

右為細末麵糊和就捏作

錠子如有惡瘡透疔不痛無血者用針深刺至痛處有血出以此推之上用膏貼疔瘡四畔推之其疔二三日自然拔出此藥最宜緊用

此証大抵與傷寒頗類其中亦有可針鎌砭射出血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎也

內托連翹散 疗瘡出時皮色不变不疼痛按搖

不動身發寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫燕疔火疔諸般疔瘡如瘡黃于黃上用針刺仍服內托散自然消散 連翹 生地 白芷

赤芍各一兩 大黃 山梔去蒂頂 薄苛各七錢 朴硝二兩

黃芩五錢 甘草一兩 每服一兩灯心竹葉各十莖水煎服其人喘加人參少許大病只三四服愈如服下心煩嘔者以護心散止之

護心散

甘草五錢

茺蔚粉一兩

為末分作二次

酸蘿水下

破棺丹

治療走黃不止 川芎

赤芍藥

山梔仁

牽牛各二兩半

連翹

牡蠣

金銀花

紫花地丁

各一兩半

京三稜

甘草各二兩

大黃

三兩半

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸童便化開服

忌飲酒及生冷

治疗走了黃打滾將死者 牡蠣 大黃 木通

山梔子

金銀花

連翹

牛蒡子

地骨皮

乳香

沒藥

括萎

皂角刺

每服五錢

壯實者加朴硝用水一盞酒半盞煎服 此乃救

命仙方也

鐵粉散 治疔瘡經久不効用此大妙

多年生鐵

炒過
三錢

松脂

一
錢

黃丹 輕粉各五分

射香

一分

右為細末清油調塗瘡口立効

走馬赴筵丹 治疔瘡

沒藥

乳香

蓬砂

礮砂

雄黃

輕粉

各三
錢

冰片

一分

射香

右為細末蟾酥汁和為丸黃米大每服一丸溫酒送下立効

金砂散

取疔瘡道人頭

微炒
即蒼耳子

礮砂

三
錢

雄黃

三
錢

蟾酥

以多
為妙

右將瘡四圍刺破以少

油調藥末置於瘡內紺帛封之數日疔自出

蒼耳散

治一切疔腫神効

蒼耳草根莖苗子但取一色便可用燒存性研細末用好米醋米泔澄淀和如泥隨瘡大小塗上厚二分乾即易之不過十度即拔根出湏針破塗之加雄黃丸妙

蒼耳與白芨研爛貼疔上拔去根

毒氣入腹嘔

吐者搗蒼耳汁飲之立効

治疗最有効用蟬退僵蚕為末醋調塗四圍畱瘡口俟根出稍長然後拔去再用藥塗海藏方單用姜蚕為末津調塗亦佳

治疗危篤者二服即愈輕者一服立効

土蜂房一小窠全此能利大小便蛇蛻一條全用瓦器盛

鹽坭固濟火煅存性研為細末每服一錢空心好酒調下少頃腹中大痛止其瘡已化黃水矣仍服后方

五聖散 大黃一兩生姜 皂角刺 金銀花各二兩

瓜萎一枚甘草一兩用好酒二升煎八分不拘

時服

治疗瘡最驗 蒼耳 臭牡丹 各一大握搗爛新汲水調服鴻下黑水即愈 单用蒼耳葉搗汁和童便服一日三次立効

肘後方 疗腫垂死者 一服立効 菊花葉紫莖者

一握搗取汁一升入口即活此神驗根莖葉花皆可用

蒼耳散 治疗瘡累用神効 蒼耳根三兩

烏梅五箇帶鬚葱三根用酒二鍾煎至一鍾熱

服出汗後不散然後用勝金散

勝金散 取鐵秀炒為末每服四錢或三五六錢

用薺水滾過停冷調服不吐為佳

反花瘡

瘡有努肉凸出者是也

聖惠方治諸瘡努肉如蛇頭出數寸者硫黃末敷

之即縮

肘後方 治瘡有肉突出烏蚕燒灰敷立消

又方 白蚕肉杵細入蜜捏成餅貼之妙

又方 馬齒莧燒灰研末猪脂調敷

瘡突出寸許根如小荳或大如梅者用花脚蜘蛛絲纏其根則漸乾而自脫落

又方

甘草

半生炒

枯允

人中白

密佗僧分

右為細末以童便半盞用無灰酒和熬竹籃攪成膏塗瘡上日三五次

經驗方

胭脂丕

貝母

各三錢

胡粉

二半

白硼砂

沒藥

各二錢

為末先用溫漿水洗後服藥

雜瘡

諸惡瘡入心腹嘔逆藥食不下

茺蔚粉

半兩

乾胭脂

三錢

定粉

二錢

為細末新水調下効

天泡瘡通聖散及蚯蚓泥畧炒蜜調敷妙若從肚

皮起者裏熱發外速服通聖散

天行斑瘡湏臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉以蒜

薑啖之即止

人面瘡昔有人左脰有瘡如面歷試諸方惟後以貝母為末水調灌之數日乃結痂遂愈

足指內生鷄眼子用鷄胃中食揩之餘者以石

壓之立驗

天泡瘡小麥炒焦為末以生桐油調敷効若神速治一切瘡疥神異膏全虫

去尾七枚

洗

蛇床子

取末三錢

皂角

一錠

巴豆

去壳七粒

麻油

一兩

黃膾

半兩

雄黃

另研五分

黑色去粗入鍋化開取出俟冷入雄黃輕粉蛇床子末攪勻成膏每用少許搽瘡上湏先以苦參湯洗過絕妙

苦參湯

苦參

蛇床子

白礬

荆芥

各等分煎湯溫洗

治漏瘡不收口 五倍子末 血竭末填塞之効

治一切瘡葵花散

葵花

梔子

黃連

黃柏

百合散 治頤頬瘡一名獨骨瘡

百合

黃柏

百合各一兩

白芨

二錢半

草麻子

五十粒

為末朴硝水和餅

貼目三五次

面上耳邊生浸淫瘡久不愈出黃水

名香辨瘡

殺羊鬚

荆芥

乾棗

去核各二錢

俱燒存性研末入膩粉半錢每用少許清泊調
搽先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次効
亦治大人小兒兩脣生瘡

附子散

治冷瘡日夜發歇疼痛

附子

半兩炮去皮臍

川椒去目

雄黃

研末各二錢半

枯凡

七錢半

右為末麻油調敷瘡上日二次

白蒺藜散

熱毒瘡癰心神壅躁

白蘚皮

白蒺藜炒去刺

防風去根

川大黃

炒

赤芍葉

梔子

麥冬

荳芩

玄參

桔梗

前胡

炙甘草

各一兩

為末每服二錢食後薄苛湯調服

七寶散

熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃蓍

川歸 防風

荆芥穗

地骨皮

木通

各二兩明礬

一兩 每用一兩水煎五六沸去

粗稍執潔淋患處拭乾避風 東垣此方曾治推車客皮膚破裂不任痛兩手不能執轍足不能履地目製此藥與之即効明日遂行自是屢

用屢効

玉女英

治瘡痒痛

滑石

五分 茄荳粉

微炒四兩

右末之用綿包撲上妙 一方加東葉一兩

連翹飲 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血風赤斑圓點開爛成瘡痒痛流黃水

連翹

生地 川歸

括萎根

荆芥

黃芩

赤芍

麥冬 瞿麥

木通

大力子

炒

防風

山梔

川芎 甘草

各等分

每服五六錢水煎

加灯心二十莖不拘時服

紫花地丁散

諸惡毒瘡腫痛如神

川帰

紫花地丁 大黃 赤芍藥

金銀花

黃蓍

各半兩

甘草根

二錢

每服一兩水酒各一碗煎服

水銀膏

半兩

黃連末

二錢

胡粉

四錢

松脂

各半兩

豬脂

四兩

水銀

半兩

黃連末

二錢

胡粉

四錢

松脂

各半兩

豬脂

四兩

右先熬豬脂令沸入松脂諸藥及水銀攪令勻
磁器收先以鹽湯洗淨塗上日三五度

治甲疽瘡

半錢

綠礬

五錢

燒赤

半錢

盧會

一錢

射香

半分

俱為末以絹袋盛包患指扎定以差
為度

漆瘡

生鱣取黃塗之効

又方

湯浸芒硝冷洗之効

明礬湯洗亦妙

又方

生紫蘇擦之累効

又人乳汁敷之好

又方

乾荷葉一斤水一斗煮濃汁洗瘡上日

三

又方

無名異末水調服

代指

手指甲頭腫痛

烏龜肉

并仁研爛

醋調稀入指浸之愈

升麻和氣飲

治瘡腫癰疥瘡

升麻

桔梗研爛

荳朮

乾葛研

甘草

大黃研

各半錢

陳皮

當歸研

半夏

茯苓研

白芷

乾姜研

各半錢

只壳

各五分

白芍

一錢半

右作一服水煎服

當歸飲子

治瘡瘍疥癬濕毒風燥

當歸

川芎

防風

白芍

生地

蒺藜

荆芥

各一錢半

何首烏

黃蓍

甘草

各二錢

右作

一帖水煎食遠服為末亦可

除湿散

大治一切風毒疥癬癩痒狀如癩風

苦參

何首烏

荆芥穗

蔓荆子

各二兩

白芷

烏蛇

酒宿浸乾

天麻

川芎

防風

各二兩

右為末每服三錢酒調下日進三次六日一浴

令汗出血氣宣通一月膚澤如故

一掃散

一切瘡疥但相對而生者便是不問乾

溫痒痛日近年深用之立効

藜芦皮

二兩

雄黃

五錢

輕粉

帖十

蚌粉

水粉

各二兩

為末用大鯽魚一對入麻油煎熟

去魚搗冷調藥搽瘡若効遲加信末少許研

杏仁十粒近陰處勿加

消毒飲

丹溪云散氣表

藥也

消毒

防風

兩

甘草

二兩

荆芥穗

三兩

大力子

四兩

每服五錢水煎服

治皮膚風熱遍身生癰疹 大力子 漢萍等分

為末薄荷湯調下二錢日再

東垣云 每風瘡大風病相似好棄葉洗蒸一宿
日乾為末白湯調服二錢

姜黃散 治風遍身癰疹痛疼成瘡

白姜黃洗焙 為末每服一錢酒調服一日三

次立瘥

衍義方 有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連
腦脛膝腹及近陰處皆然涎痰多夜不得卧

苦參末一兩皂角二兩水一大升採取汁銀石
器熬成膏和苦參為丸如梧桐子大每服二十
丸溫水吞次日便愈

小兒面瘡通面爛無完膚膿水流漓百藥不効陳
年臘豬脂不入鹽者敷之若神

治諸般瘡疥加減法 腫多加白芷開鬱 痛多
加白芷方解石 痒多加枯矾 陰囊瘡加吳
茱萸溫多香油調 乾痒出血加大黃：連猪
脂調 重多加蕪荑錫灰換即藜芦斑猶 紅