

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十五

婦人諸疾門

血積氣痛

附論

明 周王 朱楠 撰



血積氣痛者惡血久積而成痛也其狀隱隱疔痛或成塊攻築或聚或散或沉或浮蓋氣痛則血行氣澀則血滯若月水不通產後惡露不盡或因他病使血不行背

致氣血凝滯血因氣聚蘊而成積久不去則為痛

方

當歸煎丸 治婦人血積血癖臍腹疔痛心膈滿悶四

肢煩疼口苦舌乾飲食減少漸成勞瘦

當歸

切

附子

去皮臍生用各半兩

深藥

研

碓砂

研

血碓

各一兩

禹餘糧

煨赤醋淬七遍

延胡索

各半兩

以上搗研為末同酒三升調勻於石器內慢火熬成膏

和後藥

芫胡

去苗 鼈甲

去裙襴醋炙黃

人參

乾地黄

焙

芍藥

磁

石

煨醋淬七遍

牡丹皮

各一兩

木香

一分 澤蘭

半兩

右將後九味搗為細末入前膏內和丸如跳豆大每

服二十九淡醋湯下空心食前服

桃仁散 治婦人因月水不通血積不散氣攻疼痛積

聚成塊

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒二兩

劉寄奴

去根劉碎

蓬莪茂

炮細劉

當歸

炙

藁香子

微炒

烏藥

劉

白朮

陳橘皮

湯浸去白穰

桂

去分

鹿皮木香 乾薑炮 附子炮裂去皮臍 芎藭 桑黃剉 高

良薑剉各一兩

右為細末每服二錢溫酒或醋湯調下空心晚食前服

當歸丸 治婦人血積臍下結塊痛如錐刺或下赤白月水不調腰背痛

當歸切焙 芍藥 吳茱萸湯洗焙乾炒 大黃炒 乾薑炒 附子炮裂去皮臍 細辛去苗葉 牡丹皮 芎藭各半兩 蟲蠹糯米

炒水蛭糯米炒各七十枚 桂去皮三分 厚朴去皮薑製 桃仁去皮尖 炒各一兩

右為末煉蜜和劑搗令勻熟丸如桐子大每服二十丸食溫酒下加至三十丸

地黃煎丸 治婦人因月水不調血結不通血疾小腹成塊如覆杯

生地黃肥細切研爛 生薑去皮研爛絞汁一斤 煎令如乾漆炒令烟出 桂鹿皮分 當歸切培 桃仁湯浸去皮尖雙仁麩

炒生薑地黃焙芍藥 牡丹皮 牛膝去苗酒浸

二大黃煨一兩半水蛭糯米炒 蝨蟲去翅足頭炒各一百

右搗羅後各味為末入煎地黃煎中以微火上煎鞭

軟得所眾手丸如桐子大每服七丸食前温酒下

延胡索丸 治婦人血臟久冷虛積氣攻心腹臍下疼

痛嘔逆痰涎不思飲食

延胡索米醋炙三分當歸切焙沉香剉各半兩木香 白朮

芍藥 青橘皮湯浸去白穰焙附子炮裂去皮臍去 吳茱萸湯浸焙乾

炒桂去皮分京三稜温紙裹煨別搗蓬莪茂剉炒

右以為末酒煮麵糊丸如桐子大每服二十九煎生

薑醋湯下日進三服不計時候

勝金丸 治婦人血積心腹疼痛氣刺氣脹攻築或經

候不行肢節煩疼逆痺塊

乾漆炒烟盡烏頭炮裂去皮臍 狼獾 京三稜剉碎炒黃

紫葳凌霄花是也 騏驎竭 沒藥 檳榔各半兩 硃砂同為末

砂 巴豆二十枚去皮心膜研去油 大黃單搗為末一兩 芫花單搗為末半兩

右先以醋二升熬大黃芫花二味末次下巴豆硃砂
 同熬稠其餘八味同搗細羅為末同熬成膏和劑如
 乾鞭少入煉熟蜜同和劑令得所丸如菘豆大每服
 七丸至十九當歸酒下

桃仁丸 治婦人月水不利血結成積氣攻疼痛

桃仁 湯浸去皮尖 澤瀉 白茯苓 去黑皮 芍藥 瞿

麥穗 用 乾薑 炮裂 生乾地黄 焙 甜葶 紙上炒 當歸 切焙 甘草

芎藭 灸 各一兩 大黃 剉炒一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心食
 前溫酒下米飲下亦得

增減四物湯 出蘭室秘藏方 治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地黄 廣茂 荆三稜

桂皮 去 乾漆 烟炒盡

右各等分為分鹿末每服三錢水二大盞如常食前

沒藥丸 治婦人腹內血結氣攻疼痛行經

沒藥 一兩研 桂 去分 當歸 切炒 芫花 醋炒半焦 乾漆 炒烟透各一半

兩

右搗羅為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九
溫酒下不拘時

沒藥丸 治婦人血氣血積堅癖血瘕發攸攻刺疼痛
嘔逆噎塞迷悶及血蠱脹滿經脈不行

沒藥 一兩 芫花 一兩
研 去滓不用將醋入石器內入硃砂

霜一兩巴豆七粒研細入附子臍生去皮 檳榔 一兩
醋內煎成膏入後藥末

木香 肉豆蔻 二枚 炮 當歸 劉 桂 去 分 華撥 各 一
去皮 焙 鹿皮

班猫 三十枚糯米炒令黃
焦去翅足別研細

右搗羅七位為末班猫沒藥研均入煎膏內和搗干

百杵丸如梧桐子大初服三九以醋炒之白令黑以

酒浸煎一兩服吞下漸加五九七九為度如急卒血

氣攻心脾以酒醋共一盞煎服吞下血瘕堅癖結塊

攻心疼痛悶亂久醫不效者即入禹餘糧一兩火煨

醋淬七遍為末和為末每服五九蘓木節三兩剉碎

酒三升煎至七合去滓分作三分每服下九子三九

併服三服即血瘕隨大小腸遂下其病立瘥人弱者
 每服只二九如是丈夫元藏小腸氣脾積氣癥塊等
 疾即入丹砂一兩細研和停以生薑鹽湯吞下三九
 硃砂丸 治婦人血塊攻築疼痛不可忍

硃砂研 沒藥研各一兩 粉霜半錢 乾漆炒烟盡半兩 乾薑炮 京

三稜炮各一兩 桂去分鹿皮 當歸剉焙各半兩 阿魏一分醋化入白麵少許作

并炙 木香一分

右為細末煮醋麵糊和丸如菘豆大每服十五丸淡

醋湯下或空心食前服

薑黃散 治婦人冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能
 食面無顏色

薑黃 白朮各八兩 生薑去皮細切三升 當歸切十兩 陳麴末

大麥蘖末各二升 生地黃細切三升 桃仁去皮尖雙仁 杏仁去皮

尖雙仁 青橘皮湯浸去白切三升

右為末白搗如泥水甑中鋪勻以麵封之勿使洩氣
 蒸熟并甑置屋下三日取出藥暴乾搗羅為散酒服

方寸七日二服取利為度十日內忌生冷難消化物
過十日百無所忌若煉蜜為丸亦得每服三十九酒
下再服

大黃丸 治婦人月水不通結堅痂如石腹脹血積不

散

大黃剉 砂石熬沸研細 蜀椒去目及閉口 代赭別

乾漆炒烟 芎藭 赤茯苓去黑皮 乾薑炮 蟲蟲去翅

頭炒各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心食前溫酒
下米飲亦得漸加至三十九

芍藥湯 治婦人血積氣攻心刺疼痛不已面黃體瘦

經水不調

芍藥 芎藭 當歸切 防風去 桂去分鹿皮 甘草

炙 生薑地黃焙各 枳殼去穢 白朮各半

右分鹿搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服經
水久不利煎成取入芒硝半錢稍熱服

血竭散

出瑞行堂方

治婦人臍下血積疼痛

血竭

乳香

沒藥

研別

白芍藥

水蛭

射香

已上各一分

虎骨

炭灰炙盡黃不六卜

右為極細末每服三錢空心調酒下

硃砂丸

治婦人年久血積塊攻刺疼痛不可忍或嘔

吐不盡飲食面黃怠惰

硃砂

去尖石者

當歸

切焙

芫花

醋炒微焦

蓬莪茂

炮半

木

香分巴豆

三十粒去皮心膜出油盡

右先研硃砂巴豆沒藥如粉用米醋三升同煎為稀

膏後將四位搗羅為細末入在前膏內淡成劑瓷合

成用時丸如梧桐子大每服七丸看患虛實臨時加

減用酒醋各半盞同煎數沸通口服不得嚼仍須用

飲盡酒醋立瘥

沒藥丸 治婦人血氣積腹協有堅癖攻尋疼痛不思

飲食

沒藥

研別

硃砂

研別

木香

當歸

剉焙各半兩

五靈脂

二兩半

右搗羅三味為末入二研藥銀器內以酒各半盞同熬成煎瓷合盛勿透氣每服旋取一櫻桃大熱酒化下不計時候日可三二服如不飲酒醋湯化下

當歸丸 治婦人虛冷血氣及血積隱隱疔痛血塊攻築疼痛

當歸 切 延胡索

各一兩

沒藥

研

麒麟竭

硃砂

研各三分

右為末合研勻用狗膽和丸如梧桐子大每服十丸加至二十九醋湯或溫酒下

狗膽丸 治婦人血氣

狗膽

一枚入巴豆七粒空罇後掛三七日乾用

木香

丁香

硃砂

槐花 各半兩

右為細末煉蜜丸如棗豆大每服二丸血風虛腫氣

急煎薄荷酒下兒枕不散疼痛不可忍煎醋湯下產

後通身走注疼痛蓮花湯下吐血不止刺根入小便

送下血塊桂心酒下血遊蓖麻湯下熱疾地黃酒下

敗血衝心蒲黃酒下

青金丸 治婦人血積氣攻衝心腹疔痛吐逆不下食
前發作神思昏悶四肢逆冷

五靈脂 二兩取細末一兩 硝石 一分同研 班猫 不叫者去翅與糯米同炒

取一分
為末

右同研令勻滴水丸如豌豆大每服七丸煎生薑醋湯下嚼不計時候服甚者再服愈

秘傳降香湯

出衛生家寶方

治血氣攻刺如鑽針所刺痛不

可忍及一切敗血成積無藥可療者服之即愈

真降香 錢一 沒藥 錢一 麒麟竭 錢一

右為末每服一錢磨真降香溫酒下立止

穿山甲散

出楊氏家藏方

治婦人血積氣塊往來刺痛經脈

欲行腹腸疼痛寒熱肌肉消瘦

當歸 洗焙乾 漆 米醋炒 穿山甲 石灰炒 乾薑 炮

右件各等分為細末每服二錢溫酒調下食前

治一切血氣

出本草

以蚶殼燒以米醋三度淬後埋令壞

醋膏丸服之

瘀血 附論

夫瘀血者由經水蓄聚或產後惡露不盡皆本衝任氣
虛風冷所乘不能宣故血瘀也瘀血不去結痼成積則
遂令人面黃瘦煩渴增寒腰腫重痛久變癥瘕

方

調榮湯 治瘀血不消臍腹引腰背俱痛

- 川芎 當歸 芍藥 生薑 地黃 三稜 茂朮
- 白芷 延胡索 蒲黃 香附子 澤蘭 細辛

- 川白薑 厚朴 製各三分 辣桂 三分 桃仁 湯浸麩二分 半夏 製

甘草 炙各三分

勝金丸 治婦人久積瘀血在腹內疼痛不可忍

- 水銀 二分 硫黃 一兩已上二味同 棧櫚皮 燒灰 乾漆 搗碎

- 炒令烟出 鯉魚鱗 燒灰 自然銅 細研 麒麟竭 已上各一兩 狗膽 一枚

- 乾當歸 一兩微炒炙 延胡索 半兩 蝨蟲 一分微炒 水蛭 一分

- 炒令微黃 烏蛇 皮炙微黃 桂心 半兩 亂髮 一兩燒灰 沒藥 半兩

右為末研令勻以酒煮麵糊丸如梧桐子大每服不

計時候以熱酒下十九

騏驎竭丸 治婦人經絡痞澀腹內有瘀血疼痛不可

忍

騏驎竭兩半 沒藥兩半 硃砂用狗膽內浸一七日 乾漆搗碎炒令烟出 芫

花醋拌炒令乾 延胡索 川烏頭炮去皮臍 白附子各半

兩當歸微炒 砒霜兩半 伏龍肝兩 蝨蟲炒去皮 水

蛭微炒 巴豆紙裏壓去油 紅藍花兩

右為末用生鍼銚子內入頭醋一升先下硃砂攪勻

然後下藥末一半用慢火熬如膏後入餘藥末和丸

如小豆大每服不計時候熱酒下五丸

當歸丸 治婦人經絡澀滯致有瘀血在臍結聚欲或

癥塊

當歸一兩半 鼈甲半兩塗醋炙令 琥珀兩半 桃仁一兩

去皮尖雙仁 川黃連對碎 菴間子 牡丹 水蛭

三分 芎藭 桂心已上各半兩 蝨蟲三分炒微 牛膝去苗

赤芍藥

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服日空心用熱酒下二十九

蟲蟲散

一名桃仁散

治婦人臟腑宿冷經脈不利腹中有

瘀血攻刺疼痛方見本門癥瘕積聚一塊

川當歸散 治榮衛消瘀血出聲音治痰嗽

川當歸 牡丹皮 白芍藥 子苓 木通 華陰

細辛 麥門冬 甘草 各半 生地黃 一兩

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

地龍散 治婦人血氣不調腹中積瘀血疼痛

地龍

一分 微炒 蜴蜥 炒

芎藭

桂心

各一兩

乾薑

炮半兩

蘓

枋木

一兩 剉

木香

蒲黃

牡丹

赤芍藥

水蛭

炒已上 桃仁 一兩 去皮尖 雙仁麩炒黃

右為細散每服二錢食前溫酒調下

烏金散 治婦人臟腑風冷宿有瘀血不消令黃瘦羸

困

鯉魚鱗

三兩 亂髮

二分 槐莢

三分 桑莢

三分 蟲蟲

一分 水蛭

一分

川大黃 一兩 剉碎 硃砂 芫花 牛膝 去苗各半兩

右藥並入磁餅子內用瓦子蓋以鹽泥固臍候乾以大火煨令通赤慢慢去火候冷取出入射香二錢同研令細每服空心熱酒調下二錢

敗蒲湯 治婦人因血澀內瘀不散疼痛

敗蒲 燒灰 當歸 各二兩 牡丹皮 芍藥 赤芍藥 各一兩

豉心 一各 桃仁 湯浸去皮尖 陳橘皮 去白焙 蒲黃 紙上

炒半兩

右分鹿搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入地

黃汁一合朴硝一錢溫服

硃砂丸 治婦人瘀血在臍攻心腹時痛四肢黃瘦夜

卧心煩

硃砂 硫黃 與硃砂同結 芫花 醋拌炒 深藥 水

蛭黃 炒令 當歸 剉碎 川大黃 剉碎 牡丹 蟲蟲 炒令黃

各半兩

右為末入砂子研令勻煉蜜搗三二百杵丸如菉豆

大每服空心熱酒下五丸

桃仁湯 治婦人經水否澀因冷血瘀不通結積臍腹

為氣痛面黃體瘦

桃仁 大黃

生用各一兩

桂 當歸

去分鹿皮三分切焙各

甘草

炙半

兩 蟲蟲

去頭足

水蛭

炒焦各十枚

右分鹿搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓下芒

硝半錢勻空心日晚再服

芫花散

出聖惠方

治婦人腹中宿有瘀血結聚不散疼痛

芫花

醋拌一兩炒令乾

川烏頭

一分炮裂去皮臍

鬼箭羽

蟲蟲

炒去翅足 水蛭

炒微黃

桃仁

已上各一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為細散每服食前用熱酒調下

芎藭湯 治婦人經水不利血瘀不消

芎藭

大黃 生各用一兩

荷葉

燒灰三七枚

桂

去分鹿皮

菴間子

各一兩

右分鹿搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞入朴硝

一錢去滓空心溫服

大黃湯 治婦人血瘀不消及撲損瘀血

大黃生用桃仁湯浸去皮尖桂鹿皮分生乾地黃焙一兩

郁李仁去皮研半兩

右分鹿搗篩每服三錢水酒各半盞同煎至七分去

滓溫服

治婦人臟腑瘀血氣脹頭疼咽乾胃中妨悶食即嘔逆

臍下滿疼四肢無力萎黃瘦弱宜服此出聖惠方

亂髮 釜下墨 桂心 神麴微炒已上 射香

右為細散每服空心以熱酒調二錢

桃仁丸出聖惠方 治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或

來心腹滿急

桃仁二兩湯浸去皮尖 雙仁麩炒微黃 蟲蟲四十枚去翅足 川大黃二兩

剉碎 水蛭四十枚炒微黃又

右為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服以熱

酒下十五丸一方有當歸無大黃每服十粒米飲下

琥珀散 治婦人經絡否澀腹內有瘀血疼痛不可忍

琥珀半兩 沒藥半兩 生地黄半斤

右除地黄汁外三味和勻每服二錢水酒各半盞煎至七分入地黄汁二合再煎數沸去滓溫服不拘時候

燒鹽酒出真指方 治血閉腹痛產後瘀血腹痛

右以新布數重包裹白鹽一合炭灰存性研細溫酒調下即用青麻布能逐瘀血治破腹中惡血背下殺蟲

右用馬鞭草生搗水煎去滓煎如飴空心酒服一匙

地榆散出家藏經驗方 治敗血

何首烏 肉桂 地榆 香白芷

右各等分爲分鹿末每服二錢米泔一盞半沙糖一小塊煎至八分去滓服空心食前余肉子在吳興忽苦此用王克明翰林調至三服而止即厚酌之

消瘀血出本草 以生地黄搗傅心腹上

治婦人敗血甚佳出本草 以馬藍焙搗下篩酒服一錢

消瘀血不散 出本 草

以生藕汁飲之

療瘀血 出本 草

以琥珀刮屑水服之

治瘀血不散變成癰 出本 草

右搗生菴簡蒿取汁一升服之

除腹中宿血 出本 草

以乾柿多食瘥

破宿血 出本 草

用磨石燒赤熱投酒中飲之

破宿血 出本 草

以紫荊木濃煮服之

瘰癧 附論

夫婦人瘰癧者本因邪氣積聚而生也瘰者在腹內近

臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣減弦之狀多者弦氣也瘰者為僻側在兩肋之間有時而痛故曰瘰也夫瘰之與瘰皆陰陽不和經絡痞隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則作疼痛故曰瘰瘰者也

方

昆布丸

出本 金方

治婦人胸中伏氣方

昆布

海藻

芍藥

桂心

白石英

款冬花

桑白皮 人參各二兩 栢子仁 茯苓 鍾乳 紫

苑 甘草炙 乾薑一兩 吳茱萸六銖 五味子 細辛

各一 店人收百 橘皮 蘓子各五

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服二十九再加四十

丸

四等丸出聖 治婦人瘕癖氣心腹疼痛飲食不消宜

服

川大黃一兩到 訶梨勒皮 檳榔 木香已上各

右為細末以酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服食前

生薑橘皮湯下十五丸温酒亦得又方出聖

附子一兩 桃仁一兩 雙仁一兩 麩一兩 炒黃色 芫花一兩 醋拌

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每日食前以生薑

湯下十九

又方出聖

鼈甲一兩 塗醋炙 川大黃一兩到 京三稜一兩 炮裂

右為末以醋煮麵糊丸如梧桐子大每服食前以生

薑湯下十九

木香 硃砂丸 出濟生 投粹

治婦人瘰癧積聚血塊刺痛脾

胃虛寒宿食不消久不瘥

丁香 硃砂 研 木香 官桂 附子 炮 乾漆 炒烟 盡

細墨 大黃 到炒 為末 乳香 研 廣茂 青皮 京三稜

巴豆霜 減半 沒藥 研 猪牙皂角 乾薑 炮各 等分

右除硃砂乳香沒藥外同為末以好醋一升化開硃砂去子滓銀器中慢火熬次下巴豆霜大黃熬成膏

將前藥末與膏子為丸如麻子大每服三十五丸食後溫水送下加至大便利為度一方溫酒下

牛李子丸 出聖 惠方 治婦人瘰癧氣每發攻心脇疼不能

食

牛李子 三兩半生用 一半微炒 蝙蝠糞 一兩 微炒 川烏頭 三分半 製去皮

臍 川大黃 一兩到 碎微炒 葳靈仙 三分 京三稜 一兩 炮到 桃仁

三分去皮尖 雙仁麩炒 青橘皮 三分湯 浸白去 檳榔 一兩 射香 一分 牛膝

三分 赤芍藥 三分 琥珀 一兩 細研 阿魏 一分 面裏 煨然為度

右為末以乾漆三兩為末用醋二升熬成膏和末藥
搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前熱
酒下三十九桃仁湯亦得

木香散 出聖惠方 治婦人疝瘕心腹痛不欲飲食宜服

木香 三分 檳榔 各半 蓬莪茂 各半 京三稜 三分 延胡索

當歸 劉微炒 芎藭 各三分 桃仁 一兩去皮尖雙 牛李

人 琥珀 桂心 麝香 研以上各三分

右搗細羅為散每服不計時候以熱酒調以一錢

治婦人無故憂患胸中迫塞氣不下方 出千金方

芍藥 滑石 黃連 石膏 山茱萸 前胡 各

兩六 大黃 麥門冬 細辛 生薑 各一兩 半夏 八

銖 桂心 兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十九加至三十

九日三服

麝香丸 一名大麝香 治婦人疝瘕冷氣兼疰氣心服

痛不可忍

麝香半兩 別研 阿魏一分 煨令黑 五靈脂 桃仁 三稜

各三分 芫花醋炒 檳榔各一兩 茂茂 桂心 沒藥 木

香 當歸各半兩

右為末入麝香令停用粳米軟飯為丸如梧桐子大
每服十九無時淡醋湯下一方淡薑湯下

桃仁散出聖惠方 治婦人疝瘕氣令人羸瘦寒熱食少

桃仁半兩 湯浸去皮尖 柴胡一兩 去苗 檳榔三分 厚朴三分

去分鹿皮塗生 薑一分 塗醋炙令微黃去裙襴 殼三分 麩炒 烏

梅肉三分 炒 赤芍藥三分 白朮三分 甘草半兩 炙 川大黃

一兩 判碎微炒

右件藥搗分鹿羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食前稍熱服

大黃丸出聖惠方 治婦人疝瘕氣多疼痛

川大黃一兩 判碎微炒 麝香一分 細研 硃砂三分 細研 京三稜一兩 醋拌

微炒巴豆一分 去皮心 研紙裏壓去油 川烏頭三分 去皮臍 桂心三分 當

歸三分 微炒 木香三分 檳榔三分 乾薑三分 炮裂

右件藥搗羅為散煉蜜和搗三二百杵丸如小豆大空心及晚食前以粥飲下五丸以利為度

京三稜丸 出聖惠方

治瘧瘵氣攻腹脇妨痛面黃羸瘦少

力不飲食

京三稜 三分微炮裂 鼈甲 三分塗醋炙 木香 三分桂心兩

川大黃 一兩到碎微炒 檳榔 三分訶梨勒三分煨 當歸 半兩到微

炒 芎藭 兩半 郁李仁 三分湯浸去皮微炒

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大食前粥

飲下三十丸

鼈甲丸 出聖惠方 治婦人瘧瘵及血氣不調或將臍腹撮

痛

鼈甲 一兩塗醋炙令微黃去裙襴 川大黃 一兩到碎微炒別搗為末 京三稜

一兩 附子 一兩炮去皮臍 木香 一兩乾漆一兩到微炒別為末 當歸 一兩

炒 琥珀 沒藥 各一兩 枳殼 一兩麩炒微黃去穰

右為末以陳頭醋二升先煎鼈甲大黃末成膏入諸藥末和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候

熱酒下二十九

當歸散

出聖惠方

治婦人疝癖氣攻心腹痛飲食不思

當歸

三分剉微炒

木香

兩半

京三稜

一兩炮剉

陳皮

兩半 郁李仁

吳茱萸

一兩湯浸七遍焙乾微炒

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒

右件搗分鹿羅為散每服三錢水一中盞煎至六分

去滓不時候稍熱服

枳殼煎丸

出聖惠方

治婦人火疝癖氣嘔吐酸水腹痛面

色萎黃不能飲食

枳殼

三兩麩炒微黃去穰搗羅為末以米醋三升慢火熬

五靈脂

一兩 川大黃

一兩微炒

蓬莪茂

一兩 訶梨勒皮

一兩 當歸

一兩 本香

一兩

右為細末入前煎中和鎔為丸如梧桐子大每服食

前生薑湯下十五丸漸加至二十九

蓬莪茂丸

出聖惠方

治婦人疝癖氣兩脇妨脹或時疼痛

不欲飲食宜服

蓬莪茂

三分 葶藶

兩半

芫花

一兩醋拌炒令乾

京三稜

三分微炮 神

麩一兩炮 木香兩半 麥蘖一兩炒 鼈甲一兩塗醋炙

麝香一分
研細

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服不計時候熱酒下二十九

麵碁子 治婦人血氣癖積臟腑疼痛泄瀉

小麥麵兩四 肉豆寇去殼為末 葶撥為末 胡椒末 蜀椒去目并開

口炒出汗 各一錢半

右拌勻以和水作碁子用精羊肉四兩切炒令乾下

水五升入葱薤白各五莖細切依常法煮肉以鹽醋調和候熟濾去肉將汁煮碁子空服熟食之

半夏厚朴湯出干金方 治婦人胸滿心下堅咽中帖如炙

有肉嚙吐之不出咽之不下

半夏一升 厚朴三兩 茯苓四兩 生薑五兩 蘓葉二兩

右以水五升煮四升分四服日三夜一不瘥頓服一方無蘓葉生薑

沒藥散

沒藥 一兩 芎藭 一兩 鼈甲 二兩 醋炙令黃去裙襴

右為細末每服不計時候以熱葱酒調下

白朮猪肚粥 治婦人腹脇血癖氣痛衝頭面煖煖嘔

吐醋水四肢煩熱腹脹

白朮 二兩 檳榔 一枚 生薑 切炒一兩半

右分鹿搗篩以猪肚一枚治如食法延滑內藥於肚

中縫口以水七升煮肚令熟取汁入粳米及五味同

煮粥空腹食之

半夏不飭方 治婦人痰癖血氣口吐酸水

大麥麵 四兩 半夏 湯浸洗去滑盡 桂 去分鹿皮一錢為末

右同以生薑汁并米醋少許和切作不飭熟煮如常

法空心食之

治婦人患癖按時如三五筒而作水聲殊不得寢食常

心悶 出千金方

右同牽牛三升治下篩飲服方寸匕日服三十九服

後可服好硫黃一兩

治婦人氣方

出千金方

右取平日一服烏牛尿一止

神效方

出大全良方

治婦人瘰癧及血氣等

右以獾猪肝一具可及十兩者用巴豆五十枚去大皮剝在肝內用醞醋三碗火熬令乾爛熟入砂鉢內研極爛入京三稜末和就得所丸如梧桐子大每服五丸食前熱酒下

夫瘰癧瘰癧血氣塊硬發渴刺痛甚則欲死究而言之皆血之所爲僕嘗治一婦人血氣刺痛急不可忍甚而死一二日方省醫巫并治數年不愈僕以葱白散烏鷄丸遂安又甚而死婦人血氣作苦如一小盤樣走注射痛令一人伏定方少止亦用此二藥而愈尋嘗小人血氣用此二藥亦有奇效故錄於后

小烏鷄煎丸

出大全良方

治瘰癧瘰癧氣血塊硬發血刺

痛甚則欲死或塊如小盤每作痛要人伏定方少止數年不愈者與葱白散間服神效方見婦人諸疾門雜病

類

葱白散

出大全良方

專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣

攻衝疼火治婦人產前後痛胎不安或血利痛者兼能治血臟宿冷百節倦疼肌膚怯弱勞傷帶癖久服盡除但婦人一切疾病最宜服之

川芎

當歸

枳殼

厚朴

桂心

乾薑

芍

藥

船上茴香

青皮

苦楝子

香木

熟地

黃

麥牙

三稜

莪茂

茯苓

神麩

人參

各等分

右為細末每服三平錢水一盞連根葱白二寸拍破鹽半錢煎至七分溫服內大黃訶子宜相度病狀如大便不利入大黃同煎却不入鹽如大便自利入訶子煎朱先生云此藥大治心氣脾痛用之見效僕嘗以此藥治浮腫立効陳宜人病血氣作楚痛不可忍服諸藥無效召僕診之兩關脈弱為肝脈沉差緊此血氣漸成痿痺也只此二藥安愈四明馬朝奉後院

亦病此用二藥愈

治血運血結或聚於胸內或偏於小腹或運於脇出保命集

方

右用四物湯四兩焙

當歸 川芎 鬼箭 紅花 玄胡 各一兩 同為分

鹿末如四物湯茶清調服

沒藥散 出保命集方

蟲蟲 去翅足 微炒 水蛭 三錢 炒 麝香 少許 沒藥 一錢

右為細末煎藥另服血下痛止只服前藥

治女子血氣破痲痺冷氣心痛 出本草

以蓬莪茂用酒醋摩服效

乳癰 附論

足陽明之脈自缺盆下於乳又衝脈者起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至胸中而散蓋婦人以衝任為本若失於調理衝任不和陽明經熱或為風邪所客則氣壅不散結聚乳間或鞭或腫疼痛有核皮膚愀赤寒熱

往來謂之乳癰然風多則腫鞭色白熱多則腫愀赤若不即治血不流通氣爲留滯與乳內津液相搏腐化爲膿大凡婦人乳癰此非小病蓋婦人肺在前近乳故也懷娠發乳癰此却無害此蓋氣血凝滿而成纔產後便可愈又有產後發乳癰者此乳道蓄積不去因氣逆而結成塊宜常令擠乳汁令通便可愈也又有產後爲小兒口中呵吹以致結如桃核漸次浸長至如拳如餅堅硬如石數年不愈將來潰破則如開石榴之狀又反

轉外皮名審花孀年四十以下間有可治者五十以上有此決死如未破已前不如不治以聽其終天年不可不知於其右手關上脈沉則爲陰虛者則病癰乳久不瘥則變爲漏男子以腎爲重婦人以乳爲重上下不同而性之根一也坐草以後風邪襲虛榮衛爲之凝滯與夫嬰兒切未能吮乳或乳爲兒輩所吹飲而泄或斷乳之時稔出不盡皆令乳汁停蓄其間與血氣搏始而腫痛繼而結硬至於手不能近前乳癰之患成矣乳癰一

名妬乳惡寒後熱煩燥大渴是其證也甚則嘔吐無已
咽隔窒礙何耶蓋胃屬足陽明經實通乎乳血熱入胃
嘔吐何疑或者又能溫散妄以寒涼踈轉之劑行之即
便癰毒自外入裏嘔吐尤甚其咽隔妨礙者毒氣上衝
所致也生薑甘桔湯最爲咽間要藥乳粉托裏散最能
返出毒氣一香散加瓜蒌根止嘔止渴兩得其便也更
以萬金醉膏佐之能事畢矣雖然渴而過飲水入腸胃
必至下利醫理失節久而不瘥必成漏瘡又不可不妨

者也 產後不自飲兒并失兒無飲乳乳蓄常結癰不
飲飲兒令乳上腫者以鷄子白和小豆散傅乳房令消
結也若飲兒不泄者數捻去者亦可令小孩含水使口
中爲潮取滯乳汁吐去之不含水嗽去熱善令乳頭作
瘡乳孔塞也 產後宜勤去乳汁不宜蓄積不出惡汁
內引於熱則結硬堅腫牽急疼痛或渴思飲其嬾手近
不得若成膿者名妬乳乃急於癰宜服連翹湯利下熱
毒外以赤小豆末水調塗之便愈或數捏去乳汁或以

小兒手摩動之或大人含水漱之得汁吐之其汁狀如
膿若產後不曾乳兒蓄積乳汁亦結成癰 凡婦人乳
癰發痛者亦生子心也俗呼吹爛是也吹者風也風熱
結於乳房人之間血脈凝注久而不散潰肉為膿宜用
益元散生薑湯調下冷服或新水水時時呷勿輟晝夜
可三五十次自解矣或煎解毒湯頓服之

方

治乳癰方 出千金方

麥門冬一升 黃芩 芍藥 茯苓 各二兩 桑寄生 人
參 黃耆 防風 甘草 各二兩 粘糖 八兩 大棗 五枚
右呔咀以水一斗煮取三升去滓內糖一沸分作四
服

又方先服前件湯五日後服此丸即愈

方 出千金方

天門冬 五兩 澤蘭 五兩 大黃 十分 升麻 六分 羌活 桑寄生
防風 人參 黃耆 乾地黄 白芷 通草

黃芩 枳實 五味子 茯苓 天雄 芎藭

當歸 各一兩

右為末蜜丸酒服二十九加至四十九

麥門冬九 治乳癰先用諸湯藥塗傳榻後服此

麥門冬 去心二兩 木通 人參 五味子 黃耆 羌

活 去芦頭 防風 去苗 生乾地黄 焙 黃芩 去黑心 桑寄生

茯苓 去木 天雄 炮裂去皮臍 升麻 澤蘭 各半兩 枳殼 去穰炒

大黃 各三分

當歸 一分

右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服空酒下二十九

漸加至三十九以瘥為度

托裏散 出衛生家室方 治乳癰極妙

甘草 一兩 當歸 一兩 天羅 不炒絲瓜是也 瓜蒌 不炒紫色 皂角刺 十四

炒九個

右為細末每服二錢酒調下

治爛結硬 出朱氏集驗方 凡末成瘡纔覺腫硬作痛

右以葱早熨之其法用中樣小海味瓶口寬者以炭火入瓶內上以熟灰填滿平瓶口以葱葉及葱白槌損令覆瓶口以手帕子裏定致熱將瓶口以葱向腫處任意輕輕慰之有驗

芎藭丸 出聖惠方

治婦人乳癰穿穴膿水不住年月遠深

蝕肉傷筋或時碎骨瘡中自出肉冷難生疼痛不可忍

芎藭 二兩 當歸 半兩 桂心 黃耆 沉香 安息香 各一兩

附子 半兩 皮 兩 去 白芷 麒麟竭 丁香 各半兩 木香 一兩

枳殼 羌活 赤芍藥 各半兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心午晚食前以甘草酒二十九

蕤蓉 微炙 鐵精 桂心 去皮 細辛 去苗 黃芩 去心 黑 人參 防己 一作防風 乾薑 芎藭 當歸 各三分 甘草 五分

右治下節酒服方寸七日三夜一服藥十日膿血出多勿怪

葶藶散 出聖惠方 治婦人乳癰瘡腫愀熱疼痛宜用散毒

氣

甜葶藶 一兩 赤芍藥 三兩 白芷 一兩 丁香 三分 黃耆 一兩 羊桃

皮 一兩 硝石 三分 半夏 一兩 湯浸 七遍 去滑 白劍 一兩 莽草 半兩 木香

一兩 木鼈子 一兩 去殼

右為細散用酸漿水調和令勻攤於故帛上貼之

麥門冬湯 治乳癰初有異于常則先用此藥散化毒

氣

麥門冬 去心 二兩 黃芩 去黑心 一兩 桑寄生 剉下 兩半 甘草 炙令

木通 防風 去叉 赤茯苓 去皮 芍藥 妙 黃耆 各一兩 人參

一兩半

右分鹿搗篩每服三錢七水一盞入乳糖一分棗三

枚擘破同煎至七分去滓溫服三日早晨午時至晚

各三服一方無木通

治乳癰黃耆白芷膏塗方

黃耆 白芷 大黃 當歸 續斷 各一兩 薤白 二兩

切松脂二兩乳香兩半蠟兩猪脂二個生地黄汁三合

右取前五味剉碎以地黄汁拌勻先熬脂令沸下諸藥煎白芷赤黑色鹿出下蕪白松脂香蠟煎候鎔盡以棉布絞去滓瓷合內盛取塗傅乳脂三四度即瘥一方無乳香

大黃散出聖惠方治婦人乳癰經年腫破如石不消宜貼

川大黃 當歸微炒赤芍藥 黃香 芍藥 防風

去苗黃連去鬚莽草 梔子仁已上各一兩賦粉一兩乳香兩半

右為散細入粉和勻以鷄子白并蜜調令勻塗帛帛

貼乾即易

當歸散出聖惠方治乳癰堅硬如石腫痛

當歸 芍藥 人參 枳殼去稜一兩麩炒黃耆炒蒺藜

子去角附子去皮鷄骨各一兩薏苡仁半兩桂去鹿皮一兩半

右搗羅為散每服二錢以溫酒調下日三早晨午時至晚各一服一方用枳實

地黃湯 治乳癰

生地黄汁合一射干 升麻 黃連 芒硝 白劍

梔子 大黃各半 甘草 當歸各一

右九味碎剉以水五升煎至三升去滓下地黄汁更

煎三五沸以故帛二片浸藥汁更 搗腫上一二度

再煖用即瘥

治婦人乳腫不消出聖 惠方

川大黃 莽草 伏龍肝各三分

右為細散入生薑汁半合入少醋和塗乳上乾即再

塗

治乳癰初作腫痛出聖 宜方

貝母 天花粉

右等分為末酒調服

木通散出聖 惠方 治婦人乳癰成瘡腫膿水疼痛不可忍

木通一兩 黃耆二兩 玄參一兩 沉香三分 赤芍藥二兩 子芩

一兩 敗醬 一兩 露蜂房 一兩 漢防已 一兩 川朴硝 二兩

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時候

温服

又療乳癰初覺有異出大全良方

黃芩 甘草 防風 赤芍藥 黃耆各五兩 通草

十分桑寄生 麥門冬各六分 大棗五枚

右細切以水一升煮取九合去滓入乳糖六分分爲

四服

枳殼散 治乳癰堅硬

枳殼去稜芍藥 人參各一兩半 黃耆 鷄骨炙 木通

當歸 桂去白皮 蒺藜子去壳

右搗羅爲散每服二錢温酒調下日三服

療乳癰出大全良方

用黃丹一分細研末以鷄子白調停塗之乾則易

立愈

治乳腫出大全良方

用馬溺塗之立止又黃柏末鷄清調搽一方用白

馬溺

又方未成腫痛者出百一選方

用水粉炒令黃色以紙攤在地上出火毒了碾作細末傳之

熨火湯出聖惠方 治乳癰風毒腫久不消未成服先用湯

淋慰令四面惡物消散方

赤小豆五合葱干莖并原細切白礬 甘草一兩乳香半兩芥子

二合桑根白皮一兩

右用青布裹於鍋內以水三升煮令熟乘熨腫處冷

則再緩用之百可四五度熨則令內消

治癩癰歷

乾山藥 苧根 芙蓉葉 五倍子 葱蘢 具
易 白蜜

右為末用米醋調敷在患處留頭

治乳癰貼散方

黃連去鬚白欬 鼠糞 積霜草 大黃 甘草炙各

半兩

右搗羅為散用漿水調為膏貼之乾即易

治爛癰出大方全

乳香 沒藥 草烏 南星 牡蠣已上各一錢 白芨

二錢

右為細末不要見火作鷄子清調作二服用錢篋挑

塗患處用白紙蓋上面如乾用水外面濕之膿血皆

化為大小便

大黃散出聖惠方 治婦人乳癰愀腫疼痛

川大黃剉微碎 川揀子 赤芍藥 馬蹄燒灰 玄參

蒲公英各一兩

右為細散每服一錢溫酒調下日服汗出瘥

治乳癰疼痛宜薰方 薰治乳汁不出內結成膿腫名

妬乳方

用露蜂房半斤以醋五升煮令熟相和傾於瓶中

熱薰乳上三五度即瘥冷則再煎用之一方燒灰

研每服二錢匕水一盞煎六分溫服

治乳癰方出千金方

右搗為末以醋和塗乳痛即止有效劉涓子不用生薑用金背鯽魚立驗

治乳癰始作治乳癰大堅赤紫色衣不得近痛不可忍

者出千金方

大黃 枳實 芍藥 馬蹄

右各等分治下節飲服方寸匕取汁出瘡一方酒服覆取汗當睡者覺後腫處散不痛經宿乃消

治乳癰黃明膠傳散

黃明膠炙令燥 大黃炒 莽草 細辛去苗各半錢

右搗羅為散以鷄子白芍藥勻塗紙上貼腫處頻易即瘡仍割穿如小錢歇腫頭

治乳癰腫未冗痛不可忍薰陸香塗傳方出聖惠方

薰陸香一分為末 百合半兩 雄雀屎二十枚 鹽半兩

右細研令勻以醋調如糊塗傳患上乾即再傳以瘡為度一方鼠糞酥調塗

生魚薄主乳癰

生鯉魚長五寸 大黃 莽草 竈中黃土各六兩

右別搗魚如膏三物下篩更搗令調以生地黄汁和傅腫上日五六夜二三即愈

治乳癰及一切無名腫毒

瓜蒞 貝母去心 乳香 天花粉

右等分咀水酒煎以疾上下分食前後未成速散已成速潰惡毒從大便中出如膠神驗

治諸般腫毒并疼毒癩癰

白朮 猪苓 赤茯苓 澤瀉

右各等分兩瓜蒞子酒一半水煎一盞露天一宿臨睡卧用黑豆一升米醋煮乾就炒燥研末

湧泉神效散出德生堂方 治婦人吹癩或兩乳腫痛即為

癩癰急宜連進速服立效

金銀花 黃耆各三兩半 當歸 甘草各二兩

右吹咀每服四錢水一盞酒半盞煎入去滓臨卧服

滓再熬

治婦人乳癰愀腫赤硬疼痛不止出聖惠方

赤小豆炒 白芷 白劔 鷄子一枚用白

右為細散入鷄子白調和如稀糊塗乳腫處乾即便

塗之

治乳癰除惡肉出千金方

生地黄升三 芒硝 鼓升一

右合搗傅上熱即易之取瘡止一切癰腫皆用之一

方單用地黃傅之

治乳癰堅方出射後方

黃芩 白劔 芍藥各等分

右為末將水飯服半錢日三若左乳汁結者即將去

右乳汁若右乳汁結者可將去左乳汁服散消根

丹參膏出大全良方 療婦人乳癰乳腫毒氣愀作赤熱漸

成攻刺疼痛及治乳核結硬不散通順經絡宜導

癰滯

丹參 白芷 芍藥 各一兩

右以咀以苦酒淹經宿以猪脂半斤微火煎至白芷黃為度膏成去滓傳之一方入黃蠟一兩少許時時塗之

黃鼠膏

出射後方

治乳癰

大黃

鼠屎

新者各一兩

黃連

二分

右各搗為末以黍米粥和傳乳四邊痛止即愈無黍米用粳米並得

治乳癰初得

出危氏方

草烏 七個

赤小豆 七粒

柜霜葉 一兩

陰乾

右為末井花水調塗角四畔黃頂用前敷藥亦妙

車螯散 治乳癰及一切腫毒

車螯殼

燒灰十兩

黃連

去鬚一兩

蜆殼

多年白爛者炙黃泥裏燒五兩

右搗羅為散每服二錢空心用甘草酒調下日晚再服

治乳癰乳香塗傳方

乳香為末 丹砂為末 葱白切

右先研葱白令細入二味再研令勻塗傅乳上乾即易之

治婦乳乳汁不下肉結成腫名為乳毒乃成癰也宜服

此出聖惠方

川大黃炒 黃連兩 牛旁子兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治乳癰腫成瘡疼痛方出聖惠方

防風去芦 牽牛子微炒 牛旁子兩

右為細散不計時候以溫水調下二錢

又方出聖惠方

蔓荊子兩 甘草二十寸 乾薄荷兩

右為細末每服二錢用煖酒調下日三服

又療乳癰初得令消出聖惠方

赤小豆 茵草

右等分各為細末若酒和傳之愈

鹿角散

出聖惠方

療乳癰或瘡久不瘥膿汁出痛欲死不

可忍亦治妬乳

鹿角二兩甘草半兩

右為細末用鷄子白和於銅器中煖溫敷患處日五

匕易即愈一方用療角石上磨取濃汁塗之一方用

鹿角燒灰酒調

金黃散

出大全良方

治癩癰

川大黃

粉草

各一兩

右為細末以好酒熬成膏傾在琖中放冷攤紙上貼

痛處仰面卧至五更貼時先用溫酒調一大匙就患

處卧明日取下惡物相度強弱用藥羸弱不宜服

治乳癰初作腫痛便服久患乳癰戒不可用針若悞針

著乳房立死

出仁存方

右以栝樓子忍冬葉各一兩濃煎汁飲即消

皂蟾散

出投萃方

治婦人因露風邪氣外容於乳內結為

吹爛積久不消以為爛癰此藥導其汗散其風邪出其病自然痊愈矣

皂角 不蛀者 燒存性 真蛤粉 各等分一方 用皂角刺

右為細末每服二錢温酒下不拘時候詩曰婦人吹爛藥婁羅皂角燒灰蛤粉和熱酒一盞調八字雙手揉散笑呵呵加乳香少許尤佳

瓜蒌散 出危氏方 如不愈者並前方治之

瓜蒌 明乳香

右為末每服二錢温酒調下加炙石膏末少許

荆實散 治乳癰痛疼

蔓荆實 炒一兩 甘草 十寸半 生半熟

右搗羅為散每服二錢以温酒調下日再服

防風散 治乳癰

防風 去半兩 牽牛子 炒令香 二兩

右搗羅為末每服二錢空心用沸湯調下取微利為度末利再服漸減服之即瘥

鮫鯉甲散 治乳癰疼痛結硬不可忍

鮫鯉甲 一燒灰 栝樓 一燒 灰

右研和為末每服二錢空心用葱酒調下至晚再

乳初腫方 出直指方

右用甘草生二錢炙二錢為分鹿末分二次新水煎

服令人吮乳

又方治癩痛

右用芭蕉根槌碎盪之

治乳癰腫痛宜脇貼方 出聖惠方

鹽草根 生菊頭 各半兩

右搗如泥貼之立效

治乳癰方 出聖惠方

赤小豆 蛇蛻皮 燒灰

右以鷄子白和之傅上少乾即易

一字散 治婦人乳結痛不忍者

麝香 錢半 螃蟬殼 不以多少

右為灰入麝香調下

治乳癰瘡

鼠糞 粉子炒黑

右各等分停加麝香少許好酒二盞送下

秘方

山藥半斤末 官桂二兩末

右用仙米粉打糊為圓每服一百五十九用無灰好酒送下不拘時候服次膏藥貼痛處

貝母散 治乳癰

貝母 金銀花各二兩

右為細末每服三錢好酒調食後服

治婦人乳癰毒氣不散

冬瓜皮研取汁 當歸半兩末

右以冬瓜汁調塗之以瘥為度

附子散 治婦人乳疽及妬乳作寒熱疼痛宜服

附子一兩去皮臍 藜蘆半兩去蘆頭

右為末用醋調傅之乾即再傅之

又方

米粉一合炒 鷄子白三枚

右藥相和塗帛上以貼疽上開一小孔以洩毒氣燥

即易之

又方

釜底土一兩 鷄子白三枚

右搗相和塗之如少破爛良

又方

半夏末一兩 鷄子白三枚

右藥和塗之極效又水磨出小品

治婦人乳頭裂痛欲成瘡

臘脂三分 蛤粉一分

右藥研細塗乳裂處神效

治婦人乳中結塞腫痛如石成癰出聖惠方

玄參 白檀香各半兩

右為細散用醋調塗腫處乾更塗

治乳癰堅方

出干金方

以水確中盛醋泔清燒石冷熱內中沸止更燒如前少熱內乳漬之及冷更燒石內漬不過三度燒石愈

治乳癰方

出干金方

鹿角治下篩以猪脂上清汁服方寸已不過再服亦不可以錯漿水服

治乳癰二三百日衆療不瘥但堅紫青柳根熨方

出干金方

柳根削去上皮搗合熟熬令溫盛著練囊中熨乳上乾則易之愈

治乳癰痛不可忍

出炮氏方

用餛飩草酒浸服以滓傳縛

治乳癰

出聖惠方

用鹿角屑一兩為細末以猪膽汁調下一錢不過再服神驗以醋醬水服之亦得集驗方以猪額下清汁

一方鹿角炒微黃用

橘香散

一名橘皮
出拔萃方

治乳癰未結即散已結即潰極痛

不可忍者藥下即不痛因小兒吹爛變成斯疾者並皆治之

陳皮湯浸去白晾乾麩炒微黃為細末麝香研酒調二錢初發覺赤腫疼痛一服見效一方用青皮焙乾為末熱酒調下

一醉膏

出十便
良方

治爛癰

石膏不以多少煨通赤取於地上椀覆出火毒細研每服三錢溫酒下添酒盡醉睡覺再進一服療無汁以水煮服

治療婦人乳癰已穿未穿出膿大止痛斂瘡口

出大金
良方

以芙蓉花爛研如泥若無花只取根上皮先用竹刀刮去分鹿皮但用內一層嫩白皮研如泥却入蜜少許調停看瘡大小如未穿即留中孔如已穿即塞其孔其膿根自然涸出盡不倦頻頻更換此方大治一

切癰疽發背立見神效膿出盡却用後藥傳

乾膿散 出大全良方

又欵瘡口

烏賊骨 黃丹 天竺黃 錢各一 輕粉 二匙 麝香 一分 老

降香骨 錢三

右研細末乾糝瘡口不數日乾

又方 出大全良方

降香節 錢二 天竺黃 露蜂房 錢各一 麝香 輕粉 各少

許

右為末乾糝

又方 出大全良方

乳香 沒藥 黃丹 錢各一 龍骨 錢二 真樺皮 錢二 血竭

半錢 麝香 一分 降真節 錢一

右為末乾糝之

治乳癰初作腫痛 出仁存方

用萱根自然汁調傅

一方 出石選方 治乳癰

牛皮膠以多少鎔開用紙花攤貼爛上次以舊齒刷牙一箇燒灰存性研為細末酒調服甚有功效

又方出百一選方

用苔脯中泥調塗爛上甚妙

治婦人爛癰出危氏方

用仙人掌草一握好酒糟生薑各塊一處搗爛入桂末少許炒酒服滓卷腫即便止痛不成瘡

又方出危選方

用山礬菜為末食後溫酒或熱湯調下

治婦人乳癰出聖惠方

以人牙齒燒灰研令細以醋調塗貼攤上

乳癰方出直指方 治乳癰疽初發

用貝母為末每服二錢溫酒調下即以兩手覆按楫上垂乳良久自通

小麥出射後方 主婦人乳癰不消

用白麵半斤炒令黃色用醋煮為糊塗於乳即消又

方以蔓著根葉淨擇去土不用洗以鹽搗傅乳上熱即換不過三五度冬無葉即用根須避風

芫蔚子

出聖惠方

治婦人勒乳痛成癰

用益母草搗羅為末新汲水調塗乳上一宿自瘥生者擣爛用

治乳癰痛不可下

出鮑氏方

右搗橘葉極細攤傅帛縛之

薑石救急

治乳癰腫如椀大痛甚

取白薑石搗一二斤用鷄子白和如飭傅腫上乾易

之此方頻試驗如鷄子白同榆白皮和搗傅即瘥

乳癰月蝕瘡透耳根

以烏鵲鷄膽汁傅之三日

治婦人爛癰未成結者

用管仲一味為細末外用敷腫上內亦可服之

牡蠣散 治乳癰初發腫痛結鞭欲成膿令一服瘥

牡蠣

取腦頭厚處生用

右細研爲散每服二錢研澱花冷酒調下如癰盛已潰者以藥末傅之仍更服藥一日三服

搯皮散 治乳癰初發腫痛結鞭欲成膿令一服瘥

以北來真搯皮燒灰酒服方寸匕就病乳處卧及覺已瘥

治乳癰結鞭疼痛方

右和泥芥菜半斤剉碎以水四升煮取三升傾於瓷薰乳腫處日三五度即瘥

治乳癰結鞭疼痛

右和泥葱半斤細剉以水四升煮十數沸於瓷瓶子內盛薰乳腫處日三五度即瘥冷即再煖以瘥爲度一方搗葱白搏之絞汁一升頓服

治乳癰疼痛方

右車子一兩搗羅爲散每服二錢溫酒調下

治乳癰腫疼痛方

右打鷄子一枚熱酒調爲一服

治乳癰初發

用皂角針四十九枚燒灰存性瓜萋根酒服立潰

爛癰瘡

用黃瓜萋一二個連皮穰子剉碎用無灰常酒一二升於沙瓶內煮存一升去滓時時溫酒盡再煮滓服如覺初時便服此藥即時痛止便不成瘡如已成瘡服之其瘡自穿而痛自止

治乳癰痛不可忍

右用地龍一二條入生薑乳乳鉢內研如泥塗四傍紙花貼之

治乳癰

用夏枯草酒搗服仍用滓敷即日乳下三日愈

又方

右用猪膽汁蜜搗葱貼如水炒

無比方

出傳信
適用方

治婦人爛癰痛甚

用榆白皮燒灰一錢炒甘草末半錢同和煖酒下如

破用生油調塗

治癩癰

用梨錢子煎湯洗一方用枇杷葉煎湯洗若無則用棠梨葉

又方出射後方

用尿或馬屎敷並佳此消去

又方

用檮生地黃傅之熱則易小豆亦佳

治乳癰疼痛寒熱至甚宜服之出聖惠方

用鑿下馬蹄燒為灰細研以醋調塗緋帛上貼之日換之

治婦人乳癰身體壯熱疼痛不可忍出聖惠方

取蒲公英并根檮絞取汁半合酒和服之如無新者用乾檮細羅為散每服調下二錢

治婦人乳癰并吹爛疼痛不止出聖惠方

蝦蟇一枚五月五日收陰乾者以罐子盛燒令赤候

冷取出細研為散每服熱酒調下二錢

治婦人乳癰熱毒腫痛出聖惠方

右青牛腹下毛燒作灰細研水和服之立效

又方出聖惠方 治婦人乳癰不消立效

右嫩皂莢刺二兩黃色者微炒搗羅為細散以溫酒

調下二錢

治婦人乳咀及妬乳作寒熱疼痛宜傳出時紋事

以醋和吳茱萸末或搗生薑或小蒜和傳之並良

治乳癰宜薰

耶屈律藤蔓斤切一

右水二升煮取一升半瀉於小口瓷瓶中薰患處良

蒺藜丸出千金方 治婦人乳癰瘡腫疼痛除熱

蒺藜白者微炒去刺 大黃各一兩炒 敗醬一兩 桂心 人參去蘆頭

薏苡仁 附子炮去皮臍 黃連去鬚 黃耆去蘆 當歸微炒 枳實

麩芍藥 通草各三分

右為末蜜丸如梧桐子大未食飲服三丸不知益至

五九日三無所忌一方無大黃敗醬黃連通草為散
酒服方寸匕

升麻散 治婦人乳初覺腫房疼痛及欲成癰結

川升麻 赤芍藥 甘草 川大黃 各一兩 玄參 一兩

半白芷 三分馬蹄 三分川朴 二兩桑根白皮 三兩

右件藥搗分鹿末羅為散每服四錢以水一中盞煎
至六分去滓食前溫服

傳乳方 出聖惠方

天南星 半夏 生 皂莢刺 燒帶生 白芷 草烏

直僵蠶 焙各一兩

右為細末多用葱白研取汁入蜜調傳若瘡口破用

膏藥貼

治婦人乳腫妨痛日夜不可忍 出聖惠方

煨爐底土 一兩 露蜂房 半兩 赤小豆 一合 川大黃 一兩 木

香 一兩 桂心 一兩

右為細末以真麻油調塗上經宿神效

治赤腫欲作癰者出百一選方

用天南星為末生薑自然汁調塗初發便用以鵝翎塗之

又方出百一選方

右用缺盆草糯米香草又名趙侯鬚其葉小却如蒲荀有刺不拘多少連皮生薑一塊同研爛罨即愈

始爛疼方

真蛤粉五錢炒

右用皂角刺四五箇煎湯調服加好酒一呷服後又

用此藥

皂角 防風 大黃 當歸

右煎湯洗可止用手大而止久之後用口飲爛葱透

方可

治乳腫出聖惠方

桂心 甘草 烏頭一分炮

右為末和苦酒塗覆之膿為水即神效

治婦人乳腫痛慮作癰毒宜服此

甘草 半兩一半生用一半微炒 藟藟 一枚去皮瓢子細到令爛

右以酒一大盞煎甘草取六分又藟藟酒後宜更用此淋熨腫痛上

治婦人乳腫疼痛

柳白皮 地松 二握到

右以水五升煎至三升及稍熱并滓薰乳腫處以通手即淋熨乳上當日即愈

菩薩散 治癩癰腫痛時發寒熱狀如傷寒不可忍已

結未並治 關

霜杜荊子 今作杖子者是去微十二月正月二月採之 酵頭 用作炊餅者欲炒勿

焦令

右二件各搗為末以淨盤子擊之於佛前焚香誦南謨藥

王菩薩南謨藥上菩薩聖號各一百八遍等分拌勻至

心禱告畢抄三錢匕一葱酒調下食後稍空進之服藥頃間度藥力到患處即令人以手揉摩之更令人吮出乳汁尤佳飲酒人多飲之令有力不飲酒者以葱湯衝酒借氣可也得就寐即釋然脫去矣已結未成膿者立潰並免痛楚重者不過兩服 異人何伯選高曾以來久施此藥其效如神秘而不傳近日漕司李運幹家有一人患此懇而得方一投而愈治乳癰不可忍

右用右蛙竹籤截成糖研極細羅過溫酒服先用復元通氣散佳

又方

用竈間掛塵多年者羅細末二錢以乳汁調勻溫酒調下仍以手頻按腫處即消

又方

用桑蟲糞

治婦人乳腫不消

右取魚枕搗末唾調塗之

治乳腫痛甚者

野松半斤不用洗

右和鹽搗爛厚塗腫上乾即換之

治乳頭裂破

右用苧麻根搗傅之

治爛頭裂

右用秋後冷露茄兒花裂開者陰乾燒存性灰水調

傅之如未秋時但是裂開者亦可用

療乳癰及發背四肢虛熱大渴

生地黄六兩 黃芩 芍藥 人參 知母 甘草各二

兩 升麻 黃耆 麥門冬 括蕪各三分 大棗十二枚

右以竹葉切三升以水一斗二升煮取九升去竹葉
內藥煮取三升渴則飲之

連翹湯 治妬乳乳癰

連翹 芒硝各二兩 芍藥 射干 升麻 防已

杏仁 黃芩 大黃 柴胡 甘草 各三兩

右以咀以水九升煮取二升五合分三服

療婦人發乳丈夫發背爛生膿血虛成氣疾

黃耆 麥門冬 地黄 人參 升麻 茯苓 各三

兩當歸 芍藥 遠志 甘草 各一兩 大棗 十枚

右水二升煮取一升分温三服若有是證局中排膿

內補十宣散妙

神效瓜蒌散 治婦人乳癰爛勞

瓜蒌 一箇去皮焙研為末如急用只爛研子有多者有力 當歸 酒浸去蘆半兩 乳香

錢一生粉草 兩半 通明沒藥 一分二味研別研

右用無灰酒三升同於銀石器中慢火熬取一升清

汁分作三服食後良久服如有癰勞便服此藥可杜

絕病中如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即於大

小便中通利疾甚再合服以退為妙婦人乳癰方甚

多獨此方神效無比萬不失一癸亥年僕處五羊趙

經略廳判閩夫人年七十一歲隔一二年左乳房上

有塊如鵝卵大今忽然作楚召余讓僕云據孫真人云婦人年五十歲已上乳房不宜見癰見則不可治矣幸而未破恐是氣瘦謾以五香連翹湯去大黃煎服服少減則已過六七年每遇再有腫脹再合服消立效散出直指方治發背及諸癰瘡及瘰疔有效或婦人乳癰與前方間服妙

紫色皂角半斤不用枯者細到炒耐久炒赤色生粉草二兩乳香半兩別研
 沒藥半兩別研瓜蒌五箇去皮取肉并仁搗碎炒煮乾

右為細末每服二錢溫無灰酒調下無時候煎服直指方名五拘湯

竹皮大丸出金匱方治婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣

生竹茹三分石膏二分桂枝一分甘草七分白薇一分

右五味棗肉和丸彈子大以飲服一九日三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加栝實一分

治婦人乳癰出危氏方

火拔草 皂角刺 川山甲 黃蜂窠

右以上件各等存性為末入輕粉生麻油調傳瘡上

療乳癰諸般癰癰疽出大金良方

橘紅兩半阿膠粉炒粉草炙各二兩

右吹咀為二服每服用泉水一碗半煎至淺半去滓

溫服

治妬乳乳癰方出千金方

右取研米槌二枚炙令熟以絮及故帛榆乳上以槌更立熨之瘥止已用立效

療癩癰并無名癰癰出大金良方

右用鼠糞不以多燒存性二分入輕粉二十文研停麻油調塗如有頭即潰無頭即消又療火瘡

治癩癰等疾出金氏方

右用赤小豆三升酒爛去滓溫酒服以滓傳患處一方赤小豆為末水調塗愈

又方出金氏方

右用蔓荊子無子用嫩葉或花搗爛酒炒服之用滓

貼患處

伏龍肝

出射後方

療爛發諸癰疽發背及乳

右以釜下土搗取末鷄子中黃和塗之加效

治妬乳乳癰乳頭裂破

出射後方

右水楊柳根新採者一握搥碎以好酒用甘草烏梅

燂至七分去滓時時溫服

治婦人乳癰爛見心者

出危氏方

右用貓兒腹毛耳鍋煨存性為細末乾傅或油調入

輕粉少許

青桑膏

出危氏方

治乳硬作痛

右用嫩桑葉採細研米飲調攤紙花貼病處此證四

十已下可治五十已下不可治治之則死不治則自

得終其年矣

連翹湯 治吹乳乳癰

連翹

瞿麥穗

各一兩

升麻

玄參

生乾地黄

焙

芍藥

各三分

甘草

炙一分

射干

一分

普濟方

卷九

右細剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治婦人乳結硬疼痛方 出聖惠方

右取鱓魚皮燒灰搗細羅為散空心以煖酒調下二錢服之

治乳赤腫欲成癰者 出鮑氏方

白芷 芙蓉葉 赤芍藥 紫金藤 黃栢 當

歸

右為末入雄黃研少許拌勻蜜水調湯

治爛癰腫痛

右用瓜萋根為末入炙甘草末少許用薄和酒調下

治乳癰惡痛者

用茺蔚子搗傅及取汁服效

治乳腫

用括萋黃色老大者一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫服一升日三服若無大者小者二枚黃熟

為上

妬乳 附論

夫氣血流行則上為汁下為月水上下通達不失常度
 者是謂平人宜通而塞則為痛熱氣復乘之則為腫向
 日之流行壅遏矣儻失調治則結鞭成核身體壯熱甚
 之則憎風遂為乳癰世傳氣結乳閉亦為妬乳者此也
 若婦人女子乳頭生小淺熱瘡癢搔之黃汁出浸淫
 而為長百種治不瘥者動經年月名為妬乳婦人飲兒

女者皆欲斷世謂苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻
 等湯洗之傅二物飛鳥膏以及飛鳥散佳若始作者可
 以傅黃芩漏蘆湯及黃連胡粉散並佳 吹爛妬乳乳
 腫癰其實則一只分輕重而已輕則為吹爛妬乳重為
 腫癰

方

升麻托裏湯

一名內括升麻湯
出臍生拔梓方

治婦人兩乳間出黑

頭瘡瘡頂榻下作黑眼子其脈弦洪按之細小

升麻 葛根 連翹各一錢半 肉桂 黃柏各三分 當歸

身 黃耆 炙甘草各一錢 黍粘子半錢

右咬咀都作一服水酒同煎去滓稍熱服

治妬乳乳生瘡方出千金方

蜂房 猪甲中土 車轍中土各等分 一方又來車

殼中指一味

右三味為末芒酒和傳之

黃連胡粉膏散出千金方

黃連二兩 胡粉十分 水銀一兩 同研令消散

右三味搗黃連為末三物相和合皮裏熟煖之自和合也縱不得一成且得水銀細散入粉中也以傳乳

瘡諸濕痒黃爛肥瘡著甲煎為膏千金同

漏蘆散 治乳汁不時洩蓄積於內遂成癰妬乳

漏蘆一兩 黃芩一兩 去黑心 米粉半兩

右三味搗為細散小調如膏塗於乳上

治妬乳方出千金方

右燒自死椀為灰和以猪膏塗之大妙

赤龍皮湯

出大金良方

治乳瘡

右以槲皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬溫之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗畢傳膏散千金同

天麻草湯

出大金良方

右用天麻草五升切水一斗半煎取一斗隨寒溫分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏著花赤如鼠

尾花亦洗浸淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡

洗畢傳膏散千金同

飛鳥膏

出大金良方

右用燒硃砂作水銀上黑烟

名排粉者散兩熱令焦燥

礬石三兩

燒粉焙以絹篩了以甲煎和了令如脂以傳乳瘡日

三作散者不須和有汗自著可用散亦傳諸熱瘡黃

爛浸淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡疔蝕

口邊肥瘡蝸瘡等並以此傳之千金同

兵部手集療妬乳硬欲結膿令消及發乳房初發微赤

不急治之即殺人出射後方

右以鹿角於石上磨取白汁塗之乾不塗不得迨手

并以人湖却黃水一日許即散一方燒灰酒調抹一

方苦酒和塗

一方出便產須知

治妬乳便產須知云產婦乳汁不宜積

蓄惡血不出內為熱結腫痛煩悶手不可近成膿者

名妬乳乃急於癰

右用連翹湯利下惡熱毒

一方出大全良方

右用生地黄汁塗之熱即瘥又得汁吐去若不吮吐

必積蓄決然作癰醞醋調塗亦可

治妬乳出射後方

右用梁上塵醋和塗之亦治陰腫

治女子妬乳腫

右取蔓菁根生搗後和鹽醋醬水煮取汁洗之五六

瘡又搗和鷄子白封之亦妙

治妬乳及癰出本

以研朱石槌煮令熱熨乳上取二槌更立用之以覆乳上合熱徹內數十徧取為度也

治婦人妬乳乳癰出本

取車脂熬令熱塗之亦和熱酒服

治妬乳

用榆木藥生服一兩最佳

普濟方卷三百二十五

總校官候補知府臣葉佩孫

校對官編修臣張九鐔

謄錄監生臣鄧世紳