

精校  
張氏醫通

鴻寒緒論  
(一)

出版 上海錦章書局

傷寒續論序

穆叔有云太上有立德其次有立功其次有立言此之謂不朽信哉是言也吾聞古之賢達不居仕朝即在醫卜之中屈指往古名醫如秦和之論六氣越人倉公設為問難歷歷垂之左史未始無功德於後世也若路王張子者可以希蹤佳哲配德前人但素抱夷曠若不屑於應酬曾有客長揖而謁先生曰吾觀今世之延醫治病者皆耳食皆目皮相余為先生效曹邱生可乎張子拒之客又曰今之習醫者數招權顧金錢事貴人是其長技臨時驗證則先備一二語以探之製劑時則以雜採湯液投之若先生者能悟醫中最上源頭復有余為曹邱生何慮名之不揚宇內哉張子撫手而嘯遂謝客後知握手齷者流窮困則辱身下志富厚則快意驕人不足與談道於是銳意精研靈素金匱諸篇取趙以德喻嘉言之註而復斧之正其誤去其繁明其晦補其缺銓仲景傷寒六經之次至於結胸痞蘄溫熱諸篇鑿然不混載取往哲遺言隸諸類證細證所以輔仲景之未逮列為續續二論三復讀之知天下未有之奇謚於此矣是書也使智者目之天頴迅發愚者瞿然而悟固者危坐正襟洗心滌慮好自用者目眩而不賅舌擣然而不下洵為傷寒之大成其德被於天下後世也溥矣豈特有功於仲景而已哉嘻張子真不愧乎立言矣

同邑李瑾譔

傷寒緒論目錄

卷上

總論

六經

傳變

風溫病

合病

時行病

標本

溫疫

傷寒

溫瘡

溫兩感

陽毒

陰毒

三陰

中寒

熱病

中暑

寒發

夾食

中濕

風濕

濕熱

瘧病

內傷

虛煩

胃氣

寒陰

寒水

腳氣

霍亂

內癲

赤腸

黃耳

中暑

脉法

夾痰

夾水

夾血

夾氣

夾陰

夾雨

夾水

辨舌

宜禁

卷下

發熱

項強

寒熱

自汗

煩熱

拘急

結胸

小腹滿痛

發斑

下利

小便自利

渴

嘔

喘

小便數

便膿血

不大使

小便不利

小便難

自利

頭痛

惡風

如瘡

盜汗

煩躁

心下滿

藏結

腹滿

鄭聲

腹滿

腹痛

發狂

痞

嘔吐

噫氣

呃逆

乾嘔

氣逆

吐血

氣逆

頭重

惡寒

潮熱

頭汗

手足腋股汗

懊惱

身體痛

頭脹

無汗

手足

腋股汗

腹痛

腹滿

腹痛

腹滿

腹痛

腹滿

腹痛

腹滿

腹痛

頭脹

背惡寒

無汗

手足

腋股汗

腹痛

腹滿

腹痛

渴

欬嗽

腸鳴

渴

漱水

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

嘔膿血

熱入血室

畜血

動氣

振

戰慄

肉瞶筋惕

瘻癰

憊鬱

戴陽

四逆

足冷

厥

踴臥

脣甲青

咽喉乾痛

失音不語

喉痹

心悸

驚惕

不仁

厥暉

頭眩

鬱冒

不得眠

多眠

蛇厥

藏厥

狐惑

百合

舌卷囊縮

陽縮

直視搖頭

遺尿

循衣撮空

絕汗

勞復

食復

女勞復

陽陰易

遺熱

發頤

喜睡

差後浮腫

雜方

刺灸穴法

雜方目錄

陽旦湯附陰旦湯

黃耆建中湯

再造散

香蘇散

芎蘇散參蘇飲

神丸湯

十神湯

升麻湯

葛根葱白湯增損葛根湯

連鬚葱白香豉湯

選奇湯

藿香正氣散

人參敗毒散倉廩湯

荆防敗毒散連翹敗毒散

普濟消毒飲

六神通解散

獨活散

達原飲

生犀飲

清熱解毒湯

人中黃丸

人中黃飲

涼膈散

雙解散

黃連解毒湯

三黃石膏湯

導赤瀉心湯

射干麻黃湯

金沸草散

姜蕤湯

桔梗根湯

防己黃耆湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

生脈散

黃連香薷飲局方者  
薷飲者

清暑益氣湯清燥湯

羌活勝濕湯除風濕  
羌活湯

十味香薷飲六和湯

消暑十全散

冷香飲子

消暑丸

益元散

大順散

犀角黑參湯

犀角大青湯

黃連橘皮湯

橘皮竹茹湯

赤茯苓湯

小續命湯

如聖飲

大羌活湯

羌活導滯湯

葶藶苦酒湯

黃龍湯

厚朴七物湯

代抵當湯丸

金匱下瘀血湯

補急丸

大黃附子湯

二陳湯小半夏茯苓湯  
橘皮牛夏湯

導痰湯加味導  
痰湯

平胃散胃苓湯

五積散

調中湯

調中飲

人參養胃湯

沈香降氣散

香薷散

當歸活血湯

犀角地黃湯

生地黃連湯

紫蘇飲

逍遙散加味道逍  
遙散

歸脾湯加味歸  
脾湯

當歸補血湯

東垣升陽散火湯

火鬱節卷升陽散火湯

參胡芍藥湯

參胡溫膽湯十味溫  
膽湯

參胡三白湯人參  
白湯

參胡芍藥湯

參胡溫膽湯

酸棗湯

金匱腎氣丸

崔氏八味丸  
濟生腎氣丸

附子理中湯

枳實理中湯  
連理湯

金匱大建中湯

益元湯

附子散

附子粳米湯

羌活附子散

霧憲散

火絛散

豨挺散

皂莢丸

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

葶藶薏苡瀉肺湯

射干湯

大黃牡丹湯

赤小豆當歸散

黃連犀角散

百合地黃湯

逍遙湯

金液丹

黑錫丹

來復丹

養正丹

傷寒緒論卷上

長洲石禎張 稔路玉父纂述

總論

余嘗考晉王叔和集仲景傷寒書。未嘗不廢書而三歎也。嗟夫猶賴叔和為仲景之功臣使無叔和之集則傷寒書同於卒病論之不傳矣。何能知有六經證治乎。即條辨尚論亦無從而下手也。至王子所編名有未審金匱不詳復取仲景原文重分其例。取尚論及各家之註參以己見成續論矣。第殘逸已多遺失不盡檢諸家之論以補之雖其間互有發明然未免多歧之惑是不得不博採往哲之言以綴輯之。惜歷代名賢遞相祖述未能一一平標明姑從證類次第讀者毋以辭害義可也。謹敍六經傳變合病併病標本治法及正傷寒兩感三陰中寒冬溫寒疫傷風溫病風溫時行大頭溫疫溫瘧溫毒陽毒陰毒熱病中暑濕溫中濕風濕濕熱疫病內傷虛煩脚氣霍亂內癰亦膈黃耳炎食炎痰炎水炎火血炎氣炎陰冒雨溺水重身痺後等四十證暨以審證死證逐一辨論如左。如六經證人悉知為足經不知有手經證間出也。傷寒初受病時頸項痛腰脊強惡寒足太陽也發熱面赤惡風手太陽也目疼鼻乾不得臥足陽明也蒸熱而渴手陽明也胸脇滿痛口苦足少陽也耳聾及痛寒熱往來手少陽也腹滿自利而吐足太陰也口乾津不到咽手太陰也脈沈細口燥渴少陰也舌乾不得臥手少陰也耳足聾囊縮不知人足厥陰也煩滿厥逆手厥陰也傷寒以冬月寒水主令故受病必先巨陽若夫非時暴寒亦必隨時傷犯與夫時行疫癘隨其歲氣而犯虛經異治疫雖以六氣為主總不離陽明濕土至於伏氣發溫必先少陽證見熱病多兼包絡三焦皆熱邪自內達外其治法可領悟矣。

按靈樞十二經脈轉注如環豈有六經傳變只傳足經不傳手經之理如太陽傳陽明謂循經傳太陽傳少陽謂越經傳太陽傳太陰謂誤下傳太陽傳少陰謂表裏傳太陽傳厥陰謂首尾傳因此經本虛邪即傳之本無定例也。故傷寒有六經之傳變無藏府之傳次也所以在太陽經有犯本者有即入陽明之府者有傳至陽明之經而自經入府者有傳至少陽之經而入陽明之府者是以仲景有太陽陽明正陽陽明少陽陽明之別也入府則邪有定者不復傳次也非但入府不傳即太陽之犯本少陽之入府俱不復傳矣是知三陽有傳變有併合三陰有傳經直入而

無併合也。即有三陰經轉出三陽，或傳入府，皆是邪氣向衰，正氣得復之候，並無厥陰復傳太陽之理。此昔人所未明言也。而傳足不傳手，手說尤屬非理。王安道曰：傷寒不傳手經。此開卷之首疑，而諸家紛紛竟無定論，竊意只傳足經者，蓋以邪氣在經，未入藏府而言。若入藏府，則不可謂之獨在足經矣。何以言之？夫手太陽者，小腸也；手陽明者，大腸也。邪氣入胃，致有燥屎，大承氣湯下之，小腸上接胃，下接大腸，燥屎由大腸而出，二經得無與乎？手少陽者，三焦也。邪在一身，三焦獨能安乎？手太陰者，肺也。肺為清肅之臟，主氣升降，假如欬嗽氣逆，肺能保其清肅乎？手少陰者，心也。手厥陰者，心包也。表裏熱極，神狂志亂，豈有君相二火，反泰然清靜者哉？東垣此事難知。曰：傷寒傳至五六日間，漸變神昏不語，或睡中獨語一二句。目赤唇焦，舌乾不飲水，稀粥與之則喫，不與則不思。六脈細數而不洪大，心下不痞，腹中不滿，大小便如常。或傳至十日以來，形貌如醉人狀，虛見神昏，不得已用承氣下之，誤矣。不知此熱邪傳手少陰心經也。導赤瀉心湯主之。與食則喫者，邪不在胃也。不與則不思，以其神昏也。既不在胃，誤與承氣下之必死。今傷寒溫熱傳變，多有此證，不可不察也。

至於合病併病，亦須明辨。昔趙嗣真極意洗發，不過曰：合病者，二陽經或三陽經同受病，病之不傳者也。併病者，一陽經先受病，又過一經，病之傳者也。以病之不傳者，概合病，雖為定論，但未明言。合病多由於冬時過溫，少陰不藏，溫氣乘虛，先入於裏，然後更感寒氣，閉鬱於外，寒熱錯雜，遂至合病。其邪內攻，必自下利，不下利即上嘔。邪勢之充斥奔迫，從可識矣。其黃芩湯雖主太陽少陽合病，白虎湯雖主三陽合病，而實溫病熱病主方，慎不可以此誤治傷寒合病，設誤用之，必難救藥也。其傷寒合病，仲景自有桂枝加葛根湯，葛根加半夏湯，葛根湯，麻黃湯等治法，觀仲景諸例，自可見矣。

併病者，先一陽經病未罷，又加一經證，見兩經聯貫為一也。嗣真云：太陽陽明併病，若併而未盡，是傳未過，尚有表證。若併之已盡，是為傳過當下之。按此雖曰併病，而實傳經也。或言本二經病，一經證先盡，歸併於一經者，為併病。此說似是而尤誤也。按仲景二陽併病，太陽初得病時，發其汗，汗先出不徹，因轉屬陽明一條，此則太陽陽明併病也。至於二陽併病，太陽證罷，但發潮熱一條，雖曰二陽併病，又云太陽證罷，獨見陽明府證，所以用大承氣湯，專治府實，而不復用併病，例藥心考。仲景書合病併病證，或止言太陽，或止言陽明少陽者甚多。如太陽病桂枝證，醫反

下之利遂不止。脈促者未解也。喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之。此非太陽陽明併病例藥乎。又如標本治例全要活法所謂一病之標本者。如太陽中風桂枝證先惡寒為本後發熱為標其陽明熱病白虎證口燥心煩為本。背微惡寒為標。此治本不治標也。○又兩病之標本如伏氣發溫復感客邪證伏氣為本客邪為標治以涼膈必加葱豉。其內傷發熱兼冒虛風證內傷為本虛風為標治宜補中略入羌防此治本兼治標也。○又傳經之標本本太陽病初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明此太陽為本陽明為標治以葛根仍用麻黃此治標必從本也。○又一經之標本如太陽病頭痛發熱自汗桂枝證為本病後六七日不解而煩渴飲水邪入膀胱之本五苓證為標病此隨證治本治標也。○又一身之標本如病人身大熱反欲得近衣以其人陽氣素虛寒邪外鬱於表熱在皮膚為標寒在骨髓為本宜小建中加黃耆病人身大寒反不欲近衣以其人蓄熱素盛寒鬱熱邪於內寒在皮膚為標熱在骨髓為本宜桂枝湯加黃芩此寒熱互見標本合治不必如活人書先後治例也。○又寒熱之標本者如病人脈微而濶夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身或熱欲著複衣者陽微則惡寒也宜附子理中加黃連盛寒欲裸其身者陰弱則發熱也宜竹葉石膏加附子此不從標本從乎中治仲景所謂醫病是也。○又先後之標本者傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛急當救裏後身疼痛清便自調急當救裏先受寒身疼痛為本病後誤下之續得下利清穀為標病先四逆救裏治標後桂枝救表治本也標本之法略舉數條為例詳仲景證治諸法餘可類推。

夫仲景治法不同非極力精研不能悟其間奧也原夫傷寒之邪其始也必先太陽寒水之經所以惡寒發熱此為表之外證故宜發汗開腠理而通其熱則愈或有汗之而不愈者必有所夾而致或夾痰或夾食或挾水氣或夾內傷須辨脈證用藥然必先撤外邪稍兼清理痰氣而後專理他證若內外併治邪必內入所謂汗之不得其宜而入三陽之本也古云發表未除不可攻裏上盛未除不可攻下真不易之定例也。○傷寒三陽證宜汗失汗必致傳經大便燥結潮熱手足漒漒自汗腹滿煩渴當俟結定方可攻裏所謂下不厭遲也若裏實燥渴飲水過多或下傍流之水者急下之若傳三陰之經必自下利腹滿嗌乾燥渴厥逆古卷彙縮詳緩急下之此雖曰三陰實陽證也。○大

抵傷寒身熱者為熱在表。引飲小便黃赤為熱在裏。身熱引飲小便黃赤為表裏俱有熱。身涼不渴小便清白為表裏俱無熱。又曰。身拘急。表熱惡寒。脈浮緊為邪熱在表。引飲譏妄。腹滿實痛。發熱便祕。脈沉緊為邪熱在裏。胸脇痞滿或嘔吐。往來寒熱。脈在肌肉為邪熱在半表半裏。自利脈沈細但熱而無頭痛或燥渴多喜溫飲。自覺足寒為少陰本虛而挾陽邪。雖是陽證而實夾陰與陽虛自中陰寒不同亦有陽證誤用寒藥而變為虛寒者。又有汗下太過致陽虛而惡寒者皆始本陽邪。未傳寒中之證並宜加溫經藥不可拘於傷寒皆為熱邪。禁用溫補之說然究其根源從陽經來者溫經藥中又不得不兼制陽藥若峻用辛熱則真陰立槁也觀真武湯中用芍藥茯苓其義可見○王安道云傷寒傳變不常或有循經而傳者或有越經而傳者或有傳二三經而止者或有只在一經者或有傳至三陽而止者或有傳盡六經不罷者有從陽經傳變而為熱證者有直中陰經而成寒證者有初入太陽不作鬱熱而成真陰證者有始寒終熱者有始熱終寒者全在脈與證別之詳三陽之邪則一於熱耳至三陰經證之或寒或熱者何也夫仲景書本非全文既遭叔和播亂之厄成無己止隨文註釋竟不明言何由為熱何由為寒之故此非不欲言也蓋止知傷寒皆是傳經故疑於六經所傳俱為熱證而熱無變寒之理遂不敢別白耳以寒為本藏之寒歟安得當熱邪傳寒之時反獨見寒而不見熱者且所用之藥能不助傳經之熱乎以寒為外寒歟則在三陽已成熱矣豈有傳至三陰而反為寒哉成氏能潛心乎此則必悟其所以然矣○夫三陽之病其寒邪之在太陽也寒鬱其陽陽不暢而成熱陽雖人身之正氣既鬱則為邪矣用麻黃發表以逐其寒則腠理通而鬱熱泄故汗出而愈苟或不汗不解其熱不得外泄則必入裏故傳陽明傳少陽而或入府也夫三陰之病或寒或熱者何哉蓋寒邪之傷人也或有太陽經鬱熱然後以次而傳至陰經者或有太陽不傳陽明少陽而便傳三陰經者或有寒邪不從陽經而始直傷陰經者或有雖從太陽而始不作鬱熱即入少陰而獨見少陰證者或有始自太陽即入少陰而太陽不能無傷者或有直傷陰經而寒變為熱及始寒終熱者其鬱熱傳陰則為熱證其直傷陰經及從太陽即入少陰則為寒證其太陽不能無傷則為脈沈而發熱證其始寒而終熱者則陰邪傳出陽分為先寒後發熱證此三陰之病所以或寒或熱也邪氣暴卒本無定情而傳變不常耳若夫東寒外熱之證乃是寒邪入客於內迫陽於外或是虛陽之氣假作外熱之狀耳非真熱邪所為也觀仲景東寒外熱之證但以溫藥治裏而不治外熱則知所治之意矣

所以仲景治太陽經虛汗之不愈即用四逆湯溫之如太陽病發熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯是也更有少陰表證宜汗者如少陰病始得之反發熱脈沈者麻黃附子細辛湯主之少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也趙嗣真云太陽證之溫經少陰證之發汗皆證類之變故長沙各言反者以太陽發熱頭痛脈當浮今反沈少陰脈沈法當無熱今反發熱也以其無頭痛故為少陰以其有頭痛故為太陽太陽脈當浮今不能浮者以裏虛久寒正氣衰微所致又身疼痛故宜救裏使正氣內強迫邪外出而乾薑生附亦能出汗也少陰脈沈無頭痛當不發熱今反發熱知寒邪在表鬱閉而為熱故用麻黃細辛以發表邪之熱附子以溫少陰之經熟附配麻黃發中有補生附配乾薑補中有發也至第二證言得之二三日病氣尚淺比之前證稍輕又無裏證變見故宜微發汗所以去細辛加甘草是汗劑之輕者也活人書即去無證二字改作常見少陰熱陽證者如經云心中煩不得臥或咽聲不出者或欬而嘔渴或口燥咽乾或腹脹不大便是也夫豈麻黃附于甘草湯所可治耶○復有三陰轉屬胃府宜下者如傷寒脈浮而緩手足自溫是為繫在太陰太陰者身當發黃右小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明也又少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯厥陰下利讞語有燥屎者小承氣湯下之是心更有三陰轉出肌表宜汗者如太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯少陰中風陽微陰浮者為欲愈厥陰病下利後身疼清便自調者急當救表宜桂枝湯厥陰病嘔而發熱者小柴胡湯又有少陰變熱回陽者如少陰病惡寒而踴時時自煩欲去衣被者可治凡此皆陰盡復陽也至於汗下誤施燮害不測東垣云太陽始病當以汗解若當汗不汗則濕熱者表而發黃發汗太過經虛風襲而成癰不當汗而汗迫血妄行而成衄大便不可妄動動早為犯禁當汗誤下則引邪入裏而為痞結懊憹協熱利當下誤汗則為亡陽厥竭讞語小便不可輕利利之為犯本若渴而自汗多雖小便不利為陽明經熱不可誤用五苓蓋五苓為太陽裏證下藥其功在於驅胃中濕熱而救津液故仲景又有小便數大便鞭不更衣十日無所苦渴者宜五苓散之例一以自汗多而渴為津液耗散故禁利水傷津藥一以小便數而渴為濕熱內盛故宜驅熱利水藥此當利不當利之別也若當利不利必就陽明燥火而成畜血發黃不當利而利必耗膀胱津液而成燥血發狂此皆誤治之失也○又按活人書云傷寒陽明證宜下少陰證宜溫太陽明之經證身熱目疼鼻乾頭痛可宜下乎少陰之傳經熱邪可宜

溫乎。况溫病熱病之少陰尤不可溫也。自奉謠此說行後世蒙害者不少矣。○又兩感證先救裏以四逆湯後救表以桂枝湯。長沙本云先後發表攻裏未嘗言救裏也。今以攻為救豈不相背。若用四逆湯是以火濟火而腹滿譏語囊縮等證何由而除。兩感雖為死證亦不當如是處治也。○至於直中三陰寒證仲景在太陰則曰藏寒以太陰居中邪不能入必因冷物受傷也在少陰不曰中寒即曰少陰病者以少陰本寒水藏若陰寒中藏必死今受病者少陰經耳。故處方皆用溫經在厥陰乃曰中風以風喜傷肝也。○凡六經中俱有中風傷寒之辨如太陽脉浮有汗為中風浮緊無汗為傷寒陽明善饑為中風不能食為傷寒耳聾脢滿為中風口苦咽乾為傷寒若三陰風寒無變異形證但以四肢煩疼為中風手足寒厥為中寒耳。○凡傳經少陰熱證在本經失治或治之未當則復傳厥陰熱深厥亦深而咽痛者為喉痹嘔者轉為吐雜膿下利者轉為便膿血甚者發熱厥逆躁不得臥仍是腎氣先絕而死矣。○凡虛寒凍證多少陰厥陰然少陰最忌發熱發熱則恐腎中真陽飛越厥陰最喜發熱發熱則陰盡復陽但少陰發熱必大發躁悶亂不安誠為危候若利止厥回脈見陽微陰浮又為欲愈之徵也。厥陰發熱則厥逆止而漸溫腹脹少緩而囊縱吐利止而思食方為陰盡復陽若見煩熱消渴脈數又為真陰灼爍之象矣。○又有少陰中風證按盛起東云凡初起但覺畏寒饑不能食欲吐不吐腹濡滿大便祕小便頻數及多脈來弦細浮弱按之無根此為少陰本虛自中之風慎不可以其腹滿不大便而誤下之下之必不可救也。蓋寒則自利腹痛風則腹滿不大便而按之不堅寒則小便清利風則小便頻數寒則身冷厥逆風則自覺煩熱而手足煩疼寒則嘔逆不食風則欲吐不吐饑不能食稍食則脹滿不禁寒則脈來沈細風則脈來浮弱以風本陽邪上逆與寒證陰邪下泄不同即如中風之合病則嘔傷寒之合病則利是也。○傷寒外編云病在三陰皆有下利腹痛厥逆躁渴但屬於陽者必先發熱頭痛漸至唇乾舌燥煩渴喜冷飲面色光彩語言清亮手足溫燥爪甲紅潤身輕易於轉側呼吸出於自然小便或赤或澀脈來浮洪數大此陽證也至四五日後傳進三陰血分變出四肢厥冷乍溫或燥結或下利躁渴潮熱自汗譏妄揚手擲足氣息喘急小腹痛不可按舌上胎厚而黃黑甚則芒刺燥裂脈沈而滑皆三陽傳變之熟證其或身寒逆冷神氣昏昏脈來沈實附骨乃火極似水緣陽邪失於汗下所致雖身冷而不欲近衣雖神昏而氣色光潤雖腹痛必脹滿而喘急不可按捺下利傍流清水小便黃赤大便或祕或黑厥逆亦不過肘膝厥過即發熱厥深熱亦

深也。此為陽極似陰，不可誤認為寒而溫之。○若發於陰者，始病不發熱無頭痛，便自利厥逆，腹痛口不渴，身體沉重，難以轉側，嘔吐濁利，惡寒踴臥，戰慄吐沫，手足指冷，厥逆爪甲青黑，面如刀刮，顏色黯慘而不光，舌上雖黑而無胎脈，來沈遲細小，皆三陰自中之寒證。其或面赤戴陽，身有微熱，咽乾煩躁，脈來數疾，無倫。乃水極似火，因虛冷內盛，逼其浮陽發外也。又如始本陽證，誤服涼藥攻熱太速，其人腎氣本虛，胃氣素弱，遂變陰寒，雖發熱面赤，欲引衣自覆，而手足必寒，或躁渴欲飲水而不能嚥，或嘔噦而欲逆，或咽痛而鄭聲，時噪悶亂，欲坐卧泥水中稍袒露即畏寒，莫禁。腹痛可按可揉，而不鞭滿下利，清穀白沫及淡黃水，小便清白。厥逆過肘膝而不復熱，舌上略有黑胎，與灰色胎，雖老必極薄無津，而不燥裂無芒刺。脈多沈細，或浮大數疾，按之必虛軟無力，不鼓擊於指下者，此為陰極似陽，不可誤認熱證而下之。此證急溫，尚且十難救，一下之百不一生矣。○喻嘉言云：凡傷寒初起發熱煎熬津液，鼻乾口渴，便祕漸至發厥，不問知其為熱也。若陽證忽變陰厥，從古至今無一也。蓋陰厥得之一起便直中陰經唇青面白，遍身冷汗，便利不渴，身踰多睡，醒則人事了了，與傷寒傳經之熱邪轉入轉深，人事昏惑者，萬萬不同。如先犯房勞，而後傷寒，世醫無不為陰證，往往投以四逆等湯，促其暴亡，而諉之於陰極莫救，總由傳派不清耳。蓋房勞而病外感者，其勢不過比常較重，以陰虛陽往乘之，非陰盛無陽之比。汗下藥中，不過稍加甘溫照顧元氣耳。且仲景明言：厥多熱少，則病進；熱多厥少，則病退。厥愈而熱過久者，必便膿血發癰，厥應下而反汗之，必口傷爛，亦先厥後熱，利必自止。見厥復利，利止反汗出咽痛者，其喉為瘍，厥而能食，恐為陰中，厥止思食，邪退欲愈。凡此之類，皆熱深厥深之旨。原未論及於厥陰也。至於陽分之病，而妄汗吐下，致汗多亡陽，吐利煩躁，四肢逆冷，皆因用藥差誤所致，非以四逆真武等湯挽之，則陽不能回。亦原不為陰證立方也。蓋傷寒發熱發渴，定然陰分先病，以其誤治陽分，比陰分更虧。不得已從權用，辛熱先救其陽，與純陰無陽，陰盛陽之證，相去天淵。不知治陰證以救陽為主治，傷寒以救陰為王。傷寒縱有陽虛當治，必看其人血肉充盛，陰分可受陽藥者，方可回陽。若面色黧黑，身如枯柴，一團邪火內燔者，則陰已先盡，何陽可回，而敢助陽劫陰乎？證治方云：若證未辨陰陽，且與四順九試之即理中，倍甘草，可見從前未透此關，縱有深心，無可奈何耳。至於元氣大虧，陰盛格陽之證，庸醫往往反認陽證，處施下藥，殺人多矣。今羸工治傷寒，漫不辨其名證，一見發熱，其初槩用表藥，不論虛實，不分經絡，雜用三陽經藥，表之不愈，五六日間，稍見

胸腹滿悶便以承氣下之。汗下不效別無措手。委之天命。總由未得傷寒真訣耳。

傷寒者。冬時嚴寒。感冒殺厲之氣而病也。交霜降節後。春分節前。病發熱頭痛者。皆謂之正傷寒。始風寒之在太陽經。必惡寒。發熱。頭項痛。腰脊強。脈浮而緊。無汗不能食。為傷寒。麻黃湯。若尺中遲弱者。為衛氣不充。當用黃耆建中。為主。若陽虛不能作汗。或面色戴陽。足冷夾陰者。再造龍脈浮而緩。自汗能食者。為中風桂枝湯。脈浮緊而數。身疼不汗出。發熱煩躁。為風寒兩傷。大青龍湯。若脈浮緩自汗。身不疼但重。乍有輕時。無少陰證。或乾嘔。或欬。或渴。或利或噎。或小便利。少腹滿。或喘。為心下有水氣。小青龍湯。太陽經表邪不已。或犯膀胱之本。或入陽明之府。或傳陽明之經。所謂犯本者。如太陽經發汗不解。誤用利水藥。熱結膀胱。小便難。煩渴引飲者。五苓散。若自汗多者。屬陽明。則又禁用五苓。恐重竭其津液也。如狂喜忘為畜血。桃核承氣代抵當選用。火迫利汗。亡陽驚狂。起卧不安者。此火逆犯本也。救逆湯。如脈浮數而嘔吐者。必傳陽明經。其證身熱目疼。鼻乾不得眠。頭痛自汗。而脈長。桂枝加葛根湯。有食必作脹悶。更加橘半枳朴。若自利者。葛根湯。嘔加半夏。稍遲必入陽明之府。其證日晡潮熱。手足熱。熱自汗而脈滑。此屬胃實。俟其結定。用承氣輩攻之。如陽明不入府。邪氣在經未罷。必傳少陽。其證頭疼目眩。耳聾口苦。脈弦腸痛。寒熱往來。小柴胡湯。蓋少陽居表裏之半。外有太陽之惡寒。內有胃府之惡熱。故往來寒熱。少陽與厥陰為表裏。少陽主邪欲入。而寒熱交爭。厥陰主邪欲出。故厥逆反覆也。少陽寒熱往來。六七日至十餘日。大便不行。腋下汗出。方可用大柴胡微利之。緣膽無出入。瀉土所以瀉木也。如八九日脈下無汗。為膽未實。誤用承氣下之。必犯少陽之本。則胸滿驚憊。小便不利。讞語。一身盡重。不可轉側者。柴胡龍骨牡蠣湯。至傳三陰。太陰則腹滿嗌乾。下利。而脈沈細者。小建中和之。因誤下陽邪。內陷而腹痛者。桂枝加芍藥。痛甚加大黃。此闕乎平昔元氣盛衰。及有無宿滯之分也。熱傳少陰。必口燥舌乾而渴。脈沈下利。邪熱奔迫故也。若手足微逆者。四逆散。若下利清水。心下鞭痛而讞語者。大承氣湯。又有元氣素虛。或汗下過劇。陽氣傷而成虛寒證者。不可執認傳經而禁絕溫補也。熱傳厥陰。則有下奪外解之分。若手足厥寒。脈細欲絕。或下利脈大而腸鳴者。並用當歸四逆湯。若誤下而脈沈厥逆。自利煩滿。囊縮小承氣湯。若脈浮緩而囊不縮。雖厥逆下利必自愈。乃陰盡復陽。風從木化也可。與小劑桂枝湯助其作汗而解。此六經證治大略耳。其他誤治變證詳續論六經諸篇。及細證例中。此不復贅。○傷寒汗後熱不退。仍頭項強痛。而勢稍

濶者更宜汗之。若反劇煩擾者必有夾食夾痰或有宿病之故當推其源而治之。大凡汗後熱不退作危證斷之。若汗後熱愈甚脈躁疾名陰陽交者死傷寒五六日裏證具而下之。下後熱不退胸中堅滿不消或腹中疼痛不止脈尚數實者此為下未盡或下後一二日更煩熱喘滿者並可用小承氣湯復下之。若大下後身熱不退心中結痛懊憹頭汗梔子豉湯湧吐之。凡傷寒六日傳六經為一候七日當解。若不解再傳至十三日謂之過經不解二十餘日不解謂之再過經不解。宜詳虛實輕重或和解或下奪之。若脈尺寸陷者大危若過經不解脈虛數人弱發熱口乾舌燥者此為虛證不可下以參胡三白或小柴胡增損主之。至於愈後餘熱不盡伏留藏府經脈之間致變他病不一。如邪火伏於脾則變中滿不食。伏於胃移熱於脾則變休息痢伏於心移熱於小腸則變淋血溺痛。痛甚則小便不通多不可治。伏於肝則變囊癰。伏於肺則變肺癰吐腥。伏於腎則變羸瘦怯弱。伏於脾胃之間則變癰臥不起久而成痿。伏於肝脾之分邪正交攻則變瘍瘍。至若太陽少陽失汗則毒結頸項之間謂之發頤陽明少陽失下則邪結於藏府之內多成癰腫凡此皆傷寒大病後餘邪為患也。

若兩感於寒者一日太陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴易老用大羌活湯主之此專在表也二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食讞語黃連解毒湯主之此意在和也三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥雙解散主之此重在裏也至水滌不下不知人事者六日死若三陰三陽五臟六府皆受病則榮衛不行藏府不通而死矣。則知一藏一府受病猶可治也按兩感皆是熱邪亢極之證朱氏妄言前三日真為病寒以四逆湯急溫裏後以桂枝湯急解表而方書又有用麻黃附子細辛湯之說殊不知傳經者皆屬陽證陰證本無熱邪安得有傳變之理即傷寒之病兩感者亦少惟溫病熱病居多以溫熱感從少陰發出太陽即是兩感之證所以守真特立涼膈雙解白虎承氣等湯以兩解溫熱病表裏之熱毒也非特溫熱病之有兩感也凡下元虛人染患疫癟多有三日斃者蓋疫癟之勢較傷寒更劇所以死在三日也傷寒例所言六日死者是言傷寒之兩感素問所言三日死者是言熱病疫病之兩感也非特溫熱疫癟之有兩感也即如冬溫之發於太陽少陰故始咽痛而後自利豈非兩感之證乎。若陽氣素虛之人始病無發熱頭痛便惡寒踴卧腹與少腹痛自利厥逆脈沈者為真陰經寒證太陰但有內寒而無外寒病則胸膈滿手足寒臍上痛下利清穀而不渴必因內傷冷物所致宜理中湯甚則加附子下利不止宜

四逆湯少陰有寒有風寒則四肢厥冷吐利而渴渴不能飲。惡寒踴坐身體疼。當臍下小腹痛。此腎藏真陽不足所致。宜四逆湯。口中和。背惡寒者。附子湯。發熱脈沈麻黃附子細辛湯。風則但覺畏寒而不厥冷。自言腹滿而按之則濡。大便祕小便頻欲吐不吐臥而欲起。恍惚多驚心懸若饑稍食則痞脹不寔。舌上灰黑或淡紫帶青。脈來弦細浮弱。以風性上行。故其證頗似太陰。而實少陰中風之證。最難辨别。宜桂枝湯加乾薑下虛甚者。面赤戴陽。急用桂枝人參湯加葱白生附。陰結不大便。脹滿不能食者。四逆湯下金液丹。誤用寬服藥必轉劇。若攻下必死。厥陰但有中風而無中寒。若其人胃氣素常虛寒者。則乾嘔吐涎沫頭痛。吳茱萸湯加桂枝。若腎氣素虛者。面赤戴陽。急用桂枝四逆湯加肉桂。凡陰證多有陰極似陽。煩躁面赤。脈數疾無倫。躁過必畏寒渴不能飲。此不獨真陽下虛。而陰氣亦虛。不能內守。致虛陽擾亂而上泛外亡也。急宜通脈四逆白通。加豬膽汁及益元湯治之。蓋陰盛於裏則躁煩下虛。則虛陽上泛。故面戴陽而煩渴。內無熱故渴不能飲。陽虛陰亢故身熱脈大而疾。但無力耳。陰證惡寒厥逆。為陰經受寒。雖陽氣微不至於劇。故止宜溫經。若陰極似陽者。為陽氣衰微不能制其浮火。宜兼溫補。冬則白通通脈四逆。輩夏則大順漿水冷香等。然總不離辛熱也。

若交一陽後。天令大寒。有卒然倒仆。昏不知人。手足逆冷。或口吐白沫。嘔逆清水。唇青面黑。口鼻氣息微冷者為中寒。按丹溪曰。中寒者。倉卒受寒。其病即發而暴。蓋中寒之人。乘其腠理疏豁。一身受邪。難分經絡。無熱可散。溫補自解。此胃氣大虛。不急治。去生甚遠。○戴元禮曰。中寒是身受肅殺之氣。口食瓜果冰水冷物。病者脈必沈細。手足冷。息微。身躁。雖身熱亦不渴。倦言語。此言夏月中寒。大順冷香或附子理中浸冷服。若脈數飲水煩躁動搖者。皆是熱證。寒熱之異。若水火也。不可得而同治。誤則殺人。若在冬月中寒法當溫散。輕則附子理中。甚則白通通脈劇。則震憲火焰。庶可挽回。緩則不救。○中寒之色必青。唇口青。身冷脈脫為入藏。即死。身和汗自出為入府。即愈。經曰。血氣并走於上。則為大厥。暴死中寒脉散者。死。尺脈遲滯沈細。寒在下焦。○經云。陰盛生內寒。因厥氣上逆。寒氣積於胸中而不瀉。不瀉則溫氣去。寒獨留。留則血凝。血凝則脈不通。其脈盛大以濇。故中寒。夫經既言陰盛生內寒矣。又言故中寒者。豈非內寒先生。外寒後中之耶。經既言血凝則脈不通矣。又言其脈盛大以濇者。豈非以外寒中。故脈盛大。血脈閉。故脈濇耶。此中併有大疑。請光明之一者。人身衛外之陽最固。今不由三陽而直中少陰。蓋厥氣上逆。積

於胸中則胃寒。胃寒則口食寒物。鼻吸寒氣皆得入胃。腎者胃之關也。外寒斬關直入少陰腎藏。故曰中寒也。此內經所隱而未言者也。一者其脈盛大以濤。雖曰中寒尚非卒病。卒病中寒其脈必微在傷寒證。惟少陰有微脈。他經則無其太陽膀胱為少陰之府。續見脈微惡寒。仲景早從少陰施治而用附子乾薑矣。蓋脈微惡寒正陽微所致。腎中既已陰盛陽微。寒從內生。復加外寒斬關直入或沒其陽於內或逼其陽於外。其人頃刻云亡。故仲景以為卒病也。○寒中少陰行其嚴令埋沒微陽。肌膚凍裂無汗如喪神守。急用白通湯為主治。蓋薑附追復元陽。加葱白以散寒。加猪膽汁引入陰分。然恐藥力不勝。更以葱覆臍中。升灸氣海關元數十壯。取脈漸來手足溫為效。必外內協攻。乃足破其堅凝。少緩須臾必無及矣。○若其人真陽素擾。腠理素疎。陰盛於內。必逼其陽亡於外。魄汗淋漓。脊項強鞭。用薑附猪膽汁。即不可用葱及熨灼。恐助其散令氣隨汗脫而陽無由內返也。○用薑附以勝陰復陽。使既散之陽急復。不知此義者。加增藥味。反牽制其雄。入之勢必致迂緩無功也。○其次前藥中即首加當歸肉桂兼理其榮。以寒邪中入。先傷榮血故也。○其次前藥中更加人參甘草。兼調其氣。不爾。恐薑附之猛。直將犯上無等矣。○用前藥二三劑後。覺其清陽在躬。運動頗輕。更加黃耆白朮五味。白芍陰陽平補不可歇手。○用羣隊之藥。以培陰護陽。其人即素有熱。耗陽出。早已從陰而變寒。至此無形之陰寒。雖散而有形之寒痰阻塞。竊隧者。無由遂轉為熱。薑附固可勿施。其牛黃竹瀝一切寒涼。斷不可用。若因其素有挾熱。妄投寒劑。則陰復用事。陽即擾亂。必墮前功也。○用平補後。嗣後總有頑痰。留積經絡。但宜甘寒助氣開通。不宜辛辣助熱壅塞。蓋辛辣始先不得已而用其毒。陽既安堵。即宜休養其陰。切勿喜功。生事轉生他患也。

至於冬時。反有非節之暖。此屬春時陽氣發於冬時未至而至。即為冬時不正之氣。人感之而病者。名曰冬溫。冬溫雖發於冬時。治法與傷寒大異。蓋溫則氣泄。寒則氣收。二氣本相反也。其證必心煩嘔逆。咽痛。身熱頭疼。或咳嗽自汗。或頭重面腫。但始先咽痛。後必下利。陽脈浮滑。陰脈濡弱。與風溫不異。但時令不同。治之不得不為少異也。按羅謙甫云。冬溫一證。雖關不正之氣。而實正氣虛。故邪得以入於少陰。其經上循喉下入腹。故咽必痛。或下利也。治之宜用陽旦湯。加桔梗。姜蕤。或問冬溫何以竟入少陰。而前所治方亦非少陰之藥。其故何也。石禎曰。大凡四時各有正令。冬月當寒而反不寒。則少陰之氣不藏而不正之氣得以入傷其經。原非腎藏受病故。但以桂枝湯中加黃芩。

一味專主驅散風熱不須更用他藥此仲景陽旦湯所由立也若有寒食停結或誤用寒涼藥食則寒邪外鬱溫邪中結冷食內伏更加入乾姜一味以溫散其中兼黃芩以涼解其外此仲景之陰旦又所必需若咽痛甚者則合甘草湯或者合桔梗湯下利合茯苓甘草湯或陽旦加葛根茯苓不應則溫熱之氣併於明陽而蘊熱也葛根黃芩黃連湯若先受冬溫更加嚴寒外遏則外證雖惡熱煩躁而仍畏寒欲近衣者陽旦湯加麻黃石膏以發之有冬溫誤認傷寒而與辛溫表藥熱邪熱甚而胸腹滿悶醫者不察見其脈悶而屢用下藥大下後仍發熱無休止時脈反數者此陰血傷故也朝用獨參湯暮進六味丸此陰陽俱虛氣血俱弱故熱不得止息所以用六味必兼獨參湯以資陽生陰長之功若服後熱勢漸解飲食漸進神氣漸清脈息漸和者方可收功今世遇冬溫之證鮮能辨識槩以傷寒法混治致變斑黃喉痹利膈血等證者皆由誤治所致也若誤用辛溫發汗而發斑成溫毒者當用犀角升麻甘草等分煎服或升麻葛根湯加犀角黑參湯之類選用然冬溫為病亦自不一當隨所見證治之凡冬溫溫毒大便泄瀉而譟語脈虛小手足冷者皆不治也

若春夏秋三時感冒非時暴寒謂之寒疫亦曰感冒夾食則曰停食感冒雖非時行疫氣以非其時而有其氣故謂之寒疫而實非疫也其證發熱惡寒頭疼骨節痛無汗或嘔逆恶心其脈人迎多浮緊亦有弦數者夾食則氣口緊盛亦有滑數者若夾寒食則滯夾風寒則浮滑而疾也然又有人迎沈小絕不似外感者見停食感冒之脈有人迎極短小氣口極弦細其人自言傷食受寒服發散羸消導之藥一二劑脈反浮大則知未服藥時脈沈小皆為寒食鬱滯故也大抵治非時感冒止宜辛平解散如參蘇飲芎蘇散香蘇散神朮湯皆可選用有食正氣散按證加減如見太陽羌活防風陽明葛根葱白少陽柴胡半夏若天氣未熱病勢頗盛不妨從權稍加桂枝佐羌活輩汗之蓋冬溫之與寒疫俱是非時邪氣用藥亦不可拘於常候猶冬溫之用辛涼寒疫之用辛溫也宜矣即如溫病熱病而見脈緊暴寒黃芩白虎湯中未嘗不稍加桂枝五七分也此證不必拘傷寒六經例治大率春分已後則少陽風木主令況春時之寒必兼之以嶺峭之風傷少陽少陽在內則太陽陽明在外病則三經俱受所以古人治寒疫之方咸不分三陽而治但見某經證多則加用某經之藥為權衡耳若治之不得其宜後變壞病則與傷寒無異也蓋非時暴寒雖從時令傷犯然寒則大都不越太陽以寒氣而犯寒水之經從其類也即如夏月暑寒之證多有頭痛

骨節疼惡寒者此非太陽之證歟

若夫天時寒暖偶因脫露謂之傷風其證必欬嗽自汗清涕甚者亦發熱頭痛但治有時月之殊春月風喜傷肝人迎脈多緩而帶弦必自汗惡風宜葛蘇散加減夏月肌肉本疎多傷陽明病則肌肉因閉氣口多見弦長而反無汗宜葛根葱白湯加減兼暑消暑十全散秋月微涼先鬱皮毛手太陰受邪人迎脈多平而氣口脈多細濶不可拘人迎以候外邪也宜金沸草散加減冬月則傷太陽必自汗脈浮緩宜桂枝湯欬甚而喘有水氣宜小青龍湯蓋陽邪多從背受由背俞而入於肺故必欬嗽生痰也然傷風與傷熱證類相似傷風則人迎浮大欬嗽自汗鼻流清涕痰必從喉中噏出發散則愈傷熱則氣口軟大欬嗽自汗但鼻乾痰結咽脣腫痛痰從上脣咯出為異不可發散宜辛涼清肺為主姜蕤湯去麻黃川芎加前胡薄荷傷風而復傷熱必加躁煩宜姜蕤湯倍羌活石膏有酒客濕熱素盛痰飲結聚中外最易傷風素問謂之漏風其證身熱解憤汗出如浴惡風少氣治以澤朮麋卿湯以三指撮為後飯今治此證以澤瀉生朮各五錢黃耆三錢葛根防己羌活麻黃各一錢熟服取汗最效又方以桂枝湯加黃耆麻黃根防風半夏厚朴每遇發時煎取一二劑後用黃耆白朮防風澤瀉茯苓之屬調理肥盛多濕熱者導痰湯加羌防最當又有接內時偶感微風藏於腎經則內風與外風相召極易傷風素問謂之內風其證面脰癰然腫不能正偃正偃則欬宜小青龍去麻黃加杏仁甚則加附子先去客邪次用真武湯治本然後更以腎氣丸調理又有素虛勞人更感風寒裏急腹痛憊弱失精煩熱口燥者桂枝湯加龍骨牡蠣主之

至春分節後天令溫暖有人壯熱為病者乃溫病也經云冬傷於寒發為溫病又云太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病言冬時伏氣隨時溫熱發出但所發之因不同有感非時暴寒而發者有饑飽勞役而發者有房室作力而發者所感之客邪既殊發出之經絡亦異所謂溫病之脈行在諸經不知何經之動也當隨其經證而治之凡溫病之發必大渴煩擾脹滿口苦不惡寒反惡熱脈氣口反盛於人迎明係伏邪自內達未必先少陽經始若因客寒而發者宜小柴胡隨所見經證加減無客邪者黃芩湯主之然溫病亦多傳變併合未有不及少陽者如太陽少陽合病黃芩湯少陽陽明合病承氣湯三陽合病大柴胡湯或雙解散加減凡三陽表證煩熱口渴俱宜黃芩湯之類據此合病證治則傳變併病可例推矣大抵治溫病熱病無正發汗之理蓋其邪自內達外無表證明矣若果證顯非時

暴寒惡寒頭痛而脈浮緊者亦不可純用表藥宜施子歧湯或益元散加薄荷葱豉重則涼膈散去硝黃加葱豉探吐取汗最妙蓋此怫鬱之熱乘溫之氣而發雖有非時暴寒止宜辛平之劑發散若頭痛如破者爲暴感寒風勢盛先宜葛根葱白湯撤其暴邪然後用治溫病本藥若額與眉棱俱痛選奇湯脈弦而兩額角傍痛寒熱口苦小柴胡去參半加桔梗薑根若表證不解邪復入府者雙解散若汗下不解脈轉洪大數盛表裏皆實讒妄狂越此熱在三焦也三黃石膏湯凡溫病下後熱不退下證尚在再三下之以熱退為度若熱不止而脈濶咽痛胸滿多汗者此熱傷血分也葶苈苦酒湯探吐之雖熱退尚全愈者隨證調之凡下之前後或大汗將出或大汗已出或未下後餘熱不止而反大汗淋漓此實熱雖去而餘邪未盡再與小劑黃芩湯或解毒湯調之若下後渴雖減而饑欲得食者此伏邪初散陰火乘虛擾亂也凡溫熱下後多此慎勿便與粥飲得食必復若汗下後一切煩渴引飲須以水細細飲之渴未止者頓頓時與不可過多以成留飲不散也設若不與飲之則燥熱轉甚危而死矣○世所謂交陽者非陰寒交熱以為陽熱也乃怫熱畜之於裏而鬱極乃發則交傳出於表之陽分是謂交陽而後作汗也或怫鬱過極而不能交出於表者是鬱極不發否極不泰即正氣衰殘陰氣先絕陽氣後竭而死矣大欲汗而脈忽沈伏者陽氣並入於裏故也交陽而躁亂昏冒者裏熱鬱極故氣亂則神昏而躁擾也凡欲作汗無問病之微甚或已經新下者或下證未全者咸以涼膈散調之甚者宜黃連解毒湯或下後二三日或未經下腹滿煩渴脈沈實而有下證者三一承氣湯下之勢劇者合黃連解毒湯或已戰不快或戰後汗出不快或微戰數次經大戰而汗不出者乃并之不甚戰而病不去也通宜三一承氣湯或更合黃連解毒湯下之以散怫熱而開鬱結也所以戰汗時頓與熱薑湯助其開發最佳免致戰不快而無汗之患大法曰脈浮不可下溫熱病已有裏證脈沈後二三日脈反漸浮汗不能出者俗未知直以惡寒戰慄為陽虛陰勝因而誤治者多矣凡溫病發於三陰脈微足冷者多難治內經所謂病溫虛甚死是也凡溫病大熱脈反細小手足逆者死證也凡溫熱病初起大熱目昏讞語熱甚脈小足冷五六日而脈反躁急嘔吐昏沈舌本焦黑或失血躁熱脈大或痙攣皆亂或脈促結代沉小者皆死溫病熱病大熱不得汗者死得汗

後而反熱其脈躁盛者亦死也。凡溫病熱病不當汗而誤汗之狂言不能食其脈躁盛者皆不可治也。凡溫病之熱感從內而發於表所以最忌辛溫發汗發汗多致不救也。故仲景云太陽病發熱而渴者為溫病若發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必譫語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘛瘲若以火薰之一逆尚引日再逆促命期此溫病誤汗而為風溫也又傷寒例云陽脈浮滑陰脈濡弱更遇於風變為風溫此溫病更遇於風之風溫也以少陰伏邪方將發出太陽客邪又從外襲表邪新入裏邪初出故其脈輕則浮滑重則濡弱即上文陰陽俱浮之互辭言伏於少陰之邪熱悉從風木之令而發出於肌表故其證一一盡顯太陽少陰二經又嘗見冬溫一證每多誤汗而成溫毒發斑者亦有誤施汗下而變咽喉不利唾膿血者蓋冬溫亦屬太陽少陰證緣誤治而併傷厥陰之經也按風溫一證仲景但言誤治之失並不論及治法者以其既經誤治即欲挽回末由也已喻嘉言嘗謂風溫多死於三日者謂其即是兩感而更加變重耳不但溫病之不可以傷寒寒疫法治也即冬溫亦不可以傷寒例施也因其發在冬時故誤治尤多所以仲景厥陰例中有麻黃升麻湯一條正以治冬溫之誤治而變咽喉不利唾膿血者即此而推可用麻黃升麻湯去麻黃升麻乾薑白朮而借治溫病誤發其汗之風溫也并可悟黃芩湯加桂枝石膏治溫病更遇於風之風溫也○再按風溫一證仲景絕無方藥而活人書治法頗多參其所主之方皆是治先傷熱而復感風或已傷風而更受熱之證近世亦曰風溫較伏氣所發者雖死生輕重懸殊而究治之理則一似風疫結聚於肺故汗下兩難汗之則譏語煩熱不得臥善驚目亂無精多汗身重下之則小便難大便利不止尤不可用溫鍼則耳聾難言鍼溫止宜辛涼解熱兼疏風利痰然雖禁發汗又不得不兼用表藥但禁溫覆迫汗耳若發熱頭眩咽喉乾痛舌强痞滿者用姜蕤湯無大熱而渴用枯萎根湯熱不解用敗毒散寒熱而渴小柴胡加姜蕤桔梗恐寒發熱本方去參加枯萎石膏渴者去半夏加枯萎根舉世皆以風熱咽痛唾痰聲溫者為風溫雖治法不遠殊失風溫本旨矣尚論以春月時令本溫且值風木用事風溫二字不得分之為兩凡病溫者悉為風溫是又矯揉太過矣

夫春夏溫熱之邪能傳染者即時行疫癘也吳又可曰瘟疫之邪皆從口鼻而入不在經絡舍於伏脊之內去表不遠附近於胃乃表裏之分界是即內經瘧論所謂橫連募原是也凡人本氣充滿邪不易入適逢虧久因而乘之感

之淺者。待有所觸而發感之深者中而即病也。其始先陽氣鬱伏，凜凜惡寒，甚則四肢厥逆。既而陽氣鬱發中外，皆熱發，即昏昏不爽。壯熱自汗。此邪伏於募原，即使汗之，熱不能解。必俟伏邪外發，表氣潛行於內，精氣自內達表。此時表裏相通，大汗淋漓邪從外解。此名戰汗。當即脈靜，身涼而愈。若伏邪未靜，必復發熱，至伏邪已發，其證或從外解，或從內陷。更有表裏先後不同，有先表而後裏者，有先裏而後表者。有但表而不裏者，有但裏而不表者。有表而再表者，有裏而再裏者。有表勝於裏者，有裏勝於表者。有表裏分傳者，此為九傳從外解者。或發斑或戰汗，狂汗自汗，盜汗。從內陷者，胸膈痞悶，腹痛燥結，熱結傍流，協熱下利，或嘔吐惡心，譏語舌胎。當因證用治。疫脈不浮不沈，而數。晝夜發熱，日晡益甚。頭疼身痛，宜用達原飲，以透達募原之邪氣。若見少陽陽明太陽隨經加柴胡葛根羌活，為引以提其邪出陽分也。然證有輕重不等，樂之多寡隨宜，務在活法。感之輕者，舌上白胎亦薄，熱亦不甚。脈亦不數。其不傳裏一二劑自解，稍重者必從汗解。如不能汗，邪氣盤錯於募原也。只以本方主之。感之重者，舌上胎如積粉，服藥後不從外解，而從內陷，舌根先黃，漸至中央。此邪漸入胃也。前方加大黃下之。若脈長而洪數，大汗多渴，此邪氣適離募原，欲表未表，白虎湯證也。如舌上純黃色，兼見裏證，此邪已入胃，乃承氣湯證也。有二三日即離募原者，有半月十日不傳者，有初得之四五日，而淹淹懾懾五六日後，陡然勢張者，元氣勝者，毒易傳化。元氣薄者，邪不易化，即不易傳。如他病久虧，適逢時疫，能感不能化，安望其傳？不傳則邪不去。淹淹日久，愈沈愈伏，設誤認虛證而進參耆，愈墮愈固，不死不休也。○疫邪為病，有從汗解者，有無汗竟傳入胃者。有自汗淋漓，熱渴反甚，終得戰汗方解者，有冒氣壅鬱，必從下乃得戰汗而解者。有汗解裏未和，越三五日復發者，有發黃因下而班出者，有竟從發班而愈者，有裏證急，雖有班，非下不愈者。此雖傳變不常，亦為常也。又有局外之變，男子適逢接內，或向來下元虛空，邪熱乘虛陷於下焦，氣遂不舒，致小便祕塞，小腹脹滿，至夜發熱，與導赤五苓不効，得大承氣一服，小便如注而愈。女子經水適來，適斷，失血崩帶，及心痛疝，氣疾，火喘急，凡此皆非常變，蓋因疫而發舊病，但治其疫而舊病自己然。大勞大慾，大病久病，後此為四損，以正氣先虧，邪氣自陷，多不可救也。○瘟疫發熱一二日，舌上白胎如積粉，早服達原飲一劑，午後舌變黃色，隨現胸膈滿痛，大渴煩躁，此邪毒傳裏也。前方加大黃下之，煩渴少減，熱去六七，午後復加煩躁發熱，通舌變黑，生刺，算如烟煤。此邪毒混合三焦，復汎到胃，急投大承氣，傍晚大下，至夜半熱退。

次早胎刺如失。此一日之間而有三變。數日之法。一日行之。因其毒盛傳變亦速。用藥不得不緊。設用緩劑。必死無救。嘗見瘟疫二三日即死者。皆此類也。○瘟疫初起。脈雖數。未至洪大。其邪尚盤結於募原。宜達原氣。誤用白虎。既無破結之能。但求清熱。是揚湯止沸耳。若邪已入胃。非承氣不愈。誤用白虎。既無逐邪之能。徒伐胃氣。反抑邪毒。致脈不行。因而細小。又認陽證。陰脈益不敢下。湯藥雜進。愈投愈危。當此急投承氣。庶可救也。○邪伏於募原。表裏之間。至其傳變或出表。或入裏。或表裏雙傳。醫見有表復有裏。乃引經論先解其表。乃攻其裏。此大謬也。嘗見大刺麻黃一毫無汗。轉加煩躁者何耶。蓋發汗之理。自內以達表。今裏氣結滯。陽氣不得敷布於外。即四肢未免厥逆。又安能氣液蒸蒸以達表。譬之水注閉其後竅。則前竅不得涓滴。與發汗之義同。凡見表裏分傳之證。宜承氣湯。先通其裏。裏氣一通。不待發散。多有自汗而解。裏證下後。脈浮而微數。身微熱。神思不爽。此邪熱浮於肌表。裏無壅滯也。雖無汗。宜白虎湯邪。從汗解。若大下後。或數下後。脈空浮而數。按之豁然如無。宜白虎加人參湯。覆蓋即汗解。下後脈數而浮。原當汗解。遷延五六日。脈證不改。仍不得汗者。以其反覆下數。致周身血液枯涸故不得汗。白虎加人參湯。以助周身之血液。鼓舞元氣。開發腠理。即得汗解也。裏證脈沈而數。當下之。下後脈浮。當得汗解。今不得汗。後二三日。脈復沈者。募原餘邪復淤到胃也。更宜下之。更下後。而脈再浮者。仍當汗解。宜白虎湯。裏證下後。熱退。身涼。越四五日。復發熱者。此非闊飲食勞復。乃募原尚有餘邪隱匿。因而發熱。此必然之理。不知者。每每歸咎於病人誤也。宜再下之。則愈。但當少與。慎勿過劑。以邪氣微也。○應下失下。口燥舌乾而渴。身反熱減。四肢微厥。欲得近火擁被。此陽氣伏也。既下厥回去火減。脈大而數。舌上生津。不思水飲。此裏邪去。而鬱陽暴伸也。○瘟疫下後二三日。或一二日。舌上復生胎刺。邪未盡也。再下之。胎雖未去。已無芒刺而軟。然渴熱未除。更下之。熱渴減。芒刺脫。日後更復熱。又生胎刺。更宜下之。凡下不以數計。有是證。即投是藥。醫人見理不透。經歷未到中道。生疑。往往遇此證。反致擔擗。但其中間有一日一下者。有應連下二三日。或三四日者。有下二日間一日者。其緩急之間。有應用小柴胡湯去參半。加桔梗根。知母者。有應用犀角地黃湯者。至投承氣。某曰應多與。某曰應少與。此非可以言傳也。但數下之。證百人中之一二人而已。○瘟疫愈後。脈證俱平。大便二三旬不行。時時作嘔。此為下格之證。蓋下不通。必返於上。宜調胃承氣。熟服宿垢頓下。嘔吐立止。慎勿驟補。少與參耆。下焦復閉。嘔吐仍作也。○凡客邪。貴乎早治。勿拘於下。不厭。

遲之說。若應下之證。見其無結糞以為下之早。而引初鞭後瘡為例。此誤也。不知承氣本為逐邪。非專為結糞而設。必俟結定。血液為熱所搏。變證迭起。是猶養虎遺患也。况有平素多濕熱人。瘡糞失下。但蒸作極臭。如敗醬糞泥。臨死不結者。假如經枯血燥之人。或老人。血液衰少。多生燥結。在經所謂不更衣十日無所苦。有何妨害。是知燥結不致損人。毒邪之為殞命也。假令滯下初起。質實而頻數者急者。與大黃下之。此豈謂結糞而然哉。○疫邪傳裏。遺熱下焦。小便不利。邪無輸泄。經氣鬱滯。其傳為禪身目如金。宜茵陳蒿湯。若用茵陳五苓。不惟不能退黃。小便亦難得利。此乃胃家移熱是以大黃為專功也。○瘟疫邪在胸膈。滿悶心煩喜嘔。腹不滿。欲吐不吐。欲飲不飲。欲食不食。此邪熱與痰飲結聚胸中也。宜瓜蒂散吐之。○邪留血分。裏氣壅閉。非下之則班不出。班出為毒邪外解。下後班漸發。更不可大下。設有下證。宜少與承氣緩緩下之。若大下。則中氣不振。斑毒內陷。則危。宜用白芍當歸以和血。升麻柴胡白芷以託邪。大劑穿山甲末以透毒。名託裏舉斑湯。如下後班出復大下。斑毒隱伏。反見循衣撮空。脈微者。前方加人參一錢。得補發不出者死。凡發斑有汗出不徹而熱不退者。宜白虎湯。班出不透而熱不退者。宜舉斑湯。有斑汗並行。而並不透者。二湯合用。○凡時疫日久失下。自利純臭水。晝夜十數行。口燥唇乾舌裂。此熱結傍流也。急與大承氣一服。去其宿垢頓止。○凡失下以致循衣撮空。肉惕振戰。目不了了。邪熱愈盛。元神將脫。補之則邪毒愈甚。攻之則幾微欲絕。不得已用陶氏黃龍湯治之。此證不下必死。故用此法。庶幾回生於萬一也。得下後用生脈散。加地黃當歸白芍。知母陳皮甘草調之。○如方食肉而適病。致停積在胃。用大承氣湯連下。惟是臭水稀糞。其病不退。必加入參一錢在內。雖月餘所積之物。一服便下。○凡疫病有首尾能食者。此邪不傳胃。切勿絕其飲食。但不宜過食耳。有愈後十數日。微渴微熱。不思飲食。此微邪在胃。正氣衰竭。若強與之。即為食復。○凡舌胎自白而漸變黃。邪在募原。故白。在胃則黃。胎老變沈者。色白者不可下。黃者宜下。黑者急下。下後胎不脫。舌刺舌裂。舌短舌鞭舌卷。皆當下。白砂胎黑鞭胎俱下。惟白潤滑澤者。邪尚在募原也。如別有下證。宜達原飲。加大黃。若大汗脈洪長而渴。不可下。宜白虎湯。汗更出。日赤咽乾。氣噴如火。小便赤黃。涓涓作痛。揚手擲足。脈沈而數。皆為裏熱之極。下之無疑。潮熱讒語。善太息。此胃實也。心下滿。心下高起如塊。心下脹痛。腹脹滿痛。按之愈甚。昏下。頭脹痛下之立止。若初起未可

與溫病熱病傷寒通。有其陰證似陽者。惟傷寒有之。在瘟疫必無此證也。陽證似陰。為外寒內熱。故小便赤澀。陰證似陽。為上熱下寒。故小便清白。但以小便赤白為據。萬不一失。○夫疫病四時皆有。但盛與不盛耳。歲行之際。沿門闔戶。病皆一般者。謂之時行大疫。人皆知之。不盛之時。人偶感之。不過發熱頭痛。與尋常感冒相似。即有傳染。不過左右服役之人。又烏能知其為疫也。病人無處追求。每每妄訴病原。醫家不善審察。未免隨情錯認。誤引東垣勞倦傷脾為例。壅邪轉熱。多致危殆。○喻嘉言曰。四時不正之氣。感之因而致病。初不為疫也。因病致死。病氣戾氣混合。不正之氣。以故雞瘟死。雞猪瘟死猪。牛馬瘟死。牛馬推之於人。何獨不然。所以饑饉兵凶之際。疫病盛行。大率春夏之交為甚。蓋溫暑濕熱之氣。交互結蒸。人在其中。無隙可避。病者當之。魄汗淋漓。一人病氣足充一室。況於連床並榻。沿門闔境。共釀之氣。蓋以出戶瓦蟲載道腐墻燭柴掩席。委巷投涯。種種惡穢。上溷蒼天。清淨之氣。下敗水土。物產之氣。人受之者。親上親下。各從其類。有必然之勢。如世俗所稱大頭瘟者。頭面腮頤腫如瓜瓠者。是也。所稱頸癰者。喉瘡失音。頸大腹脹如蝦蟆者。是也。所稱爪瓢瘟者。胸高脇起。嘔汁如血者。是也。所稱楊梅瘟者。遍身紫塊。忽然發如微瘡者。是也。所稱瓦瘡瘟者。發塊如瘤。遍身流走。旦發夕死者。是也。所稱絞腸瘟者。腸鳴乾嘔。水洩不通者。是也。所稱軟脚瘟者。便清泄白足腫難移。即濕溫遍行者。是也。小兒痧痘尤多。已上疫證。不明證治。咸委劫運。良可傷悼。然而盛夏濕溫之證。即藏疫癘在內。一人受之。則為濕溫。一方傳偏。則為疫癘。所以疫癘之發。每每盛於春夏者。以其熱暑濕三氣交蒸故也。蓋春主厥陰肝木。秋主陽明燥金。冬主太陽寒水。各行其政。惟春分以後。至秋分以前。少陽相火。少陰君火。太陰濕土。三氣合行其事。天本熱也。而益以日之暑。日本烈也。而載以地之濕。三氣交動。時分時合其分也。以風動於中。勝濕解蒸。不覺其苦。其合也。天之熱氣下。地之濕氣上。人在是氣之中。無隙可避。故病之繁而且奇者。莫如夏月為最。以無形之熱。蒸動有形之濕。即無病之人。感之尚未免於為患。况素有濕熱。或下元虛人。安得不患濕溫之證乎。是以濕溫之證。最忌發汗。發汗則濕熱混合為一。而中氣盡傷。多成死證。惟宜分解先扶中氣。使中氣徐領其表。其裏而上下盡消。故多愈也。至於疫證。則邪正混合。邪極勝。正極衰。轉眼立薨。苦寒傷胃。溫補助邪。如人中黃丸之類。不為合法也。夫傷寒之邪。先行身之背。次行身之前。後行身之側。由外廓而入。虛疫則直行中道。流布三焦。上焦為清陽。故清邪從之上入。下焦為濁陰。故濁邪從之下入。中焦為陰陽交界。凡清濁

之邪必有此區分。甚者三焦相混上行極而下下行極而上傷寒邪中外廓故一表即散疫邪行在中道故表之不能散傷寒邪入胃府則腹滿便堅故可攻下。疫邪布在中焦散漫不收下之復合此與治傷寒表裏諸法有何涉哉或問春夏蒸氣成疫。豈冬溫獨非疫耶。蓋冬月遇溫陽氣不藏感而成病正與不藏精之春溫無異計此時有春無冬三氣即得交蒸成疫然遇朔風驟發則蒸氣化為烏有矣是以東南冬月患正傷寒者少。患冬溫及痘瘡者最多西北則秋冬春皆患傷寒殊無瘟疫痘瘡之患此何以故西北土地高燥即春夏氣難上升何況秋冬之凝沴東南土地卑濕為霧露之區蛇龍之窟其濕熱之氣得風播之尚有可耐一旦暮無風水中之魚衣中之虱且為飛揚況於人乎蒸氣中原雜諸穢益以病氣屍氣無分老少觸之即同一病狀矣此時朔風了不可得故其氣轉積轉暴雖有薰風但能送熱不能解涼盛世所謂解溫草財者在兵荒反有注邪佈穢之事矣○按吳又可所論皆是尋常所有疫癘喻嘉言所言乃天地不正之大疫不可彼此膠執也夫瘟疫證類多端豈可一律而論若傷於氣則頭項腫脹傷於血則肢體疙瘩傷於胃則嘔汁如血傷於腸則水泄不通至入藏則不知人不待救藥則斃矣大法以證為則無以脈診其傷之輕者二三日尚能行動至四五日後忽然大熱慎勿誤認傷寒而與表藥發汗不惟不解其熱轉甚而危殆矣其初病惡寒發熱頭痛宜敗毒散躁熱不得汗通解散頭痛如破十神湯兼羣癰腳膝疼軟獨活散此皆為未證多者立方也若一病便壯熱無寒多汗神昏嘔逆痞滿等證又當從涼膈雙解三黃石膏黃連解毒兩解表裏法治之古人以普濟消毒飲治大頭瘟荆防敗毒散治疔頭瘡生犀飲治瓜瓢瘟清熱解毒湯下人中黃丸併刺塊出血治楊梅瘡三棱鍼刺入委中三分出血及服人中黃散治疙瘩瘡蒼朮白虎湯治軟脚瘡雙解散探吐治絞腸瘡此皆昔人已驗之方足補仲景之未逮也○凡時疫流行之際小兒亦多傳染傷寒例所謂小兒女子益以滋甚以小兒筋骨柔脆一染時疫即驚搐發瘡誤作驚治必死治稍遲延亦死其治與大人彷彿但幼科專於痘疹驚瘡而傷寒甚略但知其不思飲食不知其疫邪傳胃但知其嘔渴瀉泄不知其協熱下利凡此何暇致思其為疫證乎

疫癘中一種大頭天行病雖略見前然不細陳難於治療此證乃濕熱在高頭之上所以必多汙氣蒸初覺憎寒壯熱體重頭面腫甚目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥宜普濟消毒飲不速治十死八九東垣云身半已上天之氣

也邪熱客於三陽之間。上攻頭面為腫切不可用降藥。陽明之邪首大腫少陽之邪出於耳前後甚至兩目不閉。面部赤腫以普濟消毒飲少少不住服治法不宜太速。速則過其病所。上熱未除中寒復生必傷人命。宜用緩藥徐徐少與為妙。額上面部赤而腫或壯熱氣喘口乾舌燥或咽喉腫痛不利。其脈數大者此屬陽明。本方加石膏。若內實熱甚者加酒大黃下之。若發於耳之上下前後併額角傍紅腫者此屬少陽也。或寒熱往來口苦咽乾胸膈滿悶本方加柴胡桔梗根脈實便祕者加酒大黃利之。若發於頭腦項下併耳後赤腫者此屬太陽也。荆防敗毒散熱甚去參加芩連。若三陽經俱受邪併發於頭面耳鼻者亦宜普濟消毒飲大抵此證以辛涼輕清之劑散其上盛之濕熱則愈。節庵以普濟消毒飲除去人參升麻白芷黑參馬勃僵蠶藍根而加入川芎羌活防風荆芥射干薑汁竹沥名芩連消毒飲樂雖稍異而功效不殊。其用大黃必須酒洗如鳥在高巔惟射以取之也。○又四時疫癘天行大頭並宜用人中黃散輕者只用芩連甘草煎成頻服不效加鼠黏子芒硝微利之不必大劑攻毒也。○蝦蟆瘡則兩頤頰下腫小柴胡去參半加羌防荆薄桔梗馬勃煎服荆防敗毒散亦可。夏暑濕熱氣蒸亦多發此宜消暑十全散加荆防馬勃一二劑可愈。

至於溫疫一證乃溫病將發之時或既發之後更感時行疫氣其證渾身壯熱昏昏不爽遂相傳染盛於春夏之間以春時天令不正則地之濁氣鬱蒸發動冬時伏氣其氣最毒人在是氣之中莫之知也。正氣虛者感而受之以正氣本虛故陽脈濡弱而邪傷血脉則陰脈弦緊也以其伏邪內動相召外疫正被邪侵怫鬱煩擾行運失常壯熱作矣。表證見馬及熱鬱腰理不得外泄侵入於裏裏證見馬設使正氣內充邪氣何由而入其感受之因異於傷寒異於溫熱異於非時感受寒疫其治大約以驅熱為主表藥間用下藥必用人中黃是君藥昔人概用清熱解毒湯下人中黃丸統治諸疫皆效其所用人參者知其本氣不足防邪入裏所謂補濕兼施也溫疫證多作渴宜用小柴胡去半夏加石膏知母若躁熱不識人輕則涼膈重則雙解如大便泄瀉者黃連解毒湯若表裏俱熱亦涼膈雙解嘔血者生犀飲便實加大黃便滑用黃土虛加鹽水炒炙內外熱極毒盛三黃石膏外熱甚用麻黃內熱加大黃餘如時行治法大率溫疫脈來盛而有力者發於陽也尚可施治脈來沈細少力者陽病見陰脈也皆不可救。若溫病七八日或十餘日前熱未除重感於寒忽然寒熱交作變為溫瘡後世方書以為壞證過經不解寒熱不除。

而變溫瘧。殊不知此本春時溫病之變證也。按傷寒例云。脈陰陽俱盛。重感於寒。變為溫瘧。其證胸膈滿煩渴而嘔。微惡寒者。治以小柴胡去參半加枯萎根石膏。無寒但熱。其脈如平。骨節煩疼時嘔者。用白虎湯加桂枝。慎不可用辛溫發散。以助其虛也。至於內經所言先熱後寒之溫瘧。乃得之冬中於風寒。氣藏於骨髓之中。至春陽氣大發。邪氣不能自出。因遇大暑。腦髓爛肌肉消脹。理發泄或有所用力。邪氣與汗共出。此病藏於腎。其氣先從內出之於外也。如是者陰虛而陽盛。陽盛則熱矣。衰則氣復反入。則陽虛陽虛則寒矣。故先熱而後寒。名曰溫瘧。夫先熱後寒者。以先前伏邪。來春時陽氣而發出於陽明。故熱已後。因本身之真陰。內燐則邪復反於少陰。故寒。治宜人參白虎湯。或有客邪。則加桂枝。更以金匱腎氣丸。去附子倍桂枝作湯。渴則飲之。蓋從腎出外而大熱。則其內先已如焚。水中火發。雖非陰火。亦可畏也。故先用白虎退熱。俟其瘧勢外衰。復返於腎。而陰精與之相持。乃為寒。設不知壯水之主。以急救其陰。十數發後。則陰精竭矣。此則伏邪自發之溫瘧。與溫病後重感於寒所變之溫瘧。似異而實同。然皆不越少陰。併詳辨此。以破二經異同之惑。

若久時溫暖人感。乖戾之氣至春始發。更遇天道過於驟熱。遂變溫毒。傷寒例云。陽脈洪數。陰脈實大。更感溫熱。變為溫毒。溫毒為病最重也。伏毒與時熱交併。表裏俱熱。故其脈浮沉俱盛。亦有冬溫誤用辛熱。或熱毒不得外解。而陷入於裏。裏有是證也。其證心下煩悶。嘔逆放喫甚。則面赤身體俱赤。狂亂躁渴。咽喉腫痛。狂言下利。而發斑。最為危候。治宜大解熱毒為主。若斑如錦紋。身熱煩躁而無燥結者。黃連解毒湯。若躁悶狂妄而無汗者。三黃石膏湯。自汗煩渴而發斑者。胃熱人參化斑湯。即人參煩熱錯語。不得眠。白虎合黃連解毒湯。斑不透。犀角大青湯。斑透熱不止。本方去升麻。黃芩。加入人參生地。柴胡。發斑熱毒勢甚。咽痛心煩。狂言悶亂。犀角大青湯。雖大便不通。勿用下藥。惟宜犀角地黃湯。凡斑色紫者。為危候。黃連解毒合犀角地黃。若斑色紫黑而平下。坑爛脈虛。小自利者。不治。其失於汗下。及溫熱時行火食陰斑。詳後發斑本例。

有陽熱亢極而成陽毒者。金匱云。陽毒之為病。面赤斑如錦紋。咽喉痛。喉膜血五日可治。七日不可治。升麻葛根湯主之。虛熱勞盛。毒不能化者。活人陽毒升麻湯。有一二日間便成陽毒者。有誤用辛熱發汗。或吐下。未當。邪熱內陷。變成陽毒者。其證壯熱。頭項痛。躁悶不安。或狂言罵詈。妄言妄見。或口吐膿血。面生錦紋。或舌卷焦黑。鼻如烟煤。或

咽喉腫痛下利黃赤。六脈洪大而數。人參白虎湯。咽喉痛者。犀角黑參升麻甘草等分煎服。若熱毒大盛時。狂時昏口噤咬牙。藥不得下者。先用水一盃。用絹裹指蘸水。潰牙關候牙關放寬。狂亂稍定。方與服藥。二黃石膏湯加減。脈洪大。黃連解毒湯慎不可以其熱咸而誤下之。蓋此證之熱散漫於外。故以攻下為首禁也。夏月熱甚。狂躁悶亂不安。脈洪數者。用新汲水或黃連水漬青布四五尺。作數摺。搭病人胸前。熱即易之。須臾得睡。效睡即去之。有陰熱亢極而成陰毒者。金匱云。陰毒之為病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。升麻蠶甲湯去雄黃蜀椒主之。活人用原方加桂枝。名陰毒甘草湯。復有陰寒極甚而成陰毒者。自是兩種不可混也。夫陰寒極甚反大熱躁渴。四肢厥逆。脈沈細而疾。或尺部短而寸口大。額上手背冷汗不止。或先因房事而後著寒。或內傷生冷。而犯房室。內既伏陰。復加外寒。積寒伏於下。微陽消於上。遂成陰盛格陽。陽氣上脫之候。五六日後。胸前手足發出淡紅小斑。為陰毒。雖盛夏禁用涼藥。宜附子理中湯。甚則身重眼睛疼。額上冷汗。嘔穢呃逆。或爪甲青。或腹絞痛。或面赤足冷。厥逆躁渴。身發青黑斑口鼻灰色。舌黑而卷。莖與橐皆縮。六脈沈細而遲。或伏而不出。或疾至七八至已上不可數者。急用葱餅於臍上熨之。隨用附子散或人參三白湯合四逆湯主之。熨之手足不和暖者不治。○劉守真云。世俗所言陰毒。皆陽熱亢極。蓄熱深於內。身表有似陰寒。此特指仲景升麻蠶甲湯去雄黃蜀椒陰熱亢極之證。若後世所謂陰寒極甚之陰毒。必用回陽退陰之藥。內溫正氣逼邪出外。庶或可愈。若服涼藥。則渴轉甚。躁轉急。必致虛陽暴脫而死也。○王安道曰。陰陽二毒與陰陽二證迥異。考仲景書雖有陰毒之名。然其所敘之證。不過面目青。身痛如被杖。咽喉痛而已。並不言陰寒極甚之證。況其所治之方。不過升麻甘草當歸蠶甲而已。並不用大溫大熱之藥。是仲景所謂陰毒非陰寒之病。乃是恩天地之惡毒。異氣入於陰經故曰陰毒。後人遂以陰寒極甚之證參入仲景證中。却用附子散等溫藥以治。竊謂陰寒極甚之證。或內傷冷物。或暴中陰寒。或過服寒藥所變。內外俱冷。固可名為陰毒。然終非仲景所言。惡毒異氣所中之謂也。○趙以德曰。按古方書謂陽毒者。陽氣獨盛。陰氣暴衰。內外皆陽。故成陽毒。謂陰毒者。陰氣獨盛。陽氣暴衰。內外皆陰。故成陰毒。二者或傷寒初得。便為是證。或服藥後變而為之。陽毒盡治以寒涼。陰毒盡治以溫熱。藥劑如冰炭之異。何乃仲景以一方治之乎。其曰陰毒去雄黃蜀椒則反去其溫熱者矣。豈非熱皆熱毒。傷於陰陽二經乎。在陽經絡則面赤斑如錦紋。喫膿血。在陰經絡則面青。身如被

杜此皆陰陽水火動靜之本象也。其曰七日不可治者陰陽之津氣血液皆消滅矣。傷寒七日猶得再經而此加以毒至七日不惟消滅其陰且火極亦自滅矣。

然春夏之交多有傷風寒疫時行與溫病風溫溫疫溫瘧溫毒陽毒陰毒交錯難辨蓋傷風則發熱頭痛鼻塞聲重欬嚏惡風自汗寒疫則憎寒壯熱頭痛骨節頑疼雖發熱不渴時行則里巷之中病俱相類溫病則煩熱口燥而渴氣口脈盛苦稍見人迎浮緊即有重感風寒矣病溫復感風邪而見自汗灼熱欬嚏聲嘶者風溫也。先前溫熱未除復感時行瘟氣即昏昏壯熱遞相傳染者溫疫也。溫病日久更感於寒寒熱如瘧者溫瘧也。溫病更感溫熱熱毒熾盛而發斑者溫毒也。發斑熱越狂走者陽毒也。發斑而身如被杖厥冷者陰毒也。已上數證多發於二三氣中一一按證定名。麻無誤治之失若交夏至後炎暑司令相火用事人有發熱身疼不惡寒但惡熱而大渴者為熱病。傷寒例云凡傷寒而成溫熱者先夏至日為溫病後夏至日為熱病蓋久伏之邪隨時氣之暑熱而鬱發也。以邪非外來故但惡熱而不惡寒熱自內發故口燥渴而引飲多其邪既鬱為熱不宜辛溫發汗不得復言為寒仲景仍以傷寒目之者謂其初受病時皆寒氣鬱伏所致耳。世言仲景無溫熱治法詳太陽陽明篇中多治溫熱不然黃芩湯白虎湯方何由而立也惜乎殘缺未備且混入傷寒六經例中設若不審誤以白虎治傷寒立見其害白虎為金神夏熱見之而退非盛暑熱病內外熱極者不可用氣虛人用之往往成結胸甚至不救其性大寒傷肺非傷寒藥也故有立夏以前處暑以後不可妄用白虎之戒夫傷寒之不可用黃芩白虎猶溫熱之不可用桂枝麻黃大小青龍也即治溫熱亦須無非時暴寒者方可但溫熱病亦有先見表證而後見裏證者蓋佛鬱自內達外熱鬱腠理之時若不用辛涼解散則邪不得外泄遂還裏而成可攻之證非如傷寒從未而始也或有不悟此理乃於春夏溫病熱病而求浮緊之脉不亦疎乎夫溫病熱病之脉或見浮緊者乃重感不正之暴寒寒邪束於外熱邪結於內故其脈外則綑結內則洪盛也又或不識脈形但見弦脈便呼為緊而妄治之蓋脈之盛而有力者每每兼弦豈可錯認為緊而斷以為寒乎夫溫病熱病之脉多在肌肉之分而不甚浮且右手反盛於左手者誠由怫鬱在內故也其左手盛或浮者必有重感風寒否則非溫病熱病自是非時暴寒耳然溫病之發因暴寒者居多熱病之發兼暑暘者為甚以伏邪乘天暑汗泄從包絡三焦一齊發出三陽也經云三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讞語遺尿發

汗則讞語下之。則額上生汗。手足厥冷。若自汗出。白虎湯主之。此雖言三陽合病。而實熱病兼見。渴證如面垢遺尿。非中渴乎。以伏邪既乘暑熱發出在表。汗下俱禁。若始發之時。背微惡寒者。為肌表之真陽。不能勝邪。故加人參以固真氣也。按長沙所主白虎及白虎加人參。凡八證。皆主熱病煩渴而裏大熱。蓋火氣之邪。自內外出。本非暴感風寒。故不宜發汗。又熱發於外。內邪不實。復不可下之。故宜此湯及竹葉石膏黃連解毒選用。若大渴煩躁。背惡寒。脈洪。用白虎湯合黃連解毒。歸血加生地丹皮。喘加枯萎根厚朴。惡熱煩悶。腹滿舌胎黃黑。五六日不大便者。涼膈雙解三承氣湯選用。如或脈兼弦緊。必有重感客邪表證。宜於天水散中加葛根石膏葱白香豉之類。其性雖寒。不礙發散也。若邪在半表半裏。古法用小柴胡。今用雙解散去麻黃加柴胡。其功尤捷。脈弱者加人參。遠勝小柴胡也。每見世人治溫熱病誤下之。未為大害。誤汗之變不可言。此足徵其熱之自內達外矣。其間有誤用攻裏而致變者。乃春夏暴寒所感之寒痰邪。純在表。未入於裏故也。○凡治伏氣發溫復感客邪輕者。只宜小柴胡去參半。加橘皮枯薑根葱白香豉。熱病更加石膏知母。○一法溫病熱病。凡有客邪。不問兼風兼寒。脈浮脈緊。惡風惡寒。可汗不可下者。通用雙解散去硝黃。加葱豉最妙。凡表證依法汗下不解。別無異證者。通用涼膈散以退其熱。無使熱盛危劇也。汗後餘熱未盡。用天水散或小柴胡加減。汗不解。下證未全者。白虎湯汗後躁不得眠。微熱而渴者。五苓散去桂合天水。汗後不解。中外有熱。口乾煩渴。解毒涼膈天水。能調順陰陽。洗滌臟腑。若純是裏證。脈盛而實。不惡寒但惡熱。煩渴引飲。自汗讞語。不大便。咽乾腹滿。可下不可汗者。三一承氣湯下之。○一法不問風寒濕暑。或表裏證俱見。或內外諸邪所傷。有汗無汗。心腹滿痛。讞語煩躁。咽乾口燥。蓄熱內盛。俱用調胃承氣合解毒下之。能潤內外大熱。或熱結極深。而數下不利。不救成死證矣。急用大承氣湯加甘遂末一錢匙下之。凡裏證依法下之。而不解。或大下後。或二三下後。熱勢尚盛而不退者。寒涼諸藥不能退其熱。脈弱氣虛。不可更下。或諸濕熱內盛。小便赤澀。大便溏泄。頻述少腹急痛者。欲作利也。黃連解毒湯主之。下之太過。其熱不退。再三下之。熱愈甚。脈微氣虛。法無可生之理。至此下之亦死。不下亦死。但用涼膈合解毒調之。庶幾陽熱退除。陰脈漸生。亦有得生者。若表裏證俱見。欲汗之而裏證已形。欲下之而表病未解。祇宜小柴胡湯和之。○一法不問風寒暑濕。用涼膈散天水散合煎解之。或表熱多裏熱。少天水一涼膈半。或裏熱多表熱少涼膈。一天水半表熱極。裏有微熱。身疼頭痛。或眩或嘔。不可汗下者。天水

涼膈合煎甚者用大柴胡合大承氣湯主之。若更不解不可復用苦寒峻攻但宜和平之藥宣散其表和解其裏用小柴胡涼膈散天水散和解之或小柴胡合解毒湯如服後熱未退者大柴胡合解毒湯微下之諸小柴胡證日久不解表裏熱勢更甚而心下急鬱鬱微煩者或發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐不利或陽明病多汗或少陰病下利清心下痛咽乾燥渴或太陰病腹滿而痛俱宜調胃承氣合黃連解毒下之外熱勢盛者雙解散為當守真製雙解散以攻熱病內外之熱邪使表裏齊解甚為得法然間有不解者猶未盡善也子和演為吐法即用前藥煎一大盞令飲其半以探引出風痰次服一半使衣被覆蓋必汗大出而解世人只知桂枝麻黃發汗不知涼藥亦能發汗也熱病用熱藥汗不出者反益病涼藥發之百無一損益元散加薄荷便能發汗更加葱豉尤捷承氣用薑棗煎借辛甘發散之意守真雙解子和演為吐法豈非涼藥亦能發汗乎若誤用傷寒藥致發斑黃者當從下後斑黃例治之夏月誤用辛溫及重複發汗變證百出往往發斑讞語衄血喘滿昏迷亂諸證並見皆熱所極致則用藥不離黃連解毒湯加減如汗下太過脈微惡寒者壞證也又當從芍藥甘草湯調補其陰中間稍加薑棗和之慎不可輕用溫補也倘不經汗下而脈虛小手足厥者必死也○大抵溫病熱病皆是熱鬱之氣故多發於三陽若發於三陰者必難治其脈若沈細或微弱或虛大無力為脈不應病必死然發於三陰者必有所因或因冷食傷脾或因慾事傷腎皆正氣先傷熱毒乘虛而發設用甘溫調補益不助邪轉熾若行苦寒峻攻真元立致消亡雖長沙河間復起恐難為力矣○凡溫病熱病榮未交者可治陰陽交者必死夫所謂榮未交者言榮分熱毒之色未交遍於衛分也而類經誤釋為邪猶在衛未交於榮其氣不深意謂熱病之邪亦如傷寒自表傳裏也按內經刺熱篇云太陽之脈色榮頰骨榮未交曰今且得汗待時而已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱病內連腎少陽之脈色榮頰前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已雖有餘證未退少需聽其自解此真訣也至於與厥陰脈爭見者死期不過三日言熱病大熱煩渴反見陰脈陰色脈皆陰故為爭見爭見亦紫滯晦傳經勢重已為主死爭見青黑冠賊發汗多未得汗故云今且得汗待時而已雖有餘證未退少需聽其自解此真訣也至於與厥陰脈爭見者死期不過三日言熱病大熱煩渴反見陰脈陰色脈皆陰故為爭見爭見亦紫滯晦傳經勢重已為主死爭見青黑冠賊十死不救矣三日死者以其熱毒復入於裏三日傳盡三陰陰精內竭故惡毒之色發見於外也太陽厥陰爭見者

死少陽少陰爭見亦死。牽連腎水在內以少陰為厥陰母水勢垂危源流並竭故也所謂陰陽交者言陰陽交互邪勝正負毒邪亢盛反逼正氣為汗也按評熱病論云黃帝問曰有病溫者汗出微復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何岐伯對曰病名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於殺殺生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出微復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱病曰汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也此段論溫獨創殺氣之旨殺氣為精精勝氣乃為汗身中之至寶也故藏於精者春不病溫病溫皆冬不藏精之故所以熱毒亢極腎水傷竭乃至狂言失志精脫而死以此故也有云二陽搏其病溫死不治不過十日死二陽者手足陽明也雖未入陰病溫至極必至不治稍延不過十日死較三日死陰之虧少饒其期耳○再按靈樞熱病云熱病七日八日脈微小病者溲血口中乾一日半而死脈代者一日死熱病已得汗出而脈尚躁喘且復熱喘甚者死熱病七日八日脈不躁躁不散數後三日中有汗三日不汗四日死熱病不知所痛耳聲不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱在髓死不可治熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病脈尚盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗靜者生汗不出大額發亦噦者死泄而腹滿甚者死目不明熱不已者死老人嬰兒熱而腹滿者死汗不出嘔下血者死舌本爛熱不已者死歟而衄汗不出不至足者死髓熱者死熱而痙者死腰折瘻癰齒噤齶也夏月暑濕交蒸人多中暑證與熱病相似首宜以脈法辨之夫熱病之脈必盛中暑之脈必虛蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛暑傷氣而不傷形所以脈虛然又有弦細芤遲之脈者何也夫人暑月必多汗多汗則脈虛此其常也守真曰熱為陽中之至陽以熱傷氣則汗自出病雖為熱脈不能實而反虛或弱也若汗出當風閉其汗孔即風與汗濕留泊肌腠脉故弦細或虛風不作鬱熱表虛仍自汗出者脈必芤遲也統而言之曰虛分而言之曰弦細芤遲其不以浮大之脈混入虛脈之中稱為暑病之脈也潔古以靜而得之為中暑為陽中之陰為暑傷陰證動而得之為中熱即謂之中暯為熱傷陽證○仲景云太陽中熱者暯是也然亦多陽明證其大汗出微惡寒發熱小便淋瀝黃赤者為太陽其面赤大汗煩渴喘急氣粗前板齒燥或嘔或泄者為陽明乃當炎暑之令而受烈日之蒸即無宿病

之人恆得之。脈必洪大。發熱煩渴重者。昏憒不省人事。有似熱病。但忽輕忽重為異耳。傷在太陽。五苓散減桂加香薷。陽明消暑丸。凡平人偶然中暍。身熱背惡寒。面垢自汗。大渴引飲。煩躁悶亂。痰逆惡心。胸膈不快。或吐瀉。轉筋。小便祕滯者。此内外皆熱。即有昏憒困倦。指頭微寒。並宜五苓合益元。若手足搐搦者。暑風也。香薷飲加羌防。咽吐加藿香陳皮。小便不利。加茯苓。豬苓。澤瀉。滑石。有痰加半夏生薑。口渴不用半夏。加枯萎根。瀉利不止。加白朮。轉筋加木瓜。若腹滿身重。難以轉側。口不仁而面垢。讒語遺尿者。此熱病兼暍也。白虎湯。若農夫田野及慣力役之人。過受燔灼。頭角額痛發熱。大渴引飲。脈洪汗大泄者。急作地漿水煎。蒼朮白虎湯。加蒼朮老人不宜用。寒者。竹葉石膏湯。稍加熱附溫順之。又老年平昔陰虛多火。不可用溫者。白虎加人參竹葉為當。凡中暍雖勢甚。但一解即愈。不似中暑之必需補益也。○內經云。因於暑汗。煩則喘喝。靜則多言。此心包證也。然亦多兼入脾及他藏者。入脾則昏憒。入肝則眩暈。入肺則喘滿。入腎則消渴。乃鬱蒸之氣傷人元氣。惟精神虧乏之人。始中之也。脈來虛細。重者伏匿若喘促逆冷。卒然昏暈。脈雖虛細。慎不可用溫補。此熱傷陰氣。故禁溫劑。凡溫熱藥。皆助陽耗陰也。如避暑深堂。起居不時。而汗出煩躁。面垢。背微惡寒。手足微厥。甚則灑然毛聳。以腠理閉則灑然寒。若腠理閉則熱而悶矣。乃包絡之火不能勝時火。故反微惡寒也。或於陰涼處坐卧。未虛不任風寒。往往自認外感。求醫解表。若誤與辛藥。重絕元氣。禍如反掌。惟宜清暑益氣湯。若果脈緊畏寒。有表邪者。消暑十全散。脾氣虛弱。汗出多而惡寒者。十味香薷飲。若暑熱之時。過傷飲食。泄瀉嘔吐霍亂者。六和湯。伏暑霍亂。腹痛泄瀉。身熱手足冷者。五苓散。下來復丹。如脾胃虛損之人。上焦之氣不足。暑濕之氣鬱蒸。則四肢困倦。精神短少。兩脚痿軟。惱於動作言語。昏昏嗜臥。頭痛而重心胸痞悶。骨節無力。氣促似喘非喘。其形濛濛如烟霧中。早晚之際。則發寒厥。日高之後。復發熱如火。乃陰陽氣血俱不足也。若四肢灼熱。為陰虛發熱。或四肢冰冷。為陽虛寒厥。以脾主四肢故也。清暑益氣湯。清燥湯選用。若自汗過多。風犯汗孔。則身體重痛。肢節麻痺。煩疾。或渴或不渴。或小便黃濁。此風鬱汗濕與暑相搏也。宜六一散加葱豉。兼驚加神砂末。小便數合。五苓或去桂。並煎服探吐。令汗出則愈。若遠行勞役。大熱而渴。則陽氣內伐。熱舍於腎。為水不勝火。發為骨痿。若踴踴熱勞形。發熱煩渴。口鼻氣促而喘。至日晡之際。病必少減。若認作陽明中暍。誤用白虎。旬日必死。此脾胃大虛。元氣不足也。總之脾胃一虛。病證百出。惟補中益氣。去升麻加麥冬、五味。茯苓澤瀉黃連黃柏之類。

補益中兼清解而漸愈不似中暎之即能平復也。○按暑暎二者名雖不同其為天熱外傷則一在素虛者自難禦之即平人受傷者亦必因勞役饑餓而勞役饑餓則虛虛則邪入而病不虛則天令雖熱亦無由以傷之則知中暑中暎固有陰陽虛實之殊彼以動靜所得分之何哉即其所謂靜而得之者避暑深堂患頭疼惡寒肢體拘急等證是感寒之類耳蓋冬月脈浮緊為傷寒浮緩為中風夏月脈弦緊為傷風弦緩為中暑以未疎自汗則脈緩表緻亦無汗則脈緊理然中暑亦有無汗而脈弦細此雖中暑必緣微涼所遇而然其所以煩心肌膚火熱無汗非暑邪也身中陽氣受陰寒所遏而作也其有涼亭水閣過受涼快為寒所襲而病脈必弦緊宜消暑十全散不可全用表藥蓋暑月腠理易開即杳常熟飲便能出汗也倘人迎脈弦氣口脈大而欬嗽鼻流清涕目疼額與眉棱骨痛選奇湯最效有天暑用冷水淋浴而病者金匱云太陽中暎身熱疼重而脈微弱者此以夏月傷冷水水行皮中所致也一物瓜蒂湯主之以瓜蒂二七枚水煎頓服少頃於無風處大吐汗出而愈虛人五苓散加葱豉探吐之若冒暑伏熱引飲過多及恣啜瓜果生冷致脾胃受濕而腹痛嘔瀉水穀不分脈來沈緊者為內傷寒而病宜大順散若陽氣虛人膏梁與水果雜進兼恣意房帷致周身陽氣不得伸越而脈沈細或弦遲面垢如塵無汗惡寒四肢厥逆拘急或霍亂嘔吐者冷香飲子若多汗喘促吐利兼作脈見微細欲絕或虛浮欲散此為緊病非梨水散不救若汗出浴臥當風或冷水浸濕或坐臥濕地而病雖當暑月非暑傷人皆因暑而自致之病當用溫散藥治之若暑熱為病不過清心利小便解暑毒補真氣而已即有脈虛昏憊手足厥冷亦不得用熱藥也世俗往往不明槩曰夏月陰氣在內大順散為必用之藥夫陰氣非寒氣也蓋夏月陽氣發散在外而陰氣在內耳豈可視為寒而用溫熱藥乎陰果為寒何以夏日則飲水乎丹溪云伏陰於內陰字有虛之義若作陰冷看誤矣大令之時燉石流金有何陰冷孫真人令人夏月常服生脈散非氣虛而何古人大順散非謂伏陰而用之本治嚼冰飲冷所傷若庸工槩用溫藥治避暑深堂寒鬱其陽之證恐不能解表反增內煩也其蒼朮白虎湯黃連杏仁飲雖宜暑病亦豈可視為通行之藥乎○又酷暑道途中卒然暎作為暑風卒倒此熱毒湧發壅塞心包也切不可用冷得冷則死急以熱土尉胸中仍使更溺於腑腹并搗薑蒜絞汁灌之立甦若熱病因暑而發治從熱病例蓋伏邪必從少陰發出心包而入陽明與陽明中暎不殊總屬白虎證治不必辨其是熱是暎也

若其人素有辨濕復傷於暑。暑濕相搏。深入太陰。則發濕溫。以太陰主濕。召暑而入其中也。證若兩脰逆冷腹滿。濕得暑而彰其寒也。支胸頭目痛苦。妄言壯熱多汗。暑得濕而彰其熱也。其脈陽濡而弱。陰小而急。蓋濕傷於血則必小。急暑傷於氣則必濡弱也。羅謙甫云。濡弱見於陽部。濕氣搏暑也。小急見於陰部。暑氣蒸濕也。病在太陰陽明不可發汗。汗之則不能言。耳聾不知痛處。身青面色變。名曰重暎死。宜白虎湯加蒼朮。分解兩經混合之邪。如有寒熱加桂枝。若濕氣勝。一身盡痛。發熱身黃。小便不利。大便反快。五苓散加茵陳。此乃熱入陰分。故見足冷脈弱。不可因其足冷脈弱。而誤用溫藥也。若內夾冷食。五苓散去猪苓。澤瀉加甘草乾薑即茯苓。或五苓合甘草乾薑亦得。然夏月亦有中寒厥冷。宜溫者。必小便清白。知裏無熱。方可用溫。若是濕溫。小便必赤澁而少。即如厥陰熱厥。亦有唇青脈伏。當用竹葉石膏湯者。此與不異。此正內經亢則害。承乃制。火極反乘。勝己之化也。王肯堂云。昔人治濕溫。遍身皆潤而足冷至膝下。腹滿不省人事。六脈皆小弱而急。問其所服之藥。皆陰病藥也。此非受病重藥能重病耳。遂以五苓散合白虎湯十餘劑。少甦。更與清燥湯調理而愈。凡陰病厥冷。兩脅皆冷。今腔冷臂不冷。則非下厥上行。故知非陽微寒厥而令用祛濕藥也。

春夏濕令大行。人感其氣。則一身盡重而痛。脈來沈緩。小便不利。大便反快。此名中濕。以其人素有蘊濕。因復感濕。今故有是證。宜五苓散加減。淡滲為主治。濕之法不利。小便非其治也。凡夏月之濕。皆為熱濕。非如冬月之濕為寒濕也。○濕家身煩疼。可與麻黃加朮湯。微汗之。即麻黃湯加白朮四兩。慎不可以火攻之。攻之必喘滿煩驚。小便不利也。○濕熱內遏。則頭汗身黃。宜茵陳蒿湯合五苓散。然濕家非內實熱極。發黃不可議。用下藥。即茵陳蒿湯中用大黃。不過藉以導熱利濕。非用下也。濕家但頭汗出。項背強。欲得被覆向火。胸滿小便不利。舌上如胎者。此丹田有熱。胸中有寒也。宜黃連湯和解之。若誤下寒濕。則噦額上汗出。微喘。小便利者。死陰陽上下俱脫也。又下之額上汗出而喘小便反祕者。亦死。經云。關格不通。不得尿。頭無汗者可治。有汗者死。若額汗而小便如常。手足自溫者。陽氣雖逆。陰氣猶不至於暴脫。白朮附子湯救之。若下之利不止。雖無額汗喘逆。此陰氣下脫亦死也。○濕家雖身疼痛。不可發汗。汗之則痙。此為陽虛脉沈細者而言也。前云。濕家身煩疼。可與麻黃加朮湯。是治暴感寒濕陽氣未傷。脈見浮緊。故宜微汗以開泄之。若夫陽虛之人。衛氣先虧。不能固密肌腠。復加汗劑。傷榮勢必內擾。肝木而生虛風。所以垂戒不

可發汗也。又有濕家身疫發熱面黃脈大。自能飲食者。內約鼻中則愈。以濁濕干犯清道而見頭痛鼻塞是不當以湯藥治其腸胃也。更有上盛之濕。下先受之之濕。濡濕之濕。大筋軟短小筋弛長之濕。因氣為腫之濕。五痹諸濕種種不同詳述醫通。

若先傷濕身疫而後傷風者。謂之風濕經言。風濕相搏一身盡痛發熱而腫不能轉側。惡風不欲去衣。額上微汗。大便難。小便利日晡熱劇者。名風濕。此病傷於汗出當風或久傷取冷所致。可與麻黃杏仁薏苡甘草湯溫服法。當微汗而解不可大發汗。大汗則風去濕不去也。自汗去麻黃加桂枝羌活。脈浮身重。汗出惡風防己黃耆湯。其脈浮虛而濁。不嘔不渴者。桂枝附子湯。若內不渴外不熱。小便自利者。為津液不足。白朮附子湯。一服覺身爽半日許再服三服都盡。其人如冒狀勿怪。即是朮附並走皮中逐水氣不得除故耳。若小便不利。惡風不欲去衣。而身微腫者。甘草附子湯。風濕相搏一身盡痛而脈浮自汗。或頭重鼻塞者。羌活勝濕湯。小便不利而微熱者。五苓散。或黃者建中五苓散各半貼和服。又中水濕之蒸氣及汗出當風或中霧露或中山嵐瘴濕與風寒合者。皆中於濕而合異氣也。宜除風濕羌活湯。微汗之太陽病失汗或汗後不解。身黃發熱者。先服麻黃連轺亦小豆湯。後與梔子柏皮湯或問中濕風濕何以別之。曰山澤陰雨薰蒸之氣冒集之者。名為中濕。此脾與腎受濕也。其證一身盡痛如薰黃脈來沈緩。治之以燥勝濕兼利小便。若夫汗出當風濕氣鬱閉於腰理。此膀胱與胃受濕也。其證惡風不欲去衣。肢節疼。痛脈來浮濁。治之以風勝濕兼取微似汗。此大法也。羅謙甫云。春夏之交人病如傷寒。汗出體重肢節痛。難以轉側。小便不利。此名風濕。但多服五苓散小便通利即愈。○喻嘉言曰。風濕雖同傷太陽而有親上親下之不同。內經謂風者百病之長。其變無常者是也。其中人也。風則上先受之。俱從太陽膀胱經而入。風傷其衛。濕流闊節。風邪從陽而親上。濕邪從陰而親下。風邪無形而居外。濕邪有形而居內。上下内外之間。邪相搏擊故顯汗出惡風。短氣發熱頭痛骨節頑疼。身重微腫等證。此固宜從汗解。第汗法與常法不同。用麻黃湯必加白朮或薏苡以去其濕。用桂枝湯必去芍藥加白朮甚者加附子。以溫其經。其取汗又貴徐不貴驟。驟則風濕俱去也。其有不可發汗者。緣風濕相搏多夾陽虛。陽虛即不可汗。但可用辛熱氣壯之藥。扶陽逐濕而已。凡見短氣雖為邪阻其正。當慮胸中陽虛。凡見汗出微喘雖為肺氣虛邪。當慮真陽欲脫。明眼辨之必早也。其濕流闊節之痛。脈見沈

細者則非有外風與之相搏祇名濕痹。濕痹者濕邪痹其身中之陽氣也。利其小便則陽氣通行無礙而關節之痹并解矣。設小便利已而關節之病不解必其人陽氣為濕所持而不得外泄或但頭間有汗而身中無汗反欲得被蓋向火者又當微汗以通其陽也。○經曰傷於濕者下先受之曰濕流關節言地之濕中人流入四肢百節也。又曰濕上甚為熱此則下受之濕襲入三陽胸背頭面之間從上焦之陽而變為濕熱也。濕上甚為熱其小便必不利以既上之濕難於下趨故云治濕不利小便非其治也然治上甚之濕熱不能發汗而利小便即為第二義矣。若陽虛者小便色白不時淋滴而多汗正泉竭而陽微出亡之象一切利水之藥不可誤施以犯虛虛之戒。○復有一種燥證反似濕痹以其證遍身煩疼手足痿弱無力脈來細濶而微此陰血為火熱所傷不能榮養百脈所致慎勿誤認濕痹而與風熱則火益熾而燥熱轉甚矣宜甘寒滋潤之劑補養陰血兼連柏以堅之然須視其人之形瘦色亦方為燥熱若肥盛者則為濕熱無疑也。

傷寒之兼濕熱者甚多惜乎古所未詳近亦罕講丹溪雖大闡濕熱法門然其所論皆外淫之濕而未及本身之濕熱也嘗讀仲景書有論寒濕者有論風濕者以其兼外感之邪故列之太陽例中其但言濕者則與痙攣同列當知痙攣亦不離乎濕熱也及觀痞論中則治本身中之方濕熱具在祇恨無人道破以致蒙昧千秋也蓋傷寒誤下則有痞滿之變然亦有不經攻下而痞者皆由其人素多痰濕因外邪觸動所以逆上而滿故仲景特立瀉心湯諸法正以祛逆上之濕熱也羅謙甫云瀉心湯諸方取治濕熱最當惟乾薑宜加斟酌以熱則生火於中恐反助濕熱為患炮時須預熬黃連汁乘火淬之此標本兼得之製也又有脾濕肺燥之人則陰中之火易於上升上升則咽喉作痛而乾渴須用貝母之潤以代半夏之燥燠薑之柔以易乾薑之僭更加薑汁竹沥以行其滯此在臨證之權宜耳又有胸中寒丹田熱者黃連湯或小陷胸合理中其在感邪之初未見痞滿之時可用辛涼解表然必兼理痰氣為要至若停食感冒更兼痰濕內盛則當胸逆滿氣道阻礙津液固結三四日間便見舌胎芒刺喘張悶亂者不急治脹悶而死速與涼膈散加葶苈子遂白芥子薑汁竹沥下奪之庶可十全二三但須明諭用藥不可輕投反招其謗也在傷寒則下不厭遲獨此證切勿延緩稍遲則胸腹堅如鐵石下無及矣况濕熱內盛之人即延至十日半月內終不結但蒸作極粘膩臭穢之物縱使得下百不一生也蓋此證外因感冒內有痰食故爾不得不下以圖徼幸設

無外內合邪。萬不可下也。下後熱退氣平脈減小者為易治。下後痞滿稍減而熱不止者。頻與小陷胸加竹茹薑汁。下後熱勢彌盛。氣愈上逆。脈仍實強反加躁亂者。為實熱內潰終難尅敵。所以此證之脈最忌滑實堅強。堅強則胃氣已竭。滑實則邪氣方張。在老人尤為不宜。若得軟大柔和。差堪調理。然雖合劑為效。甚艱。矧復粗工不察。每以寬膈理氣消尅之。則正氣愈耗。濕邪愈滯。有如陰霾四塞。六合皆昏矣。消尅不已。繼以硝黃下之。蓋濕熱痰飲隨氣升降。或時腸胃胸脇。或時經絡肌腠。豈攻下所能除去者乎。與外感傳經熱結。內傷飲食之邪。絕然不同也。嘗見屢服硝黃。脹滿愈甚。喘急不通而死者。有攻之驟脫熱去寒。遂至呃噦而死者。更有見其肢體重痛。不能轉側。而用羌防星半風藥者。蓋純是外感六淫之邪。可以汗解。此兼濕熱痰飲。其根本在胃。不惟汗之無益。且風药性升。濕邪得之。則乘風上湧。平地尚為波瀾。况元氣素有坎陷者乎。所以愈增逆滿。在所必至也。大抵蒼黑肥盛之氣及酒客輩。素與濕熱相依為命。其在氣血強盛之年。非惟不能為患。反能輔助作為。速至中年以後。正氣向衰。漸難駕馭。其濕有時搏聚於腸胃之間。則胸中嘗覺痞滿不快。或不知饑餓。或腹滿腸鳴。或行動喘促。有時溢出乎軀殼之外。則遍身脹痛。或胸脇眼脣頰疼。或手足重著。寧病當此之時。雖無客邪。尚難調理。稍加外感。引動其泛濫之勢。則胸高喘滿。腹脹身疼。惡熱煩悶。嘔逆自利。無所不至矣。此非外邪勢重而然也。乃本身中素與元氣渾合之邪。一旦乘機竊發。同舟皆敵。國矣。復有素稟濕熱而挾陰虛者。在膏梁輩少壯時。每多患此。較之中年已後觸發者更劇。又與尋常濕熱迥異。當推河間東垣類中風例治。庶或近之。其方藥詳醫通濕熱本門。茲不瑣述。蓋濕熱已是固疾。難除。兼之下虛攻擊。將何所恃。若更加外感。即倉扁復生。難於圖治矣。

夏月多有感冒。非時寒氣傷風。中濕風濕。濕熱溫溫。與暑熱病。最要辨晰。其傷風感寒已辨如上。但熱病則脈盛。身熱不惡寒。但惡熱而煩渴。中暍則脈洪大。汗出喘渴。引飲中暑。則脈虛。背微惡寒。身拘急。濕溫則脈濡。小急汗多。足冷。濕熱則形盛。喘脹中濕。則一身寒重。而或發黃風濕。則關節腫痛。自汗惡風。不欲去衣。為異耳。

濕家大發其汗。則致痽。中風頭痛。常自汗出。而嘔者。汗之必發痽。新產血虛。汗出傷風。亦作痽。故仲景有瘡家雖身疼痛。不可發汗之戒。皆發汗太過。經虛生風所致。其證頸項強急。頭熱面赤。目脈赤。足冷。腰寒。頭搖。背反張。口噤咬牙。手足攣搐。通用小續命湯。剛痽為陽去附子。柔痽為陰去麻黃。凡太陽病。發熱惡寒無汗。小便反少。氣上衝胸。口

嘯不語其脈浮緊目閉者名剛瘡此為中風重感於寒葛根湯主之太陽證備發熱不惡寒身體強几几然脈反沈遲有汗目閉者名柔瘡此為中風重感於濕桂枝湯加枯薑根二兩節萎通用如聖飲加減主治若汗多亡陽下多亡陰致筋脈失養不柔而未成瘡無外邪可解者惟宜補養氣血十全大補人參養榮大建中湯選用至於新產虛虛金瘡出血過多皆能成瘡惟脈虛小可治若實大者難愈也仲景言剛柔二瘡並屬太陽以太陽經行身之後故頭項強急而反張也瘡病胸滿口噤臥不著席脚攣急必斬齒若不大便者可與大承氣湯此論屬陽明矣若往來寒熱或左右一目牽斜或左右一手搗拗脈弦數者少陽瘡也宜小柴胡加防風其曰頭低視下手足牽引肘膝相攜海藏指為陽明此實三陰瘡也陰邪固宜攻下然欲行大承氣亦須察其內實脈沈有力乃可下之又有結胸證如柔瘡狀者此熱在胸中心下必痛宜大陷胸圓大下之仲景如字最妙如瘡而非瘡不可以風藥誤治也凡陰證脈沈細者附子散白朮附子湯選用服藥後汗出身和者吉若脈來沈遲或緊細而大便自利者皆死證也熱病發瘡腰折瘛疭齒斷者死按瘡為發汗太過血不榮筋之候故亡血新產瘡家虛家易犯此證無論陰陽剛柔脈類總之正衰邪盛卒難救療大率瘡證之屬三陰者及陽證陰脈者皆不可救其證目正圓及戴眼者不治所以仲景但論三陽治法而不及三陰也

春深長夏之時多有勞力感寒內傷之證與外感證類相似內傷亦發熱頭痛畏寒惟門隙中賊風最惡之若在大風處反不惡也畏寒得暖則解雖寒熱間作而不齊出言懶怯口淡無味腹中不和手心大熱而手背不熱兩脇俱熱蓋內傷自內達表先少陽也若外感風寒之證頭疼發熱無休止時寒熱齊作而驟發不止寒雖近火不除出言重濁算中氣粗一身盡熱蓋外感自表入裏先太陽也然溫熱亦自內達表先見少陽證腋下熱而脇滿驟然發熱如火大渴煩躁引飲頭面目舌俱赤喘粗氣盛絕不似內傷面目萎黃唇舌淡白短氣力怯等證也內傷氣口脈虛大外感人迎脈緊盛溫熱則氣口脈洪盛為異耳若內傷夾外感則人迎緊盛而氣口虛大其證發熱惡寒頭痛自汗五心煩熱遍身骨節俱疼宜補中益氣加桂枝無汗加羌活若陽氣不得下通而足冷者去升麻易葛根少加熟附子羌活外感多於內傷者黃耆建中湯加羌防若癲脈目疼眉棱骨痛加葱豉微汗之若兼停滯飲食則人迎氣口俱緊盛而滑實嘔逆脇上痛治宜先撤外感兼溫氣豁痰然後消導慎不可便用峻利之劑有等負重作勞之人

內傷飲食外感風寒且素多畜血者其證渾身壯熱頭疼骨節痛胸膈痞滿或痛六脈洪盛重按却無力或弦急強嘔逆不食或泄利或便祕以外感藥解表則正氣愈衰以溫補藥理脾則助邪轉盛並宜五積散加減但此輩多有食積瘀傷胃脘結滯者慎不可用白朮宜加桃仁當歸等藥六七日大便不行者大柴胡微利之若少腹痛而小便利者為血畜下焦桃核承氣代抵當丸選用下盡黑物然後調理○江應宿云大江以南溫煖之方正傷寒病者十無一二所以傷寒屬內傷者十居八九故丹溪主乎溫散有卒中天地之寒氣有口傷生冷之寒物皆以溫養兼發散之法實本內經成敗倚伏生於動動而不息則變作及風雨寒暑不得虛邪不能獨傷人之旨也蓋凡外感寒者必先因動作煩勞不已內傷於氣然後外邪得入故傷寒為病兼內傷者十常八九也○今人外感兼內傷者甚多用藥全要分別如外感重內傷輕則治外感藥宜用緩劑小劑及薑東和中頻頻與服庶無大動正氣如外感輕內傷重則用藥全以內傷為主加入透表藥一二味而熱服以助藥勢則外感自散蓋內傷之人纔有些微外感即時發病非若壯盛之人必所感重而病乃發也設以頭暉發熱認為太陽證誤表其汗則內傷必轉增而危殆在所必至矣又或誤認傷寒而絕其食已虛益虛往往至於不救然外感之邪與正氣交爭必然神志昏亂內傷因正氣本虛必然神識清明至死不亂也

又諸虛煩熱與傷寒相似一虛一實不可不察其虛煩發熱亦惡風自汗心中溫溫欲吐憤憤無奈但脈不浮緊頭不疼身不痛為異耳然虛火上炎亦微微頭痛時時閑熱但時發時止與外感不同蓋虛煩脈雖數大而按之必虛微無力當以甘溫補其中補中益氣少加炒黑黃柏以滋腎水兼進地黃丸可也大抵陰虛必生煩躁故叔和有云虛煩有熱不可攻恐令熱去則寒起此誠格言也發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊惱者梔子豉湯湧吐之又心中悸而煩者小建中湯先煩而悸者為熱先悸而煩者為虛也傷寒病後虛煩竹葉石膏湯為聖藥但不可施於嚴冬若大寒之時可用十味溫膽湯代之誤用涼藥虛煩愈甚而躁渴脈愈大而虛者切不可與水急用五苓散加人參名春澤湯若上盛下虛煩躁自利手足冷者竹葉石膏湯去石膏加熟附名既濟湯過經後熱不解或屢下熱不解脈虛數而煩者參胡三白湯或小柴胡加減虛煩不得眠或發熱痞悶脈虛而嘔者參胡溫膽湯汗吐下後未解無熱但虛煩不得眠者酸棗湯凡內傷虛煩脚氣痰飲食積等證雖有身熱頭痛俱不可發汗也

至於脚氣為病亦令人頭痛發熱。股節疼痛甚則嘔逆便祕有似傷寒但初起於腳膝熱腫或屈弱不能動移為異耳。然有寒濕濕熱之不同其兩脛焮赤而腫熱者為濕熱也黃白而腫冷者為寒濕也又有風寒濕熱之辨如脈浮為風緊為寒濡為濕數為熱總之風寒為標濕熱為本靈樞云身半已上者風中之也身半以下者濕中之也蓋由腎水虛儻風濕之氣乘虛而襲因有斯疾然婦人亦有病脚氣者必因胞絡血海虛邪乘七情所致以胞絡屬腎故與男子腎虛同類治法雖略有氣血之分而大意不殊但兼用開鬱藥無不効也昔人槩以小續命加減主治左關脈浮起於風去麻黃附子人參加羌獨活沈遲或緊起於寒去麻黃人參加薑汁脈數有力起於熱去麻黃附子人參加黃芩黃柏羌獨活脈沈濡弱起於濕去麻黃人參加草龍膽木瓜脚腫加木瓜檳榔大便實加大黃或東垣羌活導滯湯最妙然其證始則受濕復挾風寒暑熱而成初起不覺因他病乃發不專主在一氣亦不專主一經然此等必屬腎虛若用小續命須隨證加減慎勿以麻黃輕試即使風能勝濕亦須以羌防輩代之斷不可以中風傷寒法混治此證最忌溫補尤不可用藥湯薰洗俟病熱稍去然後改用滋補腎肝之藥更參醫通脚氣門治之

至霍亂證仲景與傷寒並類觀其所言傷寒四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不治則知霍亂不可輕治也蓋傷寒吐利與霍亂不同傷寒吐利為邪氣所傷雖吐利而不擦亂霍亂吐利是飲食所傷必暴煩躁擾而擦亂也又有內外不和加之頭痛發熱吐利是霍亂兼傷寒也此證雖屬脾胃亦主腎肝有陰陽寒熱之不同凡冬月外感寒氣內傷冷物鬱遏停滯不化嘔逆泄瀉霍亂脈沈細或伏者屬太陰理中湯臍上有築築動氣者去朮加桂苓厥逆惡寒加熟附子脈雖沈而轉筋煩躁發熱者當作熱治不可以其脈沈而誤認為寒也大抵霍亂有一毫口渴轉筋者即係熱證惟四肢逆冷下利清穀惡寒不渴者方為寒證也熱多而渴者五苓散寒多不渴者理中湯渴不能飲小便不利者二湯合用若吐逆下利心腹卒痛者為寒食內結金匱大建中湯嘔逆腹痛下利而頭痛發熱者為風氣內薄小建中湯轉筋反戾為風木行痹宜平胃散加木瓜憎寒壯熱頭痛眩暈為風痰夾攻藿香正氣散嘔逆頭疼發熱背惡寒煩躁面垢而齒燥者為風暑內薄消暑十全散嘔逆腹痛泄瀉或寒熱如瘡為暑食相兼宜十味香薷飲加減或六和湯之類吐逆下利煩渴引飲為鬱熱留滯五苓合益元散夏秋之間因伏暑而致霍亂吐利煩躁或腹痛自汗六脈雖沈手足雖冷不可用熱藥如果脈弱陽虛腹痛喜得溫按泄瀉不臭穢者來復丹又有吐

瀉後熱伏於內外則冰冷六脈細欲沈絕湯藥不下或發呃逆此火氣奔上而然也醫不能察誤作陰證投以溫藥愈服愈吐當驗其口渴以涼水與之則不吐矣後用杏薑飲加黃連麥冬通草等藥服之其脈漸出者生凡冒暑之霍亂吐瀉以治暑利水為主避暑之霍亂吐瀉以和中溫胃為主不可不辨也又如欲吐不吐欲利不利上下不通腹滿痛而頭疼發熱者桂枝大黃湯此乾霍亂多死因邪氣壅塞上下痞隔也宜用法先探吐之蓋邪在上焦則吐下焦則利中焦既吐且利邪氣得以泄去也若乾嘔霍亂兼大小便不利即是關格證也至於舌卷陽縮入腹者不治然霍亂為胃氣反逆誤犯穀氣必死非傷寒溫熱之比也

傷寒邪熱不散遊溢經絡出入藏府熱氣所過則為癰膿又厥逆脈數其熱不罷者此為熱氣有餘必發癰膿若邪熱遊於經絡則發外毒出入藏府則為內癰急當消散為主稍遲則膿成難愈矣經曰火起西方金法當癰膿其證欬而喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯畜結癰膿吐如米粥始萌可殺膿成則死又欬逆上氣時唾濁坐不得眠兒艾丸主之欬而胸滿振寒脈數咽不渴時時濁唾腥臭久久吐膿如米粥者桔梗湯王之肺癰不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之又肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆遺尿喘鳴迫塞先服小青龍湯一劑乃進葶藶大棗瀉肺湯三日一服可服至三四劑大抵初起慎不可用保肺藥得補則助邪成膿也所以宋人十六味桔梗湯葶藶薏苡瀉肺湯皆為合劑瀉後膿盡方可用異功生脈加歸耆斂之排膿用金鯉湯妊婦尤宜以活鯉魚一尾重四五兩者去腸入貝母末一錢在腹白色童便一盃隔水頓熟去鱗骨作二三次井汁食之七日當効又肺癰初起陳芥薑汁吐之屢效其脈初起不宜大數瀉後最忌短濁脈來緩滑面白者生急疾面赤者死又脈忽大忽小者死痿軟如平人者死忽然屈伸者死真氣敗也面白或黑或赤者死聲啞啞者死性急躁求速愈者不治○若胃脫隱痛而手不可近右關沈細人迎逆而盛者胃脫癰也馬仲化云胃為水穀之海其經多氣多血脈見右關本宜洪盛而反沈細則是胃氣已逆故沈細如此人迎者胃經穴名在結喉兩傍動脈應手其脈見於左寸今右關沈細人迎甚盛則是熱聚胃口而不行耳經曰熱聚於胃口而不行胃脫為癰胃脫屬陽明經陽明氣逆則嘔故膿不自欬出而從嘔出嘔是膿之淤濁兼蒸穀氣故嘔若膿出則嘔自愈夫癰之在胃脫上口者則然若過乎中在膈之下者膿則不從嘔出而從大便出矣所以今世概用涼膈散治之若膿血自上而吐當用射干湯深

得其旨也。○孫真人云。腸癰為病。小腹重強。按之則痛。小便如淋。時時汗出惡寒。身皮甲錯。腹皮急腫。脹大轉側有水聲。此膿已成或遠臍生瘡。或膿從臍出。或從大便而下。皆因飲食不節所致。無論已成未成。俱用大黃牡丹湯加犀角急服之。小腹痛而腫滿不食。小便不利。膿壅滯也。用薏苡牡皮桃仁薑仁煎服以排之。若膿從大便出者。為真腸癰易治。若從臍中出者。為盤腸癰難治。經云。腸癰為病。不可驚驚。則腸斷而死。故患是證者。其坐臥轉側理宜徐緩。時少飲薄粥。及保元湯。固其元氣為主。準繩云。凡腸癰初起發熱。惡寒。腹中疔痛。人鮮能辨。因循不識。誤作脹治。致毒攻內。藏煩躁口乾。時時驚惕。陰器腐爛。莫敗無膿。每流污水。不可治也。昔有患腸癰發熱者。庸醫作傷寒治之。絕其飲食。旬餘而斃。垂斃之日。下膿血數升。方知是癰。欲救之已無及矣。

赤肺者。胸膈亦而疼痛。發熱頭疼。體痛或脇胸亦腫。發疤者。屬少風陽熱。非正傷寒也。宜荆防敗毒去寒。加芩連犀角紫荊皮。主之。若表證已退。大便燥結。涼膈散。若半表半裏。合小柴胡去參加枳桔。又宜拔鍼利腫處。出血以瀉其熱毒。則易愈矣。

黃耳者。耳中策策痛。兩耳輪黃風入於腎也。卒然變惡寒發熱。脊強背直。如瘻狀。此屬太陽類傷寒也。宜荆防敗毒去寒。甚則小續命去附子。加白附蔓荆殭蠶天麻。更以苦參或骨碎補磨水滴耳中良。

凡傷寒。寒疫。溫病。熱病。多有夾食夾痰等證。若宿食傷脾。則氣口濁滯不調。傷胃則滑實流利。亦有逕滑及止促者。若宿食在上。腕井人迎亦滑盛。若宿滯已歸太府。則氣口雖浮大而按之必濁也。若脈來滑盛。胸滿居悶。嘔逆氣粗者。冬宜五積散。調中湯選用。餘時芍蘇正氣為主。中有二陳。使痰食無留滯之患。喘滿加厚朴杏仁。若解表藥中混用消導裏藥。必引邪內入。而成結胸下利等證也。然又不可純用升散表藥。若專一升散。則宿食上逆。而成腹脹不通矣。故於解表藥中兼理氣豁痰。使之流動。俟表邪解散。然後專力治內。庶無引賊破家之虞。所以芍蘇正氣為停食感冒之の方。若四五日脈來滑數。胸前甚熱者。宿食發熱也。調中飲加減。若脈來沈滑。雖寒食內結。其人胃氣不虛。尚可溫中消散。若夾食而氣口反濁滯伏結。或始雖浮大而按之漸虛小。其證身熱足冷。或腹痛或頭痛。但胸膈滿悶時或躁煩者。必其人元氣素虛。堅韌之物固結中宮。胃中陽氣不得下通。故但足冷而手不冷也。可用五積散去取頭痛者。陽邪上鬱也。甘草乾薑湯加葱豉以通其陽。腹痛者。陰氣下結也。枳實理中湯加熟附以通其陰。若曾

服過峻利藥消導太過致自利厥逆痞滿不除者桂枝人參湯若曾誤下而熱邪內陷愈加脈滿壯熱不止者小陷胸合枳實理中若過汗傷血小便祕濁枳實理中加歸芍或真武湯中加當歸○秘旨云陰虛之人傷寒與傷食皆難用藥若陰虛傷寒更兼傷食者為不治之候所以昔人從無治法余嘗以小建中湯用肉桂酒製生芍藥內以溫其中厚朴汁製甘草內以散其滯更加枳桔砂仁以行其氣熱除後以八味丸除去桂附減地黃加沈香砂仁調理自安復有中氣虛者更兼感冒停食則以補中益氣用桂枝酒製黃耆內以調其榮砂仁汁製甘草內以行其滯枳實汁製生白朮內以消其滿熱服微汗為效惟氣口脈大而按之滯滯或浮取小滯而久按愈覺有力大便五六日不行臍下按之痛者此為大腸氣鬱而脈滯當用大承下氣之○凡傷寒夾食既久痰飲固結有屢用承氣湯不効者黃龍湯主之內有人參助胃以祛宿垢也○溫病熱病時疫夾食無論表裏證見日數多少並宜涼膈散加消導藥最當○傷寒夾食十常四五或先傷食而後感寒或先受寒而後傷食或病勢少間而強與飲食重復發熱甚至譏語躁狂舌短目瞪變證百出况復醫者不察病之未裏先後標本虛實或當先解表而反兼治其裏或當急治本而反先治其標橫行逆施往往多致不救可不慎歟至於食積不化證類傷寒外證亦發熱惡寒但頭不疼痛為異且氣口脈必不和而惡食吞酸嗳氣腹滿欲吐不吐嘔逆痞悶見此證者即當以調中飲治之外感勢盛者調中湯主之

又夾痰積與夾食證類相似更宜審諦蓋痰者津液所化由風傷於肺濕傷於脾肺氣不清脾氣凝濁而成無論風寒溫熱內傷等證必增嘔逆眩暉風寒夾痰則令人欬嗽氣逆溫熱夾痰則令人昏眩痞悶內傷夾痰則令人吐逆妨食但外感風寒則寸口浮滑發熱頭痛欬嗽自汗宜金沸草散及芎蘇散溫病熱病夾痰則關脈滑緩痞悶聲齁宜涼膈雙解內傷氣虛夾痰則氣口脈滑而濡欬吐涎飲宜二陳湯加生朮於潛虛人六君子加香砂蓋白朮熟則補脾膩膈生則豁痰散血燥濕利水人多不知也凡人中腕有停痰留飲亦令憎寒發熱惡風自汗喘欬胸膈滿悶氣上衝咽喉不得息有似傷寒但身不疼項不強為異若涎多者亦隱隱頭痛清痰亦隱隱腹痛然止發不以其時目睛微定眼胞上下如煤炭色是也其脈左手和平右關濡滑或寸口伏匿俱宜小柴胡去參加茯苓橘皮或二陳湯隨證上下加引經藥要以分尋出路為主至於痰迷心竅如祟者與傷寒陽明發狂相似但口中時吐涎沫胸腹

按之不痛辨之宜加味導痰湯加減氣上衝胸脈滑而遲者為痰伏膈上宜承氣散虛人只用稀涎散探吐之嘗見外感夾痰證脈不甚浮不宜大發其汗激動其痰則嘔不能食宜於理氣藥中合解散之劑如香蘇散正氣散之類氣順則痰化矣痰飲證類實繁姑就夾證數條與傷寒有關涉者辨論餘不贅及。

夫夾食夾痰長沙既無治法前人亦未辨論無怪後世治之不得其當至如夾水長沙方論具備何今世無一人能用之者蓋此水即肺之液也風寒傷人皮毛肺先受之肺為金主生水肺既受傷不能行其水液至腎遂停留心下為欬為喘及乾嘔發熱等證故以小青龍發散風寒并滌肺經停留之液必令作汗以泄之故方中用麻黃細辛以開發皮腠也始失其治乘所不勝則傳少陽之分而變心下痞鞕引脇下痛乾嘔短氣等證又處十棗湯以攻逐之若更失治木復傳土則漬入胃而成協熱利也若水在少陽部分不傳入胃遊溢經絡則藏府不受其邪大熱得以差可惟腰以下重足胫浮腫小便不利者重則牡蠣澤瀉散輕則五苓散加防己主之又少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣或欬或嘔者真武湯主之此又腎虛不能制邪水也則知治水之法不獨今世無人在昔知者亦鮮矣。

傷寒之夾水既多而夾血證復不少然夾血與蓄血不同其人素有內傷跌撲停經血瘕及暴起傷肝皆有瘀積因傷寒溫疫等證發動痼疾謂之夾血必有痛處定而不移治宜察其部分消息微甚用藥又有跌撲打傷一時不覺過數日寒熱乃作有似傷寒脈當堅強最忌細濁脇痛少腹痛手不可按甚至昏迷不省少頃復甦乃瘀血上衝所致也其人大便或祕或黑輕則香穀散重則代抵當丸或桃核承氣湯加炮川山甲一錢最破瘀積寒熱更加柴胡當歸在經絡當歸活血湯在胃口犀角地黃湯加酒大黃若更兼寒食停滯中脘或腹中作痛者枳實理中湯重則加乾漆灰二三分輕則加薑汁炒黑山楂肉又或脫衣鬪毆兼感風寒有表證者必先解表邪然後治血如欲發汗宜桂枝湯芎蘇散等並加歸附桂心甚則加延胡索蓬朮不得行麻黃青龍等湯亦不得用寒涼止血之劑蓋血得熱則行得寒則凝瘀結不散必發熱如狂欬喘嘔逆若發汗太過誤觸瘀血則或嘔或泄或發呃逆但活血則嘔泄呃逆自然既發熱則攻血藥中必加乾漆炒黃連非此化熱則血不得散也若嘔泄之血其色紅紫而散者可治色如敗鰥而凝結成塊多兼血水此正氣已弱不能留也又或如污泥而粘膩不斷臭穢異常者此津氣已敗與

濁腐同下也。至於當汗不汗太陽之邪內結則為畜血與夫邪氣在經而為衄血。熱邪在胃而為吐血及諸失血家。又有奮力鬪毆之人。脫衣露體觸犯風寒。謂之火氣傷寒。今人但知用理氣藥。不知兼有夾血夾食者。其證惡寒發熱肌骨疼痛。胸膈脹閉。氣逆喘呼。若其脈浮緊。則宜輕劑發散兼理氣寬胸。如局方杏蘇散最宜。有食則加枳殼厚朴。痰加半夏茯苓。感寒嗽則加羌活桔梗。傷熱嗽則加姜蕤薄荷。頭痛加川芎白芷。四時不正之氣加藿香。甚則芎蘇散主之。若脈弦緊。或有伏結。為積血在內。當用破血利氣藥。如香殼散之類。有食不妨用溫中消導。如調中散正氣散皆可。若但恚怒傷氣。只用小柴胡去參苓加橘皮枳殼。若脇下痛為鬱怒傷肝。當歸活血湯。少腹急痛為有瘀血結聚。桃核承氣或代抵當湯。又有暴怒鬱抑不得發泄形厥如屍不語如瘧者。宜用沈香降氣散。若但鬱悶不得發泄之人。偶感風寒。或發伏氣。或傷暑熱。或兼內傷。俱隨證用藥。但略兼開鬱理氣不可行破血消導也。

復有房室不謹之後。感冒風寒及恣意乘涼。觸犯風露勞役傷精而病者。謂之夾陰。其證亦發熱頭痛胸膈痞悶。若陰火上乘。則面赤而足胫逆冷。蓋陽病必頭痛。陰病必足冷。內經所謂陽病者。上行極而下。陰病者。下行極而上也。以其虛陽發外。故發熱煩渴而躁亂。不寐真陽不能下通於陰分。故足不能熱而陽道痿縮也。按盛起東云。治熱須辨真假。夫真熱則發熱惡寒。脈數有力。按之更實。躁煩口渴大便燥。小便赤澑。或利臭積。發言壯厲。不欲近衣者是也。親乎表者宜發散。親乎裏者宜通泄。假熱亦發熱惡寒而足必不熱。脈大而虛。按之微弱。身雖熾熱而不躁不渴。或見虛狂而項之即止。終不及聲高罵者也。經曰。寒熱有真假。治法有逆從。此之謂也。○外編云。夾陰傷寒。乃太陽少陰二經同時受病。較之紳陰證倍危。在傷寒寒疫。猶或可治。若溫病熱病時行疫癘。百不一生。誘云。傷寒偏死下虛人。以其外極亢熱。內極虛寒。溫經之藥萬不可施。以故必死。即傷寒夾陰。治之不得其宜。終亦必亡而已。每見庸工治夾陰傷寒。用小柴胡和之。多致厥嘔噦呃而死者。以不勝黃芩之陰寒也。亦有見其足冷陽縮。用四逆湯溫之。多致煩躁血溢而死者。以不勝附子之雄悍也。宜小建中。黃耆建中加減。○祕旨云。若脈來尺中逕弱無力。而足冷陽縮者。於黃耆建中湯內用生附汁製入黃耆。以溫衛氣肉桂酒製入芍藥以調榮血。不應改用參製黃耆麻附

細辛汁製甘草以汗之。若尺中弦數而多虛火面赤戴陽者於小建中湯內用人參汁製入甘草以助胃氣丹皮酒製入芍藥以降陰火不應加連附汁製黃耆及葱白香豉以攝之。若春夏感冒夾陰通用黃耆建中湯加減蓋陰虛之人雖患表邪發熱其中必夾陰象所以尺脈必不能實足脛必不能溫用藥最為扼腕較陽虛之可用溫補迺乎不侔也。至於溫病熱病之夾陰雖長沙復生難於措指惟暴感風寒夾陰可用上法治之。內經云脈實滿手足寒頭熱春秋則生。冬夏則死可見夾陰傷寒病於嚴冬熱病失陰發於盛夏者皆真陽偏極邪氣亢甚多死也。若夫感冒夾陰其人陽氣雖虛春秋本無大寒傷犯邪氣原輕猶可治之非熱病大熱手足寒之比也。其中暑夾陰治法詳本例中。

至如遠行遇雨則寒濕之氣先從汗孔襲入背俞況雨氣通於腎雖有發熱頭痛欬逆等證解表藥中必先通少陰之經而兼開發肺氣故細辛羌活在所必用所以首推神木湯為主又須隨時令寒暄元氣盛衰加減始為合劑若冒雨而更加之以風則風濕相搏一身盡痛當除風濕羌活湯或小建中去芍藥加者朮羌防風葛根葛根散陽與明而發熱者茯苓桂枝白朮甘草湯大抵此證雖當盛暑亦忌寒涼若遇嚴冬稍加麻附。饑後則加白朮飽後則加橘半勞役傷氣而冒雨涉水發熱喘欬則宜補中益氣加細辛炮薑若水寒之氣傷肺而喘欬不止者又以小青龍加減陽虛者去麻黃加附子白朮為主治也。

若夫遭風溺水最忌熱酒火烘惟宜溫煖覆蓋原其溺水之時必多驚恐心腎受傷雖有發熱頭痛骨節疼痛等證解表藥中必兼通心腎在冬月麻黃附子細辛湯或小青龍加生附子三五分蓋麻黃發汗通心附子溫經通腎細辛通徹表裏之邪更宜稍加芩半以開豁驚痰若在夏月則麻附皆所禁用當以五苓散加硃砂熱服一半探吐取汗更服一半蓋驚則氣亂故宜去濕利水約中加硃砂或脈浮而見表證多者五苓散合小柴胡各半貼和解之或五苓散合羌活勝濕湯各半貼微汗之。至於暴怒悲號投河躍井雖有表證當解須香蘇散加撫芎木香烏藥理氣為要跌傷加當歸桃仁桂枝安有溺水而不驚不氣不受傷者但當取其所勝治之其有天時寒冷兼秋冷食傷脾與夫曾犯房室而遭風覆溺及冒雨涉水傷腎而病身熱足冷者皆當參夾陰例治。

夫傷寒證類多端且多挾見諸證非刻意精別用藥必致差誤即如婦人傷寒多兼經候胎產調治更難經行之時

雖有外感風寒。必和解中兼調血為主。如小柴胡合芍歸丹皮之類。否則邪傷衝任而為熱入血室矣。○又辨脈法。寸口脈弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛寒。虛相搏。此名為革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。此條傷寒論中不出方。而金匱半產漏下。主以旋覆花湯。方用旋覆葱白新絳三味。則知其意多從表邪起見與男子虛勞失精之用。小建中。黃耆建中。桂枝加龍骨牡蠣等方同義。大抵虛勞失血而見弦大之脈。皆是外感誤治而成。此云脈弦而大。按之減小者。謂之芤。明是表邪不解。裏血受傷之候。若更指下堅強。如按鼓皮則謂之革。又為邪勝正衰。胃氣革除之候。而仲景毫不以虛為慮。仍用旋覆之解結。葱白之散邪。新染絳帛之入膀胱而和血。即如後世用一味防風丸。治風入胞門之崩。與此方藥雖異。而理不殊也。○妊娠傷寒。首宜固胎。順氣雖見脈緊無汗。切不可用麻黃青龍及一切解表猛劑。以風藥性升。皆犯胎氣也。其脈以緩滑流利為順。虛濶及躁急不調為逆。其解肌藥。惟桂枝湯無礙。金匱云。婦人得平脉陰脈小弱。其人渴不能食。無寒熱。名妊娠桂枝湯主之。則知妊娠雖無表證。亦宜用此以和榮衛也。鄭虛庵曰。妊娠傷風。無論時月及月分多少。俱宜嚴氏紫蘇飲。多加葱白。安胎為要。欲嗽多者。金沸草散加減。妊娠傷寒輕者。浙浙惡寒。翕翕發熱。重則頭痛身疼。久而傷胎。亦宜紫蘇飲。或香蘇散。並加葱白。否。倘至半產胎傷。多致不救也。妊娠而犯冬溫。溫熱疫癘。多致傷胎。若冬溫則陽旦湯。春溫則黃芩湯。熱病則白虎湯。時行疫癘。則達原飲。不惟善解熱毒。兼能護持胎氣。更無藉於井泥塗臍之法也。若實熱便閉。急涼膈散承氣湯下之。庶免邪熱傷胎之患。惟大小便如常。知裏無熱。慎不可下之。妄下引邪內入。必致傷胎無疑。若下後熱不退。白虎與承氣並用。或前後而用。若誤用參耆。壅遏毒邪。則胎愈不安也。倘見腰腹痛。必墮無疑。須預言之。藥無及矣。若其脈數疾無倫。喘脹嘔逆。腹中重墜不能轉側。當臍久按覺冷。或有瘀垢下行。但看舌色及爪甲青黑。其胎已死也。急宜平胃散煎成調羹。硝牛兩許下之。虛極不勝藥力者。加人參兩許駕馭之。若併唇面青黑。而嘔噦不止。口中又有穢氣者。子母俱死。切勿用藥。

新產感冒發熱。大為危候。然有產時傷力。或去血過多。或惡露不行。或早起勞動。或飲食停滯。及蒸乳。一切發熱。不可誤認外感。妄施汗劑。以其氣血大虧。百病乘虛而入。即使更受風寒。亦宜調理氣血為主。其脈以小弱滑利為吉。繫寶堅大為逆。數大散漫亦危。更須問惡露行與不行。小腹痛與不痛。若痛者。以行氣導血為先。新產小腹結痛炒

黑山查肉三五錢炒黑砂糖兩許煎服瘀血即行其痛立止虛人加人參爻甘草炮薑茯苓澤蘭之類風寒則加桂桂二三服自效。若小腹不疼頭痛身熱惡寒無汗或喘或欬宜香蘇散有食小劑芎蘇參蘇隨氣血取用有於血兼行血藥值時行不正之氣遍身疼痛無汗敗毒散或香蘇散加葱白香豉金匱云產後中風數日不解頭痛寒惡有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在者可與陽旦湯又曰產後中風發熱而面正赤喘而頭痛竹葉湯主之又云婦人在草蓐中自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯鄭虛庵云凡產後傷風發熱而面正赤喘而頭痛竹葉湯主之又云芩在內易停惡血傷人也產後雖犯時疫宜柴胡四物湯加減即小柴胡湯合四物湯素問云孔子而病熱脈懸小手足溫則生寒則死此言傷寒也孔子中風熱喘鳴肩息者脈實大而緩則生急則死此言傷風也通宜小建中加芍藥孔子者言產後以乳哺子也張介賓類入小兒門大經產後傷風寒熱如瘡兼腹內拘急不能食宜小柴胡去黃芩加當歸紅花丹皮甚則加炮薑茯苓去芍藥主雖有大熱不得用苦寒產後虛羸寒熱有似外感食少腹脹方書俱用增損柴胡湯然不若柴胡桂枝湯去黃芩加川芎和其榮衛庶免鬱勞之患○婦人血風因大脫血而虛熱燥結熱甚則風生其證煩躁身熱循衣摸床撮空閉目不省人事揚手擲足搖動不安錯語神昏脉浮而虛或弦革者難治宜生地黃黃連湯脈實稍加酒大黃○產後傷寒切不可過用表藥多汗經虛每致發癧也○凡胎前發熱理中合四物去白朮地黃加柴胡茯苓產後發熱四君子入桂枝芎歸臨產發熱道進散加減產婦血虛最易發熱不可一概認為外感也今之醫者治病一見發熱便認外感不論風寒榮衛及裏實便輒概用發散鮮不誤人如裏發熱認作表發熱者其脈浮緊無汗為傷寒浮緩有汗為中風皆風寒外襲表熱發也其脈實而蒸蒸發熱六七日不大便者為裏實發熱邪氣內傳而熱也○有裏惡寒認作表惡寒者初起不熱但惡寒而體倦怠微脈沈遲無力此寒中三陰裏惡寒也若初起惡寒而體重氣促脈陰陽俱緊為表惡寒始雖惡寒後必發熱也○有冬溫認作傷寒者冬溫因腎氣不藏不正之氣入傷太陽少陰二經始病多不惡寒便心煩大發熱而渴必咽痛或下利脈來左手弦軟傷寒則風寒外來始病必先惡寒而後發熱始先不渴至三四日後熱耗津液方渴脈必入迎緊盛也○有伏氣發溫認作感冒者伏氣乃冬時伏藏之邪自內達表必不惡寒而發熱一熱即口燥咽乾而渴氣口脈洪大倍於人迎感冒是暴感非時寒氣始病雖發熱一二日內必不作煩渴人迎之脈必弦盛倍於氣口也○有勞力感寒認作傷寒者辛苦勞役

之人頭疼恐寒身體倦怠而痛微渴自汗此因內傷血氣兼外感風寒人迎脈必弦緊氣口脈必虛弱兩尺必弦數所謂形作傷寒其脈不弦緊而弱是也○有夾陰認作陰證者夾陰則有頭疼發熱但足不熱或陽縮入腹陰證則無頭痛發熱也○有感冒非時暴寒認作正傷寒者冬月寒水主令故正傷寒中風必先太陽若感非時風寒多兼足少陽而寒熱秋多兼手太陰而欬嗽若暴寒勢甚亦必傷足太陽為多蓋腎本寒水之經同氣相感也○有動陰血認作鼻衄者少陰無汗而強發之血隨藥動或從口鼻耳目而出名下厥上竭言陽隨血而上竭陰在下而發厥也若衄則太陽表邪失於汗下或汗下不解邪鬱經中而致也○有直中陰經真寒證認作傳經證者陰證則先不發熱四五日或六七日後反發熱者陰極生熱也傳經陰證則先發熱五六日後而變四逆厥冷熱極反兼寒化也亦有始本陽證汗下太過而變虛寒反發熱煩躁者陰陽俱虛竭也○有獨語認作鄭聲者傷寒邪熱未解睡中自語名獨語精神昏憊也若汗下太過聲出咽中無力接續名鄭聲正氣虛奪也○有少陰發熱認作太陽發熱者少陰則脈沉無頭痛太陽則脈浮緊而頭痛也○有太陽無脈便認死證者傷寒六七日或十餘日脈伏而不起者此欲作戰汗而解也如大下後厥冷下利無脈是驟虛脈隨氣脫也與三陰厥冷無脈久之不溫及服薑附脈不出皆死證也○有血證發黃認作濕熱發黃者血證則小便自利傷血而不傷氣也濕熱則小便不利氣病而血不病也○有痞滿認作結胸者痞為虛邪必居胸脇不在中也雖滿而不痛結胸為實邪正在胸中痛不可近者為大結胸若按之方痛者為小結胸○有心下鞭痛下利清水而認為漏底者因熱邪傳裏燥屎內結小腹鞭痛譏語惡熱渴飲水漿而利乃下傍流純清臭水為熱結利若下利清穀腹痛善按者為內寒又夾食傷寒因本虛不化不結而自利或因誤用消導及攻下遂利不止者俗名漏底也○有如狂認作發狂者傷寒初起無熱狂言煩躁不安精采不與人相當此因熱結膀胱也又有當汗不汗五六日後小便利大便黑此畜血如狂也若陽明內實發狂必妄言譏語欲登高棄衣此為燥結失下而致也○有譏語認作狂言者譏語有虛有實熱入胃府水涸燥結者陽邪內實也可下之若火剗取汗譏語者神明擾亂也宜清之多汗亡陽譏語者陽神躁擾也宜和之下利純清水而譏語者陽邪暴瘡有似陰寒也急下之若狂言不能食者是失志失志為腎絕必死勿治○有女勞復認作陰陽易者差後御女為女勞復此虛邪為患復犯虛虛之戒必死若不病人與病新差者交而得病者為陰陽易此熱毒雖來虛入

犯少陰猶可用祛熱藥治之○有合病認作併病者合病則一得病便見兩經之證併病則先見一經證一兩日又加一經證見前證不罷兩經俱病也若先見一經證更變他經者又為傳經矣○有暑證認作感寒者暑證則熱傷心包微涼外鬱表之陽虛必背微惡寒而脈虛或細弦芤遲暑傷氣而不傷形也若暑證而脈反弦緊惡寒者此更感非時寒氣也若陽明中暎則煩燥口乾多汗前板齒燥而脈洪大當晝熱甚則脈大證劇至夜稍涼則脈與證俱減可此熱傷陽而不傷陰也若壯熱煩渴引飲脈來洪盛氣口倍於人迎晝夜診之無異者此冬時伏藏之邪至夏發為熱病也○有噦而認作乾嘔者噦為胃虛誤攻其熱或飲冷水所致其聲濁惡而長乾嘔則似吐而無物出胃中熱與穀氣相伴及水逆痰氣所致非惡候也○有短氣認作發喘者呼吸短促而反盛者為短氣此失於汗下所致宜分表裏汗下之若氣息虛微不續為少氣此汗下太過所致宜生津兼和榮衛若裏氣逆上張口擡肩者為發喘此因水飲傷肺所致宜疎表邪散水飲為首務若夫真陽不歸而衝氣逆上者又當從事桂附然多不能救也○有蚊跡認作發斑者發斑多見於胸腹先紅後赤蚊迹多見於手足先紅後黃也○有正陽陽明府證認作陽明經病者府病是胃府受病則六七日不大便讞語發渴而脈實經病是經絡受病則身熱目疼鼻乾不得卧而脈長溫熱發於陽明則自府達經煩渴自汗壯熱目脈赤而脈洪大○有溫瘡認作風瘡者溫瘡則溫病熱邪未盡重感於寒而成發於春夏之交其證多熱少寒風瘡則多發於夏秋也○有疫痢認作漏底者蓋疫痢是冬時伏氣因春夏多雨火邪復為濕伏延至秋時真陽內入其邪內不能容外不得泄變為下痢其證大發熱而下痢煩渴其脈必氣口洪盛古人以敗毒散加陳倉米治之誤與攻積利水必死若漏底則因腎氣素虧或火冷食而見外熱裏寒之證其脈必尺中微弱當從夾陰例治亦有熱邪傳裏而下利穢積者又當從傳經熱證治之○有中濕認作風濕者中濕則一身盡痛而重脈來沉緩或面黃頭痛鼻塞風濕則一身盡痛而腫闊節不利不能轉側惡風不欲去衣其脈浮虛而濡○有燥證認作濕證者燥證則肌膚枯槁血少不能榮養百脉而瘦弱無力濕病則肢體浮腫經隧中為濕所襲而病者不舉也○有標本全不曉者即如厥逆若先發熱至五六日傳進陰經血分而厥則為陽厥若始先不發熱即惡寒蜷臥而厥則為陰厥及諸病皆有假寒假熱要以邪實壯熱為本病本虛假熱為標熱也○有雜證類傷寒者諸凡雜證發熱皆發於裏夜甚於晝惟傷寒為表邪鬱發於外而晝夜俱熱也已上諸證必須詳審明確

方得用藥無誤。如未病素脾約纏病忽便利。未病先有固疾。已病重添新病之類。若不審諦。寧無誤治之失耶。  
至於不治諸證亦須胸次了然。臨證始能決斷。如傷寒病熱不退脈反沈細者死。○欬逆上氣脈散者死。○三部緊  
盛。汗出不解者死。○陰陽尺寸俱虛熱不止者死。○身熱喘粗脈躁疾者死。○汗後餘熱不解。未可言死。脈如轉索  
者。其日死。○譏語微熱脈浮大手足溫者生。厥逆脈沈細者死。○陽病見陰脈者死。○發少陰汗。連厥陰血者厥竭  
而死。○發左右動氣汗者死。○大發風濕汗者死。○發陰陽毒過六七日死。○誤汗言亂目眩者死。○濕家額上汗  
出微喘。小便利而下利不止者死。○關格不得尿。頭汗者死。○不尿腹滿加噦者死。○大發濕家汗成痘者死。○發  
少陽汗譏語者死。○亡陽譏語脈短者死。○直視謙語喘滿者死。下利者亦死。○吐下不解。循衣摸床。微喘直視脈  
濁者死。○內傷瘀積畜血如狂下如汚泥者死。○少陽證誤下。身黃胸脇石鞭者死。○陽明病心下鞕滿攻之利遂  
不止者死。○發濕溫汗為重暎者死。○兩感傷寒者死。○汗出熱不解而脈躁疾為陰陽交者死。○陰陽易熱極躁  
亂脈急疾無倫者死。○夾陰傷寒身熱足冷下虛邪盛不可溫者死。○溫熱時行大發熱手足下體寒陽縮脈沉小  
虛散者死。○溫病遍身紫赤者死。○結胸證悉具。煩躁者死。○結胸脈浮大者下之死。○狂言不能食者死。○發厥  
肌冷而躁。無時得安者死。○如結胸狀。舌上胎滑為藏結者死。○脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者死。○  
黑斑如果實壓者死。○舌卷囊縮者死。○少陰病下利脈弦長名曰負者死。○目亂無神氣者死。○少陰病吐利煩  
躁四逆者死。○惡寒身踴而利。手足厥冷者死。○脈不至不煩而躁者死。○下利止而頭眩時時自冒者死。○下利  
厥逆無脈。服湯脈暴出者死。脈不出者亦死。○發熱下利厥逆躁不得臥。厥不止者死。汗不出止者亦死。○下利厥  
冷。煩躁無脈。久之不溫。反微喘厥不還者死。○厥利本不能食。今反能食。為除中者死。○傷寒  
七八日大發熱汗出如貫珠為氣衰者死。○爪甲青為陽衰者死。○循衣摸牀為神亂者死。○四肢振動。唇吻反青。  
為肝絕者死。○體如煙薰。直視搖頭為心絕者死。○環口黧黑。令汗發黃為脾絕者死。○汗出如油聲如鼻鼾為肺  
絕者死。○卵縮遺尿。狂言目瞑為腎絕者死。○喘而不休為邪勝者死。○水漿不下為胃絕者死。○形體不仁為榮  
衛不行者死。○乍靜乍亂為命絕者死。○已上死證不可輕投湯劑。若邪熱甚者。靜候氣衰或有可生之理。正氣衰  
者惟與漿飲。庶幾元神將復。經曰。漿粥入胃泄注止。則虛者活。身汗得利後則實者活。此其候也要知傷寒證類百

出貴在治法先後不誤則長沙復起不過如是余於暇日集諸家之要參以所歷辨論頗晰臨證庶無岐謬非敢云補長未逮聊以抒蕩羌之一得耳

### 脈法

世言傷寒脈類莫不宗節庵浮中沉三法而長沙一脈寢置久矣夫浮中沈之說固為捷訣然不能偏廢經論之綱領也傷寒脈法首言大浮數動滑為陽沈濇弱弦微為陰六經例又言尺寸俱弦者少陽受病也夫弦脈既曰屬陰而又為少陽者何也仲景意以弦脈為陰者兼見眾脈而言也沉濇者陰也兼以弱弦微之類安得不為陰乎六經例以尺寸俱弦者指單見一脈而言豈得不為陽乎以弦脈分陰陽二用之理其義微矣按脈訣以弦脈為陽動脈為陰仲景乃以動為陽脈蓋浮大者陽也兼之以動數滑之類安得不為陽乎又曰陽動則汗出陰動則發熱言浮而動者為陽沈而動者為陰故仲景之脈不可與雜證同語也且夫沈者陰也而又有屬陽者若沈而濇沈而遲沈而細小之類皆為陰也如沈而滑沈而數沈而實大之類皆為陽也浮者陽也而又有虛寒者若浮而滑浮而數浮而緊盛之類皆為陽也若浮而遲浮而虛浮而微弱之類皆虛寒陰證也夫浮而陽者宜發汗浮而虛者宜溫補沈而實者宜攻下沈而陰者宜溫經惟弦脈則隨浮沈以定陰陽以少陽主半表半裏故宜和解是以節庵主浮中沈三法即是此意蓋傷寒之邪自表達裏始雖太陽必先皮膚肌肉次入筋骨腸胃若溫病熱病之邪久伏少陰經中從少陽發出肌表在表之時不以涼解則邪復入裏而歸腸胃為實熱也此傷寒溫熱脈法之迥異說見總論中不暇更述姑以浮中沉三法論之

如尺寸俱浮為太陽浮緊而濇為寒邪在表浮緊不濇為表邪方盛浮緊而數為熱欲傳裏若浮而長為傳併陽明或合病浮而弦為傳併少陽要以脈中有力為有神可用汗解浮而緩者為中風宜解肌浮而無力為陽虛便當溫補不可發汗若浮而尺中弱濇遲細足胫逆冷皆內虛夾陰豈可汗乎若三陰經證始先脈沈後變微浮者為陰虛復陽欲愈之兆若春夏病發熱頭痛而見浮緊浮緩之脈不大作渴者謂之寒瘻若脈雖浮緊而病便見大渴腹中脹滿不和者此即伏氣內發而加客邪外襲也亦有時氣不正邪傷氣分脈浮者此即時行之類也中脈者陽明少陽二經脈也尺寸俱長為陽明長而有力為實熱當解肌長而浮者尚兼太陽宜發汗長而數者為

熱盛雖係表證不可用辛溫發汗。上宜辛涼輕劑以解肌。若長而實大有力。大便祕結為胃實。可下之。溫病熱病及時行疫癘。始發多有此脈。切不可發汗。乃黃芩白虎之證也。尺寸俱弦者少陽也。弦數為熱邪傳裏之候。弦而有力為邪實。如大便祕結不行。宜大柴胡微利之。弦而浮兼太陽證。尚宜發汗。若弦而遲緩而小。弦而微弱。皆內虛有寒。宜溫之。溫病熱病及時行脈弦脇痛。俱宜小柴胡去參半加枳橘。弦盛有力。加石膏知母。弦小無力。仍用人參有嘔無汗。是以脈弦有似乎緊也。又傷寒寸口緊盛。而尺脈弦細浮數。此為腎氣素虛。慎不可用麻黃發汗。宜小建中和之。大抵弦脈雖居表裏之半。然表多於裏。只宜和解。不可攻下利小便也。

凡沈脈俱屬三陰而有陰陽寒熱之別。尺寸俱沈細者為太陰。俱沈為少陰。俱沈弦為厥陰。若沈而滑。沈而疾沉而實。皆以有力為實。熱為傳經熱邪。為陽證。分緩急攻下之。若沈而微沈而細。沈而弱。但以無力為虛寒。為直中陰經或為壞證。詳微甚溫理之。或始本太陽病。發熱頭痛。而脈反沉者。此雖曰太陽。而實見少陰之脈。故用四逆湯溫之。若夫春夏溫病熱病。而見脈沈小微弱短濶者。此伏熱之毒滯於少陰。不能發出陽分。所以身大熱而足不熱者皆不救也。惟脈沈實而見陽明府實證者。急用承氣下之。不可拘於陽病陰脈例也。若時行疫癘而見沉脈為毒邪內伏。設無下證。必無生理。大抵沉脈最為關要。以決陰陽寒熱用藥。生死在於繖毫。得不仔細謹察乎。

夫脈沈細微緩初起無頭痛。不發熱。便四肢厥冷。腹痛嘔吐。泄瀉。踴卧沈默不渴。人皆識為陰證矣。至於脈浮而大。但按之無力。發熱而戴陽。渴欲漱水而不能嚥。煩躁時欲坐臥泥水中。此為陰盛格陽。虛陽上膈之候。人皆不識。認作陽證。誤投寒藥即死。殊不知陰證不分發熱。不發熱。脈之浮沈大小。但指下無力。重按全無者。便是伏陰。急與薑附溫經回陽之藥。雖有發熱頭痛表證雜出。只宜五積散一服。通解表裏之寒。切忌發泄。誤與發汗。則脈必緊數而發熱。誤用涼藥。則脈轉緊盛而躁渴愈急也。又有內外有熱。其脈沈伏。不數不洪。但指下沉濶而小急。此為伏熱不可誤認虛寒。以溫熱治之。是益其熱也。大法遲濶微弱可溫。浮盛洪緊可汗。沉細滑實可下。虛細勿吐。遲弱勿下。滑實勿汗。沉實勿溫。貴在辨脈施治。可謂上工矣。

至於結促代伏。皆為傷寒死生關捩。并為詳識夫脈來緩時一止復來。謂之結。此陰盛脈必有寒伏於中。故傷寒脈

結足冷腹中痛。宜大建中湯。又脈來數時一止復來。謂之促。此陽盛脈必有熱結於裏。傷寒溫熱發斑發喘。皆有是脈。大抵皆宜內奪。清理之後。其促漸退則生。轉加則死。又脈來無力。動而中止。不能自還。曰代。雜病見之必死。傷寒有寒邪水飲得畜。而正氣內虛。邪伏不解。故有脈結代心動悸者。主以炙甘草湯。至於伏脈。則有汗下溫解之殊。但初起頭痛發熱。或一手無脈。或兩手俱伏者。庸工便謂陽證見陰脈之死候。殊不知此因寒邪不得發越。急用麻黃湯汗之。若初起發熱頭痛方除。已後厥逆無脈者。陽厥也。小承氣湯主之。若初起不發熱無頭痛。便厥冷吐利無脈者。直中陰寒也。四逆湯溫之。若初起陽證。至六七日或十餘日。但服表汗藥而未曾攻下。別無刑冠證候。昏冒不知人事。六脈俱伏。此欲作戰汗而解也。當與熱薑湯助其作汗。慎勿用藥。若誤與湯劑。反致變害也。

### 察色

望而知之謂之神。見其色而知其病也。故傷寒家尤以察色為首務。察其色澤。問其困苦。辨其聲音。更合之以脈類無遁情矣。夫肝青象木。脾土色黃。亦屬心火。肺白腎黑。皆見於面。青主肝藏風寒。青而黑者多寒痛。青而白者多虛風也。陰寒極甚。面與唇口青黑。甚則舌卷陽縮。及火陰傷寒。少腹痛而面青。俱宜急溫者也。若夫厥陰寒厥。亦有唇面爪甲青紫而脈伏者。然細察之。其脈必附骨有力也。面亦多熱而有表裏虛實之殊。然亦有陰極似陽者。太陽證頭痛發熱。喘而面赤者。為表證。若面色緣緣正赤。為陽氣怫鬱在表。汗出不徹故也。又熱病煩渴。面赤脈洪大。表裏俱熱也。陽明府實。潮熱汗多。面亦不大便者。裏證也。少陰病下利清穀。裏寒外熱。為陰盛格陽。火陰傷寒。發熱頭痛。面亦足冷。脈沈細。或浮數無力。按之欲散。為虛陽上浮。壞病汗下過多。元氣耗散。微陽失守。皆面赤戴陽。並宜溫補。下元不可誤用寒藥。若午後面赤為陰火。不可作傷寒治。兩顧赤色如妝。為陰火亢極。雖愈必死也。面黃主濕黃。明者為濕熱黃而暗者為寒濕黃。而帶赤白者為欲愈黃白不榮。而多蟹爪紋者為蟲積黃而澤者為內傷蓄血。黃黑而槁者為食積黃而青黑者。脾胃衰極。為木勝土而水無制也。白主氣虛。白而無神者。傷寒大病後。發汗過多。或蓄血所致。黑主腎衰。傷寒顏帶黑青。為陰寒之色。若久病焦黑者。又為腎熱也。凡耳目口鼻黑。氣枯夭者難愈。神庭黑氣如指者。陰晦之色。見於陽之正位。卒死兆也。面慘不光。傷寒也。面光不慘。傷風也。面如錦紋。陽毒也。面垢如油。喘促多汗。足陽明中喝也。面垢生塵。灑然毛聳。手少陰中暑也。大率面帶黃者為脾土正色。病雖劇而可治。若青黑。

赤白異常而無黃色相參者皆非吉兆也

凡察病者目以開目欲向明者為陽閉目不欲向明者為陰目疾屬陽明表證目赤為經熱盛目瞑澈水鼻燥為陽邪上盛欲解必衄目黃而頭汗將欲發兼目不了了為陽明府實若睛不和者少陰熱也目眩為痰因火運眼胞微腫為有水自下灰色為寒飲目白睛黃欲發輝也目直視不能瞚或白睛黃此誤發汗將欲衄也目無精光者為腎氣素虛目正圓者痘不治凡目暗目瞪目陷目反直視戴眼反折皆不治下後目閉為陰血受傷目反上瞪為陰氣上逆

凡察病者鼻若鼻頭色青腹中冷痛者死蓋厥陰肝木之青色挾腎水之寒威上徵於鼻下徵於腹是為暴病項之亡陽而卒死也其謂鼻頭色微黑者有水氣見黑雖為腎陰之色微黑且無腹痛但主水氣而非暴病也若黃黑光亮而少腹脇痛或善忘如狂又為畜血也謂色黃者胸上有寒穀氣不化而有痰積也謂色白者亡血設微亦非時者死白者肺之色肺主上焦以行榮衛榮不充則鼻色白故知亡血也微赤為火色若非火令之時加於白色之上是火來尅金故死黑為勞為房勞以火發於腎水之中故不赤而反黑其黑必枯燥不似水氣之黑而光澤瘀血之黑黃光亮也亦為風者由熱生風風為陽邪故也黃者便難以中焦熱燥腸胃不潤是以便難然必枯而不澤若黃而鮮明者有留飲留飲以津液不行滯其穀氣化熱而致黃也又鼻孔乾燥而脈浮數者將欲衄鼻鼾語言難出者為風溫鼻鳴乾嘔者為傷風鼻痛為肺脾二經有風火鼻柱散闊為肺氣虛而有濕鼻瘦枯黑為脾勞火旺無津鼻上汗出如珠為心脾痛極鼻孔搘張為肺風鼻如煙煤為陽毒

凡察病者唇以焦赤為脾燥熱赤腫為胃濕熱青黑為陰寒唇寒面青頭痛發熱為少陽陽明之邪熱傳太陰厥陰唇口上下有瘡為狐惑唇上燥裂為熱在肌肉鮮紅為陰虛火旺淡白為氣虛淡而四遠起白暈為驟亡血唇齒焦黑為燥屎衝膈雖急下之多不可救若唇吻反青環口黧黑張口如魚出氣不復唇口動顫不止及人中反者皆死證也

凡察病者口以口苦為少陽膽熱木從火化也口甘為脾土濕熱而津液上乘稼穡作甘也口淡為胃中虛熱胃為一身之主淡為五味之本也口作酸為肝熱乘脾曲直作酸也口作鹹為腎衰虛熱上乘口中常覺血腥為肺氣傷

口不和者不知味為內傷津液口不仁者不和澤為外感客邪口燥咽乾為熱傳少陰證煩渴欲飲水小便不利為太陽犯本水入即吐為水逆渴欲飲水壯熱自汗為陽明府熱漱水不欲嚥而目瞑真燥為畜血漱水不欲嚥而目赤厥寒為陰躁口傷爛赤為陽厥口難言為血少口噤咬牙瘛瘲為發症也

凡察病者耳以耳聾胸脇痛寒熱口苦為足少陽證耳鳴及痛手少陽厥陰火也若耳輪乾枯而黑者為腎敗也若耳中策策痛而耳輪黃者為黃耳類傷寒也又重發汗又手冒心而耳聾者陽虛也與少陽經之耳聾迥別

凡察舌上胎色另具辨舌論中其有舌本強鞭為瘦舌短囊不縮為宿食舌脹大滿口為龍火燔灼此最為急候即宜砭之舌深亦帶紫者為裏熱舌色淡白為裏寒舌枯萎者為心氣耗絕也

凡察病者身以輕易轉側而熱者為陽若肢體骨節疼痛為表證以沉重難移動而寒者為陰若腹痛自利厥逆宜溫經然中濕亦主身重痛濕痹則身痛關節不利風濕則身痛而腫骨節煩疼掣痛不得屈伸汗出惡風而不欲去衣若少腹鞭痛小便不利為溺濁小便利者為畜血腹痛自下衝上者火也從上轉下趨少腹者寒也氣從少腹上衝者陰火也從左脇上衝者肝火也大抵足寒而厥者陽虛也厥而發熱者熱厥也臂多青脈者脫血也背熱手背熱者外感也腹熱手心熱者內傷也背微惡寒者陽微不能勝陰也渾身惡寒傷寒也自汗身重鼻塞多睡風溫也肉潤筋惕汗下虛也手足痺疲虛而有風也額上及手足冷汗陰毒也身目俱黃輝病也身如蟲行表虛也若頭傾視深循衣撮空冷汗發黃形體不仁乍靜乍亂皆不治也

凡察病者足以初起手足俱冷者為陰寒宜四逆蓋附溫之初起但足冷而手不冷身體發熱頭或痛或不痛便是夾陰須用五積再造選用不可用發汗攻下之劑亦不可用小柴胡以中有黃芩苦寒故也若是內傷陽氣虛人須從東垣補中益氣去升麻柴胡加炮薑半夏桂枝溫中為務又夏暑病濕溫人必足冷手溫多汗妄言宜蒼朮白虎合五苓散不可誤認夾陰而用五積四逆反助熱益病也亦有兩手逆冷而兩足熱厥如火者此陰氣衰於下陽氣衰於上陰陽不隔之兆也若初起於腳膝軟弱或足胫赤熱腫痛當從脚氣治之

凡察病者聲以清朗如平日者吉聲重鼻塞者傷風也聲如裂中止者中濕也言遲者風也言驟者火也聲啞不出而欬者水寒傷肺也聲啞如破而欬者客寒裏熱也驟然聲啞而咽痛如刺不腫不赤不發熱二便清利者陰寒也

驟然聲音而赤腫脹閉或發熱便祕者。龍火也。喘逆煩亂譏語者邪氣實也。鄭聲者精氣奪也。少氣不足以息者氣虛也。語言遲緩而憊怯者內傷也。病人語聲微然喜驚呼者骨節間病此病在厥陰陰主靜故也。語言喑啞然不徹者心膈間病此病在太陰肺主氣故也。其聲啾啾然細而長者頭中此病病在巨陽巨陽與少陰為表裏。腎在聲為呻其聲起自下焦故也。已上諸證雖非盡屬外感然傷寒家悉宜辨晰庶無誤治之失診病首宜識之。

### 辨舌

舌胎之名始於長沙以其邪氣結果若有所懷故謂之胎傷寒之邪在未則胎不生。邪熱傳裏則胎漸生。自白而黃黃而黑黑甚則燥裂矣。要以滑潤而白者為表邪灰黑濕潤無胎為陰寒灰黑薄滑為夾冷食皆不可用。寒涼攻下之劑然中暑夾血多有中心黑潤者又不可拘於上說也。若黃黑灰色而乾燥紋裂者為熱極萬無虛寒夾血之理惟屬經汗下。舌雖乾而有微薄胎却無燥裂芒刺此為津液耗亡不可誤認實熱而攻之。攻之必致不救也。金鏡三十六治法舉世宗之又觀舌心法一百三十七圖條分縷析辨證最詳其間論紅為瘟熱紫為酒毒微齧色為夾食藍為肝藏純色迥出前人未備所嫌舍本逐末未免繁縝使人無提綱挈領處故余括其捷要分條辨論於左。如白胎者邪傷氣分。肺主氣而色白又主皮毛故凡白胎猶帶表證仲景以為胸中有寒止宜和解禁用攻下攻下必致結痞變證不測若溫病熱病一發便壯熱昏憤躁渴舌正赤而有白滑胎即當用白虎湯汗之時疫初起舌上白胎如積粉者達原飲解之。若傷寒邪入胃府則白胎中黃邪傳少陰則白中變黑若純色為一經證邊與中間兩色俱傳經證若從根至尖直分兩路者是合病與夾陰舌也合病則白中兼兩路黃夾陰則白兼兩路中黑潤及灰色也從根至尖橫分兩三截胎色者是併病舌也故尖白根黃尖白根黑及半邊胎滑者雖證類不同皆屬半表半裏白胎多而滑黃黑胎少者表證多也尚宜和解黃黑胎多而白胎少或生芒刺黑點乾燥者裏證多也必下無疑雖中心黃黑而滑潤邊白者此為表證未盡傷寒則大柴胡兩解之溫熱時疫則涼膈散或白虎合承氣攻下之又傷寒壞病雖白而厚甚燥裂者此為邪耗津液宜小柴胡稍加芒硝微利之純白滑胎為胃虛寒飲結聚膈上之候每於十三四日遇經致變不可泛視也一種白厚胎如煮熟色到底不變者必裏秋寒物留滯不散致脈伏不出乃心脾氣絕肺氣受傷也慎不可下宜枳實理中湯熱甚合小陷胸主之至於能食自利而白胎滑者為藏結難治也。

黃連湯連理湯備急丸選用間有得生者。黃胎者陽明府實也。黃濕而滑者為熱未盛結尚未定。不可便攻。攻之必初鞭後溏也。冬時宜確守此例。俟結定乃攻。不得已大柴胡微利之。若在夏月。一見黃胎便宜攻下。以夏月伏陰在內多有下證。最急而胎不燥者不可泥也。若黃而燥者為熱已盛。峻下無疑。黃而生芒刺黑點者為熱勢極黃而辦裂者為胃液乾下證尤急也。諸黃胎皆屬胃熱分緩急輕重下之有種根黃而鞭尖白而中不甚乾亦不滑短縮不能伸出。譏妄煩亂者此疾挾宿食占據中宮也。大承氣加生薑半夏主之。有古色青紫而胎却黃厚甚則紋裂但覺口燥舌仍不乾者此陰證夾食也。脈或沈細而伏或虛大而濶。按其心下或臍旁鞭痛而時失氣者急宜大承氣另煎生附子佐大黃下之。若脈虛大者黃龍湯下之。熱極煩躁者更加生地。冬夏月尤宜若冬時陰證夾食而舌上胎黃不燥者宜用附子理中合小承氣下之。大抵舌有積胎雖見陰象亦是虛中有實急當攻下無疑但下法與尋常不同耳。又中宮有痰飲水血者舌多不燥不可因其不燥而延緩時日致誤也。凡溫病熱病稍見黃白胎無論燥潤即宜涼膈雙解時行疫癘稍見白胎即宜白虎達原。若見黑黃無論乾濕大承調胃急奪無疑。

黑胎者少陰腎色也。若五六日後熱傳少陰水乘火位亢極之火不為水衰反兼水化如火過炭黑是也。始因表證失汗致邪入裏而傳少陰下之則愈然有屢下熱不減胎不退者此必宿食留滯於中宮也。宜黃龍湯加炮薑川連有誤用汗下太過津液枯竭而胎燥黑者此為壞病須量人虛實為治。虛者其胎必薄而潤。生脈散合附子理中實者其胎必厚而乾生脈散合黃連解毒一則陰虛陽亢一則陽虛陰亢不可不審。熱勢盛劇則黑胎上生芒刺及燥裂分隔辦者須用青布蘸薄荷湯拭潤更以薑片刮去芒刺掘起隔辦看刺下辦底色紅者可治急下之。若俱黑者不治。又黑胎腐爛者為心腎俱絕舌黑而卷縮者肝絕皆不可治。舌黑及灰或黃而發疱生蟲腐爛雖為濕熱亦屬肝傷俱為危候。又中間一路潤黑燥胎兩邊或黃或白者兩感舌也邊黃則調胃承氣邊白則大柴胡下之。若中間一路黑滑薄胎兩邊白滑此表裏俱虛。胃中雖有留結急宜附子湯溫之。凡黑胎多凶黑而乾燥或芒刺辦裂皆為實熱急宜下奪黑薄濕潤或兼白滑者皆為陰寒急當溫經也。一種中黑而枯或略有微刺色雖黑而無積胎舌形枯瘦而不甚赤其證煩渴耳聾身熱不止大便五六日或十餘日不行腹不鞭滿按之不痛神識不昏晝夜不得睡

稍睡或呴啞一二句或帶笑或歎息此為津枯血燥之候急宜炙甘草湯或生料六味丸換生地合生脈散加桂滋其化源庶可或生誤與承氣必死誤與四逆亦死凡舌胎或半黃半黑或半黃半白或中燥邊滑或尖乾根潤皆為傳併之邪寒熱不和之候大抵尖黑稍輕根黑至重黃黑宜大承氣兼白者宜涼膈散分緩急下之若全黑為死現舌不治夏月熱病時火邪火內外燔灼胎黑易生猶可攻治冬月傷寒舌胎全黑決難救也然中暑認誤外感而加溫覆多致中黑邊極紅而潤脈必虛大急用白虎湯清之虛者加人參竹葉如更誤認陰寒而與熱藥必致煩躁不救也夏月中暑多有黑舌黑而中乾者白虎湯無疑黑而滑潤或邊白者必夾寒食古法用大順散然不若理中合小陷胸最當若直中少陰真寒始病不發熱舌心便黑色非由白黃變化其舌雖黑而滑舌亦瘦小此真藏寒必厥冷自利嘔吐脈沈遲四逆附子輩急溫之稍緩則不可救

灰黑舌者足三陰互病如以青黃和入黑中則為灰色也然有傳經直中之殊蓋傳經熱邪始自白胎而黃黃而灰黑或生芒刺黑點紋裂乾燥不拘在根在尖俱宜攻下泄熱有淡灰色中起深黑重暉者乃溫病熱毒急用涼膈雙解治之熱毒內傳一次見暉一重傳二三次見二三重也若見三重者不治若直中三陰始病無躁熱便見灰色舌潤無胎更不變別色者此必內夾寒食及冷痰水飲或畜水如狂等證當隨證治之又有感冒夾食屢經汗下消導二便已通而舌上灰黑未退或濕潤或雖不濕亦不乾燥者不可因其濕而誤認為寒妄投薑附亦不可因其不潤而誤與硝黃此因汗下過傷津液虛火上炎所致其脈必虛微少力治宜救陰為急雖無心悸脈代當用炙甘草湯主之內有生地阿膠麻仁麥冬之甘潤可以滋陰潤燥蓋陽邪亢盛則用硝黃以救陰陰血枯涸則宜生地以滋陰可不辨乎

紅色者心之正色也若紅極為溫熱之毒蘊於心胃及瘟疫熱毒內盛也若濕者不可便下解毒湯或白虎湯紅中有白胎者更感非時之寒也桂枝白虎湯紅中夾兩路灰色胎者溫熱而夾寒食也涼膈散加消導藥一二味紅中有黑胎者熱毒入少陰也大承氣合白虎湯紅極有黃黑芒刺者熱毒入府也調胃承氣湯紅極有紫黑斑及遍身發斑者陽毒入心也人參白虎湯加犀角黃連紅極而紋裂者燔熱入肝也大承氣加柴胡白芍甚則加芩連坑爛者濕熱入脾也小承氣加芩連半夏白朮者火氣燔灼也三黃石膏去麻黃紫朮者水氣鬱伏也解毒湯紅星者心

包火炎也涼膈散一種柔嫩如新生望之似潤而燥涸殆甚者為妄行汗下津液竭也多不治急宜生脈散合人參三白湯主之。古語不能動者肝絕舌忽瘦而長心絕不治。

紫色者酒後傷寒也世俗庸愚往往受寒不服湯藥用蔓葛酒發汗未當而酒毒藏於心包多有此證若純紫或中間略帶白胎而潤者宜葛根湯加石膏若紫中有紅斑或紫而乾黃紫而短縮俱宜涼膈散下之若全紫而乾如煮熟肝者死肝色也其證必厥冷脈必沈滑此陽極似陰也急用當歸四逆湯加酒太黃下之然多不效大抵深紫而赤者是陽熱酒毒宜用苦寒解毒若淡紫而帶青滑者是直中腎肝陰證急宜吳茱萸湯四逆湯溫之然亦有中心生薄青紫胎或略帶灰黑而不燥不濕下證復急者此熱邪傷於血分也犀角地黃湯加酒大黃微利之。

微醫色胎舌者乃夾食傷寒也食墊太陰鬱遏不得發越久之盦而成醫色也其證腹滿時痛者桂枝湯加枳朴橘半痛甚加大黃因冷食不消加炮薑厚朴甚則調胃承氣加炮薑下之如胃氣絕脈結代唇吊齒燥下利者死。

藍胎舌者肝藏純色也傷寒日久屢經汗下失於調理致胃氣傷極心火無氣脾土無依則肺金不生肝木無制侮於脾土故胎色如靛或兼身生藍斑乃心脾肺三藏氣絕於內也必死如微藍色而不甚深或略見藍紋者為木不受金傷藏氣未絕脈不沉濇而微弦者可治小柴胡湯加炮薑肉桂王之舌之證類雖繁不外八種胎色撮其大要亦辨證之一助也。

### 宜禁

傷寒表證宜汗裏證宜下半裏宜和膈熱宜涌陰寒宜溫此大法也然其人真氣素虛或有宿食者更宜斟酌陶尚文云陽病宜汗宜下真氣衰汗之亡陽下之多脫陰病宜溫宜補真氣衰則客熱便生苟非宿諳不無妄治之失因噎宜禁諸法如左。

宜汗太陽脈浮緊盛○人迎盛於氣口○諸脈浮緊而數○頭疼體痛○腰背痛強○項背強骨節痛○身體拘急○嗚嗁惡寒翕翕惡熱○煩熱不止○煩躁喘噦○傷寒無汗○中風自汗○服發汗藥解半日許復煩○衄血點滴不成流熱不解並宜發汗又有脈沉可汗者為身有熱也設身不熱豈敢汗乎。

禁汗脈虛無陽○尺中脈遲○諸脈沉細微弱○吐血下血及衄血如流○口燥舌乾○口苦咽乾閉塞及痛○風

濕○風溫○濕溫○中暑及暍○當臍上下○左右動氣○心下悸動○瘡家○小便淋瀝○大便濁利○溫  
毒發斑○內傷勞倦○亡陽漏風○少陽寒熱往來○經水斷續崩漏○熱入血室○新產血虛○房勞陰虛○陽  
事痿縮○夾陰陰虛○足腫逆冷○太陽犯本渴而小便不利○膀胱虛寒欬而小便利俱在禁汗例。

諸禁汗者非真禁絕表藥也但禁麻黃青龍等峻劑耳如小建中黃者建中在所必用以意加減可也  
汗後熱不止必有所因或因冷食不化或因汗後強飲粥湯或汗後更冒虛風或動起不寧或勞心惱怒皆足以致  
熱也○凡服麻黃重劑不得汗後必嘔血或衄亦有下如豚肝而死者以榮血受傷故也

宜吐病在膈上○胸中懊憹居悶○喉中有痰聲○三四日邪在胸中脈大胸滿多痰○氣上衝咽喉○手足厥冷  
脈乍結痰氣在胸中心煩滿而欲食不能食○胸中鬱鬱微煩而痛欲使人按之反有疾延○下利日十餘行脈反  
遲而微滑或乍緊或乍緩或寸口沉伏或浮滑為宿痰並宜瓜蒂散○傷寒頭痛久不愈令人喪明胸膈有宿痰也  
瓜蒂散吐之○寒實結胸宜白散○類中風痰涎壅盛宜稀涎散○食厥脈滑或上部有脈下部無脈而厥逆胸中  
兀兀欲吐而按之痛及乾霍亂心腹刺痛欲死並宜薑鹽湯探吐之○發汗吐下後虛煩不得眠並宜施子豉湯○  
病在膈上為裏之表證故用吐法取汗寒月宜置火於暖室不透風處吐之

禁吐脈微無陽○寸口細弱○舊有微溏○病在少陽耳聾目赤胸脇痛○少陰厥陰病乾嘔○元氣虛羸○氣血  
兩虛○房勞陰虛○勞倦內傷○吐血衄血○胎虛崩漏○經水斷續俱在禁吐例

南人不可輕用湧吐一吐尚可勝之二吐便致昏因而厥北方質實之人三吐不昏也

吐後有頓快者有徐快者或反悶悶者吐未盡也或反熱者不可下也大抵三日後無不快矣

宜和寒熱往來脈弦數○未下胸中脹滿○心煩喜嘔○耳聾脇痛○舌白胎滑○頭兩角痛○口苦咽乾○頭目  
眩晕○頭汗盜汗○默默不欲飲食○熱入血室○少陽半表半裏諸證並宜和之

禁和太陽表證未除○陽明裏證已具○熱傳三陰腹滿○寒中三陰自利○夾食夾陰面戴陽足脛冷○過汗經  
虛耳聾尺中虛遲緊細俱在禁和例

宜下傷寒五六日發熱頭痛方除蒸蒸發熱脈沉實滑數有力大便不通○六七日熱蒸陽明頭痛發熱不大便○

口噤咬牙。○日晡潮熱。腹痛急鞭滿。○能食不大便。○潮熱讝語發狂。○煩躁時悶亂。○服小承氣轉失氣。○燥屎逆攻胸下鞭痛。○下利脈數。或遲滑有宿食。○下利三部脈皆平。心下鞭痛。○潮熱自汗。讝語燥渴。不大便。○潮熱手足腋下汗出。○汗下後微煩。小便數大便難。○大府燥結。則氣口脈洪大。按之反濶。○小腹鞭滿而痛不可按。○小便自利。大便黑有瘀血。○小便不利。大便乍易微喘滿而不得臥。○揚手擲足。揭去被衣。○內實燥滿而發黃。○少陰病口燥舌乾而渴。邪熱內消腎水者急下之。○自利純清水。心下鞭滿。不大便者急下之。○腹脹鞭滿。遠脣鞭痛。不大便者急下之。○陽明病汗多熱甚。恐胃汁乾急下之。○腹滿鞭痛為土實。急下之。○大抵一切下證。要以舌乾口燥大便不通。再以手按臍腹胸腸鞭滿而痛。手不可近者急下之。○然又有脈浮可下者。大便難也。設大便不難。敢下乎。禁下脈浮表證未解。○尺中遲弱而足冷。○六脈大而無力。或虛細或乍大乍小。○發熱頭痛未除。○惡寒惡風。○頭背項強。腰痛拘急。○手足腋下無汗。○嘔吐未除。○咽中閉塞。○腹中時滿時減。○腹脹可按可捺。○當臍上下左右動氣。○少陽寒熱嘔吐。○陽明面白合赤色。○不轉失氣。○失氣不臭。○內傷勞力。○陰虛勞倦。○經水斷續。○胎前崩漏。○大便鞭而小便清。○小便頻數而少。○夾陰面赤。○氣陽。○夾食胸中煩滿。○服消丸而脈沈手足微厥。○心下痞滿。○虛煩欲吐不吐。○畏寒不能食。俱在禁下例。

凡禁下者慎不可用承氣等藥。即有下證。惟宜導法選用。○若陰結。宜四逆湯。入人乳膽汁下金液丹。○下後不解。一日半日復熱。或下未盡。或下後熱邪不除。或下後復結。或因飲食起居。或更冒虛風。當詳審以治。○服下藥不行者。藥力不當病勢也。更宜大劑下之。若誤用承氣不得下。後必愈脹。以裏無熱結。徒傷胃氣。濕熱痰飲愈逆也。以濕熱例治之。○有屢用承氣不行。改用溫理脾胃藥即行者。○有下出稀糞。色淡不黃不臭者。急溫之。下出純清水者。死下出溏糞者。防變溫熱時疫。不在此例。下如污泥者。死下出鮮血及血水者。死下出鮮血者。危。下瘀血如膠黏漆黑。臭惡難近者死。○下之不盡。驟用補截。復發熱譏語妄亂。脈躁不寧。或忽大忽小者。皆不治。

宜溫初起。不發熱無頭痛。便惡寒。脈沈嗜臥。○少陰病。膈上有寒飲。乾嘔不吐。○嘔吐不止。○乾嘔吐涎沫。○腹痛泄瀉嘔逆。○戰慄踴臥。○面如刀刮。○四肢逆冷。○夾陰中寒。唇面白甲青。○胃虛欬逆。○下利清穀不止。○陽縮入腹。○囊縮舌潤。○厥冷過肘膝。○小便清利。○自利不渴。○口中和。背惡寒。○畏寒身疼骨節痛。皆直中陰經寒。

證

又裏寒外熱。身反不惡寒而面戴陽。脈虛大無力。或數疾無倫。為陰盛格陽。○煩躁欲坐臥泥水中。○自利咽乾欲飲水而不能嚥。皆假熱之證也。

又初起本陽證。汗下太過。亡陽脫泄。或誤服寒藥。後變惡寒厥逆。虛汗泄濁。脈或沈細。或伏絕。或虛大。為壞病。○小便或利或不利。而色不黃赤。○筋惕肉瞶。○亡陽汗不止。而惡寒。並宜從溫補例治。

禁溫本傷寒陽證。六七日傳變入裏。後變脈沉數。煩躁不得臥寐。○自利腹痛。而時痛時止。按之結鞭。○咽痛心煩。○小便短數。赤濁。○大便實。○泄利下重。○下利讞語。厥逆不過肘膝。厥過即復熱。○喜冷飲。○面深赤煩躁。便祕。讞語。欲揭衣被。揚手擲足。皆屬傳經熱證。俱在禁溫例。

凡服溫經回陽藥。其人微煩而渴。脈來微數而不實。堅身體安和靜臥者。少與生脈散或清粥飲。其渴後自止。慎勿誤與涼藥復助陰寒也。若假寒證誤投薑附而大煩躁熱渴不寧者。急與苦寒渴熱無疑。

足太陽膀胱經禁下。若下之太早。則變證百出。足陽明胃府禁發汗。禁利小便。犯之重損津液。脈必代結。足少陽膽經禁汗。禁下。禁利小便。汗則犯太陽。下則犯陽明。利小便。則使生發之氣陷入陰中。太陽一禁。陽明二禁。少陽三禁。此定禁也。至三陰經則無定禁。但非胃實乃禁下耳。

藥禁者。津液內亡作渴。禁用五苓淡滲。汗多。禁利小便。小便多。禁發汗。咽痛。禁發汗。利小便。大便祕。濫用燥藥。多不得。復吐。吐而上氣壅滯。大便不通。只可宣散上氣。禁利大便。脈弦。禁服平胃而虛虛。脈緩。禁服建中而實實。

刮法

凡看傷寒。先觀而目赤為陽毒。黃為輝。次看口舌有無胎狀。再以三指平按心胸脇下小腹。蓋心胸以候結胸痞滿。宿食胃傷。先曾誤下致痛而鞭滿正中者。為結胸濡大稍偏者。為痞。未經下。滿痛為宿食。攻後深按隱痛為胃傷。脇下以候熱邪。寒水畜血。熱而痛者。為少陽之邪寒而多熱。為水飲停蓄。按之痛而不鞭。其人善忘者。為畜血。小腹以候燥結。瘀血按之。遙觸鞭痛為燥結。雖痛而軟。小便利者。為畜血也。

凡始病微惡寒發熱坐臥不安胸煩欲嘔。善饑脈弱陰陽未明者慎勿輕用表藥先與甘草乾薑湯加葱豉一劑後顯陽證用表藥顯陰證用溫藥若陰證或夾陰誤用升散解表必致陽縮入腹而死。

凡結胸痞滿及心脇鞭滿用生薑搗爛去汁炒微乾乘熱包熨患處○凡結胸手不可按大小便秘屢下不通急用灸法以巴豆仁十粒研爛入黃連末白麵研勻作餅填實脇中用艾炷灸七壯覺腹中鳴轉大便利為效○凡結胸手足厥逆者用芍白十莖生薑一兩同搗作餅烘熱置脇中帛捲熨之待氣入覺響即與枳實理中湯加附子○凡結胸證不拘早晚用黃毛雞一隻同生薑四兩搗爛帛包烘熱熨結鞭處半日許覺胸中熱乃止更以熱手向下揉之。

凡痞滿不拘寒熱虛實遲早使用熨法以橘葉生薑葱頭共搗爛加麩皮半升用紗絹包烘熱熨居滿處至半日許覺胸膈躁熱即止更以熱手順下揉之。

凡傷寒發狂難制以醋沃火炭令氣衝其鼻中即定不定者此神亂無主雖下必死若狂定然後察其陽狂陰躁用藥。

凡傷寒衄血不止用生薑汁或茅根汁盜許服之童便亦可服後微覺寒顫即止慎勿用冷水裹額及濕紙搭天庭鼻柱使瘀積經絡不散致成痼疾也。

凡直中陰寒無脈或吐濁脫元無脈先將薑汁酒釀半盞熱服其脈漸來者可治服後一時許仍無脈或暴出數疾無倫者不治若痛甚脈伏者不在此例。

凡陰寒陰毒四肢厥冷爪甲唇青六脈欲絕不知人事藥不得入者將葱白搗餅用麝香半夏皂莢末一字填入臍中熨之或用生薑切片貼上艾火灸之併灸關元氣海數十壯脈漸出微汗可治否則死。

凡中寒卒倒不得以火烘之中暑卒倒不得冷水灌漬若發厥昏迷卒倒者用牙皂末燃紙燒煙衝鼻中有嚏可治併用稀涎散水調探吐俟醒用藥。

凡溫熱病燥渴不得汗欲飲冷水者下咽即得大汗而解若傷寒感冒強與之水必變欬嘔噦慄自利等證也

凡乾霍亂不得吐者用鹽兩許置刀頭炭火燒紅淬水一升攪服探吐之若誤與粥飲即死。

凡腹痛未辨陰陽痰食臭毒先用薑鹽湯生香附末三錢溫服候勢稍定然後憑脈證用藥慎勿誤與調監水椒水致變嘔噦下利水腫等證甚至不救

凡傷寒服藥轉吐出不納者先將生薑汁少許徐徐呷下然後緩緩進藥即不吐也

凡胸腹攢痛嘔吐涎沫而時緩時甚面白赤乍白脈忽大忽小甚則厥逆脈亂此食滯中宮蛇上入膈也急用椒紅烏梅肉為散以安其蛇後隨蛇厥治之

凡破傷風及傷濕傷火皆發熱頭痛證類傷寒甚則牙關緊急不開藥不得入者用蜈蚣一條焙乾為末擦牙吐涎立甦然後驗證用藥

凡大便不通尺脈無力胃弱津枯者宜用導法詳辨繕論陽明下篇導法下老人枯燥閼結不在此例

凡小便不通先以麝香半夏填臍中以蕊白田螺合搗成餅封臍上布縛良久即通又法食鹽用一字入臍加葱餅於上熨之即通凡虛人津枯及胞癉小便不通者禁用上法誤用之後必愈閼也

凡呃逆不解用硫黃乳香酒煎丹法及搗生薑渣拌艾炒熨期門及灸期門左穴皆取溫散肝氣也若二便不通者禁用此法

凡妊娠溫熱病及時疫用青黛伏龍肝為末和井底泥調塗臍至關元乾再易之然不若用大承氣急下奪其裏熱庶免傷胎之患

凡傷寒服承氣等下藥以熱薑湯催令速行外用鹽炒麩皮升許乘熱包熨則大便易通若服之下咽即行而不結者為元氣衰弱防有下脫之虞服之經日不行為濕熱殘飲固結急用薑湯催之若服久不行則胃中津液敗壞下之不止必發呃逆而死不下則脹滿而死也若陰證腹痛自利用吳茱萸炒熨良

凡傷寒下後熱退不可用參耆驟補以餘邪得補必復熾盛即使虛人亦復俟正糞再行然後補之

凡內傷誤服外感藥脈轉緊盛者補中益氣調之誤服寒涼藥脈緊疾者理中湯溫之

凡用附子熱藥必須冷服蓋去極於下陽浮於上以冷折其上之虛陽以熱治其下之沉寒也

凡中附子毒一身面目俱赤狂熱失血者犀角黃連甘草煎湯入生薑菔汁服之則解

服麻黃汗出不止者溫粉撲之方用龍骨牡蠣煅過同防風蒙本為末和炒糯米粉絹包撲之其汗即止溫熱病誤汗不止將病人髮披水盆中用熟石膏黃連木生粳米粉撲之

服瓜蒂吐不止者一味麝香湯解之

服大黃利不止者虛人用人參乾薑陳皮甘草烏梅陳倉米煎服或但用陳米烏梅黃土亦效若過服承氣吐利不止如結胸狀諸藥投下未安者按法加益智仁末一錢匙用前湯半劑調服則吐利同效

服桃核承氣代抵當湯瘀血未盡腹痛不止炒黑山楂炒焦黑糖同伏龍肝煎服久畜之瘀一時不能即盡桃核承氣加桂附溫以散之虛人以桃核承氣加人參補而逐之外用芒硝炒熱熨之若所下血如凝血多兼血水或如污泥神昏語亂者不治色紅紫者屬熱色晦黯者屬寒色鮮淡屬虛當隨證治之