

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷三

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

大定四庫全書

備急千金要方

婦人方

如娠諸病第四

胎動不安

胎動不安

唐 孫思邈 撰	宋 林億等 校正	胎動不安腹痛已有所見
---------	----------	------------

大定四庫全書

備急千金要方

一

艾葉

阿膠

芎藭

肘後不用

當歸

各三兩

甘草

二兩

右五味以水八升煮取三升去滓內膠令消分三服

日三

治妊娠胎動去血腰腹痛方

阿膠

二兩

芎藭

當歸

青竹茹

各五兩

右四味以水一斗半煮銀二斤取六升去銀內藥煎

取二升半內膠令烊分三服不瘥重作一方用甘草

二兩

蔥白湯治妊娠胎動不安腹痛方

蔥白

升 切 一

阿膠

兩 二

當歸

續斷

芎藭

兩 各 三

右五味㕮咀以水一斗先煮銀六七兩取七升去銀

內藥煎取二升半下膠令烊分三服不瘥重作

治妊娠胎動晝夜叫呼口噤脣塞及下重痢不息方

艾葉㕮咀以好酒五升煮取四升去滓更煎取一升

服口閉者格口灌之藥下即瘥亦治妊娠腰痛及妊

娠熱病并妊娠卒下血

旋復花湯治妊娠六七月胎不安常服之方

旋復花

兩一

半夏

芍藥

生薑

兩各二

枳實

厚朴

白朮

黃芩

茯苓

兩各三

右九味㕮咀以水一斗煮取二升半分五服日三夜

二先食服

治妊娠數墮胎方

取赤小豆為末酒服方寸匕日二亦治妊娠數月月
水尚來者

又方妊娠三月灸膝下一寸七壯

第二漏胞方

治妊娠下血如故名曰漏胞胞乾便死方

生地黃半斤呔咀以清酒三升煮三沸絞去滓服之

無時能多服佳

姚大夫加黃雌雞一頭治如
食法崔氏取雞血和藥中服

治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

乾地黄搗末以三指撮許酒服不過三服瘥

又方生地黃汁一升清酒四合煮三四沸頓服不止頻服

又方

乾薑二兩

乾地黄四兩

右二味治下篩以酒服方寸匕日再三服

第三子煩方

竹瀝湯治妊娠常苦煩悶此是子煩

竹瀝升一

麥門冬

防風

黃芩

各三兩

茯苓

四兩

右五味以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥再
又方時時服竹瀝隨多少取瘥止

第四心腹腰痛及脹滿方

治妊娠心痛方

青竹皮一升以酒二升煮三兩沸頓服

又方破生雞子一枚酒和服之

又方

白蜜

三兩

羊脂

八兩

青竹茹

一升

右三味合煎食頓服如棗核大三枚日三

又方蜜一升和井底泥泥心下

又方燒棗二七枚為末尿服之立愈

治妊娠腹中痛方

生地黃三斤擣絞取汁用清酒一升合煎減半頓服

又方燒車釭脂內酒中服亦治妊娠欬嗽并產難三日
不出

又方取蜜一升頓服良

治妊娠腹中滿痛又心不得飲食方

黃芩

三兩

芍藥

四兩

白朮

六兩

右三味㕮咀以水六升煮取三升分三服半日令藥
盡微下水令易生月飲一劑為善也

治妊娠忽苦心腹痛方

燒鹽令赤熱三指撮許酒服之立產

治妊娠傷胎結血心腹痛方

取小兒尿二升頓服之立瘥大良

治妊娠中惡心腹痛方

新生雞子二枚破著杯中以糯米粉和如粥頓服亦
治妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血
不止

又方水三升洗夫靴剔汁溫服

治妊娠中蠱心腹痛方

燒敗鼓皮酒服方寸匕須臾自呼蠱主姓名

治妊娠腰痛方

大豆二升以酒三升煮取二升頓服之亦治常人卒

腰痛者

又方麻子三升以水五升煮取汁三升分五服亦治心痛

又方

豉 二兩

榆白皮 三兩

右二味熟搗蜜丸如梧桐子大服二七丸亦治心痛

又方燒牛屎焦末水服方寸匕日三服

又方地黄汁八合酒五合合煎分溫服

治妊娠脹滿方

取秤錮燒之淬酒中服良亦治妊娠卒下血

第五傷寒方

治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼方

石膏

兩八

大青

黃芩

各三兩

葱白

升切一

前胡

知母

梔子仁

各四兩

右七味哎咀以水七升煮取二升半去滓分五服相

去如人行七八里久再服

治妊娠頭痛壯熱心煩嘔吐不下食方

知母

兩四

粳米

合五

生蘆根

升一

青竹茹

兩三

右四味以水五升煮取二升半稍稍飲之盡更作瘥

止

治妊娠傷寒服湯後頭痛壯熱不歇宜用此湯拭其身

麻黃半斤

竹葉切一升

石膏三升為末

右三味以水五升煮取一升去滓冷用拭身體又以故布揄頭額胃心燥則易之患瘡者加恒山五兩

治妊娠傷寒方

蔥白十莖

生薑二兩切

右二味以水三升煮取一升半頓服取汗

治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可鍼灸方

鯽魚一頭燒作灰搗末酒服方寸匕取汗

治妊娠遭時疾令子不落方

取竈中黃土水和塗臍乾復塗之一方酒和塗方五寸又泔清和塗之並佳

又方犬尿泥塗腹勿令乾

治妊娠熱病方

蔥白五兩 豆豉一升

右二味以水六升煮取二升分二服取汗

又方蔥白一把以水三升煮令熟服之取汗食蔥令盡亦主安胎若胎已死者須臾即出

又方車轄脂酒服大良

又方井底泥泥心下三寸立愈

又方青羊屎塗腹上

又方水服伏龍肝一雞子大

治大熱煩悶者方

葛根汁二升分三服如人行五里久進一服

又方燒大棗七枚為末酒和服

又方槐實燒灰取方寸匕酒和服

第六瘡病方

治妊娠患瘡湯方

恒山

二兩

甘草

一兩

黃芩

三兩

烏梅

十四枚

石膏

八兩

右五味㕮咀以酒水各一升半合漬藥一宿煮三四

沸去滓初服六合次服四合後服二合凡三服

又方

恒山

竹葉

各三兩

石膏

八兩

粳米

一百粒崔氏外臺作糯
米集驗救急作秫米

右四味以水六升煮取二升半去滓分三服第

一服取未發前一食頃服之第二服取臨欲發服之

餘一服用以塗頭額及胃前五心藥滓置頭邊當一

日勿近水及進飲食過發後乃進粥食

第七下血方

治妊娠忽暴下血數升胎燥不動方

榆白皮 三兩

當歸

生薑 各二兩

乾地黄 四兩

葵子

一升肘後不用

右五味以水五升煮取二升半分三服不瘥更作服

之

馬通湯治妊娠卒驚奔走或從高墮下暴出血數升方

馬通汁 一升

乾地黄

阿膠 各四兩

當歸

艾葉

各三兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半去滓內馬通汁
及膠令烱分三服不瘥重作

膠艾湯

治妊娠二三月上至七八月其人頓仆失踞胎動不下
傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣方

艾葉

三兩

阿膠

芍藥

芍藥

甘草

當歸

各二兩

乾地黄

四兩

右七味㕮咀以水五升好酒三升合煮取三升去滓

內膠更上火令盡消分三服日三不瘥更作

治妊娠卒下血方

葵子一升以水五升煮取二升分三服瘥止

又方生地黄切一升以酒五升煮取三升分三服亦治
落身後血

又方取葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三

蟹爪湯治妊娠僵仆失據胎動轉上搶心甚者血從口
出逆不得息或注上下血一斗五升胎不出子死則寒

熨人腹中急如產狀虛乏少氣困頓欲死煩悶反覆服藥母得即安下血亦止其當產者立生方

蟹爪升一

甘草

桂心

尺各二

阿膠

兩二

右四味咬咀以東流水一斗煮取三升去滓內膠烱盡能為一服佳不能者食頃再服若口急不能飲者格口灌之藥下便活也與母俱生若胎已死獨母活也若不僵仆平安妊娠無有所見下血服此湯即止或云桂不安胎亦未必爾

治妊娠胎墮下血不止方

丹參十二兩呔咀以清酒五升煮取三升分三服湿

日三

又方地黄汁和代赭為末服方寸匕

又方桑蠹蟲屎燒灰酒服方寸匕

香豉湯治半產下血不盡苦來去煩滿欲死方

香豉一升半以水三升煮三沸漉去滓內成末鹿角
一方寸匕頓服之須臾血自下鹿角燒亦得

第八小便病方 灸法

治妊娠小便不利方

葵子 一升 榆白皮 一把

右二味以水五升煮五沸每服一升日三

又方

葵子 茯苓 各一兩

右二味為末以水服方寸匕日三小便利則止 仲景云 妊娠有

水氣身重小便不利 洒淅惡寒起即頭眩

治妊娠患子淋方

葵子一升以水三升煮取二升分再服

又方葵根一把以水三升煮取二升分再服

治妊娠小便不通利方

蕪菁子七合為末水和服方寸匕日三

治妊娠尿血方

黍穰燒灰酒服方寸匕日三

治婦人無故尿血方

龍骨五兩治下篩酒服方寸匕空腹服日三久者二

十服愈

又方

爪甲

亂髮

右二味並燒末等分酒服方寸匕日三飲服亦得

又方

桂心

鹿角屑

大豆黃卷

兩各一

右三味治下篩酒服方寸匕日三

又方取夫爪甲燒作灰酒服之

又方取故船上竹茹曝乾擣末酒服方寸匕日三亦主遺尿

治婦人遺尿不知出時方

白薇

芍藥

各一兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方

礬石

牡蠣

各二兩

右二味治下節酒服方寸匕亦治丈夫

又方胡鷲窠中草燒末酒服半錢匕亦治丈夫

又方燒遺尿人薦草灰服之瘥

又方灸橫骨當陰門七壯

第九下痢方 灸法

治妊娠下痢方

人參 三兩

黃芩 三兩

檉皮 四兩

粳米 三合

酸石榴皮 三兩

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

又方白楊皮一斤㕮咀以水一大升煮取二小升分三服

又方燒中衣帶三寸為末服之

又方羊脂如碁子大十枚温酒一升投中頓服之日三治妊娠患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者方

薤白

升切一

酸石榴皮

黃蘗

各三兩產寶作黃連

阿膠

兩二

地榆

兩四

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服不瘥更作

治妊娠注下不止方

阿膠

艾葉

酸石榴皮

各二兩

右三味以水七升煮取二升去滓內膠令烊分三服

治妊娠及產已寒熱下痢方

黃連升一

黃蘗斤一

梔子三十枚

右三味㕮咀以水五升漬一宿煮三沸服一升一日

痢
一夜令盡嘔者加橘皮一兩生薑二兩亦治丈夫常

治婦人欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行方

石榴皮

麴

各八兩

黃蘗

一作麥蘗

烏梅

黃連

艾

各一兩

防已

二兩

阿膠

乾薑

各三兩

附子

五兩

右十味為末蜜和丸如梧子大飲服二十九日三漸
加至三十四十九

治婦人水洩痢方

灸氣海百壯三報

第十水腫方

治妊娠體腫有水氣心腹急滿湯方

茯苓

白朮

各四兩崔氏無朮

黃芩

杏仁

各三兩

旋復花

二兩

右五味㕮咀以水六升煮取二升半分作三服

鯉魚湯治妊娠腹大胎間有水氣方

鯉魚一頭斤二白朮

生薑各五兩

芍藥

當歸各三兩

茯苓四兩

右六味㕮咀以水一斗二升先煮魚熟澄清取八升
內藥煎取三升分五服

治妊娠毒腫方

蕪菁根淨洗去皮搗酢和如薄泥勿令有汁猛火煮
二三沸適性薄腫以帛急裹之日再易寒時溫覆非
根時用子若腫在咽中取汁含咽之

又方燒獐牛尿酢和傅之乾則易亦可服方寸匕日三
治妊娠手脚皆腫攣急方

赤小豆

斗五

商陸根

一斤切

右二味以水三斗煮取一斗稍稍飲之盡更作一方

加澤漆一斤

產難第五

論方
鍼法

論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不得
令死喪污穢家人來視之則生難若已產者則傷兒也

婦人產乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上勿
令水血污物著物則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此
忌月乃止

凡生產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死
即母子俱病庶事皆不稱心若能依圖無所犯觸母即
無病子亦易養

凡欲產時特忌多人瞻視惟得三二人在傍待總產訖
乃可告語諸人也若人衆看視無不難產

凡產婦第一不得忽忽忙怕傍人極須穩審皆不得預
緩預急及憂悒憂悒則難產若腹痛眼中火生此兒迴
轉未即生也兒出訖一切人及母皆忌問是男是女兒
始落地與新汲井水五咽忌與暖湯物勿令母看視穢
汚

凡產婦慎食熱藥熱麪食常識此飲食當如人肌溫溫
也

凡欲臨產時必先脫尋常所著衣以籠竈頭及竈口令

至密即易產也

凡產難及子死腹中并逆生與胞胎不出諸篇方可通檢用之

治產難或半生或胎不下或子死腹中或著脊及坐草數日不產血氣上搶心母面無顏色氣欲絕者方

醇酒

升二

白蜜

升一

成煎猪膏

升一

右三味合煎取二升分再服不能再服可隨所能服之治產後惡血不除上搶心痛煩急者以地黃汁代

醇酒

治難產方

槐枝

升切二

榆白皮

切

大麻仁

升各一

瞿麥

通草

兩各三

牛膝

五兩

右六味哎咀以水一斗二升煮取三升半分五服

又方吞皂莢子二枚

又方取廁前已用草二七枚燒作屑水調而服之

又方令夫唾婦口中二七過立出

又方鍼兩肩井八一寸寫之須臾即分娩

治產難三日不出方

取鼠頭燒作屑并花水服方寸匕日三

又方車軸脂吞大豆許兩丸

又方燒藥杵令赤內酒中飲之

又方燒大刀鑲以酒一杯沃之頓服即出救死不分
者

治產難累日氣力乏盡不得生此是宿有病者方

阿膠 二兩

赤小豆 二升

右二味以水九升煮豆令熟去滓內膠令烊每服五合不覺更服不過三服即出

又方

槐子

十四枚

蒲黃

一合

右二味合內酒中溫服須臾不生再服之水服亦得

又方

生薑汁

生地黄汁

各半升

右二味合煎熟頓服之

治產難及日月未足而欲產者方

知母一兩為末蜜丸如兔屎大每服一丸痛不止更
一丸

羚羊角散治產後心悶是血氣上衝心所致

羚羊角一枚燒作灰下篩以東流水服方寸匕若木
瘥須臾再服取悶瘥乃止

又方殺羊角燒作灰以溫酒服方寸匕不瘥須臾再進

備急方以
治產難

治產乳運絕方

半夏一兩擣篩丸如大豆內鼻孔中即愈

此是扁鵲法

又方神麩末水服方寸匕亦治產難

又方赤小豆擣為散取東流水服方寸匕不瘥更服

又方含醎醋喫面即愈凡悶即喫之

又方取醎醋和產血如棗許大服之

治心悶方

產後心悶眼不得開即當頂上取髮如兩指大強以人牽之眼即開

子死腹中第六

論方

論曰凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死母活母唇口青口兩邊沫出者母子俱死母面青舌赤口中沫出者母死子活

治動胎及產難子死腹中并妊娠兩兒一死一生服之令死者出生者安神驗方

鱗爪一升

甘草二尺

阿膠三兩

右三味以東流水一斗先煮鱗爪甘草得三升去滓
次內膠令烱頓服之不能分再服若人因拘口內藥藥
入即活煎藥作束向竈用葦薪煮之

真珠湯治胎死腹中方

熟真珠一兩

榆白皮一升

右二味以苦酒三升煮取一升頓服之死胎立出

治子死腹中不出方

以牛尿塗母腹上立出

又方取竈下黃土三指撮以酒服之立出土當著兒頭上亦治逆生及橫生不出手足先見者

又方服水銀三兩立出

又方取夫尿二升煮令沸飲之

又方酢二升拗口開灌之

又方吞槐子二七枚亦治逆生

又方三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升

合煮令產婦東向飲之立出

又方瞿麥一斤以水八升煮取二升一服一升不出再服

治胎死腹中乾燥著背方

葵子一升

阿膠五兩

右二味以水五升煮取二升頓服之未出再煮服

治妊娠未足月而胎卒死不出其母欲死方

以苦酒濃煮大豆每服一升死胎立出不能頓服分

再服一方用醇酒煮大豆亦治積聚成瘕

治妊娠胎死腹中若子生胞衣不出腹中引腰背痛方

甘草

尺一

筒桂

寸四

雞子

枚一

蒲黃

合二

香豉

升二

右五味以水六升煮取一升頓服之胎胞穢惡盡去

大良

治妊娠得病須去胎方

以雞子一枚鹽三指撮和服立下

此與阮河南
療難產相同

又方麥蘖一升為末和蜜一升服之立下

又方七月七日神麴三升酢一升煮兩沸宿不食平旦頓服之即下

又方大麥麴五升酒一斗煮三沸去滓分五服令盡當宿勿食其子如糜令母肥盛無疾苦千金不傳

逆生第七

論方

論曰凡產難或兒橫生側生或手足先出可以鍼錐刺兒手足入一二分許兒得痛驚轉即縮自當迴順也

治逆生方

以鹽塗兒足底又可急爪搔之并以鹽摩產婦腹上

即愈

又方以鹽和粉塗兒足下即順

子母秘錄云以鹽和明粉

又方取梁上塵如彈丸許二枚治末三指撮温酒服之
治逆生及橫生不出手足先見者方

燒蛇虺皮為末服一刀圭

亦云三指撮

面向東酒服即順

又方取蟬殼二枚治為末三指撮許温酒服之

崔氏外臺子母

秘錄作彈丸二枚為末酒服

又方取夫陰毛二七莖燒以猪膏和丸如大豆吞之兒手即持丸出神驗

又方取蛇蛻皮燒灰猪膏和丸東向服

又方以手中指取釜底墨交畫兒足下即便順生

又方取父名書兒足下即順生

治橫生及足先出者方

取梁上塵竈突墨酒服之

又方取車釭中脂書兒足下及掌中

治縱橫生不可出者方

菟絲子末酒若米汁服方寸匕即生車前子亦好服

如上方

又方以水苦酒服竈突墨塵

治產時子但趨穀道者方

熬鹽熨之自止

胞胎不出第八方

牛膝湯治產兒胞衣不出令胞爛方

牛膝

瞿麥

各一兩

當歸

通草

各一兩半

滑石

二兩一方用桂心二兩

葵子

升半

右六味以水九升煮取三升分三服

治產難胞衣不出橫倒者及兒死腹中母氣欲絕方

半夏

二兩

白斂

二兩

右二味治下節服方寸匕小難一服橫生二服倒生

三服兒死四服亦可加代赭瞿麥各二兩為佳

治胎死腹中若母病欲下之方

取榆白皮細切煮汁三升服之即下難生者亦佳

又方生地黃汁一升苦酒三合令暖服之不能頓服分再服亦得

又方

牛膝

三兩

葵子

一升

右二味以水七升煮取三升分三服

又方

澤蘭葉三兩

滑石五合

生麻油二合

右三味以水一升半煮澤蘭取七合去滓內滑石麻油頓服之

治胞衣不出方

取小麥合小豆煮令濃飲其汁立出亦治橫逆生者
又方取瓜瓣二七枚服之立出良

又方取水煮弓弩弦飲五合即出亦可燒灰酒和服

又方取宅中所埋柱掘出取坎底當柱下土大如雞子

酒和服之良

又方墨三寸為末酒服

又方取蒲黃如棗許以井花水服

又方苦酒服真珠一兩

又方雞子一枚苦酒一合和飲之

又方生男吞小豆七枚生女者十四枚即出

治逆生胎不出方

竈上墨以酒煮一兩沸取汁服

治產後胞不時出方

井底土如雞子中黃以井花水和服立出

又方取井中黃土丸如梧桐子吞之立出又治兒不出
治子死腹中若衣不出欲上搶心方

急取蟻蛭土三升熬令熱囊盛熨心下令胎不得上
搶心良

又方末竈突中墨三指撮許以水苦酒調服立出當著
兒頭生

又方取夫內衣蓋井上立出

又方取炊篩當戶前燒服之

下乳第九方

鍾乳湯治婦人乳無汁方

石鍾乳

消石

一方用滑石

白石脂

各六兩

通草

十二銖

桔梗

半兩切

右五味呿咀以水五升煮三沸三上三下去滓內消

石令烱分服

又方

石鍾乳

通草 各等分

右二味為末粥飲服方寸匕日三後可兼養兩兒 通草

橫心者是勿取羊桃根色黃無益

一方二味酒五升漬一宿明旦煮

沸去滓服一升日三夏冷服冬温服

又方

石鍾乳 四兩

甘草 二兩一不用

漏蘆 三兩

通草

括萋根 五兩

右五味哎咀以水一斗煮取三升分三服

一云用栝
蒺實一枚

又方

石鍾乳

通草

各一兩

漏蘆

兩半

桂心

甘草

栝蒌根

各六銖

右六味治下節酒服方寸匕日三最驗

又方

石鍾乳

漏蘆

各二兩

右二味治下節飲服方寸匕即下

漏蘆湯治同前

漏蘆

通草

各二兩

石鍾乳

一兩

黍米

一升

右四味㕮咀米宿漬指撻取汁三升煮藥三沸去滓

作飲飲之日三

漏蘆散治同前

漏蘆

半兩

石鍾乳

枯藁根

各一兩

蟻螯

三合

右四味治下節先食糖水服方寸匕日三

單行石膏湯治同前

石膏四兩研以水二升煮三沸稍稍服一日令盡
麥門冬散治同前

麥門冬

通草

理石

石鍾乳

右四味各等分治下篩先食酒服方寸匕日三
又方

麥門冬

通草

理石

石鍾乳

土瓜根

大棗

蟻螬

右七味等分治下篩食畢用酒服方寸匕日三

又方母猪蹄一具粗切以水二斗熟煮得五六升汁飲之不出更作

又方

猪蹄

二枚熟炙搥碎

通草

八兩細切

右二味以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作

外臺猪蹄

不炙以水一斗煮取四升入酒四升更煮飲之

又方栝萐根切一升酒四升煮三沸去滓分三服

又方

栝萋根

漏蘆

各三兩

石鍾乳

四兩

白頭翁

一兩

滑石

通草

各二兩

右六味治下節以酒服方寸匕日三

又方取栝萋子尚青色大者一枚熟搗以白酒一斗煮

取四升去滓温服一升日三黃色小者用二枚亦好

又方土瓜根治下節服半錢匕日三乃乳如流水

單行鬼箭湯治同前

鬼箭五兩以水六升煮取四升每服八合日三亦可

燒作灰水服方寸匕日三

甘草散治同前

甘草

一兩

通草

三十銖

石鍾乳

二十銖

雲母

二兩半

屋上散草

二把燒為灰

右五味治下節食後温漏蘆湯服方寸匕日三乳下

止

又方燒死鼠作屑酒服方寸匕日三立下勿令知

又方燒鯉魚頭為末酒服三指撮

鯽魚湯下乳汁方

鯽魚

長七寸

猪肪


半斤

漏蘆

石鍾乳

各八兩

右四味切猪肪魚不須洗治清酒一斗二升合煮魚熟藥成絞去滓適寒温分五服其間相去須臾一飲令藥力相及為佳乳即下



備急千金要方卷三

總校官中書臣朱 鈐

校對官庶吉士臣嚴 福

謄錄監生臣蔣錦城