



*The University Library
Leeds*



*The Library of the
School of Medicine*

S.C.-2



Digitized by the Internet Archive
in 2015

LEEDS UNIVERSITY LIBRARY

Classmark:

Special Collections

Health Sciences Historical Collection


SC2

CUL



30106016130022





JOHN SIMPSON MD

S Y N O P S I S

NOSOLOGIÆ METHODICÆ,

EXHIBENS

CLARISS. VIRO RUM

SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, ET SAGARI,
SYSTEMATA NOSOLOGICA.

EDIDIT

SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM

ADJECIT

GULIELMUS CULLEN,

MED. D. ET IN ACAD. EDINB. MED. PRACT. PROF.
MEDICUS REGIUS APUD SCOTOS PRIMARIUS,
ET COLL. REG. MED. EDINB. SOCIUS;
NEC NON SOCIETATUM REG. LOND. PHILOS. EDINB.
PHILOS. PHILADELPH. MED. REG. PARIS.
MED. HAUNIENS. ET MED. EDINB.
SODALIS.

EDITIO TERTIA,

EMENDATA ET PLURIMUM AUCTA,

DUOBUS TOMIS.

T O M. II.

EDINBURGI:

Prostant venales, apud GULIELMUM CREECH;
et LONDINI, apud THOMAM CADELL,
et JOANNEM MURRAY, Bibliopolas.

M, DCC, LXXX.



P A R S Q U I N T A .

G E N E R A

M O R B O R U M

P R Æ C I P U A

D E F I N I T A ,

A D D I T I S S P E C I E B U S .

C U M H A R U M E X S A U V A G E S I O S Y N O N Y M I S ,

A

G U L I E L M O C U L L E N ,

Edinburgi 1780.



P R O L E G O M E N A.

RES est inter medicos satis nota, morbos quosdam natura sive causa proxima diversos, externa tamen facie, sive symptomatis, adeo similes esse, ut alii ab aliis difficillime internoscantur. Cum autem morbi natura diversi remedia diversa, quandoque etiam contraria, postulent, summi est momenti ut medicinam facientes morbum quemque, a quovis alio, certo dignoscant.

DUM medici vero, in ipso artis usu versati, de morbis distinguendis saepe incerti sint, merito queruntur, in scriptis de re medica, non semper inveniri quae hanc ambiguitatem solvere valeant. Saepe quidem observatum est, descriptiones, sive historias,

A

quas

quas vocant; morborum, in scriptis medicorum reperiundas, plerumque mancas et imperfectas esse; et neino est, ut opinor, qui non facile agnoscat, historias morborum pleniores, magis exactas, et characteribus melius distinctas, quam quas adhuc habuimus, desideratas esse.

PUTARUNT quidem multi, medicos veteres Graecos et Romanos, in observandis et notandis morborum phenomenis, diligentes et solertes fuisse, atque in horum scriptis historias morborum complures quae nobis utiles esse possint exstare. Mihi vero videtur vel ineptam et superstitiosam antiquitatis venerationem, vel quandam eruditionis ostentationem, scriptis medicorum veterum in hac re aestimationem nimiam conciliaffe. Minime quidem dissimulandum, in scriptis illis quaedam quae morborum characteres vere delineant subinde reperiri. Quae autem ejusmodi ibi occurrunt, quantumcunque a recentioribus aestimata, parum profecto nos docuissent,

docuissent, et attentionem nostram penitus fortassis effugissent, nisi res eadem nobis ex propria observatione prius innotuissent. Revera, neoterici libros veterum raro, ad primam rerum notitiam comparandam, evolvunt, sed plerumque, ut propria tantum inventa et observationes horum autoritate suffulciant, perscrutantur. Mihi quidem persuasum est, vel historias morborum pleraque, quae in scriptis veterum jam inveniuntur, ad morbos regionis a nostra plurimum diversae pertinere, ideoque nobis parum utiles esse; vel scripta eorum adeo mutilata et corrupta ad nos pervenisse, ut ad usus nostros parum conferre queant. Fatendum saltem, notitiam morborum ex scriptis veterum hauriendam multo minorem esse, quam qua opus est ad illam, de qua diximus, ambiguitatem eximendam.

NEC nisi sero admodum et lente ad hanc rem expediendam progressi sunt recentiores. Seculo enim decimo sexto, Galeni sequaces,

in instauratione veterum doctrina, tanta cum laude versati, in horum scriptis explicandis et illustrandis fere solum occupati; parum omnino ad emendandam vel amplificandam morborum historiam contulerunt.

NEC ejusdem aevi medici chemici, Galenicorum adversarii acerrimi, in illa re plus fecerunt. Medicamentis enim inveniendis, et promiscue adhibendis, solum intenti, a morborum studio hominum animos prorsus avertebant.

HINC quidem factum est, quod ab instauratis literis seculo decimo quinto, usque ad tempora Sydenhami, nullae fere morborum historiae plenae vel accuratae conscriptae sint. SYDENHAMUS vero, sagacitate et iudicio quibus maxime pollebat, majorem in notandis et describendis morborum phaenomenis diligentiam adhibendam esse protinus sensit, et in hunc finem ad sedulam observationem se accinxit, qua plures tandem

et

et meliores, quam antea quisquam, morborum descriptiones protulit.

AD hujus exemplum, et ad normam methodi, per observationes et experimenta, philosophandi, tunc temporis invalescentis, evenit, ut ab eo tempore plures medici, in historiis morborum augendis et accuratius redendis, operam collocaverint.

A tempore igitur Sydenhami in hac re multum laboris nec frustra impensum est; rem tamen minime adhuc absolutam esse censeo. Multa parum accurata, multa erronea, multa denique prorsus falsa, historiis morborum, quas jam habemus, inesse, novit quisque in his aliquantulum versatus; et novit etiam ex variis causis haec vitia subrepisse. Scriptores enim, alii ad theorias sibi placentes stabiliendas, alii ad fidem remediis ab ipsis sive inventis sive multum laudatis conciliandam; vel veritatem, praeconceptis occaecati, non percipiebant, vel etiam fictis

et

et falsis corrumpebant. Plures, re omniquovis modo mirabili capti, quod ipsi facile crediderunt, alios credere cupientes, rem omnem praeter modum amplificarunt. Plures denique, ut observationibus, hodie adeo expetitis, famam sibi compararent, historias in museo fictas, pro veris tradiderunt. Haec omnia, si specialius indigitarem, de imperfecta haecenus morborum historia fatis clare constaret; sed haec omnia impraesentiarum praetermitto, et unum solummodo, in historiis morborum conscribendis, vitium, ad rem nostram maxime pertinens, indicatum volo.

MULTI optimae etiam fidei medici, in morbis observandis diligenter versati, in historiis eorum conscribendis saepe nimium fecerunt. Non solum enim symptomata morbi cujusvis semper praesentia et inseparabilia, sed plura etiam, et cuncta quidem quovis tempore morbum comitantia, recensuerunt. Ita symptomata rarius, nec necessario cum morbo conjuncta, et plura omnino adventitia et
 fortuita,

fortuita, notarunt; dum simul illa inusitata et fortuita ab usitatoribus et inseparabilibus distinguere penitus neglexerunt. Hinc, historiam morborum plenissimam reddere conantes, quae ad distinctionem cuiusque ab alio quovis conferre possent, omiserunt, immo difficiliorem reddiderunt.

DE hacce in historiis morborum redundantia saepe conquesti medicinam facientes, pathognomonica quae dicuntur desiderarunt; hoc est, ut notentur symptomata illa pauca, quae cuique morbo adeo propria sunt, ut ab illis solis quisque morbus ab alio quovis illico et certo dignoscatur. Hujusmodi autem pathognomonica in scriptis medicis nondum data, neque unicuique morbo assignata sunt; nec, quantum video, nisi per Nosologiam methodicam, rite institutam, assignari queunt.

DUDUM quidem SYDENHAMUS et solers BAGLIVIVS, quo facilius et certius morbi distinguerentur,

distinguerentur, morbos omnes, per normam methodi botanicae, ad genera et species, appositis characteribus idoneis, referri voluerunt: Id est, ut institueretur Nosologia methodica. Hoc etiam consilium alii summæ famæ medici comprobarunt, et quisque, ni fallor, in artis usu occupatus factum fuisse vehementer optaret. Nihil tamen hujusmodi protinus tentatum fuit; an quidem ex fructu inde capiendo parum perspecto, an vero ex difficultate operis praevisa, non constat; sed revera nihil omnino tentatum fuit, donec celeberrimus FRANCISCUS BOISSIER DE SAUVAGES, circa annum 1732, rem aggressus sit.

QUAE quidem, exeunte seculo decimo sexto, FELIX PLATERUS in morbis secundum symptomata ordinandis conatus est, quodammodo huc referri possunt; conatus autem isti inconditi adeo et imperfecti erant, ut quenquam eosdem profecuturum esse vix expectandum fuit; et revera ante Sauvagesium

GESIUM nemo, quantum novimus, ulla ex parte profecutus est. Haud dissimulandum quidem, PLATERUM SAUVAGESIO quaedam suggestisse; pauca tamen, nec fausta admodum, et quae nemini usui fuissent, nisi SAUVAGESIUS, cum meliore spe, opus multo longius provexisset.

IPSE quidem SAUVAGESIUS primum lente et titubanter progrediebatur; et, re iterum atque iterum tentata, non nisi post multam lectionem, et assiduam per triginta annos meditationem, Nosologiam methodicam suam, anno 1762 editam, protulit.

INTEREA, duo alia, in Nosologia methodica, tentamina facta sunt; alterum a celeberrimo viro, et in distributione rerum methodica plurimum exercitato, CAROLO a LINNE; alterum ab erudito Professore Göttingensi, RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL. A neutro tamen, utpote vestigiis SAUVAGESII presse nimis insistente, opus multum promotum fuisse videtur.

CUM de utilitate hujusmodi tentaminum, jamdudum mihi persuasum sit, simulac ad medicinae praxin docendam in hac alma Academia admotus fui, mei officii esse putavi alumnos nostros ad Nosologiae methodicae studium allicere; et, quo facilius hoc efficerem, libellos quotquot ad id conferre possent, hic edendos, et in discipulorum manus tradendos, curavi.

EX opere SAUVAGESII, aliis rebus non admodum utilibus referto, ea tantum quae ad genera et species morborum distinguendas pertinerent excerpti, et cum his LINNAEI et VOGELII libellos integros conjunctos edidi.

AUCTORES hi aliquid laudis sine dubio merentur; quanquam enim eorum opera, rem ex toto confecisse minime videantur, nec multum utilitatis tyronibus inexpertis afferre queant; in arte tamen versatis, et indignoscendis morbis aliquatenus exercitatis, nonnihil commodi exinde oriri possit.

DIFFICILE

DIFFICILE quidem erit, hanc rem protinus perfectam reddere, nec, ut opinor, nisi tentaminibus repetitis fieri potest. Non solum igitur mihi licitum, sed mei muneris esse, opus hoc Nosologicum, quantum possem, promovere arbitratus sum; eoque consilio methodum quodammodo novam tentavi, et una cum supra dictis edidi. Hanc, etsi nequaquam omnibus numeris absolutam, prioribus tamen in quibusdam magis accuratam inventam fore spero.

QUI ante nos huic studio operam dederunt, minus consulto, ut mihi videtur, rem aggressi sunt; morborum enim species parum perspectas habentes, ad suprema classium et ordinum genera constituenda illico se accinxerunt. A natura vero, species solum datae sunt; et generum constitutio est mentis humanae excogitatio, quae, donec species omnes bene notae et perspectae fuerint, fallax et incerta erit; et in generibus quidem constituendis, nisi ad species semper respiciamus,

respiciamus, labor noster vanus et futilis evadet.

CONSTITUTIO generum supremorum, in quovis rerum systemate, neutiquam adhuc absoluta est. Classes enim, vel etiam ordines, omnino naturales, vel in systemate vegetabili, vel in animali, nondum ubique constitutae sunt. De fossilibus methodus etiam difficilior, et de morbis fortassis omnium difficillima erit. Videamus igitur quomodo hanc rem quam optime tractare possimus.

CUM res distinguendae, numero quam plurimae sint, tum ad investigationem, tum ad reminiscentiam, utilissimum et necessarium esse videtur, ut ad genera quaedam suprema referantur; cum vero species rerum non admodum numerosae sint, et quarum singillatim recensitarum reminisci, memoriae in plerisque hominibus vires non excedat, eas, summa sollicitudine, ad classes et ordines referre vix opus esse videtur.

ITA

ITA Illustris DE BUFFON quadrupedia, quorum species numero paucae sunt, ad classes et ordines referre haud necessarium esse censuit, et quae in hunc finem alii tentarunt, frivola esse, et ad denominationem studiosos plurimum turbantem duxisse, putavit.

ILLUSTRI tamen et egregio viro prorsus assentire nequeo. Etiam si enim institutio classium et ordinum morborum, neque pro investigatione eorum satis perfecta reddi queat, neque pro numero valde necessaria sit; quodammodo tamen tentandam, et ad majorem accuratationem diligenter perducendam esse, puto.

ENIMVERO, si ab illusione quae ex characteribus classium et ordinum oriri queat, cavemus, et, ni fallor, cavere plerumque licet, etiam classium et ordinum institutionem, in multis ad plenioram et magis exactam specierum distinctionem conferre posse contendo. Etsi enim ejusmodi institutionem, ubique certam et accuratam semper

per assequi haud liceat, ipsos tamen conatus ad illam assequendam magnopere ex re fore putarem, quippe qui ad disquisitiones utiles, tum in pathologia, tum in morborum historia, saepe obvenientes, subinde ducant. Certe, cum de natura morborum disquirere velimus, distinguendi sunt, tum per symptomata cuique propria, tum per illa cum aliis quibusdam communia, quod nihil aliud est, quam morbos, uti alia quaecunque in rerum natura distingui debent, per genera et species distinguere, et hujusmodi distinctio generum, tum supremorum tum proximorum, notationem necessario exigit.

QUANTACUNQUE tamen ex instituentis morborum classibus et ordinibus utilitas provenire possit, certe fatendum est, Nosologos, huic rei praecipue intentos, successus optatos nondum obtinuisse; et ex hujus studii adeo imperfecti conspectu, ni fallor, accidit, quod totam rem Nosologicam alii despexerint, alii vero impossibilem judicaverint.

QUI

QUI impossibilem putant, certe falluntur. Distinctionem morborum aliquando difficilem esse, fatentur omnes; possibilem autem in plerisque esse, fateri etiam oportet; nam, si quis hoc negaverit, idem fecerit, ac si nullam esse artem medicam dixisset. Si revera tamen medici morbos a se invicem dignoscere possint, certe quibus indiciis id faciant, etiam dicere queunt. Haec autem indicia nulla alia esse possunt, quam quae morbum quemque per genus et speciem definiant, quae rursus per methodum Nosologicam, rite institutam, solummodo exponi queant.

DISTINCTIONEM itaque morborum, hactenus saepe dubiam, per Nosologiam methodicam magis certam fieri posse, affirmare nullus dubito. Porro observandum, quoties hujusmodi distinctionem morborum exponere conati fuerimus, id commodi oriturum, quod hujus distinctionis vel defectus, vel errores, facillime percipientur, et cum percepti, vel ad observationes jam factas accuratius considerandas, vel ad observationes

fervationes postea diligentius faciendas, ducent; quin et plurimum valebunt, tum ad Nosologiam methodicam, tum ad distinctionem morborum, tandem perfectiorem reddendam.

QUAMVIS morborum characteres hactenus propositi saepe erronei, saepe deficientes sunt; tentamina tamen omnia jam facta exhibere cupiens, in hac tertia Synopsis editione ex systemate symptomatico CL. MICHAELIS SAGAR, quae ad genera morborum definienda pertineant, excerpti, et caeteris supra memoratis subjunxi. Haec autem tentamina omnia simul edita sunt, ut juxta posita facilius conferri possint, et ut collata vel optimos et maxime idoneos characteres indicent, vel ad erroneos corrigendos, et ad distinctiones magis exactas obtinendas, lectores ducant.

HUJUSMODI studium plurimis medicis necessarium fore facile credo; nam morborum titulis inhaerentes, notiones parum accuratas

curatas et determinatas habent; et, quantum video, ad magis exactas, nisi nosologiae methodicae studio, duci vix possunt.

Ex iis quae jam diximus, tum utilitatem tum necessitatem Nosologiae Methodicae manifestam fore spero; et simul patebit, quare antehac, et nunc etiam, eandem colere allaboravi. Proximum est, ut in hisce prolegomenis, quas in hoc studio regulas ipse observavi, et ab aliis observandas vellem, nunc exponam.

PRIMA et praecipua nostra cura fuit, ut morborum species in ipsis aegris praesentes detegerentur et dignoscerentur. Cum vero species nisi simul genus indicaretur, vix recte definiiri possint; et cum genera plurima a Nosologis indicata unius tantum speciei sint, inde factum est, quod nostri etiam labores, in generibus praesertim distinguendis, impensi videantur. Ad species tamen semper respeximus; et ad eas dignoscendas,

C

noscendas, characteres generum a nobis datos ubique utiles fore speramus.

IN generibus morborum recensendis, pauciora, quam in aliis systematibus dicta sunt, recensui ; quod si recte feci, id studiosis multitudine rerum contemplanda facile turbatis imprimis commodum esse puto. Etiam si enim numerum generum minuens aliquando erraverim, id tamen tuto tentatum fuisse censeo ; cum enim discipuli nostri genera facile et satis certo distinguenda recte perspexerint, illos genera forte omissa facile postea agnituros esse, credo.

GENERA morborum vero apud nos, quam apud alios Nosologos, necessario pauciora sunt ; quia plura, pro diversis ab aliis habita et recensita, a nobis, utpote nulla, quantum nobis videtur, re diversa, sub uno titulo comprehensa sunt ; et hujus rationes postea locis idoneis tradendae venient. Interea notandum, plura genera, quae primo intuitu omissa videantur, nequaquam ex oculis

oculis studiosorum sublata esse, cum generis illius, ad quod pertinere nobis videntur, uti synonyma recenseantur, et locum suum in indice adhuc retineant.

DEINDE, genera morborum a nobis, quam ab aliis enumerata et definita, pauciora sunt; quia nulla, nisi idiopathica et primaria, notanda esse duximus; dum plura ab aliis memorata, sympathica tantum sunt, sive symptomata nusquam per se existentia; et neutiquam igitur pro morbis primariis agnoscenda. Ita *Carphologia*, *Pandiculatio*, *Rigor*, *Sternutatio*, *Oscedo*, *Singultus*, *Stertor*, *Anxietas*, *Lassitudo*, *Stupor*, *Pruritus*, *Algor*, et *Ardor*, a SAUVAGESIO, et alia ab aliis, pro generibus recensita, a nobis penitus omittuntur; et recte, ni fallor, nisi quot symptomata, totidem genera morborum, ponere velimus.

DENIQUE, genera morborum apud nos pauciora sunt; quia, ex classibus VITIORUM et DEFORMITATUM, plura a nobis omittuntur;

tuntur ; vel quod morbi adeo leves sint, ut medicorum attentionem et curam non mereantur ; vel quod congeniti et immutabiles medicorum artem penitus eludant. Ita *Lentigo, Leuce, Cyasma, Seline, et Cicatrix*, ex classe VITIORUM ; et *Phoxos, Gibber, Rhysseniata, Canities, Coloboma, Naevus, Monstrositas, Rhicnosis, Varus, Valgus, Leipedes, Saniodes, Cripsorchis, Hermaphroditus, Dionysiscus, Galiancon, Galbulus*, et alia ex classe DEFORMITATUM apud VOGELIUM recensita, recte a nobis omissa putamus. Ejusmodi vitia et deformitates, fortassis in pathologia, sive historia generali, mutationum quas, quavis occasione, subit corpus humanum notari possent ; Nosologiam autem methodicam iis adeo frivolis onerare, vel eandem tam multis novis et inutilibus appellationibus turbare, minime idoneum videtur. Judicet itaque lector, quam merito gloriatur cl. SAGAR, se generum numerum auxisse.

QUOD,

QUOD, modo memorata omiserim, venia forsitan mihi facile dabitur. Sunt autem alii morbi, memoratu quidem digni, quos omissos non adeo facile condonabit studiosus. Hujusmodi omissiones agnosco, et quidem doleo; sed variae rationes, ut quidam morbi hic omitterentur, effecerunt. Primo, fieri potest, ut quidam observationem nostram penitus effugerint; dein, sunt alii satis noti, quibus, in nostro systemate, locus idoneus nusquam inventus est; denique, sunt alii quorum historia apud medicos adeo sit imperfecta, ut nec locus nec character idoneus iis assignari queat. Ne tamen ejusmodi genera penitus omitterentur, ad calcem operis, omissorum, quotquot noverim, catalogum subjunxi, ut posteri perspicaciores, ea diligentius perpendentes, characteres et locum iis assignent.

EODEM consilio, ne scilicet tyronibus contemplanda praeter necessitatem multiplicarentur, non genera solum, sed species morborum etiam ad minorem numerum redeg.

redegî. Hoc magis periculofum videri potest, cum nullam speciem, quae revera existat, recte omittere liceat. Ne quidem ad recensîonem specierum ipse accederem, difficultas operis me dubium, et timidum antehac diu cohibuit; et id tantum tentare aufus sum, ut species, a SAUVAGESIO recensitas, ferie paulo luculentiore et emendatiore traderem: Re autem amplius, et curatius perpensa, species jam recensurus, numerum earum, apud SAUVAGESIUM recensitarum, multum minuendum esse, arbitratus sum.

SOLUS quidem SAUVAGESIUS, nam SAGARUM nihil moror, in recensîone specierum quicquid praestitit; et, licet egregius vir, plurimis observationibus undique collectis, multum de re medica meritis fit; haud tamen dissimulandum, illum in multis graviter errasse, dum species revera easdem, sub diversa appellatione repetitas, pro diversis ponebat; et praesertim dum species sympathicas, tam saepe idiopathicis immiscebat, qua ratione earum numerum totum praeter modum auxit. Hos ut tolle-

rem

rem errores, quod potui feci, numerosis nempe apud SAUVAGESIUM speciebus, recte, quantum ego judico, ad pauciores reductis. x

QUOD ut efficerem, primo species plures, uti diversas a SAUVAGESIO recensitas, pro una eademque habui, et sub uno titulo posui; atque hujus rei rationes locis suis idoneis posthac tradendae sunt.

DEINDE, cum species idiopathicas solum pro veris et genuinis enumerare velim, quotquot pro symptomaticis habere potui, totidem ex numero specierum apud SAUVAGESIUM sustuli. Cum autem, in recensione specierum symptomaticarum aliquis usus sit, earum recensioem, seorsum tamen, denuo apposui.

DENIQUE, alia et praecipua ratio, qua specierum, a SAUVAGESIO recensitarum, numerum minuendum esse censui, ea est, qua plures ab eo pro diversis positas, pro
specierum

specierum varietatibus, tantum habui et enumeravi.

Hoc autem est, quod in Nosologia Methodica maxime difficile videtur, dicere nimirum, quid pro ipsa specie morbi, quid pro ejusdem speciei varietate, tantum habendum sit. Cum autem criteria illa, quae in Zoologia et Phytologia, ad species a varietatibus certius distinguendas adhiberi possint, in Nosologia Methodica nequaquam invenienda sint; varietates morborum a speciebus distinguere ubique difficilius erit. Quamobrem varietates plures recensere, tutissimum et fere necessarium esse duxi. Ejusmodi vero distinctionem, in artis usu utilissimam fore ratus, illam adhibere ubique annis sum; quod si non in omnibus, cum aequae certa cognitione, cum aliqua saltem verisimilitudine, diligenter quae sequuntur pensitatis, saepe fecisse videor.

CUM morbus aliquis, quo plures homines laborant, symptomata cujusdam speciei characteristica

raçteristica omnia et sola, in unoquoque ostendit; quantumvis haec in alio minus, in alio magis vehementia sint, hoc speciem diversam exhibere non putamus; et, in univ-ersum, morbos gradu solum differentes, non nisi ejusdem speciei varietates praebere censemus.

TUNC igitur de varietate a specie distinguenda quaestioni tantum locus est, cum in diversorum hominum morbis, vel ex solitis cujusvis speciei symptomatis; quaedam absint, vel iisdem quaedam addita sint.

CUM ex symptomatis solitis quaedam absint, quoties inter symptomata, quae magis, et ea quae minus, essentialia sunt distinguere liceat, ex horum absentia non nisi varietatem adesse concludimus:

CUM vero symptomatis characteristicis alia quaedam addita sint, si addita pro symptomatis symptomatum, potius quam pro

D symptomatis

fympptomatis caufae haberi queant, varietatem tantum conftituunt.

DENUO, cum fympptomata addita, in fpecie data, prorfus infolita fint, et fimul conditiones morbi praecipuas parum vel nihil mutari videantur, haec quoque varietatem tantum praebere cenfenda.

CUM morbi genus quoddam, ex principiis diverfis oriri queat, idem, ex diverfitate principii, fpecie diverfum evadere poteft, nec femper tamen; nam, quotiefcunque diverfitas illa parva fuerit, et fimul fympptomata parum ab ea fuerint mutata, hoc etiam non nifi varietatem exhibere, putamus.

MORBI genus itidem, pro diverfa ejus fede, diverfae fpeciei fieri poteft; quotiefcunque vero fedes diverfa, neque partis ftructurae, neque functionis ratione differat, hujufmodi fedis diverfitas etiam pro varietate tantum habenda eft.

PORRO,

PORRO, cum de morbis invicem distinguendis hic agatur, observari vellem, res duas esse, quae ad similitudinem et affinitatem morborum, in diversis hominibus indicandam, plurimum facere possint.

ALTERA est, quod principii quaedam similitudo, morborum inde in diversis hominibus genitorum similitudinem arguit; ita, quando morbi diversorum hominum, ex uno eodemque principio orientur; quando, etiam principium illud, ad morbum gignendum, in unoquoque necessarium sit; denique, quando idem principium, ubique fere ejusdem qualitatis et vis esse videatur, tum demum morbos, ex ejusmodi principio genitos, ejusdem vel simillimae naturae esse, judicare licet.

Hoc de morbis contagiosis plerisque valere mihi videtur. Ex his enim sunt, qui in pluribus hominibus ab eadem specifica contagione oriuntur; nec, in eorum aliquo morbus, nisi ab illa contagione applicata,

plicata, oriri unquam observatur; et simul illius contagionis vires et qualitates, ubique fere, eadem esse videntur. Quod ad proxime dictum spectat, id quibusdam dubium videri potest; sed, cum ejusdem contagionis effectus, per secula plura jam observati, semper et ubique admodum similes sint, eam qualitate et viribus eandem esse, merito concludimus; et, ob hoc praesertim, quod effectus isti, quatenus diversi videantur, plerumque hominis infecti conditioni cuidam, potius quam contagioni, qualitate vel viribus diversae, tribui possunt.

MORBOS, itaque, eadem contagione specifica ortos, simillimae naturae esse credendum; ejusmodi morbos etiam vix, nisi unam ejusdem generis speciem, praebere; immo, earum diversitatem quandam aliquando observatam, non nisi ejusdem speciei varietatem indicare, suspicandum est.

HAEC

HAEC omnia, non solum de exanthematis contagiosis, sed etiam de plerisque febribus epidemicis, dicta velim. Hanc autem opinionem, de similitudine febrium epidemicarum proferens, a gravis auctoritatis viro SYDENHAMO, hujusmodi febres specierum plurium esse statuente, dissentire cogor. Recte quidem, an secus, multum dubito; et posteris litem dirimendam relinquo, hoc simul praemonito, plurimum medicinam facientibus inter futurum, de alterutrius sententiae veritate sibi satisfacere, vel potius quas limites utrique sint ponendae, statuere.

ALTERA res, quae similitudinem morborum, in diversis hominibus, ostendere possit, est similitudo remediorum quibus sanantur. Similitudo quidem morborum in similitudine causae eorum proximae, qualiscunque sit, revera consistit; cum remedia vero morbis medeantur, tantum quatenus causas eorum proximas tollant, morbos, qui

qui iisdem omnino remediis sanantur, eisdem naturae esse oportet.

HUJUSMODI ratiocinatio, tum ad phlegmasiarum missione sanguinis, tum ad febrim intermittentium cortice Peruviano sanatarum, similem naturam indicandam, plurimum certe facere potest. Hanc autem doctrinam, utcumque in praxi medica aliquando utilem, fallacem tamen, neque in praxi, neque in Nosologia methodica, nisi caute admodum, adhibendam esse censeo. Apud vulgus medentium quidem, remedia eadem quibusque fere eisdem generis, speciebus, et harum varietatibus adhiberi, et hinc genera plura nullo modo specie differre, videantur. Sed peritiores norunt, morbos, aliquo modo diversos, rarius quam putatur, ab iisdem prorsus remediis sanari: Bene etiam norunt, ex promiscua remediorum adhibitione fieri, quod eadem remedia adeo saepe frustranea, sanationes saltem minus perfectae sint. Porro, norunt expertissimi, ad recte medendum, omnino opus

pus esse, ut remedia, non solum generi, sed speciei cuique, et saepe etiam varietatibus quibusdam, apprime sint accommodata.

AD artem medicam breviorē, et exinde faciliorem, reddendam, species morborum quascunque, a varietatibus suis distinguendas esse, arbitratus sum. Hanc tamen distinctionem in pluribus quodammodo incertam esse fateor, et, in nosologia methodica, tutissimum fore puto, varietates morborum plerasque notare et recensere. Hoc itaque praestare ubique annifus sum, aliis sapientioribus, qui posthac huic operi se immiscere velint, relinquens, discriminationem magis certam statuere.

EXPOSITA jam qua ratione morborum, tum generum, tum specierum, numerum minuere laboravi; superest, ut quo modo eorum, quae admisi, caractères constituendi sunt, nunc exponam.

IMPRIMIS igitur, notas externas, sensibus nostris facile obvias, ubique selegi, neglectis, vel potius rejectis, de statu corporis interno conjecturis quibuscunque. Porro, ex notis quae sensibus sunt obviae, illas medici potius quam aegri sensibus percipiendas, semper praetuli; quum tamen has, utcunque fallaces, penitus negligere vel omittere non liceat.

SECUNDO, ea symptomata pro notis characteristicis praecipue seligenda putavi, quae perpetuo cum morbo praesentia sunt, et hoc quidem semper annitendum esse puto. Cum vero plurimi morbi sub eorum decursu, aliam atque aliam omnino formam capiant, in his, ex serie rerum, et symptomatum sibi invicem succedentium, character saepe necessario petendus est.

IN hac re autem tractanda, duplex quaestio exoritur. Prima est, An ex morbi principio characteris partem desumere liceat?

AD hanc responderi possit, quod, etiam si de principiis morborum apud medicos - iudicium saepe fallax, et prorsus falsum sit, nec temere idcirco ad morbos distinguendos adhibendum; cum eadem tamen aliquando satis certe nota sint, et facile observanda, huiusmodi principia in nosologia, pro notis characteristicis recte adhiberi posse censeo.

ALTERA quaestio hic exoriens est, quatenus ex serie symptomatum, sub decursu morbi occurrentium, characterem ejus petere liceat? Ad hanc etiam possit responderi, quod, cum plures morbi, uti exanthemata et febres intermittentes, nisi post decursum aliquot dierum, ex serie symptomatum sibi invicem succedentium, nullo modo dignosci queant; ut huiusmodi morbi distinguantur, ex serie illa character necessario sumendus est. Characteres autem, non nisi post longum morbi decursum, fortassis non nisi post morbum finitum, statuendi, nequaquam in nosologia usurpari debent.

debent. Ita apud Ill. LINNÆUM *Febrorum continentium*, quas vocat, characteres a diuturnitate totius morbi desumpti prorsus inepti sunt.

IN constituendis morborum characteribus, regula tertia est, quod, cum quisque fere morbus, ex plurium symptomatum concursu solum dignoscatur, ex iis pro notis characteristicis quot sufficiant; nec plura tamen adhibenda sunt. Priores nosologi mihi videntur, in characteribus quos dederint, plerumque nimis breves et deficientes fuisse; et forsitan mihi vitio verti potest, quod aliquando sim in iisdem nimis longus et redundans. Nusquam quidem volens fui redundans; ut vero essem copiosus ubique me conatum fateor, prudentissimum fore ratus etiam ad redundantiam appropinquare, quippe posteris multo facilius erit, quod nimium est tollere, quam quod deficiat supplere.

IN characteribus denique morborum constituendis, quaeritur etiam, an ex defectu functionis cujuslibet, quae in sano unoquoque exercetur, vel ex absentia symptomatum, in aliis generibus vel speciebus apparentium, notas quasdam desumere liceat? SAUVAGESIUS quidem defectus functionum, utpote nihil positivum indicantes, pro morbis noluit admittere; plures igitur, qui a LINNAEO sub ordine *constrictiorum*, et a VOGELIO sub classe *epischesium*, recensentur, penitus omisit.

SED, pace tanti viri, dixerim, quanquam defectus, si strictius loqui velimus, nihil positivum indicet; defectum tamen functionis, quam exercet quisque sanus, statum corporis humani exhibere, quem ut distinguamus utilissimum est, atque etiam necessarium, et ejusmodi status pro morbo recte haberi potest. Porro, etiamsi in quibusdam defectus isti aliquando sine molestia vel morbi symptomate observentur; in plerisque tamen magnam molestiam, et symptomata

mata plurima pariunt. In his igitur, defectum functionum, saepe symptomatum causam manifestam, pro morbo haberi licet, et ex ejusmodi defectu, in plurimis morbis horum notas characteristicas petere licet, et oportet. SAUVAGESIUS ipse in hac re parum sibi constare videtur, *Debilitatum* classem instituens, et *Amnesiam*, *Agrypniam*, *Ischuriam*, et alia etiam tanquam genera recensens.

QUOD notas ex absentia symptomatum, in aliis congeneribus apparentium, spectat; eas nequaquam bonas, et, ubicunque fieri potest, evitandas censeo. In pluribus vero vitari, quantum video, non possunt; nec a quovis nosologo adhuc fuerunt vitatae.

CUM, secundum has regulas, characteres morborum constituendi sint, plurimum refert, eosdem sermone accurato et luculento exprimere; nec minus, morbum quemque apto nomine insignire,

NORUNT eruditi, Ill. LINNÆUM methodum plantarum perfectiorem reddidisse, eo, quod botanices linguam, usurpatis ubique vocibus maxime idoneis et definitis, magis accuratam effecit; nec quidem dubito quin delineatio morbi, ad instar delineationis plantae, a LINNÆO exhibitae, in nosologia multum profutura sit. In nosologia autem, ac in botanice, non aequè necessarium esse videtur; tum quod tam multae rerum circumstantiae, in nosologia, ac in botanice, notandae non veniunt; tum quod symptomatologia, in quibuscunque fere Pathologiae generalis systematibus exhibita, plurimum in hac re jam praestitit. Fatendum quidem, symptomatologias vulgo prolatas, nec adeo plenas esse, nec adeo exactas, ac optandum esset; et, si pleniores fierent, atque ubique voces magis idoneae et accurate definitae usurpatae essent, ad nosologiam perficiendam certe plurimum conferre posset. In hujusmodi vero tentamine cavendum est, ne distinctiones nimium subtiles et dubiae adhibeantur, uti ab auctore *Observationum*

servationum Clinicarum, quae Warfaviae annis 1767 et 1768 prodierunt, factum fuisse opinor. Ipse quidem hujusmodi nihil tentavi, tum quod plus exegisset, quam per longum tempus mihi suppetivit otii, tum quod mihi minus necessarium videtur, qui voces apud medicos usitatissimas, et in sensu vulgo recepto, ubique fere usurpandas curaverim.

QUOD ad denominationem morborum attinget, in Classium, Ordinum, et Generum nominatione, eas, quantum potui, regulas observavi, quae in LINNAEI *Criticis Botanicis*, et in ejusdem *Philosophia Botanica*, ab ill. auctore traduntur.

Quando notiones novae sunt proferendae, etiam nova nomina imponenda sunt, et ejusmodi aliquando, parcius licet, adhibuimus. Cum vero nomenclaturam medicam, diuturno usu confirmatam, sine gravi causa mutare non liceat; ne factum esset ubique curavimus; quod tamen ill. LINNAEUM saepe, nulla urgente necessitate, fecisse, et VOGELIUM, appellationibus

bus novis, frivolis, ineptisque, Nosologiam deturpasse, observavimus.

UT clarior et certior habeatur morborum notitia, appellationibus selectis, synonyma, tum aliorum nosologorum, tum auctorum maxime celebrium, ubique apposuimus. Hoc diligentius feci, ut inde norint studiosi, ex quibus praecipue scriptis, morborum scientia optime obtineri possit.

IN recensendis specierum synonymis, appellationes, quibus SAGARUS usus sit, omisi, tum quod ipse aliorum auctorum synonyma ubique omittens, nos de speciebus, quas indicare voluit incertos, saepe reliquit; tum quod, in recensione specierum, illum profecto minus peritum fuisse, et regulas nosologiae methodicae optimas quasque neglexisse, nobis videtur.

SYNONYMA veterum medicorum adhuc omisi, non quod eorum scripta prorsus negligenda esse putaverim, sed quod ego, neque satis certo, neque cum fructu, synonyma eorum indicare potuerim.



S E R I E S

CLASSIUM et ORDINUM *.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

- ORDO I. FEBRES.
II. PHLEGMASIÆ.
III. EXANTHEMATA.
IV. HÆMORRHAGIÆ.
V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

- O. I. COMATA.
II. ADYNAMIÆ.
III. SPASMI.
IV. VESANIÆ.

* Classium institutionem primo a SAUVAGESIO datam, LINNÆUS, VOGELIUS, et SAGARUS, in omnibus fere, secuti sunt. Cum vero ex eorum classibus plures sint, uti VITIORUM, ANHELATIONUM, DOLORUM, et FLUXUUM, neque naturales, nec quovis modo idoneae, ejusmodi institutionem sequi non potui. Aliam itaque simpliciore, et in universum,
ut

CL. III. CACHEXIÆ.

- O. I. MARCORES.
- II. INTUMESCENTIÆ.
- III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

- O. I. DYSÆSTHESIÆ.
- II. DYSCINESIÆ.
- III. APOCENOSES.
- IV. EPISCHESES.
- V. TUMORES.
- VI. ECTOPIÆ.
- VII. DIALYSES.

ut mihi videtur, aptiorem, hic protuli. Haec fortasse etiam minus absoluta videri possit, quod inter morbos totius systematis, in primis tribus classibus recensitos, et illos partis singularis, sive LOCALES, in classe quarta collocatos, distinctio non ubique facilis erit. Hoc quidem, rarius licet, aliquando fieri posse concedimus. Sed nihil praestantius nobis nunc suppetit; et, ob rationes in Prolegomenis, pag. xii. allatas, de perfecta classium institutione non admodum solliciti sumus.

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones laesae, viribus praesertim artuum immunitis*.

SYNONYMA. Morbi febriles *Auctorum.*

* Quod hic, et pluribus quae sequuntur locis, nobis forsitan vitio verti possit, quodammodo hic obiter excusare liceat. Ita, dici potest, pyrexias aliquando videri, quas nullus praecesserat horror, et pyrexias in quibus neque pulsus frequentior, neque calor major, quam in sanis esse solet; characterem ideo datum neque verum, neque ubique adhibendum. Istiusmodi pyrexias, rarissime licet, aliquando videri negare nolo; sed, in characteribus classium, ad species dignoscendas adhibendis, ut singulae classis notae in unaquaque specie conspiciantur, haud necessarium videtur, et sufficit, si earum pleraeque in specie quavis adsint.

Character idoneus quisque, plurium notarum sive symptomatum concursum notare debet, et male quidem

cum

ORDO I. FEBRES.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres *Autorum* S. Cl. II. V. Cl. I. *Sag.* Cl. XII.

Morbi febriles critici L. Cl. II.

cum veteribus VOGELIUS calorem auctum solum, et recentiores SYLVIUS et Cel. BOERHAAVIUS pulsuum velocitatem solum, pro caractere pyrexiae, sive febris ut vocant, posuerunt. Certe, qui dicunt febrem adesse, etsi pulsus nihilo naturali frequentior sit, ex aliis quam velocitate pulsuum signis febrem adesse judicant; quod etiam plurium symptomatum notationem, in quovis caractere necessariam esse, ostendit.

Porro, hic obiter observari velim, pulsuum velocitatem solum, pyrexiam vel febrem adesse nequaquam semper indicare; cum a causis externis plurimis pulsus sit naturali velocior, sine morbo, sive quavis functionum laesione. Hisce de pyrexiae caractere quaestionibus, in caractere a nobis hic dato, quantum potuimus, prospectum est. Sed, in aliis classium et ordinum caracterebus adeo felicem esse vix licet; et in caracterebus plerisque, si ad species plerasque caractere recte adhiberi possit, paucas exceptiones non moror. Utilem plerumque fuisse mihi sufficit, ubique perfectum fore non spero.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, miasmate paludum ortae, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabili, et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes : Paroxysmo quovis die unico tantum *.

Intermittentes *Auclorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II.

O. II. V. Cl. I O. I. *Sag.* Cl. XII. O. III.

Remittentes *Auclorum* S. Cl. II. O. II. *Sag.* Cl. XII.

O. II. †.

* Qui perpenderit quae de febribus *remittentibus*, quae videntur continuae, a *continuis*, strictius dictis distinguendis, mox dicenda sunt, facile videbit quamobrem, tum intermittantium tum continuarum characterem antea datum, hic mutare necessarium habui.

† Febrium *remittentium*, quasi a febribus *intermittentibus* exquisitis prorsus differentium, ordinem separatum instituerunt Nosologi SAUVAGESIUS,

LIN-

46. GENERA MORBORUM

Exacerbantes L. Cl. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II. *.

Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap.

13.

Continuae remittentes, *Boerb.* Aph. 727.

Compositae ex acuta periodo, *Junk.* Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* The-
rap. Spec. L. V. cap. I.

Continentes *Mortoni,* Exerc. II.

LINNAEUS, et SAGARUS; minus recte tamen, si mihi
judicare fas sit. *Remittentes* enim, quae dicuntur, ex
eodem principio, miasmate nempe paludum, ac *in-*
termittentes, oriuntur; iisdem in locis, et eodem anni
tempore, utraque simul epidemice grassatur; utraque
iisdem prorsus remediis sanatur; et saepissime in eo-
dem homine idem, qui videtur, morbus, nunc inter-
mittentis nunc remittentis typum exhibet. Morbi id-
circo, causis, sanatione, et typo simillimi, nec ad
ordinem, nec ad sectionem diversam distrahendi
erant.

* Magis inconsulto adhuc VOGELIUS *remittentes*
omnes cum *continuis* sociavit. *Continuae*, quas
vocamus, omnes quidem remissiones et exacerba-
tiones ostendunt; sed a *remittentibus* ad *intermit-*
tentes merito referendis, plurimum aliis multis diffe-
runt, ut mox dicetur.

GENUS. I. TERTIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo quadraginta octo circiter horarum : Accessionibus meridians.

Tertiana Auctorum, S. G. 88. L. 16. V. 2: *Sag.* p. 704. *Hoffm.* Tom. II. pag. 11. *Stahl.* de tertiana febris genium univcrsum manifestante, *Hælae* 1706. *Ejufd.* *Cafual. magn. Caf.* 21. *Cafual. min. Caf.* 96. *Cleghorn's* diseases of Minorca, cap. III. *Senac*, de recond. febr. natura.

TERTIANA est vel

I. Interposita apyrexia, quæ

i. Variat paroxyfmi duratione.

A. Tertiana paroxyfms haud ultra horas duodecim extenfis.

Tertiana legitima, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 18. *Hoffm.* Tom. II. p. 12.

Tertiana vera, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxyfms ultra horas duodecim extenfis.

48 GENERA MORBORUM

Tertiana notha sive spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140. *Hoffm.* Tom. II. p. 12.

2. Variat paroxyfismorum recurfu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxyfimis inaequalibus, alternis fimilibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V. G. 12. *Clegh.* Min. p. 141.
Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxyfimis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones,* de febr. interm. P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxyfimis altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. *Semitertiana Hoffm.* II. p. 40.
Semitertiana primi ordinis Galeni, Spig. de *femiter-*
tiana, L. II. cap. 4.

F. Tertianæ quotidie revertens, interposita remissione inter diem impari et pari magis, inter pari et impari minus, notabili.

Hemitritæus, *Celsi* L. III. cap. 3.

Semitritæa, *Clegh.* Minorc. p. 143. *

Semitritæa secundi ordinis, *Galenii, Spig.* L. II. c. 5.

Amphimerina hemitritæus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo-hemitritæus, S. sp. 9. *

3. Variat symptomatibus.

G. Tertianæ affectibus soporosis stipata.

Tertianæ carotica, S. sp. 10. *Wertholf.* de febribus, et auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertianæ hemiplegica, S. sp. 20. *Wertholf.* ibid.

Quotidianæ soporosa, S. sp. 8 *Car. Pif.* obs. 175. 176.

Febris caput impetens, *Sydenh.* Ep. ad R. Brady.

H. Tertianæ spasmodicis et motibus convulsivis stipata.

* Fortassis hemitritæa quævis ad remittentes relegari possit; et, licet affines separare nolui, limites non satis certe ponendos esse fateor.

50 GENERA MORBORUM

- Tertiana asthmatica, S. sp. 6. *Bonet. Polyalth. Vol. I. p. 250.*
- Tertiana hysterica, S. sp. 8. *Wedelii A. N. C. Dec. I. A. II. obs. 193.*
- Hysteria febricosa, S. G. 135. sp. 8. *A. N. C. Dec. I. Ann. II. obs. 193.*
- Tertiana epileptica, S. sp. 16. *Calderae Trib. med. p. 225. Lautter. Histor. med. bienn. Cap. II. cas. 2.*
- Quotid. epileptica, S. sp. 3. *Edinb. Essays, Vol. V. P. II. art. 49.*
- Ecclampsia febricosa, S. G. 133. sp. 17.
- Epilepsia febricosa, S. G. 134. sp. 9.
- Tertiana tetanodes *Medici Beobacht. I. Band. p. 24.*
- Tetanus febricosus, S. G. 122. sp. 10. *Stork, Ann. Med. II. p. 163.*

I. Tertiana efflorescentia cutis stipata.

- Tertiana petechialis, S. sp. 3. *M. Donati, L. III. Cap. 14. Lautter. Hist. Med. cap. II. cas. 10.*
- Tertiana scorbutica, *Wedel. A. N. C. Dec. I. A. II. Obs. 193.*
- Tertiana urticata, S. sp. 22. *Planchon. Journ. de med. 1765. Clegh. Minorc. p. 157.*
- Tertiana miliaris, S. sp. 21. *Walthieri de med. German. apud Roncalli Europ. med. p. 151.*

K. Tertianā phlegmasia ſtipata:

Tertianā pleuritica, S. ſp. 4. *Valeſii* in epid. L. 1.

Seçt. 3 *Lautt.* hiſt. med. cap. II. caſ. 5 9.

Pleuritis periodica, S. G. 103 ſp. 14.

Tertianā arthritica, S. ſp. 5. *Morton.* Exerc. I. cap.

IX. hiſt. 22: *Lautt.* loc. cit. caſ. 19.

4. Variat aliis morbis complicata:

Tertianā ſcorbutica, S. ſp. 9. *Etmuller,* prax. L. I.

Seçt. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. caſ. 15.

Tertianā ſyphilitica, S. ſp. 17. *Deidier* de morb. vener. Seçt. IV.

Tertianā verminofa, S. ſp. 18. *Stiſſer.* in act. Helm-

ſtad. *Lancis* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6.

Illuſt. *Pringle* Diſeaſes of the army, p. 98. *Ra-*

mazzini conſt. epidem. rural. ann. 1690. Seçt.

XI. *Van den Boſch.* Conſt. epid. verminof. ann.

1760, &c.

5. Variat ratione principii *.

* Nullum quidem februm intermittentium prin-
cipium ſufficiens præter miaſma paludum agnoſci-
mus ; ſed, cum miaſma hoc non ſemper validum ſit ad
morbum arceſſendum, niſi aliae poteſtates excitantes

ſimul

Tertiana accidentalis, S. sp. 12. *Sydenham*, cap. 5.

Tertiana a scabie S. sp. 11. *Juncker*, tab. 80. *Hoffm.* II. p. 12.

VEL

II. Interposita remissione tantum *.

Tritaeophya, S. G. 85. *Sag.* p. 695.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea; L. 23.

Tertianae remittentes et continuae *Auctorum*.

Tertianae subintrantes, proportionatae, subcontinuae *Torti Therap. Special. Lib. III. cap. 1.*

simul agere concurrant; has potestates excitantes pro parte principii hic admittimus, licet neutiquam morbum excitassent, si miasma paludum non antea applicatum fuisset.

* Tertianae Remittentes variant adeo, tum typi tum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil fere quod perpetuum sit efferi possit. Tertianas autem, quas comitatas dixit *TORTI*, eas scilicet quae symptomate quodam peculiari et gravi comitantur, recensui; dein, ut caetera ad hanc rem pertinentia intelligantur, auctores plures qui de tertianis remittentibus optime scripserunt, et exempla earum praecipua exhibuerunt, enumeravi.

- Tertiana subcontinua, S. sp. 19.
 Quotidiana deceptiva, S. sp. 2.
 Amphimerina semiquintana, S. sp. 24.
 Tritaeophya deceptiva, S. sp. 10.

Ex tertianis comitatis *Torti* loc. cit. prae-
 cipuae sunt :

- A. Tertiana cholericæ five dysentericæ, *Tort.* ibid.
Lautter, Hist. med. cas. 6. 16. 17. 20. *Morton*,
 App. ad Exerc. II.
- B. Tertiana subcruenta five atrabilaris *Tort.* ibid.
 Haec a *Cleghornio* nunquam visa est.
- C. Tertiana cardiaca *Tort.* ibid. *Lautter*, Hist. med.
 cas. 15. 18. 23.
 Amphimerina cardiaca, S. sp. 5. *.
 Tritaeophya affodes S. sp. 6.
 Febris continua affodes, V. 27.

* Amphimerinas inter et Tritaeophyas, uti inter
 quotidianas et tertianas duplices, distinctio saepe dif-
 ficilis. Sed quotidianas tertianis multo rariores,
 et oeconomiam animale in febres typi tertiani
 maxime proclivem esse norunt experti, hinc plures
 amphimerinas ad tertianas remittentes retuli. Judi-
 cent autem autoptae

D. Tertianā diaphoretica, *Tort. ibid.*

Tritaeophya typhodes, S. sp. 4.

Tritaeophya elodes, S. sp. 5. †.

Febris continua elodes, V. 21.

E. Tertianā syncopalis *Tort. ibid. Lautter, cas. 116*

12. 13. 15. 16.

Tritaeophya syncopalis, S. sp. 1.

Amphimerina syncopalis, S. sp. 4.

Amphimerina humorosa, S. sp. 6.

Febris continua syncopalis, V. 29.

F. Tertianā algida, *Tort. ibid. Lautter, cas. 13.*

Amphimerina epiala, S. sp. 3.

Amphimerina phricodes, S. sp. 7.

Tritaeophya leipyria, S. sp. 9.

Tertianā leipyria, S. sp. 23. *Valcarenghi Med.*

Ration p. 18.

Febris continua epiala et leipyria. V. 19. et 24.

G. Tertianā lethargica, *Tort. ibid.*

Tritaeophya carotica, S. sp. 7. *Lautter, 1. 7. 14.*

Tertianā apoplectica *Morton. Exerc. 1. cap. IX.*

Hist. 25.

Tertianā soporosa *Werlhof. de febr. p. 6.*

Febris epidemica Urbevetana *Lancif. de noxis*

pal. effluv. I. II. c. 3.

† De typo febris sudatoriae *Boyeri Meth. à suivre*
dans les *malad. epidem.* quam huc retulit Sauvage-
fius, ex ipsius Boyeri descriptione mihi non liquet, et
ad typhum referri malle.

Tertianarum remittentium exempla praecipua, nobis nota, sunt sequentia.

Causos Hippocratis. De Morb. Vulg. L. III sect. 3.

Tritaeophya caufus, S. sp. 2.

Febris ardens Boerhaavii, Aph. 738 ?

Tertiana perniciofa, quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis, et mille accidentibus periculofiffimis implicata, existit. Lud. Mercatus de febribus, Lib. VI.

Tertiana pestilens, P. Sal. Diverfus de febre pestilens, cap. X.

Tertiana maligna pestilens Riverii, L. XVII. Sect. II. c. 1. et Sect. III. c. 3.

Morbus Hungaricus Lang. Lemb. L. I. Ep. 4. Sennert. de febr. L. IV. cap. 14. Jordan. de pestis phaen. cap. 19.

Languor Pannonicus Cober. obs. castr. Hung. 1. obs. 6. &c.

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Vide postea, notas ad Typhum.

Hemitritaeus pestilens, Schenck obs. L. VI. ex Corn. Gemma.

Febres pestilentes Aegyptiorum, Alpin. de med. Aegypt. L. 1. cap. 14.

Febris tertiana epidemia, Bartholin. Hist. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumnii ann. 1657 et 1658, Willis de febr. cap. 16.

56 GENERA MORBORUM

- Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664,
et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Morton*. App. ad
Exerc. II.
- Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morb.
acut. ad ann. 1661—1664, et in epist. ad *H. Pa-*
man ad 1678, et seq.
- Affectus epidemicus Leidensis, *Fr. Sylvii* Prax. med.
app. tract. X. et oratio de affectus epidem.
causis.
- Morbus epidemicus Leidensis 1669, *Fanois*, Diff.
apud *Haller*. Disp. tom. V.
- Tertianae perniciosae et pestilentes et febres castren-
ses epidemiae *Lancisi* de nox. palud. effluv.
- Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.*
II. p. 38.
- Febris cholericus minus acuta, *Hoffm.* II. p. 112.
- Febris epidemica Leidens. ann. 1719. *Koker* apud
Haller, Disp. tom. V.
- Amphimerina paludosa, S. sp. 19.
- Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army,
Ed. 4ta, 8vo, p. 179.
- Bononiensis constitutio hiemalis 1729, *Beccari* in
A. N. C. Vol. III Obs. 48.
- Amphimerina biliosa, S. sp. 22.
- Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.
- Febris putrida epidemica, *Huxham* de aëre ad ann.
1729.
- Febris biliosa Lausanensis, *Cl. Tissot*. de febr. bilios.

Tritaeophya Wratiflaviensis, S. sp. 3. *Hahn.* Epidemia verna Wratiflav. in app. ad A. N. C. vol. X.

Tritaeophya Americana, S. sp. 12 ?

Febris anomala Batava, *Grainger* de febr. anomala:

Morb. Naronianus *Pujati* de morb. Naron.

Febris continua remittens, *Hillary's* Dif. of Barbadoes.

Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind.* Med. Edin. Diff. Inaug. 1768.

Febris critica et febr. biliosa aestatis, *Roupe* de morb. navig:

Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind.* Med. Haflar. Essay on the diseases of hot climates.

Tertiana remittens fymptomatica est.

Tritaeophya lactea, S. sp. 8.

Febris lactea, *Etmulleri* Coll. consult. cas. 57.

G. II. Q U A R T A N A.

Paroxyfmi fimiles intervallo feptuaginta duarum circiter horarum : Accessionibus pomeridianis.

58 GENERA MORBORUM

Quartana *Auctorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Sag.* 711.
Hoffm. II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Est vel,

I. Interposita apyrexia.

1. Variat typo.

A. Quartana paroxyfmis quarto quoque
die singulis ; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. sp. 1. *Sydenham* de morb.
acut. cap. V.

B. Quartana paroxyfmis quarto quoque
die binis ; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. sp. 4. *Bonet.*

C. Quartana paroxyfmis quarto quoque
die tribus ; intermediis diebus nul-
lis.

Quartana triplicata, S. sp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus ter-
tium tantum a febre vacuum habet,

paroxyfmis quarto quoque die fimilibus.

Quartana duplex, S. fp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxyfmis quarto quoque die fimilibus.

Quartana triplex, S. fp. 5. V. 14. *Barthol. H. anat. c. 1. 95.*

2. Variat fympptomatibus.

Quartana cataleptica, S. fp. 7. *Bonet. Polyalth. vol. 1. p. 805.*

Quartana comatofa, S. fp. 15. *Werthof. de febr. C. Pifonis Obferv. de morbis a colluvie ferof. obf. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.*

Quartana epileptica, S. fp. 8. *Scholzii Conf. 379. 380.*

Quartana hystERICA, S. fp. 10. *Morton. Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.*

Quartana nephralgica, S. fp. 9.

Quartana metaftatica, S. fp. 17.

Quartana amens, S. fp. 12. *Sydenham de morb. acut. cap. V.*

Quartana fplenetica, S. fp. 2. *Etmuller. Coll. confult. caf. 25.*

3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana syphilitica, S. sp. 6. *Plateri* obs. L. III.
p. 676. *Edinb. Eff.* art. XLVII. obs. 8.

Quartana arthritica, S. sp. 11. *Musgr.* de arthr.
fympt. cap. IX. II. 4 et 5.

Arthritis febrifequa, S. sp. 10.

Arthritis febricosa, S. sp. 10. *Werlhof.* de
febr. *Cockburn* de morbis navigantium, obs.
19.

Quartana scorbutica, S. sp. 14. *Barthol.* de med.
Dan. diff. IV. *Tim.* L. VIII. cas. 18.

VEL

II. Interposita remissione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. *Sag.* 699. L. 22.

Quartana remittens *Auētorum.*

Varietates sunt,

Tetartophya simplex, S. sp. 1. *

* Quartanam continuam morbum rarissimum
esse, testantur scriptores medici omnes; sed illius ex-
emplum ex *Franc. Joelis* operum tomo 3. citat.
SAUVV. In loco autem citato, nihil ad rem pertinens
inveni; sed tomi quinti pag. 63. haec verba profe-
runtur,

Amphimerina femiquartana, S. sp. 23.

Tetartophya femitertiana, S. sp. 5.

Tetartophya maligna, S. sp. 6. *Lautter. Hist. med. cas. 21. M. Donat. L. III. cap. 14. ex M. Gatendaria. Horst. L. 1. obs. 15.*

Tetartophya carotica, S. sp. 4. *Werlhof. de febr. Bianchi Hist. hep. pars III. const. ann. 1718. p. 751.*

Tetartophya splenalgica, S. sp. 2. *

runtur. Febris quartanae “ Species veteres duas constituunt. *Quartanam continuam*, (quae mihi septuagenario nunquam visa est, et ideo eam aut rarissimam aut nullam esse judico), et *Interpolatam*, quae frequentissima est.

* Huc febrem Fernelianam *Raym. Fortis* refert SAUV. et vult febrem ita a *Forte* dictam fuisse, quod ea mortuus sit ipse Fernelius: Sed quodammodo hic errasse SAUVAGESIUS mihi videtur. Nam febres quaedam Fernelianas vocat Fortis, Tom. II. cent. II. obs. 35. et 36. non quod e genere remittentium fuerint, sed quod visceris cujusdam, hepatis praesertim, labe comitatae sint; et mortuus quidem est Fernelius ex inflammatione lienis. Sed quod hic morbus quartanae typum unquam exhibuit, non dicitur a *Plantio*, qui in vita Fernelii, operibus ejus praefixa, de eo morbo narrat.

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. *Car. Pis.* in
 praefat. p. 33.

Amphimerina spasmodica, S. sp. 16.

E R R A T I C Æ.

Ad Tertianam vel Quartanam ERRATICAS
 S. pertinere putamus*; et hic ideo earum
 varietates subjunximus.

Erratica quintana, S. sp. 1. *Tulp.* L. III. 52.
Forest. L. III. obs. 43. ex quartana ill. *Van*
Swieten, Comm. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. *Boerb.* apud ill. *Van*
Swieten ibid. *M. Don.* L. 3. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto*.

Septimana, ill. *Morgag.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. sp. 3. *Etmuller* prax. L. I.
 Sect. XV. cap. 2. *Cyrilli* in *Etmuller*, p. 187.
 188. 365. *Valles* Controv. L. V. c. 25. *P. Sal.*
Div. in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII.
Zacut. *Luf.* P. M. L. III. obs. 34. *Schult-*
zius in E. N. C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70.
Arnold. de febr. Stomach. epid. § IV. apud
Haller. Diff. Praet. Vol. V. *De Haen* de divis.
 febr. div. iv. p. 9.

* Vide Senacum de recondita febrium natura,
 L. I. Cap. 1.

Hemicrania lunatica, S. sp. 10.

Erratica nonana, S. sp. 4. *Zac. Luf. ibid.*

Erratica decimana, S. sp. 5. *Zac. Luf. ibid.*

Ephemera dichomene, S. sp. 11. *M. Don. L. III.*
14. ex *Gentili.*

Erratica vaga, S. sp. 6. *River. cent. III. obs. 32.*
Etmuller, L. I. S. XV. c. 2.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum : Paroxyfmis matutinis.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1.
Hoffm. II. 33. Junck. tab. 79.

I. Interposita apyrexia.

1. Variat folitaria.

A. Universalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana simplex, S. sp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert de febr. cap. 18.*

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. sp. 10. *Cnoffel. E. N. C.*
D. I. A. III. obs. 205. *Edinb. Med. Eff.* vol. I.
art. 31. vol. II. art. 19.

Quotidiana cephalalgica, S. sp. 6. *Morton Pyret.*
exerc. I. Hist. 27. *Van Swieten in Boerb.* p.
534.

Cephalalgia intermittens, S. sp. 7.

Cephalaea febricosa, S. sp. 4.

Quotidiana ophthalmica, *Morton*, *ibid.* hist. 17.
Van Swiet. *ibid.*

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

2. Variat comitata.

Quotidiana ischiadica, S. sp. 5. *Edinb. Eff.* vol.
V. art. 49.

Ifchias intermittens, S. sp. 1.

Quotidiana nephralgica, S. sp. 7. *Morton*, *ibid.*
hist. 28.

Nephralgia febricosa, S. sp. 13.

Quotidiana uretico-sputatoria, *B. Scharf. E. N.*
C. D. II. A. II. obs. 104.

Quotidiana epileptica, S. sp. 4. *Edinb. Eff.* loc.
cit.

Hysteralgia febricosa, S. sp. 9.

Vespertinae vel symptomatice videntur frequentes.

- Quotidiana hysterica, S. sp. 3.
- Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.
- Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

II. Interposita remissione tantum.

- Amphimerina, S. G. 84. L. 20.
- Quotidiana continua, V. 15.
- Quotidianae remittentes et continuæ *Auctorum.*
- Amphimerina latica, S. sp. 1.
- Febris continua lymphatica, *Etmuller Coll. conf. cas. 32. River. obs. cent. I. obs. 57.*
- Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.
- Febris continua Lyngodes, V. 26.

Amphimerinae S. caeterae vel ad tertianas pertinere, quorsum plures supra retuli, vel symptomatice et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

- Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.
- Amphimerina anginosa, S. sp. 12.
- Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.
- Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De Amphimerina mimosa *Bontii* et phrenitica
ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

SECT. II. CONTINUÆ*.

Febres, sine intermissione, nec miasmate

* *Quae sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perseverat, Febrem Continuum esse, dixit SAUVAGESIUS; et hujusmodi febres, cum scholis medicis plerisque, Continentes vocat LINNAEUS. Hujusmodi autem febrem in quadraginta annorum praxi fatis frequenti, vix unquam certo vidi, et fere semper in febribus, maxime continuis, exacerbationes et remissiones, etiam quotidie, fatis manifestas observavi. Mecum quidem sentire videtur VOGELIUS, uti ex ejus continuarum caractere fatis patebit; nec dissentit expertissimus DE HAEN, uti videre est in libro ejus de divisione februm, Divis. IV. Schol. I.; et apprime sententiam nostram confirmat BRENDELIUS, verbis sequentibus: " Omnes namque febres nostrae, acutae, et inflammatoriae, et exanthematicae, et malignae, reliquaeve hujus generis, sunt continuae remittentes, et*
lucu-

paludum ortae, sed cum remissionibus et exacerbationibus, parum licet notabilibus, persistentes: Paroxyfmis quovis die binis*.

luculenta intensio- rum remissionumque spatia integrant. Brendel. Opuscul. P. II. Diff. XI. sect. 5.

Porro, etsi in febribus quibusdam exacerbationes et remissiones parum notabiles, et perinde observatu difficiles sint, easdem tamen revera fieri censeo; et ob hoc praesertim, quod in febribus quibuscunque, ex paroxyfmis pluribus manifesto constantibus, paroxyfmus quisque, inter nycthemerae spatium, cursum suum, ex exacerbatione et remissione constantem, semper absolvat, ita ut in his rebus oeconomiam animalem circuitus diurni legi cuidam subjici videatur. Huic etiam in sanitate parere solet, et huic in febribus hecticis quibusque ad amissim subjicitur. Verisimillimum itaque videtur, eundem circuitum, quem toties observavimus, in febribus quibuscunque locum habere; nec febrem quamcunque continenter revera in rerum natura dari.

* Cum continuam quamque ex paroxyfmis repetitis consistere ponimus, saepe ambiguum fieri possit,

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Sag.*
666. *Boerb.* 727.

Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stabl.* Caf. magn.
35. Caf. min. 87. *Junk.* 58. *Sennert.* de
febr. L. II. cap. 2. et 10.

possit, utrum febris data ex continuarum sit, an ex remittentium ordine, et ut rite determinetur, tum intermittentium, ad quas omnes auctorum remittentes pertinere putamus, tum continuarum, definitionem aliam quam antea nunc dedi. In plerisque casibus, ut opinor, definitiones nunc datae satis facile et certo adhiberi possint. Sed sagacioribus quibusvis examinandum relinquo, an vel definitiones nostrae recte dentur, vel si quid rectius dari queat. Febrem quamque continuam ex paroxysmis quovis die binis constare credimus; cum autem in quibusdam, tum intermittentibus tum remittentibus, itidem paroxysmi duplicati videantur, ex illa nota sola febres continuae dignosci non possunt. Ex illa nota sola quidem ut dignoscantur nequaquam volui; nam in casu quovis ambiguo, vel a principio, vel a typo, vel ortu ab intermittentibus, remittentem quamvis cognosci posse puto. Videant porro in his rebus versati, annon a principio, saepe manifesto et maxime frequenti, contagione nimirum humana, febres continuae saepe certe cognosci possint.

G. IV. S Y N O C H A*.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

* Februm continuarum divisio, a GALENI temporibus, in hunc usque diem, eadem fere usitata est, et vel ex putredinis gradu parum accurate definito, vel ex duratione morbi, desumpta fuit; utraque tamen nota, posterior praesertim, qua praecipue usi sunt Nosologi SAUVAGESIUS, LINNÆUS, et SAGARUS, manifesto inepta est. Vide *Prolegomena*, pag. XXV. et pag. XXXIII. et XXXIV. Aliam itaque divisionem a differentia symptomatum, et a natura morborum, quantum de ea judicare liceat, desumptam, institui; secutus simul illam apud Britannos nunc maxime usitatam divisionem februm continuarum in *Inflammatorias* et *Nervosas*. Has autem appellationes, utpote quodammodo theoreticas, vitavi. Nomina quibus usus sum apud medicos dudum recepta sunt; et si forsitan sensu vulgo recepto, in quo medici ipsi parum constantes fuerunt, iis non usus sum, parum curo, dum definitiones subjunctae ab errore quovis praecavere possint.

70 GENERA MORBORUM

Synocha, S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.

Synocha, five febris acuta fanguinea, *Hoffm.* II:

105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, *Boerb.* 729.

Ephemera, S. G. 79. *Boerb.* 728. *Junck.* 57.

Diaria, L. 11.

Febris inflammatoria *Auctorum.*

Varietates sunt,

Synocha plethorica, S. sp. 1.

Synocha fanguinea, *Sennert.* de febr. L. II.

cap. II.

Ephemera plethorica, S. sp. 1.

Ephemera a frigore, S. sp. 3.

Ephemera a calore, S. sp. 4.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Febris pleuritica *Ann.* 1765. *Sydenh.* sect. V.

c. 1. 5.

Synochus rheumatifans, S. sp. 7. *Sydenh.* sect. V.

c. 2.

Synochus hiemalis, S. sp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad tractat. de hydrope.

Symptomaticae sunt,

Ephemera naufeativa, S. sp. 2.

Ephemera a phlogosi, &c. S. sp. 6.

- Synocha dolorum, S. sp. 7.
 Ephemera lactea, S. sp. 5.
 Ephemera menstrua, S. sp. 8.
 Synocha catarrhalis, S. sp. 5.
 Synocha scorbutica, S. sp. 6.
 Synochus scorbutica, S. sp. 13.
 Synocha cephalalgica, S. sp. 8.

G. V. TYPHUS.

Morbus contagiosus ; calor parum auctus ; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens ; urina parum mutata ; sensorii functiones plurimum turbatae ; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82. *Sag.* 677.

Species sunt,

1. Typhus plerumque cum petechiis.

Variat gradu *.

* Morbos gradu solum differentes nominibus diversis insignire nequaquam convenit; cum autem
 nuperis

1. Typhus mitior.

Febris maligna hectica sive lues *νευραδης* convulsiva,
Willis de morb. convulsiv. cap. 8. *

nuperis temporibus apud medicos usitatum sit, febrem quandam, quasi ab aliis quibusvis differentem, nomine Febris *Nervosae* appellare; huic opinioni quodammodo morem gerens, sub titulo *Typhi mitioris*, variorum auctorum febres ad recentiorum nervosas aliquomodo referendas recensui. In hac re autem, cum limites neutiquam accurate ponendi sunt, me accuratum fuisse non dixerim.

Minus adhuc placuit, ad mentem vel veterum vel recentiorum inter febrium genera aliquod sub nomine Febris *Putridae* recensere. In omni *typho* humorum in putredinem proclivitatem adesse puto; sed vario tantum gradu adest, ita ut major minorve putredo speciem variare, nequaquam mutare, potest. Sufficiat sub titulo *Typhi gravioris* eas, quae praesertim putridae adpellatae sunt, febres indigitasse, uti ex apposis variorum auctorum appellationibus satis patebit.

* Hoc est exemplum, ni fallor, primum appellationis *νευραδης*, vel nervosae, febribus quibusvis datae; quam

Febris pestilens *Fracaſtor.* de morb. contag. L.
II. cap. 4.

Febris pestilens sine charactere veneni *Foreſt.* L.
VI. obſ. 26.

Febris hecetica pestilens *Foreſt.* L. VI. obſ. 32.

Febris nova ann. 1685. *Sydenham.* Sched. moni-
tor.

Febris putrida nervosa *Wintringh.* Comm. Noſo-
log. ad ann. 1720, 1721.

Febris lenta nervosa. *Huxham* on fevers, chap.
8.

Febris contagiosa. *Lind* on fevers and infection
paſſim.

Typhus nervosus, S. sp. 2.

Typhus comatosus, S. sp. 3.

Tritaeophya typhodes *Mangeti,* S. sp. 11. *Raym.*
Fort. de febribus, p. 24.

2. Typhus gravior.

Febris pestilens, *P. Sal. Diverſ.* de febre pesti-
lenti.

quam protinus Angli, non tamen niſi nuper admo-
dum aliarum regionum medici, uſurpati ſunt.

Febris pestilens Ægyptiorum *Alpin.* de med. Ægypt. L. I. cap. 14.

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Febris pestilens maligna *Sennert.* de febris, L. IV. cap. 10.

Febris maligna pestilens *River.* L. XVII. sect. III. cap. 1.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. *Willis,* de febris, cap. 14.

Typhus carcerum, S. sp. 1.

Febris nautica pestilentialis *Huxham* de aëre ad ann. 1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, *Huxham* de aëre ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum et nosocomiorum. Ill. *Pringle,* Diseases of the army, p. 294. Ill. *Van Swieten,* Maladies des armées, p. 136.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant *Henr. Maii* et *A. Ph. Koph.* Dif. apud *Hallerum,* tom. V.

Febris Hungarica sive castrensis *Juncker.* 74. et *plurium Auctorum* *.

* Morbum sive febrem Hungaricam ad tertianas remittentes, cum SAUVAGESIO et Ill. PRINGLE, supra

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742 *Scrinci*. Diff. apud *Haller*. tom. V.

Febris petechialis, *Sennert*. L. IV. cap. 13. *River*. prax. L. XVII. sect. III. cap. I. *Hoffm*. II. p. 84. *Juncker*. 73. *Huxham* on fevers, chap. 8. *Ludwig*. Infl. med. clin. No. 146. *Schreiber* von erkenntness, und cur der Krank heiten. p. 126. *Monro*, Diseases of military hospitals, p. 1.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Juncker* 72. *Hoffm*. II. 75. *Eller* de cogn. et cur. morb. Sect VI.

Exempla febrium petechialium sunt sequentia.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant, *Fracastorius* de morb. contag. L. II. cap. 6.

supra retuli; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit; sed simul constat febrem in castris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse, (*Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quæst. 39.*), et plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibusvis saepe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.

- Febris peticularis Tridenti, ann. 1591. *Roboretus*,
de febr. peticul.
- Febris petechialis epidemica Coloniae ann. 1672.
Donckers, Idea febris petechialis.
- Febris petechialis epidemica, Pofonii 1683, *C. F.*
Loeu in App. ad A. N. C. Vol. II.
- Febris petechialis epidemica Mutinae, 1692.
Ramazzeni. Const. Mutinensis, Oper. pag. 187.
- Febris maligna petechizans, ann. 1698. *Hoffm.*
II. p. 80.
- Febris petechialis Wratislaviae, ann. 1699. *Hel-*
wich, Ephem. Germ. D. III. A. VII. et VIII.
obs. 132. p. 616.
- Febris epidemia Lipsiae 1718. *M. Adolph.* A.
N. C. III. Obs. 131. p. 296.
- Febris endemica et epidemica Corcagiensis, ann.
1708, 1718, et seq. *Rogers*, Essay on epidemic
diseases.
- Febris continua epidemica Corcagiensis ann. 1719.
et seq. *M. o Connel* Observ. de morbis.
- Febris petechialis epidemica, Cremonae 1734.
Valcharengki Med. ration. Sect. III.
- Febris petechizans Petropoli 1735, *Weitbrecht.*
Diff. apud Haller. tom. V.
- Febris petechialis, ann. 1740, 1741, in Hassia,
Ritter. A. N. C. vol. VII. obs. 4.

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. *Furstenau*. A. N. C. Vol. VII. obs. 5.

Febris petechialis epidemica Silesiae 1741 et seq. *Brandhorst*. Diss. apud *Haller*. tom. V.

Febris petechialis epidemica Viennae 1757, *Hafenobrl*. Hist. med. cap. 2.

Febris petechialis epidemica Lipsiae 1757. *Ludwig*. Adversar. tom. I. pars 1.

Febris petechialis epidemica variis Germaniae locis ab ann. 1755 ad 1761. *Strack* de morbo cum petechiis.

II. Typhus cum flavedine cutis.

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiae Occidentalis *Warren*. Malignant Fever of Barbadoes. *Hillary's* Diseases of Barbadoes. *Linning* on the Yellow Fever of South Carolina. *Edinb.* Phys. Litter. Essays, Vol. II. *Mackittrick* de febre flava Indiae Occidentalis, *Edinb.* 1766.

Typhi etiam species esse videtur

Ephemera fudatoria, S. sp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius* de ephem. Brit.

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronofus, *Forefl.* L. VI. obf. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris sudatoria, S. fp. e.

Febris sudatoria, *Le Svette Gallorum, Meyferey*
Meth. ailé, &c. *Ejusd.* Maladies des Armées
250. *Boyer* Methode a fuivre dans les mala-
dies epidemiques ?

De Typho hystérico verminoso, S. fp. 4.

Typho exhaustorum, S. fp. 8.

Typho a manipuera, S. fp. 9.

Nobis non liquet.

G. VI. SYNOCHUS*.

Morbus contagiosus. Febris ex syno-
cha et typho composita, initio syno-
cha, progressu et versus finem ty-
phus.

Synochus, S. G. 81. L. 13.

Lenta L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, *Boerb.* 730.

* Cum plures febres nec inflammatoriae nec
nervosae ex omni parte sint, neque idcirco vel ad

Sy-

Varietates ex Sauvagesio sunt.

Synochus sanguinea, S. sp. 1.

Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh. de morb. acut.*

Synochus sudatoria, S. sp. 2.

Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667. *Sydenh. ibid.*

Synochus soporosa, S. sp. 12.

Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenh. ibid.*

Febris continua putrida annor. variorum. *Wintringham Com. nosologicum.*

Synochus ardens, S. sp. 6.

Synochus miliaris, S. sp. 14.

Synocha miliaris, S. sp. 6.

Synocham vel ad Typhum facile referendae; genus Synochi, cujus typus hisce regionibus frequens conspicitur, hic inferui. Inter Typhum tamen et Synochum limites accuratos ponere non possum; et an revera pro diversis generibus habenda, vel positis diversis, utri eorum Synonyma auctorum referenda, sunt, dubito. Quae vero hic subjunguntur, a SAUVAGESIO species dictae, ad Synochum fatis recte, ut mihi videtur, referri possunt.

80 GENERA MORBORUM

De synocho variolode, S. sp. 3. et

Synocha dysfenteriode, S. sp. 4.

Nobis non fatis liquet, et minus adhuc de

Synocho anniversaria, S. sp. 9.

Synocho spermatica, S. sp. 10.

Synocho tarantata, S. sp. 11.

Complicata est

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Et symptomatica est

Synochus a scabie, S. sp. 15.

H E C T I C A.

Febris quotidie revertens ; accessibus
meridianis et vespertinis ; remissione,
rarius apyrexia, matutina ; plerumque
sudoribus nocturnis, et urina sedimen-
tum furfuraceo-lateritium deponente *.

Hæctica, S. G. 83. L. 24. V. 80. Sag. 684.

* Cum febrium in numerum, hæcticam receperint
Nosologi omnes, eam etiam cum charactere hic
apponendam duxi. Ejusmodi autem febrem, cum
nun-

Ex Sauvagesio species sunt,

Hæctica chlorotica, S. sp. 3.

Hæctica syphilitica, S. sp. 4.

Hæctica scrophulosa, S. sp. 5.

Hæctica a calculis, S. sp. 6.

Hæctica hydropum, S. sp. 7.

Hæctica verminosa, S. sp. 9.

Hæctica cachectarum, S. sp. 10.

Hæctica fluxuum, S. sp. 11.

Hæctica infantilis, S. sp. 1. Characterē caret, et nobis vel rachitica, vel scrophulosa, vel verminosa videtur.

Hæctica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo haberi potest.

De hæctica lymphatica, *Baglivi* S. sp. 12. et

Hæctica nervea, *Cl. Lorry*, S. sp. 13.

Nobis non liquet.

nunquam nisi symptomaticam observaverim, in numerum idiopathicarum, quas solas enumerare licet, admittere nolui. In plerisque exemplis, hæcticam revera symptomaticam esse, ex SAUVAGESII speciebus, quas vocat, hic recensitis, satis manifestum fiet. Vide ipsius SAUVAGESII Scholium. Tom. I. pag. 319.

L

O. II. P H L E G M A S I Æ.

Febris fynocha ; phlogosis ; vel dolor topicus, simul laesa partis internae functione ; sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

Phlegmasiae membranosae et parenchymatosae,
S. Cl. III. O. I. II. *Sag.* 605. *.

* Haec phlegmasiarum in membranosas et parenchymatosas divisio prorsus inepta est ; primo enim, quod de statu partium internarum statuit, de quo in Nosologia statuere non licet ; dein, quod partes membranosae et parenchymatosae non satis certo distinguuntur, et hinc Metritis, quam inter membranosas recenset SAUVAGESIUS, a LINNAEO et SAGARO inter parenchymatosas collocatur ; denique, quod phlegmasiae quaedam, ut hepatitis, vel membranosae vel parenchymatosae esse possunt.

Nec magis idonea est ordinis phlegmasiarum musculosarum apud LINNAEUM et SAGARUM institutio,

Morbi febriles phlogistici, L. Cl. III.

Febres continuæ compositæ inflammatoriae, V.

Morbi acuti febriles, *Boerb.* 770.

Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

G. VII. P H L O G O S I S *.

Pyrexia, partis externæ rubor, calor, et
tensio dolens:

Species sunt,

I. Phlogosis (*Phlegmone*) rubore vivido ;
tumore circumscripto, in fastigium
plerumque elevato, sæpe in apostema
abeunte ; dolore sæpe pulsatili.

Phlegmone Auctorum, S. G. 15. L. 39. V. 351.

tutio, in qua neuter quidem satis accuratus est.
Male enim phlegmone a LINNÆO musculosa dici-
tur, nec bene Cynanche plerumque membranosa, ra-
rius musculosa, a SAGARÓ ad musculosas in univer-
sum refertur.

* Pro nomine generis cujus species est Erythema,
minus recte in priore editione usurpatum fuit phleg-
mone. Novum nomen necessarium nobis videba-
tur, et nihil aptius quam Phlogosis suppetebat.

Inflammatiò, L. 231. *Boerb.* 370. *Junck.* 20.

1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352.

Terminthus, V. 381.

Papulà, L. 275. S. p. 6.

Varus, V. 436. L. 269. S. p. 7.

Bacchia, L. 270.

Gutta rosea, S. G. 4.

Gutta rofacea, V. 437.

2. Variat sede*.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.

Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148.

Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.

Parulis, V. 362.

Mastodynia, S. G. 210. V. 153.

Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.

Aithrocace, S. G. 78. L. 256.

Paedarthrocace, V. 419.

Spina ventosa, *Boerb.* 526.

Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

* An sequentes pro totidem speciebus recenseri possint, judicent peritiores.

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. G. 214.

Clunisia, V. 167.

II. Phlogosis (*Erythema*) colore rubicundo, pressione evanescente; ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctae-
nas vel vesiculas abeunte; dolore u-
rente.

Erythema, S. G. 11.

Erysipelas *Auctorum*, V. 343.

Hieropyr, N. 344.

2. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353.

Carbo et carbunculus *Auctorum*.

Erythemā gangraenosum, S. sp. 7.

2. Variat causa remota.

Erythema a frigore.

Erythema pernio, S. sp. 4.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema ambustio, S. sp. 2.

Erysipelas ambustio, S. sp. 4.

Combustura, L. 245.

Combustio, *Boerb.* 476.

Encaufis, V. 347.

Erythema ab acri alieno applicato,

Erysipelas Chinense, S. sp. 7.

Erythema ab acri inquilino,

Erythema intertrigo, S. sp. 5.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema a compressione,

Erythema paratrima, S. sp. 6.

Erythema a punctura, S. sp. 9.

Erysipelas a vespis, S. sp. 19.

Pfydracia a vespis, S. sp. 2.

3. Variat complicata.

Erythema cum phlegmone,

Erysipelas phlegmonodes *Auctorum.*

Erythema cum oedemate,

Erysipelas symptomaticum, S. sp. 6.

Phlogosis sequelae sunt,

A P O S T E M A.

Post phlogosin, remittentibus dolore et

pulfatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

Apostema, S. G. 39. *Sag.* 55.

Abcessus, L. 132. V. 354. *Boerb.* 387. 402.

Pustula, L. 274.

G A N G R Æ N A.

Post phlogosin, pars livens, mollis, parum sensibilis, saepe cum vesiculis ichorosis.

Gangraena, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Sag.* 203. *Boerb.* 388. 419.

S P H A C E L U S.

Post gangraenam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum foetore carnis putridae; vitio celeriter serpente.

Sphacelus, L. 234. V. 328. *Boerb.* 419. 457.

G. VIII. O P H T H A L M I A.

Rubor et dolor oculi ; lucis intolerantia ;
plerumque cum lachrymatione.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Sag.* 231.

Junck. 24.

Chemosis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammati oculorum, *Hoffm.* II. 165.

Ophthalmiae species et varietates sunt,

I. Idiopathicae.

I. Ophthalmia (*membranarum*) in tunica
adnata, et ei subjacentibus membranis,
sive tunicis oculi.

A. Variat gradu phlogosis externae.

Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.

Ophthalmia humida, S. sp. 8.

Ophthalmia chemosis, S. sp. 12.

Ophthalmia Erysipelatosa, S. sp. 7.

Ophthalmia pustulosa, S. sp. 6.

Ophthalmia phlyctænodes, S. sp. 21.

B. Variat affectis tunicis internis.

Ophthalmia choroideae, S. sp. 13.

Ophthalmia tenebricosa, S. sp. 10.

2. Ophthalmia (*Tarsi*) cum tumore, erosionem, et exudationem glutinosam tarsi palpebrarum.

Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.

Ophthalmia sicca, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipsius oculi.

Ophthalmia angularis, S. sp. 14.

Ophthalmia tuberculosa, S. sp. 3.

Ophthalmia trichiasis, S. sp. 2.

Ophthalmia cancrosa, S. sp. 15.

Ophthalmia a synechia, S. sp. 16.

Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.

Ophthalmia ab elcomate, S. sp. 18.

Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.

Ophthalmia a corneae fistula, S. sp. 20.

Ophthalmia uveae, S. sp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metastatica, S. sp. 24.

Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.

Ophthalmia syphilitica, S. sp. 11.

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia vehemens ; dolor capitis ; rubor faciei et oculorum ; lucis et soni intolerantia ; pervigilium ; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. C. 101. L. 25. *Sag. G. 301. Boerb.*

771. *Hoffm. II. 131. Junck. 63.*

Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. G. 109. *Sag. G. 310. **

* Cum symptomata nulla dentur quae semper phlegmasiam cerebri a phlegmasia membranarum ejus, sive meningum, certo distinguere possint ; neque sectiones cadaverum distinctiones a SAUVAGESIO, LINNAEO, et SAGARO, adhibitas confirment ;

Cepha-

Sphacelismus, L. 32.

Siriafis, V. 34.

Phrenitidis idiopathicae speciem unicam hic ponere licet, et cujus synonyma sequentia esse putamus.

Phrenitis vera, S. sp. 1. *Boerh.* 771.

Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.

Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.

Cephalitis spontanea, S. sp. 3.

Cephalitis siriafis, S. sp. 4.

Siriafis, V. 34.

Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

II. Phrenitides Symptomaticae sunt,

Phrenitis synochi pleuriticae, S. sp. 2.

Phrenitis synochi fanguineae, S. sp. 4.

Cephalitidem, S. G. 109. *Sag.* G. 310. et *Sphacelismum*, L. 32. pro generibus a *phrenitide* diversis admittere nolui, et ea hic ideo, uti synonyma, sub titulo Phrenitidis, posui.

Recte monet VOGELIUS signa phrenitidis, vel ut vocat phrenismi, hoc est, inflammationis cerebri aut membranarum ejus, admodum ambigua esse.

92 GENERA MORBORUM

Phrenitis calentura, S. sp. 11.

Phrenitis Indica, sp. 12.

Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.

Cephalitis epidemica, ann. 1510, S. sp. 6.

Cephalitis verminosa, S. sp. 7.

Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.

Phrenitis variolosa, S. sp. 5.

Phrenitis morbillosa, S. sp. 6.

Phrenitis a plica, S. sp. 8.

Phrenitis aphrodisiaca, S. sp. 9.

Phrenitis a tarantismo, S. sp. 14.

Phrenitis hydrophobica, S. sp. 15.

Phrenitis a dolore, S. sp. 13.

Cephalitis traumatica, S. sp. 2.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes ; rubor et dolor faucium ; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Cynanche, S. G. 110. L. 33. Sag. G. 300.

Angina, V. 49. *Hoffm.* II. 125. *Junck.* 30.
 Angina inflammatoria, *Boerb.* 798.

Species sunt,

I. Cynanche (*tonsillaris*) membranam
 faucium mucosam, et praecipue
 tonsillas, tumore et rubore affici-
 ens, cum febre synocha.

Cynanche tonsillaris, S. sp. 1.
 Anginae inflammatoriae, sp. 5. *Boerb.* 805.

II. Cynanche (*maligna*) tonsillas et
 membranam faucium mucosam af-
 ficiens tumore, rubore, et crustis
 mucosis coloris albescentis vel ci-
 neritii, serpentibus, et ulcera te-
 gentibus ; cum febre typhode et
 exanthematis.

Cynanche maligna, S. sp. 3.
 Cynanche ulcerosa, S. Var. a. *Journ. de Med.*
 1758.
 Cynanche gangraenosa, S. Var. b. *Journ. de*
med. 1756.

Ulcera faucium et gutturis anginosa et lethalia.
 Hispanis *Garrotillo*, *Lud. Mercat.* consult. 24.

Angina ulcerosa, Cl. *Fothergill*, Account of the ulcerous fore throat Edit. 1751, *Huxham* on the malignant ulcerous fore throat, from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, *Douglas* Practical history, Boston 1736.

Angina epidemica, *Ruffel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenosa, *Withering's* Diff. Inaug. Edinb. 1766.

Angina suffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York, 1771.

Angina maligna, *Johnstone* on the malignant angina, &c. Worcester 1779.

III. Cynanche (*trachealis*) respiratio-
one difficili, inspiratione strepente,
voce rauca, tussi clangosa, tumore
fere nullo in faucibus apparente,
deglutitione parum difficili, et fe-
bre fynocha.

Cynanche trachealis, S. sp. 5.

Cynanche laryngea *Auclorum*, *Eller.* de cogn. et curand. morb. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 1. *Boerb.* 801.

Angina latens et difficilis, *Dodon.* obs. 18.

Angina interna, *Tulp.* L. 1. obs. 51.

Angina pernicioſa, *Greg. Horſt.* Obſerv. L. III.
obſ. 1.

N. An haec Sauvageſii ſynonyma et ſequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti ; ſequentia autem ad morbum characteris dati manifeſto pertinere videntur.

Suffocatio ſtridula, *Scotiſ* the CROUP. *Cl. Home* on the Croup.

Aſthma infantum, *Millar* on the aſthma and chincough.

Aſthma infantum ſpaſmodicum, *Ruſh*, Diſſertation, London 1770.

Cynanche ſtridula, *Crauford*, Diſſ. Inaug. Edinb. 1771.

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy* apud *Rutty's* hiſtory of the weather.

Morbus ſtrangulatorius, *Starr*, *Phil. Tranſ.* No. 495.*.

* An hic morbus ad cynanchen malignam, an ad trachealem pertinet, mihi non certo conſtat, et faepius de eorundem morborum apud plures auctores deſcriptionibus itidem incertus ſum.

Morbus truculentus infantum, *Francof.* ad Viadrum et in vicinia grassans, ann. 1758. C. a Bergen. A. nova. N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Ruffel*, *Oecon. nat.* p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadenfis, ann. 1758. *Hilary's Barbadoes*, p. 134.

Angina polypofa, five membranacea *Michaelis*, Argentorati 1778, et *Auctores* ab ingeniofo et erudito *Michaele* allegati.

IV. Cynanche cum rubore in imis praefertim faucibus ; deglutitione maxime difficili, dolentiffima ; refpiratione fatis commoda, et febre fynocha.

Cynanche pharyngea, S. fp. 6. *Eller* de cogn. et cur. fect. 7.

Anginae inflammatoriae, fp. 4ta, *Boerb.* 804.

V. Cynanche cum tumore externo parotidum et maxillarum glandularum magno ; refpiratione et deglutitione parum laefis ; febre fynocha plerumque leni.

Cynanche parotidæa, S. sp. 14. Gallis OREIL-
LONS et OURLES, *Tiffot Avis au peuple*, No.
116. *Encyclopedie*, au mot OREILLONS.

Angina externa, ANGLIS the MUMPS, *Ruffel*,
Oecon. natur. p. 114. SCOTIS, the BRANKS.

Catarrhus Bellinfulanus, S. sp. 4.

Offervazioni di *Girol. Gaspari*, Venez. 1731.

Offervazioni di Targ. Tozzetti, Racolta ima,
p. 176.

Cynanche purpuro-parotidæa, S. sp. 15.
vel ad malignam, S. sp. 3. vel ad Scar-
latinam pertinere videtur.

Cynanchæ symptomaticeæ sunt,

a. A causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Febris anginosa, *Huxham* de aëre.

Cynanche prunella, S. sp. 12.

Cynanche exanthematica, S. sp. 4.

Cynanche arthritica, S. sp. 10.

Cynanche hepatica, S. sp. 8.

Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

b. A causis externis.

Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.

Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

Cynanche thymica, S. sp. 7. raro inflammatoria est, et vix hujus loci.

G. XI. P N E U M O N I A *.

Pyrexia ; dolor in quadam thoracis parte ; respiratio difficilis ; tussis.

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

* Ab omni aevo, in hunc fere diem, scriptores medici, et eos secuti Nosologi omnes, phlegmasiarum pectoris interni duo esse genera, peripneumoniam scilicet et pleuritidem, statuerunt. Recentiores autem ex sectione cadaverum didicerunt, veteres de sede, ideoque de differentia horum morborum saepe falso statuisse, et quem in pleura costali sedem habere veteres putabant, saepius in pleura pulmonem investiente situm fuisse invenerunt anatomici recentiores. Novimus, porro, quod, si quidem morbi illi diversam aliquando sedem habuerint, id tamen per symptomata vix certo cognosci posse ; et, utcunque sit, morbos illos quatenus, quovis modo distinctos, revera maxime esse affines, plerumque simul conjunctos, et eosdem distinxisse ad usum medicinae

Species sunt,

I. Pneumonia (*peripneumonia*) pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso; respiratione perpetuo difficili, saepe non nisi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumidae colore purpureo; tussi plerumque humida, saepe cruenta.

cinæ parum omnino contulisse. Hisce igitur per-
pensis, phlegmasias pectoris interni non nisi genus
unicum constituere, cum HOFFMANNO expertissi-
mo putamus; quamobrem hujusmodi genus hic
sub nomine Pneumoniae posuimus. Symptomata,
quae pro characteristicis adhibuimus, cum quae in
omni phlegmasia pectoris interni semper adsint, et
in qualibet praecipua sint, ea recte characterem
genericum constituere videntur.

An species diversae vere statuendae sint, anceps
haereo. Sed, opinionibus et consuetudini medicorum
aliquid concedere volens, peripneumoniae et pleuri-
tidis quatenus, vel ex opinione medicorum vel ex pro-
pria observatione, eas distinguere liceat, characteres
specificas dedi. Interim tamen observari velim, in-
ter illos morbos, utcunque aliquando distinctos, li-
mites accuratos plerumque non ponendos esse.

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Sag.*
G. 311. *Boerb.* 820. *Juncker*, 67.

I. Peripneumoniae idiopathicae simplices,

Peripneumonia pura sive vera. *Auclorum*, S. sp. 1.
Peripneumonia gastrica, S. sp. 11. *Morgagn.*
de caus. et sed. *Epist.* XX. art. 30. 31.*.

Variat gradu.

Peripneumonia catarrhalis, S. sp. 6.

Peripneumonia notha †, *Sydenh.* sect. 6. cap.
4. *Boerb.* 867. *Morgagni* de caus. et sed.
Epist. XXI. 11.—15.

* Ad peripneumoniam, an ad pleuritidem, potius
pertinet haec varietas, mihi non certo constat.

† Peripneumoniam *notham* a *vera* gradu tantum
differre opinor; ideoque uti varietas hic apposui. In
eo quidem differre puto, quod in peripneumonia
notha inflammatio sit lenior, et affluxus humorum in
pulmones copiosior, quam in *vera*. Cum autem in
notha symptomata pyrexiae, doloris, dyspnoeae, et
tussis, vario gradu et varia ratione conjuncta, adesse
possint, minime mirandum si hujus morbi apud di-
versos auctores descriptiones parum uniformes sint,
et necne morbus sub titulo peripneumoniae nothae

2. Peripneumoniae idiopathicae complicatae febre *.

Peripneumonia putrida, S. sp. 2. †.

Peripneumonia ardens, S. sp. 3.

Peripneumonia maligna, S. sp. 4.

a diversis auctoribus descriptus idem revera sit, dubia quaedam moverit doctissimus MORGAGNI. Perpen-
pensis tamen omnibus de hac re dictis, et cum observa-
tionibus pluribus apud ipsos aegros factis collatis, ni-
hil dubito quin morbus a SYDENHAMO et BOERHAA-
VIO, sub titulo *peripneumoniae nothae* descriptus, u-
nus idemque sit, nec ab eo morbum a VALSALVA in
FRANCISCO CORALLIO, vel morbum in celebri
ANTONIO VALISNERIO, ab ipso MORGAGNI ob-
servatum, re ipsa diversum fuisse puto.

* Cum morbi diversi simul complicati sint, saepe,
quis illorum pro morbo primario habendus sit dubi-
tari potest; nec in hac re me ubique recte judica-
tum iri spondeo. In quibusdam mei ipsius iudicio
usus sum; in plerisque vero SAUVAGESIUM secutus
sum. Sufficere plerumque ratus ob oculos studio-
forum complicationes istas quomodocunque ponere.

† SAUVAGESIUM, ut soleo, secutus, hanc et tres
sequentes species quasi diversas recensui, cum tamen
pro una eademque habere vellem.

Peripneumonia typhodes, S. sp. 5.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

3. Peripneumoniae symptomatae.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.

Peripneumonia phthificorum, S. sp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

II. Pneumonia (*pleuritis*) pulsu duro ; dolore, plerumque lateris, pungente, sub inspiratione praesertim aucto ; decubitu in latus molesto ; tussi dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. Sag. G. 303.

Boerb. 875. Junck. 67.

Paraphrenesis, S. G. 102. L. 26. *

* In morbo qui vulgo *paraphrenesis* vel *paraphrenitis*, et rectius a SAGARO *diaphragmitis*, appellatur, pleurae super diaphragma extensae inflammationem adesse, et in ea morbum consistere agnoscunt

Paraphrenitis, V. 55. *Boerb.* 907.

Diaphragmitis, *Sag.* G. 304.

1. Pleuritides idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 875. *Verna*
 princeps morb. acut. pleuritis, L. 1. cap. 2. 3.
Zeviani della parapleuritide, cap. 3. *Morgag.*
 de fed. et caus. morb. Ep. XX. art. 56. XXI.
 45. *Wendt.* de pleuritide, apud *Sandifort.* Thef.
 II.

Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian.* dell. para-
 pleur. III. 28. &c.

Pleuripneumonia, pleuro-peripneumonia, perip-
 pneumo-pleuritis *Auſtorum.* *Baronius* de pleuri-
 pneumonia.

agnoscunt medici omnes; non recte igitur uti ge-
 nus a pneumonia diversum recensuerunt Nosologi.

Nec quidem pro diversa a pleuritide specie recen-
 feri potest; cum plerumque nulla alia praeter illa
 pleuritidis symptomata ostendit. Quae a plurimis
 huic morbo tributa sunt, risus nempe sardonius,
 et delirium phreniticum, certe non semper adsunt.
 Primum, quod nunquam vidi, certe rarissimum est;
 et posterius, alias etiam pneumoniae species saepe co-
 mitatur, nec tantum a parte pleurae inflammata,
 quantum a gradu pyrexiae, vel diathesis phlogisti-
 cae, pendere videtur.

Ill. *Halleri* opuscul. patholog. obf. 13. *Morgagn.* de fed. et cauf. Epist. XX. et XXI. passim. *Cleghorn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleuritide, aph. 1. 2. 3. cap. I. 8. *Huxham* Diff. on pleurifies, &c. chap. I. Ill. *Pringle* Dif. of of the army, p. 147.

Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianch.* Hist. hep. vol. 1. p. 234.

Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morgagn.* de cauf. et fed. XX. 34.

Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. *Verna*, P. III. cap. 8.

Pleuritis mediastini, S. sp. 4. *P. Sal. Div.* de affect. part. cap. 6. *Friend*, Hist. Med. de Avenzoare.

Mediafina, V. 52.

Pleuritis pericardii, S. sp. 5. *Verna*, P. III. cap. 9.

Parapleuritis *Zeviani* della parapleuritide.

Pleurodyne, parapleuritis, S. sp. 19.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen*, Rat. med. I. 7. III. pag. 31.

Paraphrenesis pleuritica, S. sp. 2.

Paraphrenesis hepatica, S. sp. 3.

De inflammatione mediastini, pericardii, et diaphragmatis Vide *Morgagn.* de cauf. et fed. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. *Van Swieten* ad *Boerb.* 913.

II. Pleuritides complicatae:

1. Febre:

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatoſa, S. sp. 11.

Pleuritis biliosa, *Bianch.* Hist. hep. vol. I. p.
236.

Pleuritis putrida, S. sp. 9.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Pleuritis pestilens, S. sp. 16.

Pleuritis miliaris, S. sp. 20.

2. Catarrho:

Pleuritis catarrhalis, S. sp. 10.

Pleuritis lymphatica, *Bianch.* Hist. hep. I. p.
233.

III. Pleuritides ſymptomaticae:

Pleuritis traumatica, S. sp. 6.

Pleuritis verminosa, S. sp. 8. *Verna* pleur. p. I.
cap. 1. P. III. cap. 11. *Morgagn.* de ſed. et
cauſ. XXI. 43. 44.

Pleuritis ſtomachalis, *Bianch.* Hist. hep. I. p.
232.

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Pleuritis lactea, S. sp. 17.

Pleuritis Polonica, S. sp. 18.

IV. Pleuritides falsae.

Pleuritis hepatica, S, sp. 12. *Panarol.* Pentac. I.
 obs. 37.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Pneumoniae sequelae sunt.

V O M I C A.

Post pneumoniam, resolutione quadam non terminatam, dyspnoea et tussis persistentes, cum decubitu in latus sanum difficili, et febre hectica.

Vomica *Boerb.* 835. *Junck.* 35.*.

Pleurodyne vomica, S. sp. 21.

* Vomica vocamus quam vomica clausam appellant medici, et inde character noster. Characteres autem vomicae apud LINNAEUM et VOGELIUM vomica apertam tantum respiciunt; ideoque ad illos auctores hic non referimus.

E M P Y E M A.

Post pneumoniam suppuratione terminatam, saepe post vomitam, remissio doloris, dum perstant dyspnoea, tussis, decubitus difficilis, et febris hectica, saepe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrothoracis.

Varietates ex SAUVAGESIO, licet non semper distinguendas, hic subjungimus.

Empyema a peripneumonia, S. sp. 1.

Empyema a vomica, S. sp. 2.

Empyema pleurae, S. sp. 3.

Empyema mediastini, S. sp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. sp. 5.

Empyema intercostale, S. sp. 6.

G. XIII. C A R D I T I S *.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas;

* Recte omnino dixit VOGELIUS, *Carditidis symptomata fere eadem esse ut in peripneumonia, sed graviora*, et ita etiam sensisse videtur LINNAEUS,
cum

spiritus difficilis; tuffis; pulfus inaequalis; palpitatio; fyncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

I. Idiopathica.

Carditis fpontanea, S. fp. 1. *Senac.* Traité. de coeur. L. IV. chap. 7. *Meckel*, Mem. de Berlin, 1756.

Eryfipelas pulmonis, *Lomm.* Obferv. Lib. II.

II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. fp. 2. *Senac.* ibid. chap. 6.

G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; abfque propriis aliarum phlegmatarum abdominalium fignis.

cum apud illum neque *Carditis*, neque *Pericarditis*, inter morbos phlogifticos recenſetur. Certe novimus, pericardium faepe inflammatum fuiſſe ſine aliis praeter peripneumoniae fignis.

Si signa darentur quibus dignosci queant sequentes, pro speciebus peritonitidis recenserī possent.

I. Peritonitis in peritonaeo strictius dicto, sive in peritonaeo, abdomen intus succingente.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud.* Hist. anat. med. L. 1. obs. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obs. 341. *Morgagn.* de sed. LVII. 20.

II. Peritonitis in peritonaeo, per omentum extenso.

Epiplöitis, S. G. 106. *Sag.* G. 308. *

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132. *Hulme* on the puerperal fever.

* Tum Epiplöitis, tum Mesenteritis, ut Peritonitidis species hic recensetur, non quam quod ejusdem continuae membranae sint affectiones, quam quod nulla fere signa dari possunt, quibus a peritonitide, strictius dicta, dignosci queant.

III. Peritonitis in peritoneo, per mesenterium extenso.

Mesenteritis, V. 60.

Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibuslibet auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus.

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56. Sag. G. 306.

Ventriculi inflammatio, Boerb. 951.

Febris stomachica inflammatoria, Hoffm. II. 120.

I. Idiopathicae.

1. A causis internis.

A. Gastritis (*phlegmonodea*) dolore acuto, pyrexia vehementi*.

* Tum gastritis, tum enteritis duarum esse specierum, quarum una phlegmonodea, altera erysipelato-
tosa

Gastritis legitima, S. sp. 1. *Eller*, de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller*, obs. 14. hist. 3. *Lieut.* Hist. anat. med. L. 1. 74.

Gastritis erysipelatoſa, S. sp. 4. *.

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. *Tralles* de opio, ſect. II. p. 231.

2. A cauſis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

B. Gastritis (*eryſipelatoſa*) dolore, et pyrexia lenioribus, rubore eryſipelatoſo in faucibus apparente.

toſa dici poteſt; mihi ex pluribus obſervationibus factis certo conſtat; et ejuſmodi ſpecies itaque hic re- cenſui, etſi fatendum ſit, gaſtritidis eryſipelatoſae, et magis adhuc enteritidis eryſipelatoſae, ſigna ſaepe obſcura et incerta eſſe. De his vero monere volui ut diligentius inquirent poſteri.

* Quam hic gaſtritidem eryſipelatoſam dixit SAUVAGESIUS, omnino phlegmonodeam eſſe mihi videtur.

II. Symptomaticae.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

Gastritis herniosa, S. sp. 7.

De gastritide sternocostali, S. sp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes ; dolor abdominis pun-
gens, tendens, circa umbilicum tor-
quens ; vomitus ; alvus pertinaciter ad-
stricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57. *Sag. G.*
307.

Intestinorum inflammatio, *Boerb.* 959.

Febris intestinorum inflammatoria ex mesenterio,
Hoffm. II. 170.

I. Idiopathicae.

Species sunt,

1. Enteritis (*phlegmonodaea*) dolore acuto,
pyrexia vehementi, vomitu et alvo a-
stricta.

Enteritis iliaca, S. sp. 1.

Enteritis colica, S. sp. 2. *Boerh.* 963.

2. Enteritis (*erysipelatosæ*) dolore et pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarrhoea.

Species symptomatice.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, sæpe pungens pleuritici instar, sæpius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnoea; tussis ficca; vomitus; singultus*.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Sag.* G. 312.

Boerh. 914. *Hoffm.* II. 14. *Junck.* 66.

* Inter symptomata hepatitis, colorem faciei *flavescentem*, posuit tum SAUVAGESIUS, tum SA-

GARUS,

Sauvagesii species sunt,

Hepatitis erysipelatoſa, S. ſp. 1. *.

Hepatitis pleuritica, S. ſp. 2. *Bianch. Hiſt. hep. tom. I. p. 388.*

Pleuritis hepatica, S. ſp. 12.

Hepatitis cyſtica, S. ſp. 4. †.

GARUS, et hic etiam addit, *urinas icteritias, bilioſas, et ſerum ſanguinis miſſi et cruſta ſubſlava*; ſed haec ſymptomata bilis regurgitantis vel reſorptae rectius a LINNAEO et VOGELIO omiſſa fuiſſe cenſeo; nam ejuſmodi ſymptomata non tantum non perpetua, ſed etiam rariffima ſunt.

* De erythemate vel eryſipelate, quod vocant, viſcerum, minus recte ſenſiſſe medicos cenſeo; nam, me ſaltem iudice, erythema non niſi ſuperficies illas internas quas tegit epithelion et tunica villoſa, epidermidi externae continua et analoga, afficeret poſteſt. Nullum igitur eryſipelas pulmonis, de quo ſcripſit LOMMIUS, *Obſerv. lib. 2.* agnoſco; nec hepatitis quendam a SAUVAGESIO hic eryſipelatoſam recte dictam eſſe puto, et hepatitis quidem ex AMATE hic deſcriptam revera phlegmonodeam fuiſſe credo.

† Quin ex contuſione vel aliis cauſis oriri poſſit inflammatio cyſtidis felleae, vel ductus choledochi,
nullus

Hepatitis obscura, S. sp. 5.*.

Pro specie male recensetur morbus secundarius.

Hepatitis suppurans, S. sp. 6.

Hepatalgia apostematosa, S. sp. 7.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor,

nullus dubito; sed quibus signis cognosci queat, nisi in uno casu, non novi. In ictero, scilicet, cum dolore in regione epigastrica acuto, a calculo, ut videtur, in ductu choledocho haerente, inflammationem ductus cystici saepe ortam fuisse, omnino censendum, et ne oriatur semper cavendum.

* Hepatitis per characterem datum evidens et saepe acuta est; sed alias obscura et chronica; nam, in sectione cadaverum, saepe reperitur apostema hepatis, quando nulla fere, saltem obscura tantum, inflammationis symptomata praecesserint. Recte igitur hepatidem obscuram indicavit SAUVAGESIUS, et omnino optandum est, ut diligentius inquirant medici, quomodo hujusmodi morbus dignosci queat.

116 GENERA MORBORUM

tumor, et dolor pressu auctus ; absque signis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67.

Sag. G. 313.

Lienis inflammatio, *Boerh.* 958. et ill. *Van Swieten.* Comm.

Una tantum species recensetur.

Splenitis phlegmonodea, S. sp. 1. *Forest,* L. XX.

Obf. 5. 6. *De Haen,* apud *Van Swieten,* p. 958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia ; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens ; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae ; vomitus ; cruris stupor ; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

Nephritis, S. G. 115. L. 37. V. 65. *Sag.* G.

314.

Species

I. Idiopathica. Spontanæa.

Nephritis vera, S. sp. 1.

II. Symptomaticæ.

Nephritis calculosa, S. sp. 2.

Nephralgia calculosa, S. sp. 1.

Nephralgia arenosa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7.

Nephralgia arthritica, S. sp. 3.

G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia ; hypogastrii tumor et dolor ; mictio frequens dolorifica, vel ischuria ; tenesmus.

Cystitis, S. G. 108. L. 31. V. 66. Sag. G. 309.

Inflammatiô vesicæ, Hoffm. II. 157.

Species sunt,

I. A causis internis.

Cystitis spontanea, S. sp. 1.

II. A causis externis.

Cystitis a cantharidibus, S. sp. 2.

Cystitis traumatica, S. sp. 3.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor,
et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 63.

Metritis, S. G. 107, *Sag.* G. 315.

Inflammatiō et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

Species sunt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1.

Metritis typhodes, S. sp. 2.

Metritis lactea, S. sp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa, et plerumque evidente
causa; pyrexia; dolor circa articulos,
musculorum tractum sequens, genua
et reliquos majores, potius quam pe-

dum vel manuum articulos, infestans,
calore externo auctus.

Rheumatismus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Boerh.*

1490. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317

Myositis, *Sag.* G. 301.

Species idiopathica,

Rheumatismus acutus, S. sp. 1.

Rheumatismus vulgaris, S. sp. 2.

Variat fede.

A. In musculis lumborum.

Lumbago rheumatica, S. G. 212. S. p. 1.

Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.

B. In musculis coxendicis.

Uchias rheumaticum, S. G. 213. sp. 10.

C. In musculis thoracis.

Pleurodyne rheumatica, S. G. 148. sp. 3.

Pleuritis spuria, *Boerh.* 878.

Species symptomaticae.

Lumbago plethorica, S. sp. 3.

Ifchias sanguineum, S. sp. 2.

Pleurodyne plethorica, S. sp. 1.

Rheumatismus hystericus, S. sp. 7.

Ifchias hystericum, S. sp. 3.

Pleurodyne hysterica, S. sp. 6.

Rheumatismus saltatorius, S. sp. 8.

Pleurodyne flatulenta, S. sp. 4.

Pleurodyne a spasmate, S. sp. 9.

Rheumatismus scorbuticus, S. sp. 4.

Lumbago scorbutica, S. sp. 5.

Pleurodyne scorbutica, S. sp. 11.

Ifchias syphiliticum, S. sp. 7.

Pleurodyne venerea, S. sp. 5.

Lumbago sympathica, S. sp. 13.

a mesenterii glandulis induratis,

a pancreate tumido, purulento, schirroso, putri,

ab induratis pyloro, vena cava, pancreate,

a rene schirroso, putrefacto,

ab abscessu circa venae cavae bifurcationem,

• vermibus intra renes.

Lumbago a faburra, S. sp. 8.

Pleurodyne a cacochylia, S. sp. 7.

Rheumatismus saltatorius verminosus, S. sp. 8.

Ischias verminosum, S. sp. 8.

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Rheumatismus metallicus, S. sp. 10.

Lumbago a hydrothorace, S. sp. 14.

Lumbago pseudoischuria, S. sp. 16.

Lumbago ex aneurismate, S. sp. 11.

Pleurodyne ex aneurismate, S. sp. 10.

Pleurodyne a rupto oesophago, S. sp. 20.

Pleurodyne rachitica, S. sp. 13.

Ischias a sparganosi, S. sp. 5.

Pleurodyne catarrhalis, S. sp. 14.

Pleurodyne phthifica, S. sp. 8.

Rheumatismus necroseos, S. sp. 14.

Rheumatismus convulsivus, S. sp. 15.

Ischias gravidarum, S. sp. 4.

Lumbago partus, S. sp. 7.

Lumbago a nifu, S. sp. 10.

Ischias a subluxatione, S. sp. 9.

Q

Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11.

Lumbago a satyriasi, S. sp. 15.

Rheumatismus febricofus. S. sp. 9.

Lumbago febrilis, S. sp. 4.

Pleurodyne febricofa, S. sp. 15.

Rheumatismus miliaris, S. sp. 12.

Lumbago miliaris, S. sp. 9.

Pleurodyne miliaris, S. sp. 16.

Rheumatismi fequela eſt,

ARTHRODYNIA *.

Post rheumatifmum, niſum violentum, vel
ſubluxationem; dolores artuum vel

* Si, ut quidam ſtatuunt, rheumatifmus chronicus
ab acuto, genere omnino diverſus fit, nomen ſim-
plex, uti genus omne, habere oportet, et huiusmodi
nec ineptum, ut puto, impoſui. Porro, cum pro ſe-
quela rheumatifmi acuti vel rheumatifmi ſimpliciter
dicendi, rheumatifmum chronicum dictum ſemper
habeo, et cum inter utrumque morbum ſaepe limi-
tes

musculorum, sub motu praesertim, aucti, plus minusve fugaces, calore lecti vel alio externo levati ; artus debiles, rigidi, facile, et saepe sponte frigescentes ; pyrexia nulla ; tumor plerumque nullus.

Rheumatismus chronicus *Auflorum*.

Lumbago et ischias aliquando morbi acuti, sed cum saepius chronici sint, plerumque ad hunc locum pertinent.

G. XXIII. O D O N T A L G I A *.

tes vix statuendi sint, ideoque pro diverso genere rheumatismum chronicum recensere vix potui ; rheumatismus tamen chronicus exquisitus ab acuto natura adeo diversus evadit, et medelam adeo diversam exposcit, ut merito nomine prorsus diverso insigniri possit ; et si quis pro genere etiam diverso ponere velit, per me profecto licet.

* In priori Nosologiae methodicae nostrae editione, Odontalgiam pro rheumatismi specie habui, ac recensui ; sed, cum eam a rheumatismo alio quovis causam prorsus diversam, acre, scilicet, membranas sensibiles irritans, habere observaverim, pro genere, a
rheu-

Rheumatismus vel arthrodynia maxillarum,
a carie dentium.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. Sag. G.
157. Junck. 25.

Odontalgia, sive rheumatismus odontalgicus, Hoffm.
II. 330.

Varietates ex Sauvagesio sunt,

Odontalgia cariosa, S. sp. 1.

rheumatismo diverso, etiam habere vellem, et hic itaque uti genus diversum posui.

Etiam si odontalgiam a frigore et aliis irritamentis aliquando suscitari videtur, cariem dentium, diathesin phlogisticam inducentem, semper fuisse puto. Sunt fortassis alii morbi, ab acri irritante orti, qui rheumatismum exacte satis referunt; sed de iis nobis non constat. Si tamen revera existeret, ad mentem Clariss. D. COTTUNNII, *Ischias nervosa*, rheumatismi ab acri nervos irritante orti exemplum aliud haberemus; sed neque phaenomena a Cottunnio relata, neque ratio medendi, neque sectiones cadaverum, ejusmodi morbum unquam existisse mihi probant; ideoque neque hic, neque alibi, *Ischiadem nervosam Cottunni* inter rheumatismi species recensui.

- Odontalgia scorbutica, S. sp. 4.
 Odontalgia catarrhalis, S. sp. 3.
 Odontalgia arthritica, S. sp. 6.
 Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.
 Odontalgia hysterica, S. sp. 3.
 Odontalgia stomachica, S. sp. 9.

G. XXIV. P O D A G R A *.

Morbus haereditarius, oriens sine causa externa evidente, sed praëunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium, affectionibus alternans.

Podagra, V. 175. *Boerh.* 1254.

Febris podagrica, V. 69.

* *Arthritis* nomen, utpote apud medicos ambiguum, rejeci, et *podagra* nomine, utpote typum morbi praecipuum notante, cum celebri BOERHAAVIO usus sum,

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139. *Sag.* G.
142.

Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II.
339.

Dolores arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Affectus spastico arthritici, *Junck.* 46.

Recte forsitan SAUVAGESIUS, more sibi insolito, hujus morbi non nisi unicam esse speciem affirmavit ; sed varietates sequentes notari possunt.

I. Podagra (*regularis*) cum inflammatione artuum fatis vehementi, per aliquot dies persistente, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.

Arthritis podagra, S. sp. 1.

Arthritis rachialgica, S. sp. 11. *.

Arthritis aestiva, S. sp. 4.

* Ut solitus sum, SAUVAGESII varietates, five species quas vocat, hic appono ; sed tum quod species ejus non semper bene definitae sint, tum quod podagra

II. Podagra (*atonica*) cum ventriculi vel alius partis internae atonia, et vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus, et cum dyspepsia vel aliis atoniae symptomatis, subito saepe alternantibus.

Arthritis melancholica, S. sp. 6.

Arthritis hiemalis, S. sp. 2.

Arthritis chlorotica, S. sp. 5.

Arthritis asthmatica, S. sp. 9.

III. Podagra (*retrograda*) cum inflammatione artuum subito recedente, et ventriculi vel alius partis internae atonia mox infecta.

IV. Podagra (*aberrans*) cum partis internae inflammatione, vel non praegressa, vel praegressa, et subito recedente, inflammatione artuum.

Podagra regularis et atonica a se invicem non semper profus disjungantur, in apponendis loco idoneo SAUVAGESII speciebus, me ubique accuratum fore non spondeo.

Conjungitur aliquando aliis morbis podagra.

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.

Arthritis scorbutica, S. sp. 7.

Arthritis syphilitica, S. sp. 8.

Ad podagram nequaquam pertinere videntur sequentes.

Arthritis rachitica, S. sp. 13.

Arthritis Americana, S. sp. 14.

Arthritis Bahamensis, S. sp. 15.

G. XXV. ARTHROPOUSIS*.

Dolores artuum vel partium musculofarum, faepe post contusionem, profundi, obtusi, diuturni; tumor vel nullus, vel

* Cum neque rheumatismum neque podagram in apostema unquam abire credo, est hic morbus ab utroque certe diversus, ideoque pro genere peculiari recensendus. Utinam character ad eum a rheumatismo, arthrodynia, arthroace, et phlogosi, distinguendum, ubique fatis certo adhibendus, dari possit.

modicus, et diffusus; phlogosis nulla;
 pyrexia primum lenis, tandem hectica;
 et tandem partis apostema.

Lumbago psoadica, S. sp. 6. *Fordyce, Practice of
 Physic, P. II. pag. 70.*

Lumbago apostematosa, S. sp. 12.

Lumbago ab arthrocace, S. sp. 17.

Ischias ex abscessu, S. sp. 6.

Morbus coxarius, *De Haen, Rat. Med. Vol. I.
 C. xxxii.*

R

O. III. EXANTHEMATA.

Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitae aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, saepe plures, exiguae per cutem sparsae *.

Exanthemata, *Sag.* Cl. X.

* Quo caractere recte definiri, et quibus limitibus circumscribi debeat hic ordo, admodum incertum est. Si eruptiones enim a contagione specifica ortae, solae pro exanthematis, et morbis hujus ordinis, habendae sint; certe eruptiones a nulla contagione specifica, sed a quodam febris statu solum, pendentes, inter exanthemata genuina nequaquam recensendae sunt. Ita *petechia* a nobis omittitur, et forsitan tum *miliaria* tum *aphtha* omittenda esset. Dein, cum exanthemata pleraque contagiosa sint, et non nisi semel in decursu vitae aliquem afficiant, omnino idoneum videtur ut haec ab eruptionibus non contagiosis, quae saepe in decursu vitae aliquem afficiant
vel

Phlegmasiæ exanthematicæ, S. Cl. III. O. I.

Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.

Febres exanthematicæ, V. Cl. I. O. II.

G. XXVI. ERYSIPELAS *.

Synocha duorum vel trium dierum, ple-

vel afficere possint, rite distinguantur. Variola igitur et erysipelas minus recte sub eodem ordine collocantur. Denique, cum eruptiones in morbo quodam non semper ejusdem sint formæ, nec semper, nec certo quovis morbi die, in illo morbo compareant, an ejusmodi morbus inter exanthemata recensendus sit, merito dubitari potest; ideoque an pestis ad exanthematum, an ad febrium ordinem, referri debeat, dubito.

De hisce omnibus utiliter fortassis disputari potest; de iisdem vero certo statuere vix ausim; quod mihi tamen in Nosologia maxime idoneum esse videtur id ex caractere quem dedi satis patebit.

Cum autem ad caracteres generum et specierum, ordinis character non omnino necessarius sit, hunc quodammodo neglexi, et hic morbos a Nosologis pro exanthematis habitos plerosque recensui.

* Vox Erysipelas tum pro phlogosi erythemate, tum pro febre erysipelacea, a scriptoribus medicis usurpatur,

rumque cum somnolentia, saepe cum delirio.

In aliqua cutis parte, saepius in facie, phlogosis *erythema*, G. VII. sp. 2.

Erysipelas, S. G. 97. L. ro. Sag. G. 296.

Febris erysipelacea, V. 68. Hoffm. II. 98.

Species sunt,

I. Erysipelas (*vesiculosum*) erythemate, rubedine serpente, latum spatium occupante, et locis ejus quibusdam in vesiculas magnas abeunte.

Erypelas rosa, S. sp. 1. Sennert. de febr. L. II. c. 15.

furpatur, sed recte SAUVAGESIUS vitium cutaneum; quod nullam febrem, nisi symptomaticam, sibi junctam habeat, erythema appellari, et erysipelas, tantum febris illa exanthematica, quam erythema sequitur, vocari velit.

Minus recte forsitan III. LINNÆUS erysipelas pro protypo exanthematicorum habuit; inter exanthemata enim, an recte, recensetur ipsum erysipelas dubitari potest.

Febris erysipelatosa, *Sydenham*, sect. VI. cap.

5.

Erysipelas typhodes, S. sp. 2. *.

Erysipelas pestilens, S. sp. 5. †.

Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

II. Erysipelas (*phlyctænodes* †) erythemate ex papulis pluribus, trunci corporis partes praecipue occupantibus,

* Haec non nisi varietas erysipelatis vesiculosi, gradu solum differens, esse videtur.

† Haec et sequens non nisi febres cum erythemate symptomatico videntur. Hic tamen notandum est, erysipelas saepe aliquid putridae et gangraenosae indolis prae se ferre; nec dubito quin erysipelas, quod in hac regione, plerumque diathesi phlogistica comitatur, aliquando, praesertim in regionibus calidioribus, cum diathesi putrida adsit; et forsitan duas erysipelatis species, inflammatoriam nempe et putridam, indicare potuissimus; sed de posteriori nobis non satis constat.

‡ An haec species ad idem cum erysipelate vesiculoso genus recte referatur, dubito; sed iudicent periti.

et protinus in phlyctænas, five vesiculas parvas, abeuntibus.

Erysipelas Zoster, S. sp. 8.

Zona, Anglis, The SHINGLES, *Ruffel* de tabe gland. p. 124. Hist. 35.

Herpes Zoster, S. sp. 9.

Symptomaticum.

Erysipelas a veneno, S. sp. 3.

Caeterae SAUVAGESII species ad erythema pertinent.

G. XXVII. P E S T I S.

Typhus maxime contagiosa, cum summa debilitate *.

Incerto morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.

Pestis, S. G. 91. L. 2. *Junck.* 78.

Febris pestilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

* De caractere pestis, lites inter medicos saepe ortae sunt, nec facile dirimendae, ita ut character quibuscunque pestis casibus adhibendus dari possit; sed sufficiat characterem dedisse qui in plerisque adhiberi queat.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. sp. 2. Pestis Massiliensis Class.

3. *Traité de la peste*, pag. 41. Ejusdem pestis, Cl. 5ta, *Traité*, p. 228.

Pestis remittens, S. sp. 9.

Pestis vulgaris, S. sp. 1. Pestis Massil. Cl. 2.

Traité, p. 38. Ejusd. Cl. 2. 3. et 4ta, *Traité*, p. 225. &c. Waldschmidt. de peste Holfatica, apud *Halleri*, *Diff. pract.* tom. V. Chenot de peste Transylvanica 1755, 1759. *De Haen*, *Rat. med.* Pars xiv.

Pestis Ægyptiaca, S. sp. 11. *Alpin.* de med. Ægypt.

Pestis interna, S. sp. 3. Pest. Massil. Cl. 1.

Traité, p. 37. 224.

Species dubiae sunt,

Pestis sporadica, S. sp. 4,

Pestis carbunculosa, S. sp. 5.

Pestis Siamaea, S. sp. 8.

Pestis scorbutica, S. sp. 10.

G. XXVIII. V A R I O L A.

Synocha contagiosa cum vomitu, et, ex epigastrio presso, dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur erup-
tio papularum phlegmonodearum;
quae, spatio octo dierum, in suppu-
rationem, et in cruftas demum abe-
unt, faepe cicatrices depreffas, five
foveolas in cute, relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3. *Sag.* G. 290.

Febris variolosa, V. 35. *Hoffm.* II. 49.

Variolae, *Boerh.* 1371. *Junck.* 76.

Species funt,

I. Variola (*discreta*) pustulis paucis, dif-
cretis, circumfcriptione circularibus, tur-
gidis ; febre, eruptione facta, protinus
ceffante.

Variola discreta benigna, S. fp. 1.

Variolae regulares discretae, *Sydenh.* Sect. III.
cap. 2.

Variolae discretae simplices, *Helvet.* obs. fp. 1.

Variola discreta complicata, S. fp. 2. *Helv.* fp.

2.

Variolae anomalae, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenh.*

Sect. IV. cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, *Mead* de variol. cap.

2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead* *ibid.*

Variola discreta siliquosa, S. sp. 7. *Friend.* Oper.

p. 35⁸.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet.* obs.

sp. 3.

I. Variola (*confluens*) pustulis numerosis, confluentibus, circumscriptione irregularibus, flaccidis, parum elevatis; febre post eruptionem persistente.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Variolae confluentes simplices, *Helvet.* obs.

sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, *Kempfer.*

Vesiculae Divae Barbarae, *C. Pif.* obs. 149. *.

* Pro specie variolae, has vesiculas hic posuit SAUVAGESIUS. Sed vesiculae a Pifone descriptae potius ad pemphigum pertinere mihi videntur.

S

- Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.
 Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.
 Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.
 Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenh. Sect.*
 V. cap. 4.
 Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.
 Variola fanguinea, *Mead de variolis*, cap. 2.
 Variola confluens corymbosa, S. sp. 13.
 Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

G. XXIX. VARICELLA.

Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 42.

Variola lymphatica, S. sp. 1.

Anglis, the CHICKEN-POX, *Edinb. Med. Essays*,
 Vol. II. Art. 2. near the end. *Heberden, Med.*
Transact. Art. 17.

G. XXX. R U B E O L A.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca, rauca.

Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4. *Sag.* 293.

Febris morbillosa, V. 36. *Hoffm.* II. 62.

Morbilli, *Junck.* 76.

I. Rubeola (*vulgaris*) papulis minimis, confluentibus, corymbosis, vix eminentibus.

Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.

Variat

I. Symptomatis gravioribus, et decursu minus regulari.

Rubeola anomala, S. sp. 2.

Morbilli anomali, *Sydenh. Sect. V. cap. 3.*

2. Comitante Cynanche.

Rubeola anginosa, S. sp. 4. *Edinb. Essays, Vol. V. art. 2.*

3. Comitante diathesi putrida, *Clar. Watson, Lond. Med. Observ. Vol. IV. Art. XI.*

II. Rubeola (*variolodes*) papulis discretis eminentibus.

Rubeola variolodes, S. sp. 3. *

Scotis the NIRLES.

G. XXXI. M I L I A R I A †.

* SAUVAGESIUM secutus, hunc morbum hic indicavi, etsi multum dubito an recte ad rubeolam referendus sit. Non solum enim forma papularum plurimum differt, sed, quod majoris momenti esse videtur, est plerumque absque symptomatis catarrhalibus, rubeolae adeo propriis.

† Inter medicos, speciatim Viennenses, de indole morbi miliaris nuper acriter disputatum est; et imprimis

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio,
fudore olido, et punctiōibus cutis.

primis an unquam idiopathicus, an vero semper symptomaticus sit, certatim quaeritur. Quod nunquam idiopathicus sit, praeter opinionem medicorum, a medio seculi decimi septimi in hunc fere diem, omnium, et contra sententiam medicorum hujus aevi quorundam spectabilium, affirmare non auctim; sed cum experientiam in hac re saepe fallacem, et medicos plerosque imitatorum servum pecus fuisse noverim, dubitare cogor; et, utcunque sit, morbum miliarem plerumque symptomaticum fuisse, ex observatione propria, per multos annos frequenti, certo novi. Nunquam contagiosum, nec manifesto epidemicum, quibusdam licet temporibus solito frequentiore, vidi. Morbis febrilibus quibuscunque, tum inflammatoriis tum putridis, aliquando adjungitur; in nullis tamen, nisi regimine calido et sudoribus praeuentibus, ortum, et in pluribus, regimine temperato, et sudoribus vitatis, morbum, alias expectandum, prorsus vitatum observavi. In quibusdam corporis partibus quasi arte excitatum aliquoties novi. Denique, cum contagionum specificarum plerarumque indolem materia, si qua datur, miliaris nequaquam imitetur, tum quod certo morbi die eruptionem non efficiat, tum quod non
semel

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95. *Sag.* G. 295.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.*
II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75.

semel tantum, sed saepius in vitae decursu, hominem afficiat. De hujus igitur materiae natura specifica, vel ad morbum quemvis idiopathicum gignendum apta, valde dubito. In hac re mecum sentientem experientissimum et peritissimum CAROLUM WHITE habere mihi gratulor. Vide *White* on the Management of Lying-in Women.

Cum autem in hac re me falli potuisse, facile agnosco, ne tamen alios simul fallerem, miliariam inter exanthemata hic recensui, et characterem ejus, quem quivis, hunc morbum pro idiopathico habens, dare voluerit, exhibui; peritis quibuscumque hanc rem certius dijudicandam relinquens.

Germanis der FRIESEL. God. Welsch. Hist. med. de novo puerperarum morbo, qui der FRIESEL dicitur, Lips. 1655.

De hoc morbo scriptores praecipui sunt.

Hamilton, de febr. miliar. 1710. *Fantonus*, de febr. mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *For- dyce*, de febr. mil. 1748. *Fischer* de febr. mil. 1767. *De Haen*, de divis. febr. 1760, et in Ratio med. passim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar. 1764.

Ad Idiopathicam, si qua datur, pertinent,

- Miliaris benigna, S. sp. 1.
- Miliaris maligna, S. sp. 2.
- Miliaris recidivans, S. sp. 3.
- Miliaris Germanica, S. sp. 5.

Symptomaticae manifesto sunt,

- Miliaris Boia, S. sp. a.
- Miliaris Britannica, S. sp. i.
- Miliaris nova febris, *Sydenh.* Sched. monit. S. sp. d.
- Miliaris sudatoria, S. sp. e.
- Miliaris nautica, S. sp. g.

Miliaris purpurata, S. sp. *b.*

Miliaris lactea, S. sp. *c.*

Miliaris puerperarum, S. sp. *k.*

Miliaris scorbutica, S. sp. *l.*

Miliaris critica, S. sp. *b.*

G. XXXII. S C A R L A T I N A.

Synocha contagiosa.

Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein saepe anasarca.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. Sag. G. 294. Junck.

75.

Species sunt,

I. Scarlatina (*simplex*) nulla comitante
cynanche.

Scarlatina febris, S. sp. 1. *Sydenb. sect. VI. cap.*

2.

II. Scarlatina (*cynanchica*) cum cynanche ulcerosa*.

* Spatio quadraginta annorum Scarlatinam febriles vel septies in Scotia epidemicam observavi, et in unoquoque exemplo morbus illius speciei erat quam Scarlatinam anginofam vocat SAUVAGESIUS. Nos Cynanchicam appellavimus, ex eo quod ulceribus faucium interniarum fere semper comitata fuit. Cum in plerisque aegris morbus cynanchem malignam plurimum, aliquando fati exacte referebat, nec unquam scarlatinam epidemicam in omnibus aegris simplicem esse viderim, saepe dubitavi annon scarlatina omnis sit cynanchica, et semper idem fere morbus ac cynanche maligna, supra inter Phlegmasias relata. Plures autem rationes in hanc sententiam ire non sinunt. Certe enim, testibus SYDENHAMO perspicacissimo et aliis, scarlatina simplex, sive nulla comitante cynanche, aliquando observata fuit, et datur, itaque contagio quaedam specifica efflorescentiam cutis scarlatinam, et hanc absque affectione quadam cynanchica, gignens. Quod, si aliquando etiam contagio sit, fauces afficiens,

T

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. *Withering* on the scarlet fever.

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. Sydenh. Sect. VI. Cap. 6. et Scarlatina variolode, S. sp. 5. nobis non liquet.

afficiens, quae plerumque etiam scarlatinam gignat, hoc nihil praeterea mihi probare videtur, quam quod sit contagionum quarundam natura, ejusmodi ut simul tum fauces, tum cutem, afficere valeat. Cum tamen contagiones istae ita differre possint, ut altera cutem, altera fauces magis et primario afficere proclivis sit, hanc differentiam inter scarlatinae et cynanche malignae contagionem semper inesse puto. In morbo epidemico, quem pro Scarlatina habui, aliquot aegrotantium sine cynanche quaecunque erant; et in iis fere omnibus, quibus adfuit cynanche, haec benigna admodum, ulcera tonsillarum, parva tantum nec serpentina, et plerumque pus bonum fundentia, exhibuit, et morbus raro funestus fuit. In cynanche vero maligna aegrotantes omnes in ipso morbi ingressu, cynanche correpti sunt, et haec fere semper ulcera maligna, foeda, serpentina, gangraenosa, ostendebat. Morbus porro, putredinis et debilitatis indicia plurima prodens, plerumque exitialis evasit.

G. XXXIII. URTICARIA*.

Febris amphemerina †.

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeuntes ‡.

* Est morbus ab Anglis, *The Nettle Rash* dictus, qui quibusdam Urticaria audit; sed morbus ille, *The Nettle Rash*, ut ab eruditissimo viro G. HEBERDEN, in Coll. Reg. Med. Lond. Actis describitur, et qualem saepius ipsi vidimus, est ab urticaria nosologorum omnino diversus, utpote sine febre chronicus, et ad Impetigines fortassis referendus.

† Hanc in priori editione contagiosam dixi; sed ex propria experientia contagiosam fuisse non novi, et quo auctore contagiosam antea dixi, nunc non invenio.

‡ Ad aliorum potius quam meipsum mentem hic character conscriptus est; nam hunc morbum raro vidi, et nunquam epidemicum, vel regulariter, ut hic describitur, decurrentem, observavi.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junch.* 75.

Scarlatina urticata, S. sp. 2.

Erysipelatis species altera, *Sydenh. Sect. VI.*
cap. 6.

Febris scarlatina, et febris urticata, *Meysercy,*
Mal. des armées, 291. et seq.

G. XXXIV. PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die, in
variis partibus vesiculae, avellanae
magnitudine, per plures dies manentes,
tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. G. 93. *Sag.* 291.

Morta, L. I.

Febris bullosa, V. 41.

Species ex SAUVAGESIO sunt *,

Pemphigus major, S. sp. 1.

Exanthemata ferosa, C. Pison. obs. 150.

* Cum pemphigum, quem pro exanthemate habere possim, nondum ipse viderim, et in scriptis medicorum de ejusmodi morbo paucissima tantum invenerim; quae in Nosologia nostra de eo dicenda essent, omnia fere ex SAUVAGESIO necessario depromenda erant. Eum itaque secutus sum; sed hunc morbum lubenter ipse prorsus omissem, cum omnia fere de eo dicta, dubia, obscura, et ambigua mihi videntur. Quae ex sui ipsius aut CAROLI PISONIS observatione habet SAUVAGESIUS, omnino credere fas est; quae autem ex CHRISTOPHORI SELIGERI, tenuis certe judicii hominis, observatione duxit, parum attentione digna mihi videntur. Quae porro ex D. THIERRY relatione adducuntur meam fidem omnino superant: Nimirum, *quod in morbo admodum exitiali acetum bezoarticum, a medico quodam datum, omnes salvos fecit, interea dum vix unus, aliis medicis commissus, mortem evadebat.* Denique, de morbo admodum ambiguo a D. LANGHANS, in Actis Helveticis descripto, donec aliae observationes rem elucidaverint, nihil concludere

Febris pemphygodes, Ephem. Germ. D. I. A.
VIII. obs. 56.

Pemphigus castrensis, S. sp. 2.

Febris syneches, cum vesiculis per pectus et col-
lum sparfis, *Morton*. app. ad exerc. II.

Pemphigus Helveticus, S. sp. 3. *Langhans* in
Act. Helvet. vol. 2. p. 260. et in *Beschreibung*
des Siementhals, Zurich 1753.

De pemphigo Indico, S. sp. 4. et

Pemphigo Brasiliensi, S. sp. 5. non liquet.

G. XXXV. A P H T H A.

Synochus*.

Lingua tumidiuscula ; linguae et fauci-

dere vellem. Nihil aliud, fortassis, quam cynanche
maligna fuit ille morbus, et, ad summum, quod
pemphigus omnis morbus symptomaticus sit, satis
verisimile videtur.

* An aphtha inter exanthemata recensenda sit,
dubito. Aphtha enim quaeque fere quam ego vidi
sine febre fuit ; et si quando cum aphtha infantum
febris adfuit, haec fere semper aphthae supervenerat.

Aphtha

cium color purpurascens ; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abrafacito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Sag.* 298. *Boerh.* 978.

Hoffm. II. 478. *Junck.* 137.

Febris aphthosa, V. 44.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Aphtha *infantum*.

Aphtha lactucimen, S. sp. 1.

Symptomata videntur,

Aphtha febrilis, S. sp. 2.

Aphtha maligna, S. sp. 3.

Aphtha adultorum quidem saepe febre supervenit. Sed, febribus diversarum specierum plerumque sub earum finem jungitur, nec, quantum novi, febris quaevis aphthae propria, a medicis nota, vel quidem dicta fuit.

Manifesto symptomatae sunt

Aphtha syphilitica, S. sp. 4.

Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

Exanthema symptomaticum est,

PURPURA, S. G. 96. *Sag.* G. 292. *

Petechia, L. 5.

* Cum in quibusvis febribus, vel intermittentibus vel continuis, in quibusvis etiam exanthematibus et profluviis, modo in iis morbis sit quaedam ad putredinem proclivitas, appareant petechiae; has pro efflorescentia symptomatica, potius quam pro exanthemate idiopathico, habere volui.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ*.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194.

Junck. 5.

Sanguifluxus, S: Cl. IX. O. I. *Sag.* Cl. V. O. I.

* Classem Fluxuum apud SAUVAGESIUM et SAGARUM, vel Profluviorum apud VOGELIUM, vel morborum evacuatoriorum apud LINNÆUM, cum illa morbos, tum facie, tum natura, omnino dissimiles conjunxerit minime naturalem esse, nec proinde idoneam putavi. In nostram, igitur, Nosologiam ejusmodi classem admittere nolui, et morbos in ea recensitos aliorum referendos esse censui. Illi quos pyrexia quaedam semper comitatur, sub classe Pyrexiarum certe recensendi sunt; et hic igitur

Capitis dolor vel gravitas ; faciei rubor ;
profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

tur hemorrhagias *activas* quas vocant posui HOFFMANNUM sequor, qui mox post febres de ejusmodi haemorrhagiis tractavit, et in praefatione rationem reddidit ; quod, scilicet, “ *probe consideratis phaenomenis, et paulo pensiculatius subductis rationibus, sanguinis eruptiones iisdem propemodum, utut, non satis completis motibus quibus febres oriuntur, progignuntur.*”

* Recte tum in Criticis Botanicis, tum in Philosophia Botanica, No. 233. monuit LINNAEUS, “ *Nomina generica, cum classium et ordinum naturalium nomenclaturis communia, omittenda esse.*”

Contra hanc regulam tamen ipse peccat, cum vocabulo haemorrhagia, classis vel ordinis naturalis appellatione satis frequenter usitata, pro nomine generico utatur. Nec quidem, cum erraverit, ipse HIPPOCRATES imitandus sit. Hujus generis itaque nomen mutandum erat, et a VOGELIO quod hic usurpatum est desumpti.

Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173. *Sag. G.* 174.

Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. *Hoffm.* II. 198.

Variat ratione aetatis,

Epistaxis (*juniorum*) cum signis plethorae arteriosae.

Epistaxis (*senum*) cum signis plethorae venosae.

II. Symptomaticae.

I. A causis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. sp. 3.

Haemorrhagia critica, S. sp. 4. *Hoffm.* II. 198.

Haemorrhagia infalubris, S. sp. 5. *Hoffm.* *ibid.*

Haemorrhagia in chronicis, S. sp. 6.

2. A causis externis.

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemorrhagia a hirudine, S. sp. 7.

G- XXXVIII H Æ M O P T Y S I S.

Genarum rubor; molestiae aut doloris, et aliquando caloris, in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, saepe spumofum rejiciens.

Haemoptysis, S. G. 240. L. 179. V. & 4. Sag.

G. 175. Junck. 8.

Haemoptoe, Boerb. 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, Hoffm. II. 202.

Species idiopathicae sunt,

1. Haemoptysis (*plethorica*) nulla vi externa applicata, neque praegressa tussi aut evacuationis solitae suppressione.

2. Haemoptysis (*violenta*) a vi externa applicata.

Haemoptysis accidentalis, S. sp. 1.

Haemoptysis habitualis, S. sp. 2.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

3. Haemoptysis (*phthifica*) post tussim cum macie et debilitate diuturnam.

Haemoptysis phthifica, S. sp. 9.

Haemoptysis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.

4. Haemoptysis (*calculosa*) rejectis simul moleculis calculosis plerumque calcareis.

Haemoptysis calculosa, S. sp. 14.

5. Haemoptysis (*vicaria*) post evacuationis solitae suppressionem

Haemoptysis catamenialis, S. sp. 4.

Haemoptysis periodica, S. sp. 5.

Symptomaticae sunt,

Haemoptysis *pneumonica*.

Haemoptysis catarrhalis, S. sp. 8.

Haemoptysis peripneumonica, *Laelii a fonte*.

Haemoptysis *exanthematica*,

Haemoptysis variolosa, S. sp. 7.

Haemoptysis rubeolosa.

Haemoptysis *hydropica*,

Haemoptysis *ascitica*, S. sp. 15.

Haemoptysis *hydrothoracica*

Haemoptysis *cachectica*.

Haemoptysis *splenetica*, S. sp. 16.

Ineptae et spuriae sunt,

Haemoptysis a diapedesi, S. sp. 3.

Haemoptysis a sphacelo pulmonum, S. sp. 11.

Haemoptysis *scorbutica*, S. sp. 6.

Haemoptysis *Helvigiana*, S. sp. 17.

Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.

Haemoptyseos sequela est

P H T H I S I S.

Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi,
febre hectica, et plerumque expectora-
tione purulenta.

Phthisis, S. G. 276. L. 208. V. 319. *Sag.* 101.

Junck. 33.

Phthisis pulmonalis, *Boerb.* 1196.

Affectio phthisica, sive tabes pulmonalis, *Hoffm.*
III. 284.

Species sunt,

I. Phthisis (*incipiens*) sine expectoratione puris.

Phthisis incipiens, *Morton.* Physiolog. L. II. cap.
3.

Phthisis sicca, S. sp. 1.

II. Phthisis (*confirmata*) cum expectoratione puris.

Phthisis confirmata *Auctorum.*

Phthisis humida, S. sp. 2.

Variat utraque species,

Ratione causae remotae.

Phthisis haemoptoica, S. sp. 6.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis asthmatica, S. sp. 5.

Phthisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

Phthisis a febris, S. sp. 13.

Phthisis rheumatico-arthritica, S. sp. 12.

Phthisis chlorotica, S. sp. 10.

Phthisis icteritia, S. sp. 15. *Schacht.* de phthisi
icterit. 1724.

Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.

Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.

Phthisis chylosa, S. sp. 17.

Phthisis scorbutica, S. sp. 4.

Phthisis syphilitica, S. sp. 8.

Phthisis a plica, S. sp. 19.

Phthisis a metastasi puris, S. sp. 9.

Variat ratione fontis purulentae.

Phthisis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen*, *Rat. me-*
dendi, vol. I. cap. 7. 11. Ed. Leid. *.

G. XL. HÆMORRHŌIS.

Capitis gravitas vel dolor ; vertigo ; lum-

* *Utrum*, de hoc fonte puris, recte an fecus judica-
verit *HAENIUS*, hujusmodi species vix in Nosologia
locum habere potest, cum a signis quibusvis exter-
nis dignosci non queat.

borum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhoids, S. G. 217. L. 192. Sag. G. 182.

Haemorrhoidalis fluxus, Hoffm. 219.

Haemorrhoides, Junck. 11. et 12.

Leucorrhoids, V. 112.

Species sunt,

1. Haemorrhoids (*tumens*) externa a marif-
cis,

Variat,

A. Cruenta.

Haemorrhoids moderata, S. sp. 1.

Haemorrhoides ordinatae, Junck. 11.

Haemorrhoides nimiae, Junck. 11.

Haemorrhoids immodica, S. sp. 2.

Haemorrhoides excedentes, Alberti de haemor-
rhoid. pag. 179.

Haemorrhoids polyposa, S. sp. 3.

vel sanguinis e vagina praeter ordinem
fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.

Metrorrhagia, *Sag.* G. 179.

Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.

Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.

Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119. *Sag.*
G. 202.

Cachexia uterina, sive fluor albus, *Hoffm.* III.
348.

Fluor albus, *Junck.* 133. *.

Abortus, S. G. 245. L. 204. *Sag.* G. 180. *Junck.*
92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, *Boerb.* 1303.

Convulsio uteri, sive abortus, *Hoffm.* III. 176.

* Leucorrhoeam, sive fluorem album, *auctorum*
hic ad menorrhagiae genus retuli, et leucorrhoeam
sine vitio locali omnem huc omnino referendum
esse censeo. Plerumque enim, et fere semper, leu-
corrhoea vel cum menorrhagia conjuncta est, vel eam
mox secuta, et a temporibus quando apparet leucor-
rhoea serum sub hac effusum ab iisdem vasis, quae
menfes profundunt, provenire, et saepe leucorrhoeam

ab

Species sunt,

1. Menorrhagia (*rubra*) cruenta in non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 3. a *Pasta*. Diff. sopra i mestru.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 2.

2. Menorrhagia (*abortus*) cruenta in gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. sp. 6. *Pasta* intorno al flusso di fangue dall utero nelle gravide.

Abortus effluxio, S. sp. 1.

a. Abortus subtrimestris

b. Abortus subfemestris.

c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

3. Menorrhagia (*lochialis*) cruenta in puerperis.

ab iisdem causis ac menorrhagiam rubram oriri, fatis verisimile est.

vel sanguinis e vagina praeter ordinem
fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.

Metrorrhagia, *Sag.* G. 179.

Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.

Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.

Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119. *Sag.*
G. 202.

Cachexia uterina, five fluor albus, *Hoffm.* III.
348.

Fluor albus, *Junck.* 133. *

Abortus, S. G. 245. L. 204. *Sag.* G. 180. *Junck.*
92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, *Boerb.* 1303.

Convulsio uteri, five abortus, *Hoffm.* III. 176.

* Leucorrhoeam, five fluorém album, *auctorum*
hic ad menorrhagiae genus retuli, et leucorrhoeam
sine vitio locali omnem huc omnino referendum
esse censeo. Plerumque enim, et fere semper, leu-
corrhoea vel cum menorrhagia conjuncta est, vel eam
mox secuta, et a temporibus quando apparet leucor-
rhoea ferum sub hac effusum ab iisdem vasis, quae
mensès profundunt, provenire, et saepe leucorrhoeam

Species sunt,

1. Menorrhagia (*rubra*) cruenta in non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 3. a *Pasta*. Diff. sopra i mestru.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 2.

2. Menorrhagia (*abortus*) cruenta in gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. sp. 6. *Pasta* intorno al flusso di sangue dall'utero nelle gravide.

Abortus effluxio, S. sp. 1.

a. Abortus subtrimestris

b. Abortus subsemestris.

c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

3. Menorrhagia (*lochialis*) cruenta in puerperis.

ab iisdem causis ac menorrhagiam rubram oriri, satis verisimile est.

166 GENERA MORBORUM

Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. *Pasta* diff. supra
citat.

4. Menorrhagia (*vitiorum*) cruenta ex
vitio locali.

Menorrhagia ex hysteroptosi, S. sp. 5.

Menorrhagia ulcerosa, S. sp. 9.

5. Menorrhagia (*alba*) ferosa sine vitio
locali in non gravidis*.

Leucorrhoea, G. ut supra.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.

Leucorrhoea Americana, S. sp. 5.

Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.

6. Menorrhagia (*Nabothi*) ferosa in gra-
vidis.

Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.

Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8.*.

* Hic fortassis lector eruditus mirari possit, quod
ad clariss. medici Parisiensis RAULIN, de fluore
albo

Menorrhagiam ferofam, five leucorrhoeam
ex vitio locali, ad morbos locales refe-
rendam effe cenfeo.

Haemorrhagiae fequentes plerumque, fi
non femper, fympomaticae funt.

STOMACACE, S. G. 241. L. 175. V. 85. *Sag.*
G. 176.

albo librum, *Traité des fleurs blanches*, neque studi-
ofos relegaverim, neque species fluoris albi varias
ab illuftri auctore indicatas ipfe recensuerim. Recte
an fecus fecerim, peritis dijudicandum relinquo; fed
quod non fecerim haec caufa fuit. Plura in libro illo
ingeniofo subtilius, quam verius dicta, mihi viden-
tur; et vel quomodo fluor albus, ab aliarum praeter
uteri partium affectione oriri poffit, non intelli-
go, vel quod revera oriantur, ex meis faltem obser-
vationibus, forfan paucioribus, mihi nequaquam
confat. Lectores itaque nostros potius ad aucto-
rem ipfum relegare, quam doctrinam ejus male in-
tellectam, et forfan minus recte traditam, hic exhi-
bere velim.

Vel scorbuti, vel vitii oris, vel injuriae
externae, symptomata est.

Apud SAUVAGESIUM species sunt,

1. Stomacace scorbutica.
2. Stomacace universalis.
3. Stomacace ab haemorrhoo.
4. Stomacace purulenta.

HAEMATEMESIS, S. G. 242. L. 184. V. 89.
G. 177.

Plerumque haemorrhagiae solitae vicaria
est, vel vitii ventriculi localis, vel morbi
nigri, vel denique vis externae, sympto-
ma est.

1. Haematemesis plethorica.
2. Haematemesis ex aneurismate.
3. Haematemesis traumatica.
4. Haematemesis ab hirudine.
5. Haematemesis catamenialis.
6. Haematemesis ex pancreate.
7. Haematemesis ex splene.
8. Haematemesis scorbutica.

9. Haematemesis cholericæ.
10. Haematemesis simulata.
11. Haematemesis carnosæ cruentæ.
12. Haematemesis atræ.
13. Haematemesis ab hepate.
14. Haematemesis a veneno.

HÆMATURIA, S. G. 243. L. 198. V. 92. *Sag.*
G. 178.

Plerumque calculi renalis, aliquando februm putridarum symptomata est.

1. Haematuria spontanea.
2. Haematuria violenta.
3. Haematuria deceptiva.
4. Haematuria purulenta.
5. Haematuria calculosa.
6. Haematuria in exanthematicis.
7. Haematuria ejaculatoria.
8. Haematuria stillatitia.
9. Haematuria hæmorrhoidalis.
10. Haematuria spuria.
11. Haematuria nigra.
12. Haematuria catamenialis.
13. Haematuria a transfusione.

14. Haematuria traumatica.

15. Haematuria a verme.

CYSTIRRHAGIA, V. 93.

Plerumque calculi vesicalis, rarius alius
morbi vesicae, symptomata.

O. V. PROFLUVIA*.

Pyrexia cum excretionē aucta, naturaliter non sanguinea.

G. XLII. CATARRHUS.

Pyrexia saepe contagiosa; mucī, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98. *Sag.* G. 145.

Coryza, L. 174. V. 100. *Sag.* G. 196.

* Ob eandem rationem qua haemorrhagias, profluvia etiam febrilia quaedam hic in classe pyrexiarum collocavi. Catarrhus quidem, pyrexia et diathesi phlogistica, phlegmasiis maxime affinis est; et dysenteria non solum pyrexia semper comitatur, sed in multis etiam a fluxibus aliis quibusvis differt.

Rheuma, S. G. 142.

Tussis, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Sag.* G. 245.
255. *Junck.* 30.

Tussis catarrhalis et rheumatica, *Höffn.* III. 109.

Genera sequentia ad hunc titulum referenda, plerumque symptomatica sunt.

Anacatharsis, S. G. 262. *Sag.* 198.

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

Sp. I. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.

Catarrhus pectoris, S. sp. 6.

Coryza catarrhalis, S. sp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.*
obf. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de sed.
XIV. 21.

Coryza febricosa, S. sp. 6.

Tussis catarrhalis, S. sp. 1. *N. Rosen* Diff. apud
Haller, disput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. sp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.?

Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

Sp. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.

Rheuma epidemicum, S. sp. 2.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Hujus exempla sunt,

Anno 1323. Cronica meteorologica della Toscana,
apud *Targioni Tozzetti* Offervaz.
Med. Raccolta I. pag. 175.

1328. Ibid.

1358. Ibid.

1387. Ibid.

Valescus de Taranta apud *Morgagn.*
de sedibus XIII. 4.

Marchesi ibid.

1510. *Valleriola* append. ad loc. com. cap. 2.

1575. *Valleriola*, ibid.

Riverii Obs. in biblioth. vet. repert.
obs. IX.

Foresti, L. VI. obs. 1.

1580. *Haenischius* in *Aretacum*, pag. 315.
396.

Wieri, Obs. L. II.

Anno 1580. *P. Sal. Diverfus*, de febre pestilenti,
cap. XI.

Forestus, L. VI. obf. 3.

Riverii Obf. in biblioth. vet. repert.
obf. X.

Sennertus de febre, L. IV. cap. 17.

1591. *Sennertus*, ibid.

Pechlin, L. II. Obf. 17.

1658. *Willis* de febribus, cap. 16.

1675. *Sydenham*, Sect. V. cap. 5.

Raygerus in Ephem. Germ. D. I. A.
VI. et VII. obf. 213.

P. de Sorbait.

1679. *Sydenham*, Ep. resp. ad *R. Brady*.

Zod. med. Gall. A. I. Decemb. obf. 6.

1708. *Schroeckius* in Ephem. Germ. Cent. I.
et II. in append. pag. 14.

1709. *Hoffm.* II. 47.

1712. *Camerarius* in Ephem. Germ. Cent.
III. et IV. obf. 58.

Schroeckius, ibid. in append. pag. 26.

1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.

C. Fr. Loew. in append. ad A. N. C.
vol. III.

Scheuchzer, Obf. meteorol. in app. ad
A. N. C. vol. IV.

Morgagni de sed. et caus. XIII. 3. 4.

Anno 1729 et 1730. *Beccarius*, A. N. C. III. obf.
48. pag. 142.

Hillary on weather and difeafes, pag.
35.

Winteringham, Comm. Noſolog. pag.
319.

Rutty's hiſt. of weather, pag. 17.

1732 et 1733. *Commerc. lit. Norimb.* 1733.
pag. 6. 52. 108. 267.

Detarding de febr. Eyderoftad. apud
Halleri diſputat. pract. vol. V.

Edin. Med. Eff. vol. II. art. 2.

Hillary of weather, &c. pag. 47.

Winteringham, Comm. Noſolog. pag.
354.

Huxham de aëre, &c. 1733. M. Febr.

Rutty's hiſt. of weather, pag. 30.

1737. Jan. *Rutty*, *ibid.* pag. 60.

Octob. *Rutty*, *ibid.* pag. 60.

Julio. *Comm. lit. Norimb.* 1737,
pag. 347.

1742. 1743. *Comm. lit. Norimb.* 1743, pag.
106. 188. 313. 336.

Fuch et *Zuberbubler* de febre catar-
rhali, apud *Haller.* Diſp. pract.
tom. V.

Huxham de aëre, 1743. M. April.

Rutty, hiſt. of weather, p. 99.

176 GENERA MORBORUM

- Anno 1742. 1743. *Targioni Tozzetti*. Raccolt. I. di
 offervaz Med. pag. 176.
1748. *Cleghorn*, Minorca, pag. 132.
1758. *Kutty*, hist. of weasher, pag. 211.
 Whytt, Lond. Med. Obs. Vol. II. art.
 13.
1762. *Baker* de catarrho, Lond. 1764.
 Monro, Dif. of mil. hosp. pag. 137.
1767. *Heberden*, Med. transact. art. 18.

Inter catarrhi, coryzae, et tuffis species apud
SAUVAGESIUM, symptomatice funt,

Catarrhus rubeolofus, S. sp. 5.

Tuffis exanthematica, S. sp. 20.

Coryza variolofa, S. sp. 4.

Coryza virulenta, S. sp. 3.

Coryza purulenta, S. sp. 5.

Tuffis accidentalis, S. sp. 4.

Tuffis gutturalis, S. sp. 8.

Tuffis xerolaryngea, S. sp. 23.

Tuffis verminofa, S. sp. 21.

Tuffis ficca, S. sp. 3.

Tuffis calculofa, S. sp. 22.

Tuffis phthificalis, S. sp. 17.

Tuffis haemoptoica, S. sp. 15.

Tuffis a polypo, S. sp. 16.

Tuffis a dentitione, S. sp. 12.

Tuffis stomachalis humida, S. sp. 6.

Tuffis stomachalis sicca, S. sp. 7.

Tuffis hysterica, S. sp. 2.

Tuffis gravidarum, S. sp. 14.

Tuffis hepatica, S. sp. 9.

Tuffis rheumatica, S. sp. 18.

Tuffis arthritica, S. sp. 19.

Tuffis metallicolarum, S. sp. 4.

XLIII. D Y S E N T E R I A.

Pyrexia contagiosa ; dejectiones frequen-
tes, mucofae, vel sanguinolentae, re-
tentis plerumque foecibus alvinis ; tor-
mina ; tenesmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. *Sag.*
183. *Hoffm.* III. 151. *Junck.* 76.

Non nisi speciem unicam novi cujus nomi-
na apud SAUVAGESIUM sunt,

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. *Sydenham*, sect.
IV. cap. 3. *Helwich.* in hist. morb. Wratiflav.

ad ann. 1699. *Degner.* de Dysenteria Neomagenfi 1736. *Huxham,* de aëre, &c. ad ann. 1743. *Cleghorn's* Minorca, chap. 5. *Grimm.* hist. dyfenteriae malign. 1759, &c. in append. ad A. Nov. N. C. vol. III. *Baker* de catarrho et dyfenteria, Lond. 1762. *Akenfide* de dyfenteria, Lond. 1762. *Stark,* Hist. et fectiones dyfenteric. diff. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr. *Zurich.* 1767.

Dyfenteria caftrenfis, S. fp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illuft. *Pringle,* Dif. of the army, pag. 224. Cl. *Monro,* Dif. of mil. hofpitals, pag. 57.

Dyfenteria aequinoctialis, S. fp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.

Variat,

1. Vermibus comitata.

Dyfenteria verminofa, S. fp. 15. *Huxham* de aëre, &c. ad ann. 1743. M. *Mai.* III. *Pringle,* pag. 225. *Monro,* pag. 62.

2. Rejectis moleculis carnofis, vel febaeis.

Dyfenteria carnofa, S. fp. 16.

Diarrhoea carnofa, S. fp. 5. *Wedelius* Ephem.
 Germ. D. II. A. II. obf. 182. *Wagner*,
 ibid. D. II. A. III. obf. 187. cum fcholio
Schroeckii. *Morgagn.* de fed. Ep. XXXI.
 17—24. III. *Pringle*, pag. 237. *Monro*,
 pag. 62.

3. Febre intermittente comitata.

Dyſenteria intermittens, S. fp. 17. *Morton* in
 append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, pag.
 236. *Lautter.* hiſt. med. bienn. caſ. 17. 20.

4. Sine fanguine.

Dyſenteria alba, S. fp. 10. *Willis*, Pharm. rat.
 P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham*, Ed. Leid.
 pag. 179. *Morgagn.* de fed. Ep. XXXI. 11.
 III. *Pringle*, pag. 225. Cl. *Monro*, pag. 61.
Roederer de morbo mucoſo, Gotting. 1762.

5. Miliaria comitata.

Dyſenteria miliaris Gruberi, S. fp. 2. Febris
 exanthematico-dyſenterica Tiguri epidemica,
 1747.

Symptomaticae sunt,

- Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1.
- Dysenteria catamenialis, S. sp. 2.
- Dysenteria gravidarum, S. sp. 4.
- Dysenteria atrabilaria, S. sp. 5.
- Dysenteria syphilitica, S. sp. 13.
- Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.
- Dysenteria Polonica, S. sp. 19.
- Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.

Ad diarrhoeam pertinent,

- Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.
- Dysenteria a catharticis, S. sp. 12.

CL. II. NEUROSES*.

Sensus et motus laesi, sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

* A tempore celebris quondam apud Anglos medici THOMÆ WILLIS, morbos quosdam ab aliis quibusvis, sub nomine Nervosorum, distinxerunt Britanni; sed, ni fallor, parum accurate, dum affectiones hystericas et hypochondriacas fere solas sub nomine Nervosarum indigitarunt. Quantum ego quidem video, motus morborum fere omnes a motibus in systemate nervorum ita pendent, ut morbi fere omnes quodammodo Nervosi dici queant. Inter eos tamen distinctionem satis commode adhibere licet, et morbi isti qui nervorum systema fere solum, vel saltem primario, neque simul vel sanguinis circuitum, vel humorum naturam, nisi secundario afficiunt, Nervosi a nobis dicendi sunt. Classem itaque tam a classe pyrexiarum, quam a classe cachexiarum diversam, sub nomine Neurosium recte instituisse mihi videor.

O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum sopore si-
ve sensuum feriatiōe.

Comata, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* Cl. IX. O. V.

Soporosi, L. Cl. VI. O. II.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Nervorum resolutiones, *Hoffm.* III. 194.

Affectus soporosi, *Hoffm.* II. 209.

Motuū vitalium defectus, *Junck.* 114.

G. XLIV. APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti,
cum sopore*, plus minus profundo,
superfite motu cordis et arteriarum.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerb.*

1007. *Junck.* 117. *Sag.* G. 288. *Wepfer.* hist.

apoplecticorum.

* Apud LINNAEUM vocabulum Sopor, tam
pro motuum, quam pro sensuum feriatiōe ponitur;
sed sensu vulgari, tantum pro somno, vel pro statu
somno simili, eodem utimur.

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerb.* 1045.

Sag. G. 287*.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerb.*

1048. *Sag.* G. 286.

Coma, V. 232. *Boerb.* 1048.

Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

Ad hoc genus pertinere mihi videntur,

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Sag.* G.

281. *Boerb.* 1036. *Junck.* 44.

Affectus cerebri spasmodico-ecstasticus, *Hoffm.* III.

44.

Ecstasis, S. G. 177. V. 333. *Sag.* G. 283.

Symptomata esse videntur,

Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23. *Sag.* G.

284.

Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22. *Sag.* G.

285.

* Cum genera *carus*, &c. hic subjuncta non nisi apoplexiae leviores esse videntur, nec vel respiratione vel excitatione satis accurate distinguenda sint, ad unum genus omnia referenda esse censui.

Apoplexiae idiopathicae species sunt,

1. Apoplexia (*sanguinea*) cum signis plethorae universalis, et praecipue capitis.

Apoplexia sanguinea, S. sp. 1. *Morgagn.* de causis, &c. II. III. LX. *Preysinger*, sp. 1.

Carus spontaneus, S. sp. 2. *Boerb.* 1045.

Asphyxia * spinalis, *Du Hamel*, Hist. Acad. ann. 1688. cap. 2. *Boerb.* Praelect. ad Instit. 401.

Morgagn. de caus. &c. III. 3.

Cataphora coma, S. sp. 2.

* Genus *asphyxiae* ad *syncopen* olim retuli, et ejusdem species quasdam non nisi gradu a syncope differre, adhuc censeo. Plures vero asphyxiae species ad apoplexiae genus pertinere olim et nunc etiam persuasum habeo; ideoque eas hic recensui. Asphyxia spinalis quidem hic apposita, utpote signis nullis externis dignoscenda, male inter species recensetur; si vero ad causas internas unquam respicere liceret, certe inter apoplexiae species recensenda esset. Cum autem ad causas externas et evidentes omnino respicere liceat, ab his fatis perspectis plures asphyxiae species a SAUVAGESIO recensitas inter apoplexiae spe-

2. Apoplexia (*serosa*) in corpore, plerumque fenum, leucophlegmatico.

Apoplexia pituitosa, S. sp. 7. Apoplexia serosa, *Preysinger*, Sp. 4. *Morg.* de causis, &c. IV. LX.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.

Cataphora fomnolentia, S. sp. 1.

Lethargus literatorum, S. sp. 7. *Van Swieten* in aph. 1010, 2 γ. et 3 α.

species enumeravi ; nec huic obstare velim quod, in quibusdam asphyxiae speciebus, tum pulsus arteriarum tum respiratio, vita etiam superstita, tandem penitus cessant; nam in harum plerisque sub initio, cum motus et sensus fere penitus abolentur, superest adhuc motus quidam tum cordis tum pulmonum ; et si tandem omnino cessant, idem aliquando apoplecticis ante mortem accidit. In apoplexia porro, cerebrum, in syncope autem cor, primario affectum esse opinor; et asphyxiae species itaque, prout cerebrum vel cor primario afficiant, quatenus id fieri, ex causis earum externis, conjicere liceat, ad apoplexiae vel syncopes genus refero.

3. Apoplexia (*hydrocephalica* *) paulatim adoriens; infantes et impuberes, primum lassitudine, febricula et dolore capitis, dein pulsu tardiore, pupillae dilatatione, et somnolentia afficiens.

Hydrocephalus interior, S. sp. 1.

Hydrocephalus internus, *Whytt's Works*, pag. 725. *London Med. Observ.* Vol. IV. art. 3. 6. and 25. *Gaudelius* de hydrocephalo, apud *Sandifort* Thesaur. Vol. II.

Hydrocephalus acutus, *Quin*, *Diff. de hydrocephalo*, 1779.

Asthenia a hydrocephalo, S. sp. 3.

* In opere nosologico, morbos qui sub suo decursu variam induunt formam, rite collocare, ideoque apoplexiae hydrocephalicae locum maxime idoneum assignare, difficile est. Hunc morbum autem sub apoplexiae potius quam hydrocephali titulo ponere vellem; primo, quia hydrocephalus, qui hic subest, nequaquam sensibus evidens est; dein quia hic morbus symptomatis ab hydrocephalo evidente plurimum differt; denique, quia causa proxima et tandem symptomatis, apoplexiae quam maxime affinis est.

4. Apoplexia (*atrabilaria*) in corpore melancholico.

Apoplexia atrabilaria, S. sp. 12. *Preysinger*, Sp. 6.

5. Apoplexia (*traumatica*) a vi externa mechanica, capiti illata.

Apoplexia traumatica, S. sp. 2.

Carus traumaticus, S. sp. 5.

6. Apoplexia (*venenata*) a potentiis fe-
dantibus interne vel externe adhibitis.

Apoplexia temulenta, S. sp. 3.

Carus a narcoticis, S. sp. 14.

Lethargus a narcoticis, S. sp. 3.

Carus a plumbagine, S. sp. 10.

Apoplexia mephitica, S. sp. 14.

Asphyxia a mephitide, S. sp. 9.

Asphyxia a musto, S. sp. 3.

Catalepsis a fumo, S. sp. 3.

Asphyxia a fumis, S. sp. 2.

Asphyxia a carbone, S. sp. 16.

Asphyxia foricariorum, S. sp. 11.

Asphyxia sideratorum, S. sp. 10.

Carus ab insolatione, S. sp. 12.

Carus a frigore, S. sp. 15.

Lethargus a frigore, S. sp. 6.

Asphyxia congelatorum, S. sp. 5.

7. Apoplexia (*mentalis*) a pathemate mentis.

Carus a pathemate, S. sp. 11.

Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Ecstasis catoche, S. sp. 1.

Ecstasis resoluta, S. sp. 2.

8. Apoplexia (*cataleptica**) musculis, sub artuum a vi externa motu, contractilibus.

* Catalepsin nisi simulatam ipse nunquam vidi, et ab aliis visam frequenter simulatam fuisse credo. De morbo itaque rarius viso, varie descripto, et saepe prorsus simulato, pro certo statuere mihi vix liceret; sed genere ab apoplexia neutiquam diversum esse, bene persuasus sum; ideoque hic inter apoplexiae species collocavi.

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. Sag. G.
281. Boerb. 1036. Junck. 44.

Species apud SAUVAGESIUM sunt,

- Catalepsis hysterica, S. sp. 1.
- verminosa, S. sp. 2.
- a fumo, S. sp. 3.
- a menostasia, S. sp. 4.
- melancholica, S. sp. 5.
- delirans, S. sp. 6.

9. Apoplexia (*suffocata*) a potentia externa suffocante.

- Aphyxia suspenforum, S. sp. 4.
- Aphyxia immerforum, S. sp. 1.

Aphyxia flatulenta, S. sp. 12. ad apoplexiae genus pertinet, si a signis externis dignosci possit.

Apoplexia saepe symptomatica est,

1. Febris intermittens.

- Apoplexia febricosa, S. sp. 9.
- Carus febricosus, S. sp. 3.

- Cataphora timor, S. fp. 8
 Typhomania febricosa, S. fp. 1.
 Catalepsis quartanaria, S. fp. 7.

2. Febris continuæ.

- Carus febrilis, S. fp. 2.
 Typhomania continua, S. fp. 2.
 Typhomania agrypnocoma, S. fp. 3.
 Lethargus a febre, S. fp. 1.

3. Phlegmasiæ.

- Apoplexia inflammatoria, S. fp. 13.
 Lethargus cephaliticus, S. fp. 4.
 Lethargus pulmonicus, S. fp. 2.

4. Exanthematis.

- Carus variolosus, S. fp. 8.
 Apoplexia metastarica, S. fp. 6.
 Carus exanthematicus, S. fp. 18.
 Cataphora exanthematica, S. fp. 5.

5. Hysteriæ.

- Apoplexia hystERICA, S. fp. 4.

- Carus hystericus, S. sp. 9.
 Afphyxia hysterica, S. sp. 8.
 Carus myftagmus, S. sp. 17.
 Carus hypochondriacus, S. sp. 13.

6. Epilepsiae.

- Apoplexia epileptica, S. sp. 8.
 Apoplexia fufpiriofa, S. sp. 10.

7. Podagrae.

- Apoplexia arthritica, S. sp. 5.
 Carus arthriticus, S. sp. 6.
 Cataphora arthritica, S. sp. 4.
 Lethargus arthriticus, S. sp. 5.

8. Vermium.

- Apoplexia verminofa, S. sp. 15.
 Carus verminofus, S. sp. 7.
 Typhomania verminofa, S. sp. 4.

9. Ifchuriae.

- Carus Ifchuriofus, S. sp. 4.

10. Scorbuti.

Cataphora scorbutica, S. sp. 3.

G. XLIV. PARALYSIS:

Motus voluntarii nonnulli tantum immi-
nuti, saepe cum sopore.

Paralyfis, *Boerb.* 1057.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.

Paraplexia, S. G. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.

Atonia, L. 120.

I. Species idiopathicae sunt,

1. Paralyfis (*partialis*) quorundam mus-
culorum tantum.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.*

115.

Paralyfis plethorica, S. sp. 1.

Paralyfis ferofa, S. sp. 12.

Paralyfis nervea, S. sp. 11.

Mutitas a glossolyfi, S. sp. 1.

Aphonia paralytica, S. sp. 8.

2. Paralyfis (*hemiplegica*) alterius corporis lateris. **V**

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228. *Sag.*
G. 276.

Variat ratione habitus corporis.

a. Hemiplegia in habitu plethorico.

Hemiplegia ex apoplexia, S. sp. 7.

Hemiplegia spasmodica, S. sp. 2.

b. Hemiplegia in habitu leucophlegmatico.

Hemiplegia serosa, S. sp. 10.

Male recensetur

Hemiplegia apostematodes, S. sp. 11

Quae signis externis dignosci non potest, et

Hemiplegia ex epilepsia, S. sp. 12.

Recenseri vix meretur.

B b

3. Paralyfis (*paraplegica*) dimidii corporis
transversim sumpti.

Paraplexia, S. G. 171. *Sag.* G. 277.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paraplexia fanguinea, S. sp. 2.

Paraplexia a spina bifida, S. sp. 3.

Paraplexia rheumatica, S. sp. 1.

4. Paralyfis (*venenata*) a potentiis sedantibus
externe vel interne adhibitis.

Paralyfis metallariorum, S. sp. 22.

Hemiplegia saturnina, S. sp. 14.

II. Species symptomatice sunt,

Hemiplegia intermittens, S. sp. 8.

Paraplegia intermittens, S. sp. 6.

Paralyfis febrilis, S. sp. 8.

Hemiplegia exanthematica, S. sp. 6.

Paralyfis rheumatica, S. sp. 3.

Hemiplegia arthritica, S. sp. 5.

Paralyfis rachialgica, S. sp. 2.

Paraplegia rachialgica, S. sp. 5.

Paralyfis biliosa, S. sp. 9.

Hemiplegia transversa, S. sp. 1.

Paralyfis scorbutica, S. sp. 6.

Paralyfis scrophulosa, S. sp. 5.

Hemiplegia scrophulosa, S. sp. 4.

Hemiplegia syphilitica, S. sp. 3.

Paraplegia syphilitica, S. sp. 7.

Paralyfis Polonica, S. sp. 7.

Paralyfis a vomica, S. sp. 10.

Paralyfis traumatica, S. sp. 4.

Hemiplegia traumatica, S. sp. 9.

Paraplegia traumatica, S. sp. 4.

Tremorem, utpote semper symptomaticum, in numerum generum recipere nollem; species autem a SAUVAGESIO recensitas, prout mihi vel Astheniae vel Paralyfios, vel convulsionis symptomata esse videntur, hic subjungam.‡

T R E M O R.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio.

Tremor, S. G. 129. L. 139. V. 184. Sag. 236.

1. Species athenicae,

Tremor a debilitate, S. sp. 1.

Tremor fenilis, S. sp. 2.

Tremor a coffea, S. sp. 4.

Tremor a pathemate, metu, ira, gaudio, libidine,
S. sp. 14.

Tremor typhodes, S. sp. 19.

2. Species paralyticae.

Tremor paralytodes, S. sp. 11.

Tremor vertiginosus, S. sp. 7.

Tremor a plethora, S. sp. 13.

Tremor a faburra, S. sp. 12.

Tremor a hydrocephalo, S. sp. 8.

Tremor scorbuticus, S. sp. 10.

Tremor rheumatifmalis, S. sp. 18.

Tremor temulentus, S. sp. 3.

Tremor metallurgorum, S. sp. 5.

Tremor traumaticus, S. sp. 17.

3. Species convulsivae.

Tremor coactus, S. sp. 6.

Tremor tendinum, S. sp. 9.

Tremor palpitans, S. sp. 16.

O. II. A D Y N A M I Æ.

Motus involuntarii, five vitales five naturales, imminuti.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Defectivi, L. Cl. VI. O. I.

Leipofychiae, S. Cl. VI. O. IV. *Sag.* Cl. IX.
O. IV.

G. XLV. S Y N C O P E.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Syncope, S. G. 174. S. 94. V. 274. *Sag.* 280
Junck. 119.

Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273. *Sag.*
279.

Asphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275. *Sag.* 281.

Virium lapsus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

I. Idiopathicae.

1. Syncope (*cardiaca*) sine causa manifesta saepe rediens, cum palpitatione cordis vehementi in intervallis: *Ex vitio cordis vel vasorum vicinorum.*

Syncope plethorica, S. fp. 5. *Senac*, Tr. de coeur, p. 540.

Syncope a cordiogmo, S. fp. 7. *Senac*, de coeur, 414. *Morgagn.* de fed. XXV. 2. 3. 10.

Syncope a polypo, S. fp. 8. *Senac*, p. 471.

Syncope ab hydrocardia, S. fp. 12. *Senac*, 533. *Schreiber Almag.* L. III. § 196.

Syncope *Lanzoni*, S. fp. 18. *Lanzon.* Op. II. p. 462.

Asphyxia Valsalviana, S. fp. 13.

2. Syncope (*occasionalis*) a causa manifesta oriens: *Ex affectione totius systematis.*

Leipothymia a pathemate, S. fp. 1. *Senac*, p. 544.

Syncope pathetica, S. fp. 21.

Asphyxiae a pathemate, S. fp. 7.

Syncope ab antipathia, S. fp. 9. *Senac*, p. 554.

- Syncope a veneno, S. fp. 10. *Senac*, p. 546.
 Syncope ab apoftematis, S. fp. 11. *Senac*, p. 554.
 Syncope a sphacelo, S. fp. 14. *Senac*, p. 553.
 Syncope ab inanitione, S. fp. 1. *Senac*, p. 536.
 Syncope a phlebotomia, S. fp. 4.
 Syncope a dolore, S. fp. 2. *Senac*, p. 583.
 Afphyxia traumatica, S. fp. 14.
 Afphyxia neophytorum, S. fp. 17.

II. Symptomaticae, five fymptomata morborum vel totius fystematis, vel aliarum praeter cor partium.

- Syncope febrilis, S. fp. 3. *Senac*, p. 548.
 Syncope febricofa, S. fp. 17. *Torti Therap. fpec.*
 L. III. cap. 1.
 Syncope exanthematica, S. fp. 19.
 Syncope metaftatica, S. fp. 20.
 Leipothymia ftomachica, S. fp. 2.
 Syncope ftomachica, S. fp. 13. *Senac*, p. 545.
 Syncope hystérica, S. fp. 6. *Senac*, p. 547.
 Syncope arthritica, S. fp. 16. *Musgrave de arthr.*
 anomala, cap. 8.
 Syncope fcorbutica, S. fp. 15. *Lind de fcorbuto*,
 P. II. cap. 11. *Senac*, p. 552.

G. XLV. DYSPEPSIA.

Anorexia, nausea, vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, pauciora faltem vel plura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium morbo.

Dyspepsia, V. 277.

Apepsia, V. 276.

Diaphora, V. 278.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. *Sag. G.* 268.

Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157. *Sag. G.* 160.

Gastrodynia, S. G. 203. *Sag. G.* 161.

Soda, L. 47. V. 161.

Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159. *Sag. G.* 185.

Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214. *Sag. G.* 186.

Flatulentia, S. G. 271. L. 165. V. 127. *Sag. G.* 207.

I. Idiopathicae.

Anorexia pituituosa, S. sp. 2.

Anorexia a faburra, S. sp. 9.

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia paralytica, S. sp. 1

Nausea ex cacochylia, S. sp. 11.

Vomitus pituitosus, S. sp. 26.

Vomitus ruminatio, S. sp. 6.

Vomitus a faburra, S. sp. 2.

Vomitus a crapula, S. sp. 1.

Vomitus lacteus, S. sp. 3.

Flatulentia infantilis, S. sp. 5.

Flatulentia acida, S. sp. 1.

Flatulentia nidorosa, S. sp. 2.

Cardialgia bradypepta, S. sp. 9.

Cardialgia a faburra, S. sp. 2.

Cardialgia lactantium, S. sp. 11.

Cardialgia flatulenta, S. sp. 3.

Cardialgia paralytica, S. sp. 7.

Gastrodynia faburralis, S. sp. 1.

Gastrodynia flatulenta, S. sp. 2.

Gastrodynia periodynia, S. sp. 7.

Gastrodynia astringens, S. sp. 9.

Gastrodynia atterens, S. sp. 10.

Gastrodynia a frigore, S. sp. 18.

II. Symptomaticae,

I. A morbo ipfius ventriculi.

Cardialgia fchirrofa, S. fp. 6.

Vomitus a pyloro callofo, S. fp. 8.

Vomitus a fteatmate ventriculi, S. fp. 11.

Naufea ab apoftemate circa cardiam, S. fp. 9.

Gaftrodynia ulcérofa, S. fp. 5.

Vomitus ab ulcere ventriculi, S. fp. 10.

Cardialgia a veneno, S. fp. 2.

Gaftrodynia a veneno, S. fp. 4.

Vomitus a veneno, S. fp. 7.

Flatulentia accidentalis, S. fp. 4.

Gaftrodynia a peregrinis, S. fp. 11.

Anorexia biliofa, S. fp. 6.

Naufea biliofa, S. fp. 6.

Gaftrodynia biliofa, S. fp. 3.

Vomitus urinofus, S. fp. 2.

Gaftrodynia calculofa, S. fp. 8.

Vomitus bezoarticus, S. fp. 13.

Cardialgia verminofa, S. fp. 10.

Naufea a taenia, S. fp. 1.

Vomitus verminofus, S. fp. 5.

Gastrodynia a xiphoide, S. fp. 12.

Gastrodynia Americana, S. fp. 6.

Nausea ex compresso ventriculo, S. fp. 5.

Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. fp. 22.

Vomitus ab oesophago obstructo, S. fp. 21.

Gastrodynia gastrocelica, S. fp. 20.

Nausea ex gastrocele, S. fp. 4.

Vomitus gastrocelicus, S. fp. 18.

Cardialgia sputatoria, S. fp. 5.

Cardialgia inflammatoria, S. fp. 13.

Nausea ex gastritide, S. fp. 10.

Vomitus gastriticus, S. fp. 19.

2, A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, S. fp. 23.

Vomitus a dentitione, S. fp. 4.

Vomitus iliacus, S. fp. 24.

Nausea ex pancreatis schirro, S. fp. 3.

Vomitus a pancreate, S. fp. 17.

Vomitus ab hepate obstructo, S. fp. 16.

Anorexia melancholica, S. fp. 5.

Gastrodynia hypochondriaca, S. fp. 16.

Flatulentia hypochondriaca, S. fp. 3.

- Flatulentia convulsiva, S. sp. 7.
 Vomitus hypochondriacus, S. sp. 6.
 Vomitus atrabilarius, S. sp. 15.
 Anorexia mirabilis, S. sp. 10.
 Gastrodynia hysterica, S. sp. 14.
 Gastrodynia pulsatilis, S. sp. 13.
 Gastrodynia chlorotica, S. sp. 15.
 Nausea a femine corrupto, S. sp. 8.
 Nausea gravidarum, S. sp. 2.
 Vomitus gravidarum, S. sp. 12.
 Flatulentia lochialis, S. sp. 6.
 Anorexia arthritica, S. sp. 12.
 Cardialgia arthritica, S. sp. 8.
 Nausea nephritica, S. sp. 7.
 Vomitus nephriticus, S. sp. 20.
 Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.
 Cardialgia a cardiogmo, S. sp. 12.
 Anorexia plethorica, S. sp. 3.
 Anorexia cachectarum, S. sp. 7.
 Anorexia febrilis, S. sp. 4.
 Cardialgia febricosa, S. sp. 4.
 Gastrodynia febricosa, S. sp. 17.
 Vomitus febricosus, S. sp. 29.
 Vomitus rabiosus, S. sp. 14.
 Vomitus haemorrhagicus, S. sp. 28.
 Gastrodynia metastatica, S. sp. 19.
 Nausea marina, S. sp. 12.

Vomitus marinus, S. sp. 25.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

G. XLVI. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia cum languore, molestia, et metu,
ex causis non aequis, in temperamento
melancholico.

Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218. *Sag.*

332.

Morbus hypochondriacus, *Boerb.* 1098.

Malum hypochondriacum, *Hoffm.* III. 64. *Junck.*

36.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.

De Hypochondriasi algida, S. sp. 10. mihi
non liquet.

Species sequentes ex FRAECASSINO, ex
theoria parum certa confictae, mihi
videntur.

Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1.

Hypochondriasis sanguinea, S. sp. 2.

Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

Symptomaticae sunt,

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5.

Hypochondriasis phthifica, S. sp. 6.

Hypochondriasis asthmatica, S. sp. 7.

Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.

Hypochondriasis tympanica, S. sp. 9.

G. XLVII. C H L O R O S I S.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium ; cutis pallor vel decoloratio ; venae minus plenae, corporis tumor mollis ; asthenia ; palpitatio ; menstruorum * retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 305. Sag. G. 135.

Boerh. 1285. Hoffm. III. 311. Junck. 86.

* In hoc caractere antea dixi menstruorum
saepe retentio ; quasi species chlorosis esset in qua
 menses

Chloroseos unicam speciem veram agnosci-
mus, scilicet,

Chlorosis virginea, S. sp. 1.

a. Chlorosis amatoria.

Caeterae SAUVAGESII species spuriae, five
decolorationes, symptomatae sunt.

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.

Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlorosis infantum, S. sp. 4.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.

Chlorosis viridis, S. sp. 6.

menses rite fluxerunt, et cogitavi de specie quadam
cachexiae huc referenda. Sed nunc dubito an
species cachexiae quaevis sub titulo Chlorosis, vel
sub caractere hic dato, recte poni possit; et nul-
lam chlorosis speciem veram, praeter illam quae
retentionem menstruorum comitatur, agnoscere vel-
lem. Hinc vocabulum *saepe* in caractere nunc
omissum est; sed simul fateri cogor, chlorosin ideo
hic minus recte pro genere recensitam esse, cum
pro symptomate amenorrhoeae semper haberi pos-
sit.

Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.

Chlorosis maculosa, S. sp. 7.

Chlorosis Carthagenica, S. sp. 10.

Chlorosis Bengualensis, S. sp. 11.

Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.

O. III. S P A S M I.

Musculorum vel fibrarum muscularium
motus abnormes *.

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. V. *Sag.* Cl. VII.

Motorii, L. Cl. VII.

Morbi spasmodici et convulsivi, *Hoffm.* III. 9.

Spasmi et convulsiones, *Junck.* 45. 54.

Epilepsia, *Boerb.* 1071. 1088.

SECT. I. In functionibus animalibus.

G. XLVIII. T E T A N U S.

Totius fere corporis rigiditas spastica.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180. *Sag.* G.
228.

* Motus abnormes sunt qui ex causa praeternaturali
oriuntur, et qui violentia, frequentia, vel diuturni-
tate

Catochus *, S. G. 123. L. 128. V. 183. *Sag. G.*
229.

Opisthotonos, V. 181.

Episthotonos, V. 182.

Hujus species, ut solet, plures recensuit SAUVAGESIUS ; sed omnes, quae idiopathicae dici queunt, ad unam, ni fallor, referri possunt, et cujus forma praecipua apud SAUVAGESIUM appellatur

Tetanus Indicus, S. S. 5. de quo plura haberi possunt apud *Hillary*, Barbadoes, p. 219. *Chalmers*, Lond. Med. Obs. Vol. I. Art. 12. *D. Monro*,

tate contractionis praeter modum fiunt ; et nullus dubito quin hujusmodi motus, in morbis omnibus sub hoc ordine a nobis collocatis, revera fiunt ; plures licet morbi sint, quam sub eodem ordine ab aliis nosologis recensiti fuerunt.

* Catochus apud SAUVAGESIUM genus est minime naturale, cum genus illud conjunxerit species natura profus diversas ; ideoque ejusmodi genus omisi, sed species sub eo recensitas, quae a rigiditate spastica pendeant, ad tetani genus huc retuli.

Monro, Edinb. Phys. et Liter. Essays, Vol. III.
Art. 30. *A. Monro*, Art. 31. et sub nomine
spasmi apud *Bontium* de med. Ind. meth. med.
cap. 2.

Necalius morbus est,

Convulsio Indica, S. sp. 9.

Variat autem Tétanus ratione causae re-
motae, quatenus nimirum vel a causa
interna, vel a frigore, vel a vulnere
oriatur. A vulnere, varietas frequen-
tissima apud SAUVAGESIUM appella-
tur

Tetanus traumaticus, S. sp. 11.

Variat etiam quavis causa ortus Tetanus
ratione partis corporis affectae ; hinc

Tetanus tonicus, S. sp. 1.

Tetanus holtonicus, S. sp. 4.

Catochus holtonicus, S. sp. 1. *M. Febr.* in E-
phem. German. D. II. A. I. Obs. 1.

Catochus cervinus, S. sp. 2. *Stork.* Ann. Med.
1758. *M. Julio.*

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.

Tetani species symptomaticae sunt,

Tetanus febricosus, S. sp. 10. *Stork. Ann. Med.*
759. p. 166.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Tetanus lateralis *, S. sp. 6. *Morgagn. de caus.*
et fed. X. 2. et 3.

Tetanus syphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminosus, S. sp. 8.

Tetanus hystericus, S. sp. 12.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus diurnus, S. sp. 6.

G. XLIX. TRISMUS,

Maxillae inferioris rigiditas spastica,

Trismus, S. G. 117. L. 124. *Sag. G.* 223.

Capistrum, V. 208.

* In exemplo Tetani lateralis quod profert SAUVAGESIUS, adfuit in eodem aegro alterius lateris paralyfis; ideoque hic mox post Tetanum hemiplegicum potui; sed si Tetani lateralis exemplum a MORGAGNIO allatum, sine alterius lateris paralyfi fuit, de quo tamen mihi non constat, idem inter varietates idiopathicas recenferi potuiffet.

I. Species verae sunt,

1. Trismus (*nascentium*) infantes intra duas primas a nativitate septimanas corripens.

Trismus nascentium, S. sp. 1. *Heister*, Comp. med. pract. cap. XV. § 10. *Cleghorn's* Minorca, Introd. p. 33. *Hofer*. in Act. Helvet. tom. I. p. 65.

2. Trismus (*traumaticus*) omnium aetatum, a vulnere vel frigore.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.* Vol. I. Art. 1. 7. Vol. II. 34. Vol. III. 31. Vol. IV. 7.

Angina spasmodica, S. sp. 18. *Zwingeri* act. Helvet. tom. III. p. 319.

Convulsio a nervi punctura, S. sp. 2.

Trismus catarrhalis, S. sp. 15. *Hillary's* Barbadoes, 221. *Lond. Med. Obs.* vol. IV. 7.

II. Sequentes apud SAUVAGESIUM Trismi species, spurias, vel falsas dicimus; vel quod non a spafmo, sed ab alio mus-

culorum vitio pendeant, vel quod convulsivae potius quam spasmodicae sint, vel, denique, quod faciei potius quam maxillae inferioris, musculorum affectiones sint.

Trismus inflammatorius, S. sp. 3.

Trismus scorbuticus, S. sp. 4.

Trismus capistratus, S. sp. 11.

Trismus arthriticus, S. sp. 9.

Trismus verminosus, S. sp. 5.

Trismus hypochondriacus, S. sp. 8.

Trismus febrilis, S. sp. 10.

Trismus crepitans, S. sp. 7.

Trismus occipitalis, S. sp. 12.

Trismus maxillaris, S. sp. 13.

Trismus dolorificus, S. sp. 14.

Trismus cynicus, S. sp. 16.

Trismus cynogelos, S. sp. 17.

Trismus fardonicus, S. sp. 18.

Trismus diastrophe, S. sp. 19.

G. L. CONVULSIO.

Musculorum contractio clonica, abnormis,
citra soporem.

Convulsio, S. G. 128. L. 142. V. 191. *Sag.* G.
235.

I. Idiopathicae.

Convulsio universalis, S. sp. 11.

Hieranosos, L. 144. V. 190.

Convulsio habitualis, S. sp. 12.

Convulsio intermittens, S. sp. 16.

Convulsio hemitonos, S. sp. 15.

Convulsio abdominis, S. sp. 10.

Convulsio ab inanitione, S. sp. 1.

Convulsio ab onanismo, S. sp. 13.

Scelotyrbe festinans, S. sp. 2.

II. Symptomaticae.

Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4.

Convulsio nephralgica, S. sp. 6.

Convulsio gravidarum, S. sp. 14.

Scelotyrbe verminosa, S. sp. 5.

Convulsio febrilis, S. sp. 3.

G. II. CHOREA*.

Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiorum et manuum motu, histrionum gesticulationes referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.

Scelotyrbe, S. G. 136. *Sag.* G. 243.

Chorea, L. 139.

Speciem unam tantum videre mihi contigit, quae apud SAUVAGESIUM audit

Scelotyrbe chorea Viti, S. sp. 1

Chorea St. Viti *Sydenham*, Sched. monitoria.

* In priore hujus libri editione, Choream pro convulsionis specie habui; cum autem ratione tum aetatis quam adoritur, tum motuum quos exhibet, a quavis alia convulsionis specie plurimum differat, hic pro genere diverso posui.

Nec alia est,

Scelotyrbe instabilis, S. sp. 3. et fortassis
Scelotyrbe intermittens, S. sp. 4.

G. LII. R A P H A N I A.

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Linn. Amoen. acad.*
Vol. VI.

Convulsio raphania, S. sp. 7.

Germanis DER KRIEBEL KRANKHEIT:

Eclampsia typhodes, S. sp. 1. *Sennert. de febr.*
L. IV. cap. 16. *Gregor. Horst. oper. tom. II.*
L. VIII. Obs. 22. *Brunner in Ephem. Germ.*
D. III. A. II. obs. 224. *Willisch. ibid. Cent.*
VII. obs. 13. *Wepfer de affect. cap. obs. 120.*
Breslauer Sammlung 1717. Julio, Septembri,
et Decembr. *Ibid. 1723. Januar. A. N. C.*
Vol. VII. Obs. 41. *Bruckmann. Comm. No-*
rimb. 1743, pag. 50.

E e

Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

An *Convulsio Soloniensis* vel *Necrosis ostilaginea* fit idem morbus ?

Vide *Salerne* in *Memoires* présentés a l'acad. des sciences, tom. II.

G. LIII. EPILEPSIA.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Sag. G.*

24. *Boerb.* 1071. *Hoffm.* III. 9. *Junck.* 54.

Eclampsia *, S. G. 133. 189 *Sag. G.* 240.

* Eclampsiam quasi morbum acutum, ab epilepsia, quam pro chronico habent, distinguere, et pro diverso genere ponere, voluerunt SAUVAGESIUS et VOGELIUS; sed, cum inter morbos acutos et chronicos limites accuratos ponere ubique difficile sit, et cum eclampsia SAUVAGESII, tum causis tum phaenomenis plerumque cum epilepsia exacte congruat, illam genere ab epilepsia diversam esse nequaquam habere possum.

Species idiopathicae sunt,

1. Epilepsia (*cerebralis*) sine causa manifesta subito adoriens; praegressa nulla sensatione molesta, nisi fortassis vertiginis vel scotomiae alicujus.

Epilepsia plethorica, S. sp. 1.

Eclampsia plethorica, S. sp. 7.

Epilepsia cachectica *, S. sp. 2.?

2. Epilepsia (*sympathica*) sine causa ma-

possim. Ejusmodi genus prorsus omisit LINNÆUS, et quae plura ad eclampsiam ab epilepsia distinguendam protulit SAGARUS, speciem tantum non genus distinguere possunt.

* Epilepsia, apud SAUVAGESIUM *cachectica* dicta, revera duarum specierum esse videtur. Primo enim hanc *cachecticam* cum *serosa* HOFFMANNI et PRISONIS eandem esse autor statuit; deinceps, utpote acri repulso orta, eadem esse cum specie sua undecima nimirum *exanthematica*, statui potest. Hinc est quod hanc epilepsiam cachecticam utroque loco posui, sed dubius, et aliis dijudicandum relinquens.

nifesta ; sed praegressa sensatione aurae cujusdam a parte corporis quadam versus caput affurgentis.

Epilepsia sympathica, S. sp. 8.

Epilepsia pedisymptomata, S. sp. 6.

3. Epilepsia (*occasionalis*) ab irritatione manifesta oriens, et ablata irritatione cessans.

Variat pro diversitate irritamenti, et hinc

Ab injuria capiti illata.

Epilepsia traumatica, S. sp. 13.

Eclampsia traumatica, S. sp. 9.

A dolore.

Epilepsia a dolore, S. sp. 10.

Epilepsia rachialgica, S. sp. 14.

Eclampsia a doloribus, S. sp. 4.

a. Rachialgica.

b. Ab otalgia.

c. A dentitione.

Eclampsia parturientium, S. sp. 3.

A vermibus.

Eclampsia verminosa, S. sp. 2.

A veneno.

Eclampsia ab atropa, S. sp. 11.

Eclampsia ab oenanthe, S. sp. 12.

Eclampsia a cicuta, S. sp. 13.

Eclampsia a coriaria, S. sp. 14.

A scabie, vel alia acris humoris effusione,
retropulsa.

Epilepsia exanthematica, S. sp. 11.

Epilepsia cachectica, S. sp. 2.

A cruditate ventriculi.

Epilepsia stomachica, S. sp. 3.

Eclampsia a faburra, S. sp. 5.

A pathemate mentis.

Epilepsia a pathemate, S. sp. 7.

Ab haemorrhagia nimia.

Eclampsia ab inanitione, S. sp. 8.

A debilitate.

Eclampsia neophytorum, S. sp. 15.

Epilepsiae symptomatice sunt,

Epilepsia febricosa, S. sp. 9.

Eclampsia febricosa, S. sp. 17.

Eclampsia exanthematica, S. sp. 10.

Epilepsia uterina, S. sp. 4.

Epilepsia syphilitica, S. sp. 12.

Eclampsia ab hydrocephalo, S. sp. 16.

Eclampsia ab ischuria, S. sp. 6.

SECT. II. In functionibus vitalibus.

In actione cordis.

G. LIV. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Sag.*
237. *Hoffm.* III. 83. *Junck.* 33.

Si palpitationis causae variae externis signis dignosci possent, plures ejus species cum SAUVAGESIO pro diversitate cau-

fae ftatuere potuiffemus ; fed, cum caufae diverfae nullo modo, quantum novimus, diftingui queant, non nifi fpeciem unicam idiopathicam ftatuere poffum, et quam caractere fequenti infigniri vellem.

Palpitatio (*cardiaca*) fere conftans, faltem faepe rediens, fine alio morbo evidente.

Pro fynonimis fequentes SAUVAGESII fpecies recensere placet.

Palpitatio ab aneurysmate cordis, S. fp. 1. *Senac*,
Mal. de coeur. p. 484. *Lancisi* de aneurysm.

Palpitatio tremula, S. fp. 4. *Senac* de coeur, p.
504.

Palpitatio apoftematofa, S. fp. 7. *Lancisi* de aneurysmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* de coeur,
485.

Palpitatio a corde officato, S. fp. 2. *Senac* de
coeur. pag. 484. *Morgagn.* de fed. Ep. XXIV.
17.

Palpitatio calculofa, S. fp. 3.

Palpitatio a polypo, S. sp. 5. *Senac de coeur.*
lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polypofa, S. sp. 6.

Palpitatio ex aortae aneurysmate, S. sp. 8.

Palpitatio ex aortae angustia, S. sp. 9. *Lancisi de*
aneurysf. prop. 53. *Senac*, 484.

Palpitationis species symptomaticae sunt,

Palpitatio a pancreate, S. sp. 10. *Storck. Ann.*
med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. sp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. sp. 12.

Palpitatio hysterica, S. sp. 13.

Palpitatio melancholica, S. sp. 14. *Lancisi de a-*
neurysf. prop. 44.

Palpitatio febricosa, S. sp. 15. *Storck Ann. med.*
I. p. 75.

In actione pulmonum,

G. LV. A S T H M A.

Spirandi difficultas per intervalla subiens ;
cum angustiae in pectore sensu, et re-
spiratione cum sibilo strepente ; tussis

sub initio paroxyfmi difficilis, vel nulla,
verfus finem libera, cum fputo mucii
faepe copiofo.

Asthma, S. G. 145. L. 161. V. 268. *Sag.* G.
252.

Asthma convulfivum et fpafmodico-flatulentum,
Hoffm. III. 94.

Asthma fpafmicum, *Junck.* tab. 51.

Species idiopathicae funt,

1. Asthma (*fpontaneum*) fine caufa mani-
festa, vel alio morbo comitante.

Asthma humidum, S. fp. 1. flatulentum, *Floyer*
on the asthma, chap. 1.

Asthma convulfivum, S. fp. 2. *Willis*, Pharm.
rat. P. II. Sect. 1. cap. 12.

Asthma hystericum, S. fp. 3. *Floyer* on the asth-
ma, chap. 1.

Asthma ftomachicum, S. fp. 8. *Floyer*, Scheme
of the species of asthma. Periodic asthma, 6.

Orthopnoea fpafmodica, S. fp. 3.

Orthopnoea hystERICA, S. fp. 4.

2. Asthma (*exanthematicum*) a scabie vel alia acris effusione retropulsa.

Asthma exanthematicum, S. sp. 11.

Asthma cachecticum, S. sp. 13.

3. Asthma (*plethoricum*) a suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel a plethora spontanea.

Asthma plethoricum, S. sp. 15.

Species asthmatis symptomaticae sunt,

Asthma hypochondriacum, S. sp. 4.

Asthma arthriticum, S. sp. 5.

Asthma venereum, S. sp. 14. *Junck.* tab. 32.

G. LVI. D Y S P N O E A.

Spirandi difficultas perpetua, sine angustiae, et potius cum repletionis et infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Dyspnoea, S. G. 144. L. 160. V. 267. *Sag.* 251.

Junck. 32.

Species idiopathicae sunt,

1. Dyspnoea (*catarrhalis*) cum tussi frequente, mucum viscidum copiosum eji-
ciente.

Asthma catarrhale, S. sp. 16.

Asthma pneumaticum, *Willis*, Pharm. rat. P.

II. sect. I. cap. 12.

Asthma pituitosum, *Hoffm.* III. sect. II. cap. II.

§ 3.

Asthma pneumodes, S. sp. 17.

2. Dyspnoea (*sicca*) cum tussi plerumque
sicca.

Hujus causae variae haud facile dignoscen-
dae sunt; sequentes autem SAUVAGE-
SII species huc referri possunt.

Dyspnoea a tuberculis, S. sp. 2.

Dyspnoea a steatomatis, S. sp. 5.

Orthopnoea a lipomate, S. sp. 18.

Dyspnoea a hydatidibus, S. sp. 4.

Dyspnoea polyposa, S. sp. 20.

3. Dyspnoea (*aërea*) a minima quavis
tempestatum mutatione aucta.

Dyspnoea a pneumatia, S. sp. 12.

4. Dyspnoea (*terrea*) cum tussi materiem terream vel calculosam ejiciente.
5. Dyspnoea (*aquosa*) cum urina parca et oedemate pedum, sine fluctuatione in pectore, vel aliis characteristicis hydrothoracis signis.

Dyspnoea pituitosa, S. fp. 1.

Orthopnoea ab hydropneumonia, S. fp. 12.

6. Dyspnoea (*pinguedinoso*) in hominibus valde obefis.

Orthopnoea a pinguedine, S. fp. 6.

7. Dyspnoea (*thoracica*) a partibus thoracem cingentibus laesis, vel male conformatis.

Dyspnoea traumatica, S. fp. 15.

Orthopnoea traumatica, S. fp. 14.

Dyspnoea Galenica, S. fp. 16.

Dyspnoea rachitica, S. fp. 10.

Asthma a gibbo, S. fp. 9.

8. Dyspnoea (*extrinseca*) a causis externis manifestis.

- Asthma pulverulentorum, S. sp. 7.
- Asthma metallicum, S. sp. 12.
- Orthopnoea a vaporibus, S. sp. 16.
- Orthopnoea a deglutitis, S. sp. 9.
- Orthopnoea a fungis, S. sp. 25.
- Orthopnoea ab antipathia, S. sp. 15.
- Orthopnoea a bronchocele, S. sp. 10.

Dyspnoeae species symptomaticae sunt symptomata,

1. Morborum cordis, vel vasorum majorum,

- Dyspnoea a corde, S. sp. 11.
- Asthma a polypo cordis, S. sp. 6.
- Orthopnoea polyposa, S. sp. 26.
- Orthopnoea cardiaca, S. sp. 2.
- Dyspnoea aneurysmatica, S. sp. 19.
- Orthopnoea ab aneurysmate, S. sp. 8.
- Dyspnoea ab aortae angustia, S. sp. 22.

2. Tumoris abdominalis,

- Dyspnoea a phlegonia, S. sp. 7.

- Dyspnoea a graviditate, S. sp. 8.
 Dyspnoea tympanitica, S. sp. 9.
 Dyspnoea a liene, S. sp. 14.
 Dyspnoea a stomacho, S. sp. 13.
 Dyspnoea a gastrocele, S. sp. 17.
 Orthopnoea a gastrocele, S. sp. 11.

3. Variorum morborum,

- Asthma febricosum, S. sp. 18.
 Orthopnoea febricosa, S. sp. 20.
 Orthopnoea peripneumonica, S. sp. 1.
 Orthopnoea pseudo-peripneumonica, S. sp. 21.
 Orthopnoea variolosa, S. sp. 24.
- Dyspnoea scorbutica, S. sp. 18.
 Orthopnoea scorbutica, S. sp. 22.
- Orthopnoea a hydrothorace, S. sp. 5.
 Orthopnoea ab empyemate, S. sp. 13.
 Orthopnoea a vomica, S. sp. 7.
 Dyspnoea a vomica, S. sp. 6.
- Orthopnoea a hydrocephalo, S. sp. 23.
 Orthopnoea a vermibus, S. sp. 17.

G. LVII. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus ; tuffis convulsiva,
 strangulans, cum inspiratione sonora,
 iterata ; saepe vomitus.

Pertuffis, *Sydenham*. Ed. Leid. p. 200. 311. 312.

Huxham de aëre, ad ann. 1732.

Tuffis convulsiva, sive ferina, *Hoffm.* III. 111.

Tuffis ferina, S. sp. 10. *Sag.* sp. 10.

Tuffis convulsiva, S. sp. 11. *Sag.* sp. 11.

Amphimerina tufficulosa, S. sp. 13.

III. In functionibus naturalibus.

G. LVIII. PYROSIS.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris
 aquei, plerumque insipidi, aliquando
 acris, eructata.

Pyrosis, S. G. 200. *Sag.* G. 158.

Soda, L. 47. V. 154.

SCOTIS, The WATER-BRASH.

Species unica vera,

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.

Caeterae SAUVAGESII species symptomaticae sunt,

Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.

Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.

Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

G. LIX. COLICA.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. Sag. G. 162.

Junck. 106.

Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.

Rachialgia, S. G. 211. Sag. G. 168.

Ileus, S. G. 252. V. 162. Sag. G. 187.

Iliaca, L. 185.

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

Species idiopathicae sunt,

1. Colica (*spasmodica*) cum retractione umbilici et spasmis musculorum abdominalium.

Colica spasmodica, S. sp. 7.

Colica flatulenta, S. sp. 1.

Ileus phlogodes, S. sp. 9.

Colica biliosa, S. sp. 5 *.

Colica pituitosa, S. sp. 2 †.

Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.

Ileus Indicus, S. sp. 8.

Variat symptomatis superadditis ; hinc,

* Cum vomitus quivis vehemens et saepe repetitus bilem plerumque eliciat, *colicam* quam, ex vomitu bilis solo, *biliosam* appellarunt medici, omnino *spasmodicam* esse censeo.

† Pituita in parte quadam intestinorum congesta non nisi a spasmu obstruente fieri videtur ; ideoque tum *colicam pituitosam*, tum *ileum, a colo pituita infarcto*, hic apposui.

a. Colica cum vomitu stercoris, vel rerum per anum injectarum.

Ileus spasmodicus, S. sp. 3. *

Ileus volvulus, S. sp. 7.

b. Colica cum inflammatione superveniente.

Ileus inflammatorius, S. sp. 1.

Colica phlogistica, S. sp. 6.

2. Colica (*pietorum*) praëunte ponderis vel molestiae in abdomine, praecipue

* *Ileus* gradu tantum, nequaquam natura, a *colica* differre mihi videtur; ideoque *ileum* pro varietate *colicae* tantum hic recensui. Multi quidem medici *ileum* omnem inflammatorium esse putarunt. Dolorem autem abdominis, sive colicam, cum vomitu stercoris sine inflammatione adesse, ipse aliquoties vidi, Sin autem inflammatio aliquando adfit, si eadem *colicae* supervenerit, *colicam phlogisticam* dari recte monuit SAUVAGESIUS; nec ideo epigenomeno genus mutari; et si quidem cum dolore abdominis et vomitu ab initio adfuerit inflammatio, morbum pro *enteritide* habere vellem. Denique, quovis modo dari *ileum* genus a *colica* diversum concedere non possum.

circa umbilicum, sensu ; accedente dolore colico, primum levi, non continuo, et praecipue post partum aucto ; tandem graviore et fere perpetuo ; cum dolore brachiorum, et dorsi, in paralyfin demum abeunte.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1. *

Colica pictonum *Citesii* et succedentium *Auctorum*.

Variat ratione causae remotae ; et hinc

a. A veneno metallico.

Rachialgia metallica, S. sp. 3.

* *Rachialgiam* a *colica* genere diversam esse nequaquam video. Symptomata enim *colicae* essentialia in utroque morbo semper adsunt ; et si forte alteri quaedam superaddita sint, haec speciem non genus diversum constituere possunt. Ut medici igitur nuperi fere omnes, ita ego quam *rachialgiam* appellarunt *ASTRUCIUS* et *SALVAGESIUS*, pro specie *colicae* habui ac recensui.

Colica pictonum *Tronchin*. Sp. five a causa remota 2da.

b. Ab acidis ingestis.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1. *Tronchin*. sp. 3.

c. A frigore.

Rachialgia ab adiapneustia, *Tronchin*, sp. 5.

d. A contusione dorfi.

Rachialgia traumatica, S. sp. 7.

3. Colica (*stercorea*) in hominibus alvi tardae, post diuturnam alvi obstipationem.

Colica stercorea, S. sp. 3.

Ilcus a faecibus induratis, S. sp. 2.

4. Colica (*accidentalis*) a materie acri ingesta.

Colica accidentalis, S. sp. 18.

Colica Japonica, S. sp. 10.

Colica lactentium, S. sp. 20.

Ileus a veneno, S. sp. 14.

Cholera sicca auriginosa a fungis venenatis, S.
sp. 2.

5. Colica (*meconialis*) neophytorum a meconio retento.

Colica meconialis, S. sp. 19.

6. Colica (*callosa*) cum sensu in quadam intestinorum parte stricturae, et saepe ante eam collecti flatus cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim transiens evanescit; alvo tarda, et tandem non nisi faeces paucas liquidas egerente.

Ileus a callosa coli strictura.

7. Colica (*calculosa*) cum duritie in quadam parte abdominis fixa; calculis quondam per anum dejectis.

Colica calculosa, S. sp. 15.

Ileus calculosus, S. sp. 10.

Colicae symptomatice sunt,

Colica febricosa, S. sp. 21.

Rachialgia febricosa, S. sp. 2. *Tronchin.* sp. 1.

Colica hysterica, S. sp. 17.

Colica gravidarum, S. sp. 16.

Colica verminosa, S. sp. 4.

Ileus verminosus, S. sp. 13.

Colica Lapponica, S. sp. 9.

Rachialgia arthritica, S. sp. 4. *Tronchin,* sp.

Rachialgia scorbutica, S. sp. 6.

Ileus herniosus, S. sp. 6.

Colica enterocelica, S. sp. 22.

Ileus ab intestino compresso, S. sp. 4.

Colica schrofa, S. sp. 12.

Colica pancreatica, S. sp. 13.

Colica mesenterica, S. sp. 11.

Rachialgia ab osteofarctosi, S. sp. 8.

Colica plethorica, S. sp. 8.

a. Haemorrhoidalis.

b. Catamenialis.

Colica pulsatilis, S. sp. 14.

Ileus imperforatorum, S. sp. 12.

G. LX. CHOLERA.

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul
dejectio frequens; anxietas; tormina;
furarum spasmata.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. Sag. G. 183.

Hoffm. II. 165.

Diarrhoea cholericæ, Junck. 112.

Species idiopathicae sunt,

1. Cholera (*spontanea*) tempestate calida,
sine causa manifesta oboriens.

Cholera spontanea, S. sp. 1. Sydenh. sect. IV.
cap. 2.

Cholera Indica, S. sp. 7.

2. Cholera (*accidentalis*) a rebus acerbis
ingestis.

Cholera crapulosa, S. sp. 11.

Cholera a venenis fossilibus, S. sp. 4.

Cholera a veneno animali, S. sp. 5.

Cholerae symptomatice sunt,

Cholera intermittens, S. sp. 6.

Cholera inflammatoria, S. sp. 8.

Cholera arthritica, S. sp. 10.

Cholera verminosa, S. sp. 9.

G. LXI. DIARRHOEA.

Dejectio frequens ; morbus non contagio-
sus ; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 253. L. 187. V. 105. *Sag.* G.
189. *Junch.* 112.

Hepatirrhoea, S. G. 246.

Cholericæ, L. 190.

Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109. *Sag.* G.
199.

Lienteria, S. G. 256. L. 188. *Sag.* G. 191. V.
108.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhœis, V. 112.

Species idiopathicae sunt,

1. Diarrhoea (*crapulosa*) qua stercora naturalibus liquidiora et majori copia dejiciuntur.

Diarrhoea stercorosa, S. sp. 1.

Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.

2. Diarrhoea (*biliosa*) qua faeces flavae magna copia dejiciuntur.

Diarrhoea biliosa, S. sp. 8.

3. Diarrhoea (*mucosa*) qua vel ab acribus ingestis, vel a frigore, praecipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.

Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Diarrhoea ab hypercatharsi, S. sp. 16.

Dysenteria a cathartics, S. sp. 12.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhoeis, V. 112.

Diarrhoea pituitosa, S. sp. 4.

Coeliaca mucosa, S. sp. 3.

Diarrhoea serosa, S. sp. 10.

a. Diarrhoea urinosa.

4. Diarrhoea (*coeliaca*) qua humor lacteus specie chyli dejicitur.

Coeliaca chylosa, S. sp. 1.

Coeliaca lactea, S. sp. 4.

5. Diarrhoea (*lienteria*) qua ingesta parum mutata celeriter dejiciuntur.

Lienteria spontanea, S. sp. 2.

6. Diarrhoea (*hepatirrhoea*) qua materies seroso-cruenta, sine dolore dejicitur.

Hepatirrhoea intestinalis, S. sp. 2.

II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. sp. 3.

Diarrhoea febricosa, S. sp. 20.

Hepatirrhoea intermittens, S. sp. 7.

Diarrhoea variolosa, S. sp. 6.

Diarrhoea pleuriticorum, S. sp. 21.

- Diarrhoea arthritica, S. sp. 9.
 Diarrhoea colliquativa, S. sp. 13.
 Diarrhoea choleriodes, S. sp. 17.
 Hepatirrhoea vera, S. sp. 1.
 Hepatirrhoea a vulnere, S. sp. 3.
 Hepatirrhoea mesenterica, S. sp. 4.
 Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.
 Diarrhoea purulenta, S. sp. 11.
 Coeliaca purulenta, S. sp. 2.
 Hepatirrhoea scorbutica, S. sp. 5.
 Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.
 Lienteria scorbutica, S. sp. 3.
 Lienteria ex ulcere ventriculi, S. sp. 1.
 Lienteria aphthosa, S. sp. 4.
 Lienteria secundaria, S. sp. 5.
 Diarrhoea verminosa, S. sp. 14.
 Diarrhoea a dentitione, S. sp. 15.
 Diarrhoea chilienfis, S. sp. 12.
 Diarrhoea acrasia, S. sp. 7.

G. LXII. D I A B E T E S.

Urinae plerumque praeternaturalis, copia
 immodica, profusio chronica.

Diabetes, S. G. 263. L 197. V. 115. *Sag. G.*
 199. *Junck.* 99. *Dobson*, Med. Observations,
 Vol. V. p. 298. *Horne's* Clinical Experiments,
 sect. xvi.

Diurelis, V. 114.

Species idiopathicae sunt,

I. Diabetes (*mellitus*) cum urina odoris, coloris, et saporis mellei.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead* on poisons. Essay 1. *Ejusdem* Monita ¶Med. Cap. IX. sect. 2. *Dobson*, in Lond. Med. Observ. Vol. V. Art. 27. *Myers*, Diff. inaug. de Diabete, Edinb. 1779.

Diabetes febricosus, S. sp. 7. *Sydenh.* Epist. resp. ad *R. Brady* *.

* Quaeri potest, an diabetes febricosus SYDENHAMI ad diabete[m] mellitum, an ad insipidum referri debeat? Et simul quaeri potest, an urina in diabete hysterico vel arthritico sit mellita, an insipida, cum SYDENHAMUS ipse nullibi de sapore urinae. in diabete quovis, quicquid dixerit? Ad posterius respondere possum, quod, ex propria observatione, novi, urinam in diabete hysterico et arthritico nequaquam dulcem, et fere prorsus insipidam, esse, et diabete[m] febricosum SYDENHAMI ad diabete[m] mellitum ideo retuli; quod in simili fenis, post diuturnam febrem, diabete, urinam omnino dulcem inveni.

II. Diabetes (*insipidus*) cum urina limpida non dulci*.

M. Lister Exerc. medicin. II. de Diabete.

* An hujusmodi diabetis species sit frequens, incertum est. In omnibus exemplis, iisque non paucis, quae viderat WILLIUS, urinam mellitam semper invenit; et observationes nuperae frequentes fere omnes ejusmodi urinam exhibuerunt; ita ut dubium sit, an alia diabetis idiopathicae et permanentis species revera detur. Affirmat autem LISTERUS; et ego ipse inter plures mellitas unicam insipidam observavi. Ejusmodi itaque speciem dari concedo, ideoque recensui; sed, an recte legitima dici queat, vel an diabetes ARETAEI et plurium auctorum ejusmodi fuissent, multum dubito. Ante WILLISIIUM quidem, vel prioris aevi, vel extra Angliam, medicorum nemo urinam dulcem annotaverat; sed ejusmodi urinam temporibus WILLISII primo et in Anglia tantum comparuisse, minus verisimile est; omnesque ante WILLISIIUM de urina in diabete dulci prorsus siluisse, potius observationi perfunctoriae, vel omnino neglectae, imputarem. Quod observatores, quibus diabetis exempla antea occurrebant, vel negligentes vel malae fidei

Diabetes legitimus, S. sp. 1. *Aretacus* de morb. diurn. L. II. cap. 2.

Diabetes ex vino, S. sp. 5. *Ephem. Germ.* D. I. A. II. Obf. 122.

Symptomaticae sunt,

Diabetes hystericus, S. sp. 3. *Sydenh.* diff. epist. ad *G. Cole*.

Diabetes arthriticus, S. sp. 6. *Sydenh.* de podagra.

Diabetes artificialis, S. sp. 4. *Malpigh.* de liene.

G. LXIII. H Y S T E R I A.

Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et

fidei fuissent suspicor; cum plurimi eorum tam incredibilia, de potu in diabeticis per renes transeunte prorsus immutato, narrant. SYDENHAMUM autem ipsum, adeo perspicacem et diligentem, de statu urinae nihil monuisse, mirum videtur; sed, cum scripta WILLISII, SYDENHAMO satis nota, urinam semper esse dulcem asseruerint, si diversam invenisset SYDENHAMUS, quin id indicasset, nullus dubito.

fauces ascendens, ibique strangulans ; sopor ; convulsiones ; urinae limpidae copia profusa ; animus, nec sponte, varius et mutabilis *.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219. *Sag. G.*
242.

Malum hystericum, *Hoffm.* III. 50. *Junck.* 36.

Affectio hysterica, *Willis* de morb. convulsiv. cap.
5. 10. 11. *Sydenh.* diff. epist. ad *G. Cole.* *Whytt*
on nervous disorders.

Quatenus specie differat hysteria idiopathica, dicere non possum, nec, ut opinor,

* Novit quisque, in Nosologia et in Medicina facienda quadantenus exercitatus, quam difficile sit inter dyspepsiam, hypochondriam, et hysteriam semper accurate distinguere. Genera autem vera, et satis a se invicem distincta, indicasse mihi videor : Recte autem, an secus, fecerim, aliis dijudicandum relinquo. Morbos affines facile inter se misceri probe novi ; et, in quocunque casu, quisnam eorum pro primario sit habendus, per characteres nosologicos indicare, mihi difficillimum fore agnosco. Posterius, ut spero, hanc rem luculentius expositam dabunt.

recte dixit SAUVAGESIUS. Species enim ab eo recensitae non, nisi ratione causae remotae, varietates esse mihi videntur. Ita habet,

A. Ab emanatione mensium,

Hysteria chlorotica, S. sp. 2. *Raulin.* cap. 13.

B. A menorrhagia cruenta.

Hysteria a menorrhagia, S. sp. 3. *Raulin.* *Sydenham,*
Diff. epist. ad *G. Cole.*

C. A menorrhagia serosa, five fluore albo.

Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4. *Raulin.* cap. 14.

D. A viscerum obstructione.

Hysteria emphrastica, S. sp. 5. *Raulin.* cap. 5.

E. A vitio stomachi.

Hysteria stomachica, S. sp. 7. *Raulin.* cap. 4.

F. A falacitate nimia.

Hysteria libidinosa, S. sp. 6. *

Manifesto symptomatae sunt,

Hysteria verminosa, S. sp. 1. *Delii* Amoenit. Academ.

Hysteria febricosa, S. sp. 8. *Wedel.* in Ephem. German. D. I. A. II. Obf. 193.

G. LXIV. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuslibet, utpote convulsionem

* In speciebus hysteriae recensendis, egregius SAUVAGESIUS RAULINUM, theoriae subtili et fallaci, potius quam observationi, innitentem, secutus fuisse videtur. Nec quidem inter caeteras hysteriae species indicasse videtur SAUVAGESIUS, illam quam maxime exquisitam et frequentissimam, cenfeo, illam, scilicet, quae foeminas adultas, laute viventes, sanguineas, plethoricas, valentiores, et a morbo alio quovis immunes, saepe ex pathemate mentis solo adoritur.

pharyngis dolentem cientis, fastidium
et horror ; plerumque e morfu ani-
malis rabidi,

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Sag. G.*
343. *Boerb.* 1138. *Junck.* 124. *Mead* on poi-
sons. *Default* sur la rage *Sauvages* diff. sur
la rage. *James* on canine madness. *Dalby*,
Virtues of cinnabar and musk against the bite
of a mad dog. *Nugent* on the hydrophobia.
Ghoisel, Nouvelle methode pour le traitement de
la rage. *Journal de Medecine*, passim. *Medi-
cal Obs. and Inquiries*, Vol. III. Art. 34. Vol.
V. Art. 20. 26. and App. *Med. Transact.*
Vol. II. Art. 5. 12. and 15. *Heycham*, Diff.
Inaug. de rab. canin. Edinb. 1777. *Parry*,
Diff. inaug. de rab. contagios. sive canin. E-
dinb. 1778. *Andry*, Recherches sur la rage,
1778. *Vaughan*, Cases of hydrophobia, second
edit. 1778.

Species sunt,

I. Hydrophobia (*rabiosa*) cum morden-

di cupiditate ex morfu animalis rabidi.

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.

II. Hydrophobia (*simplex*) sine rabie, vel mordendi cupiditate.

Hydrophobia spontanea, S. sp. 2.

O. IV. VESANIÆ*.

* *Vesaniarum* ordinem hic instituere velim, quae cum classe VOGELII nota, *Paranoiae* inscripta, eadem omnino sit; sed a classe *Vesaniarum* SAUVAGESII et SAGARI in eo diversa, quod horum auctorum ordines *Hallucinationum* et *Morositatum* prorsus excludat; itidemque a classe *Mentalium* apud LINNÆUM diversa, quod hujus auctoris ordines *Imaginariorum* et *Patheticorum* etiam omittat.

A classe *Vesaniarum* autem tum *Hallucinationes* tum *Morositates* exclusas esse velim; quia neque causis, neque symptomatis cum *Vesaniis* strictè dictis ullo modo congruant. Quis enim Syrigmum vel Bulimiam, vel aliam *Hallucinationem* sive *Morositatem*, quae a mentis judicio non pendeat Vesaniam appellare vellet? Verum quidem est, tum hallucinationes, tum morositates, cum vesaniis aliquando conjunctas esse, sed simul adfunt alia vesaniae indicia, quae ejusmodi hallucinationes et morositates affectionis magis generalis symptomata tantum esse ostendunt. Ob has rationes, hallucinationes SAUVAGESII et imaginarios LINNÆI ad morbos

Mentis * judicantis functiones laesae sine
pyrexia vel comate.

Paranoiae, V. Cl. IX.

Deliria, S. Cl. VIII. O. III. *Sag.* Cl. XI. O. III.

Ideales, L. Cl. V. O. I.

G. LXV. A M E N T I A.

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines
rerum relationes, vel non percipiunt,
vel non reminiscuntur.

Amentia, S. G. 233. V. 337. *Sag.* G. 346.

Morosis, L. 106.

morbos locales olim detuli; et nunc morositates SAU-
VAGESII et patheticos LINNÆI, antea a nobis om-
nino omisso, ad locales etiam deferendos esse censui.

* In priore Nosologiae nostrae editione, has
functiones simpliciter mentis esse dixi, minus au-
tem recte; nam perceptio falsa sive *hallucinatio*, et
appetitus erroneus sive *morositas*, quodammodo ad
mentis functiones pertinent; cum vero utraque ab
hac classe exclusas esse velim, oportebat classis cha-
racterem nunc mutare, et mentis judicantis functio-
nes dicere.

Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.

Amnesia *, S. G. 237. Sag. G. 347.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Memoriae debilitas, Junck. 120.

Species sunt,

I. Amentia (*congenita*) a nativitate constans.

Amentia morosis, S. sp. 8.

Amentia microcephala, S. sp. 6.

II. Amentia (*senilis*) ex perceptione et memoria, ingravescente aetate, imminutis.

Amentia senilis, S. sp. 1

Amnesia senilis, S. sp. 2.

III. Amentia (*acquisita*) a causis externis

* Amnesiam cum amentia ad unum genus retuli, tum quia plerumque conjungantur, tum quia ab iisdem causis plerumque oriuntur, et amnesia ingravescens ad amentiam semper ducat.

evidentibus in hominibus sanae mentis
superveniens.

Amnesia febrifera, S. sp. 8.

Amentia a quartana, S. sp. 11.

Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.

Amnesia plethorica, S. sp. 4.

Amentia rachialgica, S. sp. 10.

Amnesia a venere, S. sp. 1.

Amnesia a pathemate, S. sp. 5.

Amentia a venenis, S. sp. 3.

Amentia a temulentia, S. sp. 7.

Amentia ab ic̄tu, S. sp. 9

Amnesia traumatica, S. sp. 3.

Sequentes SAUVAGESII species in Nofo-
logia methodica nequaquam recenferi
debent, cum caufae internae a quibus
characteres defumuntur, per figna ex-
terna nequaquam dignofci poffint.

Amentia ferofa, S. sp. 2.

Amentia a tumore, S. sp. 4.

Amentia a hydatidibus. S. sp. 5.

Amentia a siccitate, S. sp. 7.

Amentia calculosa, S. sp. 12.

G. LXVI. MELANCHOLIA.

Infania * partialis sine dyspepsia †.

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Sag.*

G. 347. *Boerb.* 1089. *Junck.* 121.

Daemonomania, S. G. 236. *Sag.* 348.

Daemonia, L. 69.

Vesania, L. 70.

Panophobia, L. 75.

Athymia, V. 329.

Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.

* Infaniam adesse dicimus, quando rerum relationes omnino falsae mente concipiuntur, ita ut hominis vel pathemata vel actiones praeter rationem excitentur.

† Hypochondriasis et melancholia non semper distingui possunt. Si quando autem possint, nullo alio signo quam per dyspepsiam in nypochondriasi semper praesentem, in melancholia saepe absentem rite, quantum video, distinguendi sunt.

Erotomania, L. 82.

Nostalgia, S. G. 226. L. 83. *Sag.* G. 338. *Junck.*

125.

Melancholia nervea, Cl. *Lorry* de melancholia,
P. I.

Variat pro varietate rerum de quibus homo delirat. Ita est

1. Cum hallucinatione de statu corporis sui a levibus causis periculoso ; vel de statu rerum suarum tristi metuendo.

Melancholia vulgaris, S. sp. 1.

Melancholia argantis, S. sp. 4.

Panophobia phrontis, S. sp. 3.

2. Cum hallucinatione de statu rerum suarum jucundo.

Melancholia moria, S. Sp. 5.

Melancholia enthusiastica, S. sp. 13.

Melancholia saltans, S. sp. 8.

3. Cum amore vehementi sine fatyriasi vel nymphomania.

K k

Melancholia amatoria, S. sp. 2.

Erotomania, L.

4. Cum superstitioso futurorum metu.

Melancholia religiosa, S. sp. 3.

5. Cum averfatione motus et omnium vitae officiorum.

Melancholia atonita, S. sp. 6.

6. Cum inquietudine et status cujusvis impatientia.

Melancholia errabunda, S. sp. 7.

7. Cum taedio vitae.

Melancholia Anglica *, S. sp. 11.

Melancholia phrontis, S. sp. 14.

6. Cum hallucinatione de suae speciei natura.

* Apud Anglos fortassis taedium vitae non semper a morbo pendet.

Melancholia zoantropica, S. sp. 12.

Melancholia hippantropica, S. sp. 9.

Melancholia scytharum, S. sp. 10.

DÆMONOMANIAM nullam veram esse cen-
seo *, et nostra sententia species sub hoc
titulo a SAUVAGESIO recensitae sunt,
vel,

1. Species melancholiae five maniae, uti

Daemonomania fanatica, S. sp. 5.

Daemonomania Indica, S. sp. 7.

Vel, 2do, Morbi ab adstantibus ad daemo-
num potentiam falso relati, uti

Daemonomania a vermibus, S. sp. 4.

Daemonomania Polonica, S. sp. 8.

Daemonomania a cardiogmo, S. sp. 9.

Vel, 3tio, Morbi omnino simulati, uti

Daemonomania fagarum, S. sp. 1.

* Ita cenfeo, quia daemonum in nostra corpora,
vel hisce temporibus in mentes nostras, potentiam
ullam esse pauci jam credunt.

Daemonomania vampirismus, S. sp. 2.

Daemonomania simulata, S. sp. 3.

Vel, 4to, Morbi partim veri, ut No. 2. recensiti, partim simulati, uti

Daemonomania hysterica, S. sp. 6.

G. LXVII. M A N I A.

Infania universalis.

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. *Sag.* G. 349.

Boerb. 1118. *Junch.* 122. *Battie* on madness.

Paraphrosyne, L. 66.

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

1. Mania (*mentalis*) omnino a pathemate mentis.

Mania a pathemate, S. sp. 1. Exempla inveniuntur ex melancholia apud *Preysingerum* de diagnosi morborum capitis; ex terrore, apud *Locherum* de mania; ex amore apud *Ephem.* Nat. Cur. Dec. II. A. Obs.; ex ira apud *Hoffman.* III. p. 263.

2. Mania (*corporea*) a vitio corporis evidente.

Variat pro varietate vitii corporis ; hinc

Mania metastatica, S. sp. 4.

ab ulcere ficcato *Amat. Lusitan.* Cent. II. cur.

67.

a resecta plica, *Hoffm.* tom. III. p. 263. *Ephem.*

N. Cur. Cent. I. Obs. 35.

a represso herpete, *Locher* de mania.

a menstruis retentis *Schenck.* Obs. p. 142.

a femine retento, *Schenck.* ibid.

a repressa scabie, *Lorry* de melancholia, tom. II. P. II. cap. 3.

a graviditate, *Lorry*, P. I. cap. 7.

a parciore lactis et lochiorum fluxu, *Puzos*, 3: Mem.

Mania lactea, S. sp. 2.

Mania hysteralgica, S. sp. 8.

Mania ab hemicrania, S. sp. 3:

Mania a venenis, S. sp. 5.

Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

3. Mania (*obscura*) praegresso nullo vel pathemate mentis, vel vitio corporis evidente.

Mania vulgaris, S. sp. 7:

Phrenitis apyreta, S. sp. 10.

Mania periodica, S. sp. 6.

Maniae species symptomaticae sunt,

PARAPHROSYNE, S. G. 232. *Sag.* G. 345.

1. Paraphrosyne a venenis,

Paraphrosyne temulenta, S. sp. 1.

Paraphrosyne a datura, S. sp. 2.

Paraphrosyne ab opio, S. sp. 3.

Paraphrosyne a conio, S. sp. 4.

Paraphrosyne magica, S. sp. 5.

2. Paraphrosyne a pathemate, S. sp. 7.

Paraphrosyne hysterica, S. sp. 12.

3. Paraphrosyne febrilis.

Delirium, L. 65. V. 330.

Paraphrosyne febricosa, S. sp. 10.

Paraphrosyne critica, S. sp. 11.

Paraphrosyne calentura, S. sp. 9.

Paraphrosyne puerperarum, S. sp. 8.

G. LXVIII. ONEIRODYNIA.

In fomno imaginatio vehementior vel molesta.

Somnium, V. 339.

Somnambulifmus, S. G. 221. L. 77. *Sag.* G. 333.

Hypnobatafis, V. 340.

Noctambulatio, *Junck.* 124.

Ephialtes, S. G. 138. L. 163. *Sag.* 245.

Incubus, V. 211. *Junck.* 50.

1. Oneirodynia (*activa*) excitans ad ambulationem, et motus varios.

Somnambulifmus vulgaris, S. fp. 1.

Somnambulifmus catalepticus, S. fp. 2.

2. Oneirodynia (*gravans*) ex fenfu ponderis alicujus incumbentis, et pectus praecipue comprimentis.

Ephialtes plethorica, S. fp. 1.

Ephialtes stomachica, S. fp. 2.

Ephialtes hypochondriaca, S. fp. 6.

Ephialtes tertianaria, S. fp. 5.

Ephialtes verminosa, S. sp. 4.

Ephialtes ex hydrocephalo *, S. sp. 3.

* Cum hydrocephalus per signa externa non semper dignosci possit, haec species minus apte recensetur; sed ideo appofui, quod ephialtes in iis qui simul anasarca crurum, et hydrothorace vel ascite laborant, ad hydrocephalum utcunque referri possit.

CL. III. C A C H E X I Æ.

Totius vel magnæ partis corporis habitus depravatus ; sine pyrexia primaria vel neurosi.

Cachexiæ, S. Cl. X. V, Cl. VIII. *Sag.* Cl. III.
Deformes, L. Cl. X.

O. I. M A R C O R E S.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I. *Sag.* Cl. III. O. I.
Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

G. LXIX. T A B E S.

Marcor ; asthenia ; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309. *Sag.* G. 100.

Species sunt,

1. Tabes (*purulenta*) ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica,

Tabes a vomica, S. fp. 15.

Tabes ulcerosa, S. fp. 12.

Tabes apostematodes, S. fp. 3.

Variat fede ; hinc

Tabes renalis, S. fp. 2.

Tabes hepatica, S. fp. 8.

Tabes a stomacho, S. fp. 14.

Tabes a pericardio, S. fp. 7.

Tabes catarrhalis *, S. fp. 13.

2. Tabes (*scrophulosa*) in corporibus scrophulosis.

Tabes glandularis, S. fp. 10.

Tabes mesenterica, S. fp. 9.

Scrophula mesenterica, S. fp. 4.

* Si cum catarrho diurno adfuerit tabes, cum pyrexia hectica, nihil dubitarem ejusmodi tabem catarrhalem ad purulentam referre.

Atrophia infantilis, S. sp. 13.

Atrophia rachitica, S. sp. 8.

Tabes rachialgica, S. sp. 16.

3. Tabes (*venenata*) a veneno ingesto.

Tabes a veneno, S. sp. 17.

Atrophia *febrisequa*, S. sp. 16. ad tabem purulentam, vel ad genus atrophiae, pertinet.

G. LXX. A T R O P H I A.

Marcor et athenia, sine pyrexia * hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. Sag. G. 102. Junck. 41.

Marasmus, L. 211.

Species sunt,

* Atrophia fortassis nunquam sine pyrexia, saltem sine pulsu solito frequentiori, adest; sed absentia pyrexiae hecticae, (pag. 80.) fere semper atrophiam a tabe distinguit.

1. Atrophia (*inanitorum*) ex evacuatione nimia.

Atrophia a ptylismo, S. sp. 7.

Atrophia a vomitu, S. sp. 9.

Atrophia ab alvi fluxu, S. sp. 6.

Tabes nutricum, S. sp. 4.

Atrophia nutricum, S. sp. 5.

Atrophia a leucorrhoea, S. sp. 4.

Tabes dorsalis *, S. sp. 1.

Tabes sudatoria, S. sp. 6.

Tabes a fanguifluxu, S. sp. 2.

Sanguinis inopia Ill. Lieutaud. fynopf. univ.
med. vol. I. pag. 52.

2. Atrophia (*famelicorum*) a nutrimento deficiente.

Atrophia lactentium, S. sp. 3.

* An ad atrophiā inanitorum, an ad atrophiā debiliū, pertinet tabes dorsalis, dubium mihi videtur, et ad posteriorem referre malle.

3. Atrophia (*cacochymica*) a nutrimento corrupto.

Atrophia scorbutica, S. sp. 12.

Tabes syphilitica, S. sp. 11.

Tabes a hydrope, S. sp. 5.

4. Atrophia (*debilium*) a nutritionis functione depravata, praegressa nulla vel evacuatione nimia, vel cacochymia.

Atrophia nervea, S. sp. 1.

Atrophia lateralis, S. sp. 15.

Atrophia senilis, S. sp. 11.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum
tumens.

Intumescentiæ. S. Cl. X. O. II. *Sag.* Cl. III. O.
II.

Tumidosi, L. Cl. X. O. II.

Seçt. I. ADIPOSÆ.

G. LXXI. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescencia mo-
lesta.

Polyfarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540. *Sag.* G.
106.

Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyfarcia adiposa, S. sp. 1.

Seçt. II. *FLATUOSÆ.*

G. LXXII. PNEUMATOSIS.

Corporis intumescencia tenfa, elastica, sub manu crepitans.

Pneumatosis, S. G. 280. V. 391. *Sag.* G. 107.

Emphysema, S. G. 13. L. 288. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

Species sunt,

1. Pneumatosis (*spontanea*) sine causa manifesta.

Emphysema spontaneum, S. sp. 1.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot.

2. Pneumatosis (*traumatica*) a vulnere thoracis.

Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot.

3. Pneumatofis (*venenata*) a veneno injecto vel applicato.

Pneumatofis a veneno, S. sp. 1.

4. Pneumatofis (*hysterica*) cum hysteria.

Pneumatofis hysterica, S. sp. 3.

G. LXXIII. TYMPANITES.

Abdominis intumescencia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. *Sag.*

G. 118. *Boerb.* 226. *Junck.* 87.

Affectio tympanitica, *Hoffm.* III. 339.

Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt,

1. Tympanites (*intestinalis*) cum tumore abdominis saepe inequali, et cum rejectione aëris frequenti, tensionem et dolorem levante.

- Tympanites intestinalis, S. sp. 1.
 Tympanites enterophyodes, S. sp. 3.
 Tympanites verminofus, S. sp. 7.
 Tympanites fpafmodicus, S. sp. 5.

- Meteorifmus ventriculi, S. sp. 1.
 Meteorifmus abdominis, S. sp. 2.
 Meteorifmus hystericus, S. sp. 3.
 Meteorifmus a manzanilla, S. sp. 4.

2. Tympanites (*abdominalis*) cum refonitu
 evidentiore, tumore magis aequabili, et
 emiffione flatuum rariori et minus le-
 vante.

- Tympanites abdominalis, S. sp. 2.
 Tympanites afciticus, S. sp. 4.
 Afcites flatulento-peritoneus, S. sp. 28.
 Tympanites Stewartii, S. sp. 6.

G. LXXIV. P H Y S O M E T R A.

Tumor levis, elasticus, in hypogaftrio fi-
 guram et fedem uteri referens.

- Phyfometra, S. G. 290. *Sag.* G. 117.
 Hysterophyfe, V. 317.

Species sunt,

Phyometra ficca, S. sp. 1.

Tympanites uteri ficca, *Astruc*, sur les malad.
des femmes, L. II. cap. 9.

Phyometra humida, S. sp. 2.

Tympanites uteri humida, *Astruc*. loc. cit.

Seçt. III. AQUOSÆ SIVE HYDROPEs.

G. LXXV. ANASARCA.

Corporis totius vel partis ejus intumescen-
tia mollis, inelastica.

Anasarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Sag.* G.
108. *Boerh.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.
Monro on the dropsy, 1765. *Milman*, Animad-
versiones de hydrope, 1779.

Phlegmatia, S. G. 282.

Angina aquosa, *Boerh.* 791.

Species sunt,

1. Anasarca (*serosa*) a retento sero ob e-
vacuationes solitas suppressas, vel ab
aucto sero ob ingestam aquam nimiam.

Anasarca metastatica, S. sp. 1.

a, Anasarca periodica.

b. Anasarca ab adiapneustia.

- Phlegmatia lactea, S. sp. 3.
- Phlegmatia a ménostasia, S. sp. 5.
- Anasarca urinosa, S. sp. 11.
- Anasarca hydropotarum, S. sp. 10.

2. Anasarca (*oppilata*) a compressione venarum.

- Anasarca gravidarum, S. sp. 5.
- Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.
- Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.
- Angina Loweriana, S. sp. 2.
- Angina oedematosa, Boerb 791.

3. Anasarca (*exanthematica*) post exanthemata, et praecipue post erysipelas, suborta.

- Anasarca exanthematica, S. sp. 3.
- Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.
- Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.
- Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.
- Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.
- Anasarca Americana, S. sp. 7.

276 GENERA MORBORUM

4. Anafarca (*anaemia*) a tenuitate sanguinis per haemorrhagiam producta.

Anafarca a fluxu, S. sp. 2.

5. Anafarca (*debilium*) in debilibus a morbis longis, vel ab aliis causis.

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1.

Anafarca a febris, S. sp. 4.

Anafarca hysterica, S. sp. 2.

Phlegmatia hysterica, S. sp. 2.

Anafarca rachialgica, S. sp. 8.

Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

Anafarca purulenta, S. sp. 9. vix ad anafarcam referri potest.

G. LXXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hiantibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. *Boerb.* 1217.

Hydrocephalum, V. 384.

Species unica,

Hydrocephalus exterior, S. sp. 2. *.

G. LXXVII. H Y D R O R A C H I T I S.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis,
exiguus, hiantibus vertebrae.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn.* de fed. XII.
9. et seq.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXVIII. H Y D R O T H O R A X.

Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata;
urina parca; decubitus difficilis; subita
et spontanea ex somno cum palpitatione
excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. 150. V. 311. *Boerb.* 1219.

Species sunt,

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3.

* Hydrocephalum internum, antea hic recensitum,
ad Apoplexiam, sub nomine Apoplexiae hydrocephalicae, jam supra retuli.

Hydrothorax febrisequens, S. sp. 4.

Hydrothorax a scabie, S. sp. 9.

Sequentes minus recte recensentur, cum liquidi intus contenti neque natura, neque fons, neque sedes, per signa externa dignosci queat.

Hydrothorax chylofus, S. sp. 1. *Willis*, Pharm. rat.

P. 1. sect. I. cap. 13.

Hydrothorax hydatidofus, S. sp. 5. *Morg.* de fed.

XVI. 33.

Hydrothorax mediaftini, S. sp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. sp. 7. *Hoffm.* III. p. 337.

Bergeron, diff. de hydrope pectoris.

Hydrothorax pericardii, S. sp. 8. *Morg.* de fed.

XVI. 34. 36. *Senac* de coeur, tom. II. p. 349.

Minus recte a SAUVAGESIO hic recensetur

Hydrothorax ab omento, S. sp. 2.

G. LXXIX. A S C I T E S.

Abdominis intumescencia tenfa, vix elastica,
fed fluctuofa.

Afcites, S. G. 288. L. 217. V. 314. Sag. G. 115.
Boerb. 1226. *Hoffm.* III. p. 322. *Junck.* 87.
D. Monro on the dropsy, 1765. *Milman*, Ani-
 madversiones de hydrope, 1779.

Species funt,

- I. Afcites (*abdominalis*) cum tumore to-
 tius abdominis aequali, et cum fluctua-
 tione fatis evidente.

Afcites vulgator, S. sp. 1.

Variat ratione caufae.

A. Ab oppilatione vifcerum.

Afcites ab oppilatione, S. sp. 2.

Afcites ab hepate, S. sp. 3.

Afcites a liene, S. sp. 4.

Afcites fcrophulofus, S. sp. 5.

Afcites artificialis, S. sp. 10.

B. A debilitate.

Afcites ab exanthematis, S. sp. 8.

Afcites arthriticus, S. sp. 9.

Afcites febrilis, S. sp. 12.

Afcites ex quartana, *Werhof.*

Afcites fcorbuticus, S. sp. 11.

C. A tenuitate fanguinis.

Afcites a fanguifluxibus, S. sp. 7.

Variat etiam ratione liquidi effufi.

Afcites purulentus, S. sp. 21. *.

Afcites urinofus, S. sp. 22.

Afcites chylofus, S. sp. 23.

Afcites oleofus, S. sp. 24.

2. Afcites (*faccatus*) cum tumore abdominis, faltem initio, partiali et cum fluctuatione minus evidente.

Afcites ab ovariis, S. sp. 6.

Afcites ovarii, S. sp. 19.

a. Afcites faccatus.

Hydrometra ovarii, S. sp. 6.

Afcites cruentus, S. sp. 20.

* De hisce et pluribus aliis afcitis speciebus recensitis idem notandum est ac in pag. 278.

Afcites ftomachi, S. fp. 16.
Afcites omentalis, S. fp. 18.

Afcites intercus, S. fp. 14.
Afcites fanguineo-intercus, S. fp. 26.
Afcites fanguineo-peritonaeus, S. fp. 27.
Afcites purulento-peritonaeus, S. fp. 29.

G. LXXX. H Y D R O M E T R A.

Hypogaftrii in mulieribus paulatim crefcens tumor, uteri figuram referens, preffui cedens fluctuanfve ; citra ifchuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Sag.* G. 116. *Boerh.* 1224.

Species per externa figna diftinguendae vix dari poffunt ; fed fequentes ex SAUVAGESIO recensentur.

Hydrometra afcitica, S. fp. 1.

Hydrometra gravidarum, S. sp. 2.

Hydrometra hydatica, S. sp. 4.

Afcites uterinus, S. sp. 15.

Hydrometra fanguinea, S. sp. 3.

Afcites fanguineo-uterinus, S. sp. 25.

Hydrometra puriformis, S. sp. 5.

G. LXXXI. HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Ofcheocele, S. G. 41. V. 388.

Ofcheophyma, *Sag.* G. 44.

Hydrops scroti, V. 389.

Hydrops testium, *Boerb.* 1227.

Species sunt,

Ofcheocele aquosa, S. sp. 2. *Monro* in *Edinb. Eff.* Vol. V. Art. 21. *Sharp's* Operations and critical inquiry. *Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele. *Le Dran*, Operations de Chirurgie. *Bertrandi* in Mem. de l'Acad. de chirurgie, Vol. III.

Ofcheocele hydatidosa, S. sp. 3.

Ofcheocele Malabarica, S. sp. 4. *Kempfer*, *Amoen. exot. fasc.* III. obs. 7.

Se&t. IV. S O L I D Æ.

G. LXXXII. P H Y S C O N I A.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

Physonia, S. G. 283. V. 325. Sag. G. 110.
Hypofarca, L. 218.

Species sunt *,

Physonia hepatica, S. sp. 1.

Cl. *Cuffon. Bonet.* Sepulchr. de graviditate falsa, obf. 3. n. 8. 9. 10. *Verduc* Patholog. du rachitidis.

a. *Schirrhodea.* G. *Segeri* M. Nat. Cur. D. I. Ann. IV. obf. 142.

* Species sequentes nequaquam ad normam Nomenclologiae methodicae recensentur, sed accuratius physoniae species indicare difficile foret, saltem plus exegisset, quam quo nunc fruor otii. Interim *Cuffoni* doctissimi opus summae ad pathologiam utilitatis repetere hic placuit.

- b. *Calculosa Bonet*. Sepulchr. de hypochondrii tumore, obf. 5.
- c. *Hydatidosa Winckeri* Disp. de hydatidibus, apud *Bonet*. Med. Septent. T. II. pag. 313.

Physconia splenica, S. -sp. 2.

- a. *Emphractica Haller*. Disp. pathol. T. IV. disp. 109. *Tulp*. Obf. med. lib. II. cap. 30.
- b. *Schirrboæca Bonet*. Sepulchr. de ventris tumore, obf. 34. n. 3.

Physconia renalis, S. sp. 3.

- Bonet*. Sepulchr. de gravid. falsa, obf. 3. n. 7.
- a. *Calculosa Plater*. Obf. L. II. p. 449. *River*. cent. IV. obf. 34.
 - b. *Sarcomatico-cystica Haller*. Disp. pathol. disp. 114.

Physconia uterina, S. sp. 4.

- Bonet*. Sepulchret. de gravid. falsa, obf. 2. n. 5.
6. 7.

Phyſconia ab ovario, S. ſp. 5.

Monro, Effais d' Edinburgh, tom. VI. Art. 74.
obf. 1.

Phyſconia meſenterica, S. ſp. 6.

- a. *Hydatidoſa Greg. Horſtii*, Lib. 5. obf. 33.
Tulp. obf. Lib. II. c. 34.
- b. *Strumofa Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tu-
more, obf. X. n. 15. *Ambr. Pare*, L. VII.
c. 21. *Scultet.* Armam. chirurg. obf. 38.
- c. *Schirrodea Marc. Donat.* Hiſt. med. mir.
lib. VII. c. 15. *Claudin.* conſult. Sect. II.
conſult. 134. *Trincavell*, lib. III. conf. 22.
Riolan. Anthropogr. lib. II. c. 26. *Morgagni*
de fedib. ep. 39. n. 2.
- d. *Sarcomatica Bonet.* Sepulchr. de falſa gra-
vid. obf. 3. n. 1.
- e. *Steatomatoſa, Barth. Cabrol.* Obf. 33. et 35.
Tulp. Obf. Lib. II. c. 32. et 33. *J. Lechellii*
apud *Bonet.* Med. ſept. T. II. p. 486. Idem
Collect. acad. Tom. III. p. 585. *Hierne* Col-
lect. acad. tom. III. p. 226. Obf. 166.
- f. *Fungeoſa, Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa,
obf. 3.

Phyſconia inteſtinalis, S. ſp. 7.

- a. *Concreto-glomerata*, Morgagn. de ſedib. epiſt. 39. n. 21. 25.
- b. *Sarcomatica*, Fanton. Obſ. med. ſelectiores, obſ. 11.

Phyſconia omentalis, S. ſp. 8.

Frid. Reebman Diſſ. de omento.

Phyſconia polyſplachna, S. ſp. 9.

- a. *Schirrhodea*, Fabr. *Hildani* cent. II. obſ. 45.
- b. *Schirrhodea et ſarcomatica*, *Huldenreich*, M. N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.
- c. *Schirrhodea et adiposa*, T. *Bartholin*. cent. III. obſ. 6.
- d. *Hydatidosa*, *Volch. Coiter*. Obſ. anat. p. 117. *Maur. Cordaei* comm. 5. ad lib. priorem, *Hippocr.* de muliebr
- e. *Hydatidosa et ſcirrhodea*, *Halleri* Diſp. pathol. Tom. V. p. 256.

Phyſconia viſceralis, S. ſp. 10.

Bonet. Sepulchr. de gravid. falſa, obf. 3. Megaloplachnos *Hippocrat. Marc. Donat.* Hiſt med. mir. lib. VI. c. 2. *Schenck* ex *Garnero* de liene, Lib. III. Obf. 9. *Salmuth.* cent. I. obf. 21. *Bonet.* Med. ſept. Lib. VII. p. 487. *Bianchi* Hiſt. hepat. T. I. p. 130.

Phyſconia externa lupialis, S. ſp. 11.

Graham Tranſ. philoſ. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

Phyſconia externa ſcirrhodea, S. ſp. 12.

Ger. Blaſ. Obf. med. VI.

Phyſconia externa hydatidofa, S. ſp. 13.

Bonet. Sepulchr. de gravid. falſa, obf. 3. § 2. 3. 4. 11. &c. *Achotzii* apud *Schenckium*, Lib. III. de hydrope, obf. 4. et apud *Scholtzium* conf. 339. *Solenandri* conf. 15. ſect. V. *Riverii* Obf. communicat. ultim.

Phyſconia ab adipe ſubcutaneo, S. ſp. 14.

a. *Simplex*, Cl. *Lieutaud.* Comp. med. *J. Mich. Fehr.* apud *Bonet.* Med. ſept. T. I. p. 636.

b. *Syphilitica*, obſervante celeb. *Fizes.*

Phyſconia ab excreſcentia, S. ſp. 15.

G. LXXXIII. R A C H I T I S.

Caput magnum anterius maxime tumens ; genicula tumida ; coſtae depreſſae ; abdomen tumidum ; caetera marceſcentia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Sag.* G. 120. *Boerb.* 1480. *Hoffm.* III. 487. *Zeviani* della rachitide.

Variat,

1. *Simplex* ſine alio morbo.

Rachitis nodosa, S. ſp. 1.

Rachitis Britannica *, S. sp. 2. *Gliffon* de rachitide.

2. Aliis morbis conjuncta:

Rachitis strumosa, S. sp. 3.

Rachitis Polonica, S. sp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. sp. 6.

Neque rachitis *calmucana*, S. sp. 4. neque rachitis *a castratione*, S. sp. 7. pro morbo haberi potest.

* Minus recte pro diversis speciebus ponuntur rachitis *nodosa* et *Britannica*, cum non differant aliter quam morbus incipiens et confirmatus.

O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V. *Sag.* Cl. III. O. V.

G. LXXXIV. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo; tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367. *Sag.* G. 121.

Struma, L. 284.

Species sunt,

1. Scrophula (*vulgaris*) simplex, externa, permanens.

Scrophula vulgaris, S. sp. 1.

2. Scrophula (*mesenterica*) simplex, interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum infolito.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

3. Scrophula (*fugax*) simplicissima, et tantum circa collum, plerumque a re-
forptione ex ulceribus capitis proveniens.

Scrophula fugax, S. sp. 2.

4. Scrophula (*Americana*) cum framboesia conjuncta.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Neque scrophula *periodica*, S. sp. 6. neque scrophula *Moluccana*, S. sp. 8. ad genus scrophulae pertinere mihi videtur.

G. LXXXV. SYPHILIS.

Morbus contagiosus, post concubitum impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum ; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores otocopi ; exostoses.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319. Sag. G. 126.

Lues venerea, Boerh. 1440. Hoffm. III. 413. Junck. 96. Astruc de lue venerea.

Species unica,

Syphilis venerea, S. sp. 6.

Syphilis *Polonica*, S. sp. 2. nequaquam ad hoc genus pertinet, et de Syphilide *Indica*, S. sp. 3. nobis non satis constat, ut pro diversa specie ponatur.

G. LXXXVI. S C O R B U T U S.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente; asthma; stomacace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescences, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Sag. G.* 127. *Boerb.* 1148. *Hoffm.* III. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the scurvy. *Hulme* de scorbuto. *Roupe* de morbis navigantium.

Variat gradu.

- a. Scorbutus incipiens.
- b. Scorbutus crescens.
- c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam symptomatibus.

- d. Scorbutus lividus, *Nitzsch*, Theoret. pract. ab *Handl.* des Scharbockes, &c.

- e. Scorbutus petechialis, *Nitzsch*, *ibid.*
- f. Scorbutus pallidus, *Nitzsch*, *ibid.*
- g. Scorbutus ruber, *Nitzsch*, *ibid.*
- h. Scorbutus calidus, *Nitzsch*, *ibid.*

G. LXXVII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus ; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta ; in extremis artubus anaesthesia ; facies tuberculibus deformis ; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. G. 302. V. 321. *Sag.* G. 128.

Elephantia Arabum, V. 322.

Varietates sunt,

Elephantiasis Orientalis, S. sp. 1.

Elephantiasis legitima, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.*

Vol. I. Art. 19.

Elephantiasis leonina, S. sp. 3.

Elephantiasis Tyria, S. sp. 4.

Elephantiasis Alopecia, S. sp. 5.

Elephantiasis syphilitica, S. sp. 6.

Elephantiasis Javanensis, S. sp. 7.

Elephantiasis Indica, S. sp. 9. *

G. LXXXVIII. L E P R A.

Cutis escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepra, S. G. 303. L. 262. *Sag.* G. 129.

Lepra Graecorum, V, 320.

Varietates sunt,

Lepra Graecorum, S. sp. 1.

Lepra ichthyosis, S. sp. 2.

Lepra Indica, S. sp. 3.

Lepra Asturiensis, S. sp. 4.

Lepra herpetica, S. sp. 5.

Lepra malum mortuum, S. sp. 6.

LXXXIX. F R A M B O E S I A.

* De Elephantiasi, Lepra, Framboesia, et Trichomate, utpote morbis a meipso nunquam visis, amplius statuere non ausus sum.

296 GENERA MORBORUM

Fungi, mori, vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Framboesia, S. G. 125. *Sag.* G. 125.

Varietates sunt,

Framboesia Guineensis, S. sp. 1. *Edinb. Essays*,
Vol. VI. Art. 71.

Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. XC. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in cirrhos et funiculos inextricabiles implicati.

Trichoma, S. G. 311. *Sag.* G. 137.

Plica, L. 313.

Plica sive Rhopalosis, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1

Trichoma villosum, S. sp. 2.

G. XCI. ICTERUS.

Flavedo cutis et oculorum ; faeces albiae ;
urina obscure rubra, immiffa colore lu-
teo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerb.* 918. *Junck.* 90;

Aurigo; S. G. 306. *Sag.* G. 132.

Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species idiopathicae funt,

1. Icterus (*calculofus*) cum dolore in regio-
ne epigaftica acuto, post pafum aucto,
et cum dejectione concretionum biliofa-
rum.

Aurigo calculofa, S. fp. 9.

2. Icterus (*fpaftmodicus*) fine dolore, post
morbos fpafmodicos et pathemata men-
tis.

Aurigo hystérica, S. fp. 13.

Species quaedam, quae a SAUVAGESIO sub titulo
Auriginis a venenis, recententur.

3. Icterus (*hepaticus*) sine dolore, post morbos hepatis.

Aurigo hepatica, S. sp. 11.

Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.

Aurigo purulenta, S. sp. 7.

4. Icterus (*gravidarum*) sub graviditate oriens, et post partum abiens. *Van Swiet.* ad *Boerb.* Aph. 950.

Aurigo plethorica, S. sp. 5.

5. Icterus (*infantum*) in infantibus haud diu post natales oriens.

Aurigo neophytorum, S. sp. 12.

Icteri sequentes, siquidem recte icteri dicantur*, symptomati sunt,

Aurigo febrilis, S. sp. 1.

* Flavedo cutis oriri potest, vel a bile non, ut solet, excreta, sed in vasa sanguifera excepta, et inde subter cuticulam

Aurigo febricosa, S. sp. 8.

Aurigo accidentalis, S. sp. 2.

Aurigo typhodes, S. sp. 10.

Aurigo rachialgica, S. sp. 14.

Aurigo a venenis, S. sp. 4.

Aurigo Indica, S. sp. 3. five quarundam
gentium color naturalis, nequaquam pro
morbo haberi potest.

cuticulam effusa; vel a sero sanguinis saepe flavescente,
subter cuticulam, ut in ecchymosi, effuso. In quibus-
dam casibus, an flavedo cutis ab una vel altera illarum
causarum oriatur, apud medicos non semper constat;
sed tantum ex prima icterum genuinum, et ab altera
morbum diversum, quique, quantum fieri possit, di-
stingui debet, oriri censemus.

CL. IV. LOCALES*.

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia † S. Cl. I. L. Cl. XI. V. Cl. X. *Sag.* Cl.

I.

Plagae, *Sag.* Cl. II.

Morbi organici *Auclorum.*

* Fortassis aliquando ambiguum esse potest, utrum ad universales, vel ad locales, morbi quidam referri debent; de plerisque vero, utri classi referendi sint, fatis obvium erit; et ex institutione hujus *Localium* classis, quamplurimos morbos rectius et facilius, quam in aliorum nosologorum systematibus, disponi posse contendimus.

† *Vitia* hic dixi, utpote sub hac classe *Localium* comprehensa; morbos vero multo plures comprehendit hic classis, ita ut vox *vitia* pro hujus synonymo nequaquam haberi potest, et idem de *Plagis* SAGARI dictum velim.

O. I. D Y S Æ S T H E S I Æ.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum
externorum vitio *.

Dysaesthesiae, S. CL. VI. O. I. *Sag.* Cl. IX.
O. I.

G. XCII. C A L I G O.

Vifus imminutus vel prorsus, abolitus ob
repagulum opacum, inter objecta et re-
tinam, oculo ipfo vel palpebris inhae-
rens.

Caligo, S. G. 153. V. 288. S. G. 259.
Cataracta, L. 109.

* Vereor ne in fequentibus aliquando species
recensuerim quae characteri ordinis non prorsus
refpondeant, quasdam, fcilicet, dysaesthesiae quae
ex organorum externorum vitio non pendeant. Hu-
jusmodi species quidem aliquando recensui; fed
paucae omnino funt, et feci, quia species affines, et
hic loci expeclandas, feperare nolui.

Species sunt,

1. Caligo (*lentis*) ob maculam opacam
pone pupillam.

Cataracta *, S. G. 152. L. 109. V. 239. Sag. G.
26.

Apud SAUVAGESIUM species sunt, verae
vel spuriae :

Verae varietates sunt,

Cataracta vera, S. sp. 1.

Glaucoma Woolhoufii.

Cataracta antiglaucoma, S. sp. 2.

Cataracta glaucoma, S. sp. 3

Glaucoma *Maitre Jan* et *St Ives*.

Spuriae varietates sunt,

Cataracta membranacea, S. sp. 4.

Cataracta secundaria, S. sp. 5.

* Non video quod, cum SAUVAGESIO, *Cataracta*
pro diverso a *Caligine* genere haberi possit; et judi-
cent periti, annon ideo recte *Caliginis* characterem
mutaverim, et *cataractam* pro ejus specie posuerim.

2. Caligo (*corneae*) ob corneam opacam.

Achlys, V. 242.

Variat pro varietate morbi opacitatem facientis.

Caligo a nephelio, S. sp. 5.

Caligo a leucomate, S. sp. 6.

Caligo ceratocele, S. sp. 10.

Caligo a staphylomate, S. sp. 11.

Caligo a pterygio, S. sp. 12.

Caligo hyposphagma, S. sp. 13.

3. Caligo (*pupillae*) ob obstructam pupillam.

Variat pro varietate causae.

Caligo ab ectasi, S. sp. 18.

Amaurosis a synchyfi, S. sp. 6.

Amaurosis a myosi, S. sp. 7.

Caligo a synizefi, S. sp. 19.

Synizefis, V. 240.

4. Caligo (*humorum*) ob vitium vel defectum humoris aquei.

Glaucoma, V. 241.

Variat pro diverso humoris statu.

Caligo hypoaema, S. sp. 15.

Caligo lactea, S. sp. 16.

Caligo a rhytidosi, S. sp. 17.

Ambyopia hydrophthalmica, S. sp. 7.

5. Caligo (*palpebrarum*) ob vitium palpebris inhaerens.

Variat pro varietate vitii palpebrarum.

Caligo a symblepharosi, S. sp. 1.

Caligo ab ancyloblepharo, S. sp. 2.

Caligo a blepharoptosi, S. sp. 3.

Caligo a pacheablepharosi, S. sp. 4.

Caligo a lupia, S. sp. 7.

Caligo a farcomate, S. sp. 8.

Caligo a cancro, S. sp. 9.

G. XCIII. AMAUROSI.

Vifus imminutus vel prorsus abolitus, sine vitio oculi evidente; plerumque cum pupilla dilatata et immobili.

Amaurosis, S. C. 155. L. 110. V. 238. Sag. G.
261.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Species sunt,

1. Amaurosis (*compressionis*) post causas et cum signis congestionis in cerebro.

Variat pro varietate causae remotae.

Amaurosis pituitosa, S. sp. 2.

Amaurosis scrophulosa, S. sp. 3.

Amaurosis plethorica, S. sp. 4.

Amaurosis intermittens, S. sp. 13.

Amaurosis exanthematica, S. sp. 11.

Amaurosis venerea, S. sp. 10.

Amaurosis traumatica, S. sp. 1.

2. Amaurosis (*atonica*) post causas et cum signis debilitatis.

Amaurosis congenita, S. sp. 5.

Amaurosis exhaustorum, S. sp. 16.

Amaurosis rachialgica, S. sp. 14.

Amaurosis arthritica, S. sp. 17.

Amblyopia absoluta, S. sp. 6.

Qq

3. Amaurosis (*spasmodica*) post causas et cum signis spasmi.

Amaurosis a spasmo, S. sp. 8.

Amaurosis hysterica, S. sp. 15.

4. Amaurosis (*venenata*) a veneno ingesto vel applicato.

Amaurosis a narcoticis, S. sp. 12.

Amaurosis foricariorum, S. sp. 9.

G. XCIV. D Y S O P I A *.

Vifus depravatus, ita ut non nisi certa luce, vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clare videantur.

Amblyopia, S. G. 154. Sag. G. 258.

* Verbum *Amblyopia*, quo pro hujus generis nomine utitur SAUVAGESIUS, alio sensu intelligunt tum veteres, tum LINNÆUS et VOGELIUS; ideoque hujus generis nomen mutare necessarium duxi.

Species sunt;

1. Dyfopia (*tenebrarum*) in qua non nisi in magna luce objecta videntur.

Amblyopia crepuscularis, S. sp. 1.

2. Dyfopia (*luminis*) in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.

Amblyopia meridiana, S. sp. 2.

3. Dyfopia (*diffitorum*) in qua longe distantia non videntur.

Amblyopia diffitorum, S. sp. 3.

Myopia, L. 309.

Myopiasis, V. 515.

4. Dyfopia (*proximorum*) in qua proxima non videntur.

Amblyopia proximorum, S. sp. 4.

Presbytia, L. 308.

5. Dyfopia (*lateralis*) in qua non nisi oblique posita videntur.

Amblyopia lufcorum, S. fp. 5.

G. XCV. PSEUDOBLEPSIS.

Vifus depravatus, ita ut quae non exiftant homo fe videre imaginatur, vel quae exiftunt aliter videt ac revera fe habeant.

Suffufio, S. G. 217. Sag. G. 329.

Phantafma, L. 73. V. 289.

Species funt,

1. Pseudoblepsis (*imaginaria*) in qua quae non exiftunt confpici videntur.

Variat pro varietate phantafmatis.

a. Suffufio myodes, S. fp. 1.

b. Suffufio reticularis, S. fp. 2.

c. Suffufio fcintillans, S. fp. 3.

Marmaryge, V. 290.

d. Suffusio coloris, S. sp. 4.

Haemalopia.

2. Pseudoblephsis (*mutans*) in qua objecta re-
vera existentia aliquomodo mutata ap-
parent.

Variat pro varia objectorum mutatione.

a. Suffusio metamorphosis, S. sp. 5.

b. Suffusio nutans, S. sp. 7.

c. Suffusio dimidians objecta, S. sp. 6.

d. Suffusio multiplicans.

Diplopia, S. G. 218. *Sag.* G. 330.

Dyfopia, V. 291.

Diplopia iterum variat pro varietate causae
remotae.

α. Diplopia pyretica, S. Varietas 1.

β. Diplopia a spasmo, S. Var. 2.

γ. Diplopia a paralyfi, S. Var. 3.

δ. Diplopia ab ancyloblepharo, S. Var. 4.

ε. Diplopia a catarrho, S. Var. 5.

ζ. Diplopia a debilitate, S. Var. 6.

- n. Diplopia a contusione, S. Var. 8.
- o. Diplopia a terrore, S. Var. 9.
- p. Diplopia a temulentia, S. Var. 10.
- z. Diplopia remotorum, S. Var. 7.

G. XCVI. D Y S E C O E A.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 246. *Sag. G.* 264.
 Cophosis, S. G. 160. L. 112. *Sag. G.* 266.
 Surditas, V. 247.

Species sunt,

1. Dysecoea (*organica*) ob vitium in organis fonos ad internam aurem transmittentibus.

Variat pro varietate vitii et partis affectae.

- a. Dysecoea monoton seu malcorum, S. sp. 1.
- b. Dysecoea a meatu obstructo, S. sp. 2.
 Cophosis a meatu, S. sp. 1.

- c. Dysecocœa a myringæ atonia, S. sp. 3.
Cophosis a tympano, S. sp. 4.
- d. Dysecocœa a myringæ duritie, S. sp. 4.
- e. Dysecocœa a myringa perforata, S. sp. 5.
- f. Dysecocœa a tympani fistula, S. sp. 6.
- g. Dysecocœa a hydrotympano, S. sp. 7.
- h. Dysecocœa a tuba obstructa, S. sp. 8.
Cophosis a tuba, S. sp. 3.
- i. Dysecocœa syphilitica.
Cophosis syphilitica, S. sp. 5.

- Cophosis congenita, S. sp. 8.

2. Dysecocœa (*atonica*) sine organorum fœnos transmittentium vitio evidente.

Variat pro varietate causæ.

- a. Cophosis critica, S. sp. 2.
Dysecocœa febrilis.
- b. Cophosis a comate, S. sp. 7.
- c. Cophosis serosa, S. sp. 6.
- d. Cophosis a steatmate, S. sp. 9.

G. XCVII. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159. *Sag.* G. 265.

Syrigmus, S. G. 219. *Sag.* G. 231:

Species sunt,

1. Paracusis (*imperfecta*) in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.

Variat,

- a. Cum auditu gravi.

Paracusis barycoea, S. sp. 1.

- b. Cum auditu nimis sensibili.

Paracusis oxycocæ, S. sp. 2.

- c. Cum sono unico externo a causis internis duplicato.

Paracusis duplicata, S. sp. 3.

d. Soni quos homo audire velit, nisi sono alio vehementi simul excitato non audiuntur.

Paracusis Willifiana, S. sp. 4.

2. Paracusis (*imaginaria*) in qua soni extrinsecus non existentes ab internis causis excitantur.

Syrigmus, S. G. 219. Sag. G. 231.

Syringmos, L. 72.

Sufurrus, V. 292.

Variat pro varietate soni percepti.

a. Syrigmus sibilus, S. sp. 4.

b. Syrigmus sufurrus, S. sp. 5.

c. Syrigmus bombus, S. sp. 11.

Variat etiam pro varietate causae remotae.

d. Syrigmus a debilitate, S. sp. 1.

e. Syrigmus criticus, S. sp. 2.

f. Syrigmus plethoricus, S. sp. 3.

g. Syrigmus vertiginosus, S. sp. 10.

- h. Syrigmus cephalalgicus, S. sp. 6.
- i. Syrigmus a ventriculo, S. sp. 7.
- k. Syrigmus catarrhalis, S. sp. 8.
- l. Syrigmus ab oxycoea, S. sp. 9.

G. XCVIII. A N O S M I A.

Olfactus imminutus vel abolitus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248. Sag. 262.

Species sunt,

- 1. Anosmia (*organica*) ob vitium in membrana nares internas investiente.

Variat pro varietate vitii.

- Anosmia catarrhalis, S. sp. 1.
- Anosmia a ficcitate, S. sp. 6.
- Anosmia a polypo, S. sp. 3.
- Anosmia ab ozaena, S. sp. 2.
- Anosmia syphilitica, S. sp. 4.
- Anosmia verminosa, S. sp. 5.

2. Anosmia (*atonica*) sine vitio membranae narium evidente.

Anosmia paralytica, S. sp. 7.

G. XCIX. AGEUSTIA.

Guftus imminutus vel abolitus.

Ageuftia, S. G. 157. *Sag.* G. 263.

Ageuftia, L. 114.

Apogeufis, V. 449.

Species funt,

1. Ageuftia (*organica*) ob vitium in membrana linguae, a nervis fapida arcens.

Agheuftia febrilis, S. sp. 1.

2. Ageuftia (*atonica*) sine vitio linguae evidente.

Agheuftia paralytica, S. sp. 2.

G. C. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel abolitus, S. G. 161.

L. 118. *Sag.* G. 267.

Sequentes species a SAUVAGESIO recensentur, et, cum de iis mihi non fatis liqueat, nihil mutare volui.

Anaesthesia a spina bifida, S. sp. 1.

Anaesthesia plethorica, S. sp. 2.

Anaesthesia nascentium, S. sp. 3.

Anaesthesia melancholica, S. sp. 4.

O. II. D Y S O R E X I Æ*.

Appetitus erroneus vel deficiens.

Sect. I. *APPETITUS ERRONEI.*

Morositates, S. G. VIII. O. II. *Sag.* Cl. XIII.

O. II.

Pathetici, L. Cl. V. O. II.

Hyperaestheses, V. Cl. VII.

G. Cl. B U L I M I A.

Appetitus esculentorum majori copia quam
quae digeri possit.

* *Morositates SAUVAGESII*] minus recte ad *Vesaniarum* classem referri, supra dixi, et nunc ad locales detuli. Recte, ni fallor, cum dysorexiae fere omnes manifesto partis singularis, potius quam totius corporis, affectiones sint. Nostalgia sola, si quidem revera morbus sit, minime pro locali haberi potest; sed morbum incertum a cacteris dysorexiis separare non bene potui.

Bulimia, S. G. 223. L. 79. Sag. G. 335.

Bulimus, V. 296.

Addephagia, V. 297.

Cynorexia, V. 298.

Species idiopathicae sunt,

1. Bulimia (*belluonum*), sine morbo ventriculi, cibi majorem solita copiam appetens.

Bulimia esurigo, S. sp. 4.

Addephagia, V. 297.

2. Bulimia (*syncopalis*) cibum frequenter appetens, ob sensum famis syncopen minitantis.

Bulimia cardialgica, S. sp. 2.

Bulimus, V. 296.

3. Bulimia (*emetica*) cibum magna copia appetens, et mox per vomitum rejiciens.

Bulimia canina, S. sp. 1.

Cynorexia, V. 298.

Species symptomaticae sunt,

Bulimia verminosa, S. sp. 3.

Bulimia addephagia, S. sp. 5.

Bulimia convulforum, S. sp. 6.

Bulimia ab acidis, S. sp. 7.

G. CII. P O L Y D I P S I A.

Appetitus majoris solita copiae potulentorum.

Polydipsia, S. G. 224. L. 80. V: 275. Sag. G. 336.

Polydipsia fere semper symptomatica est, et variat tantum pro varietate morborum quos comitatur ; hinc

Polydipsia febrilis, S. Var. a.

Polydipsia hydropica, S. Var. b.

Polydipsia fluxuum, S. Var. c.

Polydipsia a venenis, S. Var. d.

G. CIII. P I C A.

Desiderium non esculenti ingerendi.

Pica. S. G. 222. Sag. G. 334.

Citta, L. 78.

Allotriophagia, V. 299.

Malacia, V. 300.

Cum de speciebus *picae* mihi non fatis li-
queat, sequentes ex SAUVAGESIO re-
cenfeo.

Pica infantilis, S. sp. 1.

Pica chlorosiantium, S. sp. 2.

Pica malacia, S. sp. 3.

Pica abscorbutorum, S. sp. 4.

Pica voluntaria, S. sp. 5.

G. CIV. S A T Y R I A S I S.

In maribus effraenis veneris cupiditas.

Satyriasis, S. G. 228. L. 81. Sag. G. 340.

Satyriasm pro specie maniae habet VOGELIUS.

Species sunt,

Satyriasis (*juvenilis*) cum veneris cupiditate praeter modum vehementi, corpore simul parum perturbato.

Satyriasis neogamorum, S. sp. 5.

2. Satyriasis (*furens*) cum veneris cupiditate effraeni, corpore simul multum perturbato.

Satyriasis acuta, S. sp. 1. *Aretaei Cappad.* Acut, Lib. II. cap. 12.

Satyriasis chronica, S. sp. 2. ad priapismum pertinet; et Satyriasis venerea, S. sp. 3. necnon satyriasis hydrophobica, S. sp. 4. manifesto symptomata est,

G. CV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris desiderium.

S f

Nymphomania, S. G. 229. 229. *Sag.* G. 341.

Satyriasis, L. 81.

Furorem uterinum pro specie maniae habet VO-
GELIUS.

Nymphomaniae species unica est, et gradu
tantum varians, hinc

Nymphomania salacitas, S. sp. 1.

Nymphomania furibunda, S. sp. 2.

Nymphomania fervor uteri, S. sp. 3.

Nymphomania pruriginosa, S. sp. 4.

G. CVI. NOSTALGIA.

In absentibus a patria, vehemens eandem
revivendi desiderium.

Nostalgia, S. G. 226. L. 83. *Sag.* G. 338.

Nostalgiam pro specie melancholiae habet VOGE-
LIUS.

Species sunt,

I. Nostalgia (*simplex*) sine alio morbo.

Nostalgia simplex, S. sp. 1.

2. Nostalgia (*complicata*) aliis morbis comitata.

Nostalgia complicata, S. sp. 2.

Sec. II. *APPETITUS DEFICIENTES.*

Anepithymiae, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* IX. O. II.

Privativi, L. Cl. VI. O. III.

Adynamiae, V. Cl. VI.

G. CVII. *A N O R E X I A.*

Appetitus esculentorum deficiens.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. V. 279. *Sag.* G. 268.

Omnis anorexia mihi symptomatica esse videtur, et variat tantum pro varietate morbi quem comitatur. Species quidem omnes, quotquot a SAUVAGESIO fuerant recensitae, ad genus dyspepsiae supra re-
tuli; sed fortassis utile hic erit easdem seorsum, et rectius ordinatas, iterum recensere.

Species sunt,

1. Anorexia (*humoralis*) ab humore ventriculorum gravante.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Anorexia biliosa, S. sp. 6.

Anorexia a faburra, S. sp. 9.

2. Anorexia (*atonica*) ob tonum fibrarum ventriculi amissum,

Anorexia paralytica, S. sp. 1.

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia melancholica, S. sp. 5.

Anorexia cachectarum, S. sp. 7.

Anorexia arthritica, S. sp. 12.

Anorexia febrilis, S. sp. 4.

Incertae naturae sunt,

Anorexia plethorica, S. sp. 3.

Anorexia mirabilis, S. sp. 10.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.

G. CVIII. A D I P S I A.

Appetitus potulentorum suppressio, five fitis
feriatio.

Adipsia, S. G. 163. L. 117. V. 281. Sag. G. 269.

Adipsiam sine alio morbo, qualis est

Adipsia primaria, S. sp. 1.

pro morbo habere nollem; omnemque adip-
fiam pro sympathica, five symptomate
morbi cujusdam, sensorium commune
afficientis, habeo; ideoque non ad loca-
les referendi.

G. CIX. A N A P H R O D I S I A.

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164. Sag. G. 270.

Atechnia, L. 119.

Agenesia, V. 283.

Species verae sunt,

326. GENERA MORBORUM

Anaphrodifia paralytica, S. fp. 1.

Anaphrodifia gonorrhoeica, S. fp. 2.

Species spuriae, five veneris rite exercendae
impedimenta, sunt,

Anaphrodifia a marifcis, S. fp. 4.

Anaphrodifia ab urethrae vitio, S. fp. 5. *

Pro fictia et falsa habenda est

Anaphrodifia magica, S. fp. 3.

* Ad dyspermatismi genus pertinet.

O. III. D Y S C I N E S I Æ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

G. CX. A P H O N I A.

Vocis plena suppressio, citra coma aut syn-
copen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253. Sag. G.
272.

Species sunt,

1. Aphonia (*gutturalis*) a tumefactis fau-
cibus et glottide.

Aphonia catarrhalis, S. sp. 4. Anginosa *Mer-*
gagni.

2. Aphonia (*trachealis*) a compressa trachea.

Aphonia aneurismatica, S. fp. 5.

Aphonia pulmonica, S. fp. 9.

3. Aphonia (*atonica*) a nervis laryngis re-
fectis.

Aphonia traumatica, S. fp. 6.

Sequentes symptomticae esse videntur,

Aphonia melancholica, S. fp. 1.

Aphonia paralytica, S. fp. 8.

Aphonia temulentorum, S. fp. 3.

Aphonia hysterica, S. fp. 7,

Aphonia ab antipathia, S. fp. 2.

G. CXI. MUTITAS.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. G. 165. V. 257. Sag. G. 271.

Species sunt,

1. Mutitas (*organica*) ex lingua ablata vel vitiata.

Mutitas elinguium, S. sp. 4.

Mutitas a ficcitate, S. sp. 5.

2. Mutitas (*atonica*) ex nervis linguae lae-
fis.

Mutitas traumatica, S. sp. 2.

3. Mutitas (*furdorum*) ex furditate conge-
nita, vel puerilibus annis aborta.

Mutitas furdorum, S. sp. 8.

Sequentes symptomatae sunt,

Mutitas a glossocele, S. sp. 1.

Mutitas a narcoticis, S. sp. 3.

Mutitas spasmodica, S. sp. 6.

Mutitas proaeretica, S. sp. 7.

G. CXII. PARAPHONIA.

Vocis sonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.

Cacophonia, *Sag. G.* 274.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Afaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhenophonia, V. 256.

Species sunt,

1. Paraphonia (*puberum*) in qua, circa pubertatis tempus, vox ab acutiori et suavi in graviorem et ingratiam mutatur.

Paraphonia *puberum*, S. sp. 1.

2. Paraphonia (*rauca*) in qua, ob siccitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca et scabra.

Paraphonia catarrhalis, S. sp. 3.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 250.

3. Paraphonia (*resonans*) in qua, ob obstructas nares, vox fit rauca, cum sonitu per nares sibilante.

Paraphonia nasalis, S. sp. 2.

Paraphonia a polypo, S. sp. 8.

Rhenophania, V. 256.

4. Paraphonia (*palatina*) in qua, ob deficientem vel divisam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca, obscura, et ingrata.

Paraphonia gutturalis, S. sp. 5.

Afaphia, V. 250.

5. Paraphonia (*clangens*) in qua vox in acutam, clangentem, et exilem mutatur.

Paraphonia ulcerosa, S. sp. 4.

Paraphonia sibilans, S. sp. 7.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

6. Paraphonia (*comatosa*) in qua, ob laxatum velum palati et glottidem, fónus inter inspirandum editur.

Paraphonia stertens, S. sp. 6.

G. CXIII. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Pfellismus, S: G. 167. L. 138. Sag. G. 273.

Pfellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ischnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

Species sunt,

1. Pfellismus (*haesitans*) in quo fermonis verba, praesertim prima, non facile pro-

feruntur, et non nisi prima syllaba fac-
pius repetita,

Pfellismus ischnophonia, S. sp. 1.

Ischnophonia, V. 201.

Battarismus, V. 261.

2. Pfellismus (*ringens*) in quo sonus lite-
rae R semper aspiratur, et quasi gemi-
natur.

Pfellismus rottacismus, S. sp. 2.

Traulotis five blaefitas, V. 258.

3. Pfellismus (*lallans*) in quo sonus literae
L fit liquidior, vel loco literae R pro-
nunciatur.

Pfellismus lamdacismus, S. sp. 3.

4. Pfellismus (*emolliens*) in quo literae du-
rae in molliores mutantur, et litera S
multum usurpatur.

Pfellismus traulotes, S. sp. 4.

5. *Pfellismus (balbutiens)* in quo, ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.

Pfellismus balbuties, S. sp. 5.

Pfellismus a ranula, S. sp. 11.

6. *Pfellismus (acheilos)* in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.

Pfellismus mogilalia, S. sp. 6.

7. *Pfellismus (lagoſtomatum)* in quo, ob divisum palatum, literae gutturales minus recte pronunciantur.

Pfellismus lagoſtomatum, S. sp. 10.

Pfellismus cotacismus, S. sp. 8.

G. CXIV. STRABISMUS.

Oculorum axes optici non convergentes.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514. *Sag. G.*
222.

Species sunt,

1. Strabismus (*habitualis*) a consuetudine prava oculo tantum uno utendi.

Strabismus vulgaris, S. sp. 2.

2. Strabismus (*commodus*) ab unius oculi prae altero, debilitate vel mobilitate majori, adeo ut uterque oculus non commode adhibeatur.

Strabismus Buffonii, S. sp. 3.

Strabismus spasmodicus, S. sp. 4.

Strabismus paralyticus, S. sp. 5.

Strabismus catarrhalis, S. sp. 6.

3. Strabismus (*necessarius*) ob mutatum situm vel figuram partium oculi.

Strabismus a luscitate, S. sp. 1.

Strabismus caligantium, S. sp. 11.

Strabismus a crystallino, S. sp. 12.

Strabismus myopum, S. sp. 9.

De Strabismo aequinoctiali mihi non liquet.

Minus recte, ut mihi videtur, ad Strabismum referuntur sequentes.

Strabismus symptomaticus, S. sp. 7.

Strabismus lagophthalmos, S. sp. 8.

G. CXV. C O N T R A C T U R A.

Artus unius vel plurium contractio diuturna, rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299. Sag. G. 225.

Obstipitas, S. G. 11.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

Species sunt,

i. Contractura (*primaria*) a musculis contractis, rigidis.

a. A musculis ab inflammatione rigidis.

Contractura dolorifica, S. sp. 2.

Contractura arthritica, S. sp. 7.

Contractura catarrhalis, S. sp. 8.

Obstipitas catarrhalis, S. sp. 3.

b. A musculis a spafmo rigidis.

Contractura spafmodica, S. sp. 11.

Obstipitas spafmodica, S. sp. 6.

Obstipitas renuens, S. sp. 1.

Obstipitas lateralis, S. sp. 5.

Contractura hypochondriaca, S. sp. 1.

c. A musculis, ob antagonistas paralyticos, contractis.

Contractura paralytica, S. sp. 4.

Contractura rachialgica, S. sp. 5.

Contractura Bohemica, S. sp. 6.

Obstipitas annuens, S. sp. 2.

U u

d. A musculis ab acrimonia irritante contractis.

Contractura scorbutica, S. sp. 3.

2. Contractura (*articularis*) ob artus rigidos.

Contractura anchylosis, S. sp. 9.

Contractura syphilitica, S. sp. 10.

Obstipitas gibbosa, S. sp. 4.

O. IV. A P O C E N O S E S.

Fluxus five fanguis, aut humores alii, solito
uberius profluens, sine pyrexia impe-
tue fluidorum aucto.

Apocenosfes, V. Cl. II. O. II.

Fluxus, S. Cl. IX. *Sag.* Cl. V.

Morbi evacuatorii, L. Cl. IX.

G. CXVI. P R O F U S I O.

Fluxus fanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerb.* 218.

Ex fanguifluxibus, a SAUVAGESIO recensitis,
fequentes, ad hunc locum pertinere vi-
dentur.

Haemorrhagia paffiva, S. fp. 1.

- Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.
 Haematemesis traumatica, S. sp. 3.
 Haematuria traumatica, S. sp. 14.
 Haematuria violenta, S. sp. 2.
 Haemorrhagia ab hirudine, S. sp. 7.
 Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.
 Haematemesis ab hirudine, S. sp. 4.

G. CXVII. E P H I D R O S I S *.

Sudoris praeter naturam evacuatio.

Ephidrosis, S. G. 258. *Sag.* G. 194.

Sudor, L. 208.

Hydropedesis, V. 121.

Species idiopathica unica est,

Ephidrosis spontanea, S. sp. 1.

* Ephidrosin minus recte ad morbos locales relatum esse agnosco; cum autem huic morbo nullum in systemate nostro locum idoneum invenerim, ne profus omitteretur, hic cum aliis quodammodo affinis morbis evacuatoriis recensui.

Ephidroses symptomatice variant, pro varietate morbi quem comitantur, et simul pro varietate fudoris elicitæ, et quodammodo pro varietate partis maxime fudantis. Hinc

Ephidrosis febrilis, S. sp. 3.

Ephidrosis febricosa, S. sp. 7.

Ephidrosis hectica, S. sp. 5.

Ephidrosis exanthematum, S. sp. 6.

Ephidrosis syncoptica, S. sp. 4.

Ephidrosis scorbutica, S. sp. 2.

Ephidrosis a faburra, S. sp. 18.

Ephidrosis lactea, S. sp. 9.

Ephidrosis mellea, S. sp. 10.

Ephidrosis vinosa, S. sp. 11.

Ephidrosis viridis, S. sp. 12.

Ephidrosis nigra, S. sp. 13.

Ephidrosis lutea, S. sp. 14.

Ephidrosis urinosa, S. sp. 15.

Ephidrosis cruenta, S. sp. 16.

Ephidrosis caerulea, S. sp. 17.

Ephidrosis acida, S. sp. 19.

Ephidrosis arenosa, S. sp. 20.

Ephidrosis lateralis, S. sp. 8.

G. CXVIII. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99. *Sag.* G.
195.

Ex speciebus a SAUVAGESIO recensitis, nulla pro idiopathica haberi potest, nisi

Epiphora frigida, S. sp. 8.

Caeterae omnes symptomaticae sunt,

Epiphora a pathemate, S. sp. 1.

Epiphora ophthalmica, S. sp. 3.

Epiphora calida, S. sp. 9.

Epiphora ex variolis, S. sp. 4.

Epiphora arthritica, S. sp. 12.

Epiphora cruenta, S. sp. 10.

Epiphora ex rhyade, S. sp. 2.

Epiphora ex aegilope, S. sp. 5.

Epiphora ab ectropio, S. sp. 6.

Epiphora ab anchylope, S. sp. 7.

Epiphora sebacea, S. sp. 11.

Epiphora lactea, S. sp. 13.

G. CXIX. PTYALISMUS.

Fluxus falivae.

Ptyalifmus, S. G. 261. L. 176. V. 103. *Sag. G.*
197.

Si quis ptyalifmus idiopathicus fit, pro eo
habere vellem

Ptyalifmum a laxitate, S. sp. 4.

Sequentes omnes fymptomatae funt,

Ptyalifmus naufeofus, S. sp. 1.

Ptyalifmus hypochondriacus, S. sp. 8.

Ptyalifmus gravidarum, S. sp. 14.

Ptyalifmus a pyrofi, S. sp. 2.

Ptyalifmus Lapponicus, S. sp. 3.

Ptyalifmus febrilis, S. sp. 18.

Ptyalifmus variolofus, S. sp. 6.

Ptyalifmus arthriticus, S. sp. 9.

Ptyalifmus phthificus, S. sp. 10.

Ptyalifmaus fcorbuticus, S. sp. 7.

Ptyalifmus catarrhalis, S. sp. 15.

Ptyalifmus aphthofus, S. sp. 13.

- Ptyalifmus a carie, S. sp. 16.
 Ptyalifmus purulentus, S. sp. 12.
 Ptyalifmus a calcúlo, S. sp. 17.
 Ptyalifmus syphiliticus, S. sp. 19.
 Ptyalifmus viridis, S. sp. 11.
 Ptyalifmus urinofus, S. sp. 20.
 Ptyalifmus mercurialis, S. sp. 5.

G. CXX. ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113. Sag. G. 200.

Species sunt,

1. Enuresis (*atonica*) post morbos sphincterem vesicae laedentes.

- Enuresis hernioforum, S. sp. 3.
 Enuresis puerperarum, S. sp. 5.
 Enuresis calculosa, S. sp. 7.

Enuresis a fistula, S. sp. 8.

2. Enuresis (*irritata*) a compressione vel
irritatione vesicae.

Enuresis gravidarum, S. sp. 4.

Enuresis catamenialis, S. sp. 6.

Enuresis a sparganosi, S. sp. 9.

Symptomatica est,

Enuresis paralytica, S. sp. 2.

Pro morbo non haberi potest

Enuresis infantum, S. sp. 1.

G. CXXI. G O N O R R H O E A.

Humoris ex urethra, in maribus, cum vel
absque libidine, praeter naturam fluxus.

Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. 118. *Sag.*
G. 204.

Species sunt,

1. Gonorrhoea (*pura*) in qua, praegresso concubitu impuro nullo, humor puriformis, sine dysuria vel libidine, ex urethra subinde fluit

Gonorrhoea pura, S. sp. 1.

Gonorrhoea benigna *Auētorum.*

2. Gonorrhoea (*impura*) in qua, post concubitum impurum, humor puriformis cum dysuria ex urethra fluit.

Gonorrhoea syphilitica, S. sp. 4.

Gonorrhoea maligna *Auētorum.*

Hujus sequela est,

Gonorrhoea (*mucosa*) in qua, post gonorrhoeam impuram, humor mucosus, cum minima vel nulla dysuria, ex urethra subinde fluit.

Anglis, a GLEET.

3. Gonorrhoea (*laxorum*) in qua, humor plerumque pellucidus, sine penis erectione, sed cum libidine, in vigilante, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhoea libidinosa, S. sp. 2.

4. Gonorrhoea (*dormientium*) in qua liquor feminalis cum erectione et libidine, in dormientibus, ex somnio libidinoso, ejicitur.

Gonorrhoea oneirogonos, S. sp. 3.

Species spuriae, utpote in quibus ex urethra fluxus non fit.

Gonorrhoea spuria, S. sp. 5. *Astruc*, lib. 3. cap.

3. § 2.

Gonorrhoea balani, S. sp. 6.

O. V. EPISCHESES.

Excernendorum suppressiones.

G. CXXII. OBSTIPATIO.

Dejectio faecum nulla vel solito rarior.

Obstipatio, L. 166. V. 128. Sag. G. 221.

Species sunt,

1. Obstipatio (*debilium*) in hominibus laxis, debilibus, et plerumque dyspepticis.
2. Obstipatio (*rigidorum*) in hominibus fibrae rigidae saepe hypochondriacis.
3. Obstipatio (*obstructorum*) cum symptomatis Colicae 1mae, 2dae, 4tae, vel 7mae supra dictae.

G. CXXIII. ISCHURIA.

Urinae suppressio absoluta.

Ischuria, S. G. 293. L. 167. V. 129. *Sag.* G.
212. *Home's* Clinical experiments, sect. XV.

Species sunt,

1. Ischuria (*renalis*) praegresso renum morbo, cum dolore vel molesto gravitatis sensu in regione renum, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae; hinc *

* Doctissimi CUSSONI Collectanea egregia de ischuria, licet ad leges nosologiae methodicae minus confecta, non profus omittenda putavi. Simul autem metuens, ne iis in hoc secundo tomo locus commodus esset, in tomo primo cum systemate SAUVAGESIANO inserui. Cum vero hic specierum ischuriae characteres nosologicos dare volui, ut tota res sub uno conspectu appareret, species CUSSONI summatim hic repetere placuit. Loca autem auctorum, in quibus ischuriae varia exempla inveniri possunt, ex primo tomo adhuc petenda sunt.

- a. *Nepritica*, a renum inflammatione, S. fp. 1.
- b. *Neophrolithica*, a renum calculo, S. fp. 2.
- c. *Nephroplethorica*, a plethora, S. fp. 3.
- d. *Lunatica; periodica*, S. fp. 4.
- e. *Nephrospastica*, spasmodica, S. fp. 5.
- f. *Nephrebmintica*, verminosa, S. fp. 6.
- g. *Nephrothromboides*, a sanguine congrumato,
S. fp. 7.
- h. *Nephropyica*, a renum purulentia, S. fp. 8.
- i. *Nephrophlegmatica*, pituitosa, feu mucofa, S.
fp. 9.
- k. *Nephroplegica*, paralytodaea, S. fp. 10.
- l. *Suppleta*, ab alia evacuatione suppleta, S. fp.
11.

2. *Ischuria (ureterica)* praegreffo renum morbo, cum doloris vel molestiae fenfu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate caufae ; hinc

- a. *Ureteritica*, inflammatoria, S. fp. 12.
- b. *Ureterolithica*, calculosa, S. fp. 13.
- c. *Ureterothromboides*, a sanguinis grumo, S.
fp. 14.

- d. *Ureterophlegmatica*, a pituita, S. sp. 15.
- e. *Ureteropyica*, purulenta, S. sp. 16.
- f. *Ureterofotomatica*, ab orificii ureterum inferioris claufura, S. sp. 17.

3. *Ischuria (vesicalis)* cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicae, et frequenti ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Cystitica*, a vesicae inflammatione, S. sp. 18.
- b. *Cystolithica*, a vesicae calculo, S. sp. 19.
- c. *Cystospastica*, a sphincteris vesicae spasmu, S. sp. 20.
- d. *Cystoplegica*, a vesicae paralyfi, S. sp. 21.
- e. *Polyurica*, a vesica distenta lotio diutius cohibita, S. sp. 22.
- f. *Cystopyica*, purulenta, S. sp. 23.
- g. *Cystothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 24.
- h. *Cystophlegmatica*, a muco, S. sp. 25.
- i. *Ectopocystica*, a vesicae ectopia, S. sp. 26.
- k. *Cystoproctica*, ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus, turgente, S. sp. 27.

- l. *Hysterocystica*, ab utero, S. fp. 28.
 m. *Atretarum*, a menftruis in vagina retentis,
 S. fp. 29.
 n. *Parodoxa*, S: fp. 30.
4. *Ifchuria (urethralis)* cum tumore hypogaftrii, frequenti ad mingendum ftimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.

Variat pro varietate caufae ; hinc

- a. *Perinaealis*, a perinaei tumore, S. fp. 31.
 b. *Urethrolithica*, a calculo urethrae impacto, S. fp. 32.
 c. *Urethrophlegmatica*, a muco urethram infarci-
 ciente, S. fp. 33.
 d. *Urethrothromboides*, a fanguinis grumo ure-
 thram opplente, S. fp. 34.
 e. *Urethropyica*, a pure urethram obftuente, S.
 fp. 36.
 f. *Urethrohymenodes*, a membrana in urethram
 impacta, S. fp. 36.
 g. *Urethrelmintica* verminofa, S. fp. 37.
 h. *Urethritica*, ab urethrae inflammatione, S. fp.
 38.
 i. *Carunculofa*, a morbis ut vocant urethrae, S.
 fp. 39.

- k. *Hydrocelodes*, ab urethrae ruptura in scrotum hiante, S. fp. 40.
 l. *Cryptopyca*, a penis intra corpus retractione, S: fp. 41.
 m. *Peridesmica*, a vinculo strictiori peni injecto, S. fp 42.
 n. *Phimosica*, a phimosi, S. fp. 42.
 o. *Aspadialis*, ab urethrae claufura, S. fp. 44.

G. CXXIV. D Y S U R I A.

Dolorifica et quodammodo impedita urinae emiffio.

Dysuria, S. G. 265. L. 57. V. 164. Sag. G. 213. Stranguria *Auctorum*.

Species sunt,

1. Dyfuria (*ardens*) cum ardore urinae sine morbo vesicae evidente.

Dysuria primaria, S. fp. 5.

Dysuria a cantharidibus ingestis vel applicatis.

Dysuria arfura, S. sp. 7.

Dysuria neonympharum, S. sp. 14.

2. Dysuria (*spasmodica*) a spafmo ex aliis partibus cum vefica communicato,

Dysuria hystERICA, S. sp. 1.

Dysuria rachialgica, S. sp. 11.

Dysuria diabetica, S. sp. 17.

Dysuria nephralgica, S. sp. 3.

3. Dysuria (*compressionis*) a vicinis partibus veficam prementibus.

Dysuria gravidarum, S. sp. 13.

Dysuria a cystocele, S. sp. 8.

Dysuria ab hysteroloxia, S. sp. 10.

Dysuria atrëtarum; S. sp. 16.

4. Dysuria (*phlogistica*) a vicinis partibus inflammatis.

Dysuria ab hystéritide, S. sp. 9.

Dysuria haemorrhoidalis, S. sp. 6.

Dysuria venerea, S. sp. 4.

Dysuria a caruncula, S. sp. 5.

5. Dyfuria (*irritata*) cum fignis calculi vesicalis.

Dyfuria calculofa, S. fp. 12.

6. Dyfuria (*mucofa*) cum excretionemuci copiofa.

Glus, L. 200.

Pyuria mucofa, S. fp. 6.

Pyuria vifcida, S. fp. 5.

Rarus vesicae morbus, *Hoffm.* T. IV. Consult. Med. Centur. II. caf. XCIII.

Catarrhus vesicae *Lieutaud.* Syn. p. 272.

Pyuria arthritica, S. fp. 9.

De dyfuria ab infectis, S. fp. 15. mihi non fatis liquet.

G. CXXV. D Y S P E R M A T I S M U S.

Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficientemiffio.

Dyspermatismus, S. G. 260.

Sterilitas, L. 171. *Sag.* G. 211.

Agenesia, V. 283.

Species sunt,

1. Dysspermatismus (*urethralis*) a morbis urethrae, S. sp. 1.
2. Dysspermatismus (*nodosus*) a nodis corporum cavernosorum, S. sp. 2.
3. Dysspermatismus (*praeputialis*) ab angustiori praeputii orificio, S. sp. 3.
4. Dysspermatismus (*mucosus*) a muco urethram infarciēte, S. sp. 4.
5. Dysspermatismus (*hypertonicus*) a validiori penis erectione, S. sp. 5.
6. Dysspermatismus (*epilepticus*) ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente, S. sp. 6.
7. Dysspermatismus (*apraetodes*) a genitalium ignavia, S. sp. 7.

§ Dyspermatismus (*refluus*) in qua nulla feminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam, S. sp. 9.

De dyspermatismo seroso, S. sp. 8. mihi non satis constat.

G. CXXVI. AMENORRHOEA.

Menses tempore quo fluere solent, vel solito parciore, vel non omnino fluentes, citra graviditatem.

Amenorrhoea, V. 130.

Dysmenorrhoea, L. 168. *Sag. G.* 218.

Species sunt,

1. Amenorrhoea (*emanfionis*) in puberibus quibus post fluxus tempus solitum, menses, non jam prodierint, et cum simul variae affectiones morbidae adsint.

2. Amenorrhoea (*suppressionis*) in adultis, quibus menses, quae jam fluere solebant, suppressae sunt.
3. Amenorrhoea (*difficilis*) in qua menses parcius et cum dolore fluunt.

Menorrhagia difficilis, S. sp. 1.

O. VI. T U M O R E S.

Partis magnitudo aucta sine phlogofi.

Tumores protuberantes, L.

G. CXXVII. A N E U R I S M A.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurisma, S. G. 32. L. 282. V. 408. *Sag.* G.

35.

G. CXXVIII. V A R I X.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407. *Sag.* G. 36.

G. CXXIX. E C C H Y M O M A.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

360 GENERA MORBORUM

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451. *Sag.* G. 5.
Sugillatio, L. 230.

G. CXXX. S C H I R R U S.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus,
non dolens, aegre suppurans.

Schirrus, S. G. 14. L. 283. V. 374. *Sag.* G. 19.
Boerh. 392.

G. CXXXI. C A N C E R.

Tumor schirrodeus dolens, in ulcus mali
moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerh.* 492. *Sag.*
G. 25.

G. CXXXII. B U B O.

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Bubo, L. 271.

Bubo, S. G. 16. V. 368. *Sag.* G. 21.

Parotis, S. G. 17. V. 370. *Sag.* G. 22.

G. CXXXIII. S A R C O M A.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376. *Sag.* G.
28.

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

G. CXXXIV. V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426. *Sag.* G.
30.

G. CXXXV. C L A V U S.

Cuticulae crassities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus five Tylloma, V. 429.

G. CXXXVI. L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis,
non dolens.

Lupia, S. G. 37. *Sag.* G. 40.

Atheroma, L. 285.

Encyftis, V. 420.

G. CXXXVII. G A N G L I O N.

Extuberatio durior, mobilis, tendini infi-
dens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. CXXXVIII. H Y D A T I S.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34. *Sag.* G. 38.

Phlyctæna, L. 273. V. 442.

CXXXIX. H Y D A R T H R U S.

Articulorum, genu potiffimum, tumor, pa-
rum primo eminens, cuti concolor,
dolentiffimus, et mobilitatem imminu-
ens.

Hydarthrus, S. G. 38.

Anglis, a WHITE SWELLING.

G. CXL. EXOSTOSIS.

Tumor durus offi infidens.

Exostofis, S. G. 29. L. 290. V. 417. *Sag. G.*

34.

Hyperostofis, V. 418.

O. VII. E C T O P I Æ*.

Pars ex sua fede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI, *Sag.* Cl. I. O. VI.

G. CXLI. H E R N I A.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXLII. P R O L A P S U S.

Partis mollis ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

* Ectopiarum genera et species, quantum ad pathologiam pertinent, opera solertissimi CUSSONI, enumerata in primo hujus synopsis tomo, pag. 15. et seq. inveniri, et summo cum fructu perlegi possunt.

G. CXLIII. L U X A T I O.

Os ex sua in juncturis sede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. *V.* 472.

Exarthrema, *S.* 60. *Sag. G.* 67.

Diafasis, *S.* 61. *Sag. G.* 68.

Luxatura, *L.* 236.

O. VIII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII. *Sag.* Cl. II.

Vitia dialytica et solutiones continui, L. Cl. XI.

O. II.

Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.

Diffolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXLIV. VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Sag.* G. 78.
Boerh. 145.

Punctura, S. G. 64. L. 243. *Sag.* G. 79.

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. G. 70. L. 243. *Sag.* G. 86.

G. CXLV. ULCUS.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

- Ulcus, S. G. 71. L. 249. *Sag.* G. 89,
 Exulceratio, S. G. 72. *Sag.* G. 90.
 Sinus, S. G. 73. V. 492. *Sag.* G. 92.
 Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Sag.* G. 91.
Boerb. 413.
 Cacoethes, L. 250. V. 485.
 Phagedaena, V. 488.
 Noma, L. 251. V. 489.
 Carcinoma, L. 252. V. 487.
 Ozaena, L. 253. V. 500.
 Therioma, V. 486.
 Sycofis, V. 490.

G. CXLVI. H E R P E S.

Phlyctænae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443. *Sag.* G. 11.

G. CXLVII. T I N E A.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497. *Sag.* G. 131.

G. CXLVIII. P S O R A.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

Pfora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444. Sag. G. 130.

G. CXLIX. F R A C T U R A.

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. Sag. G. 98. Boerh. 339.

G. CL. C A R I E S.

Offis exulceratio.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493. Sag. G. 94.

EMENDANDA ET ADDENDA

in Tomo Secundo.

Page 60. lin. 13. *pro* 699. *lege* 323.

p. 65. l. 7. *post* 20. *adde* Sag. G. 321.

p. 71. l. 16. *post* Typhus *adde* (*petechialis*)

p. 77. l. 12. *post* Typhus *adde* (*icterodes.*)

p. 85. l. 12. *pro* N. *lege* V.

p. 96. l. 11. *post* Cynanche *adde* (*pharyngaea.*)

p. *ead.* l. 19. *post* Cynanche *adde* (*parotidaea.*)

p. 188. l. 3. a fine, *pro* *recensetur lege* *invenerit.*

p. 109. l. 4. *post* Peritonitis *adde* (*propria*)

p. *ead.* l. 10. *post* Peritonitis *adde* (*omentalis.*)

p. 110. l. 1. *post* Peritonitis *adde* (*mesenterica.*)

p. 119. *post* l. 6. *adde*

Lumbago, S. G. 212. Sag. G. 169.

Ifchias, S. G. 213. Sag. G. 170.

Pleurodyne, S. G. 148. Sag. G. 254.

p. 137. l. 11. *pro* I. *lege* II.

p. 154. l. 1. *pro* XXXVII. *lege* XXXVI.

p. 156. l. 4. *pro* XXXVIII. *lege* XXXVII.

p. 160. l. 17. *pro* XL. *lege* XXXVIII.

p. 161. *inter* l. 12. *et* 13. *infere* Marisca, S. G. 35.

Sag. G. 37.

p. 163. l. 5. *pro* XLI. *lege* XXXIX.

p. 171. *post* l. 3. *adde* V. CL. II.

A a a

- Page *ead.* lin. 4. *pro* XLII. *lege* XL.
 p. 177 l. 12. *pro* XLIII. *lege* XII.
 p. 182. l. 10. *pro* XLIV. *lege* XLII.
 p. 211. l. 5. *pro* nec alius *lege* nec alius.
 p. 226. *post* l. ult. *adde* Orthopnoes, S. G. 146. L. 162.
 V. 269. *Sag.* G. 253.
 p. 250. l. 14. *pro* Heycham *lege* Heysham.
 p. 294. l. 5. *pro* LXXVII. *lege* LXXXVII.
 p. 300. l. 5. *post* Plagae *adde* S. CL. I. O. VII.
 p. 301. *post* l. 5. *adde*
 Hallucinationes, S. CL. VIII. O. I. *Sag.* CL. XIII.
 O. I.
 Privativi, L. CL. VI. O. III.
 p. 305. *inter* l. 2. et 3. *in*ferē
 Mydriasis, V. 237.
 p. 309. l. 2. *post* Haemalopia *adde* V. 289.
 p. 315. l. 6. *pro* Ageustia *lege* Agheustia.
 p. 316. l. 2. *post* abolutus *adde*
 Anaesthesia, S. G. 161. L. 118. *Sag.* G. 267.
 Anodynia, V. 274.
 p. 327. *post* l. 3. *adde*
 Dyscinesiac, S. CL. VI. O. III. *Sag.* CL. IX. O. III.
 p. 331. l. 9. *pro* Rhenophania *lege* Rhenophonia.
 p. 348. *post* l. 2. *adde*
 Epischeses, V. CL. III.
 Suppressorii, L. CL. VIII. O. II.
 Suppressiones, *Sag.* Cl. VI.

Page 353. *pro* Cryptopyca *lege* Cryptopyca.

p. 359. l. 3. *post* L. *adde* CL. X O. V.

p. 360. l. 13. *pro* CXXII. *lege* CXXXII.

p. 362. l. 8. *pro* CXXXVII. *lege* CXXXVIII.

p. 365. l. 4. *pro* 236. *lege* 237.

p. 367. *post* l. 10. *insere*

Achor. L. 265. V. 494.

Crusta lactea, V. 494.

I N D E X

CLASSIUM ET ORDINUM.

Numeri post literas S. L. V. et Sag. paginas tomi primi; post C. paginas tomi secundi, indicant.

A DYNAMIÆ, V. 183. C. 197. et 323.
Aerifluxus, S. 63. Sag. 297.

Agitatorii, L. 110.

Alvi fluxus, S. 59. Sag. 291.

Alvi fluxus non fanguinolenti, S. 60. Sag.
292.

Alvi fluxus fanguinolenti, S. 59. Sag. 291.

Anepithymiae, S. 43. Sag. 316. C. 323.

Anhelationes, S. 39. Sag. 310.

Anhelationes oppressivae, S. 40.

Anhelationes suppressivae, Sag. 311.

Apocenoses, V. 166. C. 339.

Cachexiae, S. 65. V. 194. Sag. 271. C. 265.

Cachexiae anomalae, S. 81. Sag. 280.

- Clonici generales, S. 37. Sag. 307.
Clonici partiales, S. 35. Sag. 305.
Comata, S. 46. Sag. 319. C. 182.
Concretiones, V. 224.
Continentes, L. 90. C. 68.
Continuae, S. 26. V. 151. Sag. 337. C. 66.
Constrictorii, L. 116.
Critici, L. 90. C. 44.
Cystides, S. 13. Sag. 254.
- Debilitates, S. 42. Sag. 314.
Decolores, L. 124.
Defectivi, L. 105. C. 197.
Deformationes, L. 136.
Deformes, L. 122. C. 263.
Deformitates, V. 230. Sag. 263.
Deliria, S. 56. Sag. 347. C. 253.
Dialyses, C. 366.
Dialytica, L. 126.
Dissolutiones, V. 218. C. 366.
Dolores, S. 48. V. 171. Sag. 283.
Dolorosi, L. 97.
Dolorosi extrinseci, L. 99.

- Dolorosi intrinseci, L. 97.
Dyfaesthesiae, S. 42. Sag. 314. C. 301.
Dyscinesiae, S. 44. Sag. 316. C. 327.
Dyforexiae, C. 317.
- Ectopiae, S. 14. Sag. 256. C. 364.
Efflorescentiae, S. 8. Sag. 248.
Emaciantes, L. 122. C. 263.
Epischeses, V. 170. C. 348.
Evacuatorii, L. 117. C. 339.
Exacerbantes, L. 91. C. 46.
Exanthemata, Sag. 322. C. 130.
Exanthematicae, S. 29. V. 154. C. 131.
Exanthematici, L. 87. C. 131.
Excrefcentiae, S. 11. Sag. 252.
Extuberantiae, V. 212.
Exulcerationes, L. 128. C. 366.
- Febres, S. 26. V. 149. Sag. 337. C. 44.
Fluxus, S. 58. Sag. 290. C. 339.

- Haemorrhagiae, V. 164. C. 153.
Hallucinationes, S. 54. Sag. 342.
Humoralia, L. 125.
Hydropes, C. 274.
Hydropes partiales, S. 66. Sag. 274.
Hyperaesthesiae, V. 191. C. 317.
- Icteriae, S. 80. Sag. 279.
Ideales, L. 101. C. 253.
Imaginarium, L. 102.
Impetigines, S. 79. Sag. 277. C. 290.
Inflammationes, V. 201.
Intermittentes, S. 28. V. 149. L. 90. Sag.
340. C. 45.
Intumescuntiae, S. 65. Sag. 272. C. 270.
- Leipopsychiae, S. 45. Sag. 318. C. 197.
Locales, C. 300.
- Macies, S. 65. Sag. 271. C. 265.
Maculae, S. 7. L. 138. V. 216. Sag. 247.
Marcores, C. 265.
Mentales, L. 101.

Morositates, S. 55. Sag. 344. C. 317.

Motorii, L. 109. C. 209.

Neuroses, C. 181.

Paranoiae, V. 199. C. 253.

Pathetici, L. 102. C. 317.

Phlegmasiae, S. 29. Sag. 329. C. 82.

Phlogistici, L. 93. C. 83.

Phymata, S. 9. Sag. 250.

Plagae, S. 23. Sag. 265. C. 300. et 366.

Privativi, L. 107. C. 301. et 323.

Procidentiae, L. 135.

Profluvia, V. 164. C. 171.

Pustulae et Papulae, V. 214.

Pyrexiae, C. 43.

Quietales, L. 105.

Remittentes, S. 27. Sag. 339. C. 45.

Sanguifluxus, S. 58. Sag. 290. C. 153.

Scabies, L. 130.

Serifluxus, S. 61. Sag. 295.

Solutiones, Sag. 263.

Soporosi, L. 106. C. 182.

Spasmi, S. 34. V. 177. Sag. 303. C. 209.

Spastici, L. 109.

Suffocatorii, L. 113.

Suppressiones, Sag. 299.

Supprefforii, L. 113.

Tonici generales, S. 35. Sag. 304.

Tonici partiales, S. 34. Sag. 303.

Tubera, S. 78. Sag. 276.

Tumidosi, L. 123. C. 270.

Tumores, V. 202. C. 359.

Vefaniae, S. 54. Sag. 342. C. 252.

Vitia, S. 7. L. 125. V. 201. Sag. 247. C.
300.

INDEX GENERUM.

- A**BORTIO, V. 97 C. 39
 Abortus, S. 245 L. 204 *Sag.* 180 C. 39
 Abſceſſus, L. 232 V. 354 C. 7
 Acatapofis, V. 149
 Achlys, V. 242 C. 92
 Achor, L. 265 V. 494 C. 145
 Acrochordon, V. 426
 Acyefis, V. 282
 Addephagia, V. 297 C. 101
 Adiapneuftia, *Sag.* 210
 Adipſia, S. 163 L. 117 V. 281 *Sag.* 269 C. 108
 Adynamia, V. 225
 Aedopſophia, S. 273 *Sag.* 208
 Aegilops, V. 499
 Aeftus volaticus, V. 220
 Agalaxis, V. 133
 Ageneſia, V. 283 C. 109, 125
 Ageuſtia, L. 114 C. 99
 Agheuſtia, S. 157 *Sag.* 263 C. 99
 Aglaſtatio, L. 170 *Sag.* 214
 Aglutitio, L. 164
 Agomphyafis, V. 482
 Agrypnia, S. 238 L. 130 V. 286 *Sag.* 351
 Algor, S. 191 *Sag.* 150
 Allotriophagia, V. 299 C. 103
 Alopecia, S. 312 L. 315 V. 525 *Sag.* 138
 Amatoria, V. 17
 Amauroſis, S. 155 L. 110 V. 238 *Sag.* 261 C. 93

- Amblyopia, S. 154 L. 108 V. 236 *Sag.* 258 C. 93, 94
 Ambustio, *Sag.* 97
 Amenorrhoea, V. 130 C. 126
 Amentia, S. 233 L. 67 V. 337 *Sag.* 346 C. 65, 67
 Amnesia, S. 237 *Sag.* 350 C. 65
 Amphemerina, S. 84 L. 20 *Sag.* 321 C. 3
 Amputatio, *Sag.* 86
 Amputatura, S. 70 L. 241 C. 144
 Anacatharsis, S. 262 *Sag.* 198 C. 40
 Anaesthesia, S. 161 L. 118 *Sag.* 267 C. 100
 Anaphrodifia, S. 164 *Sag.* 270 C. 109
 Anapleufis, V. 478
 Anafarca, S. 281 L. 215 V. 313 *Sag.* 108 C. 75
 Anatrope, V. 280
 Anchyloblepharon, V. 504
 Anchyloglossum, V. 507
 Anchylomerisma, *Sag.* 76
 Anchylops, V. 364
 Anchylofis, L. 286 V. 508
 Aneurisma, S. 32 L. 281 V. 408 *Sag.* 35 C. 127
 Angina, S. 147 L. 46 V. 49 *Sag.* 217. C. 10
 ——— convulsiva, V. 196
 Angone, V. 196
 Anhelatio, L. 157
 Anomia, V. 337
 Anodynia, V. 284 C. 100
 Anorexia, S. 162 L. 116 V. 279 *Sag.* 268 C. 107, 45
 Anosmia, S. 156 L. 113 V. 248 *Sag.* 262 C. 98
 Anthrax, S. 19 L. 272 V. 353 *Sag.* 24 C. 7
 Antipathia, S. 225 L. 88 V. 285 *Sag.* 337

- Anxietas, S. 187 L. 89 V. 134 *Sag.* 146
 Apella, L. 311 V. 546 *Sag.* 73
 Apepsia, V. 276 C. 45
 Aponia, S. 166 L. 115 V. 253 *Sag.* 272 C. 112
 Apltha, S. 100 L. 9 V. 501 *Sag.* 298 C. 35
 Aphthosa, V. 44 C. 35
 Apnoea, V. 265
 Apogeusis, V. 249 C. 99
 Apogeusia, V. 294
 Apomyttosis, S. 127 *Sag.* 234
 Apoplexia, S. 182 L. 101 V. 229 *Sag.* 288 C. 42
 Apoplectica, V. 72
 Apostema, S. 39 *Sag.* 42 C. pag. 86
 Apofyrma, V. 477
 Aquula, V. 445
 Archoptoma, V. 395
 Arctura, L. 261
 Ardor, S. 192. *Sag.* 151
 Argemon, V. 498
 Aridura, S. 278 L. 226 *Sag.* 104
 Artetifcus, V. 554
 Arthritis, S. 183 L. 60 V. 139 *Sag.* 142 C. 24
 Arthroceae, S. 78 L. 256 *Sag.* 95 C. 7
 Arthrodynia, C. p. 122
 Arthroposis, C. 25
 Afaphia, V. 250 C. 112
 Afcites, S. 288 L. 217 V. 314 *Sag.* 115 C. 79
 Afphyxia, S. 175 L. 95 V. 275 *Sag.* 281 C. 44
 Affodes, V. 27
 Asthenia, S. 172 L. 92 V. 223 *Sag.* 278

- Asthma, S. 145 L. 161 V. 268 *Sag.* 252 C. 55
Atecnia, L. 119 C. 109
Atheroma, L. 285 V. 420 C. 136
Athymia, V. 329 C. 66
Atochia, V. 172
Atonia, L. 120 C. 43
Atreta, L. 312 V. 549
Atrophia, S. 277 L. 210 V. 308 *Sag.* 102 C. 70
Attritio, V. 475
Aurigo, S. 306 *Sag.* 132 C. 91

B

- Bacchia, L. 270 *Sag.* 9 C. 7.
Balbuties, V. 259
Batrachus, V. 80.
Battarismus, V. 261 C. 113
Beriberia, S. 137 L. 140 *Sag.* 244
Blacfitas, V. 258
Blepharoptosis, S. 43 *Sag.* 46
Blepharotis, V. 342
Bleftrismus, V. 135
Boa, V. 446
Bombus, V. 302
Borborigmus, L. 123
Bronchocele, S. 28 V. 369
Bubo, S. 16 L. 271 V. 368 *Sag.* 21 C. 132
Bubonocele, V. 396 *Sag.* 58
Bulimia, S. 223 L. 79 *Sag.* 335 C. 101
Bulimus, V. 296 C. 101
Bullosa, V. 41 C. 34

C

- Cachexia, L. 221 V. 304
 Cacoethes, L. 250 V. 485 C. 145
 Cacophonia, *Sag.* 274 C. 112
 Cacositia, L. 87
 Caligo, S. 153 V. 288 *Sag.* 259 C. 92
 Callus, V. 429 C. 135
 Calvities, V. 529
 Cancer, S. 20 V. 375 *Sag.* 25 C. 131
 Canities, V. 525
 Capisfrum, V. 208 C. 49
 Caput obtipum, V. 513 C. 115
 Carcinoma, S. 296 L. 252 V. 487 *Sag.* 122 C. 145
 Cardialgia, S. 202 L. 48 V. 157 *Sag.* 160 C. 45
 Cardiogmus, S. 201 V. 152 *Sag.* 159
 Carditis, S. 111 V. 54 *Sag.* 302 C. 13
 Carebaria, V. 144
 Caries, S. 77 L. 255 V. 493 *Sag.* 94 C. 150
 Carphologia, S. 125 L. 135 V. 330 *Sag.* 231
 Carus, S. 181 L. 100 V. 231 *Sag.* 287 C. 42
 Cataclafis, V. 202
 Catalepfis, S. 176 L. 129 V. 230 *Sag.* 282 C. 42
 Cataphora, S. 180 L. 99 V. 232 *Sag.* 286 C. 42
 Catapfyxis, V. 137
 Cataracta, S. 152 L. 109 V. 239 *Sag.* 260 C. 92
 Catarrhalis, V. 73
 Catarrhexis, V. 91
 Catarrhus, S. 186 V. 98 *Sag.* 145 C. 40
 ————— suffocativus, V. 270
 Catoche, V. 230

- Catochus, S. 123 L. 128 V. 183 *Sag.* 229 C. 48
Causos, V. 20
Cedma, V. 168
Celfa, V. 303
Cephaloea, S. 194 V. 141 *Sag.* 153
Cephalalgia, S. 193 L. 40 V. 140 *Sag.* 152
Cephalitis, S. 109 *Sag.* 310 C. 9
Cercosis, V. 535
Cerion, V. 496
Chemosis, V. 46 C. 8
Chilon, V. 366
Chiragra, V. 139
Chlorosis, S. 309 L. 222 V. 305 *Sag.* 135 C. 47
Cholera, S. 253 L. 186 V. 110 *Sag.* 188 C. 60
Cholerica, L. 190 V. 28 C. 61
Cholosis, V. 536
Chorea, L. 139 V. 193 C. 51
Chylaria, V. 117
Cicatrix, L. 317 V. 509
Cillofis, V. 203
Cinclefis, V. 201
Cionis, V. 150
Cirfocele, V. 409
Citta, L. 78 C. 103
Clamor, V. 206
Clangor, V. 251 C. 112
Claudicatio, S. 131 *Sag.* 238
Clavus, L. 278 V. 142 428 C. 135
Clitorifmus, L. 298
Clunefia, V. 167 C. 7
Cocyta, L. 257

- Coeliaca, S. 255 L. 189 V. 109 *Sag.* 190 C. 61
 Coilima, V. 373
 Colica, S. 204 L. 50 V. 160 *Sag.* 162 C. 59
 Coloboma, V. 534
 Colpocele, *Sag.* 61
 Colpoptosis, *Sag.* 53
 Coma, V. 232 C. 42
 Combustura, L. 245 C. 7
 Condyloma, S. 24 L. 293 V. 378 *Sag.* 29
 Contractura, S. 119 L. 299 *Sag.* 225 C. 115
 Contusio, S. 66 V. 480 *Sag.* 83
 Contusura, L. 238
 Convulsio, S. 128 L. 142 V. 191 *Sag.* 235 C. 50
 Cophosis, S. 160 L. 112 *Sag.* 266 C. 96
 Coryza, S. 260 L. 174 V. 100 *Sag.* 196 C. 40
 Crampus, S. 120 V. 194 *Sag.* 226
 Crepitus, L. 194
 Cripforchis, V. 551
 Crithe, V. 434
 Crufta lactea, V. 495 C. 145
 Cyasma, V. 461
 Cynanche, S. 110 L. 33 *Sag.* 300 C. 10
 Cynorexia, V. 298 C. 101
 Cyphosis, V. 512
 Cyrtoma, V. 405
 Cyffotis, V. 71
 Cystirrhagia, V. 93 C. 39
 Cystitis, S. 108 L. 31 V. 66 *Sag.* 309 C. 20
 Cystocele, S. 56 V. 404
 Cystoptosis, V. 394

D

- Dacryoma, V. 506
 Dactylion, V. 510
 Daemonia, L. 69 C. 66
 Daemonomania, S. 236 *Sag.* 348 C. 66
 Decimana, V. 9 C. 2
 Delirium, V. 330 L. 65
 Deuteria, V. 132
 Diabetes, S. 263 L. 197 V. 115 C. 62 *Sag.* 199
 Diabrosis, V. 481
 Diachalasis, V. 474
 Diaphthora, V. 278 C. 45
 Diaphragmitis, *Sag.* 304 C. 11
 Diaria, L. 11 C. 4
 Diarrhoea, S. 254 L. 187 V. 105 *Sag.* 189 C. 61
 Diastrasis, S. 61 *Sag.* 68 C. 143
 Digitium, L. 227 V. 221 *Sag.* 173 C. 115
 Dionysifcus, V. 553
 Diplopia, S. 218 *Sag.* 330 C. 95
 Distortio, L. 302
 Distrix, V. 526
 Diuresis, V. 114 C. 62
 Duplicana, L. 18 C. 1, 2
 Dysecocia, S. 158 V. 246 *Sag.* 264 C. 96
 Dysenteria, S. 248 L. 191 V. 107 *Sag.* 183 C. 41
 Dyslochia, L. 169 V. 131 *Sag.* 215
 Dyshaemorrhoidis, *Sag.* 220
 Dysmenorrhoea, L. 168 V. 170 *Sag.* 218 C. 126

- Dyfodia, S. 274 V. 125 *Sag.* 209
 Dyfopia, V. 291 C. 94
 Dyfpepfia, V. 277 C. 45
 Dyfpermatifmus, S. 269 C. 125
 Dyfphagia, S. 199 *Sag.* 216
 Dyfphnoea, S. 144 L. 160 V. 267 *Sag.* 251 C. 56
 Dyftocia, S. 208 V. 171 *Sag.* 219
 Dyfuria, S. 265 L. 57 V. 164 *Sag.* 213 C. 124

E

- Ecchymoma, S. 6 V. 451 *Sag.* 5 C. 129
 Eclampfia, S. 133 V. 189 *Sag.* 240 C. 53
 Ecphyfe, V. 124
 Ecplexis, V. 334
 Ecftafis, S. 177 V. 333 *Sag.* 283 C. 42
 Ecthlymma, V. 475
 Ecthymata, V. 360
 Ectropium, L. 296 V. 518
 Eilema, V. 161
 Elcofis, S. 313 *Sag.* 139
 Elephantia Arabum, V. 322 C. 87
 Elephantiafis, S. 302 V. 321 *Sag.* 128 C. 87
 Elodes, V. 21
 Elytrocele, V. 402
 Emphyfema, S. 13 L. 228 V. 392 *Sag.* 18 C. 72
 Empyema, S. 151 L. 159 V. 358. *Sag.* 257 C. p.
 107
 Encanthis, V. 430
 Encauma, V. 450

- Encaufis, V. 158, 347. C. 7
 Encephalocoele, S. 57 V. 383 *Sag.* 63
 Encyftis, V. 420 C. 136
 Enteritis, S. 105 L. 29 V. 57. *Sag.* 307 C. 16
 Enterocele, S. 50
 ——— ovularis, V. 400
 Enthufiasmus, V. 335
 Entropium, V. 519
 Enurefis, S. 264 L. 195 V. 113 *Sag.* 200 C. 120
 Ephelis, S. 3 L. 325 V. 438 *Sag.* 3
 Ephemera, S. 79 C. 4
 Epialtes, S. 138 L. 163 *Sag.* 245 C. 68
 Ephidrofis, S. 258 *Sag.* 194 C. 117
 Epiala, V. 19
 Epidofis, *Sag.* 75
 Epilepfia, S. 134 L. 143 V. 188 *Sag.* 241 C. 53
 Epinyctis, S. 8 V. 441 *Sag.* 12
 Epiphlogifma, V. 176
 Epiphora, S. 259 L. 172 V. 99 *Sag.* 195 C. 118
 Epiplocele, S. 51
 Epiploitis, S. 106 *Sag.* 308 C. 14
 Epiftaxis, V. 82 C. 36
 Epilthotonos, V. 182 C. 48
 Epulis, V. 363
 Erotomania, L. 82 C. 66
 Errana, L. 19 C. 2
 Erratica, S. 90 C. 2 *Sag.* 327
 Eryfipelacea, V. 68 C. 26
 Eryfipelas, S. 97 L. 10 V. 343 *Sag.* 296 C. 26, 7
 Erythema, S. 11 *Sag.* 16 C. 7

- Eschara, S. 76 L. 280 V. 483 *Sag.* 93
 Efoche, V. 439
 Effera, S. 99. *Sag.* 297
 Exania, S. 47 *Sag.* 50
 Exarthrema, S. 60 *Sag.* 67 C 143
 Excoriatio, S. 65 *Sag.* 82
 Excoriatura, L. 246
 Exoche, V. 440
 Exocyste, S. 48
 Exocystis, *Sag.* 51
 Exomphalus, S. 40 *Sag.* 43
 Exoneirofis, V. 120
 Exophthalmia, S. 42 *Sag.* 45
 Exostosis, S. 29 L. 290 V. 417 *Sag.* 34 C. 140
 Expectoratio, L. 178 C. 40
 Exulceratio, S. 72 *Sag.* 90 C. 145

F

- Fatuitas, V. 336 C. 65
 Favus, V. 496
 Fiffura, S. 68 V. 469 *Sag.* 99
 Fiftula, S. 74 L. 254 V. 491 *Sag.* 91 C. 145
 Flatulentia, S. 272 L. 165 V. 127 *Sag.* 207 C. 45
 Flemen, V. 425
 Fletus, L. 149
 Fractura, S. 67 L. 235 V. 468 *Sag.* 98 C. 149
 Framboesia, S. 299 *Sag.* 125 C. 89
 Frigeraria, *Sag.* 318

- Frigus, V. 185
 Fungus, V. 423
 Furor uterinus, V. 331
 Furunculus, S. 18 V. 352 *Sag.* 23 C. 7

G.

- Galactia, L. 206 V. 122
 Galactirrhoea, S. 270 *Sag.* 205
 Galbulus, V. 559
 Galiancon, V. 558
 Ganglion, L. 287 V. 379 C. 137
 Gangraena, S. 314 L. 233 V. 327 *Sag.* 140. C. p.
 87
 Gastrica, L. 49
 Gastritis, S. 104 L. 28 V. 56 *Sag.* 306 C. 15
 Gastrocele, S. 52 V. 410 *Sag.* 54
 Gastrodynia, S. 203 *Sag.* 161 C. 45
 Gelasmus, V. 210
 Gibber, L. 300 V. 512
 Gibbositas, S. 30 *Sag.* 70
 Glaucoma, V. 241 C. 92
 Glossagra, V. 138
 Glossoccele, V. 197
 Glossocoma, V. 198
 Glus, L. 199 V. 117 C. 124
 Gonagra, V. 139
 Gongrona, V. 371
 Gonorrhoea, S. 268 L. 200 V. 118 *Sag.* 204 C. 121
 Grando, V. 435

- Gravedo, L. 42 V. 126 C. 40
 Graviditas, S. 284 L. 220 *Sag.* 111
 Gryposis, V. 537
 Gutta rosea, S. 4 C. 7
 ——— rofacea, V. 437 C. 7

H

- Haemalopia, V. 289 C. 95
 Haematoporia, *Sag.* 103
 Haematemesis, S. 242 L. 184 V. 89 *Sag.* 177 C. 39
 Haematopedesis, V. 95
 Haematuria, S. 243 L. 198 V. 92 *Sag.* 178 C. 39
 Haemeropathos, *Sag.* 13
 Haemodia, V. 146
 Haemoptoe, V. 83 C. 37
 Haemoptysis, S. 240 L. 179 V. 84 *Sag.* 175¹ C. 37
 Haemorrhagia, S. 239 L. 173 V. 81 *Sag.* 174 C. 36,
 116
 Haemorrhoidalis, V. 75
 Haemorrhoids, S. 247 L. 192 *Sag.* 182 C. 38
 Hæctica, S. 83 L. 24 V. 80 *Sag.* 320 C. p. 80
 Hemalopia, V. 245
 Hemerolopia, V. 244
 Hemicrania, S. 195 L. 41 V. 143 *Sag.* 154
 Hemiplegia, S. 170 L. 103 V. 228 *Sag.* 276 C. 43
 Hemitritæa, L. 23 C. 1
 Hepatalgia, S. 205 *Sag.* 163
 Hepatica, L. 51
 Hepatirrhoea, S. 246 V. 90 *Sag.* 181 C. 61
 Hepatitis, S. 113 L. 35 V. 58 *Sag.* 312 C. 17

- Hepatizon, L. 323
 Hepatocele, S. 53 V. 411
 Hermaphroditus, V. 552
 Hernia, L. 291 C. 141
 Herpes, S. 7 L. 268 V. 443 *Sag.* 11 C. 146]
 Hidroa, S. 10 V. 446
 Hieranofos, L. 144 V. 190 C. 50
 Hieropyr, V. 344 C. 7
 Himantofis, V. 151
 Hippos, L. 137 V. 199
 Hirsuties, L. 314 V. 524 *Sag.* 77
 Hordeolum, S. 27 L. 276 V. 434 *Sag.* 32 C. 7
 Horror, V. 186
 Humoraria, *Sag.* 317
 Hydarthrus, S. 38 *Sag.* 41 C. 139
 Hydatis, S. 34 *Sag.* 37 C. 138
 Hydrenterocele, V. 406
 Hydroa, *Sag.* 15
 Hydrocele, V. 388 C. 81
 Hydrocephalum, V. 384 C. 76
 Hydrocephalus, S. 285 L. 216 V. 384 *Sag.* 112
 C. 76
 Hydrociftis, V. 315
 Hydrometra, S. 289 *Sag.* 116 C. 80
 Hydromphalos, S. 387
 Hydropedefis, V. 121 C. 117
 Hydrophobia, S. 231 L. 86 V. 30 *Sag.* 343 C. 64
 Hydrophthalmia, V. 385
 Hydrops scroti, V. 389 C. 81
 Hydrorachitis, S. 287 *Sag.* 114 C. 77

- Hydrothorax, S. 150 V. 311 *Sag.* 256 C. 78
 Hygrofirfocele, V. 414
 Hypercatharsis, V. 123
 Hyperarteriscus, V. 557
 Hyperostosis, V. 418 C. 140
 Hypnobatasis, V. 340 C. 68
 Hypochondriasis, S. 220 L. 76 V. 218 *Sag.* 332
 C. 46
 Hypogastrocele, V. 403
 Hypophasis, V. 234
 Hypopyon, V. 356
 Hypofarca, L. 218 C. 82
 Hypospydiacos, V. 547
 Hypostaphyle, S. 44 *Sag.* 47
 Hysteralgia, S. 209 L. 55 V. 169 *Sag.* 166
 Hysteria, S. 135 L. 126 V. 219 *Sag.* 242 C. 63
 Hysteritis, L. 38 V. 67 C. 21
 Hysterocele, S. 55 V. 413
 Hysteroloxia, S. 58 *Sag.* 65
 Hysterophyse, V. 315 C. 74
 Hysteroptosis, S. 49 V. 393 *Sag.* 52

I.

- Ictericodes, V. 32
 Icterus, L. 244 V. 306 C. 91
 Ileus, S. 252 V. 162 *Sag.* 187 C. 59
 Iliaca, L. 185 C. 59
 Illofis, V. 200

- Impetigo, V. 462
 Incubus, V. 211 C. 68
 Inflammatio, L. 231 *Sag.* 20 C. 7
 Intertrigo, L. 247 V. 502 C. 7
 Ionthos, V. 436
 Ischias, S. 213 V. 138 *Sag.* 170 C. 22
 Ischiatocele, V. 401
 Ischiocele, *Sag.* 60
 Ischnophonia, V. 260 C. 113
 Ischnotis, V. 541
 Ischuria, S. 293 L. 167 V. 129 *Sag.* 212 C. 123
 Judicatoria, *Sag.* 316

L.

- Labarium, L. 309
 Labium leporinum, V. 522
 Laceratura, L. 242 C. 144
 Lactea, V. 76
 Lagocheilos, V. 552
 Lagophthalmia, L. 305 V. 516
 Lagoftoma, L. 310 *Sag.* 72
 Languor, L. 91
 Laparocele, *Sag.* 56
 Lassitudo, S. 188 L. 9 V. 222. *Sag.* 147
 Leiopodes, V. 545
 Leipothymia, S. 173 L. 93 V. 273 C. 44
 Leipyria, V. 24
 Lenta, L. 14. V. 79 C. 6

D d d

- Lentigo, L. 324 V. 455
 Leontiasis, S. 297 *Sag.* 123
 Lepra, S. 303 L. 262 *Sag.* 129 C. 88
 ——— Arabum, V. 321
 ——— Graecorum, V. 320 C. 88
 Leptophonia, V. 254 C. 112
 Lethargus, S. 179 L. 98 V. 22 *Sag.* 285 C. 42
 Leuce, V. 460
 Leucoma, S. 1 *Sag.* 1
 Leucophlegmatia, L. 214 C 72
 Leucorrhoea, S. 267 L. 201 V. 119 *Sag.* 202. C. 39
 Leucorrhoeis, V. 112 C. 38, 61
 Lichen, V. 462
 Lienteria, S. 256 L. 188 V. 108 *Sag.* 191 C. 61
 Lipothymia, *Sag.* 279
 Lippitudo, L. 266
 Lithiasis, V. 165
 Lochiorrhoea, *Sag.* 203
 Lordosis, S. 31 L. 301 V. 512 *Sag.* 71
 Loxarthrus, S. 62 *Sag.* 69
 Lumbago, S. 212 V. 138 *Sag.* 169 C. 22
 Lupia, S. 37 *Sag.* 39 C. 136
 Luxatio, V. 472 C. 143
 Luxatura, L. 237 C. 143
 Lyngodes, V. 26

M.

- Macropnoea, V. 266
 Madarosis, V. 530

- Malacia, V 300 C. 103
Malacoſteon, V. 523
Malis, S. 298 *Sag.* 124
Mania, S. 235 L. 68 V. 331 *Sag.* 349 C. 67
Marafmus, L. 211 C. 70
Marifca, S. 35 *Sag.* 37 C. 38
Marmaryge, V. 290. C. 95
Maſtodynia, S. 210 V. 153 *Sag.* 167 C. 71
Mediaſtina, V. 52 C. 11
Melaena, S. 249 *Sag.* 184
Melanchlorus, V. 307
Melancholia, S. 234 L. 71 V. 332 *Sag.* 347 C. 66
Melaficterus, S. 307 *Sag.* 133
Melafma, L. 322 V. 451
Meliceris, V. 420
Menorrhagia, S. 244 L. 202 V. 96 C. 39
Menſtrua, V. 11
Merocele, V. 399 *Sag.* 57
Meſenteritis, V. 60 C. 14
Meteorifmus, S. 292 *Sag.* 119 C. 73
Metritis, S. 107 *Sag.* 315 C. 21
Metrorrhagia, *Sag.* 179 C. 39
Miliaria, C. 31
Miliaris, S. 95 L. 7. V. 37 *Sag.* 295 C. 31
Mola, L. 205 V. 560
Monſtroſitas, V. 539
Morbilli, V. 453 C. 30
Morbilloſa, V. 36 C. 30
Morofis, L. 106 V. 336 C. 65
Morphoea, L. 319
Morſura, L. 244

- Morfus, *Sag.* 81
 Morta, L. 1 C. 34
 Mutitas, S. 165. V. 257 *Sag.* 271 C. 111
 Mydriasis, V. 237 C. 93
 Myocoilites, V. 63
 Myopia, L. 309 C. 94
 Myopiafis, V. 515 C. 94
 Myositis, *Sag.* 301 C. 22
 Myrmecium, L. 279 V. 426

N.

- Naevus, S. 5 L. 318 V. 538 *Sag.* 4
 Natta, L. 288
 Nausea, S. 250 L. 182 V. 159 *Sag.* 185 C. 45
 Nebula, V. 464
 Necrosis, S. 315 *Sag.* 141
 Nefrendis, V. 555
 Nephralgia, S. 207 *Sag.* 165
 Nephritica, L. 56
 Nephritis, S. 115 L. 37 V. 65 *Sag.* 314 C. 19
 Noma, L. 251 V. 489 C. 145
 Nonana, V. 8 C. 2
 Nostalgia, S. 226 L. 83 V. 332 *Sag.* 338 C. 106, 66
 Nyctalopia, L. 306 V. 243
 Nymphomania, S. 229 *Sag.* 341 C. 105
 Nyctagmus, S. 124 *Sag.* 230

O.

- Oblivio, L. 107 V. 338 C. 65
Obstipatio, L. 166 V. 128 *Sag.* 221 C. 122
Obstipitas, S. 118 V. 128 *Sag.* 224 C. 115
Octana, V. 7 C. 2
Odaxismus, V. 147
Odontalgia, S. 198 L. 45 V. 145 *Sag.* 157 C. 23
Odontorrhoea, V. 86
Oedema, S. 12 L. 229 V. 382 *Sag.* 17
Oesophagismus, V. 217
Omentitis, V. 61 C. 14
Omphalocele, V. 398 *Sag.* 55
Oneirodynia, C. 68
Onychia, V. 346
Onyx, V. 355
Operatio, *Sag.* 85
Ophiafis, V. 529
Ophthalmia, S. 196 L. 43 V. 341 *Sag.* 155 C. 8
Ophthalmites, V. 47 C. 8
Ophthalmorrhagia, V. 88
Opisthotonos, V. 181 C. 48
Opodeocele, *Sag.* 59
Orgasmus, L. 133
Orthopnoea, S. 146 L. 162 V. 269 *Sag.* 253 C. 56
Oscedo, S. 140 V. 263 *Sag.* 247
Oscheocele, S. 41 V. 397 C. 81
Oscheophyma, *Sag.* 44 C. 81
Oscitans, V. 31
Oscitatio, L. 151

- Osteocopus, V. 176
 Ostocopus, S. 184 L. 61 *Sag.* 143
 Otagia, S. 197 L. 44 V. 148 *Sag.* 156 C. 7
 Otitis, V. 48
 Otoplatos, V. 102
 Otopuofis, V. 101
 Otorrhoea, S. 271 L. 171 V. 87 *Sag.* 206
 Oxyphonia, V. 255 C. 112
 Ozaena, L. 253 V. 500 C. 145

P.

- Paedarthrocace, V. 419 C. 7
 Palpitatio, S. 130 L. 132 V. 213 *Sag.* 237 C. 54
 Panarititia, V. 70
 Pancreatica, V. 64
 Pandiculatio, S. 126 L. 152 V. 264 *Sag.* 233
 Panophobia, S. 227 L. 75 *Sag.* 339 C. 66
 Papula, S. pag. 8. L. 275 *Sag.* 7. C. 7
 Paracentesis, *Sag.* 88
 Paracusis, S. 159 *Sag.* 265 C. 97
 Paracyifis, V. 326
 Paraglossa, S. 45 V. 365 *Sag.* 48
 Paralysis, S. 169 L. 104 V. 226 *Sag.* 275 C. 43
 Paraphymosis, V. 349 C. 7
 Paraphonia, S. 168 C. 112
 Paraphrenesis, S. 102 L. 26 C. 11
 Paraphrenitis, V. 55 C. 11
 Paraphrosyne, S. 232 L. 66 V. 330. *Sag.* 345 C. 67
 Paraplegia, L. 102 V. 227 *Sag.* 277 C. 43

- Paraplexia, S. 171 C. 43
Paronychia, S. 21 L. 258 V. 345 *Sag.* 26 C. 7
Parorchidium, S. 59 *Sag.* 66
Parotis, S. 17 V. 370 *Sag.* 22 C. 132
Parturitio, L. 203
Parulis, V. 362 C. 7
Pavor, V. 339
Pelada, V. 529
Pelioma, V. 451
Pemphigus, S. 93 *Sag.* 291 C. 34
Pemphingodes, V. 43
Periadyndia, V. 155
Pericarditis, V. 53 C. 13
Perinaeoecele, *Sag.* 62
Peripneumonia, S. 112 L. 34 V. 51 *Sag.* 311 C. 11
Peritonitis, V. 62 C. 14
Peritoneorixis, *Sag.* 64
Pernio, L. 259 V. 350 C. 7
Pertussis, C. 57
Pestilentialis, V. 33 C. 27
Pestis, S. 91 L. 2 *Sag.* 289 C. 27
Petechia, L. 5 V. 452 C. 35
Petechialis, V. 38
Phagedaena, V. 488 C. 145
Phalacroctis, V. 528
Phalangosis, V. 533
Phantasma, L. 73 V. 287 C. 95
Phimosis, S. 22 L. 297 V. 348 *Sag.* 27 C. 7
Phlegmatia, S. 282 *Sag.* 109 C. 75
Phlegmone, S. 15 L. 39 V. 351 *Sag.* 299 C. 7
Phlogosis, V. 220 C. 7

- Phlyctæna, S. pag. 9 L. 273 V. 442 *Sag.* 8 C.
138
- Phlyxacion, V. 450
- Phoenigmus, S. 308 *Sag.* 134
- Phoxos, V. 511
- Phrenismus, V. 45 C. 9
- Phrenitis, S. 101 L. 25 V. 18 *Sag.* 303 C. 9, 6
- Phricasmus, *Sag.* 239
- Phricodes, V. 25
- Phthiriasis, S. 310 V. 324 *Sag.* 136
- Phthifis, S. 276 L. 208 V. 310 *Sag.* 101. C. p. 158
- Phygethlon, V. 357
- Phyma, V. 359
- Physconia, S. 283 V. 325 *Sag.* 110 C. 82
- Phyfocele, V. 416
- Phyfocephalus, S. 286 *Sag.* 113
- Phyfometra, S. 290 *Sag.* 117 C. 74
- Pica, S. 222 V. 301 *Sag.* 334 C. 103
- Pinnula, V. 432
- Piptonychia, V. 484
- Pituitaria, V. 111 C. 61
- Pityriasis, V. 476
- Pladarotis, V. 431
- Plancus, V. 545
- Plautus, . 545
- Plethora, L. 225 *Sag.* 105
- Pleuritica, L. 53
- Pleuritis, S. 103 L. 27 V. 50 *Sag.* 305 C. 11
- Pleurodyne, S. 148 V. 50 *Sag.* 254 C. 22
- Plica, L. 313 V. 323 C. 90
- Plicatio, V. 470

- Pncumatofis, S. 280 V. 391, 156 *Sag.* 107 C. 72
 Pneumonia, C. 11
 Pneumonica, L. 54
 Pnigma, V. 270
 Podagra, V. 175 C. 24
 Podagrica, V. 69 C. 24
 Polydipsia, S. 224 L. 80 V. 295 *Sag.* 336 C. 102
 Polymerisma, *Sag.* 74
 Polypus, V. 377 C. 133
 Polysarcia, S. 279 L. 213 V. 540 *Sag.* 106 C. 71
 Porrigo, V. 476
 Porrus, V. 427 C. 133
 Presbytia, L. 307 C. 94
 Pressura, L. 260
 Priapismus, S. 121 L. 122 V. 173 *Sag.* 227
 Proctalgia, S. 214 *Sag.* 171 C. 7
 Proctica, L. 59 V. 167
 Proctitis, L. 30 C. 7
 Proctorrhoea, *Sag.* 193
 Profusio, L. 239 C. 116
 Prolapsus, L. 292 C. 142
 Proptoma, S. 46 *Sag.* 49
 Pruritus, S. 190 L. 64 V. 136 *Sag.* 149
 Pfellismus, S. 167 L. 138 *Sag.* 273 C. 113
 Pfellotis, V. 259 C. 113
 Pseudoblepsis, C. 95
 Psophos, V. 177
 Pfora, L. 265 V. 320 C. 148
 Psoriasis, V. 174
 Pfydracia, S. 9 V. 442 *Sag.* 14

- Pterygium, S. 26 L. 295 V. 433 *Sag.* 31
 Ptilosis, V. 531
 Ptofis, V. 235
 Ptyalismus, S. 261 L. 176 V. 103 *Sag.* 197 C. 119
 Pudendagra, S. 215 L. 59 V. 168 *Sag.* 172
 Punctura, S. 64 L. 243 *Sag.* 79 C. 144
 Puorrhoea, V. 106
 Puoturia, V. 116
 Purpura, S. 96 V. 449 *Sag.* 292 C. 35
 ——— scorbutica, V. 443
 Pustula, S. pag. 8 L. 274 *Sag.* 6 C. 7
 Pyrosis, S. 200 *Sag.* 158 C. 58
 Pyuria, S. 266 *Sag.* 201

Q

- Quartana, S. 89 L. 17 V. 3 *Sag.* 326 C. 2
 ——— duplex, V. 13
 ——— triplex, V. 14
 Quintana, V. 4 C. 2
 Quotidiana, S. 87 L. 15 V. 1 *Sag.* 324 C. 3
 ——— continua, V. 15

R.

- Rabies, L. 85 *Sag.* 344
 Rachialgia, S. 211 *Sag.* 168 C. 59
 Rachitis, S. 294 L. 212 V. 312 *Sag.* 120 C. 83
 Rachosis, V. 503
 Ranula, V. 380
 Raphania, L. 145 V. 192 C. 52

- Raucedo, L. 146 C. 40, 112
 Raucitas, V. 252 C. 40, 112
 Renchus, V. 271
 Rhagas, L. 248. S. 75 V. 467 *Sag.* 96
 Rhenophonia, V. 256 C. 112
 Rheuma, S. 149, *Sag.* 255 C. 40
 Rheumatica, V. 74
 Rheumatismus, S. 185 L. 62 V. 138 *Sag.* 144 C. 22
 Rhicnosis, V. 542
 Rhochmos, V. 272
 Rhoeas, V. 520
 Rhopalosis V. 323 C. 90
 Rhyffemata, V. 521
 Rigor, S. 132 L. 141 V. 187
 Rifus, L. 148
 ——— fardonicus, V. 210
 Rodatio, V. 532
 Ronchus, V. 272
 Rubeola, S. 94 L. 4 *Sag.* 293 C. 30
 Ructus, L. 181 V. 215
 Ruminatio, V. 216
 Ruptura, S. 69 L. 239 V. 466 *Sag.* 84

S.

- Saniodes, V. 550
 Sarcocele, V. 415
 Sarcoma, S. 23 L. 294 V. 376 *Sag.* 28 C. 133
 Sardiasis, L. 125 V. 209
 Satyriasis, S. 228 L. 81 V. 331 *Sag.* 340 C. 104, 105

- Scabies, S. 304 V. 444 *Sag.* 130 C. 148
 Scarlatae, V. 454
 Scariatina, S. 98 V. 39 *Sag.* 294 C. 32
 Scelotyrbe, S. 136 V. 195. *Sag.* 243 C. 51
 Schirrhus, S. 14 L. 283 V. 374 *Sag.* 19 C. 130
 Sclopetoplaga, *Sag.* 80
 Scoliosis, V. 512
 Scorbutus, S. 301 L. 223 V. 318 *Sag.* 127 C. 86
 Scotomia, L. 111
 Screamus, L. 177
 Scrophula, S. 295 V. 367 *Sag.* 121 C. 84
 Seifis, V. 512
 Seline, V. 463
 Septana, V. 6 C. 2
 Serpigo, L. 267 V. 443
 Sextana, V. 5 C. 2
 Singultus, S. 141 L. 153 V. 212. *Sag.* 248
 Sinus, S. 73 V. 492. *Sag.* 92 C. 145
 Siriasis, V. 34 C. 9
 Soda, L. 47 V. 154 C. 45, 58
 Somnambulismus, S. 221 L. 77 *Sag.* 333 C. 68
 Somnium, V. 339 C. 68
 Soranolentia, L. 96 V. 233
 Spanopogon, V. 556
 Sparganosis, V. 372
 Spasma, V. 479
 Spasmus, L. 121
 ——— oesophagi, V. 217
 ——— cynicus, V. 209
 ——— maxillae inferioris, V 208.
 Sphacelismus, L. 32 C. 9

- Sphacelus, L. 234 V. 328 C. p. 87
 Spina bifida, V. 386 C. 77
 Spinola, L. 289 C. 77
 Splenalgia, S. 206 *Sag.* 164
 Splenica, L. 52
 Splenitis, S. 114 L. 36 V. 59 *Sag.* 313 C. 18
 Splenocele, S. 54 V. 412
 Staphyloma, S. 36 V. 421 *Sag.* 40
 Staphylofis, V. 422
 Steatites, V. 390 C. 71
 Steatoma, V. 420
 Sterilitas, L. p. 104. *Sag.* 211 C. 125
 Sternutatio, S. 139 L. 154 V. 204 *Sag.* 246
 Stertor, S. 143 L. 156 V. 271 *Sag.* 250
 Stigma, V. 457
 Stomacace, S. 241 L. 175 V. 85 *Sag.* 176 C. 39
 Strabismus, S. 116 L. 304 V. 514 *Sag.* 222 C. 114
 Stranguria, L. 196 V. 163
 Stridor, L. 136
 Struma, L. 284 C. 84
 Stupiditas, V. 336 C. 65
 Stupor, S. 189 L. 105 *Sag.* 148
 Stymatofis, V. 94
 Subluxatio, V. 473
 Subsultus, L. 134 *Sag.* 232
 Sudamen, L. 321
 Sudamina, V. 446
 Sudor, L. 207 C. 117
 Suffocatio, L. 158
 ——— hysterica, V. 196
 Suffusio, S. 217 *Sag.* 329 C. 95

- Sugillatio, L. 230 C. 129
 Suppuratoria, V. 78
 Surditas, V. 247 C. 96
 Suspirium, L. 150 V. 262
 Sufurrus, V. 292
 Sutura, *Sag.* 87
 Sycofis, V. 490 C. 145
 Syncopalis, V. 29
 Syncope, S. 174 L. 94 V. 274 *Sag.* 280 C. 44
 Synizefis, V. 240 C. 92
 Synocha, S. 80 L. 12 C. 4
 Synochus, S. 81 L. 13 V. 16 C. 4 et 6
 Syphilis, S. 300 L. 6 V. 319 *Sag.* 126 C. 85
 Syrigmos, S. 219 *Sag.* 331 C. 97
 Syringmos, L. 72

T

- Tabes, S. 275 L. 209 V. 309 *Sag.* 100 C. 69
 Talpa, V. 420
 Tarantismus, S. 230 L. 84 V. 193 *Sag.* 342
 Tenesmus, S. 257 L. 193 V. 166 *Sag.* 192
 Terminthus, V. 381 C. 7
 Tertiana, S. 88 L. 16 V. 2 *Sag.* 325 C. 1
 ——— duplex, V. 12
 Testudo, V. 420
 Tetanus, S. 122 L. 127 V. 180 *Sag.* 228 C. 4‡
 Tetartophya, S. 86 L. 22 *Sag.* 323 C. 2
 Therioma, V. 486 C. 145
 Thlasis, V. 47‡
 Tinea, S. 305 L. 263 V. 497 *Sag.* 131 C. 147

- Toius, V. 424
 Torpor, V. 224
 Tortura, L. 303
 Trachelophyma, *Sag.* 33
 Traulotis, V. 258 C. 113
 Tremor, S. 129 L. 131 V. 184 *Sag.* 236 C. p. 195
 Trichiasis, L. 316 V. 517
 Trichoma, S. 311 *Sag.* 137 C. 90
 Trismus, S. 117 L. 124 V. 207 *Sag.* 223 C. 49
 Tritaeophya, S. 85 *Sag.* 322 C. 1
 Tritaeus, L. 21 C. 1
 Tuffis, S. 142 L. 155 V. 205 *Sag.* 249 C. 40
 Tylloma, V. 429 C. 135
 Tympanites, S. 291 L. 219 V. 316 *Sag.* 118 C. 73
 Typhomania, S. 178 L. 97 V. 23 *Sag.* 284 C. 42
 Typhus, S. 82 *Sag.* 319 C. 5

V

- Vaga, V. 10 C. 2
 Valgus, V. 544
 Varicella, V. 42, 448 C. 29
 Variola, S. 92 L. 3 V. 447 *Sag.* 290 C. 28
 Variolofa, V. 35 C. 28
 Varix, S. 33 L. 282 V. 407 *Sag.* 36 C. 128
 Varus, S. p. 9 L. 269 V. 436 et 543 *Sag.* 10 C. 7
 Verruca, S. 25 L. 277 V. 426 *Sag.* 30 C. 134
 Vertigo, S. 216 L. 74 V. 293 *Sag.* 328
 Vefania, L. 70 C. 66
 Vibex, L. 320 V. 458
 Vitiligo, S. 2 V. 459 *Sag.* 2

- Ulcus, S. 71 L. 249 C. 145 *Sag.* 89
 Vociferatio, L. 147
 Volatica, L. 63 V. 178 C. 22
 Vomica, L. 180 V. 104 C. p. 106
 Vomitus, S. 251 L. 183 V. 214 *Sag.* 186 C. 45
 Uredo, L. 8 C. 33
 Urorrhoeas, V. 548
 Urticaria, V. 361, 456 C. 33
 Urticata, V. 40 C. 33
 Vulneraria, V. 77
 Vulnus, S. 63 L. 240 V. 465 *Sag.* 78 C. 144

X

Xirafia, V. 527

Z

Zoster, V. 344

C A T A L O G U S

Morborum a nobis omifforum, quos omiffiffe fortaffis non oportebat. *Vide Prolegomena, pag. xxi.*

Aglaftatio, L.

Agalaxis, V.

Alopecia

Anchylops

Ægilops

Anchylofis, L.

Anchylofis, V.

Angina, S. et L.

Antipathia

Beriberia

Cardiogmus

Cephalaea

Cephalalgia

Distortio

Dysphagia

Agglutitio

Acatapofis

Oefophagifmus

Dyftocia

Parturitio et alii gravidarum et parturientium morbi

Elcofis

Effera

Hemicrania

- Leucorrhoea ex vitio locali
 Lithiasis in organis uropoeticis, et in aliis corporis
 partibus
 Malis
 Cocyta, L.
 Melaena
 Melafisterus
 Melanchlorus, V.
 Myocoilites
 Necrosis
 Odaxismus
 Dentitio et alii infantum morbi
 Paralysis partis singularis ex vitio musculorum
 Physocephalus
 Pnigma
 Catarrhus suffocativus *Auct.*
 Pyuria
 Puoturia
 Sterilitas utriusque sexus
 Acyisis, V.
 Stymatosis
 Tarantismus
 Venena
 Vermes.

I N D E X

Specierum Sauvagesii, quae in systemate nostro sub nominibus genericis non inveniuntur.

Numeri indicant paginam.

- Amaurosis a myosi, 303.
- Amaurosis a synchyfi, 303.
- Amblyopia hydrophthalmica, 304.
- Amphimerina anginosa, 97.
- Amphimerina biliosa, 56.
- Amphimerina cardiaca, 53.
- Amphimerina catarrhalis, 172.
- Amphimerina epiala, 54.
- Amphimerina hemitritaeus, 49.
- Amphimerina humorosa, 54.
- Amphimerina hungarica, 55.
- Amphimerina paludosa, 56.
- Amphimerina peripneumonica, 102.
- Amphimerina phricodes, 54.
- Amphimerina pseudohemitritaeus, 49.
- Amphimerina semiquartana, 61.
- Amphimerina semiquintana, 53.
- Amphimerina spasmodica, 62.
- Amphimerina syncopalis, 54.
- Amphimerina tusliculosa, 173. et 231.
- Angina spasmodica, 213.
- Aphonia paralytica, 193.

- Arthritis rheumatica, 128.
Ascites flatulento-peritonaeus, 273.
Ascites fanguineo-uterinus, 282.
Ascites uterinus, 282.
Asphyxia a carbone, 187.
Asphyxia congelatorum, 188.
Asphyxia flatulenta, 189.
Asphyxia foricariorum, 187.
Asphyxia a fumis, 186,
Asphyxia hysterica, 191.
Asphyxia immerforum, 189.
Asphyxia a mephitide, 187.
Asphyxia a musto, 187.
Asphyxia a pathemate, 187.
Asphyxia sideratorum, 188.
Asphyxia spinalis, 184.
Asphyxia suspenforum, 189.
Asthenia a hydrocephalo, 186.
Asthma catarrhale, 227.
Asthma febricosum, 230.
Asthma a gibbo, 228.
Asthma metallicum, 229.
Asthma pneumodes, 227.
Asthma a polypo cordis, 229.
Asthma pulverulentorum, 229.
Atrophia febrifequa, 267.
Atrophia infantilis, 267.
Atrophia rachitica, 267.

C.

- Cardialgia inflammatoria, 111.
Cardialgia sputatoria, 232.
Catarrhus Bellinfulanus, 97.
Cephalaea febricosa, 64.
Cephalalgia catarrhalis, 173.
Cephalalgia inflammatoria, 91.
Cephalalgia intermittens, 64.
Cholera sicca auriginosa, 237.
Convulsio Indica, 211.
Convulsio a nervi punctura, 213.
Convulsio raphania, 213.
Convulsio ab ustilagine, 218.

D.

- Diarrhoea carnosâ, 179.
Dysenteria a cathartâ, 180.
Dysenteria a mesenterii vomica, 243.
Dysenteria Parisiaca, 180.
Dysenteria scorbutica, 343.

E.

- Eclampsia febricosa, 50.
Eclampsia typhodes, 217.
Enteritis mesenterica, 110.
Ephemera Britannica, 77.

- Ephemera dichomene, 63.
 Ephemera sudatoria, 77.
 Epilepsia febricosa, 50.
 Erysipelas ambustio, 85.
 Erysipelas symptomaticum, 86.
 Erysipelas a vespis, 86.

H.

- Hepatalgia apostematosa, 115.
 Herpes Zoster, 134.
 Hydrometra ovarii, 280.
 Hysteralgia febricosa, 64.
 Hysteria febricosa, 50.

I.

- Ischias ex abscessu, 129.
 Ischias intermittens, 64.

L.

- Lumbago apostematosa, 129.
 Lumbago ab arthroace, 129.
 Lumbago psoadica, 129.

M.

- Menorrhagia difficilis, 358.

- Miliaris nautica, 74.
Miliaris purpurata, 74.
Miliaris sudatoria, 78.
Mutitas a glossolyfi, 193.

N.

- Nephralgia arenosa, 117.
Nephralgia arthritica, 117.
Nephralgia calculosa, 117.
Nephralgia febricosa, 64.
Nephralgia purulenta, 117.
Nephralgia rheumatica, 119.

O.

- Ophthalmia febricosa, 64.
Orthopnoea hysterica, 225.
Orthopnoea spasmodica, 225.

P.

- Phrenitis apyreta, 262.
Phrenitis inanitorum, 261.
Pleuritis hepatica, 114.
Pleuritis periodica, 51.
Pleuritis splenica, 116.
Pleurodyne parapleuritis, 104.
Pleurodyne verminosa, 106.

- Pleurodyne vomica, 106.
 Pfydracia a vespis, 86.
 Pyuria arthritica, 355.
 Pyuria mucosa, 355.
 Pyuria viscida, 355

Q.

- Quotidiana deceptiva, 53.
 Quotidiana epileptica, 50.
 Quotidiana soporosa, 49.

S.

- Scarlatina anginosa, 146.
 Scelotyrbæ festinans, 215.
 Scelotyrbæ verminosa, 215.
 Scrophula mesenterica, 266.
 Splenalgia suppuratoria, 116.
 Synocha catarrhalis, 173.
 Synocha dysenteriodes, 80.
 Synocha miliaris, 79.
 Synochus hiemalis, 70.
 Synochus pleuritica, 70. et 105.
 Synochus rheumatizans, 70.
 Synochus scorbutica, 71.

T.

- Tabes dorsalis, 268
Tabes a hydrope, 269.
Tabes nutricum, 268.
Tabes a sanguifluxu, 268.
Tabes sudatoria, 268.
Tabes syphilitica, 269.
Tetanus febricosus, 50.

V.

- Variola lymphatica, 138.



