

ヤ 9
773
20



慶雲散治天陽氣不足不能施
化豆成方○慶雲子五味子各
升兔絲子三升天雄兩石解白
水各三兩桑寄生四兩天門冬九
兩紫石英兩石九味治下節酒
服方寸匕先食服日三不耐冷者
云寄生加細辛四兩陽氣不少
而多子者石解加檳榔十五枚

清也	生精	尺求	瘦刑	相女	防疾	軀乾	女真	益濟	子婦
亦清	亦清	偏嗣	子重	未者	湯已	脂滋	配精	丹陰	人附
尺兼	尺兼	旺之	宮顏	和者	防羌	滿宜	合不	調丹	無子
脉遲	脉遲	陰專	無血	調經	或活	溢子	必能	養金	多由
瀦冷	瀦冷	虛非	俱者	易易	或活	子陰	當攝	血丹	琥珀
瀦極	瀦極	福於	不福	挾氣	或活	宮養	其入	元調	調血
○男	○男	○尺	宜子	性未	或活	行四	年子	溫經	經少
若見	若見	○右	子不	行好	或活	濕物	○雖	經種	九不
脉微	脉微	沉滑	可脂	妬者	或活	燥湯	無子	○湯	味攝
微弱	微弱	勻易	不知	者月	或活	爽南	婦孕	○婦	養精
而房	而房	易為	門宮	水不	或活	星加	人雖	人天	宜調
泄無	泄無	為火	太	所生	或活	半香	瘦孕	陰歸	丸調
焉無	焉無	生動	宮太	多女	或活	夏附	怯者	血一	加味
子精	子精	息好	太	性行	或活	川黃	乃子	衰弱	益血
氣好	氣好	○左	太	者行	或活	芎滑	以男	雖仙	宜百

温腎丸	續嗣丹	固本健陽丹
心及	山子	可專
白木	一白	三兩
和具	山子	可專
及白	山子	可專
服臨	山子	可專
之臥	山子	可專
子以	山子	可專
當溫	山子	可專
歸山	山子	可專
鹿菜	山子	可專
茸萸	山子	可專
益熟	山子	可專
智地	山子	可專
杜黃	山子	可專
冲各	山子	可專
生三	山子	可專
乾兩	山子	可專
地巴	山子	可專
黃戟	山子	可專
神二	山子	可專

相女法 脉法

山藥遠志續斷蛇床子各一兩右為末蜜丸龍骨
大空溫酒下五七十九精不固倍鹿茸加龍骨
印牡蠣

五子衍宗丸 治男子無嗣枸杞子五兩車前子三兩五味
子一兩右搗為末蜜丸下五十九春丙午夏戊己
十九臨卧鹽湯吞下五十九春丙午夏戊己

合辰戌丑未秋壬癸亥子冬甲乙寅卯辰巳午未申酉戌亥
辰戌丑未秋壬癸亥子冬甲乙寅卯辰巳午未申酉戌亥
合辰戌丑未秋壬癸亥子冬甲乙寅卯辰巳午未申酉戌亥
子精代蓮子車前子

陽起石元 治丈夫精冷真精氣不濃不兆施是以無
子精代蓮子車前子

蒸焙天雄炮非子炒肉荵蓉酒浸各一兩覆盆子
酒浸石斛柴寄生沉香原蚕蛾酒灸五味子各五
錢右為末酒煮糯米九和九

玉鑰啟榮丸 治婦人無子香附子搗去皮毛醋水浸
子大空末鹽湯下七九和九

女金丹

大黃圓治帶下百病子服藥十
日下血二日下長虫及青黃汁三十
日病除五日肥白○大黃破如米

紫胡補硝乳蘆各升芎藭
五兩蜀椒二兩茯苓如雞子大一
枚石味為末蜜丸如梧子大

先食服之未飲下加至十丸以知
為度五日微下

吉祥圓治文積年不孕方○天麻
柳絮枚丹茯苓乳羊桂各兩五

味子桃花白芍龍各二兩覆
盆子二耳桃仁一百枚兔絲子楮

實子各升石十四味為末蜜和
丸如豆大每服空心飲苦酒下五
丸日中服晚一服

水嗣

媛宮蠶斯丸 婦人無子者服之厚朴一兩二錢半吳
菜萸白茯苓白芍白斂石菖蒲白附子

參各二錢五分防風肉桂乾薑牛膝沙參各一兩半細辛人
下五七

蠶斯丸 經調受補者服七日即交合孕後勿服香附
子白薇半夏白茯苓杜冲厚朴當歸秦艽各

中無月乃子效細一細外心藥
無所即子或嗣膈九入餘白
金丹不效宮無○溫空別藥
也治或瘵一酒心研赤酒末
真女赤無等女白湯鳴時先
帶下崩漏及血風血氣虛勞
諸證

八門名女金丹治婦人至子或至痰火等
忘經事亦調願容不減但久至孕乃
子宮有陰血湯不能生發宜服此散
動微陽月即效或有經事赤後赤帶

桂心人參沒藥各一兩細辛乳香當歸酒浸牛膝
酒洗各七錢半右為末蜜丸小豆大酒下一二十
九名壬子日修合○

百子附歸丸

熟地黃阿膠珠陳艾葉各二兩見水參差
不調四製香
熟地黃阿膠珠陳艾葉各二兩見水參差
不調四製香

醋連皮黃阿膠珠陳艾葉各二兩見水參差
不調四製香
醋連皮黃阿膠珠陳艾葉各二兩見水參差
不調四製香

琥珀調經丸

淨熟艾四兩拌勻再加工醋熟艾生
淨熟艾四兩拌勻再加工醋熟艾生

為度入川芎當歸白芍藥熟艾生
為度入川芎當歸白芍藥熟艾生

加味養榮丸

火等證服之有孕又胎前胎動胎漏常服可無
火等證服之有孕又胎前胎動胎漏常服可無

小產之患熟地黃當歸白芍藥熟艾生
小產之患熟地黃當歸白芍藥熟艾生

黃芩香附子各一兩半陳皮貝母白茯苓麥門冬
各一兩阿膠七錢甘草五錢黑豆炒去皮四十九
或益湯下末蜜丸九

加味益母丸

白湯下藥木香各二兩右為末蜜丸九

濟陰丹

十六人疾皆令孕及生子不育不疾無子及
十六人疾皆令孕及生子不育不疾無子及

甘草澤蘭各二兩當歸桂心乾薑細辛石斛藜蘆本秦荒
甘草澤蘭各二兩當歸桂心乾薑細辛石斛藜蘆本秦荒

藥各七錢半香白糯米炒一升大豆黃卷炒半升右為
藥各七錢半香白糯米炒一升大豆黃卷炒半升右為

勝金丹

丸細嚼蜜和勻兩作六丸每
丸細嚼蜜和勻兩作六丸每

永嗣

治月水行期久無嗣息及血瘕氣痛百般諸

日

婦中淋瀝及種子此症于近麻痺半身
不遂或氣逆腹痛脾虧飲食無味面
色萎黃常作吐逆泄瀉及遺精中風浮
腫癰疽消渴功虛勞等症臨產腹痛
及死胎墜胎下產後瘀血腹痛等症
痛用滋補湯送下真金丹也

芷肉桂白薇川芎玄胡索白芍藥白朮各一兩
香甘草各五錢右為末蜜丸每服一丸空
溫酒嚼下服二香門無沈此非金丹也
十九當有孕得無子多因七情所傷致經水不
調經種玉湯調治婦人無孕熟地黃香附子炒各六錢
陳皮身酒洗胡索收丹皮乾薑炒各三錢官桂熟艾各
二錢右剉分作四貼每貼一貼藥盡交搗成孕矣
待藥至之日服起一貼藥盡交搗成孕矣
此藥百發百中起一貼藥盡交搗成孕矣
四春無薑桂艾中起一貼藥盡交搗成孕矣

調經種玉湯

先天歸一湯生當歸酒洗一兩二錢白芍藥
牛膝酒洗各八錢縮砂炒香附子一兩人參炒白茯苓
七錢陳皮六錢甘草四錢右剉分作十貼薑水
後煎服五貼藥盡即煎臨服調和即行當有孕矣
神仙附益丹浸香附米一晒如童便浸透用水洗醋浸透一

先天歸一湯

宿晒乾為末以香附四兩艾葉一兩東流水洗淨烘乾
醋七分和前一末為丸百病而生育之功效如湯
下七九不惟治婦人百病而生育之功効如湯

神仙附益丹

調經養血元酒治經脈不調久不受孕香附子十二兩
白芍藥酒炒生乾地黃酒洗各三錢皮酒洗各二兩
川芎白茯苓膠珠各一兩玄胡索六錢蓬朮煨醋炒
夏油炒各五錢苗香炒二錢右為末醋糊丸每服一丸
甘草灸各五錢苗香炒二錢右為末醋糊丸每服一丸
子百丸空有孕勿服或溫酒
溫經湯或逾月不虛損或前或後或多或少
溫經湯或逾月不虛損或前或後或多或少

調經養血元

一方男子精冷無子免絲子酒浸煮製細末雀卵清
一方男子精冷無子免絲子酒浸煮製細末雀卵清

溫經湯

永嗣
一方男子精冷無子免絲子酒浸煮製細末雀卵清

為凡梧子大每七十九空
年至五十五及陽痿者每
兩麵火焙乾末同丸服之
透慢火焙乾末同丸服之
又方 肉戊戌酒治婦人
效 久食令人有子 乾○無
子飲之 最驗 者多灸臍中

胎孕以丸藥而調之必先視其婦之經脈調否其或末調必

行時子宮正開乃受孕者成胎之候妙合太和水纔生
過此佳期則子宮閉而胎不結矣
者成日三則五日交會者成胎矣
○婦人經水來時有兩日半爭者三日後方可也
有女何如血旺氣盛六七物或綿或帛夾之於戶
顏取而見之也惟以敗血去淨鮮紅者未爭不及也
淺淡者大過也惟以敗血去淨鮮紅者未爭不及也

佳期此時交合無不成矣
海始爭一日血脈已旺精神不勝血則為女子四日
五日後長先身生謂之神又謂之精道與釋二門謂
相薄來一而三日是也
絕後必庚辛壬癸以生氣時夜半施瀉有子
皆男秋庚辛壬癸以生氣時夜半施瀉有子
過六日後勿為
施瀉可也

陰陽交合避忌 九風大兩大會當避丙丁日及望晦朔

震天百倍冥令女得病有子必癩頭
損男地晦冥令女得病有子必癩頭
光之跛盲神多病短壽不孝不仁又避日月星辰火
之傍胎中仍不可夫行調順家道則有隆若不如法則
降說胎中仍不可夫行調順家道則有隆若不如法則
薄福道惡人來託胎中令性行凶險或針
成家道惡人來託胎中令性行凶險或針

胎孕陰陽交合避忌

五月有熱者頭眩心亂嘔吐有寒者
腹滿痛小便頻數有惡露四肢疼痛寒
熱胎動不安常處腹痛頭暈欲吐耳有
所下阿膠湯主之方○阿膠四兩八兩
生薑六兩當歸芍藥日中黃芩各三兩
覆花三合吳茱萸六合麥明冬三升芍
吹咀以水九升煮藥減半內清酒三升
膠微火煎取半升分四服日三夜一先食
服便愈不差再服一丸用烏雞膏一復割取
咽內酒中以水煮雞以煎藥減半內酒升
便前取三升分四服○年中湯曾傷者
胎者當預服此方○黃芩二兩當歸川芎
乳香人參各二兩芍藥芍藥各三兩生薑
六兩麥明冬三升五味子大蘇仁各五合大棗
二十五枚右七味吹咀以水九升清酒升煮
取三升分四服日三夜一復服一劑○
准胎六月至有胎動不安寒熱往來腹內
脹滿身腫胎動不安腹脹痛如欲
產手足煩疼宜服麥明冬湯方○麥明
冬升人參日中黃芩各三兩乳香三兩阿
膠四兩生薑六兩大棗二十五枚右八味吹咀以
水九升煮減半內清酒三升并膠煎取三
升分三服中間進糜粥方用烏雞膏一
復割取以煎藥○胡湯曾傷六月胎
者當預服此方○柴胡四兩芍藥兩白
芍藥一兩甘草一兩麥明冬三兩生薑
六兩乳香五兩大棗二十五枚右十味吹咀以
水九升煮取三升分四服日三夜一中間進糜

胎動不安及惡露之類○日更服一劑○
准胎七月或發惡露胎動腹痛者○
手足厥冷脈若微寒煩熱腹滿短氣
常苦頭項及腰背強直白湯主之方○
葱白長三四寸十四莖半夏麥明冬各升
差棗花二合黃芩人參二兩半日中黃芩
黃連各三兩阿膠四兩生薑八兩右十味吹
咀以水八升煮減半內清酒三升及膠煎取
四升每服升日三夜一濕卧當汗出若汗
出者加麻黃兩煮服如前法若汗後復
強汗汗方以黃芩雞一隻割取血內
酒中煮雞取汁以煎藥○杏仁湯若曾
傷七月胎者當預服此方○杏仁廿粒各
兩紫苑兩鍾乳乳各三兩麥明冬
吳茱萸各升糲米五合五味子三合右九
味吹咀以水八升煮取三升分四服日三
夜一中間進食○日服一劑方用白雞
一復割取以煎藥○准胎八月月中風寒有
犯觸身體痛重痛乍寒乍熱動不安常苦
脈痛繞腦下寒時小便白如米汁或青
或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目眵
為藥湯主之方○芍藥四兩生薑四兩
甘小當歸日中人參各三兩雞白切升
右八味吹咀以水九升清酒四升合煮取
三升分作三升服日再夜二方用烏雞
獨煮汁以煎藥○姜子湯若曾傷八
月胎者當預服此方○姜子三升日中

七月 骨手太陰肺 已肺養胎 始受木精 以成常食 稻稷豆菽 哭洗
八月 形骸漸長 九竅皆成 胎始受土 魄能動右 手門食甘 緩帶
九月 足成皮少 陰百節畢 養胎三始 受石其精 以成皮膏 門食甘
十月 天地氣於 丹田使關 節受氣足 神皆備 待時而生 ○
惟手少陰 其有延月 而生者 富貴而 壽有月 不足者
而賤而天 必生貴子 胎
月而產必 生貴子胎
按○氣中搖 按○氣中搖 按○氣中搖 按○氣中搖 按○氣中搖
之脈不滑 疾重以手 滑者五月 胎已婦人 三部脈浮
○氣經脈不 行已經三 月者尺脈 不止者別 是胎也
○氣經脈不 行已經三 月者尺脈 不止者別 是胎也
○氣經脈不 行已經三 月者尺脈 不止者別 是胎也
○氣經脈不 行已經三 月者尺脈 不止者別 是胎也
○氣經脈不 行已經三 月者尺脈 不止者別 是胎也

沉正等按之 無絕者娠也 細○娠八 月六細
胎氣易產 大浮緩 何以知 婦人娠 脈
驗胎法 其人二三月 經不疑 胎是身 却疑血 帶心煩
神方驗胎 散用七錢 右二味 歸全用 重一兩 煎好
艾醋湯 胎中有 神效紅 花湯
辨男女法 婦人有 孕令人 摸之如 覆盆者 則男也 如
還核是男 右乳房 有核是 女也
月胎者當預服此方○姜子三升日中

辨男女法 婦人有 孕令人 摸之如 覆盆者 則男也 如
還核是男 右乳房 有核是 女也
月胎者當預服此方○姜子三升日中

得下後稍息者氣力冷熱
 增損方調定更服一劑湯
 便喜使茯苓丸令能食使
 強健也忌生冷醋滑油膩菘
 菜海藻即半夏
 茯苓圓治妊娠阻病惡心
 悶煩頭眩重憎聞飲食氣
 便嘔逆吐悶顛倒四肢垂
 弱不自勝持服之即效要
 服半夏茯苓湯兩劑後可
 服此方○茯苓人參桂枝
 乳姜半夏橘皮各二兩白
 葛根甘草枳實各二兩右
 十味為末蜜和為丸如梧子
 飲服二十丸漸加至三十丸日
 三劑後不用乳姜半夏橘
 皮白木葛根枳實五味
 ○又云妊娠
 忌桂枝熱

治妊娠惡阻嘔吐不下食
 方○青竹茹橘皮各十八
 銖茯苓生薑各一兩半夏
 三十銖石五味咀咀以水六升
 煮取三升半分三服不差類
 作
 橘皮湯治妊娠嘔吐不下
 食方○橘皮竹茹人參白
 木各十八銖生薑一兩厚朴
 十二銖石六味咀咀以水七
 升煮取三升半分三服不差
 重作

身重金...

○物妊婦惡食但必所思

二陳湯

婦人月事不行全不入食日就瘦弱全似虛

是湯有孕縮砂所謂孕婦入薑棗烏梅煎服消痰順氣自

皆用安平植○大全方論半夏動胎而不用仲景方

經製炒有故無頭是也叨胎

參橘散

治惡阻病嘔吐痰水全不入食橘皮赤茯苓

錢右剉作一錢半麥門冬白朮厚朴人參甘草各一

白朮散

治惡阻止清丁香一錢二錢五分白朮五錢

作一貼入薑五

保生湯

治俱婦人月經不行身無病似病脈滑大而六

或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻宜服

半夏茯苓湯

治惡阻食酸嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食

痰盛入參夏一錢半赤茯苓熟地黃各一錢橘皮

覆花入參夏一錢半赤茯苓熟地黃各一錢橘皮

苓連半夏湯

治惡阻病曾背滿痛黃芩一錢二分半黃連

陳皮當歸梔子枳殼香附人參蒼朮煎服砂

歸元散

治惡阻全不入食白朮當歸白芍陳皮各一錢

草各五分半夏一錢全不入食白朮當歸白芍陳皮各一錢

竹茹湯

治惡阻青竹茹麥門冬各一錢前胡二錢橘

惡阻

治妊娠下血如故名曰漏胞
胞乳便死方○生半升斤吹
咀清酒三升煮三沸絞去
滓服之至時能多服佳
姚大夫加唯鷄黃治如
食法在後取鷄黃和藥服
治妊娠下血不止名曰漏胞
聖子死方乳半搗末以
三指撮許酒服不過三服
即差
又方○生半升汁一升清酒四
合煮三四沸頓服不止頻服
又方○乳姜二兩乳苦四兩
右二味治下節酒服方寸匕
日再三服

治妊娠胎動去血腰痛
方○阿膠二兩川芎當歸青
竹茹各五兩右四味以水二
斗煮銀二斤取六升去銀
內藥煎取二升半內膠令烊
分三服不差重作方用廿
中三兩
治妊娠忽暴下血數升胎
燥不動方○榆白皮三兩當
歸生薑各二兩乳半四兩
子升煎後右五味以水五升
煮取二升半分三服不差更
作服之
蟹瓜湯治妊娠僵仆失痰
胎動搶心甚者血從口出
逆不得息或注上下血一斗
五升死胎不出虛之少氣困
頓欲死煩悶反覆方見下胎

皆宜下血而胎動宜有腹痛胎漏無腹痛者自入門下血
漏宜清熱胎動宜行氣胎動無腹痛者自入門下血
虛受胎者不實故也亦有飲酒房室而傷者由衝任經
而胎動者有喜怒而傷者其胎自安有胎不安者因母病
以母致小者常墮其胎則子宮墮出者氣陷也宜用補
中益氣湯升府為知因勞者八物湯皆令酒炒黃芪
烏君防風升府為知因勞者八物湯皆令酒炒黃芪
漏宜用枳殼湯歸寄小膠艾湯桑寄生散胎動不安宜
艾四物湯當歸寄小膠艾湯桑寄生散胎動不安宜
用杜續九當歸地黃湯安胎散安胎飲黃芪湯內
補丸獨聖散知母丸生地黃芩散安胎飲黃芪湯內
枳殼湯一錢胎漏下血白木三錢半枳殼黃芪各
小膠艾湯四錢胎動下血何膠珠二錢煎服
膠艾湯治胎漏甘草炙極妙熟地黃艾葉歸川芎阿
振千金方膠艾湯無黃芪有芍藥藥聖用乳半治胎
千金方膠艾湯無黃芪有芍藥藥聖用乳半治胎
傷損腰腹痛欲死者有所
見及胎奔上搶心短氣

服日二次白芍藥局方
無黃芪有白芍藥局方
膠艾芎歸湯治胎動下血不絕者阿膠珠艾葉歸川芎
當歸各二錢或甘草炙一錢右剉作一貼水煎服○
胎動腹痛或下黃汁如漆如豆汁者野苧根金銀
花根各五錢煎服
酒相半煎服
膠艾四物湯治胎漏腹痛熟地黃當歸川芎白芍藥
各一錢右剉作一貼水煎服
米一撮水煎空服
當歸寄生湯治胎漏下血當歸川芎白芍藥熟地黃續斷
各一錢半當歸川芎白芍藥熟地黃續斷各七分
半右剉作一貼水煎服
貼水煎服
桑寄生散治胎漏及經血妄行桑寄生續斷川芎當
歸白朮香附子阿膠珠茯神各一錢入參
甘草各五分右剉作一貼水煎服
貼入薑三片水煎服

胎漏胎動

胎漏胎動

胎漏胎動

胎漏胎動

葱白湯治妊娠胎動不安
腹痛方○葱白切一升阿膠二兩當歸續斷川芎各三兩石五味吹咀以水一斗先煮銀六兩取汁升去銀內藥煎至三升半下膠令烊分三服不差重作
治妊娠晝夜吐呼口噤唇寒及下重兩息方○艾葉吹咀以好酒五升煮取四升去滓更煎取升服口格者閉口灌之藥下即差亦治妊娠腰痛及妊娠熱病并妊娠卒下血

滋養花湯治妊娠六月胎不安常服之○滋養花一兩半夏芍藥生薑各三兩枳實厚朴白木黃芩茯苓各三兩石九味吹咀以水斗煮取二升半分五服日三夜三先食服入兩和藥用枳殼亦治惡阻嘔逆
馬通湯治妊娠產後奔走或登高墮下鼻出惡血多○馬通汁升乳羊阿膠各四兩當歸艾葉各三兩石五味吹咀以水五升煮取二升半去滓內馬通汁及膠令烊分三服不差重作
治妊娠卒下血方○葵子一升以水五升煮取二升分三服差止又方葵根莖燒灰酒服方寸七日三

杜續丸治胎動不安腰痛以此防其墮杜仲炒續斷各二兩右為末棗肉和丸梧子大末飲下

當歸地黃湯治胎痛熟地黃四錢當歸二錢右對作一貼水煎空頓服二錢

安胎散治因驚胎動腹痛米一合右對作一貼薑三棗

安胎飲治胎動不安五錢當歸白芍藥熟地黃縮砂

黃芩湯治胎動不安黃芩白朮縮砂當歸

保胎飲當歸川芎芍藥熟地半夏茯苓甘草白木黃芩阿膠艾葉地榆各七分姜煎服治胎動不安

腹腸疼痛或時下血及惡阻一切等證并治此同切方現入附

內補丸治衝任脈虛補血安胎熟地黃二兩當歸一兩七粒

獨聖散治因墮落傷損致胎動不安腹痛不可忍縮

知母丸治胎氣不安

生地黃粥治胎漏糯米二合煮粥臨熟入酒煮服

葱粥治胎動不安腰腹痛心或下血葱白

葱白湯治胎動不安腰腹痛心或下血葱白

胎漏胎動

又無胎毒蓋孕三運化通帶則生濕濕安胎
熱故以黃芩清熱以養血白朮健脾胃以燥濕安胎
此方全而推之也散皆

安胎丸 治同上即木湯下五七丸末粥丸

金匱當歸散 服孕婦宜清其源而無後患也黃芩白朮當
歸川芎白芍藥各一兩五錢七分末每三錢溫酒調下
或酒糊和丸未飲下五七丸

為安胎之聖藥蓋白朮補脾燥濕黃芩清熱故也
况為備也服此藥則易產所生男女無胎毒則
尤為備也服此藥則易產所生男女無胎毒則
痘疹亦稀無病易育而聰明
智慧不假言矣累試驗明

五味安胎丸 芎藭條芩白芍藥各一兩五錢石為
末酒糊和丸五七丸

湯任下五七丸

芎歸補中湯 治懷孕氣血虛弱不能榮養以致胎漏
藥各一錢乾薑阿膠珠川芎五錢門子木香人參甘
草各五分右剉作一貼水煎服門子一方無木香

安榮湯 治胎氣不固時常小產宜以此預防子固胎熟
主白朮黃芩芍藥川芎當歸阿膠珠香附子桑寄生
百粒右剉作一貼水煎服

千金保胎丸 足乃婦人受胎經三月而墮者雖氣血不
養胎孕至此時必須謹節飲食絕色慾戒惱怒服
此藥庶免半產之患矣杜仲薑汁炒白朮炒各
二兩當歸酒洗熟地黃薑汁炒附米以酒醋炒成珠
條芩炒益母草續斷酒洗香附米以酒醋炒成珠
便各浸一錢縮砂二錢半右為末以棗肉和丸煮
陳皮各五錢縮砂二錢半右為末以棗肉和丸煮
子大每百丸空

心未飲吞下

長胎白朮散 白朮川芎阿膠
生地各六分當歸兩杜鵑二分
川椒三分端末蜜丸梧子大每
卅丸米飲下治孕婦宿有風痰
胎毒不長或將理失宜傷動
胎氣多致損胎常服益血
補胎調保衛任

半產

一六

和痛湯 治小產心腹疼痛 當歸川芎芍藥酒炒熟地 黃各一分 桃仁紅花各五分 右到作一 貼皮各八分 鍾童便清酒各半 鍾煎服 醫

一方 婦人每懷孕至三箇月必墮 不肯服藥子以 貼以水一分 鍾童便清酒各半 鍾煎服 醫

又方 婦人每懷孕至三箇月必墮 不肯服藥子以 貼以水一分 鍾童便清酒各半 鍾煎服 醫

脉法 少陰脉浮而下 革脈主之 弱則血耗立見 傾危 傷

卒墮胎 此孕非時 六月七月 暴下斗餘 水其胎必徐徐而下 墮

今暴下而移 故知墮胎也 細移

察色驗胎生死 胎動不安 其者當以 面青舌赤 口沫

何面冷者 為死胎 何面青者 為生胎 何面紅者 為產後

欲產候 此是產也 婦人每懷孕至三箇月必墮 不肯服藥子以

雖痛而腰不痛 或甚痛 或腰痛 或腹痛 或腰痛 或腹痛

血未出者 候非道 未產候 候非道 未產候 候非道

脉法 覺歌曰 應欲分誕 來日午後 定知生而 難經云 一

察色驗胎生死 覺歌曰 應欲分誕 來日午後 定知生而 難經云 一

蒸大黃圓治妊娠養胎
今易產方見難產

母名縮胎飲

瘦胎枳甘散 胎孕婦八九月內胎氣壅滿宜常服之滑

救生散 孕婦八九月內胎氣壅滿宜常服之滑

佛手散 孕婦臨月服之則縮胎易產自無難產之患

益母丸 催生神效益母草於五月五日為末蜜丸彈

子大溫酒或白湯下 化下或丸返現丹催生易產又

治百病逆產 後百病逆產

無憂散 當歸川芎白芍各一錢枳殼五分乳香髮

送故人瘦血少胎 弱胎產難生

送故人瘦血少胎 弱胎產難生

縮胎丸 孕婦七八九月用之 縮胎易產黃芩夏一兩

東胎丸 浸燒餅和丸 梧子大枳殼各等分右為末以水

神寢元 煉蜜丸 梧子大枳殼下二兩乳香一兩右為末以

十產候 橫產五日逆產六日偏產七日礙產八日盤腸

正產 謂臨產高處懸吊手中令產婦攀引 輕屈足

坐產 謂臨產高處懸吊手中令產婦攀引 輕屈足

胎即順 胎即順

治逆生及橫生不出手足先 見者方燒蛇蛻皮為末

服一升圭 面向東酒 服即順

胎即順 胎即順

胎即順 胎即順

胎即順 胎即順

又方○蟬殼枚治湯末
 三指撮許溫酒服之
 又方○取夫陰毛三七莖燒以
 猪膏和丸如大豆吞之兒手
 即持丸出神驗
 又方○以手中指取釜底墨交
 畫見足下即便順生
 又方○取父名書兒足下即
 順生
 治縱橫生不可出者方○見
 絲子末酒若米汁服方寸
 匕即車前子亦好服聖
 法

兒即順
 生娘順

臥產

謂產則兒不其背平着席體不僵
 曲則兒不其背平着席體不僵

橫產

謂生之入徐徐先推兒下截令直上
 收生之入徐徐先推兒下截令直上

中候

指摩其肩推上而正之漸引手攀其上
 兒身正門路順却服催生藥安詳上草自
 正

逆產

皆用力太早之過也若手足先露者
 逆產者先露手足先露者用細鍼刺
 皆用力太早之過也若手足先露者

輕兒

送足入兒得痛驚轉一縮即順生下
 送足入兒得痛驚轉一縮即順生下

者

謂之併以益蓮花生急以益塗兒脚心
 謂之併以益蓮花生急以益塗兒脚心

偏產

謂兒額角者治法令產母仰頭收生
 謂兒額角者治法令產母仰頭收生

兒

近上下又有兒頭後骨偏在難道者當
 近上下又有兒頭後骨偏在難道者當

礙產

謂因兒轉之時胸帶擊掛兒有致不能
 謂因兒轉之時胸帶擊掛兒有致不能

中產

指按兒兩肩理脫臍帶候兒身正順用
 指按兒兩肩理脫臍帶候兒身正順用

傳印

產

盤腸產

謂上貼如聖膏時見自然出兒即隨
 謂上貼如聖膏時見自然出兒即隨

好腸

頭石湯一吹乾不能飲之則其腸自收
 頭石湯一吹乾不能飲之則其腸自收

溫湯

潤其腸分調和忽嘔以安慰或用好醋
 潤其腸分調和忽嘔以安慰或用好醋

蓋新

沒水七分調和忽嘔以安慰或用好醋
 沒水七分調和忽嘔以安慰或用好醋

熱產

謂產時當暑宜居深幽靜室
 謂產時當暑宜居深幽靜室

凍產

謂如嚴冬仍厚覆下體常使溫和免
 謂如嚴冬仍厚覆下體常使溫和免

十產候

十產候

二

二

兒趨報道者方○
 熬鹽府之自止

甘草散令易生母每疾病
未生一月日預服過三十日
行步動作如故兒生墮
地皆不自覺方○甘草
一兩黃芩一兩乾薑吳
茱萸大豆黃卷麻子仁
桂心大麥蘗各三兩右
八味治下篩酒服方寸匕
日三暖水服亦可一方在
米有梗

千金圓主養胎治產難顛倒
胞不出服一丸傷錢不下產餘
汗不出煩瀉不止氣逆滿以
酒服一丸一名保○甘中貝
母秦椒大豆黃卷乳姜桂
心黃芩粳米一作石斛石
膏各六銖當歸十二銖麻
子三合石三味湯末蜜和
丸如彈子大每服一丸日三
兩用棗湯下方用蒲黃一

傷產傷者過月而產有經一二年至三四五年而
用勝金散或蒼皇用力太早漿水先下敗血裹住宜
墨服之墨最兒即出水磨京

催產臨產以助血氣令兒速生
交骨不開難產龜殼散垂死及矮石女散子交骨不開者用
湯○凡產時交骨不開者陰氣虛也亦用加味芎歸
服便令胯骨軟方烏梅生薑甘草等分煎

催生如聖散研治難產及漏血胎乾者立效黃蜀葵子
○歌曰一方用蜀葵子炒百餘粒末熟酒調下濟窘急若患
臨○歌曰一方用蜀葵子炒百餘粒末熟酒調下濟窘急若患
全家俱難尖注耗得

催生丹皮治膜產難及橫產逆產臘月兔腦一箇取髓去
○歌曰一方用蜀葵子炒百餘粒末熟酒調下濟窘急若患
全家俱難尖注耗得

錢麝香二分半右拌勻和丸雜頭實大即艾陰乾
油紙裹每取一九溫水磨化服即產隨男左女右
須臾藥出是驗

凡產損食氣熱難食常謂此飲食當加人脚濕也
凡欲臨產時必先脫尋常所着衣以龍龜頭及龜口令至密即易產也此三条在
在保產系

神效乳珠丹研細取神效又治血和丸死腹實大末下明乳香
○乾每或九除夜合未下再服
神效乳珠丹研細取神效又治血和丸死腹實大末下明乳香

如神散鼻絡小耳臨產時令人取路傍草鞋一隻取
生男右足者生女覆者兒溫酒調服即產得左足者
有驚自然理也○女覆者兒溫酒調服即產得左足者

二退散一治難產及橫逆者或子死腹中蛇退全者一
尺產難存性為末溫酒調下○髮難子大右俱

三退散條治難產及橫逆者或子死腹中蛇退全者一
尺產難存性為末溫酒調下○髮難子大右俱

三退六一散大催生神效益元散一兩男子頭髮難子
名存性為末溫酒調下○髮難子大右俱

交骨不開難產

交骨不開難產

交骨不開難產

交骨不開難產

治產難或半生或胎不下
子死腹中或着脊及墜中
數日不產血氣上搶心母
面無顏色氣欲絕者方
○醇酒二升白蜜升成煎
猪膏一升右三味煎取汁
分并服不能再服可隨所
能服之治產後惡血不除
上搶心痛煩急者以地黃
汁代醇酒

治難產方○槐枝切二升
榆皮切大麻仁各升鹽
麥通草各二兩牛膝五兩
右六味吹咀以水升升分
煮取三升半分五服

蒸大黃圓治妊娠養胎令
易產方○大黃二銖蒸枳
實川芎白朮杏仁各十八銖
芍藥乾姜厚朴各十二銖
吳茱萸二兩右九味湯末蜜
丸如梧桐子大空腹酒下丸
日三不知稍加之

治產難方○吞兒莢子二枚
又方○取廁前已用草三七枚燒
作屑水調而服之○又方○令夫
睡頓口中七遍過立出○又方
○鐵兩斤入廿個之須臾即
分免○治產難三日不出方○
取鼠頭燒作屑并花水服方
寸七日○治產難累日不
氣力乏盡不得生以是宿有

五枚穿山甲一各燒存性為末用薑水煎
二沸入髮灰調服立下○一名滑胎散
兔腦丸 治產難日久血乾宜用此滑之
朱砂二錢為衣油紙裹陰乾每丸未兔腦
香油二錢分半為末香益母草各一錢
朱砂二錢為衣油紙裹陰乾每丸未兔腦
香油二錢分半為末香益母草各一錢
朱砂二錢為衣油紙裹陰乾每丸未兔腦
香油二錢分半為末香益母草各一錢

龍蛻散 治產後惡血不除
龍蛻散 治產後惡血不除
龍蛻散 治產後惡血不除
龍蛻散 治產後惡血不除
龍蛻散 治產後惡血不除

黑神散 治產後惡血不除
黑神散 治產後惡血不除
黑神散 治產後惡血不除
黑神散 治產後惡血不除
黑神散 治產後惡血不除

黑龍丹 治產後惡血不除
黑龍丹 治產後惡血不除
黑龍丹 治產後惡血不除
黑龍丹 治產後惡血不除
黑龍丹 治產後惡血不除

催生散 治產後惡血不除
催生散 治產後惡血不除
催生散 治產後惡血不除
催生散 治產後惡血不除
催生散 治產後惡血不除

勝金散 治產後惡血不除
勝金散 治產後惡血不除
勝金散 治產後惡血不除
勝金散 治產後惡血不除
勝金散 治產後惡血不除

震震丹 治產後惡血不除
震震丹 治產後惡血不除
震震丹 治產後惡血不除
震震丹 治產後惡血不除
震震丹 治產後惡血不除

病者方○阿膠二兩赤小豆二升石三味以水九升煮豆令熟去滓內膠令烊每服五合更服不過三服即出○又方○槐子十四枚蒲黃二合石二味合酒中濕服更不生并服之水服亦得
治產難及日月未足欲產者方○知母兩為末蜜丸如兔屎大每服死痛不止更丸

滑胎令易產方○阿膠八兩滑石三兩車前子二升石三味治下節飲服方寸七日再至生月乃服藥利丸數不可先服

救之蛇退一條退紙燒存性各一錢乳香五分
髮燒灰路上一條退紙燒存性各一錢乳香五分
黑鈔子研細水為末以積猪心血和丸
結砂子研細水為末以積猪心血和丸
下化為衣取二三丸倒流水送下如不
龜殼散治產難一箇主男婦及矮人頭髮一子握燒存性川
芎當歸各一兩右為末每三錢
水煎服良久生胎死胎俱下
來麩散治臨產久不生胎死胎俱下
加味芎歸湯治臨產久不生胎死胎俱下
催生宜用滑利藥凡生多難產者宜用滑利藥
水血多下子道乾澀者宜用滑利藥
尿葵子牛乳滑石榆白皮之類是也○若風冷或

入氣血凝滯者牛膝葱白
香觸犯惡氣心煩躁悶而難產者宜薑之類是也○
乾兒不攪得下香油清各一椀火上微沸調滑石
末一兩攪服之外以難產和蓋母膏尤妙○
油蜜童尿和服最治難產和蓋母膏尤妙○
皮滑亦
可
榆白皮湯治產難乾麻仁去殼各一錢半木通一錢
石煎服一貼
襪法口則產易勿令產婦知常所穿衣以龍竈頭及竈
令產母生其上則催生易○臨產取赤馬皮鋪之
即把一驗林
外貼法全之難產宜催如神丹如聖膏立聖丹遇仙丹
催生宜用滑利藥

真珠湯治胎死腹中
 熟真珠一兩榆白皮切升
 石味以苦酒三升煮取一
 升頓服之胎立出
 治子死腹中不出方○以
 牛屎塗母腹上立出
 又方○取鹿下黃三指
 撮以酒服之立出上當着兒
 頭上亦治橫產不出手足先
 見者
 又方○服水銀三兩立出
 又方○取天尿二升煮令沸
 飲之
 又方○三家鷄卵各一枚三
 家鹽各撮三家水各升合
 合煮令產頓東向飲之
 又方○瞿麥一斤以水八升

如神丹

捏作巴三餅子貼臍中分產即去殼入麝香少許

如聖膏

搗如泥攤去殼麻子去皮一貼臍上九時產下即洗去母

立聖丹

膏塗頂上繞產速洗去亦名如聖膏此

遇仙丹

子以大臘紙覆上以椒湯淋潔臍下安藥一丸於臍

下死胎

須外證指甲青黑心腹脹治之○胎死則母舌必

佛手散

治胎傷心腹俱安若胎死則立便逐下胎不損

香桂散

末作死胎一貼溫酒調下須臾即下

桂香丸

末飯丸菜豆大白湯下十五丸

下死胎

下死胎

二日

治胎死腹中若母
 病欲下之方○牛
 膠子升右二
 味以水升煮取三
 升分三服
 又方○澤蘭葉三
 兩滑石五合生麻
 油二合石味以水
 一升半煮澤蘭取
 之合去滓內滑石麻
 油頓服之

煮取三升一服一升不出再服
治胎死腹中乾燥者背
方○葵子二升阿膠五兩右
二味以水五升煮取三升頓服
之不出再煮服
治胎死未足月而胎卒死不
出其母欲死方○以苦酒濃
煮大豆每腹服一升死胎立
出不能頓服分再服
治胎死腹中乾燥者背
衣不出腹中引腰背痛方○
甘草一斤筒桂四寸糖子三枚蒲
黃二合香豉三升右五味以水
六升煮取四升服升頓服之胎
胞極惡盡去大良

治產難胞衣不出橫倒
者及兒死腹中氣欲
絕者方○半夏二兩白飲
二兩右二味治下篩服方寸
匕產難一服橫生二服兒
死四服亦可加代赭膠膠麥
各二兩為佳
治胞衣不出方○取小麥合
小豆煮令濃飲其汁立出
亦治橫逆生者
又方○取心瓣三枚服之立
出良
又方○取水煮弓弩弦飲
五合即出亦可燒灰酒和服
又方○取宅中所埋柱掘出
取坎底當柱下夫如鷄

奪命丸

治胎死腹中乾燥者背
服之可下或胎腐爛者立
赤茯苓可下或胎腐爛者立
空服三九或九如彈子大
胎及三月而漏血不止胎
胎九胎動多在當臍今動
下其胎宜用桂枝交
苓九丹宜亦稱妙
烏金散治難產胎乾則進
此藥後更進香桂散即下
也

烏金散

治難產胎乾則進
此藥後更進香桂散即下
也

一方

死胎不下取烏雞二隻去尾
細判水三升煮取
如牛糞熱塗母右腹上即下
胎不下血所脹上衝心胃喘急
疼痛必致危篤宜急

奪命丹

治產後血暈入錢壯丹
未以醋一升入大酒下
膏和丸梧子大酒下
花藥石散胎衣不下
水而取下胎血如猪肝或
牛膝湯治產後胎衣不下
胎衣不下

花藥石散

胎衣不下

牛膝湯

胎衣不下

胎衣不下

治子死腹中若衣
不出欲上搶心方
○急取蟻蛭三
升熬令熱囊盛
熨下胎不得上
搶心良
又方○取天內衣蓋
井上立出
又方○取炊草當
石煎燒服之

子酒和服之良

又方○取墨三寸為末酒

服

又方○取蒲黃如粟許以

井花水服

又方○生男吞小豆七枚生女

者十四枚即出

又方○竈上墨以酒煮一兩

沸取汁服亦治逆生

又方○井底土如鷄子中黃

以井花水和服立出

餘方畧見下死胎

冬葵子二錢右剉

三退飲方治胎衣不下神效蛇退一條全者吞退紙水

一字神散治胎衣不下鬼白黃色者研如粉不用煎

一方化溫分二服便下極驗一云但多服猪脂亦佳

三難姓家蓋各取一撮相和頓服仍探口令嘔而下一匙

服○又方童尿一升生薑蔥白各三錢右煎麥沸熱

襪法立脫下靴○又取法取初洗兒湯一盞服之勿令產

下母要知立

有妊娠心腹痛證治法見下單方

產前諸證有感寒孕婦不語兒在腹中哭孕婦腹中鍾子懸

子癇迷時作時止或發搐直筋脈急口禁語澀痰盛昏

羚羊角湯分防風獨活酸棗仁五加皮各一錢二

子煩相火用事煩躁或值天令君火大行暑熱之時俱發

竹葉湯白茯苓二錢麥門冬黃芩各一錢半防風一

竹瀝湯赤茯苓一兩剉右以水一升煎至半去滓

襪法產前諸證

子癇子煩

子癇子煩

子癇子煩

子癇子煩

子癇子煩

子癇子煩

子癇子煩

子癇子煩

治妊娠腫有水氣心腹急滿湯
方○茯苓白朮各四兩黃芩杏仁
各三兩後復乾一兩右五味咀咀以水六
升煮取三升半分作三服

鯉魚湯治妊娠腹大胎間有水氣方
○鯉魚二頭一斤白朮生薑各五兩芍
藥當歸各三兩茯苓四兩右六味咀
咀以水六升先煮魚熟澄清取八
升內藥煎取三升分五服

治妊娠毒腫方○蒼黃淨洗去
搗碎和如薄泥勿令有汁極火煮
三四沸適性薄腫以帛裹之百再
易寒時溫覆非根腫用子若腫在
喉中取汁含咽之

治妊娠手脚皆腫方○赤
小豆五升商陸根一斤切右二味以水
三斗煮取一斗稍飲之盡更作方
加澤漆斤

治妊娠小便不利方○葵
子一升榆白皮一把切右二
味以水五升煮五沸每
服一升日三○又治子淋方
葵子一升以水三升煮取
二升分再服○又方葵根
水煮服
治妊娠小便不通方○蕪
菁子七合為末水和服方
寸七日

子腫

孕婦因胎中有水多於五六箇月以致遍身浮腫
腹脹常急或腹大異常高過心胃氣逆不安若不
治必損其胎宜用鯉魚湯因常食鯉魚逆不安若不
湯防已湯已損其胎宜用鯉魚湯因常食鯉魚逆不安若不

鯉魚湯

治子腫白朮赤茯苓各二錢白芍藥當歸各
一錢修事如食法水者取清汁一盞半入藥及薑
七片煎事如一盞空心溫服以水盞腫消為度

茯苓湯

治子腫當歸芍藥子炒麥門冬厚朴甘草各七
分右剉作一貼薑

防已湯

治一錢半桑白皮五分右剉作一貼入薑五片水

煎服

天仙藤散天仙藤香薷也木香附烏藥陳皮甘中各
六分薑煎入紫蘇木瓜各三片同煎日三服腫消

止藥治孕損向足漸腫以致喘悶飲食不
美甚則脚指間有黃水出名曰子氣

全生白朮散

治同上白朮一兩生薑皮大腹皮陳皮
茯苓皮桑白皮各五錢右為末每二錢

一方

治子腫山施子仁炒為末每三錢合水煎服治
子氣

子淋

子淋婦熱積之膀胱或胎宜澤瀉湯安榮散地膚子湯
子淋婦熱積之膀胱或胎宜澤瀉湯安榮散地膚子湯

澤瀉湯

治子淋澤瀉桑白皮一貼入薑五片煎服

子腫

子腫子淋

子腫子淋

治妊娠尿血方。黍穰燒灰酒服方寸匕。日三。

治婦人五故尿血方。龍骨五兩。治下節酒服方寸匕。空腹服。日三。久者二十服愈。

又方。瓜甲亂髮。右味并燒末。等分酒服。方寸匕。日三。飲服亦可。

又方。桂心鹿角屑大豆黃卷各一兩。右三味。治下節酒服。方寸匕。日三。

又方。取夫瓜甲燒灰酒服。又方。取故船上竹茹。曝乳酒服。方寸匕。日三。亦主遺尿。

治婦人遺尿不知時方。白薇芍藥各一兩。右二味。酒服。方寸匕。日三。又方。胡燕窩中。

草燒末酒服。方寸匕。亦治之。又方。燒遺尿薦草。灰服之。差。又方。灸橫骨。當陰門七壯。

傷

安榮散

治同上。入參川芎麥門冬木通滑石當歸燈心甘草各一錢。右剉作一貼。水煎。空心服。燈

地膚子湯

治同上。地膚子車前子各一錢。升麻通草甘草各七分。右剉。水煎。服。

葵子茯苓散

治孕婦小便不利。冬葵子赤茯苓各一錢。米飲調下。詳。

忘憂散

治子淋。琥珀為末。每半錢。取。

參朮飲

治人參白朮半斤。夏陳皮各一錢。門見材各一分。錢加。

一方

治轉胞。熱尿閉。葱白通神效。吐。

一法

治轉胞。尿閉。急令產。婆香油塗手。自產門入。

子嗽。紫苑湯。紫苑外感風寒。久嗽不止。謂之子嗽。宜。

紫苑湯。一貼。入蜜。竹茹雞子杏仁桑白皮甘草各一錢。右剉。作。

百合散。治子嗽。各一錢。甘草五分。右剉。作。

馬兜鈴散。治子嗽。蘇葉各一錢。陳皮大腹皮桑白皮紫。

天門冬飲。治子嗽。天門冬紫苑各一錢。右剉。作。

子嗽。煎服。

子嗽。煎服。

子嗽。煎服。

子嗽。煎服。

子嗽。煎服。

子嗽。煎服。

子嗽。煎服。

子嗽。煎服。

治狂娠下痢方○白楊皮一斤
吹咀以水大升煮取二升
分二服○又方○燒中衣帶
三寸為末服之○又方○羊脂
如菓子六十枚温酒升提
中頓服之

治狂娠惡脹無赤帶魚
腦白帶臍腹絞痛不可忍
者方○雞白切升酸石榴
皮黃蘗產寶作各三兩
黃連黃連

阿膠二兩地榆四兩若去味
吹咀以水七升煮取二升半分
三服不差更作
治狂娠注下不止方○阿膠
艾葉酸石榴皮各二兩若
味以水七升煮取二升去滓
內膠令烱分三服

治狂娠及產已寒熱下痢方○
黃連一升黃柏一斤梔子三十枚
右三味吹咀以水五升漬一宿煮
三沸服升一日夜令盡嘔者加橘
皮二兩至三兩亦治天常痢
治狂人欲癩輒先心痛腹脹滿日
夜五下行方○石櫛皮雞骨八兩
黃柏一作烏梅黃連各二兩防
巴二兩阿膠乳香各三兩附子高
吉味魚鱗蜜和如梧子大飲
服于九日三漸加至三十四丸

治狂娠患瘧湯方○伯山
二兩甘少一兩黃芩三兩烏
梅十四枚石膏八兩若去味
咀以酒水各半升合漬藥
一宿煮三四沸去滓初服
六合次服四合後服三合凡
三服○又方○伯山竹葉各
三兩石膏八兩棗子伯粒一
兩糯米一石四味吹咀以水六升
煮取二升半去滓分三服第
服取未發前食頃服之

子痢子瘧

一方治子嗽貝母去心炒黃
為末以砂糖
子痢當歸芍藥湯赤白腹中
痛裏急後重名曰子痢宜
散大寧詞木

當歸芍藥湯治子痢白芍藥
各一錢木香一錢當歸黃芩
甘草各七分去右連加乾薑
煎服

白木湯治三錢右對作一貼
水煎服

雞黃散治子痢烏雞卵一箇
厚紙糊口鹽泥固濟火煨
研為末是男每取二錢是女
調下一

鴨子煎取自然汁鴨子一箇
打破入薑汁內攪勻右
煎五至八分入溫服立效

訶朮散治各一錢半陳皮良薑
木香白芍藥酒炒
肉豆蔻煨甘草炙各一錢右
剉作一貼薑五水煎服

大寧散治三錢五粒下痢赤白
或泄瀉腹痛研死者黑豆
半生半炒右為散末都作一
貼

子瘧 驅邪湯 治白感發瘧良薑
白朮草果橘紅藿香
八薑五片棗二
枝水煎服

濟生石膏湯治一錢半黃芩麥
門冬人參知母乾葛

第一服取臨欲發服之餘
一服用以塗頭額及留前心
蘇淨置頭邊當易近水邊
飲食過發後乃進糜粥

治孕婦傷寒頭痛壯熱
脈節煩疼方石膏八
兩大青以鹽黃芩
各三兩葱白切二分前胡
知母梔子仁各四兩右
十味以水七升煮取
二升半去滓分五服相
去如行八里久再服

治妊娠中風寒熱腹中絞
痛不可緩方○鯽魚一
頭燒作灰搗末酒服方寸
匕取汗
治妊娠遭時疾令子不落
方○取竈中黄土水和塗
臍乳復塗之方酒和塗方
五寸又酒清和塗之并佳
又方○大尿泥塗腹勿令乾
又方○車轄脂酒大良
又方○并底泥心下二寸立愈
又方○水服伏龍肝一雞大
又方○燒大棗一枚為末酒和服
又方○槐實燒灰取方寸匕酒和服
餘方悉見寒明孕婦傷寒

各一錢甘草五分右判作一
貼烏梅一箇同煎服
子懸謂之婦胎氣不和逆上心胃脹滿疼痛
紫蘇飲治子懸宜用紫蘇飲葱白湯
各一錢甘草五分右判作一貼
葱白湯治子懸宜用紫蘇飲葱白湯
於銀子懸器內煮至半取汁頓服食葱盡即愈

感寒孕婦傷寒產前安胎產後補血為主治法無犯胃
氣及上二焦為三禁謂不可汗不可下不可利小
便也但當和解小柴胡湯主之
命○也但當和解小柴胡湯主之
保○安胎白朮散散熱白湯○孕婦熱病發黑癩用梔子
大青湯○熱病護胎方取浮萍朴硝大黃蛤粉藍
上等分極妙
根安胎極妙
上安胎極妙

治大熱煩悶者方○葛根汁二
升分三服如人行五里久進服

芎蘇散川芎蘇蘇紫白芍藥白朮麥門冬陳皮乾葛
各一錢甘草五分右對作一貼入薑葱白

黃龍湯治孕婦感寒熱如瘧柴胡四錢黃芩人
參甘草各一錢右對作一貼水煎服

保安白朮散治孕婦傷寒安胎白朮黃芩各等分
煎服亦可最妙

葱白湯治子懸宜用紫蘇飲葱白湯
煎服亦可最妙

施子大青湯治子懸宜用紫蘇飲葱白湯
煎服亦可最妙

孕婦不語內經曰人有重身九月而瘖此為何病岐伯
脈貫腎繫舌本故不能言也胎終者繫於腎少陰之
分繞則自能言勿藥可也○孕婦瘖不能言曰

子懸感寒
孕婦不語

又葱白把以水三升
煮令藥服之取汗
食葱令盡

四順理中圓已產訖可服此方
○甘中人參白朮乾姜各二兩石
四味為末蜜和丸如梧子服十
丸稍增至二十丸新生臟虛
此所以養臟氣也

物湯
沈冷時
時加
大黃
芒硝
各一錢
水煎
去滓
入蜜
少許
許
沈
冷
時
時
加
大
黃
芒
硝
各
一
錢
水
煎
去
滓
入
蜜
少
許

兒在腹中哭

兒在腹中哭者因母登高取物脫出兒口以中
聲也令母向地拾物使兒復得令母服亦
則其聲即止○向地拾物使兒復得令母服亦
止○向地拾物使兒復得令母服亦

孕婦腹中鍾鳴

孕婦腹中鍾鳴者或因胎前失血或因胎前
中土氣虛弱或因胎前失血或因胎前
止○向地拾物使兒復得令母服亦

產後諸證

產後諸證不語兒枕腹痛見鬼譫妄產後
下乳心腹腰脇痛產後嘔逆產後淋瀝產後
產後諸證不語兒枕腹痛見鬼譫妄產後
下乳心腹腰脇痛產後嘔逆產後淋瀝產後

兒枕痛

兒枕痛者胎前血氣不和或因胎前失血
胎前血氣不和或因胎前失血
胎前血氣不和或因胎前失血

夫笑散紫金丸三聖散黑龍丹上方見花藥石散
胡
索
壯
丹
皮
桃
仁
紅
○
芎
歸
湯
加
三
稜
蓬
朮
玄
胡

失笑散

失笑散治產後血暈心腹疼痛欲死百藥不效
入水煎服一盞煎至七分
分入水煎服一盞煎至七分

紫金丸

紫金丸治產後血暈心腹疼痛欲死百藥不效
桃大每二九以失笑散不和醋熬膏丸如櫻
桃大每二九以失笑散不和醋熬膏丸如櫻

三聖散

三聖散治產後血暈心腹疼痛欲死百藥不效
胡索散一名玄
胡索散一名玄

起枕散

起枕散治兒枕痛極苦當歸白芍藥各二錢川芎一
錢煎服
錢煎服

立效散

立效散治兒枕痛極苦當歸白芍藥各二錢川芎一
錢煎服
錢煎服

兒在腹中哭

孕婦腹中鍾鳴

產後諸證兒枕痛

當與醫胃參看
 一方治血暈以韭菜細切納於
 有甯瓶中以紙醋沃之急封
 其口以甯塞產婦鼻中可愈
 眩冒

一方治兒枕痛百藥不效螞蟥一箇燒存性研為末
 用空酒一盞調服立止生男用酒服之
 蒲黃二錢白湯調下又火芥燒赤投酒中溫服
 產後血暈者閉絕口禁神昏氣冷宜用清魂散
 前生花甚者閉絕口禁神昏氣冷宜用清魂散
 而己當補血宜用芎歸湯
 乃惡露上行宜奪命散
 當破血宜用四味湯
 後血暈宜用四味湯
 荆芥散醋墨法端

血暈
 產後血暈者閉絕口禁神昏氣冷宜用清魂散
 前生花甚者閉絕口禁神昏氣冷宜用清魂散

清魂散
 治產後血暈
 澤蘭葉各一錢
 荆芥穗五錢
 川芎二錢
 半人參
 溫酒熱湯各半盞調二

奪命散
 治血暈
 以童便好酒各半盞煎數沸調服神效
 竭一名血

四味湯
 治產後血暈
 胡索血竭各一錢
 或細末每二錢童便

荆芥散
 治血暈
 四味湯
 醋墨法
 一方醋破其面暈取美清醋熟煎之
 其氣非菜細切又乾漆或舊漆燒之
 又非菜細切又乾漆或舊漆燒之
 醋墨法
 一方醋破其面暈取美清醋熟煎之

又方
 治產後血暈
 服五合日三五次即醒
 夏末或皂角末吹鼻中令甯
 服五合日三五次即醒

血崩
 產後血崩不止是謂重傷宜大劑
 藥煎服救之若小腹痛滿是肝藏
 乙寒為難治

血暈
 血崩
 產後血崩不止是謂重傷宜大劑
 藥煎服救之若小腹痛滿是肝藏
 乙寒為難治

婦科金匱要略卷之九

○產後血崩不止四物湯
○產後血崩不止四物湯
○產後血崩不止四物湯

濟危上丹

治產時下血崩宜五○煎服
○產後血崩不止四物湯

此乳香硫磺五靈脂太陰玄精石陳皮桑寄生阿膠卷相各等分右將前四石藥研微火炒再研細

補氣養血湯

治小產後下血不止人參黃芪當歸白芍藥酒炒艾葉阿膠川芎青皮香

一方

治產後血崩取木一錢煨積殼末二錢右和勻每

錢附子炒縮砂研甘草煎服各一

血血

不產後治急用荆芥散及鼻衄者名曰胃絕肺敗此證

散亂入胃絕肺敗宜用犀角地黃湯救之防見血

襍法條急取絛線一條并產母頂心髮兩

喘嗽因產後極危多死也難治宜大劑芎歸湯中故令

蘇飲此名孤陽後絕陰急難治宜大劑芎歸湯中故令

用童便好酒各半盞調和服惡血即下喘自定或

二母散治產後惡露流八肺二杏仁各二錢右到作一

小參蘇飲治產後敗血入肺至一梳調入參細末二

服貼水煎

錢服

旋覆花湯

治產後感冒風寒咳嗽喘痰盛旋覆花赤芍

咳逆

煎後咳逆不止欲死肉桂五錢對薑汁三合右同

產後不語

散由敗血干心見氣閉塞故舌不語者宜孤鳳

七珍散

治產後心湯防風人砂各一錢石菖蒲川芎各二

孤鳳散

治產後一錢熱水調下不以時

甘中湯治產後腹中傷絕
寒熱恍惚狂言見鬼此病
中風內絕氣虛河海旁
○甘中湯藥各五兩羊角三
斤通草三兩當歸石四味
以酒升升煮肉取一
斗若肉內藥煮取三升去滓
分五服

產後見鬼謔妄

蘇合香元一錢童便調此由敗血干心也

散亦佳防見加龍腦少許服之加琥珀心言

遠志朱砂金銀煎服所感地黃煎元亦妙神無所

後昏冒不省目無所知蓋因血暴亡心神無所

交感地黃煎元

治產後風角反張或下血狂如見鬼狀或

腹疔痛結為癥瘕生布裂汁留以生薑汁妙地

黃煎以兩當歸酒玄胡索琥珀各一兩右為末蜜丸

寧神膏

治產後亡血心神昏悶言語失常不得睡卧

咳逆 產後不語

以遠志為君加芍藥名遠志
湯在產後忽若心中衝悸正
志意不安言語錯謬惚惚
懶懶情不自覺

竹根湯治產後虛煩方○甘竹
根切切五升以水三斗煮取
六升去滓內小麥三升大棗三十
枚復煮麥熟三四內內甘草
一兩麥門冬升湯成去滓服
五合不差更服取差短氣亦服
之
甘竹茹湯治產後虛內煩
熱短氣方○甘竹茹一升人參
一兩茯苓甘草各二兩黃芩三兩
右五味咀咀以水六升煮取三升去

薄分三服日三
和母湯治產後下寒下熱
通身溫壯煩渴方○和母
三兩芍藥黃芩各二兩桂枝
草二兩右五味咀咀以水五
升煮取三升三服一升不用桂
升葉湯治產後心中煩悶不
解方○生淡竹葉麥門冬
各一升甘草二兩生薑茯苓
各三兩大棗十四枚小麥三
合右七味咀咀以水一斗先煮竹
葉小麥取八升內諸藥煮
取三升去滓分三服若虛
悸者加入參二兩其人食少
穀氣者加粳米五合氣逆者
加半夏二兩
赤小豆散治產後煩渴不能
食虛滿方○赤小豆三升
燒作末以冷水和頓服之良

朱砂乳香各五錢右為末燈心大棗煎湯調
下錢或蜜丸彈子大薄荷湯化下
茯苓散治產後心虛怔忡不定言語錯亂人參當歸
各七分半棗二水煎服一貼
入薑三棗二水煎服一貼
栝子仁散治產後諸言妄語皆心參歸
當歸熟地黃甘草各等分入藥煎至一盞去渣溫服
心歸一枚煮汁取二盞乃入藥煎至一盞去渣溫服

產後發熱重或後血虛熱入血室以致發熱煩躁晝夜
物湯過多者必虛大無腹內無痛宜芎歸調
去血○有惡露不盡者必消導○有塊作痛宜黑
神散○有傷寒者必入血室或有去瘀血宜柴胡破
散○有傷寒者必入血室或有去瘀血宜柴胡破
產後因傷寒熱病入血室或有去瘀血宜柴胡破
冬人參地黃桂心各一兩大棗二十枚粳米一升為
冬人參地黃桂心各一兩大棗二十枚粳米一升為

藥四兩淡竹葉三升右九味咀咀以水一斗二升
煎取三升服之
柴胡湯或柴胡湯治產後發熱因風寒則宜用
柴胡四物湯治產後發熱及赤芍藥當歸黃芩各一錢
入參半夏甘草煎服五分右剉作一貼
涼血地黃湯治產後發熱生地黃三錢赤芍藥當歸
牛黃膏治產後壯丹皮二錢朱砂鬱金各三錢牛黃二
末蜜丸九皂子化下
芎歸調血飲治產後去血過多以致發熱心煩腹痛
白茯苓熟地黃陳皮便香附烏藥乾薑益母草
丹皮甘草各七分半剉作一貼入薑五棗二煎

產後發熱

東醫圖書集成卷一百一十一

三十五

蒲黃散治產後煩悶方○
 蒲黃以東流水和之可七服
 極良
 蜀漆湯治產後虛熱往
 來心煩煩滿骨節疼痛及
 頭痛壯熱時輒甚又如
 微瘧方○蜀漆葉桂心甘
 草黃芩各兩黃耆五兩
 知母芍藥各三兩生地黃一
 斤石八味改咀以水一斗煮取
 三升分三服治寒熱不傷人
 若藥湯治產後虛熱頭
 痛方○白芍藥乳地黃牡
 蠣各五兩桂心三兩石四
 味改咀以水一斗煮取三升
 半去滓分三服日三服湯
 不傷損人且毒亦治腹
 中拘急痛若通身身熱
 熱加黃芩二兩

黑神散治產後惡露不下以致發熱煩躁當歸熟地
 黃白芍藥酒炒肉桂甘草各一錢五分
 一攪灰蒲黃沒藥各二錢半乳香一錢五分
 柴胡破瘀湯治產後因傷寒熱病入血室或惡露
 不下者柴胡黃芩半夏甘草赤芍藥當歸
 歸生地黃各一錢桃仁五靈脂
 各五分右剉作一錢貼水煎服

柴胡地黃湯治產後熱入血室寒熱譫妄如見鬼柴
 胡甘草五分右剉作一錢貼水煎服
 柴胡防歸湯治產後發熱不困亡血蓄血傷食蒸乳
 錢川芎一錢半柴胡人參各一錢半夏陳皮防風
 各八分右剉作二貼入薑三片棗二枚
 水煎服

竹葉防風湯治產後傷風頭痛發熱青竹葉二十四
 片防風人參桂枝枳梗前胡陳皮赤茯苓
 各一錢半右剉作一貼入薑三片棗二枚
 水煎服

熟地黃湯治產後虛渴天花粉二錢人參麥門冬各
 一錢半右剉作一貼入薑三片棗二枚
 水煎服

人參當歸散治產後亡血生內熱煩渴當歸熟地黃
 白芍藥人參麥門冬各一錢半右剉作一貼
 入薑三片棗二枚水煎服

一方治產後發熱煩渴生藕汁飲一盃甚妙
 煎至一盞去米葉乃入前藥及薑三棗二再煎服

產後乳懸證詳見
 下乳汁有產後氣血弱而枯澀不行者壅閉則宜用漏蘆散

產後乳懸證
 下乳汁有產後氣血弱而枯澀不行者壅閉則宜用漏蘆散

產後乳懸證
 下乳汁有產後氣血弱而枯澀不行者壅閉則宜用漏蘆散

產後乳懸證
 下乳汁有產後氣血弱而枯澀不行者壅閉則宜用漏蘆散

產後乳懸證
 下乳汁有產後氣血弱而枯澀不行者壅閉則宜用漏蘆散

產後乳懸證
 下乳汁有產後氣血弱而枯澀不行者壅閉則宜用漏蘆散

產後乳懸證
 下乳汁有產後氣血弱而枯澀不行者壅閉則宜用漏蘆散

產後乳懸證
 下乳汁有產後氣血弱而枯澀不行者壅閉則宜用漏蘆散

產後乳懸證
 下乳汁有產後氣血弱而枯澀不行者壅閉則宜用漏蘆散

硫黃湯 治產後至門不斂 硫黃四兩 右研每五錢水一盞

陰脫治驗 一婦人產後陰戶中下一物如合鉢狀有

麻當歸黃芪大料二貼與之半日已收但乾破此一

又法 臨產驚動用力太過以致有傷陰戶中垂

生薑微動則淨洗去絕先服失笑散二斤拌勻炒熟

綃袋兜起肉線度却用熟絹五尺摺作數層令婦人輕

綃袋兜起肉線度却用熟絹五尺摺作數層令婦人輕

綃袋兜起肉線度却用熟絹五尺摺作數層令婦人輕

綃袋兜起肉線度却用熟絹五尺摺作數層令婦人輕

綃袋兜起肉線度却用熟絹五尺摺作數層令婦人輕

綃袋兜起肉線度却用熟絹五尺摺作數層令婦人輕

綃袋兜起肉線度却用熟絹五尺摺作數層令婦人輕

綃袋兜起肉線度却用熟絹五尺摺作數層令婦人輕

治產乳運絕方○半夏二兩
振篩孔如大豆內真乳中即
愈此是扁○又方○神曲
末水服方寸匕亦治產難○
之方○亦小豆振篩散取東
流水服方寸匕不差更服○又
方○含醯醋啜面即愈凡
悶即啜之○又方○取醯醋和
產血如棗許大服之

鬱冒

婦人經水不通治矣

產後風症

名曰瘧風症後發熱若舌寒獨活酒

瘧

瘧疾之類也

後

後症之類也

產後風症

產後風症之類也

瘧

瘧疾之類也

後

後症之類也

產後風症

產後風症之類也

小兒明湯治婦人在產
得安蓋四肢苦煩熱
皆自發熱而為若頭
不痛但煩熱與三物
湯黃芩湯陽頭痛與小
柴胡湯方見寒門
三物黃芩湯○黃芩
苦參各二兩乾地黃
兩石以水升煮取

大芎藭湯川芎錢羌活枳
殼甘中各五分赤茯苓赤芍藥
酸棗仁桂枝當歸木香牛膝
各一分姜煎服治血風身
體骨節痠痛心膈壅滯不
飲食
人參利不故人參利不北地胡
驚甲酸棗仁枳殼羚羊角白
木各七分半桂心川芎當歸防
風甘中各五分羌活熟地治
血風體痛頭昏目眩心怔煩
渴寒熱盜汗煩赤口乳痰嗽
胃滿或月水不調腰腹疼痛
痲痺塊硬或產後瘦弱症至痛
禁服
小芎藭湯治同前法宜湯方
牛芎藭根生薑各兩半
在四味以水九升煮取五升
服後汗佳
招治湯治產後血暈不
能言言○招治湯治產後血暈
防產後血暈治法○本中身
偏肘子各三兩當水二兩
一兩次下以水一升二升

產後三升宜分之二
治產後血暈後中身及百
病并男子一切婦科妙
○治產後三升宜分之二
升宜分之二升宜分之二
以清酒三升半先淋諸毒
以清酒三升半先淋諸毒
以清酒三升半先淋諸毒
以清酒三升半先淋諸毒
以清酒三升半先淋諸毒

羚羊角湯治產後心悶
是血氣上衝心所致○羚羊
羊角一枚燒作灰下師以
東流水服方寸匕若未差頂
更再服取調差乃止

血然後治瘵切不可作中風治而用發表出汗之
藥入物湯煎加減用之為可○用產後汗多風
難治門者論曰凡產後血暈者宜用此藥
歸荊湯等治產後風症每三錢微炒當歸身尾各
獨活酒治產後風症每三錢微炒當歸身尾各
愈風散治產後風症每三錢微炒當歸身尾各
交加散治產後風症每三錢微炒當歸身尾各
豆淋酒治產後風症每三錢微炒當歸身尾各
紫湯治產後風症每三錢微炒當歸身尾各
防風當歸散治產後風症每三錢微炒當歸身尾各

甘草湯治在尊中風背強不得轉動名曰風痲方
甘草乳地黃麥門冬麻黃各一兩括蕒根苦蕒黃
甘草湯治在尊中風背強不得轉動名曰風痲方
甘草乳地黃麥門冬麻黃各一兩括蕒根苦蕒黃
甘草湯治在尊中風背強不得轉動名曰風痲方
甘草乳地黃麥門冬麻黃各一兩括蕒根苦蕒黃
甘草湯治在尊中風背強不得轉動名曰風痲方
甘草乳地黃麥門冬麻黃各一兩括蕒根苦蕒黃

二升去滓適寒溫服
一升日三四下出
本防已膏治產後
中風方○本防已膏
斤茵芋五兩若二味
改咀以苦酒九升漬
一宿指膏四分煎三
上三下膏成炎干
摩于遍差
治產後中風風痲
疼痛自汗出者
百疾方○獨活八兩
當歸四兩若二味咀
以酒八升煮取四升去
滓分四服白晝一服
微汗若上氣者加
治產後中風頭面手
臂通滿方○大豆三
升以水六升煮取一升
半去豆漉清更煎
取一升內白木兩附子
三兩獨活三兩生薑

血風湯治產後諸風急或痿弱川芎當歸熟地黃
白朮白茯苓冬一兩白芍藥羌活白芷
各七錢防風五錢右以一半煎末溫酒吞下五十九
錢以一半為末蜜丸梧子大溫酒吞下五十九
錢以一半為末蜜丸梧子大溫酒吞下五十九
錢以一半為末蜜丸梧子大溫酒吞下五十九
錢以一半為末蜜丸梧子大溫酒吞下五十九
錢以一半為末蜜丸梧子大溫酒吞下五十九

八兩湯水斗煎取五
升內好酒五升合更
取五升去滓分五服
日三夜間粥類服
三劑

產後頭痛此九等後發熱身痛頭疼不可便作感冒治
或四物湯加柴胡煎服○產後頭痛此九等後發熱身痛頭疼不可便作感冒治
或四物湯加柴胡煎服○產後頭痛此九等後發熱身痛頭疼不可便作感冒治
或四物湯加柴胡煎服○產後頭痛此九等後發熱身痛頭疼不可便作感冒治
或四物湯加柴胡煎服○產後頭痛此九等後發熱身痛頭疼不可便作感冒治
或四物湯加柴胡煎服○產後頭痛此九等後發熱身痛頭疼不可便作感冒治

產後心腹腰痛神散心腹疼痛全失笑散宜見
產後心腹腰痛神散心腹疼痛全失笑散宜見
產後心腹腰痛神散心腹疼痛全失笑散宜見
產後心腹腰痛神散心腹疼痛全失笑散宜見
產後心腹腰痛神散心腹疼痛全失笑散宜見
產後心腹腰痛神散心腹疼痛全失笑散宜見

產後頭痛
產後心腹腰痛

木槿散不香檳榔玄胡
索金鈴子三稜莪朮厚朴
吉更川芎當歸白芍黃
芩甘中各等分水煎服
治產後一情感傷血與氣
併心痛

壯蠟散杜蠟松川芎熟地茯
苓龍骨各二錢續斷當歸
艾葉人參五味子地榆各錢廿
草五分二分姜棗煎空心
服治產後惡露淋漓不
斷心悶短氣四肢之弱不思飲食
頭目昏重五煩熱面黃體
瘦

生藕汁各一升生薑汁二升右先煎三味約三分
減二服分乃下薑汁慢火煎如稀餲每取一合溫酒
服

八味黑神散治產後惡露不盡心胃膈腹禱痛及血
地黃甘草各一兩黑豆四兩炒右為末每二錢童
便溫酒調下痢○本方加百草霜五錢又名烏金
散

馬金散候候鳴百十霜男子亂髮及松墨散碎鯉魚鱗乾灰玄胡肉桂當歸各
右等分為末二錢空酒下產後敗血不淋瀝不新膈腹疼痛頭目眩昏方

桃仁湯治產後惡露方行急然斷絕腰腹重痛或流
水蛭並炒各三枚右為末每三錢水一盞煎
至六分去滓溫服惡血下即止如有大痛處必作
瘵疽宜取五香連翹湯

去大黃水煎入竹瀝服之

桃桂當歸丸治產後惡露方行急然斷絕腰腹重痛或流
各五錢當歸桃仁淡藥冬二錢半蜜煎下三
各三十枚右為末醋麩糊和丸每服五錢

桂心湯桂心小阜吳茱萸乳姜獨活地當歸白芍
各一錢甘草細辛各三分水煎服治素有寒疾因
產大虛寒搏於血凝不散
上衝心之絡脈故作心痛

散

沒藥散治產後血瘀作痛沒藥三錢蜜煎取二錢服之
根十九

養血佐肝丸治產後左滋脹悶一塊痛卧不着席香
皮半夏紅花炒白朮炒青皮油炒神麩炒薔子炒
壯丹皮紅花炒白朮炒青皮油炒神麩炒薔子炒

推氣養血丸治產後右脇膨脹有塊如豎弦一條着
右錢末酒糊和丸梧大子空蓬木並醋炒百丸

酒炒白朮炒青皮油炒各一兩皮枳實烏藥厚朴
麩乾薑炒黑土炒芥子炒各一兩皮枳實烏藥厚朴

醋糊八錢麥芽炒肉桂各六錢木香三錢右為末
羊肉湯此寒月解產寒氣入兩當歸陳皮各二兩生薑

心腹腰脇痛

至一兩右到水三梳酒一盞煎

產後嘔逆 胃故後腹脹滿食也宜吐不吐此兩致血入脾

抵聖湯 治產後嘔逆惡心不能飲食 甘草五分 右剉作

香靈丸 治產後嘔逆 研勻用狗膽或豬膽和丸 芩實大

產後淋瀝遺尿 婦人產後淋瀝遺尿無時宜用參

參木膏 治產後胸膈成淋 參木膏至一月而安

茅根湯 治產後各一兩 蒲黃 滑石 甘草 各五分

桑螵蛸散 治產後黃赤 桑螵蛸 粉 人參 各五分

黃芪芍藥湯 治產後遺尿 黃芪 芍藥 各五分

產後泄痢 煎後見又瀉宜的湯如 產後月內宜鴨子

淋瀝不禁遂為廢疾 因思肌肉在外而破尚可補

完診其脈虛甚試之頃禱服參木膏至一月而安

恐血氣遲亦難成其功 完

紫貝五箇石首魚頭中石六箇右煎服亦每二錢

木通湯調下或為鹿末三錢燈心同煎服亦可

桑螵蛸散 治產後黃赤 桑螵蛸 粉 人參 各五分

脂厚刺各一兩 酒炒為末 薑湯調下 飲調下 二錢

黃芪芍藥湯 治產後遺尿 黃芪 芍藥 各五分

甘草灸三分 煎後見又瀉宜的湯如 產後月內宜鴨子

產後嘔逆 散亦可 產後淋瀝遺尿 產後泄痢

的奇散

治產後泄瀉惡露不行此散餘血入大腸為

產後大便結

便難後有三種疾鬱胃則多汗致胃燥亡津

液故大便結不通

滋腸五仁丸

治產後陰虛耗大便閉澀紅末四

產後浮腫

行產後浮腫消腫此由敗血滯經入四肢故也

利之劑或用水腫宜用澤蘭散

大調經散

治產後腫滿喘急尿澀黑豆紫蘇葉煎湯

小調經散

治產後浮腫當歸一兩桂心赤芍藥各五

正脾散

治產後通身浮腫蓬朮炮便香附子陳皮苗

五味白朮散

治產後腫宜補中導水行氣白朮三錢

澤蘭散

治產後風腫水腫澤蘭醋湯調下

產後脈法

絕者生○診婦人新產脈沉小者生實大堅

產後大便和結

更醫醫醫難有常

產後浮腫

甲二

產後脈法

此仁煎治煩人產後百疾
諸氣補益悅澤方○桃仁
千二百枚搗令細熟上好
酒一斗五升研濾三四遍如
作麥粥法以極細為佳內
長項瓷瓶中密塞以麩封
之內湯中煮伏時不停火亦勿
令火猛使瓶口常在湯上
令沈浸熟吃出溫酒服一合
日再服夫亦可服之○凡煩
人因暑日產乳取涼大得風
冷腹中積聚百病旋起迄
至於老百方治不能差桃仁
煎之出毒後服之婦人
從今之病每至秋冬須服
一兩劑以至年內將常服之
佳

地黃羊脂煎治煩人產後
欲令肥白飲食平調方○
生地黃汁一斗生薑汁三升
白蜜五升羊脂一斤右四味
煎地黃令得五升次內羊脂
令煎減半內薑汁復煎
令減合蜜著銅兜中煎
如飴取雞六枚投熱酒
中服日三
地黃酒治產後百病未產
前一月當預釀之產後
中服之○生地黃汁一升好
麩好米者二升右三味先地
黃汁清麩令發準密法
醞之至麩封七日取清服之
常使酒氣相接勿令絕慎
蒸生冷酢滑雞魚一切婦人
皆頂忌之但夏三月熱不可
合春秋冬並得合服地黃并
淨內中炊合用之一石七石

產後治法

強急者死○新產之脈緩滑吉實大
弦急死○來侵又云沉細附骨不絕生
證以後當大補氣血為先宜用補虛
後切不可發表○不可用芍藥以性
生發之氣故也○如產後必先用
消然後方可行○如產後必先用
加痰後心即危○如產後必先用
也○曰此非有餘之邪則加乾薑或
補肺藥同用之○此造化之妙非
與於此則用○大抵產後必先用
信地黃芎夏倍當歸藥
補虛湯一錢參白朮各一錢半當歸川芎
服乾薑輕倍加茯苓熟重加酒生血
加乾薑輕倍加茯苓熟重加酒生血
犀骨湯治產後虛乏五勞七傷虛損不足
熱不調方犀骨一具遠志黃耆芍藥乳香
風後

產後虛勞

未覺厥後即成虛勞
名曰死後虛勞其證虛羸
嗽頭目昏痛發渴盜汗寒熱如瘧
先將豬腎一對續斷牛膝鱉甲桑寄生
半入煎藥末三錢及葱白三寸烏梅
穗再煎至七分去滓空心服
用當歸羊肉湯參黃散建中湯
四物湯人參黃散建中湯
當歸羊肉湯一兩參黃散建中湯
煎至三盞分三服
增損四物湯治產後血榮虛損
人參黃散治產後血榮虛損
產後治法

姚氏無當歸有鬼白
子母和錄若留中微熱
加黃芩麥門冬各兩大
便不利加黃芩而小使
加麥子二兩去氣逆加
五味子兩

鯉魚湯治婦人體虛流汗不止
 或時盜汗方○鯉魚二斤去
 白切在升乳薑桂心各三兩
 煮三升以三物以水一斗煮魚
 取六升去魚內諸藥微火煮
 取三升去滓分三服取微汗
 即愈勿用生魚

歸赤茯苓白朮各七分半右剉作一貼
 水煎服或為細末溫酒調下二錢
益母丸 一名濟陰丹 治血產前產後一切諸病及行氣
 有補陰之妙故命
 益母膏 治一逆理丹通治死胎不出胎病及催生神效
 益母膏 治一逆理丹通治死胎不出胎病及催生神效

斷產 婦人產後難或一歲經行後空此服少問之四物
 湯加芸薹子難或一歲經行後空此服少問之四物
 宿疾終末不可深胎者牛膝四分麩麥桂心蟹爪各
 二煎婦因疾去胎不能安服即下之法○麩麥桂心蟹爪各
 二煎各半升醋和水煮服之即下神效○又方麥芽神
 二煎各半升醋和水煮服之即下神效○又方麥芽神
 用白麩去渣作三服候酒五經打來糊煮至二升半以
 縮三指撮和服立下

去胎方○以鷄子一枚
 鹽三指撮和服立下

寡婦尼之病異乎妻妾 蓋有謂也此二種寡婦別製方
 無類溫瘧久則多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱
 全類溫瘧久則多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱
 韓女病腰背不可得也何知之為診得其人脈病
 得之欲男子不可得也何知之為診得其人脈病
 弦主寸口是盛以知思室婦人血以盛精為主婦人脈
 為弦主寸口是盛以知思室婦人血以盛精為主婦人脈
 脈弦出寸口又寡婦則陰成可故知惡風氏之
 言有謂矣○又寡婦則陰成可故知惡風氏之
 倦口宜寒作熱面赤煩或散抑自陰地肝脈其證如惡風氏之
 寸口宜寒作熱面赤煩或散抑自陰地肝脈其證如惡風氏之
 至親○後方可頭昏腹痛驚惕稍見勞動與月經來
 四時其證加人參茯苓神陳皮柴胡羌活香附子甘草以

斷產 婦人產後難或一歲經行後空此服少問之四物
 湯加芸薹子難或一歲經行後空此服少問之四物
 宿疾終末不可深胎者牛膝四分麩麥桂心蟹爪各
 二煎婦因疾去胎不能安服即下之法○麩麥桂心蟹爪各
 二煎各半升醋和水煮服之即下神效○又方麥芽神
 用白麩去渣作三服候酒五經打來糊煮至二升半以
 縮三指撮和服立下

斷產 婦人產後難或一歲經行後空此服少問之四物
 湯加芸薹子難或一歲經行後空此服少問之四物
 宿疾終末不可深胎者牛膝四分麩麥桂心蟹爪各
 二煎婦因疾去胎不能安服即下之法○麩麥桂心蟹爪各
 二煎各半升醋和水煮服之即下神效○又方麥芽神
 用白麩去渣作三服候酒五經打來糊煮至二升半以
 縮三指撮和服立下

內補富歸乳當歸阿膠自是
續斷乳美川官廿各四兩白
木其茶葉各三兩肉桂附子白芍
各二兩蒲黃八錢熟地五錢黃
蜜丸梧子大每五丸溫酒下治氣
血俱虛月水不調或崩中漏下
血過多肌體羸瘦及水月將行
腹脹重痛即

婦人雜病

抑氣散

香○朱砂○皂
英○臍鼠皮
去留前氣婦人者衆陰之所集常與濕居十五以上陰
可具論所後交牙瘀血停凝中道斷絕其血不調胎墮不
產其嗜慾多於夫感病倍於男子加十倍難療
也○戀○愛○憎○深○着○堅○穿○心○痛○不○自○抑○所○以○為○病○根○深
病雖有○名○數○莫○詳○以○證○無○狀○且○原○其○理○諸○證○頭○暈○滿
婦人○氣○盛○於○血○所○以○散○神○道○散○加○婦○人○道○宜○滋○陰○湯
宜○補○氣○散○異○香○四○神○湯○三○合○湯○丹○濟○身○有○血○線○見○宜○滋○陰○湯
百○陰○地○黃○通○治○宜○神○湯○三○合○湯○丹○濟○身○有○血○線○見○宜○滋○陰○湯
滋○陰○百○補○丸○治○氣○血○不○足○乍○寒○乍○熱○不○思○飲食○羸
九○益○母○膏○方○並○宜○神○湯○三○合○湯○丹○濟○身○有○血○線○見○宜○滋○陰○湯
無○汗○助○附○子○滋○陰○至○寶○湯○治○虛○勞○熱○嗽○有○汗○熱○嗽
抑氣散一兩右為末每二錢沸湯點服

異香四神散

滋陰百補丸

人參荆芥散

逍遙散

加味逍遙散

異香四神散一錢右到作一貼入薑三錢烏藥二錢甘草
滋陰百補丸治氣血不足乍寒乍熱不思飲食羸
草末四兩當歸三兩川芎熟地黃白朮各二兩白
芍藥一兩半茯苓人參玄胡或酒或
醋湯或白湯下五七十九
人參荆芥散治血風體痛寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽
人參荆芥生乾地黃柴胡
羊角白朮各七分半桂心
赤芍藥甘草各五分煎服
作一貼入薑三片煎服
逍遙散治月經不調及血虛
甘草薄荷各五分煎服
加味逍遙散治血虛各一錢潮熱盜汗痰嗽似勞白芍


頰人雜病

更醫實監在病篇下

四

五

安產方位圖



產圖及催生符借地法並以朱書於產房內北壁上先貼產圖次貼催生符及貼借地法讀呪借地法三遍而止

九逐月安產胎衣宜向月德月空方位所有
 三神殺並須避忌若交得之月即換次月產圖有
 人從入節十日作圖者非也假如正月十二日也
 春若每婦十三日產圖者非也假如正月十二日也
 必依所產之日用之乃是依節氣更換則天德
 月德衣在產矣○九產遠棄之切忌開肚方旅
 隨藏衣之方德在丙可安產室月空在壬可藏胎
 衣○如正月德在丙可安產室月空在壬可藏胎
 此衣餘依旅

安產藏胎衣吉方

九月空德安產室
 藏衣為準

天德	丁	坤	壬	辛	乾	甲	癸	艮	丙	乙	巽	庚
月德	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚
月空	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲

正二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

生氣子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

催生符



右符以朱砂書之貼於房內北壁上過坐草之時

體玄子借地法

步登房之四角餘步安產借地恐有穢污或有
東海神王或有西海神王或有南海神王或有北
招搖舉高十丈符地軸入地十丈令此地空闊

產婦某氏安居無所妨礙無所畏忌諸神
擁護百邪逐去急急如律令勅讀三遍

月遊胎殺所在

月在門房○十月在床房○十一月在爐竈○十二月
在房榻

日遊胎殺所在

日在米倉○子在門○未申日在堂○寅卯辰酉日在竈
縱不墮胎令兒破形色青體孳塞或至天殞可

房中神所在

丙午丁未日在房內東○六戊六巳日在房中○
庚子辛丑日在房內南○九遊神所在忌安

東... 監在... 五

床換帳致重物於床
中必主傷產墮胎禍

推婦人行年法

逐件七神詳斷吉凶
後按

宜宜 生禍絕開八反
方方方方方方方方方方

十三歲 庚申 西南黃衣 坤 離 巽 辛 甲 正 七 辰 戌

十四歲 未 正南赤衣 離 坤 兌 壬 癸 二 八 卯 酉

十五歲 午 正北黑衣 坎 乾 艮 癸 壬 三 九 寅 甲

十六歲 巳 正東青衣 震 艮 乾 甲 辛 四 十 丑 未

十七歲 辰 東北黃衣 艮 震 坎 乙 庚 五 十 子 午

十八歲 卯 西北黑衣 乾 坎 震 丙 丁 六 十 巳 亥

十九歲 寅 正西白衣 兌 巽 離 丁 丙 正 七 辰 戌

二十歲 丑 東南黃衣 巽 兌 坤 庚 乙 二 八 卯 酉

二十一歲 子 西南黃衣 坤 離 巽 辛 甲 三 九 寅 甲

二十二歲 亥 正南赤衣 離 坤 兌 壬 癸 四 十 丑 未

二十三歲 戌 正北黑衣 坎 乾 艮 癸 壬 五 十 子 午

二十四歲 酉 正東青衣 震 艮 乾 甲 辛 六 十 巳 亥

二十五歲 申 東北黃衣 艮 震 坎 乙 庚 正 七 辰 戌

二十六歲 未 西北白衣 乾 坎 震 丙 丁 二 八 卯 酉

二十七歲 午 正西白衣 兌 巽 離 丁 丙 三 九 寅 甲

二十八歲 巳 東南青衣 巽 兌 坤 庚 甲 四 十 丑 未

二十九歲 甲辰	西南黃衣 坤	高巽 辛乙	五十一 子午
三十歲 癸卯	正南赤衣 離	坤兌 壬癸	六十二 巳亥
三十一歲 壬寅	正北黑衣 坎	乾艮 癸壬	七十三 正辰戌
三十二歲 辛丑	正東青衣 震	艮乾 甲辛	八十四 卯酉
三十三歲 庚子	東北黃衣 艮	震坎 乙庚	九十五 寅申
三十四歲 己亥	西北白衣 乾	坎震 丙丁	四十六 丑未
三十五歲 戊戌	正西白衣 兌	巽離 丁丙	五十七 子午
三十六歲 丁酉	東南黃衣 巽	兌坤 庚乙	六十八 巳亥
三十七歲 丙申	西南黃衣 坤	離巽 辛甲	七十九 辰戌
三十八歲 乙未	正南赤衣 離	坤兌 壬癸	八十八 卯酉

三十九歲 甲午	正北黑衣 坎	乾艮 癸壬	三十九 寅申
四十歲 癸巳	正東青衣 震	艮乾 甲辛	四十九 丑未
四十一歲 壬辰	東北黃衣 艮	震坎 乙庚	五十九 子午
四十二歲 辛卯	西北黃衣 乾	坎震 丙丁	六十九 巳亥
四十三歲 庚寅	正西白衣 兌	巽離 丁丙	七十九 辰戌
四十四歲 己丑	東南黃衣 巽	兌坤 庚乙	八十九 卯酉
四十五歲 戊子	西南黃衣 坤	離巽 辛甲	九十九 寅申
四十六歲 丁亥	正南赤衣 離	坤兌 壬癸	四十九 丑未
四十七歲 丙戌	正北黑衣 坎	乾艮 癸壬	五十九 子午
四十八歲 乙酉	正東青衣 震	艮乾 甲辛	六十九 巳亥

四十九歲申甲 東北黃衣 艮震坎乙庚正七辰戌

一注氣方 帳產婦宜向之開門大吉及床

二反支月 皮遇此月即鋪令惡血汚地吉

三禍害月 不得於其便避之大吉

四絕命方 不得於其便避之大吉

五懸尸方 懸馬此日產不得攀繩宜

六閉肚方 臨月及棄不淨之水謹之吉

七八疰方 產帳忌不得向之

小兒初生救急

小兒初生救急 綿絮包置懷中勿斷臍帶且將胞衣置爐火

中燒之仍作大紙燃蘸油點火於臍帶下重之令

斷臍帶方 如臍帶斷後以熱醋湯盪洗臍帶須令氣回啼哭

小兒初生 面青身冷口紫乃胎寒也用白殭蚕散急

綿分右到水煎取汁以

小兒初生 有即死者急看兒口中懸痲前臍上有泡

中若惡血入口

小兒初生 忽患撮口不飲乳名曰馬牙不治則百無

鐵挑出生便看兒齒齦上小泡子如粟米狀急以

墨遍口內擦之勿飲乳一時許即差

小兒初生 刺道無孔以蘇合香元少許作鐵納孔中

小兒初生 蘇合香元少許作鐵納孔中

治妊娠腹痛方○準三斤
 擣絞取汁用清酒升合煎
 減半頓服○又治妊娠腰痛
 方○生薑汁八合酒五合合煎
 溫服

單方	當歸	蒲黃	子行	菟蔚	生地黃	石燕	朴硝	甚妙
	治婦人血積刺痛頭暈	治產後血暈	治血行不順	治難產及死胎	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
仁若紅花	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
當歸	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
頭暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
桃	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
血	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
刺	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
痛	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
用	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
當	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
歸	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
乃	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
和	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
血	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
之	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末
藥	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	龍肝細末

單方	伏龍肝	大芥	朱砂	小兒	小兒	小兒
	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
伏龍肝	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
龍肝	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
一	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
二	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
錢	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
以	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
水	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
調	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
下	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
其	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
兒	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
常	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
頭	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
戴	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
土	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈
出	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈	治產後血暈

治產後腹痛中滿痛之不得飲食
方○黃芩三兩芍藥四兩
六兩右三味以水六升煮
取三升分三服半日令藥盡
微下水令易產日飲一劑為
善也

芍藥

主婦人諸疾并產前後諸病
又治血虛腹痛酒煎服之
使婦人胎安各二兩煎至半服之
艾葉二兩或腰腹痛下血不止艾葉
不安或以酒煮服醋煮亦良

黃芩

產前安胎黃芩白朮妙藥也
降火下行也○條安胎聖藥也
熱之藥可養胎知產前宜清熱養血
經而不妄行故能養胎也必取細挺沉實者用之

紅花

主產後血暈口噤閉絕紅花
二盞煎至一盞分二服立效
是也

玄胡索

主產後血暈及惡血衝心或兒枕痛欲絕為
末酒服一錢立止○又玄胡索桂心各半兩
當歸一兩或熱酒調下

桂心

治產後血痕痛大熱酒磨下二九
錢童便或熱酒調下

桑寄生

治胎漏不止能安胎並佳
或煎服或為末服並佳
蘇木欲死產後血暈及惡露不下痛悶

蘇木

欲死產後血暈及惡露不下痛悶
桑螵蛸每主二錢空小便數不禁右為末

鯉魚鱗

研治酒後服一錢能破滯血
烏賊魚肉有墨主婦人血崩心痛甚者名曰殺血心

淡菜

主產後血氣積聚可煮久食之
然取小產下血過多而心痛者亦
蛇蛻治產後血氣積聚可煮久食之

藕汁

主產後忌生冷惟藕不忌者為其能破血故也
生即順
單方

即紅蛤

單方

更醫百病監值百篇

五十六

治妊娠腰痛方○大麻子三升
以水煮取汁三升分五服
又方○大豆三升以酒三升煮取
二升頓服之亦治腰痛○又方○
燒牛屎焦末水服方寸匕日三
服

治妊娠忍苦痛方○燒鹽令
赤熟三指撮許酒服之立
差○又治妊娠傷胎結惡
心腹痛方○取兒尿二升
頓服之立差大良○又方○
水三升洗夫靴剔汁溫服

治妊娠心痛方○生鷄子一
枚酒和服之○又治妊娠中
惡心腹痛方○新生鷄子二
枚破着杯中以糲粉和如粥
頓服亦治妊娠卒動不安
或但腰痛或胎轉搖或下
血不止○又方治妊娠中惡
心腹痛方○燒敗鼓皮酒
服方寸匕須臾自呼盡
姓名

<p>大麥蘖 ○能又催孕婦有胎病欲去胎服之即下</p>	<p>神麴 和水胎服并下濃煎取汁末二錢</p>	<p>黑豆 不子下婦黑月數三升醋煮取汁飲之即下</p>	<p>大麻根 汁催生今易產胎根不亦妙煎取</p>	<p>胡麻油 下胡麻即黑荏子也胞不</p>	<p>五仁重細 倍煎湯未少 枯○一清酒一 白產後陰腫 末研桃仁細 研桃仁為膏 塗之</p>	<p>桃仁 腹主中婦人積聚後百病千二百枝去皮尖雙仁熬搗</p>	<p>蒲萄根 汁治孕飲之即下而胎亦安</p>	<p>柑子皮 主產後浮腫酒煎服之雷公云</p>
--	------------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	---	--	-----------------------------------	------------------------------------

<p>醋 一升孕婦胎死不出醋三升煮黑豆</p>	<p>冬葵子 主難產胎死不出醋三升煮黑豆</p>	<p>葱白 莖治胎動不安或胎上煩悶葱白大者二十</p>	<p>馬齒莧 煎主產後血暈惡血痛下直口目服</p>	<p>蠶菜 和主產後血暈惡血痛下直口目服</p>	<p>雞子 取主清產後血暈惡血痛下直口目服</p>	<p>鹿角膠 能安胎止痛炒成珠作</p>	<p>阿膠 治難產因乏明膠二兩好酒一升半微火令熔</p>	<p>鹿角 主胎不出一枚鹿角細屑煎服立出</p>
------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------

單方

治妊娠心痛方○白蜜三兩羊
脂八兩青竹茹升石三味合
煎食頃服如棗核大三枚
日三○又方○蜜升和井底
泥心下○又方蜜升頓服

治妊娠腹痛方○豉二兩榆白
皮五兩右二味製搗蜜丸如
梧桐子大服三丸亦治心

治妊娠心痛方○青竹茹一升
以酒二升煮三兩沸頓服

兔頭骨

主催生落胎并產後惡血不下兔頭骨
和毛髓燒為灰作末酒下一錢妙
治難產為末每二錢等歸湯煎水調下即產狸

羊腎

主產後虛羸瘦弱無力羊腎一雙炮
熟切和五味作羹或作粥食之
治後切和五味作羹或作粥食之

猪腎

治後切和五味作羹或作粥食之
和五味作羹或作粥食之

麝香

治產後難產又催生墮胎今產
易取麝香一錢水調下

榆白皮

治胎動不安甘竹
升胎即下○或人臨產月取末一錢日二服

甘竹根

治胎動不安甘竹
根煮汁服之

芋根

治兩胎動欲墮腹痛不可忍芋根
二兩切銀石器酒半煎服妙

瞿麥

治胎動欲墮經白不出或子死
腹中欲死瞿麥煮取濃汁服之

車前子

治胎動欲墮經白不出或子死
炒為末酒服二三錢不得出

水銀

治胎動欲墮經白不出或子死
取水銀二兩吞之立出

大黃

治胎動欲墮經白不出或子死
一兩為末醋半升同熬成膏九如

鍼灸

鍼灸法三子無嗣者以鹽填臍灸灸之連日灸至二
報灸之百壯無嗣者以鹽填臍灸灸之連日灸至二
五寸壯胞門左不邊二寸子宮三寸關元右壯可
二寸壯胞門左不邊二寸子宮三寸關元右壯可
八寸壯胞門左不邊二寸子宮三寸關元右壯可
生難產及下死胎取大衝補合賓商補三陰交瀉立催

斷子法

東醫寶鑑雜病篇卷之十

用白麵	壯是墨	則舒	不橫	三陰	陰交	效衣	壯而	中如	抱頭	時分
麵一升	神按	點記	再紋	陰交	交中	急於	一有	子有	頭分	解
無灰酒	驗之	後以	孕取	二七	極照	不於	婦人	子有	分	○
五升	即上	此以	釋壯	陰交	神海	下產	其母	子有	子	子
作糊	所動	此量	一條	神門	內關	醫鑑	蓋後	子有	上	上
煮至	脈應	心平	長同	照海	元關	云脚	各暴	子有	衝	衝
二升	手各	自膈	身才	○	○	小即	醫卒	子有	八	八
半瀉	穴灸	安前	之四	婦人	產後	至指	女其	子有	六	六
去粗	點處	垂下	寸令	無子	陰後	陰尖	也母	子有	分	分
分作	兩頭	處兩	婦人	或產	下脫	○	墳為	子有	七	七
三服	頭盡	頭盡	後久	產後	血暈	○	○	子有	令	令
候經	處以	處以	仰	久	取臍	○	○	子有	得	得
					三取	○	○	子有	氣	氣
					三取	○	○	子有	母	母
					三取	○	○	子有	正	正
					三取	○	○	子有	坐	坐
					三取	○	○	子有	立	立
					三取	○	○	子有	使	使
					三取	○	○	子有	人	人

治煩人水洩兩方。
 參氣海百壯三報

