




特 7
10
494

伊藤大郎


六九



国立国会図書館 タイトル『本草匯18卷』 請求記号 特7-494

ガラス使用

特7-494



本草匯卷五日次

雜證病機畧

陰陽榮衛

藏府受病

陰陽辨惑

診病愈劇

脈從逆

重實重虛

五臟補瀉



陰陽受病

火分君相

診面皮肉爪膝

診生死

經絕

陽氣陰血

寒熱

本草匯

卷五

目次

一

本草匯

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

熱分虛實

勞瘵主在陰虛

虛寒正治

外熱內寒外寒內熱

瘧寒熱

諸瘧

眩

癩痢

瘧

諸瘧

驚悸

目眩

脇痛

諸痛

小便不通

陰縮陰縱

霍亂轉筋

頭痛

不得臥多臥

諸痛

心痛

胸痛

煩躁

譫妄

諸血

諸瘵

卒中暴厥

自汗

內傷飲食

痰

消痺

黃疸

腹鳴

嘔吐膈氣

吐酸吞酸

狂顛



面熱面寒

積塊癥瘕

少腹脹滿

癰

殭泄

泄瀉分四氣

欬嗽

喘

痔

腰痛

舌瘡

諸厥

脚氣冲心

耳聾

齒痛

遺濁

恐

本草

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯

男 樹畹芳谷

姪 維均梅在

紫藤陳陸坤白筆校訂

襍症病機畧

陰陽榮

在天為陰陽在人為榮衛榮行脉
中五十周晝晝夜陰陽之異衛行脉外五十周有晝
陽夜陰之分榮衛之行以宗氣之呼吸為領神衛氣


本草匯

卷五

襍症病機畧

一

每七頁



平旦生日西衰榮氣分經絡伏而不露見者為經脉
浮而常露見者為絡脉

陰陽受病之初清淨則陽氣周密邪不能害煩勞則
陽氣解散邪入傷人七情傷氣飲食傷形東垣論勞
倦所傷風雨寒暑傷陽飲食男女傷陰喜怒傷氣寒
暑傷形陽主府陰主藏陽主心肺陰主腎肝五藏外
通四時五 五行內通六府九竅皮脉血液五藏皆
稟氣于胃

藏腑受病初藏府之病皆始于胃氣虛胃虛則大

小腸無津液灌溉諸處而病生胃虛則五藏無氣
之受而九竅不通五勞所傷五味所傷陽強不密則
外邪入傷五藏天邪害藏外傷入府邪中于陽者從
頭面始入陷于經地邪害府內傷入藏邪中于陰者
從臂胛音杭始入陷于府

火分君相人之日用燒燄屬君火天之龍雷海火屬
相火相火在天出於龍雷海在人具於下焦肝腎相
火之本在地中陰氣無時妄動則陰受煎熬而為病
死之漸聽命道心而主靜則陰得養而為之運故諸

病多屬相火。

陰陽辨惑。晝病屬氣。夜病屬血。左主血。右主氣。脉浮洪強數。氣病。脉不可還作熱。沉細弱澁。血病。脉不可還作寒。外傷。鼻息重。身熱。手指熱。內傷。口無味。兩脇熱。手心熱。病在上。吸促。病在下。吸遠。脉數屬府。欲寒。欲見人者。屬府。府病移動。脉遲屬藏。欲溫。不欲見人者。屬藏。藏病不移。

診面皮肉爪腠。直鼻上下候五藏。挾鼻兩傍候六府。又鼻候肺。目候肝。舌候心。唇候脾。耳候腎。皮候大小。

腸肉候胃。爪候膽。腠理候三焦。膀胱。

診病愈劇。肝病愈于夏丙丁平日。甚于秋庚辛下晡。心病愈于長夏戊巳日中。甚于冬壬癸夜半。脾病愈于秋庚辛日晡。甚于春甲乙日出。肺病愈于冬壬癸下晡。甚于夏丙丁日中。腎病愈于春甲乙夜半。甚于長夏戊巳四季。藏病脉沉大易已。寸脉沉滑病益。浮滑病損。寸脉浮滑病益。沉滑病損。診生死大法。察形氣得失。脉之逆從。色之澤夭。有胃



無胃又形氣相得為可治形氣相失為難治色天不澤謂之難治赤色出兩頰如拇指大卒死色澤已浮謂之可治黑色出額中如拇指大者卒死黑色起入目及鼻口耳者死

脉從逆春脉弦為從弦而弱滑為有胃生弦而力強為無胃死夏脉鈎為從鈎而弱滑為有胃生鈎如薏苡子在胃死秋脉毛為從毛而弱滑為有胃生毛如羽中入膏為無胃死冬脉石為從石而弱滑為有胃生石 彈石為無胃死長夏脉代為從代而弱滑

為有胃生代如屋漏身啄為無胃死間藏者生次傳者死真藏脉見色天毛折必死脉懸絕必死寸有尺無尺有寸無必死代脉必死結促代皆動而中止結促脉能自還生代脉不能自還死至脉叔和云一呼再至曰平三呼至曰離經四至曰奪精損脉一呼一吸為一息四五至曰死六至曰命盡至為平減一至三至曰遲增一至六至曰數若必死乍疎乍數者四季死沉消陰夜死盛躁陽脉晝死熱病晝死水病夜死寒熱病旦死風病夕死

經絕足少陰絕齒長足厥陰絕舌卷卵縮五陰俱絕

本草匯

卷九

雜症病機畧

四

每七與



目運六陰俱絕汗出手太陰絕爪枯毛折手少陰絕
 面黑足太陰絕唇反汗出喘不休水漿不下為命絕
 肝先絕目黑身黃唇反心先絕直視搖頭腎先絕遺
 溺目反脉先絕喘汗髮潤陽先絕色青陰先絕色赤
 肘絕手足寒上氣脚縮藏絕利不禁手足不仁
 重實重虛五實脉盛皮熱腹脹前後閉悶五虛脉細
 皮寒氣少前後利不食能食為實不能食為虛大法
 病氣有餘宜瀉病氣不足宜補形肥汗多脉弦懶語
 為氣虛宜四君子輩形瘦無汗脉大無血氣宜四物

輩

陽氣陰血肥屬氣虛瘦屬血虛汗多屬氣虛無汗屬
 血虛

五藏補瀉大法肝虛辛補實酸瀉心虛鹹補實甘瀉
 脾虛甘補實苦瀉肺虛酸補實辛瀉左腎虛苦寒補
 右腎虛辛溫補實鹹瀉

寒熱大法陽勝則身無汗陰勝則多汗身寒陰陽俱
 盛無汗身寒陰陽俱虛有汗身熱陽生寒熱者得之
 風雨寒暑陽虛生外寒陰生寒熱者得之飲食勞倦



喜怒

陰虛生內寒
陰盛生內熱

顏色黃赤為熱青白為寒脉數為

熱脉遲為寒正治以寒治熱以熱治寒熱病服寒而

熱不退者取之陰寒病服熱而寒不退者取之陽反

治以熱治熱以寒治寒脉從病皮肌寒熱無汗可治

身寒熱汗出不休難治

熱分虛實陰不足能食為實熱陽不足不能食為虛

熱實熱正治虛熱反治脾胃病始為熱中宜溫之即

反治法熱分氣血晝熱屬氣夜熱屬血熱分表裏有

表而熱屬表無表而熱屬裏熱分上下肘獨熱多渴

咽腫赤目口瘡屬上掌中熱胃實齒煩屬中手獨熱

大小澀閉血痔屬下熱分五藏熱在肌肉遇夜甚消

穀屬脾熱在皮膚日西甚喘咳屬肺熱在血脉日中

甚煩心掌熱屬心熱在兩脇寅卯甚怒屬肝熱在骨

及腰不能起牀屬腎熱分腸胃胃熱臍上熱腸熱臍

下熱脉弦數五心熱為火鬱熱火鬱熱宜發運氣火

助心胃而熱者治以寒寒攻心虛而熱者治以熱

寒涼脉弦數惡寒者亦陽陷略舉之服寒涼証減脉

寒涼脉弦數惡寒者亦陽陷略舉之服寒涼証減脉

反加數者亦忌寒寸關脉弦數者宜安神脉浮大芤
弦為勞脉虛微細弦為勞聲啞咽痛者不治大法忌
燥熱補寒惟無邪無積無熱者可補之傳尸勞熱吸
安息香煙咳甚者為傳尸宜吐出蟲用乳香薰手背
有毛蟲出者為傳尸宜汗出下蟲

虛寒正治陽虛脾胃病未傳寒中痺病惡寒四肢寒
掌寒魚際有青脉者腹胃寒有氣分寒血分寒有上
焦寒中焦寒下焦寒有背寒身前寒有五藏寒寒病
當夏者宜從中治

外熱內寒外寒內熱表熱內寒者身熱欲衣表寒
熱者身寒不欲衣

瘧寒熱邪入并陰則陰實陽虛故寒慄邪出併陽則
陽實陰虛故熱燥日作者邪客淺間作者邪客深邪
與衛會于風府者則瘧作邪客頭項衛至頭項則作
邪客腰脊衛至腰脊則作邪客手足衛至手足則作
先寒後熱者夏秋傷暑風寒入于腠理先自外入并
後寒者冬春傷暑風寒客于骨髓先自內
出并于外多熱但熱者陽獨盛于外不入并陰于內

邪與衛會則作邪與衛離則伏陰多陽少者間日遠
 陽多陰少者間日近潔古分時令晝夜三陽瘧發處
 暑前三陰瘧發處暑後三陽邪氣淺三陰邪氣遠太
 陽瘧為風宜汗陽明瘧為熱宜下少陽瘧為風熱宜
 和晝發屬氣夜發屬血仲景分寒熱先後多少先寒
 後熱者柴加桂先熱後寒者小柴胡多熱但熱者白
 虎加桂多寒但寒者柴胡桂薑丹溪攻邪補正一日
 者受病一月二日者受病半年三日者受病一年暑
 風深入陰藏為久瘧大法補中帶散勞苦脉弦濇者

純用補後賢散表劫痰宜調瘧于未發無治其
 諸風冬至避西風立春避西南風夏至避北風立秋
 避東北風春分避西風立夏避西北風秋分避東風
 立冬避東南風風入皮膚為寒熱風入經脉為厲風
 風入陽明為熱中寒中風入分肉為不仁春甲乙傷
 風為肝風夏丙丁傷風為心風季夏戊己傷風為脾
 風秋庚辛傷風為肺風冬壬癸傷風為腎風風偏中
 為風風入風府為腦風風入係頭為目風新沐中風
 為首風飲酒中風為漏風入房汗出中風為內風久

風入中為殄泄風。風在外為漏風。五藏風皆汗出惡風。卒中之初中分淺深。中淺半身偏痛。舌能言。中深半身不收。舌難言。中血脈。口目喎斜。中府肢體廢。中藏舌難言。中倒之初經稱暴仆。世稱中風。半身不遂。經稱偏枯。世稱左癱右瘓。舌廢不言。肢廢不收。經稱痲病。世稱風懿。風柔。丹溪補中帶收。丹溪以治痿法。治痲。主于補養。肥作濕痰。治瘦作火熱。治風病。治痰為先。少食用竹瀝。能食用荆瀝。厥逆者溫補之。熱煩者冷補之。口噤藥不下者熏之。痰盛者必用吐法。仲

景攻中帶補外有六經形證宜解表。內有便溺宜通裏。內外邪盡宜行中道。安神清肺。高實痰濕者宜治痰。昏冒自汗煩燥不臥者宜治熱。脈沉不得汗者吐以提之。癘風重者取積取汗。絕味絕色輕者疎風和血。專科秘傳用藥治驗。潔古疏泄血中風熱。東垣講解補氣瀉滯。

眩內經論眩皆屬肝木。去血多而眩者為血虛。虛者兼補中痰閉不出者宜吐之。體虛有寒者宜木附。眩而吐逆為痰厥。宜治痰。大小結滯者微利之。風氣助

肝眩治以涼濕邪傷腎眩治以熱

癩癩晝發屬陽蹻夜發屬陰蹻諸仆皆因厥氣逆上

亂于頭顛高者因而越之高者抑之行之內消痰涎

脉滿大為熱脉小急為寒久癩積為痰嘔多沃沫氣

下泄不治如狂不治

瘧音至丹溪海藏補虛仲景活人祛邪無汗惡寒為剛

瘧有汗不惡寒為柔瘧肢不厥為陽瘧厥冷為陰瘧

背反張屬太陽頭低視下屬陽明瘧脉皆弦緊伏堅

脉浮惡寒伸欠拘急宜表脉洪便赤府閉腹滿汗出

宜裏脉浮自汗為表虛虛日久宜養血

諸痺風氣勝者為行痺其痺走注寒氣勝者為痛痺

其痺疼痛即痛風也濕氣勝者為着痺其痺麻木不仁初

感風寒濕其痺在骨筋脉肌皮之表表痺不已再感

風寒濕其痺入五藏之裏痛久則不痛不仁濕多則

汗多陽少陰多則寒陰少陽多則熱諸脉有餘痺在

表諸脉不足痺在裏歷節痛風與附骨疽相類皆能

痺歷節脉弱而溢痛風大法因血先受熱後感寒

而血汚作痛丹溪治先受之血熱挾老痰者疎之導




之痛在胃經者解食毒無寒熱者俱治汚血先賢治後感之外寒微者蒼朮發甚者桂附發又甚者以酒行桂附服藥發不動者蒸之熨之痛風多屬血虛氣血虛不行為麻木閉目則麻木為風熱下陷眩運兼麻木亦風熱下陷風寒干衛不行為不仁[攣]熱則筋膜乾而攣寒則筋脉急而攣虛則無脉弗榮于筋而攣邪氣惡血住留關節而攣

驚悸大概血虛併痰瘦人多是血虛肥人多是痰飲飲停心下必悸時作時止者痰因火動有慮使動屬

虛脉大而虛為血虛臥而驚悸屬肝因驚成悸者亦在心膽聞木音則驚屬胃濕痰驚悸屬脾

目瞳子目黑法陰白眼赤脉法陽黑眼屬肝赤脉屬心兩臉屬脾陰虛則眼楞緊急陽虛則瞳子散大目疾始于飲食勞倦**大法**暴發除風散熱久病養血安神黑睛痛則夜甚點苦寒劇白睛痛則晝甚點苦寒功實者瀉之陽病以陰藥點陰陽以通忌用寒初痛太過實熱者下之吐之虛熱體肥氣盛胃熱者槐子



清之實熱脉盛大府秘者微利之熱甚者反佐以取
 之外障在睛外遮睛翳從上下眉稜痛者屬太陽宜
 溫之散之翳從上下多熱者屬陽明宜寒之下之翳
 從外入內者屬少陽宜和之新為熱翳在表宜表散
 久為冰翳在裏宜焮發牢而深者為陷翳九竅不通
 者補陽退翳從下上為實翳瞳子散大者補陰翳已
 除至其年月日復發者有積內障在睛裏昏暗氣虛
 則目無光視不見暴失明為氣脫宜參朮急救大心
 寒涼漸失明為氣虛宜參朮助陽微佐寒涼血虛則

則睛散大視物花宜酸收之忌辛散之肝旺火妄
 脾受邪生內障皆血病氣血鬱結口赤昏花不明鬱
 則玄府不通利而昏虛則玄府無氣運行而昏先患
 一目次延復目者邪乘虛客藏府針足厥陰太陽手
 少陰三經治用補藥為君逐邪佐之羚羊角夏枯逐
 厥陰邪細辛玄參逐少陰邪得于房勞為腎虛羌活
 車前逐太陽邪左腎屬陰陰虛則瞳子散大右腎屬
 陽陽虛則陽事多痿若目昏兼聾善恐為肝虛肝血
 不足膽熱淚衝風淚出者厥氣迎上火獨燔目邪中

腦則眩邪中睛則視岐神勞睛亂則亂見不能近視者陰虛也不能遠視者陽虛也

脇痛肝實則脇痛善怒挾食積肝虛則脇痛中清運氣木助肝實宜清燥攻肝虛宜溫

諸疝痛少腹痛同一治大法疝因暴寒束歷代獨治外束之寒丹溪兼治內鬱之熱小腹手不可近脉如循刀噴者死血肝受邪小腹引脇痛風助肝盛者瀉肝燥攻肝虛者補肝小腸受邪少腹引辜丸痛熱助小腸實者寒之寒攻小腸虛者熱之膀胱受邪少腹

疝不得小便濕攻膀胱虛者熱之寒疝辜丸冷痛疝疝辜囊腫痛筋疝陰莖腫脹狐疝臥人立出癩疝囊如升斗疝脉皆滑脉急亦為疝癩氣不痛難治痛者易治寒束外者溫散運氣燥攻肝邪為癩疝癩疝為熱在外寒在內

小便不通渴而小便不利熱在氣分不渴小便不利熱在血分熱渴而腹冷為水氣氣血鬱于下微者香散之甚者吐以提之血鬱于下微者輕利行之甚者重劑破之濕攻三焦腹痛脹不利風攻痺痛瘕泄

本草綱目 卷五 雜症病機畧 三 每卷真




不利燥熱癆閉淋血受傷者補血行滯氣氣虛兼補
氣元氣不虧者一味行汚血諸淋皆屬熱胞痺似淋
屬寒按之痛若沃湯小便澁鼻多涕為胞痺小便數
數而少為實數而多為虛溺赤脉澁脛冷為寒熱痛
者屬肝消穀者胃實卷舌喜溺者肝已絕產尿遺產
痔音傷尿胞澁可去脫

陰縮陰縱肝筋寒則陰縮入肝筋熱則陰挺長傷內
則陰不起傷寒則陽縮入陰痿因傷肝筋陰濕癢燥
臭屬酒濕

霍亂轉筋皆作虛治身熱脉長屬陽明頭痛脉浮尸
太陽腹痛脉沉屬太陽四肢拘急脉遲屬少陽脇痛
脉弦屬少陽四肢厥冷脉微緩屬厥陰

頭痛多主于寒三陽散而寒之三陰燥而溫之熱濕
熱頭痛宜清空寒厥逆頭痛下虛上實為寒濕大寒
犯腦頭痛齒亦痛虛頭目魚尾次起痛者屬血虛頭
痛兼耳鳴尤竅不利汗出鬱甚者屬氣虛實虛熱在
頭者必吐之邪在胃者必下之風虛則壅塞而痛宜
辛散之風盛則疎散而痛宜酸收之眼疼日暈為風




痰頭痛惡心屬濕頭痛或腹腫或右脉盛或鬲痞或
動作則盛為邪在胃

不得臥多臥衛獨行陽則陽盛陰虛為不臥衛久陷
陰則陰盛陽虛為多臥膽虛不眠膽實多臥胃不和
則臥不安運氣多臥皆屬內熱

諸痛卒痛之原寒客脉外痛得灸止寒客脉中痛不
可按寒客脇胃按之痛止寒客脊脉按之無益寒客
衝脉痛喘動寒客臧痛如死寒客腸胃病嘔寒客小
腸痛泄熱陷小腸痛閉寒客背膂痛引心背寒客厥

陰痛引脇肋少腹寒客陰股痛引少腹寒客膜原卒
成積有形不痛者陽傷無形有痛者陰傷先痛後腫
氣傷形先腫後痛形傷氣

心痛大法新為客寒宜熱之身感寒宜溫散口食寒
宜溫利久為鬱熱宜寒之輕者反佐薑汁重者反佐
辛熱心痛徹背者為寒為熱有物冲起為大寒手足
冷便利溺清汁出不渴為寒身熱足冷煩燥脉洪為
熱面白斑唇紅能食者內有蟲痛有休止者有塊往
來上下行吐木者亦蟲蟲覺上胸喉者宜吐出之服



藥不出者宜安之手足清至節不治

胸痛肝病虛則胸痛引背脇實則胸痛善太息脉沉遲者寒痰虛痰按之滿痛者熱痰實痰胸脇痛引肩者火邪痛引少腹者金邪肩背痛屬肺肩背胛痛屬小腸背痛兼噫驚屬陽明厥陰皮膚痛肺主皮皮者絡之部皮焦爪枯爲手太陰絕運氣火邪傷肺治以寒


煩躁煩是有本熱躁是無根火煩躁厥逆不安死獨煩不躁屬熱惟悸而煩爲寒獨躁不煩屬寒惟火邪

躁爲熱起臥不安謂之煩煩熱怔忡心亂者安神但煩熱者清肺去痰煩于下利後者吐之熱助心實煩寒制心虛煩金攻肝虛煩土攻腎虛煩木攻脾虛煩煩躁欲坐井中口渴手心熱脉伏爲火不渴手不熱脉虛爲寒煩不得眠欲飲補虛短氣虛悸者補之譫妄運氣火助心實者宜鹹寒寒攻心虛者宜甘

卒中醒後譫妄者爲中風卒中惡或脹滿吐利者爲諸血嘔血傷于血氣氣逆而血隨嘔出也脉數者逆

脉弦細遲。色紫為寒。弦花相搏者。亡血。諸見血脉實。大者死。沉細者生。身熱脉大死。身涼脉靜生。衄鼻出血也。衄而頭汗者死。吐血氣血不能攝血。有熱補中降火。血見黑則止。挾痰者開痰降火。血虛隨火上行。行血則血歸經。痰積者下之。血紫氣塞上者下之。暴吐紫血塊許無事。肺虛以補養為主。宜酸收之。肺盛宜辛散之。熱傷肺者宜酸寒。濕傷腎者宜苦熱。肺虛汗多。忌生薑。伏梁唾血不治。唾膿血脉虛數。胸無痛者為肺痿。脉實數。胸隱痛者為肺癰。咯血不嗽而咯

出血也。咯與唾少異。唾出于氣上無所阻。隨唾津而見。咯出于痰氣鬱于喉嚨之下。滯不得出。咯乃得出也。此俱屬腎。下血大法。血清色鮮者腸風。血濁色黯者藏毒。血射如線者蟲痔。蟲痔宜熏。天腸虛者升陽益胃。腹不痛為濕毒。腹痛為熱毒。寒濕便血。脉虛澁者為結陰。下血身涼血寒者生。身熱血溫者死。腸澼脉沉小滑生。浮大懸絕死。其血另作一派。四散如篩是也。腸風初起下血色鮮是也。藏毒久而血色黯濁是也。



諸痿肺熱生痿辟足皮毛敗大法諸痿皆生于肺熱
筋痿白淫口苦筋攣爪枯得于入房太甚肺痿澀血
樞折色赤絡脉溢得于所求不得骨痿腰脊不舉色
黑齒稿得于勞倦逢大熱肉痿口渴不仁色黃肉蠕
音得于居處濕地治痿在瀉南方補北方東垣以黃
藥佐參耆朮草等藥補氣丹溪以乾薑龜栢鎖虎等
補血又法補虛退濕熱無擇治痿獨補虛脾實痿四
肢不舉脾虛痿四肢不用解休即痿病
卒中暴厥身脉動而形無知為尸厥氣厥不治自愈

目開口張手撒失便溺為虛目閉口噤手拳為表實
宜發表腹卒滿痛為裏實宜吐下中于酷暑為暑中
于嚴寒為寒汗後血後昏迷為鬱冒鬱冒多生于婦
人漏血之虛運氣熱冒治以鹹寒寒冒治以甘熱診
脉乍大乍小為鬼祟脉濡為厥脉浮散為虛脉浮弱
為暑唇青身冷死身溫汗出生婦人病異脉濡緊為
帶下脉沉微為血厥

自汗不任外寒為陽虛脉澀滑亦為陽虛陽虛甚者
參耆桂附胃燥熱者瀉陰火汗多惡風者為中風音



本草匯 卷五
如瓮中出者濕勝

內傷飲食大法輕則內消重則徐下脉緊盛宜下微
弱宜溫痞不能食傷寒下早為痞雜病下多亦痞實
痞便閉厚朴枳實虛痞便利芍藥陳皮飲食傷者宜
消導及吐之治痞獨益脾土升胃氣戒暴下脾氣鬱
結飲食傷脾無形氣證以苦泄之有形血證以甘散
之不能食脾虛難任飲食脾虛有積不食邪淺參朮
枳朴邪深參朮巴霜饑不能食胃熱腕寒

痰百病皆生于痰運氣痰飲皆屬濕四飲素盛今瘦

為痰飲欬引脇痛為懸飲身體疼重為溢飲欬喘
氣為支飲脉軟散是飲脉澁為飲脉沉冷汗眠起不
安是痰眩暈是痰噫酸是痰喉中有物咯咽不去是
痰身有塊是痰臂動不得是痰眼灰烟黑色是痰風
痰多見奇病濕痰多見倦怠熱痰多見外症痰吐不
出者難治治痰忌利藥過多

消渾上消大渴多飲中消善飢而瘦下消燥渴小便
如膏大法熱渴分虛實熱能食為實熱不能食為
虛熱渴分濕燥熱小便不利為濕熱小便頻數為燥

本草綱目 卷五
熱運氣熱助心盛渴治以寒寒攻心虛渴治以熱中
消因數食甘美所致食飢即消中病胃熱則消穀善
飢大腸熱則消水善飢運氣消中皆屬熱下消皆屬
腎虛瓜蒌根治消渴要藥

黃疸大法表裏諸疸但利小便疸而腹和脉浮者宜
汗之疸而腹滿汗出大小秘亦宜下之疸而腹痛嘔
者和之小便不利無汗為實小便自利自汗為虛小
便色白不變為無熱小便色變黃赤為濕熱運氣黃
疸皆屬濕熱女勞疸額黑手足熱小便利酒疸心熱

懊懣小便不利穀疸食即頭眩小便不利

腹鳴腹鳴食少為脾胃虛疾行則鳴為漏水

嘔吐鬲氣大法食已暴吐為嘔吐朝食暮吐為鬲氣

有物有聲為嘔血氣受病也上壅表實者宜辛瀉壅


胃虛胸閉者宜甘益虛大便不通者硝黃微利之穀

氣久虛者食飲和之腸鳴痞滿者瀉痞嘔而腹痛為

寒運氣火熱嘔治以鹹寒甘寒風嘔治以辛涼甘溫

酸風火嘔治以鹹辛酸寒濕嘔治以甘熱有物無聲

血病也脉浮洪者先降氣氣降便結者微下之



困弱者獨參。實熱者大黃。無物有聲爲乾嘔。氣病也。
厥厥者辛散。不息者甘緩。其聲濁惡而長爲噦。欲吐
不吐清水上溢爲惡心。生薑半夏水入則吐爲水逆。
吐酸吞酸。蒼朮治吐酸要藥。三錫云吞酸是膈間酸
味刺心。吐酸是吐出酸水痰涎也。丹溪論吐酸爲熱。
吞酸爲寒。東垣論吐酸吞酸皆爲寒。嘈雜似饑不饑
似飽不飽而有不自寧之况也。噯氣卽打噯。皆脾不
運濁氣阻塞所致。關格寒在上焦吐逆爲格。熱在下
焦便逆爲關。鬲噎血稿在上爲噎。血稿在下爲鬲病。

噎當內觀。鬲噎原于有升無降。仲景治氣不用香燥。
狂癲自得自尊。欲閉戶牖而處。妄言妄走爲狂。直視
僵仆爲癲。大約心熱極則病癲。肝熱極則病狂。

面熱面寒。面熱爲胃熱。面寒爲胃寒。面青面塵。運氣
燥金。面塵嗌乾宜溫。

積塊癥瘕。大法諸積皆生于陰虛。潔古補虛爲主。丹
參補中帶磨。虛甚者補多于磨。不甚者補磨相半。塊
積寒消之。寒積熱消之。塊在五藏。肝積氣曰肥氣。

素問定在兩脇脇面青脉弦長難經定在胃脘如覆
 盆心積氣曰伏梁素問定在中面赤脉數實難經定
 在心下如臂脾積氣曰痞氣素問定在大腹面黃脉
 大虛難經定在胃脘如覆盆肺積氣曰息奔素問定
 在胸中面白脉數虛難經定在左脇下如覆盆腎積
 氣曰奔豚素問定在小腹面黑脉大實難經定在小
 腹如奔豚塊分積聚積有常處屬藏聚無常處屬府
 少腹脹滿氣血腸覃寒與氣搏于腸外經事時下石
 痕寒與血搏于胞中經不時下血分即石痕之屬先

經斷後脹血分脉沉滑者實熱先腹大後四肢腫為
 脹大法胃脹宜溫中行溼鼓脹宜補虛行溼按不痛
 為虛痛為實時減宜溫不減宜下治脹必須補氣血
 為主禹餘糧丸治脹切當須隨證加減因積成脹者
 補氣消積盛壯人宜行溼開鬼門脉沉洪便結者宜
 微利肢厥脉弦細為寒脉弦細脇痛者宜溫散口渴
 脉洪數為熱氣分大腹滿先脹後經斷血分小腹滿
 經斷後脹腹腫肢不腫為脹先自足腫後腹大為
 水仲景法者木桂甘以補陽下先腫者防冬潔淨府

本草匯編 卷五 雜症病機畧 三 每花與



死手足溫者生厥者死利魚腦屋漏純血死忌恣飲
食脾虛不任飲食忌枳實久利謹寒初利謹補虛寒
人忌黃連地榆

飧泄脾虛滑腸下陷為飧泄治飧泄先宜奪食次用
升柴升陽炒麩化食反胃加乾薑肌肉消盡勿治汗
出肢厥脉虛細為寒身熱口渴脉弦為熱脾土泄瀉
皆屬脾虛寒則驚澹飧泄熱則腸垢出黃食少困倦
脉弱弦為虛潔古補脾和胃丹溪補脾行濕脉弦者
升陽除濕臨泄必痛者實無痛日久者虛滑暴泄澹

驚為寒身冷便滑不渴脉沉遲為寒身熱便赤口渴
脉洪數為熱

泄瀉分四氣滯下屬熱泄瀉屬溼久泄屬風暴泄屬
寒隨證施法裏急後重惡寒木苓芍桂連困倦食少
木芍苓脉實宜下脉浮忌下脉細宜溫閉甚宜調分
上中下上部血煩燥先便後血須黃芩下部血脉沉
先血後便須地榆中部血脉沉腰臍痛須黃連分寒
則腹滿驚澹宜溫熱則大渴引飲宜滲虛
則泄出不禁宜澁實則虛坐努責宜調分經太陽溫

熱宜涼膈陽明後重宜承氣太陰需泄宜四逆少陰
虛滑宜石脂厥陰久泄宜續命東垣謙甫法傷冷食
殮泄溫而清之傷熱食便血寒而疎之風邪陷升舉
之溼氣盛分利之滑泄脉細溫之收之後重脉實下
之寒之難經法胃泄不化宜下脾泄脹嘔宜溫大腸
泄色白宜溫小腸泄膿血宜下大瘕泄後重宜下諸
泄利皆用朮芍為主隨證加藥

欬嗽大法南星半夏勝其痰而欬自安枳殼陳皮利
其氣而痰自下仲景法脉浮發表脉沉解裏丹溪法

脉浮惡寒頭身疼解表欬即能出痰者宜燥脾連欬
不能出痰者宜利肺形肥有汗脉緩者宜燥脾形瘦
無汗脉澁者宜潤肺飽則欬酸搶欬宜溫脾酒人欬
傷肺欬宜解肺面部黃白者食積痰欬沫欬血咽燥
為肺痿肺痿得之亡津液欬沫咽不燥者非肺痿上
氣而燥為肺脹面赤腹脇熱脉洪大者熱痰面白脇
肋痛脉弦微者寒痰夏嗽發寒熱為熱火熱嗽冬嗽
發寒熱為寒傷冷嗽風頭運目眩者風痰不能食為
虛陰虛咳者四物能食為實陽虛欬者參耆痰在腸

本草匯 卷五 雜症病機畧




胃脉沉實者宜下痰在胃鬲脉浮弦者宜吐乾欬嗽
大法開鬱補陰欬嗽中作聲喉如軒音翰聲爲虛喉如
水雞聲爲實

喘大法未發扶正氣已發攻邪氣喘而自汗者宜補
氣喘而無汗者宜發表大便秘者下之有鬱結者解
鬱發時有痰吐出者化之發時痰閉不出者開之氣
從小便衝上者衝脉之火丹溪獨補陰降火東垣分
冬熱夏實行動則喘者亦衝脉之火脾胃腎諸喘皆
屬肺肺虛則少氣而喘宜補氣肺痺肺積則久喘肺

痺宜宣通其氣肺積宜消磨其氣胃熱煩而喘腎喘
欬而喘運氣金助肺則氣盛而喘治宜溫火攻肺則
少氣而喘治宜寒喘不得臥脉浮按之虛熱者忌下
感冒風寒氣壅者表散唾濁多痰者化痰脉沉而大
者行之多年不已者墜痰劫痰息有音者陽明逆產
後喘下血過多爲孤陽絕陰惡露不快爲敗血熏肺
有憂鬱者爲肺裏鬱發見表證爲外感傷鹹冷爲內
傷

痔東垣治濕熱風燥四氣丹溪主于涼血番花痔頭



向上是大腸熱甚癢者補虛去蟲血不止者止血憂
怒即發者調氣痛甚者微利之調之熏之

腰痛大抵寒濕多風熱少寒熱腰痛皆本腎虛脉虛
及房勞人陽虛脉大及膏梁人陰虛瘡痢後痛為虛
經行後痛為虛少腹拘急小便不利者利之積氣凝
滯脉沉有力者下之得于冷臥濕地為寒濕平日膏
梁厚味為濕熱腰連脊項痛為太陽經不行

舌瘡音邪入陰則瘡舌不轉運痰涎乘虛閉塞舌本
之脉道而瘡中風熱則舌縱不語中風寒則舌強不

語喉瘡喉中聲嘶疎泄肺壅開結痰

諸厥大法寒熱二厥皆本腎虛陽虛寒厥陰虛熱厥
二厥皆宜斷欲熱厥手足熱寒厥手足寒脉沉實數
為熱脉沉細微為寒脚氣頑麻腫痛為肝厥足痿軟
不收為痿厥

脚氣冲心陰虛有火少腹不仁者補腎心悶便澀者
利氣

大法聾而面頰黑者腎虛聾而少氣嗌乾者肺
虛聾而多恐及病後者肝虛聾而頭痛耳內氣滿者

氣逆。鬲有痰滯者。下之。風熱耳聾。為心竅虛寒。暴聾。虛邪厥逆。耳鳴。皆屬風火。耳腫痛。皆屬火。

齒痛。大法。牙得清涼。痛甚者。為寒。口吸涼風。痛止者。為熱。

遺濁。大法。精滑。專主熱。脈洪。有熱者。八物吞檮皮。九等清固之。脈虛面白者。八物吞巴戟。九等溫固之。龍牡。不已者。五倍最良。神浮者。辰砂鎮心。痰逆者。猪苓。導溼。陰虛者。黃蘗。蛤粉。陽虛者。遠志。鹿茸。陰陽俱虛。珍珠定志。數旬。一遺。清之。不止。為虛寒。宜遠志。高蒲。

遺不滿旬。澁之。反甚。為鬱滯。宜猪苓。導赤。白濁。皆屬溼。大槩。二陳。二朮。胃氣弱者。梗參。升柴。白濁。溼傷氣。赤濁。溼傷血。

恐驚者。不自知。聞響則驚。恐者。自知。如人將捕。腎主恐。肝膽虛。則恐。因恐得之。為傷腎。收而恐。為膽虛。恐。如人將捕。補足少陰。恐而目昏耳聾。補足厥陰。少陽。

本草匯卷五 終

本草匯 卷五 終 惟在病機畧 三十一 補劑



本草匯 卷五 內容文字 (Faint bleed-through text from the reverse side)

本草匯卷六目次

傷寒病機畧

太陽六證

陽明十一證

少陽五證

太陰三證

少陰五證

厥陰五證

合病併病汗下吐後等證


四時傷寒

婦人傷寒

婦科病機畧

治法通論

胎前



產後

外科病機畧

腫瘍

潰瘍

久漏瘡

癰疽所發部分各狀不

同

丹毒瘰癧

幼科病機畧

通治

痘瘡治法通論

雜證對畧

本草匯卷六

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯


男 樹哇馨肝

姪 維均梅在 參閱

紫藤陳陸坤白筆校訂


傷寒病機畧

傷寒通論大法三日前病傳三陽宜汗三日後病傳三陰宜下若三日前脉靜無陽明少陽證不傳陰若三日後能食不嘔者不傳陰三日陰陽病俱傳曰兩



感三日脉微小身和者欲解七日傳經盡當病衰若
 七日脉大躁煩者解七日無熱躁煩者傳陰若更感
 異氣者變他病欲攻當先表後下汗證汗下後汗證
 不罷者再汗和證下後和證不能者復和汗下大法
 汗下吐後陰陽自和者愈仍不解者為壞病下後便
 硬者陽多清穀者陰強診病解病解必先煩或口噤
 不言脉微小身和者欲解寸關尺同等者當愈能飲
 水者欲解未藥脉數大藥後脉遲小愈三陰病脉浮
 長欲愈三陽晝解三陰夜解脉浮緊按之芤當戰而

汗解脉浮大按之不芤當不戰而解脉微當不戰不
 汗而解診生死陰病陽脉生陽病陰脉死脉盛汗出
 不解死脉虛熱不止死禁忌諸脉沉及尺脉遲忌汗
 諸脉浮外實外未解及諸虛忌下諸脉濡弱微澁忌
 汗下諸脉浮數忌火便溏忌梔子無汗忌桂枝有汗
 便數宜桂枝誤下諸變不可勝數表裏發熱惡寒體
 痛脉浮為表發熱惡熱便硬腹滿脉沉為裏寒熱往
 來脇滿脉弦為半表半裏陰陽頭痛身熱脉浮洪為
 陽吐利厥冷脉微為陰汗下分緩急脉浮有表為表



本草匯 卷六
二
之表宜急汗。脉沉有表。爲裏之表。宜緩汗。脉浮有裏。爲表之裏。宜緩下。脉沉有裏。爲表之裏。宜急下。汗下但當隨證。不可拘日數。不可表。不可下。不可和。頭項支節不痛。和表解。無發熱。惡熱。和裏解。寒熱移時。和半表半裏解。

太陽病

發熱惡寒惡風頭痛項強身體痛

脉浮緩有汗者。中風。宜桂枝發之。脉浮緊無汗者。傷寒。麻黃發之。風見寒脉。寒見風脉。宜大青龍發之。太陽病。不惡寒。兼渴者。溫病。兼汗出者。柔瘧。表不解者。

卽太陽病。心下支結。柴桂。脇滿而渴者。柴胡。水氣在

欬者。小青龍。心下痞者。先解表。後攻痞。脹利者。先溫

裏。後解表。卒口噤。背反張者。瘧病。不狂。不秘。不反張

者。陰證。太陽解時。從巳至未。太陽病。脉同等者。必解。

太陽病。血衄者。愈。太陽未解表。忌下。

瘧音至。瘧音勁。上聲。同病。兩音。

發熱。惡寒。脉浮爲表。惡熱。汗出爲裏。脉細而嘔爲半

表。半裏。咳喘爲表。不解。渴者有表。有裏。汗之仍熱。脉


浮數者。更汗之。但熱蒸。心下硬者。下之。多汗。多眠。息

鼾者。風溫。悸。澀。眩。振者。真武。溫之。發熱。厥逆。下利

者四逆脉躁不解不食者死下之仍熱脉浮者更汗
 之心滿小便不利者芩朮心痛煩懊懣者梔豉發熱
 脉浮浮滑者白虎浮遲利清穀者四逆發熱厥逆下
 利者為陰陰陽脉浮有表屬陽者青龍葛苓脉微厥
 逆屬陰者通脉四逆發熱下利面赤微厥者汗出解
 厥躁死汗出不止死消穀不便者抵當傷寒續法丹
 溪補兼發散隨所現證加藥寒多者加薑桂熱多者
 補散加苓栝痰積者補散加消導海藏以神木代麻
 黃以白朮代桂枝潔古以黃耆代桂枝以川芎代麻

黃惡熱而渴有二傷寒宜白虎雜病宜補陰立夏前
 忌白虎

惡寒不當風而增寒雖身熱而不欲去衣者是也發
 熱惡寒脉浮屬太陽無熱惡寒脉微屬陰症惡寒身
 蹇利止肢溫生自利肢厥死時煩去衣生四逆無脉
 躁者死大汗下利者四逆口躁者白虎口和者附子
 惡寒發逆頭汗便硬者柴胡背惡寒中暑而渴者白
 虎汗後惡寒為虛下後惡寒心下痞者桂枝瀉心痞
 而汗者附子瀉心禁忌惡寒為表未解忌下惡寒使



數脚欒忌汗又忌近火

惡風當風而增寒也發熱惡風屬太陽惡風脇痛而渴者小柴胡

頭痛發熱惡風屬太陽頭痛不大便便赤者承氣便清者桂枝頭痛發熱脉弦細者小柴胡脉反沉者四逆頭痛乾嘔吐逆沫者加茱萸表解脇痛者十棗小便利欬厥者寒邪頭痛吐利爲霍亂頭痛發黃爲濕丹溪補兼發散活人葱白發散海藏太陽頭痛無汗麻黃有汗桂枝陽明頭痛白虎少陽頭痛小柴胡太

陰頭痛脉浮桂枝脉沉理中少陰頭痛脉沉發熱麻黃附子細辛厥陰頭痛外傷本經桂枝麻黃各半

項強發熱惡風項強屬太陽項強脇痛發熱而渴小

柴胡下後身熱小便難忌柴胡項強背反張者爲瘧

身體痛發熱惡寒身體痛屬太陽純太陽者麻黃大

青龍兼肢結者柴胡桂枝兼下利者先四逆後桂枝

八下脉遲者血少體痛脉沉發熱者四逆肢寒者附

體痛吐利爲霍亂體痛厥逆自利者四逆渴者中

暑體痛面青咽痛爲陰毒濕痺身疼發黃爲濕痺脉

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

沉小便閉者甘附五苓下後額汗大小利死身疼不能轉側屈伸爲風濕不得屈伸者甘附不能轉側者桂附大小便利者木附身重汗出者防已發熱日晡劇者麻黃

陽明病

胃實不大便自汗手足汗不得臥潮熱譫語狂亂捻本摸牀渴嘔乾嘔

陽明爲胃家實能食名中風不能食名中寒忌攻解時從申至戌胃實嘔多面合赤色心下硬皆忌攻之胃實有表者先解表頭痛惡寒脉浮者宜汗有汗桂枝湯無汗麻黃湯脇痛脉浮弦者宜和口渴脉浮緊


者宜和胃實解表無裏證者忌攻硬者導之潮熱少攻之先試小承轉失氣者可攻不轉者忌攻譫語者攻之腹滿痛者攻之胃實解表有裏證者隨證攻心煩者調胃小便不利發黃者茵陳不臥者承氣喜忘屎黑清穀者抵當目不了者承氣胃實反無汗虛邪厥者寒邪脉浮者麻黃身黃者茵陳胃實脉浮數能食名陽結脉沉遲不能食名陰結胃實欲寐者少陰自汗不因發散而自汗出也汗出身熱不惡寒爲裏兼便硬譫語者下之胃實汗多者急下之兼脉浮緊

口苦者忌汗下宜和解海藏太陽自汗桂枝陽明自汗白虎少陰自汗四逆似陽明外證有二柔瘥似陽明而身反張吐後似陽明而關脈細不惡寒屬裏惡風寒屬表汗後汗出身重多眠語難者風濕煩躁不眠欲水者胃乾厥逆惡寒者四逆身熱汗不止死脈微汗少者和汗多者過汗多渴者忌猪苓汗出小便數忌桂枝自汗身冷脈疾細者白虎湯加桂自汗筋惕肉瞤者防朮牡蠣

手足汗潮熱便硬為熱不食初硬後溏為寒

不得臥小閉大難不得臥者大承氣汗後不得臥水者與水汗下後不得臥反覆懊懣者梔子豉晝躁夜靜無表證脈沉微者薑附少陰欲寐變不得臥二三日變者黃連阿膠湯始不利不煩變自利煩躁不寐死六七日變嘔渴者猪苓厥利不臥死下利心煩不臥酸棗仁湯

潮熱若潮水之潮其來不失時也一日一發發于日晡時者為潮熱屬陽明若三五日發者即是發熱非潮熱也胃實表解而潮譫語者宜下不解者承氣



結胸者陷胸。便澹脇滿。脉弦浮而潮者。宜和。未和者。柴胡。和後者。加硝。

譫語。亂語無次第。數數更端也。鄭聲。鄭重頻煩也。只

將一句舊言。重叠頻言而終日不換也。陽明胃實。潮

熱譫語。宜下。下後轉氣為實。不轉脉濇為虛。實則譫

語。素註為氣虛獨言。全善用參朮者。歸虛實不虛則

鄭聲。汗後譫語。便硬胃不和者。宜下。汗多亡陽者。忌

下。宜和。脉短者死。和者生。目眩者死。火後譫語。脉浮

忌下。不大便者。液枯。振慄自利者。欲解。汗下

語為壞病。胸滿譫語。下後煩驚者。宜和。直視喘滿。死

下利。死。脉浮肢温。生。脉沉肢冷。死。便利肢厥。脉微妄

語。為便秘。肢温脉洪。妄語。為熱。

狂亂。大汗後狂亂者。鎮墜之。少腹滿身黃發狂者。畜

血。狂言遺尿直視死。狂而脉實者。為實熱。狂而脉虛

者。為虛熱。

捻衣摸牀。脉弦者生。澁者死。便利者生。不利死。

渴不惡寒者。陽明温病。渴似陽明而有太陽渴而下

利者。少陰消渴吐蛇者。厥陰忌下。宜少飲水。小便不

本草匯 卷六 傷寒病機畧 八 每七與



利而渴脉浮發熱者五苓猪苓頭汗者柴胡茵陳表
不解欬而渴者小青龍暑渴似表而足冷肝乘脾似
表而腹滿表解而渴者白虎渴而脇滿往來寒熱未
汗下者柴胡若汗下者柴胡薑桂渴而心下硬硬而
痛不大便者大陷胸硬而痞小便不利者五苓欲飲
不渴者文蛤散文蛤即海蛤粉也渴不能飲者下熱上寒渴
欲飲水水入則吐者五苓渴欲飲水者少少與之診
下利渴者脉弱數愈渴脉浮弱汗出愈禁無汗表不
解渴忌白虎汗多表解渴忌五苓虛渴而食少者和

胃忌涼

嘔食穀欲嘔者陽明腹痛欲嘔者胃有邪嘔而發熱
者柴胡兼惡寒節疼心結者加桂兼脉緊者麻黃嘔
而寒熱腸痛不下利者小柴胡下利者半苓薑嘔而
鬱微煩下而和從心急者大柴胡極吐下後胞痛腹
滿者調胃先渴却嘔屬飲兼惡寒頭痛鼻乾者葛根
嘔而下利嘔而厥嘔而心煩不臥汗下吐後者梔豉
未汗下吐者猪苓嘔多忌下忌服桂枝湯
乾嘔發熱汗出鼻鳴者桂枝水氣而欬者小青龍乾

嘔脇痛表解短氣者十棗往來寒熱柴胡乾嘔下利
身涼脇痛者十棗痞滿腹鳴者瀉心脉微厥逆者通
脉乾嘔厥逆為陰脉微不利者通脉脉強不利者四
逆乾嘔涎沫為飲乾嘔不止為虛

少陽病

耳聾口苦咽乾眩
往來寒熱胸脇滿

胸兼脇痛屬少陽但胸痛下利屬實未吐下脉滑利
數者宜吐吐下後腹滿便澹者宜下

耳聾不經汗宜和重發汗宜補

口苦咽乾少陽為病口苦咽乾目眩耳聾胸滿者忌

吐下脉強發熱者忌汗解時從寅至辰

眩少陽眩口苦宜和汗後眩為虛振振者真武肉瞤
者建中言亂者死眩脉沉緊忌汗

往來寒熱屬少陽兼脇滿心煩乾嘔者小柴十餘日


熱結在裏者大柴汗下後往來寒熱脇滿頭汗小閉

渴者柴桂薑脉微遲者亡血脇滿乾嘔寒熱者少陽

脇滿惡風項強者兼太陽未下而渴者宜柴胡脇滿

胃實者陽明脇滿潮熱者陽明大便自澹者柴胡脉

浮細嗜臥者柴胡



本草匯 卷六
脇滿少陽口苦耳聾脇滿者柴胡喘而胸滿者麻黃
少陰咽痛脇滿者猪膚下後脇滿脉促者桂枝煩驚
者柴胡舌胎者溫痺胸窒塞似滿者桅鼓胸痞硬似
滿者瓜蒂

太陰病

此吐利下利三門並附入少陰病蓋此三門之病本屬太陰病因在少陰者居多故附入少陰也

腹滿太陽為病腹滿時痛吐利忌下下後轉屬太陰者桂加芍藥脉浮者桂枝設行大黃芍藥宜減少解時從亥至丑腹滿吐利宜溫霍亂作利者理中下利

身疼者先溫裏後攻表腹滿大小閉宜利大閉者承氣小閉身黃者茵陳脇病柴胡腹滿不減為實時減如故為虛腹滿脉浮但浮者桂枝浮弦脇痛者柴胡浮緊口苦者忌汗下腹滿脉遲小便難者忌下潮熱者宜下腹滿汗出身重難轉側者白虎腹滿汗出不惡寒脉遲潮熱者宜下脉浮口苦者忌汗下汗後腹滿吐後腹滿嘔而胸痛者調胃臥起不安者桅朴不能食者為虛腹滿脉沉細無力者理中有力者承氣腹痛腹滿痛吐利者為太陰熱頭痛發熱者霍亂腹

本草匯 卷六 傷寒病機畧 上 每花與



本草匯 卷六
二 和 和
滿痛不大便陽證但繞臍痛者承氣從心至少腹滿者陷胸腹痛下利為陰肢重痛者真武便膿血者桃花利清穀者四逆腹痛厥逆為陰逆者四逆散厥者四逆湯腹痛欲嘔為陽無寒熱者黃連有寒熱者柴胡腹痛欲吐不吐欲瀉不瀉為乾霍亂此正氣擁閉陰陽隔絕其證最凶直指薑鹽同炒加童便溫服

黃濕熱黃小便不利色如熏黃身重者為濕色如橘黃無痛者為熱身黃脇痛便難汗後身黃下後身黃頭汗者茵陳腹滿脉遲者忌下脇痛不食者忌柴胡

畜血小便自利少腹硬如狂大便黑者畜血不硬不狂不黑者非血身冷汗出脉沉而黃為陰便赤能食而黃為濕熱鼻寒而黃為濕在頭

少陰病

但欲寐嗜臥口燥舌乾咽痛吐利下利

但欲寐嗜臥始得欲寐病一二三日發熱脉沉者微汗之無他證者微汗之口和背寒者附子口燥咽乾者承氣得三日者以上至四五日變不寤者連膠腹如使膿血者桃花腹痛不利者真武得六七日腹脹不使者承氣變欲欬嘔渴不眠者猪苓變自利煩燥

本草匯 卷六
三 和石
不眠死變息高死得七八九日脉緊自利肢溫者愈
通身熱者使血厥逆欲寐無汗者忌汗惡寒身踈無
脉躁者死利者亦死利後重者四逆薤白無脉者通
脉白通身痛者附子脉沉欲寐者四逆兼體痛肢寒
者附子兼發熱者麻附辛解時從子至寅惡寒時欲
去衣可治利止眩冒死脉浮者欲愈脉細沉數者忌
汗下陽證脉浮嗜臥無汗脇痛者柴胡脉但浮者麻
黃汗出身重者風溫盜汗者合病目開欲眠爲狐惑
口燥舌乾但欲寐而燥者少陰身體熱而燥者陽證

表解無痛者白虎心下滿痛者陷胸燥欲嗽水不咽
者衄咽乾多眠目不閉者狐惑

咽痛咽痛欲寐者少陰熱者甘草桔梗寒者半夏散
湯咽傷聲不出者苦酒咽痛吐利爲少陰毒咽痛面
赤斑者陽毒面青黑者陰毒眩而欬者咽痛不欬者
咽不痛先厥後熱利止者喉痺不止者喉不痺咽閉
忌汗下伏氣先咽痛後下利

附吐吐食腹滿痛者太陰欲吐不吐但欲寐者少陰
肢寒有物出者宜吐無物乾嘔者宜溫六日變燥利

本草匯 卷八
不得臥死腹滿欲吐者黃連解後欲吐者竹葉吐沫
頭痛者茱萸吐水煩渴者五苓吐下後吐入口卽吐
者薑連芩參朝食暮吐者小逆汗後吐脈數者客熱
胃冷厥逆者乾姜吐膿血者內熱
附吐利吐利無寒熱頭痛爲陰腹滿吐利者太陰欲
寐吐利者少陰汗出清穀脈微者四逆汗出咽痛者
亡陽無汗厥逆者茱萸肢溫者生逆者死欲寐嘔利
者少陰欬渴變不眠者猪苓小閉肢重疼者真武脈
微汗出者灸之徐成嘔利去小者傷氣未汗者黃芩

汗不解者大柴水藥不入者逆暴發吐利去多者
亂熱渴者五苓汗出肢厥者四逆脈微者溫裏寒多
不渴者理中乾嘔利分陰陽脇痛痞氣者十棗瀉心
厥逆脈微者四逆白通

附下利腹滿自利不渴屬太陰但欲寐自利屬少陰
下利欲寐兼渴小便白者四逆利清水者承氣變不
眠者猪苓兼腹痛肢疼者真武兼咽痛胸滿者猪膚
厥利屬厥陰少陰汗後拘急者四逆下後咽不利者
升麻脈沉遲面赤身熱者鬱冒解愈厥利但兼欲寐

本草匯編 卷六
屬少陰下利有表脈浮爲陽身疼者先溫後表頭痛
鼻乾者葛根欬嗽發熱者青龍頭疼脇滿者黃芩下
後脈促者連苓下利清穀脈沉厥逆屬陰者通脈脈
浮不厥屬陽者四逆下後身疼者救裏救表下利便
膿血欲寐者桃花厥少熱多者當愈厥熱無汗者不
止脈數而渴者有熱下利譫語脈微肢厥欲寐爲陰
脈和不厥不寐爲陽下利裏急後重熱者白頭翁逆
者四逆散下利肢疼身痛四肢疼真武四逆通身疼
先溫後攻下利心不硬未下爲結熱宜承氣下後爲

虛氣宜瀉心下利咽痛胸滿者猪膚厥逆者通脈唾
膿者升麻下利胸痛脈滑宜吐下後利遂不止者爲
協熱利心下痞硬者理中瀉心桂參脈促喘汗者葛
芩連潮熱譫語者柴胡承氣脈大腸鳴者當歸四逆
陰證厥逆者麻黃升麻下利脈治脈滑爲陽宜下脈
微爲陰宜溫下後脈大者當歸四逆六七日忽自利
肢溫自利厥者難治發熱汗不止死躁不得臥死脈
微弱數而滑者自愈大者緊者未止實者死損者難
治寒熱濕臍下寒大便青白爲寒臍下熱大便黃赤

為熱使膿血為溼汗下後下利大小利腹痛宜溫裏急後重宜下氣逆宜和

厥陰病

氣上撞心飢不欲食吐
蚘虫厥少腹滿囊縮


厥陰為病氣上撞心疼吐蚘欲飲水者少少與之脉浮欲愈不浮未愈解時從丑至卯氣上撞不吐蚘者陽證衝咽不得息者瓜蒂拘急者燒裊往來寒熱者奔豚卒口禁者剛症

饑不欲食兼吐蚘厥冷者厥陰吐蚘者忌下厥冷脉結者宜吐吐下後者陽證吐後吐食者中逆下後懊

懷者梔豉

吐蚘蟲兼氣撞心疼或厥冷者厥陰汗後者陽證病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘烏梅丸

厥厥陰先厥而後熱者為寒先熱而後厥者為熱脉細弱而厥為寒脉滑而厥為熱脉促脉微而厥宜灸脉結脉緊而厥宜吐脉沉而厥體痛者附子頭汗者柴胡悸心熱厥者茯苓甘草逆者四逆桂吐而厥汗後者甘薑食入則吐復不能吐者宜吐利而厥下重者為熱脉微沉為重寒吐利而厥為寒寒熱者四逆



本草匯編 卷六
六
梅在岫
煩躁者茱萸吐利止脉微者通脉渴而厥爲暑躁煩
而厥躁無暫安爲臑厥靜而復煩爲虵厥少腹滿痛
而厥爲寒四逆無脉皆速死厥多熱多病進厥少熱
多病愈厥與熱相應亦愈熱少厥微欲食愈先熱後
厥者宜下忌汗先熱後厥脉滑惡熱口渴大秘小赤
爲熱得痛病厥脉微惡寒不渴自利清便爲寒厥脉
沉疾有力宜下沉遲無力宜溫厥脉浮大者死寒厥
冒脊忽無力者必有汗天寒證寒宜熱之天熱證熱
宜寒之天熱證寒宜從中治

少腹滿囊縮脉沉短者厥陰宜下按之痛肢厥者膀胱
冷結少腹滿小便利者畜血不利者畜飲從心至
少腹滿爲結胸厥陰煩滿囊縮脉浮者宜汗脉短者
宜下脉緩者宜和煩厥囊縮厥逆爪青大小利發熱
引飲宜下大小利不熱不渴宜溫陰氣獨盛變陰毒
咽痛面青爲陰毒仲景治陰毒主發毒活人更爲陰
毒傷寒主退陰陰毒脉沉細疾陰毒漸深爪青面黑
凡七至沉細陰毒沉困脉入至附骨方有

傷寒人病併病汗下吐後等病喘身重盜汗遺尿面赤筋惕肉

傷寒病機畧

海

關戰慄振搖心悸結胸痞煩煩躁發小便不利
小便數嘔無汗頭汗舌白胎鼻翳衄血唾血畜
血短氣心痛
除中痛狐惑

合病必下利 太陽少陽合宜和 太陽陽明合宜表少
陽陽明合宜下 太陽陽明併病 太陽不罷宜汗 太陽
證罷宜下

喘發熱脉浮為表無汗胸滿者麻黃有汗者桂加朴
杏欬嘔者青龍潮熱腹滿大小秘脉沉為裏汗後喘
汗出無大熱者麻杏飲水多者停飲脉沉大便難者
裏實下後喘無大熱者麻杏利不止脉促者葛芩表

未解者桂杏額汗大小便利死但欲寐息高死汗油
髮潤喘不休死

身重身重汗出不惡寒口苦脉浮緊者宜和而垢遺
尿者合病多眠脉浮者風濕潮熱者宜下身重汗出

者惡風寒脉者風濕脉虛而渴者中暑身重為陽
四肢重為陰一重無汗脉浮緩不欲寐者青龍下後

心悸者自汗身重不能轉側為熱濕腹滿汗出者
白虎胸滿煩驚者柴胡身疼不能轉側為風濕盜汗

傷寒盜汗者非若諸病之虛由其邪氣在半表半裏

本草匯

卷六

傷寒病機畧

六

海乾真



使然也。

遺尿遺尿身重汗出腹滿譫語者合病多眠息鼾者風濕衛氣虛脉微惡寒數欠遺尿者衛氣虛欬而遺尿忌汗大汗失溲者欲解直視遺尿者腎絕。

而赤面熱赤煩躁短氣脉澁者汗不徹身癢脉微遲者陽虛口禁背反張者瘧病赤斑如錦咽毒痛者陽毒虛寒而赤下利厥脉微者爲陰而赤者忌下。

筋惕肉瞤汗後者與武建中汗下吐後者難治戰慄振搖戰者身爲之戰搖也慄者心戰是也戰之與慄

戰外而慄內也又云戰爲正與邪爭爭則鼓慄而戰搖但虛而不至爭故至聳動而振也戰與振振輕而戰重也汗後虛振振搖者苓桂振振躡地者真武未汗戰振爲欲解平居忽戰慄者初中邪。

心悸汗後心悸眩悸者真武心欲安者桂甘讞語者調胃臍悸者苓柏下後心悸身重尺微者自愈悸而驚者氣血虛小便不利及飲水多而悸者停飲先悸後煩及脉結代而悸者氣虛。

結胸結胸皆心下滿痛大結胸不按而痛小結胸按

本真津 卷六
之而痛。水結胸頭汗無大熱。熱實結胸。潮熱寒實結
胸無熱。太陽利後脈浮者。必結胸。結胸煩躁者死。結
胸脈浮。下之死。結胸藏結皆痛。寸浮關沉。下利爲結
胸。寸浮關細沉。下利飲食如故。爲藏結。結胸項強。心
下滿痛如結狀。小便不利者。苓朮氣寒不通。宜穿結
散。血結胸宜海蛤散。以枳朮理中治大小結。以半夏
茯苓治水結。

痞心下痞硬關脈浮者。大黃瀉心。惡寒汗出者。加附
子。惡寒表未解者。先解表。心下痞硬關脈沉者。半夏

瀉心。嘔利者。加甘草。噫利者。加生薑。心下痞硬嘔利
下後心煩者。甘草半夏。熱不解者。大柴胡。表解者。十
棗湯。心下痞硬下利汗後表解者。生薑。下後表裏不
解者。桂參。病解後心下痞硬噫氣不利者。旋覆下利
者。生薑。心胸痞硬氣上冲。心下支結似痞而表不解
支結者。柴胡加桂。痞滿者。先表後攻。心下滿似痞而
手足冷。脈結心煩者。宜吐。脈細頭汗者。宜和。忌心下
硬。脈浮太厲裏者。宜攻。忌汗。屬表者。忌澁。忌攻。心下
硬。胃實。忌攻。色青黃。膚黧難治。脈浮緊。誤下成氣痞。

本草匯編 卷六
三 梅補
虛滯。枳實理中。治痞最良。痞先用桔枳行氣。

煩吐下後。懊懣而煩。無燥屎而大便者。梔子豉。有燥屎而不便者。大小承氣。胃實而煩。吐下後者。大小承。不吐下者。調胃承。胸滿而煩。未下者。柴胡豬膚。汗下後者。桂薑龍桂。胸窒者。梔豉。心下滿而煩。腹滿而煩。臥起不安者。梔朴。有燥屎者。大承。胸痛欲吐。調胃。先煩後悸。為熱。先悸後煩。為虛。煩而渴。但欲寐而煩。自利便白者。四逆。脈微肢溫者。欲解時。欲去衣者可治。手足厥而煩。脈結宜吐。無脈宜溫。

煩躁。煩躁有表者。未汗已汗。皆宜汗。煩躁無表者。未汗下。心下硬。大便難。宜下。已汗下。脈沉微。無大熱。宜溫。煩躁。心下硬。未下。非結胸。宜小承。已下。是結胸。宜陷胸。因火煩躁者。為火逆。下後燒針者。龍牡。汗後振利者。欲解。煩躁厥逆。先煩後躁。可治。先躁後煩。死。獨躁不煩。死。躁無暫安。為藏厥。靜而後煩。為虵厥。初欲臥。不煩。至六日。煩躁不臥。死。煩躁不飲水。脈沉細。身冷。為寒。

欬表不解而渴。屬太陽。宜青龍。往來寒熱而欬。屬少

陽宜柴胡表解胃實而欬屬陽明但欲寐而欬屬少陰小閉肢重者真武變嘔欬不眠者猪苓欬脉散死欬忌發汗

小便不利表不解者青龍苓朮胸脇滿者柴胡牡蠣大難不臥者大承氣小便不利而渴脉浮者五苓猪苓頭汗者柴胡茵陳小便不利關節疼痛惡風不屈伸者甘附脉沉大便快者五苓小便不利無餘證勿治小便不利但欲寐利膿血者桃花四肢重者真武四肢逆者四逆

小便難汗後小便難惡風難屈伸者桂附火劫陽汗者身黃欲衄火劫陰汗者欬利譫語下後小便難脇痛身黃小便難未下宜柴胡下後忌柴胡潔古胃熱失下者便秘脉實宜承氣便軟脉微宜瀉心身寒反渴不欲近衣汗下後為虛寒宜烏附

噦汗下後噦為虛飲水得者虛寒火劫汗者虛熱皮乾薑陽證者橘皮竹茹無汗無汗發熱惡寒屬太陽喘者麻黃躁者青龍項

傷寒病機畧




強者葛根口噤者剛痊自衄者愈無汗不大便屬陽
明脉浮喘者麻黃蟲行者建中小便利厥者寒邪小
便閉黃者淤熱無汗身癢為虛無汗小便不利頭汗
身黃者茵陳脇痛身黃者柴胡心下滿痛者苓朮發
汗不出者死無汗脉浮緊忌桂枝表不解忌白虎但
厥遲忌強發

頭汗頭汗小便不利脇滿者柴胡薑發黃者茵陳蒿
頭汗心下滿便硬脉細者柴胡無大熱者陷胸太陽
頭汗小便難微者身枯腹滿不便甚者捻衣摸牀而

噦頭汗不尿死下後額汗大小利死忌濕家頭汗惡
寒忌下

舌白胎半表半裏舌白胎脇滿嘔者柴胡心懊懣者
梔鼓便閉者有寒有熱忌舌胎足冷脉緊勿妄治八
日大熱者難治手足溫者欲解舌胎藏結者忌攻舌
白胎邪淺舌黃澁邪深赤者白虎黃者下之舌黑者
死

身軀而體痛無汗者麻黃衄而頭痛便清者桂枝
脉浮發熱者自衄者愈汗後衄被火者陽盛陰虛厥



本草匯編 卷六
者難治。脉浮、鼻口燥、嗽水不咽者，必衄。衄非脉浮，忌發汗。脉浮者，麻黃桂枝。脉微者，犀角黃芩。衄不止者，茅花湯。衄血、唾血、畜血、衄唾、嘔吐血者，在上。嗽水不咽、胸滿、手不可近，為血在中。小腹滿、小便利、大便黑，為血在下。下血、少腹急結者，桃仁承氣。咽痛、唾血、面斑如錦者，陽毒。下后厥逆者，宜升。太陽畜血，表在身。發狂、少腹滿、抵當湯滿而不黃、不狂者，抵當丸。但少腹急結者，桃承氣。口燥、嗽水不咽者，畜血在胸。吐血表虛、脉浮緊者，麻黃加參者。熱毒入內藏者，抵當

與桃仁。許學士云：血在上則喜忘，在下則發狂。

短氣、短氣、腹滿、腹痛、表不解、脉弦浮者，柴胡。表解、瀧

熱者，水氣、身涼者，十棗。短氣、煩躁、汗後、面赤、表在者，

更汗。後心下硬痛者，陷胸。短氣、脉微、緊為虛寒。

心痛、後心中結痛者，梔鼓。脉弦浮大、脇及心痛、小

柴胡

除中。口欲言、舌不轉、眼睛不慧、反能食、為除中。厥利反能食者，恐為除中。

痲陽證發痲有四。有溫毒發痲，有熱病發痲，有時氣

本立

卷六

傷寒病機畧

言

海花

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

發癍有傷寒發癍熱病與時氣傷寒癍並同癍癍如錦紋或發之

四肢以發之面部或發之胸背色紅赤者胃熱也紫

黑為百爛也陽癍如錦紋溫毒癍咳嘔至春發熱病

傷寒無時發陽毒癍赤在面陰癍如蚊咬狀赤癍

五死一生黑癍十死一生皆用白虎人參湯可下者

調胃承氣

狐惑欲眠目不閉聲啞為狐惑為蠱仲景但名狐惑

活人更為狐惑傷寒欲眠目閉而赤黑白為狐惑聲

啞者瀉心蝕肛者雄黃熏之咽乾者苦參湯舌白唇

黑為蠱上唇有瘡蝕臍下唇有瘡蝕肛

勞復仲景攻邪食復者枳實大黃發熱者柴胡蓋後

餘邪水氣者滲之喜睡者溫之欲吐者抑之下了了

者二日愈勞氣者舉氣勞血者補血勞中者調中勞

心者補脾氣欲絕者麥門冬湯陰陽易差後交接復

病為陰陽易熱者水調燒裨竹皮寒而脉沉結微者

四逆調燒裨

四時傷寒各不同

冬為傷寒春為溫病夏為暑病秋為瘧病一歲長幼病相

似為溫疫多睡多汗脉浮為風溫一身盡痛為濕身反張為瘧


本草匯

卷六

傷寒病機畧

卷

梅花嶼



傷寒不同四時正氣獨辛苦人觸冒之為傷寒非時邪氣不拘長幼皆染之為溫疫四時傷寒通用宜補散補中益氣通治四時傷寒神木湯白木湯通治濕痺腸溫黃耆治腸

傷寒與中寒不同冬為傷寒霜降至春分為傷寒春為溫病立春至夏為溫病初夏發痲為溫毒汗後灼熱為風溫診溫不同仲景謂溫病壯熱不惡寒活人謂溫病發熱惡寒汗下後過經不愈亦溫病夏為暑病中暘即暑病脈弦細芤遲忌汗下針身熱惡寒汗

出而渴者白虎身疼重者瓜蒂暑病有三脈洪身熱惡寒為熱病有汗者桂枝加膏苓無汗者加麻黃膏苓無汗加躁者青龍加膏苓日中勞役者汗多惡熱脈洪大前藥不差者桂膏病在二月為晚發脈虛身熱惡寒為中暑渴者白虎惡心疼痛滿者五苓痰逆惡寒橘皮渴仍不差者黃連脈弦細芤遲者參者不惡寒者竹葉齒燥者大杜濕溫皆中暑無熱脛冷腹滿汗多頭痛渴而無熱者濕溫秋為瘧病長幼疾狀相似為溫疫非其時有其氣為溫疫天法非其時寒

本草匯 卷六 傷寒病機畧 每七編



者宜熱之非其時熱者宜寒之防病于未萌春反涼夏反寒秋反熱冬反溫多眠多汗脉浮為風溫忌汗下火熏宜姜蕤灼熱甚者知母渴甚者瓜蔓一身盡痛為濕濕病有二痛而發黃為中濕痛而轉側為風濕。

續增妊娠傷寒產後傷寒

婦人傷寒與男子同惟熱入血室妊娠畧異○預防熱入血室○大法經水方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼寒多者柴胡乾薑熱多柴胡地黃實滿桔梗桃仁

硝黃喘急先化涎身汗身涼經斷者桂附子表除汗解涼多者甘芍藥霍亂發熱大法潔古以參耆四物為君汗下之藥為佐產後傷寒大法產後熱極惡寒宜補虛忌發表忌苦寒腹痛者去惡血乳不通者無子麥芽有子宜通草

婦人治法通論 調經經閉血崩赤白帶

大法四物六合婦人常用藥

調經大法紫黑為熱紅色為虛兼脹者補中脉弦大為氣不足將行時痛為滯行後而痛為虛經成塊為


本草匯 卷六 婦人病機畧 三七 梅花真



滯不及期為血熱。挾寒過期者為血虛。三月一來為血氣俱虛。天癸過期為有餘。

經閉無腹痛痞嘔證為血枯。枯在中善食消渴。枯在下大小秘結。枯在上得于勞心。大法先降心火。後補氣血。有腹滿痞嘔為汚血。臍腹疼痛者汚血在下。微者輕劑。重者重劑。甚者重劑。有熱者寒消之。有寒者熱消之。痞嘔寒熱者結痰在上。丹溪輕劑消痰降火。叔和重劑消痰下積。

血崩大法或腹滿或腹痛宜行之。氣短自汗無力者。脾虛宜補之。或脈沉細或沉洪或久瀉者氣陷宜舉之。虛挾積滯者補中破積。虛挾濕者補加伏龍肝燥之。虛脫者澁之。脾虛宜補宜舉。心虛宜戒宜勸。大補氣血自止。脈數有熱為熱。脈弦無力臍冷為寒。赤白帶大法帶皆濕痰。少腹熱脈數為熱濕。少腹熱痛者為熱。瘦少腹冷脈微為寒濕。惡飲及滑脫者澁以枯之。管枯及滯者滑以潤之。少腹寒痛為寒疝。挾腰痛者宜摩腰。虛而有積者攻補施。脈微無力言食少倦怠為虛。脈滑有力為實。



胎前

求子法 大法調經為先。肥人脂閉子宮者。燥之。瘦人無血攝精者。潤之。

受胎 大法精成其子。血成其胞。子宮分左右。男受胎左子宮。女受胎右子宮。男女兼形者。受胎在左右之宮。太谿脉動甚為孕脉。左尺疾大為男。右尺疾大為女。胎上逼心。逼心滿悶者。下氣通陽。逼心疼痛者。消食溫中。遍身痛冲心者。去水。跌撲傷者。逐汚養新。痛不可忍。命在須臾。縮砂桂苓。

治火發熱輕用茯苓淡滲其期欲產者涼血安胎過血氣虛。

外科病機畧

癰疽

腫瘍潰瘍久漏瘡

滯氣實者耗氣抑陽。

沉細滑皆產候胎陷痛


大法腫瘍宜托裏忌大黃潰產候宜養痛或作或止

腫瘍癰疽未見膿而腫者也不陷者未穀道不逆者

以托裏而表散為主設欲行者未宜產母寬志養心

以發表為先發表即是內托產母志忌抱腰亂妄用

陽明分野宜升葛發表少陽宜催冬產宜常溫暖夏



脉有力者。春夏發者。宜寒涼。礙產宜撥。盤產宜水醋。者。宜溫熱發表。服丹石者。守唇口俱青。子母俱死。面者。解裏積毒沉痼者。攻裏少。

補忌疎利。寒熱邪風外入者。

屬熱內熱惡熱者。宜涼藥敷。及春夏者清之。寒證多。藥敷貼。常患痙癰愈而復生。而頭汗為陽盛。血暈下。

脉微者。沉寒鬱積不遂。志欲。而暈者。宜補血。無乳實。

陽分野發癰。當補虛。妄用大。不痛為虛。急痛為實。丹。

及潰瘡忌施。十宜。年老體衰。并一切苦寒。必用乾薑。

十月未足欲產。過期不產。先。熱即有發熱惡寒皆屬。

期不產者。補血行滯。

難產縮胎法。氣虛者。補氣行。

臨產坐草法。產脉或離經。或。

極殺道。迸漿破。為正產。未正。傷宜補接。忌香散。

者未。腹滿腰不甚者。未。胎高。炎腫瘍。內外皆壅。宜。

夫。漿血不出者。未。漿出不痛。大黃者。所當審也。潔古。

宜。任意行坐。養力。忌愴惶。剉太陽分野。宜羌防發表。

力。忌妄用催生藥。見正產候。厥陰分野。宜柴胡發表。



產宜適溫涼。橫倒偏產宜正。發表。脉無力者。秋冬發。噴面。忌面赤舌青。母活子死。解毒發表。灼見有實熱。青舌赤。母死子活。陽厥陰太陽分野。宜預。

產後

大法。產後必用雜方。熱證多。貼內冷及惡寒者。宜熱。及秋冬者。溫之。面白陽虛。嘔者。積熱泄瀉自汗。肢冷。血少而暈者。宜破血。下血多而成者。行氣。十二經少。當疎之。虛當補之。乳汁自出。黃十宜。致死。禁忌。夏月。溪產後。纔見身熱。不可發表。宜補。忌施內托綠豆散。

不熱痛者。熱內鬱者。忌冷藥敷貼。血虛忌施蟬針。瘡家忌汗。血氣不和。寒熱者。忌表散。面赤反鬱。冒者。忌下宜表。脉浮洪滑數為癰。微沉緩澁為疽。脉緩除濕。脉大除熱。脉弦去風。脉澁瀉氣。補血。脉緊細寒。初起便焮痛腫大者可治。不痛熱腫大而陷者不治。潰瘍癰疽之膿已潰出者也。內外皆虛。宜以補接為土。設欲行香散者。宜防其虛也。凡按之軟及色不變者。有膿。按之堅皮白。艾灸赤者。無膿。又以手掩腫上。熱者為有膿。不熱者為無膿。癰則皮薄腫高。疽則皮

外科病機畧



厚腫堅初發宜灼艾膿成則宜針烙膿大泄宜內補膿不多宜排膿脉六脉沉數有力雖隆冬亦宜下脉微泄瀉內陷者雖盛夏亦宜溫腫瘍口乾嘔作毒氣治宜內托散潰瘍口乾嘔作陰虛治宜參芪朮瘡口久不收膿小者峻斂之瘡口不合者必兼補接藥丹溪收斂瘡口止有桃柳枝皮白斂煎飲之又亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性酒服治久不合神效亂髮補陰甚捷也

久漏瘡丹溪須先服補藥以生氣血即參芪朮歸芍


為主大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚艾炷灸令微熱不可令冷如痛則止來日再灸至肉平為効

瘡疽所發部分名狀不同

疔瘡石瘡癰癤馬刀結核癭瘤天蛇頭代

指疔乳癰乳岩囊癰陰疔便毒瘰癧內瘰

大法腦疽頤四處乃為瘡疽必死之處消子不可患瘡疽者七處眼後虛處頤接骨處陰根上毛間睛與尻接骨處耳門前車骨接處額骨下近耳後虛處鼻骨中諸因小腹風水所成瘡疽並能害人腦瘡疽



宜急破額及太陽發疔慎風水發肋慮內攻宜急破脚接骨上慮損筋脚心發毒淺可治深不治

疔瘡皆生四肢發黃疱中或紫黑先癢後痛先寒後熱也世傳蒼耳與白梅研爛貼疔上拔出根脚

石癧其堅如石不作腫者是也

瘰癧馬刀結核連續者瘰癧形長如蛤者為馬刀須

表裏交攻內除藏府之本出耳下耳後至肩腋者手

足少陽出頰車者手足陽明瘰癧有七種瘰癧如豆如

梅排列肩項流注瘰癧如梅流注四肢單窠瘰癧生不難

治蓮子瘰癧一包十數動可治不動死重臺瘰癧重臺見

之不治妳瘰癧燕窠瘰癧似燕窠不治鼠瘰瘰癧赤脉貫

瞳主死忌瘰癧起于厚味鬱氣非痛斷嗜慾思慮者不

治

結核獨行而單核者為結核此火氣熱甚則鬱結堅

硬如果子核也但散熱自消或在項在頸在臂在身

如腫毒者多在皮裏膜外多是濕痰作核耳

瘰癧瘰癧則着于肩項瘰癧則隨氣凝結忌妄破決忌厚

味浸大浸長堅硬不可移者名曰石瘰皮色不變即




名肉瘰筋脉露結者名曰筋瘰赤脉交結者名曰血瘰隨憂愁消長者名曰氣瘰五瘰皆不可妄決破唯胎瘤破而去其脂粉則愈瘰氣結核腫破聖惠以昆布一兩洗去鹹搗為末綿裹于好醋中浸過含咽肘後以海藻一斤洗去鹹酒浸飲之

天蛇頭蒲公英陰乾與蒼耳草二味等分為末用好醋煎浸洗即愈又以蒲公英忍冬酒治天蛇頭極妙

代指手指忽腫痛名為代指以烏梅入醋浸研塗患處立差

甲疽腫痛黃水浸淫泡如火燒綠礬五兩熔盡研細末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡末傅

乳癧乳岩乳癧結核腫痛乳岩隱核下痛乳癧在行滯氣活血祛痰有熱者清之乳岩在早治清心疎厥陰乳房陽明所經乳頭厥陰所屬此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而成又有因口氣吹噓或怒氣鬱悶而成也治法疎厥陰之滯以青皮清心之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫導毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當



歸頭或湯或散隨意消息然須以酒少佐之山居婦
人吹乳用桑樹蛙盾飯搗成膏貼之乳頭裂破丁香
末傅之。

囊癰陰頭癰癰疽入囊者死囊屬厥陰以濕熱入肝
經施治而用補陰藥佐之若陰頭癰不能醫者鼈甲
燒末以雞子白和傅之。

便毒癰穀道前後生癰謂之懸癰此病初發如松子
大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃子卽破若破
難治。

內癰肺癰喘而兩胠滿吐膿如米粥脉滑數而實先
解表次取膿終補裏肝癰兩胠臥則驚不得小便腎
癰小腹痛而痞堅便數似淋脉滑數卽腸癰也肺癰
收斂瘡口止有合權樹皮白斂煎湯飲之若已破入
風者不治。

丹毒瘰癧

丹毒瘰癧
附疥癬

丹毒發斑屬風熱當微汗散之不宜下防風通聖散
虛人發斑游火外行也宜補以降之風丹遍身風癢
癰癧凌霄細末酒下立止。

瘰

小瘰即熱瘰也

勞汗當風寒薄為鼓鬱乃瘰


疹似傷寒暴發暴消者是也疥似疹而延歲月乾濕痛不一經所謂癩瘰是也癩亦延歲月乾而不濕癢而不痛是也疹屬熱與痰在表者消毒飲子在裏者大柴胡湯虛者補中益氣疥膿胞瘡治熱為主蟲瘡如癬狀退熱殺蟲為主癢者治癢痛者治痛春天發焦疥開鬱為主經年不愈殺蟲為主

小兒病機畧

通治

心主驚實則叫搖虛則悸動肝主風實則目直

虛則咬牙脾主困實則困睡虛則吐瀉肺主喘實則悶亂虛則硬氣腎主虛畏明無睛光五藏病法肺怯唇白熱唇紅肝熱手搏衣插眉心實仰臥心熱合臥腎虛白睛多解顛腎虛下竄心熱上竄五藏相勝參見時令肝病見秋宜補脾瀉肝肺病見春宜補肝瀉肺腎病見夏宜治腎脾病見四旁心病見冬宜補瀉心凡病先補後瀉生下胎疾胎實而紅黑睛多胎怯面黃白睛多母虛羸瘦父虛解顛



角弓反張發時身軟為癇張為瘧。

驚搐早晨熱搐當瀉心肝補脾日午熱搐當瀉心補

肝日晚熱搐當瀉心肝補脾肺夜間熱搐當瀉心補

脾傷風後搐口氣熱呵欠煩悶者宜表傷食後搐身

溫或吐宜裏急驚屬陽屬熱痰慢驚屬陰屬脾虛痰

盛氣者礞石辰砂鎮之痰盛濕瀉者膽星半夏燥之

驚癇大法身熱驚啼脉浮為陽身冷不驚啼脉沉為

陰。

潮熱肝熱手尋衣領肺熱手掐眉毛心熱上竄咬牙

脾熱目

肚大腎虛下竄畏明脉沉欲飲水者為

熱脉浮

不飲水者為外熱熱有八般潮熱有作止

壯熱一

出不已風溫溫而不熱傷寒熱呵欠項急瘡

痘熱噴

耳冷變蒸熱唇泡起疳熱脾泥土驚風熱

發搐風

天熱宿食熱皆在夜

積熱無

法面赤大小赤者清涼下下之不退汗


之汗下不退和胃錢氏法胸滿短氣者桃枝下之煩

在腕鼓吐之。

痘治法通論

小兒病機畧

海花齋




大法錢氏溫涼攻發隨宜丹溪分氣血虛實潔古海
 藏皆宗錢氏陳氏偏主溫補潔古法先宜安裏解毒
 大便不秘宜微發大便過秘宜微利海藏法惡寒者
 發之表大熱者奪之渴者清之大秘者下之小秘者
 利之泄者分之證驗施治傷寒瘡疹疑似之間均宜
 微發大便酸臭為傷食宜消導昏不知人脉豁大虛
 宜補禁忌忌妄下忌妄發忌房忌穢氣忌風冷及壅
 遏忌辛熱燻灸忌過愛痘密宜涼藥解毒
 痘出不快大法出不快用溫藥微發之微發不出加

藥分兩加藥不出即大發之有熱不出者利小何
 淡不紅活為虛如水疥不紅活為虛表裏煩不得眠
 宜汗利便澁宜流利
 痘灰色靜怯為寒躁勇為熱大小利為表虛大小
 閉為裏實
 痘黑為倒靨毒不出者補中有通色淡補血大小
 清利麻浮者疎通表色紫解毒小赤大結脉實者調
 秘裏寒戰咬牙身黃腫赤者下之未綻齊黑為陷已
 綻不齊黑為靨

小兒病機畧

痘疹



發熱大熱煩渴腹滿喘便澀利小便利小便又熱不差者下之。

痘渴而赤煩躁大小澀為熱面白脹瀉足指冷為寒

渴瀉身熱脉洪數為熱足冷脉虛遲為寒兼不起不

紅活為表裏俱虛。

痘癩搐痘不發搐痘疹發搐痘疹後發癩身熱驚跳

宜發散

雜病

吐瀉大法夏秋治裏五月身熱瀉黃九分下一分補

六月身溫瀉黃六分下四分補七月身溫涼三分

七分補八月身冷青一分下九分補下後不愈隨證

用藥大法冬夏治表身溫瀉黃白欬嗽先表後補身

熱瀉黃而渴先止渴後表身涼瀉青不渴先補後表

身熱瀉黃多渴為熱肢冷瀉青不渴為寒睡露睛為

虛熱睡不露睛為實熱脾寒痰乳不化為傷食微則

消積甚則下之。

吐沫痰白綠及脉遲為寒吐稠涎及脉數為熱。

泄瀉脾虛結者補而散脾虛清者補而收虛而有積



者先補後攻瀉白為虛寒瀉青為風寒瀉黃赤黑而渴為熱渴而瘦脹為疝

赤白痢治痢先下後補弱不堪下者滑之黃赤為熱青白為寒

腹脹因病後脈微手足冷不喘為虛寒脹不因病後脈實有熱而喘為實熱脹而喘滿宜下脹而嘔喘滿忌下腹如蜘蛛時痛便濁為疝脹實者分氣消積虛不大便者升陽潤血痿黃食少者升陽導食痘後者益胃解毒

水腫水腫加喘難治

疝大法疝在內脹瀉獨瀉不脹多食為蟲疝少食為冷疝初病寒熱為肥熱疝久病寒熱為瘦冷疝冷疝似熱肝疝目疾瀉血多驚筋疝瀉血心疝身熱疝熱先去積化蟲脾疝面黃食土便渴肺疝喘腎疝瘦疥骨疝喜臥冷地

渴不因病後為實熱因久病為虛熱小便不利為濕熱

黃陽黃大小赤澁身熱面赤飲水陰黃清便自調肢



冷淡白黃為胃怯。

腹痛面白肢冷便清為寒痛面赤肢熱便黃為熱痛
面黃白大便酸臭為積積痛食痛虛痛相似蟲痛與
痢相似蟲痛目青腹泄食不化必死。

驚口胎熱為驚口。噤口風痰為噤口。

欬嗽欬喘面腫為肺盛哽氣長出喉有聲為肺虛春
夏嗽為虛秋冬嗽為實昂實腹脹為實痰宜下嗽吐
痰乳宜下積。


喘喘而氣少為肺虛喘而氣盛為肺實喘脈緩生急

死。

夜啼大法曲腰面青白為寒仰面身赤為熱。
五硬五軟五硬即瘓屬五軟即痿屬。

本草匯卷六 終

小兒病機畧




特 7
10
494

本草匯

卷六

五

梅在嶼



国立国会図書館 タイトル『本草匯18巻』 請求記号 特7-494

ガラス使用