

門類目錄

外感門

中風

傷寒

中寒

傷寒

中暑

中溼

瘟疫

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

風門

破傷風

胃風

痛風

癆

癟風

寒門

咳嗽

霍亂

暑門

瘡

痢

溼門

泄瀉

溼熱門

吞酸

疽

水腫

鼓脹

赤白濁

痰門

喘

噯

恶心

嘔吐

欬逆

翻胃

嘈雜

闊格

廢氣

痰熱門

痙

癇

顛狂

驚悸怔忡

健忘

經喉風喉痺

大門

大

吐血

咳血

嘔血

咯血

衄血

漏血

下血

腸風臘毒

痔瘡

漏瘡

脫肛

淋

小便不通

小便不禁

夢遺

風熱門

斑疹

頭眩

頭痛

頭風

眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒

燥門

消渴

燥結

鬱門

六鬱

氣滯

寒鬱門

心脾痛

腹痛

大鬱門

脇痛

跌撲損傷

瘀血

瘀血

瘀血

瘀血

瘀血

瘀血

瘀血

瘀血

溼鬱門

腰痛

疝痛

脚氣

脚氣

脚氣

脚氣

脚氣

脚氣

脚氣

積門

積聚痞塊

虛損門

發熱

惡寒

自汗

盜汗

痿

厥

勞瘵

補損

婦人門

經病

崩漏

帶下

產前

產後

子嗣

諸病

小兒門

小兒諸病

痘瘡

雜治門

倒倉法

吐法 救急諸方

十危病方

備用要方

體氣

汗癥

烏龜

駢顏 拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑溼致疾之殊故繼之以風寒暑溼內傷又有溼熱痰火為病之異故繼之以溼熱痰火况外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首

甲集

丹溪本草衍義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱溼燥寒論

詒家樞要

十二經脈歌

卷之一

乙集

外感門

上

中氣

預防中風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

卷之二

中風

預防中風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

外感門

下

暑風

預防暑風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

中暑

預防中暑

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

運氣證治

預防運氣

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

卷之三

丙集

內傷門

預防內傷

傷食

調補脾胃

卷之四

風門

破傷風 胃風 痛風 脈節痛 肩背痛 癔 痘風 血風瘡 身上虛痺
癰疹

卷之五

寒門

咳嗽

肺痿 肺癰

霍亂

卷之六

暑門

瘧

痢

卷之七

溼門

痞

泄瀉

卷之八

溼熱門

吞酸

咳氣

痘

水腫

鼓脹

赤白濁

卷之九

痰門

痰

哮熱

哮喘

喘

恶心

嘔吐

咳嗽

翻胃

嘈雜

關格

卷之十

痰熱門

痰氣

瘧熱

喘熱

霍亂

虛症

虛熱

虛喘

虛霍亂

虛瘧熱

虛瘧氣

丁集

瘰癧

癰

卷十二婦人門

經事不調

血痛附血
瘡

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

癰疽

乳癰 疗癰

諸瘡

卷之十七

溼鬱門

腰痛

腎痛

疝痛

水腎偏墜

腎囊溼瘡

腳氣

足眼痛

腳轉筋

卷之十八

積門

積聚痞塊

卷之十九

虛損門

發熱

胸中煩熱

虛熱

虛煩不眠

惡寒

面熱面寒

自汗

盜汗

痿

厥

手足十指麻木

勞瘵

補損

諸虛

卷之二十

婦人門上

經病

崩漏

帶下

婦人門下

產前

產後

子嗣

補虛

斷子法

諸病

卷之二十二

小兒門上

小兒諸病

卷之二十三

小兒門下

痘瘡

卷之二十四

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用藥方

體氣

汗癥

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

丹溪先生墓表辭

丹溪翁傳

丹溪心法附餘卷之十二

風熱門

班疹 五十九

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息當以微汗散之切不可下。大傷斑者胃氣極虛一身火遊行於外所致宜補以降於陰証略例中求之。發斑以傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之若下之非理。疹屬熱與痰在肺清肺六降痰或解散出汗亦有可下者。疹即瘡疹汗之即愈通聖散中消息之癰疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癰疹也發則多痒或不仁者是兼風兼溫之殊色紅者兼火化也。黃瓜水調伏龍肝去紅點斑。

戴云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出即收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之。載云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出即收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之。附錄斑疹之病其為証各異瘡發城腫于外者屬少陽三焦相火也謂之斑小紅屬行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹。又傷寒陽証發斑有四惟溫毒發斑至重紅赤者為胃熱也皆黑者胃爛也一則下早一則下之晚乃外感熱病發斑也以元參升麻白虎等藥服之。陰証發斑亦出背晝又出手足亦稀少而微紅若作熱証投之涼藥大誤矣此無根失守之火聚于胸中上獨薰肺傳于皮膚而為斑點但如蚊蚋瓦蟻咬形壯非錦紋也只宜調中溫胃加以茴香芍藥或以大建中之類其火自下斑自消可謂治本而不治標也。

附諸方

玄參升麻湯 三因方 治傷寒失下熱毒在胃發癰或汗下吐後餘毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譶妄

右㕮咀每服四錢水一鍾煎七分溫服溼毒發斑亦宜服之

玄參 升麻

甘草 炙各等分

陽毒升麻湯 活人方 治陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血

升麻 三分犀角 射干 黃芩

人参 甘草 炙各等分

二分

右咬咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

梔子仁湯 活人方治發斑煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁 赤芍藥 大青 知母各一升

麻黃兩 黃芩

石膏各二兩 甘草炙半兩 杏仁去皮火燄右咬咀每服四錢姜三片豉百粒水煎溫服

化癰湯 治傷寒汗吐下後癰發脈虛 人參 石膏 知母 甘草 守真加白朮一方加玄參

右咬咀時時煎服

黃連橘皮湯 治濕毒發癬

黃連去毛四兩陳橘皮 杏仁去皮

枳實

麻黃湯炙葛根各二錢

厚朴製甘草

炙各一兩

右咬咀水煎服

調中湯 治內傷外感而發陰斑

蒼术

一錢半

陳皮一錢

砂仁

藿香

芍藥

炒甘草

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼

鐵

川芎

分五錢

麻黃

桂枝

分五錢

右咬咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子 牛旁子

六錢

荆芥

防風

錢各三錢

甘草

一錢

右咬咀水煎服

通聖散 出丹溪經驗方 川芎 當歸

麻黃

薄荷

連翹

白芍

錢各半兩

黃芩

石膏

桔梗

各一錢

滑石三兩 荆芥

梔子

白朮

各二錢半

甘草

二兩

右剉水煎服 如身疼加蒼朮羌活

痰嗽加半夏每服細末三錢生姜三片擂細湯起煎沸服之

頭眩 六十

丹溪心法

○頭眩 痘挾氣虛併火 治痰為主挾補氣藥及降火藥

無痰則不作眩痰因火動又有溼痰者 溼痰

者多宜二陳湯火者加酒芩挾氣虛者相火也治痰為先挾氣藥降火藥如東垣半夏白朮天麻湯之類 眩

暎不可當者以大黃酒炒為末芩湯調下 火動其痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行溼 左手脉數熱多

脉濇有死血

右手脉實有痰積脉大是久病

久病之人氣血俱虛而脉大痰濇不降也

昔有一老婦

患赤白帶一年半頭眩坐立不得睡之則安專治赤白帶帶愈其眩自安

附脉理 脉訣舉要曰風寒暑溼氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊溼細暑虛涎弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當審歸先理痰氣次隨證治

附諸方

獨活散 楊氏家藏方 消風化痰治頭目眩暈

細辛

去葉一兩

石膏研

甘草

炙各半兩

防風

去芦半兩

藁本

去土一兩

旋覆花

蔓荆子

川芎

獨活

去芦各一兩

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎至六分食後熱服

川芎散 本事方 治風眩頭暈

山藥

甘菊花

人參

茯神

小川芎

各五錢

山茱萸肉

一兩

右為末每服二錢酒調不拘時日三服不可悞用野菊花

芎术湯 濟生方 治冒雨中溼眩暈吐逆頭重不食

川芎

半夏

白朮

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜七片煎七分溫服不拘時

芎术除眩湯 直指方 治感寒溼頭目眩暈

甘草

炙川芎

附子

白朮

官桂

等分

右咬咀每服三錢姜七片水煎溫服食前

荆黃湯 張子和方 治頭眩

大黃

荆芥穗

防風

各等分

右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

芎辛湯 濟生方 治風寒在腦或感邪溼頭重痛眩暈欲倒嘔吐不定並皆治之

川芎

一兩細辛洗去土

白朮

甘草各半兩

右咬咀每服一兩姜五片茶芽少許水一鍾半煎八分臨卧溫服或食後服亦可

頭運方

利痰清氣降火

南星

製五分

半夏

一錢桔梗

七分枳殼

一錢陳皮

一錢甘草

三分

茯苓

一錢黃芩

右作一服姜七片水煎服食後

香橘飲

治氣虛眩運

木香

白朮

半夏曲

橘皮

茯苓

砂仁

各半兩

丁香

甘草

炙二錢五分

右剉散

水二鍾

姜五片煎服

加當歸

川芎

官桂

治血虛眩運

白附子丸 治風痰上厥眩頭疼

全蝎

炒半兩

白附子

炮南星

半夏

旋覆花

甘菊

天麻

川芎

橘紅

殭蚕

炒乾薑

生各

一兩

右為末生姜半斤取汁打糊丸梧子大煎荆芥湯下五十九

人參前胡湯 治風痰頭運目眩

半夏麴

木香

枳殼

炒紫蘇

赤茯苓

南星

炮甘草

炙各

人參

三錢

前胡

橘紅

各五錢

右剉散每服五錢姜五片水煎服

川芎茶調散 治風眩頭痛

見傷風

半夏白术天麻湯

見頭痛

喝起散 大金良方治婦人血風攻腦頭旋悶倒不知人事喝起草即蒼甘草也

右取嫩心不以多少陰乾為末每服二錢酒調下

黑錫丹 治早起眩暉湏臾自定以為常此因老痰鬱痰所作必湏此藥刦之

見痰類

○廣按頭眩之症多主於痰無痰則不作眩有因寒痰溼痰者有因熱痰風痰者有因氣虛痰者有因血虛痰者其症不一也夫寒痰溼痰作眩或因外感寒溼或因內傷生冷熱痰風痰作眩或因外感風暑或因內動七情氣虛眩暉或因脾虛不進飲食或因胃弱嘔吐泄瀉血虛眩暉男子每因吐血下血女人每因崩中產後而作也已上數方雖各有所主未能盡其變在智者擴充之也又嘗論之夫咳嗽頭痛頭眩三者乃病之標必治其病之本而病方已如產後眩暉只補其血如脾虛眩暉只補其氣是治其病之本也

○頭痛 六十一 附眉暉痛

丹溪心法

頭痛多主於痰痛甚者火多可有吐者可下者 清心膏治諸頭痛除血虛頭痛不可治出東垣試效方血

虛頭痛自魚尾上攻頭痛用芎歸湯古方有追涎藥

附諸賢論

王節齋曰久頭痛病略感風寒便發寒月湏重綿厚帖包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥暫時得効誤認為寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常疎故風寒易入外寒束其內熱閉逆而為痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然必熱濟熱病本益深惡寒愈甚唯當瀉火涼血為主而佐以辛溫散表之劑以從治法治之則病可愈而根可除也

附脉理

脈訣舉要曰頭痛湏浮風緊寒風熱洪數溼細而堅氣虛頭痛雖弦必濡緩厥則滑腎厥堅實頭痛治例

心法附錄曰頭痛湏用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎 陽明白芷 少陽柴胡 太陰蒼朮 少陰細辛 厥陰吳茱萸

如肥人頭痛是溼痰宜半夏蒼朮

如瘦人頭痛是熱宜酒製黃芩防風

如感冒頭痛宜防風羌活藁本白芷

如風熱在上頭痛宜天麻蔓荆子台芎酒製黃芩

如白人頭痛是氣虛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏安神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黃芩之類

如若頭痛用細辛

如項顛痛宜藁本防風柴胡東垣云項顛痛湏用藁本去川芎

且如太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主

少陽頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實升麻葛根石膏白芷為主

太陰頭痛必有痰體重或腹痛脉沉緩以蒼术半夏南星為主

少陰頭痛是寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃附子細辛為主

厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩以吳茱萸湯主之 血虛頭痛當歸川芎為主

氣虛頭痛人參黃芪為主

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓荆子三分細辛二分其効如神

又有痰厥頭痛所感不一是知方者體也法者用也徒知體而不知用者弊躬用不失可謂上工矣

附諸方

加減三五七散 和劑方 治入風五痺肢躄不仁大治風寒入腦陽虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有濕痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸去核三兩細辛一兩半乾姜炮三兩防風去芦四兩茯苓去皮三兩附子三箇半炮去皮臍

右為細末每服溫酒食前調服

川芎茶調散 治諸風上攻頭目偏正頭痛

見傷風

都梁丸 和劑方 治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前產後傷風頭痛

香白芷 揀大者沸湯洗五次剉晒乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用荆芥湯下

小芩辛湯 濟生方 治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不已

川芎一兩細辛洗去土白朮 甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片茶芽少許煎服

一方 治傷風感風一切頭痛

甘菊一兩 細辛半兩 甘草七錢

白芷 羌活 香附子 薄荷各三

荆芥枝

茵陳半兩

蒼朮浸川芎各一

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末調下

定風餅子秘方 治偏正頭痛

草烏頭半兩

微炮

香白芷一兩

川芎二兩

防風

天麻

甘草炒各一兩

細辛半兩

右為末姜汁九如龍眼大挖作餅子每服一餅食後茶湯下

川芎九聖惠方消風壅化痰涎利咽膈清頭目旋暈心忪煩熱頸項緊急肩背拘踠肢體煩疼皮膚瘙痒腦昏

目疼鼻塞聲重面上遊風

川芎 薄荷各七兩五錢

甘草 細辛

防風各二兩五錢

桔梗十兩

右為末煉蜜丸每兩半作五十九每服一丸細嚼茶清食後臨卧時下

二芎餅子濟生方

川芎 撫芎 乾姜炮甘草

藁本去芦

天南星炮去皮

防風去芦

桔梗十兩

白术各等分

一方有蒼耳無白术

右為末姜汁蒸餅為劑如鷄頭大挖作餅每服五錢餅細嚼茶清下

徹清膏

蔓荆子

細辛各一兩

薄荷葉

川芎各三

生甘草

炙甘草各五

藁本一錢

右為末茶清調下二錢

神靈散 治偏正頭痛眼痛不止及破傷風等疾

燭硝一兩

黃丹 雄黃各三錢

沒藥 乳香各二錢

右為細末令患人用噙溫水用竹筒吹藥入鼻中少許

一方 治偏頭疼以雄黃細辛等分研末每服一字左邊疼吹右鼻內右邊疼吹左鼻內

○已上諸方辛溫外散風寒之劑

天麻散 治頭項痛頭面腫拘急風傷衛發躁熱

方見風熱

生朱丹御藥院方治諸風痰盛頭痛目眩氣鬱積滯胸膈不利

硃砂一兩二錢半 龍腦一錢 白附子炮去皮臍半斤 石膏燒通紅令冷半斤

右為末燒粟米飯為丸如小豆大硃砂為衣每服三十九食後茶酒任下

大川芎丸 治首風暈眩外合陽氣風寒相搏胸膈痰飲偏正頭疼

川芎一斤天麻四兩鄭州者

右為末煉蜜為丸每兩作十九每服一丸細嚼茶酒下食後

上清散集成治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者

川芎 鬚金 芎藥 荆芥穗 薄荷葉 芒硝各二錢半 乳香 沒藥各半錢 腦子一分半

右為末每服一字鼻內搐之

菊花散和劑方治風熱上攻頭痛不止

石膏 甘菊花 防風 旋覆花 枳殼 蔓荆子 甘草 筋活各一錢半

右用水二盞生姜五葉煎至一盞去渣溫服

芎芷散直指方治風壅頭痛 川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

川芎散拔粹方治偏頭痛神効 甘菊花 石膏 川芎各三錢

右為細末每服一錢茶清調下一方有白姜桑六錢生用

石膏散拔粹方治頭痛不可忍 麻黃去根節 石膏各二兩

何首烏半兩 乾姜七錢半

右為細末每服三錢臘茶清調服

點頭散聖惠方治偏正頭痛

川芎生二兩 香附子去毛四兩

右為不每服一錢好茶調下常服除根

一方 治頭痛去風痰

南星一箇大者七片 皂角十四箇七箇生七箇煨 白梅一箇姜三片 牙茶一撮葱頭一寸四分

右將前藥俱在石器內搗碎水一盞半煎至一盞去滓溫服不可輕犯鐵器搗

一方 治頭痛連眼痛 此風痰上攻須用白芷開之

雨前茶 川芎 白芷 防風 蕃本 細辛 當歸 右用水煎服

川芎散聖惠方治頭風偏正頭痛

羌活 細辛 川芎 香附子 桂花 甘草 石膏 荆芥穗 薄荷 菊花 茵陳 防風各一兩
右為末每服二錢茶清調食後服治動風物

○已上諸方辛平外散風寒內消風熱之劑

消空膏 治偏正頭痛年深不愈者又治風溼熱頭上壅及腦痛除血虛頭痛不治餘皆治之

川芎五錢 柴胡七錢 黃連酒炒 防風 羌活各一錢 甘草一兩細挺子黃芩三兩去皮一半酒製一半炒

右為末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨卧 如若頭痛每服加細辛二分 痰厥頭痛脉緩減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢 如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍 如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加香白芷 白虎湯方見溼熱類

靈砂丹御藥院方 治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞聲重鼻流清涕口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嗽痰寒腸胃燥澀小便赤黃或腎水陰虛心火熾甚及偏正頭疼髮落牙痛遍身麻木疥癬瘡瘍一切風熱並皆治之

天麻 獨活 羌活 細辛 石膏 防風 連翹 薄荷各一錢 川芎 桔子 芍藥 荆芥穗
當歸 黃芩 大黃生全蝎去毒微炒 菊花 人參 白朮 各半 破砂二兩 寒水石 生桔梗各一錢 級砂仁二錢

生甘草二兩滑石四兩

右為末煉蜜丸每兩作十九丸細嚼茶清送下

真珠散聖惠方治偏正頭痛頭風 盒硝七錢半白滑石半兩乳香一錢半片腦少許

右研細用一字口噙水搐鼻內

豆粉丸聖惠方治風熱頭疼

川芎細辛甘草白芷豆粉各二錢半薄荷石膏各半兩樸硝二錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一丸細嚼茶清下

川芎散聖惠方治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣攻眼下多淚多眵目翳急作偏頭痛

川芎柴胡各一兩半夏麵甘草火甘菊花細辛人參前胡防風各半兩

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片薄荷少許煎至八分溫服

安神湯聖惠方治頭痛頭旋眼黑

羌活黃藥各一兩酒浸防風二錢柴胡升麻知母酒浸生地黃各半兩

加蔓荆子半錢川芎三分炙甘草三錢

右㕮咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣溫服食後

治頭痛片芩酒浸透晒乾為末茶清調下 治諸般頭痛亦治血虛頭痛

治頭痛如破酒炒大黃半兩一半茶煎

○已上諸方辛涼內消風熱之劑

定風餅子治風寒客於陽經邪傷腠理背膂強直言語蹇濫肢熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顛鼻淵方見如聖餅子和劑方治風寒伏留陽經氣厥瘦飲一切頭痛

防風

天麻各半

南星洗乾姜

川芎甘草

川烏各一兩

半夏生半兩

右為末用姜汁糊和丸鷄頭實大作餅子每五餅細嚼茶酒下同荆芥湯下澹寮方加細辛

三生丸濟生方各等分治痰厥頭痛

半夏 白附子 天南星

各等分

右為末生姜自然汁浸蒸餅為丸如菉豆大每服四十九食前姜湯米飲任下

天香散簡易方各等分治年久頭風頭痛不得愈者

天南星

半夏湯洗去滑盡

川烏去皮

白芷

各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎一半入姜汁半盞煎八分溫服

九龍丸聖惠方各等分治男女入般頭風一切頭痛

川芎 石膏 白芷 川烏頭 半夏 南星

各半兩加細辛 全蝎各二錢半

右為末並汁為丸如梧桐子大每服五十九茶清送下

不卧散濟生方各等分治頭痛不可忍者

玄胡索七枚青黛二錢猪牙皂角肥寢者刮去皮及子二兩

右為末用水調丸成小餅子如杏仁大用時令病者仰卧以水化開用竹管送入男左女右鼻中覺藥味至喉少酸令病者坐却令咬定銅錢一個於當門齒上當見涎出成盆即愈

玉真丸濟生方各等分治頭風不可忍其脉舉之則弦按之則堅

生硫黃二兩另研石膏硬者不煨半夏湯洗七次硝石別研各一兩

右為末研勻用生姜汁煮糊丸如梧子大每服四十九食前姜湯米飲任下虛寒甚者去石膏用鐘乳粉一兩芎烏散濟生方各等分治氣厥頭痛因氣所觸心腹脹滿嘔吐酸水頭目昏眩

川芎 天台烏藥

各等分

右為細末每服二錢臘茶清調下

苦木湯濟生方各等分治着溼頭痛身重眩暈痛極

附子生去皮臍半兩白术 川芎 桂心

各二錢半甘草一錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜七片棗子一箇煎食前服

○已上諸方治痰厥頭痛着溼之劑

順氣和中湯 治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈

黃芩半錢 人參一錢 甘草分量各七分 白朮 陳皮 當歸 芍藥各五分 升麻 柴胡各三分 細辛 蔓荆子 川芎各

右作一服水煎食後服 亦治氣血俱虛頭痛

半夏白朮天麻湯 治脾胃証已經服疎風丸下二三次元証不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不敢開頭苦痛如裂四肢厥冷不得安卧此氣虛頭痛也

黃柏二分 酒洗乾姜三分 澄瀉 白茯苓 天麻 黃芪 人參 蒼朮各一分 炒神曲 白朮各一錢 陳皮各一錢 丹皮各一錢 半夏
右每服五錢水煎熱服

芎歸湯 治血虛頭痛 川芎 當歸 等分 右每服五錢水煎服

四神散 大金良方 治婦人血風眩暈頭痛 菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗
右等分為細末每服二錢葱白三寸茶末二錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服
調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛 內加川芎三分蔓荆子三分細辛二分 方見脾胃

○已上諸方治氣虛血虛之劑

丹溪心法

○眉眼痛屬風熱與痰 作風痰治類痛風

入方 黃芩 酒浸炒 白芷 右為末茶清調二錢

又方 川烏 草烏二味為君童便浸炒去毒細辛 羌活 黃芩 甘草等分為佐

右為細末茶清調服 一本加南星

附諸方

選奇方 治眉骨痛不可忍大有効 羌活 防風各二錢

甘草二錢 月酒黃芩一錢

生冬炒用有熟者用

右每服三錢水煎食後溫服水一鍾煎七分

上清散 治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者

一方 治頭痛連眼痛

俱見頭痛

頭風六十二

丹溪心法

頭風六十二

○屬痰者多有熱有風有血虛 在左屬風薄荷荆芥 屬血虛川芎當歸 在右屬痰芩半夏屬熱酒芩為主又屬溼痰川芎南星蒼术 偏頭風在左而屬風者用荆芥薄荷此二味即是治之主藥有君臣佐使之分凡主病者為君而多臣次之佐次之須要察其兼見何症而佐使之如有痰即以二陳湯治痰而佐之他症皆倣此又須察識病情全在活法出入加減不可執方

入方 酒片芩一兩 蒼术 羌活 防風 各五錢 細辛二錢 蒼耳三錢

右為末每服三錢生姜一大片同搗勻茶湯盪起服之

又方 酒片芩五錢 蒼术二錢半 羌活 蒼耳 川芎 生甘草 酒黃連 各一錢半 夏桑白皮三錢半

右為末服法同前

瘦人搗藥 軟石膏 樸硝各五錢 腦子 荆芥 檀香皮 薄荷各一錢 白芷 細辛各二錢

右為末搗鼻內

頭痒風屑髮黃 用大黃酒浸炒為末茶調服

一粒金搗鼻方 治偏頭風

藁本 玄胡索 白芷 川芎 青黛各一錢

一錢再入薄荷一錢研細用猪膽汁拌

右為末入製華撥末一兩半用無根水丸每服一粒長流水化開搗鼻以銅錢二三文口咬定出涎

治頭風 烏頭尖七箇 荆芥 防風 甘草 蔓荆子 台芎 桔梗 麻黃 右為末茶調

一人頭風鼻塞 南星 蒼术 酒芩 辛夷 川芎各等分

右為末茶調

附諸方

川芎散 拔粹方 治偏頭痛頭風神妙

甘菊花 石膏 川芎各三錢

右為末每服一錢茶清調下一方有白姜茶六錢生用

消風散 和劑方 治諸風上攻頭目昏眩偏正頭風及婦人頭皮腫痒並皆治之

川芎茶調散 和劑方 治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛頭風

並見傷風

菊花茶調散 治諸風頭目昏重偏正頭痛風鼻塞

菊花 川芎 荆芥穗 羌活 甘草 白芷

各二兩

細辛

一兩

浮萍 防風

去芦一兩半

一蟬蛻

殭蚕

薄荷

各五錢

右為末每服二錢食後用茶清調下

芎辛湯 治膈痰風厥頭目昏疼鼻塞聲重肩背拘急

川芎

五錢

細辛

三錢

甘草

炙

一錢半

右為水煎食後服

一方 治一切頭風

用猪牙皂角炮玄胡索各一錢青黛半錢為末滴水為丸如梧子大搘作餅子晒乾每用一餅新水化開男左女右仰面以蘆筍鼻內灌之口咬銅錢一十五文其涎便出更不再發亦治痰疾妙

一方 天麻 防風

川芎

等分

右為末每服一錢溫酒食後調下以豆豉湯洗頭避風即愈

一方 治偏頭風

用華撥為末令患者口中含水如左邊痛左鼻吸一字右邊痛右鼻吸一字甚妙

金花一聖散 治頭風

川芎

川烏

白芷

各等分

右為末每服二錢生葱三寸薄荷葉三四皮同煎食後服

炙法

宜炙顙會百會前項上星等穴瘡

丹溪心法

○眼黑睛有翳皆用知母黃柏。眼睛疼知母黃柏瀉腎火當歸養陰水。眼中風淚出食後吞龍會丸數粒日三次。冬月眼暴發痛亦當解散不宜用涼藥。

八方

神效七寶膏 治暴發眼熱壅有翳膜者

蕤仁

去油心膜

白硼砂

片腦

硃砂

右用蜜調成膏點眼

爛眶眼

薄荷

荆芥

細辛

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗蜜少許於內覆香烟上取烟盡之後以小青罐收烟藏之丸眼有風熱多淚者皆可點此是陽明經有風熱所致

生熟地黃丸 治血虛眼

見後

龍會丸

見脇痛

一人病眼至春夏便當作鬱治

黃芩

酒浸

南星

姜製

香附

童便浸

蒼朮

童便浸各二錢

撫芎

酒浸兩半

山梔

酒浸兩半

龍膽草

酒浸一錢

陳皮

連翹

蘿蔔子

蒸青黛各半兩

柴胡

三錢

右為末神麪糊丸如梧子大每服五十丸白滾湯下

附諸賢論

王節齋曰眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒卒涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其辛性甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或用乾姜末生姜汁點眼者皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於目從內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火上攻不得散矣故點藥皆用

辛熱而洗眼用熱湯是火鬪則發因而散之從治法也世人不知冰片為却藥而誤誌為寒常用點眼遂致積熱入目而昏暗瘡翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒涼而妄將冷水冷物冷藥挹洗嘗致昏瞎者有之

附諸方

明目流氣飲和劑方治肝經不足內生風熱上攻眼目視物不明常見黑花當風多淚癰澁難開或生瘡翳婦人血風時行暴赤一切眼疾並皆治之

大黃牛蒡子炒川芎 菊花去皮白蒺藜炒去刺細辛去苗防風去苗玄參去芦山梔子去皮

黃芩去芦甘草炙蔓荆子去白荆芥去梗木賊去根節各一兩半
草決明一兩半
蒼朮米泔浸炒二兩

右為末每服二錢臨卧用冷酒調下

洗心散和劑方治風痰壅滿心經積熱邪氣上衝眼澁睛痛或腫或赤迎風多淚怕日羞明並皆治之

洗肝散和濟方治風毒攻上暴作赤目腫痛澁澁多淚

薄荷去梗當歸 羌活 防風各去芦川芎 甘草 大黃各一兩

右為末每服三錢食後熱水調下

密蒙花散和劑方治氣風攻注兩眼昏暗多淚羞明并暴赤腫

密蒙花揀淨杜蒺藜炒去尖羌活去芦木賊 菊花 石決明用鹽同東流水煮沸時取研粉等分

右為末每服一錢臘茶清食後調下

撥雲散和劑方治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜睛怕日羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活 防風 柴胡 甘草炒各一斤

右為末每服二錢水一鍾煎服食後薄荷湯調茶并菊花苗煎湯皆可服忌諸毒物

蟬花散和劑方治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一切風毒并宜服之

穀精草去土 菊花去梗 蟬蛻洗去土淨 羌活 甘草 白蒺藜炒去刺 草决明 防風去芦 山梔子去皮

川芎不見火 密蒙花去梗 荆芥穗去梗 黃芩去土 蔓荆子去皮 木賊洗淨各等分

右為末每服二錢食後茶清調服或荆芥湯調亦可

菊花散和劑方治肝生風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澁痛

菊花去梗六錢羌活去芦白蒺藜炒去火 木賊去節各二兩 蟬蛻去頭足翅三兩

右為末每服二錢食後茶清調下

四生散治肝腎風毒上攻眼赤癢痛不時羞明方見風熱

苦蘗丸御藥院方治遠視不明常見黑花久服明目

苦蘗 菊花 荆芥 薄荷 甘草各一兩 蒼朮二兩米泔浸

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸食後茶清下

荆芥散三因方治肝經蘊熱眼目赤腫

荆芥穗當歸 赤芍藥各一兩半黃連一兩

右㕮咀每服三錢水一鍾煎三沸瀝去滓溫服或洗

十全神龜丸三因方明眼目百歲可讀細書常服有効

神龜四兩光明硃砂一兩磁石二兩蝦醋重淬

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸食後茶飲下

黃連丸本草方治肝經風熱上攻眼目澁痛不可用藥補者

乾熟地黃一兩半黃連決明子各一兩沒藥光明硃砂甘菊花防風羌活桂心各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後熟水下

決明子散濟生方治風毒上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤澁胬肉或痒或痛羞明多淚

黃芩甘菊花去枝木賊決明子石膏赤芍藥川芎川羌活去甘草蔓荆子石決明各

右為末每服三錢水一鍾姜五片煎至六分食後服

草龍膽散聖惠方治風毒熱氣攻衝眼目暴赤癰澁羞明及腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛胬肉癰痛

龍膽草

洗去梗

菊花

去梗木賊

洗淨去節草决明微炒

甘草

炙各二兩香附子炒去毛

川芎

不見火各四兩

右為末每服三錢用麥門冬湯入沙糖少許調服食後或米泔調下亦得

又方和劑方治眼目暴赤腫痛風毒熱氣上衝睛疼連眶眼背赤爛瘀肉侵睛時多熱淚及因忿怒逆損肝氣久勞瞻視風沙塵土入眼澁痛致成內外障翳等疾

龍膽草

蒺藜炒去刺各六兩

茯苓

去皮四兩

菊花

去枝五錢

赤芍藥

防風去皮核各三兩

甘草

散熱飲子

拔萃方

治眼暴赤腫

防風

羌活各三兩

黃芩

黃連一兩

○已上諸方散風熱之劑

石膏羌活散

宣明方治久患雙目不覩光明遠年近日內外氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活

治腦熱頭風

蜜蒙花

去皮羞明日開瓣

木賊

退翳障

香白芷

清利眼目乾

菜子

細辛二味起

麻子

蒼朮

行氣開瓣

甘菊花

明日去風

荆芥穗

治目中生瘡

石膏

二味洗心退熱

黃芩

本治偏頭痛

甘草

和諸藥各等分

右為末每服一錢至二錢令後臨卧用蜜水一盞調下或茶清亦可日進三服至十日漸明至二十日大驗此方醫數十餘人矣後人加當歸枸杞子梔子仁連翹柴胡薄荷葉防風天麻桔梗各等分為小丸服蟬花無比散

和劑方治大人小兒風毒傷肝或為氣攻

一切眼目昏暗漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸漸

細小連眶赤爛小兒瘡疹入眼白膜澀睛赤澁癰痛並治

茯苓

甘草

炙防風去芦各四兩

川芎

羌活

當歸洗焙各三兩

赤芍藥

十二兩蛇蛻炙一兩

蒺藜

去皮尖半斤

蟬蛻

去頭足翅二兩

石決明

用鹽水煮研細為粉

蒼朮

去皮炒十二兩

右為末每服三錢食後米泔調服茶清亦可忌毒食

明眼地黃丸和制方治男子婦人肝虛熱積上攻眼目翳膜遮睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘並治暴赤熱眼

牛膝去芦酒浸三兩

石斛去苗生地黃一兩熟地黃一兩

熟地黃洗防風去芦四兩杏仁去油研細

枳殼去白炒各四兩

桑子

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九食前益湯溫酒任下

羊肝丸

濟生方治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝一具生用黃連去鬚另研為末

右先將羊肝去筋膜於沙盆內搗爛入黃連末杵和丸如梧子大每服五十九熟水送下利濟方用白羊肝上清丸秘方治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛

羚羊角

犀角

黃連

厚樸各一兩

牛黃

黃芩

川芎

羌活

蟬蛻

白芷

菊花

大黃

右為末煉蜜丸如梧子大每服三五十九

杞苓丸魯氏家傳專治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障

白茯苓去皮八兩

真枸杞四兩酒洗青鹽一兩別研

兔絲子二兩酒浸蒸

當歸二兩酒洗

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十九食前熱湯下

導赤散魯氏家傳治心臟積熱上攻眼目兩眥浮腫血侵白睛羞明酒淚一切治之

牛蒡子炒榆子

槐子

炒生乾地黃

黃芩各等分

右為末每服二錢食後麥門冬湯調下

車前散魯氏家傳肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞明多淚

密蒙花去枝葉

甘菊花去枝葉

白蒺藜炒去刺

羌活

粉草

草決明

車前子各等分

黃芩

龍膽草洗各等分

右為末每服二錢食後飯湯調下

五味子丸魯氏家傳治心肝二經蘊積風邪并腎臟虛耗眼目昏暗或生翳膜

阿膠蛤粉炒熟地黃各一兩白茯苓麥門冬各半兩芍藥五味子杜仲斷絲各二兩姜汁炒貝母炒

柏子仁 茯苓去木遠志去心人參百部防風去芦各一兩

遠志去心

右為末煉蜜丸如彈子食前姜湯嚼下一丸

蔓荆湯聖惠方治勞役飲食不節內障眼疾此方立効

黃芪人參各一兩蔓荆子二錢半甘草炙八錢白芍藥二錢黃柏三錢酒浸晒四次

右㕮咀每服五錢水二盞至一鍾食後臨卧溫服

助陽和血補氣湯衛生寶鑑治眼目發腫熱白睛紅多眼淚無疼痛而癰澁難開此服苦寒藥太過而真氣不能通九竅故眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風七分黃芪二錢甘草炙一錢蔓荆子一錢當歸身半錢白芷五分升麻柴胡各五分

右㕮咀作一服水一鍾半煎一鍾臨卧通口服忌風寒及食冷物

地黃湯拔粹方治眼久病昏澁因發而久不愈者

防風羌活黃芩黃連地黃當歸人參茯苓

右等分為粗末水每服五錢一鍾半煎八分食後臨卧通口服

四物龍膽湯拔粹方治目赤暴發作雲翳疼痛不可忍者

當歸川芎芍藥地黃各五錢羌活三錢草龍膽二錢防風三錢防己二錢

右㕮咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服

○已上諸方散風熱兼補虛之劑

菊睛丸和劑方治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚

枸杞子三兩旋容酒浸炒二兩甘菊花四兩巴戟天去心一兩楊氏家藏方加五味子三兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸食後溫酒盃湯下

加減駐景丸簡易方 治肝腎氣虛兩眼昏暗視物不見

車前子炒一兩

熟地黃洗

當歸身各五錢

五味子

枸杞子各一兩

兔絲子半斤酒製

楮實子無翳膜則勿用

川椒炒出火毒一兩

右為末蜜糊丸如梧子大每三十九食前溫酒鹽湯下

養肝丸濟生方 治肝氣不足眼目昏花或生眵淚

當歸去芦一兩

酒浸

車前子酒蒸焙

防風去芦一兩

白芍藥

蕤仁另研一兩

熟地黃酒蒸焙

川芎

楮實子各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十九熟水下不拘時

生熟地黃丸 治血虛陰虛眼目昏花 生地 熟地 玄參 金釵石斛 各一兩

東垣熟乾地黃丸 治血少神勞腎虛眼目昏黑 熟地黃一兩 生地黃一兩五錢 柴胡八錢 天門冬

甘草炙 枳殼 地骨皮 黃連 五味子各三錢 人參二錢 當歸身酒浸焙乾 黃芩各五錢

右為末煉蜜丸如菉豆大每服百丸茶清下

○已上諸方補虛之劑

白龍散御藥院方 去翳膜明眼目

用芒硝五兩取真白如雪者置銷金銀鍋子內以新瓦蓋又用熱炭火用一小磚火內放先燒磚熱然後下藥在鍋磚上四面有火慢慢熬溶良久鍋內有聲先去頂上火并瓦鍋中覩未沸顯清明汁以鐵鉗鉗出鍋傾藥汁在別器中凝潔如五色者方好研如極細入龍腦各等分用點退下翳或吹入鼻中立有神効

黃連膏宣明方治 一切眼目瘡肉攀睛風痒淚落不止 黃連半斤 白丁香五升水一瓶淘淨去土殼細用 撲石脂一斗以水半瓶淘淨去土陰乾

右取水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁噙乾硝用猪羊膽和加蜜點之效矣

撥雲散秘方 點眼中冇翳雲膜遮障近日瘀痛眼不可點

硇砂去石研細末

黃丹水飛青鹽

盆砂各五錢

爐甘石半斤煅七次入童便淬

輕粉一錢如鷄黃為度研細末

旋仁六十箇去皮用白仁黃色者不用

右為極細末研無聲為度忌鷄魚一切辛熱之物

碧霞丹宣明方點一切惡眼風赤者

龍腦 射香 硇砂各二錢 沒藥 血竭 乳香 銅青各一錢 鵬砂二錢

右為末滴水和丸如梧子大每服一丸新汲水化開點之立効

撥雲膏秘方 爐甘石 黃丹一兩 川烏一錢半 牛角 乳香 沒藥 硇砂 輕粉各一錢 青鹽 血竭

片腦半錢 射香 薏仁各七分半 當歸二錢半 黃連一兩五錢 密一斤 銅綠 鵬條各一錢二分半

右件脩合各如法研細用白沙蜜十五兩慢火初沸下黃丹二沸下爐甘石三沸下諸藥不粘手為度用磁盞內熱水泡開熱點不拘時

捲簾散楊氏家藏方治久新痛眼昏澁難開翳膜遮睛或成胬肉或暴發赤腫疼痛並皆治之

礪甘石四兩碎黃連六錢搘碎用水一碗煮數沸除去前滓樸硝五錢細研

已上先將礪甘石末入沙鍋內開口煅令外有霞色為度次將入黃連樸硝水中浸飛過候乾又入黃連半錢水飛過再候乾次入

白礬二錢一錢生用一錢飛過膩粉另研一字黃連末半兩 青鹽 膽礬各七錢 丁香另研乳香另研鉛白霜各一錢 銅綠七錢 硇砂另研一字

右為末同前件藥和合令勻每用少許點眼

○已上諸方點攀睛瘀肉之劑

黃連散楊氏家藏方治肝受風熱眼眩赤爛

乳香一錢半 黃連去頭半兩 荆芥六百穗 鐵燈芯一百莖

右㕮咀每服二錢水二鍾煎一鍾濾去渣熟洗

光明湯秘方治一切暴眼

白礬一字銅綠一錢 杏仁 甘草各一錢 乾姜三分俱各細末

右件用生絹袋盛貯頤放於磁器內以沸湯浸用紙封蓋定待冷臨卧洗之

洗眼湯 治暴赤眼 當歸尾 黃連各一錢

赤芍藥 防風各半錢 杏仁四箇去皮尖

右用水半鍾將小孩乳汁少許蒸過澄清點洗不拘時

消毒散 御藥院方治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消 大黃生五錢黃芩黃柏各一兩

右為末每用生蜜水調藥如糊攤在緋絹花子上隨目赤左右貼於太陽穴如乾用溫水頻潤

五黃膏 御藥院方治目赤 黃柏一兩黃芩黃連黃丹大黃各半兩

右為細末每一錢蜜水調成膏攤緋絹上隨左右眼赤貼於太陽穴

赤眼方 秘方 鷄爪黃連 銅綠半餅大艾葉

右將銅綠黃連研末用淨水調膏攤於磁器盞內却將艾操軟為丸燒艾炮黑盞內藥乾用沸湯炮澄清以銀簪蘸藥點之

礪甘石散 海上方治一切目疾不問得病之因悉治之

礪甘石 真者半斤黃連四兩剉如豆大於銀石器中
用水二碗煮二次揀去黃連取出甘石細研片腦二錢半別研

右二味同研勻每用半字白湯泡時時洗之點亦可

又方 海上方 純甘石 半兩飛三國砂 鵬砂各一兩 白礬 腦子各半錢射香少許

右為極細末用沸湯泡點洗俱可

乳香散 治眼赤腫疼痛不可忍 鐵金二錢半 盆硝 黃連各一錢 雄黃 乳香 沒藥 片腦各半錢

右為末鼻內搗少許點亦可

復明膏 秘方 點遠年近日雜患眼目昏花

黃連 一斤洗淨去鬚剉當歸半斤洗淨擘開取柯子三兩洗淨搗碎黃柏三兩去粗皮

右四味用臘水一大桶磁器內浸十五日入銅鍋內熬至數十沸濾去滓礪甘石半斤桑柴火煅七次用前藥四味汁蘸七次如鷄子黃色為用研極細末水飛過鵝梨二十五箇搗爛用生絹袋濾去滓黃丹半斤水足本丹溪心法附錄

飛過去為用蜜二斤半水二升半葱一把熬水盡去滓猪胰子十五箇擇淨脂油用捍草袴一大把同搗爛泥生絹袋滌去滓再過一次同煎藥汁下入銅鍋內煎熬欲成稀膏下後六味

青蓋 盆硝各一兩 銅綠研極細末 磷砂 鵬砂 熊膽各五錢

右為極細末入鍋再熬一時欲成稠膏子下後四味

射香 三錢水研細龍腦 輕粉 粉霜各一錢研細

再熬從緊至慢漸漸微火熬成膏出鍋入磁器內盛放土中埋一箇月去火毒可用已後若乾時却用乳汁化開點每日可點三五十筋若腫時歇一二日再點以効為度二月九月脩合為妙

珊瑚膏秘方治遠年近日不覩光明一切雜患病眼五輪不損者並皆治之新患眼冠日見効每用皂角子一大塊冷水半鍾鷄子殼少許於小盞內浸化研開點眼或洗眼亦得臨卧點用奇効不可具陳除內障

紫金膏秘方同珊瑚膏治証每遇病眼用藥如菉豆許點眼大角內點五七遍看病大小用此膏與珊瑚膏方並見片腦膏

龍膽膏秘方治暴赤眼腫痛癰濿難開怕日羞明迎風淚出視物昏花每用豆許點眼大角內少時連點數筋大有功效今具藥品於后

玄精石一斤桂府滑石一斤俱為細末黃連 秦皮切細龍膽草 苦練根 五味子各用十兩當歸 赤芍藥

大梔子 莘仁搗碎杏仁各五兩 槐枝二斤切三十許 柳枝二斤切三十許

玄精石至五味子七味用大鍋盛水二大桶煎至一半去滓將細生絹滌過亦用磁器盛放白沙蜜五斤先用少油搽鍋內慢火煉蜜亦要用水二桶煎至一半去滓再將細生絹滌過亦用磁器盛放白沙蜜五斤先用少油搽鍋內慢火煉蜜紫色為度將前二次煎成藥水同煎數沸再用生絹滌過再熬至一半入銅鍋內下鵬砂五兩猪膽大者五箇慢火煎用鉄罐不住手攪熱成稀膏除二斤於磁器內盛放一宿將上等片腦六錢研細入藥內攪勻用油紙封固宿名為片腦膏下礪甘石六兩黃丹六兩用水飛過磷砂九錢盆硝九錢銅綠九錢輕粉三錢粉霜一錢俱研細用水一碗用細生絹滌過盡入煎熟成一斤藥內將鐵罐不住手攪慢火再熬成稀膏

又除二斤半用磁器內盛放經一宿再用上等片腦一錢射香二錢研細入藥內攪勻將油紙封固一宿名為紫金膏又以珊瑚半兩為粗末用水一大碗煎數沸去滓不用入前熬成稀膏半斤於內又下爐甘石二兩黃丹二兩用水飛過將鐵鎚不住手攪煎成稠膏再下上等片腦一錢研細入藥內攪勻於磁器內盛放名為珊瑚膏

修煉爐甘石黃丹之法

爐甘石不拘多少砂器盛頓木炭火煉通赤用黃連水蘸七次水飛淘澄為泥用之

黃丹不拘多少以砂銚炒候紫色用水飛過淘澄為塵用之

光明撥雲錠子 治遠年近日一切眼疾

爐甘石一斤煅過用黃連半斤水二碗煎硼砂一兩片腦一錢海螵蛸二錢射香二分珍珠一錢

血竭三錢乳香沒藥各一錢

右研極細以後黃連膏子和劑搘成錠子淨水磨化點

劑藥黃連膏子

黃連半斤龍膽草當歸芍藥大黃黃柏黃芩川芎生地黃白芷防風木賊

薄荷葉羌活紅花菊花各等分

右用水七八碗浸藥三日前煎成膏子和劑前藥成錠子

開光錠子 爐甘石煅黃連水淬硼砂五錢珍珠一片腦各三分牛黃雄黃各一錢

右為細末熬黃連膏為錠子磨點

春雪膏

於春天雪冷凍之時取明淨樸硝三四斤為末或不拘多少用黃連防風赤芍藥當歸尾各五錢牙皂三箇各剉片與硝拌和入雪與硝一般多同拌勻為水過一宿濾去黃連等藥却將硝雪水用瓦盆或銅盆盛之足本丹溪心法附餘

於露天淨處受霜露之氣其盆弦上自然結成砂却用烏盆一箇以紙勑盆底內用厚皮紙盛砂於盆內紙勑上使砂中水氣盡滲於紙內候砂乾爽以磁器收貯封固如用每砂硝一錢加硼砂半錢片腦三分研細點眼

○已上諸方點洗之劑

○廣按眼疾所因不過虛實二者而已虛者眼目昏花腎經真水之微也實者眼目腫痛肝經風熱之甚也苟實焉則散其風熱苟虛焉則滋其真陰苟虛實相仍則散風熱滋真陰兼之夫何眼疾之不瘳哉此內治之法也至於久而失調熱壅血凝而為攀睛瘀肉翳膜赤爛之類不假點洗外治之法則何由而全愈乎蓋病情有標本治法有內外故也又嘗論之氣有餘便是火而散火在於破氣血不足則陰虛而滋陰在於補血也常使血能配氣水能制火則眼疾胡為而作也歟

耳聾六十四

丹溪心法

○耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多當用開痰散風熱 通聖散滾痰丸之類 大病後耳聾者湏用四物湯降火 陰虛火動耳聾者亦用四物湯因鬱而聾者通聖散內大黃酒煨再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星青皮桔梗荆芥不愈用四物湯妙 耳聾必用龍會丸食後服 氣實入耳聾丸或神芎丸下之 聾病必用龍會丸四物湯養陰 溼痰者神芎丸枳榔丸 耳溼腫痛涼膈散加酒炒大黃芩酒浸防風荆芥羌活服腦多射少溼加枯礬吹耳內閑閑然亦是陰虛戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

入方

草麻子四十九粒棗肉十箇

右入人乳汁搗成膏石上畧晒乾便丸如指大綿裹塞於耳中
又方 鼠膽汁滴入耳中尤妙

又方

將龜放在漆棹上尿出用綿漬之枕入青葱管中滴入耳中

附諸賢論

王節齋曰耳鳴症或鳴甚如蟬或左或右或時閉塞世人多作腎虛治不効殊不知此是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣遇此疾但審其平昔飲酒厚味上焦素有痰火只作清痰降火治之大抵此症多因先有痰火在上又感惱怒而得怒陽之火客於耳也若是腎虛而鳴者亦是膀胱相火上升故也其鳴不甚其人必多慾當見勞怯之證

附諸方

犀角飲子濟生方治風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿水流出

犀角镑

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆炒

甘菊花

去枝梗各一兩

甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎七分溫服

清神散治風氣壅上頭目不清耳常重聽

殼炒去絲嘴

乾菊花各一兩

荆芥穗

羌活

木通

川芎

木香

防風

石菖蒲

甘草各三錢

右為末每服三錢食後臨卧茶清調下

復總湯姚方伯傳治痰火上攻耳聾耳鳴

半夏製

陳皮去白

白茯苓去皮

甘草炙

萹蓄

木通

瞿麥

黃柏去粗皮炒褐色各一錢

右用水二茶鍾生姜三片煎至一茶鍾空心臨卧各一服

涼膈散治風熱上攻耳聾見溫熱

通聖散

治風熱上攻耳聾見火類

見斑疹

滾痰丸

治熱痰溼痰耳聾見火類

神苦散

治溼熱溼痰耳聾見火類

梔榔丸 治溼熱溼痰耳聾 見病類

龍會丸 治肝火上升耳聾 見脇痛

和氣流氣飲 治氣閉耳聾 見氣滯

內加菖蒲生姜葱白同煎服 九治聾須開鬱行氣

六味地黃丸 治陰虛火動耳聾 見補損

內加知母黃柏菖蒲遠志

地黃丸 治勞損耳聾

熟地黃 當歸 川芎 辣桂 兔絲子 川椒炒故紙炒白蒺藜 胡芦巴炒杜仲炒白芷

石菖蒲各二錢半磁石 火燒醋淬七次研水飛一錢二分半

右為末煉蜜丸如梧子大每五十九葱白溫酒下

磁石羊腎丸 治諸般耳聾補虛開鬱行氣散風去溼

磁石三兩火煅醋淬七次用葱子一合木通三兩用川芎 白术 川椒去目肉棗去核防風 茯苓

北細辛 山藥 遠志去心 大川烏炮木香 當歸 鹿茸酒浸一宿炒兔絲子酒浸炒黃芪各一兩

肉桂六錢半熟地黃二兩 石菖蒲一兩半

右為末用羊腎兩對去皮膜以酒煮爛研細好酒糊丸如梧子大每五十九空心溫酒下鹽湯亦可

○廣按丹溪云耳聾皆屬於熱而已上二方又用辛熱之藥不無使人疑議殊不知耳聾多屬痰火鬱結非磁石之鎮墜川烏之流通與夫川椒細辛肉桂菖蒲之辛散則老痰鬱火何由而開耳聾何由而愈哉雖然耳聾由此而愈亦為却劙後當以通聖散和之可也

○已上諸方內治之劑

一方 蒜耳聾久不聞者 瞭磁石 一塊如豆 大川山甲燒存性為末一字

右用新綿子裹塞於患耳內口中含夢生鐵覺耳內如風聲即愈

一方 用甘遂末吹入左耳甘草末吹入右耳立効

一方 治耳痛及聾

用巴豆十四粒研爛以鵝脂半兩鎔化和巴豆末為丸如小豆大以綿裹塞耳中

耳鳴方 草烏燒石菖蒲 右等分為末用綿裹塞耳中一日三度

耳鳴暴龍耳方

川椒

石菖蒲

松脂

各二錢半

山豆肉

半錢

右為末溶臘丸如棗核大塞入耳

耵耳方 治風熱搏之津液結蘚成核塞耳 生豬脂 地龍 金下墨

等分

右件細研以葱汁和搘如棗核薄綿 罩入耳令潤即挑出

紅綿散 治耵耳有膿及黃水 海螵蛸 枯礬

各一錢

射香一字

乾胭脂

五分

右為末用管吹入耳中

一方 用五倍子焙乾一兩全蝎三錢燒存性為細末吹入耳中

一方 用枯白礬一錢胭脂一字射香少許研細以綿杖子先輾去耳中膿水即用別纏杖子送藥入耳中

一方加龍骨亦佳

一方 治耳內膿出或黃汁

石膏新瓦上煅明礬枯黃丹炒真蛤粉 龍骨各等分射香少許

右為末綿繩竹篙拭耳換綿蘸藥入耳

一方 治耳作膿者

用甘遂一塊如棗核大以綿裹塞耳中以甘草口中徐嚼下

耳爛 用貝母研末乾掺

治百虫入耳

一方用香油灌入耳即出

一方用鷄冠血滴入耳即出

一方驢牛乳最良灌入耳即出

治一切虫物入耳

用竹管入耳門以口氣盡力吸出最妙

一方 治凍耳

用橄欖物燒灰清油調敷雀腦亦可

○已上諸方外治之法

○廣按丹溪云耳龍皆屬於熱誠哉斯言然有左耳龍者有右耳龍者有左右耳俱聾者不可不分經而治也夫左耳聾者少陽火也龍會丸主之右耳聾者太陽之火也六味地黃丸主之左右耳俱聾者陽明之火也通聖散滾痰丸主之何以言之有所忿怒過度則動少陽膽火從左起故使左耳聾也有所色慾過度則動太陽膀胱相火從右起故使右耳聾也有所醇酒厚味過度則動陽明胃火從中起故使左右耳俱聾也蓋左耳龍者婦人多有之以其多忿怒故也右耳龍者男子多有之以其多色慾故也左右耳俱聾者膏粱之家多有之以其多肥甘故也總三者而論之忿怒致耳聾者為多丹溪云厥陰少陽火多當用開痰散風熱其此之謂乎

用開

痰散風熱

丹溪心法

○酒瘡鼻是血熱入肺 治法用四物湯加陳皮

又云柏皮

紅花酒炒黃芩煎入好酒數滴就調炒五靈脂末同服

格致論中於上藥有茯苓生姜氣弱者加黃芪

又方 用桐油入黃連末以天吊藤燒灰熱傅之 一云用桐油入天吊藤燒油熟調黃連末拌傅之

又用山梔末蜜蠟丸彈子大空心嚼一丸白湯下

鼻病

六十五

治鼻中瘻肉 胃中有食積熱痰流注治本當消食積

蝴蝶礬 二錢細辛一錢白芷半錢

右為末內鼻中

治鼻渊

南星 半夏 蒼朮 白芷 神曲 酒芩 辛夷 荆芥

各等分

右末水調食後服

附諸賢論

王節齋曰鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或略感風寒便塞不時舉發者世俗皆以為肺寒而用解表通利辛溫之藥不効殊不知此是肺經素有火邪火鬱甚則喜得熱而惡見寒故遇寒便塞遇感便發也治法清肺降火為主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭者再審其平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥噙化或末藥輕調緩服久服無不效矣此予所親見而治驗者其平素原無鼻塞舊證一時偶感風寒而致窒塞聲重或流清涕者自作風寒治

附諸方

菖蒲散 御藥院方 治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲 皂角等分

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧片時

增損防風通聖散 治鼻塞不利肺氣不清

鼠粘子 桔梗 桑白皮 紫苑 荆芥穗三兩甘草生二兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半姜五片煎八分食後溫服

羌活散 治腦有鬱熱遇寒鼻塞

見傷風

仙木芎散 治腦有鬱熱遇寒鼻塞

見傷風

川芎石膏湯 治腦有鬱熱遇寒鼻塞

見中風

○已上數方治鼻塞之劑

倉耳散 三因方 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁 半兩 倉耳子 炒二錢半 香白芷 一兩 薄荷葉 半錢

右為末每服二錢葱茶清食後調下

辛夷散 濟生方 治肺虛為四氣所干鼻肉壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

川芎 木通 去節防風 去芦 甘草 辛夷仁 細辛 洗去土 藁本 升麻 香白芷 各等分

右為末每服三錢茶清調下

防風湯 治鼻淵脳熱滲下濁涕不止久而已必衄血

防風 二兩半 黃芩 人參 甘草 炙川芎 麥門冬 去心各一兩

右為末每服二錢沸湯調食後服

已上數方治鼻淵之劑

鉛紅散 治風熱上攻面鼻生紫赤刺癰瘍俗呼肺風

舶紅硫黃 白礬
桔各半兩

右為末黃丹少許染與病人面色同每上半錢津調液塗之臨卧再塗兼服升麻湯下瀉青丸以除病根也

局方升麻湯

熟半夏 茶芩 白芷 當歸各二錢 蒼朮 乾葛 桔梗 升麻各一兩 熟枳殼 乾姜 各半錢

大黃 蒸半兩 芍藥七錢半 陳皮 甘草 各一兩半

右咬咀每服五錢生姜燈心水煎食前服

瀉青丸 見中風

白龍丸 治酒瘡鼻并滿面紫赤酒刺

川芎 藁本 細辛 白芷

甘草

等分

右為末每四兩入煨石膏末一斤水丸逐日用此丸末洗面如潔豆法更罨少時方用湯洗去

又方 用黃柏苦參梔榔等分為末傅以猪脂調尤妙

又方 用青黛槐花杏仁研傳之

又方 用杏仁研乳汁傳之

○已上數方治酒瘡鼻之劑

白黃散 簡易方 治鼻瘡瘍肉鼻痔等症

雄黃 白礬 細辛 爰子各等分

右為末搐入鼻中

辛荑膏 御藥院方 治鼻生瘡肉室塞不通有時疼痛

辛荑葉二兩細辛 木香 木通 白芷 杏仁

湯泡去皮尖研各五錢用

右將羊髓豬脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦射香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉脫即愈

麝金散 治鼻中生瘡肉

用麝金猪牙皂角各一兩二味水浸一宿火煮透麝金為度去皂角不用以麝金焙乾再用北細辛半兩射香礞砂各一錢同為末煉蜜丸如茶子大每服一丸食後細嚼茶湯嚥下

輕黃散 治鼻中瘡肉

雌黃

半兩 射香

火許 輕粉

杏仁

湯泡去皮尖雙者仁各一錢

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁盒蓋定每有患者不問深淺夜卧用筋頭點粳米大維鼻中隔夜一次半月効

又方 用狗骨燒灰加礞砂少許每用搐鼻中瘡肉自化

又方 以胡荽搗爛塞鼻中一夕自然落出

又方 用白礬燒為末面脂和綿裹塞鼻中數日瘡肉隨藥落

又方 用雄黃一塊如棗塞鼻中過十餘日瘡肉自落

○已上數方治瘡肉之劑

丹溪心法

○口瘡服涼藥不愈者因中焦土虛且不能食相火衝上無制用理中湯人參白朮甘草補土之虛乾姜散火之標甚則加附子或噙官桂亦妙。一方生白礬為末傅之極効或噙良久以水漱之再噙。一方治口瘡甚者用西瓜漿水徐徐飲之冬月無此用西瓜皮燒灰傅之。又方黃連好酒煮呷下立愈。又方遠志醋研鵝毛掃患處出涎。

入方

細辛 黃柏炒等分一云黃連

右為末貼之或捲舌上吐涎水如再傅湏旋合之若合下既久無效。

治滿口白爛

草揆為末一兩厚黃柏一兩

右用柏火災為末醋煎數沸後調上藥漱涎再用白湯漱口則愈。

附諸方

立効散

端効方

治唇繫瘡疼痛

訶子肉 五倍子

右為末乾貼唇上立効

赴筵散

端効方

治赤白口瘡

黃柏 青黛 密陀僧

右為末乾貼瘡

枳榔散

應驗方

治口瘡疼痛大有神効

五倍子

三錢寒水石半兩煅

蒲黃

黃丹 三錢半

右為末每服少許乾貼瘡上

龍石散

和劑方

治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽嗌腫塞疼痛妨悶每用少許捲貼患處嚥津小兒治瘡亦效

氣攻口齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥捲貼立効

硃砂

一錢半研用

寒石水 煅通赤三錢二分半

生腦子

二錢半研

右為末每日三五次用夜卧捲貼妙

清金散

竭效方

治大人小兒白口瘡急惡狀似木耳

五倍子

去土四錢

青黛 四錢

右為末好油調貼瘡上咽喉中瘡爛用竹管吹入喉中有津吐出

兼金散 三因方治 熟毒生瘡於舌 細辛 黃連 各等分

右為末先以布帛蘸水揩淨患處捲藥於上涎出即愈

赴筵散 澹寮方治 口瘡疼痛 五味子 嫩者一兩 滑石 半兩研 黃柏 半兩蜜炒

右為末每服半錢乾捲瘡上良久便可飲食

治口瘡 張子和方 白礬 一兩枯至半兩 黃丹 一兩煅火紅放下再炒紫色為度

右為末捲於瘡上即愈

一方 治癰脹

用黃柏一兩去粗皮以五倍子二錢蜜陀僧甘草各少許三味為末水調敷在黃柏上炙三五次藥未盡及度後將黃柏切為片子臨卧時貼於患處天明即愈

一方 治爛瘡瘍

用橄欖燒灰存性為末先用米泔水洗淨後捲上藥

一方 治舌腫

名曰重古 用百草霜為末以好醋調敷立効真蒲黃末捲之亦效

柳花散

治口舌生瘡 玄胡索一兩黃柏

黃連各半兩蜜陀僧三錢青黛二錢

右為末傅貼口內有津即止

○已上諸方治標之劑

升麻散 濟生方治 上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

甘草 生用五錢 升麻 赤芍藥 人參 桔梗 乾葛各一兩

右㕮咀每服四錢水一鍾半姜五片煎八分溫服

瀉黃飲子 濟生方治 風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷 升麻 枳殼 去白炒 黃芩 防風 牛夏 湯洗 石斛各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

黑參丸 治口舌生瘡久不愈 黑參 天門冬 夷門冬去心各炒一兩

右為末煉蜜丸如彈大每用一丸綿裹噙化嚥津

增損如聖散 治上焦熱壅口舌生瘡 桔梗二兩 甘草炙一兩半 防風半兩 枳殼製二錢半 黃芩一兩

右為末每服三錢水煎食後服

○已上諸方治本之劑

○廣按口舌症中治標之劑毛靜而治本之劑稍畧宜於火類風熱類之中選而用之

牙齒六十七

丹溪心法

○牙痛梧桐淚為末少加射香擦之 牙大痛必用胡椒薑擦能散其中浮熱間以升麻寒水石佐以辛涼荆芥薄荷細辛之類 又方用清涼藥便便痛不開必須從治薑擦川芎薄荷荆芥細辛樟腦青鹽

治牙痛甚者 防風 筋活 青鹽合同細辛 薑擦 川椒 右為末擦噙

又方 南星為末霜梅五箇取其引涎以荆芥薄荷散風熱青鹽入腎入骨擦噙

又方 蒲公英燒灰香附末 白芷 青鹽 右為末擦噙

治陰虛牙出鮮血氣齶 用四物湯加牛膝香附生甘草側柏

蛀牙 蘆薈白膠香塞蛀孔中

陽明熱而牙痛 大黃香附各燒灰存性為末入青鹽少許不時擦牙上

固齒 用羊脰骨燒存性二錢當歸白芷猪牙皂角青鹽各一錢為末擦牙上

刷牙藥 燒白羊骨灰一兩升麻一兩黃連半錢擦用

附諸賢論

王節齋曰牙床腫痛齒痛動搖或黑爛脫落世人多作腎虛治殊不知此屬陽明溼熱蓋齒雖屬腎而生於牙床上下床屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚味膏梁甘滑之物以致溼熱上攻則牙床不清而為腫為痛或出血或生虫由是齒不得安而動搖黑爛脫落也治宜瀉陽明之溼熱則牙床清寧而齒自然安固矣

附諸方

血竭散 應驗牢牙定痛治 齒根注復連臍骨疼痛久而不愈者

血竭 石膽 乳香 五靈脂 蜜陀僧各等分

右研令勻每用一字以指蘸貼牙病處候少時荆芥湯漱

立効散 御藥院方 治牙疼不忍

百草霜細研滄鹽研各一錢射香淨研乳香研細各半錢

右併一處再研勻每用少許口噙溫水隨牙疼一邊鼻內搐之用無時尤妙

一方 用蒼耳草細辛芫花小麥川椒各等分剉碎水煎時時噙漱吐去藥不可嚥下又細辛芫花二味擦漱尤妙

青龍散 御藥院方 治陽經風熱齒斷腫痛

香白芷 川芎 盆硝 細辛各半兩青黛三錢薄荷葉二錢

右為末以指蘸藥擦牙腫處吐津誤嚥不妨

宣牙膏 御藥院方 治齒動搖不牢疼痛不止斷肉出血 射香一字龍骨 定粉另研各二錢半

右二味為細末後入射香勻用黃蠟一兩磁盞內鎔開入藥於內攪勻放冷取出熨斗燒鋪紙內藥攤之勻薄每用剪作紙條兜臨臥於齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥每夜用之此半月消牙齒腫忽生斷肉治疳蟲去風邪牢牙齒大有神効 生斷肉治疳蟲去風邪牢牙齒大有神効

梧桐淚散 御藥院方 治牙齒斷腫悶宣露血出

梧桐淚 細辛 川芎 白芷 各半錢 生地黃一錢 青鹽二分 寒水石燒熟二錢

右件同為細末每用塗貼患處吐涎誤嚥不妨無時日五七次

露蜂房散 御藥院方 治牙齒疼痛經驗神效

露蜂房 炒黃細辛各二錢半 大戟七錢半 防風一錢下半

右咬咀每五錢水一鍾煎七分去滓熱嗽冷吐無時

消毒散 御藥院方 治牙齒并口唇生瘡腫痛

晚蚕蛾 五倍子 蜜陀僧各一錢

右為細末每用少許乾傅瘡上有津吐出

開關散 應驗方 治牙關緊急不開因風熱攻注牙齒

川芎 薄荷 盆硝 白芷 全蝎各一錢 瘤蠶 天麻 各半錢 細辛一錢

右為末每用少許以指蘸藥滿口擦牙斷上噙半時用溫水漱吐

太和散 御藥治牙齒動搖斷肉浮腫蟲蛇發痛

梧桐淚 白茯苓 生地黃各半錢 川芎 香白芷 升麻各三分 華陰細辛三分 青鹽一分 射香半分

牙皂燒存性二分

右為末青鹽射香另研拌勻每用藥少許指蘸藥擦牙病處常用去疳牙定疼止痛

消風定痛散 應驗治牙齒疼痛風熱攻注斷肉腫悶

荆芥四錢 白芷 防風 細辛 全蝎 升麻 川芎 各二錢 膽礬 二分 朴硝 青黛各八分

右為末每用一指蘸藥擦於牙上噙半時有津吐出

赴筵散 和劑方 治風牙虫牙攻痒疼痛不可忍者

良姜去芦草烏去皮 細辛去土葉 荆芥去梗各等分

右為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良久用鹽湯灌漱其痛即止用腐炭末一半根常使擦
細辛散 和劑方 治風虫牙疼或牙齦宣爛腮頰浮腫皆治

荆芥去梗一兩縮砂半兩細辛二兩川椒去目炒白芷二兩鶴虱牙包草撥各半兩草烏一兩

右為末每用少許於痛處頻頻擦之有涎吐出仍用漱盃湯

丁香散御藥治牙齒疼痛 丁香 草撥 蝎蛸 大椒 各等分為末擦法同前

定痛散御藥院方治牙風疼痛立効 細辛生半兩草烏生一兩全蝎半兩乳香二錢

右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之湏臾以鹽湯灌漱即止

雄黃定痛膏楊氏家藏方治牙齒疼痛 盆硝三錢雄黃一錢別研細 二錢大蒜二枝牙包四錠二錢

右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧子每用一丸將綿子裹藥左邊牙痛放在左耳右邊牙疼放在右耳內良久痛止取出藥丸可治數人亦皆治之

一方 治一切牙痛

川升麻 當歸 川芎 細辛 草撥 白芷 荆芥 各等分

右為末用瓦合貯之緊閉口令勿泄氣每用少許揩在牙痛處以溫荆芥湯灌漱立効

一方 治牙疼 鶴虱 細辛 白芷

甘松各等分

右為末拭牙上或煎湯噙漱立効

一方 治風牙疼 防風 麻黃

生地黃各一兩 芫花

蜂窩各五錢 花椒三錢 浮麥一把

右為粗末入葱白三根同水煎熟漱不可嚥下

一方 治虫牙疼不可忍者

用漢椒為末以巴豆一粒研成膏飯丸如蛀孔大綿裹安於蛀孔內立効

葦撥散 治風艸牙疼 葦撥

二錢 蝎硝 良姜各一錢 草烏去皮尖五分

右為末以指蘸藥擦於患處

一方 取疼牙落不犯手 草烏 葦撥各半兩

川椒 細辛各一兩

右為末每用少許擦於患牙處其牙自落

○已上數方外散治標之劑

獨活散御藥院方清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒攻注牙齒斷肉虛浮宣露根下動搖發痛又治偏頭痛漸漸攻注眼目或發疼痛視物不明其藥功效不可具述

川芎 獨活 羌活 防風六分半細辛七分薄荷 生地黃 荆芥各一錢

右粗末作一服水二鍾煎一鍾去滓溫服食後日進三兩服愈

上清防風散御藥院方治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙齒悶痛斷肉虛腫鼻塞聲重頭目昏眩並皆治之
防風 細辛去苗葉薄荷葉各二錢半 川芎一錢七分 獨活去頭芦天麻 荆芥穗 甘草炙白芷 各一錢二分半 片腦一分五釐

右同為細末入腦子再研勻細每服二錢淡茶清調勻稍熱漱冷吐不拘時如覺頭昏目痛牙齒腫悶用熱茶清調三錢食後服

甘露飲子御藥院方治男子婦人胃中客熱口氣齒斷腫悶宣露心中多煩飢不欲食嗜卧及咽喉中有瘡並皆治之

黃芩 天門冬 枳殼 麥門冬 生乾地黃 山茵陳 石斛 熟地黃各等分

右為粗末每服五錢水一大鍾煎至七分去滓溫服食後若齒斷宣露腫悶煎藥熟漱之極驗
敗毒散御藥院方治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

細辛五分薄荷葉一錢半地骨皮五錢荆芥穗三錢半

右為粗末每服七錢水二鍾煎至一鍾去滓溫漱令吐煎服尤妙

地骨皮散應驗治牙齒虛熱氣毒攻衝斷肉腫痛口舌生瘡此藥如神 柴胡四錢地骨皮三錢薄荷二錢

右咬咀作一服水一鍾半煎至一鍾去滓熱漱冷吐煎服愈好

升麻散御藥院方治牙齒疼痛生斷肉去熱毒鮮外風寒

防風去苗當歸升麻各二錢藁本去苗土甘草炙白芷細辛苦蕎各一錢木香半分

右件搗羅為散於乳鉢中砂細塗貼齒斷粗者以水二鍾藥五錢煎至七分去滓熱漱冷吐秋冬牙痛用此煎服解散最妙

地黃散御藥院方治風熱攻注陽明牙痛斷腫或血出宣露

生地黃一錢半防風細辛薄荷葉地骨皮藁本各一錢茵蕎葉當歸

荆芥穗各半錢

右同為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓微熱漱口冷吐之煎服尤妙

玉地散御藥院方治牙痛或動搖不牢

地骨皮白芷升麻防風細辛川芎槐花當歸去頭芦藁本去土甘草生各一錢

右為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓溫熟漱口冷則吐之煎服尤妙張龍圖去地骨皮加獨活治牙流膿血變骨糟風者及骨已出者俱效

○已上諸方內消治本之劑宜於火類風熱類選用

血竭散應驗治牙疳並惡瘡不差如神

寒水石燒熟四兩細研龍骨一兩蒲黃二兩血竭五錢枯白礬一兩

右為末每用少許貼在瘡口上紙封貼

檳榔散應驗治牙齒疳餽口生瘡立效

寒水石燒熟一兩細研蒲黃五錢黃丹五錢

右為末每用少許乾貼瘡上噙多時吐出

一方治走馬牙疳黃柏藜芦石膏銅青膽礬

右以火焙存性為末每用五分擦於患處

一方治牙痛青黛三錢銅綠晉礬黃柏藜芦枯礬

人言用紅棗十枚去核各分又內以火

芒硝各二錢射香半錢輕粉四十九貼黃連二錢

右為末後入輕粉射香研勻少許擦患處

一方 五倍子炒焦一兩 銅青明礬各一兩 射香少許

右研末先以鹽醋湯洗患處拭乾撒藥於上

○已上諸方治疳之劑

固齒茯苓散 應驗牢牙固齒固密不生疳疾

龍骨 寒水石燒熟 升麻 香白芷

茯苓各二兩 細辛

青鹽各三錢

石膏細末一兩

石膏四兩

射香半錢 石燕子大者半對火
燒醋淬七次

右為末每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口吐出

白牙散御藥院方 治牙齒黃黑不瑩淨

零陵香 白芷 青鹽

升麻各二錢半

石膏細末一兩

細辛一錢 射香另研砂鍋細末一兩

右除砂鍋膏香三味外五味同為細末加上前三味共八味調勻再研每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口吐出

土蒺藜散御藥院方 治牙齒疼痛斷腫搖動常用擦漱固齒

土蒺藜去角生用不以多少

右為粗末每服五錢淡漿水半碗煎至七分沸去滓入鹽末一捻帶熱時時漱之別無所忌然雖藥味不衆蓋單方之藥取効急速兼神仙秘旨云若人服蒺藜一年以後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年輕身長生今雖不作湯散服餌久而漱之其效亦同

沈香白牙散御藥院方 携齒瑩淨令白及治口臭

沈香 射香各五分 細辛 升麻 藁本 蕙香葉 甘松 白芷

二分半 石膏一兩

寒水石一兩

右為末每日早晚揩牙

齒藥方二因 西嶽蓮花峯神傳

猪牙包角及生姜

西國升麻熟地黃

木律旱連槐角子

細辛荷蒂要相當

青鹽等分同燒殼

研細將來使最良

揩牙牢齒毬黑

誰知世上有仙方

右用新瓦罐盛藥合口以若縛定塗泥固濟日乾穿一地穴先放新磚後放藥以罐口向下用炭火燒令青烟出稍存性去火經宿取為末每用擦牙溫水漱去一方早連作黃連

一方 固齒烏毬髮

母丁香 沈香各半

石燕子一隻火蟻
醋淬七次

龍骨一錢海馬
酥炒

茴香一兩生地黃
三兩

射香二錢

青鹽半兩

右為末每用一撮空心擦牙縫噙片時溫水漱去

羌活散 應驗漱牙藥去風止痛

薄荷 羌活

二錢大黃一錢

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫漱冷吐之嚥亦無妨

○已上諸方固齒之劑

○廣按牙痛之証其人腸胃素有濕熱上出於牙齦之間適被風寒或冷飲所鬱則濕熱不得外達故作痛也其病情有標本之分所用藥有溫涼之異何則牙痛之証寒是標故外擦漱之藥宜辛溫以散寒開鬱熱是本故內服餌之藥宜辛涼以散熱清中如此則內外交攻標本兩治其病豈有不愈者乎



丹溪心法附錄卷之十三

燥門

消渴 六十八

丹溪心法

○消渴養肺降火生血為主 分上中下治 三消皆禁用半夏血虛亦忌用口乾咽痛腸燥大便難者亦不宜用汗多者不可用不已必用姜鹽製 消渴若泄瀉先用白朮白芍藥炒為末調服後却服前藥即諸膏內傷病退後燥渴不解此有餘熱在肺經可用參苓甘草少許生姜汁調冷服或以茶匙挑姜汁與之虛者可用人參湯 天花粉消渴神藥也 上消者肺也多飲水而少食大小便如常 中消者胃也多飲水而小便赤黃下消者腎也小便濁淋如膏之狀面黑而瘦

入方 黃連末 天花粉末 人乳汁又云乳 藕汁 生牛汁

右後三味汁為膏入前三味搜和佐以姜汁和蜜為膏徐徐留舌上以白湯少許送下 能食者加軟石膏瓜萎根

附諸賢論

劉河間宣明論曰燥乾者金肺之本燥金受熱化而成燥澁也兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝溼熱能耗液故經云風熱火同陽也寒溼燥同陰也又燥溼小異也金燥雖屬秋陰而其性異於寒溼而反同於風熱火也又加大便乾澁乃大腸受熱化成燥澁經云諸澁枯涸又加癰瘍中風皆因火熱耗損血液玄府閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲經云肺主聲肢痛緩戾者風熱溼相致而遂以偏枯語音澁手足不隨也然中寒吐瀉液而成燥亦以鮮矣亦有寒溼相鬱榮衛不能開發實注多成偏枯經曰諸澁枯涸乾勁皴揭屬於燥也亡又如胃膈癰熱煩滿饑不欲食或癰或消中善食而瘦或燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便狂陽心火燥其三焦腸胃燥澁拂鬱而水液不能宣行則周身不得潤澤故瘦悴黃黑也而足本丹溪心法附錄

燥熱消渴然雖多飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外湯不能止而便注為小便多出俗未明妄為下焦虛冷誤人多矣及夫周身熱燥鬱故變為雀目或內障癰瘍瘍瘍上為咳嗽喘下為痔瘡或停積而濕熱內甚不能傳化者變為水腫腹脹也世傳消渴病及消瘦弱或小便有脂液者為消腎也此為三消病也

消渴 消中 消腎 經意皆云熱之所致也

附諸方

東垣曰膈消者以白虎加人參湯治之 中消者以調胃承氣湯三黃丸治之 下消以六味地黃丸治之
人參石膏湯即白虎加人參湯治膈消上焦燥渴不欲飲食

人參半兩 石膏一兩 甘草四錢 知母一分 東垣加黃芩杏仁

右咬咀每服一兩水二盞粳米一撮煎至一盞去滓通口服無時

清心蓮子飲 治心經蘊熱作渴小便或赤澁或濁淋

黃芩 麥門冬 地骨皮 車前子 甘草各三錢 蓮子 茯苓 黃芪 柴胡 人參各三錢半

右咬咀水煎服

六神湯三因方治三消渴疾 枇杷葉 丞蔥根 乾葛 蓼房 甘草 黃耆各等分

右咬咀每服四錢水一盞空心煎服小便不利加茯苓

地黃飲子簡易方治消渴咽乾而亦煩躁 人參去芦生乾地黃洗熟乾地黃 黃芪蜜炙天門冬去心

麥門冬去心澤瀉 石斛去根炒 枇杷葉去毛 枳殼去穰炒 甘草炙各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

硃砂黃連丸秘方治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴 硫砂二兩 別研宣連三兩 生地黃二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九粒心棗子湯送下

烏梅五味子湯大成專治消渴生津液

五味子 巴戟

酒浸去心

百藥煎

烏梅

甘草各等分

右咬咀每服四錢水一盞空心煎服

補腎地黃丸
秘方降心火益腎水治消渴除骨蒸壯筋骨明眼目 生地黃

半斤酒浸二日蒸爛研膏與柏子同研

鼠苓酒炒白茯苓四兩黃柏一斤剉同當歸酒洗枳殼去心熟地黃

酒浸三天門冬一兩熟地黃去心熟地黃浸天門冬去心熟地黃

心棟參甘菊花

各二兩生芩一兩

右為末滴水丸如梧子大每服七十丸空心鹽酒下

麥門冬飲子宣明方治膈消胸滿煩心津液短少消渴

五味子知母甘草炙瓜萎仁人參乾葛生地黃茯神各一兩去心

右咬咀每服一兩水二盞竹葉十四片煎一盞溫服

川黃連丸治消渴川黃連五兩天花粉麥門冬去心各二錢半

右為末生地黃汁并牛乳夾和搗丸梧子大服三十九粒米湯送下

玉泉丸治煩渴口乾

麥門冬去心人參茯苓黃芪半生半蜜炙烏梅焙甘草各一兩去心

右為末蜜丸彈子大每一丸溫湯嚼下

甘露湯經驗方治煩渴口乾百藥煎白乾葛各三錢烏梅

五味子天花粉各二錢甘草半錢

右咬咀水煎服

又方經驗方止渴及除瀉後煩渴常服調中和氣茯苓人參各五錢

乾葛一兩藿香木香甘草各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服加滑石亦可

桔梗湯經驗方治消渴小便多

用桔梗根薄切炙五兩水五升煮取四升隨意飲

桔梗丸

用枯萎根薄切用人乳汁拌蒸竹瀝拌晒為末煉蜜為丸如彈子大噙化或丸如菉豆大每服百丸米飲下忍冬丸 治消渴既愈之後須預防發癰疽之患

用忍冬草不以多少根莖花葉皆可用置瓶罐內用無灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入取草少許碾為細末以所浸酒打麯糊丸如梧子大每服一百丸不拘時溫酒米飲任下

一方用忍冬草水浸煎服。

黃耆六一湯 治諸虛不足胸中煩惱常消渴或先渴而欲發癰疽或病癰疽而作渴並宜服之

見盜汗
大黃甘草飲子 宣明方治男子婦人一切消渴不能止者

甘草 大麗者四兩長四指打碎 大黃一兩半錦紋者 大豆五升煮三沸另淘苦水再煮

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糊水少更添豆軟於盆中放冷令病人食豆渴飲湯汁無時候食盡如渴燥止罷不止再煮前藥不三次病即去矣

○已上諸方治上消之劑

調胃承氣湯

三黃丸

俱見火類

順氣散 拔粹方 消中暑熱在胃而能飲食小便黃赤以此下之不可多利微微利至不飲食而愈

厚樸 姜製一兩 大黃 四錢 枳實 一錢 右咬咀水二盞煎至一盞去滓通口服無時

人參白朮湯 宣明方 治胃膈痺熱煩滿飢不欲食痺成為消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒過積毒一切腸胃燥澀倦悶壅塞瘡疥麻痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山梔子 荆芥穗 薄荷 桔梗 知母 澤瀉 各半斤 茶芩 去皮 連翹 瓜蔞根 乾葛 各一兩 甘草 三分 蕙香葉 青木香 官桂 各一分 即石膏 四兩 寒水石 二兩 滑石 半斤

右為細末每服抄五錢水二茶盞入盆硝半兩生姜三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢組
臟腑流利取効如常服以意加減兼服消痞丸散以散腸胃結滯溼熱內甚自利者去大黃芒硝

消痞丸宣明方治積溼熱毒甚者身體面目黃心脹滿嘔吐不能飲食瘦弱難以運動咽嗌不利肢體焦紅
眩悸膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為咳血衄血下為大小便血腸風痔漏三焦壅滯閼痺熱中消渴

傳化失常小兒疳積熱

黃連

乾葛

各一兩

黃芩

大黃

黃柏

梔子

薄荷

藿香

厚朴

茴香

炒各半兩

木香

各二錢半

青黛

一兩研

牽牛

二兩

右為細末滴水丸如小豆大每服十九新水下溫水亦得小兒丸如麻子大病本濕熱內甚自利者去上

黃牽牛忌發熱諸物

黃連猪肚丸三因方治強中消渴

黃連去鬚梁米

瓜蔞根

茯神

各四兩

知母

麥門冬

去心各二兩

右為末用大豬肚一箇洗淨入藥末於內以麻線縫合口置瓶中煆極爛取出藥別研以豬肚為膏再入蜜搜和前藥杵數千下丸如梧桐子大每服五十九人參湯下一方加人參熟半濟生除知母梁米用小來加味錢氏白朮湯直指方治消中消穀善飢

人參 白朮 白茯苓 甘草 炙霍香葉

一枳殼

去穰炒半兩

乾葛

二兩

木香

北五味

柴胡

各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎服

五豆湯瑞竹能解酒毒止消渴能發小兒豆疹不出并解發渴之証後成瘡痍者

黑豆

黃豆

菉豆

青豆

赤小豆

各五升

乾葛

二斤

甘草

一斤

貫眾

半斤

右前藥俱不到用水五斗五升臘八日用大鍋熬至熟濾出豆汁令以磁甕盛之箬葉紙重封春夏月開田酒後渴隨意飲大人渴後或成瘡痍小兒豆疹不出皆可飲最妙

炙法秘方近世醫者不審病証從何而得不明靈實每以補藥投之遂致不救可惜也殊不知癰者乃積熱山

復以熱藥與之是乃失之若服補藥即寸口脉芤其人下熱即不可治也甚者吐血而死有灸法甚妙令病人豎其兩手剪去中指甲於兩手中指頭上各灸一炷如大豆令兩人發火仍令兩人吹去各指尖上艾培其火必爆再用艾培兩箇兩脚二處太衝脉上亦依前法兩人發火吹之亦爆高五六寸四箇艾培有四箇小孔處此其驗也其人立飲食黃色遂退更先灸百會穴一焙如前法吹之萬不失一也

○已上諸方治消中之劑

六味地黃丸

見補損

八味丸加減

治心腎不足消渴引飲

本方減附子加五味子

方見補損

玄兔丹

和劑方治腎水枯竭津液不生消渴諸証

兔絲子

酒浸研焙乾本十兩白茯苓二兩去皮淨乾蓮肉酒浸三兩

五味子酒浸焙半兩

右為末別研山藥末六兩將浸藥餘酒更添煮糊搜和搗數千杵丸如梧桐子大每服五十九米湯空心下夢遺白濁服之亦好

鹿茸丸

三因方治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸

去毛炙七錢半麥門冬二兩熟地黃

黃耆

五味子

鷄膝胫

炒肉

從容酒浸

山茱萸

破故紙炒

牛膝

酒浸人參各七錢半白茯苓

地骨皮

玄參各五錢

右為末蜜丸如梧桐子大每服三十九米湯下

加減腎氣丸

濟生方治腎氣不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肌體損瘦並宜服之

山茱萸肉

白茯苓去皮牡丹皮去心熟地黃

酒蒸五味子

澤瀉

鹿角

鏘山藥

炒各一兩官桂

火不見沉香

各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十九鹽湯米飲任下

弱甚者加附子半兩兼進黃芪湯

人參散

宣明方治消腎善飲而食後數小便弱者人參砂仁各三錢

白朮

澤瀉

瓜蔞

桔梗

梔子

各半兩葛根

黃芩大黃薄荷

連翹

各半兩

甘草

一兩半石膏

一兩半滑石

寒水石各三兩

右為末每服五錢水一盞煎至七分入蜜少許再煎三二沸去滓食前服食後服消痞丸

○已上諸方治下消之劑

燥結六十九

丹溪心法

○燥結血少不能潤澤理宜養陰

入方 治大腸虛秘而熱 白芍一兩半 陳皮 生半 归身一兩半 條芩 甘草二錢

右為末粥丸白湯下七八十九

附脉理

脉訣舉要曰熱厥脈伏時或而數便秘必難治不可錯

附諸方

潤麻丸丹溪秘方能潤血燥大便不通 麻子仁 當歸 桃仁 生半 枳殼各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心白湯下

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸身 升麻 桃仁泥各一錢生半 熟半各半錢 甘草炙紅花各三錢

右作一服水煎食前調枳榔末五錢或加麻仁泥一錢加大黃名當歸潤燥湯

潤燥湯 升麻 生半各二錢 歸梢 甘草生大黃 煙熟半 桃仁泥 麻仁各三錢 紅花半錢

右除桃仁麻仁另研作一服水煎次下桃仁麻仁煎空心熟服

活血潤燥丸 治大便風秘血秘常常燥結

當歸梢一錢 防風三錢 大黃一錢 煙
裹活各二錢 桃仁研如泥 麻仁二兩五錢研 包角燒存性一兩三錢其性得溫則滑

足本丹溪心法附餘

晚食之大便不致結燥以磁器盛之紙封毋令見風

脾約麻仁丸 和劑方治腸胃熱燥大使秘結

厚樸 去皮姜製芍藥

枳實 炒各八分杏仁去皮尖炒

麻仁 另研各五錢大黃蒸焙一兩六錢

右為末蜜和丸如梧子大每服二十九臨卧溫水下大便通利即止

潤腸五仁丸 楊氏方治津液枯竭大腸秘滯傳道艱難

柏子仁 半兩桃仁杏仁炒去皮尖各一兩

陳皮 四兩另為末松子仁一錢一分郁李仁炒二錢

右將五仁別研為膏入陳皮末研勻煉蜜丸如梧子大每服五十九空心米飲下

潤腸湯 楊氏方治大便秘滯連日不通

麻子仁 一盞半細研用

水浸濾去皮取濃汁芝麻水浸取濃汁

桃仁 湯泡去皮尖炒黃研去泥荆芥穗搗末各一兩

右前藥入鹽少許同煎可以代茶飲之以利為度

橘杏丸 濟生方治老人氣秘大腑不便

橘紅 取未杏仁湯浸去皮尖各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服七九空心米飲下此治脈浮晝便難者如脈沈夜便難用桃仁橘紅

紫蘇麻仁粥 老人服之能順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁

右二味不拘多少研爛水瀝取汁者粥食之

潤腸丸 濟生方治發汗過多耗散津液大腑秘結

肉蓯蓉 酒浸焙二兩沉香另研一兩

右為末用麻子仁汁打糊為丸如梧桐子大每服七十九空心米飲下

搜風順氣丸 治虛老之人大便結燥

方見中風

潤腸丸 直指方治大便澀閉

陳皮 半兩阿膠炒防風錢半皮尖

杏仁 炒去皮尖枳殼去穰炒麻仁各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九蘇子湯荆芥湯任下

大黃飲子 聖惠方治身熱大便不通

川大黃 溼紙裹煨 杏仁 去皮尖炒 升麻 桑子仁 枳殼 去穰炒各五錢 生地黃 一兩 人參 黃芩 甘草 二半錢

右咬咀每服一兩生姜五片豉二十一粒烏梅一箇水二盞煎至一盞去滓食前通口服 一方用枳實通神散 良方 治婦人大便不通 大黃 芒硝 桃花 郁李仁 湯泡去皮微炒各一兩 木香半兩

右為末每服二錢米飲調下空心加四物湯二錢尤妙

火麻仁丸 良方 治婦人腸胃風結大便常秘

火麻子 去殼研膏 大黃 炒二錢 桔梗 木香 枳殼 各一兩

右為末與麻仁研勻煉密為丸如梧子大每服三十九食前白湯下

○已上諸方治血液枯涸燥結之劑

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯 已上三方治風寒傳裏厥熱極深大便燥結以此下之 方見火類

三和散 和劑 方治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不和心腹痞悶大便秘滯

羌活 去芦 紫蘇 去梗 宣木瓜 薄切 沉香 各一錢 木香 白朮 桔梗 各七錢半 甘草 炙陳皮 各七錢半

大腹皮 一錢

右咬咀每服五錢水一盞煎六分不拘時服

枳殼丸 濟生方 治腸胃風氣壅盛大便秘實

枳殼丸 去穰 川大黃 羌活 去芦 木香 不見火 橘紅 桑白皮 蜜炒 香白芷 各一兩 包角 一挺去黑皮炒

右為末煉蜜丸如梧子大服七十九空心米飲姜湯任下

枳榔丸 濟生方 治大腸濕熱拂鬚不通心腹脹滿大便秘結

黃芩 一兩 大黃 濟生方 治大腸濕熱拂鬚不通心腹脹滿大便秘結 桔梗 白芷 枳殼 蜜炒 羌活 去芦 牛牽牛 炒各一兩 人參 五錢 麻仁 炒去壳另研 杏仁 去皮炒

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十九空心熱水下

木香三稜散

瑞竹堂方治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛半生半炒多用大腹子多用枳榔

木香雷丸錫灰醋炒三稜煨莪木煨大黃以上各二兩

右為細末每服三錢空心蜜水調下或砂糖水亦可湏先將燒肉一片口中嚼之吐出口中肉汁後服藥

牛黃丸拔粹方治上焦熱臟腑秘結

大黃一兩白牽牛頭末半兩

右為細末有厥冷用酒調下三錢無厥冷而手足煩者蜜調下

皂角丸濟生方治大腸有風大便秘結年高人宜服

皂角火去子枳殼去穰炒各等分

右為細末蜜丸梧子大每服七十丸空心米飲下

南木香丸聖惠方治大便秘結

南木香不見火枳榔麻仁枳殼

右等分先將枳殼去穰每箇切作四片用不蛀皂角三寸生姜五片巴豆三粒略搗碎不去殼用水一盞將枳殼同煮和滾瀝去生姜巴豆皂角不用只將枳殼剉細焙乾為末入前木香枳榔麻仁同為末煉蜜丸梧子大蜜湯下不拘時服五十九

搜風潤腸丸聖惠方治三焦不和胸膈痞悶氣不升降飲食遲化腸胃燥澁大便秘結

沉香

枳榔

木香

青皮

蘿蔔子

炒槐角炒陳皮去穰

枳殼炒三稜煨

枳實去穰

木通各五錢

郁李仁

去皮一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五六十丸木瓜湯下常服溫潤腸胃導化風氣一方有大黃無木通米飲

消毒麻仁丸和劑方

杏仁二兩去皮

大黃生五兩

山梔子十兩

右為末蜜丸梧子大每服五十九食前白湯送下

○已上諸方治溼熱拂鬱燥結之劑

治大便不通

用皂角燒烟馬桶內坐薰即通

治大小便不通秘方 用火燒鹽於臍內切蒜一片蓋鹽上艾灸二三炷即通

治大小便不通 用明礬末一匙安臍中冷水滴之冷透腹內自然通如是曾灸無臍孔即於灸盤上用紙
撲作圈子籠燙盤着礬末在內仍作前法用溫水滴之

治大小便不通直指方用連根葱一二莖帶土生姜一塊淡豆豉二十一粒鹽二匙同研爛撲作餅子烘熟掩
臍中以帛札定良久氣透自通不然再換一餅


提盆散拔粹方即霹靂箭 用草烏一味為末用葱頭帶涎蘸烏頭末納肛門中

蜜導法 凡諸秘結不通或兼他証又或老弱虛極不可用藥者用蜜熬入皂角末少許乘熱撲作丸候冷以
導之冷秘生姜兌佳

猪膽汁導法 用大猪膽一枚瀉汁和醋少許灌穀道中一飯噴當大便自利

○已上諸方外導之法

○廣按燥結之証有虛實二者之分何則或因風寒邪從外入或因七氣火自內起此是溼熱怫鬱燥結有
時乃為實也實則宜瀉滌腸胃開結軟堅如大黃芒硝枳實厚樸承氣湯之類是也或因病久飲食少進
或因年高將息失宜此是血液枯涸燥結無時乃為虛也虛則宜滋養陰血潤燥散熱如當歸地黃桃仁
條芩潤燥湯之類是也凡燥結之症苟不審虛實而輕用藥死生如反掌之易也耶



丹溪心法附餘卷之十四

鬱門

六鬱七十

丹溪心法

○氣血冲和萬病不生一有怫鬱諸病生焉故人身諸病多生於鬱 蒼术撫芎總鮮諸鬱隨証加入諸藥
丸鬱皆在中焦以蒼术撫芎開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降矣 餘皆倣此

戴云鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化也此為傳化失常一鬱之病見矣 氣鬱者胸脇痛脈沉澁溼鬱者周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉細痰鬱者動則寸喘口脉沉滑熱鬱者督悶小便赤脈沉數血鬱四肢無力能食便紅脈沉食鬱者噯酸腹飽不能食人迎脉平和氣口脉緊盛者是也

入方	氣鬱	香附	蒼术	撫芎	溼鬱	白芷	蒼术	川芎	茯苓
疲鬱	海石	香附	南星	米泔水	蒼术	米泔水	撫芎	白芷	蒼术
熱鬱	山梔炒	青黛	香附	蒼术	撫芎	白鬱	桃仁	皮紅花	青黛
食鬱	蒼术	香附	山查	神曲炒	針砂	皮紅花	川芎	撫芎亦可	香附
越鞠丸	解諸鬱	又名芎术丸	蒼术	撫芎	醋炒七次研極細	春加芎	夏加苦參	秋冬加吳茱萸	神曲
附論									

王節齋曰丹溪先生治病不出乎氣血痰三者故用藥之要有三氣用四君子湯血用四物湯痰用二陳湯又云久病屬鬱立治鬱之方曰越鞠丸蓋氣血痰三病多有兼鬱者或鬱久而生病或病久而生鬱或悞藥雜亂而成鬱故予每用此三方治病時以鬱法參之氣病兼鬱則用四君子加開鬱藥血痰病皆然故四法者治病用藥之大要也

氣帶 七十一 附氣刺痛 諸氣

丹溪心法

○破滯氣須用枳殼高者用之夫枳殼者損胸中至鬲之氣二三服而已入云滯氣用青皮勿多用多則濁真氣如實熱在內相火上衝者如氣滯用知母黃柏黃連黃芩如陰虛氣滯者宜四物加玄參黃柏以補血○氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行則可若稟受素壯而氣刺痛宜枳殼烏藥若肥白氣虛之人氣刺痛者宜參木加木香若因事氣鬱不舒暢而氣刺痛當用木香

○諸氣新增

附諸賢論

張子和云夫天地之氣常則安變則病而况人稟天地之氣五運迭侵於外七情交戰於中是以聖人嗇氣如持至寶庸人投物而反傷太和此軒岐所以論諸痛皆因於氣諸病皆生於氣遂有九氣不同之說氣本一也因所觸而為丸怒喜悲恐寒見驚思勞也其言曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣王太僕曰怒則陽氣逆上而肝水乘脾故甚則嘔血及飧泄也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心緣急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦長故氣不行矣太僕云恐則傷精却上而不下流下焦亦廻還而不散故聚而脹也然上焦固禁下焦氣還故氣不行也寒則腠理閉氣不行故氣收矣太僕云身涼則衛氣沈故皮膚文理及滲泄之處皆閉塞而氣不流行衛氣收斂於中而不散也炅則腠理開榮衛通汗大出故氣泄矣太僕云人在陽則舒在陰則慄故熱則膚腠開發榮衛大通津液而汗大出也驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外氣越故氣耗矣太僕云疲勞役則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出內外皆踰越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣太僕云繫心不敢故氣亦停留而結也此素問之論九氣其變甚詳其理甚明矣

原病式曰氣為陽而主輕微諸所動亂勞傷乃神陽火之化神狂氣亂而為病熱者多矣子和云河間治五志獨得言外之意凡見喜悲怒思恐之證皆以平心火為主至於勞者傷於動動便屬陽鬱者駭於心心便屬火二者亦以平心火為主今之醫者不達此旨遂有寒涼之謬

劉宗厚曰捍衛冲和不息之謂氣擾亂妄動變常之謂火當其和平之時外護其表復行於裏周流一身循環無端出入升降繼而有常源出中焦總統於肺氣曷嘗病於人也及其七情之交攻五志之間發乖戾失常清者行者抑遏而反止表失衛護而不和裏失健悍而少降當運漸遠肺失主持妄動不已五志厥陽之火起焉上燔於肺氣乃病焉何者氣本屬陽反勝則為火矣河間有曰五志過極皆為火也何後世不本此議而一槩類聚香辛燥熱之劑氣作寒治所據何理且言指迷七氣湯製作者其皆用青皮陳皮三棱蓬朮益智官桂甘草遂為平和可以常用通治七情所傷混同一意未喻某藥以治某氣已下諸方尤有甚焉者茲不復叙況所起之情各各不同且夫經言九氣之變未嘗略而不詳如怒則氣上等證其言治法高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之驚者平之勞者溫之結者散之喜者以恐勝之悲者以喜勝之九氣之治各有分別何嘗混作寒論而類以香熱之藥通言而治諸氣豈理之謂歟芳香辛燥熱之劑但可却滯氣衝快於一時以其氣久抑鬱借此暫行開發之意藥中不佐制伏所起之氣服甚則增熾鬱火蒸熏氣液而自成積積滋長而成痰痰飲下膈氣乃氣虛清虛之象若霧露之著物雖滯易散內挾痰積開而復結服之日久安有氣寔而不動氣動而不散者乎此皆人所受悞之由習俗已久相沿而化卒莫能救升發太過香辛散氣燥熱傷氣真氣耗散濁氣上騰猶有腎虛不能攝氣歸原遂與蘇子降氣湯四磨湯下黑錫丹養氣丹鎮墜上升之氣且硫黃黑錫佐以香熱又無補養之性藉此果能生氣而補腎乎請熟詳之夫溼痰甚者亦或當之初服未顯增變由喜墜而愈進形質弱者何以收救不悟肺受火邪子氣亦弱降令不行火無以制相扇而動本勢空虛命絕如縛積而至深丹毒潛火一旦火氣狂散喘息奄急而死吁以有形丹石丸藥重墜無形之氣其氣將何抵受隨而降之乎譬以石投水水故未嘗沈也豈不死歟丹溪有曰上升之氣自肝而

出中挾相火其熱為甚自覺其冷非真冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故有此證認假作真是似之禍可勝言哉內經雖云百病皆生於氣以正氣受邪之不一也今七情傷氣鬱結不舒痞悶壅塞發為諸病當詳所起之因滯於何經上下部分臟氣之不同隨經用藥有寒熱溫涼之同異若枳殼利肺氣多服損胸中至高之氣青皮瀉肝氣多服損真氣與夫木香之行中下焦氣香附之快滯氣陳皮之泄逆氣紫蘇之散表氣厚樸之散衛氣枳榔之瀉至高之氣藿香之馨香上行胃氣沉香之升降真氣腦麝之散真氣若此之類氣實所宜其中有行散者有損泄者其過劑乎用之能却氣之標而不能制氣之本豈可又佐以燥熱之藥以火濟火混同謂治諸氣使之常服多服可乎氣之與火一理而已動靜之變反化為二氣作火論治與病情相得丹溪發揮論之冷生氣者出於高陽生之謬言也自非身受寒氣口食寒物而遽論寒者吾恐十之無一二也

附脉理

脉訣舉要曰下手脉沉便知是氣沈極則伏竚弱難治其或沈滑氣兼痰飲

又曰沉弦細動皆氣痛證心痛在寸腹痛在關下部在尺脉象顯然

附諸方

蘿合香丸和劑方專能順氣化痰并治傳尸骨蒸諸項勞瘵卒暴心痛鬼魅瘡瘍赤白下痢小兒驚癇等症

沉香

射香研子

丁香

青木香

安息香

別為酒

一升熟膏

香附

去毛

草梢

白术

白檀香

各一錢研蘇合香油

入安息香膏內

龍腦

研各一錢

硃砂

研飛烏犀角

各二錢

右為末入研藥極勻用安息香膏并煉蜜和劑丸如櫻桃大空心用溫水化下四九酒服亦可

三和散和劑方治五臟不調風氣壅滯面目虛浮腸胃燥澁見燥結類

流氣飲子 治男子婦人五臟不和三焦氣壅心胸悶痞咽塞不通腹脹脹脹嘔吐不食及上氣喘急咳嗽痰盛面目浮四肢腫大便秘澁小便不通及治憂思太過陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰又治腳氣腫痛喘急

腹脹大便不通及氣攻肩背脇肋走注疼痛

紫蘇葉 青皮去白當歸 沈陽芍藥 烏藥 茯苓去皮桔梗 半夏湯洗川芎 黃芪 枳實炒

防風各五錢 甘草炙陳皮去白各七錢半 木香二錢半 連皮大腹子一兩姜製一宿焙

右咬咀每服半兩水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去滓不拘時溫服

拔粹方有枳殼枳榔各半兩

分氣紫蘿飲

治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止見喘類

蘇子降氣湯

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

見痰類

秘傳降氣湯和劑方治上盛下虛氣不升降上盛則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽乾喉燥下虛則腰脚無

力小便頻數或大便秘結

骨碎補去毛炒訶子泡去核草果仁去皮煨半夏曲桔梗各半兩桑白皮炒二兩地骨皮炒黃

枳殼去穰炒五加皮酒浸半斤炒黃陳皮去白柴胡去芦甘草各一兩

右為篋散和勻再就蒸一伏許晒乾每服二錢紫蘇三禁姜三片水一盞同煎六分食後溫服又能調順榮

衛通利三焦如痰嗽加半夏曲心肺虛滿加人參茯苓上膈熱加黃芩下虛加熟附子婦人氣血虛加當歸

沉香降氣湯

和劑方治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘促短氣又治脾胃留飲噫醋吐酸脇下胸膈常覺

砂仁四兩八錢甘草炙十二兩沉香一兩八錢半沉香附去毛四十兩沉香一兩八錢半

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

沉香升氣湯御藥院方治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞見脇痛

紫沉通氣湯御藥院方治三焦氣滯不能宣通腹脇脹大便秘

紫蘿葉枳殼炒陳皮去白赤茯苓去皮甘草炙枳榔各一兩沉香木香麥門冬去心五味子

桑白皮黃芪乾生姜薄荷葉荆芥穗枳實各五錢

右咬咀每服半兩水一盞半煎八分空心溫服

香橘湯聖惠方治一切氣不快久病服藥不下者

香附子大者去鬚陳皮去白枳實生白木甘草炙各三兩

右為末每服二錢鹽湯調或姜棗煎尤妙如傷風用葱白姜棗煎

分心氣飲和劑方治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神或臨食憂懼或事不隨意使抑鬱之氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噫氣吐酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘或因病之後胸中虛痞不思飲食皆可服之

木通去赤芍藥赤茯苓官桂半夏湯洗七次桑白皮大腹皮陳皮去青皮甘草羌活各一兩

紫蘇四兩

右㕮咀每服一兩生姜三片棗二枚灯心十五莖水二盞煎至一盞去渣通口服之

分心氣飲秘方治症同前

木香半錢丁皮一錢人參半錢香附子一錢半白术半錢大腹子半錢霍香一錢

大腹皮半錢桑白皮半錢草果半錢桔梗半錢麥門冬半錢厚樸半錢陳皮錢紫蘿半錢

甘草錢枳實半錢半夏一錢

右用水二盞生姜三片棗子一箇燈心十莖煎至一盞溫服不拘時

大藿香散濟生方治七情傷感氣鬱子中變成嘔吐或作寒熱眩暉痞滿不進飲食

木香見火一兩不藿香葉半夏慈白术各一白茯苓皮去火桔梗炒芦人參枇杷葉毛去皮官桂不見火甘草炙各五分

右㕮咀每服三錢水二盞生姜五片棗子一枚煎至一盞溫服

紫蘇子湯濟生方治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促胸滿腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而濶

紫蘇子一兩大腹皮草果仁半夏湯洗七次厚樸去皮製木香不見火橘紅木通白术枳實炒人參

甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水二盞生姜五片棗二枚煎至一盞溫服

橘皮一物湯直指方治諸氣攻刺及感風寒暑溼初証通用丸酒食所傷中脘痞塞妨悶嘔吐吞酸

橘皮 洗淨用新汲水煎服

木香流氣飲和劑方調順榮衛流通血脉快利三焦安和五藏治諸滯痞氣不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食肩背腹脇走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澁又治憂思太過怔忪鬱積脚氣風溼聚結腫痛喘滿脹急

半夏一分半 厚朴一錢二分 陳皮二錢四分 青皮 甘草 香附子 紫蘇各一錢二分 人參 赤茯苓 木瓜 白朮
麥門冬 大黃錢半各一錢 白芷 枳殼各三分 草菓 官桂 蓬术 大腹皮 丁皮 桔梗 木通六分
沉香各四分半 木通六分

右用水二盞生姜三片棗子二箇煎至一盞熱服不拘時候

蟠葱散和劑方治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇膀胱小腸疝氣及婦人血氣刺痛

延胡索 肉桂 乾姜炮各二兩 甘草 紹砂去蒼术米泔水浸一夜 丁皮 桔梗各四兩 蓬术 三棱煨
茯苓 青皮去白各六兩 右為末每服二錢水一盞葱白一莖煎七分空心熱服

撞氣阿魏丸和劑方治五種噎疾九種心痛痃癖氣塊冷氣攻刺腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫疝氣婦人血氣

茴香炒 青皮去白 甘草炒 陳皮去白 蓬莪术 川芎各一兩 生姜四兩切片鹽水淹一宿 胡椒 白芷 肉桂去皮

宿砂 小茴香炒各半兩 阿魏酒浸一宿同麪糊各一錢半

右為末阿魏和麪糊丸如鷄頭大每藥一斤用硃砂七錢為衣每服三五粒丈夫氣痛炒姜鹽湯下婦人血氣痛酸湯下

神保丸和劑方治諸積氣為痛宣通臟腑 乾蝎十箇全者 木香 胡椒各二錢半 巴豆十箇去皮心膜 別研取霜用

右為末入巴豆霜令勻湯化蒸餅丸如麻子大硃砂為丸每服五七丸 心腸痛橘蒂燈心湯下 腸痛橘蒂煅姜湯下 血痛炒姜醋湯下肺氣甚者以白礬蛤粉各二錢黃丹一錢同研煎桑白皮糯米飲下 氣小喘只用桑白皮糯米飲下 腸下痛炒茴香酒下 大便不通蜜湯調枳榔末一錢下 氣噎木香湯下

宿食不消茶酒漿任下

○廣按已上三方消積之藥也蓋五心之火動素常無積則流注四體而病輕有積則阻滯一處而痛重故此三方乃消積之藥也前諸方乃調氣之藥學者須審輕重而用之可也

○已上諸方辛溫消散之劑

三因七氣湯 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆恶心並宜服之

半夏五兩茯苓四兩厚朴三兩紫蘇二兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜七片棗子一枚煎至八分去滓熱服 若因思慮過度小便白濁此藥下青州白丸子最妙 婦人惡阻尤宜服之但半夏用姜汁製過 一方治七情所傷中脘不快氣不升降腹脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩尤快或者謂其耗氣則不然有是病服是藥也

桔梗枳殼湯 直指方治諸氣痞結滿悶 枳殼 桔梗各二兩甘草五錢

右㕮咀每服四錢水二盞生姜五片煎至一盞溫服

烏附湯和劑方調中快氣治心腹刺痛 香附子一兩烏藥半兩甘草三錢

右為細末每服三錢入鹽少許沸湯調服不拘時候

快氣湯和劑方治一切氣疾心腹脹滿胸膈噎塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解不思飲食

砂仁 甘草 香附子各三錢二分 加桔梗一錢陳皮一錢

右用水二盞入生姜三葉煎至一盞去滓溫服不拘時

木香枳术丸 拔粹方破滯氣消飲食開胃進食 木香一兩枳實炒一兩白术二兩

右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十九溫水送下

木香化滯湯 拔粹方治因憂氣食溼麪結於中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食食之不散常常痞氣

枳實二錢 柴胡四錢 木香 橘皮各三 甘草 紅花各半 半夏一兩 草豆蔻半兩 當歸一錢

右㕮咀每服三錢水二盞生姜三片煎至一盞通口服

枳殼煮散 治悲哀傷肝氣痛引兩脇

防風 川芎 枳殼 細辛 桔梗 甘草 葛根 右用水煎服

木香 桀榔九 頤藥疎導三焦寬利胸膈破瘀逐飲快氣消食

木香 枳殼 麸炒青皮去白 杏仁去皮 麸炒 桀榔各一 郁李仁去皮 包角去皮酥炙半夏麵各二兩

右為末別以包角四兩用漿水一碗搓揉熬膏更入熟蜜少許和圓如梧桐子大每服五十九食後湯下復元通氣散聖惠方治諸氣閉澁耳聾耳疼腹癱便癱瘡疽無頭一切氣刺活血止痛內消瘡腫

甘草半錢半生三兩半生川山甲炮二兩 桔萎根二兩青皮 陳皮各四兩

右為末每服一錢熟酒下瘡無頭者津液調塗

東垣木香順氣散 治濁氣在上則生腹脹 木香三分 厚樸四分 青皮 陳皮 益智 茯苓 澄鴻

生姜 半夏 吳茱萸各五分 當歸五分 升麻 柴胡一分 草豆蔻三分 煨蒼朮三分

右作一服水煎溫服

木香道氣丸秘方治憂思傷脾停積飲食常服消食化氣

神曲 麥蘖各四兩 蘿蔔子 牽牛末 杏仁四兩 木香 陳皮 青皮各二兩

右為末將蘿蔔子杏仁研泥同麵糊丸如梧桐子大每服三五十丸鹽湯下

木香破氣散又名不老湯 木香 甘草各半兩 香附子四兩 烏藥 片姜黃各二兩

右為末每服二錢鹽湯空心調下

木香順氣丸 木香半兩 枳殼 麸炒陳皮 补骨脂 香附子各一兩 牽牛六兩 大腹皮 蘿蔔子各半兩

右為末水丸如梧子大每服五十九溫水下不拘時

青木香丸和劑方治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔吐痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛二十四兩取炒香取頭末十二兩木香三兩補骨脂炒草澄茄各四兩
枳榔酸粟米飯裹溼紙色火中蝦令紙焦去飯四兩

右為末入牽牛末令勻以清水和為丸菉豆大每服三十九茶湯熟水任下

○廣按氣病用氣藥而不効者氣之所藏無以收也蓋肺主氣腎藏氣已上二方用補骨脂所以使氣升降而歸於腎臟也

東垣升陽順氣湯 治忿怒傷肝思想傷脾悲哀傷肺以致各經火動有傷元氣發熱不思飲食

升麻 柴胡 陳皮各一半夏 人參各三錢黃芪四錢甘草
各半錢當歸一錢草豆蔻一錢神曲炒一錢半

右㕮咀每半兩入姜煎

○廣按此方補氣消氣之藥也

治氣六合湯 治亡血後七情所傷或婦人產後月信後着氣

當歸 川芎 芍藥 地黃 木香 枳榔 右以水煎服

○廣按此方補血消氣之藥也

○已上諸方辛平消散之劑

是齋推氣丸百一選方治三焦痞塞氣不升降胸脇脹滿大便秘澁小便赤少宜服

大黃 陳皮 枳榔 枳實 牽牛各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九溫水下量虛寢加減

木香順氣丸秘方木香半兩枳榔 青皮去白各一兩大黃三兩微涼黑牽牛末生一兩熟一兩

右為末每藥末四兩麵一兩三錢蜜丸梧子大每服四十九溫水下

木香枳殼丸 寶胸膈進飲食消食快氣

見痢類

木香枳榔丸瑞竹堂方治因氣胸膈痞塞腹脇脹滿 木香 枳榔

黃連去當歸

枳殼去穰火煨

青皮去穰陳皮去白香附子黃柏皮粗蓬朮各一黃芩二兩牽牛頭末二兩大黃酒浸四兩

右為末水丸如梧子大每服五七十九姜湯送下

○已上諸方辛寒消散之劑

○廣按張子和云諸痛皆因於氣諸病皆生於氣誠哉斯言是氣也常則為氣道引血液升降三焦周流四體變則為火有升無降燔灼中外以致血液稽留為痰為積充乎臟腑溢乎經絡膠乎咽膈為嘔欬為痞塞為脹滿為疼痛之所由也局方不分新久類用香辛燥熱之藥以治之宜乎丹溪先生之所謂也今子所集不然分而為三曰辛溫曰辛平曰辛寒使後之人久遇氣動痛作之時即以辛溫以散之稍久即以辛平以和之辛寒以折之如此則邪易退正易復而病安庶乎不為以火濟火病根愈深真氣愈耗而死期逼矣然於風動痛作之初非辛溫消散不可必須詳其所起之因觸動何臟之今於辛溫藥中加以苦寒之藥尤佳如喜動心火加黃連怒動肝火加柴胡悲動肺火加黃芩恐動腎火加黃柏思動脾火加芍藥之類是也夫病源屬火而辛溫之藥止能開鬱行氣豁痰消積而已加以苦寒之藥方能降火而去其病根矣或曰諸病皆因於氣治例固宜如此而諸病皆主於氣治法當何如哉子曰於上三類方中觀其所出之證審其所用之藥分火分痰分積而施治之是其法也