

門類目錄

外感門

中風

傷寒

中寒

傷寒

中暑

中溼

瘟疫

內傷門

內傷
傷食

調補脾胃

風門

破傷風

胃風

痛風

癆

癟風

寒門

咳嗽

霍亂

暑門

瘡

痢

溼門

泄瀉

溼熱門

吞酸

疽

水腫

鼓脹

赤白濁

痰門

哮喘

喘

恶心

嘔吐

欬逆

翻胃

嘈雜

闊格

廢氣

痰熱門

痙

癇

顛狂

驚悸怔忡

健忘

經喉風喉痺

大門

大

吐血

咳血

嘔血

咯血

衄血

漏血

下血

腸風臘毒

痔瘡

漏瘡

脫肛

淋

小便不通

小便不禁

夢遺

風熱門

斑疹

頭眩

頭痛

頭風

眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒

燥門

消渴

燥結

鬱門

六鬱

氣滯

寒鬱門

心脾痛

腹痛

大鬱門

脇痛

跌撲損傷

溼鬱門

腰痛

疝痛

脚氣

積門

積聚痞塊

虛損門

發熱

惡寒

自汗

盜汗

痿

厥

勞瘵

補損

婦人門

經病

崩漏

帶下

產前

產後

子嗣

諸病

小兒門

小兒諸病

痘瘡

雜治門

倒倉法

吐法 救急諸方

十危病方

備用要方

體氣 汗癥

烏龜

駢顏 拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑溼致疾之殊故繼之以風寒暑溼內傷又有溼熱痰火為病之異故繼之以溼熱痰火況外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首

甲集

丹溪本草衍義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱溼燥寒論

詒家樞要

十二經脈歌

卷之一

乙集

外感門

上

中風

中氣
預防中風

傷風

冒風同治
中寒

傷寒

冒寒
中寒

丙集

卷之二

外感門

下

中暑

暑風
注夏

中溼
溼熱

瘟疫

大頭病

冬溫病

嶺南諸病

運氣證治

卷之三

丙集

內傷門

內傷
傷食

調補脾胃

卷之四

風門

破傷風 胃風 痛風 脈節痛 肩背痛 癔 痘風 血風瘡 身上虛痺
癰疹

卷之五

寒門

咳嗽

肺痿 肺癰

霍亂

卷之六

暑門

瘧

痢

卷之七

溼門

痞

泄瀉

卷之八

溼熱門

吞酸

咳氣

痘

水腫

鼓脹

赤白濁

卷之九

痰門

痰

疾熱

哮喘

喘

恶心

嘔吐

咳嗽

翻胃

嘈雜

關格

卷之十

痰熱門

瘰癧

癰

卷十二婦人門

經事不調

血痛附血
瘡

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

癰疽

乳癰 疗癰

諸瘡

卷之十七

溼鬱門

腰痛

腎痛

疝痛

水腎偏墜

腎囊溼瘡

腳氣

足眼痛

腳轉筋

卷之十八

積門

積聚痞塊

卷之十九

虛損門

發熱

胸中煩熱

虛熱

虛煩不眠

惡寒

面熱面寒

自汗

盜汗

痿

厥

手足十指麻木

勞瘵

補損

諸虛

卷之二十

婦人門上

經病

崩漏

帶下

婦人門下

卷之二十一

產前

產後

子嗣

補虛

斷子法

諸病

卷之二十二

小兒門上

小兒諸病

卷之二十三

小兒門下

痘瘡

卷之二十四

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用藥方

體氣

汗癥

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

丹溪先生墓表辭

丹溪翁傳

丹溪心法附餘卷之十七

濕鬱門

腰痛 八十附腎著

丹溪心法

○腰痛主濕熱 腎虛 療血 按閃 痘積 脈大者腎虛杜仲龜板黃柏知母枸杞五味之類為末猪脊髓和丸服。脉濤者瘀血用補陰丸加桃仁紅花。脉緩者濕熱蒼朮杜仲黃柏川芎之類。疫積作痛者二陳加南星半夏。腰曲不能伸者針灸中。凡諸痛皆屬火寒涼藥不可峻用必用溫散之藥。諸痛不可用參補氣則痛愈甚人有痛面上忽見紅點者多死。

戴云濕熱腰疼者遇天陰或久坐而發者是也。腎虛者疼之不已者是也。瘀血者日輕夜重者是也。

入方 治濕痰腰痛大使泄 龜板一兩半 蒼朮 椿皮 滑石各半兩 白芍酒炒香附各四錢

右為末糊丸如內傷白术山楂湯下

入方 治腰腿濕痛 龜板酒炙二兩 蒼朮 黃柏酒炒 蒼耳 藏靈仙酒浸一兩 化柏半兩

右為末酒糊丸每服黑豆汁煎四物湯加陳皮甘草生姜煎湯下

久腰痛必用官桂以開之方止其腹脇痛亦可

又方 龜板酒炙一兩半 炒柏 白芍一兩 陳皮 威靈仙 知母 蒼朮 蒼耳各半兩

右為末水調服

又方 龜板酒炒半兩 酒炒柏四錢 青皮三錢 生甘草一錢半

右為末姜一大片同前藥末一錢研勻以蒼耳汁盪起煎令沸服之

摩腰膏 治老人虛人腰痛并婦人白帶

附子尖 烏頭尖 南星各二錢半 雄黃一錢 檀腦 丁香 乾姜 吳茱萸各一錢半 朱砂錢一粒

大者五粒

右為末蜜丸如龍眼大每用一丸姜汁化開如粥以火上頓熱置掌中摩腰上候藥盡粘腰上烘綿衣包縛定隨即覺熱如火日易一次

附脉理

脉訣舉要曰腰痛之脉皆沉而弦兼浮者風兼緊者寒濡細皆濕實則閃胸指下既明治斯不惑

附諸方

五積散利濟方 治寒濕傷子腎經腰痛不可俛仰兼氣加茱萸婦人血氣加桃仁見中寒
水附湯濟生方 治濕傷腎經腰重冷痛小便自利

附子炮去皮 腰白术各一兩 杜仲去皮半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心溫服

牽牛丸楊氏家藏方 治冷氣流注腰痛不可俛仰 延胡索 黑牽牛 破故紙各二兩

右為末研煨蒜為丸梧桐子大每服三十丸葱酒鹽湯任下

一方 用黑丑四兩半生半炒研細取頭末水丸梧子大硫黃為衣每服三十九空心鹽酒送下四服即止
連效散 治腰疼不可忍 川棟子用肉以巴豆去殼五箇同炒赤去巴豆 茴香鹽炒去鹽破故紙炒各一兩 各一兩
右同為末每服一錢食前熱酒調服

獨活湯 治因勞復得腰痛沉重如水似折

羌活 防風 獨活 肉桂 大黃澤瀉各三錢 桃仁五十箇 當歸 連翹各半兩 甘草二錢 防己 酒連各一兩

右㕮咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服

一方 治積年久患腰疼 用地膚子為末酒調一錢日三五服即愈

威靈仙散 治腰脚痛 威靈仙生不拘多少

右為末每服二三錢食前酒調下

立安散 杜仲去皮炒斷絲 橡核炒取仁

右各等分為末每服二錢入鹽少許食前溫酒調下

青娥丸 三因方治腎經虛冷腰腿重痛常服壯筋補虛

破故紙四兩杜仲四兩炒生姜二兩半炒乾

右為末用桃仁三十箇研膏入蜜丸梧子大每服五十九粒鹽酒下

杜仲酒 三因方治風冷傷腎腰痛不能屈伸 杜仲一兩去粗皮用姜汁製炒

右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服 一方為末溫酒調一錢空心服

立安丸 三因方治五種腰痛常服補暖腎經壯健腰脚

破故紙 繢斷 乾木瓜各一兩草薢二兩杜仲去皮姜炒斷絲牛膝酒浸各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九粒溫酒鹽湯空心往下

○已上諸方散邪理氣之劑

獨活寄生湯 治腎氣虛弱為風溫所乘流注腰膝或掣牽掣痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力

獨活 三兩桑寄生加無歸細辛 代之二兩牛膝 泰艽 茯苓 白芍 桂心 川芎 防風 人參 熟地

當歸 杜仲炒甘草尖各二兩

右剉每服三錢水煎空心服 下利者去地黃 血滯於下垂中穴刺出血炒仍炙腎俞崑崙尤佳

牛膝酒 三因方治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍者

地骨皮 五加皮 蓼苡仁 川芎 牛膝各一兩甘草一兩生地黃十兩海桐皮 二兩羌活 一兩

右㕮咀用緝帛裹藥入無灰酒內冬浸七日夏三五宿每服一盃日用三四服長令酒氣不絕 一法加炒杜仲一兩

虎骨木瓜丸 治飲食過度寒濕停駐經絡不和傷取風血走注筋骨疼痛晝靜夜甚殘風冒露所傷筋骨走注并婦人血風疼痛 虎骨醋炙乳香 没藥各研一兩木瓜 天麻 蔴蓉 牛膝 附註四味各二兩好酒浸十日取液乾存酒下三味各一兩

右為末將浸藥酒打糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九空心食前溫酒送下

如神湯 治男子婦人腰痛 玄胡索 當歸 桂等分 一方有杜仲

右為末每服二三錢食前酒調下

治腰痛 聖惠方 青木香 乳香 各二錢

右件酒浸藥飯上蒸乳香化以酒調服

卷閣丸 濟生方 治墜墮閃肭氣血凝滯腰痛

卷閣子 半兩 没藥二錢 乳香半錢 補骨脂炒葳靈仙沈去杜仲炒斷官桂不見大川當歸酒浸焙各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十九空心溫酒鹽湯送下俱可

復元通氣散 和劑方 治氣不宣流或成瘡癧并閃挫腰脇氣滯疼痛

舶上茴香炒穿山甲蛤粉炒去粉各二兩玄胡索 白牽牛炒甘草炒陳皮去白各一兩南木香不見火一兩半

右為末每服一錢熱酒調下病在上食後服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調下

補陰丸見補損

○已上諸方散邪理血之劑

安腎丸 三因方治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢體羸瘦

葫蘆巴 补骨脂 川練子 茴香 繢斷各二兩桃仁 杏仁各去皮尖核炒別研山藥 茯苓 各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心益湯服五十九

溫腎丸 三因方腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色並皆治之

熱乾地黃洗培牛膝 蓼蓉 五味子各八杜仲三兩甘草 炎巴戟各八茯神 乾姜各五麥門冬八兩

右為末每服二錢空心溫酒調下

華薢丸 治腎損骨痿不能起床腰背腿皆痛 華薢 杜仲

炒去絲 蓼蓉 酒浸兔糸子酒浸

右等分細末酒煮豬腰子搗爛為丸如梧桐子大每服五十丸至七十九空心溫酒下

無敵丸 治腰痺腎虛 川芎解 虎骨酥炙續斷酒浸一宿

當歸 酒浸砂仁炒鹿茸各一兩 杜仲二兩炒 地龍去土大頭絲半錢 青鹽六五錢半 兔絲子四兩酒浸

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九空心鹽酒下

補髓丹百一選方升降水大補益心腎強筋壯骨治腎虛腰痛

沒藥一兩

杜仲去皮一兩

鹿茸二兩刮去皮酒浸

補骨脂十兩用芝麻五兩同炒切芝麻

黑色無聲為度

歸去芝麻不用

右將杜仲補骨脂鹿茸一處為末入沒藥和勻却用胡桃肉三十箇湯泡去皮研為膏入麵少許酒煮糊丸如梧桐子大每服一百九溫酒鹽湯任下

二至丸濟生方治老人虛弱腎氣傷損腰痛不可屈伸

鹿角

麋鹿角鋸各二兩附子

桂心泡去皮一兩

大補骨脂大桂心不見

杜仲炒去皮一兩

鹿茸大頭絲各一兩

青鹽炒去皮一兩

酒蒸焙

各一兩

五錢

右為末酒糊丸如梧子大每服七十九空心嚼胡桃肉鹽酒湯任下惡熱藥者去附子加肉蓯蓉一兩

○廣按腰痛之証多因腎臟真陰衰虛或外風寒之鬱遏或內濕熱之流注以致榮衛不通故作痛也然腎臟不虛則外邪不能襲內邪不能占榮衛周流何病之有哉已上六方治腰痛乃散邪兼補虛之藥也

○已上諸方散邪補虛之劑

丹溪心法

○腎著為病其體重腰冷如水飲食如故腰重如物在腰治宜流濕兼用溫暖之藥以散之

附諸方

腎著湯 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利 乾姜

炮

茯苓各四兩

甘草

白术各二兩

右㕮咀每服五錢水煎空心服

滲濕湯濟生方治寒濕所傷身體重着如水中小便泄大便溏

蒼朮 白朮 甘草 炙各一兩 茯苓 乾姜炮各一兩半 橘紅 丁香各二錢半

右㕮咀每服四錢水二盞棗二枚姜三片煎食前溫服

勝濕湯濟生方 治坐卧濕地或雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多汗惡風小便不利大便泄濁

白朮二兩 人參 乾姜炮 白芍藥 附子炮去皮 茯苓 桂枝不見大 甘草 炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分溫服

疝痛八十一附 水腎偏墮 腎囊漏瘡

丹溪心法

○疝痛濕熱痰積流下作病大聚因寒鬱而作即是痰飲食積并犯血 專主肝經與腎經絕無相干大不宜下 痛甚者不宜參术 癲濕多 痘氣宜灸大敦穴在足大指爪甲後一韭葉聚毛間是穴 食積與犯血成痛者梔子桃仁山楂枳子枳實 吳茱萸並炒以生韭汁順流水煎湯調服一方加茴香附子 却有水氣而腫痛者 又有挾虛者當用參朮爲君佐以疎導之藥其脉沉緊豁大者是 按之不定者屬虛必用桂枝山梔炒烏頭細切炒右爲末姜汁糊丸每服三四十九姜湯下大能散痛

戴云疝本屬厥陰肝之一經余常見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也

入方 治諸疝定痛速效 枳實十五片 一山楂炒

作橘核 山楂炒吳茱萸炒或等分濕勝加荔枝核炮

右爲末酒糊丸服或爲末生姜水煎服或長流水調下二錢空心服

守效丸 治癩之要藥不痛者

蒼朮 南星 白芷散水 山楂各一兩半 枳核又云枳半夏各半 秋冬加吳茱萸衣鉢有山梔

右爲末神龜糊丸服 又云有熱加山梔一兩 堅硬加樸硝半兩 又或加青皮荔枝核

又方 治諸疝發時服 海石 香附各等分

右爲末生姜汁調下亦治心痛

又方 治陽明受濕熱傳入太陽惡寒發熱小腹連毛際間悶痛不可忍者

山梔 桃仁 枳子俱炒山查

右各等分研入姜汁用順流水盪起同煎沸熱服 一方加吳茱萸

橘核散

橘核一錢五分

桃仁十五箇

梔子一錢

川芎細切炒

吳茱萸各五分

川芎細切炒

吳茱萸各五分

川芎細切炒

吳茱萸各五分

右水煎服

橘核散單止痛此蓋濕熱因寒鬱而發用梔子仁以除濕熱用烏頭以散寒鬱況二藥皆下焦

之藥而梔子又為梔子所引其性急速不容胃中留也

又方 治疝瘕藥

用烏頭細切炒梔子仁炒等分為末或加或減白湯丸服

又方 治疝

枇杷葉 野紫蘇葉

椒葉

蒼耳葉

水晶葡萄葉

各等分

右以水煎熏洗

腎氣方 苗香 破故紙

吳茱萸

益炒各五錢

胡蘆巴

一錢半

木香

二錢半

右為末蘿蔔搗汁九梧子大每服三十丸空心鹽湯下

積疝方 山查

炒一兩

苗香炒柴胡炒二錢

牡丹皮一錢

右為末酒糊丸如梧子大每服五六十丸鹽湯下○疝病黃病久者皆好倒倉

又方 治疝作痛

山查

炒四枳核炒

茴香炒山梔

炒各二兩

柴胡

牡丹皮

桃仁炒各一兩

八角茴香炒

一吳茱萸

炒半

右為末酒糊丸梧子大每服五十九空心鹽湯下

又方 治疝作痛

蒼朮 香附俱鹽

黃柏酒炒

上為君青皮

左胡索

益智仁

桃仁

為臣茴香炒附子鹽

製甘草

已上為使

右為末作湯服後一痛過更不再作矣

又方 治癩疝

足本丹溪心法附錄

卷十七 痘瘍

四一尾江海上書局印行

南星 山查 蒼朮

各二兩

白芷 半夏

製枳核

神麴

各一兩

海藻 半兩

昆布半兩

立胡索

吳茱萸各二錢

右為末酒糊丸如梧子大空心溫酒下五十九丸

一方 瘰癩作腹內塊痛止塊痛作

三棱

莪术

醋煮炒

姜黃

南星

各一兩

山查

二兩

木香

沉香

香附

各三兩

黃連

用茱萸炒去茱萸莖用五錢淨

蘿蔔子

桃仁

山楂

枳核

炒各半兩

右為末姜汁浸蒸餅為丸梧子大每服五十丸白湯下

○予常治一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦穴適有摩腰膏內用烏附丁香射杳將與摩其囊上橫骨端火溫帛以覆之痛即止一宿腫亦消 予舊有相橘積後因山行飢甚遇橘半食之橘動舊積半復滯氣即時右丸腫大寒熱先服調胃劑一二貼次早注神思氣至下焦嘔逆覺積動吐復吐後和胃氣疏通經絡而愈摩腰膏見腰痛

附脉理

脈訣舉要曰疝脉弦急積聚在裏牢急者生弱急者死況遲浮濇疝瘕寒痛痛甚則伏或細或動

附諸方

立効散

本事方治疝氣

川芎

川練子

青皮

去白舶上茴香

黑牽牛

炒桃仁各一兩

右為末每服二錢無灰酒一盞煎七分溫服

失笑散

治小腸氣痛及婦人血氣痛欲死者

五靈脂

蒲黃炒各等分

右為末每服二錢先用醋一合熬藥成膏水一盞煎服

茴香練實丸拔萃方治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸於一

川練子炒茴香

山茱萸

食茱萸

吳茱萸

湯青橘皮去馬蘭花

醋炒

芫花

陳橘皮各一兩

右為末用醋糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒送下食前量人虛實加減丸數以利為度

金鈴丸

本事方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

茴香炒馬蘭花炒海蛤 破故紙 海帶 兔絲子各三 金鈴子肉五兩 木香 丁香各一兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服五十九溫酒盞湯下

烏藥散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥 木香 茴香 良姜炒青皮去白 桑榔各五 川練子十箇 巴豆七十箇打破同數炒川練子黑色去殼巴豆只用川練

右為末每服一錢溫酒調下痛者炒生姜熱酒服

一方 治小腸氣痛不可忍者 烏藥超碎姜酒浸一宿高良姜

茴香各一兩 青皮去白二兩

右為末每服二錢遇發時熱酒調下

青木香丸 治腎冷疝氣脹痛

用吳茱萸一兩分作二分酒醋浸一宿焙乾香附子一兩華澄茄青木香各半兩為末米糊為丸如梧桐子

大每服七十九空心鹽湯或乳香葱白湯下亦可

一方 治疝氣發作痛不可忍者

真料五苓散一貼連根葱白一寸燈心七莖煎湯吞下青木香九五十粒即效 五苓散見中暑

立胡索散 治小腸氣痛 用立胡索鹽炒乾姜等分為細末空心鹽酒調下

川練子散 治小腸氣痛 木香不見大茴香鹽炒黃川練子用巴豆十粒搗碎同川練子炒黃色去巴豆各一兩

右為末每服二錢溫酒空心食前調服

一方 治遠年近日疝氣 吳茱萸 八角茴香 小茴香 川練子 花椒各一兩青鹽半兩

右為細末以連根葱頭入酒同藥搗成餅晒乾糯米半升同藥餅用文武火炒黃色研為末酒糊為丸如梧桐子大每服一百九空心溫酒鹽湯任下忌發氣之物

一方 治小腸氣脅腹攢疼陰中痛悶不省人事

用茴香鹽炒枳殼各一兩沒藥半兩為末每服二錢熱酒調下日三服

四神丸 直指方 治腎冷疝氣脹不已

吳茱萸

揀淨一半用老酒浸一宿焙乾用米醋各浸一宿焙乾薑澄茄 青木香各半兩大香附子 桧榔一兩

右為末水糊丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯吞下或乳香葱白煎湯下

一方 公猪腰子 一箇去膜 左胡索 黑牽牛各半兩為末

右將猪腰切作二片入藥末在內濕紙裹煨熟不要焦空心鹽酒連藥嚼下必渴下惡物忌食生冷

一方 治疝氣腫墜疼痛 用猪脬一箇去尿以小茴香大茴香破故紙川練子各等分填半滿入青鹽一塊縛定好酒煮熟先食猪脬以酒下之將內藥晒乾或焙乾研為末酒糊丸如梧桐子大每服五六十丸空心溫酒或鹽湯下

○已上諸方辛溫散氣之劑

大烏頭桂枝湯

三因方 治風寒疝氣腹中刺痛手足不仁身體拘急不得轉側或致陰縮悉皆治之

大烏頭

五箇實者去皮尖蜜一箇大益減半出湯洗切芍藥 桂心各三錢甘草炙二錢半

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片棗三枚入前煎烏頭蜜半呷同煎七分食前服一方去烏頭用附子一箇名蜜附湯

葱白散

三因方 治一切冷氣及膀胱氣發攻刺疼痛及婦人產後血氣刺痛皆宜服之

川芎

當歸

枳殼

去白微炒

厚朴

姜製

木香

官桂

去皮青皮

乾姜

炮茴香

炒人參

川練

炒茯苓

麥芽

炒三棱

炮蓬子

醋浸一宿焙乾

地黃

神曲

芍藥

各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞葱白二寸煎七分去粗入鹽少許空心熱服大便秘滯加大黃溥利加調子

聚香餃子

濟生方 治七情所傷遂成七疝心腸引痛不可俛仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香

並非火薑香

各一兩

左胡索

片子姜黃

洗川烏

炮去皮

桔梗

去芦炒

桂心

不見大甘草

矣各半兩

右咬咀每服四錢水盞半姜五片棗一枚煎七分去粗溫服

益智仁湯 濟生方治疝氣痛連小腹呼呴不已診其脉沉緊是腎氣積冷所致

益智仁 乾姜炮甘草炙茴香炒各二錢烏頭炮去皮生姜各半兩青皮去白二錢

右咬咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分空心熱服

左附湯 濟生方治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑溏泄

木香 不見火半兩左胡索炒附子炮去皮臍各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎去分去渣溫服

狼毒丸 濟生方治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬刺痛不已

芫花醋炒狼毒炒川烏炮去皮臍各一兩全蝎去毒三錢乾姜炮椒紅炒沒藥鱉甲醋煮乾漆炮烟盡各半兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服四十九空心姜湯溫酒任下甚者以鹽半斤炒極熟以故帛包熨痛處

茱萸內消丸和劑方治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝陰囊偏墮痛引臍腹或生瘡瘍時出黃水

山茱萸去核梗桔小浸時焙乾川烏炮去皮尖茴香船上升者去炒焙炒用白蒺藜炒去白吳茱萸湯泡入肉桂去皮各

大腹皮 姜洗五味子揀淨海藻洗焙左胡索各二錢半木香一兩半川練子炒二兩桃仁去皮尖數炒

枳實去穰麸炒陳皮去白各一兩食茱萸二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下

葫蘆巴丸和劑方治大人小兒小腸蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墮陰腫小腹痛形如卵上下走痛不可忍

吳茱萸湯洗七次炒十兩葫蘆巴炒一斤茴香去土炒川練子炒一斤大巴戟去心川烏炮去皮尖各六兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下小兒五丸茴香湯吞下一方加黑牽牛

丁香練實丸拔粹方治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脈所主陰經也乃腎肝受病治法同歸於一

當歸去芦剉碎附子炮製去皮臍川練子茴香炒

右四味各一兩剉碎以好酒三升同煮酒盡為度焙作細末每服藥末一兩再入下項藥

丁香 木香 各二錢 全蝎 十三箇 玄胡索 二兩

右為末四味同入前項藥末內拌和酒糊丸丸如梧桐子大每服二十九至一百丸空心溫酒送下

神砂一粒丹宣明方治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者 附子炮一兩 鐘金 橘紅 各五錢

右為末醋麵糊丸丸如酸棗大以硃砂為衣每服一丸男子酒下婦人醋湯下服能又服神聖代針散

神聖代針散 乳香 没藥 當歸 香白芷 川芎 各半兩 元青 一兩 去足翹即青紅娘子

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次將藥末在茶上不得吹攪立地細細急呷之心驚欲死者小腸氣搐得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癆血迷血暈血刺血衝心胎衣不下難產但一切痛疾服之大有神效只是要詳疾証用藥

十補丸百一選方治小腸寒疝膀胱伏梁奔豚疝氣等症

附子一兩用防風一兩剉如黑豆大鹽四兩黑豆一合炒附子剉去諸藥用附子去皮大葫蘆巴 木香 巴戟 去心 川練子 炮取肉官桂去皮

延胡索 華澄茄去帶舶上茴香炒破故紙炒各一兩

右為末用糯米酒打糊丸丸如梧桐子大辰砂為衣每服五十丸空心酒下婦人醋湯下若加益智仁亦可

○已上諸方辛熱消積之劑

○廣按疝痛之証其人平素外因風濕轉入經絡或是內因怒氣衝上小腹以致榮衛不順血液稽留日久盛積聚牢堅每遇風寒之氣外鬱或是五心之火內起則小腹作痛下連陰股或是小腸作痛上連脇肋甚則搐如角弓咬牙戴掉冷汗交流須臾不救古方以為小腸氣膀胱氣腎經寒氣用辛溫之藥以散氣則是治其標也丹溪以為疾飲食積死血流注歸於厥陰肝之一經用辛平之藥以豁痰消積破血則是治其本也夫疝証痛有定處是以形之積也非疾飲與食積死血相聚而何哉若是無形之氣作痛則走注於滿腹而流散於偏身矣

木腎偏墜 新增

附諸方

入方 治木腎 猪肺葉又云楊樹雄者晒乾為末酒糊丸如梧桐子大空心鹽湯下五十九

又方 治木腎不痛

枸杞子五錢

南星半夏各七錢

黃柏酒炒

蒼朮鹽炒各一兩

山楂炒各一兩

白芷滑石炒八錢

神鈞昆布三錢

砂吳茱萸四錢

布吳茱萸四錢

右為末酒糊丸梧子大空心鹽湯下七十九

治小腸氣及木腎偏墜

黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以線縛定口子好酒米醋各一碗於砂鍋內煮乾為度

取去黑牽牛用青紅娘子十九箇於鐵鍋內炒燥去青紅娘子將牽牛碾取頭末四兩另入豬苓澤鴻細末各二兩醋糊丸如梧桐子大每服三十九空心鹽酒送下不可多服如服令人頭眩可服黑錫丹

奪命丹和剉方遠年近日小腸疝氣臍下撮漏外腎偏墜腫硬陰間濕痒振成瘡癬

吳茱萸一斤酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩

澤鴻去毛二兩

便浸四兩各浸一宿用火焙乾

澤鴻去毛二兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服五十九溫酒鹽湯任下

金鈴子丸澹寮方治釣腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川練子五兩

剝作五分製一分用斑蝥一箇去足翅同炒

香入藥一分用黑牽牛三錢同炒去牽牛一分用破故紙三錢同炒留故紙入藥一分用蘿蔔子一錢同炒去蘿蔔子

右將練子去核同破故紙炒香培乾為末酒糊丸如梧桐子大每服三十九溫酒空心下

金鈴丸本事方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛閭水出

方見前

三茱丸百一選方治小腸氣外腎腫疼

山茱萸吳茱萸食茱萸各二

黑牽牛一兩

破故紙炒一七錢兩

青鹽一錢

炒各三錢川練子一兩用斑蝥十四箇去翅皆同炒赤色去斑蝥不用

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服三十九預先喫炒桃仁十五箇以溫酒或鹽湯下鹽或炒茴香湯亦

可空心食前服

一方 治外腎大如升斗 茵香 青皮 荔枝核 桂皮 破炒

右各等分炒出火毒為末每服二錢空心酒調下

一方 治陰疝或偏墜大小子痛欲死者 木鱉子一斤取肉淡鹽磨

芙蓉葉末 黃柏皮末

右將木鱉子同醋調二藥末敷核上痛即止

腎囊濕瘡 審院僧 乾姜 滑石

右等分為末擦患處

又方 先用茱萸煎湯洗

吳茱萸半兩 寒水石 三錢 黃柏 二錢

樟腦 蛇床子碎輕粉十 益硫黃二錢白礬

樟榔 白芷 各二錢

右為末麻油調搽

又方 治腎上風濕瘡及兩腿 全蝎

樟腦

蛇床子 碎黃 各一錢

右四味研如細末用麻油調入手心搽熱吸三口用手抱囊一項次搽藥兩腿上

脚氣八十二附足跟痛脚轉筋

丹溪心法

○脚氣須用升提之藥提起其濕墮氣血用藥 有脚氣衝心者宜四物湯加炒黃柏再宜湧泉穴用附子末
津唾調傅上以艾灸泄引熱下

入方

防己飲 白朮 木通 防己 楊柳 川芎 甘草梢 檀角 蒼朮燒黃柏

生芻 各酒炒

大便實加桃仁小便澁加杜牛膝有熱加黃芩黃連大熱及時令熱加石膏有痰加竹瀝姜汁如常腫者專
主乎濕熱先生別有方

又方 治濕熱食積疾流注

蒼朮 黃柏

防己各一兩

南星

川芎 白芷

各一錢

庫角

楊柳各一兩

血虛加牛膝龜板

右為末酒糊丸服肥人加痰藥

健步丸 生半
兩 醉歸尾 芭藥 陳皮 蒼术各一
吳茱萸 條芩各半 牛膝一
桂枝二錢 大腹皮二箇

右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心煎白木通湯下

又方 一婦人足脰腫 紅花五錢 牛膝一
錢俱酒洗

若筋動於足大指上至大腿近腰結了因奉養厚遇風寒宜四物湯加黃芩紅花蒼术南星姜煎服

濕痰脚氣大便滑泄

蒼术二兩 防風二兩 桑榔六錢香附八錢川芎六錢條芩四錢滑石一兩二錢甘草三錢

右為末或丸或散皆可服

脚軟筋痛 牛膝二兩 白芍一兩
龜板酒 吳黃柏酒炒一兩 知母炒甘草半兩

右為末酒糊丸如梧子大空心白湯下五十九

應痛丸 治脚氣痛不可忍此藥為劫劑 赤芍藥半兩
細辛半兩 去皮草烏半兩 去皮尖

右為末酒糊丸梧子大空心服十九丸白湯下

又方 治脚氣腫痛 芥子 白芷等分

右為末姜汁和敷貼或用仙术羌活獨活白芷細辛為末入帛內作襪用

又方 煙洗脚氣 威靈仙 防風 荆芥 地骨皮
當歸 升麻 蒜薹

右煎湯煙洗

附脉理

脉訣舉要曰脚氣之脉其狀有四浮弦為風濡弱濕氣遲濶因寒洪數熱鬱風寒汗濕溫熱下寒熨腳氣治例

心法附錄曰脚氣有濕熱有食積流注有風濕有寒濕 勝濕以仙术白术防己川芎為主或六物附子湯或足本丹溪心法附餘

當歸拈痛湯

腳氣氣鬱甚者舟車丸除濕丹有飲者東垣開結導飲丸

脚氣解表用麻黃左經湯等藥隨經選用有兼痰氣寒濕者五積散加木瓜

若雙解以大黃在經湯東垣羌活導滯湯

若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加黃柏南星或健步丸

若疎風養血用獨活寄生湯最效

春夏氣溢腫而痛者用香蘇散加五加皮木瓜枳榔川練子熟而紅腫者敗毒散加木瓜蒼朮秋冬以後用五積散加木瓜牛膝枳榔吳茱萸

附諸方

麻黃左經湯三因方治風寒暑濕流注足太陽經腰足隣脾關節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛眩暉

麻黃去節乾葛

細辛

白术

未泔浸茯苓

防已

桂心

不見火羌活

甘草

大防風

各等分

右為末每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心服自汗去麻黃加肉桂芍藥重者加白术陳皮無汗減桂加杏仁澤瀉並加等分

半夏左經湯三因方治足小腸經為風寒暑濕流注發熱腰脇疼痛頭眩嘔吐不食

半夏湯洗乾葛

細辛

白术

麥門冬

去心柴胡

茯苓

桂心

不見火羌活

甘草

大防風

各等分

大黃左經湯三因方治風寒暑濕流注足陽明經使脚痛赤腫痛不可行大小便秘或惡聞食氣喘滿自汗

細辛去苗茯苓

羌活

大黃

甘草

大前胡

枳殼

去穰厚樸

去皮炒

黃芩

杏仁

去皮大研各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎空心熱服七分腹痛加芍藥祕結加阿膠喘急加桑白皮紫蘇
小便澀少加澤瀉四肢瘡癰浸淫加升麻並等分

大料神祕左經湯 三因方治風寒暑濕流注三陽經腰足拘攣大小便祕澁喘滿煩悶並皆治之

半夏

湯洗之後

乾葛

細辛

麻黃

去節

麥門冬

去心

小草

即遠志

苗白姜

厚朴

姜製炒

茯苓

防已

枳殼

去殼炒

甘草

桂心

羌活

防風

柴胡

黃芩

各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片裹一枚煎服自汗加牡蠣白朮去麻黃黃腫加澤瀉木通熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻腹痛或利去黃芩加芍藥附子大便祕加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分對証加減尤宜審之

六物附子湯 三因方治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子

炮去皮

桂心

防己

各四錢

甘草

炙二兩

白朮

三兩

茯苓

二兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎六分食前溫服

換腿丸和劑方治足三陰經爲風寒暑濕之氣所乘發為掣痙緩弱上攻胸脇肩背下注脚氣痰痛足心發熱行步艱辛

薏苡仁

南星

泡石楠葉

石斛

去根

枳榔

華解

炙川牛膝去苗酒浸

羌活

去芦

防風

去芦

各

木瓜

四兩

黃芪

去芦蜜炙

當歸

去芦酒浸

天麻

去苗續斷

各一兩

右爲末酒打麪糊丸如梧子大每服五十九溫酒鹽湯任下

一方加大附子肉桂蒼朮各一兩

○已上諸方治各經邪氣之劑

香蘇散

和劑方

治風濕脚痛疎通氣道

加枳榔木瓜名

香蘇散

方見傷寒

右㕮咀每服四錢水一盞姜葱煎服

活血應痛散和劑方治風濕客於腎經血脉凝滯脚重疼痛項背拘攣不得轉側常服活血脉壯筋骨

狗脊

去毛

蒼朮

泔浸一宿

沒藥

另研

草烏頭

半升

香附子

去毛炒

陳皮

去白五斤

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服二十九溫酒熟水任下

活絡丹和劑方治諸般風邪濕毒之氣滯經絡流注腳間筋脈掣拳腰腿沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝心腹一切痛風走注

川烏泡去皮臍六兩 没藥研乳香研各二兩 二錢草烏泡去皮臍地龍去土 南星泡各六兩

右為末入乳沒和勻酒糊丸如梧桐子大每服二十九空心酒下荆芥湯下亦可

經進地仙丹和劑方治腎氣虛憊風濕流注脚膝酸疼行步無力

川椒去目及閉口者微炒去汗四兩 兔綠子酒浸覆盆子各二兩 白术一兩 白附子羌活 防風去芦二兩 各人參半一兩 烏藥二兩

川烏泡一兩 附子泡四兩 茯苓一兩 地龍去土三兩 赤小豆 骨碎補去毛各二兩 甘草一兩 木鱉子去殼三兩 薑解二兩 狗脊去毛

一錢茶四兩 牛膝去芦酒浸南星湯洗姜製各二兩 黃芪二兩半 何首烏二兩

右為末酒糊丸如梧子大每服四十丸空心溫酒下

加減地仙丹濟生方治風冷邪濕流滯下焦足膝拘攣滿身痛

地龍炒去土五靈脂去烏藥白膠香別研五加皮 椒紅出汗威靈仙 木瓜去穰赤小豆炒川烏泡

黑豆炒去皮 天仙藤 蒼朮米泔浸去皮炒 木鱉子去壳油各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心益鹽湯酒任下

不老地仙丹直指方治腎臟風毒輕脚壯筋

蓆蓉用酒浸炮當歸培虎骨酒炙牛膝酒浸煑赤小豆半兩 蕤藜炒搗川椒去目出汗川芎各一兩 薑解鹽水煮乾一兩

血竭半兩 白南星泡白附子泡何首烏黃芪蜜炙各七錢半防風半兩 杜仲姜製羌活 没藥別研獨活各七錢半

木鱉子去油地龍去土 茴香炒乳香別研各半兩

右為末酒糊丸如梧子大每服四十九木瓜陳皮湯下

神翁地仙丹醫方集成專治風痺脚氣

天仙子一兩 川椒一兩去目并閉口者木鱉子四兩 赤土土珠九兩即白膠香過別研黑豆六兩 黑牽牛六兩 五靈脂三兩陳黑

色好者用好醋浸後草烏七兩小而堅者用藍在鍋中并炒水淘去絳濾過晒乾令色黑焦黃折裂候冷以紙布頻揩令淨

右為末同入白膠香木鱉子末隔年好醋打麵糊杵千百下丸如梧桐子大每服三十九茶清下病甚頻服加減至腎丹蘆陵歐陽康叔家傳方專治脚氣止疼痛除風濕

石膏火煮三十兩當歸酒浸後骨碎補四兩去皮毛炒淨三五次楨榔二兩月寶砂五兩醋白蒺藜炒赤去皮尖刺三兩木瓜生用二兩紫金皮去骨生淮烏頭三箇起一兩白膠香三兩淨水煮數十沸冷水中乾

右為末蜜丸如彈子大每服一丸嚼生姜一塊空心以好酒一盞送下多以酒助藥力服後一時久用外應散薰蒸淋洗一方除金紫皮木瓜加防風小黑豆一方加赤芍藥一方除紫金皮石膏加白木木香川芎

透骨丹康叔家傳方專治腳色

川烏一兩羌活二兩白茯苓二兩乳香別研楨榔木瓜川芎各一兩木香兩半沉香一兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服六十九姜湯下

黑虎丹康叔家傳方治脚氣筋骨軟弱步履不隨

白术五加皮肉桂各半兩楨榔一兩黑豆半升附子川烏黃芪白茯苓赤芍藥各一兩熟地黃
烏藥各一兩生蒼朮杜仲當歸川牛膝虎脰骨白蒺藜各一兩半羌活半兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服五十九空心鹽酒下

○已上諸方治風濕之劑

摶風散康叔家傳方專治寒濕流注兩脚酸疼有兼痰氣者用之尤宜內加木瓜麻黃不去節甘草不去皮淮烏甘草解杏仁各等分
右咬咀每服四錢水一盞煎服不可多進

五積散和剷方治寒濕流注兩脚酸疼有兼痰氣者用之尤宜內加木瓜甘草古見中寒搜風散康叔家傳方治寒濕脚氣愈後可常服之白芷川芎茯苓甘草芍藥當歸各一陳皮
厚樸枳殼白术乾姜泡麻黃去根節各二兩桔梗一兩蒼朮十二兩酒浸去皮肉桂一兩

右咬咀每服五錢水一盞姜四片煎服 此方即五積散去曰木加半夏是也

導氣湯仁存方 治寒濕脚氣赤腫疼痛心腹脹頭目手足浮腫身體腰背疼痛並皆治之

羌活 獨活 木瓜 蒼朮仁 青皮 陳皮 桑白皮 大腹皮 枳殼 楠榔 青木香 紫蘇
甘草 大腹子 木通 赤茯苓各等分

右咬咀每一兩水二盞煎至一盞通口服 热加大黃寒加蒼术

沉香大腹皮散御藥院方 治濕氣鬱滯經絡以成脚氣腫滿疼痛筋脉不利

大腹子連皮二兩沉香 桑白皮炒 楠榔 茴香炒白茯苓去皮木通 荆芥穗 紫蘇子炒蘇葉各一兩
乾木瓜去穰微炒 一兩半 枳殼去穰微炒 一兩半 甘草炒陳皮 各白焰烏藥各一兩

右咬咀每服五錢水一盞姜五片乾蘿蔔五大片同煎七分溫服如無蘿蔔用蘿蔔子一錢微炒搗碎同煎
如覺大腸乾燥即服加減神功丸

茱萸丸三因方 治脚氣入腹腹中不仁喘急欲死 吳茱萸湯洗七次 木瓜去穰切片日乾各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸至百丸酒飲任下或以木瓜另蒸爛研膏為丸尤妙

勝駿丸三方 治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳腳面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真

氣壯筋骨 附子一箇炮當歸酒浸 一兩天麻 牛膝並酒浸 各二兩木香一兩酸棗仁炒熟地黃酒浸防風去芦各三兩

木瓜四兩 羌活一兩 乳香另研射香二錢半 全蝎去毒浸藥另研 甘草炙各一兩

右為末用生地黃二斤研爛如泥入無灰酒四升煮爛如膏以前藥和勻杵令堅每兩作十九每服一丸細
嚼臨睡酒下如冬月無地黃煉蜜丸如梧桐子每服二十九鹽湯溫酒任下 一方加楠榔草薢從容破故
紙已乾各一兩當歸地黃各五錢

葫蘆巴丸楊氏家藏方 治一切寒濕脚氣脚膝疫痛行步無力 葫蘆巴酒浸一宿焙乾破故紙炒香各四兩

右為末用大木瓜一枚切頂去穰置藥在內以滿為度復用頂蓋之以竹簽簽定蒸熟爛研同前餘藥末和

為丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下

越痛散 楊氏家藏方治濕氣攻注脚腰痠痛行步少力

杜仲 炒斷絲一兩半肉桂去皮延胡索

華解

沒藥

當歸酒洗各二兩

右為末每服三錢空心溫酒送下

一方 治濕脚氣 溫隱居歌括

濕氣同流脾膝疼 香蘇散者忍冬藤 木香芍藥仍增入

功效如神喚得應

東垣開鬱導飲丸

治食積痰流注

白术 陳皮 澤瀉 莪苓 神曲 炒麥蘖

半夏 兩各二

枳實 炒

巴豆霜 各一錢半

青皮 生姜 各半

右為末湯浸蒸餅丸如梧子大每服五十九或六七十丸溫水送下

○已上諸方治寒濕之劑

當歸拈痛湯 拔粹方治濕熱為病肢節煩痛肩背沉重胸膈不利及遍身疼痛下疰於足脛痛不忍

羌活 甘草 黃芩

酒浸 茵陳

酒炒各一錢半

升麻 苦參

酒洗 萬根

蒼朮 各二錢半

防風 去芦 寶歸身

知母 酒洗

茯苓 炒澤瀉

猪苓 各三錢半

白朮 一錢半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓空心溫服

舟車丸 治濕熱勝氣

甚者方見中湯

除濕丸

治濕熱勝氣

甚者方見中湯

趁痛丸 御藥院方治腳氣毒攻兩腳痛不可忍

白甘遂 白芥菜子

畧炒

大戟 白麵 各二兩

右滴水捏作餅子瓦上燄令黃赤碎研為末醋糊丸如棗豆大冷酒下十九粒則止

又方 治下痒瘡脚腫痛行履難者

甘遂 半兩 木鼈子 四兩去皮

右為末猪腰子一箇去皮膜切片用藥四錢在心濕紙包定煨熟空心米飲送下量虛實加減服後便伸直兩腳如行下便利者只吃白粥二三日為妙

夢中神授方 醫方集成 治腳氣神效

右用木鱉子每箇作兩邊數炒畢切碎再炒用皮紙滌盡油為度每一兩用厚桂一兩同為末熱酒調服以得醉為度蓋覆得汗即愈

治腳氣百一選方 治腳氣上攻流注四肢結成腫核不散赤熱掀痛及療一切腫毒

右用甘遂為末以水調傅腫處却濃煎甘草湯服之其腫即散二物本相反須兩入置各處安頓不可相和則不驗清流中子韓諒苦此只一服病者十去七八再服而愈

○已上諸方治濕熱之劑

枳榔湯濟生方 治一切腳氣順氣防壅

枳榔 香附子去毛 陳皮去白 紫蘇葉 木瓜去穰 五加皮 甘草炙各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服婦人脚氣加當歸半兩室女脚痛加赤芍藥兩半如大便虛秘加枳殼熱者加大黃

烏藥平氣湯三因方 治腳氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神去木 甘草炙 白芷 當歸 白朮 川芎 五味子 紫蘇子 乾木瓜 人參 烏藥去木各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

太腹皮散濟生方 治諸証腳氣腫痛小便不利 枳榔 荆芥穗 烏藥 陳皮 紫蘇子各一兩 蘿蔔子炒半

沉香不見大 桑白皮去根 大腹皮三兩 乾宣木瓜去根 紫蘇子炒一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

○已上諸方理氣之劑

獨活寄生湯 治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或攀牽製痛不得屈伸或緩弱冷痺行步無力見腰痛類金匱八味丸 治足少陰經腳氣入腹腹脹疼痛上氣喘急腎經虛寒所致也此証最急以腎乘心水逆火死

不旋踵見補損

三因神應養真丹 治足厥陰經為四氣進襲左癱右瘓疾涎壅盛半身不遂手足頑麻語言蹇澁脚膝無力
榮氣凝滯偏身疼痛 四物湯內加羌活天麻

右為末蜜丸雞子黃大每丸木瓜兒絲子浸酒化下

○已上諸方理血之劑

加味敗毒散 治足三陽經受熱毒氣流注腳踝止掀赤腫痛寒熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒

羌活 獨活 前胡 柴胡 枳殼 桔梗 甘草 人參 茶荅 川芎 大黃 蒼朮等分

右㕮咀每服半兩姜三片水一鍾半煎溫服

東垣羌活導滯湯 治腳氣初發一身盡痛或股節腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯

羌活 獨活各半兩 防己 當歸各三錢 大黃酒浸煨一兩 枳實炒二錢

右㕮咀每五錢或七錢水煎服

加減神功丸 御藥院方治三焦氣滯心腹痞悶六腑風熱大便不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾
心胸煩燥睡不安及治腳氣并素有風 大便結燥

訶梨勒 牽牛微炒大麻仁另搗如膏各四兩人參二兩去芦

右為細末入麻仁搗研勻煉蜜丸如梧桐子每服四十九溫水溫酒米飲任下食後臨卧腹如大便不通可倍
丸數以利為度

牛膝丸 大金良方治腳氣浮腫心神煩悶及婦人月經不通

川牛膝 羚羊角 楊柳 大黃炒芒硝各一兩防己 官桂 牡丹皮 赤芍藥 甘草各五錢桃仁十粒

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口食前服以下惡物量強弱用

枳實大黃湯 拔粹方治腳氣腫痛 羌活一兩半當歸身一錢 枳實 大黃各五錢

右剉都作一服水一盞半煎至八分去滓空心服下利一兩行痛止

搜風丸仁存方治腳氣腫痛 大黃 桃榔 枳實各半兩 黑牽牛生二兩

右為末米糊丸如梧桐子每服五十九食前飯湯下

○已上諸方治風熱之劑

四斤丸和剉方治腎經虛寒下攻腰脚筋脈拘攣製痛不已履地艱辛脚心隱痛一應風寒濕輝脚氣緩弱並宜服之
宣州木瓜去穰天麻 蔴蓉洗淨各半兩附子炮去皮虎骨塗酥炙牛膝去芦一斤炮同木瓜天麻後酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日取出焙乾再入附子虎骨

右為細末用浸藥酒打麵糊丸如梧桐子每服五十丸空心煎木瓜酒鹽湯任下常服補虛除濕大壯筋骨加味四斤丸濟生方治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步履不隨如受風寒濕氣以致脚痛者最宜服之

虎脰骨酥尖一兩

天麻一兩

宣木瓜一箇去核蒸熟

肉蓯蓉一兩酒浸

藥乳香研碎各半兩

川烏炮去皮一兩

牛膝去芦酒浸兩半

右為末入木瓜膏和酒糊杵搗為丸如梧桐子每服七十九空心溫酒鹽湯往下

木瓜丸和剉方治腎經虛弱下攻腰膝筋脉拘攣腫滿疼痛行履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澁

熟地黃洗焙陳皮去白烏藥各四兩

黑牽牛炒三兩

杏仁去皮一兩

牛膝酒浸石楠藤葉當歸酒浸

蓯蓉酒浸續斷

乾木瓜各二兩亦可藥一兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子 每服五十九空心溫酒下

木瓜牛膝丸三因方治寒濕四氣下注腰脚緩弱無力腫急疼痛

牛膝酒浸木瓜大者三四箇切開去穰先用鷄糞發透鹽焙為末

牛膝一兩

木瓜大者去皮大者用鹽末入瓜內令滿仍用蓋釘定蒸二次燜研為膏

川烏薄切以酒煮乾細研為膏三兩

大者去皮大者用鹽末入瓜內令滿仍用蓋釘定蒸二次燬研為膏三兩

青皮 青鹽別研羌活

羌活一兩無薑解

茴香一兩無薑解

狗脊炒去皮一兩

巴戟海桐皮各一兩

右為末入青鹽拌勻將前二藥搜和如硬再酒杵數千下丸如梧桐子每服五十九空心鹽酒鹽湯往下

神烏丸濟生方治遠年近日乾濕脚氣

川烏 炮去皮臍切黃色虎骨脰 酢 失海 桐皮

川

華解各二

川牛膝

去苗酒浸肉蓴各一兩半

金毛狗脊

炮去皮毛

右為末用木瓜膏為丸如梧桐子大每服七十九空心溫酒下

思仙續斷丸 本事方治肝腎風虛下注脚膝痛引腰脊一切風毒流注並皆治之

華解四兩

防風

去苗

薏苡仁

各兩

五加皮

三兩生地黃

五兩

思仙术

即桂仲剗炒

牛膝

浸酒續斷

羌活

各三兩

右為末酒三升化青鹽三兩木瓜半斤去皮子以鹽酒煮木瓜成膏杵丸如梧桐子大每服七十九空心鹽

右為末酒三升化青鹽三兩木瓜半斤去皮子以鹽酒煮木瓜成膏杵丸如梧桐子大每服七十九空心鹽

酒鹽湯任下

十全丹 三方治腳氣上攻心腹足心隱痛小腹不仁關節掣痙痙痛無時煩渴引飲大小便或秘或利

石斛

酒浸狗脊毛

華解各一

蕤草

酒浸熟地黃

二兩

牛膝

酒浸地黃

一兩

仙子

一兩

茯苓

一兩

遠志

去心一兩

杜仲

去皮炒二兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九溫酒鹽湯任下空心服

○已上諸方治虛寒之劑

外應散 康叔家傳方治腳氣用此薰蒸淋洗

石楠葉

矮樟葉

杉片

藿香

紫金皮

藁本

獨活

大蓼

白芷

紫蘇

羌活

各等分

右剗碎如花椒五六十粒葱一握用水二斗煎七分置盆內令病者以足加其上用厚衣蓋覆薰蒸痛處候溫可下手時却令人淋洗

五枝湯 聖惠方洗脚氣

右用桃柳楮桑槐五件枝條煎湯洗脚消腫止痛先喫酒三五盞

一方 用無名異末化牛皮膠調勻貼痛處

一方 用草麻子七粒去殼研爛同蘇合香丸和勻貼脚心其痛即止

一方 用草烏末以麵酒糟搗爛貼患處即止若無麵糟用生姜汁亦可

一方 治腳氣衝心 用白礬二兩水一斗五升畧煎三五沸浸洗

一方 治寒濕腳氣不可忍者

用團魚一兩箇水二斗煮至一斗去團魚止用汁加蒼耳尋風藤蒼朮各半斤煎至七升去粗以盆盛之乘熱薰蒸待溫浸洗神効

○已上諸方外治之法

丹溪心法

○足跟痛

有疾有血熱 血熱四物加黃柏知母牛膝之類 有疾唾者五積散加木瓜

四物湯

見補損

五積散

見中寒

○脚轉筋

新增

附諸方

一方 治腳轉筋夜痛掣急

用松節二兩剉細乳香一錢以銀石器內慢火畧炒焦存性研細每服一錢至二錢木瓜酒調下

一方 治腳轉筋

取赤芍莖細切用酒四合水二合煎至四合分二服

一方 急將大蒜磨脚心令遍熱即瘥

一方 治腳氣筋骨疼痛

用金銀花為末每服二錢熱酒調下或剉碎同木瓜白芍藥官桂當歸甘草酒水各半盞煎去粗空心熱服

丹溪心法附餘卷之十八

精門

積聚痞塊 八十三

丹溪心法

○痞塊在中為痰飲 在右為食 一云痰積在左為血塊 氣不能作塊成聚塊乃有形之物也 痘與食積死血而成也 用醋煮海石醋煮三棱蓬木桃仁紅花五靈脂香附子之類為丸石醺白木湯吞下 瓦罐子能消血塊次消瘧 石醺一物有痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積 治塊當降火消食積即瘧也 行火血塊去須大補 ○凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不去當用消積藥使之融化則除根矣 凡婦人有塊多是血塊

戴云積聚癥有積聚成塊不能移動者是癥或有或無或上或下或左或右者是瘕

○積聚癥瘕朱先生醫台州潭補家用蜀葵根煎湯去滓再入人參白朮青皮陳皮甘草梢牛膝煎成湯入細研桃仁玄胡粉各少許熱飲之二服當見塊下如病重者須補接之後加減再行

入方

消塊丸 即千金方硝石大黃丸止可磨勻不令人因須量度虛實

硝石 六兩 人參 三兩 甘草 三兩 大黃 八兩

右為末以三年苦酒三升又云三斗置甕器中以竹片作準每入一升作一剝桂豎器中先納大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸則取丸如雞子中黃大每一丸米飲下如不能大丸

作小丸如梧子大每服三十丸服後當下如雞肝如米泔赤黑等色下後避風冷啖軟粥將息之苦酒即米醋

三聖膏 未化石灰半斤為末瓦器中炒令淡紅色提出火候熱稍減次下大黃末一兩就爐外炒候熱減下

桂心末半兩炒入米醋熬攪成黑膏厚紙撲貼患處

○痞塊在皮裏膜外須用補氣藥香附開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚味

又方 琥珀膏 大黃 樸硝各一兩

右為末大蒜搗膏和貼患處

又方 治茶癬 石膏 黃芩 升麻 各等分

右為末沙糖水調服

又方 一人愛喫茶 白朮 軟石膏 片芩生者半膽星 薄荷員藥大者白芍藥各二錢

右為末沙糖調作膏食後津液化下

又方 治脇下有塊 龍會丸 二錢半起科姜黃五錢桃仁五錢

右為末蜜丸如梧子大每服五十九食遠溫水下

又方 龍會丸和鵝糞大能消食積或入保和丸治塊看在何部分

治血塊丸 瓦罐子能消血塊 海粉醋煮三稜 異木醋煮紅花 五靈脂 香附

各等分 石鹼減半

右為丸白朮湯吞下三十九

又方 治婦人血塊如盤有孕難服峻利 香附醋煮四兩桃仁去皮尖白朮各一兩海粉醋煮二兩

右為末神麵糊丸如菜豆大每服五十九空心溫水下

又方 治婦人食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩暈身熱時作時止男子亦可服

黃連萸一兩半一半用吳茱萸炒去茱萸炒去吳茱萸不用山梔炒川芎 三稜 神曲 桃仁去皮尖各二兩香附童便浸二兩

蘿蔔子炒一兩半山梔一兩莪术醋煮一兩

右為末蒸餅丸如桐子大每服五六十丸食遠白湯下 又方用青皮半兩白芥子一兩半炒

保和丸 治一切食積 山梔六兩神曲二兩半夏 茶芩各二兩陳皮 連翹 蘿蔔子各一兩

右為末水浸蒸餅為丸如梧子大每服七八十九食遠白湯下

又方 山查四兩 白术四兩 神麩二兩

右為末蒸餅丸如梧子大每服七八十九食後白湯下

又方 山查三兩 白术二兩 神麩半兩 陳皮 茯苓 半夏各一兩 連翹 黃芩 蘿蔔子各半兩

右為末蒸餅丸如梧子大每服五十九食後姜湯下

阿魏丸 治肉積 諸阿魏丸脾虛者須以補脾藥作湯使下之切不可獨用虛虛之禍疾如反掌

連翹二兩 山查二兩 黃連一兩 三錢 阿魏二兩 醋煮作糊

右為末醋煮阿魏作糊丸每服三十九白湯下

小阿魏丸 山查三兩 石斛 半夏一兩 皂角水浸透略乾

右為末粥糊丸每服三十九白湯下

又方 治飽食停滯胃壯者宜此脾虛勿服

山查 蘿蔔子 神麩 麥芽 陳皮 青皮 香附各二兩 阿魏一兩 醋浸軟易研

右為末炒餅丸如梧子大每服三十九食遠白湯下

又阿魏丸 去諸積聚 山查 南星 皂角水浸麥芽炒神麩炒黃連各一兩 連翹 阿魏醋浸承墮各半兩

貝母半兩 風化硝 石斛 蘿蔔子各二錢 各一兩 連翹 胡黃連一錢半煅無以宣連代

右為末姜汁浸蒸餅丸如菉豆大每服六七十九食遠溫水下

佐脾丸 山查三兩 半夏 茶荳各一兩 連翹 陳皮 蘿蔔子各半兩

右為末粥丸如桐子大每服三十九白湯下

小溫中丸 青皮一兩 香附四兩 便後蒼木二半夏二兩 白术半夏二兩 陳皮一兩 苦參二兩 黃連一兩 姜汁炒半夏二兩 山梔 厚模姜汁炒半夏二兩 台芎半蒼木一兩

右為末麪糊丸如桐子大每服三十九食遠白湯下

又方 鈎砂醋煮三兩 香附四兩 童便後蒼木二半夏二兩 白术半夏二兩 陳皮一兩 苦參二兩 黃連一兩 姜汁炒半夏二兩 山梔 厚模姜汁炒半夏二兩 台芎半蒼木一兩

一方加人參白朮炒一兩半有苦參用白朮苦參不用黃連

松實丸

白朮二兩

枳實半夏

神曲麥芽各一錢

姜黃陳皮各五錢

木香一錢

牛山楂一兩

澤鴻各二錢

災甘草砂仁

川芎三錢

姜製豬苓一錢半

右為末收餅丸如梧子大每服一百丸溫水下不拘時

大溫中丸 又名大消痞丸 黃連炒黃芩六錢 姜黃白朮各一錢 人參陳皮澤鴻各二錢 川芎三錢 姜製豬苓一錢半
乾生姜炒麵各二錢 枳實炒半兩 半夏四錢 炒牛山楂一錢半
右為末收餅丸如梧子大每服一百丸溫水下不拘時

附諸賢論

或問人有積塊疝氣心腹痛等證者雖多服久服附子姜桂等熱藥而不發藥毒不生他病然本病日深者何也王節齋曰諸積諸痛喜溫而惡寒熱藥與病情相合積久成鬱而火邪深矣鬱熱既深則見寒愈逆見熱愈喜兩熱相從故不生他病所謂亢則害成廻制火極而似水者也然真氣被食陰血乾枯病日深痼而不可為矣世人不識但見投熱不熱悞認為沉寒痼冷而益投之至死不悟悲夫然則治之當如何曰當用從治法內經曰熱因寒用寒因熱用伏其所主先其所因者是也

附脉理

脉訣舉要曰胸痞脉滑為有痰結弦伏亦痞濶則氣劣肝積肥氣弦細青色心為伏梁沉乳色赤脾積痞氣浮大而長其色脾土中央之黃肺積悬青浮毛色白奔豚屬腎沉急而黑五臟為積六腑為聚積在本位聚積定處駛緊浮牢小而沉實或結或伏為聚為積實強者生沉小者死生死之別病同脉異

脉理提綱目鬱脉沉濶積脉弦堅

附諸方

肥氣丸 三方治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜蟹狀久不愈發咳逆嘔其脉弦而細

當歸頭

蒼朮各一兩

青皮一錢

莪朮三錢

三棱三錢

鐵梨粉各三錢

同入醋煮一候時久蛇含石

醋酒淬五錢

右為末醋煮米糊丸如菉豆大每服四十丸當歸浸酒下

伏梁丸三因方治心積起於臍上至心大如臂久不已病煩心身體脛股皆腫環臍而痛其脉沉而芤
枳殼去穰麸炒茯苓 厚樸 人參 白朮 半夏 三棱煨各等分

右為末麵糊丸如梧子大米飲下二十九作散酒調亦可

痞氣丸三因方治脾積在胃脘覆大如盤久不愈病四肢不收黃疸飲食不為肌膚心痛徹背背痛徹心其脉浮大而長 附子半兩泡赤石脂煨醋淬川椒炒出汗乾姜 桂心半兩 大烏頭二錢半泡去皮臍

右為末蜜丸如梧子大朱砂為衣每服十九米飲下

息黃湯三因方治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病酒酒寒熱欬逆喘嗽發肺壅其脉浮而毛

半夏湯洗七次吳茱萸湯洗桂心 人參 甘草炙桑白皮 炙亨蘆各一兩半

右剉每服四錢水鍾半姜七片棗二枚煎食前服

奔豚湯三因方治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨痿少氣其脉沉而滑

甘李根皮培乾萬各一兩 川芎二錢半 當歸 半夏湯洗泡七次四兩 白芍藥 甘草炙黃芩各二兩

右剉每服四錢水鍾半煎七分服

○已上數方治五積之劑

膝紅丸簡易方治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水大夫酒積婦人血積氣塊小兒食積並皆治之

陳皮 畴木二味同 青皮 三棱 乾姜泡良姜各一兩 附子炒去皮二兩

右為末醋糊丸如梧子大每服二十九姜湯下

木香通氣丸聖惠方治痰癖氣滯心腹痞滿嘔逆咳嗽順氣消痰進飲食消痞

人參 木香各一兩 胡索 陳皮 黑牽牛各六兩 楠榔 丁香各半兩 三棱 炮廣朮泡各三兩半夏製

茴香炒 木通 神曲 麦蘖各二兩 青皮 一兩

右為末水糊丸如小豆大每服三四十九生姜湯下食後日二服

導氣枳殼丸宣明方治氣結不散心胸痞痛氣逆上攻喘急咳嗽

枳殼去殼炒木通

青皮去陳皮白桑白皮炒蘿蔔子

白牽牛炒黑牽牛炒莪朶燜茴香炒荆三稜各半

右為細末生姜汁打麵糊丸如梧桐子大每服五十九橘皮湯送下

消滯丸治酒食所傷心腹痞悶刺痛積滯不消黑牽牛二兩杏附子炒一兩五靈脂一兩

右為細末醋糊為丸如梧子大每服五十九食後生姜湯送下

荆蓬煎丸拔粹方破癰瘍消癥塊積聚胸膈痞悶通利三焦升降陰陽

蓬木二兩醋浸

三稜二兩酒浸

二味用巴豆三十八粒銀器內炒乾黃色不用巴豆

木香枳殼青皮

茴香一枚枳榔各一兩

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三五十丸食遠生姜湯下

烏梅丸治酒積消食化痰烏梅一斤半夏半斤生姜一斤

右件石臼搗細末新瓦兩片夾定火上焙三日三夜為度次下

神龜麥芽陳皮青皮莪朶丁皮大腹子枳殼各四兩

右共為細末酒糊為丸如梧桐子大每服四五十九姜湯下

木香三棱丸宣明方治一切氣閉胸膈痞滯榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無問新久

青木香破故紙茴香炒黑牽牛甘遂芫花大戟荆三稜蓬莪朶川練子葫蘆巴

巴戟去心六錢巴豆去皮心不出油各七分半陳米將巴豆同陳米三合一處炒黑砂仁二錢

右十五味用好醋半斤除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮乾為度研為細末醋糊丸如菉豆大每服五七丸食後湯水送下

寶鑑破積導飲丸治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

梔榔 陳皮 去白 廣木香 青皮 去白 枳殼 麸炒 枳實 去穰 麸炒 廣茂 炮 荆三棱 炮 半夏 湯泡 七次 神曲 炒 大麥芽 炒

乾生姜

茯苓 去皮 甘草

火澤瀉

各五錢 牽牛 頭末二錢

巴豆

三分 膜油

取霜

右為細末入巴豆霜勻生姜汁打糊為丸如梧子大

每服三十丸食前溫生姜湯送下

○已上數方辛溫消導之劑

開結枳實丸

御藥宣導凝滯消化痰飲升降滯氣通行三焦瀉滌脾胃去結潤燥流暢大小腸專主中痞痰涎

惡心嘔噦醉飽膈實宿物停積而脇膨悶咽嗌不利上氣喘嗽等疾

枳實

去穰 麸炒 白朮

半夏

湯泡 天南星

白礬

枯苦薑蘆 糊紙 大黃

青皮 去白 各半兩

木香 三錢

黑牽牛 頭末一兩

皂角 去皮子各一兩

右為末生姜汁煮麵糊丸如梧子大每服四十九溫生姜湯送下 如單腹脹上喘涎多四肢腫滿食後生姜湯下 如婦人乾血氣膈實腫滿或產後有傷面目浮腫小便不利生姜葱白湯下

況香降氣丸

瑞竹 治胸膈痞滿升降水火調順陰陽和中益氣推陳致新羹進飲食

況香

木香 菖澄茄 枳殼

去穰 砂仁

白豆蔻仁

青皮

陳皮

廣木

枳實

麸炒 黃連

半夏

姜製

白茯苓

去皮一兩 蘿蔔子 另研半兩

香附子

炒去毛二兩

右為細末生姜自然汁浸蒸餅為丸如梧子大每服七十九臨卧煎橘皮湯下姜湯亦可忌生冷

香棗丸

治五積六聚氣塊

三棱

六兩 青皮

陳皮

莪朶

或 枳殼

炒枳實

炒 蘿蔔子

炒香附子

各一兩 黃連

神曲

炒 麥芽

炒 鱗甲

乾漆

烟盡為度 桃仁

砂仁

砲砂

歸尾

木香

甘草

炙各一兩

梔榔

六兩 山楂

四兩

右為末醋糊丸

每服三五十丸白湯下

一方 治腹中癰塊及諸般癰塊脾胃怯弱飲食不消腹脹面黃四肢酸疼無力

麸曲

四斤炒黃色 蒼朶

木泔水浸 皂礬

一斤以好醋一碗煮乾

蓋地上一宿取出

右同為末酒糊丸

如梧子大每服三十九加至五十九空心米湯或酒任下一日三服

積氣丹聖惠方治新久一切沉積氣塊瘕瘕積聚面黃肌瘦沉困無力口吐酸水

枳榔二箇 芫花三枝 黃連牛膝 商陸根廣茂各一錢砂 一錢肉豆蔻青皮 陳皮石菖蒲

巴豆生木香各三錢半 大戟大黃 甘遂白牽牛 乾姜青磁石 乾漆各五錢

右為末醋糊丸如梧桐子大每服十九粒臨卧燒棗子湯下若是有積者肚內作聲病退為度不退每夜十九粒廣按此方用陳皮青皮木香枳榔之類所以治無形之氣積用牛膝乾漆三棱莪术之類所以治有形之血積用大戟芫花甘遂牽牛商陸磁石硇砂之類所以治水穀魚肉之積也餘用乾姜巴豆以治新積之寒用大黃連以治久積之熱可謂周而且備矣然此晒眩之劑中病當已而不可服之太過也歟

○已上數方辛平消導之劑

宣毒丸 大黃炮二錢 青皮陳皮 蒼朮各一兩 當歸去頭一兩 黑牽牛四兩

右為末煮蘿蔔丸如梧子大每服五十九溫水臨卧下米粥補之

妙功丸 治飲食不節起居失常七情所感動勞不一以致氣凝血滯於榮衛之中或冒風寒濕氣凝結於經絡之間臟腑之內或為癥瘕或為積聚癰塊此藥功效不可具述

大黃四兩 黃連鬱金各一兩 輕粉二錢 硬石煅二錢 粉霜半錢或一錢 川芎二兩 黑牽牛頭末八滑石四兩

白豆蔻沉香 木香各半兩 蓬木枳榔 黃芩各一兩

右件除粉霜輕粉硇砂另研白豆蔻另研和匀水丸或稀糊丸如梧子大量虛實加減

木香和申丸聖惠方治消腸胃中積聚癰瘕癰塊宣暢三焦開利胸膈主治氣逆上攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢筋脈拘急身體困倦潤大便利小便和脾氣進飲食

本香去皮 沉香枳殼 茄蓬莪木去青皮去陳皮去當歸酒黃芩去腐木通皮黃連去白豆蔻 三稜去牙皂連子去皮各一兩 醋李仁去皮各一兩 大黃去皮四兩 級砂半兩 黃柏去粗皮去毛 香附去毛一兩 牽牛頭末二兩或四兩

右為末水丸如梧子大每服一錢半加至三錢生姜湯下或茶酒亦得不拘時候

木香枳殼丸御藥治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹滿心腹反痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋石酸飲食退化並皆服之

枳殼去穰炒茯苓去皮白朮

厚樸生姜炒

半夏湯先七次

人參去芦頭

木香

青橘皮

陳橘皮二味各湯浸去穰炮乾

荆三棱炮莪木二味

煅香枳榔

神曲炒麥芽一兩乾生姜半兩

枳實用炒

牽牛微炒半兩

大黃五錢

右為細末生姜汁為丸加麵糊如梧子大每服七十丸食後姜湯下

○廣按凡人有積病則氣滯而餒此方用藥攻補無施真得古人養正積自除之理有疾病而涉虛者用此最當

木香枳榔丸瑞竹治一切氣滯心腹滿悶脇肋脹張大小便結滯不快

木香

商枳殼去穰炒

青皮去白

陳皮去白

枳榔

廣茂

黃連各二兩

黃柏

去粗皮

香附子略炒

大黃各三兩

黑牽牛半斤去頭末四兩

右為細末酒糊丸如梧子大每服五十九食後溫生姜湯下

全真丸端效方治三焦氣壅結痞心胸大便不通傷寒下證已服承氣不利服此數粒安穩而通

川大黃

商枳殼數炒

枳榔

黑牽牛半生半熟各半兩

右為細末滴水為丸如梧子大每服五十九或七十九米飲下

解毒枳榔丸治男子婦人嘔逆酸水痰涎不利大便膿血口苦煩燥涕唾稠粘嗽血血崩腹脹氣滿手足癟

弱四肢無力酒疸食黃口舌生瘡寒熱往來瘧疾腸風痔瘻瘕血積諸惡瘡疔痘皆治之

枳榔

黃連

青皮

陳皮

木香

沉香

巴戟去心酒浸當歸

廣木

枳殼

香附子炒

甘草尖

大黃各二錢半黃柏七錢半牽牛末一兩

右為細末滴水為丸如梧子大每服七十丸溫生姜湯下

取積丹聖惠方用好大黃不以多少為末用好釀醋熬膏子為丸如梧子大每服一百丸量虛實大小休吃晚足本丹溪心法附錄

飯用好墨研濃好酒送下次日見膿

○已上數方辛涼消導之劑

七轉靈應丹 治一切山嵐瘡氣疊毒不問新舊諸積諸氣及婦人血瘕血閉小兒肚大面黃疳積及一切心痛諸般蠱積凡人面上白斑唇紅能食心嘈顏色不常臉上有蟹爪路者便有虫也此丹四時宜服不損真氣無病之人春秋各服一服打下虫積終歲無病惟孕娠不宜服之

蕪荑五錢取末四錢牽牛五兩取頭末三兩梔榔五兩取淨末三兩大黃五兩取淨末三兩木香五錢取淨末四錢雷丸四兩取淨末三兩錫灰一兩煅取淨末三錢右各取淨藥末一處拌勻葱白湯露一宿為丸如黍米大每服四分病深年遠者加至五分用葱白湯露一宿早晨心冷下取出病根日晚用溫粥補之忌生冷硬物童腥等物三十日若失聲音加沉香琥珀各五錢又方以茵陳皂角各四兩煎膏為丸或入使君子鶴虱各五錢為末更好

八仙妙應丹 治男子婦人小兒外感內傷以致水穀停留腸胃生蠱成積惡心嘔吐若酸糟雜癰癧黃疸水腫鼓脹膈噎翻胃及婦人癥瘕積聚心腹疼痛小兒疳症面黃肌瘦肚大腳細一切蠱積並治

雷丸一兩錫灰半兩白蕪荑一兩木香一兩錦大黃一兩梔榔十二兩使君子一兩黑丑頭末三兩不見火

右八味為細末葱白一斤煮沸露一宿為丸如粟米大每服四錢病重年深體實者加至五錢葱白湯送下或木香湯下十五歲以上者可服三歲七歲者每一服作三服早晨空心冷下務在房內坐桶不要見風外出通泄或見積如絮動不斷或如爛魚腸肚或如雞旦黃色或如米泔水色稠粘不斷或如馬尾虫或血鱉虫或胡蚕虫或蝦蟆樣子一切等物一服即出有虫即取下虫有積即取下積有氣即消了氣必效之藥加以硇砂甘遂尤妙如虛老之人用此推蕩後服四君子湯數帖尤好也

木香三棱散瑞竹治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛半生半炒大腹子二錢梔榔

雷丸一兩錫灰醋炒三棱煨蓬木香二錢大黃三錢

右為末每服五錢用沙糖水調服先將燒肉一片口中細嚼吐出然後服藥一方加阿魏一錢蕪荑仁三錢

萬應丸 下諸虫 柏榔五錢 大黃八兩 黑牽牛四兩 苦練根皮一升 鬼角十錢 虫不蛀者

右先將兒角苦練根皮二味用水一大碗熬成膏子一處搜和前藥三味研細末為衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三丸四更時分用沙糖水送下

取寸白虫 紫柏榔十箇 向陽石榴皮七十片

右水煎露一宿飲之以下虫為度

治吐虫有積 用黑錫皮柏榔末米飲調下

一方 治茶積 用花椒為末麵糊丸如梧子大每服十九茶湯送下

一方 治酒積面黃黑腹脹不消 用甘遂一錢為末以猪槽頭肉一兩細切搗爛和末作一丸紙裹火煨令香熟取出臨卧細嚼酒嚥取出病根

○已上數方追虫取積之劑

龍會丸 見膈痛

○廣按積聚痞塊之症諸書所載皆以內為喜怒憂思悲恐驚七情所致此言良有以也但云五臟傳變成積不無求之太過乎蓋人之氣血榮衛一身上下周流無時少息一旦七情感動五志之大火性炎上有升無降以致氣液水穀不能順序稽留而為積也必矣丹溪曰氣不能成塊成聚塊乃有形之物疾與食積死血而成也在中為痰飲在右為食積在左為血塊誠然言也何以明之夫左關膽肝之位肝膽藏血液右關脾胃之位藏飲食所以左邊有積則為血塊右邊有積則為食積而其中間則為水穀出入之道路五志之火薰蒸水穀而為痰飲所以中間有積而為痰飲也其理昭矣治法調其氣而破其血消其食而豁其痰是矣如木香枳榔去氣積三棱莪朶去酒積香附子枳殼去食積牽牛甘遂去水積山楂阿魏去肉積海粉礞石去痰積雄黃白礬去虫積乾姜巴豆去寒積黃連大黃去熱積各從其類也大抵積之初固為寒而積之久則為熱矣予令分辛溫辛平辛涼三例正欲人知斯久之義爾榔當

論之醫為病所困首惟陰虛之難補久積之難除玉山自倒陰虛之謂也養虎遺患久積之謂也嗚呼人之罹此二者須節慾以養性內觀以養神澹泊自如從容自得然後委之於醫不然雖張劉李諸子復生亦不能為我保也

丹溪心法附餘卷之十九

虛損門

發熱 八十四 附胃中煩熱 虛熱 虛煩不眠

丹溪心法

○陰虛發熱証難治 戴云九脉數而無力者便是陰虛也 四物湯加炒黃芩龜板兼氣虛加人參黃芩黃芩白术 四物湯加炒柏是降火補陰之妙劑甚者必加龜板 噫酒人發熱難治 不飲酒人因酒發熱者亦難治 一男子年二十三歲因酒發熱用青黛瓜萎仁入姜汁每日數匙入口中三日而愈 陽虛發熱補中益氣湯 手足心熱屬熱鬱用火鬱湯 傷寒寒熱當用表散 發熱柴胡惡寒蒼木虛人用蒼木恐燥 發熱惡風人壯氣實者宜先解表 發熱惡寒亦宜解表

入方 蒼术 半兩片芩 三錢甘草 一錢半

右為末湯浸炒餅丸服

治手心發熱 山梔 香附 或加蒼术 白芷 半夏生川芎

右為末神麵糊丸如桐子大每四五十九食遠白湯下

治大病後陰虛氣鬱夜熱 酒芍藥

一兩五錢五分香附一兩蒼术半兩炒片芩二錢甘草一錢半

右為末炒餅丸如菉豆大每服五十九食遠溫水下

癥發熱 炒片芩 炒黃連 半兩香附 二兩半蒼术 二兩

右為末用瓜蒌殼丸如桐子大每服五十九溫水下

退勞熱食積痰 上甲 下甲 側柏

瓜蒌子各五錢

半夏

四錢

黃連

黃芩

炒柏

各三錢

右為末炒餅丸如桐子大每服五十九食遠白湯下

○胸中煩熱須用柏子仁 有實熱而煩燥者亦用柏子仁 有虛熱而煩燥者宜參芪麥門冬白茯苓竹茹

白芍藥 若脉實數有實熱者

神芎丸

○虛熱用黃芪止虛汗亦然又云肌熱及去痰者須用黃芩肌熱亦用黃芪 如肥白人發熱宜人參黃芪當歸芍藥浮小麥炒止虛汗同

補中益氣湯治虛中有熱或月表之熱

○治虛煩不得眠

六一散加牛黃

補中益氣湯見內傷

火鬱湯

升麻

葛根

柴胡

白芍藥

各一兩防風

甘草

各五錢

右剉每服五錢入連鬚葱白三寸煎稍熱服不拘時

神芎丸見火類

附諸賢論

王節齋曰世間發熱証類傷寒者數種治各不同外感內傷乃大關鍵張仲景論傷寒傷風此外感也因風寒感於外自表入裏故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義也以其感於冬春之時寒冷之日即時發病故謂之傷寒而藥用辛熱以勝寒若時非寒冷則藥當以變矣如春溫之月則當變以辛涼之藥如夏暑之月即當變以甘苦寒之藥故云久傷寒不即病至春變溫至夏變熱而其治法必因時而有異也又有一種冬溫之病謂之非其時而有其氣蓋冬寒時也而反病溫焉此天時不正陽氣反泄用藥不可溫熱又有一種時行寒疫却在溫煖之時時本溫煖而寒反為病此亦天時不正陰氣返逆用藥不可寒涼又有一種天行溫疫熱病多發於春夏之間沿門闥境相同者此天地之癘氣當隨時令參運氣而施治宜用劉河間辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒已上諸證皆外感天地之邪者也若夫飲食勞倦內傷元氣此則真陽下陷內生虛

熱故東垣發補中益氣之論用人參黃芪等甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足者也又若勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變為火矣是為陰虛火旺勞瘵之證故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物湯加黃柏知母補其陰而火自降此用血藥以補血之不足者也益氣補陰皆內傷證也一則因陽氣之下陷而補其氣以升提之一則因陽火之上升而滋其陰以降下之一升一降迥然不同矣又有夏月傷暑之病雖屬外感却類內傷與傷寒大異蓋寒傷形寒邪客表有餘之證故宜汗之暑傷氣元氣為熱所傷而耗散不足之證故宜補之東垣所謂清暑益氣者是也又有因時暑熱而過食冷物以傷其內或過取涼風以傷其外此則非暑傷人乃因暑而自致之之病治宜辛熱解表或辛溫理中之藥却與傷寒治法相類者也凡此數證外形相似而實有不同治法多端而不可妄認故必審其果為傷寒傷風及寒疫也則用仲景法果為溫病熱病及溫疫也則用河間法果為氣虛也則用東垣法果為陰虛也則用丹溪法如是則庶無差悞以害人性命矣今人但見發熱之証一概認作傷寒外感率用汗藥以發其表汗後不解又用表藥以涼其肌設是虛証豈不死哉聞有頗知發熱屬虛而用補藥則又不知氣血之分或氣病而補血或血病而補氣誤人多矣故外感之與內傷寒病之與熱病氣虛之與血虛如冰炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣可不畏哉可不謹哉予每發會此數証合為一書使界限判然而治法昭若以惠斯人而未遑也故略發其槩以為後日張本云

附諸方

補中益氣湯拔萃方 治陽虛發熱久患虛勞 黃芪 甘草 各半錢 當歸身二錢 人參三錢 白朮七錢半

柴胡 五錢 升麻 五錢 陳皮 七錢半 又方加白芍藥 紅花 黃柏

右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾食前溫服

地仙散經驗方 治骨蒸肌熱一切虛煩 地骨皮 防風去芦各一兩 人參 雜蘇 甘草 各二錢半

右剉每服一兩生姜三片淡竹葉五片水二鍾煎至一盞去滓通口服不拘時候

四白散 拔萃方 治子婦人諸虛發熱夜多盜汗羸瘦腳痛不能行動

黃芪 厚朴 蓼智仁 蕙香 白朮 白扁豆 陳皮 各一錢 半夏 白茯苓 人參 烏藥 甘草
白豆蔻仁各五錢 茵藥一兩半 檉香 沉香各二錢半

右剉每服一兩生姜三片棗一枚水一鍾半煎至七分食後溫服

黃芪飲子 濟生方 治諸虛勞瘵四肢倦急潮熱之力日漸羸瘦胸膈痞塞咳嗽痰多甚則唾血

黃芪 蜜炙一兩半 當歸 去芦酒浸 紫苑草 去土石斛去根 地骨皮 去梗 人參 藟白皮 鹿茸 酒蒸

穎冬花 各一兩附子炮去皮半夏湯泡七次甘草炙各半兩

右剉每服四錢水一鍾姜七片棗一枚煎服此藥溫補榮衛枯燥者不宜進唾血加阿膠清黃各半兩

○已上數方治陽虛氣虛發熱之劑

當歸黃芪湯 治虛火上攻頭目渾身胸背發熱 當歸 酒浸一錢黃芪五錢

右剉水一鍾煎至七分去渣食後溫服

子芩散 拔萃方 治心肺解勞熱

黃芩 一兩 白芍藥 子芩 人參 白茯苓 麥門冬 桔梗 生地黃 各半兩

右剉每服一兩水二鍾竹葉一握小麥二十粒姜三片煎至一鍾去滓通口食後服

人參柴胡散 拔萃方 治邪熱客於經絡肌熱痰喘五心煩躁頭目昏痛夜有盜汗婦人虛勞骨蒸尤宜服之

白茯苓 去皮 赤芍藥 人參 去芦 白朮 柴胡 去芦當歸去芦半夏 酥 萬根 甘草 炙各一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾姜三片棗一枚煎至一蓋去滓食後服

人參地骨皮散 拔萃方 治臟中積冷榮中熱按之不足舉之有餘此乃陰不足陽有餘也

茯苓 去皮五錢 知母 石膏各一兩 地骨皮 人參 柴胡 去芦生地黃 黃芪各一兩半

右剉每服一兩姜三片水二鍾煎至一鍾去滓通口不拘時候

人參黃芩散和劑方治諸虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忡日晡潮熱夜有盜汗胸膈不利減食多渴咳嗽痰唾稠粘時有膿血

天門冬

去心
三兩

半夏製知母

桑白皮

炒赤芍藥

黃芩

去芦

紫苑

去土
一兩

甘草

五兩
各十

白茯苓

去皮
去皮

柴胡

去芦
去皮

秦艽

去土
二十兩

生乾地黃

地骨皮

各二十
兩

人參

桔梗

各十
兩

鱉甲

去裙
一兩

一方有生姜

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服不拘時

鱉甲地黃湯濟生方治虛勞手足煩熱心下怔悸及婦人血室枯乾身體羸瘦飲食不為肌肉

柴胡

去芦
當歸

酒浸

麥門冬

去心
三兩

鱉甲

醋炙
去皮

地黃

酒炮
一兩

秦艽

去土
各一兩

甘草

半
兩

官桂

不見火
人參

甘草

半
兩

右㕮咀每服一兩生姜五片烏梅一箇水二鍾煎至一鍾溫服

人參散醫方集成治邪熱客於經絡咳嗽煩熱頭目昏痛夜多盜汗四肢倦怠一切熱血虛勞宜服

黃芩

五錢

人參

白朮

茯苓

赤芍藥

柴胡

甘草

當歸

半夏

大腹皮

葛根

各一
兩

知母

散
楊氏方

治虛勞心肺熱咳嗽唾膿血大能解勞除熱調順榮衛

黃芩

一兩
安妥

白芍藥

生地黃

黃芩

麥門冬

去心
人參

去白茯苓

去皮
桔梗

去皮
知母

甘草

五錢
各七

甘草

五錢
半

柴胡

去皮
甘草

右㕮咀每服八錢水一鍾生姜三片小麥一撮竹葉一片煎至八分食後溫服

柴胡

一兩
安妥

桔梗

各一
兩

生地黃

地骨皮

人參

茯苓

白朮

甘草

當歸

各一
兩

薄荷

五錢
半

柴胡散

拔萃方
治寒熱體虛

右㕮咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至八分去滓食後溫服

滑石

一兩
半

牛草參

二錢半

柴胡散

拔萃方
治寒熱體虛

腹瀉

頭痛

躁

又本丹溪心法附錄

卷十九

發熱門

三 滬江海左書局印行

柴胡 黃芪 赤茯苓 白术 各一兩 人參 地骨皮 枳殼 蕤桑白皮 赤芍藥 生熟地黃 各二錢半
麥門冬 三兩 甘草 炙五錢 桔梗 七錢半

右咬咀每服一兩生姜三片水二鍾煎至一鍾溫服

樂令建中湯 治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡 去芦而細半

黃芪

蜜炙人參

桂心

橘皮

去白當歸

白芍藥

茯苓

去麥門冬

甘草

炙各半夏

湯泡

桔梗

四錢半

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片棗二枚煎服不拘時

人參保肺湯 宣明方治五勞七傷喘氣不接涎疾 稀粘骨蒸潮熱

人參

去芦

柴胡

去當歸

芍藥

桑白皮

知母

白术

川芎

黃芪

去紫苑

荆芥

地骨皮

各二錢半

茯苓

去皮黃芩

連翹

大黃

薄荷

山梔子

去皮各五錢

甘草

桔梗

各一錢半

石膏

滑石

寒水石

各五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至七分去滓溫服泄者去大黃

防風當歸飲子 宣明方治煩渴發熱虛頭骨蒸

柴胡 人參 茯苓 甘草

各一兩

滑石

三兩

大黃

當歸

芍藥

防風

各半兩

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至一鍾去粗通口服不拘時如有痰嗽加半夏泄者去大黃

○已上諸方治陰陽氣血兩虛發熱之劑

青蒿散 楊氏不治虛勞骨蒸咳嗽聲啞皮毛乾枯四肢倦怠夜多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱

天仙藤

鱉甲

醋炙

香附子

炒去毛

桔梗

去前胡苗

秦艽

青蒿

各一錢半

甘草

川芎

二錢半

右咬咀每服一兩生姜三片棗二枚水二鍾煎至一鍾食後溫服

秦艽鱉甲湯 拔萃方治骨蒸壯熱肌肉消瘦唇紅頰赤困倦盜汗

地骨皮 柴胡 鱉甲各一兩

秦艽

知母

當歸

各五錢

右剉每服一兩水二鍾烏梅一箇青蒿數莖煎至一鍾去滓通口服

地骨皮枳殼散菝葜一方治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多因夜多盜汗

地骨皮 秦艽 柴胡 枳殼 知母 當歸 鱗甲 醋炙黃等分

右㕮咀每服一兩水一鍾半柳桃各七枚生姜三片烏梅一箇煎至八分去粗通口食後服

秦艽鱗甲散和劑方治氣血勞傷四肢倦急面黃肌瘦骨節煩疼潮熱盜汗咳嗽痰唾山嵐瘴氣並皆治之

荆芥去梗貝母去心天仙藤前胡去芦秦艽去芦洗青皮去白柴胡去芦甘草去陳皮白芷

鱗甲去穢醋浸炙各一兩乾葛二兩肉桂去皮羌活各半兩

右爲末每服二錢水一鍾姜三片煎八分熱服酒調亦可

○已上數方治陰虛血虛發熱之劑

○廣按發熱之證實非一端王節齋先生論之詳矣尚有痰飲脚氣食積虛煩四證未之及也其治各證發熱之方已隨本証不復重舉外今於發熱病下只具治陽虛陰虛二者之方古人於陽虛陰虛二證論之未詳而方之未辨至再溪出而後明矣何則晝夜發熱晝夜輕口中無味陽虛之證也午後發熱夜半則止口中有味陰虛之證也陽全陰半陽得以兼陰陰不得以兼陽自然之理也陽虛之證責在胃陰虛之證責在腎蓋饑飽傷胃則陽氣虛矣房勞傷腎則陰血虛矣古人以飲食男女爲切要厥有旨哉以藥而論之甘溫則能補陽氣若寒則能補陰血如用四君以補氣四物以補血是也若氣血兩虛但以甘溫之劑以補其氣氣旺則能生血也若只血虛而氣不虛忌用甘溫之劑以補其氣氣旺而陰血愈消失故陽虛之與陰虛甘藥之與苦藥不可不詳審而明辨也歟

小草湯 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃芪去芦當歸酒浸麥門冬去心酸棗仁炒去皮石斛各一兩 人參 甘草火各半兩

右剉每服四錢水一鍾姜五片煎八分溫服不拘時
人參竹茹湯三因方治胃口有熱嘔吐欬逆虛煩不安 人參半兩 半夏一兩 竹茹一團

右作六服用水一鍾半姜十片竹茹一團煎溫服 一方加橘皮一兩去白

地仙散 治骨蒸肌熱一切虛煩見發熱

辰砂妙香散 和劑方治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

射香

一錢另研

山藥

姜汁炒一兩

人參

半兩木香

梗半錢半枝芩去皮黃芪

茯神

各一兩去皮去心炒

桔梗

半兩甘草

梗半兩遠志去心炒

辰砂

三錢別研

右為末每服二錢溫酒調服不拘時

人參竹葉湯

三因方治汗下後表裏虛煩不可攻者

竹葉

一把入參

甘草

各一兩半夏

二兩石膏

麥門冬

各半兩

石膏

半兩

麥門冬

各半兩

濟生方去石膏加茯苓小麥

右剉每服四錢水鍾半姜五片粳米一撮煎去滓空心服

橘皮湯

三因方治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目眩惡寒食反嘔逆穀不得入

橘皮

一兩半

甘草

半兩人參

二錢半竹茹

右剉細每服四錢水一鍾姜三片棗一枚煎空心服活人書加生姜一兩棗八枚作六味

竹葉石膏湯

治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛不可

汗下者

溫膽湯

治大病後虛煩不得睡卧及心胆虛怯觸事易驚短氣悸乏或腹自汗並見傷寒類

○已上數方治虛煩之劑

慈寒八十五附面熱面寒

丹溪心法

○陽虛則惡寒用參芪之類甚者加附子少許以行參芪之氣 一婦人惡寒用苦參赤小豆各一錢拘朶

水調服服吐之後用川芎南星蒼术酒炒黃芩為末鴆丸服五六十九白湯下冬月芩減半加姜汁調鴆更

糊丸 虛勞冬月惡寒之甚氣實者可利亦宜解表柴胡乾葛 惡寒久病亦用解鬱

戴云凡背惡寒甚者脉浮大而無力者是陽虛也

○面熱火起 寒鬱熱○面寒 退冒熱

自汗 八十六

丹溪心法

○自汗屬氣虛 血虛 濕 阳虛 痰 東垣有法有力 人參黃芪少佐桂枝 陽虛附子亦可少用湏
小便蹇 大氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散主之 痰症亦有汗 自汗大忌生姜以其開腠理故也
附脉理

脉訣舉要曰汗脈浮虛或濇或濡軟散洪大竭飲無餘

附諸方

黃芪建中湯 治男子婦人血氣不足體常自汗 方見補損

芪附湯 潤生方 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠 黃芪 去芦蜜炙 附子 炮去皮脐各等分

右㕮咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓臨卧口服

玉屏風散 治自汗 防風 黃芪各一兩白朮二兩 右每服三錢水一鍾半煎至七分溫服

大補黃芪湯

治自汗虛弱之人可服

黃芪蜜炙防風

川芎

山茱萸肉

當歸

白朮炒肉桂

甘草炙五味

人參各一兩

白茯苓一兩半

熟葶苈二兩

肉蓯蓉一兩

右剉每服五錢棗二枚水煎至七分溫服

一方 治氣虛不足津液枯竭體常自汗晝夜不止日漸羸瘦

防風 黃芪 白朮 麻黃根 牡蠣 洗淨研過各一兩

右用水一鍾小麥一撮煎至六分溫服

防門黃芪湯

治風濕相搏時自汗出

方見中濕

撫芎湯

治寒

自汗頭眩癱逆惡心

撫芎

白朮

去油墨炒

橘紅各一兩

甘草

炙半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾姜二片煎八分溫服

涼膈散

見火類

溫粉 驴蠅 麥皮 麻黃根 茶本 糯米 防風 黃芩

右為末周身撲之

又方 何首烏末津調封臍妙

盜汗

八十七

丹溪心法

○盜汗屬血虛 陰虛 小兒不須治 忌用生姜 東垣有方 用當歸六黃湯甚効但藥性寒人虛者只有黃芪六一湯 盜汗發熱因陰虛用四物加黃柏蕙氣虛加人參黃芪白朮

戴云盜汗者謂睡汗出也不睡則不能汗出方其睡熱也淒淒然出馬覺則止而不復出矣非若自汗而出也雜病盜汗責其陽虛與傷寒盜汗非比之亦是心虛所致宜斂心氣益腎水使陰陽調和水大升降其汗自止

附諸方

麥煎散

和劑方 治營衛不調夜多盜汗四肢煩熱肌肉消瘦

知母 石膏 甘草 火滑石 白茯苓 人參 地骨皮

淨赤芍藥 茜草

麻黃根

兩半兩

杏仁

去皮尖核炒各半兩

右為末每服一錢浮麥煎湯調服

當歸六黃湯

聖惠方

治盜汗之聖藥也

當歸

生地黃

熟地黃

黃柏

黃芩

黃連

一

黃芩加一倍

右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓臨卧口服

黃芪六一湯 治虛人盜汗 黃芪 六兩 甘草 一兩

右各用蜜炙十數次出火毒每服一兩水煎服

治盜汗百一選方心液為汗此藥收斂心經

人參 當歸 各等分

右二味剉每服五錢先用猪心一枚破作數片并心肉血煎湯澄清汁煎藥服

參芪湯松方治虛人盜汗

人參 甘草 炙白扁豆 炒乾葛 萍芩 陳皮 白朮 黃芪 山藥 半夏 麴 各等分

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣溫服不拘時

降心丹和劑方治心腎不交盜汗遺精方見補損○按此寧心神之藥也

又方 白朮四兩分作四分 一分用黃芪同炒 一分用石斛同炒 一分用麸皮同炒 一分用牡蠣同炒

右各微炒黃色去餘藥只用白朮研細每服三錢粟米湯調下盡四兩炒○按此燥脾濕之藥也

正氣散 治盜汗 黃柏 炒知母炒各一錢半 甘草 炙五分

右作一服水煎食前熱服○按此去相火之藥也

又方 治別處無汗獨心孔一片有汗思慮多則汗亦多病在用心宜養心血

以艾煎湯調茯苓末一錢服之

又方 青桑第二葉焙乾為末空心米飲調服最止盜汗

又方 五倍子為細末以唾調填臍內絹帛縛定立効

一方 治陰囊汗 用蜜陀僧研令極細加蛤粉撲患處

○廣按自汗盜汗之證為病雖一其源不同自汗者乃陽虛氣虛有濕也陽氣虛則不能衛護肌腠故醒時津津然而汗出矣盜汗者乃陰虛血虛有火也陰血虛則不能榮養於中故睡時湊湊然而汗出矣何以知之如古方用玉屏風散治自汗効者其間防風黃芪所以實表氣白朮所以躁內濕也用當歸六黃

湯治盜汗効者當歸黃芪生熟地黃所以補陰血黃芩黃連黃柏所以去內火也其藥性與病情相對豈有不愈者乎

痿 八十七

丹溪心法

○痿證斷不可作風治而用風藥 有濕熱 濕痰 氣虛 血虛 瘦血 濕熱東垣健步丸加燥濕降陰
火蒼木黃芩黃柏牛膝之類 濕痰二陳湯加蒼木白朮黃芩黃柏竹瀝姜汁 氣虛四君子湯加黃芩黃柏
蒼木之類 血虛四物湯加黃柏蒼木煎選補陰丸 亦有痰積死血妨礙不得下降者 大率屬熱用參木
四物湯黃柏之類

附諸賢論

或曰手陽明大腸經肺之腑也足陽明胃經脾之腑也治痿之法取陽明一經何也願明以告我丹溪先生曰
內經云諸痿生於肺熱只此一句便見治法大意經曰東方實西方虛濁南方補北方此固是就生尅言補
濁而大經大法不外於此東方木肝也西方金肺也南方火心也北方水腎也五行之中惟火有二腎雖有
二水居其一陽常有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然肺金體燥而居上主氣畏火者也脾土
性濕而居中主四肢畏水者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝脾得火邪而傷矣
木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢
不能為用而諸痿之病作矣濁南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何
肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此駱隆吉亦曰風火既熾當滋腎水
東垣先生取黃柏為君黃芪等補藥之輔佐以治諸痿而無一定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有
濕熱相半者有挾氣者臨病製方其善於治痿者乎雖然藥中肯綮矣若將理失宜聖鑒不治也天產作陽
厚味發熱先哲格言但是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也

附脉理

脉訣舉要曰尺脈虛弱緩濶而緊病為足痛或是痿病

附諸方

二陳湯 見痰類

四君子湯

四物湯

補陰丸 並見補損

東垣健步丸

防已

酒洗一兩

羌活

柴胡

滑石

甘草

炙取根一兩

澤瀉

防風

錢各三錢

苦參

酒洗研末各一錢

肉桂

五分

右為末酒糊為丸梧子大

每服七十九葱白煎愈風湯下

愈風湯 見中風

清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動

黃芪

一錢五分

蒼朮

一錢白木

橘皮

澤瀉

各半錢

人參

白茯苓

升麻各三分

麥門冬

歸身

生半

麵末

猪苓

各二分酒柏

柴胡

黃連

各一分

五味

九箇甘草各二分

右每服半兩水煎空心服

五獸三匱丹 澹寮方 治因氣血耗損肝腎不足而脚痿弱

鹿茸

酥炙

麒麟竭

虎脰骨

鮮片酥炙

牛膝

去芦酒浸

狗脊

燎去毛各等分

右脩事為末即五獸丹料也

辰砂

一兩天者一箇去皮臍割旋

附子

木心室入辰砂於內

足本丹溪心法附錄

卷十九 瘦

七 滬江海左書局印行

宣木瓜一箇削去心仍薄去皮入上附子於內以旋附子末蓋肚子曰王坐於銀石罐中重湯蒸十分爛附子斷白為度即三僵外也

右為三僵丹研膏調五獸末勻為丸如雞頭大木瓜酒或降氣湯下

加味四斤丸 治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步履不隨見脚氣

五斤丸楊氏方治筋血不足腰脚緩弱行步艱辛一切寒濕脚氣並治

沒藥另研川烏頭炮去皮山藥各四兩天麻透明者切焙

大木瓜

牛膝去芦用熟灰酒浸一宿控乾切焙

肉蓯蓉酒浸一宿切虎骨生酥火金黃色四兩

右將木瓜蒸爛研作糊和藥末丸不就更加元浸牛膝酒打糊搜勻杵一二十九如梧桐子大每服五十九溫酒鹽湯任下

黑虎丹 治腳氣筋骨軟弱步履不隨方見脚氣

一方 治骨軟風腰膝疼行履不得遍身癢痒

用大何首烏牛膝各一斤酒一升浸七宿晒乾於木臼內搗為末煉蜜丸如梧桐子大每服三五十丸空心溫酒白湯任下

羌花散 治背腰間忽一二點痛入骨不可忍者

右用羌花根為末米醋調敷痛處以絹帛札之婦人產後有此疾貼之妙

○廣按風癆之別痛則為風不痛則為癆經曰痛則為實不痛則為虛曰風曰癆虛實二者而已矣東垣曰氣感病盛氣衰病衰何則人之氣血充實而風寒客於經絡之間則邪正交攻而疼痛作矣人之氣血弱虛而痰火起於手足之內則正不能勝邪而癆痽作矣故丹溪先生曰癆症切不可作風治而用風藥蓋以風為實而癆為虛也曰散邪曰補虛豈可紊亂矣乎

○厥逆也 手足因氣逆而冷也 因氣虛為主 有因氣虛 氣虛脉細 血虛脉大 熱厥脈數 外感
脉沉實 有痰脉弦 因疾者用白术竹瀝 氣虛四君子 血虛四物 热厥用承氣 外感用雙解散加
姜汁酒

有陰厥陽厥陰衰於下則熱陽衰於下則寒

○手足麻者屬氣虛 手足本者屬濕痰犯血 十指麻木是胃中有濕痰犯血

附諸賢論

心法附錄曰厥者甚迫短也逆也手足逆冷也其証不一散之方書者甚多今姑撮其大概且如寒熱厥逆者則為陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則發厥也不可作陰証而用熱藥治之精魄絕而死矣急宜大小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者始得之身冷脉沉四肢逆足踰卧唇口青或自利不渴小便色白此其候也治之以四逆理中之輩仍速火闌元百壯矣尸厥飛尸牛厥此即中惡之候因冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚栗起頭面有黑精神不守或錯言妄語牙關緊口噤或昏不知人頭旋暉倒此是卒厥客忤飛尸鬼繫凡吊死問喪入廟登塚多有此病以蘇合香丸灌之候稍甦以調氣散和平胃散服名調氣和胃散痰厥者乃寒痰迷悶四肢逆冷宜姜附湯以生附代熟附蛻厥者乃胃寒所生經曰蛻者長虫也胃中冷即吐蛻宜理中湯加炒川椒五粒換榔半錢吞烏梅丸效蛻見椒則頭伏故也氣厥者與中風相似何以別之風中身溫氣中身冷以八味順氣散或調氣散如有疾以四七湯導痰湯服之

附諸方 小承氣湯見痢疾雙解散見傷寒四逆湯 理中湯 姜附湯並見傷寒蘇合香丸 八味順氣散並見中風調氣散

白豆蔻 丁香 檉香 木香 各二錢 砂仁 八錢 甘草 各八錢 砂仁四錢

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

半夏散見中溫 烏梅丸見心痛 四七湯 導痰湯並見痰類 補氣湯拔萃方 治皮膚間有麻木此肝氣不行也足本丹溪心法附錄

黃芪 甘草一兩 白芍藥一兩半 澤鴻五錢 橘皮一兩半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘時

勞瘵九十

丹溪心法

○勞瘵主乎陰虛疾與血病。虛勞漸瘦屬火陰火銷燬即是積熱做成立健可用子和法後若羸瘦四物湯加減送消積丸不做陽虛。骨蒸發熱積病最多。勞病四物湯加炒柏竹淮人姜汁大補為上肉脫熱甚者難治。入方 青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減至二斗去蒿再熬至一斗入猪膽汁七枚再熬數沸甘草末收之每用一匙白湯調服。

附脉理

脉訣舉要曰骨蒸勞熱脈數而虛熱而濶小必頑其軀加汗加嗽非藥可除。

附諸方

黃芪鱉甲散 和劑方治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盞汗減食多渴咳嗽有血。

鱉甲浸去裙 天門冬去心各五兩 知母焙 黃芪 赤芍藥各三兩 地骨皮 白茯苓 秦艽 柴胡去芦各三錢 生乾地黃洗培 桑白皮 半夏煮 紫菀 甘草兩半 人參 肉桂 桔梗各一兩六錢半

右咬咀每服五錢水一盞煎至七分食後溫服。

秦艽鱉甲散 和剗方治氣血勞傷四肢倦怠而黃肌瘦骨節煩痛潮熱盞汗咳嗽痰唾古見發熱 秦艽扶羸湯 和剗方治肺痿骨蒸已成勞嗽或熱或寒聲不出體虛自汗四肢怠惰。

柴胡去苗二兩 地骨皮一兩半 鱉甲末醋 秦艽 當歸洗培 半夏湯洗七次 紫菀 草 甘草各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片烏梅大棗各一枚煎至七分去滓食後溫服。

青蒿散楊氏方 治虛勞骨蒸咳嗽聲嘎皮毛乾枯四肢倦怠夜多盞汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱古見發熱

經効阿膠丸 濟生方 治勞嗽并嗽血唾血

卷柏葉 山藥

阿膠蛤粉炒生地黃酒洗防風

去芦 雜蘇各一兩 柏子仁 炒另研

大薊根 五味子

百部洗去心遠志 去心甘草水煮人參 茯苓去皮 麦門冬去心各五錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎小麥湯送下

宜肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

蠟煎散 楊氏方 治虛勞久嗽痰多氣喘或咯膿血

杏仁去皮尖以仁炒黃研別

人參去芦 麦門冬去心

乾山藥

貝母去心 白茯苓去皮百合去心

黃明鹿角膠尖如無以阿膠代 甘草尖各等分

右為末將杏仁別研拌勻每服二錢水一盞入黃蠟兒角子大同煎七分食後服

參芪散 直指方 治勞瘵嗽喘咯血聲焦潮熱盜汗

柴胡 阿膠炒 黃芪蜜尖 白茯苓 紫苑茸 當歸 川芎 半夏 薤貝母去心 枳殼 桔梗

秦艽洗

甘草 焙各五錢 入參 五味子 羌活 防風 杏仁去皮 款冬花

鱉甲 醋尖 桑白皮 炒各五錢半

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片棗子一枚煎至八分食後服

○已上諸方止嗽宜肺之劑

味十全大補湯 治發熱漸成勞瘵者

十全大補湯加柴胡黃連煎服如熱在骨髓更加青蒿

鱉甲煎服 方見補損

一方 治男子婦人骨蒸勞瘵增寒壯熱 青蒿

春夏用葉秋冬用子用子不用葉用根不用莖四者混用而反以為痼疾必用重便浸過便有功驗無毒

大鱉甲醋尖 白木根 地骨皮 白茯苓 桑白皮尖 粉草尖 捣人參頭去芦 北柴胡去芦 丹蔘實各半兩

右為末每服二錢姜三片煎服

鱉甲地黃湯 治虛勞手足煩熱心下怔悸及婦人血室枯乾身體羸瘦飲食不為肌肉 方見發熱

青骨散 經驗方 治男子婦人五心發熱欲成勞瘵

生地黃 二兩 人參 一兩 防風 一兩 北柴胡 二兩 薄荷葉

七錢 春光 赤茯苓 胡黃連

半兩 熟地黃 一兩

右㕮咀每服五錢水一盞煎七分溫服患骨熱先服荆蓬丸一服使臟腑微利然後服此

荆蓬丸見清寒類

○廣按丹溪云骨蒸發熱積病最多此云前服荆蓬煎丸後服青骨散暗合其妙

白朮黃耆散 宣明方 治五心煩熱自汗四肢痿弱飲食減少肌瘦昏昧並皆治之

白朮 黃芪

當歸 黃芩 去皮

芍藥 各半兩

人參 川芎 各七錢 半兩

石膏 甘草 炙各二兩

寒水石

茯苓 各一兩 官桂 一兩半

右為末每服三錢水一盞煎至六分去渣溫服食前一日三服

地骨皮枳殼散

治骨蒸壯熱肌肉瘦痿多因夜夢盜汗

方見發熱

柴胡梅連散

瑞竹堂方 治骨蒸勞熱久而不痊三服除根其効如神及五勞七傷虛弱皆治

胡黃連 柴胡 前胡

烏梅 各二錢

右㕮咀作一服取童子小便二盞猪膽一個猪骨髓一條薤白半錢煎至一盞去渣服無時

○廣按此刲刺也胃虛者斟酌用之

大上混元丹 醫方集 成治勞損五臟補真氣

紫河車

一具用少婦首生男子者良

帶子全者於東流水洗斷血脈入麝香一錢

在內以線縫定用生絹包裹

懸胎於沙瓮內入無灰酒五升慢火熬成膏

沉香 別研 砧砂 各一兩

人參 肉蓴客

酒浸

乳香 別研

安息香酒煮去沙

白茯苓 去皮各二兩

右為末入河車膏子和藥末杵千百下丸如梧桐子每服七十丸空心溫酒下況香湯下尤佳服之可以輕

身延年

○已上諸方補虛除熱之劑

當歸地黃湯 宣明方 治咳血衄血大小便血或婦人經候不調月水過多喘嗽者

當歸 茄藥 川芎 白朮 漆槐子 黃藥子各半兩 生地黃 甘草 茶芩去皮 黃芩 白龍骨各一兩
右為末每服五錢水一盞煎至七分去渣溫服食前

一方 治陰虛內多食積痰

川芎七錢 黃連 瓜萎仁 白朮 神曲 麥芽各一兩 青黛半兩 中白三錢

右為末姜汁蒸餅九服 外丹溪退勞熱食積痰有方具在發熱類

遇仙災和劑方 治療捷法取癸亥日二更後六神皆聚時解去下衣直身平立以墨點記腰上兩傍陷處謂之腰眼穴然後上床合面臥每穴灸七壯勞虫或吐或渴而出取後用火焚之棄於江河中恐害人故也或依崔氏穴法灸之宜服後將軍丸

將軍丸祕方 治傳屍勞瘵前災法并此藥乃異人傳授累經效驗

錦文大黃九蒸曝焙 射杳一錢研管仲 牙兒去皮醋炙 桃仁去皮炒 桔梗雷丸 各一兩 藜羨半兩
鱉甲醋炙黃一兩

右為末先將蒿葉二兩東邊桃柳李桑葉各七片水一盞煎七分去渣入蜜一大錢再熬至成膏入前藥末及射杳安息香搗丸如梧桐子大每服三十九食前棗湯下

○廣按此方追虫取積之藥也

神授散三因方 治諸傳尸勞瘵殺出去毒 川椒二斤揀去子并合口者炒去汗

右為末每服一錢空心米湯調下必麻痺暎悶少頃如不能禁即以酒糊丸如梧桐子空心服五十九丸

○已上諸方治血疾虫積之劑

○廣按人之五臟各一惟腎有二左腎以藏真水右腎以藏相火少年之人嗜慾無節以致真陰衰虛相火猶旺大寡子畏自下衝上自裏達表故名為骨蒸勞瘵病也夫症有二其火衝於上焦者發熱之中則兼咳嗽喘息吐痰吐血肺痿肺癰等症其火結於下焦者發熱之中則兼淋濁結燥遺精溢汗腹痛驚悸等

症萬可久先生保和湯保真湯中已具其端倪矣東垣先生曰火與元氣不相兩立一勝則一負經曰少火生氣壯火食氣可見火為元氣之賊火既熾而氣傷矣氣傷則不能運化水穀水穀停留而為溼熱生虫生積之所由也治之之法滋陰降火是澄其源也消痰和血取積追虫是潔其流也醫者可不以補虛為主而兼去邪矣乎

勞瘵治例

出明醫雜著

王節齋曰男子二十前後色慾過度損傷精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈哈咳嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎帶血咯唾出血或咳血吐血衄血身熱脉沉數肌肉消瘦此名勞瘵最重難治輕者用藥數十服重者期以歲年然必須病人得命堅心定志絕房室息妄想戒懲怒節飲食以自培其根否則雖服良藥無用也此病治之於蚤則易若到肌肉消爛況因着床尺脉沉取細數則難為矣又此病大忌服人參若曾服過多者亦難治令製一方於后治色慾症先見潮熱盜汗咳嗽倦怠趁早服之

主方 川芎一錢熟地黃一錢白芍藥三分當歸一錢黃芩七分蜜水拌炒知母一錢蜜水生地黃五分甘草五分白朮一錢三分天門冬一錢去皮陳皮七分乾姜三分炒生姜三片水煎空心溫服

若咳嗽盛加桑白皮馬兜鈴瓜萎仁各七分五味子十粒

若痰盛加姜製半夏貝母瓜萎仁各一錢

若盜汗多加牡蠣酸棗仁各七分浮小麥一撮

若潮熱盛加桑白皮沙參地骨皮各七分

若夢遺精滑加牡蠣龍骨山茱萸各七分

若赤白濁加白茯苓一錢黃連三分炒

若兼衄血咳血出於肺也加桑白皮

一錢黃芩山梔仁各五分炒

若兼嗽血痰血出於脾也加桑白皮貝母黃連瓜萎仁各七分

若兼嘔血吐血出於胃也加山梔黃連乾姜蒲黃炒各一錢荳蔻半錢蜜姜汁少許

若兼咯唾血出於肺也加桔梗玄參側柏葉炒各一錢

若先見血証或吐衄盛大者宜先治血治法輕少者涼血止血盛大者先消瘀血次止血涼血蓋血過多必有瘀於肓膈者不先消化之則止之涼之不應也葛可久十藥神書方可次第檢用方內惟獨參湯止可用於大吐血後昏倦脉微細氣虛者氣雖虛而復有火可加天門冬五錢若如前所云陰虛火動潮熱盜汗咳嗽脉數不可用也說見本草集要人參條下明白

此病屬火大使多燥然須節調飲食勿令泄瀉若胃氣復壞泄瀉稀溏則前項寒涼之藥難用矣急宜服藥
理脾胃用白朮茯苓陳皮半夏神曲麥芽甘草等藥候胃氣復然後用前本病藥
收功保後可合補陰丸常服之及用葛可久方

又治勞証方法

出十藥神書

心法附錄曰夫人之生也稟天地氤氳之氣在乎保養真元固守根本則萬病不生四體健康若曰不養真元不根本疾病由是生焉且真元根本則氣血精液也余嘗聞葛先師有言曰萬病莫若勞証最為難治蓋勞之起因人之壯年氣血完聚精液充滿之際不能保養性命酒色是貪日夜耽嗜無有休息以致耗敗真元虛敗精液則嘔血吐痰以致骨蒸體熱腎虛精竭面白頰紅口乾咽燥白濁遺精盜汗飲食艱難氣力全無謂之火盛金衰重則半年而斃輕則一載而亡况醫者不究其源不窮其本或投之以大寒之劑或療之以太熱之藥妄為施治絕不取效殊不知大寒則愈虛其中太熱則愈竭其內所以世之醫勞者萬無一人焉先師用藥治勞如羿之射無不中的今開用藥次第於後用藥之法如嘔吐咯嗽血者先以十灰散遏住如甚者須以花蕊石散止之大抵血見熱則行見寒則凝見灰則止理之必然止血之後其人必倦其體次用獨參湯一補令其熟睡一覺不要驚動睡起病去五分鐘服諸藥

保和湯止嗽宣肺 保真湯補虛除熱 太平丸潤肺除痰 消化丸下痰消氣

保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味和之 保真湯內分驚悸淋濁便澁遺精燥熱盜汗
六事加味用之餘無功用 服藥之法每日仍濃煎薄荷湯灌喉中用太平丸先嚼一丸徐徐嚥下次噙
一丸緩緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開藥流入竅中此訣要緊如痰壅却先用飴糖拌消化丸
一百丸吞下又依前噙嚼太平丸令其仰面卧而睡 服前七藥後若肺有嗽可羹潤肺丸食之如常七藥
之前有余暇羹此服之 亦可續羹白鳳膏食之固其根源完其根本 痘可之後方可合十珍丸服之此
為收功起身之妙用也

甲字號十灰散 治勞証嘔血吐血咯血嗽血先用此藥止之

大薑

小薑

柏葉

荷葉

茅根

茜根

大黃

山梔

牡丹皮

棕櫚皮

各等分

右各燒灰存性研極細用紙包碗蓋於地上一夕出火毒用時先將白鶴搗絞汁或蘿蔔汁磨京墨半碗調
服五錢食後下如病勢輕用此立止如血出成升斗者用後藥止之

乙字號花蕊石散 五內崩損湧瀉出血斗升用此止之 花蕊石

火煅存性研如粉

右童子小便一鍾煎溫調末三錢甚者五錢食後服下如男子用酒一半女用醋一半與小便一處和藥服
使瘀血化為黃水服此訖以後藥補之

丙字號獨參湯 止血後服此藥補之 大人參

去芦二兩

右㕮咀水二鍾裹五個煎不拘時細細服之服後宜熟睡一覺後服諸藥除根

丁字號保和丸 治勞嗽肺痿成者服之功效

知母 貝母 天門冬 款冬花各三錢麥門冬去皮天花粉 蕙莎仁 杏仁 五味各二錢粉草尖

馬兜鈴 柴苑 百合 桔梗 阿膠炒當歸 生半 紫蘇 薄荷各半錢

一方無地黃百部

右以水煎生姜三片入飴糖一匙入藥內服之每日三服食後進加減於後

血盛加蒲黃茜根鷄節大薊小薊茅花

痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實括囊實炒

喘盛加桑皮陳皮大腹㕮蘿葛子葶苈蘇子

熱盛加山楂子炒黃連黃芩黃柏連翹

風盛加防風荆芥金沸草甘菊細辛香附子

寒盛加入參芍藥桂皮五味蠟片

戊字號保真湯 治勞症體虛骨蒸服之次效

當歸 生半 白朮 黃芪 人參各三錢蓮心 赤茯苓各五分牛天門 麥門 陳皮 白芍藥

知母 黃柏炒五味 柴胡 地骨皮(熟半各一錢赤芍藥

甘草各二錢半

白茯苓五分

以水煎生姜三片棗一枚食後服

驚悸加茯苓遠志柏子仁酸棗仁

淋濁加草薢合烏藥豬苓澤瀉

便溺加木通石葦萹蓄

遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子

燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲

盜汗加浮麥子炒牡蠣黃芪麻黃根

己字號太平丸 治勞証久嗽肺痿肺癰並皆噙服

天門冬 麥門冬 知母 貝母 款冬花 杏仁各二兩當歸 生地黃 熟地黃 黃連 阿膠珠各

一兩半蒲黃 京墨 桔梗 薄荷各一兩白蜜四兩麝香少許

右為細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後下諸藥末攪勻再上火入麝香略熬二三沸丸如彈子大每日

三服食後細嚼一丸煎薄荷湯緩緩化下次噙一丸臨卧時如疾盛先用錫糖拌消化丸吞下却噙嚼此丸仰卧使藥流入肺竅則肺清潤其嗽退除七日病痊丸一切咳嗽只服此藥立愈

庚字號沉香消化丸

治熱疾壅盛

青礞石(煅黃金色)明礬(飛研細)猪牙皂角 南星 大炮 半夏(生製)白茯苓 陳皮 各二兩枳殼一兩半

枳實一兩半薄荷一兩沉香 黃芩

右為細末和勻姜汁浸神龜攬糊為丸如梧桐子大每服一百丸每夜臨卧錫糖拌吞次噙嚼太平丸二藥相攻疾嗽除根

辛字號潤肺膏 治久嗽肺燥肺痿 羊肺(一兩)具杏仁(一兩)淨研柿霜 真酥 真粉各一兩白蜜二兩

右先將羊肺洗淨次將五味入水攬粘灌入肺中白水煮熟如常服食前與七藥相間服之亦佳

壬字號白鳳膏 治一切久勞怯弱虛憊咳嗽吐痰嗽血發熱

黑嘴白鴨(一隻)大京棗(二升)參芩平胃散(一升)陳煮酒(一瓶)

右將鴨縛定脚量患人飲酒多少隨量洒在器中盪溫將鴨項割開滴血入酒攬匀一氣飲之直入肺經潤補其肺却將鴨乾擣去毛於脇邊開一孔取其腸雜拭乾次將棗子去核每個中納參芩平胃散填入鴨肚中用麻扎定以沙瓮一個置鴨在內四圍用火慢煨將陳煮乾作三次添入煮乾為度取出先食鴨肉其棗子陰乾隨意食用參湯送下後服補髓丹則補髓生精和血順氣

製鴨以上法煮乾為度取出用火焙乾連骨為末取鴨腹內藥乘搗膏為丸如丸不就煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十九人參湯下或作大丸如鷄子黃大用人參湯下一丸空心日午臨卧各一服如此製曾驗有效

癸字號補髓丹(一名十珍丸)治久勞虛敗髓乾精竭血枯氣少服前藥愈後服此藥

猪脊骨(一條)羊脊骨(一條)圓魚(一枚)烏雞(一隻)

四味製淨去骨存肉用酒一大碗於沙瓮內煮熟搗細再入後藥

大山藥五條蓮肉半斤京棗一百粒霜柿子一枚

四味修製淨用井花水一大瓶於沙瓮內煮熟搗細與前熟肉一處再用慢火熬之却下

明膠四兩真黃蠅三兩

右二味逐漸下與前八味和一處熬成膏子和平胃散末四君子湯末知母黃柏末各一兩共一十兩搜和成劑如十分硬再入白蜜同熬取起放青石上用木槌打如泥丸如梧桐子大每服一百丸不拘時候乘湯下

補損丸九十一附諸虛

丹溪心法

大補丸去腎經火燥下焦溼治筋骨軟氣虛以補氣藥下血虛以宜血藥下並不單用

川黃柏炒褐色

右以水丸服

龍虎丸補下焦

白芍

陳皮

各二兩

瑣陽

當歸

各一兩

虎骨

酒浸醋炙

各一兩

知母

酒炒熟

各三兩

黃柏半斤

鹽炒

龜板

四兩酒浸酥火

右為末酒煮羊肉搗汁丸服冬月加乾姜半兩

補腎丸治痿厥重者湯便與大補丸同此冬令之正藥春夏去乾姜

乾姜二錢黃柏炒龜板一兩半酒炙牛膝一兩

右為末姜汁糊丸或酒糊丸每服七十九白湯下

補天丸治氣血諸虛甚者以此補之多與補腎丸並行若治虛勞發熱者又當以骨蒸藥佐之

紫河車淨洗用布繖乾同前補腎丸搗細焙研末酒米糊丸夏加五味子半兩

虎潛丸治痿與補腎丸同

黃柏半斤酒炒龜板四兩酒浸知母三兩熟半
陳皮各二兩虎骨一兩乾姜半兩白芍二兩

右為末酒糊丸或粥丸 一方加金箔一片 一方用生地黃懶言語加山藥 加炒黃柏知母浸龜板各等分乾姜三分之一酒糊丸名補血丸 一方無乾姜冬月方加有當歸一兩半熟半比前多一兩餘同補虛丸 人參 白朮 山藥 枸杞 瑣陽各等分

右為末麵糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下

湯藥 補心肝脾腎 蓮肉去心枸杞 山藥 炒瑣陽各等分

右為細末沸湯調服若加酥油夢小尤妙

補陰丸 側柏 黃柏 烏藥葉各二兩龜板酒浸苦參三兩黃連半兩冬加乾姜夏加縮砂

右為末地黃膏丸梧子大每服五十九空心鹽湯下

又方 黃柏半斤酒炒知母酒浸熟地各三兩龜板酒浸白芍炒陳皮 牛膝各二兩 瑣陽當歸各一兩虎膏一兩酒浸

右為末酒煮羊肉為丸每服五十九空心鹽湯各加乾姜半兩

又方 下甲二兩黃柏炒牛膝 人參各半兩香附 白芍各一錢甘草二錢砂仁三錢春不用

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下

又方 下甲二兩黃柏一兩

右細切地黃酒蒸熟搗細丸

又方 龜板二兩酒浸黃柏半兩知母三錢五味二錢

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下

又方 白朮 白芍 人參 蓼肉 知母 黃柏各等分

右為末糊丸朱砂為衣空心服一百丸鹽湯下

又方 治抑結不散 下甲五兩側柏一兩半香附三兩

右為末姜汁浸地黃膏為丸空心服如梧子大服七八十九盞湯下

加減補陰丸

熟半八兩兔絲子四兩益酒當歸酒浸白芍三兩瑣陽三兩酥半桂枝仲炒牛膝酒浸破故紙

枸杞牛

虎骨二兩酥半龜板三兩黃柏二兩

山藥

人參黃芪二兩

冬加乾姜一兩

右為末猪骨髓入蜜丸如梧桐子大空心服

一百丸益酒浸白盞湯下

三補丸

治上焦積熱泄五臟火黃芩黃柏黃連各等分

右為末蒸餅丸如梧子大服五十九食遠白湯下

一方 治酒色過傷少陰

黃柏炒一兩半黃連炒一兩條芩炒牛兩龜板酒炒黑色五兩

冬加乾姜炒黑色三錢

夏加砂仁三錢五味五錢

右用蒸餅丸每三十九食前白湯下

一方 治陰虛人參一錢白朮三錢

麥門冬半兩陳皮二錢

右作一服水煎吞補陰丸

一方 治體弱肌肥壯血虛脉大

龜板三兩側柏七錢牛生芖一兩白芍一兩烏藥葉七錢半

右除生芖細切敷膏餘皆作末同搗為丸以白朮四錢杏附一錢半焦湯下

一方 益少陰經血解五臟結氣

山梔子炒令十分有二分煎黑

右為末以姜汁入湯前飲之此方甚驗於他也

五補丸

枸杞瑣陽各半兩續斷蛇床微炒各一兩頭尖二錢半

右為末糊丸每服三十九盞湯下

瑣陽丸

龜板火知母炒黃柏酒炒各虎骨牛膝浸杜仲炒瑣陽酒浸破故紙續斷酒浸各當歸地黃

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九

○諸補命門藥須入血藥則能補精陽生陰長故也陽藥若多則散火

補心丸 硃砂二錢五分 辰鬱五錢 黃連三錢 歸身尾三錢 五分

右為末猪心血為丸如棗豆大食後白湯下三十九

又方 宜心益智 人參 茶芩 茶神 牡蠣 酸棗仁 遠志 益智各半兩辰砂二錢半

右為末棗肉丸

大補陰丸 降陰火補腎水 黃柏炒褐色知母

酒浸炒各四兩 蜜半酒蒸龜板 酸矣各六兩

右為末猪脊髓和蜜丸每服七十九空心鹽白湯下

濟陰丸 黃柏二兩七錢炒龜板一兩

陳皮一錢當歸酒浸一兩知母一兩酒浸虎骨一兩

錢半

山藥 白芍 砂仁 杜仲炒熟黃耆

蜜水拌炒熟半錢各七錢

錢半

枸杞五錢故紙三錢半炒鬼絛子三錢半

錢半

右為末以地黃膏為丸如梧子大每服七十丸

○充按丹溪書並無補損專條諸補陰藥並見於各症之下楊氏類集於此又取燥熱興陽諸方混於其間殊不知丹溪之補乃滋陰益血之藥與燥烈壯陽之劑其意天壤懸隔今故去之不復錄也

附諸賢論

王節齋先生曰男子陰痿不起古方多云命門火衰精氣虛冷固有之矣然亦有鬱火甚而致痿者經曰壯火食氣譬如人在夏暑而倦怠痿弱遇冬令而堅強也予嘗親見一二人腎經鬱火而有此症令服黃柏知母清火堅腎之藥而效故須審察不可偏認作火衰也

附諸方 補陰丸明醫雜著論曰人之一身陰常不足陽常有餘况節慾者少過慾者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈消而勞瘵咳嗽咯血吐血等証作矣故宜常補其陰使與陽齊則水能制火而水升火降斯無病矣故丹溪先生發明補陰之說謂專補左尺腎水也古方滋補藥皆兼補右尺相火不知左尺原虛右尺原旺若左右平補依舊火勝於水只補其左制其右庶得水火俱平也右尺相火固不可衰若果相火衰者方宜補火但世之人火旺而致病者十居八九火衰成疾者百無二三且人在少年腎水正旺似不必補然

慾正懲妄用太過至於中年慾心雖減然少年斷喪既多焉得復實及至老年天真漸絕只有孤陽故補陰之藥自少以至老不可缺也丹溪先生發明先聖之旨以正平載之訛其功甚哉今立補陰丸方備加減法於後

黃柏去皮酒杵炒褐色

知母去皮毛酒杵炒

敗龜板熟地黃酒杵蒸透

熟地黃酒杵蒸透

酒鐵五兩

瑣陽酒杵蒸透

五味子乾酒杵蒸透

枸杞子一兩

甘草一兩

天門冬去心

白芍藥酒炒各二兩

乾姜炒紫色三錢

寒月加至五錢

右為極細末煉淨蜜和入豬骨髓二條和藥末杵極勻丸如梧桐子大每服八十九丸心淡鹽湯送下寒月可以用溫酒下愚按乾姜宜換作肉桂蓋肉桂引諸藥入腎又和知母黃柏為從治法也

若有夢遺精滑病者加牡蠣童便煅七次

白朮各一兩

山茱萸去核

椿根白皮炒過各七錢

若有赤白濁病者加白朮白茯苓各二兩

牛山楂仁

黃連各炒各五錢

若有軟弱無力者加牛膝酒洗二兩

虎脰骨酥炙二兩

防己酒浸洗

木瓜各五錢

若有疝氣病加蒼朮鹽炒

一黃連生姜汁炒各六錢

川芎菊花各一兩

吳茱萸炒青皮去穰各五錢

若脾胃虛弱畏寒易泄者加白朮

三兩陳皮

一兩乾姜炒加至七錢

若眼目昏暗者加當歸酒洗

川芎菊花各一兩

柴胡黃連酒炒烏犀各五錢

若兼氣虛之人加入參黃耆蜜炙各二兩

金匱腎氣丸 即六味地黃丸
若左尺既虛右尺亦微命門火衰陽事不舉加黑附子小便浸炮去皮肉桂去皮各三兩熟芋八兩

治形體瘦弱無力多因腎氣久虛久新憇憇汗發熱五臟齊損遺精便血消渴淋濁等証及婦人血氣虛

無子者服之有效

乾山藥

山茱萸肉各四兩澤鴟

牡丹皮去心

白茯苓去皮各三兩

熟芋八兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五六十丸空心白湯下寒月溫酒下如腎虛有飲作痰唾生姜湯下

○廣按腎惡燥而脾惡溼前補陰藥中多是溼藥若只腎虛而脾胃壯實者宜服苟脾胃兩虛則不可服也
惟此六味地黃丸及八味丸八物腎氣丸雖專補腎虛又兼理脾胃不溼不燥而於脾胃兩虛者甚得其
宜也矣

八味丸 治腎氣虛之下元冷憊腰腹疼痛夜多旋溺脚膝緩弱肢體倦怠面皮痿黃或黧黑及虛勞不足渴
欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利

熟地八兩澤瀉 牡丹皮 白茯苓各三兩 山茱萸肉 山藥各四兩 附子炮桂心 各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九溫酒送下或淡鹽湯送下婦人淡醋湯送

○廣按六味地黃丸專補右尺腎水之藥八味丸既補左尺腎水兼補右腎相火之藥少年水虧火旺宜服
六味地黃丸老年水火俱虧宜服八味丸况老年腎臟真水既虛邪水乘之而為溼熱以作腰痛足痿併
疾吐消渴小便不禁淋閉等証非桂附之溫散而能治之乎

八物腎氣丸 平補腎氣堅齒駕頤

熟半牛斤 山茱萸肉 山藥各四兩 澤瀉 牡丹皮 白茯苓各三兩 五味子 肉桂各二兩
右為末蜜丸服六七十九空心白湯下

三一腎氣丸古卷方補心腎諸臟精血漏心腎諸臟火溼

○廣按人之一身陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足故滋陰補血之藥自幼至老不可缺也古方如
腎氣丸固本丸補陰丸俱是滋陰補血之劑然固本丸冒滿有疾者忌之補陰丸脾虛有溼者忌之惟腎
氣丸專於補血滋陰而兼理痰濕最為切當但品味數少不足以盡其變今廣傳三方合而為一略用加
減名曰三一腎氣丸其間補漏兼施庶子可也

熟地黃 生地黃 山藥俱懷慶者 山茱萸肉各四兩 牡丹皮 赤白茯苓 澤瀉 球陽 龜板各三兩
牛膝川者 枸杞子 甘草人參 達麥門冬 天門冬各二兩 知母 黃柏 五味子 連肉桂各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸漸加至六七十九空心淡鹽湯下或溫酒下虛甚加鹿茸一兩虎胫骨一兩

此藥其間有補有濕其故何哉夫五臟藏精血者也精血一虛邪火乘之而為溼熱補者所以補其精血也
濕者所以濕其溼熱也世人徒知五臟精血虛而生火殊不知五臟精血虛而邪得以來乘之此方既用知母黃柏以濕火又用茯苓澤瀉以滲溼尤為備也

補腎丸 有效無燥

熟半八兩 兔絲子八兩 酒浸歸身半兩 肉蓴蓉酒浸破故紙酒炒山茱萸肉三兩 黃柏酒炒褐色知母酒浸去毛

右為末酒糊丸梧子大每服五十九丸

滋血百補丸

半斤 芒硝蒸鬼絲半斤 酒蒸當歸浸杜仲酒炒各等分

知母酒炒各等分 沉香一兩

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下

沉香百補丸

熟地六兩 兔絲子四兩 杜仲炒三兩 知母炒二兩 黃柏酒炒各等分

沉香一兩 知母酒炒各等分 沉香一兩

蓴蓉各三兩 沉香一兩

右為末酒糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下

滋腎百補丸

當歸四兩 酒浸知母二兩 酒浸沉香五錢 黃柏酒炒褐色山藥 菊花 耆實各一兩 青鹽一兩

炒鬼絲四兩 酒炒杜仲炒二兩 熟地八兩

右為末酒糊丸或煉蜜丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下

○廣按已上三方兼補右尺之藥也

人參固本丸簡易方夫人心藏血腎藏精精血充實則鬚髮不白顏貌不衰延年益壽其天閑者多由服性熱之藥不能滋生精血也而藥之滋陰補血者無出於生熟二地黃世人徒知服二地黃而不知服二門冬為引也蓋生地黃能生心血用麥門冬引入所生之地熟地黃能補腎精用天門冬引入所補之地四味互相

為用本草又以人參為通心氣之主故宜加焉

生地黃

熟地黃

各酒洗浸

天門冬

去心酒浸

麥門冬

去心酒浸各二兩

人參一兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九空心溫酒淡鹽湯住下如有痰者生熟地黃各用姜汁炒過恐泥隔故也

鹿柏固本丸

鹿角霜半斤

牛角以角之新者才截入布囊置流水中七日

七日水煮每角一斤入黃蜡半斤

水酒一壺掩之別沸流水旋添勿令一鍋

蒸榮火足十二時共角數次用竹刀切去

黑皮取白者春細為細霜黃柏一斤酒一壺

乳三製鹽湯一製乳

天門冬四兩同酒浸

春細為細霜黃柏一斤酒一壺

乳三製鹽湯一製乳

天門冬四兩同酒浸

麥門冬四兩同酒浸

生地黃四兩酒洗浸

右為細末

煉蜜為丸如梧子大每服五六十九

溫酒送下不誤酒白湯下

立鬼固本丸

生地黃酒浸熟地黃

不犯鐵器天門冬去心

麥門冬去心

五味子去枝梗神去皮木乾山藥

兩

白者蓮肉

人參去芦枸杞子二兩甘杞子

川芎性兔絲子一斤酒煮熟沸搗爛捨作餅子晒乾淨稱八兩

右為末

煉蜜丸如梧子大每服五十九漸加至八九

十九空心滾白湯下或淡鹽湯下溫酒下亦可

冷補丸

治腎水燥少不受峻補口乾多渴目暗耳聾腰痛腿弱小便赤澀大便或秘

天門冬去心麥門冬去心熟地黃

酒洗川牛膝去芦地骨皮

石斛去立參

沉香另研不磁石

大焰七次研水飛通各等分

白芍藥生地黃

酒洗

右為末

煉蜜丸如梧子大每服七十九空心鹽湯下

○廣按此方云冷補丸者蓋因當時不明心屬火而惡熱腎屬水而惡燥反用熱燥之藥見傷之意也

明目益睞丸

枸杞甘州者當歸

兔絲子生芻各一兩俱酒浸

五味半兩知母

黃柏各七錢酒炒

蒺藜一兩山藥

巴戟去心人參

甘菊天門去心各五錢

右為末

煉蜜丸如梧子大空心益鹽湯下五十九

三才封髓丸

降心火益腎丸

天門冬去心熟地黃

酒洗人參各五錢

黃柏三兩炒褐色砂仁一兩甘草七錢半一兩無

右為末水糊丸梧子大每服五十九用蕤英容半兩切作片子酒一盞浸一宿次日煎三四沸去滓空心送

古卷心腎丸

論曰予嘗見年高之人有患其無子者有惡其髮白者予謂之曰無子責乎腎髮白責乎心何則腎主精精勝則孕成心主血血勝則髮黑令也嗜慾無窮而虧其本然之真憂慮太過而損其天然之性心君火也腎相火是君火重而有火翕然從之相火動而君火亦腎亂而不安矣是二者有相須之道焉夫髮白者古方皆責之於心蓋以心之所藏者神神之所附者血血之所動者火也心火動則血沸騰血沸騰則神不安神不安則夢寐紛紜而鬢髮漸白矣雖然天地間不過陰陽五行而已五行有相生者有相制者令心火上炎由於腎水虧之不能制耳是髮白不獨由於心也夫無子者古方皆責之於腎蓋以腎之所藏者精精盈則有子精虧則乏嗣耳今腎精之妄洩由於心火所逼而使之然是無子不獨由於腎也予雖不敢粗具一方補血生精益神降火庶乎兼治

熟地 生芍俱懷慶者酒浸切刀切 山藥 茯神去木各三兩 山茱萸肉酒浸去核 枸杞子甘州者酒洗 龜板去裙一兩 牛膝去芦各一兩 鹿茸
火去毛酥當歸酒洗澤鴻去毛 黃柏炒褐色五錢 牡丹皮辰砂為衣黃連各一兩毛酒洗 生甘草牛膝各一兩 牡丹皮去心
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九漸加至一百丸空心溫酒或淡鹽湯任下辰砂為衣不遍再加一兩

法曰心惡熱腎惡燥此方補精益血清熱潤燥治心腎之聖藥也不獨施於髮白無子二者其驚悸怔忡遺精盜汗目暗耳鳴腰痛足痿諸症無不法也

五精丸淡察方治腎虛痿弱大補元氣 秋石剛硬者鹿角霜 茯苓去皮 陽起石 山藥各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸湏要常近火邊使乾燥庶幾服之無戀隔之患

鹿駁丸 鹿票純陽一名班龍駁者天地初分之氣牝牡相感之精也醫書稱鹿耳角血髓大補益於人此駁則入神矣其法用初生壯鹿三五隻範圍馴養每日以人參煎湯同一切料草任其飲食久之以硫黃細末和入從少至多燥則漸減周而復始大約三年之內一旦毛脫筋露氣勝陽極別以丸隔炮誘之欲交不

得或洩精於外或令其一交即設法取其精置磁器內香粘如餳是鍛也 蘭人所宜補藥古方如六味地黃丸八味丸補陰丸固本丸之類以此鍛加煉蜜三分之一同和丸劑或和鹿角霜一味為丸空心鹽酒送下用起虛寒危疾尤捷予之軀羸賴此再造願與人人共之

異類有情丸 此方并前方四川韓應霞作也

鹿角霜

製法見前鹿角霜如紫茄者黃乾酒洗取
相固本丸下過脉失炭火令冷為細末

七日酥浸虎脰骨新而真者長水浸苔
黃為末虎脰骨熟而真者長水浸苔
蜜酥和火令透為細末

右霜板末各三兩六錢草腰末各二兩四錢重羅極細火煉白蜜入猪猪脊髓九條同春劑為丸每服空心
鹽湯下五七十八十九周而復始丈夫中年覺衰者便可服餌此方鹿純陽也龜虎陰也血氣有情各從其類
非金石草木例也如厚味善飲之人可以猪膽汁一二合於和劑中以寓降火之義

○廣按丹溪補損條中多主滋心血而補腎精為事夫心惡熱而腎惡燥故凡熱燥之藥皆損心腎而虧精
血也今附已上諸方皆是補精益血清熱潤燥之劑或專補腎或兼補心或補腎左尺或兼補腎右尺在
人分而用之

諸虛 新增

附脉理

脈理提綱曰氣虛脉細或緩而無力者右手弱血虛脉大或數而無力左手弱陽虛脉過陰虛脉弦真氣虛脉
緊指男人久病氣口脉弱則死強則生女人久病人迎脉強則生弱則死

附諸方

四君子湯 和剷方 补氣和胃進食 白朮 人參 茯苓 甘草 各等分

右㕮咀水煎服

○廣按四君子湯用白朮人參茯苓甘草者白朮則健脾燥溼人參則補肺扶脾茯苓則降氣滲溼甘草則
補胃和中譬如寬厚和平之君子而不為奸慘卒暴之行也和剷云等分愚以為藥之君臣劑之大小又

人之所處何如也

四物湯和劑方 補血和血調經 當歸 白芍藥 地黃 婦人用生男人用熟芎芍各等分
右㕮咀水煎服

○廣按四物湯用當歸芍藥地黃芎者當歸則和血歸經芍藥則涼血補脾生芎則生血益心熟芎則補血滋腎芎窮則行血通汗其性不同所治亦異和劑云等分愚以為隨其所在而輕重之度得變通之道也王節齋曰氣虛補氣用四君子湯血虛補血用四物湯虛甚者俱加熱附子蓋四君四物皆和平寬緩之劑須得附子健悍之性行之方可成功附子熱藥本不可輕用但當病則雖在暑熱時月亦可用也予嘗治一僕人五月間病熱口渴唇乾讐語診其脉虛細而遲用四君子湯加黃耆當歸芍藥熟附子進一服愈甚狂言狂走或曰附子差矣脉之如舊仍增附子進一大服遂汗出而熱退脈還四至矣又嘗治一婦人亦夏月間病熱初用和調劑氣兼清熱和解之劑服三二服不應熱愈盛舌上焦黑脇間如火漱口不嚥診其兩手脉皆虛而遲右手微甚六七日內讐語撮空循衣摸床諸惡證見後偶用四物湯加黃芩人参白朮陳皮麥門冬知母熱時一服之一二時汗出而熱退次日復熱再進一服又退又次日復發知其虛極也遂連進十服皆加附子脉始復而病安

八物湯 平補氣調和陰陽 白朮 人參 茯苓 甘草 當歸 白芍 地黃 川芎
右㕮咀水煎服

十全大補湯和劑方 治男子婦人諸虛不足五勞七傷此藥性溫平補常服生血氣壯脾胃

白朮 去芦 人參 去芦 茯苓 去皮 甘草 去皮 當歸 洗酒浸炒 白芍 酒浸炒 地黃 酒洗蒸焙 川芎 黃耆 去芦 肉桂 去皮

右為末每服五錢水一盞半生姜三片棗二枚煎至八分溫服之

雙和湯和劑方 治男子婦人五勞七傷血氣不足面色痿黃四肢倦乏將為虛勞之証常服養氣益血
白芍藥 七兩半 當歸 酒浸洗焙 熟地黃 酒洗黃耆 去芦蜜炙 川芎 去芦各三兩 甘草 去皮 肉桂 去皮不見火各二兩二錢半

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎空心溫服

雙和散
拔萃方補益血氣治虛勞少力

黃耆去芦熟地黃當歸去芦川芎各一官桂去皮七錢半白芍去毛七錢半甘草七分牛人參二錢

右咬咀每服五錢水二盞生姜三片棗一枚煎至八分去滓溫服大病之後虛勞氣之者宜此

太真丸
御藥院方治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱飲食不進腸胃溏泄津液枯竭久服生血補氣暖胃
駐顏羊肉七斤精者為好洗去脂膜去脂皮扯開入藥本肉蕤仁溼山藥去皮當歸十兩當歸去酒洗天門冬去心培東一斤

右四味為末置之羊肉內裏定以麻繩纏縛用無灰酒四瓶煮令酒盡再入水二升又煮直候肉爛如泥再入黃耆末五兩人參末三兩白朮二兩熟糯米飯焙乾為末將前後藥末同剷為丸如梧子大一日二次服一百粒溫酒送下須以漸而進如覺難丸入蒸餅五七枚焙乾為末同入白朮十百下丸之

養血當歸地黃湯
拔萃方治病久氣血漸虛邪氣入胃和氣養血

芍藥當歸川芎地黃藁本防風白芷各一錢細辛

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後溫服

黃耆建中湯和剷方治男子婦人諸虛不足羸乏少力此藥大生血氣補益榮衛

黃耆去芦肉桂去皮各三兩白芍六兩甘草尖二兩

右咬咀每服五錢水一盞半生姜三片棗一枚同煎八分服一法用炒浮小麥煎去滓入鴨少許再煎令溶稍熱服虛甚加熟附子

十四味建中湯和剷方治榮衛失調血氣不足積勞虛損形體羸弱短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸去芦酒焙白芍藥白朮麥門冬黃耆去甘草肉蓯蓉酒浸人參去芦川芎肉桂去皮附子炮去皮驗半夏湯洗熟地黃酒浸焙茯苓去皮各等分

右咬咀每服五錢水一盞半姜三片棗一枚煎至八分空心溫服

未病蓮心散 簡易方治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精

人參 茯苓 蓮肉各一兩

白术 甘草 白扁豆炒薏苡仁炒北桔梗炒乾葛炒黃耆炒當歸各二兩桑白皮

百合 半夏麴 乾姜炮山藥炒五味子

木香 丁香 杏仁去皮尖炮白芷 神曲炒各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞姜棗同煎空心溫服

黃耆益損湯 直指方治諸虛勞倦

官桂 熟地黃 半夏製甘草炙各三錢石斛酒浸當歸 川芎

黃耆 炙 白朮各一兩 白芍一兩半 北五味半兩

木香三錢

右㕮咀每服一兩水二盞姜五片棗二枚有熱加柴胡煎至一盞通口服

○已上諸方治氣血新虛之劑

鹿茸大補湯 和劑方治男子諸虛不足婦人亡血一切諸虛

鹿茸 酒洗數遍醋塗炭灰令透為細末

黃耆 當歸酒浸洗白茯苓 熟地黃各一兩白芍 白朮 附子炮人參 肉桂

半夏 石斛各一兩半 五味子一兩半 甘草半兩 肉蓴蓉

酒浸焙杜仲炒斷絲各二兩

右㕮咀每服四錢姜三片棗一枚煎七分去滓空心熱服

究原雙補丸 簡易方治一切虛損五勞七傷面白目黯黑唇口乾燥目昏耳鳴夜夢驚恐四肢酸疼煩熱盜汗

鹿角霜三兩熟地黃酒洗沉香 鬼絲子酒浸蒸焙覆盆子去核

白茯苓去皮人參去芦宣木瓜 意苡仁 黃耆大

旋參 酒浸五味子去皮石斛炒當歸去芦澤鴻功塊再蒸

麝香一錢硃砂半兩別研碎砂牛乳別研為末

右為末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯盞酒任下

究原心腎丸 簡易方理水火不既濟心忪盜汗夜夢遺精目暗耳鳴腰膝緩弱常服調陰陽補心腎

牛膝酒浸熟地黃酒洗旋參酒浸各一兩

鹿草火去毛附子泡去人参去芦遠志去甘草水煮骨白茯神去黃耆蜜炙

山藥 炒當歸去芦澤鴻功塊各一兩

菟絲子酒浸蒸爛成餅三兩

右為末用浸藥酒煮麵糊丸如梧桐子大每服七十丸空心棗湯下

○廣按此方補虛溫寒燥溼蓋為虛中有寒者設也然虛中有熱者又當以右卷心腎丸治之

瑞蓮丸 經驗方定心煖腎生血化疾

蒼术

主脾一斤內酒浸四兩醋浸四兩生用四兩杞子甘州者佳北五味生脈二兩去枝梗

蓮肉

王心一斤去心皮酒浸軟入猪肚內煮熟地黃酒浸蒸

熟地黃

次焙乾一斤納豬肚一箇

熟地黃

主腎二兩酒浸蒸破故紙主腎二兩炒

右為末

煮猪肚膏同酒糊丸如梧桐子大空心溫酒下四五十丸

訛訛書

容九

簡易方

治丈夫稟受氣血有偏勝者氣勝血則陽盛宜服此藥和陽助陰

熟地黃

酒浸洗蒸

熟地黃

次焙乾一斤

紫巴戟

嫩鹿茸

酥尖

龍齒

各一兩

川當歸

酒焙一兩半

人參

去芦

石蓮肉

肉蓯蓉

培根

北五子

嫩黃耆

蜜尖

白茯苓

各一兩

兔絲子

蒸二次研焙一兩半

右為末

煉蜜丸

如梧子大

每服五十九

溫酒

鹽湯任下

右為末

煉蜜丸

如梧子大

每服五十九

溫酒

鹽湯任下

鹿茸

四斤九

和劑方

治肝腎虛損之極

以致筋骨痿弱不能自持

起居無力足膝酸疼

肌體瘦悴氣血不生

肉蓯蓉

酒浸

天麻

兔絲子

另研牛膝酒浸

熟地黃

杜仲

酒浸

鹿茸

去毛

熟地黃

杜仲

酒浸

鹿茸

去毛

乾木瓜

等分

右為末

煉蜜丸

如梧桐子大

每服五十九

米湯或酒空心下

五味子丸

本事方理肝腎諸虛收斂精氣補真陽止虛汗

益智仁

炒肉

蓯蓉

酒浸

川巴戟

去心人參

去芦

五味子

去枝骨碎補去毛

玉茴香

白朮

覆盆子

白龍骨

熟地黃

牡蠣

童便

七次

兔絲子

各等分

右為末

煉蜜丸

如梧桐子大

每服三十九

空心米湯下拔草方名巴戟丸

○廣按

此方專為遺精盜汗已久虛脫者設也

金櫻丹

御藥院方

治男子去血失精婦人半產漏下五勞七傷衰憊之極身體瘦削四肢困乏虛勞骨蒸等疾

金櫻

即汗

仙木

淮生地黃

取仙靈皮研木香

內蓯蓉

酒浸

兔絲子

另研牛膝酒浸

生雞頭肉

乾丁香

生蓮子肉

乾山藥

麝香

別研

柏子仁

別研甘草炒人參

茯苓

去皮陳皮去白

葛蒲

各一兩

右將鬼絲子已下同為細末入柏子仁并白砂蜜入銀石器中於爐內置熟火五斤煉蜜微解入兒孩乳母

汁二升以甕搗次入上項膏汁同攪勻勿令住手傾入藥末一處熬攪至火消續緩添熟火勿令火緊數

至膏成取出就於銀石器中候稍溫入麝香末一處搜和成劑更於石臼中杵千餘下每兩作十九每服一丸空心細嚼酒下

無比山藥丸和劑方治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦耳聾目暗常服壯筋骨益腎水

赤石脂 茯神去皮木巴戟去心澤瀉 乾熟地黃酒蒸山茱萸肉各一兩山藥 牛膝一兩去芦酒浸

杜仲去皮炒 兔絲子酒浸各三兩蕤英酒浸四兩五味子棟六兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九空心溫酒下

還少丸楊氏方大補真氣虛損肌體瘦憊目暗耳鳴氣血凝滯脾胃怯弱飲食無味

乾山藥

牛膝酒浸一宿焙乾各一兩半白茯苓去皮 山茱萸肉 楮實 杜仲去皮姜汁和酒蜜煮

五味子 肉蓴客酒浸焙

巴戟去心遠志去心

茴香炒各一兩 石菖蒲 桂杞子 熟芋燒焙各半兩

右為末煉蜜丸入蒸熟棗肉和勻丸如梧子大每服五十九空心溫酒鹽湯下

是齊雙補丸簡易方平補氣血不燥不熱 熟地黃牛膝補血兔絲子半升補氣

右為末酒糊丸如梧子大每服七十九人參湯任下 氣不順沉香湯下 心氣虛伏苓湯下 心氣煩躁

不得睡酸棗仁湯下 腎氣動茴香湯下 小便少車前子湯下 小便多益智湯下

小兒絲丸 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精 又云心腹脹滿脚膝酸痿小便滑數股內溼痒水道澁痛小便出血時有遺瀝並宜服之 石蓮肉二兩兔絲子酒浸五兩白茯苓一兩山藥二兩七錢半打糊上

右為末山藥打糊丸如梧子大每服五十九空心鹽湯下脚無力木瓜湯下

葉氏十補湯簡易方治諸虛不足安益心腎

沉香不見木香 檀半夏湯泡白芍藥各一當歸酒浸一宿黃耆蜜天生乾地黃洗茯神去木各半兩肉桂去皮四錢

北五味 醋棗仁炒陳皮去白各三錢天台烏藥 麥門冬去心人參 白朮各二錢半

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片棗二枚煎七分每服

返本丸

補諸虛百損 黃健牛肉

不拘多少去筋膜切片以河水洗數過令血水盡仍浸一宿次日再洗一
遍水清為度用無灰好酒入磁器內重泥封固暴寒文武火一盞夜取

出如黃沙為佳

黑烏鵲肉用蛤乾為末

每用末半斤用後藥末一斤為則

山藥

葱鹽炒去心葱鹽

蓮肉

炒去葱鹽

白茯苓

去皮

小茴香

微炒各四兩

右為細末和勻用好紅棗不拘多少蒸之大爛剝去皮核研為膏加好酒入煎藥和劑為丸

如梧子大晒乾空心溫酒下五十九日進三服久服止一服切忌用麵糊米飲之類為丸不效

海藏大五補丸

補諸虛不足 天門冬

去心麥門冬去心

蕤神本菖蒲

人參 益智

枸杞 地骨皮

遠志 熟芋各等分

右為細末煉蜜丸如梧子大空心酒下三十九

首珠丸

詹寮方音西蜀藥市中常有黑髮朱顏道人每大醉高歌厲聲曰龍闕不禁滄浪竭九轉靈丹都謾說惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下血即貨此藥也朝野遍傳一名斑龍丸

鹿角膠

妙酥鹿茸去皮毛切片酥炙或酒炒或湯炙或鹿角霜

陽起石

煅大附子半錢當歸

地黃

熟九味辰砂半錢

肉蓯蓉

醋裹仁去殼黃耆蜜炙

柏子仁

去殼同煮仁搗膏

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服五十丸空心溫酒鹽湯送下

養氣丹

治諸虛百損真陽不固氣不升降或發喘促

方見風熱

○廣按古人補虛方中多是燥熱之藥蓋為虛中生寒者設也然虛中生熱者十常八九而虛中生寒者百無一二世俗好溫而惡寒好甘而惡苦用藥處方故至於斯不可盡棄謹錄可用者於右中間有用附子者此又甚焉然肥白人陽虛氣虛脾虛有溼衰老人命門火衰陽事不舉脉沉細而遲者又不可以舍附子也

降心丹

和劑方治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上盛下虛小便赤白濁氣常服鎮心益血

乾熟地黃酒浸焙乾三兩

天門冬去心三兩

麥門冬去心

人參

茯神去木山藥

茯苓去皮

遠志

甘草煮去芦骨各二兩

當歸

去芦肉桂去皮各半兩朱砂半兩別研為衣

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸人參湯下

平補鎮心丹和劑方治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮層崖常服心腎益榮衛

白茯苓去皮五味子去枝車前子茯神去皮肉桂一兩麥門冬去心各一兩遠志去心甘草二錢半天門冬

山藥洗熟芋酒蒸各一兩半酸棗仁去皮炒熟牛人參去芦二錢半龍齒二兩半朱砂半兩別研為末

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心米飲溫酒任下

十四友丸和劑方治心腎虛損神志不寧

白茯苓白茯神去木酸棗仁炒人參各一兩龍齒別研二兩阿膠蛤粉炒黃耆遠志去心湯當歸酒洗

熟地黃柏子仁別研肉桂紫石英別研各一兩辰砂別研一錢

右為末同別研四味細末煉蜜丸如梧子大每服三十九食後棗湯下

天王補心丸 宜心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦化痰涎去煩熱除驚悸療咽乾育養心神

熟地黃白茯苓人參遠志去心石菖蒲玄參柏子仁桔梗天門冬去心丹參酸棗仁炒

麥門冬去心甘草尖百部五味子茯神當歸杜仲姜汁浸炒斷然

右各等分為細末煮蜜丸如彈子大每兩作十九金箔為衣每服一丸用燈芯棗湯化下食遠臨卧服或作小丸亦可

○廣按已上四方兼治心腎二經之藥已下諸方獨治心經之藥也

妙香散 治男子婦人心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神方見發熱類

宦志膏 和劑方治心氣虛耗神不守舍恐怖驚惕恍惚健忘睡卧不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

乳香五錢坐水盆中研辰砂研細水飛半兩酸棗仁炒去皮取末一兩人參取末一兩

右和勻煉蜜丸如彈子大每服一丸溫酒棗湯下

茯苓補心湯 治心虛耗不能藏血以致面色黃悴五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷姪惡阻嘔吐亦服之

靈砂宣志丸 楊氏方 治男婦病後傷損榮衛失血過多精氣虛損心神恍惚不得眠睡飲食全減肌體瘦弱

辰砂 二兩不燒石者用東絳袋盛懸於銀石器中用板紅三兩取升水調板紅入於器內可八分別用鍋子注水置外砂器在內重湯者令魚眼沸三盞夜為度取出辰砂細研水飛

白术 鹿茸 炮去毛酥炙黃耆蜜炙後神去木入參去芦各三兩 石菖蒲一兩

右為末次入辰砂研勻用棗肉和杵一二千下丸如梧桐子大每服三十九溫酒米飲空心住下

葉氏鎮心爽神湯 簡易方 治心腎不交上盛下虛心神恍惚睡多驚悸小便頻數遺精白濁常服鎮心安神

石菖蒲 去毛半兩 甘草 錢四 人參 去皮去芦赤茯苓 去皮各三錢 酸棗仁 湯浸去殼一錢半 當歸 酒浸培半錢 南星 二錢半炮 陳皮 去白乾山藥

細辛 去紫菀半夏 七次湯泡 川芎 培不 五味子 各二錢 通草 去心 麥門冬 去心 覆盆子 各一錢半 柏子仁 炒 桔杞子 各一錢半

右㕮咀每服四錢水一盞蜜一匙煎五分去滓取藥汁入麝香少許再煎一二沸溫服不拘時

辰砂遠志丸 本事方 安神鎮心消風化痰 石菖蒲 去遠志去人參 茯神 去木各辰砂半兩 川芎 山藥 鈇粉

麥門冬 去心各一兩 細辛 半兩 天麻 半夏麵 南星 炒黃白附子生各一兩

右為末用生姜五兩取汁入水煮糊丸如菉豆大別以朱砂爲衣每服二十九夜卧生姜湯下

鎮心丹 濟生方 治男子婦人心氣不足神志不寧一切心疾並皆治之

遠志 去心 熟地黃 洗新羅人參 木鷺子 炒去殼 白术 各五兩 麥門冬 去心 當歸 去芦酒浸培 石菖蒲

石蓮肉 去心炒黃耆 去芦 茯神 去木 柏子仁 棗淨茯苓去皮 益智仁 各三兩 朱砂 五十兩

右將人參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將朱砂裝入以夾生絹袋盛貯用麻線繫繫袋口却用瓦錫火燒令滾沸勿使火歇煮三日審焦黑再換藥煮候七日足住火取出淘去眾藥洗淨朱砂令乾入牛心內入白沙蜜於重湯內蒸如湯乾復以熱水從錫弦添下候牛心蒸爛取砂再換牛心如前法蒸凡七次其砂已熟即用湯水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分米粒為丸如豌豆大陰乾每服二十九食後參湯湯參

門冬湯住下

○廣按本草云此物鎮養心神但宜生使煉服則有毒少有不作疾者以此觀之反不如生使之為愈也

一方 治心氣虛損百一選方 猪腰子一枚用水二碗煮至一碗半將腰子細切入人參半兩當歸身半兩同煎至八分將腰子喫以汁送下久服為妙也

補心神効丸百一選方 黃耆

蜜炙

茯神

去皮各四兩

人參

去芦四兩

生乾地黃

四兩

柏子仁

炮七次去殼

遠志

去心四兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九米飲溫酒任下 盜汗不止麥門湯下 亂夢遺精人參龍骨湯

下 卒暴心痛乳香湯下 虛煩發熱麥門湯下 吐血人參湯下 大便下血當歸地榆湯下 小便出

血茯苓車前子湯下 中風不語薄荷生姜湯下 風癇涎潮防風湯下

八物定志丸拔萃方 補益心神安定魂魄去邪熱治風痰

人參一兩半 石菖蒲

遠志

去心茯苓

去皮

朱砂

一錢

麥門冬

去心

白朮

各半兩

牛黃

二錢刷研

右為細末煉蜜為丸如梧子大米飲下五十丸無時

大歸神丹 安鎮心神固劑元氣

夥塊硃砂入猪心血 酸棗仁壳去皮 當歸 人參 白茯苓

去木二兩

龍齒

遠志

姜汁炒

琥珀

各二兩

金箔

銀箔

各二十個

右為末酒煮稀糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十九麥門冬湯下 如寐不寐亂夢炒酸棗仁湯下

又方 石菖蒲三分 茯神 人參各二分 遠志七分

右為細末白湯調服方寸

○己上諸方治臟腑久損之劑

○廣按古方滋補虛損之劑多不清切夫心腎主陰血心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而濡

肺脾也肺脾主陽氣肺惡寒而脾惡溼是溫寒燥溼之藥是補脾肺而濡心腎也今一方而能通補之乎

五臟豈有齊損之乎如袖珍方中三建湯兔絲子丸安腎丸麝香鹿茸丸補丸橘皮煎丸

起痿丸正元散固真丸丹溪心法附方中價寶丹延齡丹添精補髓丹巨勝子丸如意丸延生護寶丹延壽丹等劑皆是類聚辛香燥熱之藥補陽而消陰助氣而耗血殊不知人身中陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足用此藥損不足而益有餘實實虛虛之禍誰任其咎今將此等偏方不錄外上錄簡當中和之劑以便後人也抑嘗論之局方用辛香燥熱之劑而不覺其非者蓋以其能健脾胃濕之多進飲食也雖然則陰血潛消而心腎暗損容顏日改而壽算日偷矣可不畏哉可不謹哉

或問曰長營集一少年素好風月今孟夏清和之時赴宴笑談間而卒其故何也予曰此陰竭而陽暴絕也何以明之蓋人之陰血為陽氣之附依此少年平日色慾過度陰血已竭一旦赴宴馬上勞役心中隱忿不無動火性炎上陽無依附遂隨火而發越也譬如樹木賴土培養平日土虧根露一旦天地作變則樹木亦隨風傾倒矣夫陽為陰之先導陰為陽之依附天先乎天地先乎婦氣先乎血先導之義也天倚乎地夫倚乎婦氣倚乎血依附之義也不曰陽陰而曰陰陽蓋以陰有形為陽無形之依附也知此理一可不以陰血為至寶乎哉