

草部

發表之劑

涌吐之劑

攻裏之劑

表裏之劑

和解之劑

渭珍氏

本草醫方合編

卷貳

柴胡 苦平微寒味薄氣升為陽主陽氣

下陷能引清氣上行而平少陽厥陰之

邪熱肝膽心包三焦相火時珍曰行少陽黃芩為佐行厥陰黃連為佐

宣暢氣血散結調經昂按人第知柴胡能發表而不知柴

胡最能和裏故勞藥血藥往往用之為足少陽經表藥胆

清淨之府無出入其經在半表半裏法當和解小柴胡湯之屬是也若病在

太陽服之大早則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表最宜詳慎

治傷寒邪熱仲景有大小柴胡等湯痰熱結實虛

勞肌熱寇宗奭曰柴胡本經並無一字治勞藥性論曰華子皆言補勞

傷醫家執而用之貽誤無窮時珍曰勞有五若勞在肝膽心包有熱則柴胡

醫方集解卷二

發表之劑發者升之散之汗之也表者對裏而言也三陽為表三陰為裏而太陽為表之表陽

明為表之裏少陽為半表半裏也邪之傷人先中于表以漸而入于裏始自太陽以及陽明少陽乃入陰

經由太陰少陰以及厥陰六經乃盡也治病者當及其在表而汗之散之使不至于傳經入裏則病易已

矣若表邪未盡而遽下之則表邪乘虛入裏或悞補之則內邪壅閉不出變成壞症者多矣經曰善治者

治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治六府其次治五藏治五藏者半死半生也

麻黃湯仲景治傷寒太陽症邪氣在表發熱頭痛身痛腰

痛骨節痛項背強惡寒惡風但有一毫頭痛惡寒尚為在表無汗而喘

脉浮而緊寒邪外束陽不得越故鬱而為熱經曰人之傷寒則為病熱寒初中人必先表即足太

陽寒水之經太陽為諸陽主氣乃一身綱維本經之脉起目貫上腦下項循脊挾脊抵腰行于身後故所過之

乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃
有熱或陽氣下陷則柴胡為升清退熱
必用之藥惟勞在肺腎者不可用耳寇
氏一繫攢斥殊非通論昂按楊氏秦芄
扶羸湯治肺癆成勞咳嗽聲啞體虛自
汗用柴胡為君則肺勞亦有用之者矣
嘔吐心煩邪在半表半裏諸瘧寒熱東垣
瘧以柴胡為君佐以引經之藥李士材
曰瘧非少陽經慎用喻嘉言曰瘧發必
有寒有熱蓋外邪伏于半表半裏適在
少陽所主之界入與陰爭陽勝則熱出
與陽爭陰勝則寒即純熱無寒為瘧瘧
溫瘧純寒無熱為牝瘧要皆自少陽而
造其極偏補偏救弊亦必返還少陽之
界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼
他經則有之謂他經而不涉少陽則不
成其為瘧矣脉縱屢遷而弦之一字實
貫徹之也昂按瘧之不離少陽猶咳之
不離于肺也談藪云此知關久病瘧熱

處無不痛也惡寒者雖無風而惡寒惡風者當風而始
惡之故惡寒必兼惡風惡寒有陰陽之分惡風惟屬陽
經故三陰無惡風之症風為陽邪寒為陰邪也原病式
曰身熱惡寒熱在表也熱在表而淺邪畏正故病熱而
反惡寒或言為寒在表及熱在皮膚寒在骨髓者誤也
凡人之傷風暑濕皆有汗惟傷寒獨不汗出寒能滯血
又表實也氣上逆故喘邪在表故脉浮傷寒脉緊而傷
風脉緩者寒動急而風緩散也喻嘉言曰冬傷寒春傷
溫夏秋傷暑傷濕此四時正病也然夏秋亦有傷寒冬
春亦有傷暑傷濕乃四時之客病所謂異氣也冬春正
病有汗為傷風無汗為傷寒即夏秋亦治太陽陽明合
病喘而胸滿表邪壅盛陽氣不得宣發故逆而作喘若
去表甚近非裏實雖有陽明然與太陽合病尚為在表
宜汗不宜下經曰陽明病脉浮無汗而喘者發汗則已
宜麻黃湯又曰陽明病應發汗反下之此為大逆或問
兩經合病當用兩經之藥何以偏用麻黃湯耶蓋邪自
太陽而來仍當提出太陽不發亦治哮喘症哮喘由風寒
其陷入陽明故不用葛根也

時如火。年餘骨立。醫用葶附諸藥。熱益甚。孫琳投以小柴胡湯。三服脫然。琳曰。此名勞瘧。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。熱有在皮膚。在藏府。在骨髓。在骨髓者。非柴胡不可。若得銀柴胡。只須一服。南方者。力減。故三服乃效也。時珍曰。觀此。則得用藥之妙矣。昂按。據孫氏之說。是柴胡亦能退骨蒸也。

頭眩 此則得用藥之妙矣。昂按。據孫氏之說。是柴胡亦能退骨蒸也。

目赤胸痞脇痛 凡脇痛多是肝木。有餘。宜小柴胡湯。加青皮。川芎。白芍。又左脇痛。宜活血。行氣。右脇痛。宜消食。行痰。

口苦耳聾 肝肺之邪。婦人熱入血室。衝為血海。即血室也。男女皆有之。柴胡在藏主血。胎前產後諸熱。小兒痘疹。在經主氣。

五疳羸熱散 十二經滄疽。血凝氣聚。功同連翹。連翹治血熱。柴胡治氣熱。為少異。

陰虛火炎氣 感于寒而作。此湯散寒利肺病。哮喘者。雖服麻黃而不作汗。

麻黃 去節。桂枝。二。杏仁。七十枚。甘草。一兩。先煮麻黃。數沸。去沫。內諸藥。煎熱。服。覆取微汗。中病即止。不必盡劑。無汗再服。

凡用麻黃。去節。醋湯畧泡。晒乾。備用。庶免發汗為先。汗出則愈。活人云。凡發汗。病症仍在者。三日內。可二三汗之。令腰以下。周徧為度。王海藏曰。表症當汗。脈浮。急汗之。脈沉。緩汗之。裏症當下。脈浮。緩下之。脈沉。急下之。三陽汗當急。而下當緩。三陰汗當緩。而下當急。按汗有大汗。解表。微汗。解肌之別。殊下有急下。少與微和。滲利之別。

此足太陽藥也。麻黃中空。辛溫。氣薄。肺家喘藥。而走太陽。陽能開腠。散寒。從。此。入。仍。從。此。出。桂枝辛溫。能引營分。之邪。達之肌表。桂入營血。能解肌。營衛和。始能作汗。杏仁苦甘。散寒而降。

皮膚。肺之所主。其。桂枝辛溫。能引營分。之邪。達之肌表。桂入營血。能解肌。營衛和。始能作汗。杏仁苦甘。散寒而降。

營衛和。始能作汗。杏仁苦甘。散寒而降。

杏仁苦甘。散寒而降。

杏仁苦甘。散寒而降。

杏仁苦甘。散寒而降。

杏仁苦甘。散寒而降。

杏仁苦甘。散寒而降。

杏仁苦甘。散寒而降。

杏仁苦甘。散寒而降。

杏仁苦甘。散寒而降。

升者禁用。銀州者根長尺餘微白。治

勞瘠良。北產者如前胡而軟。並良。南產

者強硬。不堪用。外感生用。內傷升氣酒

炒用。根中及下降用。稍有汗咳者。蜜水

炒前胡半夏為使。惡皂角。

前胡 辛以暢肺。解風寒。甘以悅脾。理胸

腹苦泄厥陰_肝之熱。寒散太陽_{膀胱}之邪。

微寒一性陰而降。功喘下氣。氣下則火

降而痰消。氣有餘便是。能除實熱。治痰

熱哮喘咳嗽。嘔逆痞膈。霍亂小兒疳氣。

氣甘草甘平。發散而和中。經曰寒淫于內。治以甘熱。佐

以苦辛是已。喻嘉言曰麻黃發汗其力最猛故以桂枝監之甘草和之用杏仁潤下以止喘逆正

如馭馬防其放逸。其李士材曰古云冬不用麻黃夏不

用桂枝。蓋以冬主閉藏不應疎泄。夏令炎熱不宜辛溫

經所謂必先歲氣毋伐天和是也。又云夏月不用麻黃

兩說相反。何耶。或舍時從症。或舍症從時。臨時變通。存

乎其人。其李時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃。有汗用

桂枝。未有究其精微者。津液為汗。汗即血也。在營則為

血。在衛則為汗。寒傷營。營血內滯。不能外通于衛。衛氣

閉固。津液不行。故無汗。發熱而惡寒。風傷衛。衛氣外泄。不能內護于營。營氣虛弱。津液不固。故有汗。發熱而惡風。然風寒皆由皮毛而入。皮毛肺之合也。証雖屬太陽。然而赤。拂鬱咳嗽。有痰喘而胸滿。非肺病乎。蓋皮毛外閉。則邪熱內攻。故用麻黃。甘草同桂枝。引出營分之邪。達之肌表。佐以杏仁。泄肺而利氣。汗後無大熱而喘者。加石膏。活人書。夏至後。加石膏。知母。是皆泄肺火之藥。是麻黃湯。雖太陽發汗。重劑實散。肺經火鬱之藥。腠理不密。則津液外泄。而肺氣虛。虛則補其母。故用桂枝同

有推陳致新之績明目安胎無外感者

忌用按柴胡前胡均是風藥但柴胡性升前胡性降為不同肝胆經風痰

非前胡不能除皮白肉黑味甘氣香者良半

夏為使惡皂莢忌火

麻黃 辛溫微苦僧繼洪云中牟產麻黃地冬不積雪性熱故過

服泄入足太陽膀胱兼走手少陰陽明心大

腸而為肺家喘藥發汗解肌去營中寒

邪衛中風熱調血脉通九竅開毛孔治

中風傷寒中猶傷也頭痛溫瘧咳逆上氣寒風

鬱于肺經經曰諸痰哮喘哮喘宜瀉肺氣難用

甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥瀉木而固脾使以薑棗行脾之津液而和營衛下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脉沉遲者加人參以益肺氣也活人書加黃芩為陽旦湯以泄肺熱也是桂枝湯雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥也王履曰傷寒即病者謂之傷寒不即病者謂之溫暑其原不殊故一稱為傷寒其類則殊施治不得相混仲景之書專為即病之傷寒設不兼為不即病之溫暑設也今人或以傷寒法治溫暑不過借用耳三陰傷寒寒症十居七八若溫暑但一于熱耳後人誤為通治遂疑諸熱劑不敢用是未悟仲景立麻黃桂枝湯之有所主有其時矣苟知非治溫暑之劑則羣疑冰釋矣又曰傷寒即發于冬寒之時寒邪在表閉其腠理非辛溫不能散之此麻黃桂枝等劑所以必用也溫病熱病發于暄熱之時鬱熱自內達外無寒在表故非辛涼苦寒苦酸之劑解之此桂枝麻黃等所以不可用而後人所為之解散大黃湯千金湯防風通聖之類兼治內外者之所以可用也夫即病之傷寒有惡風惡寒之症者風寒在表表氣受傷也後發之溫熱病有惡風惡寒之症者必重感風寒而表氣亦受傷也若無新中之風寒則無惡風惡

麻黃而不出**赤黑斑毒**胃熱一日斑症汗本草未載表虛不得再汗

非便閉亦不可下**毒風癩痺**皮肉不仁只宜清解其熱

目赤腫痛水腫風腫過劑則汗多亡陽

夏月禁用汗者心之液過汗則心血為之動搖乃驕悍之劑丹溪以

人參麻黃同用亦攻補法也東垣曰十劑曰輕可去實葛根麻黃之屬是也邪

客皮毛腠理閉拒營衛不行故謂之實二藥輕清可以去之時珍曰麻黃太陽

經藥兼入肺經肺主皮毛葛根陽明經藥兼入脾經脾主肌肉二藥皆輕揚發

散而所入不同王好古曰麻黃治衛實桂枝治衛虛雖皆太陽經藥其實營衛

藥也心主營為血肺主衛為氣故麻黃為手太陰肺之劑桂枝為手少陰心之

劑時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝未有究其精微者津液為汗

寒之症故仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病

溫病如此則知熱病亦如此而不渴惡寒者非溫熱病

矣或有不因新中風寒亦見惡風惡寒之症者蓋因表

虛熱達于表而傷表氣所謂衛虛則惡風營虛則惡寒

耳非傷風惡風傷寒惡寒也溫病熱病亦有先見表症

而後傳裏者蓋鬱熱自內達外外不能泄還復入裏而

成可攻之症非如傷寒從表而始也每見世人治溫熱

病誤攻其裏亦無大害誤攻其表變不可言此足明其

熱之自內達外矣間有誤攻致害者乃春夏暴寒所中

之疫症邪純在表未入于裏不可以溫病熱病同論夫

秋冬傷寒真傷寒也春夏傷寒寒疫也與溫病熱病自

是兩途豈可同治况傷寒直中陰經與太陽雖傷不及

鬱熱即傳陰經為寒症而當溫者又與溫病熱病大不

同其可混治乎一陽子曰傷寒傳足不傳手非窮理之

言也草窠劉子指足經所屬水土木水遇寒而涸冰土

遇寒而圻裂木遇寒而凋枯故寒喜傷之手經所屬金

與火金遇寒而愈堅火體極熱寒不能襲故寒不能傷

味者奇之將人身營衛經絡上下截斷不相聯絡失血

氣周流瞬息罔間之旨矣夫寒邪襲人必先皮毛灼熱

鼻塞息粗肺主皮毛是手太陰肺辛金先受病矣海藏

汗即血也。在營則爲血，在衛則爲汗。寒傷營，營血內濇，不能外通。于衛，衛氣閉固，津液不行，故無汗發熱而惡寒。風傷衛，衛氣外泄，不能內護。于營，營氣虛弱，津液不固，故有汗發熱而惡風。然風寒皆由皮毛而入，皮毛肺之合也。蓋皮毛外閉則邪熱內攻，故用麻黃、甘草、同桂枝，引出營分之邪。達之肌表，佐以杏仁，泄肺而利氣。汗後無大熱而喘者，加石膏。活人書：夏至後，加石膏，知母，皆泄肺火之藥。是麻黃湯雖太陽發汗，重劑實散肺經火鬱之藥。腠理不密，則津液外泄，而肺氣虛，虛則補其母，故用桂枝、同甘草外散風邪，以救表。內伐肝木，以防脾。佐以芍藥，泄木而固脾。使以薑棗，行脾之津液，而和營衛。下後微喘者，加厚朴、杏仁，以利肺氣也。汗後脈沉遲者，加人參以益肺氣也。活人書：加黃芩爲陽旦湯，以瀉肺熱也。是桂枝湯雖太陽解肌，輕劑實爲理脾救肺之藥也。

有傷寒，自皮毛入之語。先師有桂枝湯之說，雖太陽表之劑，然汗法舍皮毛，何自而解？更衣悖常，結閉溼泄，手陽明大腸病矣。先師有硝黃、朴實之用，雖兼正陽三陰裏之裏之劑，然下法舍大腸，何自而通？劉子謂金遇寒而愈堅，信乎陽氣怫鬱，舌胎言妄，手少陰心下火病矣。先師有瀉心數法，亢極動血，上下煩蒸，手厥陰心胞火，手少陽三焦火病矣。恰有三黃、柴、芍、數條小便癰閉，手太陽小腸丙火病矣。恰有五苓、薑、赤之例。劉子謂火熱寒不能傷，信乎經又云：人之傷寒，則爲病熱。熱云病熱，則無水。水土折木枯之說，而有金燔火亢之徵矣。劉子何人，敢恃管見，惑世誣人哉！機要云：有厥陰經下利不止，脈沉而遲，手足厥逆，唾涕膿血，此難治。宜麻黃湯，小續命湯汗之。此有表邪，縮于內，當瀉表而愈。張子和曰：飧泄以風爲根，風非汗不出，有病此者，腹中雷鳴，水穀不分，小便滯澀，服瀉藥溫藥不效，炙中脘劑下數十，燥熱轉甚，津液枯竭，延余視之，脈浮大而長，身表微熱，用桂枝麻黃湯，加薑棗煎，連進三大劑，汗出終日至旦而愈。次以胃風湯和其藏府，食進而安。經曰：春傷于風，夏必飧泄，故可汗而愈。按風屬木，脾屬土，木剋土，故泄也。附大黃湯、大黃兩半、芒硝、大腹皮、木通。

發汗用莖去節煮十餘沸掠去浮沫或用醋湯略泡晒乾備用亦有用蜜炒者

庶免止汗用根節無時出汗為自汗屬陽虛夢中出汗為盜

太發汗屬陰虛用麻黃根蛤粉粟米等分為末袋盛撲之佳時珍曰麻黃發汗駛不能禦根節止汗效如影響物理不可測

如此自汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痙等

症皆可加用蓋其性能行周身肌表引諸藥至衛分而固腠理汗雖為心液

然五藏亦各有汗經曰飲食飽甚汗出于胃驚而奪精汗出于心持重遠行汗

出于腎疾走恐懼汗出于肝搖體勞苦

汗出厚朴白微為使惡辛夷石膏

荊芥一名假蘇辛苦而溫芳香而散入肝經

甘草各一兩桂心七錢半桃仁廿一枚治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂破棺千金湯苦參一兩酒煮取吐

治天行熱毒垂死冰解散防風通聖散見表裏門

本方除桂枝加石膏名麻黃杏仁甘草石膏湯仲景治汗

下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者或問發汗後不可更

行桂枝湯桂枝既不可行麻黃可行耶無大熱石膏可行耶喻嘉言曰治傷寒先分營衛桂麻二湯斷無混用

之理此症太陽之邪雖從汗解然肺中熱邪未盡所以熱雖少止喘仍不止故用麻黃發肺邪杏仁下肺氣甘

草緩肺急石膏清肺熱即以治足太陽之藥通治手太陰經也倘誤行桂枝寧不壅塞肺氣而吐癰膿乎亦

治濕瘧先熱後寒本方加白朮名麻黃加朮湯金治濕

家身體煩痛宜發汗本方去桂枝杏仁加附子名麻黃附子湯金治脉沉虛脹者為氣水屬少陰發其汗即止

氣分兼行血分。其性升浮。能發汗。又云止冷

汗虛散風濕。清頭目。利咽喉。治傷寒頭

痛。中風口噤。身強項直。口面喎邪。目中

黑花。其氣溫散。能助脾胃消食。氣香入脾通利

血脉。治吐衄腸風。崩中血痢。產風血運。

產後去血過多。腹內空虛。則自生風。故常有崩運之患。不待外風襲之也。荆芥

最能散血。中之風華。陀愈風散。荆芥三錢。微焙為末。豆淋酒調服。或童便服。諸

家云。瘰癧。瘡腫。清熱散瘀。破結解毒。結毒散

熱清則血涼。而毒解。為風病血病瘡家聖藥。荆芥功本

治風。又兼治血者。以其入風木之藏。即是藏血之地。李士材曰。風在皮裏膜外。

本方除桂枝杏仁甘草麻黃湯。金匱治裏水。一身面目黃腫。脉沉

小便不利重覆取汗。本方去桂用麻黃。不去節杏仁。不去皮尖甘草。

生用名三拗湯。局方治感冒風寒。咳嗽鼻塞。麻黃留節。發中有收。杏仁留尖

取其發連皮取其瀉。甘草生用補中有發也。

忌汗諸證。仲景曰陽盛陰虛。下之則愈。汗之則死。陰盛

痛宜汗之。假令尺脉遲者。不可發汗。以營弱血少故也。咽燥喉乾者。不可發汗。津液不足也。咳而小便利

若失小便者。不可發汗。發汗則四肢厥冷。肺腎虛冷也。下利雖有表症。不可發汗。汗出必脹滿。走津液而胃

虛也。淋家不可發汗。發汗必便血。亡耗津液。反增客熱也。衄家亡血家。不可發汗。發汗則陰陽俱虛。針經

曰。奪血者無汗。奪汗者無血。王海藏曰。仲景言衄家不可發汗。蓋為脉微也。若浮緊者。麻黃湯浮緩者。桂枝湯

活人云。脉微者。黃芩芍藥湯。犀角地黃湯。瘡家雖傷寒身痛。不可發汗。發汗則痙。表虛熱聚。故生瘡。汗之則

荊芥主之非若防
風能入骨肉也
連穗用穗在于巔故善升發

治血炒黑用凡血藥用山梔乾薑地榆機欄五靈脂等皆應炒黑

者以黑反魚鱗河豚驢肉勝紅也

連翹微寒升浮形似心實似蓮房有瓣苦心

故入手少陰厥陰心包氣分而瀉火兼

除手足少陽三焦手陽明經大腸氣分濕

熱散諸經血凝氣聚營氣壅遏衛氣鬱滯遂成瘡腫利

水通經殺蟲止痛消腫排膿皆結者散之凡腫而

痛者為實邪腫而不痛為虛邪腫而赤者為結熱腫而不赤為留氣停痰為

十二經瘡家聖藥經曰諸瘡痛癢皆屬心火

表益虛熱愈甚而生風故變痲少陰病脉沉細數病

為在裏不可發汗少陰病但厥無汗而強發之必動

其血或從口鼻或從目出是名上厥下竭難治脉動

數微弱者不可發汗脉沉遲為在裏反發其汗則津

液越出大便難表虛裏實必譫語汗家重發汗必恍

惚心亂汗者心之液心亡血液故亂腹中上下左右

有動氣者不可發汗

傷寒傷風辨傷寒鬱而後能發熱傷風即能發熱傷寒

手足微厥傷風手足背皆無汗傷風有汗傷寒無涕傷風有涕傷寒

溫傷寒脉緊傷風脉緩

陰陽表裏辨陽症之表發熱惡寒頭痛脊強便清不渴

手足厥逆陽症之裏唇焦舌燥煩渴掀衣揚手擲足大

便秘結小便赤澀爪甲紅活身輕易于轉側脉浮洪數

陰症之裏不渴蹠臥引衣自蓋唇紫舌捲大便滑泄小

便清白爪甲青黑身重難以轉側脉沉細數惟腹痛與

嘔陰陽裏症皆有之三陽經又有陰陽表裏之分太陽

以熱在皮膚頭痛項強在經為表麻黃湯桂枝湯九味

紫蘇 味辛入氣分。色紫入血分。香溫散。

寒通心。利肺開胃。益脾氣香入脾。發汗解肌。

和血下氣。寬中消痰。祛風定喘。止痛安。

胎利大小腸。解魚蠱毒。多服泄人真氣。

時珍曰：同陳皮砂仁行氣安胎。同藿香烏藥溫中止痛。同香附麻黃發汗解肌。

同芎藭當歸和血散血。同桔梗枳殼利膈寬腸。同藟子杏仁消痰定喘。同木瓜厚朴散濕解暑。

治霍亂脚氣。氣香者良。宜橘皮忌。

鯉魚 蘇子與葉同功。潤心肺尤能下。

氣定喘止。嗽消痰利膈。寬腸溫中開鬱。

有蘇子梗下氣稍緩。虛者宜之。葉發汗散寒梗順氣

羌活湯以口渴尿赤熱入膀胱。在府為裏。五苓散陽明以熱在肌肉。目痛不眠。在經為表。葛根解肌湯以口渴

背寒為熱。漸入裏。白虎加參湯。若自汗狂譫。熱已入胃府。為全入裏。調胃承氣湯。少陽以胸脇之間。為半表半

裏。表多。小柴胡湯。裏多。熱盛者。黃芩湯。以上皆發熱。太陽惡寒。陽明自汗。少陽多嘔。皆三陽症也。大抵陽症多

得之風寒。暑濕邪生于太陽也。陰症多得之飲食起居七情。邪生于少陰也。故曰傷寒內傷者。十居八九也。

桂枝湯 治太陽中風。陽浮而陰弱。發熱頭痛自汗惡

風惡寒。鼻鳴乾嘔。關前為陽。衛亦陽。陽以候衛。關後為

風也。陰脉弱者。營氣弱也。傷于風者。頭先受之。故頭痛

經曰。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。風併于衛。營弱。筋

強。故發熱自汗也。衛虛則惡風。營虛則惡寒。自汗則皮

腠疎。故惡風復惡寒也。惡寒雖屬表。亦有虛實之分。無

汗惡寒為表實。宜發汗。汗出惡寒為表虛。宜解肌。鼻鳴

並舉。義重。惡風惡寒。未有不惡寒者。所以傷寒及陽明亦互云。惡風後人謂傷寒惡寒。傷風惡風。誤矣。

安胎子降氣開鬱消痰定喘表弱氣虛者忌用葉腸滑氣虛者忌用于炒研用

薄荷 辛能散涼能清本經溫蓋體升浮溫而用涼也

能發汗搜肝氣而抑肺盛消散風熱清

利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽口

氣語澀舌胎含眼耳咽喉口齒諸病辛

通竅而散風熱皮膚癢癩癧瘡疥驚熱凡小兒治

驚藥俱宜骨蒸破血止痢能治血痢血痢病在疑滯

薄荷湯調辛能散虛人不宜多服能發汗疎表夏月多服泄人元

涼能清氣蘇產氣芳者良薄荷猫之酒也犬虎之酒也蜈蚣雞

之酒也桑椹鳩之酒也葶草魚之酒也食之皆醉被猫傷者薄荷汁塗之

病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗脉遲汗多屬陽明症

以微惡寒尚兼太陽仍當從外解肌斷其入胃府之路

桂枝 芍藥 生薑三兩 甘草二兩 大棗十二枚 熟服須

臈啜稀熟粥以助藥力溫覆取微似汗不可令如水淋

漓汗出病差停後服服一劑盡病症猶在者更作服

此足太陽藥也仲景以發汗為重解肌為輕中風不可

大汗汗過則反動營血雖有表邪只可解肌故以桂枝

湯少和之也經曰風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘

緩之以酸收之桂枝辛甘發散為陽臣以芍藥之酸收

佐以甘草之甘平不令走泄陰氣也薑辛溫能散散寒止嘔

雞蘇

一名水蘇。一名龍腦薄荷。

辛而微温。清肺下氣。

理血碎惡而消穀。治頭風目眩。肺痿血

痢吐衄崩淋。喉腥口臭。邪熱諸病。

局方有龍

腦雞蘇丸

方莖中虛似蘇葉而微長。密齒

面。燭氣甚辛烈。

木賊

温微甘苦。中空輕揚。與麻黃同形

性亦能發汗。解肌升散。火鬱風濕入足

厥陰。少陽血分益肝膽。治目疾退翳膜

翳乃肝邪鬱遏。不能上通于目。及疝痛脫肛腸風痔瘻

赤痢崩中諸血病。

藜甘温能和此不熇于發散。又以行脾之津液而和營

衛者也。麻黃湯熇于發散。故不用薑棗。而津液得通矣。

龐安時曰。若無汗。小便數。或手足逆身冷。不惡寒。反惡

熱者。慎不可用。又自汗。小便數者。不可服。自汗為陽虛。

小便數為下焦虛寒。初病表裏俱虛。病不在表。服此重

汗。竭其津液。是虛虛也。經曰。脉浮緊發熱。汗不出者。不

可與。脉緊為傷寒。與之則表益實。而汗愈難出矣。傷寒

例曰。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛則亡。周揚俊

曰。風既傷衛。則衛氣疎。不能內護于營。而汗自出矣。汗

者。血之液也。苟非用血藥。以桂枝和營散邪。以為藥護

營。固裏。則不但外邪不出。且入而為裏患矣。然後知和

營。則外邪出。邪出則衛自密。更不必用固表之藥。而汗

自止矣。仲景曰。病當自汗出者。此為營氣和。營氣和者

外不諧。以衛氣不共營氣和諧故耳。以營行腠中。衛行

脉外。復發其汗。營衛和則愈。宜桂枝湯。王好古曰。或問

桂枝止煩出汗。仲景治傷寒發汗。數處皆用桂枝湯。又

曰。無汗不得用桂枝。汗多者桂枝甘草湯。此又能閉汗

也。二義相通否乎。曰。仲景云。太陽病發熱汗出者。此為

浮萍 辛散輕浮。入肺經。達皮膚。能發揚。

邪汗。丹溪曰。浮萍發汗。甚于麻黃。止搔癢。消渴。搗汁服。

生于水。又能下水。氣利小便。治一切風。

濕癱瘓。浮萍一味。蜜丸。酒服。治三十六種風。濃煮汁浴。治惡疾瘡癩。遍

身。燒煙辟蚊。紫背者良。

蒼耳子。一名萁耳。即詩卷耳。苦甘性溫。善發汗。散。

風濕。上通腦頂。下行足膝。外達皮膚。治。

頭痛目暗。齒痛鼻淵。肢攣痺痛。癩瘡。

疥。采根葉熬。名萬應膏。遍身搔癢。作浴湯佳。去刺酒。

拌蒸忌猪肉。聖惠方云。葉搗汁。治產後痢。

營弱衛強。陰虛陽必凌之。故用桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗而解。若非麻黃能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗出。而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。李東垣曰。仲景治表虛。製此湯。用桂枝為君。桂枝辛熱發散。體輕助陽。芍藥甘草佐之。若腹中急痛。乃製小建中湯。以芍藥為君。芍藥酸寒。主收補中。桂枝甘草佐之。一治表虛。一治裏虛。又曰。以桂枝易肉桂。治感寒腹痛之神藥。如中熱腹痛。去桂加黃芩。許叔微曰。仲景一百一十二方。桂枝獨冠其首。今人全不用何也。昂按。仲景治傷寒。用麻黃桂枝。而全不用羌活。防風。是古人亦有所未備也。故潔古製羌活湯。黃耆湯。川芎湯。海藏製神朮散。白朮湯。皆用羌活。防風。以代之。黃耆川芎湯。附補門。神朮白朮湯。見後。

本方加白朮。川芎。羌活。防風。飴糖。名疏邪實表湯。節台。

同。陶氏製此。以白朮為君。以代桂枝湯。喻嘉言曰。坐令外感內傷。混同論治矣。昂按。節菴之君。白朮亦做潔古之黃耆湯。海藏之白朮湯。而來。又按。節菴所著傷寒六書。盡易仲景原方。參合後賢治法。以代桂枝麻黃葛。

天麻 辛温入肝經氣分益氣強陰通血

脉強筋力疎痰氣治諸風眩掉頭旋眼

黑語言不遂風濕痺小兒驚癇音頑諸

眩掉皆屬肝木肝病不能榮筋故見前

症天麻入厥陰而治諸疾肝氣和平諸

疾自瘳血液衰少及類中風者忌用風藥能燥

血故也昂按風藥中須兼養血藥制其

燥也養血藥或兼搜風藥宣其滯也古

云治風先治血根類黃瓜莖名赤節有

風不動無風反搖一名定風草明亮堅實

者佳濕紙包煨熟切片酒浸一宿焙用

秦艽 苦燥濕辛散風去腸胃之熱益肝

根青龍等劑在後人誠為便用故世之嗜節菴者勝于
仲景以節菴為捷徑以仲景為畏途節菴之書行而仲
景之書晦如節菴者可謂潔古海藏輩之功臣而在長
沙實為操券也本集採節菴方論頗多然不能無遺議
者以節菴之功罪不效本方去芍藥生薑名桂枝甘草湯仲景

治發汗過多又手冒心心下悸欲得按者汗多則亡陽而耗血故心

虛悸而又手冒心也桂枝益氣固表甘草補中助陽本方加附子名桂枝加附子

湯仲景治太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急

汗多亡陽無以衛外故惡風汗多則便自少兼膀胱無

陽不能化氣故便難汗多則無液以養筋兼有風入而

增其勁故四肢微急與桂枝湯以和榮衛加附子以助元陽本方去芍藥加附子名

桂枝附子湯仲景治傷寒八九日風濕相搏身體痛煩不

能轉側不嘔不渴脉浮虛而澀八九日再經之時邪多在裏而復身體痛煩者

瞻之氣養血榮筋風藥中潤劑治風寒

濕痺經曰風寒濕三氣雜至合而為痺風勝為行痺寒勝為痛痺濕勝為

着痺痺在于骨則體重在脉則血滯通在筋則拘攣在肉則不仁在皮則寒通

身變急血不榮筋虛勞骨蒸時珍曰手足陽

胆陽明有濕則手足酸痛寒熱有熱則日晴潮熱骨蒸聖惠方治急勞燥熱秦

芩柴胡各一兩甘草五錢為末每服三錢治小兒骨蒸潮熱食減瘦弱秦芩炙

甘草各一兩每服一二錢乙加薄荷五錢疸黃酒毒腸風

瀉血口噤牙痛齒下齦屬手陽明大腸經張潔古曰秦芩能去

下牙痛又濕勝風淫之症利大小便牛乳

煎服兼治黃形作羅紋相交長大黃

風濕相搏也煩風也痛濕也不嘔不渴裏無邪也故知為風濕相搏脉浮風也濇濕也浮而濇知寒濕但在經與桂枝湯以解表風本方加芍藥生薑各一兩人參三加附子以散寒濕

兩名桂枝新加湯仲景治傷寒汗後身痛脉來沉遲沉遲汗後

血虛也正氣虛矣外邪豈能出乎與桂枝湯以解未盡之邪加芍藥人參斂陰以益營血本方減甘

草一半加芍藥一倍名桂枝加芍藥湯仲景治太陽誤下

腹痛屬太陰症表症未罷而誤下表邪乘虛而入裏當作結胸則仍屬太陽經今不胸滿而腹

滿是邪已入太陰經然但腹滿時痛尚非大實本方加

之痛故但用桂枝以安太陽倍芍藥以和太陰大黃名桂枝加大黃湯仲景治表症誤下大實痛者別見

門本方去桂加茯苓白朮名桂枝去桂加茯苓白朮湯

仲景治服桂枝湯或下之仍頭項強痛發熱無汗心滿微

白左紋者良。葛蒲為使。畏牛乳。

豨薟草

苦辛。生寒。熟溫。治肝腎風氣。四肢麻痺。筋骨冷痛。腰膝無力。風濕瘡瘍。

若痺痛由脾腎兩虛。陰血不足。不由風濕而得者。忌服。

風藥能燥血 江東人呼猪

為豨。其草似猪。豨具故名。唐成訥有進豨豨表。宋張詠進豨豨表。云其草金稜銀線素莖紫

荻對節而生。頗同蒼耳。臣喫百服。眼目清明。即至千服。鬚髮烏黑。筋力輕健。效驗多端。以五月五日六

月六日。七月七日。九月九日。採者尤佳。

去粗莖。留枝葉花實。酒拌。蒸晒九次。蜜

痛小便不利。表症未退。復增滿痛便秘。邪已內陷。故去

桂枝表藥不用。而用芍藥甘草以除痛。生薑以散滿。祛寒。白朮茯苓以生津。瀉水。合薑棗以和胃。安內。即所以攘外也。本方加厚朴杏

仁。名桂枝加厚朴杏仁湯。仲景治太陽病下之微喘。表未

解也。桂枝湯以解表。杏枝湯以下逆氣。本方去芍藥。生薑加茯苓。名茯苓

桂枝甘草大棗湯。甘瀾水煎。仲景治汗後臍下悸。欲作奔

豚。汗後臍下悸者。心虛而腎氣發動也。腎積名奔豚。腎氣逆欲上凌心。故用茯苓伐腎邪。桂枝治奔豚。甘草大棗助脾而平腎。益土以制水。甘瀾水者。用瓢揚萬遍。水性鹹而重。揚之則甘而輕。取其不助腎氣也。本

方合麻黃湯。名桂麻各半湯。仲景治太陽症如瘧狀。熱多

寒少。寒多為病。進熱多為病。退陽勝陰也。本方二分。合麻黃湯一分。名桂

枝二麻黃一湯。仲景治太陽病已大汗。形如瘧。日再發。再發

丸甚益元氣九次加以酒蜜則苦寒之

陰濁盡去而清香之美味見矣數不至

九陰濁未盡則不能透骨搜風而却病

也搗汁熬膏以甘草生地煎膏煉蜜三

味收之酒調服尤妙

威靈仙

辛泄氣鹹泄水

本草苦元素甘

氣溫屬

木其性善走能宣疎五藏通行十二經

絡治中風頭風痛風頑痺

濕熱流于肢節之間腫屬

濕痛屬熱汗多屬風麻屬氣虛木屬濕

痰死血十指麻木亦是胃中有濕痰死

血脾主四肢故也痛風當分新久新痛

屬寒宜辛溫藥久痛屬熱宜清涼藥河

者為

本方二分合越婢一分名桂枝二越婢一湯

景治

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可

發汗喻嘉言曰此風多寒少之症無陽二字仲景言之

不一後人置為闕疑不知乃亡津液之通稱也故

以發汗為戒然非汗風寒不能解故取桂枝之二以治

風越婢之一以治寒方為合法方時行曰此即桂枝麻

黃之合劑乃大青龍以芍藥易杏仁之變制耳本方倍芍藥加飴糖名小建中

湯仲景再加黃耆名黃耆建中湯金匱並見寒門除飴糖名桂枝

加黃耆湯金匱昂按小建中以飴糖為君除飴糖即不

治黃汗發熱兩脛自冷身痛身重腰上有汗腰下無汗

小便不利此陽通而陰不通上下痞隔故用黃耆以固便利而諸陽桂枝以通陰陰陽通營衛和則正汗出小症悉退矣小建中加當歸名當歸建中湯干治婦人產

威靈仙傳曰一人手足不遂數十年遇

新羅僧曰得一藥可治入山求之乃威

靈仙也服之而愈癥瘕積聚痰水宿膿黃疸浮

腫大小腸秘風濕痰氣一切冷痛性極

快利積疴不痊者服之有捷效然疎泄

真氣弱者慎用和砂仁砂糖醋煎治諸

骨哽根叢鬚數百條長者二尺餘色

深黑俗名鐵脚威靈仙忌茗麵湯

鈎藤鈎甘微苦寒除心熱平肝風治大

人頭旋目眩小兒驚啼癩癧音熾縱筋急而縮為

癩筋緩而弛為癩伸縮不已客忤胎風

為癩癧俗謂之搗搦是也

後虛羸不足腹中痛引腰背小腹拘急寒傷血分若崩傷不

止加地黃阿膠本方除甘草加黃耆三兩名桂枝五物

湯金匱治血痺身體不仁如風痺狀本方加栝蒌根名栝蒌桂枝湯

金匱治太陽症備身強凡凡脉反沉遲此為瘧龐安時曰栝蒌根不

主項強凡凡其意以肺熱不令移于腎也加于桂枝湯

中則可以撤熱榮筋調和營衛矣凡字無鈎音殊羽短

難飛本方加龍骨牡蠣名桂枝加龍骨牡蠣湯金匱治男

子失精女子夢交桂枝生薑之辛以潤之甘草大棗之甘以補之芍藥之酸以收之龍骨牡

後虛羸不足腹中痛引腰背小腹拘急寒傷血分若崩傷不

止加地黃阿膠本方除甘草加黃耆三兩名桂枝五物

湯金匱治血痺身體不仁如風痺狀本方加栝蒌根名栝蒌桂枝湯

金匱治太陽症備身強凡凡脉反沉遲此為瘧龐安時曰栝蒌根不

主項強凡凡其意以肺熱不令移于腎也加于桂枝湯

中則可以撤熱榮筋調和營衛矣凡字無鈎音殊羽短

難飛本方加龍骨牡蠣名桂枝加龍骨牡蠣湯金匱治男

子失精女子夢交桂枝生薑之辛以潤之甘草大棗之甘以補之芍藥之酸以收之龍骨牡

以固之蠟之脂本方加葛根麻黃名葛根湯見後

大青龍湯仲景治太陽中風脉浮緊身疼痛發熱惡寒不汗出而煩燥成氏曰此中風見寒脉也浮為風風傷衛

發斑疹。主肝風相火之病。風靜火息。則

諸症自除。相火散行于胆三焦心包。有刺類鈎鈎。

藤細多鈎者良。純用鈎功力加倍。久煎則無力。

茵芋 辛苦微温有小毒。治風濕拘攣痺

痛。時珍曰古方治風癰有茵芋丸治風痺有茵芋酒治產後風有茵芋膏風

濕諸症多用之。茵芋石南莽草皆治風

妙品。近世罕知。莽草辛温有毒。治頭風

癰腫。乳癰疔瘕蘇頌曰古方風濕諸酒

多用之。今人取葉煎湯熱含。治牙蟲喉

瘕甚效。甄權曰不入湯。莖赤葉如石榴而短厚。莖葉炙用。

當歸 甘温和血辛温散內寒苦温助心

痛也。煩為陽為風。躁為陰為寒。風寒兩傷營衛俱實。故

不汗出而煩躁也。仲景又曰。若脉微弱。汗出惡風。不可

服此。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此為逆也。按此即少

陰過汗亡陽之症。故仲景更立真武湯以救其誤。又治

傷寒。脉浮數身不痛但重。乍有輕時。無少陰症者。曰此

傷寒見風脉也。傷寒者身痛。此風勝故不痛。中風者身

重。此兼寒故有輕時。風寒外甚。故不吐利。厥逆無少陰

裏症也。昂按成註非也。此湯必脉浮數。浮數煩躁無汗

方可服之。仲景恐少陰煩躁而誤服此。則逆。故加無少

陰症一句。大法太陽煩躁宜汗。陽明煩躁宜下。陰症煩躁宜温。

麻黃 六兩 桂枝 甘草 二兩 杏仁 四十枚 石膏 雞子

三 大棗 十二枚 先煮麻黃去沫。內諸藥煎。一服汗者止

後服。

此足太陽藥也。成氏曰。桂枝主中風。麻黃主傷寒。今風

散寒。諸血屬心。凡通脈者。必先補心。當歸苦溫助心。入心肝脾。

心生血。肝藏血。脾統血。為血中氣。藥治虛勞寒熱。

效逆上氣。血和則溫。瘧。厥陰。辟。痢。便血。

頭痛腰痛。心腹諸痛。散寒。風。瘧。無汗。音。

擊上聲。身強項直。角弓反張。曰瘧。無汗。為剛瘧。有汗為柔瘧。當歸辛散風。溫和。

血。產後亦有發瘧者。以脫血。筋骨緩縱。足不任地。曰痿。風寒燥客于。

肌肉。血脉曰痺。血凝氣聚。按之堅硬。曰癰。雖堅硬而聚散無。

常曰癢。尚未至癰也。癰疽瘡瘍。衝脈為病。氣逆裏急。帶脈為病。腹痛。腰溶溶如。

坐水中。衝脈起于腎下。出于氣街。俠臍。上行至胸中。上頰額。參諸陽。權。

寒兩傷。欲以桂枝解肌。驅風而不能已。其寒欲以麻黃

發汗散寒。而不能去其風。仲景所以處青龍而兩解也。

麻黃甘溫。桂枝辛熱。寒傷營。以甘緩之。風傷衛。以辛散

之。故以麻黃為君。桂枝為臣。甘草甘平。杏仁甘苦。佐麻

黃。以發表。大棗甘溫。生薑辛溫。佐桂枝以解肌。薑棗又

之津液。而營衛陰陽俱傷。則非輕劑所能獨解。必須重

和營衛。營衛陰陽俱傷。則非輕劑所能獨解。必須重

輕之劑。同散之。乃得陰陽之邪俱已。營衛俱和。石膏辛

甘微寒。質重而又專達肌表。為使也。風寒外盛。人身之

膏體重。瀉熱氣輕。解肌。故云重輕之劑。足太陽膀胱經。表病也。而表有營衛之不同。病有風寒之各異。仲景治

分三症。桂枝解肌。驅風。麻黃發汗。散寒。青龍風寒兩解。各分疆界。鼎足三大綱也。按大青龍為發汗之重劑。陶

諸精下行入足滲三陰灌諸絡為十二
經脉之海主血带脉橫圍于腰如束帶
總約及婦人諸不足一切血症陰虛而
諸脉

陽無所附者潤腸胃澤皮膚養血生肌

血旺則排膿止痛血和則然滑大腸瀉
肉長

者忌用當歸為君白芍為臣地黃為佐
芎藭為使名四物湯治血之總

劑血虛佐以人參黃耆血熱佐以條芩
梔連血積佐以大黃牽牛昂按血属陰

四物能養陰陰得其養則血自生非四
物能生血也若氣虛血弱之人當用人

參取陽旺生陰血之義多有過使氣
服四物陰滯之藥而反致害者

血各有所歸故名血滯能通血虛能補
血枯能潤血亂能撫

蓋其辛温能行氣分使氣調而血和也
東垣曰頭止血而上行身養血而中守

節菴曰此湯險峻須風寒俱甚又加煩躁乃可與之喻
嘉言曰解肌兼發汗義取青龍者龍興而雲升雨降鬱
熱頓除煩躁乃解匪龍之為靈何以得此乎青龍湯為
太陽無汗而設與麻黃證何異因兼煩躁一證煩為風
躁為寒非此法不解也然不汗出之煩躁與發汗後之
煩躁迥別下後之煩躁與未下之煩躁亦殊若少陰煩
躁而誤服此則有亡陽之變矣又曰石膏一物入甘温
隊中則為青龍從清涼同氣則為白虎夫風寒皆傷宜
從辛甘發散矣而表裏又俱熱則濕熱不可用欲併風
寒表裏之熱而俱解之故立白虎一法以輔青龍之不
逮也按煩躁有在表者此症不汗出而煩躁是也有在
裏者不大便而煩躁是也有陽虛者汗下後病不去而
煩躁是也有陰盛者少陰病吐利厥逆煩躁欲死是也
內熱曰煩為有根之火外熱曰躁為無根之火故但躁
不煩及先躁後煩者皆不治

小青龍湯景仲

治傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而

咳或噎或喘或渴或利或小便利少腹滿短氣不得

尾破血而下流。全活血而不走。雷敷海
藏並云。頭破血。時珍曰。治上用頭。治中
用身。治下用尾。通治
全用。一定之理也。川產力剛善攻。秦

產力柔善補。以秦產頭圓尾多肥潤氣

香者良。名馬尾當歸。尾粗堅枯者名鏡

頭當歸。只宜發散用。治血酒製。有痰薑

製。昂按當歸非治痰藥薑製亦臆說耳畏葛蒲海藻生薑

惡濕麩

苦窮 辛温升浮。為少陽引經。胆入手足

厥陰氣分。心包乃血中氣藥。助清陽而

開諸鬱。丹溪曰。氣升則鬱自降。為通陰陽血分之使。潤肝燥

人發熱惡寒。頭痛身痛。屬太陽表症。仲景書中。凡有裏
症兼表症者。則以表。不解三字該之。內有水飲。則水
寒相搏。水留胃中。故乾嘔而噎。水寒射肺。故咳而喘。水
停則氣不化。津不生。故渴。水漬腸間。故下利。水畜下焦
故小便不利。而少腹滿。氣短者。氣促不能相續。與喘不
同。有實有虛。有表有裏。此為水停心下。亦令短氣。水氣
內漬。所傳不一。故有或為之症。○金匱云。平人無寒熱
短氣。不足以息者。實也。又云。膈上有留飲。其人短氣而
渴。丹溪治許白雲。脾疼。臍痛而短氣。
大吐下之。二十日。吐膠痰一桶而安。

麻黃去節桂枝 芍藥酒炒細辛 甘草炙 乾薑三兩 半夏

五味子半升 渴去半夏加花粉半夏温燥。花粉 喘去麻

黃加杏仁喘為氣逆。麻黃發陽。杏仁降氣。形腫亦去麻黃喘呼形腫。水

故並去之。噎去麻黃加附子經曰。水寒相搏。則小便秘。去麻

黃加茯苓便秘忌發汗。宜滲利。

補肝虛。肝以瀉為補。所謂辛以散之。辛以補之。上行頭目。

下行血海。衝脈搜風散瘀。止痛調經。治風濕在頭。血虛頭痛。能引血下行。頭痛必用之。加各引經藥。太陽羌活。陽明白芷。少陽柴胡。太陰蒼朮。少陰細辛。厥陰吳茱萸。丹溪曰。諸經氣鬱。亦能頭痛。腹痛。脇風。氣鬱。血鬱。濕瀉。血痢。寒痺。筋攣。目淚。多涕。熱風木為病。諸風眩。

肝及癰疽瘡瘍。癰從六府生。疽從五藏生。皆陰陽相滯而成。氣為陽。血為陰。血行脈中。氣行脈外。相並周流。寒濕搏之。則凝滯。而行遲。則不及。火熱搏之。則沸騰。而行速。為太過。火鬱邪入血中。為陰滯。于陽。血鬱邪入氣中。為陽滯。于陰。致生惡毒。然百病皆由男

九起也。芎歸能和血行氣。而通陰陽。

此足太陽藥也。表不解。故以麻黃發汗為君。桂枝甘草佐之。解表為佐。咳喘肺氣逆也。故用芍藥酸寒。五味酸

溫以收之。經曰。肺欲收。急食酸以收之。發汗以散邪。水收斂以固真水。水停心下則

腎躁。細辛乾薑辛溫能潤腎而行水。經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。細辛又

為少陰腎經表藥。半夏辛溫能收逆氣。散水飲為使也。外發汗

內行水則表裏之邪散矣。此症為水寒相搏而傷肺。若

異日之患。金匱曰。病溢飲者。當發其汗。大小青龍湯並主之。程郊倩曰。水氣之渴與白虎湯中之渴不特寒熱有殊。亦且燥濕各異。金匱云。先渴後嘔者。水停心下。小

青龍湯主之。不治渴而喘治水。水去而渴自止矣。李時珍曰。仲景治傷太陽症。表未解。心下有水而咳。乾嘔發

熱。或喘或利。小青龍湯主之。表已解。有時頭痛惡寒。心

下有水。乾嘔引痛兩脇或喘或咳。十棗湯主之。蓋青龍

散表邪。使水從汗出。內經所謂開鬼門也。十棗逐裏邪

婦一切血症。然香竄辛散能走泄真氣。

單服久服令人暴亡。單服則藏有偏勝久服則過劑生邪。

故有此失。若有配合節制。則不至此矣。

昂按芍地酸寒為陰。芎歸辛溫為陽。故

四物取其相濟。以行血藥之滯耳。川芎

辛散。豈能生血者乎。治法云。驗胎法。婦

人過經三月。用川芎末。空心熱湯調一

匙。服腹中微動者。是胎。不動者。是經閉。

蜀產為川芎。秦產為西芎。江南為撫芎。

以川產大塊裏白不油辛甘者勝。白芷

為使。畏黃連硝石滑石。惡黃耆山茱萸。

白芍。苦酸微寒。入肝脾血分。為手足太

陰行經藥。肺脾瀉肝火。酸斂肝。肝以斂安。為瀉。以散為補。

使水從二便出。內經所謂潔淨府去陳莖法也。

本方加石膏。名小青龍加石膏湯。治肺脹欬而上氣。

煩躁而喘。心下有水。脉浮。此去水飲散。風寒之重劑。

葛根湯。治太陽病項背几几。音殊。無汗惡風者。動則引。

頸几几然。狀病人項背難舒之貌也。無汗惡風。中風而表實也。陽明脉上頸而合于太陽。恐將傳陽明。故加葛根以斷之。此症又名剛痙。乃風寒傷筋。故拘急而強直也。金匱治之。亦主此湯。剛痙無汗。柔痙有汗。仲景又曰。太陽發汗。不徹。煩躁短氣者。亦宜此湯。更發其汗。經曰。何以知汗出不徹。以脉濇故也。按傷寒失于汗下而短氣。為實。汗下後短氣者。為虛。亦治太陽陽明合病下利。

表實宜發汗。表虛宜解肌。傷寒有併病。有合病。本經未解。傳入他經。有催併之義。為併病。二經三經同受邪者。為合病。合病者。邪氣甚也。太陽陽明合病。其症頭痛。腓痛。肌熱。鼻乾。目痛。脉浮大。而長。頭腰太陽也。肌目鼻陽明也。浮大。太陽也。脈長陽

脾肺固腠理。肺主皮毛。脾主肌肉。肝木

金。則肺安。脾和。和血脈。收陰氣。斂逆氣。

酸主散惡血利小便。斂陰生津。小便自

收斂。緩中止痛。東垣曰。經曰。損其肝者。緩其中。即調血也。益氣除

煩斂肝安胎補勞退熱治瀉痢後重。除能

胃中脾虛腹痛。瀉痢俱太陰病。不可缺

濕熱。民曰。白芍不惟治血虛。大能行氣。古方

治腹痛。用白芍四錢。甘草二錢。名芍藥

甘草湯。蓋腹痛因營氣不從逆于肉裏。

白芍能行營氣。甘草能斂逆氣。又痛為

肝木剋脾土。白心痞脇痛。往來之道。其火

明也。陽經合病必自下利。邪併于陽。則陽實而陰虛。陽

外實而不主裏。則裏虛。故下利。吳鶴臯曰。庸醫便謂傷

寒漏底不治。與此湯以散經中表邪。則陽不實而陰氣

平。利不治而自止矣。按葛根能引胃中清陽上行。故凡

下利多用之。趙嗣真曰。合病者。二陽經或三陽經同病

不傳者也。併病者。一經先受病。又過一經病之傳者也

如太陽陽明若併而未盡。是傳未過。仲景所謂太陽症

不罷。面赤陽氣怫鬱在表。不得越。煩躁短氣是也。猶當

汗之。以各半湯若併之。已盡。是謂傳過。仲景所謂太陽

症罷。潮熱手足汗出大便鞭而譫語是也。法當下之。以

承氣湯。是知傳則入府。不傳則不入府。併病傳變有如

此。仲景治太陽陽明合病。主葛根湯。太陽少陽合病。主

黃芩湯。少陽陽明合病。主承氣湯。三陰有兩感而無合

病。此事難知。云足太陽為諸陽之首。故多傳變。太陽

傳陽明。水傳土也。謂之微邪。又謂巡經得度。傳太陽傳

少陽。謂之越經。傳太陽傳太陰。謂之誤下。傳太陽傳少

陰。謂之表裏傳。水勝火。火勝水。此南北二方之變。頃刻

害人。辨之不早。必成不救。太陽傳厥陰。謂之首尾傳。三

陰不至于首。惟厥陰與腎脉上行。與太陽相

接。又名巡經得度。傳災變至重。不為不多矣。

癰腫疔瘕其收降之體又能入血海衝

為血海男女皆有之而至厥陰肝治鼻衄鼻血曰衄音女

六切目濇肝血不足退火益陰婦人胎產

及一切血病又曰產後忌用丹溪曰以其酸寒伐

生發之氣也必不得已酒炒用之可耳時珍曰產後肝血已虛不可更瀉也寇

氏曰減芍藥以避中寒微寒如芍藥古

人猶諄諄告戒况大苦大寒可肆行而

莫之忌耶○同白朮補脾同參耆補氣

同歸地補血同芎藭瀉肝同甘草止腹

痛同黃連止瀉痢同防風

發痘疹同薑棗溫經散濕赤芍藥主

治畧同尤能瀉肝火散惡血治腹痛堅

積血痺疔瘕邪聚外腎為疔腹內為瘕經閉腸風癰

疔

疔

葛根四兩麻黃兩生薑三兩桂枝兩芍藥兩甘草二兩大事

十二救

此足太陽藥也成氏曰輕可去實葛根麻黃之屬是也

此以中風表實故加二物于桂枝湯中仲景以有汗無汗定傷風傷寒

之別有汗為傷風用桂枝加葛根湯不用麻黃無汗為

傷寒用此湯張元素曰二湯加葛根所以斷太陽入陽

明之路非太陽藥也若太陽初病便服升葛是反引邪

氣入陽明也周揚俊曰不去麻黃復加葛根大開肌肉

之藥不慮大汗無制乎故以桂枝監之且以芍藥收之

喻嘉言曰仲景于太陽帶陽明症其風傷衛則桂枝湯中加葛根寒傷營則麻黃湯中加葛根太陽帶少陽症其風傷衛則桂枝湯中加柴胡寒傷營則麻黃湯中加柴胡合併之病亦然則陽明以葛根為主藥少陽以柴胡為主藥矣乃少陽經專用小柴胡湯而陽明經全不用葛根湯何耶此有二義太陽而畧兼陽明則以方來之陽明為重故加葛根陽明而尚兼太陽則以未罷之

腫目赤皆散瀉之功白補而收赤散而瀉白

益脾能于土中瀉水赤散邪能行血中

之滯產後俱忌用赤白各隨花色單

辦者入藥酒炒用制其寒婦人血分醋炒

下痢後重不炒惡芒硝石斛畏蠶甲小

薊反藜蘆

生地黄 甘苦大寒入心腎瀉丙火小腸為丙

火心與小腸相表裏清燥金胃大腸火消痰

通經平諸血逆治吐衄崩中唾血者隨唾出咯

血者隨痰咯出或帶血絲出腎經及肺經自兩脇逆上吐出者屬肝經衄血者

太陽為重故不加葛根恐葛根大開肌肉則肌肉盡從外泄耳小兒布痘見點之時亦忌之今人知忌升麻而恣用葛根兒命遭枉者多矣又曰金匱論痙病于風木生事之時已申不可汗下之戒夫妄下損陰則筋失所養而痙妄汗亡陽則脉失所養而拘急及遇無汗之剛痙又不得不用葛根湯取其微汗至于下法全不示戒且云可與大承氣湯見身內之陰為外熱所耗容有不

得不下之症但十中不得一二終非可訓之定法畧舉其端聽用者之裁酌耳

本方除麻黃名桂枝加葛根湯仲景治前症汗出惡風者

本方加半夏名葛根加半夏湯仲景治太陽陽明合病不

下利但嘔此又以利不利辨傷寒傷風之不同也寒為陰陰性下行裏氣不和故利而不嘔風為陽

陽氣上行裏氣逆而不下故嘔而不利加半夏以下逆氣本方加黃芩名葛根解肌湯治發熱惡寒頭痛項強傷寒溫病

血溢于腦從鼻而出。咳血者。咳出痰內有血。並屬肺經。吐出嘔出。成盆成碗者。屬胃經。經漏不止。曰崩血。熱則妄行。宜以此涼之。虛人忌用。用乾地黄可也。

傷寒陽強。痘症大熱。痘症用之甚多。本草未載。多服

損胃。生掘鮮者。搗汁飲之。或用酒製

則不傷胃。生則寒。乾則涼。熟則溫。故分為三

條以便施用

乾地黄 甘苦而寒。沉陰而降。入手足少

陰。厥陰。心包及手太陽經。小腸滋陰退

陽涼血。生血治血。虛發熱。經曰陰虛勞

傷咳嗽。咳嗽陰虛者。地黄丸為要藥。亦能除痰。丹溪曰。久病陰火上升。

麻黃附子細辛湯。景

治傷寒少陰症始得之。反發熱脉

沉者。少陰症。脉微細。但欲寐。是也。太陽膀胱與少陰腎相為表裏。腎虛故太陽之邪直入。而脉沉。餘邪未盡。入裏而表熱。此症謂之表裏傳。非兩感也。

麻黃 細辛 附子。二兩 一枚

先煮麻黃去沫。內諸藥煎。

此足少陰藥也。太陽症發熱。脉當浮。今反沉。少陰症脉

沉。當無熱。今發熱。故曰反也。熱為邪在表。當汗。脉沉屬

陰。又當溫。故以附子溫少陰之經。以麻黃散太陽。惡

而發汗。以細辛腎經表藥。聯屬其間。是汗劑之否不出

真曰。仲景太陽篇云。病發熱。頭痛。脉反沉。身體表。其經

表者。麻黃附子細辛湯。均是發熱。脉沉。以其口渴。陽太陽。陽症。脉當浮。而反不能浮者。以裏久虛。故臥不

津液生痰不生血宜補
血以制相火其痰自除
痿痺驚悸有觸

動曰驚無驚而自動曰悸即怔忡也有
因心虛火動者有因肝虛胆怯者有因

水停心下者火畏水故悸也地黃能土
交心腎而益肝脾亦能行水故治之

衄尿血痛為血淋不痛為尿血由心腎
氣結或憂思房勞所致多屬虛

寒不可專
作熱治
血運崩中經曰陰虛陽
搏謂之崩
足下

熱痛折跌絕筋生地一斤瓜薑糟一斤
生薑四兩炒熟罨傷折

處冷則易之又生地汁三升
酒升半煮服下撲損瘀血
填骨髓長

肌肉利大小便調經安胎又能殺蟲治

心腹急痛海上方搗汁和麵作餅既食
能利出虫忌用鹽本草匯曰

丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也
不知血藥屬陰其性凝滯若胃虛氣弱

微又身體疼痛故宜救裏使正氣內強逼邪肌肉盡從

薑附子亦能出汗而散假令裏不虛寒而脈浮升麻而

太陽麻黃症矣均是脈沉發熱以無頭痛故名于風木

陰病當無熱今反熱寒邪在表未全傳裏但皮筋失所

為熱故用麻黃細辛以發表熱附子以溫少陰十之剛

使寒邪入裏外必無熱當見吐利厥逆等症而示戒

陰四逆湯症矣由此觀之表邪浮淺發熱之反猶有不

氣衰微脈沉之反為重此四逆湯不為不重于麻黃舉

子細辛湯矣又可見熟附配麻黃發中有補生附配

薑補中有發伸景之旨微矣按傷寒傳入三陰尚有存

經表症如太陰有桂枝加芍藥湯少陰有麻黃附子細

辛湯厥陰有當歸四逆湯之類皆陰經表藥也又按少

陰雖有反熱而無頭痛厥陰雖有頭痛而無身熱且痛

不如陽經之甚若身熱頭痛全者則屬陽症醫貫曰有

頭痛連腦者此係少陰傷寒宜麻黃附子細辛湯不可

不知喻嘉言曰仲景太陽經但有桂枝加附子法並無

麻黃加附子法太陽無脈微惡寒之症不當用附子若

見脈微惡寒吐利煩躁等症則亡陽已在頃刻又不當

用麻黃矣又曰三陰表症與三陽迥異三陰必以溫經
之藥為表而少陰尤為緊關俾外邪出而真陽不出方

之人過服歸地等劑。反致痞悶。飲食減少。變症百出。至死不悟。豈不惜哉。大抵血虛固不可常補其氣。而氣虛亦不可徒補其血也。凡勞病陽虛。宜四君補氣。陰虛宜四物補血。陰陽俱虛者。宜合用名八珍湯。

江浙生者

南方陽氣力微。北方生者純陰力大。以

懷慶肥。大菊。花心者良。酒製則上行。外

行。薑製則不泥膈。惡貝母。畏蕪荑。忌萊

菘。葱。蒜。銅鐵器。得酒門冬。丹皮。當歸良。

熟地黄。甘而微温。入手足少陰厥陰經。

滋腎水。補真陰。填骨髓。生精血。聰耳明

目。耳為腎竅。目為肝竅。目得血而能視。耳得血而能聽。黑髮烏髭。

合正法。經又曰。少陰病吐利。手足不逆冷。反發熱者。不死。脈不至者。灸少陰七壯。此又以陽氣為注。少陰吐利。法當厥逆。以無陽也。發熱為陽氣猶存。故不死。

本方去細辛。加甘草。名麻黃附子甘草湯。仲景治少陰病

得之二三日。無證者。當微發汗。得之二三日。較初得之

裏症也。用此湯微發汗以散之。是汗劑之輕者。周揚俊曰。言無裏症。則亦有反發熱之表在可知也。二方皆治

少陰表症。少陰無發汗之法。汗之必至亡陽。惟此二症用之。金匱用本方治少陰水症。少氣脈沉虛脹。

升麻葛根湯。錢仲陽。治陽明傷寒中風。頭疼身痛。發熱惡

寒。無汗。口渴。目痛。鼻乾。不得臥。及陽明發斑。欲出不出

寒。暄不時。人多疾疫。三陽皆有頭痛。故頭痛屬表。六經

寒在表。故發熱惡寒。寒外束。故無汗。熱入裏。故口渴。陽明脈絡鼻俠目。故目痛。鼻乾。陽明屬胃。胃不和。故臥不

治勞傷風痺胎產百病為補血之上劑。

丹溪曰：產前當清熱養血為主，產後宜大補氣血為主。雖有雜症，從末治之。昂按：丹溪產後大補氣血一語，誠至當不易之論。後人不善用之，多有風寒未解，瘀血未盡，妄施峻補，反致大害者，不可不察。王碩云：男子多陰虛，宜熟地。女子多血熱，宜生地。以好酒拌砂仁末，浸蒸晒九次用。地黃性寒，得酒與火與日則溫。性泥，得砂仁則利氣，且能引入丹田。六味丸用之為君，尺脉弱者加附桂，所謂益火之原以消陰翳也。尺脉旺者加知柏，所謂壯水之主以制陽光也。

何首烏

苦堅腎，溫補肝，甘益血，澹收斂。

精氣添精益髓，養血祛風。治風先治血，血活則風散。

安陽邪入胃裏實，表虛故發斑。輕如蚊點為疹，重若錦紋為斑。

升麻三錢，葛根芍藥二錢，甘草一錢。

川芎白芷。川芎為通陰陽血氣之使，白芷治陽明頭痛，身痛背強，加羌活防

風。此兼太陽，熱不退，春加柴胡，黃芩防風。少陽司令，柴故加二藥。

夏加黃芩石膏。清降火熱，頭面腫，加防風荆芥連翹白芷川

芩牛蒡石膏。升散因痛，加桔梗。清肺利膈，咽斑出不透，加紫

草茸。音戎，紫草涼血潤腸，用茸者取其初得陽氣觸類升發。脉弱加人參，胃虛食

少加白朮，腹痛倍芍藥和之。

此足陽明藥也。陽明多氣多血，寒邪傷人，則血氣為之

壅滯，辛能達表，輕可去實，故以升葛辛輕之品，發散陽

強筋骨烏髭髮。故名首烏令人有子為滋補。

良藥氣血太和則勞瘦風虛崩帶瘡痔。

瘰癧癰腫諸病自己。營血調則癰腫消赤者外科呼為瘡

止惡瘡。益陰補肝瘡疾要藥而本草不言治瘡時珍曰不寒不燥

功在地黃天。冬諸藥之上有赤白二種夜則藤交。

一名交藤有陰陽交合之象赤雄入血

分白雌入氣分以大如拳五瓣者良三

百年者大如栲栳服之成地仙凡使赤

白各半泔浸竹刀刮皮切片用黑豆與

首烏拌勻鋪柳甑入砂鍋九蒸九晒用

明表邪陽邪盛則陰氣虛故用芍藥斂陰和血又用甘

草調其衛氣也。雲岐子曰葛根為君升麻為佐甘草芍藥以安其中升麻甘草升

陽解毒故又治時疫。時疫感之必先入胃故用陽明胃藥斑疹已出者勿

服恐重虛其表也。麻痘已見紅點則不可服陽明為表之裏升麻陽明正藥凡斑疹欲出未

出之際宜服此湯以透其毒不可便服寒劑以攻其熱

又不發汗攻下虛其表裏之氣如內熱甚加黃連犀

角青黛大青知母石膏黃芩黃柏玄參之類若斑勢稍

退潮熱譫語不大便可用大柴胡加芒硝調胃承氣下

之傷寒未入陽明者勿服恐反引表邪入陽明也

柴葛解肌湯節菴製此以代葛根湯治太陽陽明合病頭目眼眶

痛鼻乾不眠惡寒無汗脉微洪。太陽脉起目內眦上額交巔陽明脉上至額

絡于目風寒上干故頭痛目痛眼眶痛也惡寒無汗屬太陽鼻乾不眠屬陽明脉洪將為熱也節菴曰此陽明在

疾之為使。忌諸血無鱗魚菜。服葱蒜鐵

器。善時有何首烏者。祖名能嗣。父名延

日。而思人道。娶妻連生數子。延秀服之

壽百六十歲。首烏又服之。壽百三十歲

髮猶烏黑。李翱為立何首烏傳。然流傳

雖久。服者尚少。明嘉靖初。方士仰應節

進七寶美髯丹。世宗服之。連生皇子。遂

盛行于世。方用赤白首烏各一斤。黑豆

拌九蒸晒。茯苓半斤。乳拌當歸。枸杞。兔

絲各半斤。俱酒浸。牛膝半斤。酒浸。同首

烏第七次。蒸至第九次。破故紙四兩。黑

脂麻炒。蜜丸。並忌鐵器。昂按地黃何首

烏。皆君藥也。故六味丸以地黃為君。七

寶丹以何首烏為君。各有配合。未可同

類而共施也。即有加減。當各依本方隨

病而施。損益今人多以何首烏加入地

黃丸中。合兩方而為一方。是一藥二

君。安所適從乎。失製方之本義矣。

經之邪。若正府病。另有治法。

柴胡 葛根 羌活 白芷 黃芩 芍藥 桔梗

甘草 加薑棗石膏一錢煎服。無汗惡寒甚者。去黃芩。

冬月加麻黃。春月少加。夏月加蘇葉。

此足太陽陽明藥也。寒邪在經。羌活散太陽之邪。用此

黃芷葛散陽明之邪。柴胡散少陽之邪。此邪未入少陽

寒將為熱。故以黃芩石膏桔梗清之。三藥並用。節菴加用之

草和之也。芍藥酸寒。斂陰。散中有收。

柴胡升麻湯 治少陽陽明合病傷風。壯熱惡風。頭痛

體痛。鼻塞咽乾。痰盛咳嗽。唾涕稠粘。及陽氣鬱遏。元氣

牡丹皮 辛苦微寒 入手足少陰 心厥陰

心包 瀉血中伏火 色丹故入血分 時珍曰 伏火即陰火也 陰

火即相火也 世人專以黃柏治相火 不知丹皮之功 更勝 故仲景腎氣丸用之

和血涼血而生血 血熱則枯 破積血 積

不去則新 通經脈為吐衄必用之藥 屬

陰本靜 因相火所 逼故越出上竅 治中風五勞驚癇瘵

瘵 筋脈伸縮 抽掣為瘵瘵 或手足抽掣

時止為癇皆陰虛血熱風 除煩熱瘵癰

火相搏 痰隨火湧所致 丹皮治無

汗之骨蒸 地骨皮治有汗之骨蒸 神不足者 手少陰志不足者 足少陰故仲景

下陷時行瘟疫 劉宗厚曰 傷風一症 仲景與傷寒同論 雖有麻黃桂枝之分 至于傳變之後 亦

未嘗悉分之也 諸家皆以感冒四氣 併中風條混治 惟

陳無擇別立傷風一方 在四淫之首 且依傷寒以太陽

為始 分註六經 可謂詳密 但風本外邪 諸方例用解表

發表 然受病之源 亦有不同 若表虛受風 專用發表之

藥 必致汗多亡陽之症 若內挾痰熱而受風 亦宜內外

交治 不可專手解表也 或曰 此云表虛與傷寒中風表

虛同歟 子曰 不同也 彼以太陽中風 而于有汗無汗分

虛實實者加麻黃 虛者加葛根 俱解表也 此云表虛者

當固守衛氣 而散風者也 柴胡 前胡 黃芩 六升麻 五錢 葛根 桑白皮 四錢 荆芥 七錢 赤芍 石膏 一兩 加薑三片 豉二十粒 煎 此足少陽陽明藥也 陽明而兼少陽 則表裏俱不可攻 祇宜和解 在經 柴胡 平少陽之熱 升葛散陽明之邪 三藥

腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精為志故腎藏志火之精為神故心單瓣花紅者入藥肉厚者佳酒藏神

拌蒸用畏貝母免絲大黃忌蒜胡蔓伏

心時珍曰花白者補赤者不利人所罕悟宜分別之

續斷 苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脉

而理筋骨主傷中補不足經疏云味甘故然煖

子宮縮小便破瘀血治腰痛胎漏懷妊瀝血

崩帶遺精腸風血痢是齋方平胃散一兩續斷二錢半每

服二錢米飲下治時痢亦驗癰痔腫毒又主金瘡折

跌以功止痛生肌女科外科需為上劑

皆能升前胡消痰下氣而解風寒桑皮瀉肺利濕而止

痰嗽荆芥疏風熱而清頭目赤芍調營血而散肝邪黃

芩清火於上中二焦石膏瀉熱於肺胃之部風壅為熱故以石膏

辛寒加薑豉者取其辛散而升發也

九味羌活湯即羌活沖和湯張元素治傷寒傷風憎寒壯熱頭痛

身痛項痛脊強嘔吐口渴太陽無汗及感冒四時不正

之氣溫病熱病有物有聲曰嘔氣逆則嘔有物無聲曰吐胃寒則吐胃熱亦吐邪熱在表則不

渴傳裏則渴四時不正之氣謂時當熱而反大涼時當

寒而反大溫非時而有其氣也冬時傷寒不即病者至

春而變為溫病至夏而發為熱病餘症解見前
羌活 防風 蒼朮錢半 細辛五分 川芎 白芷 生地黃

川產良。狀如鷄脚。皮黃。皺節節斷。真。

去向裏硬筋。酒浸。用地黃為使。

碎補

苦溫補腎。故治耳鳴。耳鳴必由腎虛及

腎虛久瀉。

研末入猪腎煨熟。空心食之。腎主二便。久瀉多屬腎虛。不

可專責脾胃也。

腎主骨。故治折傷。

以功命名。粥和傅傷處。

牙痛。炒黑為末。擦牙。嚙下亦良。

又入厥陰。肝心包。能破。

血止血。

入血行傷。故治折傷。粥和末裹傷處。

根似薑而

扁長去毛用。或蜜拌蒸。

益母草

一名荒蔚。

辛微苦寒。入手足厥陰。

肝心包。

消水行血。去瘀生新。調經解毒。

瘀血去。則經調。

黃芩

甘草

錢

加生薑葱白煎。如風證自汗者去。

蒼朮

發汗

加白朮黃耆。

發表而即實表。譬歐寇者。隨關門也。

胸滿去地黃加。

枳殼桔梗喘加杏仁。夏加石膏。知母汗下兼行。加大黃。

此足大陽例藥。以代桂枝麻黃青龍各半等湯也。藥之

辛者屬金。于入為義。故能匡正黜邪。羌防蒼細芩芷皆

辛藥也。羌活入足太陽。為撥亂反正之主藥。

除關節痛。痛甚無汗。

者倍。

蒼朮入足太陰。辟惡而去濕。

能除濕下氣。及安太陽。使邪氣不致傳足。

白芷入足陽明。治頭痛。在額。芩入足厥陰。治頭

痛。在腦。細辛入足少陰。治本經頭痛。皆能驅風散寒。行

氣活血。而又加黃芩。入手太陰。以泄氣中之熱。生地入

治血風血運血痛血淋胎漏產難崩中

帶下帶脉橫于腰間病生于此故名爲帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益

氣而兼升提血虛者爲經產良藥消疔

腫乳癰亦取其散通大小便然辛散之

藥腫子散大者忌服益母子主治略

同調經益精明目血滯病目者宜之活血順氣

逐氣氣行則血行血活則風散行中有補治心煩頭

痛血虛血熱之候胎產帶崩令人有子有補陰之功時

珍口益母根莖花葉實皆可同用若治

分風熱明目調經用子爲良蓋根莖花葉專于行子則行中有補也產寶濟陰

手少陰以泄血中之熱黃芩苦寒生地寒滯二味苟用

當議子發熱之後則當若未發熱猶防風爲風藥卒徒隨所引而無不至治一身盡痛

爲使有汗宜倍用甘草甘平用以協和諸藥也藥備六經治

通四時用者當隨症加減不可執一張元素曰有汗不

得用桂枝若未瘥則其變下可言故立此方使不犯三陽禁忌爲解表神方冬可治寒夏可治熱春可治溫秋

爲穩當但陰虛氣弱之人在所禁耳

十神湯局方治時氣瘟疫風寒兩感頭痛發熱惡寒無汗

咳嗽鼻塞聲重感冒四時不正之氣謂之時氣天災流

發熱惡寒無汗邪在表也咳嗽鼻塞聲重風寒兩感故表實而氣爲之不利也按傷風寒而咳嗽者其感爲輕

麻黃 葛根 升麻 川芎 白芷 紫蘇 甘草

返魂丹。小暑端午。或六月六日。採益母
莖葉花實為末。蜜丸。治胎產百病。近效

方搗汁熬膏亦良。

急鐵子微炒用。

澤蘭 苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入

足太陰厥陰脾通九竅利關節養血氣

長肌肉破宿血調月經消癥瘕散水腫

防已為使治產後血瀝腰痛瘀行未盡吐血鼻衄

目痛頭風癰毒撲損補而不滯行而不

峻女科要藥古方澤蘭九甚多時珍曰蘭草

澤蘭一類二種俱生下濕紫莖素枝赤

節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節

陳皮 香附 赤芍藥 等分加薑葱白煎

此陽經外感之通劑也。吳鶴臯曰。古人治風寒必分六

經。見症用藥。然亦有發熱頭痛惡寒鼻塞而六經之症

不甚顯者。昂按前症亦陽經之可辨者亦總以疏表利氣之藥主之。

是方也。川芎麻黃升麻乾葛白芷紫蘇陳皮香附皆辛

香利氣之品。故可以解感冒氣塞之症。諸藥以散表邪陳附以導裏氣

而又加芍藥和陰氣于發汗之中。加甘草和陽氣于疏

利之隊也。吳綬曰此湯用升麻葛根能解利陽明痘疫時氣非正傷寒之藥若太陽傷寒發熱用之

則引邪入陽明傳變發處矣慎之

神木散海藏

治內傷冷飲外感寒邪而無汗者。內傷冷飲則寒濕停

治血風血運血痛血淋胎漏產難崩中

帶下帶脉橫于腰間病生于此故名爲帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益

氣而兼升提血虛者爲經產良藥消疔

腫乳癰亦取其散通大小便然辛散之

藥腫子散大者忌服益母子主治略

同調經益精明目血滯病目者宜之活血順氣

逐氣氣行則血行行中有補治心煩頭

痛血虛血熱之候胎產帶崩令人有子有補陰之功時

珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子爲良蓋根莖花葉專于行子則行中有補也產實濟陰

手少陰以泄血中之熱黃芩苦寒生地寒滯二味苟用子發熱之後則當若未發熱猶

當議防風爲風藥卒徒隨所引而無不至治一身盡痛

爲使有汗宜倍用甘草甘平用以協和諸藥也藥備六經治

通四時用者當隨症加減不可執一張元素曰有汗不得用桂枝若未瘥則其變下可言故立此方使不犯三

陽禁忌爲解表神方冬可治寒夏可治熱春可治溫秋

爲穩當但陰虛氣弱之人在所禁耳

十神湯局治時氣瘟疫風寒兩感頭痛發熱惡寒無汗

咳嗽鼻塞聲重感冒四時不正之氣謂之時氣天災流行沿門闔境傳染相似謂之瘟疫頭痛

發熱惡寒無汗邪在表也咳嗽鼻塞聲重風寒兩感故表實而氣爲之不利也按傷風寒而咳嗽者其感爲輕

麻黃 葛根 升麻 川芎 白芷 紫蘇 甘草

返魂丹。小暑端午。或六月六日。採益母
莖。葉花實為末。蜜丸。治胎產百病。近效
方。搗汁熬膏亦良。

忌鐵子微炒用。

澤蘭 苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入

足太陰厥陰脾通九竅利關節養血氣

長肌肉破宿血調月經消癥瘕散水腫

防已治產後血瀝腰痛瘀行吐血鼻衄未盡

目痛頭風癰毒撲損補而不滯行而不

峻女科要藥古方澤蘭時珍曰蘭草九甚多

澤蘭一類二種俱生下濕蒼莖素枝赤

節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節

陳皮 香附 赤芍藥 等分加薑葱白煎

此陽經外感之通劑也。吳鶴臯曰。古人治風寒必分六

經。見症用藥。然亦有發熱頭痛惡寒鼻塞而六經之症

不甚顯者。昂按前症亦陽經之可辨者亦總以疏表利氣之藥主之。

是方也。川芎。麻黃。升麻。乾葛。白芷。紫蘇。陳皮。香附。皆辛

香利氣之品。故可以解感冒氣塞之症。諸藥以散表邪。陳附以導裏氣。

而又加芍藥和陰氣于發汗之中。加甘草和陽氣于疏

利之隊也。吳澂曰。此湯用升麻葛根能解利陽明。痘疫時氣非正傷寒之藥。若太陽傷寒發熱用之。

則引邪入陽明傳變發斑矣。慎之。

神木散海

治內傷冷飲外感寒邪而無汗者。內傷冷飲則寒濕停

長葉光有岐者為蘭草莖微方節短葉

有毛者為澤蘭嫩時並可接音那而佩之

楚辭所謂紉秋蘭以為佩是也朱文公離騷辨

證云必花葉俱香燥濕不變方可刈佩今之蘭蕙花雖香而葉無氣質弱易萎

不可刈佩吳人呼為香草俗名孩兒菊夏月採置

髮中則髮不腫浸油塗髮去垢香澤故名澤蘭蘭草走氣分故

能利水道除痰癖殺蠱辟惡而為消渴

良藥經曰數食肥甘傳為消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血

分故能消水腫塗癰毒破瘀除癥而為

婦人聖藥以為今之山蘭者誤矣防已

于中經曰其寒飲食入胃則肺寒肺寒則內外合邪是傷寒亦有由內而得者不特外感風寒而已也寒能滯血故亦治剛瘕太陽純傷風傷寒則不發瘕惟先傷風後傷寒先傷風後傷濕及太陽過汗濕家過汗產後血虛破傷風皆發瘕其症頭搖口噤手足搐搦項背反張無汗為剛瘕有汗為柔瘕亦有剛柔不分者不可純作風治宜清熱化痰疎風養血亦有用大承氣者凡陽瘕不厥逆其厥逆者皆陰瘕也宜附子湯附子防風散桂心白朮湯

蒼朮製防風二兩甘草一兩加生薑葱白煎如太陽證

發熱惡寒脉浮緊者加羌活浮緊帶洪者是兼陽明加

黃芩浮緊帶弦數者是兼少陽加柴胡婦人加當歸

此足太陽藥也防風辛溫升浮除風勝濕為太陽主藥

苓朮甘溫辛烈散寒發汗辟惡升陽能升胃中陽氣加甘草者

為使 寇宗奭朱丹溪並以蘭草為山蘭

之葉李時珍考眾說以譏之按別

本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水解

鬱調經閩產者力勝李士材云蘭葉稟

金水之氣故入肺藏東垣方中嘗用之

內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余

屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草

也其集諸家之言曰陳遜齋閑覽云楚

騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或

以為荷蘭當以澤蘭為正今之所種如

麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋

著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古

之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者

今之所謂蘭其葉如茅者根名土續蘭

發中有緩也 按神木白木二湯乃海藏所製以代桂枝

方益不欲無識者輕以麻黃桂枝之熱傷

入也昌明仲景不得不表揚海藏之功

本方除蒼朮加白朮二兩薑三片不用葱名白朮湯

治前症有汗者 二朮主治畧同第

濕故 有止汗發汗之異亦治柔痙

多汗 有汗為柔 痙風而兼

大無神朮散 蒼朮 浸厚朴 薑汁炒 陳皮 去白

香石菖蒲 各錢 治感山嵐瘴氣憎寒壯熱一身盡痛頭

面腫大瘡瘡時毒 濕熱時毒感于口鼻傳入陽明邪正

百節則一身盡痛上行頭面則為腫大各頭瘡蒼朮

辛烈升陽辟惡燥濕解鬱厚朴苦溫除濕散滿化食厚

腸陳皮理氣通利三焦甘草和中匡正脾土此即平胃

散而重用陳皮為君者也蓋人之一身以胃氣為主胃

經爲實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蟲而除痰癖乎其種盛于閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭爲蘭何其惑之甚也昂按朱子辨蘭援離騷紉佩以爲證竊謂紉佩亦騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之露餐秋菊之落英豈真露可飲而英可餐乎又云製芰荷以爲衣集芙蓉以爲裳豈真芰荷可衣芙蓉可裳乎宋儒釋經執泥恐未可爲定論也第騷經既言秋蘭則非春蘭明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭無疑也然離騷不常曰春蘭兮秋菊乎不又曰結幽蘭而延佇乎不又曰疏石蘭以爲芳乎若秋蘭既屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又不得爲山蘭當是何等之蘭乎且山蘭爲花中最上之品古今評者列之梅菊之前今反屈于孩兒菊之下以爲盜襲其名世間至賤之草皆收入本草備山

氣強盛則客邪不能入故治外邪必以強胃爲先也加藿香芎藭取其辛香通竅亦能辟邪而益胃也吳鶴臯曰大無此方但些脾胃而解瘴之妙自在其中不愧爲丹溪之師矣

局方神木散蒼朮二兩川芎白芷羌活藎本細辛炙甘草

各一兩每服四錢加薑葱煎治傷風頭痛無汗鼻塞聲重

及風寒咳嗽時行泄瀉頭痛鼻塞咳嗽是傷風也傷風應有汗若無汗是挾寒也泄

不利者清陽不升木邪尅土風兼濕也蒼朮辛羌芎止各走一經祛風發汗而勝濕散三陽之邪而能升清者也加甘草者

緩其中也

許學士神木散蒼朮一斤脂麻五錢棗五十枚取肉搗丸

治水飲結成癖囊水飲結成窩囊非蒼朮辛烈雄壯不能破之加脂麻者潤其燥也用棗肉

者補土以制水也

蘭清芬佳品。擯棄不錄。何其不吉者斯之甚也。本草殺蟲之藥最多。皆未必有驗。至于行水消痰。固山蘭之葉力所優為者也。蓋李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳藏器以澤蘭蘭草為一類二種遂併騷經而疑之。崇澤蘭而黜山蘭。遂令蘭草無復有用之者。不思若以為一類。則本經蘭草一條已屬重出。何以本經蘭草反列之。上品而澤蘭止為中品乎。况一入氣分。一入血分。迥然不同也。又騷經言蘭者凡五。除木蘭人所共識其餘春蘭秋蘭幽蘭石蘭若皆以為孩兒菊是不特二種一類。且四種一類矣。而以為九畹之受誣。豈理也哉。蓋本經言澤蘭所以別乎山也。言蘭草明用葉而不用其花也。騷經言秋蘭所以別乎春也。言石蘭所以別乎澤也。愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭。其曰幽蘭則山蘭之別名。以其生于深山窮谷故也。寇氏朱氏之論。又安可全非乎。姑附

九製蒼朮散。茅山蒼朮九蒸九晒為末。治痰飲腹痛。

葱豉湯時後治傷寒初覺頭痛身熱脉洪便當服此。

葱白一握升煎服取汗出如無汗加葛根三兩崔氏同

此足太陽藥也。葱通陽而發汗。葱空中為肺葉散手太陰陽明之邪。豉升

散而發汗。邪初在表宜先服此以解散之。免用麻黃湯

者之多所顧忌。用代麻黃者之所紛更也。

本方去淡豉加生薑名連翹葱白湯。治同人

人參敗毒散治傷寒頭痛憎寒壯熱項強睛暗鼻塞

聲重風痰咳嗽及時氣疫癘嵐瘴鬼瘧或聲如蛙鳴赤

眼口瘡濕毒流注脚腫臃腫喉痺毒痢諸瘡斑疹風寒在表

愚說以誌
多識之士

白微 苦鹹而寒。陽明衝任之藥。利陰氣。

下水氣。主中風身熱支滿。忽忽不知人。

陰虛火旺。則內熱生風。火氣焚灼。故身熱支滿。痰隨火湧。故不知人。血厥

汗出過多。血少陽氣獨上。氣塞不行。而厥。婦人尤多此症。宜白微湯。白微當歸

各一兩。參五錢。甘熱淋温瘡。洗洗寒熱

草錢半。每服五錢。酸痛。寒熱作則營氣不。婦人傷中淋露

血熱。千金白微散。治胎前產後遺尿。不知時。白微芍藥等分。酒調服。丹溪曰。此

即河間所謂熱甚。廷孔鬱結。神無所依。不能收禁之意也。廷孔。女人溺孔也。

產虛煩。仲景安中益氣竹皮丸用之。經疏云。古方調經種子。往往

則惡寒發熱。頭痛項強。風寒在肺。則鼻塞聲重。痰多咳嗽。聲如蛙鳴。俗名蝦蟆瘟。邪氣實也。風寒濕熱之氣上

少陰。則喉痺。壅于腸胃。則毒痢。注于皮膚。則瘡疥。人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼

桔梗 茯苓 甘草 每服一兩。加薑三片。薄荷少

許煎。口乾舌燥。加黃芩。脚氣。加大黃。蒼朮。膚痒。加蟬蛻

此足太陽少陽手太陰藥也。羌活入太陽而理遊風。獨

活入少陰而理伏風。兼能去濕除痛。柴胡散熱升清。協

川芎和血平肝。以治頭痛目昏。前胡枳殼降氣行痰。協

桔梗茯苓以泄肺熱。而除濕消腫。甘草和裏而發表。人

參輔正以匡邪。疏導經絡。表散邪滯。故曰敗毒。喻嘉言曰。暑濕

用之。蓋不孕緣于血熱。血少而其源
于真陰不足。陽勝而內熱。故營血日
也。益陰清熱。則血自生旺。而有子矣。
須佐以歸地芍藥杜仲菴蓉等藥。

似牛膝而短小柔軟。去鬚酒洗用。惡大

黃大戟山茱萸

艾葉 苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂

絕之元陽通十二經走三陰太少理氣

血逐寒濕煖子宮止諸血溫中開鬱調

經安胎 胎動腰痛下血膠艾湯良 治吐

血崩帶 治帶 要藥 腹痛冷痢霍亂轉筋 皆理

逐寒濕 殺虻治癰 醋煎外科有用乾艾

之效 作湯投白礬二三錢

熱三氣門中推此方為第一。三氣合邪。豈易當哉。其氣

五傳則為疫矣。方中所用皆辛平。更有人參大力者。荷

正以祛邪。病者日服二三劑。使疫邪不復留。詎不快哉。

奈何俗醫減去人參。曾與他方有別耶。又曰傷寒宜用

人參。其辨不可不明。蓋人受外感之邪。必先汗。以驅之。

惟元氣旺者。外邪始乘藥勢以出。若素弱之人。藥雖外

行。氣從中餒。輕者半出不出。重者反隨元氣縮入。發熱

無休矣。所以虛弱之體。必用人參三五七分。入表藥中。

少助元氣。以為驅邪之主。使邪氣得藥一湧而出。全非

補養衰弱之意也。即和解藥中。有人參之大力者。居間

外邪遇正。自木爭而退舍。否則邪氣之縱悍。安肯聽命

和解耶。不知者謂傷寒無補法。邪得補而彌熾。即痘疹

瘧痢以及中風中痰中寒中暑癰疽產後初時。槩不敢

用。而虛人之遇重病。可生之機。悉置不理矣。古求表汗

用五積散。參蘇飲。敗毒散。和解用小柴胡。白虎湯。竹葉

石膏湯等方。皆用人參。領內邪外出。乃得速愈。奈何不

察耶。外感體虛之人。汗之熱不退。下之和之熱亦不退。

大熱呻吟。津液灼盡。身如枯柴。醫者技窮。正為元氣已

瀉。故藥不應手。耳尚元氣未漓。先用人參三五七分。領

藥深入。驅邪何至汗和不應耶。東垣治內傷外感。用補

洗瘡然後敷藥者蓋人血氣冷必假艾力以佐陽而艾性又能殺蟲也

之灸九音火能透諸經而治百病血熱為

病者禁用灸火則氣下行入藥則熱上衝不可過劑○丹田氣弱臍

腹冷者以熟艾裝袋兜臍腹甚妙寒濕脚氣亦宜以此夾入襪內

者良揉搗如棉謂之熟艾灸火用婦人

丸散醋煮搗餅再為末用入茯苓數片同研則易細

煎服宜鮮者苦酒醋也香附為使艾附丸調婦人

諸病宋時重湯陰文自明成化來則以蘄州艾為勝云灸酒場一灸便透蒙筌發

明並以野艾為真蘄艾雖香實非艾種

延胡索 辛苦而温入手足太陰脾厥陰

中益氣加表藥一二味熱服而散外邪有功千古傷寒

高科從仲景至今明賢方書無不用參何為今日醫家

單除不用全失相傳宗旨使體虛之人百無一活曾不

悟其害之也蓋不當用參而殺人者是與蒼朮歸桂薑

附等藥同行温補之悞不謂與蒼獨柴前芎羊芷桔菴

膏等藥同行汗和之法所致也安得視等砒鴆耶嘉靖

己未江淮大疫用敗毒散倍人參去前胡獨活服者盡

效萬曆己卯大疫用本方復效崇禎辛巳壬午大飢大

疫道僅相望汗和藥中惟加人參者多活更有發斑一

令在室

餘飲食起居不節致患時氣者宜用此法

本方除人參名敗毒散治同有風熱加荆芥防風名荆

防敗毒散亦治腸風下血清鮮血鮮者為腸風隨感而見也血瘀者為臍毒積

久而本方去人參加連翹金銀花名連翹敗毒散治瘡

毒除人參加黃芩名敗毒加黃芩湯治温病不惡風寒

心包經能行血中氣滯氣中血滯通小

便除風痺治氣凝血結上下內外諸痛

通則癥癖崩淋月候不調血氣不和因

至時產後血運暴血上衝折傷積血疝氣

危急為活血利氣第一藥然辛溫走而

不守獨用力迅宜兼補氣血藥通經墮胎血熱氣虛

者禁根如半夏肉黃小而堅者良酒

炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

紅花古名紅藍花辛苦甘溫入肝經而破瘀血

活血瘀行則血活有熱結于中暴吐紫黑血者吐出為好吐未盡加桃仁

而渴除人參加大黃芒硝名硝黃敗毒散治熱毒壅積

敗毒散合消風散名消風敗毒散見風治風毒癩疹及

風水皮水在表宜從汗解者本方加陳廩米名倉廩散

治噤口痢乃熱毒冲心食入即吐單陳廩米煎湯治痢後大渴飲水不止

川芎茶調散局治諸風上攻正偏頭痛惡風有汗憎寒

壯熱鼻塞痰盛頭暈目眩正偏頭痛者風中于腦作止無時也中風故有汗惡風風邪在表故憎寒壯熱風寒傷于皮毛腠理密緻不得泄越氣併于鼻故鼻塞火升故痰盛痰熱上攻故頭暈目眩

川芎茶調散正偏頭痛者平康正偏頭痛者平康僵蚕与菊茶調服如前方用二良

薄荷錢芎藭錢荆芥錢羌活錢白芷錢甘草錢防風錢

半錢細辛錢每三錢食後茶調服一方加菊花錢僵蠶錢

紅花行之。大抵鮮潤燥消腫止痛。凡血宜止。瘀血宜行。

腫則作治經閉便難血運口噤胎死腹

中。非活血行痘瘡血熱。本草不喉痺不

通又能入心經生新血。須兼補血藥為佐使。俗

用染紅併作胭脂。胭脂活血解毒。痘疔挑破以油胭脂傅之。

少用養血多則行血過用能使血行

不止而斃。血生于心色藏于肝属于衝任。紅花汁與相類故治血病。

有產婦血悶而死。名醫陸氏以紅花數

半日而蘇。金匱有紅藍花酒云。治婦人六十二種風。

茜草 色赤入營氣温行滯味酸走肝而

三名菊花茶調散治頭目風熱。菊花清熱明目。僵蠶消風化痰。

此足三陽藥也。羌活治太陽頭痛白芷治陽明頭痛川

芎治少陽頭痛細辛治少陰頭痛防風為風藥卒徒皆

能解表散寒以風熱在上宜于升散也頭痛必用風藥

者以巔頂之上惟風可到也薄荷荆芥並能消風散熱

清利頭目故以為君。辛香輕清能入肝經氣分而搜風熱。肝風散則頭目清明。同諸

藥上行以升清陽而散鬱火。清陽不升則濁。陰上干故頭痛。加甘草者

以緩中也。用茶調者茶能上清頭目也。湯液云茶苦寒下行。如何是清

頭目。陳嘉謨曰。火下降則上自清矣。凡頭痛用羌防芎

芷辛温等藥由風木虛土寡于畏壅塞而成痛。故用此助肝以升散之也。若服辛散藥反甚者則宜用酸澁收而降之乃愈。

鹹走血本經入厥陰血分心包能行血

止血能行故能止消瘀通經消瘀通經酒煎

一兩通經甚効治風痺黃疸疸有五黃疸穀疸

疸此蓋蓄血發黃不專于濕熱者也女勞疸必屬腎虛亦不可以濕熱例治當

用四物知柏壯其水參朮培其氣隨症而加利濕清熱藥崩運撲損

痔瘻瘡癩血少者忌用一根可染絳忌鐵

紫草甘鹹氣寒入厥陰血分心包涼血

活血利九竅通三便鹹寒性滑治心腹邪氣

即熱也水腫五疸癰癤惡瘡及痘瘡血熱所致

血熱毒盛二便閉滯者血熱則毒閉得紫草涼之則血

再造散節菴治陽虛不能作汗陶節菴曰治頭痛項強發熱惡寒無汗服發汗藥一

識二劑汗不出者為陽虛不能作汗名曰無陽症庸醫不識不論時令遂以麻黃重藥劫取其汗誤人死者多矣

人參 黃耆 桂枝 甘草 附子炮 細辛 羌活

防風 川芎 煨薑 棗二枚加炒芍藥一撮煎夏加

黃芩石膏

此足太陽藥也經曰陽之汗以天之雨名之太陽病汗

之無汗是邪盛而真陽虛也故以參耆甘草薑桂附子

大補其陽而以羌防芎細發其表邪加芍藥者于陽中

斂陰散中有收也昂按汗即血也血和而後能汗故加芍芎亦以調營節菴曰人第知參耆

能止汗而不知其能發汗以在表藥隊中則助表藥而解散也東垣丹溪治虛人感冒多用補中益氣加表藥

行而毒出。大便利者忌之。若幼心書云：紫草性寒，小兒脾胃實者可用。脾虛者反能作瀉。古方惟用茸，取其初得陽氣，以類觸類，用發痘瘡。今人不達此理，一藥用之，瀉者忌用。去頭鬚酒洗。

凌霄花

一名紫威

甘酸而寒，入厥陰血分。包

肝能去血中伏火，破血去瘀，主產乳餘

疾崩帶癥瘕腸結

便不大

血閉淋瀝風痒

血熱生風之症，女科多用，孕婦忌之。

云養胎經疏云：破血之藥非所宜也。○

肺癰有用之為君藥者。凌霄花為末，和密陀僧唾調敷酒釀甚驗。

藤生花開玉瓣黃赤有

點不可近鼻聞傷腦

即同此意

大羌活湯

古

治兩感傷寒

內經曰：傷寒一日太陽受之，二日陽明受之，三日少陽受之，四日太陰受之，五日少陰受之，六日厥陰受之。厥陰脈循陰器，絡于肝，故煩滿而囊縮。兩感者，謂一日則太陽與少陰俱病，有頭痛項強而又口乾煩渴也。二日則陽明與太陰俱病，有身熱譫語而又腹滿不欲食也。三日則少陽與厥陰俱病，有脇痛耳聾而又囊縮厥逆也。此陰陽表裏俱病，欲汗之則有裏症，欲下之則有表症，故內經仲景皆云：必死。吳鶴臯曰：易老製此方，意謂傳經者皆為陽邪，一于升陽散熱，滋養陰藏，則感之淺者尚或可平也。

羌活 獨活 防風 細辛 防己 黃芩 黃連

大小薊 甘温大明曰凉皆能破血下氣行而

帶補治吐衄腸癰女子赤白沃安胎凉血

功之小薊力微能破瘀生新保精養血退

熱補虛不能如大薊之消癰腫丹溪曰小薊治

下焦結熱血淋本事方一人冷氣入陰囊腫滿疼痛煎大薊汁服立瘥

兩薊相似花如髻大薊莖高而葉皺小

薊莖低而葉不皺皆用根

三七一名山漆甘苦微温散血定痛治吐血

衄血血痢血崩目赤癰腫醋磨塗即散已破者為末

之參為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二錢則血不衝心杖後

蒼朮 白朮 甘草炙三錢 知母 川芎 生地黄一兩

每服五錢熱飲

此陰陽兩解之藥也氣薄則發泄故用羌獨蒼防芎細

祛風發表升散傳經之邪寒能勝熱故用芩連知母生

地防己清熱利濕滋培受傷之陰又用白朮甘草以固

中州而和表裏之氣升不至峻寒不至凝間能回九死

于一生也仲景書兩感無治法又云兩感病俱作治有先後如表症急當先救表裏症急者當先救

裏李樾曰表裏俱急者大羌活湯陽症體痛而不利者為表急先以葛根麻黃解表後以調味承氣攻裏陰

症身痛而下利不止者為裏急先用四逆救裏後以桂枝救表陰陽未分者陶氏冲和湯探之古法一日太陽

少陰五苓散主之頭痛加羌活防風口渴加黃芩知母二日陽明太陰大柴胡湯三日少陽厥陰危其氣

敷之去瘀消腫易愈。大抵陽明厥陰血分之藥。故治血病。此藥近

時始出。軍中特之。從廣西山洞來者。略

似白芨。地黄有節。味微甘。頗似人參。以

末摻猪血中。血化為水者。真近出一種葉似菊艾

而勁厚。而岐尖莖有赤稜。夏秋開黃花。蓋如金絲盤紐可愛。而氣不香。根大如

牛蒡。味甘極易繁衍。云是三七治金瘡折傷。血病甚效。與南中來者不同。

地榆 苦酸微寒。性沉而澇。本草未嘗言澇。然能收汗

止血。皆酸斂之功也。入下焦。除血熱。治吐血。崩中

血虛。皆斂之功也。入下焦。除血熱。治吐血。崩中

血虛。皆斂之功也。入下焦。除血熱。治吐血。崩中

加川芎。柴胡。救之。劉宗厚曰。傷有兼風兼濕。不同表裏。俱實俱虛之異。大抵俱虛為多。脉從陽者可治。從陰者

難治。

桂枝羌活湯機要 治瘧疾發在處暑以前。頭項痛。脉浮。有

汗惡風。

桂枝 羌活 防風 甘草等分 每服五錢。迎其發而

服之。如吐。加半夏。麩。無汗。桂枝。易麻黃。名麻黃防風湯。

按二湯機要以之治瘧。實發表通用之劑。

此足太陽藥也。瘧分六經。故倣仲景傷寒例。以防風羌

活散太陽之邪。而以桂枝麻黃分主。有汗無汗也。朱丹溪曰

凡治瘧。無汗。要有汗。散邪為主。帶補。有汗。要無汗。扶正為主。帶散。河間曰。瘧發寒熱大作。此太陽陽明合病。汗

寇宗奭曰虛寒瀉痢及初起者忌用似柳根外黑裏紅取

上截炒黑用稍反行血得髮良惡麥冬

蒲黃 甘平厥陰血分藥肝心包生用性滑

行血消瘀通經脉利小便祛心腹膀胱

寒熱同五靈脂治心腹瘵撲打損傷瘡

癰諸腫一婦舌脹滿口以蒲黃頻搽此

用蒲黃乾薑末等分搽之愈時珍曰觀

此則蒲黃之涼血活血可知矣蓋舌為

心苗心包相火乃其臣使炒黑性瀋止

得乾薑是陰陽相濟也一切血崩帶泄精香蒲花中蓋屑湯成入藥

出不止知為熱也陽盛陰虛之症不治必傳入陰經桂枝芍藥湯主之桂枝三錢芍藥黃耆知母石膏各一兩如寒熱轉大者桂枝黃芩湯和之小柴胡加桂枝知母石膏外邪已罷內邪未已大柴胡大承氣等下之

卷栢

生用辛平。破血通經。治癥瘕淋結。

炙用辛温。止血。治腸風脫肛。生石上。

拳攣如鷄足。俗呼萬年松。凡使鹽水煮。

半日。井水煮半日。焙用。

蘭茹

辛寒。有小毒。蝕惡肉。排膿血。殺疥。

蟲除熱痺。破癥瘕。內經同烏鰂骨。治婦人血枯。根。

如萊服皮黃肉白。葉長微濶。折之有汁。

結實如豆。一顆三粒。甘草為使。

菴蘭子

辛苦微寒

別錄微温

入肝經血分行

醫方集解卷二

水散血散中有補治陽痿經澁腰膝骨

節重痛產後血氣作痛閃挫折傷

撲打方多

用能制蛇

見之則爛

葉似菊而薄莖似艾

而粗苳蕒爲使

鬱金

辛苦氣寒純陰之品其性輕揚上

行入心及包絡兼入肺經涼心熱散肝

鬱下氣破血

行滯氣亦不損正氣破瘀血亦能生新血

治吐

衄尿血婦人經脉逆行

經不下行上爲吐衄諸症用鬱

金末加韭汁薑汁童便服其血自清痰中帶血者加竹瀝血氣諸痛

涌吐之劑

邪在表宜汗在上焦宜吐在中下宜下此汗吐下三法也若邪在上焦而反下之則

逆其性矣經曰其高者因而越之又曰在上者涌之是也先賢用此法者最多今人惟知汗下而吐法絕

置不用遇當吐者而不行涌越使邪氣壅結而不散輕病致重重病致死者多矣○朱丹溪曰吐中就有

發散之義張子和曰諸汗法古方多用之惟以吐發汗者世罕知之故子嘗曰吐法兼汗以此夫

瓜蒂散

景治卒中痰迷涎潮壅盛顛狂煩亂人事昏沉

五癰痰壅及火氣上衝喉不得息食填太陰欲吐不出

痰壅上膈火氣上衝食傷寒如桂枝症頭不痛項不强

寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝喉不得息者胸有寒也當

吐之汗出惡風頭痛項强爲桂枝症具爲邪在表今無頭痛項强而脉微浮胸痛鞭則不在表而未入裏

產後敗血攻心顛狂失心。顛多喜笑尚知畏懼症屬

不足狂多忿怒人莫能制症屬有餘此

病多因驚憂痰血塞于心竅所致鬱金

七兩白礬三兩米糊丸服名白金丸

鬱金入心散惡血白礬化頑痰故也

毒入心鬱金一兩甘草二錢半煮乾焙研末冰片五分每用一錢加猪

血五七滴新汲水下治斑痘始下蠱毒

有白泡忽搖入腹紫黑無膿

同升麻服

不吐則下

出川廣體銳圓如蟬肚外黃

內色鮮微香味苦帶甘者真市人多以薑黃偽之

赤

薑黃 苦辛 本草大寒藏器大明曰熱 色黃入脾兼入

肝經理血中之氣下氣破血除風消腫

功力烈于鬱金治氣脹血積產後敗血

為邪在胸中胸中亦治諸黃急黃卒然發黃心滿氣喘命在須臾曰急黃或

服此散或擦鼻或加丁香

甜瓜蒂炒黃赤小豆 為末熟水或酸漿水調下量人虛

實服之吐時須令閉目緊束肚皮吐不止者葱白湯解

之良久不出者含砂糖一塊即吐諸亡血虛家老人產

婦血虛脉微者俱不可服非尺脉絕者不宜便服此恐損胃氣若止胸中窒塞悶亂

以物探之得吐即止如頭額兩太陽痛者令病人噙

探不出方以此湯吐之

水一口以此散一字吹入鼻中出黃水即愈

此足太陽陽明藥也胸中痰食與虛煩者不同越以瓜

蒂之苦涌以赤小豆之酸吐去上焦有形之物則木得

攻心通月經療撲損片子者能入手臂

治風寒濕痺血虛臂痛者勿用時珍曰入臂治痛其兼理血中之

氣可

知

出川廣

陳藏器曰鬱金苦寒色赤薑黃辛温色黃逆味

苦色青三物不同所用各別經疏云薑

黃主治介乎三稜鬱金之間時珍曰薑

黃鬱金莖逆形狀功用大略相近但鬱

金入心專治血薑黃入脾兼治血中之

氣逆入肝治氣中之血稍為不同今時

以扁如乾薑者為片子薑黃圓如蟬腹

者為蟬肚鬱金並可染色莖

形雖似鬱金而色不黃也

莖逆

述音

辛苦氣温入肝經血分破氣中

之血能通肝消痰通經開胃化食解毒

止痛治心腹諸痛冷氣吐酸奔豚疝癖

舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱者故用參蘆十劑

曰燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是也赤豆瓜蒂並能

行水濕痰涎頭痛胸滿寒熱脉緊不大者並宜此散吐

之或問何謂木鬱曰厥陰少陽屬木于令為春乃人身

生發之氣也食者陰物也脾胃者坤土也飲食填塞太

陰則土盛而反侮木生氣不得上升而木鬱矣吐去

上焦有形之物則木得條達而遂其升生之性矣

本方除赤豆名獨聖散治太陽中暈音謁暑也身重痛而脉

微弱夏月傷冷水水漬皮膚中鬱遏其外出之陽反中

之水入內故身熱重痛以瓜蒂搗去胸中之水則皮中

自行本方除赤豆加防風藜蘆名三聖散子和本方除赤

豆加鬱金韭汁鵝翎探吐亦名三聖散治中風風癇痰

厥頭痛本方除赤豆加全蝎五分吐風痰本方加淡豉

治傷寒煩悶瓜蒂厄豉皆吐劑要知瓜蒂吐痰食宿寒

厄豉吐虛煩客熱如未經汗下邪鬱胸膈

酒醋磨服。疝音賢小腹痛。疝癖多見于

男子。癥瘕多見于婦人。我蔬香烈行氣

通竅同三稜用。治積聚諸氣良。按五積

心積曰伏梁。起臍上至心下。肝積曰肥

氣。在左脇肺積曰息賁。在右脇脾積曰

痞氣。在胃脘右側。腎積曰奔豚。在小腹

上至心下。治之不宜常用下藥。恐損真

氣。宜于破血行氣藥中。加補脾胃藥。氣

旺。方能磨積。正旺則邪自消也。經曰大

積大聚。其可犯也。衰其大半而止。過者

死。東垣五積方用三稜莪逆皆兼人參

贊助成功。按治積諸藥。神麩麥芽化穀

食。菜煎化麵食。磁砂阿魏。山查化肉食

紫蘇化魚蟹毒。葛花枳椇消酒積。麝香

而痞滿者謂之實。宜瓜蒂散。此重劑也。已經汗吐下邪

乘虛客胸中。而懊懣者為虛煩。宜梔豉湯。此輕劑也。

丹溪用瓜蒂。梔子苦參。藜蘆等劑。累吐許白雲先

生不透。後以附子尖和漿水與之。始得大吐也。

參蘆散 治虛弱人痰涎壅盛

人參蘆 為末水調下一二錢。或加竹瀝和服。竹瀝

此手太陰足太陽藥也。經曰在上者因而越之。痰涎上

壅法當涌之。病人虛羸故以參蘆代藜蘆。瓜蒂宜猶帶

補不致耗傷元氣也。朱丹溪曰人參補陽中之陰。蘆反

瀉太陰之陽。亦猶麻黃根節不同。

梔子豉湯 治傷寒汗吐下後虛煩不眠劇者反覆顛

倒心下懊懣及大下後身熱不退心下結痛或痰在膈

中。汗吐下後正氣不足邪氣乘虛結于胸中。故煩熱懊

懣煩熱者熱而煩擾懊懣者懊懣悶也。晝動為陽

接續大小七香丸集香丸諸湯散中多用之

根如生薑我生

熟搗之入氣或醋磨酒或者煮熟用入血

荆三稜 苦平色白屬金皮黑肉白入肝經血

分破血中之氣亦通肝經聚血兼入脾經散一

切血瘀氣結瘡硬食停老塊堅積乃堅者削

之從血藥則治血從氣藥則治氣須輔

以健脾補氣藥良昔有人患癥癖死遺

言開腹取之得病塊如石文理五色削

成刀柄因刈三稜柄消成水乃知此藥可療癥癖消腫止痛通乳墮胎功近香附而力峻虛者慎用色黃體重若鯽魚而

夜臥王陰陽熱未散陰氣未復故不得眠身熱去而心結痛者熱盡入裏則為結胸熱不去而結痛者客熱散漫為虛煩熱仍在表故當越之

梔子十四枚淡豉四合服令微吐仲景曰病人蕪微溘者不可與服

此足太陽陽明藥也煩為熱勝梔子苦寒色赤入心故

以為君淡豉苦能發熱腐能勝焦腎氣為腐心氣為焦豉蒸晉而成故為腐

助梔子以吐虛煩故以為臣酸苦涌泄為陰也此吐無

形之虛煩者膈有實邪當用瓜蒂散王海藏曰煩氣也躁出于腎故用梔子治肺煩香豉治腎躁亦用作吐藥

以邪在上焦吐之則邪散經所謂在上者因而越之也

或問煩躁皆心為之何謂煩出于肺躁出于腎曰熱則煩熱甚則躁煩為陽躁為陰大抵皆心火為病火旺則

金躁而水虧惟火獨在故肺腎合而為煩躁按大便爽者為吐症大便秘者為下症若大便微唐者不可服以

小者良。醋浸炒。或麪裹煨。

白茅根 甘寒入手少陰。心足太陰陽明。

脾補中益氣除伏熱消瘀血利小便解

酒毒治吐衄諸血心肝火旺逼血上行則吐血肺火盛則衄

血茅根甘和血寒涼血引火下降故治之撲損瘀血搗汁服名茅花湯亦治鼻

衄產血閉寒熱血瘀則閉閉則寒熱作矣淋瀝崩中

血熱傷寒噦逆即呃逆說文曰噦氣悟也東垣作乾嘔之甚者

未是肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫清火行水

時珍曰良藥也。世人以微而忽之。惟事苦寒之劑傷冲和之氣。烏足知此哉。

茅鍼潰癰瘡酒者服一針潰一孔二針潰二孔

裏虛寒在下。雖煩非蘊熱也。若宿食而煩躁者。梔子大黃湯主之。

本方加甘草名梔子甘草豉湯仲景治前症兼少氣者以苦

補本方加生薑名梔子生薑豉湯仲景治前症兼嘔者以辛

散本方除淡豉加乾薑名梔子乾薑湯仲景治傷寒誤下

身熱不去微煩者梔子以解熱煩乾薑以溫誤下本方除淡豉加厚朴

枳實名梔子厚朴湯仲景治傷寒下後心煩腹滿梔子涌

朴泄腹滿亦表裏兩解之法。本方加大黃枳實名梔子大黃湯仲景治

酒疸發黃心下懊懣或熱痛亦治傷寒食復輕則消導重則吐下

本方加枳實名枳實梔子豉湯仲景治傷寒勞復傷寒新

未平餘熱未盡作勞動病者為勞復傷食者為食復本方加薤白名豉薤湯張文

蘆根

甘益胃寒降火治嘔噦反胃

胃熱火升

則嘔逆食不下。金匱方蘆根煎服。

消渴客熱傷寒內熱

止小便數

肺為水之上源。脾氣散精上歸于肺。始能通調水道。下輸

膀胱。腎為水藏。而主二便。三經有熱。則小便數。甚至不能少忍。火性急速。故也。

蘆中空。故入心肺。情上焦熱。熱解。則解肺之氣。化行。而小便復其常道矣。

魚鱗河豚毒

取逆水肥厚者去鬚節用

芋根

甘寒而滑補陰破瘀解熱潤燥治

天行熱疾大渴大狂胎動下血諸淋血

淋搗貼赤遊丹毒癰疽發背金瘡傷折

止而鷓鴣魚骨梗搗如龍眼雞骨雞湯下魚骨魚湯下汁能

治傷寒下利如爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸熱症

危鼓苦寒

能升能散。薤白辛溫。能開胸痺。及大腸氣滯。

本方加犀角大青名犀角大青

湯治斑毒熱甚頭痛

稀涎散

治中風暴仆痰涎壅盛氣閉不通先開其關令

微吐稀涎續進他藥

不可令大吐。醒後不可大投藥餌。緩緩調治。過恐傷人。

亦治

喉痺不能進食

皂角

四挺去皮弦炙

白礬

一兩

為末。溫水調下五分。或加藜蘆

藜蘆能吐風痰。善通頂令人嚏。

此足太陰厥陰藥也。吳鶴臯曰。清陽在上。濁陰在下。天

冠地履無暴仆也。若濁邪逆上。則清陽失位而倒置矣。

化血行水。芎皮與產婦作枕。止血運安。

腹上止產後腹痛。散痰之功。溫芋汁療消渴。

薔薇根 苦澁而冷。入胃大腸經。除風熱。

濕熱生肌殺蟲。治泄痢消渴。牙痛口糜。

煎汁遺尿好眠。癰疽瘡癬。花有黃白。

數色。以黃心白色粉紅者入藥。子名營。

實酸溫。主治略同。于金曰。薔薇根角嵩。口瘡之神藥。角嵩所

在多有。開淡紅紫。花角微彎。長二寸許。辛苦有小毒。治惡瘡有蟲。及口齒瘡。

芭蕉根 味甘大寒。治天行熱狂煩悶消。

渴產後血脹。並搗汁服。塗癰腫結毒。為末油調傳霜

故令人暴仆。所以痰涎壅塞者。風盛氣湧使然也。經曰。

病發于不足。標而本之。先治其標。後治其本。故不與疎。

風補虛而先吐其痰涎。白礬酸苦能湧泄。鹹能軟頑痰。

故以為君。皂角辛能通竅。礬能去垢。專制風木。故以為。

使固奪門之兵也。師曰。凡吐中風之痰。使咽喉疎通。能。

進湯藥。便止。若盡攻其痰。則無液以養筋。令人孿急偏。

枯。此其禁也。按痰不可盡攻。不獨中風也。朱丹溪曰。胃氣亦賴痰以養。不可盡攻。攻盡則虛而愈。

劇

張子和加藜蘆常山甘草名常山散。吐瘧痰。甘草合常山必吐。

本方加雄黃藜蘆名如聖散。為末搗鼻。治纏喉急痺牙。

後者佳。

大黃 大苦大寒。入足太陰。脾手足陽明。

厥陰。大腸胃血分。其性浮而不沉。其用

走而不守。若酒浸亦能引至至高之分。

仲景太陽門調胃承氣湯。大黃註曰酒

浸。陽明門大承氣湯。大黃註曰酒洗。少

陽陽明小承氣湯。大黃不用酒製。皆有

分別。東垣曰邪氣在上。非酒不至。若用

生者。則遺至高之邪。熱病愈後。或

目赤喉痺頭腫膈上熱疾生也。用以

蕩滌腸胃下燥結而除痰熱。治傷寒時

疾發熱。譫語。大腸有燥糞。故譫語宜下之。譫音占。溫熱證

瘡下痢赤白。腹痛裏急。黃疸水腫癥瘕。

關緊閉

乾霍亂吐方

因

治乾霍亂欲吐不得吐欲瀉不得瀉腹

中大痛者

霍亂揮霍撩亂也。外有所感。內有所傷。陰陽

在上焦則吐。在下焦則瀉。在中焦則吐瀉交作。此濕霍

亂症。輕易治。若不能吐利。邪不得出。壅遏正氣。關格陰

陽。其死甚速。俗名攪腸沙。切勿與穀食。即米湯下咽亦死。

燒鹽

熱童便

三飲而三吐之

此足太陰陽明藥也。吐瀉不得。邪結中焦。鹹能軟堅。可

破頑痰宿食。炒之則苦。故能涌吐。童便本人身下降之

氣引火下行。乃其舊路。味又鹹寒。故降火甚速。此由脾

而不得發。以致火熱。鹽涌于上。溺泄于下。則中通矣。方

內擾。陰陽不交而然。

積聚 積久成形謂之積屬陰聚散無常
謂之聚屬陽積多是血或食或痰

聚多 留飲宿食心腹痞滿二便不通
是氣 皆

鬱奪 吐血衄血血閉血枯損傷積血一

切實熱血中伏火行水除痰蝕膿消腫

能推陳致新然傷元氣而耗陰血 下多

若病在氣分胃虛血弱人禁用 病在氣

之是謂誅伐無過東垣曰能推陳致新
如定禍亂以致太平所以有將軍之號

時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄
血者用大黃黃連黃芩乃瀉心包肝脾

胃四經血中之伏火也又治心下痞滿
按之軟者用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾

胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下
之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之

極簡易而有回生之功不可忽視 準繩曰鹽調童便非
獨用以降陰之不通

也陰既不通血亦不
行兼用行血藥也

本方單用燒鹽熟水調飲以指探吐名燒鹽探吐法治

傷食痛連胸膈痞悶不通手足逆冷尺脉全無 食填太

肝胆之氣不得上升兩實相搏故痛連胸膈陽氣不舒
故手足逆冷下焦膈絕故尺脉不至鹹潤下而軟堅能

破積聚又能宣滯使不化之食從上而出則塞者通矣
亦木鬱達之也昂按此即中食之症有忽然厥逆口不

能言肢不能舉者名曰食厥若作中風中氣治之死可
立待宜先以鹽吐之再行消食導氣之藥經曰上部有

脉下部無脉其人當吐不吐者死或曰食填太陰胸中
痞亂兩尺脉當用事今反尺脉不見其理安在曰獨陽

不生獨陰不長天之用在于地下則萬物生長地之用
在于天上則萬物收藏此乃天地交而萬物通也故陽

火之根本于地下陰水之源本于天上五藏主有形之
物物者陰也陰者水也食塞于上是絕五藏之源源絕

上脫當心。故曰瀉心。經曰。太陰所至爲痞滿。又曰。濁氣在上。則生脹。脹是已病發于陽而反下之。則結胸。乃熱邪陷入血分。亦在上脫。故大陷胸湯。丸皆用大黃。亦瀉脾胃血分之邪。而降其濁氣也。若結胸在氣分。只用小陷胸湯。痞滿在氣分。只用半夏瀉心湯。或問心氣不足而吐衄。何以不補心而反瀉心。丹溪曰。少陰不足。亢陽無輔。致陰血妄行。故用大黃瀉其亢甚之火。又心本不足。肺肝各受火邪而病作。故用黃芩救肺。黃連救肝。肺者陰之主。肝者心之母。血之合也。肺肝火退。則血歸經。而自安矣。寇宗奭曰。以苦泄其熱。就以苦補其心。蓋一舉而兩得之。李士材曰。古人用大黃治虛勞吐血。意甚深微。蓋濁陰不降。則清陽不升。瘀血不去。則新血不生也。

川產錦紋者良。有

酒浸酒蒸生熟之不同。生用更峻。黃芩

則水不下流。兩尺之絕。此其理也。千金用此法。三飲三吐。通治霍亂。盡毒宿食腹痛冷氣鬼氣。且曰。此法大勝用藥。凡有此疾。宜先用之。

為使。欲取通利者，不得驟進穀食。火黃得穀食，便不能通利耳。夷堅志湯

火傷者，搗生大黃醋調敷，止痛無癢。

葛 苦入心。寒勝熱。瀉中焦實火。除脾

家濕熱。治癖痢腹痛。便血曰澼。寒痛忌用。凡腹痛，有寒熱

虛實，食積瘀血，痰濕之不同。寒宜溫，熱宜清，虛宜補，實宜下。食宜消導，瘀血宜

行散。痰濕宜化痰利濕。痛時手不可按者為實痛，按之痛止者為虛痛。寒

熱往來。邪在少陽。黃疸。五淋。血閉。實熱在血分。氣

逆癰疽瘡瘍及諸失血消痰。丹溪曰：黃

其降火也。按痰因利水，解渴安胎。胎孕

火動，當先降火。養陰退陽。補膀胱水。酒炒

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '養陰', '補膀胱', and '酒炒']

則上行瀉肺火利胸中氣肺主氣熱傷氣瀉熱所以

保肺治上焦之風熱濕熱丹溪曰黃芩上中二焦藥火

嗽喉腥五臭肺為腥目赤腫痛過服損胃血

虛寒中者禁用得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹

痛得桑皮瀉肺火得白芍安胎之聖藥

時珍曰仲景治少陽症小柴胡湯太陽

少陽合病下利黃芩湯少陽症下後心

滿瀉心湯並用之蓋黃芩苦寒入心瀉

熱除脾家濕熱使胃火不流入肺不致

刑金即所以保肺也肺虛不宜者苦寒

傷土損其母也少陽症雖在半表半裏

而胸膈痞滿實兼心肺上焦之邪心煩

喜嘔默默不欲食又兼脾胃中焦之症

故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦

少陽藥也揚士瀛曰柴胡退熱不及黃

芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之標

醫方集解卷二

攻裏之劑邪在表宜汗邪入裏宜下人之一身元氣週流不能容纖芥之邪稍有滯碍則壅塞

經絡隔遏陰陽而為病矣或寒或熱或氣或血或痰

或食為症不一輕則消而導之重必攻而下之使垢

痰盡去而後正氣可復譬之寇盜不勦境內終不得

安平也然攻下之劑須適事為宜如邪盛而劑輕則

邪不服邪輕而劑重則傷元氣不可

不審也其攻而不峻者別見消導門

大承氣湯仲景治傷寒陽明府症陽邪入裏胃實不大便

發熱譫語自汗出不惡寒痞滿燥實既全見雜病三焦

大熱脉沉實者陽明外症身熱汗出不惡寒反惡熱是也此為在經仍當汗散若熱邪已入胃

府痞滿燥實堅全見者為當下實則譫語亂言無次也

虛則鄭聲一語頻言也陽明多血多氣法多自汗過汗

亡液無水以制火胃有燥糞結而不下故妄見妄言也燥糞在大腸不在于胃傷寒傳胃不傳大腸然治病必

也。黃芩乃寒能勝熱折火之本也。東垣治肺熱身如火燎煩燥引飲而晝甚者宜一味黃芩湯。以瀉肺經氣分之火。黃芩一兩煎服。本事方用治崩中暴下。

黃明者良中虛者名枯芩。即片芩瀉肺

火清肌表之熱。內實者名條芩。即子芩。

瀉大腸火。補膀胱水。上行酒炒。瀉肝胆

火。猪胆汁炒。山茱龍骨為使。畏丹皮丹

黃連。大苦大寒。入心瀉火。王海藏曰。瀉心實瀉脾也。

實則瀉。鎮肝涼血。凡治血。防風為上部

其子。使地榆為燥濕開鬱解渴。單用能除煩

下部之使。益肝胆厚腸胃消心痰。能去心止盜汗。竅惡血

求其本。且胃與大腸同為陽明燥金也。經曰。何緣得陽明病。曰。太陽病。若不汗。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。胃實大便難也。又曰。太陽初病發其汗。先出不徹。因轉屬陽明。陽明症。能食為中風。風陽邪能消穀。不能食為中寒。寒陰邪不能消穀。以此為辨。胸悶不食為痞胸。腹脹為滿。大便枯少為燥。腹滿痛不大便為實。按亦治陽明剛瘕。此太陽兼陽明症。其症之鞭硬為堅。胸滿口噤臥不着席。攣足齟齒而無汗。謂之剛瘕。宜下之者。以陽明主潤。宗筋風寒濕熱傷陽明胃。津液不行。筋失所養。故以此湯下濕熱行津液。喻嘉言曰。傷寒腹滿可下。胸滿不可下。謂熱邪尚在表也。此症入裏之熱極深極重。湯熱既極。陰血立至消亡。小小下之。尚不能勝。必大下之。以承領其一線之陰。陰氣不盡為陽所劫。因而得生者矣。既有下多亡陰之大戒。復有急下救陰之活法。學深造端于斯矣。○胃為水穀之海。四旁有病皆傳入胃。已入胃府。則不復傳他經。如太陽傳入胃。則不更轉陽。陽傳入胃。則不傳少陽。少陽傳入胃。則不傳三陰。經明居中土也。萬物所歸無所復傳。

涼心治腸澼瀉痢便血曰澼有藏連加濕熱鬱而為痢黃連治痢

之但得下咽便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼以解表

次用苦寒以攻裏機要云後重宜下腹痛宜和身重宜除濕脉弦宜去風風邪

內結宜汗身冷自汗宜溫膿血稠粘宜重劑以竭之下痢赤屬血分白屬氣分

戴氏曰俗謂赤熱白寒者非也通作濕熱處治但有新痞滿燥濕開鬱仲景治

久虛實之分九種心下痞五等瀉心湯腹痛清

皆用之熱心痛伏梁積目痛皆傷人乳浸點或合歸芍等

分煎湯熱洗散熱活血癰疽瘡疥諸痛

皆屬心火酒毒胎毒小兒初生合甘草為末蜜調令嚙之明目

傳信方羊肝一具黃連一兩搗定驚鎮肝丸

凡目疾皆治名羊肝丸

大黃四兩酒洗王海藏曰邪氣居高非酒不到大黃若用生者則遺高分之邪熱病愈後變生目赤喉痺

頭腫膈上芒硝三合厚朴半斤枳實五枚先煎枳實將熟內

大黃煮二三沸傾碗內和芒硝服得利則止陶節菴曰去實熱用

大黃無枳實不通溫經用附子無乾薑不熱發表用麻黃無葱白不發吐痰用瓜蒂無淡豉不湧竹瀝無薑汁

不能行經絡蜜導無皂莢不能通秘結

此正陽陽明藥也東垣曰太陽陽明藥熱淫于內治以鹹寒氣堅

者以鹹軟之熱盛者以寒消之故用芒硝之鹹寒以潤燥軟堅大黃之苦寒以瀉熱去瘀下燥結泄胃強枳實

厚朴之苦降瀉痞滿實滿經所謂土鬱奪之也陽明屬土大黃

厚朴之芒硝治大燥大堅二味治有形血藥然非大實

治大實芒硝治大燥大堅二味治有形血藥然非大實

厚朴治大滿枳實治痞二味治無形氣藥

止汗解毒除疳。同猪肚殺虻。虻得苦虛

寒為病者禁用。久服黃連苦參反熱從

味苦必燥燥則熱矣且苦寒沉陰肅殺

伐傷生和之氣也韓愈曰黃連與肉桂

同行能交心腎于頃刻時珍曰治痢用

香連丸薑連丸用黃連乾薑薑黃散用

黃連生薑左金丸用黃連吳茱萸治口

瘡用黃連細辛止下血用黃連大蒜一

陰一陽寒因熱用熱因

寒用最得製方之妙

大滿不可輕投恐有寒中結胸痞氣之變。此大小陷胸

也。承順也。十劑曰通可去滯泄可去閉使塞者利而

閉者通正氣得舒故曰承氣仲景曰欲行大承氣先與

小承氣若腹中轉矢氣者有燥屎也可以大承氣攻之

若不轉矢氣者此但初鞭後澹不可攻之攻之必脹滿

不能食也又曰陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解

也可發汗宜桂枝湯陽明病脈浮無汗而喘者發汗則

愈宜麻黃湯此斷其入陽明之路仍從外解則不內攻

也又曰陽明病應發汗醫反下之此為大逆皆仲景慎

于攻下之意也喻嘉言曰陽明以胃實為正則皆下症

也陽明之邪其來路則由太陽凡陽明症見八九而太

陽症有一二未罷仍從太陽而不從陽明可汗而不可

下也其去路則趨少陽凡陽明症雖見八九而少陽症

略見一二即從少陽而不從陽明汗下兩不可用也惟

風寒之邪已離太陽未接少陽恰在陽明界內亟為攻

下則不再傳他經津液元氣兩無虧損矣庸愚無識必

待七日傳經已盡方敢議下不知太陽有十餘日不解

者若不辨經而但計日其誤下仍在太陽至陽明二三

日內即顯下症反以計日當面錯過及陽明已入少陽

心宜黃連吳茱萸中焦火薑汁炒下焦

胆汁炒上焦火酒炒亦有吞酸嘈雜等症

降火開鬱酢音醋

火鹽水或童便炒食積火黃土炒治濕

熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水

炒點眼赤人乳浸時珍曰諸法不獨為之引導蓋辛熱制其

苦寒鹹寒制其燥性用者詳之黃芩龍骨為使惡菊花

元參殭蠶白鮮皮畏欵冬牛膝忌猪肉

時珍曰方有藏連丸黃連猪肚丸豈忌肉而不忌藏府乎殺烏頭巴

豆毒黃連瀉心火佐以龍胆瀉肝胆火白芍瀉脾火石膏瀉胃火知母瀉

腎火黃柏瀉膀胱火木通瀉小腸火黃芩瀉肺火梔子佐之瀉大腸火黃連佐

之柴胡瀉肝胆火黃連佐之瀉三焦火黃芩佐之○鄭奠一曰熱鬱惡心元元

欲吐用黃連數分甚效

又以計日妄行攻下輕者重而重者死矣仲景法日數

雖多但有表症而脉浮者尤宜發汗日數雖少若有裏

症而脉沉者即宜下之○古人有治惡寒戰慄用大承

氣下燥屎而愈者此陽邪入裏熱結于裏表虛無陽故

惡寒戰慄此陽盛格陰乃熱病非寒症誤投熱藥則死

矣朱丹溪曰初下痢腹痛不可用參朮然氣虛胃虛者

可用初得之亦可用大承氣調味承氣下之者是氣病

血病然後加減用藥常治葉先生患滯下後甚逼迫正

合承氣症但氣口虛形雖實而面黃白此必平素過食

傷胃寧忍二三日辛苦遂與參朮陳芍藥十餘帖至三

日後胃氣稍完與承氣二帖而安苟不先補完胃氣之

傷而遽行承氣寧免後患乎此先補後下例之變者也

本方加甘草等分名三一承氣湯治大承氣症腹滿實

痛調胃症謔語下利小承氣症內熱不便一切傷寒雜

病畜熱內甚燥實堅脹謂合三承氣為一方也成無已

邪不服若小承氣症反用大承氣則過傷元氣而腹滿

不能食仲景所以分而治之後人以三藥合而為一云

胡黃連

苦寒。去心熱。益肝。胆。厚腸胃。治

骨蒸勞熱。五心煩熱。

心窩手三消。渴而多飲。

為上消。肺熱也。心移熱于肺。傳為鬲消。

是也多食善飢。為中消。胃熱也。瘰成為

消中是也。渴而小便數。有五痔。牝痔。牡

膏。為下消。腎熱而水虧也。五痔。痔。疥。痔。

腸痔。血痔。濕熱下流。傷血。分無。溫瘧。瀉

所施洩。則逼肛門。而為痔腫。

痢。女人胎蒸。消菓子積。為小兒驚疳。良

藥。朱二允曰。解吃烟毒。合茶服之甚效。

性味功用似黃

連。故名。出波斯國。今秦隴南海亦有之。

心黑外黃。折之塵出如烟者。真。畏惡同

黃連

通治三藥之症。乃傷寒雜病。內外一切所傷。與仲景之

方甚相違戾。失軒岐緩急之旨。使病人暗受其弊。將誰

咎。本方加柴胡。黃芩。甘草。入鐵繡水。三匙。墜熱。開結。名

六一順氣湯。節菴謂合三承氣。二一承氣。大治潮熱。自

汗發。渴。譫語。狂妄。斑黃。腹滿。便實。正陽明府病。本方加

人參。甘草。當歸。桔梗。薑棗。煎。名黃龍湯。治熱邪傳裏。胃

有燥屎。心下硬。痛。身熱。口渴。譫語。下利。純清水。有燥屎。何以又

下清水。陶節菴曰。此非內寒而利。乃日飲湯藥而下滲也。名熱結利。庸醫妄謂漏底傷寒。以熱藥止之。殺人多

矣。年老氣血虛者。去芒硝。本方去芒硝。加麻仁。杏仁。芍藥。蜜丸。名麻

仁丸。仲景治跌陽脉浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮

濇相搏。大便則難。其脾為約。跌陽胃脉也。經曰。飲食入胃。游溢精氣。上輸于脾。脾

苦參 苦燥濕寒勝熱沉陰主腎補陰益

精養肝胆安五藏 濕熱去則血氣和平而五藏自安 利

九竅生津止渴明目止淚 淚為汁熱 治温病

血痢 純下清血者風傷肝也宜散風涼血下如豆汁者濕傷脾也宜清熱

濕腸風溺赤黃疸酒毒熱生風濕生蟲

又能祛風逐水殺蟲治大風疥癩然大

苦大寒肝腎虛而無熱者勿服 張從正曰凡藥

皆毒也雖苦參甘草不可不謂之毒久服必偏勝為患經曰五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而

久天之由也王冰註曰氣增不已則藏有偏勝偏勝則藏有偏絕故令人暴死

筆談云久用苦參擦牙遂病腰痛由其

氣無精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經

並行是脾土為胃行其津液者也今胃火乘脾約束精液但輸膀胱致小便數而大便難故名脾約與此湯潤燥通腸此太陽傳入陽明之症故仲景曰太陽陽明脾

約是也按成氏釋此症謂脾弱胃強然本文但云脾約未嘗云脾弱也喻嘉言曰脾弱即當補矣何為反用大

黃朴實乎此脾土過燥使腸胃津液枯槁致中消便難使脾果弱非溼則瀉焉能反約少胃中之穀食乎陽明

症中凡宜攻下者惟恐邪未入胃大便弗鞭又恐初鞭後溼未可妄攻故先與小承氣試其轉矢氣方可攻之

皆是慮夫脾氣之弱也若脾約症在太陽即當下矣何待陽明耶朱丹溪曰此由久病大汗大下之後陰血枯

槁內火燔灼熱傷元氣又傷于脾而成肺金受火氣無所攝肺為脾子肺耗則液虧金耗則木寡于畏土欲不

傷其可得乎肺失傳送脾失轉輸故大便秘而小便數也理宜滋養陰血使火不熾而金化行木有制而脾土

運津液乃能入胃腸潤而通矣此方施之熱盛而氣實者則安若熱盛而氣血不實者勿膠柱而鼓瑟也

當下諸症 發汗不解腹滿痛者急下之脈滑而數者皆平按之心下硬者急下之

氣傷腎也。經又曰：大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉菓菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。按人參補脾，沙參補肺，紫參補肝，丹參補心，元參補腎。苦參不在五參之內，然名參者皆補。

糯米泔浸去腥氣，煮用。元參為使，惡。

貝母、兔絲子、漏蘆、反藜蘆。苦參一兩，或酒煎或醋煮。

能吐天行時毒。

知母 辛苦寒滑上清肺金而瀉火。瀉胃熱，勝

脫邪熱，腎命相火。下潤腎燥而滋陰，入二經氣。

分。黃柏入二經血分，故消痰定嗽止渴。

安胎。莫非清火之用，治傷寒煩執，勞骨蒸。

有宿食也。宜下之。脉經曰：滑為食病。仲景曰：滑則穀氣實。又曰：寸脉浮大，按之反瀉，尺中亦微而瀉，知有宿食。宜下之。傷寒六七日，目中不了了，睛不和，無表裏症，大便難，身微熱者，此為實也。急下之內經曰：諸脉皆屬于目。針經曰：熱病目不明，熱不已者，此腎水將絕，不能照物也。陽明病發熱，汗多者，急下之。汗多則亡津液，而內燥，宜急下以存津液。少陰病得之二三日，口燥咽乾者，急下之。邪入未深，便作口燥，此腎水將乾，宜急下以救欲絕之水。少陰症六七日，腹脹不大便者，急下之。此少陰邪熱入胃府也。土勝則水乾，宜急下以救腎水。少陰病自利清水，色純青，心中必痛，口中燥者，急下之。青為肝色，肝邪乘腎，故下利。陽邪上攻，故口燥。此亦少陰傳入陽明府症也。厥陰症舌卷囊縮，宜急下之。此症仲景無治法，按舌卷囊縮，有寒極而縮者，宜附子四逆，加吳茱萸蕪湯，並灸關元氣海，葱熨等法。又有陽明之熱，陷入厥陰，經陽明主潤宗筋，宗筋為熱所攻，弗榮而急，引舌與畢丸，故舌卷囊縮。此為熱極，當瀉陽以救陰。以上皆大承氣症也。張兼善曰：胃為水穀之海，四旁有病，皆能傳入胃土，燥則腎水乾，故陽明與少陰皆。有急下之條。症雖不同，其入府之理則一。故皆用大

退有汗燥渴虛煩久瘧下痢治嗽者清肺火也治

渴者清胃火也退骨蒸者瀉腎火也利二便消浮腫利小便

腫消東垣曰熱在上焦氣分便閉而渴乃肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源

宜用淡滲之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便閉而不渴乃真水不

足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃柏知母大苦寒之藥滋腎與膀胱之陰

而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升

又有隔二隔三之治如肺不燥但膀胱熱宜瀉膀胱此正治如因肺熱不能生

水則清肺此隔二之治如因脾濕不運而精不上升故肺不能生水則燥胃健

脾此隔三之治瀉膀胱黃柏知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二朮之類昂

按凡病皆有隔二隔三之治不獨便閉也然苦寒傷胃而滑

承氣有病循衣摸床兩手撮空者此胃熱也錢仲陽小兒直訣云此肝熱也亦承氣湯主之婁全善曰嘗治循衣摸床數人皆用大補氣血之劑惟一人兼振脈脈代遂于補劑中加桂二分亦振止脈和而愈按謔語亦有因氣虛陽脫而然者皆當用參附補劑

忌下諸證太陽病外症未解不可下 脈浮大不可下 嘔多雖有陽明症不可下 惡寒不可下 惡寒為邪在表 不能食攻其熱必噦胃中虛冷故也 陽明病應發汗反下之此為大逆 太陽陽明合病喘而胸滿不可下 宜麻黃湯肺氣清則胃邪自散 少陽病陽虛尺脈弱 瀝者不可下 脈數不可下 數為血虛為熱下之則熱邪入裏血虛為亡陰 惡水者不可下 下之則裏冷不嗜食完穀出 頭痛目黃者不可下 虛家不可下 陽微不可下 下之痞鞭 諸四逆厥者不可下

小承氣湯仲景一名三物厚朴湯 治傷寒陽明症謔語便鞭潮熱

而喘及雜病上焦痞滿不通

腸多服令人瀉。李士材曰苦寒肅殺非長養萬物者也世以其

滋陰施之虛損之人如水益深矣特表出以為戒。得酒良上

行酒浸下行鹽水拌忌鐵

龍膽草 大苦大寒沉陰下行益肝膽而

瀉火。相火寄于肝脾有瀉無補瀉其邪熱即所以補之也。兼入膀

胱腎經除下焦之濕熱與防己同功酒

浸亦能外行上行治骨間寒熱。腎主骨驚

癩邪氣。肝經風火時氣溫熱熱痢疸黃寒濕

脚氣。足傷寒濕則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜風又有攣

縮枯細痛而不腫者名因喉風熱赤睛乾脚氣宜養血潤燥

大黃四兩厚朴二兩枳實三枚

此少陽陽明藥也邪在上焦則滿在中焦則脹胃實則

潮熱。猶潮水之潮其來有時陽明燥金旺于申酉故日晡潮熱傷寒潮熱為胃實無虛症。陽邪乘

心則狂。故譫語胃熱于肺則喘故以枳朴去上焦之痞滿

以大黃瀉胃中之實熱此痞滿燥實堅未全者故除芒

硝欲其無傷下焦真陰也。大承氣通治三焦小承氣不犯下焦調胃承氣不犯上焦

按陽明症有正陽陽明有太陽陽明有少陽陽明自陽

明經傳入胃府不惡寒服滿便鞭者宜大承氣下之若

汗多發熱微惡寒者為外未解其熱不潮未可與承氣

湯若腹大滿不通者可與小承氣微和胃氣勿令大泄下謂陽明有在經者未全入府尤宜審慎陽明少陽病多由太陽傳入成無己曰自太陽少陽傳入者眾所共知自三陰傳入者鮮或能識三陰有急下之症多矣豈非仲景之微旨歟經曰傷寒脈浮緩手足溫者繫在太

努肉 瀉肝胆火能明目。元素曰：柴胡為主，龍胆為使。目疾要藥。昂按：若目

疾初起，宜發散。忌用寒涼。**癰疽瘡疥過服損胃** 甘

草水浸一宿，暴用小豆貫眾為使，惡地黃

青黛 鹹寒色青，瀉肝散五藏鬱火，解中

下焦蓄蘊風熱 衍義曰：一婦患臍腹二

出黃汁，二便澀，用鰻鱧松脂黃丹之類

塗之，熱痛愈甚，其婦嗜酒喜食魚蝦，發

風之物，乃用馬齒莧四兩，研爛入青黛

一兩，和塗，熱痛皆去，仍服八正散而愈。

此中下焦蓄蘊風熱毒氣，若不出，當作腸風內痔，婦不能禁酒物，果仍發痔。**治傷寒發斑吐咯痢血** 陰虛火炎者忌用，合杏仁研置柿餅中煨食，名**小兒驚癇疳熱丹** 熱傳聖餅子治咯血。

陰當發黃，若小便利者，不能發黃。至七八日大便硬者，陽明病也。程郊倩曰：此疴，謂之太陰陽明陽明為病，本之胃實，不特三陽受邪，能轉屬陽明，三陰亦能轉屬陽明。推之，少陰、三、大、承氣厥陰、小、承氣，何非轉屬陽明之病哉。

金匱用本方治支飲胸滿 更名厚朴大黃湯。本方加羌

活名三化湯 機治中風邪氣作實，二便不通。三化者，使

復其傳化之常也。加羌活者，病本于風也。然中風多虛氣上逆，無用承氣之理，非堅實之體不可輕投。

調胃承氣湯 仲景治傷寒陽明症，不惡寒，反惡熱，口渴便

閉，譫語，腹滿中焦燥實，及傷寒吐後腹脹滿者。邪在表

汗出而惡寒，邪已入裏，則表症罷，故不惡寒。身熱汗出而反惡熱也。汗多亡津，熱又入裏，故口渴便閉。無水以

制火，內有燥屎，故妄見妄言而譫語。吐後不解，腹脹滿者，熱入胃也。然滿而不痛，不宜急下。少與調胃和之。

癰瘡蛇犬毒 即靛花取嬌碧者水飛

淨用 內多石灰 故須淘淨

大青 微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒

時疾熱狂陽毒發斑 熱甚傷血裏實表 虛則發斑輕如疹

子重若錦紋紫黑者熱極而胃爛也。多 死活人治赤斑煩痛有犀角大青湯。

黃疸熱痢丹毒喉痺 處處有之高二

三尺莖圓葉長葉對節生八月開小紅

花成簇實大如椒色赤用莖葉

牽牛 辛熱有毒屬火善走入肺經瀉氣

分之濕熱 肺主氣火能 平金而泄肺 能達右腎命門

陽明病不吐不下而心煩者 吐後煩為內煩下後煩為 虛煩不吐不下心煩者胃

有鬱 熱也 亦治渴症中消善食而瘦

大黃 酒浸芒硝兩甘草 錢 炙五 少少溫服

此足太陽陽明藥也 東垣曰正 陽陽明藥 大黃苦寒除熱湯實芒

硝 或寒潤燥軟堅 二物下行甚速故用甘草甘平以緩

之不致傷胃故曰調胃承氣去枳朴者不欲其犯上焦

氣分也 準繩曰陽明一症分為太陽正陽少陽三等按 本草大黃酒浸入太陽經酒洗入陽明經浸入

于洗故能引于至高之旁仲景以調胃承氣收入太陽 門而大黃註曰酒浸湯後曰少少溫服曰當和胃氣又 本湯治不吐不下心煩者及發汗不解蒸蒸發熱者吐 後腹脹滿者是太陽陽明去表未遠其病在二不當攻 下故宜緩劑調和之也至正陽陽明則曰急下之初入 承氣湯大黃下註曰酒洗洗輕于浸是微升其走下之

承氣湯大黃下註曰酒洗洗輕于浸是微升其走下之

走精隧通下焦鬱遏及大腸風秘氣秘

利大小便逐水消痰殺蟲墮胎治水腫

喘滿疔瘕氣塊若濕熱在血分胃弱氣

虛人禁用東垣曰牽牛苦寒誤矣其味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦

寒安在哉乃瀉氣之藥比諸辛藥泄氣

尤甚若濕從下受下焦主血血中之濕

宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄下焦

之氣是血病瀉氣使氣血俱損也王好

古曰以氣藥引則入氣以大黃引則入

血時珍曰一婦腸結年幾六十服養血

潤燥藥則泥膈服硝黃藥則若罔知如

此三十餘年其人體肥膏梁而多鬱日

吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降

津液皆化為痰不能下潤腸腑非血燥

也潤劑留滯硝黃入血不能入氣故無

效用牽牛為末皂角膏丸纔服便通外

性以治其中也至少陽陽明則去其陽而逼大陰其分
為下故小承氣湯大黃不用酒製少陽不宜下故去
硝又曰少與曰微溲之勿令
大泄下此仲景之妙法也

本方加當歸薑棗煎名當歸承氣湯河治裏熱火鬱或

皮膚枯燥或咽燥鼻乾或便溺秘結或瘀血發狂加當

血分以潤燥調營亦與桃仁承氣同意加薑棗引入胃也本方除芒硝名大黃甘草

湯金匱用治食已即吐外臺用治吐水隼絕曰仲景云

又以大黃甘草治食已即吐何也曰欲吐者其病在上

因而越之可也而逆之使下則必抑塞憤亂而益甚若

已吐不止有升無降則當通而折之引令下行無速于

大黃者矣故不禁丹溪泥之而曰凡嘔吐切不可下固

矣本方用大黃二兩半芒硝甘草各二兩又名破棺丹
治多汗大渴便閉譫語陽結之症及諸瘡腫熱

勞素多酒色病二便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不效子思此乃濕熱之邪在精道壅隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也

用棟實苗香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平東垣補下焦陽虛天真丹用牽牛

鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂破故紙諸藥深得補瀉兼施之妙有黑

白二種黑者力速亦名黑丑取子淘去浮者

春去皮用得木香乾薑良此藥漢前未入本草故仲

景方中無此別錄始載之宋後始多用者

防己大辛苦寒本經平別錄溫太陽經藥勝能

行十二經通腠理利九竅瀉下焦血分

濕熱為瘡風水之要藥治肺氣喘嗽水濕

桃仁承氣湯仲景見血門

大陷胸湯景治傷寒下之早表邪入裏心下滿而鞭痛

或重汗而復下之不大便五六日舌上燥渴日晡潮熱

從心至小腹鞭滿痛不可近或無大熱但頭微汗出脉

沉為水結胸按之鞭痛者為結胸鞭而不痛者為痞氣

次之支結又次之結胸由于下之太早裏之正氣為邪

所損表邪乘虛入結于心胸之間故石鞭而痛重汗復

下內外皆亡津液邪熱內結故不大便而舌上燥渴邪

入陽明則日晡潮熱或水飲結于胸脇但頭微汗餘處

無汗水飲不得外泄非熱結也名水結胸亦有熱已入裏久不攻之失下而成結胸者又有心下硬痛無熱症者為寒實結胸小陷胸及白散主之結胸固當下然脉浮大者下之則死猶帶表邪下之重虛結而又結故死喻嘉言曰太陽誤下之脉主病皆在陽在表即有沉緊沉滑之脉皆不得以裏陰名之按仲景曰病發于陽而

熱氣諸痛降氣溫瘧脚氣足傷寒濕為

而為熱濕則腫熱則痛防己為主藥濕

加苡仁蒼朮木瓜木通熱加芩栢風加

羌活草薢痰加竹瀝南星痛加香附木

香活血加四物大便秘加桃仁紅花小

便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈

仙痛連脇加胆草又有足跟痛者屬腎

虛不與脚水腫風腫癰腫惡瘡或濕熱

氣同論流入十二經致二陰不通者非此不可

然性險而健陰虛及濕熱在上焦氣分

者禁用十劑曰通可去滯通草防己之

亦以行水者為氣分燥劑無以別矣木

通甘淡瀉氣分濕熱防己苦寒瀉血分

濕熱

出漢中根大而虛通心有花紋色

熱

反下之熱入因作結胸病發于陰而反下之因作痞皆

邪入裏為結胸無熱惡寒者發于陰也陰邪入裏為痞

喻嘉言曰風為陽衛亦陽故病起于陽寒為陰營亦陰

故病起于陰周揚俊曰發陽發陰二千年來未有知其

解者果如原註無熱惡寒則中寒矣下之有不立斃者

乎如嘉言以寒傷營血為陰則仲景痞論中中風傷寒

每每互言未嘗分屬也不知發于陰者洵是陰症但是

陽經傳入之邪非中陰之謂也陽經傳入原為熱症至

于陰經未有不熱深于內者此所以去熱入二字而成

于載之疑也熱症由三陰傳于胃已入府者為可下若

在經而下則為悞下與三陽在經無異故曰陽邪結于

陽位則結在胸陰邪結于陰位則在胸下或邊旁也陰

經悞下何以止成痞所以結只在陰位不若陽邪勢甚

也○六書云胸膈滿者胸間氣塞滿悶也非心下滿滿

滿者脇肋脹滿也非腹中滿蓋表邪傳裏必先胸以至

心腹入胃是以胸滿多帶表症宜微汗脇滿多帶半表

此湯下之附白散巴豆一分去心皮炒黑研貝母苦辛以

各三分治寒實結胸巴豆辛熱以散寒結貝母苦辛以

半裏宜和胸中痰實者宜湧之如結實燥渴便秘宜以

此湯下之附白散巴豆一分去心皮炒黑研貝母苦辛以

各三分治寒實結胸巴豆辛熱以散寒結貝母苦辛以

此湯下之附白散巴豆一分去心皮炒黑研貝母苦辛以

各三分治寒實結胸巴豆辛熱以散寒結貝母苦辛以

此湯下之附白散巴豆一分去心皮炒黑研貝母苦辛以

各三分治寒實結胸巴豆辛熱以散寒結貝母苦辛以

此湯下之附白散巴豆一分去心皮炒黑研貝母苦辛以

各三分治寒實結胸巴豆辛熱以散寒結貝母苦辛以

此湯下之附白散巴豆一分去心皮炒黑研貝母苦辛以

各三分治寒實結胸巴豆辛熱以散寒結貝母苦辛以

此湯下之附白散巴豆一分去心皮炒黑研貝母苦辛以

各三分治寒實結胸巴豆辛熱以散寒結貝母苦辛以

此湯下之附白散巴豆一分去心皮炒黑研貝母苦辛以

黃名漢防己。黑點黃腥木強者。名木防

己不佳。陳藏器曰。治風用木。酒洗用惡。防己。治水用漢防己。

細辛畏萆薢。

葶藶。辛苦大寒。屬火性急。大能下氣。行

膀胱。水肺中水氣。臄急者。非此不能除。

破積聚癥結。伏留熱氣。消腫除痰。止咳

定喘。水濕泛溢為腫。脹為痰。嗽喘滿。通經利便。久服令

人虛。十劑曰。洩可去閉。葶藶。大黃之屬。是也。大黃。泄陰分。血閉。葶藶。泄陽

分氣。閉氣味俱厚。不減。大黃。然有甜苦

二種。甜者性緩。苦者性急。泄肺而傷胃。宜大棗輔之。仲景有葶藶大棗瀉肺湯。治肺氣喘急。不得臥。昂按輔以大棗補

散。痰竄結在胸。故以桔梗浮而上。之利膈。清表。故病在膈上必吐。病在膈下必利也。

大黃二芒硝一甘遂一錢。先煮大黃去滓。內芒硝煮

一二沸。內甘遂末。溫服。

此足太陽藥也。表邪入裏。結于高位。以致三焦俱實。手

不可近。證為危急。非常藥所能平。故以甘遂苦寒行水

直達為君。芒硝鹹寒。軟堅為臣。大黃苦寒。蕩滌為使。三

藥至峻。而有起死之功。準繩曰。邪結胸中。處至高之分。宜若可吐。然邪氣與胸中陽氣

相結。不能分解。壅于心下。為鞭為痛。非虛煩。膈實者所

可同。故須攻下也。低者舉之。高者陷之。以平為正。故曰

陷胸也。經又曰。太陽病。脈浮而動。數浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心下懊。懷陽氣內陷。心下因鞅。則

痰裏食積痰血致清不升濁不降而成者有濕熱相生隧道阻塞而成者有燥熱沖擊秘結不通而成者亦屬有餘有服寒涼傷飲食中氣虛衰而成者有大病後正氣衰憊而成者有小便不通水液妄行脾莫能制而成者症屬不足而起分別治之然其源多由中氣不足而起丹溪曰水病當以健脾為主使脾實而氣通則水自行宜參苓為君視所挾症加減為用利水藥多致不救

疝積聚留飲宿食痰迷癩癩虛者忌用皮赤肉白根作連珠重實者良麪裏

煨熟用。或用薺萇甘草汁浸三日其水如墨以清為度再麵裏煨瓜

蒂為使惡遠志反甘草。仲景治心下留飲與甘草同用

取其相反以立功也。有治水腫及腫毒者以甘遂末腫處濃煎甘草湯服之

近嗽水不欲嚥喜忘如狂大便黑小便利宜犀角地黃湯劉心山曰結胸痞滿多由痰飲凝結心胸故陷胸瀉心用甘遂半夏栝蒌枳實旋覆之類皆為痰飲而設也

小陷胸湯。治傷寒誤下小結胸正在心下按之則痛

脉浮滑者及痰熱塞胸。前症上下俱鞭此則正在心下前症痛不可近此則按之則痛

結胸脉沉緊或寸浮關沉今脉浮滑知熱未深與此湯以除膈上結熱

黃連兩 半夏升 栝蒌一枚

此足少陽藥也黃連之苦寒以泄熱栝蒌之寒潤以滌

垢半夏之辛温以散結結胸多由痰熱結聚故用三物

以除痰去熱也。王海藏曰大陷胸湯太陽本藥也大陷胸丸陽明藥也小陷胸湯少陽藥也大

陷胸湯治熱實大陷胸丸兼喘小陷胸湯治痞

其腫立消二物相反感應如此

大戟 苦寒有毒能瀉藏府水濕行血發

汗利大小便治十二水腹滿急痛積聚

癥瘕頸腋癰腫風毒脚腫通經墮胎誤

服損真氣時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到入心則迷成癲癩

入肺則塞竅為咳喘背冷入肝則脇痛乾嘔寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入

筋骨則牽引隱痛入皮肉則癩癧癰腫陳無擇並以控涎丹主之殊有奇功此

乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則結為痰大戟能泄藏府水濕甘遂

能行經絡水濕白芥子能行皮裏膜外痰氣惟喜用者能收奇功也又曰錢仲

陽謂腎為真水有補無瀉復云痘症變黑歸腎者用百祥膏下之非瀉腎也瀉

大陷胸丸仲景

治傷寒結胸項強如柔痙狀

有汗為柔痙胸膈實滿故

項強而不能俯項屬大陽部位

大黃八兩芒硝

葶藶

炒

杏仁

去皮尖各半升

合研取如彈丸

一枚別搗甘遂末一錢白蜜三合煮服

此足太陽陽明藥也大黃之苦寒以泄熱芒硝之鹹寒

以軟堅杏仁之苦甘以降氣葶藶甘遂取其行水而直

達白蜜取其潤滑而甘緩

十棗湯仲景

治太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其

人熱熱汗出頭痛心下痞鞭引脇下痛乾嘔短氣汗出

不惡寒表解而裏未和邪熱內蓄有伏飲者下利嘔逆裏受邪也

其府則藏自不實。府者膀胱也。百祥惟大戟一味能行膀胱之水故也。竊謂非獨瀉府。乃腎邪實而瀉肝也。實則瀉其子。大戟浸水青綠。肝胆之色也。痘症毒盛火熾。則水益涸。風挾火勢。則土受癘。故津液內竭。不能成膿。而成黑陷之症。瀉其風火之毒。所以救腎扶脾也。昂按瀉心乃所以補心。瀉腎即所以救腎。邪熱退。則真陰復矣。機要用大戟一兩。棗三枚同煮。焙乾去戟。用棗九服。名棗變九。百祥。

杭產紫者為上。北產白者傷人。漿水煮。去骨用。得大棗則不損脾。畏菖蒲。反甘草。

商陸 苦寒有毒。諸家辛酸。沉陰下行。與

大戟甘遂同功。療水腫脹滿。腫屬脾。脹屬肝。腫則

汗出不惡寒。表已解也。頭痛痞鞭。引脇下痛。乾嘔短氣。邪熱內蓄。而有伏飲也。此為水氣上逆。嘔逆頭痛。與表症頭痛。稍別。周揚俊曰。此症與結胸頗同。故湯亦與陷胸相仿。表解後。攻與結胸之戒。不殊也。

芫花 炒 甘遂 大戟 等分 大棗 十枚 先煮棗去滓。內前藥

末。強人服一錢。虛人五分。或棗肉為丸。病不除者。再服。

得快下後。糜粥自養。

此足太陽藥也。芫花大戟之辛苦。以逐水飲。甘遂苦寒。能直達水氣所結之處。以攻決為用。三藥過峻。故用大棗之甘。以緩之。益土所以勝水。使邪從二便而出也。

湯。小青龍湯主水氣乾嘔。桂枝湯主太陽汗出乾嘔。薑附湯主少陰下利乾嘔。吳茱萸湯主厥陰吐涎沫乾嘔。王海藏曰。表有水。用小青龍。裏有水。用十棗。或問十棗湯。桂枝去桂。加茯苓白朮湯。皆屬飲家。俱有頭痛項強。

陽氣猶行。如單脹而不腫者。名蠱脹。為木橫剋土難治。腫脹朝寬暮急。為血虛。暮寬朝急。為氣虛。朝暮俱急。為氣血兩虛。腫脹由心腹而散四肢者。吉。由四肢而入心腹者。危。男自下而上。女自上而下。皆難治。

瘰癧不通。薄切醋炒。濕熱之病。瀉蠱毒。傳塗喉中良。

惡瘡墮胎孕令人見鬼神。取花白者。

根。赤者傷人。只堪貼臍入麝。三分搗貼。小便利則腫消。黑豆湯浸。

蒸用得蒜良。

芫花。苦温有毒。去水飲痰癖療五水在。

五藏皮膚脹滿喘急痛引胸脇咳嗽瘡

瘡。五水者。風水皮水。正水。石水。黃汗也。水積胞中堅滿如石。名石水。汗如柏。

之症何也。張兼善曰。太陽經多血少氣。病人表熱微渴。恣飲水漿。為水多氣弱。不能施化。本經血氣因而凝滯。致有頭痛項強之患。不須攻表。但宜逐飲。飲盡則自安。杜壬曰。裏未和者。蓋痰與燥氣壅于中焦。故頭痛乾嘔。汗出短氣。是痰膈也。非十棗不能除。但此方不宜輕用。恐損入于倏忽。

本方除大棗加大黃黑丑輕粉水丸名三花神佑丸。河

治壯實人風痰鬱熱肢體麻痺走注疼痛濕熱腫滿氣

血壅滯不得宣通及積痰翻胃服二丸後轉加痛悶此

痰涎壅塞頓攻不開再加二丸快利則止。加牽牛大黃。

濕加輕粉無竅不入。以去痰積。虛人不可輕用。本方各五錢加黃栢。三兩。酒炒。大黃。

煨兩。半。粥丸名小胃丹。治胸膈腸胃熱痰濕痰。

三物備急丸。治食停腸胃冷熱不調腹脹氣急痛滿。

汁。名黃汗。久不愈。必致癰膿。時珍曰。仲景治傷寒太陽症。表未解。心下有水。而咳。乾嘔發熱。或喘。或利者。小青龍湯主之。表已解。有時頭痛。出汗惡寒。心下有

水。乾嘔痛引兩脇。或喘。或咳者。十棗湯主之。蓋青龍散表邪。使水從汗出。內經所謂開鬼門也。十棗逐裏邪。使水從二便出。內經所謂潔淨府。去陳莖法也。十

棗湯。芫花甘遂大戟等分。棗十枚。葉似柳。二月開花。紫

碧。色葉生。花落。陳久者。良。醋煮。過水。浸

暴用。根療疥。可毒魚。反甘草。聞訟者。取葉擦皮膚。

輒作赤腫。假傷以誣人。

蕘花 辛散結。苦洩熱。行水捷藥。主治略

同莞花

同莞花

同莞花

欲死及中惡客忤卒暴諸病。食滯腸胃上焦不行下脫不通故痛脹欲死內實者

法宜下之

巴豆霜 大黃 乾薑 等分 蜜丸 小豆大 每服二三

丸 中惡口噤者 折齒灌之 崔氏乾薑易桂枝 名備急散

此手足陽明藥也 大黃苦寒 以下熱結 巴霜辛熱 以下

寒結 加乾薑辛散 以宣通之 乾薑辛溫開五藏六府通四肢關節 三藥峻

厲非急莫施 故曰備急

礪砂丸 本 治一切積聚痰飲心脇引痛

礪砂 巴豆 去油 三稜 乾薑 白芷 五錢 木香 青皮

胡椒 二錢 大黃 乾漆 炒一兩 檳榔 肉苳蔻 筒 爲末

澤漆 辛苦微寒消痰退熱止嗽殺蟲利

大小腸治大腹水腫益丈夫陰氣 生

平澤葉圓黃綠頗類猫睛一名猫兒眼睛草莖

中有白汁粘人李時珍曰別錄云是大戰苗非也功相類爾

常山 辛苦而寒有毒能引吐行水祛老

痰積飲痰有六風痰寒痰濕痰熱痰食痰氣痰也飲有五流于肺為支

飲于肝為懸飲于心為伏飲于經絡為溢飲于腸胃為痰飲也常山力能吐之

下專治諸瘧然悍暴能損真氣弱者慎

用時珍曰常山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分之後用之瘧有

經瘧藏瘧風寒暑濕痰食瘴鬼之別須分陰陽虛實不可槩論常山蜀漆得甘

醱醋二升煮巴豆五七沸再下三稜大黃末同煎五七

沸入礞砂熬成膏和諸藥杵丸菜豆大每五丸薑湯下

此治肉積氣積血積通劑也礞砂化肉食礞砂性大熱能爛五金本

草言痰能化人心為血故治膈噎癭瘕肉積有奇功乾漆散瘀血木香青皮行滯

氣三稜破血而行氣肉蔻煖胃而和中白芷散風而除

濕乾薑胡椒除沉寒錮冷大黃巴豆能斬關奪門方內

多辛熱有毒之品用之以破冷攻堅惟大黃苦寒假之

以蕩熱去實蓋積聚既深攻治不得不峻用醋者酸以

收之也玉機微義曰方中因白芷散水行氣故更言治痰飲也○潔古曰壯人無積虛人則有之皆由

脾胃怯弱氣血兩衰四時有感皆能成積若遽以磨堅破結之藥治之疾似去而人已衰矣乾漆礞砂三稜大

草則吐。得大黃則利。得烏梅穿山甲則入肝。得小麥竹葉則入心。得秫米麻黃則入肺。得龍骨附子則入腎。得草菓檀榔則入脾。蓋無痰不作瘧。一物之功亦在驅逐痰水而已。李士材曰：常山發吐。惟生用多用為然。與甘草同用亦必吐。若酒浸炒透。但用錢許。每見奇功。未見其或吐也。世人泥于雷敷老人久病。忘服之說。使良藥見疑。沉痾難起。抑何愚耶。○常山吐瘧。痰瓜蒂吐熱痰。烏附尖吐濕痰。萊菔子吐氣痰。藜蘆吐風痰。雞骨者良。酒浸蒸。或炒用。桔萸為使。忌葱茗。名蜀漆。功用略同。

古方有蜀漆散。取其苗性輕揚發散。上焦邪結。甘草水拌蒸。黎蘆辛寒。至苦有毒。入口即吐。善通頂。令人噦。風癩症多用之。

張子和曰：一婦病風癩。初一二

黃牽牛之類。得藥則暫快。藥過則依然。氣愈消。疾愈大。竟何益哉。故善治者。當先補虛。使氣血旺。積自消。如滿座皆君子。則小人自無容地也。不問何藏。先調其中。使能飲食。是其本也。

木香 檳榔 和 治胸腹積滯痞滿結痛二便不通或瀉

泄下痢裏急後重食滯實積 胸腹痞滿瀉痢由于飲食不通。由于熱結。裏急後重。由于氣滯。○按裏急後重。有因火熱者。火燥物而性急也。有因氣滯者。大腸氣壅。不得宣通也。有因積滯者。腸胃有物結墜也。有氣虛者。中氣陷下。不能升也。有血虛者。津枯腸燥。虛坐努責是也。當分症論治。脈洪大而實為實。宜下。若脈浮大慎不可下。

木香 檳榔 青皮 醋炒 陳皮 去白 枳殼 炒 黃柏 酒炒 黃連 菜

湯炒 三稜 醋煮 莪逆 醋煮 五錢 大黃 酒浸 一兩 香附 黑牽牛 二兩 芒

硝水丸 量入虛實服一方加當歸 洗 張子和 儒門事親 無三稜枳殼

年一作後潮日作。甚至一日數作。求死而已。值歲大飢。採百草食。見野草若葱。採蒸飽。食覺不安。吐膠涎數日。約一二斗。汗出如洗。甚昏困。後遂輕健如常。入以所食葱訪人。乃慙葱苗。即藜蘆是矣。李時珍曰。和王妃年七十。中風不省。牙關緊閉。先考太醫吏日月池翁診視。藥不得。余獲已。打去一齒。濃煎藜蘆湯灌之。少頃。噫氣。遂吐痰而甦。取根去頭。藥不瞑眩。厥疾不瘳。誠然。

用黃連為使。反細辛。芍藥。諸參。惡大黃。

畏葱白。吐者服葱湯即止。

木通古名通草。甘淡輕虛。上通心包。降心火。

清肺熱。心火降則化津液。肺為水源。肺熱清矣。熱清則津液。

化水。下通大小腸膀胱。導諸濕熱。由小。

只十味。紺珠無三稜。陳皮。名木香導氣丸。

此手足陽明藥也。濕熱在三焦氣分。木香附行氣之。

藥能通三焦。解六鬱。陳皮理上焦。肺氣。青皮平下焦。肝。

氣。瀉痢多由肝。枳殼寬腸而利氣。而黑丑檳榔又下氣。

之最速者也。氣行則無痞滿後重之患矣。瘧痢由于濕。

熱鬱積。氣血不和。黃柏黃連燥濕清熱之藥。三稜能破。

血中氣滯。莪朮能破氣中血滯。大黃芒硝。血分之藥。能。

除血中伏熱。通行精滯。並為摧堅化痞之峻品。濕熱積。

滯去則二便調。而三焦通泰矣。蓋宿垢不淨。清陽終不。

得升。故必假此以推蕩之。亦通因通用之意。然非實積。

便出。故導赤散用之。凡利小便者。多不利大便。以小便愈通。大便愈燥也。

木通能入大腸。通利九竅。血脉關節。治胸

中煩熱。遍身拘痛。楊仁齋云。遍身隱熱。疼痛拘急。足冷。皆伏

熱傷血。血属于心。宜木通以通心竅。則經絡流行也。大渴引飲。中

火淋瀝不通。下焦火。心與小腸相表裏。移熱于小腸。則淋秘。

水腫浮大。利小便。耳聾。泄腎火。目眩口燥。

舌乾。古為心苗。喉痺咽痛。少炎。鼻鼈。音甕。熱

則氣窒。失音。清金。脾熱好眠。脾主四肢。倦

不通。脾母。心熱清。除煩退熱。止痛排膿。破血

催生行經下乳。火不亢于內。氣順血行。故經調有準。乳汁循常。

不可輕投。加當歸者。潤以和其血也。綱目曰。此戴人經

上實。抑火升水。流濕潤燥。推陳致新。散鬱破結。活血通

經。及肺痿喘嗽。胸膈不利。脾濕黃疸。宿食不消。婦人調

和氣血。小兒驚疳積熱。皆可量輕重用之。滑伯仁曰。腸

胃陽明燥金也。下焦少陽相火也。後重之用木香。檳榔

行燥金之鬱也。瘕秘之用知母。黃柏。散相火之熾也。

枳實導滯丸。東垣。治傷濕熱之物。不得施化。痞悶不安。腹

內硬痛。積滯泄瀉。大黃。一兩。枳實。炒。黃芩。炒。黃連。炒。神麴。炒。錢

三。澤瀉。錢二。蒸餅為丸。多寘量服。此足太陽陽明藥也。飲食傷滯。作痛成積。非有以推蕩

之。則不行。積滯不盡。病終不除。故以大黃枳實攻而下

汗多者禁用。東垣曰肺受熱邪津液氣化之源絕則寒水斷流膀胱受濕熱癰閉約束則小便不通宜此治之。朱二允曰火在上則口燥眼赤鼻乾在中則心煩嘔噦浮腫在下則淋閉足腫必藉此甘平之性瀉諸經之火。火退則小便自利便利則諸經火邪皆從小便而下降矣。○君火宜木通相火宜澤瀉利水雖同所用各別。

藤有細孔兩頭皆通。故通

通草

古名通脫木

色白氣寒體輕味淡氣寒

則降故入肺經引熱下行而利小便味

淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁

治五淋水腫目昏耳聾鼻塞失音。淡通

寒

降火利肺氣 退熱催生

之而痛瀉反止經所謂通因通用也傷由濕熱黃芩黃

連佐之以清熱茯苓澤瀉佐之以利濕積由酒食神麩

蒸罾遏合之物化食解酒因其同類溫而消之芩連大

黃苦寒太甚恐其傷胃故又以白朮之甘溫補土而固

中也

倒倉法

丹溪

黃牡牛肉肥嫩者二三十斤切碎洗淨用長流水桑柴火煮

糜爛濾去滓取淨汁再入鍋中文武火熬至琥珀色則

成矣擇一靜室明快不通風者令病人先一夜不食坐

其中每飲一鍾少時又飲積數十鍾病在上者必吐病

淨瀉 甘淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經

之火邪功高利濕行水治消渴痰飲嘔

吐瀉痢腫脹水痞脚氣疝痛淋瀝陰汗

陰間 有汗 尿血洩精 既利水而又止洩精何

虛滑者言也。虛滑也。此乃濕熱為病。不為

則當用補滋之藥。濕熱之病濕熱既除

則清氣上行又能養五臟益氣力起陰

氣補虛損止頭旋有聰耳明目之功

有濕熱則頭重耳鳴目昏。滲去其濕則

熱亦隨去。土乃得令而清氣上行。故本

經列之上品。云聰耳明目而六多服昏

在下者必利。病在中者吐而且利。視所出物可盡病根
乃止。連進之急則逆上而吐多。緩則順下而利多。視病之上下而為緩急。吐利後必渴不
得與湯。其小便必長。取以飲之。名輪迴酒。非惟止渴兼
滌餘垢。行後倦臥覺飢。先與米飲。次與稀粥。三日後方
與厚粥軟飯菜羹。調養半月一月。精神煥發。沉疴悉痊
矣。須戒色慾。半年一年。戒牛肉數年。
霞天膏即照前法。每肉十二斤。可熬膏一斤。磁罐盛之。
夏月水浸。可留三日。寒天久留。生黴。音梅用重湯煮入煎
劑。調服。入丸劑。每三分。加麵一分。煮糊。或同蜜煉。
此足太陰手足陽明藥也。朱丹溪曰。牛坤土也。黃土之

味丸用澤瀉冠寧真謂其接引附桂入腎經李時珍曰非接引也乃取其瀉膀胱之邪氣也古人用補藥必兼瀉邪邪去則補藥得力一闢一闢此乃元妙後人不知此理常一于補必至偏勝之患矣王履曰地黃山茱萸茯苓丹皮皆腎經藥桂附右腎命門之藥何待接引乎錢仲陽謂腎為真水有補無瀉或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不可瀉瀉其伏留之邪耳易老云去將中留垢以其微鹹能瀉伏水故也昂按六味丸有熟地之溫丹皮之涼山藥之澁茯苓之滲山茱之收澤瀉之瀉補腎而兼補脾有補而必存瀉相和相濟以成平補之功乃平淡之神奇所以為古今不易之良方也即有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二味餘三四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多揀本草補藥恣意加入有補無瀉且客倍于主責成不專而六味

色也以順為德而法健為功者牡之用也肉胃之藥也液無形之物也積聚久則形質成依附腸胃迴薄曲折之處以為巢白豈銖兩之丸散所能窺其藩牖乎肉液充滿流行無處不到如洪水泛漲浮塋陳朽皆順流而下不可停留凡屬滯碍一洗而空澤枯潤稿補虛益損寧無精神煥發之樂乎其方傳于西域異人中年後行一二次亦却疾養壽之一助也

王綸曰牛肉補中非吐下藥借補為瀉以瀉為補亦奇方也

蜜煎導法

仲景治陽明症自汗小便利大便秘者

胃實自汗小便

復利此為津液內竭非熱結也若與下藥則液愈耗矣雖大便鞭不可攻之宜用外導之法

之功反退。處于虛位。失製方配合之本旨矣。此近世庸師之悞也。鹽

水拌或酒浸用忌鐵

重前子 甘寒涼血去熱止吐衄消瘕痰

明目通淋 凡利水之劑多損于目惟此能解肝與小腸之熱濕熱退

而目清矣雷斅曰子甘寒清肺肝風熱使葉勿使莖蕊

滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓

同功強陰益精令人有子 腎有二竅車前子能利水

竅而固精竅精盛則有子五子衍宗丸用

之枸杞兔絲各八兩五味覆盆各四兩車

前二兩蜜丸慣遺洩者車前易蓮子時珍

曰人服食須佐他藥如六味丸之用澤瀉

可也若單治濕痺五淋暑濕瀉痢 歐陽

用則過也

蜂蜜 用銅器微火熬頻攪勿令焦候凝如飴捻作挺

子頭銳如指搽皂角末少許乘熱納穀道中用手抱住

欲大便時去之 加鹽少許亦可鹽能潤燥軟堅

此手陽明藥也蜜能潤腸熱能行氣皂能通竅經曰表

解無症者胃雖實忌攻故外導而通之不欲以苦寒傷

胃也 徐忠可曰此為大便不行而別無所苦者設也結胸痞滿臟結胃有燥矢皆有見症今但自汗且小

便利是津耗熱鬱而乾燥也

猪胆導法 仲景 治症同前

猪胆 一枚 取汁入醋少許用竹管長三四寸以一半納

穀道中將胆汁灌入肛中頓覺大便

患暴下。國醫不能愈。夫人云。市有藥三。文一帖甚效。公不肯服。夫人雜他藥進。之一服而愈。問其方。乃車前子為末。米飲下二錢。一云。此藥利水而不動氣。水道利。則清濁分。谷藏自止矣。

目赤瘡翳能除肝熱**催生下**

胎酒蒸搗餅焙研酒蒸搗餅。入滋補藥。焙研。入利水泄瀉藥。

燈草甘淡而寒。降心火。入心。清肺熱。利

小腸心與小腸相表裏。心火清則肺清。小腸亦清而熱從小便出矣。**通氣止血。**

治五淋水腫。燒灰吹喉。瘰癧。塗乳止夜啼。

擦癰最良縛成把。擦摩。極癢時。蟲從草出。浮水可見。十餘次。能斷根。

瞿麥苦寒。降心火。利小腸。逐膀胱邪熱。

為治淋要藥故八正散用之。五淋大抵皆屬濕熱。熱淋宜八正及

此手陽明藥也。便秘者屬燥。屬熱。自汗者為亡津液。當

小便不利。今反利。是熱猶未實。故不可攻。猪胆汁寒勝

熱。滑潤燥。苦能降。醋酸善入。故能引入大腸而通之也。

津液枯者。宜蜜導。熱邪盛者。宜胆導。如冷秘者。削薑薑

亦消導之。海藏法。用蜜煎鹽相合。或草烏末相合。亦可。蓋鹹能軟。堅潤燥。草烏能化寒消結。可隨症陰陽所宜而用之。

山梔滑石之類。血淋宜小薊牛膝膏腎
虛淋宜補腎不可獨瀉。老人氣虛者宜
參朮兼木通山梔亦有痰滯中焦作淋
者宜行痰兼通利藥。最忌發汗。汗之必
便。破血利竅決癰消腫。明目去翳通經。

墮胎性利善下。虛者慎用。寇宗奭曰：心經雖有熱而

小腸虛者服之則心熱未清而小腸別作病矣。花大如錢紅

白斑爛色甚。媼媚俗呼洛陽花。用蕊殼

丹皮為使。惡螬蛸。產後淋當去血。瞿麥蒲黃皆為要藥。

扁蓄一名扁竹。苦平。殺蟲疥。利小便。治黃疸。

熱淋。虻咬腹痛。蟲蝕下部。煮服。葉細如

竹弱莖蔓引。促節有粉。三月開細紅花。

此方治瘧疾如神百中百發

常山 枳椇 木耳 冰糖

火酒早用酒盞在再燉數滾服後晚先時或

吐痰飲

天仙籐 苦温疏氣活血治風勞腹痛妊

娠水腫有天仙籐散

葉似葛圓而小

有白毛根有鬚四時不凋一云即青木香籐

地膚子 甘苦氣寒益精強陰入膀胱除

虛熱利小便而通淋時珍曰無陰則陽無以化亦猶東垣

治小便不通用知栢滋腎之意王節齋曰小便不禁或頻數古方多以為寒而

用温澁之藥殊不知屬熱者多益膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數

也故老人多頻數是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主

而佐以收瀉之劑如牡蠣山茱五味之類不可獨用病本屬熱故宜瀉火因水

不足故火動而致便數小便既多水益虛矣故宜補血補血瀉火治其本也收

醫方集解卷二

表裏之劑 病在表者宜汗宜散病在裏者宜攻宜清至于表症未除裏症又急者仲景復立大

柴胡葛根黃芩等法合表裏而兼治之後人師其意則有防風通聖參蘇五積諸劑姑采數方以槩其餘

善用者審症而消息之可也

大柴胡湯仲景 治傷寒發熱汗出不解陽邪入裏熱結在

裏裏非三陰之裏乃胃府也此為少陽陽明三陰亦有轉入陽明者如太陰有桂枝加大黃湯少陰有二大

承氣厥陰一小承氣皆兼陽明症也心下痞鞭嘔而下利或往來寒熱煩

渴譫妄腹滿便秘表症未除裏症又急脉洪或沉實弦

數者表症未除者發熱頭痛脇痛寒熱仍在也裏症又急者痞鞭燥渴譫狂便秘也脉沉實為在裏弦數

者邪在少陽也洪者邪在陽明也其嘔而自利者何亦用之張兼善曰裏虛者便雖難而勿攻裏實者雖利

之瀉之治
其標也
治癩疔散惡瘡煎湯洗瘡疥良葉作

浴湯去皮膚風熱丹腫洗眼除雀盲溢

痛 葉如蒿莖赤子類蠶砂惡蝶蛭

石韋 苦甘微寒清肺金以滋化源凡行之藥必皆能先清肺火通膀胱而利水道益精氣補

五勞 利濕清熱之功高陽賢對 治淋崩

發背 炒末冷 酒調服 生石陰柔韌如皮背有

黃毛去毛微灸用杏仁滑石射干為使

得葛蒲良生古瓦上者名瓦韋亦治淋

海金沙 甘寒淡滲除小腸膀胱血分濕

而可下。心煩喜嘔裏熱已甚。結于胃中。故下之則愈。

柴胡八兩 半夏半升 黃芩兩 芍藥兩 生薑五兩 大棗十二枚

枳實四枚 大黃二兩 酒浸一方無大黃下註云若不加大黃恐不為大柴胡湯也。崔氏去柴胡加前

胡。名大前胡湯。胡洽云亦出仲景方。治同。

此足少陽陽明藥也。表症未除。故用柴胡以解表。裏症

燥實。故用大黃枳實以攻裏。芍藥安脾斂陰。使木不尅

土。黃芩退熱解渴。半夏和胃止嘔。薑辛散而棗甘緩。以

調營衛而行津液。此表裏交治下劑之緩者也。周揚俊曰仲景

于太陽入膀胱府症。則有五苓散。少陽兼陽明府症。則

有大柴胡湯。皆表裏兩解之法也。昂按此乃少陽陽明。故加減小柴胡。小承氣。而為一方。少陽固不可下。然兼陽明府症。則當下。宜小承氣湯。輕則大柴胡湯。或問大

熱治腫滿五淋莖痛得梔子牙硝蓬砂

治傷寒熱狂大熱利小便此釜底抽薪之義也莖細如

線引竹木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火

茵陳 苦燥濕寒勝熱入足太陽經膀胱發

汗利水以泄太陰陽明之濕熱脾胃為治

疸黃之君藥脾胃有濕熱則發黃黃者脾之色也熱甚者身如橘

色汗如栢汁亦有寒濕發黃身薰黃而色暗大抵治以茵陳為主陽黃加大黃

梔子陰黃加附子乾薑各隨寒熱治之又治傷寒時疾狂

熱瘡瘧頭痛頭旋女人瘕疝皆濕熱為病

香薷 辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝

柴胡湯瀉也桂枝人參湯補也何為皆治下利心下痞

裏不解故用桂枝人參解表和裏若傷寒發熱汗出不

解心下痞嘔吐而下利者此為實故當用大柴胡下

之陶節菴曰傷寒邪熱傳裏須看熱氣淺深用藥三

焦俱傷則痞滿燥實堅全見宜大承氣湯邪在中焦則

有燥實堅三症宜調胃承氣湯加甘草和中去枳朴者

恐傷上焦氤氳之氣也邪在上焦則痞而實宜小承氣

湯去芒硝者恐傷下焦真陰也若表症未除裏症又急

不得不下者則用大柴胡湯通表裏而緩治之大承氣

最緊小承氣次之調胃又次之大柴

胡又次之蓋恐硝性燥急故不輕用

柴胡加芒硝湯仲景治傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日

晡潮熱已而微利此本柴胡症知醫以圓藥下之非其

治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以加芒硝

湯主之傷寒十三日為再傳經盡當解之時脇滿而嘔少陽也胸滿而日晡潮熱陽明也邪氣猶在表

結屬金水而主肺。為清暑之主藥。肺氣

清則小便行而熱降。暑必兼濕。治暑必兼利濕。若無濕但

為乾熱。非暑也。治嘔逆水腫。熱膏服小便利則消。脚氣口

氣煎湯單服治霍亂轉筋。時珍曰暑有乘涼飲冷致

陽氣為陰邪所遏。反中入內。遂病頭痛發熱惡寒。煩燥口渴。吐瀉霍亂。宜用之

以發越陽氣。散邪和脾。則愈。若飲食不節。勞役作喪之人。傷暑大熱大渴。汗出

如雨。煩躁喘促。或瀉或吐者。乃內傷之症。宜用清暑益氣湯。人參白虎湯之類。

以瀉火益元可也。若用香薷是重虛其表。而濟之熱矣。蓋香薷乃夏月解表之

藥。如冬月之用麻黃氣虛者。尤不宜多服。今人謂能解暑。驟用代茶誤矣。李士

材曰香薷為夏天發汗之藥。其性溫熱。只宜于中暑之人。若中熱者誤服之。反

裏之間

小柴胡湯見和解門加芒硝六兩

此少陽陽明藥也。表症誤下邪熱乘虛入胃。以致下利

而滿嘔潮熱之症猶在。傷寒潮熱為胃實故宜下。故仍與柴胡以解

少陽。加芒硝以蕩胃熱。亦與大柴胡兩解同意。

桂枝加大黃湯仲景治太陽誤下轉屬太陰腹滿大實痛

者。腹脹雖屬太陰。若裏症尚淺。腹滿時痛。猶宜和之。以桂枝加芍藥湯。惟滿痛便秘。口燥咽乾者。方可以此

湯下

桂枝湯見發表門加大黃一兩芍藥三兩

此是太陽太陰藥也。誤下而作結胸。則邪在上。仍屬太

成大害。世所未知。按潔古云。中暑為陰症。為不足。中熱為陽症。為有餘。經曰。氣盛身寒。得之傷寒。氣虛身熱。得之傷暑。故中暑宜溫散。中熱宜清涼。

者勝。宜冷飲熱服。令人瀉。

青蒿。苦寒。得春木少陽之令最早。二月

故入少陽厥陰血分。治骨蒸勞熱。使

搗葉取汁熬膏。摩勞虛熱。凡苦寒之藥多傷胃。氣。惟青蒿芬香入脾。獨宜于血虛有熱之風毒熱黃久瘧久人。以其不犯胃氣也。

痢瘡疥惡瘡鬼氣尸疰。時珍曰。月令通纂言。伏內庚日。

采蒿懸門庭可辟邪。冬至元旦各服二錢亦良。則青蒿之治鬼疰蓋亦有所伏也。

補中明目。童便浸葉用熬膏亦良。

陽今腹滿而大實痛則邪已入太陰。經曰。諸痛為實痛。

隨利減。故用桂枝以解未盡之表邪。加大黃以下內陷

之邪熱。經又曰。太陰病。脈弱其人續自便利。設當行大黃芍藥者宜減之。以胃氣弱易動故也。仲景之

慎于用下也。如是王海藏曰。腹痛桂枝加芍藥。大實痛桂枝加大黃。何為不只用芍藥大黃。而于桂枝內加之

要從太陽中來。以太陽為本也。趙嗣真曰。太陰腹痛有三。有次第傳經之邪。有直入本經之邪。有下後內陷之

邪。此腹滿時痛為下後內陷之邪。宜桂枝加芍藥湯。大實痛者。桂枝加大黃湯。設遇本經直入陰邪。腹滿實痛

脈沉細者。用此下之。豈不貽結胸之悔耶。周揚俊曰。大實痛者。有宿食也。非大黃不能除。亦通因通用之意。

水解散。治天行一二日頭痛壯熱。

麻黃四兩。桂心。甘草。白芍二兩。大黃。黃芩三兩。

此是太陽陽明藥也。麻黃能開腠發汗。桂心能引血化。

使子勿使葉使根勿使莖

附子 辛甘有毒大熱純陽其性浮而不

沉其用走而不守通行十二經無所不

至能引補氣藥以復失散之元陽引補

血藥以滋不足之真陰引發散藥開腠

理以逐在表之風寒同乾薑桂枝溫經散寒發汗引

溫煖藥達下焦以祛在裏之寒濕能引火下

行亦有津調 治三陰傷寒吳綬曰附子陰症要藥凡

傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖大熱而

脈沉細者或厥冷腹痛甚則唇青囊縮者急須用之若待陰極陽竭而用之已遲矣東垣治陰盛格陽傷寒面赤目赤

汗黃芩以清上中之熱大黃以瀉中下之熱甘草白芍

能調胃而和中蓋天行溫疫鬱熱自內達外與傷寒由

表傳裏者不同故雖一二日之淺可以汗下兼行不必

同于傷寒之治法也

防風通聖散河間 治一切風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪

所傷氣血怫鬱表裏三焦俱實憎寒壯熱頭目昏運目

赤睛痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽喉不利唾涕稠粘咳嗽

上氣大便秘結小便赤澀瘡瘍羊腫毒折跌損傷瘀血

便血腸風痔漏手足癩癧驚狂譫妄丹斑癰疹憎寒壯熱邪在

表也頭眩目赤風熱上攻也耳鳴口苦邪在少陽也便秘痔漏熱結大腑也小便赤澀熱畜膀胱也瘡瘍癰腫

煩渴引飲脉七八至但按之則散用薑

附湯加人參投半斤得汗而愈此神聖

之妙也中寒中風卒中曰中漸傷曰傷輕

則為氣厥痰厥虛寒而厥者宜之如傷

中熱厥似寒者誤投立咳逆風嘔噦胃膈

斃宜承氣白虎等湯咳逆寒嘔噦胃膈

噎膈噎多由氣血虛胃冷胃稿而成飲

可下而食不可下稿在吸門喉間之

厭會也食下胃脘痛須臾吐出稿在背

門胃之上口也此上焦名噎食下良久

吐出稿在幽門胃之下口也此中焦名

膈朝食暮吐稿在闌門大小腸下口也

此下焦名反胃又有痰飲食積瘀血壅

塞胃口者如寒痰胃冷則宜薑附參朮

胃稿者當滋潤宜四物單泄命火

牛羊乳血瘀者加葶汁月泄不足冷痢

寒瀉霍亂轉筋脾虛寒客中焦為霍亂

寒客下焦肝腎為轉筋

氣血怫鬱也丹斑癰疹風熱在胃也

手足癰癢驚狂譫妄肝風胃火也

防風 荊芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎 當歸

白芍 炒白朮 山梔 炒 大黃 酒 芒硝 五 錢 黃芩 石膏

桔梗 一兩 甘草 二兩 滑石 三兩 加生薑葱白煎自利去硝黃

自汗去麻黃加桂枝涎嗽加薑製半夏

此足太陽陽明表裏血氣藥也防風荊芥薄荷麻黃輕

浮升散解表散寒使風熱從汗出而散之于上大黃芒

硝破結通幽梔子滑石降火利水使風熱從便出而泄

之于下風淫于內肺胃受邪桔梗石膏清肺瀉胃風之

為患肝木受之川芎歸芍和血補肝黃芩清中上之火

熱霍亂者禁用拘攣風痺癥瘕積聚督脉為病

脊強而厥小兒慢驚痘瘡灰白癰疽不

斂一切沉寒痼冷之症經曰陰盛生內寒陽虛生外寒

助陽退陰殺邪辟鬼本草未載通經墮胎凡陰

症用薑附藥宜冷服熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰益甚

治之以熱則拒格不納用熱藥冷飲下

嗑之後冷體既消熱性復發情且不違

而致大益此反治之妙也又有寒藥熱

飲治熱症者此寒因熱用義亦相同也

經曰正者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒此正治也或以寒治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所主而先其所因蓋借寒藥熱藥為反佐以作向導也亦曰從治王好古曰用附子以補火必防涸水如陰虛之人久服補陽

連翹散氣聚血凝甘草緩峻而和重用甘草滑石亦猶六一利水瀉火

之意白木健脾而燥濕上下分消表裏交治而于散瀉之

中猶寓溫養之意所以汗不傷表下不傷裏也

本方再加大參補氣熟地益血黃栢黃連除熱羌活獨

活天麻細辛全蝎祛風蜜丸彈子大每服一九茶酒任

下名祛風至寶丹喻嘉言曰此中風門中不易之端方也本方除大黃芒

硝名雙解散麻黃防風荆芥薄荷川芎以解表黃芩梔子連翹石膏滑石以解裏復有當歸芍藥

以和血桔梗甘草白木以調氣故曰雙解

葛根黃連黃芩湯仲景治太陽病桂枝症醫反下之利遂

不止脉促者表未解也喘而汗出者此湯主之發熱頭痛惡風

之藥則虛陽益熾真陰愈耗精血日枯而氣無所附麗遂成不救者多矣母

為烏頭附生者為附子連生者為側子

細長者為天雄兩岐者為烏喙五物同

出異名附子以西川彰明赤水產者為

最皮黑體圓底平八角重一兩以上者

良或云二兩者更勝然難得生用發散熟用峻補趙嗣

真曰仲景麻黃附子細辛湯熟附配麻黃發中有補四逆湯生附配乾薑補中

有發其旨微矣丹溪曰烏附行經仲景八味丸用為少陰嚮導後世因以為補

藥誤矣附子走而不守取其健悍走下以行地黃之滯耳相習用為風藥及補

藥殺人多矣昂按附子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者回生起死非此不為

自汗所謂桂枝症也此邪在表而反下之虛其腸胃表邪乘虛入裏遂協熱而利不止也促為陽盛雖下利而脈促知表未解前症仍在也汗出而喘為邪氣外甚所致喘而汗出為裏熱氣逆所致與此湯散表邪清裏熱○脈數而止曰促

葛根半斤甘草炙黃芩二兩黃連三兩先煮葛根內諸藥煎

或加薑棗

此足太陽陽明藥也表症尚在醫反誤下邪入陽明之府其汗外越氣上奔則喘下陷則利故舍桂枝而用葛根○主陽明之表葛根能升陽明清氣又為治瀉聖藥加芩連以清裏熱甘草以調胃氣不治利而利自止不治喘而喘自止矣又太陽表裏兩解之變法也

功故仲景四逆真武白通諸湯多用之其有功于生民甚大。況古人日用常方用之最多。本非禁劑。丹溪乃僅以為行經之藥。而云用作補劑。多致殺人。言亦過矣。蓋丹溪法重滋陰。故每嘗陽藥亦其偏也。王節齋曰。氣虛用四君子湯。血虛用四物湯。虛甚者俱宜加熟附。蓋四君四物皆和平寬緩之劑。須得附子健悍之性。行之方能成功。附子熱藥。本不可輕用。但當病則雖暑熱時。月亦可。用也。
水浸麩裏煨令發折。乘熱切片炒黃。去火毒用。又法甘草二錢。鹽水薑汁童便各半盞。煮熟用。畏人參黃耆甘草防風犀角綠豆童便反貝母半夏栝蒌白及白斂。中其毒者。黃連犀角甘草煎湯。

三黃石膏湯 治傷寒溫毒表裏俱熱狂叫欲走煩躁大

渴面赤鼻乾兩目如火身形拘急而不得汗或已經汗

下過經不解三焦大熱譫狂鼻衄身目俱黃六脉洪數

及陽毒發斑陶節菴曰此因熱在三焦閉塞經絡津液營衛不通遂成此症

石膏兩黃芩兩黃連兩黃柏七錢梔子三錢麻黃二錢淡豉二合

每服一兩薑三片棗二枚細茶一撮煎熱服

此足太陽手少陰藥也表裏之邪俱盛欲治內則表未

除欲發表則裏又急故以黃芩瀉上焦之火黃連瀉中

焦之火黃栢瀉下焦之火梔子通瀉三焦之火而以麻

黃淡豉發散表邪石膏體重瀉火氣輕解肌亦表裏分

解之黃土水亦可解。烏頭功同附子。

而稍緩。附子性重峻。溫脾逐寒。烏頭性

輕疎。溫脾逐風寒。疾宜附子。風疾宜烏

頭。烏附尖吐風痰。治癩癩。取其鋒銳。

直達病所。丹溪治許白雲。屢用瓜蒂梔子。苦參藜蘆等劑。吐之不透。

後用附子尖和漿水與之。始得大吐膠痰數碗。天雄補下焦。

命門陽虛。寇宗奭張元素皆云。補上焦。丹溪曰。可為下部之佐。時珍

曰。其尖皆向下生。故下行。然補下。乃所以益上也。若上焦陽虛。則屬心肺之分。

當用參耆。不治風寒濕痺。為風家主藥。當用雄附矣。

發汗。又能止陰汗。側子散。側旁生。宜

消之藥也。

五積散。局方

治少陰傷寒。及外感風寒。內傷生冷。身熱無汗。頭痛身痛。項背拘急。胸滿惡食。嘔吐腹痛。寒熱往來。

脚氣腫痛。冷秘寒疝。寒瘧惡寒。無汗。婦人經水不調。上症

皆寒濕為病也

白芷 陳皮 厚朴六分 當歸 川芎 芍藥 茯苓

桔梗八分 蒼朮 枳殼七分 半夏 麻黃四分 乾薑 肉桂重表

者用桂枝一分 甘草三分 加薑葱煎。又法。除桂。正枳殼。陳皮。餘藥。

慢火炒。攤冷。入桂。芷。同煎。名熟料五積散。用炒者助其溫散也。

汗去蒼朮。麻黃。氣虛去枳殼。加人參。白朮。腹痛。挾氣。加

于發散四肢充達皮毛治手足風濕諸痺

草烏頭 辛苦大熱搜風勝濕開頑痰治

頑瘡以毒攻毒頗勝川烏然至毒無所

釀制不可輕投 野生狀類川烏亦名

烏喙薑汁炒或豆腐煮用熬膏名射罔

傅箭射獸見血立死

白附子 辛甘有毒大熱純陽陽明經藥

能引藥勢上行治面上百病陽明之脉營于面白

附能去頭面遊風補肝虛祛風痰治心

作面脂消斑疵痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕瘡

吳茱萸胃寒加煨薑陰症傷寒肢冷虛汗加附子婦人

調經加醋艾

此陰陽表裏通用之劑也麻黃桂枝所以解表散寒甘

草芍藥所以和裏止痛蒼朮厚朴平胃土而散滿陳皮

半夏行逆氣而除痰苦歸薑芷入血分而祛寒濕枳殼

桔梗利胸膈而清寒熱茯苓瀉熱利水寧心益脾所以

為解表溫中除濕之劑去痰消痞調經之方也一方統

治多病惟活法者變而通之本方能散寒積食積氣積血積痰積故名五積王海

藏曰桂枝麻黃芍藥甘草即各半湯也蒼朮陳草即平

胃也枳桔陳茯苓即枳桔半夏等湯也加芍歸治血又調經之方雖為內寒外感表裏之分所製實非仲景表

根如草烏之小者長寸許皺紋有節

炮用陶弘景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生

破故紙一名補骨脂

辛苦大温入心包命門

補相火以通君火煖丹田壯元陽縮小便

遺尿亦治治五勞七傷五藏之勞腰膝冷七情之傷

痛腎冷精流腎虛泄瀉腎虛則命門火衰不能薰蒸脾胃

胃脾胃虚寒遲于運化致飲食減少腹脹腸鳴嘔泄泄瀉如鼎釜之下無火物終不熟故補命門相火即所以補脾胃破

故紙四兩五味三兩肉寇二兩吳茱一兩薑煮棗九名四

神丸治五更腎瀉婦人血氣婦人之血脫氣陷亦

猶男子之墮胎出南番者色赤嶺南

裏桂枝麻黃薑附之的方也惟在活法變而通之陶節菴曰夫病不身熱頭痛初起怕寒腹痛嘔吐泄瀉踈臥沉黙不渴脉沉遲無力人皆知爲陰症矣至于發熱面赤煩躁揭去衣被脉大人皆不識認作陽症誤投寒藥死者多矣不知陰症不分熱與不熱不論脉之浮沉大小但指下無力重按全無便是浮陰急與五積散一服通解表裏之寒若內有沉寒必須薑附温之若作熱治而用涼藥則渴愈甚而躁愈急豈得生乎此取脉不取症也按傷寒有舍症取脉者又有舍脉取症者

本方合人參敗毒散名五積交加散治寒濕身體重痛

腰脚酸疼

麻黃白朮湯東垣治大便不通小便赤澁身面俱腫色黃

麻木身重如山喘促無力吐痰唾沫發熱時躁已振

寒項額如冰目中溜火鼻不聞香膻有動氣少腹急痛

者色綠酒浸蒸用亦有童便乳浸鹽水

炒者得胡桃胡麻良惡甘草唐鄭相國方破故紙

十兩酒浸蒸為末胡桃肉二十兩去皮

爛搗蜜和每日酒調一匙或水調服白

飛霞曰故紙屬火堅固元陽胡桃屬木

潤燥養血有木火相生之妙忌芸薑羊

血加杜仲名青娥丸

肉苁蓉 甘酸鹹温入腎經血分補命門

相火滋潤五藏益髓強筋治五勞七傷

絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛崩帶遺

精峻補精血時珍曰補而不峻故有苁蓉之號驟用恐

妨心滑大便 長大如臂重至斤許有

東垣曰此宿有濕熱伏于營血之中木火乘于陽道為上盛短氣喘促為陰火傷氣四肢痿弱為腎水不足冬時寒水得令乘其肝木尅火凌木大勝必有大復故見諸症

青皮 陳皮 黃連酒炒 黃栢酒炒 甘草炙 升麻二分 柴胡

桂枝 人參 黃耆 蒼朮泔浸 白朮土炒 厚朴 猪苓三分

茯苓 澤瀉 吳茱萸四分 白芷剉 炒麩五分 麻黃不去

節六分 杏仁四粒研 分二服

此是三陽三陰通治之劑也前症蓋因表裏俱傷陽氣

抑不得升故風火濕熱鬱而為病也桂枝麻黃解表祛

風升麻柴胡升陽散火黃連黃栢燥濕清熱而黃栢又

能補腎滋陰寇朴青陳利氣散滿而青柴又能平肝寇

松子鱗甲者良。酒浸一宿。刷去浮甲。劈

破除內筋膜。酒蒸半日。又酥炙。用忌鐵

蘇恭曰。今人所用。皆草蓰蓉。功力稍劣。

瑄陽

甘溫補陰益精興陽潤燥養筋筋強

故能興陽

治痿弱滑大腸

便燥者啖之可代蓰蓉。煮粥彌佳。

鱗甲節比狀類男陽酥炙

巴戟天

甘辛微溫入腎經血分強陰益

精治五勞七傷辛溫散風濕治風氣脚

氣水腫根如連珠擊破中紫而鮮潔

者偽也中雖紫微有白粉粉色而理小

朴又能溫胃杏仁利肺下氣神麩化滯調中吳萸煖腎

溫肝參耆甘草蒼白二朮補脾益氣二苓澤瀉通利小

便使濕去而熱亦行方內未嘗有通大便之藥益清陽

升則濁陰自降矣昂按此方蓋合四君五苓補中平胃

既多故所用表裏寒熱補瀉之藥俱備但皆氣藥而無

血藥與五積不同然乃東垣之方錄之以見治療之中

又有此一種也

參蘇飲元戎治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽痰塞中焦

眩暈咳煩傷風泄瀉及傷寒已汗發熱不止發熱頭痛外感也咳

嗽痰壅嘔逆泄瀉內傷也

已汗而熱不止陰虛也
人參 紫蘇 乾葛 前胡 半夏薑汁炒 茯苓七錢 陳

暗者真也。蜀產佳。山葦根似巴戟，但色白，人或醋煮以亂之。

去心酒浸焙用。覆盆子為使。惡丹參。

胡盧巴 苦溫純陽入右腎命門。煖丹田。

壯元陽治腎藏虛冷。陽氣不能歸元。同附

子硫 瘕疝冷氣。同茴香巴戟川黃烏川棟吳茱萸寒濕脚

氣 出嶺南番舶者良。云是番萊服子。

酒浸暴或蒸或炒。

仙茅 辛熱有小毒。助命火益陽道。明耳。

目補虛勞。治失溺。無子。心腹冷氣不能。

食溫腰脚冷痺不能行。煖筋相火盛者。

皮去甘草 枳殼炒桔梗 木香錢二 每五錢加薑棗

煎外感多者去棗加葱。白肺中有火去人參。加杏仁桑

白皮瀉肺泄瀉加白朮扁豆蓮肉。健脾炒燥濕

此手足太陰藥也。風寒宜解表。故用蘇葛前胡。勞傷宜

補中。故用參苓甘草。橘半除痰止嘔。枳桔利膈寬腸。木

香行氣破滯。使內外俱和。則邪散矣。溢飲身重注痛者亦宜此湯和解之。

劉宗厚曰：此出少陽柴胡例。藥治感冒異氣。拔痰飲之

病。本方云：前胡葛根。自能解肌。枳殼橘紅葷。自能寬中。

快膈。毋以性涼為疑。愚觀藥性非涼。亦是辛平之劑。元

戎謂參蘇飲。治一切發熱。皆效。謂有風藥解表。有氣藥

和中。則外感風寒。內積痰飲。並可用也。合四物。名茯苓

補心湯。尤能治虛熱。及吐衄便血。乃虛實表裏兼治之

劑。然不可遇。

忌服 葉如茅而略濶根如小指黃白

多涎竹刀去皮切糯米泔浸去赤汁出

毒用忌鐵唐婆羅門始進此方當時盛傳服之多效照前製陰乾蜜

九酒服禁食牛乳牛肉許真君書云甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨

酸能養筋滑能養膚和苦酒服之必效也

淫羊藿 辛香甘温入肝腎補命門時珍曰手

足陽明三焦命門藥益精氣堅筋骨利小便治絕

陽不興絕陰不產冷風勞氣四肢不仁

手足麻木一名仙靈脾北部有羊一日百

合食此藿所致故名去枝羊脂拌炒山

本方去人參前胡加川芎柴胡薑棗煎名為蘇飲瘧疾

傷風寒外有發熱頭痛惡寒內有咳嗽吐痰氣逆此

實熱故去人參加川芎為通陰陽血氣之使

蘇飲局 治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶

噯氣惡食內經曰卑下之地春氣常在故東南卑濕之區風氣柔弱易傷風寒俗稱感冒受邪膚淺

之名也由鼻而入在于上部客于皮膚故無六經形症惟發熱頭痛而已胸滿噯氣惡食則兼內傷也○輕為感冒重者為傷又重者為中

香附炒紫蘇二錢陳皮去白甘草七分加薑葱煎傷食加

消導藥咳嗽加杏仁桑皮有痰加半夏痛加川芎白

芷傷風自汗加桂枝傷寒無汗加麻黃乾薑傷風鼻塞

表裏

藥為使得酒良

蛇床子

辛苦而溫強陽益陰補腎散寒

祛風燥濕治陰痿囊濕女子陰痛陰癢

濕生蟲同

擦煎湯洗

子藏虛冷產門不閉炒熱腎

命之病及腰酸體痺帶下脫肛喉痺齒

痛濕癬惡瘡殺蟲風濕諸病煎湯浴去

風癢時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨

此而求補藥于遠域

豈非負耳賤目乎似小茴而細微

炒殺毒則不辣以地黃汁拌惡丹皮貝

母巴豆

頭昏加羌活荆芥心中卒痛加延胡索酒一杯

此手太陰藥也紫蘇疏表氣而散外寒香附行裏氣而

消內壅橘紅能兼行表裏以佐之橘紅利氣兼能發表

而食亦消矣甘草和中亦能解表為使也

茵陳丸外臺治時氣瘡氣黃病痰瘧赤白痢等症

茵陳 梔子 鼈甲炙 芒硝二兩 大黃五兩 常山 杏仁炒

巴豆一兩去心皮炒 豉五合 蜜丸梧子大每服一九或吐或

利或汗如不應更服一九不應則以熱湯投之老幼以

意加減

此足太陽太陰陽明厥陰藥也梔子淡豉梔豉湯也合

兔絲子

甘辛和平凝正陽之氣入足三

陰脾肝強陰益精温而不燥不助相火

治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴脾虛

而生内熱兔祛風明目補衛氣助筋脉腎燥

益氣力肥健人補肝腎之效老學菴筆記予族弟少服兔絲子

凡數年飲食倍常血氣充盛忽因浴見背腫隨視隨長乃大疽也適值金銀花開飲至數斤腫遂消兔絲過服尚能作疽以此知金石藥不可不戒無

根蔓延草上子黃如黍粒得酒良淘去

泥沙酒浸一宿暴乾搗末山藥為使

覆盆子 甘酸微温益腎藏而固精補肝

常山可以涌吐合杏仁可以解肌大黃芒硝承氣湯也

可以蕩熱去實合茵陳可以利濕退黃三藥名茵陳口湯治黃正藥力

巴豆大熱以祛臧府積寒加鼈甲滋陰以退血分寒熱

此方備汗吐下三法故能統治諸病居平當預合之以

備緩急雖云劫劑實佳方也

虛而明目。起陽痿縮小便。寇氏曰服之當覆其溺器

故澤肌膚烏髭髮。柞汁塗髮不白女子多孕同

蜜為膏治肺氣虛寒。李士材曰強腎無燥熱之偏固精無

凝滯之害金王之品也

狀如覆盆故名去蒂淘

淨搗餅用時酒拌蒸。葉絞汁滴目中。

出目弦蟲除膚赤收濕止淚

蕤藜子 苦温補腎辛温瀉肺氣而散肝

風益精明目 肝以散為補凡補肝藥皆能明目 治虛勞

腰痛遺精帶下咳逆肺痿乳閉癥瘕痔

漏陰癘 音頽 肺肝腎三經之病催生墮胎

刺蕤藜主惡血故能破癥下胎 沙苑蕤藜綠色似腎

故補 炒用 亦可代茶 刺蕤藜三角有刺去刺

酒拌蒸 風家宜刺蕤藜補腎則沙苑者為優 餘功略同 瑞竹

堂方牙齒打動者蕤藜根燒灰傅之

使君子 甘温健脾胃除虛熱殺藏蟲治

五疳便濁瀉痢瘡癬為小兒諸病要藥

醫方集解卷二

和解之劑 邪在表宜汗在上宜吐在裏宜下若在半表半裏則從中治宜和解故仲景于少陽

症而以汗吐下三者為戒也昔賢云或熱病脉燥盛而不得汗者陽脉之極也死然有當和解之症汗之不得汗和解之力到汗自出而解慎勿錯認為死症

也由是觀之和解之劑用以分理陰陽調和營衛顧

不重

小柴胡湯 景仲 治傷寒中風少陽症往來寒熱胸脇痞滿

默默不欲食心煩喜嘔或腹中痛或脇下痛或渴或欬

或利或悸小便不利口苦耳聾脉弦或汗後餘熱不解

及春月時嗽瘧發寒熱婦人傷寒熱入血室 寒為陰熱為陽裏為

陰表為陽邪客于半表半裏陰出與陽爭陰勝則寒陽入與陰爭陽勝則熱陽不足則先寒陰不足則先熱又

經疏曰。五疳便濁。為痢腹蟲。皆由脾胃虛弱。因而乳停食滯。濕熱痰塞。而成脾胃健。則積滯消。濕熱散。水道利。而前症盡除矣。時珍曰。凡殺蟲之藥。多是苦辛。獨使君子。榧子甘。而殺蟲。每月上旬。蟲頭向上。中旬頭橫。下旬向下。道藏云。初一至初五。蟲頭向上。凡有蟲病者。每月上旬。空心食數枚。蟲皆死而出也。

出閩蜀五瓣有稜內仁如榧亦可煨食久則油黑不可用忌飲熱茶犯之作瀉

益智子 辛熱本脾藥兼入心腎主君相

二火補心氣命門三焦之不足心為脾母補火

故能生土能膏精固氣本草未載又能開發鬱結

使氣宣通味辛能散温中進食攝涎胃冷則涎

曰太陽行身之後屬膀胱寒水為表陽明行身之前屬胃燥金為表之裏邪在于中近後膀胱水則寒近前陽明燥則熱也寒熱有定時者為瘧無定時者為往來寒熱以熱在表而淺邪惡正故畏寒寒已復熱此邪未併于表裏故寒熱微而無定時也半表半裏屬足少陽胆脉行于兩脇手少陽三焦之脉絡心包風邪干之心氣不得宣暢故煩滿或攻胸脇故又胸脇痛也邪在表則呻吟不安在裏則煩而悶亂邪自表而方傳裏故默默靜也經曰陽入之陰則靜邪在表則能食入裏則不能食今在表裏之間故但不欲食未至于不能食也邪在表則不煩不嘔在裏則煩嘔表方傳裏故心煩喜嘔也裏虛協熱故或渴或利或腹中痛裏有停飲故悸而小便不利少陽胆脉絡于耳故耳聾胆氣上溢故口苦胆與肝皆屬木故脉弦春月時嗽少陽當令之時也血室衝脉也男女皆有之婦人傷寒七八日邪當傳裏值經水適來則邪不入府乘虛而入血室或經水適斷表邪乘虛亦入血室熱與血搏結而不行至有寒熱如瘧暮則譫語如見鬼狀在男子則下血譫語皆為熱入血室婦人傷寒與男子無異恐熱入血室姪姬傷寒為不同也小柴胡在經主氣在藏主血故更能入血室經曰傷

通縮小便。腎與膀胱相表裏。益腎辛溫。固腎鹽水炒。同烏藥等分酒。

煮山藥糊丸。鹽湯下。名縮泉丸。治嘔吐泄瀉。客寒犯胃。

冷氣腹痛崩帶泄精。瀉精固氣。因熱而崩。濁者禁用。

出嶺南形如棗核用仁。

砂仁。即縮砂。蜜。

辛溫香竄補肺益腎和胃醒。

脾快氣調中通行結滯治腹痛痞脹。痞。有傷寒下早裏虛邪入而痞者。有食壅痰塞而痞者。有脾虛氣弱而痞者。須分虛實治之。不宜常用利氣藥。恐變為鼓脹。鼓脹內脹而外有形。痞脹惟覺滿悶而已。皆太陰為病也。

噎膈嘔吐上氣咳嗽赤白瀉。濕熱積滯。容于太腸。霍亂轉筋奔豚。

痢。砂仁亦入大小腸經。

寒中風有柴胡症。但見一症便是。不必悉具。又曰傷寒五六日。發熱而嘔。醫以他藥下之。柴胡症仍在者。復與柴胡湯。必蒸蒸而振。發熱汗出而愈。或濕熱在半表半裏而發黃者。仍與小柴胡湯。和其表裏。雖雜症不能外也。亦治傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿不。

欲食大便鞭。脉細者為陽微結。

仲景曰。汗出為陽微。假令純陰結。不得復有外。

症。脉雖沉緊。不得為少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭有汗。故知非少陰也。蓋三陰脉皆至頸胸中而還。不上循頭。程郊倩曰。熱須結而不甚也。以有微惡寒之半表在。至于脉沉。雖似裏陰。則又有頭汗出之症。以別之。凡脉細。脉沉。脉緊。皆陽熱鬱結之症。無關少陰也。可見陽氣一結。不但陽症似陰。陽脉亦似陰矣。

柴胡八兩。半夏半升。人參。甘草。黃芩。生薑三兩。大棗十二枚。

嘔逆。加生薑。陳皮。生薑散逆。陳皮順氣。煩而不嘔。去半夏。人。

參加栝蒌。以蕩熱渴者。去半夏。加花粉。生。若不得渴。外有微。

崩帶祛痰逐冷消食醒酒止痛安胎氣行

則痛止氣散咽喉口齒浮熱化銅鐵骨

更王好古曰得檀香荳蔻入肺得人參益智入脾得黃栢茯苓入腎得赤石脂入大小腸醫通曰辛能潤腎燥引諸藥歸宿丹田地黃用之拌蒸亦取其能達下也經疏曰腎虛氣不歸元用為嚮導殆勝桂附熱藥為害出嶺

南研用

白荳蔻 辛熱流行三焦温煖脾胃三焦利脾

胃轉諸症自平而為肺家本藥肺主散滯氣消

酒積除寒燥濕化食寬膨治脾虛瘧疾

感寒腹痛吐逆反胃肺胃火盛及氣虛者禁用白睛

熱去人參加桂枝覆取微汗解肌咳嗽去參棗生薑加五

味子乾薑咳為氣逆肺寒五味斂肺乾薑散寒戴元禮曰少陽有嗽無喘有喘非少陽也陽明有喘

無嗽有嗽非正陽明也虛煩加竹葉粳米竹葉涼心粳米和胃齒燥無津加

石膏齒燥屬陽明火石膏清胃止渴痰多加瓜蒌貝母能去熱痰腹痛去黃

芩加芍藥黃芩寒中芍藥合甘草和裏脇下痞鞭去大棗加牡蠣大棗

甘令人滿牡蠣鹹能軟堅脇下痛加青皮芍藥脇為肝胆之部痛屬肝火二藥平肝心

下悸小便不利去黃芩加茯苓經曰太陽症飲水多心下必悸水停心下故悸

水畜不行故小便不利黃芩苦反堅腎茯苓淡能利水本經頭痛加川芎入肝活血散鬱

隆發黃加茵陳利濕

此足少陽藥也胆為清淨之府無出無入其經在半表

翳膜白睛屬肺能散肺滯太陽經目皆紅筋番

船者良研用

肉荳蔻一名肉菓辛溫氣香理脾煖胃下氣

調中逐冷祛痰消食解酒治積冷心腹

脹痛挾痰挾食者並宜之中惡吐沫小兒吐逆乳

食不下又能瀉大腸止虛瀉冷痢初起忌用

出嶺南似草蔻外有皺紋內有斑紋

糯米粉裏煨熟用忌鐵

草荳蔻一名草菓辛熱香散煖胃健脾破氣

開鬱燥濕祛寒除痰化食治瘴癘寒瘧

中裏不可汗吐下法宜和解仲景曰少陽中風耳聾目赤胸滿而煩不可吐下吐

下則悸而驚釋曰邪在半表半裏以吐除煩吐則傷氣氣虛者悸以下除滿下則亡血血虛者驚又曰傷寒脉

弦細頭痛發熱者屬少陽不可汗汗之則譫語釋曰汗之亡津液少陽之邪因之入胃故譫語邪入本

經乃由表而將至裏當微熱發表迎而奪之勿令傳太

陰柴胡味苦微寒少陽主藥以升陽達表為君黃芩苦

寒以養陰退熱為臣陽不足則陰濇之故發寒用黃芩降陰氣使不陷入陽中則不寒陰

不足則陽濇之故發熱用柴胡升陽氣使不陷入陰中則不熱又曰柴胡黃芩之苦寒以退熱半夏生薑之辛

溫以退寒人參大棗甘草之甘溫以助正氣半夏辛溫能健脾和胃以散逆

氣而止嘔人參甘草以輔正氣而和中使邪不得復傳

入裏為佐二藥固太陰使木邪不致尅土然必虛人方可加參邪在半表半裏則

佐常山能截瘧。或與知母同用。取其一

陰一陽治寒熱瘴癘。蓋草菓治太陰獨

勝之寒。知母治寒客胃痛。散滯氣利膈

陽明獨勝之火。痰因滯因寒

者多。霍亂瀉痢噎膈反胃痞滿吐酸痰

飲積聚解口臭氣酒毒魚肉毒。故食料

過劑助脾熱耗氣損目。閩產名草寇

如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁如

砂仁而辛香氣和滇廣所產名草菓如

訶子皮黑厚而稜密子粗而辛臭雖是

一物微有不同。麵裏煨熟取仁用忌鐵

香附一名莎。性平氣香味辛能散微苦

草根

營衛爭。表屬衛。故用薑棗之辛甘。以和營衛為使也。李

珍曰。少陽症雖在半表半裏。而胸膈痞滿實兼心肺上

焦之邪。心煩喜嘔。默默不欲食。又兼脾胃中焦之症。故

用黃芩。以治手足少陽相火。黃芩亦少陽藥也。芩甚辛

夏止嘔。和胃健脾。亦通治煩嘔不欲食寒熱間作。脾亦

有之。不獨少陽也。小柴胡之用半夏。以邪在半表半裏

則陰陽爭。用半夏和胃。而通陰陽也。靈樞經用治不眠

亦同此意。而仲景治喉痺咽痛。及大小便秘。皆用半夏

取其辛能潤燥。又能散也。丹溪謂半夏能使大便潤。而

小便長。今人專以半夏為除痰之藥。稍涉燥症。輒不敢

用。而半夏之功用不復見。知于世矣。徐忠可曰。小柴胡

能引清氣而行。陽道能引胃氣上行。而行春令。能散諸

經血凝氣聚。故凡邪之表裏混雜者。俱藉之以提出少

陽。俾循經而散。以柴甘生薑為定藥。餘則加減隨症耳。

陶節菴曰。本經症。心下飽悶。未經下者。非結胸也。乃表

邪傳至胸中。未入于府。尚為在表。只須小柴胡加枳桔

不效。就以本方對小陷胸。加枳桔一服。豁然。其效如神。

喻嘉言曰。傷寒分表裏中三治。表裏之邪俱盛。則從中

而和之。故有小柴胡之和法。用人參甘草半夏生薑大

能降微甘能和乃血中氣藥通行十二

經八脉氣分主一切氣人身以氣為主氣盛則強虛則

衰順則平逆則病絕則死矣經曰怒則氣上恐則氣下喜則氣緩悲則氣消驚

則氣亂思則氣結勞則氣耗此七情之氣也以香附為君隨症而加升降消補

之藥利三焦解六鬱痰鬱火鬱氣鬱血鬱濕鬱食鬱止諸

痛通則治多怒多憂痰飲痞滿胸腫腹

脹飲食積聚霍亂吐瀉腎氣脚氣癰疽

瘡瘍血凝氣滯所致香附一味末服名獨勝丸治癰疽由鬱怒得者如瘡

初作以此代茶潰後亦宜服之凡瘡疔喜服香藥行氣通血最忌臭穢不潔

觸之康祖左耳病癰又臆間生核痛楚

半載禱張王夢授以方薑汁製香附為

裏助脾之中但帶柴胡一味透表黃芩一味透裏飲入胃中聽胃氣之升者帶柴胡出表胃氣之降者帶黃芩

入裏一和而表裏之邪盡服未盡者加工治之不相扞格矣又曰虛勞發寒熱者乃衛虛而感寒營虛則發熱

耳緩調營衛俾不亢戰寒熱自止若誤用小柴胡俾汗多而衛傷于外便溏而營傷于內虛熱轉加病益甚矣

吳綬曰小柴胡為半表半裏之劑太陽經之表熱陽明經之標熱皆不能解也若夫易氣虛寒而卡發熱水元

足冷者服之立見危殆及內有虛寒大便不實婦人新產發熱皆不可用也李士材曰今人治傷寒不分陰陽

表裏槩用此方去參投之以為平穩殺人多矣不獨峻劑也○李東垣曰若血受病亦先調氣謂氣不調則血

不行氣夫血婦也如婦人經病先柴胡以行經之表次四物以行經之裏亦先氣而後血也

本方以前胡易柴胡名小前胡湯崔氏治同胡洽云亦仲景方

方加陳皮芍藥名柴胡雙解散節治同本方加芒硝名

柴胡加芒硝湯仲景見表裏門本方加桂枝名柴胡加桂枝湯

虛鹽水浸炒則入血分而潤燥。或蜜水炒

鹽炒則補腎氣。酒浸炒則行經絡。醋浸

炒則消積聚。且斂其散薑汁炒則化痰飲炒

黑又能止血忌鐵。時珍曰得參朮則補氣得歸地則補血得

木香則散滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼朮則絕

解諸鬱得梔子黃連則清降火熱得茯苓則交濟心腎得茴香破故紙則引氣

歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則發汗散邪得三稜莪朮則消積

磨塊得艾葉則治血氣煖子宮乃氣病之總司女科之仙藥也大抵婦人多鬱

氣行則鬱解故服之尤效非宜于婦人不宜于男子也李士材曰乃治標之劑

惟氣實血未大虛者宜之不然恐損氣而燥血愈致其疾矣世俗泥于女科仙

傷寒傳足不傳手。其實原無界限。此症邪熱于心。神明內亂。故致煩驚譫語。仲景加入心藥數種。不專以足經之治也。本方去半夏。人參薑棗加桂枝乾薑花粉牡蠣

名柴胡桂枝乾薑湯。仲景治傷寒汗下後胸脇滿微結小

便利渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。頭汗寒熱而兼

滿渴。表裏皆有邪。故除人參半夏。而加桂枝以解太陽。乾薑以散滿。花粉以生津。牡蠣以奠堅。以此和解復津

液而助陽。亦治瘧發寒多熱少。或但寒不熱。喻嘉言曰小柴胡本陰陽兩停

之方。可從寒熱以為進退。此方加薑桂則進而從陽。其加苓連以退而從陰。可以類推。李樾曰傷寒餘熱未盡

重感六淫之氣變而為瘧。治法與雜病不同。寒多熱少。或單寒者。太陽邪變也。柴胡桂枝湯熱多寒少。或單熱

骨節煩痛者。陽明邪變也。白虎湯加桂。寒熱相等。或先熱者。少陽變邪也。小柴胡湯渴者。去半夏加花粉知母

寒熱大作。戰慄汗出不散者。太陽陽明合病也。桂枝石膏湯。服此後瘧愈甚者。三陽合病也。恐傳入陰經。急用

藥之一語惜未
有發明及此者

木香 辛苦而溫三焦氣分之藥能升降

諸氣泄肺氣疏肝氣和脾氣怒則肝氣上肺氣調

則金能制木而肝平木不尅土而脾和治一切氣痛九種

心痛痛屬胃腕曰寒痛熱痛氣痛血痛濕痛痰痛食痛疝痛悸痛蓋君心

不易受邪真心痛者手足冷過腕節朝發夕死嘔逆反胃霍亂

瀉痢後重同柝柳用劉河間曰痢疾行血則膿血自愈調氣則後重

除癰閉痰壅氣結疔癩癥塊腫毒蠱毒

衝脉為病氣逆裏急殺鬼物禦瘴霧去

腋臭實大腸消食安胎氣逆則胎不安過服泄

桂枝黃芩湯如傳入陰經從卯至午發而嘔吐大便閉

者大柴胡湯下之從午至酉發而腹滿便閉者大承氣

湯下之從酉至寅發而欲狂喜忘便黑者桃仁承氣湯

微利之不敢下者梔子升麻湯若挾痰食瘴氣治法與

雜病略同附桂枝石膏湯桂枝一錢黃芩二錢石膏知

母各三錢桂枝黃芩湯即小柴胡湯加石膏二錢知母

二錢桂枝五分李樾曰二方以桂枝治太陽白虎治陽

明柴胡治少陽意甚明顯挾痰合二陳食積合平胃溺

澀合五苓便閉合大柴胡無汗加葛根蒼朮有汗加黃

耆白朮夜發加白芍桃仁日久加常山柝柳吐之治瘧

之法本方去半夏加花粉名柴胡去半夏加栝蒌根湯

盡矣治往來寒熱而渴及勞瘧花粉潤燥生津太陽小便

不利而渴宜調胃承氣大柴胡已利而渴宜白

虎少陽寒熱往來而渴宜此湯遇勞即發名勞瘧本方

去柴胡黃芩加厚朴名厚朴生薑半夏甘草人參湯仲景

治發汗後腹脹滿者凡吐下後脹滿者乃當汗不汗誤

與吐下表邪乘虛入裏邪氣盛則

真氣。丹溪曰。味辛氣升。若陰火衝上者。反助火邪。當用黃柏。知母。少以木香佐之。王好古曰。本草主氣劣氣不足。補也。通壅導氣。破也。安胎健脾胃。補也。除痰癖。癥塊。破也。不同如此。江機曰。以補藥為佐。則補。以瀉藥為君。則瀉。時珍曰。諸氣臏鬱。皆屬于肺。上焦氣滯。用之者。金鬱泄之也。中氣不運。皆屬于脾。中焦氣滯。用之者。脾胃喜芳香也。大腸氣滯。則後重。膀胱氣不化。則癃閉。肝氣鬱則為痛。下焦氣滯。用之者。塞者通之也。

番舶上來形如

枯骨味苦粘舌者良名青木香。今所用者皆廣

木香。土磨汁用。東垣用黃連製亦有蒸

木香。用麩裹煨用者。煨用實。腸止瀉。畏火。

藿香。辛甘微温。入手足太陰。脾快氣和。

實之症也。汗後表已解。而脹滿者。知非裏實。緣脾胃氣虛。陰氣內壅。而為脹也。法當補虛散滯。本方除

半夏。加當歸。白芍。大黃。名柴胡飲子。和治肌熱。蒸熱。積

熱。汗後餘熱。脉洪實。弦數。表為肌熱。裏為蒸熱。壅為積熱。言曰。于和法中。略

合平胃散。名柴平湯。治濕瘧。身痛。身重。本方加青黛。薑汁糊丸。名清鎮丸。古治嘔吐。脉弦。頭痛。及熱嗽。本方一

分加四物二分。名柴胡四物湯。治婦人日久虛勞。微有寒熱。本方與四物各半。名調經湯。

治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

黃連湯。景。治傷寒胸中有熱。而欲嘔。胃中有寒。而腹痛。

中開胃止嘔胃弱胃熱而嘔者忌用去惡氣進飲

食治霍亂吐瀉心腹絞痛肺虛有寒上

焦壅熱能理脾肺之氣古方有藿香正氣散正氣通暢則邪逆自除

出交廣方莖有節葉微似茄葉古惟

用葉今枝梗亦用之因葉多偽也

茴香古作懷香大茴辛熱入腎膀胱煖丹田

補命門開胃下食調中止嘔療小腸冷

氣癩疝陰腫疝有七種氣血寒水筋孤癩也肝經病不屬腎經以厥陰肝脉絡陰器也多因寒濕所致亦有挾虛者當加參朮于溫散藥中乾

濕脚氣多食損目發瘡小茴辛平理氣

成氏曰濕家下後舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而為下寒上熱也胃中有邪氣使陰不得升而獨治于下為下寒腹中痛陽不得降而獨治于上為胸中熱欲嘔吐與此湯以升降陰陽

黃連炒 乾薑炒 桂枝 甘草三兩 人參二兩 半夏半升 大棗二十枚

此足陽明藥也黃連苦寒泄熱以降陽薑桂辛溫除寒以升陰人參助正祛邪半夏和胃止嘔甘草大棗調中止痛上中二焦寒熱交戰以此和解之喻嘉言曰濕家下之舌上如胎

者丹田有熱胸中有寒也仲景亦用此湯何耶蓋傷寒分表裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和之故有小柴胡之和法至于丹田胸中之邪在上下而不在表裏即變柴胡為黃連湯以桂枝代柴胡以黃連代黃芩以

開胃亦治寒疝食料宜之。大如麥粒。

輕而有細稜者名大茴。出寧夏。他處小

者名小茴。自番舶來。實八瓣者名八角。

茴香炒黃用得酒良。得鹽則入腎。發腎

邪。故治陰疝。受病于肝。見疝于腎。大小茴各一兩為末。猪肝一箇。

連尿入藥酒者爛為丸服。

甘松香。甘温芳香。理諸氣。開脾鬱。治腹

卒滿痛。風疝。齒齩。脚膝氣浮。煎湯淋洗。

出涼州及黔蜀。葉如茅根。極繁密。用根。

山奈。辛温煖中。辟惡。治心腹冷痛。寒濕

乾薑代生薑飲入胃中。聽胃氣之上下敷布。故不問下寒上熱。上寒下熱。皆可治之也。夫表裏之邪。則用柴芩用生薑之辛以散之。上下之邪。則用桂連用乾薑之辣以開之。仲景聖法灼然矣。昂按上下未有不分表裏者。大槩上焦屬表。中下屬裏。胸中與太陽為近。故用桂枝。嘉言着眼雖高。而立言尚有未盡。

黃芩湯仲景治太陽少陽合病自下利者。合病者謂有太陽症之身熱頭

痛脊強。又有少陽症之耳聾脇痛嘔而口苦寒熱往來也。自利者不因攻下而泄瀉也。自利固多可温。然腸胃有積結與下焦客熱。又非温劑所能止。或分利之。或攻泄之可也。成氏曰。太陽陽明合病下利。為在表與葛根湯以汗之。少陽陽明合病下利。為陽邪入裏與承氣湯以下之。此太陽少陽合病下利。為在半表半裏與黃芩湯以和解之。

黃芩三兩芍藥二兩甘草二兩大棗十二枚

此足太陽少陽藥也。成氏曰。虛而不實者。苦以堅之。酸

霍亂風蟲牙痛 生廣中根葉皆如生

薑入合諸香用

良薑 辛熱煖胃散寒消食醒酒治胃脘

冷痛

凡心口一點痛俗言心氣痛非也乃胃脘有滯或有蟲及因怒因寒而起以良薑酒洗七次香附醋洗七次

焙研因寒者薑二錢附一錢因怒者附二錢薑一錢寒怒兼者每錢半米飲加

薑汁一匙鹽少許服初梁緄患心脾痛夢神授此方二味等

分服後人各炒分用 霍亂瀉痢吐惡噎

膈瘡瘧冷癖肺胃熱者忌之 出嶺南

高州子名紅荳蔻温肺散寒醒脾燥濕

消食解酒 東垣脾胃藥中常用之 並東壁土炒用

以收之黃芩芍藥之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足

者甘以補之甘草大棗之甘以補腸胃之弱 昂按二經合病何以

不用二經之藥蓋合病而兼下利是陽邪入裏則所重者

在裏故用黃芩以徹其熱而以甘草大棗和其太陰使裏氣和則外症自解和解之法非一端也○仲景之

書一字不苟此症單言下利故此方亦單治下利機要用之治熱痢腹痛更名黃芩芍藥湯潔古因之加木香

祗榔大黃黃連歸尾官桂更名芍藥湯治下痢仲景此方遂為萬世治痢之祖矣

本方加半夏 升生薑 二名黃芩加半夏生薑湯 仲景治前

症兼嘔者 嘔胃氣逆也加半夏生薑以散逆氣千金曰生薑嘔家聖藥是散其逆氣也金匱曰嘔家

用半夏以去其水水去則嘔止是下其痰飲也亦治胆府發欬嘔苦水如胆汁

胃氣逆則嘔苦本方除大棗名黃芩芍藥湯治火升鼻

胆液溢則口苦

葦菱一作撥

辛熱除胃冷。溫中下氣。消食。

祛痰治水瀉氣痢。

牛乳點服

虛冷腸鳴。

亦入大腸

經冷痰惡心嘔吐酸水。疔瘰陰疝。辛散。

陽明之浮熱治頭痛。

偏頭痛者。口含溫水。隨左右。以末吹

一字入鼻。效。

牙痛。

寒痛宜乾薑葦菱細辛。熱痛宜石膏牙硝。風痛宜皂

角。蠶蠶蜂房二烏。蟲痛宜石灰雄黃。

鼻淵多服泄真氣動。

脾肺之火損目。

出南番嶺南亦有類。

椹子而長青色。去挺用頭醋浸。括淨皮。

粟免傷人肺。

烟草新

辛溫有毒。治風寒濕痺滯氣停。

衄及熱痢。

外黃芩湯。黃芩人參乾薑。

各三兩

桂枝

一兩

半夏

半斤

大棗

二十枚

治乾嘔下痢。

芍藥甘草湯。

治腹中不和而痛。

此陰陽氣血不和。肝木乘脾而然。○腹痛有寒

有熱有虛有實有食積有濕痰有死血有蟲寒痛者。痛無增減。或兼吐利。熱痛者。時痛時止。腹滿堅結。實痛者。痛甚脹滿。手不可按。虛者。按之即止。食痛者。痛甚則利。利後痛減。死血痛者。知有常處。濕痰痛者。脈滑痰氣阻礙。不得升降。蟲痛者。時作時止。面白唇紅。大抵胃脫下大腹痛者。多屬食積。外邪。遠臍痛者。屬痰火積熱。臍下少腹痛者。屬寒。仲景用治誤表發厥。腳攣吐逆。與乾或痰血。或溺澀。

薑甘草湯。以復其陽。厥愈足溫者。更作此湯。以和其陰。

其脚即伸。

酸甘相合。用補陰血。王海藏曰。稼穡作甘。其者已也。曲直作酸。酸者甲也。甲已化土。此伸。

痰山嵐瘴霧其氣入口不循常度頃刻

而周一身令人通體俱快醒能使醉醉

能使醒饑能使飽飽能使饑人以代酒

代茗終身不厭故一名然火氣薰灼耗

血損年人自不覺耳烟筒 閩產者佳中水

能解蛇毒

金銀花 甘寒入肺散熱解毒清熱即甫是解毒不

虛凡味甘者皆補 療風養血止渴丹溪曰癰疽安後發渴黃

者六一湯吞忍冬丸切當忍 治癰疽疥

癬楊梅惡瘡腸癖血痢五種尸疰經

景妙方也

白芍藥 甘草各四兩 脈緩傷水加桂枝生薑脈洪傷

金加黃芩大棗脉瀦傷血加當歸脉弦傷氣加芍藥脉

遲傷寒加乾薑

此足太陰陽明藥也氣血不和故腹痛白芍酸收而苦

泄能行營氣炙草温散而甘緩能和通氣又痛為木盛

剋土諸痛皆屬肝木 白芍能瀉肝甘草能緩肝而和脾也虞天民曰

白芍不惟治血虛大能行氣腹痛者營氣不和逆于肉

裏得白芍行其營氣又以甘草之甘緩和其逆氣此不

治之治乃所以深治之也 本方去芍藥加乾薑仲景別 名甘草乾薑湯見寒門 金匱

冬不凋一名忍冬。又名左纏藤。花葉同功。花

香尤佳。釀酒代茶熬膏並妙。忍冬酒治癰疽發背。

一切惡毒初起便服奇效。乾者亦可。不及生者力速。忍冬五兩。甘草一兩。水二碗煎至一碗。再入酒一碗。畧煎。分三服。一日一夜服盡。重者日二劑。服至大小腸通利。則藥力到。忍冬丸照前分兩。酒煮晒乾。同甘草為末。以所煮餘酒打糊為丸。陳藏器云。熱毒血痢。濃煎服之。為末糖調。常服能稀痘。

蒲公英一名黃花地丁。甘平。花黃屬土。入太陰

陽明。胃。化熱毒。解食毒。消腫核。治乳癰。乳頭屬厥陰。乳房屬陽明。同。忍冬煎入少酒服。搗敷亦良。疔毒亦

為通淋妙品。諸家不言治淋。試之甚驗。擦牙烏鬚髮。

用此治肺痿肺冷。吐涎沫。小便數。以此本方加附子。名

芍藥甘草附子湯。仲景別見寒門。本方加黃芩。名黃芩芍藥湯。

機要治熱痢腹痛。後重身熱。膿血稠粘。及鼻衄不止。脉洪數。此即仲景之黃芩湯。除大棗。本方加白朮。名白朮芍藥湯。機要治脾

濕水瀉身重困弱。保命集曰。瀉痢不止。或暴下者。皆太陰。故須白朮。四時下痢。于白芍白朮內。春加防風。夏加黃芩。秋加厚朴。冬加桂附。更詳外症治之。如身困倦。加白朮。自汗逆冷。氣息微。加附桂以溫之。如裏急後重。膿血稠粘。雖在盛冬。于溫藥內。亦加大黃。

栝蒌薤白白酒湯。金。治胸痺。喘息咳唾。胸背痛。短氣。胸

者。心肺之分。故喘息而咳唾。諸陽受氣于胸中。轉行于背。氣痺不行。故胸背為痛。而短氣。

栝蒌一枚。薤白三兩。白酒四升。

栝蒌一枚。薤白三兩。白酒四升。

栝蒌一枚。薤白三兩。白酒四升。

栝蒌一枚。薤白三兩。白酒四升。

栝蒌一枚。薤白三兩。白酒四升。

栝蒌一枚。薤白三兩。白酒四升。

栝蒌一枚。薤白三兩。白酒四升。

栝蒌一枚。薤白三兩。白酒四升。

瑞竹堂有還少丹方。取其通腎。東垣曰苦寒腎經君藥。白汁塗惡

刺。凡螻螂諸蟲盛夏孕育游諸物上。必遺精汁。乾久則有毒。人手觸之成疾。

名狐尿刺。慘痛不眠。百療難效。取汁厚塗即愈。千金方極言其功。葉

如萵苣花。如單瓣菊。花四時有。花罷

飛絮。斷之莖中有白汁。鄭方升曰一莖兩花。高尺許者。

掘下數尺。根大如拳。旁有人形拱抱。搗汁酒服。治膈噎如神。

紫花地丁。辛苦而寒。治癰疽發背疔腫。

癩癰無名腫毒。葉如柳而細。夏開紫

花。結角。生平地者起莖。生溝壑者起蔓。

杜牛膝。一名天名精。一名地松。甘寒微毒。能破血。

此上焦膻中藥也。膻中兩乳中間。經曰膻中者。臣使之官。喜怒出焉。喻嘉言曰。

胸中陽氣如離。昭堂。曠然無外。設地氣一上。則窒塞

有。加。故。知。胸。痺。者。陰。氣。上。逆。之。候。也。仲。景。微。則。用。薤。白

白。酒。以。益。其。陽。甚。則。用。附。子。乾。薑。以。消。其。陰。世。醫。不。知

胸。痺。為。何。病。習。用。葶。藶。木。香。訶。子。三。稜。神。麩。麥。芽。等。藥。

坐。耗。其。胸。中。之。陽。亦。相。懸。矣。薤。葉。光。滑。露。亦。難。於。故。曰。薤。露。其。性。滑。泄。能。通。氣。滯。

故胸痺下重並用之

本方加半夏名栝蒌薤白半夏湯。金匱治胸痺不得臥。心

痛徹背。以不得臥。故加半夏。本方除白酒。加枳實厚朴桂枝。名枳

實薤白桂枝湯。金匱治胸痺氣結在胸。胸滿脇下逆搶心。

一婦產後。口渴氣喘。面赤有斑。大便泄。小便秘。用行血利水藥不效。用杜牛膝。濃煎膏飲。下血一桶。小便通而愈。

殺蟲治乳蛾喉痺砂淋血淋
良方云濃煎加乳麝

少許。小兒牙關緊閉急慢驚風。不省人事者絞

神效。汁入好酒灌之即甦。服汁吐瘡痰。驚風服之

亦取其。漱汁止牙痛搗之傅蛇蟲螫毒。

根白如短牛膝。地黃為使。煎湯洗痔渣塞患處良。

鶴虱 辛苦有小毒殺五藏蟲治虻蝥腹

痛。面白唇紅時發時止者為沈存中筆

記云是杜牛膝子。或曰非也。最粘人衣

溫膽湯
治膽虛痰熱不眠虛煩驚悸口苦嘔涎
胆以

候虛則寒。寒則不眠。驚悸亦由于胆虛。虛火上溢。故口苦嘔吐多。屬半表半裏。少陽胆經之邪。胆虛氣鬱致脾

生痰涎。而煩嘔。傷寒病後。多有此症。

陳皮去白半夏薑製茯苓或用甘草 枳實炒竹茹 加薑

煎或加棗局方無茯苓如心虛加人參棗仁心內煩熱

加黃連麥冬口燥舌乾去半夏半夏行水耗津加麥冬五味花

粉表熱未清加柴胡內虛大便自利去枳實加白朮內

實心煩加黑危子

此足少陽陽明藥也。橘半生薑之辛溫。以之導痰止嘔

即以之溫膽。戴氏曰痰在胆經神不歸舍亦令人不寐枳實破滯茯苓瀲濕

有狐氣炒熟則香。

山蓋根 苦寒瀉心火以保金氣去肺大

腸之風熱心火降則不灼肺而金清肺與大腸相表裏肺金清

則大腸亦清消腫止痛治喉癰喉風齧腫齒

痛含之喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡

解諸藥毒傅禿瘡蛇狗蜘蛛傷療人馬

急黃血熱極所致苗蔓如豈經冬不凋

牛蒡子一名鼠粘子一名惡實辛平潤肺解熱散

結除風利咽隔理痰嗽消斑疹利二便

行十二經散諸腫瘡瘍之毒利腰膝凝

甘草和中竹茹開胃土之鬱清肺金之燥涼肺金即所

以平甲木也胆為甲木金能平木如是則不寒不燥而胆常溫矣

經又曰胃不和則臥不安又曰陽氣滿不得入于陰

氣虛故目不得瞑半夏能和胃而通陰陽故內經用治

不眠二陳非特溫胆亦以和胃也溫胆湯即二陳加枳實竹茹三因云心虛

胆怯氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症觸事易驚或夢寐

不祥或短氣悸之或自汗並溫胆湯主之嘔則以人參

代竹茹內經半夏湯治痰盛不眠半夏五合糯米一升

用清湯水揚萬遍煮服汗出即已半夏除痰而利小便糯

米益陰而利大腸使上下通則陰陽和矣經又曰諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚準繩云內經半夏湯皆去飲之劑無飲者勿服金匱治虛勞虛煩不眠用酸棗仁湯棗仁二升甘草一兩知母茯苓芎藭各二兩深師加生薑二兩此補肝之劑經曰臥則血歸于肝昂按本草云棗仁炒用治胆虛不眠生用治胆熱好眠竊謂

滯之氣。性冷而滑，利痘症。虛寒泄瀉者忌服。實如蒲萄而

褐色。酒拌蒸，待有霜拭去用。根苦寒，竹

刀刮淨，絞汁蜜和服。治中風汗出乃愈。

搗和猪脂貼瘡腫。及反花瘡。肉反出如花狀。

山慈菘。甘微辛，有小毒。功端清熱散結。

治癰瘡疔腫癩癧結核。醋磨塗。解諸毒蠱

毒蛇蟲狂犬傷。根與慈菘小蒜相類。

去毛殼用。王樞丹中用之。廣筆記云出處州遂昌縣洪山，無毛少，真者有毛。

誤也。

漏蘆。鹹軟，堅苦下。泄寒勝熱，入胃大腸。

胆熱必有心煩口苦之症。何以反能好眠乎？温胆湯治不眠。用二陳加竹茹枳實二味，皆涼藥，乃以涼肺經之熱。非以温胆經之寒也。其以温胆名湯者，以胆欲不寒不燥，常温爲候耳。胆熱好眠四字，不能無疑也。

本方加入參遠志棗仁熟地，名十味温膽湯。治夢遺驚

惕。

逍遙散局。治血虛肝燥骨蒸勞熱咳嗽潮熱往來寒熱。

口乾便澀，月經不調。骨蒸潮熱，肝血虛也。肝火乘肺，故咳嗽邪在少陽，故往來寒熱。火盛

燥金不能生水，故口渴便秘。肝藏血，肝病故經水不調。

柴胡 當歸 白芍 白朮 茯苓 甘草 加

煨薑薄荷煎。酒炒 酒炒 土炒 錢一分 炙五分

此足少陽厥陰藥也。肝虛則血病，當歸芍藥養血而斂。

通肺小腸散熱解毒通經下乳排膿止

血生肌殺蟲治遺精尿血癰疽發背古方

以漏蘆湯為稱首及預解時行痘疹毒取其寒勝熱又

能入陽明故也出闔中莖如油麻枯黑如漆

者真甘草拌蒸連翹為使

貫衆 味苦微寒有毒而能解邪熱之毒

治崩中帶下產後血氣脹或發復發

斑痘王海藏快斑散用之化滑更能軟皮

根似狗脊而大汁能制三黃化五金伏

鍾乳結砂制汞解毒軟堅以此浸水缸中日飲其水

陰木盛則土衰甘草白朮和中而補土補土生金亦以平木柴胡

升陽散熱合芍藥以平肝而使木得條達木喜條達故以瀉為補取

疏通之義茯苓清熱利濕助甘朮以益土而令心氣安寧茯苓

龍通心腎生薑煨胃祛痰調中解鬱薄荷搜肝瀉肺理血消

風疏逆和中諸症自已所以有逍遙之名有乾咳嗽者丹溪曰極為

難治此係火鬱之症乃痰鬱其火邪在中用逍遙散以調之下用補陰之劑可愈昂按此即後條醫貫所言之

旨也

本方加丹皮卮子名八味逍遙散薛氏治怒氣傷肝血少

目暗目為肝竅經曰目得血而能視肝傷血少則目昏丹皮能瀉血中伏火卮子能瀉三焦鬱火故薛氏

加之以抑肝氣兼以調經也醫貫曰古方逍遙散柴胡薄荷當歸芍藥甘草陳皮白朮茯苓其加味者則丹皮

能辟時疫

射干

苦寒有毒能瀉實火火降則血散

腫消而痰結自解故能消心脾老血行

大陰厥陰之積痰

肝肺脾

治喉痺咽痛為

要藥

搗汁醋和噲之引涎干

消結核瘕

疝便毒瘡母

皆取其降厥陰相火也

經閉利大腸鎮肝明目

扁竹花根也

葉橫鋪如烏羽及扇故一名烏羽烏翬

泔水浸一日篋竹

葉煮半日用

續隨子

一名千金子

辛溫有毒行水破血治

扈子。余以山扈屈曲下行。泄水。改用吳茱炒連其論五。鬱曰。東方先生木。木者生之氣。即火氣也。火附木中。木鬱則火亦鬱矣。火鬱則土自鬱。土鬱則金鬱。金鬱則水鬱。五行相因自然之理也。余以一方治木鬱而諸鬱皆愈。逍遙散是也。方中柴胡薄荷二味最妙。蓋胆乃甲木少陽之氣。其氣柔嫩。象草穿地而未伸。此時若被寒風一鬱。即軟萎。遏抑不能上伸。不上伸。則下。尅脾土。而金水併病矣。惟得濕風一吹。鬱氣始得暢達也。蓋木喜風搖。寒即摧萎。濕則發生。柴胡薄荷辛能發散。濕能入少陽。古人立方之妙如此。其甚者方中加吳茱炒連。即左金丸。黃連清心火。吳茱氣臊。肝氣亦臊。同氣相求。以平肝木。水平則不生。心火火不刑金。而金能制木。不直伐木。而佐金以制木。此左金所以得名也。此法之巧者。然猶未也。繼用六味地黃。加柴胡芍藥。以滋腎水。俛能生水。逍遙散風以散之也。地黃飲雨以潤之也。木有不。得其天者乎。此法一立。水火之鬱既舒。木不下尅土。土亦得滋潤。無燥熯之患。金水自能相生。余謂一法可通五法者。如此推而廣之。凡寒熱往來。惡寒惡熱。嘔吐吞酸。嘈雜胸痛脇痛。小腹膨脹。頭暈盜汗。黃疸濕疫。疝氣。喉泄等症。皆對症之方。推而傷寒傷風。傷濕除直中外。

癥瘕痰飲冷氣脹滿蠱毒鬼疰利大小

腸下惡滯物塗疥癬瘡王樞丹用之治百病多效經疏

曰乃以毒治毒之功去殼取色白者壓去油用

時珍曰續隨與大戟澤漆甘遂莖葉相似主療亦相似長于利水用之得法皆

要藥也

馬蘭子一名蠶實

甘平治寒疝喉痺癰腫瘡

癰婦人血氣煩悶血運崩帶利大小腸

久服令人瀉叢生葉似薤而長厚結

角子如麻大赤色有稜炒用治疝用醋

拌根葉同功

凡外感者皆作鬱看以逍遙散加減出入無不獲效如小柴胡湯四逆散柔活湯大同小異然不若此方之響應也倘一服即愈少頃復發或頻發而愈甚此必下寒上熱之假症此湯不可復投當改用溫補之劑如陽虛以四君子湯加溫熱藥陰虛以六味湯加溫熱藥五臟之士不須余贅矣又曰余于冬月正傷寒麻黃桂枝症作寒鬱治不惡寒者作火鬱治此余創論也既曰寒邪何故入內而反為熱不知即是本身之火為寒所鬱一步返歸一步久則純熱矣三黃解毒解其火也葛根升麻火鬱發之也三承氣土鬱奪之也小柴胡木鬱達之也此理甚簡易劉守真謂用麻黃桂枝必加涼藥子和六神通解加石膏于麻黃蒼木中陶氏謂九味羌活可代三方皆非也不若逍遙散真可一方代三方也火為寒鬱發煎腎水至木旺時無生發滋潤之本故發熱而渴非外感也余以六味湯滋其水以柴胡舒其木活人多矣

六和湯方 治夏月飲食不調內傷生冷外傷暑氣寒熱

交作霍亂吐瀉及伏暑煩悶倦怠嗜臥口渴便赤中酒

苳麻子 辛甘有毒性善收亦善走能開

通諸竅經絡治偏風不遂嘔邪搗餅左貼右右

貼左口噤鼻窒耳聾搗爛棉裹塞耳寒鼻喉痺舌

脹油作紙能利水氣治水癥浮腫研服

青黃水壯人能出有形滯物治針刺入

肉搗敷傷處頑看刺出竹木骨哽苳麻

兩疑水石二兩研勻以一胞胎不下苳麻

二粒巴豆一粒麝香一分貼臍中併足

頂心能追膿拔毒傳癰癧惡瘡外用屢

奏奇功鷓鴣油能引藥氣入肉苳麻油

等症風寒暑濕之邪傷脾則瀉傷胃則吐傷肺則渴傷

脾主四肢傷則倦怠傷酒亦以溫散為治

砂仁 藿香 厚朴 杏仁 半夏 扁豆 木瓜

人參 白朮 赤茯苓 甘草 加薑棗煎傷暑加香

蒿傷冷加紫蘇一方無白朮一方有蒼朮

此足太陰陽明藥也藿香砂仁杏仁厚朴香能舒脾辛

能行氣而砂仁厚朴兼能化食木瓜酸能平肝舒筋肝

乘脾故轉筋木瓜酸能斂肺助肺金以平肝邪故治霍亂轉筋

熱而扁豆又能散暑和脾半夏辛溫散逆而止嘔參朮

甘溫補正以匡邪甘草補中協和諸藥薑棗發散而調

然有毒熱氣味頗近巴豆內服不可輕

去皮黃連水浸每晨用浸水吞一匙至三四粒治大風疥癩 形

如牛蟬黃褐有斑鹽水煮去皮研或取

油用忌鐵食蓖麻者一生不得食炒豆犯之則脹死

白頭翁 苦堅腎寒涼血入陽明血分胃大

腸治熱毒血痢仲景治熱痢有白頭翁湯合黃連黃栢秦皮東

垣曰腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之溫瘧寒

熱齒痛骨痛腎主齒骨鼻衄鼻衄瘡癩癰

亦瘰血痔偏墜搗傳患處明目消疣有風

反靜無風則搖近根處有白茸得酒良

營衛皆所以和之也或加香需者用以祛暑加紫蘇者

用以發表散寒也吳鶴臯曰六和者和六府也脾胃為六府之總司先調脾胃則水精四布

五經並行百骸九竅皆太和矣昂按六和者和六氣也若云六和六府則五藏又不當和乎蓋風寒暑濕燥火之

氣夏月感之為多故用諸藥正脾胃以拒諸邪而平調之也

藿香正氣散局方治外感風寒內傷飲食憎寒壯熱頭痛

嘔逆胸膈滿悶咳嗽氣喘及傷冷傷濕瘧疾中暑霍亂

吐瀉凡感嵐瘴不正之氣者並宜增減用之元氣虛弱人慎用

藿香 紫蘇 白芷 大腹皮 茯苓 白朮土炒 陳皮

半夏 厚朴薑製 桔梗 甘草 每服五錢加薑

煎一方加木瓜氣脫能收氣滯能和傷食重者加消食藥

王瓜 即土瓜根

苦寒。瀉熱利水。治天行熱疾。

黃疸消渴

搗汁飲

便數。帶下。月閉。瘀血利。

大小腸排膿消腫下乳

通乳藥多用之。單服亦可。墮

胎。根如栝蒌之小者。味如山藥。根子

通用。

丹溪曰。主治畧以栝蒌傷寒發斑。用王瓜搗汁和伏龍肝末服甚效。

王不留行 甘苦而平。其性行而不住。能

走血分通血脉。乃陽明衝任之藥。

陽明多氣

多除風去痺止血定痛通經利便下乳

催生 俗云穿山甲。王不留。婦人服之乳長流。

治金瘡 止血。癰

瘡 散 出竹木刺。孕婦忌之。花如鈴鐺。

此手太陰足陽明藥也。養香辛溫。理氣和中。辟惡止嘔。

兼治表裏為君。蘇芷桔梗散寒利膈。佐之以發表邪厚。

朴大腹行水消滿。橘皮半夏散逆除痰。佐之以疏裏滯。

茯苓甘草益脾去濕。以輔正氣為臣使也。正氣通暢則

邪逆自除矣。

吳綬曰。若太陽傷寒頭痛發熱骨節痛者。此方全無相干。如妄用之。雖汗出亦不解。

變成壞症者多矣。凡傷寒發熱。脈沉元氣虛入。併夾陰

傷寒發熱者。皆不可用。戴元禮曰。肥人多中。以氣盛于

外而歉于內也。肺為氣出入之道。人肥者。必氣急。氣急

必肺邪盛。肺金剋肝木。胆為肝之府。故痰涎壅盛。治之

必先理氣。中後氣未盡順。痰未盡降。調理之劑。當以霍

香正氣散。和星香散服。此藥非特治中風之症。中氣中

惡霍亂尤宜。

本方合三味香薷散。香薷扁豆黃連。名霍薷湯。治伏暑吐瀉轉

實如燈籠子。殼五稜。取苗子。蒸漿水浸用。

冬葵子。甘寒。淡滑。潤燥。利竅。通營。衛。滋

氣脉。行津液。利二便。消水腫。用榆皮等分煎服。

通關格。下乳。滑胎。秋葵。復種。經冬。至

春。作子者。名冬葵子。根葉同功。春葵子。

亦滑。不堪入藥。蜀葵花。赤者。治赤帶。

白者。治白帶。赤者。治血燥。白者。治氣燥。

亦治血淋。關格。皆取其寒。潤滑。利之功也。

白鮮皮。氣寒。善行。味苦。性燥。行水故燥。入脾

胃。除濕。熱。兼入膀胱。小腸。行水道。通關

筋

三解湯。治時行瘧之通劑。此三陽經瘧也。機要曰。瘧有

各殊。同傷寒也。在太陽。謂之寒瘧。治多汗。又在陽明。謂

之熱瘧。治多下。又在少陽。謂之風瘧。宜和之。此三陽受

病。謂之暑瘧。發在夏至後。處暑前。此傷之淺者也。在三

陰。經絕。謂之濕瘧。當從太陰。經論之。發在處暑後。冬至

前。此傷之重者。遠而為疹。疾者。若也。居西方。宜毒藥。療

之。李梴曰。凡瘧。須分陰陽。氣虛屬陽。血虛屬陰。發于春

夏。屬陽。發于秋冬。屬陰。自子至巳。屬陽。自午至亥。屬陰。

邪淺在府。為陽。與營衛並行。故一日發。邪深在藏。為陰。橫連膜原。不能與衛氣並行。故間日發。或三四日一發。衛虛則先寒。營虛則先熱。喻嘉言曰。瘧發必有寒。有熱。蓋外邪伏于半表半裏。適在少陽所主之界。出與陽爭。陰勝則寒。入與陰爭。陽勝則熱。即純熱無寒。為瘧。溫瘧。純寒無熱。為瘧。瘧。皆自少陽而造。其極偏補偏救。弊亦必還返少陽之界。使陰陽協和而後愈也。謂少陽而兼他經。則有之。謂他經而不涉少陽。則不成。其為瘧矣。縱屬遷而弦之一字。實貫徹之也。昂按。瘧之不離

節利九竅為諸黃風痺之要藥。一味白鮮皮湯

治產後風時珍曰世醫止施之瘡科淺矣兼治風瘡疥癬女

子陰中腫痛濕熱乘虛客腎與膀胱所致根黃白而

心實取皮用惡桑螵蛸桔梗茯苓草薺

草薺 甘苦性平入足陽明厥陰肝祛風

去濕以固下焦陽明主肉屬濕厥陰主筋屬風補肝虛

祛風堅筋骨風濕去則筋骨堅益精明目治風寒

濕痺腰痛久冷關節老血膀胱宿水陰

痿失溺莖痛遺濁痔瘻惡瘡諸病皆陽明濕熱流

入下焦草薺能除濁分清古方有草薺分清飲史國信云若欲興陽先滋筋力

少陽猶咳之不離于肺故經曰五藏六府皆令人咳然必傳以與肺也

柴胡 麻黃去節澤瀉各三錢

此足少陽藥也吳鶴皋曰病有三在在表在裏及在半

表半裏也瘧邪藏于分肉之間邪正分爭併于表則在

表併于裏則在裏未有所併則在半表半裏麻黃之辛

能散表邪由汗而泄澤瀉之鹹能引裏邪由溺而泄柴

胡升陽發熱居表裏之間而和解之此但可以治實瘧

虛者當辨其氣血而加補劑晝發屬氣夜發屬血

清脾飲嚴用和治瘧疾熱多寒少口苦噤乾小便赤澀脉

來弦數熱多陽勝也口苦噤乾肝胆火也熱盛故便赤瘧邪居于半表半裏屬少陽甲胆之分肝胆屬

若欲便清先分肝火。萬金護命方云凡
人小便頻數便時痛不可忍者此疾必
因大腸秘熱不通水液只就小腸大腸
愈加乾竭甚則身熱心燥思水即重症
也此疾本因貪酒色或過食辛辣量臞
之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小
腸故便時作痛也此便數而痛與淋症
溢而痛不同宜用萆薢一兩鹽水炒為
末每服二三錢使水道轉入大腸仍以
葱湯頻洗穀道令氣得通則便數及痛
自減也

軟者良意改為便長大黃柴胡前胡忌

茗醋時珍曰萆薢解菝蓐土茯苓形不同
而主治不甚相遠豈一類數種乎

萆薢根細長淺白
菝蓐根作塊赤黃

土茯苓 甘淡而平陽明主藥 胃大 健脾

木故 脉弦

青皮 厚朴醋炒 柴胡 黃芩炒 半夏薑製 茯苓 白朮土炒

甘草炙 萆薢 加薑煎一方加檳榔大渴加麥冬知母

瘧不止加酒炒常山一錢烏梅二箇常山劫痰截瘧
烏梅斂陰清熱

此足少陽太陰藥也瘧為肝胆之邪然多因脾胃受傷

而起脾屬濕土重感于濕濕生熱熱生痰故見前症也

脾既受病木又尅之故用青皮柴胡以破滯而伐肝柴胡

疏上焦肝氣青 半夏厚朴以行痰而平胃厚朴平胃半
夏燥痰古云

皮疏下焦肝氣 茯苓用以溼黃芩用以清熱萆薢辛熱能散

太陰之積寒除痰而截瘧能清膏
梁之痰 益先去其害脾者而

胃祛風濕脾胃健則營衛從風濕除則

筋骨利小便止瀉泄治筋骨拘攣楊

梅瘡毒楊梅瘡古方不載明正德間起于嶺表其症多屬陽明厥陰而

兼及他經蓋相火寄于厥陰肌肉屬于

陽明故也醫用輕粉劫劑其性燥烈入

陽明劫去痰涎從口齒出瘡即乾愈然

毒氣竄入經絡筋骨血液枯涸筋失所

養變為拘攣癱漏竟致癩痼土茯苓能

解輕粉之毒去陽明濕熱用一兩為君

芍仁金銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分皂角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒湯療癩瘡腫營衛不利則生瘡腫經曰濕氣害人皮肉筋脉是也土茯苓液能滲甘能補患膿疥者煎湯代茶甚妙

以白木甘草調而補之也此即小柴胡湯加減從溫諸方而一變也虛瘧忌用吳

鶴臯曰清脾非清涼之謂乃攻去其邪而脾部為之一

清也劉宗厚因草菓之辛熱而譏焉是未達嚴用和氏

之清矣張子和曰世醫以瘧為脾寒甚者歸之崇怪良

可笑也劉宗厚曰暑盛陽極伏陰在內人或納涼滌浴

寒容肌肉之間或飢飽勞役內傷而病作肌肉屬脾發

則惡寒戰慄乃謂之脾寒耳實由風寒濕喝邪鬱腠理

夏時毛竅疎通而不為病至秋氣收斂之際表邪不能

發越故進退不已往來寒熱勢如凌虛人之狀所以名

瘧即四時之傷寒也十二經皆能為病古方多兼埋內傷取效由脾胃和精氣通陰陽和解諸邪悉散實非脾病也世用發表解肌溫經散寒等法亦未嘗執于燥脾劫劑也昂按脾虛惡寒胃虛惡熱寒熱間作脾亦有之不獨少陽也雖十二經藏皆能為瘧而脾胃受傷者實多故仲景小柴胡湯人參甘草半夏薑棗皆脾胃藥其治少陽獨柴胡一味而已嚴氏宗之故以小柴胡加減而立清脾飲是明從脾胃論治矣劉氏之論亦主脾胃內傷乃不敢翻子和之案以為非脾病恐不然也又古方用辟邪丹雄珠丸治鬼瘧蓋雜病多有挾鬼症者何

團有赤白二種白者良可煮食亦可生

啖忌茶

白斂 苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱

殺火毒散結氣生肌止痛治癰疽瘡腫

面上疤瘡金瘡撲損箭鏃不出者同丹皮或半夏為末酒

斂瘡方多用之故名每與搽凍耳同白及相須黃

栢末 蔓赤枝有五葉根如卵而長三

油調 五枝同窠皮黑肉白一種赤斂功用皆

同 鄭莫一曰能治温瘧血痢腸風痔瘻赤白帶下

預知子 苦寒補五勞七傷治疔癖氣塊

獨于瘧必云無此也

痛瀉要方 劉草

治痛瀉不止 脾虛故瀉脾實故痛吳鶴臯曰此與傷食不同傷食

腹痛得瀉便減今瀉而痛不止故責之土敗木賊也戴氏曰水瀉腹不痛者濕也痛甚而瀉瀉而痛減者食積也瀉水腹痛腸鳴痛一陣瀉一陣火也或瀉或不瀉或多或少者痰也完穀不化者氣虛也

白木 土炒 白芍 炒二兩 陳皮 炒兩 防風 一兩 或煎或丸久

瀉加升麻

此足太陰厥陰繫也白朮苦燥濕甘補脾温和中芍藥

寒瀉肝火酸斂逆氣緩中止痛防風辛能散肝香能舒

脾風能勝濕為理脾引經要藥 東垣曰若補脾胃非此引用不能行 陳皮

辛能利氣炒香尤能燥濕醒脾使氣行則痛止數者皆

天行温疾。蛇蟲咬毒。殺蟲療蠱。蠱衣領中如遇

蠱毒。則聞其聲。而預知之。故名。利便催生。籐生子如

皂莢。褐色。光潤。出蜀中。云亦難得。

旱蓮草。一名鱧腸。又名金稜草。甘鹹汁。黑補腎止

血。黑髮烏髭。千金云。當及時多收。其效甚速。經疏云。性凉不益脾

胃。故千金方。金陵煎丸。用薑汁和劑。苗如旋覆。實似蓮

房。斷之有汁。須臾而黑。熬膏良。

劉寄奴草。苦温。破血通經。除癥下脹。止

金瘡。血多服。令人吐利。一莖直上。葉

尖長。繖澁花。白蓋黃。如小菊花。有白絮

以瀉木而益土也。

黃連阿膠丸。局方。治冷熱不調。下痢赤白。裏急後重。臍腹

痠痛。口燥煩渴。小便不利。濕熱鬱于腸胃。故腹痛。口渴而便閉。

黃連。三兩。茯苓二兩。阿膠炒一兩。為末。水熬阿膠為丸。空心

米湯下。延年除茯苓。加乾薑當歸。名駐車丸。治同。

此手足陽明藥也。黃連瀉火燥濕。開鬱消痰。以平其痛

熱。阿膠補陰益血。潤燥利腸。以和其裏。急茯苓能使肺

氣下降。通于膀胱。清熱利水。止渴除煩。為清解之平劑。

黃連退熱。茯苓除濕。阿膠潤燥補虛。

仲景黃連阿膠湯。黃連四兩。黃芩一兩。芍藥二兩。阿膠三兩。雞子

如苦蕒子細長亦似苦蕒子莖葉花

子皆可用劉裕小字寄奴微時嘗射一蛇明日見童子林中搗藥問

之答曰吾王為劉寄奴所傷合藥敷之裕曰王何不殺之童曰寄奴王者不可殺也叱之不見乃收藥

回每遇金瘡傳之立愈

馬鞭草 味苦微寒破血通經殺蟲消脹

治氣血癥瘕癰瘡陰毒塗搗墟陌甚多

方莖葉似益母對生夏秋開細紫花穗

如車前草類蓬蒿而細根白而小用苗

葉

穀精草 辛溫輕浮上行陽明胃兼入厥

黃二枚 治傷寒少陰病得之二三日以上心煩不得

臥二三日以上寒變熱之時也少陰多寐此傳經之陽邪陰氣為陽熱所灼故心煩不得臥

執雞子阿膠之甘以益血芍藥之酸以收陰氣用苦寒甘潤酸斂之劑收攝其欲亡之微陰較之四逆一水一

火為不同矣

海藏黃連阿膠湯 黃連炒四兩 黃柏阿膠炒各一兩 山梔五錢 每

服四錢治傷寒熱毒入胃下利膿血虛加芍歸腹痛

加芍藥血不止加地榆

薑茶飲東垣 治赤白痢及寒熱瘧

生薑 陳細茶 每味約三錢濃煎服或微炒煎

此足太陰陽明藥也茶助陰薑助陽使寒熱平調並能

陰肝明目退翳之功在菊花之上亦治

喉痺齒痛陽明風熱收穀後荒田中

生葉似嫩秧花如白星小兒雀盲者羯羊肝一具不洗

竹刀割開入穀精煮熟食之或作丸茶下

青箱子一名草決明味苦微寒入厥陰肝祛

風熱鎮肝明目治青盲障翳鼻赤惡瘡

瞳子散大者忌服能助陽火類雞冠而穗

尖長

決明子甘苦鹹平入肝經除風熱治一

切目疾故有決明之名又曰益腎精瞳子

消暑解酒食毒此方用之屢效勿以藥之平淺而忽之也

本方除生薑加陳白梅蜜水煎名梅蜜飲治熱痢除茶

加木香肉蔻治冷痢蜜最能治痢

蘆根湯干金治傷寒病後嘔噦不下食此由初病時熱盛多服冷藥飲冷水

熱勢既退冷氣便發故脾胃虛寒而不和噫噦食臭腹內雷鳴而瀉利也

蘆根一升竹茹一升生薑二兩粳米一合

此足太陰陽明藥也蘆根甘寒降伏火利小水竹茹甘

寒除胃熱清燥金生薑辛溫祛寒飲散逆氣三者皆能

和胃胃和則嘔止加粳米者亦藉以調中州也

神光屬腎。日華曰。明目甚于黑豆。作枕治頭風。狀如馬蹄俗

呼馬蹄決明。搗碎煎。惡大麻仁。

藜實 辛温。温中明目耐風寒。下水氣。時珍

曰。古人種藜為疏。收子入藥。今惟酒麩用其汁耳。以香藜青藜紫藜為良。

有香藜青藜紫藜赤藜木藜水藜馬藜

馬勃 辛平。輕虛清肺解熱。東垣普濟消毒飲中用之。

散血以嗽。治喉痺咽痛。吹喉中良。或加白礬。或硝。掃喉。

取吐痰愈。鼻衄失音。外用傳諸瘡。良。生濕

地朽木上。狀如肺肝。紫色虛軟。彈之粉

出。取粉用。

陰陽水 治霍亂吐瀉有神功。按藥中治霍亂者最多。然

未嘗分別言之。萬一誤用。立死不救。倉卒患此。深審切勿輕投。偏熱偏寒之劑。惟飲陰陽水為良。

子和曰。霍亂吐瀉。乃風濕暈。三氣合邪也。所尅鬱則生熱。心火上炎。故吐。吐者瀉瀉者濕也。風急甚則轉筋轉筋

在上焦則吐。在下焦則瀉。在中焦則瀉。

沸湯 井水 各半鍾和服

此中焦分理陰陽之藥也。

瀉而霍亂飲此輒定者分

甘草黑豆湯 解百藥毒兼

邪術而得之。用此方者。亦取其解毒。

甘草 二 黑豆 半

木鱉子 苦溫微甘。有小毒。利大腸。治瀉

痢瘡積癰癰瘡痔乳癰蚌毒消腫追毒

生肌除黥音早 黑斑 入外科 核偏如鱉

綠色揀去油者能毒狗

此足陽明藥也。甘草和

曰古稱大豆解百藥毒也 不然又加甘草其驗乃

稍能徑達中

本方加大黃名大黃甘草