





要方集評序

夫為人而不可不學

醫也伊川先生曰病

卧於床委之庸醫比

之不茲不孝事親者

亦不可不知醫誠乎

哉

刻意內經已下諸名
醫述作無不歷覽也
以醫爲業常思救疾
苦而已故日用施行
之要方九十選之方
後言其治而不言其
所以治今言其所以

又加以評又書簡誤
以防誤用之失予爲
見於用方之意書於
一二之治驗名之曰
要方選評誠非蛙管
見取罪於大方門者
乎後之醫明君子正

之幸甚幸甚不顧

陋任翰書諸

不

于時寬文十辛亥年

秋八月中旬津陽後

學高須氏健庵春川

識

卷

○

一 四君子湯 二 五味異功散

三 六君子湯 四 錢氏白朮散

五 八寶散 六 八味順氣散

七 人參養胃湯 八 四物湯

九 四物坎離湯 十 六合湯

十一 八物湯 十二 十全大補湯

十三 陳湯 十四 導痰湯

十五 溫痰湯 十六 平胃散

十七 不換金正氣散 十八 五苓散

十九 胃苓湯 二十 歸脾湯

二十一 調中益氣湯

湯九 參苓白朮散

五九 逍遙散

七九 生脉散

九九 火鬱湯

○中卷目錄

一九 正氣天香湯

三九 行氣香蘇散

五九 參蘇飲

七九 人參敗毒散

九九 平血飲

一九 九味羌活湯

三九 桂枝湯

五九 小柴胡湯

四九 參苓白朮散

六九 理中湯

八九 六鬱湯

十三九 香蘇散

二九 芎芷香蘇散

四九 檳蘇散

六九 茯苓補心湯

八九 倉廩散

十四九 藿香正氣散

二九 麻黃湯

四九 黃連解毒湯

六九 大柴胡湯

七九 小養氣湯

九九 桃仁養氣湯

一九 三氣養氣湯

三九 五積散

五九 防風通聖散

七九 分心氣飲

九九 水香流氣飲

○下卷目錄

一九 三因七氣湯

三九 半夏天麻湯

五九 清心抑鬱湯

七九 行和芍

九九 三和散

八九 大養氣湯

十五九 調胃養氣湯

二九 外麻葛根湯

四九 白虎湯

六九 外陽散

八九 蘇子降氣湯

十六九 木香調氣散

二九 大七氣湯

四九 養血清心湯

六九 瓜蒌枳實湯

八九 參芪芍藥湯

十七九 滋陰降火湯

- 一 小建中湯
- 二 黃芪建中湯
- 三 大紫蘇湯
- 四 逆湯
- 五 九味清脾湯
- 六 烏藥順氣散
- 七 七味清脾湯
- 八 清胃散
- 九 胃風湯
- 十 龍膽瀉肝湯
- 十一 甘桔湯
- 十二 三生飲
- 十三 瀉白散
- 十四 益元散
- 十五 搜風解毒湯
- 十六 獨參湯
- 十七 參附湯
- 十八 八味丸料
- 十九 六味丸料

目錄終

要方選評上

盛方院門人

攝州大坂

高須氏健庵春川編述

四君子湯

一 治氣虛脾胃

虛弱

人參 炙白朮 白茯苓 甘

草 各等分

右四味 生姜三片 棗肉二枚 水

煎服 丹溪心法附餘曰 和利云

等分 愚以為藥之君臣劑之本

小又人之所宜何如也

此方調脾胃充元氣之要方

也 人參補五藏之氣 白朮

補五藏之母氣，扶養五藏之清氣，其真調五藏之平氣，四藥皆得其得中之味，溫得中之氣，猶之不偏不倚之君子也。故曰：四君子方，廣且譬如寬厚和平之君子，而不為奸險卒暴之行也。

藥以製法，其能各別，假令匠人猶以一木或為柱，或為梁，或為椽，成其用，各皆別也。故一藥數製，業醫者詳不可不知矣。以下以此心，可致思者也。本草曰：人參生用氣涼，熟用氣溫，以是思之。今四君子

湯之人參，以溫補之，然則以熟可用，有痰氣者，生姜自然汁浸炒用之，和痰氣是生生子之臨時用藥活法也。斟酌此意，諸藥可知也。白朮脾胃虛弱時，時太便泄者，炒可用，不食大便不泄，則蜜水浸炒，可用。甘草補中宜炙，瀉火宜生用，然則於此湯宜炙。

評曰：氣虛者中焦脾胃元氣虛也。人者先夫以腎水元氣生後，夫以脾胃元氣養身安乎。也。故脾胃元氣虛則病，病則以藥補之助之也。

簡誤 氣鬱氣滯密氣 食太

通實秘相火常上眼赤食積
頭痛風寒諸疾實熱者可禁

之

五味果功散 二 治久嗽不

已或腹滿少食或面腫氣逆等

四君子湯加陳皮

右煎法如前方

此方加陳皮者利氣去脾胃

滯也方意論前

評曰加陳皮治久嗽腹滿面腫

最可也一味之加味如此治

數病况數味乎也能可為商

量也且小兒日久泄瀉最得

驗案小兒脾胃脆薄食滯中

焦故泄瀉以陳皮辛溫去之

故有功又病後常服此湯助

脾胃可也

簡誤 同前

六君子湯 三 治氣虛挾痰

因之發飢亦可也

四君子湯加半夏製熟

陳皮白朮二味各等分

右煎法同前

此方半夏燥濕治痰之本陳

皮利氣泄痰之標標本既得

攻補之行補而不滯攻而不

峻故曰六君子加香薷者

砂仁名香砂六君子湯其用
稍峻也

評曰氣虛甚而兼痰氣者王四
君加二陳痰氣多而兼氣虛
者王三陳加四君夫量病之
輕重為藥之多寡脾胃衰弱
有濕者用淡滲則虛有碍用
補益則濕不流宜此方四君
甘溫補脾二陳辛溫燥濕孫
一奎治中叔太學湯食從鼻
出以六君子湯加沉香之類
沉鎮之藥治之愈最奇治也
以是見此六君能有形無形
降氣之方也察而可知之

簡誤

脾胃充實大便實秘燥
症內熱渴甚相火盛風寒熱
病最可禁之

錢氏白朮散

四 一各七味白朮散

治小兒吐瀉發熱渴者

人參 生白朮 白朮 甘草

生木香 藿香 乾葛 各等分

右共為末姜棗湯調服又姜棗
水煎服之 汪石山曰去木香

加白扁豆蓮肉妙

此方治大人小兒肌膚熱吐

瀉渴者之要方也人參白朮

茯苓甘草補脾胃藿香乾葛

治發熱渴者木香止瀉健脾胃

評曰脾胃虛寒而兼發熱惡寒
泄瀉者理中湯之大過難在
用補中益氣峻補未適當於
此時必投之謂之中治

簡誤 氣實氣滯上焦實熱眼
赤血症可禁之

八解散

五

治傷風感冒頭

痛身熱惡風多汗或惡心嘔逆

人參 生白朮 茯苓 甘草

生陳皮去白 半夏 厚朴 藿

香各等分

右八味姜枣或葱白水煎服

此方治內傷外感之要方也

以不君子湯治內傷厚朴除

濕滿散結藿香開胃除

逆散風寒

評曰內傷重而外感輕之病用

之可也入溫泉皮膚開汗出

不正其人多汗日久而疲用

此湯得驗思之汗多亡陽故

助陽氣而愈也

簡誤 風寒實熱者可禁之世

醫灸後發熱不辨虛實一藥

用此湯大非也皮膚虛陽氣

不足之人一旦得艾火之氣

肌熱有之用此湯可也若風

邪內鬱又得艾火之氣內火

外火映發屬實壯者用此湯

立取及謹之謹之病應能
可用勿忽略諸

味順氣散 六 治中風先

宜服此藥以順其氣次用治風
之藥

人參 炙白朮 白茯苓 陳

皮 青皮 烏藥 白芷 各

分 甘草 炙減

右八味水煎

此方補氣順氣要方也四君

子湯補脾胃中氣陳皮青皮

理泄肺肝氣烏藥順氣白芷

去陽明經風

言曰中氣不足兼風之人用此

湯先順其氣後用治風之藥

可也仲景所謂治有先後是

也若不兼風之人去白芷用

能順氣 治壯婦忽昏悶氣

急不言眼閉危急也診脈緩

瀯叩其病因不得先此湯去

白芷用之順氣其後乘病勞

思療之水煎服忽言語昏悶

愈如無事人眾皆驚問曰如

何而俄如此昏悶至危急者

曰一男子以手打胸膈忽不

覺如此至危急今醒如無事

思之一旦打氣道外降心

碍故氣外降

醫文治準此
用之病去自速用此湯效

簡誤 風寒寒熱大渴中氣不
實脈沉實者可禁之

人參養胃湯 七 脾胃虛弱

而發瘧者外感風寒內傷生冷
傷寒壯熱頭目昏眩不問風寒
二證夾食停痰俱能治之

蒼朮 半復 厚朴 陳皮
各藿香 草菓 茯苓 人
參 炙各 甘草 小烏梅 一
右十味生姜棗水煎

此方內傷飲食外感惡寒發

熱壯腹脹痛瘧因飲食飢飽
傷胃成者與之要方也人參
茯苓甘草補脾胃陳皮蒼朮
厚朴可以乎胃之有餘半復
可以醒脾藿香可以開胃除
風寒烏梅可以斂陰草菓可
以消滯矣

評曰 二陳湯乎胃散不換金正

氣散三方合一加人參蒼朮
菓梅之劑也故其功多瘧後
用之可也諸病後中焦陽氣
不足故難酒憎寒或瀉
者此湯得驗合方之用臨
時能可為商量

○簡誤 世人專謂此湯

不辨於癸瘧之本而一藥用

之誤人者甚多飲食傷胃成

胃癰者用此湯可也其佐瘧

疾初癸用之還而增病可禁

之如目前許瘧愈後用此湯

最可也藥方誤先後則害人

謹之謹之胃熱甚大渴脈實

數者可禁之

四物湯 八 治一切血虛月

補癸熱

當歸 熟地黃 心法附錄 曰婦人服

生男者 白芍 川芎 各等

用熟 四味水煎服丹 心法附錄

和利云等分愚以為隨其所

在而輕重之庶得變通之道也

此方血不足者專用要方此

四物皆濡潤之品故為血分

主藥熟地黃甘溫走北方以

沃血之源當酸辛溫入心肝

而此主血攝血之本芍藥酸

寒入肝家而斂疎泄之血海

川芎陰中之陽可上可下通

入足三陰而行血中之氣有

日補多熱芍藥生用若無癸

熱一切此芍藥酒製用同

也

以其寒清解，謂之...
即以四物湯，以...
清熱之...
此固一時自得之愚，用錄之，
以告同志者，使知治法當隨
時俗為變，而常套不可不脫
也。予準此例，發熱發散之後，
四物湯加青蒿用之，得驗，熱
全不散，則去熟地，用生地，解
有功，先人之論可貴可思。

評曰：血虛者，中焦脾胃元血虛
也。血虛二字，可着眼也。經曰：
心主血，肝藏血，脾統血，三藏
共以血言也。詳以內經可考。

知也。短紙難述，虞天攻曰：
虛者，血中之陰虛也。此言不
審血虛者，陰虛者，所病有不
何總而言之，於理不適當，候
後之醫明君子。

簡誤：失血太多，氣息機微，之
際，大便溏泄，脈遲，腹痛，胸膈
痞塞，濕痰，虫積，瘀血，蓄血等
之類，悉可禁之。

四物以難易 九 治兩尺泄

盛或聚細而數，面時赤而脈逆
者，屬陰虛。
四物湯加黃芩知母二味
右六味水煎服

此方補血為論

有知毋瀉陰生

評自人身陽陰外地夫交泰

最法宜機為平今血虛火勝

故脈兩尺洪盛甚則弦細而

數陰火衛上故面特赤而咳

逆最二味酒製可用借酒力

達上焦火瀉而後強此湯不

可用脾胃思苦寒故黃柏知

毋二味可斟酌也

簡誤 大藥同前臨時察之

六合湯 十 治血虛隧道枯

澁氣因壅滯

四物加木香檀榔二味各錢

分

此方補血導滯之要方也木

香檀榔導滯

又一方

四物加秦艽羌活二味各等

分

此方補血驅風之要方也血

虛中風最用秦艽羌活驅風

評曰二方同名共四物加味之

方也二方加味之藥最有意

至方別而用所各別也可着

眼也

大藥同前臨時對之

小物湯

十一名小珍湯治

氣血兩虛

手湯一 物湯八

右二湯合用姜二片棗肉二枚
水煎服

評曰純用四物則獨陰不長純
用四君子則孤陽不生二方
合用則氣血有調和之益而
陰陽無偏勝之虞矣氣血兩
虛症候不可枚舉宜臨時視
之

簡誤 在前

十全大補湯

二十 治氣血虛

而寒者下元氣衰者薛立齋曰
凡人元氣素弱或因起居失宜

或因飲食勞倦或因用心太過
致遺精白濁自汗盜汗或肉熱
晡熱潮熱發熱或口乾作渴咽
痛舌裂或胸乳膨脹脇筋作痛
或頭頸時痛眩暈目花或心神
不寧或寤不寐或小便赤澀
中作痛或便溺餘滴臍腹陰冷
或形容不充肢體畏寒或鼻息
急促或更有二切熱証皆是無
根虛火但服此方固其根本諸
証自息

人參 白朮 熟地 黃芪

白茯苓 白芍 川

芎 茸 甘草 各等

右味姜棗

四君子補

氣以薑棗為實際理加以肉

桂道火歸原嘉言甫曰此方

合黃芪建中湯四君子湯四

物湯三方共得十味合天地

之成數名曰十全大補

上評曰飲食勞倦五藏虧損一切

熱症皆是無根虛火但服此

湯固其根本諸症悉退嘉言

甫曰但肉桂之辛熱未可為

君審其腎虛腰痛少用肉

桂若當衛之虛須少用桂枝

調之取為使可矣文忠甫嘗

以桂枝用之二先生之意同

矣予案當衛之虛下元氣衰

於此二間能辨桂枝肉桂可

用若下元氣衰甚則肉桂為

君用可也臨時達變勿守死

法矣癰疽一切腫物膿出後

而脫氣血者最用此湯陳寔

曰凡大瘡每日膿出一碗用

參必至三錢以此為則愚以

為癰疽者熱毒所積於此時

大參黃芪甘草為藥此四味

全用其用若勞倦虧損之時

宜草各等黃芪蜜製炒

酒製下

右從宜者...一義也

簡義 實熱久咳 血充實者

全可禁之

三陳湯

三十 治濕痰為患喘

嗽脹滿

半復君陳皮 祛白茯苓 臣松
草使

右四味姜水煎服

此方治濕痰要方也半復手
熱能燥濕茯苓甘淡能滲濕
濕去則痰無由以生所謂治
病必求其本也陳皮辛溫能
利氣粉草甘平能益脾或曰
有痰而渴宜去半復佐以貝

母果氏曰渴而喜飲水者易
之不能飲水雖渴宜半復也

注

云俗以半復燥而有毒

代以貝母不知貝母治肺金
燥痰半復治脾土濕痰何可
代也脾為濕土故喜燥肺為
燥金故喜潤若痰屬脾經候
投貝母可翹首待斃古人半
復有三禁謂血家渴家汗家

也

評曰趙氏曰三陳湯謂一身痰

都治世醫執之凡有痰者皆

以三陳湯治之其三陳湯內

有半復性燥者若風痰寒痰

食痰則不...勞痰...
鼻血瀉血尿血血崩皆不可
角以其能燥血氣乾津液病
不能愈而反加如天道暑熱
之時最當禁用抑且痰藥數
多世醫治痰何必拘拘二陳
之半復哉予思焉趙氏此言
宜乎哉一槩痰必為用二陳
湯者矣之痰之察源而可用
矣二陳湯峻劑也加味而可
用隨症加裁全功在活法之
君子

簡誤 虛痰勞痰吐血鼻血瀉
血尿血血崩老人血燥大便
秘結胃熱渴症實熱者可飲
之

道可吸湯 四叶 痰飲流入四肢
令人肩背痠痛兩手軟痺醫慎
以為風則非其治宜此湯

二陳湯加枳實南星二味各
等分

右六味姜水煎服

此方治痰飲流入四肢肩背
痛之要方也枳實性急最利
氣南星主風痰

許曰行痺癰風以風藥治之不
宜以此湯治之蓋然痰飲之
為痛風毒之為痛各別也脈

去症能可辨也病同而在治
異者病不同而有治同者於
此間妙在其火此湯峻劑也
不可輕用也

通誤 大槩底前臨時察之

溫膽湯

十五 治膽虛不眠夢

中驚悸嘔吐痰涎

半夏 陳皮 生姜 枳實

竹茹 各中甘草小

右六味水煎服

此方治寒痰在中焦碍升降
之要方也半夏陳皮生姜枳
實皆却痰之品也竹茹清痰
甘草和痰逆也

評曰 **胃氣**云膽虛不眠寒也

經曰寒者溫之故以辛溫又
曰痰客中焦而妨碍升降則
少陰不降少陽不升心為之
勞膽為之憊却其痰則少陰
降少陽升而心膽調和而已
溫養也有溫養之義也是瀉
中之補也膽虛虛字可着眠
也不眠病人歸脾湯此湯二
方案案用之必差矣

簡誤 心血不足而不眠心脾
虛耗血熱虛痰皆可禁之

平胃散

十六 治脾濕痰飲痞

高

蒼朮五錢陳皮六錢厚朴各三錢

右四味為末白滾湯點服又生
姜水煎服

此方治食滯脾濕之要方也
蒼朮其燥其則入脾燥則勝
濕故為君厚朴苦溫溫能益
脾苦可下氣故以為臣以陳
皮之辛正下行之令和以炙
甘草之甘為而導濕氣分消
敦阜以乎所以有乎胃之名
也

評曰名方各各有義也此湯乎
胃二字最可味矣乎字猶有

意所無事何乎哉今有脾胃
食滯故乎也若脾胃虛者此
湯不可用矣

簡誤 無積滯脾瀉飲食不進
舊病脾胃虛可禁之

不換金正氣散 七 治脾氣

虛弱寒邪相搏痰停胸膈瘟疫
時氣山嵐瘴氣寒熱往來霍亂
吐瀉下痢赤白若出遠方不伏

此玉者宜常服之
平胃散加藿香半夏二味各
等分

右六味姜枣水煎熱服
此方治水土濕痰飲之要方也

平胃治脾濕霍香開胃除氣
寒食去濕痰也

評曰不換金有此方可貴並有
黃金吾不與易矣故各也正

氣指中氣也中氣不和水濕
不行則痰生為患此湯最妙

飲食暴傷脾胃大泄瀉用此
湯忽止乎得功數次古人名

義不虛可御可貴矣
簡誤 非水濕食滯泄瀉清晨

泄下老人虛秘腎陰虛耗可
禁之

五苓散 八十一 治傷寒太陽之
症小便不利而渴者或泄瀉者

霍亂吐瀉者

白朮 澤瀉 赤茯苓 猪

苓 各等分 肉桂 茯苓

右五味為細末白湯或清水飲
下或生姜煎服

此方治太陽裏之下藥小便
不利之要方也白朮健脾輸

津液沃瀉茯苓猪苓滲水而
利小便肉桂和榮衛以通血

脈性辛熱則能和氣氣
和則利小便張氏曰此方妙

在肉桂
評曰嘉言甫曰人之臟腑以脾
胃為主益人之飲食皆入

胃而運以脾猶地之土也
脾能化物與否實由於水
火二氣非脾胃所能也火盛
則脾胃燥水盛則脾胃濕皆
不能化物也生諸病水腫之
證蓋水盛而火不能化也火
衰而不能化水故水之入於
脾胃皆滲入血脉骨肉血亦
化水肉矣腫脹皆自然之理
也導其水使水氣少減復補
其火使二氣平和斯病去矣
丹溪謂脾失運化由肝木侮
脾乃欲清心經之火使肺金
得令以制肝木則脾土全運

化之職水自順道乃不為腫
其詞迂而不切予讀此篇以
於故加肉桂之深旨似會之
誠乎哉張氏曰妙在肉桂始
而尊信於先人之言如公符
節也

簡誤 腎陰虛虛陽泛口渴水
氣身溢小便不利脾胃實熱
共可禁之

湯 九 治脾胃不和暑

濕停飲泄瀉腹痛水穀不化陰
濕不分不伏水止

蒼朮 白朮 厚朴 陳皮
茯苓 赤茯苓 猪苓 各等分

吳茱萸

赤茯苓

猪苓

各等分

甘草 各減半
朱砂 水煎服

此方治去水濕一切泄瀉之
總司也

近日平胃散 五苓散 二方合用
之劑也 二方之評合考商量
而可用之

簡誤 見前

歸脾湯 十二 治思慮傷脾不

能攝血 血妄行 或下血 或吐衄
者 心虛而怔忡 驚悸 喜忘 盜汗
寤而不寐

人參 黃芪 白朮 白朮
苓 龍眼肉 酸棗仁 各二錢

遠志 一錢 木香 當歸 甘草
各五

右十味 姜水煎服 加牡丹皮 山
梔子 二味 名加味歸脾湯

此方統補心脾血受傷之要
方也 參朮芪苓 甘補脾龍眼
肉 酸棗仁 遠志 養心 木香 和
氣 當歸 補亡血

評曰 心藏神而主血 脾藏意而
統血 思慮則內藏受傷而血
不歸經 故用此湯 悉歸中州
而聽太陰所攝矣 故命之曰

歸脾湯 諸屬虛血者 用此湯
甚奇驗矣

氣鬱滯而胸痞實火
合神中焦為痛陽明實熱而
眼痛咽渴夜不眠忪可禁之

補中益氣湯 一尤 治勞倦傷

中氣不足 懶言語惡食漉
泄或身熱而煩或氣高而喘或
頭痛惡寒自汗或氣虛不能攝
血脈洪大無力或微細軟弱或
瘧痢等症因脾虛久不能愈或
虛人感冒風寒不勝表者宜
以此代之

黃芪 病甚勞役挾
甚者一錢

甘草 已上各
五分灸

人參 去芦二分
有款去之

已上三味除濕熱煩熱

藥也

當飯身 三分酒焙
乾或日乾

橘皮 不白
分或三分

外麻 二分或
三分

柴胡 二分或
三分

白朮 二分

右八味都作一服

推觀曰薛新甫常用方芪參朮

歸錢橘柴外各
錢五分

薛氏賢集附錄參芪朮
錢五分

飯錢陳皮五分柴外
各三分

煎至一盞煎至一盞量氣弱

病盛時酌水盞大小去

發遠和熱服如傷重者不過
服而愈若病久者以權立加減
法治之加減法詳見

此方治內傷諸症並諸病陽
氣下陷之要方也黃芪益元
氣實滕理止汗而衛寒人參
補上喘氣短灸其草補胃中
元氣當飯和血脈橘皮以導
氣又能益元氣得諸其藥乃
可若獨用浮脾胃外麻引胃
氣上騰而復其本位便是行
春外之令柴胡引清氣行少
陽之氣上升白朮除胃中
利腰脊間血

評曰古今群方之粹者也李氏

曰東垣先生深達造化故立
溫和之劑溫和者春氣之應
養生之道也且以外麻提脾
之右陷者從右而升柴胡提
肝之左陷者從左而升地既
上升天必下降二氣交通乃
成雨露此氣行而生氣不竭
矣治勞傷者不當如是耶予
閱於方書依此湯加減而治
功者多矣誠群方最上方也
加減法東垣詳著脾胃論
溪江石山其他歷代名醫如
裁亦可校舉矣業醫者搜於

諸書見之而妙存其人乎
臨時詳商量加減而用之李
氏曰此東垣先生別行下路
以廣補中之妙者乎丹溪汗
石山常加黃柏用之薛氏加
茯苓牛復用之予準此例治
弱者又多故今此三先生之
加味書于此

簡誤 肺實咳嗽食積或相火
常上怒氣常盛胸膈痞積
火內積寒熱往來能食大便
實秘脾胃充實共可禁之張
主錫曰下焦陰虛火盛者不
宜服近來世醫動用補中益

氣湯誤入者目擊甚多矣還
而言用此湯不治者命也嗚
呼可歎矣認病不明妄用誤
入者醫之罪而歸于命者又
誤之大誤也用方者誤而非
方誤也東垣以活人為心豈
以殺人製此方乎哉可思可
悲醫者司命職大事不過之
偏于補偏于瀉而我能療病
者我敢不足言必其人誤入
數多魚不知他人內心知之
人者可欺天者不可欺可恐
可懼矣 **丹溪**曰氣血偏
勝而成痰者偏勝之氣以

此之偏濟彼之偏而使之平
此用藥之功也予常歎此語
而思之參人參茸草有毒其
佗峻烈之藥乎也妄用藥未
有不誤人者可謹可戒

調中益氣湯

九

治脾胃不

調而兼濕者

黃芪

錢一

人參

去荒頭有
嗽者去之

甘草

蒼朮

已上各
五分

柴胡

橘皮

如腹中氣不得
運轉更加一分

升麻

已上各
二分

木香

一分或
二分

右八味都作一服水二大盞煎
至一盞去粗帶熱宿食消盡服
之寧心絕思藥必神效蓋病在

四肢血脉空腹在且是也加減
法詳見脾胃論

此方東垣所言皆脾胃不調
之証也汪石山曰用人參
草補中兼助陽黃芪益陽氣
為本蒼朮健脾兼助木香陳
皮疎壅氣為標升麻柴胡升
散胃氣上騰為佐使

評曰補中益氣者宜脾胃損傷
而陽氣下陷者調中益氣者
宜脾胃虛弱而腸內不調者
補調之二字當翫味也

簡誤 肺實咳嗽怒氣甚胸膈
痞塞鬱火能食大便實秘脾

胃氣實可禁之

清暑益氣湯

北

治長夏濕

熱大勝人感之四肢困倦精神
短少懶於動作身熱氣高心煩
者

黃芪汗少減五分 蒼朮 升麻已

各一人參 沢泻 神曲

橘皮 白朮已上各五分 麥門冬

當歸身 炙甘草已上各三分 青

皮去白二分 黃蘗酒洗去皮二分或三分

葛根分二 五味子分九

右十五味都作一服水二大盞

煎至一盞去粗大溫服食遠利
之多少臨病斟酌加裁法詳見

脾胃論

此方治由飲食勞倦損其脾

胃乘天暑而病作之方也皆

從時令之旺氣以浮脾胃之

客邪而補金水之不及也以

黃芪其溫補陽氣泄為君人

參橘皮當歸甘草其微溫補

益氣為臣蒼朮白朮沢泻

滲利而除濕外麻葛根其苦

平善解肌熱又以風勝濕也

濕勝則食不消而作痞滿故

炒麩其辛苦皮辛溫消食快

氣除惡燥急食辛以潤之故

以藥苦辛寒清其味濕熱

補氣虛者滋其本源以人參
五味子麥門冬酸棗散寒救
天暑之傷於庚金名曰清暑
益氣湯

評曰氣弱人遇暑濕見熱證熱
虛熨者用之老人虛人長夏
元月養生之藥與之亦良也
補中益氣調中益氣清暑益
氣此三方東垣之妙手定製
方微意徹底而可用矣

簡誤 實熱實渴咳嗽發寒熱
脈數熱在肺經真寒假熱可
禁之

參苓白朮散

治脾胃虛

弱不進飲食或瀉或嘔

人參 茯苓 白朮 甘草

炙山藥 扁豆 各四兩 砂仁

桔梗 薏苡仁 蓮肉 各二兩

右十味共為末姜棗湯調服

汪石山曰如噤口痢易石蓮肉

和石葛蒲二兩木香二兩粳米

湯如休息痢砂糖調下

此方治脾胃虛弱之人別無

發熱惡寒之候但見勞倦不

食之要方也脾悅耳故用人

參耳聾故用脾喜燥故用白

朮茯苓脾喜香故用砂仁心

生脾故用蓮子治心土惡水

故山藥治腎枯搜入脾能
升能降所以通天氣于地道
而無中塞之憂也

評曰大病之後欲保養脾胃又
脾胃虛而常易瀉者其用此
法有功矣若浮者白則如煨
山豆蔻最得驗也瀉有暴瀉
有久瀉暴瀉者大槩屬熱久
瀉者屬虛此湯宜久瀉矣生
生子曰按泄瀉二字取義必
有輕重非一症而無分別者
也何也按書有云泄者有云
浮者有云泄浮者假使無分
別經何分言之若是乎以此

泄瀉辨又推察浮不無暴久
之分別矣能可著眼者也
簡誤 屬熱暴瀉或能食大便
秘結屬諸實熱風寒者可禁
之

省道散

治肝經血少而

肝火動者

酸散 白芍藥 白茯苓

柴胡 甘草

各五
分
二味名加味道遙散

此方治血虛發熱或寒熱往
來或脇腹痛月經不調之要
方也婦人最用此湯可也白

本藥其脾其肝當
服藥養血柴胡散其惡火
乎肝補血之法也

醫學原理由遙散人參白朮

當飯錢各二白芍茯苓錢柴

胡七右六味水煎

贊其甘也遙散治其木鬱

而諸醫皆因而愈

柴胡薄荷當飯芍藥陳皮其

炒白朮茯苓神右八味水煎

評曰遙散一名而有三方共

臨時用之有功矣故三方書

之同方異藥古人用之各有

所能也壺史曰執古方以為

治謂之泥於古方以為治謂

之鑿泥也鑿也皆非致治之

良能也求其隨宜合用增減

參成斯得變通之理為技之

善者耳

簡誤用實寒熱往來鬱滯痞

氣食積風寒實症共可禁之

九一各人參理中湯

治寒陰症之傷寒霍亂吐瀉而

不渴者中氣不足寒氣乘之腹

痛者

人參白朮乾姜炮其艸

各等

右四味水煎服或乾薑本方加

附子名附子理中湯

此方專治中氣之寒要方也

補脾欲緩急食甘以緩

之用甘補之人參白朮甘州

之甘以緩脾氣調中寒濕所

惡乎以辛熱乾姜之辛以溫

脾散寒者

評曰成無已曰心肺在上為陽

腎府在下為陰此上下藏也

脾在中州名曰孤藏位處中

焦以灌溉四傍理中湯丸專

治脾胃之劑也脾胃一病則

上下左右無病不至矣夫霍

亂吐瀉腹痛者渴則為熱用

五苓散不渴者為寒用此湯

寒甚而欲死者加附子用之

簡誤 鬱火積成煩熱胃火盛

而消穀脾胃共充實屬熱者

悉可禁之若熱病用此湯立

斃真然假換真寒之時用此

湯有功假寒真熱假熱真寒

疑似之間可能辨明也是生

藥之関也可慎可慎

生脈散

治熱傷元氣氣

短倦怠汗

人參 五味子 各

錢

右手味水煎服東垣夏月加黃

其取人氣力湧出

此方為入素陰虛後遇暑途
肌因勞倦昏絕者主之要方
也人參益元氣麥門清肺金
五味子收耗散肺金滋腎陰
嚴熱

評曰復月肺金被火冠津液燥
氣血虛或喘息或咳嗽真水
虧邪火盛者老虛之人復月
暑甚時共用此湯可也如脾
胃不足復月伏陰暴絕另有
補助中氣之法混為一途
矣

簡誤 肺鬱邪火咳嗽吐痰脚

胃不足泄瀉肉寒之類肺實
諸病共可禁之

不特傷 治一切鬱症

橘紅錢一 香附分七 撫芎錢一 砂仁
分半復八 蒼朮錢一 赤茯苓錢一
梔子分七 甘艸分五

右丸味加姜水煎溫服

此方治諸鬱之要方也丹溪
先生觸類而長之則作六鬱
之方是也氣鬱香附撫芎濕
鬱蒼朮茯苓熱鬱梔子痰鬱
半復益壽撫芎食鬱砂仁陳
皮然香附撫芎蒼朮總解六
鬱也

評曰主黃齋曰鬱久而生病或病久而生鬱宜知此意矣如中焦元氣不足陽氣下陷之輩非補中益氣湯不可治也世所謂鬱症有不鬱症者世醫曰鬱症用六鬱湯又用分心氣飲解鬱開鬱更服不驗却而至危殆此等之病人皆補中益氣湯加茯苓半夏或腹脹有浮腫則加大腹皮用之無不洽有功效也因而思之世醫曰鬱症是不鬱症中焦元氣不足陽氣下陷之症也業醫者鬱字如何可見可

思可慎

簡誤氣脫血脫中焦不足陽氣不歸似鬱不鬱者可禁之

火鬱

九治火鬱症

甘艸三山梔子柴胡乾

葛撫芎白芍藥連翹

地骨皮各一錢

右八味水煎服

此方治小便赤澀五心煩熱口苦舌乾脉数者要方也山

梔柴胡乾葛連翹地骨皮甘

艸治五心煩熱口苦舌乾撫

芎白芍治脉数

評曰火鬱之症遲治之則必生

惡瘡惡毒至危殆小便赤澀
煩熱口苦舌乾脈數是火鬱
之症也見此症則早用此湯
免火毒變行之災是治未病
之一法乎

簡誤 虛熱似實熱是假熱真
寒之症虛陽外馳之類全
禁之

香蘇散

十三 治四時感冒風

邪頭痛發熱者及瘟疫傷寒

紫蘇 香附各二兩 陳皮去白

甘草半兩

右四味生姜水煎不拘時候服
此方治感冒瘟疫四時不正

之氣要方輕劑也紫蘇辛溫
能散風寒發表香附味辛苦
甘辛能散苦能降其能和且
香而能竅能輔正除邪陳皮
辛溫能下氣燥濕其州其平
能和中輔正也

評曰太平惠民局有云昔有白
髮老人授此方與一富人家
其家合施當大疫城中瘡
皆愈予試之誠乎哉感冒瘟
疫治之得表發愈最速也表
發之輕劑也重則此湯不能
治不敗毒散不可也輕重之
辨不可不知也

簡誤 元氣虛感風寒自汗奔
熱之輩可禁之是補中益氣
之症誤而用此湯脫元氣至
危症也安用不可誤火矣

要方選評上終

要方選評中

盛方院門人

攝州大坂

高須氏健庵春川編述

正氣天香湯

治婦人

切諸氣作痛或寒熱往來眩暈
嘔吐等症

香蘇散去甘艸加烏藥 二兩

乾姜 一兩 二味

右五味生姜水煎服

此方治男婦一切氣要方也

抑鬱而不通暢治宜疎鬱通

滯經云辛以散之是以用烏

藥散姜辛藥散鬱行滯

評曰此湯治氣要湯也王宇泰
證治準繩氣門類方此湯第
一載之治九氣以是見之王
氏氣門群方之冠方豈妄記
之且婦人經閉用此湯得
數次思之蓋婦人屬陰其氣
易鬱結氣鬱結則血亦凝滯
故經閉用此湯踈鬱通滯有
驗宜也用方者能知方意而
用則得驗不然大誤不可慎
可慎
簡誤 氣血兩虛而寒熱往來
真陰不足而經不通此湯可
禁之

香蘇散

治感冒頭

痛甚

香蘇散加川芎白芷各等分一味

右六味生姜水煎服

此方治頭痛要方也川芎白

芷治頭痛藥品也

評曰治傷風頭痛輕劑也頭痛

有數種詳考而可治之一際

不此湯所治矣

簡誤 痰厥頭痛真頭痛可禁

之傷風頭痛之外可斟酌也

行氣香蘇散

治內傷生

於飲食厚味堅硬之物肚腹脹

滿疼痛外感風寒濕氣頭疼身

熱增寒遍身骨節麻木疼痛七情惱怒相冲飲食不下小腹氣痛

香蘇散加烏藥川芎羌活枳

壳麻黃五味

右味生薑水煎服

此方治外感風寒內傷生冷

要方也羌活麻黃治風寒烏

藥川芎枳壳治傷生冷也

評曰此湯香蘇散之輕劑加味

之方世忽之用者少誠濟人

之製方莫忽略矣一老婦發

熱甚骨節痛腹瀉瀉血數十

行脈左右浮大有力其家甚

恐迎數醫或曰風邪兼血症

脈不相應或曰風痢脈浮大

有力痢症惡候予有故手其

子時會談故招予述老婦

之急病診之叩其因待人曰

昨夕食生魚鱸枇杷以後腹

痛瀉血至于今予曰非風痢

又血症脈浮大不宜虫然此

外感風寒內傷生冷之症脈

浮大相應生冷傷血故瀉血

外感風寒故骨節痛行氣

蘇散相對之劑也服之二貽

其夜發熱甚汗出多瀉血減

半明日診脈浮而緩又二貽

服之其夜發熱止瀉血全止

欲食_レ生_レ物可忌_レ之
食進脉緩而病全愈誠偶_レ
之幸者也已往此方之功效
最重而常用之得_レ驗多故記_レ
簡_レ外無風寒內無生_レ冷傷
全可禁_レ之

蘇散

四

治風濕脚氣踈

通氣道

香蘇散加栲柳木瓜二味

右六味姜葱水煎服

此方治氣滯脚氣要方也栲

柳木瓜通氣道

評曰脚氣之病內經無名兩漢
間爲之緩風脚氣之稱自晉

藥敬始王肯堂曰脚氣之名
起自後代其頑麻腫痛者則
經所謂痺厥也痿軟不收者
則經所謂痿厥也其衝心者
則經所謂厥逆也愚案_レ厥
痿厥厥逆共後代渾曰脚氣
又以腫者爲濕脚氣不腫者
爲乾脚氣以是思之脚氣因
有_レ多種一槩而莫論之業醫
者博可考於先醫評論也小
此湯氣滯濕滯脚氣服之久
而有驗曰無速効而莫_レ廢之
其他脚氣臨時施劑脚氣之
病妄見不可誤_レ矣

簡語 氣虛而喘寒入骨
間為痛等癆症其可禁之
醫動癆證与脚氣渾同治大
誤也癆為內臟不足所致陳
無擇詳論今略之欲詳知者
可見本論者也

蘇飲

治四時感冒癆

熱頭疼咳嗽痰飲中脘痞滿嘔
吐痰水寬中快膈不致傷脾一
切癆熱及內外所感皆能而効

- 乾葛 前胡 半复 人參
- 茯苓 各七分半 木香 枳壳 桔
- 梗 芫艸 紫蘇 陳皮 去白
- 各五分

右十一味水一盞半姜七片棗
一枚煎六分去渣温服不拘時

此方治尋常傷風頭痛鼻塞
清涕咳嗽脉浮數者火罇于
上要方也注石山曰紐云邪

之所癆其氣必虛是以用人
參茯苓芫艸補中益氣葛根
紫蘇癆表前胡桔梗半复治
痰定喘枳壳陳皮木香利氣

張氏曰妙在木香
先哲曰或曰今世俗常用此
方則去人參木香可乎曰此
非立方之本意也人參氣味
俱薄助表氣驅邪非

說得詳矣本香味手氣芳逐邪氣在毒疫神農氏嘗得明矣夫邪氣浸皮膚則表氣縮小人參使氣舒暢則所以邪氣去也夫邪氣客際理則衛氣留滯木香使氣順行則所以邪氣散也若除一物則非參蘇飲嗚呼何人之臆見乎哉評曰熱病大熱退尚有餘熱更徐徐服之自然平治因藥飲發熱但連日頻進此藥以熱退為期張氏曰大治中脘痞滿嘔逆惡心開胃進食無以踰此毋以性涼為疑一切發

熱皆能取效不必拘其所因也小兒室女亦宜服之予見張氏言畢竟以鬱熱為主魚一切發熱皆能取效外感太陽之發熱此湯不可治也為醫者請藥性而此方藥味如何可見也妄泥方後易用矣簡誤 氣虛發熱陰虛發熱真陰不足火上衝肺咳嗽氣虛血脫之症共可禁之

女補心湯 治婦人虛

勞熱嗽無汗者男子亦可

參蘇飲 西物湯 八

右二方合 五味姜棗木煎

此方補氣清痰要方也

方意在煎

評曰合方為用能考方意而可
用妄合而亡藥功
人以單方
多以是致思
予見於此場
效今記之廣爾志之見十年
前稍野氏醫某六月中旬初
而血二三合吐出胸膈脹痛
奔熱往來數醫治之不愈至
于九月吐血胸膈脹痛發熱
不止予為舊故之人招予曰
病既數日不愈數醫施劑還
而益病我自欲施藥劑而舊
病力乏舊來之恩意易我施

劑診脈左右浮大按有力右

寸關洪強甚曰血症脈不相

應欲施何劑曰扶心湯

去地黃加牡丹皮蘇木

此破血之加味吐血之症恐

非乎病人曰服此劑而死何

恨是命也不能已而與二帖

歸家通霄思之待明日而至

于病家病人曰服二帖藥夜

夜吐血六七合皆黑塊血也

血無凝胸膈痛減半今日

前劑牡丹皮蘇木加倍診脈

右寸胃洪強生緩於是又與

二帖其血四五合胸膈

痛全止而食進去牡丹皮
蘇木加紅花服二十帖九月
下旬全愈予歎曰如有明
療而人不知之曰是命也不
可言予常思此湯未會此病
愈至于近來初而知宜乎哉
牡丹皮蘇木妙在此二味初
恐二味今知有切業不積歲月
不可也修練之功可仰者也
簡誤 氣脫汗易泄外邪甚食
積痞滿共可禁之

人參敗毒散

二十 七 濕傷寒瘟

疫風濕風眩拘蹇風痰頭疼目
眩四肢痛增寒壯熱項強睛疼
及老人小兒皆可服或瘡煙之
地或瘟疫時行或人多風痰或
處卑濕脚弱此藥不可缺日二
三服以知為度

羌活 獨活 前胡 柴胡

芎藭 枳殼 白茯苓 桔

梗 人參 已上各一兩 甘草 半兩

右十味每服三錢加生姜三片
水一盞半煎至一盞溫服或沸
湯點服亦可

汪石山加薄荷少許用

吳昆加黃芩 毒瘡久日口乾

加黃芩

此方治 四時通用之要

方也方者... 活法... 前胡川芎... 也故用之以解... 枳壳桔梗者取其... 氣也用人參... 其中氣使... 培其正氣... 陶尚文曰若初看... 先以敗毒散... 經再隨經... 評曰毒書... 乎更以人參... 正驅逐其邪... 萬億奈何... 去人參不用... 而能活人耶... 往往去人參... 參敗毒散去... 方之意似相... 此言如夢始... 言得製方之... 矣業醫者博... 益也

簡誤 正氣不足而惡寒發熱
湯甚泄不食胸膈痞滿血脫
血虛諸屬虛症者可禁之

倉廩散 治痢疾赤白... 然不退腸... 風邪... 毒及

時行瘟疫... 胃境皆下痢噤
可者服之神效

人參散毒散加黃連 陳倉

米^{三百} 二味

右十二味姜末煎服

此方治風痢要方也黃連去

腸胃炎陳倉米助脾胃

評曰痢病前代諸公皆叙名滯

下經書云腸澼其為病多端

而一槩難述古人評論區々

博考於群書以知之今此湯

風痢之一症最用之有功也

簡誤 痢病脉沉細無熱屬虛
脫者可禁之

平血散

九^{三十} 治身生瘡膿血

腫痛且痒或風熱積毒發於面

頭手足如胭脂色

人參散毒散加葛根 赤

芍 外麻 天麻 蟬脫

薄荷 麥門冬 生地黃^八味

右十八味煎服

此方治皮膚熱瘡要方也葛

根赤芍外麻除脾胃熱天麻

蟬脫薄荷去風熱麥門潤肺

生地去血熱

評曰此湯防風通聖散二方共

身瘡頭面瘡治之要劑也雖

然診法有別也脉浮數緊此

湯表發而愈脈沉實洪大通
聖散用之愈診法能可考知也
簡誤 脈沉實氣血虛瘦人骨
按共可禁之

藿香正氣散

十四

治四時不

正之氣時氣山嵐瘴氣雨濕蒸
氣或腹痛吐利中暑胃風吐瀉
中濕身重泄瀉或不伏水土脾
胃不和或飲食停滯嘔逆惡心
胸膈痞悶或頭疼增寒發熱無
汗者

藿香錢三 陳皮 白朮 厚朴

半夏 桔梗各二錢 大腹皮

紫蘇 白芷 茯苓各一錢 甘草

半

右十味入姜棗煎服

此方治四時感冒霍亂吐瀉
腹痛要方也在右山曰藿香
和脾胃進飲食以辟惡氣而
止嘔逆厚朴陳皮消痰理氣
茯苓白朮甘草補中大腹皮
助脾胃斂氣寬中半夏降逆
氣燥痰涎桔梗為諸藥舟楫
於治痰紫蘇下氣散寒白芷
散遊風兼止頭疼

評曰近世不辨傷寒感冒表裏
動用此湯能治萬病是大誤
也有此病有此藥何書此

方哉先成此藥不可用之述
辭具簡誤

簡誤 果緩曰此乃宋人所製
非正傷寒之藥也若病在太
陽經頭疼發熱骨節痛者與
此方全無相干如妄用之先
虛正氣逆其經絡汗出不
解變成壞證多矣凡傷寒發
熱脈沉與元氣素虛并來陰
傷寒發熱者切宜戒之果中
甫云風寒客于皮毛腠理則
宜解表若四時不正之氣由
鼻而入不在表而在裏故不
用大汗而以芬香利氣之品

以辟不正之氣佐以白木茯苓
苓其燥之品以培養中氣也
用者宜慎之

加味羌活湯

四一石大羌活湯
一名中和湯

治傷寒脈浮緊傷風脈浮緩并
解兩感惡候春分後傷寒代桂
枝麻黃湯用

枝麻黃湯用

羌活 防風 蒼朮 各一錢
五分

細辛 川芎 白芷 生地

各一錢

若丸味水煎服用生姜三片東
二枚煎一鍾加葱白搗汁五匙
入藥再煎一二沸食後溫服被
覆取微汗為度如無汗時更稀

粥取之煉蜜作丸服最妙
云有汗不得服麻黃無汗不得
服桂枝若誤服則其變不可勝
言故以此法不犯三陽禁忌解
傷風得傷寒脈故仲景有太青
龍之劑及汗出過多戒不可服
有筋傷肉瞶之證許學士諱六
以此則知麻黃桂枝不可輕用
及韓氏亦有桂枝之戒至湯氏
明理特有互見脈体非精於持
診者未易能也先師書古老人
傳採衆方別立此法無問有汗
無汗中風中寒悉治使喜溫者

去五積之變換好涼者除雙解
之裏寒雖市夫農子用而無失
此方治兩感傷寒及四時不
正之氣憎寒壯熱頭疼身痛
口渴人人相似者要方也若
活治太陽肢節痛大無不通
小無不入乃捻亂反正之主
也防風治一身盡痛聽君將
命令而行隨所使引而至脊
不雄壯上行之氣能除濕氣
下安太陰使邪氣不傳脾經
細辛治少陰有經苦頭痛用
芎治厥陰頭痛在腦白芷治
陽明頭痛在額生地黃治少

陰心焚在內黃芩治太陰肺
焚在胸其神緩裡急和諸藥
此方乃易老所製凡見表證
悉宜服之不犯三陽禁忌實
既利之神藥也然以一藥而
類治諸證苟用其方而不知
所以立方之意則未免有執
一之弊故述各藥主治使學
者詳而用之果岷曰非其時
而有其氣長幼之病多相似
藥之辛者得天地之金氣于
入則為義故能匡正而黜邪
易老自序云冬可治寒夏可
治熱春可治溫秋可治燥是

諸路之應兵也生生子曰夫
此方予每用加柴胡乃總治
傷風各經之活套也令人只
知其治四時傷寒如神不知
加柴胡總治各經之妙使學
者詳各經之症孰重以本經
之藥為君送為賓主則所治
無不响應

汪石山曰此藥不独解利風
寒治雜病亦是如神如中風
狂經加附子如中風秘者加
太黃如治風寒濕三合而
為痺症冬隨十二經上下肉
外寒濕溫涼四時六氣加減

補淨而用之

評曰徐東舉曰易老花味着活
湯爲解利兩感傷寒而設經
曰兩感於寒者死不治以其
六日太陽與少陰俱病則頭
痛口乾而煩滿二日陽明與
太陰俱病則腹滿身熱不欲
食謔語三日少陽與厥陰俱
病則耳聾囊縮而厥木漿不
入不知人此爲藏府俱虛內
外俱病欲表之則有裏欲下
之則有表故云兩感者不治
然所感有淺深虛實之異虛
而感之深者必死實而感之

淺者猶或可治故易老有
味着活湯之製也其黃芩生
地爲裏枳之藥着活細辛爲
解表之藥亦和乎表裏之輕
劑耳然非正傷寒之王藥也
陶氏謂其可代麻黃桂枝膏
龍三方之用噫亦過矣但用
之於傷風見寒傷寒見風頭
身疼痛惡寒發熱而兼有裏
證者宜用之大抵終是輕劑
若臭溢發汗必用麻黃而着
活防風豈可也若表虛有
汗則用桂枝若行而煩必
用青龍着活豈可代也非即

病正傷寒而九味遂用於
春秋之時此之麻黃湯能則
又穩也知者查諸

簡說 李士材曰陰虛氣弱之
人非所宜與 愚按血脫崩血
後惡寒發熱氣血兩虛脾胃
虛弱共可禁之

麻黃湯

仲景曰太陽病

頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛

惡風無汗而喘者主之

麻黃

三兩 去節

桂枝

二兩 去皮

甘草

一兩 炙

杏仁

七十枚 去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減
二升去上沫內諸藥煮取二升

半去滓溫服八合覆取微汗

此方治正傷寒太陽無汗粟

方也成氏曰麻黃其苦為君

者以輕劑專主發散也桂枝

為臣者表實滕密非桂枝所

能散必專麻黃以發汗經曰

寒濕干內治以甘熈佐以辛

苦是也其辨其乎杏仁其溫

用為佐使者經曰肝苦急急

養等以緩之肝者榮之主也

榮勝衛固血脈不利宜其炒

杏仁其以緩之且桂枝湯主

風傷衛風邪併于衛則衛實

而榮弱故佐以芍藥助和榮

也麻黃湯主寒傷榮氣邪併
于榮則榮實而衛虛經曰氣
之所并為血虛血之所并為
氣虛者是已治之以杏仁用
利氣也

評曰李士材曰愚按審係真寒
太陽無汗非麻黃湯莫可代
者前哲謂冬不用麻黃復不
用桂枝蓋以冬令主閉藏不
應疎泄復令本炎熱不可辛
溫經所謂必先歲氣勿伐天
和之說也又曰麻黃惟冬月
寒邪在表滕密無汗者必用
是何與前說相反耶戒不用

者明時令之常慮輕用也
必用者免病機之理慮遺用
也或捨時從症或捨症從時
臨症變通存乎其人倘一槩
疑懼惟以輕和之劑代之必
有陰受其天折而莫之覺者
該通君子其熟察之

簡誤 附節庵曰麻黃桂枝二
湯仲景立治冬時正傷寒之
方今人通治非時暴寒溫暑
之候愚按非太陽正傷寒妄
此湯不可用矣先人之格言
能可考也

桂枝湯

四

仲景曰本湯中

風頭痛陽浮而陰弱陽浮者熱
自發陰弱者汗自出。治者惡寒
新斯惡風命命發熱鼻鳴乾嘔
主之。

桂枝 三兩 去皮 芍藥 三兩 兩 甘草 二兩 炙

生姜 三兩 兩 大枣 十二枚 去核

右五味以水七升微火煮
取三升去滓適寒溫服一升服
已須臾飲熱稀粥一升餘以助
藥力溫覆令一時計遍身熱大
微似有汗者益佳不可令如水
流漉病必不除若一服汗出病
瘥停後服不必盡劑若不汗更
服依前法禁生冷粘滑肉麪五

辛酒酪臭惡等物

此方冬時即病治太陽傷風
傷寒有汗要方也成氏曰桂
味辛熱用以爲君者桂猶主
也宣道諸藥爲之先聘辛甘
發散爲陽之意也芍藥味苦
酸寒甘艸甘平用以爲臣使
者經曰風淫所勝平以辛佐
以苦以甘緩之以酸收之也
生姜辛溫大枣甘溫二物爲
使者經曰風淫于內以甘緩
之以辛散之也姜枣固能發
散此又不特發散之愚專行
脾之津液而和榮衛者地麻

黃湯不用姜枣專之則
不待行化而津液得通矣

詳曰傷寒麻黃湯桂枝湯兼氣
湯用之說關於諸書無詳於

證治集編誠王宇泰之發明

冠于古今欲記之雖歿學醫

者關於本書能可知其心故

省略之今生生子傷寒用桂

枝說徐東臯評麻黃桂枝二

湯記之具參考矣

或問傷寒用桂枝說見醫書

後有云脈浮緊發熱汗不出者

不可與與之則表益實而汗益

難出耳則是以桂枝為固表藥

也何麻黃湯中又用桂枝為臣

耶生生子曰考方瘴疾全在體

認氣味行義謂桂大熱桂味辛

甘主溫中利肝肺氣為諸藥先

聘通使溫和榮衛宜道百藥無

所畏然桂枝湯用桂者以其衛

為邪襲則氣不固故汗出惡風

桂枝味辛甘陽劑也陽劑其行

快入咽則先布散充達百骸四

肢無處不至此散之之意也至

于止汗自是芍藥芍藥味酸陰

劑也陰劑入咽其行遲故先散

之而後收之一開一闔邪氣散

而真氣不過洩以致...
謂桂枝能止汗也麻黃湯用桂
枝為臣者亦以其辛耳發散為
陽者謂其實表止汗將安用之
蓋以其寒傷榮桂枝能佐麻黃
溫和榮衛則邪自不能容留汗
出而解也桂枝湯後叮囑不可
與者為內有芍藥寒既傷榮發
熱無汗復用酸寒收斂之劑則
邪無從而出表乃益實也非謂
辛散能實表也風陽氣也陽主
散風傷衛則氣散而汗出寒陰
氣也寒主斂寒傷榮則氣斂而
無汗欲治法無汗要有汗取辛

散能發汗也有汗要無汗取酸
收能止汗也俱用桂枝者以其
既能發散而又能溫和榮衛也
予故曰考方癘疾全在辨認氣味
評麻黃桂枝二湯見前本
活人書云服麻黃湯發煩目眩
者必服桂枝湯吐者其後必
吐膿血頭痛發熱無汗惡風
宜麻黃湯是應解表而用麻黃
者頭痛發熱汗出惡風宜桂
枝湯是應解散而用桂枝者二
者均為解散正分輕重不可不
察也仲景云無汗不得服桂枝
有汗不得服麻黃若人有汗者

當解肌無汗者當發汗是太陽
一經尚有差別有死不分陰陽
而用藥乎當汗而下即死當下
而汗亦死所以云桂枝下咽陽
盛則斃謂當下而反汗也陽盛
下也誤投桂枝發
汗是陽盛即斃也
美氣入胃陰盛乃亡謂當汗而
反下也陰
盛者惡寒而邪在表故當汗也
誤投美氣攻下是陰盛而亡也
可見麻黃桂枝美氣者死生之
係業醫者可不慎哉

簡誤 李士材云如骨髓無寒
則桂枝不宜與矣論曰桂枝
下咽陽盛則斃其此之謂乎
成無己云桂枝本為解肌若

其入脈浮緊發汗不出者
不可與也常須識此勿令誤
也又云酒客不與桂枝湯
外臺云桂枝下咽表和則斃
美氣入胃裏乎以亡此表裏
之交錯其候至微發汗吐下
之相反其禍至速仁者鑒此
可不慎欤

黃連解毒湯 治傷寒太

熱不止煩燥不眠

黃連 黃芩 黃柏

梔子 各等分

右四味水煎溫服

此方治火邪要方也任氏云

黃連以解內熱，以退表熱。黃柏救腎水，以降火。梔子清痰解虛煩。

評曰：在書此方，大倉公火劑湯。

也。誠乎哉！非大倉公合此苦寒品味而何用。有此病，有此藥，合其症，則立得驗者也。予一日語談於佐藤氏醫某，此人先年長崎，住有年。語曰：太村武夫，其十餘年開眼，火花飛數醫治之，無效。有故來于長崎，遇于異邦一醫醫曰：愈之治療，而終火花不飛，全愈。其後問其藥方，則黃連解毒。

湯也。予聞此語，感心而思之。瀉火之妙劑也。業醫者深達于醫理，應變而可用藥方也。近來本邦，恐苦寒不用，動用甘溫藥，是補劑也。大誤。人臨時苦寒有功，勿一槩廢焉。簡誤。氣血虛而火妄動，崩血脫血而火妄發，一切虛火，脈浮太虛，按無力，共可禁之。

小柴胡湯

五 主傷寒五六

日往來寒熱，胸脇苦滿，脇痛，耳鳴，默默不欲飲食，心煩喜嘔，或胸中煩而不嘔，或渴或腹脹，或脇下痞，或心下悸，小便不利，或

不渴身有微熱或發者此邪在少陽經半表半裏之症也

柴胡^{八兩} 黃芩^{三兩} 人參^{三兩} 甘草^{二兩}
三兩半 半夏^{半升} 洗 生姜^{三兩} 切 大棗^{十二枚}

右七味水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日進三服

此方和解表裏之要方也
成氏曰邪在表則寒在裏則熱半表半裏故寒熱往來在表則不滿在裏則脹滿止言胸脇苦滿知在表裏之間少陽行身之側胸脇為少陽之部

其脈循脇絡于耳故胸脇痛而耳聾在表則呻吟在裏則煩亂^症曰陰入之陰則靜默默者在表裏之間也在表則能食在裏則不能食不欲飲食者邪在表裏之間未至于不能食也在表則不煩嘔在裏則煩嘔心煩喜嘔者邪在表方傳裏也^經曰熱淫于內以苦發之柴芩之苦以發傳邪之熱裏不足者以甘緩之參草之甘以緩中和之氣邪半入裏則裏氣逆辛以散之半復以除煩嘔邪在半表則

柴衛爭之辛其衛之美也
和柴衛

節痛日婦人中風七八日續
得寒熱發作有時經水適斷
者此為熱入血室其血必結
致使如癰狀此湯主之

仲景曰胸煩不嘔去半復人
參加括蕞實一枚渴者去半
復更加人參二兩五錢括蕞
根四兩腹痛者去芍加芍藥
三兩脇下痞去大棗加牡蠣
四兩心悸小便不利去芍加
茯苓四兩不渴外有微熱去
參加桂枝三兩溫覆取微汗

效者去參姜棗加五味子半
外乾姜二兩

評曰徐東臯曰傷寒五六日嘔
而發熱者小柴胡湯証具却
以他藥下之柴胡證仍在者
復以小柴胡湯與之此雖已
下不為逆若得小柴胡湯必
蒸令而振發熱汗出而解難
為汗下者必用小柴胡故又
名三禁湯今見傷寒多用小
柴胡不問陰陽表裏皆與之
豈不為害也不知小柴為少
陽表裏和解之藥惟嘔惡心
寒熱怕風惡寒在表親切傷

寒但嘔便屬少陽止用小柴
胡湯和蘇蓋少陽邪未入裏
而在表裏之間是邪欲入胃
氣充而不納故嘔出若邪稍
入裏氣未和當用大柴胡湯
微下之自然熱退身涼何有
壞証若只邪在皮膚惡寒熱
作脈浮而促則當解表用九
味羌活湯所以有謂解表未
開不得攻裡表氣尚存攻之
為逆

簡語 李士材曰愚按近世治
傷寒不分表裏陰陽驟用此
方去參投之取其乎穩不知

此為半表半裏之劑太陽經
之表熱陽明經之標熱皆不
能解也若夫陽氣虛寒面赤
發熱脈沉足冷者服之立至
危殆可不慎哉即大便不實
脈息小弱者皆在所禁信乎
用方不當皆可殺人不獨峻
劑也孫一奎又曰婦人新產
發熱不可用之也

大柴胡湯

六

治陽邪入裏

表症未除裏症又急

柴胡 八兩 黃芩 二兩 枳實 四枚 芍

藥 三兩 生薑 五兩 半夏 半升 大

棗 十二枚 去核 大黃 二兩 生 用酒洗

右八味水一斗五分煮六分去
滓煎服一升日三服

或兼也云大便太實堅有燥
屎非駛劑則不能泄大小養
氣湯是也如不至大堅滿邪
氣甚而須攻下者必用輕緩
劑攻之大柴胡湯是也李士
材曰表症未除裏症又急者
此為兩解之劑方考曰表証
未除者寒熱往來脇痛口苦
尚在也裏証又急者大便難
而燥實也表証未除故用柴
胡黃芩以解表裏証燥實故
用大黃枳實以攻裏若藥能

和少陽牛復能治嘔逆大東

曰生姜亦所以調中而和榮衛也

評曰徐東臯曰或問傷寒有表
復有裏証用大柴胡湯之緩
劑下之何如答曰大柴胡湯
傷寒下藥與三養氣湯之次
也其間應下尚有表証多或
虛弱易動者宜用大柴胡湯
緩方為至穩若血虛人更加
當歸虛弱用之穩為其有人
參茸草和中故也傷寒發熱
汗出不解心下痞硬嘔吐而
利非大柴胡湯不可也此非
是有陽明嘔吐又非霍亂吐

利謂之太陽末柴胡証也故
緩以下之為穩也

簡潔 血燥而便秘氣虛壅滯
不流行便秘屬虛者悉可採之

小養氣湯

四一一名順氣湯
七一一名厚朴湯

六七日不大便腹脹滿陽明無
表症汗後不惡寒潮熱狂言而
喘專寫上焦之否熱

大黃

厚朴

枳實

枚

灸

已上三味以水四升煮取二升
二合去滓分溫二服初服湯當
更衣不爾者盡飲之若更衣者
勿服之

此湯方考曰邪在上焦則作
滿邪在中焦則作脹胃中實
則作潮熱日潮熱者猶潮水
之潮其來不失時陽乘於心
則狂熱于胃口則喘枳朴去
上焦之痞滿大黃蕩胃中之
實熱此其裏証雖成病未危
急痞滿燥實堅猶未全備以
此方主之則氣亦順矣故曰

小養氣

成無已曰養順也傷寒入胃
胃氣鬱滯糟粕秘結壅而為
實是正氣不得舒順也湯以
蕩滌實邪使正氣得以舒

是以兼氣名之。又曰兼氣。下藥也用之。若宜審焉。知本實太滿。堅有燥屎。乃可投之也。如非太滿。則生寒熱。而病不除。况無滿實者。而或妄投之。則結胃痞氣之病生矣。故云傷寒有兼氣之戒也。成氏曰。大熱結實者。與大兼氣湯。小熱微結者。與小兼氣湯。以熱不大。甚故於大兼氣湯。去芒硝。又以結不至堅。故亦裁厚朴枳實也。仲景曰。欲行大兼氣湯。先與小兼氣。腹中轉失氣者。有燥屎也。可以

大兼氣湯攻之。不轉失氣。慎不可攻。又曰。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之。法少與小兼氣湯。入腹中。轉失氣者。此有燥屎。乃可攻之。若不轉失氣者。此但初頭鞭。後必澹。不可攻之。攻之必脹滿。不能食也。愚按。先哲曰。凡有可下之証。未可使投大兼氣湯。先以小兼氣湯與之。如得利。先鞭後澹者。此裏熱未甚。所謂不轉失氣也。慎勿再利之。為逆也。若得利。只有一行結糞。來再不行。只有一行清水。

即止此謂之轉失氣也病在
燥糞宜作大承氣與之以大
便溏為邪盡如中風人有便
難者本方加羌活二兩名三
化湯

評曰春甫曰小承氣湯治上焦
積熱而成否實以厚朴枳實
去否太黃瀉實熱不用芒硝
則不傷下焦血分之真陰此
為上焦實熱而用之者也愚
按海藏云小承氣湯治實而
微滿即少陽陽明是也惟少
陽陽明為最下之分處三經
之內故太黃不用酒浸也

簡語 實熱而不有便難安不
可用可禁之

大承氣湯

四十

陽明病脈遲

雖汗出不惡寒者其身必重短
氣腹滿而喘有潮熱者此外欲
解可攻裏手足濇然而汗出者
此大便已鞭也主之

大黃

四兩苦寒酒洗

厚朴

半斤苦溫灸去皮

枳實

五枚味苦寒灸

芒硝

三合味鹹寒

右四味以水一斗先煮二物取
五升去滓內大黃煮取三升去
滓內芒硝更上火微一兩沸分
三服得下餘勿服

成氏曰

經曰燥淫所勝

苦下之。大黃枳實之苦，燥除熱。又曰燥滯於內，治以厚朴之苦下，結燥。又曰熱滯，所勝治以鹹寒。芒硝之鹹以蘊熱。

王海藏云：厚朴去痞，枳實泄滿。芒硝軟堅，大黃泄實，必痞滿燥實四證全者，方可用之。又年老虛人傷寒，可下者，本藥氣湯調胃藥氣湯皆去硝，慢火熬成玄明粉，量輕重而下之。

評曰：春甫曰：大藥氣湯治三焦俱實，否滿燥堅全，故用厚朴。

枳實苦寒，瀉滿。芒硝鹹以除堅，大黃之苦以瀉實。熱此爲胃實，不大便，發熱狂言譫語，三焦俱實而用之者也。又先哲曰：痢疾後重，重者以本方下之。若兼虛証者，先以參朮補之，後用本方。如此之類，不可勝數也。

簡誤：下藥峻劑，也不可輕用矣。不有大滿大實，堅在燥屎，不可用之也。如非大滿，則猶坐寒熱而病不除，况無滿實者而結胸痞氣之屬，由是而生矣。是以脈經有曰：傷寒

養氣之戒古人亦特謹之

桃仁承氣湯

傷寒外證

已解小腹急大便黑小便利其人如狂者有畜血主之

桃仁

五十個去皮

桂枝

二兩去皮辛熱 李時曰桂枝誤也官桂也

大黃

四兩芒硝二兩 芍藥二兩

右五味以水七升煮取二升半

去滓內芒硝更上火微沸下火

先食溫服五合日三服當微利

丹考均無頭痛發熱惡寒者

為外証已解小腹急者邪在

下焦也太便黑者瘀血清之

也小便利者血病而氣不病

也上焦主陽下焦主陰陽邪

居上焦者名曰重陽重陽則

狂今瘀熱客於下焦不行則

于上部清陽之分而天君弗

寧矣故其証如狂桃仁潤物

也能澤腸而滑血大黃行藥

也能推陳而致新芒硝鹹物

也能軟堅而潤燥甘草平劑

也能調胃而和中桂枝辛物

也能利血而行滯又曰血寒

則止血熱則行桂枝之辛熱

君以桃仁硝黃則入血而助

下行之性矣斯其制方之意可

王宇泰云按這是桂非芒

也蓋桂枝輕揚治上桂
治下成氏隨文順釋未足
李士林云按犀角地黄湯治
上焦之血抵當湯治下焦之
血此治中焦之血宜用桂心
舊本誤作桂枝成氏隨文順
釋不足據也今改正之

評曰春甫按桃仁養氣湯治中
焦瘀血積熱經曰中焦如瀼
血之源也中焦熱甚則血瘀
凝故有腹痛不可按又有彥
語則以調胃養氣加桃仁肉
桂以破之亦不用枳實以傷
上焦此則諸養氣因証立方

而不谷以不易名也上文謂
無形有形緩急次第惟見其
大畧焉耳豈若直以三焦證
治而論不亦深切著明也哉
簡誤 不有瘀血蓄血妄不可
用也可禁之

調胃養氣湯 五 發汗後惡

寒虛故也不惡寒但熱者實也
當和胃氣此主之

大黃 四兩 去皮 其艸 二兩 灸
芒硝 半兩 味鹹 味其平
芒硝 苦大寒

右三味咬咀以水三升煮取一
升去滓內芒硝更上火微煮令
得少少溫服之

或無止云內經曰熱淫者治以鹹寒佐以苦甘芒硝寒以除熱太黃苦寒以瀉實甘草甘平助二物推陳而緩中亦曰兼氣湯中用甘草恐其暴下也

評曰春甫按調胃兼氣湯治邪在中焦則有燥實堅三症故用甘草調胃和中芒硝潤燥大黃瀉實不用朴實以傷上焦之元氣也

簡誤 此方下之輕者重於小兼氣不有中焦燥實堅妄不可用也可禁之

三三兼氣湯

五十一 三陽之熱

邪入裏者玉之

大兼氣湯加甘草一味

右五味煎法同前

此方治大兼氣湯証腹滿實痛亦治小兼氣湯熱不便亦治調胃兼氣湯証譫語下利此湯合而為一故名三三兼氣湯

評曰先哲曰三陽者太陽陽明少陽也自太陽經入胃腑者謂之大陽陽明自陽明本經入胃腑者謂之正陽明自少陽入胃腑者謂之少陽

三陽明皆厚實之証也
主之此河間之方也右亦
傷寒之降劑而通治諸病者
也學者常翫味立方之意酌
邪淺深分之輕重施之則使
入無夭橫也

簡誤 羅謙甫氏曰若大兼氣
証反用調胃養氣湯治之則
邪氣不散小兼氣証反用大
兼氣湯下之則過傷正氣而
腹滿不能食故有勿大泄之
戒此仲景所以分而治之未
嘗越聖人之制度後之學者
以此三藥合而為一且亦通

治三藥之証及無間傷寒雜
病內外一切所傷一槩治之
若依此說與仲景之方甚相
違背又失軒岐緩急之旨紅
紫亂朱迷惑衆聽一唱百和
使病者暗受其弊羅氏此言
也明正後世用三七兼氣之
誤實有肯哉

外傷高根湯

五十

治夫人小

兒傷寒斑疹時氣溫疫頭痛發
熱肢躄煩疼及瘡疹發與未發
疑似之際並宜服之

葛根

十五

外麻

白芍藥

桂艸

各三

兩

各

兩

右四味為末每服三錢水
送下
熱服日三服

此方陽明發表要方也有陽
明証惡寒發熱者熱在肌表
必用此方也石山曰用葛根
發表外麻解熱毒白芍養血
芍藥和中

評曰唐晉之世謾用之通治於
雜病誤人多故棄而不用之
情乎哉陽明之發表無如此
左今試之應手有效也醫不
明經而謾用之醫之罪也故
海藏太陽証用此湯引太陽
邪氣入于陽明不能解是不

明經戒也業醫者可慎矣

簡誤 海藏云活人言頭痛如

破者連翹葱白湯次亦不已
者葛根外麻湯恐太陽流入
陽明斷其路故以此湯主之
不知外麻乃陽明藥非太陽
藥也人或初病太陽証也便
與葛根外麻湯是遺太陽不
惟遺反引太陽邪氣入于陽
明不能解也其妄可勝言哉

五積散

五十 調中順氣除風

冷化痰飲治脾胃宿冷腹助脹
痛胃膈停痰嘔逆惡心或外感
風寒內傷生冷心腹痞悶

昏痛肩背拘急肢躄怠惰
徒來飲食不進及婦人血氣不
調心腹撮痛經候不調或閉不
通並宜服之

白芷 茯苓 半復湯洗 當

飯 川芎 苒艸炒肉桂

芍藥各三 枳壳炒 麻黃去根

陳皮去白各 桔梗十二 厚朴

姜六兩 蒼朮米泔浸去

炒乾姜四兩 蒼朮皮九四兩

右十五味除肉桂枳壳二味別

為麤末慢火炒令色轉攤冷次

入桂枳殼末令勻每服三錢木

一盞半入生姜三片煎至一盞

去滓溫服胃寒用煨姜但覺惡

寒或身不甚熱肢躄拘急或手

足厥冷即入炒茱萸七粒鹽少

許同煎婦人難產入醋一合同

煎並不拘時候赤木玄珠曰此

方一兩加生姜五片水煎入射

香無煎二沸治中濕而致癱瘓

與中風相似二服立效

此方醫學入門釋名曰積寒

積食積氣積血積痰五者之

積可散也先哲曰中寒濕者

或入水或坐濕地或于風雨

遠行之類也其証也頭疼身

痛頸強拘急惡寒嘔吐或有

腹痛也蒼朮半復陳皮

也麻黃白芷川芎桔梗
也枳壳厚朴乾姜茯苓甘草
肉桂芍藥當歸利中溫裏和
榮也今之醫流中寒用之意
中寒者宜四逆理中之類感
寒風冷濕者宜此方也

評曰海藏云麻黃桂芍藥甘草
即麻黃桂枝各半湯也
其艸陳皮厚朴即平胃散也
枳壳桔梗陳皮茯苓半復即
枳桔陳湯也又川芎當歸
治血兼乾姜厚朴散氣此數
藥相合為解表溫中泄濕之
劑去痰消痞調經之方雖為

肉寒外感表裏之分所制實
非仲景表裏麻黃桂枝姜附
之的方也主積冷嘔泄時疫
項背拘急加葱白豆豉厥逆
加吳茱萸寒熱咳逆加棗婦
人難產加醋始知用之非
途也惟知活法者其擇之
簡誤不有風寒濕脈弦緊者
不可用可禁之此方宜東北
土地不宜南西土地也內經
異法方宜論有言乎哉能可
致思矣

白虎湯

四 五

主傷寒傳入于

胃脈大而長

仲景曰

表裏俱熱

煩渴

知母

六兩味苦寒

石膏

一斤碎味辛寒

粳米

二兩味甘平

粳米

六合味甘平

右肆味以水一斗煮米熟湯成去滓温服壹升日三服

成無已曰白虎西方金神也

應秋而歸肺熱甚於內者以

寒下之熱甚於外者以涼解

之其有中外俱熱內不得解

外不得解者非此湯則不能

解之也夏熱秋涼暑喝之氣

得秋而止秋之令曰處暑是

湯以白虎名之謂能止熱也

知母味苦寒內經曰熱淫所

勝佐以苦甘又曰熱淫於

以苦發之飲酸表熱必以苦

為主故以知母為君石膏味

甘微寒熱則傷氣寒以勝之

甘以緩之熱勝其氣必以甘

寒為助是以石膏甘寒為臣

甘草味甘平粳米味甘平脾

欲緩急食甘以緩之熱氣內

餘消燥津液則脾氣燥必以

甘平之物緩其中故以甘草

粳米為之使是太陽中喝得

此湯則頓除之即熱見白虎

而盡矣

李中梓曰愚按知母之寒不

及石膏况知疑但主內熱不
能解肌况止用六兩恐非君
也宜作臣石膏入肺屬金其
色又白其性又雄正與白虎
之義相合且用一觔恐非臣
也宜作君珍珠囊論石膏之
性而謂仲景有白虎之名因
名責實則豈非此方之君邪
身熱口乾煩渴面赤發熱身
脈虛者用白虎加人參湯名
化斑湯治之或問曰夫發斑
脈虛者似難投白虎用之何
乎曰呂滄洲曰夫脈血之波
瀾也血為邪熱所搏滯而為

斑外見皮膚呼吸之氣無形
可依猶溝隧之無水魚有風
不能成波瀾癍消則脈出矣
汪石山曰如秋盛感熱夜病
或陽明症大便不固熱不退
或濕溫症不退而大便溏如
蒼朮煎服名蒼朮白虎湯

評曰徐東臯曰證治論云白虎
湯性涼惟夏至後用之謂如
上地七八月猶熱處有壯熱
為病相度尚可用白虎湯服
之自然汗解然白虎湯用石
膏故亦治傷寒不專於治暈
也或問曰夏月若果見麻黃

桂枝証亦豈從不用而固用
白虎湯也曰此說尤妙但臨
時看證用之假令虛弱人老
人不可用白虎也蓋白虎性
涼若下利腹痛者勿服當改
服小柴胡湯或問夏至後皆
可用白虎湯耶答曰白虎治
中暈并汗後一解表藥非
正傷寒藥也今之醫家
月中病多云中暈不辨熱病
用藥太涼况夏月陰氣在內
尤宜戒之證治論云白虎亦
治傷寒不專治暈活人書云
白虎湯治暑并汗後一解表

藥耳其二說魚頗異大抵隨
時審證當用即用不可執一
說也

簡誤 李中梓曰立秋後不可
服服則不能食多成虛羸愚
按此方也惟傷寒內
者可用之若血虛身熱
白虎誤服白虎者死無救又
東垣之所以垂戒矣

防風通聖散

治一切風

熱大便秘結小便赤澀頭面生
瘡眼目亦痛或熱極生風
口噤或鼻生紫赤風刺癢疹
為肺風或成風腐而世呼為天

風或腸風而為痔漏或腸蠱而為諸熱譫妄驚狂併皆治之

防風 川芎 當歸 芍藥

大黃 芒硝 連翹 薄荷

麻黃 各半 石膏 桔梗 黃

芩 各一 白朮 山梔子 荆

芥穗 各二 滑石 甘草 各三

右十七味細切加生姜三片水

二盞煎至一盞溫服日再服

喻氏曰按此方乃表裏通治

之輕劑用川芎當歸芍藥白

朮以和血益脾所以注不傷

表下不傷裏可多服也方考

曰防風麻黃解表藥也風熱

之在皮膚者得之由汗而泄

荊芥薄荷清上藥也風熱之

在巔頂者得之由鼻而泄太

黃芒硝通利藥也風熱之在

腸胃者得之由後而泄滑石

梔子水道藥也風熱之在決

瀆者得之由溺而泄風濕于

膈脾胃之邪石膏桔梗清肺

胃也而連翹黃芩又所以祛

諸經之遊火風之為患肝木

主之川芎白朮又所以和胃氣而

健脾劉守真氏長於治火此

方之旨詳且悉矣

許曰先哲曰劉河間長於治火
其妙太率在此方天地之間
不可無此方者也予治不吐
男發熱甚頭痛尤甚如醉人
診脈沉細病脈不相應予沉
思而疑之此發熱頭痛非外
邪恐毒厲之氣問病人曰胃
身有所痛否病人曰時々面
掣疼又止又疼而已隱見病
人面部果左頰有小粒毒腫
予曰此疔瘡也此發熱頭痛
非尋常之毒腫急不治恐有
害即以通聖散大劑而與之
發熱頭痛止毒腫黃水出而

愈不計得效速也誠適中之
藥如此得效者也爾來後疔
瘡其外一切毒腫初發用此
湯應手無不愈矣誠河間制
方之妙可貴者也

簡誤 氣血虛症脾胃虛冷大
便下泄一切虛症寒症虛熱
兼飲食不進等悉可禁之

外陽散火湯 治男子婦

人四肢發困熱肌熱筋骨間發
表熱如火燎于肌膚押之烙手
夫四肢屬脾脾者土也熱伏地
中此病多因血虛而得之也又
有胃虛過食冷物發過陽氣于

脾土之中並宜服之

外麻 葛根 獨活 羌活

白芍藥 人參 已上各五錢 芍藥

炙甘草 生柴胡 已上各三錢 防風

二錢五分

右十味剉每服五錢水煎服忌

寒涼之物

此方治脾熱甚要方也

曰外麻柴胡羌活獨活防風

乾葛皆辛溫上行之物也故

用之以外少陽之氣清陽既

出上竅則濁陰自歸下竅而

食物傳化自無抑遏之患芍

藥味酸能瀉土中之木入參

味甘能補中州之氣生甘州

能瀉鬱火於脾從而灸之則

健脾胃而和中矣東垣氏聖

於脾胃者也其治之必主於

升陽俗醫知降而不知升是

撲其少火也安望其衛生耶

評曰李氏曰東垣自評曰四肢

屬脾脾者土也熱伏地中多

因血虛而得又有胃虛過食

冷物鬱遏陽氣于脾土之中

者並宜服此愚按經曰火鬱

則發之外柴羌獨防葛皆味

之薄者陰中之陽故足以發

無光之火而顯揚于上

助其上升而固衛氣為藥功
其發散而飲集氣其艸以緩
之勿使風藥太過而元氣及
傷也東垣此方非洞曉陰陽
孰能與于斯

簡誤 汪石山曰此方能治血
虛成前症者吾恐方中風藥
過多若謂脾熱太甚而成前
症者則可若因血虛致病則
風藥不無愈燥其血縱有大
參為藥恐難倚仗雖有神効
吾不敢信用也智者思之

分心氣飲

男子婦人諸

氣不和鬱結留滯成病者王之

紫蘊 芩芎 青皮 陳皮
大腹皮 茯苓 桑白皮
芍藥 甘艸 木通 羌活
肉桂

右十二味一劑生薑三片棗下
枚燈心一團水煎

醫學 無羌活肉桂二味

此方治諸氣鬱証要方也陳
皮青皮腹皮辛溫可以利氣
所以破鬱木通茯苓其淡可
以遣滯羌活紫蘇所以散解
半復桑皮所以導痰肉桂芍
藥破血滯甘艸和諸氣

評曰夫火之在世則憂愁不

思慮恐驚悲哀之情無不
 且無不感時時感而通則氣
 隨轉散或事不遂意則鬱結
 而成病故內經曰百病皆生
 於氣也其為症也心胸痞悶
 脇肋虛脹噎塞不通吞酸噯
 氣嘔噦惡心頭目昏眩四肢
 倦怠面色痿黃口苦舌乾飲
 食減少日漸羸瘦或塊外
 降大便虛閉等不可勝記矣
 悉治之蓋醫病之聖劑也
 簡誤 男婦自汗盜汗小便頻
 數白淫泄下諸屬血虛者悉
 可禁之

守氣湯

五十 治虛陽上

攻氣不升降上盛下虛痰喘咳嗽

當飯 陳皮 各二錢 厚朴 半
 復 蘇子 前胡 各七錢
 桂 其 卅 各五分
 右入味入姜棗煎服

此方治虛陽上攻喘促咳嗽
 足冷者要方也若足不冷者
 無十分之功蘇子厚朴前胡
 陳皮半復共能消痰下氣之
 品也當飯肉桂辛溫熱灸其
 炒之其溫收拾虛陽之品也
 評曰降氣二字更著眼也古人
 方名實有心寒於有下陽

不能降是易所謂天地否也
此時以此湯湯降陰陽升降
而全矣故市人曰不知易不
足言大醫誠哉最可思察矣
同誤 風熱衝上攻肺痰喘咳
嗽諸屬熱者悉可禁之

木香流氣飲

又各三十四
味流氣飲

諸氣凝滯胸膈不舒或痞悶或
走痛等証主之

陳皮 青皮 甘枳 厚朴
製紫蘓 香附 各四 大腹皮
丁香皮 檳榔 木香 草
菓 莪朮 炮肉桂 藿香
人參 麥門冬 白朮 赤

茯苓 枳壳 炒石菖蒲 木

瓜 白芷 半复 各一 木通

二兩

右二十四味細末加生姜三片
大棗一枚水煎

此方治氣鬱腫滿初起積聚
氣滯腰痛不可轉側者要方
也有者曰氣陽也升降出入
法乾之行健不止使氣無留
滯斯無痛苦若人也以寒熱
怒恚喜憂愁七氣于之則痞
悶痛楚之疾生爾今夫寒則
氣收收則氣不流矣故用丁
皮肉桂草菓之屬溫而行之

熱則氣亢亢則氣不流矣故
用麥門冬赤茯苓木通之屬
清而道之怒則氣逆逆則氣
不流矣故用檳榔枳殼厚朴
木瓜之屬抑而下之悲則氣
積積則氣不流矣故用青皮
陳皮腹皮木香莪朮之屬快
而利之喜則氣緩緩則氣不
流矣故用人參白朮甘州之
屬補而益之憂則氣沉沉則
氣不流矣故用白芷紫蘇之
屬升而浮之愁則氣鬱鬱則
氣不流矣故用香附葛蒲半
復藿香之屬利而開之

評曰先哲曰或問七氣之來豈
能並至方以二十四味何示
入以弗精專也余曰氣証與
諸証不同諸証者痰血積食
屬于有形故著于一處偏于
一隅可以單方治也若夫七
情屬于無形上下左右散聚
無常故集辛香之品而流動
之雖二十四味不厭其繁譬
之韓信之兵多多益善云爾
簡誤 氣血虛耗脾胃虛損太
便泄瀉屬諸虛者可禁之

木香調氣散

治氣鬱其

症腹脇脹滿刺心不舒

烏藥 香附 枳實 薤

皮 厚朴 陳皮 川芎

蒼朮 各一兩 木香 砂仁 各五錢

肉桂 甘艸 各三錢

右十二味加姜水煎

此方治男婦因氣鬱而胸痛
胸塞氣下陷不快要方也烏
藥香附順氣枳實青皮厚朴
陳皮通氣滯川芎補血蒼朮
補脾胃木香砂仁肉桂破氣
塊甘艸和諸藥

許曰氣鬱滯而脉道不利故脉
沉此時以辛溫熱之藥脉道
利氣流通而乎和也順行之

法最有益人乎

簡誤 氣血虛耗虛火時盛潮
熱煩悶之屬可禁之

要方選評中終

要方選評下

盛方院門人

攝州大坂

高須氏健庵春川編述

三因七氣湯

一各四七湯

七氣相干陰陽不得外降攻衝

作痛者主之

半隻

製五錢

茯苓錢四

厚朴三錢

炒紫蘇錢二

右四味姜棗水煎

此方治氣升降有妨要方也

方考曰三因者內因外因不

內外因也七氣者寒氣熱氣

怒氣懣氣喜氣憂氣愁氣也

要方評

以三因而發七氣外降有妨
則攻衝而痛是方也紫菀之
辛芳可使散七氣厚朴之苦
溫可使下七氣半夏之辛溫
茯苓之淡滲可使平水穀相
干之七氣

評曰先哲曰醫癘之偏也從古
然前賢屢嘆之夫偏于瀉則
惡參芪如蚘蝎偏于補則穿
壁裡添柱真可哀哉仍載先
哲之醫案而為覆轍之戒括
蒼吳球治一官者年七十少
年患虛損素好服補劑一日
事不遂意頭目眩暈精神短

少請醫調治遂以前症告之
謂嘗服人參養榮湯補中益
氣湯等每服用人參三五錢
其効甚速醫者不察遂用前
方倍以人參熟地弗効却以
為年高氣血兩虛當合固本
丸與湯丸并進可以速効服
之數服筋脈反加以氣急其
診其脈大力薄問有病情因
得之曰先生歸休意切當道
欲留豈無抑鬱而致者乎况
公有年氣之所鬱醫者不審
同病異名同脈異經之說槩
行補藥所以病日加也病者

嘆曰斯言深中予病遂用四
七湯數服稍寬氣血和平淡
旬而愈思按不偏于補瀉臨
時通變是醫家第一義也最
可思察矣

簡誤 氣血虛損脾胃虛弱食
不進自汗盜汗屬虛者可禁
之

大七氣湯

二 治積聚隨氣

上升心腹痛小腹脹滿等症

益智仁 陳皮 三稜 莪

木 香附子各一兩 桔梗 肉

桂 藿香 甘州 青皮各三錢

右十味加姜水煎

此方治積塊屬寒者要方也
益智陳皮青皮香附藿香肉
桂皆辛溫而能破滯氣三稜
莪木苦溫能削堅消積桔梗
所以開胸利壅甘州所以和
氣調逆也

評曰五積木聚最有故也閱於
內經難經而可知本也經所
謂治病必求於本此之謂也
簡誤 先哲曰縱魚有堅積脾
胃虛弱者不可妄投屬熱者
不宜用也

半夏白朮天麻湯

三 治痰

厥頭痛眩暈者

人參 黃芪 白朮 白茯苓

苓 天麻 蒼朮 沢瀉

黃柏 乾姜 半復 橘紅

神麴 麥芽

右十三味加生姜食後熱服

此方治頭痛眩暈四肢厥冷
要方也夫頭痛甚謂之足
太陰痰厥頭痛非半復不能
除眼黑頭旋風虛內作非天
麻不能療黃芪甘溫瀉火補
氣實表止汗人參甘溫瀉火
補中益氣二朮俱苦甘溫除
濕補中沉瀉茯苓利小便導
濕橘紅苦溫益氣調中神麴
消食蕩胃中滯氣麥芽寬中
助脾乾姜辛熱以滌中寒黃
柏苦辛以療冬天小火在泉
發躁也

評曰虞花溪曰半復白朮天麻
湯治痰厥頭痛眼黑頭旋惡
心煩悶氣促上喘無力以言
心神顛倒目不敢開如在風
雲中頭苦痛如裂身重如山
四肢厥冷不得安卧愚按此
東垣之說虞氏述之此方東
垣之製方也具隻眼者能可
玩味也

簡誤 至陰不足而無上升陰

陽氣独止盛氣血虛損小便頻數不食等可斟酌之

養血清心湯

六十四 癲者心血

不足也又云癲者喜笑不常顛倒錯亂之謂也此方主之

人參 白朮 茯苓 遠志

酸棗仁 炒 生地黃 石菖蒲

川芎 當歸 各等分 芎藭 減半

右十味水煎服

此方治癲要方也人參白朮茯苓補脾肺遠志酸棗仁石菖蒲補心川芎當歸補血生地散血熱芎藭調和諸藥評曰癲狂癩孫一奎辯之詳也

孫氏曰夫癲者或狂或愚或歌或笑或悲或泣如醉如痴言語有頭無尾穢絮不知積年累月不愈俗名曰心風此志願高大而不遂所欲者多有之愚以孫氏此言得於效告同志備參考一壯男不立於道路條然數男捕之置於室家無人又出如數月也招予請治診脈左右六部沉遲左寸似瀉予察症脈以為是孫氏所謂癲也如醉如痴此男志願不遂所欲而發

此病此湯對病之劑也與三
帖略平與五帖全愈不思如
此速應誠偶中之偶者也後
學其計斯矣

簡誤 實熱邪氣盛而似癩者
可禁之

清心抑膽湯

五 六

癩屬氣血

虛而兼痰火者宜攻補兼施也
此湯主之

當飯 白芍 白朮 茯苓
陳皮 麥門 川芎 人參
遠志 半復 枳實 竹茹
石菖蒲 香附 黃連 姜汁
并州日夫

右十六味加姜水煎
此方平肺解鬱清火化痰除
眩暈諸癩之疾要方也當飯
白芍川芎補血白朮茯苓人
參補氣陳皮半復枳實竹茹
化痰除眩暈遠志石菖助心
香附姜製黃連解鬱清火并
艸和諸藥

評曰孫十奎曰大癩時發時止
者是也有連日發者有一日
三五發者或因驚或因怒而
動其痰火發則昏昧不知人
事耳無所聞目無所見服此
劑地不省高下甚而癩癢抽

擊目作_二視或口眼歪斜或
口作六畜之聲將醒時必吐
涎沫彼癲狂皆無以上証也
用此辯之亦易詳明大抵皆
痰火所致愚按_二斯認証詳
而可言醫_一大徒以方待病
古人所謂刻舟求劍安圖索
驥可慎可慎

簡誤 腎水虛耗_一上煩渴心
悶寒熱往來潮熱陰虛火動
之屬可斟酌之

瓜蒌積實湯 六分 治痰結略

吐不出胸膈作痛不能轉側或
痰結胸膈滿悶作寒熱氣急立

痰迷心竅不能言

瓜蒌仁 枳實 桔梗 茯
苓 貝母 黃芩 陳皮

山梔子 各一錢 當歸 六分 砂仁
木香 各五分 茸艸 三分

右十二味入姜煎加竹瀝姜汁
少許服

此方治實症咳嗽痰喘要方
也大抵午前咳痰宜此湯午
後嗽可用滋陰降火湯此方
瓜蒌枳實桔梗茯苓貝母陳
皮姜汁皆消却痰飲之劑也
黃芩山梔竹瀝所以清痰熱
熱清則痰自收木香砂仁辛

濕所以致痰滯滯散則痰不聚當取甘州甘溫一以和血脈一以和諸氣血氣和則痰不生矣

評曰先哲曰諸痰爲患者除寒痰外皆主之痰雖有風痰濕痰燥痰熱痰寒痰氣痰食痰諸痰之別飲有懸飲留飲支飲痰飲諸飲之異大都皆主熱故內經曰諸氣贖鬱皆屬肺金丹溪釋之言火之外也儒醫精要曰譬諸釜中之水無火之時清冷冷湛然無滓火一奉之則湛然者皆

爲白沫矣人身無病則津液澄清若一病焉則血氣不和不和則經絡壅塞而生熱熱則津液之澄清者亦隨熱渾濁而成痰矣愚按痰証不可一槩論古人述之明也今附于此以備參考

薛新甫曰痰症有因脾氣不足者有因脾氣鬱滯者有因脾肺之氣虧損者有因腎氣虛不能攝水泛而似痰者有因脾氣虛不能攝涎上溢而似痰者有因熱而生痰者有因痰而生熱者有因風寒

濕而得者有因驚而得者不
因氣而得者有因酒而得者
有因食積而得者有脾虛不
能運化而生者有胸中痰鬱
而似鬼附者各審其原而治
簡誤 真陰不足而無所陽附
而泛為痰諸屬虛寒者寒痰
四肢厥冷者可禁之

行和方藥湯

六平 七 治下痢赤

白初起積滯不行裏急後重頻
上圖而去則少腹痛

白芍 錢二 當飯 黃連 黃芩
各一 大黃 分七 檳榔子 木香
肉桂 其 分各五

右九味水煎食前服

此方治痢病初起要方也雲
林龔氏去大黃肉桂加枳殼
予以此方痢病初起不甚腹
痛用之無不應也如腹痛甚
則以本方用之速効腹痛甚
則大黃肉桂不可去 予初見
痢病用數方不得効後初起
以此湯臨時增損久痢去多
不止者參歸芍藥湯風痢倉
廩散臨時增損用此三湯無
不應也世人痢病難治予思
實不難治若甚損脾胃元
氣者不死何待此等人虛漏

也。只藥方者轉變在我不可期。他人之論臨時活法者可默識心通也。

汪石山曰痞滿加枳實一錢。臟毒下血加黃柏地榆。石山之法有得效故附于此。方考曰痢滯下也。患痢大都責濕熱傷氣。故下白熱傷血。故下赤熱傷大腸。則大腸燥澁。故裏急後重。河間云行血則便膿自愈。故用芍藥大黃以行血和氣。則後重自除。故用木香檳榔甘草以和氣苦

能堅腸寒能勝熱。故用芩連厚腸胃而去熱。有假其氣則無禁也。故假桂心之辛熱為

反佐

評曰生生子痢門曰已前諸公皆釋名滯下經書又云腸澼。又曰脈訣舉要曰無積不痢。脈宜浮大浮絳急死細沉無害。王肯堂曰香以赤為熱白為冷。至金河間李東垣始非之。先哲曰河間曰痢為濕熱甚於腸胃。佛鬱而成其病。背熱症也。俗以痢白為寒。赤也。如熱生瘡癰而出白膿可以

百為寒乎陰陽水火一高則
一下一盛則一衰若以百為
寒赤為熱則兼赤白者乃寒
熱俱甚於腸胃之間而為病
乎况下迫窘痛小便赤澀而
痢白者必多有之為熱明矣
故凡痢疾赤白二痢及兼下
者並用此方可治之

簡誤 脾胃虛弱泄瀉不裏急
後重無積滯之屬可禁之

參歸芍藥湯

六分 治痢久一

二十日痢去多不止者

白芍一錢半 人參 當歸 枳
苓 山藥 陳皮各一錢 砂仁

七分 甘艸五分

右八味剉一劑烏梅一個燈草

一團蓮肉七個水煎溫服

此方治久痢不止要方也赤

白久痢脈沉緩沉遲者用此

調理氣血自愈白芍治瀉痢

人參補元氣生津液當歸和

血茯苓去濕山藥助脾胃陳

皮砂仁溫補脾胃甘艸益脾

胃調和諸藥

評曰初痢積滯不行時驟用補

劑則後自無藥功可慎可慎

是古人壁裡添柱之說也能

可思察矣近世痢疾積滯不

行用補劑，裏急後重，益甚，至死矣。愚目擊多矣，故書于此。察積滯行不行，而可施藥劑。治知先後，醫家第一義也。簡誤：初痢積滯不行，風痢發熱者，全可禁之。

三和散

治五臟不調，三

焦不和，心腹痞悶，脇肋脹風，氣壅滯，肢節煩痛，頭面虛浮，手足微腫，腸胃燥澀，年高氣弱，背脇痛妨飲食，及脚氣攻胸，腹滿悶，大便不通。

大川芎錢三 羌活錢三 紫蘓錢三 木瓜錢三 大腹皮錢一 沉香錢一 陳皮錢一

檳榔子 木香 白木 芥

各九分

右十味加姜水煎

此方治疝氣，又因滯氣而秘結者，要方也。醫學入門，秘方曰：血秘氣秘風秘三者皆可和也。先哲曰：川芎辛溫以之為君，可以行血滯，血行則濕熱不鬱，沉香木香陳皮可以散氣滯，氣散則濕熱不留，大腹枳榔所以破濕滯，燥能消濕，故用白朮風能勝濕，故用羌蘓木瓜之酸濕收脾之陰，氣平炒之其溫助脾之不足。

評曰先哲曰血氣風之三秘可
和故有三和之名予以氣
秘風秘尤可也至血秘不審
川芎爲君故云爾乎雖然餘
藥不血藥十品之藥功勝於
一味之川芎矣以是思之於
血無全功只治滯氣之說左
有肯乎哉用藥方者能可爲
商量者也

簡誤 氣血虛耗自汗盜汗泄
瀉屬諸虛証者可禁之

滋陰降火湯

十七 陰虛火動

發熱咳嗽痰喘口乾盜汗等症
主之

當飯 白芍 酒炒 錢二分 生地

八分 熟地 姜汁 炒 天門冬 麥門

冬 白木 各一錢 陳皮 七分 黃柏

蜜水 知母 各五分 苁蓉 灸三分

右十味 生姜三片 大棗一枚

水煎 臨服入竹瀝 童便 姜汁 少

許 同服

此方治陰虛火動 勞瘵 午後

咳嗽 要方也 飯芍 生熟 二地

黃可 滋陰 益血 黃柏 知母 可

滋陰 降火 火動 則金 裏 天門

麥門 可以 救金 火盛 則氣 耗

白木 苁蓉 可以 養氣 陳皮 所

以 消痰 利氣 也 童便 何也 丹

溪曰凡陰虛火動熟蒸如燎服藥無益者非童便不能故加竹瀝何也丹溪曰經云陰虛則發熱竹瀝味甘性緩能除陰虛之有太熱者寒而能補與薯蕷寒補義同故加又云竹瀝滑痰非助以姜汁不能行故加

評曰生生子曰自丹溪倡陽有餘陰不足及相火易動之論而明醫雜者和之統旨太旨又和之故今之人總見虛弱發熱一委之陰虛火動開場便用滋陰降火不分陽虛陰

虛脾胃勇快一驟用黃柏知母生熟地黃天麥門冬牛膝天花粉五味子童便之類胃強而陰血不足者間或無虞胃弱氣虛而無實熱者服此純陰苦寒之劑其火愈熾甚至惡心胃滿咳嗽痰沫泄瀉聲啞而斃哀哉叩其師則曰書以陰虛火動著其症吾以滋陰降火應其病病之不起天也雖屢試屢死而師家病家終莫能醒其藥之悞而一歸之天吁天何寬也丹溪陽有餘陰不足之論蓋為當時

局方溫補之藥害人故著此
以救一時之弊至於按病投
劑陰虛則補陰陽虛則補陽
曷嘗固執又曷嘗隄防流害
一至於此據經去火鬱則斃
之又曰輕者可降重則從其
性而外之蓋火之性上炎以
輕揚之劑鼓之則易散也若
不察而一以降火為言將逆
其性而使之愈熾矣故曰其
溫去太熱是也按東垣書只
有外陽散火湯火鬱湯二方
並無滋陰降火之法豈賢如
東垣者尚昧此滋陰降火之

法欬綠脾胃喜溫而惡寒形
寒飲冷則傷肺體既虛弱膈
膜不密易致風邪由此咳嗽
潮熱故以輕揚之劑投之其
熱頓釋熱退即以補劑收其
功時師暗于此理動藉開口
則曰丹溪諸公云云人身之
虛皆陰虛也故任前藥而不
疑不思滋陰降火之藥皆欵
肺助濕滯痰損脾者風邪火
熱皆莫能散愈投愈咳愈進
愈熱也予閱於生生子之書
似會滋陰降火妄用之弊詳
可見生生子不書者也故省

略矣

簡誤 外邪發熱熱痰上盛脾
胃虛弱泄瀉食積煩悶虫熱
虫積等悉可禁之 愚家君曰
世所謂發熱潮熱非外感而
謂陰虛火動用滋陰降火之
屬無效者悉虫熱也虫熱誤
用地黃天麥二冬之潤藥益
熱甚宜乎哉本邦有一種之
虫証有此証有此治無世知
者能可為修練也始愚疑之
家君曰勿疑醫者無他惟救
入而已見發熱潮熱者曰是
虫熱也其外他醫皆盡而

危殆者見之曰虫証也皆用
一種之虫治得效數也目前
見之多矣於是解疑以為誠
乎哉救入而已此法何而傳
來叩其出處家君曰交武
夫其姓服部氏 本多甲斐
守尊公奉仕矣武而好醫遇
于外國之一醫而傳此妙術
始予亦疑之危病數人立愈
驚而叩其術傳其家法一時
之天緣乎服部氏深喜其傳
而無漏事傳之故今得此術
者也汝又修練之

小建中湯

主傷寒中

急痛

膠飴

外 一兩

桂枝

三兩 去皮

芍藥

六兩

十二枚 去核

生姜

三兩 切

右六味水七升煮三升去滓納

膠飴微火消解溫服一升日三

服嘔家不用建中以甜故也

此方治其人素脾胃虛弱而

中於寒腹中急痛者要方也

以此湯治之邪之所湊其氣

必虛故也李氏曰膠飴甘溫

其性甘平脾欲緩急食甘以

緩之故以飴為君其性為臣

桂枝辛熱辛散也榮衛不足

潤而散之芍藥酸寒酸收也

泄也津液不逮收而行之是

以桂枝芍藥為佐生姜辛溫

大專甘溫胃者衛之源脾者

榮之本衛為陽益之必以辛

榮為陰補之必以甘辛其相

合脾胃健而榮衛通是以姜

專為使

訂曰李氏曰邪氣入裏與正氣

搏則腹痛太陽腹不痛少陽

有胸脇痛而無腹痛陽明腹

滿痛此為裏實宜下之三陰

下痢而腹痛者裏寒也宜溫

之陽氣傳太陰而痛其症有

三腹滿便閉按之痛者實也

宜下之腸鳴泄利而痛者
也宜與建中湯成氏曰脾應
中央二有不調則榮衛失所
有津液失所行必以此湯溫
建中藏故建中為焉

簡誤 實腹痛熱腹痛重腹痛
腹痛而兼嘔者可禁之

黃芪建中湯

二 傷寒汗後

身痛脈遲弱者主之雜病亦良
小建中湯加黃芪一兩半餘
依上法

評曰吳崑曰汗後身痛者此由
汗多耗損陰氣不能榮養筋
骨故令身痛陽虛故令脈遲

汗後故令脈弱云云此方以
建中名者建立中氣使其生
育榮衛通行津液則表不虛
而身痛自愈矣

簡誤

大槩同前無汗者

大紫藕飲

一 各連生散
三 各東胎散

治胎氣不和湊上心腹脹滿疼
痛謂之子懸

當飯 川芎 白芍 人參
陳皮 紫蘇葉 大腹皮 各
分半 炒減

右八味俾下眼加生姜三片葱
五莖水煎服

此方治胎前諸病要方也

子懸胎前諸病增損用之則
悉愈也臨時可為商量也當
飯川芎白芍藥補血安胎本
參補元氣陳皮和脾胃紫蘇
下氣流行太腹皮去脾濕甘
艸和諸藥

評曰方書子懸專用太紫蘇飲
此湯不子懸妊娠腹脹滿或
通身浮腫小便不利最有效
也業醫者不拘于方書詳藥
性而可用也如斯則醫柄在
我矣能可為工夫者也
簡誤 氣血虛損食積惡寒發
熱屬諸氣者可禁之

芎歸湯

七十一 又名佛手散 新

產婦人用之調血則諸症悉愈

當飯 一兩 川芎 七錢

右二味水煎服又加酒煎服

此方治產前漏血產後諸症
金瘡脫血諸血症要方也先
哲曰當飯川芎俱辛溫所謂
春夏發生之氣以助其資始
資生之化源者也產後氣弱
則加人參挾惡血則加紅花
新產婦無氣不弱者無不挾
惡血者故予常用當飯川芎
人參紅花名芎飯調榮湯屢
用屢驗故入可勝美矣

評曰：厚花溪曰：芫散湯治婦人因事跌仆，子死腹中，惡露妄行，疼痛不已，口噤欲絕，用此藥探之，若子死腹中，立便下。若腹痛隨止，子母俱安，又治臨產難生，胞衣不下，及產後血暈不省人事，狀如中風，血崩惡露不止，腹中血刺疔痛，血滯浮腫，入心經，語言顛倒，如見鬼神，血風相搏，身熱頭痛，或似癰非癰，一切胎前產後危急，狼狽垂死等証，皆治之。愚按：金瘡血脫，此湯加入參用之，有切也。四物湯芫散

湯共治血症，其治有不同也。可知能考矣。金瘡不用四物湯者，誠有故也。先哲之格言，可考者也。

簡誤 氣虛氣滯一切痰証，脾胃虛弱，泄瀉，貯証，共可禁之。

四逆湯 七十 即病太陰傷寒

自利不渴及寒中，三陰脈沉細而遲，身體痛，四肢厥逆者，主之。
芫艸 二兩 乾姜 三兩 強人 可四兩 附子 大者一枚 生用 去皮破八片
右三味以水三升，煮取一升，分服。

此方治陰証，傷寒又雖夏月

中犯大寒，四肢逆冷，脈絕，
息微者，要方也。陰症傷寒治
法，雖有太陰、少陰、厥陰之別，
其初急用此方，溫補之內經，
曰寒淫于內，治以甘熱，故用
甘艸、味辛平、姜、附、大、棗、之劑，
申發陽氣，祛散寒邪，能溫經，
煖肌，而回四逆，因以名湯焉。
然必涼服者，經曰治寒以熱，
涼而行之是也。否則戴陽之
者，反增上燥，耳目口鼻皆血
出者，有之藥難用也。有如此
先哲曰：熱藥涼而行之，寒藥
熱而行之，諸方皆倣之。先醫

常如此

評曰：嘉言甫曰：嘔而脈弱，小便
復利，身有微熱，見厥者，難治。
四逆湯主之。嘔則穀氣不資
於脈，故脈弱弱則陽氣虛不
能充於內外，下焦虛則小便
冷自利，上焦虛則濁氣升上
逼迫其陽於外，雖假熱內實
真寒證成，厥逆所出之陽，頃
刻決離而不返矣。治之誠難
也。惟四逆一湯勝陰回陽，差
有可用耳。

簡誤：諸陽症諸熱症，口渴煩
悶，四肢熱者，悉可禁之。

九味清脾湯

治瘧疾

但熱不寒或熱多寒少口苦嘔乾木小便赤澀脈弦數者

柴胡 黃芩 茯苓 白朮 厚朴 青皮 半夏 草菓 苧艸

右九味入姜煎服

此方治熱瘧要方也柴胡黃芩清去脾中之熱茯苓半夏清去脾中之濕白朮苧艸清去脾藏之虛草菓仁又所以清膏梁之痰也青皮厚朴清去脾部之痰
評曰李氏曰瘧症之因多是大

陰受傷濕生痰痰生熱熱生風故脈見弦數也吳氏曰清脾非清涼之謂乃攻其邪而脾部為之一清也劉宗厚先生因草菓仁之溫熱而譏焉蓋未達嚴用和氏清矣

簡誤 虛熱虛陽上泛咽乾脾

胃虛弱屬諸虛者悉可禁之

七味清脾湯

治瘧疾時

但寒不熱或寒多熱少手足冷脈沉細者

厚朴 青皮 半夏 烏梅 肉桂 良姜 各二錢 草菓 各一錢 苧艸 各五分

右七味入姜煎服

此方治寒瘧要方也又按寒
冷鬱於脾胃而成病者良難
病可用之良姜草菓厚朴辛
温可以清脾部之冷滯青皮
陳皮辛温可以清脾部之痰
滯烏梅酸所以收陰其艸其
所以助胃也

評曰瘧疾雖有數十方無如於
九味清脾七味清脾二方能
察熱瘧寒瘧而二方轉變用
之則無不愈矣始予迷于瘧
治而後轉變得於此二方爰
得瘧疾無不愈矣惟恨乎病

家不在治不遂於藥功是不
遺憾而已且此湯治虫症甚
妙矣一友醫治小兒龜背用
此湯而愈龜背本邦俗間曰
背虫誠乎哉虫俗語有取矣
是虫症明也今而後知虫症
之變多矣

簡誤 陽症熱症陰虛實熱煩
渴胃熱等共可禁之

烏藥順氣散

中風遍身

府痺語言蹇澁口眼喎斜喉中
氣急有痰者此方主之

- 麻黃
- 烏藥
- 陳皮
- 錢
- 川芎
- 白殭蠶
- 白芷

桔梗各一錢 乾姜炒 甘草炙

右半味入姜棗煎服

此方治中風順表氣婦人血風老人冷氣要方也吳崐曰遍身麻痺表氣不順也故治以麻黃川芎語言蹇澀裏氣不順也故治以烏藥陳枳口眼喎斜面部之氣不順也故治以白芷強蚕喉中氣急其艸可緩肺氣上逆桔梗可下痰之為物寒則結滯熱則流行佐以乾姜行其滯也此治標之劑也然必邪實初病之人方可用之

評曰劉宗厚按嚴氏調氣之說

或出於此也太陰陽明氣藥也愚按風寒兼之症最可用也四肢冷痛此湯加桂附有

效矣能可為商量者也

簡誤 吳氏曰若氣虛病久者則勿之與也自汗盜汗甚者

胃風湯

七十

風邪入腸胃泄

下鮮血或腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血者此方主之

人參 白朮 茯苓 川芎

當歸 白芍藥 桂各等分

右七味粗散每服二錢入酒煎

百粒同煎食前服

此方治風冷乘虛客於腸胃
水穀不化泄瀉腸鳴腹痛要
方也吳氏曰風陽邪也血得
之則善行故下鮮血濕陰邪
也血得之則敗壞故如豆汁
氣血虛而後邪湊之故用人
參白朮茯苓以補氣用川芎
當歸芍藥以養血肉桂之辛
可以散風邪肉桂之熱可以
燥濕毒血藥得之可以調榮
氣藥得之可以益衛又曰白
朮茯苓能壯脾而療濕川芎
肉桂能入血而驅風

評曰劉宗厚曰按此方名為治
風而實非治風乃補血和血
益胃氣之藥下血痢而挾虛
者實可倚仗愚按風邪入腸
胃然則以風藥不散風邪而
何散此湯無及于一味之風
藥也只腸胃濕毒下瘀血冷
氣乘虛客於腸胃等之症最
可有效矣風邪入腸胃症不
審醫曹明君子其正之
簡誤 熱瀉食積瀉痢風熱痢
屬諸熱實者可禁之
清胃散 十八 治胃中濕熱牙
疼

外麻三錢黃連一錢半
生地各一錢牡丹皮各一錢

右五味水煎涼服或為末擦牙亦佳

此方治牙齒痛要方也汪石山云經云苦可勝濕濕可勝熱故用升麻黃連牡丹皮諸苦寒以清濕熱當飯生地涼血補血李氏曰外麻為陽明之引經且症在上者尤為相宜也用以為君黃連之苦本歸丙子得外麻則引而入胃矣况諸瘡痛痒皆屬心火故用以為臣歸地益陰殺其元

烈之威丹皮下行開其一面之路而倉廩之宜獲有寧字矣

評曰李氏曰治膏梁之變麴蘖之災唇齒作痛或潰爛生瘡甚而頭面頸項俱痛胃者水穀之海一切飲食之毒陽明先受之口齒者胃之應也內毒醞釀積熱薰蒸則病顯于外故口齒瘡潰而疼痛不止諸痛屬實也愚按清胃二字可玩味矣此方妙在外麻

簡誤 虛陽上盛生口瘡牙痛是假熱真寒宜溫補不宜此湯屬諸虛者可禁之

龍膽瀉肝湯

治肝膽

溢火實口苦

柴胡錢一黃芩分七五味子粒九

山梔知母天門

冬麥門冬黃連人參

龍膽草各五分

右十六味水煎服

此方治肝膽濕熱要方也李氏曰肝為將軍之官性急而暴不有以直折之則火之炎也必烈柴胡輕清上外能順木性而使之條達故為君山梔龍膽味苦性寒直入肝膽以平其亢甚黃連降心火實

則瀉其子也金盛可以平木故加五味門冬木旺將以賊壬故加入參甘艸腎肝同治故用知母古人立方之意其深奧如此

評曰準繩曰有病口苦名曰膽瘳乃肝主謀慮膽主決斷盛汁七合是清淨之府取決於膽或不決為之恚怒則氣上逆膽汁上溢故口苦或熱甚使然也龍膽瀉肝湯主之又孫士奎治吳氏婦隱疾陰挺孫氏曰子戶屬厥陰肝經肝屬木肝有濕熱故生陰挺猶

木_有濕熱而生_{聾然}法_以
龍胆瀉肝湯云云前疾果如
駁言消釋無痕此醫案全
四愚按先哲之論照然矣本
邦便毒初發小柴胡湯此湯
交用最得效也是又寫於解
經濕熱之謂乎

問誤 氣血虛損脾胃虛弱屬
諸虛者可禁之

桔梗湯

八分 一名桔梗湯 宋
仁宗名如聖湯

治風痰上壅咽喉腫痛吞吐有
礙

甘草_{二兩} 桔梗_{一兩}

右二味每服三錢水一盞煎

分食後溫服

此方治咽喉腫痛要方也成
無已日桔梗辛溫以散寒甘
艸味甘平以除熱甘桔相合
以調寒熱

評曰金匱治肺癰咳而胸滿振
寒脉數咽乾時出濁唾腥臭
久久吐膿如米粥者服之則
吐膿血也愚案王海藏此湯
加減轉變而用之詳審其書
而轉變之法可知之也

簡誤 真陰不足而命門之火
独上盛咽喉腫痛口舌生瘡
是假熱之症不實熱其外

切下焦之病悉可禁之

三生飲

分

治卒中昏不知

入口眼喎斜半身不遂并痰厥

氣厥

南星

一兩 生用

川烏去皮 生用附子法

生用

各木香

二錢 半兩

右四味每服五錢水二盞姜十

片煎八分服

此方治卒中要方也入門積

方曰三藥皆生用也王機曰

中風之病多因痰得乃行經

治寒痰之藥也愚按南星主

風痰為君川烏附子大熱為

臣木香調氣為使是君臣使

製方妙劑也世所謂君臣使

佐一字考內經不明也內

經法君臣使也別有辨故今

于此不贅矣

評曰薛新甫治卒中以三生飲

一兩加人參一兩煎服即甦

薛氏醫案評註述之詳也且

又王氏準繩卒中暴厥門載

乏準于薛氏法加人參誤矣

中急症非如斯藥不能治矣

宜乎哉

簡誤 不卒中暴厥妄不可用之

瀉自散

分

肺火為患喘滿

氣急者王

来自皮 地骨皮 各一兩 粵州 五錢

右三味水煎服

此方治肺火咳嗽要方也先哲謂肺中有火邪氣有餘故喘滿氣急来自皮氣寒味辛為之用者所謂實則以辛瀉之是也肺火有餘腎亦受邪地骨皮大寒味苦以清腎中之熱所謂實則瀉其子也其艸和二味苦寒也

評曰肺火咳嗽此湯甚有效矣臨時加棧轉變在我世好藥方棄少藥方不用者多矣

噫乎僅三味對病用之速

不可勝言也孫氏曰醫貴

病苟識病一二品便能成

劑立切經云約方如約囊又

曰方以類聚方憑病立苟不

識病即盡本草一千六百五

十六品併而服之未見其益也

簡誤 肺虛勞咳屬諸虛者可

禁之

益元散

一名太白散 治中暑身熱煩渴

小便不利者

滑石 水飛細 六兩 甘草 一兩

右二味每服三錢蜜少許溫水

調下實熱用新汲水下解利
用葱豉湯下通乳用猪肉麵湯調
下催生用香油漿下

此方治身熱口渴小便不利
要方也吳氏曰身熱口渴陽
明証也小便不利膀胱証也
暑為熱邪陽受之則入六府
故見証若此滑石性寒而淡
寒則能清六府淡則能利膀
胱入甘艸者恐石性太寒損
壞中氣用以和中耳經曰治
溫以清涼而行之故用冷水
調服是方也簡易而效捷暑
途用之誠為至便

附

△本方加乾姜五錢姜汁為丸
名溫六九治白痢及水瀉
△本方加紅麴五錢名清六九
治血痢

評曰沛然父曰此藥大養脾腎
之氣通九竅去留結益精氣
壯筋骨和氣通經脈消水穀
保真元明耳目安寃定寃
志輕身駐顏益壽耐勞役飢
渴乃神驗之仙藥也凡難產
或死胎不下皆由風熱燥滯
結滯緊斂不能舒緩過也此
藥力至則結滯頓開而產矣

產後熱脹腫滿殊有奇効也
愚閱於赤水醫案孫十奎以
此散治奇今書於此醫案備
于同志之龜鑑矣

赤水醫案卷八曰余侄元素內
人季夏難產夜過半亟叩予門
起而問之爲產者急矣曰然作
何狀曰產已及戶不能下用力
則胸膈間有物上衝痛不可忍
予思少頃曰此必雙胎胞已分
而一上一下也及戶者在下欲
產在上者以用力而上衝惟上
衝胸膈故痛也執亦險矣晒諸
書如產寶良方胎產須知與各

大方家俱未論及將何以處因
詳思其治法偶悟必安上而下
始用力產也即取益元散一兩
與之令以紫蘇湯送下囑必如
法飲藥入腹而胸膈痛止不逾
時產二女毋亦無恙予仲子泰
來問曰益元散非產科急劑何
能取効如是予曰紫蘇安胎下
氣滑石滑以利竅亦催生之
品蓋醫者意也予亦以意裁處
之耳此法方書無載故記之以
俟專女科者采而用焉

簡誤 吳氏曰但於老弱陰虛
之人不堪與也虛實之辨明

者詳之否則蹈虛虛之戒惡乎不慎愚按屬諸虛者妄不可用之或以補藥濃煎湯下之可也臨時能可為商量矣

搜風解毒湯

六分 又名仙遺糧湯

治楊梅瘡不犯輕粉病深者自餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服之亦効

土茯苓一兩 薏苡仁 全銀花

防風 木瓜 木蓮 白鮮

皮各五分 皂莢子四分

若八味氣虛加入參七分血虛加當歸七分水二大盞煎飲下

百三服惟忌飲茶及牛羊雞鵝

肉燒酒法麴房勞蓋秘方也

此方治楊梅瘡要方也愚按

土茯苓健脾胃強筋骨去風

濕治楊梅癰漏薏苡仁治風

濕筋攣骨痛金銀花治熱毒

瘡腫防風木瓜治風痛去濕

入肝益筋去血木通利便白

鮮皮治濕痺諸疥癬皂莢子

疎通五藏風熱

評曰李南豐曰凡患下疳瘡者

宜此預防之愚按見之則惟

不楊梅瘡下疳亦可用矣

因是下疳用之有效也本邦

楊梅瘡曰妙方而銜之者多
多無如此方應手得功矣故
表出此方備此者也

簡誤 不風濕熱脾濕者可禁
乏

獨參湯

平 一各奪命散
七 又若復脈湯

陰虛陽暴絕眩暈者主之

人參 二兩

右一味水一升煎半升溫服

此湯治諸虛氣弱危急要方
也煩躁脈微者加童便一七
虛而有火也有痰者加姜汁
竹瀝本草曰傷寒壞證時疫
不問陰陽老幼婦誤服藥

餌困重垂死脈逆伏不省人

事七日以後皆可服之百不

失一以井水浸冷服之少頃

鼻梁有汗出脈復立瘥

吳崐曰氣者萬物之所資始

也天非此氣不足以長養萬

物人非此氣不足以有生故

曰一息不運則機緘窮一毫

不續則霄壤判是以病而至

於危急良醫以氣為首務也

人參味甘性溫得天地中和

之氣以成形故用之以補冲

和之氣使其一息尚存則可

以次第而療諸疾矣

評曰先哲曰按陰虛陽暴絕者
或下血或吐血衄血或泄痢
或血崩產後或產後眩暈之
類也夫陽根於陰陰根於陽
故陰極則陽無所依附而暴
絕也於此時滋陰之藥豈能
速生血乎惟用人參沖和之
品益元救血則血自生蓋血
脫益氣之法也丹溪用參膏
亦此之意也或問曰虛甚者
加附子益參芪之功此先哲
之妙法也於前証加之否答
曰有訣陰虛陽暴絕者其根
本盡也宜以沖和之味因元

惡假勇烈之氣過於真乎若
根本未盡者衛氣散解則須
加附子追友廢陽焉愚按下
血過多或吐血崩漏泄痢其
脈大而無倫次或微細絕無
皆可用本方病証脈候最可
為互見者也

簡誤 吳氏曰虛實之辨不可
不察獨參但可以療虛耳若
實証危急猶然攻之故越人
有實實之戒愚按不陰虛陽
絕妄不可用之

參附湯 治道陽不足上

氣喘急氣短陽氣虛乏四肢厥

冷者

人參 附子熟

右二味水煎冷服痰喘氣急加薑

此方回其孤陽要方也先哲曰人參甘溫補五藏之元氣附子辛熱退陰起陽已使之冷服謂熱因寒用也

評曰先哲曰陽氣虛弱四肢厥逆者及傷寒傳變三陰與中寒夾陰雖身大熱而脈沉者或厥冷腹痛脈沉細甚則唇青囊縮者又陰盛格陽之證面紅目赤煩渴引飲脈來七

八至但按之則不鼓等之證用之得奇效古人用八物湯補中益氣等湯加附子者借斬關奪將之氣而令藥行十二經非賴附子之能故不參用海藏曰非身表涼而四肢厥者不可僭用善用則有起死回生之功不善用則損人天命學者宜潛心矣予以此湯起死今告同志備參考矣寬文戊申年仲冬上旬一醫婦發熱往來小便不利其夫遠在九州其子知醫而治之初以藿香正氣散加減投之

腫脹益甚矣後用五苓散何
計通利之藥多用而元陽脫
虛果臘月下旬小便利多而
元氣疲招予問治時有痰喘
予以爲通利之劑過多元陽
虛痰上溢也補中益氣湯加
茯苓半復可用之明日薄暮
俄發熱痰喘甚動肩氣急面
赤呼急吸少至危殆矣診脈
兩手散亂而無倫次舉家謂
章而迎數醫皆束手無技予
醫用加味六君子湯與之忽
吐益痰喘甚而近死矣其好
者大熱湯也故生姜汁少湯

混與之服之胸膈少快於是
予以爲是假熱真寒之證也
發熱面赤是虛陽飛越明矣
欲用參附湯如此急症何尋
常之藥劑當之不惑見於坐
死矣先誠以大參二錢附子
一錢速煎與之服此湯痰喘
少緩予曰此難病也又以大
參四錢附子二錢速煎其子
恐峻劑予曰勿恐前年參附
湯人參十錢附子五錢用之
得效何恐又用此湯痰喘緩
氣急少汗出又以大參四
錢附子二錢速煎與之時

月二十六日曉天惡服此湯
痰喘又緩氣急又止愚
冬之時又內寒不知此溫熱
之劑何過今夜是又偶中之
奇者也及于天明又以人參
四錢附子二錢調之水煎徐
徐可與之予欲睡不思夜來
因于心氣動一睡時移覺而
問之天明後少睡今或粥少
食予甚喜而診脈兩手緩大
按無力是大溫補之應脈也
夜來今朝料人參十四錢附
子七錢最不少已往補中益
氣湯八味丸料可交用也則

準于先哲之法朝補中益氣
湯夕八味丸料交用正月下
旬全愈予嘉歎於先人之假
熱真寒之語不知此語何臨
此時用參附之溫熱誠先人
之賜也救命可喜也得我又
可喜也業醫者可知先人之
法言者也

簡誤 先哲曰按夫附子者其
性健悍走而不守有大毒若
陰虛精竭有內熱自汗盜汗
等之病人雖似附子證必不
可用之火為元氣之賊附子
為補陽之最故走散真陰是

促死也。愚按：不肉寒，真寒者，妄不可用之。

六味丸

九

丁名地黄丸
丁名腎氣丸

治腎經虛損久新憔悴盜汗奔熱五藏齊損瘦弱虛煩骨蒸痿弱失血等證薛新甫曰治腎虛作渴小便淋秘氣壅痰涎頭目眩暈眼花耳聾咽乾燥舌痛齒痛腰腿痠軟等證及腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失音水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑又治腎陰虛弱津液不降眩濁為痰或致欬逆亦小便不禁收精氣之虛脫為養氣滋腎劑也

導水使機關利而脾土健實

熟地黄八兩 山茱萸 乾山

藥各四兩 牡丹皮 白茯苓

澤瀉各三兩

右六味各另為末和地黃加煉蜜丸桐子大每服七八十九空心食前滾湯下臨時煎服

此方王安道曰惟陰虛者用之也

啓玄曰壯水之主以制陽光即此藥也

吳氏曰腎虛不能制火者此方主之腎非獨水也命門之火並焉腎不虛則

火虛則火熱所制方與寒者
矣名之曰陰虛火動
所謂腎虛則熱是也今人足
心熱陰股熱腰脊痛率是此
證老人得之為順少年得之
為逆乃咳血之漸也熟地黃
山茱萸味厚者也經曰味厚
為陰中陰故能滋少陰補腎
水澤瀉味甘鹹寒其從濕化
鹹從水化寒從陰化故能入
水藏而瀉水中之火丹皮氣
寒味苦辛寒能勝熱苦能入
血辛能生水故能益少陰平
虛熱山藥茯苓味甘者也年

從土化土能防水故用之以
制水藏之邪且益脾胃而培
萬物之母也

評曰先哲曰人之所資以為元
氣者二曰腎精曰胃氣腎精
者先天之元氣也胃氣者後
天之元氣也故腎與胃是生
命之根也古人虛損病人朝
用補中益氣湯夕用六味丸
其肯深哉腎虛之為諸病不
可勝記方下証候舉其梗概
已臨病問切之際宜詳審診
察焉

簡誤 食積與積不虛

症諸氣贖遺
外感者可禁之

八味丸

十九 腎間水火俱

虛者此方主之薛新甫曰治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹痛夜多漩溺

即六味丸加肉桂附子各一兩

此方王安道曰益兼陰火不足者設

論見瀟湘集

啓玄曰益火之源以消陰翳

即此藥也

吳氏曰渴而未消者此方主

之渴而未消謂其人多渴喜

得茶飲不善消渴之求飲無厭也此為心腎不交水不足

以消火故令亡液口乾乃是

陰無陽而不升陽無陰而不

降水下火上不相既濟耳故

用肉桂附子之辛熱壯其少

火用六味地黃丸益其真陰

真陰益則陽可降少火壯則

陰自升故竈底加薪枯籠蒸

溽槁木得雨生意維新惟明

者知之昧者鮮不以爲迂也

昔漢武帝病渴張仲景爲處

此方至聖玄關今猶可想

評曰先哲曰夫治腎虛

味

方專主溫熱消燥於
溪矣揮之後專主苦寒傷
於胃氣恒德之所謂不偏於
彼則偏於此者也若過服苦
寒撲命門之相火損坤元之
生氣者非此方不能救也薛
氏曰婦人脬轉或內熱傳搏
於脬或怒小便氣逆於內以
致小腹急痛不得小便甚者
至死不問男女孕婦轉筋小
便不利命在反掌非八味丸
不能救予一醫見治孕婦小
便不通至危殆衆醫技盡束手
考出於前言投於八味丸

料救之果而有效也誠世醫
孕婦恐桂附不用之何恐臨
時桂附太溫熱還而有效矣
後閱於亂產全書曰張遠文
曰余室人懷孕五月而轉胞
醫投他劑反增脹劇証諸方
書皆用八味丸主之時醫泥
於桂附卒不敢用七日而斃
後一隣婦症同余方以八味
丸服之小便遂行大便亦下
再以前丸加車前子一劑肚
腹頓利而安大悔前爲懼
後識此方之妙故爲志之

簡誤

嘉言甫曰後人謂八味

丸為治消渴之聖藥
矣然今世以為壯水
腎平補之套藥曾不問其人
小便之利與不利口之渴與
不渴一槩施之總於金匱之
義有未悉耳張景岳曰六味
丸八味丸俱用茯苓澤瀉滲
利太過即仲景金匱亦為利
水而設雖曰於大補之中加
此何害然未免減去補力而
奏功為難矣使或陰氣雖弱
未至大傷或藏氣微滯而兼
痰濕水邪者則正宜用此若
精氣大損年力俱衰真陰內

之虛痰假火等證即從
猶嫌不足若加參利如實瀉
厄矣故當察微甚緩急而用
隨其人斯為盡善因製左歸
丸右歸丸二方論及左見本
正錄

附

加減八味丸

仲景云常服去附子加五味
子

姚公云加五味子三兩茯苓
四兩

張文仲云五味子茯苓各
兩

肘後方云地黃四兩附子澤
瀉各一兩余各二兩
薛新甫用治腎水不足虛火
上炎發熱作渴口舌生瘡或
牙齦潰蝕咽喉作痛或形體
憔悴寢汗發熱五臟齊損即
六味丸加肉桂一兩五味子
四兩王宇泰六味丸加肉桂
一兩五味子二兩

寬文十三年九月吉日

文臺屋

要方選評下終

治郎兵衛藏板



