

瓊玉膏 虛勞喘嗽氣促發熱

金櫃腎氣丸 治腎虛不能攝水津液不降致成

痰飲欬逆潮熱盜汗方見虛損門

補肺湯 治勞嗽

桑白皮 熟地黄各二人參 紫苑 黃耆

五味子各二 右每服四錢水煎入蜜少許服

治老人虛嗽久不愈者

人參一兩 胡桃肉 杏仁各五錢 五味子五錢 冬五枝

右作一服水煎食後連三服即愈

黃耆劫勞散

治心腎俱勞欬時復三兩聲無

痰夜則發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠身

劣黃瘦飲食減少唾中有血系名曰肺癆

白芍藥四兩 黃耆 粉草 人參 半夏 熟地

茯苓 杜五味子 歸身 阿膠各兩 右每

服八錢姜三片枣二枚水煎服一日三兩服

紫苑湯 飲食煎燇邪熱傷肺或叫呼走氣咳嗽

咽痒痰多吐血喘急胃滿脇痛

紫苑 欵花 百合 杏仁 貝母 蒲黃

經霜桑葉 半夏 犀角屑 炙甘草 人參

各七 阿膠 半一錢 分二帖 姜三片 水煎服

天門冬丸 咯血吐血大能潤肺止咳

天門冬 西 杏仁 茯苓 阿膠 錢各五 右為末煉

蜜丸如彈子大 日夜噙化三五丸 一方有

潤脾膏 治勞証久嗽肺燥肺痿時常服

羊肺 具一 杏仁 柿霜 真酥 真粉 各一 白蜜

二 右先將羊肺洗淨次將杏仁膏柿霜等白蜜
水解薄打攪五味稀稠得所灌入肺中白水

煮熟如常服之

團參飲子 七情抑鬱飢飽失節咳嗽膿血漸成

肺痿勞瘵 人參 紫苑茸 阿膠 百合

細辛 欵花 杏仁 天冬 半夏 經霜桑

葉 五味子 各一 炙甘草 錢五 每服六錢 姜五

片水煎服

地黄煎 治肺損吐血嗽血

生地黄 兩四 鹿角膠 兩一 右為末 每服三錢 童便

一盞 煖熱入姜汁少許調下 無鹿角膠阿

膠亦可

古方紫苑散

紫苑

款冬花

錢各五百部二錢

右為末烏梅湯點服姜湯亦可○如嗽加五

味子○喘加杏仁○渴加烏梅○氣逆加橘

紅○頭疼加細辛三錢甘草二錢 氣脫者

加御米壳蜜炒粗末水煎服

○臟腑欬劑

小柴胡湯

治肝臟發咳兩脇下痛甚則不可以

轉轉則兩脇下滿熱見前條

黃芩加半夏生姜湯

治膽府發欬嘔苦水若膽

黃芩

生姜錢各三

炙甘草

芍藥錢各二

大棗枚二

半夏餅

右咬咀水煎服

甘桔湯

治心臟發欬而喉中如梗狀甚則咽

腫喉痺方在上前

芍藥甘草湯

小腸府發咳而失氣

芍藥

炙甘草

各四錢水煎服

升麻飲

脾臟發咳而右脇下痛痛引肩背甚

則不可以動

升麻

白芍

甘草各二錢

葛根 三錢 水煎服

烏梅丸 治胃府發咳而嘔嘔甚則長虫出方在

麻黃湯 肺臟發咳而喘息有聲甚則唾血門在

麻黃 三錢 桂枝 二錢 甘草 一錢 杏仁 十枚 水煎服

赤石脂禹餘糧湯 大腸府發咳而遺瀉

赤石脂 禹餘糧 各二兩 水煎服

麻黃附子細辛湯 腎臟發咳則腰背相引而

痛甚則欬涎 麻黃 細辛 各一錢 附子 一錢

水煎服

茯苓甘草湯 膀胱府發欬而遺瀉

茯苓 錢 桂枝 半錢 生姜 五片 炙甘草 一錢

水煎服

異功散 久咳不已三焦受之其狀欬而腹滿不

欲飲食此皆聚于胃干於肺使入多涕唾而面

浮腫氣逆 人參 茯苓 白朮 甘草

陳皮 各一錢 入姜枣水煎服已上諸方皆傷寒例

藥也特存之以備其旨以三因論之則自有

一臟一腑之病機亦不止於寒已也

○食積痰嗽

凡食積痰嗽非青黛瓜蒌仁不除人面青白黃色不常面上如蟹爪路一黃一白者是也

瓜蒌丸 食痰壅滯喘咳

瓜蒌仁 半夏 山查 神曲 各等分為末

以瓜蒌穰拌為丸竹瀝姜湯送下

又方治食積痰嗽

杏仁 蘿蔔子 各二兩為末粥丸服

食積痰作嗽發熱者 半夏 南星 瓜蒌仁

蘿蔔子

佐為

青黛

石碱 使為

隨証加減丸服

保和丸

治食積痰嗽飽悶

○食飽咳嗽

千金方温脾湯

治食飽便咳

甘草

兩四

大棗 枚二十

水五升煮取二升分三

服若咽中痛而聲鳴者加乾姜一兩

○醋搶喉嗽

甘膽丸

治吃醋搶喉因成咳嗽不止諸藥無効

用甘草二兩去皮作二寸段中半劈開以猪膽

汁五枚浸三日取出火上炙乾為末煉蜜為丸
每服四十九丸茶清吞下卧服神效曾有患此諸
藥無功服此良愈

○酒熱傷肺咳嗽

丹溪云飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入韭汁 吞瓜

萎仁杏仁黃連丸

又方 治酒嗽

青黛 瓜萎仁 姜汁蜜丸含化散熱毒也

丹溪白龍丸 治酒積有痰

半夏 滑石 茯苓 枯礬

右為末神麩糊為丸

酒病嗽 白礬另研杏仁升水一升煎乾攤

新瓦上露一宿砂鍋內炒乾每夜飯后細嚼


杏仁十五枚炒

○痰嗽

局方桔梗湯 除痰下氣胃脇脹滿痰逆惡心飲

食不進 陳皮白去半夏姜製桔梗炒各枳實白去

三兩炒右末每服四錢水一鍾生姜五片煎服



右用陳皮枳實氣充形實者宜之寒者加姜桂此小夫南星半夏乃燥濕之劑若嗽而痰澁者忌服 形肥有汗或脉緩身重嗜卧之人有咳者脾濕勝也 形瘦或夏月無汗或脉澁之人咳者肺燥勝也濕者宜蒼白木星半之屬燥是也燥者宜杏仁瓜蒌仁之屬潤是也

寒熱痰咳而嘔吐面腫 蚌粉新瓦上燒紅放地上出火毒每半兩加青黛五分入麻油數點以

淡蘆汁調服妙妙

本事方 化痰涎治咳嗽

枯礬二兩 白姜蚕炒去系五錢

為末研薄苛令爛

為丸菴荳大每服三十九薄荷湯下日三服

青礪石丸 消痰消痞經絡中有痰作痛皆治之

青礪石煨 黃芩各五錢 半夏二兩 風化硝二錢 陳皮

茯苓各七錢 白木一兩 姜汁打神麴糊為丸

又方礪石丸 治痰嗽 礪石 南星 茯苓各五

錢半 夏七錢 風化硝二錢 神麴糊為丸

風化硝丸

治痰嗽

黃芩

酒洗 兩半

滑石

白

芥子

去殼 各五錢

貝母

南星

各一兩

風化硝

半二錢

餛餅丸

羅太無人參半夏丸

化痰墜涎

止嗽定喘

或風

痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏

正頭風頭目昏眩耳聾鼻塞咽乾胃膈不利喘

丹溪墜痰丸 治食積痰飲咳嗽痞滿氣逆

枳實

枳殼

明礬

牙皂角

黑丑

風化硝

三錢

三錢

枳實

枳殼

明礬

牙皂角

黑丑

風化硝

三錢

三錢

牙皂角

黑丑

頭末

右以

蘿蔔子

汁為

丸

每服

五十九

丸每服五十九鷄鳴時服初有糞次下痰

治久嗽痰積

半夏

以江子

打碎

同煮

半夏

透為度

去江子不用

杏仁

以烏梅

五錢

同煮

去烏梅

不用只將

半夏杏仁焙乾為末煉蜜

為丸菜菔大量虛實服

痰泡方 若或作白泡當于肺中瀉火

滑石

貝母

南星

半夏

風化硝

白芥

子

陳皮

茯苓

皂角

蒼朮

瓜蒌仁

加燥

枳實

加結

青黛

黃芩

加熱

枳實

加結

青黛

黃芩

加熱

枳實

結

青黛

黃芩

加熱

枳實

加結

青黛

黃芩

○肺脹

仲景曰咳而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮大者越婢加半夏湯主之
麻黃兩石膏半生薑兩大棗十五枚甘草二兩半夏半升先煮麻黃去沫內諸藥同煎至二升分三服
肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青龍加石膏麻黃芍藥桂枝細辛
甘草乾姜各兩五味子半夏各半石膏水一斗先煮麻黃去沫內諸藥者取三升壯

人服一升弱者減之日三服
仲景之治乃傷寒法也邪從皮毛而入皮毛者肺之合也故肺脹以散邪為重丹溪之治乃除虛火動火逼肺金及濁痰瘀血凝結於內故治以收斂消痰之劑

丹溪云肺脹而咳者用訶子青黛杏仁
訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂降火之功佐以海石香附瓜蒌仁青黛半夏麩姜蜜丸喻
香附須用章便浸三日

氣鬱痰嗽睡不安宜清化丸貝母杏仁為末砂糖入姜汁餗餅為丸噙化

肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物加桃仁訶子青皮竹瀝之類

一法灸之妙左不得眠者灸右足三陰交右不得眠者灸左足立安

張光顯年四十二患肺脹咳嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病降火疎肝以清其痰四

物湯加桃仁訶子青皮竹瀝八帖而安

乾咳嗽

蘇治燥條杏仁青黛貝母瓜蒌等潤劑皆可用

本事補肺法

生地黄

洗淨二斤

杏仁

二兩

生姜

蜜各四兩

右搗如泥

入瓦盆中置飯上蒸五七度每五更挑三匙

中年婦人乾咳寸脉滑動似葶狀餘皆散大不

浮左大于右每五更躁熱有汗但怒氣則甚與

桔梗不開諸藥無効遂以石膏香附為君芩連

青黛瓜蒌仁陳皮黃柏當歸桔梗為臣五味砂

仁川芎紫苑佐之凡二十餘帖而安

○咳嗽喉中作聲

咳嗽氣急喉聲如鼾者為虛

男子五十餘歲病傷寒咳嗽聲如鼾與獨參湯

一服而鼾聲稍止至二三帖嗽亦漸退凡服三

帖始得全愈

喉如水鷄聲者為實

仲景治欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

射干三兩麻黃兩生姜各四兩細辛兩紫苑兩款冬兩

花各三兩大棗枚七枚五味子半斤半夏各半斤水一斗二

升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥煮取三升

分溫三服取此虛實二條為治規

○暴嗽○失音

千金治暴熱嗽方杏仁紫蘇子一斤陳皮一兩

柴胡兩四水一斗煮三升分三服

又方治暴嗽

百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏嚥之

貝母散暴發欬嗽多日不愈

貝母 桑皮炒 五味子 炙甘草各五錢 知母二錢

半款花二兩 杏仁三兩 每服一兩姜三片水煎服

白蜆殼散 治暴嗽

白蜆殼洗淨研細粥飯下

三拗湯 治寒燥不常暴嗽喘急鼻塞痰壅方見前味表條下

一服散 治暴嗽 生姜片阿膠二片炒 烏梅二枚

甘草一錢 紫蘇十片 杏仁七枚 大半夏三枚 嬰粟

殼條三 水煎臨睡服

治久嗽失音

真蘇子二兩 杏仁三十枚 訶子三枚 百藥煎二兩

為末熱酒調一錢

治暴失音

用猪脂油一觔入鍋先煉出渣入白蜜一斤再煉少頃濾過淨磁器內冷定成膏不時挑一茶匙噲化大能潤肺出聲

治失音不語

訶子四生半 桔梗一兩五錢 甘草二寸一

分三服水一鍾童便一鍾煎服

治久寒痰結咽喉音不出

桂心 草烏各一錢 半夏五錢 右為細末姜汁浸

蒸餅為丸如芡實大每服一九至夜噙化

治謳歌失音 連翹 桔梗 甘草各二兩 薄荷四兩

訶子肉 砂仁 大黃各一兩 川芎兩 百藥煎兩

右為細末鷄子清丸如彈子大每服一九臨

卧噙化

治失音不語

百藥煎 杏仁 百合 訶子肉 苡仁 等分

為末以鷄子清和丸如彈子大每臨卧噙化

治失聲 皂角一挺 蘿蔔三斤 水一碗煎至半

碗服之不過三服能使語聲出

杏仁煎 治嗽失音不出

杏仁三兩 生姜汁 蜜糖各一兩 木通 桑皮 貝

母各一分 紫苑 五味子各一兩 一方加知母一

兩款冬花一兩水三升煎半升去渣入杏仁

蜜糖姜汁再熬成稀膏食後臨卧每服匙

含化 一方有石菖蒲

訶子飲 治久嗽語聲不出

訶子肉 杏仁錢各一通草半一錢分二服每服水

二鍾姜三片煎一鍾食遠溫服

一方 治暴嗽失聲語不出

杏仁 姜汁 砂糖 蜜 五味 紫苑各三

通草 貝母各四桑白皮兩五右九味咬咀以

水九升煮取三升去滓內杏仁脂姜汁蜜糖

和攪微火煎取四升初服三合日再夜後

稍加

又方 通聲膏

五味 款冬花 通草各三人參 細辛 青

竹皮 桂心 菖蒲各二杏仁 姜汁各一升

白蜜升二束升三膏升五右十三味咬咀以水五

升微火煎二上三下去查內姜汁束膏酥蜜

煎令調和酒服束大二九

○久嗽

羅太無柴胡飲 治虛勞羸瘦面黃無力減食盜

汗咳嗽不止 柴胡 知母 鱉甲酥炙各

赤火生味

卷

五味子錢五地骨皮半兩 右為末每服三錢烏梅

二枚青蒿五葉水煎服

本事驚甲丸 治勞嗽虛証及鼻流清涕耳作蟬

鳴眼見中黑花一切虛証丈夫婦人皆可服

五味子兩驚甲兩地骨皮兩 右為末煉蜜

丸如梧子大空心食前溫酒或鹽湯任意服

三五十九丸婦人醋湯下 此方延曲江人家

秘方服効者衆且處方有理

丹溪蛤蚧丸 肺臟內傷咳嗽氣急久不除漸羸

瘦スレ 蛤蚧去一兩 炙甘草

熟地 阿膠成珠粉炒 麥門冬各五錢 為末蜜丸

每一兩分十五丸每含化一九

貝母湯 諸嗽久不瘥

貝母姜製一兩去心 黃芩 桑皮錢五 乾生姜 五

味子 陳皮 半夏 柴胡 桂心各一兩 木香

甘草各半錢 右每服六錢加杏仁七枚授之一

服瘥以治諸般嗽通用悉効者緣方內有寒

有熱有收有散也

潔古枳殼湯 日久痰嗽胃膈不利上焦多熱

枳殼兩炒 桔梗兩 黃芩半 每早取二兩半水

三盞煎一盞半日三服三日服盡再服後半盞

生半夏湯 半夏三錢半水盞半姜五片煎至一

盞食後服一日三服服三日了再服枳殼丸

其痰為度論曰先消胃中痰氣后去膈上痰再

與枳朮丸謂首尾合治尽消其氣令痰不復也

丹溪久嗽丸子 海蛤粉 瞻星臣杏仁臣訶子

佐青黛佐皂角使右為末姜汁丸如梧子大

姜湯下

久嗽乃積痰久留肺脘粘滯如膠氣不升降或挾

濕與酒而作 香附浸便姜炒海蛤粉 瓜

蒺仁 蜂房 杏仁 姜汁 竹瀝 神麩

各等分蜜調噙化

夏月無汗成久咳嗽方在汗門

衍義治久咳膿血胃膈咽痛

蛤蚧 阿膠 生犀角 鹿角膠 羚羊角

各一兩除膠外皆為末入膠河水三升煮半

升臨睡細呷愈

療三十年嗽以百部根二十觔搗絞取汁煎之如
飴服二匙一日三服驗以溫粥飲調下
煎師方以白蜜二升更煎五十六沸服三合

百一方 治久咳嗽上氣十年諸藥治不瘥以蠶
蝠除翅足炙令存性為末飲服之

紫苑散 久嗽多年不愈

紫苑 兩 款花 兩 為末米飲調服一錢日三次
三物湯 大人小兒久嗽神效

桑皮蜜 百部根 馬兜鈴 等分水煎服

清金湯 遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎声留

滿氣逆坐卧不安 嬰粟殼蜜 人參 粉草各五

錢 陳皮 茯苓 杏仁 阿膠 五味 桑皮

苡仁 紫蘇 百合 貝母 半夏麴 款花

每服六錢姜三片東二枚烏梅半箇水煎服

○收斂之劑肺欬收急食酸以收之

羅太無九仙散 治一切咳嗽

桑皮 人參 桔梗 阿膠 五味子 烏梅

欵花各一兩 貝母五錢 嬰粟殼八兩 蜜炒

右為末 每服三錢 白湯調服 嗽止住 后服

欵花清肺散 治咳嗽喘促 胃膈不利 不得安卧

人參 炙甘草 枯礬 烏梅連核搗碎 欵花各一兩

粟殼醋炒 四兩 甜葶藶生用 一錢 右為末 每服二錢 溫

米飲湯調服 食後忌油膩 節言語

人參清肺湯 治男婦肺胃虛寒 咳嗽氣急 胃膈咽

塞 腹脇脹滿 迫塞短氣 喜飲冷咽 嗝隱痛 及

療肺痿 勞吐血 腥臭 乾嘔 煩熱 声音不出 肌肉

消瘦 倦怠 減食 烏梅 地骨皮 人參 炙

甘草 阿膠炒 杏仁去皮 桑皮 知母 粟

殼去鬚蒂 各一兩 右每服四錢 烏梅一枚 水煎服

人參欵花散 咳嗽久不愈者

人參 欵花各五錢 知母 貝母 半夏各三錢

粟殼炒 一兩 右每服六錢 烏梅同煎服

人參養肺湯 肺痿咳嗽 清痰 午後熱 并声颯者

人參 炙甘草 阿膠珠 各一錢 茯苓半錢 貝母

柴胡四錢 杏仁 五味 桔梗各半錢 桑皮二錢 枳實

半錢 右每服八錢 生姜三片 枣一枚 食後溫服
減柴胡 茯苓 五味 貝母 桔梗 枳實 加地骨皮
知母 烏梅 嬰粟殼 即上人參清肺湯已上
乃御米殼 烏梅 例收後藥也

舟溪謂黃昏嗽者火浮于肺以酸味斂而降之用
訶子 五味 五倍子 白礬等是也

○雜方

血竭散 治勞嗽見血諸治不效

蛤蚧蜜炙 訶子錢 血竭錢 三味共為末以姜

汁與蜜等分熬膏入前未調三五分服效

治咳嗽感胃方 及痰嗽熱嗽

雪梨一箇開一竅入明礬一錢用紙封固灰火
中煨令礬化梨熟為度食之立愈甚者不過枚
又方 治痰嗽

細芽茶三四兩濃煎濾去渣好蜜六兩水內槓
滾抹去沫入濃茶內同煮二三沸露一宿空心
溫服一碗二三全愈

阿膠散 一切咳嗽虛人老人皆可服

阿膠 馬兜鈴各一兩 五靈脂 桑皮錢各一 炙甘草錢 杏仁錢 右為末每服一錢水一鍾煎六分食後夜卧通口服

當歸散 治男婦因打撲負重辛苦勞力傷損肺臟既損遇風寒則為咳嗽或咯紫血宜此藥去心肺之瘀血仍灸肺俞穴 蘇木 生地黄 當歸 大黃 芍藥 等分為末每服四錢或水酒煎服亦可
活血飲 自裁得效方治怒氣積血在曾脇咳嗽

年久不愈每咳則隱紅而痛 滑石錢一 杏仁錢五 紅花錢五 桔梗錢五 粉草錢四 瓜蒌錢二 丹皮錢八 茜根錢八 貝母錢八 柴胡錢五 香附錢五 麴錢五 水煎服
躰厚者加大黃川山甲或作末以菲菜汁拌為丸服

本事 治三十六般哮喘

阿膠兩 炒一馬兜鈴 炙甘草 半夏姜汁浸 人參錢五 杏仁錢各一兩 右為末每服一大錢水一盞煎至七分臨卧食後服

隨病看湯使為引

心嗽面赤或汗流加乾葛煎 肝嗽眼泪出加
烏梅一枚木米十四粒煎 脾嗽不思飲食或惡
心一兩時入姜二片煎 胃嗽吐逆酸水入蛤粉
煎膽嗽冷入不睡加茯神五分茶清調下 膈
咳嗽出痰如員塊生姜汁調藥嚥下 勞嗽入
秦艽末煎 血嗽連頓不住當歸末末子同煎
暴嗽涕唾稠粘入烏梅生姜同煎 產嗽背
胛痛甘草三寸黃蠟少許同煎 氣嗽肚痛脹

滿入青皮去白同煎 熱嗽夜甚蜜一匙葱白
同煎 哮喘喉如拽鋸入半夏三枚同煎 腎
嗽入黃耆白飴糖同煎 上件十六般嗽依法
煎服無不効驗此方京都丁家專治此疾因中
官厚賂始得其方屢試有効
本事劫痰方 治癆嗽及哮喘痰湧

青黛 錢辰砂 雄黃 明瓦 信石 生用各
右俱為極細末淡草豉一百粒湯浸去殼研
如膏入藥丸如梧子大臨卧冷茶吞下丸

瓊珠散 治咳嗽不問遠近其効如神

桑白皮兩四 五味子兩二 甘草兩二 陳皮兩二 粟殼斤一
去帶膜用醋浸三宿 晒干再入醋浸晒干 右為末用冷蜜湯調服

忌煎燂油膩酒醎酸等物

潤肺湯 治上盛下虛脾肺濕熱遠年近日氣喘

咳嗽痰盛心胃氣悶不思飲食或寒熱往來或

感冒風寒喘嗽氣急五癆七傷吐血等症並皆

治之 知母錢二 紫苑錢五 山梔仁錢半 甘草錢一

麻黃半 杏仁錢五 荆芥錢五 馬兜鈴錢五
去白沫 晒干 梗去 筋去

前胡錢二 赤芍錢一 桑白皮錢二 半夏錢三
湯泡七次 晒干 皮去 用蜜炒 紅

赤茯苓錢二 杏仁錢五 黃芩錢二
去皮 尖研成泥用 錢半去皮

如婦人加當歸川芎生地黃牡丹皮各一錢

此藥製度每服一兩四錢半用水二大鍾生

姜五片初感風寒加葱白三根久患咳嗽加束

二枚不用葱白煎至一鍾半去滓臨睡候將身

右卧用絹帛頂住右軟肚次用竹筒緩吸藥

熱服不言語呼喚切忌房勞

○姪娘咳嗽

馬兜鈴散 治胎氣壅塞咳嗽喘息

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母 各五錢

橘紅 紫蘇 大腹皮 桑皮 各一兩 五味 五錢

每服六錢姜四片水煎服

麻黃散 姪娘外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃 節 橘紅 前胡 各一兩 半夏 人參 白朮

枳殼 貝母 甘草 各五錢 每服六錢姜四片

葱白五根束二枚水煎服

竹茹紫苑湯 咳嗽不止胎不安

紫苑 天冬 各一兩 桔梗 五錢 甘草 杏仁 桑皮

各二錢 每服五錢竹茹一塊水煎去渣入蜜半

匙再煎二沸溫服

天門冬湯 氣逆咳嗽

天冬 去心 貝母 人參 甘草 桑皮 桔梗

紫蘇 各五錢 赤茯苓 二兩 麻黃 去節 七錢

每服六錢姜四片水煎服

大宮 詹少溪 吳馭閱 校



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

才
之
毛
一
ノ
身

終

赤水玄珠第九卷目錄

喘門


氣短 氣促 少氣 產後喘

哮門

善悲 肺痿 肺癰



國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



也胃者六府之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得卧也下經曰胃不和則卧不安論又曰夫不得卧則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主卧與喘也

東垣曰肺脹膨而喘咳胃膈滿壅盛而上奔者於隨証用藥方中多加五味子人參次之麥門冬又次之黃連少許如甚則交兩手而督者

真氣大虛也若氣短加黃耆五味子人參氣盛去五味子人參加黃芩荆芥穗冬月去荆芥穗加草薹寇仁

丹溪曰哮喘未發以扶正為要已發以攻邪為主陰虛自少腹下火起衝於上而喘者宜降心火補陰有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火上氣喘而躁者為肺脹欲作風水症宜發汗則愈諸喘不止者用川椒目研極細一二錢生姜湯調下劫之氣虛不用又

法用蘿蔔子蒸為君，皂角燒灰等分為末，姜汁加煉蜜為丸。小菖大每噙化，五七十九劫止之。後因痰治痰，因火治火。氣虛者用人參、蜜炙黃栢、麥冬、地骨皮之類。氣實者因服參著過多而喘者，用三拗湯。喘甚者，須用阿膠。若久病氣虛而發喘者，宜阿膠、人參、五味補之。新病氣實而喘者，宜桑白皮、苦葶、薤瀉之。凡喘正發時，無痰將愈時，却吐痰者，乃痰于正發之時閉塞不通，故喘甚。當于其時開其痰路，則

司方玉函 卷之六

三

喘易安也。宜桔梗湯及枳殼、瓜蒌實、杏仁、蘇葉、前胡等，引出其痰，候痰出喘退，却調其虛實。虛者補以參、著、歸、朮、實者瀉以沉香、滾痰丸之類是也。肺虛則少氣而喘，經曰秋肱者肺也。秋肱不及則喘，呼吸少氣而咳，上氣見血，下聞病音，治則人參、五味、門冬之屬是也。肺痺，肺積則久喘而不已，經云滯氣喘息痺聚在肺。又云肺痺者煩滿喘而嘔，是肺痺而喘治法。

司方玉函 卷之六

四

或表之或吐之使氣宣通而愈也

難經云肺之積名息貫在右脇下如杯久不已令人喘咳發肺癆治法則息貫丸是也

胃喘則身熱而煩經云胃為氣逆又云犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六腑入六腑則身熱不得卧上為喘呼又云陽明厥則喘而哕哕則惡入或喘而死者或喘而生者何也厥逆連臟則死連經則生是也啟玄子註曰哕謂熱內鬱而煩凡此胃喘治法加減白虎湯之類是也

腎喘則嘔咳經云少陰所謂嘔咳上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故咳上氣喘也東垣治以瀉白散是也

凡喘不得卧其脉浮按之虛而瀦者為陰虛去死不遠慎勿下之下之必死宜四物加童便竹瀝青黛門冬五味枳殼蘇葉服之

東垣曰病機云諸痰喘嘔皆屬於上辨云傷寒家論喘嘔以為火熱者是明有餘之邪中于外寒變而為熱心火太旺攻肺故屬於上又云膏梁

之人奉養太過及過愛小兒亦能積熱于上而為喘咳宜以甘寒之劑治之脉經又云肺盛有餘則咳嗽上氣喘渴煩心胃滿短氣皆衝脉之火行于胃中而作係在下焦非屬上也蓋雜病不足之邪起于有餘病機之邪自是標本病傳飲食勞役喜怒不節水穀之寒熱感則害人六府皆由中氣不足其膜脹腹滿咳喘嘔食皆以大甘辛熱之劑治之立已今立熱喘寒喘二方熱用人參平肺散寒用參蘇溫肺湯

三因論曰寸口陰脉實者肺實也肺必脹上氣喘逆咽中塞如嘔狀自汗皆肺實之証右寸陰脉虛者肺虛也必咽乾無津少氣不足以息喘有寒有熱有水病寒喘遇寒則發熱喘發于夏而不發于冬水病者小便澀胃膈滿悶脚微腫是也熱喘宜蛤蚧丸寒喘宜煮肺散水病宜當中分冷熱虛而冷者紫金丹實而熱者防已丸戴元禮曰有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者一喘便有痰声氣急喘者呼吸急促

而無痰聲有胃氣虛喘者擡肩擡項喘而不休
火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘太
槩胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下稠
痰喘則止稍久食已入胃反助其火痰再升上
喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者
以火濟火也葉都督患此諸醫作胃虛治之不
愈後以導水丸利五六次而安

又心法附錄曰凡此証脉滑而手足溫者生脉瀼瀼
而四肢寒者死傷寒必上氣急不得卧喉中

有声或声不出以三拗湯華蓋散九寶湯神祕
湯皆可選用 氣不調而痰鬱喘逆四磨湯或
蘇子降氣湯 若虛喘脉微色青黑四肢厥小
便多以活人書五味子湯或四磨湯

腹滿脉沉實者為裏實

羅太無治一婦年踰五十身軀肥盛因飲酒及滄
乳過腹脹喘滿声聞舍外不得安卧大小便澁
滯氣口脉大兩倍于人迎関脉沉緩而有力時
值八月霖雨不止予思霖雨之濕飲食之熱濕

熱大盛上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實實者下之故製平氣散以下之 白牽牛
二兩一牛生一半炒只取頭末一兩 青皮去 檳榔各三錢 橘紅五錢 大黃七錢

內經曰肺苦氣上逆急食苦以泄之故以白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿以為君陳皮青皮苦辛溫平散肺中滯氣為臣栝榔辛溫性沉重下痰降氣大黃苦寒瀉滯滿實故以為使
右為末每服三錢煎生姜湯一大盞調下無

時一名服減半再服喘愈只有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽再與加減瀉白散

桑白皮一兩 地骨皮 知母 橘紅 青皮去白

桔梗去芦各五錢 黃芩 炙甘草各三錢 每服五錢

水二大盞煎至一盞去渣溫服食後數服良愈華佗云盛則為喘減則為枯活人云發喘者氣有餘也凡看文字雖要會得本意盛而為喘者非肺氣盛也言肺中之火盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也言肺中之火有

餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺也瀉肺中
之火實補肺也不可不知

陰虛者補之

丹溪治一人家豐好內厚味每年到四月九月
內必發氣喘擡肩吐痰脉沉澁而細數諸醫用
平肺之藥數年不愈用人參生地黃膏和當歸
牛膝肉蓯蓉枸杞子五味子知母黃柏天門冬
玄參末為丸如梧子大每服百丸空心服以救
肺虛又用阿魏黃連山查沉香牛黃辰砂膽星

陳皮神麩糊為丸梧子大臨卧姜湯下三四十
丸以治厚味服訖復用瓊玉膏一劑繼服之而
東垣調中益氣湯加減法

如秋冬月胃脉四道為衝脉所逆并脇下少陽
脉二道而反上行病名曰厥逆其証氣上衝咽
不得息而喘息有音不得卧加吳茱萸五分或
一錢觀厥氣多少而用之如夏月有此証為
大熱也蓋此証隨四時為寒熱溫涼宜以酒黃
連黃柏知母各等分為細末熱湯丸如桐子大

每服二百丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時便以美食壓之使不得胃中停留直至下元以瀉衝脈之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛勞七損症也當用溫平甘多辛少之藥是治其本也如時見寒熱四時証也又將理不如法或酒食過多或食辛熱寒冷之物作病或居大寒大熱之處益其病當暫用大寒大熱之藥而取效此從權也不可以得效之故而久用之必致大損矣

平居則氣和行動則氣促而喘者亦衝脈之火子族兄六旬有餘素有喘症或嘔吐血痰平居時則不喘稍行動則氣促喘急以黃柏知母滋腎丸空心服七八十九其症大減此黃柏知母能泄衝脈之火者如此效也

簡易方 治肺氣喘嗽馬兜鈴二兩去殼取子秋石半兩入碗內和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味為末每一錢水一盞煎六分溫呷之以藥末含嚥津亦得

肺氣虛者宜補之

本事方治咳喘氣急以參一味為末鷄子清投新水調下一錢昔有二人同走一舍人參一不吝俱走三五里許其不吝者大喘舍者氣息自如乃人參之力也

仲景治火逆上氣咽喉不利以麥門冬湯主之止其逆而下其氣也 麥冬七升半夏升人參兩甘草二兩粳米合大棗枚右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一

許學士治一婦年五十餘素有痰嗽忽一日大喘痰出如泉身汗如油脉浮而洪似命絕之狀予適在彼速用麥門冬四錢人參二錢五味子一錢五分煎服一帖喘定汗止三帖後痰亦漸少再與前方內加瓜蒌仁一錢五分白朮當歸芍藥黃芩各一錢服二十餘帖而安此實麥冬五味人參之功也歟自汗兼腹滿脉沉實而喘者裏實宜下之

活人五味子湯

治喘促脉伏而數者

五味子錢二 人參 麥冬 杏仁 橘紅錢各二
姜三片 紅朮三枚 水煎服

喘九遇冬而發此寒包熱也解表則熱自除

枳殼炒三錢 麻黃 防風 黃芩 桔梗錢二 陳皮
木通一錢半通利九竅 紫蘇葉五

右分四帖水煎服之

又方 治寒包熱而喘必用發散 半夏 枳殼

炒 桔梗 黃芩炒 紫蘇 麻黃 杏仁 甘草
如天寒加桂枝

東垣麻黃定喘湯 小兒寒鬱喘喉中鳴腹內响

堅滿鼻流清涕脉沉急而數 麻黃 草薺

益智仁各兩分半 甘草 歸身 紅花 黃芩生

柴胡各一分 升麻 神麴各五分 吳茱萸三分 蘇木半分

全蝎 右分二服水煎微汗愈

麻黃蒼朮湯 治秋暮冬月每夜連声嗽不絕口

喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛卧而多驚

筋挛肢節痛痰吐涎沫日晚呵欠不能飲食

柴胡 羌活 蒼朮各五分 麻黃一分 防風 甘草

稍生 歸尾 黃芩各四分 炙甘草三分 五味子九分

草豆蔻六分 黃耆一錢半 右分二帖水煎稍熱

服 此二方發中外之寒

七情氣鬱宜四磨湯以解之庶下其氣而止其喘

急也 人參 枳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取七分煎一二沸放溫服

加木香枳殼為六磨湯 有苦寒者加丁香

亦可 待義云烏藥枳榔氣稍走泄但不甚

剛猛與沉香同磨作湯治胃中氣膈甚當

舟溪治一婦人發熱氣喘與解表藥汗出而定因

夜半食粥早喘再作心痞口乾 半夏 枳實

炒各三錢 黃連 白朮各二錢 木通 陳皮各一錢半 麻黃

紫蘇各一錢 炙甘草 加姜水煎服

分氣紫蘇飲 治脾胃不和酒浙惡寒氣逆喘促

五味子 桑白皮 茯苓 炙甘草 草果

大腹皮 陳皮 桔梗各等分 紫蘇減半

姜三片水煎服

東垣人參平肺散 治心火刑肺傳為肺痿咳嗽

喘嘔痰涎壅盛胃膈痞悶咽嗑不利桑皮錢一

知母分七炙甘草 地骨皮 人參分各五 茯苓

天冬分各四 青皮 陳皮分各三 五味子三十粒

如熱甚加黃芩紫蘇葉半夏各五分

參蘇溫肺湯 治形寒飲冷則傷肺喘煩心胃滿

短氣不能宣暢 人參 肉桂 甘草 木香

五味子 陳皮 半夏 白朮 桑皮 紫蘇

莖葉各二 茯苓一 每五七錢姜三片水煎服

如冬寒月每服加不去節麻黃半分

加味華蓋散 肺受風寒胃滿聲重

蘇子 陳皮 赤茯苓 桑皮 麻黃 杏仁

各二錢 甘草一 姜三片束二枚水煎服

九寶湯 欬而身熱喘急惡寒分二 麻黃 薄荷

陳皮 肉桂 紫蘇 杏仁 甘草 桑皮

大腹皮各等分 加姜葱水煎服

發時有痰吐出者宜化痰

婦人大全千緡湯 半夏七枚破四 皂角去皮

炙甘草各一 生姜如指 右用水一碗煮去半

頻服一方不用甘草但用半夏末一兩皂角
去皮絃半兩生姜七片同入紗袋中水三升
煎至一盞五分以手揉洗取清汁分作三服
連進之效

咳逆上氣時濁唾但坐而不得卧者皂莢丸主
之方在咳
嗽門

水氣凌肺者宜徹之

東垣神秘湯 治病人不得眠則喘急水氣
逆行上乘于肺得水而浮使氣不流通其脉

沉大 蘇葉 陳皮 生姜 桑皮 人參各五

錢 茯苓 木香各二 右分二帖水煎服

防己葶藶丸 治肺氣喘嗽面目浮腫小便赤澀

喘促不得卧 漢防己 木通 貝母各一 苦

葶藶炒 杏仁 右為末枣肉膏為丸梧子大桑

白皮湯下

喘咳倚息不得卧仲景小青龍湯加石膏主之

方在痰
飲門

汚血凝滯胃膈者宜治之

丹溪治卒上氣喘鳴息急欲死者，葦汁飲一升，痰蓋葦汁能去胃中惡血滯氣。

又方 治上氣咳嗽胃膈妨悶氣喘，杏仁二兩

去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煮粥食

東垣加味瀉白散 治陰氣在下陽氣在上咳嘔

喘促 桑皮一兩 青皮二兩 茯苓三錢 甘草

地骨皮七錢 陳皮 五味 人參各五錢

每五七錢入粳米百粒水煎服

清金湯 治男婦不拘遠近肺氣咳嗽上氣喘急

喉中涎声胃滿氣逆半卧不安飲食不下方在味嗽門
丹溪清金丹見味嗽門 治食積痰喘哮喘因厚味而發者

調氣化痰丸 快脾順氣化痰消食治久喘或作

或止者 半夏 南星 白礬 皂角 生

姜 右各一觔水煮南星無白點為度揀去皂

角不用將生姜切作片同半夏南星晒乾再炒

青皮去白 橘紅 蘇子炒 蘿蔔子炒另研 乾葛

杏仁法皮尖另研 神麴炒 麥芽炒 山查 香附子

右各半觔淨與前藥合和一處為細末生薑汁浸餅打糊為丸桐子大每服五七十九食後茶湯送下

飲水多者宜滲利之

仲景云病人飲水多必暴喘滿以五苓散主之

白朮散 治夏月飲冷酒生痰膈滿而喘

白朮 茯苓 黃芩 半夏各等分 每服六七錢

姜三片水煎調陳皮神麩末各一錢食後服

開提之劑

簡易方 治喘急 桔梗一兩半為末童便并

升煎取四合去渣溫服

開闔之劑

安肺散 治痰嗽不問新舊喘急氣逆

麻黃去節二兩 炙甘草二兩 御米殼去蒂炒黃四兩 右為末每

五錢水一盞入烏梅一枚煎七分溫服

人參理肺散 治喘嗽不止

麻黃去節炒黃 川歸 木香各一兩 御米殼炒兩 人參

杏仁麩炒各二兩 每服六錢水煎服

○雜方

保命集半夏丸

傷風痰作喘逆元元欲吐惡心

欬倒

半夏

一枚柳

椎黃

各三錢

右為末姜汁

浸餛餅糊為丸梧子大每服五十九姜湯下

羅太無人參半夏丸

化痰墜涎止嗽定喘或風

痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏

正頭風疼或壅頭目昏眩耳聾鼻塞咽乾胃膈

不利

人參

茯苓

南星

薄荷

各五錢

半夏

乾姜

白礬

寒水石

各一兩

蛤粉

二兩

藿香

半錢

右為末水糊為丸梧子大每服三五十九姜湯下日三服此方治久喘極効於未發時

服之若已發時用沉香滾痰丸微下之累効

孫兆視雷道矩病吐痰頃間已及下升喘咳不已

面色鬱黯精神不快兆乃與仲景葶藶大棗瀉

肺湯下服訖已覺胸中快利畧無痰唾矣

加味白虎湯治熱痰喘嗽火迫肺金

白虎湯加瓜蒌仁枳殼黃芩神効

雙玉散治火痰喘嗽痰湧如泉

寒水石 石膏 等分為末，入參湯下，三錢。

羅太無真應散 遠年喘急不能卧，百藥不効者。

白石英 四兩通明者以縮袋盛以椎猪肚下箇包之縫口煮熱取出再換猪肚一箇如前法煮三次取出藥 晒乾研極細末入后

用官局款冬花散二錢入

前末二錢再加桑白皮二寸生薑三片枣子

一枚水一盞半煎七分通口服其猪肚亦可

食只不得用醬椒醋鹽姜等調和

官局款冬散 款冬花一錢 貝母 知母 桑葉

杏仁 半夏 阿膠 甘草 麻黃 去節 四錢

為末

陳皮湯 治痰喘 橘紅半斤 明礬半兩 共炒香

炙甘草二兩 半夏二兩 姜汁 右為末 每服二錢 湯

杏蘇飲 治上氣喘嗽浮腫 杏仁半錢 蘇葉二錢

五味子 大腹皮 烏梅肉 紫苑 炙甘草

各一錢 橘紅 麻黃 去節 桑皮 阿膠 桔梗 各七分

姜三片水煎服

玉華散 咳嗽上喘清肺利膈 甜葶藶 桑皮

半夏 貝母 天冬 馬兜鈴 杏仁 紫苑



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

百合 人參 百部 甘草各七分 水煎服

定喘膏詩括 一兩麻油二兩蜜半兩生姜自然汁紫

苑麻黃及杏仁桔梗細辛斟酌入更加半夏與

人參慢火熬成黑漆臨睡之時三兩匙覺來

定喘無蹤跡

定喘 治上氣喘滿倚息不能卧 杏仁 菀仁

俱越 桑皮各一人參五錢 姜棗水煎服

二竒方 治水氣發喘方在水腫門

杏仁煎 治喘嗽 杏仁夫皮尖 胡菀肉去皮 等分研

為膏入煉蜜少許丸如彈子大每嚼一二丸
姜湯下

又方 治氣虛喘嗽極效 人參三錢 胡桃肉五枚

姜五片水煎服

又方 用胡菀肉三枚生姜三片臨卧嚼下畢飲

湯三兩呷再嚼菀姜如前即就枕勿行動甚

又方 肺熱胸滿痰嗽 瓜蒌仁研 半夏二味和

勻生姜自然汁打麵糊為丸如梧子大每服

五十九姜湯下

又方 治諸喘 麻黃分七 杏仁錢一 甘草分四 細茶八

分 石膏煨 錢半 水煎服

定喘奇方 治稠痰壅盛肺肥實而喘者

廣橘紅兩二 明礬錢五 同炒香去礬不用 半夏

一兩 杏仁一 麩炒 瓜蒌仁去油 皂角去皮絃子燒

炙甘草錢七 黃芩乾 五錢 右為末 餗餅用淡姜湯

打糊為丸 藜蘆大每食後白湯下 一錢日二

次服三五日 大便下稠痰而愈 虛弱人每

治熱嗽喘咳不已 苦葶藶另研 知母炒 貝母

各一 杏仁尖研為泥 右為末 煉蜜丸 梧子大食

後臨卧 桑白皮湯下 五七十丸

治喘嗽 貝母一兩 香附干兩半生 為末 食後茶

調下 二錢 忌鹽油煎 樽不拘 水嗽 鹹嗽並効


劫喘方 牛黃散治熱痰暴 白牽牛炒 二 大黃煨

兩 蜜水下 二錢

又方 蘿蔔子蒸 皂角燒存性 姜汁和蜜丸 梧子大

每服五十丸 白湯下

治喘 用古文錢七箇 鹽梅七箇 水一盞 同浸 二



宿每服一呷空心良久吐出惡痰而効
子和稀涎散 治痰喘氣逆下氣化痰甚速

○氣短氣促少氣

短氣而息促似喘非喘也少氣者氣以不足以言也

素問云三陽絕三陰微是為少氣方盛論怯然少氣
者是水道不行形氣消索也示從容篇言而微終日
乃復言者此奪氣也 綱目云治此少氣蓋生
脉散獨參湯之屬為愈也

一陽發病少氣善咳善泄

運氣言少氣有二 一曰火熱經云火鬱之發民
病少氣又云少陰之復少氣骨疼又云少陽之
復少氣脉痿治以諸寒是也 二曰風濕經云
太陽司天之政四之氣風濕交爭風化為雨民
病大熱少氣是也

○喘與短氣辨

成無已曰短氣者氣而不能相續者是也似喘而
非喘若有喘上衝而實非氣上衝也夫喘者張

口擡肩捶身滾肚謂之喘也氣上衝者腹裏時
時氣上衝也所謂短氣者呼吸雖數而不能相
續似喘而不搖肩似呻吟而無痛此短氣也經
所言短氣者衆實為難辨愚師莫識悞者多矣
要識短氣之真者氣急而短促謂之氣短者是
脈經曰寸口脈沉胃中短氣

生生子曰短氣少氣治法亦有異也短氣仍有虛
有實治法有補有瀉以氣則純不足也治惟有
補而已

仲景曰陽脈微而緊則為寒微則為虛微緊相
搏則為短氣 又曰胸痺氣中氣寒短氣茯苓
杏仁甘草湯主之橘枳姜湯亦主之 方見胃
痺痛門胸
痺喘息咳唾胃背痛短氣栝蒌薤白半夏湯主
之 方見胃
痺痛門夫短氣有微飲當從小便去之苓桂
朮甘湯腎氣丸亦主之 腎氣丸方
見脚氣中款花補肺湯
治咳嗽短氣 又曰短氣皆屬飲苓桂朮甘湯
是其一法也金櫃云咳逆倚息短氣不得卧其
形如腫謂之支飲又云支飲亦喘而不得卧加

短氣其脉平也。又云：膈上有留飲，其人氣短而渴，四肢歷節痛，脉沉者，有留飲。又云：肺飲不弦，但若喘，短氣其治法危急者，小青龍湯，脹滿者，厚朴大黃湯，冒眩者，苓桂朮甘湯，及澤瀉湯，不得息，葶藶大束湯，吐下不愈者，木防己湯。是之類也

東垣曰：胃滿少氣，短氣者，肺主諸氣，五臟之氣皆不足，而陽道不行也。氣短，小便利者，四君子湯，中去茯苓，加黃耆以補之。如腹中氣不轉者，加甘草一半，肺氣短促或不足者，加人參。

白芍藥中焦用，白芍藥則脾中陽升，使肝膽之邪不敢犯之。如衣薄而短氣，則添衣于無風處，居止，氣仍尚短，則以熱湯一碗薰其口鼻，則不短也。如衣厚于不通風處，居止，而氣短，則宜減衣，摩揩汗孔，令合于漫風處，居止。如久居高屋，天寒陰濕，所遏令氣短者，亦如前法。薰之，如居周密小屋，或大熱而處寒涼，氣短，則就風日，凡氣短皆宜食滋味湯飲，令胃氣調和。

仲景曰：平人無寒熱，短氣不足以息者，實也。丹溪論許

白雲先生脾疼跨痛短氣用大吐大下法是也

孫尚正元散 治氣不接續兼治滑泄及小便數

王丞相服之有效 莪朮一兩金鈴子去核二

錢半右件為末入礪砂一錢煉過研末和勻每

服二錢鹽湯或溫酒空心調服

苓桂朮甘湯 治痰飲短氣 方在痰飲門

產後喘

產後喘乃急症極危多死郭氏謂此名孤陽絕陰為難治因所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚

肺中故令喘促喉中氣急也治此症用獨參湯

為妙 陳無擇云宜大料芎歸湯 君惡露不

快散血停凝上薰于肺亦令喘急但服奪命丹

血去喘自定

血沒散 產後敗血冲心胃滿上喘命在須臾

真血竭 沒藥 等分為末每服二錢用童便

好酒煎一大沸溫調下 產時進一服上

床良久再服其惡血自循經下行更不上冲

免生百病

參蘇飲 產後血入於肺面赤發喘欲死者

人參為一兩蘇木兩二 右以水二碗將蘇木煎至

下碗去渣調人參末隨時加減服神効

若因憂怒性氣抑鬱而發喘者以小調經散用桑

皮杏仁煎湯調服

旋覆花湯 產後傷風寒咳喘嗽痰涎壅盛坐卧

不寧 旋覆花 赤芍藥 荆芥穗 半夏麩

五味子 麻黃 茯苓 杏仁 甘草 前胡

各等分 姜五片東二枚水煎服

婦孕時足腫七月初旬產後二日洗浴即氣喘

但坐不得卧者五個月惡風得煖稍寬兩關脉

動尺寸皆虛百藥不効牡丹皮杏仁桂枝茯苓

乾姜枳實厚朴桑皮紫蘇五味瓜蒌仁煎湯服

之即寬二三服得卧其痰如失蓋作汚血感寒

治之也

若傷臑冷飲食而喘者宜見睨丸 姜黃 三稜

華澄茄 陳皮 良姜 人參 莪朮 右等

分為末蘿蔔水煮爛研細將汁煮麵糊為丸

梧子大蘿蔔子湯下

小調經散 產後四肢浮腫者敗血循經流入四肢浮留日久腐爛如水故令四肢腫面色黃宜服此血行腫消則愈 沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸 錢各一 細辛 射香 各五分 右為末每服五分姜汁酒調服之

哮喘

丹溪曰哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐不用涼藥須常帶表散此寒包熱也亦有虛而吐者

哮喘遇冷則發者有二

其一屬中外皆寒者治法乃東垣參蘇溫肺湯調中益氣加吳茱萸湯及紫金丹劫寒痰者是也 紫金丹即砒霜猪肉煨為末蒸餅丸者 其二屬寒包熱治法乃仲景越未寒之時先用大承氣湯下其熱至冬寒時無熱可包哮喘自不發是也

食積痰壅哮喘咳嗽清金丹遇厚味發者用之

蘿蔔子

淘淨蒸熟晒乾為末一兩

猪牙皂角

燒存性三錢

用生姜

汁浸蒸餅丸如小葶藶大每服三五丸

下_ス 劫喘以姜汁煉蜜如梧子大每服七八
十九噲下止之

遠年近日哮喘痰嗽

蟬退_{足去}

輕粉_{研另}

馬兜

鈴_{各一} 五靈脂_生

雄黃_生

杏仁_{去皮}

砒_{各生}

錢_五 淡荳豉_{九四十}

右為末用生薑葶藶自然汁

合輕粉諸藥為丸小彈子大每服下丸細嚼

臨睡_三 生薑湯下

治_ス 齁嗽

蘇子_{錢二}

麻黃_{去節} 欵花

桑葉_炭

半夏_各

杏仁_{去皮}

甘草_{錢半}

白果_{二十一}

去衣炒黃

色水三鐘不用姜煎二鐘徐_ニ頻服_ス

一方_{治全} 用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入

口內服_之 口中橫咬竹管一個片時間則涎自

口鼻中流出如綿當白立愈二次絕根

治_ス 水咻

芫花_{末為}

大水上浮淳_過

大米粉

右三味搜為糲清水煮熟恣意食之

又方 青皮_{一枚} 半開者入芭荳一粒鐵線縛定燒

存性為末姜汁并酒各一呷同調服過口_{定便}

定喘湯

白菓_{二十一}

切碎炒黃色

麻黃

欵冬花



桑皮炙

法製半夏

如無以甘草湯泡七次去皮用各三錢

甘草

蘇子錢二杏仁半錢

黃芩錢半

右用

水三鍾煎

二鍾分二服不用姜不拘時徐服

詩曰 諸病原來有藥方 惟愁齆喘最難當

麻黃桑杏尋蘇子 白菓冬花更又良 甘草

黃芩同半夏 水煎百沸不須姜 病人遇此

仙舟藥 服後方知定喘湯 金陵有一浦舍

用此方專治齆疾無不取效此其真方也

壓掌散 治男婦哮喘痰嗽 麻黃去節二錢半 炙甘

草錢二 白菓五箇打碎 水煎臨卧服

二黃九濟生方

治停痰在胃喘息不通呼吸欲

絕絕 好雌黃錢一 雄黃兩一 研極細末熔黃蠟為丸

彈子大每服一丸於半夜時煮糯米粥乘熱

以藥投入粥內攪轉和粥吃

善悲

內經云在臟為肺在志為悲又云精氣并于肺則

悲是也

肺虛補母仲景云婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神

